

Indian Botanic Garden library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO.....
BOOK NO..... *RAI-8*

ACC. NO. *B-8703*



m

V/'•/•:,*

JOANNISRAII

Societatis Regiae Socii

•Historiae Plantarum *m*

TOMUS SECUNDUS.

CUM

DUPLICI INDICE.

Genera *H* Altero

Nominum & Synonymorum praeipueorum-^

ALTERO

Affectionum & Remediorum:

ACCESSIT

NOMENCLATOR BOTANICUS
Anglo-Latinus.



LONDINI:

Ingeni. SAMUELIS SMITH & BENJAMINI WALFORD Regiae Societatis
Typographorum, ad Insignia Principis in Caemeterio D. Pauli. MDCXCIII.

PRIFATIO;

Quamvis initio factis operis profectus fuerim quod turn sufficere arlitrabar, nonnulla tamen ab ejus editione quod Lethrem monitum oportuit a me omnia antmadverto, alia interea temporis J« ad finitiam illustrandam, augendam aut etiam emendandam pertinent, vel ab extens prod/ra, vel ab amicis communicationtm, nee permittui ut Tomus hic secundus acephalos prodeat, qui aliis id non requisisset, cum eisdem velut carportis medietas fit, non aliam ob causam bipartite, quam ne si in tnuifH vohmen tempingretur^ nimis id spijum minufqut trailabite ejjet.

Prime ergo novitrit lxlor, me omnes de nomenclaturis eoncer tat tints fludio declina~ffe, rec valde folicitum aut indujirhtn faife in txquirende quo qu£que Plants nomine Veteribus diceretur, cum in multis ob not as adfcriptas, paucas Mat, generates, & T flunbus fpeeielus communes, Mud certb definiri nequmt, in aliis eontreverfis id tentare maj ens ejjet opera quam fruHns, eimijue ab aliis me Ungi dcHionbus in hue paltrflra jamdudum abunde deertatum fuerit, nee onit<f«*m fere Jne*il*m rejier f**J mm diilum priits, aporitt autem ut Cenfrorerfiarum etiam aliquis modus Jit. Hinc nomina retepta & tHmturm* ufq approbata ubique retbui? nee temere folicitanda aut loeomovenda duxi tjua initio fortajfi injra impo(ita fuerbt, ne prtcferrpthis jure nobifcum experiantur.

Dtinde citm nomnum non minis quam rerum nen neceffariam multiplicathntm oder'm, in its etiam jpeciebus qitas i genere ad genus tranjluli perfaife nsm'na antiqua, novis nullit impositis, reliqui; bine ut nexnullit fctaffe videar^ multiplicandi mettt a neceffaria etiam ot>oftg.\$Fmaf abjlinuijfe, & T illorum tmtui me aggregate qui dum viram vitia in concr.uu currunt. ludicis tamen (g exoticis nQmimbus qua auribuj Europtis duriora (\$ abfona pojfnt videri, lemnata feu titulos defcriptorios aliquoties adject, quod Lellori nee inutile nee ingratum futurum fpero.

Proximo in loco monere eonvenit, me non pro ntis vettditart omni quibus AttToris *v-men adferiptum "von eft: Mud enim in mtthti incurd ant feftinationc omiffum {£ fentio (\$ doleo: imprimis Jo. Bauhini, i cujus Hifhria plurima mutuatus fum eo non laudato; quod lie palam & ingenuè agnofco; ne quit ob fcripta alena clam (urrepta gravem mihi plagii dicam meriio impingat. In mutualit its ip/a Autorum verba jcrupulos'e fervavi 5 non tantum mihi in alt or urn fcripta I ice re rat us ut ea immutarem; veritus infuper ne fit id facer em, {ut rji prclivii in errorem lapfus) fenfam eorumperem, novdmqne (\$ ab Autoris mente, forth etiam veritate, alienam male intelUHis fententum ajjingerem, {£ Leflori obruderem,

PorrOy In fruluum exotkerum, quorum ingens nwmtrus a Ouolo Clufio, Jo. Buulno, Jo. deL<icc Ol,io Wonnio alti/que defcribuntit, Hijloria, me plane, peregrinum ejje, (it xlul in Sylva yitadam aut Labyrintho verfari jateor, unde nulla indu/trii memet expedire pojfum, finyitdfyke Jpeies ad fua genera reduare. Jfgmin* in Ut ordinandis C Bluliini fotms methodum, qnamvis mon mints accuratam, fequt mtlui qufm in nova (\$ ctmmodiore hnxjligandame fritfra f/tfgare. Alrat a Bsuliino non tradittas, nulh ftri ordine fervato, prcut jffe obtulerunt exbiui, minimi dubitans quirt nonnul^ arborum in Ilrflona deferiptarum fruilta fint, alii fub diverfis nomimbus tit time *)*etiti. Sui in magnis Emporiis degxnt, tpjdsque frultu a na^ii redimendi opportunism babnt, quibitfque eurioftrum Mitjed ejujmodi eimeliis refera patent, eo'jqne eoram jjtfpkere, invicem conferre, (ft furwi examinare conceditttr, facile d/fceruent qui'quarto* .Tberum Jruilus fint, quotit ob nominum var'tetatem & defcriptiones imptreflas iidem iitm fat pro diverfis fallant: emntumqne convenientiis i\$ dtffrentiit adnotatis^ fuis fintuhs loch difponent & i* ordinem reducent.

Tandem, ne quid difsimulem, dum fchedas à prelo tranfmiffas ad exames revoco, ab Operis Typographicis fapius, à meipfo aliquoties, & pluries equidem quam vellem, erratum depredgdo. Nec tamen miram in tam lauro opere homini veterata diuturni labori, tadio fomnum quandoque obrepfi/c, inque tanta (ejliujt/one prtptti talamo mult* utique exo. fitfe, (hx in ribki ipfa Errata obfervavi tn Appendix emcni'ia repentis, qum verbis & fyntaxi inter TOe*&<K>f* Typographic^ Qninimo prtter bujufmodi ^sX/^ me obfervata, in difpofuione jpraerum jsptin erratum vereor, dm mulras mthi npndum videre eontigit, qudfue dim vidi non fim eurioit eotitemplatus, ut notat tenerum chartflerilicas ineljigare (ncc enim jam turn de Jfillona PUntarum condnda per fomn* quidem cogitabam.) In altariim autem defcriptionibus partes practpme tx quibui

P R I E F A T O .

defumitU Cunt, ~~cas~~ ~~fillu~~ & ~~fr~~ ~~ymt~~ ~~WFW~~ ne Alices & lOnctpUatU non ra-
j>.ti,r; **tmde** in bis conjeUuras probabiks **feqm** ~~cas~~ ~~ous~~ ~~fum~~ quodqite fufpk'abar po-
qium quod compertum habebam.

MirA-cris forUj/e, LtSor, Append icem in taut am molm extrtviffc : lilud autem dmbos
potijfimim dt CAUJIS acridity qiuurum prtma oblivio a- t>fif.intia nojira. Citm enim ut
Opus hot corfirdnarem, Hijtorias Plant.trum evolveran, multifout imbi fpedes lods alie-
r.is ~~dispositas~~ ittvemirm, tifque idencf different & i» pT~~em~~ ommittercm, nee tame* me-
j?fort£ vimium Jijiu, &ig«avr£ libenter imdmfgemt, «lJhJiaie excrrperem, # in Mir
~~diligent~~, .dnotutas n-javarem, ^m ad hca. vtntum ejjet quibxs mjeri deUrtwt, ememo-
r.afaaU ehpU& per cbhytomm omifa funt. Alter* Appends auQ~~£~~ cavfa fare *<*>&
nmlU medum dejmpU PUuU pofi Tomum primam & feetindi ttUm macaw parttm ab-
joluUm O- imprefw evnlgaU, turn *b aliis, turn pr*«puh h Ceteberrimo viro & rei Her-
banx lun^ periOJjitno D. Paulo Hernunno in Acadtmia Lugduno-Batava Med,an* &
Botawes ProjeJlore, in Caulogo fiiirpim Horti Mtdni illius ActdcmU. Horum auidem
pars magna m bortis area Londinum colitur. At nobis ob rationes hk wn dkcndjs
Londinum adire vd mn luuit, vel non pUmt. Q*i» ft ,d liemffit, cum Catatogi max
landau edition* proptdkm cxptQarem, fatius dnxijjem Mori meo parcere, quumiu de
firi iendu wutilemoperamxavare j ffquidem accnntionspUmvrefque earum bijierUs quh,*
(go poffem textre me wibt inventurumconfiderem^ cum ego fimct tantutH & brevi ttm-
porisjpatio i'tfdem inUrcfje potwrim, D. Mtcn Hermannus ftmper & yg liul »fkfw^
iwif 6K W yii, £ axKs^w^i <c •^wfWcwt. Plwrimat ctri ertulitittiaHt hu:c Viro gra-
tia/ dtbcmuSj iutit eb ea qu* y*m prxfirtit in Opere prxdio r/Hper cdito, turn oh at qtt£
pot In >t us tji in Mufro Ztylanico brevi cdendo. Hie cum tnmadverteret ntultos lucro
tut enter mgotiandi i*iHtA magnis qmtannis dajfibus India m Oriental em adnavigare ne.
mktan ad id habtkw & idomstm Plantarum indagandarum & ffifioris Naturalit promo-
vend* jludio illitc prufjd^ qva?uvis regio iftg, cxh foloque fiiirpiutn generations propitio
WKumtrdt fri fpecies £facuitditfmo fuo fum effunderet^ novas, raras, facie & i) iibu
admirandas, ipje ad epus fe auinxit, fpretifyue m.ignanimiter Um ionginqui itineris dif-
fcult.tt:bui & perhHhi, per immenfum <eqnor in hidiajn contendit, ibitkmqne aliquot in-
tfos fubfijhvs &- inflitHtittm pertinadter urgent qu£ ad Hijloriam Naturahj pertinent
(uricse rimatut eji, tandimque Orientis divitiii onuftus in Europam rediit.

At neqw, citm iti hoc fumm, reticendus LUitjirijftmm Vir & immertali ~~jama dignus,~~
D. Henricus van Rheede, van Draakenftein, qui reius pace bdloqne per ludtam ~~Orien-~~
idem geflor d.trus hoc fibi ad laudem non fuffiare arbitrbatur; verim imenli c* ~~do Ci-~~
q-u> Htjioris. Botanic* iltufirandx & amplijicandx %do jligrans, in ftirplbus per ~~totum~~
Btanu* hUUBartcuKt jTjffientibus conquirendis, defcribendis^ ddinenulii ntdlis fat ~~varibus,~~
vulhs fuTHptibus peperdt, ut bunt benefido icottas non tantum omnium qtwixtint ~~pulcher-~~
rimas babcamus, Jed etiam dejiripiones non minus accurate & fnkhl plurttu- ti ~~reici-~~
inlucem prdatas, qth» c~~so~~ per univrsfam Indiam fpentt oriri unquam credidi/L

HisddjuKgereliccat &terfmm, nonminorisinBotankisnominu^- fams £> I ~~banifter,~~
qui in India quam vecant Ocddentati idemjladium decurrit, & Vjrginue Ui ~~nunc de-~~
git, Ifjloriant NituraUm meditatut. Nemo certe haUenus ex nojira g'ente ~~Botanices~~
omnmuc htcratur* genre ci (tmilis utt fcawdus in Nomtm ~~Orbem~~ **ttdtm** ~~intulit,~~
nemo omnibus reqntyta ad takm Hijloriam confribendam paratior ~~acceffa.~~

forum indijirij hdis ntri tfque montes, filv*, valUr, litora **cat** ~~opi, prata,~~ viridarU
perlufirata, eorumque Jirpcs v **jhu** & alumnt oculis nofiris expohx. ~~Hinc ut~~ **1** ~~icamus*~~
Indiam ab Enropa non minu* > atari quam loco diftare. ejnfque retioms ven ~~um antopera~~
4 tiofirate abhdere, ut ftiquu k w illue per quietem tranferretur, experreffus ~~vix crederet~~
Jt vigtlarc, **adei** vmmu novu, nfolita, admiranda *biqnc oculis ocenrrerm • ~~ut verbi gr.~~
Arbonwi vonnullarum j),.pem.a procritas, altijjmarum Europatrtm duph'tri ~~pluve, ut qua~~
trecentes pales ad~~q~~ ~~ikt~~ vel etiam fnperet \$ aliarum enormis craUUks ~~ut e~~
veljexduivt homwum ampkatnthm nlr.*s t xenjas impUant • Thms foli ~~in cana longi-~~
Utdwem exteitju O^ htittulinem f*fa~~3~~ < * fi- ~~l- -i. L- -i.~~ ~~monstrandis & a-~~
vi,t protegetidis fujjuiant: Illius Heri durities ferri emula, nec gravitas valido infer r.
Quid m- Silius quam arbortm cernere, qua cum per triginta quinque aut quadraginta an-
no* que fructum, novae florem protulit, tum demum novam velat arborem e vertice ~~altiffima quadam~~
n ttat, & diir.de folia omwv CXHCHS, veliit, ~~sublime elata~~
-A<^©. r/? , *l reliqu* Palate) ereUa. & i, ~~natura enim ipse~~
oor paidatim comam explicet, ~~ramofque & furculos numer,~~ \$£"*** donee nev* ~~bac*~~
incredibili floru & i'ljqe ~~succulentium fructuum multitudine~~ ~~tot quagnaversum~~
ferdttvis tmer ~~ipfa~~ rudicitvs intriu ~~stet, quibus ad~~ *****

P R A E F A T I O.

Quis crederet hi HUM pravintsa iV \AdA., clique non admodum vajlj, trteentdt arborum & fr*imm species spontantt irthemri ? e^ tamen plures adhuc dart verifmile est, §>iis tot ufpiant Urrdritfis hzrbas ffuXicefcetes & liguojas prove/iirc fptravcrh tjuot in Indus obftrvat£ fucrint ? l'ix ulfam certe berb&rttm gems tji in quo non dcutur f litres tiHJHpuodi fpteks.

Si cuiquJM Enrofao per jlvds iter facietiti arbores qu&dar>: in eonfpeUum venimrt cor- tkttm fttoritm mtemoUu hctnthim {fkndore, tarn cUro ut viit illxjirandis ji/fficeret & ad <wn Jitcr£ L%oi pejjint, rjiicm non jltipore percelUret turn iufokns jptiitttiltm ? & tamett hujufmodi in Amtriea rtperiri idoneot ttjles hubenuts ItlujirilJiniHm Domitmm D, Joannem ComiUm de Gubery J.:rmy«e Infule npper Prortgem, Regi£ Socieiatu mine Prxfidem im[Tmu>n\ & D. Thorn am Traphatn M. D. in infula },tmdit~la mtdicindm fciemHm. Illud inftprr fngtilarc, India prop)mm, & miraculo itffine, Arbores nonnulhs, info non Flcij ibidem crefctre, qM citntjivrcrc imipiunt jolu w-nia umittmt, atqae interim dum jioient ttud£ iifqtie vidu£ manent, novis tandem deexffo fore und cum fruSu immptnt'tbrn; Forte ne fiuloret radii qitibns illujlrjn vejixttt jlores fotiomu objcSit tntericyrcntur'-, forh elidm fil florei ornaius quo fuptrbitvt arbores ojientttioni folia ojficrcnt) ejii/qxc parte all- qua occult;iti impedirent ne adjartiim nidi tarn pukhri%jpe3acnli inUgra vvluptdtc fruc- rentar.

g^nis j*m credent in mediis Indiis Enropans rtperiri ? in regione fervida, qn£ nihil ferè cum temperatoribis commune prœducit, jr/gidioris tti<im emit potimibus ptantis aticibti locum ejfe f" Hmj*t tamn rri fdtm nobis fiat infems p*r*\$rim*ier D. Bernier. Ctm cnim hi terris ntdgno MogOrum Imperatori fubjclh iter fdcicns mantes ttxttfos trj*jien- deret, i Lttere mtridiem jpedanle, PMm£, Piper, Artmdimi facebar'tna, breviter Indica. & Exotica omrsias Veritm pojł fix feptemw horarum itcr, cammine fuperato cum ex ad- vcrfo Uterc defeendcret, ttct novu rtmn fciens, & velnt momenta temporis in EuropJM travjUtu; fitiffet, Quercus, Ulmi, i'1;»*1, Hj^FWi Mdjordnd, Rojmarinvs, nee ulis quam tiojiro Orbis quadrnti familiares jlrpfis confpickndt.

Std ut e divrticido in vidnt redeam, non illuftrat£ tAntum pr*di3orum operU Indit, fed & in E'tropam quadnlenm trj>Jltt£ font, ut fit in *)>ortji nojirii (xUioribus ob,imbu- Us; te in ipjis bidiantm viriddriis Jpatiari crtdercs, tot ubiqc Indica <jr- Exotica cailis obverfdnttr.

Horum denique blfquc fnilitm per Europant pUntas tMdagsntium & eohnthm, D. Pauli Bocconi. D. Jacobi Breynii, D. Pttri Magnoli, I). Jofepbi Tournefortii, quoi honoris cavtJ tiomino, indefej/h jldiiij & Ubonbus BoUnices icientia^ qu£ a Clufit ^ Bauhinorum temporibm pauUtim ctanguit, rcjufeitda est, miro'fque intr* bos viginti amtos proximè ebpfos frtgrcfjus fecit, hgiltnt fcilket feculi noftri Botanic^ mt m*jo- rum inventis content's ad ulteriord trndunt, me altos ftbi inquisitionum ttrmincs ci" colum* •tids fitpitt quàm quas natura terris fixit, univerfhm erbem cur it juts complex t.

TJnum adhuc in excffationem rjir*mpf efandum Jpfteti, ttimintm PUnUs mult ASqqua- ruis nomUM, in Citafogo Horti Regii Piriftenfis aliifqw cxtndt u me ontijds, quod jtil- pigcret tot iuuda nomina vet patten Epithet is antf.i, nntlis additis dtfriptwmbus jtt figuris. Jfijiori* injerere, ckm mihi non. ctjnlrtt, annon earum aJ/qn* jub uliis nominibm jam cdiU & dcfcripU fuiffnt) alt£ jam defcrtyl<rum varictatt/ potiis qtttdm miam ttov£ species cifent.

At nec ante finicndum quàm, prater initio laudato, eorum qui Tomo huic fecundo sym- holxs fuas contulerunt honorifica mentio facta fuerit. Pj autem funt 1. Illuftris Vir D. Gulielmus Courtine Medus Templi Londinensis Arnicer. 2. Praclarus Vir, & in jir- ripum cogitiione mdli fecundus^ D. Leonardus PlukewTt, ^ £). j. fj, Sjmuel Doodf, & 4. D. Jacobus Pcttivr, Phjrni.tcoptri'LonAmcnfa, Jtt.vicci apprinsgnari. H*r>»»* frequats mentio tuns m IJifiori>t, ttit>» w Appendste, quidq*ijqut eontnbucrit LdJorn* cer- tiortm fn'et.

His adds tpuumrtJ initio diiluit, non tdmtn (me ingnttitudit.ii not.t itt pnt cpais rai- ndHut doftifpmwB& «meiſimtm l'mnt D-Tancredum IVobinfoli M. D- <-*w perpttuk - crtttdilji inditjlrj, rjnat/t mht jr totumtompUtionii & cditioms turn pnmi turn Jtitndi V HMintis dtcHrjttm knevoli commodavit^ HtjiJrij nofira muhu & fptatbnt r>^hferv*- tionibus aufior, & min'dis repurg^tivr quaw dbftitc to fuiffnt, fredtttrr fi.

Scd & inumerjfo AnQerum alteri lomo prtmijj.t, imp<r>t3* cum fit, tornm adjectivc fapptcKctd venit qtti a nobis per oblivionem Mjfc munuW ftripu poji id temPMJ cd&t, vrf nobis jilteta tr.iditd fiat, Prim* in hco CLtriJ. firi D Chriftophori Meuret, *^ vis & jeitntia grdfis, dc Proffjiottc jit.i deque Reptb. Hot anted of time merit t: fi tMJts Pintct rtrmm n&turdittm Britannicarum, AnnutMtombus in Antonii Ncin .-irtvvi i>itr<t' riam, atijque feriptis non pMcd in irbjioridm no]trj/i trjnjinli.

P R Æ F A T I a

Dtnde D. Pauli Hermanni, de quo jura, | CKJ) Ca(tlogo fiantarum Horti Academic' Lugduno-Batavi Appmdic'is magnam partem ntutu^ (us fi«».

fum JoannisBapnftarTriumfctti, iayvs Ohfervationilui DeOrtu & Vegttat'one Phnte-riirn aliquammultas novarum Plantartm defiriptioxes fitmptas Appendici infant.

Fofl Jo. Commclini, cujusCatalogum Plantantm hidigcnarum Hollands fJ/tum Ait. 1684. in 12. vidimus, & ex eo fpecies nonnulli in flijhriam nojlrarn tranfiripfimus. Idem Horti Mtlabarhi Tom. x, 3, 4, 5> & • natis adauxit & commsittariit ilhjrtnit, Utm Traftittm de ctthura Limowtn & Aura»tiorn> & emifit in 8.

Tundtm Riuii Ammaoni, eu/us CkaraSer plamarum naturalii Francofurti 1684. impref- fus netis & difcriptimibui netnullit liftonam uoflram auxit.

Bjus Hortni Uolianus 1687. editus ad manus mflras nondum pervenit.

Deniqut p. Rochcfortii, cujm Hilloirc nacuretle des Antilles uos Jthiterts aznofcimHs.

ffe minus Mauritii Hofmanni Catalogo Ffontarum Herti Medici Akdorffini, & Cata- log? plii/ttarii* circi Altdorffium nafctntium.

Item Jacobi Su[hcr]andi Horto Edinburgenfi.

Atque nee emittendj Robcrti icones foi Parifiis. Ucqtte D. Rob. Plot Htfloria natura- lis territorii Oxonicnfis edit. Ap. 1677. & Scaffbrdicniis An. 1686. fti. e quarum pane ea qute de pUntit agit hifleriam mflram htupletaximts.

Joan. Baptiftx Ferrarii Hefperidtt, five de Malornm Axranthrum, Citriorum & Limonum rarietiitibus, culture & afu, fol. Roma;. 1646.

Joan. Eufcbii Nicrcmbergii Hijioria Nature. Antwerp./W. 1635.

Joan, de Lace Hijioria India Ot*i<k*talis. fol

M*jLum Olai Wotmii. fol.

AJuJknm Rtgil Societatis Lcmdinenfis. fol.

His addi pffiiint libri mnnulli Eotanici qtos nolis nondum videre conthit nim' m*

Hyacinttu Ambrofini Pbynologi* partis prim<c Tomtit primut.

Mkh.Boym, S.J. Ftcra Sinenfit Vienna 16J<S. fol.

Francifci Stegrbcek Citri cultura. Ejitjdem Thtatrurn Fuazorum 4.

Georxi Turrc Hifloria PUmfrmt fol. Patav. 1684. Hie liter ag-tt folummodo A. f. I Ut'tbm (if virifas flmtarum e Thcophrafto, Diofcoride & Galcno

PoflOptiahfelMtum&typisimprtfKmliterasaccepi * Botanko non imtlelri D Tho T f in Wcftmorlandia degente. qulus Cauhgum mflrmt rLntarnm i ft o&Urvarjr SeptennonatibHS Anglix ffonte vofcextum, quartm nennull* nov* (ET nondum JZ a nabti in Catalogo Anglitanarum prfcterix (£> biditU.

Primi generis font

1. Cerasus fylveftris fructu minimo cordiformi, The leaft wild Heart Cherry-tree, Ru- fticis Ceftrienfibus, The Wherry-tree, cujus in Phytologia Britannica mentio. Hanc circa Buriam & Mancunium Lancaftria oppida, & alicubi etiam in Weftmorlandia inveniri fcribit D. Lawfen; circa Stockportum & alibi in Ceftria D.Stanhofe, qui hanc rorum Cluf, a nomine Wherry-tree conjocaretur, ni color fructus dil- rico niger efl, obfaret. Verum farrat D. Stanhofe; Clufius enim grum non attribuit fed rubrum; D Cerafo autem fimolicher dicto impedit quo min

2. C n a manna folid ar^ulofo parvo, in Wthq vU)R5 r«w I«w#riie »(»» Huic nullj qW exur raihi falrem vila ,tcque icon, ncque defenptio rcfiwndct

n.L Hu,c fpcacm pro TMICMK Gennii hanatodis vU)kar,s ,n Hiftona Z ^f h f prove- mine, aobfcrvatione pbne in horto oiler mcliuiedoai, dtverfun S ^ ^ms, at S S g « q M m cciamcutcarTM, fed* paTOCft f c humilitate, aliifque accide.

4. ilmnyconvallium Anguftifolium, ad pontem Hftaf«iin Wt(tm»MiU

5. H...aciuni macrocaulon hirlutum foLo rotund.ori • prope 5 S r S r •

Secundi generis fimt

1. Granwn fpartcum montanum flica foliacea graminea m m (M « monrium verucibus copiofe nafcens obfcrvatum, quavis in fummis altiffimo- nem omilium. Catalogo per oblivio-

a, Luitria minor ramofa.

- 3
3. *Ltinaria minor* foliis diffaSts, utr. jūM *S^hickl*, »*Jia tnajtri* in *Wtfimvrlmdia*.
4. PJJOU Alfinis fiore Brafiliaaa, pi ipe *ŷtshur%oum oppidum* in *ClevelmJia*.
5. Sambticus foliis Udoiatis prope *M[^]tamm Ltmtajhi** in fepibus.
6. Scabio(a pratefnis minor Hnre carneo *Tark*. in *Wiftmorlandia*.
7. Sorbes fylvefris Anglict <ñijlijfij toilb ^>Ctbilf, <njef^^pplc, ^t<<©«Icrjtf. Anerit *Ferkiájuxiti* eam in *Witbtrjloke Vfrk* Iponce nafci. Viirum arbor co loci hoc nomine vdgo diita Aria tfl Thcophralii.
8. VIOL1 folio Traehelii D. Merrtt.
9. Violn pakifirisriDtunitifolia D. *Fiat* Hift. nat OIKOK.
- ro. *Geranium columbinuni maximum* fbl.dil'Eettisf/ii/i/flw, quorum dcfcRIPTIONcs in Hiftoria no- ftra cshikiimusj ut &
- 1 r. Ailiatiti tohU biiidis vel triHdis.
12. *Helleborinc minor alba* *VarL JVijt morUnJ*.

Hit adde Varittates quantndam Tl&ntarum injt gnes, v. g.

1. *Carduus monftrofiis* Imprati.
4. *CotuJa non f renda flore* plcno *IVestmvert*.
- J. *Gentianelk flore laAeo \bul*.
4. *Gcianiumbacrachioidecsnore* deganter variegato, *I/mM Dtr-Tark fy ThonikiHiii J&tjtmerlttuL*

ER-

*Jdonmi, jub quo nomine imp/tcfentiarm & Fruticcs compkiHmur,
Tabula (jcmralis.*

Arborcs funt vel CautUce

Simpfai, nan rmi(t, fwisuijw & funv'n'if Tlicophraflo, qur etiam «MSXA*W/ did poffunt, ea-
rum pler-que & jariChimi hoc eft, uiucam citnum Una vice in iitnmo faftigio gemmam
nuximam pioJujJiwci, iintqiw vcl folio*

*KArundincto feu trim, InK eft, ftn.it--> fie nervofbi nervis fecundum longitudinem productis,
< floretripctalo, & pi-azque et ;im Spathiferar; P»I, JIA, lib. XXIV.
^/jajc, n<-T-isi media coJla vcl a pctJiculo ad Jatcr.i exairrenubus, fcti*

*\Grntmfctfiont fubrotundo H. in Ucinias kcto ; PBPO ARBOKESCES'S, FMMH SC
J. Ibidem.
Longifimo & maximo j caudicc annuo; Mu s A. Ibidem.*

.Ramofe ; I Ix autcm funt vcl fru&u

*'XA fiore fjt*H&6 fiu rfwvd; qua; vcl*

*Nucifera; Nuclei item voco fr&us majores putamine duriore nucleum claudentes,
coque vel*

*{Ojfo & fra
{Cariaes & mct/wrr,extJniis vcl*

AVELLANA. Lib. XXV. Sect. 1.

*{ Tigmmtuo td'natu unJi-itu trichfo JCAJTASEA & FA GUI. Lib.XXV, SeAi.
C*/; « icu ta^tU excepto, (iipenore rare nuda; Q_UEKQ S & ILEX. Har
Gluidiferje dicuntur. Db.XXV.Sect. '.*

4

*Conf, Conos voco fiiiSws fquammos dura & Hoax, polyfper, in coii icu
maxformum pkrumque turbuvtos: Hoc ctumnomine compi chendo fructus pluri-
bus partibui cruftjccii att li^nlts per lurmontam coaptacis & maturiure JeJufcenti-
busconlt-tntCj, quamvis Conoido non **Cat:** vide TabuUm iwjucnteni- Lib. XX.V.
Sea. :.*

*Laufer, quarum Scmina Limigine invotvuntur cifve Ltnugo jtlJu-rect; ut S A L I X 8C
PUMIS. Lib. XXV. Sect. +*

Vuolk niaiibranceis aut niembranis ai^iii femina cUudentC; B i T " - u i j c l n -
L **fma.** Lib. XXV. SeA. j .*

Fieri contiguo, qua: vcl

*{ Florc (m&uxt rur A ato, feuct pluribus in unum coeuntiui compofito, ut licut,
6cc L^ AXVE. Part. I.
{ Florc iimpliti, nec i' pluribus Hofcoli* confecto: in quibus FIOJ vcl*

*'Summo fT*a*t mfiJtt, node fruauiacalyce Sorts plennqvc refiduo vclut umbilicatu
eft, qui vcl*

*flTuniidus; pericarpio (cu pulpi huniuli S/miu vcl univcria Jimul, vcl tingda
icorfim ambiente, cltqvc vel*

{ Major,

*{ Polypyrreus feuplures miclcostomincns. Arbores autem quifinodi f_n-
ftu donate l'otii n, n. AL umt'ic*t^ nobu dicuntur, *R- Plfam,
M A L u s, &c lib. XXVI 'irt. a, ScA. a.
{ M. mffTixui, feu umcum nucleum tlauden*; CUIUK«IOII truAum pro-
ducunt Indies nonnolk arbores, quz eximic Pnmftrm nmbthemx
dtei poi7iint. Lib. XXVh l>an.i.Sc ct. 2.*

*{ Minor, qui itidem vcl Pp?rpjrm*i, vel HWffrw"; Horum omn um' gares
produdnces arbore Bd«iftr*.*m *mtitic*un*M nuniinc cotnproHbm-
mm, i Lib. XXVI. Part. 2. ScA. a.*

{ Sicut, ut in Prpert 7«v«tri Sc Ctrjepfytlo tmntucv Lib. XXVI Sect. 4.

*U*w «wi/w /r>ff» *ih*ttt; IU v;l lunt fructu*

Sabrotando brevitate, Coquevel perm;uritatem

f Humide,

f Majwt,

{ M<im, trrem<, fell unkm inttis nuclcum aut oflkulum indudfintC ;
P A U N I T E R A A k x. U >. XXVIL
Polypyrno, feu plures nudcos continents,

II

(Cute mtmkrmatt* feu tmuere ttUo. Lib. XXIX. Sc<S. i, (mt
fiiKhi oonoislc fquamofc. Lib. XXIX. So 2.2.
j/C;-, iufc feu oortice effiort non (amen liuro obdufto, ca-
iufmodi iuric Malm Cuns, Ar**tia, Lmuttis. &c l' o M i>
J T A K K dicit folitx. Lib. XXIX- So 2.2.
Ccv«« Ier naturis. f w d'tro & cruftivo munito, cucurbitiaut
mclonis Rttna, untie hujufmodiarbores CUCURBITIFERAS
appello.

Minore, vel nudo, vel calyce wcepto, vel monopitSIK) vcl polypyre-
no; DACciFcuA Lib. XXVIL

Sto, qiix vel mttstfrx, vel hattiftra, vcl Uni^tr*, vcl fru&u alato feu
niembranuljs 3ucto, vdmiltifiliq**. Lib. XXX.

• n, / (n) f J f M r | (tr) Aftl valculo piorunque biv. ilvi Sc Idiuiurhm radii icu dorlo
adnascntibus | qua: S i L i G U o s j t appelUmw. Lib. XXXI.

limus Atbores & Trurices vd anonialas, vst minus cognitaf & imperfecte ddbiptat.
L b. infyn.
hem Partes Sttrpiora nuniis cogQitarum, Ortiw, D, gna, Folia, Fkru, Fruilm, Sxtiu & Ls-
ciryma. Ibidem.

<*Jrforttm Comferarum Tabula.

Aborts Conifers funt vel

Rtjiniftr*, fructo

{ Squamifc, binisfub fingulis Iquamis femini!:, folijs

{ P=octuis,

rAngiifti?,

{ Sparfim undique à forculis ex... itaque vel

{ Long arihu 5; Kinis ex eadem ihcca foi mbulo
{ Drevoribus & fingulatim enalco: ex...; P I N U S
{ Brevoribus, & Tamarifci vel Cupreffii fimilibus, quz duplex, mar & femina.

< 1 { JOWJJ & ?uniw.iim; conis minirais; S • B I N A valaris.
{ Malioribus, ranmlii compreRi, conis paulò majoribus è panca Iqua-
mis & impactis; ARBOR \ I T E, Thyia.

{ Agmentum in Vberculis, in penicillis velut coaggeftis, conis magnis furfum
Ipectantibus; C E D R U S Libani.

{ La'wibut, /alignil fimillb's; ^ K T Cimfr* i Carolina.

{ Decidim, Cc^irinum in nioduni oafcentibus, conii pai\«, L A R I X.

LECIAVAUJ rubenbas per harmoiiiim ooptatis coinpoitco^ folijs brevtbm in fmunia; Depeno-
rantibus i C U P R E S S U S

{ S... equi pradite,

{ ramis adulationibus & candidis albican-
tibus, cuticulis annuatum exarctibus, conis minus; B I T U L
{ Folia majoribus Coryli, in aquofis nalcens, conis aliquant>> ni. ij. jiiixi>; A L N U S

Myrtum Brabantiam dicitur ladhtmoei am locum i pertinere lit, icor. Ex. am meat c r i o f i q u a -
but planani rk . tTudxi onulln n videro -unttgsrir.

HISTORIC P LANTARUM

LIBER DECIMUS NONUS,

Q'U'ESR,

De He ibis Pentapcta 1 is va (c u 1 i f c r is.



IS admittimus nonnullas minus prope Pentapetala dicta ob petala ad unguem juncta, ut flores integri decalant: unde proprie et stricte loquendo Monopetala dicende sunt.

Pentapetalam Polyptetalam adungimus, & ob convenientiam in reliquis notis nonnullas etiam Tetrapetalas.

Huius Librum in duas Sectiones partivimus. Prima erit De Herbis pentapetalis cum folio in caule ex adverso binis:

Secunda De Herbis pentapetalis foliis in caule alterno aut nullo ordine positis.

SECTIONE PRIMA.

7) e I'erbis pentapetalis foliis in caule ex adverso binis.

Herkd

alo florepentdfkt, foliis integris in jule cwtjugathn

ulIpOJULi JUHt I'll floft

Pm Iff'

Maritima, semine gratia; ALIUM cncemta purims.
Terrifera, calice

Integro, concavo seu fistuloso,

Oblongis & cylindraceo; petalis margini extremo incis; vaseculo rudem terminali cylindraceo,

Lactifolia folio vivente; ARNICA.

Angustifolia, folio glauco grammito, seminibus compressis, rugosis, nigis; CRYPTOPHYLLIS.

Tamulorum & plerumque striato; pericarpio plurimum pyriformi; summa parte per maturitatem se aperiente in oca dentata, non calice virgilexibus, florum petalis plerumque bifidis; LYCHNIS.

Admodum sicut expanso in plura segmenta,

Fruticosa, superficialiporeni; flore specioso caduco,

Majoris & minoris, capsula in plerisque speciebus pentagona; CISTUS.

Minoris & lamellosi, calicibus tripetalis seu triplis; vaseculo seminibus trigonis; CHARACTYUS.

Herbacea, superficialis annua; semine conceptaculo

Triplis & minoris; flore flavo; conis triplis vixit cruentatis; HYPERICUM.

Broadis; flore itidem flavo, foliis salicis oblongis, ad genitalia usque demum tenuis aut quaternis; LYTHRACIA LUTEA.

Simplex, semina in modo sua exteriora protergenta; florum petalis

Dijuncta, color: albis;
 [JgU] ; *ALSINI graminea.*
 } *foliis foliis; ALSINI mini.***
 } *foliis angustifolia,*
 } *floris in caule oppositis; SAXIFRAGA pepula.*
 } *caulis ad nodos foliis ambulantibus; SPERGULA.*
Ad angustifolia, adeo ut flores integri decedant; II singulis foliorum alis
singulis; ANAGALLI & terrestris.

*Hex. tpt**!*; in aqi:ofs nascentes,

Ereilla & protera, floribus in spicis longis in summis caulis; foliis ad genicula interdum ter-
nis; LYSIMACHIA.
*Humilis & supina; A purports ffr** rotundis, flosculis & seminibus in folioru-*
partulata juu.

ALSINB " . "

A* oTon iubH;^r<icitulocomrv >mnino enim genere conveniunt, cujus
 nor* font rt< floras, conti icrentium digitos velut crucnuns, & pericarphun enb own-
 positum. K p....

Gramen lanceolatum, majus & minus & Caryophyllus bolosus utroque Alsini species censentur sunt

ob foliorum petala bifida, & vasculum seminale conformata.
Hypocistis lupina etiam loci est, cui D. Morifonus florem pentapetalum tribuit, capsulam semi-
nalem longam innumeris seminibus minutis repleta. At Jo. Bauhinus florem hexapetalum eidem
ascribit. Utri ego subscribam nescio, nisi cnumi)H: florem adeo exacte & diligenter observari, ut
reccoder quot petalis constat.

Glabular: Ittie mttiTtu) F. Columnz Iychradis Speciebus: mnumcrancU videtur.*

CAP. I.

De Caryophyllis.

CARYOPHYLLUS ab odore Caryophyllum aromaticum refertur: tediAacfVhxcpn<, forte etiam
 ab aliqua similitudine, quam habet flos expansus cum suo caliccam Caryophyllo dicto.
 Nonnulli Veterum Vetoniam seu Betonicam a Vetonibus Hiipanur populo dictam esse
 arbitrantur. Officina Tunica a Betonica per apharesin denominatur.

Ego Veteribus incognitum fuisse credo. Si enim flos tam eximie pulchritudinis & fragrantie
 quam est Caryophyllus alius & hortensis, eis innotuisset, proculdubio non minoribus cum encomiis
 celebrassent quam Rosam ipsam, cui odore quidem aequiparanda est, venustate & durabilitate etiam
 preferenda.

Caryophylli note characteristice sunt, calyx floris oblongus, cylindraceus, leviter, utroque, in mar-
 gine dantaxat sinuato dentatus, vasculum stylum continens oblongum, cylindraceum; Petala mar-
 gine extremo incisa aut lacinata, semina compressa, rugosa, per maturitatem nigra.

Duplex est 1. Angustifolius foliis grammeo, glauco: 2. Latifolius, calyce foliis oblonga cincto,
 Aini:ia dictus.

§. 1. *Caryophyllus angustifolius calyce non barbato, sed ad basi* fyuams*
brevisibus cincto.

1. *Caryophyllus hortensis Park. Caryophyllus alius major C. B. Betonicus* " « « « • y-hw.jfc. *Caryophyllus*
foliis J. B. The Clove-July flower.

Folius est e singulis genicula binis, angustis, gramineis, duris, per extremum acuminatis, caelo
 quasi sive glauco colore: caulis levibus, terribus, cubitalibus, raro alioribus, geniculatis, no-
 tis, in 2. oos diviso: in quorum fastigiis longicaulis spectantibus calicis teretes, glabri, orbiculo supe-
 rioris demiculati, quibus debicentibus paulatim diversa apparent florum genera, candida scilicet ex
 candido purpurea, occinsea, nigricantia, variegata, diversisque colore variegata, aliquo non una
 sed variis ratione. Invenitur etiam in quibus candidis & occinseis color ita miscetur, ut in alio
 candida in alio rubra foliola minus superiora evadant. Quod quod simul videri in candidos,
 ut minutissima rubra punctis sunt redimto, contra qui rubent lacteis notis alperci videntur. Po-
 sitremo ex uno & eodem caule non raro duo florum genera, quod ad colorem attinet, hoc est par-
 tum

tim aniki rubrilquo nucuta. rwxaci, piram ... ubri leu cocdnei p>tilunt, & quod mi im m^ii videri possit ipe uno . . . ediculo diverti coloris flores suffulta dependenda. In florum medio flammibus candidis & bina cornicula recursa supra florum eminentia semenciali intratum longitudine. Coenocula hanc nihil aliud sunt quam stylor geminis summo vasecula seminali innatis, oblongo, tereti, feres continenti per maturitatem nigro, rugoso, compresso. Radices simplices, fibrosae.

Caryophylli videntur in hortensos seu albos, & sylvestres: nec praeter rationem, siquidem hortensos & lativi diei a sylvestribus & spontaneis revera locis differant: quare negandum non sit quum lativi etiam alicubi sponte proveniant, & nos ipsi in Italia observavimus Caryophylos sponte nascentes, quos lativorum primos ut ita dicam parentes fuisse suspicamus: ex his enim iteratae satione, transplantatione, irrigatione, aliisque cultu & mangonio paulatim immutatis & cicuratis hortensos tandem & lativos primitus factos opinamur. Quocirca nancim c experientia docet Caryophyllum semen in solo pingui & bene subacto satum, praesertim loco calidore, soli exposito & ab aens uiuib euro, I'ODO: ni producere florum magnitudine & figura, nancim petalorum multiplici serie, & colu: variatate a matre diversam, quae diligenti cultu & mangonio dicto adeo adhuc immutari & (si ita loqui liceat) meliorari possint, ut novum tandem vultum & habitum induat. iicc pro priiirtvx pun: progenie ab harum artium ignarib & minus exercitatis agnoscit possit.

Caryophylli hortensos a nonnulla dividuntur in maximos & minores, & utrumque genus in eos qui multipli petalorum serie donantur, & qui simplici. Alii Caryophylos hortensos seu lativos primo dilctngmint in cos i; si flore sunt simplici & flore multiplici seu pleno, & utrumque genus in plurimas species subordinatas. Nos has omnes varietates pro una & eadem specie habemus, adeoque his recensendis non immorabimur. Nae tamen si maxime vellemus id unquam efficere possemus, cum huiusmodi varietates, novis indies emergentibus, infinitae sint. Si quis species calabraves scire desiderat Parkinsonum & C. Bauhinum consilatj necno: Hortum Eyslerensem, Theodori de Bey florilegium, Crispini Palki hortum floridum, Emmanueli Swerii florilegium, aliisque.

Innumcroi (Deo benalicaite) solo decoct. flo .um Cin ophyllorum vindicari a febri iibtisnuli^ ms; St hoc onini! as Medicinar studiosis parato veluti affirmo, vel potentior sudores movent, vel urinas pel]unt citra magnos naturae motus, simulque coe corroborant, sitimque sedant. 5. Quadrip. Botan. p. 242.

Flores Caryophylli cephalici sunt ac cordiales; unde usus eorum praecipuus est in capitis malis, Vertig. poplexia, Epilepsia, Paralyti, aliisque nervorum affectibus; in syncope, palpitatione cordis, sic. In ventriculi imbecillitate, cardialgia, &c. in febribus pestilentibus, dato vel succo expresso totius herbae ad ʒij. vel pulvere radice ad ʒij. Eodem tempore naves contingere oportet aceto caryophyllato, gestare lintheola eadem maledicta. Fugant lumbricos, partum faciunt. Extrinsecus adhibentur in vulneribus capitis, extrahunt ossa cranii fissis, leniant cephalalgiam & odontalgiam. In usi sunt succus inspissatus, essentia dicta. Seisrod. 2. Conserva ex floribus. J. Aqua stillitiria ex Sy. floii"• ex infusione florum, 5. Acctumcx n sifusione florum.

In facultiuiihii f inquit C. Hoffmannus) compone florem nostrum cum rosa. Quemadmodum narti ilia iurftm stabilem odoris gratiam habet, ita etiam flos noster, estque pariter gustu amarus, sine tamen ungue suo. Quemadmodum in Rosa odor & sapor in superficie est, perique in flos; ita in flosce nostro. Quare quemadmodum Rosae sunt cordiales, reparatae speciebus animalibus ob benignas e ventriculo ad caput evaporationes; ita haec. Veruntamen hac differenti. Rosae calidis affectibus sunt aptiores, Caryophylli frigida. Hoc enim affirmo ut Rosa temperata vix est, ita Caryophylli superant.

Eenperinou

I 2. 1 triffbjSm Mtlwrrfctnt Crtkm C B, Betonica w w w sriuru trtiu* I B C. B. prol. 7. silba, Jitu fit lignolj f#<0' cubitum superantes exurgunt, albi, rotundi, leves, gciuciiiti, tiffii osi, in alas brachyati. Folia • glauca, insperantiam circiter longa, angusta, rigida, in acucini & pungentem mucronem desinentia, in stolonum & circulozum extremis duntaxat conferunt posita conspiciuntur, ut muscaria totidem videre videant; nam in reliqua rariorem partem caciuca, -effigis relicta nodoUm 1 am alpe. .lincm efficiunt. Calycis antiquam in floribus explicentur exigui, echini instar spinulis horrent, ipsoque adeo ejus n. acro porgit: inter un manentibus istam spinulis calix productior reddens florum exhibet simplicem circinate rotunditatis, e quinqs foliis constat, per extremam oram incisus, colore dilute purpureo praeditis, striata, paulo ultra medium lineola guttata saturatius rubente pictis, ex quarum omnium concursu circulus describitur, infra 1 ijucm !: nugo quaedam apparet. Medium occupant ji*minj li-rum concoloria.

& Augusto, inquit; annos durat, hyeme in hypogonum reponen- Trapp.

Floret n>cnlc Jul; ; multin. 1

Nobii pbnw liacc CiryopljyUiui wborcus Mtm. Exm. ndow, quir- non bene

ei valde lin ulii i>DU mvaiu-ctl in P.-

vjxiin S. M. Migili¹

Caryophylli (pau) flore magno radice t, (sato C. B. Caryoph) Im/fht/f. 1. (Cl&C

Hujus breves sunt cauliculi, tres uncias raro excolentes, geniculati: folia in singulis geniculis bina, superioribus breviora, molliora, viridia, dorsum reflexa, splendens, in novellis autem geminibus, satis copiose ex eadem radice nascentibus, angustula, lacteaque: flos e nigricante & crassiore caliculo emergens summis cauliculis insidet, truncus, superioribus major, quinque etiam totis constans, paulo saturatior priore, circa umbilicum longioribus villis hirsutus, & neganti ex latera purpureo

Ltcui.

milla varietate gratus, inodorus tamen. *Se** in longis *vifctdu*, qua- nuniriutc hianria palticeum
 fulcam aliorum Caryophylleorum modo continent. Radix superiori simili *di*.
 Frequentissimum est in Sueberg & alus Austriacis in Stiriacanumque Alpmum jugis: ubi sub
 nem Junii & Julio *fr.*
 Illi per omnia ferè simile cre- it in alcifimo Jugo *Etfber* vocato/nifi pnuld lonejoribus^fict *ft*
 & - *whala*, *flere* plerumque majore, nec eo unico sed gen- ino ant criplkc: prazerea sub villis
 lincum stibicentibus inxqualem quandam & in frequentes macandros excurrer...^{hncani} impref-
 lum habet, hinciam crani futuram scelerentam, colore rubro saturatoque praxitam, ut prioris *ft.*
 In eodem pigo pauca hujus generis; in Sueberg verò secundi aliquot plant
 •bill duntaxat floris varietate differrent: nam licet forma dispar non esset - *mv^bam q*
 umbraici ambitus purpurasc. nitibus villis hirsutis. , uiior umcn albtis

- 1. Caryeff/Hitj *flju. flere laciniata sine corniculis edero, C. B. Bitmica coronaria folia arugulosa*
latwrt, jlvre ru *re laciniata J. B. Caryophylleat 3. Cluf.*

nitibus foli.

similes, quinque *folis* per : > ras laciniati^ atque circa umbilicum *circi* I J n , L " £ L ^ L l n n l a b n
 stantes, rubri colore, nullis corniculis intlex.
 candidi futuri videntur. Floribus succedunt *cornicula* latis
 Caryophyllei, continentia. Radix oblonga, iicmfj, a capite plures furcos in orbem.,
 plerumque fibras agentes adeo se propagant, ut brevi totas arcas, ocoiDent
 ^ *Inde primum illatus ignoro: sed in omnibus Austriacis, Ungaricis, Bol* — u , , etiam Ger III;
 plurique hortis colitur, & *Mao* mente cum reliquis floret.
 est etiam, fortasse, qui in hortis nostris nomine *E*
 ex purpura rubens; interdum *rubens* va
 macularum atro-rubentium saturationum. Habetur etiam i
 tiffimus est, adeo ut cum floret o
 tantum flore naribus admoto. V.
 Clidiano Caryophylleo tertio differre i *lene*, viz. quod non (quantum quidem hactenus observari)
 co modo, ! *caulis* radices agentibus *ji* urG paget: deinde quod in cauliculis ramosis plures ternu
 flores gessit. Esto *EoGuyopf^llu* *Pu* i nostratibus dictus.

A. V Caryophyllas simplex flore minore pallide rubente C. B.

Qui in maris lapidibus & lateribus iriis eodem fere modo oritur quo && ku L,u=omm ^^

- A. 6. Ctrjpsbflht miun *repens* nofnw. An *Virginea* Ger? *flvest. humilis flore unico C. B?*
Bitmica coronaria sive Caryophyllea repens rubra : *Waiden Pink.*

Radix tenuis, longa, paucis fibris donata, plurimos per totam ramulos spargit, in terram recl-
 B3CO4, & fubini. : radices agentes. *Cauliculi* flores suffruticosos sesquipalmares sunt aut dodrantales,
 teretes, tenues *se* suffruticosos, *binis* ex adverso positus, absque pediculis
 caulem am-^xj-, digitali interdum iongitiidine, led *plen* inque brevioribus vestiti, in summitate
 dun vd tres flors *frui*, *circulo* feu corolh punctorum saturationum circa umbilicum
 nes, c a *longo*, oris in quinque segmenta acuta divisus, ut in reliquis caryophyllis. Ramuli
 illi in terram procumbentes qui flores *proferunt*, crebris foliis vestiuntur breviori-
 in caulibus sunt, angustis, nec admodum *QOn* *caulis*. *Semes* in calyculis paleaceum, fulcum.
 Locis sabulosis duntaxat apud nos in Anglia spontj provenir. *Est*ate ad Autumnum usque floret.
 v^ e *collibus* sabulosis prope *N* *itine* *na* iccus vi.u copio *vicum* in .IRT" *Bedford*ensi, itenque in
 praxerea in epulmodi collibus arepola prope *Sandy* *vicum* in .IRT" *Bedford*ensi, itenque in
 quodam non longe ab *Hilderham* in agro *Car* *itaor* *vicum* in .IRT" *Bedford*ensi, itenque in
 quem invenit non procul *Bedgemont* Salopie oppido: Denique *D. Horswell* in colle quadam
 J^A J^A o prope *Slough* vicum *lesquimilli* *vicum* in .IRT" *Bedford*ensi, itenque in
 tur.

Letf*.

Caryophyllus qui his in lotu oritur duos ai t tres & interdum etiam plures in uno caule flores
 profert, cum qui Cluho & *Duttuio* dcleribitL. - ^ u ; ^ inque (interdum l... « I o n s) iniin
 gulis caulibus producere dicitur, ut dubitemus an specie convenient necne, quamvis alias &
 figura & descriptio illius huc nostro satis bene respondeant: Descrip... Cauti subspicimus.
 Dodrantales huc sunt *cauliculi*, teretes, geniculati: *folia*
 sica, oblonga, angusta, dura, mucronata, colore quasi carn... calyculo rubente emergent.
 singulis cauliculis unicus plerumque insidet (interdum *foliis* *constans*, lente timoria-
 si, coloris in *distu* purpureo rubente, circa umbilicum *urtinis*, & saturatione purpurea nitent,
 aree molones, ex qua medio umbilico duo brevia *filicula* prominent: *Semes* in calyculis palea-
 ceo fulcum. Radix longa, tenaci fibras spargens, e cujus capite plures cauliculi late in ambitu &
 conicentim sese diffundunt.
 Invenitur in Hamburgensi monte duobus *lepra* Polonium, octo infra Viennam Austri^ in illis
 Floret illhic *Mao*, in hortis vero tra *ilatus* than Aprilis. * At nostras tertius multo florere *inciyu*, 5c
 ad Autumnum usque florere perferat.

* 7. B <tfj)iea cerMaria five Csrja\$>fit*> eertSJ ffitrputJ mfgnis J. B.

7. B.

Non alie affurgit & hæc Caryophylli species. Rami supra terram sparsi, ut in precedente, denso foliorum stipatu nuntii, minus carborum: qui in parte duriculi & fore lignosi. Caudes in duas, aut ad summum tres ramulos divisi, quorum quilibet singularem sustinet *floribus*, elegantissimumquinqueparcituram, in ambu puld: e dilectu m, Si **inmechoinceaa** corolla laturatius purpurakeiite decoratum: cujusodor [iumfltmus gratifltmulque.

PZOOX est 6c reliquos antevernt: Maio fc floret.

Hujus descriptio meliuscoviivenKCuyophyllo (**upra propofito**, apud nos in **arenofis** n.1^{centi} quam Clifiana Caiyopllyllei (**yhreftrsgrimi: nofter tamen terius floret quam <rd hie, rel poccedena** Joco propotitus; ut pucem ab utroque diverlum **eflt**

8. *Carjofbjltui fylvtftrit Ctriatuiscm ruter C ft Caryofh. Jjlv. 4 Cluf*

Cl<f.

Craffiufculam habet *rautum*, nigro corrice testam, &tu fibrorim, (**upemi in aliquot** r-ur.os & vifanij qui fumnu tellure multa capita Rignuntj c ccnuibus, gramiuwis^ **virendbutque feStlii** conflau: irtter qua: prolitiunt aliquot ratnuii feu *ta*lie*»li cenues, geniulati, palmars, & m\ lingulos nodos bma cxigua *falitrfæ*. *Caiuet* in lingulis tauliculis (itmuiarc^j majufailt, e quibus *fin* mber dilurior qmque foliis nonnitiil per ambicum crotus conihins, i cujus timbijioj buu inccrJi^ »U bjuintia *cermcuU* occntnt emu aliquot ftaminulis. *S*mm* ut irt uitcniugnini, jialcaccuiR

Crefctt in Tauro **Cirincha**: nionce. Floret Julio, *jmm* /Vsgulto niacurum cV.

Hoc genus Caryophylli in monte Jura propi Genevain, invciimus.

Locus 3
Tiruput.

f

9- *CerjrtfjijBM foltiefrv ttrtuiu fiert Inmate, fttmmulu ctrmoi/jtu oJar/Ku C. B- Btttmhs cvrtmarm rnuis ramefo, fiert remitter fimirtatt, rtie, cumcuLt duehut tmtrgtiaijt J. B. Ctnupbjltui fylv. <. Qui. tmmtmm nibui Ger. etnac*

CH.

Hakcram Senigra *roJixdi*, dura, lignofa, niuftos nunulm humi rparfos fimdeu; *titgnx* item illos km/ilque Si inbirdu fibras agent©.: ex us *mditmii* exeunt dodraxii ales, geniculari, intima parte gramincis quibuiilantv, brevibus, angulii, toloic urins *foliu*, In- m temper ex advero inter fo oppohtis, tleinde {cainditm genicub aut **IOLIOS** aliis ranoi ibai onufb: c\; i - ms canicularis infident long! *idati*, *fiertm* continences album, odoratum, qmngut: *totn* \-e. de facinatis conflantem; e quorum unibilicobina emcitur *fl*mtn*-. longitula, carniculorum Papill **uminftarioflexk**. *Stmtn* deinde in longionlnt capituls pbnun, <. ale reliquorum Caryophyllo >uu.

Provenit in Hamburgenti monte inter faxa, qua Au ft rum & Septencroiiem (pcaat. FJor; Maio.

Locus 3
Tempus.

2. Iftius criam genus ibidem inveniturj limgionbus *amba&it*, & plures flores profrens, iuperion quideni tormi 8c candore iimil<, (cd infexorum torniculoniin cipertes, atque eorum loco dectn flaminula, ipius flons fuperfiuem paiihInniqdaperantia habentes: captoila cuam in quibus femem connctur lyngiura. *J. Baubno* liototuci coronana minus rainoQ, folio tenuiter iimbiiatOj plane albo, line conuculis. *C. Btubme* Carj'ophylloij **fyfr**. Horibus Linuginolts liiriutts.

. Almd temum paulo majus inveniebonius (iiiiqutClui!) ad radices nontii oppido *Maiding* ininunens, terno tere i Vienna milltart. I'rmioriwis & longionbus cit *auitcahi*, majore trjam *jtort*, licce noti minus profuntk¹ per or.is laaniaco, nec oiloratOj aut l. fcti candoris c'inmnbj aut dilucms rubentis, &C qLioojmwxlo carnd coloris, brevibus viliis purpure is umbilic i cicunifcutntum in utraque lpede occupancibus, oulbt fimilkerctmculitj fed dcocm lUtmmbus uc in (upertocce promi- nuntibiu, aiioituu CbWj radio; & floiendi tompjrc uonvenmnt. *J. Bmhma* B;tonica «Jiv>nirTa live aphylla, flot« tctiuitcr laeinuco, imuore albo 8c dilutiis rubente. *C. Ciuhinu* Caiyophyllus Iris lacintams i. (cu flore tenuitiffic diflcetu,

10. *CarjBplijita fylv. alnr fiert lecinmo oJoratijjimo C B. Smicm ttrmaria tajmjfimi Jifltf**, *fcvt CtrjefLjltts Juftrb* tUtter vtigaru* }. B.

jr. B.

i

Caultt lucic font niulti, cubtQles ic bicubitalts, ramofi, genticilatij *folia* inftrioribijluiuibuj. 1J<" afulis, dodran.talibus, vircfecntibts, Gipcrlonbus tttterarum betouicarum; coronarum in tJjbtii, tjms geniculit ampltxiennbuSj (aporis anun. *Flora* fpjdi, CK *pediculis longioribus*, multo, l«ngio Etbu cabcolis idduti, quinqcebiolo, nmic albis, nunc ptr *peralcentibus* ootTantet^i. *longiffimas* & tejiuiflinias [acini-is (liilciii^ umbilico virefontCj Sc purpurat-Lente **laniiigint**; liirliuu*, *lavillani* odo- s 5t fi longinqLio najes ferienns> *Vafnd** iieccedunt duas penè tincias longa, *temia*, *fuperna* i>arte , quumor iwncs crenata, extra calicem cininentia, qm tunk.i confat & aliquot brevibus iiiiwitS IU podigobni, *fimmt* abutidans nigro, cotnpreiluj paleacea **RJJIX** hbi>^.

In iiiiitittus Ucndvo: ncine kJ parci.is lulcsitn inveniriKM en^m in Gsrnuma, *ta* quibLrtdam i *irisnon_pi*"oail *Wsfiaibr*^4 Francomoppido. Spontcnalt.i[ar (in *que Clufus*) in h. nldiortbus uennenfS agri pratis, atque eti.im ad exdiianim lylvamm prii vicinarum declives margines, pto- atque *Aultræ* loca. *Scmia* •oliquk **Hoi**<, nimirum Julio & t"to A.UR¹lfo.

Repe- ntur ctiam nore pleno, q1_u j, U-iuiuno Ikcoruca WKOIUIU iive Carj'ophylkus & m, flore tenuituiK Jiiictw, plcno, purpm

u. *Caryophyllus* fm. ik* famttl* tifiliut C. & n> Mt* nm buntiu Uttfolimi. Bt)im, ca C<T**
CmwyhmmarUhnvmitwgrK.mt rptn, fieri ar^tnttu tnnUu mi*ta^, It
pbflttit fflv. 7. Cluf.

J.B.

Fohomm hujus Oiyophylli ratius defcriptioneni promeiiu eft: ca enim cam fum *II a* (liis coto vuttu Cmilta, colure, figurf, non lamem odore & iapotCj ut icpenti iniponant • c «xi» «&</» palmars, Ci:vopriivllori.m lylvdtruim inih genkulaci, nonnihil al iitbhiriuri /£" fiftincnt Caryaphylli fy^eftrb, qmnoucpMtitos, (tpiru pane hirtutus, fuavcmk pundis gucutos, quorum lingula folia iiiubdoides hncA ficuraoor cocctnca pineit < natx fiim : porro prona pane color cii ex lutco yirelceas, levi njbore pcrfulU HMreiniK>t R "u*. Repta-

Locat.

Crefcsre audio (tnquir Clufiu*) in monte iilo non procul ;\ *Niclafbur** Moravu: duffito. Uut-

Hujusipeacnij.CpotiLii vanet.ir;n] flore plcno in hordsquibufdani obfwvavit & defcripfit Clu-
fius: cuian Bctomea coronitria minima, tubelloflore pleno repens J.B, i adem fit necne dubi fu-
mus: *eauii* ei in aliquot lamulosdivilosattribuic, in eorimquc extrttniute lingulares flores, parvos,
plsnos, rubelJosj *film* eft brevibus, lanul culit.

12. *Caryophyllus caeruleus* Menfpelienfium C. B. Park. *Aphyllanthus Menfpelienfium* J, B. Lob. *Caryophyllus caeruleus* friv. *Aphyllanthus* Ger.

J. B.

Multos junceos enodes caules emittit, quorum fingulis flis latis magnis infidet, unicus in fummo, quinque denticulatis caeruleis foliis conitans, ex caulis oblongo erumpens gultu dulci. *Radix* fibris muJm, iongijj tout, lignofis, duris, albis conit at: drc, quam *folia*, multa graminea, celeriter marccfcnaa.

I MM.

In colbbus juxta *Cajtetntuf*, aliiqjie fierilio;it>iis Menfpelio *vdaii* abundat.

1 j. *Armtria pnliftr** Ij&tlit Ger. *Cryophyllui prtiliftr* Park, *fylvtftri, pnhfarmarm jijturaofd fylvtftrx* J. B. C. B. *Betonica ca-*

Redo* complures eniittit «</<, lives, geniculatos, dodrantaes, interdum cubito longiores, ad quorutniingnUs m^ftnrn bin, *fitis* gr.ndnca, angufta: fun^mo caul, ex ^ mifque ramulis *calyx* quo cefcente alius quoq; id feptem aut octo] flos^tibindeplnres, iuiiinEulicilidbus obrofun fubr^tcmitur, untonumer^ us folobis multi- tudine rumpantur. Flores ^ - **W u n , plaque f i n g u b S S S f f i** tus aporuntur & e calyce apparent.

Locat.

In Italia, Sidlia, Galtia. GenmnufojquensocairT^inpafcuis, pntfarim fterdioribus.

* i+ *OtrytbfUu fumilut latifdmt* C. B. Park.

C, i>. frfti.

A radice tanlicnlhs, ftatim in duos ramidos fex uncias altoSj tenues rotundos divifus prodit, cui ad wditem /</(4 bicvia, latitucua, in ramulis longiora, niollia I; pallida, binis fibi invicem ad geniculos refpondentibta. Cuilibet ramulo *Jlt* unus, (equunte multo minor, pallide purpurafcena, niagilque albens, cs brevi cabce prodiens infidct Habuit ex Aullru

C. B. frca.

f. £*ryepb)lliuJjffoeftri' hifleritt C. B.

Ex radice parva folia pauca, anguftiffima ut priors [*Caryoph. fylv. repentis multiflori* C. B.] fed multo longiora exurgunt, & inter hec calliculus tenuis, plus minus palmam altus, in fummitate in duos pediculos femper diftinctus, quorum finguli flores magnum, *Caryophyllo* fylv. vulgatiffimo multo ma j m , qmncpieclium, loit laciniatum, colore pallide rubentem fufinet.

LHut.

Orca Gencvau Chérlerus collect.

φ. 2. *Zif Caryophylklat, folio bortatojive ArmtrU,*

1. *Armtrw albartP.wiTuhraGtt. Rttmka corcvaria, fat QartopbfUu fylvoftri vulgatiffimus* J.B.

Hiac rW«p^llircs» & c diverfis capidbits, reai, rotundi, ftrjeofi mine palmars, nunc pedales ac enamcujitala, non r.imon, niuinterciuin in Gininate: *folia* graminea, viridia, ad genicula binaj propter terram nuu-^llora: *radix* longa & latis crassa, colore foris fulco, intus albo, fapore fubamOb *Ikrti* modoinguhiCSj modo pJuros *Iimul*, *Hiavcrubfti* CCS, odore nullo eccellente, per obtulim margiieni CTcnatt, ex *Vifculo* oblongo, teret; i, atro-ruWntc cui ad bafin foliola acuta, calyci aequalla, (i-pc b;*eviora appofita.

Locat.

In praoi, pafems it inedds campjs per Gennfu-;.,, Italia & Siciliam frequentiffima eft. Hujus aliam (peciem habet C *Dauinius* fitb ttalo C *ju*pn> jli fylv. vulgari anguftifoli, *Caryophylli* momaii albi *Tab. Ger.* apud quos vide qt; deltriptionem

2. *Armeri* rubra iatifoha* Gtr. *Armtriu UtifoltMjffimpttX*, *fivrt rulrra* Pirk. p.trad. *Ctrryhjtimi barntfii bsrkatui, htifolira* GB. *Btti.mcaiciron.tnj htffvltu ftrme, jhrt ftn;tuLs afou nato* I. li.

J.B.

Lignoia radix caules emittit cubitum unum aut alterum altos, Leves, teretes, geniculatos, inanes; ad quorum singula genicula folia hiliacea, atrovirentia. Flores in caulum & alatum extremis, suaveolentes, multi simul in umbellae formam juncti, ex oblongis rubentibus calicibus, coccineis, crenatis, circrdiim t pun&is albis, Unirilljuc purpureis circa imam fuorum parcem • obtinentes.

Gcferus in pctroiii collibus *Sc* afpens, *faQ&*, fabutofis jpridfque loas tuuu fenbit.

H*c planta floninicolore inh'jfiivr v.in.u: iiumuum i. *Albo*, hinc *Armoria*, Litiulius (impl« flore albo/Vi, %, *VarUgaxo*, hinc *Arm. Lull. v.riegiii: five ve liolor P->t. lh.v~* in cadem u:nbella^ow hatwntur nonnullt purpuru, alii albicuttes, alii ciina, cum ciicul" live cutolla pundulorum albenuum *five* argenreomni, ant purptireonim vel fiturJtioruHi vel dtkicio, urn, *Sec* aut line illo. 5. *Rubrt futttTQheloferteto*, ut nos efiam cum Parkinfono obterv.ivimu?. V.iti.i; inCiper hop genis flore mukipiici iuu plno. Hinc *Armeriuslatifalius* ilore rubro multiplic*«nf.

Ummfcujulque floris calicem circumltant folioLi (ex, angufti., mucronata, calice n (olongiora: *Stmma* in vatculis cylindraceis per matuncacsm ni^r.1, *Carj'ophylliQram* jemula. *Flam* qui cum pn^TM6 apcriunrur albicans, pofloa paulatim purpuraLunc.

J. C^jepbySvt burbalui bar *Unfit tm^ujt'tfoUtH* C. B. *Armtriu ang: 9ifolium r uhrxi fsmfltx* Park. *Beienica certmtri* miniu UufeIU flert froftatJl JiJtthJ.B. Armtrmt[atrut-rutmt Gei*

J.B.

E radttt alfabroni plur.1 prodcun! capita foliorum palunum longomm, uncum fcii: Luouin\, atrovirentium, fimiliumqueKiamiiuJu *Plaatiglni aneuftifoliar*, Ill quiousduo n^vi exigu juxta coltam (ecundum longitudinem exteniiuntur. *Cauks liijquicubicalL"*, rail, elabri, in plures ramos divifi, per quorum genicub gemina/i>/4 alterno pofitii difcrepantu, angilt, lurrec\ Summkata ramulorum *flew* fipant fuivticolntcs, accdenes quadantenus ad Syperb* *Ai&x* florenj, minds umenprofundeatque tenuiter *icftA*, fed profiindius multo quara in]raccden.; p.irpurei, poiillimum area foliorum media & umbiliaim, exttenutatibvisartjuc Icgmenmadalberiincm ter: dentibus, in quibufam cnam laturatius catidicancibus, in quibus *spunk* eminent gcmirUj candivances, exigui. Sipur radios *Sc* fidiorum amarus.

C. *Bauhiniis Armenum* limplici flore *Pannonicm Ctmf.* hue ref^rt, cujus di^ercnuj:quinque; 1. *Eicgann* ell roio, coqueaut plane rubro aut laelci *andoris maculis alperlo*, autm^co oris carneicolons, i. *Oinnino* nivco. ;. *Flora pauciorOj* illiutu- ruU::ites, & c:nci colons. 4. *FJo** purpuraicens oris albis. <. *Flores* die pritno & fecundo quo aperti fiint lafci prot (its candoris, {b- quentikapauLitim albcdmc erandcenIC, undemommno purpuratcunt, he Dt in cadim mnbella flores kdcosj atios exalbidos & media ex parts purpuraltentJS, alios omniio purpureos conlpicere liceat.

Mihicquidctn videtur *Armenum* huncfimpILi flore *Pannonicum CJ*f.* pnedend *Armerio* U-cifolio cundeincile obtlorum confonnaatem, qut in hoc uti in *Arnierio* latifolk) umbellatim ru- lctincur&codem modo colore variant, quamvis minu recte puigatur folio jiiimis oiiguflo. Hinc *Sc* *Armenum* plno flore Ctullii (uperiqfe *Ipcciem* (eu vaxJctawm cfe oportet.

Cxteruni & *Arniertus* hoc in loco c J. iUuhwo dekriptus *Roru a>lo; c albo varbr*, qux varietal *Par kinlotio* dcfenbitur tub titulo *Armerii angujltfohi aibt fiafUck* • *UtraquJ* cttam vartecaj tiore pleno t'pencur feu porius duplici, *Nux. <Anr>trw angujltfolm Juflrx* Park.

A. + *Arnrtri* fylvejhi air era tljcuta #Iw!* f*!tgi*tk em /oLob. Caryphyl' pr*!*nj»Gw, prMtnfii mtjfr m*w & minor* Park. *Vida barb*; a tngufitfal*]jltcbjixpti.\.* *Canephnl lut borbitw fjlvtfi*. C. B. ©rptofjt pink.

E MA«alba, lignoia, (liipHci, fibcHa innuracrjs tcnmffiniui >apillata tJ«.'« exeunt plur«;tenue, teretes, lacu firmi & rigidi, obfeure nrentes, imi parte glabi, jiummi brevi adraadum 6t vix conipn.ua lanuane huJii'ti, nodofi, longis internCkiiiis, in Ipununcalion tnuhuni palrnum esoodenM, in cuitacubitaTes,6c aldores. hlu adnodoi tunaadv la, angufta, oblonga, scuta 8crejot graminea^ cauiibus adnalcuntur. Omits ad nodos in rimos ti equencss divaricuiturj in quoum extremis «&• tmlt plcrunquc plurciconfurti, nulU umen umbella: rormi^ pdiiculis brevibus an: nidlif uiidntes, cylindracct, tenues, unciali longuudin(;,ftriati,roln>li> bin anguftis, acumin itii, zquaiibca auc otuni longioribus obvallati; c {uWnii finfodi emicant parvi, pulchre lubentes, p< als anguftior-Uii, quonum later* Sorexpiua l_ mutua non continguit, niinus obtus quam in aliis Armeriis, ;>erextremutn (ubrotund>j ficunijlterfvc citn.i iatilB, pundulii Gturaonbus area Umbilicam: afyeria, quibiii in fafcuLj oblouga cyUndrace^, qax iununa parte per maturitateap m quatuor denculos aperiuncur, (uccctlvuit jmtn* uarva, angulofj, nigra. TU/M qiii-piinoa Gtion. anno e :adicc exeunt Uoora multo Cim & fere unckm dimidiain ciccdunt, xqu* prapemodum butudinib ad exortu ad extranum, quoti (ubrocundura cit, duos plus digitos longa, obicure vindia, glabra.nulhi pocter coftam nicdiam nervisconfpiaiis.*

iecuuitk.) .1 Utiom; annu cauicm edit, 6c poiluuum {ctticn penecrit radidnu exarcteu.

Ill pr<b &. palaui plunmis toca inroaimrj *folio palati* am arcnoli) aut glareolo^flac floret: x.<n> I TtmfM.

Car. It

Dc Lye fan fie.

Lychnidis nonien accepifle contendun: hanc herbam «&* TM «** ^x@» «tr©-, quod /«- Htfowr /O/*NR: \c\ quod romentoiis cjs foliis Va^rci ad lucemaram ulum pro ellychrms

Lyclinidis noxae Cunt Calyx flons integer, ftri-itiis pleninque 8c mnrrior: Valoilum femin.ilc pluruniim, pyriformiOj interdum tamen oblongum & propcinodiim c^lin-iraccum, Uimma pane per niaturitatem fe aparientc in oras dentatas, femimbs turgidioribusj non lans, comprflis & rugois, ut in CaryophylliSj in medio fitis ca ambiente tindiquc 8t protcgunttt valcvilo.

FloL-um pctala m LychiiKiibiiifxpiffiniL- bifida iunt, raro intcgra, rariflimf latunata, nunquam, quxl (cum, in margins creiuta, quo a Caryophyllorum diftingmincur.

^, I. Lyihnides umbellata.

I. Ljet-bttit &irffiffj iore cocemto Tftyer C, Ji. loch. Chalcidonica flore (implies mmiatn PJI-JC. Lych- nit Chalcdvniea Ga'. Flet CVntaw^p^J ranno miniatu, alioe, df v^w J. H. Donfuch, o; flotoer of CciiBaiinnopfit.

J.B.

Numerofis fibris craffionbus, 8c in .ilus fubdmfij nuUatur, g'iftu (liti.ici: ttulu collom biai- tales interdum & akiorw, ali.is aibitaleSj pro radonc k>li aut loci in (juo nrirm, ceroes, lii; tos, ma- tin, crebris geniculss incrcceptos: ad quorum lingula Una folia conpgidin, altrnanre conjurb- rum fitu, adnafcnnturj pcttailo nu!!o, fed lictore bxfi caueao amplerientM, Lychnido fvlvcliri- amula, venta) nisnoa, rigidiora, magilque alpera UnngineobSa; pnora cum hxmean maenam limilitudinem habennaj guflu acrl Vlnrtt in caule lumnio St rimulorum extremis umk-li> L J romiant, odore luavi quanquam obituro, lei) colore perquam amceno miniaio aut unnaKirii (a&i tii, interdum carneo aut albei, petalis oblongis bi'ulcis, umnquc us medium alatis, & ad'cxor'tui binis appendiabus incumbentibui auclis, lie it mwgrum 5c explicatum peulum Papibonem oculu wocorporc exprimerc pofie vidcitur: inter hai; jiomma purpurealcenna apemki viotaccos Itiitincnr Emicat aacm Hoscx caljt* oblongohiriito, viridante, tiafulw* oblongum occulrante immt i •''' riiffo repletum.

Varietates. Lecut (3 Tenifut.

Flos colors variatj albo, carneo, variegato: psulorum etiam nmlopuci (eric. Percgrmiis eft flos: fentur in hortis icmine e Conftantinopnli adveda Junio & Julio a lterio à larionc anno floret, dcinde ploribus lrequentibus. Rjdict cnini conftat vivaci, diuquc durat, hyemis & fngons patiens.

Lychnis flore coccinco minor C. S. nobis incogoita & fu(p<fbi cfl. Soli porvitac a precedente ditFert.

2. Lychnis AitncuU Urfi facie C B. Lyclmii fflv. UtfJta Cbjii, five Mafcipula Cratca An- rtuLc urjifaie Cretica J. B. Ljcb. jjh. Uufolta Clufri Ger. emac C. B. fr«L

Radice eft alba, long*, 8t fibrora, foltis ad radiceni pluribus, criam viginrt numero, per terram ipariis, incanis, lamiginofis, Auriculx tiri florti luteo toltii formi & craffitie fimilibus, nctas trcseuam quatuor longis: qu* ex longifEmo & latitucidapediculo (enfim rotundam figuram acquirunt, &: ranus ungiem UtiBirfinc (upcrant. CW«» Tetundo a iatione aim cubialeni & ainprem, raniofum, rotindiun, lurfutum, firmum, in fummo lento IUCCO »brin ex vindi fhveicentes, plures 'quail in urabelb congefii., quincufoln & bh< 5 luanoiuin - i pro plaiiti magmtudinej quibus ttfud* jaarva Semen minunim

;. Ljchm vifiarte maxim* CmU* Alpini. nfcarU maxim* Crtiica Alpni Park.

Plantam hare prcedenti candemefle fufpico^ quamvis needefcriprios^ nec icoooi twr om- nu convenient. AJi^nus diveiani eHc contendir, quod nitnirum pnedens unicaulis fir *t hac multicaulis: quodcaulii illiu5 lit trescubitos longus& ramofits: Jujus autem caultt v * cubitum attoUantur nu|16lque rainos ckumfrant, iisexceptis tn quibus fores nrarii««r * plus illius folia pauca iimt, & radix fibrola, Primula-veris periimilis, EUMS folia m m 3- r V ^ i lffi m ftipata, 6c radu cralla 8c longa, minime hbota. "numera feri iunt limul den-

4 Lyetmii Montana ftort luteo gldofo, Btfa mmana Hurt globofo t C.B. Globularia la- tea montana Col Park,

Cfli Radicem habetlongam, pedalem, minimi digiti craffitudine, crafts r t ^ ^ w cr modulla intus, dura; fibris, ii circa foliorum exortum tentibus, inferiis ramoribus craffis angio.

Hjioue donaur: ftpore fcco, OLWC gravi, icuro: MJ ad illam denla (piura tumqufi longra & d't^ oblori&if GhbuUn^ hmilia, iligitJ.li in fumino biicudiiii; nujora, minora vero srmma n^Levia elata, camofo, rig^: i cri cjrncm & mini tuis extuberantibus, fmgulis propaginibus pedales exeunt juncti £ e > com acrimonia quadam : Inter qua: e l w », aur oujotes panini, zquahter ciM, un n^ longKud'J^m intercept!, in cjuo purpuralttitit. In li- JICU- lupra ipialus Ebborui

U lurUci, pwpurafcenres in glotum cor n.iVinzvaw, psiit.iper.iitTO, aim decem intu Jeoiw St V«o fnSA ini qw intrti floiwn adhuc latent ovate elt, & tent; 'ut Sturm* extulwarc vidcannir, difluxU per mat: s hiriucus iit, i nigii,oomprefti, romnda, (ed parumincij i-ila, qux apest^ in panes wricaroi ore vento excuten ^decidunt.

Junio horet, Angullo perficiuntur femina. Montium altiffima juga fupra Villam Flaminianum Aquicolis Martii Comitatus, loco lo Serrae dicij, qn quod est fupercilium montis, incolit, loco her- bido & plano; nec alibi invenit defcriptione F. Columna.

Planta haec inter Lychnidem & Caryophyllum ambigere videtur: caliches florum bifidis ricarpis ovalibus cum Lychnidibus convenit. Pencarpia ^x in quatuor pa;us hiaatc, & ionaubui compressis Caryophyllos emulatur.

5. *Lychnides Chalcedonica umbellata* Philonii *Lychnides* altera Syriae Lob. *Verbasco* Am jrute *Salviae folio* C. B. *Verbasco* Lychnides Syriae *incanum* *saurocaris* Flori *Hieracium* rane J. B. *Verbasco* folio *Salviae tenuifolia* Syriae *Pauli*, *Philonii Lychnides* Syriae Ger. **enuc**

Lob. Hec nova Lychnides sylvestris vcf Chalctloiiicarj ooloris flari, /Mr* item ang. onspicienti florum ortu & modo: fiant enim flus, & virgulis quadratis, tomento crallo incanis, & radic: bgitex Lib.

6. *Camara fart alho htxfilinfit* Marggr.

Marggr. Caudis lignolo, duro, q ailratOj nifp'ulo, in duonini aut mum pedum allargis abitudine, atque in niultos ex | anditur ramis; partii edant cudes loon in rcnam procumbunt, ferpentes cum fuis ramis. / alia autem habet rugofa, hirta & ad tactum dura, in amben serrata, fplendens, faturate nndia, bin a femper fibi invicem oppofita, & ad exortum ramorum fparfim. In canemitate autem ramorum 6: luraflituae e cillis umbellatis proveniunt fufculi parvi, infar florum Lychnides Chalcedonica, fe. lactei, fnavis odoris. Tota planta odorem habet ficut infar Menthaftia. Aatacx, colorb candi Mulcipula Lobeli Ben rubrum dicta, verum od caulis iifra Eir Ad hoc gen^i pectitice mU tuu admodunt vilcolis, ac fi guatine perfufi effent, eam Lychnidibus vilcolis annumeravit.

7. *Ljcbmt um&rllftri mt*t*** Htlvet** Ja. Zaroni. An *Lychnides* *incanaria* fflor. CB? *Ljcb. cur.* MTM rmt uai* Ail- Lob ?

Ex ratUcc magnim ccrpiwm foliorum per t^rr.im (Votonii emitte, ejuldem formz cum Ocy- moi*lisal>: foliis, crallior it.imcn.> iurora, cartilaginea, magna & villofa, antamen vicia. Ex ho- rum medio piotrudiiintu: caulis plurimi, villofi eidem, quadrati, albi, in medio cavi, nodis feu ge- nicalis exceptis, que raro difponuntur & crallifcunt, ex quorum fingulis exeunt bina folia, ex op- pofito difpofita, nunc a dextris & finiftris, nunc ante & retro, ut cernitur in plantis omnibus caule quadrato don. In fumma caulium ramis nalcuntur plurimi flori, umbellatis difpofiti, finguli quun» petalii mbenbus, <ordatis feu bifidis conftantes; in quorum medio exie flus ejuldem co- loris: Flo:cs, inquam, in capiculuni congdl pulchri afpectu cernuntur. Hifce evanidis fucco- dimie capiuLr linwl jundx, oblongJt, fiilcau- exterior, & virides, ufque ad numerum denarium: captiuh interior cartiLieutca, luperius qinque crilhtis • tennenas donatur, mU tuui foramine, ex quo deddunt f< msa fubriata, pauli: l^m p^... cum p^l^ n prot.berantibus.

Floret M.tio: fenaiBJ pcrhat Jidio Be AuRiifto. Hec forte eft quain Gelherus in Klwtu- Alpibus thre I

^ a, *Lychnides fativa* & *lylveftres* *minis* *vifca*.

1. *Lychnides incarnaria* • *flor* J. It. *vulgari* P.iik. *idofc. fativ* j C B, *MJ** & *ruhra* Ger. *Sat* 6cn *Campton* ons, o: (*lait* *Campton*.

Ex Mirt implwi tiwlfiim fibrofa plur eunt caulis cubicales & aliores, teretes, tomentofa la- nugine intJm, ill alj aliquo diviti; folia veltis per intervalla ex adverso bilis, ad genicula can- Jem uiipteiisJ Ian' gine denfa, molli & incana obtusa, tres aut quatuor digitos longi, latitudi- cuni tatu, in aamicr delinentibus; [que tamen ad radicem obtusa funt.] Flori in fumma cauli- bus fie ramulis oodt i fere modo difpofiti quo Ocyroidis vulgaris, obfcure ruberati, & callicis ob- longis, ftriatis, quinine in li ngulis ftris emittentibus, ac fi angulati effent, totidem minus fibi in- te: ctu Flori im yf;U lubioiun^ia luni & vetus umbilicam ftrata, & ad ipfam umbilicam duos emittunt

emittunt procellissdntkularos, fatis rigidos, fur fim cre&os. V<fcu**m* *fmmdt* fuccedit craflum, vor icofum, pyrifom<;, aipicio *femmt* inrus refcmim ad modum Ocymoidisalbi.

Flos colore albo *Si*. ex candido carneoque mix to vai be.

Colitm¹ in honis multiplici petalonim ferie UilTgnis.

In Italia pafllim provenit, ubi & flore albo modo incarnato interdum cernitur Tponcc orta;

Loco.

A. 1. *hythtiii fytotlri*: (*lore tlbo* Ger. emac. Park. *fyly. alia fmfU** C B. *Qcymetdt ulium muttit* 1.B. JOiO tofiuc tompion.

7B

Porcm nitimr *raJkt*, cubiconim duorurt aut trium longitudme, inrerdu bradinli fi:ri cnlfitu- (Utic, multifitU, alba,acj-j6i (ubanura, qux antequm c terra emergat in numeroia u;~iu polliun; craffituiinis aut minora, dodranralia ant palmaria dividicur. [J]Ufl nosumam Ionptmiinem aut craflricm non aflequitur, in terrain tamen profunde ilfcenitit. J *Omlei* cmittit crebros^ cubitales *tc fcfquicubitaJes* re) ctiatn majores, terneSj hirfutoSj inane, (•eniaJatwij ramolbs, prope temm mbentes: ad quorum fingtilas jiiinAuras *folia* bina advcrfa, aaimtnau, piloia, duos ant tt« diginK (oogx, {cdjudigtum Ucij nervis aliqtioe iniigniortbus fecundtini loii^itvidiim excurrentibis, m acutO5 apices (enfim anguftatAj per margines equalw. *Flerti* in fiini; i *caulibus, & ramulis* e: alis folionmi excuntibus, p<Sicrjlis ad modum brevibusj £ catice oblongOj *canaliculato* lliis purpuranh- bus, turgidL'JOjaJbjpentapctalu pctalisiii medio profunde filis, bos, *subconidia*. *Circi* centrum fioriscorolja qnatitini lacuiiat.t cernitur. Flori (uccdit turbnatum, Nicotiartr ormulum, ccrutum denticUcumvc [dceeni denticulis recurvis] dehifcens* vafculum; m quo *j<ntm* copioium llyo,¹ *cya-* mi par, rotundum, coniprefliim nonnihl, colons cinerci.

Loco.

In pafaiis & ad (epes pafllm.

Flore pleno reperitur oo rantatcm & elcganaam in honis culta.

Virtu.

In Jiqiiorc poffiti decora optimum eft leinedjum in convullione pueravnt. D. *Palm* • ex rela- cione D. Hen; *ani*.

A. .; *Lycbtii fylvtflTiM ntbefloftart* Ger. *fyly. prt njrro* Park. *Mv. fvtv vfustit** *pttrpmrt** *fffltx* C B. *Ocjmvdti fvfurtum nmitii* J. B. *ScDflOtoCTCJ* Inia Campion.

Exrfl**i*< minimi digitier.iffirudun:alba,faporefLibacri & fubamaro, fibrismulns donau, *cmla* cmitrit aliquot cubitales & bicubitalw, geniaialato», hirlutoSj conca*os, nonnihl lubjnJc nibentes. Ad quorum fingua geniaih/o/*¹ bina onunturopofita, foliisPlantagmn abquueous Imulu.oblonga tita, aaita, taftu raolliaj hiifuta. *flerts* fimul aliquot in cauluro jonanutare tat, inter folia limuf junaos, fed non fimul fe tpaodentes, t quinqe pctalK fuarerubenobus, biparritis coimpolicos, *flemitta* qtiinqualb.t, florealnora ambicntesj *caljce*, Itriato, lanuguiolo, paitini iibentc, paixim vi- rentCj pedicuo brevi, villoip, in quo iminK conceptaculum oblongunu

Loco.

Ad fepes & t foltis, inque lylvis humidioribus pafllim mvcnimr.

Virtu.

More pleno haticnir, qiLto (pedem & voiuflatem ab hormlanii noftni colitur, nomine ficfi SCSatfclojS tiittontf.

Datur &c prolifera flore vindj, qium Lobcuus Lychnidem agreftem abortivatn, multiplici vindi flore appslbt, Camcrarius cp. Matth. Ocymaftrum flore pleno viridi.

A. 4. *Lychnh fylv. btrfuta amua flart mmart tarittu* Mo: id

Morif.

Apriorediffert, i. Duratione: a. Florispanitatu & colore cameo, quodque cito evanefcat "Cjrtra familis, nee plura de CO habet. ViJctur die *Lyelmufflvejlrit amain *ng*HjeIn Hart pm-j I rofctmt mpraf*, (ijjam D. Dm invenit inter legetcs propi' follim ilbm fanioiam in aero <~>"- gienJi Cjrl^rbil? ottclj didum 8: D. *Nwton* ctiam alibi.

5. *LcAroj noHiflor** C. B. Park *OrymtMct mm fptexfum* \ B. *Night flowering flofc tfatnpxon*.

E ««fiwalba.fundfid [mterdiim molttfida] fatB crafli, lignofa, fibris aliquot capillau non altc defcendenre (Wu exurgic implex, aibitalis & altror [in viridank cut*] icTc* hirfutta ibliJus, firmus, ramolus: *film* ad iicos blms adrcb bfm pofis OcymoidU albi acrovirwS bus, hirluns, acuminansi tmis lanonbus, {iimmis oblongis U anguftu. Ranmii c toliorum iinu bus cgediuncur pietunque (inguh altematim, incricium bini oppoliti, in raftigio duos trelve J? m luitjncntes, paiculis uncuibia *hum i <*kjh** oblongis, villofis, camTiculatis iaua[iK>T Oqrmoidw ilbi minores, parte iupina albosjcvj rubore tindos, pmna ex bnguido lute' 'nil tH tes, penis bifidis, noftu expanfo*; Sole illucclente flaccfcfcntesilloco. pctalis uitro. (m f -cen- tUIJL t on,

Flore pr^ttinto *vafatl** feminaba intumefaint valJf, & pro planta: motlo nn^ I; quam in rcl.qui, dadque *Lychnidibae*, ad,o ut intodum calyceSTdiWanr*^T *ora* radunt calyx cvHinitur & CKLuLlr ad pericarpj. intui conrend X u X: *T* *uniquc tamen* denticulos recurve apeTM riftfc vjEftati. arcorp[^] VS *matunitatem in fax* Summi caules & ramUi, ut 8t flonim cilices .id taaum vifcofi font. *m. Planta eit annua.*

Loco & Virtu.

et Augusto & Septembri. Flos astate noctu

A. b. Lycnii major xststifisra Dubr, f*i* New r mi.

E radice alba, limplid reda in terram defcoi dente, furculos aliquot transverfos obitor emittente, plu> exant germina crebris tohis terram operientia, inter quz multa in caules excrefcunt cubitales, & It quicubitali...les auctaltiorc,, medio crecto & huflem rigente, reliquis in ambicu terram verus redm. teretes, nimos, meallia faectos, brevi led tamen denfa lanugine hufutos, geniculatos internoil. longioribus, ramofos, ramulis brevioribus quam in Oeymoide albo vulgari, quin potius furuilis : fonters quam ramulis dicendis, bms ordine ad fingula genicula, ab imo fore caule ad fumum, ad uinqne aur \c\o pjr n . in eodem caule. Flore in fingulis furculis crebri, eodem fitu quo an jlus Lycnufibus t- uilyo; ant; ,allo, ftratum, oblongo, minore multo qulm in i Oeymoide albo, iiiiinulq;c illllllf>, fltii an- n mltis rubentibus ;ini^inr, alba, minores quam in pafidico Oeymoide, pculisprole unde ad ungoes fere filis, fegments quam in illo multo anguftioribus. Si ignu autem pci mala ad umbilicam dnas habent appendices lei proceffus acutos adnatos quz qua inUm quafi corollam efficiunt in medio flore, e quo exant quinque flamma pralonga, inicio alba, poftica purj uafcentia, apice fufcentia primo pallidos, demde pariter purpurantes. Floribus fuccedunt ca/cola feminalia turpidula, quz calyces rumpunt, turbinata, feminibus copiofis, minois, per iUtlitii em nigro-purpureis repleta. Filia lata, obtufa, craffiora & breviora jlllll in Ok\inoktt: jlixij obiaii i is viridis, nervis nitidis confpicuis.

Flos nocti aperit IT, Sole illi i pefcente contrahitur ne n umen penims msrctcit led node fcqueme denuo fc p.imk.

Maif mento floret & femen brevi perhit: In clivis maritimis quibus inafflicatur Arx Dubrenlu i*(.*) obliervata uo & fomen epu accipiunt.

7. Oeymoideis repens Park. Lycnii vel Oeymoideis repens mont' mm C, B. f-yehnu m<mi*n* rtpm Ger. emac. Saponaria minor quidamam

J.B.

R*Uei lubet crallii3 IOHRAS, mulcilub, fibeatas, in multa capita divifa, moj s / extends nigns, intus albas: Cduiti p ter tam lupini procumbant, hirtuti, rubentes, genicula, rantofi: qionim jindisadn.ii cuntur ex adverfo polita folia bina, Polygomi aliquatenus figura, hu [uta. /W/purpurantes, Saponaria n unores, calice oblongo, hirtis, rubente, quinq; & culii & ^<*i< m me dioconfl.ir.

Dulcedatui' 1" ad Meridie m fuis, ay & Arve flu' <<< Genera: i.<cn/. in lulu ULim oblcivavimus uiwr Mui i >cn.

* 8. Lj(bmi Crttij dti^i filula Park. hofata anguftifolia Cracca C. B. Oeymoidti fft nAro mi-XMI Cr<ltcnr> j. B. flfo. 7. Cluf.

Claf. J. B.

Stاتم .1 radice in njultos ramios palm.ies vel etiam minores dividitur, teretes, tenues, enico-lato>, hirforos. [J. Uauhuiiu caulculos phu es, pedales ex radice pullulare icribit.] Folia ad furculos nodos caJenntuT biu contrario exortu, exigua, craffiuscula, villis qu ilamm odo recta obli>tiga, mutrone obtuio. Sing li rami fufcent membranaceum calycem, ftratum, lanugine obfitu i, in-tima parte anguftiorem, fuperna laxiorem, e quo exilit flus, quinq; folis confians, in fiintmo Inti-dis, colons inicio nibslh, deinde leviter canefcantis; in quo flaminula alipoc flavelcentibus apidbus pncii a. Flos (uccediuat capmila./<*> oontinentia tinule Lycnialis hortenfis femmu Radix icnuil.,in firkn ramos Jivjriuu., non umen vivas.

9- Lytbbmmftrv», fl#rt r*btFU i ttjjet nbltnga ang 1*, Uji.tnt>fti.

Abalwfpcc ebis diftinguit calyce floris pralongo & tenui; flore pulchre rubello, cuique peta-lism i medio profunde ad ungoem fere filis, quemadmodum in Aline majore aut Granule leucan-themo, &c.

Juxta Meifan IHI tnprunovntium afcenfo hanc obfervavimus. Siipemia pioxi me deler ipczJinulb tit; non t.inisn udeu.

10. VjtbmMfylvtjbit lirls Lob. /jfo. bnta 5. Claf. Ger. flfo. hofata major Park. /w. lanugine Claf. 5. J. B. flfo. lanuginofa major C. B.

Multos caules ex una radice profert rotundos, longiusculos, ceteris infirmiores, in terram pro-cumbentes, geniculatos: folia in fingulis geniculis bina, longa, mollia, & lanugine quam canef-centia, inter quz flores alternatim fecundum ramulorum longitudinem nafcentur, fuperioribus forma fimiles fed majores & diluioze coloz rubefcentes, vel ut ita dicam, incarnati. Semen in vafculis fuperioribus par, lubratum. Radix craffa & fibrofa, quz tamen plerumque alterum annum nun fuperat.

II, Lyeima flvtjtrtt l*, angulofa minor C. B. Park. flfo. 6. Cluf. Lycnii parv, j ^ p> rta minima

Oi^ltuilo Altirgir circitor piunum allo, geniculato, tenui, lanuginolo: ad quorum fingula in-ternodia bina tenua, longicula, lanuginola folia nafcuntur. Alternatim ex fingulis geniculis prodant flores parvi, purpurei coloz, palcherrimo rubro mixti, longo lanuginoloque caliculo in-clufi. Radix tenuis cft, II^IIIJJ hbratJ, Plante

Plantae quam C. Bauhinus Joanni furi Lychnidb parv. Tr Hmlo mift folu itifinu p1TM Kr terram ungue non multo longiora, ac superiora longiora & latiora paulo existerunt. Polemonii petrae foliis fimilia sed minora, magis hirsuta. A caule medio summo tenus teneta foliola & strobili alternatim confederant, oblongi, tunicati striati, rubenti-lon[^]spiliiohTfa.nvoliK, &c.
 '»! flores colore variegato. ^WTM Jn, i stoc, call>o&rU^bTM, &cAccedk<H ychnidem nostram
 Præcedentem plantam in ma[^]mibo. quoran&m Ciftell* agrorum in, enit Clafius: hanc, non-
 nil m .. illibus Salmantica •KniK, intw fexa ptwcoicattin, arqur ucratncjuc Miao florentem.

L] * [3lv. tlbtfrU T&M Botati. Monfp.

suit*, K reus cymas p!uri_m < fcti jfer<%lbi QaiiK regione adnascuntur folia an-
 ^onatos, fteflolifqne qoafi jtmuknco, atque uno vafii d'ispositos: quibus succedunt capsula ob- que angustis petalis ad modum biruils
 cartilaginea, continente in fe femina mi-

Planum i D. Morifono *defcriptione de Lychnidam circa Neapolin & Messinam invenimus.*
 sic describit.

radicem ^er coran. fjurfi, BclJ, minori U &M [aliquando duo] sesquipalmari. S^d circa
 ojs bina opponiuntur a[^]ufti & oblong font: toSSf C, ro ad fingulos
 no caudi Scopt. TMdo testiva est, fcnf[^] r3n.cn port Boris J a S S r T r ipf^r ^
 J diamm [^5michm more. Ffc quinq. puHs a| & prelL, ? bIJ3 J r - utriculati pro-
 cellare incipiunt tintrorecurvanrur. Planu estjwnu* aJ q ur cum mar-

15. Ljcmii fore mlim mmimo.

Folia huic angusta, in femora & qux c raJkt exeunt tresuncias longa, vix unam lata; superiora
 in canibus sentum b<v,ora & angustior[^] fapma&MMns piff & longioribus, interna seu pronâ
 crebris rubris crebris intercepis, u, hirsuta, inferius prope radicem
 onbus & biaipribus bi binis, ex angusto principio sentim
 gaiioifisutin hoegpnerefins crebris intercepis, u, hirsuta, inferius prope radicem
 cLUar[^]bf pccu[^] di[^] d d G angulos nodos cinctus, mucronem tandem contractis. E
 foliorum supenorum inibus exeunt floris sin latim & alternatim, brevibus pediculis, inferioribus vix
 bes longis palis hirtis e aliarum congenerum, per
 estre)IKl ^ bihtlis * [enibus, si ^ abus & raro expandi ^ marg^{'''} ^ us mtror-
 Jbi pfcnjwb mterdum umen purpurafoctSs in eadem planta. le-
 lis Lydmid&as humorem qua viscosum exsulant, quo stringentium
 & fcmuie A erafidffimo fc amrafBmo Vim D. Hanli, Sloane ad
 ndeautiquoiUudJcmcnhabmcdffii me tranlmiffo cnata est.

14. Lychutjhtjiri, tlmhtfil44, simul junctis C. B. L. sylv. angustifolia Park. sylv. foliis an-
 singulis Clafsa 1. in Hsp. 8. in psp. lisp. J. B. sylv. 8. Clafsa

Claf.
 Geniculatos habet caules, tenues, in plures alas divisos, pedales aut majores: folia in singulis ge-
 miculis bina ternave, interdum plura, angustiora quam reliquorum, vixis candido perfusi & quasi
 casti coloris. Flores in summis ramulis nascentes, quibus foliis bitho mucrone pradiis constan-
 tes, interna parte candidos, externa aliquantulum purpurascentes, & antequam omnino tabescant
 sese contrahentes & circumvolventes: calycis admodum duos, breves, subrotundos, altero anno
 rotundum Papaveris rheados continentes: radicem lati crassam, albam, multifidam, altero anno
 percentem.

Non modò in eadem sylvis, sed etiam ad restibulum agrorum margines nascitur per universam
 Austriam, infra Anisum, Moraviam, Bohemiam, Pannoniam, utraq; Muram & Dravum;
 abundè etiam sylvis Francofurti vicinis. Ubi adolevit lento quodam & glutinoso humore, supe-
 riore parte illa videtur.

Lychnids capsulam verbo meminit C. Bauhinus, quam flore obsoleto Autumnalem calyculis
 turgidis vocat, nulla addita descriptione aut Synonyma.

* 15. Lychnia sylvestris hirsuta perennis foliis Cochlearia Britannica, flore amplo Saponaria,
 Moril.

Moril.
 Caulibus est hæc sesquipedalibus aut pedalibus, partim humi procumbentibus, partim erectis, ge-
 miculis crassioribus: quibus adnascuntur folia oblonga, hirsuta, forma Cochlearie Britannicæ: in
 summis canibus conspiciuntur flores ampli, Saponariae florum æmuli, quibus singulis deciduis succedunt
 capsulae pares continentes parva semina [Lychnidi sylv. albæ]
 De tempore florentis nihil habet.

* 16. Ljchmt CbaUpmlit tmiua, frfus pimtm bjrd & im%ou^u, floftulii carnt/t, pedictllu wfrm*
luna; ihi'ut mfijitnttktti, capful a fevi rotunda, Moril.

A longitudine pedunculorum, scilicet bitu; Lutn, k. qmbus dependent floiw & capfuk fernim¹
succo. iitci no: • facili est a ceteris lux lbrtis.

Hue & prac: deus ex feminibus Chalepe> ufr], i D. Rob. Hunnngton mirtis cnata; font in Horta
Botanico Academic Oxorn. nfa.

rlantam kiwc. i] modd roctè pidi i fit, atl Allincs ecnus poiiiiis quasn ad Lychnkliis pjrtinre
puto, •ih calyocin in Iegtticnu itiviiuin, & ad moduni flons exp ~alum.

* 17. Lrhnt flthrm antma, feiHt tblmgu mmrenat* fkr (anfio rvhelk, xipfuti tkimgi fyrant-
id* Mori!!

Mortf.

Florcin gent amplum, eleganter ruiiUunij cui fuoadlt capftiti verfus fundum criflj taris^in lo-
vati define: i> pyran l iii ii III motlu m.

18. Ljel/tu trtfo piryj, fiart ruieSa, fib* fawgo a*r*jle.

Inter leges u Lini uivenimm April* meof fiurentem, maiio urciter itinra ititer Maftam & Loc.
Loc on.

19. Lychnti birfuts fUrt thgjntr variegata. An Ljcbntt HtjijmucM vifafa minor bifata, floribus
WJfJr.ii/.. • gignit m. I/* Hurt, i apd.

terdum imicum, jwiiles, teretes, (bUdos, ab imo ftjtim ramolbs, tiit (icos, infirmoi, fragile^, Folia
in caulibus p^r iucrvaila cs adrer& biuu, al) anguito principio lentim tlibtata, duwcirciter djgi-
toslonga, maliumdiginim Ua ; fuperiora in catuc angnfl lora, macronib> acurii, ittring, liirfura.
Summi caules Be ratnuli ad ta^umvi icida & pinguis, Horibus -x ala fol iomn titipjtitim cxeunti-
bus alterno ordine, pediculu admodm n brevibus mudent ws, onuih. H <> i calicibus oblongis
ftriids ralwntibiis exeunt ama'tiij qu: q folis fubveo ; ndis non crenatij nicdjo purpunftibus, cu-
cum cos albi wmpoilci. DtljuiJs tioiibus M&CI Ih'un in ventra utrin^, turbntatos exni-
maliamt VafcuU Iciminalii occukintes gbbra, tuibinata, fmmtbmi exiguis puipurantibus re-
pleta.

EfftatsBoret fictemioe ad nuturiutni producto radicans lateris: femi utedectduo fequenti vero Tempus
(o renouan >> noftro: non nro ccum Aununnoc femi eaiduo otma; & per totam
hyemeni viret, Si isquenti verc incabttabni ahuudinem aflurgit.

SO, Lyebnit mmtmit riguid Cbtrlm J. B.


Rigiduk eft planta, dutini tnumvc unciurum altmdine, raro palmum atinRir, talittdit durt
2 ratnoiii. Fali* ad nodos bina oppolitj, femincia brevion, perangufta, pilola : e qm
lafcuntur ctlttu femiim&Ui, perquam g Auiles, xquabiles, him 6c alperi : c qui
proliht, quem pne cxiguitat: vix vilis capit, purpweus. RJMX <iun, lignolx.
In collibus ptopc floceotum nobii oblcifata cit, Chertcro propc NctiuuJum juxu molen-Loc.
dinuni.

II, Ijchnu (jfof'hii calyiuhi -iriatu IWk. caije. jriatu 2. Clafj Ger. f]lv. latifolia calycul
fiJu jtriflu C.B. ASijjopuli Hitjtsr ttiyctur^ida ventruje I &

Cu! talem cr iittit <</>>, refturnj ftatini a raJice ratnulum, craffiuloliim, hieftum, ftatum,
fraplem F<M Ocyroidis non fpecioT, hiifijra, moilia. Ex ramorum dirancationibus, foliorum
Jintii amilque extremitis y/er<< « pediculo i.titi longo appsnfi, qi^na, petalis bifidis purpurafcen-
tibus, orto Sole flaccolcentibus .oniUnt tpmitu in medio alb; , ex calyci oblongo, hirtato, pulchre
ftinato, quem in immenfam diltendunt L-mintmi •vifada, e lata leffilique hale ventrota, in mu-
cronem achamenti. l, y^wMi coutinentk [nildirum, nonniltit ad papaverinum accedens, fed majus,
compreffum, ftatum, cunicum. Wjix robufta eft, neiii, c< late
plan: ad tactum viliofa : iuliornm (aptr glutinoW Her = bl annaz.
In Germanaz pal CUM & 4gns Riicnuni topiort provenit.

22. Ijchnti f]lv fbil an**fifelut (alytuht ttirgijit jrtitii C B. Mnjafnl* • gignit vna<&f>
fmiuiij.] tcmstsljrcmUtJhmu PaiL f]tv. mtsna i vna Ger. 'rxc,d*m,, f]

Malum fimilicodum habet hac herba cum precedenti: radice alba, craffiulcula, paucis fibris de-
nata ; CM* in craffiulculi, rigidi, pedales, purpurafcentes, geniculati : Ad genicula fola bina caulem
amplexentia, fuperiora tuncam longa, angufta, hirtata, canaliculata : caulium fuperiore parte di-
viduntur potiffimum in cernos bina ramos, in quibus extremis calices turgentia, magna, bre-
viores nullo quam in precedente ; in his vafcula JIK>r.1; tunica dura, femina Papaveris modo
parva cinerea contenta. Hac ex llcca.
Mompela fecit via> oblcrcAVit Olicrlcru*.



Hæc, auctore D. Magnol qui vidit (posse ortam in loco à Chailero designato, præcedentis varietatis tantum censeri debet.

§. 3. *Lyce HIS afyuh, ctu striculis, mcmhra*ac:is, laxi & ixtm inflatis.*

1. *Lychnis hystrix que* SM album *twigs C. li. Behn album 0\$ç. Ger. /: in album Officinæ MMJ. B. Papaver flammum fce Sm Album vulp Park. ^&p rttlnifl poj .pp.*

7. B.

Lignola radice, crassa & alba, caulis emittit cubicum & tetragonum altos, teretes, leves, geniculatos, in alas circa summum divisos: Ad singulos articulos folia bina opposita nascuntur, Lychnidis formâ, sed pentas glabra, cum dulcedine quadam acris asarum & subamara. Flores ex laxis utricolorum instar habentibus calycibus, quinquepartitis, rubro herbideque & albo verticilloribus, glabris parum prominent, vel albi, vel ex albo purpurascetes, quinque foliis binis constantes, feminibus purpurascensibus medium occupantibus. Calycis postea pericarpia continent Lychnidis fcmtn plena.

Lycn.

- En paid quem aritur.
- plunnum glabris, noimunquam tamen trifuns; ftaminum nuoo. am
- In horto medico Lugduno-Batavo has nvcnio varietates.
- 1. *Lychnis seu Papaver spumeum flore pleno.* NI D.
- 2. *Lychnis montana seu Pap. spumeum* iio.iibo; itanflacxalboMbleto.
- 3. *Lychnis hirsuta latifolia fl. albo* feu Pap. spumeum.
- 4. *Lychnis iylr. angustifolia, Ben album dicta.*

2. *Lychnis frutescens myrsifolia, Pen *Ih go,ilu C.B. Bm silt OffiU*

per sicuti i ,c,b fjh., itmfr -vtrns, /rut OcpBHJti trbortum fimf<r i£Tc&t*

Hæc nfflo ab eaAm radice prodotnt rtrm!, palmares, craffinfajj, l;?nt^que quidendi (ed fragiles: in quibus nascuntur bina temper ad verk inter (c folia, Be!; da folia non majora, a^k In; o auSadni in latum CNiianlo, led k:ninio muaonataj viridia admodum & • splendens: e in equi tamis aut enascuntur odorantales aut [=c]Jala mterdua, ranmU. wn- culati, graciles, lous mter se oppositis angustioribus foliis ad singula genicula donati, & fu in alas contrario sim utriusq; foliis constantes, quibus insident membranaceis pinguibus ca Mi indufi ^w,, qmnqtic h ifidus flamma. Radix candida, passilique fibris prædita dt, perennis tamai, Pknajwta

Semine ex Italia misso Clasio enata est. Hanc P. B. «M liibcitufo StptMnxFTHUtftetnucutufetex Sidli* tkouimt & describit: & cucu P^Aiiormuni & Agngenmm inter (axi ubique crumpac moncL

A, .: *Lychnis maritime rpen, C. B. m*rm* rrptm alkt vil rubra Park. marina Anglia Gr. mama Angtkm J. B. CnnUf& jfeta tfaniptan.*

7. B.

Pri (identi apprimo similis f^{itE 3 iaut} ^ Itwquam ^ Facile ife mi queat Nam > .n Hi a tina quoque geniculis hærent fce, multo tam pias brevissimis albis serrata: *Caudiculis tercia, dodrantr^l - - - angiores, glabri, humi sparsi: Flors ex turpulis folliculis prodeunc Ipcuofc, ftrbre & Avellj nam magnitudine ferè æquantibus, pauciores, foliis constantes quinque, binis, niveis, quim in T^{lo} latioribus. & uti - - - minati, ut flori plenus illius respectu videatur: in medio stamina totidem line^{io}ail,< «7'nW:~.?:: que cum capitulis geminis ex falso hirsuta: tapor nullus insignis. Ad hunc modum in horto Montbelgard. latam ang, c:dam descripte J. Bauhina: in spontanea flocum petala non adeo lata sunt & geminata. Ob servavimus interdum cum foliis præsertim primulum erumpentibus tomento candido hirsuta.*

Lycn.

In toto litore Meridionali Angliæ inter silices & Brassicas marinas, quæ ferè unde aliant enasci & nos cum Lobelio observavimus; ve rum attain Meridmiuli .antim sed sn_n Occidentali, ut Lan- castrensi, &c.

Que de Raminibus habet J. Bauhina illius fide t idimui: notits cnici non observata fiwt- An specie revera dulcior à Ben albo vulgari nihil nondum planè or •nftare But or.

4. *Lychnis jgetitm.*

A. 1. *Lychnis segetum major C.B. L. f vt lytbmdts fettain & Nirdt gram Park. Pseudo- mlanctum Ger. J. B. €99.*

Simplex & alba radice m:itur. *Fdi* a in auleoppefiu. angusta, longa, per margines aqua- lia, lati basi caulem amplexa, & in aaitum ii: cronem icniin ilcr i^o hirsuta & incana. Caules teretes, hirsuti, cubitalis & altiores, geniculati, inanes, in raris aliquid di- viii, in summitate gestantes floris pentapetalos petalis binis, purpureos, circa umbilicum latratio- rioris lineis striatos cum punctis in striis nigrescentibus, & calice oblongo, striato, villoso, in quinque oblonga legnata, flore aliove diviso. Siliqua capsulæ feminale oblongum, glandis ferè figura; in quinque partes per manicatam delinens, semina magna, angulosa, striata, per maturitatem ni- gra, sapore amaro in se continens.*

Inter fc<< passim observatur Maio & Junio mensibus florens.

Hujus Ion... microscopio inspectum. Etenim in se conglobatum non male exprimit.

9s>4»^m r... tiginib;... ablique scabiei generibus: itam vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, coagulandis...

Ridican Nigelfaftn in hftenda fmon!... pulis & <faijus utus effi, uc lingu* lill... vtm experftis fui in hacorrhagtis r... moaem nonnulli iufficai entur. i'. i'aul. Quadnrx. Boian- Clai!

*. Pftudmtlawbium gUWum Siculum. i' jctus filia glabra, calva durare Bocconi.

Ritix ei alba, lignofa, unde plantam annu.v i... Hplex, rertt, graalis, \x\>, pcd... ill in quo ctefeit, nodolui. Ft ft* ad... leucartlicmi fistis nonnihil similia, raris pilis hirsuta. Flores in caulis & ramulorum fastigio...

In lateribuj moitatum Mellanz... itminenrimn, »UM i%<a JJ proi nontomolum Poms Cereula di... IROnliJllgc a Patailla Obfervavit!i.

Huk eadem noba videtur

Lychnis fegeram, Nigellastrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello.

.). Lcknu figttum rubra foliu ?crtUata C. B. Lytb. fit. Faccaria rubra dicta Park. Faccaria j.B. Qcr. flea Co;u CAIIIJJOH, ini).i:opculn un'cii (Coto'53aB(.

Caul. •furgit (IngtJiri, cubital) Etakiore, IJCVI, terece, concax-o, glauco quodam ^olltnc, qui fa*... Uvaricarur, atqisc hi in ahos, luu femper c ontrario. Folia ad caulis genicula bina ex aduerso...

junio & Jalio ret, & brevi semen perficit, quo perfecto rubicula exi: elctt

Ob colorisJ ut puto, ficutudinem Ipaids' Ipcie a nonnullis cenetur, IUOI ad tingsnium om-... VMitrit did* ufl (ju6d vacae cam liboircr depalcantir.

^ . j. De Lythnldt Stptnaria A.lla.

Saponiru Recentionaus ab extergendi I scultate dicta est hac herba, quod Saponis ritu pannos... eluae purgetque: S; utnum Veterum nonnulli creditur, quod a verbo purgare St Candida facere nomen accepit.

A, 1. Sxpmoria Anglta cm... i J. B. G<triana imarva Gcr.

C.B, I'rod.

Planta est elegans, radicebus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus, fibrillis paucissimis adhaeren-... tibus: unde caulis exurgunt cubales, rotundi, striati, glabri & albi, geniculis distinctis, in terram re-... ctimati & concavi, circa quos folia viridia, glabra, rotunda, nervosa, uncias duas lata, paulo longi-... ora, rarius ex fingulis genicula bina, sed ex quolibet geniculo unam tantum, nullo certo ordine...

In: pinato quodam prope Ludberru oppidum in Northamptonie agro eam invenit Joan. Ge-... gardi:s; at m :oco illo eam indagantibus hodie non coepparet. Nobis Lufis nativae seu Saponaria quxttam degener est videtur.

A- i- S<ponaria Ger. vulgata Park. J. B. major levis C. B. Sceptuoyt.

. Radicebus tenuibus geniculatis cortice rubenti... caulis trifurcibitalis & al-... cepti, modoll' fusti. Folia ad genicula ex aduerso bina, plantaginea similes [J. Bauhino Gen-... tianz cruciate] tribus nervis intignis, non secundum longitudinem decurrentibus, glabra, sapore...

brevissimus pediculis mixti, e calice tenui, unclam longo, glabro [J. Bauhino hirsuto] non striato, qui marcescente flore in ventrem turgescit, pallide rubentes seu carnos, odorati, petalis quinque compositis, nec laciniatis neque bifidis. Succedunt semina in ypsilon oblonga, circa medium crassiore, parva, peno rotunda, compressa, spicacea.

Locus

Juxta torrentes, fluvios & stagna loca aprica & artemisia sponte nascitur, ilorensitino, jal'io, & Septembri, ut recte J. Bauhinus.

Vires

Li usum mciicuii veil'... ut Folia sed raro & radix. Saponariae radix attenuat, aperit, sudorifica & Ufoin Afri': are, unro & mensibus cienda. Decoctum eius in lue Venerea commendat Sequitallus: Estrinfectus parricida est, tumores ac praecipue panos dicitur. Schrad.

2. Saponaria Lychnida folia, fascicula alba C. B. Lamxri* fa Struthium Dufroida Imperato J. B.

Jrr'...

Ortu hujus plantae similis fore est Saponaria vulgaris aut Lychnida. Folia Caryophylli, bina ex adverso sita, angusta fetuncularia: Caulis cubitalis valde ramosi & ad ramos angulati, ramulis admodum ramosis, quorum extremis fasciculi haerent pentapetali, albi, minutissimi. Semina minimis involucribus confertius nigra, magis turgescunt quam illi, lapidis amarissimissimi.

Locus

Nos in Messane inveniimus. Imperator noster provenit in Calabria & in regione B... ubi L.J.: ... est, quod hujus radice ramisque conum de man arm! mumlindai Unas.

Salsicor hanc genuinam Lychnidae ripiemnonel

Hunc eadem nobis videri, quamvis C. Bauhinus distinglat & separet, Saponaria altera fruticosior ex Sicilia, angustioribus foliis quasi Oleae C... ilpino, la o ccfpke ikwbn distantiibus.

6. Lychnii peratis laciniatii falujlrit.

A. Lychnii plumaria sive stris simplex Par Armerint j>stenis Ger. Flus cuculi, OJrath nix. J.B. Caryophyllis pentensis laciniatis fiort fimfltti fine FUS catth C B. ... cadoto piiiilt. fIDUS I-Dallams, Curttoto Roller: rectius S^taDottitiinpiojt.

J. B.

Su^mlc reitanc fibr.i:lice propagat; MM/<< .it:ollens c Mt!<< &alciorw, manes, hifutoijeenkul^os, drums; in cjuibus folii ad senioib binajtiift.t, oblonga, .tcuta, gbk.t, abluft pediculis. Flos Caryophylli sup. • bi ilicli, tubente carneove colorc, cocicm [nckio in ipfii anguli] divaricationum caulium in ramos siti, quo Alfinis vulgaris, pediculis longis mliJcnres, firabriati, apiuinulaco.

Isew.

In pratis humilibus & ad rivis ubique fore cernitur. Variat interdum flori colore albo. Habetttt cnam in horns flore niulilplicato.

7. Lychnis viscosa.

A. 1. Lychnis viscosa ultra ahpifiifolia C B. Park. Odomuli fixv Flvri ctKuli af. fua Lychnis viscosa in I. Clufn in Pamen. 4. m llqt. p#ft. J. B- MujcipxU an^MjifJ.A Ger. canic.

J.B.

Caulis tollit cubitalis, rectum, cavum, longis intcmoaiis distinfuntij a&n circa caaimen glutinosum: ex singulis geniculis bina folia ex adverso ita. Fioris aiculi, obiongaj .icuiijiau, crassiora, lanzatiulque vrenta: ad eadem geni lib i me no fer e :nJc id (iimnium fasetum pediculi a foliorum I nu exori longi floris crebros sustinent, pukhre purpurafecnte, quinis folis constant, Saponariae floribus accedentes, ex calice oblongo, iigu. So., .: .nummum teq urur in vaiiabsei principio angusto paulatim dilatata. R<J(* cr\flu)LuLa, tiigra, (ni)ulis annts novos colique numero-cautes profert.

Locus

In rupibus in viracio Edinburgenf. 1. Li omnibus Fere P.mnoni.r & Auftria: inferioris c*! .uis syl- vis provenit (autore Chuso) edulique & herbis iii loos. Flora XI.no, li:mciij Junto nutm ofcit. Cum floret, flores multi simul aperti & elegantiiirinocolore rubro .id purpuram tCfid .antur.

D. Lloyd eam invenit ad latera capillam montfc Craig Wrthihm d>ai in comi<tu Montis Gomerici in Walli •, tit nosmunwt D.TiweKi/w Kobmfin.

2. Lychnis viscosa furfuns latifolia !*vis C. H Mujciful* Lohla Ger. Park. Ca,t<t>mm urn, 'u:l>»{d*m LjclmiJu visiiJa gams J. B. SolltjeT tf.ltljflp.

Radix nititur alba, lignosa, simplici, paucis fibradona) . Caulis plerumque singularis [interdum plures] abutalino pedali aut cubitali, termes, terctes, riji, glabri, ramosi, prope terram interdum rubescentes alias calu, geniculari. Folia ad genicula ex adverso bina, lati bah caulem amplectuntur, & in acutum declinant macronem, glabra, glauca, sapore fore oleraceo, magis nitrolo. Flos in lunam caulibus & ramulis in umbellam quodammodo dispositi videntur Ceterum minutis otis imu- las, flavo-rubentes: verum si accuratius eos inspectas observas omnes in ramorum divaricationibus sigillatim orit, quomodo & Lychnidum alarum & Alfinis; e calice prolongo, striato pur- loente exstantes; quinque petals obtusis non ihl I iinds compositi. Circa floris umbellam singula petala duos proccellu accctb :occurvos o binenc E medio flore fencialis aliquot exsunt cum apri-

bm purpurcis. VtfcHlafemimaha otJonga, & ap... SLASid ~7T
P. infra genicula supiora e... de csudatj humor quidim v... iunrar.. iV
mm minntmii !... J. Bauhino emsrtnni. Vafodum, per i... in quinqs legmenta
acuta furmiu partt: iindinir Sc aoerioir.

Spon... circa Semenei sub castaneis Junio & Julio mensibus Lem.
florentem. Botan. Manf.

* ;• Ljcbnis v'tfeoft rubrtt alter* filv, C. B. Mtfcipitla •vifania five LychmJk fbtatt J. B.
Ljcb. vifaria 've Mjfcra Ger Ljfc. Jjtv, ntlm irtmsr Park.

Crebsn ftdin \ radice fairicit ramis, nultis cauUm jpfium cubitalem airtudine arquantibuSj gc*
jiaa: lansj folidis, rotundis: idr quos ail genicula nafcunrur^e/M adverft, duobus plara, oblonga,
aaiminacij quibus faciora & ol>ru(ori fmit infima, ad Bellidis at... w, glalu
turn extremU umulorum, turn c foliorum Una prodcunt rubelli, ex idjt (iaih l'olemonl<
trio, obiongOj flriario, qm ddapits floribus a pericarpio & vlcujo in •entrem :rgente diftenditur>
Iviiime liibmgio. Radix hgnoz, alba, multifida.

Spout*: luiLitur in arvt intur fcgetci, pingui (b'lo, autore Clulio., Dclrifque Caftellx vet2ii) b
Floret a Maio utque in Autumiuun codem ijuo Uta clt anno, & itiperventence hyemc corruni-
pitur.

4. Lychnit vifhofs filtu lanugiuufn, floribiu i.-nntu C JJ. Ljch. Jjfv, ftmint ner* %. Cluf.
MttftfuU Italic* fiere c* rmi Park.

Cluf.

E. i »na radccrcnui aliquot profot wufi/, tet... nodofa, quidam lanugine pubefcentes: quibus
ex adverfo len... iper inharcne bina iamiginoli felts. Summit rani. n intc
turcilkuli cumidufaiii, itrian &: pubelcemcs, e quibu... emargant fofculi coloris ex albo purpurafcenti-
tis live tjriwi, in quibus c'ilia {lamina.

A. 5. Ljcbnis montana yifaf* & * bififo C B. f... Ger. f... alba i
... f... Park. Palenianum petr. cum Geifleri J. B. Wild white
Cathci

Radix • nintur cr... f... (interdum tamen ramola) prof... intcr am
defccndente, fibris aliquot dcnata, in plurima capita divifa; uncl' exorta folia plura dento ce-
fpite terram op... Folia fingularia hirtuta, ano virentia, uncam circiter lata, tres, quatuorve
uncias longa, figurd foliofum Ocyroidis albi, fed minora, pediculis longis carinatis ftipata. Caulis
ex eadem radice plures cubitales, tenues, rotundi, hirtuti, folis veltuti ad fingula genicula ex adverfo
binis hirt... ex alis foliofum... nulos emittunt binos femper inter fe op-
oiis oblongts, ftnma pai 1 =auls innafcunrur fora pediculis uncialibus ilir !
>itiofj quibus ut & lummu in ipfius =auls innafcunrur fora pediculis uncialibus ilir !
—bi, evaniuii, petals bifidii, c«/*«rubena friatio, (ramni... quibus calice longioribus. Secedit
•wftulM, * Jrmhule pynformie, ftnma mtus pa^a, pulJi, rentforntu continent. Pars caulis fuperior
numorem pinguem Klminolum c>idat, and: & MufopnU cUatur, Junii mensis initio & Maii fine
noi'et, M.itLiio (en uno valculum feminale lumina fm... nitur in fex legmenta denta.

Singula pocaU btas mut... onatas appendiculas circa umbellam obtinent.
In mu... risarcisNotingJumtarprovemr. GenCTr in maris ipfius urbis, inque montibus vicinis abun-
dar : in Geimantx quwjuemciidionali pane nufquam non obvia est.

6. Ljcbnis vifcifa i f... i... C. 1) vifcifa flore albo Italica, fere Mufcipitla
... Park. J... Clufa i. e' femina nata, folio lanuginofe, fofculo ovato, viviradix
AtutcrpuU hahTum J. B

Cluf.

Culm: ali autampbore... excrefcit, nodofa, bina folia alternatim ad fingula genicula femper
<< adverfo prolcrat, e, oblongiufcula, ^rremo mucroaata, i quorni, Su J
lento quodam rore, ut exunne... alis ex... ramulis,
e... regantes f... mes, longifculos, ftriatofque calidius,
que per longia... quibus dec... a, tenna, qu... mini
quinque... fere fele explicans ramis compicua int, & albicantibus a... es pradita, aha demum
<< wnt contrahente fc Milvinorum unRinuni infn., Uumrj ~... floribus fuccedunt, in
s /*w» quile in rrtiquis. /t, ^x mukifida cfl... e qua ramuli enafcuntur purpurafcentis feren-
verk mter lc folia, qiiidam lrcvi bnnginc alperli'... quaque facile propagari & pungi pof-

7- L. th... vifcifa florib... fir* puTpurofoM, intus & i c u. j, ... Clufa J f... nMj
fit' V 1. /b« fens txjtt, & nt furt>>... m alio vi vu jJx j. j), ...

Cluf.

Ilwcbrevior eft cW< & C:llito minorj ^ ^ ^ mu^tu ^ , anctus, e vindi purpurafcent.
... quoniam in... lita: ex quorum alis evant
... tifiwe, non minus taincn lanu... lita: ex quorum alis evant
aw* lento bimore i nodum &... Ex radice fecundum caulis
... j qub... folis pcedit... floribus fere pccedentis foliis, omnino
... purpurafcentis... Sm mo cauli & extremis ramilib,
... purpaloiilt, iniidcent llnaci CJutropurpuialccntes >/, </, i quibus cu-
petal

... jfe anguftis per iv. ... lra feSbt t ...
 ... albi, cum quinquelong. ... ama part:
 ... brevionui in candidos apices definenfabu* In reitquis cum p
 ... cm arguar, noflm u-
Ado.

*** 8. Ljcbms fjlvjtjiru pire<rrm<\$, noRifier* nlarsta Zllioni.**

E r*ltct alba longa, ram fibris donarj, fubftantia tenera, uninn aut plurc, *filarum* cespites
 emittit Se&mokiis Salmantici niagni Cluf. perfuniliuni.nifi quod panto, mmora font, a affiora, fo-
 lidiora' maais cartilaginw, glabra Si u ... udda : [qua: J radice pnma exeunt lata km c. ex-
 tremo ... 1-1 1)ervo medii! m percurante elato, locundam capus ductum lupina parte folia
 leniter falcata funt, alios ... Ex unoquoque foliorum cespite em-
 fimbria tenui transparente coloris argentei circumdata funt. Ex unoquoque foliorum cespite em-
 fiantur caules multi, propè terram arcuati, deinde in directum furgentes, altitudine fere ulnæ [Bo-
 <UM^...J(1) ... n ...
 nodos (iipriores & seihvo ccmptic, humore glutinolo, t came csudantCj crepns geujcuhs incerec-
 pti, prxapuc terram versus, albicaruibus, quanivis Autumno aprpten[e rabdeanr, nodolis adeo ut
 reliquim caulem craffitie multum fupcrent. E quorum unoquoqtie foil* cxaint bina oppofita,
 caulcm fimul ample&entia, atque infuper unus & interdum btui foliomn cdptee^ qw plantain
 folioGjn & denfari effliciunc, c quibus ramuli egermunanc foliis cinSi ad nodos bo ... in Tollo-
 ftm cccpiccm definentes- Caules principales fuprema parte fiertt producut dnos trtfve mterdum
 ftnul in eodem communi, eoque brevi pedicul'i abas fingulares, e "we oblongo friato feu can-
 nulato, friis vindibus, fulcis altitij piloJo, q ... I Lb compofiti, con tracte& unitis ancequiro,
 • apcrianar flavicantibe e poi tqum expucamur e ... j Utis & iubrotimdk, extremo
 unien biido, fm creni in medio excavato : medium flore ... m occupat JUmnu, aliquot apicibus albii
 infignia. Fl. iperam Se Solis occaium te ex plica i, liMVifumum, GeUcmira vulgaris
 laib {imilm, minui cainen acutuni, odoi-em Ipirans. Mine icqucmc, illDceicente Sole, fe itcc um
 concahn: Sc occludit, nee amplius denuo aprcitur. Florem excipit capfula Olivans, viridis, fi
 daudens angulofurti, mjnucnra, rufcfcais.

Grca fincm Junii florec, Augufto & Septembn Icmcn perficit

.A, 9'. **Lycbtii vsfcesa fore mtfofo CB. StfaimiJtt StlsmmtkuM K.-gwn Gar. AUfeifuL, Sultnnumtica major Park- Mufaf. nwfcovj flertftvt Ocymouia Biliiforme J.fi. jbpamt Catchly.**

FelU primum pullulancia Bellide folia vel potius Globulanx referunt, fatis denia, fibred, ob-
 feurt virentiaj fapore nuilo inligni; rcliqua per cauti anguffiora oblotigioraquc confpiciuntur, Sc
 ad- genkala mulw breviora Be tenuioca enafenna. ^ Caulei pedales aut cubitalia, in wlt> etlam
 duos cobitos fxpc extedunt^tcretcSj hirtuti, inanes: a caubs medio fijre ad (iimmum fora aligu
 modo racemoti, ex longulculis pediculis fpicam longiore ...
 mufcaris, fingulares autem parvi, ex luteo herbacei, pentapetali petalis parvis anguftis, cum pluri-
 mis inns ftaminulis prelongis, concoloribus, calyculo friato infidentes ...
 ijuw -v<jtka uxapiunt
 u "''' -...v^ i ~r~«u.u .«, Mur-j. . . r- r- * . . . £ long
 alba. Ta&u glunnofa eft haba^potiflLnum circa (uperiora,

Urn. Orca Newmartet locis glareofis, & in campeftribus eundo a Bartonx molendinu ad Tfector-
 dam Norfolaz oppidum provemt. Cluiui laptdo(b fie ando (bio circa Salmanucam oblervj

1 J. Ljcbmi fyhnfrit minima fat mufitt Botin. MonC

110 vat fili* prodpdt Carj-optiylli (ylvcftris proLfcn aemula: C**lu eft pedali>, xt mus, in
 3iios tcnmffinM> lubdiyiiiis, in quorum iimmmtate captuU puwucuntur, ex qutbus tantum fismnt
 vtndia cum apicibus, ficuc in vifolo flore muicofb exurgunt. S<mtn parvum fufenni: \scida est
 plarita, annusc durationb.

Uftu In luco Gramuncio Julio 8c Augujto menfibus occurnt
 Planعان luncin fylva Gramontia & agnt vidna in.entmus, & jtj Catalogo plaiitarum tranfina-
 nnamni Ljtbmdtm •vifcoftius ercilam aimxam cmjofbjSoiJem dcnominavinius, b'clui ci anguffiffima
 int & CarlOphyUcorum fnnili; CCddet tenues leu tamehi firmi, creAi. CsfarbUm uunmj
 os & ramuli. Flore» non vidimus, jam ciiim Augufti menib medio prwricraL

11, Lycbtu v.feofa dh* angujtjfyha major C. B. Ljeb. rtftwt folio -vvrtdt, fa, «/», CluS J. D. j^/v. lo. Cluli CarjvbjUt i'uulis fiurt cunMda smgno Ger. cniaw

Cluf. K'lis annis ex caJcm radice novi prodcut catdiculi, per terram fpirii & I
 usEeni. ...
 >: ^IWJ in Juninus caultcui
 Bconfluc ... ix-vajcuL ...
 mine (quJ noti quand a ^ ; nitaram cum A ... floribus hibe ... i refoita: n Fibrof | u b <
 i iw quam Facik- pang:
 tnea m ... inatarufii Alpuun Si Snetlben fupri unnbuun Neubre radice; abundannus

Aliud hujus generis multo minus et; angustioribus foliis minoribus etiam Hore, -atoris notis non diff-u, inveniatur. */*« i] uncuparo, foundo (iupra Gan mig.i m niillian. ! ychmisyiv. all angul ifbiu minor C. J. dicitur,

§. 8. Xycknides aliquot miscellanea iitcerti Jiuis, Sy exigue.

i. C:yi >>:r Alfimts eahce obiongo btrfuto C. B. Carysph, montanus C/wfi Gil. Pirk. Bttmu*

Longiuscula radice squamosa, subfusca, aliquot fibris donata figitur, in capita aliquot divisa; ex quibus exeunt pediculi uncialis & leucunciales, uno aut altero nodo articulati, binis grammis ad similia genicula foliis vestiti: larem sustinentes durioriscentem. maxime carentesibus ex calice unglii ftrino, hirforo, in quinque bonus divitb, quem noiimepte GeticLsn;lli; HLdvctici :ori compares- Felia ad radicem crifliLdcuIn, liic-ulenra, Caryophylli nuniu folits feri familia, ftt-quentiEfimi & conC.rtiilinUj amariufoli Upons. Stm Cludo oWcraxs ntrn licit.

Proveciut InT-uroCirLQchia: monts, Solorcnui 6Carenifplerutencereferto: Floret (ub fuKm Lant. J-Jji 6c Augufto Cluf.

1. CarjofbjSat arotmfjt gfa&tr txmimttt C B. Park.

C. It. jrad.

Ex radice capiLUceij nifclcente r^uiiiaihi mm. vel alter, tenuiflimiis, geniaitatus, pedalisprodit; in fummo valde r(HJ)W, ran nuls capillo tenuioribus; quorum lingula tui. lot fistulos albos, mtnti-iffEIIUKj in duos apices abeuntes sustinent. Folia habet paucis, longa, angusta.

Vires magis:ii'iine: nain 5c leii palmam est, pauciflms, capillacos, brevioribus: tolioln: ilium exfngmCK 'ollibiis habemus; hun, v.ro Monlpclio.

Circa Motifpcliini non invent. P. Mdgnol.

AnLydmidis 3ti potius AJlincs species BtaeSanus.

* 5. Ljchnu Mfinaglabra minims: i.e. dtm<uUmu> i Almas glabra, aut Caryophyl-iminima fptanprf Me), fi, _^i'o. Alfn*glairr* CD.

jf.B.

D. vitifculb & pro pUntila: niotlo etiim (rraffiuiculu radicebus mtitur, albis, non aiimodtim ii-br o lHj iapore 11 u quilibet, pmaricem: 11 i i m' dto. uber (s, re tundi, cenicubti, in ramulos aliquot, hique in -Jios tiivili r Ftli* oblo: glabr^, acuminau pal-lide virentia, Lini formi lei breviora: Fives lurrecti, candidi, toliolo quinque per er extroi: nro denticulata compositi, stammbis aliquot donan. Caliculus in Lychnidum lyvestraum morem: ft*. mattiSj striatus, luperius nonmbul fimbriatus. Vafi ala succedentia ubi deluicant denticellis fctas habent oraSj im quibus/in» tcnua. Herin paucub est.

In Alpiibus vani- in lbtis oritur. LodslaxoJis luuntdu gat"let.

Uetu.

4. CtjofyUvs grtm'tHK folio mmtmw C B. Bttsnicd M unarm Jive Ttonca miunt J. B.

Ra4ix hujm pro plantulx modulo ctaiTuicula est, multorum capitum: Calici i numerolTj julirures & alciorc-, ranoii: ad quorum lingula geniaila lunc feliolm }>:•>, ex adverfo potita, pcranguftra, mia.ini brata long : extremis ramulis ikikuh ni-ijulculi, fingulii cs iiiiicm alcantur, ex albo put' yrafecmes, pntaiictali: in tingulis pctalii flria purpurca; eaUu ambiente c\ squama obl agii, li-n.ii vmdancibtis friads.

Ctra Limborgam in Bavaria. Giniuiu Sc Florcnuam in Italia, atque alia • im tn Iralu <juam LKMI. in Germ.ina copiosum observari • ius.

At: ad Lychnidum an potius Alfirtarum gen u referendum lit dabitcj, quonkm non memnt, an flons cal] x integer fit, ut in Lychnide, in in plura log'icnu ai fundura ferc rivifus, ut in Aliinc

5. Bttmief five Tunic* nummx [tnulu plants J. B.

Dodrants Jis efl ptanti.bj, aliquandopccinlis, gra< ilis, plerumq ramulorum divifura stipata, hanc fecit ferè ac Alfine angustifolia, i :ua canic: pleribus nega manifestè differt, quemadmodum a Betonica Dtininu quo;;ue. Felia: tara ^ ad fingulos ramulorum geniculos bina, angustissima, longiora quam i in Alltne difta. Eixtremis ramulorum fofcals appcuti fubpurpuri, p • K'li Be-tonica modo dicitur abquatens: iitiitescal' ce foliol • qui Sc v: tnia fequenza flofculos sustinet, quz nulls flru pradta fiant, ut Alfine tenuifoluz: S mm* omi'vient exigua, valde nigricantia. Radex ex j¹¹ 1 emalque alba, led dura ac liffoli> in ali quot divifuras fecta. Annus est.

Florebat & femen gerebat n -n(c Augulto in ag rns montis Rofiberg propè Alajmanftir: Monbel-gardi Jumo fupra mtea. Nos etiam, quantum memini, hanc plantam invenimus. « :ii agi' propè loguni copiofè. Reftus ad Alfine genus refertur.

* 6, Lftbnm fjwffiru mourn* *x,p» fi>t C. B. Park.

C. B. prsul,

Ex radice obli • u^ tenui cauliculis rotundis rufefcens, geniculatus, trium quatuorve unci: irtnij in alas mm in)a brachyatus exurgit, foliis binis exiguis, acutis, ad quemlibet geniculatum & alim, ex qualibet: ala pedicellis oblongis, angustissimis, rigidi, quibus fofcals purpurafcens, • quUMJue I o- lalisjii: gulis cordis formam referentibus, compositis infidet. Hec

H-is duas species in Anglia spontaneas invenire tradit v&nis in lock Ir reve. a precedem nubis
fiipenus iib ntulo 1 ychnada fylvestris L. iurur ainnat florc minor e carneo Morif. delcrops finilis est
li non cadein. Huius autem alimz nihil a nobis litnile in Anglia nee vilum, nec aulim.

CAP. III

De Cijio moHtano feu JJCAO Alfao.

TT i plantx vera & genuinr Cifti fycda funr ex liore & vafculo fcmlruli, loco Mntuni
171 ferunt.

1. Ledum Alfinum birfutwn (L. B. Ledu-n Alfmum ftvf Ref* Atpina Park. Nn
tjmbnCdam nlia Ltdum kirfettnt J. B. Vi'iai Ltdum Atpinum Cl!:> Ger.

duf. J. P.

Mu... ts fielttiibmjam'v> ac hgnois, L'ubitalibus aut paulo ton^ia
tat Fait* porilfinium per r,imorum BXDBm confptdnnnr, ;c illicn^
ifldi Alpini yl-ibri, 8c ubnidor.^ Chamxlcac [talkx foliorum an
J.icurato 6c Iplcndente, inferm dilatore, per ambinim
;x)ris noningra[i,aronwnc 6i nnnllili rcilin
; coma ferum, pediculis hrfucus u
panna: modo concavoriini; qui fimm
neis veluci guttis (cum i
parte dilatis ru
in, iliquot jiammulti intra Ur^n:
pala quinque ocellu
i is canftaiiru, m qiubm /
lignof.i.oblonga; iedrami pcrcterram fparli:
In iiiiiriii Sntbrrg, Snealbn, fVechflit, purrenjrem & vidirungi Alpium ji:gis mter (kxa ad ilc- 1
vexa plcrunque latera uivenicur. Nobis in praxepis Alpium fopulis propc Patubam oppidum,
qutxl Veneaanum & [nij^rulc rcrritoiuini ilifterninat, obfervatum cft.
Floret Junio & Julio: Icmcn Augnltonu-urefcit aut aliquanto fo his.

2. Ledum Alftm filia fWrta rubigint mfricsn's&ui C B. Nrritim Alpium quib'lam, alia
Ltdum gUbrum j. o. Citmicrivdot/cnJr^i Alpgtvs Ger. Ltdum Alpium feu Rifa Al

Chf. J. B.

Rawi nuic concord, digitali cniflttic, cortice veftiti extimo quitktn cineniOOTj irriorio autem
nigricante; at minimi ramtli (iibtndc etum nufK:;
gum conferta, glabra, brevbw hxrem pcdiailis, Lcntila folis parva; nec formi diflimili, nifi
tjuoil craffiora: nervoliorn, minime in anibiui hrfuta, fmwriore parte virent, inferiore ferruginei
(unt coloi is, 14jX) is adtlringCHtis & qiKxlimmchlo
dilatores: Capfula & fomat liniiltj. Radix • oblonga, lignofa, dura, fubulgyo exercee.

I [ujvjs Foli I (lului); II lora nec ita conferta., majo
predita quam precedentes

Hujus porru drcalorn (iimmitatibus eapitMU quaskm tncrcfcanc fquamis foliaceis congefita, ob-
longa, Pc gi:ninii majoris (p:rem ex li^na, colore ruiffo forh, irans flaviccns, cupimodi in
"aliubus cornimtur. Folis vero ramifque adnata aliquando reperiuntur tubercula nunc nuch Pon-
tic c, mo i Piti magnitudine, inaequalia, foris rufticante aut pallcfcente nonnunquam colore, intus
fungofa, albi, guftuofe adftingente palpi plena, que Gallorum vicem p* tare poffint, cup-I modi
pihik

Invenit Clufius in Swealbn fupra Newberg: nc>i m liimiiii [ugu inomis Jur.- propc Genzvam: Lant.
J.B.iuhinus un'uniquL- in mondbus Rhartificus Burnuo. Floret uti unque Junio & Julio: Sines fub
Augufti rincm .iut panlo (crius mature (cit.

Utroque Lttdo Alptno tincoi-es, qm montium Sitting Scaliormn ridna iiii.hibiunc ubi pro
ucunturad lineas p<iutas nigio totu
ulas, amot: Ci

j. Ciftitu tumiU/t mtmtit BaUi, f rti Auftriacu myrtifida J. B. Ch*m. b'rfuf C- B- Cifus lami-
U Akfrifca Clufii Ger. Cbem*afha hnfut. Park.

y.R.

Campufalis fefcualibus & ... quadrantalibi:~
virentia, crebra latis, fimilia Myr... vel Lentis folis parva, nec ita diflimili circumfer-
poliu diverfiflimo, qu... inconclita tamen, fornicatis pilis lupca, fubulqz do-
n ju, P-r II^A
Cum iJiul' itamibus.

Eadem forte est (un... J. Ui.;;inus) cum Chamxcllo S.C. '4/quem fk deli'ri)'fit;
Palmaris est aut paulo amplior, [a nobis obfervans fempiterna i eratautakio,] fupcrioribusque
femur, folis, lignofis, rectis & nigricantibus ramulis pediculis, quos numorol & adq conferta
ambiant folis ut quaternis vertibus difpofita videntur, Myrti minoris folis non diflimilia, minora ta-
men & hirtuta, licet atra viriditate fupreme fplendet it, cjuorum gu!! s adftitionis participi efi.
Flor urucii, imeiiiiim Si alter oxt-... ramulis e;it, Luis craffij pediculo fubactus, amco quidem
confiam f w j led tjuinqe protundis craiis, tiiltldtnqac velut etron.i:la divilo ut quinque fol 1 fu-
bens

terc VHICKI!:-, ejuſdem turn 11 dianthemo vulgari penè magnitudinis, coloris ex albo purpuralcent-
 rii S- quali car ntl dilutions, d'ecem flammibus extremi parte nigri & stylo oblongo purpuralcente
 medium florem ocoipa; rubra. Floribus excuffis apparent pentagona bapula, obtusè mucronata,
 quae maturitate aperu fmn continere deprehenduntur exili admodum, flavo coloris.
 Ranflimum hunc fruticem duntaxat in Smaltes iugi Scopulis nascentem observavit Cluſius floren-
 tem fubmerUisJurtti tiitem; fen line vero prxgnam em in Poyrtaltes limbo ſuperſilio duobus lapra
 Ncubtrg :: ullianbus. No- m Tupil
 mus, aim Vicuna A ulthaz Venerias iter faceremus, Septembri menſe.

Lmi.

4. Cifiut Udan folikRifm.- C B. Refa*miH fjhtft Urn I R

••obmttum Matthioli, ſive Ledum Siltum
 Jacquin Ger. item C!>ui LtJum Refimrni ſila eju tun

Cubitalibus interdum eſt rfit, Emm, lignofii, cortice emerco oi
 plures alia ramores, & quoda iinO(io purpuralconces, caique criam nmUs ilivjctiinotr
 if i* noſi dodrantales ramulis, virentes quafium, led tomento quodam iſſini, m-i >
 la fene digefta, fed conflata in m. hit b & «, Libanotidis O feliiſ /W I
 in^ pa to virtua, adcoq. • in protiam pansm reflexa & convoJuu, ut'
 pratermrvum Iccundiim folii longiru.. nem ex...-rentem, I muli tomento cum pedicelo cui utinaver
 c et cttijgiar: ! le ſuaſis odori, acriſſimi autem ſaporis. Summi iſtis ramis inſiſſe
 multis brevibusqu.il! f^uamk : erugines compacta, ex quibus deinde ſeſe explicat corymbacea
 dem multonun fiorum. corua, oblonga, tenellis atque virentibus.

ceUisinhacrentmi -lbis con petala nonnihil ammen lanueinofo, 2U.
 /«*»& a in ſua medium florem occupantibus. His demum ſuccedunt oblonga, caſa capitula
 inn, Argentea puncta diſtincta eſſe videntur, ſed maturitatem adepta, rubagine ſunt coloris,
 menq. e continent oblongum, flavoſum, adcoque exili, ut ſcobs e ligno vortibus arolo ſpen
 dcaikniLi inftar lit. Veiim pcailure in Uliſ capinUis eſſj ut matura deorſum inſiſſant. *
 rimque inucrone (pedent nu^n.i n.itur.i :•: videntia, ne ſeſe ſiHuat ere e
 quorum con fact udmeni, a pedicelo non ab extrema culmine aperiri & dehifixe r l''
 femine terni aw qoaerni ramuh, fubigmo tomen, o obducta cu:) imſ foil 1^ulm ^wio
 bus nafainrur, ſpem riorum in focquentem annum pollicentes. JWJC liBolidV^i, ^ L^Kri"
 bnsdonaca. «B«WI* tit, at bievibuj it-

Lasf-
lasfm-

TocapUma, pnefetim flonbus onufla o.lorata eſt, & aromaricum quidpiam feit*
 mini non eſt ſi, telre Manlnob, reMms Inpdarur ad ca; a tincis pr.TiG-vaniLs ^ , quare ni-
 N.ificimr plentique Sled: in locis, autore Cluſio, Matthiolo in Bohemia. Floret ſub
 ac Julw: femen Aug. uſto ac Septembri maturum eſt: Inhxrenr finem J nn
 annum capitui. he ut recenti flore, & fructu ſuperioris anni vacuo, nonnun [uentem L
 us pqdicelUſonuft, ranii contpiu polint. 5 << 6c tertii ai^u

J. CifimLtdm fdu, Sdkh a*g*Jlfi!u C K
 mtrmum ſylvſtfire i»(ut park. Roſmarinus ſylveſtris aerye Cluſi J.D. Roſ-

Cluſ.
 Pedafis eſt alitudinis, raio amplior, tenuibus, fubn:bentibus ...,;, praditus, quæ deinde in te-
 icandit antelique rji»<#j dividuntur, anguſtis longdqjic f<,!ſy 1e m re & confuſo ordine eos
 IO& iupem. vircnt^us, bfoS vro e S S f f l & \
 ex mulns bVenus Iqnamis compacta Cachryos modo, — bus ſeſe explicant aliquot
 ſiſculi, tenuibus oblongisque pedicellis inhaerentes, quinque foliolis, ut ſuperioris, pradii, ſed diverſi
 coloris, rubi nimirum ſilumoru ſive quodammodo carnei; quibus excuffis pentagona conſpiciuntur
 capitula, brevia, obtuſo mucrone, exili, pallescente ſemine plena.
 Eodem quo ſuperior tempore floret & minutum lemen profert.

CAP. IV.

^5r Cifte gnuine.

C UHSJ Græci αἰθῆ & αἰθῆ & αἰθῆ : fortè inquit C. Bauh
 lem foliorum limitud
 & Pinum pro ſicy
 « legf conſtat, nam HedeSmverS^
 Appellant. JaBoitus i Stapcl * <nn
 aoten i Cillo pner i nomen ſumpſiſſe fabulantur. Fabulam vide apud Caſſianum Baſilum.
 Alii i w (*Ar v< rermis, corculi, aſſe dictum volunt, quia lignum Hoderæ eſt admodum porolum
 (k aquam tranſi I ctiit'citbon
 ob dntie; a rationem dictus eſt.
 Cui genuini notæ characteriſicæ ſunt, Frudcofuni eSc & ſubſtantia lignea, florem habere pen-
 tapetalon amplum, & quaſi roſeum, caducum; capitula pentagona. Foſta habere in caulibus
 ramulis ex adverſo hinc omnibus ciffi generibus commune eſt.

Hoi piofcoriJeni ferui' leu Ciftum simpliciter dictum & Ladani- ferum; Non Ladani- ferum deinde in Marem & Pa- minam. Mircju vo qui album, lir.

cum aliis plerisque Botanicis sequenti Ciftum primo dividemus in non Ladani- ferum; Non Ladani- ferum deinde in Marem & Pa- minam qui florem habet rubrum nunc saturatiorem nunc dilutiorem: Focuniam

De Cifla mare fin Ilcre rulro.

1. Ciftm m/uf folio c&lmgc incsne C. B. »x tv. folio oblvngv alb'uly J. B- mat vul^arx Park. mat earn Ippoaiiue Gtfr. ttiiv I. Clul. J.B.Cty.

Frwx est quamfamina robuftiorj al bidior, bi aibitalSjfClufio * hum ana alimidine,] hictatis, * Nihilis uno- quam ea alti- tudine vifus. iigno fatis fragili, & caniiioaim: tonice tetlo: frequetmbus rsm, alee natum femper ex adverfo reipo: i(lejtitibus, candem cdam (crini fervantibus fetui, qua: onuniio iint incina, moHiora & Ion- giora in fiovdilis planci; in adultis v.10 contractioia, iuriora & aipca. adfringpnas euflus, in- rurne rugola, angufho. a ipfiorique quam funtue. r/a; ejus Cynorrhooi aut Rolz tyiv. magni- tudine, pentapetalos, dilutioni rubei coloris, feu, ut vocant, incarnati, multa flaminibus cum luis apicib i roccis mediis occupantibus, confertus, agrinatione ftipatis, numerofo in ramulis. m extremiij ex brevibus, rubuliU pediculiSj non debilibo. • ibluigss, Iuiiut.it:bus ut in CiRu tu'miru: quibus dccidentibus lutceduiu Capfule qu. dam pentagona, dura, huf. rij mucrorura, in qmbus exiguiiij eft fnto> ex ruffb nij?ncm^ femina Hyofcyami aut Papaveris mag. ninditiv'. J. B^uhii- us capinih u itariani lecti ci .iki ibit, foialis i mbus mucronatis hufum oblecta.

Ad il.lii> ijtiices, qux lojiinus coibii bus diffundantur & coherene, Hypociliidem oblen- avit. Clufus cepiose nafcentem. Per Siciliam, Italiam, & Gal. i*n) N«rboncjiij;iii in h, rularibus & faxofis CiAhm & fylvis copiose Lem. n alcentem obfervavimus. Vetere vim adstringent an Ciftoattribuunt: untie fl(vino a uftero triri 8t birin Ac poti Piss. dyicnterus Scibludi mbus ventris produnt: ulceribus veteribus & ambuftis cumcera: & per led' n ulcenus. Diejter. Vin. Ladem ferè habet & Galema.

2. Ciftm mat angupifUius C. B. Paik. Ger. mm 11 folia la gmt J. B. mat j. Cluf. Cluf.

Eadem altitudine qui fuperior allargit, interdum etiam majore; non minus fruticofa ftipite, ne- 9 o minore ramorum frequentia, minus tamen candicat. Folia praterea eodem ordine difpofita, molliora iUinen, longiora, anguftiora, & iugis inucroiut.i. //» lupenoci Imulbjincarnatu^; capi- tuliscuanl & femina parum differt.

Nafiat in Hilp.nn.i, S: itlunus rail q. s. maris generibus floret: item ramIUB ejus lub Autunj- Locu'.

3. Oftttt mar folio brtvtrt C. B. Park, mat VL folia itlmim virtmAm). B. mat ;. Cluf

Superioribus Wevior eft, non minus tamen ft-urjco&s, fed tenuioribm riant. Felt* ejus jam iliAo cvioraj & Jilunore viore prxtUu, m>g< niRi bla, pingua & odorata. Fes aliis fimilis, dilute ru- bens, & aiiquaiitullim odoratui; quam noi um in reliqua d Cifti maris generibus non obfervavit Ci- iij. Huius capitula liiperionbui mko inln ora lunt, & i i inoiucriis, qux florum ces f. mc, dio> mni rornlraum quiddam pinguc & otlofom contrahunt i i inoiucriis, qux florum ces f. mc, dio> ttxilratur. Smm ia capialifiatquak.

In Ijuiiunu iblum bum. fpoote nac jutcm^ liipraUlyffippo! rem itine J Conim bricentis, icque Lem, CttatB iniuruinu-, oUirvavit Cliilu* Siifi-ucr hunt wm dijferre Q>tcte a fr&ctiUme, ftd folut iluntaxat vir'urt, fti nihi! tmere ajjery.

4. CJ?F mat fetu retmndvbrfittlfitna C.B. «/* L ftm mttjfr ftrlie%lxnJt?rt J. B. mat i lia fhrstumio Park, mar 4. Cluf

J Cluf. Himi.tn.! alriiuiine pleruntjuc atmlu'.i, itt i Jujia Cifli fniricofus: rtm-.. aliquantulum incanis: Folia relijjuis m-ij>ra &>, vani orbiculati, hiriuta nonnihl & njgoU. i la reliquis formi fimilis, paulo niij>r & colore faturadus rubente: i*fi*U hiriita, dura, penugona. fuperioribus majora, in quibus vmm rurTum, Inviuicr Regno Valentino & Aragonum. Aiuit S: in lulu bequemem ctT;, not tomtit At >w Lem, vsiltmm ; ftrti m Apulia mvtmtr.

f. ViTba'jttm (u'jTsiunio Strfyuc falu C. B. filvrftilium txotumm • Judo Park. ^fc fyor- fte Salvo filtuw txotteHm Lob.

Hec folia rofandioribus, denfioribus, candidioribusque minus tamen lanugine canis, fed Salvia emu' la concretione; alie .jmn lig noia fibratiq le rjtut, CJUIC & fttie no ita diffimilis ligo- non (Phlomo l. JInm alteri Synacr] illidem gaudet Syrix natalis. Flores Lobelio videre non amtigit, at Cii i emulos appingit Parkinsonus, & pentapetalu' i, pecalis lubrotundis, colore flavo, ibfiimubs rubcatibus i biferib.

- 6. Ciftui mat fl.iiiCh<tnneJr)i C- B. mm f, f«U* criiffii & yuoJmmeJo{anteftt J. B, mat Amtaim Ger. MM kumi{u?2xk.m*t j.Clul

Cluf.
 Humilis „! & fiipinus urplurimum, pedajibus r.vnis aut paulo amphoribus, nmltis ex eadwn radkc prodetintibus: *Fobs* criffa font & quodammodo Imofo, condicant, & hiffois, gu: acerbi & afrinKcnris. *FUei* ramulorum {unimiutibus squall akirudine 5c quaji umbellaoni nafcuntur, fiipciioribuspauli minores, fed cleantis ex rubiopurpuralcenos coloib, intnfua uquam in quarto, *CaairM* reliquis minoraj luis involucra plerunq, cont«U, /f««» coutineat ICIKJUL. fimile, magis

Locus & Tempus.

amun. In (oil Luficanli nafcenrem vidit Clufius, nee ufquam frequentiorecm quim apud moaafterium *Ptra Itmga* dmium, qiiiimo fnpra Ulyflipponcm nulluri. Floret April) faiiiive aut u«ib pro loci I ^ H tura & reinpraniento: Sciuen Augufto, Sepcenibri a;t Octobri nuirurekit. H

D. Mignd hanc (pccicm mvenit in fterilibus locis vulgi *Gtingntt* utter *Tznanu* & *Btutrt* Mato menfo florentem copiofe.

CAP. V.

De Ciffo femina.

*Cifim fatm*rut folio *Salvia C.B. fen* WAJ Gcr. /**• vulgaris Park- *femina* *Montpeliana* /-T<dt? & *Hispanica* *lutte*], B.

Cluf.

FRutexeft ramulus, cubitum interdum alius & erectus, nonnunquam fupinus & humi ftratus, era cibus, nigricantibusque ramis; folio non minore quam in maris quarto genere, circanate paulo ^{ten} minorem quAm nus, qum generis Bon pine dmilem, album, nonnunquam cuam fijvum, Lrci» fibrisj utinRofaiyWeftn, medium florem occiipannbus, non minonbus quam mans, multo imwnbus quam Lwli *Cant**!-* tminota fiinc nui is cai«uilu, rugnoia, non mucroruta fed nonmhii comprefla fupciore parre, pentagona, *fimm* P4LIO Bigrius **b tea** nutnimi cominenuL

Locus.

In Ilcrlilioribus & (Liqfis collibui Sc dumwis per Itakun, Siciliam ttGalbam Narbonenlcnl vulgatifGma eft-

Duplex lubetur, daoor & luimilior, ut ref; noUt C. Baulunus.

CAP. VL

Cc C'fto Ledo fen ladanifera.

HOc genus hiimore pingui, Ladano dido, qucm copiosi exfudant folk a pneedenribus dU flingiuur.

L'VE LADANUM.

E folijs Cifti Ledon appctkei exudac liquor quidaniy Ladantim diflus, in tnaflii graves ex DUT-pura fufas coadas, odore valido fed fuavi, infimmabtlis, aoccnGqoc gratum odoreni k

Milde cal- p'nd.

Tradit Diotecondes fuccuni hunc hircorum barbii dum fruncem depalctmtur adhxrecti depeSi; necbarbis wnrum (oi bi femoribus fillofis. Qiidam ctiam j i. aqua) funiculos per frutices trahimt, & aulwrcm iplis pin. Quomom .tsraiam cifovnuilL Qui modis eum colligendi rde i fat eft quem I & Caocuradra ravirita deferk i • Græci colligendo Lad. pccuui.uc J: trumentum pi iraitt raffro dentkm expcin Groile, *Er^tjv* i illis dictum. Huic affixz funtmukj e hgula five z>nx i coriorudi ne ardorei Sois caltris cl abradendia Iuque Ladanum collicendi Cimmus, imi uuok-rabilii eft!?

bor, cum toto dies ardentillimo caticulz. aftu in montibus hærere necesse aluz... ad id colligendi operam fumit preter *Calabris*, i. e. Monadios Gra:cos. Siquitumen in Hispanis huc colligendo operam navare vcllet, multo mmore flRciulTri tur) tie^ magn; m c|ts loi puriffima, retinoli & odor. opiam colligere poffet; cum integre aliquant' tinuntur ommuni ted quod Ciftus Ledon flore macula nigri cantcnotatoinlcnl.

Vari.

Ladanum ¹⁴ digerit maturat, anehuat, apertt, orficia vciurem ri: fefatj -mi iht „ cap. (inquit Schroderus) humido ac catarrhale *Mf*t*ltm* ^ tulli a cralla pinata, in Sangria, ecc. Extrinsecus eja » increue dykntcnk Landing creores in dynis, tuffim ledar -ns dt in empUftii* emolUctn boz, ano- i via dolose venmo.ii (cu^ m^ko I i vuo & lava; in odotu.i ga & cardial- i.LJiooi. vel i. 1. i. ante i. ante a carat & W

In f... i aligns elfi... in pellendis secundum & scribis immortalis; in scirhis uterina: pecc...
liartherad uteri vna co... nvmmit. Dk / . Galen. Ploc.
Maximccehb atar in ulcenus am ...nm nugno Ubinrum cu...more & duritie.
GalenmLatlanumdefld illosrenne
mias lanare, upoccnugi is viies quani qua: Ladano iniunt, ...poscentes.

i. C. *Cifm Ladan folia Laurens* C.B. *Cifm Ladan* tier* folie J. B. *Ladan* 1. *istifohumi* Jul. Cef.
den latif hum Park.

S&perata Calpe, litore **mariao**, qua Malaceni iter clt, nafcirurhoc g:-us, latiore folio, quasi ad
LAhanguftjtblia: [i] horum formam... He am;>i: adinem accedente: non mi...
illo ha more abimdar. qu.ini III CIXK! .mgulhore ell folio proxime describendum.

In horto Botanico Montip... liaco hanc pul...
In horto Botanico Montip... hanc Cisti speciem vidimus, e vicina montibus (ut
nobis retulerunt) delatam: cupis pleniorum descriptionem e Parkinsoni Theatro Botanico mutuatam
dabimus.

Vena tliquot lignoiiis, quinque iunt lex pedes alts, in plures ramos dirifis affurgit. folia ad gemitu
cula binis oppui i... canct s, lationbus paulb quJm pro...
mum proxime acco... Icodtres, lupin* parte colore viridi obliano...
tibus, ad tactum pinguibus & glue nofts una cum caulibus & furculis talleis; olore valido laavi e
longinqtio oares (erieoce, acfr... tun tempore & nai...
mullii crumpunc flora J imp! ices, canditli, pctali...
m.ailis arentibtiSj alias ad unguis macula atropurpurea in angulum sursum verius producta no...
catisj in albi in ajore, in alio minore, multa...
dunt e*fit*r* gran... quinquenaria, dura, fibrotunda femina parva sulca continenti.

Quarrenduni annonhaC ipj...
efciibic Itiric.tr. lib. %, pag. 119. in qua airtituU...
tannil cxuitj obliirva...

i. C. *Cifm Udmiftra Hi\$*Hieasnedtts* C B. O/w J^M» I. I... Ger. C } m leJ&t fart nnuula
wgrieamttMatoya. Cfiut Lidm sngufiftimm Park.

Ckf.

U<v (inquit ClufiuiJ omniuui per I ii¹...
fructu...
icad nomioa...
nigrii fi/ia quenwdmodum & ramie Gufuur, oblonga, tranfverfum digitem quandoq;
lau, nonnunquam criam brio...
nellis ramulus pinqui quodam, odnL...
procul etum cxlpkadore con(pia & agnofci pollit, (woraut^);
j fimplid quinque foliorum...
ex purpuraiiencante macula rhoir, ...
infeia (iintj nonumbilico mulciscroc^u ribiispleno. C*fif<*>ii] It...
datisj omnium maxima, rotunda reri: & plana,, non mucronat.i, & laponumero decagona, JUMI
intends Haveicnaaj quibus dcliiJcentibus frmm decidE copioiunt, fabulam, ontxuum minudi
limum,

Tota plaiuaj dum relitxata est, quendani candorem contralut, pingucmtamen ilium fuumlen
lorem & fiuvcu odorem rion.inmtic jerniultm annoi.

Crclac frequentiflimc multii Hitpanuc &: Lulu...
miom forum hominib...
collibu lewumqucde...
cupato. Repentur ccum m^x cam...
Lulu.

• 2. *Cifita UJmfdui Peputi mgr* & iM^rC. B. *Cfi.LeJ. Pefuit mp*fptijt Uufu major* J fl. *Oft*
*LtJ.P?»?ulnt*frmUm*ier^>ixk.OfiMJ.* 2. Cifm Ger.

CUp

Brevius est & bicubitalibus duntaxat affurgit *foliis* ramosis: *rami* sunt fragiles: *folia* omnium
inter Cisti genera que observabat Clufius maxima, superne viridia, inferne nonnihil candidiora,
Hede...
ze foliorum formam interdum, & Populi nigre plerumque xmulantia, lato rudia & carnosa,
hyeme rubedia 1 ;m nonniitlain contraHciun, tu^• ad i & adstringentis sapori. *Fis* candidas, Cisti
forainz Don par: *CftiuU* penragona, nuici •nata, exili & nigricante femine reforta sunt.

Tendlac pl.intje neque pingi...
pr.tferim, quocimKiro 0l...
& magts tenad, prargi...
nt.

• 4. *Cifm Ladan folia Populi nigra*... Cli, P*f>!*vfm...
Pop. nig. folia Clufa •wrjia...
populta frmJt t •er.

Cuf.

Prccdenri per omnia limilis est fed humilior, noque cubitum excedens: folia ctiammii...
flore, len iino guftti conveoiunc.
Utrumque Kenus iwlaturo in ex 1...
eft... ijuj Ulym'pponc Hifpalui iter uemne, fis uujuibdila.ii coliiUiu Graxuuc ••...
Dios.

• 5. Cistus Ladan Creten C. B. f. 7. Led. latifolium Creticum J.B. Cistus ladanifer Cjprta Park. Et Ladanifera Cretica vera eisdem. Cist. Ladan 4. Clusii Ger.

Cubitali & i. r. Juni nujorc alimulin. iflurgit, iruncolum, nigricantibus ramis, carnosis foliis (& pax saturata viriditate nigricantibus, mollia inter primi & secundi generis [Secundi & tertii in ilirri folia magnitudinis, breviora tamen & rhomboida quodammodo figuræ, que cum novellis ramis lent" & rosido humore oblita sunt, non adeo tamen abundanti & d. info, ueque co am adeo odorato ut in secundo genere. Flis albus est, secundo generi similis; semes turn exile nigricans in rotunda capi mms.

J. Bauhinus folia infernè candicantia, tribus fecundurn lory uadine decurrentibus nax v. p. iA tagii eis describit: capitula < ireris circiter magmtu Jmi;. -Olyæ ferè five oblongi figurâ, huc cum quinque angulis, membranis distincta, plena /ir» w^ ounw n, papaverinis, fidei, £ galotis.

Nascitur in Creta & Cypro insulis.

An Alpina de hac ait? Pbnam w gna Udanum Crtfenfet colligunt, danc diffirrei tem ab ea quam haecenus fore omnes p" »««?. mfpn; Cistis femine perhumilis est, fol liita[] n c' h liagoribus prædita, Salviaque proxim is, Hordlque fm fyreftribos mlis omim to simili, I(J1= etiam colore, quam Cisti femine majores. f. B.

Hanc in exoticis describit Alpinus, quem consule.

' 6. Cistus Ladan hirsutum C.B. Oft. Ud. 4. cft^Gcr. 4. Ci'i flore candido J. Kbirfmm, five 4 Clusii Park.

Clus.

Multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis & flexibilibus, hirsutis, albicantibus. Folia reliquis Ladi generibus molliora, ad Cisti femine folia accedunt, verum paullo longiora, angustiora, hirsuta, nigresca, & lentè pinguedine conspersa, non moslovernoii impore, sed etiam per totam astitern confpidunmr. femina Cisti flore oon minor, nec ci iblm,,,

nixiti Hini, riji rami

IKJ K. nera

In Cola CdlcIIa raci hoe gems obfcmæ QufiiB, viani pigo S. Maniitii del Castanul locis.

7. Cistus Ladanifera Montpellierensium C. B. Ladanif five Ladanum An. M. 11. (w, angustis foliis nigricans J.B. Cistus Ladan 5. Clusii Ger. Olet folis Park. Cist. Led. folis Olea fol angustioribus C. B.

7. B.

Frutex est cubitalis, odoratus, 1: 1 rimos pkra beachi atis, cortice Sucti... folis leliquiunciam longis, angustis, nigris, rugosis, ex l revibusiaterva Uisfibimua^S^S

obfci vanobus, parva, qui» quepartita, per mamriuw colon: fpa. lico splendens, non hispida, ca arpa hispida [nobis [yobusumen hilpidisocaltata] k femina minora quani inOf to mare Montspeil.

Nov. cum j II-uilmo, cuiedanj ailuntitur P. Mianol, VI D. Montpellierensis existimamus Le jkn V. CMnkfcnic ile hunc Mon (pdjenii, jamque & descriptio & locus conveniunt: ait eni: l nri In! iflo [rdi genere ralgarius die torn Valentino ICLHO & Nirboiicni] Galia, ubi aliud utiq Ladan non obier

li- H um Mrietases locorum dj?erfrtate pender. angustioribus, huc reducendum est. Fo

servantur cum Clusii tunc. J. UilJiiHS.

* 8. Cistus Ladan angustifolius e B. Park. C. Ladan VI, minoribus ang v\$^m i*fot fohuciufu j u. Cist. Led. 6. Clusii Ger.

Quinto prnc (mule c!t breviii p onibus, angustioribus, huc reducendum est. Fo 1. nto humore asper- albus item & quinque tois contans; semem etiam respondet.

9. Cistus Ladan folis colore cinereo J. B. Cist. Ladan folis Rosmarini hispida Ger. 7. Clusii five Rosmarini hispida f. liu Park. Clus.

Cubitalis est, multis & fipucmibus raw/ fruticam canenuxo ajlwre n ednis: quos sequunt fre- quentissima folia, Rosmarini corous irii WMW tmba, oammovici L Apida, nec mi- nus pinguis & lento succo perfusa ntyi^iupcnorifimilis, ntx/me* diffimlc. K us. Flis hincm ca- tis copiosis, ca ntyi^iupcnorifimilis, ntx/me* diffimlc.

IMC

v afaitmo ft. km> ha aCim oWervata (unt area tat' rva.

10. Cistus Ladan folis Rosmarini » itus incanus C. B. Cist. Led. folis Rosf WTMcmtil Clusii, flore latis J. B. Cist. Ud. 8. folm Rosmarini subtus incanus Park.

E' dem qui superius magnitudine crescit, rami tamen magis expansi sunt, folia tenuiora, sepe nã parte ex sulco viridia, infernã vero candicantia, ut Rosmarina coronaria: toha videantur, gustata- men adstringentia, licet lento quodam & pingui humore sint cum tenellis ramis oblita. Numerosi fiores secundum ramorum longitudinem nascuntur, exigui, postremo tamen descriptis jures, lateri co- oris. Semes in paucis capitellis ex cinereo nigricans.

Invenitur frequero incultisjliis locis ana Tagum lipra UlyiEpHem cum Cil!o folis Ha- Linn. Sec

' i t . Cijm \ Adon folia Rorifmarini, sed non incana ca c / ed. Rafmarini folia subta non in- camis Pai e. Cijm Leden IX. Chyfo J. B. Cijm Leden folia Rafmarini Ger. cmac.

Cluf.

Minus est superiore, folia paulo majora, mltic mbtus incana, uc in precedente, sed rariora & magis glutinola sunt: ramulos quibus flos infunditur tenui, >, cxiuccosj planque rei ornato; alijque in- ania capitula & exuilo I finere deprelienJekat Clulius.

* IX. Cijfn Ldenfiliis Thymi C B , Park. Cift. Ui 7b)T»i foUtt C/O/TJ j. D. Caf. Lden x. Chyfo Gor. en: ic.

Piitali tlunrisarcft altitutline, remain cxililwsj ligiv. in, fatis •unen fragiLbys, nignaintibuy pinguis B j & quodam lenno humore madentibus: folia longe minoribus quam in precedente, non turn Thymi folis diffidentibus. Flori non observavit Clulius, quemadmodum nec in superiore, sed in obtij gn ramulis quasi umbellatum prodeuntia capitula, exigua & fupenore pair, a- i, inini.i lam, & com fun ramulis arida.

Njtcutnt! hae duo »itrcnia ia extranaBa; ice parte [tiaOf^lliTONovam fpe ctat. Linn.

* 1 5. C/WJ Mj/rifclut Riileoruiu Tinnai. Myrtocyl / ^rHr^-/ Park. Cluf.C. 11. Mir.:. ITj, Vmua Anglo Ger. Myrtoc. Penna, furibus latius oblongis J. B.

Cl*f.

Frutex est intricatum tricubitalis, scaber admodum cortice, & veluti quibusdam tuberculis obito, qui in venulis ramulis facile abscedit & fr. adit. Folia sunt parva Myrti (quorum desinunt fion'm mis scabrum est quam ipsi ramuli) superne levia, conjugatum ut in Cisti & Myrti generibus circi rimulos nal centia. Flores summius virgis infident lateri, quinque oblongi foliis constantes, & multi in nodatulis longiusculis staminibus pectati: His succedit oblongum & pentagonum capitulum femine plerumq. Him.

Tota stirps odorata est, ::lentore: a five pinguent quendam liiccumiquali (Cisti Ledi genera madent, cifondere videntur.

Ex Baleariurfi inlul.i: um majore Mtjmea v.: go didia (-i-ucPenn tua. Linn.

CAP. Vn.

De Cijh Vdfcxlu trigonis, Sf prime De

§. I. />/jur(ttf/mricofiore, Cijlus femina dillo.

* f. Cijfut fxmins folio Sanipftl Park. folo Sa. Sanyuri Chijii, tit nratula in fiart J. B, C>D»» folio Sanyurichi Ger. cmac.

Cluf.

F -v est mulros gracibs r.imulos p oferens, in quibus folia parva, quasi circumata, incana, Sany- pluch-> (iinilu, pauli) mlp>ra & dorlo eminento, contranis inter se pediculis, ut in ceteris Cisti generibus, nascuntur, & adstrictionem habent cum quadam aciesitate & soliditate conjunctam. Flos in lamina ramis copiosus, albus, molliulliam petalorum macula & purpura nigricans tnlit, villis & staminibus flavis medium florem occupantibus: Capitula deinde Lini fore exagua, trigona. III (Habilis) seminum minutum Hyofcyam, ex nigro candicans live cinereum continetur. Toes vero oblongus i: j rainulij 1 u florem & capitula sustinet, tenuis manro arefcit, ut in si: !golul Cisti generibus.

Copiosum mvenit Clutius circa Cjraireja & toto Iktico ag: o inter Tagum & Anam flamm u. i.*mr

* >, C'ijtm fgm: > folo Thym Park. C B, le'w Tlymi CUjifmt mscuUvi fare J. & f lo Thy- MJGer.

Cluf.

Pedali fruticat altitudine, ramula ex purpure nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine folio conficiuntur praeterquam circa osium summitates, in quibus contentis nascuntur, exilia admodum, viridia, Thymi foliorum xmulu, adstringenti gustu. Flores summius sunt, luperior similem, minorem & nulla macula utocium. Semen non observavit Clulius.

Solum autem conspicuus est extrema Betice parte, que Castellam & Lulitanam spectat. Linn.

* 3. Cijfus femina folio Halimi major Park. sem. Portulacae marime folio, latere, blenfo C. B. folio Halimi Ger. folio Halimi, flus later J. B. folio Halimi i: Clul.

Cluf.

Cabatales aut amphiores profert ramos, graciles, cum tritoculos: in quibus folis Portulacae marime similia, sed omnino incana ut Halimi, obscuriore mucrona, subacidi & adstringenti gustu. Semen ramis molli adherent floris, flavo coloris, minores quam in superioribus, Heliantho similia, sub- fibris in mollo continentia.

Haec incedunt longiuscula & triangula capsula exiguum lubricum fomes continentia. Ad huiusmodi radices Hypocistalem observavit Clusius.

Cistifolium ma folio Halimi minor Park. folium Pirtuuc* ingram* titgmpivrt mucronH? C.B. folio Hniimi kvgian IBMJW J. folium* Iulunt j. Clusius C: jlmfaU» Jut/tW; la Ger.

Clusius

Proccrior est prior Cj firmionbu ramis & incanis ut prior. Folia etiam habet Halimi, paullo tiora, angustiora, • lagis mucron.K & dorso elatiore, incana tamen tota & sicca. ^ 1u6

Leon.

Uterque frequens est in Lihania arenoso solo, & rari marini afflato inter Ericas mo procul Olyfeps

" 4. Cistifirmm.1 Lavendula folio Park. folioftkx C.B. /#/)» LroenJuU Cufw^ fort idem cum HUBus emi rallo J.I.I. Dur icmitfolm Ger.

Clusius

Cubitali pkninqe alutu^ino cftj piuninis r.iniis ii(que bre ribus proccius; circ •; quas confertim mfcunt: folia angusta, incana, Laver Mx fbbii proxima, adstringentis gustu. Flos superior flor: •ilcimi: .ibftinilesjpirvj, caruliJi; Siitncrri :on oblcavav Clu ins.

Locit.

Alco LJvcudd.v limilb d I exco >to o^ore & iapore cum non ioret pro «(umi poflet. Solo Valentino regno, aaidis 8c petrofis Jocis quarto i Valentia nil. April; initio vivem Quil us.

^ . CtitMaciJfus Ihhmi fylic ebltme MoriC pn lud

Hic fiiffutL' : d pedalem altitudinem ut plurimum, aliquando ad bipedal ail afTurgit Folia pro fert, oblonga, mucronata, incana, Halima instar. Flos fert luteus, qu unibus succedunt capsulae triangulares, minutae multa subrotata fomes in se continentis.

Leon.

lii giart ois & arenoso circa cap: Cnonunonim.

6. Ol<f LtJonfdit JUjrti C B. W<w onguftifelism Ger.tuium Mjrtifol^m Leitli Park.

Virgts, (iirculis, frliis multocr.ifHoribiiSj Jafioribus& loneioribus est quam mas, fecmina ant I, dantera vulgaris, Semach Plin: iaucRu(u notlot/rubcofa, icmine icem tnc<cco.

Multa lacivic quopiam in mo •ule celliflimojgri fteriLis Seven*, cuinomenS.Columbi*. Alioqui gustu Cisti Lodi, & fragrantia gravissima.

Suspicio hinc non differre specie a Ofo IJJO 1. feu lacifblo Perk, quintumvii LoWlius feracn tnoocum ei attribuat.

^ . 2. DeCiJiocMf>fuli\$trigonitait>/na.

1. Cif. •.n folio PL-magma C.B. T*bt*rt4 mqvr Mjumi].K An Tuberaria nostra eadem.

Caulis pede alior, teres, alioqui glaber, imo duntaxat parte tomento candicante oblitus, interla cente levicula quadam rubedine. Folia circa inferum caulis crura, Plantaginea, ex rotundo ob longa, lanugine semenciali, longitudine fere unciali, cap: A lubttltq no incana lanugine pubescentia, nervis tribus Plantaginis in modum dispositis distincta. !^cr rebquum emlcn c> lanqz intervallu bina

diverfo titu velut ex geniculo nascuntur, (aut alterum altero paulo interaque quam infra, glabra, nervosa. In supremo caulis fastigio parva dum ad 12, plurimum foliorum voluminibus contexti, quorum bafm fuiaunr tb Uo & 'j^i" ^ acuminata.

Ltuit.

In monte D. Joannis prope Pafis collecta fuffineze plantas Stoechadis Arabice. Mycono Radix lignola per lumina calpataz ipaguar: flos color luteus; semen folliculo inclum.

D. Mjomi in Indice plant. Monf. Tuberariam majorem & minorem Myconi pro eadon plint* specis habet, pro loci humidioris vel ficcioris natura variantis.

2. Cistis flore pallido, panicante macula insigni J C B. tf« uni flore maculata (Ger. emac. annua) flore parato Park. Ponz. Tuberaria minor Myconi Logl. J. B. Helianthemum flore maculo Cul.

Folia in terram strata promit, tribus nervis distincta, oblonga, Centauri vulg. min. modo, sed acutiora. [Mjomi plantaginis familia sed minor, humi repentia, villola; Ponz Olee effigie] Unico caule tuberosa Columna, nec ramulo, [Bina canes appogit Myconi] pedali altitudine, tenello, recto, nec admodum ramulo Clus. quadrato, hirsuto, viriditate Ponz. Folia per genicula bina, alterno situ, parva, hirsuta. In summo ex petiolis longa Flos plures, pentapetalis, lateri, petalis singula panicante Columna ex nigro rufescente macula egra ingrem insigniam, antequam aperiantur mutantes, fixa & hirsuta habentes, & hiantes eriguntur, paulatim, in medio apices habentes crassum, quem plurima fomes circumdant. Tenella admodum & triquetra capsula pusillum & cinereum fomes continent. Folia illata viriditate jrzdita lina cum ramulis per Caulicis affus pingua quodam & luto humore sunt obata. Clus.

Leon.

Nos ad radices Vesuvii moocis invenimus non quamplurimas eodem loco una cum maculosis na oimes. Mam nienle (lore; vavit

In Nrfadrituru Ivk. ... Lute ... Myconus ex Hispania ...
ubi palli m, iiiiqur, in pram ... Radice i i l ... lignola, tenui, &
nonnihil tibra&i ahtur.

1) *Magnol* Cut diximus) Tukrariam majorem & minortm Myconi pro cadem i I
ber, pro natu i .l duntaxat loci Immtidioris auc
Grariunoo ib ME, quin & falmangoftii
rem anipam angulfi •, fi. Nosejus fentwci = libenter aitentimur ut
qm fpxa<£ temere multi plicate odimus.

IT, Tuberaru noftru 7- ft Tubcraria major & minor *Mjempl. C* i
"indus .mnuus flore guccato *POM*, denitpw *CUti* Ipcacs anmu angulcifoha
5: cadem plantar Ipeaes.
∴ *Cijius Mmmu* Ger- annum, *Salicu* Pack. <mw r, *Clttflo U-1*> ntmim J. B Mu
Ik* C B.

Li hoitis cultus ad cabin interduni .iltntiitinem & „ajorem exerc
nigra, modo *calicula* Lino, mod6 plunbi,
terentibus: *folia* veluti per genicula bann, Majoranz fimilibus, longioribus, potillimum circa medios
caules, inferiora enim torundiora funt, fuperiora vero anguftiora, pilola. Ad latera fidegolorum
gTiailoruni, ad i
& duobus parvis ad eju exortum appofita. Floribus fuccedunt *vafcula* triquetra, brevia, magna,
Cicuta tere apud, que matura in tres defiliant veluti coxytas, latus, corticolas, niftas, quos cingunt
foliola tria hirtuta, collas habentia. Intus membranula, tenuis, lucida, cui adhaerent multa *semina*
minus rufta, papaverinis minor

In victorumapud Salmannccnicis marginibus, c- Granatenti regno Clufo observant
CaActkm' *Tama-am* hunt vocanc, aurore Chfj
Tubera, quI illis *Twin** dkuntur, crecant. Eadem fcribit Myconus de Tubcraria fua mi-
iiwc.quacabhac can. icllj nimirumCiftusanmius J. CII
11— alia (j ecies inv aurur, longioribus a!
oribitii ettam *ftiitii*; *cujus fia* minor, pillidu
mhis <ftj li non idem,

* 4. *Ollor L<li folia* C R annum [die LtJ, Park, *mmu fill** LtJt, fart Uut J. a
fulum *Labelu* Ger.

Satbreftprecedente, twjjj craflioribus, non minui tamen liirfuti
mbtilve ancejlonaoribuSjanguftionbus, mucrone aaiooro, hirtutis no
norc. *FURuvtarm*,
loribus magnicudinc, pallide lutci. C<tfU*U *Sefemn* illiitiiunilu.

Annua Apbnta ; III hortulo tamen noftro aliquant
non Horucrat, inquit I
In loco djcto U g*rrt£*t ,l,tu *Trrrat* & circa Silcooram in herbis inculcis ultra ponrem (i-piitii
C9Iic(nmui, intjuit D. AOgmtia #««», *Monfh*L

5. *OftgvMi* *annus angulififo* UJ.B.

Dodranwlis eft, vel ttiam m.tjor ac aibiulK: *rm/* unica, tevtcr rBbio
jtjuodque *folia* intu, iliu
in breviu! > aliquot ramutos, inxtjuaiiter j -
venmus, quatuor aiit cimnnui: uncias longoi; *ctjtitulu*
triqctrb, Ledi *Monfpclbuni* iim'iltbus, nunonbus tatnen, ci
Tgcntibus. _Fhi cirailutn in
ctula nigra alp

LncrMonpclmrn He *Ptmvl* invenic C B i
bet: * 1 icliipra qur ad illam plllc.ln jniituvimtu.

<t- \- *OtCiftoatpjtdts* *trigtmis* *humiliore* & *perenni* feu

DeCbamtdfie & *Jlelianthcmc*.'

Helianthemum *Anglicum* *latius* *lucanum* *Germanicum* *epulidum*. *Sloacf* *Cfi*
0; little £un *flouet*.

V. *rtJict* all*!, ILJ, *ofa* *Casles* plures, tenues, teretes, Kami full, hiriliti emergunt, [Am ycfHri 6b-
longi, angusta, ex adve
longi in [ummiutibus in
luta, pCHTjp.-nli, cum i)liirinit> intu* *fiAmmmhi* rf 1 u, & *calice* *trilobio* *lineis*
Rrrr j, rubm

nibus striato exeant. *Flori succedit valcuhum t ignnura.gvande, {emu* aliquot m^oria, nifli c^otr
nens. Ad lk>isuniufajufqie pcdiulim appoiimr toliolunilonguinanguftum. DdUpfo ft<>re fe
mina deortum depen?cnc. Florajurua*

Loc.

In montolis ficcionibus praefertim cretaeais abun^{las}.

Helianthemum folis majoribus flore albo *J. B.* Chimacciftus viilgirii floie albo nujore C.B i
poore fola magnitudine & floris colore albo differt, inventu faciliffimum est.

Vitz.

Vulneraria est & atringens haec planta, unde in fputo sanguinis, alvi profufvio, uvula (& ut nu^{ncro}
dicara) omnibus affectibus quibus? fluxiisntmit est, Symphyti aliamque confolidarum i
more, miripan potest *J. B.* Hinc *Panax Chirentium* nonnullis ce. lita est, & Herbariorum Germani
coram vn^{lgo} *Confolida aurea* v^l ^

Exhibetur decoctum in vino rubro cum Symphytofic Plantagine ad (anguinis (puturrijdiarlx Eani,
dylentoriam, &c.

Ad ukeca on; & gentralmm dccoquitur In vino rubro addiro momenco Aiuminis, dccoctbnc que
o* toiloitur am ulcera p-irritm difiarum.

' ; C</« btomlu Clu'iofiyt Htlimbttrmt emmo candictms fieri TUIKC alb*, Wtnf sis: do J. B. Chi
rtiitajiw f Jiu minorbut & intntu C. B. Cbanttcqjh-n 4. Cluiii.

CM

E g est pl^ncitb, tenutbuSj lignolis, humque fparlls virgulis p^{ardita} : /i./ij pmo ggnert,
quod Heliajithem putant, (imilibus, inindribustamcrij Onitii mtibiiSj guttibus fruigeutibus.
Flori 1 extremis ratnts irdident, colons inrerdu alfei, titpluimimi pAllidi, fwruntbtu mutlium
flore occupantibus. *Semctt* triangulis capiruiis, UDO paribui incftj caguurn, rufilim. *Radix* b-
gnoft & fibrofa.

1<>>

Salraanat *enti agro frequens* est : I. E. J. *hama Montpe* : >>vidit Horentem mnioncc piogc *Cafiekeuf*,
Stinmoncib'la prope *Gigas*, mense *Mario* & *Aprili*.

Ment7.c)iiiiin pujplo l'juwanim ilu!Aiithemi Ipeaem m monic ApctuunocollcAam
git qiw m

Helianthemum (axaulc, caulibus & foliis mcans^ oblong, ri albSflimis, Appcameum in-
fenbit

3, *Chamxciftut fliit Thrmx mtm'u* C. B. *Heliabtm*mJJare al'bc folia anguftt tir'iuo* J. B. *Am Cta*.
mxtfftu V. *Quf?* *Hltanihtum enfujltfelwm* l'aik. Ger.

J. B.

Plantula feiquipalmaribus dodrantalibufi' C raris ttoruta, interdum paulo rmjoribus, Mortfpdii
ver6 & Lugdum ntingam fere cubitalibuSj param cicibSj partim ispanzii, *Folia* modiocriter
mign, fematciam longa, anjnulla, pilo: i, incana at Lave; *aulz*, *inipada*, nonnihil vilcofa. *Flori*
etfoi *ngre ferie pures*, quales *Helianthes* volgare, niliquoti albi, fibres lates modum occupantibus.
Calyc Mrariua, *trifcula* quoa, *confimilia* in quibus *femm*. Qua: *Montpeli* provenit radiocem >abcc
cfaffiufcnlam, light)(am qu-ri; *jsabicpropagiics*.

Loc.

Prop^ Monrpelliim tn colbb jentibus < etiam dfciNcmau-
fum. Fqta cioblona fimt, incanaj & Hguri fba ad Rofinani. .sij; qm^j ^levj"
ora Gat

J. Bauhinus dubitat anhxcp Unti & Cluma; tiftus 5.C*/. *lufi*, & rmcra defenpno Cluiiinonvi-
dctur xoi Screlponderc.

' 4. *Chamxciftut rtfni ferfy SifeUa lutt** C. B. *Serpilla folio nigricante & hirsuta, flore aureo ad-
rato*. B. *StrpBifdK.fien lutu* Park. j. *Clul Cifiui bumtlu Strpytiifolu* Ger.

Ch

Multosproi-nt ex eadem raiios *rgmukt*, Kiiues, oblongos, ferumi r: hure fparfos, fubrubentes;
in quibiii *exgna folia*, ordine quoa miac duuL. *ferie difpofit*; *Serpvi!* • fere imilia, nigricantia &
lurtuta, orals.; *ae*: sub florum autem partum in novella ramis longiora & candidiora. *Flori* in
extremis eirdem novcihs ram *ali terni aut quaterni, oblongi & hirsuti pedicellis inhrentes*, Heli-
anthei volgaik flonbos mag *magnitudine pares, fed aurd plan**; »I,ri*&odSrwi. *Semen* ^ *ervare non*
hcaut. X*(nt mutnnaa, aliquot hbns lace IparItscipiluu,

Nufquamnifi in fummis AufVrix & Stinx Alpibus invemt CWtns, idque fenid menfc A
fiorentem: in hortoi tnull.inis Maio mente floruit; fed *font* cum fins pediclu Ntmiun
omnem obfervandi (oninis occafione-n plane ademerunt.

Cifiut Hthamhttmiffirt farvo luito). B.

Flotwpan-iutequi triplo minores quam Helianthemo viJfpri, 8c loconafcendi
fan a fufxinon: difere. *curca Nema:*

" 5. *Cbauttfui mgttjtifolw f*t turn Clujn* J. B. *Chamacciftus anguftifolia* C. B. *Chamacciftus*
6 d C & L & ang ^ MG Ger. *Helianthemum anguftifolium* Park.

Dodrantales aut majores humique filios *ramali* habet, 1 multis oblongis anguftisque *folis*, nullo
certo, fed confuso, ut plurimum, *ordie*: *dispolitis* fop^{tos}, f *erter* volgarem in omnibus Cefli gene-
ribca foliorum licam, *fapris* *inno* • clut guninmit, den *de* amaricanis. Extremos ramulos bini aut
terni occupant *flori*, *lutci* cum luis in mcilin Il.imini *is color*: quibus luccedant *trigona capula*
lats magna, *manifculus* 1 & *inxqualt*; *WWCT* contmenaa. *Radix* ignota, dura, vivax, toia ingro
oorouc LikkeU, & m aliquot romo> (pi

Kanor eft, nufqium emm mli in monte Badenlibos chermis imTTBncnn, tj ^{iano a Vienna Au} ^{tk-m} ^{ttmx} million, acqus in Haniburgenli duobusa Poionio Un ^{partu uba} nul. paucuks pianos tvcnic-
but Clufius tiorentes nienfo Junio, & brevi femcn perriacntes.

- 6. *Cbamadjltu felth Mini m'moris, mantis C. B. film Mjrri Twntin* cams vt! emereis]. B. Cbamaci/lus ; Cfut. Cbam&ufiui Itiifolm Park. Cijiut bdmslu UttfJmi G er.*

Clif.

Dodrantalibus eft ramulis, humi diffuHs: quosbim (emper contrario inter fit I tu ^{sepiane folia :} Myrtil Tarentina: folus xqualia aut anguftiora, Sipernci ^{aneres quadam lamugine obducta, inferne} vero omnino mcana, guftu adfriogente & nonuilitl amaro priv.. ^{Pericclios postea exlerit deas} auc tres uncias longos, qmbia infiJent qumquo aut lex ^{flum Chad} ^{uscitl lerypilatoli fere formi} Jinnies, lucet colons. His luccduuc tngona parva ^{tifttil*}, ^{fmmi} mj-quali, ^{unnto, ruffo} plena. ^{RaMxlignofa, dura, Wax. in nocetiain ramuli Sores luftincentes, tnaturoSi dc-iduolcr} ^{uno, exic-} can & confringi plcruncj, (blent.

Nalcitur maxima abundanna in omnibus illis niontibus, qui a ^{Ctiti&trg} D.irt.bio inimineiuc ad Alpes Auftriacas continui qtudam (eric procurrunt, &c., Floret JVLio; ^{[tmm} maturum eft Junio. ^{Lucu.]} Invcmeur eciam in monte ^{CapQultJen} non procul Monfpelio *Botan. Movjf.*

- A. 7. *Hel'umthmam Alpmim folio Prfofct* mmorii Futhfit J.B. hem.Ctflm Hcliantbemi folro Tnliimantsni cjuidern/flrt* .' »*« Cijlm pufriulusfelw c*niUo,jivrt lust,' ejuldom.*

J.B.

Fruicolaeft hct-ba, cui ^{fti.} ^{oblonga, Pilofella minoris Fuchin} bmlia, inferiore pane nugis candicanna, lupertore vindia & ; iloli., I ^{di minia quam in interiore. Fij} lucus^ quells Uclua-
thenio vulgarL

Plantula nobis colleAa in monte ^{SaUv*} prope GenevJtn, <<llc<< furrigt pa! ma res 6c longio-
resj tenucs, ccreteSj incanoSj non lamolbs, ^{folut} per iotervalUlongjbra bints adv ^{ris cinctos, tan} nma
fuiparte quatuor autquinque Holculos (ingulatim caulcm confctndciites, pcdiqilts CCnibus ipj ^{cr-}
itSj iuttinences, parvos, colon: luteo. ^{Folts} una unciatia fcreau: minora, oblou^j, in acuqien ddi-
nentia, ginerej St fere alba: que cuiiailo* vcfUum breviora lunt & ^{pro magis} miiiiic Ltiora. in
moncoiis Scpuntononaiibus Anglii-.i Ic inventum nobis oUcndit ^{D.Jat.Ncwiva.}

Ad laccra & radioes montb Salevx prope Genevaiu copiose oritur.

I***.

- ' 8. *HtUmthtmum five Ctjtm bumiiifilu Samffutbt cafttmu v»Ut btrfntu J. 1\$*

PlanLe nobisdefoipcx & inrellcd* eatlem die vidctur. Radicem Ugnolim Ci.ifiulcubm pi at-
tnbair; ^{folia} Mjiorana: folib p.iria. Vide 8c confer.

Hunc Monfpclii tolloctum lubuit J.Bauhmus, iuxta Monfpclii patibuluni nugiū copUfruciat
^{QiltfoltoMajoraisit} nomine notus, *Botan, Manj}*.

- ' 9. *Cbanueafrm SerpyUfdia fimnbm carntis C. E Cbum. 7. Cluf Chum. StrfySifitit, fitrtcor- (KflPark. An Cbtmxcijui AlpuL ex i StrjSifoluu Go-.cniac*

Claf.

Jbion^quiUukKucdodrancaibus ^{atum} fcpit raniulb, hsmudiffuib, nigcantibus, in multoi
alio; breves ramulos UivilU. ^{Fehs} j-rcquisiria & conferta iint, bina iemper inter ic oppoltu^ exigiu,
Scryllo mmora, llymi doriork foliis hand majora, cralla, fupcnortf pane vindia^ uiterni candi-
caiuu, amaxicaittJiupQrb: excreniis ramult, inruicuncur bim am quicini ^{flo/culi,} iimul juiwit,
^{perpul} Hi, pentapctali, carnei quali cokais: ^{lh>} ^{succodus a ttpiuU} m quinquc^ crenat ruaniri-
tare Icic apenentia, & (cmcti role ailmoduni ortctidentu. ^{jLuitx} dura, lignoia, aiqunc fibris
donata dx: quinctiam ranu fubtodo tciuuw hbras agujic. F.tificara planca non injii-iindo fpuac
odorc.

Nalatur tenui fblo neri faxa, in fummis ^{Stthrr,} ^{Snta!htn,} 8c aUis Aufriacanan SdriacArumque L<T*.
Alpium liipcruliis. Floret Junio aut inccrdLim paulo nutiums.

Valoilo knuiuli ib hot geneie dificrre vdetur.

10. *Hdiantlxtnum tnuifvltungUhrum fivrt iuscu J. B. Cbamacijm Erx* fdmt Park. Clum. Erx**

J.B.

Ex ^{ntJict} crafla, lignola, cortite nigvLante conreda ^{rdtmdi} plurescxurgunt, I ^{gnofi,} ^{dodrantaes,}
nonnoquaiQ ere&i, inctraum per humum I parti, ^{feliu} donacivjldc ^{tenuibus & anguftis, ut in Cori}
MonfpUuilana, vd Erica arborelcente, vindjtui ^{bus & librubentibus, glabris, noc fibi opp} x>lnis ut
myulgart, Jed akcnumrajncaamfajniieniibii ^{& singularibus. Ramofa videtur quam Thymi-}
folium iequiciis. ^{FUrtr} inulto minores quini in vulgarly ^{aurea, caduci, quibus succodunt} ^{ff} ^{ma-}
jukula, lucida, qux ^{Icruiic} m ^{anuro} in tres velun ^{scutellas} triquetras delibant; ea aute ^{il} ^{valculi}
ambunt trw turner. ^{Smm} ^{COMO:} ^{um, ferrugineum, triquetrum.}

Ad radices mentis Jur* & ,, oolibmtJolis circa Genev,un & Monfjclium mil lras onit. ^{De-Loug}
plex habemr ercdior & hunitl.,-. 11, (in<mp 11. ^{Magnol}) mil canruni ma ^{gratidans} differunt ^{fed}
& mado conlervandi lenunv, fiqwdem ^{erectiois} capitula dum aperitur decedat IVatiu Icn.en, ficut
alui in humiliori quainvu uplula apw ^{la fit & pona} verus terram, uuuet taiu-n iunien
quali capul* adhxrens.

11. Helianthemum folio T. fmi mm J. B.

J. B.
 Vircul. T plures, renuc- incanz, que in i illos repandos mox dividuntur ramulos. *Foliola* Thymi di-
 rioris, minuta, brevia, ni lata, cinerea, terrea, quaternis, interdum plura ex eodem gemculo enata. *Flos*
 & capillae in tres carinas debilescentes cum involocis hirsuta, ut in Helianthemo vulgari, *Radix*
 craiTiufcula, contorta, lignosa, multida, malorum capit im.
 Potest fiquit i nvl ane mlicet & intelligit Lobelius cu in Hvli.ii. themo tenuifolio gl \vro: flmi-
 les sunt plantz, diferentes tamen diligentis considerant.

Nos circa Montpelium observavimus in eadem planta *folia* inferiora in caulis tenuissima, qua-
 lia ferè Camphorata Montpel. superiora verò longè diversa, viridia & Helianthemum proxime de-
 scripti foliis similia, unde & Lohvhum non i npeate it comere kis duas, < amas mlicant opinat la-
 mus. postea tamen circa Massiam Chama alti loco :vi obfervsmmi s cura omnia folia tenuissima
 erant Camphorata similia & glabra, plura (imuliu(cenda; aliameuam Ippciem, folio Thymilong-
 a Or, cupis tamen florem & vasculum feminale • ion' valmna.

Ha addo, artemlat quafilim & panm ctgnittu spec/ts.

- 1. HiU&iilies fiteüs rgra, comJ mfltxä m m Helietrepit J. B. Tt! rphum repant folio deciduo C- B. TlhJUi s gu quam Imperato Uul. Ger.Pirk.

Radix craflarudine digitali, bngirudine fefquidmarij ligii ofa, fibris)<nucis led valkfo ct nata, foris
 baxea, ini is alta, vivax, ramis sex, octo, aut plures per terram spargit, palmares & Ipehamros, te-
 retes, tenues; quibus *folia* nullo insigni sapore praedita, crebra, alterno sine utrumq; adnascuntur, Ma-
 joranz, glabra, & ex viridi hazola, unico nervo per longitudinem decurrente : at priora folia & que
 proxime terram non parum ab his que per ramos voluntur differant, utpote longiuscula. *Flores* in cx-
 trem« tamtilis perqu; in conferti, & Scorpioidis instar reflexi quibus tollia albis constant, apu'
 teolk, qmnqnc viridanabus exmnice his obvallati: *capula* loquuntur triquetra, fusca, *semine* exoguo,
 papavcrino pan, aira, caviutcm imprdlam ahra, parte habente, altera g ubo referta amaro.

Morlonaz, hanc plantara Polygoni ipeaein faat, verum cum Lufius S. J. Bauhinus di otis verbs
 affirmant fnetus ejus tnquaroi non Icniuu eTcj led vascula I
 cum illo fainre non pollumus; verum ob Bores pentapeolos, & vascuU fcrainalia a quetra, o
 ami Ch.im.rafti> convenitj iis cuni J. Baubino fubjungendam duxunus, (juinivis fi uibuj
 i »J.

b iuidemdiAer.it.

- i. CIJKM* /S/M StacbaJts titrin* C B.

Cupis

Deque defcriptionem, nwjtie fynonym.i iUt.

3. Cifiumfolia Majvraue C B.

Eademj viiecur Chanucifto oAav-^id est, Hclunthcno five Cifto hunnli folio S.imp(utl' ca
 pkulis valiic hiriios J. B. quam D. \Lignol Ciiti folio Majoranx nomiiu Monlpclii nocum t' iibit.

Item,

- 4. C&atKdcijlum yiadt folium CB. i& Hdimihtvm Sabandtcumli?A.xV. Tab IGer.

Foiis quaterno ordine in caule poluiSj viz. id ftngu].igcniia]jaqa.ituor, ireliquison
 pra:apuc diftert: in quo convenit cum Pfcud&ofto 1 xdo alte; a 41pm> cwi.

5. Tl't*Utf>ilsiam AJpin. CCCC PjwJ. i. Park.

Aifm.

A raAct longa cranaqtie micrit plures furculos KiktX, rotundos, gractleb, f_ul;_a f_{cre} Lieufln, fol
 minoribus lorgii intercavalli paudfbmis velHeos, qm wmm, modin; ;min plurCs p rivos furculos
 drndunmTj in quorum iimmiuubus ptru Cifti flonUis long: mmores apparent, .-,' quibus filique
 rotunda, oblongx, in acurum *ie(inence), nigrx, nunutum/c_{ures} cominentes. Tou pUnta modem
 & inliimu est

6. PfaJoojltH LeJm MII&HM Alp\N.exot, PfmJec. i.Park.

Alfm.

Herba est fniticoft ab una raJkt parva tiuUcutu plures, niollo., obliquos produccns: *folia* Myrti
 fcti mmoribus, &inoibbms, in ntRrumalbicanibusutiinque bini ad intervalla; a quibus foliis f_{III}u1
 exeunt Jk. v. albicantes, parvi, h)arvis periolis pemlcnte; q:ib.: succodant folia

Lout.

Getxi diligena est.

CAP. VIII.

De Flyperko, Artlrofamc, Afciro.

Hypericum, Androsamum, Afcyron non aliter inter fe differunt quam ut Genus & eisdem species. Hypericum enim Generis nomen, Afcyron & Androsamum quarundam ejus specierum.

Hyperici nomen rano;cm non inveruo. Afey on Grammatica per Antiphrasin dictum voluit cum mollis herba lit, muffc enini Grscii asperitatem significat. */*f folium autem ab Luc dictum constat, quod comit equitrix terentium digitos velut crucient.

Notae Hyperici characteristicae, pr Tter foljonimm cuile (mini advesuni, font (lorei flavi ftjmi- rubea milita; vasculum feminale e tribus p- iribtii, [in uno genere t]uin^J compolir...n, triplici flylo, coma atritu sanguineum succum reddens.

i. AndrofAmum Corfantmpolttaniim prtm^xime Whiwlcri. AftjniJtt A^pia. exot. Afcyrida Creta major",trk.

Hi. us folia consistenti & colore sunt foliorum Androsami vulgaris, longiora & marii bnta, cauli quadrato, fruticosa, rubenti, non ultra spithame longitudinem assurgenti adnasciturim. Oulis fastigio infidet flus amabilissimus, pentapetalos, petalis incurvis seu arcuatis; e quorum i umbilico fl.iniinuLi infinita, flava, oblonga, in formam globosam composita, apicibus veluti punctis notata, exurgunt. Siliculae succedunt pyramidales, e loculamentis quinis, dem adhuc viridia sunt arcte junctis, per maturitatem desilicentibus compositae, ceterarum hujus generis capsulis triplo majores. Radix longe lateque serpit, & plantam stolonibus emittit propagat.

Floret Junio & Julio, semina perficat Augusto & Septembris mensibus.

IIA-C no in eadem planta videtur quam describit & depingit Prosper Alpinus in Exot. titulo -/ftj- ruda. Et recte nostro iudicio Afcyroiden potius quam Afcyron appell- n, o\> cipfulis in quint), loai- latneni dispersitas, praeter normatn hujus generis reliquorum.

Non est autem reticendum, D. Wheeler unicam tantum florem summo hujus pianti cauli appin- gere, nec plures in descriptione ei videri attribuere: cum Alpina, & Morifonus etiam, plures ei danr. Morifonus autem plantam ipsam e semine a D. Wheeler nullo ortam in horto Academico Ottoniceni coluit. Forte in loco ubi eam invenit (prope Constantinopolim) ob soli siccitatem aut sterilitatem unam tantum florem produxit. Odore est Terchinthinae optime fragrantiore.

Hujus plantae folia & virgas Vincet pervinca folis & virgis comparat D. Cervs, inque eodem caule unum vel duos (interdum etiam plures) flores gestare scribit, odore Scoticum crudum referentes.

* a. Ihft^w Oljmpi montu Whseteri. A Afcyros magna, *?«? C B Park?

Haec pljnni D, Whittlr ab Androsamo suo Constantinopolitano diversam facit. Hec etenim caule est potius aut altiore, cum illud ultra spithame altitudinem a terra non assurgat. Hujus folii I, hyperici vulgaris similia sunt sed minor: illius consistenti & colore Androsami vulgaris, duratiora longiora & tenaciora. Hujus deniq, (quod praecipue est notabile) vasculum feminale rotundum est Androsami vulgaris instar, illius oblongum, & in quinq, loculamenta divisum.

Descriptio Afcyri flore magno apud C. Bauhinum in Prodromo plantae nostrae sim bene convenit, nisi quod plures in summo caule flores ei attribuere videatur, cum noftnism Hypericon unicam tantum gestet. Descriptio Bauhini sic se habet:

Afcyro vulgaris seu Hyperico dimerorum similia est, caule tetraedrico, teretibus, glabro, rufescente, quon folia pallide virentia & inferne albidiore, unciarum longa, semunciam lata, subrotunda, una semper sima adverso cingunt. In caulis summo flore calycos viridi sustentati pallide lutei, magis, quantuplo vulgaris majores, ex quinq, folis uncialibus compositi; e quorum umbilico flammula plura, flava, veluti puncto notata exurgunt. Siliculae & lamina non vide Bauhinus.

In Pyrr. iiii D. 1)urferm legit. In Olympo Af £ inojicu D. O'«»rj(K I)waler.

3. An'rofxmtm fatidum Park. capsula longissima filamenta denata CB. A in Hypericones j<w*/- dan Sicilianz effina sive Tragi

7. B. el.

Pentex est rotundus, aspectu polcher, atres, nonnunquam & quinq, cubitos assurgens, caule tereti, lavi, ramolo, rubente, brachiali interdum crassitudine: folia ad articulos adpressis, duplo Hyperici majores, glabris, nonnunquam pertulis, teretibus. [Bellis folis Glycyrrhizae aut Terchinthinae ea comparat.] Sapore ut J. Bauhinus videtur, acidulo: Floribus magnis, Siciliis proximis, [sed quadruplo majorebus Bel.] luteis, demsi circumum, lictorum, tenuissimorum longiorumque unctis apiculis, legere medium occupante: capsulae sequente oblongo, rotundo, Terchinthino fructui aequali, tenuissimo semine referto, [e oqum summo emicant stamina longa 7. B. quod observari dignum.] Capsula haec a planta non decidit, sed ei perpetuo inharens.

Sicca fontis & rivulos provenit non in Ceco tantum, sed & in Sicilia & Calabria frequens. Tota planta na hircinum virus olet ut longius percipi possit: aetate rosinam fundit, sed paucam. Perpetua fronde viret, Bello teste. Junio mense floret.

• *Caru Hypericuli obscurum* J. B. *Cera Matthiola* Parl. Ger. CIII3C. iii.tr. C *Caru legitimo* Cre
uca *BiSi* quflent. Cf* *laira* t. B.

J. B.

• *Erica* ramulis Thymi magnitudine fricat, vel potius Corvii Montepellanae, remiori-
bus, erectis, in multas alas brachiata, teretibus, fibrulentibus. Folia ex brevibus intervallis velut
articulos ternis, radiata, Erica arborescentis. Caulium fastigium, in ramulos subsinde abeuntia longi-
usculos flores gerunt plane Hyperici, luteis, quam folis radiatis, constantes, numero longum croceor-
um a cum caris modum occupantibus. Folia per hyemem vicia retinet, Bello ictis. Tunc flori
foliola pusilla viridantia ad basin subiecta sunt.

Nosaim CIUuhino Corin > Et Coiin I £ lunifem Belli ad idem caput
re ucinus.

A. 5. *Hypericum ictim* Ger. vulgare CB. Park. *vulgare seu Perforata caule vitando, folia glabra*
J. I.

• *Radice* I multifariani (iivifj, buxco CO tico inecta, virgulae surgunt complures rigulae, li-
gnosa, teretes, fibrubentes, in plurimos ramos divise, sesquicubitales aut altiores. Folia ex adverso
bina, absque pediculis capibus adnata. Majoranae aut Centauri minoris, glabra, nervis per longum
irmentibus donata, innumeri foraminibus soli obiecta pertusa esse videntur (unde & *Perforata*
dicitur *hec herba*) sapore sicco & adstringente cum aliquo amaro. A geniculo ad geniculum seu a
pari foliomi incrioi i tit; inqtic ad utriutqu fu; erioia para foli nervum excurrit linea in *tatdc*
clarior, cett aneulus qunUm. *Flortia* t tremis ramulis copiosi, «*quina* radiatis folis compositi,
fimbriati. *ajHocusmucis* concobnbuSj nujoes £^ speciosiores qu mi Afati, brevibia aut nullis pe-
diculis nati, stylo triplici. *Calce* quina angulata acuta legumensconstat. *Somos* parvum, ex nigro
rufi in, in *capulis* oblongis granum hordei similibus, e tribus carinis compositis. Tam flores quam
capitula femine gravida, si verantur, sanguineum succum red-
Description est J. Bauhini a nobis interpolata.

In domo & ad lepes.

• *Durum* est & vulnerarium inigne. Daco
Treg. Cass. Excretaiones languans silit, vulneribus & erosiones internis auxiliatur. Sanguinem
coagulatum resolvit. *Cum sanguine succum sicut, quando coagulatum dissolvit?* calculum renium at-
tern: lumbeicos expellit. *Sennae* in pericarpis seu summit.uis uJ vulucMiu b.ilbm.i nulli fcamda
experimento chirurgorum Montepellensium.

• *Oleum* Hyperici duplex habetur *simplex & compositum*, & utnimiti, varii a pud varies fruitur. Ge-
rardus noster *Oleum* Hyperici quod magis laudibus effert, & Balsamo curvis naturali praefert, fie
parat. R Vini albi sextarios duos, Olei Olivarum fl. in. Olei Terchinis fl. ij. foliorum, flori
lenium Hyperici leniter commisorum aa. M. ij. Vasi vitreo capaci indantur, & infolentur per octo
aut decem dies, deinde coquantur in MB&C oolcutur, abjectisque herbis novae indantur & operatio
repetatur.

• *Herba* decoctum qu adragnta diebus p. mm, vd ettam fonhmm n icti i urn & podjRram G
riat, calculo apphine conde-
bit. D. *Bevle*.
.it, inwrancouu verities nose, S; ballimica quaJiutc fioguiiicm im-

• *Tinctura* flori f" Hypoii egregium est medicamentum ti mania inrus fumpa in *Salo, Gr* KL,
nili quoque sepius experium. Idem praestat & in Melancholia. *i. D. Ntlbtm.*

• *Inter* varias Hyperici virtutes "T?^ 1? emissile publico agrotorum plurimorum con-
erit. Est vero praestantissimum a luniorcos pellendos si flores in (p. Vini
quod certa nobilit. matrona experientia didici. *T. Barthelemy. Act. Med. An. 1671, 1672. Oe*
Kitt! est autem hoc novum experimentum. Hyperici enim succum ad vermes necandos commendat
Camerarius & alii, ut superius vidimus. Schroderus, superfluous nimis, Hypericum lumbeicos
fugare ait, sed si tempore exaltationis collectum fuerit, aliis hac facultate destituit.

6. *Hypericum Syriacum & Alexandrinum* J. B. *Hyp. folia breviora* C. B. -Vyrüi IIM Ger. /&L11U
Johns wort of Alexandria.

• *Quadruplo* minora quam nostri Europaei, quae su-nUcubitalik) virgulis confertum tanquam
verticalis exeunt, praefert folia: flores lictos nostriti periinu les. Descriptio est Lobeli, & nimis
quidem brevis, sed tamen plenior (quod sciam) apud Botanicos non occurrit.

• *Plantam* hanc aliquando cultam & florentem vidi in horto instructissimo
Howard, Ducis Northolciae fratris. *Parkinsons* eam cum Hyperico peltico io Kob. VaiD. *Caroli*
peram. *fimidit*

7. *Bjferittm fliit fsrv mftu (in finatu Suulum,*

• *Sicilia* prop: Promontoriolum *Panis Cerealis* dicitur tj fton loi ge à *Petalis* hanc speciem inve-
nis: quam postea in horto Vini Nob. D. *Caroli Howard* cultam vidimus *Darlinge* in *Sarceia*, unde
allatam nescimus.

• *Eadem* esse videtur quam *D. Georg. N. leier* in * *Inverazio* sco titulo *Coridis* folis crispatis depin-
git & describit: oblat quod folia caesium nodes plura simul accrescere scribat, quod in nosti o non
oblcervavuni, in quo bino ordine, ut in reliquis congenentibus, adversa inter se oriuntur.

* Pag. 110.

Locu.

InmonrcO]ymp) Atiz oblcervavit D. W. Keiler.

Fbremnon videmuSj necdum cnim cum ibielfemus Mail mailism-Jio floccat. c. it acuem
-aw/* tJicti, firmo, inpluresramulos6c(urculos pntcnucs (parla

8. *Hypericum Nummularia folio* C. B. Park. £nM11 St. Johns we^ Untlj Montp wort
leabcf.

C. H.

Radice li.ibct oMoggam, tenuem, panels fibellii capillatam; c* qu *cauliculi teretes, rufescentes,*
>almareseflerunt *et, quos folia parva, tenuia, nummo liiululu, bina aduerso li. & axiali iist.m*
li loctt.t cingLint : qi *et superne atroviolenta, inferius alba, aliquando punctis vel maculis rubris no-*
aca conipiciuncur. Cauliculorum fummisJNrr pallide lutei, iatismagni, plirirms ftarrunulis do-
jati, odoiatifliinij non ita multi infident.

L* ipfii rupium max.Carthulianorum ccenobio imminenrium hlius emergic;

* 9. *Ilypencon motitis Olympii folitis circa margntis h:rfut:n* WIICclrL

E *raJice* fibroia germina emittit teneUa, *foliti* bino ordine altcmarim idnafcentibus adeocbris
ibfica,ut cauliculi pemtus occulteatur, iipcAu pulcernmo, & ut'undique pih huiita videantur,
quonvis folia ad margines tilitLin piloia lint Verum cum elungantur in caliles ad alitudinem dr-
cna sem-peddem allargentes, augentur foliorum tntervaila, eundra tahten ficum retincent folia
aulisi abocta, h.c.binaadverla altcno ordine,oriuntur; funtautem figura ovali, ner^Pola paili de
rirulUj Hypenci vulgaris inftar pen ula, iun iqueglabraj exocptis m.irginibus quivalde hirliitiiint
& piloi. umma parce caulium ex alis Mtiorum exeunt floreSj alii liipra alia>; quibus Cicedunc
alcuia tripartito ilivilj *et reliquis huius generis.*

In monte Olympo *Alia invenit I. Georg. W. titlr, & detchbit dqngitque* Inner.u. Lib. ;.
ag. sir.

A. IO. *Hypericum ruinw fupinum* Park, *minimum Jtpimim* J.I!, *mtvus fupintm, vil fupnum*
glakum C. 11. *fufinumglabrum* Ger. Zi)(Ir.lft tr.IIIIIU ->t. 3,01)11? UJOlt

E *raJice* tenui, lutca,nunc (implka, tiunc ramofa, fkucis & tenuibus fibris capillau *ctulum*Ui fun-
Jit numeroibsj rcnucs, terete, inhrmos & in terram rTupinoSj palm arcs & longiorc^ ab exortu mox
ramolos, *ramulu* binis ifblionimadver(orum aUsexeni bus, & pltsedam in ramos divifis, Ctilis
autem medius inbinos tandem diraricatarramos, & umidjuiftnieianiulLiinaliosbinosonline iib-
iividitur, inque iplis divaricacionum angulis (edent *fiofcuh* (ingularcs,p6diculis femuncialibut <ut bre-
/bribus, pncapctali, ftcll.it 1, flavi, Anagallidis iucez non molciim difl imio, jt.ilis UouleulaSc
cum defincntibusj cum plurimis in medio flammulis luteis. *Cahx* s flonquetfoliis, tujus-
fol A poll florem delapmm augentur. *Pafola* fuccedunt Hyperici vulgaris formi, in ternaparieer
Lilamenn divifi. *Folia* pai-va Hypenci rigura & a>lorc, mtnora imilto, SetyyUt pana, glabra
nullis foraminulis pemifa, neque punJtuls inlcnpTx C o ft trita in hac otum fpede ementat, mi-
iiiiis tamen quam in aliis,

In paluus arenofis &c fcnlio I us requietis agris ciritur.

Ltem.

Plantula *huc ab a iisomnibus !! peris fpecies parvita:c* liia, cauliculorum multiruditic, qui
ienfi) interdum cdpicu terram opacant, a3nbusrariusdilbofids,cauhbuiinnVmis 8c in turram pro-
vol tisti.il djftinguitur.

A. II. *hfyprrkum puUbm Tra^t* | II. ^, (itt puhbrum *Tragi* Ger. a,IC. *minui evilium*
Park. C 11. .*ni.ill upJigljt M, 0 oJ»S too?t.

Radice plures, lignotz, *Aurz,* corti x rabente, teriiu albx. *Ceulu* inde exoriuntur
dodrantes & majores, teretes, glabri, inia pane ruben, *intsrvailla* per binis
oppoitis, lra b *ne acute* ut triangula videantur, lii, *scrne oblcarius vi-*
rentibus, inferne [iibglucis, glabris, minonbus Zc fol *idioribus qua* n Hypcna
caulic mms Scramulis lutei, conlimiles (ed pauci, brevil *luno pediculis nxi, & eodem modo in iplis an-*
gulis divaricant inum caulis 8c rainulorum fid Srijlus pantertriplex, & »a(t *ilium femmale par, tn-*
bus loculamentis compoliniii

In dumedis ik. ericetw (bio przferttm arcnolb ant glare

Ltem.

A. II- *Aft ,rt>n* Ger. *vulgart* Pa k. *Hypericum Afyrc* 1 *dictum ctult 7* *ad angula* J.B- ^- .^J'-
ram dilans IV. /n/e *Andrtfxmum btrjutum* C. B. jfc. pfterjf ttWM.

E x *radkt* reptantej Hbrata, *rubente caul.* • cnnttit 11 *yperico* vulgari pares, quatu" nicmbranulis
caulis fecundum tongitudiu in productis quadratos, rubelcentes, ramolos: M«* qu.iin Hypcnd
breviova, *atiora pceptae ad bafin, nervofis, raj* CIKICIII tamen orm 8c ockxe, nullis poris pertula.ad
Majorana¹ fyl *veltris folia acco* identu. *Floret* lutci,pcntapctali, plmdiniid«^{minor}c^s quara Hypenc*
petali minime limbricat, triplici parie jrft^lo, pediculis brevillimis, tanguncum *la* amdigKoram
attrim reddenic. *Valculum* Icmiuiie qu mi lh *perici minia, epiden* ^{M m c n} figura- 3c tnbus locu-
lam mis coiupolimni, jcmine palillo pnrgium.

Cmhiii quadratis, Roiculi nunonbii, locoiuuli cirtanvulos inqucrigui, & pratenfibus huiiidis,
ab Hypenco Facile diftinguitur.

Ltem

C. liauhinn male hoc genus Androlinum hirtutum, cum noj nutlam in cju, tiulibus aut *folis*
hiriuoctn pctciperc *podimas*.

A. II. *Alcyron fupium galeifum palustre* C.B. Park. *Afc. fupium* *ludus Clufa*, Geremac. *St. Peter & wort*, with hoary leaves.

Claf.
Hoc genus Alcyri molle est profus & Unugine <ditum, caule non quadrangulo, festered & rando praeditum, quem alterius bina semper ambiunt folia, ex aduerso nascentia, ut in Alcyro vulgari, aliquantulum tamen magis orbiculata, summo caule gellatae floris (paucis) quinque foliis collantur, flavi coloris, qui tri- inguineo succo norintuunt, uc J: us quod siccoribus loci sru- scatur; quod humidioribus natalibus tribus. Procumbunt autem singuli cauliculi, & recenter lecti humore turgent, ad singula pene internodia fibras aggeru5, & (ubiiiiit; JiovdK ramulos producentes, sub aqua tamen latent; & qua ratione feliciter se propagat.

Lecat.

Hec planta in Occidentalibus Angliae, locis palustribus frequentissimè uactt, ai-bi rarior. In pafio. fhib. suis patridis & aquosis late se propagat; & totas paludes nostratas *Woggs* & *Woggs* dictas occupat. In altitudinem non atollitur, raris ultra semipedem supra aquas emittens, nec admodum rari- i est, & i- uocis in summis caulibus flores gertat.

Hinc eandem esse subcor Caryophyllum palustrem, foliis (iiWoomdi ino) floribus i uocis Mentzdii: n^'niquc & deicnpao, & icon, & locus cottraiaaL

14. *Hjptricum lomtmajam* Lob. J. B. *tamtnefnst Ixbtiu* Ger. *fupsmurt HmtMef^m mm^** Park. *Hyf.fupmitit tomatufum mtm* *vel Monpelina ^mQ.JL*

7. B.
Radix esse cr.fuuu'-'ula, lignosa, rubente: *Cauliculi* multi, ptni.iriv;- & dod intalibm, I ere tota i riiicLs, int ius: *foliis* Hyperici vulgaris sed albidis laminae obitis *Hertbm* lutolis IT inonibus, capituJis b; evioribus.

Lema.

Lobelii folia non tantum minora esse quam Hyperici vulgaris, sed & ex intervallo rariora esse vero scriptis. In 3. ula *Moles* & circa *Monpelina* in lotis niturJ udis & ubi per hyemem aquae stagnant nobis ot/ervata e I hsc fpcci

[J. *llipertcum fapinuM* *ttmten:* *furo ma* *fJiftmemmClmfSi* G B. *tt/mtmajum WJJ* « *HIISMU-C^M* Park, *tomtxtefufii* ***%** *Clufn^** sco.

Claf.
Multis ramulis hu. iitis, Ivjnit ft: ata praeditum est, microftv confertitque *folia* illos ambic: **jc^bus** vulgaris Hyperici similibus, sed pline toment ifis & **incanti** *Epis fieri* secundum ramulos lura, **pallidiores** umen^ 8c **minores** *liqui* Aitultun aitani in vulgari; quibus liicedunr capirui seu vascula vulgatis capitulis similia. *Radix* est dura & lignosa; *lani* it twin **rami pa tttram 1** parti subinde libi JS & roiiices agni

Lema.

In conuallibus quibusdam non procul Salmantica crecit, ubi Julio menfe flo: C>tespJanuiiivs. m t(*lulus*, adeo late spariis & diffusis, ut ampli petali orbem aequare possent. *Queritur* Clufius quod plantam superius proxime descriptam Hyperico huic eandem esse allerat: Verum tum descriptiones tum icones in omnibus fere conueniunt, quod haec numerosa & conferta in caulibus sint folia, illi rariora: quod tamen non loeci diverfitatem indicat. Nos ex tam procliviores sumus: *ve* go in Lotclu fentem fcitum cu^ *Melitenfe* nob: *ob* lervatum Hypencon torn.],. c^m- rimus. NI [iam feruire vidcui D. MaRnol inB*r^«. *Alexfp.*

A. I^ . *Androfamum vulgtm* P.irk. *m.ix; rmm frtrteftm* (*B. Siciliana alia Caeciliana vel Androfamum* *St. Peter & wort* leaves.

Radix est crassa, lignosa, rubens, fibras **b** ogiffim Ai emittens. *Vimm^* Leru 1^ a, cubitalia & sesquicubitalia, rotunda, rubenta, glabra, pinnola membranacea alata. *Folia* bina ex aduerso sita, Periclymeni, quae tamen carbis non transaligit, glabra, superne atrovirentia, interne candicans. *Flores* Hyperici, minores tamen minisque speciosi, observatione nostra, quamvis *J. Bauloni* contrarium assernet, quinque foliis luteis constant, quibus totidem viridantia suspensa, quae delapso flore surgunt. *Vasculum* feminale (iuintnH) encoronjntiuij(x.im limuiat: dt enim mtubrana ejus exterior seu pericarpium lemen cont iuiij craftimSc cironolum, quod tamen ante maturitatem leminis exiccatur & turquoq; embus parti b us <amp; angoni, nam tres in apice stylos habet. *Flores* ii: hag specie pediculis longioribus infident quam in reliquis.

Lema.

In duinis & lepibus 3c umbioiii agEcnbus-yKftate floret.

A. 17. *Hypericum majtu j.* *de Androsamum Matthali* Park. *Hf^rruum* *Androsamum dictum* *J.N* *...* *Ger.* *JtruM* *seilit* *typer.* *...* *quod aliquam Hypericoides* C. B.

Caulis sesquicubitalis & aliores, teretes, hirsuti, rigidi, per totam longitudinem, percipue (uninu parte ramoti, ramulis brevioribus quam in Hyperico vulgari; folia crebra vestita, ex aduerso posita, lamiginosa, venosis, quam Hyperici vulgaris i: i. qon bus & latioribus. *Flores* quam illis minores non nihil & pallidiores; vascula feminalia similia. *Calicum* segmenta ad margines lembis ex rubro nigricantibus obita sunt, unde & conia punctulis nigricantibus ceu pulviculo quodam aspersa videntur. *Radix* habet furculosa, obliqua.

Ab Hyperico differt caulibus Mrfatis, minus ramofis Sj fd his pariter hircucis, p... & i- caulo crabbioribus; quodq... iineis in caule e... ribus (tit tiW!!iui) qu... m Ily- perict iii!horibus &- pallidionbiis. Cautas, folia, in univertum iota planta pallidor ell qiura Hy- pericum.

Ad iijM* & in dumctii, Julio menfc flora.

iS. AnHrejumum ytrfdia:»m & firvvrerum C. B. edtrum Apiilum Col. Pji-Jc.

Col.

E raiict fibrofs, rubcnre, obliqtia, plures fitrethi pedals & majores profert, nil... K ro- tundos; linbo alternatim per longum dccurrenre, l geniculo ad geniculun, caoles vcluti angulo- fitsefficinaj; ib imo plunous alis dtvifbs, atqic genailiscorum it... binis hvrentt bus, admodum ex oppoico alternating atque adso ut a caule perforata valeatur, ut in Peridyem i & Campoclaren G Androfemo ;... mtnora I... acun ora, & inferni albidiora, li- vi.i, & imperceptibilibus feti pun<fis nigris per oras depidia, tucem cnam ex poris tranfrnki... ut Hvoericum. Dffert ab alns, nam circa cmlis fuinnum ram dccrecend.t Si mtnora, fed lime f^inpor ainpliora&Unora^d caulis ufqueacumen [folu fiint] ipsiqttecava.TelutpsUiciilar, |<i ambunna minucis dennbus I errata, utpenc fallant oculos. h'krts infant mulu, coaccrati vcluc coivmbt, quorum calycom foliola & riorumdepicta (ant pnn&isillisnjrri... LC in Gipn... FJorum born antequam pandantur rorundiores Sc comp... indpianas. Apnlr ft... me inferot apparent. Δ bio fructus perfidit

Divert faxe J Cam... iiiolliora & lu^cm tninfrmtentUj atque in fumm... fblib & Soi

Hujus onus in campeftribus Soli cspoiicis calidiorum regkmum Ciiinolano inculti... us reb in umbrois mont bus, frigidionbus fcpentjrioiuljbus loos.

Hiuus hi Ilorum inteeram C F.Ootamnc Hiff, minm cognit. dr rarmwrn... quoniam planta ranor eft, &c parum cogiita.

- A. 19. Hyftricum tlrfa>nftmum non rwmfimt felts hto J. [(Aleyram five Hyp netmbifeSut gltkum nan ptrferalum C.D. AnJrojmttm Maiifaelii Park. 7<*>J. Mrujlan... Camfolartijt CoL tflrgant inipcv[o:ott <& jf.of)n0 ti)a;r.

F. Col.

Hujus planta... urtemteft, lignoti, multifitla, fibr.itj, r>:t[irj;i(Juc, ili;h vo! ti... cabitalis & abiores, teretes, rectos, glabros, tenues, firmos tamen;... pectatoUsh<renriahal>a... Hyperici vulgaris) pervu, membranea, gkbra, a nervo i f l p In mucronem excurrente productis Jimris in arcua vcnulis; inferna pane per margins. In caulis imo fo- lu rotundiora iine, minor.1, Ilyponci vutg.iri* part.i denfiora. ob... ad malium uiqu:- caulis ferpnper miy... loiiKiOii, I... Odorp! nre, florum & fructuum n pj;)er:itn idmofm; atque Liccum ligro-purpleUni! M>...

Pianca h w in raonrofe non admiylum r^ra eft, ut r. R. in nn... in iujiictii moi... cntnon.ilibus... Warv,icenti fponro fuccrevit.

CAP. IX.

Dt J.} smachia latea.

oblonga, ad gc- III u a inKiitum tct iu .mi qtuenu.

- A. 1. Ljfn machia bat* \ \ Ger. lutea... C. D. l#ta mtjer vulgato...

Subrubente radice, reputi i... Itrutoij hiilutos

rarius bin a, Siilicis lantoliaTj adiminataj iiparii: .vtiovjrenria, in fene magis candicantia, l. nugi- tiola. Ftara in extremis ramonim taihglii lutei, Hypeiid, acidi fapors, e quinque petalis e°m- politi, toridem ftaminibus medium occupantibds. Semen [pocius valculum lcm.\ CJo iandro par, lapore hand legniter aftringente.

In aquoils & ad rivos fed ranus invenmir.

S, Lylim*(bt*Uttan>merft>littitigriipt>niiiKiaiu O B. /*/< minor J. B. Ger. Park.

ckf.

CuWtali plcrim^, aflufRit caul?, internum edani unpoOfc, firmo, auro, lanuginof & villis ob- fito: hunc anibumt ordtnataquadam lent; quaterna plcrunq, limul, nonnimqiam ctiam terna m- verlis inter ie pediculis/c/irij mollta, aliqtantulum inuuaia, qium prarcciWntii mwif .urin faporii, ilcndc lalivam denris, inernaparte nigris punftisdifhnda. (arca lummum caulem ex finKilouiT) foliorum iinu prodeuii vel ramuli aliquot Honbusonufhj cam hngulatib:: aliquot flori- buij vel fringulares duntaxat fimm, piaieiUUJ iuninin vauli* faftiOj iutei, cam, t quadam gravi- tire odoraci, veluti quinis niLicronatis tbiis conftames, fed qui ; amem minima lolo cohx. ent Stimuli defkuntj cuni totidem pammbut fitvk Radixcnxcolna. exfinj; unum geroco- It. novas propaBincs produccns, & liibinde fibras agcrtSj quibu5tellunfirmnicerinha.T<

Crefcic in Alpium Auftnacarum a!u inarum regionum convallibus8cpi atenfibz locis pluima: ut Clufw 8c nobis oblii vatum. Fbret Jmuo.

* ;. LyfimtchUtrifdi* lotta fpietta C.V. litta alter* iEiS(CoL

?WwobdnetadfineUaca: .lis genicula teia, hirluci qukm Lyf. IUL vulgaris minoia ; e quorum cadis (inu petioi m.iii.isi:n. iio< fi*tt, i^i> non diffimiles, emicant, pen- tapetali e calyce quinquepartito. Caulis tenuis angula- natus, uuibui, m talHmor, ft ibatur, guo tauis doijnebat, dense atiiue in acumen ramoruni inogu, quibus ilia in tummo djviditur, in niini pares at% iinuleSj in qwbus<W>M tjite ob imperfedioncm ohferuare neqanimus. R lem die (ufpicor. In lv men peulos Horuii longos i obliqu^ repciw, tennis, plu; 15 cmirrii Colore c(t ex mulct us canito, into verb ftUvi- canrej fibns oJiquv f 'lius rdpedu, hunium tiitiemibus., prop.' lunuiiam cellurem hxrennbus diviU : Sapore :<y.t, odors gravi terreo.

piffat hac A. vulg. ramoruni inogu, quibus ilia in tummo djviditur, in quibus floresaniol. lares fimul infidentesproduccuntur. PlanuniJurteclL.:: precedente fpecie can- non in loco natali lem die (ufpicor. In lv pratea ramulos t men peulos Horuii longos i Linu provcatro icuplit, non U

* 4. Iyfmachia litta t&fttx* Caffebtl dntrt Alpin exoe.

Semicubiialis & ajnplior frutex eft, ferciis ab radice cauUm longun, geniculatum, ferè ex toto rotuniluni, ovum, incus habentun mctiullam albam ut Sambucui, colon, falvelcentem, ramoliam, r.imutb exopiwfitoxcunabus, refXa, geniaibtis, e quorum genicuLs un inq, duo exant furculi, itibnics, parts laentcs magmmdUie 8t hguia riorum lutiij Lyiiniadw , quibus foccoent parvi foli- cals oblongi, inaanun ddinentesj nigri, (imm nigmm & minuruni continentes. Folia vero bina infingulucauUumgaicuLsutnng,exoppofito pniw ccmunoir, ol>lon. ta, lata inferius, in acutum detincntu, finttpctiohiadharentucerniintir, Lylimachia foliij Jinuluj (cdndnoi.. tamen. Radix efter.itla, longa, In acumm ccmunam.

Uxc plauta(inquiO videair fimiis ex cota Lyiimachiz lute*. Caules ejus oraffio<9> non fupe rant oMftitcni digiti minoru, qat fiocefceotes medulla iiccata, utcalami c vti exadant, colore fil- vejaiat, taalc tranguntur^ inriifq, habent meduUarum iubftantiam IV. que in ore agitata len- teTat: motion fum, vel exigui admodum nanic ingniti odoritj prj terum radix: lignum cum ali- quanta atrimoiim eft araarum: Qyibu* nous oonvenit cum Cijarra • aromatico Dholcorini: pro quo eo unintur Arabts & /tgyiKii.

In Egypti loctz humidii naotur-

j. LffwuKk*fata forijrUlvft Get. Vark. Infeiufiglolofo Un C B, alt era litta litta, flos I*aft{ }icato J. E

Cla:

Pedakm habec caulm, tencudj ftmtum. civum, multis nodis lcpum : ab uno brevibus bina nalcntibus cinctum: que circa mollem cau- S* veiponui v.iguiulis, ad lmgulos nodot ex advd nalcntibus cinctum: que circa mollem cau- liquo i'tl&A - ex quorum imu cnaicuntur unuak'- pccellu, tenues, fuffinentes flores nudi oblongi, & quinq, Havis foliolis tonftantium (prodeundbus c medio longiuiculis tenuibus flammulis cum apice aureo) veiou fpicam. RBIM uititur longaj Kic IUai. fe fpargente, ad cupz ingnita frequenter crefcum tallies & qliafl capdijres fibra., quibus pier. que aquatice flurpes donatz funt. Adnata ie propAgac.

i 1 toffis paluftribui area Stvtnbtjtj m IloRmdia mvonmtis: 1 obelius in humidibus foffis dra Gandaviim. ajq, inrtr Tejicranmdjiii & Quwatum, uocnon in Hollanda circa Amftelto- damuin ; SdiLckius ngus loos id Aliimm KautUirir. vicinaz radices.

Nuperrimi: poricifltmus Botanycus *D. Dtdjworth*, in Anglia, Comiutus Eboraceafij otienuB parte haic invcnit.

LyfmacL':-e latex fart gUboft fimilis Brafiliana hnemiaata Marggr.

Marrgr-

Cade lento, ruiTo, fcr-piij & trium auc quatuor digitorum interv.tlloj in pediculo dig'-turn longo rtia lempcr *ftit** liui appolita habet, quinq; auc lex digic. long.ij %*on* ambiru le *rrata*, late viridia, nervo & venis'obliqus conlpiatis pnrata. Ad podicutum tolitorum alms pediculus, quinque aut icx digicos longus pnjrcnit, rtilfus, cui umbel lam lubec mft*r Sambud, flotculU ni'nsniisqui nullis foliis conftant; in cocum languinct clegatitillim colons; quilibci corum iigtram habet rhopali quo leproii menotcances circumcurianr.

Efhmtmrn Matbtidi J. B. Ger, emac- Epbtmtrim Mutthieli, vtl pi.t:ut EphtmrHiu j'purium Leh, Dod. C. U.

Prorlit *ftliis* oblongs Jaw, duri: *scalis*, vian Katidisj fed tamen minonbus: *c/mhetdu* compluribus, rowndii, cabko alnoribus, non abfqcadnani: quos (upends quinquefoln *candali* *JUV*-ihunc *fiojcnli*, haud tnagni luccflivi,- prodcuntes. *Stmex* iiocedit m roaindis capiculi^ CMguum. Craflis 6c multis fibris capillaet *rdteti*.

In Ananicnlibus monribuSj tam in praxis, quint in (ylvis coj>io(c nalcitur^ autore Mitthiolo. *Locus*

CAP. X.

De Anagallid.

A Nagallis didi videtur viris doftis ab **w%* St *yia&* quod xq; repriinat ac reponat fodem procidu.im. *Te&-* denout cum cm ampuuM fiinc ririlia. Yci itimilios illud no men ac-
*CCpTe «« n itfjaytit »»(4'^*i ammar tvtxart «c* *dicere*, magica enim herba est ac à *Magis* proprio nomine Magko *tinttu*, BdgU gtli«hel heutit < *Germanis* *Quilcherei*, i. e. fatuorum *falus*, quod in liminc vcilibuli luipenla contra nulenì *horum* introitum pollere credatur. *Magiam* herbam diè oftendum hxc Plinu vertu, *Pr**. *quasi aliqui offerunt, ante Solis ortum, priusquam* *am* *<JUK-*
euM ohud tafHJnlur, tr fklmtsn t*M, turn {ukljtam ixfrtmrt,* *?*ar*
Yont a colore hyacinthino, qui in firmin.i rcluas non- *en* accepti :: off enim r< *Hyacinthid.*

Now Anapallidis funt Folia ex adler(o bina, tn vulgari ("ubus maculoli. *Flores* in fingulis foliorum ali? *linguli*, *jwiahs* longis, centiibus, hircwcs *sMJis* .id ungues junctis, adcu ut *li* res in-
Kgn decidant: *Vaulcu* i luminalia per maturitaccm rranhflini icu horiwnralit^r *dithilicutli*.

A- I. *Ana^aSu mat Qzx.fiorxshxnut** C. B. Park, *pbjemct* mm* I B. *qqa* If *pjimpernel*.

Radix ei alba (implexj tenuibus fibris przdiu. *CauL* *ula* infirmo & homu tufi, mlmares aut fani-
 pedales, <P> *arati*, *laves*, *folis* canch per intervalla *bimis*, oppositis, *Allines* modie paribus, abique
 pediculo adnath, *tniema* (up *hcie* *crè* *rrrunu* *punctis* ex rubro nigricantibus guttatis. *Flores* ex
 alis *hijorum* exeunt *ingulaciin*, *pediculis* tenuibus oblongis nixi, in quinque legumenta acuta toti-
 dem tolia miir.intia ad unguem *ferè* *divisi*, e *calice* quinque angulis, oblongis, acuta legumentis
 conipofito. Succedunt (prone* *fe* e rotunditatis *vafcula* *feminalia*, pro *plamula* modo grandia ;
 Icnine replcta, (jux per maturitaccJ *in* *transverfum* feu *horizontaliter* dirupta *semen* effundunt. *Flo-*
 rum *H* *amina* *purpurea*, *apiculis* *luteis*. Sapor totius plante acru.

In arvis&hortis. Scrius & circa medtam *astatem* floret; *Semine* perfecto marce' ;at *ciJ* *cro-u* *LtaUr*
 provenit xlhtc.

Anagalhs modaatc caluk est *U. fleet*, qiuntu; *nra* C. Hofmannus *repagne* [*unit* *£c* pro viil-
 ncrana habetur. adhibecurque tilu incern) & exte *no*.

Ati. *ninhei* condude, ii *ulurpata*, ut postquam ex illa (in vino fe. *ijaofa*) me-
 diocrem h *antulum* accepti >, in Whim re com *bonas* probe contacta ac ludez. *Trag.*

Muher quicdam L-utctu- aqiu i *Humu.M* Anagallide dettilhci multm JurLiione Ubonno *cu-*
 ravit.

Ad Phchifinij t.ik:iii pulmoattra. (pumm fattdum & purulsntum bibat J ger *lingulis* *dieb* & *tmni*
 & *velpe* *n* atjux *Vnigalli*.ijs *nurm* *dcuilbtj* cum ; *sen* *lactis* e *vacca* *rubra* *emulsi* *quantitate* *cr-*
milla & *Sacchan* optimi q. (*cdukuratx* *codileiru* *duodcam*. *Exptum* *nutocis* *mo* *icamen-*
mm.

Ouiicranus In born) *scribit*. *venatora* in *ova* *fixis* *Anagallidem* *dare* *cani* *ab* *altero* *demorfo*.

Balilca: in tre<4. *peni* *uli* *el* *pro* *tomnibus* *reccns* *natorum*. *Egis* *decocto* *utuntur* *Weilphaliar*
muUres *in* *ins* *ulibus* *morentis*. *C. Hifaka*, *de* *Medicam*. *Offic.*

Vulgui decwjuic *c* *ndem* *in* *urina*, & *cataplasmatis* *forma*, *calide* *applicat* *pedibus* *ubi* *podagrict*
dolor *est*: *quod* *Nobili* *Anglo* *prz* *omnibus* *aliis* *pestuolis* *pofuit*, *teste* *Gualtero*. *Imò*
a *cocta* *faciant* *cum* *quo* *a* *paroxylmo* *lepe* *liberari* *viderunt*. *Difcunt*
D.Temer, *Rabot*. *Ca* *venidum* *est* *maximè* *in* *hoc* *mo* *bo* *a* *repellenti-*
mata *post* *se* *ducunt*: *Quippe*, *ut* *inquit* *Hofmannus*, *tum* *vi-*
entes *repellantur* *ad* *vifcera*, *aut* *si* *vifcera* *tam* *lunt* *debilis*,
Amr *nrtrr*, *I* *ft* *HumOfei* *Ulf*
Humores *ai* *luperficiu* *part* *tanq* *si* *dui* *luper* *illa* *podagrict* *dilapant*, & *dis-*
9 *non* *padtrir*. *I* *5111* *reucia*

terras & villosa v corroborantibus nittUomicnns u opus est: topcis & repe Intibiw om∈ es interdices ium.

Em: jptiasqu baldam Aq. AmgaUidb ph< nicae certo experim i:nto dedi. Ex Obfcrv. Achilla Garten D. Horn, Stame.

Wiliitius in manu pro Tpeci'ico vendit TO <cocti Anagalhdis flore pypurco, irem fiinnucatum llyperirf. D.Sofine c DoSio.

A. i. *Anagallis femina* Ger. *carules femina* J. B. *carules flore* C B. Park, f nil ale 0' £3ltU) RotoJrrcG pimperl.

Solo floris colore à precedente diverfa **eft, ide6que ulteriore** deferipneme non indiget. Inti.-nimarnis regionalibus, us, Italia & Gallu ufciq; obvia cl> j nev; luj< nore que flore **eft:** phicn- ceo mini.

Nee ateer qtiam Boris colors a priccientibus, & i- ter fa differunt.

1. A *Anagallis flore obsoleto* Park. -purco *Ciuftfark*.

i. *Anagallis Wæ earneo*.

; Antg»Utt omnium tn'mim* Monf prelud.

Morif.

Planta clt in humidis proveniens, vix biurkials. *Flores* 01 gerit coceruleo Sj vulgaris *Anagallidis* tri- plominore5; ciplulas icminalcs pariter inn :orec.

A, 4- *Ana^aUu futta* Gi. *flore lateo* Park. *late j ntmorum* C, B. hN& j *Nummularia fin,* J. B. iflOID % pimperl.

Numeiv ; flumis fibris albenribus aut fibrubentibus è geniculis demiffis radatur. *Caules* plures per terram fpargit infirmos, teretes, rubentes, folia per intervalla veftita ex adreffo binis, quàm Nummularia acutioribus & minoribus, Alfin Anagallidis mris fi iilibus, fl abeis, inferne Splendentibus, pediculis brevibus natis. *Flores* ex alis foliorum excoK, finguk mibus & ob- longis pediculis, lat monopetalis quidem, in quinque tam- it famenta ituc. i. ui ungses fiirt ut penrjptaii vidcannr; magnituilme k tlonin) Anagallsttis i vulgaris teretibus: quibus succedit valculum lo minafe roaindum, nan-am, quinque catus aaitK tbtolis obvalijtuin.

Locu.

Iriiylvis poit ins*ium xftawm fi

J. *AjingaSffcgruUa filiit bmit t'enu'fve ex aJverfe naftetujiat* C. B. *ttuifUi** Ger. Cttuc. *ttiwfitha flert cjTthj* Park, *ttutfta Mvntti* C lul.

Pliuxs (Vatim A radio: rjMw fparRit, peiialk longicmlinis, qua^ angulos, ut aliz Anagallides, qui dein :i< alios niinoca i latere procrqit, uncto~ per intervalla longifculis & angallioribus folis quan\ ana; Anagallidis lubcanc, 6c jifurat; aliz foliorum formam plurimum accedentibus, atque ex ad cr(o (emp^r n.itcentibiis, utplunium binis numcOj intertlum cri.; in termin, raro pluribus, iilqui: aitquando in eodem ramtilo: t: fluoruin alu nugn.i ex mrrc rondem << altunt petioli, quot folia cauilculos per intercvdLl t hmu! ambiunr^ flTmmo fiUig- o fultinantes flores pentapetalos, coloris ca-rulei, uiuibiltcocamen pnrpurakence, & phirniecis nuj= res, è quibus exiliunt exigua flammula. Abundf flores profert, & plerunque toro ti i; nelti fpatio. Floribus fucced- lujn)yl, valcula vafcula ut in reliquiSj limile femnaaam concinentia, quodeaduo Jetjiicre anno iiov* plants peneran' tur; annua enim live artivalis duncaxac eft pUno.

L*er*.

Ssmine Gadibus accepco Monello orta eft.

CAP. XL

A. *JmttyBs. martnma tntifflu* C B. Park. *Arab, lauifilu,* f, vi *Alfnt WKWA mmn** Ger enuc *Amb. Untifolta ?tflu eff. de martnma* J. D), *Mfm l<ft<fti >JW P<r<*ii,* << C. B^ y*/ln< gam ptUgitum CltJ. j&ca 4Tt)lthtiKCb.

Longe lartjuc fim it, mnkifque rmw humi jpicantibus pra<ta est tontitib knus, flexilibus quadranc .. inalu ambium M/W. AnaBallivis auc Alfucis folia noti .liffimiiw, ! .icci pknaj f ut (unt nlcraijuc IVI urn) btna (emper es a<id lutini naiccnua, virktuj gbbr.i, WJoguftu: inter no* << !> floibus fuccedunt valcula grandia, (jiitnque lolioit> aj.ift •ntes, & in his quinque flantibus iiniu pallida in quins jtmma qu.ini vno p ante modo multo tiora ajora.

Locu.

In ai motis maris litoribus ubique fere in c\asitu Aiiij lie. Hec planta quamvis Allinis non nine innotcfat, nec Kore umen, ocque ifmine cum A<TM>>>re convenii; ideoq; teo um cam tollocavuius.

CAP. XII.

De Aijinc.

Alijnc diet, est *quir* >*, id est, lucra & umbrofo loca p-ripud a net
 icae sunt Folia con- caule fita, calyx ad modum floris in
 vavis folia ex; oec est, in plures cal-
 Alh'ncs nota- gjen;- iugatim in
 ptur.i (egroonUj fi; n unfiu, viicnU femtmlu limplicn, h
 luks icu lociilsmenM minimi divifi, lemmibus mediutn occupantibus cxrenus **
 Hamm nonmil.T pi i;cr relitjuarum nurnutn tetrapctalx untiim iuni, aftjuc hoc retpeAu .ino-
 nrate, qtus fcnrffiii (inmo in loco cslubtrmiu. Qiix pentapcuU iiiiut, vcl peula lubanc
 in incendio bitiiiij vcl eadctn Integra.

§. I. v^*** tctrapeialiE anon;..

Has pro *Alfinis luben* i>s dudmus ob convenientiam in rcliquii nocb, quamvis pcutorum on-
 mcro ab is differant.

A. i. *Aljnt tetrapetala Caryophyllides, quibusdam Heloficum minimum. Alfinis verna p!At**
Ind. Montf. Alfinis montana capillaris folia Par!... C. B.

Ralitufo ci alba, t nms, fibris donata: *Cauliculi* plures, lenmpalmares, tenues, teretes, infirmii,
 rotentes, :-IX*risgC!; culis intercepti. Ad fingula gemcula apponuntur *folia* ex adverso bina, eat-
 lcm fere ample dimidium vix digitem longdj c bail latiuscula in acutura mu cronem finem de-
 fiocm -uiiuis,albi, tetrapetali, ccal\ve quadri JIO, quodnota à reliquis llo
 iofcti dictis discreti facili est.

Vcre fl<• in glareolis sterilibus frequens. Hæc planta eadem proculdubio est quam descri- *Luce;*
 bic D. *Alfinis verna* glabre timlo: cui radiculam exillem attribuit, circa quam aliquo [v]•

Alfinis angusta, oblonga, glabra occantur: *cauliculus* uncias tres altum, duobus aut tribus art- iajlisdi-
 rinctum, binis foliis articulum amplectentibus, ad secundum vel tertium articulum in duos vel tres
 rum quilibet *foveam* unicum habet folioli albo constantem, quibus quatuor
 rainulos divifunij qm
 fbiol .icuta (u; *prolita* fuita. Saccodente *loculo* oblongo minuto semine pleno.

Ciixa priculum Id Gramontii copia fjin inreo it vere cum flore & fetu ii&

* 1. ^>a< *Alfut* minim* gltbra* C B. PATJC

Plintula est flofcuili ckg.mti(lim^ placens, ex cuius *radice* rufefcente, in fibras oblonga abeutite
 €4nliatl p! res in terram roclinati, *folioli* multa, prioribus similibus, sed glaben vestiti, procedunt:
 ex quibus pedicelli unciales rarius trunciales nudi est runtur, qui in summo in duos, tres & p arcs
 pc[iolos divniicunrj ?e *linguli foliolos* elegantem, JLI Lrimi, mulrifolimij punftulb Hilignicun),
 albnunij vd etiani purpui alcantem, ex calyculo o. nergsmem, fuit inent.

In itm montilxi*, ut monte FIACIO, & ad Thomas Fabarus, xlljtc floreat r: *pe-Luce;*

7. *Alfinis muscosa* Park. Lugd. *muscosa* quibusdam J. B. t(v;t;tittii mustef* C. B. An *Alfinis*
frag"">!Alfalis minima montana Col?*

J.Jt

Tencelli adm^ lum & inferna est plantula, veluti musco terre superficiem operiens, palmaribus
 & hypalmaribus *cauliculi* interdum duas aut tres uncias longis, pretenuibus, ramosis, quorum nodis
folia adnascuntur uncialia & fescencialia, aliquando vix semuncialia, his instar tenuia, late vi-
 rentu; *Ft* vni minimi, ex quatuor foliolis constantes, alit, Spergule facie & formâ, quorum media
spiculi albidissimi, nodulo vinctissimi insidentes, occupant. Flosculos sequuntur calyculi exigui. Ipa-
 dicco aut atro-rubente femine, Portulacæ fere, facti. *Radix* gracilis, inutilis, articulatum fib. 4U.
 Jit tv. planta tantillum amaricansis saporis percipimus.

Montium hummida siccibus umbratis usilque ferè gaudet. In montili is Saxæ, itemque in Ju i & t<w,
 S.lli; ita prope Genèvam, locis humilis & umbrosis ad fontes & equarum scaturigines observari- iius.
 Julio & Augusto floreat. *Tempu.*

4. ;:r!^ *msntittu* ...; *Lactis folia* C. B. Park *Alfinis Saxifraga angustifolia mont*** "WF*
tapa Col. Item Saxifraga montana Ne •paltunij 1 Park. p. 428.

la fixO; um rium cupium pcurptarum, & e. irura <v n umbrosu, circa D. Philippæ Intrim E-
 quincolorum, ab æque pluvialis impetu tutasocitur hæc plantula tenera puilla, que angusta oblonga
folia profert, Saxifragæ magne Mantholi modo, paulo laxiora, albescantia, molliora, è viticulorum
 gemculis bina procedunt: ex quorum sinu alæ, & in summo *foveæ*, candidi, quatuor folioli con-
 structi, *flammarum* intis multa, candidis, ramibus admodum, florentes Maii fine & Junio: quibus
 utriculi succedunt fere orbiculares, parvi admodum, Mibi seminis magnitudine, cartilaginei, i, i<
 quinque oras divisi, Ocyroidis modo, in quibus solum, obcurum *semen*, nullitum

FoliB untuiu :• floribus & albescantibus à præcedente differre videtur.

Alnus incana. Altram hanc similem sed maiorem duplo in montibus maritimis Neapoli observavit Columna, Agrumque sine florentiam, suave-rubente flore, pericarpio oblongo, acuto, in quo semina exigua. Vulgari colore simile. Planta est repens, sed cum floret resurgit: flante Alnus aluntur unda illique gaudere videntur.

Hec etiam in Lintia I^a Arkinsono his describitur, primo p. 438. sub titulo Saxifragæ maris. • Hi Neje policanx: dcuidsp.765- iub titulo Alnus repens angustifolia flore suaverubente.

A. J. Saxifragæ grammae fit JiUa fitrt ftrvc tetrifl. Caryophyllus incana multiflorus vulgaris. Pirk. Saxifragd. An'ixnnt Al. folia Ger. r. enlace. ; Carl. 1707.

FUM ad raJicetn inOrbem dtfpofta, anguftifEma, graminc.i glabra, obfcure viridia, nuftronata, femenciam longa. Caulis ex eadem radice plures exeunt, lenipalmates, tenues, inferni, rotundi, humi procumbentes, rami, glabri, crebris geniculis intercepti, & ad fingula genicula bina foils cincti. Ramuli vero e foliorum alii alterum femper exeunt. Flores quoque e foliorum alii alternatim enafcuntur, fingulares, pediculis longis, tenuibus fultis tetrapetalis, albi, perexigiti, e calice quadrisfo. Succedit vasculum feminale rotundum Alnus, per maturitatem membranaceum, pellocidum, feminibus perexigiti rufis repletum. Radix nunc simplex nunc multilida pluribus fibris illis capillata. Sapor plantule vrens & ctmluLulm.

Licu. In uliginofis, in fus paucis itenhonbus & hortorutn areis frequens occurrit. Per totam ferè astatem floret.

Floreeft plenuiq^mutio, Polioli!!! albi seu petalis que floris propria sunt, carente; unde eam in Oi^Jogo ptanAJiim Caiirabngisnlium Bore he; bido & mulcolo denominavimus.

A. 6. Stufraga Angina tumid Alfuufdu. D. Ploc *

23. Pl.

En hoc parva, fibris caulis diffundit tenues infernos, fefunciales, geniculatos; foliola ex- illis ad fingula genicula cinctis, ut in precedente. E geniculis fuperioribus verius extre- nic» < caulis exeunt pifilis herbacei, tetrapetali, vasculo feminali membranaceo, petala illa teu ca- lycc incki in.

A } precedente differt foils & caulibus fondale viridibus ex fusco seu bru :ino; radut .inm.a ; quod- que non repat ut illa, aut ex cauliculorum geniculis radices agit.

Licu. in umbelacti hortensibus Collegi Baholentis, inq. novallibus & arvis requietis circa 33 .-iuugis fic Cmltj agri Oxoi; cinctis.

A. 7. Mt8tzr.ma minim* Ger- *»» una fer •Urmsri* minor Park. Polygona j minimum fru Alnus minima C. B. The It afl Jiupmrc-hjojt, oj 3tli lift).

Radice mitur parva, alba, simplici. Caulis digitalis aut altior, simplex, rotundus, valde ramulosus, fenui pr-t tenues, ruberius, foils veluti Thymi aut Alnus minima figuris, sed multis numeris minoribus, albis pediculis immudiate conatis, ex adverfo • binijj elabris. Turn cai:li tum etiam rami bifariam dividuntur & subdividuntur lapsus. I x ipiii r.imuloi llm ciivori in aut divaricationum angulis oriuntur foils imgulart, pediculis pro lamulx r.ittonc iam longis, tenuibus infidentes, tetrapetali, albi, minutissimi l: qtubus incedunt vn/aiU jnamsft* rotunda. vV una pra exiguate vix confpigit.

Licu. Aftate viget in ericetis fabulolu& boinidioribui prxferdm.

8. Form f&«/» or Alnus filia incana; B. Av.hjUu intritima inc*n* Pork, w n.\ Alfmfulti C. B. marina incana Alnus filia C. jr. * Ob.

7. It

Hunn (par^ .e numerosos caules, palmates, subrubentes, crebro geniculatos, subinde in ramos divilos: quorum articulos foils veltunt vespallatum, Alnus minoræ, per extremam rotunda, glabra, mean.: bina & etiam quaternæ, foils membranaceo lacentibus subocis. Flois albi, copiosissimi extremis caulis ramulorumque acervatim congesti harent, pefilli. Radix simplex, brevis.

Licu. in : mca circa Mellanam & Mospelliam per totam ferè astatem floret: foils tamen ut rectè I), /V/itj'»/ non inijna Ion, sed pallide viridia.

9. ?oijmn» tngufitifmu gTMir'met fdu> trtFm» Bot.in. Monfp.

Magn.

Ex radice t: nui palmat.*: fefquipalmates caules producit, erectos : ^/, a ^ ^ M articulis bina, angustissima & oblonga, & que in floente planta usque ad summum ficea sunt : j!wj ex ramulis plures procedunt, tetrapetali, albi, quibus totidem foils viridia lappotit. • iuut Htmn rurvuni e(l & nigricans.

Tempo 9 Licu. Annua est planta, que Julio 8c Anguflo mmlibcB fierce in nurgmibus faWofis li<>nim Botto- neti propè Mospelliam.

Plantam hanc similem si non eandem cum Mospellæ esse observavi lata frequentem in agro- rum marginibus, cui radice simplex, lignosa, alba: caulis plures, lenipalmates aut dodrantales, teretes, tenues, satis firmi tamen & erecti, crebris geniculis, ad quorum fingulos foils bina angustissima, vix uncialia, & verius summis caules duplo breviora. Caules fuprema parte ramulos fundunt non binos ex adverfo sed alternatim fingulos, in quibus Jt& in lennis caulis ex alii foliorum articulis paleæci exeunt, parvum, pulchrum, nonnihil compressum hun & subrotundum fomes continentes. Florem non vidimus, jam enim præterierat, Septembri mense.

p. i. Al[tv]€ pininptiltE grtmiita petalk bifiJis.

1. Gramen Uaatnlhcmummarinum maximum Hort, Lugd. B.lt.

A. 2. Caryophyllus holosteus arvensis glaber flore majore C. B. Grjmoi leucewhtmkm Ger. Park. Gramen Fuchsi sine leucanthemo J. B. Stitthwoyt.

Tenu & infirma radice, summo caespite geniculata reptans; demissa tanquam albis fibris. Caliculi inanes, quadrati, dodrantales & cubitales, geniculis distincti, ad quorum unumquodque bina folia...

Hec J. Bauhinus, quibus addit, Caulem prope summitatem in binos ramos dividi, utrumque; deinde ramum in alios binos, &c. Ad singulas autem caulis & ramulorum divaricationes ex ipso exoritur flos unicus longo pediculo nixus; qui florum fitus huic cum Caryophyllo holosteo arvensi...

In sylvis, tepibus, & dimetiis passim: Vere fitWCt

Lacu.

2. Caryophyllus holosteus, foliis gra. nmttactu, jivibis alba Mentzel.

Marchia Brandeb. incolae est: non describit sed tantum dep. uijic At. ut.

A. 4. Caryophyllus holosteus arvensis glaber flore minori C. B. Gramen leucanthemum alterum Ger. leucanthemum minus Park. Gramen Fuchsi leucanthemo affinis & simile verba J. B. The lesser Stitthwoyt.

Sentis hoc florere, tantioribus, quadratis vixitula nervo medio tenaci & valido fardis. Folia breviora & viridiora quam in vulgari Leucanthemo. Caliculi eandem observant divisionem, & floris ovium Goum cum illis floribus: verum longe minores sunt, & pediculis praelongis indene: quinque pan: er foliis constant, verum ad unguis ita fissis, ut incurvatis spatium decem videantur apiculis rutilantibus. Caliculi foia quinque acuta. Capitula minorum, oblonga: radia similiter fibrosa, serpens.

In paluis & vepibus, interque genestas, praesertim solo arenoso, exiit.

Lacu.

Ratione loci in quo crevit tacem insigniter mutat, siquidem in aggeribus paludum Eliensis in fill* coloreum plantam Caryophyllorum obtinet, & caules firtniores: reverentia, ut diverlain quij offest suspicari plantam.

A. s Caryophyllus holosteus Ger. holost. arvensis hirsutus Park. hol. ar. hirsut. flore majore C. B. AuntuU mwa palis: flore albo J. B. Chichweed, s.:<ouff tax, UJth . large tuigte flotorr.

Radix ei geniculata sub terra reptat, ad nodos fibras demittens, & surculos prostrans. Caulis per terram spargit complures, teretes, hirsutos, infirmos & humi procumbentes, foliis cinctos ad ter. vlt genicula contrario lina binis, hirsutis, Alfinas Myofotida angustioribus, exceptis in quae in caulis floriferis existunt, quae aequae lata sunt; abique pediculis caules amplexantur, qui in summitatibus suis in binos ramulos divarantur, & utrumque ramulus in binos surculos, & unumquodque surculus deinceps ordine in alios binos, donec ad extremum ventum fuerit, apposito flore in uniuscujusque divaricationis angulo, pediculis oblongo insidentibus. Sunt autem floris amplis, floribus Graminis leucanthemi dicti pares & similes, pentaperali petalis in medio bethis, striatis, cum staminibus in umbilico plurimis apices pallide luteos sustinentibus. Calix pariter quinquefolius. Folia quoque & florum calices hirsuti.

In aggeribus terrenis prope Cantabrigiam ut v. g. colle Semitae dicto; in plantis prope New-War/it inter vepes, in via que Londinum ducit inter Trumpington & Haverhill, & utU l'adm< vicium, aliisque locis plurimis copiosae. Floret aestate.

Lacu.

6. Albus Caryophyllus tenuifolia montana, Linn flore. An Americae maris paludis flore, folio tenuifolium J. B.?

Radix ei lignosa, virax. Caliculi seu ramuli similes, ut in Caryophyllo, lignosi, cortice cinereo tacti [verosimiles intellige] geniculis crebris intercepi: ad quorum singulos folia ex adverso bina, Tunice minime vel Spergulae purpureae, angusta, Laricea. Caliculi ramuli, inferius glabri, superioribus hirsuti floris gestant in summitatibus longis pediculis hirsutis insidentes, magnos, albos, quinque petalis minus striatis, subrotundis, non hirsutis in extremo Lychnidum in morem, adeo ut Flos integer Linn florem referat, non tamen perinde caducus est, sed sui dicitur, fames plurima contractis hirsuta, vel ex albo ad herbaceum orbem tendentia. Calix hirsutus, quinquefolius, ad modum floris expansis. Paucos seminales longiusculum, crassum.

In monte Thetis mensis Junii sine florat.

Lacu.

Si J. Bauhins eandem nobilissimam plantam intelligat, figura eius vitiosa est, petala foris bitula representant, nec minus descriptio, cum flores ei attribuit non differentiam ab aliorum Aurigale pax... Reliqua descriptio & loca etiam convenient.

7. OayopyBai htUftas tentmtfm J. B. pArk. bal<St*; mentifus latifolius C B.

J. B. candido molli denique tomento est oblitus, ut vix aliud quam tomentum esse videatur. Totus geniculato, dodrantalet, e singulis geniculis bina profertur folia, ex adverso sua Auriculae... Dura clt 8: fibrofi r*iff... folia superiora sunt quam Auriculae muris pulchro flore, nec ita acuminata.

8. Caryophyllus bellianus folhgUbro C.B. f tlbCliitUIDcta, beirins the flowers in an Umbel. latif. Park. latifolius arvensis Ger. etc.

i Dura clt 8: fibrofi r*iff... folia superiora sunt quam Auriculae muris pulchro flore, nec ita acuminata. (radicali tenues, parvi & rotundi, sphamerei, tribus aut quatuor geniculis...)

Locu. Inter legetes variis in locis occurrit in regionibus transmarinis; in Anglia, quod sciam, non invenitur. Item veris... quae J. Bauhino est Linum catharticum.

9. Cmqp? jlas latifolius Alfinui L; folia C. \ Almtu Utifolmi P.ufc

C. i? pro/. Acl rsdctm tenuctu, albicantem^ fibrofum & repentem, ... kali ali^coc in termini: reclina; j^j... Et hic radunh est repefte, itulUuh ter oblongs, acumjra, bjm libi oppolit.i...

Utto, In Valdianflruia Alpibus, loco Gemme dicto, & circa Faharias reperitur.

10. Caryophyllus latifolius Alpinus angustifolius purpureus a CIS. Alftt», angustifolius purpureus Park.

C. B. prod. Et hic radunh est repefte, itulUuh ter oblongs, acumjra, bjm libi oppolit.i... Ex Pyrenaeis Hispanicis?

Liku. Ex Pyrenaeis Hispanicis?

11. Caryophyllus fulojius Alfnutgrmintttt CE Alpinus jtrjmatm Park.

C. B. prod. Radicalem habet exiguam; caule... paJmarem, odlen), ro:undum, geniailm-m... In Alpibus provenit: in Austria monte Taurero.

Locu. In Alpibus provenit: in Austria monte Taurero.

It. Caryophyllus latifolius... angustifolius tlkts C B. prod. montanus angustifolius... Park.

C. B. prod. Et hic radunh est tenax, geniculato, rufescente, glabro, trium quatuorve unciarum; folia oblongo-angulata, glabris cincto, ... In horto Dia Burferus !qot.

Locu. In horto Dia Burferus !qot.

Hic... parte: adis & parte glabris; qui statim in ramulos brevissimos, ex alarum suarum, ex adverso luto dividuntur. Folia habet oblongoangulata, angustissima, reflexa, ob tomentum mollis, & ex vindi albanri. Caudiculus in tres pedicellos, hinc folioli sustentans, caeteris oblongos, sed longitudo impares abt, qui singuli calycem viridem sustentant, cui folia una, ilque alba & quinquefolia infidet.

Locu. Hinc in Granada ad radicem montis copiose Albinis observant. Caryophyl-

CarjrofbjBmt fmxatilu fili^mfm C. B. Park.

Ad Herbas flore retrapeccalo filiquofas refrendus est.

C*rytpb/1*(pttMtilit felia gramintit, wmkHaUs ccrjm'oit C B. SymphyHoi p-.ttxum five Gyyf- ffyium majus Thai.

Item , QuyoplySui fdxaultt Joint grammtit mistr C B. Sjmpti/tum ydrxum fnt Gyyfelyum mmm ThaL

Nobis iicogniu func

A. 14. Aljne Vtcafa P.irk. birftaa ahtr* -vtfeofa C II btrftua nnyfois laifola; praccim Cat. AngL Clir f;oiiaacrir,lbcDClr''OUfe car Cij lwerb.

Radiciu iubcc fibrofam, ccmiffimii fil.imcncis capillaram ; ttndc tauhi ctncrgum pi LI res, pal mum & intant un femipedem .iln, rorundi, hirliiti, intrinn, plurimum tamen erecti, foliis p-jr intervjlja binis. oppolitii un&ii, pallidius nrennbu& l mioribus quam (equantis, versis imam parte iitrantdi, rareis non conrranis inter fe, ... Versis lntim fcllmKi.ales in binos ramulos divaric mtur, 8c hi dcitide in bmos iios miliores, oppolito ad unamquamque caulis divisionem in iplo divaricatioiiu angulu (fort unico, in j pediculo admodum beevi, contra quam in Aljne fit. Flores autem pentajwali luit f<-ilo longis angulit in extremo filio filium minus profundi quon in AJima Vti^ari; cum flam:-:ibu istis ex luto virentibus. Succedunt vascula feminalis oblonga, nonnihil incurva, por m.icuritacem pdlucula, fern sa parva, rotunda, subruffa, numerosa contiguata. Semma poll ddiplbs riores ll.itim nucurdcaac, Sc valculis se ipoute aperientibus decidunt. foe* planca ad ciftum nonmhil vifcida ell.

Aprili 6c Maio tiwntibiis Horet, in (tectoribui areis & palcuis ubique.

Tempu 8
Lieu.

A. 15. Aljne bis fa mjofeti d. af's birfta magis flore C. B. Auricula muris quarandam flan psrvv, vafeuk tenui Lngo J. B- sponfe tax <clii htweti).

Raiix huic fimplex, allw, fibrofa. Caulei quam grxcoJentit inhnniore*, & m terram plerumque recliruti, nibences, Fttu angufbora, vtndiora & lubaiiwa. Fbrti longii.>ibus inilicent pediculis, petaks piottmJuii tiffi-i.

Tandis flores, nec ante medium Maium, & Autumnum usque durat.

Tempu.

dit C. Bauhino e Thallo tertiam Allines inrtute arvensis (pocion, quam ...

AJ vocjt, Thalw> Al(in-iii mmucam hilpidain:qu2in videapud iplum. inrfutam minoretn

• 16. Alfint thunha* Omfh J. B. Park. G&. Lychnis ft :tt*m mmsr C. E

Palmara hzc est hsrfeila, unico cdntj qui in aliquot n mos dividitur, confians, coque geniculato, tencro, tubiiiiito, ut Ailing vuigans. Felia Alnus foliorum amula, paulo longiora, subhufata caam, inter Ic opx>; ita & ex intervallis gemina. Alaru cavu inlidant pofilli flores, candicante, qtubus fiic. odunt membranacea & transparentia ramula, gallitacorum calcariu i torma, i que lenta quodam alperia humore a tangentibus deprehendantur: fern urn in ilLis cxij^uumj nuti. itate nigruu Radix uIUNIB & 4iir.Li est ; iOu inlipku dL

[ntoi ILV etes frequens Salmanticensi agro. Ego cum J. Bauhino nec Lychnidi, nec Pseudo- iticlanthtonanc lubjung/ndam duco, quod es non fit simili. Mas mente flores produat & semem iiuoirum praiec Allitiii m; olodis hufata fpecie eile videtur, tum ex figura, tum ex descri- puonc,

Lieu.

17. Alfint maxima H.Lngimttnfu J. B. Aiftm angulifoli J C D. mximt Park.

Lugd.

Radice cii Iu. Euifculi, [viulatiu gi I cilefcente, innumeris fibris capillati ; JUIKMU milite, pedalibus; /ifo> Alfino> vulgaris, per intervalla fepe quaternis, interduu: (ingulf i modum bins; ramulis multis, brevibus, copiofioru Nfarm\ oducenribus, antoquam hier obloa oie agumi nato capite inclufum, cui ii apstus dlt-iiuiiUiHi, cxiguum, t Jdiatmn, ; ex foliolis confians;"> ac toridctn :ils tenuiffimis.

In opaco gignitur.

Historia mihi fufpecta est, 1. quod nullus alius Botanicus hujus meminit prater eos qui de Historia tranferipterunt. 2. quod folia quaternu, & fingula interduu in caulibus ei attribuit. ad florem hexapetalum.

18. Alfint nemorefa maza M mmtJH^ Alfim mmums bdtr*tta maxim Co!. Park. msnt. Utif. flore laciniato (. It

Radix t vivax : Vitalicuh torrac>. hufati, pedales aut cubitales, infirmi, procumbentes nifi flutidb vicinis fuffitententur, nonnihil rubentes praefertim ad genicula, que in caule crebra brevibus internodiis, filis cuncta ex adverfo bina, longis & tenuibus pediculis hufati [fol.uncialibus] nuxa, ipla parte hufati 1 ijilli-ii' nreocito, IQILM. I lata bafi in acutum mucronem fufum delinens veluti Smilacis, per margines interdum nonnihil finuata. Flores in limbatibus raro. Jovis alio, in pentapetali, petalis ad ungues fere filis, ut in reliquis congeneribus. In

J XI,

In fylvolis in afcentu ninnn-. S.ilcvx inveni... Hec est proculdubio Alfine montana heteracea maxima. Cel. parvitai... Uca> ati) >e tres longa. Flores petiolis longis infident, eodem quo in aliis hujus generis fin, nimirum in rainulon am florid; >rum divancanooc. Valculum femina Ic pyramid ale cum f Avo ii tus [effline, miniitn, col] uolo.

Tkmfm.

Augulto floret, & Septembri perficitur. HuiCFc&i fructus, atque elata remanent petioli sorutn, non <t inmigari deorsum (pocantes. In uninbri is excellorium montem Campocarentium; <-tjue /tqmcoiorm dentis fylva collegit F. Columiu.

llzc non alia in re (ut moao diximus.) quira nugnitudinc a nobis obfcrrijta &, delcrite, Jff. ferCj quz ilocce >icetur.

A: i <). Alferle majr rftiti pertmit J. B. Alfine altissima nemtrum O. B. nem Alfine aquatica major efufcbm. W;7JH HM/O¹ Park. nem Al. aqu.; trt ^t< i uolubris major euidem. arfb-Chirkweed.

f. B.

Ex radice perenni, repente, (ibroia << /< profert plurei, qui lati ic diffundunt, cubitos aliquot Jongi, terctes, iubrubicntes; lanuginofi Sc ramofl; ad quorum iingulos nodos folia ex adverfo ita naJainmr, quomm major.* Parietariae (oli i-quant, form ndum nen os & per oras hirtuM, minora vero m Alfine volgans, pedk alo alias nullo, alias mediocriter longo, pilolo, lapore fatuo. Flvrtj Ipecioii Graniii: leucanthemi, quinque foliolis confiant, fingula ad unum ufque fil- fo, c. Indidis, ftriacci, jlamimda mvct> mudium occupantibiis cum c apulo viridi, e caps fummo quinta, rell aa fibra; emkant, totidi-mque flori tori I ultinendo fufpiciuntur folia viridantia, villola, quz va- feula Jiib(i:qticntia obvolvunt, Hypenci valculis fimilia, turba inata, in quibus grju.i continentur Pa- DJVCI mis paria, ruffa, circa clavam racematum cohercentia.

Lucez.

Folia in hac planta interdum nonnihil firmata funt per margin: s & velut crisp. In locis humidis & paluftribus, nemque propc fontes & defluentes aquas reperitur. Haul dubium dl qitm EKxlortus Alitnc= majom ntulo hincplauam defcribac: Dyonai au- tern figuram affiimunc Lobeluu, Geranim & Parkinonufj pro Allmc mapri, em dem ergo plantam mtelligunt, iduoque hi duo ex una (pecjdoaj I inurum AJlinem majoret: & Alfinem paluftrcm.

Lobdium autem in Ad*, non cognoviflc: AUinem majorem fuipicatur J. Bauhims. Hanc ctiam d'L-puw qiwm delcrtiic & depinj; Chriftiana Mcnaelius, b Pogillo ranorum plantamnj ad calcon Indias liu nomitmm Plantanini multilinguis, ntulo Al/in< maximzSola- mfb luc March. Brndtburg. Hec enim (vi diii) folia h.ibst act trurgines nori^aro parum i^nuata.

A. 1&. Alfa* vut^aris (rot Mcrfnt Getlxx J. B. Alf. mmr fivt mtiha Ger. Alfint mt/lm C R muer 1*.rk. Conimtni CliicktBrCO.

Non multum diflimilifcft niajori, alitolis locis pennde gaudens; radtcuii ci pillaribus [potius fingubnbus in plunmas fibrilbs diviiii.qur ad co horiter terram apprelteniiirnt ur extirpato difficilis fintj htimi (rraris, rcticjlifj hurfuris, lubrubcimbus,, genicubtu vittculis. Fel* Anag i illis m^ora quam in maiore, lubtiurfuta, exgeniculis limiliter adverla, guftu 6iuo: [aft-cand; |G ftclJati" r nores; Stntn tpericarpis non diiliim la.

Lucez.

In utiginofis ad (epes fii via*, itemque in vincis & Harris inter olcra pafllim provenit, & DCT to. turn fere annum floret.

Hare planta ratione Joci aliorumque aeddennum magnitudine adeo in/jgniccr variat & f^K muijUjUtoprodiverfifaUotanicatorum vulgo Kabcatur. Hinc AJfinem marinam Dod.Gtr. P eadem habco, J. BauEunus (ufpitarur Allinem marin.un DiJ, tonvenire po(K: cum Alltiic gmutolio: & dubitat an Dodonarus exhibent figuram huz Allincz manna: • Siquidem aaaaot P» Alfine manna ab illo oftenditit a Leibeli pro Alfine majore ac paffim nafcente accipitur, m intelligere fufpiciuntur.

Nos Dodouxum Altincm cma.it.nu nurui.

A. it. J^^SM lengifolut *litEm,fit frwrnim Lets J. B.

Zinnia: est annua in hincantibus. CWJ pcciar, quadrata, imbrnii; ad qtionmi genicula f > birw: GratioLr foliolis pana: minora, netperamhitum lerr. iu. in acumen dcdnsmU qhb BOICO medium etccun ehee. are a msdituo Utora nu im llj Gram. i l. modum dccmrc: circa medium latioranum in firjul ofe leucan themo minor ofe au m men (aus fimiles, aut Alimca vulgaris. extremis luvenc ramu< l^Ilr; albi. C... .. foliola flo- re. Li ambiencu quinque dmt vihdia, alba adkemdecom U ptn In tmbiencu quinqut. dmt vihdia, alba affit fit pr<crej apice. In palaftrib • & tvrvit proYenit non rara.

LKIM,

Perla hinc in floit decem rovera non time, fed illiuv.it quinquej uique adeo ad iunguem feret filia ut decem videantur, & i minus cantu tute improvan.

• ;; Alfine nupr* ^ r / << MNWU w^^bv Monf' pr *lui

Aiorsj*

CtuUi produ. trancia iKj quorum nodi* apponuntur bina ^ .W^ £ re- gione difpofit. j* niicro- nta, Languz paller nix Itmilu. In uuliuni I unius nalcantur flori, finguh quinque petals albu, aJ m ediam bifidis con I into, alarum lujus generis more, qui vix interdum lacente loie conspicu- tur, p opter tenuitatem p iraum. Hoc valde familiare est plurimo Lychndum fpeciebus.

Lucez.

Celcit ii i wm, inque lylvalb huniu lu fifudifc Qju.n plantam intelligat nekinnu.

22. *Oryzoides Lycbnitt repanit mAtce J. B. Ljiltmi mt&n* rtfou C ft. O., milder Lycbn-*
sa Col

Col.
Radix tenui admodum firmatur, parum sub terra descendente, atque circum reptante, ex qua plures fruticant viticuli, rotundi, incani, hirsuti, hinc foliola singulis geniculis haerentia habentes, quae in imo minora sunt, deinde majora in medio viticula, quod contra evenit in plantis ab radice facti in foliis ante cuds ernpoonem; ut in Thecopbrallo li'gitur, hirluta, carnoiji, incajia, Lychntdi (imili.ij fed nttgnitudinc & forma <Xymoidi> l'ekmuui Jictt. Caji etiam genti He alurutn congsnerum ricujSWi edit Aprlh itci«e VLuo meafe Candidas, quint'iii; foliis c...» ftruAos ftanuna inrui quinque lutai jubenres. Junio fmna id oU< m^ii pentarpus nioliibtis, cartilaeiicitiitjui; perticijj nilvaj angiiololit, htrlaquoBi Peticarpu VCSVJ non t.ilice oWud.i liint ut in Lyauiiiilibus, led untiim bifi» quinqc ioliolis toiiifrudurn ut in Alluic ktbent. Radix aJiuoJum vivax cftj ideoque muUCun fmicjt., teaJBaraie i|i!iiiiiiiiopent.*

Spontcae frequens oritur in roonce D. Made vnmals appeUaco, locii humentil>us pcnuHt.
Sapor phntx dulcis est; qture non ioepti HcrKiriomm tamelUruniquevul^iii .ulcUaemiini Ue gopiolim utitur; .ltqac plaiium icuui cetera olcr* [tilaiib .idjinxtii ovi, dHrupo decoquunt, non fine Piperis atque Anwaa modioo, TC! {ut .ihi liilcent) iti pLicenram einriiuot, i .qus un rugnara Ufts topum provenire experimento (c habat .iflwunc Ab faacLictt. cliucndi t Juilucc J f^u^iii* Neapotiuiis vulgo *Hcrta iMtori** diutiir.

X4- *Alfina B<t<<<fM »n atulcala Boccioni.*

Bocc.
Humi nntoimbtt, atque c*«he*fj* temtibis, ngiddw, geniaibtK, m pinto MmfiakM .*Alfina* p... f... t... circa quos FO/M tcnuU,angufta, Tithym.ib leprophyllt xmuU, dent rti[uni invicem oohaoeoc, qu.r in kneiconte planu Jum contraliantiu- aailiuu videocr. t'U^uh albii & c*fj*lm A Ham tuore.

Bonorux 8c ad vicuin ChoniiUy ublervavit Auroc.

§. 3. *Alfina pttalis integri r, alitque mifielkae* itcrt* fidis.*

1. *Aljmt miner tntkkautu C B. minima Ad. Lob. Dod. Qcr. J. B. syvita tmmj Park. The*
IcatKtjithhxtb.

To a fade Alline muiort (ai media ilmilucft; [fjbclio in Ad. AiwRallidem admodum pfjcfacj TenJm per otnnia minor, tencUis ritnului fit hirluck dotuu; *film* tnintniii Alluie* medix niionbui, nigiiic-tncibusj paulum hirfuus, pediculobrcvifltiuonuis. *Stjbn* (itnibra albo: Srwan, p... car... m\$ miinitiffimuin, njJum.

Foliai hujtis pbnoc Serpylli folia scfcint: t'losquincq petals indiviii cnnnu^ unJe ab Allino U>rc Sc iije.lio nullo rjc^ocio dilucmicur. in iildem cum prxcdcnribiw hev, uivunicur, non raro eoam mun» innafuuu.

Aljhu mmor Urn capiulit C. B. ftrxa Gci. Park

Milu line 3 prxcdctuc non videmr diverfa.

Aljmt miner folut retundu C. D. Alfauu mmrii aiu frttm Thai. mdu imegmtA, q. apud Tha-
iam.

• i *Mfnt Atym* gUbra C. B. prod. Park.*

C. B. frai.,

Ex r<Jw< albnt, oblonjja, fibris capilbua *tsuluuh* pitires, lique palnurtt. *terres, leves, rotundi* & gjniLuUti in ramuloi aliu*.*. hique in alicc divili, prodamt. *qui folia pallide virentibus, Lini for-* ma, led brevioribus Be acua^binii c *adverso lita chri^untur.* *Flora: plura, alba, ftaminibus alio* JJt doruri, pedicellis inlidnces^ e c-ibulis prodcum, O[>ititits mi nuto femino refertis succodentibus

tie ben lixotis hunudu gaudc^ quant copk^c ui c* balneum Sult/iergeiila in Marchonari *Lea* obfervari mus.

3. *Alfina Aipns jmuto f>iu> C B. Park.*

c.a
Ad ;> dtni alt itiumem accedic: *qus tt aliculas statim i radice r. i duce, higoo in alio ramulos bre-* vior« dinduntw; into- quo* unus vol jlter fen *palmaris exurgit, in tinnitate ftrm l,* cum fidi- vcl is uno alterbo pcdculo dojutui, 2c - *uliber una, ilque albu, pentaperato, laci mag-* nus, ex cajece prodiu in **Wd.** **FDIUKt** **iuU**, *is, virentibus, rigulis & inordinate difpofiti JuiiD **Bocet.** In HclvcucU&c Geneveniunimoobuf repentur. N<»!^ in HI *utibus ill> luxioecunib**

A. 4. *Jlfi* ttmuifoi** J. B. An Aljm* md>f* Gtrmm** G B. prod. ParL*

Radice lubct numerous, albic... n... mulnhdas: ei quitms iireuiit <*. *leale palmaris &* *felcupalmare,* aut etlwi alno<^*^ *terres, ramoll; ad quorum node* fU bir* mini mi, *longa tte tennu; FhfttU* Eaitigns h... nireat ramuknun *pedicelque* **didfi** **J** *UngiuWwlu ft i**

Alfines tertie Fuchii minor... itell.iri. Sapor huic plinz nulW conipicux... In ams ad nur... uiGogrr... Oanrab.jgicnff provenir... jion alibi in cooem Coc...

A. 5. Alfne Plantaginis folia J. B. & nobis. An Alfnt fma* G\$?». ». metit*meJut C B. Park? Plantain-leat

E m/i... tercia fibrilla numerosa tenuissimis capillari, emlioih fundir ; lucimos, eodrantales, re- rotes, tenues, humi procumbentes, geniculato, ramolo... 5. bievi L;... Ira!

Wan... qic Gpore nequc pdore notabilis est. Floret mense Maio Junio, & sem... u hrevi ad niatiiriratori perduat. In (ylvis anii... & septium aggenbis i-equens occmritj loas pr.dcmut uiiginofis.

6. Alfne Leticulae Sicula Bocconi. Alfne palustris minor folia oblonga C, B.

Hujus plantulae fibrabentes, geniculati & invalidi cauliculi humi sparguntur. Folia quoad sub- stantiam seu texturam & figuram, non numerum, quadantenus ad Loo Libycz Dalech. sive Tri- folia vesicaria sive halicacabi Cass. folia accedunt. Flosculi, capsulae & semina Alfines vulgaris modo verticillatim cauliculos ambiunt.

Lxui. Propè Catanam in palustribus locis inv^pit Paulus Boccone.

Radice est tenuis, obli... iRa : enfied... rnuibus. Jn... firmantibiis;... tcmiiffimis pediu;lii infidciobu*... quibus ?

Felia huyiis non relpondent i... Bocconi, ut nihi ipfc affirmaret cmdem *(C... Ego in Catalogo plantarum Anglie Allunem palust... Alfines rotundifoliae sive Portulacae aquaticae nostratae & Germanae synonymam feci: Venim si recte descripta sit C. Bauhino flosculus rae... ni modo ju n^ & ^ illius pedicellis in- fidentibus, fallus ha; quamvis reliqua descriptio conveniat.

7. Aiftucfait Yermjchi* ftmJ* ALntbUU Boconi.

Tnbus ;mt quatuor raRiulis humi jacentibus, Altines fblis nwucrofi... Jiinimicate cohjucmibus donaturj ad formam accsjens Paronvciib: J... [aaffl]

Uau. Exit passim1 in msiitnto iirorc Modiot dvi<tk Syfm... plantam eandem esse Millegrana...

8. Alfne maritima longius radicata Htrtwm* fbi'ui BocconL

Radice nititur pro planta modulo l... mga, tr-iffia, Jur.i, Ci... Lychindum moec, ad- nans etiam appendicibus... modi furcata: Ab hac Cauliculi denso co-... « fime vaiia; uni quidem [in Sicilia] Hemitarie formi &... niAnrimi: Neapoh.,ux Cal. Flores & semina lunt proo...

A. 9. Si_xfrwj*l**n,An£l_K* Park. ^//Sn f*

R*J?ct nitit... alba, multiplici, fibris mag... Jcuits donar.i. fWw... quae ad radicem graminea, angu- stissima, uncialis aut sescuncialia. CW«exeadC1... radice plures, palmares, tenues, infirma, glabci, crebri geniculis intercepti. Ad singula genicula folia ex adverso bina, angustissima, brevia, acuta, inferiora digitum longa, superiora brevissima, sedentibus in foliorum alis glomerulis foliolorum mi- nutilsimorum velut ramulorum germinibus. Flores in summis caulibus & ramulis Alfines foram siti, pediculis semuncialibus, ten... tui, niajoj c> (ami p... in medio flore decem alba cum... circumstant Alfines simile, semina parva, per maturitatem obscure rubentia con-

Innbus rspitwlmr... tinens. la i ••iluilii JU. menii Julio t!ret.

10. Saxifraga Jtavarica Park, Pun*.

Htuit feigit immlis plurimis tereubus ceniuisH, in .ilios minores liibdivi is, foliis crebri...

A. J1. Albes pulchra pulchra fan 'i\$tm>my. fan Saxifraga caryophyllodes pulchra...

E tu. ... simplici furculosa caudiculis fundit numerosos, tenues, teretes, infimos & humi procum...

In noiuoiiis Ebuiaenniibm piope Sts/U, ntxnon Dabicrihbiu co;>iofc.

ii. Saxifraga JatKjuarum qmb*pl*i* J. I- ... Saxifraga major It thrum A: ...

J.R.

Digici parvi magnituduic five crasficudine obfervavimus ... ramulorum longiore...

Ex luc descriptione Lychm tdis fpcik s effe vid JOJT.

Rara est fuc planta, ooc iibis unquam occurrit vd ii Anglia vel in transi...-inis regionibts...

15. Curjopi/jiiv jivjtjirt fing^er, vtt Cjrjopbjliw Jjlv. fisrt mtw** C. B. Saxifrag'i An...

Lobelii (ententii cadciu Gfl prircdcitti, verum frieolior oli lixuim; non est ergo liiificieni ratio...

14. Arauria j. B,

J.B,

Dicaula plantub, vi\ palmari, ex,UMU... longicaulis albis, crebris geniculis intercepta, ra...

15. Rah* linifh* after* C. B. Juncaria SalmMumfts Cluf Park. JuncarU J. B.

Cluf.

Habet in linguis Romail... bina f... exaas... A(pcn.i... odoratae folis quodammodo sim j...

Proveni locis arenosis inter vineta, secundo a S.ilnuntk.t milluri. Floret LJio: finen An...

16. C#7*pi^0w faxttt* Ericefilwt im&tli tu corj... tit C. R Park.

C. B. prid.

Ex radice tenui lignola, cont.»rt^|^ clinata, «*W. p]ures, geniculati, infefcentes, femipal...

D. Magnol flores semper pentapetalos obfervavi, inque defozna montis Capuladae a /^ Cam...

In (iallo-provinciar locis laxolis in 1t-nre eduo prop; *^<i 1 e...

17. *Caryophyllus (axatilis tricaefolius ramis repens)* (J. B. *fxm. tricxftl. ran.* *in repens, aut*
ex simula Park.

C/>' *prod.*

Hie i:ilt •• nucel clavati per terram repens ex radice *caules* lignosum emittit, in ramos plures
& hos in alios subdividit, quos *folia* exigua Ericz foliis simili Jitgimt, q uorum famulitibus *fl-*
res copiosi, nives, magni, elegantissimo spectaculo insident.

Locu.

Ex Pyrenas. Hanc floribus rubris, sed *maribus*, foliisque ad cauliculos longioribus & latioribus
in Hispania habemus.

A. 18. *Spergula purpurea* J. B. *alpiniformis* *flor 5. cap. 42. Lib. 1. Ger. enac. Sagina*
Spergula minima Park. *Alpina Spergula* ; *rgula minor flore subca-*
erulea

C. B. purple & \$rump. "

7. n.

RaJtce est (ngulari, longa, crassifucula, apophyfe qtufflam e latenbm emittit; ite, sapore betaceo.
Caules multi, per terram spai 'I, dexlraicales &c immores, in ramulos divifi ad quorum singulos no-
dos *folia* stellatum adra ijunnir. [Qy.- nris folia ca- liu nodos ftellarim ambire videantur, curio-
fius tamen rimanti duo tantum plerunqve folia appaebunt ad singula gemcula, ex eorum autem
similibz reliqua orantur,] angusta, acuta, quam *Spergule* vulgare breviora, obscure viridia, fe-
cialia circiter, plurimum glabra, raris hirsuta, quibus ad exortum velut squamule duae albae ut
in Polygono drcimponuntur. Sapor herbaceus. In divaricatione ramulorum *fofoli* singuli; in
(Traimiratibus etiam cauiculorum ad lingulos nexlos lingiilt orinntur, parprei, Ai tagallion phar-
nicez fl i i bua iiiiuki, L- quinque foliolis compofiri, alii recti expansi, alii penduli occlusi, calice
quinjucfblOj obfongo, herbacco, iuhii luto; pediculis oblongis hirsutis neri. *Semen* in capsulis co-
noideis, per maturitatem in tres carinas dehiscens, minutissimum arenae instar, fulcum aut
ruiEim.

Item.

In arenosis & glareosis frequens; M.iiio & Junio menfibz floret.

Quarit C. Bauhinus, annon hac lie AltcriasfeuScellarU *Lugtl. iir. Alles* *flor Stell. ir. Mon.* *bell-*
entium Park. D. Morionus (liurum aktrum SpcrRul* fpeckmtn niL-minit, solo semine a vulgari
differentiam, quorum tituli,

1. *Sperg*

2. *Spergula* annua, semine comprdfo toluao niuiore, i; i i • medio fulco, circulo pariter albo
cundo.

Utrague hare species Autore nostro dec&Sa fui: in arvis fegetaibz circa RupclUm, & in arvis
arenonrtnt, [cepta *Cbambort* Has.

Verum cum *Spergula* marinx semen foliaceum sit & fulcum cum circulo foliaceo albo, caveo-
dum ne multiplicentur *Spergule* species, ut recte monet D. Magnol in Botan. Monspel.

A. *t+Spttjpl** J.B. *Sagina %>jf<l* Ger. anac *Sag. Spergula* *major* Park. *Alpina Spergula*
alpe. major C. B. *Spergula*.

7. it.

Palmaris i *foliqui* ilmatis est pknta, .t<\ cubiti ctiam altitudinem (*acrescens: caulis* multus
ribus, frequens! gonicubtk Uibhirlutis, raniolk *Folia* ad iinguloi ar: i
ut in GaUio caulcm aiabtiuic cenuitati; quoque pan, led tictjuaquarti
tia; fuperiora cum coliculo k *inter hirsuta, i ira li pai i* *imicata, sapore nullo evidente. Capitula* in
rAmulorum fiihjpis multa, tineuia ling^lis pediculis donata (quorum unus aut alter deorsum pen-
det, alii furriguntur, ucin IIok.il
JtofcHioi ajbos c quinque roliis inf^ris o • *capitulis explicantur, apicibus* lutes; quibus succedunt IE ^^
/ " « ^ Allincij *tmma* counnentes *pubilla, nigra. fl* < // A-* fubeft (mgiiil.3 *na, recta, raris fibris* albis do-
nau.

Locu.

Inter iegectis ubiqne fert- nirms

A. 10. *SferruU itiorituvyflrat* J. U. *wvtrna Dulecbtmfu* *flor 4. f^ 46^ . / . £ . j .* (; *er. enac.*
Alpe. major C. B. *Spergula* *major* Park. *Alpe. major* C. B. *Spergula*.

7. fl.

-(liore est rai/t« qu^im mCviii^ n. mca S^J ftuila, ex qua *cettUs* fimthter multoi proferr nalmi
res S^ pcdales; ad quorum genitula n, I

ifa. Kanmloiimi ca *umbos* flores & calyculis hirsutis erumpent, i^t— !, " *que*
formi lod col- *alpinum* legitur luteo, errore forte *S-*
graphi, neque >c purpurafcente [apud j . li *ut de ea audir* *IEfZry*

^mm unquam vidi Siicrgufam riore iuteo, a *1*] Valuita nonn'it *itur*
sir toli.itcum. *ranen* nascens, ut abqu *y* *veritatem*

est *Spergukpn*rpurKE m Medjta *hapi* compeclium & *i_n*, u totamd-
tens; *ententiam* mutavi.

Locu.

(bus & niaririmls paslim prorenit

21. *M B*tk*s CluC Park. *Alpina Symphyte* *petrae* *capitula* G B.

(flu/e iimpliciutplu. *num* & singulari donatur, interdum multiplici, ^nicuian, *pedis* doctantem
alto, (ubrubic, dliqiw *lammis* pedibus; *folia* lato angusta, secundum pediculos tamen latioribus,
& extremi pane muaon- *is*, dorso magis eminente, nulli *in*guine obfita altera instar, sed lavis-
bas& teurai vircentibus, *gei* *nis* semper ad singulos nodos ex adverso nascens; extremi ra-
muli

muli velnt capitulis irifar Sympliytt petraa oni

radix mediocris, c:

Circa Jfrw & /* frmsa>* > ahilque Rr

i(e)lfe

22. Albia i marinma Ntapelsun* Cot Park, mar \ uhttat C D.

Jfc/it a anguRtflmia, nee LuituJine vitiatLisip'as, in quibus harent geniculatum bina, superantia, ipfiuque crua.uo orilinc es foluto genicno proacunai, longitudine pollicari & majore: fives habet in furano¹ c lonRL¹. pci solis procedentes cum calyce foliato, ut in congenentibus, colore flavo-benrc, ynf/w oblongo tv. femine similibus. Radice admodum tenui, fibrillis divisa, candidante, et qua inorbem repunt modi fntic-intOj itumi JKontos, sed cum florent relapsa. Habeaje \uculi medium IVamen, ut in congencnlv.

Oritur in marinrnis AuRro CVJVIris circa Neipolin [talixurbem.

Leau.

\, Saxifraga alte- Alpin. exot.

Alfin,

Ab uru raJiee mulrk aflurpi; fercula, longitudinalis dodramalis, tenuissimis, et intervallis geniculatis, es quorum t-angulis geniculis utrinque ex opposito bina foliola exant, tenuissima, longa, in acutum admodutv definentia Caryophylli minimi folis proxima, sed minora: men & t. miora, Tunicx minima; verius Gmili, aut sola, aut una cum ramulis binis tenui fints ex iitilem Sa-culorum genitulis indem prodcunbnm: in luminatibus vero hofculi purpurei, parvis Caryophylli-Us non i-iffimiles cmiunt, Sc in (irculorum 11 nis parvorum fere umbellatum modo, qui i[^], y[^] minutunij niencar.

I quot rad culas longas, tncuc, fibrosas, per larum in terra superficie actas: Tota planta inodora est, fl, ^ifumoiiii- abfqtic ulla amarimidine

nibus Alpino nata est.

* 1+ Atjm Albia caahathf nuJh prdftra C, B.

scrit, an sit Saxifraga ? Col.

Noque defcrihitj neque (ynonymu addit, dmitautq.

& fuitas C.

Alfnt fbivutitu Tab. Gw. ajxatica mm

D.

criptionem apud Tab. & Ger.

Nobb ino>giutJ & iulpeila. Vidcfis ejus iconcm 8c d

Alfnt fbivutitu fua Portulaca aquatica Ger. eniac, aquatica minor folio oblongo, Ger. eniac, aquatica Park. Water Purslane, o; round-leaved Water chick

A. aj. Alfnt tkmU,f*lu.

ilitrtl. Anngauu StrfiU'fd.: 'iVJMti J. ii

Plutimis fibris abcnibus £ genkulis in terrain deniiflis raicatm; Caultt paimares, ' te ctes, * Jib "V in^rmi, nibeitces, folm vdln creori, ex adverfo bina, Portulace amula sed longi minores, ex alatum dilatata, & in extremum rotundum definentibus, glabra, non aogufto itimirum pncipio pa alatum dilatata, & in extremum rotundum definentibus, glabra, non crcaus, lutoo-virtidibiu. Flores in alis foliorum fingulorum finguli fedem, nullis pediculis, fix ptirpurantibus foliob compoHn, q\ibus succedunt vafcula subrotunda tegumentis repleta, minutis raffif.

Iji poluftribus Sc aqiiiois ubi per liycmCm aqua flagrant it, per a>: am Angliam frequentissima Leau. cfl. I LIK olini habuit pro Aliino palot tri minori folio oblongo C. B. verum nunc mutata fententia pro AJiinc paluftniu ore Serpyllifolia rpfidem eam habeo, sed neque hujus defcripio per omni.i refpondet, nec enitu noftrae folia funt Serpylli multo minora. Plenam & accuratam hujus plantuii dclcripuonum vide apud J. Bi;JutUi>i lib. 29, cap. 117. Sub finem aeftatis floret.

Temfni,

A. 16. Alfnt fdupTM Ver'.ulme i Aljine fjlu-in StrpjBft Cillkb ©WlitO.

Radix plunii.ii iibiii upilbmbut conlUt. Ceuitt indf emargunt plures, rotundi, rubente, in terram roclinati & ful/inderaJv.es agent-v, duonun tnumv.- digitorum longitudine, ramoli & cre-bis gei aculis int-;reepd; qua, vcllu?ut folia ad nodos biva oppofita, pallide virentia, ad Serpyllum vil.zare accidentia, verum anguliora pro modulo luo & longiora, fatis craffa, pallide virentia. Vervis caulium m lutiiliiute> ex i: foliorum egreduntur fives, alia ex fingulis pediculis femuncialibus finguli, alia plures in eodem communi pediculo, perexigui, pentapetali, albi, quibus succedunt vafcula. • tnoocca, Icmuu ti na rotunda nigra continentia, qua in fua carnis per maturitatem deliifcunt, & icernna ostendunt: Carinule deinde fe contrahentes fives luum cori impetu ejaculantur. Sapor plantae amaricans.

Am.ic IJ a humida & paluftria, 5J poc aridiora jrj>crnatui v*re p affectum plaviolo: obiter, an-mus eIUtlrflo: raro in arvis inter fegetes.

Hac. plants est, ni tailor, iquam in Pralud. Botan. defcribit Morfonus sub titulo P., tubca: niini-matHorealba Eft auto n plantula fingulari & fuo genere.

Descriptione Portulace exiguæ five arvenfis Camerarij cui ii noltra hiyus hecbuU dilijittKCr col-lati, caitoai) ommno |>dicj

* 17. *Alnus palustris* Serpylli filii Bocconi.

Parvis est foliis, carnosa, Gratiola. Hyllofoliis angustioribus, ad cauliculorum humi jacentium nodos binis ex aduerso positis: Floribus in foliorum sinu rubentibus, cingulis capsulis & semine Allinis vulgaris. Integra planta danische palinr magnimilancem vix aequat.

Locu.

Locu palustribus circa Syracusas nascitur. A precedentibus diversa videtur.

* 18. *Alnus palustris* minima, flafailv aibss, fTM:u < *arizoidis* exiguus Meritz.

Uncia quadrantem non superat. Foliola LejiasmagniruJinc ionga & lata. Flores vix conspicui. In Borussia locu talis crescit.

Locu.

CAP. XIII.

De *Lyfimachia purpurej spicata.*

A. 1. *Lyfimachia purpurea spicata* Ger. Park. *purpurea, quibusdam spicata* J. B. *frkm purp. furti* Plin C. B. *Purple spiked Willow herb.* ex *Keole* sicut.

J.B.

Naves spargit radices digirales, lignosae, albae. Caulis ad hominis altitudinem lactiore solo ad-
Jr Idcum/rJ ubi, in alas divisi, angulosi, subrubentes. Folia plurimum binia ex certis intervalla, alius
ternis, Saligna, quam latee Lyfimachiae strictiora & saturantia viridia, acuminata, sicco gusta.
Flores in spicis dodrantalibus aut brevioribus, & pluribus velut verticillis compositis; hilaris perquis
oculos perfringunt; quorum singuli lentis foliis constant, flaminibus concoloribus medium occupan-
tibus, ex cauliculis oblongis striatis subpurpureis, in duodecim segmenta divisis.

Præcipue notabile est in hoc flore, quod petala non exeant ex uno calice circ
mm.;
cun in (quod in eodem fere occultatur) sed è summo calicis inargmc, mftatin- patibz ea avellent
nt. In palustribus & ad fluvio .nt.

Locu.

Virt.

um ripas > abunde provenit. Aestate floret.
Aqua h ad vultura, puncturas & sugillationes • oculon:: a, nection ad obscurita ^
aliquo arum viao pralentaneum eftremctlnim ai • inlbnno ; • iitinfhmma-
tionibus.

* *Lyfimachia purpurea* 2. *flos minor* Clu. *Lyf. rubra non fuscata* C.B. *purpurea Pannonica* J.B.
mnwrrub *flos purpurea* Park. *?urture, i ramer Clu* Ger. eniac.

Claf.

Humilior est precedente, cubiulem iincudmemr.iro fup: ans: *Caulis* illi tenerio; es, gracilioris,
quaflr.ingi)H> • acuminis in plures ramulos ex adverb innr & nascentes divisi. Folia vulgari minora
& angustiora, sibi invicem etiam opp »lr.i, leriw & "qiiod.iTini nodo gummosa, deinde nonnihil acri-
monix & amaritudinis exserentia. Quæ in summis ramis fufcuni i: confusa in habem ordinem, neq,
feriem ullam serva ni: intei que calyculi emergant rariore, minore, neq, adeo barbati, aut verti-
alJonim inftrar caulem a mbientes ut in precedente, plerunq, hexagoti, ex quibus fls prodit hexa-
s, ruber, aliquot flaminibus ex umbilico proceduntibus. Radix dura, lignosa, no ii rcpensutin
Juperiore sed ex eodem corpore niicos oules iingulis annis proferens, & subin, » btncbir le pro-
pag.nis, nuntitque fibris uilutrens.

Locu.

Pr-venit multis Pannonie locu in humidis pratis & : DanL bu insula. Floret cum vulcaij luno
& Julio.

" 5. *Lyfimachtm rubra minima* CluC *hmfelis fmrswat^rutt** C B *purpurea flos rubra minima*
P*rk.

Claf.

Dod ranwIU est aTcitudinis- Statim (caindum radjeem raim erafundeni PS
frequentibus *radix* argenti mital rionem Lam, ad brevioribus obtus: inter que nascuntur sin-
gulares, interdum gemini caliculi, longiuculi, quales fere in precedente, è quibus emergit fls calicu.
quinque petals constant, ex purpura coerule. • qlibus « lefluentibus succedunt capitula membrana-
cea caliculis inclusa, exhi lenuno candicante plena. Radix longiucula, fusca, aliquot fibris
donata.

Gulielmus M cr\ Clulio ostendit, ex lulu re liens in sinere lectam.

CAP. XIV.

De Trifalio fpwfo Crtho.

Trifolium spinosum Creticum GliCluf. Park. Ger. etruc tuukitum Crftatm I, B.

R Arum est hoc *Trifolium* (uquit J. Bauhinus) Cr«z mumis, cui <W« in rimos alteroa-
tnu «mndos, creberrimos, angustos, de novo in minore, ramulosdivariauos, humio, fufes
^ TL ita fa ue divi ; tur: ubtq, veroqui rami lurculitj, dividuntur duo exeunt pedicelli bi-
oppoiri, Gnguli/o/i« terna, p,ii-va, obionga, in acumen (pis olum detinentia pl ibriqoc futinemes:
iifd6mquetiv.iriunun]buiub(uiK, adiinci, n^iJuli. mo daces, deorfum fpeftantes aculei [Clu Kiil
iingulos nodos quatuor ipinul.v, bints fiipeme, todaeni inferne fpedjntibuv] Supa nis vero ei ipio
ramoram toitupediailusexit i> . ex calyce vintUnes emicans infii et for amemus, m ignos,
purpuro-violaccus, Lylmuchix Jpctioli limilis o quinque flitt t ompofita, modium obtidern;bus
.lpit;lbls luccis. *StlijM* e* qtutuor ant quincq col: n canaliculatis, latiafculis ad micronem rubina-
cum cocuntibus conltant, *ftmint* in lingi lis contento lato ruffo.
na Belli *Opilizer* nomine.

CAP. XV.

De CaryophyUo marine.

H e planta pentapetik quidem est, veriim qñalfi (cmen prwlucat, nuduninc an VAICUIO
iridulum nondum dil«rncrc poniimus, *tevra qtumris diltgencer qudivknus* nullum
hadthus (cmen in ea *imeminos*, quo tamen proculdubio nun *ant*, ut *nee* alu |tlania
quscunqa*.

A. I. *CtryfhjSus* *ntunM m;nimm* Ger.Lob
cat. *ven minor J. B. Granis marisum rrunut* V.vX. 4TI]:ifl. o: ;? .a July
flotorr. o: *jtn* ctinnon.

F alia est *Serpentine* priufquam florcu, brevibus duarum undamnij ubi va d caulis excre ritSc
flore quatuor vel ctiam quincq uncianim, 8c paulo larioiUis: r*4ut crafia, non brevi, uc vuk
Dodoiu-Lii, in planra doca rubente, ubi foba procrudi; in aliquot capita divifa, ex reliquis ve: .y^m
folio; um quali rapillau: CWv pnmo aliquot uncuru m, deinde palmari, tenuis, inf: a capi: ulun
j'quod Scamola- ovm.v accedir) vagina longiuloi). ab ipa capitula bali enalcente, & deorfum ad d>
gkakm longicudmcm provlucta inclulii& Exterii' facies capituli conftat *foliis* membranacis, exte-
nis vi entibus, mceriis argento ailorc luentibus. Torum capitulum icaret membranacis foliolis
lucentibusj inter qujrcxo riantur *rtt* in cdrobis fiini ma parte membranacis, quincq petalis pur-
puraiibus compofiti, cum toideru flamina useifdem 3 nexis apices albenas geltantibus. Sc: uuna
nandnm inconlpodum noftm venerunt, nam que pri i feminibus habet J. Bauhinus memb naoo
uüibiliOQ. *calycis riorui!* & vafcula etia;], ut apin<or, feminaria.

In iwluinbui maritimi> inque Icopuli* ad maru po totam A.-iglijin ubüjm.' frequenti [linu ha-
betur. *Loc.*
Hie (ut rofte Lobelius) Angli Sc Belg* arcinim margina ornuit; est enim vivax admodum,
denlo wlpits terrani opent 3t per totani aeltatcm floret.

X. *Ctrjophjllmt mmtmm* *nujur flert glc&rfo* C B. *CarjfyUotot fki afin* *caulis vel junct.*
J. it. *C*/opblftiit* *Mt.tütrrjntM* Gfir. (*irjumpt marrnum* *Mediterranea nujj*, *Si*:ct*
quib //dm Park. 4&)C&t &tj.'ltt.

Prox *Aea* cideni, vel vahlc finnlts, MW dolrantalet edittit, rectis, enodes, quoniam • tidC
capulque ituinini (quod uncialiiSt longm: vapua membranacea obvolvii) *lis* intidet rem glome-
racus, Schwmopi-jfli tetviimiiniilini; exalbn purpureis, foliacearum fquamatum vallo circumdatis
longa, ignota, teres, crassitudo in multa capita dividitur, unde terram proxime magna feget
foliorum emegit, graminorum, glaucorum, laticidine paulo fubinde variantibus.
Parkinsonius caulem non profla nudum esse affirmat, led duobus parvis perbrevis folia ad nodum
qn em habet unicum cinctum, que preter aliorum onium foliorum nocum non furtum crefcendo
attoUunt, led deorfum vergunt. Præterea flores non una omnes aut etiam multos fimul ar
funtur fimiles alios post alios, u* diu III antequam totam capitulum deflorarit.
!,,,ocia *Mediterr* *incii&Atu* *tee* procul remotu occit. Nos prop: *Moguntiam* Germ imr urbem LMM.
jnv enimus, & alibi oti mi in ij *ermama* frequens habetur. Confule fi placet J. Bauhi II utn: unde
(j *Bauhinus* non sine ratione m eam denotavit. *uiunum*
Ceterum licet Dodonæus ufum in medicina nullum habere teftetur, led fofculos in exoem fo-
lüm præfiam aliquam obtinere dicit, *Dalochampus* tamen japonem totius *Statice* plantæ adtrin-
gwtim pji iibw, •• facultatem habere ad miraculur ' u^ dciiscaili; ; & *crampotium* humorum
T t t t j impetun

jmpffl" mhibgndi, live pita admorcaiur, fire succus ejus bibotur; Dyfemenis tin-ro, HCN-
lum abundantiam, linguinis e n uibut profiuvm tiltac, (inguittm excrea nciuii opittdari, de-
nigque vulneraria esse, & maligna ulcera ad cicatrionem perducere.

5. Stake AmerU«n*YvL Dra-Gilly ficfoft, O? Ttjjift Of Arae rica.

Park.

Folia habet sup .-infi familia, Jed oMcurius viridia, nonnihil Splendentia, duobus secundis, n Ion-
genum deturcentibus nervis, niucronibos obi b' Can Uli, or tenus confimilem floiculo-
tum glomarem gestat ., coiore u me n abbo, e membr r.ina crunij tUclit, pom
radicatur. Radix longij paucis hbrb doita.

LIBRI DECIMI NONI SECTIO SECUNDA.

De Hrbis pentapetalisfoli'ts in caule alterno aut nullo ordinepositis.

*Herba flore pentapetalo, foitit in cauhbus nullo ant alteniQ
ardmpQJaiSjjuM vel vasculo feminali*

Simplici, i. e. non (Uvif in loaibnicnM, quod per maturiraten horizontalircr nmipirur • Boto
flav\ cilice bivaivi; tolits crallis, ltvikiSj extremis lubrocundisj PORTULACA.
Bicorm; foliu in nonnutlisIpcuebus cr.iflSs; SEDUM.
Triquetro, (cu e cribus cadois compofico, flore

Pentapetalo,
Uniformi foedofo, in uno caule utuco, aibo; vifculo conoidc; foliis paxvi, \yedn- in
palustr
Difformi, calcaridonatOj odurato; VIOLA.
Hexapetalo, cujosjaiTK difficuker adnuvlum difierni & iftingui poffunt; vafcula feminalia
vix inquam
cies funt. rama Monfpellienfium lupu fpe-

Pentacoj roftmo;
Quinquipartus, feu in quinque c^S as plura fcmina continentes divifo,

Breviore & h
ALCIA Veneta, Malva boraria, qui
ritur.
Longiore & in filiquam producto; foliis in eodem pediculo binis ut in Faba
liba; floribus albis flaminofis, velut Cappareis; *CAPPARIS leguminofa, Fabaga

In decem locamentis totidem femina continentis differtus; flore caduco; feminibus oblongis compref-
fo Splendentibus, colore melino; LINUM.

CAP. I

De Portulaca.

Portulaca Græcis 'af&X' 5t'A#. Turnebus Portulacania Portulacam dicendam ex-
stimavit, quod foliis portulacæ imitetur; sed exemplantit uorum voluminum delunt. Alio-
runt lenrentia est, Portulacam appellatam esse quasi Porculacam, nomine à porcis impo-
idque quod à Gallis Portulacæ, vel Portulaca vocetur (unde & Anglicum Purshur; Apulcius etiam
Porcaltrum appellatam scribit: & Græcis uionbui *Portulaca* (quod *portulacam* sonat) vocatur.
Exempla vide apud J. B. & Stapel.

Portulacæ notæ characteristice sunt vasculum simplex, seu non divisum in locamenta, quod per
nutijiKjrtm do rizontaiter rumpitur, flos flavus, calyce bivalvi inclusis, filia crassa, succidenta,
irvUj extremis luUuii: da.

1. Portuiae* Utififia Jr. B. bontnjit Utifolta J. B. JttntSic* Gr. Lvrrafis Park. Sat
torn pitrl'i'inr.

J.B.

Simplex lici cfl rulke, progreffu t^inpois iijncn^nte, an fibra' pauc appcnfa. Cauhi \ lures
cmkcitj oedaH longpodui Lr&brerio, non r'eres, teretes, criffis, fubrut^ncs, non erectos iz d terram
ram versus r'ocinatos. I las incoanata. CMLji 8c incciilenWj es angufto prinupio, quo cai,;i ad
ntui liciitiin dil atata, extrem: atc (iibrocunda, larvia &c per marginos. xquali.i, lapoic lubatido:
inter .jii,r onunrur ; i. Iklbti,]>e>.i;-v;r,ili, apicibus concolortbiii. Hilce uiceduot ftri-
carpa obli .ng-v gr-> no hordei palu ! majora, qua: per macuricnom media parte tranlvcdim fai Jiori-
zonditice: rumpunrtiTj B fenes crinuk ;nt puHllum, pullum.

In hottis .iccorum arei fubactis ac flercorads commodi firitur Martia aut Aprilii initio, Junio
vero ac decinde ;:i Aucumiuint u% vige ac vixt.

Locus
Tt MBfc

1. Fersalc* fatfV* JuUsfvit tuna, (Golden Purslane.

Nclao an fpecie a prtcedence difierat, core cencnor eft iIUj fblii* latioribus flavicantibus.

\ Portukeafilycflru Gr. Pirkijlvffiru miner fivt \$<mta>a J.B. mgufiifotui five fivt fhit (J.B.
XDilU purdimc.

7 B.

Mulctis numem minor efl < am fativa, tota terre appreffa, nec humo furgens: radice craffiu-
clij ICUti fie ri ma incoactura, multibds. Folia unguis digiti minimi fere parva, fucculenta, craffa,
atro: r'itnsneia :/6r« pufilli, m mulcoli. Summā vix alia in re quam partium omnium parvitate a fativa
differit ; ut (ulpicer fativam e iyivcltn culur.i initioraom.

In ItAli.i, Skili.t, G.illia Nirbonaih & Germanu in vcrvaSis 6c At! viasfrequens occurrit.

Locus
Vitt.

In ar<lorG & <iolore Aotnachi PortuUca cjufque fuccus & Jyrupus aut ipta pliiitu receos coaicfta
experta ell.

In acetai in frequenj ufijs eft Portulacx : Scomadu ardorem leat, 8c bflis fen-orem compefot, t;/^.
fie hinc in febribus putittlis ac nulgigns, ardore nnn.v & Scorbuto p. odelt: V uierem inhibit, vCHC-
redque infbmnia. Dencium fhiporan recens comnurKiutara tollit, Sc v. oboles dentes ftabit. Ver-
miuntibus peris cum» fuccdiu exhibetur. Veriim c(us quis nimitu cavendus dt, quonum olj i
gdicateni liumfle ImtnUitatem in ventriailo putrcfcerc apej eft, ejiiiq, ficrdiquoi vulcerum tu-
num Jifiblv'iire, ut in nobiiincnplis non femcl experti (amn.

Solet apu i nos mm Ulet accco & aronuris conoiri aii ititin&ui, codem modo <pro Cappares, Ge-
niflx flores, Lingua avis^ Crithmum, &c, condiiinrur: qnomodo parata ventriailo nugu grata &c
amica eft quam crutli.

4. Pertultcj txirmftvt arvtnfis Csmersrto }.& aruen/h C. B. fxigw Camcrtrn Park.

HerbuLicft nonab alii>ut (ut autor perhibet) demonitrata, pn gnis, fubitca; caulculis incurvis,
aliqmntulnm proLimbennbus, flm tnuos Pormlacx lyvdl is, pallidioribus tamen, femper ge-
niinis lugro/mMM in VA:ulis parvulis, PortulaZ iimiltbm, ted qui longioribus pediculis & gracil-
libia nicumur, & marurc incipiunt hiare antequm femci plene perfic utur. Sapor ilji nullus qia
notan qucat, pr^terquam herbacous ut in A linc.

Primo vere in agrii fhuncne acis fice lucens eft circa Lipfum an: Cremenfa nportura.

Lett

II.nn. licrbam candeni ellb AUtc noltrj; palulin l'onuljt.v acjtu: ice luma I fuperius diximus.
Vide 8c confer.

5. Vmulte* Brafilmnfa Citpeng* Jiffs Marggr.

Marggr,

Ex roAut brevi, in multa ttbmenta alba definente producit caulan rotundum, craffiufulcum &
lucculcentuni, (J'i ftanni propc terram m mulcos allot caujes tiivtictr, Sc hi porroin tuo> ramos,
qui vcfiuntur loliii mftar Portulacr fucculentis atque akernarim poitcis: in cftu mutato autem cu-
fuilibcc Kimij <xito folia in ftcllx mod um dilpof ita font, ex quorum medio l(<J cmfcitur luteus, pen-
upetilos, itugnitudine rions l'ortulacje noftratu. Pofftiorer. denique remanet corpafulcum qu"J-
JjinobrinumUini. pappo albo urcundatum, in quo femtn cc-nnnai r nigricans, rotundum, Papa-
vobis femine paulo minua. Rami hujus plant.c tomentu a 1 bo circuiid.iti conlpiduntur udtar lane
oviu:n. Cod.: comeditur haec herba.

CA t. II.

DeSette,

\ fl'»»rGr.rci\$ * * » • fola habet ad radices exiles
*~ IciUIU ut vi Jt Martinus, vel forte a fedandis doloribus nomen impolitum.

NottautcmScdigcnonct h^m f^r crassa angusta non serrata aut dentata, vascula seminata
bicornia.

N. B.

N. B. Sedum Luiillino i • ilu accip i pro planta quacunq̄ie pennictala aut polypetala vafiab filami, imo plantas etiam succulentas multiliquas complecti; a n'»» awem hoc in Lu co tum a succulenta multifloris, tum a planta valculo bicorn folia minus In W Cotylcicon, Samicula gortata & Saxifraga alba dicta, distingua.
 Notata digniffimum est plantas pleralique cralfas & succulentas in per oils & (kcoribus prove- ntre, ibiti- nque fine humt re du durare; cujus ratio esse videtur, quod folia cutic, U Jjiiiore mi* nimeque porosa j qm: hum orem evaporare non finit, involtantur.

P. r.

A. i. *Sedum minus tritifolia* m album C. B. iwinw, folio latiuscula triti, flore albo J. B. mi- H.v.i. officinarum Ger. P. r. micularit flert alb Park.*

Vermicutan hunc nonicn feceruit /*&», qu,r pingiibus -alcorum patrefcentium varmbus (unt (tmillims, alternatim in caulis ipicKaniB & dwirantalibut disposita, atroverruis, vel panctis cre- bns g itata. Flore conferti velut 'i nmbella, Itell.in, quini oe folis constantes, interne albis, spi- e?but mud atro purpureis umbilicium conost Icm albidurn, •circumstantibus. RII/JA- tenuis fibioii, In hoc Swlo nulbm pc caplo atro.moniam, quicq̄iiddicat in A- verfaris Lobe bus.
 In vercribis n; um & 6b & non raro invencur. Meniibus arHvis Bores promic

2. *Sedum »»i»«(trrtitfilmm shvum C. B. J- B. »»•«« i. CluC*

HuU5 /i/i> percclenm familia (int, fed frequenriora & dcnfius in aule ftipara, in minis Se maccnis eaan; •alcens, sed priore minus frequens, huma procumbens & fibris sabinde se firmara.

3. *Sedum parvum folio crasi-3<6>, firt elh* J. B, wllMtr folio crasi Vermiculari dafj- phylli Park.*

tfl brevi, cnpilUta 6c pallidaj gricti> in exigiu terra & parictm. rums herelcente : iit plumts, quanior oigoto alts, perquani ipilic cona etis: fol w numen-: ilinqs, cralfis, tere•ibus, a)bi^ anibus leu glaucis, confertidime fiiiuriSj guthi fitub, cum Jevi quaii am aditractione : flore in virgilti tenuibas cindulOj copiofa: J'tmmt exiguo, iubniffb.

Ctrea Mbn/peluun. Genevan^ Lug^ anum,&c. in muns & rupibus copiose oritur.
 J. B-iuluriui & Clulius folu hujus Sodi rn'm. aaii foliis comparant, quib. paulo : raffiora & ciiv dkliona fine-

4. *Sedum BIOIOTIJ J / « Mfmfbt\$*laxa fateiu major, folia rntttt J. B.*

ParietinU hzret paQim Mofnpclienfibis Sc Nemauteffljus Setlum quondam (atis magnum, canli- hm crafi; icnlis, i jqucnibus ex una radiCC lubolefcenctibus ; quos fli* \-cliunt Wi mm^rr. vulg- fies later folis (itnilia, lid nujorj, traffior-ij longiorique, in acumen defuictuu. Fftrihm or natur albis.
 Flo•ct loco natalj menfe Julio.

J. *Stdum Alfimprn truv.In purptrefetnt CB.*

C. B. *prod.*

Ramis est palmaribus^U nris, flexi ulibus, denfc-gniculjtis, per terrani fpa fis; quos folia brevia, craliulcuLi, Ence formi vcluirit, & hi in plura alios (iuarum triumve uncianim & caam brevt ores dividuntur, hique foliola frequ n.i, hbi terc incumbertria & c rotundjora Kibenc. i n fingulo- mm Cimm ; •ibus, velut ex squamolo ca lice flu Ian; tiugm. n purpuralcem, ex quatuor, aliquando quinque, foliis, & abequot in medio flammibus compofita infidet.
 £s ho to Dei habuit C. Baularia.

A. 6. *StJum Alfmwn Erucsdci cam., uni C. B. J. B.*

C. B.

ET pneiuptis jugis ac fa -is humidis propenda, rji«o« habens oblongim, fibrofim, m&m> mos; iurei, foliis quam in priore bfvionbus, craflia, cinerei, velut San amundb l. CirvdEriei Alexandrina compactis emctis. Singulis c-iultcuUuiiaalibus, foliaact. kw nugtim, caeruleus, qua- drifolus, aliquot fawm' /// brevibus tionatus iniidcc.

In rupibus ad latus Septentrionale montis *Leibnorgb* copiofiffime proxi run) Martio menfo floret. C. B. Luhim in Aipi bus Rhaticis, inque Goch arm lummii m- Valefia ad thermas Loccenfes fupra Gemme invenit. Florum magnitudi leganti colore cae- ruleo oculos reficit & delectat valde : rariffima lane est plantula, caps flos pccox in frigidiffimis illis montium |ups 6: rupibui liunmiis vt, rplum arifevertatr venj; ifan ad Sedu genua referend unlit dubito cum florem expluci q: a<tiifljuijii valculum autem |aatoafc oon oblirvl- erim.

7. *Sedum A non minimum, (•HI* tinrtu, flore candido J. B. Sedum Alpinum album A/ nls com alia C. B. Sed. minus 9. C ulu, minimum Alpinum muscoides Park. Sedum Alpinum 3. CA Gor. emac.*

Compacta & fibi invicem infidentibus cfl *folia*, ti unimis, rigidula, cralfis, cinerei coloris ad caeruleum quodammodo tendentia, ut t«a planta (u* addi l&j J| f

muscum quidam videatur: Panicelli e medio foliorum exant dant pnti unciis longi, graciles, sinuati, in quibus tenent plurimique flosculi, pentapetali, candidi, cum aliquot latis flosculis luteis. Cum in semina abeant filices cauliculi aliquantulum excreverunt. Mirum in modum propagantibus serpit & radices agit Cotyledonis alterius riu, integros cespites, equidam multa mltas, interdum occupans.

In Baldo, Braulio & Monte fracto sive Pila jura Lucernam reperitur: Inque praeceptis *Sorablen Laco 13* & *Suiberg* loca inter saxa. Julio & Augusto floret.

J. Bauhinus cauliculis tres, quatuorve unciis altos huic attribuit, filii instar graedes, hirsutos, raris foliis angustioribus donatos: radices lentas, lignosas, crassiusculas, nigricantes.

StJurn Mtmunum minhmmCxrjc- <n J. B?

Densio caespite terram operit. Folia habet graminica, angusta, acuta, glauca, non pilosa, neque crassa, Caryophyllocoem similia, sed multis numero mucosa, & pro magnitudine etiam breviora, contortissima: e quorum medio exsilit cauliculus, viz datus dignis transversis alnis, oblique rubescens, villosis & rubentibus foliolis vestitus, unum & alterum in summitate flosculum gestans, milidum, 1 quinque foliolis rotundiusculis, tenella compositum, cum flosculis in medio luteis.

bus non longe a *Sedum luteum* *Tribolium* Martio mense florens nobis *Sedum luteum* fuit. A precedente specie diversum videtur, cui tamen in multis persimile est: ipso florenti tempore fati distinguitur.

9. *Sedum muscosum* J. Bauhinus hu verbis describit,

Cespites totius operit luxurie fecundit, Sodorum in moeem, radicalium repenti. Folia majora quam *Sedi Alpini* cineres, acutiora, molliora, muscum terrestrem imitata. Cauliculus ex umbilico natus, unicuni mum aut Juai altuSj foliol: crebrioribus vestitus unicum plerumque in fastigio gerit *tm* magnum.

Propriis *ipibus* crescere dicitur. *Sedum* *ivtilis* in A *perpusillum* luteolis floribus *Park.* A *Sedo* *mulcolo* J. B. forte non differt: descriptio enim convenire videtur. Florem ei attribuit pallide luteum.

* 10. *Sedum* *Alpinum* *grandiflorum* *Park.* *Alpinum* *Saxifraga* *alba* *fieri* vel *grandiflorum* *Syrriacum* *luteale* *flore*, *Saxifraga* *alba*, J. B. *monis* *flore* *ample* *Ge.* *An* *Sedi* *Alpinum* *IV.* *trawl* *luteale* *fk'* *longius* *Col?* C.B.

LA. Omnium [Sodorum] huic longe minimo, ex Syria asportato folia quam superioris [Sedi minoris] majore facile & folis *Lob.* & petrae montani *Sedi* minora. Cauliculus Ichimunciam aequant, in quibus luteoli *flore* majores quam pro plantae modo, *Saxifrage* *albe* aut *Sedi* *petrae* *mon.* *iv.* *Radix* *imp:* *scata*, *fibrata*.

* II* *Stiintj* \$ *ilttti* *Mtn* *Tukro* *rrs.* *wvj* *fict* C D- *minus* *montanum* *flore* *ridro* *Park.* *Ancide* *mmuw* *Lugd.*

A. 11. *SeJam* *fstrvam* *acrt* *jiort* *iutto* J. 11. *Semfervr* *Jum* *mimii* •; *ermiculatum* *acrt* C. B. *Permiculato* *sive* *Illici* • *ra* *minor* *acrt* *Ge.* *iBictlr* T* *Min.* *r* *j* *for* *Sedum* 3. *Disfert* J* *Park.* *Wall* *ppppr*, *o:* *^tontrop*.

Obvium in miris est, capillaribus radicalium fibris appositum, unde ramuli plurimi palmatae aut breviores, tenues ornantur, foliis exiguis admodum, densitate cum longitudine fere palmari. Flores in extremis ramulis plures, lutei, quinque folis radiatis constantes, apicibus in medio similiter luteis. Sapor plantae acris.

In miiri, tectis & aggeribus ficcoribus: paffini reixxitur, *Laco*

* i;. *Sedum* *minimus* 4^ *ham* *non* *acrt* J 2- *Stxtperv* *xmn* *mmn* <*vtrmic***l#***m* *m/ifulum* C B. *Illicia* *vispida* *Park.*

Cer/. Coliculis & foliis multo minoribus & exilibus constat, quam praecedens. Flosculi habet illius similes, cum quinque exiguis acuminatis in medio apicibus semini ferendo natis, iidemque decem staminibus circumvallatis, non tamen illius modo umbellam seu capitulum constituentes, sed dicitur ab uncialibus aut longioribus colliculorum adnatis utrinque alterno situ exant.

Idem cum prope acris locis invenitur. *Laco*
Ad multitudine pertinet & non est hujus loci, verum ibi per inadvertentiam omisum.

A. 14. *Sedum* *minimus* *non* *acrt* *flore* *albe*, *Wall* *ppppr*, *o:* *^tontrop*.

An a precedente [12.] aliter quam flores colore differat mihi non constat, nec enim unquam inter se studiosè contuli.

In sterilibus Suffolcae, toto fere itinere a *Tarmonis* ad *Danvers* oppida plurimum observatum: nec minus abundat in rupibus *Westmorlandicis* & *Lancastriensibus* juxta lacum *Winnandem* dictum, *Ver:*

Vermicularis herbe stpendas vires in Scorbuto Castrensi expertus est. cum incredili & ocoeffii
D. Below interne in decocto, & etiam externe applicat in contracturis •icinbroium, in ulceribus
& gingivis corruptis. Epitom. German. An. 6. Sc - . Obf. 22. D. T. •urtJ. Rcbjfen nobis fuggellit.
Eandem observationem habui à D. P. Vatr ex dktatU D- Ikfh...

If. S. dum Alpinum laffide •, f < r i f f c m e f w m , flare fitiJa J. fl,

7. B.

Multos dodrantales ferè caulis, tenues emittit, folia vestitos alternante fita, femuncialibus, per-
angulis, acuminatis, ex viridi pallentibus, fumulis per margines asperis, qualia prope terram mulu
reptantem inferiorem caulium partem ornant. Ramuli in quos caules superius dividuntur, florem in
acumine gustant finguli Sedi montani minimi lutei parem, pallidocentem, anulo in medio multis.
Succochit unicuique capiti lonlini nmilCj mii. tie bifareo patente, ctiLoconcu
mi •, longe copiosissimum. minuciffimum pulviloiini inflaj, coloru nigrum. '
jx monte Calcarn, item Goto urdo atnltit jf. // . Chcrlsruus.

•"•

I £ • 5 e A » ^ i t ^ w mariimnm vermialttHm, fieri S*xtrfi,* alba, fmmmt -uUUfe Bocco

Itc.

Lxs pLutu! Sedi ap. Kali fpeciebus annuncranda venit; Csulibui, felt* acutis & vermricula
t p i s omnino perfimilis. W« promit Saxifrage alb; I albiterz : S««* TiUoliini umo.i^ •
caulium, non abimile Semmi pentagono, quotl in GeJremjioPeruvuiioconfpici tar. ""**" « m-
Fn. inniuni Thymi capstan modo in marimis n\ gi anarium Vigctuinum.

Lavr.

17. StJimm,? xr. ClaC 5. Alpiwm jyamifKo filie, UHts fare C B . WTOWWW Alpinum
9ram.iteo f.iio l'oik.

Clof.

Longiora nonnihil habet folia, graminis modo angusta, dura, viridia, levia, subacidi aino Cipo-
ris, deinde ingrati. Unicus aut alter inter folia erumpit caulis, levis, utacilis non-
ferè unciarum longitudinalis, raro major, in quo unicus, interdum
5 res, candidi, medio lutei, quinque foliola, cordis ut vulgò Pingttur tornam referentibus pn|.

* Clana-
19900

5

Serpit & hoc reliquorum instar, in Suedberg & vicinis jugis invenitur, sub finem Junii & Julio isthic
florens.

Li

18. Scdum mntamim grtmmo folio altrvm Part

Pa

A precedente crescendi modo, foliorum parvitate, caulicorum floriferorum altitudine parum
differt: præcipua differentia est in floribus, quos plures in summis caulibus profert, colore pallide
luteo, oblique petalis non cordatis sed integris compositos.
Ham speciem à nemine antè se adabkamakJ ark. veri mnocubi sponte nascantur, nec à quo
aw nude rubuit nos certiores facit.

f). StJumAhmum {lon pBtfa CR Part m.nui 6. five Atpmm i Cl.,r
wZtttwwJ.a ^JHMB i.Clulii Gur-cmac. parcum mnt-

7. B.

Caules unum plurtivo erigit, ulruarem^miidiononnanquam minorem, Mw cre:bris vestitum
Sedi minoris lutei vulg. minus acuti, plurimosq; qualia etiam ^rtterrarn/^Uulbimo, harent:
superius dividitur in ramulos latis frequentes caulis, qui flores gerant polichitos, mascululos, ex luteo
color- aliquandum pAllecentes, pentapetalos, apibus luteis. Radicula summa fore tellure va-
W, & fiibuide nov.i. plant* p t ^ , JUURW ^ a n , Ilit)Clinic- ^ ^ ^
cane. valde exo-

Lavr.

Provenit in mom. Baldo, in monte Pilati & Gothardo: in Suedberg aliq; StriacArum Alpium
lugis, in T.i8ro monte atque Judenberg crefcere scribit Cluius; fl. item Julia & Augusto.
ioS^: Beten, Monsp. f^ nit D. Magul Julio mensè

A. la 5/(HW ff;,'<.vi Alf;num laUtm najhjt.

Radix huic extrinsecus nigra, multis fibris prædita, in quamobvoluta capta, quæ ut in aliis Sedi
speciebus denso calpate terram operunt, dividitur. Folia ut plurimum longiuscula, angusta, plana,
pallide viridia, glabrè nihil splendens. quæ spinula d:
lenipalmares & non tolim vestiti, t
plures gestant in summit. iviffart, futcos, [wnuptaliK, plirimis punctis circa umbelicam
notatos, flamma lutea cum continentes. Flos cum expanditur decapetalos videtur,
ob quinque caliculi foli ulmm icmiail •
tllunsj^ ad radicem her. ... ^ ^ , ""^
SSJ" nonnihil inomuJlis plontii tolu « & Paronychi:

Lavr.

Ad latera montis juxta aquarum rigmes fitquen, : invenatur & in Haridms &
Wrense Westmoelan TM* monibus, & alibi propè S-? vicuni m codem (am.

A. IT, Sdrmn Alwum; *trifida folis C. B. Alpis. laciniata Ajaga folis Park. Seda affinis trifida Alpina flore albo J. B.*

1- B.

Summo cespite va... **ittir, nugnumque (paü-**... **ilireftis •**... **im, Chanifcpsyos minoi**... **ilia in oWongimi i**... **pal-**... **rum i;**... **luparius in pediculos aliquot,**... **rumibus piano, quodcir**... **at florum calix lacinis denticulatis.**

In montibus CambroSnt.uinids, ut *Snawdm*, nwjuc *Eborac*... *lilium ut IngU'vorwjrl* copiofidinic... **ontur, jiiivenimui & In jura nionte, 8t .ilibi in I**

22. *Sedum tridactylites* Alpmum majiti album C. B. *Tridactylites* fJ Alprn J. B.

C. B.

Radice i lubet ccnuem, capallaceatn; *taidiculnm fa-*... **lum, in ranmli-**... **plures**... **folia ad radicem terrena & moll.**... **ramulls minnta**... **in tret Licuuas pmn nn, demdcin alias divisa.**... **quinqüifolii, totiL-m fiaminitlit doiuuti; quibus cafaU**... **contincwia luccedunt**

Ex Baldn monte habuit C. Bsulunus.

2. Simile, sed folis lincocibus, & in ternis primùm profundas lacinias divisa, hisque in minora... **orunj ustuni lubnii idem.**

3. *Vlitid* cicululo rotundo, iemipalmari, pilb Icviflimi5... **trida^litis tCiSorum nitxlo lividsj tot unque c.iu**... **prcedente litccalunt.**... **ExT^uro Auitnr montt: habuit Habco inter plai**... **dadylites Alpioi fpaem tnajorcni arcu**... **aliquot ramulos d'mtb, in qmbus Hores c**... **um u**... **quam describi: Jitan. it, ml tin us lub**

Palm iris interdum & major multo... **Fl ptanta, folia pteraque humi fundens, interdum innculi**... **longitudine ac**... **uc JL in cuiliculis liint, in**... **ut Ageraa purptirci propagatur.**

23. *StJm tridactylites* Alfmum tmnus C. B. *Stidum Monfpiltcxfce & Tptnrxnm* hunuium Park

Ail ratiiceni p.irv.itn repenteni & nigncanteni,... **finus vel all er,**... **littent: hi •**

Hot in tnonffaim l'api & Caltwis ni;... **ilura**... **ant.**... **nmniinquin & plures laci-**... **Huic titulum impolumma Stidum IT,**

Huic coiRjtier aut

i. Stidum sHpiwm II!. Fr.Grtgarit Ult^enfit Col, feunda

Cui *radix* fibrosa, tenuis, *folia* in summo... **Chamri-**

Prima varietas ab hac difert; est autem *radix* multa, fibrosa, ex fusco rufescente: *folia* non... **linBti*cf-**

A. 24. *Sedum tridactylites* teston; »C\ 12. *TruU*... **Pftnjebia m-**

Radice tenui simplici firculosa... **luiirit.**... **in**

Locus
Tempus
Vires

... licawnbuscopiosir prove... Floret mense Maio, & brevi tempore perficit, inde radicitus exarefcit. Herba infusa in cervicia tenui seu leptomora, & per aliquot dies pon, abfque idla cracuatiom: fenfibili ferophilis medetur, humorem abftrahendo, dolores mitig incoj nimoresiilaincndoj & uicnofot exuccando. D. Boyle, de utilitate Philofoph. Nat. ad Medic. p.

S. i. T... Sedi nomine a Columna defcripta... def>nle, quas tamen... gemu pertiaac ctnfet.

f. Sedum yf... RGrrgarti Khtgivifit, i.Col. Aif. txigmt/Jui I.C.B. CvL

Radice habet tenuem admodum, æqualem, c\ rufco nibsntem, qtiinque uncn longam ex capite, cui prui novelle plante caput fiitt, ramns duo, vel tres odit, tenues, carnali... Foltos, jngiilbialcemat!:- Interce:<», & in (umtno in... detina... alios ex illa producit ramos, eodem ordine regenerantes, in plantulam centum... annorum; ex ramis vero i in terrim proctimbentibus iterum radices fundit fimilem, fed hirtu-^ni, quod non in prima observatur radice. Florem non habebat, fed inter ramulos fuperiores lunos petiolos observavit fructum habere, ::i talycc piodeumcin quinq-foiato, oblongum, cartilagineum, nec abfimilem mma fructui Lychudom aut Armeriarum, fed femore longe ab omnibus differens, quod binum in... QS, oblongLinij OVAII Hg... ntx, colore ex fu/co rubescens, ca-um imus, fed antequam dividatur vel... ci paniitn & nigruni Triad granura Sapor in Ikca parum acns apparuit. Foliola non adm idm camoii aut vermiculaLi vi(a furt.

Sin genera planca elk videtur.

* ^ Si... mniaktnim cjuftcm. StJ. Alp. angustifolus, carnos flore C.B.

Col.

Prore magna est, eisdem effigies, nisi quod.1 nova germina florum supra vetustiora... nicantim- mediate longifque... itq, palcarcs, [cfquimici.ini long>» duos vel tres in fingis fo- n quorum cacuniinc Horcnij [inr... duos] ex calyce... utt:nti, a... abui qnmq... rum quinque in (unimo fiflorum corda figur. Radis tenuior... Jbrwior ex capite carneo, fufca, & otutp ex procambente ramulo oat. Faint eodem modo quo iipcnons tafiint, fupra caulialilos data,

Ex feca defcripta Columna.

^ .3. SCJJ aliquot it. Baulmi InJreme, qnsrum defer ipt tornj WJ* a breves Gf genemJeSt xcc hembm iSfi... ata.

* 1. S... m ftxatilebirfaum farpurtMm C.It Park.

PlautuU eft triuiKialis, rsJieM capillacq; ttaltido termi, leviter pifofq, •CUJU (Cmimius in breves r... ijiosdividitur, qui (uiguli Horem parpurcum fuftinaat: FeluU ad radicem plura, hirtuta & Lente itunora-

Ex Pyrr... ns allitum eft,

* 1. Sedum ftxntile a:rort4bcnubnifiarthtt C B, Park.

^ S ^ U t ^ non excedit, radtculam Kabens exilem, longiufoilanii; unum ilterumve... fufcula paucis, exiguis, longiufoiculis alternatim veftitum, fofculis atro-rubentes, velut in umbella difpofitos fuftinentem.

* ;. StJumfaxsnU -wtrugat*fbrt G B. Park.

R... ur eft capillacea; ««iW«r plirimis, tenuibus, Kiunaali'jus, per torr.in. repentibus, & fi- bellis capillaribus terr... ulhrreiribus: flula nuim, pallide vircentibus, Jubi-ocutula, Lente minox- bus veftit. Eramulorum fumnis ped'cclli pliireSj capiliacri, oblonn CXUR...; finguli florem qua- drifo Imm, van... m, alben t, piirpureum & atrorubenteai fufluieiu, ckv... anti fpectaculo, cum plantula huc capitis muficque inftar laxa exornet.

Inter Valefiam & Auguftam vallon in monte SUtharfb di<So coping provenn. Obfloron tar.ifx::; alumalio quam ad Scda referenda vidttur iwet pUnu.

* 4. StJum Ai«at:tm [vltidis trttuttu afftru CD.

J... die eft cap... a repeal; Cauliculis tenuiffimis, lempalmaribus, etiam brevioribus, raris pa... ribus, in fummo in ramulos aliquot fectis: Fofa habet longiufoicula, angufta, acuminata, cre- ni uiinq... exasperata, & parte averia candicante. Flores quadrifolii, purpurafcentes & fi- l... s donat cauliculis fuftentantur; quibus... p;u.Hm lubronindum, mcrfirajuocmu, a... ice dona turn, mitalulum fmes continens fuccedit.

Julo mense floret in alicnfa montis S. Bernar... ii nwjoris & Godu; do. Hoc etiam, cum florem tetrapetalum ha... bcu, ad aliud genus verticare videtur.

f, Stum arvmft fare raimit C.B.

Flaiice est lignoia, fibris ciniiku: c**Ik*It aliquot pal ma ribus, roumide, rugolo mif. icanrecor- tce nocnos, u quamiog, places, ranmbs (quorr. r aliqui recurvantur) dividuntur. Hos frfi* longiuscula, angufta, fucculnia line online ambttint. Ramulis fperioctibus floris plures, vul- gari Sed floribus fimiles, fed rubentes infident, fentapete vulgari fimile fuccedit.

Nonlongct. afulea in agris Hunengendibus Autumno jam exiccataum it v ^

Lacu.

& StJgm Alfmurn fioriUt foitit maeulfii C B, StJi miners}gnutt fitfeula lateri vii crecw mac- hfi Gciufij.

CoiifiiJeGctneruni.

CAP. III.

DeScdc foliis latioribus minus favelemtu fereJtis Mt (nun:it &

4. 1. DfCitilednud Ra.

Cotyledon • figura folii acetabulum refer- iicc •?«?«?»Di' fcoridi Anglice a iSitumr.dt: enim re quodm cavum. nomen hoc accepiffe pu- wjxn acccabitum Imtisni quo capuc temorii vtritur, 6c in gen. umbilici ic l'al- lunturci-go (inquit Jo. Uodr Cotylel raannu nommis, quod quo delc tanr, qttoddbtnu inecfolUnabeai ihmnm. Him leni (kfeemureKrcnttaj propie accipitur de primo g mi tnbuit Dit- ilico Ven- ribitar lgar. Hpinium plants, &c quibus nunc agimus Umbilici Veneris nomen melius convenit quam Cotyledoni: turn eorum mltz folis in globulos compactis umbilicum len. oculum referunt, ad inftar Sedi major, cujusfc

I. Std*i» far.iTiirt ahtrum fytif U*rv angmfu. An Sti. Vyrnaam fmuttm Un^tfihum Horr. •4 faqifitM ferret* C. B ? An Std. ftnnum w*j« fltu trnam H>a:«*rve uciarum* I, li'

Longitudine & angudu fulioiuuj :ortc etiam & alia accidentibus à Selo ferrato viJgati differt.

Invenitur in Alpium pccurpis non longe à Pcnaba, poftca in horto Regis Parisienfi cultum vidimus, utrobique Autumali aut Hyberno tempore, unde noc flos, nec vafculum fcmiale nobis confpctam est. Lacu.

Eandem plantam elfe fufpicat>ir qu tin Cai Horti Reg. Parif & Horti Londenis, inq. PntKA Bot. Morioni *Sauicula Alp id crew* um'&csi* • alio dicitur, cupo infra c Morioni Pral. Hgc. Jc. fcriptionem dabemus.

i. 5w. *on ferratus* J. B. *Cotyledon media folia oblonga ferrata* C. B. *Cotyledon altera Matthioli* Park. parad. *Cot. alt. verfularidm floribus equalitn in Theat.*

Tenuis, nigra (ft r*Jjat, fubiodeproduct: fibris latis fe propagans. Folia plummam per ram fparfa, rariushomo fe tollant, Seds, pinguis, oblonga, extremo rotundo, atque etiam quidam in acutum definentia, unciam unam aut duos longa, colore glauca, argutiffimis in ambitu denticulis rugulis, reliquoque folio candidioribus crenata, lapore frenne adstringente: e quorum medio exturgit *caula*, palmum unum aut alterum alta, foliola, in alas aliquot divifa. Flores albi, petalis quinque non imbricatis fed fubrotundis, circa umbilicam punctulis rubentibus notati conftant, umbilico viridia J. B. [poclis flavo] apices croceos habent.

In montibus Tyrolenfibz & Helveticis, inque Saleva & Jura Genevz vicinis obfervavimus.

Lacu.

3. *Cotyledon altera minor* Park. *quadr. icm. Cotyle* fce *Matthioli Chul Cotyled. media folia fubrotunda* C. 15

Clef.

Huc numerofa & conferta funt folia, oblongis ligulis fimilia, craffifcula, mucronata, nonnihil per ambitum crenata, candidantia, acido & fubaftringente gulta: e quorum centro feu medio fo- borum exorta *caula* intordum coftata, plerumq, tamen petalis dumtaxat allargz, fupremo e parte hirta, brevioribus folis inclinatis nafcentibus feptis, fitumo falligo ex lingulis foliorum aliis pod- cellis emittens, quibus infident buni aut tenui floris, albi, pentapetali, interne veluti languinea gut- ta alperfi, umbilico pallido & fplendente, decem ftaminulis orato. Semen connctum in capitulis, exale, nigrum. Rs4t. habet fulca, tenuis, fibrofa, cui fecundum m-rtum multe alie in orbem ad- nafcuntur pUiuX, ut in integrum ceptum aliquid tegunt vulgari Sedi majori inftar.

Lucas

Nascitur non modo in *Saxberg*, sed & in reliquis Austriae & Stiriae Alpibus, saxa & scopulis inherens, in quibus floret Junio & Julio.

Dubitat J. Bauhinus an haec non eadem sit *Sedo serrato*: verum si ico! proba fit, non erit illi eadem, cum floris petala acuta purgantur; quae illi obtusa & subrotunda sunt: delc:iptwct)a:n ho: ju: non ulquoqwaq; illi respondet. An *Sedum serratum* mapus *J. B.*?

* 4. *Cotyledon altera* V. Clus. *Sedo specios* sive *Cotyledon altera Eschleriana*, lanugine alba, hirsuta folia *J. B.* *Cotyledon media subrotunda serrata* C. B.

Clus.

Præcedenti affinis est, sed mollius, argutioribus & longioribus foliis, non dentatis, sed alba Jo it-
textat lanugine hirsuta, minus etiam incanis, brevioris crassiorisque pediculo, & raris foliis septo,
quae plerumq; tam superne quam inferne nonnihil hirsuta sunt; paucioribus floribus hinc inde secun-
dum caelum ad singulas alas sparsis.

Lucas

Obiervat Clusius hoc genus in Eschleriana regis tacente Junio suis floribus ornatum.
Miror C. Bauhinum Sedum foliis minoribus albicantibus serratis hujus synonymum tacere, cum
Clusius expresse scribat hujus folia minime dentata esse.

* 5. *Cotyledon minor foliis subrotunda serrata* C. B. C. Bauhin J. B. Clus. *alter minor foliis subro-
tunda* Park.

C. B.

folia subest tenuis, fibrosa, fusca; circa quam folia multa, semivivae minora, non ut in præ-
cedentibus oblonga hujus similia, sed subrotunda, margine crenato, crassiuscula, candicante &
nonnihil adstringentia: e quorum medio caulis scirpalmaris, quandoque palmaris, subsuper, mi-
nuta & paucis foliis cincta allurgit: in caulis summo pedicelli *folia* multo quam in prima specie
minores, pentapetalos cum apicibus in medio sustentores, qui albi, aliquando punctis rubentibus
asperis, nonnunquam extrinsecus lineis tenuis foliola florea percrepantibus, ita ut *folia* pallide pur-
pureascentes appareant: hoc capitula exigua nigra semina continentia sequuntur.
In Helvetiorum Alpibus ipsa saxa ac scopulis adheret. Junio & Julio floret.

Lucas
Timpus.

6. *Cotyledon sive Sedum serratum latifolium mutis cum guttata flore* Park.

Radix hujus filamentis pluribus nigricantibus composita, eodem modo se diffundit quo sui generis
reliquae, multa capita seu gemina prociudens e plurimis foliis non in ocellos conglobata, ut in *Sem-
perivro* majori & *Sedo serrato*, sed in superficiera fere planam Rose annulata expansis, congesta.
Sunt autem folia cum adoleverunt majora, latiora & tenuiora quam caulis præcedentium, pedi-
culus uncinatus, latiusculis donata glabra, obscure viridia, inferius tamen per maturitatem rubentia,
 præcipue secundum venulas seu nervos, quae ibi univereæ fere apparent, ex rotundo oblonga, un-
cam viz. aut falcinariam longa, vix uncam lata, longitudine tære ad latitudinem sesquialtera,
circa margines crenata crenis rarioribus, ut denticulis crenis interscissis latioribus & obtusioribus sint,
micronibus obtuso. E foliorum medio, Maio exeunte, emergunt caulis tenuis, rubentes, fo-
liis minoribus ad medium fere emitti, ubi in ramulos aridi incipiunt, in quorum fastigiis, *foliis*
erunt numerosi, quae petalis, exiguis aliquantulum acuminatis, interna parte diluvis rubenti-
bus, plurimis punctulis sanguineis eleganter guttatis compositis, *frons* carnes capitulum subri-
de ovalantibus, quod delapso flore extumescit in valculum tenuissimum, in limbo lacerno, *semen*
continens pusillum nigricans.

Duae hujus species seu varietates habentur, altera flore majore, nec.

In hortis nostris frequentissima est: ubi tamen sponte oritur iobU nondum constat, est autem
proculdubio montium incolæ.

7. *Cotyledon minor foliis rotundioribus, guttata flore.* An *Cotyledon altera* sive *Matthiolo* J. li.

Planta quam hoc nomine intellectam volumus in horto nostro Cantabrigiae aliquot annos ex-
stitit est. *Folia* plana, ex oblongo & latiusculo pediculo fere rotunda, imo (in male motum)
latiora interdum quam longa, circumferè crenata, denticulis crenis interscissis magnis, quam
in præcedente arboribus, glabra & tære splendens, minora & pallidiora virentia quam præceden-
tis folia, nec adeo conferta.

Cotyledonem alteram sive Matthiolo quam hanc eandem esse existimamus, J. Bauhinus sic de-
scribit:

Quicquid habet folioetum ad omnia per terram surgit: Sunt ea vero numerosa, pediculis unci-
latis latiusculis, unde veluti ex cervice insurgunt dilata, ut tandem circumscriptioe sunt rotunda,
pediculis crenata, semivivae magnitudinis, crassiusculis, & ne vel siccata quidem corrugari solita.
Caulis unicus, rotundus, septem vel octo digitorum altitudine, medius plurimum, raris una supra radi-
canti unca foliis donatus, superius in alepox tenues ramusculos divisos, quorum extremis hærent
foliis parvis, pallide rubentibus, fatuatoribus punctis sanguineis creberrimis asperis.

Lucas

Reperitur in montibus circa Comam & Gochardum, utique in Surke Alpibus. J.B.

A. 8. *Cotyledon aquatica hirsuta.* An *Semula Alpina alipastensis affinis* J. B? An *Semula
montana alipastensis* specio 2. Clus? *Paup* *hiberni* 1. luot.

Radix obliquè sub terram agit, ubi locum invenit, saxa crassam pro plante modo, fibras lon-
gas, albas, crebras emittens. *Folia* in orbem sparge brevia, viridia, pilola velut *Auricula* muris,
peltis rarioribus, quatuor vel sex denticulis majoribus serrata, in acutum desinentia, uncinata aut
falcinaria

le(cund.tm long.*; fonundam vars-is mucronem laca. E folio mm media *tsuliculi* exurgunt palmarc* 5: altiores, terctes. piloIT, foliU nudi ad locum oique tibi m ramulos ;argi incipit u: geftant autein in (ummitare *feni* aliquot, quinqc pceaus nlbi, acuris, duabus rruculis ihvii (irope un *gnes n a ti c ia con i p* in medio dcoem f purxi ri nrub us *apicu'ti* ca pitau conti n e i: res. i *Vaf than* (eminale cj-allum, bicornie, ut in reliquis hujus generis, *fimtn* p.irvurt, ronvrdnm, rutlum.

Loca hmdla montium aliorum sectat ir, ut rivnlqs & (copuloi udos, & aquanim (aturiginesi *Liua.* ragx auresc modo. Ad latent montnun *Snow/Ian> Carntri-Licavli* ;, *CtiJtriJrii,iLy.* focus r- valos del iacntci: necnonin inonribus *Htribtst Hi Wrtmft* in Wuflmoila. dia.

9. *S.micutilit Aipitue thquatastn ajy.Jiem 7- Baukr.m fie Jtfe ibit.*

Ex *rsdiatlm* fparfis capillirixiSj tlo.; antalibus lurgic (*aulicitiu*, nodis, fine *subhrlatis*, inpe- ritis in ramuloi aoeuntikis; quorum exereinis iurent ^w« SantcuiU* Alpini gun.ir-, r;uin(Li(caii- ditlulis confiani *es folia, anicum* nn biiiJo iTMJ. *ies* turbinato medium obocinentibus, circum,MS pri ilori tolois viridantibus. *Pal'd psrrcn'.int* Ip.ir^uncur (uWsrhitA, uncum .tu: Icfairctam 1"nga, *fer* *him dilauu. (etnunt* "fe *Qimur nite, traLmtilij* ^uli nit.

Reperit *J*, ilauihimii in rirolo fontis puldiCiTiiiiia,qm cil III onrisj ilidn flrf/w^ L** tf ubi florebat *Vugato*. T/X Descriptio lat is bene convenit Cotv laloni noftr .iqtrnic*fuir[i]rx,ut& loccijnonnulli tamen pnif- fa func: icon mm repondet; fi dia cairn non lans uaufera & in . *sculos* ^ompofiu, neque pilofi pingi ur.

to. *Sanicula nMMt<t''erim fpecie ** *secundam Clufius hii* vs;bis *describit.*

Sanicula « *stanlmona angaftiotc fotio St per extremum* ("errata, *Hi ato erian* ^ & *adstrin-* gentis guftusj coloris es *licMCCO* palluLj:::is. E medio foliorum procedunt *cauliculi* triunciales, mid), qui area furamum feibum in plures mnulos finduntur, *candids fofalis*, *Sanicula guttata* limilibtis, onuftos, verum nufis (iiiRuincis guttii, ut (Hi, afperloi. is: *ida* *fuccedunt ta m* \pm f(«., *tul** csiguum ni^ricans *Jimr. continentia.*

Floret etum jQUOj in hort't Maio; In *SntaYvtn*, Stc

SanituLi monuiw minor C £. pa i in omnibus *Lre cum SmicuLc* mont. *alterius fpecie 2. Clu* £ *Tempu.* conventt, cxoiptis flulculti pan£bas: non dicit Mmencujuscolons puncli linr, fi Utigiiinea, Clu- liana. *Sanicula* cfc tu^uit; iiti flira, ut in nolira Cotyledonc aquat. huiit.i, non obtanc quin Oufiana: *Sansculx* did.r eaosin die poGtt.

Nos ergo pro caJem Ipecie habebimus Cot^itHonem noOram aqiutkam hirtutam, *SanicuLc* Al- pin* aliquaicaus *vinum J. H.* *SanicuLx* mont. ittenits *fpoaem* fecoi *Iam Clu.* S; *SanJca* Um mont. nunoreiu C. ii. /r<i donec quw ccriora docuent.

II. *Ssnic<la Alpm* acnjta umhlite ftSiJe Hon.* Rig. PlriC & Hort. Lugi Bar. MoriC prxluii

Morf.

Species est *Sanicub* montjn.v gut: *atx, cupis folia sunt oblonga*, tenuia, prr.ua, e quorum me- diorbliis ercnacu (Iloti inibr) IJ;-> exit *cauliculus* *dostrantals*, raber, (uftineru plunmo] *flores* albos, pundlatos, umbilico pallido, quorum ir *ingulis* *fuccedunt filii* [ux bifircatar.

11. *S&tkuU mem*n*nfta fore guttato* Hort. Reg. Par,

§.2. *Dt StJo faliit fulrotuxIts ifeutath SJUHMI Aulo.*

I. *Sonicuh mtmlm* rvunJtfolia major O. & San. Alfin* gutm* J, P, Sanicula guttata Ger.* Park, ^portct) ^feanitr.

Multa lulKE/i/w arcinauc fere ro *unditatis*, *Saxifragz* aura- *Wiorum rriiula*, longa *pediculis* *loL-n;ntia*, altis per an *bitum* *incularis* *lerrata*, sic ut minima folia can *quam* *digitata* videantur, *pin-* gium *hirluta*, In; *erne* *viridia*, *inferne* *aliquantulum* *exalbida*, & valde *hirluta*, *alstringentis* *guftus*: *Caules* *deinde* *promte* *pedaies*, aut interdum *ampliores*, *virides*, *hirlutos* -i *noniiiiin-* *tortuosos*, & in *his* *folia* *superion* *bas* *repolulcntia*. *Sutnini c* *lues* *iq* *plures* *alas* *dividi-* *inir*, & *ingulis* *ramo* *infi-* *dent* *t.* *mi* *atit* (*fwstujurtj*, *Oxyacanth** *oiorum* *I.* *ferentes*, *quinaefolioli* • *albis*, *linguones* *pun-* *ttis* *inferiore* *partt*; *notatis* *tonftantes*. *Bifida* *vifc*facam* *Azccm* *ftmtnifa* *medium* *florem* *occu-* *pant*, *qux* *m.ituia* *c'vile* & *minutum* *tdoiodum* *iii^rtmqie* *ftmm* *ointinent*. *RJ* *is* *quodammo* *do* *a* *latenbus* *propagines* *agit*.

In *Alpibus* Idvetids, inq: *montibus* *Jura* & *Salev.i* *propc* *Genevam*: ^refcit *c'um*, au *orc*, *Clulio*, m *oninibii* *Aullrix* & *Saxiz* *Alpibus*, *ft*, *in* *breo* *loco*, &. *Floret* *J* *in* *honu* *etiam* *Te* *matunui*.

1. *SMICUU meat*** mtwitfdt* f*i*9r H'ff amica.*

1

reum oras cr. accentibus latis c. is, Saxifragz al me acuminatis ure viridi, pediculis tenui-

Minor est pr*CCoente, /eirr multk 4. radice excutibis, cirtinarr, roriintijMtis, aut nonpat. *Guadalupe* *caules* *bul* *combricari* *nevis* *arbu* (iropcu / U. *listan* *condit* *scro*.

bus longii CMuliatH &c flares Sd"> ferrati montani ltnfolu guaato Horc Park. quantum quidem meraini

Cintabrigiar per multos annos hanc planr.un alui qua umbroi f delectatur, hortis facile affue- frit & propagat, net hyemcs noftras rclrbiniidat, quamvis ex nomine Hifpanicae onginib dr.

SaniatLi ra! anil'sfdta ereiMr* filbj* Horr. Ltlgd. Bat.

Qiam pronon il. fcripta habent precedenti forte ea iemelt; nec enim illa a quoquam (quod feUm J hadenui ofl ctcfncptA, Sc nomen eonvencit

\$.3. De Stdo fol't'n fuhrstuardii crenatit Sxifraga alia di le.

1 Snxif-~~ra~~ alba Gcr. *lb» vulg*rii Park, ratuulifolia alba C B. *k« rd^Ve gratulcfs I B- J.B.

Raj = illi plurimis, hylpita, Coriandri feminis magntidinc, purpurantiff, anurih, toiuihus fibris inter fe commiflis confat, quanquam & ahis prsterca fibris longionbus CfaffioribkjDC Hi »ii- Caulis profert linguUrcm nonminquam, alias ternos, tjuinos 8t pluresj terces, hirtutos, pmpurem, ramnlis brachutos: qmbus inlident flora albi aliquot, quorum non uiem omnium tepnus tiorentii' quinqtic pet.ilis (ubrorundis, non bihdis ut in Aiiine, ftamtmbm ludfcJb Sc tiylo viridi conftr odorc nullo evideme /'/'«-«induduntur foliolis quinque viriitantih'. s cum ora purpura, hirtuab, & taclu nonnihil v'&aGs, tujus lentoris particeps est cum foitiis cautii. Felia ex pediculis palmari- bus aut brevbribiisj JiirJutis, fare rotunda, cnUat.i, ad He dcrz terrestris folia quodammodo acce- dendia pingua: com in veto qua: in caul c It- r, videt aliquam nullam diffectionem experta, integra, laoccolata, munone (p, idicco: alia fimbn.it.i quidem, fed non ita propc orbem completia. Valcu- luni temnale bicorne est, vclut Swli cujufdiin.

Tempus & Locus. VI firm

Flor: circa finem Aplnlis Be inino Man in aggeribus leptura, paltuia & pratis ficcioribus. Hups habx in cineres rttiaAi (al iixus Ipiricum prxbw microium qui mukum calculo conducit. D. P,i/mtr,

* i, Sexifraga m%uftifaUa Antumtudid flat iota guttate Brej'nji.

Urn 8 Tetnptu.

Ranorem hanc elegant^mqc Saxifragam hiimida & muicofa fundunt prata qurdam Bonifflr & CiiIub; praefidm (ccundum arccm Kieie* Krakow, ubi^ab Augufto in fawn ufque Aum- num floret, in horris auceni udo nec apncomtnii loco repoika aliquanto Hururiis, a Julio uempc ad meiiiiiii Sepeembrctn.

En raduculis c»inll.iceis, fubcantli.lo colore 6c japorc atltfnRentij fDf^gmi m^Ax rubentes, 1)l- iis ferruginei. lanuginoi*, integros [jrpiHime tel pices, (crpendo occupante, cmiuuntur: tu-ui qua* foli* anguda, carnofa, Juttiliibmt. dcoirrentibus nen'ulis, line atrovirentia & tiguJJiluiU, per marginal! tubtnde pilofi, cum Polygal* & Najdi Cclnea; Fobs me lociter comparant] a > tjuoir, nonnulla Atitumno ficcelecre mtipictitia pro viridi (uo triftem feu fiavum induunt uoli^tm initar Nardi Celticx. Inter propagines Caulituh doilrantaies, utptunnum liiinnu tel luvc Ipari, te nuc, fotundi Sc virefcentes, interiore parw fiibrubicundi, liipenore niolli, ferrugmci feu pallidore] mu' lenitor hii fiiti, prorelecurr.; qui foliis parumper minoribm temere & confuio online, circa ra- aia em dense, in fuperna aatena cauliaiti parte lubinde rarenter & parte vefiuntUr. duliculorum j.i in wmulos duos, tres, quatuor, plurtlve abcunti.i, fui'fcula .nimoiluni eleganties Soifriez alba:, (ed lutco colore nniSos gerunt, quinis foliolis nervoiis, in ungue .tppendiculai buus Gen- daaz tl^odeanii' leu putictata: Cluf. in modum habentibus confitutes; in (jiuibb non Jme inaenti vplupt.ve est cernere, tju.im nitidi- & cunosc dad.tb Datura punctulis innunicrv. lanre crog ed» « n- Itflime ilios confperferent, Sc quidem a medio ufque ad uml bilicium: unde jilqna fubvirefcent bifur- cau.loquUmnicisl una Saxur dita, inter flamina decem, croci capiti] Ji. i, pr O. minet: i Horc magw magi(<Juc inwmetu:, iuftainque ro., ^ Lor^ nicula finditur, a i Horc magw magi(<Juc inwmetu:, iuftainque ro., ^ Lor^ vero cauJiculi, : iemmt_cxiguo, lubrutilo fit micante YNo > a^Juc K fo,lu, inpnns

Var:at; quodam enim flor aJitringenie lunt guftu. tula; quodam magi acumiruu: pnterei foliiniwib & minoribz, diluitoribz & obfcuris virentibz invenitur.

In mukii cam Hirculo Frifi (Claf. onvenit, J quo tamen difTot; li modo Hirc.lj (OMS ^ . pulii cxMiftantes tluplici untum pun&ulorum feric uKerftmeti; ac folia lirca radican ac in caudic tam lata, & uruo) taltem nervo plumius lateiales vcimlas fiindcaec, piadita lint, licut in r'./' mmt_ pfl. planu dcUncatur.

Saxifraga alba porae Porue Park. Gcr.cnuc

Hanc C. Bauhinus in pinaco ad Sedum tridactylites Alpinum maj album refert, quod lupri^ volumus, un Parkinsoni reprehentionem incurrit. Verum live ad Sedum tridac^lito, live a[Saxifragam V sltwm referas perafcls est, itquidcmS; Saxifrage alfu dicta Sodi proprie ditti)<;.

Saxifraga alitj /ilpata Park. Lugd.

Saxifragum Alpinam Lugd. C Bauinu* SAjufraga: Alpmc eanJcm tile iu^icanir.

J. Saxifragia

3. Stxifragi* aiha tltrj ki&ifera Park. Sax. faffafa alms. bulbifera montana Col. Saxi- frtt£* aJ folia liulffti grmt G B.

Col.

Hujus radice adnata inir npn acini ur. prxctfdcnris, fed vclnci Iquamofi be ;|!>uij, U_N mmi^o f₀ propaganti, duplo superioriis grumis leu granulis majores, foris rubefcentes, intrinfecus albi, fa- pore primùm adstringente, postea amaro & ingrato, paucis in imo fibrillis terram amplexantibus. Folia huic minora, rotundiora, brevioribus purpurascensibus petiolis, pilosa, per ambitum rotundis crenis diftilla, tactu gummola sicuti caulis, florum calyces, & tota planta. Capsum est crassitatem, pa- rùm liiriucum, purpura (concern, cui den(i altenum folia, abique petiolo, per ambitum cristata, vdiici Euphragu* tolia acutis cretiis divilij in quorum liuu^i? bulbali orientur, quibus propagantur, I^niinii vii^iii lopp^lentes, citius enim Ian enunpuntj atque nCiuni in fbhorum ii:; ubus, sed in flo- mm p^ciolis atque !xta flor. aiplos, qii in finimo tiulU vclnti coi ymbi uno ortu e emlis summo pi-oducuntCi, ramoi, j>ctiolis iniuicncs, Aprili mcafeatqu Mil in quinq; foliola candida dehil- cunt, calyces vdm tyinos liiriitti habentes, vel Hyolecyami, quinque etiam ocs difatos, in quibus tmchii Incomes, ftamkiibusplunbiw flavennbusaroj adnati, qui perfecti per cornicula difeccantur, copiofa, arene inftar niinutimm.i ; emina extendentes, supervacua.

Pratenfibus m^rmrium gaudet, & faxofis herbaliis umbrofa Campoclarj & Equicola.

Locu.

CAP. IV.

De Gramine Parnassi.

Huiusofer (unt Pericafpium oonoides, i rribus cannis compofiRim : Flet III. formis, speci >fus, palatris.

albw in uno ciule unitus: Folia parva haicijee.i, LotUi

Grwwi V*rn*ffi Lob. Ger- P4n». w Part P<rw. /we alio fimrhct C. B. Taro. Dadinat, ijmaufiUm Htpaitciu fiot J. B. Grafts of fcti tus.

E radice fibrofa modice crassa [ex albo rubente, cum vestigio levi caloris adstringente] folia prodeunt lata frequentia, pediculis longis [rubefcentibus] appensa, violaceis similia sed minus, glabra, pallidius virentia, mucrone acuto: [J. Bauhino Hederaceis non angulosis similia, multa minors, crjffulcula, ImuatM a pedic. Cw/« ex ejil;m radice exurgunt plures, s; lithama, : angulofi, rigidi, unico folio non longè a ra- dice, coque bail lua CAULcm amplectente, cincti, quorum unicuique fca unus mider, specialiter can- dUuij quintj, foliij connxilims concavis, lubronij; mnta striata. Medium occupat conicum ca- pitulum circundatum, quinque majoribus, longioribus, albis, cum #pabm cone loribus; coddem nunoi bus, apiculis luteis, in ma gine virentibus & coch- learis figuram referentibus. [Tandem co nicum illud capitulum paulatim in Cicera majidellu molem c^craCj quod in quatiwi carinas dehilcens semen ostendit copiofum, minutum, rufum.]

Vix temere alibi quam i paluftribus putrii. occurrir. AltpiHi demum mense floret, & vix se- men ante hyemem perficit.

Habetur etiam duplicato fer; pleno flore.

Locu 3; Tmpu.

CAP. V.

De rich.

Viola per diminutionem i Grreo %, & u\ est, fpi r a lenu in v literam converfo, ut in aliis nualis.

Note ejus generis (lint fios pemapctalos diffbrmts, calcin donaru>, validam feminale termis loculamentis distinctum.

Duplex est, ali-i fblu rotundis, alia folus oblonRis, qu* (Iacca dicta.

§. 1. Viola Mania {did retundo.

A. I, fWd Marti* furfurta 1. II. Gci. Martia purpurea, fura fuplica i /trf⁰ C. B. fimfhx Mtrus Pa.k.pirad. purple 610ict.

7. R.

E rdJttivt fibrofe, aliqiundo in pUira capita divilij, demata emittit nv.tlu, qua: fibri* fi; bnde dems lbs radicanir, Sc l tantam propagant. Folia e radicebus & larmenra cacant multa, ex ro- nmtb normihil oblonga, serrata, longi pediculi appensa: inter que ptteli, e radice quoq; enari unico purpurascens, odori suaviffimo, calcari donatum, e affinentes « &*» aliove ex aliis modulis (quod notata dignum & fingula- quinq; bliohs conipolteum; quo BtraCOCCC ix iius pomculis (quoa , tgrann ••» ^

cit in hac pUma) ad ra&ccm onntur [ubronmda ceptula, in trescarinasderufcentia, iwHw plena parvn, rotundo.

Val. oia feminalia extnntffOrt hexagoiu yidentur intusmterna loctlamcnu dividuntitr, quorum unumcjuoJque bmos iciinnuiii orpines cormnet.

In aggeribus ltpiiim mvenitur ied ranus.

A. 2. P>i» Man* alb* C-B. Mfat alht adormto J. B. fart tlio Ger. fimpltx Marti* fiert *!ho Park, paxad. 3Di|ircJ?10fet.

Non aliter qium floris colore a precedende differt. Ad fepss & in ar geribus foilaru n1) & fo. quennusmuitoquim pNCCsdms mvenitur, aqua non vidctiir Ipecr differte, sed forte (J. i[ccet] [^ tern aut (ferifiutem (oli riorum oilor in album langucicit. J. Hauhmus fclu mino-a & maps hir- futa l Etc atnbnuit, floret etiam minores, qtxiquidem nobis non oblervaia, li camen vbra line lbo mamftfti' debect^r, ui in .iliismultb ftlyeftribusccraitur.

Turn hxc tum prjiccJens Hore multiplici (cu picno inveniuntur in hortis cuica. J. B. IL! mms obfervavit, *Viola Martiam inteni purp trcam, fieri mmerc fltwo*: Hem alwm fieri tx alba & ,-,.,/,, mixto multiplicata, edocati] m«, Coft.vus tern, in Mejutm Viola: fpcci-ni Byzantii toll (cribit Martue fimilem. Ied flore infimim foliolisconfVrufto, Sc Roiam Damafccnatn iquantffj iioniolumniagni- tudinc (cA Si. odore nofratri3 fuperaite.

Virt.

In Viola oitouci, utgc in .iliisofnpViribus plintis, multa'fkint panes.vinbus diftindx. Radix e linij umbilicus &femen vim habent cath.itT.icim' radiciim enim tres onciz concilxj & m 4. quam feryemem, ciim ah^ne remoreti:: injeclz, aut vino per ne&rs fjiatum i>r,:.e, vim purgatricem ipfifcon^mmr. &men pulveratum & liquori ^inuftum fcl(jiindr.ignia: ponderoidem preftat. Um- bilicus multo est debilior, eamque vim communicat aquz cui infunditur ex qua fit fyrupis v111- rum quem ex infufionibus vocant: humores autem depiciunt biliofos, ferofos, nec a Iniodutn per- tinaces.

Folia vero fubfrigida & aqucum fubftantiam i-ibent (iipcrantem : itaque p Megmonas mitii aftuaiicem in vciititulo 8t otuhs talorc m Ictiahti Ill olerc fimptra lemunt alvum. /> j e malm.

Flos rccens refiigr.it, hunicdar, emollitj Uxat. Cordwlii c(t e qiiatuor illonim faniolorui n nu- mero & pectoralis. Ula pncip. i1 fervorc fcbn, in compclccndo, colorea, capitis inde nato, in tufti, afperitate gutturs & pleuride. Syrupus crebemvi usis est ad fimm rebelcm reftinguendam & alvumcniter (i obducendam.

Violarum lemen est lithontripicu m infignCj D. Bnsho Cantabngicnfi raedico celebemmo olim inter arcana. V \ \ .

Dici coriaces & Plinius in quoa m. flore purpureum est cum aqua potum angina correxiiS: Co- mitalibus maxime puerni moderi affirmant. Quod autem aunt Comitalibus moderi (inquit Paul. Renalibus) experientia docuit non vacare impoftur: Antiquorum fcripta non fine mendis ad nos traducta malit afferre.

A. 3. Viola Martia violora fylvetru CB. dMMD jhtftw Ger. exvies Martia violora fi- vaitm, m cuotmtutfirmfrou}. B Viola fylvetru J l*ark. JDID, 0: j£ ogo Dioict.

J. R.

Radix est famentofa, te iuij lienoi & longa, v irio reptai hinc inde penetrante, denfa & longa fibrarum comi per intervalla pcedita. Folia circinate fere rotunditatis, nifi in macronem acutorem delinere^r, (upiiui parte leviter hifuta, viridantia, proia vero glabra, distincta virentia & fere luteola, interdum fubpuri'urca, in .ini^itu (erraa, jjuftu vilcilo, pediculis tenuibus, qua- drantalibz. Cauliculi pauci, quos ad alas involucra foliola, acuta, in ambitu hifuta complectuntur, flosculo in ramulorum laminitatibus proferunt Viola Martiz odoratz fimiles, ex quinque pe- talis confantes, quorum fupremam longius protentem reliquis, calcar deformat, purpuram utrinq; locante falciis alba, qui ipfa albedine reliquorum quatuor foliorum faturata purpura tunc tonun uii- guos colorantur, nulla odoris gratia: in medio flamma lutea cum ftvlo virente. Caudis fubinde cubitalein nancalcantur longitudinem, inq; ramos dilticti folis velluntur; feres, ut mox diximus, gerentes; quos ; i-L m unturj f w longi, in trescari nas delilcentes, femine tarctz copiofo, ex ro- tunditate oblo nap.

A Viola Martia purpurea differt precipue folis nunoribi & mag, mucronaus; fioribus la- dntre purpura tinctis & inodors: valculo denique feminali productiore triquetra.

Loc.

Ad fepss & in dumentis paffim & abunde oritur; ubi floret cum priore aut paulo ferius, fed dimws durat in inulfani astatem.

* Hift. Na.

A. 4. Viola palustris rotundifolia i^^rtfUMomC & D. Plot. *

Oxtn,

Mrij.

, l'ups radix alba, genici XA, mulctis fibns ex (ingulis gtTILLi excantibus, horizontaliter non dooclitu tendentibus, pceduta; ex cujus fupiore parte procciduntur pediculi tenues, quorum fingi s fingula innuuntur folia rotunda, glabra, atq; exinde etiam exeunt alii pediculi tenues, fuffi- nentes feres faturate violaceos, duplo aut triplo floribus Viola Martiz minores: quibus flacciditanti- bus fabreniant coz/ala oblonge, tenues, tribus loculamentis distincte; in quorum hii <ulis 0 mti- nentur plura fozna, tubulca.

Loc.

In humidis & paludofis locis, mulco o Muftis mvenitur; tit V,R. ad warginw flu', n Cervill inter Oxonium & Water-Ejies.

Nos in paljiftribus 8c aquofis loci* nuilcoiies oWemvyrnas VioU fylvefns fpecim uux (ouan" turn mentinimu>; M« habuit tenuioraqaam flint Viol* canina; vulgaris, fitui minores ruWncs fatiiratoribus lincii ftriatofj quain eamcm putamui Parkinfbno dcoripca: iub cinilo l'wU rubrx jinat* Ebwacexfit.

A. f. Viola Martta major, forfaa, modora MoriC D. Plut VkU Trachtlii D. "Phi.

A R*fif* fffro& filia croittk plurima, hirfiiu, avctsi pncipud pane, niajora, longiora marife acominara qumi (tint Viobe Mama; vtigaris folia, pediculis (iris loflga innitentia. inter'folLif'cx eunt ffor<j ut in rduquifj, p-iliu^ccemlci, lincii LU radio a] >e medio :xcuaDbus ftii.ui inodori" HJC I fque reptit flagellis cmiflis Viok Marri* vulg, rotundifeli* moAo, nec in p-amos divi- dinir ad mfbr Violi canine.

In Ivi's cardais juope Oxonium copiofc piorenr: lit in Sleicvtr colic. Sixx.-wwJ, Col lefti Magdalenenlis l'lvvis.8cc

Item 3 I). Dak (i :t in Eflexji addextram vix Tilliuri.i Clor*m SuffolcixoDDidum An. centis, prope Tilburiam : item in via < ibrola Qvmun & hrl djmp S. Rattli dsxtram. In conhnis On- tabnj;^ enfa comitatus verius Suffolciam, Via publici ab Apley ad Sa gcribus.

6- *E« ACrr/w fiftu Ger. Park. J. B. jf/^ < r.->in/fJui lute* C II.

Clif.

* habet nigr* Viola I ntoi-a M I & * viridi colore pa] Icicand. lidoguftu: [J. Bauhino folia arciriate fet; rott: caaw, p.uva, cvterarum VioUrum foliis deliador.1, tenuior.i, (juod & qtiinque talib aanfantantSj quorum mrituum JUUICUL. interiore pane liiHiiwtum; reliqua utc dehifcunt, exiRtimi nigncans, la, multas prop.igin<a c btcnbns proatat, <

Stiriae Aipvxi- gUzmonribusinvcnin Leintc companm.

7. Viola fotta yir^miaaa Park.

IX hac nihil habet quim qud Viol* lutex in Paraditb fuo defa-itxz (imillinu fit, & V ires pao TOS liuults lv^<r- Ego iutem in Paradii ili.i non allnu VioUrti lutcani detiuptani im tqontanam lutcam Hore nugno C. H. qoz cfljacex triwlous (pecics.

* 8. Viol* Atf'm* fitrperu txigati fahii C. B. rmtiatt* ~fnprrts s [sUImt May I, B. rnmsmn* i. Cluf

• c / < / ;

Eskhaecm (unrai Siwiwjf lup i iguis/o»/ 8tq uali circinatx otuniii;:, in ambmi levitei (ci r.itu, cv foliorum ticus unciat longus, unicam ferra fultinens, purpurcii-1, vulgari fimilem, fed longe ma- pofim & inodorum, cui taccodit triangula fil. cft. Flotct lith finem Junii.

/'tn/i

i Mrk. VK* 7. Ger. C. B. mmsna film nmlttfd* J, B.

.7. S.

R.i! Ikuhino inmoncc Xmhrtt Rhxtd. um prope balneum Warmo inven- amplici fere radice hureb it. ft> pediculis longiufulisni^ ebannr e radice flatim ortis, in de- cem longifcula & angusta legmet- (g ula Lunarix totum referentia, nervo locandam longi- tudinis ad pediculum utque diffecta, guftu, glutinolo, reliquarum Violarum more. Florem, qvimmtdt cederat non obferavis, fupercitibus adhuc filipes in tres carinas hiantibus, quas pediculi breviores quam foliorum fultinebant.

lo. VuU Atherim* fj.n UUHJ-MJ: Won. Paril. Viola Nova Anglia Martini facia Londi- nent-

FlorCj femine Ci capfula feniinaJi VioLe nofrari Marti* ommno confbrini., cli: !loris ite., m- lor violaceas. Flos loammodo habet lata, limota, in ternos lobos heteraceos profunde fans di- vid, GnuudiQa feu flos pallionis triphylli modo, unde et nomen impofitum. Hae D. Morifonns; cft tamen etiam differentia in flore, quantum memini: per aliquot en imannui¹ Cantabrigie in hor- tulo meo plant. Lin aoi, Loiui anno acceptam triginta circiter abhunc anni.

§. i. *Viola Marti* folio ehloxo.*

• |. r. !; 'urriBafvrpm Park. 'fan triertfcm purfiata C.B. l'hUtijfirgtnt m</<rG*T. <*. (ca tricolor furelliu ..laibut, yifafclam . riera di. < J. B.

J. B.

Sarrectis est *caulis*, orbitum aliis aut etiam altioribus, angulosis. *Folia* prota vulgaris *Viola* tricoloris similia, subrotunda, cetera longa ad uncias quinque, alia longiora vel breviora, angusta, quae cultu variant, & lanora reddita *Viola Martie* blia imuUntur, ail quorum genicula foliola emicant, modo parva, modo majora, quantum etiam laciniata, & per ambitum serrata, colore Jaott vulgaris: *flos* quoque dicitur Jacez, quinque foliis constantes, in ambitu dilute violaceis, lonp insident pediculis, e foliorum limbus ortus, quorum folia duo lateralia, interna parte albis vil- lia obita, . sc ctini imo pulchellis fctiis decorata. Quibus succedunt *filice* longe, in ternas carinas dehiscentes, *semen* continet .. album, pan-urn. - Radix tot i fihrola c si, ac perennis. Tota planta sapore viscido est.

Locus

Frequens occurrit in Austria & Stiria nemoribus Claf. inter vepres in limitibus M'tmbclgardcn- fife- , rincere velia Mathuci arcem florentem Maio observavit J. Bauhinus.

Viola tricolor recti, an Jo vis *Flos Theophrasti* 6. h di.6.C.B.h. uo eadem vide :ur.

A. I. *Villa trkeloT* Ger. *trkshr major* & - *algara* Park. *trio fer lortefii rtprti* C. B. *faua tricolor five Trinitas* o f.a I B. ganfir^ D^ Ij)can0--cafe: vulgo Cl;:ce facty un- Der a Ijocru

Pulcherrimi *flos* conumque varietas efficit, ut in hortos translata cultu digna iudicaretur i quos quinque folis constantes delicias suas adversa facie spectatori offerro vulza, modo totos purpureos, modo luteos caeruleo & purpureo variegatos, aliterque etiam varicosos, in pediculis longis com- pacts, ex foliorum alis, quae modo Hederæ terrestri instar rotunda, modo oblonga, in ambitu serrata, in *caulis* reptantibus, ramosis, ex radice tenui & fibrosa exortis. *Seemen* in pericarpis turpidulis, fere triangulari minutum, splendidum, copiosum.

Locus U Tempus.

In montosis Septentrionalibus Angliæ inter segetes, 6c in maceris & Topjur: aggeribus frequens oruuf. Vere una cum *Viola nigra* aut piuio post emicar, *fl ite deinde tota & in multum Au- rumnum floret.

• 1. *Viola montana tricolor odoratiffi* wC B. .7 << trititmt Jive Flmt Trhtittu tmtt fart latus & purpureo magno, repertu non anticum J. B. *Viola montana* 3. five *tricolor* Claf.

Claf.

i?lu imos ex una radice profert *caulis*, pedales, angulosos, valde ramulosos: quos per intervalla ambiunt y *Viola tricoloris* *Viola* foliis fere limbi, longiora, crassiora; lucca plena, leviter & rarius dentata, apophyfibus ad latera oblongis & profunde laciniatis, amariulcuh gustus & nonnihil acris. Ex summis alis longi oriuntur pediculi, triangulares, tenelli, singuli sustinentes *flos* omnium flos in hoc genere viderim maximum, quinque folis constantem, quorum duo superiora extremis oris ex caeruleo purpuralescant, circa umbilicum pallidi erant coloris; bina illa in latera expansa, ill(> minora, lateri coloris, maculis ex caeruleo purpuralescantibus respec U, trinitique purpureis radius ex umbilic o emicantibus insignita: inferius folium reliquis latius erat, aurei fere coloris, septenis radiis purp ureis ab umbilico intercursantibus, n laa lique ex a eruleo purpuralescente infimo labi ono tatem; o. lor flavissimus: crassiuscula *capsula* quæ in ternas partes dehiscentia, *semen* ostendebant alio humile, pusillum, rotun : um, mam itate fuscum, tricoloris *Viola* ferenun proximum. R. dis fibro- sa & durabilis, quæ facile etiam ramulis pangi possit.

Locus.

Sponte in Helvetiis montibus nasci ferunt.

• 4. *Viola MM lutea grandiflora* & - C B. M r, Jj www. i*4 /WW non ornatus, ejusdem? *Viola montana tricolor* 2. Claf. *Viola flammea lutea maxima* Park.

Claf.

Hoc genus, autore Clusio, precedenti per omnu f?mle est flons colon; excc[<o: nam qu> in (u- periore varia est color, in hoc omnino flavus est, purpuralescantibus radius ex umbilico emica qui magnam gratiam flori adferunt: aliquantulum etiam odoratior videtur. Audio & tXum pur- puleam repertu: quam varietatem semino accedere puto.

Parkinsonius hanc speciem hyemalis nostras melius tolerare scribit quam rdiqvas *Violas* tried res: ramulis avulsis facile propagari quæ in humido solo depacti illico compret o aut nunquam ferre in hortu satum, quantum quidem ille observaverit.

• 5. *Viola montana lutea grandiflora nistrans fl.* - « *lutea*, seu 5. Ger.

Hæc species quæ in montosis pascuis Derbientibus, Eboracensibus aliisque Septentrionalibus An- glie petrido & palustri solo subinde occurrit, *flos* est amplissimus hucus, circa umbilicum limbi seu radiis nigricantibus striato, nec unquam spontanea, quod viderim, colorem variat. Planta ipsa parva est, & humilis, nec affurgit aut humo atollitur, forte ob sterilitatem soli, & loci natalis in- temperiam nimis frigidam, siquidem locis humidis montium altissimum delectatur; an vero in hortos translata faciem mutat, & in magnitudinem proficiat (quod verisimile est) aut flori colore variet nic nondi:m experim tateos: unde ætem eadem sit quam ex Clusio delectam oculimus necesse do- termi. sare nequeo, puto tamen specie differre, nullum enim in nostra odorem percepit. Gerard- dnm

dam auceut lianc intclligere rum Dclcriptio mm locus convtncunc. Pfireontm cfl« puto, neque id tamcn compemim habso.

" 6'. Vtda mantana fumila Cluf mmt. fumHa angujffolia Park, moitt. fum. angujtif. flnt m-veo odoro C. B.

Gulielmus Boelius in Hifp.inii obicrvavit Violam montanam quandam valdo pumilaniy adco ut binas uncias alntudine vix fuiperarct. Satis cratla rtdia conflat: cujus fbliii anguftiora videre non mesninL Nam qoafcunq; alias videre mihi contigu orbiculata folia habebant; hijus vcr6 m Rorilmanni coronani angufta eraiitj & unciam dumaxat tonga. Floi inter folia cxili pediculo mildenSjiweuSjOlorus.

A. 7. Viola bicolor arvtmfis C B. tTVelor fylvtfiru Park. Jt/cea bkolor frugvm & horterum •vituim J, B.

Folia huic ad radicem breWora & laciota, in cauibus longiora 6: anguftiora, tltenuom pofica> iiccutis donau, ransinaliirb circa margincs crenata. Cauiet palmares, ftri.itij concavi, citSrb geniculis inwrcepti. Ex alis tblioruni cgraitiuitur [iorti iingulatini, longis pediculi, violas limilcs, quinque pecals parvis oonfrudi, calico quinqocKilio. Succoiit flori vsfcMlmm fenunale, eraiidms, in tres carinas per matuntarcem dchifi^ns, fmma plunma, obfonga, OVJU, aJbicanru luotlejii.

Ad pedicubrum qut fiorec iiftinent exortuni prater folium medium diia- apponditos tot auricula Uanitse Folio primario non multo minonn ail cioletn hitic iadi adnafcunctu'.

Floleui huic miiko nunwea lunt VioLe tricolors hortcnJh doribux, colorc albido & luteoj inuuii-ti vcnulh* fltit viruia

In arvis inter (cgres ubiqic occurrit.

CAP. VI.

De Refda, & UteoU

R Eleda a (bdaijilis doloribus dida eft: rum collclioncs & inflatmnanones omna dilcudt, ut script Vilnius W.18. Mp.13. Cjui curant ea addunt hxc irerba, Refeda morbos, ref&ii, lci(-nc, fclnc quis hie pullos egcric, radioes nec podes nec oqwt habeant; Hxc ter dicunt, to-riifque defpuunt.

keledz notx funt Flos hacapeulos, cujus panes difficuher adniodum difecniij B: diflingiij poflunt, Vaiculum (eminala in tfrna locubmcnudivifuni, qic vix uiiquim perfecti daudunnir ledperceptuo hiant, & in nonnullis adeo didutta iint ac fi dilercu leu difjunfla cT^nc.

Lutea & Luteola dich, quod ci panni luici & eel* linea:, canJUX= quidem, colore luteo \ rimito ver6, qua: ante carruleo dntLt, innaantuTj RclcJi nocas chart rterificas habet, i>:6que genuiti.i cjus fpedes habenda eft.

I. Rtfda alba J. B. tatUUs Lugd. major alba rtfi inferAuur. <OJffit Inljitr baH.ltb floct. An Refd* fchu Ctlairap* ftert alho llorr. D!

Zult (urgit aibitali aut altiore, Hrmo, rotundoj ftnatt, ab ime- ftjtni ramolb, film vclitrij crebns, nullo ordine pofitBj ladniis utnouc ptunbus ad med tam ferò toftatn diflcchSj V.ilcrlariu! in modum, glabriSj obi. tubus. Floret in fumnutatibus wulis & ramorum in (picas longa* digefti, jilbi, hexapctab lex calicii foliis indulT, plinmis intus jffjnw>ulii cum afittbia majufculis. Singula flokulorum pctala in tres lacinias diflecta (one.

Invenit D. Magwl Maio menfc prope pagum BaBervc juxu ftagnumj qui iair ad thernas. Bo-Lean. jVfoi>f>.

Rtfda maxim* C. B td. \ Gcr. major Paik.

Prrcedemi eattctn vulcnir.

A. i. Rtfib vulgmi C B. minor fat mlgmi Pork. ?/«« Ger. 4tfw J. B S5aCf floct.

Temiem quidem, fed longam Gtis habet raJictm, albam, lignolam, noubili acrimonia V^; tam; 7suU, «urgunt pTures, ftrinri, hirluti, inhd., []V>ahino fitulohi *] inlinra, <t m f e (ullincnrfii, pedates int aibi]al« ramoiit rti/* vcluti iimnirini r.olis, Erux nianni tsc <JVI- lura profunda, inordinata, crifa feu undulata, angufta, obcurus viridis, fapore dieracco. Flors in fummitatibus caulis & ramorum in thyrifulos fpecifice difpofiti iViorCS, Ocfarokua, tJU tcillulu COMpofiti, quorum alia minora, intin-t » onlptcutj om- h figulanSi ^ ii ex i m. R folio duo alia eme erent; medium floris occup; it Jfitmmii- nwroS turn Ol 'locw del. nigen: captularum angali hrluti i hint; calyx iLru hexa- phyllus.

risc \vfm occurit; Reperkur & in muris.

Unc,

3. *Physium J. B. Reseda affinis Physium C. B. Valeriana 7. Ger.*

Park

Radix angularis, nullis aut...
plures, exi...
emittit...
uiciaram riferlongcibe. Am per ranUa
Bauhundeceprum pmo] quint* radiaa folu viri
ffTftM& divlllon: infioncm, tjiumur
pofin [in hoc
Letts. am passim prov enit; m lulu quoq, circa Romam & alibi.

4. *RtfcJa ait* minor C. B. Sesamoides parvum Salmanticum Clus. Mascipula Salmantica minor Park. Sesamoides Salmanticum parvum Ger.*

Clmf.

Dodrantales trnes axx quaruor ab una radice producit virgulas, teretes, circa quas folia Lini exi-
gaa i-r.ittij inorJiutj, 8c in li mnis plurimos fofculos ipice aut racemi instar contentos, ex herbaceo
purpur icentes initio, deinde tenuibus capillamentis ex albo pallefcenribus ornatos, in quorum me-
dio v... ta,»».,yorgTM,v.nd,, conf... : ssa:
cane... Radix crassiuscul... dura, vivax, subinde etiam ante hyemem re-
pullat

LKUI,

In collibus Salmantice proximis lapidoso solo provenit. Maio floret & deinde semen profert.
Planta hęc, si recte à Clusio describatur, quatuor vasculis semine repletis unicuique flori succedentibus, ad multiflikas pertinet & non ad hoc genus, quò Bauhinum sequuti eam retulimus

5. *Reseda Linariae foliis C. B. Park. an Sesamoides Salmantice se parvum alterum Clus?*

C. B.

Ex radice candida, longiuscula caulis cubitalis, rotundus, in ramos palmares divisus, foliis Linariae strictissimis, oblongis, vridibus vestitus exurgit: rami singuli in florum oblongam veluti spicam ab-
mm. i... p.rvi mji;0;,
ve... tibus capillamentis ornati, ut in precedente, pallide fla-
codunt. tula vel vascula angulosa, bifida, exili semine pallido plena suc-

Lcom.

Hęc in solo arenoso convallium montium Pyrenæorum collecta fuit. Nobis siccam communicavit Monspellii D. Carolus Sueker Dantiscana.

6. *Lutea maxima Cretica Honorii Belli J. B. Luteola herba folio Cannabino C. B. max. Cretica se-
conda & sterili Park.*

Bellus apud J. B.

Radice maximam profert, lignosam, in multis divisam, crasso & lento cortice vestitam. Stela-
nes plures ab una radice nascuntur, brachiali crassitudine, qui ad quinque, sex, atque etiam ad de-
cem usque cubita atolluntur, qui hyeme exsiccantur. Folia fert magna, pinnata, ex multis foliis
una, longis, serratis ut Cannabis, alterno positis harentia, sine tamen ordine certo.
ex viridi pallefcant. Trunci pars superior in magnam spicam fastigiatur, duos & an-
longam, ex vasculis quibusdam longis & angustis densisque constaram, similibus is que
aris gerit, semine plenis ad rufum tendente. Procul intuenabus Cannabis esse videtur.
radix ita amara est, ut Aloem etiam & Colocynthidem ipsam meo iudicio superet.
nificit Autumno, ideoque Luteam vocare.

Luteola herba sterili non aliter à descripta differt quam Cannabis aut Lupulus fertili à sterili.

7. *Luteola vulgaris Cretica Park. Luteola Cretica C. B. Struthium legitimum Dioscoridi, que senilis in tua Grecia appellatur quò fullones in tingendo serice utuntur Hon. Belli ep. 2. ad Clusium.*

Hanc Gualandino epistolæ ad Maximilianum II. Cæsarem anno 1572. de-
enpompdick. Camerarius vulgari eandem facit.

A. 8. *Luteola Ger. vulgaris Park. Lut. herba Salicæ folio C. B. Lutea Plinii quibusdam J. B. Wild Wood, Dicty weed.*

Radice gnosa, paucissimis fibris donata, crassitie interdum pollicari, sapore
Nasturtii acri. Caules bicubitales, teretes, striati, glabri, viridantes, arctiori tubulo pertusi; ramosi,
foliis crebris longis, angustis, glabris, non crenatis, verum obiter interdum sinuatis aut crispis, nullo
ordine positis vestiti. Folia antequam excaulescat humi in orbem spargit nitentia. [J. Bauhinus lon-
gitudinem palmarem, latitudine; i JemunciaJem folia attribuit. Linocem subacrem cum lentore.]
Thyrsi florum prælongi, teretes.
brevibus stipati pediculis, quatuor petalis lact... occupant. Flosculi singuli
bde luteis; qui his]... occupant vascula tripartita, hinc, tribus loculis, que vix unquam exatē
cluduntur, sed in medio delucunt, & semina parva nigra, rotunda continent, composita. Ad sin-
gulos florum pediculos ligula apposta est.

Lcom.

In muris & locis rudicatis, non raro etiam in arvis requiritis: feritur etiam in agris ad usum tin-
florum.

The Herb'ts pentapetais.

Quale bilis planes vinbus in medicinu... Linarum mfaftonkis fuc... riniu^eni... fueric color arrulcus. lupanni bicolo;

QrtitU enguMfdaa Ger. Clhac. su^ufnftl. a five maut Park. Hyfifolia C. B. Hyfifolia aquatica

Caulis multi, dodranteales vel etiam longiores, striati, virides, folia amicti alternatim posita, Hyfifoli, aliquando brevioribus, brevis vite, nervo unico secundum longitudinem distincto...

In quouis & ubi per hunc aquae stagnat... mam IK regioribus.

Hyfifolia maut vel p. At Tfymt... U.

Simplice, lignosa, contorta radice nitida, ramis diductum, per quos crebra folia, Camphorata, sursum vergentia...

IqjtticU niaritimij & ad vinearum margines prope Grammontium in agro Montipeliensi colle-

Notin Siulia infuli; rope Mallanam duas invenimus Hyfifolur (pccia simul nascentes, alteram triplo elanorem, omnibifque suis partibus majorem altera, alias similem. Verum minor speciem

Ageratum purpureum Dalechansij j. B. Mrfurampiric. ftnMum A:MM C B.

Radix est brevis, capillata, subflava; folia parva, numerosa circa radicem sparsa, Agerato simili-

In rupib'taj radios monns Silcvx, in, ascensu monti I^irx prope Gciievani, utrobique copk>

Danir liujvis v^i icus foiiis & caolil... quod Ageramm pupu: cum villosam Marfina.

CAP. VII.

Geranium.

Geranium a graeco capiti & nostri imagine que summo ovis plantae capitulo inest, apudissima similitudine dicitur: nec aliam quare necesse est notam Geranii characteristicam quam

I. rum fottii paula prodnii; oribus, Althea cantlii,

i. (jrt>ium Akbt* fetu O D, Albttdc- mejt Park. malaculis Gar. vul-jAtaa* J. B. Sparsh mallow leaved Cranesbill.

Folia haec malvaceis magnitudine, colore & mollitie proxima sunt, nonnulla oblonga, subulata, in ambitu serrata, pediculis appensa duas treve uncias longa, interduin fere dodrantalibus. Caulis ex eadem radice, solo latiore & fimeis, multin, hirsuti, molliociter crassi, distantem aut cubitum alti. E foliorum sum pediculis exit duas treve uncias longus, multifidus, cui fere insident multi, circuli, pentapetali, quibus decidendis refra oriuntur unciam aut sesquiciam longa.

Circa Geniam in Italia, Montpeliam & alibi in Gallia Narbonensi sponte & copiose oritur. Hec planta (inque J. Bauhina) aliquando vix trientalis est, foliis ovatis, crenatis & Betonicae fere similibus: que forte eadem est Geranio nostrati pessilo supino maritimo Altheae aut Betonicae folio proxime describendo.

In Sicilia quadam insula ad Promont. Pachynum nunc dicitur C#fo / dicitam, alias hujus speciem minorem observavimus quod

j *Geranium procumbens* AUh&it folis denominavimus, *Cauliculis* ex jJiiew nitloio plunbus, humi proci mbenctibus, rotunda, rara & brevi lamagine obliata: *Folia* Althaez, binis ex adverte [ubi liiny mulois caulis dividitur] in margine crenatis, non autem laciniatis, **nc** **IIjs** quilletn que in summis caulibus sunt. *Floribus* purpureis parvis: *Rosula* brevibus.

Fortè hæc eadem est altera illi species cujus meminit Parkinsonus, quàm Geranium Althaez ^{K.ies} minus vocat, que non alia ferè in se à primo in loco descripta distet quàm humilitate partium, omnitiu parvitate, & quòd folia albidiora sint.

In]orto Leydenli inventio *Geranium Althaez* f. **M sd&AStm**: irem, *Geranium, fricatum arboriscenti, folia Althaez,* 1

L s. *Geranium ptfr3it7» funnum mtrit;rm<m Althaez aut littenxx fcho nnsfir.it.* <EmiaU &ca Cranes bill.

Radix crassiuscula, simplex, rosta in terram descendit, paucis sed mascululis fibris donata, cortice subtiliavo, sapore nauseoso. Cum primo exit, *folia* crebra per ambitum spargit in terram reclinata, pediculis crassis, hirsutis nonnihil compressis, duos digitos longis mixta, Betonicae folia similia sed quadruplo minorâ, ^rotund) i. laciniata, pili brevibus rari hirsuta. *Caulis* seu ramuli crassi, succulenti, hirsuti, in terrâ im relupim. *Josali* herbacei & vix cont; icu [D. Monlono purpuro-rubentes] *Rosula* semuncia. • m longa, duo vel tria in eodem loco rculofeu conmuim pediculft

Lxxx.

In arenosis 8c gl:m:ohs prope luus Angliæ Occtknule, v. g. in inlulii Mona & Prcftolou, in Wallia cur.X oppidum *Conmrvan*, in C. *armata* à ca. *Vrnfim* & alibi.

4. *Gtrtniam Cresicum* (Ger. Park. *latifolium longissimum* acia C. B. *speciosum annuum* *lappifimu* *rosula* *Creticum* J. B. **Candy Cranes-bill.**

J. B.

Late terram obumbrat *rassula* ^{<n) hi} *litocum*, *nodosorum*, *longorum*, *terteriorum* <•••\ r^ fliuu *prælorum* longis, hirsuta, nonnihil rubentibus, sinuosis & serratis, sapore acido & aul. •mgeiite. *Floris* caruleis anticis, pentapetali, cum *style* in medio purpureo, quos circumstant *calicis* *scantis* folia quina è striatis bila modis membranulis albi pellucidâ commissis composita. *Am* *plurquam* palmari longitudo. •in^j flu tJAI *crassiusculis*: *Semina* majora quàm aliis Geraniis (acuu 8c pungentia.

I tern.

In Sicilia prope Messanam speciem hanc spontaneam invenimus; uiule Cretr infuLt non eflic peculiarera novim **UB.** MOD. *peliano* agro, Clasio teste, provenit.

J. 1. *Qtrattiam* fv>u *pinnatu* aut *varie diffe* ra, *Coriendri*, *Myrhtcif* out *Cicuta*. *Hit* am *pleraque*, *duabus* *ultima* *exceptis*, *floris* *habet*; *t* *to* *com* *man* *pediculis* *floris*, *vein*: *in* *umbella* *disposi* *tat*.

5. *Geranium Cicuta* folis, ac longiss. //?* C B. *im* *Ucmiai**m Park, f **rrncfj** long *bill*.

Caulis est bicubitalibus, hirsutis, asperis, angulosis, in varios ramos brachiatis, foliis Geraniis mosch *chai* five Cicute modo divisis, floribus taburpateis vel violaceis, quinquefoliis: cuilibet acui unctas quinque longa, hirsuta succulat, opæ ex utriculo hirsuto, quinquefolio, apicibus donato *semen* continente proliit, quod per maturitatem exilit, & cum utriculorum nitrosibus sursum positum, dein deorsum alioque modo circumvolitur.

Lxxx.

Ad agrorum margines & **ll jnp** *ribes* circa Monspelium observavimus. A Geran. Apulo Coriandri folio specie diversum putamus. Monspelientibus, cum ibi cilemus *•cranium Creticum* dicebatur sed perperam. Hinc forte idem fuerit

* 6. *Geranium Salmanticense* *rosulatum* Claf. *parvum* folis *Ranunculi* C. B. *parvum* *Salmanticense* Park.

Perussillum hoc genus (inquit Autor) *Ranunculi* ferè *folis* j lubcbat, *Twrpuwim* esiguim *floris*, & longissima crassissimisque (pro stirpis tenuitate) capitula *Gerani* rostris pene æqualia. *rosulata*

Lxxx.

Salmantice agros in vicinis ultra *Thermis* *rosis*, aut *salte* *thi* *gramine* *tectis* observavit *Clafius*. *ti* *amneni* *coilibus* *nudu* *ferific* *pc*: **mle**. *Ex* *brevi* *hac* & *imperfecta* *descriptione* *modis* *non* *con* *ut* *lit* *distineta* *species*.

* 7. *Geranium Apulum* *Coriandri* *folium* *Patk.* *Coriandri* *folis* *edi* *quashed* *Cr* *»•* *CoL* *Afylvm* *datum* *mm* *C.B.*

Aliquam eam *Cretico* pirato *humiditatem* *habet* • *prima* *nano*, *folia* *cum* *illis* *quadrata* *videntur*, ac reliqua latera multam, lacunata magis, *Marricariz* vulg. *divitum*, nisi parum essent retusiora, ad *Coriandri* prope *caulem* *folia* *accidentia*, mollia, hirsute vix apparente obducta, odorata ut *Acem* *moschata* *thicta* ex *odem* *genere* *Geraniorum*, longo petioliis tuberculandis tulta, circa *radice* *parvam*, *flavam*, vel *rufescentem*, brevem, è terra parum elata, auriculas live alas in imo petioli circa *radices* *caput* *unde* *ornantur* *habentia*, *rubra*. *Caulis* *profert* *Martio* *hirsutum*, *geniculis*, *distinctum* *ut* *Creticum* & *congenera*, in quibus *brua* *folia*, *minuta*, *brevisioribus* *petioliis* *ex* *geniculo*,

cub, & bims illis cti-iii barbulii cartilagineis rubenribus, tic to *conwenat* Co.* *»»«). J.
 E. .
 ba fem.M.Ui, « * * hirVut* **arqæ rifoob** « , , S infidentem abens quinque
 pttttm, ex qui peoli quan pinj, prodeuot /fcr« emitter^, colorc vi" lacco pntureo
 dihso, pentaperalo?, ex hirCiti ^lycis v, ^, psrentibus, acxu in fommio sed i
 pungenubus. I & Wtricialia v^ lucccdunt in in» craffiora, .n (ammoten, .''?
 m niodo, atque tune AU& feti hi uta taicanum apicem relinquant, in imo fe ^ oblonmm
 lunim continentia. Sajwrc oft admoduni afti tngesne. wvngtini
 ••• > iwrhcitar. OrinoU nee alibi ridknu in agrorum &. hororum m.irRinibui d.itis friir. Lora.

A. 8. *Geranium cicutæ folio inodorum* Gjr. *ciutæ folio minus & sapinum* C.B. *inodorum* Park. *moschatum folio ad myrrhidem accedente minus* J.B. *field*
 bill without sent.

R«;« ei alba, **fimpl^ uroc osneja**, cuml nervo inms **durrore &** tenaciore, ^ xoxe " " " ,
 mim .-icccacne pancn hbn* don.ua, fans craffi, & in cm.mi & defecudens r cj *le ex eaden* ^
 dice plure^craffiu cull, rawe, h.rfuri, m terram redinaci., *Amali folio redat* •£
 RreoTis feu paliculis duas aut rrcs uncias Ion *è caulis lateribus ubi in ramos findantur excutitur* " , "
 quatuorvd quinqc aucctiam plura li *um velat in umbella. pedic: llis pnvati* femuncialibus 10t
 longioribusinlidttiites purpur...i *entra petali, petalis angustis, obtuè inure luhda, è calice quinque*
folw: Sonint apiabui **n£»i£ nfgia** S^SiSbt *longa, pulla aut fusa. rostrata, rostra unciali-*
 bu5.mtlonRionbm.K-i.tis. 5 ^ q 1 lca. Lora.

In arenois prorerat [jontCj & [iam arftatem Hoicr. Lora.
 A. 9. *Cfretmm eiciita: folio UtoJvrtm album* Gar. *fare albo* Park
 & IJBS varietas est, qux nobU etUm ipcac difitm: vkbttta à præcol. •.ntCf J9ons albo
 tails lationlxis; *twdAu*, ctiam trallionbus, brevionbus & pailidis, cum illiilsrukant • *major, pe-*
 »s 8c minus arginc I. *Folia detur,*
 i litieni cum [trxcedunte locis reperitur, Jai rariormulto. Lora.
 A. IOI *Gtr&tmr* moschatfm^Get.Park. Cicut.1 folio m* *schatum folio ad Myrrhidem accedente*
major J. B. Moschat Cranes biii, iJ^urroUit

Superiori (verba (unt J. Bwfami) affinis & ilk fpecicJ, invenru rarior, tota major, odorc Mb-
 "chi, ioliis non iw alci inalbSi perLrpe mitum (crratis).
 In montola regio nC C>«««, ditla quar wi est O-ccidental. k Eboraccnfis comitatuj Tpontc |e co- r
 «c prove invenit, eoam non proaJ pntolu cundo ad nipsm S. V.ncntii
 In horto Lo-dam invenio Gerami Cicuosiblio fpc. iam in imorem, fupinxn , floribus pallidis.

11. *Geranium trifide* Cocnuti: *triftij fivt tHdiam notttt oltm* Park. *Sweet Indian Cranes-*
 mil.
Cemut.

R*/ic«n habet ex mulcis coharrentjbas fibns i que in nodulos exuberant. Liliifibrodeli puniceo
 rudo. Statim i; terrj lurculofum in jltitudinem palmarem est. *Caulis teres est, fœner invalidif-*
 que hiHutus, neccn *odis, sed per triam digitorum intervalla articulatus. Folia in junvium quatuor*
 auc quinqc 6 u *unculis procedunt, initio humi jacencia, subhisfuta, pluribus segmentis divisa, formi*
 Fdipendnk; Breviora tamen, pinguisa, molliora, & amphora multo: horum mollius ncm>
 (quamTocanca>fUm)p *urpurat, cætera atrovirefcunt. Caulium fistigio infidet densa u* mbcU
 It coma, fbni nihil a cztens fni genens dtfiruni fonna; nninnuc eirim *folioli conflant tori-*
 lola g *mina vel* .< a«», nu.ula drnpundben! infidit; ftaminibu, & prftdk, &S:
 dimcmoconclonbui *ik,or & acutior ???/*.* pmjit, roftio • *quibz annula, in cura*
 bad quinqc (untxigiu & fubromnda Icnui *um conceptacida. Alveolis maturitate dehiscentibz* us
 fWm: *illa polingafue* ^eunc - H« no*» ^11 foa«ute incnarraWi, intmliu null, *infutum*
 im *illucens Sols adeo alpernari valent, . . . vlu* rumque ^ *lntcKrodicmiorcii*
 ,mo odore molchato quasi thure liber, qui o *neget, cum Linnæ accitiffi grati-*
 severat, statimque Sols præfentia evanescit. *ctæ ad Auroam ulique per-*
 uuiuc inter • *lra recenferi potest . . . vlu* rumque ^ *huic plan*
 gratiorts inter eptOai appom. Fl *oret integra propemodum ætate, nec nisi incuria foliis* I *r !)*.
 nem omnious. Cmtur.

11. *Gcrai'wm *&* olau* *«Ethiopicum r*Jiu t*btr»f**, *filmM/rrbUk* *lateribus* Breyml.

Tubcrofim agit *radum*, obt< *leti coloris purpurei, perampl: III ^era(], m, crassique balan* K, co-
 low Sc lotm.i junioribus Chirac *è flavæ radicibus haud abstimibiles, p; jriitam: quj| «* *strequam è terra*
 crumj>itin fivutos aliquot *nh* *propagines subinde facillit palmares, Folia emittentis Gerani* tri-
 /lit (Joinuti maloi,i, atquo af[«nora. Ex hontm greauo *caula A^* *inde in postalem majoræve elo-*
 vantur longicijIncm, rotundi, inanes, ternis ac quaternis long: *distantibus, foliof mangut timbra-*
 tu incercepd gcniailiSj in quorum hn *gals folium conspicitur, inferocibus ternis proximo longè mi-*
 X m

nas, in primis quò altiorem in caule gradum, obtinet. Sequuntur flori caulium & pediculorum in cacumine quibus... novemvel Hecem i/mbellanidifpofiri, G<- rami trifida Corn. n:imhit majores, qui I fructus longos, rostri granulo milar fori natos iibamr, fomen o<-longum continences, colons (mil me fallit memoria) olivaces.

i: Granium... raJict tubtroff, flui MyrrbiJit engujlintibm Breynit Breyn. Præcedenti in omnibus t unite ell, mii a nod Floris ad purpureum obl>ctum in clicant colorem, /</>7vt in Ijou rias plura 'lo> anguliorum nonnuoqua uorum poicu nugii purpu^sct.

11. Gt*juum netlu okitt /Ethiopicum raJice txbtrefa, Af>»iUgue :>liu Breynii.

Hi'haber tuberosa nificr Au aze riz; nec plura de eo a Idie. Cohcur in borto LcydsjdT, at a D. w h abca.

15. Geranium t/EihkfUum MynbiAit /die, fare magm friato Brejilii.

Pedales & cubitales profert caule, hirsutos, partim viides, partim rubentes, gonis J.itos, ramoiosj quorum articulorum juncturis pinnæ dux cartilagineæ annexæ, & folia longos pediculi lubhi luta, plurimis segmentis divisa, crenata, & per oras aliquantulum mbjjitJ.i, t.ijcem ujedwni mter Gerani Apali Coriandri folia Cal. & Gerani trifidi Corn. folia minora habentia. Pl'' in utn- ixllap-iiia, carru, speciosi, fibris purpureis insigniti, folia quinque amplis, 2v innun'angiifta con- tian, & calycibus longis, hirsutis, qttunquopa tutu exsertentes: quibus Fructus rostratus o: Jeraai Gtra, u Apali Coriandri folia succedat.

Omnes hæ Gerani species à Promontorio bonæ f[wi aJ D. fl* vromgè transfuisse sunt.

16. Geranium fetidum Park j&tronji ftiitcft £raii 3 bill.

Folia emittit aliquam multa i. viniis canclencw, m tanae lacinias plurifariam dissecta; è quo- ruin iutlio iiuo trelre UU&atTi exurRunc ti nucis, l-Iitti, .id rv > los folioli paucis, exiguis vestiti, tres quatuorve fere: rutjufailf • rubentes in fummo gestante- aiiioium (Geranium similes, in hortis no- stris suavolentes, vjiuni in cftlidioribusregionibus, ubi sponte oiinir, graveolentes. Succedunt se- miva oblonga ngidi. JR<<M lte in terram descendit, colons esreriis mbenns., inicrltis albi, odore graviort! It ingrauoere qu.im vei folia, i el flores, & in multa capita dividitur.

Ad ille montis Lxf t pro^c Mon^cLuni Ipoite ortur, referente Parkinsono. A nobis quuJcin ibi fmfr.i quxfimm : verum D. Alagui Monipelitanis M.D. Rei herbarie genouissimus collegit Scnobisoltentiii: unde 8t t rificatum habemus ex dono D.Zutcbtr Dam

Hinc pUntani Lobelms in !• rpium Illustrationibus describit, Radiam iUi tribus crassissimam, rLbro-nigricintcii: l''/w palmaru, p.mim villofi: csttliculu palmaics: ^tr: amencæ oerulcos, linzo- lisp); nima oblcunior ibui iliffiM ctos.

Oiloreni haberequaleni rubotaneufflitbliunl acu longiflima (kprchsniic D. Magud, ncc ta tantum fatere ut lipothvmum inducercvaleat, heucdicat * LoUshn.

A. 17: Gramwm Robertianum C B. Gi;r. RJeertijtuun iulgrjt Park. Robertianum im »;wm;e J. B. E) rto Hol'Ert. RebvrtiMatm 4 rubare au'tum & floram ,!• Jam creditur.

J. B.

Obvium Tiilenbus Ger.iniunt Robertununj raJict Knui, colon ff cWraJis & cubits iros, rubo me cirui a ram, raniotbs. Fein pan , ix fero il ftringencCj pcrab, tj c

In veteribus maris, cais arboribus, aggcii bus leppu i & locis nulcratis p.ifEni provenitj tota Qatfi ibreni.

C Bauhinus, quique cum Ionuitur Parkiffonus nofrjrs, altcrum hujus (pectem confinmmt. Ve- rum A*x .l Lobelio m Aitv- allatar noftro judicjonon fufficiunt ad fpecicradiftindam art; nendam; nec putamus hacten- iuf inventas aut ddenpus JLU; pocios. Certe C. B.uihimis p't perain ^c sine no- cessitate ex... "•Ari]jlicat, ium Geramini 4, •nub. Gruioalem Dod. Lugd. Ghrani Aemmo- nis folia rucanda speciem VII. facit sub titulo Gerani batrachinida, CeUi grwi Geramiorum, & postea eadememmet nomina adhibet pro Synonymis Gerani sui Robertiani alteri...

Geranium granale J. Bauhin, cui eadem synonymia accomodat que Casparus frater Geranio Robertiano alteri, Gerani Robertiani species esse non potest, cum folia et Pedu columbini attribuat rotunda: videri ur pooi accedere ad nostrum Pedem columbinum folii lacie

Valde vulnerarium est Geranium tum columbinum, tum Robertianum, urn porionibusvt i nera- riis iuuitiini, qu im externis applicatum. Flum m l.ngnims iit, i ffrunq ue Ingiuncjn coagula- turn resolvit; vulnera quoque & alo:r* nuiodtticUj ulcutum v ellice & arenulas pellit, colicos do- lores sedat, autore Lobelmo. >xochim in rino ^trlitricos dole res lenit [in fomentis] Ad herni- nam & rupturam commendatur.

Ufus est vulgus ad erysipelata, ad or'i, rummarum & p dendorum ulcera & ru[no]a. Rard in- tus afflammur od fngularitatem. F... ita poffe à qui edat ales volentem, te- ter & ingratis cubata.

Simplex

Simplex decadem Geranii Robert, nummis. unciois apheatur lijje nan mk-lta luccflii. f. HiU.m. Cbirurg, Retirum est mihi do cantiofa quadim uniaira h.iborc folatmm m dedore abaqu hujns. C. Hofnitit. De Mtd.Offi.

Decadum p. flores prabeiu jumsati* aueiui mingciuibus,

§. 3. Geranium folio circumfcripiicne fit Brotundo in »i>n»uUts tJmtHfpheetibus ad ptditulum fjrc iaaniate.

A. P*i*. Geramum cehtmb'aom maim jt<r< nunert, arules. If|t greater bictis flower d

R*a*ix alba, fimplex plurimoy caulicules tirnJit, uifirmoSj & Ierè procumbentes, adcrantales aut longrcs, ci jffiuafioj cretes, gcaiaiLitOij bi-cvi id: notum & vix confpicta lanugine hirsutos, non-mini interdum rubentes, mufto urnea minus quim vulgaris cinles. Folia Malva, altis tamen m-ciUj & inpWa Igmenta drat.: longis p pediculis nris, brevi lanugine ad tactum mollia. Ad genicub excurt fivuli hinc. ecfjntes flores, fus fingulos pediculis uncialibus nris, parvos, pentapetal", ex cornico diluto purperantes. Refola flocaulis succedentia vix lamencialia. Semina quina, jil bi(in roftellij fus fingula loculamentis inclufa, ut in reliquis omnibus Geranii, per maturitate) fufa.

Ill locts rmltratai 8c gU: -ofo fepiuntIjuu.igg-ctibus prova me

Locu.

A. 19J Gerxnm wlumhtnim Ger. columbica <um-vulgare Park. folio rotunda multum ferr. »y1 EM

Ctn#6iIL

Cum priore convenit radice alba, fimplici, furculola, caules eminentes plurimos, in terram reclinatos: Folia malvacea, in plura segmenta [septem plerumque insigniora, aut saltem quinq, etiam in (uinm cauLb] divisa; Floribus pariter, ut in illa hinc in eodem furculo, seu communi pediculo, nec unquam pluribus prope immittatis caulium & ramulorum ex adverfo plerumque foliorum fatis. Refola paria; semina fusca similia sunt. Ab eadem distet. 1. Parvitas sui. 2. Hirsutis caulium & foliorum: Calyx praecipue lanugine molli, albi pubescunt, nisi quoque parte multo magis rubent quam illis. 3. Floribus multo majoribus, & hilaris purpura nitentibus. 4. Surculis seu pediculis communitatis flexis sustinentibus plerumque brevioribus. 5. Folia minoribus, mollioribus, villosis, longis pariter pediculis fatis.

Vere floret in glareosis & sterilibus, non raro & ad vias & sepes.

Locu.

*10. liujm ji-tntm miarcm mafuti fitt, l<:- fexum bifida proponit D. Magnol in Botan. Monip. 7 fepiunt wntiam circa Men, folios, a qui fuiti difco-guuit ciim jiiird.

A. 11. C Geranium columbinum majus defoliat folio Ger. emac. malvaceis laciniatum fiv columbinum alterum Park. An Ger. Malva folio II. fiv columbinum tenax laciniatum C.BP Malvaceis fiv columbinum tenuis laciniatum Park. Dodes loct Craney-bill, Uutf jagged leaves.

Caules hinc infirma, pedales a it cubiul, ramofi, folia per intervalla longiora ex adverfo hinc vestiti. Folia una & que e radice excurt pediculis longis [palmatis] infident, darioza quim precedentis, minus hirsuta, altis in quinque lacinis ad pediculum fere divisa, ut in Geranio bathriades. Flores ex aliis foliorum excurt hinc simul in eodem communi pediculo, femeligitto brevior: at pediculi privati quibus finguli flores infident, longiora sunt, & prope horum lartum airvi,uti:: hujus generis reliquis. Colore florum p purcui amoenus, nullis lineolis striatus; Ros (Iella noiui nil longiora quim in precedentibus iludub! vataik Ieniinalta folia nou t ulque convergentes occulcent. tenu cu JC tn aliii, pulU. nrisque Geranii. Semina fusca seu

la boitarum ambulacra, arvia rec Jaii, inq palium stralioctha & ad sepes, locis pedestem glareosis oritur, & aftar fibret

Locu.

11. Geranium granale folio tenax det. J. D.

An eadem species est, aut mihi nondum cognitum. Repugnat quod fives Geranii Robertiani paulo majores esse dicat, cum in hoc is minoris sint; folliculo etiam laxiore notio. D. Magnol in Botan. Monip. Geranii columbini speciem ponit, quam majorem, folio tenax defoliat, pedale bifidus appellat, quam in omnibus convenire dicit descriptio Geranii praedicti granaliti J. B. nisi quod in illo petals bifida sint, quod forte a Bauhino non fuit animadvertum. In partibus Lrora.

A. j; . C.,;ium, columbinum defoliat folio, pediculis florum longiora.

Tota planta abqu into jW> not est quim precedentem, folio viridioribus, calycis segmentis triplo quim illius amplioribus. Rostris longioribus. Praecipue vero notabili est longioribus pediculis quibus infident flores, palmatis interdum aut rarior. Planta est aetna ut precedentem.

Loco.

tianc liwciem primo nobis oflendit Jacobin Bobertus Oxoiux a ie inventam in agris araimja- ceitibus; pollea & iplecopjofcimbfcvmiinagro Guuiaiio circa vicum SwanUj non procul Der- ferdia: Poitsj mccllai a D.GteJjero pridsm imxnum in Southampton!* comitaiiu locis plu- rumk

A. 14. Gtr&uum cvlxmkmumMmaximumfJli'u Mjftlit D-Plot. ctliaalimum mtjxi f*hi\$im'u luv- gu,ufpit * & ftiimlum in qja D. Mont"

ft J

IL. c folia qu.: primo exeunt non rotLnda Punt & finuata, ut pKCdientiuinj sed uncialia & le- fcantialia, ad pediculum ulque divifa li tuntuivirentia: omnia peniculis longis infident, funtque multo quam hujus generis 1 clKjtioruni m jora: inter quz caules exoriuntur, digitali fore crassitie, al- titudine feiquicubitali, propemodum erecti, ramofi, ad genicula in nodos prodeberantes, & folis con- fimilibus amplis profunde duflectis, ad fommitates conferti, vultui: inter quz flores breves pedicu- lis, lulari rubore micantes, quam precedenta majores, exiunt.

imm.

In feptibus propè Marfhes vicum, & in calcei Bodleyenfi extremitate Oxorao proxinu copiosi oritur.

A. 2J. Grrmmwm ft: utis Ger. CdUC. Park. Uadum j.B. UcdumftxaisU C B. Shining ^tone fr.mro bill, 0: jDoDrji foal.

Radix est minima, parum flavicante, interdum vix humo herentis. Folia in pet 10U rubentibus fibrotunda, Geranii columbini amula, ex ,1:, j o.'.....; mtrtiim coinipalbdiorc] ptdchri !u- LiQiuii ict* lenipcr tn- partita divifa, rotunda creta per ambitum incifa. Cauliculi multi funt, locidi, rubentes, lupum ferè, pedales & longiores, in varios ramos divifa. Flores Geranii Rubertiani floribus fimiles & pares f.: F. Columbea rectis minoris, rubentis potius quam purpurafcentes: quibus breves admo- dum, nec rigentes fibroriantur cornuculi five rottra.

Loco.

In locis faxofis, micis & maceris antiquis, umbrolis praefertim, fponde & abundè luxuriat.

* 26. Geranium tuberosum M>J.B Ger. tuber fum vel bulbosum Park. parad. subtrajimm>jnt C.B. ?2>n boufs, 0: ItnoMfo <canr.s tuil.

7 B.

Nomen invenit à radice niberogj GiblivUa, iniipida: cujus /#/ii lemipalnuri & palmari, Cibir- fano pediculo donata, lata funt, divifura octoni novenave ul ipliin ulque pediculum, (inguhs fw- lenrlt minutis diflecta, colore ex viridi canefcente. t*' » petUlui aut ilcior: fiEvo in pctioli* terribus fibrubefis, ac hifuta pulchra, purpurafcentes, ex quinque folis in fummo divifa aliquan- tum, interiore purpura ftriam, & circa margines nonnihil hifuta compofiti. Circumferta autem funt foli quinque eidem folia acuminata, intus nonnihil rubefcentia, glabra, fons virefcentia & hnu- gipola. Roftra tenuia acuminata. Radix de fe fibras undequaque emittit, quz ad interi illa in tul- bulos extumefcunt, qui brevi folia & caules emittentes, à matre fe emant: me 3c plants none fiunt: unde immenfa fe propagat huc fpecies.

Loco.

In Illyrico provenire dicitur: Junio & Julio florat.

* 27. Geranium radice gramifia C. B- i>ll'fem Vmmtt, frvt grnnvf* rdJut Piite fiffhedtU radice J. B. bulbosum FtiMjct Ger.enuc Cubrrou^ roorf b Cwnf^itill.

Claf.

Radice habet ex multis parvis longuifculis bulbis o luftantem^ vcrfiis (iimum fibratunij necnon ab imis bulbis: Caulis cubitalem, geniculatum, juxta radice: & genitula parum rubentiaii. E fingulis gemulis duo folia longuifcula pediculis nitentia, in quinque praecipuas partes diflecta. 91a- rum fingula in ambitu inaequaliter incife funt. E fingulis punctura juxta foliorum exortum quinq, folia macronata exoriantur. Flores in fummis ramulis conjugati parvi pediculis infidentes, rofici, pentapetali, colore ex purpureo rubefcentis, Geranii harrachodis vulgaris floribus fimiles fed paulo minores.

Loco.

Ifi O#u)ia provenit agro Hafnicnli, imdcTurnerus Ou fc attulit 6t dono dedit.

* 28. Geranium tuhmfz mmm Ci a C B , n O ^ « « * Csm^rii Park tuberosum mdu- mum f, B

Est folia, fufculo & tea ,'«« vujgaru VtJ* columbfu attamenniiiltomijius: r*i_kt Avcllanz magnitudine, i'otiuuji, tuba < a, mullis fibris, fed vduii acaabulis aut oluilis c parictinis ilimcentum hauriens.

Loco.

In murorum rimis nafcitur. camis dubi herentes.

P,«cr Caroorarum nraohujus racmiju^ nec hjbenuis quod 6c co Ji-

* 29. Geranium nodosum C. B. Par tillUtti d Craney Bill. A. M/J/SM P^r<w Clui: Ger. enuc wugmm fuis trifida J. U

Claf.

Alisquot à radice provenit folia lata firma, in quinque laciniis altè divifa, inter quz bini aut tcni affurgunt rosas pedales, graciles, ex fulco purpurafcentes, geniculati & nodofi, bina ad fingulos no- dos feu articulos ferentes folia, ex adverfo lita, in tres duntaxat laciniis lecta, orande è medis ali- longiores pediculos, in quibus bini, intencam tres quamoveve feres fimal nafcentes, quinque folis bi- folia (ut Malvacei) confantes, purpurei coloris, fed quibellam fcuratoribus venus diftincti, pro-

tUbc: ante

mberanre in medio rubro *umfane*, fummo tifhgio in qtnque psi... qai in loiiuifcutam inde
Hum traniii, *qitti* & ints... *xjOsfemat* continet, "laniricacc, ut inreliquis
ganerikus, M>tte usilions, *fMix ivxloli ell* & ganiciuara, aliquot pmerfta fibrts <lo: 22.

N<s *iunc pUnraro Iponte provenicnrcm obfcrvavninis* in DelpruiutUj cuiido a Gratianopoli A Lema.
ia fcttMtst ixthHfl't ad (cpes.

o. *Gtrmitim argtnitmn rwntu fia'.J: J. B. ar%oen: eum Alpinum GB, Ger. ar^oiitum Alfv-*
nu Ingiu raJicatum Pwx l'ark, Etart:lratoft) 3301111 ttUn<Crilll*0< bill.

*Kiidite** procmic tubcrofatrij longain, reft... in terran\ defcndcmeni,, fiirtum versos t:rrsc fupcr-
ficiem in bina ant terna capicua brachiatam; ex quorum fineulis extliunc quin.i fcaavc/e/i*, ton-
gillimis pediculis intentia, in cjtuius lacinias prxcipuas ad pcoiculum ufauc fiiiia calique trirariam
vera:s mucronss ictftas, molli 8t incana lanuginc ooduft.t. A *geranix* oolorc. i autz folia oriur
pediculi alit, iongi, in faffigio luftincntes flores binm tem6ve, lam amptos, ;> talis quibus bifidis
conflanrcs, pallid^ rubris lincis notatoi. In medioapparent fl.iniin.i cum !*lo. *Raftra* brevia fime.

J. Bshinus aWtudinemci afcribit palmo poulo niajorcni; tolia parva&i qua- pollids artjeulo Ie-
gas: florem purpureum.

"Nafdtur Alplnts rupibus mnjorismontisBayi, Onente;; *alpien* tibus, acibjpaTtri flora inirio *Ltau.*
Junii, (crnai calentb Augufti perhcitur.

3; *Geranium hatrna* *altes abo: eum C. B. batrachoides longius radiatum abratum J. B. batra-*
chouli ahrrim ion, *in radiatum Lobelia Park: batrachoides longius radiatum Ger. Rong-*
raatrb <Trototoot <Cr.mcf lull.

J.B.

Spcitabili riorum amoenitate nulli Geranio cedit, qui ex calicc globofo, friato, rubenfc hifutoq,
odorati emicint, purpuro-violacei, c quinque foliis conjKjliti, liirredo Itaminum purpnvaicentiLim
altiorecintinno, in caulibus geniculatis, dodrantalibus cubiro altjoribus Interdum, & : *alutis. Folia*
djvifura qtiodammodo SanicL-j c. virore incana piloia, odorem fpirnt non Migratum, *RJHIX* ob-
lique afta terpir, longaj minimi digin a *affidulinc*, fibrts & geniculatis tuberibus Sonata forit *rubens,*
inte:. alba, cum aditnfione valit.i ncfuoqtud aronutiti guitui' *Ilerens.*

In iurtis alintr, verum de loco nacali *Nkm* Boranja> nec nobis confc.it

A. p. *GiTi* *in batrachoides Park: j Mtm,itm Ger.fengtontxm maxtm flore C. B. fanguineum*
fit> t hjrmjtaci ertffa rsJte J. H. Bloudy Cranes bill.

J.B.

Craft hzret M^K« multis longis, craffutculis appendicibus au&a, mbrij [aliquot fibrts donati,
novas fub terram propaginei fingulis annis ad latera fpargms, qiix non in. do fibras fimuliter
agiint, (ed ctiatn craaionbiss radio *bus interdum lele firmas\ CrnHts* cmkni plures cubitum altos,
rubent<, liirliitos, genicuJatos III *micis* alas divilos. Ad lingii]« |unduras bm.i nafcuntur *folia,* cir-
oimcriptione rotunda, fed in quinque *lacinias, tri:.* is plurinur *is,* ad pediculum fere diffecta, hir-
i i, fupcrnt virenaij; (ubtus cancltentia, iicco 5: adJrringente iapore *redita. Ex* fupcrioribus alis
obJongi nafcuntur pedicul^ unicuni fut *guj)itrm, b;* I Geranngenera m
niuin, Cifti mariitron ferine parem, colare - *elegant* r *is* *ibro,* cjuinque foliis comaotlntra, decera in-
ms. *fchmnihi,* qui tctidem [quinquet] I *marvoti,* *is* *ibros* *foliis,* *ibros* *marvoti* *foliis,* *ibros* *marvoti* *foliis,*
I incur. *Kqltra* (b)qriuritur pentagon. (*mtn* inturnfcrib: *utriculis* feu *torulis* continencia, quod
nuturuni cutii; *onita* exulat, *circumvolvendis* le *utriculorum* *macronibus.*

In criccM Sinionre; *is* *condus* *fylyis* & *damicos* frequens occurrat, alibi inventu rarius.

Lcm.

Hujus alterum genus fimili flore, difparibus tamen folijs & Batrachoidis Geran. f. lionun potius
zmulis invenit *Cl* iliusadprai *ocum* *marginet* & *inter* *sores* *pro* *pe* *Norimbergam.*

In hortc. Leydenfi CO&OT alu adfiuc Ipecics Geranu (inguinei, quam *Geranium fanguineum* *cas-*
tieulii £ t vocant.

A. *Geranium hxinai* Jii Laiu* Jlrnfe fart tltgcmtr frittt.

Cum Ger.uio brautode vulgari ui omnibus convenit prAterquon floris colore. qui albus est tu-
berit & \, vanegatus.

In IndJa W.thnc^* Lancaftri.i: adjacente a D. Lawion inventa eft, Si D. Newton oftenfij folo. *Lema.*
•ircnolo ad nurii linis tui *ema.*

A ^ *Grrantum batrstboitla* J. B. *Cer.^airMiLoiJv five carutt* Park. *btrrschiaJa Gratu Ott*
Germanicus' LJitiu C li, <C;otuloor f rantri bill.

Radix ci *cralla,* oblique acta, *rubenti* coitice *tecb* *intus* *buxea,* *ras* *crallie* *fib* *emittens,* (a, <)nt
ama n K aaitnngciKtt. *Folia* inde *emigunt* *plura,* *pediculis* *dodrantalibus* *nixa,* *circumfcriptione*
rotu *ida,* *Atonici* (inilia, in pi *obundas* *lacinias* *divifa,* [*feptem* *infigniores*] ad *pediculum* *fere,* *vani*
profundioribus *ru* *goia. Caalti* *tenaet,* *poic* *im* *aut* *cubitum* *alti,* *teretes,* *brevi* *lanugine* *albicante*
oblid, *qucnudinuduiii* *taut* & *folia,* & *fit* *m* *idiculi;* *fiiii** *ntdi* *quoadulqvn;* *in* *ramo* > *dividuntur,*
ubi *dao* *plerunqz* *folia* *adverta. Caalis* *in* *binis* *ramis* *divancatur,* *linguis* *deinde* *rami* *in* *alios*
bind. Ex *angulo* *unifcopalque* *divaricationis* *exit* *furculu;* *duos* *tret. o* *flores* *fulmineis* *amplos,* *pen-*
tapetalos *ex* *oculo* *purpurafcentes* *fiturafionibus* *lucis* *ftriatos,* *petalis* *tubrotundis,* & *calice* *pen-*
petalo *hiflito,* *ftriato. Scedunt* *infra* *brevia,* *cralla,* *hifluta,* *quinque* *ad* *bafin* *loculamentis* *oro-*
nbuli' *longu* *circumvallata,* *itidem* **w* *na* *oblonga,* *linuata,* *colore* *pulla* *contis* *mw.*

Loca.

In pratis & paludibus humidioribus non raro occurrit.

Geranium batrachoides flore variegato C. B. & Park. ab **we non i** differt specie sed accidentaliter tantum.

A. | + *Geranium batrachoides montanum nostrar. An Geranium batrachoides minus Park? batrachoides alterum Ger. emac? batrachoides minus five alterum Clus. hist. batrachoides folio Aroni C.B? batrachoides aliud folio Aroni nitense Clus. J.B. Pountain Crokfoot Cranes Lull.*

Radix hinc satis crassa, oblique acta, fibrosa, *sapor* amari & adstringenti: *Folia* Geranii fusci, longis pediculis inserta, in quinque, vel septem vel novem lacinas divisa, minus tamen profunde quam Ger. batrachoidis vulgari folia, molliora insuper & flaccidiora, minusque rugosa, utrinque hirsuta. *Caulis* pedalis vel etiam cubitalis, rotundus, hirsutus, uno vel altero folio densata antequam in ramulos dividatur. *Flores* in summis ramulis numerosi, quinquefolii, Geranii batrachoidis minores, coloris inter Geranii sanguinei & batrachoidis flores media, pallide **it. putpurci.** quibus succedunt rostra Gerani.

Loca.

In montosis sylvis, dumetis, sepibus & puns arn V. elluoclandici & Eboracensis co, iose provenit.

Geranium sicut *batrachoides minus* Clusius sic describit; Prodeuntibus e radice frequentibus longisque pediculis nascentibus *folia* proximis ut, Ranunculi platyphylli aut Aronis *Lyrolloni* paludis *flore* folio respondentibus ferè, rugosis, subhirsutis, in aliquot profunda lacinas divisa, deinde in ambu serratis, que postea mitio adstringere & linguam excicare, deinde nonnihil calcacere deprehenduntur. *Caule* cubitali ut plurimum, firmo, rotundo, geniculato, in multis alia diviso, quibus subnascuntur *folia* superioribus rursura, patensibusque lacinis divisa, penultime tamen in ambitu serrata. Summi rami in oblonga pediculis *flore* gestant quibus, folia consistunt, Geranii batrachoides quod in Belgicis hortis alitur floribus forma parvis, paulo tamen minoribus, nec ut illic coloribus, veniam ex purpurea rubentes, decem staminibus cum stylo ex umbilico floris prodeuntibus: deinde oblonga erectaque rostra, non inflexa, aut inclinata, quibus utriculis ad oecum basim surgentibus, & semen continentibus, quod maturitate exiit, aliorum Geraniorum more. *Radix* superioci [Geranio pullo flore] ferè respondet, & summa tulle in plura crassa, internodis rubentis capita extuberat; que fibras etiam agentis singulis annis augentur.

Loca & Tempus.

Crescit hoc in Pannoniacis Sarmaticisque Alpibus, nunquam **"men abtkUn;** nisi in illa supra Garavito in horis autem Maio.

Hec descriptio in plerisque nostræ plantæ convenit, nisi quod folia rugosa, profunde laciniata & minus hirsuta faciat. Conferant inter se diligenter, quibus utriusque copia facta fuerit. Huc pertinet est & fortasse idem species Geranium batrachoides alterum flore purpureo Park. *parad.* Verum si folia (ut ille describit) in plura lacinas & profunda incisa sunt quam Geranii batrachoides vulgari, h. e. ad centrum usque, omnino oportet ut specie diversum sit. Autho nulla adfert Synonyma, nec an nondum descriptam poterit meminisse.

Ab hac denique specie non multum differre nobis videtur Geranium Moscoviticum purpureum Park. quod tamen ob soliorum maculas ad Geranium fuscum, aut Romanum stratum, magis accedere merito censetur.

35. *Geranium plus* **"ft-** *Clus. J. B.* **sMst** *hirsutum flore ut rubente C. B. Ger. pullo flore* *batrachoides pul.* **Dushp Cranes bh.**

Cubitalis frequentissime ex una radice producit *caules*, firmos, geniculatos, virides, sanguinei tamen veluti guttis aspersos, lanugine pubescentes, in aliquot ramos divisos: in quorum fastigio ad singula genicula longi nascuntur *pediculi*, in quibus bini *flores*, quinque laciniati (geranii reliquorum Geraniorum usitatum formam) foliolis consistant, colore saturatus rubente, & quasi atro, medium florem occupantibus multis *filamentis* circumvolatis cum *stilo* prominente. *Semen* demum succedit in *capsula* mucronata (que maturitate ut in reliquis Geraniis distillium & circumvolvitur) fuscum. *Folia* illi ex radice multa, ampla, mollia, lanugine obducta, externa parte nervosa, Geranii *per gyralis* folia similia, quinque, lenis aut septenis profundiorebus incisis divisa, non tamen usque ad umbilicum, deinde per ambitum serrata, quæ etiam ad singulos nodos sub ipsis ramis nascuntur, minora tamen, atque subinde ad singulas incisuras nigricantibus maculis insignata. *Radix* etiam annis augescere & novos stolones producente.

Loca.

Invenitur in Sive Alpibus ubi sylvæ desinare solent, & floret Junio; in hortis vero in quibus felicissime provenit & luxuriat, Maio; quo etiam mense suis floribus ornatum in sylvis illis montibus Pannoniæ inter Dravum & Saviu sitæ, & prope area Interamnis cognovimus, observavit Clusius.

Geranium hoc à vulgari fusco, flore reflexo, quod in hortis nostris alitur, specie diversum esse mihi persuadere vix possum; ad eò omnibus sui partibus cum eo convenit præterquam flore non reflexo, cuius, petalis laciniatis. In vulgari autem interdum observari flores petalis linguata ad marginem & vix crispis. Nobis fastigatur J. Bauhinus, quem consule. Quis quod Parkinsonia nomine Geranio fusco vulgari folia floris ad margines nonnihil incisa tribet.

Verum non duas species temere miscuisse videantur. *Geranium folio fusco reflexo* descriptionem è J. Bauhini historia mutuatam proponemus, ut liberum ***: t c,** e Lectori iudicium relinquamus.

pig ;

The Herbis pentapeta

36. Geranium phaeum* (tore rfitxo). B. Gtnm.mmiaww [solum C. B. Geranium fuscum fiv mactr
lar, 1% Park. par.uL macuUtwmfivcfai'tnmG-x. JDlltflqitCtVHrs bill.

F. II.

Speciosum est apprimè hoc Geranii genus, foliis amplioribus quam Butrachoidis, in octo p as mi-
nibus legnuuiUj angusta n extremis, sed versis pediculum lata divisi, subhirsuta, nigricantibus venis
asperis, per a nbicuiv lv
alculis crevis conspicuis, nullo odore praedita. Flo summitatibus insidet
purpur
reus 8c pa*nc I
caudens ad florem Geranii folio odorato, quo inversè
concoquetur atq, reflex
hair: in medio sfittt. Florib
decidentibus rostra oculis i tir unculi
longa.

Foli.. huic ad singulas incisuras ni; ricmrit>ii\$ mi culis, ut n Ger. pu lo flore Claf. insignita -urn:
in univcrsum descriptio ritus apud
Clufium lr,ic uptime quidrar, ex -qris duntaxat dual us illis quis
liperis monumentis differentie notis.

Pl. nnm Kane in alafij no cacumine montis Jurx propè Thuri sponte ortam vidimus & collegi. Licut.
mus. Floris color in planta -;mni n sylvois montis Jurx cacuminibus observayimus, multo dilu-
tior erat quàm Geranii phaei, & p; purais p>xtus quàm fuscus: totaque planta hirsutior quàm
illa visa.

37. Geranium Raasanum vericoUr fivt firUtum Park. par.n!. Dnriobl f rripd Cranes-
bill.

P-ri.

Pufchro i tuc Geranio folia à radice fibrosa exeunt plurima, lata, pallide seu ex luteo viridita, in
q itnqa
<ar. l'aha singula ad singulas incisuras seu incisionum angulos macula atropurpurea insigniantur :
in verum folia integra tam figura quàm colore & maculis Ger. fuscis foliis simillima sunt, in so
> nni
at differunt quod minora sint. Inter folia exurgunt caules aliquot pedales & altiores, geni-
ummitatibus suis duos trève flores proferentes, pentapetalos, albos, hincolis seu
cil.ici ic nodofi, in ; nubus creberrimis, flexibus arcuatis sibi invicem occurstantibus, & quasi per
anastomoses junctis, pulcherrimè variegatos, ut in quocunque folio videri vix tot nervos discurlan-
tes invenias. Modicum floris occupat sylvam exiguam, qui flore delapso fit. vasculum fem. Wff. Radix
mulcts
> exifibn lutea cor iftat

J<- Geranium Moscroisknmp*rf*rtw* Park, pirrpif Cranes bill ci Mufcovy.

Folia hiberlata, in quinq, plurimum segmenta divisa, circa margines dentata, Geranii fuscis simi-
lia, vertiTi tanullo niinora, ad Gerini Romani itra. ia roaa propius accuectutu, led <•
& fmbuflam pincer nuai! nigricantibus. Ms id incisurarum angulos not.u.i. O</# ad btpedalem al-
itudinctn ailurgu, agnu'aula abquot •/trwwai
ilul. Sem(M iucaxJemu Rwiun) vericoloria femini!>usund!> majora. Radix in plura capita
dividit
ur quibm propagieur: verum folia omnu tiycmcamitut, quo i reltqais ton.: on:libra 'ilhn-
gatur.

Hanc speciem in Mos.ovia sponte provencicnteni Jecamtt Trsitfamtm primus in Allgliam i: milt. Licut.

;9. GtrMtum Bi.htmscum, htttti. luides amant.

Soriipedali altimjine .tlTieic Folia ton<ffirms mftdene POIKUIK, Gt. rani fufci quodammodo
similia, verum minora, pallidius virentia, molli & incana lanugine utrinque obfita. Caules in binos
dividuntur ramos, ad quos hinc inde apponitur folium, eq iplo divaricationis angulo pediculus lon-
Rjffilinus ext, bicornis, binos in summitate flores gestans, pedicellis prorsus uncialibus sustentatos,
purpureo caeruleos, saturatioribus lineis purpureis striatos, petalis latis, obtusis, crevis in medio incisè
binis & rdut cordatis. Flores delapfi relinquunc rap* uii -alia, crassiuscula, in microIMSacuUK
sensim enuata, per maturitatem nigricantia, quorum sales circumstant utriculi quini, ut in re liqait
congeneri ihot. turfudult, i ariter nigricantes, toidem femina fusca, manihula reniformia continen-
tes. Semine ad maturitatem perducto planta ipsa radice exarefcit. In ramulis ad singulos
btna
apponantur folia, ex eorum autem sinibus pediculi alternatim exeunt, non hui oppositi, sen-
tum breviores ad summitatem usque.

Floribus delapfis tam caules sumis, tum praci pui florem calkesfKikiir: rubcfciat.

40. Geranium Alee < wftoirmflin Park. Gtrtan Sjtttn j^crwi Smln G<r.emtc.*pp.

Gooder.

Multa huic è radice exeunt folia, lata, circI marginddnu sta, paululum dissecta aut divisa Gera-
nii Cretici in modum, verum pallidius virentia & minora; inter quæ exeunt caulesi seu ramuli
plures oblongi, teretes, infirmi, pilosi, in alios minores divisi, folia pcedit similia gestantes, sed nu-
mera, nec magis divisa. [Parkinsonius folia Aleez Venete similia, sed magis divisa ei attribuit]
Flores parvi, Geranii molchati similes, verum saturatior purpureo tincti, quinque petalis parvis extremo
sebretrandis compositis. Semine parva, oblonga, pilosa Rostris Geranii molchati gemelli basin ambiunt.
Ridit oblonga, lignosa, perfecto Semine vigore exhumida una cum superficie extarifici, & immo.

Hec species Geranii Aleez seu Malvæ folio amovetanda est.

CAP. VIII.

De Geffipte fr: < Xyle.

Gossipium seu Xylon d.:[>]« est aiboreum & Lebaccum. Theophrastum lanigerz arboris in Xylo insula nascentis nomine arboreum intellexisse verisimile est, ut & Plinium. Errisse ergo videntur Botanici nonnulli ipsi, dum Plinium & Theophrastum erroris insimulant, quam Xylon herbaceum p. uerint. F
 certius vide apud J. Bauh. •oregrimm & incognium fibi Jhspem pro aibore halt [onun lea
 Xylon recentioribus Bombax & Cotoneum uellicio valent a mali cotonei similitudine. Ceterum Xylon tum folis, tum etia ididum est, ut R. indicam dictam refert; vasculo feminiali in interna tantum loculamenta diuisa, & mollissima lanugine candida seminibus intermixta auz adhaere
 nre replaa

1. Xylon siue Gossipium herbaceum J. B. Gossipium frutescens i itmutim Park. Gof. frutescens seminat albo C. B. Gossipium siue Xylon Ger.

J. B.

Breuis nax herbaceum Xylon caule cubitali vel altiori, lignificente, Lottke rubente Im t. to recto, in ramis aliquot breues diducto, folis virgineis, primaria diuisione triplici, Aceris minoris folia x-quantibus hirsuto, ex pediculis duas tresve uncias longis, pilosis. Flores diluta flavedine pallidi, & circum oras umbelaticque simam eleganti rubore purpuriformes, figurae florum Malva. Fructum fert barbulis quibusdam florem tegentibus inclusum, amplexudine Nucis Avellanae, per maturitatem in tres vel quatuor fragiles atque punctatas carinas dehiscentem, qui mollissimam delicatissimamque offendent lanuginem in fila ductilem, cui involvuntur semina strobilis supparia, tunero fragilique coevis, cui lanugo pertinaciter adhaeret, nucleo inter dulei. Ipse fructus uncial longiore pender pediculo, ex calice crassiusculo emergente. Carinae singulae singulum interstitium interne in m sui secundum longitudinem habent, quali ante matur: jtem in : ructus medicinalio coivissent.

In Creta insula, Lemno, inter Hierosolimam & Damascum magna copul feritur, ubi plenu agn conspicuntur, magnitque : ex ep fiunr rodirus. Sentur 6c hac xute in < ypro, Melita & Sicilia n(u. ls, ubi copiosissime prov: nit, qucnudmodum & in regno Apubx. J. S, In Catpan: ;[<. vatium fuit a D. Taur. Rom.

Solum amat tenue magis quam pingue; solum utique siccum, non aliter hbiturum Mditx ar-
 vum. Mirans huc hoc quamquam calidius solum est, fimo mactori ab agricolis & liberatori, quam solo statim fructificat omnia. Vere feritur, nec nisi probe madefactum, & in arvo statim restibili [illo enim agrum pinguedine ferunt] max aratum integritate erant, vel rastro quod supertrahunt: lio feritur tempore, & runcatione quadam inuvides. Libris liberatur : III II MI II II quam iarcuio. Dum vellitur tunc pluvia horrent J. B. e Quintino, qui plura habet. Certe insulae Melite solum ticcissimum est & iam calidum, nam tota insula mihi aliud esse videtur quam rapes ingens paucis terra coo- eta, nec frumenti ferax sed hordei tantum; ex A nisi, Cumini, sed praecipue Xy i proventu quatum uberimum faciunt: hapa enim t; JOO O n as anntuxini divdndunt fit in extera i regiones transmittunt. Carrara autem Mebantis 116. libras Anglicas a; iut.

Quod ad usum attinet, nullum Lini genus est quod huic candore & mollitie praefertatur (inquit J. Bauhinus) quamquam firmitatis in eo parum esse videtur. Hafluatuj tur autem nonnulli potantes Bombacem arte dealbari, nam natura candidissima can n Uvatur non accipit (quod nec i potest accipere) aliquid albedinis, sed e contra amittit magnam i partem nivd cmaonsj :ccas quam Larium, quod quo lapsus lavas eo candidus efficit.

E Cotone autem Canasia, femoralia, aliaque v cftes finnt; <i;us Unugine (uiGm hodie uiuiiun ad faciendas vestes, sive endi caloris ergo.

Quod ad usum in medicina attinet, Usta sicut sanguinis profluvia, & praesertim in vulneribus. Semina modicula tussiferitas & difficiliter spirantibus munitice auxiliatur; genitura n quoque auget, proinde venereis stimulat. Gloum e seminis modicula expressum lentigines, alphas & ceteras cutis infectiones delezj fulpebrau:ni tjuoque apenu tn lenit. Lumgo tcaea sa, & naribus subdita uteri strangulata avertit.

Aegyptii lanugine Kyli artxjrci (turn Kerbaceum apud ipsos non feritur) uffuwur Jmcintni pecu rum loco quibus nostris tantum videntur ad ulcera vulneraque : oninu (tm.mclI. Adhibetur & ipsa, ut no- stri faciunt ad fluentem sanguinem sistendum. Semina que ync macilagine ulis est frequen: illius ad omnes febres ardentes, atque venena erosionem ventriculo & intestinis inter JntJa Ad ient- tes ex acrum salisocumque humorum destillationibus plurimus apud eos usus.

Semina in Xylo herbaceo nobis observata Strobilis multo erant minora, & ordinatè posita, non tamen coherenta, neque nigra ut in Xylo Brasiliiano.

1. Xylon arbori -m J. ft Part Gtiptmrm trhert um caule lavi C. B.

V. J. J.

Ad decem usque cubitorum altitudinem crescit, stipite ramisque duris lignosis. Folia ramulis insident violaceo tinctis, que perfectius adacta quinque velut laciniis profundius diuisa reperuntur, e quibus tum inferiores duae, tum superiores & longior exiguo folis additamento anctiores habentur. Florem illum diluta flavedine pallidam, sec. (qui in vulgariore Xylo notatur) in hoc castore Gossipio videre non conigit, sed gloum tantum lanceum Pomi magnitudine intra viscidum membranam collectum, qui denticulata veluti saggemeris hescente, Gallica nre candidior fertis, in

auras elu&stur. Is intiore bombyc; maturior/«»rtM continua fufco colore urnbrofa, non uvanim
coiigeftu invicem conugiia, fed incenraUis fuis nonjliil dirempta. Foliis glabm a Xylo nrbacco
differt, adrwunce J. Baunino, qui plantain adokfcientiorem quam i Zuingaxj habuit in horto cav
um dcfcribic

j. %Un BraflUnum Jr B. *Erafiltntf&m; lufttms Algeim Mvgrair.*

Mzg

Excrefat i'cru in magninidincm Coryli, ligno niolli, corrice ferc ut Sambocus. F«tr« tneri &
niollia, fi p«rtus dil UK viridu, infenus faruranora, in cres lacinks Icda, quarum quiarlibst fuum ncr-
vum & venas habet. Hincin ia (olioh proti :un) & punclularA, finmlia fotiolis que
Awliwas virides c«ntant, prove- contains fia, qumque foliis Utis, cle-
ganter vi, interius in fi. t«bo tinguibes par lurtis, lubens in malio *fiamen* Havum, cub-ircub ejuf.
ocm colons tnCgnitum. Pofl Soran loquitur ovalc corpus Jiugnirudinc Pruni, uiu extrenjitare
acutum inftrar conl, Sc rribus Untis iiontum, & in ton Jem partes feparabile, viride, nigris pu:ctu-
lum CKtepu fperiac vancgatuni; quam-aiuem mannicrit fuicum ell, & (pome diillit in trei
panes, St c\ titwlibxS timm caplu] rum prominat albiffimum Goffipium, in cujus quotibet Hucco
oontinentur iq>teni nigri iruaus, in agnitudine fin u] rifheconim, & cjuUiem plane hgrur, fcb cute
fua mgra habemes nudcum caxnc alba BaTefoaro ooftanecoi, pmgui mltar Amygdak, dukb la-
poris.

J. Bauhinus *lupus fructum exactis describit his verbis*: L: In fitufu Rrana Juobus veriiias, qw» la-
luigo sjrlina vi *legari fimilis intercedit, diftin&ta, oblique per fuperficiem planam, fine ulla lanugine,*
media, inter ic incubitu (ilpoica^ oblongs rrtobiiwrum *farmi, n*
ia xylo herbaceo toto gr.ino non adhxrcnK, quoram extrennini jenicn *inora, nigra, glabra, bombace ut*
coctc: iivus cuncub mombranta prion lubjacens exalbida, mcJulhm oontmci *granum unum lingulare*
guejii, dokctn ut in vnlgn. Scinibus nigris, arae'jmiais feuconglc; *is candidam, pun-*
inanitsfc differ., ut non opus lit plurw dilbnftioms notas exquii *tratis a precedentibus*

Ab hoc .irborc diverfa videtur iJombax Indtea *Ten* haL* qu« caulibuteft *inofis, folia in fep-*
ton laooiai SupJudis igri* nxio dhrife; qmmvu C Biulunus cas conjunj; *et, & fub titulo Gollipii*
arboris cauJc (*quod nonnulli in fpeciebus aliis aggraviat* in nulla mentio, • S*U Le-
" nee, tit pnto, apml J .:ij tit ex noniinc Jiraiiluno *& descriptione appar-* tt, candem cum ^{"W)} ^ "f
MargrAvio pjancim uudligit. *turn*

4. XjUa Malabarica Cuiiu-p*riti d.Junt.

ArbufaJa eſt duorum ho:Tiintini alrimdinc; *raJta* pinniformi, corrice attacante teda, fibris
eminence, iHpic duos in *ambu palmis* craflo, ^njcccmmunicum *circulo in medio ligni. Folia*
font infUr ma nus m quii; *4iok* fo fl fco-uir: i' 13 & culpalata incifa, mediâ laciniâ lon-
gijima *decimdecim* utr *que proxima, crassi-* -n J] p n ^ d taAum lsnia,co!on? utrius ex viridi fulco-
toff U quijquec: viridi albicantibus lacini *is mcJHTJ^.-aircrKjbiis. Fierv* in fummisramulis praxe-
dentium iin *ules tum forma tam* colore, fed qui raagis ad virorem veryit, niuuo: *es ceteris, in averfa*
parce venci> *minis eminentibus striat,* iunime vcro.i *per, nuda quoq, fo crispant: in inferi* ore parte
colli, in *mbilioo tad purpuro'ilicuro-nibra* nocaâ fuir. E medio emicat / *iWalbtans, ix'nicillo*
flammulorum *tunuium& rubrorum, dpkibj** llavti fie In- *ularibus insignium circumdatus, fupere*
parte qui *upra peniulluni ciunct ilbit-uite* *Lalyx rotundus,* arcuus, viridi-albicant & punctula ex
itridi *icis no f* ns, ac ad *nfiatiorem partem t* ribus folis viridibus grandisiculis, oblongis, culpidatis,
quic iinguta quaniior vcl ijuimjuc oufptdibus *antenna* mneit *& nervis in exteriore parte in*
tongmn fruu ! *ant, circumamictus. Fiores ut in reliquis, cum per aliquod tempus aperti fuere, rubo-*
icun, aut in rubrop. *ficum colorem mutantur. Capulae feminales trilatere funt, & in fummitate*
fr«db- ac culpidate, lateribus *i* nihil rotandiola, viridi *dilui* *que punctula lacunofa viridi-fu-*
fas etfble, ac in a tip; *lla fulco striata funt in* itenore DI *arte a calyce ar&e apprehenſe conſtanque*
corrice *illo ac duriulculo, qui odoiis eſt iriftar fiii^us Mangat Indicx: in its rria'loculajmenta*
font per interfepiincma membranacca, qua: iuipia c medio cujuique latens oriunnir, & in mccio
ftylis itinolisLonairnint *r* uter fe diſtin&ta, continentia lingula in *le tria quatuorve femina, ac* den-
la filamenu camiila, lanuginofa, que femina arcibilime ac denae involvunt. *Semina oblongo-ro-*
turi'iiofl (mitj colnri: in cortice primum albicante, deinde fulco, nucleo intus albicante, ſaporis non-
mli.i ardenti & acris. Ex filamentis candidis Go lipiuii 00] *ficunt.*

In arenofis nascitur, & per totuin annum floret. L*tui.
Folia trita & cum *i*s. vaccz mixta in undione *capita* nilubica iomun concilunt, It(«u. *Vir-*
codem etiam modo ſedant dolorem capitis ac epu vertiginem. Fructus trit, & in aqua epoti flexui
dyicnturicu hdendu confauit, ſervantur ;ue pro tulu a

C A p. IX.

De Alca Indica diſta.

Hæ plantæ a Malvis quocunque nomine notis toto genere differunt, ſuamque ac pro-
priam genus conſtituunt: adco ut, liro inregra eſſet, patrio potius nomine Partii quam
appellarent.

Earum notæ sunt Folia Malvacea, Flos amplus, pentapetalos, fundo purpureo aliòve saturatiore colore tincto; vasculum feminale majusculum, in quinque loculamenta divisum, seminibus intus reniformibus.

1. *Alcea Sida dicta quibusdam* J. B. *palustris* C. B. *palustris* Cytini flos Leds. Park. *F. B. Ad.*

Folium habet circumscriptione Abutili putati, ex rotundo in acutum macronem desinens, delicatum, molle, villosum, & per ambitum serratum. Flos magna, pentapetalos, Malvæ rosæ florem æquat, oblongus in heca planta, staminibus in medio longis, colore præditus, ut volent Adversaria, purpureo, saturatiore quàm Prœnix, aut Malvæ sativæ aut Cytini. Juxta & in fœmibus cauliculis videntur tempore vindemiarum utriculi rotundi, oblongi, plati vel palli colore, Aristolochiæ effigie, prægnantis Snytnia ferunt, aut Milii colore & magnitudine. Radix hortenli Malvæ; caulis colorum dicitur.

Dodonæo fructus tuberosus, rotundus fere « « & » id, quàm I. angulori tamen specie [& in quinque partes per maturitatem dehiscens.]

Loco.

Cambranis ad trajectum Amelis fluvii propè Ar. fiuilaram in lulu oopTifflnum obiervavit.

2. *Alcea dulcis parvi flos* C. B. *Aegyptia* Clus. *Bamia* J. B. *Bamia seu Alcea Aegyptia* Park. *parva Alcea Aegyptiaca* Ger. *cinna.*

Clus.

Rotundo assurgit caulis, recto, virescente, sesquicubitali, cui inhaerent nulla crassi serie disposita folia, circa infimam quidem caulis partem Malvæ foliis penè similia, in tres potissimas lacinas divisa minus profundas, & in ambitu serrata: à medio verò caule ad summum in quinque profundas lacinas instar foliorum Sabdariffæ minus tamen alas hecæ, dilatatis videntur. Flos in alis nascitur, Sabdariffæ quidem formæ & colore sæpe similis, pallescentes videlicet, minores tamen sed non minus fragrans. His succedunt crassiuscula; longa pentagona, villis obtusa, & macronata capsula, rectè lobulatum eadem luteo, quæ in quinque per maturitatem segmenta dissiliunt; è quorum uniuscujusque rostro locandum longitudinè intergerminis paries enascitur, unum utrinque versu annexum habens feminum, Obobo minorum, rotundorum, cortice crassiusculo, nigro, crispo, p. lpi aliò dulci. Radix in aliquot fibres sparsa, non vivax tamen; nam primæ etiam primæ totam plantam corrumpunt.

Loco.

Alpinus frequentissimam in Aegypto nasci tradit.

Bamia Aethiopica siliqua decagona Clus. app. alt. capite tantum magnii aline, quod quatuor uncias longum erat, & decem angulis præditum à precedente forte differt.

3. *Alcea Aegyptiaca villosa* C. B. *Bamia* *istM^ytt* *Aegyptia* *Honorio Belle* J. B. *Alcea Aegyptia moribata* Park. *Ab el mosch seu Mosch* *in Veiling.*

Veiling.

Seminis odorati fragrantæ mollium provocat. Surgit à radice multiplex copiosè quatuordecim ventulis diffusis, caule singulari, amplo, succoso, cubitali mensuram altitudine consuetæ facillè superans, qui juxta cum ramulis sub rotundis, ab ipsa protinus infimè albicantibus veluti pilis hispida cancellis. Folia impari magnitudine, ad contactum aspera lanugine foliis non tantum majora, sed profundioribus etiam laciniis locandum oras, & frequentibus sinuosa. His flos succedunt circa flavedine docti, quinque in stellam divisa petalis radiantes, productis sine ramulis appendices aureos adjungunt. Floribus tandem fato rerum colentibus feminum custodes capsula sese proferunt, rotundum ambitum inducta nigra line obscurantes, in quibus illa tenuem suavissimèque spiritum prodigè exhalantia spermata conservantur, pusilla quidem, sed in quibus illa tenuem suavissimèque spiritum recurvata, leni amaritudine gustantium linguam imbecunt. »wi vwnip.icti, quuxque in lium utriusq.

Loco.

Juxta Aegyptos hodie tam nota est hæc planta. Seminis leviter exiccati pulverem Caoræ admiscunt, ut roborandi capitis, ventriculi, cordisque majorem acquireret efficaciam. Sæpius etiam intemperant salubri efficit, quibus limum tenuissimum Ambræ Moschive ulim denegavit.

Ab el mosch & simpliciter mosch, non bel mosch, semen autem asperatione adactis Hab el mosch, i.e. granum molchi ab Arabibus appellatur.

Cum Morifolium nostrum Abel mosch Aegyptiorum Park. ab Alcea Aegyptia Park. separet rationem non video; cum ipse Parkinsonius ear conjungat.

Mosch, i.e. Bamia molchata Alpino in Exoticis dicitur.

4. *Alcea arvensis glabra*, *Kami* Jui* I B.* *Alth* fntiux * f luf >Δi** *in versum Syriaca* C. B. *Althea frons flos albi vel purpurei* IrlT

Clus.

Francæ modo assurgit stolonibus lignosis, cortice nigricante obscuris, quali etiam vestiti rami in quos stolonibus dividuntur: his nullo ordine distributa adnascuntur flos angulosa, in paucis laciniis dissecta, in ambitu serrata, superne admodum viridis, inferne quodammodo pallescentes. Seminibus canis inualcuntur flos, Rose milar ampli, elegantes, quinque folis constantes, albi, quæ multo purpureo vix prædita sunt. Ungues purpurei floridore sunt in Sabdariffæ flore infecti. Ex unilico prodeunt multa stamina flava, & stylis albis multitudine.

Hujus flos (inquit C. Bauhinus) e rubro purpurealeunt, at vetustate ad coeruleum colorem vergunt: habent etiam flore candido.

C. Bauhinus (ut alibi diximus) Althæam fruticem 1. Clus. huj. cyronæ hujus speciem facit flor. nurore, cum plantæ sint tota genere dicitur.

Hæc est quæ in hortis nostris Althææ fructus titulo suo hodie colitur, ob florem venustatem.

5. *Alcea*

' f. Ahta hirtuta pert favo & f<mint mcfibato. Marggr.

Marggr.

Ex semine lato primo liireimt duof>liola Numimiliriar x,-ula, dein provenit caulis rotundus... parte vuidiSi all^ri. ruffiSj mikkmis, Los tfrcter pedes aim... pediculis qimCiorj quitirj, amctiaai icx dig.Jongts, birfiiti... illic. long-* 6c rocidem J.UJ, atque etiam minora: quinq, nervi e centro... mfiln venulis varie intdtexta. Ail pe... cum toliii nunorit-i, & in pediculo duos dig. longo flu modestus, magnitudine & figura fere flois... ut 6; -externis ubi pedicu-> inkknitur: i: centro flois est fames erectum, semidigitum al-... turn, fUvurrij LUI (u... quinq, petalis .anft.iii., leqaliquam longis, late flavia, ac flavis venulis... trihonum ante nieriitcmj 6c ll.itim .1 nii;-1... Stnirbinitum, iluos& lcmis-... in quinq,ue cellitas tiiltinL^Uim; in quilibet duolcum, cr&iecinij... ramulos & tiameni... Colitur in hortis. Sevi inquit MirggFj (eico AprilftS: floniit firw Augiilt: & Septu tihiri, 5c

ntlit frr. n, Aiwa: Vciicr Icu Malvsc horarit C bons ipci affinis Ec iimilis est.

6, SMartffa ftu AUta Amcm* Park. U*m/< sf^wa... SabJrijifa J. B. Alcea W... r<M Cltli. Alct* bitliii wagM (art C. B. Subilsrtija G or.

Caulis habet rectum, striatum, purpurafcenteni, lim... rem, fim... hint inde sparsa, intima serrata quidem in ambitu, sed non laciniata, que medio cauli inhaerent in... in... albo... plusmalius (uperni p.mcramoius, albus, I floribus valde fugacibus (na... itinc monentutj

7. Atti vtjteam* five Vntt* Park, ptrrgnu* Gtfr. vtfietri* C. B. Akta fthftfis, nmliu Vatt* J. 15. Ma'-v* berMritntlto.

Candidissimam sed tenacem, fibratam... & hirsuta, capsulimodi sunt & pediculi... Flors equam Alceae vulgaris minores, sed peregrina elegantia acceptiores, e i lu-... i nicilmiji occupat cuncol... luc ill... elator & erectior lie.

Quamvis nonnulli plantam hanc italicam... Unatamenin lulliooduo Ve-... t cam alibi qu.iiii m hon i quxivem.

8. Alcea Veneta Capite... fls, ptm Alcea vesivaria C.B. f. Douc-shallow, from the Cape O! MO& liopt.

Caulis erigit in solo latiore cubito lcm, teretcm, firmmn, I simlis rariocibus asperum, fl- a per... fingali exeunt pediculi. palmare flores sustinentes quinq, petalis amplis compositis, ochroleucos, unguibus obicure purpureis, flammula in medio pluribus, confertis, apices croceos sustinentibus. Exterior margo uniuscuiusque petali externe e purpura rubet. Calix flois amplus flans in quinq, nenta acuta dividitur, que & antequam flos aperitur, & postquam decida, connitent. Delapso autem flore calix in vesicam grandem, striatam, hirsutam, ut in Solano vesicario, intumescit, que /into... in quinq, cellulas fecu. litill lot" gradumem divisum, quarum unacuique duos... i per nuturitaem t\ caroled aigriouiv

am. it ecu vaillum quoddam, fohor::m anguJ... Ex alis fohorum ad latera pedicularum flores sustinentium elevant rami prope terram prelongi. ad humum reclinati.

Circa meridiem, splendente sole, vixit praefertim tempestate, flos aperitur, & post umra vd alteram horam verum clauditur.

Alcea Veneta flores habet punctatos, circulis albis inter se distictis; Africana purpureos, punctis truer ic non iti distinctos: observante D. Her... ntrma Botanici Prtrfcl* re Leydenis />. r. imer.

* 9 ,/!.-J fir: y6, ?Hii>£<>mi*L*fil*nuJtiIa, Cun^injiirs & AngiUnfhxt.g... Marggr.

Marggr.

In decem aut trium pedum altitudinem assurgit, caulis crasso, rotundo, hinc inde nodoso & rufus: pediculos protrudit varis alternatim positos, sex aut septem dig. longos, partim rufos, p. rciin virides, quoslibet sustinet folium laciniatum, in quinque lacinas sectum, ac toto a mi fr- ranum, magnitudine fere simile folio Ficiis, superius obscure, inferius dilute virens ac ibidem ner- vnrn rufum ac raras virides habens. In superiori- cau]c, in pt. licalis brevibus crass[is tr« aat] qu- tior magni nascuntur flos, quinque folus rosaces majores constantes, sulphurei coloris, unKuibus bnmo purpureis, qui intus & extus appirent: in medio stamen crassum, sulphureum apicibus flavis & summa: (KiniitB pur; urea. Fruita eius pericarpium est tres digitos longum, pyramidale, nm-anst!... re, n"tu mnturitati ridcum, con ft a ns aliw t^ parum glutinosi carne, mr. tice cras. r mltar Mali Au. n octo loculamenta longa divisum; in quovis duplex ordo seminum rotundorum marjnrrii; intiii i a Cannabis continetur, & quodlibet granum suo petiolo est appensum.

Pericarpium hoc viride odoris est: femints (osi, & sap... ur totum cum aqua & coctum comeditur cum oleo, aceto & sapere: quo immaturus eo melius ad coquendum.

Radic alba est haud magne mole, multas radicales oris fulxiuLts, ab Coquic... nta & mltar nu felli sapore.

Flore & folis cum supradictis Alceis In...

UH-

icis conrenit, fructu ,ib ctUem iliitiit,

* 10. Cdrcier-r^iaMC. B. Ctrchwm five Mtloci* j. & Park. Mtttli. i A... i ar« Gci. t).W fitJaicum rum-

J.B.

Cubiti.lij brsiterum ur- ic pbnt.tm obltrTJVT; flitii CynocramlxM • tum lcrata, que : uUJQ(. barbulam utriusque unam. ^brum tonRirudinc, ... >jta inu terum ^x- oroi corii. iLi(o quodaii ... um extrem. i in purpurLuni ctcincnrrfL miccas longe, striate stris tubulato, sensim ad micronem sique attenuata, in quinque secundum longitudinem portiones debilescentes, semen claudens copiosum, cinereum angulosum, parvum, guitu viladum. AVe*, telte AJpino, parvi limr, cro-^i, Lcuoois minors, quinque petalo latis, brevibus mucron -is comp'itii.

yfcgyou mdifpsijj di hzc herbai

In cibis mhl ell i • A gyprus ta... miliariu5, \ el gratis : tiecxiiMirtt enim IT: aqua vel pure .arnium- ex cjus tartKii elu multi male lo habent. . ruin paruni numt fit iuccuin vilcidum gignit, ex qu (u') difficiles obstructions incident qua cum in abor, coquantur. Attestatur Velsingus, in quibus, ^Z, culu n exdeai ta Melochi parata n wiminoplbecium 1,ijjt, vikului; gustu finam, nisi a multo, utltikT, fjmonum ltico condintiintum jeeeaat. Scmiiu'tunc in nuximojj ad Egyptios usu ad omiv affectos quibus tenui Altvce conJucere compertum est; habet ocujj! majorem visciditate. nis mucilago q, ini Ailux : pondere 3u (ampra copiosissime p. arg. mt or- uno humores. Est autem totius plantae, vel maxime foliorum decoctum pectori amicum, ipsum enim humectat, ex quo liccis alperisque tussibus praesentaneum cum Saoccharo candido est auxilium. Alpin.

••II. ^/«4 Jrvame* trherfnt (!" * pltuem+ttmJaH... ynu. Sclon Paris Hort. M.; ^

Brya.

Frutex peramoenus secundis... uc est, Ail perguj^^ andas valde idoneus, m Rofinjm excref cens altitudinem, qui compluribus obsequiis, ut... Ligultri i... ricatur v. nibus : perqw filia carnere licet longis inmtciM|... riculm, auriculas circa eandem habentibus, levia, tenera, late virentia, digitorum tres vel quatuor transverso rum longitudine latitudine duorum transve, crasso modo in ambitu dentata, Alcea junioris Syriace figura; at titminoriuneim consideres cum Gelsomii Indici flore pheniceo Ferrazii foliorum extremis lobis tam forma quam consistentia admodum convenientia. E ramorum extremitatibus & foliorum proximorum sode alabastris circa tempus floriferum germinare incipiunt virides striatque, longis sustulati petiolo, & a base usque ad medium folioli angustissimis, veluti cancellis ita oblecti, ut calyculos eorum geminos pure mentioque existimare possis. Horum alabastrorum singuli cum maturitate in quatuor laciniis deli- scentes, flos admodum spectabilem & amplum, Alcea arborecentis Syriace similem, petalis quinque, rubicundis constantem, expandunt : cujus modum occupat triuncialis fere flis, circis paronino in apice coronata, & ad imo usque ad summum modo multiplici foliorum lato luxurians, modo quinis quaternive foliis triplici, quadruplici aut numerosiore serie ita emissa, ut flos vel densissima foliorum compage omnino plenus, vel quasi tres, quatuor, ... faciliam intuentibus jucundum oblectationemque praebant.

Variat floris colore carneo peramoenus.

Utraque in hortis Indie colitur.

Satis convenit cum Roia Batavko-Indica MoJoru, feu Mtlv.i Eiaefcente Boitii, excepta niuld- plicitatefloris, quod pioaildubioacadentanum 6: individuate eft.

• Vi. Malva Rofit erhrcA InJica Park, Rc'd Smmfit Fcnarii.

E radice albida, lignofa, inramos (parta, numoiofis implexifi;uc fibris .n) fiuntnam nfquc tellu- remcapUJaEa«*A* pallidus, fimp1cx& tsvif, deque nubes lub ntedijinctusuoilbj aflirgir, lum- mi p.arte in rimos frondentes late exporrefios tlivifis, raatrcic Ficulna? ii star candida & camola. Folia per mcervalla biiLioppolita alcenio ordine cailes veftiunt, imgnitudinc pain pint: is, atuericjci: ficulncisj hgur.^ utrifquc, aut pot! ; AUIOB con lint ilia, icd tamen crenata, iu ipla ro- tum liciteangijlosac nnushabent: fupenore partunerbido virent itolore, inferlorccandicanc: ra- mol; iitunc), nervis ac venii ex vinui pallennbttis difti ngantur: lua ipla !tiinque l-inugine alpe- rantiiir: .fperif itidemcr.tflis, piilongis,ac l. ipe palmatibus, primo vicentibus, tum ! ; pefiotc pane pediculis (iubrubentibus nimntur: ante Solfit; im hybernium deflaunt.

Secundu a fatione anno non raro floret. Florum pedicali, qua praefertim parte Solem afpiciunt, fubrubicundi, niu i:alytiUis annectumur craffio.-cs, ta: dem pauduntur foliaceas in bellas, octonis denllvc virentibus ii que planis ntdiis Horunt calyces except; rto, quinis compa: ilcs & qualicnta- tps eminulis commilluria, ij-j.-iisquinqucpaniius, N in p itera formam oonihil linuoios: quibus in- tides ites flora ad Batavx ro& aniplkiidmem Tdc expanduti!, colore primum lacte: extimh fbltis lnnrnommque noruiullurum Otis (ubi ubentibus vjria Icric ioh- eum ramulofis nsqb tri)!antii, rn ipecioli, criplicffque colons viatlitudinc ^ccioliores, pnmo iul.!acta; Albo demde rubro. luereni- perati colons lunc; tandem purpui ei evadunt: de qua colorum mutatione fua rhetoricam Ferr- nus: qux tamennun ulqvx to fo infolita est in floribus, ut miraculo fit; cum & nos in Echii .or* pioidis&inPemelii arie Kordelcni floribus eundem aut fimilem obfervavimus, a colore ad ookxca tranfitum; ut in eanun hiftonis miwminus.

Variat interdum hie Hos (implici qtiinque folioruni (c.

Florii caput (eu globulus peditulo ailurefcens, inter 5 fiWm calv jam ar!..» foliaceas lacinas, adejuflemadulticalyasmagnitmlinem estuinidLB, eminulis pulvinorum tons orbiculatitn ftrians, canahculis in (uranu unique pane ftclhum in iigurani coeuntibus, aridi prxterca colorc folii, quieviridi inclinat inflavumdecoioratur, brevique libalbido piln hilpidus inborrefic Ac vero torus interior foDiaJus candicat: Sexdrdtei carinata localamenta [natura potiijs.ut lufpicor, quinq] intercuHantibusmetnbranubs Jilcnmiruiuu r, que ftrias inter exortat in dunticJam med- diam cartilaginem cocunt. Interfepta membrants con.ava pars lanugine densa longiuicula & can- dida pubefcit Pediculiabacufpisad mi adium ulque folliculum pertinet, cui matia cartilago adha- rcli.It; huic fmnv ipla numerofiffima, rufula, minutula, rotunde longula, modice incurva, & qu-i pane g&bum babent: aquali longitudine periculis albicanibus ac ttrandis, acurione fui parte liratum adiechintur. In uno tan- tum folliculo tria & fexaginta fupra centum numeravi, fit tn foculos five fin a pari tere numero distributa.

ScmdphupuxOccidentali India nuliim clt, m mine Fuyò.

Turn foionun figura^ turn florum cobre a Javan ca fuper is defcripu Alcca Breynii, Sc a Ma- labaricisproxinic dclcnbendis djlfen, ui ab omnibta (peciedivefUm p

" 13. Aletm Mddm* Abuttli f>li>, fitrt **}#*> <

Arbor eft excelfa, densa acilque frondibus, caudice hominis amplexum fuperante, ligno alba- cante moluore veh i Abert" o p rorum nullis venis undulato- hot nulli nadem molli, cortice Triu. Fe- It* pedolis loci is, teretibus, viridibus, tenuibus appenta cox& formam amulans, magnitudine unU> piimi lit amplius, i) obloie.i. & anguftam cupulem i roduAa, s. extra molli & folida, plana &c glabra, fiipt, rudiia Sc pauum nircr i, fubus diluora, tribus cuftris compicnis a petiolo ad margtinn excurenobuSj qitx in Tupina (cu .l. i vtriusq; folia parte eminent, fed in averia feu prona ma- gs. Odoic Bc&pore carene tuni folia, tumenam mncx Be lip. Fieri e foliorum iinubs exeunt, pediculltlongts, caHflanifonBCS, qui^m: pctJis ol longo-rotunda, calyci arcto, rotund, profiindiole & crallo, ex vuidi fuko, nureinc quinqucpant'. infident, color it es albo "arefcens, qui nonnibil ad vjrorem vergit, odons nuluus; pctau lupra fc in vicem convoluta funt, exteris ve- nil teu HUT vis eminentibus in longum friata, & ad idem lams in parte inferiore valde afpera, fiant- que ad calycem cradiob, ante rora versus tenula, raga valde cripa & contracta, & cum unguiculis versus unam parte m infls xa: inferius in collo feres rosi insigniti funt, poftea ombi undio filca, quinquefoJ rorum, que fingula in fingulis unguiculis foliorum diftincte notata funt. it. ij de medium OCCUp,It ft tana albicans, penicillo numeroforum flammulorum, tenulium, albicanum, quibus LLIII. Litis navis docitorum cinctis, fupra quem digito ferme tranfverfo eminenti tortuofe inflectant. Flores aperturam ex albo magis & magis flavefcant, & fpatio trium dierum ex fulco rubefcenti con- poft trahimruf &ccuiunr. i locibus deciduis capifala flavo-rotunda & pentagona in confpectum i vchii- unr, in calv^A flammis profunde demerfa, habent, latera nonnihil utrivium mifera, lant [uo per imercfpinwit' iu tn iuni' uitem) etnincem c rica futuram in duo localitatera divife funt, femina continentia oblonga, trilatera, uno lateis iotuiiuo, in quo a; rigitro lanuginolo cortice circumdata funt, coloris fpaicoco-fulca nu- deo n

In arenoln tulurur, BC per totum annum flo«s fe<< til' ere prore "fu / MI- Cai:; ula incia flavo- m gmntnolunt bij rorum, Geria i mitem, fipois incm Sc odons debillii ac fylveftris exidant. Lignum ad conficienda mthecorum inftrumentorum opercula ad- bctur. I>ha uikciuin (iutiuru (emunc ii* appl

14. *Alicea Malabarica*, *Abutili folio*, *flore minore ex all.* • *fijvffunt;*, (*xteri/it fubafver* : *Pa- rui seu Tali parvi Malabarici*).

Altitudine est trium forme hominum, caudice unius hominis amplexu minore; *radice* fibris capil- latis in latum se diffundente; ramis fusco cortice, internis viridi, toctis; *Folia* solitaria in petiolo medio- cribus, teretibus, crassiusculis, viridibus, superne etiam rubescentibus, precedenti latioribus & rttindioi ibus, pariter cuspidatis, ad petiolum oris per incisuram deluctis, tenuissimis cremulis per- mar, es incisuris utraque foliisore & crassiore, superne ex viridi fusca, lactis albicantibus lamiginosis & lenibus instar *Folmi*: [*Castz modiz & nervorum in folis discolorum videtur apud autorem*]. *Flores* in superiore furculorum parte e foliorum alis egrediantur, petiolo uncialibus, crassa & viridibus, forma & colore precedentis similes, verum minores, & in exteriori parte subaspera, nec tamopere se crispant accarur. *Stylus* albicantibus & subflavis gemmalis ses glomus circumdatus est, in summitate qua supra glomus eminet, nodo oblongo crasso, & purpureo rubro & valde fusco ex- tuberat. *Calyx* quinque foliis viridibus, cuspidatis oblongis, in medio costa eminento in longum striam, decem minoribus cuspidatis arché comprehensis constat, pede crasso digitali subacto, qui in- ferius diobis parvis, cuspidatis & viridibus foliis ad inflexuram petioli cui annexus est, succingitur. *Flores* delapsis e calyce erumpunt *Capitul* i oMongorotund.A, a foliis calycis; qux tum colore R-r- fics sunt, forme in totum comprehendi J, ptlisminari albicantibus obrita, in longum quinque lincl seu sulca striata, ac in quinque capsul« fcmtiales pc; membranatis intermisciis distincta. *Flores* tri ti aim *vitz* mulksaitnbusindunrur prodol oribus capis.

Flora

CAP. X.

De Melantilio five tfigella.

Melanthium, Græci Plitio, ReccmioribK NigdU & Icnutus colors ntgro difta, *foliis* ... niter diffectis, floremagno, conceptaculo ttiJeni lbunus magno, membranacco, in pfo- ra loculament i, quinque piurimum, Jivi(o₁ (Ingulis lucubmcnets liimma parte conucuUds, a rel:qnas pentapeta l dilUeur.

i. *NkvMs Sort m*im thru crnlto* C. B. *NgtU Damftm* jlerit miltlylici* Park. *Mltmh* ... **Double blue piflrlla, o: fnmci flotoct.**

Radix et *l.* ... *caulis* nodalis aut cubitalis, tenuis, teres, striatus, concavus, ... *foliis* ... *capite vel calice & flore majore plano* J. B. **Double blue piflrlla, o: fnmci flotoct.**

2. *Nigella angustifolia flore majore simplici cœruleo* C. B. *Melanthium capite & f* ... *Nigella sylvestris seu Damascena undata* Pa ... **erttmajtrt**). B. **k. Mtümtbuim . Damascenum** Ger.

Cam precedence cetera et arrant, *l* ... folo differt, *mi* hinc simplici quinque f<liolorum ienc onftatj c; cœruleo albicantium: modum occupant mult > *jim*^{TM*} **putni vindanrii*> uaiam pen- carpii rudi mento, quæ omni I ungit toiou ex bulgulis opercul tibus.

3. *Nigella arvensis serrata* C. B. *arvensis* Park. *Melanthium sylvestre* Ger. *sylvestre* seu *ar-* ... *vense* J. B.

Hinc cum Melanthio Damasceno magis quam cum ullo alio convenit, sed longè strigofius nata- les suos testatur, ad palmarem aut dodrantalem magnitudinem pertingens, caulibus modo simplici- bus, modo a radice statim, (que ramosa) lignosis, striatis: *Folia* Anethina, vel potius Damasco- nae Nigelle, sed non ita lata, rara, in tenuissima filamenta difsecantur. *Flores* stellati quinque foliis constant, colore cœruleo vel pallente, luteæ Nigelle floribus non majores, nullis foliorum tenuium barbulis ut Damascenum fistulo. *Hinc* succedunt *capula* Aquilegæ, quibus corticibus, in diversa qualem superius abeantibus, sed a medio ad immum ulque connatis. *Semen* nigrum, exigui odoris. *Per* Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem inter legetes passim inventur.

Flora

No« quidem aim psr iftas i regiones eregritureiniir, baax. pro (pocij ,! M^Umliio lini iteno
flora limplici dilbn^U non li i umms, I a qutcnui dit
mas, non iose aramadventians, an fouotis illi viridibus dulcibus florent calicis loco luffal-
centibus caret necne, quorum carenta differentiam pulquam accide icickm arj
Parkinsonus repertus in hoc genere tradit qu: Folia ilji viridia Ho em obrallantia obtineat. Cluina illi
[(> ,zico] non val Ic ili^Kmiljm fi tion candt m uvccam scribit in arvis poii demellia laperet, tota
Pwnc nu, Aultra, reliquique Germani 8c Bvlao.

- 4. jV/?i-J ./orf mmart fimylkt cafiuulu C. B. *Melanthium calice & forte m rr, fmine &£*<> & /K/«J. B. Mltuttbium G<r. NigtS* Remutn.. fve favea l'ark.*

Folia latiuscula dividuntur, hinc i iingtil.i interim PegmenM ailmurn litituiiinc non'«quent, medium
percurrente semper nervo, it iacis pedalius amlAut hxcrcn:. /TWI-J ra nocum exuemis harent lin-
u.li; ca, ex allx pallentes, nunoris quam oa ulei, e quinque foliis compolci, nulla apicibus r.u.
ium ocaipancibuSj *efaulaaqm* dngcnubus, qu^d delaplo flore minus quoque apparet quim in
Damasceno, qumque aut lex corne5i3 prxdirum, femine retatum angulato lato, vel nigro, glo-
rato.

- 5. *Nigella flore mature firm & «lh C B. Mtlmh'atm capta mure, fove multiplicata J. B. Ni- g illa peal&v multiset Qcu eirom fort »IU> mu. rplca Park. parad.*

Ex radice exili simplici cauda surget singulari cubitali & semicubitali, teres, striata, hirsuta,
inana, in alia divisa: alteram folia orantur longa carinata pediculis appenda, colore ex viridi
in luteum vergente, dividuntur multo latiore quam in vulgari *Melanthus, hirsuta*. Flores ex albo her-
bacei coloris, multiplices foliorum stipatu pleni, apicibus multo herbida, & pentagono hexagonove
apu e, in tota lem coraid la inflexa superne diviSo, quod iitcrauUnciboi i iuzme membrani ple-
m est fetninc nigro, odoramm vulg. ris

Ntgell.i latitblia rtjr« plaiOj quam m homilo nntro cnuimui feininc est cirimo o ioratOj cipi-
rulis minoribuj cuto seu membrana cratvire qu ii Nigdk Damalocare rectis, corncuiis primo
rect. 1 ailurgetihus, dcinde aji quantulum inflexa.

- * 6. *Nigella ihfptm* fort amp! Ger. emac. Hispanica flore simplex Park. parad. latifolia, flan Mtjore, fanfliti cxtltt C B,*

C. S.
Ex radi e tenui, oblonga, flavescens cauda cubitali, rotunda, virida & levis, in summo ramulis
CXMIg: folia ad radicem tenuissimè laciniata, in cauda vero aliquando in latiores partes, aliquando
inferiorum infl ar tenuissimè divisa: forte autem quam in caetera ampliores sunt, pentaperall, pe-
taloquolibet uigiam equante, superne eleganter cœrulei, inferia parte pallidi, venis elatis per-
cartantibus. Floribus succedunt *capita* pentagona hexagonave, dura, in totidem cornicula in latera
reflexa superne divisa, que membrans interne intercurentibus *femine* subnigro inodoro pl:-uLunn.
[Capitulum circumstant septem aut octo foliula cœruleo-viridia hians Park. Ger.]

- * 7. *N'arifj Crtri.a C B. MltotLta* ftmpbt flore Crisiana Clul. Nigella Crisna imJcr* ff mm Park.*

Claf.
I'quis prima folia Delphini foliis non multum dissimilia sunt, angustiora tamen. *Caude* dei :tds
brevis cinerogea, [cubito minor C. B.] paulo supra radicis caput in plures ramos dividitur, te rjci
& teretes, bipedales vel ampliores longioribus, valde infirmos & vix se sustinere valentes, quibus in-
nalantur rara *folia*, paucis incisuris præsertim dividuntur rursus illi rami in alia minores ramu-
lotj fji singuli singularem sustinent *flores*, in quoque folia plurimum dividunt, e viridi candi-
can'; in initio, ut *Nigella* vulg. deinde exalbida, postremo cœrulei nonnihil conspurcatis, micro-
mbus intcm ftnm • iudicatem retinentibus: e floribus modo exit caput in quatuor, sex, septem deli-
nciiscornua, inftav conivium hirci intorta ut in vulgari Nig. & in ambra frequentia *femina* viri-
diaquon; n *apices* cœrulei: infra stamina postro super ipsa folia expansa recumbunt octo alia foliola
bunda, pari distantia ab invicem separata, quorum pediculis cum lra basi cœruleis est, hinc trans-
verse venis fulcis; quod inter venas medium est e viridi flavescit. *Radix* etiam flavescit instar
Nigellarum, [longiuscula, tenuis, parum fibrosa C. B.] nec vivax est, sed hyeme perit.
Clavus plantam hanc *Nigella* arvenis valde similem si non i undent scribit.

- * 8. %fi a Crisna. lafstodtsu Park. Fwuv IuL »&* fmfha fan Alpin. exot.

E *radice* fibris capillata, lutescente, annua *cauda* exit singulari, tenuis, inermis, in aliquo
d vilis, foliis longis oblongis, in partes seu segmenta aliquot divisa, mox tamen, ut in reliquis hujus
eris, Fœniculi aut Delphini modo incisus, sed in laciniis multo latioribus. Senecionis aliquatenus
tumulus, verum minoris & tenuioris. Summos ramulos terminant *flores* singulares, albi, reliquarum
Nigelltru in similes; *capita* quoque similia succedunt, *femina* nigra, odorata repleta.

Pa.
radices hinc durescunt seu lignosiores esse dicuntur quam ceteris generibus, annue tamen: *cauda*
plures, recti, tenues, *folia* paucis vellic, in plures alia divisi. *Flores* minores e pallido albescens. *Se-*
a angulosa, nigra, acris & nonnihil locata in vasculis parvis quodammodo hepatis hinc datus
parva referentibus. Y y y y *

Vitis

Scimin Nigella præcipue in usum medicum venit: in niudbeinc lul. piilm*umum ref. ivcndafi: expectoranda, lacte augendo, urini ac mensibus ciedndi, moribus venenatis corrigendia. Specifoe, in febribus quartanis & quotidiana. Extrinsicis crebri usus est in Cephalalgia sedanda, cirjrtis exsiccandis, in cucuplus, epichemiat &c. applicatum. Sebriæ.

Radix filix propriatate sua hæmorrhagias, si de utibus nulhcetur, runbiifque imporatur.

Exp: iniinir cl fcmuic ifto oleum, quo impend Plumucojx ei plerique pro olco N-miiiu iwn abiq, gravi utantur errore.

Viride excrementium haur. tiliutemplurinuti lube. ob quam non nisi cum periculo intus ftmitur, ut Tragus monet. Ideo (inquit Casp. Iosmannt,) ut semen Carui post abluentionem iljbonose ficari debet: ita Melanthium •)uoque. Qiuri ob causam frictum potius quam crudum in Catarrhis & Coryzis usurpatur. Frixia aut utulata incredibili successu in Catarrho aut Coryza ifurpatur: in his casibus commendo hunc nodulum. R Sem. NiguiU tost. Tabac. styrac calami. aiu Dj, ambra grisea gr. ij. M. ac inde sydoni rubr. x. V. I a, nodulus iubinUc Jantibus admoventis. Sem. Paulus.

Ad anallum odorantem, R: NIJICHJ:Komanx q. (I redigitur in pttlverem, & cum oleo veteri subigatur in mortaria Ex hoc liquore, captefcupino &c ore aqua pier o immitte in nares attrahendo spiritum. Galenus.

Nobilissimam Dominam a gravi COTJ-JU liberavi postquni ei illml enhitton, ttntiini hifWia Mil" anax facta est mentio, Qommeadah hone luxiulum, Re Sem. NIRCIU to(lif>. Abclmoidb, Orvi Foliar, Majorartx ana Jjj, Scyrac calanut. Tabac. Jj. Ambn %nfex gr. vi]. Olei lignj Rhodu gut. ij]. M. F. L 3. noduius, quo poAca cuarrhis villh obnoxu fc ao cts pœafervit Sim. Pauli.

Nadl* Bores, quimvis ccerulei lint, li mu iibus chart r aut luicao cosaffriccs colorem pidchr. vid: urcddunr. DMQbfc xv. in Anton. Neri p. 228.

CAP. XI.

De Lino.

Limini .l Grxcu *iw. j quo non alitor dirTert quam modulo (ylljbx: nam priorem Grzcis corripit, Latini proJucic. Szpc uruniur Graxi pro idius c lino coiiftebs, uc pro Lin. tci - ac velis
Lui nocer generice sunt vascula feminalia subcotum LL in deeam locuUmca coudem (enuna continentia dispersita, femina melina plerunqae, floves canica

A. i. TJmim fati-VMm Gr. emau C.B. Park. t->ta<< J- B. SiSaitlrrti j]ax.

J.M.

Tenuisradialis nititur, pauci filis uilonita: cjuliteictu plunmiun limplia, tnani,tenm, glabro cubitum aut sesquicubitum alto, alis circa lina rmmun dii ilo. P< acuminjcjj culmum latjj uncus duas plus minus longa, alternatim aut pocius nullo ordint cauli appoiuu, niollu, glabra. Fioru cœrulea, pentapetala, petala extremo subrotunda curuis, ihiatis, i ctawut in quij quo logne: m2 acuta druis, pediculis rennibus longiusculis insidentes, admodum caduca. QtfkwU \ occidunt rotunda [Cicem magi HEBJFIA 7 in quibus femina decem continentur, loculis in c'.....xu ptopnis diftmAi de' preffa, in uiguhim- catum definentis, superfice valde levi & splendente, in Hlcitolti in Cef. 7 H lino tulca.

In agris ferunt tam in Anglia, quam in transmarinis regionibus.

Feri & Cya.

Pinus proximo Libri 17. de Lino usu ad vela naviam agent, in qua (inquit) non i occurrk Vix parte? quodve miraculum magis? herbam esse que admoveat Agyptum Italia? herbam esse que Gader Herculis columnas septimo die Ostiam allerat, & ceterisqum Hispaniam quarto, Provinciam Narbonensem tertio, Africam altero? Andax vita, scelerum plena, aliquid feri ut ventos p recipiat: & parum esse fluctibus lola vela: denique tam parvo semine nacta, quod orbem i urn ulro citroqae poctet, tam gracili avena, tam non aliè à terra colla: neque id viribus suis nocti, sed passim riuumque & in molitionem linae coactum, injuria nature ac summa audacia. — At nos priore libro imbres & flatus cavendos frugum casual fructusque prezmo nebantur, ecce feruntur hominis m meritar ejuldem ingenio quod ventos in mari optet. Hæc Pinus, quibus addit J. Bauhino, •tnu. quanta confecta est velorum ex Lino utilitas, si ad reliquum Lani ulum per omnem vitam confer tur? Hoc los detargemur, hoc foedili defricamur. Ex hoc facta veste totum corpus ad cutem inegentæ omnes interdii vellimur, nocti stragulis inde factis incubamus ac integimur. Rusticana gens (in Germania] urialque sexis pallia & tunacas ex iplo gestat, & mundis muliebra magna ex parte ex hoc consistit. Sed omnes has necessarias vite utilitates facile superat. Lintum chartarum dono. Hæ ex iplo pennis detro & nullus amplius uss repulso sunt, ut hodie ubique officinis, ut multa hominum nulla ex preparandi chartas opera, in papyraceis (ut vocant) molendans se nutiant. His charts & literarum notæ omnes bonæ artes, leges, tota Philoſophia, & vite pæ ac recte agendæ rationes excipiuntur, conservantur. Harum utilitatem vix animo qui concipere possit, nodum pro dignitate explicare, quantumvis longa iusticia oratione. Hactenus Bauhinus.

Liber imperfectus ex lilo Lino consistat, si papyrum ad nigredinem istam, & oleo U,,mertlito mistam pro atramento utant. Alciati Majoris in l'is/tra.

Quanta

Quantas injurias, quot tormenta hæc herba præ aliis ^{smnflwiabnonunuaspiu} atur, legat qui vo-
 let *Gervasio Beccario* luculenter & rhetoricè
 Quidam olim ^{c, a, G, um} lemi tempore ureban*** (emineLiftitofto pro obfonb cum «m .V* n i
 rmxto. Sod&tuo, dl, inqmt.ftonwio inoommod, S j a" paucis
 abbc anim MidtebuiB. bi Zclandu Cnquit Tragus) an" ^{malveri potuit, cum propter frumenti}
 f:afTc/tieuammor ^{hoc coctis vafcerentur. Diffenta}
 Oleari ^{ura morunt, et racies atque partes tumide faciã, quorum non pauci}

Oleum Lini, quod « fcmuic ir, multiplicetij u(um tub a. acq, e^m 3 taddonbui
 imSedundas <, >LL, nqryomm KaBoa* coacra&oncll ^ IJHCTS.
 (ores illtciiii lopic. /, />. * ^ ^
 I S l>hlifi * C1^dari!r •*" ^ >>" : vcrum cum can-

Oleum Lini est magnarum virium in peripneumonia, pleurisi, doloribus colicis. Ego multoties
 in pleuriticis doloribus nihil melius expertus sum quam Oleum Lini propinatum: hoc enim statim
 respirationem faciliat. Spontèque promovit: in hæmoptycis etiam idem Ol. exhibui cum optato
 effecta: Consolidat enim partes affectas vi sua balsamica & emplastica. *Ephes. Germ. An. 6. & 7.*
 ex Oblcrvat<>: e D. Raygeri, Obf. 109.
 Oi. briles, ui in fiftilibosQrvari nequcat qui exudet. *jfakulMnt*

Atrai nentum typographicum è fuligine lampadis & Oleo Lini componitur.
 Sulex politus si in Oleo Lini coquantur duritiem invictam acquirunt, unde sterculis illi quæ opus est
 in tabula marmorea evadit aptior. *J. B. in bifor. fontis & balnii Balneis, ex relatione D. Lutz Phar-*
nuuef. Krichenfi.

Tamoi es ventu foliciflms curannir ab Olct Lini tifu. *Esfbanfr.Qyman. An. *. nfi.*
 1. Unum trvtujt C. B jfi ^{W ε</i> Park, j^v^fw, /*rh<i> r'ani referens J. B. Com}
 ntoii Iwlo iHjL%

Sativutu plane rcfort forma, nisi quod caules habet & folliculos crassiores, ^{j^m qores, & in fu :mio}
 fiirculis II. ^{Maxima autem inter hæc duo Lini genera in co consistit differum,}
 quooi roll'culi sylvestris Lini calore Sola non aperiuntur perinde ut aliteris: nam quamprimum
 liccati Sole fissuræ, excutere semen u: jiuillin (iugiir.1 OptMIC, autoctTraga.
 Inter segetes Avene reperitur.

* 3. *Linum pere* (W WVIW utnlam., eaptuk m.~jere Morif.

Non aiu> in defcripctouc nocu i>iiit qium in titulo pofuerac
 • 4. *LiJium fremt mtrnu (xnlum, capi:ala manire Morif.*

Hæc caules emittit non rectos ut præcedens, sed reclinatos, foliis angustioribus c: LOOS : flores Sc
 capitula quadruplo minora product.

3. *Linum sylvestris latifolium, bifatum, caralium C. B. sylv. latif. bifat. flore carules J.P. sylv.*
Us folium Ger. sylv. latif. caralium Pack. sylv. latifolium 1. <inf.

Exeaden *radix*, quæ crassifcula est & candicans, unicam interdum plures præfert *caulis*,
 modo pedali, nonnunquam etiam majore altitudine assurgentes, crassos, firmos, huiusmodi, superiore
 parte in plures ramulos divisos. *Folia* quæ eos ambiunt reliquis generibus majora, venosa, hirsuta,
 .niniimim digituin iata, gummofo aufu; dcin de amaricante. Ramuli ab infimo ad summum *se-*
ribas o: <fi oinnmiii IIUXII:», Malva vulgaris ferè æmula, cærulei coloris, aut vegetioris aut di-
 lutioni, cumquion que inter nis / <n w / v aptecn
 DHUJ, quinque foliis five apophylibus ii clata & comprehensa, quæ maturitate hiant, *sempit-*
 utineir lativo Lino simile. *lamm, nigne* ars, splendens. *Radix* perennis est & vitax, linguis
 annis repelle:llls, caulidubolque ciara amc hyc-

Frequens est multis Pannoniæ superioris & Austriæ inferioris locis editioribus & siccoibus gram-
 neta tamen: loca particularia vide apud Clusium. Floret Junio & Julio: semen maturum Augusto.

* 6. *Linum sylv. latif. bif.* **tunt*nSUIim-Jtxitt*» *abilies purpureis C. B. sylv. latif. lanuginosum,*
*flore candido, purpureu tmnt/ruut}. B. sylv. allMM fufmit v*n> Vuk. sylv. latif-*
limum 2. Cluf.

CUF.
 Pedales, graciles, lanuginosos ternos aut quaternos ab una radice pronnc f4#/r/, in quibus Lini
 latifcula *folia*, truncata, ad Alcyon formam hæc accidentia, nec multum a prioris foliis differ-
 panna, lanug nola. Extremi cauliculi in binos aut ternos ramulos liivili, ^ Helicropi majoris
 quo Jjmincw iiiiiji* ctreutnflen, pleni sunt *se*; *<f, qu ibuiw apeun ii opunt, Lino florum di-
 viluri, led uujoributj (uperiori terè aequalibus, candidis, quos multa purpurea vena interstit-

dunt. S<>> & capital* J. in timula. Radix pere; mb elt, aaffiulailij longj, candicanj, raris fi-
bril sepea.

Apud Ltiitani.T **urban** Colibmm celebri Acjticimii **dbuam** iunc firpem duntaxat obJervare memtnit Cluiius.

7. **Lsnum fyfaijh* muaa C B.** /-**>> fwmlim, film fimptr it*n, die fart, vd fate **pb**
Imtt IB. CB*ma!fH»m ptrfufiUum Ge

Ckf.

iK, rotundo -?ut paulu majore alTurgic **tauhcuk**, qi ia in Hypc-
ina(cmp) III **folia**, Lim lmyi foltis fctt paru. Supre- m aliquot
raiiuuloidividimr, q*u in oHongii ;
lii luccedunr **parva eapi: *U, J**

Lias

Provenit in herbosis collibus **it montanis** Aulbut atque Pannoniz: floret Junio & Julio. Pedale
& erfttuni vultic **D. Magn^l** III licrbidis inontb **CafmiUJtm**, iist.i flaviam **Herat** Julio menle florens:
yiaangiiftiiUma habct **flares** vclut in umbella difp*o*itos, luta», p.irvos: aliud invenit palmare Julio
menfe in li z^ bidis ^/l **Gamgue dt PeTMt»U**, quod tone Luium ^icrpulillum I **Obf.**

8. **Lu&m fjIwfrtc*rnIeuM folit 4t*tt G B.** prod, falvtp ttrtgufufuham car am am fie **fari**
Uocin. Monip.

C.B.

Cale oft pabli, rotundOj lignoib, fturim ad exortum in ramoa **pabnare** divilo <JUOS **fiat** atro-
viciencia bad Ltnorc alremanm cingunt, & in exquisitiffimum & veluti aculeatum mucronem deli-
mine. Ramorum (Immiutibiis * oauliCuli multi, quafi in umbella difp*o*iti, **calices** aliquot !.picibus
donatos fuffinent, e quibus **flares** magni, caerulei, in medio flaminibus donati, prodeunt, quibus va-
fcula fibrotunda luccedunt.

*Patis pedi-
cail.

Lxm.

In faxofis Provincie nonirmgi Maffitii provenit. Variis in loos fterilib;: circa Montipelum
Junio menle cum **flor** j reperitur, lisl prJuiim: in **via** qua itur **LrAtl**, proj. pradium dictum **la Te**
colliere de Maffia r 1.

9. **Ltoun fj** **angulifolium** & **denforibus folis**, **flares m*rt** (> B. **flv HT* 4. angulifol.** 1. **CluT**
(lv. **su angulifolium** i **re nuncie Park flv. tenuifolm** Lob. < r.

Complures liint huic **ce.licula**, teretes, n'rmi, ped.ilis lonRitudini^, vn **kks**, flCquenclbiK fjliolis, Lru
lativi limilibij **ex** viritli diban-rulcis omifhj unmiu iaJbgio in alijuw ramulo, iliviii, tiuibus inii-
dent **flares** intenc caerulei, lativi Lini floribus fimillim, quinq. • in mixli **flamula**, totidemque
apices feparatos continentes. **Sem** in capitulis crallioibus, fibrotundis, Lino lativo non minori-
bus, nigrum, oblongum, planam, lativi lenini fore par. **Radix** candicans ell, perennis, **aliquan-**
tulum fibrofa, amarificali gultus, deinde fuavis, acrimonie particips.

Lcm.

Variis circa Viennam Auftriz locis nalcitur, praefertim in gramineis acclivitatibus de |u\|tj **vias**.
Floret Maio & Junio interdum etiam tota affate, fermen vero maturum ell Julio.

Liniim fytvltre **ail**, multifolium a tolib r.moribus C.A. dejoiptoidem videtur, c (Iciitctua D. TI10.
Johnon i **Gerardi erna**
1 i..ic peilmiile eff (1 non idem

A. to. LJmim jffoefre cmileum ftrttint iw?r*r.

Cui **ulix alte** iicp.IL -), perpetua: **calices** ex eadem radice plures, in **ten-am** reclinati, ped. **la** aut
longiorci, I, miratus virentes. **Folia** brevia, acuminata, cauli concolorea, unciam circiter longa, mo-
dice **lau**, i. ni lativi **imilia** trct^l, nullo ordine polita. In fummo caulibus **flares** pentapetali, Lini
lativi, caerulei limarioribus lineis ftrian, angulos flavis. Succedunt capitula Lini lativi, paulo mi-
nora, non exacte rotunda fed nonnihil furfum produftiora.

Lcm.

In agit) Cantabrigienfiad nurginos laterum in collibus • **K^m** < ¥.t *icta copi "^^ prove; ut
In **Gualoga** Plancaruni An&lia: hoc g **genus** habui pro fequenti **M** Lino iyvlci ri ajigullifoUo flore
nuj;tio **C h.**

11. **Lamm fjhtfin m/titfifilum fi<*t mag** C B.** fjh. y'*Kg*flif<limm %, **Qtlf. fjh** &>-
rii<r *lb* Lot Ger. (!/v. ****g*jhf. csrttlm vitUa fUn awjw Park.**

Cimf.

Dodrantales, nrtmionqium ctum potUles, la! .i, graules, fimios, ret: **os: filia** lativi
Lini, angulifora, dura, mucronata, virenti, amaricanti: **flares** in fummo caulibus multos, **iiag-**
noi, quinq. fobis albis praeditos, circa umbilicam quinq. purpureis locis diftinctos, totidem **ib-**
mi nibus, & quinq. feparatis apicibus ex medio umbilico prodeuntibus, coloratos: **Sem** in rotun-
dis valculis planam, nigricans, fplendens, lativo Lino fimile: **radices** candicantes, **UllJ. JLL.. 1111*** ...
fibris donatam, perennem & fingulis annis noves cauliculos profertentem.

Lcm.

Magna copia nalcitur toto Vienneni agro, plerifque aliis Auftriz & Pannoniz oblioribus locis,
atque **ocundum** publicas **vias**. Floret Junio, fermen perficit Julio & Aug. ito. Juno & Julio men-
fibus copiofum reperit **v. AUj-** vel cum flore in fterilibus **I.** bidis circa **S. Marti** velus montem
Lupi.

12. *Limim fjhftirc ariguflifolium fore e/uaji cimreo; cspitulit magnis J. B. Lini flv. V. Clufti varietal,*

Clmf.

In Auftriach Alpbibus, prsefertim vero Sneber^, aliudjgenus inventiir, huicomnini *limile*, auli. *cul.* **Lim** & foliorum gracilitate & cenuitate flommqac form! *Si r.idic;*; : in *floTum* duntaxac colors c(l differentia qut nivei non (tint, fed coerulei incandtdum Unguefcetes, Sequ&li cinej-acci. *Ca-pitnla* ctuni flonbus (ucccdontia longc ampliora, nec minora quim Ill iacivo. Florebat iftlic lub fineni Jiuii. *Semen* extremo Julio 5t Augufto maturum.

A- >r *Linitpt jyivjtjhe anguJufvlum f^rsbm dilute purpurafcentibut vtl carmis, C. B. fylv. angafijoliim J. B. An Lmum flv. 6. angujitfohum Clul.?*

J.B

Duuni lignoumqc pofidit *raikem, imictlttam*, exqiiagcrminant multi (*imx& caulit*, tenths, qui ad cut^itaicm alatuainera ifeendunr, *fi-Uu* fipari confcidiSmis, ccnuiffimis, longituiinc *terc* Lint fatii'i. P^x cilytibus longiulailis *fhrts* extremis r.imuloium br. vium malcantur, m.-gnijalbi, vel quail cincrei, fortuiti- *coeruleis flru loblice;* ;ibus, tllll *cadaci ut vix aningp pol* jut quin dclabantur: vaicula minora quam Lini ianvij quadhpordta, ScmineLini minora.

C Baiihii *florum ex lituca purpura candicantem, vel carneum* huic ;.tt;ibuit: Clufiis *fiord formi & color? fupcliori few limiles VaA muiorea; ixrguljs dodranules, Hmias, liccc valtfe graciles;* y*/Wa Lino muled angdiiora & minora; *capuula &c /iw««Lini, (od ni nora; radiocm ex. icnij emdicantem, perenneni tarach.*

Cluito oblcrvatnm eft lioc gcniii in .mrcnore Madrictonx iyJv. > parte, que fecundo ab urb; Lutccia lapiit; tiftac, niter gramtna loco aperto *Si nullis aiboiibus tojilint^ Horensjulp, fiatuiim li-raen proferens Augufto.*

Ne-do an tuuii; .m pnecc Ijiiiri Lino idem fit quoi in Comubi *z pakus vrcod oppida Tran, & 5. JWJ* expiof provenitj a nobiscdam propC^l Genevan) oblcrvatnm, cui folia (quantum memini) non .l. *leo conti* ata aut prebra fuere in cauLbus; durior.i tamCnfcimucronata: relii *ita auterl de-* (enpeio quam ex J. Bauhini hiftoria dedimiUj & Cluhatu fatis aptc conveniunt. Planta i;)la, (qnam ad tnanum nonhabemus) inlpicienda, & a m descriptionibus conferenda efl. Putamii t.imt;n *froxnnc de(c)lplr.r cmdL'iii ufc ipc^icm illai;* Lini quam in denim rbus circa moncam Lupi non

ongc a Monlpdio, Septembn adhuc m *enla copiofe* Horentein *oblcxavimus. Erat autem i* a in loosp ij foliis anguibffimJSj l confertuin < *florc lato grand, coloru ex* purpura albicanbs.

" 14. *Linum fruxicsfmm mvenm C. B. jflvrflrt 7. fruticefum Clul, frultcsfam fimper vrcm Pirk.*

Clmf.

Fruticofum eft, atque dodrantalibus pctUlibufque fermii ramulU fcmper virentib; *is prxdim;* qu>s niimerola /i/i* exonunt, medix inter Thymi & P'lylln magnicuduus, iib.ilbi.lt; *fin* *demde* *lupen* • >nj paulo nujfres, omninonivei iumnnsramulisinlident: qmb; *is fuccodunt capkuUisnunc* plcn.l. *RaJtx* dura & Bgnotieft.

Ext: defeitfs tjuibuldam lilipanix locis, (ble liluftratis: floret Junio Scjulio.

Locu;

15. *Linum fylv. Unfnltum; taule vifcofc, fiore rubra C. B. flv. larifal, flort ruhtt) Park,*

Hujus mernmit C Biuhinus in pinace, vtrum non defcribit. Nfos in planitie quadam propc Auguftain Vindcliconim, o~v qiam *monachium Bavarix* *icr* efl, pulchram linc invenmtu, Lir'i *ipccm, ven. It, qioi* i *olet, in ea exactus defcribenda mmois caroli huius.*

Folia habet p'iot. L. IOJ *gitaline foliorum. Lini, modice lata, acuminata, nervi quinque* • per longicodinem decurrentib; *es. Fia pentapetalos, coloru incarnati, faturationibus & valuti languineis in-colis firu uis. K<'/* lignola crt, & pu. plures annos durai o videtur.*

Augufto iDCnle florentem adhuc invenunns.

16. *Linum latifolium luttum J. B. jflvefire las if ahum In! cum P.i k C B. flv. 3. latifolium CluCr/v. W. J.OW: Ger. emac.*

J. B.

Caulis as adoLfat angulofis, frmis, cubitmn altii, .liiunitiulm rubentibus, pbril> *is ex uni ra-* *diccortiSj HL* iiperiis in ramo *brevcs divifis, quos folia veltiant alternata, glabra, cra-* *iliuicul^ uncu* long. • >'& lemundam Lir.i, in obtutum mucronem definentia, perquam amari fapors. *Flors* numero *extremis ramulis innalcuntur, magni, perelegantis flavi coloris, quinque* *flores* totidem- que Vi *is lones mediam obfidentes. Srmes, ti:il^ Clul'* o, in capitulis compreffioribus reliquis *paulllo minus, nigricans quidem fed non fplcndens quomadmmodum illorum. Radix* *lata cralla,* contorta, albicans, aliq'ace libra donata, fungulis annis repullulans, novdq'ue caules producem.

Exit abunde in monte Badenfius Aultrix thernis imminenti loco gramincis, locundum fepta, *Locu.* *inque* *icillii, & t. FIO* *et Junio & Julio; fomes maturat Augufto.*

17. *Linum luieum N*rkmt*f, J. u. mitmm luttum Ccr. mmumum hxt^m C B. flv. 3. latifolium angufifolium lat. exm Park.*

7. B.

Ab - j M*/«(iirgunt plurK, cubitalci, q *is in ranios dividuntur;* , molliccUa. latulcula. btsviwa qwm Luu lauvi, in(iptla. /•/«« Iwronc rwmlU, L»^l *locu;*

coloris lutei, amaricantis, quibus succedunt **Lin** tivo amara, ^^{ous} continentia.
 In pratis circa Monsipelum & Sellam novam observavimus **Lin** tsetum Septembris fl. centem.
 Hujus varietatem duplo grandiore invenimus ad mare, (jum taman a p; ore specie dil; ITC
 nequam cuncolimus. Flores nempe, caules, .ipuula, icmitu ucncq, CAI!CHI: Differentia untum
 in magnitudine & statura, quæ rationa loci event.

Infinctu J. Bahuri hæc duo **Lin**æ inter se studiosè conulimus, cum Monsipeli essemus.
Lin un frutescens C. B. *prod.* idem fortè est majori hujus varietati: Descripio in
 omnibus convenire valene-

18. *Linum latifolium ad singula genicula floridum C. B. latifolium sive latifolium Col.*

Col.
 Il yemali pander tempore planta hæc, ex pratensibus, ar^oUnsi humcent que tollere er ca, De-
 cendri mensle. *Radix* nititur lignosa, parva, mcoitd ; raini* pluri bus è caulis in summo tridid,
 solum exiguum intellitio ex geniculis procedentibus *sem.* In singula geniculis *floræ* habet
 hureum, & postea fructum acinofam ut **Lin** lativi vulgaris, cta etiam *semes* compressum simile,
 nitidam, fukent, amud parum sapore. *Flor* & fructus incident quinquefoliate bali, exiguis angustis
 foliolis constructæ. Tolia in uno exigua, & per caulem semper majora & Lino latiora duplo, &
 m um'h postca semper ad cacumen usque decrefcntia & angustiora.

19. *Linum arboreum* *Crttiitm Intern Park, arhrtmn AJpin. exot.

Ajpin.
 Planta est arborefcens quasi, constans ramis obliqui actis, gracilibus, rotundis, cortice nigroctis:
folia **Lin** lativi latioribus, ut ad Myrti folia magis accedant, densis & undique ramos contogenti-
 bus. In cacumine producantur *floræ* flavi, pentapetali, & *folioli* multicapsulares, suis pediculis
 magnitudine Ciccorum, figura pyramidali, ceterorum Linorum moç. *sem* a
 continentia **Lin** lativi semibus omifio simili, sapore amaro. Provenit in Creta insula: Floret
 arLUf. atq. eadem durante semina sua perficit.

20. *Linum sive sive minus latum*, tmmauwifdtm latmre ti- J>>fa^wr* Mt^nl.

Morsl.
 Vix palmarem aut ad summum didantalem excohit altitudinem. *Flores* fert LKOS, pcrrape-
 ukw: *capfulæ* feminales ceterorum capsulis conformes, *semibus* ibidem contenta paria sed minora.
 DipL- est, aliud foliis latioribus, aliud angustioribus, nullo alio discrimine intercedente.

Locu.

Utrinqoe sponte crecit in sylvâ humida circa Blacas.

81. *Linum sive sive catharticum Ger. emac. pratensile foliis exiguis C. B. Chamæditum Clousi
 fere alio, fere Linum sive catharticum Park. Ajiæ verna glabra foliis albis, vel parvis
 Linum minus J. B. Purgung o; toU& Ewart flo.r, o; d^tll mountain.*

F. radice tenui, alba, lignosa, fibillis aliquot donata, *radiculis* emittit nonnihil reptantes, mox
 humo ad palmam & alia se attollentes, tenues, rotundæ, rubentes, fastigio lursam ramolo, in-
 tante. *Folia* infima mucrone obtuso & subrotunda sunt, superiora quæ in caulis bina opposita,
 crebra, exigua, semulicam longa, cuneum lata, glabra, absque pediculis adnata. *Floræ* pediculis
 longo tenuibus insident, albi, pentapetali, petalis acutis, minime bifidis, cum apicibus totidem in
 medio luteis, è *calice* quinquepartito. *Pediculi* succedunt **Lin** parva, canaliculata, in quibus *semes*
 lucidum & lubricum **Lin**, compressi Hi S; ubiongum J. Ektuniio. ixipor K>tius planu
 amarum &
 nauseosum.

Tempus
 Locu.
 Virtus

Floret initio Junii, & deinceps per totam æstivam, & in pAfcuis Hocionbui præfertim „„„ motis
 alium J.
 Hujus herba integra cum caulis & capitulis vino dbo per notion (upcr cineres caliittii untala
 ferofis humores purgat satis valide.
 Sem potest vel herba costata, vel ejus exsiccate pulvis, cum tantillo cremoris Tartiri & semi-
 num Anili, & purgat linæ molitæ. *D. Hæwle.*

21. *Linum mucinum fellatum C. B. Chamæditum fellatum Park.*

C. B. prod.
 Tota plantula densam, ramis trim unciarum est, radiculi capilli instar tenui, albicante, *cau-
 liculo* uno vel altero tenellino: *foliola* brevibus in expansissimum apicem detinet rdsu>; inter
 que *foliola* parvi, pallide virenta, flollati, ex quinque radiolis exiguum circulum velut umbonem
 cingentibus composita.

Locu.

Monsipelluli in Grammis & Boustoneto & aliis plurimis in locis provenit, ubi vero f'oret
 An vera & genuina **Lin**æ species sit ex descriptioe hæc m>u Iltii ooniUT; noba wccm riandt in
 Videre contingit.

22. *Linum foliis sive umbellatum latum Botan. Monsip. Labiiferum Linaria folia Monsipellum
 C. B. Park. Pejserna Lobelii J. B. Pej. Linaria folia Lobelii Ger.*

J. B.
 Folia est per caulem didantalem confertis, **Lin**æ similibus, viridantibus, acuminatis, uncialibus,
 circa superiora minoribus, variocibus: *foliola* in humis ramulis brevibus, acervatim congesta, lu-
 tes; quæ exoptima valcula exigua, turbinata **Lin**æ, dimidio aut triplo minoræ, folioli quibusdam
 acutis undique obtusata, femine plera lubrico, hccido, fulco, multo **Lin**æ semibus minore. *Radix*
 satis longa, tortuosa, alba, lignosa.

Locu.

Circa Monsipellum in squalida loca Geræw. dictis observavimus: .itprocaiorcmi. Sicilia.

CAP. XII.

A Plntitgmeiia p/lufrx GB. *Plantago eyuatie* mimj* CltiC Park.

R Aduiw fibrosis abt. terram .ipprehoutir: cftubi radicem {mplicem pi< funde in iinum
 demifluin libra: **ploret** dngunt. *Folu ov eadem radjce plui.i. Plinragin-* linn-
 ha, (wl mults nujiwris miuora, potiicihis longis donata (ngulis pediculis imvc una-
 arum] in terram rodinact. *Qsa* folia nujora fu- alio brevioribus, tenuil minora co
 brevion bus. l nter folia pluri mi c radice **exeunt: fiofa** infidentes fifiia
 .cramcaulcm nonprodiiDt,} nonnultis icrmcialibtkj abis mr.li HIS^ in rerram
 reclinatb, quino, pct.ilU cxjguu, acutisj albis compofitt, *raisce* i : -*vasculum*
fmmsk turgtdulum, ovJc quodnmmodo aut gLindiformej Itiminibtu **eri**] - copidts rq>Ic-
 cum, per maturit,item in duas cann-ts defaifbe
 Sapor plantulx initio herbaceus, poft&i nonmiul acre gtift.i>ti fenetur. FiagcUis emillis ad in-
 valla radicesagentibus immcnlimife propagat tocom idonjum **na&.**
 *Vill. HCB anWOCU hWjuLii
 In hndis pifinarum, *aquifitate ciit-uinij, atit alibi ubi per hyemem afia flagnaraac provenit. LMU.
 Alime palmis exign' fo his lamccobm Pranugineib aquiticy mt.ii, Holoujs abis vix compr-
 yerim nona Bpdum frequens.
 culs nuc cadent nobu videtur.

CAP. Xin.

TmiJptsllt Brafilttinaficni/ui luttit mimmu.

IN duorum aut etiam trium pedum afiui'git altitudinan; <*> tereci, geniculate>, fubuffe-
 fcent:; paululumquo ptlofo: ex genicul: omittit .ituulos *Sc* bias *folia* temperli>i oppoljca, bre-
 vionbus pedjeuiu intiicnru, qutnque aut (ex dig. fongi aliquando crallo mod. dsnur.i,
 ium eriam non. In exf remitate ramal trum floras nfcuii;ur Egitani, lutei, umbilico conico
 confUntes, 8cinambituiilius(juinquefolielii lutes mjniniif- *R* adix exili admodum. Flor. *HIM*
 ciarctn tubet liiavem, fercut dunirmeli.

CAP. XIV.

Pentapetalt Brifil-.Ina flen Lychmidu.

Magr.

IN quacuor aut numq, pedum altitudinem aflureit, *ami** rocundo, ligrtofb, **tenter** piiioi), qui,
 liipenus iniucos le diipefat ranios (iirfumelevaios. In eade aut :mftramn (biita rie poftca
 nor aut quinque dig. longa, fimilit folis
 Sals lunr *fvltj* angufla, brevibu* peditulii innitentia, quai ante angullilima lant & parvula.
 Floru, atque ptloia, diverfc magniudims, in tunitniuci: eotm pi unguibus in medio purpureis &
 flami (crt magtiictulini; flonitt) Lychruilis, alboi, peiitaperalr arenlis, a
 put* luteL. *RJUIX* luud longa eft, lid lubet **mukat** prolcii ad laten c: cqcnc edani
 hJjmcnu.

CAP. XV.

Rhabarberum Uwgmtfum, fvt Uffithum Chowft U*/rif>Um Nlan In i^i<rrJT*< J. & Rha-
 barirum ;. fu Ofaiatnim CB. <<*> It \$**!-AUiliulwftnga quldem.

Atw eing.

E Radice longeva, craffa, ferme rotunda, parum ultra femipedem longa, fibres quibuldam
 brevibus ac craffiusculis undiq, enatis onulsa, externe fulca vel quali e rubadine nigrefcente,
 intorneluta ru **iwii nonti** nullis ftris venulle permixta, fisco ex parte vilcofo, e rubedine
 ANVL icente plena, amara, necnon gultui ingrata, *Folia* procrude numeroia, acie conjuncta,
 & quali limal e radice fupremo, ferie rotunda, mirabili unum fupra aliud paulo elatius provenien-
 tudine aut majore, inferiori parte adeo angulla, ut ultra digiti unius latitudi-
 in medio tamen latiora & fupremo latiffima, ubi tres plus minus digitos lat-
 tudine equant, in mazonem plane rotundam delineant, molli lanigine, in marginibus maxime
 vilcofo obducta, non diffecta, neque plicata, verum plana, fupremo lere viculis, inferne pallidi-
 tel in medio latiori ac majori vanti, e qua plurimi minores in latera unilae excu-
 tes,

Ki, 8c cird ex pirum incurvatè dispositè proveniunt, ps-a-lici; naturi quidem *ihrium* ten. lentia, antenoi *nihilo* mnta parte, *Struthiocan* :-li plumirum *mitr*, tjuod m.iRnim plami vaxmftatcm aJJit, parum doocum sese incurvantia : ftiofUncu *jnu licè* cralsi, guitu aniata, necnon taftu mol

E foliorum medio Pediculus unicat, ad rres, quanjorvdigitofupra foha Omnia n lficur, te- nus, teres, e viridi purpurefcens: cupis fumme) cto, decem floresoc: odecim numero, brvib- bes pC. licalis nitentes, & modo ex hac, modo ex illa caula parte provenientes, pallido colore ce- mlco non ingrato flonatt, fiffma & magnitudine Leucii arborefcens floribus non valde diffi- mtes, quinqe peulu an fjtwoa: antes, od're admo^: un ingrati, cerebri: ii mm pari n perturbantes, & fuccum fenni arrulciitn edentci viluntur, qui ravi in hu e nullo relicto femine marcefunt & d cj unt.

DeRhaburbari vinbut & ufibus fupenuicgiinm in capita *dc* Lapatho

HISTORIC

HISTORIE PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS.

CLUI EST

De Herbis flore pentapetaloide vasculiferis.



Herbas hoc Libro comprehensas pentapetaloides potius quam pentapetalas vocamus, quoniam que videntur petala distincta, revera non sunt, sed ad unguis juncta, adeo ut flores inccgn cctoanc, « irnct loqtendo monopcralis anmimer.wdi (unr. Vieiecepufententu mmi* reccleremui hujii(ni<xli Bore* pcnupccalii pobui moywtalii annumeravinius.

Herb flore pentapetaloide momaU.*

Florcm pencapetaloidem didituis podusquim pentapctalon, quia folia (cupctala florem compo- BDi ad angues jiinfla fiintj adco uc flores intcgn decidanc Hx vel font

Terrifres, folus

Simplicibus, h. c. in (ingulis pediculis tngulis, caulibus

Nudu> flore A tubo oblongo in quinque ladnias&i foua bif<ia expand; flbus

'(Ritgtfi', rettur rariom; tforti ejlice ohkngo, concavo, fmm ; PAKAI TJI,*

*^Z^Trtctr^w/feuptinis, lua.iilcruibunui.denJioribus, talice floris brevioris ut & vasculo C Icnunali; AURICULA *rft.*

[Feliivijlita

Adversit, feu binii in cauiibus oppoHtH,

J'Süiqm & lawgtra,*

\U8tfcmu, (fliquiipclniinquebinis; APOCTNUM.

{Succo limpilo,

{ EtMu>r, flore pij-vo, liliquu fiiiguhriijus, O a u u r roftrum refcrenti- bus; AsetriAi.

*{)lMmiltcr, provoluta &rqwns^toliis gbbns, cotore Sc confifrentii he- Jraceonim, flore amplo, liliqoa biconu; CUHATXS *deplmides.**

PtricMTfiu frmme minntifim ufertM, nulli intus lani, floribuj in lummis ciu- ubuj& ramulis trebns, laporcniario miigncs, flore

*{Embotblenp « *quinque segmenta acuta cxfanii CBNTAURIUM MMNW**

*{Sive tube inorti> *ere laciniis bu pecala divUo; fobs in i<uale adversis in ununi coalclli tibus tui Diptaco>, glauco ooJoi: conspicuis; Centau- nwwluteum.**

Alternis, floribus m thyr> oblongs confertu: pcriLarpio bivjlvi

*aut *turbinate; VERBAICUM.**

{Gh BLATTARIA.

*Camfitx, in mo CdL pediculo tetah, valoilo penu gono, per m imricatcm fi tangatur dif- (ilicnte, Si ternai cjjwdantcj iapoc totiu pUn *iz acido; Th 11 FOLIUM acet ^w, Oxy trifoli*.**

Aquatica folus

Integris

{";*(<£i simplicibus fabricati 'v' &u qua' est

K'** • *parvula* in aVis lolioruni floreusj foliis CuWotundk per nurgines xqualibus; NUKMULARIA. jC d«Wm *trista*, fo liii in eodem pediculo terns., Rorilxuintus ftUmcntoiii in fiunmis «u- llb in diyifiim depoiliis; TM * o i

• 7i«- *simi diffusa*, floribus speciosu i VIOLA ejuttit*.

in summo caule. Lin*lc pitliculi flomm luieul.itmm exeunt, qm^am i ubet folio; :m rudimenta, que quoniam peregrina, i sunt, nec cjuJera figur-r cum in qux ul tub. em, pro foliis perfectis non habeo; ac proinde .lulis nihilominus nudus nobis cenccur. ftr*ifj» Af«ut HSU *arsculi nisi accensenda est.*

Quid Clematis daphnoides filiquam producat lanigerat: i mihi non constai* fatoor: qutxlili- qtuni (in' longim bicornem & velut geminam i)roduc« (ut recte <"sGUpmus,) mihi comportuin est: undi ob convemotiam in filiquacuni Apocj-nis, livcLmigiaa iit, iiventwij cum cislcn mo-xwo copuUcur.

"Res filu caules producir nudos flores fu/lineiuei kmgA feric verwls imam parteni fpeAanns, i ca- lice fsu cuVx) otolongoin quinq, legmentidivifbs; vaicuU {emuulia oblooga, ic maAp mini tili- nus tepku; .-fij, ukirco ad hoc genus percincrc ykltcur.

Iicrtu flore pc utapetalo St polyjxralo (eraiaala vakuli rofpe<9ai commodak, divi. • «j(lcmt m »ii- tuffvl&tt & mtUicapjulord. Uniatfa alnti ob defedum commodiods vocV uli dicimus vafculo fim- phd Sc in locuhmem.l non panico contenos, quilmi (emimis lcdos in tncdio ell; e exterius prot- ceenw vafculo ; MulucapfuUrtt vafculo c plunbus cellulis ftu locuLinicntis conjundis compofito aonaus.

Phorjs generis fisnt Caryo^hllm^ Amtri*, Lytlmt, Alfint, Sptr%ul*, jtmmtldm, V&.. *lyfi, Auri- tuU urfi; fine tiutm Caiiltrutm ntinn SuUnm & tuTfummt Ljfmjtcbia l*tt*, F«rtul** NmmnLirut fWj jtjHti.1. Vetiiinquoniam"de nonnullis h< genera mihi nondum co Hat, qiiotnodbYa& culumTemptwlc conform.itim, Scfemtna ui eodem difpofita funt ; alias notas magis>SVIM& CXUO- titis pro chirafciiftiu* generitn fubalwrnorijin C4jui. per adhibere coactis fiam duri vatcula (crui- nalia omnium de q<t>ui dubito vidcnJi Si tiinofc claniitundi <XXilio dabkur.*

CAP. I.

Dt FnmU verit Sf Para/?Ji.

P Primula vera dicitur vt hxc Iwtlu quod priroo vcre floccat; Paral>-fij qU U>valyfi motbo me. en do exhibetur a peritis medicina. Notae ejus generis funt caules folis nudi, i, flores ituboobloigo in folia feu potJus lacinia qmque bifidas expa^^corumque calyces oblongi, concavi, laju, Ruan; foli , rago(i lexmx - norix

A. Primula vera vulgaris, jordan, simplicibus Primrose. « Park. wrjrMMrCer. v*m jbnrm * foJmim f- lcula, t. 1. 1. Common

Fila U numc. ofis, albicanibus, masculis, profundè in terram demittuntur, & fibrillis aliquot tenui- bus catnllatis, è radice modicè crassa squamola, rubente extenuibus sumatur. HjJitu lap. v sub- allingens: spume autem è foliis quotannis marcescentibus residua sunt.

Folia plus palmam longa, fere quadratum aut duos digitos lata, obtusa, rugosa, ad margines denti- culata, lupina parte glabra, proxi hirsuta, nervis crebris hirsuta eam percurrentibus, ex angusto pnnncipie Ientim dilatata, pediculis propriè dictis carentia. Inter folia emergunt flores ab eadem radice piuref, pediculis tenuibus, teretibus, apertis, hirsuta, radicem versus leviter puberantibus

palmaribus aut palmantibus nixi; in singulis pediculis singuli, è angula hirsuta, margine in quinq, legmenta acuta divisi; monopetalus, amplius, 6 rubo oblongo, aa- guito, in (i'™4, 'e8) menta cordata totidem folia imstantia divisi, è languescente luteo palliduli, unguibus iuvMj inqiiOrum medio rocotiduntur (femina lutea), piihlo Iwrbacco capitulum rir de mmi:alnni> inrra U<imuu iccoadicum p (interente, nunc in lamina) obi pane supra stamina emi- nente Odor validi & non ingratus. \ alculum terminale in calice reconditum.

Law. Infylvsj sepibus & diametris verno tempore ubiq; exit. Hujus multipl, x habetur varietas. 1. Flore vireo, que 1'arkiniofio i \Mni4 writ Sart adu Adv. Sjlymm IrimkU *lk»- In • ortis nostris frequens i Flore viridi simpli, cupitum l'obliu*, Pnmubr. 2. Flore viridi, ^ albo simpli Park. 4. Flore viridi duplici Park. que ab ea que flore simplici seu secunda flore tantillo saturatiore, è duplici petalorum serie compofito differt. 5. Flore lica, separatum dicitur Park. que Primula vera Hoskoti dicitur. Hæc præter flores quos profert ticalis seu caliculis singularibus Primula vulgaris modo, alios etiam producit caules

qui in fastigio suo plures flores gestant ex uno calyce erumpentes, interdum plurimum duodecim. florum fragmenta seu partes in eandem calycem confisatas. 6. Flores plures seu multiplices omnium ferè Autorum. 7. Flores duplex Park. quæ præcedente omnibus suis partibus minor est, flores autem dupli- cius calycum tibiuis iWacx^mt tegmenca in foliola videntia excrevant & degenerant; seu mavis di-jrc, cafoim k-gmema in nugnuudinem aufa rimkna nurgline. foliaceo velut fimbriata fu...

2. Carthages Tartarus for Pr. Confusio: Jit/in* O.>muti. PrhnlIU vrri; 7. grica 7r.; defanti flore retiree Par. Biew P:imrose. Cernat.

Folia 1 vulgari nonnih mollitru diftinRuini. Foliorum medium difcnmiiunt coftx albi, inlima pirtcctio!«, ac levi mbore.iljycii.r: margincfui in Lactuca Romanj raodicdrcnantur: numc- rosc ac contertim in orbem cretumext ralla ac HT>(I r.-Jkt iih.tibitb. Hnc foli- nt hertini (A pl.mt.t rariutem mltifanam iliikca:e, ut prxter (enwn faac ctiam ratione •wopagatur. Inter folia pcJiculi iuiJn vix ultri digittmi longimdnis efferuntur; chntti (uftinenc fibviniu, tot fimbria ftr- atos juot (jofuu^ um folia in flore succedere debent: non plura qui que illa esse confueverunt: iingiiU coi-4ifcigcm repr.rlcnc.ir.- & diluta purpura cfflorantur, nifi qua unguiculis est, colorem cnim itt luc^Rei anaf, in radium aureum croco adumbratum efformatus. Dices medium floch Lnbilicuni ftclUm d le, adeo radius quinque fulgentiffimis intrenitet. Pofilam eht modo flcllx concolor. Int:igo prope anno floribus ornant. Ho* ft.itit Papaveris albi facie, que levi capsula inclusa maturefcunt. Multa deinde folioles juxta decifo femine germinat.

A, ud Turcas adho nominati Car thages, quasi qui rivalem florem nuncuparet: Argumentum n in flori vivacitas dedit; media quippe hyeme supra nives etiam caput exalere solet.

Calici est Ce Uecz, gustique nnn ni- floccantur adtingere percipitur. Ufa efficaci pot: ad PK;- Wm detidum mclandiolicis Ci pituitolw atFtk'hub: coltibendo a. i pofitimo maguopere confert: ventctilumat que adeo v.liverla intctina foluri roborat.

Floris colore infinitum variat, CCh lefcnte, iurpurco i miffiore, & intefiore feu violac:n, car- neo, ferruginco, oblwac oallido, minuto, alb, &c. Reper:ur ctian' flore geminati leu altero alcninnaco, variorum colorutn. Hzomncsjluqueadhucpluresvai letates lenniud^>ciicur.

\\ Fr'nnuU vnit Cmftjmintfcltm* five CjrcbkUc fdj&ttbt.

It.c plures in codum ciule Reftsi flores velut in umbellam diftufos, Prim:la prætenfa inodora lutei niodo; fiint aittctn Horoi nonnifiil minores præcedentis floribus. Flores pariter colorum varieucc ludunt, 5c non raio geminati ah&A.intur.

4. TfmuUprtttnfninBdara l*tt& Gcr. i-cris ceulfira, tflUAoflert wAtta avi vix eJiv J.R Ytrbitftitlum prattrjc out filvtttum pit durum C. o. PmraUij ail a a tolerate p XJ lb Pkar . pad . 6jlt £tofl1j. 0? £>flips.

Foliis & radice cum Prutiulj vul^i convenit, flon; infupcr, fit r>cclicilonim h rlitie: duffert, quofl plures in caule flores gellit in umbellam quandam digeftos, Paralyfa vulgari (odorat •in m o dum, eodemque tantillo minores & coloratiores. Cum Paralyfi vulgari convenit, quod plures in eodem caule flores gellit: ab eadem duffert foliis Primula vulgaris fimbriis; caule zoni rubel ad petiolorum basin cincto; caulis & pediculorum hufone, horum etiam longitudinali; Flore pallidior, majore, magis expanfo, minus odorato; calicibus minus tumidis. Duffert denique quod præter flo- res quæ a timbellit illos producat fingulares, e radice excentes in privati pediculis, quod in Paralyfi odorata nunquani accidero obfervavi.

In fevis & ad. feres non admodum. nilfregtens mreniuni ctwm in pafcu dslcndit. Aliqua jito txcat' ferius fior^cquini Primula vulgaris.

Hujus etiam varistates aliquot liabentur in hortis enurnte. i. ParalyGs flore (Uvo Hmplia ini> doro, abfqu; calyabus Port Fla hiuc IUUAH ett abfi ne ullo mitiflo calyLC - ! Paral. flore gemi- nato inodora Park. 3. Paral. inodora calyabus diflectis Park. 4. Paralytis flore fi Hæc flora loc 1 in liinimo cu le congenem gellit foliolorum anguftorum videntium, lutes nott* mllliUt emittit.

A. j. Vrtntkla vtrii mitjar (i.e. vna odorata flore lato fimplici J. B. Verba/calum p utnft edo i.v.ttn C* H- "aralyfa vulgaris prætenfa flore fævo fimplici" us Park. parad. •Commonpiuglr,u. 0: C11ps.

Ra ice ami ma y p jnvinit. Fvli* per ternim Ij rfa, quam illic mino h,brd iora, obfcurlus vrentia, rigidiora, glabriora, non crenata, prona parte lanugine adeo brevi obfua ut vix perceptibilis fit. Caule ab eadem radice unus [interdum plures] fequifpalmaris aut dodrantalis nudis, teres, firmus, folidus, brevi & vix confpicua lanugine hirtus: in cupa fastigio flores sex, feptem, aut etiam duodecim, aut plures [in nonnullis 24 numeravimus] velut in umbella dif- fusi, finguli fingulis pediculis e caulis fastigio etatis fulti, e calyce mafaculo, pentagono, albe- cante, in quinque segmenta acuta, non tamen profunde, incifo; minores quam Primula vulgaris, magisque concavi, & faturatus flavi, unguibus maci la crocei verum exigi J notatis, valde odorati. Valcula feminalia in calice occultantur.

Aprili mense apud nos Bor a in palcuis frequens. L1.7.7. Hujus

Loco & Tempi!

Virgata. Hujus etiam non pauciores habentur varietates quam precedentis: 1. Paralytis alba odorata flore pallido polyantho *Park.* Folia hinc majora, pallidius viridia, flores in uno caule plures [ad 22. interdum numerari] pallidius viridius, pediculis longioribus appendi. 2. Paralytis flore viridante simplici *Park.* Flores huic tantillo ampliores sunt quam vulgari, calycibus viridantibus concolores. 3. Paral. flore & calice crispo *Park.* 4. Paral. flore genuato, seu altero alteri innato: in hac specie & omnibus quas observavi hujus generis flos exterior nihil aliud est quam cuncti nature lusu in florem degenerans, seu potius erectus. 5. Paral. horrentis flore pleno. 6. flore viridanti pleno *Park.* sola florem multiplicare à secunda varietate differt. 7. Paral. flore viridante sive calamistrato *Park.* Flores hujus è pluribus exiguis angustis foliolis compositis, nullo calice inclusis, Rose parva in modum fore expansi, luteo virides seu pallidi, inodori, si à Solis radis defendantur ad duos etiam menses durant antequam marcescant.

Virg. Radix hujus aqua aut cerevisia cocta vertiginem sanat. *r. a/Vi. W.* Paralyti, vertigini & similibus nervorum affectibus utilem esse hanc herbam vel nomen arguit.

- 6. *Paralytica mtmtana rotundifolia Equicula m Col. Primula vera* *mattm* mcamj, H**
KJ 1***

Col. Variat hæc à congeneribus, rotundioribus admodum foliis, tenui, longo, trigono & triangulari petiolo insidentibus, erectis, carnosiss, venosis, inferne incanis, lanosis, summois omni ut cæcra videantur, è radice obliqua, carnosâ, multis fibrâ albis, Elleberi modo carnosiss dependentibus, atque hancum amplexantibus, odoratis, sapore acri, amaro, odorato parum palato. *Caulis* dodrantalem emittit, vel majorem loci & alimenti uberosi causa, rotundum, tenuem, nodum, Junci mi Cyperi modo, thyrsum representantem, in summo ex basi tenuibus foliis divisa flores decem vel p-ludo- res prodeuntes sustinentem, luteo colore hilari, ex calycibus hirsutis Icarus, quinq- e orn divitis, in quibus rotundum *pericarpium* longo apice perficitur, marcescentibus atque etiam herentibus floribus, in quo *semita* nigra, angulosa & copiosa concluduntur.

Lacti & Tempus. *Equicolorum* montibus supra Flaminianum, à *Serrone* dicto loco, in cacumine, Se; wentnoj. op- posito latere, humenti humo, Maio flores, Junio perficitur.

Virg. Primularum folia & flores gustu non ingrato in odore, placentis & acetatis sumuntur, suntque admodum amica & utilia capiti & nervulo generi. Ahibentur & in Apoplexia, Paralyti & articu- lorum doloribus. Florum succus maculis rugisque faciei, & alia cutis vitia mirifice detergit. Aqua florum & conserva nec minus syrupus anodyna sunt & hypnotica. Innil- decocta & extracta noris sunt seu ætatis, seu constitutionis *ipppmf nionca. D.T* vcrtdittRtbfm,*

Decoctum radicis *n Triniulæ* veris yuig. in *Zyt'iogaloali* ove aloneo vehiculis, fimp- tum singul- JO est & persentissimum remedium ad vertiginem. *D. Hulse.* Succus foliorum & florum expressus cum pari quantitate lactis è vacce rubre uberibus emulsi frequenter haustus Cephalalgiam inveteratam perfecte curavit, cum alia medicamenta nequoquam tentata fuissent. Hujus mentionem & ad hanc affectum lenicodum commendationem factam invenio in *Herb. Sanitate Langlone.* Idem.

Acetum radicibus imprægn- *Jittiii,* ac loco orthimi in nares attractu- modanti *lgiam* mirabiliter so- dat. *Schrad.*

Paralytin lateris *sanati* curavit. Tho. Bartholinus spiritu *G unicnti* cui *hcrfea* ParaM« *incoct* tat, ut ipse refert, Ephemer. German. An. 2. Obl. 2.

CAP. II.

Vt Auricula arsi.

A Similitudine aliqua foliorum nomen sortita, differt à Primula veris, cui aliâ simillima, fo- liis levioribus, densioribus, succulentioribus, flos calyce brevior, ut florum tibi fore nucli appareant, foliorum quorundam rudimentis in caulis vertice è quibus florum pediculi

- i. *Auricula arsi flore luteo* J.B. Ger. *arsif lutea* Park. *Sanicula Alpms lulta* C R *Hellott*
Deary ear o; OrifOu^frmn^oUjnip .

Clas.

Hujus *folia* Primule veris foliis fore respondent, rugosa tamen non sunt, sed crassa, Fabarie fo- liorum instar, eaque aut farina quasi polline conspersa, & prostris incana, aut leviter tantum cano- scenna, interdum omnino viridia & levia; nullis omnino vel per ambitum serrata, vel nullis denti- cula prædita, interdum novella duntaxat dentata, vetusta minime, omnia autem gustu amara. Ex horum medio aut è lateribus prodeunt *cauliculi* dodrantales aut minores, nudi, veluti quidam fati- na resperti, qui 10, 20, 30, interdum etiam plures (præsertim si in hortis colantur ubi admodum luxuriant) *flos* sustinent, ex uno veluti capite æqualiter prodeuntes, & petiols (quos tanquam squamule quædam incane ab invicem segregant) brevibusque *calicibus* inhaerentes, Primule vo- ris similes, quinque aut sex divisuris constantes, dulcem & melleum quendam odorem spirantes, coloris aut lutei aut pallenti, atque vel majores & ampliores, vel minores, omnes autem interiori circa umbilicum albo circulo insignitos, *file* inter stamina nonnunquam prominente, utendum nulla. *Stem* deinde fuscum, inæquale, bullatis vasculis inclusum quale Primularum veris. *Radix* crassa

crass' est & mulctis candute oblongu'tis tibris pr-di:t, ex qua in cultis n pangatur plows pianos enlci lolent.

Cre I at in Sijfxrg. Nuberg, Etfcicur, Sc alii s vidnis At: fl rir, b; (,fc, v, Ci>f Atiricula urli 7. C/<' <<t. j> y'f. ab (uc non vklotur nob. Ipecies diverla.

2. Auricula urfi flore y. irft/rto G;r. ^ e fjm-o Par'i Auric. urfi, fice Pri W/J vtru A Jm nbtvt J. B. SMSOJA Alpina purpurea C. B. |j>ur]]r 23r.iry. /at.

Fe< r r upis breviora sunt, extremâ parte latiora plerunq; .; 5c inicio rju-ii ronindaj qux cempo- ra fuce n angustiora circa radicem fiunt, crassa quidem illa, sed minus quam superioris, in .milliini ferrata, lupc mē viridia & levia, infernē e sviridi pallefosmia: ince que vel ad quonun latus ex- eunt nodi, dnas nncias longi, auc paulo longiores CMMUHI, quibus iniident lex, octn, sue plures- flores, lu jiiil in upuc aur umbelUm a n gelst, ut :n fuprii i re, illique formâ funiles, sed majores, n.ibro colors ntentes, obfeortore tatnen innio quaii mom mm Iacco in :inde fent, cle garni & diltadi rab purpur t gniriffimi, mruscn- ca umbilicam pallentes & exalbiti, odorati quid- dem tllij Ted minus (iiprioribui, Sam in capitnlis longt nitnoritUij parnim, uigriiitij in»jualt Radix pno i similis.

[nOonipow: nō & vi inis AlpibusaWndtrnafci intllcxi: Clulius, cam in Auilriacis& Stinacis J Alpibus fcifW (quadriforis.

AutiaJa uHi ;. Cluf, Auricula urfij (lore rubro, maculis exalbiJii, foliis fubhifutis. J. B. Sani- cuta Alpina flore ranegaco CJSI ioliU mini ribis, tenerio ribus, minus cratlii^ [ubbriuns, &: (lore rubro, tniculis exalbitiu aJperlo i prxec^ iente differt; nec tamē . ut puco) Ipcw Jivcria c(t.

* ;. A*ritxU urfi y. CllC StnxuU Alftn* fbtit tetundu C t t

Fe< circinau feri rottuwlratis, lonfjiuicuU camen & in ambitu fenara, long^ mlnora quam prr- tedenrii, & minus vindia, l&l aliq uantulum canefcentia; inter quæ tonus & lelcanciam longus canaliculus exilitj binos, teraos tut ;. ures fores luftinens, fupiore minores, quinque petalis bifidis ctinm cijjiilt-iuuc^ coiore rubenie rtunu* laturo quam in prcedente. Radix hbrola tit ut relt- quorum.

4- 5 auricula Al?&w ruht feni folia non ferrata. CJ- B. Auricula urfi carnea coloris, folia minima jerruns J. U. Atirtt: i la urfi 4. Clul.

Cluf.

Quarta hæc Clula Auricula minoribus est quam fecunda foliis, carnosâ, macronatâ, in ambui non ferrata, fupernē levibus & fplendentibus, infernē ex viridi pallentibus & venotâ, minoroque acrimoniâ & amaritudino præditâ quam aliarum folia. Flores illi fecundo generi fimiles, profundi- onbus latinis (eb, tolore dilutius rub- nec, intus circa umbilicam incanâ quidem lanugine vi:loli, ftylo prominere, biu termautad iimmumquaterni. Summo unciali, raro longioris C- miculi ra- ftigio nafcentes. Semen in p-irvii vaicttlis icli<ii> m- p- & fulcum. Radix min- Sc nigtkaiu, atque ad- . imeroLi I'bbolo interdum fe propagans ut latiffimos celpites occupat.

Ulvenerit in Snek & reliquisque vicinis pagis & Stiræ Alp- ixisfroqu.

5. AurtiuU itrjl vL Ctuf. AXTKUIS ttrfi *H* J. B. SttuCU Ahma *b< fahu ntn crtnxtk C B>

Floris præcipuē colore candido aliisque accidentibus à cultura & fatione ortis à præcedente ItSerc, unde nec fpecie ab ea diverla .ii puto. Siquidem ex Auricula urfi femina lato immutata fer e va- rietates indies producantur, non floris colore duntaxat, fed & figurâ & magnitudine diverfa.

In Ct r. pofl. Clufius inter lextam & leptimam fpeciem aliam intorfert quam (cpnum facie, qtu ipauc is differt à prima fpecie, ut epa femini lato ortam folium debere fufpacer.

6. Auricula urfi anguftifolia, colore rubnrt J. B. rftfrir. <<rf 7. Clu(> 1; t. 8. epifdem cur. pofl. SiivtuU Alfm* mpiftfdtt C, B.

Cluf.

Crassifolia radice n titur.qmn e hand diflimili,mules candicantibus fibris capillat, ex qua angufta folia quina aut fena, succulenta & pingua, quartæ foliis multo anguftiora, à modo ad extremum ufa, mucronem in ambitu ferrata, l. m. l. l. que gultus prædunt. Canaliculus inter ea nakitur tres uncias lon m- nubis, inLVB, luftinens capulorum e folioli compactum, unde quaterni aut quini flores cle- gantiffimi, quatuque petalis bifidis ut reliqui con- lantes. Capicula hujus quartæ proxima e int; Se- men obfervare non licet Clufio.

Crefcat i DI- bulbulam Stiræ & Carinthæ Alpibus, præfertim verò Tauro monte & Jade jugis. Flores hâc finem Juli, nubis liqueticonbus. Rara est, & culturam agræ admittit.

Similem huic in Tyrolenfibz Alpibus nafci poftea intelligebat Clufius, cujus plantam Bocatn a fratre Gregorio Rhenenfi Capucino accepit, eulique iconem exhibet in or. p. 7.

7. Auricula urfi minima flore carnea & neta J. B. Auric. urfi 8. minima Clu C hift. Auricula Alpina minima crenata C. B. v. 110. Samsi tra euldem. Auric. urfi minima alba Park.

Cluf.

Folia hujus unguem magnitudine vix æquant, infamē circa falem anguftiora, fupernē & t- tremo latiora crenataque, viridia, nervofa, fupioribus minus denfa, amari gultu. Pedicellus inter folia exiit, vix digitiun tranfvicium alto, unicum, interdum alterum, flores ferens, dilutis tu- dcn-

tis live carnei coloris, e fimbriato <*hcula obniliore prodetintcoi, modotum, incus ctUm Jeirc* i mbi-
licum candidi lanugine pube^ mem, nullo prominente flylo. Neque luius fmntp) servare licuit,
cum in hortum cum luo calpate tra ::ilit. id mig&m nuur-uin rxrtvcnem. Adrians fwnm in modum
le p propagit & iocor Juin m.ignoscefpitcsoco.. par candicantes fibras e Cnguhs pro; a pinibus icmittCnv
In (iiiiimo Sncberg jugo, inque Tauri> Si Judenberg moniitxii invenitit. Floret eodem tern-
pore cum rLqua.

A. 3. faritjtk* Abms taaj<r Park. Verk*jt*lxm A'fsmm nmhUjtum mtjm C. B TrtmnU ,
vru flore albe Ger. Claf

Cuf.

Fibrousa^i-ambin Prim Ix veris rsJuihxt hxret, ad qoarum caput alia: novj: p iantale fecun-
dum nutreni -abinde germinant. Il nte verr folia deni aut duodena emiitir, initio Cvk.Xv in
globum contracta, que lacteilla temporis lele expli^ntj & hum: fparguntur, ftintque exriere parte
incani, veluti fcni quida im apherla. nervorum vtdantiuni dulcaris virgiz i; itncra raro «
vir: palJcnri.; sextantali longitudi ine, latinidinc unculi, arcumcirca ferrau, ahq amulum rripa
& dentalcala, Auricule urfi, quam Primale vrrs timiliora, acris lapons. Ex horum u: dio aani
aut plures allungunt ca tiadi dod: antales, intero -m pedales, iudi, giacilcjj cnotdj, in quorum ca-
cena nfi umbclU iiJit florum i numeroforum, femuncialibus -ctbetJis lixiciitit.!, Hotflis Aunculz
urii reffondentium, magna ex pane tleganti dilunonfcq purpuri nitentiiiin, aut camei colons., in-
terduo Cuurarii'ii rubciittuni, nonnunquam (led raro) onimno candidorum & etiam exalbidora-
tura; otncs autem area umbtbeum luccoli iitit, Sc jiiquantulum odorati Semes deinti in oblon-
gs vafado admodum esili fiJrelccm continetur.

In prarit montofiSi lods fumkiis & pilufhtbus, in Septentrionaii comitarus Eboracenfe parte &:
in Wcrtmorjandia CQKME proven it. Floret Maio.

In horros trannaca, qianicunqic curamaahitiwooa diu. durat Magoi copii tofc Cluiio pro-
venit in uligtuui. Cc vium* UIM Viennenfi pfai*.

* q. PruTM/j wru maur pmrfmrfttms J. B. Virdffu »wvr ^»« n»ir« Parfc^pataA Prim,U
•vrrit fitrt rmlnv Ger. VifbtfcuUm amtnimxm Aipvmm mom CBu SOirtit tpm.

Prxcedentipromnia fimilis eft, caule rrium quatuorvc unciaruin ; foliU pxnc Altinss vtilgarb
ti cdim di.Tiidio minonbus, vit apprenribusaeius; flonbui pauca, uno la. auobos vcl cribus.

" 10. AurKuUMrfiMyemifihfs ccrulta J. B. Auric, mrfi fore ccntUafolu Bertfmu Park. Sa
£ </ina W. Bregua v Bf C B.

X*A»i multis emiitit fere captiLceai, (uTcu, pectiv inkxrenws, piftu adfringcott); area quo*
/UM perhum>> repunt. BoraRim qmAtnmii nmt&t, in amhita nonnihil lu muu, jilpca, TMp-
li, enfla, nrv ola, pilofa , nuxune prope rx^csi: « ii» enim ad (blioram exortum imgtu piIm n
conecne, tom ento cadam & vctun julw Jldmilb aUKJBH. Estiem WM cam Jiiprad qaam in-
ferne villofa Cuit, ai^H pun in ambitu pif ubique rufefeum. E foliorum msluo iiuo aw trei rj».
lxmis emcrgunt, ro:u- M, •• -intilc*, hiriiti, fobdi, fiicofi, purpurafcentes, cum dulcedine adfri-
gemes, in quorum fjtigiU ^r< funt coenilei, penupctdi, 6£ in borum modio ftamim lutca^ vdoti
ex vafuib, gram Horda hguia, fed maiore, in imo fiorisporito cxeunna.

Nafarur m umbroll monlosirtjue locii, nonnunqium ctum humidis. In Pvrcn<is prapicuz
repenrur.

CAP. III,

Dr Ccrtuft.

Fo di. cr. Im Knuioribus, brij angilofis feu in laanii divilio, fic -nbus panrti i PjraJyfi & Auricula urfi

I, SweatW Alfm* frvt Ortftd Mattbic'.i Park Sim. Alt. Clmfir, fivt Cmmf* Martiali Ger.
Ctrtufi* J. B. SMXUU mentru tssificit* laamstm C B. S&fartftM panicle.

CM

MLJU fel* promit noro vere, firi* crlflb pediculo memdo, adco fofc per orai initio contra-
ntu. pnoni pane, ut orbiculata vide -amnr; admodum rtervoii & rugota, (upina ver6 pwtctu-
nienu, crispae ut Lufitanici Ranuncul aut Lactm. • <P luttj: (oliai dcinde ubi fffc exolicirunt.
m ambint non modo fer au, led cruin in lex aur phire laciniis divita, omnino virentia, fupernc
quod ammodo Splendens, inf rrn: nequaquam, fenidci guftu; inter que p linaris exit cauliculus,
firmit, rocha mado & line ti'llhs lubpurpuracens, qui in fummo Primularum & Anemone
ftar, < medio quorundam foli >uni captc oflo, novnn, au; plures protit fofolus, Campanule
modo penlil« & deoriam fpeftans, quiquc crenii dirtiot, clegani flimo rubo colore lenuo &
ad purpuram tendente, fundo interiore albo, m quinque atigulot ddcinenc, prodcunttubi ex inio
quorijue ptmmd lutes, albam fufcicm, & raedium oblongum ft>uni uxrplc*
ctet l nbui, luavii <K- qmbw ddHucntibui luccc hnt luvofa ca-
pula, tenue, fulcum ut Hial*«w cominemu; JMm nunwrofc., k>jt> rnuibus t nigricantibus

hbit*

fieri ex uno capite proleptibus constat, fingulis annis ad latera angulos & incrementum lumen, ut temporis succellit, veluti Auricula & Primula allepuz similes in plures floras divisi & pangi possunt. Tota planta hirsutiora lanugine pubescente.

Promulca nascitur cum Sanicula Alpina guttata in Austria & Serie Alpibus umbrato loco.

Singularis esse videtur & sui generis planta, tum ab Auriculo veli tum a Sanicula guttata diversa.

2. *Cortusa Indica vel Hedera terrestris Indica* Bodai à Stapel in Theophr. hist. An *Sanicula sive Cortusa r. rterkana fruticosa* Park.

Bod.

Ex radicibus capillacis caulis alis promit repentes, sabburifatos: Folia Cortusæ Martholi similia. Majo mense cauliculis promit exiguum, digni majores longitudo line, in quibus *caliculi* palliduli, antequam panduntur figura Hyacinthi Melici, postea stellares ac candidi, mox multo flammibus prædit. Hanc speciem nonnulli Cortusam Americanam flore fimbriato appellare ad differentiam legitimus. Vascula semina (observante * D. Hermanno Botanico Professore in Academia Lugduno batava, & Horti medici ibidem perfecti dignissimo) cum Sanicula non conveniant. Ego olim Cortusam hanc flagellis repentem aliquot annos colta, verum minus tum diligens sui in observandis feminibus aut seminum conceptaculis. Anomala est planta, neque ut satyricor, genere convenit cum Martholi Corma. Verum quoniam Cortusæ nomen usurpavit, hic maneat donec ejus copia mihi facta fuerit.

* Exrelatone D. J. P. P. M. D. P. M. D. P. M.

3. *Cortusa Americana flore spicato, fclato* Hort. Lugd. bat.

Hæc à nemine descripta est, & D. Hermanno antea ad Pyrolæ classem referenda.

Folia una longis pediculis insident lato seu planis, Sanicula guttate ferè in modum dentata, nec figura sibi valde dissimilia, circumscriptione scilicet subrotunda, sed paulo longiora, majora. In caule biiu ex adverso sibi respondent folia, minora multo his que ad radicem sunt, in acumen producta. Flonim Ipic* Ictisulmaria è carn *fasciola*, brevibus admodum pediculis insidentibus composita: qui quales fuisse nescimus, jam enim cura planta collecta fuit præterierant. Flosculi succedunt vascula compressa, bicapitata, Thlaspeos amola, que eodem modo debilitant quo Pedicularum later vascula, semina in utraque cellula nigra lucida seu splendens angulata & oblonga continentia.

Plenum fun in horto Regio Parisiensi collegit, & exsiccatam ad me transiit doctus. Vir D. Ham SU&ie. Anonuli est planta.

4 *Ctrfus* Atfic^f* j/ff* foliis minutis fimbriatis Martzel. *Sanicula sive Cortusa Americ. an. Cr.* Hort. Reg. Paris.

Fkfculi albi, capillacci vis confpiciuntur. \$me» in upfulis rotutnlis niBnim, splendilumque contitienir.

Sanicula s. v. Cortusa Indica flore spicato fimbriata Doleris, an à *peractantibus* distincta?

Ra. i. m. obinet subrubentem, capillatam, lapore adstringenti: multa inde protrudit germina, denso cespite foliorum angulorum, denticulorum utranque hirsutorum, & pediculis pilosis insidentium, truncali longitudine, solum umbrantia. E medio cespite exant *cauliculi* flures hirsuti, pedem alti, & ad modum altitudinem nudi, ubi hinc foliis sibi mutuo oppositis, aliisque pediculis adnatis, acutioribus magisque dentatis in que in uno seu ad radicem sunt vestiantur: reliqua pars caulis veris summitatem spicam producit foliolorum albenam caliciformiam, in quinque laciniis divisorum, colore albo ad rubrum tendente, pediculis brevissimis adnexorum. Modicum florem occupant octo aut decem *floribus* spicis flavis instructa. Præterea flore calix grandæscens fit capsula seu vasculum, quinque aut sex grana ovata, nigra splendens continent.

Aonli fii .Lnu nicr sibus floræ: umbra gaudet. Amc Ianz originis est, unde id nos tr. mliju.

Tempus Cl. Linn.

CAP. IV.

1. *Chamæscissus Alpina* J. B. *Sedum Alpinum* 4. *Clois* Ger. enac. *minimus Alpinum* *oblongum* Park. *Alpinum hirsutum luteo flore* C. B.

RAdis huic exigua, nigricante cortice tecta, in superficie terre in multa capita se spargit, Sedorum minorum imitat, quorum singula denso cespite foliorum constant. [capsula hæc ocellis vocat] Bauhinus] Folia autem perexigua sunt, oblonga, angusta [J. Bauhinus longitudinem seminalem, latitudinem culmi in attribuit] acuta, per marginem æqualia, admodum villosa, præcipue circum oras, Paronychie vulgaris foliis figura nonnulli similia: Inter que emergunt *cauliculi* duntaxat tramine unchaum, teretes, rubentes, villosi, rigidi, foliis nudi, gestantes in summitate *flosculi* umbellatam dispositos pro plantula modo magnos, eodem fere modo quo in Paralyfi moctant dicti. Singula *flosculi* pediculis brevibus insident, e *calicula* exigua tardiduli, quinquepartitis exstant: sunt illi revera monopetali, in quinque tantum segmenta seu lobis expositi ad ipsum usque centrum seu umbilicem adeo divisi, ut pentapetali videntur. Primale verum in modum; singula autem segmenta (sua parva manu dicere) in circumscriptis subrotunda sunt, non blanda sed coacta et in Primula. Color carnosus est, circa centrum tantum luteis rubent.

Strucina multa inque *Stylis* conspicua in floribus quos collegimus. Umbellae exortum **ircum/lant** foliola viridia, herbata, infima humi strata multo minor, plurimum quinque, Tithymali Helioscopi instar. *Foliola femoralia* ut in reliquis congenitibus.

Locus

In altissimo vertice montis Juris *la Dolé* dicto invenimus: J. Bauhinus in **micodo** Burmo Toponym.

Flores in montium jugis dum recens est odoratissimas, Jasmini instar, ut **Chamizalmen** Alpinam voco, Aristolochia Alpina cognatam. Flos candidus, utate rubescit. *Græc.*

2. *Solum minimum Alpina callosa alium Park. An præstanti virtute?*

Mulus habet callosa seu capitula foliorum oblongorum, tenuibus ad marginem pilis obtusum, et quorum medio exstantur *cauliculi* tenues, tres quatuorve uncias alti, foliolo similibus obtusi, tres quatuorve *foliolo* albis in castrum gestantes.

Ob nomen conveniunt à Parkinsono impostum Chamizalmen subjungimus, etiamvè caulis foliosa diverfam arguit, & ad Solum ponis referendam.

CAP. V.

i. *Androsace Matthioli altera* J. B. Clus. *altera major Matthioli Park. Alpina affinis Androsace della major* C. B. *Androsace verna floris* Ger.

7. B.

JK *Stylis* singulari, tenuis, fibrata *cauliculi* emittit septem, plures aut pauciores (viginti interdum ut ego observavi) palmares aut dorsuales, nudos, nodos, teretes, hirsutos, [herbatici coloris, aliquando purpurascens] quarum fastigium in sex, septemve abscissos, unciales & longiores, *cauliculis* mentientes, ad quorum centrum & exortum radiata foliorum septem coarctata, oblongorum, pilosorum, quibus subinde crenis incisiorum; ceterum singuli pediculi *cauliculis* gestant inapiculatum, in quinque lacinias acutas, foliorum instar habent, divaricata; quorum umbilicum cum globulo *Stylis* obidet albus, parvus, [in quinque crenis lectus *Clus.*] quo marcescente globulus in Piti molem grandescens *semen* continet copiosum, triangulum, oblongum, rufum, [Prinela veris semini non caspar sed magis.] *Flos* frequentia per terram in orbem sparguntur, uncias duas circiter longa, semunciam lata, hirsuta, Plantaginis instar nervosa, & per ambitum subinde crenata, colore ex viridi pallidescente. [Ci>JccLi ctun roliis pmnanQ atiJrtmr] *cauliculis* in toto gustis, paulo post amari & acris deprehenduntur *Clus.*

Locus

Copiose nascitur inter segetes circa Badenles thermas, non procul Vienni Austriæ. *Clus.*

2. *Alpina affinis Androsace della minor* C. B. *idem, Alpina* *cauliculis* eadem C. B. *Androsace minor* Park.

Matthioli

C. B. *prol.*

Radiculis habet oblongam, tenuem, rufescentem, circa quam *foliola* multa, per terram sparsa, parva, oblonga, orbis crenatis; inter quæ *cauliculi* plures, multi, nonnulli pilis, æquales, duas, tres etiam quatuor uncias alti: Summo fastigio quasi umbella ex octo, decem, *cauliculis* pollicellis composita infidet: quorum singuli *foliolis* parvam, albam, **mar Anlrtsfau ihrtut** *cauliculis* sustinent.

Locus

In arenosis provenit non procul Herbipoli.

3. *Alpina verna Androsace capitula* C. B. *Androsace minima* Park.

C. B. *prol.*

capitula est sabulosa, unciam trium, ad cuius *radicem* simplicem & brevem *foliola* Paronychia vulg. minoris simillima, orbicularem per terram sparsa sunt. Ramulos habet tenuissimos, binosales, nudos, reflexos, circa quorum medium quasi corolla quinque minutissimorum foliolorum, unde pedicelli quaterni aut plures emergunt, & singuli *callosam* exiguum, quinque apicibus donatum, è capsâ medullis *foliolis* parvis, albis emergit.

Hæc planta Northusane alpina est.

PL,

arsJeuJtm f 6l''

v.

CA P. U

De rsftijtje.

A ViSc<fledunonK in accepit hæc planta (inquit Columba) (jtn: quia canes inferunt, à canibus nomen habet, *ars* *vi* *sc* *ledunon* dicta.

Nota quo sunt Folia in calidibus binis opposita; succus lacteus; **MJUC utugerx** oc m plerique specibus genuina.

Apocyno nullam vim homini salutarem inesse tradit Dioscorides. Galenus non tantum canes celerrimè interire scribit, sed & hominibus venenam esse, & extra solum corpus **inpolifurn** discutendi vim habere.

Folia Apocyni Syriaci contusa (ut in Alpintis) tum in aqua cocta; emplastris modo opponuntur in Irgidis tumores & doloribus. Ex bnuagne param cubeba Egyptii in suum usum. Utantur etiam ei ad extingendum ignem ex fisco excussim. Succus lacteus, quo scatur, calidissimus est & exurentis facultatis, quem plures in quibusdam vasis excipiunt ad depilanda coria; nam si aliquanto tempore in eo macerentur nisi macerantur, Lac quoq; siccatum praestantius corpora solvit, atque dy-
Icnce rios fluxus etiam lethales facit. Est etiam praestantissimum remedium ad impetiginem curandam, si ail plurci cudsmaais Si mfdioncs toll.

1. Apocynum sive Periplaca scandens, folis longe, flore purpureo J. B. Apoc. folis oblongo C. B. Apoc. 2. angustifolium Clus. Periplaca repens angustifolia Ger. Apoc. angustif. sive ca-
rark.

J. B.

Topiarum opera utilis ad pergulas obumbrandas experta est anademata haec planta, non aliter ac Periclymenium vicina adnuncula folia scandere, vicinis pedamentis sese convolvens (unde Periplaca quasi circumplectens, eo quod proxima amplexetur dicitur) multa longissima sarmenta quibus etiam praestantem arborum (si vicina nanciscitur) cacumina superat: lux vero ea sermota
dm.l. lignosa, lenta, fractu laxa, rutilans ex fusco colore, multis nodis sive geniculis distincta: e quibus hinc folia opposita. Aldequalis, sed ex minus lato principio sensim dilatata, ex intervallo, lacteo pregnantia succo, in modum acutam paulatim faciliencia, oblonga a medio nervo ven-
null., cis margine definentibus, ut in Myrto Laureis, quarum extremitates colligit vena, totam ambitum circumuens, viridis. Flores extremis ramulis lacerales quaterni, quini aut plures, veluti umbellam
bellaj conficiunt, quorum singuli quinque, folis radiatis constant, quae infra na parte glabra ex luto virefcunt, superne vero hirsuta, oblonga purpurea (cuius mediam partem rhomboides macula viridis obinet, tincta luteis virefcntibus, quae vero foliorum concutunt exortis oscollam efformant rogeriori purpurea, quinq; eundem colore flavosides nro recurvis emissa; omnium aetiam medium occupat quinquedartium, albidum, villosum capitulum. Floeibus porro lacerales flavae Rhodo-
dendri oblongae, torula, geminae ut plurimum, & extorsum aliquantulum inflexae sive divaricate, deinde mucrone coalescentes; quibus defuscantibus pappi lanugine involutum semis apparet. Ra-
dis late se spargit & subinde germinat.

C. B. lirk. Apocyno sive Secamone flore albo J. B. Apocyni
sive lotffrtm m'ttra Ci l.

Apoc.

Planta est repens, altius saltem, seque a boribus convolvens, folis duris, longis, Soctios Ethiopiae proxima, sed majoribus. Flores hinc albos, Syriaci similes, duos quatuorve simul copulatos, a quibus produciuntur silvae longe ac crasse, quales in Rhododendro cernuntur, plena lanugine alba, ac f-
mense parvis. Ex hac planta succus emanat flavus, urens, quam hecatium Egyptea valenter tenuis
humores purgare auit.

Præcedenti (inquit Cluhus) per omnia Fere v' m'is est, sed tenuioribus ramis, multoque angu-
stioribus folis.

Ægypti incolæ est.

Parkinsimus Secamone in JEgyptiæ Alpini ad apocyni secundi specie altera separata, & C. Bauhinum reprehendit, quod eas conjunxerat Bonnus male hanc plantam Phalcolium
occat

folis se extendit C. B. latifolium non repens Park. folis raris, flore ex albo pale-
fente J. B. Periplaca latifolia Ger.

J. B.

Brevis frutex est stirps haec, naque proxima se advolvens, verum sui nro viribus recta stat, pel-
licari crassitudinis stipite, in plures ramos devisa, cortice cinereo. Folia ex diverso hinc ad sus-
gulos nodos nascuntur, heteraceis similia, non angulosa, modice acuminata, crassa & mollia, un-
ctidib aut sextantibus pediculis harentia, succum resinentia ex albo palliscentem; ex quorum
lun flores ubertim emittant, longi innixi pediculis, umbellam quodammodo emittentes, candidi,
e quinq; foliis oblongis constati. Fructus non observavit Clavius, sed Aldequadis fructus pene
similem intellexit, cetera & semini semis par, planum, in medio aliquantulum intumescens, ul-
gram, alba interiore pulpa. Radix later crassa, pingui succo turgida & fragilis. Hyeme sola
abjicit

Locus lualis Don a nro traditur; Syria umen & ulivliontm regionu! incolæ esse dicunt.

4. Apocynum latifolium amplexicant J. B. Scamoneia Menfeliaca sive Park. Scamone. Menfeli.
sive folis acutiorum C. B. Apoc. 3. latifolium Clus.

J. B.

Longa, tenuis & frequentibus sarmenta proxima quaque scandit, multiplex circumvolutions
& arcto nexu illa amplectens; viridibus, geniculatis: folis Hederæ, mollioribus, subcineracei colo-
ris, lacteo succo, ut etiam sarmentis, adeo turgida, ut vel levissimo valente non minus copiose quam
ex quovis Tithymali genere profusit. Flores ex alarum limi multi umbellæ sere in mucrone produnt
ex, candidi, parvi, quinq; folis perinde ac Aldequada theses constantes. Silvae præterea similes,
multo tomento & lanugine plene, quae semis occultatum planum, ex cineraceo-fuscum Aldequada
semini par. Radices candidæ & fragiles, sarmentose & flexile admodum, longissime hinc illas
serpant & loca vicina occupant, hortulans ob si moleste, & otiose.

Circa Cataniam Siciliæ urbem collegimus, & Pincia Hispaniæ ad Clavium m'isum est.

Linn.

Apoc.

5. *Apocynum latifolium Scammonia Valentini Clus. Scammonia Afr. Bellina dilla Park. Monfrel. fove parvo J. B. Aloe latifolia eximioribus C. B. Monfrelensis Ger.*

7. 4.

In longis, teretibus, tenuibus, bicoloribus (arista, vicia quæ amplectentibus, ramosis, folia nascuntur opposita, Aristolochiæ Clematicis, vel Alari, foliata ad pediculum, in medium de-
finientia, lata, densa, glabra, albida, unci longioribus pediculis herentia, sicco lacteo pergrana.
Flores ex foliorum sinu pediculo orto multitudine insident plures, confertim congesti, parvi, stellati.
alba. Semen Lobelio argulorum, in utriculo innoto quam Aristolochiæ. Radix longi digiti ferè cras-
situdine, alba, longa (vixit Lobelius) reptans multum fibrosa, succulenta veluti reliqua planta.

Luc.

Ad mare prope Montopolim ortus, & ut Clavius refert, in regni Valentini maribus.

6. *Apocynum Syriacum Clavi Ger. emac. velum Americanum majus seu latifolium Park. Beidell-
sar Alpina, seu Apocynum Syriacum J. B. Inapitium Aggratum bellifolium sive Alapa-
da C. B. Hispanæ seu Vincetoxicum Indianum Ger.*

Radix constat alba, pollicem crassè, parvis fibris donatè, quæ longo reptans horis non modico
citer insola est. Heridem superat humo sepulta vivens. Sub finem Maii foliones teretes [John-
sono quadratos, digitali crassitudine, concavos] lentos & fractu continuatos, duos tredec cubitos al-
tos, superiore parte ramulos parcos è foliorum sinibus alternatim emittentes exserit: quibus alter-
nata linea semper aduersa, nullis intercedentibus pediculis adnascuntur folia, lata tres uncas, sex
longa, à latiore basi in longam gracilem cono rotundata, firma quidem illa & crassa, ad Aloes
tamam crassitudinem minime delicta, aliquid nervi è media costa ex umbis satis crassis, & aversa
folii parte maxime conspicuis prædita, ex viridi pallidiora [Johnsono superius obscure viridia, in-
ferius albicantia] gravis odore. Nec à tenera lobis adolescentis lenis carne, & dispersis vixit
primis cum raris albis, foliorum caule, ramis, nervisque cunctis acre & amarum lac uberrimè
effundit hæc planta; quod concretis loca calidioribus, non saporis sed candorem quadam simi-
tudine *Moon* & *Saur* el *asar* appellatum fuit.

Circà lunatum casu fastigium pediculi crassi, singuli [non bifidi ut vult Clavius] extantium flo-
rum umbellam sustinentes, quinqueaginta, sexaginta, aut etiam centum, vel plures floribus com-
positam, tenuibus, longisque pediculis appensis, & plerumque pendulis seu cernuis, terram respici-
entibus. Singuli autem flores componuntur primò è quinque, folioli exiguis, viridantibus, retroctum
reflexis, quæ pro calice intersunt; deinde folia totidem quadruplo majoribus, retroctum pariter
reflexis, & prædicta calycis folia obtegentibus, hæc autem inferiori parte viridia sunt, superiore pal-
lida cum aliquo rubore: restant tandem interioris siccæ quinque granula (si ita appellare liceat) ex-
terna facie Milia grana similia, interiori concava, colore laeve rubente, è quorum singulis singula
egrediantur filamenta seu stamina, capitulum parvum subrotundum circingentia, inferiori viride, su-
perius albicans. [Clavius flores hinc eodem folio constare, sed quinque profunda malis dario,
instar Borum Apocyni Asclepiadis scribit.] Ex numerosa borum compage vix una aut altera
siliqua succrescit, quæ longitudine digitum implet, continetque membranaceo involucreo semina lata,
depressa, instar Cocose Imperialis, frequentia & quasi imbricatim disposita, quibus ad germina
promissa lanugo sericea adnascitur, candidissima & mollissima, ignota celeriter rapens. Siliquæ cum
lemine & lanugine intus contenta Asclepiadis siliquis simillime sunt. Exterioris fructus membrana raris
è rariorè veluti pube resperfa videtur.

Parkinsonius noster Apocynum suum rectè latifolium Americanum à *Beidell* Alpini, &
Ofer frutice Belli, i. e. Apocyno Syriaco Clavi specie, diversum putat, his rationibus iunctis:
1. Quia Apocynum Americanum frutex non est, nec folia per hyemem retinet, *Ofer* Belli in-
ferat, sed tota ejus superficies hyeme quodammodo emortuit, radice detrahit in terra superflue latente.
2. Quia lac Apocyni Amer. acre & crassum non est. 3. Quia siliquæ Apocyni Amer. incurvæ
sunt & prolixiores, *Beidell*is autem rectæ & breviores. 4. Deniq; quia Apocynum Ameri-
canum radicibus insigniter reptat; casus qualitatè in Descriptionibus Belli & Alpini nulla
mentio.

Nos tamen his non obstantibus tam *Beidell* Alpini, tum *Ofer* fruticem Belli unam & eandem
cum Apocyno Americano *Park* plantam esse minime dubitamus: siquidem *Beidell* Alpini cum
Ofer frutice Belli specie convenire tum nomen, tum locus natalis suadet. *Beidell* autem Alpini
Apocyno Americano *Park* eandem esse accuratius ejus descriptio quæ extat apud Illustris. Velling-
gum *Ofer* *Carum* in *Alpin. plant. & Egypt.* & siliquæ figura addita convincunt. Vellingus enim
ipse in Aegypto peregrinatus est, & *Beidell* loco suo natali crescentem vidit & descripsit. Nec
obstat, quod Belli *Ofer* suam folia per hyemem retinere scribit, cum eadem planta in calido-
ribus regionibus folia retinere, in frigidioribus amittere possit. Plantæ ipse inspicendæ & diligen-
ter conferendæ sunt.

• • • *Apocynum Brasilianum amplicaulis frutic. WMJrffij fir. Inzti Brasilienfibus M. JTSII.*

Morce.

Caulis laminosus, externis cinereo, interiori viridi, spongioso longe humi læpt, aut alibi planta
è implicat. Folia semper sunt bina in suis pediculis hæc opposita, figura cordis quamvis ventricosa
& oblonga cum præca, mollia, subherura externa paulum incana, in caule quos, multos ramulos ter-
rectos, solitaria cum similibus foliis opposita. *Plumula* sive copiosa ad capitulum folii præculant,
vario modo sine proprio pediculis: quilibet autem constat quinque foliis, & bellam quinque-
angularem apicè repræsentat: in medio habet orbiculatam lamam, hæc elevatam, cum circumscissa quadam;
tota est pallide lutea, interiori umbrota, inodora. Hinc provenit *frutic* oblongo, crasso, in
cui uni-

ewremitate acuminatus, magnitudne ovi gallinacei, « viridi lubftmis, quando macuruSj iubens COfticem craffiore Aur-tnni, extenu* mult is prominentiis infiii- sculeoruni pri-dicum: Fun die deft fucaim Ifteum glutinofuni, iti ut glurinis loco fungi police: imrurior ipont li, JC bonus *ftm'ma* oblongaj nigra, infigni orduie difpohta liabst: quouillibct iiiiirem gramini *km* nis iijibe[*foc-* cum quafi £ gluma, coloria argent?!. jplcnJiiliflimt. Hi flou in extreniitate fnidiis interiusctjarn jungunturSc liipcnor pars cat'itatis rnieiui rionilr.it ianina, inferiorflocoos illos argent^, picundo ijwitalulo. Tocapianuolcc gravncr So copioliiin be ha bet lbiflimuni

• 8. *Apocynum Mtxicanum Tftztntlt JiHum ftujj>icu Majzumonni Fr.Heman^ez.*

Merbi eft *fali** ferens purpuratcentu, Limomi forma IcJ mojoia: *autlft*, <uincL feri dodrantes longosj teretes, purpurais, digicum craiosj genicu!icos **per** interval]*, *fruBxm* Clulli [CapRd^re-fttrum *ftmint* ptani orbicukri, & lanugine comprdiculo; *rtdietm va^*> contoTam 2c cantlidam, quibiildam veluci glandibus adhirelccnttbus.

Naidtur infrigidUScfaxoiu loci.

Radix extra mtuluc cinikfcit, giift.ua rirus minimi ingr.itum olef, Paronir fitnile. Ssn^im *Pint.* aliquid aalorisj *ni* dicam urcdinb prxbec crca gurmr.' Tufa ac >iil ponderc cr *aqut* devorau Qtnnc humorutu genus (upra intraque cvacuore dicitur.

* 9. *Apocynum Canadrsfe angit(tifoli*n\$ fion Awntii Morif. prxlud.*

Vis bipedalem excedit aJtitudinem: folia gent angufla, lotigioi> multo Apocyno iurreciO urnbellifero Canatt, [quod nos pro Beidelfar Alpiiu habcinus] In ciujtum iummis (Jltigin fierti aurrr aut auraticn coloris gent: quibus lingulitim fuccedum fiiiif mcinbrancejr., pappojx maicnx intermixu *ftimme* comprefla, rufa (cxrcrorutu ritu) continctes.**

* 10. *Apocynum Virginianum flore herbaceo, filiqui longiflora Morif. prxlud.*

Morif.

Hujus *folia* Uta funt, glabra, Bcidcl&r Arabum foliis magmwdine accedcnria. C </« habet ternosauc quatemopedesaltoi, iubrubros. In fumrus alts caulium prove nknt *tiafmli* herbacei, *epul-* dem cum crtens mx tortis forma:, fed multo minore*; qutbu* rUcctdis fdcecaunt *ftih*<{H*} dodran- ulcs, tenuiflunz, pappolain rrucciam & *fermns* contprecti, aiicxum more cUiuki. *Lactefce* ctiam aiiorum Apocynorum &c Atdepudum modo.

* II. *Afoep Indictm mi ut Namoralia foliis *B/cynii*

Btjn,

Simuc eft Apocyno primo ktifolio Clufii; 8c ficu minus ita in omnibus fufciliu'. depreheniintr.: *CauUs* proferttenucsjtereteSjConca.yoSjla^fcentes: perquo&ad g<nicula *nziamar fill** genu'na, contrario iitu oppolita, NummuLmc p^ria. magU acuminata, qunrum unum maius alterunque minus, femunaalibus *ic.* loigioribus pedicciu nuu. *Fle/c*U* perptihlii mulcoii, in uulium *Sc* ranwrum apiribus, ac inter fotiorum alas alcernu ordiuc, in umbellis panih catiliinlis *tenuiffimis* fdcundalibus inlidncilms dilpofitL

In Infiik *ZetUn* oncur.

11. *jifcepwm mmm rrtlw m CtntinU Corntlti. rtQum jOlgafii flitm Americonnm mhtn. Park. Cent*.*

Longe aliter fe lubet Apocynum minus, neq, enini fub terra repit til Syria cum., fed per Cin> mam terram multw tadioim fibramencji apricarur. WUo rev *relicis, folia* dip galls nun — longi. & acutii, pertereteni & airppurpurcum M<.'«» JC *minatim* pccolento more difpofit: *utrudine-* VIX cubitum xquac caulk, qui tu liinimo *fierihm* oin.tcur nuilm, umbellr f *cmi*: hi famili *i* **Quittem** cum Apocyno Syriaco hgurx, (id faturatiore purpura micnc.

Cum den on; it ciritis in duos cauliculos dividitur, 'ui ebciore fjeti alteram in fiftigio Honim umbellam ProfcrunL LcntorqiKKj, panter floreni obtsgif, 8c X mulcb tucturj qui li temsri ad- volcnr, vifco impbeam pediculis ccnaciur adlirrcclunt, *Hi* fruflra alarum rtilu vitr confolere ren- tanc Sub Aimimniun c Honbus n.ildror foUiculus umu aut alrei, membrarK^ A! *lepads* imtar, i quo *ftmns* deprejiJ 6c Uta LonJuduntur, a quorum aouion partC pappoQ Ian *go* dependet. *Plan* thzcUaeo tiiccodeleccio turget.

* 11. *Apocynum Canadrsfe folis Andrezemi majoris Bocconi, Morifon.*

Boer.

Hax planta raatate atque elegatitii inllgiiH, **Arbuftul*** more crigic *Caul* ijedali *SL* longiof f, cnodi, aphylo, (iubrufo, fupcm *in varios & multiplices ramos* diftributo atq, da *oottxsr. Fel,** l>ifia, iubrotunda, Atidi, *laxni* maj jrisfoliis quim proximc accedentia, e regione p *io, s, v, is* au- libus hrrencu, adorruni totius pbmx compaRan. Ab : *utremis* cymis caulium extum *TUoni* *ft.* *Ti* £ diluto rubore levitr pujpurallcn;t; *i Liliu (oijjr'allmiii aut *Unedoni* calculati; quibui iuli- *aifiU^ttM* Afdepwiis angulborec, candidi int *lanugine & femine* compreflo, i'Uno, tub *ulu* coloru rcfcrw. *R*JUM* longe lateque fub terram forpentes admodum vivaces *lun* nt, & liibido prot^nmnantctuieni in calcam areoUrur femiiB. *Lacteo* fucco fcatur, qui em mat quaaano, p*rtc vulnerccur, cweroi-um lui geneni omnium adinfar. **Mulemun** pernicious eft G Honnis iniioeat.

Luretix in borto Regio vidit.

InhoitoChdluno propeLondinutn colirut fub nomine Apo^vi flgc L4;i comfilbum purpu- **>• rafenic, Onotmonuit *D.Tj*crt<l>.<RA*

CAP. VII

Dt Aſclepiade ſca Vinctoxyca.

Aſclepias dicitur ab antiquo medico, nec dubium quin illud nomen ei impoſitum ſit à vi qui
venenis reſiſtit. *Ja Bed.*
Nomen Vinctoxyca vel Vinctoxyca barbarum eſt, & à recentioribus huic impoſitum, quod
illa inſignis adveſicis venena vis inſit. Vox conſtata eſt ex *vinea* & *toxyca*, rectius *toxyca* utraq;

Humiditatem etiam vocant à fructu ſeu potius ſiliquis quas producit, quæ deſuſcences
oſtendunt ſemen, atq; Hirundinis figuram referunt. *Idem.*

Ab Apocyno diſfert ſucco limpido, ſiliquis ſingularibus Cocco *ix* rotitum r^Aferentibus. At Co-
iumnaA ſclepiadem ſucco dilute luteo turgere ſcribi; noa limpido Icu iquco.

1. *Aſclepias flore albo* Park. Ger. C 11 *Afitpatfivi Vmtttmcam mmltu jterih*: *albicantio* ^y B.
Swallow wort.

J. B.

Numeroſas *radix* demittit fibras, bene habitas, longas, albas, guſtu nauſeoſo, *caules* ſurſum
tos, cubitum & ſeſquipedatum altos, hirsutos, *penicillatæ* ad *caulis* terminantur
adverſa, ex brevibus pediculis ſurſum vergentibus, *capitula* *convolvulæ* ſimilia
ſita, formâ hederaceorum, longiora, rugoſiora: Ex quorum alii pediculi prodeuntes, *flores* privati
inſuper pedicellis donatos ſuſtinent, albicantes, pentapetaloides, quinque apicibus concoloribus rotule
modo, ſeſſilibus, piſtillo vix mediæ occupantibus. Hiſce ſuccedunt *ternaria*, ſeſcunquæ aut am-
plius longa, *ſemes* tomento involutum continentia ruſſam.

Loca. Per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonenſem non in montibus tantum, ſed etiam in dome-
tis & ſepibus ubiq; ſere invenitur.

Viſs. *Radix* hujus herba alexipharmaca ac ſodorifera eſt inſignis. Uſus præcipui in peſte aliq; veno-
noſis affectibus, in obſtructionibus menſium, in palpitatione cordis ac lipothymia, in Hydrope.
Semen commendatur ad calculum. Extrinſecus uſus tam ſorum, quam radicum ac ſeminis eſt in
ulceribus ſordidulis ac malignis purificandis, ad iccus inſectorum m vcnen tocum, in ulceribus mamma-
rum, &c.

D^{vi} ejus ad Hy^{cm} rid: J. Bauhinum & Tragum, item Ephemer. Germ. n. An. 1. Ob-
ſerv. 16.

Radix pondere ſemilibra per noctem in vino macerata, & deinde niq; ad tertias decocta, manè
jejunio ſtomacho calida poſta, ſudore intermi provocato, niſiſſicè expellit aquam intercutem, adeo
ut illa per pedum plantas erumpat, eſtq; hoc ſingulare experimentum.

Nobis interim mirum videtur Apocynum malignam & lethiferam eſſe herbam, Aſclepiadem au-
tem ei planè congenerem ſalutarem. At Pena & Lobelius in Adverſ. ſe certum exploratumque ha-
^ aiunt jam diu Apocynum latifolium ſaltem aliis venenis à anc fac *ſtis* antiſpharmacum ſu-
quibus contraria ſcribit Cluſius.

2. *Aſclepias anguifolia flore flavoſcente* Hort. Reg. Parif. & Blaf.

3. *Aſclepias flore nigro* Ger. Puk. C B. *flore nigro quarundam* J. R.

Col.

Si: 1 nititur fibroſa, Aſclepiadi non diſſim^{£ £} ſeu viticulis flexibus, levibus, dactis aut
tres cubitos longis, in multas alas diviſis, quæ Periploca inſtar ſe circumvolvendo, con-
ſcendentes, in altum erigunt. *Folia* habet ſucculenta, mollia, viridia, brevia, Aſclepiadis ſimilia,
nonnihil in ſummo acuminata. *Flores* Apocyno repenti vulgari ſimiles, ſed colore pallo, parum
in porpureum vergente, quamobrem nigrum ſorem habere dicitur. *Siliquis* & *ſemis* pappoſis,
ut aliud vulgare Apocynum, compreſſis & nigra Auguſto menſe perficit. Tota planta ſucco tur-
get luteo, ingrato.

Loca. Hanc in collibus Monſp^{icn} Ts agri Fronugna, & vicinis naſci tradit Lobelius.

Macrone C. B.

Aſclepiade vulgari flore albo in paucis diſfert, ut deſcriptiones conferrenti apud J. Bauhi-
nium parebit. *Folia* nunquam dilute virentibus, *ſiliquis* brevioribus ſed craſſioribus, ſtriatis, biſſilo
macrone, interdum ſingularibus, nonnunquam geminis. *Flores* terni aut quatermi ſimul prode-
unt, pediculis brevibus nitentes.

C A P . Vlir.

Et tkmitsdi I.: sbuicde fea Vi Tica pivinta.

C Lematis ferc <hcirtir qua inll.ir JAU.^W repenres prafer.ir ciuKcultK, quos nfacn fi menu] Grzci vocant: Daphnoides yere., cum a Lauri foliorum figura, tum ad diftincti- ad Vinc. k fe in modum fra- dam aliarum a>Knomimim. D , perviuca, dubd liumi lcrp.it, I ticuli porrigat, viana qunjoe vinciens. Fuck Nocar cjus (iint (amenta lon^a, repenai, Folia glabra, colore & confiftenui hd<aceoram flos ampins^ iuiqua ad luigulos Bores gemma non I i r

A. r. Cionata Daphnoides miiKr C B. J. B. Vincapervis ea minor Ger. w<jf<ii Park. Perri- IUltlllr.

7 A

Flage illis reptamcibus, Immi Tafis, JAC le prnpagac. HsJix fibrofa eft: framenta multa, tenuia, teretia, virencia & genicuUta, c g miculis emiffis hinc rurlum radican- Fala e geniculis bina oppo/Tta, Laurinis Rmilu [colore & confiftemij Hederaceorum ut nobis quidem videtur] immo- raumenmule o, acuta, rigida, levia, brevis, appenta, fuperne lentato vivere nitentia, infci ne diluatore, lapore adstringente, fulamara. Floz pediculo e geniculis erato, duas uncias longo, fingi lari fingulari mider, oblonga Gelfemini modo, nunc simplex, in quinque laciniis altitudi- ias 6c bras diductis, nunc aucto foliorum numero multiplex, quocum interiora modo bina, modis tern.ti *tl imum u terna, laciniantur duntaxat, aliis penitus feparata. Color lim- ribas, fed diluitoribus parum, vel albus cum ftraminalis hinc. Spectaculo violaceum florem per fu- in multiplici obfervatur. Verumt in violaceo colore obfervavi, & bi- pinus. Cornicula tenuia funt, na confiftentia, oblonga. Seftina. Jr. C.^uf

plicl cenuleaj aim apidbus concolo piffillo albo, (undo Candida reriSbus ftriuto; vel Kilchenmo gill AS lacinias .1 fiinimo ad imum linea documt lieto, id quod & qñre mulplici cfi ft nan alk) qium purpiureu utt purpur^ coloireuc<ji&h;i toedk led ianffitnc/<y twd/rf, »tra<uc xtremnitt cohrentia, bma flcrunqnt femina (tmtmemid, tblenr*, Ad (epes & in aggenbus krilkniu Vulnaria infenis<ft. (7fia 1 ftnaonibtti alvi, ilv(cnWria,hxmorrftDiiiibas,expuirion (anpunis, himorrhagM nanuitij vulncntms nabia. Extcmi , io nienhuin, ill luiuce Icjitium: Lie extindum revocat. i^AfW. ixum c nritms enimpencem ainpreJlilTe fretjuawer ndimas, in- quit Orffxus tk: in dincrent3i

Folu recentia (uper charAm HbuLim »d empwccicim bnpofto (upcrius lino pevo incrbafata, bodore fuffita, umfilio muliercube cjuflLiam in Ummis .-uthibita, t^mpore, qut per anoi fpaouin alik meticianiends a mediu>dn relictus curatus eft antea. rac, Eoiicni mcJicatitcmo cjufllem mulicns moaitu pro depioraro D, HxJfe. • >rcm amifit, huiusherba q. (Effabit tamen ut vinum preis in aliud puruni darumque & genuiju coJom redder, txperc. Ti vas tnuokratur.

1. Clcwrtii Djplittula taajnr C B. Cl. Duph. nMer fbrt <xrultt &• atko J. II. Cl Daph. five Fervbxa taajn Ger. CUm. D#fb. Isnfolw five t'ntis frvmtM major IVirc. 7. A. Per omni.i major eft Parin ca vulgari. Fala que oppofita, ex femuncialibus & longioribus pe- tliculis .ippucf.t, e vinculis pauce craffioribus oriantur, tres circiter uncias lata, paulo longiora, nunc acuriora, nunc obn.iora, cum acrimonia amarefcunt lapore ingrati. Floru ex foliorum alis, pe- tiaJis hxrent femmidilibus, longo crnnailo, Jivilione & fouiv- florum Pervince vulgariore, fed, HI par eft, muhu nuiora, coloris ca rubei vel intere im albi. In hac iiliqua, five cormcuU lingu- laria oWerravimus. Apud nos Irigore interdum abluuntur. Circa Monfpcliura trecquem repencur.

CAP. IX*.

De CtnUur'16 minere, purpureo, tutthvt non pcrffliatt.

CEncaunum unde nome. accepit diximus in capto de * Centauro majore. No: x Centauro minoris non pofolati funt flores e tubo oblongo in quinque fegmenta .L.h 7- acuta expanfi, in fummis caulibus & ramulis crebri, fapoc amari, femina minantiffima. cap. 14 Centtiu'ium hieuni penoliatuni B do genara ab hoc differt, lapore duntaxat amaro & feminum itare amvenit.

11. Centaurea minor C. B. minor vulgare Parf. minui fart furfurn & *w J, B. parvum Ger. & \\\ purple £ auto; p.

?.*

f

Radix ei parva, alba, lignosa, oblique acta, fistulosa, creta & insipida. Caulis ptonique unicus, angu. foliis, dodrantalis aut petalis, levis, firmus. Folia alia in terram sparguntur, alu in caule bina ex adverso sita, Hyperici foliis majora, glabra, viridia, tribus nervis insignioribus, avria parte maxime conspicuis, secundum longitudinem excurrentibus donata. Flores in summitate caulis mitaobttt cuihs & ramorum, plures simul juncti, nullis pediculis donati, e tubo longo in quinque segmenta micro- nata totidem folia unicantia expandi, suavo-rubentes, apicibus pariter quinque latis. Calyx floris quinque foliis angustis, acutis componitur. Floribus succedunt capsula longa stri mimbai tumidissima annularibus fimbriosisplen;

Sunt autem, inquit J. Bauhinus, tum flores tum folia insigni amarore praedita.

Græci Καρδοφύλλον ποικίλον: Plinius ob summam amaritudinem Fel terree dici a miuit. Italici Febri-

Locat.

Julio mense floret, in pascuis ficcolibus frequens. Hortense solum relictus, nec hortis quicumque i jhibucii* cuncta alTue/ar. .7*. R^ * 5^ M Theophr. hist. lib. 2. cap. 2. p. 87. Et iterum lib. I. cap-9- pag> 104^ . Illud c\pcrienu.i didici, Centaureum in horto transilvanico eodem periri anno, nec uniju.im ex femine rctulci. Yvritm w ben* nostru simul succreva ex summe, voga, jUrmt, & [mmfo] .

.. Cm/mutm mtnut \$K*r*m C B. Park.

C. l). prod.

Ex radice parva, alba, fiSmCi CMMIU csurgit mox in dm> palmaresfi: {cmipalrrures, (It i atos, hique in alios divisi. Folia sunt parva, pediculis carinata, quorum prima lata, subrotunda, superiora angusta, acuminata, quandoque bina adverso sibi caulem amplexantia. Flores oblongi, non semper albi, ut vult C. Bauhinus, sed frequentius purpurei, preceduntis fumiles, ab imo sursum per ramulos fissi, singulis utrobique ex una caulis parte sibi invicem succedentes, e vasculis foliosis procedunt. His floris ut in vulgari fomes quinatum continentes succedunt.

Locat.

In agro Montepelensi & alibi in Gallia Nar-

" ;. CeniMTmm pufwtwm mmimum Mori I hift. cf- prxlud

Meri.

C: sicut binuales & triunciales ra stutumfert: /Wi purpureos, nunimot, pcnupculot: cifaljt feminales minores, & jomna multa exilia Centaurei minoris vilgars rubn IUGJO.

Lrrin.

In humidis circa stagna aestate exiccata locis provenit.

Centaurei minor varietas III.

D. Wheeler in Itiner. duas proomr Ccnuurii varietates, nimirum Cent, romofuni rubrum fie album in insula Corcyra observatas.

4. Cm:i:iTni> intniH naimm C > m fsmiHum C- B. maumum las turn |ark. Centaurea lateri •UOfiSis i'irk.

Col.

Dodrantalis est, & afff perqtain cxigui, bgnot, pallente: f: ij in imo fr.«U ut congenciii & vulgari flore purpureo, sed minoribus: caule anguloso, binis oblonga foliis alternatim per inter- valla herentibus ut in vulgari, sed duplo minoribus. Rute proxima: in summo vero floris binos aut unicum, longa calycibus pro basi insidentes, colore luteo, Majo mense hiantes, femine ut congenciois. Sapor amarus plantæ immolam, sed non tam intensus ut vulgari purpureo.

Locat.

In toto veteris ædificii Batani pifera mæstalis alichi observivimus: \enam quod ibi ortum est solo floris colore a minore purpureo differre nobis videbatur. Columna in maritimis oppidi dicti v Terris della Namante, nun bn. è a Stabii ruixa, in Vefiiviniuiuh raJicetllusi prinmni mvehk,

A. J. Cmu&wm ftimfiTt fawn mournum.

Radix ei alba, lignosa, simplex, nonnunquam fibris majoribus donata. Folia ad radicem parva, angusta, oblonga. Caulis triem circiter digitorum altitudine assurgit, nunc simplex, nunc multi- plex, ramosa: ad eam singula gemcula, duo ex adverso sita foliola angusta, acuta. Flores in sum- mus ramulis longis pediculis sulcatis, lutei, exigui, ferè semper clausi, quinque petalis (quantum deprehendere licet) mihi visi sunt componi. Vasculum feminale figuræ ellipticæ, per maximitatem in duas carinas divisit, & fomes effundit minutissimum, subrotundam, ex rufis nigricantem.

L*M.

Vervis extrema Cornubæ loca putrida & lacustribus provenit, nec alibi observavimus.

l j c n^tn. i

6. Centaurea

ym.

Pulchra hæc plantula radice nimirum flavescente, tenui, fibrosa, uncias duas longa & nonnihil lon- gior, gusta amara. Ex qua Caulis gemculatus, pertenuis, erectus, dodrantali altitudine caudicis loco erit; qui in summitate in ramos duos, quasi brachia expansa, dividitur, & hi in ramulos rufis alios, uncales & majores, alterno ordine pteronque positos; Folia oblonga alius viridibus, Gemula tinctore formâ haud abstruibus, bina semper ad singula gemcula sibi adverso positis cincta. Foliosum quidem in caule apice inter brachiorum juncturam tantum ferè unicum; sed plures tam in extremitatibus ramulorum, quam inter foliorum illorum alas, perpalchros, purpureos, tubulo- sos, in quatuor folia rotunda excentes, Centaurei vulgari flosculi duplo majores; e calycibus specta- libibus «m atuJen" quadrangularibus, membranaceis & rigidisculis, venulis conspicuis, & in quo-

Hazt anguilo fimbriam h u m lnl>snribus, proJeumes. Hos capful* anguihc, oblongs Cmcauni m-
no. is zanale, liminibus nxmidu minntis fe •alca referta, loquuncur.

CAP. X.

Centaurium luteum perfirliatmt.

Hujus nota in L I alu m cjule advert ill unnni to alefcentia nt in Dutia^o, colore glauco; flo-
res corumque dlycis iti o&o lacuius, condom folia imutaates, fit li.

A. .Centauriumthitmm ptrfeljiitHrn C. B. J. B. mmns laltum frfalhtum ianofau l'ark. parcm
luteum Gzi:))C\O\Ji CCIII0?P.

7 R.

Inutili, fibrofs, nultifid. ique albi riJiee niticur; ctuUm tollens modo (implitxm, modd ramofum,
terecni, gli>i tunj Itiquipalmarem aut dodrantalem; qui foli<m A linguk genicuk getnellum,
mucronacum trajiat, haud lecus arque calidarum regionum Perichymen a: caxcroqui circa radi-
ccm proximcque terram fternnnu foha mulra in orbem, Saponariae vel ;in non dilSmilia majors
t-imen fit caidicantui, leu glauco quodam pollinc, digitis fluii detergnr, (ut 8c toca planta)
obdu<3a. Summus CiiiUs in floret* unciali auc brevtion pedculo luftultum, vcluc indivorcio leu
angulo duorum rancijitum (<)ui ad utrumque eus latus oruntur) fitum, terminat r. Jlanmii ifti
alios affurgentes primis i ID dim ti vidantur ramos, inter quos in roctum affurgens con jllieriosjec
ddiiCw^ i .liiHii; colcm -41JH; LutMivjuLineur, ounce a extremos larcalos ventum ;jt* yha qujm
Centatim uiin. pitpurei major, calicis loco otto plerunqne anguliffimis foliolis oL>v, illirus, i tubo
calculun femiue ample&snse in CK'O plerunqne folia, aureo ftilgorc mictneu dx-panditur: quos
magiu excipiunc vafiuU iubrotunda. Jtmtn copiofum niinutilliiuiin .nigruin claudena.

Herba perqudin unam eft, non auceni BOL

Floret apud nos Julio & Auguflo menlibui, fcnius ettiufve pro anni temperatura.

In montolii & i necionbus pram.

Cencaurit minoris vires lunitiuuii rcccnfet SchrocL

SplencricuiTi c(l fit hepaticum, anuruin cttra moi mentibus fuppreffis, Scorbuto, arthetide, lumbrica, Virtu

& afenens, vulneranum. Ucila eft in UI

(pecitilj in mortii canu rabidi. Da cur cms de coctum utiliter tertianaris, quod bilem per interu

deprece dica oitj iju-; t uc qtiidam bane licri'i
Ceterum qu<j Diolcorides, 6t port cum Galen. I nbant bi-

pituitofe bumorta per alvum educere, ii -ottum (inqmt Dodotuui)

frequenter 8c feliatcr hoc uii, per alvum unien expurganoncm ullam faccre oblvare non
potunus, &x.

Dodoru:o (copponit C Hofnunnus, Licet emm (inquit) Centaurium noflrum minus purget
quam Veterum; nun ob id umen non purgar. Vidonius cnlm li debua quyticas decurquod pur-

get. Contrmg Herbar comzque decoctum lenrti; >hos 6c orreras cucts infcdiones extcrrir. In He-
truna Bionia: illa noacapatOr, q: oni.nn C dealbinduque mulieruni cipdlis ex hxivio plun-

Om przlUf. Mtttb.

Novi hominem qui pro de(perato rd ii his importuno lutitlu Centatim nun- in] , Sc lun \ \

tiontstoitii in im. inc .ibu-terocofivjluit D. Bates in M.S. contmunicavit O.HuJje.
Frequentiffimo certiffimoque est maher .uhs remedio dum tntmlinn l obflruclione

quo > dftociu Cjci! ori certo experimento T eni.imm higu : & : aquj eju > id I ill.it .l ufui eft. uc in

Sal Cenuurii nihi: ori certo experimento T eni.imm higu : & : aquj eju > id I ill.it .l ufui eft. uc in
ci pulveres febnfugi, rd fal eju diffolvantur paroxylm tempore propinandi, tu largicer (udaiL

Contra furfures fit anftoufi capitis fcabiecm vix praltantus ullum decox cum repenws •quam

Cenuunt min. ex pilorum ito brodiajuratum quod coqai prorundunt, quando ad e am ufque

mollitictu codLt liint deglubenda uc pinli queant. Illo emm deoo&o (i lavctur caput inligniu

fores & fcjbiect de: > un.i myri-ues pediculatoruni

Tanr* affumationis eft lute herba apud Germanto, ut vix vutum medicacum feu a'biinchiui vul-

a parctj cupis partem non conit ituat. Stk
Galeous ob mligncs miralque hujus plantx f\cul<tc> deca Sc rpius viridibus in : ;grum ubnim
nkiipit.

Ad Ifchudon, K Cenuuru mm. q. *. daewjuatur, per cl^erern infulitm miriheum eft aaxi-
hum : humorem «nun clidt, & Jobreui iedac.

CAP. XI.

Verbascum nimitli'i nixafi IVi Ui (cum tlktum pucatur, ciuia Tolla epa pilola sunt: Italis enim *Barbasi*, & prima species vulgo *Tapius barbatus* dicitur. Cfr. l'UnUii J Verbena tied- a l. Græcia *Βασι* appellatur, *Βασι* in *εργα* à IMU, quod ejui tulis ft: L^klubi in U- ternis Bfo ell'lmis ut... JITT.

Note ejus sunt folia in ciulibus iltem.1, tWes in thyrfs oUanfjii confem, non horizontaliter fin fed patius »d -m perpendiculars; etplule bivalves uonfex auc turbinatx.

A. I. Vttbdmm THU LufJtum !asm>n G B viitjart, flrt htiQ *>*£*«, fiJhmjximt J. B- VrrbsifcHm album -vntgATt, fiw Tafhu Urtatm emrnww Park. Tiffm tunbatie I.Ger

Radix iiSiJij;;¹ofa, fimplex fir-ras aliquot grandiore< c Litenbui etnittK, minor t;ujm pro plam* mo-la, craffirie poi¹-can. *Folia* ad radicem multa, dodram mem lon^a, quatuor poltkes iau, n'olli & incana kmiRinc uninqe hrriiua, per nurpnes lenter crciua. C«»/i ploninqe unica, JICO- b'tulK :-u: tticubiulis, tern, hirfuius, rtguius, modull' farchus, foliis ntillo (*H*ino politis, crebra, ini- motlw idmcis, m qux fed ratii em finilibus veftitut, lonets appeixiabus hint mdc producta a- ukm vciw alatum efficwntibus. In fiimrno caule /W« in Ibngo thyrlo co: •: x figorani re- fenint. *Ffets* auceni (ingyiares non niaximi fiinc, monopecuui, m <juinqe tamen laanks oba: /as, tatjdem folu imitanres *arnti*, cum q' -... .. villosi, flavi, apicibus rubentibus, & acuta (phirik.)in, Isd obkngiitt, aoiitunaaim, ndli UIHRUIC hirfutum, q'ufd per -... .. bin« Carina* tichiiat, *fwufat* parvu, puil>replctuni.

Ad jgmrum margines, Ge in aggenbus toflanun, nuimimquatu tu munt&rudenbui.

* i. Feriffcmm mtxtmum MtrUnmaltmt tdert;um Juplix imStmti & 4 w» I. B. *Verbascum fimm** flert lura marno C II. Cnw Vtrk*{am fwmm* fan albs qiiWCni. J *Verbascum* <Ihm« GLT. (fr- Vttitfc. Ijdr. 4. j««r /*Ztu Imgmim i'ark. & *Verb. fmmtflere* *U« vtlf**BtJe* c;

Lab. Ad.
 Excellit maximus odoratus Menfionatum *Thapfus barbatus*, ut magnitudine foliorum, fic etiam odore fuavi, omnibus *Verbafcis*, varietas rarerit rannim v 4 U' <icJo tpci t omnibus Phlomi: flores bus quippe lates & interdum albis exit, fana foliola, qua arantar mfaui iincola, odore fuaviffimo; folio longiore, latiore: *radix* cra I, nec alicubi diffim. is tota plant*.
 Cum *Labellus* ipfe faeatur lura in tantum effe twmmunis Plilomj; me ncaffi i n agro Pedemontano, *fla* aut Gallia Narbonenfi tam conige videre, in Anglia autem campeffribus non mveniri tertum iff, non immerito dubitaniin an dam- huiulntodi pbriu. Veriini mm
 U faAi, & icon qua; extac a pbnta *Mi*, ut veniunUimiim ell, dclujjiwa cont«n
 fuadent: qm 8: utoque vanctu habentr in CauJogo horn Rffgu ParUicnits.

7. *al'ovalentam ffrst lm» ptrw* J II *mar folis anguffioribus, floribus pallide* C.B. ftoorp, o? *dusty* *Qnu* rin.

Radix pro p.,,e ratione non a irnodum <affa, alba, fure ore amaro. *Caules* bicubita- les & tricubitales, teretes, una cum foliis & floribus pulviliculis locan6c-i nte, qui facile derogit quat obduci, ex fingulis radicebus finguli, ab uno ad fummum t-|oc ramdi, ramulis qui in longos flo- rum thyglos caulium undaque obvallantes ipfiusque fere altius ine aquassus exant. *Folia* lena po- dem & interdum creberrima longa, valtuam aut femipedem lata, pediculis manifestos non habent, a principio tamen anguffiore paulatim in Latitudinem funduntur, deinde rufius in acumen ferdum definunt, circa margines obfcure crenata, in caule creberrima, alteri ainata, que primo ex- erant utntKjuc lanuginola, poi teriora fere glabra [gravis fi fricentur •dom, fapore herbaceo cum tantillo onurore.j *Fbri* w I ummi caulibus & ramulis confert, & vniur racematum naffentes, pe- diculis uimodum brevi es, monopetali, in quinque fubovunda tegmenta partiu, pallide flavi, cum alkju, K mnu *fiammim* i unuginota, croceis *apicibus* fuffinentibus, cum ftyle. *Flis* minor equidem est quam *Verbafci* vulgaris, non tamen quadruplo, ut vult J. Bauhinus.

Ed NofdviCliffJl Urt. in, *Banam* oppidum a, invctutur, fii atibiui Anglia.

4 *Verb. fr trifrm & fmutum* J. a l«tui»Um Park *agrum folis Papaveris corniculati, &*

F. a.
 Huic infima *folia* fequipalmarum circiter longa, *Papaveris* corniculati do fincata, candicantia, fupiora vero breviora, in acutorem mucronem definentia, fere hederacea, pulvere alperia utru- que magis tamen inferno, videntur, nullo pediculo, alis *caulis*, cui funt continui, amplexantia. *Flores* parvi, lutei, *flantur* floribus non altissimis, caliculi, in quinque fegmenta laciniati, flammis bus totidem villosis porporafcentibus median occupantibus, *apicibus* croceis.
 In Italia ad vias paffim invenitur. J.Bauhinus Montpela obfervavit, ubi Antiturus (ignat) paffim fixet.

A. 5. *Ver-*

A. 5. FerhdfewmjsrtaWo fsrvt J. B. Verb. Lfthmstt flare alh /wrw Q B. Kerb. Ljehmitt Mat-
ibh Gcr. 30Ditf fictomQ a?nlkm. Vahfscum tn folia longioribus P art'

J. B.

Haud aliis oriundum naralibtis, nee hide mulcum diverfi ex VeiWcei luis cognofeendum :
radix compar, & <W*f alls concavus, lanuginofus. VCQ: i fuis interne tantum inca niUUlanu-
gine pubelcint, [iipcrni: verb, Gtendla ilia & exigiu floribus appolit. i excipias, .Jubraex atio vi-
refcunt, acuniinata : Fhrts veto parvi, in als digefsi, Verbalci pulveri ulcilli niixloj colore albo.
Stamina Enfura buxci flint colons, apiabus nrmrtis.

Floresin hoc ut Sc in ahis genenbus petalorum feu legime itoruta in qui Hnduntur nan]ero
ludunt, qmpps in cotiemramulo& excotiem pundo oni uotij quitu, uado lens coaftut de-
prefcenduntur.

In .igro Cantiano fceiisvias (roquem csrntur. Qiionum se propagat femel fatui ex femmedc-
[parta: caule producto

* 6. Verbaſcum anguſtifolium ramuſum, flirt twr<>ftilu creſtione J. R.

. 3.

ftii dodra n t al ib. uncias duas & ſemis laci. ſiſſis, albi, velati lanugine pulverulenta obductis;
dduo: primo anno caulem non fet, fed folia per terrau pcrir.
Icftuin.

7. Vtrb*[atn% ngtm for . parvi, apicibus purpureis J. B. Verb. nig. flore rx lat to prntftntt
^w< IJOK jfctier iciltcO Blach a^itlifinr
Park, dc

Verbalci vidgans, ut & (•</*, non niinusaltuSjbrachiat is, ſtriatu, purpur^(cens, minus
hirlutus. Folia minora, rariora, alierrutim potij podicolts rubentibus duas aut tres uncius longis
appenduntur, Salviæ armula fed nu. ho major, foecida, at vit-enm, in nus villo-u, kvicer crenata.
Fitrtt ficu & L crebntacc pares fedminores, faruranox crocoun&t, UUtann nilgar7, purpuraiiribus
fismmihut villoſis, Stmtn uc in vu^an. Stiperficiis Kycmc ; erit.

In agro Cantabngicnfi plunbus in \o~s occurrit, & alibi etiam in Anglu. J. fiiuhinus Baulcx6c L*CU,
Montbelgardi froquatem eSc ſcribit.

* 8. Vtrhaſcum promt mgrwn floribus albo Moril. pzelud.

Hæc Verbalci (pec: < folia {crtt f; bviridia ; flores albos minutos, quibus panter (utcedunt capfulz
bivalves, multa fanina mtnura, ut cæteræ ſuæ familiaſ, continentes. Perennis eſt plu in.

Miro; Morilonum nullam hujus inter Verbaſca mentionem facere in Hiſtoria ſua univerſali.

* 9- Vtrhtfatm JubrttunJo Salvae filte C R Stfoifolum ex thiam eſſiſides Pirk. fjlvpt Sal-
vifulmm txoticam fein rituaJiore J. &

Lei.

Hæc foliu rocundionbus, de 1 floribus candidioribusq, minus tamen lanugine canis, fed Salviæ
amuta cone ret 10l va: alioqui lignoſa fibratæque radice, caule & facie non ita diſſimilis, iſdem gu-
detSynxrucalkiis quibus Verbaſcum lychmites Synacum. Flores deſcriptoſi Lobelio videre non
contigit, quu, ut rict, ſ narcidi jam erant. Parkinsonus, nescio unde doctus, flores luteos quin-
que toiiii libromdis compolitoi ci attnouic, 6t apptngtt.

I'rsuſeum ngrttm cjaratim Park.

Bbr. ante ſpecies eſſe vincturj & ſortalle à i'ulkari Ititei non diverſa: verum deſcriptio Verbaſco
nigro Salvifolio meliis convenit quam Blatuar, ut niti ille exprcllb verbis id vauflet & m, affec-
ego eandem plaium acididfein.

Sponuncum in Aaglia quamvis minus: requentorl imemri tradit: noi nonduin tam felice*
fuimus ut illud ipſi reper maſſ, at net; ne quiſque ten ilipſa (i inrentam nobt* tuclenuſi ſtendit.

De ſcriptjooemac hiftonanuntegtn n vide apud Parkinsonum.

* 10. Verbaſcum Danicum hums"]*j, k,

Jlet,

Folioru nt figu d & hirtute, & florum colore aliſque accidentibus cum Taplo barbato communu
convenit: verum humilior eſt & minor multo, caule pedem altitudine non excedente; folia quæ m
illiusdupiomii, -ribus : W w t i m en pro plantæ proportione ampliffimis.

Obſeryavit Lot>cli. inter Cronenburgum & Hiſſiam pn pe Elſenoray in Dania.

Lew.

Verbalcuin [funMiwaas & UMURO] in hzmorrhoidium doloribus à Golario & Rivario, item à Pire.
Dan. Senneito & Weilu-Jo commendantor.

Taplus barbatus ſpecificum eſt contra tympanitem, autore Grembo

Verbalcuin prinium precipue utile eſt in morbis peſtoris, tuſſi, eſpinoſis ſanguinolenta, tormi-
nombum affectus in jumentis & vaccis à Verennariis nobis adhibent, unde
noſtratiuni Vulgo <CotQ IUIBtDOJt, id eſt, Pulmonaria vaccarum appellatur. Extraneos flores
6t folia prAcipui jelliminationis ſunt in ſopiendo doloribus quibalcumq, imprimis in aſthmaticis ac to-
mentu I uant, ii morrhoidibus, in capillis luteo colore tingendis. Sebæd.

Hujus ~~folia~~ plantis pedum nudis intra calceos supposita, paucas diebus ante debitum purgationis tempus, menses remorantes leniter movent & educunt.

C A W. XII.

De Blattaria.

Blattaria, monent. Plinio, lib. 25. c. 9. Est similis Verbasco herba, que saepe fallit pro ea capta. foliis minus carnosis, caulibus pluribus, flore lato. Hac abjecta Narta in se contrahit, itaque Roma Blattarium vocant. Blattaria vulgaris, ut recte Plinius, a Verbasco foliis minus carnosis differt; et certae di tinilio nis nota est capsula feminalis sphaerica seu globosa, cum Verbasco nonnulla turbinata sit & in acmen producta.

1. Blattaria lutea J. B. lutea minor seu vulgaris Park. lutea folio oblongo laciniato C. B. flore luteo Ger. Bellon. Boott. muller.

J. B.

Firmum tollit caulem & rectum, a lutiinci: tenam humana, laevem, crassitudine pollicari, densissimo ramorum stipatu frutescentem: in quibus alternatim positi flores Verbasci, ex pediculis hirsuti, uncia longioribus, flavi sed saturatis, sic ut nonnulli rutilantes rubore sit assulsum, unguibus intrinsecus villosa lanugine pubescentibus; *staminula* similiter lanuginosis, apices minutos sustententibus, nonnulli odorati. Succedunt *semine* nigra, in vasculis rotatis, bivalvibus, e vertice stylis profertibus: ceterum uniuersalis, flore pediculis appellatum est folium acuminatum, unquam circiter longum aut magis: reliqua autem *folia*, quibus nudis facit, Verbasci sunt, angustiora, atrociora & lupinis splendens, nulla lanugine decorata, in ambitu laciniata, odore ingrato. *Radix* Napa figurata, alba, sapore nascio quid aromatico respicente.

Locus.

Variis in locis hanc observavimus, tam in Italia & Gallia Narbonensi quam in Germania, juxta aquarum margines, in litosis aggeribus, & haud longe a fluminum ripis, ut recte Dodonaeus.

Tempus.

Floret a Junio mense in Septembrem usque; *semine* interea perficitur. Gerardus & Parkinsonus nostrates ex unica hac planta duas fecerunt, quarum alteri Blattariae Plinii Gerardus, *Verbasci nigri vulgaris* Parkinsonus nomina dederunt, alteri Blattariae flore luteo C. Bauhinus hanc duplicem facit, alteram quatuor cubitorum, tria, quatuor, quinque aut plura vascula compacta habentem; alteram humiliorcm, singula vascula profertentem, foliis multo viridioribus.

Varietas.

Quae flore albo est, caerule violacea quiddam habente ab hac non differt specie, siquidem ex hujus semine descendit ortus, ut in hortulo nostro Cantabrigiae aliquando experti sumus.

Blattariam flore viridi a Lobo in scoribus ipsam C. Bauhinus ad Blattariam flore albo refert, item, Blattariam flore viridi purpurascente *Lob. us.* item Blattariam alturam *Lob. us.* Varias inquit, Blattaria alba flore parvo, coquo albo, vel viridi purpurascens, & magno flore. Nos ^CBid. ino libenter assentimur: nec enim sine necessitate species multiplicandas ducimus.

Blattariam flore luteo purpurascens Park. e lutea vulgaris semine octavi esse. Autor ipse haud dubitat, & tamen (quod mirum) radicem vivaciorcm ei attribuit.

* 2. Blattaria magno flore C. il J. B. ft** *mfkG<x. BU. lmt*n>i* fve Hispanica Park.

Park.

* Bl. lutea nuda

Folia habet longiora & viridiora quam * precedens apicibus rotundioribus: *caulem* clavatum & robustiorem, superiore parte peator *folia* etiam gestantem copiosa, colore auro relicto, minus confectis, amplicius tamen quam lutea vulgaris, staminula purpurascens modum occupantibus, nufca staminularem quandam referentibus: quibus succedunt *capsula* rotunda, bina terve aut plura interdum simul, plurimum tamen singula; *semine* fusca claudens. *Radix* non admodum crassa, fibrosa, leniter perfecto exarscens.

3. Blattaria fan,*rml*ixlp*f* J. B. flore purpureo Ger. Park. purpurea C. B.

J. B.

Radix crassa est & longa, succulentique, cortice obdusa rubente, albi medullae intus referta, sapore subdulci: *folia* per terram expansa ad Coryzam Mattholi majorem [Baccharin Montpensium Ger.] accollit, non tamen ita villosa sunt, sapore subacri cum aliqua acrimonia. [Parkinsonio *folia* latiora & breviora sunt quam Blattariae luteae, magni canescuntia, paucas aut nullas per margines serratis, microcibus acuta] *Flores* & *capsula* Blattariae vulgaris similia sunt secundo anno C. Bauhino *folia* est nigrioribus non laciniata, parvisque serrata. *Fas* modo obduso colore purpuraceo, modo nigrae Violae colore eleganti niter, quandoque dilute rubet: & hanc vocamus Blattariam flore pheniceo. Floret octavo purpureo flore Junio & Julio. *Stamina*, annotante Parkinsono, in medio flore flava; *capsula* minor quam in Blattaria la. a; *semine* humiliora, non raro tamen ramulq; *radix* in multos annos vivit.

Folia in planta a nobis culta non nigrescunt, sed ut recte Parkinsonus potius canescunt, & ut verè J. Bauhinus, folia Coryzae majoris Matth. referunt, tum colore, tum serratura, &c.

* 4. Blaitaria frtrnu flerc gilvoft* tbfelai ttrrit Mflrif.

Mor:f.

Fha hajus pricedenris Fbliia multo funt nujora, Sc S^iapl"ti foliis quim proxime accolent. Flin edit late umplos, eleg^nter coloratos, e carneo feu ailud nibdlo gilvo; in reliquis cum prXL adentibus convcmc. Natura adoo intenta eife videtur hujus propagationi per radices ut agri in Galka Meriilionaj, mulco ra.tgi lamcn fiunt. perfiat.

* ^ . H'attaru ItMJ J^ira Park.

Perk.

Folia huic plura, per terram frata, iviridi canefcennia, latifolia & ofclonga, parutn at: nihil (errera, in acutum oclincia : Caules tines r.: sive pedes alti, foliis minoribus veluti, a medio fufum vi plures oblongos rstrwK divifi^ flofeuLt ^illi^ luteis, odoratis, crebris onufti. Semen rarius perficit. Radice eit vivaci & perenni. I, quad panos hujui generis plantis contingit. Pr.r : i i dli iii fjiicor.

* 6. Blaitaria pilofa Cretica, For Ar. 7ai tfuWMndam J. B. Ctrkafaim huimtt Crtlitum laciniatum C I Verbafev» Brtjic* film Cot. Bl*rid Crate* incana tetimJo Luwista filio Rtrfc

Col.

Longa & ptukm fore profen/oi;- alternatim excaule creantia, appendicibus five lobis circa potio iij uc in V>:du ce folis observatur, que summum foli habent magnum, uncias quatuor latum, longum quinta, & amplius, radice ubertatis loci, in medio pediculo lobos digitales, & reliquum radam; lina, ex viridi incana, lanugine crassa obducta, dura tactu, & pilosa, ficuri & canis, qui r j n p i ? , f i e a l i a m multis e foliorum sinibus proceduntibus divifis. Flors in fummo caulis & alarum groiat^ fid in caule priu> detnde in alis, ita ut ditiis floceat, & ab imo incipiunt flors. qui tnjni lont 2c pollicari diamccru, cok re aut hilari, quinquupartiti, Verbalci vulgaris f. g)iri, purpurafecntem habentes. ivmbiliuutu 6c c: nitata flamma lutea; sed totum flamen liuwje nugna. tenuiffima uc Bombydm, purpurifcanc, 6c piln ill inhiatice caputatis oblinum : Apimb ctturnlubent nisdium, cut flore exculTo &. mtegre decidui, ut in Sambuci flore observatur & alia, fructu lubell rocundus in acntum Helincns ui in vulganbu Verbalci, in quo inw»< ex^uutu mo: distimile continetur, &c fanim exit. M.110 tncnle tlonitt.

Hxc dV Ardurus Creticus Belli. Vabafiam I runcosam auriculatum Pene Ital. Vanat (inquit O BJUI inna) nam aliud folis eit latioribus, capitulis rotundis: eit & alteram longiusculis, capitulis longiusculis, & hoc eit Archari facunda speciei Pene Ital. Blaitaria Cretica incana longiore laciniato folio Perk. Prove : iicui^cr

' 7. ^fi icie divtrfam fail C. Baubmm, *mg fecttMsTsri. in fcau Veixifami fii.nj AAl \ libro tunds, flore Blaitariz, quid in Prodrumo sic describit.

C. B. ffd.

Caules eit cubitalibus, viridibus, rotundi; leviter villi ftriati ^noribi& oblonga, reliquis omnibus subrotundis, parvis, caulem basi sua alternatim amplexantibus, minime incana, superne nigricantibus: ad quocum fore singulorum exortum duo minora adscendant, ex quoqueq sinu pediculi erant, Juo, tris, rarius quatuor, procedunt, quibus fingulis fls unicus, luteus, parvus, pentapetalos infidet, caps medio flamma aliquot purpurea, quasi ex calyculo ut in Blaitaria emergentia, infident. Huic valculum fennis minutum, rotundum continens succedit.

Flors e a precedente differt, & partim omnium parvitate. Morifonus noster hanc annuam facit, u creantem: verum Parkinsonus utramq, saltem apud nos, annuam. Chabreca apud J. Bauhinum pro eadem cum precedente habet: verum si G. Bualino recte descripta fit, folis superne nigricantibus, caules non ramosis, floribus luteis, parvis, oportet ut fit diversa.

* 8. BUtterHtOatcaffrmftVaxV. Lnuouon Omcum fpmofuittClttC J.B. Cnucmn ffumfum »- (puro) /<M> C. B. il*Lj/vt,U Crttefixm htlii. Lmc. ffaafiw. cruciatu1 Alp. //»>" sum LVtricMMGer.cmac

Relias.

Radice et multitudine lignosam, firmam, longam, multos caules conjunctim proferens: in ortu: diffunditur, & late frutescat, pedem altitudine non excedens: caules albi sunt, crebris firmis, spinis perdit: inter quos fls Leucos albi folis similia, licet minora & quadam lanugine obita: flors Verbalci aut Blaitariz similes, albi, panulium ad flavam tendentes, in quorum medio flamma quadam inirpi; ea: Floribus succedunt caules floris rotunde, tenuissimum semen continentes.

Rustici ad fervendum ignem calefacendiq, fornaces ei utuntur, ob similitudinem vero q cum Stoebe- hict, Sc A. am colorem galam flavidam vocant, non quod lac cnttna. IUaiiuii

Hm.

Clasius descriptione fax flores tctnocuIcK fitatuit. L'icoli lura similes, sed n. morci: fsl^nas oblonga, plano semine pennis; quibus deni a Belli Galatrida in tantum differt, ut plante toto genere diversis videantur Leucosum Creticum spinosum Clasii, & Galatrida Creticum Belli; quamvis Clasius & C. Bauhinus eas species convenire putent. Plantam istam non vidit Clasius, adeoque excusanda si tam minus recte descripsit.

'9 R'.J: strut maau tmtkifuU Botconi

... Capula, fntnc ... itMrum esse arguunt. Folia vero magna, ... upbobusBi pi<sfunde ... Igaro aliquacenu* imuU ... Ramum unicam hujus plantae abla, radice à Joanne Maria Ferris, Veneto aromat iriij lubuit D. Boccone; qui à Ragusa allatum esse affirmabat.

CAP. XIII.

Dt Tnfolit acetofe.

AB acido sapore roce diminutiva Acetofella dicitur: Oxys Plini creditur. Calabris lubob dicitur, radicula Barbari corrupere in Lajula & Alleluia. Scal. in 77e fbr. At cojjifi Pimt. Notae insignes habet quibus ab omnibus aliis plantarum generibus facile ... ituiIKUitu r, mirtam Folia in eodem pediculo ternis, florem pentapetaloidem, sapore acidum, va ... uluin (cniuule ... itatem levi tactu diffiliteris cum impetu semina ejaculantur.

A. t. Ttfluam mtn (um vulgare Park. C. B» Oxjt alb*. C. P* Tnftlwm tculum flre thfr ft ... J. B. Auctoſula & LMJUT* ; ſce Alletu... Offic. J©o»6 feo;rcI

J. B.

Ex crassiſcula, ſquamata, alba, vel ex albo rubente ... radice longa & crebra pendens ſinx all< cantes, indistincte emergunt pediculi minimi, tenuis, rotundi, palmares & longiores, ternis gerentibus folia latis magna, laniosa quam longiora, cordata, hirsuta, ex viridi flaventia, saepe reflexa, ut caput ad pediculum coitus turbiditatem reddat formam, sapore acido. Inter haec alii surgunt pediculi, flores singuli sustinentes unicum, magnam, albicantem, striatam, tenerum [quinque petalis ad ipsos tamen unguis junctis compositum, unguibus (praesertim internis) flavicantibus.] Foliolus pentagonus, quo attac... omes exilit rufum, nucleo Persici simile, striatum.

Opacis plurimum pnovent loci, in sylvis & ad sepes.

Ut Linow tuSc vinbusami Acetofj convenit, ideoq, astum feberilem mitigat, sitim sedat, & ventriculi ardoros, jecur refrigerjx S: tor robo, quoquo modo sumpta. Fit etiam ex ea syrupus, conserva, aqua distillata ad hos usus. Extrinsecus adhibetur aqua destillata ad collusiones oris, ad Erysipelata, ad ulcera foetida mundanda, &c. Observasse autem sese scribit Pochinus, atq, adeo multo eum experientia comperit, quod epius hujus copiosi flores crebras tliiu torn pluvias & aquarum inundationes certo potendunt: pauci contra siccitatem.

2. Oxys lates Ger. J. IV. '«(*!/*)* Vark. Trifolurn ttmfmm cmueme^ttm C B.

J. B.

Serpendo per terram spargit coloris palmares aut sesquipalmares, graciles. Folia tenuissimis nra pediculis ternis coherent, minoribus quam Oxys vulgaris, magisque per extremum filia, corculum (ut vulgo pingi solet) expressius effiguntia, hirsutiora, ex brevibus pediculis à cobculo procedentibus dependentia; gustus acidi. Flos forma stellata eadem, sed color luteus: quem cornucula sive filixae fere unciales sequuntur, sursum spectant ... cs, crassiſcul... foliosa, ex quinque loculis constituta; quae ubi ad maturitatem pervenire, levissimo tactu semina plurima, parva, rufa, aspera exiliunt è lateribus, ocellis quam 1 prinwm con... viventibus, ur ne apparat sinquas diffilul... Radix longissimula, gracilis, fibrata.

Planta est annua, semine decedens se propagans, in Italia & Sicilia, umbrosis praesertim, ubique foet obvia. Aestate tota flores producit.

3. Oxys affinis. fb*! * * * fosa Africana, flre purpureo magno Brc^Tiii

Hujus flis ex caetero in quinque lacinias angustas profunde dissecto subhirsuto calycis, primum pyramidalis forma convolutus, postea vero in quinque, folia ampla, ex rubro saepe purpurea, cum caeruleo colore mixta explicata, forma florum Convolvuli Indici majoris (praeterea quod non monophyllus) se diffundebat. Fulcrum epius caelicis erat subviridis, tero, duas treise uncias longus, carnosus, debilis & tener: Folia circa medium compluribus, pediculis longis inflexantibus, laet viridibus, crassiſculis, tergenium, Trifolium similibus, comitata. Hujus origo ex balba nigerrimo, Avellanae magnitudinis, multis squamis compacto, cui etiam plantae atrae, cjpilUciTj oblis, ... e appen... debant longissima fibrae.

E promontorio Boeae Spei in Belgium delata est, ubi in horto Beverni ... em explicat.

4. Trifolium balbosum f. albe prunq. Bene Spei Bod. à Stapel.

Folia tria in unoquoque pediculo crassiſcula, saporis aciduli habet. Bulbus eius oblongus est, cortice nigricans: Flos albus, quinque, semive foliis constat.

K) isto Heurno accepit Bodrus.

CAP. XIV.

De TrifoUe paixftri, fibrino nciHuliif dith.

A. Trifolium palafre I. B C B. fulttAtftm Ger. Park. TriftUitm fi&ruwm TohenumHt. c Gtrmtlnorum. 39atffj ^rCWII, Elicit til" atl.3.

G Eniculata radis lo\&, alba, prorfum incalir, fibris fibrinale demiffio fr.mats; pediculi in- terios lanores vagin odrantales, tria habent annexa folia, m:

...s inftar, d ...iorum, qui ...igna, Fabacets fbr- ije magnitudine rdpondentia, Irm ; inter lux; ctitla ilirgie aibiulis, lens, gracilifj ens, tlyrfum jerens fiomni, ex albo purpuralccnriutn, Ip-j-igne feu pabe c. ^amapenuntar torius riiciM, recluji in quintjuc (igmenta auit.i esjandlmi medio fjr rTionopetaj fiiper :iz i>ti:rna tenuillimls & caiduiis filamentb cripttt, velui 'Ichianthera';jj:lam obini&i E igulis ilioii ic alba cum fpiabts Havii; in Sc viri- or. Succedunt ttfimU R :un<h, m qmbus /twew ! :iloo

In paJufnUu & aquoiiis frequentifUmum ocamit: Extra, aquat non dm diir.it. Maio & Junto Lxw. floret.

In moibo aiti... Pruffie in nonnullis agris faliciter experta. Folia herbe in Cerevicia deco- ptekiitai, ltd Thorn' de die cum dolore feruans, decoctum habent, quavis ingratiiffimi odore & (JULinc, Be bis ,< utantur levamen omnes percipiunt. Qui & mstrona quaedam folia in

Uporis (it. Qoi 3ut.(tn co utn arthritudo vaga admodum depradicat. Granor dqtia decocta, & catidi- parti .ifiwtj: applicat.l in * extractum liquidum, & Syrupum. Ep' njddi pwerir licrba preparatione uiuuta in ipiritum, extraftum liquid..

fi TsnertAuf Rebi>im TnfbtLim pakdoium in hydropids affe&ibus coirnnq^ feque fepius obferuiife ait oves tabidas in palud« hac herb.i abundantn compull.u, cjits eflh Stiti quiui Gertnanicos nonniillos fcripcore> cam Uudan; in S.oibuto, febri'atij in :ibus fie ca- tarthis.

Sinion P.i. ... s' cutn G > chlearis Scorbuticis valde prodeffe fcripffer: vel cum fero lactis vel per iccxhit' tum, hoc tamen Trifolium fibrinum, inquit, ei preferendum est. P. Trifolium preparat varia medicamenta e Trifolio paludolo, ut fpiritus, fola, effentia, tin- cturas, olea, quz in morbis chronicis egregie depradicat, omnibusque aliis plantis hanc longe pre- fert. Ephem German. An. 12. Obl. 74. Recte obfervavit D. Teuerdale Roboijus herbam hanc Germanis, aliisque gentibus Septentrionalibus nunc diuini unice charam & in magno precio esse, & afliduo ulii frequentan in omnibus fere raorbis, ut ccraiEtiam panacoini, adiuuam eciara ui ^eploraas affeAibui vckt ad iatram anchoram)ontugunt.

CAP. XV.

De Numalaria:

N Uiiimuljna a foborum figuw rotunda t> mmi annula obata, flagellis reptantibus, floreb nibch uis generis diffingitur.

lioium JU excuiitibujj loco nauli tn aquoiiSi ab aliis ii \ t, Nttm>i'->ria Ger. vulgata Park. maj. •* hir* C B. Kum.JivtCaaimerhM). R fl^o^ ncp wo;r, 0: l)rrb riDo prmc.

Longa fed tenuibus vici ulaanguli fo, e geniculis fibris longas demittentibus proferpe; quibus ex brev lonbui u intervallis folia bina oppofita adnalcuntur, fibrorunda & nonnihil crifpa, guftu ve- hementer citra morfum ficcante adftingenteque: ex quorum alis flores amplj, flavi, quinque folijs acuminata compofiti, [quz tamen ad unguem parita liot, ut flor integer decalat,] totidem in medio ftaminibus cum luis apicibus latus, ftylo tenui non capitato valculo feminali miferent. Pedic- ull ttoruni: annuaciales aut longiores, ex alis foliorum fingulis finguli ecutit, ut ad fingula genicula himp! rana, flores fint. In nonnullis ramulis tertia folia & totidem flores ad fingula genicula obfer- vavimus. Delapfo aut marcefcente flore calices folia connivent ut in Coerobulis, & valculum fe- tunale. igtondunt, ail modum exiguum, lentine intra minutiffimo & vix compicuo refe: um o**'". tant.

Juxtit fcorobes & flumta, aliique ligna loca provenit, fubinde & in humida reperinu fylvu, ut K'dc I Bjuhinus- A Maio nante in vultam zitatem floret.

Sicc, tLcSc.h iltrngem, vulneraria e precipuis. Flores & folia trita & impofita ••ulnerj&tJceni Pter. quavis glutinare valent: Eadem cum vino lupta dyfenterias, ventris imbecillitate, maxime ac humideates fanant. Conducunt & ad fanguinis rejections produvia muliebria, & ad omnia ino- ranorum vulnera & ulcera, potiffimum pulmonis. Commendatur & in Scorbuto. Precipuatn autem vim que effe dixi Matruofinal purorum zircocelas tam illez, tum in pulvere haultz.

A. i. * N*mm*ljn.: *minor flore prope alicunde. C. B. Ger. emac. Park. t*m***I&9BJk*
flore d' *non p' l'ro; t.*

Caules tenuissimis p. — curtam reptat, filis albicantibus è genaculis demissis. Folia ex brevibus intervalis compagata bina, subocunda, pallide viridita, glabra, non crenata, brevissimis pediculis fulta, Scrypili vulgari foliorum magnitudine aut cantillo minoria, Chamaelytes paria. Flores ex alis foliorum exeunt singulares, pediculis longe tenuibus, pro plantula ratione grandes, in quinque oblonga segmenta ad unguem puncta partiti, cum filamentum in medio lanuginosorum glomere. Succedit vasculum seminale parvum rotundum. Caliculi folia angusta sunt & acuminata.

Tttofrn.

Palakatis gaudet. & Julio decem mense floret.

3. *Nomenclaria mucronata Præmunt. bon. f. f. Bod. i Stapel.*

Folia habet lanuginosa.

C A p. XVI.

Dt Rvve Silts, five Rel: lla.

Park. 6

twitj

Folia è radice fibrosa tenui plura exerit, pediculis longe superne hirsuta mixta, uncinata ferè rotunditatis, auriscalpi figura, modice concava, pallide viridia, tenuium, rufolescentiumque staminum velis cibo circumquaque, fimbriata; aspergunt rotunda granularum etiam per ferventissimos aethus adhærescentium madida. Epistodi staminum breviora maliam quoque folii partem supinam obsident: prona namque superficialis omnino glabra est & pilis destituta. E medio foliorum exurgunt caules duo aut tres teretes, graciles, rubentes, foliis nudi, palmares aut semipedales ferè sustinentes longa serie, versus unam partem spectantes, brevibus pediculis fultos, candidulos, è calice oblongo in quinque segmenta diviso exeuntes. Floribus succedunt *capsula seminosa oblonga, figura & magnitudine ferè granorum tritici, seminibus repleta.*

Ros pills seu fetis adhærens tenax est & viscidus, inque filamenta ductilis digitorum tactu.

Floret mense Julio, & in humidis palustribus oritur, non raro inter muscos aquaticos.

Liv. «
Tropus.

A. 2. *Ros filis folio oblongo C. B. I. B. Ger. Ros filis l'piv. X longifolia Park. Hong-ka-
vrd Rosa folis, of Sum-deta.*

*Magnitudine sua, & foliorum figura que sensim ab imo ad summum usque dilatantur, rotundam velut auriscalpium desinant, & multo quam illius longiora sunt, à præcedente differunt. Non procul Cantabrigia in palude quadam *m IwiiirdS*** à præcedente differt.*

Præter descriptas & à nobis observatas tres adhuc alias Roselle species invenit, «[ue licem ad me datis sic breviter descripsit Tho. Willisellus, transmissis etiam earundem iconibus

1. *Roselle speciei tertia, seu rotundifolia a frtmstt ruljMn, rotundifolia major est, radice perennis, foliis erectis, non ut in vulgari in orbem super terram; lint!*

2. *Roselle speciei quarta, seu longifolia perennis Radice est perennis seu vivaci; siquidem eam sæpius vidit cum caulis superioribus anti exiccatis adhuc eadem manentibus. Folia est duplo pluribus quam vulgari longifolia, una parte prope terram rotundata, & postquam dilatari incipiunt ab-*

3. *Roselle speciei quinta, seu longifolia <J WJAFU, foliis est longissimis, ab eadem radice pluribus, utrinque ab exorti usque pilosis. Tribus à *Carolo* milliaribus *Sotiam* versus eam observavit & eruit. Hac*

De viribus hujus plantule non convenit inter Botanicos: Sane qui ad phthysim, ad pectus, ad vulneta, ad epilepsiam eam commendant: alii nec sine ratione ulam ejus internum verent, quoniam caustica est, & cum impedita ipsam exulcerat. Hinc

*Planta Rosa solis omnibus maxime notia cenetur, Pulmones enim ovillas adurit, & tussim lethalem excitat: Hinc & nostratibus *Cher rrd Not* dicitur. Ex *Obi. Olai Borrichii in Act. Med. Tho. Bartholin. An. 1676. Obi. 57.* Not tamen hoc primus observavit aut prodidit *Ol. Borrichius*: si-*

quidem Camerarius in horto annoct, In Anglia observatam esse ab opilionibus oves que e- hinc herba vesicantur, hepat & pulmones male affectos & man- <t,U0di n vitiator habent. D: " S

*Aquam vite seu ardentem cui Rosa *Ib cum Aromam nonnuUu let* addita est, olim in frequenti usu fuit pro cordiali in leprosyma & delirio.*

*Multa traduntur superflua de hac herbula, que consilio præterito: cupis *trila* commata est, quod amico quodam suggerente suscipimus.*

Ros Solis collectus quando Sol est in medio Leonis extractus, & sacculo reconditus pectori applicetur. Arcanum est ad hæmorrhagiam nasientem.

CAP. XVII.

Ds Viola 6fatica.

A. *Millefolium aquaticum dicitur Viola aquatica J. B. M. aquat. seu Viola aquat. caerulea C. B. M. aquat. fusciana, seu Viola aquatica Park. Viola palustris Ger. Water-Diolet, D: .S?tJioil.*

J.B.

Purimas fkr& rni. albae, alte in limbum demittit. *Caulis* obliquus sub aquis feruntur, *folia* crebra pennatis pinnis angustis uncialibus, nullo ordine pedes vestiti. *Caulis* flores sustinentes lutei super aquas eminent, manes, sorian, gonculis aliquae per summa nodosi, ad qttonn unumquodque quini aut sem verticillatim nascuntur *flores* pediculi, masculi, Leucis 1111- Jes, quinq; e folis albis, apicibus in medio luteis constantes, pediculis uncialibus & falcibus libus harentei Flomn *calice* vite obvallant foliola oblonga, viridia, ipsaque pediculis apposita foliola 3«- quib; langiora, acuUj TX&JU. Succedit *vesicula* feminale parvum, lobrotundum, *semina* E*ra continens.

N. *Floris* revers; monoix:[ilos est, in qtiinque lcy;-vanta adeo profunde ad tinguem feri divilus; ut pentapetalos videatur.

In aquis salubus ut & fluentibus vaginalis habet nascitur, & Maio mense flores prodit.

LICUK

CAP. XVUL

Dt Anagallide aqtatka rotundifolia HOM aenata.

A. *Anagallis rotundifolia* in(n>ic* rundifuii. I str. aquat. 3. *Lab. folia* subrotunda non creata Park. *aquat. rotundifolia* Valerandi J. B. Ground-leaved Water-Pimpernel.

Radice et alba, fibrosa. *Folia* ad radicem ex angusto principio scilicet dilatantur, extremitate subrotunda, duas uncias longa, unciarum lata, pallide viridia, per ambitum minime incisa, crassa, glabra. *Caulis* semipedales aut dodrantes, aliove, tenuis, rigidi, teretes, foliis per intervalla alternatim positis vestiti, absque pediculis, lutescentibus brevioribus & raris in quibusdam ad terram sunt. *Caulis* superior in ramos dividitur. *Flores* in summis caulibus Scramulis in singulis pediculis femuncialibus singula, raris dispositi. Ad exortum pediculorum e caule nullum apponitur folium, ac in ipso pediculo non longe a flore semper habetur folium. *Flora* auteni i arvi, alba, in quinq; segmenta lata divisa; sunt enim revera monopetali, & integri decidunt Succedunt in calicibus quinquepartitis, a flore residuis *vesicula* rotunda, *semina* parva, per maturitatem subcasto repleta. Sapor plantae amarus est.

Amat loca paludosa, & Junio mense flores.

LXM.

CAI>. XIX.

A. 1. *Pyrola Alpina* fore Enrop** CD. Pirk. *Herba trientalis* J.B.

j.fl.

Caulis affurgit simplici, tenello, gracili, palmum plus minus alto, tereti, nudo, glabro, qui summo tenui velut in umbella *folia* sustinet ex brevi pediculo sex, septemve, pallide viridia, ovata [nostrata *folia* oblonga sunt & acuminata, ut in iconc C. Basini] uncia vix longiora, latitudine proportionata ad figuram ovatam, quaedam etiam minor, nonnulla majorum vix mediam aut tertiam partem requirunt; e quorum costa venulae eminentiores alie no posse existit ad ambitum: sed & minimam quoddam unum aut alterum *serpilla* *folia* facie & magnitudine *calliculo* adhaerit. Porro e medio foliarum exortu pedicelli commaniter bini lurriguntur *stanciacula* aut duorum unciarum ac ferè capillares, labrati. *Stanciacula* sustinentes *impulsa* ex, stellatos, albicantes, quos *foliola* *predicte* *foliis* concolora, & stellam pulcher potui experimentum ambiant, octona plus minus. *Radix* quamplurimis, tenuibus, prolixis, albidibus *fibula* consistit. *Flis* (mrw- tam mense) *simplici* *lanceol* *confat*, in quibus *lacuna* *tridens* *folia* *mutanti* *dividit*.

Theo. Willdenkum cum invenit nobilique ostendit ad orientalem extremitatem *Revolles* *meas* prope *Mons* in agro *Elveacensi*, lo, o paludoso inter pinos: inq; Northumbria trans marum *Pedernum* quinq; m. ultra *Hadham* oppidum *Borcan* versis: necnon inter *colas* et montanis palustribus non longe ab oppidulo *Harbale* ad Occidentem. *Nascitur* etiam in montosis humidis nonnullis Germanix in locis; vide J. R.

Duplex est, autore C. Bauhino, major & minor. *Purpur*, inquit, *Val. Cordus* in *Observ.* *sebra* sub *herba* *trientali* proponit: deinde Jo. Thalia in sua *Harvina* *Saxoniae* *thuringica* *lab* *Alpinae* *thema* *descriptis*: & tandem Calp. *Schwarzscheld.* in suo catalogo *planta* in *Silesia* *Alpina* *Alpina* *nominavit*, nulli *deserenti* *ostensi*, &c. vide apud C. B.

2. *Pyrola*

2. *Pyrola alba flore Brasiliensi* C. B. Park.

c. a. r.

Ex radice alba, capillata caulis efficitur singularis, sex, septemve unciarum, inferiore parte nuda, circa medium duobus foliis parvis, sibi oppositis donata, superius vero foliis sex vel septem per ambitum cinctis, quae magnitudine imparia sunt, aliquibus unciis duas, alii unam longioribus; unciarum vel sextunciarum lato, Plantagine quinque-nervia formis, (cum & per hujus folia quinque nervi distendant) sed glabra, tenera & viridia, in acumen fastigiata; ex quorum medio pedicellis tenuis, uncialis emerge, flores singularem, pallide luteum, ungu pollicis aequalem, quadrifolium, striatum, caps folia. (Pelle modo desposita) lateralia alii duobus laetora sunt: ad flores umbilicum flammula plura, exigua, rubicunda occurrunt.

Urn.

In Brasilia apud Tocantinambalbes reperita est. Kb BavOpxi f. (foliis quinque-nervis, ftoic quin-tuplo majore distet. At Brasiliensis minor ab Euro; ca minors lolum folioium magnitudine, ;:x in Brasiliensis longiora angustioraque sunt distet.

CAP. XX.

Valeriana Ger. Park. *Graca* quorundam color. *cernis* & alii. J. B. *cernis* C. B. *Speck* Dattfen, callrt b p t h bl gar: Sadder to Headen, o; Jacobs ladder.

Yndata *let, ta* ui, fibrosa, albicante, evidenter .tnura proserpit, inquit J. Bauhiniu. PJura c nuhcc/*w cmnr, per roc. i in hyemem virentia, e multis pinnularum ad median n coftwn adnatarum conjugationibus composita [decem interdum aut duodecim] cum impari co- terminante. Singulae pinnae digitum longae sunt, dimidium latae, e lata basi in acutum cronem sensim angustatae, tribus nervis inferioribus secundum longitudinem icurren: bex, virides, per margines aequales. Caulis ab eadem radice plures exeunt, teretes, striati, inanes, hirsuti, digitali crassitudine, altitudine sesquipedali, ramosi, foliis ornati ad intervalla singula summo caule & ramulis nores conferti, [x] diculis brevibus tenuibus, decem nstantis, e calic (imr}, aaiu Icgmenra liivito, iplifjtii sperioli, coenila. quinc folis obovatis, ad unguis punctis constantes, id w integn deddam: qmnoue tntas ftaminj apiabw bii eis donata continent, cum stylo > ubloneo in (ummiure enfido fie wurai nis oxuleo, odore minime commenda: les. Valcului: feminale tur. >iicum Alfincesmodo, mm a localam ma dr- ilum, quod per matur' item in (ummitacc dehifdt, (aniai oWonga, panra, ntgri. antia continent. Sapor hs:br Ientus&anu.

Tempo.

Mnomenfe floret.

CAP. XXL

1. *Glauis exigua maritima* Ger. J. B. *maritima* C. B. *maritima minor* Parlc. Sea Silkwozt, o; Black Saltwozt.

7 R. p¹ illis & gracilibus est *colencia*, subinde reptantibus, & fili instar tenuium fibrarum e genicu- his propagatione radicatis. Folia per articulos Hemiteriz, bjna contrario sito, ex quorum uniuscujusque sumi *semes* per pusillum nudum sulcum Parkinsonus & Gerardus capsulas se- in salis palustribus mari contemnis ubiq; fore reperitur.

Ltem.

2. *Glauis maritima major* Park. *latusa* filo *Thuringica*. C. B.

Glauis major paisgru fnt Uri-mtj Monf pril.

Marf. Hae in flu aquis innatant i per pnu Jahentiium provenir: W> habet pedales nutritur too pbntj. Ad tinguta genicul. denuntiantur fibrae in aquam pararum beneficio mucrutuia: in cutliui: alis super ionbusc: T> herbacei coloris, qui relinquunt. U C h l i r o m .anci magnitudi ne; [n Iingulis] infinita semina B. 100 ra, gUbra, Planta haec nobis inco d h enus minime pertinet; verum ob icapluik nomen CUuctt j b Au* dicitur indi. jneuni hue renduntu, donec «ennis innotescat ubi disponi debeat.

C A P . XXII,

Quadrifolium arduum Persicum Zanoni

^{Zan.}
Multosfundit (*auUcuUs*, juliuijm writer longos, tennis, li^notos, fi^ARil», membran.i tenuiilimi in v^mdi nitdcentc iccto^ maiulu al^oicintc picna>, LTcbris nodis proniinentibus, annularibtiiliflinctos, adjntervalJj a rcciter uncualia, au quorum unumquemqueappoica quaterna tuliaj trutii torruui, biwi 8c tenui pediuiilo iiiiwccdeiiw;, iiiiipernc vinduj iubtu> alba, hie illic asperaj & lantigine quad.im aJbi piindaut, qui ea Tilui vjxu rfidic, nervo renui per mediam longirudmcm djvifa, Aiiitlyllidis Valentu^ Clud'i Jimilia. fed paulo lanora, & excremo nonnilul c^ctvata& indla. Ex iingulis gemculi* prxce: toIn exeuoi r-imuli tolioli, 8c ex his denuo alii muiorej & dicitidc tertii, foltis mtnuriilunil vefititi, Kaicula adeo vicini^ irt planta fbliis St ramulis crebemmis adinodurti dcnli videatur, (ipmc eitccame & accrbo ticus Immaturi. E genaiilispmertolu dicta egreditur ctum gemma qu.ubr.ita, qiwcui colbs uMc cUtlis, intercedentibus Julas Jjtis deprcllis \$£. concavis^ patte inferni, pra capue lo amdura valla, rubeksns & punctis (upradiftis vanegtaj qua: circa pnntipiutn Junu florm explicat pul. hcrimui-i, colors Amethy ftitiOj quinque pctads iubrotandj> j extremo ffolioruni n^star) creni excavatis, compofitum. More dcupto rcfctaiu in ooncepuailis fmins miiiulTiin.i, q uae microfcopio fectata figurz ovaliscnbcilimilia apparent, cscremo mmore tiigia, cum fillura in madio ad modiuu tntia, Tabad colore aliquanrulum lucido. *Kidix* tenms eft, alii* inn^lcx, ali^inramulut iiiiivjja,temu(fin<i> fbrbis donata, colore ad fenugineum obfctirunt te/idcentc.

Planca c(t annua.

HISTORIC

HIS TORII PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS PRIMUS.

QUI EST

De Herbis radice bulbosa donatis, iisque affinis.



Herbarium quoniam plantula seminalis bifolia seu bivalvis, seu nuda bina coryleone ^{iiibi} as
infructa non est, sed unica tantum vel nulla coryledonis seu folio feminali donata,
sunt vel flore imperfecto seu staminico, vel flore perfecto seu petalobde. Hi TCI fuir
radice bulbosa, vel tuberosa fibrosa, ^{•ius bul>olis affinis dicimus.}
De bulbosi nulice prxdnts lue inPorte agemus, du Bulbolb jffinibus in fequenic

PARS PRIMA.

De HerbU radice bulbosa prteditis.

Radicem bulbo&m voco qui unico con/tat tubere feu capke, fibras mi ^{tas ex ima} icde seu
bail crmttenw. Non me latet dan ceuni aim iwrfcus pneter (^{as quas intellectas vel}
(jiurum radiabus lire ddtnttto conveniar, ut v g. Ranunculo bulbofo, verum ^{•CU) 4}
verio generefuitt, quarura lei. pUntulj fcm: ^{nalis bina coryledonibus instructa est.}
Hup: ^{autem generis herbe plantarum} lam fetniulem unitt) tantum cot ^{ledone: <lonatam obtinenfj}
& alia preterea ^{•nibus nocn a} KI<tin dil ^{serunt, nimirum totis sine pediculis in longi-}
tudinem productis, valculo seminalibus in terra localimenta dispersita: Flor ^{ut plurixnuni Iwu-}
petalis, aut certe in sex lacinijs ad margines scissa.
Hic vel sunt bulbo squamoso, seu ex pluribus imbricatis ^{•CUH)BCI} ribes squamis com; o(ito; vet
bulbo tunicato, hoc est, ex pluribus corticibus seu tunica in orbem se amplexant ^{jbi>aMj{mcnuto;}
vel ^{it<i} bulbil (<liio, fubl.ritu continui, iwc in squamas aut tunicas divisa.
Secundi generit pLi ^{ex quarugi bulbitunicati sunt dividi possunt in ^rdvcoluites, Jx odore null,}
nit nimugrjvi prardiroi

SECTIO PRIMA.

De Herbis bulk fqtumoso.

Herb rtJict bulbosa i j quam compactili.*

Vabxrjulicccbulbo& ^{•lonate sunt vel eadem squamosa, vel tunicata, vel solida, hoc est substantia}
contini Jj) nee in tmuci ^{tum involucria aut squamas divisa.}
Que radice Im-uwoij ium divtdi pollum in ut quarum butbus cvrnpwuiur c fipaj

Malta imbric. ann incumbendxu, ctule

Flora ^ floruin pculii
j *Rellerribar*, iionbui etum ipCu t ^{tuca: LILIA VILGARE.}
«», floribus iplis pendiIU leu doorfum ^{SILVESTRIUM MARTAGON, Liliun montanum.}
Hyacinthi; HYACINTHUS LILIFOLIA *florum*

Pancivicia 8i majonbus rmjores & etmores, dule

Supra fteru tjj*g*r.tt, florifaas ipfis psndulis caulem coranx inftar in orbem dugentibus, lm. dice TMpcni l ente: CORONA Imferi*k. In florum: jrfKi'i ittm»»9, fionbusparvls, itcorfum nuuntii«is: LILIIUM PERSICU.W.

mit J**t*sot, humiliorj flora Tulipx, pentulofeu dcorftim nutanw, caule fbliofo: FR,ITIL. LARJA.

Heibr radicebulboCi tunicaui (tin^vcljjravtd/wrf/, flofailismuttis c fummo aulisiltftigiocnaxis in un.IKIUIII aut corjnbum ditFuiss; vc| odore nutJo ant niinui gravi prtditr.

CAP. L

Corona Imperialis Ger. Park. Corona Imperialis sive Tufai alicj. B. Lilium sive Corona Imperialis. C. C. rollin g: imperial.

J.B.

R Adia bulbosa, rotunda, crassa, diversa à Liliorum forma, effcinim compfel'13, cxm ignis, crassissimis & succulentis squamis compacta, colore interdum albo, nonnunquam etiam purpurascens, sepe pallido, odore foetido & viroso, ut & folia, Colchicum olente, Clusio hircum [milia peltis vulpina] naves etiam procal feriente, qui eruit binas & amplius libras pendentem. Caulem tollit hn nlar^j bicuhitalfTi aut c etiam amorem, digitali crassitudine, inferiores parte plouquam poUicari, hrmo, incus funs olo, vir li. ron: do quidem, sed ad cubiti altitudinem striato, folis magna parte stipatis im nomeri flos, splendore viridanti nitentib: -scen, modo a- do confulo ordine etiam ambientibus, nullo nixit pediculo, sed lat ore lii^trtc cauli adiu- tis, ita ut appendices paulum eminentes ab is propagati caulem reddant nonnihil angulosum. Supra autem densius hoc foliorum agmen caulis ad pedem, nonnunquam etiam cubitum protenditur nudus, sine foliis, gracillior quam inferiores, & teres, neque striatus & viridis sed levis & purpurascens coloris. Serpentinae instar maculosus, qui in se nimo totidem pene in angulos definit quot flores sustinebit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, senos aut plures, omnes Vere quasi aequaliter & contrario situ nascentes, singulorq; inter bina folia, inferiusque longe minora & angustiora, aequali fere longitudine. Quum flores primam erumpunt, inter folia latent, candicantes, sunt, deinde paulatim incrementum sumunt, una etiam succretcente ea caulis que illos sustinet nuda parte: flo- ram vero pediculis, qui sefcunciales, in zugimento deorsum inflectuntur, è quibus flores penduli sunt circumcirca, regum coronas imitati. Lilia candidi pares riaromco color ruilantes [Lobelio ex pher- nico rubentes] parva, semis constant tohis latis, per extremum mucronatis, poliora striarum lato- ratorum sive purpurearum discursantium pictura variegata, laciniata celsura subinde lacerantia, ungue autem (inquit Clusius) singulorum petalorum nonnihil foris eminente, & ex nigro purpu- rante, quorum uniuscujusque fundam obscuriore colore pictum obsidet gemmantis liquoris margari- ta argentea limpidissima & dulcissima, pertinacis durationis, post multos etiam dies à refectione; [Lobelio Visci grano fere pares] Ea deinde tubercula macrescentibus floribus in alba lacunas ab- eunt. Ex iplo penitus floris umbilico prodeunt pro foliorum numero fessis candala adeo cot- puncta, ut pro uno fallant obiter insistentem, apicibus masculis in Ochram vergentibus, breviora trifido stylo inter ea latitante. Supra flores Caulis deorsum arduatur dodrantali plerumq; aut majori amplitudine, foliis exilibus & angustis omnibus: nonnunquam supra flores nullus cauliculus eminet, sed conferta duntaxat angustiorum foliorum coma: interdum etiam (inquit Clusius) mihi nati sunt supra flores non unicus cauliculus sive ramulus, sed bini, terni aut plures, suis etiam foliis singuli ornati.

licrifu ccedunc magTU trigotu «M<, intmlum etum K tragona ut in Lilio puniceo, quorum singuli anguli utriusque pennam lent, & alati; exculto autem flore statim sursum eriguntur quae fereunda futura sunt capita: Semina plana sunt, lilacea, paulo oblongiora, cartilaginea, lubrica, duplici serie in singulis angulis digesta, quemadmodum in Lilio generibus, &c.

- Hujus plantae multiplex tubetur varietas, nimirum
- 1. Lilium sive Corona Imperialis duplici corona C. & B. Caulis enim in hac planta nonnunquam supra priorem illam florum aequaliter propendentium seriem dodrantali longitudine arduatur, ibidemque florum seriem gerit, aliquando etiam tertiam, & cum densius foliorum comam supereminentem: eas vero stipes unicum florum ordinem subsequentes annis plerumq; fere observavi (inquit Clusius) ut peculiare genus non sit censendum, sed Naturae luxuriantis quaedam duntaxat lusus.
- 2. Corona Imperialis flore lacteo cum styis purpureis: qualem Clusius primo in loco describit. Variat in nonnullis plantis florum color, est enim vel modus inter utriusq; generis, vel ad priori* secundive colorem quam proximo accedit.
- 3. Lilium sive Corona Imperialis multiflora, lacteo caule C. B. Caulem latefcere & multos deorsum flores proferre, alii etiam aliquammodum plantas accedit.
- 4. Lilium sive Corona Imperialis flore pleno.
- 5. Lilium sive Corona Imperialis foliis angustioribus, non ferent Clus.
- 6. Lilium sive Corona Imperialis ramosa C. B. Tulia sive Clus.

He aliaque varietates quarum meminit Lobelius accidentales nobis videntur, & vel soli luxuriae, vel culturae & mangonio debent, nec speciei diversitatem arguere.

De Corona Imperiali per omnia majore *Car. Turf. & Corona Imp. Sincensium* (sive *IJO vano* *ca. 1000*, cum mihi nondum fuerint conspicua, quod dicam non habeo.
 Constantinopoli allata est huc planta: ex Persia vero Constantinopolim delatos illius bulbos omnino sibi persuadet Clusius; quoniam cum acciperet inter reliquas huc fuit inscriptio, *Tulsi sine Persiana esse & disiderata cum la. esse obeso*, hoc est, Tulsi sine Persia ruber aut decolor tantum capite.

Loc. Pers.

Floret Aprili, interitum etiam Maio si aeris temperies paullo calidior fuerit.
 Coronae Imperialis gaudis in flore utuntur Turcae ad vomitum excitandum; sive a *IJutum c. 2.* dandum. *D. Falun*, & dicitur *D. Herman*.

CAP. II.

Lilium Persicum Ger. Park. C. B. *Persia. m. fivt Stfimi* MM J. B. *The Persian* >iit>.

Galis ex croceis, non multum crassius, caeruleis & altior, rotundis, filis ab una parte sursum versus dextram stipitibus, Lilii crocei foliis angustioribus, acutioribus, digitalis longitudinis, longe quam Coronae Imperialis angustioribus, illa fere similibus quae in humo ipsius capite nascuntur, virescentis ex cineracco coloris, sive quodammodo atruginosi (inquit Clusius) qualis in Tulipe foliis conspicitur; contorquentur vero illa, herique sunt odore i. Suin-
 ma caulis longum gerit thyrsum *floribus*, sequilunyalibus & longioribus pediculis haerentium, numeroforum, pendulorum, terramque spectantium, Leucei bulbosi notas imitantium, satura purpurea unicolorum, sive (ut ait Clusius) foeta purpurea valde obsoleta colore praeditum, interne autem diluorum, unguibus libruelcentibus, odore rubro insigni. Ex umbilico sex inaequalia *floribus* praedant, purpureis apicibus primum confuscia, qui obverti flavo polline conferti apparent: tria deinde longiora staminula coeunt, *filibus* mediam florem occupantem simulantur. Scapularum deinde sexangula capita sive triangula, quorum singuli anguli binis ala sunt praediti, Coronae Imp. capitibus fere similia, sed minora & breviora; *floribus* etiam simili, paululum tamen breviora. *Radix* bulbosa. Poni Arantii magnitudine, subrotunda, tilla, margis squamis loricata, ex albo flavescens, tenui membrana cincta; substantia epius qualis in reliquis bulbis: ima parte sessilis, foramine plurimum pertusa caulis vestigio. Sapor substantiae peramaris horribilis; in *Jlo teno* aut grati odore nares feriente praedita est.

Turf.

Floret Aprili, semen ejusmatutum cum Tulsi semine aut pullo possit. Apud nos etiam redurat hyeme non nimis acri, sed bulbos tempore decrevit, nisi calido in loco seratur, aut in fictili per hyemem reponatur.
 Clusio Lilium Sufianum dicitur, quod Suse Persiae urbe delatum sit.

c * p. m.

De Fritillaria.

Fritillaria A uhiSi Scaccaria seu abaco in quo Scaccorum I usus exercetur, quem Fritillum dici existimant, nomen accepit. Verum Fritilla non est proprie tabula Scaccaria, sed vasculum alioquorum sive pyxis cornea lignave turricula aut infundibili specie, e qua mitterentur alae vel tellae in tabulam ad cavendam fraudem.

Genero & dicitur Melagris dicitur est, a Melagris aris plantis, quas si non colore specie, tamen varietate & dispositione, & maculatum magnitudine refer. C. B.

Melagris noce sunt Radix in duas velut partes divisa, Morfona e duabus velut magna squamis composita; flos Tulipae amula, decorsum mutans vel pendula, maculis quadratis tabulae Scaccariae in modum picta.

1. *Fritillaria vulgaris* Park. Ger. *praxo purpurea variegata* C. B. *Melagris* sive *Fritillaria* *lilium & jatropha* J. B. *Common Fritillary*, or *chequer'd Lilp.*

J. B.

Ex radice emerge bulbosa, candida, solida nullis tunici septa Clusio, sed veluti in duas, et: UJUS ut plerimum inaequales partes facta; e cujus medio prominet quasi palmis quidam, unde emerge, sessili parte multis fibris donata. *Caules* prout tertium, runcem, singularum, dostrantalem & pedalem, interdum etiam majorem, fors ex viridi porporascentem, vel fusco obsoleto colore praeditum, levem, nuda fungulam; ad quem sine pediculis adnata hinc inde, nullo ordine, folia *Tragopogoni* purpurea, quinque, sex, septem, masculociter longa, angustagarnata, subacido sapore praedita. In humo caulis *filibus* sepe unicus, aliquando bini, intercom totum [Clusio eodem tempore se aperientes] ex pediculis incubibus, caeli concubibus incurva nutantes dependant, pulchri, Campana instar, magni, hexapetali, tricolato emblemato fibrilli seu tabulae lustrucolorum distincti, plaga abromo rubore, carneo sanguineo & albedine picta, aspectu pulcherrimo, interiore superficie saturatior purpurea splendente: singula petala ab uno costam elevatam habent, ad petali ulque medium absurgentem, in tuncillo penico litorum: in floro medio *floribus* sex, capiendo *floribus*

farinl crd=s.i atpsrfo, JlyUm ambuint tnaipucui, colons htfrbacai; oJons nullius. Florem verò CKcipil eapitHtwn, cnanguljrc, tnctam pleriinqm; longuni, fuperna parte cnallits & lino corona, aliaqm Nirbonanlii Tttlpr Cipti fimile; quo! in ih continet Jemen palliduni, ainipreilum, Tuliparum lcmioi acccdens, vel, ut ait Clufius, Tulip* Naiboncniii feincn quaii" rullren.-, membranaceo marine Litiore, in quo nullum, contra qi: inj in Titipa, germcn confpkioir.

Floret cum prtccioribus Tulipis., iota dum ex un M.utio in horas, Sponte qmbuffHam p ratis Tmctur & Lmca, Varietas.

Duplex clt, altera fpeciolwr & colorator, paullo rictus ffareits; altera colore diliinore eft, minib fpedoft * < nonnihl tirdius fiortiH. Ob loll luxuioon imca'dum Horcin gemiiLitum pixxlui.it, five dodecapecalon. Hinc

Fiinllariani flore niagno plcno C. B. Cam. Ejff. FntiUanani flore duplici aibiCinte Park, pro lito vicntu nanirx lufu habco, non profpeccaljqoa l'nlllarir ililhrufti.

Qui nacuralcm & ftabilcm hancipedem elic alfiimant non varietaccm aca*lcntalem 5: rnuul)iJcm, obfenrcnt, an bujuf feminc I a to oitr p!.intx hujulmodi lempcr vc! maxima ex pane Horc\$ producant.

1. FritHuria *ib» prtccx C B- *Ika Park, alba pin CluH App. alt & au^ . & CUF poft.

Prxcedentis vanctas potius cifc viJetur quam (pecies diftimrb : litjuuicm, annotante CluiTo^ canl « 8E folia vulgans liabet iimilta, fie prxcocius una cum ilia Horcr, NOTJC prxcipuc quibus ab ea differtj obfen'anto Parkinfono, ha: (unc, I. Caulufle folia produs vIndia iunt, non ut illius ima parte purpurafcentu fen fufca. 1. Fioru color alUts, qui tuneti in nonnullis variat, interna pane vents quiouiliani piirmirafccnbus diftinftus. ;• Ungucs pctalonuu virities liint, co/i.i cnani viridit medium fol;ni divilvit, >cr lonftituijiiem.

In plerifq; oehufim geneni plant is cefliix quxdam obfeuriores apparent, in non nuli i* ctum color purpurafcens diliinor: unde manitctuni crt cAs non aliter diffsrre a vulg. urbis Fritillari.-, tjuim alix pl imx flore albo interdum vanctis ab etOern flore rubro vel cacralc-l vel alio quocunq;. • niyuraiter & ufiute prxditis. Hinc neque Fritillariam atbam ex phxo purpurco tdlellatam IJA. Ad f*rt. i. cu)U5 Ho> interne rubicundior eft, unguibus albis prsouus, a vulgan i'ntilLru (pcuc d> iingui toncciiinus.

3. Fritillaria fn-vtinj atrwurfur* C B. Xantanic fir*tu\$*Lob, Ad. pan. }. ^!> ftrtii fure *tr*-r*htttt Park?

Lobclius hatu. Uc b eviter defcrib r. Serotinj Xaotu: nix fls pulcherrimus eft, & Garanoic nic t;JJO r cqi: c purpuTO- v i ffo coiro gr*ulS n >. i i i i nodo eandem in tedeU r iga t, huac in modum.

R*d& huj* nonnihl rotundiof eft magftqie coaAa quam prarcedentis; cmitt brevior ic humilior quim alterius cujufcunq; FncilUdr Ipouci, /*/* intent*, unico vel altero donatus, lup«rna parte duobtu ttibulve arrte jun&ii, lanoribus, brevionbus 6c atbidionbus quam reinjia, Fritillarij [utea; fobisicre hmilibus, inter qiix exit pedcultis flwim luluiicmdi;oriumnonnilul nuumem, feu potius produm extintern, qu.ni vulgaris amporecm, fit FritiUarur Ltex flori magnitudine fere iquxlcm, fo~! obfeure cinereum feu per tocum ex cinereo lulaim, intafius atro-rubenteni, vatic frutamfea maculatam. lice (pecies neque radicc libenter (c propagat, neque femcn pericic apud no&

Cum prtccioribufloict: Flos aumt cluicinus evanefck quAm cujufiru alte, i a Fritill-iix-

4. Ftullorta flm t*t<t fun Park.

Pe'i.

Radic em hab« nx andiozem, minus planam feu comprcil am qudm fuperiori genera, mediocrit magnitudinis: tm/f- * fcliquipedalem & interdum altiozem, felis aliquammulta, oblonga, latmluillu, exvindi cxliis feu albicani bus, Fritillariæ nigra fimilibus fed duplo angu: lioribuj, veftitum : Ftrrun minufailum, oblongum, Frmlan* nipia- figura iiii non vaKie diffinidem, pctalii tiincn. minoribus& mno-onibus rotundioribus, pallide(e); ex vaidi lutcum, nuUu neque fom negus iitius maculti feu teucllis variegatum, fitmm/ut Si apcibas intus luteis. Semen primi genera ltnitlc

Hint; in Kortulo noflro Cantabnguc aluunm; Ad FritUlanam nigram accodere videtur.

5. Miliagris fiva Fr iditrt* f.A'M J. B- Frttil. fitri UH MM fixt ytmftm* Park. Fritil. fiva rub

Affurgit M. altitudinem prarcedentis zmalum, felis cinerea v latioohiii, brofiojibu* & obtufioribus: ferioribus majoribus, quorum petals flavi funt coloris, ribris macula diftincta, Ikorum medio neeve promuulo ^ virticentia coloris.

6. Fritillaria lat m mxim* !t*).* Patlc AUlt>grv ft" «M»«W» i *low Eyll.

Park.

Caulcm furiRit teraem, ex foCx i virentom, f*itu «bqu« ladututt* brevionbia obkum: quæ hafi fua cum amplexiumr, cobrii ub! are vuida. Propè lammum jjuleni, qui deorlum nonnihl incurratur, tblia exeunt t ia vel quatuor, & quorum furi omcrgit ft>> pkirimum fingulantj quim prxcedentis Iwigtor, dtorliim tiuum reuquorura in/Ur, tulore c lb>co obluiro purpuraleftlie, matlij parvu rubrw t)T:llanis.

' Serb & poll reliqm, tand:m oipnei fl

7. FrtfMr.j Intte julifla dntcs Pilk. A* Jruil. angulif M -yir^J<J magna for C. B?

Park

Caulis allurgit corat> obbngo, Ktiui^t infatnio, /Jutraiioribiii, oblong angulif & fere junceis vestito. In M cillit [Pantia], kitoini, nutulit tauten m>u crebrionbt: legmentz .tutu tjuJr. quodv aliud P'itjLIU mC!! genus.

Fritillaria Lusitanaica Claf. var. pof. hoc referenda videtur. C. Bauhinus tamen distinguit, & re vera notz nonnullz sunt in Clufiana descriptione que non bene conveniunt, nimirum caulis firmus, foliola br. TM, coJr floriz foris purp. obfoletu 1 "> VCJU* q ualdam ad extimas oras vergetitddi- flinctus.

8. Fritillaria flore minor • C. II. mm Fritil fratma fsrika* ex flavt vtrmln cjuJtrni. Melagris fove Fritil. Pyrenaea flore minore J. B. nam Melagris fove Fritil. Aquitanica re- flexa ora caudata. Fritillaria Pyren. • fivt jiptnmtM Dark. Fritil. A|>MHM M nor flore later obfolato Ger. cinac &tjr bkick. jrtrillarp, o: Ic^tttr-toai.

Tullum habet [Clufio] Fnnlbrur csp. x. IA. ilttft. ticfaipU fbrmi (imilcm, minorcm M- Uiu. [Parkinkjius hu]Uk btillbum in um moleni Sc nugnhuiinctn in;erduin c rioru: Irnpetulia NuUccm muliou'em menti.itur) ex quo proJit j>, adalis caliculis, gracilis, viridis, fems aut leptenis folis leptis, c' vinJi timesjecii, qu* as fere lunt in alis Fritillaris, in cupis sum- mo fastigio nalcitur. aliaruin FntUliriai"um riure mi nor, sex petalis constans, quz extimas oras iionihl renous habent, ut | arvi um"nnatxJi formain cvpimut, quoioni rarna excenora internis aiiffuffhora Junt, outnu ob!;len foris colons, *ra oras tamen (practerum ut.tcnora) venii quib- ddam flavicis .ntibus ililhiic'taj interne vero ex .iradi flavicentis & splendentis; i irwdiii porro id tpf(K ulfUC "'WitTt (qui similem colorem habebant) plurimis maculis laterate purpuris- centibus tessellatim dispositis notata. Ex umbilico prodeunt sex luvra flamma, longi apicibus pal- lids perdata, trifidos hlo e medio illorum procedente. Odor eius gravis, quasi Phalli odorem referens, & proximz ad eum qui in Spatula ferida percipitur accedens. Semen Fritillarie vulgaris lenius simile.

In eadem parte FritillarLc pUtiuruin qux e PyTciuu inonnbtt cmmntur (kqiiii ut Clufius in hif. app. ad.) floribus non illiiorobfen atur dire rliosquini in illa | iue vulgam in divert s •Galliz pro- vmeiis re] rionitur: nam licet omniumj (qiios mini q i leni nœiere contig:1) forma quodammodo similitu fit, sex viz. petalis con tjiBj coruinqtte terai imm u nugna Ot pane i uba externa lunt la- tiora & amplicora, quida 11 tamen flores ilu rpanLt tubent, U. c ilkron extimas oras reflexas, non iullontnt vero ore vel lion dint reti.*x peoioii, vel certe ri:mi minimum: mrfii illi flores qui extimas foliorum oras reflexas etiam adeo fa- tum ut nigri videantur, practerum externa foliorum parte, que nec splendet, nec tessellis distincta apparet, ac interna purpureis quibuldam maculis distincta vel frequenteribus, vel minus frequenti- but, aut iuu gis saturis, aut diluocibus, eaque splendet. illi vero flores qui folia repanda non ha- bent, vel quorum ore paululum dentaxat lunt reflexa, externa parte uparimum vrefcens lunt colozs, interna aute il cv' viridi flavicentis & splendentis quali pane pradita est tenuis ille sericeus pennis, quem vulgo Tafita nuncupant, ex flavis & viridibus sericis flaminibus contextis, atque in illis tessellarum illa distinctio obcurior apparet. Singulorum autem foliorum ungues interni non- iii] cai subviridem maculam impressam iibent; •ex floriz vero umbilico sex alba flamma prode- unt, quorum *p. pallidi, inter que trifidos exite stylus paullo supra stamina sese exerens.

Florent p.: n vulgare> Ijuxinx l- ritillarLr & semen forunt in thoci seu capitulis mg' .iii^vuJi; rris Fritillarie instar, plantam, vulg' .ini (ernitu pror(i: i finile, in q':n niillum Ctum ger- n conljidmr. Interdum hzc plinu biitn tioic> in eodem czulc j¹ totat quemadmodum vul- gar.

9. Fritillaria Aquitanica Clafu & Bttfnfirmms, i t. FnttL feritina floriz flavicentibus Ok ft

Videtur IjbelioActv. [art. 2. quadrare cum varietatibus Fritillarie nigre:ille tanten notz reclamare videtur, 1. Quod in horum petalis dorsi nervus extuberat paululum atque vrefcebat. 2. Quod petala omni • • .mo ail i extimas oras obfoletz purpurez radiis, sub ;;ibis no nmJiil ftivj confpiceretur, disti iigubantar. ;. Quod folia angustiora nugtfque lierktcca. 4. Tencnor erat & frvoris impa icnuor.

Suet Fritillinar quam Clulius AqLiitanicjm voc« hvmorrhaguin in ruvene Bdg» lupprdUru oblerv.ni LuK<ustf llauvonuti. Lit vetu tocrnmi odoritj on limilem puodUBmum ovum lpuat. S Pauli Quadrip. DoLUL < Claf. 2. p. 83.

10. FnttiUru imMifir* C B. thfrtm* mmkHfif Park.

Fritillarie nigre :utui diibic congen. est, adeo partibus omnibus ei similis est, m, 10r cm. axat, quod forte solo len erkboir. rJoro >n fastigio quatuor vel quinque simul pendula Coxone Im- perialis inst. caukm antihiunt, col ore intui t.:vo-viridi, rubentibus maculis notati, foris wgn- into.

Fritillaria II. seu ramosa C. B. item Fritil [aril HI ftu polfiiunoi fli>a-nri<K (i i p-Zv odente spece differant nobis cave inognitiz lunt.

IL Fritillaria Lilfiunica CiuΛ. m. p. ambigere videtur inter Fritiilanas vnlgares & Friollanas nieraj, liquidcm petaloram mucronesm canon refle&ebanrur, colo- s tamen „jnt foris purpurei obloleti, in verus ad exrimas oras vergenres <llif mfti, nullis maculis tefellatin, dilpoiios app.ucti- tibus, fingulorum mucrone ex vimi paulum flavjks;tir=. Flons pars interior iubfl.ivi coloriad<t inpies ver6 yiroijjente macula infc;ti. In flore didoiem nultum deprt hendere ;x>tuit Ciuiiis, qm> i I-ndlJaria nigra differt.

II. Fritillaria minima fluTibtuflotib.it CB.

A Swertio plngitur.

11. Fril'dlarut InJica maatlte tattle, Vifmna dtj}* Hort Rcg. Paris 3t Lugd. Bat.

Fritillarii flos (autorc PauLRcncatmo) non tanrum ardentibus febris confert, fed U (iiiindx Vu fiti ex hujus fucco fit unguenmm ad carcomonotoii uloera prrtantiflimum. Vim prxteera lic flos robor.indi cordis & cerebrt non parutnpoffidct, mcomiqut; (ut me doaic expenentu) nialigni- cateiu inringtt. Aqua ut <icct dcltillata oculorum inrhmmaumbui fuccurt.

C A P. IV.

Murtag m C ^ f e m * e * l * t * m Park, Mm. ft* Lihum Je Cm * da, ,WTI cebrem rfernts fiert m- tm tigrut m * c * U \$ ngxrft Bry.

Park.

A Mbtgere videtur inter UIU floribos reflexls & cre&ts. FoLa nttu illis per inrorvalla ro<- nm caulcm ambiunt. RsAix parva, fquamola, ritinstenuibus lortgts ex. iuuicdidcpcndcn- tibus. Caulu lads craffus, icifquicubitali aut altior, f. ;w<«» lon^orum, anguHorum, viri- diunij pauoruin tamen mum in MarcaRone Imperial • triplici aut quadnjplid per mtervalla (eric circulariter cinctus. Ex lupremo foliorutu ciculo una crumpunt quaniot attt qumqmc Hores, Lillii nibri pini pares, lingulis podiculw longis tenuib; fuli, diorfium nunllliil incurvati, puldti- colore (iivo M. UIICO tincti, interni palTe nuculis Ica flrus aro-purpureu puiij cum lex Jlamiiibu> tidcin Jpicci (uftmendbus & piiriilo in mco.

CAP. V.

De Lilh Jimpliciter di&o Jlerihs ercHis, Gf torunitm pttalu non rtjlexis,

L Ilium Latino i Grxco >*«» tiduAum cfl, (literi in I mutati

I. IJ,um album Gr. *famv>txrt J.R Park, slttw* fore mete & vulsrt CB. Common tU icJ tlp.

B.

Florum delioze Lilium 11 c* TiJict bistwi.'i, multu nucle) tonfljjite caulem furtige rectum, c ibiu lem & felquicubitalem, vel etiam altiozem, fingularem, terete m : ctii ab i mo ad fummam adnato f I:J onllo pe licalo, oblonga & latidcula, viridia, glabra & l' Icndenti.! veris fummam caulem lenlim minora & n gultora. Flors in icapo ferie quib; lim plin, non eodem tempore panduntur, odoris inavitate e niUjColoie lafleo, ftms pinguibus repandi- folis cal uhuu tmititi, in quo medio flylum longi; licalum : £ albo viridantoi, tniulcum oraunllant fl*inina, folis nutneco Si. col- lore ;iria, quibts afxu ml idem crocci,

Scillatittani rioru:: aquam dari unlit,;. pourui.: in egre parturientib; is, & aJ pellenda fecunda Fren a.^dl^> cn>a> S. callia icribit Matthiola: Crocum & Calliam ad augendam penetrantiam addi non conceflerit Camerarius: s: quj a; ; iam fillationam folam ad hos ulus efficaciffimam at, unde non remere in aliu affectibus dandam. Tragus duo aut tria cochlearia reftituere animo linquento ferbit iionun len: anta. Schroderus ulus crebis eife in affectibus pulmonum, althruat, tafi & fimilib; us Ieri'it. Vnguncula familiaris & expedita efl, ut ei facies nitorem concilient, tanullum Camphu us fcOUT. rtri per deliqui,n, deftillet „ di difolventibus. Sim. Paulin.

Oleum a floccib; per mfolationem fit. Cavendum autem ne folia relinquuntur in o >veKre ad quimicci n dias: Camenim tota planta targeat fucco mucagineo, facile putrefcat, & oleum I tain re- dulce non Lilia, que poma bonitatis nota efl, fed grave & fetidum quid. Sufficit igitur ti Juum, quo to imponantur alia, tum denique iterum alia. Sufficit enim unum repofit.

Hoc oleum maximu habet vires in quibulcunque doloribus & affectibus frigidis: tenfa remittit, (iur- emollit, dolores fedat. Ufus ob id efl in doloribus coctis & nephriticis, in pleuritide, &c. Ufus cu imcft in induratis nervis precipue, in fchirho uteri & mife dependente menfium mora.

Radice ufus internus raris efl, externus crebrior in tumoribus lenendis & maturandis, in cletis pedum tollendis [aringia rotere excepta & illice] in pudendis pertunexiam emolliendis, in ambuflis emendandis, &c. Subtil. B b b b b ; Scamila

Seamina exhibentur *id tadhundtim pamim aim aqiu* Verbenz vel simili. *Idem.*
 Guillelmus Goderpi, Elizabethz reginz Chirurgus, referente Gerardo, multos hydrope laborantes sanavit radice succo cum farina, Hordeacea mixta pane scilicet ex istulmodumata confecto ergo
S menieri aut sex hebdomadas continuas exhibito; quo solo & iwn alio pane; pertotum id tem-
 lecretur.

* likm codctm refoetire, R. *idicis mife succo* m "prefium aim vino exnibiaim 6c per duos *trive*
 .wxiiim vencnum pell *idiciale expellere,* & facere w foraj cnmpat in puftulis b *cutem*
 extremam occupantibus.

2. *Lilium album Byzantinum* Cluf. Park. Ger. *Lil. album "tribus dependentibus: sex peregrin-*
*man C. Sultan Zambach & Mari-gan Qmjl*KtvMp>lit* *fieri CM.* *lult. Li-*
 JJ. : *lium album Syriacum Razerifii* J. B.

Claf.
 lilii albt genus est vutgari proxinum: Eim tamen eW « Uqet *vulgari no-* n brevier *es, a diligentis*
observantibus gracilliora », raronbuicjuc 6L mmonbus rblitt fcp(*deprehendantur, ipsulque flos*
 paulo minores, atq; tamen ac *Lilgans floics oioratu* NonnullLe vero radios in umatn nwlent
 crescant, ut vix utraq; *re manu comprehemii poffint.* Honun noiuiulli in piano & lam caule
 sexagenos floz% pronJcrunr. Lob *alios in caule palmato* mcuduib, hununx proccriutii, 100 &
 plures candidilima & suaviffimos flora oblervavit.

j. *Ulm nbrvm vtl fTKtton msjm J. B.-jwTpm-cneam mtjm C B. IMwm amtmm Ger.*
Park. Joria. Plantag. & Lycopodium

7. ff.
 Par efft *TIUP-umaine* 1 ilio' albo, nifi quod folia incondita minus sint lata, ac firmiorj, nervosiora,
 atro-virentia, splendens, longiora quam in bulbifero. *Caulis maculatus, bicubitatus; humilis*
 in pediculis *uquoc* faciens, singulis lingulis inhaerens flores sustinet, Lilaceis magnitudine for-
 ma foliorumque numero similes, varium colore natio *convulsantes, fere omnibus tunc flugmatis pur-*
 ctati. *Ralis iibcft* bulbosa, e *:AOH* ti* mpaustis, albo, ex *cl-* ramulis repentes novos generant
 bulbos.

Nulquam *non* sponte provenit *(Matthiolo)* in Italia, quandoquidem circa messam in ar-
 vis inter *roes in prat* ui mona *lit66t* in v. *libus aurco oioict emKU.* Nos in lyns supra Nea-
 palm propTcamiduieniium ocnotrium obicrvavimus.

+ *iiiww fi«iif«M C B. fhnttttKM Jil*ium J. B- Loh, nbr*m Get.*

I flngo 5c fhedto atlurpt *mJt,* vikic dilutoj fort riores, (crodnique cA, cum Ijlioalbo duntAxat
 florens: *n* quo sexagenos aliquintlo riorts. uni a *ali inhaerentes oblere* naiuni.

Hanc speciem Chafius *lgarem & ommiMu noui* scribit. Parkinsonus quoque *ib LUii* aurei
 tulo hanc describere videtur. Nos a precedente specie diversam non potamus.

Huc forte referendam est Lilium Sandicis colore poly *intlioi C. B. cruentum polyanthos Hort.*
 Fjrf.

5. *Lilium rubrum vtl trixtuM nvmui J. ti Ijlmrnprf*r**n*tom mmui C B. f>*mt'.*m cruen-*
turn Park, fuppuruftunvwt Ger. enuc

7-A
 Sgtumnuu Win f*»/rt» pronnt anRulut.fii. Ilrutiim, altituiliu *sefquicubitali, cui temere folia*
 numcrota^ *ur, atro virve i* i, perquam aneuJlt *secundum longitudinem ner-*
 vof.L *Ciula fastig* ;ni in aliquot po *HKK, pundb i* *variegatos, modice hirsutos divi-*
 dicar, quorum unicus *tque /.* JbaceMi tobrc ex rubr- *flavelcente*
 sulcata & laturationis *i nlore fuavi, fiamthm 5t ft'uKi flori tonajoribui.*
 Praxodior est priore: Singulare etiam hab *ct luce* *vb& ex nu)ure bulbo ol.li.*
 terea propagines sub terra gramina modo spargit.
 Flore pleno in hortis colitur.

6. *Lilium CIMMMN UtfJmmJ. R (TWKW Tlmt'gmufJu C B.*

Bulle innititur omnino tali quali 1 ilium album *caule vero denat*, non ut cetera Ltlia, cr flo,
 qui *uencum, lex joins'* lata constantem. Cauli /iii* raia, vaMc lata, Plan-
 tag *i* i similia. C. B. *huhur.ii* dubiuc on iiaur luin *finodi plan u 6c quxnam fk.*

7. *Lilium bulbiferum idttfdmm NMvif C B. kdhftrum mtjw J. B. Pjik. tmm* bulbiferum*
 Ger. onac

Claf.
 Bosphitali interdum affargit *i*U,* hrmo, crailo, *folia secto* Lilaceis, subatis, in summis ale cras-
 flores bulbos gestans & amplos floct rubrth, Lilio punie< > *minori non bulbifero concolores. Te-*
 neriores hujus plantz ante quam flores ferre incipiunt, bulbis secundum caulem inter folia natis
 non minus densitate sunt quam relique dicit species, sed quando *flunt, florifque abipoc*
 2000 prodeunt, vix, nisi *si* Immo t.uils nl* m alai *dividuntur & secundum flovc majores*
 iialls nate solent.

Floret hec planta cum duabus subsequenribus Junio, alia alii paulo maturis, sctmna perice
 Augusto. Bulbi in aliis herere solent, donec venio aut contactu excutiantur; uno interdum plantz ad-
 hac inherentes fibras deorsum spectantes agere solent, tanquam ad communem matrem in eam alij
 rantes, & illi se conda *jpitftCv*
 Inventur

T--*

Inramur amid Lobiliim in iconib Martagon cruciatum angulbfolium, C, Bauhino Lili u bul- biferum angHmfolrini dictum.

LilttPH btSifrrum incarmm J. B. C. B. CluL crntnl latifolium Ger.

Vix cubitilem excedic altitudinem ; emit eti.im ell hrmo, ltri no, ex vusdi nigricantibus foliis pradio, qus tameo cum lummo caulcincana Unuginc pubefcunc: Ejus [p]fi igneo rubore non rutilant, uc in fuperio, led PURIS p.illclatnt, & ad l i i i panica non balbiferi majorem colorem plurim: m jeedunt. Ejus adbtionsciukspaucos etutnJ ubi coliqz fupcriore minore mliinlu: mms alts geltarc (blent

9. IUwn bulbifritmMMtisG. B- Park buliifrrum rtpcti J. B, crntmum ficunJumcauUm bniula dematum Ger. mac

J. B.

Inter Liliu bdbifcrum mains & inciniitn media est tmgnitutlinc, nunnunquam eti.im primum squat. Bulbo iyusmuto cum icli<juii luu^ ecnens coovenit Cateru11 (W< (irnuti, It: ius, cuoitalis [Ctuiius ciulem infirmitorem 6c ^laciTtorcma attribun] ac milt-i niultOj maculs iilj:is nouittis, tamiginouis & in jt.ii divilus, //er* multos proicn ann tODKOWBiej ex lex repandft alii, quantum p-ralii, multo <*co rnci is, mtrinlecus multi lris aipe- ratb, (qua partf & color tolii mJii tiJutor • pundtifq, lit; rate languines notati, extrinlocis lano- gne Icri profuiii: quorum nonnulla cLitwrcm, Litiorem, :aturatioremq, coftam, profundo u inu^ ad latera luko, lubem: mxi: um florem obtident reliquorum inflar lena flamma, pefillomque ut- qucmun, eodem cum i ore colore praedita. Fala fert Martagonis, quorum alio bulbi frequenter mJident R*/w plonuu, e later >ui propj, ines fpargere folet, que ad fingula genitalia in can- ditios buibos excrefcenstss, lubinde 1101 in circum plantis jirooucunt, Liliu ralsi minoru nun bulbiferi raodo.

Ferunt omnesruec plantx in capiribus triangulij {tmtn latum, cimLiRiiiciini, (ubfufcunt, qmta- admodum Liliu vulgarc, quod non fterileft, lra etiam geoerk puntats prolcri, verum que eibulbults in alis tunscrelcunt plantx bngi dm s adolefcunt.

Hxc& prxcdens Ipecics in tnonLinu Auftna: ScStiru^ pratU ipoNk oetcunt, hxQ camea ta: Lira.

Solent vrcocum hx, turn .ilix non bidliterr, aim pntiutm llaruni gcmni.b aftimJen: inanmiir u fbrmitis admoduni LitclUn, Sec Idem.

CAP. VI.

Bulhut IMitctM wmtmttt Captu Bo** \$pn Breymi.

Hujus bulbus Ulu miniati K> zantini valde liinili- cft, nifi quod plerumq, major, & ex ma- joribus aaffionlu, Isporib mino vilcidi & aquoti, mox autem accerrini, ac linguam infar An f<rm^ vctlkant^ purp; rafcentibus liquans compactus; in quibus Soli obvci- lts pun&ub oblcur^ purpuru denL inperfa, & lineola quardam per longitudinem excurrentes cer- nuntur. fi/w Lili folioruin colon--n, formam & totum habitum amulantur, fed longe anguftiora (unt. Setpum ex butbi cciuroi eretem, diluto virore albicantem, bipedalcm feiquicubitalcmve imp- pellat, Flenlut ucberriinis, c\ fubviridi albefcentibus, a tertia interiori parte ad apicem ufque in fpi- cam longam congeftis, decoratum: Quorum nondum aperti, immaturis Hyacinthu flore albo flo- ribus fundos, reliqui autem folia fua tam miri & variabli explicabant formi, ut numerum eorum fifur.imq, cjinJ^arc I aud valeret Auzor: in quorundam umbilico fylw longos, quadrangulatis, -i obtufus & vehit relcA in aliorum e contrario reflexus, & quali ex multis orbicularibus arce coniuindb globulis controthis apparebat.

Delcriptiocaulli ad muRincni pictun a D. BeTcmingh mi: lam compofit. eft.

An Bulbm Tubtr PTMMI. Bv*t Spei sdbut ntogmtitt f^tumofin SWJH ?

Nacurajii olid 1n & ficcam, am, vim abfurgendi & p- f>candi luScix* [nih • quid virofi illi ut Fira.

(«3 exiftii: Tres aut e;ii.imorki us bulbi squamas e: m nonnihil L: mis concile famelico cani devorandas objeci, qui ciaptis quafidam poft fumptum hoc: tereculum horis multam tenuem exal- lamque pan: ium evonuut i undent & iv ateriam putuofam per alvum rejecit, quanquam non fup- magno languore. Jec. . Brtynw m Efbtmtr. iicrmm. Ann.4, & 5. Obi. 1 ;+.

CAP. VII.

Hyacinth latifolium palla

radice Lili C.P. bellata latifolium Ger.

certut.

Cuf.

Bulbo ell lil)K>o (iris linuli, led min ore & oblongiore, flavefcendo ut Martagon. Sena aut plura tat rolu lain ->ki (ancoquatn i caulem abent) folia fimilia; e quorum medio caulis exis pede brevior, mukoi Horci Ia fummo fultinens, Hyacinthu Itellig vulgo non- cupari

capiti floribus... ibusonmi" o pares, sex foliis constantes intense caeruleis sive violaceis, in ilnctcexumbilico quosdam veluti umbone. Fiori succedunt triangula capitula in quibus s...men.

Locat.

In montibus Pyrenaeis nascitur, istnon i: quibusdam montibus us Galii: Aquitanicr, 8c loos h...antibus gaudere dicitur.

Palliores animalibus hanc...; hiium depAlixittibus ciput incumfcerc Joactiuno Vencno aflerc-Kmt. <Luf.

luvcnirur ctum loa r.iuui iiorcnivco.

CAP. VHL

Pe Like fitrihu rejiexk Martagen ditle.

I. Lilium florihu reflexu mitutmtm C. B. fat itvtaatt firruftKi m.nui), B. I Lilium montanum fivt hlv. i. wmut Out LJL mttttMum mtnm Gtir.

Floris hujus... compacti, lubdula & vilculo Upore, fibris donans albida, alis in imo, alis qui cauli committitur, quem erigit bicul...lirjl'm, t...retem, punctis ru-bentibus maculofum: cui ex intervallis radiata circumnascitur foliorum Lilaceorum, atrovi-ventium series: circa caulis summum singularia folia temere qu...fr>ri nitit .1 pponuntur. Cau- lis fastigium ornant: Lilacea, >cmiliti/few (, ex foliis pungibus...spurpur.il centibus, sanguineo saturatiore gutatis, reflexis admodum constantes, juorumni-...similium occupant totidem ferruginei apices cum pilillo, odore gravi.

Locat.

In montibus Germaniae oritur, pra... fiffi«»<i. ... Wjmttm-l-j.il'l' Cr^ d copiose in monte Bar, Bahlex in monte Mouttz. Genes in montibus abundat J. B. Nobis in monte Saleva prope Genevam observatum non videtur esse dactilo a sequente, at in observandis minus curiosi sumus: dif- fert enim insignibus notis, si J. Bauhino fides, nimirum: • lyi.rite c

Martagen Imperiale sive Lilium... ibata poljanthe, Martage

a. . . . amam J. B? L

nmtmtm mfJK Park. L*i*«» /; W r, /fm MM

elj:4 poljaml.

n Impruk lmffftvum Lob. Ad, par. 1, yf« ZJ/WW ft

JWJ

JJ*W fir*mU*U mofiba;itm C. B.

J»I*w huic c

rii cnmpidilii reliquorum tiliorum in/Ur. pallidius umen fla-...:«./» crigit bi. I puroureo

V...dem quam pro... fulcum superiore parte, & brev... rium, micidissimo spectaculo, larvatum Rosa moschate osori etudi, fastigo sustinentum. Flos penduli seu decubum nutans, sex petalis pungibus, unciam longis, modicum digitum lato, colore in pallido rubentibus, fortassis ex fusco purpureo macula lanocibus aspersis compositi, per exortu quinq; aut sex varie de hinc caulem ornant. Folia ex intervallis radiata serie caulem ambiunt seu corollant: bini aut terni, & interdum quaterni, foliolum circuli cauli circumnascuntur; & praeterea circa caulis summum singularia folia reliqua minora multo, temere qua forv tult apponuntur. Sunt autem folia glabra ex rotundo turbinata, juxta annexum angustiora, eminentibus ramosis, a tergo in mucrone cocumbens venis. Stamina ferunt singuli flores lensa, petalis numero respondentia, in quorum extremitatibus apice oblongo, in rufco purpurei, rubiginoso polvilculo statim, percunte conspersi. E medio staminum prode incurvus apex, in triquetrum rubens, capitulum desinens, viridi & triquetro folliculo insidens, qui...illv:cnibus A-rum partibus solus remanet, & resupinus sursum incurvatur, paulatimq; increscit, donec uncia longior & seminae latior fiat, qui intensus angustior existit: idem sex eminentibus angulis totidemq; lateribus constat, intus autem tribus membranis seu parietibus in tres cavemulas per longitudinem dividitur, in quibus bini contigui ptyocorum, laterum planorum, sibi invicem superiacentium & flavorum seminum series concidentur.

Illanc plantam, ni mu! an & llun ur, invenimus in sylvestri monti Saleva prope Genevam.

Florum petala in hoc genere non usq; adeo reflexuntur ac in minore proxime describendo.

Hoc forte Quartum Lili montani genus est Clasio, cujus flores serius late explicare solui i-iiu, illiq; non insuavibore praediti.

Vires

Martagonis radix unam c'rt.

1. /j,i^Jn Iffisu^uMTU (ut sive sive mian Park. Au Lal. mont. sive sive sive J^ fffgim /'Jnl^J T ' ff rito r' fitxM altrxm ljuginr kufutv .11? indium JIM^ (;

Balis est major seu Imp^rub pe; simili, ut difficulter possit inde distingui. Diferet 1. Quod mentis plerumq; spatio terra e terra exat, & tamen maturus floreat. 2. Quod folia angustiora sint & aurora, viridiora. 3. Quod florum petala aliquanto longiora sint, saturatus rubescant, minoribus maculae coalescant, interdum etiam maculae caeruleae multae, magis reflexantur. 4. Quod flores in eodem caule multo pauciores obtineat & raris dispositos. 5. Quod florum capita antequam flores aperiantur hirsuta sint & lanugine incana. [In nonnulla hujus generis planta, Autore Parkinsono, nulla hirsutis vestigia videntur, verum capitula glabra sunt & purpurascunt.] 6. Quod hujusmodi caules in hoc genere sunt & virides locis quam in illo. 7. Denique vascula seminalia longiora multo & duplo tere majora sunt.

Lilium flore nutante albo J, B. floribus 1 •erlcxis -ilbii noti piinciads C. 5. Lilium mont.;loro albo puro Clttf,

Non Ipecies Lillii diftin^ta, fed accitientilis hujus varicMs> a fcmine orta, nobis vk-kcor. Hujus in* quanij non primi generis, uc viil: Parkinlonus. Flomm enim gemrtur, referent;; Ckilio, anrc- qnatn expandamur, multa candidi lanugine (unr oliiita-, quac um eft ex notis quilxi* lioc g^nus a priore dimnguicur.

LiliLim Borib. reffexis vaim C. B. i, c Lilium momanum leu fy!^ 2. Cluf. cni fk> antequam explicatur tons camCLis; expficuus inctf .ilbus noris purpurai iniigni: 13

Lilium Boribus reflexu albis pun&atU C. B. i. e. Maitagon florealbo nukulato Park Item Lit. Hor.rcHex. potyxnthos alb. punft.

Et alias qo.« re<;enienr v.uitutes Clufms & Lobelius, pu accidentalibus v.1 hjjus vel prxcedentis geneiU oifHrentiis habentiiB. Paskinlonns pro prxcccJentis difieieatus rcpurat, ob rtutam ctur^ite- niticim quamciimcq;communem obtinent, ci auwmeft, Gpanus radius co moli> tongertai leu difpoficaflubere, aciidux trdve iiniuij altcivi altcu innafercentur.

4. Ldsum Rp.annnum tmnuutan C, B. »<» IM.-8)X*nS. mmiatum fmlfjnrbos C, U. flan mint*:* rmijnte, five HmtruaUu Chatttdsmtca ijuibuJJam). |J. Ltiturrt ruhrum Bj-^anlntan fivt Mart*£ <mCm/i0ittmepolitmiiml*Ark*BjtfMrtmwft •

Ex nu/tfr buJbofi emrgit tmtlu bicubitalis^ minimi dugti ferè craffitudine, ima parte punctis ru- benubus guttatm, tfttera virelcnb, <ncavus, paullo poftquam è balbo eluctatus eft radiatas fibras arcumqujq, emit: ens : perquam frequenna oriuntur folia, idigefiaj lili Martta.;onis, (tnau, acu- niinata, permaTjincm ixjnuiffii veluti piloti oftentantia, fapore oleraceo pralita. Fls c toll fini- mo reflexo induct, plerurq, unus, ili<;.mJo J'ioa'.it plures, enlore pharnicco pulchermnic), quorum iinguli Uliacc

Ex hujusmodi hujusmodi, Ltcunq anguifKoribiii qnam Lillii albi: h*c ftnis no- cau, que extrorfiun rclfxa ecu MartagomSj apicibus cii a caulcm cocunt, promwientibus 0 minluis apicibus, quo* pallidaj?<fmiffn iiiiinentj quonitn meduini obtinct piitdlum apicibus con- tnlor. Semma; Cluitotefte, funr in angutolo otpicc plana, aiit Lillii lylv. fenti fumilia, fed nignora.nnnora, neq,adco fpongiola; tBrra commiflk prodienmt, planaq, fbiola tulcrunt. Radix utplurimum non tit tdcò magnate qmdam exifitnant, led Libi femeltris radican luui multum iuperat, eolortque dum recte enata eft adeò illi perfumilis [etenim fi dntus e, tr.i terrim alt rve- tur puipurci tore tota eft, Sc k: inde quibeldam notis faturate rubentibus inſpergiunt] ut etiam hi firpium cogmtione aJmodum exrcitact, rait i,ii nnci i^ conferant difficile diltcernere poſſunt.

Hujustamen i.idix c cctuuoribui fi^uamis coaiexta eft, nec n lina fibris ſupra & infra quam illa dorura.

Duplex eft, Ull dilucioribus floribus pralita, altera ſaturatoribus. Ego ſane (inquit Cluſius) longa expentiu diiicij CJS pbntas qux diluciores frunt flores, caulem & folia viridiora habere ut quibus lacuriorCi iunc Hores; pofti cmis enim cauds & toti;i pleruique ex porpora mgncint.

Lobelius etiam duas varicccacs memorat, alteram prrcocenij qumqiiCj («, dſccniq; utpluri- muni flores proferentem; alxrani ii.rotin.un> quatidoque diu multifque annis unicum florem edentem.

floret Junio am paullo (en us, ConftanmiopoJi, Viennai: I lilium delatum ex hortis ſi^ra li- num in cornu Byzantino vulgaviter Pera nuncupate iius Zufotiart appellation..'

MartaRon Con/VandnopoLunum maculacum T>k.

A deferipto differt nugnituJiic £c proccrtcuc: Aore ampliore & Ltcuiatiore, macuiis Sc Itni* aliquot aigiicanubus variegata

Lilium purpuro-fanKiiincuni horc reflexo C. B. B\w-iriniium flore purpuro-iinguinco

Cum I olio Zutinuru idem cil'j vilt Clulius.

5. Lilium ntrium frjctox Cluf mbrmt a anguifolium" C B Gei. cinac Am Martagan ftm. mirum vtl txstKtmfiart ffridictv Kirk ? Lilium praxos

Cl*f. r.u'.iintt flore ruinn J, |J.

Flora color minus (atur eH & long*' dtlutior co qui in lili mbrvior Byvumnu aiitlms, cubi talent vldicet alt it lulum quod dicitur appit cadens Uno, ^ucJiu> tmbus eft Honbus: Sc qtiia aliquando anguiftioribus eft folia vel latiorib A idureu • Cluis in lilium rubnjn i. &; . dultnf; uit. Primum folia multò breviora habet & paullo' litiora qium Con- ſtantinopolitanum, iccuJKL: verò anguift: OIO.

Subtuici: Man au; inititimjuu'i floral. •

6. USim ntrium tr* x j. «<» anguifolium Cluf. Lil. brevis & gramina fuis f- " • LtI"*m F-tax 'MJiUt fUtt r*ki. tanguifolium» J. It. r<irm. anguifolium 2. Ger. emac.

A praxedente (inquit Clui;) valde diverſam eſt, non n quulcm Sons forma, led colore> qui Lilio rucnto nujori non buj; ſed ſimilis eſt, tum ſim folioſum ia per caucim Ipai • ſorum diſti- ilimilne;; multJ enim 8c <nterra fert folia, cubitaleu & amplioſum caule in confuſe veſtientiã, ad- moilutui angiiIU &: longa, ii- ſed in ſummis caulis alis, inter an- an rjftigium flute profert, non guſtiffinu tbhoU

l'oftca Imju* floris colorem plurimum ad Mali Auranti ptjunatui colorem accedere observa-
bat CkHui-; odorem aurem in aacu tuavem tjt puictiains, led [ctius lilia montani flavo
fiore odorem refenc Pliirriios uuctdiim Hoicii: caule fert. Ab lioc not) ciafett, ut puto,
(pecic

j. *Lilium mimatum* odorem *ajv(Hf*luim C R Afrtrt#u« Pomfntn CM. cur.; poll. Aim*gem
Lttwm ntmnm frxt:* & LlnntmKUaJsmcmm Vk

Qpod longe nitidtoribio eft florilxa, nam protlui mintato* illos fert ui BvMrmnum, certe magis
fatuos quam d;ij upturn, neccos inodoros, Foka etum tien angufta ut illits nugiitanien fatura
viriditate paxiliu & magi* ipleinlentu Clufio videbamur, arqtie inordinate quoiradmodimt Horn
in caule nafcebantur. Obtervabat edam prxjkhu Autor cjiis caulem non adeo hreriraar«!.ere
w illtus, t-1 durtus perdurare

Parkinfonui no(basplamam hanc pleniufc accunuius docripfit, ideuc^non pigebic defmptto-
nem an* Latinam tacce & hue transferre.

Radietm habet fquamodm, (ijianm arfte compa&i, tatoribus & tenmorilxs mum reliijafimm
congencnim, xtate granck lcentom, a>lorc luteo faairaciore tinibm. CM lu inde exilit viridis,
phtnmirarcrej, ranus plums, lcfquicubttaiis aut bicubiuli*, fohu pkinmti, angilfso! longa, Car-
phylleorum jrmulis (od vindioribusj creberrimis nello oi dine poh'tu gradaoni minonbia, ad fahi-
gium fere vcttitus: cut infident pens plures paudorfve pro «ace aut VIROTC pUnuc, in mnioibus
pauoores 8c nnus difpofiti, in vetufttonbus multo plures & ilenfiocCi [in uno cattle notes leu-
glnta & plures numeravij in akcro ad centum utque, confatim nakenco.] Color Honun ex luteo
rubefeem, minui faturatLS feu imenius quam Maiugi ConftandnopoJitani: fibres ipft quim illiu*
tandJJo minores, alas forma limiks; Seminum thus tngularis Illius ctuni dmiln ted minor,
in qua iextuplici fene contmentur fimm*, pli^imum inanu, qt: x vero lola Ida IJU pknti orbka-
lau, parvaj lubrubenria. Adnatts rariifime k propajcai.

Hujus tro quatuofve varietates receiilet i Parkinsonia.

i. Innum folia in uule minus crebris, terius aliquanwlum florentem.

% Secundam folb brevionbiu paullulam & larioribus, nutunut nonnikl florentem.

; Ttttiamfloribui paldats rubenobm fit ad fiavura tendennbta, tbliis ctuni pracedente la-
ctohbus Sc brevioribus^ierotioam.

8. *Lilium flavum angustifolium* C. B. *Lilium nutante flore flavo* J. B. *Utom mont. flavo flore ma-*
cula diffracto & non diffracto Chuf. *Mertagon luteum paniculatum & non paniculatum* Park.
mont. flo. flavo paniculato & non paniculato Ger. emac.

Caules huc bicabiales & aropbores, rotundi, viridct, quo* incondiro ordinp plutima ambium
f*ts, longa, anguOa, \trtdu, ntollu, tniicnn, orivalbiumibia Hi vdut latuigme quadamobiv

ex tiridi palcke nra, deinde p ilbA, tandem fl»i, p«ai» faHum idfau & conrolum inftar
rdmuorum hujus eenem i i«d» *» umbdawm intern^ puoa» in maculis ex atropurpureis
AftmAii, [Repenuntur hupw Kencm fUrofot* puro, (eu nuU» maeulu notaro] fex ^-W «r,
identibus, miniato apfac prxdins euro ptftiUo tngulan craffiufcub at umbilico pcod;
QUO pJftOki non,, ^ gm ca'ent ettam in cidem pbmi qua alu: Oto inediut btfl grawcm u.
fiuvera, q uala fere 13,, Sanibua 4: quinindatn Induni flonbwL R*6* aana, muJm iquamu pra-
dita infti r radice Lili a !bL *, » a

Montnim Pyrawwum mcaU eft- Byzantino & mmuio Maiueorw matunta floret.

SECTIO SECUNDA.

De HerbU bttlba tunicatogravcoktitibttis.

Herbarum caules e summo fastigio iiiiurinos fuwbnt periuL, flosculos fuffinentei in corymbi air umbellae formam difpofiti.

Herbdradice bulbofa graveolentes, flosculk wuhis e fummo caulis fastigto eiiddtSy i<r in umbellam aut corymbum ttijufis, fum vel foliis

Fiftulofa, capitulis
{ /> alfera, feu e multis bulbillis, quibus flores intermifco ntuTj caiiipofio.^ unde Schnjiilmodi plante amplicarpe nonnullis dicuntur; AUUMSYLVIJIG.
E flosculis (ala compofita, radicibus feu bulbis
{ Non pulfura, grandibus, efcalentis, major & elatior, caul. in ventremutruwji. turbina- tum inunefcente; Cepa.
{ Praifera; vel
{ V. minor, florida; POKRUM SECTILE.
{ Major, non florens, aut faltem rarior tJoremj AICALOHITII
{ Solida & planis,

Langu, graminis, bulbo
{ E multa nucleis feu fpecis compofita, odore
{ i Geotone, caule recto, Sativa; ALLIUM.
{ Remifura, caule fummo in gyrum inerto; OPHIOCORODON.
{ 5. implus, non compofito ex nucleis, tioribus
{ veficu; Matv.
{ Minus pulchra,
{ v. Flatio & major, radice angufta, odore mitiore, flosculis plurimis in fpheram conglohis; POKRUM.
{ Mimlin Sttinoc; ALLIUM SI LYESTAL.

Latu, breviribus;
{ Mantum, floribus minus fpeciofis in globum, vii corynbum ciraimadis; VICTOR I* ALIX LONGA.
{ jia utica it, Honbtis albis fpeciofis in uiuaclb j ALLIUMU ASTINUM.

Allii Sylvestris plurim JC iint (pctcs, oui iddtiogaicaredu. i poffunt j aiterum capitulis prab- fens, feu e multis bulbillis, t, utnj llocluli interiulcentux cempolicu; altemni capitulis e folis thet- bus coagmentati.

CAP. 1.

De Cmfa.

Cepa, Graeci scilicet, teste Hifloro ita dici v. i. Siir, J opiri. in-i. ... CjuQ est cur per x scribitur. ... Eft Cepa condimentaria, quae opponitur capitate, nam Ge'lyon cap it non luSc, aut vix habet. Recentiores Graeci Teyv dicunt. Ac conser Salmastus Boles pro ymo dixille ymo, inde esse cepa: vel venio illud ex Aeolico ymo vel ymo pro ymo: Boles enim y in a con- vertebant, ut pro alia male, unde ferent: Simile ite pro ymo ymo, inde cepa, F. j. Ha mara con- jectura nobis videntur. Ego Hiflori sententiam magis probo.

Cepa

Cepae noce characte istice sunt folia fistulosa, radices magnitudine line iniignes non prolifaz, ciuus in ventrem uniusque turbinatum intusolceris.

1. *Cepa vulgaris* C. B. *Cepa alba* 6- r*hr* Gr. Park. *Oft* *five Cepa rubra* & *lh*, *retunda* *et longa* J. B. *Onp*

7. B.

Bui docum quantum usquam est in natura ditione nouissima Cepa est, cupis *radix* scerrima, oculos modicando lacrymas elicit, ex tunacatum inpoluerna contexta, modo rubra, [potissimum tunica exte-
rior] modo alba, interdum orbicularis, alia bulbis longo, pendulis ab uno *ferri* alba. *Folia*
pedalia fistulosa, partum acrimonia videntur radice cedere, si recentia fuerint. *Caulis* nudus, rectus,
diorum trime cubitoem altitudine, circa medium in ventrem utriusque turbinatum turgelic,
glomeratum in summo fastigio gestans *forma* caput, pugni magnitudine, adeo ponderosum cum
semine pregnans est, ut a caule nisi falcidat, arge possit sustineri. *Semen* angulosum, atrum.

Cepa ab aliis omnibus bulbosis differt quod eius radix nullam omnino loboleum edat, unde & *Ums*
Lanus dicta est olim, referente Columella: unde Anglicam *Onyon*.

Ceparum varietate habentur species seu potius differentia X JCClik:: alia, v. g. 1. *Oepa* .. ^'^ns alt
& rubra.

2. *Cepa* oblonga, nostratibus & t. Omerg ©Rports *dis* folit., i- e. Sanfii Audomarii *Cepae* :
Cepa Hispanica oblonga.

3. *Cepa* radice candida dulci C.B. Hanc *Cepam* edulem Parkinsoni: *Cepani* i hispanicam vixat,
tam longam, tam planam, atque tam dulcem esse ut Porci instar manna potit, & a multis man-
datur. Hispanis tamen ipsa in cibo non adeo familiaris est, qui *Cepis* alba vulgaribus veiciantur.

+ *Cepa* candida tum oblonga, tum plana seu lata, quae per maturitatem in terra iacentes lapi-
dam cietacorum speciem exhibent.

5. *Cepa* Argemontis rubra, cupis exteriores tunice rubrae, it
vehementis.

Fieri &
1. 2.

Cepae calidae sunt, partium crassissimum, adeoque stultente. Utiles sunt in qui frigida & viscidis
abundant humoribus; in quibus somnum faciunt, coctionem iuvant, acidos roctus solant, alvum
modò movent modò fistunt, obstructions expellunt, menies & urinas cient, transpirationem in-
sensibilem promouent. Contra in biliosis omnia mala inducunt, caput praecipue valde petunt, furi-
as inquietas faciunt, oculis advesamur, &c. *H. f. f. f.*

Olfactu ipso (inquit Plinius) & delacrymatione caliginem medantur, magis vero succi inunctio-
ne: & Dioscorides, Succus cum melle illitus oculorum hebetudinibus, argenti, nubecula, & in-
cipiensibus suffusionibus auxiliatur; Cepae tamen in cibo usurpatæ modernorum i nwdicoruni conlen-
oculis nocent.

Qua qualitate Cepa lacrymas elicit queritur: non acrimonia sola, cum ali i acriorij nt A liiutn
& Piper, ad non faciunt; sed acrimonia & lentore. *C. d. d. d. de* variet. rerum.

Auricule nostrae curantur cepam concidant, ac in equam fontanam impiant, perque noctem in
ea maceant, postea eam aquam parvis & infantibus potandam exhibent ad episcandos ventris lum-
bricos sine hand infelici successu. *J. R.* Decoctum puro melius est. Allium hoc praestat efficacius.

Cepa magna excavata, theriaca denique repleta & tecta, ac postea in calidissimo cinere affata,
denique detrahitur exterioribus tunica fusa, ac cataplasmati seu imposita, pestes ac venenosa ulcera
relinquitque collectiones malas & duritias efficacissime enollit & aperit.

* Method.
lib. 6.

Ambrosius Paracelsus ad ambuista, modò ne epidermide pars sit spohata vel ulcerata, mirè com-
mendat cepas crudas cortice liberatas, & cum momento salis subitò applicatas, empyreuma enim ex-
trahere, veniculis probere. * Fernelius quoque cepas cum sale coctas parti impositas ambuista
miraculo sanare scribit.

Cepas coctas ad Alopecias commendant tum Veteres tum Recentiores. Post tota inunctiones
praescribit Fernelius, ut mane & vespere caput his confricetur dum proctus nabeat, & mox melle
oblinatur vice cataplasmati. *Schil. Salern.*

Centris cepae loca demulsa capillis
Sape frigus potius cepae reperiri dicuntur.

Ad cephalgiam, R. Cepam albam, per molam incularur, & in Sp. vini infusa applicetur supra
partem dolentem. Valde prodest, ut mihi nobilis mulier communicavit ad antiquas capitis dolores
& haemicum. *Chesnes.* Pernonem conferunt cepae cum adipe coctae & impositae. Cepa non so-
lus ac Allium Rosticorum theriaca est, & praeservare creditur a peste reliquisque morbis co: it 2-
golis mane curata.

Calor ignis in aspectum producit literas scriptas sacro cepae prius delatentes.

Ad dolores post partum, R. Cepas q. v. coctas cum vino; cum oleo postea frige in fastagine
prius coctas applicentur calide supra ventrem, itam dolorem sedant, inquit Bryria. *D. Helje.*

Ad pedum inflammationem, applica cepas coctas, vel succum ceparum cum adipe gallinae mistum.
Lacer. Strypus.

Biboni attractivum, R. Rad. Libonum alborum aut Cepam: coque in aqua pauca, & portino
adipo non, salio contunde cum theriaca 3ij. &c. applica sero & mane. *Chesnes.*

Intensissimus haemorrhoidum dolor qui occulæ exteris se non proferbant filiam meam graviter
afflicta. Apertis tamen Cepis a pellicula liberatis & coctis prostrato istam sanata est. *Adul-
les Gallus Observ. 85.*

* O. 11

Novi atque quidam, qui plurimos curabat pleuriticis fomento ex cepa incisa & sub cineribus
assata mixta tum cum are lactis. Heron. Realiter in * Observ. a Vesalio editis.

Dolores calculi iam praesentis, & accelerandae excretioni nullum praestant in seipso expertus
est remedi- ui L. *Ucanna* caput Angustiani ad S. Mariz ex omnibus topicis quam cepas in vini &
olei

ici olivarain part, xqii.il. L.);H>, SC tribus faccula injectas, quarum una, Dorlo, alter & [emus Hits jrriicerallieandnscll. Ex. * Observationibus Hieron. Realuzi à Vellichio e lift. »c 167. In tutG acfperata & hrui^cyii; concarrosow D&P laudat decoshun ex alio rel cepa. L.j.a. ip. I. Seft. it*. D.Sosmt.

CAP. II.

De Bulhefti gjavtokntibus, folia fjinlojis, radtdhm prol'rferis.

I. Crw Af(»hiucA (he fifths J. K Ctpa AfcatonKn v fii lonie Jet Park. AftaLmitiia Ger. cmac. Ctpa jftrilis C.B. 2>.irrcu *£>niioiip. *Cfrfiilot;tjar.

P Lurei fimu! conjuniSos bulbot, Porrai is meliocribis fup,ares, fitrofbsbabet, riooreCepi quam vulgaris. er 1 & florere it fiinlol. dtca. Ciuleni &: i: EfcamiliniL- profert. Njbis ccrte Borentm ROOMn fid :igit: noil Mmiii idarco ntu- r JUmamu.-. JUmamu.-. quod apc ad cibum excitant & acunt. autemGajlicis Aitiitorum Aft-ti.' :P.ilrfhru am audBrom fitivum nigefti: Appitit, ficidaler, quob. apx:ticmn pr*fi» Ger. Park. CiUfJ 0? Chilly

7A Confertim in fafciculos plures nafcuntur hujus plantula: tmplexn mutuS cohxcnibus buibiUk albis, ocloris cepawt, tjuociatn prxiita liinr. juncca tuln fiftuloG (Cepa adoleto: nm,lc(qui palmum aut liodfammii etiam alca. Flares ex utriculo albido unibellatim prociewit, quorum fun;u\ foltii confant fems acur nlatu> oolore diluti purpleOj^ ftaa lituratorii muluim foluim peruinente. Stamtn albida apiculis Hori concoloribus.

Fel: aon (iicocUi planuntur plures con)undz terra^uc infatx., be enim hycinii fiigora faalitis ferunt.

Minutum inciia pro olerc ui'w funrur: Accuriis quoque admifcentur ad fapove FIi acjtuni cam- Vfi«- mniranrim.

Vinbus cum ccpis umveniuntj ut caJem repeterc non fit e-us.

:. ASum uicamt frtliferum fiert mtui dlbeceme cam fria furpttfcttite extrni J. II. fjlveftre bicane forte obfolata C B. An MQI} mv&mm j. Clut.

J.B.

Dilidet hujus raliix ab Allii r.ui: ce, non tantum odore minus vin lo, fed & quod non e fpcis confata, verum fimplex Caccarum i unicarum involucris tantum conflet, fublonga, canalicula, nuci Mofduta: par, pen dulis fibra tenuibus donata, fuperacris. Caulem producit cubitalem, bicubitali & amplicorim, firmum, teretem, novemlibi ftriatum, [apud nos fponfo ortum pedalem abundinem raro fperat] quem involvni cea vagina pedem aut cubitum longa folia, que ubi a caulo abfcedunt jttialu, vd ctum oil- maha, Cepacis fimplia, fiftulofa, ftriti. Sed ftrigiliora malio & oompreiji, in Terram reflexa. Ceterum caulis in folliculos duos deimit, in corniculatum mucronem delinente, palmum circiter longos, globum continentes cauli continuum, Avellana ix- ftxundr pare, & multis bulbilla rubentibus congestum, inter quos frequentes exeunt pediculi, unctam unam .r. alteram longi, quibus infident fiftula fons folis contexti externe viridibus, intus albican- tibus, purpurafcentis limis ftratis, apiculis modicum occupantibus. Superveniunt capitula fexan- gtila.

Geneva: pafitni provruc. Moly montant ;. Chf. tum figura, tum dcfgnptio per orruiii Eeri liuic plants conveniunt, ut recte I Llauhinus.

Alium Iylv. tenuifolium AJ, Ui, DoJ. abA]t!» casino Sylv, altero it Ji-

J tuulu Allii (ylv.lv cornis flore obfolata. J. Bauhinus ad idem caput utrumque ducit, nec tantum fatisfacit, cum Tragus, utique, ita obfcure hunc tradat hiflor ijin,

ut nihil certi affirmare au lim. mJnrur vaccar •

Iac & precipue haryrhuis odori & gultu infectum in certum est, fi ubi par- rems Alla creverit grahani intermixtum: quod multo magis de Allio urino verum est.

hocgoiuh K 4- *• flium fjlveftre I"ark- Ger. cnuc fjlvtftrt ten.. folium Ad Lob. fempitrc juncefalium caputatum purpurajen • .M*jm < . ii Common (CroUJ«OarJtfl(.)

Folia huk juncis fimilia, tereta, glabra & interna vacua: inter que medius exit canla cubitali aut altior, interdum tamen pedalis aut brevior pro ratione loci, duobus tribufve foliis, una parte vaginæ inflar cum obvolventibus, emittit, fuperiora verus nuda, gracila, teres, glaber, durus ac fo- lidus: in caps falfigio lemna multa, triticeis granis magnitudine paria aut majora, purpurafcentia, denf. • ftipj in globum collecta; odore fapoeque Allii. Pro radice ell bulbus, non quidem e nuc- leis compofitus, fed adnatis nonnullis donatus.

Semina e quibus capitulum componi videntur, nihil aliud sunt quam nuclei seu bulbilli, qui plerumq, germinantes, & foliola tenuia viridia emittentes capitulum conofium reddunt.

Capitulum in hot gen. ve unico tantum & simplicia non bicorna involucri* including, quo tepani mutatur.

Nos in hoc genere flosculos nondum observavimus, verum in omnibus quas h: & enus videre contigit plantis capitula ex sola nucleis seu bulbillis nullis intermixtis flosculis constabant.

In fassigo caulis geminum caput seu geminum nucleorum globulum non raro observavimus, Porum sylvestris gemino capite C. B. id est, Ampelopsalum seu Porum sylvestre Loh. ab hoc non directum opinatur.

LXXX

Gignitur non raro in arvis inter legetes, quin & in pratis locis aridioribus & in muris antiquis. Segeti innatum tritico primum odorem & saporem communitat, quo deinceps tum farina, turn

tt alioruni

ina, turn

Fallis fistulosis capituli folliculo seu theca simplici, ut in Cera, capitulum globulis e sola nucleis coarpositis, nullis intermixtis flosculis ab alia omnibus nobis cognitis Allii species differt.

§. A. ltu m ffxrtiifhaltm purpureifera.

Bellus ei simplex, albus, veluti parv[Gepe, folia cepacea, fistulosa, glauca, culmo minor, tria, quatuorve. Cassi doctamalis aut paulo altior humiliorve, in cacumine forte gestans in orbiculare fere capitulum congestum, e membranaceo involucrio, purpurascete, striato, in duas carinas debilitate erumpente. Flosculi singulares brevibus pediculis mixti, sex foliolis constant, longiusculis, acuminatis, pallida purpura obiter dilutis, per medium decurrente linea purpurea saturata: intus occultant Stamina sex, brevia, totidem apices purpureos sustententia.

LXXX

Florentem inveni Junii initio, in arenosis ad Rhodanum arenam paulo infra Genevam. Hec planta quantum observavi, non est capite prolifero seu bulbifero, quo a precedente differt.

C. All** - fere luteo fere pallido I 11 Atlutum mmiimm ktrwt fi<rt falliJt tjtre C. B. Allii montani 4. flosculi ?

Claf.

Terna habet parces folia; caulem cubitalem, rotundum; cui insidet caput duabus membranis tunicas concluditur, quo utrinque debilitate magna explicatur florum ex longa pendentium coma, qui sex pallidis foliolis constant, totidem etiam Stamina I* CUII flylo in mc*to obtinent; qui cum suo caule resecti, & in cubiculum illati, suavissimi odoris (qualis in precocioribus Cyclamini floribus percipitur) sed fugacis admodum esse deprehenduntur. Is succedunt trigona capitula, in quibus semen nigrum, plenum, Caryophylleorum florum semini non multum abfimile. Radix globosa est, superiori [Allii 3. Claf.] simili, & eodem modo capillata, nucleos interdum, in lateribus deponens.

LXXX

Circa Posonium Ungarie, & loca No. jitmrg it: Mocavia vicinis, os iijitium autem abunikntiQIme supra Balonias thecenas crecet.

Allium punctatum bicorne luteum C. B. ab hoc non videtur specie diversum; qumTts btibltj in oblongum ei attribuit C. Basiliens, caulem breviorcm, umbellam parvam.

Estato conspicitur in satorum marginibus supra Boulognetum III IX alibi propè Montpelium sed rariss. D. Moysul.

7. Allii montani quartis species 2. Claf. Allium mentum bicorne ff-rt Ufatritrt C. 11, An Allium Ger. emac.

Claf.

Pari fere cum precedenti altitudine extrescit, similibusque propè folia predicta est; caput coma inter laxas membranaceasque & longum mucronem habentis tunicas late scle explicat, florum coloris valde obsoleti plena. Radix superiori simili, nucleos etiam in lateribus profert.

Allium syl. flore viridi J. R. Allio sylvestri nostrari Crow Garlich dicto radice & folis simile erat, coarsum non proferebat coccineam, sed videntem, copiosiores etiam flores, nec bulbulos ad flores.

LXXX

In sterilibus herbis propè La Valette sub magnis rupibus iuxta Ladum amnem Montpeliacum Augusto mense cum flore colligit D. M*gi#, ota & in vinearum & satorum sepibus circa rivi, iou] dictum Ravennae, Ital. Moyp.

8. Göttauer sylvestre Col. An Allium montanum bicorne flore exa >, /> C.B? Mily nufchatum ttttam Claf. Ger. emac?

Claf.

Ampelopsali vulgari est effigie, bulbis oblongo, parvo, cortice tenui fusco, intus candido; folia cerni sine fistulosis, ut Cera sunt, dimidiatae virge figuram amulantes, striata parum dorsoque elata in rotunditate, altera parte planis que caulem respicit, sapore herbaceo, parum dulci, nullo gravi odore tares ferentia, aut gustu innocentia, canillum vir calorem exerentia. Cassi albicans est, rotundus latus, succosus, leviss, tripedalis aliquando, & tenuis, in summo folliculum oblongum profert, longi bene apices veluti folli emicantibus, quorum alter pedem longitudine adaequat, alter brevis est. Matio flori edit in orbem dispositos, corymbi figura, albicantes, effigie cavos ut congenerum, bellatos, sex foliolis constructos, nervulis virentibus distinctos, staminibus una sex parum exortis, capitella tantum pallentibus, medium vero locum fructus obtinet oblongos, qui farno & Julia percipiunt. Radix lobatam e latere emittit folia, eodem cortice cinctam, sapore parum acri absque fereore alkpa.

LXXX

In Alprensibus observavit Columna aspe etiam ali i.

9. Afoly mofchatum cafilLeca folia CB. mofcaturx vel Zibttmtt Mcxjrdieitfe PJIk.parad, ASium fylv. perpufiMumjuncifoltum nsofcbatim J, B,

Lck

Andis Natiobrigata agri Monfpeho vicinis collibus exiguis hic bullus convictor & alumnus, parili bulbo Hyacintho Autumnali. Cauliculo palmari, recto, rigidifculo, exili; e cujus fummo fex circiter erumpunt propogines, e quibus flosculi veluti in umbellam politi prodeunt, quibus aut tents foliolis confantes, pan-is, .ingiiftis, & ob!ongis, Ornithog,ih ilniibus J^ulbu acum um, li neis rufcisii) medio per longituilmem interltinfis Aphodeli albi inftar: oolori albi obfcuriori, ft.iiiiibufq, in tBt & Q, Mofchi plane odorem itiajjlimum lpiraiici-^us, pr^tis: ijt^Lbii ILJC^_dunt ca-^iW<*rotuntUj in quibusires velquamor, tiquecra, obloiiR,!) ni^iqt;/<<<>-.J connticnrur. •Jublu Jublunc parvi, .ilij oblonguiftiilt, Aliii (ylv. fimiles, ingradqoc.odo n. Filia etnittit juncea, c^i-iraj teninflima, qnaterna <ut qum.i mmicro, fix imaam loilga.

Hi collibus. prope Monfixjiutn & Sellani novam, tux Guar'g* <:opiofe prove nit

CAP. III

De Bulhofu graveeUntilusfol'tis foUt!ti& f>tarth, & p>ind

De AIVta Sylvefri planifolia.

I. ASium msntati^a bicorne Uttfolium fore <f>furfurafetntt C. I* Moly montanum latifolium pntvum dtijii Park. Ger. ctnac All mm fivi Moly trmtanum latifolium J. B.

Chf.

^*4uUw habet duonim ciibiconim altitudine exercecentem, quem ad medium uiq, ambiunt folia, multu qu-inun Allu gencribuit Utioim, longa, P-iracis proxima. Sum no cmii, qui kvis S: juncclS z% inlidec capui £ mtiltu.bulbi ex atro purpurea, fumal congestis, fanla, crallis conflatum: inter tjnos in oblongis pctiolis n. icuntur feres dilute carpurafcentes; quibus (ic-ccducngona vafctiU in rjuibui I omen. RaJtx bulS t t, << mufos nuduis con [hn.s, nr. in albis fl>ns prrdita est : (aj Sckilbi romndi r.iditi inIma it, in fare pures qui in capite nalcuntur, quiq xcn.i exccpci planws iiii generis prodiicunt- Ton (lu-pi AJIigi. ivisodor incth

Junio & Julio flores & bulbos ferr.

Jmpm-

1, ABium fyhvfttrt bicomt furfurtum prv!iftnim], ji> mrntt/num bkmu an rafctntcC.K Maty mmamunl. Clujit Gor. Mdy tmmtawm IV amJum Park, parad.

J. B.

Tenui, (edduro, tereti, glabro &: (ingulan est amU) utbitum alto, in quo/e/i* ; jcfqtupalnuru & dodrantalia, admoium angwfti, craulalculi. Scfx> (unimo u c bulbHis viiiiUiicilMii^lotneitum [du.ibus, laxis membrjuueeis invofuer ditis obvolutumQ c (juoiniii [bulbi! remi mgi, puucantes, /Zw. medium ftrn Uuur.itior perenrnt compol

-diets pulbacx plures Gmul utucrent, obi' % ACUMMijvifit mltum fivrt ixtrhacte elhicmt turn tnplta (lu.- atro-purpurea, An Allam fivi MDIJ mmtanum tertium Cluf? Al. imntenum bicorne fiort r

RadixhuteCpex figtird, nucisMynfticxpan'xnuRnttidinc, alba, c imilot cuoicarum invnlucris Ccpex in moduni conipoliu, ia[x>rc & . . . ore Allu non admodum vehementi. Caulis cabetalis, tenuis, vcluc Allii corvini Anclis ti: ct, duobus tribufve folis cinctus, ijuar cum tubi in modum aliqu<i(f), ampleftiintirj angums, cintutb, pLwii umoi & i folulis, nanime teratibus aut fifti. nollu> ut in Ccpa aot Allto corvinoj fpitlnmam longis. Sum no cauli, nt in aim hups gencra utidct ca- fituhtm, bulbillis crebiis, pauaonbus tamen qium in ADiocorvino, , ranorum Hordis figura fere 6c magnitudine auttaiuiUo malonhu4 o mponitum. Inter bulbulos emergunt pediculi tenues, tel- tes quaquaverfium diffufos, petalis oblongis, colore obfolero, nimiruni ex herb-iceo a] ma'rgines lord; ftriato bicorni, res inter chaitasrepd

urn muuvcrc Inveoimiu u <r fegtes Notci* Eflf Aug..!; o manfe <far*wan. Exccjrto flonscolars a pr<<dcii

4. *Scordoprasum alterum bulboso & convolvuti capite* Park. *Ophioscoridon* Ger. *Allt jtemu, Of hiscoridon dillam quibusdam* J. B. *Allium sativum alterum sive Alliostrum caulis summo convolvuti* C. B.

J. B. Claf.

Hujus bulbos multis nucleis constantem, fibrisq; numerosis exalbidis capillarum 1 fecili p. ite circumvestitur tunicee capaceae binæ aut ternæ, ex albo purpurascetes. *Caulis* singularis, minimi digiti crassitudine, sesquicubitalis aut bicubitalis, *folia* ab infima parte ad mediam usq; porraceis, ut plurimum 1 main) tanque circumdatis, quæ postquam caulē aliquoties involverunt, ab eo abscedentia reflexa terram spectant, medio inter Porrum & Allium odore. Reliqua caulis pars nuda, viridis, lævis, summo fastigio caput sustinet è multis bulbis ut in Moly Italico congestum, & candidante membranaceo involucri, cuspede longa, viridi perhito contexto, quod deinde bulbis excreveritibus rumpitur, nullisque bulbos initio purpurascetes, postea exalbidos detegit, inter quos *festuca* quidam nascuntur. Summa pars caulis in gyrum unutu aut alterum spiram serpentinarum more intortetur, donec tandem caput erigat.

Tropis.

Junii initio suam caput contorquet, Julio verò erigit, eodemq; mensē bulbos ad maturitatem perducit qui terræ crochi sui generis plantas procreant.

J. Bauhinoi Moly serpentinum *Lob.* huc refert, sed dubitanter: C. Bauhinus speciem diversim facit, titulo *Moly angustifolia folia reflexa.*

Parkinsonus noster in *Parad.* Moly serpentinum in hunc modum describit. Hujus bulbilli ex quibus componitur capitulum summo caulis infidens rubicundiores & aspectu hilariiores sunt quam Moly mont. latifolia prima vel secunda *Claf.* *Caulis* humilior & tenuior: *folia* graminæ, reflexa & contorta (unde nomen obtinuit) minora & pallidius virentia: *Floris* ex interstitiis bulbillorum exascentes pariter purpurascunt, sed pulchriores sunt: odor multò quam illius *•miflor.* *Radix* parva, rotunda, albicans, plurimis bulbillis, pso non majoribus, albicantibus, circumcirca adnatis se propagat.

5. *Allium sphaerocarpum • pwrptrum filvijirt*) *Allium seu Moly montanum s. Claf.:* *Allium montanum capite rotundo* C. B. *I filij matt. i*miK- Claf. Ger. art. Moly per urn Neapolitanum* Park. *parad.*

Claf.

Caulis affertur cubitali aut sesquicubitali, nudo, viridi, [colore & formâ junco, solido tamen & firmo.] *folia* tribus, quatuorve, palmum longis, interdum minoribus pro natibus ratione obfio; cum fastigio infidet caput obiculare initio, [ovo columbino par aut nani] *v* multis *floribus*, brevi petiolo præditis congestum, qui sex foliola nunquam sese præfius explicantia habent, sex in medio itaminitis & stylo, elegants purpurei coloris. *Radix* bulbosa, alba, nucleos interdum tenui membranâ teetos, & penitine caulē lateribus adnatos habens, & fessili parte multas albicantes fibras. Eius odor Allii instar caput ferit.

Lacta.

In vineis & legibus variis in locis reperitur, circa Generam, Montpelum, Francofurtum ad Mactum, Posonium in Hungaria, &c.

Tropis.

Junio & Julio mensibz floret.

6. *Simuluerixefialmm kfi lium Italium* J. K

J. B.

Vix sesquipalmis aut aliusdimem adæquat. *Radicali* nititur olivari, fibrata, alba, nullo tunicarum foris conspicuo vestigio præditi. *1* *caliculis* rigidis, & pro plantæ proportione sic factis crassis teretibus, surgit, atroverem, binis *folia* crassis & canaliculatis vestina. In summo *floris* gerit, in glomari congestis, eleganti purpurâ conspicuis, ex quibus *flamincis* quædam muscosa profiliunt. Sapor Allii hand distimilis.

Lacta 3
Tropis 41.

Româ hujus bulbillos aliquot *•ittolir* G. triferus. Floret toto Maio; ingruente tandem æstivâ 1 donoc plantæ marcescat.

7. *Allium parvum umbelliferum* J. B. *Allium montanum sive Petroselinum* 1 Gdn. *herb. Al. mont. folia Narcissi majus* C. B. *Moly Narcissina folia tertium* Ger. *emac.*

J. B.

Inter *folia* graminæ, cotuplura, angusta, compressa, dodrante longiora, in retisum mucronem dehincntia, obscure virentia, sapore Cereæ acri, *Caulis* surgit singularis, palmaris vel pedalis, nudus, enodus, angulosus & nonnihil compressus; *cupis* extremo *floris* inudent numerosi, terram versus comantes, colore purpurascete, apiculis figuratoribus, interdum pallentibus, triquetrum in medio positum capitulum circumstantibus. *Radix* bulbosa, porracea, alba, tuberculis adnascētibz novam bulborum sobolem præfert, fibris longiusculis capillata ac veluti repem, multum se multiplicat.

Lacta.

Bamii Rhetorum Junio mensē florentem invenit J. Bauhinus.

J. Bauhinus hunc plantam pingere existimat Clusium pro Allio sive Moly Narcissinis folis secundo, C. Bauhinus Petroselinum Gesneri ab Allio Narcissinis folis secundo Clusii diversim facit. Nos cum J. Bauhino sentimus.

8. *Allium umbelliferum præfise* J. D. *J*A2t*mftz- Moly irtiGmmfa* Claf? *Allium montanum folia Narcissi majus* C. B. *Moly Narcissina folia primum* Ger? *Moly Narcissina folia* Park. *parad.*

J. B.

Udis prætis Generæ ultra flancem *Arvi* orunde...n *Allium umbelliferum* tmo inote. dictum, ,,,; utitur

titurPorrifublong.1, fflwaM, alba, fed qua: ex bulbo radicaai nVquam liberatam, Valeriane hoc-
tstnii radici aliquacemis limilem producat, pdore Allii. Folia primum pene triangula, paulatim
comprediora evadunt, cubito longiora, catta equalia, qui naAas, angulof. in capite albicans oblon-
gum definens, eo dehifteate umbelLim xplicac Allii untni mnbellx limilem; fuffula lex folis apaci-
bufaue compolios, colore purpsir.itccnet

floret mends Junii pncipio ; Lo:o a J> Bauhino racmorato jioliiis ctum obfervatm ell hoc
Allii genus. Ei, inquitj, J. naagna.(iinilitudo< am Allio um bellifero petrara fuperitis proximè de-
feripco. Con<ideranda man fort< tantum ejus variatio fit ratione loci, vel an idem cum Allio five
Mi>ly Naraflinii bliis I. Ciuf. CLUUS defcriptionem fuby demtjSj ut Lector botanicus eas invio.<t
conferac & juui: .

MoJj Ntrrciffifilto I. Cluf! Bitl'jns tiominn, *manilla*.

Qaina aut (cm ex radice ptomk oblonga fe/a, plana, flicailait.j, Narciffi alterius niveo :lore
Cw/l finiilia, viniia admodum St (plctidcciciaj inter qua: cubital is plcn na, exi canis, nudus, fir-
nms, viridisj frurjs, ferens in fmiimo mtulto^ floret, fax purpuraiocntibus toliuUt, totidemque inte-
rius (taminubs pridicos, Itmul conge: tos, & v. luti globofiim caput conftituentes, quematmodu m
in Ccpa; duibusliiccedunt tngona tsfHtk, qua: matuniate dehdentia, rotundam, nigrum fine>
contnere oprchndimcur. RaMx ntxlotj eft, ante us progrediens Polygonati modo extima pa tc
globofij Candida, mulus turucii cttcomraltiu, piiirinus j[bi.- fibris praedita, & aduata feliciter (c
propagans.

Aliudcjus genus eft, non valdi abimile, i< mationem & magis cineracen folis, du<rioribus cri. tm Trmpvt tf
fianbus. Florecutrum4, fuL>t: Yti\; jHiiii Juiium t. Julio. Nafcini in Leydenberg fupra Manderitor ffLxur.
(ubi tepid* font aqua?) Sc aliis tncmtibus U! bi Vienna;

- 9. ABii gntts forte Scorodoprjftm attrum Lebt/e J. B. An Alliu» fbb*ricto eapitt folio mgtt-
ftiore CB. Scuroioprajjum mmm Ger. cmac. afrmim Lt-'btht Piik.

7-a . . .

Selunculi eft aut longion t</to, fibrato, turbinato, mrcusniuldsni&conipadili; acquo/oiw
duo autria, BnuLi, palmumlonga, ciuicm aliquoui j, obvolvotu pclilcm, tirmura, trccte-n,cno-
dem; cuiumbella inliJct pary&Jierum pdUidonuti minorum quam Atlii parcel
Ab hoc non diverfiim vidcoir

Ahum jTtcMatmm ralut shlm^a C B prod

In hujus licfcriptinne nihil (ingulare uivenio, mli qtioil capituUim rocunditm pallide piirpnrilar.
Non longe Mon<ix;lio in loco montofu, qui Hottus Dd dicitur obisrvavu C. Bauhums.

yfft<w mentanum mmut

A C Bauluno in Prodomo defcripcum an ab aliis omnibus fuprarenptis Allii fpecicibus diftl-
ftum lit necne, tnllii non confat.

- 10. Scorodeprajftm di&um J. B. ScortuLprnf. i. Clut AH turn jpboricto captte, fdto Us'tsre, fvt
StoTudeftajfum al'.erum C. B Seffodsiprajfum prirrm Clufii Ger. Cntac An Parrum !;/-
vfttrfdto Uujfmo CB? SjriatumTiki

Cluf. I. R.

Oblonga Sc lata profert /*&4, Porracci> niapr.ij carinata: cntltm (cfquicubitaJem, n on nun qua m
iCtibitaleni [J. Baulina n es, quatuorve cubitos alti m] a parte digitrnhu allitudinis, fopono:2
parte nuduiij pauibtmii: puceam tenuitatem delincentem, ferentem in fimmu capu membranaco-
cco involucre teclum, uc ccpaj lub 1uo florum\ glomer purpur.il'irj multOoi^,ais timul conge-
bidis foliolis conftantes explicatos codant tri

P

itos, Cepaccis timiles, (es exal .. otferidens; quibus (uc
gona capituUj in quibus nigrum leoien, Cepje femim par. Rtdx (ubeft crailli, parvc Ccpae x-
qualis, mulris abls tiiniasconftans, fibracus>oi'um glotncn tuppap, & ipicis multis Allii rim L
FCtutibu compolitus, odore &c lapore remifliorej [CUilio gravi od : vxer Atlium Hi
Porrur. vci iliosma(orCibulbo>ielcdtviilemj adnatis etuin - i bulbiUis, truneula-

I

ribu
Jin.
Taib
ia>m TJI
pro I
Bauin'.
Ufelfo! - i-nti n.]>:
niTil i

>>

rum buffimo I
Hanc pUntam oltm O
dam in urbe SManni, n
pro.nittit. B

11. *Scorodrastrum* Ger. 1 Park. *Alliportum* sive *Scorodrastrum* C. B.

Radix bulbi Cepaceo major, candida, splendens & ferè pellucidus, rarioribus adnatis fecundis, *folia* aliquot edit magna, Petracem multo longiora, crassioraq. interdum etiam *caulis*, non tamen questantia, mollem, succulentum, digito crassiorum, bicubitali, summa parte à medio usq. nudum, in fastigio gestantem *floribus* glomeratam membranaceo involucreo reatum, quo disrupto apparent *filia* meli quam Moir Homericæ pallidiores aut potius albicantes: quibus succedunt *capitula* triangula *fr* Jttwin niE replent.

A. 12. *Allium sycostre latifolium* C. B. *arsinum* Ger. Park. *arsinum bifid* J. B. *Hamfens*. I'm ••-nm.in fl

J. B.

Radix est oblonga Porri, tenuior, longis & frequentibus fibris capillata, membranâ medioeris crassitudinis involuta, Allium redolente: à cuius imo statim exoriantur bina aut tria *folia*, odore vehementi Allii, & gustu fervido, levi virore splendenna, striata, tenera, lequapalmum longa, in sciumen desinentia, duas uncias lata, pediculo dodrantali, virente, qui post in membranam tenuem, lucidam striatamque faciens, floribus alteri sive vicini folii pediculum ad radicis usque fibras vaginæ testar obvolvè: Eodem autem loco cum foliis surgunt *pediculi* bini, terni aut plures, triangulares Cyperi modo, dilute virescentes, in bulgam fortam latitaculam, exalidam, mucrone virente striatam, desinentes, quæ ubi se explicaverit umbellam ostentat, numerosis flocculis, etiam ad quadragesimam, constantem, candidis, stelle in modum radiatis, quos constituunt folia lina, oblonga, mucronata, intra quæ *floribus* totidem alba, *filia*q. concolor, ex umbilico tribus tuberculis virentibus compositis. *Semen* succedit parvum, rotundum, nigrum, leve.

In pratis & ad rivulos frequens oritur. Aprili plerumq. *fr* t. immo Maii floret.

13. *Allium Alpinum* J. B. *montanum latifolium maculatum* m t. li. *fr* *latifolium*, seu *Villarialis* Ger. *argyrium* Park. *Villarialis longa* Chif.

Radix nonnulli obliqua est, in longum bulbum desinens, multasq. fibras perplexas emittens, multiplici coarctate, variis fibris transversim coarctatis quodammodo reticulato involuta, unguis annis (aitore Clusio) febreiter alii bulbis circa ipsam adnatis se propagans, fibræ adeo implicati, ut difficile sit bulbos coarctatum natos *fr* occotrrt. Hinc emergit *caulis* cubitum altus, minimum digiti crassitudine, propter terram tuberosus, enodis, levis, superiis viridis, striatus, fungosus, cui insident glomeratim congesti *fr* «r», *Centrum* Honbus Jimilo, uncia longioribus pediculis haerentes; candidi (in planta nobis observata flores non candidi proies erant sed ex albo pallidali) quibus trigona succedunt *capitula*, *seminibus* rotundis, pullis repleta. *Folia* duo aut tria vaginâ suis caulem complectuntur, formâ foliorum Allii usini, nervola, sublonga & lata, acuminata, sed majora, rigidiora, Germanæ majoris foliis penè similia, et non male censet Clusio.

In summis jugi altissimorum montium maximo Cartusianorum cenobio in Delphinatu immenentem. Vinbes cum reliquis Allii sylvestribus per omnia convenit.

Plebi nostrati (inquit Schroderus) Judæis, amuletum est familiarissimum, quo à spectris aeræque mtaero le tutos fore persuasi sunt, unde & Victorialis nomen ei indan.

CAP. IV.

Afoum fore jptdtje Mai) Jtfiwm,

1. *Moly vulgi Libi* DM WmM Bontis.

L Jlij i nostis rubris figurâ & coloris elegantia hanc cedit. Si tamen ulli florum Indicorum comparandus, certe Moly montano lasfolio, flore flavo *Clusi* simili existit. *Caule* unico, enodi, firmo sed tenui, ad altitudinem nostrati Libi assurgit: cui infra tria quatuorve *folia* oblonga, sutrocta, supina parte carinata & contorta adnascuntur. Summo autem fastigio ex membranaceo folliculo, bifariam diviso quindecim aut plures *floribus*, uncialibus val longioribus pediculis, fenis foliis, stelle in modum expansis emergunt, qui simul eleganter jacti Coronati Imperialem representant.

a. *Moly Tropicrafti maximum* J. B. *Moly Tropicrafti sive Honeri* Park. *Moly I. ntr.* Ger. *Moly latifolium, biflorum* C. B.

Radix bulbosa pugni interdum magnitudine, formâ nigricante, intus alba, *folia* rariis quinq. cubitum longa, duos aut tres digitos lata, crassiuscula, supina facie concava, invicem amplectentia, in mucrones acutos desinentia, colore viridi, glauco quodam polline, qui facile detreptis, obducta: *Caule* teres, concavus, bicubitali aut tricubitali, nudus, foliis concolor, in fastigio flores gestans in urabellam dispositos, minores quam pro plantæ modo, pediculis sesquialibus aut longioribus insidentes, sex & non raro septem foliis mucronum compositos: totidem staminibus breviuscula, apicibus pallidis insignia capitulum circumstanti naturaliter trigonum, non raro tamen tetragonum. Florem umbellæ initio membranâ crassa includuntur, quæ disrupta explicantur. Color florum albus est cum diluto

filuto ruEror. Esterius iinit virkii. petals media dividit ab ungue ad apicem. Adit Clufus, (quod & nobis obferv- itum,) juxta. ouiem intci folia alins plerunque exit cauliculis planis & foliatis. In reriis folium, lummo velut Allii nucleuni gerens iiiiia cm.: cantem dande pallefcem, qui terri ceitepnis geminat, 5c ejufdem gan- rii plantam proferit. De loco hujus natali nihil certi tradidit tivcnio.

" j. Moly Indico vt Caucaſos Park. J. B. Moly latifolium Indicum C. B. Moly Indicum Ger. & J. A. M. Catcaſtn.

4. Superiori foliis & reliquis brma limilo cftj nunquam (inquit Clufus) flores apud me, neque apud multos alios pre- fulcitur admini- tfulic; fe uuo atrolli noo ^olli^ futmmo falſigo conglomeratum caſe fert, multis velut Allii ſpice Melpili vulgaris magnitudine, conflans, in: i in rra nuti rprofice germinant, telliiri tunen comra ulle in majores bulbos adoleſcunt, folia Sc (noti tamen iingulis air ium necipG edam (parens) producant. Radix, in Jcariis, copacea, rotunda, alb.i, multis tnicis annebj ijiur: i: pi- 5, fit in altoi buliwj pangerts. lusbulbus; Neapolicuiuoetiam in regno ſponte naſci autar eſt Fer- a*..

4. Moly latifolium ſicco flore Ger. montana •1 Ijiiſilistm \$AVf> ji flore Cluf. montan. latifol. later flore Park. latifolium laterum odore Allii præſertim C. B. & ſecundam quiddam laterum Botanice- ram latifol. Allii odore J.

Olitnonn fl"ret uncium duntaxat folium emittit latum & oblongum, cum cauleſcit & floriferum eſt bina, iifinu parts tek mutuo ampleAcitfia, tlccoin aut pli- res uncias longa, unam lato, ſurrecta, firma, liipina parte noinihil carinata, Pon acci coloris, & odore Allium referentis: inter que affluigit ratih cnodis, Be laris graolis, firm us tamsn, i uelocis, pedem alia aut paulo amplior, li- ililincns fumiii falſigo prodeuntei ex membranaceo folliculo, bifarium diuifo triginta aut pares fivfa, uncialib. & longi iitribujpei: culis, ulque firmis nixos, ſemi petals, ſtelle in modum expanſis contantc, foris pallefcem, interiore parte proliis flavos, occupante umbilicem triangularem capituloj lex n.iv! II amumbes cincto, quorum apices etiam flavi. Floribus lucidant trigona capitula y<n>kt nigmi ti iſquale conti i^ucu. Radix alba, buli quodammodo amuletur.

Floret menſe Juiuo: e monbbiK I^rciLccr crtiwin eſt. aliunt. Trmpui

" 5. M<&) Vpm&tm fxrpattim Park. AU'atm TyTnannt C B-

Fo/w emittit duo aut tria, pnedenti nomiM iimilu, led atieufbori, nec adoualba: I flores in ſumr, 10 caule ptiuciores, colo^e purpur: o obioktioru. R*Jix albica^ odore Allii lirisvchci. ſenti prædita, fingoie fadle corrmptur.

6. Moly montanum latifolium pnrpi om Hifp. mutnt Park. CluC cur. poſt ad. Moly la- tifolium Hiſpanicum C. B.

Chfi Biii cum excauleſcit l ita, ^rſli nga, viridia producit folia, infima parte ſeſe immo amplecten- tia Moly luti in modum; inter que aſurgit caulis teres, firmus, bipedalis aut alior, lummo falſigo flores ſubſtans plerimos, e membranaceo involuero erumpentes, amplos & ſpcculoſos, ob- Jongis ped culis ſubnixos, petals ſex, ſtelle inſtar expanſis compoſitis dilatis purpureoſcentis, tf4- ow/æ tot dem concoloribus, apicibus luteis donatis, capitulum modicum erigentibus. Inter caJem & foli.i ima WJ« aliquot adnalocmes olxmcc, qui iati iacile comprehendunt. Radix parva ro- tunda, fibroſa; alba multos edit bulbulos. Nec radix* HP ue ſolia aut flores Aiiium rcJoIcnr, ^ut reliquiat.

Sub exitum Maii floret.

7. Moly Diſcoridiæ parvum »n:i-utll.-tn J. 11. Moly anguſtifoium ambilltam C. H. •Moly Di- ſcoridiæ Park. Ger.

7. E radice bulbola, mucis Avellanæ parva magnitudine, cortice nigricante teſta, plerimas prxloti- gas fibras ex ima ſede emittente, Allii odore ingrato, caules erigit pedalem aut cubitalem, ter- ſetn, lreves, foliatis, in cacumine diſrupta membranâ umbellam gerentem florum candidorum, flores Allii uſum exponentiſſimum, minorum paullò, ſex folia candida, oblonga conſtantiam, quibus ſue- ccedunt caſcula ſeminalia tenuis localamenti contiguâ compoſita, que per maturitate ni lenuru cl- tuodunt Fel.it pccffii gramtnM, in 6. ram naximil reclinata, bina ternive caulem amplectentia, hirtuta, [que in c iilibus (up erona, lata ſunt, glabra, carinata] Album obolentia & reliquienta. C ur ad terram ſunt media hyeme menſe Januario exant. Flores explicati diutiſſime durant antequam marceſcant. Juxta ſeſes umbroſas propè Frontignanam vii iui itur Biltut Maw menle cum Hore ctJlegit P. Læm. itgmt.

8. *Moly Dufca* tJttm WfpsHuMM Park, parai

ForceJenri per omU fimitceft, verum minus & fpeciofius multo ; *fores* cimiidia, duplo nujo rbs. F igorn inipitens hyem« nofr. agre tolerat.

9. *Moly minor* Chf. *minor flore orbiculata major* J. B. *Diofcor.* Am minus Park. *Moly angu- ftilium ferdus majorum* C. B. *Moly minor flore cili Ger. enac.*

Caulis hujus palmaris, viridis, decem aut plures fuficiens *fores*, fex niveis foliis, non mucronaris, ut fuperioris, fed orbiculatis & majoribus constantes, lenis in medio *Januaria*, inter bina Forracea *todamn* per longitudinem, fed anguftiora folia emergit. *Radix* rotunda candida, nuch Pontice n. s. nitiditate, albicantibus fibris prebita.

10. *Moly p.* —y* m (. t v l t i T U K T u l * C. B. *Moly caule & folio . r t a a g t l z r l t o t* Park. pUnd. An Mdj *flore albo, folio viridis* Jmk Swc; ut?

•lu cc quatuor vel *•uino, obluoca*, lufcula, pallide viridis, fupernè plana, fubtus *•liingulum* elata feu carinata, unde & triangula videntur, inter quæ *caulis* attollitur fequipedalis a: i major, triangularis pariter, *fores* aliquammodo in fiftigo gertans, - membraneco toiLcuo cmmpenio, albos, lita amples & oblongos, campaniformes ferè, unumquodque petalum ex terius XMA viridis per longitudinalem medianam dividit. *Si*mr**rls cawmluni* medium cuigcistw ^* . - « J l u t c o t (u l l m e n t .

Radix, folia, flores Allii odorem fed mixtum & vis perceptibilem expirant. Plantam hanc inter Mallam & Sarzas-mi LtiJii' u{^uu Apili menlc liu;entem invciutnus, nec multo post circa Baias in agro Neopolkaoo.

j. *Moly Africanam umbellâ purpurafca* <* C. B. *Afnam umbtU* fufmfentt* Park.

C J,

Ex *radice* bulbosa *caulis* (modò unus, modò plures l cii ato alior, nudus & cavus exurgit, linâ cum *folio* alio uoc I- nufcula, in acutum definentibus, palmariibus & cciani). fequipalmariibus, per margines inftar graminis hirtiati pelofis. *Umbella* *caulis* fummo infidet, cujus *fores* communiter è quinque foliis dilute purpurafcentibus oblongis pwiiculu & fii ntii iifkclm • quibus vefkuU duo traxit *semina* nigra rotunda includens fuccedit.

Mâle *Basilica* ma (lores i communiter pentapetalos huic planta- ittribiir, aim bilbofi in univerCim omnes *fores* hexapetalos obtineant, aut factem monoy oalot in lex ban: s divifos.

11. *Allium fym* 4 *res flore Moly minor refes ample flore* Vocari. Monf.

Magnif.

Bulbosa *radix* plurimos alios bulbos opra.kcit, in qn- folia anguftifolia umbellati folis latiora, oblongiora & omnino glabra occurrunt. *Caules* habet pedalem & fequipedalem, cui "liiict vcluti umbella florum, fex folia rofeis multo quam *Moly Diofcor.* latioribus & amphioribus conAjotium, cum totidem ftaminibus & apicibus luteis. Antequam marcefcant *fores* plures in codem cjpirc fir nul rofei, alii alii videntur gratum odorem fpirantes.

Plurimum videtur in vineis, que funt circa *Colombier* - & *Mvmmau*, & *Mxto* menL* flora. In Germania huic fimilem invenimus capite bulbifero.

" i; . Nij fUrt fiAvirii Booconl

Bot.

Bulbus habet oblongum: *Folia* *Afphodeli* albi familia: *Caules* rotundam, laevem, non raro tri- cubitali proceritate eminentem; cujus fumum occupant in umbella quafi *fores* è luteo virefcetes, lor piffinis pediculis innixi.

Gaudet opaco locis & fylva umbrofis. In morni* Mudonije eonwlibes copiofum occurrit.

;: .: . bwmtU film ptmmto C B. Cbtmxml, an Moly Dufca n, Col.

Ct,

R. div bulbosa parva, nucis Avellanæ magnitudine, flavo cortice duro obductâ naitur. *Folia* qua- tuor vel quinque, ab radice, per ambitum hirtiata. Autumnino emittit, Graminis formâ, magnitudine (grada) inter fe diftantia, maximum verò non excedit pedem. Primo cæli tepore, ipfa etiam Hyeme, *fores* folliculo fimul inclusi inter folia terram tangentia, caule nequoquam à terra elato, emittit; qui aperto folliculo feptem aut decem erumpunt itellati, albi, fingulærum petalorum dorfo purpurafcente aut virente. In florum umbilico fructus exuberant apicem habentes, lates fex fla- minibus circumlati, quibus cum petalis marcefcenibus crefcunt fructus in Pifi vel Cicerni magnitudi- nera, per maturitatem in fex partes divifi, *semina* oftendant nigra, angulofa, vulgari *Moly* familia. *Carmole* per lemtas & agros non procul ab oppido floret *Januario*. *Floribus* evanefcentibus fru- ctus in terram incurvatur. Odor inter *Braflicam* & *Allium*.

12. *Moly anguftifolia* • / * // i / r c / 7 w » C. B. *f. pentianus* i ter. Park.

Lab.

Diofcoridis *Moly* perfimile octis, folio ad terram item reflexo, odore & bulbo: fed flor candore rubens, cui fubfecent nudi bulboli *Iodis* *Moly* ritu. *Radix* Cepaceo præfuro involucto •wegitur. *Caulis* pedalis & fequipedalis. Belgis hortenfè eft.

CAP. V.

Di AUio fative.

Allium noi- nullas dictum videt... aba***" exilii;;, quod exdieruto crclcac. Sunt qtii ab ha-

Aiatite Ria!... j.iucunt, 6c Mum (album; Votlius nmi ilubium puac qutn lit ab eZ>-i\$K, i. e. Alliorum capita (eu nuclei.

•as Eiu'yi'ir di ii *M(l>f^"ji'U- fuilts rofj, proprer odorem gravetn: vdqudil come- (l v.iporcicxereroeniino.i ad cadmpcUK & vetwncibus pandkaJaborM

Atlii". titiyi notar lunt bulbus a mulcis nudcis leu (pids corapoticus, odor gr.tvis vchementior., caulis rc&is finguns. Ger. fsuvum C B. val#n & jkhum J. B. (Common <D.irlirt.

i AUk» I irocens, enodis, concavus, glomeratim congestos m nuSP³ capita flores sustinens, diculo apparentis, postmodum & nulis parvos quibus possit propagari.

CZOILK, mpw fol Denique non simplex sed numerosis nucleis, (> uiii comrauni tindcni membrona tolled^ conf.it, t^potc pc acm, odore g ivi, muk hbra; t au-

diJj: dependent. Aliiuni wffim & TUIRA omnibus non. -ntuun lei i

& m f is u fois quidem cjuftica, intos autem mi nime; quia intus miscntur cum aliis edulis cemp, citat fel curm coerodit, Costro observatore. Nec obstat, quod in censu alimentorum est; nan-

lo vcnttiaali arto-annir: & pestcrea vcamculus hmnoie mucoto fatis denlo oblinetur; ut lo vcius interiorcin non ungant ingofta.

emem folidit Sc di cicut, Alexph irnnaimeK Ulus pr.rcipius incc: nis & externus est in colica situ -Vfrn.

lenca, iumbn cis, peffe [cum ac -"] tuffi, aK ubi. Scrvit. Ex ad predictos effectus sapissime a

vuleovdinladevlp ficulo decoctum exhibetur, unde & Theriaca ruficorum appellatur. Vc. rum ulis epa frequenter molestus est & noxius, partim ob fortorem intolerabilem, precipue vero

qua capitis dolorem infert, sicm excirat, oculis nocet, sensuumque omnium instrumentis. In thoracis affectibus puerulis egregie facit ad expectorationem. In lacte coctum & tritum

sistit catarrhos & prodest ad ranciditatem. Maliercals nostratibus ad hoies affectus in pueris in fre- quenti usu est; ut & ad lumbricos ventris enecandos & expellendos.

Allium (inquit Platerus de Febribus) in hydromelite decoctum, & ad 3 ff vc paulo plus exhibi- tum poterit sudores & urinas elicit atinpeffe! iborambus llungari f inql Joh. Bockelius de Peste)

peffis tenui orc non lubciit CCrtiuSfo modium quam Allium: extocat enim corpora humana & potredinem impe lie

Refert historiam Zacutus Lusitanus de quodam seno, qui cum in tempore hyberno per nivosa loca ai res facillet, irinato ventriculi calore parte exincto lethali ter decubuit. Pro quo instaurando

3 vivificando cum calidissima remedia nequaquam proficerent: tandem Zacutus admonitus ab coena Allium siccum melle delibatum exhibuit. Hoc cum quadrato usurpisset melius habere

CO pe, & cum epa usum mensum unum continuisset, sanitati restitutus est. Atque id ipsam Sep- tentrionales populos natura docet, <In pro, vera Allium in continuo usu habent. Sennert Sept. lit. 4. part. 1. cap. 3.

Allium cum adipe sulto tatum, si plantae pedum eo imungantur, multum conducit ad pulmo- num canales aperendos & ab infaritu hberarv in Asthmate, &c. D. Halse.

Si einpUftra ex Allio comiso plantis pedum applicentur, oris halitus Allium spirabit. Trant etia emborgin in Appar. Plantar. lib. 1. cap. 2. Allium gallicis & aliis aliohis cum esca

Q Vet. Ur rem & odorem suum in eorum carne & ovis prodece. Denique Christophorus Ben- net M. D. quai casu in Teat. tabularum 2222. 23. assent fonticulos egrotum membra vel mes- fos, vel inu in rariocis ter aw homuribu, Allii inna sumpti post tertiam aut quartam a come- sione horam odorem reddere. Verunl (ut recte D.Lawr contr.i Erfw.

odorem vapores totum corporis habitum, m penwranes non producant; sed corpuscula quaedam ex Allio decedentia languam miscntur, cumque ec ata, una cum fuliginosa sanguinis effluvis per expirationem emittuntur, , simul ad pidmones del

Alli succus poena hominem non modo turbat, sed etiam interficit Spiegel Hist. lib. 2. cap. 16. Arnalphi Imperatore vram terminantur vermicali in epa carne ex nimia Alli comestione 6P

mi. Crazo. Hist. Sac. lib. 3. cap. 3. Allia cum exantescant plenius quam recent esita ob ut cha method. cogn. Simpl. l. 2. c. 7. Gilbertus notat de Magnete lib. 1. figmentum air & mendacium esse, Magnetem non attrahit

ferrum si alio illius fuerit, aut si Adamas prope. Ad cornua pedum, R. Allium (lib cineribus coctum, purius calidissime suppetutor: ell vni re- ligwfi c- peimentum. Ob/waz.

A. ". Allium montanum majus Anglicum Newtoni.

Radex nucleis aliquot masculis constat. Allii vulgari in modum, tunica durescat subfusa facta, quam facile exant; de reliquo integra est, & canalis, e basi multas oblongas, validas, alias sibiis denutrens. Caulis firmus, mollii quadam spongiola fartsus, quatuor pedes altus, parte inferiore ad

ad cubiri arciier alctudincm per inervalU foliis quaruor cin&ui imaiua parte cum ampleaentibi: reliqua fupcnore parte nd.i 8: elabra; curus feibgio Uifidcc corynibus amplus floloilorum purpu- racentium tcnuibis pediculi* fultorum. Scmtn parvura, album, iuWongum, triqucmm, vaftulo trnctpfulan exigtio inclufum.

Trunc U
Liui.

Augullo floret. In parvs infula HJW> diA> fupra Briftoliura in Sabrini xUmrio copiose pro- venit. Ob umvncnti.un cum Allio litivo in radiabus &u bulbil i tnulris audds compoftris cUctn fib maximus.

CAP. VI.

De Ampdeprafle.

A- AmftUp*fi*m J. B. Part ^«rt(/. /w* Petrwn (jlvtfir* Ger. Lob. P«rww tyvtfirt tt- mmo cmfut C B. Pamtm jlvjtjht vmtsnn* C. B. ynomcdt dtffirtt alia >n^»irtnMa» C" trimtrttfrütttt rtmqmm,

Vincis, arvis, marginibus, fsnticcds & iuini<i5 Galli.v 8: Bclg» gauJcc. Fila ei i AIUJ Iviv. tern. folii non abf nili, \cA nuiore & icriore in biaibiiili emir. X*Li> bulbola, non cxnudcis, led JlnRulan capne omdansj Porn minor, durtor, acnor, nonnullts ad natis fele propagans. Flare, & nucleus feminis vi. J triocca granti junbu.s>n glomcratu capkults non dif- tiri bus Allii fiveltis tenuifoli.

De Ampelopraillo mihi nondum fatustatum fatore. Allii genus in Borealibus A nglix prznptK montium laxa fponie proveniens obfervavi, quod Ampeloprailium effe aliquando fufpicatus van. Folia ei naque fistulofa, neque terena, led fupeme plana, fubtus carinata, angufta, glau & tna aut quatuor in canle. Capitulum duplci folliculo membranaceo in acutum mucronem declinente clau- ditur. Huic fimile, fi non idem in pratis & umbrofis feptem aggeribus prope Ceftriam top, fiam vidi, cujus bulbis fimplex cortice nigro tegitur, mitem & vix perceptibilem Albi odoreni Ipu arts. • Iupa fiosmihi non confpectus; cum cniin Ceftru: rui Maii insniii uitto nondum Horucr.it,

CAP. VII.

De Forrs.

Porum Latin: dictum volent nonnulli quod porro ut Ic Inn, lateque graflectur. Sal cfl (inquit Voffii a regis facta fecunde tartur, uc literx crajectone & quattje rtuariane in R. quoniodo a vige est tartu, a titof caler. Porro nCX (tint radix anguita, florum n corynibi rrugni, feu Holculi plurimi in capuuluni fphxri- cum grande con ipjoban.

Pornim falile tn n-jllr.t graveolcmiunt liiviiionc ad aliud genus pertin«: folia emm fituiofoc com Cepi convenit.

i. Porrum Pork. J. B. taptawn Ger. emmmxt tfUtm C B Xrch#, o; Pozret. %B.

Folia luxuriant adolefcenctus adhuc Porrum femi nci.tn <rciter lato, alio rrutimpofttii, ii inferiore fu- perba ceu vagini aliquotifque comploctente: adultis adtm polita, led longitudo cubitali, Lmcudo laxantalis, forma carinata, color terz glaucus, fapoe cepaceo. Ubi caulectit f Jfian diftMULEm tC craffiorem ad tres, quatuorve cubitos furreje, folidam, faculentum, glomeratis in pilarii, rjuam utriq;e manu vix comploctata. fofolis fultinentem, fco unumquemque pediculo mixum, ex al- bido purpurafcentem, apicibus faturatione mictis purpura. Ser"j* tnanguiuuii, arrun^Cepx. Radix bulbola, tunica alba compactila, fibrata, fapore mitiore quam i Ccjt.

Porrum feetivum latifolium C. B. Porrum feetivum hvm aut (oniile Go-, a prxcedente non diti, et fpecie, cum ex eod i ti lemine utraq;e generentur, led cultura tantum: qua I quod ad culm-, na plicula fepius detondet foler, feetivum aut feetile Colameliz & Pallad lio nominatur: rjiid vero capiteam fieri debet, nontoni- endum, & : autuniuili tenipii. e transferendur 11; ctum PJJJJO r. nente C. B.

%, PtTTWmf)lvrfirt tnaimim C B. Loll.

Omnia Porro fimilla funt fed exilio ra Sc t m ^ n. Licr* Brabontonjm in Jawto D. J^ annu Diffi alitur. Hac Lobelius in Obfervationibus, nec plurahabet.

7220

Porrum ut gultu fic viribus cum Allio & Cepu, iverut, Jneniut, ap- ic, incidit, refolvit. Ufia TRUC pulinoji!m. Extrinfeos in aunum ciuuiiu C^ iuppiu3uoniou> in hemorrhoidem tumore, &c.

Ad doctorem Pleuricozum, & ex iltxdinc Pom nun unum incifi q. C uife parum tn Wugmr, & applica fupra partem dolentem. Mallos juveni: rduu (uii: uquit Jifmt**. D. flu/.

VA Polypim, • iicci Porri non lectilis q. i. cum pauco tartari & ceti vindii F. ung. de quoli-
 quid fatpiis in nafium innwniturur. *Alt* *via Pedemont.*
 Pravorius Porrum conhuum undiq, radic ulis Hellebori nigri cor turn ilicjuones jkunC- menlibas in-
 ftanribus cfitatum in corundem difficultate commutat. D. Scauro iDolaa
 N. Freqvens Pom ufus tom os turbulento inducit, vifuique officit.
 Nonnulliad vocii clinutenic (*phnd-*rem inducit idum Porri efum commendat. Vkari tamen
 bet (inquit J. Bauhinus) iTTuus aut multus eftis uliii, qit-1 itatera afficij ftonu cho
 adve rrfatur, naltaque alia incommoda faat: cipropter nonniliro'oaliUadniidiiiTiidccoiumn, cum
 mella vcl in Ptifana otic exhibendum.

C A P . VUL.

De Bulbefi African* anontaU Mohj afiini.

Narciffus Indicus Strfmtrim Col. notbin Recdium. *bJicm* *parvitem gemis latiore* *alia Ferrat.*
Afric *u free exatice* *Labelis* Park,

Ferrat. Col.
Bulbosa radix, Pinez :uci parv oblonga, squamola, uni fibeati vertica orbe angulfo coronata,
 fibris infar botryodis Hyacinthi, quem *Mafcars* vocitant, craffis lateque prorepentibus lub-
 nix deorfum porrecto tubere callola. September mende *caulis* protrudit craffitudine digi-
 tali, **pedaled** aut *mW* ^{TMⁿ} > • "" ^ n ° c X ? Dra ^{TMⁿ} V
 S S c E n S V. *co,u* effigy convol,

vcrop^rtcdiluj ore, magnam *caulis* **ii» intinioi** fibralos confertiffimo, nonnihil hian-
 tes, rulucimdulos, • *brevis* folialidila, pediculis nixos complectentem. Horum finguli preter **me-**
 djuni i *ylan* oblongiore, oblongo, candicante capita micantem, fena exila ftamina, rubentia,
 capiribus luteis definita, fitqui *na,* angulfa rubelcentia foliola, ftaminala & ftylum contententia de-
 frant Floi^ulis poftca diU *marcefcentibus & dependentibus fibris foliolis* *fuojacta caputis*
 turocent m follioilos anlenti • *coloru* rubros, trigonos, Olive nuclei magnitudine, racomi fea co-
 rj-mbi al>cAu<ongi<^^{tr>s,} ^{ing^m} *cos* in ternas cellulas divifos, in quibus fingula *ferrens* nigell : mi-
 Eina poft exallum florem folia cultunt, ii *accelfenti*

atque in C *non exo* ' X I S u m lafa, Sc>lk, **G^diac .qualia, pUaa** live **gquilu**
dan longitudine *in* *folis* *ovata,* in duos circiter palmos **l**nga **po-**
 & minime *caru* *in* *nigra,* primo furrecta, humi d *ovata,* in duos circiter palmos **l**nga **po-**
Africana *virgna* *ft,* planta anomala ad *Maly* nonnihil *ovata,* in duos circiter palmos **l**nga **po-**
riente. *ft* *foliis* *caulis* *unaferentibus* non *ad* *Maly* *aaum* 6- Mi *d* omntbm
alii *falhfit* *Jiffirt*

SECTIO TERTIA.

De Herb U bulbotunkato odor*vel nulto vet minus gravi *praditis.*

Herb* radiebulbofa tumcata, odonmdto ant mats grmn *prfditxJHrtvel flore*

Encapitali . foliis. Uisqux **refloauntor** furluni in (lore
 { *Btji* *Ji* ; *Ints* *I* van os*.
 { *Integr* : r **Smmnrx** **CHIUN.**
Hexapetala floribus

Fallula *fen* *periantibus* in *summo* *pericarpio* *infidentibus,*
 TCMM> *altee* *rubice* *in* *medio* *flore* *quem* *sex* *folia* *circumftant* : *Narciffus.*
 (LNiri *in* *medio* *flore* *calyce* *a* *sex* *petalis* *diffincto,* *floribus*
Majidus

^Majeril*

{ Liliaceis ; LILIO-NARCISIS.
< \ Colchici ; Co ; CHICO-NARINUS.

Mineribus, pendulis, ^cuUs albts cun) apicibus v ini&m in plerifij, Ipcciebui; Lru-
COIUM-BULBORUM.

Nodu, fructus seu vascu Ji femiuli* bafi cohxrenribasciulibus

Filosa, floribus erectis, amplis, in singulii dulibus narari fingub, colorum vanctateBe
pulchritudine insignibus, seminibus unprcSs tenuibus, radice cfcuicnu : TIJLIPA.

l "r
^bylla, flonbus in iingol» caulibus ^luribus

{ ^'trttm*, raiL-e grandi, Horibiisfolu ai teveritibus,, SCTLIA.
1 Mtdittmt*, ftamruilis florum;

{ ^Temitut fcii angustis Sc tertibus, flomin pctalis plcmnq, puris feu unicoloribus.
HYACINTHUS
Lato, spicatis aut pasculis, quorum tru acumnata, tri,i bifa seu sinuata sunt
[Kimin-i hrc capulum seminis lea stylun includunt arete cocurata, etiam
explicatis folis exterioribus] radi-obaca, Horum petalis tn plerifq, speciebus,
avcrii [jarte lincii virentilxi> nouns: ORNITHOCAZ.UK.

C A P . I .

De irtde luhcfa.

IRis Dic-floridi a cck'ftii arci'is fimiltudine nomen accepit, quem vario colore Ham i
tenus h^urar.
Hcex Irklii liint floas cncncapoli, peulis jlirfum rclciii bifijis,

1. Iru bulbosa latifolia aculeis odora C. B. bulbosa latifolia flore carales & candida J. B. bulbosa
latifolia Ger. emac. bulbosa latifolia prima C. B. Park. parad. 2. Broad-leaved bulbous
Flott cr Br lurr.

Clas

Sena ut plurimum habet folia, longiuscula & UuufcUa, Hemcrocalljdis DoUoim five lalufpho-
dell folia ferè similia, breviora tamen, alijmriin invicem .r. nplectentia, mollia, in terram protra,
superne ex viridi pallentia, inferne vero incana : e quorum medio flos exilit, e membranaceo in-
volucto, unicus odoratus, oculus (incerdura lactes candore) novem foliolis constans, iris fi-
gura, quo nunc narscente utrinque alii singulares succedunt. Nulla est illi caulis, sed Hos lon go dun-
taxat pediculo insidet, ut in Croco. Radix bulbosa, L'liiilkla, Avellanæ instar dulcis, multiplex
cortice nigricante involuta ; Cui (præsertim dum floret) aliquot præter fibras crasse lonæ radice
subnascuntur, ut in Hyacinthi radicibus interdum fieri solet.

Linn.

Invenitur in Lusitaniæ Beticæ, collium radices non procul ab Ana flumine sitis, circa
Antequaram & Cordubam. In Lusitania porto Januario : autem Fel... abam
& emebam, inquit Clusius.

Iru Bulbosa Persica Park. parad. Iru Persica variegata praxia Ferrar.

Park.

Ad praxidentem accedit tum radice, tum foliis, que tamen breviora sicut fianguflia. Floris
figura non multum dissimilis, color tr divci fm nimimm passie orri leus ruffescens, pe ub uniti re-
panda ferè tota colore obtusè purpureo intincta : ittitir, cumni. u ula in medio flava.

Rariss apud nos floret.

Ferraris eam sic describit:

Hujus radix proximè superiori persimilis minorem nacta est modem. Fo]u pautior^ dtun> vi-
rore veluti rosulenta, atq, in canalis effigiem concava, sex digitorum longitudine, dæim latitudine
desumitur. Exiguè post foliorum exortum sub extremum Februarium flores existunt, supradictis
conformatione pares, numero autem & colore dispares. II enim quaterni tantum quinque pro ca-
put, bulbis vixibus fundentur ; totiq, sic albicant, ut folia i tan. surrecta dilatiore fuce coruleo inter-
tulo pelchre livescant : totidem verò huc selecta cum prominula crocea linea intercurante di-
stincta, tum violaceis guttis circumlita, grandiore janthini coloris velut holostemata macula devo-
xum labem intuscano, splendide nigrescant.

Deniq, eadem forme folliculis Juno mensè maturisq, in semen,

I. ir; r Lily: | ... <A Vt r rruIt.i J. B. I ... bulbosa filia cepaceo maculata, flore ... bulbosa purpurea I & fexfurt ... Ucca Pat'z. bulbosa Anglica Ger.

CM Bora & Lino-i est ... ac v. ... parte interiore carinato, multiq. qu. ... nullis argenteis ... exteriori striato: crasso inhimisq. ... quem quartum aut quonia folia ample ... ex vaginulis uphucimim ... prout flores, invicem succedentes, interdum unicum ditul ... it, novem foliis cotifUntern, vioiacei profiis & ckg.inriilirm color is, injwdum liihirior ... inodo ... nzn, quorum : ... ia majora sunt ad terram inclinata & prona, ur in misspri Iride, & labroecum ... inW propenden n; tili i ia angusta & extrema ... ta bifida alataq. us in ... nibum, ufq. ad UC ... im ... iucuiam 't]ur trifonbus pro fimbrii ell) perung' ... nazi cna .ilia iutreAa itiprcmaq. parte Ist!uf ... uta, mfimi ver & valdiajigufta: ... ribus succedunt in flo a laxa, ... capta, quibus /i:nj(> inert rugo ... im tiliveicensErvi r ... magnitudine, rjuod (nxtunira in <| ... nibus crepitate, li movcantui'. /-iVixnujpij plurimis menibranis ... tenacibus nigncmiibus CircunMroiuta, iutus aloa. & kitili p.arte rlbm j)r.r ... dir.ij, qui iingntis anni5 multos nude<> circa la:jr.i tlcponic. Hujus folu nora vcre dedmm ger ... min.inr.

Huftisecnerts pUniam in liortonoftroalimus aCluharu m nonnultii ilifcrepantcni. Pluiactenim in caule (ad docem usq.) folia habet: Floris petala extrema & repa ... nbnuculiicx «erukj nignc-in ... tibus perbellè pinguntur: petala etiam turrocta varia sunt & cœralo aut purpurocasruJeoiatura ... tiore & dilataiore. Flores insuper p ... rfcpe tilts in codem caule prd ... ut.

Huju- varietates nobis esse vidi max,

1. T ... •bulof •major five Anglica cœrulea Park, ... »*/. Swm. bulfofa Anglica Cfr.

1. Iris bulfofa major purpurea variegata five striata Park.

Has ... C. Bauhino sub titulo Iras bulbo ... •feUte <MttU Jmmtx coniplwlmir: quam ... Iride hoc in loco à nobis propolr

<ae (Siftinctjni aii confituit.

J. lrw tw/Ss/i major fvt latiftH* alia Park. i</io/i i</i/e/r* (<n/ii/< C B

Incegromenfe fenus qn ... lens e terra cmqx¹! f^{***} nonntiil tn.i: ... altero prius ... ^peramplos florei gclbntCj • ... ap^ncur, ... iipu ante expdeatur quail) prior concra&u* hicile, coJoro Ant<quam ox^i ... pla (ui ... maculâ illi in medio flava intignia. ... Varietates aliquot proponit Park ... ifbniBj nimirum IrUtoni bulboOm majorem alUain varic ... 2-iunij & ... majorem five latifoliam verficolor ... cm.

4- frit Mhefi OKf: ... folia tria Jer cJtre CortJtiJri C.B. itdbofa \.fv: vtrfuA^ir CU(. bullift CJ- ... Titteo & alio verficolori I. B. biubofM -VSTI4 Gc.

Huicquinq. au[(cs fun: ... folia, angusta & tenuia, cul •mlis lone ... tudinis, interna parte striata & ... fandi ... ca, :jma rug' ... ta, viridis cum cintraco commixti coloris, caules amplexantia cœtibalem, ... interdum etiam majorem, nodosum, unicum plerumq. flores, raro binos, & membranaceis vaginulis ... proferentem, Iras angustifoliae formâ finalem, cujus tria latiora & ad terram inflexa folia extrema ... parte ampliora sunt & candidiora, latioq. macula insignita, eâ videbitur parte, qua folia his in ... cumbentia & ligulam occultentia, bifidaq., & in parvas alas reflexa, desinunt, illa subterulei ex ... candido coloris; reliqua tria erecta sunt, oblonga, & dilatae ex cœruleo purporascenna. Totus ... flo succendo spirat odore, premanti Coriandri obducti saccharo five preparati instat. Flori succo ... dit longum triangulum caput, altero gracilus, non lax ... tun, jhutii jngulo! in, subteruleum continens. ... Radix bulbosa, candida, subulcis, spadicem aliquot me •nbr.inis involttt.i, m ... noc superioris radiceCj 8c ... illi libenJiusnudeos; rodacens, quibus facillime feri pot -ft.

Varia flore latiore & radice brevi, binis plerumq. •Oribusj alrera flora angiiihorc radice oblonga: ... utratL dilui ... oris aut fannationis coloris. Vide Clusij ... in

In jounnullis Castellæ collibus non procul Pincia sponte nat¹ur. ... Iride bulbosæ verficoloris quinq. varietates & fannine enatas jiroponit 6i tldcnbit Clusifilii, qvianim ... defcriptiones: C. Bauhino contractas dabimus.

1. Trum foliorum [floris] inclinatorum libera flava ... nt, Qiacui aureâ magna in iibroiefiW" ... MM, .nl quam vaix p^ purascens-> excurrunt: at trium tnaimbain ... emi dorsum & alr ... p^j" ... lent, latera v.imlicaiK: tria crocta :!bent, venii (iibcceriltfii (aturana ... ribus vel dilata ... rionbus di ... functa.

i. Tria inflexa pallent labro flavo maculâ notato, inten. è quibusdâ to ... P"!"" ... centibus ... distincta: tria ligulam tegentia albicant, vel ochri colore sunt tria furec ... bida, nervo flavo ... excurrjntc.

ore est latiore breviorc, ternis folij inttexis lant & pmpenJc»re labro mna tOKuU uil igujt^o, ... & .ilio orbe ci ... o, pc: oris crispo, cœruleo coloris, nervo extrinsecis ... intv:st intn.C(us pillencie, ... vana purpurea in latera excurrentibus: at tria gibba purpurea sunt gibbo albicante, ala cœruleis: ... tria crocta ex cœruleo purporascu

ia reflexa flava sunt, macula aurea in lil>ro, a qui ranx dil ... •iir:(centas Ipargun ... trnr: folia incumbentia cœlibida, nervo pallb ilivili: trta furreAa i ... ius vel i ... cœneo-purpu ... rascensibus distincta, supernè candidant.

5. 1. Erna inflexa lactei coloris, aurei macula albo impressa; folia incurva ximia St t. ma erecta alb*, fie circa unguis libetere lea.

Trilli bulbosus seu vericoloris Claf. per omnia ferè similis est, brevior tamen caule, gracilioribus, & ex viridi pallidioribus foliis: pro onibus, interdum bini, contractione tamen ex vaginulis summo caulibus harentibus prodeunt, lactei coloris, inodori, medius inter secundum & tertium generis magnitudinis quemadmodum de filiqua, seu caput trigonum, in quo semen superiori simile: radix tertia generis radice simili, que nucleis non secus ac illa propagatur.

Sed hinc flore quandam etiam differentiam habet, licet exigitam: nam invenitur latiore quantumvis saturatiorque & magis rutilante aureo colore: radice itam brevior & crassior, membranacea præterea illa vagina, unde penum folia emergunt, sanguineo colore à lumina via interius in interiorem illius partem rarisimè deficiente magis infecta est, quam illius que diluitor: est flavo colore: nam illa interdum sanguineo colore caret, utriusque autem, quæ nutini duct) He tertia folia ante hyemem germinare solent.

Nascitur pingui solo & petrosi collibus ad Tagymfirii supra Olyffipponem Floret paulo mamma tertio genere, eodem quo secundum tempora.

Clasus multas proponit varietates ad tredecim usque, è semine fluxe varie ortas, quarum delcriptiones qui desiderat apud ipsum valeat. Nec enim eas hic transcribere operæ pretium putamus, cum & ihx multa nullo cato aut detimto numcin à semine lato obtineri possint, quas sepe omnes describere v. Att, Jj linuo hoc riorc integrum voluincn cotnj- ncre possit: quod idem, Jc Tullpa dictum u:: dligitur.

CAP. II.

De Narcisso.

N: Narcissus non à Narvto adolescentij nimium (cipsum adamante (ut poa* /libulantur) fcJ vi stupefacendi, rjuni ^*f*» Gr; ru vocant, dictus est! seu, ut Plinius, à n. ircc. quam rim Narcisso inesse l. 31. c. 19. te Bator: him; Pluurdio in Sympoito qitiii nerron kl>c- tans, & torpidas gravitates efficiens, dicitur. C «.

Narcissus à reliquis bulbosis tunicatis certissimi noci, calyce in medio ilore tiisting Liimr, in plures addere non sit opes.

Narcissus clanculo doctrinæ gratia dividemus in latifolios & angustifolios seu juncifolios, Latifolios iterum partiamur in monanthes seu unicum in uno caule florem gerentes, & polyanthes seu pluribus in eodem caule floribus decoratis. Monanthes denique subdividemus in 1. calyce seu tubo longissimo præditos, 2. calyce brevissimo & 3. calyce brevi.

f i. tfjrrijiu caiycefiutufa Uwgifim UtifeliMtPft*dt- iu>r<ijl*s&

1. fi*K.,/;>» /?. >Y fJJ*, (*>o/?*«#, femimnt. An Hsrtrffa miner fsBulm ample utm firm <m< r? NtruJ-mrbfũlhCB

Folia huic breviora sunt quam vel vulgari Pseudo-narcisso vel Hispanico, duplo tamen latiora, planiora nec adeo carinata, minus glauca, pallidiora, mucronibus obtusis, setiquipalmaria aut semipetalia. Caulis semipetalis, lactis crassus & firmus, è membranaceo foliiculo flavo exiens, in laxa pallidiora quam Bulbocodio vulgari, albida, latiora tamen expansa, cum tubo in medio prelongo, flavo, fundum versus tumidiorè & quasi venricoso, summo margine circumscicta firmato non tamen similitudo aut incubo, nec extrodium reflexo campanæ in modum, ut illius. Folia robum circumstantia ad illius basim sita sunt quam in vulgari klltXMXMIO & expandantur magis. Stylus in medio flore pallidus ad summum prope tubum extenditur, quem lex flamma lo- eadem ferè aequalia aretè anjpint

Semio floret quam vel vlgare Bulbocodium vel Mjfpankuni, vw. non anrc initium Aprils. E singulis autem bulbis quatuor exeunt tota. Un Riie foli(um florb&fundus cubi uitcnfiw flivenr seu crociscunt.

De loco natali nihil certi hibernui, biilbum affXgirma inter aJux mulroi ab cnuimffimo & awt- cillimo viro D. Uvidtit.

2. Narcissus major itam lateri calice prelongo C. B. Pseudo-narcissus Hispanicus aureus maximus Park. Bulbocodium Hispanicum J. B. Pseudo-narcissus Hispanicus i ucr. cnuc

Elatior est & omnibus partibus major Bulbocodio vulgariore, e**/* pedal: aut altiore, filis di: ituiji latis, dodrantem longis, in hortulo nostro è singulis bulbis bini. His longe major est vulgari Pseudo-narcissi flore, [unde miramur Clusium florem paulo maiorem huic attribuere] totus flavus & quasi aureus, tam calix, quam folia eam cingentia, alioquin ei similia. Radix lassa crassior est quam illius.

Floret

Flordwt nobis circi inirium Mirtii.

Parkinlbmis PftaJtnarafitm annum ffijhamcum fiere flmt K faninc ut conjfiiiatur priced::: Variata
fibi natum defa-ibit PoraJ. pag. 1 o j. #» j

.; £!srei\$w tlinu oblmga entice C. B. Tfmilmardjuf oibi jltri Clujit J, B. Gur. emac.

ITic precedent! palmi'ilis est foliis & caule E lingulU rannn bulbn • tria prodibant folia. Floa
..itijj urn i .bia, quam folia cum circumstantia, albn e't, aut pom* piling, Aliquanto ferius
flore; nijn precedens; flos quoque tenerior est & citius marcescit. Utr.

CluJim speciem h.n c exactis delcipit hii verbis. Valde elegans hac planta terna e' radice bul-
boft oblonfiriic". nigroque cortice five membranâ tota (a cujus fode frequentes tenuisque orizban-
tur candidæ fibræ) proferebat folia, dodrantæ m vel paulo amplius lon^i, Narciffi angustioribus
foliis valdt limiha, lupna parte cuiiuu, vox que t Jus prtxlib.it MK/H, ;ans exilis, non cræffis,
dodranted alcur, fumro faftigioine membranaceum folliculum gerens, e quo propendebat fign totus
albs, Pleudoircirffio vulgaræ i quidam paulo tamen t minor [n no potius major] fe-
ficuti ini IOIVJ, lex folis tu bom imp! cmm liter conlt,ns, tubo autem paulo angustiore,
& oras i .iniihil rimbnacu tubenti:, in quo lex .tbi thmin.; Havcleni e apice prædita, & mediis
lylus Innfior. Nullum vero |culiajenci odorcm in <M Horc oblbr'aban•, qui aperiebatur Aprilii,
deind sjunio femem proferebat in triangulari capite five theca oibicul,ve, nigrum & splendens,
quialcNa.cidit [uncifolii j'ivj Bore rcfc xo, sed m tjus.

4. BulbtevAum: J. J., TfenJa-n* qm vider Hispaniam Claf. Ocr. emaa NtreiJitt per-
tm latent C. It.

A Pseudo-narcisso Hispanico majore differt foliis longè minoribus & angustioribus, fere pufillo
infidente digitali, tenui, viridi candido. C;Wffiw [-gonum oblongum] i;ii est angulus & fere rotundus
in quo fawn tnxquale nigrum, latu: •tugntiin pro plaiux proportionc. ft dca bulbola, exigua, to-
ns njgncins.

A- ^ KtrciJiu fylvfftis putiui rliu tutto C. B. PfetUvwriffitt A*£ hca Gur. Angliam
vtdfiru i>jrk. ItulbocUtum WF « I M J. It IOIIt Cljijilfil i C I f & l.

J. B.

Radix bulbola ex multis tunica compacta, mediocri migniti albn, tactu & gustu viscida, cum
aliqua dulcedine, acrimonia tandem aliquam relinquens, cui subfunt molte capillares fibræ, non-
nunquam unica, alia plures ubi se propagat. Folia longa, angusta, e viridi cæsa, caulium ad sum-
mum falligien committunt, striata, cordis duabus aversâ parte prædita, terna, quaterna, quinta ter-
nâ uni cum caule statim e radice exorto involuta. Caulis palmatis & dodrantalis, compositus,
striatus, fistulosus, cui infidet flos singulari, doctissimi mutans, duas uncias longus, lex, pallidus &
ficllim nRan5) fol nugno, loago, ttavucjuc 6c hinbiijn calice campanula, fere hy-
r.i promberans, iure, splendens fimbria com IU 6i Uciuiata, in cti] is malio apices lex lateri circa
pidtllmii Lencolorem intorquentur, ;iuiiriK)Oilorc,noiij < alqui volunt, nullo, qu: pariCRccicalo
intermedio cauli flos adnascitur membranula exalbida florem antequam exbocet involvit: qui-
lôque infra florem medium lex folia pallidula, micantia, mediocriter lata, macronata ex iplo fioris
cædo recta fove se pantiunt. Succolant pericarpia rotunda, in quibus semen Caser. nigrum, in
principio latiusculum, tempore progressu rotundum.

Vanis in loca sponte oritur, circa margines agrorum & vervecinarum, humido præsertim solo, Læta
inque sylva & domans, locisque arboribus confinis. Martio incipit apud nos in Anglia florere, aut
serius citiusve pro anni constitutione, & æris temperie.

- 1. Bulbocodium flore pleno seu multiplice calice carente: item
 - 2. Bulbocodium flore calice seu tubo duplici, triplici & pleno: item
 - 3. Bulbocodia pleno flore speciosum genus Venerio Claf. J. B. pro luxuriantis •.«[irxkfbcs Kil 'arant.
- benda cænicæ, non pro speciebus Bulbocodia distinctis. Horum descriptiones siquis desiderat, Clu-
Lobelinum & J. Bauhinum adeat.

Non differt In. a Dioscoridis Narcisso facie vel viribus: Is autem vomitorius est & non is immickt. Fere
extrincais amen prodeffe dicitur amblysis, valværbca & hernia.

Narciffi cupuloneque radicem vomitum ciere Chifus se sepe numero expertum ci. scribit: quin
& I, sbelia hujus plante radicibus rusticam plebem vomitionis moliri alicnt.

Folia confusa in Erysipelate conducunt. D. Palmar distantq D. Hermann.

Memine C. Bauhinum Narciffi totius lateri floris foliis reflexis C. B. i.e. Narciffi tot lat. oblongo
calice & reflexis foliis Eys.

Item, Narciffi alba, fimbria lateri C. B.

scu, Narciffi lateri repentis, i.e. Pseudo-narciffi lateri repentis /ys.

i- r. Wairiffus ampla calyce, retidia Uxgitudnh.

6. Narciffus maximus pallidus ampla calice flavo Claf. latifolius pallidus calice amplo alter C. B.
latifolius maximus ampla calice flavo, five Nonpareille Park. maximus Gur.
The gr.u jOompart, o; Donsurb Daffodil.

Ex singulis bulbis quatuor aut quinque emittit folia, pedem aut sesquipedem alta, unciam lata, ca-
rimata glauca, impura litoraque in hortulo nostro quam aut Bulbocodii vulgare, aut Hispanica

caulis elatior, unicum in summo florem gestat. Juplo fere ampliorem Pseudonaffi vtdgaris flor., magis expansum, sex foliis amplis, pallide laevis cum medio tubo flavo compositum. Tubus diniidior brevior est quam Pseudonarcissi vulgaris, inferna parte angustior. vomi marctnes continue la-tior, oris circiv. circa iiii. incisa & inaequalibus, minus tamen incisus quam illius. Fl. >is tutmi i va- sculo sem. n. iiii. id locuti. ubi exorientur folia angustia est, digitalis longtudme fecusquim in Bui-boco Jiu Sramiru in maiore flore a stylo recedunt.

C Bauhinus ex hac planta duas species » faac, mmiratn Narciflum maximum pallidum foliis tncan- nis & Narcifi, latifolium pallidum amplo calice. rum

Narciflus omnium maximus flore & cali JC Havo Park, qui flores incerdutu binos oonjunaim ex uno membranaceo folliculo prodeuntibus obcintt: K-m

Narciflus max. griseus calice flavo Pwi, non (Hnt fpedes Narcifli i reliqua titfiiiida:, /ed varie- tates duntaxat precedentis e semine natj:, qua: iau: icnuia fbcacm fiuni non propagim.

I lalwmui etiam in horns noftm hujus genu Narciflum floris calice pleno Jiu mufaptici: qui

7. Vercifm Itifdw fittva ffrvt, *mfU caliu Cuf, Cur. pod Istif, fiwvti fat tmp'o mttt five MMimtji Park, parai Utif. fdlhbu, t*Ut *mpt* & mirto, firwe C li.

Radix bi:\>oQ, oblongiufciill. Folia tri- aut quatuor lattufoilj, Icfquipedem long* [unriib brevius & angustiora quam precedentis] Caulis pedalis, stratus, Fr** petala ptlli la, seu dilute admodum flavo, calix semunciam longus, oris valde fimbriatis, coloris aurei. [Parkinsonus calicem paUidi flamm. p. ciolis concolo: em tacit, & forte natura in his ludit] Sex breviulcub fl. amk. flavis apicibus praedita; modis rym Itanunibui longtor. CXlor lim obiainis, nomithil tamen SpmX ap- pendicis flor. odorem referent, qui Aprilis & Maio aperitur.

Cilice brevior 8c angustiore, nec IU a fundo ad marginem sensu n dilautOj marginibus etum nu- nis tunciatu a precedentis differit, nec tamen ob haec species differit: cijticcedimus.

8. Narciflus maximus Jiu Sramiru spofliffau frfilui Park.

Folia e singulis bulbis emittit tria vel quatuor, lata & oblonga, glauca seu ex viridi canescens; inter que caulis exoritur ciliatilis, unicum in fastigio florem gestans amplum, [raris binos] sex petalis albis compositum, absque ulla vel leuissima flavi tinctura, non admodum lato, quorum tria aver la parts ai' extortum ex uno latere apoclylin quand am foliaceam velut auriculam obtinent sin- p.i:U; ichtjia e i carent. Calix non multo minor Narcifli incomparabilis minoris calice, ad fun- uium anpifm, adurufcu iiiiargm.- lato & peramplis, pulchre flavis, marginibus interdum fimbriati- bus & velut croco tintii. Olor floris gravis & valde suavis. Hut nugnus, albus, Corticc exte- riore pallido potius quam nigricante. Adnatis raris se propagat i liortu uultiii, nec sem: n ad maturitatem producit, ob tenebulam & frigoris impatientiam.

9. Narciflus oblongo calice Cluf. albus oblongo t*Ui Lite frutimus major Park. albus calice flavo Alfacari alter C. B.

Terna habebat fCtuiii] oblonga & satis angusta, carinataque folia, ceteris quodammodo Jocxi- rili coloris; inter que prodibat calicis longitudo aut amplior, levis, nodis, satis gracili, firmus tamen, summo fastigio folliculum membranaceum sustinens, e quo emorgebat utriusq; floris longiuscula, summa parte in sensa folia alba, satis ampla & in mucronem desinentia densa, cum umbilicem occupat flavo, semunciam longus, oris aliquantulum incisus, & quodammodo fimbriatus, habens in medio stylum pallidum, epistemon cum calice longitudinis, cinctum sex Ar- mendar, flava veluti farina conspersis, eorum praesertim apicibus; valde autem suavis erat e oris & Muscati floris odorem parit referent. Radix bulbacea, longiuscula, digitalis crassitudine, alba, e multis tunici consistat, quarum exterior subtilis, aliquot crassioribus fibris lbs infima sede ob- nata.

Julius duplex praeterca hujus varietatis meminit:

1. Alter floris precedentis speciei simili, calicis tamen oris magis croceis. Hanc Parkinsonus Narciflum pallidum oblongo calice ferocinum vocat, & florem summa parte magis flavum ei attribuit, paulo amplius, calicis marginibus intensius flavo seu croceis.

2. Alteri petala ex albo pallidebant, aut ex croceis erant, calix vero multo latior quam in dderipco & oris plane croceas habens.

His addit Parkinsonus duas alias varietates:

1. Narciflum totum pallidum oblongo calice ferocinum minorcent.

2. Narciflum album oblongo calice flavo ferocinum, du

10. Narciflus albus calice flavo alter C. B. Narcif. albus oblongo calice praeciu ad. cur. :>oll. Jipm M/CRJ i r-fttY *<fi> frlet&X mmar Pat It.

Lata & carnata habet folia, non incana sed viridia, tria vel quatuor, fere qualia Leucori bol- boli vulgaris, potius alta. Caulis viridis, foliis brevior, unicum in fastigio florem gestans, ma- gnitudine, minorem tamen quam precedentis primo loco descripti, petalis albis, ad cre- mom seu horns satis colorem accedentibus. Medium horem occupat tubus exacte latus seu florus, se- munciam longus cum stylo intermedio, sex florumis farina laevi conspersis cincto, interdum lon- gioribus iplo stylo, interdum brevioribus. Olor non ingratus, sed obscurior.

Extremis Martio & mensis Aprilis fleret.

Autoris Additamentorum ad Clusii curas posteriores (!ja, lu, jlav*!, cates proponunt;

I. Alccia folia luber anguftiora, nun omen id angitfta **LI** pincifolia dici queat: caulis atque & Joris magninidu & forma convchiunt cum **proci.** Flors folia in utriusque hac fpecie alba. [iwc, it • r.inicn ut pallorom aliquem occulant, qua ivx& prae i imnir. i. Tertiaa prioribH dtubus differt felistuburn angencibus rton alb; sed plane pallida, paullo angutt rntes & icumiiuos. Parfciiilono N.iciiiinsp.illidLS oUong" calico flavo ptecox dicitur.

§. 3. tjarcijfus Utije. in manu whet In. i calyce.

11. *Narcissus medio-purpureus* J. B. Gz. *medio-purpureus feritius* Park. *albus troth purpure* C. B.

Radix ci bulbosa & nitida, lapore amariante *folia* à radice statim exorantur caulem tanq is m vagina aliquouiqua involventia, latitudine semicirculari, pari cum caule longitudine. *Caulis* flagulini, setquicubitalis, compressus nonnihil, utriusq, acutus, fistulosus; in capsâ fastigio *folia* unica, a nu 1 (nave olens, candida, nitans, pediculo per articulum cauli puncto, vaginâ membranâ o-TO-Itiro, cuius cervix in ci • quetram saturatè virentem floris quasi basin desinit: hinc canaliculata fil CXpian: ar, cui fena illa floris candida folia coherens, subrotund, i, quoaim tria aculeum mollicellum proterunt, totidem alternatim eo desinantur: florem medium obtinet coronâ fimbriatâ, ora rubentî, infra quam circulus exalbidus, alioq, huic subiectus luteus; fena in fistuloso canali *flamma* lutea, **cria medicie IaUj reliqua tantillum** s pices proferentia.

Ian plantam in quibusdam Galliarum Narbonensis partibus observavit. *Cliffia* sponte prov: iuentem: **Lena** I **QauJu** ma in Italia. Narbonensium prae stellarum candore ornare dicit Lox in *Adv.*

Tres huius species habentur formâ, colore aut odore nequaquam distantes, sed florendi tempore: magnitudine etiam nonnulli led partim diflidentw. Map] res mediis pteoces & feris prodeuntes minores sunt. *Did.*

Parkuifonus A fpedes proponifj niniurum

1. Narciduin mediopurpurcuin pra:axa:ia
1. N.irciilum nicJio-purpurcum liirotintim : aii folia tribuit qu.im prxcejent: latiora : krtm cttam nujbrem, petilia lanonbusBe iibi nmtnd conrigiis : radicem etiam crassiam nem.
1. NarcUim molit-puqi.maximum: qmonmil-ia parte, foliis, floribus, radicibus re liquisnujot **est, & a.**

4- " arcilium medio-purpureum stjllarem : cujus folia quàm precedentium tantillo angustiora font & viridiora : floris petals angustiora, nec sibi invicem conigua, tunc & longiora videntur, & bellam referunt. Odor huic remilior est quàm prae fpecie.

Prima species Martio mensis floret, reliqua Aprilis aut Maio. Secunda species in Italia, Gallia Narbonensi atq, etiam Germania sponte provenit, reliqua Constantinopoli missa sunt.

Narcissus albus circulo croceo vel luteo C. B. A priore potissimum circuli colore differt, adeoque diluji. t.] at> CO J rccles non est center: (ilL

Ia. *Njri.ij'us mtu-entm ferititM Vuk. slex circuit erecta mmcr* C. B. *irkkie-crttm mmsr ft-retam* Ger.

Folia huic minorâ & breviorâ quàm precedentibus: *caulis* etiam humilior: *floris* petals an nâ- fpatio intermedio relicto à se invicem disjunt: jj fcltarim expanlj, »tv ca, calice circui:ior.»crt>. eo colore tincto. Maio floret.

13. *Narcissus •irJuhfurpurtw magw fiert fdio Unert* J. B. < *huic magna sâra flore, circulo pallido* C. B. *latif. 7. Cluf*

Claf.

Latiora reliquis *folia* habet, coloris ferè ærugini ci j- llescentis: inter quâ (jt: • latus p r odck-wir, nides ut reliquis Narcissis, paullo > irfirmio! fori striatus, int: • conaivn-. lumina parte sustinens niagnunij. ixuni. moif n folliculmn, (Jno dchtteente t xit unicus utplurimum fler magnus, odoi atus, lex albis folis modum mcaluor: pallidum cingentibus consistens, cujus fimbria ex pallido purpur::cie. Flori succedat latus crassum triangulum capse, nigram feres continens. Radix crassior superiore, & aim Niirciit medio lutea vulgaris radice comparanda, etiam sboles suis felicitate proci..ans

E Syria allan imaiunt. Serius floret, nen ipse Maij mensis. Eadem videtur Narcisso m s-f**» dio-purpureo 7. lea maximo Park. superius posito.

14. *Ifiruffk • nrona sâratu circulo rubello* C. B. *medio-purpureus minor* J. B. *latifilam* 6. Cluf **Tat mdto.turpu-ent fclera** Park.

Claf.

quaternâ aut quina Martio mensis erumpunt *folia*, oblonga, angusta, inter ea deinde *caulis* Iliiis, r quindis, utra fungosa; in capsâ summo è tenui membrana pedit unicus, nonnunquam & alter, *folia*, lex nris *folia* huic modo, decussatâ consistens, parvum *calicem* pallidum cingentibus, capsâ orâ rubelli fimbriâ evanata, lex in ea inæquabilibus *flamentis* flavescens. Flori suaviter odorato succedunt capitula triangula, crassiuscula, in quibus nigra inæquale *feres*. *Radix* ut ceteris bulbacea, multis candidioribus cymis consistens, estima quæ reliquis ambrâ fusca, è capsâ fastili parte plurimâ fibulose fibes dependens.

Provenit magno miliari supra Gatingum Carthaginiensium monasterium, prae quibusdam altissimo lacu vicinis.

Hic flore est omnibus partibus minore quam precedens, foliis eius angustioribus & acutiori- bus: tandem etiam florens: eandem esse putamus Narcisso medio-purpureo Stellari Park. Narcissum coeruleum solo flore colore à Narcisso medio-croceo differt. Lob.

15. *Narcissus medio-cr.* t>igfmmtef^o Ct» - *alio loco tenet* J.B. Ad. part. i.

Lob. Palmatis & quinque uncialibus, tenibus Hyacinthi Autumnalis foliis eix, viridibus, buB» ceteroq; caule dodrantali, & flore precoco medio-croceo Narcisso non dissimili, minore tamen.

16. *Narcissus parvus albus fimbria sarco-rubente* C. B. *parvus stellati* a'.b.ii mdi! juavt rrtitfe *centio* Lob. Ad. part. 2. J. B.

Nihil in hujus descriptionem invenio. Lobelius à N. de Quelt accepit.

17. *Narcissus maximus flore coeruleo albicante, fimbria cruce-aurata* C. B. *maximus medio-purpureus aut coeruleus latifolius Hispanicus* Hort. Epl.

4. *Narcissus latifolius polyanthus seu pluri* « in ee/tem ; ale fleribus.

18. *Narcissus unicus ferens flos medio-luteus Narbonensis* J. B. *medio-luteus copiosus flore, alba gravi* C. B. *Narbonensis vulgaris* Park. parad. *medio-luteus polyanthus* Ger.

Clas.

Tria aut quatuor producta folia, virenti, oblonga, Parti folia ferè similia: caules cetero striatum, nudum & sine foliis, pedem altum, interdum altorem; in cuius summo sex aut octo plerève nascuntur flores, triangulis pediculis insidentes, & è tenui membranaceo involacro erumpentes, modècriter amplios, cum gravitate quadam odoratos, sex foliis constantes albi, interdum etiam *hyacinthinis*, quorum medium flavum omnino calce occupat, sex brevia filamenta cum suis apicibus pal- latis continens. Flores succedunt triangularia capsula, in quibus semen nigrum, angulosum. Ra- dix illi satis atria, bulbosa, nigricantibus aliquot turacis septa, fibrilla, multa capillata, utraque alba, & si præcidatur lentum quendam succum, ut reliqui bulla, exillam, amara.

LKM.

Nascitur plerisque Hispaniæ que Mediterraneo mari obiecta est locis, & omnibus ferè circa Non- socium part. *Nas in Italia, inter à Lerice ad Massam, & à Massa ad Lucam inter septem septem- san observamus Aprili mense florentes. Circa Minusiam Maris, & inter* *ruaria* *part.*

Hujus duas præterea species seu varietates proponit Parkinsonus in *Parad.* alterum vocat *Narcissum Narbonensem flore medio-luteum præcoccum*; alterum *Narcissum Narbonens. majorem ampliore flore*: qui ferè Narcissus medio-luteus petalis longioribus circulo patulo *Botan. Mon.*

19. *Narcissus medio-luteus majoribus fimbria* C. B. *Narc. pluri ferens flore majori præcoccus medio- luteus* J. B. *latifolius Byzantinus medio-luteus* 2. Clus.

Clas.

Precedenti ferè similes est, & *si ple- rima, nonnulli terni, quatuor aut ad summum sem* *lPrncMiOuli infiJenc.* Major ciodo *si ple- rantia quam superior.*

LKM.

Adfertur Constantinopoli & in fœdibus ^odimir, ubi floret April), imcduni edimMirtio., si ve- ris temperies paulò calidior fuerit.

20. *Narcissus nevosi calice flore alba fragrantissimi* C. B. *Unfluttfimftx mJto-luuui* ; Clus

FJ*. hinc superiore ampliore, omnino terti præter medium calicem flavum, odore fragrantissimi. sepeeni & plures summo caule simul nascentes. Folia carinata nec minus lata habet quam qui plo- num fert florem & radicem crassiorem.

21. *Narcissus albus circolo cruce polyanthus* C. B. *medio-luteus ferentis cum aliquo floribus* J. B. *medio-luteus polyanthus* Park.

Folium latitudo & magnitudo eadem cum magna Narcissi lutei Hispanici, sed obscurius virent. Maio præfert flores, duos, tres, quatuorve, pulchros, magnos ex uno pediculo. *Lob.* Brevi huc & obscura descriptio nobis non satisfacit. Parkinsonus folia cæsa seu ex cincto viridis hinc attribuit, Narcissi Narbonensis latitudine parva, *flore* calicem ampliore, luteam, margine croceo cinctam.

LKM.

In partu quibeldam ad dextram Lani amni Montepellati, in loco ibcto *es grammæ*, elegantissimi floribus etiam strum distingatur. *Botan. Mon.*

22. *Narcissus Pisanus* Park. *medio-luteus Pisanus pluri ferens ferens* J. B. *pallidus medio-cr.* # C. B.

Park.

Folia habet Narcissi vulgaris Narbonensis parva vel majora; *caules* nonnulli alioecem, *flore* mul- tas, albos suffimentum, valde pulchros, Narcissi prædicti similes sed tantillo majores. *calice* etwmi medio-luteo, ampliore & rotundiore.

A. 27. *Narcissus medio-luteus vulgaris* Park. *medio-luteus* Ger. *pallidus circuli later* C. B. *Nar. albidus medio-luteus cum aliquot floribus* J. ii. Common pale Daffodill, or Primrose peccrisis.

ufai hure fatis crallus S; (iibrotimudus, multis tunicis compoficus, pliiirimis Rtris al'es e bali ex-
eant. *H* *Folia* dodrantalia, interdum *ancubita* Li & longiora, vix Jigitum *hi* a, *microtia* non *MAV**
dum acuto, i vi *di* glauca, quatuor *nr'* *fciv*, caule in aliquibus *amplicenda*. *E-* *foli* inanes, striati,
non exacte rotundi, sed aliquantulum compressi in germinam aciem, par cum foliis alitudine, aut
paulo humiliores, e membranaceo folliculo duos aut tres flores prominentes [interdum unicum] *im-*
plos, sex foliis lata, obtusa *compositos*, cum vehementia quadam odoratos, corolla seu c,t-
lyce in medio humili, pallide flavo, fimbriato, cui insunt stamina perbrevia cum apicibus pal-
lidis.

Floret circa finem Aprilis, aut *l'* *is* *est* *ive* pro *ar* *mi* *temp* *sur* *icuri*. Li An^{li}.t *ip* *pe* *iv* *ve* *Temp* *U*
nirc acidimr, & nos quidem *extm* Iwnos flonrntcm aliquoti: *ob* *serv* *vinus*, verum hortorum re-
jectamentis originem suam debuisse suspicamur, non tamen negamus cum alicubi sponte nasci.

Matrona nostrata *Primulam* *vera* *incomparabilem* huic vocant, ob colorem floris non dissimilem
Primula vera.

Hanc speciem esse puto quam *Chusis* majorem appellat, amplis foliis, & in *col* *m* *ciule* *11* nos
utplurimum, interdum ternos & quaternos flores magnos sustinentem, sex foliis albis consti-
& calicem pallidum cingentes, odoratos; quam in Anglia sponte nasci a *v* *us* *ide* *dignu* *se* *intel-*
lectis scribit: quem C. Bauhinus *Narcissum* *totum* *album* l. facti, & *Narcissum* *tbuiii* *nurorent*
aram appellat. Verum *Chusis* *calicem* *non* *album*, sed *pallidum* *ei* *attribuit*.
Hic *ti* *im* *Nartidiii* *ore* *salp* *dureo* *medk* *lucis*, *odoro* *gravi* *ho* *«»*. *Mm* *S*. *idetur*.

14. *Nituffispitii* *Jiflmi* *x4* *w* *mc* *Mt* *Jivt* *%* *Cv* *Si-* *fa* *Si* *Juscircuit* *auris* *alijr* C. B.

Cluf.
IUJUS bulbus (atis *crailiis* *eflj*, (xterno cortice *spadiceo* colons *pi* *ditus*. *Polu* *Cluli* *protulit* *Ji-*
iari *Oi* *quat* *m* *j* *lau* *£*: *quo* *J* *mmo* *do* *cannata*, *viridia*, *cubitalis* *longitudinis*, *inetr* *qua*: *caulu*
proiliic *cubitalis* *auc* *alioor*, *deinde* *iuo* *iuim*. *altorum* *altitudinem* *superant*. (quam in reliquis *Nar-*
tii *orum* *g* *scribis* *ob* *servare* *non* *meri* *init* *ait* *«*) *viridis*, *striatus*, *intus* *cavus*, *limbo* *salpigio* *su-*
mbreanaceum *quoddam* *involutum*, e quo *exiunt* *his* *petiolo* *innascenti* *floris*, *quatuor*,
J *tin* *ens* *ru*
lex, *septem*, *aut* *plures*, *coloris* *flavi*, *nonnihil* *qu* *lii* *Cni* *[>*, *ille*: *centis*, *floridi* *tamen*, *quorum* *modis* *calic*
zurus, *floris* *valde* *odora*.
Ma *tii* *iinto* *Borc* *ut*.

15. *Narcissi pallidi medio-auris variata*, seu *Narc. sulphurei coloris minor* Clid! ad. cur. post. *N*rc.*
pallidus medio-auris C. H, *Narc. f** *pbircus* *motor* *Pajl* *parail*.

Cluf.
*Felt** *nabet* *quslii* *vu* *Igaris* *Nai* *a* *f* *l* *in* *medio* *luteo*, *latiuscula*, *pedilu* *ferc* : *t* *W* *«* *altior*, *ex* *an* *ica*
vagina *feu* *menibraiucco* *folliailo* *prore* *et* *tres* *plerumq*, *sed* *uiterdum* *plures* *jl* *res*, *illis* *qui* *similis*
tere *generis* *Pisa* *Italix* *aut* *Byzantio* *transmissi* *sunt*, *itemq*, *vulgatiorum* *junctoriorum* *floribus* *non*
majoris, *sed* *collo* *brevioci*, *sex* *foliorum* *valde* *pallidiorum* *feu* *sulphureorum* *textura* *constantes* *dn-*
gentium *coronam* *longitudinalem*, *nec* *tibi* *aut* *calicis* *forma* *predicant*, *1* *croceji* *iii* *cu*
auram, *cum* *apicibus* *plurimis* *quali* *farina* *conspersis*. *Odor* *non* *inj*, *ritns* *>*
£ *monnbui* *Py* *ciucii* *crutu* *** *est*. *Lt*: *a*.

16. *Narcissi praeae sulphurei coloris majuscula* Clul. ai our. post. Mn«. **t* *%* *ujlif*. *fa* *Ut* *Jui* *taliee*
Jm *Vg* *V* *i* *i* *K* *J* *iffm* *T* *C* *m* *f* *rti* *je* *r* *Park* *parad*.

Cluf.
F *M* *b* *a* *b* *a* *c* *t* *f* *e* *l* *i* *pedalis*, *viridia*, *non* *incana*, *angusta* *pro* *longitudine*: *inter* *que* *em* *igite* *W* ***
brevior *ip* *si* *foliis*, *sed* *tamen* *plurquam* *pedalis*, *plures* *ex* *uno* *folliculo* *floris* *protrudens*, *sex* *foliis*
pallidis, *ac* *proprie* *sulphurei* *col* *ns* *con*: *stantes*, *intermedio* *calice* *proctus* *flavo*, *heer*, *sed* *it-*
wen *cubif* *xmi*, *cum* *folio* *breviculo* *&* *parvo* *intermedio*, *tribus* *tantum* *apicibus* *cincto*. *Odor*
*** *a* *l*.

In *addit* *C. Bauhinus* *«*: *Hoi* *to* *Eyftettend*
Narcissum *Orientalen* *1* *ai* *xx* *rotunib* *itico* *!.* *..*

17. *Narcissi albidus palmarum calice amplo later*. An *Narcissu* *fmlflman* *mjer* *Pork* } An *Narc.*
orientalis albi calice later, *campanale* *sim*: *h* *m* *x* *m*: *C. B* *?*

Folia *huic* *ab* *unico* *bulbo* *quatuor* *extendit*, *dodrantalia*, *pedalis* *&* *altiora*, *interna* *parte* *con-*
cava, *glauca* *quidem*, *minus* *tamen* *quam* *Bulbocodii* *Hispanica* *longiora* *lateraq*, *quam* *illius*.
Caeca *pedalis* *aut* *sesquipedalis*, *firmis*, *crassior* *quam* *Bulbocodii* *Hispanici*, *floris* *in* *summitate* *e*
vagina *membranacea* *plures* *promens*, *in* *hortulo* *nostr* *tres* *tantum* *primo* *postquam* *latus* *fuert*
ann. *J* *albo* *cum* *pallore* *quodam*, *non* *peritus* *niveos*, *calice* *in* *med* *IQ* *i* *U* *vo*, *criplo* *quam* *in* *Nar-*
cisso *medio* *croceo* *clatiore* *feu* *longiore*, *circa* *marginem* *funato*.
Hujus *ut* *&* *sequenti* *floris* *juvandum* *odorem* *faciant*.

28. *Narcissus albidus polyanthus calice completato* nhtar, Jim tijrcif. ertmt. aüm edit* Imn mi-
nor C. B? an *Milium* quilibet?

Hic precedens per omnia similis est, sed multo minor. *Folia* angustiora habet & viridiora, quae
non abscedunt bulbis. *Caules* subnatos & inferiores, *flores* in summitate gestantem albidos, cum
calice flavo, similes ferè minore, breviorisque quam precedentis.

29. *Narcissus luteus polyanthus Africanus* C. B. *Africanus* airtvt nuyt Park. *Africanus flavus*
polyanthus Adit. ad Clu. cut. post.

Folia habet lata valdè, bipetalis aut pedè altiora, non admodum carina; inter quae licet *caulis* brevior,
crassus, rotundus, firmus, ex uno membranaceo foliolo *flores* producit duodecim aut plures, quo-
rum singuli majores sunt quam reliquorum *Narcissorum* qui plures simul unico *caulis* innascentem
flores producant, & paullo minores vulgaribus medio-luteis aut medio-purpureis *Narcissis*, profus
flavi & splendens lutei coloris, è cuorum medio exiit *calix* longus, seu tubus petalis, magis flavus
quam ipsa *folia*, minor tamen *Narcissi* pincifolii r. *Claf.* major autem illo calice qui in *Narcisso* pal-
lido medio-aureo conspicitur, admodum græci coloris minime crenatus & incisis margibus, sed præ-
fectis quodammodo & aequalibus planè oris: in cuius medio *apex* sex lutei formæ quasi conferti,
non conspicuo stylo seu pistillo.

Tempo.

Extremo Martio & incunte Aprili floret.

Parkinsonus *Narcissi* Africani aurei minoris meminit, qui non jlii ferè in re quam omnium
suarum partium parvitate & pallidore floris colore à precedente differt.

30. *Narcissus luteus polyanthus Lusitanicus* C. B. *Narcissus aegyptius* J. B. *Narcissus* 5 *Aegypti*
aut *Aegyptus* Lob. Ad. part. 2.

Lob.

Bulbus est *Narcissi* mediolutesi Narbonensis pari & simili, sed externis involocri nigrioribus. *Flores*,
caulis, *folia*, *Narcisso* Pilano similia, sed *flores* variant, alii minoribus, rotundioribus & veluti de-
cussatis: alii vero una pluribus & longioribus.

Locus.

In Lusitania tritus est prope D. Uve.

31. *Narcissus luteus Constantinopolitanus* C. B. *latifolius fert pryffm Jlav* five 4. *Zerincada ca-*
tamer nomine alatus Clu.

Claf.

Folia huic proxime descripto [*latifolia* nivo 2. *Claf.*] similia. *Flores* variae, nam vel totus fla-
vus est, vel omnino pallidus, præter calicem, qui in hoc plantæ aureus est. *Semina* in trigonis capitibus
Narcissorum, inaequalia, nigra. *Radix* tamen ipsa coloris tota.

Locus.

Byzantio allatus est.

32. *Narcissus angustifolius tenui luteus* C. B. *tenui luteus*, se»f*r fbrtm Cartmt CluC ad. cur.
post. *angustifolius luteus* semper firmus Coccini Park.

Folia habet angustiora, *twivn* aut cicer longiora, coloris obscure viridibus, & aliquo modo carinata,
media quodammodo inter *folia* Pseudonarcissi Hispanici & vulgaribus medio-purpureis *Narcissi*, sal-
tem laeviora quam ut pincifolii accenseri debeant: idcirco angustifolia *Narcissi* ii vocem non in-
commode poterit. Inter haec *folia*, quae sunt numerosa ex una radice procedunt, *aniti* iliquot ai-
ferunt, singuli duos aut tres *flores* proferentes [uno multo plures usque ad quindenos] parvos, lu-
tes, media coroni seu *calice* brevi, profus flavi coloris, odorem obscuro: quodque mirum est *terris*
in anno *flores* proferit, ita ut nunquam desinat florere, quin & ex aliam suis bulbis, quos eo em
quo ipse commisit anno plures habere solet, illo ipso anno alios *caules* & *flores* perdit.

UtK.

E Florentia missus est.

33. *Narcissus angustifolius albus nivo* C. B. prod.

C. B. prod.

Ex radice bulbosae tunici subtergri tota & paucis fibris capillati *folia* hinc & Jtcnuoblioni: a, an-
gusta, porracea erigunt: inter quae *caulis* palmari, caps summo bini *flores* parvi, albi, *calice*
oblongo, angusto devoti insident.

Locus.

In floribus collibus circa montem Lupi & in monte Cerio Aprili mense cum flore invenit
D. Alegrol.

34. *Narcissus tenui albus major* C. B. *latifolius* *fontis* *floris* *profus* *albo* 1. Clu. *Narcissus* *ca-*
pluribus *floris* *tenui* *albus* *major* J. B. *tenui* *albus* Ger.

Claf.

Folia habet terna aut quaterna, viridiora paullo quam *Narcissi* mediolutesi nives, longiora & an-
gustiora, è quorum medio exiit *calix* latifolius, angulosus tamen & concavus, cui insident seni,
sexteni, interdum deni *flores*, prioribus similes, sed oblongiora paullo, & omnino nivi, quorum
videlicet *calix* illi modus, qui in * predicto flavus etiam albus est: odor illis similis, similis etiam
radix. Illis neque capsa, neque semen observare potat Clu. cum Januario extremo nascentem
pungit solo tunculis Lusitaniae & Barce locis, & alpinis, multaque adhuc aquis stagnanti-
bus cum florentem observabat, tum etiam Februarii initio in humis Calpe

* *Narc. mediolutesi*

;j. *Narcifus mtus dhtis miner* C B. *folnt* (*MnAxtnt'thui cum flanhm fisrihus, ictui albus miner*
J. B. *N<>rc. t<\$f. nivtuj alitr* CluC

Claf.

Superiore minor est, firmioribus nugifque candicantibus *foliis*, qual'u feri in Niraflo marino
Pancratioidifto, *tmU* bntviore, fit duos, tresautquatuor duntaxat flores proferente.

t

Roliquis Narciflii leriui, h. e. Maio menie floret.

%&. *Ntrriffiü nivtm* C B *nivtu latffiliut Bz.amiat* J. B. *UiifJtus ruvim* j. CluC

Felu primo generi familia profert; *Cnultm* inter folia pedalem, qui ternos & quatemos *font*
gent, ejudem cum fupenore magnitudinis, nivei prordia colons, id est, calice eoam mvco, i tjuibus
emergunt (era *flamitta*, terna aius longiora, flava.

Hk Byzantio illatus est.

*.<<<<

Alius prxterti adeo illi in omnibus familia, ut vix quilibet discernere potuit, nilidiff[er]enti. In
feallent *fiart* illo minores & frequentiori;) in (umno caulc nfeentes, odorem *sc. Agrannam* JaP
niuii tefetentes: tlujui femer mtrigonis capkulu mclulum, nigrum, inxquale. Utnufque *radix*
minor paullo priorc, & nigris tunios iapta.

Maio me life floret.

Tropw.

His addit C< Bauhinus, I. Narcifluni Orientalcm majorem album, Le. *Narcit Orient*, major,
totum albnjpolyanthem. *Ejfl.*

2. *Niraflera Orient*, meduun album, i. c. *Narc Orient*, medium totum album ptyanthem.
5. fi. <in a priore JOLI magnitudine ilitfiirt. Est jucteni prior *UritoliuSj* flortbm topoliu albis per-
le, oi>ratis, tribus (ian-umbos *land** brevibus (ionatis.

3. *NarafFutn* Oient. allium exloiatum, calice Itcllato *Ejfl.*

4. *Narcilium* album maximum, calyce luteo brevi Wort £#.

5. *Niru* lacitblijin fulphurcum vel album brevicaiyce C. B.

4- 5. *Narctjfui juncifol'tus.*

11 *Ntrriffiü jtacifolim pr<ecox* Gsr. *juHttfimi fore* Ixto J. B. *Njn\ jtn.'sfUm* I. Cluf. *j<w*
cifoltus oilonga cuitt Itfeui rrtjior C 1).

*R*Jtce* est Uilxjfi, tunicata, tunica feu inembrana exteriore nigra aut THIM., pturimb fibris ex ima
fede: feu Kifi puKicimolxti Iipjci. *Folia* ex, codem buibo pterunflue duo, pedalis longitudinii. angu-
gusti, tenultate & viore imiceo, intenore umen feu fupma fperfiuc nonniluJ concava, i:ter
que *cau'w* exurgit teres, nudus, ccnuu*, paris Rre alcimdinis cum fotiis, in cacumince ihect.i mem-
brana: tres auc quamor *flora* promens, pemnis flavos, £ loogo & angufto cubo in lex folia cs-
tunibi, ami pan'o 8: breviuioilo in medio calite ciraim oras unuato, tna intus flaminula, cacu-
minuU ftava getianm continence. His (inquit Cluiius) (uccednnt triangula (*fita, obtuJu angu-
> ut rdicijioruii Narcijloturn, nigroSc aogulofb lemiii; plena, nimore taitien tjuajn aliorum.

Apiili tneafi (LMLC. Spoiite nalcitur in montanu pratu non procul Tolcto *Si.* area GuadiJupe. *tm/w* IJ

Claf.

Clafis in Hst. *Narciflus* X. qui angustifoli *jfl.* Sc (uncifolius I. dicitur.

Narciflus juncifolius flore rotundæ circumscissæ: oleo *Let*, hue refertur J a C. Bauhino prodiverla
spe: ie proponitur *tulo* *Narcifli juncifolii* flore *re'* Cundo roieo.

J. *N<rc(JJm* *lururt'* *Jiui* minor Cv£. luft. *jmKifuliHt* *Imtia* mpw C B. *jumiflius flirt* luSm J. B.
jflint *frettmu* <Ser.

Claf.

I lac prcedente minus est, gracitioribus, rocundionbui frequentioribusque *film*; < *auliculu* è mo-
dio prodeintibus pulillu, iimcunt plerunque aut ahcrum *fiarem* duntaxat fuftinencibus, flivum \$c
odt>:atum ut Jteruis, led foliis conlUntem hrmioribusC; *nwgii* o>i<<am.

Uliginofis intJI 1 lipnlim *Ce* Gades locis cum ipfo Horc Januario menic emit Chifius: In hoitw *Liau* &
noftreis iionnili Aprili aut Maio foret. *Tt*>fu.*

J. *Narctjfm jmcifiltui* *Jfert* lutto vtrit%ato C B, *juncif**. *luttut* **!bicMttfai* *liatu* *Jifidius* F 'Jit
janif. imt. *atinotmitHti* *ttntu* *JipmcJut*, *brtvi* *taiut* Swcr.

Park.

*Fob** hab<< trefli, viridia, obking.i, Jundfoln Narciflii rulgm iilmWii; >>< /M* duos *triGre* floret
(iiltinentem luteoi, *pet* *lis* extremo tubrocunda, lineal abd per amolcniatque modium *decurre*:"e vj-
negatis, t<fc<< brevi, coa>:le simili, oro nonnihil crispis sca finasto, cetara & praocedente non
differt.

4. *Narciflus jmcifiltu*, *fat* *fdtJe* *rtfUxe*, *jm* *cifilias* *mi* •» J⁶ *palido* J. B.

Hic in hortulo nostro *filim* è bulbo unicam exibat palmare. Non tamen dubito quin plantæ
regolijr< (ololsto plura Si majori producant. *Caulis* palmatis firmus, teres, viridis è f Jtculo
membraiuceobu] os protulit *fiari*, *pediculu* longu pendulo. *Floris* *tubu* à valculo feminali cui in-
(idct angisJui ad Horcm uique diffin. *I W<* Hons mediuj lemidigiraJ *fer*,
campantorsiii, margmibts *qualiWs, nonnihil Snuani, cum *fjU* in medio paru lu>gir. *dimis*,
quam

quæ circumstant *flamma* breviora. Floris folia reflexa sunt. Tut jurem Has tarn folia quam calice pallide lutea sunt, ejusdem scilicet coloris cum foliis > tubutu circumdubus in liore Bulbocodi vulgaris.

5. *Narcissus juncifolius* JI Aniumr. alii flore viridis Park.

Park.

Filius unicum distaxat promit, prælongum, teres, viride, saltem in omnibus quas Descriptionis autui videre conrige plantis, quo tandem masculcente & evasido emergit *cauliculus*, folio prædicto similib, teres, nudus, viridis, summa parte *flore* tres quædamve nullinem ex involuero tenui membranaceo erumpentes, petals sex angustis, in mucronem acutissimum & veluti spinulam desinentibus, cum calice in medio rotundo parto compositos. Floris totius tum calicis medi, tum petalorum ambientium color viridis, odor suavis admodum, reliquorum hujus generis similis. Floram non ante mensis Octobrem explicat, qui prius brevi supervenientibus nun kk miilro poll apud nos corrumpitur. Planta est tenera, nec hycines nostras facile tolerat.

E Barbaria Africa delatus est.

Lucas.

6. *Narcissus juncifolius flavus*

OB.*/ / *nsif. five juncif. n u n w *mf>e auk* Park. paradT/*«*isul. ampie*

calice Ger. emic.

Claf.

Bina aut terna huic sunt *folia*, pedalis aut majoris longitudinis, crassa & succulenta, carinata & viridi colore prædita, proximè ad ¹ juncifoli Narcissi foliorum viriditatem accedente. Prodit inter folia *caulis* gracilis instar ejus qui subsequens, firmis, pedalis longitudinis, qui summo fastigio ex membranaceo folliculo binos aut ternos *flores* promit, valde elegantes, majores & laxiores quam reliquorum Narcissorum juncio folio, sex prædita: foliis flavis, quorum medium occupat *calix* major quam in illo Narcissorum genere, lomentum namque longius & per ora veluti funiculus, paulo futuratice lutei coloris, continem brevis sex *flamma* lutea, apicibus auris prædita, & *stylum* flavum, extrema parte crassiorum. Olorata est in flor perinde ac Narcissi juncifolia flores. *Radix* habet Narcissi juncifolia bulbo equalis.

E montibus D. Jacobi Gallicæ vicinis à Nic. lo Quæle : J Lnbidium devcilus est Aprilis mensis floret.

C. Barbanus hanc plantam Narcissi juncifolia non acenlet, verum Narcissi totis luteis quon vocat.

Lucas & Tempus.

7. *Narcissus juncifolia*

r CluC * -ur *flore* f*Ue J. B. jmafilm fart u&i fare, <*IK, fa v • B.

Claf.

Ex bulbo aliorum Narcissorum juncio folio bulbo non dissimili, valde tamen pusillo, quinque aut sex *folia*, producta, angusta quidem illa & juncta, aliquantulum tamen planiora, dodrantem aut pedem longa, nonnihil procumbentia, viridia: inter que prodit unus aut alter *cauliculus*, gracilis, nudus, viridis, pedalis longitudinis, summo fastigio gestans folliculum membranaceum instar aliorum Narcissorum, e quo exiit unus aut alter *flor*, longo pediculo innixis, formæ juncifolia vulgaris floribus simis, sed paulo minor, sex foliis pallidioribus constans, cum medio *calice* flavo, majori aliquantulum, & majori parte quam in illis *flore*; è capis umbilico pallidula brevique staminibus emergunt, medio stylo prominente. Olorata quidem est *flor*, pusillo tamen gravior est epa color quam vulgaris juncifolia.

Sponte nascitur in illa Gallicæ p: : *teqite ruij* *Reveris* appellatur. Apnb florec Clatio describitur in Appendice ad Histon. plantarum rariorum.

Lucas.

8. *Narcissus juncifoliae totus albus* C. B. *juncif. flore albo* alii

rr CluC App. alt. aml. j«w^»J ar

albi Park.

Claf.

Hujus multo longiora sunt *folia* quam Narcissi juncif. flore albo reflexo, & viridia: *caulis* etiam longior, summo fastigio sustinet binos aut ternos *flores*, diverge tamen ab eo sequitur: nam Narcissi juncifolia minoris floribus valde similes sunt; horum tamen color albus, tam ipsa calice quam sex foliorum illius ambientium. *Radix* non valde magna est, longicula, membranâ cum cingente præfusa folcâ.

Floret Aprilis: è Pyrenæis autem montibus eruit est.

Narcissi juncif. albi Park. folia magis ad certum tendebant, parè ut foliorum Pseudonarcissi, quales erant plantæ à Veneto ad Clusium missæ.

Paphlagonia allam adhuc hujus varietatem proponit calice majore, cætera similem.

Lucas.

9. *Narcissus albus Autumnalis minimus* C. B. *fortissis five Autumnalis minimus* Cluf. *Autumnalis minor* Ger.

Claf.

Unicum *cauliculus* digitalis longitudinis, gracilem, vacuum habet hic Narcissus, in cuius summo florem Narcissinum, odoratum, sex foliolis albis constantem, & in medio exiguum *cauliculus* flavum cœmulentem: *folia* succidit crile, trigonum *caulis*, exiguum, nigrum, angulosumque *flores* continens. *Radix* Navaio juncifoliae valde simis, minor tamen, multa candela tunica, lentisque *foliis* p. egantibus constans, sed nigra quiddam membrana mta. Tota planta amara est.

Nascitur primus ad Aram flumen in Tardalia, via florentem, & suis capitulis jam maturiscent incipientibus certam sub Octobrem finem, nullis e bulbo nata foliis, nec ulla certum vestigia observant.

Lucas.

10. Narciffat moMMUu jvxtifui. calict (l:i-o C. B. Pftutlaiurecijuj jtaicifeliiti primit CluC juth aftlws w<>n<miu mimmus Gsr. em.ic.

Ct*f.

Folia huic vaKle- .tngufh, Ura potius juncea; ctmlis tennis, nudus, palmtun alms, cujus extreme tab inlulet fie> £ vaginuLi emergens, qvti fe (bliis« herbido pallcfccnnbus & expwiis conf.it, quorum medium ealix flivus, olithi irtitar nMongus, ons prseitiis non (muofis 3c hmbnatis at ill- periorum (cd acqunlibus: JW.X exiguo NarcHio Gmils, intus Candida, torn nipricans,

Nalcittir quibufdam Lulit.tn.r Bxtururque collibus, ubi Jamiario Horentem mvontt Clufius. LOCK.

Parkin (ont;s ttium adlmc lj)ccicruni icu varictatum Narclffi (unafolu flore reflexo meminit, ni- mirunif

i, Nartiffi juncifolii Hore tutortfiexo filth m.ijoi'ibus i c longioribus quam Narad junciL flore albo reflexo; cault cantillo eubore flora duo trclvc, cotos aureos iustine. ite.

i, Ntrreif. jwcf. ealke albo, rtjlexis folia luteu, CMUU pedali., viridi, dlIOSj tr&fifc floret fuftjpetltc pe- talis pallid^ lutcis, cabce pallide albo.

5. Ntrcif. jmctf.aditt l*tw,rtfltxu foliu albidu,

11. Harcijfut mextanus alter jlvrt pmhriate C. B. PftMJonartjJm jttrrcif. II, fUvt fiort CluC men- tsnm jmcif. Jfort fimbriato GtT. CIIac,

CUf.

Tenuiora paullq qu.un prxcedens, iicct (urredia iabec fob*\ t'arem flavam, hoc est, calicem m per oras I: iter & tenuiter mbriatura, &c lex ilia Irotola caiicem ani i ntia ex herbido pallcfccn...i; in capulis flori succedente n...-rum naeui... profert. Radix puillij tbris nigncans, bul- bases, tenuibus fibres i. fede procoiv... in.

It. Nm-ajfat mmtsnuv alkm minhaut C B . PfruJaurritfuj jmcif. ttrtm CluC enmiuM minimus mmmui alimi Ger. cmic

Clu

Quarerna ant quina/>I/* protultc [Clufio] tenuiffima & capillaiii, vnidu, liumi procambenii.i & (parla: inter mix tudiaam emerlic infirmus, paimarisj tenuu, nudus, unica in I um mo Borem e ncmbranacco fblUculo prodeuntenj lallintaii teadluin, candiduai omnino 8c calici, oris rimbui- ris. Semen non potuit oilclrvare Cluiiiii. tUdix fiipenon iiiidi.

Hujus Sc Uipcriotii radices c Caoubroruni JURIS cnita- hicre.

Locu

I ;, Narcijjut tnfru^ifehut slims, ettct oblongo fUeyuc re... C. B. juncifolius albo flore gifa) Clut app. ale *u£t jmetfolim Jkrt affo TCJUXQ Park, junafofm rffkxnt flan tba Gee. emac

Claf.

E raJice bulbofa, nucis Pontic* magnitudine, Candida, fuica menibrana obdueti, cujus ftJem ploriinj cenei albi fibrxoccupabant. quaterna aut qmna exilicbant foli.i.dotUantei Tilonga, angulla 6c pxnc .juncea, aliquantulum HIAU, &c luptiu parte nonmhil cannata, viridu; inter <ux pro^ii- bat ilodrjntalU caulu, virmis, Uvi, non valde craffus, fummo fastigo iustiners in membratu ceo involucre binos, ternos, interduni quaternos oblongo, fibres, nivei quidem candoris, sed odors ex- pares, dcorfuniipropendenci & nutantes, iex longiuloijii Sc lai is angustis foliis coaltintes, Ierlum reflex is floram Cyclamini tnftar; £ quonun umbilk» prominb.i: calix, femenci tm longus/cl etiam longior, iuu-tju> i mi fiitmitiMla alba, quorum <fict> :avelcentes, ^ tenuem Ion- gum f., Mn. calicis oras malum fu [WTiintera Succedebant tngulari... cliccx, exiguo orbiculari, nif, roque & splendent: fmnte plcnx.

Florebat Apr... At ex 1 Iijpaous aut Pyrcnais montibus:

Locu

14. Narcijfw jtuiumxslu albut C D. jawf<<f /ob>> *lbnl At4:umn,ilit> meJit cbfotttos Swertil

15. PfiuJo-narciffts grammeo filio, Jivt L*uto-*arc>Jf*s <e{tr-mi C B. prod.

Ex radtct oblongum, angultum bulbum itniunts, exigui> captllaceis fibris prxdia, memb... fii ci : ciita foha bina aocdi a-inub oUoogaexurgunt, que lj:pc ciuliculum lujwrasK, • ui modus tcauii, tniini, quatuor, quandoque qujnque uticurunvj-... :inis, qua;terrai brt-... ex foliis sex compofitum, iustinet, in cujus medio caliculus breviffimus in stylum abans, ;uem ft*-

mtiul.. | apicibus candidis donata cinguntur capitulum I emcii con / mens succoat. In Alpil. i & ad Then i! nfc **>). /

Sorec

16. Nartiffu, mtmanui ,renMtn C. B. Buliiondtunt minimum cironato J.K Narcijjut jtmofobttt

ga Hoffani x htrtuljnum t Clu. Pan?

CAP.

CAP. III.

De Lili-narciffis.

Lho-narciffiir dicimus hanc plantam, quia flore Lilium refert radice narciffum. Flores an- tenci c men- tiano involucreo Narciffiorum modo excent, unde ad Narciffum propius quam jd Ulii: n accidit, & feunda species, fi recte defcripta fit, vera & genuina Narciffi I⁸''

1. sUraflks nurh'omi C. B. marina/ CluC liift. app, ak. Pftwleturcijftis wgrhms 4&*t; Van- crtlium •outgo Park. paniL Pancratium mannam Ger. Ak-njptffuLnatt!, mu/ia Saks dis twvit J. B.

7. B,

Jfji'wf nititur bulbolj, minore quam ScilLe •ulgaris ruffe; Ix>▷clio Adverf. cum maxim a c(l quanta maxin Lili, aut Aranti vel Lirjwnij oblonga, fibris donata, cortice Cepe obiecti pullo, intus candida, tunica veficis cepaceis, pollicis, leniter fibrata, aliquot decraftis candidiffimis, eman in nteduallio fitis c allis, miriui canien qu.;'n Scilla dacty, albes, vifcidis, lento humore plenis, fine acris; lonia ana rta vd odtoiu, Porraceis familia, cobitalia, pollicem circiter lata, colo- Uglaiid, inobnifum ni cronem delinquentis. [plantora & firmiora quam Narciffina Claf.] Inter

lilium, parum folis longior, crassius Alphonfeli, tenerior, nudus, enodis, qui e fastigi folliculo men- branaceo flores quinos, tenos & interdum plures profert, magnos, Pseudonarciffio vul- gari lunileSj un dias tres vel quatuor longos, albos, prater exterorum sex foliorum necraim & ex- tremis macronis, qui viridi colore nonnihil aspersi videntur. E medio oblongo > procumb ante ca- bet, | ter oras laciniato excent canthida sex oblonga flamma, lina •pinae flavis ornata, & medio l.;:igio no,) ut Uliis albo fore, quibus succoolunt porcaripa aliquot trigona maxima plera fumis nigro, mag- no,) ato, comperito, fungolo.

Lacu.

In maritimo circa Valentiam Hispania frequens, ut toto illo maritimo tractu infra Montfchem, i.Vi •I aio mense florentem, Julioque & Augusto semem manum ferentem observavit Clufius. Nos in 1 hr ribus arenosis prope Neapolim florentem invenimus Junio & Julio, necnon in Sicilia.

Mutato mttali solo nunquam aut raril inic florere Met, dim viz. coicicq ;o pan in iplo bulbo flo >re cruiwr S: tmsfertur.

Variar mos cobie; (ur aiont) apud Moiiifpelienfts est alba, est liiblwco, & est pallefceme, 3 paul Irajos rubra & purp; puiutante C A Cluiio alcerius colons /fores videre non COI- dgit quini albr, ur nec Parkinl i>o,

2. UartijffU IS/ricu Lilt,icon C. & nurromi fivt j. JW arkidi Park. Narciffus tertius Martini. Ger. emat. Pancratia A. a ficut Lili narciffus, vel Nar- ciffi 2. Marti •ali J. B.

R*/« kiiffii Narciffi, fi in eotlem loco JK. multos annos quicere permittatur, hoc aliud transfe- ratur, in n. ignominiam Scille medicosis amulam, reliquorum cupiscanque generis Narcifforum bulboi lo: ^ ge luperantem excrefcit, tunica aliquot nigricantibus exteriori obiecta, multis ex ima fede exantibus fibris longis, crassis, varie ramosis, aliis prope terre fpecificiem diffusis, aliis dorsum ten- dentibus, que non, ut in reliquis fere omnibus Narciffis, quocumque marcescunt & intereunt nova subna- fcentibus, sed perpetuo durant, unde planta hac non amat transferri, sed in eodam (ut diximus) loco perfistere linenda est, si vchis ut floreat & vigeat. Folia emittit sex, feptem, aut plura, duplo latius quam Narciffina reliqua, pro latitudine tamen hecra, ut que diuidiam longitudinalem nonnullorum Narcifforum vis attingant, et viridi cesa aut canefcentia. Ex liortimii. lio & interdum etiam ad eorundem. ...era emergunt caulis nunc lingula, lapius plures, petales aut aliores in cacamine fu- flinereves octo, decem, duodecim, aut plures floris, e membranaceo folliculo egressos, ses petala al- lis expanfa compofitos, cum brevis in medio calice seu corolla, in sex partes seu fegmentsa divisa, & unoqtioq; fegmento in tres denud lacinias, [in univerfam octodecim] in petala fupradicta relapina. Ex fingulis huiusce calicis fegmentorum angula fingula exiunt flammae albae longae, extremitat j^L* film vellexa aut incurva, apices luteos gestantia, e medio flore flum albus. Floi de lapio fucei capiti • trigona, fenne magno, nigro, notu do, alion: n Narcifforum simili repleta. Floru odor flavis, nimis vehement.

Lacu.

*I nca hujus generis Parkinfono a sen iincorta, non antedceimum qmrtiitn a latione annum florei produxit.

In fllyria. (ponte i: lci dicitur, in .iuiu anlrimU Sirilitiit infibr monubus, 8t IQ locii er nimis, qua ratione Narciffus iuc vel nviritiniuj, vel mmitanis n\ ucupari potest. um u u *

Nos hanc speciem observasse putamus m n w i u m i i Skill anctolis, ut a bulbo nra iudine con- jectabamur, nam florem non vidimus. *•''

1. Namifjai mirmtr actiion \ '^

V*rk,

Quinque aut sex fela larga longiq; emittit, pallide viridia; inter que caulis exurgit firmus & latis crassis, summo fastigio plucinos sustinens flori, e folliculo membranaceo tenui erumpentis, peramplos, sex longo & acuminato fatis, pallide pappulacenticis compofitos, cum calice in medio amplo, rotundo, petalo, colore lauratiore quam fola praedita. Radix pergrandis, reliquorum tamen Narciffio- rum fimitis, tunica exterioribus leucophab aut eos hujus natalis ignoratur. 2. Nar-

2. Nar-

4. *Narcissus In. iticus Jilturmuis C B. Vncrati* m Inieum am Iftreijfu: hdicitt Aulumslu <«».*
ruttJm Lebtlv Park. Tajcrtium ant Narcijfet Indicem maxtmxt autumtahi jumauUm not
amarus, mtiiv JL H.

lot.

Radix: e est (pithamam loog^, braclualis craffitudinis, multis Cep. icrti (LKilBictis ninicis fqm; <««^o,
extimifq, cudculs ex niffb (ubfuias aut Caftanx dilim colons: fefili p.ittu m.ijore modloarem
puRnum atquante - numeroti^ camofis, habuionbusfibiiSj Pancrarii ant SUIJC m(Ur, quaff tru nco
aut noido tollefit 8t appenlis, fulta. Septembn aut Oftobri ofto Ant deceni ftdlatii llm ihus. t
chid albi Anglid panbus, liid longionbusj (ubluroi?, t-x .i)tx) bridis, (enis longiofibtis *flamimkit*
albi pitelitJij latioribus t- menibriincis tunias, MolyDiolcoridisiiodo, pendubs, bre?b(ibta, fine
caule, pen: *na forte al* imenttiniucrentibus, FoliOntm nidiincna rcrufa apparucrunjt l*a!5crarii Mon-
J(>ci.ici limiha, dtws uncus laUj breviora camen, fort^ nondum produs *auzi*, aut perfe&atn lon-
gkinlinem allccura.

Ex HifpanioU advedui eft hie bdbus.

5. *Narcissus Indicus Ger. Indicus tatar raber C. B. Indicus latifolius Indico* /art J. B. //wJi-
auflort rwire, JiUxi Jtcthxus l'ark.

Radix huic bulbola, Cenzrocundx (imillinu, verum fupsrni runiLi polll. *Fls* 4 pritDum emlri-
t *crall* j oblonga, Narcifli Jiarim l. itnula, fecundum rend fofa, arc], add *ex lara* • jwdalii 6c
Jongior etiam emicat *rattlu*, plenif, unnm, aliquando VLTO & jlrer. fionmuijiMm pant or , qa.tn-
qiumhocriiro) mterduni Iwcedfiv^, dilutejubensj POTunAg, cfwnprello tuiK-n ii\o, cavus & in-
tctiui fubalbidis, qui in menibr.xncani tfeimt vaginubm (jnirat rabeneem, & adexfremumam-
inacain lftimq., cojia^ Jiu unicuserutiipic oblongus, pjdioilo nix us viridiorCjqui dcorfim inflexus
(c nucans, minus tanrfn quam in Lcucoio bulbolo aut Lilio ml>ro, (ex munitur pctalis, eleganti
minii tolorc rubentibus, tnbus (iipenoriu*, lotidetn infciioribus, quorum (juo.l e luperioribis me-
dium eft, krrethiis eminer, reliqtii duo ad laicra a medio retjeduiuur, iiferiora auteni deorfum
oirvannj\ aindbi itl conannatr:, ut cnlis etum rubn, qui abordmis S. Jioabi equicibtu in vefte
geftatur formim valicrelent, unite jacobcti cognomen a *Simme it Tovar* dei'cnpr loms auroro ei
inditum. Sunt porra in lioc cleganrillimo iiorc *fitnm** icptem, limiliter rubra, quonim medium
aliquanta longiib in crutigurum apicem delink, crtct* *iex* aoi< <tranl< *urfi fitnm* e interiib I *lca*,
fiipeffiac vtro luroo ptilvilaJo obduti; cunAa *veto ad medum Iere corum lo* >gttudmcin me-
dium < infenoriub folium ambit; idem coani a reliquis duobus inferioribus completum: atq, ubi
hxcdi oclum floctuntur flamina ipfa iurlunclevancur. < *lufus flor*-in Ajundmis InJicx diAj; liori
non valde abundem dicit.

Ex I ni! i a Oicnu i l a d l iitu r. /., cut:

6. *Narcissus tx JJW rubtftou C B. Nornfiu Gsrtti fbrt tlfo, Mtrifn font ruhicimJt Sweim.*

In Catalogo Horti Regi Parisienfis extat.

7. *Narcissus Virginis* Park. parad. *Lilio-narcissus Indicus parvulus monasteris albus* Morif. Atamafo
dicitur.

CauUm olit fpjthamxum, tinioim m raffgio ^ <w geftantem I jtiacci:ni, alb am, hevape: alum,
Tulip* iij, Ur erefcjm, oim/V" w> meUio, quern lex *fltm** circum/bnt. *Fl* *extrap* /
denmm protteunc duo *vel* rrw, looga & iipuft.i, vmdia ad modum Violz bulbot: *majoris* & (plet-
ilaitu [NartiffinB fimi]w, maga muciyiuta *Attr.*.) *Bulhu* lubeft cepacciu, oblongus, d niutis tin
nicis coinpoituis, eswnuj nigncans, inna albus. *C*ptul**m parvum oblongum *ftmia** cotuuict
porva, nigncascia, tompreila.

Maio menle floret; c Virginia Americc Septemrionalk provincia ad nos dejatuscft^ *ubi co* *Tempus* *fl*
pioseprovtnii: in horns noftns rarotloretj nee ccclo aut lolo faali allie! .it.

8. *Noresljms Indian Lthactus fmmttt tl!*rt pwrprtjemi Fcrrarii.*

fir.

Magnitudie formaque candido lilio par est, *fitmt* folis magis contlnuach minufue refupinis
difpar, flonim namero (uperior, quibusalbo rubroq, blamic teniperatis arciter S:ptembrescaltMM.is
expangit, ut ipfus *piilcnritudo* lade & lingmne coalaUTE videamr. Albitli- nienibi *anas i-upto ill*
volucro, conivem *rs* pronum foJu Horn modice mbent, cqloraooribus tanrjm lineis in longinim-
nem vergata: in calatu deinde *ina*; inem didufia adulto pudore fuiFunduntur. Totodemq, kmli
VLHU I tubcandiore, *dum deHore*(aint hWklora fum. Imus unibiliov inms *de* *que* *»>«• Sex
ina J *anna* ina parte *ca* *ndicantia*, I *imma* in *^jnibentu*, li:n:r i navctes
itefmunt. SCI *n & medium flaw*, *rolix* B. in «•«• col *nuUo* ap *g* «nr [ftylus
hoc] Viceni pi *ive* flores, e pediculi fana craffis, binos seu ternos digita *ng* Sj ex atto Tircn-
ib, & vivo *b* *ovexis vivo* arceci, modo* in orbem *pendu* Ji, modo in lylvam prominub, necnon
particularum dehucentes fummam caulem *mane* C«W« ipfe rotundus, digitum grafui, ac prope
bipalmis ex viridi obfolefcit *m rubctini*. *FtUa* Ulucci viocrs & Narcifiina; magru'tudiJlis, ttefia o
jam flore, a latere canis enata in spum caulem incumbunt. flulbus NeapoLtanoin teporeSolkm
on *pe* exquat, Romano sub celo minis tumer; inftar Eno *fian/maiK* (ub cortice mcmbraiateo
lanolis extra pallet, nec florem fert nisi ad *tm* Pumci matt mokra adolevil. Et hi>Na
moq, *arvorum* fermentat, paico tamen proventu

Eceee

Nar-

Narcissus Nilivus Liffac... color purpuralcens Per. & prxcedeme, contra... temiore pedali 8c iutqu;... ilonim quoq, minore & nnnicro & magnitudine faciequo...

9. Narciffui Japmictu tuttU fore Cornea.

Car.M.

Inter ottnes Kirciffos, qui lu&tenu\$ invifi apud nos exuterunt, pirna itt aibicror AURorit.ii no. biliffimo huic e...

Spc&abih... in le in pedU altVtmiincni ftjbi tur^ fupoiom p-irte vircm, inferna 1 aao. atro-purptu c... gemma tofidern peti"U* hxrentes in inibelhm diipomintur,...

luc reloluu & pmguihumo (er,tur; nam li Jicca auc tonfeiU poltu I... anRufta & cxigui vtluui .ii.una fulc.itA : (uxca Rons centrum J. ... more Luui montani

niixtunr artificio quifquam atlcqui ncqutr, Icdnecullis ludcniis florib. ... ram obfervatum eft. Nam prater eximium hunc colorcm, quo intuctium obnirum hebetat, fi...

10. N*Tiff>t pMtnlits lnJtiut ptjmtb*i Cornv.!

Car. at.

HtJix ell carnolior majorque bulbis: fola octo aut ioi cirij palmum longa, lata pollicem, glauca^ virentu, noti... Inter qux non media* t*ntit, fed rclit&is ad Urcra folm nudut & liber eruu...

11. Km eiffu ludi-it *>*<* duplex fr*(tx & ferotmus Comur. Am N*re. btktu tftus rttitt CD?

Prxocior flori-us eft ex rubro cuidicintibus & oJorabllimis: caule duni Icmuia nuturefcunt vi...

Alter veto ftircni edit poll Arcturuni, tongc rubenorcniij fed ignarius odoratum, caulefemper...

Comunem autem liabcnc florendi mclxum, figtudenti uthufq, caulls cut finctolus, fubnari...

Jl. Nrttjaf Indicia flm Llitw \$k*riiur Ferrari. Am Narc. M. tblmftUntf, ftUo, bulks va...

FITMT.

Bu! vs longè Scallino m ajor venirem ptopc ronimut: terrugineum & quamvis tencu t... tamen corum fopernaducit: mum pirteni ut in botr>-ode odoratu Hyacintlio, protuberantem,...

gintiflimi forts, vuh: o convolution mtiMn lilio xquales, nec abfimides, jaippe pfionniccorubore colorari, Sc folns quints natirash cirroi reflsjs cil.imiftr.iri, exteriors folio aim fVunintbus iuiuir-Rente, qux t&tii canfpicisn.li Jt.imina fij extant: Sena lx.o colore n. nicaa in totidem .Lrfatiles «pie» primumfiivos & grandiuibjloij deinde coittraiftwres, iibter iibfufculos, fup; i exalidos & vdufafai. na conl; sfos degenerant S^ptmutn fine apicc pifilli facie, pro ductus, craffus, longi iimiiij, rlinuU interfec-inte fnatum, (iimmiparte rcoirvurn, [writer purpurar, Omncs inter ij florcis ternis quaternid'i; digit is intervacinibus diftant. Per [>arte; iichi(aifit, ncep- for ante d, flo- rcfat qulm vernenc unirerlL Scniuni illos non toncrahir, \- infulcat ac demum decus. Men- ft ipjla viv Sc ver Aummnal; Scprembcr cooilim parit oriens, perinis occidens. A b. "iim in- terini, ttuoguU t; A pita grande faint, pleraq, inanii, perpauci nonnulto ill omni feminis radiar-. 'nto facta, five quid peregrina planca nofratis auouiuu fiigus reformiidat, live tinod cadem apid nos non d um rooulb: ftrainditiris eft. Folia circa O&obni cxirun\ apparent floce noI provenic:ite : iri cju(3cmproventu Ibruis, cittremo fd. Novembri menfe exiftunt. Pauciora initioj lex wii. am flop prolu(2re. Longitude* illis bipiimiSj Lititudo pjJmahf, tiimidiatl f're d'ici ihu cultri cr affi- tud'o, retufa forma, lara viriditas &c fulco iwr or.is rubore ctreumlici ; corpus humi erraticum, U- t&q, proaimbens j ita ufque ad extre IUII jVüimn iive ad primus calyres {Kod^b.

13. Narcifus Indkm folio Ituij/ima tn^uaro CB. Nitre fivt P**tr/itturnOritntiUSmrt

CAP. IV.

De Cthhko-Marciffii

Hec planta radice Narciflim refert, verum cum (fare, turn florendi ternporc aliilq, iccki enti- bu5 Colchicum; ideoq, de urroq, paraciparc, vd inter utrurik{, ambjgercviiiictur.

l, Cdeiummimprt CB. Wtrciffw Prfrw Qui'. Park.Ger.

Claf.
 *Argo plant L^cftKec phnra, & Honsduntaxaiepiculo nrwliu, velsiri Ciocum Cokrucu na; cu lit ergo £ membranacao cucullo tan quam ex valculo aut theca fit oblongis, Croci aut Colchici floe Uxtitulut, fint tollii coilltons, ex flavo pallidcentibus, quorum una interiora paullo angulioia funt, cswrn.i Litjora, 6c (umnio mucr r nonnihil incurva live ~~extera~~ quandam habentia, qua m- teriori m mucronem ampleduntur Si coinprdtendiint, ingr.iti Ckui i & Papave n quasi virus redol- entis. Stimma fex medium floreni occupant, in foliorum ungubus nata, fed interiorum folorum rdiqus longior'. Exilit e msdio oblongior *fijlm* BT *capit*, & sine capite. Folia illi funt Homercalladi Valentine non multum abtimilia, lit.i, pl.ma, cjtildcmq,t um illa coloru, h. e. ad aruginem tenden- fis, qua: utplurinwmi tonvolvuntur, ai lele circumagunt. Radix crassa, bulbosa, a bali (que multis fibrisonata est) it stim exuberans, intus candida, fora pallidior quidem fed aliquantulum etiam nigri- cani./Kftate breve inter folia caput, pollicem crallum, brevi pediculo inhazeta & fummi tellare vix crumpen^ terre alioq, otics obic rvari, quo I aim inane cJi- r, feminis confpiciendi spes omnis fibilata. Sub i mem SeptentbrU dlos c: ncriz Clafio.

i. Ctkbtatml*tnmm*j*i CB. -Narcifus Atramala major Chi iCPartGer.

Claf.
 Praecedenti valdi aii nis est, tamen neuter flore Narcifium amulcat, fed folis folis & radice. Qyina iutem aiit iewx. \xhc: fola oblonga, pollicem lata, pra viriditate fore nigricantis, Splenden- Az, hum) picininqj fparta; inter que brevis exit *cauliculus*, viridis, rotundus, vix fupra terram fo ac- colleni, aii irdidct/w, fuperiori forma Jinilii, fed brevior, r avi omnino coloru, ex membranaceo fbiliculo emergens, oijus extenora tria/i/w intenoribus nujora funt, eique velut ampleduntur, omiua autem inucronc lum nwgii orticulato quam Perfid tblia: fexjtjmmtt I un apicibus ornata, tafijlm e flora wnblico crunipunt. itWix craJU eft, rotunda, intus Candida, fora, i: Narcifium, ni-

Pu.
 b hncm Augiifti &c Septembri germinare incipi: &c plerunque floret. Gaudt mwnti un Hiipanii praos. Invcnitiir tofaj arifjuilionbis.
 ;. C*LbKxmUat*mmn, CB. Ntrctjfu, Aufuaaulu mmr ClaL Park. Cehbuum f*rv*m mm.

Octobri menfe, quemadmodum Perficis, nudum e vagina la membranacea profert *florim*, fex oblongis & angulis fuis conflantem, non equalibus, nam exteriora paullo longiora & latiora funt, omnta into n mucronata, feruifavefcentia & Splendentia, interiora flava, ad majorem colorem magis accedencia, r lava/^w- media medium florem occupant. Odoratus est hie *flor*, foloque pediculo inni- t&fm, fupra terram nor: anollitur: Flore jam marcido emergere meridum incipiunt folia, utpluri- muraaudem incunte vewrinnta *capit*, terna aut quaterna, plana, viridia & Splendentia inftar folorum majora, fo i ions.¹ ati^ultioraj 8t pr • ter aliorum motu lale contortuq, & circinoforum inftar convolvuntur. *tmr** tere ill CJJUli uncialibus fore trigonis, rotundum, nigrum, cui adhaer al- bicans quidam & fpo igiola ab UVD latsre nuteru. K¹- *capit* paullo, nigra tunca tecta, inferioroque fede tenuibus fibres *timilia*.

4. *Colobium latum varium* C. B. *Narcissus varium praecipue* f.a-jo fitm Gk-f. Ger. cnuc. *Nar* of. *Trapezantium flore lato praecipue* Park.

Cluf.

Quacema aut quinaprodi... it filia, plana, digitum patie lata, surrecta, viridis, Na ricii medjo-lu- i felionim imul ; inter que prodit caesia fere dodrantalis, plana, non valde firmus, levis & - o»- dis, fuffinens fommo • affligo membranaceam folliculum reliquorum Narcissorum modo; e quo emergit unicus • affligo coloris flavi, penultimo in loco defcripti Narcissi formi non valde diffimilis, lex etiam petalis conflans, fclanciatim longis, femunciam latis, mucronatis, quorum terna intro ion paulo longio' a sunt externis, totidem ex umbilico pro' wunobu' flammibus candicantibus, in fla- vum apicem definentibus, atque illozum quidem tribus brevioribus quam cetera, cum m. • jji> ffU omnibus flammibus lon; am, & multis tunicis conflantem (quarum internae albae, exterum vero ex fpa-uox> mgriunm) &: wiima fede mules flari pra- ditam

Tempus 3
Locus.

Przcox est hoc giniisj <• alio Februario mense i >rem produxit: Pauvto nimulm est, ad Clafum a Jo. Pinello: Pimplonuz Coniitaiuinopob acce; it, Narc G Trape^L: nuci timo, unde verifimile cu circa Trapez.intiu:-. l'oirtaacura invcmri-

5. *Cvhuo linn ftmsiu fare alia* CB, *Synganwm Flacx* Cluf.

Cluf.

Supra Valenriam dlebrois 5c pttrofis lous lufdtur qiardam pUnu hv\acca, lino foliis pandra, humi fritis, !< affluca is, ex viridi rug ricantibus, Narcissi n.ijoris A Autumnalis folis tere fimilibus, fed quibus interna parte fecundum nervi modii longitudin. m alia quaedam latifcula linea ducta l est. R. de bulbosi-, niiltis tiinich conitam candicantibus, & lenti vilcadique luca plenis, in- fran atrinque lax>rii, tor is 11; ro cornes obdocti. Caulis, referens Placa, pedalis, levis, aliqnot in lummy jLrti LJU xmulos, caiviuioi ten, ilcin>lc rotuuU capituLi, m <iu'ln. extigum contine- tur /<>e>.

CAP. V.

De Leuceie iidhofe.

Leucoium bulbodun i Naroilo & congenenibus differt Gilyc is in medio flore carenti; , flo- ribu* ipls nimfKiUb, peadul0> pculonun ipiabui vet omnium, v el aliquorum virentibus in pkntque f pecc^us.

1. *Leucoium bulbosum vulgare* C. B. *bulbosum hexaphyllum cum uno flore, raris lino* J. B. *tuliefmm frothum* Ger. *bulbosum praecipue majus* Park. *parad. The common* greU« Ctt

Ip ftotoriic bulbous JOiatt.
Cluf.

Tota planta quam Leucosum minus triphyllum crassior: bulbis multis candidis tunicis [extrema umen fufci] conflans, & candicantibus fibris fimiliter capillatis, sapore viscido, acrimoniam vix no-Ublll. Folli poiT,acca ut Triphylo, sed lenora & splendidiora, tria, quatuor, quinque, viridis admodum & nitida: Caulis dodrantalis, cum flore angulosis, striatis, cavis, nudis, quem simul cum folis investit etiam ad medium usque vagina alba. Flos plerumque singularis, interdum geminus [raro tertius Clufio] pediculo longo appensus, e vagina peculiari in medio membranata, ex- albida, ad latera crassiora, viriditate, natis & deorsum spectat, exigui cymbali modo, major quam triphylo, ex folis sepius lex, unicusque septem & octo [hoc luxuriae foli debetur] cetera candido, mucrone acutiusculo, extrinsecus macula viriditate notato, intro leviter reflexo: in medio apertus lutei lex, modice inter se distantes filium unicum candidum ambiunt. Odor ex non ingratus, qui Fuchio Violarum purpurearum perhis refert, Clufio Oxyacanthae vulgo crealite odorem referens. Succedit flori septisalem membranaceum, Pyri modo (ut ait Clufius) turbinatum. Somen ex candido flavescentis oblongiusculum, durum.

Locus.

In imbrofis Helvetiae ad sepes in pascuis montosis plurimum observavimus Martio mense flo- re: SJ qinn & in Italia prope Taurinum, sylvis montosis, hincque inter Ballanum & Tridentum. Prove mcinfiipo multis Germaniae in loca, v. J. B. Maio mense evanescit, radiceBttnnini in terra superflite.

C. Bauhin HIS Leucoii bulbosi alerius flore patulo meminit, cui folia laiora, (lorem nuwrern t ai- tu

2. *Leucoium bulbosum minus triphyllum* J. B. *trifolium minus* C. B. *bulbosum praecipue minus* Ger. *Park. The lesser early bulbous* Diolet. or *Snow drops.*

J. B.

Radic est bulbosa, parva, multis tunicis albis constante, externa nonnihil nigricante, multis fibris longis albis appensis latis parte donati: Gestu lenno, amaro, subacri. Caules inde exurgit sin- gularis, angulosis, una cum folis vaginae albi ad tertiam usque longitudinalis partem inclusis, tenuis, concavus, trias, dodrantalis, aut paulo major; quem fere ad summam usque consistunt filia bina, porracea, glauca fere, nec ita lucida ut Leucoii hexaphylli, vel (ut ait Clufius) colore argyreo et & quod-jd-uunwdocu; raco. Extremum caulis tenet fua pedicelo longo, nutante, vagnala aliquo- ligue

utque indu(r), i. n. c. p. r. v. s. f. o. l. i. o. l. i. s. t. r. i. b. > p. c. j. u. i. t. i. s. Lattjis, :: omnibus obus, alia interioribus di-
 plo longioib'js lateribusque constant, in <sup> q<sup> uis ali<sup> tra, alternans sibi breviora, angustiora, et
 gidior .t. levi exfura in fumino, in quo extrinfecus corculi ex d. h. i. t. o. v. i. r. o. p. e. n. e. l. u. c. o. l. o. e. t. t. i. g. i. a. t. u. r. a.
 mtrinecus discorantibus per fo. Uori lonj> radinem alternatim stris albi & viridibus. Teclis
 tlotis nodum obtineni aqua [utci, ij]>LiufLii i. x. f. y. l. i. s. q. u. e. e. x. i. l. l. i. s. c. a. n. d. i. d. i. s. i. n. t. e. r. i. o. r. i. b. u. s. f. l. o. r. i. s. f. o. l. i. o. l. i. s.
 Δ•midio breviores. Florem fcqtur eapimbr ur Narcillis, oliva; virnos (mti
 pene a pnmcsj in quo fmat candidius ilcero f l^ncio bulbolb hexaplylio aim i. n. o. f. l. o. r. e. r. a. p. i. o. f. i. c. e. r. a. p. i. o.
 IIS biuo.] Flos notfts (i conrali", & cum sole explicat imr, criam (xtra tarram in hyp
 mini iindii fl(K cxir tiuas h. bec virides & herbaceas costas ad latera, quibus adherent membrane
 3Hiculum_eHia;ntts. Turn Iwrba tum r. idtx odons (iint mgratij ad LJI
 oJor Cldto nuUus, auc pc; quam exigua.

i'brtiar'n i monte flore, inter ipsas interdum nivcsj umle a; ad nobis ii flores ^uotQ b?Opsf
 id est, gucta: rivales appellatur.

In unily • o. l. i. a. d. r. a. d. i. c. e. s. A. l. p. i. u. m. d. i. n. T. r. i. d. e. n. t. u. m. V. e. n. e. t. i. a. n. t. e. r. f. a. c. i. e. n. t. u. m. o. b. s. e. r. v. a. v. i. m. u. s. U. b. i. q. u. e. L. o. c. a.
 fcreperti tam Anglam in hortu colunt, radicibus numerosa foliole secundis.

. Ltteo'mm bulbtsfxm frxcex tyzanutium Cliiti Ger. Cnl. C. J. B. tw. f. y. l. i. s. t. r. i. b. u. s. m. a. j. o. r. i. s. C. D.
 Mbofum fr*cux minus Uj%imttunf Paik.

A priedcenta vis alia in requam partium omnium, [radicis, folii & floris] magnituiine i. d. d. e. r. t.
 ut cleclripooncm CLS tjiut 11 abent in Claf. b. f. com pcedentis conferenti patebit.

Byzantio miiui cii hujua bulbuij '• arpoli etiam a Per. Imperato, e monte Virgindo eruta. L. o. c. a.

4. Lencium bulbosum trifolium stralinum C. B. triphylion flore caruleo Stmtri J, B. Lencium bul-
 boji pacoia Byzantini varietas Ger. emac.

In AIUmii ConAarmnopoi r&licns cruit Somcerus,

5. Ltucoium bulbosum vrnm twim*m Clul~ Park, kulhfem muifrlium -venxm C. B. t*tf#-
 fum 6. Gsr. ciaac.

Hnjus bulbutn i Nbobo le Quele redimebat Clufus. Proferebat vero ante hyemem terra aut
 g. ateina, folia, parie capillaria, us non valde diffimilia que Lencium minimum autumnale ha-
 bere dixi [Clufus] ea sequente Aprili emarcuerunt. Extremo autem subsequente anni Maio na-
 tus e • illius exortus est cauliculis, angulosis, semipedalis longissimis, summo fastigio membranaceo
 cium sustinent folliculum, e quo hinc exant fasciculi, longissimula tenuibusque pediculis suberiti,
 deorsum instar Campanule perpendentes, sensilque foliolo constantes candidis, quorum terra inte-
 riora lanuicula, externa vero paullo angustiora, & fori secundam exortum circique capitellum
 dbmbentibus, iLvis /itiminAm ombiliaim occupantibus: tot: s elcgin- erat hic floiculus & suavis
 odorLs, perfrabitq;e in fiu eleganea quinos & \-fens die s: nullum . ero dedit semem, atq; subsequens
 hyenu plaiit. ini conupir.

6. Luevüm buskfian tolytnthmtm mraüü formi f. orihw mmtrivur). B. bulbfam m. iyt • aljas-
 thumum Ger. bulb. • /tm* ;ia i' truti'ür* ParL bulb, nujm five tn>lii, HüTum; <JKC. : aljas-
 urum Pilsa iatuint. t. B.

7. a. Lencium hoc ut reliquis ejusdem generis formis, ita tota mole major, radice crassa, longè majore,
 bulbosa, que multa succulentis tunicae ac etiam filis constat, sapore amaro. Caulis tollit unum
 aut alterum, pedalem, cubitalem & sesquicubitalem, crassum, viridem, qui ne plane rotundus sit,
 impedimento est utriusque vel altero tantum latere elata costa acuta. Folia Narcissina, virentia, cau-
 ran 1 inquam vagina inferiore parte completentia multa [Cmlio quinque aut sex] carinata, se-
 monciam aut • • ciam lata, mucrone obtuto, qnorumalii pan cum caute alt' tudine affurgunt, alia
 infra subsistunt. In singularum caulium cacumine ad geniculum e vagina oblonga pendent foies
 Ixuajii bill: oti hexaphylli timiics paulo minores, numerr'i, quini, sens aut etiam duodecim, rimi-
 nabili modo penduli, sex equalibus foliis constantes, quorum eorumque partem virides ma-
 culis inficiunt, sens tota staminibus flavis, modicis lacteo stylo, apice viridi insignis, odoratis
 pediculis aliquando palmatis, aliquando vix uncialibus, praesertim antequam fior expandatur; hi-
 que non simul se explicantes, sed alii expansi & tere marcesci, alii primum e vagina pullulantes
 produm occupant. Floribus succedunt magna & trigona capitula angulis obtusis, Peri in modum
 tere turbinate, in tria locamenta divisa, quorum unumquodque duos feminum ordines continet,
 ut in alia bulbosa.

Serius superioribus plerumque germinare solet. atque Maio demum mense flores proferra
 Plantam hanc in palustribus prope Pilsa Etruriae urbem copiosam observavimus: Clufus in uligi-
 nolis pratis supra Werastinum in Pannonia interamul: Oriat & in pratis Lattre vicini non pro-
 cul Mun'plw.

Temp*

7. Lencium bulbosum Autumnale trifolium Claf. bulb. Autumn. minus trifolium • j . n. tu. \
 Autumnale C. B. Park. bulb. Autumnale minus Ger. emac.

Claf. Cauliculis est palmari alto, gracili, unicum, incedunt alterum & tertium ferens fissis, omnino
 lacteam, pedalem, sex petalis constantem, & staminibus modo formatum, majorem, mgratijque
 gustis, in quo pallia p. a. a. Flore jam aperto demum prodant quaterna aut quina capillaria
 viridia,

viridia, fe. lia. & tix bulbo <3, (an crassa pro plur uccxdiu Ec, c nrakts glutinotts tunicaco in pac USC amara, "qua: candicanre membrarw integitur. *

Lattu.

Extrc miku i qua est, in nan con procuij Wuwi, ad tfumen. Ail am fitum lub fincm Oa obru & Norvmbra :••*« cum soo : Crubr. Chama.

Frrit.

De Lciicoit bu] bosi temperamento & v : * « * ? • » « nealium : xefiitx : c, De folius Erangdw [Verb tiuncwj L a. locunda spociei t ; mpcraracnto & vinbus nobii agendum: quid enim alia potius propter ipsarum raritatem explorare uobis non licuit. Temper iinent crfto bulbus est calido & sicco secundi gradus initio, praeterea libellum partium, vomitu: no, i novet, quare in quibus ventriculus crassis & viscidis humoribus est infarctus magnopere prodest. Urinas cicc, mclenteriam obstructionibus liberat. Floris minus calidi sunt, sed partium subtilitate prxfiant, sedoreli, movent: tam flores quam bulbi ad ionthos delendos, & scrophulosos tumores discutendos animoti conferunt, sed bulbi floribus praestantiores hac in re.

LMKOIO b*thf> affau duplex C. B.

Bulbus qintuor ant q'uing, fiors gefUns in modum Campanula: albz Claq. hif. Altenim adjt bdbum Horc m.'gno, Ompam:!* tonni terram fpc&ante, intuj lct:o, foras purpurca Ibi.

CAP. VI.

De Tulipa.

C.B.

Tulipa, cujus descriptionem & figuram primus Gefnems, A*no 1560 in Append, ad Cordi hft-dedic, A pileo Dalm imiculo upttK, id ipfu Rdtari (c, [un, Tulip<n dicto notnen .itcpit, Idqic propter fiors cum vAleo iimilstudincm Stint qui Anemone rrt Tjwoprafla velmt, ciim ibt Ptiliatilant uitellige. ali Cyn MThodon Pliiii i. u. c ^ . cenfent: alti ad SitjTium trifolium refenuu. Dodonzus, qu: m loquut: C IJL hinas ad •nSm* Theophrasti,

* Clafus B Parkinsonia.

Genera pnma ma font: prxaKtus tinum : ferotinum akerum; dubttm tertiuni, medio retnporc florens. * Alu&re Amsdiiocarnuni genera coniliniunt, przcox & ferroanum, Umctli enim invaniannirqiixdam • cluti dabur (verba sunt Clafus) quae moxio inter utrumq, genus tnpore flf> hre fo hm, pociuu tvnen inter ferotinas ibendx [iinc <quam inter praecoces, quod & foliorum colore parit= vitentc C" eis conveniunt, & caulem procerum florentq, ampliam earum vltar proferunt, quodq, e mediarum femine ferotinae, e ferotinarum modie enalcantur, nunquam tamen quod b fervant Parkinsonia, e mediarum lem ine praecoces exortz sunt, quamvis Clafus contrarium affirmet; cui potius ut diligenti & veraci fidendum. Nos certe omnes Tuliparum majorum differentias anctates e femine pnii[u<> onuiUu liifpicamur, ideoque unam tantum Ttihparum majorum nem agnoscimus.

Tulipa Nae.

n. Tuliparum characteriier funt Cat. les foliofi, flores a>A hexapctali, nodi, in fingulw cauli lti etffi, colonunpi>^hnti<|r)tc \- riaz inexplicabilis, unica nonnulluy illa agrorum creduntur de cruibui afKmat Salvoroc nofter, ni Soli onem quidem, in omni gloria fia amiftim fuifc (Juctnadm octum unum ex illis; tenuis compressa, tenuis, Lilaceorum a nnjj, umlc i nonnullits, ;lanta Libonarciffius dicitur, minus recte cum nihil ferè cum Narciffo con IIIUUI habtt

1. Tulip * fr*:tx in gener.

Clafio sic defcribitur: Unicum fert caulos, pedalem maxima ex parte, interdum ampliozem, rotundum, virentem, & brevi quadam incanilo, lanugine alperam, non concavum, sed firmâ m •dulU plenum. IIIHL plenum, terna amplectuntur flis, nonnunquam quaterna & quina, inferiora lata •adxnoduin, ui<i<im palmarem latum lineam explere viderim, & Lilacea, longiora tamen & crassiora, cannata, [iupra terrar- lese pandens & contompentia, superiora autem minorâ & angustiora, caq, vel propendentia & nutantia, aut interdum harrcta, omnia autem colore ex carulo virente aut arugineo, & velut farina alperâ. Suo uno cati inidlet magnus flos unicus, (geminos etiam aliquando vidi [hoc praeter naturam ob luxuriam soli accidit] vel summo caule compunctim nascentes, vel hibido inherentes) furtum spectans, sex plurimum folis constans (quanquam & septem & octo- nis conspexerim) epulem initio cum caulo colata, & interdum ad terram sese infloeciens, illicque decumbens, ut colubri aut serpentis caput in terra decumbentis emanat, deinde paulatim sese sublevari & colorem mutans, atcji: tandem sese explicans, & calathu cyathave instar in fundo pandens, ex quo sena, aut totidem quot foliis constat stantia prodeunt, modo lutea, modo IIIKII, ITK> do nigricantia, pediculis ctian> qiu lt.ni! mula fuffinent narum in modum variantibus. Excalo flure succollit membranaceum triangulare caput, lato magnum, oblongifolium, vel brevius, virentiq, nupq, prominulo, quo in tres partes a summo declinente, conspicuntur sex ordines, seminis plati, cartilaginei, Lilacea fere, & circumatae propae modum rotunditatis interdum, altera tamen parte que caput centrum de interlicia pertingit, oblongifolium, apicatum pallidum, salvi aut rubescentis, & si imbric frequentiores occiderint, etiam fusci. Radix bulbacea est, interdum brevior, nonnunquam oblongior, crassa, inferose sede nonnihil prominente, sicut Colchici radix fere, fibres aliquot

aliquot tenuibus donaa, & foris vel fulvefcntc, fed imgna c...
qua; interna paite lanuginoti eft, eaftanearam co; t...
plena, ut mollifimc recubct bulbus, qui lbulidus cft^ firmus, i...
gultantique dulcis, faltem non ingratus.

1. Tulipafr:-:na.

Defcribente Clifio, majoreft amptimdinc, cubiutam cnim & tripolale...
lern, firnriorem, ovtflorem, lotun'i...
lugine, foe effloreisiv; a quadam alperfiu1. Hunc-iltiirrutim dmpclclunciif ^lucerna pJerumjuc
f...ta, nonnunquamquina auticna, cannau, firnrioraquani in prarooc, utplunnum accti, non
nit.inria aut AJ wrram inficxa.. atque o is incerduraado r... ur(inuoi a vidczant r, iJiquondo
oninia atquall Summo cadi, qui pedali vz! majore plerunqne longitinline, imo. ctibitali onnun-
quam nutlus (upra folia eminctj unicus iniitict Hos mafmus fi oblongui, o-achi Ill odo concava, lex
foliis confans, cxtfome aptce omnium mucronato vel orbiculato, aut tnbui c-...
mucronatis, interioribus orbiculatij ut in pricooc, & c- contra: tput ur in illi...
branaceum., cralfus utplunnum 6c prominulo ventrej quo A lumino ddiifcnc, ...
plani, cartiLigijioffj mlvi aut ruhzkams, majorilqoe cjiuu in praccoc cSi^...
prxcoci fimilis., kngioic tamen majorique UUbo coauac plerunqne, in...
venir.

Caulis huic interdum *vj1*>Ot& f& ramofus eft, quodproculdubjoacddentinumdlj fc lolt ubcr-
tati plantarqne luxurici tribuctniuni.

In hoc genera tain Inligncm colorum vancutoii nmn deprehendit Clufuii, fed fl>v4i duntaxat,
vd ad auri eolorem indinantw, & nibraj unguibus ila-taicf, yigib, orbz anreo...
odorato vd inodovo (tore).

Carerumhamm (erorinaram Ttilipaniam, qux vel Ravi, vel nibri coloriv flore prrditK (lint nuLU
haftenus (intjuit Cluliusj viricatcm in iatione nulli pepererunt,!^ quod interdum in ex rubrx femine
flavz, contra ex tUvx (minu rubrx IUU lunt, ungtulnu lxpnumcio v.uunbus.

}, Tnltpa 4>h'w.

Ttilipr medio inter pnecoem Se (rotinam temporeflorentes, viiklicet qux n arcefcen:c price-
cimn flora fuo* explicant, dlcrotimsHorere uicpiciutiUi jnm leneicuac, imo interdum cum illis
."imilorent, Dubi.. quodammodo appellari poffunt, cum utriufque generis naturam referant. Sunt
verO inter eas nonrv... quarum flores & ipsa planta ferocinarum magnitudinem aequant; aliz que
pr...ococ non li... perant, nec illis forma funt difimiles, & ille quidem vel ampliffimo floribus prelatz,
vel pzococ non majoribus: funt etiam quardam i prcoobushuiniioie-. Harum differentias fe ob-
lervjras tatcperr... Clufius.

Ut Tuhfv Olfervathnti gttXrtltt.

Nobis non videtur opera; pretium CnguUi numerarc, nmlto minus acairatiu* dcfcriberCi ciun
tas pro fpecie diftinctis non habeamus, quippe quod...
rum latum eadcm perpetuo varietates producat. Hinc ramquounki lsimnc exorientibus
rum numerus infinitus, certe...
micriiit; aut indeterminatus eit, unde etiam conftat eas fpecies di-
rinAai non die, cuni fpecierum numerus in natura certus & determinatus fit, ut * fuperns dixi-
ritui. Quibus...
l«, fi in «xk;... loco abfq; cultura diu refitare linantur, degenerare paulatim & colores mutare, &
variegat: unicolores evadere. E contra habuille fe refert Clufius Tulipam cujus flos cum pro-
dentibus annis elegans ruber fuiffet, poftca varie conmixta ex rubro & flavo inter fe confufis co-
modum

Libus, modoflavo quali foliuniotcupante, tnodo rubro vel utnx^ ra<tian:itperonu dif-
rrerwe fuent. Simiker fUvamqua* tfavum ficrubrum, & purpureani qua: album & purpur.
colores vane inter le connuxtos 8c radiatini folia (ccantes habucrinc Ac illud criam oblcivabu
uon niut.in illi (ibmde torn: ; voluule umen antea hac caloruni
Hinc proabunditer colligitur colorum varietas... Tulipa morbu
ma eife, quam luxuriantis nature lala, debet

Præterea, obfervante Clufio, non omnes Tuliparum flores diu in fua gloria degunt
flute perdurant; verum nonnullarum magis caduca brevi marcefcunt, aliorum firmiores funt, &
colorem granam diutius retinent, præferunt ferotinz & dubiz: omnes certe rubelo caelo fele contra-
hant, & pluvio facile corruptuntur, etiam ante matam expandi poffunt interdum, fi continui ca-
dunt imbres; contra temperato Sole illuftrati explicantur & diutius confervantur: at vehem-
eniam ejus ardore nimium excedi, & fvo humore exhausti facile deficiunt. Neq; omnes verticol-
tam pzococes quam ferocine, fingulis annis eandem coloris gratiam perpetuo retin-
varietate fapuis obfervari. Infantias feu exempla vide apud Clufium.

Cæterum, pergit Clufius, tameti femibus terræ mandatis Autumnno (inutilis e...
& tuberolanum maxima ex parte verna eit (ano) hujus plantæ genus confervari folet: interdum ta-
men & nucleus majoci bulbo adnata propagatur, fed nulla inter pzococes Tulipas fe thoe rubca &
alba, omnium autem maxime ferocina rubca, que adeo fecunda eit, ut etiam femine lata, & vix
buna alu >proles generet, biennio aut triennio antequam florere incipiat, quod etiam faciunt ple-
roque; dulv. Solent enim omnes Tulipe nondam adultæ, & antequam flores proferre incipiant,
utplurimum Inguis annis recti & quali ad perpendicularum in dohrantalem & palmarem abiffimou
profundius

profundius descendere. (Apenninas excipio & quaedam alias, quae non in altum, sed in latas & obliquas antequam florere sint, proleque longa vixis descendentes spargunt). Serotina autem illa & dubia jam dicte etiam in veteri bulbo exuvio aliquid substantiae relinquunt, quae in alium bulbum efformata similiter in exuvio substantiae quidpiam relinquit, quae in alium bulbum transit, ut signa cum dexteritate quadam & industria trinos & quadrimos etiam exuvionum vestigia sequendo, nonnumquam velut catenam aliquot bulborum coherentium, & ex primo exuvio ortum discentium inveniat, haec interitum accidat, ut Radix serotina jam grandior, nondum tamen plane adulta, in raris

Tulipe Apenninae sive Bononiensis proles in latis spargat, ut non lamel observari.
 Memini & bulbos in infima ala, quasi summa tellure natos, in serotinarum & dubiarum generibus praefertim, qui telluri commissi, eisdem coloris cum matre florum subsequente anno protulerunt; eundem etiam colorem retinent bulbi matris aliam. Ex seminibus vero quae sit propagatio plane incerta est, in praecocibus nimirum & dubis, nam serotinae magna ex parte suam genem conservare videntur, aut si aliquam mutationem adquirant exigua ea est, & plerumque in unguum & flammam varietate, aut coloris intensione vel remissione consistit.

Solet caulis e medio bulbo erumpere, sed ipso cum foliis jam marcido & siccato, si bulbum eruas, ad latus illius adnatum conspicies, (quod etiam evenit in Iride bulbosa, Colchaco & congeneribus aliis) novo bulbo paulatim succrescente, & totus plantae locum ad se recipientu, quo tempore commodissime erui potest, eruique ad servandum adservari, & in alia loca etiam procul distita sine

Omnes capsulaeque generis Tulipe, quandoque (In raris non Ierunt, sicut plane sunt, & unicum folium singulis annis protrahere solent: at si dum emerit sese explicare incipiens secundam etiam emicantem apparet, illo anno florem prolatum) proles est, nisi pruina aut abud ab in Jcdortim crosse incommo- dum eam interceptat.

Petalorum figura in Tulpis variat, in nonnullis enim: Ouuu acuta sunt, in aliis omnia obtusa aut subrotunda; in multis tria exteriora acuta sunt, tria interiora subrotunda, in aliis vero veris interiora acuminata, exteriora subrotunda. Praeterea in nonnullis petala omnia longa sunt & angusta, in aliis breviora & laeviora. E praecocibus nonnullae flores habent peramplos & serotinarum ferè pares, alie eisdem parvos, nec Bononiensis Tulipe majores. Quin & petalorum fundi in Tulpis plurimum differunt, uti & flammae & apices, in aliis enim nigri sunt, in aliis albi, &c.

Est & in florum odore diversitas, nonnullarum enim flores valde odorati sunt, aliarum per modum modici, aliarum odore suis vehementi sunt & ingrato.

Absent Parkinsonus se nunquam observare potest, qd quod alii fonsant, i semine praecocium Tuliparum modis aut serotinas nasci, sed semper praecoces, miiito mima praco ces e sem i modiarum aut serotinarum, quod argumento est eas specie differre.

Quod ad electionem seminum, Chiusa e praecocibus ex albe semine prognatas plantas insignem colorum varietatem pra reliquis nancisci experientia & diligenti observatione didice. Parkinsonus pro semine inhibendo albo puro flori praefert eum cui aliquid rubri aut purpurei admiscetur; pra alia autem ad hunc idem purpureo flore insignis semen commendat, post eum purpurea marginibus alba, tandem rubra marginibus flavia.

E modis pro semine praefert albas flavas, porporea* mbrn, flavas & rubras omnin, & repat. Albi pura maculosas praepone. Verum in his fundi flori praecipue rationem habendam monet. Nam si flori albus sit aut albidus, maculosus vel strilo coeruleo vel purpureo, haec omnium longe praestantissima est, ad producendas ex semilantia colorum varietate & raritate spectabiles.

Tempus serendi Autumnus est, ut superius e Cuiusnotnumimus. Pjriofon.a fawiiium poti im Aummi truno, aut cum femuu Mm pc itas matu, i iinar, pra-coti ortu interdum ve- anseverunt, & supe TVC-

Semina non minus densa seu crebra serere convenit, terra laxa & opulenta. Nam quo se pinguis & uberius est eo major florum elegantium & variegatorum proventus sperandus.

Praecocium Tuliparum folia observante Parkinsono, hac nocte a dubiarum & serotinarum foliis discerni possunt quod e terra tunc exorta, pediculam cum inflexione ostendentis, cum dubiarum & serotinarum folia e terra nunquam penitus emergant & appareant, verum inferior eorum pars terrae perpetuo immersa haeret.

Tulipe e semine orta cum jam trima sunt (nonnullae etiam sunt si solum & caelum faveat) e terra eructae sunt, & vel alio transferenda, vel eodem loci iterum deponenda, postquam paululum exsiccat & mundata fuerint; nam natura sua alie in terram descendunt adeoque elevande sunt subinde versus eius superficiem. Cavendum autem ne nimis dense serantur, sed modico spatio interposito pro bulborum magnitudine, ne sibi mutuo impedimento sint. Satis biennio relinqui possunt, aut singulis annis transferri pro libito, modo id tempestive fiat, nimirum circa finem Julii aut Augusti initio. Quinto plerumque a serone anno florem producant, rariis quarto, interdum non ante sextum & septimum, aut etiam forte octavam & decimam. Ad Tuliparum rariorem & teneriorum bulbos a frigore & pruinae injuriis defendendos consilium Parkinsonus ut paulo altius in terram demergantur, & eorum moerem probat, qui hyberno tempore soli superficiem stramine operunt.

Tulipas transferre cum jam fibras novas ex ima sede seu basi cogunt, (hoc est a Septembri mense ad florendi tempus) valde periculosum est. Verum cum defloruerint, foliaque & caules exsiccati sint, tutissime e terra eximi possunt, & per sex mensium spatium, modo in loco sicco, solaribus tamen radiis et ventis minime expositis fuerint reposita, extra terram servari absque insigni noxa.

Notandum haec in generis bulbos omnes quorum fibrae aut quocumque emoriantur nova subnatae absque ullo sermone vel injuria e terra eximi posse, quo tempore fibrae emarcuerunt & nove den- dum

* Paricula
 non sunt
 sicca.

dum fubiuu: (une, & IJ) extra terram -Ti, (tic jam dixim-is) lirrvari; qitx vero fibras parp;tuu f...

NocamUtm criam Tulp>as (i colnrum degsntus din tu eri nec degenerare velis, quotannis e terra...

Tmitani quod de Tulp.i: bulbo offcecvay it in go nioii filings Ferrari- 5 mil... In jnnmo (inquit) bulbo, uncl cmlis & An eminor novus quoque bulbus, vclm gemulus...

Sun: le quid a Clutio oblat vatum fiijuuuii propoltnr... rem d.u-: peripexilla >idaur, AUC certe meodun... Ejt tr... Tulpe, ut & aliarum...

Bon: tatis notz in Tuliparum floribus sunt, i. col... "cs petii.! peractra itej & utrmque conspicui,

4. Tulip* dubia ptmitio J. B. Clif pumilio Unifdia rubrt C B. Park, parai

CM.

Pedalcm aldtudinem non fupcrat, im6jtp!urimum infra am confilia, folia & flore ad preco...

j. Tulips frnmlio shtr*), R Cluf ptmlio mguftftli* C B.

Chf.

Totiplanta (quantum ex icone deprcheiderc potiiir Clitii:) palmo major noel est, fjuatuo...

1 Luiu ami C Uauitino iubco pn>Tulpa pumilione angustifolia alba i*i. qu:ntumvis (. Bau...

i. Tulip* fuMilie grsmbuo ftlw C B, fumilio alia dltr* luffitmtiA j. B- L*Jitavi<a fht Jm...

p'neialis aut fr:(cimnalis hxc plantula, exilloribus bi... angustifoliae T Wax. ftiper...

Sponce in monte D. Oue ad mans htoru proveniL... ParlunloMus' i ulipam suam Luiiunteam veHicolofem Tulip* nunori Bononienfi & lulico Cmi...

7. Tulip* motorJWM Naribngfi J. E mmr \MU Galica CB. \$*rbm*fi' (TM* Almfelctfu...

Foliu est angufhoriUui & ... ^ Jsljix) & c^le Naraffi, ... miore, delictiore,...

Muor est in omnibus Tulipa Apenmn... ^ HJVI, ddiatkn quid...

U. Tulipa

i, 7m!ifi Il/pnui KMimttf fm J. B. minor ae Utti fnrfürmfctmj C. B.

Narbonensis paulò minor est, eys florem non vidit Clusius sed Narbonensis similitem esse intellexit, qtu: oia tamen habeat fors onomnui viridia, venis porporalente cum colore peri:fi.

9. Tmif* htu B*Km**Jii I' B, Brnmimfn fort htu Park, miner, Imta Jtmlem C. B.

», ediocriter magno bulbo . rjfdita estj oblongn, fibroso, sapore dulci & grato, qualis est Tubet ^m
terre, spadeo (ut ait Clusius) cortice tacto, qui in binas aut plures soboles singulis annis dividit
tur, proximo anno flores daturus: quin & alias subtile obliquè & in latera spargit (f wx sortum que
nonnumquam in ramis in ramis... in eadem parte ab una radice (ut asserit Camer.) divi-
sum, angulosum nm<h... : Folia dodrantalia aut ampliora, ali-
qua minora, unciam lata, partim à radice statim, partim paulò excurrunt, nullo pediculo, cæcinata,
calore glauco. Flos unicuque (re gravi, Letizoni Ciceri dicti, sed imbecilliore, modeste
magnus, foliis sex constans, : ramo cui 1... : fiances
intrinsecus lutea, tria reliqua petala lutea, nisi quòd macrone tantillum rubent. In medio apices
lutei feni cum stylo trkjucto viridi, qti in iikiuin magtum abt. StntM, tdteClusio, u
quis Tulipis, sed longe nus.

Parkuifonui in Paradiso prat. Jr Boion. ensim Tulipam aliam Italianam, maiorem & minorem
proponit, qua: tameT mihi à præcedenti non videntur differre. Vide apud ip carum deleri-
paones.

10. Tulipa Bononiensis fræt bombycina fæt rubra major Park: parat. item Tulipa paulò rubra,
fræt burgomense rubra media
vires ejuldem.

Hæc belba quam Tuliparum majorum longie us ad basim eminentiam habet qualis in
illis cernitur, præcipue verò ab his differt, quòd i...
ml: restat: quin & cortex seu membrana exterior i..j| ^ H f nalli
(UC: deò facile delibatur; nec tantum rectè deorsum sed ad latus etiam se extendit, Tulipe Bon-
nonjcnJu JUCV no: descriptæ in modum. Folia edit l iu lons 1
viri: ita quam Tuliparum ferocinarum, nec pariter glauca seu cæcinata, tria quatuorve in
rem in lilligio gestante reliquarum similitem, petalis tamen longioribus & angustioribus fir-
gro, colore pallide rubente, minus hilari quam in Tulipis majoribus, odore tamen
Tulipæ luteæ Bonon. accedente.

Tulipa bombycina Cretica C. B. T
gine obtus & velut tomentosus est.

11. Tmbps hetUr VKL. h. ... tribus luttit & a ... rubra fatis Caccini Clus. tur. post. ad

Jolu hibet valdi angust^ Hyadnthinii tuw latiori okreuri vinilu. i-Jons neuJ* tru rubra sunt,
iru vero lutea.

12. Tulipa variegata Persia, C R Fcyfi fr<,x Cki& cur. post r<r^ p^

Caulis Clusio pedalis duntaxat longitudo, à Matthæo Caccini, à quo b...
Clusio, bipetalis, satis gracilis, quatuor foliis non valde latis præditum, imò angustis, & N. irbo-
nemis Tulipæ fodorum lateradine hanc superantibus, non adeò tamen viridibus, & ad præcedentem
Tuliparum coioiem magis accedentibus ac carinatis, qui supremâ parte florem sustinebat delica-
tim, Narbonensis vel Hispanica Tulipæ flore paulò majorem (quin altis assurgit, & majorem
florem libero loco nata præerat planta non dubio) sex foliis binis incus JOUR, om IU tan, q<>
rim terna exteriora paulò longiora & mucronata, foris i... luteo-rubente coloris, omi <<ncn
albis, internè verò petalis albis, tria autem interiora folia, que aliquantulum breviora, mucronem
Kibe bant nonnihil orbiculata, nique plane erant cæcinata, omnium autem unguis purpurej
macellâ insignitâ; filamenta nigra; apices etiam nigri. Bulbus exiguus, ut qui exigue nucis Avellan.
magnitudinem non excedebat, cortice luteo nigricante & fusco tactus, internore parte molli lanigine
fulcâ & quodammodo ferruginei coloris obtusa, quali ferè Rhododendri semen est, aut castoreum
cortex ipsum nucleum tegens. Sæpe in heris nostris raro ad maturitatem perducit, Bononiensis
tamen Tulipæ simile esse aiant. Post primum annum rariis apud nos florit ob æris inclementiam,
sed bulbus paulatim languet, & singulis annis minuitur, donec tandem peritus intereat.

Præter descriptas duas tres adhuc alias Tulipæ minores species habet Parkinsonus, nimirum Tu-
lipam Creticam, Tulipam Armeniacam, & Tulipam de Cassa, quarum de...
vnde.

Virt. An usum facultates cum Stryio Tulipæ præditæ sint, neminem periculum fuisse intellexi, in-
quit Clusius, Jo. Muller Pharmacop. Vienn. multos Tulipæ bulbos condit, radicam Orchidis imitar,
quibus longè rariiores, & palato gravioris deprehendebam: an verò id præstarent quod Stryio ur-
bitur nondum intellexi. Parkinsonus etiam scribit se Tuliparum radices cum Saccharo condidisse
Eryngi aut Orchidum in modum, aliisque sapore delicato Eryngi radicebus vix cedere comperisse: an
vero veneris facultatis aliquid obtinuit nec ipsum Jagn quam Clusium fecit. nec ab aliis delibisse:
quod si Orchidum radices hujusmodi facultas sint, verisimillimum judic-
participes esse. Tuliparum

Tulipanum immunerasfetiwiectesreointendorum cukor\$}uaschnunu:rarcu;diol/:ctoridlec; conliihntin P.vki:i(i)it Panuttfin, C B-uhini Pinax, & Flnrj L). Ho. Harum accidentalium, v,i- l'ict.inini cautas explLi'ivitiiii. Nee orurt ess hucrantuui ... pretium pucamtu, ... alic mltalK varietates mrvx nullo csrto aut dcSnico numero a tetninc f.ito ofcranci polfinr, cjiiai :iquis omnes tielenbero vellet, tic unico hoc fflore integrum volmiicn coirnxmerc poflft: quod idem i : alius bulbofo iitulligatur.

CAP. VII.

Dt Ornithogalo,

propter lafteum colorem qui in flore meet, flinilcii ci am in alls ant oris giUnarum obfervanti, nomen accepKfi; videmr C, B. AliipoiuUaudicc lectra duct. ttiarbitrantur. Nota: Ornithogali genencjt font ft.uuiinula riorum lata, Ipic.ita, quorum cru acurninau, trii bifidafeu lin'.uuiunt Suninu luce capirulum icrayiis feu (tylum indudui arcti cœtuuu, ctUm explicite folus extcnonbus: radix la&ea; HorumpcrAla urcria parts liners vltentibus ntxar.4.

A. I. Ornithogalum angulifolium majn fiaribm tx alto virfficuim CV> Aphelium ball-fits leg. maza. ... J.B. Spiked Star of

J.B.

Gw.~4fl>baJ*lt Ifuihjm Galmi, five Ornithog. m., fart h. albus, subdalcii AlpboJ. blbufin Dvdant, fivt Or*ttm>g., JOertjlcftm.toitft a orrenirt) folurr.

Similis Ornithogalo Monpelicnli fpicato pugnum inplet buj i quo exeunt pnegrandia fdm porracca, cannata, humi fert futa, (ipoc riiddo: inter vuz liirgit rt^his caul a, unioiSj bcra, nudui, teres, duobus cubit is aluor, porillimum cttlto, iaquoodranulis itnea. forum A(phodeti 5c Ornithogali fpicari, ex longii pediculi* folliailu .ilkjuouique iiclniw, col nerbaceo vcl ex luteo p-illido, odore grato, ex lerus foliis (leilatt confantkwjj in quoram medio reda (urteda; ftix, laulculx, toliis numero pares, J' totis, Mptcet (ulUnait, ex lutiio albidoSj dtpi/n/nm .1 .igum, []'e apcran .it terftitia habct plena leinine OitithogaJi albi .it autem parvum elt jugmtn, angulofum, fipoie [cguminufo, vcl [mo- fblidum, iitius candidum laporc quati Jcgurwnojo, quo maturu ; t in tres panes.

I Propi Gencvam versus Salevam montem inter fitgetes invenimns. Tlio, WillileUa cun u vayit in colic quodam cribus cis Bnftolium miUtaribus, inter vcpres, vii qui iculc Bathoniain • Clulius inter JcgctiK Paniionii fatis rrequenicju oblervavit. Floret Maio ii: Junio mcafibus, am lenus paullo.

J.B.

1. OrtHthvgalim m>)m (fcteatum tlbun IVk. \$>ejtum /fart ii.ij C, IV //««»>«n GCT. CIUC J/)- tstum stint part MvttJpt/1 } . B.

Il uk r*Jix bulboG unicaeft, nugna, Cepam imtaUj Cluflo can im prxcdentL> fl'vc firenti, 8t longior interdtm, in amplam magnitudiue extuberant: /UML law, extremo moerone atunuruto: Cauta, quantum h fuf cubiro longii i i bitubitatts, teres, firmus Lact. Iiiimnuni i.iftigiuri] am um-teur Icsiiim liapenentibus jiafibui, ftigimu (tipacii ut t _ntuiuur,quomm (tngularo um propc J Tts accedunt, ut piou fallam decerpti, intus albi, fomherbooei, apicibiii in medio itucU, fuitsprx- ter oras qua; albae fmit omnino vinJes, interiui vco tium expliciti iunt laAci omnuio emiotii. St- rut* in trugulis capitibus alten Jimilej led paulo niajus Bi oblongius, nig'um, rugolum, iivrqmle; ut in Supliiuc .igru, icd parvum .idmodum.

Inter tegetes Moiifpcliano agro fc per Hifpanias obfervavit CluGui. Maio (lore: GelaJpui. Ornithog i ait interdum flore luteo. C. B. Pannonicum alio fert Cluf. Pomen-

* ;. Qrmil**altiM m>jm fficMum ciierim Q B. fyimitMtm Cltpt J. 0. Sf; ;amm «w Ger. etna

PanUf bumilim eft pnccdcme, diluaorc xiam cade Se folib (uquitClufiuO q^uJ gemi- inxvj delctri aim bulbis permiiuin, nullo adtko nomine. cum Ger. Park. CVrtKwL^ PvmL'tZ,!*!> fi* J. & Clk. nuinque atit WX an; itur, in-

occupante ut in vulgari : triangula deinde *capita* nigruin, rocondum *femes* continentia. *Radix* sub-
est bulbosa, longa, candida, leuto humore plena, gustu primum insipida, deinde acru, fori cinera-
cea tenui membrani obdubi-
farc link : hae planta, ut nari, loco, i bi fronte nascitur, magna ex parte cum floribus onusta est,
sine folijs conspicitur, aut saltem jam ferè evandis & fla .OHK. At in hortis culta diuisa plo-
nmq e folia retinere solet. Be m niajorem aniplitudincm exac lat, spicam vicenium aut plurium
florum nannunquam on-
ferent.

Locum naulcm tit [^]at
J. Jithinui < rnthogalum Crencum, q^{uo} fl at Honono Belli accepit, huic tdem puut. Addit in
sinu floris velut glomulum esse itam tnbusonchim: S*mm p-irvum, nigrum, ruRpL,,^ ac FCIM ara-
neofu peniculus eleganter imprellu; LL rotundwn mil quod mu para modice acuwri à, durum, imm
cau iudinij upore l-
blakci.

t. *Orxhtei*iu>i* nMvww fitrxhin mrfut mvtu CM J. B. Uttfvim*& ,,,,,, ^
ximtm album J'rk. ⁿ **

Muita id ineunte vere ab radice pi-
nencle ant B^zannum: inter qu-
niagnam longimque *Jlmm* t-
mincrini, (ex rbluii acimirutts con-
flora uiliginitos f in homilo noftro Boribus qui primo apenebanmr petalorum aptco virch "
interdiurplicanrur, lexque *fimm** brevia & lamiCub, a!!u,fla.
conum eingencu, & umbilicium occupanria oftendunr, noftu vero oonrrahenoir jflorum mi
[Singula flores pediculis duas uncias longu inident, & e finu telioU obloiigi exeunt.] Flonbus
cuffis foccodunt trigona *capita femes* rocu. id mn IUK *Radix* bulbosi, crafil, candu
& lata fode multas fibras emittent. [*oliamarce*
ferua floret penitus exficcatar aut ^jjum Borercliftnat] FlorefcumAli i M . i'
dum etiam Jun-bo pi-o anni prrcociorii lut nia^U ferocmi ratione. "i<0(inter-

6. *Onuthef*l*m* Uufrltmm aitrtrn -C B. t^thbfimm CluT ct. ut. post. Park.

Ex I-*/<Y Ornithofrllr. nujon TM(ari (quod nonnulli Aphodclum Galeni cognominant *
fimiJi, ceftd *Dwult Nhfrm*, qui hmu> folia cum aiquot Ainbus xA ' me mutcbat niulu
cebat ft/ar, pedaJem londitudincm habentia, unciam aut paullo ampfius U u, nxjllu*
teniii Janueine *prdia* apparectnr, pcrinde ac Enophon folia, (quasn (tmiitcf noun, in
alianua bulbaccaruni pUnuniin folia non (emel obfen-jxc memini) intra ciu* cubiulb ail
fuu'v, Litti firmas, viridis: a cujus medto ad Juniniuni ufijue faAi)tium prooibant
& longioribus, illique crassifculis & viridibus pediculis inharerent, lex folijs nives conftantes. Orni-
thog. Ari nci fionbus parne u'o, nee m muwo rmmores, quortim vn
bant, ex eorum autem umbilico prodibant lex candida *flamina* flavis.
nu'c: bafi *capitales* modium crassifculo brevique ^{!*?*} pnedkum aniplcabanu, at ilJud
nunj<|uod lucccilu cenipons ob: ictur, jtmcn coritincnj.

LtiM.

7. *Ornithogalum Neapolitanum* Ger. J. B. Park. *cuticium magna flore, minore imato* C.B.

Folia hinc car-
crassius, satis firmas, dodrant-
aut etiam plures, pediculis fer-
tens in fingulis cauli-
ra c cupiia*^m membranuljr j,nu j fofisfai actlminaS in
f*1 r- racco trvdecntibtB orajqucAJIU* hibef'1' . *
Folia umbilicium occupat alius flofcu-
tam uou tubulam eform- ifatetMm
apicibus donata, & medius styis
ru.bmcompohuK in quo jppaLebanc lex *tt> *OmmLi*. . - . TM M W I »
km <<TO pr. .stio ciori; quibuJ f n a K T ^ K
^ona (Mftinu i a, a^<jh i r n muoronemddincentia, caulem proj*:r Kra<<cem<fcpnmemL.
/o>.w nigro ruRofo npleca. R*bx bulboU candiuns fuffid ramen wonbnai r«M i

Lati.

s caniUdf non* in amhm prxtijtx
Hae planta Hyaci-
Emam, codinque tempore car i comolo 1 lyacinrho vulgan bwryode fibrere (hibiL

t>, *Ormrbeful*}* *Arsittam* Park. CluC *majm Arahittam* Ger.emat *umbellatam maximam* C. B.
flotocr. *Ottat Arabian Star*

^{^^}TMiga habet *fitu*, viridia, ci*^{ina}, *Hyacinthi Orientalis* folijs adeo fimile ix • w
cubkalii cmopi ^{^^}>> lavis, nudis, graci-
lis, virefcens, qucm aliquot in fummo nascentes contulo oridine ambiant ramuli, fir-
fiores magnos sustinentes, Narcissus magnitudine pares. sed Ornithogali forma:
modo sub vesperam se cadentes, sex folijs proxiis aih
Coriandrum ferè referentis, triangulati capitulo nigro, pcedentem, neco-
florum occupante, quod

quod ambiunt sex alba stammina flavo apice coronata : Semina nunquam a
 ngelis annis Byzantio cum aliis stirpibus ejus bulbi Vienneam missi fuerint
 dederint : *capitula* tamen incrementum copientia senescente flore, & ex
 trahentia, ut semen dataa valerentur, paulatim contabescere ceperunt. *Radix* bulbosa, Hyacin-
 thi simula, candidiana plerumque, e multis radicibus confecta, lata admodum sede, & in ambitu fibras
 spargit. *nee.*

Floret Maio.
 Mira est (inquit C
 nuli singulis annis ex
 datur, tunc enim demum germinare solet etiam ante b
 eius est nisi rorem Constantinopoli allatum. Nam ex
 ceptum urn in uero florem habeant, nullum dent in frigidiores provincias translati Frigo™ valdj
 impatiens cum sit, hyemes nostras iion Iert, sed in fictili reponendas cfi, ubi bul
 adnatis feliciter se propagare solet.

A. v *Ornithogalum vulgare* Ger. 1. 11. k. umbellat. <m medium ang. : i. fo-
 lium C. B.

Radix bulbosa, candida, quae multos bulbulos adherentes habet, veluri raceriurim,™ impactos, si-
 profos, se plurimum multiplicantes, gustu amariante, lentè spongiatque mucagine masticatos os
 reolentes. *Folia* promit angusta, tenuia, semipedalia, caulem superantia, carnata, modicum corum
 latera discurrunt lineis, in terram strata, mollia, & inter haec caulem palmarem aut semipedalem,
 tenerum, teresem & nudum, quae circa fistulam pediculis emittit, quorum unicus, subactum folio-
 lum oblongum, membranaceum, flores sustinentes e folio semis compositos, oblongis acuminatis, li-
 ctoe immo candore, foeli non nisi (ser oras, medio herbato : supra quae *floscula* laterales lena, can-
 dida, in macrones acutos fastigiata, quibus insident apices *capitula* : m conim nicdio capitulum sty-
 him e summo profert albidum, *floscula* continens compressa, nig- 1 colors. f&r< auEcro in fumma
 caulibus velur in umbellam expansi sunt.

In Germania, Italia & Gallia sponte provenit : anti- it & in Anglia spor tancum invenit : i & nos Lucu.
 quidem in pomariis ad sepes vidimus copiosam, forte tamen olim tot latum. Habetur major h
 species si C. Baubino credimus.

10. *Ornithogalum vulgare* fonsle Latior folio J. B. *Ornith. umbellatum albam videtur latifolium* C. B.
Ornith. albid. vulgare Clus.

V. fl. Cii

Hujus caulis J. Buchino levis, Boem ampliores quam praecedentis, externis viridis internis albi,
 folia limosa duplo, lineis albicante declinata; bulbos paullo major.

E Tyrolculi comitatu allatum est; quin & Neapoli ad Clusium misit Fer. Imperata

Li>ut.

11. *Ornithogalum minus* C. B. *Ornithogalum minus i Pyraech* Cl. f. l. B

Clus.

Ab i Ornithogalo Hispanico minore Clus. in eo duntaxat Clasio videbatur differre, quod illius
 flores paullo majores apparent, petali singulis foem nervo seu vena subocerulea secundum lon-
 gitudinem per medium essent distincta, & sex stamulorum apices in hoc fieri qui in illo
 violacei.

12. *Ornithogalum Hispanicum minus* Ger. Park. Clus. j.* *Ornith. umbellatum floscula ex albo*
subocerulea C. B.

Clus.

Ex parvo orbiculari, albicante bulbo lena sex septena vero profert folia, Ornith
 gan fore similia, sed paullo angustiora, nulla vena candicante per longitudinem facta; e quorum
 medio prodit singulari *cauliculis*, interdum & alior, palmaris, teres, sustinens lenos, septenos aut
 plures *flosculos*, alternatim quidem nascentes, sed quasi umbellam quandam efformantes, adae aequali
 lux almidine, non facta atque in vulgari & Arabico, fens foliulis ex albo suboceruleis constantes,
 totidem candidis *flosculis* & molle *capitula* suboceruleo umbilicem occupantibus. Nulla adhuc
 capitula vel semen observare potui, tota comi brevi a floribus marcescente.

Floret April.

Ornithogalum cornutum pallens Lab. Osf. flore Hyacintho Autumnali pene pari & simili J. Ba-
 hnius praecedenti idem esse suspicatur; Calparus fratris diversam facie & *Ornithogalli* spicatus an-
 numerat, forte quia Lobelius florem ejus Hyacinthi Autumnalis flos pene parem & simidem esse
 scribit. Non tamen dicit Lobelius spicatum esse, sed tantum flores ejus singulares illis floribus
 similes.

A. 1; *Ornithogalum latum* C. B. Park. *latum seu Caps agraria* Ger. *Bulbus sive caulis*
Insulis fere later, seu Ornithogalum latum J. B. *Pelloni Jbtax* or *2 Bethlehem.*

J. B.

Veni manus *Ornithogalum latum* radice est bulbosa, *Ornithogalli* sibi bulbum equante, albo,
 patenibus filaments fibrali, gustu viscido & subdulo, non amaro & astringente, ut annotat
 Puchlin & Dodonaeus. E radice statim *floscula* emargit porticum, semunciam fore lanam, do-
 drantalis tunc longitudo, in terram caducum, coloris glauci, in tertem macronem desinet,
 glabrum, superius leve, inferius costis Plantaginis donatum, modo unum, modo duo aut tris, p
 interdum sola sunt, pinguiscula, angusta, triquetra: comitatur ipsa e bulbo quoq, ortus *caulis* bu-
 gularis.

gularis, angulosus, OLIK brevtor, subcubans, cetera nuda, alioqui leuciscula fore infra summam cacumen folio pedibus unico aut altero, sextantali vel palmari, nonnunquam glabro, aliis subhirsuto, oris paulum intro flexis, et carinam imitatur: e cujus lino reliquis caulis pergero, aliis indivisis fere perit unicum, aliis subdivisum, plerisque ad novem usque flores sustinet, unicuique divisioni folio apposita. Flores singuli ex longiusculis pediculis Ornithogalo similibus, petalis constant oblongis, foris viridatibus, hirsutis, oris luteis, lino perina flavis, medium occupantibus totidem *feminae* cum *epistole* luteis: modicillum obtinet etiam nondum delapso flore subnascens *capitulum* triquetrum, *feminae* conceptaculum, cujus ex umbilico *folio* exit in apicem luteam desinentem.

loeat.

In agro Podemontano ad sepem & inter segetes observavimus. Ad agrorum & sylvarum caeduarum margines in Germania frequens est. Habetur etiam in Anglia Comitatus Eboracensis Septentrionalis parte, in sylvis prope portum *Grete & Ringsall* vicum, ad fluvium *Tesam*, unde bulbosus ad nos transmisit D. Johnson.

s., *caz fr-
caula.*

Ornithogalum flavum Alcina unum i *laf. i e. Orn. luteum* magno flore C. B. flavum cum flammibus rubris 'l. /(. ciini floruni prxcipit- nuRiirinlinc flt ft. t unum rubro colore a descripto differat, ab eo specie diversum esse non libenter concedimus, praesertim cum Clusius ipsum non viderit, sed quae de eo scribit ex aliorum relatione habet.

Sptao ttra

Fortè etiam nec Ornithogalum pallido flore *Claf. J. B. luteum* sive pallidum majus C. B. à supra descripto specie differt: cui, *ignote* Clusio, non valde ab simile est, majori tamen *fala* comitat, *caulis*, crassiore licet infimo: binis, aut terni quos sustinet *fUrff nujotcSj i i* tinus flavi, sed ex herbaceo quodammodo pallidi.

In Stiracorum & Asinacorum *ihUtnpram ubifylw dcfi-ere* solent observabu *Clusius*.

Lew.

14. Ornithogalum i *Ixtummm* J. B. C R U *Ormtb. lm<> fhrt O.d. Onub. 'untum ftr-M* Ger. emac.

Claf.

Unico prode *fobis*, duas aut tres uncias longo, angusto, exalbidi coloris & acidi gustus: iuxta quod tenus, uncias *caulibus*, unum aut alterum folium sustinens, e quorum medio bini aut terni exilius *fobis* stellati, intus flavi, foris ex viridi purpurascens, sex radiolis & totidem *feminae* intus prode: his succedunt parvula triangula *capitula*, *feminae* rallo exili & inaequali *plena*. Radix alba, rotunda, ciceraceo pinguis *tune obdi* cta, exigu Pili magnitudine. Sed & *ti^^j* aliquantulum majus evadit.

15. OnuhfgalMm hkl'nftnim l*tr*mmiMunam tauuftltm Co!. *angulifolium bulbiferum* C. B.

<cl

IUntula est sempetalis, radice bulbosa, rassa cortice tota, intus albi, capillamentis Cepe modo tremulis admodum: Folia brevia, tenuibus, Croci vel Ornithogali, minoribus, angustioribus, pedali longitudine: *Caule* triangulari, supra quam thyrri modo vel Cyperi *fobis* sunt quina vel sexa graminea, tres aut quatuor uncias longa, in uno latiore, rubentia circa octavi, [alibi hirsuta & candidiora] in quorum centro coarctati sunt globuli seu bulbilli, Milli vel Rape terminis magnitudine aut etiam majores, flavescens & purpurascens, qui siccati planta in terram sparguntur, ibidemque germinantes sequenti anno folia emittunt singula singula. [Invenitur alicubi abis bulbilli in caule.] Inter foliorum linoe quae bulbillos circumdant peroni duo aut tres rubelcentes, triangularis proleunt, *fobis* habentes linoe intus, foris vero virentes, sex foliolis constructo, *feminae* luteis & apice in medio crassiore ex fructu prominente, qui paulatim in Bone t; dicit trigonus, fupcne latior, *feminae* intus minutis arex instar refertis.

L**-

" . * r'is cum calidarum tum frigidi- inim reponum pnn:o vere floret, **Fdxturio menfc** *caudicibus*, **Uruo vcj'** frigidioribus.

16. Ornithogalum album *mafulum* Park. *Bulbus* *mafulum* Ger. *Bulbus* *mafulum* *fobis* alba, *caulis* *Thiopyrasi* J. B. *Latium* *maico* & *junco* *fobis* C. B.

Claf.

Valde rara est li. re planta, antea (*Clusio App. al. aut.* Eam autem redemerat à Nicolao *le Quis*, qui in Lusitania eam afferbat. Unico autem e terra pedebat *fobis*, tenui pedum & prolixius junco, quod tandem pedalem adquirebat longitudinem: duabus autem septa terram uncia paullo majorem adquirebat latitudinem, & canaliculatum ferebat, extremi tamen parte muriente junco: ubi vero latorem adquiret incipit latitudinem, ex ejus medio exilicbat triangulari longitudinis *caulibus*, tenuis, lavis, dilutis virens, in cujus fastigio alternatum sui erant tres *fobis*, non valde magni, qui sex folia candidissima erant prode, non multum abimples floribus Graminis Parnassi, sed nullo calyculo, ut illi, inclusi: e quorum medio prodebat sex alba *feminae* flavae apice praesata, & umbilicem occupabat *capitulum* triangulare, summo fastigio sustinens exilium *fobis* album flammum longitudinem non excedentem. Odoratus autem erat ille *fobis*, & Spinae appendicis florum odorem amabat. Ego bulbos orbiculati erat formae, nec Avellanae mios magnitudinem excoelebat, sulci membranae tota, folio, illis multis tenuibus candidis fibris obditi. Hinc folia, totidem, canaliculos habet. Flores autem periebantur medio Junia. Semen observare non potuit Antea.

17. Ornithogalum /<<<>> *caulis* *bul-* fww *Caucibus*

Huc *Caule* & *fobis* simul emergunt, longa, lata ut Pannonica, similiter etiam sulcata. *Caule* inter haec molius ultra pedalem longitudinem asurgit, rotunda, glabre viridis: hanc tenuis vel et glauci coloris halitus suffundit, qui leviter tactu desiccatur, ut in primum integris oris per-

maturis videre licet. A meato fert* ad apicem ufque flofculorum que tbit appendicula, cujus cavitatibus riore. finguii ^clami"- * globulis fpcantur, adjecta quibus-
 tice. qua: gtm.i (dix obtegero: Id quod kmiliare eil vilga i noftro Ornithogalo. Paullatim glo-
 buli ic a cavitare illa fub- beunt, fubjcdiq, e sum pediculy Jon; gnis producantur, unq, cum flore
 deorfum noam. Ekw tandem lutco-virens dchficit, (ex pctalis oonflans, quorum tria externa latil-
 find expanfa IUKOcolore hmbi vntiir, triavcro incrnaiii ie tompri; a manent, ut Leucoii mino-
 ris verni^ mucroncs iubene iutrp reflexos. quibus/aiwiw* alba cum apicibi a luteis reconduantur: tria
 vero his interpoliti ftamma mfkibm carent. Pirtiljuni tneularc medium Boris occupans femini-
 bus PMTB rurfiet: hutus mapke moilis ftac epiphylls, qua: cum flore maiiefcit

Nunquam Hons hujus tolu vento auc vctiilUte dccutiuntur, fed in Ic contradfci & occlu& ta-
 nut

17. Ornithogalum caeruleum pallente flore C. B. Ornith. caeruleum pallens Lob. ob.

Ornithogalis qualibet fui parte valde cognatum & affine, fed flos caeruleus, Hyacintho Autum-
 nali penè par & fimilis.

CAP. VIII.

De Hyacintho.

HYadnthum, ot Pfinius lib. 11. «p. 11. duplex comitatur fabub, IUC tum preferens ejus
 quem Apollo dilcxcrat (Ilyaanh. vocat.) out cX Ajacts enjore edicl ita difcurrentibus
 _vcnB, utGr«anim liwarum figurx A 1 infoiptx icRonrur. Utraq. tabula habetur apud
 Ondium m Mixamorph. alters lib. i o. ubi de Apolline iu canit v. 215.

Jffe ft*i jrcmitxfella inftribtt, & M At
 Flos batra mfcripim*, fmftria^ liter* d*i.U tfti.

Altera lib. i;. qu.im fie concludic.

*Pvrpttreum i/iruui ^ttiuit At ccfpttt fiortn;
 ^ftofthufdclma Seojueiet zinniaerentii
 Leer a ammunis itttitit faere^ vtrify
 bifmpia eft joint, life licmmii, ill* quicla.*

Nam liftra: AJ Punt prim* nominis AW finta, interjedto lamcnunili .tur de8eo4.
 HyACmchus Veicribus duplex clt, Medicus & Poet ai\$. Poticum crudiri plurimi obvcnam
 in Hor d uctus Steras^* refcrennum C' unioliam regalem eife c>,nn.intur.
 Oi itinchiii ab Oniith. ogalo differt florum ftaminibus re j.ubus & angultis, pctaltspurts
 ellj non timen Leucoio buibo. quem quid im ad Hyacindium deduc

§. I. JJjociHtfm fitUark.

A : Hyaci. •but fitStiSm Fucljit GiT. fie Sdttr vui^a,•, fice bifolium Fuchfi Park. parad. Stel-
 ittm bifoluu & trifelitH-vtrntu dmmorum fivrt erruUo O" •• J. B. folium bifolium Ger-
 — r G B ttm trtfolwf cjufdem. Jbmaii tofrnal j6i.ir ypactntl).

J. B.
 Ex radice bulbosa, oblonga, fibrosa, vilcida & Jubctula L'it caticulus juncus, fi-j
 gilis, palmaris K ped. ilis. tultus, radicem vetms exalbi an; duobus foliis, interdum tribus, longipetulis,
 carnatis, a bulbo ftj:mi exorts ftipatis, qui in pediculos pro florum numero plures paucioresve ad
 duodecim nonnunquam, nunc breviores, nun :loiii! flores feretes divaricantur, licet aliquando ipfo cobculi
 feres fofculum fingularem gerere reperitur. Flores pulchri, caerulei, raris albi, ftellati, sex folio-
 indis, angultis, mucronatis conflantes, in <j!n<ii!ii nicdinj!?(Mw:W.j i ex dilute caerulea fufci-
 nent capitea faturatis tineta, piftillum turge • um niueri!- tatum concolorem circumftantia; at fi
 fit albus tum flammul- —<*q iia aputbut luteis priJiit piftillum album ambiunt. Succed - ,••
 pitulum u • iquo™, ^, , n atrum, ut in aliis Hyaaandus* fed fufcum duntaxat & veluti fu J, ^ -
 infectum.

[a infulis quibii(3am drej <ambrian, coptoseptov enit, ut v. g. in Bardefcia. In Gormania Lem.
 campeftribus & juxta lepca: Circa Genevam etiam & Montpelium. Primo vere flores.
 Hyacinthum ftellarem album a precedente cum J. Bauhino non diftinguimus, cum fol i rlorii
 colore, qui mere accidentarius efl, diffare: at netj, I i yacintium ftellarem caeruleam ftaminis
 ex viridi luteis C. B. neq, Hy ac. ilcllamm (lore ruban o Park.

1. *Ilj(iKiuvi iJi'J-triū albicam -tritinm J, D.*

Hunc C. Bauhinus cum Hyacintho stellati albo eandem facit: frater J. B. distinguit. Lobelio in serius floret & folia exillora habet: Flos aspectu jucundus albicax, septem interdum aut pluribus floribus luxuriat.

Ap

Lacu.

In Belgium d. -Lttuscfe Bifcaurmontibu*. Perperam pictus est a I ubcbo coin flo«spenu;x:uJa

Uj.:;iHtlmfit!;jru vrtim frvulxt, fiert tx cxrnks emtrn J. B. JttBtrm mmm*i C. B frvth lot jicUara vemm Lehtlu Qa. CnUC

Lai.

Vu res terni aut quaterni, stellati, ex cereo cinerei, sensu foliola rotundum, frammuli & apicibus obicursi conflati, pistillo in medio cum umbone ex cereo cinereo. Vex palmari est punctufc. ftut a- gustis, luroctis quatuor aut quinq., Radix parva, alba, oblonga, parum fibrata. JuimlofiLii.ipiiJ Ctr. tmtc. hone lpcciem certum ponit in c

4. *fljtcmtbmfL. I. B. Ijob. ftHarm purfwrn C B.*

Oniai tui rurteduplo major est Hyacuitho ftclUn Germanico; fitrtt mcnfions parpunc R*. Jiru buibus alber.

His addit Parkinsonus I. y. inthuin ftelLmun Mjrtkm ItVe prccwem caruleum, lundemq; ?;jre ilho&c Bare fuave-nibente.

5. *H)MP*thm fitSdrf firt tmmt Park- /trIUtiti »... UTU J. U. ftLilai Sumeri Ger. ^*iUr« \$tt*in emmm C B.*

Lak.

Facie tota, spatis foliis & caliculis speciemus Hyacinthum Aucliuith qitulanrenia MV... stellati, subcerculei, pall... [ad triginta interdum aut plures] in Rose modo in latam expressam aut aliquantulum depressam spicam, & tandem in longioribus succedunt c; KUU tngon.i I onen contentia. Radix bulbosa, candida in- tithi Anglici,

Floret aim vulgari rukexEre;;um Martium, vel etiam April, paulo tamen serius vul^in. Loau iuujis aiu,Jb iion ndii ur, quod lici ni; in Jio;tb tamen I nostru frequens est.

6. *Hjcmmbm jittstut Bpu*atf**t mtjtr firrt Rer^mu Ger. jttBj: Byzantinus aliter, flos floret Brittanu Pjrk. jiiUuii Hjtm. sitrt tlt^mujfmat fntomt »*.*», J, |. Lob. nrm Hjt- tmbmi Terri J. B. /^*r, jhdUrw t*T*lou M I W C. B. 1 & Hyacinthum latifolium Dale- < t*«fu fate re/irt, fwaj tuitm.*

7. B.

fciiift nhicur bulbosi, nugru, fibrii d<mau. alba, i^ubi ptirpi. valente, sapore subdulci, viscido & naulcofa FOIV. a radice quaterna aut quina, per terram sparsa, unciam lata, Hyacinthi stellati dimetrorum latiora [a quo distat licet affinis] longitudine cubitali, carinata, striata & splendida: C-WK teniai, miui vd duo, intaJum niut: m, cubitum alo, [ali palmum, sequipalemm & pal- mos duo* longi] purpi. ances, nitentes, angulati, flores sustinent in summo fastigio quatuor, quinq., vd sexj i latenbui, perals 6 (ii>lonins, acuminatis, coerules, vel potius violacei, ungue albicante, occurrente per longitudinalem lineam saturatiore viola tincta, ita a se invicem ad pediculum usq; distan- tibus ut radiatam stellam emulcent. Medium occupat capsula rotundum, cancellatum Pib parvi magnitudine, album, loculamenti seminum rudimentum, quod ordine circumstant stamina rig- gidula, lena, violacea, circa unum albicantia; e medio autem capitulo stili violaceus emicat: pedi- culi inferiorum quidem florum plus quam duas uncias longi, purpurantes, splendidi, lurocti, superio- rum vero sex cubitum latum longi, medio eorum medio modo se habent.

um titulu indicat, mens autem Aprilis Hottt.

7. *Hyacinthi stellati Byzantini J. B. stellati Byzantini nigra radice a. fol. Byzan. nigra radice, flore t, rales Ger. stellati isidori cassidens xtim. jre C. B.*

Ci*: ?*

c aut quina... la, longa, carinata, dilute virentis, Hyacinthi Ang- lica fo is aequalia sed brevior: inter que casalis allurgit digitalis ferè longitudinis, gracilis & infir- ma, nq; aut lex fistula sustinens, stellatos, dilute cereulos, modicos, petalis a se invicem di- stantibus explicantur nec adeo contigas & adn 004 tic in alis congeneribus: staminulo- rum flos purpurei. Succedunt capsulae triangulae, qualia in vulgari soli inana: raro etenim semis- tantitatem perducit, quoniam capi... q; ob gravitatem suam a caulibus infernis susti- neri nequeunt, sed humi strata, vel ib humore vel a pulvis corripuntur. Radix bulbosa est m{ i magna, nigro cortice tecta. Btfibmnoonuill «*»yun» cum pr-ctficw e affinitat -m hb-.

8. *Hyacinthi stellati Byzantini major Park. parat. stellati (,,.*

Park. par.

Præcedenti omni sua parte major est, alia ei perfimilis. Folia ad radicem plura & multo majora obtinet: radicem triplo quam illius majorem, non tamen extensis ingrantem, sed albam.

9. Hyacin-

9. Hfaambui fteSotut egrulem (frialtrt C B. ffjwc fhUtniVvrrHi CluC C ur. post. fialar. Per. rui, ffr? rxmito, Hnn pur fur tit Get". Cmac.

Claf.

E. crallim oifo & quafi nucii jngkndis tmgtiicuJins bulbo ejaateina <lunf<at p. riuiculat priMc^ntis foliis non vajdi dalliniuu; nv. tuili!US cniemi im liiillo, j lacei coliora. Floris umbilicum occupabat trigonum capellum, virelccas Z_UQ Jtilo p'omnente pradium, lex violaceis flammulis canito, quorum apices nigri.

I aperiebatur, & tenuem quendam atque evanidum odorem habebat. Exculto Bore trigona illa capitula maturitatem adepti p'ifillum nigrum fomes continere deprehendebatur. Ix autem non valde diffimilis erat Hyacinthi sub Autumnum flores proferentis bulbo. rime accedit ad Hyac. is defcriptam, fi non idem fit.

Flqs. Appjctmthm fiftUrti future ixtultm C B. Kfptmtm JhStt* jffim Clu(l cur. port. // fpan. y/ri^r. yHre /jl<rf carult Gr. cm.lv. uitlutm raruin J.B. liipei;

Terna 3Ut qtiatdvna p'oduGIE ^O/M, humi expanfa, pedem longa, viridia, cernata, femineum ert latjj .itque linfim in mazonem delincentia: inter que sub extremum Apertum prodeit caula do-irantalis aut paulo longior, viridis, firma, fuffimex ex intervallis octodecim aut viginti floris, lex in floris in modum expanfa pedibus, colore candido fatis, p'efertim circa umbilicum, nec valde diffimiles Ervophori Peruviani floribus. A cernente umbilicum prodeunt lex pallida flammis me- dium capellum violacei coloris amplecten- ri.ij trigonunt. Semen quale efl: Clufo ignotum.

11. Hjuimhut JitUatM dcjivm major Park, parad. Ger. ftulltm /ftivui J. B. CluC jiltiru *j'io-to-purfwaftiu major Cfl.

Claf.

QUJ-nis, quinis aut plunbus /deis pradina ell, viridibus, cernata, palmam longa, flris anguftis, tLimi(lue qu4i in n boni flris, alioqui lato firma, inflar foliorum Hyacinthi floris flore candore; inter quir illurgn p linari caudice, lato firma, fuffimex in oblongo pericli inter appendiculas purp'arcentes, prodeuntibus decem aut duodecim floris, ex cernulo purp'arcentis, nullius aut e peregrini odora, umbilicum occupante umbone five capituli rudimento micronato, canito lex flammula ex albo purp'arcentibus, quorum apice cernati. Fiebant tandem in capitula triangula & micronata, qualia five in Hyacintho Belgico, que maturitate delincentia fomes continere deprehendebantur rotundum, nigrum, fplendem, illis femini p'ochis fimile. Radix bulbola ell, p'ene orbiculari & cernicanti, intima five feffili parte in ambitu frequentibus & tenuibus albis fibris in latera fele fpargentibus donata, & interdum una etiam craffiores, digitum p'ene longa, atque in profundum fe mergento, ut aliquoties in aliis etiam in HyacmSwrum generibus obfervare memini.

Ex Libania allana elfe dicitur.

Leuz.

II. Iti-UMtbm -icliuttu &fi--ui mm J. B. Ger. P.irk. pjiJJ. Cluf. Stul. af. nunc fofcula altar, nunc jtu 0. &.

Claf.

Cam p'olim f terra profit, (u pism aut ado t i adice p'rom fola, angufta, p'ama, viridia & quodammodo le-entia, circiter feptem uncias longa, que fele humi diffundunt & in orbem fpar- gunt. veluti contorquent: inter que affurgit caudice teres, brevis, binarum unciarum longi- tudine: n noii excedens, limbo falfigo lex aut feptem floris alternantem firmis, veluti in fuffim congestis, formis & colore p'ecedentis p'ene fimiles, fed longe minores & dilatares. His fuccedunt triangula etiam capella, extremo micronata, nigrum fomes continencia. Radix bulbola, fere orbiculari, Avellane Hispanicis magnitudinem aequans, candida fed fufci m'ovicanis tecta, e cujus finu li' e numerofe exiliebant fibres, magna ex parte valde tenues, in tantum admixta feptem aut octo paulo craffiores.

Flore [MJIO nuiJecum majore; &c c L'itania pariter a IUueft.

Leuz.

A. 11. Hyacinthi* Autumntlu I Ger. Park. autumntlu no MM J. II. fclira autumntlu nunc C. B. The Junii Star Hyacinth. iuniii

J. B.

Folia vir. pollices quinque excedunt, tenuiffima, tria quatuorve ex albicante bulbo exorta: Caulis palma brevior, tenuis: Flores a medio ad fumum parte, orbula, floris, quos excipiunt onco- p'acula parva.

Flores indiget antequam folia emergunt, sub initium Septembris. In r'ipe S. Vincentii prop' Britolium obfervamus, & in promontorio Lizard p'ine dicto in Coenobis exoptiffimis: Cultus in colliculis Montipelo vicinis invenit, & in Malitiana r'iva prop' Luzziam, necnon circa Sal- manicam in colliculis ad Thormum thurru' fuis lapidolo almodum foit.

14. Hyacinthi fclera Autumntlu major C. B. Autumntlu major J. B. Cluf. Ger. Park.

Claf.

Quam aut fena habet lateracula & flexuola fola, viridia, aliquantulum cernata, Colchici mo- tani Hispanicis inflar: inter que prodeit una, nonnullam bene termi a floris, caudice, palma bre- vior, lato firmi, multo floris lex folis floris inflar expanfa conflantibus, & dilate purp'arcenti- bus floris i, in tj4

succedunt tenuia admodum & trigona capsula, quae brevi maturiscentia & leantia pusillum rugulosa
 fere ostendunt, quod terrae graviori statim exceptum sui generis plantulas generat, quae mihi tertio
 anno florae dederunt. Radix crassiuscula, candida, infima sede multis fibris donatur.
 Hoc genus mihi interdum cauliculos dedit ramulos, quorum singuli ramuli suis floribus erant orna-
 ti. Spicae natum non vidi Clusio, sed in hortis dexteras cultam. Noni praecedenti varietas esse videtur.

Hyacinthi matmut mtmmui C B. prod.

Tota (inquit) planta unciarum sex est: ex bulbulo parvo oblongo, corneae viloso tecka CJUI-
 culi duo vel tres nulli inter folia angustissima exurgunt; quibus capsula minuta, rotunda, solum
 porrecta insidet. Folliculi minutis, caeruleis, quibus veluti filiquae oblongipulcra semen niam con-
 tinentes succo.

Montepellani in litore maris.

Hyacinthi Autumnalis minoris varietatem canum esse cum D. Magno tulpiamur.

#. z. *Hyacinthi Sati crio-keri*.

15. *Hyacinthi ViniMBi* Ger. *Prtrvtsnm*, J. fi. *ft&atm B*tk*t mtjer.* - *algè Pera* «». p. 1, L
 parad. in

Ex *bulbo* i 3c oblongulcuU, iri bulbo valde diffimili (nam fibulfo coniee tefla
 erat, prominentemque sedem habebat, supra quam in ambitu crassiusculiUshbnwI^rgcluMquir a
 aut lena novo vere prodibant *folia*, viridia, parva unciarum lata, carinata, >todraucm longa. humi in
 orbem fusa: inter quae dodrantalis allungebat *caulis*, [pro planta magnitudine brevis admodum]
 tibi pennae scriptoriae crassine, qui circa fastigium frequentes longiusculos pedicelos ex porrecta quasi
 rugulantes producebat, quorum singuli sustinebant *folliculum* sex mucronatis foliis constantem, stel-
 lula instar expansis, coloris nunc e caeruleo purpureo, modo purpureo saturatiori & quasi violacei,
 e quorum umbilico crassiusculus exit umbo, coloris unquam purpurei, cinctus sex *filamentis* laterocu-
 lis, diluoreis in quibusdam caeruleis, & quasi albescentem coloris, in aliis paulo saturatioris, quorum
apices flavi: tota autem florum congestio equalis fere erat altitudinis & velut umbellae formam refer-
 rebat. [Spica antequam flores aperiantur Coni Pinea formam refert] nullam vero suavitatem odo-
 ris in floribus observabam; sed cortex & folia abscpta in tenuissima staminula distrahantur non
 minus quam in bulbo eriophoro.

Varia florum colore albo & saepe rubente seu carnea. Maio mense Horet. Citrum <Gulielmus
 Boelius Clusium ut & Parkinsonum monent, non fuisse necesse hunc bulbum ex America aut Africa
 peti, quandoquidem circa insulam Gades atque adeo in ipsa insula, [atque inde incipiendo in pra-
 tis maritimis ad portum usque *Santa Maria* dictum] copiosissime nascitur.

16. *BmSiut trwfxmn* P«nwvi C.U. J a Cluf

Maia ex radice promit *folia*, surrecta initio, deinde in terram sese inclinantia, densa, carinata
 i.r.jr loito. Hyacinthi, viridia splendensque, quae miniam contracta tenuissima stamina pre-
 bent. Inter folia sequepodali nascitur *caulis*, teres interdum & gracilis, firmus tamen, nuncius, vi-
 rescens, qui summo fastigio plurimos fundit *flores*, initio quasi in spicam congestos, deinde ab infimo
 sese explicare incipientes & in latitudinem expan- lena, sex foliis stellatim decussatis consti-
 tare deprehenduntur, coloris purpurei, circa umbilicum autem caerulei, ut & prominens umbo,
 atque lena quae illum ambiat *filamentis* lata, flavis seu pallidis *apicibus* praedita; singula florum fo-
 lia per longitudinem secante veni ex atro purpurea. Odor valde tenuis & exilis: oblongis vero
 gracilibusque immixtis flores pediculis, ex viridi purpurascens, quorum singuli ex appendicu-
 larum candidarum & membranacearum sinu prodeunt. Floribus succedunt trigona mucrona-
 tius *capsula* *semen* continentia rotundum, nigrum, semini Hyacinthi Anglica par. Bulbo ipsi
 crassius, longiusculus, & quodammodo pyramidalis, ex albo flavescens, capsulae squamae molli lanu-
 gine plect, infima sede multis crassiusculis fibris praedita.

Floret extremo Maio.

Magnam inquit Clusio cum praecedente affinitatem habet, hujus tamen folia duplo latiora, caulis
 quoad elatior: flori purpurei, circa umbilicum caerulei, veni atro-purpurea floris folia percurrente.

17. *Hyacinthus eriophorus* Park. parad. *Bulbi eriophorus* Cluf. Ger. *Bulb. eriophorus* *Oriente*
 li C. B.

Cluf.

Sunt ea multa oblonga *folia*, Hyacinthi fere similia, non Narcissini, minus carnosa & succu-
 lensa, duriores etiam, viridia, mucronata, ingrati saporis, quibus minutissime etiam contractis tenuia
 quaedam stamina instar tele araneorum deduci possunt. Ex horum medio *caulis* exit ciliolatus aut
 amplius, teres, Scallum caulis amulus, lavi, nudus, vivescens, suprema parte ad caeruleum colorem
 tendens, oblongumque & densam veluti spicam, in denos vel plures versus antequam explicetur
 distinctam, penum rarisem sed paullatim (deni sese explicat in flores) caeruleum colorem con-
 trahentem sustinens. Flores semis foliis stellatim expansis constant, triangulo umbone in medio
 protuberante. Hyacinthi autumnalis floribus valde similes, inodori, caerulei, cum his, quibus insi-
 dent, pediculis & internodiis *caulis*, quorum *apices* initio purpurei ubi sese expandunt, pallescente
 quaedam veluti farina aspersi sunt. Incipit florere ab imo, ut Scilla, & reliquae magna ex parte bul-
 baceae stirpes, flores racemi aut spicae instar confertos habentes, solent. Semen observare volumus,
 sed flores admodum caudici statim macerantur exsurgunt, & relicti tantum in caule pediculis deci-
 dent.

iterant, KMHX craffi & bulbofe eft c pluniiiis tunicis albis concern, tomentoia 5c velitt aranearum telis oWiu, multos utplurimum bulbos aJ btera adnaiois lubens, Sc craffii oblongiique fibns nrens.

Confarmrw. soli fepti5 tniflus ell. R.iritimi: excaubftii & flores profert in O offris regionibus; licet bulbis mirā hcc indiuto [l]ui-imas (oboies procrect.

Balban eriepborum minartm C. B<

Quem Clafius cur. poff. Hy.I.nuhi) oblolcco jEcliioipico fubjecit viddie ibidetn.

4- 3. flyacittihi fiore olfango.

[S. li- arizibui Orientali, quibafdam Conftantia ffeittmau J.B. Orwtuifi tau!t maculato, &c. C.B-Orient. cxrultHt Qr.

J. B.

Undue eft bulbo!a, magna, multii ton icis compofita, gufti. viciido ilcij cui fu blunt fibrez longe, teV&, medicament craffe: A qua caulis iurgtc I ngularis, dodrantalis, levis, folis nudes, ad immu dtlurovire pallcfccns, fupeme infcra: a cu;wm dio fere ad fummum fcapam prodeunt fctmancia- libus pedutulia, ox vi idi lubnigis, deorfum nutantibus appenfi flores tres, qwmor, quiquis .ui undecim au: duplccam & plures, odore fuaui; hilar, caruleo aut mixto, aut rarna albo, omnino fpe- :aml: colore, unciales, teretes, concavi, e longo tubo in fex lacinas nonnull reflexas diviti, fa- tumitt.--lurco pulvere confperfa, brevia, penitus reconcilita continentur. Folia fex, feptenive aut ctiim plura, a buli>o cufatira mulcula, arinata, in fmc herbacco colore, propè cacamen fa- tuninui vinentia. accedit capitulum trifloro laculamentis compofituni, quorum Jngul,i duos feminus nigrorum, rordines continent.

Hujus Hyacinthi plantaz funt fcu fpecies fcu varietates. Alii enim latifolia fiint, folhs amplisLi- liaccis, & hi fere precoces funt, & floribus majoribus, caule & folis imis I>\aconni inllar macu- ktis: Paikuilonoli acinthia Orientalis major precoc, dicta Zumbal Indi.

Alii .iiu- ulfolia, floxibus coloris refpectu vel purpureis, vel albis feu nives, vel exalbids qui ante- quam apaiantur aRr funt, apertis oras tantum albas habent, reliqua parte carnis funt, fenefcentes toti njvci,velvaric, atis, Sec. Utriusque generis alii polyanthes funt, multos ferentes flores ad vicinos & plurts, coique vel m unum latus propendentes, vel in omnem partem aqualiter fpafos; alii panci- ores producent flores: Clafius narrant amolam fua e femine natam fcrlbit, verum hae fapientis armo *ms>A>St ai 4!a tumis faftj eft. IdemClulu cur. poff. Hyacinthi Orienta- li foliolo caule meminit, quem non fecus ac precedentem pro monftro feu natura à <ijxi uber- lantis aut faltem ladentis effactu habendam cenfeo. Differunt infuper magnitudine flor alis enim majores lant, aliii rnilto minores. Habenturctiimfldrepte no rariorum colorum, caruleo, purpuro violacco, rtivco, Sec. Tandem refpcSu temporagt?1 noent, alii precoces funt, aliiicro- uni. Pnaliiiprasocibus inllgnis Sciortc; etiani a reli^uis ipeic liiveitLs cii.

19. //;t. nrlas Or m&dit brttmatu Jive frxctx fart mfitrtt Park, parad. hnmiltt alba intmtL Orientali i'bni Lob. Qrttmelu albas C !)

Ephorum & florum forma cum aliis plerisque hujus generis converciCj, id tamen fibi vendicat fmgulare, quod flatim fub folis herbentium tropo e terris erumpat, caules quoque protrudens interdum per medias nives. Florem venuliffimum laxat circa principia Januarii. Non gaudet humidis locis, fed ab humore prius quam frigiditate corrumpitur, idcirco & in tella fidelis affervatur. Sane illi folia i iion IK CJ teris laxa & mollia, fed fucculenta, fpiffa ac terè femper erecta, ut in generibus Ai. Nerv in his nulli confpicui: fed ftriaz folummodo recte ac veluti tenuis fbrae. Lirant autk in vitore et mfljuto ulyuc ad Hncm Julu mēfis, ac mul ilw diutiis quJm crters ufv vrur. 7qj [evi caulel nonnilnlvca filVigu a fmgulos pediculos excavato propendet candida, nonnull tamen fub imta & circa fupremis oras lubcarnula pre fo ferens, quo quidem evanefcente, fenfim Februarii mēfe totus fit lacteus, odore fragrantiffimo, in fpecie deinceps mēfe plus integro perfeverans. Radix bulbola, intus candida, toris ruffa, circa foliorum exortu maculas quidam, quales s iti Se pentariae majores caule fpectantur, effundit, inter fua purpura nigra. Verum id maxime fub Veris aulpicia, & cum torre rurlus mandata caulem ementum gerit. Hec Cornelius Gemma apud Lobelium.

Tempore permanci feu e terra exundi, & boyenti, florifque colore. [addit Parkinson flos lion i. n. 1 6c & florum parvitate] à reliquis diffat: ceteræ noar plcfilijuc J!is Hyacinthi Ori- entatii communes funt.

Foli.i cu n vino in forma cataplafmati. adhibiu puW & memo crinum excrefceniam impediunt, Vires. & (cmiiv cum theraica in ficcu alii conveniu nL D.F*!iër.

A. 10. B acinthis Anglicas Ger. Anglica five Belgica J. B. oblonga fere cereleus major C. B. Anglica, Belgica vel Hispanica Park. parad. English Hyacinth, & Hf bellg.

Radix hinc bu ifeooi oblonga, candida, tuncata, plurimas ex ima fode fibrai in circulo emittens, qui radice exime tenues, mox crallefcenres, Folia fex & interdum plura, oblonga, ac caule plurim- que breviora, fctmanciam lata, carinata, bilare viridia, levis & fplendemia, in acroteru micronem terminata. Caulis e bulbo unicu j olib viduus, femjedilis aut dodrantalis & alioor, teres, culmi crai-

crassitudine, Hyacinthi Orientalis caule minor, cuius contra florem pendere, cum primum florere incipiunt, gravata deorsum recurvatur. *Floris* odorati, cereulei aut violacei, rarius carnei aut albi, oblongi, penduli, octo aut decem & interdum plures [*Clas.* in parts Londino vicinis crucee nominis qui tricenis flores habent] non eodem tempore se pendentes, neque integri ut in Orientali Hyacintho, (quantquam tales obiter insenti videri possint) sed ex squarumatum incumbentes & subternitibus sex foliis, ora multum reflexis, quorum singula armata sunt stamina singula epifidem colorem, cum apicibus albis, compositi. In medio flore *stylis* tenui vasculo feminari infidem, per maturitatem crasso, trigono, in tria localamenta divisa. *Semina* parva, rotunda, nigra. *Florum* pediculi seminales; ad singulorum exortum apponuntur ligule latæ violaceæ, altera major, **jlctn**

LXVI.

In *lyris* & *dumetis* vulgatissima planta. Vere floret.

21. *Hyacinthus Hispanicus* Claf. I B-

Superiori non valde ab simili est; *folia* tamen profert non alio, *splendentia*, nec hauri strata, sed potius *surrocta*; breviorum *caulis*, *floris* dilutius purpurascens, & ad cereuleum colorem quodammodo tendentes, quorum odor etiam magis obscurus. *Semen*, radix ferè convenient.

C. *Basilensis* hunc non separat ab Hyacintho Anglico, sed pro eadem specie **ibtt**
Floret eodem tempore cum precedente.

22. *Hyacinthus Hispanicus obsoletus* Park *Anglica* *femina* J. B. *obsoleta* *flora*
C. B. *obsoleta* *flora* *Hispanica* *major* Gir. *cnuc*,

Claf.

Quina aut sena habet *folia*, oblonga, carinata, succi plena, coloris ex cineraceo viridescens, *Mu-*scari foliorum annula tere, angustiora tamen, flexibilia, orbiculato semine mucrone, candida vetri anteriori parte per longitudinalem excurrens, ingrati saporis. Prodit *caulis* è medio foliorum pediculis longitudinalibus, vel etiam amplior, gracilis, humis tamen, nudis, decem, duodecim, interdum etiam viginti *floris* per inter valla ferens, deorsum spectantes, Hyacintho Anglico non multum ab simili, sex petalis constantes, quorum terna exteriora valde reflexa sunt, interiora non alio, sed veluti tubulum quendam imitantia. *Color* in his valde obsoletus, ut qui ex purpureo, pallido & viridescente permixtus videatur: *Odor* nullus; *Semina* ferè in triangulis capitula plantum, nigrum, cartilagineum, circumate ferè rotunditatis, Scille semini parvo par; *Radix* globosa & rotunda, multis candidis

cuinbus

"df

Temp.

Serò germinat & folia in Autumnum ferat; Junio autem cum Liliis floret: *Floris* etiam femine ex eodem capite excepto natatum stirpem variare solere observabam, ut alii alius obsoletiorum ton! noantur, quidam etiam pene viuentes.

23. *Hyacinthus Mauritanicus* Claf. hist. ap. 1. J. B. *Hyac. oblonga* *flora* *falsa* C. B.

Precedenti non valde dissimilis est tum foliis, tum floribus, omnia tamen paulo ei majora. *Folia* & *radix* ad Oenithogali Arabici legitimi valde accedebant. *Caule* crassior quam in precedente, impenso viridis, viginti, interdum etiam plures *floris* sustinens, coloris magis obsoleti & fulci.
Ex ea Mauritanie parte, ubi urbs Fessa & Marochum, delatus est.

LXVII.

24. *Hyacinthus obsoletus Ethiopius* Claf. Cair.pofit *Hyac. oblonga* *flora* *flavo-viridi* C. B.

Claf.

Caulis crassiusculus erat & firmus, viridis decem aut plures *floris* sustinens, dum adhuc florem gerens omnitus esset aliquantulum nutans, sed floribus sensim sese aperientibus erectus. *Floris* uncialibus pediculis appenit, hexapetali, ternis petalis interna ad oras dentatis & albis, alioqui toti hinc, sed interna parte virides. *Folia* quinque, aut sex, impenso viridia, quam Hyac. obsoletus Hispan. paulo firmiora, alia ea valde similia.

Ab extremo Ethiopie promontorio cui Bona Spes nomen à Batava delatus est.

Aliarum adhuc varietatum meminit C. *Basilensis*, v. g. 1. Hyacinthi obsoletus flore albis: ferenti in obsoletus flore *Ess.* 2. Hyacinthi leucem abscentis: ferenti facie Orientalis *Ess.* 3. Hyac. oblongi flavo flore, in luminatate Pontis Gari reperu: quos accidentibus quibusdam potius quam specie à precedentibus differre opinamur.

25. *Hyacinthus minor Hispanicus angustifolius* J. B. *oblonga* *cerealis* *flora* *minor* C. B. *Hyac. minor*, *Orientalis* *facie*, *flora* *cerealis*, *albo* & *rubente*; Park. *parad. minor* *Hispanicus* *cier* *cnuc*.

Claf.

E *radice* bulbosa, olive pusille magnitudine, subli membrana tecti, & multis fibris donata quina aut sena penne *folia*, longiora & angustiora quam Hyacinthi Anglica, striata & carinata, viridia, humis plerumque sparti. *Caulis* gracilis, dodactylus, teres, lavis, glauco subinde pollinis obductus, in humiditate floris sustinens senas aut septenas [interdum duodecim aut plures,] pediculis feminiculis insidentes, deorsum nutantes, monopetalos, conavos, in sex parvas acutas lacinas per oras divisos, colore cereuleo auresco, sed dulciore nentes, [sex hinc saturatiora per longitudinalem ad laciniam apicem excurrentibus striatos] Hyacinthi Anglica floribus minoribus, duodecim, sex inter similia perbrevia apicibus hinc ex unilico prodeuntis cum exiguo in medio *stylis* continentibus. *Floris* hinc hinc capitula trigona, mucronata. *Variat* *flora* colore albo, interdum mixto, dilute lavitæque rubente.

Temp.

Floret Maio mense, semine Julio maturat, autore Clafio.

Variat flore cereuleo, albo, interdum mixto, dilute lavitæque rubente, venis sanguineis per foliorum exteriorum longitudinalem excurrentibus.

2.6. Jiaamlut prifai *campanale uno versu diffusum C. B.* *Hyacinthus totus albus, Campanilla J.* **HiibMi.-ut ma; ** G~ r-**

PurL

Hy idntho Anglico ralgai i pertanilis eft, fed omni parte major. F W in fiimmo caule multi, drarfium niitanrcs, majoas, laciores, orifiais amilionibus Campanamm inftar. colors canuko obfeuro, oilorc nullo.

Hjac mtbui ftenbtts CampanuU urrmq, Jsfrefnis C B. ifr*tuU*tt turn vJItm fitttt Lv*fmi

17. Hfacmtbui faluftr* vtnuuJUfculu fimlrintu *albida.*

Hanc (pectm ad follorum margines & in boiindjOnbdj inter Liburaum 8c Pita a Itala obfer-
vavimuij nccdunioclaiprum puunuu.

§. 4. Ujaanthus AL *emefat.*

28. Hfarintmi botnidtt minor crrttttt tbjrurut Park. *racemofus ca-licin minor yancefelm C B*
*betrycid.txrulati Ger. w w i hotryoUtt minor cxruiui; #*gu;-; urabus folia, abrawi J. B.*

Bull^ haicqtulis Hyacinthi *stellari vulgo xo oblongis, fibris multis capillatis, tunica compa-*
*ctis, [exrenus nKncans] 'T*re viscido & amaro. Folia lena, novena, Jc*
frutia, virtidia, proper terrain purpurakemia, [humi fratajcauk palmo nonnunquam
Cauluxmus, mtodnra dno, dodranrales, tenues, Ixves, propter^ccrramu! folia rubelcentes, per re-
liquum herbaucio colon: prxditi, excepto (capo acuro ca'rulco rindo qm (Ian, (ultinct, ex brevibus
poJiculUm racemum duas unculongum cunReftos, aloiatos, m uranii modem concaves, dcor-
dim nLitances.purpiireo-vtolaceosVorts albidisemiatis, quonun qm extreranm boi um claudunt le,nec
minoresdiuutiore purpura micBti, nulU umen atbalinc or as pictt, no ita mutant, fed vel furvecti,
TCI refta foras protorf omnj explicits liibjedo flores inutnbnot. Sa l hic floret quam botryoides*
qui moxtequirur.
tfifunin 5: Gallut Narbonenii vulgaris & p.iflimobvuw eft in agrai llm iitu^nihus 5v fecundum 11^,,
viaiC/u/i No in agn> PcJcnionUno in lulu copiultflimum oblcrva*iriHii mta vias, cum ner ilb#*
faceremus, Aprii incio Rorcentent*
Huliii aliud Renui habcnir trafionixw bngioribiifq, fbliu, ffenim niam racen no longiore, dentioes
&odoratioreCM qui Hyacinduis racemofus cocrulciis minor Luitoliui C.B. Hyac botroides alter
major ccceruleusooturusPwi parad.

lfjtcmtbut r*ctmf*t tterulei majvr C B.



NobSs non viiletur a (equsnte diver fin.

29. Hjatnlbui btneiJti virwn miner Uifotin» *cxrultui major*, J, D. ietrjaJa ptrprtui %.* Claf.
rtttmfmf lasifeimi fpeculo C. B. bitr)Miltt utmUui mjjur Gtr. Am Hyacinthus
tetmUet amlrni ma. no Lob ? i',u k ?

7.B.

I'lanu eft (e(qujpalnam, r4j/c< bulboi-. *fibrosilique, lipore ut pccolent an urn & lenta Folia*
refertbina auttma, fruta carinataque, interdum & potiffimum primo provemens, non muf.
um latiora quum jam dicti, fed multo breviora, fepe, potiff. culta & ubi adolevit, latiora, [quz (u:mi
dUTuadi mm lolent, nec I! xuola lu otutfiiiperi ris, fed furrecta} nee catils aiuru dinem an inecen-
tia. Caulst Imgularii, tenuis, Idqmpajraam aba flat, (ullinct raicmanm enngeftm ur fuperior,
fed non ut illa odoniDj) ran ves, bre iorcs, ininorw, inagi^j, ventriort,rt, orij iinilitci urenao
loratifque

Montebgarii pmyenic ffonte : dtiusflora i>ixu^!enti, (oluq, non rcinet tantctiu.

Pro hujus varietatibus hat.

'• 11; acanthum racemofu Ill album C /t. bncmulnalbum 'PitrA. ftr*2 borj-rKien aU> Hore Claf.
qui (npa nis defcripto minor ell & tenerior, *folia dilutius virentibus & quafi pallidicentibus, floribus*
mVClu, cetera fimilia.

1. Ily.; acanthum botroiden flore albo rubente Park. *parad.* Hyac. flore e niveo purpurafcente Claf.
capis flori niveo pccula eft tenuis quaedam & diluiffima purpura, qualis in Rofis albis nondum plané
ex[u IIIIS, pccletum circa unguis, hac vetullate & maturefcence floce immanit redditur: Caulis e
vindi purpurafcit: folia virentiora line & infima parte quodammodo purpurafcentia. Radix (autore
i'ai kmiono) n illas aut raras adnatas foboles producit

H'. acanthum botroiden ramofum Park. |yac. uvi ramoti nwjaron 6c minoicm C. fl. l u m
dun

Qui ramofam profert florum iiwrn, Ho. cit, qui u. * in modbm plure. habet congdlors ratcfmilos,
alio ii minores & g: idiom.

Outhncoau *res varietates ex riyaanihihpryal*
Intj cas inter fo & a *arente Ippccic ii*
Hyacinthum botryoiden album pro distincta fpecie ponat, & Camerarium reprehendat quod Hy-
acinthum album & ccceruleum pro uno & eodem habeat. Ego enim in defcriptione I: acanthi bo-
tryoidis

typosi alibi Baeticiana nihil invenio quod non congruat Hyacintho cerealeo prater folii colore.

Omnia hujus generis similia in triangula quibusdam valde committunt, rotunda, nigra, et...

30. Hyacinthus racemiflorus... C.B. intruder major... J.B. Meiser...

Quina aut tenui oblonga pediculi... flos, hinc diffusis & obliquis... in quibus...

E. vicinis Constantinopoli horti, ultra Bosporum in Asia...

Hyacinthus racemiflorus... C.B. Meiser... J.B. Meiser...

Inm

Clusius nullam particularem hujus descriptionem ponit licet iconem eius habeat, sed in superiori...

Hyacinthus racemiflorus... C.B. Tiberius... J.B. Meiser...

AcLpr

Morei inno subcorulei sunt, postea laevi

§. 5. Hyacinthus racemiflorus

31. Hyacinthus comiflorus... C.B. Park... J.B. Meiser...

Ex capivXO... flos, hinc diffusis & obliquis... in quibus...

Inter leges circa Genavam & Lieberman copiosum observatum... J.B. Meiser...

32. Hyacinthus comiflorus... C.B. Park... J.B. Meiser...

Quarta... flos, hinc diffusis & obliquis... in quibus...

fjinr i plerunq; aut plures ambiunt *fiori*, oblonguiculi, ora in sex lacinolas divisi, sex staminulis purpureis ignis præditi, inodori, incio canalicant, demas cum marcescere incipiunt fusci & inelapantis coloris: pediculi quibus flores innantur inatio brevissimi sunt, deinde paulatim marcescentibus floribus exerescentes quatuor unciarum aut amplioem longitudinem adquirent, sic ut totus caulis suis floribus rei expansis onustus, aspergillum non minus referre videatur quam Hippuri quod.

Um gem

Caulis suprema pars cum florum pediculis purpureis: incipit florere ab imis. Trigona demde capitula fort exigua pro plante amplitudine, in quibus paucum *fomes*, interdum in singulis capitula unicum duntaxat, rotundum, nigrum, præcedens semine minus continetur, interdum nullum, nam ut plurimum capitula inania sunt. Radix rotunda, 2, Wboia, m

exterioribus tunicis constat, subfusca & basi multis albis fibris præditi. Cofthinnopoli primis allata est circiter annum 1578.

IV *HiMnthmt em fui a'lm Ger Park, par-ni. Em* mtd!kmi Belgicus CD comofus alba flore Cluf. corxtfut albi cum cxnl* fismmit) J. B.*

Cluf.

Præcedenti non admodum dissimilis est, nulli aut persepilla comâ pediculis, cuius flores oblietioris coloris albicans, illius flores satis accedunt, pediculi tamen flores sustinentes in longitudinem non valescunt; *fomes* & *radix* satis conveniunt. Parkinforis omnem præcis comam huic denegat, ideoque Hyacinthos botryodes potius quam comolis referre scribit; *radix* nigricantem & sublongam tribuit, unde *folia* exiunt tres aut quatuor, levia, albicantia, angusta, cinnata; *caulis* pedalis aut altior, hincalium summa parte prioris similibus, minus tamen crebris, ostiis, tantillo longioribus & amplioribus, osculo lanoe, ad marginem interius maculis quibusdam nigricantibus infecto.

34. *Hyacinthus penitus sine comolis ramofus elegantior Ger. parad. Hyac. Samofus comâ parvulus Col. Hyac. comofus parvulus carules C.B. comofus ramofus elegantior Ger.*

Col. 1 mi.

Martio mense [in] ... us quatuor ... yonda molchati nonnihil similibus sed minoribus, brevibus, latiusculis, colore caesio, inter quæ *caulis* ex parte pedalis aut altior, fastigio florum comam gestam speciosissimam, in comâ effigiem efformatam, in innumeros ramulos divisam, quæ cum flores explicantur, utarum racemum ablatis acinis annulato, magnitudine doctantis ferè, panicule graminis Millaci modo paulatim fastigata. Singuli ramuli in alios denso dividuntur filamentorum crispam glomeram extremitatibus contractis & velut cinnamato; colore purpurascente pulchro seu columbino, odore cum gravitate jucundo. Flos gramam suam dantissime retinet antequam marcescat, & tandem nullo succedente semine evanescit. Minus dicta (Inquit Columna) bulbosam plantam vulgarem Hyacinthum non abssimilem, fructu ac semine præcis destitui: an translatione & cultura id accidit, an pumia florentis hermitæ ab ubertate proveniente (Sylvestrem enim nondum videre licet) ignoscamus.

Nos equidem hanc plantam pro specie Hyacinthi nova & ab aliis omnibus distincta habemus, vorum ubi sponte occurit seminis fecundam esse minime dubitamus. At varietatem hanc quæ in hortis nostris colitur Naturæ inno deerranti, aut si majori lascivienti ob alimentum ubertatem, aliunde nobis incognitam causam tribuendam censuimus; adeoq; accidentalis cum sit, frustra in agris sponte prtweitem quærit.

In agro Papensi primò inventum aut IK: adnsm se propagat.

Leno.

35. *Hyacinthus comofus ramofus Pit II. Ger. emac. 4. e. comofus præcis.*

Hujus *folia* latiora, breviora & viridiora sunt quam Hyacinthi comoli vulgaris, non tamen pariter infirma & humi strata, sed firmiora & erectiora nonnihil; *caulis* altioris per; comâ præcedenti similibus, minus sparsa & cinnamata, colore purpureo oblietioris; *R. Vrt fituu in'or* & brevior quam illius pluribus adnata se propagat.

His addo

*Hyacinthum Indium Imü^mn mtnirtm t. B. Ind idM *rt<flw fkitm. leno Swertii.*

Item, *Hyacinthum latifolium m/ mnxpmtm C. B. Hyacinth. Ind. Orient. dictum alius magnus Swertii.*

Item, *Hyacinthum latifolium alium n C B . H)-t:vil'»m Af rccomum bulbo crase, facit Hyacinthi Præcis Swertii.*

7. B. Item, *Hyacinthum Tripoli amm J. It rtUvMt /e Phalangio C. B.*

Folia est longa, tenuissima, Phalangio nostro similibus. *Caulis* fere magnus, in cæca summitate quatuor flores, speciosi, colore & magnitudine similes foliis tribus erectis in parva laxe cærulea; *Radix* lirma & colore Tulipæ similes.

Florebat Aprilis Tripoli, ubi observavit Rauwolfius.

Leno.

6. Hyacinthus Imdtan animalis.

1. Hyacinthus Indicus major tuberosa radix Park. parad. Indicus •tmfmi Ger. laJxm taknfm, J. II

E radice tuberosa Ari Egypti aut Colocazie simili sed longi minore & graciliore, adnata se propagante, multaque fibra praedita procedunt folia multa hemi in orbem sparsa, oblonga, angusta, ciliolata, mucronata Alia foliorum annula; a quorum medio plures exurgunt caules, teretes, graciles, bacillales interdum aut longiores, durisculi, leves, minimi digni crassitudinem mucosam superantes; unde substantiam illam longitudinem & tenuitatem quo tempore fuerit se contorqueant, ac haeni plerumque procumbant, nisi baculis, fulcra, aliisve adimiculis sustentantur. Hos autem caules per intervalla singularia folia alternatim lata basi velut Perfoliatae folia ambiunt, breviora multo sed usque acuminata in qua circa radicem atque in totum hinc inde perituli spicatum coherentia miscere ferri candidi, Hyacinthi Orientalis floribus omnino similes.

Folia nulla de contracta non locis in stamina delucentur quam Bulbi eriochaei folia.

In America seu India Occidentali oritur: in Frigidioribus haece regionibus si omnino vix ante medium Augustum floret.

Leont.

2. Hyacinthus Indicus major tuberosa radix Park. parad. Indicus Autumnalis, ferri simplicis alio alitatum, radix partim tuberosa, partim bulbosa Moril. Indicus tuberosus ferri Narcissus C.B. Cubi I Off.

Floris habet omnium maximam, albam, odoratissimam, Narcissi albi in modum expansam, cum apertis in medio lateris. Caules pedales, robusti & firmi, quos durescunt verna radicum ambiunt folia plurima, dunt virentia, palmari longitudine, mucronata, quo aliam sita in caule eo minora. Radices habet inferas sui parte tuberosam, superiore autem bulbosam seu tunicatam, [geminae haec transferri radice truncata sunt bulbosum instar.] Ex inferiore tuberosa parte plurimum

radicum gaudet natalibus cum procedent. Folia rursus pariter in filamenta

CAP. IX.

De Scilla.

Notum est dicuntur, Scilla maris montis aut de radice alba, & Scilla planta, de qua agitur quavis Graeci nonnulli de plantam ipsam Xantho scribant, minus recte.

Nomen accepit quod inter hanc & testaceum pilarem à tunica squamarum compo- sili ferre maxima humilitate intercedit, vel adhaec nomen obtinet aut si maxime i. e. virilitate, quod in fabulosis marinis sole retrotrahi oritur; copiosius hanc in Hispania, & prope aride Lesbiae reliqua maritima. Lani Scillam dicunt & Squillam etiam antiquissimi. Jn. Bot. à Stapf.

Cepaeo generi tantopere est compar (inequit Lobelius) ut multi eam C.?? MTWWI vocent. At nos Hyacinthos, ut puto rectius, tam adhaec nomen.

Notandum Scillam Graeci veteribus etiam dictam fuisse nomine cum Lentisco communem. Idem Verum tria Scillae genera tradunt; duo medica, masculum alba folis, feminam nigra, & tertium genus, & totum cum gratum Epimenidiam vocatum. Plin. lib. 19. c. 5. C. Hofmanni Epimenidiam orrigit.

1. Scilla rubra magna vulgaris J. B. Scilla vulgaris radix rubra C. B. Scilla rubra ferri Paniceum varium Park. Penicillium Classi Ger. The red Squill. o: Jhera-Onion.

7. B.

Bulbum habet magnam Pomu Adami vel Cario majori sepe patrem, multis crassis fibra donatum, e lamina tuniceis, rubeantibus, viticulis concentricis, sub bulbo multa fibra, e quo folia emergunt superne virentia, ciliolata longa, palmum fere lata, succulenta, crassiuscula, cum multa visciditate armata: inter quae legit caulis Albidus, flexilis usque, ferre longa dispositi & succulenti se aperientes, canaliculis, Ornithogali ipsam ferre emulantes. Foliis. Caulis ut in croco prius possit, tum ex eo flos in luteo candido, qui cum lotura folia demum multo post diebus emittant luteo, nullo nisi pedendo, Cepaeo quidem specie, & plerumque ex his in terram deflecta. Matthiolo nota est Scilla de acris.

Classis Paniceo suo simpliciter maxime tribuit quam Scillae, estoniam tunicae rubeant, folia angustiora, longiora, magis carinata & quodammodo hirsuta. Verum quod ad bulbum attinet, non aliam à Scilla alba differre quam colore J. Bauhensis & Lobelii crassiuscula, cum tunicae extimae hinc rubeant, ut Cepa oblonga, illa alba.

2. Scilla rubra alba C. B. Scilla magna alba J. B. Scilla alba Park. Sc. Hispanica Chaf. 16. Jovis vulgaris Ger. etiac.

Chaf.

Caulis huius usque cubitalis est aut major, rectus, nalis, absque folio, pluribus candidis & stellatis

latis floribus ornata, Alphodeli minoribus, Ornithogalo majori (quod quidam Scallam Elementariam putant) valde similibus, qui ab imis (ut verissime Theophrastus Hist. 1. 7. c. 12. scribit) expleantur incipiunt, quomodum Alphodeli & quomodum aliarum bulbosarum, hirsutam floret. His succedunt triangula *capula* compressis angulis & vix inanis, in quibus tamen nigram, plenum, pulcherrimam *foem*. Quisquid, sex aut plura dentium emargunt *folia*, liliacea, lata, viridia admodum, densa sive carnosa, humi expansa, nonnulli ornata. *Radix* crassa est, multo minus alio loco quodam humore plena peribet, multaque crassiusculis fibris capillata.

Copiose nascitur supra Olymponem & plerisque aliis Lusitanis & Hispanis locis. Floret Augusto *Lacus* & September, semen Octobri & Novembri maturat. Folia maturo jam senescit & exarido caule *Tempus* emergunt Novembri & Decembri.

J. Bauhinus in Scallis albis discrimen à vulgari rubra non potuit animadvertere: præterquam in colore magnitudo eadem, sicutque crasse ac late; ex quibus appareret folia æque lata esse atque rubris. Non placet ergo duplex descriptio Scille albidæ tradite à Dodonæo.

Præterea, cur (inquit) Dodonæus & Clusius Scillam albam veram Scillam censent quam rusticam non possumus adhuc intelligere.

De Scille viribus & præparatione multa habent Plinius, Dioscorides, Galenus, quæ apud ipsos *Vires* vide: Incidenda, aperienda, discutienda vi præditam esse Recentiores consentiunt: unde ubi eius est in obstructionibus hepatis, meatus bilium, litis, mentium retentione, utitur in miscalagis pulcherrimum & raris.

Maximus eius usus est (inquit C. Hofmannus) pro Trochiscis Scillæ quæ Theriacam ingrediuntur.

Habemus in Officinis duplex Oxymel Scilliticum, simplex & compositum, utrumque Meise, ad affectus præcipue pectoris ex pituita crassa, &c. Habemus & *Lacus* eandem duplex, simplex & compositum, utrumque ad crassos & frigidos in pectore humores. *Hesper.*

Tempus in Brasiliensibus, Lusitanis *Cabula* albarum Martii.

Mar.

BoDami habet album, rotundum. Pomi nostrati magnitudine, cuticula tectum umbra coloris, qui inferius multas agit radices, quidam ad novendecim digit longas: producit porro duas, tres, aut quatuor *folia*, pedalis aut sesquipedalis longitudine, quatuor digitis lata ubi latissima, succulenta, dilute viridia, splendens: linea fovearum longitudinalem & latitudinem viridioribus quasi texta.

C A P. X.

Tigris aut C. B. Dod. **Lob. Ger. TtpJ* fitt Dr*** *unali* *specie*, *^, u4 y* B. *Ovianceli* *spu* *Flu* *Tigre* *Hernandez.*

Hunc florem figentium esse suspicari sinit multi Botanici, nec dari in rerum natura qualimodum plantam poterunt: verum *scissus* & inde dignis *ovis* *cruculiam*, qui dari affirmant. Lobelius à Juari de Brancioni accepit coloribus *stibus* *expulsum*, & sic describit: *Vires* *oblonga*, *angusta* & *acuminata* est *folia* è pullo *radice* *bulbo*: *flora* *lato* *criguo* *quampulcherrimo* *notida* *formis* *panicantibus* *varians*, e *cuis* *modo* *lauro* *rubens* *stylis* *exornat*.

C. Bauhinus radicem aut habere porraceam, folia Gladioli, florem egregie rubentem, circa malam tamen album, & nigræ pelli *Tigris* *maculatum*.

Cum C. Bauhino confertur Franc. Hernandez, qui plantam sic describit.

Herba est folia tendens Gladioli, nervis denticulatis densis, & fovearum longitudinalium percedentibus. *Flora* *rubrum*, *magnum*, *sernis* *constantem* *folia*, sed circa medium pallidum albumque & *Tigris* *pellis* *more* *maculatum*, unde nomen. Addeat in corollis floribusque marginatos ob *floris* *prestantiam*. *Radix* *vero* *porracea* est, que frigiditate ac febrem extinguit $\frac{1}{2}$ pondus ex *Vires* aqua devotata, & punctis adversatur que ardentis febres sæpi solent. Sunt qui etiam devotatam, efficere fecunditatem; odoris etiam est, frigiditateque nec omnino impediendi nutrimenti, Liliacea & pectori confertur.

Nascitur clementi celo, quale sonitur ubi Mexicana, hortenstibusque præcipue, humidique & cultis locis.

Radix *oblonga* *Asiaticis* *specie* *ex* *una* *parte* *plaga* *Decyn*

Briza.

Narcissorum aliqua ex parte similis est hæc bulba, nisi quod sepius, hincmaris quomodum longitudinalibus, ad præparationem hanc crassus, *fibra* *autem* *validis* *una* *buli* *Hycanthi* *legit* *Milicam* *diffusa*. Hic in Beveringario hinc *folia* *truncat* *potissimum*, *glabra*, *crassa*, *carnosa*, in macronem partimque exstantia, *læva* *parte* *san* *re* *viridis*, *prona* *dilatata* *a*, *quatuor* *vel* *sex* *uncas* *longa*, *sed* *ne* *duas* *quidem* *lata*, *minuimus* *clivis* *modum* *ubi* *latissima*, que contracta *liberare* *nascibendum* *odorem* (quamvis *læva* *singularem* *amaram* *hanc* *per* *se* *fiat*) *sepi* *ex* *verulium* *cavitate* *in* *carne* *dissolventium*, *tenissima*, *arante* *multa* *libola* *flamma*, in modum *Eriopori* *Peruviani* *præbet*. Digna vero spectari hæc folia *radicem* *narcissorum*, *plu* *sublevis* *spadicea*, *duplici* *serie*, *admodum* *curiosè*, & *ferè* *ita* *imbricati*, ut pro *caulis* *innumerabilium* *in* *altura* *foli* *parte* *appretuum* *guttulatum* *sive* *oculorum* *haberi* *queant*.

Nondum docuit apud D. Bretingh.

CIP. XL

De Syzyzychio aut patri Syzyzychio.

SYzyzychus non solum foliis pabulo bulbose atque carnosae radicis apertudo, sed rostrata
 fixata radice rostrata foliis, movente sagacissimo Columna, nominis causa fuit.
 Non in hoc capite duas toto genere diversas plantas computatissimas, nimirum Syzyzychium
 Clusii, & Syzyzychium Colomae, alteri enim folia in flore novem, alteri sex tantum; altera, id
 est Syzyzychium Clusii, ad Irionem bulbosam accedit, à qua tamen distat radice seu bulbo gemino
 altera alteri insidente ut in Xiphio, & petala illa quae solum reflectuntur nomine hinc, observant
 Jungeo, altera, id est, Syzyzychium Colomae, Croco similior est, verum foliis cancellatis, & ra-
 dice cum epiphyti rostrum suillum referente distinguitur, geminam autem bulbam habet praeceden-
 tis modo.

Utriusque planta satis apte respondet descriptioni Theophrasti & Plinii. *Peculiare Syzyzychus da-
 cum est (inquit Theophrastus) ut una radix primo angustior hinc, tum mox ante vix quod in una exterritur
 contrahatur, superna, vestat quod manducatur.*

Syzyzychium Colomae ob dictam radicis epiphyti melius convenit nomini interpositioni;
 quod rostrum praecipuum significat; & praeterea odore est, quod de Syzyzychio Clusii nega-
 boelia.

- 1. *Syzyzychium majas flore lateri macula utat C. B. Syzyzychium majas Clus. Ger. Ind. bul-
 bosa affinis Syzyzychium majas J. B. Syzyzychium Park. parad. Spanis. Gut.*

Clas.

Odore est angustilique folia, mollicibus quam in aliis bulbosae folia, & ad Allii aut Hyacinthi
 botryoidis folia proxime accedentibus, striatis, venisibus, & hinc plerumq; fusa, rotunda, dorsantali,
 striatis firmis, easque quae ex multis involucris tanquam ex vaginulis flores prodeunt quatuor aut quinque,
 alternatim procedentes, h. e. ut primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps,
 Xiphio petala florem referentes quam Irilia, ex novem foliis compositos, quorum tria distantum
 mixta, pro funicula, linteam maculam habent; alia tria hinc alioque distantem amplexantur; tria vero
 reliqua, quae in aliis ligulam tegere solent, curvata, summa parte divisa & bifida. Est vero totus
 has pulcher aspectu, coloris cerulei, praeter maculas illas, & odore quidem praedicti sed valde su-
 gaza. Floribus succedunt foliolis, vaginis quibusdam cutaces mchati, adeo tenui membrana con-
 stantes, ut *seors* rotundum, parvum, subrotundum, quod in illis continetur, conspici possit. *Radix* bul-
 bosa, gemina, planta ipsa flovente, & altera alteri insidem Xiphii modo; superior plena, candida,
 dulcis, odulsa, & patris exposita, inferior floccida; totam nimirum substantiam ad se trahente su-
 periore, ut in Croco, Xiphio, & tandem transiens cum adherentibus nitens: multiplici vero cor-
 tice reticulato, crasso, nigro utroque Xiphio radice tollat, & aduatis sepe propagat; nam quatuor
 interdum etiam senas aut plures plantas, quarum singulae bulbi suo retiformi tegmine invidua erant,
 alio villosa capaciore, tegumento simul comperentia erant moniam in collum supra Oxyhippo-
 nem ubi hem accretibus, atq; etiam Gahibus non peccat à ponte qui cum insulam continere itac
 coniungit.

Tmpm.

Floret Martio natah solo, sed apud Belgas Maio duntaxat, interdum etiam Junio, idq; valde
 raro, utpote quod alternis usque annis duntaxat prodire soleat, imò paulatim plerumq; con-
 tribetum prolixo tandem sesennio perat.

Hoc genus (inquit Clusius) Lusitani *Nixellae*, quasi maculas aut parvas nubes dicere appellat,
 quia patris illius eius bulbo, perinde atq; Avellanis, videntur, eoque in debetis habent.

Clusio contradicit Gahelius Boelius, referente Parkinsono in Parad. & huius plantae bulbos in
 in loca *Nixellae* appellari negat, infirmos enim eos esse, minimeq; odulsa, verum Croco parvi sed
 vulgaris variegati radice in dca, affert, quae & gustu dulces sunt, & à pasturibus patris, velle
 appetunt.

Lum 15
Tempus.

Non plantam hanc in lingua portum Messinensem à Eryto Saeculo stramento observatissimam floren-
 tem circa medium Aprilem, & in Insula ad Promont. Pachynum.

Hoc refer Syzyzychium flore alba macula notato C. B.

- 2. *Syzyzychium majas Clus. Ger. Ind. bulbosa affinis Syzyzychium majas J. B. Syzyzychium Park.
 parad. Syzyzychium majas C. B.*

Clas.

Superiori (inquit Clusius) simile est, minus tamen gracilioribus foliis. *Floris* è vaginulis pro-
 cedentibus colore superiorum floribus similes, sed magis odulsa: terminos etiam *foliis* minores & ex-
 hore sentunt pleni: *radix* item minor, non minus tamen quam superioris retu-
 xulato ccr
 sumina.

Cruet Valentino Hispaniae regno, sed Mandano frequentissima observabam, perierum tribus
 lina supra *Atacama* Antiquis Murgis, eius regni metropolim.

Floret cum prore.

*. "

Ad venis normata omne esse referunt incolae, sed devorata radice illico corpus esse
 carcerendum.

Clusio iterum contradicit Boelius, & duplex Syzyzychus genus dari negat, nec enim in
 noce aliter quam magnitudine differre quae major est planta in mari vicina naxosibus
 rum alluvionem, aut ante maris affluam.

3. *Sisyrinchium Mauritanicum* Cist. Park. parad. *Sis. flore alba macula nigra* C. B.

Hoc genus flores Clusio protulit *Sisyrinchio* majori Lusitano formâ proculâ similes, non tamen caruleos ut illi, sed purpurei diluatis coloris, valde etiam fugaces & ephemeros, quorum terrâ majora folia inflexa & terram spectantia albi macula erant insignita.

4. *Sisyrinchium Theriacale* Col. *maxi angustifolium* C. B.

Radice habet bulbosam, parvam, Avellanæ nucis medullæ partem, cortice Colchici modo obductam rufâ, qui facillè avellente, rotundâ formâ oblongâ verò, & inferâ non ut aliæ bulbosæ rotundam planam & fibrosam basin habentem, sed in oblongum productam, fimoformem & in acumen deicivientem, Delphini vel Suis rostrata elegantem, levem veluti arte elaboratam, superiorem animalis mandibulam imitantem, atq; palati cavam partem: ex alia verò velut inferiorem alteram mandibulam, quæ tenuis est & lata, rotunda memi instat, ex lata in tenuissimas fibras divisa, tandem densa velut capillamentis quibus terræ adhæret detinens: inter ambas verò lingue modo carnea fibra rotunda longa exit, ex qua se propagare videtur, ut aliæ bulbosæ solent, & bulbos anno sequenti efficitur. Cuius rei signum est cortex inanis bulbi qui supra vegetum bulbum paulo superius invenitur. Fibræ palliæ, diaphanæ ut *Ochridium* fibræ, non solent ut bulbos, qui densus, durus, albus, splendidus est, Castaneæ immittitur sapore. Duas uncias infra terram occultatur, & supra folia emittit quatuor, quinque, aut septem inæqualia, comita, dura, carnea, minima & breviora Croci simili, nec lata, sed *Xiphi* molliora doctum, foliis, distichata, striata. Binos emittit flores oblongos, striata inter folia terre hærentes sex foliis constituctos & sulculo cacumini: quorum tria exteriora viridant vel violacea sunt, reliqua alba, & lincis tribus violaceis per longum ductis depicta, sivestris Croci modo, brevibus inis flammulis. His marcescentibus fructus remanet oblongus, viridis Trilici grano par, trigonus, deinde duplo major, in quo semina turgent, & in superficie proferuntur cutis tenuitatem exulcerantia apparent; fissatis dilanantur & copiosa, minuta, rotunda & nervosa ostendit.

Novembri fine observavimus in hac planta bulbolum emittere superne, uti *Gladolis*, qui tunc parvus admodum erat, duobus foliis emisso, atq; hinc postea creta, folia alia emittit. Quare hinc bulbolum crescere & pinguetate cultum videtur, assare verò contrahi exsiccatum, nam Vero Eubæopense Apoll. mensi cum Bojovet Mario. Hæc omnia F. Columna.

Per viarum pinguis herbidos *Crimole* observavit Columna.

Leuc.

5. *Sisyrinchium alterum latifolium* Col. *maxi latifolium* C. B.

Radice *radice* simili formâ, sed duplo major oblongior, ac multiplici cortice nigrore, inflexis barbata ut superne, sed ex altera manu parte oblonga, plana, rostrata & flavescens adhæret bulbulo, qui anni precedenti erat ventosus, cortex supra vegetum novum bulbum relicto, ut in superne. Hæc precedente succosior est, atq; sapore amariante partem. Fibræ laci, portacet, brevia respectu latitudinis, levia, splendida, omni parum pilosis, *fractis* inter folia, & terra hærentes, ut vir prominent & apparet, trigono uti superne, sed majore, rotunditate, in quo duodecim *semina* in-
tunt, quatuor angulis angulis, crassiora, *Ovobi* aut *Vicia* terè inæqualitate, angulosa parum.

Via quæ ad Aquægenam rursam hinc inter *Ochridis* sive *godes*.

Leuc.

6. *Sisyrinchium Africum angustifolium alterum* Col. *maxi angustifolium flore majore vari-*
gato C. B.

Hæc nunquam anni tempore emicat, *Hyemem*, Januario mensi observavimus in Castro *Afra* dicto, in *Sabern*, olim *Casertum* appellato. Bulbo est crassiore precedente Apoll. cui folia similia quatuor, parva, canaliculata, sed in tenui *filifera* ut mihi animadvertatur, pincta videtur, & colicæ crispæ. *Flores* odore Croci figurâ & odore, magnum respectu plantæ, sed Croci munitionem, candidante colore, & in aliis partibus hinc partes purpureo-caruleæ, & hinc vultus linguæ limbo colore; stamina inis tria, crasso & oblongo capite prædita, laci, medium verò apicem albam, oblongorem, in sex rotunda breviora lacina in summo dividunt, ex pulido cantharum odore. Variat hæc, nam tria ex sex foliis *cantharum* dorum habent vel rubens & hinc varietatum, vel ex limbo vivente linea inter purpureum colorem, aut obtinet purpureâ. *Radice* bulbosâ barbata Apoll. simili, sed majore duplo, eodem sapore Castaneæ, crassa, & bulbo superne propagante. Hinc loca trigonem altera Apoll. nuntiant.

Cora

7. *Sisyrinchium Indicum* Coruzi.

Hæc *radice* bulbosæ, Nucule magnitudine, Croci effigie Marfuci, quam incolæ *blentier* esse ferunt (sicut quidem etiam generis *Indicum* Hæpami opulenti odore, quam *Mysia* appellat vocantibus vernaculis Avellanæ significantes.) Posteriori citatis parte, quam *apoll* vocant *flore* invidi in singulis calibus non singulis, nec ut alia claret, sex folia sunt coloris cantharum: Inferna in eadem parte carulea est, circuliore flavo dactylis, dactylis autem nullis & infima parte cinerascens, modis rem que in nostrorum porrigit linguæ caruleam. Elapsi sunt *in* *filifera* *Indicum* & caruleo, ut *Gladolis*, cortice *Indicum*. Fibræ ut *Indicum* bulbosæ ut *Apoll* hinc munitionem, tæcedunt sunt, & per longum lincem *filifera*.

Ex India Orientali delata est.

8. *Sisyrynchium* ex plantis *suaveolentis flore* & *Ethiopicum* Beeyn.

Beeyn.
Almondine plüquam perläi afforge, folium possidem rotundum, Croci aut Sisyrynchi Indici
Grossi, crasso ex folio carnoso & filamentis odochum: e quo ralis viridi, ut exultimo carno-
sus afforge, folia partem longillimam, partem brevioribus, angustis, nervosa, vegetissima viriditate
colorata, in modum sem Sisyrynchiorum Clasi, amictu; capsä superne pari papaveri erratici in-
star hirsuta, florem ita venustate aspectum delectantem suffulcit, Croci aut Sisyrynchi Affren-
tum Col. grandiorum, folia sex triseriata, e carneo & phornico; necnon dilatä Rosarum
purpureä blandä rubentibus, ad unguem crocum, congestum; capsä in medio *folio* quadrangulari,
crassa, phornici coloris occultatur.

Ex unguis figuræ sunt coloribus ad vivum depictæ, à D. van Beeryngk (in capsä be- no rioruit
ista planta) crassissimè descripta Ja. Beeynium.

Locis qua natale Promontorium Caput Bonæ Spee dicitur.
Vixit hinc trillia & obolitina suberit, & languido collo decolam dependens, velut Poi- 11-
nati ramosi flore hinc Grossi, pari quo, formä & convolutis folia

9. *Sisyrynchium* *tuberosum* & *Ethiopicum* *folio* *placis* *nervosa* & *ovata*, *radice* *tuberosa* *phornica* Beeyn.

Hæc radix tuberosa. Iridem quadratam feniis, viz seiscunciam in longitudine, ac pollicem
transversum in latitudine contingens, non adeo inotivenerit Cygni corpus representabat; sub-
stantiä carnosä, ex phornico crocä lentam mucilaginem continens, & concilli firmiter inhi-
rente, tenui, sanguineo, costata; cui insuper cortex, colore & substantia Colchici similis ob-
ducta fuerat, (cum tubum accepit Axtor à D. van Beeryngk missum) jam rotunda, quo lan-
guineo perpalidæ radice color sine impedimento melius oculis lastrari possit. Et enim Radix
hæc est namq, ut illo quo planta optime argetur tempore incrimata, venosissimam colicis splen-
dorem deperdit, formamq, suam in polli figuram convertat, sub qua crassa inter fibras nova pro-
pago tandem procreat.

Hæc tuber mente Julio raris commisitum parvas post dies *folia* octo aut decem producebat, ped-
licata, palmata, vel etiam pedata, Iridis facie, & que eo etiam modo in latum expansa, mu-
tuoque se amplectendo **ulcctuntt**, obturata arem viridia, incana, hirsuta, nervosa, plicata, &
ab imo ad molium usq, carinâ amplâ predata: E quorum medio *Grossi* pedalis, rotunda, viri-
da, & hirsuta effundebatur, parte inferiori rubicunda; ima modicatis geniculata, singulis ge-
nicula folio angustiore breviorq, cinctis; supra vero pluribus ramis, (quorum quovis **rcibalm**
longum angustumq, comitabatur foliolum) brachiatas; quas Sisyrynchi Theophrasti Col. paros,
sed grandiores duplo ornabant *folia*, sex foliis purpurea, aliqua flavoliva ex phornico colore
incarnata, fortis, leniter hirsuta, costata. His marcescentibus *fructus* ematuebantur quidem
trigoni, nec tamen ut Sisyrynchi Col. oblongi, sed Hyacinthorum in modum subrotundi, qui
perfectiorum debitas non allicati, virides erant, & pilis brevibus, velut caulis folisque, hirsuti,
minutis vero glabris, in tres separati partes, singulis *fructus* singula tantum complectentes, quan-
tum ex fructu facto emicantur hant.

12. *Sisyrynchium* *Perfianum* L. B. *Flos* *Perfian* *Sisyrynchii* *ingenere* Clus. hist.

Hæc *Stipa* Bos (quem solum cum *topena* caulis parte coloribus suis distat ex **UUIH**
vidit Clusio) pulcherrimus erat, summo cauli sem gracili & virentis immixta, & ex membra-
naceo involucro, instar folliculorum qui Iridem flores ambiunt, emergens, tribus tantum foliis
(si picturæ fides est adhibenda) costatis, macrocaris, bitis utriusq, longis, minimum digitum latis,
serio clarioris, cavuli coloris alio elegantis ut cum Gentianellæ cavulicæ floribus comparandis
possit: interna parte ramosa quodam *fructus*, in multas tenues fibras lecta coarctare videtur, ruti
colore, *epicalis* vero albis infra alium additæ aut aliteris flore gemma, suo membranaceo folliculo
etiam involuta.

Hæc picturâ Constantinopoli expressa erat ex altera picturâ e Persia allata

C A P. XII.

De *Gladis*.

Gladis a foliorum formâ dicitur, Dioscoridi *Radice* *foliis* *efformibus*, flexibus in *fructu*
caulis pluribus longa seris & firma pediculi a congestibus distinguunt.

1. *Gladis* *fructu* *Xiphis* J. B. *Gladis* *Narkensij* Park. *Dalces* *Ger.* *Glad.* *fructus* *uno* *verso*
de *pelle* *super* C. B. *1620* *pl. 28.*

Radice & *membranaceo* *caulis* *folium*, e quo alia duo aut tria emittunt, Irâi similis, medio
tamen angustior, utriusq, brachia, & Irâi modo ita inflexa, pinnatis, mucroni, cubito longioris
& glabris *caulis* *angustioribus*; in capsä summitate quatuor, sex, aut septem, egregie figure &
colore

coloris floris, Sole Cancrum ingrediente se profertunt, à se invicem (Hfctnte) in unam partem caulis
 ss, & dorsum nitantes: constant hi lex peralis, nncià partem longioribus, tum ab uno
 exortu producantibus: ex quibus quatuor semencià paulò latiora sunt, colore rosco, sed nullo 6 Ir-
 tiore & palchore; interdu, cum Sole tanguntur, igni & scimillarem modo exteriori superficie
 coruscantia & veluti fragrantia, reflexis labris profundioris calathu figuram referentia: reliqua duo
 foliola parviora multò tenuiora sunt, ac intra florem constituta, Internis aliquantulum prominent,
 & candidam, longam & in medio latiorcm maculam habent, quam undique purpurea linea cir-
 cumscribit & terminat: superiori floris folio floris libell triduum, & inter hoc & folium singula-
 rii ajx. Floret paucis diebus ab inferius parte incipiendo: aperientes enim se qui in summitate
 Inngi, tenibus faulis distincti, nuch Avellanae quantitate, qui cum lunaturerunt, in tres partes
 dividuntur. Sc tonia, paleacea, flavaque femina ostendunt, in quibus rubens, cartilaginea & par-
 vos est ~~scitia~~. **Rajitm** habet non profundam, parvam, rotundam, bulbosam, ab una basi versus
 gemma turbinatam, aliquot crinis & reciculato tunica veluti locum vestitam; quibus detractis duo
 edgit, candidi, carnosique apparent ~~balli~~, uno alteri insidente, superiore quidem Veris initio mi-
 nore sed venenore; inferiore autem majore & latiore, verum flaccido & fungolo; perit enim &
 flaccidore incipit prociis ~~irit~~ **bulbus Vj** rns initio supervascente alio: itaque simul decrefcentiam &
 increfcentiam radicem habet: nonnunquam etiam inferiori subest tertius bulbos, sed adeo flaccida
 & inanis, ut inter sollendum (quia non est spectabilis) negligatur; dum floret superior & minor
 bulbos increfcit, vincitque soliditate & qualitate inferiorem; nam cum flaccidore flos incipit, di-
 giti crassitudinem & globuli figuram acquirat; fibras ab inferiori bulbi basi emittit tenes candi-
 dal. Saporem radix habet pro ceteris herbe partibus excellentem, nempe dulcem & modicè
 acrem; relinquit enim in palato aliquandiu linguam & fauces aliquantulum urentem & salivam
 elicientem [flores & folia stem faciunt J. B.] acrimoniam.

In calidioribus regionibus frequens inter legeres reperitur. Nos circa Libanum in Italia copio- ^{Loca} ~~Loca~~
um invetti mus. Passim Montpelii in legerebus provenit. J. B. In Italia & circa Montpelium ^{Tempo} ~~Tempo~~
 Aprili etiam & M xcc i in frug »loribus Juno & Julio.
 Variat floris colore pjlliiliote & imerdum »Un& alba

a. GUL*It utrinw fiartJui CB. 4*WJ fiorum ~~radonias~~ Put Glad. balisani hinc floris »*»

Vix aliqua in re à precedenti differt quàm flexum duplici ordine in caule; quarvis Parkinfora
 HillCt:n minorem & nigrorem ei attribuat; caulem item obfusciorem; flores pariter coloratiores

j. Gi*2mUt fknbtu MM wr/i Juffejütt mmct C. B. fm-fureui trantr Park. ~~scitia~~ !ob. Ad
 pat: 2.

Lob.
 Minor est qual ~~Id~~ vulglri i Narbonensis Ci lltitolili fird-i. concoloribus, nuncioribus, uno versu dig-
 Hi* in petiU) Ki.ilii f««f /''*«« item duplo nuncioribm. R*«; Siltyrychi aut Gladioli partt.

4. (jUdulut **fuffa gTmm* fail C. B.

C. ft.
 Folia gramincis, ang. «llllllKj j«hMitti.» ^WT^M p«t«m ~~floris~~, [turns aut quateris] pallidè
 ruberibus supra se invicem ad caulis summum utrinque: ~~foliolis~~ minoribus à precedentibus dif-
 fert.

In Mut. na Hispaniz collegit Albinus.
 A rxct demibus non aliter differre videtur quàm magnitudo inc; (jin- Iortè loco debetur. / <<

5. Gladiolo Byr.ontani Park. w<< Byr.ontani C. B.

Pan: om omni<n nugmtudine; fi, ~~rubi~~ uno versu disposita, atro-rubentibus, fervis post reliquis
 omnes se a ~~encntihut~~; r/Uut icernxc 6, frigore miris patente à Gladiolo Narbonensi differt.

6. GtdJtlmt t'rkufeat fort ncm* Oiniutl, ~~Ab Gladiolo~~ KMMI IUITM C B?

Rubrum lubet iinicutn, (nan duplicati ordinis ut vulgari) eumque longi habitioris & aduitoris
 amplexudine, plantam tamen, ac ut Naix vomica depressam: eja caro intima fere vni colorem
 rosco, & gustanti acerrime linguam pungit. Bulbus hic multis tunicis obducatur, singulae nervos
 filamentos ducta in sese & in plexum veluti rotiformem textu fimbriantur. Alia alia insident, ut in
 Croco Myiaco usu venit. Folia sine Iridi nostrati magnitudine & figura similia, longitudinali inter
 se dispersa, qualia in Gladiolo vulgari. Thyris inter folia modis erumpit, nudo limbo, nunc ca-
 mosis (ut vidi) tenui, fragilis, glaber, crispis, atque ex nigro leviter purpurascens. Hujus superna
 pars in coccineam veluti speciem figuratur: adeo bellè florum gemina utroque versu disponuntur,
 ut in Hordeo Adry videmus: prius autem quàm singula hec aperiantur, alia post alia longius ex-
 crescent, tuncque corniculorum modo leniter incurvantur; ac rotolium finatum formant lutei co-
 lora; periculis tamen quo tubulus cauli adnectitur ruber est, nec nisi propius intuenti apparet,
 cum genuino foliolo atro-virente hinc inde regatur. Dum tubi hujus extremum huc, in tex lacinis
 distans, rotidem quoque folia format, quorum tria longiora sunt & obtusa, coccineoque colore ru-
 bilant, reliqua tria breviora admodum & acuta; extra purpureo colore tinguntur, intus croceo, non-
 nulla lines coccineas striato splendent. Ea autem disposita sunt ordine: ~~superum~~ ampleximum
 1

est; subiectum utrinque minimum; que deinceps pedicula magna; infimum autem valde exiguum: uno verbo breviora longioribus interseruntur. A cavo hinc fiunt quatuor *rami* flant, que per superius folii sinum descendunt inaequali longitudine: inferiora duo humiliora sunt, tertium clausa est; singula perperam *apicibus* ornantur, liliis parte superiora, prorsum vero duplici linea ex pulvere lacteo connecti distinctis. Quartum flamen sine apice est, & lingua serpentina modo trilicium apparet.

Leu.

A Provenatoris hinc spici dicto delata est egregia hinc Gladioli species.

Gladiolus Africanus, radix tabernis, Cere filia Bryn.

Tuberosa constat *radix* crassa, penè pugillari, foris ex cinereo fusca cum aliqua flavescina foedescens, intus carnem solidam cerisea colore habentem, in superiore parte colliculi instar subrotundè elevata, ac fibris multis ex una circulari serie planaque basi diffusis, de qua hinc radices plerumque in conjunctis ut facili tamen negotio separari possint. *Folia* ex colliculorum verticibus prolata erant, Cere vulgaris formam, colorem ac magnitudinem emulantes, concava, aut maxime levi, spongiosa, ut & spumè quidam glutinosi sapore larisa: hinc folia tenues veluti glaci coloris habitus hifundant, qui levissimo tactu desolantur: Hocum primùm emergentia inferiore parte incumbunt terra, superiore autem ea se erigunt figurè, ut cornua penè tauri representent. Caudem (ut ferunt) impolite rotundam, foliis minoribus vestitam junctis, & *floribus* laevo-ruberitibus, cacumen emittentibus densissime spicatum: hi Gladioli *Aethiopia* *Ceres*, dimidio breviores, nec eo modo incurvati, in modo *ramis* apicibus hinc donata, complectentes, è calyculo Unorum tuborum membranaceo Canna Indice progenerantur.

An *Radix tabernis* Provenat. hinc spici, esse *txmti tr*j** iv. tra?

C A P. XL.

De Colchico.

Chicum dictum est quòd plurimum in Colcho nasci Magnitudine sua & totius lateris Lilaceis, va aJb lauinjlrix nujonbu^ .; Croco a i alla verisimile est, distinguitur.

A. i. *Colchicum* MM OB. *Colch. Anglicum* Jnrpffl, & *Anglicum alium* Park. Ger. *Colchicum* J It ttraftoln ^, affren.

Ced.

Autumno est quinquiescens, nonnunquam etiam dodrantalem, gracilem, glabrum, candicans-tem, atque egregie teneritudinis *radix*, in cuius summitate ses Labo non dissimilis, sed minime repanda & collis in dorsum folia, sex petalis, longitudinali scissuram aut basin nJUilKku, b> tendunt verò unci paulò angustioribus, utrinque acuminatis, glabris, nitidis, pinguibus, in atria glutinosis, primùm clausa & convoluta, postea se explicantibus consistant, colore in subrubente purpureo albicant; in modo lacteo colore *ramis*, numero ipsa floris sola non excedentia continent, qui postquam unum atque alterum diem duraverint flaccidescunt: dense paulò post *apicibus* Verò initium *folia* præfert, longitudine dodrantali, latitudine verò unciæ aut sesquialte, acuminata, crassa, Lilaceis formè & substantiæ lentore similia, sed longiora, sub terra coarctata, & tunc, tunc, candicansque pediculum consistunt; in quorum medio prope tertiam utriculis exte-riora, acuminata, triquetra, longitudine ad sesquialteam plerumque accedens, lanuginè verò unci-ana superfluum æquata, rotundo, nulloque majori, primùm cavido, ætate deinde post Solstitium maturiscente, ad rufum in nigro colore transiens MM 4-j(c.i) quo *folia* flaccidescunt. Invenitur nonnunquam duo aut tres utriculi simul conjuncti, & ab una radice procedentes, cum eadem radice totidem floris præterit, sed una tantum ex his magnitudine præstat, alia veluti abortivi sunt. *Radix* nitens longitudine sesquialteam, modicè in planitie compressa, lineamine unciam plerumque quartæ ejus parte excedente, superius turbinatè, inferius autem lamellata parte veluti in partem unguem deflexa, & candela filica in terram demissa, & parva bulbis circa latera ex-ternè se propagat, foris multè in rufo nigro tunica vestita, ex quarum numero ejus ætatem cog-noscere potes: Singula enim annis singula superindat tunica, quibus detractis reliqua radice pars externa, totaque candela, & hinc lacteo plena est, eadem ab una parte rimam veluti habet, per quam floris coliculis transit; hinc enim non è superiori & acuminata parte majori radice *Autumno* perit, sed ab inferiori flaccidescit unguè & lacteo, contra reliquorum bulbosorum moroni. Ea verò radix à cuius mucroni M I & folia emittunt, sicut caret ulque in Autannum, duntaxat *folia* parvula alia emisso hinc perire solent. Hinc est quòd radices, quibus Verò & *Autannum* principio folia insident canaliculatum illam silvam non habent. Eadem radix que priore anno germinavit, sequenti flaccidescit, Autumno succedit alia admodum parva, inferius adunata, à cuius superiori parte Autannum floris prodit: (non hic minime à majori ex) *nam* hac radice un- cum floris adolefcit; in Vere autem & ætate sequenti simul cum semine ad justam magni- tudinem pervenit, quo tempore prior omnino perit. Succata radix tam foras quam intus fusca fit; superius habet dodecim, semisimile anarum tantum silvam provocans, & aliquantulum nardo- sim. Omentum verò omnia hec hinc parva gravem & nauseabundam ferant.

Leu.

Nascitur in pratis tam planis quam montanis, solo par- tam in Occidentibus, quam Borta- libus Angliæ partibus: nec nunquam in transmarinis regionibus.

> Sollicium

Colchicum Anglicum album Park. candido flore Anglicum Lob. a descripto non aliter quam floris colore differt, quoniam dicit Lobelius. Hoc autem more accidentarium est, nec speciem minus. Nos enim neque vidimus neque a quoquam audivimus, ullum aliud præter descriptum Colchici genus in Anglia sponte natum inventum unquam. Certs mini uo in montanis & collibus præpè Brilfoiam occurrunt.

Fortè Lobelius Colchicum polyanthum IKS album Cuf. five P-innonictim, quod in honi> calium vidit, per errorem pro Angi. is diihincto tubuit.

2. *Colchicum album*; cum pMrpurafctMibw Unt.t J, U. Ctkb. muuritt alitrum Cluf tx a'fo farfw^ u* C.B. vtntgtmm sit cram Vark.

Floribus candidis perpurata&entibutUna, Scnxulis eleganter perfpchUa prxcedente diffett; in reliquis ferè convenit.

J. Bauhinus in Helictu iii convailibui ad radicem nwnm WsJJirfall uivenit Septembn ftorenctm.

R<periftir flort pleno.

3. *Idumm fmftrta-Uuimm aragatum* CR vtr/itclvr Cuf.Park. muuritt Cluf.

Non minus crasso est bulbo quam Pannonicum muuritt, vel etiam crassiore. Octobri paullo feris quam superiora bios, ternos aut quaternos producit flores, vulgari breviores & brevi pediculo innixos, ut vix supra tallarem antollantur, quorum interiora tria folia ex purpura quodammodo rubent, aut Hilpania montani floribus concolores sunt ut plurimum; exteriora autem tria vel octiduo lacte candore sunt, vel interne media ex parte purpurea, aut crassioribus purpureis venis radiatim distincta, vel purpureis maculis aspersa, omnia vero mucrone magis orbiculato & obtuso quam in vulgari. Hujus folia i mcuiiu- vere germi;untu ex viridi purpureasunt, deinde explicata saturatius vinent vulgons loliii

4. *CiLuxm Tttmemam *l!nm* Pirk. p*l)**tbt i a!m J, 1. candidam multiflor „« C U.

Bulbo majore; folia dilutiùs viridibus; floribus lacte candidis, ab eodem bulbo pluribus ad septem, denos aut duodecos &c. à Colchico communi differt.

Autumno prætis quibusdam Viennæ Austriz vicinis non procul à Danubio erit Clufia.

Leuc.

C*lttrt>m fJiffOtbtt fivt mmUjivrnv fmfntum IA't.u J. 1).

A precedence non Jucr (juim flora colore didere viJctur.

5. *CekbicMM Bjanwium Utiftiaem ftljMbt i Citrf. j. B. 8;jz*:t*itm* Park. l*» *Hellebori albi* folia *d)*mt>3t C B.

Novo vere germinat, ternoque aut quaterno producit folia amplissima, Hellebori albi folis nec forma nec magnitudine valde assimilata, nec illis minus nervosa, magis tamen viridia, & sese mutuo amplectentia. Autumno cum vulgari numerosos fert flores, et viginti aliquando observare meminerim ex eodem bulbo procedentes, vulgari quidem floribus forma & colore præpè similes, sed ampliores, crassioribus pediculis innixos, tota dilutius, interne tamen purpureascentes, & tanquam venis quibusdam per folia spuris notatis, in quibus fames ut in vulgari. Satis copiosam fomes fert interdum in triangulo, laxe, brevibusque capsulis sine folliculis, triplo crassius vulgari. Eius radix crassissima pagnum æquans vel etiam amplior.

6. *Ctlchkm JjSt*x*m FrttiU*nam* Park. *Lepitanicum purpureo om alio H* uti coloru Cluf. J.B.

Hujus plantæ florera tare describit Clufius, Parkinsonius rdtquuaU:n partes accuratiji. Uco* que descriptionem ejus adhibebimus.

Flores hujus majores & longiores sunt rjiunve! AHRIKJ, vel Pannonici, ad præcedentis flores proximè accedentes, epulèntique ferè cum illis coloru, paulo dantaxat limatiores, maculis tessellatim (ut in Fritillaria flocc) dispositis purpureis, sed floridioribus, & vel è longinquo contiam; Folia hujus ortu suo reliqua omnia Colchica Autumnalia præveniunt, siquidem ante hyemem semper emergunt, quinque vel sex numero, brevis potius quam longa, basi lata, tenuitate acuminata, canaliculata seu concava, quasi in circulum disposita: & sese mutuo una parte amplectentia, colore pallido; seu ex viridi canescente, à reliquorum hujus generis colore devio. Radix Aici aut Pannonici perfimilis, paulo dantaxat major. Floret Autumno omnium primis.

Colchicum latissimum Boslioni Cluf. Clufius ipse hoc referendum suspicatur.

7. *Colchicum Niv. omes Fritillariæ* Park. flo. f>*«!« *nqfar rjfelati* C. B. *Colchicum* Nast. Qul. hilt. A: p. 1.

Park.

A præcedente, cui alio perfimile est, differt florem colore limatiorè, adeo ut nuncule tessellatæ & longinquo etiam conspicatæ sint, floribus Fritillariæ abscissisunculis coloratæ similes, & quam præcedentis pulchrioris & speciosioris. Folia post flores brevia erant, tenuia, nonnulli longiora quam illius & obscurius viridia, ad cinereum tamen tendentia; nec adeo dècenter se orbem distulit, sed crassiora, & velut inter se complicata.

Clufia

Clivus Neapolitanum sicut paullo alter describit. Flores, inquit, quatuor aut quinque protuberant, non adeo alte insurgentes ut in vulgari, sed breviores, quocirca, folia luci opposita tessellatim distincta apparerant, perinde fore ac in diluore Frutillarum flore. Semen etiam abunde præbet ad genus, sed in minoribus brevioribus capitibus quam vulgare.

8. *Colchicum Frutillarum Clivæ Park variegatum Cornuti.*

* *Cornut.*

Aurumno statim incunte supra terram folia emergit, mille variegata maculis, dilute purpurascens, quadrata & in quincuncem disposita, ut in Melagrædo Desl. Singulis vltis petalis uncti albeicentis quantum vena, que per eorum medium ab infima parte ad macrobem usque præcepit. Filamentum tunc ac Ion. ¹ corollæ apicibus donata, à cavitate floris oritur. Bulbus huic plantæ pro radice est, tunica habens plures, coloris ex nigro rufescentis, interior multa bombace nuntiat: conspicuum id est si quis delibret. Post florem folia sunt atro-virentia, angustiora & breviora nostratum. Æstate media seminibus turge rufis, quæ siliquæ coruæce virides oculatam coarcent.

Park.

Folia huic plerumque tria & quatuor emergunt, pallidiora seu hilaris viridia quam præcedentia, humi appressa, ad basin lata, leviter mucronata, ad marginem sinuata, seu undulata & veluti crispata seu serrata. Radix parva, oblonga. Flos pulcherrimus reliquis fere minor, serius Autumno adulto, nec fore ante Novembrem se aperit. Hyemes nostras agrè tolerat, sed paulatim fere iniquat, bulbo quotannis immutato, donec tandem in unum emonturfic emittit.

9. *Cddx*M mnt*wnm*frjff:luaH C B. mum. fierr f*f*n* J. B. MNWAWM* // .spanicam ; j1,f; iw<r. WMIIJW Mmu l'jrk. Ger.*

Claf.

Terre 14 ant ototonu huic iunt M> digitalis longioribus, carinata, firma, humi tamen sparsa, semina viridula & sparsissima, vis sennamiam lata, acidi gustus, rufescentium colorum contrahentia dum tabescente incipiunt. Flos sine foliis primum exat Septembris, aliquando etiam Augusto, sex longa, angusta & ex perispermis rubentibus foliis, totidem in medio filamentis consistens. Hunc statim (præter aliorum Colchici generum morem) folia subloquuntur, & notam deinde hyemem perdurant, usque in mensis Martii vel etiam Junii. Radix bulbosa, non magna, multa ex rufis nigricantibus tunica amicta, intus alba, solida & cum quadam adstrictione dulcis, longioribus sode, quali in cæteris generibus, & adnatis in lateribus se propagant.

Collibus Salmanticæ vicinis, solo valde lapidoso erant Clivus cum suo caule doctantali firmo & triangulari capite, in quo semen ex rubro nigrescens sive fuscum, leve exiguum subrotundum.

Datur supra varietas in floris colore, cætera interiora petala tota alba, exteriora modis ex parte Tinflia, altera carni quodammodo te.

10. *Colchicum Salmanticum * ciui. f. a*

Hore erat diluore & in tonnuJK pU; nis lactis unmo cuiJorti Hoc vulgari ut m v:t, ;; ewite rate t uxat profertem.

11. *Colchicum t.mrnm Out) B. P*fk- <ffl*> UffM*um C B. W* m Ger. emac.*

Novo vere cum Dente canino Croco, verno hoc Colchici genus prodire, & unum aut alterum florem una cum foliis producere solet, primis quidem diebus antequam sese explicare & pandere incipiat, coloris albi, sed qui paullo post in purpureum diluorem mutetur, brevi pediculo subnitum, sex petalis constantem mucosibus & angustioribus quam in vulgari flore, & Croci verni albo flori formâ valde similem, singulis foliis ex infima sode albem præferentibus cætera. Exteriorum trium solorum flamina interiorum flaminibus sunt tr-n. E medio floris umbilico oblongo-fusculus exilit stylus, staminum longitudinem superans, albus, in tres partes summo divisus. Nascitur verò flos ille inter terra folia, carinata, sese mutuo complectentia, Colchici vulgaris foliis longè angustiora, montani tamen Hispanici foliis paullo latiora. Flori succedebat triangulare membranaceum capitulum, haud magnum, semen continens rotundum, subrotundum. Radix Colchici vulgaris radici sive bulbo, formâ qualem similia erat & fusca pelle obducta, sed longè minor, multas candidas fibras ex infima sode protuberante spargens.

Non convenit inter Botanicos an Colchici radix sit Hermodactylus Officinarum, alii ad aspartum, alii negantibus. Doctores & peritiores diversam faciunt, inter quos J. Bauhinus & J. Bodeus à Seap. Hermodactylum non esse Colchici radicem putant, quod Hermodactylus retinens albus permaneat, nequaquam rugosus, modice durus tandem, talis sit, pulveremque habeat candidum, que omnia Colchici radix siccata non habet. Ait J. Bauhinus Colchici radicem videntem esse, Hermodactylus præcipue ventres innoxie gustari posse. Interim tamen, annuunt Trago, admodum illos quorum interest pilulas pro podagrica describere, ne his consistat Colchicam seu Hermodactylum adhibere velint, quod, inquit, hactenus magno cum errore commissum fuit. Ceterum Arthride laborantibus Colchici radicem usitam esse Arabes scripsere, & nos aliqua ex parte experti sumus, sed tum cum foris tuona intpatuttif.

Fier.

KMU.

13. *Colchicum pumilum Croci folii* y C. B. *mmimam tenuifidum* GMUtmm Lob, AA purt i in

LA.

Pumilum hoc Colchici genus *folii* est Croci montani minoris, humi sparsis, uncias binas aut sesquianciam longis (nisi folia duo solum dedit J. B.) *radice* Colchici, Avellanæ parva nucleum æquante, sive una cum foliis peduncante, sensu constante petalis angustioribus, porporantibus, totidem, staminibus, apiculis luteis præditis, è brevi pediculo, parum è terra emergente.

Ex Hispaniæ regione Gallæcia opera *Le Quin* rhizotomi Lutenani delatam est hoc genus.

Licet

CAP. XIV.

De Croco

CROCUS à Croco puero in hunc florem verso dictum fabulantur l'otxx. OVKL Metamorph. 4
Et Crocus in partem versum cum Smilace florit.

Potius *versus* dicitur à *versis* vel *versis* trama, filum, villus, id quod statim inferitur, cuiusmodi sunt Croci flammis seu villi, qui *versis* appellantur, qui plerumq; terni, nonnunquam etiam plures in floribus modis conglascuntur, & cum foliis in ulum veniunt, per excellentiam Croci nomine donantur. Nec Croci tantum foliis & alierum etiam flammam *versis* appellantur, Nymphæaz v. g. apud Dioscoridem 4. c. 111. Liliorum apud Plinium 1. 31. c. 5

Croci nocte sunt flores nudi, creati ab ipsa statim radice orti alba, pediculi herbaccis, Folia angusta, graminata, linea in medio alba secundum longitudinem decurrentia.

1. *Crocus vernus latifolius albo variegatus* J. B. Clus. J. B. *Crocus vernus minor albus* C. B.

Clus.

Hujus *folia* Croci sativi & legitimi folia satis rufescent, nisi breviora essent: inter que lini aut tenui prodeunt *folia*. Croci albi floribus maxime, petalis mucronatis, quorum forma cæteris (que pallidula sunt foci) tribus talibus ex auro porporaceis ab intima basi ad extremum folium ductis striata, interius alba sunt, ut & tota interna tria petala, *stamina* in medio alio habent Croco montano simili, sed magis pallentem *filum*. Liberalis hæc semina præbet in triangula capitibus rotundum, ex fusco candidam. *Radix* albi simili, foci mucronata fuscis obducta, ibi minima fode donata, & unius alba.

Reperitur hujus species per omnia minor, que Croco vern. latif. albo variegato a florell (*Clus.* Crocus vern. minor porporaceus C. B.

Crocus vernus latifolius albus vel variegatus C. B. An Crocus vernus flore cinereo striato Ger.

2. *Crocus vernus latifolius albo flore* Clus. *Crocus vernus latifolius albus variegatus* C. B. *vern. latif. albo flore, interdum porporaceus* v. c. *vern. J. B. vernus flore albo* Ger.

Quarta plerumq; habet *folia* latiuscula & brevia; veni albi speciem unã, filum duabus per totum longitudinem escartentibus præditis; inter que petala è membrana *filum* unum aut aliter, brevi pediculo nuda, *folia* constant alba, una parte cum pediculo (qui in hac specie brevior fore est quam in aliis) porporaceis, tria *stamina* cum apiculis oblongis, luteis, *filum* breviorum in tria folia similitera crociæ divisione circumstantibus continetur. *Flos* in hac specie nuda concavus est & ventricosus quum in flavo-rubro, petalis luteis, obtusioribus, concavis, alio ut via unquam aperiantur, ad linguas porporaceas lineis striata: interdum etiam tria folia interius tribus lineis porpureis per totam longitudinem ductis striata sunt. *Radix* candida, tenui cortice arida, pluribus filis candidis infima fode prædita.

3. *Crocus porporaceus saturatioribus lineis striatus*. *Crocus vernus latif. porporaceus variegatus* Clus. J. B. *vern. latif. porporaceus variegatus* C. B.

Folia quatuor aut quinque digiti longitudinalia vix excedentia, culmum læta, carinata, linea latiusculis mediana percurrente, *Flos* è membranaceo involucre dupli *folia* consistunt exteriora, hexapetala, petalis penè paribus, quorum exteriora tria pallida almodum porporaceis exterioribus, tria interioribus lineis porpureis ab angulo ad apicem per totam folii longitudinem ductis, que ad linguas virgales spargunt, tria superiora exterioribus nonnulli breviora interioribus & colore exterioribus similitere tribus partem linguæ marginale porpureis ad linguas strias longas eorum ad marginem usq; foliorum exterioribus continetur, insignis. Lineæ hæc utriusq; conglascuntur sunt, & e. tam interna quam exteriora foliorum longitudine. *Folia* exteriora interna superficie interius porpurea sunt quam interiora, teraq; mucronata, concava, mucronata, scaphoides. *Stamina* crociæ tria rubentia, triadum, non almodum longum, tria *stamina* decussata, longis mucronatis apicibus erectis donata, flavis & multo pallidioribus quam *filum*, eo unum nonnulli prædictioribus. *Radix* majuscula, rubicundum similibus, numerata lobis foveola.

Orbis bulbum Fœnæ Italia ad Clusum tunc Alphonso Parisi.

4. *Crocus*

4. *Crocus, »* *verus latifolius striatus unguibus violacea. Croci verus latif. purp. fl. minor Claf. f. minor* *Claf. f. minor*

Folia haec longa & lata, lateraliter mediam longitudinem percussunt, utraque pierumque ab eodem habito: inter quae folia pediculo longo & membratissimo involucro exurgit, amplius, oblongis, petalis exterioribus tribus internis longioribus, mucronibus acutioribus; utriusque mediae sui parte propere unguis, ut de ipsa unguibus, & caulis parte superiore lateribus purpureis seu violaceis: [inter in unguibus petalorum haud color nihil apparet] quoniam unguis exterior albescent. Petala exteriora ad marginem interdum candicantibus limbo varia sunt; interiora ad marginem tam exteriora quam interiora & purpurea albescent, laterioribus purpureis venis striata seu virgata: interiora autem parte haec venae sui lineae confectiores sunt. Stamina longiora sunt in hac quam in quavis illa nobis descripta specie, apicibus flavis lato etiam longiora. Stylus ut in rubra tritida, flammula non multo alior, equaliter cum apicibus coloris, aut paulo etiam pallidior. Radix crassifolia, lateribus albi peribula. Flos petalorum marginem plerumque, spectantur aut interiorum convolvuntur, ut flos integre vix unquam explicetur.

5. *Crocus verus latifolius purpureus flori minor Claf. J. B. verus purp. Ma Park. verus latif. purp. violaceus C. B.*

Folia est Croci albo similia, paulo tamen angustioribus: flos proterum equaliter magnitudine, brevi pediculo immixtum, violaceo ad crurium tendente purpureo colore, unguibus & limbo pediculo saturati purpurei nitentibus. Radix praedicti similis, & in eodem solo loco fixanda interdum. Nonnunquam, sed valde raro, flos fert rotundum exaltatum in triangulari capitula.

In agris & pascuis Romae vicinae Februarii initio florentem invenimus: necnon in pascuis montibus prope Curiam Rhetorum, & in humilitate montis Jura sed multo fortius florentem. Reperitur etiam & in monte Baldo, & Alpibus Helveticis & Bumis Rhetorum.

6. *Crocus verus latifolius purpureus flori major Claf. J. B. verus purp. major Park. verus latif. flori purpureus major C. B. verus latif. fl. purpureus Ger. emac.*

Haps flos petalis formam similes, petalis multo amplioribus, licet colore non valde disparibus, nec insipidum odorem, quoniam exteriora tria paulo longiora interiora tria breviora amplectuntur. Stamina alba sunt, magnis floris apicibus praedita, inter quae folia est paulo longior, extrema parte in tres quasi tubulos laxosque divisa, aerei coloris. Cum flos exortit terna aut quaterna folia praecedentia non dissimilia, paulo tamen longiora. Radix superius nigra.

7. *Crocus verus latifolius flori major flori 1. Claf. Cr. verus latif. flori major C. B. verus latif. flori major Ger. emac. verus latif. flori major Ger. emac.*

Quoniam aut flos habet folia, terna, instar fere legitimi Croci, inferiora parte ex purpurea nigricantia, & quorum molio unam aut alterum flos proterum, aerei fere coloris, legitimi Croci odorem nonnihil referentem, petalis exterioribus paulo angustioribus & magis mucronatis, tribus crassifolia radice ex atro purpureo colorata ab imo ad summum lacundum petali longitudinem excurrentibus, & multas intermedium venas in latera surgentes insignitas: terna interioribus lateribus, & unguis flos etiam ex atro purpureo colorata. Pediculus quo flos sustinet totidem purpureo coloris sunt radice notatur quae sunt in flos folia. Umbilicum occupant tria flava filamenta, inter quae folia erigitur extrema parte tritida, aerei coloris. Floibus loculantur crassifolia trigona repae, alio limbo purpureo colore infecta, ut atra videtur & splendens, quae maturitate hinc inde flos continere conspicuntur rubrum. Radix praeter aliorum morem multiplici reticulata, cortex obducta, & multo multo fibris tenuibus, per tubulorum conficitur tubulis se extendit praedita, 12. & ab hinc habet praeter.

Crocus vera latif. flavo-variis flos 1. Claf. A descripto solo flos radice differt, qui alio latif. flos spargunt, Lt praeter ora terna exteriorum terna foliorum doctum insidant; pediculus etiam flos sustinet et purpurea nigricantia splendens. Flos dodecapetalus & in uno caule gemellus interdum hinc.

8. *Crocus verus latifolius flori major flori vulgaris. An Croci verus flori striatus Park?*

Flos flavus, aut potius pallidus, legitimi Croci odorem nonnihil referens: exterioribus tribus petalis paulo angustioribus, tribus crassifolia radice ex atro purpureo colorata exteriora parte ab imo ad summum lacundum folia longitudinaliter excurrentibus, & multas intermedium venas in latera surgentes; terna interioribus paulo lateribus, unguibus etiam flos atro purpureo. Pediculus quo flos sustinet totidem atro purpureo limbo praedita quae sunt in flos folia. Umbilicum occupant tria flava filamenta brevia, apicibus pallentibus praedita, mucronibus quoniam in quavis alia specie terna habemus vili; inter quae folia erigitur aliorum praedita, summa parte tritida, reliquo brevioribus. Folia haec spacia angusta, longa, antice convergant. Radix parva terna in solo loco hinc immixtum se propagat per omnia nobis cognita Croci species, alio & ab hinc immixtum hinc haxalano contraria in.

A Croco verno lanif. flavo-vario flore Clusu differt quod nec bulbus reticulato cortice obductus sit, nec raro adnatos bulbos profert, sed frequentissimè.

9. *Crocus vernus latifolius* aut *tyfivrt*, CluC veraut *Usifal*. dtratt C B.

Flores huic speciei folia plerumque anteverunt breviores & ventricosiores quam flavo-varii p^oj-
mè descripti, aureo colore insignes: In nonnullis petals averta parte linea viridis secundum longi-
tudinem media dividit, cui ad ungues duo minores parallelæ oppositæ, unde florem pediculus sex striis
viridibus insignis est. Intus stylus brevis trifidus, quem circumstant filamenta tria, apicibus donata
stylo multo longioribus, è lamella basi in acutum mucronem exsertentibus, ad modum floris diver-
gentibus. Tum stylus, tum funiculus sunt concoloria.

10. *Crocus vernus latifolius* at *fi*V* f* vs Clul. *vernas!* *fiMCMi* P<< *favo* J. B. *vernas latifolius*
favea C B. *vtrw fuu kit* C*.

Quædam huic aut plura sunt *folia*, ad Croci lanif. purp. versic. flore valde accidentia, longiora
tamen, & circa exteriorem latiora, bina candida venis secundum modum nervum per longitudinem
excurrentibus, quæ emergere incipientia florem simul ostendunt cum petals exterioribus mucrona-
tis, internis paulatim obsoletis, flavo colora, utique odoratam, tunc longioribus latiusculisq. *fa-
mentis*, dilatis flavescens intus continentem, & longioribus *stylis*, lamis fastigio in tria lamina
divisum, latvi Croci filamentibus parè concolorem; cui succedit membranaceum triangulum *capu-
læ*, rotundo rubroque *semine* plerum. *Radix* cum supradicti Croci radice convenit, vel etiam major
est, solida, aliquot candidantibus fibres scissis parte donata, & aliquot tunicis circumdata. Rarior plu-
rumque, ternos, aut quatuor vel etiam plures profert flores: in *lu en 10* Croci verna speciem huic li-
beratur in producendis floribus.

QrtiCM tKTHM iJtiJaUui faluao fit' vs Clul. *vera latifol pallida* C. B.

Florum petals magis mucronatis, eorundem ooiore omiuno palliJo, viridibus venula cruce toruin
trum unguis foris distinguentibus à descripto differt.

In Serria seu Murcia *enure tab fidJograUo Mittio uiciile florentem emit Stepli viit I buloi L<w*
Non•argensis.

11. *carulea* *fiwt 1/1*1**11 micUmm tamduiu 11\$** J. B. *C' wwi* (*ier*.

Terna, *nutucriu* aut plura ha *Kt f*14, KWRJ* *viridula*, Crocina longè angustiora graciliora
rotunda & capsulacea ferè; inter quæ prodeunt basi aut term *cauliculi*, uniaxio ut plurimum, angu-
losi, sustinentes flores cum petals imâ parte flavescens, intus nonnihil candidantibus, reliqui ad
caeruleum tendentibus sive violaceos, [intermixtis & toti candidi] odoratos. His succedunt *fil-
liculi* sive capitella trigona, exilè *semine* fulvescens consistens. *Radix* exigua Avellane magnitu-
dine, dura *IpodK* oblique cortice sive putamine tecta; intus alba, firma, subdistingente gustu.

Frequens invenitur Gallibus, atque inter Alindum (vulgò *Melona Salina*) & Calpen locis *falo-Lan-*
brofis & aprica.

12. *Crocus vernus angustifolius* 2. Clul. *vera angustif. I <m*> Mb* C B.*

Folia *fc radice* externo cortice præcolenti omnino similia est, paullo minore *fior*, ex albo purpsi-
rescente, visque è terra prominent. *Radix* gemina, candida, una super alteram intidet, quantum
superior firma, dulcis & oleosa erat, inferior flaccida.
In Betuzæ collibus Lusitanis finitimus observata Clulica.

13. *Crtau vmrnt m^ttjũfũltM\$ vuiem fixt* Clul. *van. Mfujlif. ftrwfi* vs C. B. *vtrmi nw-
wr Gci.*

Ubocoribus & crassioribus est *folia*, aliq. internis interiectis: *Flo* duorum præcedentium
longè minor, totulque caerulea, tribus exterioribus petals exceptis, quæ foris viridem
nihil aspersa sunt. *Hujus radix* priori formâ similia, paullo tamen major est, *semine* *crassius-
culum*.

Gallibus duntaxat juxta primim Ipeccitn invenii C:usim Febuaris :litio.

14. *Crocus vernus* 4. *fvs violacei flore* Clul. *verus justifolius purpurei* C. B. *caulic. angustif-
folium flore violacei* Gci.

Terna habet aut quatuor *semine* & *folia*, primo angustifolia similia; inter quæ uncialis tenuis
cauliculus prodeit, membranaceum *foliolum* sustinens, ex quo *semine* emergit purpurei lanæ coloris
, *pecta* *foliorum* unguibus alba venis distinctis: *folia* è flore umbilico prodeit. Pæctæ admodum est
hæc nos, utpote qui unico duntaxat die aperta manet. *Radix* parit Ipeccit radii par, multis *se-
mine* *caulicibus* dura tecta.

r iicu 1.

15. *Crocus vernus cellulari folio* J. B. C. B. Cul.

Chc.
Ergatum habet radice, belbetam, duro spithico cortice radam: & quæ producunt duo auribus, angustissima & quæ capillaria folia, viridia, torveta: unæ quæ pulchre vixit quibus variculis, unciali longitudine aut paulo major, ab una parte platis, lullinis, immutabili magnitudine fere, petals tubæ cæmurentibus paulo longioribus & purpurei coloris, tubæ verò semimodice fecundam longitudinem variculis distinctis; tribus intermedias herbariorum se dilatare colore præditi, omnibus autem unguent dicitur purpureal omnibus, & unguis balneantes pallide, tertio verò distincta, prædantibus ætundilibus tribus *femore* heribus, longo æque flavo pediculis, & fructu *fis* curvata parte *ovis*.

Floribus præbet natio Maii, quæ Sole splendens aperitur, sub noctem clauditur, & paucos dies durat, nullum aut periculum odora.

16. *Crocus vernus angustifolius variegatus* C. B. *vernus æreus variegatus* Eyll.17. *Crocus* J. B. Ger. *serotus* C. B. *verus serotus* Anatomia Park. parat. *Saffron*.

J. B.

Constat hæc *bulbo* dulo, Avellanæ, (interdum etiam Juglandis) magistraline, tunc et interdum etiam in terra & oblonga capillamenta filia fore octo, multo fibris capillaris: *radice* quæque aut odori pulmoni aut etiam coarctantem longi, almodum angustæ, striatæ. *Caulis* inter hæc erigitur brevis sub lineam Angustæ aut Septembris metali, florem sessilibus unicam, Colchici *floris* similibus, sed petals ex purpureo habente carulis constantem, in quædam modo *femore* lex, etia croca *spiculis* *bulbi* donata, munda, brevis & superficialiter pulveracea sunt; reliqua tria longitudine ipsa *floris* *bulbi* pachim trahunt, cum etiam ex clauso concolatque fibre jam ex terra producto exerto capillata præstant: radice inferior angustæ, superior verò latifolia existunt, & lobulatis. *croca* nonnullorum oculos laborifugientibus nocita; color est in vasis purpureus, [7. & flammis hæc flammis tubæ sunt.] Ea collata anima calidæ coarctant, omnibus Crocis seu Crocum appellatum, quibus amarissimum, odori pectore, acri, hinc spicante, oculos aliquantum modiciorum, lachrymas producere cogunt, & modice cum siccitate non ingrua caput aggravant, vomitibus coarctant. Ego tam tunc, quam integri parva portio magnam aquæ aut vini quantæcumque lenis aut citrino soluti ad præteritum inclinante tingit. Floris unum aut alterum tantum diem postquam aperti fuerint durat. Cum desierit, vel cum adhuc floret folia emergunt, quæ hinc non flaccidant, sed sub ipsa tunc vident. Radix Autumno cum planta flores bulbo constat singulari, frequentiam verò & ætate duplici, atque altero altero superioribus insident. Cum enim vasa inchoa folia incrementum superiorum radice paræ & qua hinc exant inchoa parat, donec ætate pariter sub se retentam quantam æquet. Hæc itaque vegetam, solidam succosissimam constitutionem nati ipsa pariter languida & flaccida radice, atque Autumno tota evanescit. *Hæc omnia Croci communis esse paræ.*

De loco natali illi sponte ortus nihil certi traditur: forte autem in plerisque provinciis, ut Sicilia, Italia, Pannonia, Gallia, Germania, Anglia. De serotio autem apud Botanicos est dicendum: Serotus autem de portis radicem bulbo. Serotum apud eos quantum ad hunc usque ser, nec alibi, ut puto, in singularibus: in locis autem ubi sponte ortæ semper perficere minime dubium est.

Crocæ electionem vide apud Casp. Hofmannum. Qui vulgo quædam, fere est corruptus Carum seu Crocus, quem Crocum Saracenicum vocant. Latetur in Croco summa portio tenuitas, & trahitur in diadem (inquit Casp. Hofmannus) annis illa vincit omnia alia simplicia.

Moderata qua usæ crebro prodest, sensis vegetæque radice, somnum & torporem extingit. *Dul.* [copiosius vigilas inducit, & capere dolorem] omnium consensu corroborat ore, & lætitiæ cogit; quod experimento confirmat Amatus Lætanus afferens se mercatorem vidisse, qui cum in ostium in qua carum coquebantur molam Croci impelleret, post carum elum, in tunc profusum sicut erupit, ut parum detrahit quam rila memo & calidum è via excoheret. Simile exemplum est apud J. B. Alexandrinum in *Solide*. Nos, ut, nobidem formidam Tralenti videmus horarum circiter tunc ipso immediato rila excoheret, riciendorem fore modicum causi. Jello plus croco usum Thioracis crudos humores ad coarctationem pertulit, palmas aperit, & ad obstructionem liberat, & ad hæc tam efficaci est remedium, ut febres plethoricas in humore vix dicitur, & propter eodem animam ætatis spiritus replicat, & vix ad aliquot dies progre, tempore dimittit, ut ad humorem integri, cum Palo aut vino Prunio vel alio dulo calidum; quomodo etiam data gracillimas febres struens cura, febrem dysentericam Ratum & momentum tempore tollere non ferat; nono coarctantem est. Crapulam etiam acere hoc modo sumptum Diocles alibi refert. Latetur ad hepatis & felis obstructiones, necnon ad regum morbum; atque hinc bonum colorem Crocum officere Diocles alibi refert. Admittit eodem usum ad omnes que intermedium curæ temporibus potentes, sed novis etiam ad eas potissimum que mentis, feris & secundis educant. Ut nam ot, Venarum extat, ad Vulvæ & fimo cataplasmata addunt, necnon ad emplastra & cataplasmas humores & dolores dicitur, inflammationes erysipelatosas mitigat; compedirentibus alicuiusmodi usum admittit: oculos ab oethymia & exanthemata cum lacte aut Feruam Rofæ dulo legere præservat illis, & humorem in eos inflexiones reprimit. Hæc è Dodonæo.

Nos etiam cum in scitro, si non passim bibant, sepius experti sumus, ad quem molam que partem non sunt & tingendo apta plerumque conducunt.

In partibus difficultatis adeo vixit est fortis eglic (inquit C. Hofmannus) et memo usum apparet crocus. Hoc experimentum est a Rhaz, quem Serapio laude. Post multos quædam, inquit, que aliquot diebus laborant in partibus & doli illi in partibus Croci, & peperit illam. Et experit illi hoc postea Raso sepe, & semper fuit ita. *Perfusa of librationem eris p. 3 u. 3 u. 3 u.*

Apud nostrates ad variolam expellendam frequenter datus est; itum in lit. ...

Crocus in nimia dosi nocivus est. Sed quod tandem est illa dos a qua periculum est? Iel ut Julius Alexandrinus dicit.

Croam non Julawndo die iblinn gravem fed & obtmendo 3: fransulaiulo C Hofinanno idetur.

Idem D*ionxuni errons infimulit qual Croajm rtgmis raccte fenbat in niniM dofi, cimi c ...

Crocus par. ... f: qture Owcroceum emphftrujn ...

Croco confidit ad emollitc; ... I r/oimi menra ...

iS. Cr««u Ahum Auinrnwdti C B. w.mnmit L ClsiL mnf. AattmnAu J. fi. Park. Ger.

rt « Cl sativi Croci, sed ninnic Gcdibtiore, tnbui inttsraoeu /tamuuimt, & ^t/> Jutco liimma ...

In nonnullis Lusitanis rubas, pniertira iis quir non urooil a man abtunt NovcmWi obfervavit, iL ...

19. GttiuA*t>iimMtxfl*rtM6MfttMjrmtiu,d<>r*tC\nKmtmin 1. Chlf HMUM 1, jlr* ...

Præcedenti ferè simile. flos fine folitt prontit Septenib: 1, unciali aut longiori pediculi ...

la, Crafw Amimoudtr ftheruUxi muhijUnu C B. KWWW** fffw/ Cluf J, D). Of «j fljxjnr- ...

Flu u, odoros est, vel tenuis admodum & evanescens. Miti odorii, peculi' interioribus partib: ...

G> antantiniopoli allatus est^ etlqac pr> alididit iden Croco fy]. ^yranf. serozino Leb. Ad. part. 2. Linc ...

11. Cwemm Pyrenæum Ammmui* CluCap. i. m*m**Mm Pjrn**m Autumult J. B. Croci A- ...

Florem sat Pyrenæi Croci montani flore ampliozem, colorisq; saturatioris, & quodammodo ...

E Pyrenæi A montibm i quodim Rhiwtoino omnim redemit Oafi ...

CAP. XV.

De Dent canis.

I. Dm* td ... O B . Dr*ttMiw*> C.cr. Sj.'jr.mm 9*;THWJ.. w Erythronium bifolium flore unico radice albo & purpureo J. B. Dent Dent canis; ifrtrmht Park, parad. Toth DtOift.

7. R. Claf.

Radicis est duar uncias longa, alba, crassiuscula, & infima parte crassiore, superiore vero parte gracilescente. Folia prostrata, raro terrena inquit Clusius, opposita, primo mutuo se complectentia, de florem occultentia, per terram fusa, Lili convallium act Allii usula formi, crassiora & magis carnosa, ex angustiore principio in ventrem sextantem latum dilatata, deinde sensim in mucronem declinantia, [aliquando tuberosa & latiora si, quod interdum fit, unicam habeat folium] longitudine palmari, macula ex fusco rubentibus, vel, ut ait Clusius, ex albo purpureo, lata, magnis variegata: teres, inter que surgitur orbiculus unicus, levis cruciatus, nonnunquam albus, nonnunquam purpureus cum unguibus inter albos compositus, qui ipsi zern [Sola radii exaltati] tepore se explicat, radiato positu loborum visendus ea sursum reflectit, Cyclamini instar: Stamina in medio fere purpurea stylis circumstant longiorem, album, tricuspidem: nulli odorem gratia (inquit Clusius) placens, sed soli elegantia commendabilis. Succedit siliqua triangularis, nuda DC AtM, IJ: videri spadicata. Capsulam sive siliqua, teste Clusio, continet aliquot semina lacerata. In feminibus fere respondentia, sed longiora gracilioraque flavescunt col.

M bulboti pcwwe>akeria>l«aW

hac planta unico duntaxat exi folio. Flos ex purpureo rubet, aut ca: aut purpurea & candore confusa pallens; qui fere rubro est macula rubra; qui albo latius variegatur: sic folia maculata, aliquando macula

renc. c. n.

No» Bore purpnrco infignem copiofini rS fertur prope Augustam Taurinorum ad latera rooms quern tMfiito Pido aibct: am urbem, Aprilis initio florem: cum quic flore jlbo dt in I jgurue monriKa cundo I Nova Pido ad Genuam, Jo. Bauhinus copiose prope Genevum Borenteni Mortio m colic Is B*\$u\ Ma etutn in montosis invenitur non raro;

:apud 7-

Stracis mucositas radice efficitur. r polliocm pultdxu puc: orum inipergere ad enecandas elidendiq: amurcam. ,, vciitn. tin :^ Ouli ::Uf,.mc!l. L\ vino iutem luull am marisco coli dolores nuti otportum ell. iniuper corpora v»o rafnre 8c nutnre, a *n a vero partes epilepticos rare-

Ad excinndim, »uiore Loelio, Ve norem magnam vim habere ostendit humida & calida sub ft intU cum jc. Hic >C nonni illis Satyrum erythronium Dioscoridis creditur, f.,1 errunce I>jlkini< ni palacio, qui Tuliam pro Suyno erythronia lubo.

2. Dent canis angustiore longiore folio C. B. Satyrus Eljthxnu thmJ tmu I B. Dm tan, flore albo angustioribus foliis Ger.

Claf.

Folia hinc longiora quam precedenti, maculas albas diutius retinentia, initio dum exoritur florem etiam amplexentia, qui superiore major plerumque est, vel lactei omnino candore, vel mistis purpureis albidisque coloribus constans, staminibus albis, apicibus nigricantibus: Hinc succedit trigonum caput, femina alteri pars continens; radice etiam longa & (upcnarct. afflor.

3. Dent canis flore luteo J. Rea.

A prima specie differt foliis obscurius virentibus & flore pallido seu dilute luteo, cetera similia.

Herbii btibofis ctffiwbui.

LIBRI VICESIMI PRIMI PARS SECUNDA.

De Herbtu btibofis affimbiu.

Herbi B \ S butbolii \ Whna voco quz cum hajus genera Gnt \$olm, floribus, pncarpis aut ra-
di. ibu* BulboOu iinit.iitm.

Herb foliis, fkribtts, perkarpüs ant nuiiabus 'Buthjlt a/fines
difinguauLt funt vtt ex*

< Numert fttcnum m fort, m

f F.B*r*p: •• i iiguram refacnte cum iu J uii obverfa, Jall

fTui trofo aut crallis,

"Maxim*, fobi!

^Xtapi fuccuicnfe, adnur^ines aculeatis, ridite Ciccum craflum iUvum iafigfti-

*' < taamam fundente; ALOF.

Cltnuhrsi-ui & inAitxibitit tonuvii,iTurgiiij';sifiuilibui; YUCCA.

Minor,

{Major floru
{Minor flullato, femine urgoftro; Afp}

F:fri>/<i (blitt

VrUu\ PSEUSO-APPHODILU.

IGrtmm, ftjre Ipc^ioio; PHALASOIIUI.

Pentapala; PHALANGIUM Virgin

Triptala; PHALANGIUM Virgin

Minor fm, H re foli fructis

tudo, fapore, acri, folis

CYCLAMEN

it ad ungu» jundUj rajct; orbicukta;

cohnrcnte, rufico tubcroti, piftillo profit>bui media flore

{Lacmata, hujus generis maxima. J.IUL pelli Ierpentiuu iti motium macuUio; DRAGON;

11

Integrat,

{Major ; AHUM.

{Minor ; Am**tun.

,%«rJ A^"/ J ^ **W/jii* - : 1 UC vd font

fA\$hl*, nullit neq, a r^dtee, neq,tn ciulibus folio vircnbbus; radidbus

{Squamofa; OROBANCH

< Denticulata; DENTAN I A jfbjtiej, Aoiüttmm Ctrdt,

{Fibru mmlt* m*,Uj.n.w ,mtUu> w"iJlaitibu»; Ni lut A-12

Filofa, radicibus

{Tuberofa, gemmo pleru ficjuscubrcadhxrentc; O «cun.

{Fibrofa, folis

Nervofa

flor, in caule oppofita; BIFOL low.

{Floribus alternis; HELLBORINE.

{Floris virtutibus, perpetua

CAP. L

De Iride tuberosa & fistula.

Nomink ration, peub, i... delimus in capite de Iride bulbosa: Notz char... aenft>cx funt flora ennc...

ca Fuch. vulgare Germanica... 3. Eya moll

rommon ptirple f lotenr be itirr,

Or/

Ah uno cespite ctura 6c ere 11 a cnfpt cubtio tongior.i... Ah uno cespite ctura 6c ere 11 a cnfpt cubtio tongior.i...

brants paullatim se in novem folia explicantibus: ex his tria infernora dtgxali lunt... brants paullatim se in novem folia explicantibus: ex his tria infernora dtgxali lunt...

lritii colors in cmcuro it a... lritii colors in cmcuro it a...

oracixiftunt, &... oracixiftunt, &...

it He otlon... it He otlon...

Sylvatica ab hortensi non videtur aliter differre... Sylvatica ab hortensi non videtur aliter differre...

Natio tar Cki<ij & ciivou tocts in... Natio tar Cki<ij & ciivou tocts in...

2. ltr. >Ln *l*> J.E A*IT^... emmits C II P*'

7. h. Qui precocentim recte videt, & iunc nan... IUbictn Atunutirenvitt.

forma differentiam in... IUbictn Atunutirenvitt.

Nos Iridem albam Florentinam a vulgari fere... Nos Iridem albam Florentinam a vulgari fere...

Non videtur J. B. propter colorem albam particulatim vocanda Iris Florentina... Non videtur J. B. propter colorem albam particulatim vocanda Iris Florentina...

C. Barbina Iridem Illyricam a Florentina specie diversam facit... C. Barbina Iridem Illyricam a Florentina specie diversam facit...

Iridis radix in vino aut cervisia... Iridis radix in vino aut cervisia...

Pharmacologia plantae radice virtutes a Veteribus... Pharmacologia plantae radice virtutes a Veteribus...

Long. C.B. P. 11. C. 11.

tormentibus ventris infantum. Extrinsecus abstergit cutis maculas & lentiginis (cum Helio... & me... mixta) Creberrimus usus modernis est in pulveribus... m qm ci-

In Hydrops ad forum in specie purgandum commendatur radices Ircos succus ab ʒʒ. ad ʒʒʒ. dan- dus. Honesta matrona mihi nota se plures hydropicos curasse affirmavit solo uso hujusce fuod, ex- liibcn lo quodlibet mane jejuno quatuor f ooch caria in fix cochlearibus vini albi.

In desperata alvi obstructione succus radicis Ircos recens ad ʒʒ. propinatus expertus fuit, teste Schenchio lib. 3. Observat. D. Edm. Halle. Purgat, atque Calo. Hofmanno penitentiario penitentem & aquas, secundario bilem, non contra. Hodie fere solus succus frequentatur in hydropticis: In qui- bus cum fepe ardores faciat, non in faucibus tantum, sed & in toto corpore, quidam prorsus ab- horrent ab illo. Sci distinctione op s est. In Germanica vel fieri verumide est: in Florent. non est. D'aituc sen em est de succo crudo, per residuum non deperato. Il autem heri debet si modo tuto curare •oluntur. Succus crudus non ultra ʒ ij. exhibendus est, depuratus & impinis Italicis in majore doli lunnis. Ca. Hofmanno videtur ʒ iii. superari non posse.

E. Eliiiiim .iilvclutur .vi i nos in corticibus testive Tolidinarum pulcherrimum quoddam pigmentum, quod vulgari eorum ubonate dicitur *Verdelis*; ipsum vero ita paratur. Irisi florum sanonua- tem (colligunt ante maturitatem perfectam, quam trahunt in mortario lapideo cum pistillo ligneo: inde massam sic talem recondunt in vitreo vasa, & in cella vel alio loco humidore collocant it per dies quindocim, ut digerantur atque putrefcat: quibus elapsis elicient materiam e vase, & hntuo ve- teri petcolant; nam veris erit sero tota in liquorem, quem igni exponunt in ollula vitrea ut fer- vant, donec decreverit tertia pars, cui tunc additur Aluminis Roche modicam plus minusve donec dissolvantur, magna clarifcat, & desolvetur color, quam experiri poterit, si in ʒʒo liquore majestiat frustum albe papine [charte] & conspicietur pulcherrimus color, qui servari potest in Telli- rum testis prita Pluvitrocum morem. RJJ *Suppl. de Astrucis Londini* p. 706. Iphemat idem observavi quater vel quinquies in locis Belgii Hispanici & Funderati, ut in Diario meo invenio. Hoc pigmento usus observavi Belgas ad chartas colorandas, & ad vasa tum lignea, tum fictilia 'pwgCiiJa, cupi iionmcin- nit Caneparicx D. Tamer

is altissima bicolor, carules obfulto, emerebor m tftii J. B. hortensis pallidi carii M <. B

Rarior huc Iris, proceritate vulgarem superans: folia non minus lata: fere autem suaviter odo- rati & vulgari minoris non obvia amonitas, cujus tria maxima folia repanda lamina ovali sinuati pur- pura tincta sunt; inde usque ad fundam crocatis, humani supercilli amulam sinuati linea purpu- ra longa, campum albam percurrentibus, utrinque autem i fundis lateribus oblique ferruginea linea luteo marginis distinguunt: terna quoq; folia, ut in hoc genere fieri solet, intermedium curvata ferruginea, colore magna ex parte ferrugineo cinereo obfulto, infra parte rugulosa, lutea, lamina ferrugine guttata: penultima & ultima terna in costa foris, intusque leviculi & foetida purpura lent, utrinque lateribus luteo lurido infectis.

Hac nobis latibol u nujor vulgirii c^foleta Cluhl cficvidemr, hortentls pilliJi ettrulea C. B.

4. Irrt CbiktJtm* C et. Chalcedonia fere Salsana major Park. S. M, yforr MAMW M <^<

a, J.B

Sena aut odotu tu! ex folis, Irisi Lusitanice hiflorz folia non abfinitia, maxio fole ut in alia In JH:III PCIEIIV s 111:1-err--M: 11 quoniam, H: MJ: j, l. m: cubitali... goni- colata, digitalis crassifolius, fere sustinens omnium quos usquam in Iridda conperimus maxi- mum, novem ut reliquorum folis conflantem, colore tamen ab illis differentem: nam tria ad ter- ram inclinata folia crassa sunt, interiore parte omnino nigra, nisi quedam vena ex purpura candi- cantes intercurrent, ab infima basi ad medium usque nigra villa late obita, macula nigra, foveici villosi nigri punni instar, modicum folium occupante; foris nimio dilatiora sunt: terna illa minorz es incumbens, que ligulas tegunt, fornicata & bifida sunt, & ejusdem fore colorem paullo tamen dilatioris, licet ad obscuram purpuream accedentis; tria latera palmari sunt amplitudinis, & membranacez pene tenuitatis, plurimis lineis ab infima basi ad extremam usque folium ex- currentibus, partim nigricantibus, partim ex cineraceo candicantibus, ut Americani Pavonis expansionem fere videntur, internis circa unguem nonnihil hirtis. Nullo colore in hoc flore de- pdKJiiit C loin l, kA l. • ^ ^ • • v^rietate Jv nnu:c commen Ubilu CJl II 1 : . . ^ : dant, sed raro almodum capata trigona, crassa, utiaii tres, ifiutuor, & quinquis interdum longa, numerosam foveis, rugosum, sulcum, Piti fere instar magnam continentis.

Constantinopoli delata est. Hypericis vulgaris difficilis fert in hostio rep- ricibus: Rarior etiam ceteris florat, & uno JH, ui pl'imum, florem proferit Mas: semio manu Trepn- ram Julia intra.

c. Irii AfMKm *Arveia palustris* C. B. Admit* t*r. mamtm Inborn *mfi-C***, Dalmatica of- Jai J K

Sent, i- ptena, octonisque habet folia, omnium Iridium amplissima, & in latum expansa, viridia cui aruge permixta videtur, coloris, maxio se amplectentia; e quorum medio rades promit so- l i t) . Item, interdum etiam bicubitali vel ampliore, firmam, crassiore superiore, levem, go- niculatum, multique alis concavum, e quibus copiosi (nullam enim feraciorum conspici) rugu- lalique incli i pro lant 1 pagni, petalis densitate inflexis dilate purpurascens, & ad extre- mam recedens coJorih multu p. purpurascentibus vena ab infima parte, & flammis hirtis flant

in longitudinali & latera excavantibus: bina petala exalbescunt, gibbo tamen illosum dilute purpureo: tria sursecta, angustiora, & nisi parte quibusdam purpureis brevibus venis distincta sunt, ubi vero se in latera expandunt subcorollam habent coarctam, dilatati enim adhuc quam inflexa, & florem Sambuci odorem, graviores tamen, quodammodo simulantur. In succulentis rariore *filice* sive capita crassa, magna, triangularia, & obtulo mucronis per dies, que maturitate deficiente sicut condicere deprehenduntur, crassum, angulosum, durum, flavescens, superiori ferè par. *Radix* crassa est, magna, nodosa, multis longa crassisque fibra donata, lateribus ut reliqua se propagans, & si repurgata succum coloret.

Hanc Constantinopoli accepit Clusius.

Hinc perhinc in herbario nostro habemus, cupis tamen flores vulgaris Iræa floribus minores sunt, petala reflexa & dependentibus in parte purpurea, latera ex flavo albescentibus ab ungue folii & nisi villosa in margines unguis producta. Fimbria seu sibi villosa ab ungue per mediam petala curvata alpenulique producta magna flava est quam in vulgari libro: que hinc incumulant petala crassiuscula, bina, ad margines lutescent, gibbo cinereo: tria crassa petala cinerea sunt, seu albescunt cum dilata curvata unguis, *vain*, v unguis tamen flavicant, & lœcolis ferruginea striata sunt.

6. *Iris Dalmatica major* C. B. Ger. *Dalmat. major, flos vulgaris minus violacei* J. B. *major latifolia* Clus.

7. R.

Spectare pulcherrimè & magnitudinis est hæc Iris, *caule* bicubitali, tereti, minimi digiti crassitudine, alis crebris donato: in quorum extremis *flos* multi, magni, toti cyanei, exceptis paucis in unguem alis stris obliquis, varicoloribus, alternis: unguis foliorum fimbria crocei, angusta quidem, sed elata: *filia* vero quam in ulla alia [quam coluit 7. R.] latiora, unguis stris lata interdum, expleta Aquile alis referant, ultimo prostratum sine suo semper exerpente, ut in alio, colore glauco.

Clusius hanc à precedenti *filice* in summo caule fastigio magis contentis, *flos*** in breviori caute, minori, pallido, angulato, rugulo, præcipit differre scribit.

7. *Iris Dalmatica major flos purpureo dilatatus* J. B. *Iris latifolia affinis major* C. B. *Iris Dalmatica major* Ger.

7. R.

Iræa Laticornis seu hæcæ similes (*inrun* < Clusius in Hisp) quam Pancius ad nos misit nomine Dalmaticæ minoris insignitam, nisi quod paullo angustiore *folis* videatur. *Flos* purpureo dilatatus, & terni aut quaterni in singulis canibus, oblongiori pediculo imbricatis *foliis* angulato, pallidum & rugosum. Floret Ieris Vert.

8. *Iris major latifolia Dyanthis Dalmatica* - T*mu. m.L., i. e. *minoris similis* J. B. *Bjt^mmt* *ft** *purpurea* C. B. *major latif.* 18. Clus.

Clus.

Folia est quinti generis [Austriacæ purpureæ] non dissimilibus, sed brevitate aliquantulum *caule*, in aliquot ramos diviso, qui sustinent *flos* & vaginulis emergentes jam dictis paullo minores, quo *col** mfeis inter secundi & quinti generis flores.

9. *Iris latifolia hancior purpurea* C. B. *major latif. angustioribus foliis, purpurea floribus minoribus*, Clus 19. J. B.

Clus.

Precedenti magnitudine par est, angustioribus tamen *foliis*; *caule* gracili, pedem & IertiUclII, interdum etiam cubitum alto, in ramos diviso, quibus *foliis* mliem ^irr*, omnibus pndktai mittotOr tribus petalis ad terram inclinatis dilute purpureis, tribus vero erectis obolatis purpureis color in vulgari quodam genere conspiciunt. *Radix* non magna, nodosa.

Ab hac non defect specie quam Clusius maiorem 10. facit sed illam colere tantum qui in plantis huius generis à semine omni plantarum variet.

Iris latifolia b*munr v' . . . f A <#* *latif. fœmilia flos filia fœmilia*, & *latifolia* Clus. 20. J. B.

Clus.

A decima not hoc gracilitate *caule*, qui in ramos etiam divisa, nec angustis *foliis* dicit differ: *flos* hancior magnitudine paribus *foliis* diverfi coloris; nam terni -i jj nuiZT- inflexa dilute & quodammodo obolati purpurei sunt coloris, multa saturatiora purpurea *foliis* fimbria ad oras se spargentibus; fimbria floris flammeis *foliis* binae folia illam tegentia obolatis flavicant: terna sursecta inferni angusta flava erant *foliis* aaiBKtl, U: ost axenti *foliis* terna coloris, quodammodo tamen lufali levissima & que via agunt purpurea. Scit- *foliis* hancior odorem refert, sed paullo graviores.

Nec magis à precedentibus differ Iris major latifolia 21. Clusio à semine decimas spec: *foliis* orti, quam C. Bauhino Iræam latifoliam Germanicam candido purpuream vocat; J. Bauhino *foliis* Iræa mag. latif. purpuream, *foliis* repandis cancellatis. *purp.* -'tB Taw .tifbna*

Que non minus ampla *foliis* quam superior, inter que *caule* all *foliis* ciliatis, viridis, sustineti membranaceis thocis viridis, per ora *foliis* .rver pirpartKXxit. & quibus emergunt bini aut terni *flos*, jam descripti paullo minores, petala stris *foliis* gulfioribus, cancellatis interitis, satore purpureo *foliis* .pclr *foliis* distictis, latiore vero parte omnino purpureis: Villosa fimbria inferni parte flavicant, superiora purpureis, *foliis* Url ola h h q i *foliis* latera floribus purpureis sunt coloris, ut & erecta folia sursecta. *Flos* tanquam odoratus.

10. *Iris amafcata polyanthes* C.B. *major latifolia* ^fivi Damafeesa CluC *major hitf. fvi DM-*

Claf.

Dalmatica majori non difpar est foliis & radice. Cauda cubitali aut paullo majore: floribus ruco, magnitudine, colore Afaticae caeruleae respondentibus, petalis tamen ternis inflexis p dilutius purpureis. *mafeaut cxruka* J. B. *cruculum tendens* *; *ternis bifide* i angulibus & ca nerei quodammodo *[ibus, Sc.* *crinis vero furrectis caerulei coloris, &* *tertiarum candidantibus* venis externa parte confertis, odore Atutico; limili.

11. *In» Afuttica furpitri** C B. *Aftatica fmfurta major latifolia* J. B. *wijer /<ifi/*, *jyTx/e Afatica pitrp.* CluL

Claf.

Folu hal et fecunde [Afaticae caeruleae] fimilia, paullo tamen breviora 5c *ngu(lior.i, interqua; exit fu/ir rotu adus, cubitalis, digitalis crassitudinis, in aliquot ramos divifus, qui prominent e ntem-branacsb thecis *flc* superiore minores, nonnihil odoratos, quorum labra five folia ad terram in-flexa, faturationis funt purpure; & infra circa unguem, qua videlicet hirsuta illa & pallescenti fim-bria excurrit, varis venis distincta. His incumbunt tria alia lamifcula bifida folia, que candidan-ica ligula tegunt: deinde e lateribus surgunt etiam folia, eleganti purpureo colore pradita, flori Lusitanice biflorae ferè fimilia, latiora tamen. Succedunt triangulares *filipae* oculo mucrone, in quibus *seum* inaequale. *Radix* tuberosa, fecundae fimilis.

Hec etiam Constantinopoli nulla fuit: Maio floret.

Hinc congener fuit latifolia major 6. *Claf.* peregrina *ibens inodora* I. B. *maj. latif. flo. purp.* cum aliqua rubescit 7. B.

Cui *Cauda* paullo major: *forts* fimile, aliquantuluin majores, inodori, quorum terna (inccla folia aliquat rubo ink habere vidcbantur. ^

U. fr<ir *LiifoUa Qtrmanua odortfutvi* C- B. *l.»/l. major.furf. quibufdam I'Jjirua*, B. *nwjer /-if.* 7. CluC

Claf.

Longa latia, *folia l. itw nilr* natica majori parè paria: *caules* non minus grandem, nec rario-rea minorefve *floris* proferentem, petalis inflexis & terram fpectantibus plane purpurei five viola-ces, dilutioris tamen coloris, nulla nisi circa infimam partem venis distincta, fimbria medium folii nervum occupante, albis ftramibus flavo apice praditis donata; furrectis quidem ferè, fed magis diluci coloris, ut & ternis bifidis ligulam tegentibus & fimbriae incumbenibus; odore fatis fuavi.

In hortis Francofurtensibus observavit Clafius.

C40B.

13. *Iris latifolia* 1 Gm«M(4 9(i)r< S'mfwfi C B. *nwjer 'atf. cui in furt craf.* *t vn* fHrfurt* J.B. *majtr Utf.* S. CluL

Claf.

Similia habet *fun*, ab exomi aucem area raicem purpurafcenoa: f«/«» cubitalera aut. ampio-rem, multos e vaginulis, purpurafcentibus radis insignita, proferentem *floris*, petalis ternis incur-vis multis crassis venis purpureis notatis, fimbria ad labrum inflexam proccnta, capillaribus stamini-ulis flavo apice praditis donata; ternis erectioribus plerumq; bifidis, colorisq; habentibus obsoletum in quo purpureum quidquam magis vel minus saturum elucet: alata angusta folia fimbriae incumben-tes qualem cum furrectis funt coloris, praeter nervum modum in longitudinem excurrentem, qui ex caeruleo purperafcit. Odor florum Sambuca. Breviter Irdis obfoletae Belgicae valde fim-ilis est.

14. *km Uiifoit* Bfae* Uart Sarr.* ^, C. I. *Iris Claf* I wijrr *latifolia* i i cum vtuit *furfm-rtu* J:B.

Chf.

Breviora quam superior habet *folia*, alioqui non diffimilia, nec minus circa radicem, qua invi-gem amplectuntur, purpurafcentia: *caules* cubitalem & ampliozem, in alis divifim, in quibus multae *floris*, totidem quot praecedentes folia praditi, quorum terna doortum inflexa, per ora lubcaerulea. circa unguis ex flavo candidant, deinde multa crassiusculis latere purpure venis ab uno in longitu-dinem excurrentibus funt pradita: staminum fimbria superiori fimilis est: terna erecta petala can-dicantia ex caeruleo funt coloris; eorum orae quodammodo flavescant, unguis ternioribus venis di-linguantur: bifida & alata petala fimbriam tegentia ferè ex flavo candidant. Odor praecedenti fimilis.

Iconem e«idem habet Lobeliuc pro In de Lusitanica verna violae ex

15. *Iris JW/W** *Belgica verficolar alata Sambuci* C. B. *l*f. major, cui «* ad flavum obfoletum* *medum* J. B. *latifolia* J m<;f 10. ChX

Claf.

Paullo humilior est praecedens; nec epi folia circa radicem purpurafunt: *Cauda* gracilior in alis funditur, *floris* gellantibus superiori ferè quidem fimiles, diverfi tamen coloris: nam terna in-flexa *folia*, licet illis foliis non funt difparia, ora ad flavum obfoletum accedentes habent, ve-nisq; paullo dilutioris; terna sursum erecta obfoletum funt coloris, ex flavescante & purpurafcentia mixti, Verticolaris, quam a Cameraco accepit Clafius, foliis non abfimilia, paulo tamen dilu-tiora, circa unguis etiam magis flavescens, & ternioribus purpureis venis noata; angusta alata *folia*,
folia,

folia, simili colore prædita, præter medium nervum, qui magis purpureus: Odor etiam florum Sambuci æmulus.

P seeder. in eadem videtur; nec diversa.

16. *km L. folia Belgica* jr> SJtmi r arafab. Lit. a iw-fis<ntifiti j). B. it-
tj. maj. XI. Clus.

Clus.

Pars superiori habet *folia*, inter quæ cubitali ferè & superiori æqualis affurgit *caulis*, terminatæ quatuordecim è vaginis viridibus, oras purpureascentes habentibus, teretes *fovi*, quorum tria inflexa petala docime quarte non valde abscissis, longis tamen prostratis habent fimbriam illam vilis constantem, quales ut à bifida & gibbosa folia tota rari possit, quorum color obfuscat & saturatior, quemadmodum & sepe stultitiam, quibus nunquam insperare licet misale. Odor idem cum superiori. Paillo tamen scribitur **ri ntxw**.

ira major latifolia jr > r arafab. J. B. Lit. Belgica variegata C. B. r uje Lit. XII. Clus.

Clus.

Precedenti colore sine responder, & peculiariter id habet, ut inflexa folia duobus diversis coloribus secundum longitudinem sint discreti, altera videlicet parte reliquorum foliorum coloris respondet, altera diverso.

Hæc ex semine nata est, cum alia Irisibus, quæ **um** nonnulla unicum dentatæ folium variegatum **hibcbtn**, quædam versicolorum tantum nervum medium folium facientem, cuius, vel æqualem è latorem, vel angustiorum: ut mirum dicta sit, quomodo natura in his floribus loquitur.

ira latifolia major variegata caerulea dilatata J. B. Clus. II. *ira latifolia Belgica caerulea variegata* C. B.

Clus.

Hoc etiam genus semine natum, similis prædicti varietatis colorum conspicuum, non adeo tamen elegans, sed coloris ex cætescoo pallidioris, ut variegata caerulea dilatata dicitur quæ ex Ira

S&.iu:i. OntfM BOB nOKOT, W n l.-XJ*.---iintwi.

17. *Iris caerulea coloris* * & fJJ^j fultgmtHrfitft Qtmtrtr., Clus. 14. *Iris latifolia coloris Oxymintsh* C. fi. * « CtfNKrjm OCT.

Clus.

Ampla hæc sunt *folia*, è loneiora Uboriu, quam in præcedentibus, videlicet **ij<ll>**, magis, aliquantulum crispata, mucronis mucronato, è quorum medio emergit cubitali aut *major caulis*, levissimis, rotundis, viridis, in aliquot ramulos divinis, qui è viridibus vaginulis sine amples prominent *fovi*, nonnihil odoratos, & ad vulgarem Oxysanthæ florea odorem accedentes; quorum tria inflexa petala pallida, nitidi crassis purpureis venis à folii infima sede, & à fimbria ad extremam oram ipsius prædita sunt, labris etiam lateræ purpureâ nigrescentibus: tria illa incurbantur, sub quibus occurrunt ligula, coloris pallidi tanquam fuliginis postuli, ut etiam sint tria erecta, sed magis laevi. Nullam sequit Clusius) mibi hæcenus tenent tali, tametsi multis annos illam jam abierim. Materiam **il<< lecnddi**, Ac oolur floru aliquando saturatior, magis dilucida.

Ex Pannonica caulis nata censetur. *Clus. pass.* qui eam à Joseph. Camerario habet.

18. *Iris Lt-'-'tj P,mmmtJ coloris multiplici* C. B. Lit. major 15. Clus. am Imiti folia florum

Clus.

Regulae sunt etiam ista *folia*, quibus **utnea uu.** longa & viridis quam in decima quarta, secundum radicem omnino interitum purpureascentis; è quorum medio *caulis* promitt cubitali, levem, viridem, aliquot ramulis dentatum, quibus inflexa *fovi* è vaginis emergentis, magis, vel profus inodoro, vel Oxysanthæ vulgaris florum misale odorem, coloris varietate commendabilissimam tria folia que fustium spectant & amplexantur, raro se nascens amplectuntur, aut cæcissime mutua > lo' plerumque, (nisi marcescere incipiunt) erecta sunt, ut in Iris bulbosa, nonnulla tamen convexa, angustiora, **rei 4** coloris, quemadmodum & illa que ligula fimbriam contegunt tria ad terram inflexa circa basin & extremam pallent, reliqua parte carlescent, molles tamen purpureas radios ab ipsa sede ad extremam usque folii (quod plerumque) generatim purpureascent, in earum florum floris que circa radicem nulla purpureâ sunt fustia) pallida oras eleganti picturâ decorantibus: villosa fimbria qui parte integræ latea est, extrema vero exalida; pallens ligula; magna, triangula & obtusa aliquantulum mucrone *capæ*. *fovi* Orbis magnitudinis, fuscum, rugosum continentia. *Radicis* nodosa, vulgaris Indis imitæ, toris flavescens, multis utrinque nascentibus fibris firmata, que purpurata & esthæcia odoratissima est, & cum Illyricæ, que in Officina habetur, *caulis* grandis exarere posse existimato.

In montanis Ungaricæ Chæsiæ: Utriusque genus in Leytenberg monte supra Mandersthorf, & hinc inde præter Soprono vicinis, &c.

Florat Maio, sub Junii finem semen maturat.

Camerarius hæc Irisidem florem **utn tn t** *caulis* non premere debet, in horto vero translatus, contra aliam hylæstrum plantarum **tanm il** horto arvo florere, & quatuordecim postea, ac longe latius, ferpe.

Ab (uc non cWtf t) species sed folia r4ftPJ: in variegata

Lew.

Tropæ.

bkUfcli* thvirdtf C.&, mjjcr fo lut Jmins mfarifw JtjIntfiit alia & wrJi, Clul. 16J.B.

Precedent! vaUi (imilt? eft, Bt ex ejus femine natam putat Clufius; felis tamen illi brevia iora, & (quod ranun) magna ex parte duolius cob: •bus diftineta albo & viridi, fic quidem ut albus Inngitudinem excurrat noi in untjua Jno im; dicitur in f>lanxu mans, interdum fere totum, aliquando ejus duntaxat partem: nide in ctium t coloribus aliquando diftinete va, mmiiores ITcludentes, qui a precedentibus is flonbtunoiiniultum <yrenint, lbituM ditntaxai hmbna in relicxis foliis touflavaeft; & folia furrecta iifrua pane purpurei vdui maculii intemi alperii func.

19. bit Uttfelm (x alb* ptStftrtif frut* C B. mtjtjr Unf. ffStfctrti tx *bi> cum purpuru vena J. il. »<r, UtiTtf. Cluf

cy.

Pedalem habuit ctnttm, ronindum, gcniaJamm, binw aut terno* « menibrani; i= vapnit pro- meiw flirtjt, (juorum terna terrain fpcAantw p. latera, tum a fimbria, lora, mukupur, ad extimas ab innnu foliorum bait, qux anchor eft. in interdum binx, purpuree macule funt alperie: fblto: i^arrecutibts, (Juibts (iiiguuri; lora, cujus etiam terna furrecta (excursa corum an- btriUa regenciii ±y#i^*'' -^ptacoru! gfuli bail quic itivefcensj nmlcb purpureii venu in latera procurrentibui.

10. Ifu kifitu* Ijtfitanx* flan vioL(i*, Clftu li. j. B. bifiar* ?,rt mmrt, tJst, Lohi curvatum C B. /n iij&IJ G=f.

a*f.

Fsl. H anguftjora, alioq; L' diflimiia: in fumnto podali caule fls purptwif :tviolacei :urjti(ins purpm coloru, qui in in- Spro-K idusnirct; >ta iju* don.ua lunr profri villosa illa fimo in candida. Umaim autem liigulares cauta ptmintj, flu: , interdum fed rub altcn. tuiui Jir:'

a, multii fibri* iuxnu tellute ILOXIH, & fubuute in plum propagine, e lateribus nascentes dicit.

Nafantur multis Lufi imz locis fupraTagttm, vel ptnguifc>lo& inanri> vel falo roCa & Li- iloi (huj). M eoait Aurunnw in hoae Car. Audonun, cupu ret gratii bi- florain we Huli> po; i 1 xv iiletur quim fpeoes Jiftinili

Iridi biflora affinis flore mjm C D. Iru Hyria biflora Jtmx, Clmjli 1 J, flori purpura J. B.

CUf.

Non multum a precedente differre vili •••: Quon J ennn am fena ex fingulis radice capie :tis prome felia, illius folis fimilima: caulem raro amplorem, qui in fummo e vaginulis purpurafcentibus florem prorebat, Latitanica forma pofumidum, paullo tamen minorem & tunciorum, nec adeo fnavis odoris, licet ad eum fati accederet. Radix nodofa & gemculata ut fuperioris, odoris cum vitens eft ingrati, exficcata vero latisiti, ^ Sol) pda inico gultis, poftca tamen fervili fucelleque urentis.

Nec diverfa fpecie putanda eft

B. Iru peregrina alere Oxyacantha C. B.

Q)ix [kmifn^ rtrccdentt extera (Tmilis, paalomm in Axe ni am furrectorum colore ad caruleum magt> tetwente, timb: dij, infc knim nugis fiavetcente, 5c ix hoc vulgaris Oxyacantha differbat.

Iru latifolia caule aplylo C. B. maj. latif. 25. Cluf. An Iru flore violaceo, f>TU-, w<< J-B f

CW:

Lata habet felia, rugofa, podalis fere longitudinali, circa radicem nonnihil purpurafcentia: non prodeuntem e medio folioeum, ut alia, fed foefim fine folis, pedalem, in quo tres aut quaoxx ftof e purpurafcentibus vaginulis exarctis, magni, purpura latitante nitenti, nodofi, quorum tria folia ad terram inclinata ab ipfo exortu, ubi, ad fimbria (que tunc candida eft) extre- mum, albis radice infignita font. Ha fuccedunt triangulares filioe magna, obculo microne, mag- num fomes continentes aliarum Iridum modo. Radix cralla, gemculata, intus candida, foris furri colons v rntot tecta, latis odora, ad Phi five Valeriana donvltate odorem accedens.

Peculiarem habet hanc prater ceteras Iridi notam, ut nulla folia per hyemem retineat, fed omnia flaccidant & exficcentur nulla, conftipantur, demde incunite vere nova gemina profert.

Iru major latifolia 26. Cluf. hanc dicit a proci femine orta eff, a qua non aliter diftate Clatio ipfi vifa eft quam folis circa radicem lateralia purpurafcentibus. Noque ab eadem diverfa occulenta eft

/r» UttJt* fkmIM f-rf*n* W» *disposita C. B. major Luf. 27. Cluf. may. • Utif. candida cum mmilMfirm pnpart; ' ll.*

Claf.

Folia, radice caulis seu cum XXV. convenit: Ai flora in coder caule fingulares aut gemini e vaginulis ex pallido viridicentibus prodeunt, forma precedentes simplex, sed colore variantes: nam tria petala perpendicularia candidant, purpurea excolere vena ab infima corum sede per latera excurrentibus usq. ad extremam limbram subcoruleis vili conflantem: tria autem incombantia & ligulam five flamina tegentia alba sunt, earum tamen gibbo subcoruleo: tertia surrecta etiam candida, & ab infima sede multis purpureis venis distincta, donec in latitudinem expandi incipiant. Flori succosum triangulum caput binas pene uncias longum, crassiusculumque, quod maturitate debilem Julo, sensum offendit rugosum, subfuscum, cavi marginaline. *Radix* hyeme sola non rennat.

Hanc ex semine 25. deciduo natam fuisse minime dubitat Clufius, turelli hups fies edens gratia commendabils non fuerit, qui tamen in illa deprehendebatur. Mutum enim in modum variam, que ex semine nascuntur Irides, non secus ac precocci & dubie Tulpe atq. Papavera, ut longa experientia didici, inquit Clufius.

21. *Iris latifolia* L.
Jessen J. B.

ifolia ceter-

Claf.

Multa habet folia invicem amplexentia, ceterarum Iridum instar, unciam lata: inter que pedalis, geniculata, teres, viridis exilit caulis, semino fastigio sustinent binas membranaceas vaginas, ex viridi pallidicentes, e quibus **nape jki rclinuK** Iridum generibus forma similia, colore autem diversis, nam ex albo pallescit hinc *exhibet* est & terna repanda folia ab imo ad extremam laevicentibus vena sunt distincta, tubella albicante; sed quantum a bifida folia (que simili colore sunt praedita, gibbo tamen dorso nonnihil purpuralescente) integitur, flavicentibus: surrecta folia ab imo gracilia, interna parte multis in latera sparsis venis obliquis purpuralescentibus sunt distincta, ubi vero lato in latum expanduntur *exhibet* coloris. Nullum in hoc flo. -odorem deprehendi.

24. *Iris palafra lutea* Ger. *palafra lutea* fve *Aurum alab.* *non adaltemum*
C. B. palafra, fve Pseudiris & Iris lutea palafra Park. *Yellow water flower.*
br liter.

J. B.

In obliquum *radix* apertif, com; licatas & multum fibratas, *ur propter foliorum vestigia & venenoffi reliquas fortis villosa, nigresque sunt, intus vero rubentes, substantia porosa, & cum his quibusdam venis, sapore stimulo adstringente novis quotannis oculis, instar Typhae aquatica **gam** *radix* Iridis, longa, mucronata, quorum ea que propè radicem sita sunt tubula nonniam apparent. *Caulis* dorsi cubitus aequat, & interdum superat, rectus, levis, teres, spongiosa, & interdum aliquid inanis, in alas divisis. *Flores* Iridum lateri, inodori; quorum tria folia reliquis sex majora, extroflexum repanda, lutea, fimbrie supercalium imitantis loco, & utrinque adiacentibus folii marginibus, lineis nigris variegatis: haec intercedunt tertu i terno postu terrecta, valde angusta & brevita, tota lutea: sicet & interna, que cristâ bifida, reliquia, formâ cum iride violacea vulgari conveniunt, solo colore luteo excepto, quibus à dorso appressa **immm**, ex latulo alboline quadam praedita. Sapore est floz tota fervidissimo, non quidem primo occurfu verum paullo post fauces omni pipere ardentissimè urit. Siliqua longe ut in Spatula semen continet ruffum. Olorem tota herba non sicut.

In peatis riguis, locis palustribus & ad margines & ripas fluviorum *radix*.
Calidiane an frigida sit hups plantæ radix inter Botanicos non bene convenit, quid vero lesignem adstringenti facultatem obtineat ferè omnia oonlentnmt Ac gusti h unde confirmat: unde ad dysenteriam aliâ, fluxus alvi & itera commendatur, sanguinem etiam unlocans, manantem cohibet. Hinc extrinsecus ad dysenteriam aliâ, sanguinis fluxus praecavendos appendatur: unde patet quanto olim in errore versati sint Pharmacopoei, cum hups pro Acco vari radicibus facultate plane contrariis destans usurparent.

Scribit J. Bauhino, se Tiguri aliquando degustasse hups flores, qui tantum ei anilem & fervorem excelsunt ut faucibus, ut summam epu acrimoniam vit potuerit mitigare Oxyca!». Unic (inquit) nulli fuerunt cum Trago idem tam a Crik non» MI Mutimurionera o. uV m.

Scoti montani (*Hylander* vocant) ex hups plantæ radice, per viginti quatuor horas in aqua infusa aut purim cocta, perperatâ in illa aqua fricando calculum albam asperam superboem super calcellum aut pernoctâ chalybis frustum per aliquot horas stramentum optimum conficiunt; ex relatione D. Georgi Mackenii. Sebald. Prodr. Hist. Nat. Scotie. Transact. Philosoph. N. 117.

6. 2. *Irides* hamilya fva *Chamaerides*.

1. *Chamaeris variegata* C. B. *Iris hamilya latifolia* ceteri *valata* J. B. *Chamaeris latifolia* genus
1. *Claf. Iris valata* Ger.

J. B.

Petala plurima est, *radix* crassa, alba, rugosa, acris, à qua folia exant abque. Iridis vulgaris folia limbia, immensum lata, duas tresve uncias longa; *Caulis* leccrissimâ, quadrantal: *Floz* violacea & purpurea ut in Iride vulgaris sed per omnia minor, nec odore aliquo excellens.

Lobellus

Lobetiashinc luulitiisoule null<> ellā scribit, flore, femine, ubi jui XyruJb tirndx: vernmin Belgium aut Anglimi rr.inllir.ini, frigidōque & hum^nti Lib cicco>an. caulam producere dōdranulem, noiuiunquAni pcUleii, floi

tos, Sec

Clusius se in Lusitania, saxosis & marini aut afflatis locis supra Olyssipponem observasse scribit, foliis eisdem ferē cum Lusitanica biflora latitudinis sed brevioribus; radice illi simili, geniculisque, capitulis acuminatis in humili & vix supra terram allurgente cauliculo, triangularibus, magnis pro seminis proportionē. In varietate colorum in floribus ex semine natis in Belgio eadem habet quae Lobelius.

Nos in rupibus maritimi prope LiUirnum in Iulbj 5t-'f* Car, igw propi Manfpettum inGal-Lusac' \u Nirboncnfi obfcmvintii

z. Clsm.tiTU fcre futMro K>*/rw C.B. Cbtm, bundis unfJ;j m*<er ttaalu Clttfw J. B. Cirfm. kufdia jw.i.'rCliff'

Clmf.

Folius est brevis m. intenium ramen en.rn oetliblbn. Iritis mloirk moJn Ians, & secundum radicem magna ex parte purpurascens: inter quae multi flori e vaginula prodeunt, singulari pediculo dodrantaliq, fulto, vulgari paullo minores, Lusitanicae biflorae aequali tum magnitudine, tum colore, qui saturatoris nigrae violae est, praefertim tria folia terram spectant, quae villosam hinc, usq, ad bota illa. (JUT H^HUI teg) sunt folia, ex caeruleo purpurascens habent, sub ligula vero sine flammibus hinc: omnia autem petala, tam quae sursum attolluntur, quam quae repanda terram spectant, inferiore & fossili parte albis quibusdam radiis variata sunt. Sunt autem eae flores vel aliquantulum odorati, vel inodori: triangula epta magna, mucronata in <quibus semis Orobi magnitudine pallefcens, quod exsiccatum gja contrihit c. fulvescit. /f*ijr nexWi est, reliquarum eodem modo, ^atinatii Ic^ propi

Semitic mu iiterium vjru* nom col. /rcarrulca

; ai*M*rtijMusiUiG*3u*C, R 2x< ptrpifilU fioutlti Istfilid, dtmbifirmtlxi Ad.

ALIA.

Minn in & rariflir omnia est haec, radice plexa, substantia densa & colore Illyrica nec iitniin eade vero nullo, praefertim raris; folio latialculo, rigido, mucronato, pal.'iutn alto, cut imodi Gladioli: flore, femine, filiquis Xyridis feride.

Plurima oritur in agro Narbonensi locis aridis & saxosis [Garrigues dictis] locis specum illam fef- quicullare Montpelho distitum via qua Front puiun iur; in cuius campis & rupium commiffu- ri frequens adest: at prope Ferulam.

4. Cimmi.ori latifolia m. Mr Qui. -n jwr'ifal J. Q. Cii naira moni flore purpura C. B. latifolia for 1 nrM# Ger.

CUf.

Breviora haec angustiora, paullo sunt folia, qualia Chamæridis primo in loco descripsit: flori paullo minores; epta triangula & mucronata etiam minora; semina minus. In floribus summa variata: licet ferē omnes hinc villos supra stamina caeruleos obducant, infra vero, ut in modo dicta, luteos. Ex his paucas duntaxat adnotavit Clusius: nam omnes, inquit, valde difficile.

1. Flore est lanata, & o uo ato; interdum tamen dilatore & inodoro, su.iediii pe- tals modo orbiculata, modo longioribus & bifida.

2. Odorato est flore, deorsum reflexis petalis n • mnihil purpurascensibus, rucis.

3. Flos quodammodo rubet, interdum dilutioni & levi quadam rubedine velatque e lore, praefertim petalis surrectis: Villulae hinc superior pars albicat, inferior lutea est. Et in- tem aut odorata aut inodora: Haec omnium stamina caerulea.

4. Flos major, pallefcens, nonnunquam exalbida: petalis surrectis in utroq, ab iplo statim ex- ortu pu purpurascens luteis notatis, deorsum inflexis in pallefcens exalbida, in albicante vici- bus: pallefcens sem Oxyacanthae vulgaris flori odorem peroris simulat: alterius etiam odoris.

5. So o>lorc flavescente, fir octis petalis p; purpurascensibus virgulis radiatis propovl. nibus vel nigricante vel diluta purpura in medio notata, a quarta differt. Odoratus hinc -turn est not. Stamina porro haec & quarta alba sunt.

Nascuntur omnes in rudis & apertis collibu Pannoniae & Austriae, V. Cluf. Carorum, Mm Ill. signora varietatem ex semine decido fronte gigni non est dubium, inquit Clusius: infinitum ergo variare possunt, & nove quocunq, ex semine suo varietates obtineri. Minis recte ergo a C. B. pro distinctis speciebus ponantur. Nam icnu ttiim f'i>avi. n, si has specie distingui onasderc mus, omnino incertus & infirmus est.

A pixu*:aa<ibu>nncr*d*cc,ic(oliU, inij. Bori figura Men, proinde nec l-

Chamaeris latifolia m. Cluf. du J 'mmtu kttfii* mm*f*mrni** J. D. Cb*m. fUt obfolata

Claf.

Omnia petala prope te" obsoletum colorem pallido permixtum habent, & ab eorum ima parte usq, ad extremam hinc, quae pallida est, purpura excurrunt vix: pennata omnia petala alba stamina tegunt ex pallido albescunt, sursum vero erecta pallida sunt, circa imam i non foliq, purpurascensibus radiis aspera.

2!

Circa

Grv Bodam in Pannonia Maris finitima creta fuit. Clusio enotata brevem admodum caulem, vix ternos digitos supra terram eminentem habuit, cui inflorescent bini flores.

Nec magna specie differre censenda: reliquæ Chamæridam varietates à semine ortæ, quas describit Clusius septimo, octavo, nono, decimo, undecimo loco.

Chamæris latifolia minor 7. Clus. Ch. minor flos varii palli C. B. Iria humilis latifolia minor
axi^jnj, - vari palli J B,

Hujus flori tria petala dorsum inflexa variis radis, ex pallido, ut irascensibus, ab imo sursum & in latera sparsis sunt distincta, per ora etiam tenui quodam colore aspersa: timbræ medium folium ad inflexionem usque occupans multis vallis consistat, quæ hinc solo integuntur flavis, reliqua parte dilute coruleis: petala gibba illam & ligulam urgentia coloris sunt ex coruleo candidantis, qui in costa sc tun pou laminator: terna sole attollentia folia ex coruleo flavescunt ab imo angusta, & multa purpurea venis in latera excurrentibus pendita, quæ verò in latum expanduntur purpurascentibus maculis aspersa sunt. Flori succodebat longiusculum triangulare caput.

I floren cum aliis Chamæridibus dedit April, nulli odori grati commendabilem.

Chamæris latif. minor 8. Clus. flore purpureo flavescente C. B. Iria humilis latif. minor, flore vario, epa folia valde incurva 7.E

Ou maris latif. minor 9. Clus. Ch. jimim ikxc palMi tuttO C. An It a humilis latif. floce pallido, albicante & vario 7. B.

Chamæris latif. minor 10. Clus. Ch. miorar Bare purpureo C *. ITM hmmlB ijtiC mum for< vari> nolac 7. B.

CJunu. ris latifolia minor 11. Clus. Qt cowljeini renit THUS diffindi C A La hi minor Hore vario, folia epa inflexa candidantibus 7. B.

Harum descriptiones omnium, è Clusio hyst. plant. rarior. si qua eas idklefit. pctexkUt. i Clusio enim hujusmodi varietatum numerus (novis quæ à semine suo latifolia) certus & definitus non sit, infinitum eilet singulis persequi, & si id aggredieremur, plantarum historiam in infinitum tandem excreveret, nec Elephantiæ voluminibus posset comprehendi. Verum certus & definitus est, ut sæpius diximus, in rerum natura spectrum numerus, à prima creatione ad hanc usque diem, ut creta par est, consistens & immutabilis.

6. Cb*m*tn fim Ut* G & fru MOW JWM DOA Cismkm iuu Cer.

Iri sterilibus Garrigue
Moj.

Bolan.

4. 3. Irides angustifolia.

1. Iria Tripolitana Clus. Trij ; " ~ ' filia longissima, flore aureo J. B. media longissima folia la-
ua C. B. " " f

E celsiorum aut albis affurgentium I mers dl lu\, Talu habou reliqua quam conspicitur Clusio, multo longiora, bicubitalia videlicet, natis inter latifoliam & angustifoliam latitudinis, unciarum scilicet «a, insparum Iridam foliis magis viridia, non tamen splendens ut Xyrinth: Casies habebat inter folia prodeuntem, quinque pedes longam, vel etiam longiorem, rotundam, firmam, licet non valde crassam, nodosam, & aliquot breviora, in JH» tunw biafolmprjh! JH» tunw
nata, aurea colore, quorum tria majora versus terram, & tria minora, alata, ligulam flavam urgentia; tria reliqua & lateribus majorum prodeuntia, alia ^-f.4i« m-
star illorum que in Iridibus bulbosis conspicuntur, bifidamque macronem habebant. Flores in-
celsiorum una capita, in singulis lateribus gemini crassi sive nervi secundum longitudinem
emittentes, non dissimilia capitibus Iridis nar " , plena. Radix
digitalis crassitudinis, nitar radice angustifolia Aumm.

2. Iria præterea angustifolia folia fetida C. B. tenuifolia Michelsfeldensi spontanea J. B. capite
folia major flos 1. Clus.

Clus.

Multa profert folia, longa, rigida, angustiora & nervosa quam Tri-
contracta ingratum terramque odorem sperant, ut ut Sout
illa vel
gw<c4tonai: mterwutt*iM tcremoUonfi « utUula, imenkim aun longiores exurgunt,
quarior :: quinaoc jUrti c\ vjjpm.lii Utralixa pramenta, I radia bulbosæ verticillatis floribus
nan «^««*11« a, tului c a coruleo laminatore præditis: quibus succedunt oblonga ca-
pita triplex, libens, modo tenuiora, magisque cartilaginea quam latifoliarum Iridum, in parva
que in Tripolitana, angusta etiam eminentibus & quodammodo geminis, que desinentes semina
duplex fore digestum, aliquantulum compressum & angulosum, oblongum duntaxat, fibrisilicente
membrana nectum ostendunt. Radix oblonga, longe, nodosa, gracilior quam in latifolia, Tri-
polidi radices equalis, fere nigricantes, intus candidantes aut pallidantes, i pore aci & ;,
vido, multas longaque fibras spargentes. Invenitur etiam folia non gravolentibus.

HUM

Luc.

In Germania & Hungaria in præis videntur.

3. *hn pratense angustifolia non fatida alior C. B. ttWifelU m*i* flus carulis & frutis, in-
versifolia Cl. in Park. In silveftru
Byzantia Gor.*

Claf.
Cubitalia, interdum etiam longiora *folia* habet, admodum angufta, minimi digiti five femuncia latitudinem non excedentia, viridia, non tamen fplendentia, fumma parte mucronata, infima vero, qua sub terra latent, purpurafcentia, nullo ingrato odore, [J. Bauhino oleracum quid rofolent.] *Caulis* habet feiquicubitalis, nonnunquam bicubitalis aut ampliores, reftus, teretes, firmos licet intra cavos, geniculatos, virides, fummo fuffigio in binos aut ternos ramulos divifos, quorum fingulis infident finguli *floris*, Iridis bulb. vertic. latif. floribus forma fimilis, odorati, quorum terna petala decursum inflexa, infima parte, & quatenus bifido alarumque folio ligulam occultente teguntur, furvo colore funt, reliqua vero parte (que in nonnullis brevior & latior eft) in alba oblongior & anguftior) nunc candicante, modo purpureo feu violacco colore, venis faturatiore purpura nitentibus ver tota longitudinem & latitudinem excurrentibus, & fimbria five fupercilio carentia: tria fursum erecta anguftiora funt, & cum bifido illo exalbida ligula regentibus, purpura faturi five violacei funt coloris. Breves deinde fuccedunt *filix* five capra triangula, breviora quam in precedente, neque adeo mucronata, neque gemina colli eminentia praedita, qua per maturitatem nigricantem colorem contrahunt & debilefcunt. *Semen* inaequale, angulolum, nonnihil compreffum & durum continentia. *Radix* nigra, tenuis, dura, nodofa infiar fuperioris, fibris dura & tenubus praedita.

Clitius in pratens nonnullis b&locttpruaiftbut Aufinze & Unjarircam invenit: T.o« pamcukria Locu.
apud Ipliam vide.

Clitina Iridis anguftifolia tr (ccunic fpeciem alterim 1 tenunit, epique iconem dat, fed nullam Varietas
adde descriptionem. Han nsem anguftifoliam humiliorcm appellat,
apud quem reliqua Synonyma vide.

Iris candidis floribus anguftifolia L". »b luc non aliter qu'im Boris colare diffiare vUetur.

4. *hit mg*lhft!u wurtlimt wujer C. B. **%*pf. %• CluC y<> MI frt ufilia flure v...««. J.B?
Int mtrnmi Nartmmfit I det.*

Claf.
Ex *radice* nodofa multa producat *folia*, firma, longiora quam precedens, & prioris folis magis angufta, faturoque viriditate praedita, nonnihil etiam tortilia; inter que cubitalis altitudo *caulis*, teretis, aliquot flores proterens. Secundae floribus longioris, & Primae pene fimiles, fed longi faturatiore purpura & quali nigra praedito: quibus fuccedunt *caprae*, primae capites pene fimilia, *feminae* etiam fimili plena. *Radix*, ut dictum, nodofa, dura, fovea nigra, minimi digiti craffitudine, interna parte ex albo flavofcens, antroffum & in latera progrediens, aliarum anguftifoliarum Iridum infiar, & tandem veluti in orbem fele fpargens, (quod omnibus Iridibus commune eft) multa fibris donata gracilibus, duris, ficcis, lentis tunc velle craffiores, molliores & candidae.

Ab ki- nihi ti"i" ilivci Li Ipcoe videtur

Jrt tngajltU* wmrtime* nwr C. B. "frnfif, mMMtr Clmfa •ttdrla j, II.

Claf.
Praecedens humilior eft, *itrAnt* \. allò minoribus & angul:IMfX:S .«que catm di hitoribus,
Primae tamen floribus faturatiore; cetera fimilis. Naf: -icur titrumque bogeir Hifpanie &
Gallie Narbonenfis locis maritima.

5. *Iris angustifolia latensia versifolia C. B. **g*, uif. ftert vieljteo, nfitxti ftlk U&tit &• M.*

Claf.
Nec foliorum forma, nec radicibus multum differt à majore marina, nifi quod folia habere non videatur tam atra viriditate praedita: *floris* etiam plurimum differunt; nam tria folia furrecta purpurei funt coloris & violacei; tria vero reflexa & terram fpectantia paulò lateora funt, & multis laetis purpureisque venis, alternatim permixta, ab ipfo folio ungue exorientibus, atque fecundum longitudinem & in latera fe fpargentibus granulinam varietatem efficiunt.

Floret cum marina, feris primis, Junio videlicet mense: Semen mat: titotom icquirk Scppcm>
bru inio.

Umr mmtumm vttnmtm fuffi fufpaw, «-»» * ^ n ^ M M fartM r*Mxm>.

6. *Iris graminis cui praesens quattanis folia J. B. primum radicans major & minor
C. B. angustif. b. Claf. Chamceris tenuifolia C*

Claf.
E *radice* inodora, tenuiore & graciliore quam ceterarum Iridum, nodofa, nigro cortice refta, obliqua, brevi tempore magnam caliditatem occupante, ut cum difficultate eni queat, *caulis* palmatis (cum petalis, alteri vix oblongis Claf.) tenuis furguntus. *Flo* anormis e fubjecto *calice*, fex profundis folcis totidemque acuis porcis exarato, emicat, novem petalis aliarum more confians, fed multum diverfis; nam tria extrema repanda extrema ora albo violaceoque ftrus obliquis viridibus, inde contractis folium quasi ex ultimo electatum paulatim latefcit, purpurafcentia in lateribus, nulli in modo hifuta fimbria, cupis locum fupplet linea lata lutea, ftris purpureis pata; cui extrinfeca refpondens colta ex luteo viridit. Hinc incurvunt fimiliter repanda tria illa bifida folia, que in medio quadem e vir: U pui purafcent, à lateribus autem e dilute rubore fore cino:
11111
11111

rea sunt, quibus averla parte apponuntur frangula latifolia, castrata, coloris ferruginei: hisce al-
terno posita interjecta sunt tria reliqua minus duplo, colore violaceo, turgescant in limbo reli-
quarum more occurrunt, sed apicibus involutis a se invicem distita. Olor nobis gratia Prunorum,
Clusio Armeniaci nalis. Succedunt capita sublonga & turgida, valde eminentibus oculis pre-
dita.

Passiflora. Clusio dicit huius differentias deprehendit: Unam pedali interdum altitudine, caule tereti, basi
aut teretes plerumque flexos gestante: Alteram caule vix dodrantali, unicus magna ex parte florem
pubescentem.

Loco. Provenit in pratis Viennae Austrae vicinis, ad radices montium fais. Hinc folia hyeme accres-
cant, suntque tenuia, angusta valde, non rigida, sed mollia, & superioribus dilatatis verticis.

A. 7. *Xyris* Ger. *Xyris* five *Spatala* fatida Park. *Spatala* fatida, *pirifera* Xyris J. B. *Xy-
ris* l. five *Gladiolus* fatidus 1. l. *Stinking* Gladden, or *Gladiwyn*.

7. B.

Radix incurva Dod. in novellis plantis rotunda, & veluti bulbi aut cepae alioquin capis, e qua
flos dependent crassiuscula, veteribus & mulierum annorum plantis multo, longae, penicillatae, basi
invicem implicatae, magnum veluti cespitem constituentes, denique ut formi ita & acrimonia in-
tensa ad Iridem accedit. *Folia* multa caespitosa & sesquipedalia, in castratum mucronem desinunt,
angustiora quam vulgari Iridis, amo viree splendens, hirsutum mucronem odorem atrito obolens:
inter haec *caulis* plures, glabi, crassine mechois, per mollia folia recti alligunt, quorum singuli ca-
ribolam calca inflorentem ferunt florum Iridis, sed minorem, novam foem constantem, quorum
tribus repanda ex pueris obloleta albicantibus, virgatis, nulla fimbria villosa donata, terna modico
intervallo imposita, fuliginoso colore, bifida, ligulas concolores occultant: reliqua tria modice
erecta, ab exortu ad modum ulque circiter sulca, dentate ex albido leviter purpurascens. Flori-
bus succedunt *filices* oblongae, vel (ut ait Cordus) Iridis hyl. similes stricula, sed paulo majores
& trisperti, quae per maturitatem Persiae lussar debilitatis *flos* offendant rotundum rubrum, mu-
cronis Pisi magnitudine, gustu feruida.

Loco. Ad Alpes & in dumetis apud nos provenit, sed rarior. Observavit cum Lobelio & ad litores
maris aggeris: Passim Montpelii locis similibus invenitur.

Uso. Ea vi & acrimonia praedita est radix; tamen Cotalem aut cimices oleat, ut contra capitis vel-
nera Diosc. teste, faciat & fracturas, educat aculeos & omne telum extrahat cetera dolorem: admix-
ta floris aris tertia parte, radices Centaurii quinta & melle sanet tumores & inflammationes cum
aceto imposita. Radix cum pullo confusa bibetur ad convulsam, ruptam, contudicam dolorem, trine
stulicidia & alia profluvia. Semen ad citandam urinam efficacissimum est trine oboletum pondere
in vin.: Idem & lincem abluunt cum aceto potum.

Labels. Ad alvi profluvia bilium non fecia ac Rhubarbarum & Alarum: ventris floores ma-
torem per urinam dulcedendo & averendo supprimit. Ceterum opibonibus & ruficorum plebi in
prate. Somentis Angliae huius radice decoctum aut etiam infusum purgationes Iridis modo
molim.

In omni alvi profluvia i rtonui e perun hanc se. ti i yn radio...: inquit J. Bauhina; forte possit
tolerari usi in profluvia alvi penatolo.

Huius radices maximarum sunt verum in Scrophulis intra sumptz. D. Needham.

Pulvis radicum efficcatarum in hysterica passione, orthopnea & hypochondriaco affectibus un-
dissimus est. D. Boyle.

8. *Iris* «tmfd C & Cer- Pirk. rWrwi Btftctnum j. B

Folia illi tria aut quatuor, sesquipedalia & longiora, angusta, striata, qua L*in*u, cum primo
erumpunt rigida, vix postquam in suam longitudinem excreverunt, infumosa & terram vixit
reclinata, in acro mucronem obtinent, coloris glauci, ad exortum gracilia, & duobus tribusve bo-
lois seu septimo membranaceo involuta: inter quae exurgit *caulis* pedalis aut alius, gracilis, teres,
striatus, duobus foliis archi et inulomdptt. & similibus suis cum amplexis & involucribus ab uno
al summatu fecit. In limbo *caulis* huius observabiles sunt huius invicem proami, e quibus to-
tidem folia membranacea acuta, carinata exsunt, alterum superius & angustius, alterum inferius &
latius, tum folium superius, tum *flos* huius ipsam anteaquam aperitur includens & occultans. Flos pe-
tala externa tria verba tertiam valde reflexa, supina parte significant mollitie & splendore pannum
nigrum holdericum referentia: in incumbentia tria eriguntur magis quam in alia Iridis, & in
duas acutas lacinias erigidas instantes profunde dissociantur: tria reliqua in alia erigi & supra flo-
rem effertur solita, brevissima sunt & perangusta, ut foliorum potius rudimenta quam folia genuina
ceteris mercantur. Omnium, excepta apicibus extimatorum, color pallidus aut herbaceus, nigro
quadam alio obster tinctus. Flos huius vasculum longius oblongum teretissimum quod flos
mixto grandescit, & ob gravitatem suam & pediculi infirmitatem dorsum dependit, lacinia con-
stanti rotunda, albicans. *Radix* tuberosa, varie depecta, quae in plura interdum tubera, velut to-
talem digitum in uno frustulo eximitur, excrebit.

Orbit in Orientalibus regionibus & in Arabia.

CAP. II.

De LiliafpbsJeh.

T liiafpwhkslus tklaeft h*c pUnu i flore Lili & radicc Aphodeli.

L

I. Lilitffbadtlm Itiitm Park. Liliun l... cm* A\$B... Utiiofbailitii quormUsm... fieri... J.]... UM MM Mi*fm Get. Che Sap Ailp.

7. fl.

... nos diviso; radice fibrola, glandulis appensis donata, Aphodeli radicium amul... (multa, oblonga, ab uno capite descendunt) fovea burza, intus alba, sapore subdulci. E glandu... rum annexu libez quedam crassiores serpunt, quibus in plures plantas multiplican... ir. WJ* ci... sum ilon.trJ. /*>< odore plane*

Floret curi Ubo p... parvo majore, & paulo ante, Lilia candida, *jccdeni. lit Uiiiftjru mai... ni copia sponte nascentem, in multis uliginosis pratis, n>n procul ib opptdo mimtlliriu> Kemtib... invenit Clusius.

X. / :> << radice pharica w Park. Ltliumrtitkt AffhoJtU fbxnictHM, l... Liliu pboJelm ^mAmf... dam : B. Liliu Tithian Affledtli rodUt C. B. Ltltum mm Ituliefiam pbenictim (in The... Sap Ailp.

Nh admodum abfimilis est hac plantae praecedenti, sed in singulis partibus major. Radix quippe... confinuli!... ti crxf&... radice... ti: : folia majora, carinata, latiora quam lura : flores in caulium ramis altero tanto majores, Lilia... ..lies, colore tristiore rubent intrinsecus, lutei lineis per modum decurrente ad ungun ulfjuc to... rot luteo: extrinsecus folia ad luteum magis divergant.

De loco ubi sponte exit nihil invenio apud Botanicos qui id eo scripserunt: Quod semen apud... ipsos non protulerit I.<xquot e... prtxlucit. Radidboi adco ic nulnpliut & prodigal, ut ob id honuUnu tmiuacepou & gra... tis fit.

Ob flo ;iunumuluntiXJt diem duranws n n inopē Hemerocallis di ipoffit

CAP. III.

De AftlndcU.

A Sphodelon dictum volent quasi... Etenim in tumulis Veteres Aphodelum scribant, ne decilte cibus mortuis, ut... Porphyrius in quodam epigrammate scriptum reliquit, ubi tumulum his verbis indicit, Nery p... Foru quidem Malvern Aphodelumque... habet, necis veri mortuum clauda.

Aphodeli nox sunt radices mults tubenbui ui o capite deper. Ientitwi codlima, Horn Itdbti, femina triquetra.

1. Aphodelu major v... ramofae Get. Park. albarum f' >> * C B... Che crr.< Wljitr ti:inc(jfti f sphodel.

Multa... iabec obinnKi /WM, aitenltj, (run pit i 6c... valari carinata, fungola & lenta, microv... ara:... casum roscatum, levem, bacubalem interdam, in ramulos superne filiam, quam a medio terd... Eritum vergendo exornant multi, stellati floru, coloris intus alba, fovei vero perco purpuralescente... singula folia secundum longitudinem quasi distinguente (ut Ornithogali flor virentente linea distin... ctus est) sex flammulis modum occupantibus. Semes durum, lignotum, rugosum, strum & figurat... triquetra, capitulo orbiculari fere, sed tribus eminentioribus costis praedito, & ex viridi purpuralescente... continetur, quod illo per maturitatem dehiscente cadit. Floret per partes, ut verē dicit Theophras... tus, & incipit ab imis. Radices ab uno capite numerose exeunt, oblongae, exiguae Napii similes, sed inferiori fove crassiores, atque in libras definescentes, facci plene candido, ingati & acris... gustu.

Illius (inquit Clusius) radices videre memini, dum Olyssipone Hispaniam proficiscer aratro >eni... tas, quae 100-200 plures, ab eodem capite pendentes, oblique crassae admodum naves habuerunt, ut... 50. aut amplius libras totam plantam pendente poterit. Itaque nihil mirum si Plinius, So. simul acer... vum sepe bulbis referat.

Locus & Tempus.

Nos in montibus Messianis immensibus atque etiam in collibus saxosis agri Montepelensis obser-
uavimus. Floret Martio & Aprili. At tXM Autumno etiam florentem invenimus: unde forte Al-
phodelus Autumnalis Case.

2. *Alphodelus* a..cm *.*rdmtfm C B Park. major aliam non ranojer J i • ** Tmtfrn Gft.
2. Cluf.

Claf.
Præceder. resque firculof. ». tt fUn nui on-
nino albus: Illius etiam radex non admodum nit terou. J n Sicilia circa Syraculas & alibi obser-
vavimus.

Alphodelus purpurascens filia maculata C. B. mutj* jtirt t*rm» P J A jfr» nJatr Ger.

Cum nulla præter eas quas tituli exhibent noxæ hujus tradantur, nos varietatem præcedentis acci-
dentalem, non speciem diversam arbitramur.

3. *Alphodelus Idmwmmt Oaf.* fnt. appi Ger- ante * M W * < W J. & C E Pirfc.
Claf.

Minor est tertio jam descripto [Phalangio] Scaboo punctum dttTat; turn
glandulosa radice habet instar loculi gen- rfc, boetmlnore^ c qiurumcipfcepRKfeumqanijie
aut sex folia valde angusta & longiuscula, inter que a trantem aut pe-
dem altis, singularis, nec ulla ramis præditis, in quo ttrgie rtultetim racuodiu, oi>
singulis petalis internæ & externæ venæ quadam fo: >icr in modum rukuncu multi ferri albi,
undum longitikitoem nouic, perinde ac tertu
flores.

Tempus. Julia initio flores profere incipit, quam reliqui genera suot abpecervnt. 11 vane foU amittit,
&ini) a demò acquirit circa Aprilis initium.

4. *Alphodelus luteus* Ger. J. B. luteus minor fca Hafala regia Park. luteus & fere, & radice
C. B. Bellou Alphodel, o; Kings Spear.

J. n.

Radice ab uno capite multe nascuntur, inge tanuomr. nam Alphod. Ibi HUMD, culore Ltc*
pendit, exprotrcha per transversam h >n (; [jfojgjiito CM&I tel»uKu!>:t.
lata, à medio ad summum ferebri Alphodeli, ab uno moq. ant altior, singu-
laris, sed lutea, (jum ctapwK pchsrpu rociindi, ftn uigiun ferc enqua mentibus ornati,
port' inguuii, Tcun anguola nt aiqt; tra fere valantio, fistulosa, colore glanco prædit, à radice
lata nuro-rola oriantur, se uuleni etum <1 Sara dque enkt*. unJiquc
unJHTUJ ditfuln rnulun fc pn>p>f
convellunt. Radicebus
In Italia ad promontorium Phalangium & alibi in Sicilia esse invenimus.

Locus.

Alphodelus luteus minor Ger. hinc eadem species videtur.

f. *Affix.* luteus Autumn. •mtlu C. B- Amimmul* fiv* - major Cam.

C*P. IV.

Phalangia.

Phalangiam sic dictum est Galeno 8. SanpL fculr. quod <kmat& i Phalang M [Aiwoi gi
nera] axillæ: cui ut & Plinio l. 27. c. 12. Phalangia.
Ab Alphodelo radicebus distat.

1. *Phalangia* »j! res Libi J. B. Alabrogum Park. Alabrog. tmm^m CLL mtgm fimt U B.
Ger. emac. Spi Dr: wort.

Claf.

Quia vel sena producebat [Clasio] folia, carinata, lam sum», tarreAi, nrkiu, fumini parte
macrodata, inferna sese invicem am- fi: trina int (alinpwm: inta que proclibat
eandem petalis aut amplic, viridis, teres, firma, summo fastigio mæ r (UIKULUCS ip endices denos US
plures gestans fien, proctis naves, majores quàm in majore Phalangio vulgari, ma
tim propendentes, (ternis interioribus petalis paulò lateribus & crispis, can- noribcu »cui vvidi
macrodata præditis) horum parvi Libi f- tnuni quodimnwdo rdtrnto, odor, e quorum umbi-
lico linea gracilla prodibant fam. -juncur 1161011
circa, & flava an. rachi in medio stylo. u: oparone

comparari posse Lmvkkjf • sam ,ivo llioafra Flanbai 'ccodebant trigona capsula, fu-
scam fomes & inæquale continentia. Radix in multas, crassas, candidas & longas fibras, aliozum
Phalangiorum radicebus non dissimiles dividebatur, & aduam se propagabat.

Locus.

In Alpibus Alabrogicis prope parvillum Carthaginiensium cornubum foveæ oritur: I Radicebus
reperit florentem Junio in præti montis Septima Bm Klutw _i ij-ope I alessi: atque
nare cum esset, in montes Thauri.

2. Wffilgw** f>Ubrm iwn ramofum J. B. ;JTVO fire tun r*mej*m C B. man TmaCam v>h*rt Park, parad f> ramofum Ger.

^f ft

Folia est Pl: Alaneio ranofo pane limilibuj hii...ribus paullo : caule eodem, fed non ramofa: tf^ . ^ijw paullo m-lonbus, a,fois, multii, & fpicamrc|xxfantantibus: succedunt capifula fublonga, ... quibus femina rotunda.

Lhip! cem huius Ipscteni tacit C. !. ubinus, majorem folio longiore & latiore, femine majore: & alter.un in qu.1 rmima minea : Cuius adhuc alceris meminit, cujus folia longe ampliora, le-n- gtora Sicraffioi a quam precedens, caula etiam multo procerior, qui & flores longiore fpatio -b jnvicem Jirtantios p offerbat. Fo itihat onus fuit tantum precedens varietate. Reperitur in moncibus Pj-ren*!:- Nos in monte&i'.-va prope Genevram hic defcriptam observavimus.

3. Phalangium farw fitrt romfittm C B J . t t Pb*UitEtmrtmifam VK). Ger.

J. B.

E radice perenni fibris crassiusculis, candidis, subdulcibus, glutinosis composita caulo surgit fingu- laris, tenuis, lavis, teres, leiquicubitali, cupis fcapus in ramulos aliquot faciens, feres sustinet fre- quentes, stellatos, emaculato candore Lili conspicuos, quibus pericarpia globosa succedunt, Lini capitulis roscalia, per maturitatem in tres partes delibentia, femine (ut vult Dodonaeus) nigro, ve- luti Melanthi, non perinde tam i a iugulo!, retorta: Folia graminea, petraechi teniora, angu- stiora, carinata, pede aliquando longiora, ac etiam cubitalia, statim a radice exorta in terram panda parum atolluntur.

Circa Francofurtum ad M... mum, Bifileain, Gcfwram 5: alibi in Get-mania, in collibus, pitcais Utw, montois, 8e crctctt oopios oritur.

4. ?bdUH*i*mCrr.*S*IMtnfu Lob. Ger, Aftboitlm foUit faUUfu CD. mt*;r /**/* ^.

J. H. jtm< nwifer /JV< FfideJ*i Park.

J. B. Clu.

Ex fibrosis Phalangii (cui tota l pUtua fatu ITmilii) r*/. ibi, malocriter crassis, non nodosis, o capite numerosis folia promi multa, angusta, rotunda fere, striata, fistulosa, tres aut qua- tun: uncias longa, [in culta planta etiam cubito longiora] in acumen detinentia: e quorum me- dio sex aut plures eadem radice allurgunt caulis, cubitales, ramosi, quos sine ordine nascentes stip- pant feres, laperioribus similes, sed minores, colore lacteo, lineis ferrugineis [Chalo purpurascens] unumquodque l etalium l caribum longiusculum percurrente, f... in medio lactis, apert fer- rugineos sustinentibus. Folia subocantur triquetra fere, femine nigrum, triangulum rugosum clau- dentia.

In ompo illo Upidofb (ipra AreUwm versus Maffiliain, ca oppidum Saloznam, Cretes, » 5nfc Lemt ntnfm vocat Ijobelius, VUIRO /* Cr<NX, capiwe pruvem;. Nifanir etum, i. ferente Chalo, plerum, regi i Gf r l ocis.

CAP. V.

Vc Pseudo-phalangis.

1, Pb*U*gt*m r,r,xmMMm TrsJftitMt Ger. CfUC Efbmtrmn Hr^ntmm TrtJiftiMi Pailr. ;uia i jilum fivt Afflj Yirxi**#*m CD. apt>. Ptiotliun/>|IIDer tuot.

Park. fibrosa, longe lateque sub terra repente hic illic folia protrudit, ex cunctis virgulis, ttiuu auc terru t: nul, rariu plura, unu parte se mutuo complectentia, longa & quasi gra- minica, angusta, e taut tve principio in acutum mucronem sensim delinentia, per margines nonnulla aspera, nervosa, canaliculos superantia. Caulis inter folia exturgit palmam, rigidisco- lus, geniculatus, foliis ad singula genicula singulis eum amplectentibus vestitus, e quorum limbus ramuli in rrdumexair. Caulis fastigium in duo plerumque folia discedit, Cypri fere in modum; inter quae l ei emergunt plerumque velut in umbella, ad viginti interdum, tripetali, lati ampl. puro-ceruleo saturo colore tincti, calice viride trifido pariter antequam aperiantur inclusi. Se ot tremulis pedicellis penduli, qui floce se explicare incipientes productiones facti originem. Medium florem occupat umbo sine capitulo, staminibus sex rubentibus, plumosis, apicibus latis insignibus, circumvallatum. His interdum aperitur, sub vesperam se claudit, deinde marcescit, & contrahente se calice doctum demum mutat. Umbo medius, calice occultato, in vasculum feminale turgescit, femine parva, nigricantia, oblonga constricta.

E Virginia ab amico quodam in Angliam illatam accepit Joan. Tradescantius senior.

Vanat in colore albo & tfw; & tota etiam in iiplri

2. Phalangium ramifum Virginianum folio lato, rtf • Jac Zanoni.

Zan.

Radix nartur longa, reptante, tenax, caulo non crassiore, nodosa, e singulis nodis fibra. cui- tante longe lateque sub terra repentes teretes, pallide laeas, qua facile delibantur, medullis tota fossili, succulenta, sapore inito dulci tandem mordicante, Raphani emulo. Caulis e radice capi- culis glaber, cubito paulo altior, latus & frangi commutat, medullis densis, viridi, succulenti re- platis,

pletus, sacco tamen minime viscido un precedentis, convexo, seu conoidem maſſam dicens, tenui, vincti aut purpurante, maximè verſus fundum, veltitis, lanugine ſubtili albicante. W<ffi>A raris nodis interſecta, mediè parte longioribus intervallo diſtantibus, ſumma & ima ſatis vicinis: E ſporum ſingula ſingula emittitur ſiſta, membrana ad extremum lateri caulem aliquoſque obvolvendi podiculo brevi lato adnata, tactu molli; nervo medium percurrente, infernè elevato ſeu curvato, ſuperne in ſiduum rariorem depreſſo, cum aliis ſubtiliſſimis nervulis, per totum ſiduum excurrentibus; tactu aſpera, ſubſtantia cartilaginea, ſuperne obtuſe viridia; infernè albicantiâ, nempe lanugineâ, confuſibus lineis viridibus ſtriata, quæ à baſi ad apicem utique extenduntur, adeò exiles ut aperte ſint viſibile. Caulis in ramos ſatis crebros dividitur, & hi rariſſimi in ramulos ſecundarios. In extremis ramulis natiſcuntur pellicule [ſeu calyces] herbacæ, ſubſtantia membranacea ſeu cartilaginea, quæ claſſe hemiſphæri figuram repræſentant, quarum unaquæque, ſeres ſufficit tripliciter. Phalangia præcedenti, binae curvaturæ, tribus in medio ſtansibus apertis flavo ſuffuſentibus: aperte triangularem referunt. Flore delapſo ruſſate calices ſuperadditi herbacei, lineis rictuatis adeò eleganter ſtriati, ut hæc oppoſiti velut reticula aut Aranearum telæ apparent. Hi undique claſſi ſunt exceptæ parte ſuperne, quæ coram cæno interius extorſa (CHI culis terna, tenuis, nodofa, in duos vel tre pediculos tres ſeres reſortos dardis, quorum uniusquodque, cone præpeticulum ſubſtat capiti ſerpentem ore hænte effigiem affabre mentem, cum lingua intus palato adnata, quæ poſtea ſeres efformat, lingue ſiquæ color uobis colore canteris, ſubtili flavoſcente. Planta hæc ob nimiam raritatem ſe propagandi facultatem raro florem producit: nam ſi factiſi coarctetur quotannis plurima, floret.

Phalangium Africanum Heistermæſis ſic non deſcripſit. Hort. Lugd. Bat.

C A P. VI.

Be PſtyU-aphodetis paluſtris.

PſtyU-aphodetis inquam Lobelio, qui primò ſibimetipſi parum conſtare videtur, cum in *Obſervat. laborat. lux. Plant. Dodonæi* iconi huiusmodi titulum imponat, *Aphodetis nemorum latum Acriſolan præſta: Aphod. latum famjtru IVxkm. m agro Leſſafria doglas*; & tamen in *ſubo. part. 2. Tabernamontanum* reprehendat, quòd Lancaſtrienſem Britannicum palæſtrum Aphodetium hæc cum Batro aut Flandrico Aphodetio paluſtri Dodonæi confunderet, quòd ſcilicet ipſe fecerat. Deinde in *ſubo. præſta. noſtra ſententiâ*, quòd Aphodetium ſuum minimum Norvegicum hæcum paluſtrum & Lancaſtrienſem, quem Anglo-Britannicum nulloſtat, apud quas frequens natiſcitur, à rictuatis capitis *ſtyU-aphodetis* & virginis capillum, vocant, à ſecundo PſtyU-aphodetio Claſ. non diverſum putet, ſed varietate parvitate & magnitudine rarietate natalis ſolæ.

Quæſio enim alicubi forte in Anglia proveniat (quòd non credimus) PſtyU-aphodetis ſecunda, ſed non tamen certo certo adeò frequens uſquam oritur, ut ruſſici & mulierculæ cognita, & in vulgari uſu recepta ſit. Verùm PſtyU-aphodetis paluſtris noſtra [ſc. ut patam, *Dodonæi*] tum in ſeptentrionali, tum in Occidentali Angliæ parte, locis paluſtribus & æquoribus oritur, ut nemini è medio vulgo incognita eſſe poſſit. Adde quòd hæc à floribus colore ſtato rictuatis aptus videtur, non autem PſtyU-aphodetis ſecunda Claſi, cuius ſex paluſtrium ex herſecaco o locis eſt. Lobelium ſecun J. Bauhina & Johnſonus Gerardi emaculatæ eodem tenentur: C. Bauhinus hæc rectè diſtinguit; atq; inſuper PſtyU-aphodetium paluſtrum Angliæ à PſtyU-aphodetio paluſtri Scotico diverſum facit: Hoc etiam rectè, ſi PſtyU-aphodetium Scotico noſter ei cognita fuerit, de quo eſt cur dubitem. Certè Lobelius Aphodetium ſuum minimum Norvegicum paluſtrum Scoticum cum Lancaſtrienſi ſeu Anglo mifcor & confundit.

Reſtæ alicubi ſtyU-aphodetis. An ſcil. PſtyU-aphodetis hæc paluſtris noſtra idem ſit Aphodetio hæc paluſtri *Dod.* Si etiam hæc eandem pedalem habeat, poſtquam eam deſcribit Dodonæus, utique nudum, ſed minus ſolubile ſive vagantia illam amplectentibus doctam, ut vult Claſi, à noſtræ, quæ humilioſ eſt plerumque, & caule ſolus pauci aliquos exigui lobulo diverſi videntur, ut & ab aliis nobis cognita, adeoque quantor erant PſtyU-aphodetis ſpecies, quòd non credo. Eſto ergo PſtyU-aphodetis *Dod.* cum noſtra idem.

Nov eundem tres hactenus PſtyU-aphodetis ſpecies reliquas, utque loci ſuis natalibus collectas, ſpecies adhuc allecavimus, nec plures agnovimus. Ex ſunt

1. *PſtyU-aphodetis nemorum ſeræ pamiſa ſola Italia ſeræ 2. Claſi. PſtyU-aphodetis Alpinæ C. B. nemorum ſola Italia Park. Aphodetis Lancaſtrienſis Ger. ſicla.*

Claf.
Numerofa ſunt huic ſola, ſeſe merito amplectentia, ut in Aphodetio hæc paluſtri: *vtkl* & *leade*, anguſta, linearis, viridia, dura, amariſſima & calidè lapora: è quorum medio *conduſa* graciliſſis egrediuntur, poſtquam interſerunt aut max, aliquæ nemumquam ſolulo inherentes, ſperam *ſtyU-aphodetis* ſeres ſex lobulo emittantur, aliorum inſtar, ſed minorum, paluſtrium ex herſecaco colore, & odore expreſſum: ſeres ſexta: *tt^KI* capicilla, interdum tetragona aut pentagona, minutifſimum ruſſam ſerem emittentia. *Kada* tæ corpus habet, ſed rictuatis aliquot lobis dantur, conſtat.

Hæc Claſi Aphodetio hæc paluſtri *Dod.* per omnia natiſcitur hæc, ſolia ei ſic ſimilem.
Hanc ſpeciem in Anglia ſeres etiam nemumquam invenimus, nec ab aliis ſic dignè inveniam auctorem: in tranſiſtrina autem nem ſerem, in rictu ad rictuſ mocta Sibiria prope Genovam in apertis, & alicubi in Germania J. B. *PſtyU-aphodetis pamiſa*, Lem *ſerem*, Johnſono apud Gerat. emaculat. KB A. 2. PſtyU-

A. 2. Tl€*J**fcMm ffi:j: rm. Afybtdttm Lmtfrix vtrm G<r. cmic. if

i hab« unciisi!u.t» cum dtmtdio, aut trc longa, in u parts1-uinr.i, in (nucnmeni .icumm ferv
fim angustata. Ctwui alcituiiinem palalem ra ob, alloquitur, levis & foliis paucis donatus; c
summam partem ipi a OCOMt fiornm cIcfr...num, stellatorum, sex foliis constantium, ^^
flavo; quibus succedunt cap. <fx lonpukuljt, trigonx, interdum ctiant taiagoni; S: penugoilt, ft.
non exilo; ruffum, continentes.

In paliiltibus putridH & mquotis multis Angh* in loos, copioffim^ rtimr, & *fl<c flora. Lcra.
Hanc . proAiphwJtjl. lutoo palutru fW habemus quj- utumvi no- Ldclcnp- , noq, fi ^uraDo-
donat i ci per omnta HJponAant. DitTer- cna enim in magnitudine, & caule multis foliis
duto non tantu est, ut properea ipi m, pefertim cum loco conven
donat Afbodei palutru & noftra. ^'aa multiplicindapiuc m, ant Do-
Ju

Afbodelum Lancallmentem
A vulilwa lin.<iti.i m ire cffita^cin die aiunr. Vid. FiiUfofb Trsntti)^" <--
tf.li-

Floribua lisivio m • i fliviim inijaunt trf.
A- J- PfnJ affbeJtl.-it fdlmfirw Snsitm mmmm, Ccf if .if) ^fcrotfl) XfptioHtl.
lo aut qiaJnipto minor c inentibus -ifphodelo palutru A vel nudo, vel unico ^lp mis
foliolo donato: ipca florum brevis; foliula (quantum conjicio) albenibus; or umo
capfula brevis & tute: leudo afbodel: .itUa lucceduii
Hanc fpeciem nota rivlum
brotundr. ludicesubluncnbrotT, tit in Plcutlo afptxKlclo i C/<
iXimnonprcc.il Ik

C A P . VII.

De Aloe.

A Ijoen Gnr. & Latini pariter tum & Officinae hortiun ipfam epula succum denatum ap-
pellant. Aloe autem dicta videtur quia maritima gaudet. A Roccoio
vum & Sempervivum marinum, quia a Srmpervivi modo dicitur. A Roccoio
Floribus hexapetalis, vasculis feminalibus in
offendit. Folis crassis succulentis, ad marginem
ter amarum fundente à reliquis congenerebus distinct.

1. Aloe vulgare C. B. J. B. vulgare sive Sempervivum marinum

Folia bene multa è radice emittit, in orbem disposita, imò parte
succulenta, digiti crassa, pallide viridia, dentata dentibus rigidisculis, in acumen dententia,
quorum exteriora apud nos plerumque in terram reclinata absquantulum, verum in loco natali
erecta, acriù virora, adeò ut per hybernos menses extra terram, in hypocaustis suspensa non
marcescant; sapore apud nos, (imò etiam loco natali autem Parkinsono) minimum amari, sed
potius refrigeranti. Caulis è medio foliorum exurgit, crassus, in duos trique ramulos divisis, alti-
tudine sesquipedali aut bipedali, à modo ad summum usque plurimos. Foliola, lagenule figurâ,
dorsum reflexos seu dependentes, apud nos albicantes (in calidioribus flavescerites) oris in sex
laciniis divisis, sustinent; Quibus pteritis succodit semen in capsulis Aphodeli renulis inclusam.
Ralis crassa, pedem longa, in fibras tandem crassiores spargitur, tenuioribus è lateribus emic-
tas. Caulis foliorum delapsoeum vestigia retinet, ut in Brasica.

In Sicilia & Melita insulis, in muris & tectis frequentem observavimus. Clusius in Hispania. Lcra.
Siccus ille insularis, Aloes nomine vulgò notus ex hujus plantæ foliis elicitur in Socotora in-
sula, Persie & Indis Orientalis provincias nonnullis, unde ad nos defertur. In Italia, ubi etiam
sponte & sata libenter provenit, ob cæli solive varietatem Socotora hujusmodi non reddere olim
credidit. Verum ingeniosissimus E. Columna, Aloem etiam in Italia elicendi modum à frin-
ventum in Historia stirpem rariorum publicavit. Is autem hujusmodi est. Supposito lato figuli-
no vase vitriato, multa supra illud ab radice statim avulsa folia suspendit, atque ex illis sponta-
neum succum luteum (quem in vasa tantum contineri animalitererant) descendere & guttatim
destillare permittit, manibus postmodò etiam doctum verum comprimendo folia, atque quod imò
foliorum oris concreverat radendo. Excepto itaque ex pluribus foliis copioso succo, vas illud
triana diebus soli exposit, ex circumscripta vase quoties quod hæretur duriore (statim enim
quod paucum est concretum) abrado & cum liquore consummo, atque pluries in die, noctisque
reposita vase, concretum postmodò succum omnem atque frigidem habet. Color (utique) ex
cinereo cum concrefcere incipit rufescit, atque concretum magis nigrescat, atque obscure parvam
rubentiam acquirere colorem, languinis concretum modo, vel potius Hepati similem, translocidus,
levis, odore grari aromatico, sapore amaro admodum ac abhorrendo; & mirum quod manu
tantum amittenti illius vapore inficitur ac, atque gustu amarum reddatur. In pulverem (ut
Dioscoridis notat) digitis confictus succo, qui probe fuerit arefactus, ad minimum usque re-
manentem tædè redidit, & aqua infusa statim liquatur, dissolvitur, atque cinereo evadit colore,
quo

Ger. Park. Common %lot#.

Upfaoael

Aloe elioes
de modis

quo ante concretioem praedita fuit. Omnis habet notas optima Aloe, & cum praestantissima Officinarum Aloe Succotrina comparata, cum excellere vixit est: eadem etiam virtus obtinere, & ad eadem in medicina valore experientia deditur ab eadem Columna. Hae cum ita sint verisimile nobis videtur in Orientalibus etiam regionibus Aloem hoc aut simili modo ex hujus plantae foliis elici; non ex eis in frustra dissectis & contulis expressis, eo modo quomodo describitur J. Bauhino. Sapor quippe foliorum minime amarus est, sed potius leviter refrigerans; dissecto etiam planta folio atque rance concisus (monente Columna) nihil succi, nec amari, sed mucosum quoddam, ac poenam insipidum gustu inveniebatur. Ex quo haec scripti hodiernam Aloe colligenda modum e dictatis D. Hermannus nobis communicavit amicissimus vir D. J. de Palmer M. D. si etiam sic se habet.

Ex foliis à radice avulsis manu vel instrumento leviter compressis succus destillat in vas recipientem. Solidare debent partes crassae per noctem [& postea insolant] alia vero supernatant. Postero die in aliud vas infundunt & insolant ut concretat & trahatur, in quo tempore fulvum acquirit colorem, quae est Aloe Succotrina Officina; crassa vero pars remanens effunditur in aliud vas & insolatur, ut colorem hepaticum contrahat, quae Aloe hepatica dicitur: crassissima pars Caballina appellatur. Succus sponte ex foliis oblique incisus emanans artem habet colorem.

Hic modus conformis est superius proposito à Columna invento.

Muntingius florem hujus plantae in quinque, particulas obtusè mucronatas non profunde dividi scribit. Verum suspicor illam vel errare, vel memoria lapsum esse, cum Clusius in sex lacinas eam dividi affirmet; cumque verisimile non sit eam à reliquorum hujus generis normis abeundere. Notabile est quod scribit idem Muntingius hujus plantae florem duabus internè trichotomè gemulo, ut in *Crossa Imperiali*, limpidissimis ac melle dalsioribus, decussimè, vixentibus, nunquam tamen decidens. Idem confirmat D. Hermannus Leydenis, qui & similia Soli familia ei attribuit.

2. Aloe vera minor Munting.

Munting.

A perconante differt foliis rectè magis salsum virgatis, vix pedem, in Belgii oris, longitudine superantibus, nec ultra digitum in medio latis, in angustum mucronem fuscis, colore non cinereo seu albescente, ut in illa; sed viridi saturo, neque tot tantisque maculis albo ab utraque parte circumdatis, sed paucis duntaxat minoribus, illic in extremo mucrone juxta se positis conspiciuntur, non fulgentibus, spatula vero à parte utraque, frequentissimis, exiguis, crassiusculis, latis basi notantibus, colore viridi albescens vel è lacteo candida, parum aut nihil purgentibus sed mollissimis, atque quam in priori multo artius dispositis, cetera similibus. Nonnumquam floruarat Munting.

3. Aloe vera major Munting.

Munting.

Differt ab Aloe vulgari foliis crassioribus, nec in mucronem adeo acutum, sed paulò latiorum definentibus, superne plana, inferne ex obtulo triquetris, in dorso emittens non minus quam in lateribus spatula eadem coloris, et magnitudine atque crassitie eadem superantibus, praeditis, albidis maculis laticioribus simul & angustioribus undique conspicuis; nervis internè ex albedo lutescentibus, raris, repletis. Flores in thyrso pedes aloe, digitum in uno, in superne vero haud ita crasso, recto, subulo, colore ex obscuro lacteo quasi hepatico obscuro fulgentis, atque superiores in tres aequales partes semipedes longitudine superantes digito inhaerentes; colore vulgari Aloeis florum dissimiles: Hi enim albescens non ingratus: Illi vero ex obscuro lutescentem: Alii vero luteum stris diversis albicantibus distinctum obtinent.

4. Aloe vera major Munting.

Munting.

Folia eadem vulgari Aloeis in modum disposita, colorisque eodem, similique forma aspectu ac colore donata, sed longe majora; maxima enim ultra spatium pedes Romanos longa sunt: cetera tamen pro illorum serie paulò minor, atque magis ordinatè disposita: in uno, ubi latissima, septem aut octo digitis lata, tres vero plus minus crassa: tante amaritudinis sapore repleta, ut eam degustatam Auctor terre non possit.

Harum plantarum succus, in alata, stribus aut vesicis concretis, Solisque calore induratus hodie et olim Aloe dicitur.

Hujus in Officinis genera reperiantur tria, 1. Succotrina seu Succotrina. 2. Hepatica. 3. Caballina. His addit Schrodertus *Laxidam*, quam alia à Succotrina non distinguit.

1. Succotrina ab insula Succotora denominatur (Est autem Succotora India insula, ultra 128. m. p. à mari Erythraei freto distans) Haec omnium praestantissima est, 1. colore cum rubedine flavescens hepatis in modum, nigra etiam, h. e. pellucida seu transparenti. 2. Odoe aromatico, ad myrrham sine accedente, unde odoramenta & balsimiga omnia ab illa erant. 3. Sapore amaro, aromatico & adstringente, amaro fugax nec diu morante in lingua. 4. Pondere levis, substantia tandem compacta. Trattando, in Sole etiam vel calore mollescit, liquefacta friabilis; quae Aloe optime nota sunt.

2. Hepatica, quod hepatis tunc colore tunc consistentia similitudine se vocatur, perconante impurior est, colore è citrino rubescens, non pellucida, odore graveo, amaro attenuato, rugisque adstringens.

3. Caballina, quae est Aloe crassamentum, seu pars superior, artiosa & sordida conspurcata, adeoque caballo seu equo exhibenda.

Flores of Aloe.

1 lorum cnum Kcncnurt ex um tt&mqc ; lanta, vel evidamati earum focietibus, p^{(ran4j} ratio- nem polt J-B-uhimim tr; fir Abrahamus Manningus in *Alid lif.* fequentem.

Folia aJuriuiiomnu, JJCK runcunt, necnon per 30. horarum fpatium in terra permanent, abfcindunt, in frufta fecant, atque planè e om- fupponunt fucci purum, ad eundem ufque evidantem omnino differentiam demant, quam i i ala- tam vel veficam, Solisque calore exficcandam deponunt, eamque Aloen *Succotram* vocant rum Infula Succotora tum Indiarum indigenæ omnes.

Deinde in medio confiftentem fuccum, uterculis exfic- mi cauia conacJcnitum. tolluur, quctn *Hepaticam* dicunt.

Tandem ex fola remanente illorum fece *Cabalina* vocitata, omnium fel. impurif^{tm,i,per}ficimur. Nos :otius fufpicamur Aloen è vulnere feu incifione in folis facta emanare: Alo-•«iimnobi5 vi- deat eile fuccus plante effentialis & proprius. Inguini analogus, in vafis majoribus contentus, in it, ciliannam coctione exaltatus, in quo tota vis planta quæ talis nalcitur: non cru- dior ille & limpida, qui fibres oCjurenchym.:ii foliorum inelt. Calore autem Solis concrefcit. Quæ in opinione autoritatis Plinii me saafiraux.

Aloe vim præter purgantem obtinet & exficcantem calefacientemmqc; obftrvi^ioncj. aperit, me- tas referat: Purgat autem biliofos & pituitolos humores.

Aloe pene fola medicamentoſorum quæ alvum folvunt confirmat etiam ventricolum, adeò not) la- beſcit vi aliqua contraria. *Galen. Plin. &c.* Hoc caſtigations opus habere ſcribit C. Hofmannus ^{denim} *Medicam. Offic.* Inquit purgans propriè dictum, quo ipſo affert locum aliquid nature adverſum, que-^l kjm cor: roborat ventriculam, mimis purgat. Elevantur enim ſimul cum ſordibus partes quedam igneæ acrefque, quæ alioqui ventriculo acciſunt.

Quòd frequens Aloes uſus hæmorrhoidum venas aperiat, ego (inquit Fachſus) millin ober- va i; &VO4 ex 1 OD. conmt cju Aloe aucv- rniorrhoidiim fluxmn p.iri, 01 nullo verò Aloes ulu venarum erendas faeces unntur, videbitis 90. hæmorrhoidibus inha- bere in continet. 1 eſt, ob ki VIUIHU tuqui lumorrljæ obno»» ſunt ex ore, alvo, utero; hincnoxu pregnantibus. Er Tho. Barthol. its Aft. N lod Ann 1673. Obl 64. exemplum addocit u lar crante e1 nimio Alt*cs ulii. Dices validum adſtringens eſſe. Imò externè applicatum, ion Incus ſumptum. Non autem quod medicamentum facit foris, id protinus etiam intras facit.

Aloe ventris tuncas & lumbricos enocat & expellit: cum aceto & felle bovino mixta, atque um* bilico impoſita idem efficit; ſtcretiam flavam depellit, omnemque putredinem arcer, necnon; iiii cadavera corruptionis vel putrefactionis manuna, cum Myrrha præſertim aliſque miſta, conſervat. Quare nonnulli Mammæ effiçiam omnino poſſidere contendunt, eamque præter Aloem humanam 1 mji. fine miſtam nihil aliud eſſe aſſeverant. Ego verò pilule tres per aliquos dies uſur- ſum abundantiam exciunt. I i bea ancillam (inquit C. H. "fiunmm) owjiwi <ua czraooz nicu- tui null alii uoone pto- moveri poterant menſes quàm oſa pilularum de tribus.

Ex^uerne pulvis h'inorrmiilil as inſperſus ſiſtit. In vino diſſoluta Alopeciam curat. Colly iii in- diu vi acuit: Cum melle miſta paludorum ulceribus, necnon ſiſtulis, oculique putredinibus oraiubui n>cederur; & hilimm eimicnlar. i Dva venarum clauda, languinem liſtit, denſat & ſicca 1 exteri c adaxxa; in pulvere v ulnere recentis & que ægrè ad cicatricem perducit poſſunt mirificè ooqdt.

In Aloe exhibenda cautiones quedam habende ſunt. 1. Ne detur iis qui ex ruda intemperia ſine materia laborant. Tales non indigent vacatione, necdum medicamento tam fortiter ficcante, quòdque loco vacationis tabem inducit. Contra datur cum magno commodo frigida & humida.

2. Ne ſenibus detur & quicunq; quatuor, de cauſa ficcati ſunt, niſi neceſſitas ingeat.

3. Ne ſit uſus ipſius nimis creber, adeoque quotidianus, ut quidam faciunt. *Evacuatio enim que fit per purgantia valde indigentibus & ex lo. & Alport uſu eſt.* Vido C. Hofman. l. 2.

4. Quomodum Agaricus prohibetur gravibus, ita Aloe & Aloetica. Hinc ratiocinans Helid. in pertinaciſſimis menſium obſtructionibus dat Elect. de H:rrj i cum Scrupulo C. JU integro. *Hec omnia Hofmannus.*

Tria ſunt (inquit Le P. mi) in Aloe quæ corre ctione egent: 1. Quòd tarde fit Ooperationis: quod corrigitur adultis aro in<iUu citenxx tenulors & acibus, ut ſunt *Mace, Nax me/c 4/4, Cery- pſis, Cinnam. ſica nardi,* Cabot. Schenard. Crocat.

2. Quòd debilis fit operationis: quod corrigitur à Ruſſo addita Terebinthin i vel J!14 rcJifU sen* ore. Alii adiant eam in decocto Rhabarbari, vel infuſione Roſarum, & he reſolunt robuſtiores.

3. Quòd anæſtometrica & enarum aperiat. Quod corrigitur commiſcendo Maſtiche, Tragacantham, Boleſium & C imulu. Vel abſtindo eam aqua Eudivæ vel Cachœii: ut ſuperius innt:ma.

j. Alt Amr ricanis Cfcf Par ^<rt<<M i^>>*fj J. E A!M filt* mmermm* Ger. /J> j*

Cleſ.

Multa ſunt illi falſa humanam longitudinem attingentia, ſicutatè virentia quid* Tb fed (JUibys uj- ſperſus videatur cintracti quadpiam coloris, ut in Tulgarum quarundam folis, levia, circa intr. lodem trium aut quatuor digitorum tranſverſorum craſſitudine, quodammodo carinata, valde lenu, ntatni'i Jc amplectentia, inſtar foliorum Aloes vulgariſ aut Alphonſi, ſenſim in mucronem delin- gentia, quæ nihil aliud eſt quàm ſpina, ſicca, craſſa, unclam cum ſemelle interdum longa, & aded firma ut Americani pro ſubula uti ſolent, & caſpida ferrea loco ad ſua tela adoraunt: folio- rum latera tenuiora ſunt, & ſpina eadem coloris aſpera, ſed brevioribus, latera baſi præſtita, & de- ceſum incurvis ut in Rhanino tenuior; interiore parte fibroſa ſunt hæc folia & ſucca plena, ſed non amara. Ex eorum modo '«*** en- ſitu, brachiali craſſitudine, & brevioris lane i* Jtiulu*

Et est crassa, longa, curva, veluti internodis articulata, è quibus ad latera nascuntur alie plantæ
alernis, ut in Arundinum nodis gemina seu gemine sunt dispositæ.

Planta hæc brevi interdum tempore spatio, celerissimo auxilio, minæ proceritatis caulem emittit.

• Adde ad
Cajana. post.

Jacobus Fontanus in * Epistola ad D. Blasiam Capisula Avenionensem gubernatricem, de quadam
Aloe planta Avenioni in herbo D. Divo emissa, quæ per 100 (ut credebatur) annos ibi man-
ferat, necdum floruerat hæc habet. Caulis ex ea orti cepit Sexto Nonas Maii 1599. quæ intra
41 dies crevit ad 12 palmos. A medio ferè hujus caulis ad summum usque ramos five brachios
emittit 19 perinde efformatos ac brachia candelabrorum quæ illuminationis causâ in solo Magnatum
suspenduntur, origine rectis, tandem sursum recurvi, in quorum fastigio summo valge enatae sunt
plurimæ, Hastulae regie vulgus non abimiles, quibus saprema porta hærentes flores crocei, floribus
Rosarum capillamentis inhaerentium non disparæ.

Perius Borullis Aloe plantæ caulem, cum per longum tempus sine eo remaneret, tandem erumpere
suscipit cum fragore & strepitu, ut impetu sicco tota in truncum ferè **oopvautur; & Co**
mirantibus hominibus incrementum tantum suscipere, ut enim Quercum modicam æquet, & 10
circiter palmorum altitudinem, & ferè crassitatem acquirat, floribusque in summitate decoretur.
Quodque magis mirandum intra paucos dies, [quatuor vel quinque] hanc molem attingere, adeo
ut incrementum ipsa etiam oculis percipi possit. Tale quid viliam æquet apud Montiphanenses, hæc
Credat Judas Apella. Nos anno 1651. Aug. 20. Monachi Bavariæ, in herbo Illustris Duci
octo aut decem hujus generis plantas vidimus quæ jam, caules producerant hæc altitudinem, brachia
crassitie, summa parte planius floribus ornatos, eodem ferè modo è caule exstantibus quo describit
Jacobus Fontanus, nondum tamen plane explicitis: de caulis erupione & ceteri auxilio nihil pro-
digiosi nobis ab Hortulano relatum. Verum eisdem est, intra unius ætatis aut semelstre spatium
caulem erumpere inque eam altitudinem & crassitatem excrecere, ut arbor quædam videatur, quod
quantvis mirum, non tamen si foliorum & reliquæ plantæ magnitudinem consideres omnino pro-
teritulum & incredibile apparet. Proinde in ratione hujus phænomeni expugnanda frustra se fati-
gant suspensæ aures. Flores hexapetali hæc sunt: *flosus* tribus cellulis distincta.

i. v. 13
7. 16.

Planta hæc unica (nuper Franc. Hernandez) quicquid vitæ esse potest necessarium prestare posse
possit, si esset rebus humanis modus. Tota enim illa lignorum lapideorumque agrorum usum per-
stat, caules signorum, sola verò testa tegendi, involucrum, lanciam: eorundem nervos & fibra eun-
dem usum habent ad linteamina, calcosi & vestimenta conficienda quæ apud nos Linum, Can-
nabis, Gossipium, &c. E micronibus sunt clavi, aculei, fibule, quibus perforandis auribus, muer-
randi corporis grati Indis uti mos erat cum Demorum vacarent cultu; mens aculei, acia, tribuli
militares, & castilla adeo pectendi subteymibus. Præterea è loco manante, copia crustis ge-
neris: *uicernis* foliisve tenerioribus cultis [*Yucou*] in medium cavitatem stillat planta unica ad
50. interdum ampheas (quod dicta est mirabile) Vina, Mel, Acetum ac Saccharum parantur. Suc-
cus namque destillatione fit dulcor & spissior donec tandem cogatur in saccharum. Venerit sit ex
eodem succo diluto fontanæ aquæ, additis corticibus Malorum Medicorum Limorumque, & abin-
E saccharo dato paratur acetum, nuper resoluam in aqua, & novem diebus infusato. Item succus
mensiles cat, alvum lenit, urinam evocat, renes & vesicam emendat. E radice quoque restitunt
femilifera. Crassiores foliorum partes trunculique decocta sub terra odendo sunt apta, sapientique
Citra trusa saccharo condita: quæ & vulnera recentia mire coagulavit. Fit enim succo assila-
tione glutinosa, quæ suapte natura fragilis ac humens est. Folia quoque aila & affecto loco im-
posita convolutionem curant, ac dolores leniant (precipue si succo ipse calens bibitur) quamvis
ab Indica proficiantur hæc, sensimque hæc **bcunt** atque torporem inducunt. Radice *suca* *laem* *Ve-*
neriam cura apud Indas. D. Palmer.

6. Aloe Americana nym Niantig, Alo Theamal five Magui diviana

Hcnunkx?

Monti

Radix nuncur digito interdum crassiore, nodosa diversis geniculationibus distincta, ov-
dopradrtri, nouaan trnumera fibrosa, primo albescit. **•nnbu.j** *stera* verò ad helvum declinansibus re-
dicibus dicitur.

Folia protrude ita inuicem amplectentia, pedum Romanorum duorum longitudinem nunquam ex-
cunt, pro illorum aucta brevitate admodum lata, sex minimum octo aut novem digitos non raro
firantia, cæteris obtusiora, & in brevem micronem desinuntia, reliquarum specierum more cras-
sa, circa margines tenuiora, necnon frequentioribus basium atque exalibus plane spissis etornata.

Ex Hispania nova allatam Manzingio obtulit nascens quidam, qui ab Indigenis America *The-*
mal vocitari solet: eadem videtur *Theamal* five Magui diviano à Fran. Hernandez delirigo
& depicto *Revea mala*. *Nova Hisp.* lib. 8. cap. 19. natiq; & nomen & virtus conveniunt: spissu-
dem ergo succum optimo cum succo trum quatuorve cochlearum mensurâ fabricantibus omni-
bus exhiberi prædictis nascens ab Hispania quidam mulieris elocutus est.

7. Aloe trrmdmt in umbellifera Mantig, Atil five AU(*t, || Hernandez.

Montig

Radix hæc brevis est, crassa tamen, subulca, fibres frequentissimis undique obfusa. Planta ipsa
pseudocactaceis partibus nup, prima tamen specie minor est, cujus effigie ac foliorum dispo-
sitione persimilis, nisi quod sola pulchra latera ac magis canalikulæ, atque breviora, vicihora,
atq; ab utraq; marginum parte (penalis crassioribus horridioribus, & modice longis, ac ferè in modum
bellè admodum, non tamen adeo rectè dispositis, necnon in apice seu hermo ac crasso quodam
necrose è purpureo colore obfusa præfata, quatuor plus minus pedes longa, vix unum lata. E quo-
rum medio Cassi in adultæ plantæ brevi tempore, ad duodecim, quatuordecim, & non raro sol-
cium pedum proceritatem allurgit, unicus, imò sui parte coramibus humant crassie, pyramidali,
numeratioribus quæ *Macromis* filis *magore* lobulis cum archis anglicentibus cincta. E quo-

* Alo Am-
rica in Cuf.

rum sinibus in superiore parte ramuli undique emittuntur, non adeo multi, umbellæ in modum dispositi, quorum apices insident *steri*, pediculis brevibus & tenellis nisi, vix plures conjunctim, sed separatim dispositi omnes, ultra articulum longi, minimum digitum crassi, in uno juxta pediculum viridi quadam concolora externè cincti, in supremo verò in sex foliola de'ill, quorum interiora tria lutea, exteriora è pallido lucefcunt, calnum lata, mucronata, digicum plus minus longæ, necnon radiantem flammam palchre efformant. **undi. circa {Ivlum II** bidium sex luteis flammulis, lapius exobscatis, interdum sese contorquentibus, bulque prominentibus apicibus onustis, emergentibus. Flores tempore progressu nullo succedunt forane in frigidioribus regionibus marcescunt. Semen Aphodelito simile. *Hernan.*

Hæc planta esse videtur quam describit Gomara, (referente Clasio) nonris *Alt: I, iv* inullis *Magnus* alin *Carden.* Cui ut eadem nomina ita eadem fere virtutes ascribit, quam *Hernandez;* cas autem superius posuimus sub *Aloe Americana Claf.*

8. *Alee ttrturda U-vu Muntim; Pati, seu Meli leoffman Heri :.injcf.*

Alant.

Radice nitide copiosa, stramenti *infir cni*lla, longa, externè fusca, internè candefcente, fibris tenuioribus hinc inde emergentibus prædita. *Folia* duo, tresve pedes pro ætate plantæ longæ aut etiam longiora, tres, quatuorve digitos lata, ad basin angustiora, in medio lævissima, indeque in angustiam ac modicè longum mucronem spinula quadam è sulco nigricante vel porporascante armatum firmiter, marginibus tenuibus, levibus ac planis, nullisque omnino spinis obtecta denata. *Yuccæ* in modum cinnamata, externè maxime ex parte è viridi purpurascens, aut purpureis quibusdam maculis hinc inde contaminata, internè verò ad albedinam quandam vergentis, foliola, rectè semper sursum tendentia, necnon pernullis fibris internè albicansibus, ceterisque *Aloæ* speciebus omnibus tenuioribus ac pretiosioribus repleta.

Caulis octo, decem, vel duodecim nonnunquam pedes alta, unicus, rarò plaris, foliis minoribus, carinatis, crebris ab utraque parte cum arcu amplexantibus septis supremo apice variis in ramulos umbellatim dispositis sparsis. *Flores* & *semina* non vidit *Autur.*

9. *Aloe Brasiliensis Caraguata dicta Marggr.*

Marggr.

Radice cum *Aloe Americana Dolonzi,* *folia* cum vulgari convenit: nimirum ex *radice* crassa, brevi affurgunt *folia* viginti aut plura, crassa, succulenta, acuminata, utroque latere dentata seu spinosa, unum vel etiam duos pedes longa, pallidè viridia, antea hinc inde griseo colore maculata. Inter *folia* prode *caulis,* tres aut quatuor pedes altus, in duos ramos divisus, quorum quilibet sustinet spicam *florum* flavorum: est autem quilibet *thos* cavius, digitum longus, ad terram striatim erectus, continens totidem *filamenta* flava apicibus flavis: insidet quilibet *thos* suo pediculo brevi, & apertus propendet doctum, adhuc autem clausus directe ad lævata: est inodorus.

Suscipiantur nonnulli (qui de rebus Indicis scripserunt) *Ambram-gryllam* Anglice *Ant'jr r jrtf re fecir.*, qui vi maris & piscibus abreptis huc & illuc agitur, coagulatur, & interdum in magnam molem conglomeratur variis partibus coalescentibus. *D. Tamaris Robinson;* qui ulterius addit *D. Tropham* observasse in hinc succolentis plantæ materiam quandam viscosam, crassam, & bituminosam <ju*folia* tiirgpu, Aiii'jr* gryllæ valde sunt: 1cm.

10. *Caraguata fttvU* Mirgr. itk *. udf. 16. no* in lya defoxya*

Marggr.

Ex *radice* filamentosa, super candide & ramis arborum scandata, proveniunt novem decem aut plura *folia,* ab uno ad quinque pedes longa, & crassa ut *folia Nese,* tres aut quatuor dig. lata, & cava instar canalis, antea in ambem dentata, aculeis brunnis, acuta, sursum erecta. In medio autem horum foliorum prode *caulis* albacans, teres, minimum digitum crassa, duos circiter pedes longus, lignosus & modulosus, ad quem bina & bina capitula portat, in summitate autem plerumque quinque, figuri ut *Cinaz;* magnitudine Nucis Juglandis, ex crassis atque aculeatis foliis constans, elegantia coloris incarnati.

M. *Cr*j>**ts &uu* Mai;* gra.

Alant.

Est major species, ex subulosa *radice,* que magnitudine, figura & colore plane cepam æmulat, atque inferius multa habet filamenta, primo affurgunt tria, quatuor, aut quinque *folia,* crassa succulenta, viridia, cava; dein proveniunt plura, figuram habentia trianguli acutissimi, flantque erecta, in orbem adnata, octo, decem, quindecim pedum longitudinem æquantia, pedem lato, in extremitate acuminata, & in lateribus variis inferiora acuta denticulis rufescentibus munita. Ex una radice 30. aut 40. *folia* produunt. In medio foliorum, quando planta bonam ætatem habet, affurgit *caulis* seu truncus, superius rube humanæ crassitie, rectus, spongiosus seu nullis, hinc inde triangulatis *foliis,* minoribus vestitus, altitudine circiter octodecim aut viginti pedum; in summitate autem explicat conerum & fastigium truncum instar arboris cum suis ramis; & ramis iterum ramulos habent, & multa canica corpuscula, pene digitum longa, que *folia* sperantia *florum* exhibent, quam petalis compositum, magnitudine *florum* *Boissier* ex viridi flavescentibus, ac aliquæ flammulis in medio; referit illa figuram stellæ. Brevi tempore in summam altitudinem accrescit.

Ex *foliis* hujus plantæ cœcibus panis confici potest, qui præstat bonitatem panis lioci. Ex substantia conerum corpuscularum, antequam in *florum* abeant, alia filamenta, Godyppu emula castrebi possunt. *Radix* aut etiam *folia* hujus plantæ recentia tota ac liqua injecta pisces et exanimant, ut *Ratum* deloger nantem & manu pchendi possunt. Lignum siccatum instar funiculi sulphuratum; ex eo lignis elici potest duriore ligno applicato.

12. Caragana aonga Margg.

Megg.

Folia est terra prostrata septem aut novem pedes longa, sesquialgitum lata, infra canalis cavo, late viridia, & prope exteriorem angulum habentia minutas, crassa, in extremitate acuminata, dorsum curvatur digitorum intervallo per ambicum aculeis munita. E medio foliorum prostrata ad terram multi flores parvi sic in orbem positi prostrantur, ex circumlo purpurei, & in medio alba stantia habentis: quilibet hinc digitorum longas consistat tribus foliis. Fructum fert odorem, quinque digitos longum.

Hec planta plurimum acciderit videtur ad Mexicani seu Magos peninorum Fr. Hernandez, ut eandem suspicaverit. Ad hoc genus minime pertinet: verum ob foliorum similitudinem locum quem occupant tenere permittimus, donec certius constiterit quo referenda sit.

13. Alis ferax Manning. An Mexicani? Hernandez?

Manning.

Hujus radice cinereo erant colore obscuro, tenera, modice longa, plane fibrosa, e basi crassa, rotunda, tenuis, nonnihil fibrata, atq; ex parte tuberculosa pullulantes. Folia max. 2! pedes longa erant, circa basin laeviora & crassiora, indeque Cupressi modo, in pyramidalem angustiam sensim tenuata, semipedita plus minus lata, ab utroq; gracili latere spinis digiti unius transversis longius denis aut circiter possidentibus, admodum crassis ac ferocissimis, colore e nigro purpurascensibus horridis conica, naturali omnino atro-virentia, long. mucronem longitudinali sua, laminae atq; crassitie terribilius ornamenta, ore constantia palato non ingratis, necnon his quibuscumque albet...

C ^ p. vm.

Alis Americana quaedam species e Fr. I utmtudt. listisid.

1. Meli Canis seu Meli luteum Fr. Hernandez.

Hernand.

* Meli seu Magna.

Folia est modicis si cum * precedentis foliis comparentur, ad margines luteis, spinis parvis: caule bicubitali, digitum lato & rubro, cum flore iteUICO pIDICTti cacumen ejus occupante, & radice furculata.

Loco.

Campestribus locis Mexici nascitur, quamvis sola aestate floreat. Scribitur ex germinibus ortis pITU parentem.

Vitis.

Jus •ntimquM-.ove foliorum, additis Salspatrii tenuis, frigentes ac crassi humoris per feculentam & urinas paulatim vacuat.

2. Mexicani meli seu Magna epi

Fr. Hernandez.

tttml

S^euci est fui va, valde t t u o i, Ac virore ulnnduiti eutunuo cmfi , cujus si U cJum ar affa, & 1 ut pr: ceteris gustu grata.

Loco.

Offenkur ea in mooutxa Tepoztlancnibus.

3. Mexicani meli seu Magna peninorum ft. I letromic/- An Caragana aonga Margg?

Hernand.

Planta est spinosa, fructu dulci, acido; Prunis simili, multiplici, & in orbem Indice Pinx quidamtenus parva compoito, odore loco pleno & gran sapore. Folia sunt Meli, aut illis potius Pinx Indice similia, spinosa, subrae veluti marida. Caule vero brevis, teris ac crassus: Radix fibrata crassiq;. Pruni sunt oblonga, glandibus tenuia, & ex candido pallecentia, obducta membrana, intra quam consistit callis candida, ac ut diximus dulcis & acida. Peninarum Indicarum i ore referunt; foetia praci in candido, ac postea nigro, obtusando & duriusculo.

Loco.

Nascitur in lacteis regionum calidarum Tepoztlancnibus. Ad Nartji ponui rdirtwl* nictur hat pbiw e¹ fructum.

* Hist. Amer. Lib. 17. c. 7.

Hernand.

Rara est formi, folia BHL <M|m OMUrno fa a proren, alpr itj Uta<, JC imperni sustineta circa calpalem: ovales brachi crassiores, sic data cacumen fructus occupat oblongis, Pyrocon parviorata formi, unia, septem caulem. Nascitur in calida. V. J. de Last Hist. Amer. lib. 17. c. 7.

Sunt & alie quamplurime species, quarum, quoniam facultate similes sint, & formi parum differunt, nomina ad monellarum partium differentias libysiam.

1. Mexicani meli seu Meli viride.

2. Mexicani meli seu Magna rubra dictum.

3. Mexicani meli seu Magna nigra dictum. tmmm lquanti color, fibrata radice, & longo crassiq;e infusa furculo.

- 4. Hmtxjnilm etl, aculeis lngb, purpurelij, 1 adicibus & spinis.
- 5. T¹apaxamtl seu Magus tapayaczin preo ^<nri limilt
- 6. Acantel seu Magus Arundinum, albidioibus pitta ndioein folis & rubofcentibus spinis atque raicibu
- 7. AjraM nieiiant obcoHwum wum, quanquam (pint radicle* nigrofulvelcint % Xtlcmittj Kii Ma} piloliiiiii, rub;is (pinis Be cadiabtu.

J. Tepcmexcalli /> Mjguci momnium jtlmJ, 11 mand

Forma Metl constat sed tenuibus spinulis.
 >4. mutis laxuolis, gaudet locis calidiorum regionum quilibet est 7i; . *calonica*. *L. m.*
 Contula atque devor. tca, illitdvc curat cos quonim arrus mocu prrfici (unt ob nen-orum corwul- :*ms*
 Gonettb

6. Tlacamed/"««Magud/<r«w. Hernaiwl.

Ead. ixn pine forma & viribus est quibus cetera, & easdem quoq; usibus, sed inter reliquos tigare at robur a.

7. Theoracl Tor Mjguci itvantm I{t>untL « j<f AmtK*n» miner > lanning.

Eadem pane cin reiiquis facilitate crt ik. forma, longi radice, fibratia, & exilibus spinis: duas spinas longa sunt tantum folia: succus vero epota aut illius fibris extinguit.
 Nascitur in frigidis & calidis locis sicut atque campesribus. Plenius & exactius describitur j MUH- *L. m.*
 ingioj iiii> titulo Ai- ti Ammsn* mm**.

8. Pajfot yicAiauJfiwmm Hemainl Al<* AmtTKmufalw angustioribus alij, *flina*.

FoL: el iui, ra'utorih(is&: tnuionbuSj mipiaque expancpiirpi rascantibus, & r*Auc Kbrai- cralliqoz. Parant' ex coili a tenuissima, 1 siugnolultj preo pantiqoz MM preclo fiscwadasptiffinia.

9. QucculjclitU *Um Ma) Pitx Herru!

All argit in arboream altitudinem; radice fundit crassam fibratam, & sensim gracilec. Jecfttem; folia vero sp

Xolometl /< MIRUCI feru. Heriund.

Sp: is est Metl tribus veluti orbiculis aggregatis; radice constat firmata & fibris autu rufocenti unde proferuntur folia coccinea horrida aculea, raris, & a medio usque ad mucronem procedentibus. Succus foliorum exsicca ac libino de sem unciarum pondere, unversi corporis do *Pres.*
 lores & prapioe articolorum tollit: verum q. 1 tribnur tempore corpus est magna cin OJd i- end..m.

NJLKUI- f^MVMci |utu taucis numnum. *L. m.*

CAF, IX.

De Tacca.

Tacca seu Tacca Peruviana Ger. 1'KCI »«M t *viridi elata & spinata* *ltms Lob.* Ad part. ak. *Tacca* *seu Tacca* Park, parad. r*t*[*lut AUti C B. Purta, s; Judian Sprad.

R adice nictur crassa, tuben*n*i, H'andi, succulsi temporis in multa capita protuberante, lona carulida, foris rufa. Rapi habitanti sed duresce, succi pleni, sapore subdulci, *falsa* emittente plurima, in orbem se minus amplexentis, castrum longa, dura, carinata, e circum vinda, in acutum de fuscum mucronem convolvato utrinq; cacumine deflexa, aeterno viore, Sacta consumacia: in quorum medio, postquam planta adoleverit, at ne tunc quidem singulis annis, exurge *caulis* tripedali, teres, firmus, superiore parte in ramos divisa, quibus innascuntur *ferri* plurimi, lora amplu, hexapocali, albi, deorsum dependentes, tribus *extremis* *ibiii* petalo veris multo dilute rubentibus aversi parte striata, e petalorum unguibus ad modum coram a extensis, non ad margines usq;. Flores in Septentrionalibus & triglorialis regionibus nullo fere loca *ferre* aut pericarpio increscant & decidunt: verum in locis natalibus, India sic. OccuileriliJb,' *viridis* plurima *tranguUiet* *capitula* *inrtiu* *locum* *diljx* *ritia* *producere* dicitur, *femina* *ronundis* *aut* *quodammodo* *angularibus* *repleta*.

AWuniwMuniuiR us in Herbario Belgico aliam depingit & describit Yucoc f^ am quam

Vocit Juoin Anioiuiuni & DnfUanam ftell-n i n elms, folio uuoioiMUi |c folio drcala.

Almsam

Alteram Yucca speciem exhibent Mustangus & Mortones qui donatur foliis filamentis, seu potius foliis filamentis albo interpersis.

Firm.

Nullus in exadibus nisi, imo venenatus esse dicitur sed perperam; cum non solum ad vitæ sustentationem conducatur, sed etiam ex radice in farinam coarctata panis edulcentis conficiatur. Radix insuper sine omni injuria, uno cum commodo comelinur absq. ulla eius preparatione. D. Pabes ex illis D. Hermant.

Non est autem hæc planta ex copâ radice panis in America vltimissima Cæsel datus sit, ut nonnulli per errorem crediderunt.

C A P. X.

De "M»J ft" Arundine Indica ferida,

1. *Canna fœc Arund. Indica, vulgarem Flor. Canna. J.B. Canna Indica flore rubro & flore lævi* possitate Park. *Ar. si. (brUi Ha. Arwm) Indica Indica C. B. Mart. Brasilia Margg.*

J. B.

Inquilina nobi nostro casu geniculato, cubitum & sesquicubitum alto surgit: Flos quam pro planta modo majoribus, cornicula chartacea convoluta primo pullulam arundinis, quæ ubi explicatur insigniter apparet ampla, duorum palmorum latitudine, trium quatuorve longitudine, tertia, medio antica, modice in acumen desinentia, à nervo medio secundum longitudinem decurrente exsertita in margines agmine prædente vincta obliqua. Caudem firmam ornant floris raris lateraliore tinctis, Glaboli hanc ita abfinitis, capsulo verrucoso infidertis, quod delapsio flori grandis, triangulato, sit & veluti spinosum (inquit Clusius) ut Ricini fructus, in quo continetur fovea per maturitatem fuscum, atrum & rotundum, Fabre Venerum dictæ maganone. Radix nodosa & crassioribus filis stipata, alia radice nodis adnatis habens, qui strobili etiam matris similes profertur.

Frigidioris cæli impatiens hyemes nostras non ferit, nisi in fictili deponatur & in hypocaustis recipiatur.

Marggravius plantam hanc in *Hesperia seu rerum naturalium Brasilia* plena describit. Caulis (inquit) in octo aut decem pedum altitudinem assurgit succulentus, viridis, digitum crassus, quem per intervalla ambiunt folia solitane *Kiïpt.* Flores tribus petalis linguiformibus constant, circiter duos digitos longis, erectis, que circumdantur ab alio folio acuminato & convulso, autem sunt duo angusta paululum connata, & in hanc modo adhuc unam, infra ligule, habent ad lamellam infusam in quadam parte *raima* Flo est inodora. Petalis dividitur in duas in tres cellulas, habent in quilibet ut plurimum duodecim grana levanum, densissima, que malleo rariore non densissimam substantiam albam, que cavitatem intra se habet instar viti rari, & in illa corpusculum instar vermiculi calis, ex quo progerminatio fit. Radix humanam crassitudinem acquirat, longa, splendide ex albo flavescens, instar Cæpe squamas habent rufas, ang. succulenta: per intervalla autem hinc inde habet tubera seu prominentias fastigiatas, unde novos profunde caulis. Observat Clusius è vetustis hujus stolonibus cum marcescentes in vaporario *prth* *Mi* *iam* foliis senescentes existerent quoddam excrementum, nisi sapore.

Marggravius eam que flore flavo est specie diversam facit, & sic describit.

Flos est angustioribus, magis acuminatis, ac ut plurimum circa unum caulis è vaginis erumpentibus: Flores paulo majoribus, quorum uniusquisque tribus petalis cochleariiformibus (pura Luteis) constat, tres digitos longis, incurvatis, in quantum modo adhuc angustum foliolum, sesquidigitum longum, instar calypse duritie extensum. In postica parte floris post tria illa majora folia idem talia foliola duo minorata existat, sed ut tota flos octo consistit foliis, & adhuc in medio, more Glaboli, ramulorum flavum extremam sua sulcum obinet. Cætera cum præcedenti convenit.

2. *Canna Brasiliensis rosea* Pæco Castings *dilla* Margg.

XJ

Caulis habet arundinaceam digitalis crassitudinis, rotundam, & intra continentem succulentam mollem sublimi sapore, consistentie sive ut Canna Saccharifera. Hinc porro ambiunt sine pediculis hinc inde flos solida, septem, octo, vel novem dig. longa, circiter tres lata ubi lævissima, medio & majora, figura linguæ, nervo in medio secundum longitudinem donata, nullis secundum latitudinem venis, sed subulatis lincis obliquis decurrentibus ut in foliis *Mans* sunt: superius glabra & dilute viridis, inferiori molli hirsute pedata, & subulcanta. In summitate caulis provenit eorum (ut in Peru) octo aut novem dig. longus, in fastigio paulo acutus, squamis præditus ut circa Peru, que in prominentibus extremitatibus atra sunt coloris, in partibus ubi hæc hirsutis ambiunt minari. Succellis autem temporis spatia illa à se invicem dilatantur, & sub quæ apparet *seculo* cæcis, instar alveolæ apertæ dilate purpurascens coloris; sed floribus vero candida est albedinem, rotundam succulentam præbens, & quilibet coarctatus 14 aut plura grana firmis magis splendens, hinc seminibus copiosum, triangulatis, flos, parva alba filamentis, quasi lino involuta & ita adhaerent.

*Canna Indica ferida

^Hh*1

Caulis hujus plantae masticatus detrahit humorem e capite, cetera sic ut super & frange calca-
los uteretur, esse, insignis remedium contra Gonorream, quam frequenter de die masticata,
neglectis. Succo intra oculos facti curat nullo alio medicamento adhibito. Acce hoc ventri-
culo utilis est, adeoque frequenter ejus usus vitetur.

Reperitur & alia hujus speciei, folis inferis levibus, Roscallis rubris.

Item tertia, floribus coruleis tetrapetalis.

Pilo radicem hanc Arundinis bulbosam attribuit, eamq, semper vitore scribit.

. F. <<- Serci* BTA, Margg. Pilo. Carna In.* aJ imm aultm r

Margg.

In sex, septemve pedum altitudinem assurgit, caule recto, spongioso & viridi instar * Mura; * Carna In-
habem, folia eodem modo alternatim disposita, & ejusdem magnitudinis, figuræ, coloris, ac simi-
libus lines striata, sed in summitate folium convolutum ut in Pass. Ad exortam autem caulis
propè folium provenit pediculus crassus, venis brevis, in aliquot ramos superius divisa, qui mul-
tos habent flores, sesquidigitum aut circiter longos, cætos floribus Pass quidem similes, sed incar-
nate rubentes. Flores hujus seorsum fructus in utram congestus, Pruti magnitudine & figurâ, ha-
bens prominentem umbilicum, estque adhuc immaturus saturatè viridis, maturus verò lubrificus,
triangularis figuræ, & cortice Auranti mali cortici parè equali cinctus, qui sponte finditur in
tres partes, atque facillè separatur, intus verò habet paucam pulsam, filamentosam, magni-
tudo nucis Avellanæ, in tres idem partes dividendam per conculam flavam. Pulpa autem hæc
Cinnabari est coloris, odors viscosi fere ut nostras cydonium, in qua continentur supra 70. grana
seminis triangularia, fusca, cum macula cinnabari in superiore parte, magnitudine seminis Cin-
nabari, & albidissimum nucleum habentia: Cortex exterior succulentus, qui cutem tingit co-
lore brunno, ut Cerasia nostrata nigra vel Viola Martiz, atque ideo usurpatur loco tra-

mcsiri at 8c e**/* fit du fo. in tutu* '1 I centur o; or<m de (o fumi. ut Zinziberi
& suavem addo uni ac prande detcttum aromatum supplent. Balni.) quoque calida ex in con-
fiantur.

4. Radem Indici squamoso fere. Tammarana Brasiliensium Margg.

Margg.

Ex bulbo albo, splendente, triangulatis tunicis consistente, figuræ & constitutione ut Tulipa,
ovali vel etiam rotunda, magnitudine ovi Anseris vel etiam minore, producit caulem duos aut
tres pedes altum, inferius in longis pediculis duo vel tria folia habentem, ut & in summitate unum
aut alterum, foliis Cui trepida figuræ & aspectu similia, sed paulò minorâ. Sub folia autem quod
in summo caulis est pediculi duo, tres, quatuorve proveniant, duos circiter digiti longi, qui qua-
tuor ferunt flores splendè albos, sesquidigitum longos, ex triangulatis obtusis squamis more
piu e Illicipantos, taoaom. DUUXB w<j utur, & more Battate comedunt, boni saporis.

C A P. XI.

Agavepsis Brasiliensium Margg.

Margg.

EX radice superioris rotunda, submissa & esculenta, que inferius sex, septem, octo dig. in
terra oblique distenditur, & multa cralla habet filamenta; provenit caule, tres, quatuor,
quinque pedes longus, arundinaceus, rectus, digitum crassus, hunc inde habens in pedicu-
lis duo, tres, vel etiam quinque aut sex dig. longis, folia unum aut sesqui aut etiam duos pedes
longa, quatuor dig. lata, acuminata, eleganter viridia, splendens, ad tactum instar membræ-
naceæ chartæ, aut foliorum Pass-cra, nervo secundum longitudinem, & subtilissima lines obli-
quis decorata, & in ambitu lineâ rubelâ fimbriata. In summitate caulis provenit flor instar Lili,
eque incarnati & ignei coloris, tribus vel quatuor petalis consistens: apud quodlibet folium tria,
quatuor, aut quinque flamma existant eisdem coloris, figurâ ut dens Apri.

Radix comula ulceribus modetur, mundat ea & implet carne: stillic autem & coctæ como-
duntur tempore sanis.

C*r. XII.

De Cardo.

Citius Indici, Arabibus Carcum, Officinis Carcumina Boreis, Crocus Indicus Garcia C. B. Carcumina Park. Cyprus Indicus seu Carcumina Ger. Curmereth.

Rost.

Flos laevis habet haec planta, non absimilis foliis Hellebori albi, nisi quod non tam striata, sed leviter laevi. Radicem habet oqualem formae Germanicae. Flos est pulcherrime purpureus. Radix porro colore flavo tingit non locus ac Crocum, unde Garcia ei nomen indidit Crocus Indicus. Fructus huius Carcuminae qui hodie succolunt ochinati sunt instar Cassiacarum in Europa: aperti flosam suam ostendunt, Pilocum formam rotundam; quod etiam coctum in pulcilo gallinarum vel carnium hordiliarum alimenti simul & medicamenti praestantissimi vicem obtinet.

Flos
Cra.

Malum radicem cum pilocibus & carnibus coquant condimenti & sanitatis gratia; quod & Batarum (ab his ut credibile est edoctus) etiam factitare observavit D. Temerius Robosius cum in Belgio peregrinaretur: pisces persarum et mirum modo coctis condere, siquidem & laporem gratum odoris communicare & colorem flavum asserunt. Ceterum excellentissimum est remedium in obstructionibus viscerum, Pulmonum tumorem, pectoris & henis, tum in opulatione venarum melancolicarum, tum Nephriticis doloribus. Calculo renum & vesicae efficaciter operatur, tum feminis menstrua promovet, difficultatem pariendi auferit: & quod in ea caput rei est peculiare & specificum remedium est in scimo, quod maluit felicitur experta sum. Chineses quoque hanc usum praecipue Saccharo coniungunt.

profx

Hanc cum pulvere Santali & alii floribus odorata in marmore subigant in unguenti curantiam; quo universum corpus tum Vici quatuor Firmine inungunt. Quod quantum inoleis alpechi secundum ob flavum coloratum sit, tamam adversus calorem febiles & Sola ardore, tum molestissimos quoque calicem morbos sumitur est peccatum. Summa haec radix ntr tteou

Nepertum observari Chincisliis etiam in sterutatorum hac radice in instar radice Hellebori albi. Boreis.

CAF. XJU.

De Cardo.

1. Cardamomum minus Boreis, Cardamomum simpliciter in Officinis Indicum C. B. Card. cum flori seu thum longi & brevis J. B. minus vulg. Ger. Park.

Rost.

Cardamomum habet Arundinis modo internodiis distinctum & certis foliis non dissimilia Arundinis foliis; & caulis quoque modo crevatum cretice; primumque insuente vix dissimilia inter duas has stirpes videbitur, nisi quod Cardamomum vix ultra duos, aut ad summum tres pedes in altitudinem assurgit; folia quoque contra furvillimum odorem a se reddunt. Dum florentem eam primum conspici Gargaris errorem animadvertit, &c. Nam circa radices primum emittit spissum, quale in Spica Nardi conspiciatur, verum longi crassiores, cujus calycibus superne locantur flos pallidi porro in peripheria quam albi, in calyce vero flavum coloratum ostendunt, huiusmodi similes fructus Mali auri. Foliis huius decedentibus flosse eorum loco succolunt, semina fragrant Cardamomum comminuta, quae in Officinis nostris conspiciunt: sed colore sunt flavo laevissimis concalida, quae ariditate & tractu temporis in purpureo strum, quam in exiccato Cardamomo colorem videmus, contrahunt.

Flos
Cra.

Gloratur autem Boreis se primum esse qui Cardamomum exacte descripsit, & ad vivam debentiam exhibuit.

Calorem habet blandum, natura nostra in...rttm«Mi.»u tum temperata in visceribus relinquens, adeoque etiam solum alio cibo multari & comedi posse licet ac Pipet, Zingiber & rosacea aromata. Urinas porro commode coe, menstrua femininum blandie movet, anichnum commendat, tum obstructionibus Hepatis, Lienis & vesiculae Melancholicae ad miraculum usque conducit, tum in pulcilo gallinarum, carno haurit & vinorum.

In cibo porro condenda, perforant carnes & pilocibus elicit, apud Malicos in summo usum est. Et certis fragrantis gustum in addit, coctis quoque adjuvante lincini conducit.

2. Cardamomum majus Boreis, majus vulg. Ger. Park. majus Officinarum C. B.

Rost.

Capsula creta in foliis Jacaris flore Hyacinthi modo fasciculata. Differt a minori specie Primo, quod ultra hauriam altitudinem assurgit; quod folia quoque longe ampliora habeat, quod caulis non sit generalis ut Arundinis instar nodoso, sed qui Ceporum more solutus a se lincicem separatur: praeterea flores non in spica & radicalibus, sed Hyacinthi modo in fastigio gerit. Semina demum quoque vel usque oblongata sunt, digitali aliquando longiora. Folia tamen colore conveniant, ut & flores; nisi quod folia majus Cardamomi, praesertim quod sunt majus circa comparamentum

paranonen, etiam acria parte, instar Verbata sunt mollia. Tota planta pulcherrimo est aspectu, exato virore floridifque albis cum purpureo habeo nitet.

Vires cum minor specie plantae convenit.

< ii > in Pinace Cardamomu prater Meleguetam seu Grana paradisi quatuor species nimirum predictas duas & tres. Cardamomum medium, Condo in hist. mediocre dictum, figura oblongam, triquetram, utriusque acuminatum, colore in candido fuscum, quantitate grandi Avellanae nucis aequale, majore Cardamomo minus, minore vero majus, ideoque mediocre nominatum, lutea densè in se latitis majorique Cardamomo similibus granis repletum, cortice constans venoso, sed multo tenuiore quam majoris, in tribus suis angulis quibus maturum dehiscit, singulas commissuras habens. Gullu Cardamomo majori grana ipsa respondent.

4. Cardamomum minimum; de quo J. Bauhinus, Aliud assignat, quoJ fola magnitudin' videtur à minore differre, est enim filiqua omnium minimi, iu, crWrum quid djferit pixterca non video.

Cardamomum Officinatum an idem sit Cardamomo Veterum < Ciim xni ^mliigirur, .liiii i J jffii> manibus, alii negantibus; nobis verisimilius videtur idem esse.

Meleguetam Grana Paradisi Officina dictam non esse Cardamomi speciem, sed fructum plantae generis diversae affirmat Goussier. Cordus quoque errare eos aut qui dicunt Meleguetam manū Car- (umotnum esse Cardamomo enim tenuis innumisque terrens, led grattu JC (uaitulus est fapor, Melegete vero Piperis instar acerimus.

Abrahamus Muutingius in Historia plantarum Belgica duas dicit -ilnt-i: & Jcjuigir Ordunori arboreas species, primam vocat

Cardamomum arborescens majus Africanum.

Secundam Cardamomum arborescens minus Africanum.

CAP. XIV.

Dt Cyhmiac ft* Cythmin.

Cyclamen dicitur *kiri fl mta*, ab orbe seu circulo, tum ob folii circinatum ambitum **turn nli** orbiculatum radice bulbum. Vulga panem porcinum vocat à forma radicum compe panibus simili, quòdque gratam sibus pabulum sunt.

Cyclamini note sunt, radix orbiculata, caulis prater floris pelliculam nulli, flos pentap **dli** talis reflexis & ad ungues junctis, ut revera monopetalos sit. **:uku, pe-**

1. *Cyclamen Orientale, Karmet Bochoor Tartarus Cornut.*

Cov.

Pro radice cortice nigro obductum tuber amplissimum, quod infra superque mediocre sub- fidit, ut Rapum. Hujus media fere parte vulgari similes sed longiores extant pediculi, teretes, car- nei colores, quorum alii foliis, floribus ornantur alii; eodem enim momento ambo pullulant. *Folium* ederaeum est, nec angulosum, in ambitu tenuissimè serratum; illud atropurpureis à terra, superne pinguis diversis viriditate, in qua etiam albicans macula. *Flor* è calyce quinque foliolis composito est. Virens in eo multiplex est; fere quadruplex apud nos observatur; nunc quippe foliis quinta, tantum consistit flor, (alias pure candidus, alias colossus & una parte elegantissimi purpureo) nunc foliorum numerus duplicatur, (quorum duplex quinque est differentia, aut enim flos iste cocus sibus est, aut hujus pars robusta purpureo colore limbitur.) Folia haec longiora sunt multò & angu- stiora nostrorum; minus quidem diam è calyce erumpunt simul innocta deorsum natant, nec multò post laeva deserta sursum reflectuntur, ac veluti corollam formant cui cavum odoratissimum subest, a quo singula folia prostrant; nec enim unum locum decidere potest, quum & universa concidant. In eodem cavo quinque apice sibus aequali intervallo disjuncti apparent; eodem cavo ita agglun- tantur, vix ut ab eo divelli queant. Scitum atque flos decidit, pediculi in speram serpentigni more convolvuntur, & *semen* progignunt rotunda capsula inclusum.

Floret April. Semina Julo maturescunt, & fere quod anni reliquum est foliis destituta.

Temp.

2. *Cyclamen sibus vitreolite vulgare*; B. *Cyclamen orbiculato sibus, inferni purpureo*; C. B. *orbiculato sibus* Gec. *Ascumale vulgare sibus ruando* Park. **Round leaved Au- tunna i ^oULi:rad.**

Et globulari radice, tenuibus nigricantibusque fibris praedita multa circinate propemodum rotun- ditate profert *folia*, palmatis plus minus pediculis herens, Alia foliis fere respondentia, non alto tamen crassa, ligent atrogreena, alperis subinde maculis lactis, inferne purpureoconea, nonnihil per margines serrata. *Flores* in longis pediculis natantes, unico folio, sed in quinque pro- fundis lacinis diviso, sic in plura videantur consistentes, quae sese explicare incipientes sursum re- flectuntur, colorem vel dilutum, vel saturatissimum purpureoconea, odore suavissimi: si marcescentes in- tegri decidunt, capitulumque subdignum cum pelliculo cui insidet in multas spiras se convolvunt, ducunt terram atrogeli, cui incumbens paulatim augetur, donec Viola Martie feminariam valcu- lam nigrosissime equat, quod maturitate ab extremo mucrone aperitur, *sempit* ostendit inaequale, ex sulco subscissum, quod terra committitur in germen non abo, sed in tuberculum aut radiculam **-JO-** varitur, prater respectum feminam naturam, unde postea foliola promit.

Tempus. Sub æstatis finem aut Autumni initium flores prodeunt, deinde folia, quæ postquam tota hyeme perfluerunt, sub Apelis finem aut Maio auferunt.
Locus. Nulli sunt Pannoniæ & Austræ spicidii montes, nulli saltus, aut interdum in montium acclivitatibus idæ præta quæ in non abundent.
 Nos in montibus Scythiacis, inque Allobrogicis propè Genevam observavimus, ubi Junio & Julio florat.

Cyclaminus hecæ caput interdum in longissimam extendit, & in duo valet cornua dividitur, ut nos cum J. Bauhino observavimus. cum in Alpibus Scythicis eas radices aliquoties invenimus, hincque C. Bauhinus frustra multiplicat species, cum Cyclaminum longioris radicem & radice in hac capite ætatis Gæa. speciem ab hac distinctam facit. Consule, si tibi latuisse non sit, J. Bauhinii hibernam.

Variat interdum hæc species flore colore albo.

Cyclaminus orbicularis folio inferni ex variis pallente C. B. Cyclaminus alvatus flore r. Chaf.

Chaf.

Præter planè fœmâ est, pauciora tantum tempore folia proferte conspicitur, cæque non purpurascens sed albicans quodammodo aut pallidioris cui vixit mæstris, ut in Alari aversis folia.

Nos hanc à præcedente non kyavimus.

1. *Cyclaminus Hiberna folio C. B. Led. Ger. folio anguloso J. B. Autumnale folio Hiberna Park.*

Dod.

Folia, describentes Dodonæo, vixit lævis, angulosis, ac hederæ similibus, ambicu lœviter serrata, superius parte in vixit rugosissima, albicansibus tamen maculis variegata, & umbilico sine medio tota lœvillimo, inferius vero ac præter parte purpureis, & hederæ colore tincto, alia delatæ. Fœmâ est stellata pendente pediculis, ætatis in rotundis, foliis ætatis factum reflexis, & purpureo violæ nig. & culper, non tamen lævis lœvillimo; odoris ætatis; lœvillimo ætatis lœvillimo, in lœvillimo pediculis contrariis. Radix hederæ aut Rapæ modo in orbem circumacta, & aliquantulum in lœvillimo duntaxat præta, fœmâ nigricat, ætatis cordata, rugis mæstricis contrariis.

Locus. In collibus hibernis non longe à Roma auferunt, Septembri mæstris florant. Nascitur & in Venediciæ, Verocæssum ac Atrægentium finibus ætatis Dodonæo.

Hæc est illa species, quæ pulchre in locis nostris in Anglia colitur, flore purpureo & albo, Autumnis florant, cum semper ante ætatis cmlævillimo ad maturitatem pervenit.

J. Bauhinus, quæ non sit in lœvillimo, hæc referit

Cyclaminus alvatus varietatem hederæ Chaf. Cyclaminus alvatus, ætatis lœvillimo lœvillimo, folio mæstris C. B.

Quædam præta folia albo macula obliquis notata, ætatis parte ruberrima, albidissimum angulosa, fœmâ lœvillimo purpurascens.

Aliæ folia ætatis parte vixit, ætatis macula albo, vixit valde conspicuus ætatis, notandæ lœvillimo; fœmâ lœvillimo; vixit ætatis lœvillimo lœvillimo, ætatis ætatis lœvillimo lœvillimo.

Item, *Cyclaminus folio hederæ A. L. ætatis C. B. Hederæ præta Chaf.*

Magnæ & palmari lœvillimo tubera, quod fœmâ tulit 20, 40, 100, singulis ætatis.

Non aliter quæ magnitudine omnium partium, & fœmâ ab eadem radice mæstricis, ab Hederæ Cyclaminis vulgari distincte valetur, à quo nec præcedens aliter differit quæ tempore florant, & odore fœmâ. Nos in Italia ætatis ætatis ætatis Cyclaminis observavimus, quos tunc non aliter à vulgari folio hederæ quæ fœmâ tempore differit ætatis ætatis. Ino nos, quæ vixit tempore, ino lœvillimo. Apellis, fœmâ ætatis observavimus in mæstris, ætatis à Mæstris ad Lucam, vel floræ, vel folio ab Autumnale vulgari folio hederæ differit vixit lœvillimo, sed fœmâ tempore tunc. Verum quæ præta ætatis ino lœvillimo ætatis, nihil ætatis ætatis ætatis. Ebo ergo (si ætatis vixit) Cyclaminis radice Callagæ magnificæ C. B. lœvillimo. Cyclaminis Hederæ Chaf. & Cyclaminis Autumnale hederæ folio fœmâ ætatis. Ebo ætatis radice (describente Chaf) valde mæstris ætatis ætatis ætatis, quæ fœmâ ante hederæ folia producantur, Cyclaminis vixit folio lœvillimo lœvillimo, præta parte lœvillimo purpurascens, & lœvillimo lœvillimo mæstris insignita, præta lœvillimo angulosa præta: Martio lœvillimo fœmâ lœvillimo: Verum quæ lœvillimo ætatis non tunc lœvillimo, sed ætatis ætatis ætatis, ætatis ætatis ætatis, præta, præta lœvillimo Chaf, & in Autumnale Cyclaminis an Vernali ætatis ætatis, lœvillimo.

Cyclaminus Hederæ Chaf.

Locus.

Præta in locis ætatis *Cephalodæ* sub hæræ inter rupes ætatis hæc ait D. Mæstris, præta à lœvillimo ætatis ætatis & à lœvillimo Martio ætatis cum fœmâ purpurascens & albo. Vixit Chaf (æ tunc) ætatis hæc, an Vernali ætatis in Autumnale, quæ Hederæ vocat, Cyclaminis.

Cyclaminis præta radice C. B. J. B. & ætatis quæ præta sit nos lœvillimo, & an à præcedens species distincta. De æ tunc lœvillimo & ætatis lœvillimo - k'A in*.

4. *Cyclamen rotundum* Lob. Ger. *folia angulosa* CB. *Cyclamini flore rubro graciliore rotundi*
J. B.

Clas.

Flores profert odoratissimos & vulgari saturatiore, paulloque graciliores: *folia* alia minor, in ambitu ferè crispà, & foliorum Hederæ formam imitantia, teneriora tamen, lupini parvo candidioribus maculis aspersa, angulorum etiam mucronibus albicantibus, prout omnino purpurascèntia.

Variar flores colore albo; cui Clusius folia attribuit circinate ferè rotunditati.
Lobelius commuliones suos flores luteos ad se attulisse meminit in Adv. p. 264.

5. *Cyclamen A'ntiochianum Autumnale flore purpureo duplci* Park.

Folia huic subrotunda Cyclamini æstivi, minus angulosa, maculis albis plena. *Flores* peramplic, decapetali interdum aut dodecapetali, colore florum Persicæ aut Cyclamini verni purpureo, ad unguem saturatiore.

Quòd flores tot petalis luxurient accidenturiam est; nam inveniuntur hujus generis usitato petalorum numero.

C A P. XV.

Orrithogala æstiva radice tuberosa, Cyclamini folio C. lene spui Breyer.

Breyer.

R Adicis minus tuberosa, crassa, pugnata parè æquante, coloris purpurei obsoleti, infra in tubera alia, ut futuros heredes divisa. Ex qua *folia* inter Cyclamini & Dracunculæ palustris modicam faciem obtinentia, penolis longis sustulsa prodeunt, atro viridis: inter que *caulis* tetrapetalis, rotundus, viridis, *præ* & perennis nodus exurgit: quem à medio usque ad extremam apicem confuso ordine amovunt longi pedicelli, *folioli* parvos, ad Orrithogali Hissa minoris Cl. huic multò diversos, sustinentes, lenis è candido cœnula & subviridibus foliola obsoletis constant. Fractis non vidit Autor.

C A P. XVI.

Ficus Isidori è vulgari fusca radice tuberosa Ferrac.

Ferrac.

R Adicis tuber effigie rapula, colore est intus albo, extra fibrato, corpore limbo torpido digesto lato, superno internodius umbilico angusto, & nonnihil intro sum actis.

Septembri mense in fictili primam depositum, germinare Octobri, tum verno tempore surgere cepit in florum. *Folia* exeunt è tubere longa & serpe cubitalia, lata, nervosa, striata, gladii modo in mucronem exacuta, dilato virore albicantia, propter humorem candida, rubilique gutta interstincta. Modus deinde scapæ exist, dense ramulosis, & bulbosè iris mose articulatis, at brevioribus mucronatis foliis articulatis armatis: ut licet Isidem non nemo vociter, Gladiolo tamen propter hæc plama videatur. *Flores* simplici Narcisso grandisculo profert albo sappere, in sex folia decussantur, subter viridèntia, supra è violaceo fusca, nativo tanquam helioserico villata, turva & velut fuliginis obfusa, per ambicum circi seu fimbriis crispata & corrugata, striis albidisque unguibus maculosa, prominenti linea intermeante distincta. Medium præterea *stylus* ferrugineus lentissimus atque albicantibus maculis notantur, *strobilus* tenuissimus in uno violaceo in summo luteolis capitulo, quaternis quoque masculis bifidis crocis exteriorum in decussim demissis digestis communitum. A medio caule ad cacumen usque summis è ramulis atque ex ipso foliorum complexu mense Martio atque Aprilis particulatim exsurgunt: Medicamenti cupuldam aut mellis excocti inellegantem odorem spirant. Diem aut paulo longius vivunt, deinde contrahuntur & decidunt.

Mira est hujus tuberi figura; ex imo enim umbilico fibra prodit, modo longior, modo brevior, narcissine instar candida & modice crassa, cujus summa pars è tuberculum paullatim loboliferum. Quare factum est non semel, ut quæ fibra jam corruptæ solito nexu procul à matre præter moram natus fixus in obscurato adhuc miraculo inveniretur: interdum quoque brevioris fibre ligamine adhuc nigro foliola matris coherens & contigua, vel etiam de more adnata deprehenditur.

diffimè crassas lentisque excretaiones, adeoque asthmaicos maxime juvat: harnias curat, & tei-
na ciet.

Eadem succata insignè medicamentum est in Scorbuto; nec minus efficac in afflœtibus hœnis &
uteri, frigidi; præsertim in flatibus. D. Neesbœm.

Ad Arthritidem, & fol. Ari, contundantur & cum (tereoare v succino applicentur calidè. Valde
proliant, inquit Martioles.

Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillaticias aquas ad faciem pa s ad faciem erugandum
illustrandamque magnis laudibus esseunt.

Id quod etiam efficacius præstat insolata radicum succus, corulle speciem referens, quem Gesa
coeruptus ut videtur à Cerasia nomine vulgò vocant: is lapideum murum in modum cuti splendorum
& nitorem conciliat. Masch.

Hujus herba & radices circa Maschen Cantuarii agri non ignobile oppidum ad linteamina mun-
danda saponis loco, aut certe eodem admixta utuntur. D. Phil. Skipp.

Radices Ari cum floribus Sulphuris commixtas B. Beynon, miseræque illo Samaritanis tanquam
simum remedium, dum adhuc viveat nobis in Philisti revelavit. Dolens L. i. C. 4. S. i6<
D. Same.

1. Arum vena albu C. B. WMX¹¹¹¹ w. videtur folia Park. major Veronesi Lob.

Folio est vidibus, vena albis distinctis, quam Ari vulgarem duplo majorem, & in hyemem illa,
durantia, aliis Aro vulgari simillimus. Acini, (observant Dodonæo) minus saturato, sed ad cœci
inclinante colore rubent. Cetera Aro vulgari respondent.

Primo in insulis circa Venetias se nobis in conspectum dedit, etiam Novembri mense vincta: Urn.
postea in Lombardia peregrinantibus occurrit.

2. Arum Byzantinum Clus. J. B. C. B. Park. Dracontium minus Ger. quoad icon.

Clus.

Hujus folia, referente Clusio, primis duobus annis postquam tuber Constantinopoli acceperat, ad
Ariani latifolia folia fieri accedebant, nec valde macronata erant, sed potius orbicularem figuram
referbant, nec radix valde dissimilis. Verum postquam ea augeri coepit, digitalem longitudinem
adquisit, multis tuberculis inæqualem, & uncialem aut amphocem crassitudinem, multisque pro-
les adnatis habuit: folia nem potule longi majora, ad Ari foliorum formam plurimum accrescen-
tia, nisi illa turris splendensia superat & inferat. Interdum ante beatam folia emittit. It
verna folia quandam differentiam observavit Clusius, quod ad formam & figuram attinet, sunt
enim illa proflis simili forma, sed inæquale magnitudinis: & in quibusdam plantis licet ex eadem
matre abseptis folia erant nigra aliquot exilibus maculis distincta, alia minime: tum etiam flos co-
lore variat, nam plantæ maculis nigra notata folia habentes pericillum purpureum folliculo inclu-
sion habuerunt, alie vero candidantem, atq, postrema folia ante hyemem plerumq, germinare sole-
bant, altera vero vero duntaxat.

4. -KM Mh'ffisit Alpin. exot.

Alpin.

Radix majores quam in hætema descripto Ari specibus, radice fibris alisque proflis par-
vis Colocalis strongylochijs perimilo, sex septemve ad plus singula folia producant angula, longis
pediculis prædita, ad Personariz quam Ari vulgari magis accedunt, elegantioribus variatibus:
inter que caulis caricæta, dorsalis, crassius terè digni minoris, cum involucri Ari vaginæ
simili, sed longiore & latiore cum flore Ari & fructibus, sed longi minoribus. Radix rotunda, &
in germine ad acutum declinat, exteriori tenui cute tegitur ad orbicularem fissuram, intra canalicu-
laturæ scissuræ: exteriori etiam ipsam globulos parvis per totam superficiem sparsis habet,
qui suo tempore germinant, non locis quam in Colocalis.

5. Arum maximum Aegyptium, quod vulgi Calocasta C. B. Ar. Agypt. rotunda & longa re-
s, vulgi Calocasta dicit Park. Calocasta Clus. J. B. Agypt. »fix« Ger.

Radix tuberosa, crassa, magna, Clusio & J. Bushino duplex, altera alteri supposita, intercedente
cervice ut ligamentum mutari videatur. [P. Alpinus radice duplex figuræ observavit quendam longi-
gæ, quosdam rotundas, magnitudine mali Coroni; hæc exteri rubescant, immo candescant, & gustu
acris cum abstractione observantur.] Velia, immo alba, fibres adnatis se peragunt. Folia tenax aut
quærens Nymphaeæ foliorum figura, & magnitudine, longis, utriusque tuberosa alia similitudine
notata, crassa, levia, sed avera parte nervi obliqui in margine excurrunt crassiuscula, a nervo per
longam distansimè producti, quos venule intercedunt undatim: pediculis autem crassis non ex-
tremo folio, sed aliquot digitos integro folio insunt.

Hæc in locis natalibus Aegypto, Creta & Cypro insulis, ubi sponte & copiosissime præterit nun-
quam florere dicitur. Alpino, Bolonio aliisque antestaminis se nunquam, licet solo perquisiver-
unt in Aegypto florentem vidisse, nec ab aliis observatam acdivisse, Aegypti eos desiderantes qui
rogant ut flores fructusque Colocaliarum ipsis ostenderent, quod videret eas florere omni &
fructu destitutam esse se comperim habere crederent. Verum quod in Italia in modum florere, cum
verdostissimi Fer. Imperato & Fab. Columna Alpinam monstrant, tum experientia propria olim
contra sententiam convicit.

Hæc planta in sacretiori Alpini horto peliviam castelior exit rotunda, Alparag ex fimo,
cum folijs ejusdem cancolor, in cuius apice vagina seu involucrium longum Ari involucris 4 mli-

causa circubatur, minus quam in Aro, in fibula admodum distincta, undique clausa, coloris auri cui visio se permittitur. Quod si hinc sibi per longum explicat, floribus, excutit digni merito longioribus, macroscopis crassiss, colore candido, ac valis terpenis candidis, quasi serpenti longam foris ex ore euntan simulantem. Quae Columna habet de huiusce plantae floribus a se observato cum Alpina ratione non bene convenire, ut ergo in modum praetermissa: Propriam (magis) habet haec planta quod non pariter caudex, sed quo vice omnia primo folium, quodam folliculi modo, quod a stipulosis distinguit periculos in uno ab alio, nam qui flores odoris est una parte folliculosa est: Propriam etiam habet quod non unicum florem, sed plures emittit, illa tertia ex singulis lobis quae unum folliculosum perhibet, efficit vulgarem An nostratis, cucullata, non ad cavea, angustibus Aridus proxima, medium habentes aliam crassum, in tenuitatem aboutrata, semipalmata, et diuida in horum aculeam ut in Aro, sed omnia oblongiora & angustiora, & leviora, coloris calam diuidens, ac odorata, gratia odore inter Lallum & Narcissum, triduoque macerantur, incipientes ab uno flore, paulatimque emergentes una post alium. Fructum aculeum pallentem in Italia nunquam ad perfectam maturitatem perducitur auctor P. Alpina.

Radicem Columna describit bulbosam, magnam, Scilla emulam in venasore, foris rufescentem, intus candidantem, bulbulis se oblique propagantem, non Arumlinaceam, gemacula aspersa, sed levem & orbiculatam.

Alpina radices forma differre observavit: ac alteram quidem *parvissimam*, alteram *oblongam*, i. e. longi & rotundi radice praeditam. Macroscopice folia longe minoria censuntur, tenuiora & magis in acutum desinentia, coloris, venis dilatoris; pediculi radem sunt longi subulocem, gustus raldio acris acuminilqoc. Radix vero longi gracilior, extremitate obliqua intus non ita alba et alutris; laperis idem acris: quam de terra in terram descendere videtur, veluti Beta radix. Hanc speciem non admodum frequentem esse tradit, nec unquam, quod auctorit, in Italia florem profuisse.

Rotunda a prioribus differre visis fuit, quod ut longi majores in latitudine quadrantes fuerint, & veluti compressa & lata, quae id propinquum habent, ut non omnes in apice radice medio germinant, ac circumscissa, nihil germinis in apice radice medio producentes: (pena dicitur quod germinant horum nonnulla in apice radice medio, ut omnia alie bulbote faciant: Columna quod, radix huius plantae bulbosa est.)

Huius radix & tota planta acris est, non alio quam Aro modo, quamvis minor, & alio in cibo & alio uso ideo est. Differit ab Aro vulgari, quod Julius melius est stercula ornato dimidia sua parte, & reliqua in tenuitatem ab, in vulgari vero Julius in imo tenuis & in summo crassior, pistilli figuris, oblique fibulosa, sed levior. Hanc ergo plantam non esse Colocasiam longifoliam Aegyptiam Anagyriacum manifestum est, quam ut contraria opinioni resistende tempus insinere oportet periculum sit. Vile si placet F. Columnam de hac re. Notum Aegyptiacum Coloe Roccierens ut ita sentirent indubitabile videtur.

Lucia

Planta haec in rivulis & aquosis apud Aegyptios sponsum oritur, qui magis curi & diligentia eam colunt. At non in Aegypto duntaxat spontanea est, sed & in Creta, observantur Bolonio, & in Syria, referentur Ranzolino: atq, etiam in Cypro, & Sicilia ut alii annotaverunt; quoniam & in Italia, agro Salernitano frequentem invenit in quadam vallecula F. Domiana de Eremita, aequali loco dicitur supra portam ductam *sub Ammoniacis*, ut voluit F. Columna.

Radix in Aegypto, Syria, aliisque regionibus Orientalibus in omni exportatur, eiq, cocti frequenter viscuntur locola, nec minor hominum numerus ea ali dicitur quam in Germania rapo, (sicut illic de flava Passinacae non carere) quibus tamen minus grata sit. Adde F. Columna radicem hanc Nepheli a Turcis & Africanis municipi exporti, atque in cibo celebrari. Bonum naturam suam venositatem esse scribit nec nisi aqua per triduum maceretur, edulcora esse.

6. *Dracontium aquaticum* Gr. J. B. *visio aquaticum* Park. *palystro seu radice* — r^d****
Flora C. B.

7. 8.

Non bulbosam, aliorum Dracontiorum Arique more radice habet, sed digitalis crassitudine, tralobata, gemulata, transversis sibi longis palustribus exoculis solo incumbentem, cui figur ex articulo densa fibrarum bobole numerosa, bulbulis seu cinctis instat. Folia ex eadem cauliculis, pediculis dodecimalibus haurientia, Hederaceis parva (uno majora) figuris quodam similibus, nullis per ambitum angulis, in acutum desinentia, polita, virgata. In foliis una quod somno cauli manifeste racemus comprehensibilis et similia quoniam Aroa prout. Dodecalis fructus tenuis quidem et tunc candidissimae flammulae, quae pro flore sunt circumscissae excretae, tunc in racemum, penitus viridem, cum naturae rubentem. Nesciam quae rividos de in fossis paludosis. Nos in fossis palustribus prope *Serresburg* Hollandia observavimus.

Lucia

7. *A.* Antihar *ditum* Zoon. hist. bot. cap. 17.

Hae herba (describitur P. Mathen) facit radices similem Aro vulg, cum aliquibus parvis radicibus appendis. Ex hac radice virga aculeis circumdata, quae exollitur ad sex palmos: In vertice gignit pyramidem, ex bacis viridibus compositam ad similitudinem capite, quae dum hinc ovaria rubentem cum galla in medio. Folia sunt duo, & a radice inde habent originem, aequaliter exollentur, unum in aliam inflexum, ex quoque modo exat virga vel caulis habent folia ad formam simpliciter, coloris qui in vertice rubet, nigra macula aspersa, & sunt palustrissima visis, fructus & radice sunt calidissima, quibus Ino tanquam contra morbos frigidos.

Pater Matthaeus obfervavit hanc plantam in hot-to D. SII-UU in Artifa, in urbe Balfoea, quae ad Euphratem fita efb. Ob infoitam & nwmcm folioram figurum fufpeaa eft nobk hxc plants

8. *Aroae* I>,u,u Rumphal ditam Z. tent Uift. bot. cap. 93.

Rumphal vulgè dicitur Ignome; producit florem oblongum, unico folio, pictum ad modum Tuppe coloris flavi, ex rubro maculatum, odoris acuti, ex caps medio exit lingua ad modum Serpeni, fed non pictum, coloris fubflari: truncus altus, aequaliter maculatus, coloris fupradicti: fucus ebbitus noxius efb: utuntur radicibus ad fanandos morfos ferpentum, fi vulnus efb recens: quod fi nof ferro vulnus iterum aperiant & fic curant.

Efb etiam remedium infigoe trita & impofita fupra partem morbo Gallico affoctam: expurgat eum & finit.

9. *Arifaram latifolium* Park. Ger. latifolium quoniam Um J 11. latifolium alteri «C, B. um latifolium MM; r epli: oab Untie 6 friar e Cotul.

Claf.

Hocera am Smilacis ferè l'u U. A. l. tria aut quatuor, viridia, mollia; fana tamen carnofa, acris faporis, oblongo pediculo innixa, anteriore parte qua pediculo adhaerent, utrimq; pinnata, Ari foliorum annula, fed obtufioribus & quali orbiculatis angulis: inter que pollicibus duas uncias longos, multa rubris maculis diftinctis emergit, cui oblongo flo infidet, monachalis caculli five Ariftolochiae floris modo efformata, amplius tamen, extrema parte fufca colorem, qui doctum radiatum tendit, III carnis albis caninum odens, pitillum obtufum incurvum, & veluti ex cacullo profpiciens continens. Radix rotunda, globofa, Aro minor, foris nigricans intus alba, aliquando etiam tuberosa & oblonga, initio dulcis, deinde acris, minus tamen Ari radice (hæc veteres contra lepram) fibris aliquot fupra eam expanfis, ut in Orchilibus.

Aliud etiam eius genus invenitur paullo amphioribus foliis, & rotandioribus aliquantulum atque mollioribus, pluribus tuberculis fe propagans, oblongifq; & craffas radicales fapris in latum obliquum fpargens.

Fructum non defcribit Clufius, it tioq; IHM olervavimus. In aggeribus fepiam & umbrofis, itingre à Mafia ad Lucam copiotam vidimus, Apiculis initio florentem: poftea etiam in Gallo-provincia, non longe à Tolona portu, ad montium latera. Clufius in collibus Lufitanie frequens, falebrofo & lapidofa folo, ad lepes & juxta vias obfervavit, fca. Frigoris admodum impanens efb, neq; in hortos noftros tranflatum floret.

10. *Arifaram anguftifolium* J. B. Ger. Umftlmm Pork. «v Arifolium, Defcenda ferè C. B.

Claf.

Folia longa funt & angufta, inftar ferè Plantaginis anguftifoliz foliorum, viridia, fplendenna, quina aut fena: poft que feu cacullis longior & macronatus, retrorfum inflexum & albicans prodit: e caps rima oblonga veluti vermis exilit, fpatham interdum longitudine, inflexus, coloris aut purpurafcentis, aut ex purpura virefcens, non ille quidem obtulis extrema parte, fed mucronatus: Fructus, racomi inftar confertus, albus, vix terrâ emergens, fco tempore fubfequitur. Virax magis efb quam fuperius, noq; tantâ curâ indiget.

In agro Romano inveniri aiunt fponitaneum Clufius ab Imperato accepit miffum Neapoli: ij>Jc Ltem* fponite nalcens non vidit, uti noq; nos.

Fructum in horto noftro vere tandem è terra pro>tulit.

CA ». XIX.

De Dracantia.

Dracontium five Serpentaria à caule Serpentinae pellis inftar maculofo nomen traxit. Folia multifida feu in plura lacinas divifa, caule maculato, feu membranaceo folliculo maculofo inferius veftito, ab Aro diftinguitur.

1. *Dracontium majus* Ger. Dracmtmlm mtjv vmlgvm J. B. Park. polyphyloei C. B. Dragons.

J. R.

Dracunculo majori, profunde in terram depacta radix efb, ferè orbiculata, volam caput, caps lateribus parvi bulbii plures, quibus fe propagat adnatis conlocaverunt, foris colore buceo, intus candido, fapore fervido. Caulis uncias, rectus, pollicaris & craffior, quibus duas uncias, maculofa colubæ tergora affabè memens, e tunica convolutis confians: ipfa vero fola pediculis dodrantilibus fingotis donata, in fegmenta dignata fidiuntur, levoe & fplendore Ari, craffina & colore parvi: e quorum medio eluctans caulis vix digiti minimi craffitudinem aequat, e caps fcapo vagna pedalis exit, coloris foris herbacei, intus in purpura rubens, e ficut pitillum promens nigricans, Ari pitillo magis, in mucronem acutorem delinens: fubfequitur fructus racemofus, granis per maturitatem rubentibus. Olor floris valde furens.

mus. *Palis* multa, magna, *Laticora*, *levia*, & a radice, & in caule ad ipsam usque spicam fore nata. *Caulis* crassus spicam distans sustinet *filium* fortiorum: quorum singuli pediculo virili (cui appositum foliolum sextante longius) inserto, ventricoso insident. calcar admodum brevis & viride, galea & alii foris ex albo viridibus, intus purpurascens punctis & striis notati. A labello exteriori albidis, interioris purpurea punctato araneus demittitur, triplici circino viridibus **imti com.** *ostius*, quorum laterales crispi breviorisque & convoluti interdum, medius le... Odor gravis & vitiosus. *Semen* in valvulis oblongis striatis percretaquum.

Solo pinguisimo nascitur *Label*. Floret circa finem Maii, & ferè usque ad medium Junii. Pro. *Tempus* & venit in collibus masculis, praesertim inter umbrosas convales. *J. B.* In Cantio viae quae à *Crayford* *Locus* ad *Derford* oppidum ducit invenit *D. Beauli*. Cur *Jo. Bauhinus*, quem sequimur, non separaret *Orchidum* factam 1. & 2. *C. B.* apud ipsam vide.

2. *Tragorchis* *m. w > r*; *algans* ! *D. ft. ruii. r.* *varior* Park. *Orbt hUt itnt wflwr* *C. B.*
Tragorchis *Jomus* Ger.

Geminum habet *bulbos*, *rhizomem*, *rotundum*, alterum *superius*, alterum *inferius* situm, ut in aliis ferè sit. *Caulis* plerumque pedalis, ab imo ad summum usque *foliis* vestitus, longis, angustis, acutis, carinatis, quae sine suo ipso amplectuntur: in nonnullis plantis decem vel duodecim folia numeravi. *Semino* cauli insidet *spica* florum congesta, duos digitos longa, obsoleta purpurea tineta. Singulis *foveolis* ad pediculi extortum apponitur folium sine longum. *Flores* ipsi parvi pediculis insident brevibus, adeoque contortis, ut calcaria velut amplectantur. *Galea*, ut in aliis, quinque componitur foliis admodum arcuè convergentibus & velut agglutinatis, ut una & continua lamina videantur. *Labello* breviter est, retroflexum flexum, magis etiam quam in ulla alia quam hactenus viderimus *Orchidis* speciosum, in modo seu tactu ipso punctibus purpureis asperum. *Dividitur* *stigma* in tres lacrimas satis latis, quarum media longissima est: *Color* lacrimarum ex herbaceo nigricans seu fuliginosus. *Odor* canicam ingratus.

Florentem invenimus Maii 16. prope *Genevam* in paludibus trans *Rhodanum*.

Orchis illa quam *Cloussus* in pratis urbi *Londonensi* proximis eruebat, *spicis* florum purpureorum, recentium odoris, quamvis fuerit ignorans: nihil ejusmodi nobis unquam occurrit, neque in pratis circa *Londonium* neque alibi in *Anglia*.

Orchis *Batavica* vi. *Cloussus* h. l. quam ingrati odoris esse scribit, nec ineptè *Tragorchidum* minoreem nuncupari posse, caule *dodrantali*, tribus quatuorve angustis foliis cincto, *spicam* sustinente florum elegantem exteriora rubri coloris interius vero paulo dilatioris, trivido *labro* prope pendente, *Orchidis* nostrae fortioris purpureae *spica* congesta *pyramidalis* *caudam* *centeo*. Nam & ipse *Cloussus* hanc in hortis *translatam* *latius* explicare florum *comam*, in *mate* quasi *formam* *detinentem* scribit.

3. *Orchis* *stratemonica* Ger. *frat. major* *J. B.* *militaris* *frat. stratemonica* *majo* Park. *latifolia* *altira* *Cloussus* *Orchis* *militaris* *majo* *C. B.*

7-ft
Cwfttettnir

inveni (pene cubitali *Cloussus*) folio amplissimo, i. e. longo simul & lato, & subrotundo inter initia. *Flo* *intus* candidus, *marginibus* purpureis interstitiis, foris velut *fibris* purpureis ac *circinis* impositis rubens. [*Cloussus* *esalobolam* *Galeam* *Orchidis* *lax* *latifoliae* *altiri* *attribuit*.]

Hujus (inquit *J. Bauhinus*) *provenit* **ubci** *in* *Sylva* *Floride* *vallis*. *Eruptum* *menfe* *Decembri*, *floret* *autem* *Maii* *auspicio* *ad* *finem* *usque*. *In* *Sylva* *Newburyar* *oppido* *vicina* & *in* *Lecono* *latu* *supra* *Mendishor* *observavit* *Cloussus*.

Mentio *quae* *J. Bauhinus* *cur* *frater* *C. Bauhinus* *Orchidem* *latifoliam* *altiram* *Cloussus* *bifoliam* *voce*, *quam* *Cloussus* *talem* *esse* *non* *scribit*, *quam* *iconem* *cui* *multa* *folia* *pro* *ex* *ponit*, *quae* *à* *Labello* *stratemonicae* *dicitur*. *C. Bauhinus* *tamen* *Orchidem* *psychodem* *epiphyllam* *Lob.* *hujus* *synonymam* *facit*, & *stratemonicam* *Lob.* (cujus *icon* *eidem* *est* *cum* *Cloussus* *Orchidis* *latifoliae* *altira*, *ut* *diximus*) *Orchidis* *lax* *militaris* *majo* *synonymam* *facit*. *Nos* *certò* *haec* *non* *intelligimus*. *C. Bauhinus* *per* *inadvertentiam* *Orchidem* *latifoliam* *altiram* *Cloussus* *ba* *ponit*, *primò* *pro* *synonymo* *Orchidis* *bifoliae* *altira* *errore*; & *deinde* *pro* *synonymo* *Cynolorchidis* *militaris* *majo*.

4. *Orchis* *bifolia* *latifolia* *C. B.* *Serapis* *bifid.* *latifolia* *Park.* 1. *amplissimo* *folio* *Cloussus* *altira* *psychodes* (*if* *Lob* ^ *.t. *UnmspbrU.* *ut* *secunda* *C. Gemma*.

Cloussus.

Bina *habet* *folia*, *Ellebori* *albi* *foliis* *magnitudine* *non* *codentia*, *aliquae* *verò* *à* *pediculo* *ad* *extremum* *usque* *folium* *productis* *similiter* *insignita*, *superne* *viridita*, *inferne* *dilatata*, *profus* *tamen* *splendens*. *Caulis* *cubitalis*, *pauca* *folia* *sive* *involutiva* *praelinum*, *pentagonum*; *filii* *in* *limbo* *spicam* *coherentes*, *cujus* *autem* *coloris*, *cupulae* *formae* *ignoro*, *cum* *antiquam* *aperirentur* *plantam* *distans* *observarem*: *Radix* *hirsuta*, *crassa*, & *parvi* *Napi* *modo* *oblonga*, *supra* *quas* *inferno* *cauli* *insistent* *aliquae* *fibrae* *latae* *crassae*.

In *declivitate* *montis*, *cui* *indefinita* *est* *arx* *Grobes*, *inter* *Sarum* & *Dexum* *amnis*, *bina* *ultra* *Warrington* *miliaribus*, *observavit* *Cloussus*. *Cum* *hujus* *descriptio* *apud* *Cloussum* *imperfecta* *sit*, *neque* *quisquam* *praeterea*, *quod* *scimus*, *eam* *descripserit*, *quo* *referri* *debeat* *dubi* *sumus*.

5. *Cynolorchis* *frat. Didonae* *J. B.* *latifolia* *hinterwaldi* *J. C.* *C. B.* *majo* *latifolia* *altira* *Park.* *Cynolorchis* *majo* *Ger.*

Did.

Bina *habet* *lata*, *pingua*, *lilli* *foliis* *propinquam* *similia*: *caulis* *palalem* *aut* *aliozem*, *angulosum* [*Labello* *sesquipedalem*, *glabrum*, *nitidum*, *curvum* *in* *summo*] & *in* *eo* *filii* *capillosi*, *spicatum* *digitos*, *colore* *robore* *caulis* *purpureae*, *cupulae* *aut* *galeae* *pauca* *similes*, *ex* *quibus* *partes* *inferiores*

interiore laciniolam quiddam canis aut aliam animalis quadrupolis exuvio simile dependet, dilute & ipsum porporaferis, punctulis magis purpureis repletum. Lobellus florem odoratum, purpureum, maculis ... Q^A. d. lei (&...s) habent, omnibus fore Orchidibus communis sunt.

Quantum Orchidis speciem describit Dodonaeus & Lobellus non noscimus; & an à quocumque praeterea Bozzaco alio nomine descripta sit: certi non: quas tradant generaliter sunt, & non incursum relinquunt. Quia ..UM Ixoel in pratis rigum frigidissimum latet: Uta quare terrarum? nobis in Anglia & regionibus transmarinis plantis scilicet indagantibus nullis conspicua est.

C. Bauhinus hoc refert Cynosorchidem marem quantum Tragi: J. Bauhinus eam separat, & sub titulo Orchis alias purpurea, alias ex roseo candida. In quarta Trago proponit. Huius sententia nobis magis probatur: inquirendum tamen proponit, an non Trago forte intelligatur Orchis majorum totum purpureum, cui rosacea descriptio Tragi convenit. Magna confusio est obfusca

6. Orchis major, latus foliis, galea fusca vel nigrescente J. B.

7. R.

Folia habet quatuor aut quinque, magna, liliacea, palmata, & subpalmata, ovata circiter tres lata, striata, nitida, & praeter haec mucroni foliorum in aqua radientia. Caulis stratus, subquadratus, superiora versus purpurascens, in quo florum trifolius masculinorum, galea brevi, strobiliformi, striata, quibus apprimuntur bene alie concoloris, calcari parvo ad pediculum longissimum contractum angulosumque appresso: Ex pedicula pendet labelium, exsertis Martis aut Zabellii expansione egregie expansionem vel cum orbiculis & canis, adversa parte ex alio purpurascens. Infima florem penesilla rubro candida, & variata sunt. Olex levis non lignata: sapor viscidus non insularis.

Less of Tragus.

Aci U. Una styrosi cupulam collis perpe montem Salva non longe à Gensera invenimus, Mayo mense florentiam.

A. 7. Orchis vera non folia maculata C. B. Park. Cynosorchis vera mar Ger. crnac. Orchis major, non purpurea, maculata foliis J. B. The male Fool flower.

Radix gemina, olivaceo modo rotunda; una nova & plena, altera fungosa, rugosa & flaccida. Folia ad radicem levi sequeuntur, & interdum plura, modice lata, levia, liliis foliis similia, superiora maculis aliquot ex rubro nigricantibus signata, nocturnum in carnosa, quorum unum & subinde alterum caulem quoque circumplectitur. Caulis dorsalis aut pedalis, teres, striata. Flores in spica longa purpurei, numerosi, obovato & alpectui grati, circa umbilicam albidioris, & punctis parvis purpureis lacrimaribus pecti, posteriori calcaneo habentes bractea & crassius. Folia ille angusta & acuta que à galea lateribus exurgunt, & in hoc genus foliulae alie dici solent, nonnulli entium velut auriculae quaedam, & in acutum mucronem desinunt. Ad pediculum foliulae unicusquique apponitur folium acuminatum, purpureum. Foliulae in spica non admodum acite strigati sunt.

Tragus.

Florat circa finem Aprilis & initium Maii, estque frequens in domibus & pratis; & vel inde à reliquis huius generis dignoscitur potest, quod omniumque aequali res sponte videntur prima flores.

Orchidem nostram totam purpuream non maculatam 7. R. cum ipse considerandum proponat qui in re, dampis orbiculis nigra in foliis, differt à descripta, non nisi accidentibus quibusdam ab ea differre existimamus, non aliter quam Arum vulgare non maculatum à maculato: quantum (ut verum fatentur) nonnullae sunt in descriptione notae quae directam arguere videntur: s. g. florem confert, obovato fere nullo, calcari lato longo.

A. 8. Orchis vera femina Park. C. B. Cynosorchis vera femina Ger. Orchis minor purpurea & aliam colorum cum alie varietatibus J. B. The female Fool flower.

Radix gemina, rotunda, mox strallice parva magnitudine aequant, altera superior, altera inferior, cum fibris aliquot sepe liliis striatis, ut in huius generis alia. Folia quatuor aut plura forma veluti lactina, non admodum longa, naque glanda, reflexa plurimum & quodammodo striata; similes maculata: in caule palmari diti plurimae exstant cum longiora. Spica florum brevior est quam in Cynosorchide masculinae maris; flori pauciores, purpurei, & interdum carni aut albi, intervolentes, labello liliaceo punctis purpureis lacrimaribus notatis. Alie huc lacrimae, concavae, minus quam in * illo exstante, capite quoque densum colorum sunt videntur huius striatae, qui notis ab omnibus quae hactenus videntur Orchidibus distinguantur. Postquam pedicula apponitur folium purpurascens. Floret circa finem Maii, & pro Vera consuetudine interdum immixtus. In pulcibus videntur fere obvia est.

* Cynosorchis vera non maculata.

Less of C. B.

Orchis cal. & hum. saporis est dulcis. Utes perpe. (ex figurata lacera) ad vim fortitudinem restaurandam: Sic februm confortare credunt & ad conceptionem dispondere. Subst.

Ad conceptionem vitandam R. Sal. Seryion. Scrip. β. cum vino Malvatico aut Aq. vine Mellis lepus post Menstruatum fluxum. Multas feminas hoc remedia curavit Hartmannus B. Hoffm.

9. Cynosorchis laciniata sive compallid C. B. Park. Orchis sive Cynosorchidensis Dodonaeus, Lobellus major aliter J. B. Cynosorchis palustris.

Dod.

Folia ille angusta, striata, Plantaginis angustifoliae foliis quodammodo similia: caulem tamen sive in brevi duraque folia cupulata, colore florem punctato & obliquo purpureum referunt, ut in vero absente, quibus cum * superiorum forme sed tamen mixtus; dependente quoque ex ipis vult & inferne exiguo Quadrupolis veluti armatis radientibus. Radix substat alioquin Orchidum similia.

* Cynosorchis laciniata sive compallid.

Icon 1 D»J. & W. tuiuiti habet limilicudiitem If mqi (J. Bauhinus) cum Cynolorchide maiore Lobcii & priore Dodonni, at inligge alKjuod dUcnmen (teacre non [K>]. Nos idem vt-detur.

In herbis locis Valentis sive, vlt qua' itur ad pagum Vals, Maio mense copiose florentem cr. legit D. Magnus. Unam notam aliquam characterificam nobis doctiliter, qua' cum ab aliis omnib' certa distinguere possimus. Mirum Dodonni tit lilt. GJI. nugru Sc lara folia, Lilioz folis pane similia hinc trahere, adoque sibi ipsi contradicere.

IO, Or did ^ if non paruum flore persus purpureo, adoru suavisim J. B. Cynolorchide montana, fxTfwtB, cJrrtta C k f>r. Nim Cynolorchide alioru purpurea, idrata exilenti. Cjnsfrtrbn mtlutmt furpmtj tJer*u iPark

Folia vestita eff, deseribent Trago, Lilio hnulli: Fhve emicaps po:rpureopio:Lit, (nec enimul- nos in hoc ge- nere minimum exulit foavisimo commendatur odore, & ad Caryophylleam accedente.

Nascitur plenique in asperis montibus inter Juniperos, terra loci i JIII gaudam.

11. ihiiitt fmmme* tm* Out rf'iw< fmfuri**Ur*t* C II.

Hac bini hoidu crassis pedata est: folia longa, angustis: caulis interdum pedalis: spica florum elegans, odorata, quorum calicis obscura purpurea niger: huius cum propendente labro candicant, purpureisque macula insignantur.

J. Bauhino perpendicularium proponit anno 1 luc pRKsdent) eadctn (if. DrtTercniii est m flxi- bus quorum labellum in illa parum est sine -nactiw, in luv nuciUu purputv; a insignitum; unJc not speciei diversas verum similitudine existimamus.

A. II- Ortbii Pannica 4. CiuC Ofii/ prvn f.^ilutt m mltis punctis notatis, An Clasio Or- ciuit Pannica 4. J. B. CjnoliTibn miMorit fMi mli hamilar C. B. militari Pan- »«WA Pjfk Cjmtfrcl. minor sammutt Qti emac. littlt puq!c flowered

Bulborum altero olivari, altero rotandiori fibre adnascuntur ut in ceteris. Caulis sesquipedalis & dodrantalis, cui circumjecta folia quatuordecimque sesquipedalia latitudine, longitudine palmari, quorum aliqua separata, alia caulem involvunt. Flores in spicam latis brevem compactam digesti, ferrugineam contra in fastigio caulis antequam expleantur amulantes, odore melio. Flores singulares exiguu, calicari herboso brevissimo, palea ferruginea, alia vel tota herbida, vel ex dimidio purpurantibus, imus rubro punctatis. Labellum simile quodammodo Animalculo quadrupedi, tripartitum vel quadrupartitum alatum, foris penina albicant, intus creberrimis punctis saturate purpureis notatum; apicibus in rictu hinc.

Clasii descriptio melius congruit Orchidi apud nos in vOdi'ms licdixibih & steriliori:n», pra-S. Lom. tim cretaeas, frequentissime, quam militarem Pannomctr appellare solemus. Folia est quatuordecim vel sesquipedalia latitudine, longitudine palmari, quorum aliqua separata, alia caulem involvunt. Flores in spicam latis brevem compactam digesti, ferrugineam contra in fastigio caulis antequam expleantur amulantes, odore melio. Flores singulares exiguu, calicari herboso brevissimo, palea ferruginea, alia vel tota herbida, vel ex dimidio purpurantibus, imus rubro punctatis. Labellum simile quodammodo Animalculo quadrupedi, tripartitum vel quadrupartitum alatum, foris penina albicant, intus creberrimis punctis saturate purpureis notatum; apicibus in rictu hinc.

Hac à preced-nu (quinnnm ex delotpcwaiiwt ooUigere lion) nu^ruttkline porapui Jjllern videtur.

13. Orchi f*rV* jfor» ncim 6xx ft venice J. B. An Cynolorchide M-lti*rjt m. -# CB. militaris sequens Clas?

7. J.

Palmis major est: folia pluribus, non magnis, caulem multum amplexantibus: - flonbui relut in spica sesquipedali longa, & pene unciali lata, parvis, rubris, & pene viridibus coloris.

Circa Montebelgardium mense Junio florentem vidit J. B. Orchide lectuade Clas. folia sunt plura quam lanfolia alia sesquipedalia latitudine, longitudine palmari, quorum aliqua separata, alia caulem involvunt. Flores in spicam latis brevem compactam digesti, ferrugineam contra in fastigio caulis antequam expleantur amulantes, odore melio. Flores singulares exiguu, calicari herboso brevissimo, palea ferruginea, alia vel tota herbida, vel ex dimidio purpurantibus, imus rubro punctatis. Labellum simile quodammodo Animalculo quadrupedi, tripartitum vel quadrupartitum alatum, foris penina albicant, intus creberrimis punctis saturate purpureis notatum; apicibus in rictu hinc.

Hanc olim habui jwoO: hinc nostra purpurea spica congesta pyramidalis; verum in tanta descriptionum brevitate & imperfectione nihil audio de vlti' spicam tamen me fastium fuisse, saltem quod ad Clasium attinet, nisi forte hinc mKhm ptwitJin i. ... i io <> -iic" B 4012 vi. Clas. descriptio melius videtur convenire Orchidi nostrae spica pyramidalis, quam secunda hinc pulcherrimo superis posita. J. Bauhino descripta à Clasiana fortasse diversa est, & nostra spica pyramidalis.

A. 14. Orchi f-T*r*s spica congesta pyramidalis. An Orchi Bataviae vi. Clas; An o. parva flore rubra sive plumbea J. B? An Cynolorchide militaris spica rubent conglomerata triple late IM rring Orchi.

F. cenuno Ww ocbU ilari, non palmato, caulis exoritur palmari & major, erectus, folia multum angustis, planis que cum amplexantibus non maculatis, pallidius virentibus cinctis: cupis fastigio infidet spica florum brevis, densa, pyramidalis, pulcherrima flocculis purpureis vel sauro-rubentibus nullis maculis, cum longis calicibus retrosum extantibus composita. Hocum caulis reliquorum mox vlti' folia constant, quorum duo velis alia nonnihil catant: labellum propendem in- farnoc

feroque parte in tres lacinias dividitur, superiorem duobus procellis albiscentibus huic Orchidi pro-
pria donatur, qui procellis in sinum exigent lili caremularum sicut articulatam quadammodo refe-
runt. Variat interdum flore albo.

Tropis
Linn.

Floret mense Julio, nominum que apud nos sponte oriuntur Orchidum, Triorchis & Monorchis
exceptis, postrema in paludibus siccois & cretosis satis frequentis.

Cynolobis militaris montana typica rubente conglomerata C. Bauhino in prole. descripta huic
eandem valent, magnitudine sola discreta. O. chus Batavica vi. Claf. huic referenda est, i. e. Orchis
odore hirci muree typica purpurascens C. B.

14. Orchis glaberrima C. B. rotunda Delphinium J U Cynolobis capitata glaberrima

Radix constat gemina, equali & oblongi non exacte equali: caulis umbellati, rotundo, robusto,
gracili. Folia, ex nostra observatione, longa sunt, angusta, carnosa, subglabra, tria vel quatuor in
caule, ad radicem nulla: Flosi sunt in caulis emittuntur: perianthia globosa & aliquantulum compressa
coacta, non aliter in generum modo in thyrum longam & speciem digressi: [Thalo in un-
guibus hinc modum triplicem] Descripsit Thali pbnis a nobis in monte Jura inventi t* 6c obknm
melius responderi quam Lugdunensis.

J. Bauhinus fratrem Calparum reprehendit quod in Phytognatho Orchidem rotundam Dale-
champii liliam appellat, cum is, inquit, non sit flore lili i l:d pontCCOT Verum, quoniam in
lilia sit in in quas nos observamus flore colore: at memorie non multum fido, cum in ficat,
quam observavimus, color purpurascens & quasi c... r, & C. Bauhinus in Pinax lili
epitheton omisit; & inter notas de ea nostras hec verba invenio: J b d b llafatlontui UXUJ : rior-
bus punctis purpureis ndUDtW.

Linn.

Clivis pratis montium triglorum gaudet, ut recte Lugdunensis.

15. Cynolobis angustifolia hinc caulis... Park

C. B. prod.

Hinc radices subsunt due globosae: caulis curvatus, cubus minor, folio aliquot pallide viren-
tibus, brevibus, striatis, unciarum sex longis, succulentis liliis inferis, & uno algero superis, amplo-
xantibus: speciem habet oblongam ex floribus variis, candore purpurascens, ex
caulis dependentibus hancem coculum n. MHpgi

Linn.

Hanc in pratis Patavii legit C. F.

Uuhm».

16. Cynolobis militaris pratensis elata... Park

C.

Hac prole [Orchide speciosa pyramidalis] referenda est minoribus; caulis brevior; folio
unciarum duas longis, etiam caulis succulentis tubi instar cingentibus: speciem brevior, ex floribus
longi minoribus, illic ex albo & rubro eleganter variegata.

Linn.

In pratis humilis Michellidensis & trans Rhenam reperitur.

17. Chamaecris alpina folio gracili C & proJ. Aifm» \$... Park

C. *

Planta palmaris est, ex capsula radice gemina globosa, angustissima, utrinque qua-
drilatera, truncata, quae inter ea fertur, superius emittunt: speciem unciali, cui
utrinque foliolum brevissimum subiacet. Flosi virides, galericulati sunt.

Linn.

In monte Helvetorum Gocharo copiose & acerrime Junio flores reperitur.

18. Monorchis Ophioglossi db »; M .: itzel

Merzel.

Ex radice bulbosa, globosa, parva caulis proteris tenorem, unciarum duas longam, & unam
cum dimidia latam, Ophioglossi folio peristiale. Caulis in speciem liliam ducit, foliis
minutissimis, capillaceis, nigram (si per microscopium florem inspicere) Orchidum exacte per-
sentantibus, coloris herbacei. Spica huc cum suo folio adnata emittit liliam Ophioglossum
ID. notat.

Linn.

In aldis & paludibus Borudis circa pagum Salsvoldes in ditioribus Salsvoldis mense Augusto;
item circa Godanum urbem reperta.

Invenitur interdum cum altero foliolo radice adnata.

19. Monorchis bifida floribus viridibus Michellianis Merzel.

Hac unico radice testiculo caulis allargissimus, quem inferis duo invadunt filia, unam
excedentis, striata & in recedentem acuminata. Superius emittit foliolum Orchidum virides, odo-
rem Melchi liliam spirantem.

Linn.

In Alpibus inter Trivisum & Ispra locis raris in scopulis nemora...
quod dicitur ab Orchide vulgaris aliorum Michellianis, exceptis parvitate.

Reperitur huc folio similibus, floribus pallide...
> t)cuufaua: non floribus luteis p... similibus,
sive olivaceis, cura tamen Melchi odorem.

21. *Morchea folio plerumq; angulatis, floribus luteis ceram alentibus* Mentzel.

Copiosè circa Berolinum sedem Electoralium Brandenburgensem in potis provenit.

Lecm,

A. 21. *Orchis elata multifida* sive *Morchea* C. B. *radice elata* Park. *parva autumnalis* J. B. *Orch. preflott*, flora, o: muflh *Orchis*.

J. B.

Dicocha aut tribus foliis Plantaginis quinquenervie similibus, venosis, glabris, immo caules complanati donata est: ipse vero caulis junctus pedalis, [nunquam vidi apud nos ex altitudine, sed plerumque palmarem aut sesquipalmarem] thyrsum gerit longum *fulvum* pedicellorum, tribus apiculis constantium, ex herbido colore in luteum vergentium, hanc Morchea ferè odore fragrantium. Floriculi ut in reliquis Orchidibus summis valculis seminibus insident, quæ eis marcescentibus auferuntur, & longuicula evadunt, breviora tamen pro plantula parvitate quam in plerisque congeneribus, in sinu folioli è quo exeant nullo pediculo, sessilia, caulis appressa, conferta. *Radiis* canis uno adhibet unico exigenti lora quem longa propagines exsporigantur, crasse, quibus unicus aut alter bulbulis consiliis adhaerescit. Bulbus quatuordecim marcescit & novus producit.

In palcatu sterilibus, maxime cretaceo solo, sed non ita frequenter nascitur.

Lecm.

22. *Orchis Folia bifida* J. 11 *iutt4 hufmt* fJ* <1 D 'radice lateralis* Pjltl. *Fnjid latera* Ger.

Dico habet folia bifolia similia, paulo minorâ quam *Plantago angustifolia*, *aspera* & *hirsuta* tactu: caulis palmarem altus: Floriculi multi, ex limbo virides, ut in *Hyacintho* majore: *Radiis* duæ, parvæ, rotundæ.

Orchis sive *Truxchis lutea altera*, *varietas birjuta* J. B. *lutea altera* C. Gtm* Lab. Pirk.

Lobelio iplo autore videtur eadem aut congener cum precedenti. *Folia* est *nitidiora* & *Ixoon*: quam superior [*Orchis Ispiralis alba odorata*] virentior & nonnihil hirsuta.

24. *Truxchis lutea folio glabro* C. B. *Orchis minor Leodensis*, *Truxchis lutea*, *spice lutea* C. *Gemma*, sive *Radicis minor* Lob. *Orchis Leodensis* Ger.

Lob.

Terna folia angustiora Quinquenervie Plantaginis amula prout, luteo & virentate Auricule resing. *Flos* nalem in canaliculo exhi Testuoli *ca. luntip* *radix* ternis & quatuor pediculis sessilibus libell.

C. *Brachina* ex hac planta duas facit: *rc vulerur j Altcram Triorchin lutom folio glabro*, *altcr.uu Triorchin luteam alteram.*

25. *Truxchis lutea tertia* C. *Gemma* Lob. *lutea radice oblonga* C. B. *Orchis sive rratilm* !* *ita tertia* *ti longioribus radicibus* J. B.

Oblongioribus est radice oblongioribus bulbis, nec plura habet Lobelius.

Nobis suspicte sunt tot *Truxchidis* luteæ specics, præsertim cum nemo hæcenus Botanicus præter Germanam & Lobelium eas accuratè descripsit, aut à se videri meminerit. Utinam existerent nobis hinc Krupeliani herbarii Paris & Leodensis.

A. 26. *Orchis spiralis alba elata* J. B. *Truxchis* Ger. *Truxchis alba elata minor atque etiam major* C. B. Park. *Triple* *Wd* *ites traxp.*

J. B.

Duplici radice nititur bulbosâ, oblongâ, villosâ, ima veris acuminatâ, aliquot fibris donatâ, [imò per se triplici & virentium etiam quadruplici] E. supra summo folia vaginato pediculo unciali surgunt, viridia, pingua, semunciam lata, unciam aut amplius longa, dorso crasso averfa parte, quæ ex alto virentes venale ab imo ad summum conspiciuntur. Juxta hæc *radice* quoque origitur *dodec* *trifida* aut pedalis, teres, foliis acuminatâ, cui vagina, vestitus, iidem tamen vix ac ne vix quid præmissentibus. Floriculorum odoratorum thyrus, albidorum, clavicularumque hæcundum ita nitat, ut Ispirum instar summa veris circumagatur. Hi interni parte ex limbo virent, ad lutea verò duo foliola candida velut ale herent. Utericuli succedant ut in reliquis ferè Orchidibus, parvi, *ptif* *verulento* semine referti. Thyrus florum amaricat, & jucundi odore est.

Autumno florit, & in palcatu scabrobus, arenosis & cretaceis, interdum etiam in humid *oninu* *Luce* *Trt* *pus* reperitur.

27. *Orchis endrypphura viridis* Col. *endrypphura viridis femina* Park. *forte nudi hominis eff* *g. rrp. ajonem, femina* C. B.

Col.

Hæc nudi hominis aut potius mulieris effigiem integram veluti umbra imitari videtur, floribus capis habentibus tegumento quinquempartito rectum, [duabus lacinis angustis, nec nisi manibus spectantur conspiciendis] virentem, purpureis acis carandam, è quo dependet labellum, in quo non solum omnis humana proportio circumscribitur, sed & facti ferè. *Fern* *antem* *pallido* *colore* *&* *radice* *acris* *areis* *inpressi* *micant*, *notandus* *quo* *ut* *extorib* *modo* *in* *spicem* *per* *caulis* *la* *flum* *dispositi* *circum* *dependent.* *Caule* *sesquipalati*, *lris*, *rotunda*, *duabus* *foliis* *intercep*, *cani*,

caro, illam amplectantibus? Reliqua una sola quatuor, oblonga, impolala fore, atq; unquam vel minus lata, virentia, super lictum elata & convexa, ex longa cervice suspendunt: capsae mollior exoculantur, quadrantales, crasse, varii & obliqui partitae, quibus subsunt duo testes, quorum alter durus, levis, albicans, resti oblique marginaline, alter vero rugulosus, pallidus, verrucosus, et in omnibus observatur.

Loc.

Mais floret in montibus hybridis Aequicolorum. Hanc esse peto quam nos circa Genavam invenimus, & Orchidam anthropophoram flore ferrugineo tincto hunc in modum descripsimus.

Geminosa habet et reliqua folia, laminae grandes: folia ad radicem quatuor vel quatuor, nervosa, pallida, quatuor uncias longa, unam lata: in una eadem parte duo vel tria, quae ipsam complectuntur. Caulis caetera modo ad spicam usque, quae praelonga est, numerosis foliis crispis, herbaceis, obscuri tamen coloris & quasi ferruginei purpureo tincto, composita. Geminosa quatuor foliis constans, in tantum conniventibus ut unam & indivisam videntur. Labellum suspensum praelongum est, & in quatuor laciniis longis divisum, quarum superioribus duae utriusque ad circumscriptam galiam & labelli brachiorum, reliquae in extremo labelli crurium modo dependent. Flos ipse calcaribus habet: pediculi flocculorum, ut in aliis fere fit, contiguantur, cohaerent in modum, habentia, tingunt ad exortum suam foliolam percrepant.

Facit ceterosae planta haec Orchidem palmatam flore viridi nobis detam imitari: nec affert ad eam similitudinem, quam Columba Orchidi sine anthropophora ortadi tribuit.

28. Orchis anthropophora a Col anthropophora ortadi mai Pack. flore viridi limbo effigens representans, mai C. B.

Col.

Hinc folia ex pallido virent, et radice, ut in congenitis, suffocata, palmum hinc, quorum alterum super & reliquorum longitudine, duplo latitudinem superante; deinde alia quatuor paulatim fere majores, longiora, latiora & unciali latitudine, palmum longa, per antheram unctula, primis exceptis, & quae veluti foliicola caulem ambiunt, tria ferunt discretissima. Caulis est pedalis, tener, levis & virentis, in summo fere densis in crassum spicam & obelam, & florentia ab imo defluentibus plenam congestos habens, colores interquam desiccant robente, deinde aperti florentium carnem humanam emulantes, fere rubentem, ac hinc coloris ex crasso effigie nudi hominum figuram exprimentis, brachiis incurvis veli amplectari cupentis, utriusque figurae corpus, femora, crura, scapulas, imitantis. Caput inter flores foliola superna includitur, ut in congenitis.

Tempus & Loc.

Saepe germinat Auziaco. Aprilis mense Columbae floret ex Alpennibus allata. Ortus etiam ad radice Vesuvii montis. In Alpennium collibus y hn boht repent Columba.

A 29. Orchis palis de alia fere similitudine 11 Ji Cypselia latifolia hians cu... C. B. latifolia, MMHT I M i. «M... Ger. Cypselia altera Dod. de floribus. The Span

m

Hinc folia fereque appende haec alia oblonga: folia duae unciali lata, quatuor uncias fere longa, (in collibus apertis & herbaceis, ex 11. pit i Ma non attingunt.) quarta unciali. Caulis dodrantalis, flores sessiles in spicam congestos, odoratis, quorum singuli pediculis terminalibus existunt, calcar breve expriment, galea alba, fere cinerea, intra rubentibus, & lanuato-ribus punctis lineis) t. ri); quibus interjecta una foliola oblonga, valde angusta, rubentia: labellum oblongum, in... alia rubentis distictum, intra albidum, punctis rubris punctum, fere ex albo ad... puram declinans; in cetero apices herbida. Dodonaeus dependere ait ex singulis floribus veluti animalculi quadrupedi vel hemisphaerici extensis brachiis & divaricatis cruribus absque corporeculum.

Loc. & Tempus.

Circa Monteburgum abundat in collibus praesens florem Maio, inquit J. B. Genevz videm, & satis copiosam, observavimus. Reperitur & in Argilla in collibus prope Thancin fl. ad portum Caspium non longe Rodinga oppido, ubi eam indicante D. D. L. non observavimus. In hoc genere brachia utramque incurva fere sunt.

Nos cum Genevz Orchidam hanc penitus invenimus, eam Cypseliam nosterque fereque praesens conglomerata denominavimus, & hoc modo descripsimus.

Ad pedalem fere altitudinem affert. Folia omnia varialia, herba seu nervosa, non maculata, quatuor vel quatuordecim uncias longa, latitudinem lata, in acumen distentia, in caule duo aut tria, quae cum toto in ar circumcumbant. Flores in spica summo caule inflexis densis, brevis, ex pediculis pallidioris purpurei obscuri coloris composita: Singuli autem sex partibus seu foliis constant, quorum quatuor galeam constituunt, in tantum conniventibus ac si unam dentantur ferunt, in tres laciniis fissum, duo nempe quae inter seferuntur & alia media sunt penitus occultantur. Labellum in quatuor partibus barbata dividitur. Primum barbatum par ad ipsum angulum quem faciens galea & labellum existit: deinde labelli corpus absque prodeuctum in alia tandem barbatum par dehisce; uterque & quinta brevis & exigua barbata seu laciniis cernitur. Tum labellum, cum alia interstitiis maculis purpureis percrepant asperguntur. Barbata autem summa purpurea quatuor reliquis fere unguantur. Calcar liberum breve & in extremo veli geminum. Quod ad exortum foliolae apponitur folium vix perceptibile est.

Tempus & Loc.

Mais montis in... sta Rhodani fluvii ripa & alibi prope Genev.

Hinc, in magnitudine obscurae, eandem eorum Orchidem Zoogoeam Cypseliam exprimentem ortadi Columbae, capsae idem & dispositionem habentibus.

30. *Orchis Zosteria Cercopithecum exprimens, striata* Col. Park. *Orchis flore Simiam referens* C. B.

Col.

Hæc superiori accedit, quæ tamen omnibus in partibus major est; qui nisi faciei magnitudine & oculorum deterreret animalis Cercopitheci caudâ detruncatâ, quod referre valetur, maris hominis effigiem repræsentaret. At quia curva brachia admodum atque tibiâ habet, erectam Cercopitheci animalis iconem magis refert, sicut etiam monstruosa facies. Eodem modo caput tegitur quo superioris. Hæc testiculus vegetus rotundus est, digitali diametro pulchri, filuram Armeniaci mali modo habens, alter vero oblongior rugulosus, ut in congenicibus. Fila hinc in imo tria palmaria, duplo superioris [*anthropophora oreada* Col.] lanota verum breviora, reliqua tria minora caulem distinguunt fore bipodalem, [forte bipalmatam] circa summum tubescerent. Florum laciniæ in locum purpurascunt: at media pars, Animalis corpus referens, atque etiam tegumentum gigni eodem colore insperguntur, nam diluoria sunt multum.

Mais in Æquicolorum montibus observavit F. Columna.

Ab hac etiam non video quod differat

L. 101.

Orchis Cercopithecum exprimens Lusitanica prima Breynii, quam sic describit.

Hujus testiculi *Orchidis Anthropophoræ* alterius Col. planè similes, supra quos, ut in aliis filis aliquot expanduntur, foliis adherentes perbrevis, caulis nunc velut testiculi complexentibus. Ex foliis dictis *folia* enascuntur *Liliacea*, nervosa, per ambicam undosa, *Orchidis* modo dictæ foliis admodum respondentia, inter quæ *ovis* esterris pedalis, minoribus foliis tepus, cujus summum innumeris *filis*, ex porporeis rubentes, in spicam densam dispositi exornant. Horum singuli è pediculo subviridi, terosâ, contortâq; foliolum sub sede acuminatum habent, pendunt; & ex galea è porporeo rubente, foliis tribus acuminatis, nervosis, majoribus, quibus interjecta bina minora, constant, in qua ponè calcar cernitur, infra verò foliolum sive labellum oblongum, galeæ instar coloratum, punctulis purpureis inspersum, quod brachia, cruribus, caudâ, & in superiore insuper parte per exuberationem subviridem, carnolam, tanquam capite monstruoso ita instructum, ut *Cercopitheci* effigiem veluti umbra repræsentet. Floribus exaractis pediculi eorum tandem immolentes, in *foliis* maturitate secundum longitudinem nimis Helleborines in modum dehiscerent, & semine exiguo Scobis instar se exonerantes, excreverunt.

Differt ab *Anthropophoræ* alterius Col. flore quâ corpus angustiore, cruribus lanioribus & nimis expansis, ac caudâ etiam longiore.

Aliam hujus speciem observavit Autor in horto Bevermigliano, Floris libello brevioræ, brachis brevioribus, brevioribus etiam, angustioribus atque expansis magis cruribus, cætera similem.

Orchis striatomatica minor J. B. Lob. *militaris minor* C. B. Park.

Cum hæc species *Orchidis* galeæ & alii cinereis perfimilis sit, proximum ei locum dabimus. Differt ab *Orchide* dictâ, quod alæ interioris purpureæ lineolis sunt striatæ, quodq; labellum latius sit, superioribus laciniis brevioribus, inferioribus autem non brevioribus distaxat sed multis etiam numeris latioribus. Adde quod seris floreat, circa finem videlicet Maii.

In monte Saleva observavimus.

L. 101.

* 31. *Orchis Apis* referens *Lusitanica* Breynii.

Breyn.

Ex bulbo geminato *Serapiadis* secundæ *Did.* sapore subdulci & viscoso, *Fila* quædam angusta, striatæque, Testiculi vulpius secundæ *Sphegosis* à *Labelio* descripti foliis simillima emittit, atque caulem sesquipalmarem longiorisve, hinc vel ternis minoribus foliis circumjectum: cujus summo flori tres, quatuor, quinqueve insunt, calcaribus *Orchidum* plerarum, *Serapiadis* de more omnino destituti, galeam habentes è foliis tribus grandioribus & duobus angustioribus brevioribusque, albicantibus vel carnis, imo & purpurascensibus constructam sub qua exuberatio quædam crassa, carnosa, subviridis, formâ ex ovo prorepentis avicular, oculis eminentibus & rostro crasso admodum, curiose adeo & lepidè se ostendit, ut illa contemplatione non modo digna, sed sola etiam ad prætium & admirationem huic flori conciliandam sufficere videatur, nisi gloria ejus maxima in dependente veluti holoserico lenitor & breviter villosa, ferruginea (aut ex cinereo ferrugineo obsolete) ac ventrioso consistat hinc, quod *Apis*, mellificantis cadaverulum magnitudine & figura tum exactè, cinque repræsentat versutè, ut propter bestiolæ dulcissimæ speculami illos attingere veretur.

A. 31. *Orchis mydalis galea & alia herbida* J. B. *musca corpus referens minor, vel galea & alia herbida* C. B. *mydalis* Ger. *mydalis minor* Park. *The common Fly-Orchis.*

J. B.

Fila tria, quatuor, aut quinque obinet, unicum lata, interdum angustiora, longitudine circiter palmari: *Caule* tenuis palmari, sesquipalmari & major, flores sustinet ex pediculo surrecto, ventrioso, cui oppositum folium ad ipsius florem cacumen usq; pertingens, raris, nullo calcar, galea & alii colore herbaceo, reliqua parte muscæ corpusculum affabre exprimente, prorsum parte albida, ois ferruginea, lupinâ verò colore subginoso, zonâ subaxillâ septum cingente: in rictu geminis corniculis stipatis *apertis* lateri occultantur.

In Angliâ invenitur sed sparsim & raris. Nos in Cantabrigienti agro, Suffolcæ & Essexiæ observavimus, v. g. in aggerè fultæ illius famosæ vernaculæ, *The Devils duns* dictæ, in præstulo quodam

L. 101.

dum palati illi seu maritico *Trevorham-moor* dicto adiacente, &c. Monhelgardi, auctore J. Bushino, abundat, florem Maio.

33. *Orchis myodes flore grandifolia* J. B. *maifam referens major* C. B. *myodes altera* C. Gemma, *folia laxiore & flore grandifolia* Led. *myodes major* Park.

Leon.

An & quid differat à precedentielidemia. D. Magnol in pratis inter positam Castri novi & locum Grammontium sita, & in aliis plurimis herbilibus locis oriri & Maio florem scribit, in *Itin. Monpel.*

34. *Orchis maifam majorem cerealeam representans* Breyne.

Radix, caulis & folia à priore Apem referente nihil aut parum differunt. *Flos* vero discrepat multum: namque, quæ galea foliis liberioribus, angustioribus consistit; exuberatio quæ galeæ lobis carnosa non adeo distinctè aviculam exprimit, & labium herbatum, sativè curvatum, pedicelli splendens, pilis circum margines fimbriatum subtulis Maifam majorem tota accuratè representatæ cerealeam, ut non tantum in admirationem summam rapi spectatæ; sed faciliè etiam decipi queat, quò potitum hanc fœdulam maifam à planta abigere allaboret.

35. *Orchis myodes lutea* J. B. *maifam referens lutea* C. B. *myodes lutea* Nomenclatoris Led. Park *myodes lutea* Gcr.

Hujus color, inquit Lobelius, luteus totus, nec alia notas addit. In æstivis & aridis floribus, declivibus inter Cistum naarem & Illicem cociferam prope specum quæ vocantur Frontiniana Montipellum ad levam est, etiamque in herbida arida Gramontæ sive vicinis observavit Lobelius. Variis in loco circa Salenavam, *les Terras* & positam Castri novi invenit D. Magnol.

Utinam hanc accuratius nobis descriptam & depictam exhiberent.

36. *Orchis myodes lutea Lusitanica* Breyne.

Breyne.

Flores hujus præcedentis floribus non male respondent, excepto quòd aurum labellum Focum majorem luteam representantem, luteis, brevioribus atque obtusioribus quam illis luteis prædictum, intensiorè, aureo colore tinctum, ac macula in medio holoserica, villosa, magis, magisque purpurea, & spectabilior est donatum: exuberatio galeæ ex flavo viridi subnata aviculam longè crassiorum ac Testiculi apud Lobelium vulpini majoris refert.

37. *Orchis myodes fusca Lusitanica* Breyne.

Breyne.

Thyrsus hanc emittit aliquanto albiorum, colore idem viridens, *folia* nonnunquam latioribus interceptum; *capa* summo flore insunt nonnihil liberioribus, cæterum ab *Orchide myode lutea* florem figurè parè nihil aut parum recedentes, præter foliolum holosericum demissum, quod palli seu fuliginosi coloris, Scarabeum melita quam Focum exprimere videtur.

In Phytologia Botanica duas adhuc invenio *Orchidis myodes* species, Altera

- A. *Orchis myodes elegans purpurea* denominatur, & in silva *Redworth* à D. Stenchoofa inventa fuisse datur.

Altera

- A. *Orchis myodes flore cæcæ elegans* inscribitur & in silva *Swatwicorde* sponte oriri traditur.

Neutra nobis hætenus in conspectum venit: posterior tamen hæc amico cuidam nostro ostensa est.

- A. 38. *Orchis fusca galea & alia purpurea* J. B. *phlegmas flore fusca* referens Park. *Orchis flore Testiculi vulpini* s. *phlegmas* Gcr. Or. *fusca referens major*, *foliola superioribus candida & purpurea* C. B. *The common Humble Bee Satyrion*, *The Bee flower*, i. e. *Orchis militaris* *vestitior* vulgo dicta.

7. R.

Foliorum hujus, quæ Plantaginis angustifoliae foliis respondent, alià restantur, alià canela ambientia ferruguntur. In caulis palmari & dohrantali flore rari, calcari exports, galea & alia purpurea, linea viridens à summo ad anam decurrens: quod labelli loco est amplam exhibet & pingue folium, fucum pulchre exprimens, colore fuliginoso, & ad obliquum lucis hilariori vel nulliori, eleganti lareolarum linearum discurso varianum, sic ut arcole tres arcules, medio ferrugineo decorant: rectis concavo, viridi, lupæ quem in rostro latet apicis lutei; una labelli ora humida, concava, fursum reflexa: averla parte albet, in ambitu ad ferrugineum declinata; petiolulis incurvis, ventrosus, cui appositum folium surrectum, bisquincunz circiter longum, angulum. Radix libellæ gemma, sine magna, dulcis, lactulenta.

In paludibus fenestris frequenter reperitur. Junio mense floret.

Leon.

- A. 39. *Orchis seu Testiculus sphaerodes hirsuta flore J. B. Orchis suavis referens colore rubiginosa*
C. B. *Orchis sphaerodes altera Park. Testiculus vulpinus major sphaerodes Ger? Dumble-*
See Sarprion with green wings.

J. B.

Galeam aliam, expandit virentes, trichotia, & obsoletiore filiginoso colore sicum potius quam apert praebet: folium infimum hirsutum, quod pro labello est, in quo non luttarum linearum, ut in illa, discursu nullus conspicitur, sed solummodo hirsute duae reliquo folio leviores deprofloratae, transversa lineola conjunctae. Hae masculam Romanorum efformant; alia vero duobus locis coeuntes infusam ovali figura hirsutam circumscribunt.

In Anglia sed raris invenitur, solo sicco, in locis ubi sabulum seu glarea effusa fuerit, ut v. g. *Linn.*
In sabuleto quodam prope *Selford* vicum non longe à Cantabrigia. Floret ante praecedentem, integro menie.

Hanc esse suspicor quam Orchis Arachnitem Herbari nostrates vocitare solent.

40. *Orchis alba calcari oblonga J. B. cujus descriptionem omnium numeris absolutam mutata summi.*
Or. Serapias bifolia vel trifolia minor Park. alba bifolia minor calcare oblonga C. B. hermaphrodita Ger. Duttisch Sarprion.

J. B.

Hermaphroditicam Orchidem hanc haud temerè dicis, ut quae Cynolochis inter & Serapiades dictas medium quoddam obtineat, quod qualem ad formam radicum attingit. Radix enim duplici constat bulbo sublongo, pyramidi, productione demissis fibris, quae in capite alias plures aquae crassas quatuorversum exoritur: A qua in uno statim folia insignia prodeunt duo vel tria [varia tria] lata, plantagina [vel liliacea] nuda tamen nervis insignita superiora parte, laevia, pallidius viridina: Reliqua vero octuplo vel decuplo minora angustiora, caulem nullo ordine decorant pedalem interdum aut altiore, angulatum, striatum: Capis summa flores spicati occupant, odoratissimi, albi, [varia dispositi] Papilionem expansis alis amulantes; quorum foliorum supremum leviter erectum obtuso mucrone sub se bina in lumen, inclinatione quadam coeuntes, colore ex luteo herbaceo praedita comprehendit: lateralia duo alterum instar expanduntur; propendet autem longum folium, angustum reliquis, album, una parte ex luteo herbaceum. Stylus obtusus galea occultans, ut in aliis Orchidibus, medium florem occupat. Aversa floris parte prominet calcar longissimum, prope floris basin album, caetera ex luteo viride: Unicusque autem pediculo introto herbaceo, appositum est folium acuminatum. Sapor foliorum amarus; Radicum aquae insipida.

In dumetis, non raro & in pascuis occurrit. Menie Juno apud nos floret.

Linn. C.
Tempe.

Orchidem Serapiada trifoliam majorem C. B.

Ipsa non dissentiente Orchidi praecedenti eandem statuiamus.

- Orchis Hermaphrodita bifolia J. B. Hermaphrodita secunda C. Gemmz, seu Orchis ptychodes diplysa Lob. Ob. Orchis bifolia altera C. B.*

Lob.

Oblonga eructans, solo gaudens palustri, capis suos erumpit mane Julio, omnino candida, tener, qualis Oreadum; quantum & in quibus differat à praecedente perquirendum proponit J. Bauhino. Nos antea ad Orchidem 1. amplissimis foliis Clasi dubitanter eam retulimus. Certe C. Bauhino eam perperam confudit cum Orchide luteola altera Claf. et superioris monimus. Ego jam cum J. Bauhino à praecedenti non differre suspicor.

Orchis ptychodes Ger. sphaerodes sive Testiculus vulpinus 1. Park. dicitur.

41. *Orchis montana Italica, flore ferruginea, lingua oblonga C. B. Orchis seu Testiculus maximo flore J. B.*

C. B.

Testiculos habet parvos, rugulos. Caulis cavus, nonnunquam pede alio, quem filia angusta, paucisque, unctis tres vel quatuor longa basi sua vestiunt; at cuilibet flori solum breve quidem, sed latius & in apicem detinens, subspicitur. Flores quatuor, sum, alternatim in caulis summo dispositi, colore ferruginea, obliqui tubuli totius, quocum lingua propendens oblonga est, & ex basi liliore in apicem abit, cui tegumentum pallidioris coloris, vesicae instar, impositum, etiam in apicem & communiter bifidum fuit. Floribus tubiculi squamis pulverulentis repleti, ut in ceteris, succedunt.

In pascuis, varia Italiae in locis observavimus.

Linn.

42. *Orchis macrantha Col. montana Italica lingua oblonga altera C. B. Orchis macrophylla Col. linaea Park.*

Col.

Hujus radix unico bulbulo seu testiculo nobis inventa est, (nec melius an unico vel gemino bulbulo consistet observare licuit) colore fulvescente, partem rugulos, supra quem hinc eodem colore, atq. etiam per cervicem altera dependens, quod in aliis non observatur, (& forsitan ibi bulbos novellas concipitur) Filia in uno duo, sed nec paria; plura per caulem disposita, coarctum longiora sesquipedalem ferè longitudinem assequantur; reliqua minora pedalis, ac demum decretescunt, verum latiora. Caulis longus admodum, tripedalis ab radice, in cujus summo flori instar obliqui veluti tubuli, longam atque laxam barbata habentia, suave rubentes; at circa tegumentum

tum veluti folliculum magis purpurascens, per caulem in longam spicam pedalem disponuntur: quibus utriculi magis succedunt, alii similes, *semine* supervacuo pulverulento repleta.

43. *Orchis Ornithoglossa filia maculosa* Lob. ico. Ger. Park. *Orchis papilionem referens filia maculosa* C. B.

Hujus, teste Lobelio, differentie accidentales plurimae sunt. *Floribus*; purpureis, purpurascens, albis: *Folia*; pergrandibus, parva, ovalis figurae, ex lato in acutum desinentibus, ex acuto in amplum & rotundum.

Tabernemontano folia lata sunt cum nervis apparentibus, minus macula aspersa: flores ari volanti similes purpurei. Suspicioe enim ex icone descriptisse.

44. *Orchis Ornithoglossa flora colore herbaceo* J. B. *Or. papilionem expansion herbaceo colore referens* C. B. *Ornithoglossa* Ger. *psyllodes herbaceo colore* Park.

In hujus descriptione nihil invenio quo ab aliis omnibus Orchidum speciebus certo queat distingui, quod non ex titulo & icone ita potest colligi. Si tamen detur aliqua *Orchis* eadem multis foliis et velut appressis cincto, *floribus* herbaceo, papilionem alio expansis referens, distincta omnino species est, nobis tamen incognita.

45. *Orchis Ornithoglossa candida* J. B. Lob. Ger. *Orchis papilionem referens angustifolia alba* C. B.

De hac praeter iconem & titulum nihil invenio.

46. *Cynorchis Delphinia maculosa filia, flore purpureo-violaceo* J. B. *Orchis minor filia sessilibus maculata* C. B.

Sessilibus est & maculosis obtusioribus, *filia*; *floribus* purpureo-violaceo; *caule* sesquicubitali, maculato elevati gemmo bulbis.

47. *Orchis minor minor filia maculata* C. B. *Cynorchis minima secundum caulem [pedalem & cubitalem] maculosa filia, floribus purpureis* J. B. Lob. ico.

Plura non invenimus.

48. *Orchis minor angustifolia in suprema parte longa filia* J. B. *Orchis Serapias 17. sive angustifolia* C. B. Ger. *emac. mydalis angustifolia* Park.

Hac non satis valde tribuente Tabernemontano auctoritate meae, qui, ut ait J. B. more solito nullam exhibet descriptionem. Si icon ad plantam facta, notabile est Orchidis genus, in eo distans a ceteris, quod folia superiora juxta flores sunt longa, cum alia sint brevia.

49. *Orchis melitica* J. B. *melitica sive Apu calatveralem exprimens* Lob. *facum referens, flore subviride* C. B. *Serapias secundum minor* Dod. *melitica sive apifera* Park. *melitica* Ger.

Hujus descriptionem videsis apud Dodonum. Nobis ab Orchidibus fucifloris superioris descriptis non diversa videtur.

Orchis Araneum referens C. B. *Arachnitis* Park. *Arachnitis* Lob. ico. Ger. *Spider-Orchis*.

In Ephemer. German. Ann. 2. Observ. 41. Orchidis Serapiadis seu Arachnitis iconem invenio, nulla addita descriptione, nisi quod eam flores Araneum purpureo colore affidee exprimebant, quod in sybro apud Patres Camaldulenses prope Wacsoviam Poloniae eam invenit Martinus Bernhartus à Bernia; qui iconem Dodonaei secundam Orchidis Serapiadis Fucum referens ab Arachnitis sua parum declinare, uno eandem se credere scribit. C. Bauhinus tamen ad Orchidem Meliticam eam iconem refert, ut superioris vidimus. Cum ergo Dodonaeus ad fucifloram eam retulerit, C. B. ad Meliticam, Auctor hic noster, ut & nostras Botanici ad Arachnitem: nobis eadem verisimile videtur, unam & eandem Orchidis speciem esse Meliticam, Fucifloram, Arachnitem dicitur.

50. *Orchis trifolia minor* C. B. Ger. *emac. Orchides, calices minores triphylla* J. B. Lob. ico. *Orchis minor calicem exprimens* Park.

Vide descriptionem in hujus Belgicae Lobelii.

51. *Orchis Hermaphroditica* C. B. *hermaphroditica* J. B. Lob. Park. *Serapias hermaphroditica* Ger.

Ramula à Boen figura dicitur. Ea eorum genere est quae sexus ambigua sunt, ut & Hermaphroditicae testiculum non male appelles. Sunt enim media inter Serapiadas & Cynolochis, maxime quoad formam radicem. Lob.

51. *Orchis castrata* C. B. Park. *Scrapia castrata* Gec. *Satyrium castratum* seu *Emulium Bernardi à Bernitz.* *Orchidis* generis, quibusdam *Satyrium castratum* J. B.

Martinus Bernhardus à Bernitz sic eam breviter describit. Planta est elegans, coloris purpura-Ephem. Generis scentis, aliquando violacei, & punctulis ornata. In nostris partibus in pratis mensis Junii conspicitur. Bulbum habet divinum in duas, aliquando in tres partes. Unde verisimile est aliud aliud genus J. B. canle palmari & pedali, cum quatuor radicibus crassis, uncialibus & sesquuncialibus, &c. ab hoc non diversum esse.

§. 2. De Orchide palmata, quæ geminum habet bulbam, velut in digitos divisum.

- A. 1. *Orchis palmata non maculata* J. B. *palmata major* mas, seu *Palma Christi* mas Park. *Palma Christi* mas Gec. *palmata pratensis latifolia longis calcaribus* C. B. *The male handed Orchis*, or *male Satyrion* flopal.

Radix gemino bulbo, in quatuor fere digitos diviso constat, sapore saturo. *Caulis* dorsalis aut pedalis, ab imo ad apicem fere foliis vestitus oblongis sesquunciam lato, mucronibus acuta, nullis maculis notatis, pallidius virentibus. *Flores* in spicas nec admodum densas, nec valde productas congesti, purpurascens, alas utrinque erigunt purpureas; folium quoque supremum erigitur, quæ autem ei subsunt coccinea galeam simulatur: labelum lamina, tripartitum, latus & punctis purpureis saturatoribus striatum seu guttatum: calcar retro extenditur semunciale. Ad singulos florum pediculus apponitur folium latum & oblongum, purpurascens. Sapor foliorum amarus. Pediculus floris intortus, ut in hujus generis omnibus, in vasculum seminale turgescit & retorquetur, longitudine semunciale.

In pratis humidis, & locis palustribus putridis, & ad aquarum rivos oritur. Mensis Maio floret. *Locus.* Variat floris colore purpureo saturatores & alutiores, carneo, & interdum albo. Variat etiam magnitudine & spica longitudine insigniter.

Hæc est proculdubio quam * observavit Clusius in pratis urbi Londinensi proximis: quin & * H. B. p. 2. Orchidis V. descriptio huic egregie convenit, nisi quod bulbos seu testiculos rotundos, non palmatos ipsi appingat: quid intelligat per illam aliam grandiore paulo florum purp. spica, terrorem odoris, quam in istis pratis eruit, nos nescimus. *cap. 1. p. 258.*

- A. 2. *Orchis palmata speciosiore thyrse, folio maculato* J. B. *palmata pratensis maculata* C. B. *palmata mas* seu *Palma Christi* mas Park. *Palma Christi* mas Gec. *The female handed Orchis*, or *female Satyrion* flopal.

J. B.

Caulis pedalem & interdum cubitalem aut alioquem erigit, viridem aut subpurpuream; in cujus fastigio spicam dispositi flores rubentes vel dilute purpurei, calcari triunciam pollicis circiter longo, cruris duabus erectis, galea è duobus foliis quibus tertium opprellum incumbit composita, labello in tres lacinias diviso, purpure saturatores lincolis & punctis guttato, pediculo purpurascens aut viridi, cui semper appositum acuminatum folium viride aut purpurascens. Hujus flores observantur & intensius purpurei & penitus quoque albi. Folia plura, & à radice orta eadem ambicaria, & è caule ipso nata, infera sublonga, lato lato, superna angustiora & breviora, alterno situ posita, crebris maculis nigris notata. *Radix* ex gemino bulbo lato, utroque in digitos fere quatuor abeunte, composita, ad quorum conjunctionem propagantur fibræ. Sapor radicis aqueus viscidus cum nonnulla amaritudine: folia multo amariora. Descriptio est J. Bauhini.

Spica florum in hac planta plerumque densa est floribus confertis, interdum rarior. Statura & spica longitudine insigniter variat: nam in sylvis & pratis pinguibus maximo & vel palmum longo thyrsis prodit, in palcos floridioribus (nam utrobique oritur) spica est dimidio minore & brevior.

Mensis Junio plerumque floret.

Tempus.

Palmata maculata J. B.

In paucis à precedenti differt, altitudine minore, foliis evidentius maculosis, foliis acuminatis ad floris appositis saturatis purpureis. Hæc autem differentia non tanti sunt ut speciem diversam existimem.

Palmata alba J. B. *Scrapia candida flore montana, maculata foliis* Lob.

Hanc quoque solo floris colore à precedenti (quam flore albo interdum variato observavimus) differre cum J. Bauhino suspicamus, adeoque nec eam tanquam speciem distincte rationem habebimus.

Hanc C. Bauhinus Orchidem palmatam vicissimam facit, titulo *Orchidis palmate montane maculate*.

& novis ex fusco purpurascens. Subest labellum longiusculum retroctum flexum, coloris ex fusco purpureo & interdum laevo- viridis (nam sepe variat) in tres lacinas divident, quarum media longe brevissima. Univerſa floris facies Bitoli ſimilis, niſi quod flores Bitoli vaticuli illiſque calcarium loco ſunt omnino carent, & in ſis labium propendens in duas tantum barbulaſ dividitur.

Floret circa finem Mai & Junii initio, in paſcuſ ſiccioribus.

Linn.

Deſcriptio C. B. in plerisque huic noſtræ convenit: differt, quod floſculos in ſpica paucos habere dicit, labro in duas duntaxat barbulaſ diviſo.

Orchum batrachiten ab Herbariis noſtratiſ dicit ſolitam intelligo, unde & Lobelianæ Serapiadi batrachini eandem exiſtimo.

8. *Orchis palmata minor odoratiſſima purpurea ſive nigra* J. B. *palmata anguſtifolia Alpina* Park. *palm. anguſtif. Alp. nigra flore* C. B.

Folia conſtat Croci: caule dodrantali, ſarceo levique: in cuius cacumine ſis emicat purpurea, Amaranthi amulus, qui roreſ odorem quam ſuaſſimum reddit.

In paſcuſ montanſ Jurae & Saleva montium propè Genevam copioſam obſervavimus.

Linn.

9. *Orchis palmata prænſis anguſtifolia major* C. B. prod. Park.

C. B.

Radices habet parvas, veluti palmaſ geminaſ, in binos digitos diſtributaſ, fibrſ paucis annexiſ: folia liſacea, anguſta, levia & palmata, per quæ veluti tubum cauliſ cubitaliſ cavus eſſetur, cui ſpica ſerè palmariſ, anguſta, ex floribus dilutè purpureis, brevi calcare donatiſ composita, quibus ſinguliſ ſoliola oblonga, acuminata ſubiſcuntur, & capitulum oblongum, ſemeraſ aliarum imitar continens ſuccedit.

Hec in pratſ udiſ Michelfeldeniſ ſiſ aſtate reperitur.

Linn.

10. *Orchis palmata anguſtifolia minor odoratiſſima* C. B. Park.

C. B. prod.

Radice eſt geminiſ, oblonga, anguſta, palmæ ſimiliſ, in tres, quatuorve fibraſ craſſiſſimaſ diviſa, ſupra quæ ex imo caule fibraſ aliquot ortè expanduntur. Ex radice folia quinque aut ſex, oblonga, graminea prodeunt; inter quæ cauliſ unicaſ, palmariſ, pauciſſimaſ & exiguaſ ſolioliſ donataſ, quæ veluti in ſpicam biuncialom abeunt, cuiſ flores dilutè purpurei, odoratiſſimi inſident, qui galeæ tecti, labro prominulo, in quatuor barbulaſ diviſi ſunt, & parvo calcari à tergo prominente donati.

In pratſ humidſ Michelfelde provenit & Autumnſ floret.

11. *Orchis palmata caryophyllata* J. B. C. B. Park. *Serapias caryophyllata* Lob. G2.

Vide Lob. Hiſt. Belg.

- A. 12. *Orchis puſilla alba odorata, radice palmata. White handed muſk Orchis.*

Ad latus montiſ *Snowdon* dicti in Wallia, ſecus viam quæ à *Llanberriſ* ad Carnarviam oppidum ducit, hanc obſervavimus; non tamen, (quod dolet) deſcripſimus.

§. 3. *Orchides quædam palmata vel breviter & obſcurè deſcriptæ, vel quarum nudiſ duntaxat tituli aut icones traduntur abſque deſcriptionibus: ut nobiſ incertum ſit an à ſuperiſ propoſitiſ & deſcriptiſ ſpecieſ differant necne.*

1. *Orchis palmata paluſtriſ latifolia* C. B. Park. *palmata ſive Serapias paluſtriſ latifolia flore albo ſubpurpureſcente* C. B.

Lobelius præter notaſ in titulo poſitaſ non aliaſ habet, quàm quòd ſit folio leviſ latèſque, violacèſ præcocior. Ego equidem hanc non diſſere ſuſpicio à vulgari Orchide palmata non maculata, quæ non alibi apud noſ quàm in pratſ humidſ & lociſ paluſtribus oritur.

2. *Orchis palmata paluſtriſ altera* C. B. *palmata Serapias paluſtriſ leptophylla, violacea maculata & non maculata* J. B.

Linn.

Seriſ floret, comâ violacèſ, foliſ interdum levibuſ, interdum maculoſiſ.

3. *Orchis palmata paluſtriſ tertiſ* C. B. *palmata anguſto folio viſiſſima paluſtriſ* J. B. *Cynoforebiſ paluſtriſ leviſ folio, ſeu leptophylla omnium viſiſſima* C. Gemmae Lob.

Icon Lobeli, obſervante J. Bauhino, non demonſtrat folia anguſta.

4. *Orchis palmata palustris sive rubra* C. B. *palmata floribus impensis rubris* J. B. *Cynifer. Dracontias foliis & floribus impensis rubris* C. Gemmae Lob.

Tempus.

Floret circa finem Aprilis & initio Maii. Nascitur in humidis & uliginosis pratis, praesertim ubi rugior terra est. Lob.

Hanc etiam à vulgari *Palmata non maculata* specie non differre conijco.

5. *Orchis palmata palustris maculata* C. B. *palmata palustris neptelodes* J. B. *Cynifer. palustris leplodes vel neptelodes* C. Gemmae Lob.

Flos illi communis ferè cum ceteris maculosis. Orchidi *palmatae* feminae in palustribus nascenti eandem suspicamus.

6. *Orchis palmata Serapias montana folio laevi* J. B. *palmata montana altera* C. B. *palmata montana Lobelia* Park. *Serapias montana* Ger.

7. *Orchis palmata pratensis maxima* C. B. *palmata, sive Cyniferibus macrocaulis galericulata* C. Gemmae J. B. *Cyniferibus macrocaulis, vel conspica, vel galericulata* C. Gemmae Lob. *Orchis palm. prat. maxima, Conspecta dicta* Park. *Palma Christi maxima* Ger.

Tempus.

Floret circa medium finemque mensis Maii usque ad Junii ferè medium.

Flores in hujus aetate, observante J. Bauhino, multum habent similitudinis cum *Orchide palmata rubella* cum longis calcaribus.

C A P. XXI.

De Pseudo-Orchide.

Folii & floribus cum *Orchide* convenit, radice non tuberosa sed repente aut fibrata ab eadem differt.

1. *Pseudo-Orchis* C. B. *Orchis radice repente* J. B. *minor radice repente* Cam. Park. *Palma Christi radice repente* Ger.

Hanc sic describit Camer. in hort. *Orchis minor tholculis alba, foliis crassis nigris; radice repente geniculata; & ubi folia emergunt apparent pusilla rudimenta, tanquam naturæ testiculos ostingere constant.*

Nascitur sponte in opacis sylvis in ramis arborum quae longa vetustate emarcuerunt. Ad hortos tranllatus durat, sed colorem acquirit magis pallidum, nec tam crassa manent folia.

2. *Pseudo-Orchis rad. repente, foliis maculis nigris aspersis* Meuzel.

Folia *Cyclamini* aut *Fritillariae* instar eleganter sunt maculata.

Locus.

Hæc raro in nemoribus temperatis circa *Furstenwaldiam*, *Berolinum* & alibi in *Marchia Brand.* crevit.

- A. 3. *Pseudo-Orchis bifolia palustris. Orchis bifolia minor sabaletorum Zelandia & Batavia* J. B. Lob. Ad. in append. p. 506. *Chamaorchis bifolia* C. B. *latifolia Zelandia* Park. *Dwarf-Orchis of Zealand and Holland.*

Radices habet bulbosam, è squamis compactam, item si dissagetur viridem, & *Orchidum* plantae dissimilem; nam fibrae è bulbo prodeunt infra, non supra & juxta bulbam è caule, & præterea rependo se propagat, fibra in novos immutantes bulbos. Folia præsertim bina, pallide viridia, inter quae caulis palmam & major exergit, angulosis, in summitate strobilos tres vel quatuor & interdum plures sustinens, dilute virides seu herbaceos, sex petalis compositos, cum stylis in medio viridi, albi maculi in apice notato, & paululum incurvo, ac si cuculli vicem suppleret. E petalis quod dependet labelli loco ceteris multo latus est, ceteris quinque tria ejusdem ferè sunt longitudinalis, duo longè angustiora alarum loco sunt. Vascula seminaria in Labelli regione optime pinguntur.

Locus.

In aquis palustribus propè *Hatum* & *Terevsum* vicos, non procul *Cantabrigia*.

Pseudo-Orchis palustris Clus. hæc perfoliata est, eandem dicentem nisi distaret monophylli epithetou. Fortè tamq̃ Clusius non integræ valis.

CAP. XXII.

De Orobanchis.

Orobanche dicta est *ἡ ἐν ἔργῳ τῆς γῆς*, quia Vicias strangulat.
 Florum figura ad Orchidem accedit, foliorum, vasis & herbaceorum carentia differt tum ab Orchide tum ab aliis plantis. Est autem vel radice simplici non repente squamulosa, *Orobanchis* simpliciter dicta; vel radice denticulata repente, *Dentaria*; vel radice multis fibris crassiusculis implexis composita, *Nidus avis*.

A. 1. *Orobanchis sive Rapum geniste* Ger. Park. *Orob. flore major* J. B. *major*, *gergypheum* deni C. B. *Syoom-flap*.

J. B.

Cubitali altitudine exurgit & major, *caulis* recto, tereti, hirsuto, pallido aut limbo, aut subnigro, concavo: in quo non tam *folia*, quam foliorum rudimenta, angusta, longiuscula, seu ligule calerime marcescentes, raris, quorum etiam singula singulis floribus sunt subjecta. *Flores* in thyrisio Orchidum more, sed ex longioribus intervallis, Melite *Forsk.* magni, impene hirsuti, colore ex porpureo obsolete pallido, rictum effigiantes, è quo prominent *apices* nigricantes flammam albidorum: labrum autem quod demittant in tres lacinas est divisum, ipsaque *flores* sancto mellico succo viscido madet. *Radix* bulbosa, & *limbata* compacta, non admodum alte demergitur: *sapor* quo admodum amarus. *Flores* odorem spirant haud ita ingrati.

Geniste radicibus frequenter adhaerens unde & Rapum geniste vulgo dicitur: invenimus & *Locis* inter segetes.

Herba condita aut eius syrupus ad splenicos & hypocondriacos affectus usus est calmi; unguentum ex eodem cum Axungi ad tumores duros & scirrhos. *D. Boerh.*

Orobanchis flore minore J. B. adeo parum differt a praecedente, ut speciem diversam esse mihi persuadere vix possum.

2. *Orobanchis magna, purpurea Monspeliensis* J. B. *major Monspeliensis* Park. *major Monspeliensis* floribus oblongis C. B. Ger. *emac.*

Hujus digitalis crassitudinis, altitudinis autem bicubitalis *caulis* adulescens, totus purpurascens, cu serie quadam sursum verum apprimuntur *folia* lata breviter, amplexicaulis. *Scapum* obdient *flores* porpurei, Orchideis floribus similes, calcaribus brevibus, singuli foliolo intecto. *Radix* superiorem refert partem radicem Orchidis, nullis tuberculis tamen aut bulbis ornata. *Sapor* amarus, teterimus.

Propè Montpellier in syva Gramont mense Aprili florentem observavit J. Bauhinus.

Locis.

Clusius hujus meminit sub titulo Pseudolimodori Monspeliensi.

Hanc loco praedicto se sepius collegisse scribit D. Magnol Aprili & Maio mensibus: verum figuram eius quae habentur apud Clusium & J. Bauhinum non probat: nam in figura *Clus.* labrum inferius bifurcatur, quod (inquit) in nostra non fit: in figura J. B. nulla est proportio caulis cum floribus.

3. *Orobanchis majoris flore* C. B. Ger. *emac.* *Orobanchis subcaerulea flore sive* 3. *Clus.*

Cardui vulgaris, inter segetes nascentis radicibus inhaerentem olim errore meminit Clusius cum Montepeli viveret.

D. Magnol in hortiis maximis sepius collegit.

Locis.

4. *Orobanchis flore majori & caerulea purpurascens* C. B. *flore majori purpurascens* Park. C. B. *prod.*

Radix est crassa, longa, fibrosa: *caulis* sempervirens, *foliis* paucis, brevissimis, crassis & acutis cincto, qui in quinque, sex, etiam plures pediculos, nudos, trinucleos absumunt, quorum etiam ex foliorum alis pediculi prodeant, quorum limbo *radix* uncialis, sinuata infidet, & ex quolibet *folio* onico, ovulato-purpureo, longo pediculo donatus exit, qui magnus, uncias duas longus, formi galericulatus, & velut rostratus, ut in Alektorologio, ex quo filamentum oblongum rubrum prodeit: quod *flores* succedat non consistat.

In Pyrenaeis montibus collegit Buserus.

Locis.

5. *Orobanchis ramosa* Ger. Park. C. B. *minor purpurea floribus, sive ramosa* J. B.

J. B.

Ramosa est *caulis*: sepe etiam plures, dactylotales aut breviores emittit *caulis*, trunks tenuiores quam Orobanchis vulgaris, ruginosaeque, densa, rufescentes, hirsutae, in ramos libido divisos, foliorum dumtaxat vestigiis quibusdam ornatos. *Flores* speciosi, minores, porpurei, oblongi, hiantes, è multo solo calice emergunt, cui singula singulorum appositum foliolum acutum. Sequuntur *capitula* turgeta, pediculo plena. *Radix* tuberosa Avellanae maggotidina, fibrarum propagandis donata. *Sapor* plantae aliquantulum amarus.

In arva demissa segete primo circa Ratisponam Germaniae urbem observavimus, postea etiam in Italia & Gallia Narbonensi.

6. *Orobanchæ parvæ radicis coraline ruberrimæ* Montzel.

Coralis rubra & colore & specie exente magna natura miraculis in hujus plantule indice confirmata ad vivum exemplar conspicitur.

Locus. In scopulo Mittenwaldensi reperta est.

7. *Orobanchæ hypocyti latæ* Montzel.

Locus.

In Posastretis sub altissimis Marchæ Brandtædi nascitur. Cum mensibus Maio & Junio erumpit corpusculum luteum in se contortum, tanquam esset fungulus orbiculati luteæ, ostendit. Ac deinceps ultra sphæram longè exurgit. Radix lævis ultra longitudinem ulnæ in terram demissa radici arboris inhaeret. Planta cum marcescit nigrum colorem acquirit, saporemque Ulmarie habet. Aliarum etiam plurimarum arborum radices in hanc observavit Auctor.

8. *Orobanchæ quæ Hypocyti dicitur* C. B. procl. *Hypocyti* Park.

C. B.

Vulgari similis est, sed humilior & nigricans, caule unciarum quatuor, quasi squamis contexto. Flores in summo velut in parvam spicam congesti, Nido avis similes, albidiores carnosos ac duriores. Sub picco, Abienibus & Pinastis provenit. Sapore est aliquidnikum adstringente.

9. *Orobanchæ quæ Hypocyti dicitur*, *Hypocyti* Ger. Park. J. B. C. B. & aliorum. *Stape of Cistug*.

Hypocistis è variorum Cisti generum radicibus excrefcit. Orobanchos seu Limodori quoddam genus videtur; crassum est, pingue, carnosum, luteo plenum, ex multa veluti Hyoscyami utriculo, ut Mali Panice cytini totum consistit. *Herbolarum à Stapel*. Mollis, describitur Parkinsono, exsurgit caulis erectis, foliis parvis crebris undique obtusis, vix palmæ altis, multis in summitate flores congestos gestantibus crassis & succulentis, albertis, Mali Panice cytini similes, reliquos post se semina in capsulis duris pulveris instar tenuissima.

Clusia sub Cisto mare primo hypocistidem natam refert elegantissimam omnium quas unquam viderit. Nam quando primum è terra emerge, purpureum sive Kermesinum sericum esse dicitur, deinde paulatim assurgens & sese explicans multum de pristina coloris elegantia remittit, & cytinos suos profert candicantes, turgidos & lento succo plenos.

Idem ad radices Cisti Halimi solo Hypocistida observavit omnino luteo seu ochreæ colore ipsius plantæ florem referentem.

Idem ad Lodi Narbonensis radicis adnatam inveniebat, multis veluti squamis, ut quod in aliorum Cisti generum radicibus crescit, compactum, pallidum coloris, quibusdam tamen lineis porphyralentibus & nonnihil viridibus distincti, cytinos suos summa parte profert, lento & glutinoso succo totam prægnans.

Quæ & aliarum etiam Cisti specierum radicibus adnata hypocistidem in calidis regionibus verissima est.

Flores.

Almodum efficax remedium est ad omnes fluxiones partu sanguinis rejections, profluvia mulieris, colicacos dyentericisque affectus. Quæ siquam partem roborare consilium sit, quæ viz. pluculo humore exoluta fuerit, robor & firmitatem illi non infremè addit. Sic sanè stomachicis cythematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto Antidoto inditur. *J. B. i Galeno*.

Hodie ad hunc usum præparatur modum, Cytinum contundunt recentem, ex eodem eliciunt succum, qui subito insolatur ac densatur servaturque ad usum. *Boer. à Stapel*.

CAP. XXIII.

De Nido avis.

A. 1. *Orobanchæ affinis nidæ avis* J. B. *Oculus abortiva ruffa sive Nidæ avis* Park. *Saturus abortiva sive Nidæ avis* Ger. *Oculus abortiva sive* C. B. *Wasshen Oyeis*, *or* *Nidæ avis*.

J. B.

Caulis surrigit modò singularem, modò duos vel tres, pedales aut cubitales, albicantes; folia velut concava, pellucida, striata, nequaquam acuta, sed obtusa, superna parte quoddammodò cordis formam exprimentibus: quorum summa florum thyrsum Orchidæi modo & formæ occupat coloris helvi aut pallidi, qualis & foliorum tabidorum; ac ocellus quidem è brevibus pediculis, ad quorum exitum solida parva, singula sese extarunt: ubi verò se aperunt, Orchidæi modo hiant. Galea exigua sub qua pistillum breve cum apiculis albicantibus, quod utrinque ad latè hinc foliola cingunt: *Labelum* magnum, una floris occupati, cavum intus; nullus odor notabilis. Debilioribus floribus *ovariis* pulvisculorum succedunt striati, angulati, retibus florum potalis marialis iniquis. Radix crassa fibræ, succulenta, fragilibus trita perplexa, indotum avium straturam imitantem, quorum extrema obtusa observavimus. Sapor radicis ac totius plantæ amarus heraculus.

Locus.

In Syria & opaca invenimus in Cantio prope *Mardam* oppidum, inque Suffolæ non longè ab Aldebergo. In transmarinis etiam in insulis & hinc opaci reperitur.

A. 2. *Orobanchæ*

A. 2. *Orobanchæ Verbasculi edera* D. Ploc.

D. Ploc.

Radix hujus plante obtusa est & squamofa, cui appenditur glomus aut velut fasciculus fibrarum complicatarum *Nido avia* dicti simulum. *Caulis* exortit tenerum, teretem, valde fragilem, vix octo digitos altum, foliis parvis, brevibus, squamofis, tenuibus & fere membranaceis, proximè adnotis seu appressis obtutum. Propè fastigium *caulis* flores exortunt parvi octo aut decem interdum, ab *Orobanchæ* vulgaris floribus longè diverfi, petalis sci. quatuor majusculis exterioribus, quæ totalem interius minora continent, compositi. Vasculum feminale fundo globoso, collo angustulo cum foecune in apice, ambiunt stamina tenuia purpureis apiculis insignita.

Tota planta caules, folia, flores cum florere incipit colore est pallidè luteo seu stramineo; & fracta seu compressa odorem exhalar *Prunellæ* radices æmulam.

Ad radices arborum in sylvis propè *Stakes* templum ortiva, in Comitatu Oxoniensi.

Lew.

A. 3. *Orobanchæ & Nido Avia affinis Pseudo-limodori Austriacum vulgatum* J. B. *Orchis abortiva violacea* C. B. *Nida avia purpurea* Park. *Nidas avia flore & caule purpureo-vulcano*, an *Pseudo-limodori Classi* Ger. emac. Purple Birds-nest.

Clus.

Pedali affurgit *caule*, frequentibus secundum radicem foliis tanquam vaginalis involuto, spicam gestans *florum* tetrapetalon, superiore petalo in corniculum desinentem, & promulcide quadam inter media folia prominente, cui adnate sunt duæ tenues barbule. Floebus striata & longa subsunt *capitula*, semine exili & *Orchidum* simili plena. Subrotundam radicem non habet, sed crassas longas & obliquas *fibras* quemadmodum *Hellebocine*. Tota stirps sicutè purpurea & planè violaceo colore prædita est.

In montanis supra *Badenses* thermas observavit *Clasius*. In *Southamptoniæ* comitatu propè *Lew.* *Alton* oppidum invenit *D. Goodier*.

CAP. XXIV.

De *Dentaria aphylla*.

A. 1. *Orobanchæ radice dentata major* C. B. *Dentaria major Matthioli* Ger. *Orch. radice dentata sive dentaria major Matthioli* Park. *Abiatum Cordi sive Aphylla* J. B. *The greater Tooth wort*.

J. B.

EX radice multiplici, mira squamarum denticularum congeneri stipata, alba, molli & succosa, *caulem* erigit minimi digiti fere crassitudine, dodrantalem aut altiore, serotem, focculentum, fragilem, tenui membrana vestitum, aquæ pulpâ abundantem. Juxta quem ex longis intervallis auriculæ quædam membranaceæ, foliorum æmulæ prodeunt, adverte quædam, sed alterâ tantillum eminentiore. Tertiam & supremam cauliculi partem flores occupant plures, hiantes, eodemque modo nutantes & astrosum spicantes omnes, brevi pediculo appenti, à quorum tergo pediculorum quoque exortum foliola moxiant. Florum color ex rufio vel purpura candicans. Illis succedunt vascula *Avellanzæ* fere magnitudinis, à pediculo ad modicum calice foliaceo, subdurato, tenello, succoso & quadruparto vestita, lincis quibusdam ac canaliculis quadrupartita, semine rotundo, ova piscium minima æmulante denticulè tarcta, quod maturum totum nigrum est, papaverinum, sed sextuplo major. Tota cætorum planta gustu est aquoso, acerbulo, non tunc aliquo amaritudinis sapore, quæ tamen in semine magis conspicua.

In umbrosis leprant aggeribus & sub arboribus solo frabili in Anglia invenitur, sed rariss.

Lew.

2. *Orobanchæ radice dentata minor* C. B. Park. *Dentaria aphylla altera* Clus.

Clus.

Tota tenella est, radicemque habet candidam, è multis veluti denticulis congestam, *cauliculis* seu potius pediculis profertem dodrantalem aut paullo majorem, fœci plenum, & quasi transparentem, candicantem, foliorum expertem, quibusdam tantum velut articulis distinctam: qui *flori* summo fastigio gerebat binos aut ternos, alternatim dispositos, ex albo purpurascetes, nigre *Violæ* aut veris *Orchidum* seu *Limodori* florum æmulos & valde tenellos.

Florentem Augusto mense invenit *Clasius* ad radices *Etcheri* jugi sub *Abietibus* aliisque hujus *Tromæ* & generis arboribus, quo Sol vix unquam penetrat, nullaque aliæ stirpes nascuntur: *Amphocem* & *Lew.* pluribus floribus omnium in *lybrula* *Francofurto* ad *Mœnum* vicina Juno mensis.

3. *Orobanchæ radice coralina* C. B. *Dentata aphylla minor Tabernamontani* J. B. *Dentaria coralina radice sive aphylla* 3. Clus. *Dentaria minor* Ger.

Clus.

Hæc *flori* sunt quinque aut sex, minores, *Orchidum* pumila floribus parvis, similiter ex herbaceo pallefcentes (labro tamen propendens exalbido, & circa umbilicum purpureo vena insignito) in odori, spicæ in spicem in palmari pediculo enascentes, foliis carente & subsulis velut vaginulis recondita. *Radix* illi ramola *Corallini* instar, profusè alba, fœci plena, nullis fibris contexta, amaritudinis sapore.

Hanc duntaxat observavit Clavius Majo in hinc florentem in sylva recens cetera paullo superca. *Entesof in Langenthal.*

4. *Orchide radice dentata, alibi radicata, folia & floribus purpureis* Montzel.

Montzel.

In Borussia & Marchia frequens terra erumpit fertis, sub Fagis umbrosis, primo instar cruste ad terram retortæ, postea maturior erigitur, spithamam exsuperans. *Radix* squamata & alioquin radicata, superioris forciculos emittit, qui intra terram emicantur, medio & supremo forculo extra terram tantum se erigente.

5. *Dentaria aphyllis flore purpureo.*

Densò celsius terram operit Sempervivi majoris in modum. Ex singulis squamis singulos præmit flores, pediculi semuncialibus insidentes, è calyce amplo, striato, turpido, quinquepartito, galeatos, magnos, purpurascens, cum staminibus unius plurimis.

Luc.

In Italia locis humilis & umbrosis secus fluvium quendam mocho circiter itinere inter Massam & Lucam observavimus. Plurimum differt à reliquis Dentariis. Nos ob fastidiationem in ea observanda & describenda minus diligentes fuimus.

CAP. XXV.

De Helleborine.

A Folis nervosis Hellebori albi quadratum similitudo nomen sortita est. Radice fibrosa, folis nervosis ab Orchide differt, cui quoad stipes & vascula seminalia similis est.

A. 1. *Helleborus latifolius montana* C. B. *Helleborus* Dod. *Gen. Eleborus* Dodonæ J. B. *As Eleborus flore viridante* Park. *The most common bastard Hellebor.*

J. B.

Nervosis fibris radicitur, albidis, quam Elebori habitioribus, & ad Ruscii radices accedentibus, sapore amaricante: *cavus* modo unicus, modò plures, pedales aut etiam cubito altiorem, nullis ramis donati, teretes, & farinâ quadam aspersi, quibus sine pediculo adnascantur *folia*, Hellebori albi instar nervosa, sed multis numeris minore, & vix ad foliorum Polygonati magnitudinem pertingentia, sapore eisdem amaro. Caulis à medio surc ad summum usq. fastigium, per intervalla alternatim floribus ornatur, Orchidum floribus non multum dissimilibus, quos quæstionant folia hinc albidis, terna herbacea, utraq. exserta, quorum medio ceu exsertorum mulce calaverulum ex albo purpurascens conspicitur. Flori subest canalliculatum capitulum, pediculo inhaerens brevi, quo aceto *semen* clauditur minutissimum & pulveris instar.

Luc.

* Hist. Nat. Com. Oxoniensis.

In sylva caduis, lucis & opacis lapsus occurrat. Aestate floret. Variat floribus colore hæc species: nobis observata flore erat herbaceo, * *D. Platt* & Oxoniensibus botanicis, flore purpureo, etiam saturatior quam Helleborines flore atro-rubente dicitur. Hinc nonnunquam dubitavimus an Eleborine quam nos invenimus lapsus tum in Anglia, tum in regionibus transmarinis sit Helleborine *Dod. néene*, & non potius Damasonium flore herbaceo, minus nonnihil candidante *J. B.* nodum nobis plane constat; Hujus adeo Synonyma & descriptionem proximo in loco dabimus.

2. *Damasonium flore herbaceo, minus nonnihil candidante* J. B. *Eleborus montana* J. Clus. *Helleborus angustifolia palustris* sive *pratensis* C. B. *Helleb. flore viridante* Park.

Clus.

Pari est cum precedente magnitudine, paullo latioribus *foliis*, minoribus *foribus*, qui etiam quinque petalis constant, & galeatum cum prominente labio amplectuntur, coloris quoque sunt herbacei, interius nonnihil candidantis, nullus odor: quibus corolla contracta, *capita* subiant. *Radix* nominata simili.

Luc.

Invenitur in quibusdam Austria & Pannoniæ siccioribus pratis, & in Norimbergensi sylva urbi vicina ad latonem.

Miror cur C. Bauhinus hanc angustifoliam appelleret, cum Clavius folia illi latiora tribuat quam sint Helleborines *Dod.* quam tamen idem C. B. latifoliam vocat.

Suspensum hanc non differe specie ab Helleborine *Dod.* ut nec sequentem.

3. *Eleborus flore carneo* J. B. C. B. *Eleb. flore purpureante* Park. *fortis*. 4. Clus.

Clus.

Hæc minor est aliando, similitudo nonnunquam *folia*, interdum multò latiora; *semen* aut omnino purpurascens, aut prope carnei, Helleborines *Dod.* floribus prolixius simili, nec radiis differt. Crescit in montanis pratis in caduis sylvis Austria.

Luc.

4. *Eleborus montana angustifolia squamata* C. B. J. B. *Eleborus* 5. Clus.

Clus.

Cubitali altitudine *capite*, & amplissima omnium sunt illi folia, atq. oblonga purpurascens florum *spica*.

Nascitur in multis Pannoniæ & Austriæ sylvis, & ad montanorum prætorum margines, &c. Locus.
Hanc non differre specie suspicamur à sequente.

- A. 5. *Helleborine altera atro-rubente flore* C. B. *Elleborine flore atro-rubente* Park. *Elleborine latyrolæ flore* Alisma racemosum J. B. *Wald*, or *Wassard white Helleboze*.

Sesqui-dodrantalis est planta: caule geniculis discretis: ex quibus continuo ordine folia sua extant, Plantaginum majorem fere imitantia, septicimam lata: flores verò racematum quasi in longi recurvato, sæpe dependent plurimè rubicundi.

Species illa Helleborines quam nos pro Hellebor. flore atro-rubente habemus, quædam, sæpius in montosis Angliæ & regnum transmarinarum observavimus, ab Elleborine Dodonæi nova credita differt, foliis angustioribus, in caule crebrioribus, florum colore atro-rubente, quamvis hoc non sit perpetuum, & tempore etiam florendi, menstruo minimum spatio serius quam illa, ut nos movit D. Plot.

- A. 6. *Helleborine flore albo* C. B. *Ger. vel Damaschinum montanum latifolium. Damaschinum Alpinum sive Elleborine floribus albis* J. B. *Elleb. minor flore albo* Park.

J. B.

Radices ei fibrosæ, tenues: Caule modò dodrantalis, modò major, modò minor, gracili totius, alternatim amictus, Plantaginibus lanceolata, angustis, aliàs etiam unciæ latioribus, sed Hellebori albi modò striatis, nitidis. Flores per caulis summa spicatum & velut Orchidum modo dispositi, è sinu foliorum exiguorum, singulares, masculi, lactei, longi calyces capitulo impositi, tribus in ambitu foliis prædin, intra quæ duo alia minora, his verò oppositum tertium hians & labellum luteum velut alis quibusdam munitum; ex hujus hiare pistillus albus, nitidus, brevis, capitulum sustinet nitidissimum, tenerimum, oblongum, summa parte per longum huius impressione notatum.

In sylvis prope summitatem montis Saleve Genevæ vicini invenimus. J. B. in montibus ad Locus.
S. Ursinum florentem Maio, item prope Tigrum urbem. Reperitur etiam in Angliâ, viz. in sylvis prope templum Stokense agri Oxoniensis, non procul viâ quæ Londino Ottonum ducit.

7. *Helleborine angustifolia montana purpurascens* C. B. *Damaschinum purpureum dilatum sive Elleborine 6. Classi* J. B. *Helleborine angustifolia 6. Classi* Ger. *Elleborine angustifolia spicata versicolor* Park.

Class.

Cubitali caule, tereti, mucoso, genicolato, quæsi in singulis geniculis alternatim ambiunt angustifolia, Elleborines Dod. foliis non dissimilia, eripere meminit Clusius: cum summis caulis distinebat in spicam sex, octo, aut plurimum interdum florem, quibus totus, elegantissimi dilatæque purpureæ coloris constantum; inter quæ latebat quædam velut galæa, melleam proboscidi similia, labium inferiore parte adnexum habens, æqualis fere cum foliis longitudinalis, canalicatam, intrâ striatum. Sustinebantur ii flores anguloso, tortili, hirsutisq; nonnullis capitula. Radix illi fibrosa, sparsa, fibrulescentis coloris.

Ad radices montis Saleve versis Genevam copiosè occurr. Floret Junio nonnunquam etiam Julio. Locus & Tempus.
In Ungariâ sylvis Zollonock vicini observavit Clusius.

8. *Elleborine ex alba sublata* J. B.

J. B.

Caule surgit recto, sesquicubitali plus minus. Folia vestitur pluribus, alternò situ posita, perforatis, latioribus quam Elleborine, flore albo, venosis & striata ut Ellebori albi, sed multis numeris minoribus, sativè virentibus. Caule summa thyrus occupat florum ex albo lacertum, galæa alba, labello luteo & subcroceo præditum: è quoque sinu pistillus firmus, crassus cum apicali farina. Ad quorum pediculos semstantiam longos singula exteriorum conspicuntur toliola parva, angusta acuminata. Radix fibrata, ad Elleborum accedens, valde profunde radicata. Sapor amarus admodum in foliis & floribus.

In sylva quadam monti Saleve versis Genevam vicina invenimus. J. Bauhins observavit florentem mense Maio in limitibus Montbelgardensis diocesis versus *Machiarum* in vepibus. & in monte dicto *Machiar*. Floret omnimò quasi novimus hujus generis prima. Locus & Tempus.

Hæc & præcedens pauciores profertur flores quam reliquæ plerique Helleborine, eodè, (quantum meminimus) majores & summos caules occupantes: nec minime à se mutuo differunt præterquam flore colore.

9. *Elleborine tenella, tribus in caule foliis prædita* J. B. *Helleborine 7. Classi* C. B.

Class.

Hanc siccam tantum vidit Clusius. Erat autem pedalis fere altitudinis, gracili caule, tribus foliis prædita, Elleborines vulgaris foliis formâ similibus, & quibus nervi per longitudinem eorum excurrentibus, sed longè minoribus, ut quæ circiter unciam longa sine distaxat, semicimam lata. Summus caulis in spicam florum delinquit. Orchidæ & Elleborines vulgaris floribus imitantium, sed minorum. Radix summa quasi tallure sparsa crassiusculas succulentisq; fibras egerat.

- A. 10. *Helleborine palæstra nostræ. Warts Helleboze*.

Radix obliquè sub terra reptat, fibras albas crassas subinde emittens. Caules decubitalium & interdum pedalem altitudinem assequuntur, teretes, non ramosi, summa parte purpurascens. Locus & Tempus.

sex sepe in caule, ad singula gemcula singula, basi sua caulem amplexa, glabra, nervosa, quam Hellenicosines *Dial. angustifolia* & acutiora. *Flores* in summo caulibus in spicas laxas dispositi, inferius pediculis sepe penduli, & quinque partibus seu foliis componuntur, quae quoddam quasi calycem vocalem musca exaristatam ambiunt. Horum exteriora tria exteriora purpurea obsoleta tinguntur tantillo viridis & albi coloris admixto: interiora ex utraque parte interna & externa albicantia, purpureis lineis seu striis notantur. *Stylus* ille, quem musca corpulculo comparavimus, capite est luteo, pedicelo albo, purpureis striis intus sulcato, ventre albo tenui commissura pectori adhaerens. *Labelium* propendens amplum est, album, & veluti fimbriatum in margine. Singulis florem pediculis longula adhaerentia folia exigua, acuta, & in supremo caulis latragio tria quatuorve minutiora, apicem quendam constituentia. Superior pars caulis ubi flores erappendantur, uti etiam florum calices seu tria externa folia, farina quadam albicante aspersa sunt.

Nulquam apud nos qualem in palustribus (quod unquam viderim) occurrit. Mense Julio floret.

*Flos D.
Tropae.*

11. *Demofianum Alpinum floribus latis J. B.*

Logd.

Radice est nigra, modice fibrata, alius descendente: *foliis* oblongis, angustis nervosis, lanceolatis sive Plantagini minori similibus, aliquanto longioribus, acuminatis: *caulis* pediculis: *flore* luteo, *seminibus* oblongis angulosis, quaternis simul sic punctis, ut hinc medio spatio, tenellata quadam rosetta appareat, apice nigro supereminente, eleganti lineae figuram, lateribus, quae nonnulli crum chartive obducta est, clausis, simis & hinc plantae peculiaris.

Linn.

In Alpinum umbrosis convallibus gignitur.

A. 12. *Helleborus flore vitando sive Calceola C. B. Eloderis major sive Calceola Park. Demofiani species quaedam sive Calceola D. Maria J. B. Calceola Maria Ger. Our Madies slipper.*

Folia hinc variosa, fibrisata, Hellebori albi, alternatim per *caulis* pedicem, firmum, aliquantulum lanuginosum disposita, quatuor aut quinque, saponi amaricante. E foliis quod extremo cauli infidet, nonnunquam & ex petalium sum prodit *flos* unicus, longo pedicelo mixto, quatuor petalis atro-purpureis, decussatis, oblongis, acuminatis, superno & infero suspiculis, laterales angustis & interiore parte lanuginosis, consistunt. Ex horum umbilico emergit membranacea quadam, tenuis concavusque utriculus, columbinum ovum parvo aequam magnitudine, superiore parte secundum umbilicum apertus & hians, lignipedem Franciscanorum calopoda imitatus, cui color aut luteus, aut pallidus, internè nonnulla villosa, infernè autem purpureis quibusdam venis sectitudinem longitudinem distinctis: hinc tegit duplex anfracta, quarum superior alba, tenerior, purpureis maculis confersa, infernè verò densa, herbidi coloris, & veluti Cancrorum oculos in lateribus habens: ipse flos non penitus odoris exers. *Capitulum* illi succedit oblongum, minimi digiti magnitudinem aequans, triangulum, tenue & veluti pulverem semen continens. *Radix* nigra, non valde crassa, in longitudinem & latitudinem oblique summa tellure se spargens, multum, fibris donata, superiorum annorum caulis vestigia impreta retinens, extremitatibus semper in novum germem exuberantibus, amarosculi gustis.

Linn.

Reperiri aiant flore albo, & utriculo purpureo: Habetur in Anglia sed rariss: v. g. in sylva quadam prope montem *Engleborough*, *Helkewald* dicta. In montibus Helveticis satis frequentem est: Nos in sylvis ad latera montis Saleve prope Genavam invenimus. Clusius in sylva & sylvosis locis Pannonicis eam observavit, quem consule.

13. *Calceola Mercurii Canadensis Cornuti.*

Corn.

Figura nullo modo sed magnitudine & colore differt à vulgari: *Folia* siquidem longe majora sunt, & ferè tantum gemina nascuntur. *Flores* verò utriculus candidus est, lineis ruberibus hinc inde distinctis. *Radix* quoque transversam habet & Ellebori modo fibrosam.

Tropae.

Floret Mayo. Flore elapso apud nos semine vidua tota planta praeter radicem hinc tabescit.

C A P. XXV.

De Bisulis.

Notam hujus characteristicam nomen Bisulium indicat.

A. 1. *Bisulium majus sive Ophrys major umbellata J. B. Bisulium sive Ophrys vulgaris Park. Ophrys bisula Ger. C. B. Common Swap blade.*

J. B.

Quoniam ex Orchidum sit familia Bisulium ambigi vix posset, nisi *radices* multiplices fibrosas, obtarent: siquidem *flores* eleganti thyrso dispositi, qualem proxime accedunt, herbacea, culicibus ferè formam exprimentes, sex foliis compositi, nuncium labello longo bibeo, galae ei adhaerens, alio duabus, auriculis duabus, quibus galae incumbit. Calcere carere: Utriculus infidet hexagonus, brevioribus & minoribus quam in Orchidibus plerisque, in sex partes per maturitatem delincentibus, pulviculo seminali Orchidum simili. Ad horum pediculos ligula minutissima, & non qualem Orchidibus. *Caulis* singularis, teres, modo vix sesquipedum altus, albis pedalis aut etiam cubitalis, hirsutus. *Folia* verò duo solummodo habet nervosa, plantagine latibilia circa medium caulem ad-

tero ex altera sinu pendente. Sapor radice subamarus cum aliqua acrimonia non sine visciditate: Caulis verò & foliorum sapor viscidus.

In sylvis & dumetis, non raro etiam in pratis & pascuis videtur occurrere. Junio mense floret. Linn. G. Timp.
 Ophiis trifoliam Ger. & aliorum pro specie Ophrydis degenerate habeo. Ophiis bulbosa Desl. si detur ejuſmodi, radice sola bulbosa à descripta differt.

A. 2. *Bifolium minimum* J. B. *Ophiis minima* C. B. *The itail* *Sway-blade*.

A radice subterrescente, fibrosa & Orchides radolente caudiculis simplex trium quatuorve unciarum sub foliis prodit, cui *filula* duo Ophiis vulgari modo apponuntur, quae pa. va sunt, glabra, splendens, coloris Unifolia, & nonnihil in coarctatam ethigiam è rotundifolia figura discoloris, quibus caudiculi altera pars, tumuliter trium quatuorve unciarum supereminet, cujus lamina *filiculi* parvi, herbacei insident, ab Ophiis vulgari floribus castitate sola recedentes, quibus *va*cula exigua succedunt.

Julio mense potissimum floret loco natali, sed in hortis cum gleba soli natalis citius. In ericetis videtur, in opacis inter Ericas observavimus in Anglia, sed raris, & in septentrionali parte insule duntaxat, ut v. g. propè *Almondsey* vicum in comitatu Eboracensi, in monte *Pendle* Linn. dicto Lancastrensi, &c. In opaca multicolosa, sylvis Beoccio & Osmannino verticè dicto interventibus nascitur C. B.

3. *Ophiis minima floribus purpureo-cruciat.* Mentzel.

In scopulo Alpstri Mittenwaldensi, modis val. inter *Innsbruck* & *Munich*.

A. 4. *Bifolium palustre* Park. *Wharf* *Sway-blade*.

Park.

A Bifolio vulgari differt parvitate sua & quòd interdum etiam trifolium sit, vitore insuper & glabrie foliorum; florum spica multo minore, strobilus singulis aliis similis & concoloribus; tandem radicibus sub terra reptantibus.

In palustribus oritur. Hæc planta à D. Desl. hoc anno 1684. in palustribus propè *Gamling* in agro Cantabrigiensi inventa ad nos delata est à D. Dale, stirpium indagatore diligentissimo. Linn. Parkinsonus non in vidi & humilis loca propè S. Albani oppidum & *Hatfield* in agro Harfordensi inventam scribit sed in palustribus Romanensibus in Cantio plurimam.

CAP. XXVI.

De Pyrola.

A Folorum cum Pyri folis similitudine nomen sumpsit. Florum spica & semine pulverisili instar minutissimo cum hoc genere convenit, radicibus fibrosis & foliis semper-virentibus à reliquis speciebus differt.

A. 1. *Pyrola* Ger. J. B. *nostra vulgari* Park. *rotundifolia major* C. B. *Common Wintergreen.*

J. B.

Quinque aut sex folia humi spargit, subrotunda, Pyractis parva, crassa, atro-virentia, glabra, nulliq. facie superna, pediculis palmaribus terre inherentis: inter quæ *caulis* nascitur dodrantalis, angulosis, parvis & acutis foliis aliquot donatus, nullam ramorum divisionem agnoscentis, thyrsum gerens amcenorum florum, pentapetalon, albidorum, Orchidum ferme modo, supernis duobus [petalis] galeam, uno verò labellum bifidum referentium, multis umbilicam obtidentibus *apicibus* crotis, ex quibus pistillus recurvus prodit, & una versus reflexus, & quandam veluti proboliscidem referens. Flicca *capitula* sequuntur angulosa, pulvisculo minuto plena. Sapor totius plantæ amarus, non sine insigni attractione.

Hæc, observante Clusio, flore est vel ampliore molliorque, vel minore & duriore. Nos etiam in hoc differentiam observavimus.

In Septentrionalibus Angliæ variis in locis invenitur. Propè *Halifax* oppidum copiose oritur. Linn. In montosis propè Genevam collegimus; inq. sylvis montosis, plurimis Germaniæ in locis, Apud nos in ericetis melicosis inter Ericas lapsas occurrat quæ in sylvis.

Vulneraria est usâ interno & externo corroboratissima. Vide Chirurgiæ scriptores.

Vern.

A. 2. *Pyrola folis serratis* J. B. *foliis mucronatis serratis* C. B. *tenues* Park. *secunda tenues* Clusio Ger.

J. B.

Tenerior est altera, radice repente, caule brevior, infirmiore, foliis circa summum ornato, dimidio minoribus, tenuioribus, oblongis, acuminatis, capsulis in ambitu crenatis. *Flora* per caudem thyrsoidea, percolenti simili, minoris, *capitula* subnupant angulosa, stylum ex umbilico protendentis.

In montibus Genevæ vicinis, inq. sylvis montosis non longè à Constantia urbe Scaphusium Linn. variis nobis inventa & observata est.

Hanc esse sulphoreo quam in sylva *Halwood* in Comitatu Eboracensi nascentem observari nobis ostendit D. Wislizen: nam & folia minorâ erant quàm in *Pyrola* vulgari, & mucronata & circum oras leviter crenata, & in umbrosis oriebatur.

3. *Pyrola fruticans* J. B. Park. *Chil. frutescens*, *Arbutifolia* C. B. 3. *fruticans* Clus. Ger. emac.

Chil.

Elegantissimum est hoc genus, interdum quodammodo fruticans: nam novelli brevèsq; ramuli, singulis annis succrescentes, aliquot annos firmi viridèq; permanent, & supra tellurem eminent, donec tandem pondere suo deprelli humi procumbant & musco se condant, fibrèq; interdum agant. *Folia*, capitulum ad singula internodia, ubi novi ramuli succrescunt, bina, terna aut quaterna habet, carnosa, superne saturatis viridia & splendida, Laureole foliis ferè & magnitudine propè similia, in ambum tamen serrata, gustu admodum exsiccante, deinde amaricante, ut reliquarum. Ex horum medio solent Aprilis nova germana prodire, quæ foliolis rotatis squamulis prædita, in virgulas tandem desinunt, quibus terni, quaterni, interdum etiam quini insident *floribus*, vulgari *Pyrolæ* floribus similes, paulò tamen majores, ex albo purpurascens; quibus excussis succedunt pentagona capitula, tenui semine mista scobis plena, quæ cum suis virgulis hyeme exarescunt. *Radix* sive potius caudiculi sub musco latentes longè latèq; summa tellure sparguntur, & subinde fibras agunt.

Linn.

Abunde provenit in sylvis Entzeistorf arci vicinis, vulgari interdum permixtum.

HISTORIÆ PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS SECUNDUS.

QUI EST

De Herbis Graminifoliis flore imperfecto culmiferis &
non culmiferis.



FLOREM imperfectum voco qui merè staminibus est, hoc est, solo calyce & staminibus constat, foliis illis fugacibus coloratis, quæ petala dicuntur, caret. Calycis nomen hoc latè accipio pro glumis etiam æcerolis, è quorum sinibus stamina exiunt, quæque semina aliqua saltem ex parte tegunt.

Cum autem Graminifolæ flore imperfecto duorum sint generum, culmiferæ scilicet & non culmiferæ, Librum hunc in duas partes dividemus, quarum Prior agit de culmiferis, Posterior de non culmiferis.

Herbæ Culmiferæ sunt quæ caulem teretem geniculatum & plerumque concavum edunt, foliis cinctum ad singula genicula singulis.

Hæ vel sunt grano *majori*, vel grano *minori*.

Culmiferæ grano *majori*, frumentosæ & Cereales dicitur, sicut vel grano *humani*

Esulentis, quæ propriè Frumenta, sicutque vel

{ *Spicata*, grano itidem vel

{ *Majore & oblongo*

{ *Nudo*, glutinis vel

{ *Triturando facile abscedentibus*, seu quæ grano est

{ *Turgidior & lucidior, sulcato*, farinâ candidiore & leviore, nutrimenti optimi; TRITICUM.

{ *Strigosior & fuscior*, farinâ crassiore nigriore & viscidior; SACCALIS.

{ *Artibus adhaerentibus*, ut eas triturando non deponat; ZEA.

{ *Certius crassior tibi*, Spicâ

{ *Complicâ simplici*; HORDIUM.

{ *Laxâ & ex pluribus complicâ*, ORYZA.

{ *Minore & rotundior*; PANICUM.

Paniculata seu *pubata*, grano

{ *Oblongo*, seu *nudo* seu *glutinis crassioris tincto*; AVENA.

{ *Subrotundo*

{ *Majore*, nigro plerumque aut fusco, culmo arundineo sex septemve pedes alto; SORGHUM.

{ *Minore & splendens*; MILIUM.

Paniculata simul & *spicata*, Paniculâ in cacumine calidâ, spicâ maximâ è geniculis ad culmi latera exsertitibus; MAIXIMUM, *Frumentum Indicum*.

Non esulenti,

Spicata

Spicata; Spica

Longa compressa, strigosa, semine capis tentante & vertiginem inducente; LOLIUM.
Brevius & habitus e squamis compactis; PHALARIS.

Paniculata, glumis castis, seminibus à glumis aliquantum tumoris, perforatis, maximis, positæ levioris & invicte durities, culmo & foliis arundinis; LACIETMA JORI.

Herba culmifera grano minore sunt vel

Majores & elatiores; ARUNDINES.
Minores & humiliores; GRAMINA; quæ vel

Spicata; quæ in plura adhuc genera subdividi solent, à similitudine denominata, nimirum Triticum, Secalimum, Hordeaceum, Phalaroides, Loliacum, Panicum, Typhitum, Alopecuroides, &c.
Paniculata; quæ pari modo vel à similitudine cum frumentis vel à loco natali aliisve accidentibus, in plura adhuc genera subdividuntur, nimirum, Pratense, Miliaceum, Avenaceum, nemorosum, aquaticum, &c.

PARS PRIMA.

De Herbis Culmiferis.

Culmiferas vocamus herbas quæ caulem teretem, geniculatum, & plerunque concavum edunt, foliis cinctum ad singula genicula singulis, longis, angustis, acuminatis, quarum etiam minima glumis acerosis tecta sunt.

Culmiferae sunt vel grana majores, vel grana minora.

Culmifera grano majore Frumentaceæ & Cereales dicuntur, quia earum grana hominibus in cibum veniunt, si non omnium certe plurimarum, cuiusmodi sunt *Triticum, Secale, Hordeum, &c.*

SECTIO PRIMA.

De Culmiferis grano majore, seu Frumentaceis & Cerealibus.

CAP. I.

De Tritice.

Triticum male dictum creditur quod ex spica trititando facile excutatur, Græcis *triton* quasi *triton* à *triton* sive. Pro qua Erymologia facit, quod Herodotus scribit, à Syraculanis *triton* dictos fuisse *triton* quasi *triton*. Quosdam *triton* dicitur ab acutis & pyramidalis specie figura.

Est autem Triticum frumenti genus, grano majore in hoc genere, oblongo, nudo, hoc est glumis non arcte adherentibus, sed trititando facile abscidentibus tecto, turgido, lucido & flavescens, ab uno latere falcato, farina candidiore & leviore, nutrimenti optimi.

A. 1. *Triticum spica mutua* Ger. Park. *Triticum hybernum arista carens* C. B. *vulgare, glumis trititando deprensis* J. B. *White or Red Wheat without awns.*

Ex radicebus multis, tenuibus, callos plures, geniculati affurgunt proceri, trium cubitorum & non raro humana altitudine, quatuor plerunque geniculis nodosi, latis crassis, intus concavi. Summo culmo spica intidet palmari circiter, arista carens, aut brevibus admodum cincta; circa festum S. Joan. hauriente florens. Ubi desecuit grana subrotunda succedunt, per quorum longitudinem rimula dilucens, superiore parte hirsuta, quæ alibi candida, alibi hirsuta, figura etiam & magnitudine pro genio loci nonnihil variant, triplici glutinosa, quæ tribulorum verbera deponit, vallo clauda, nã ut gibbus duabus, sulcus una transeat.

Provenit

Provenit in omnibus ferè orbis culti regionibus, solum latius & pinguis amans sili, aptum magis & siccum quam humidum: pro terra enim bonitate & diligenti cultura magis luxuriat.

Tritici monci seu aristis carenti duæ apud nos in Anglia species feruntur, nimirum

A. 1. *Triticum spica & grano rubiginos*

Quod & ponderosius est, & farina cum furfures excussit sunt candidiores.

A. 2. *Triticum spica & grano albi.*

Quod levius est precedente, & grano plerumque turgidior: forte Triticum filigineum C. B. cui granum mollius, levius, extrinsecus nitidum, medulla lactiore & candida, facinam omnium candidissimam & levem faciens. Nostrum quoque farinam omnium candidissimam reddat, dum recens est à mola; verum postquam furfures diligenter lecteri faciunt precedenteis farina seu potius farinae flos candidior habetur.

Has duas species in se invicem nonnunquam transmutari non inficias verem.

Utraque autem spicam aristatam interdum, sed rarius, producit; quod quidam, (C. B. verba sunt) frugis proprietati, quidam agri conditioni tribuunt, ita ut in pingui & stercoreto agro aristis careant, in macro & non stercoreto usdem hercant. Addunt & coarctatum, quo segetes adolescit, humidore aristis carere, sicco aristis muniri. Sicut qui segetis densitatem raritatemque, ad id facere valent, densiore segete spicas mitius, rariore vero cum aristis producit.

Nos in inque ordinariè & naturaliter spicas seu mitius seu aristatas producant, ad frugis proprietati ascribendum esse, non agri conditioni, non culturae, affirmamus. Quod verò quæ naturaliter spicas sunt vel mitius, vel aristatis, nonnunquam variant & diversas producant, soli libertati aut luxuriae imputandum censemus, aut alia eadem nondum nobis cognita & comperte cause aut accidenti.

Alias præterea Tritici rubri varietates observavimus, alteram nimirum spica mitica albicante, aliam spica aristata albicante.

Nec Nos in Anglia Triticum Autumno semper serimus, nunquam Vere: nisi quis animi aut experiendi causâ aliter faciat. Minime autem dubium censemus, quin Triticum quocumque Vere satum tum proveniret, tum semen perficeret ante Autumnum; verum id Autumnali infirmius esset. Quocumque enim frumentum hyemem tolerat Autumno satum multo latius & uberius, grano quoque firmiore & copiosiore evadit quam si Vere sereretur.

Nos cum Columella & Bapt. Porta Triticum æstivum seu trinitivum proprium genus non esse opinamur: verum agricola si quando Autumnis male cessit, hanc sationem pro tardulo commentos esse. Et apud Samnitas, aliisque gentes Alpinas, quia Triticum hyemis rigore & imbres nunquam perferre possit, sationem in vernum tempus differri; non quod existimant, si alibi ubi coelum indulgens sit leatur non provenire, vel quod proprium genus sit. Et alibi, Genus trinitivum Theophrasti vel Italie incognitum est, vel Triticum pluribus annis Vere satum quoddam genus constituit. Nam continuatio unius rei equi naturam mutat; unde non species, sed imbecilliore quadam constitutione hoc trinitivum Triticum à vernaculo differt.

2. *Triticum rufum grano maximo C. B. rufum grano maximo, Far seu Africum Vetterum patrum J. B.*

Spicam fert miticam, granum maximum & amplissimum, sed ad conficiendum panem minus utilis, ex quo decorticato cum lacte pabulum fit, in cibo rusticis grandissima, equare aut eas delicias colunt.

Haud procul Lugduno in pagis monti alto seu arcto propinquis colitur, & ob inanis hinc rursus, Leon. & Grai hinc vocatur. Lugd.

Cum non aliam habeat naturam præter Lugdunensem, non suspensum est: fertis ubi ubertatem silis & caliditatem in loco Triticum vulgare grano majore & turgidiori proveniat.

3. *Triticum rufum hexastichon C. B. J. B.*

Ex eadem est Officina: Spica est rigidissima & firmissima, sex ordinibus distincta, cum in aliis quatuor tantum reperiantur.

Circa pagum Eriam in Allobrogibus habetur, ubi hinc regitur, id est frumentum rigidum dicitur; aut frumentum sex quartis, scilicet sextangulum vocant.

Notandum dignum est, Triticum quantumvis omnium frugum perstantissimum sit, & in cibo tum sapidissimum tum saluberrimum, utriusque extremi frigoris & caloris patientissimum esse, nec in regionibus tantum temperatis provenire, sed hinc in trigida & Septentrioni subiectis, Scotia v. g. Dania, &c.

Indè in fervidis & Mediterraneis, ut *Agypto, Barbaria, Mauritania, India Orientali, provincia, Gaesæ, Madagascariæ, &c.*

Nec minus observabile est, & cum Divine Benignitatis agnoscere commemorandum. Triticum (ut rectè Plinius) nihil familiaris esse, quod ex natura, [scilicet Naturæ Partem] tribuit, quantum in eo maxime hominum alit: utpote cum e mola, si & aptum solum, quale in Byzacio Africa campo, centeni quinquaginta mola reddantur. Misi ex eo loco Divo Augusto procurator epus ex uno grano (vix credibile dictu) 400 pasci minus gemina: misi & Nervus simulat 150 stipula ex uno grano. Verum de Tritici fertilitate libro primo, dixi, ad quem locum Lectorem remitto.

Notandum præterea solum pinguiſſimum & opulentiffimum Tritico abſque frumentaceis perficiendis non convenire, ut nec pauperiffimum & graciliſſimum: eſt enim in ſola & ſtipulis vim ſuam totam effundit, quæ mire luxuriant & excreſcant, ſpicæ interim gracilibes & fere vacuæ pauci intus grani, niſi quæ malè nutritis & ſtrigolis. Herba ſcilicet & culmi alimentum præſumpunt & ſpicæ defraudant, ſocro etiam propitios Sole radios arcent, qui ſucco nutritivo excoquendo & in materiam ſeminis idoneam erigendo neceſſarii ſunt. Huius rei experimentum habere noſtrati, cum Triticum vulgare in Amſtedæ ſecere gleba ubi & coelum favetur, primo lererent, in haſta enim altitudinem ſuæceſcit, ſpicæ tamen ferè vacuæ & lomine callis prodant. Quocirca Agricola tanti **Veteres quam moderni ſata lætiora pecunibus immiſſis depalcere & exerceere ſolent.** *Luxuria ſequitur vulgaris Juncus pennis, in herba luxurians, & diſpoſita qualem vel ſerpiem nullam in ſpica videri*

Notandum denique humorem nimium frumento nocivum eſſe apud nos in Anglia, non aſſertum & ſiccitatem: unde diverbio jactatum eſt, Siccitates in Anglia atraxerunt caritatem nunquam effugere: quod experientia nupera confirmavit, cum Anno 1664 æſtate omnium memoria noſtra ſicciffima, Triticum aliæque frumenta ſatis ſalubriter adoleverant, & granum protulere plenum, & ponderoſiſſimum.

4. *Triticum multiplex ſpica C. B. Ger. Park. Trit. cum multiplex ſpica, glumæ facile deprensæ J. B.*

J. B.

Radix fibroſa, calamus geniculatus, foliaque cum vulgari uſu Tritico habet communia: ut ſpica ſaciliſſimum diſcrimen, quæ in hoc præter quatuor illos verſus arillatos, qui in ſumma ſpica ſolentari, circa medium complures undique ſibi adiangit, multiplicique congeſſione in ventrem creſcit: granum etiam multò candidius & delicatius. C. Bauhinus Tritico ruti ſpeciem facit. Hoc Neapolitani, quibus familiare eſt, ut cætera genera ferunt & colunt, referunt Porta.

5. *Triticum ſpicuſum grani longi J. B. An Triticum oblongi ſemine C. B?*

In ſpica exiſt ſpicæ Tritici vulgari longè majorem, ſex, aut ſeptem unciam, arilla dodrantibus, pedaliſive plus minus. Glumæ unciales hæc granum oblongum, uncæ triente, & quàm vulgari duplo ferè longius continent, è glumis facile ſeparabile, in quo cum vulgato & cinereo convenit.

Locus.

Ex horto Scutgardiano habuit J. Bauhinus.

A. 6. *Triticum arifis mucronatum, valentibus grani & ſpica, glumæ levibus & ſplendens. Hed. earred bearded Wheat. An Trit. arifis circunculatum Ger. & Park.*

Hæc ſpecies apud nos in Anglia ſeruit, eſt ſpicæ minoribus quàm Triticum æmericum, glumæ levibus & ſplendens, caſtaneæ quodammodo per maturitatem coloris ſæpius rubi, granum omnino reſerens. Hæc ſpecies arillas ſponte non deponit etiam poſtquam maturæ, verum ne perſtantiſſime adherent quam in Tritico æmerico.

7. *Triticum æmericum maxime arifis donatum, glumæ truncatis deprensæ J. B. An Triticum typhum ſimplici foliolo C. B? Triticum typhum Ger? Typha Dodonæi Park?*

Specioſum videndæque magnitudinis eſt, calamus proceris geniculatis, folioſis, ſpicæ maxima, fere ſeſquipalmari, duobus granorum ordinibus compacta, glumæ hirsuta, cinericea, in longiſſimas alperiffimæque arillas deſinentibus, quibus tribuli verberè in area facile excutiantur ſemina. Huic nobis idem videtur.

A. *Triticum arifatum, ſpicæ maxime mucronatæ, glumæ hirsutæ, noſtræ. Oſay Pollard, in ſome places Dutch-bill wheat.*

Hoc genus apud nos in Anglia frequens fertur: Tritico ſpica mucronatæ mapis eſt & elamæ, ſpica majoribus habitibus arillo longè circumvallatis, quas tamen non raro ante maturitatem amittunt, glumæ cinericeæ hirsutæ.

Noſtrum hoc non ſimplicem habet foliolum, qualem Tritico ſuo typhano tribuit C. Bauhinus; idcirco ſi detur equiſmodi Triticum typhanum quale deſcribit C. Bauhinus noſtrum hoc eſſe non poſſeſt. Verum Hiſtorie plantarum Ebroduntinis Auctores C. Bauhinum errorem inſinulant multiplices in ſynonymis huius aliorumque Tritici generum, quos conſole.

Triticum longioribus arifis, ſpicæ cæruleæ C. B. Triticum lucidum Ger. Park.

Spica eſt elegantiſſe & magna, & cum maturat arillis denſis longè horret, cæculos aliquando colorem locum quàm in aliis frugum generibus, quorum ſpica ſiſveſcunt: grana ſunt magna, dura, atropurpureo colore nientia, cupis coloris & ſaruta.

Triticum frumentum genus ſpicæ cæruleæ *Legl.* quod huius ſynonymum facit C. Bauhinus ad præcedentem ſpeciem referit Hætor. Ebroduntinis: quod & nobis etiam placet.

Triticum longioribus arifis, fpecie albid. C. B.

Priori fimile est grano excepto, quod pulchrius est & album, ex quo farina alba & delinata fit.

Triticum quo ponderofius ceteris paribus eo melius. Hinc apud nos Londinenses infiriores ponere Triticum emant: habet aliquid lentoris & obftruentis naturæ.

Noxæ optimi Triticæ sunt quod recens, & perfectè maturum fit, quod colore luteum, quod denfiffimum & ponderofiffimum, quod aquâ maceratam citiffimè & maximè intumefcat, quod copiofiffimam farinam præbeat, quod ab omni vino immune, ut Lolio, Melampyro, uftilagine, &c.

Triticum inter omnia Cerealia tanquam præfiantiffimum commendatur, non folum ob infignem nutriendi vim, fed quod etiam aduersus multos morbos & intrinsecos & extrinsecos utiliter ularpotat. C. B.

E Triticæ farina probè fermentata optimus conficitur panis. Verùm & Amyldin ex ea fieri Plinius affert. Pulvis quoque infantibus commodiffimè ex ea in aquâ aut lacte decocta fiant, quæ & opem nutriunt, & in carina appetentia & Venæ defectû commendantur. Eadem in faucium & pectoris affectibus, Renum & Veficæ exulceratione, fluxionibus alvi, præfertim dysenteria, perniciis sunt, vel ex fculis cum butyro confecta. Crudi Triticæ efu alvus inflatur; nec facile conficitur. Galenus Triticæ extracti in cibo ufum damnat; verùm nos ab ejs butyro conditi, & Saccharo edulcorati, ufû frequenti nullum damnum aut noxam fenfimus.

Granzæ Triticæ confectio apud Catonem, (hic vocat pifanam triticam pulcentre ex ea paratam) parùm differt à preparatione pulvis triticæ apud nos in Anglia ulitata, *Fruimentis* dicta. *Sedulam tritica pari in mortarium parum indat, laues bene, corticemque detrahât bene, claudat bene, postea in ollam indat & aquam puram, capiatque, ubi coctum erit, lac addet paulatim usque ad id donec creuerit crassus erit factus.*

Extrinsecus ad vifum & debilem & obfcurum & ad maculas tollendas collyrium quod Triticum ingreditur vide apud C. B. in *Theat.* Ad maculas tollendas succus è Triticæ expreffus valet. Faciem erugat farina Triticæ, fi cum aqua Fabarum calida folvatur.

Ad lichenas recentes in-vincto aut alia faciei parte Crifpi apud Galenum è Triticæ medicamentum.

Triticæ grana multa in incudem imponito, deinde laminam æris [aut ferri perinde enim est] igno calefactum Triticæ fuperponito, & refolutum ab eo hquorem calidum adhuc afferto ac fuper lichenas linito. Hoc fole multos curatos fcimus, nec folum ad lichenas faciei, fed experientia noftra ad omne genus herpetas & imperiginas valet. Idem ad ulcerum fima, pedum & manuum rimas à frigore, & cutem afperam levigandam facit.

Farina cum oleo mixta & in forma cataplafmæ impofita, fed melius in aqua cocta, oleo addito, mammarum duriciam emollit. Eadem Apofteumata hepatis, lienis, aliarumque partium maturat.

Nervorum contractionibus & manibus dependentibus ex aceto cocta & impofita prodeft.

Triticum crudum commendatum & impofitum commorfa à Canis rabido auxiliari dicitur. Idem oculorum apofteumata maturat.

Ad alvum irritandam, è farine paribus duabus & unâ falis cum albumine oui pafsa conficitur, in formam fuppositoem reduciunt, oleo vel butyro ungitur & ano inditur. Podagra conferre dicitur pedes ad genas usque in Triticum mergere, quo levatus est inopinatè Sextus Pomponius referente * Pimo: melius succedit curatio, fi Triticum conquassatum in vase ad ignem calefacit. * Lib. 21.

Ad omnes quorumcumque artuum dolores nutigandos valet cataplafma ex farine Triticæ & Hordeaceæ, florum Chamæmelii & Rosarum, fingulorum uncias duabus, in aqua decoctis, dein olei Chamæmelini & Rosææ fingulorum uncia una additis, ac in modum cataplafmatis calidè parti impofitum. * cap. 21.

Fermentum ex farina tritica calefaciendi, extrahendi & manendi vi præditum est, privatim callos in plantis pedum extenuat, & cum alia tubercula tum etiam furunculos ex fale maturat anq. aperit.

Furfurum multiplex ufus est. Intervient manibus purgandis faponis vice, fi aque in qua abluuntur immisceantur, quin & manus molles albaque reddunt.

Furfuribus purgandis intervit aqua in qua calefacta per diem & noctem infusa fuerint. Gargarifma ex decocto faucium afperitatem & dolorem lenit.

In aqua decocti & fuculo inditi omni humore expreffo fi calidè applicentur, Pleuriticorum punctiones nutigant, modò faculus refrigeratus in eadem aqua calefactus & expreffus fepius applicetur.

Alia præterea multa pavamenta præstant que fi placet apud * C. Bauhinum vide.

* *Tour. lib. 1. l. 4. cap. 2.*

De Pane.

Panis multiplex Etymon affertur. Vel enim deducitur à *Faxo*, i. è *Taxo* fivè fili glomus ad cuius fimilitudinem panes fingi folent. *Faxo*. Vel dicitur Panis quafi pascens à pascenio. Vel est panis à Deo Pano, quod Pan primus confurialis fruges coctiffe pascibetur. *Cyphod*. Vel ab Adjectivo *pan*, quali *pan* *panis* *panis*. Panis dicitur quod cum omni cibo apponatur, vel quod omne amant eum appetat fidor. Vel quod inflat omni cibi fit.

Sed omnium (inquit Voffius in Erymolog.) herentæ fontem diluit Athenæus, ex quo dicitur est Romanis panem vocari quod Doctes dicunt *panis*. Vel *panem* à *panis* deducere l'cebit.

Panis, definitæ C. Ba. hinc, est cibus ex frumentaceis molen, aquâ maceratis, pifina ac coctis apparatus.

Quoties panis generis apud antiquos à tritico sibiatur.

1. *Siligo* panis, *scythici* ex siligine, id est, flore farinæ, sive purissima, mollissima & tenuis-
sima pars, ab omnibus surturibus exactissimo repurgata.

Tunc & arcus molitur siligine factum. Jovenal.

2. *Siligo*, *scythici*, ex simila seu simagine, id est, farinæ parte tenui quidem, sed siligine impure, utpote ex qua non omnes exculli sunt surturi, sed crassiores tantum.

3. *Confusum*, *scythici* & *scythici*, ex farina omnes suspensi partes in se continent, cui nihil vel floren, vel surturum decessit.

4. *Cabrus*, *scythici*, *scythici*, *scythici*, *scythici*, est surturacea farina coacta, ex quo mollissima purissimaque farina exacta est. Nonnulli his addunt quintum genus, quod surturaceum vocant, *scythici* seu *scythici* Athanasio, qui Caricaceus panis dicebatur, quod in Canum fore grana concha seletur: Et hic ex Tritici estis consistit, quæ Latini *scythici*, *scythici* & *scythici* vocant.

Fabatur & olim (Marcello fides) è polline frumenti tenuissimo, ad mole puritatem adhaerente indeque multis cum sordibus deterio.

Optimus ac saluberrimus panis est qui concoctus facilis; talis autem est, prout Galeno, qui plurimum est fermentans, & pulcherrime subactus, quoque in clibano igne moderato fuerit assatus.

In simina (inquit C. Bauhinus) panis optima commendatio constat Tritici bonitate, pulchritudine ejus molitura ac pistoria, crum tenuitate, melle plurima, fermenti, salisque modico; dein apparatu subactionisque exacta, & proba coctura, de quibus copiose distulere nostri non est institum.

Notandum tamen in Anglia spumam Cerevitiæ concretam utantissimam fermentum esse, nostrates abo fere ut, nisi in lupis inopia. Hoc autem fermenti genus (teste Plinio) apud Septentrionales olim in usu fuit. *Gallia & Hispania frumento in panem resiliat, quibus decimum generibus, sicuti et curat per fermenta stantur. Qua de causa lectur illa quam ceteris panis est.* Plin. lib. 18. cap. 7. Est ergo, Plini testimonio, laudatissimum hoc fermenti genus.

Certum est hujus vires absterforias obtinere, quibus intestina, si non sumatur, ad digestionem simulantur. Hinc panis qui fit ex farina cui surturi omnes exculli non sunt, modo probe fermentatus fit salubris nobis videtur, simpliciterque etiam quum qui ex mero flore seu siligine. Extinctis mica panis ad calam fere utilis est ad quæ farina triticea. Galenus scribit cataplasma ex pane factum magis digerere, quam quod ex Tritico fit, cò quod Panis factus & fermentum adjuncta habeat, cujus sententia rationi consentanea videtur, & experientia etiam eam confirmat.

Chondrus & Alca quid sint diximus in explicatione terminorum quantum sufficere videtur: cum enim jam in defensionem abierint, non est cur de eorum preparatione aut usus in cibo & medicina admodum solliciti simus. Quæ pleniorum eorum explicationem desiderat C. Bauhini Theatrum & J. Bauhini historiam petat.

Amylum etiam quod fit indidem dictum est: cujus vires & usus vide apud Bauhinum utrumque.

Far duplex est, naturale & factum: naturale est certum quoddam frumentum genus: factum Plinius pro Faris farina, sive pulve, sive grano decoctato simpliciter videtur, cuius ex Verri sententia scribit Populum Romanum fieri tantum è frumento trecentis annis usum fuisse. Far ex Aetio ostenditur esse quoddam frumenti genus, decorticatum, & ab urticulis repurgatum ac deinde in partes aliquot contractum & siccatum.

Athera, pul & gluten consistentia tantum differunt, Athera enim pulviscula liquida est, infantibus conveniens quæ ex farina tenuiore cum cerevisia tenui aliore liquore coquitur.

Athera crassius & solidius est gluten, Græcis *scythici*, ex simagine & farina Tritici, quo chartæ glutinatur: quod propter eam quum habet glutinandi vim sanguinis excretionibus prodest.

In utriusque mero *scythici* sive pul est, solidior quidem ac spissior Athera, liquidior verò Glutino, proinde minus glutino, plus autem quam Athera viscera obstruere. Atheræ aut potius pulvis genus est, edulsum quod Galenus ex multa Tritici farina lacti permixta fieri scribit, quo hac ætate universa inferior Germania frequentissime utitur. [Pulvem puro intelligit quam nos *Dasty pub* tang vocamus.] Cibus boni sicuti & multi alimenti, sed eos qui eo assidue utuntur ostendens. Nam in hepate obstructions parit, & calculos in renibus gignit, autem Galenus 7. B.

Tragus est res siccata. Fabatur autem ex diversis Frumentorum generibus, ut ex Doctore, Galeni Plinii locis ubi de eo agunt inter se collatis patet. A Chondro & Alca preparatione purissimum difert. Chondrum siccatum gypsum & arena perficitur: Halicam creta emundat, Traga sola æqui macerata decoquitur.

5. *Triticum Creticum* Park. *Sylvestre Creticum* C. B.

Herba est Tritico similia, folia & caules Tritici ferent, spicæque aliquantulum asperæ, nigrescentes & aristas breviores, capsæ grana Tritico sacivo nuda sunt & altera parte obtusa, ita ut Secalis grana potius quam Tritici, emulentur.

Frequentissime in Creta invenitur, & negligitur tanto Honorio Belli ejus semina ad Chusum misit *Agricola*, quod Triticum sylvestre significat, nomine. Quare non absque ratione Cretensis, Diodoro Siculo referent, sibi persisterant Triticum primo à Creta in Cretam invectum fuisse.

9. *Triticum Tripolitum* Park. *Tri Theriopsi* Jacq.

Est semine Tri, cò allato in Anglia sanum culmo ferere localitatis, folia quam Tritici nostratis latioribus crassis, ipsas palmam longæ, arista prælonga circumvallata, grana Secalis instar nigricantibus.

CAP. II.

De Secale.

Secale à ferando dicitur. Nam cum duo sint genera frugum, *Frumentum* & *Legumen*; legumina quidem manu leguntur vellunturque: *Secale* ac frumenta alia locantur. *Fes. Etymolog.*
 Secale à Trinco differt grano fragiore, tenuiore & nigriore, glutinis non operato sed nudo: culmo clauore.

A. 1. *Secale* Ger. J. B. *weigat* Park. *bybernum* vel *mayn* C. B. *fit.*

C. B.

Radice est multis, tenuibus, fibrosis: *folia* cum primùm prodeunt rubicundibus, dein ut reliquorum frumentorum vicibus, *Triticea* tenuioribus, longioribus; *ovula* numerosa, lenia, leuicant, etiam pluribus (si enim ante hyemem à pluviosa tempestate illatum cadicos egent, & in coactum quasi evadent, magno proventus spem facere solet: quæ plerumque adeo non fallit ut ex uno grano duodeni & plures quoadmodum spicas culmi excant) quæ *Triticea* graciliora, ac firmiores, longiores, & ex vagina alpera graminea *Acuminatæ*, quaternis ut plurimum, nonnunquam quinis internodiis distincti prodeunt, spicas in varia digestis, arista brevibus, nequaquam innocentibus cinetis, & aliquot quasi hamulis serratis (caveat ergo quis ne ovi spicam indat) quod & in reliquorum frugum arista notantur. *Flos* est luteolo, qualis in plerisque frumentis observatur; & diu flores, adeo ut quadragesimo tantum die à flore maturecat, postquam enim defloret septimanis quinque maturatur. At spica cum floret erecta est, quare rubigini cum indolis retinere opportuna: semine vero prægnans procumbit & dorsum propendit quia longior. Gramen est oblongum, flagellum, tenuis & nigra *Triticea*, glutinis non operatum sed nudum, adeo calidum & sepe immo spem exalcat.

Duas hujus species constituit C. *Bauhini*, *hybernum* scilicet, seu *mayn*, & *vernum* seu æstivum & *ritus*: quæ latius distaxat tempore, & accidentibus inde ortis differre putamus.

Spica seu Varietas.

In Germania, Gallia, Anglia, aliisque regionibus, potissimum Septentrioni subiecta nascitur quæ lentius solo, etiam gracili, macro & arido (arenoso sabuloso & leri) in succulente tamen & leniore melius & perstantius.

Leno.

Apud Anglos ferunt Autumnum, nunquam (quod sciam) Vere, etiam ante æstivum; quo maturum eo melius & uberius evadit.

Proximam inter frumenta à Trinco locum vendicat. Panis ex eo factus atrox & prolatiora est, lentioris atque obstruentis natura nonnihil habens, concocta difficilis & ventriculo gravis, prolatiora si furfurum expers fuerit; quin in qui non afflicti sunt alvum plerumque mox non sine torminibus, Agricola periculosum est hujus panis usu crepida validiora fieri. *Bygonius* alicubi in Loghnanensi tractu & vicina nulliora quæ panis *Secalino* muntur validas, & bene curatas, formique egregias conficit, quæ tamen admodum spernendum alimentum hominibus præstare censet.

Fer. & Len.

Panis secalinus ob humiditatem suam à nonnullis præfertur ei qui vel ex *Triticea* vel ex *Zea* conficitur, cum non ita facile & subito ab aere exsiccus & aridus reddatur.

Solent nostri tantundem *Triticea* vel ex *Zea* confecta farina admiscere, ut panis tenorem suam duntaxat retineat, lenioreque & gratior evadat: sique parvus crummi medicamentum consilio ad alvum emolliendam etiam *Magnanibus* in usu est, maxime ætate. C. B.

Apud nos in Anglia, & in *Itellia* refert, apud Gallos etiam, *Secale* non tantum solum & simplex ferunt, sed cum *Triticea* mixtum, æquis fere partibus. *Miscellanam* hanc legem Latino nomine *Miscellam* appellamus, & sicubi *Stung rom.*

Quæ de *Secalis* episcopi partium visibus & usibus in medicina traduntur vide apud C. *Bauhini* *Theat. Botan. Lib. 1. Sect. 4. cap. 17.* Quibus adde è *Sin. Pauli Quarupar. 1.* illud verissimum & experientia confirmatum, quod farina *Secalina* confusum capiti dolores levat, in luteo capiti circumligata; quæ etiam delirantibus profunde observatum est, præsertim si eis remissi fuerint ablutitii corymbi. *Sm. Pencil.*

Vulgus doctum est ubi *Erysipelate* infestantur siccam facinam *Secalinam* indere mundo linteo, ac loco affecto applicare, inque succo satis felici discutere. *Idem.* Habus ex *excipien. D. Hæ.*

Per frequentes parvas grana spicarum inferiora in *Secali* per maricatum in grana atro purpurea excrescunt [C. *Bauhino* semina quædam longiora ex articulo suo seu glutinis protrahuntur, ac in modicis etiam crassim excrescunt, quorum quedam in cervicali modum curvantur, quæ omnia nigram colorem siccis contrahunt, metis vero canthala farina lentioris mixturæ continent.] quæ *libellæ* formam, saporis *Mali*, *Noctis* & *Butterthom.* i. e. *Secalis* nunc dicuntur, & longiora portulicam ad compendendum loquorum fluxum habentur. *Secale* hoc modo degenerans *Secale* *hermian* C. *Bauhino* appellatur, *Clari* *Silvæ* *Lonkica.* *Annon* infestis allicis panibus originem debeant hospitio excellente inquirendum.

2. *Secale latifolia peregrina* C. *Bauhini* J. B. *Secale latifolium* Park.

C. B.

Culm exurgit candidantibus, rotundis, striatis, quibus *glus* palmum longi, crassa, arista longissima, & ut in vulgari, tenuissimis denticulis alperis armata, mislet. *Flos* habet culmum longissimum, & per marginem leviter exasperata: grana non videt, spicas & folia habet è *Contaræ* *Veneri* *Son.* horto.

Ustilago *Segetum* sive frugum, præsertim spicarum, *Secalot*, *Tritici*, *Hordei*, atque etiam *Avene* vitium est. Ipsi autem accidere solet, atropiam è *graminis* vagis panibus ita exardet ac

in calum atrollant, idque cœli constitutionem crebro incomitant. Quando enim Apeli & Maio mensibus, post Solem ardentem subita pluvie succedunt, & sol continuo arduos radios spargit, spica adhuc teneræ ac latentes, humore madida à Solis favore correpta, sic aduruntur, ut quamprimum è vagina prodeunt, nigrae & veluti pubere fusca vel atro obiter appareant.

Loca cœri (docentibus Theophrasto & Plinio) & à flava silicibus præcipue legetes æruginè ipsius infestantur; motu enim excutitur & decidit humiditas æruginis causa. Ausugunt hoc vitium que flant non erecto sed prono cacumine. Quamobrem spicam inclinari utile est, ut imbecs decedant, nec rores excipi possint. Hinc arago, quamvis frumentorum omnium communis vicium sit, magis tamen infestat Triticum, quod tunica integatur pluribus, & folium spica græz proximum, unde frugem suam effundit: residet enim in eo humor putrefactus qui æruginem creat. Adde quod spicam geret erectam dentareque unde humor minus potest desilire. Hæc forte causa procatarrhice & externæ utilitatis esse possunt; quod si non adsit interna dispositio in grano ipso sui semine, cause externæ effectum suum non loquantur. Hinc agricola nostri maxime cavent à semine legotis utilitatis infectæ, & præterea ad præcavendum hoc malum semem antiquam terræ committunt lxxvijo ex cinere per 24. horas insulani calce viva aspergunt, adobque firmam efficiunt adversis hujus vitii causas.

CAP. III.

De Zea.

ZEa Tritici quoddam genus est, glutinis adeò arcte adherentibus ut eas triturando non deponat. *Zea* aut *Zea Levi* & *Qid* dictam volunt, quod ea ante inventum frumentum homines vitam tolerabant. Antiquissimi autem Romani (teste Dionysio Halicarnasensi) *Zea* *Far* dicebatur. *Fari* tamen vox ambigua & æquivoça.

1. *Zea sive Spelta* J. B. *Zea ducens sive Spelta* vulgo *Park*. *Zea ducens* vel *Zea major* C. B. *Zea sive Spelta* Ger. *Spelt*.

J. B. C. B.

Tritico haud abimilis est, radice multiplici caulis tenuioribus, numerosis, gonoculatis, firmis, Hordei alioribus, ac Tritico brevioribus. Spica, que circa festum S. Joannis Bapt. floret, palmatis aut sesquipalmatis, incondita, compressa, plerumque mutica, interdum aristis circumvallata, longioribus brevioribusve, gemino granorum versu, vel ita dispositis granis ut alternatim utriusque principio modum alterius respondeat, multiplica folliculo arcte inclusa, & geminis utriculis geminis granis junctis, que Tritici semine longiora, dorso acuto, colore rufis, pertinaciter hærentia, nec triboli seto semine colligantia, quo nomine (inquit J. Bauhinus) à Tritico vulgari distinguas licet, alioqui glutinis & tunicae evasa granis vix internoscas.

In multis Italiæ, Galliæ & Germaniæ locis provenit, qualicumque solo etiam humilioris, lato tamen pinguique melius proficit.

Eodem cum Tritico tempore seritur, floret & demittitur. *Zea*, si pista ac purgata seratur antea tertio in Triticum mutatur. Theophrasto autore. Et Plinius, *Tridum* inquit, *Zeam* et *Tephen*, cum sint degeneres, volens ad frumentum, si *psa* & serentur, non prius, sed tertio anno. Nos non negamus accidere interdum posse ut *Zea* in frumentum transeat, verum ut hoc semper eveniat si pista seratur nos non videtur verisimile; penes autem fides esto.

2. *Zea monacensis, Breia quosdam* J. B. *Zea Breia dula sive monacensis* Germanis C. B. *Zea monacensis, sive simplex, sive Breia* Park. *Breia monacensis* Ger. *St. Peters Cozn*.

C. B.

Caulis est & spica dicocco brevioribus, angustioribus, tenuioribus & depressis: spica dupli ordine Hordei modo digitis, aristis subsæpatis armatis: lemnibus duplo minoribus, singulis utriculis (qui levis, candidantes & modice depressi) inclusa, à quibus in raris, non in arca evadunt. Folia angusta sunt: radix fibrosa.

Nascitur aspers & monacis plerisque Germaniæ locis, solum tenuis & aridum amat. Autumnio cura reliquis frugibus facitur, seris tamen, ac subinde Septemberi demum mense maturificat.

Panes ex *Zea* Germaniæ conficiunt, non minus albos qualem ex Tritico, leviores tamen, minusque nutrientes. Recens hærns est & concocta facilis, antequam non ita grata & concocta difficilis.

Ex eadem pulvis cum lacte, vel Amygdalato, vel vino, vel cerevicia & saccharo sunt & sanis & ægri utilis. Picticulis ex farina adstringunt, unde ad eadem valent ad que pulvis ex *Oryza*, hemoipysin, orienticam, diarrhoeam, &c. præcipue cum pedibus vervecinis & vitulinis decoctis: exterius quoque ad eadem utilis est.

Nos Veteris uno quasi ore panem ex *Zea* damare. Quare manifeste (inquit C. Bauhinus) panem *Zeam* diem aliam esse ab ea, quam Plinius semina Romani vocari tradidit, ex quo tam præclarus cibus Alia habet.

Levi.

2. *Levi* C. B.

Levi C. B.

Levi.

CAP. IV.

1. *Zea verna* J. B. *Zea Amylea* seu *Olyra* C. B. *chazari*. *Olyra* Park. *Triticum Amyleum* Ger.

7. B.

Culmus habet tres cubitos altos, quatuor, quinque aut sex geniculis donatos, & planè triticeo. Folia plerumque semunciam lata. Spica duorum est veruum, sibi mutuo equalitate ressondentiam, arista multis vallata, ut ceteris ad Hordeum accedat: in singulis autem veribus ordines duo seminum masculorum, quæ glumæ involvunt valide, aliis albicantes, aliis quasi ferrugine infectæ vel rubentes, binæ quidem undique, extrema verò externa tantam parte. Grana glumæ exuta Tritici grana similia sunt, unde nobis semen ejus Londino multum est sub titulo *Triticæ spicae Hordei*. Seminis nondum planè maturi aviculæ appetentissima sunt, ut difficile sit illud ab eorum rapinis defendere.

In Germania locis aliquibus seritur, & quidem verno tempore circa festum S. Georgii. Tantiæ Latæ vocatur scilicet primùm Septembris.

Hæc planta inter Hordeum & Triticum quodammodo ambigit, spicam enim habeat Hordei, grana Tritici.

2. *Zea ribon* seu *Oryza Germanica* C. B.

C. B.

Cum *Oryza* nihil affinitatis habet, sed potius modè inter *Zeam* & *Hordeum* nature est: radices, folia, culmi gemsculati *Zea* similibus: spicis Hordei modo aspera & acuta arista armata, singulis tamen majoribus: grano candidiore, utriculis ut *Amyleum* incluso, quod *Zea* modò à coenice in mola repurgari postulat.

Est ex æstivarum frugum genere; quare apud Mediomatricos cum alijs trimestribus seminibus in optimis agris seritur.

Si hæc planta à C. B. rectè describitur nostrum *Spjat Watley* esse non potest.

CAP. V.

De Hordeo.

Hordeum Velio teste, prius fuit *Ferulam*, unde per aspirationem scribendum liquet. Videri possit Hordeum dictum ab *horro*, est enim horridum ob aristas hispidas & mordaces. Sed malum statim *ferulam* & *forbea* *typhum* esse originis, nempe à *typho* ali, *nutris*, unde *typhum* alimentum à quo *forbea*, sed in *ferulam* à *in d* convertitur: *Vossus Etymolog.* ubi plura vide.

Hordeum à reliquis culmiferis spicatis grano, coenice crassiore undique acie adherente, nec ullis præterea glumæ, tacto differt; ab *Oryza* spicâ simplici conspectiore.

A. 1. *Hordeum distichum* Ger. J. B. Park. C. B. *Common Watley*.

Breviore culmo est quam vel Triticum, vel Secale, sed spiculis tamen interdum, & in lætiori solo bicubitali, quinque plurimum, interdum sex geniculis intercepto, ad quæ singula folia culmum aliquoties obvolvunt, inâ Triticeis angustiora, liperiosa nonnunquam, aris lata, & quosque culmi obvolvunt plano quodam polline plerumque obducta. Spica longa asperisque horret arista, quæ singula à singulorum granorum capitibus exeruntur: grana vero glumâ tenet, simplici clauduntur, quam nullâ tritura deponunt, nisi vel molarium contactu, aut laculi asperioris, calidâ prius macerata, aut denique palâ. Distichon nominatur hoc genus quòd duas habeat granorum ordines, quibus tamen interjecta & aliorum malimenta, sed quæ tibi aliud sint quam inutiles glumæ.

Sepole per maturitatem molliores sunt, minùsque fragiles quam triticeæ, unde & succulentiores sunt, & pabulum bobus & vaccis alendis commodum & pinguis suppeditant. Spicæ ob longitudinem & gravitatem plerumque nutant & doctum incurvantur, & vel viginti interdum grana in singulis veribus continent. Radices ut in reliquis culmiferis fibrosæ. Ab eodem grano plures stipulæ exeunt.

Seritur hoc genus Vere, nec enim hyemes nostras asperiores tolerat.

Tempus.

A. 2. *Hordeum distichum spica breviori & lætiori, grano conferto.* An *Hordeum distichum minus* Park. *Hordeum distichum Germanica Oryza* J. B. *Zea ribon* seu *Oryza Germanica* C. B. *Spjat Watley*, or *Wattie-doo*; *Watley*.

Hoc à præcedente differt staturâ plerumque breviori; spicâ breviori lætiorique, grano magis conferto, & à scapo medio exantibus, arista quoque brevioribus nonnullis: quoniam & ab avium injuria tutum esse creditur, quia grana ejus ante perfectam maturitatem à spicâ difficillius avelluntur.

Hæc duo genera apud nos in Angliâ hyemem non ferunt, ubique seruntur Vere.

Tempus.

Inter geminos granorum versus duo alii utrinque, i. e. quatuor gemini intercedunt, palacæi, nullum granum continentes, mollicillis & brevibus arista donati. J. B. *Hæc & in Hordeo vulgari habentur, sed conspiciuntur sæpe in hoc genere.*

A. 3. *Hordeum*

frigere, torere, in cerniculo cribrare, aspergere, molere, manu sudare, mandendum apponere.

Rusticos pro pane alicubi ea usus olim legitur. Veteres etiam Græci milibus potentiam præbebant. Romani tamen milites ipsius imbecillitatem damnavit. Maza est Pulenta cum aqua solta, aut cum aqua & oleo permixta.

Uva Aeno Hordium est madefactum, quod germen emisit, & deinde una cum enati ligula totum est. Maltum recentiorum ex quo fit Cerevisia describere videtur.

Maltum apud nos in Anglia ex Hordeo disticho potissimum conficitur, quæquam apud Septentrionales, ubi distichum non provenit, è polystico fiat. Modum conficiendi breviter describit Lobelius, cujus ideo verba adferemus.

Hordeum biduo & tribus noctibus aqua maceratur, deinde effusa aqua in horreum acceratur, loco ventis minus pervio, quoad perperillos radicum cirros & pullulationes (hyeme quidem tardius, vere autem & æstate biduo aut triduo) emiserit. Mox prorsquam nimium incalecat in arca complanata sulcatim dispersam sesquialinari densitate, ter quævis die ac nocte aperto aere subvertitur : octo vel decem [imò plures] dies continuos versando perficitur. Tandem in tabulato petulo igne subdno, vel calatho vimineo acuminato tecto fornaci aptato, & Hordeo superstrato, igne leno è palea, cremis vel arido ligno, [palea seu stramen huic usus aptior est, nam lignum odorem & saporem fuliginem Malti & Cerevisie inde confectæ communicat] furnacis ostiolo admoto, sesquialinari intervallo ab imo interposito, exsiccatur quoad molis frangi queat. Hyeme & Vere laudatissimum efficitur. Quæ vero Malti faciendi modum accuratam lore desiderat ea sufficere scriptores consular. Nam de his prolixius agere instituti nostri ratio non permittit; & consulat Transact. Philosophicæ N. 142. p. 1069.

Bera sive Cerevisia ex Malti & Lupuli Salictaris floribus seu potius fructibus, modo proportionè certis aqua dulci permixtis coquitur. Et simplicissima quidem ac purissima talis est: Proxima quæ Tencum, Zzam aliisque fruges una cum Malti hordeaceo admittit. Quæ verò præter fruges, herbas, semina, flores, aromata aut alia hujusmodi permixta habet, compositæ quædam Bera sunt ac medicatæ ab Hordeacea Trinocivæ & sapore & qualitate dissidentes. J. B.

Veteres ex hordeo potum varus nominibus appellabant, Quædam, ut Hierodotus, *isou asihou*: Aristoteles, Athenæo teste *isra* dixit: alii *Spou*: Aegypti apud quos olim in usu fuit, hordeaceam portionem *Spou* appellabant, Theophrasto & Plinio testibus: Hispani, autem Plinio, *caliam* & *coriam*, Galli *cerevisiam*. Ex *isidem* [frugibus] sunt & potus, *zythum* in Aegypto, *calia* & *coria* in Hispania, *isrocissa* & *plata* genera in Gallia aliisque provinciis, L. 22. c. 25. Dioscorides autem Hordeacæ potus genus *Zythum*, alterum *Cervi* nominat.

Hæc autem omnia, inquit J. Bauhinus, sive similia sine genera diversis appellata nominibus, sine proprietate aliqua discrepantia, cum Bera sive Cerevisia nostra in eo convenire possunt, quod ex hordeo & frugibus componantur, præparatoris tamen modo, vel alia qualitate aliqua ab ea fortalis differunt.

Dioscorides & Galenus *Zythum* Antiquorum multos nominibus damnant & improbant: verum suspicamur non satis perspectum illis fuisse *zythi* præparandi modum. Quicquid sit de *zytho*, nos fidenter affirmamus non dari potum salubriorem Bera sive Cerevisia hodierna, si modò ex bonis frugibus ritè præparata, & probè decocta tanlongue idoneè fermentata fuerit: Copiosum bonique sacci alimentum præbet. Nos verò generosiorum fortiorumque Cerevisiam in quotidiano usu improbamus; ut & nimis tenuem & aquam, mediam inter has eligimus, & saluberrimam existimamus.

Modum conficiendi Beram seu Cerevisiam breviter describit Lobelius in Adv. part. ult. his verbis.

R. Malti mollis, leviter contriti modis Britannicos octo: cui superfundit aquæ fervens limpidioris ferventis, in qua aliquot manipuli turris tritici incocti fuerint, quantum sitis sic insudando dobo Aureliano aut Aquitanico & semiss. Exactè mixta, insula calide possent tres horas; deinde foraminulo paleæ opereto aut duplicato fundo apto subvertant. Id quod transmissum est [Belgæ & Angli *Wort* vocant] recoquat semihoram, sesquihoram, aut aliquot horas ut melius contervetur, adjectis unc. duodecim florum Lupuli Salictari: mox longo litore saca, depressis labris vix pedem alto perfrigerantur. Et hujus decocti frigidatis libra octo vel decem, fermenti sive facis Bieræ vel Alæ potentioris libra aut sesquialibra adduntur exactè agitando, loco tepidore permittentur, stragulis operendo, semihoræ reliquum liquorem affundendo, ut commodius fermentescant. Quibus absolutis transcolantur; vasa adimplentur, demumque fermentatione absoluta, exactissime occluduntur, eidem Malti novam affundunt fervidam, transcolant, eoque tenuem Cerevisiam concantant. N. Quo durius liquor Malti impregnat, *Wort* dicta decoquitur, eo durabilior est Cerevisia, & ætatem melius ferit, ceteris paribus.

1. Quò Maltum magis exsiccatum totum & adustum fuerit, eò Cerevisia magis confecta coloratior & rubicundior evadit, particule enim adultæ huic colore communicant, Cerevisia è Malti leno igne exsiccatò pallidior est seu candidior.

2. Lupulus Cerevisie incoctus eidem duratis aservandus & ab adultæ turris infervit, quod efficit amarorè insigni qui pollet, quin & eandem salubriorem salubrioremque reddit, nimium Alæ lenorem attenuando, aperiendo, asurgendoque; Ala, præsertim si generosior sit, corpus minus obelium & pigrum reddit, Cerevisia lupulata calore suo dissipat pinguitinem, corpusque vegetior & ad motum aptius est.

3. Lobelius, quamvis natione Belgæ, faretur Cerevisiam Britannicam qualibet Septentrionalis bonitate longe superare: idoneis testu, qui in plerisque regionibus ubi in usu est Cerevisia, peregrinata fuerat.

4. *Hordeum eximium caespitium* C. B. *Cevadilla* seu *Hordeum caespitium Americanum* Park.

Planta est à Nicolao Monardæ propofita, quæ in Hispania nova *Cevadilla*, id est, Hordeolum vocatur, à similitudine quam cum nostro Hordeo habet, in spica & vaginulis quibus sensim includitur, sed eo minus & Lini semine nequaquam minus; & longè aliâ facultatem præditum.

Vires

Hujus semen admodum urcente vi præditum est, ut in gangranis, pottidæ & impostis ulceribus usitatis quos sublimatum & causticum ignitam effectus præbeat: pulvis sensim insperis verum in ulceribus necat, ulcera putrida expurgat, pro ulcers magnitudine, majori minoreve quantitate insperis, modo præservativa, quæ in horum remedium usu usurpari solent, adhibeantur. Ad hec facultatem infringendam pulverem aquâ rosarum aut Plantaginis excipiunt, & Linnam intricatum ulcibus & gangranis imponunt, dein medicamenta sarcotica adhibent. Hæc omnia Mistrando.

CAP. VI.

De Oryza.

Oryza ut semen ex India primum fuit allatum, sic & indidem nomen Lobelio ascriptum videtur.

Oryza gluma seu cortice crassiore arctè adhaerente grana, spica laxa, è pluribus composita à reliquis frumentaceis distinguitur.

Oryza J. B. C. B. Ger. Park. & *aliam* *amam*. *Sirt.*

C. B.

Radices est triticeis, culmo bicubitalibus & tricubitalibus, striatis, triticeis & hordeaceis, crassioribus ac robustioribus, geniculatis: *folia* longis, arundinaceis, carnosis, Pterocia hand ab imitibus: in culmo cacumine non spica sed *juncus*, Mili aut Panicæ modo, in ramulos divisa, in quibus semen utrinque impari ortu & alternatim provenit, cortice subtili, aspero, & angulosis striis in longitudinalem donato, superne villosis, ovi figura, toctum, & asperè aristâ armatum est, quo exuto granum quovis præstantissimo Tritico candidius, pellucidum, durum, Aveni brevius & crassius comparatur. Flores ut in Miliio purpureos esse, & eodem tempore flores & semen proferte dicunt.

Locus.

Oryza præcipua omnium Indiæ Orientalis regionum annona est, indeque primum allata in Græciam & Italiam. Hoc etiam solo in universa India frequentissimum ejus usus est, ut in omnibus fere ejus regnis, provinciis, insulis copiosissimè seratur & colatur, ut *Bengala*, *Pegæ*, *Cambaja*, *Ceylon*, &c. Quædam in Ægypto magno provenit fertur, aliubi etiam in Syria, & Fortunatis insulis: In quo Hispania & Italia, ubi nos in Ferrarentis ditionis locis palustribus Latam observavimus.

Humidis locis delectatur, & in istis aquis crescit. In insula *Zulus* aquas in stagnis reseruant ad Oryza satam irriganda: & ibidem, (aium) terra pinguis perpetuis exundationibus ita mollescit, ut Oryza messem facturi ad dimidiam gemi in aqua vorientur. Sic, auctore Porta, in Salernitano agro, ubi patenti, tuda planitie maximo provenit fertur, curpis & sicibus & furin ductis quocies opus est rigant, aliis nullam aut cassam segorem laruram: ita ut mirum sit tam siccam & exsiccum gramum tam humidum requirere solus; terramque humidam & uliginosam tam præstantis saporis & salubris nutrimenti tam, siccam frumentum procreare.

Tempus.

Maturelca æstivis Solibus, episque messis serotina est circa æquinoctium Autumnale: quare Septentrionales regiones, licet humentes magis, tamen ut aliofas respicit, nec ibi ad frugem pervenit.

Vires & Ufus.

In cibo Oryza admodum est familiaris, apud omnes nationes Orientales præcipue apud Indos: concoctaque facilius eradit & ovi granor, ubi ex lacte bubulo aut Amygdalarum cremate, aut carnum pingui jure decocta fuerit. Danur utiliter in cibo dysentericis, colicis & diarrhæis affectis, præsertim ubi prius tolerata, in lacte, in quo ignis calculi fuerint extincti, decoquatur. *Marræ*.

Oryza Indis panis loco est, variis modis preparata: Preparandi modos vide apud C. Beulium *Thes. Bot. lib. 1. Sess. 4. cap. 29.* Potum quoque in multa Indiæ loca ex Oryza conficiunt. Vide C. B. *loc. cit.* Turci quoque ex Oryza pulvis efficiunt, & multa ex ea ferocia parant. Varios Oryzam ad cibum preparandi modos in Europa, ubi Triticum in panem venit, vide apud prædictum auctorem loco laudato.

Vulgi animos opinio pervasit Oryza frequenter vescentes obediens reddi: quare in quibusdam locis feminæ graciliores & macilentiores et frequentius utuntur ex lacte & largiore saccharo alimntes. Sed Veterum medicorum sententia contradiçit: ut qui inter *dyrryssa* seu leviter alentia, & *diarrhæa* sive quæ difficulter conficiuntur tam retulere. *Nabis aliter videtur, & vixit patris quoniam avulsum, nec videmus dantare calidum ut sentiam, ut scilicet usâ approbatam; Alium modum aspergere concedimus: unde & in hepatis foveis & miltione sanguinea, inque tunc acili esse alium aspergendum addit non abusus.* Farina etiam cataplasmatum repellentibus admiscetur, & in quæ mammarum ite expletam inflammationem arceat floribus Chamæmeli & rosarum additis. In hæmorrhæi hæudæ Helmontius Oryzam Aq. vel Lactis chalybeato coctam. *Dol. l. 1. C. 8. S. 16. D. Sacro.*

Oryza tenuis decoctum, in aqua, usitatissimum est apud Indos multorum medicamentorum vehiculum.

Liquorem vinosum ex Oryza extractum *Arak* alioq. vocant.

CAP. VII.

De Panicis.

Panicum, Græcis *Ἐριπύλον* & *Μαίλας*. Etymon Plinius adfert, lib. 18. cap. 7. *Panicum*, inquit, à *panicula* dictum. Ac paulo post ait, quoddam *Panicis* genus esse à *pans* parva *vaccinatum panicula*. At *Panicum* non *dicunt* à *panicula* dici; *Assarjia* enim repugnat, sed à *pans* cuius diminutivum *panicula*, ut *panicum* & *panicula* eisdem sint originis. *Pans* autem à *πῶς* pro quo *Dores* & *Eoles* *πῶς*: à *πῶς* autem *πῶς* à *πῶς* & *πῶς*, *Post. Etymolog.*

Panicum spica laxiore, & velut è racemis composita, grana minores à reliquis frumentis speciatim differt.

1. *Panicum Germanicum* sive *panicula minor* C. B. *Panicum vulgare* J. B. Ger. *Panicum alium vulgare* Park. *Panicum*. In *Gerardo* emaculat, *nomina* *duo* *ultima* *sunt* *transposita*.

C. B.

Radix nimirum valida & fibrosa, è qua plures erigit *culmos*, *Arundinaceos*, duorum plerumque cubitorum (silo tamen fecundo proceriores) rotundos, solidos, geniculis rumentibus, decem nonnunquam, præcinctos, ac sensim extenuatos, cacumine languido & nutante: quibus adnata *filia* *arundinacea*, *Mili* *asperiora* & *acutiora*, *tritici* *laxiora*, *unciali*, *latitudine*, *Arundinaceis* non multum dissimula, è geniculis exarantia, plerumque cubitalia. In culmis summo *spica* *oblonga*, *didrachmalis*, *raris* *pedalis*, *teres*, *crassa*, non ut in *Milio* *divalva*, sed *racemum* *instar* *compacta*, *ex* *grana* *Milio* *numeriosioribus* & *minoribus*, *rotundioribus*, *splendentibus*, *folliculis* *quibusdam* *sublevis* *obvolvatis*. In eo differentia quòd quoddam flavis, alterum purpureis aut nigris *spicarum* *fastigiis* *emicat*, & hoc quoque *avicularum* *injuris* *obnoxium* *est*.

In crescente *spica* à duobus *geniculis* *inferioribus* *culmi* *undiq;* *in* *orbem* *excrescunt*, & *in* *terram* *fibra* *descendunt*, quibus *culmus* *falcitur* *nè* *pondero* *spicæ* *nutantis* *sternatur* & *humis* *pro-cumbat*.

Seritur in agris in Germania, Gallia, Italia. Solum & terram qualem *Milium* *desiderat*, *nimirum* *levem* *solutamq;*, *arenosam* *item* & *fibulosam*, *modo* *hementem*. J. Bauhina *hujus* *varietates* *duas* *describit* & *deponit*: *nimirum*

[1. *Panicum panicum* vel *vulgare*]

Quod, uti provant in horto, *radices* *habet* *fibrosas*, *sed* *validas*, *subribentes*; *culmi* *verò* *duliti* *aut* *tum* *cubitorum* *altitudine* *loco* *fecundo*, *firmos*, *ex* *viridi* *rufescentes*, *crebris* *geniculis* *interceptos*, *ramulos* & *laves* *preterquam* *sub* *spica*, *que* *sesquipedalem* *longa*, *spiculis* *conspicuis* *densè* *congestis* *compositus* (in *minoribus* *plantis* *spica* *non* *apparet* *ita* *ex* *spiculis* *composita*) *in* *quibus* *semen* *Panicis* *vulgaris* *copiosum*; *gluma* *etiam* *non* *alia*, *sed* *aristis* *que* *inter* *grana* *plurima* *em-cant* *purpurascens*. *Folia* *Arundinacea*, *frequentia*, *vagus* *longis* *caulem* *involvunt*, *adòque* & *inferior* *vagina* *superiorem* *excipit*, *tactu* *aspera*.

2. *Panicum spica* *vestiter* *dividit*.]

1. *Panicum Indicum panicula* *vulgare* Park. *Panicum Indicum* Ger. *Panicum italicum* sive *panicula* *major* C. B. *Indian Panicum*.

Hoc *radice*, *culmis*, *foliis* *priori*, *ut* & *Milio* *per* *omnia* *simile*, *sed* *omnes* *in* *partibus* *fecundius* *exultat*, *maximè*, *panicula* *differt*, *siquidem* *in* *hoc* *pedalis* *longitudinis* *est*, & *duorum* *digitorum* *crassa*, *ad* *terram* *versis*, *granis* *numerosis* *hirtulisq;*: *color* *panicule* *etiam* *variat*, *in* *quibusdam* *caudicis*, *in* *aliis* *rufescit*, *in* *pluribus* *verò* *flavescit*: *sic* & *seminis* *color* *variat*.

Ego *hanc* *speciem* *potius* *Indicam* *quam* *Italicam* *dicendam* *puto*; *siquidem* *à* *quodam* *chirurgo* *Bristolium* *Angliæ*, *cum* *Lobelius* *ibi* *commoveretur*, *ex* *novo* *orbe* *delatum* *est*; & *spica* *eam* *in* *horto* *colta* *è* *semine* *pro* *Panico* *Indico* *misso* *ortam*.

3. *Panicum caryeum* Ger. *caryeum* vel *Indicum* J. B. *Indicum caryeum* Park. *Indicum*, *spica* *ob-tusa* *caryeum* C. B.

C. B.

Radix *est* *valida*, *fibrosa*, *amphioribus* *quam* *sint* *vulgari*: *culmi* *harundinacei*, *recti*, *crebris* *geniculis*, & *veluti* *articulis* *preeditis*, *lanigine* *obtus*, *vulgari* *Panico* *longi* & *quidem* *digito* *crassioribus*, *firmioribus*, *altioribus*, *humanam* *altitudinem* *sepe* *superantibus*, & *juxta* *radicem* *caryeum* *elegantis* & *nitido* *purpurascensibus*, *medulla* *fungosa*, *pallescente* *farcto*, & *velut* *in* *ramis* *divisum*: *siquidem* *inter* *folia* *è* *geniculis* *alii* *breves* *culmi* *prodeunt*: *filii* *vestiantur* *arundinaceis*, *ex* *singulis* *geniculis* *prodeuntibus*, *magna*, *longa*, *lati* *ac* *durò*, *medio* *terzo* *divisus*, & *per* *ambitum* *lenissime* *instar* *Milii* *Indici* (in *non* *valde* *dissimilibus) densatis*: *cuiuslibet* *culmo* *spica* *crassa* *infidet*, *que* *æqualis* *ubiq;*, *propemodum* *crassitudine*, *instar* *clavæ* *Typhine* *densè* *compacta*, *aliquantulum* *hirsuta*, *nonnunquam* *digitalis*, *interdum* *solum* *pedicaris* *longitudinis*, *spicæ* *cylinde* *simi* *conii*, *fastigio* *recto* *ad* *effigiem* *Mayræ*, *subcaryeum* *colore*, & *in* *respondens* *calidioribus* *latitudinibus*, *siquidem* *stamina* *florum* *ex* *coraculo* *dilato* *nitent* *Sarissæ* *petiolis* *oblonguiculis* & *gracilibus* *mixta*, *capillares* *utriculis*, *que* *ipsam* *spicam* *hirtam* *efficiunt*, *inclata*, *que* *eximie* *parte* *glumæ* *prominente* *vulgari* *crassiora* *magis*, *rotunda*, *levia* & *subcaryeum* *sunt*.

1. *Panicum* *in* *Europam* *pridem* *fuit* *allatum*.

4. *Panicum*

LICH.

4. *Panicum Indicum* (speck long.) *Ind. C. B. Americanum* (speck longissim.) *Ger. crnac. Americanum* (speck pedale) (speck J. B.)

Spicam habet sesquipede longiorem, crassam, firmam & compactam, non ut in priore aequalis, sed paulatim ex ima parte gracilescens: semina precedenti Panicis similia, nec multum maiora, sed plura simul juncta, & glumâ bifida inclusa, breviter pediculis unita.

Linn.

Londino à Jacobo Garoto primum accepit Clavius, postea similes ex Guinea.

Vireo.

Tres Panicis Indici species depergit Parkinsonus, quarum icones apud ipsum vide.

Gusta, qualitate & viobus Milio respondet, quare in cibo, pane & medicina ut Milium usurpâ potest; unde magis per universam Germaniam, Ungariam & Bohemiam, perhibente Clavo, vis est: etiam in alimentum coctis ac pulvis ex eju semine deglutato sunt non ingrati saporis. At, inquit C. Bauhinus ex Veterum sententia, malis sacis est, difficulter in ventre coquitur, flatibus parit, alvum alstringit, faciat atque refrigerat: adeoque Milium Panicis ad omnia praestantius. Lac ei admiscere (in pulve) salutare inventum fuit, tollit enim aut saltem minuit praedicta mala.

Pala cum lacte in capitis doloribus à bile causata, hæmorrhoidis & pollutione nocturna commendatur. Ventris fluxus, cum ipsum etiam Milium, nonnihil fuisse Galeno; in lacte caprino coctum & bis die haustum, Pleno, cui & sic prodest ad tormina. Form in cataplasmate illum efficacit & refrigerat.

Apud Italos ad Gallinarum, columbarum, saginam potius quam ad hominum alimentum fertur. Nos etiam non dico cum C. Bauhino, illud rusticis fossoribus & melioribus, sed pueris & aribus coactibus commendandum relinquamus, & melioribus frugibus Dei gratiâ reperit utamur.

CAP. VIII.

De Phalaride.

Spicâ è squamis compactâ, culmo tenui, grâis lucidis à reliquis frumentis specatis differt. Phalaridis nomen accepit à *phalax*, quod semen splendidum candidumque reddat. Spicam spumâ alba obductam esse non semel observavi. *Bot. à Stapel in Theophr. hist. lib. 8. cap. 7.*

1. *Phalaris J. B. Ger. vulgari Park. major semine albo C. B. Canary-grass, i. e. Gramen Canariense, quia ex insula Canariensibus delatum est, & Persicis Canariensibus alenda inferri.*

J. B.

Culmo adolefcit sesquipedali, Hordeaceo [C. B. Zea non dissimili, graciliore tamen] quatuor aut quinquegeniculis nodoso: *foliis* Hordeaceis, [parvis Arundinis aut Tritici similibus C. B.] radice habitiore [parva, mellefida & fibrata C. B.] Uniuscuque culmo (qui ex una radice plures pro- nascuntur) *spicæ* singula insident, sesquipedalem aut unciam longæ, turbata, foliaceis glumis stratis squamatum scabularum ritu compactiles, è quartum sinu tremula tholocalorum pallidorum filamenta prominent, videri, postea loculis *semine* reconditur lubrico nitore Mili, candidum, forma Lini, sed magnitudine superat.

Linn.

Sponte oritur non in Canariis tantum insula, Fortunatis olim dictis, sed & in Hetruria, autore Anguillara, inter segetes, & in Hispania, & in Gallia Narbonensi circa Monspelium.

Vireo.

Phalaridis semen, & herbe succum, & folia pota ad vesicæ dolores & cruciatus commendantur. Alimento esse & nonnullos panes ex eo pastendos curare, ceteraque ad calculum testiculique vesicæ perhibet Lobelius.

2. *Phalaris major semine nigro C. B. J. B. Phalaris semine nigro Park. Canary-grass, with black seed.*

E radicibus fibrosis, masculis, fibellis tenuibus rubentibus cetrata, tres quatuorve aut plura pro- ratione soli *culmi* erigit, bacchitales, quinque, vel sex geniculis interceptos, ad quorum singula *spicæ* *folia*, *seminum* lita oblonga, Triticeo sere parva, nec folia tantum, sed ex inferioribus articulis rami seu culmi secundarii exiunt. Spicæ quam precedenti longiores & graciliores nonnihil, viridiores, è squamis lineis virentibus & albidis stratis compactiles: *foliis* albidis, è tenuibus filamentis pendulis: *semine* minorâ, per maturitatem fusca, seu nigricantia, imâ parte albicansis quantum bifidum habere videntur.

Linn.

Circa Messaniam in Sicilia, Bais & Neapoli in Italia, & Monspelium in Gallia Narbonensi spontaneam observavimus.

3. *Gramen Phalaridis Linnæicum.*

Ex semine Londino nullo succrevit nobis hoc genus Gramina, annis & saporis, cuius vix de- dantibus, ad terram reclinatis: cui *Spica* brevis, crassa, Phalaridis, è folliculo vix excurrit.

4. *Gramen*

* 4. *Gramen Phalaridis minus* C. B.

Folia est oblongis, angustis, viridibus, quorum unum vel alterum culmos cubitales tenues tubi instar cingit: In culmorum summo *spica* Phalaridi similia, sed angustior, trium unciarum infidat. Nec radicem nec semen vidit descriptionis autor C. Bauhinus.

5. *Phalara bulbosa semine albo* Park.

Park.

Crescendi modo Phalaridi vulgari similis est, *culmus* tamen tenuioribus tenerioribus, elatioribus. *Folia* tum quæ ad culmorum genicula, tum quæ ad radicem molliora lenioraque: *Spica* minores sunt & nonnihil longiores, nec perinde compactæ, ad tactum etiam molliores, *semina* minora sed candidiora producentes. Pro radicibus bulbuli subsunt multi, coacervati, fibras longas in terram profundè demittentes, quibus firmiter ei inhaerent, nec quotannis altiarum specierum modo emouuntur, sed in multos annos durant in magnos densosq, caespites excrecentes.

In Hispania inventam attulit Boelius.

Locu.

6. *Gramen phalaridis spica panicæ* Secalium.

Culmus est procerus, firmus: *folia* longis & modicè latis, *spica* palmari Panicæ, hoc est, è multis brevibus & confertis *spicis* coagmentata, glumis acerosis è viridi albicanibus, nulla omnino arista dotata. Semen nondum maturum erat, cum observavimus: In Sicilia.

CAP. IX.

De Frumento Indico Mays dicto.

Hæc planta insignibus notis ab aliis omnibus frumentaceis differt: Est enim paniculata simul & spicata. Panicula scilicet caesa, acerosa summo culmo infidat, *spica* crasse tres quatuorve è foliorum finibus exeat.

1. *Tricum Indicum* J. B. *Frumentum Indicum* Mays dictum C. B. *Item Frumentum Indicum* Mays dictum alteram ejusdem. *Milium Indicum maximum* Mays dictum, seu *Frumentum Indicum* Park. *Frumentum Turcicum* & *Indicum* Ger. **Indian Wheat.**

C. B.

Radicibus nititur numerosis, duris, fibrosis, sed minimè crassis, & albis: quibus ab imo caulis geniculo sulca quædam in terram demittuntur, quibus culmi à vento agitati sustineantur, qui Arundine, septem vel octo pedes alti, rotundi, pollicem crassi, rigidi, multis geniculis articulati, inferna parte purpurascens, qui paulatim extenuantur, solidi, densi & albi medullâ, instar Arundinis Saccharine, farcti, qui dum adhuc virides & succulenti sunt, dulcedine sunt Sacchari. *Folia* est Arundineis, cubito plerumq, longioribus, tres aut quatuor uncias latis, venosis, marginibus aliquantum asperis: *panicula* summo caule dodrantalibus, gracilibus, raris, jube modo multiplicibus, aliquando in 15, 20, & etiam 30 *spicas* procumbentes divisa, aristis carentibus, & flori tantum emittendo nata. Etenim flores summo culmo mutant, non fructu destinati, non umbra, sed ornata spectatores oblectantes, naturæq, luxum ostentantes, quod raro in aliis conspicitur: nam cum deflorescunt exarescunt, & nullam semen producunt. Flores autem Secales instar, si tunc candidi, nunc laevi, nunc purpuri coloris, proæ videlicet fructus sive frugiferæ *spica* colorate erunt. Et quod singulari huic plantæ videtur esse, quod alia parte florem, alia fructum ferat, & non reliquam fugam more in panicula semen fructumve proferat, sed à latere ex culmorum geniculis, medio foliorum & geniculorum sine *spica* arista carentis, longæ, crasse, rotundæ, cylindracea effigie, fructum ferentes, & ab uno culmo tres quatuorve alterno ordine exiunt: at à singulis nodis singula, quæ multis foliaceis tunica vaginæ instar obvolvuntur, in summo tam aride convolutæ ut nec aquam quidem transmittant, quæ *spicas* corrumpere possit: & *spica* cum ad summam magnitudinem pervenerint *Piceæ* arboris conos tum longitudine, tum crassitudine æquant, & è vaginalium verticibus filamenta capillacea eodem cum granis colore dependent, quæ ab ætate & vorumque injuria tute esse possunt. Vagina cum exaruerit denudatis grana apparent *Pan* magnitudine, omnino nuda, nullâq, folliculo indula, levis, subrotunda, & quæ mediastriâ insignitè tundi, hæret: propter compressionem angulosa, frequenter, quæ sæpe in uno racemo apud Indos 700 (apud quos sæpe ex uno grano 300 modis colliguntur) coacervata, at archissime puncta, ac in octo, aut decem, raris dodecim ordinis, in longitudinem rectis lineis digesta: quæ ratione coloris variant, modo candida, interdum lutea, modo purpurea, nonnunquam fusca aut rubra, medullâ tamen candidâ, & sapore ceteris frumentaceis dulciori ac frivoli.

Interdum panicula, Camerario monente, etiam grana adnascuntur, ubi nondum plene sese explicavit, potissimum circa imam partem, quæ tunica vestitur, quasi secunditas nuditate evanescens pereat, cadensq, à tempestatum injuriis operimentis integra conseruetur.

Quid paniculae fructiferæ infuscandæ à *semine* seu *fructu* remota grana non huic frumento propriam esse, sed à *Lactoyne* Joh. dicta communi.

Quid verò panicula hæc sumens ad generationem masculæ sit: & ad *spiculas* seu *lactas* naturæ sit?

latum lantat comparate, *Barbani non dicitur*: Verisimile enim est apices feridos *Barbana* masculini
vires proferre, & semina secundum ruborem, ut in *Parte Generali* docuimus.

Fraxea *Gerardus* nostras, *Tabernamontanum* sicutis, pro granorum colore species multiplicat, cum ex
eodem semine perat, haec veritate haberi possunt.

Frumentum hoc *Indie Occidentalis* indigenam esse (si cuius omnium fieri regionibus reperitur) indig. in
Africam, Aſiam, & Europam dilatam, *Mexicis* confirmatum; quoniam contradicendi *Indis* repugnant
Adversarium auctori: *Milium* autem *Indicum* *Bloni*, quod *Nocera* principis in *Italiam* fuit conuictum,
Milicam seu *Sergam* esse minime dubitamus.

Tempus
Luce.

Sentur *Milium*, in singulis serociis, inter se passim unum distantes, quaternis quavisve granis
conjectis. Nalictur paucis diebus, & quarto in *India* mense demittunt. Apud *Germanos* sibi in
agris observavimus; ubi terram probe *Barocaram*, pinguem & humidam experit. Frigoris & pru-
nium impariam est. Tempus serendi pro regionis qualitate & temperamento variat: alibi seritis,
alibi citius serendum. Alibi etiam breviori temporis spacio semina peritice & ad maturitatem per-
ducit, alibi longius requirit. Est genus triennale; est quod duobus tantum mensibus & seritur &
metitur. Quoniam aliud est quod 40 tantum diebus a sinitate maturit; si *Aurore* fidelis.
Quod in altitudinem excrescat, & plures spicas producat, vel soli fertilitati, vel calidi temperati
debetur.

Floris
Uj.

Quoniam hoc frumentum in *Medicina* posse novulum satis constat (inquit *J. Barbani*) quia an-
tem dulcedinem & lenocetis quendam grana ser se ferunt, hinc debet idem cum *Turico* habere
temperamentum, ac proinde eisdem etiam facultates obtineti necesse est. Grana levis torretur in
candillissimam farinam, que in panifica subinde cogitur. Pans tamen ille lentore quiddam &
obstruentis nature habet. Hinc est, quod in *Aſia* & *Turcia* illius nullum in cibo usum esse, nisi
cum assueta prout unqua, dicunt. Pans ex eo paratur (auctore *Dodonæo*) mediocriter quidem
candidus est, absq; susturbibus concinnatus, sed durus ac ficus, veluti *Isococtus*, nihilq; lentore ha-
bens; concoctus est eo causis difficilis, corporis nullam aut omnino exiguum alimentum prebens,
tam descendens ac alrum constringens, veluti ex *Milio* aut *Panico* factus.

Franciscus Hernandez frumentum hoc valde celebrat: Temperatum est (inquit) aut ad cali-
ditatem humilitatemq; paulisper assueta, substantia mediocri, concoctus facile, precipue his qui
eo victu uti consueverunt, non crassa, aut, veluti quidam opinantur, obstruentis & viscosa, quod vel
India ipsi, qui ex eo pane in placentalas formato vivunt, nec tamen obstruenti, aut ducolores con-
spiciuntur, periclitari licet: nihil affirmantibus, nullam in ventriculo gravitatem sentire post opo-
las, imò post paucas horas rursus ac si nihil ingestissent elurire, & magna aviditate, si alie copia,
reperere nutrimentum, nec vel de nomine solo ad adrentiam usque *Hispanorum* *Insulam* novale:
quoniam quod nullis est apud *Mexicanos* celebrior agritudinum acutatum & commodior victus, qui
etiam *Prisax* prefertur, quod mille experimentis comprobatum confirmatumq; est: Calidius
utique (sunt) coctum descendere, corpora quantum sat est nutrire, nullum inferre gravitatis
sentium, mollire ventrem & poctis, calorem sibelem demulcere, (perfectum si pulvis epi ex aqua
permutatur brumali tempore gelare) urinam evocare, viasq; omnes extirgare. Reliqua apud ipsum
vide, ut sic vago modo illius parandi tum sanis, tum morbo aliquo affectis.

C. Barbani, nescio à quo edoctus, scribit *Indos* si nimium utantur hoc frumento in cibo, tu-
midos & frabulosos reddi. Imò (inquit) pueri *Guineenses*, qui hoc frumento sepe panis loco
utuntur, videlicet granis è spicas excussa, usque nonnihil tusta & preusta, si paulo frequentius
utuntur, à febre se se vindicare non possunt, cum sanguinem nimis calidum & quasi adustum
figunt.

Pans & *Vini* ex hoc frumento conficiendi apud *Indos* modum vide in *Histor. C. B. lib. 1.*
Sect. 4. cap. 11.

Pans usus est ad cataplasmata mollientia & suppurantia, nam suo lentore meatus obstruentis
apostematibus suppurandis periculosus est. Foliorum item recentium succos refrigerandi facultatem
obinet, & *Erysipelibus*, si panni intincti applicentur, conducit.

2. Frumentum Indicum *Milij* dillum minus *C. B. Indicum* alterum seu minus *Park.*

Quod mediam precedentis altitudinem vix attingat, cupisque spicae frugifera non ad culmum
rura latera producat, sed panicula cum desoluerint locedunt cetera ex similibus, cum invalido ubi-
cine sibus *Tabernamontani* fide & auctoritate naturæ, nobis quidem dubium & suspensum est.

Pro culturi & usu frumenti *Indici* *Milij* dicti consulantur *Transact. Philoloph. N. 142. p. 1065.*

C A P. X.

De Milio.

Milium, *Grecis* *μύζα*, ut *Varroni* placet à *Grecis* derivatum est, nam illud *græcis*
post *μύζα* dicebatur sibi *μύζα* communi cum *Panico* nomenclaturæ. Verum præbet.
Vossius *μύζα* vocem apud *Dioscoridem*, *Galenum* aliisque veteres pro *Panico* ducit.
taxat accepi. Probabilior ergo quædam videtur *Felsi* opinio, *Milium* dictum à copia seminum,
quasi *millesemum* ferat granum.

Milium autem *esset* *μύζα*, granis minoribus, subrotundis, lucidis ab alio frumento paniculatis
distinguentur.

1. *Milium J. B. Ger. Milium femine laeta C. B. Milium vulgare allium Park. Spillet with
pellito seed.*

J. B.

*Radix crebra, fibrosa, valide, albicantes. Pluribus culmis, crassiusculis sesquicubitalibus, brevi-
bus internodiis geniculari surgit. Folia Arundinacea, unciali latiora, hirsuta, praesertim qua parte
culmum obvolvunt densa lanugine obsita sunt, & evidenter striata, postquam a culmo abscesserint
laxa & glabra paulatim evadunt. In summis stipulis sibi explicatur ampla, atro-purpurea, dorsum
reflexa, ad longa tenuisq; stamina intermixta glumis comprehensa grana, labro leviter lucida,
parva, colore fulvo aurcove appensa obtinens.*

Levem solatimque terram desiderat, nec in sabuloso solum, sed in arenoso quoque provenit, *Levi.*
modo vel humido solo, vel riguo, nam siccum cretosumque reformidat. Antequam ver commode sibi
non potest, quoniam teporibus maxime letatur. Ultima parte mensis Martii omnimodissime
terre committitur. Nec inopem gravi sanonem cultoris onerat, quippe Sextans ferè quatuor
(quinque Palladio) jugerum implet Columelle. Si dentis seminetur nocet. Tertio post sa-
nonem mense pericitur: est autem ad annonæ civitatem & famem remedium permaximum.
Contra tempestates enim univèrsis acrisque malignitates resistit, & nullo tempore ditione potest,
licet frugum cæterarum floritas invaldecat.

Habemus aliquando hujus varietatem semine aureo.

2. *Milium semine albo.*

Hoc quamvis ab omnibus Botanistis cum precedente ad idem caput reductatur, easque tantum
varietas habeatur, est tamen reverè species distincta: liquidem non tantum granorum colore ab
eo differt, sed statura & magnitudine, & florendi tempore, & sibi seu panicula: illo cretius
multo elatius est, ut quod ad bicubitalera aut tricubitalera altitudinem assurgat, culmo crassiore, ge-
niculis pluribus intercepto, foliis latioribus longioribusq; multo, pallidius viridibus, comâ ma-
gis inflexa, albicante.

Semis deniq; paniculam explicat, nec ferè in hortis nostris ante exitum Julii.

Hec species esse videtur quam describunt Joan. & Caspar Bauhini.

3. *Milium semine nigro C. B. semine nigro spadicato J. B. Milium nigrum Ger. Park. Blatli
Spillet.*

C. B.

*Caulis est altiore, tenuiore, non hirsuto sed glabro; sibi latiore; foveis nigro oblongiore, medullâ
quam in priore albo, illoque deteriori, non minus tamen arido, ut columbis & gallinis nutrien-
dis, expetitur.*

In Argovia Helvetiorum frequenter feritur *Milium nigrum*, quod foliis est vulgari latioribus,
caule non adeo alto, sibi spatâ & minore, semine aliquantum majore & rotundiore, & ad pulvis
conficiendas altero longè utiliore. An à precedente diversum?

*Milium refrigerare & siccare Veteres & Recentiores consentiunt. Mali suavi est, difficulter con-
coquitur, alium colibet, & flatus generat. Attamen hoc multis gentibus in cibo gratissimum fu-
isse, & hodie quoque esse, inter omnes constat. Meliorum frugum usum in panificia olim cog-
noscunt, nisi testatur Galeus, Plinius, Dioscorides aliisque è Veteribus. Apud Italos (siquè C. Bau-
hinus) videmus frequenter panes ex Mili confici, qui flavent, quos calidi devorati sua dulcedine
placent, & à multis, etiam non urgente necessitate, expetuntur. Cum verò panis ex Mili obdu-
ritus planè nigritans est. Ex farina quoq; ipsa & lacte levi lagana & placentia parantur que nisi
mix cum cocta fuerint odantur, in manducando glutinose & ingratae sunt. Pulvis candidatus ex
Mili olim factum fuisse testatur Plinius. Sarmatam quoq; pastis hac maxime parte alunt, &
cruda etiam farina equino lacte, vel sanguine è cruris vena, admixto. Hac pulvis etiam Germanis
hodie in usu est, cum lacte cocta, butyro addito, & saccharo plerumq; asperso: Hujusmodi etiam
pastes in Angliam pridem introducte & in usum recepte sunt.*

Ceterum Mili farinae olim usus fuit in fomentis ad tormina, capitis quoq; & nervorum dolores.
Fors impositum fuit in facie; nam in cataplasmatibus ob friabilitatem difficilis eius usus est. Qui
plura de eius facultatibus & usibus desiderat, C. Bauhini theatrum Botanicum & J. B. historiam
adeat.

Si membrana cerebri fuerit vulnerata, egregie ipsam conglutinat (inquit Archigenus) Calamita-
tha succus insusus, & farina Milii arida inspersa.

Ad sudorem provocandum, R. Decoct. Mili cum pulvis & sicca. Nobile sudorificum & dis-
tenticum vocat Otho Heurnius. Vel R. Decoct. Mili ad crepaturam oculi Jui Vini albi Jij. Exubo
calide agrotanti. Vocatur sypapa S. Ambrosii. *Cherson.*

4. *Milium Sabazum C. B. Mili Milium cretium argenteum ex Cayo J. B.*

C. B.

Granum est parvum, rotundum, Mili ut nomine, ita & forma non absimile, sed gustu
dulcius.

Hoc in Guinea, in regno Sabo *Mili* vocatur, & hoc frumento incolæ præcipue vescuntur,
ex hoc panem conficiunt: granum probe maceratum lapidi plano seu lateri imponunt, hincque
alio lapide manibus suis alidoe terunt, non siccis ac pastores coloramenta sua committere solent,
comminutum aqua subigunt, & ex ea rotunda liba aut globos conficiunt, quos luteis aliteo fructu,
pauisive involutos coquant, quantum ipsi sufficere videntur. Panis hoc ingrati gustus non est. Ex

eamdem grano potum efficiunt coquendo aut aliter miscendo; gustui gratissimum & saluberrimum.

Milium fimum argenteum ex Cayo J. B. sic describitur, Vulgari Milio magnitudine colit, magis rotundum in acutum umbilicum terminatur: tenuis, argenteo, valde laevio corneo & à Medulla levi attractu separabilis. Medulla Milii vulgaris, alba, insipida ferè, dentibus friabilis. Romæ ab amico acceptam a male Chorleus, nomine Milii ex Cayo.

C A P. XI.

Milium arundinaceum, vulgo Lacryma Jobis J. B. *Lacryma Jobis* Ger. Park. *Lolopernum arundinaceum* C. B. *Job's tears*, & *Steed-millet*.

J. B.

Culmibus donata est culmibus unum aut alterum altis, geniculatis: folia autem habet Turcica frumenti, cubito subinde longiora, uncias duas lata, quibus emicant sunt illa quæ in raris nascuntur, ex quarum alia petioli emicant, quibus transadiguntur singula grana upharum singula, raris densa, laeviora polistillim, nitida, ante maturitatem sterilescentia, postura ex nitido rubescentia, duritie lapidea, Cæter æquamita, superiorem parte turbinata, unde exit inanium glomerum spica mystica.

Linn.

In hortis colitur. Parkinsonus in Creta insula, Rhodo, Syria aliisque Orientalibus regionibus sponte provenire ait. In Anglia & frigidiorebus fermen ægrè maturat.

Semine maturo & aqua ferventi immixto globulos parant quibus funiculo tractis utuntur ad numerandas peces.

Fert.

Est eximium, si expertus hæc scribat Lobelius, ad calculum renium & vesicæ laburram polline & decocto præfidium vulgatum.

C A P. XII.

De Sorgo seu Milio Indico.

Hoc genus Italici Sorgo vel Sorghæ dicitur (auctore C. Bauhino) à proceritate, qua inter suas cognatas fruges, Milium scilicet & Panicum, surgit: Inhibebat *Atelegus*, *Melica* & *cap.*

Culmi cælitate & altitudine, graciorumque magnitudine inter frumenta paniculata eminet. Descriptio Milii Indici Punicata nota eius characteristica continet. *Milium* (sorghæ) *incis* *huius* *de* *est* *omnis* *ex* *India* *in* *Italiam* *introducitur* *est*, *nigrum* *culmibus*, *angustis* *grano*, *Arundinaceum* *culmi*: *ad* *lesit* *ad* *pedes* *articulata* *septa*, *pergranulata* *culmi*, *lobis* *vocant*, *omnium* *frugum* *fertillimum*.

1. *Sorghum* Ger. J. B. *Melica* *seu* *Sorghum* Park. *Milium* *Arundinaceum* *seu* *Indicum* *semine* *fabricandi* C. B. *Indian* *Millet*.

C. B.

Tota planta Arundinem tam formâ, quam proceritate refert, sed ut agri in quibus ad maturitatem ulque adolevit procul distantibus Arundinetæ esse videantur. *Milium*. Hoc radicibus fibrosis multis ac valde nititur: culmibus est quatuor, quinque, aut pluribus ex uno grano allurgentibus, octo, decem, nonnunquam tredecim pedes altis, digitum crassis, fuscis, upharum novem geniculatis tuberosa intercepis, medullâ candida, subdula, Sambuci modo, factis, & mansuetisense semine rubentibus, foliis Arundinaceis & singulis geniculis cubito longioribus, tria, quatuorve digitos, superiorem macronato, per quibus in mansuetisense sed acuta dentibus armatis, sed ut si deorsum micrantes, tenores etiam digitos valentem. In summate ipse cælitate desiccante plurima longior, latitudine quatuor aut quinque unciarum, plerumque panicula consistit: que Juno Juliovo mensis & grammis vagant emergens flores humos, ovatos, oblongos & peribulos profert, quibus desiccantibus spicæ rubescere incipiunt. Succedunt grana numerosa, Milii aut Cannabis semina duplo majora, oblonga rotunditate, colore upharum subrubra, vel in raris nigricantia, raris subalbescantia & laeta, dupli tunicâ involuta, quibus cæcissis petioli, quasi crassis filamentis, ex quibus scopas concitant, remanent. At macrescentibus culmibus & spicis nigricantibus, radix ex inferioribus geniculis undiq, quasi sulca demittit, que in terram figuntur fibris, agunt, quæ culmos sustinent, et facile vento resistunt.

Linn.

Solum amat pingue & humidum, unde à nonnullis in episcopi solo ad agrorum hirciam castigandam fertur. Ex India primum adactum est in Hispaniam, Italiam, aliisque calidiores regiones. Non in Foro Julii Italici copiose satum observavitur. Ex æliis incantibus est. Aestivo maturet.

Semine Panico sapore & temperamento simile est. Italia infima plebs & Passenti rustici ex grano in farinam molita panes conficiunt, qui friabiles sunt, & panem alium subministrant, nigri dicitur conficiuntur & alium conficiuntur: ex farina cum lacte panes conficiuntur spongiosius. At in Hispania gallinarius, columbarium, ligna ferunt potius quæ ad hirciam aluntur. Semen & bestiæ

hominum & equorum pabulo etiam ferrug. Si boves, auctore Catalpino, herbam vicentem depalcantur, intumescunt & pereunt, si culmos exsiccatos proficiunt.

Ex culmorum modulla medicamentum ad stremas praestantissimum fit: cuius conficiendi modum *Fern.* vide apud *Martio*, *J. B.* & *C. B.* Idem Matthioli flores ad fluxum muliebrem & dysenteriam commendat. Vide locum.

Ex summis *Sorgli* viticulis rigidioribus arefactis scopas Itali conficiunt, vestibus & capiti detergendis, quibus in variis Galliae & Italicae, nunc & Germanicae, locis utuntur *C. B.* Huiusmodi scopas Venetis venales observavimus cum in Italia peregrinaremur.

2. *Milium arundinaceum semine plano & albo* *C. B.* *Sorgli album, Milium Indicum, Dura* *J. B.*

C. B.

Hoc *radice* fibrosas & duras habet, terram à summo petentes, eisque infixas, quo plantae moles firmius contra ventorum impetum firmetur: quare quondam diebus singulas radices e geniculis profert, e terra proximioribus incipiendo gradatim sursum ad quartam tendens: *calvus* *Mayza* vel potius Cannae Saccharinae similibus, (qui sex vel octo cubitorum) medulla alba, dolci, Arundinum Sacchariferarum modo, farctis: quorum summitati *panicula* speciosa, Miliis praedicto maior, alba, semipedalis longitudinis insidet: ex qua post flores delapsos e filamentis capillaceis exiguis & rigidis *grana* dependent, folliculo albo inclusa, candidissima, Lentis modo compacta, (Oroba magnitudine in Arabia) fractu durissima, nigro puncto, quo spicae vel pericly, e quo aegre divellantur, haerent.

In Arabia circa urbem Aram, cum Babyloniā veterem flumine peteret, utrinque ad fluminis ripas agros confitos *Rauwolfius* observavit; & quidem solo arenoso, rami & saxis profundo, quod Octobri mense iam maturum & parum collectum erat. Ex Bellonio in Cilicia & Epiro, ubi rustici magnos fucos refertos Corcyram in forum devehunt, notavit.

Hae planta *Dura* Arabum censetur; quae sicca est, parum nutrit, & ventrem stringit. Grana candidissima farinam panificis aptam promunt, ex qua, ut *Rauwolfius* habet, panem bene lapidum cinerecum conficiunt, placentarum formā, circa digitos quatuor transversos latis, sex longos, & duos crassos: & ut *Bellonius*, molas habent domi, quibus grana conterunt, & ex farini massam duram pinunt, quam tenuiter admodum complanatam radiis Solaribus coquunt: aut veteri Romanorum militum more, qui togulae ab igne calefactae, & lapidibus utrinque sustentatae, massam pistam complanatam imponentes coquebant: eadem ratione rustici panem coquant; at urbani in clybano. Incolae ex culmis, eo quo ex Cannis Saccharinis modo, masticans, succum suavem & dulcem eliciunt, qui in his magis in superiore parte, in Saccharinis autem in inferiore continetur. Corcyrae insule incolae hoc columbae alunt: in Calicia ob lignorum penuriam forunt, cupis calanice pollicari crassitudine incolae diligenter colligunt, & ex illis ignem servant.

C A P. XIII.

De Avena, seu Bromo.

UT ab habena est habena, sic ab *aves* (inquit *Vossius*) videtur esse *Avena*, sive ab occupandi aviditate, quod *Agretus* scripsit: sive potius quod *aves* illud edere pecudes ac equi.

Avena panicula sparsa, semine angusto oblongo nunc mudo, nunc gluma crassiore tecto, in locustis bisulis, à reliquis frumentaceis distinguitur.

A. 1. *Avena alba* *J. B.* *vulgaris seu alba* *C. B.* *vesica* *Lob. Ger. Park.* *White Oats.*

C. B.

Radice copiosa nititur: ex quibus culmi aliquot ex graminis vaginis prorumpentes affurgunt, geniculis distincti, ac triocis nodosiores [quatuor aut quinque articulis in eodem culmo:] *filia* *Tritici* aut *Zea*. In cacumine panicula se explicat cum juba Arundinis, ex qua folliculi veluti parvae locustae bipedes, longis ac tenuibus pediculis dependent, flore candidante, in quibus *semen* *Hordeo* longius, tenuisq; acutum & subalbicans continetur, quod geminum (altero tamen semper grandiore) & superiori parte exiguis capillis hirsutum est, glumae crassae ac durae involutum, & inclusum: at in maturitate membranae desiccantes maxime nudum semen ostendunt: modica est mollis, candida & dulci. Aristas habent grana laterales, interdum tamen in carent.

Quae lata nascitur (inquit *C. Bauhinus*) culmo est crassiore & propeiore: quae sponte tenui stipula & spicae juncti sterili est.

In omnibus regionibus tam calidis quam frigidis feritur: apud Germanos [& etiam Anglos] *Locus* & communiter initio Martii, aut oriam Februario exeunte. *Virgilius* *Avena* segetem campum urere *Tempus*, & emaciare adnotavit.

Urit enim Lani campum segeti, urit Avena.

A. 2. *Avena nigra* *J. B.* *C. B.* *Black Oats.*

Hae ipsa (inquit *C. Bauhinus*) alba aspectu sylvestrior est, stipula quoniam crassiore & folio nigriore: granum huic strigosius, longius & pilosius est quam praecedens, glumae pilosae & nigrae tectum, e cupis dorso arista intorta nascitur.

Parkinsonus & Gerardus vel hujus non meminere, vel cum precedenti miscent: a qua J. etiam Bauhinus eam specie diversam non facit. In Anglia multo frequentius & copiosius feritur quam Avena alba.

A. 3. *Avena nuda* J. B. C. B. Ger. Park. *Baked Oats*, & in Cornubia, ubi copius fertur. *Pillis & Pill rom.*

Hujus semen durum corticem non habet ut Avenae vulgaris, sed plures glumas tunicasque ternas, paleasque; porro autem granum ipsam habuit est & ex albo fulvescens, quodammodo simile Avenae.

Quod J. Bauhinus Avenae nuda granum minus pertinaciter glumis haerere affirmat nobis non probatur, quin potius contrarium videtur.

Lat. 1.

In extrema Cornubia prope Belciani promontorium copiose fertur ubi non minori pretio venditur quam Triticum ipsum.

A. 4. *Aeglepi quibusdam arsisis reovis sive Avena pulsa* J. B. *Festuca strucula lanuginosa* C. B. *Aeglepi bromodes* Ger. *emac. Aeg. bromodes* Belgarum Park. *Strawed wild Oats*, o; *Haber.*

J. B.

Folia sunt Avenae foliis amula, spica vero sicut alia ejus generis Cerealia, admodum speciosa, pedalis, raris tamen, glumis stipata: haec quippe alia binis, alia ternis, longis & trium unciarum pediculis haerent porquam elegantes, glumis utrinque, munitis oblongis, laevibus, striatis, pallide partim virentibus, partim virentibus, laevibus quam in vulgari Avena, cui similia grana, intus bina communiter, raris singularia, folio ac pane rustico colore praedita, paleis flavescenibus, ac pulchre Hyssii instar laevibus, oblique, quae sunt Avenae grana longiora sunt: locus quoque aristae extant gemellae, longae, duarum aut trium unciarum, atque incurvae, uti crura Locustarum sylvestrium, rigidiuscule. Spica Avenae spicam pulchre emulat: nam ad ejus modum, ex granorum, uti conijcere est, pondere, pedicelloribus, subtilitate ita pendula aequo tremula haerent glumis, ut nec pendulas nec surrectas quis simpliciter dicere queat.

Lat. 2.

Inter segetes nimis frequens est; nec agri qui ea semel infecti sunt facile hac peste liberantur: etenim ante messem matrescens, semen in terram effundit, quod per hyemem ibidem restans, aut per integrum annum si saepe intermitatur, cum segete de novo succrebit.

Fieri & Cibus.

Avena in qualitatibus primum temperata est; delicias, modice digerit, & astringit non nihil: in usu frequentissimo est apud nos tum in cibo, tum in medicina. Scribitur quidem pro eorum pabulo, quin & anseres ea saginantur, & gallinae aluntur: Ex ea tamen non solum pro rusticiis, sed etiam pro magnatibus farina optime & variae pulvis & sorbitiones conficiuntur: Ex ejus farina, (grana decorticata) interdum sola cum sale & passulis aquae incocti, sed frequentissime una cum caribus, juscula & sorbitiones parantur: nec alia fere juscula apud nos in Anglia in usu sunt quam avenata tam apud nobiles quam plebeios, quae sane tam aegrotis quam sanis saluberrima sunt, facile concoquantur, & primum alimentum corpori subministrant. In annorum caritate tenuioris conditionis homines haec juscula praecipue vicantur: & tamen meliore valetudine fruuntur, quoniam qui delicatissimi varisque arte confecti cibi utuntur: bene nutriunt, stomachumque sanis colorum infantibus efficiunt. Oratio quoque Avena maxime omnium leguminum ad concoquendum accommodata est, & ejus optima est sorbitio. Roché ergo Pinnis (inquit C. Bauhinus) Germaniae populos Avenam licere scribit, quibus frumenti instar sit, cujus etiam paleae vivunt.

Solent & Saxones farinam Avenae crassiores, quam ipsi *Gross* vocant omnibus fere obsonis una cum sale aspergere & sic simul coquere. Nos quoque in Anglia Avenae grana deglubita integra *Scotts* vocamus, usque utitur ad farcinina & bomolos cruore diluentos parandos.

In montosis Septentrionalibus Angliae, inquit Cambria, ex Avena decorticata & molita panes & placentae variae generis conficiunt, nec alio pane unius rustici, & tamen optima valetudine fruuntur, & maxime sunt longevi. Et sane minime dubium est, quin panes hi saluberrimi sint, quantum non sibi ob amarorem minus grati.

Cerevisiam quoque ex Avena non facis quam ex alio fragilis Angli non minus quam Lithuani conficiunt: quae hordeacea bonitate non multum cedit, aliquo etiam respectu ei praefertur.

Walis ex Anglia Avenae in aqua ad galatina crassiorum decocto farculam parant *L. Llanney* eorum lingua dictam, quod magno, non in Wallia tantum, sed per totam Angliam in pretio est. Galatam hanc Amyliam Avenaceam seu *Fassney*, calidam in tabulis diluam cum lacte, vel cum cerevisia aut vino albo saccharo edulcorato mixtam comedunt.

Cremor aquae non minus utilis est aegrotantibus quam Pinnis ex hordeo. Medici nostrorum in morbo acuto non alia fere sorbitionibus aegrotos alunt quam Avenae. Farina Avenae extrinsecus ad cataplasmata non minus utilis est quam Hordei, desiccata & digerit modice, ac sine morbo.

Avenae, dum colica nos affligit, cum medicamento potissimum utitur, quae confecta pagillis aliquot Salis communis torretur in tartagine, tolla vero sacco tenuiore tela indita abdoctum aegrotantis applicatur, & plerumque nisi colorem & incessum rectum extromenti sunt referta, ingens levamen ab illis ubi percipi solet. S. Passi.

Qui calculo renium laborant in commendandum balneum ex polenta trita, Lupulo & Avenae stramine, quod insigniter mitigat dolores in phrethos, calculum & urinam ita pellens humida, stramine calente & pebete percolato circumdatis, in vasso coarctatis macturiam: & sepius sine dolore calculum externum. Quod Esopociton habens publici juris facio, quod jam per 30. & amplius annos compluribus commenda: regni, multis aliis remediis miscellum adhibita. Sicut Passi.

SECTIO SECUNDA.

De Culmiferis Grano minore seu De Graminibus.

GRamen à gradiendo seu progrediendo, serpendo, quòd geniculatis vinculis per terram intricatè repat, nomen habet: vel à gignendi fertilitate, siquidem crebro à se novas radices spargat, idque non tam ut terram ameno virore ornet, quam ut eius perenni proventu bobus & jumentis pabulum suppeditet. C. B. Venim non omne gramen vinculis serpat, sed caninum præcipuè, quod ob id Gramen simpliciter & *ἄσπερον* dictum.

Græcis *ἄσπερον* dicitur quasi Agrestis *ἄσπερον* est, id quod in agris ubique sponte, quovis celo, & solo etiam non satum, nec cultum luxuriet.

Gramina in duo genera dividimus, spicata timirum & paniculata.

Primum Genus

Gramina spicata continent.

Hæc à similitudine cum Frumentis aliisque rebus à Botanica in plura subaltera genera dividuntur. Nos à Graminibus caninis dictis partim ob spicam Tricicem similem, partim quia Gramini nomen à gradiendo seu rependo dictum in præcipuo & maxime proprie competit, incipimus.

CAP. I.

De Gramine canino.

- A. 1. *Gramen repens, Officinatum fortè, spica Tricicem aliquatenus fuisse* J. B. *An Gramen caninum Ger? caninum vulgatum Park? caninum arvense, seu Gramen Dofzeridis C. B. Common Dogs-grass, or Quick-grass, or Couch-grass.*

Procerum est gramen, interdum tribus cubitis altius; Folia è longa vagina, plerumque asperis, rariùs glabris, quatuor vel quinque in eodem culmo, è toidem geniculis exarantibus. Spica summo culmo infidet duorum versuum, eodem cum Tricice situ, sed omnibus modis strigiosior, cum aristis perbreuibis sububens, semine oblongo fusco. Radices pro Graminum ratione crassiusculæ, longo latèque reptantes, extrema germibus acuta, duris & pungentibus, sapore dulci præditæ sunt.

In agris & hortis reptatu suo & impertuna luxurie obosum, molestum, & extirpati difficile est. *Loc.* Hujus aliam seu speciem, seu varietatem observavimus cum aristis multò longioribus, circa *Sentis Parisis* oppidulum in agro Eboracensi, & alibi in Septentrionalibus Angliæ.

Si C. Bauhinus eandem nobilicam plantam intelligat, spica minus rectè picta & descripta est. Gramen viride, non tantùm *ἄσπερον* Officinæ dictum, sed quæcumque, dissolvit calculos præsertim biliosos: Oves & boves calculis vexati in hyeme Verso tempore liberantur à Gramine recenti, ex *Observ. Fran. de la Riv Sydenh.* p. 300. Idem jamperdem observavit D. Glissonus in libro de Anatomia hepatis.

- A. 2. *Gramen caninum marinum Ger. caninum maritimum spicatum C. B. caninum geniculatum maritimum spicatum Park. Gram. repens marinum spica exoval* J. B. *Sea Quick grass.*

C. B. Ex radicibus oblongis, tenuibus, albicantibus, lignosis, levissimè capillatis tantùm plures, repentes, rotundi, leves, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, undè rariùs plures foliola arundinaceis, brevibus & angustis cinèti, prodeunt, quorum superioribus spica truncata, ex cinereo nigricans infidet.

In toto litore propè Monspelum frequens invenit. *D. Magnol.* Hæc descriptio minime convenit Gramini nostro canino maritimo spica tricicè, idèoque altius. *Loc.* rariùs, & nobis inobservate plantæ sit oportet: nihil tamen solenter affirmo. Nam Johannis Gerardii amaculator Gramen geniculatum caninum marinum *Lib. 3. c.* Gramen caninum maritimum spicatum seu S. C. B. idem esse conjectatur Gramini nostro canino maritimo spica tricicè, quantumvis icon minus proba sit.

- A. 3. *Gramen caninum longis radicibus marinum alterum* Loh. *Gr. can. maritimum spica fusca* C. B. *can. marit. alterum* Ger. *can. marit. alt. longis radicibus* Park.

Ex singulis radicibus oblongis capillatis, prioribus similibus culmibus unus & alter tenuis brevibusq; inter folia sempalmaria affurgit, qui in spicam crassam, foliaceam, velut squamulosam & duram abdit, & sapore cum prioribus convenit. [C. Bauhinus in *Theat. Botan.* cap. 1. duas habet species Graminis canini]

nimi eodem titulo *Graminis canini maritimi spicati* donata, nimirum VIII, & XI. Octavam speciem (ut diximus) Johnsonus pro Gramine nostro canino maritimo spica Triticea habet; cujus opinionem Botanicorum peritocum iudicio relinquimus.]

Loco.

Hanc speciem in maritimis Mersæ insule prope Colcastriam nuper invenit nobisque ostendit D. Dale.

4. *Gramen caninum maritimum spica echinata* C. B. *ominum maritimum asperum* Park. *parvam echinatum* J. B. *rough eared Sea Dogs grass*.

J. B.

Longè, albicantibus fibris radicans, culmi pluculis donatum palmaribus aut paulò longioribus [dodrantalibus C. B.] duris, rubentibus, crebro nodorum interceptu distinctis, quos folia ferè totò obvolvunt, vix unciam ab eis recedentia, hirsutis per marginem pilis donata, alioqui glabra. Spicæ unciales & longiores [interdum eam longitudinem minime attingunt] denso glutinorum pulchris denticulis muricatarum stipatu contextæ, foveæ ochinuli modiculis continentium pusillum, oblongum, nullum.

Loco.

In arenosis circa Montisplium copiosè provenit. Vidimus etiam Florentiæ in Arni fluminis alveo. C. Bauhinus in hore Veneto & maritimis circa Anconam.

Tempus.

Sexus & post Solstitium æstivum spicam producit.

A. 5. *Gramen caninum maritimum spica triticea nostrat.* An Gr. can. 8. seu maritimum spicatum C. B?

Fibris plurimis ex imis foliorum agnuntulis emissis radicans, obliquis etiam seu transversis geniculatis germinibus Graminis canini in modum sub terra reptans. Folia modicè lata, striata, glauca, lateribus coarctatis per venustatem convoluta. Culmi sesquicubitalis, bicubitalis & altiorem, tenuis, tribus quatuorve geniculis intercepti, & totidem foliis armati, spicam in summo gestant Tritici micæ singulæ longitudine etiam pari, variis minus conspicuum & strigulosum.

Loco.

In fossis palustribus maritimis frequentissimam est.

6. *Gramen hirsutum repens spica simplicis molli* J. B. *Creeping rough grass, with a single soft spike.* An Gr. caninum vineale C. B?

J. B.

Importuna luxurians est radicans, nididarum, geniculatarum, sapore subdolei, quibus in immensum se propagat. Folia longa, hirsuta, mollia, vaginæ longissimi culmum nodosum, tenentem, cubitalem obvolvunt: panicula mollis, contractior, palmum circiter longa, ex viridi purpurascens.

Loco.

Abundat in vineis Montisbelgardi flores Junio & Julio. Nos habemus in arvis præcipue Graminis canini speciem Gramini lanato Dalechampii adeo simile ut pro eo fallat, quod huic idem esse suspicantur.

7. *Gramen caninum longius radicans latiore panicula major* Lob. Adv. part. alt.

Nobis nondum innotuit. Alii Botanici quæ de eo habent è Lobelio mutantur. Vide si placet historiam eius apud ipsum: ut &

8. *Graminis canina latiore panicula minoris ejusdem eodem in loco.*

Quod C. Bauhinus *Gram. caninum longius radicans major* vocat, uti præcedens *Gram. can. long. radi. major*.

Gramen caninum saporum paniculatum dulce C. B. Idem videtur Gramini nostro Miluæo a quatuor suavis saporis. Color albus panicule non respondet.

9. *Gramen caninum saporum* Lob. Ger. caninum saporum minus C. B. *caninum saporum arvense* Park.

Nobis nondum observatum est. Quæ de eo habent, si placet apud Lobelium & C. Bauhinum vide.

10. *Gramen caninum saporum paniculatum folio variis* C. B.

Thali est, apud quem descriptio eius requirenda, vel apud C. B. in Theatro.

Utu.

Graminis radices præcipue Officinis in usum sunt, rarissimè semen. Refrigerant & sciunt moderate, aperiant (quoniam enim tenuium sunt) & laxantur. Hinc egregiè conducunt in obstructionibus viscerum, ictero, calculi renum & vesicæ, &c. partim quod sine calefactione agant hoc opus suum, quod profecto rarissimum est, nam diuretica & leuonitrica medicamenta plerumque calida sunt, partim quod ob adstrictionem suam tonum reddant partibus. C. Hoffm. Ad humores insaniam nocandos & expellendos commendantur: necnon ad expunctionem sanguinis.

Non minus faciunt contra febres malignas vi sua exsiccatoriæ, ut & contra fluxus alvini, præsertim putrorum. In his hinc utitur ferè aqua ex tota planta destillata, (inquit C. Hoffmannus) non quidem nostrat, sed vulgè seu tuberosi.

Extrinfecis in dolore capitis leniendo, in oculorum inflammationibus ac deflexionibus commoventur, in naribus persistenti, in odontalgia, in tumoribus podagricis discutienda usum earum est.

Adhibentur autem vel aqua stillantia ex radicibus Maio vel Septembri collectis diligenter trundatis & concisis *N.B.* elata; vel decoctum earum in vino: vel Infusum in mosto. Reliquos ad usum preparandi modos vide apud C. Bauhinum in Theat. Bot.

Radices Graminis ad obstructions hepatis, henis, maxime si febres ex eis scaturiant, item ad calculos renum pellendos valent, & ubi est insignis dyscrasia viscerum calida, cum cocundem obstructione, vix exoptatum medicamen quam radices Graminis ars nostra nobis suppeditat, atq; ut Hofmannus observat sine satisfactione opta suam perficiunt, quod profecto rarissimum est, & sicut cum adstrictione tonum addunt partibus. *Simon Paulus*. Ex excerptis *D. Hoffi*.

Aqua radicum Graminis stillantia commodissima omnium est aquarum qua pulveris contra interiticos verminantibus pueris diluimus, praesertim si una vel altera gutta sp. Vitrioli cum tantillo Syrupi acetos. Citri instillentur.

Gramina quaedam Triticea à C. Bauhino Theatro Botanico.

1. *Gramen latifolium spica Triticea compalla* C. B. Park. *As Gramen caninum primum nostrum?*

C. B.

Culm. est sesquicubitali, uno alterove geniculo distincto: folia frumentaceis, pedalis; spica Triticea palmari, lata, glumis aristas carentibus.

Basilica ad agrorum margines: Norimbergae vero spica occurrit angustior, magis sparsa, & utriusculi aristata.

Nihil invenio in hac descriptione quod non conveniat Gramini nostro canino respectu vulgaris spicae Triticeae, primo in loco descriptae.

2. *Gramen latifolium spica Triticea devulsa* C. B. Park.

C. B.

Hoc à priore spica potissimum differt; quae in spicis distinctas & angustas devulsa est. Haec sibi invicem in culmo alternatim subsequuntur, earumque utriculi brevissimis aristas aruantur.

In Italia ad agrorum margines.

Lena.

3. *Gramen angustifolium spica Triticea compalla* C. B. Park.

C. B.

Hoc folia est angustioribus, sesquipalmaribus, rigidis, acuminatis & albicantibus: culmo laevi, rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmariibus, compactis, utriculis rigidis & acuminatis.

Basilica ad sepes, locis aridioribus extra portum Blasianam.

Lena.

4. *Gramen angustifolium spica Triticea multaeformi* C. B. Park.

C. B.

Radices oblongis, geniculatis, nodosis, canaliculis serpic: culm. est sesquicubitalibus, rotundis, folia juncea oblongis, duris, in acumen fastigiata: spica oblonga, triticea, glumis paucis, oblongis, aristas carentibus.

Arenosis circa Basilicam, ut ad Clibon provenit.

Lena.

C A P. II.

De Gramine cum spica Briza.

Briza Germanis dicta Zea species est.

1. *Gramen spica Briza majus* C. B. J. B. Ger. emac. Park.

C. B.

Radices & culm. est frumentaceis, folia angustis, spica palmariibus, multiplicibus, utriculis aristas brevibus armatis, hinc ut in Tritico lateolis. Tota planta ad viri altitudinem assurgit, & apud nos locis acclivibus ad Rheni ripam & ad montes Creutzacensis ascensum provenit.

In laterum marginibus circa Salcnovam Montispeho non longe invenit. *P. Magni*.

Lena.

2. *Gramen spica Briza minus* C. B. J. B. Park.

J. B.

Tota planta palmo minor est, radice exili, fibrosa; foliola ad radicem brevibus, mollibus, canaliculis: spica unciali, quae modo simplex, modo gemma & terna, utriculis aristas armatis.

In agris Montispeho invenitur.

CAP. III.

De Gramine Secalino.

Sub hoc titulo comprehenditur Gramen illud, Hordium spicatum dicti Solitum, cuius Spica Secalis non Hordei spicam refert.

A. 1. *Gramen Secalinum & Secale sylvestre* Johuloni apud Gerardum. *Hordium spicatum* vulgare Park. *maritimum* J. B. *Gramen hordiatum minus & vulgare* C. B. *An Herba Phoenicea Graminum* Plinio lib. 22. cap. 25? *Wild fire, or fire grass.* Wall. *Warlep.* *Verum spica proposita accedit ad Secale quoniam ad Hordium.* Wap. Brunet.

C. B.

Radix est capillata, parva, candida: *folia* graminum, & quadam primum palmaribus, angusta, non nunquam articulata: *calami* frequentibus, longipalmaribus, & interdum cubitalibus, gemularum: *spica* longis, Hordeo similibus, [aut potius Secali] ac tenuioribus, mollioribus, frequentibus aristis horridis, glutinisque manibus.

Locus.

Ad muros, macerias & locustas plerumque oritur.

Hac spicam differt à proxime sequente brevitate sua, ut quæ dodrantalem altitudinem raro excedat: spicarum aristarumque longitudine, quæ in hac multum superant: loco denique nimirum in facioribus ad muros, macerias & locustas, cum illa in pratis & pascuis plerumque humidioribus diutius proveniat.

A. 2. *Gramen Secalinum* Ger. emac. lib. 1. cap. 22. n. 4. *Gr. Secalinum majus an minus* Park? *fire grass.* *An Gr. spic. Secalini* C. B.

Calami alligati tenes, herbacei, tribus quatuorve nodis distincto ad quos singula *folia*, culmum ut in aliis una sua parte involventis, à quo ubi recedunt, in palmarum longitudinem, extenduntur. *Caulis* fastigium *spica* occupat truncatus. *Secalini* emula, aristis paulo brevioribus quam in precedenti, purpurulentibus, circumvallata.

Spiculae exteriori oblongos, luteos.

Locus.

In pratis frequentis oritur. A precedenti proceritate sua & spicarum aristarumque brevitate præcipue differt.

A. 3. *Gramen Secalinum palustre & maritimum.*

A vulgari Gramine Secalino seu Hordeo spicato differt *spica* brevioribus, pyramidalibus, è latiore basi in angustum apicem sensim tenuans, squamis crispioribus & magis confertis compositis, ad dem & *aristis* magis extantibus, immo longioribus, superioribus ceteris brevioribus omnibus purpurulentibus, *Radix* quæscens vel quod minus firmius terram apprehendans, vel quod ut laxo & spongioso solo plerumque oritur, facilioris extirpato sunt.

Locus.

In palustribus frequentissimum est.

4. *Gramen bulbosum ex Alep.* J. B. C. B.

J. B.

Ex olivaribus, multis lacris tunica vestitis, *bulbis* pendens sicut rosetta. *Calami* pedales, crassissimi, *folia* insignis angusta, palmaribus. Summo scapo gerit *spicam* Hordeo murice similem, palmarum numeroem glutinis densa, longo, calamo appressis, sursum spectantibus, in brevem aristam singulis delincentibus.

CAP. IV.

De Sparte & Gramine Sparteo.

Quoniam horum plerumque spicam habent Secalino similem, ideoque proximum Secalini gramenibus illis locum deditur.

Spartum à verbo *emissus* dicitur, quod non tantum terræ semen mandare, sed & texere aliquid vel levari se nocturno significat. *Salsum* & *emissum* fusticulis vel lineis sunt, sic dicta non quod ex herbis suis noctantur, sed quod ad vincendum idonea sint à *emissis* noctere, compescere. Hinc botanici quæ fusticulis, veribus, stercis, aliisque rebus texendis aliquam usum exhibent, inter quas præcipuum locum obtinet de qua nunc agitur, hoc nomen donarunt Veteres.

1. *Gramen spartium Plini, five spartularum ficum J. B. spartium primum panicula comis C. B. Spartum herba Plini Claf. Spartum Plini Claf. Gr. Spartum Plini, five Junca Hispanica Park. The true Spatweed of Pliny.*

Claf.

Numerosa, tenuia, viridula, junceaque habet folia, cubitali longitudinali, ex eadem radice produntia, quae cum novella sunt laminae conspicuntur, & interiore parte canaliculata, succosum vero tempore contrahuntur & convolvuntur, fiuntque juncea, dura, flexibilia tamen, & marginibus ita connatis ut vix rima appareat, nisi diligentis observet. Inter haec culmi exiunt, ipsi foliis paullo longiores, qui vero & aestate parvam, Arundinaceam paniculam ferunt, simili propemodum cum illa ratione florentem: deinde oblongum seminis, ut nonnulla Graminum genera. Radices sunt fibrosae & perennantes, e quibus multae simul evadunt plantae contiguae. Junci modo, ut interdum una planta, five multarum simul congestarum cumulus, duorum pedum spatium, vel illo etiam amplius, in ambitu occupat.

Frequens nascitur collibus arenosis inter *Verna* & *Alcala real*, atque aliis Betice locis, sed omnium abundantissime ab initio Granatensis regni five Betice humilibus usque ad Murgin urbem, vulgo *Marcia* dictam, ut non sine causa totus ille tractus Veteribus appellatus sit *Spartaria campus*; quo etiam Nona Carthago, vulgo *Cartagena*, ubi maritima continetur: haec etiam a territoriali Spartaria cognominata est, ob Sparta (ut credibile est) eo agro nascentis abundantiam. Nascitur & Valentino regno, atque illud quidem superiore longe uberius & latius.

Est vero Spartum hoc, quod Hispani, apud quos nascitur, etiam nunc *Sparto* dicunt, illud ipsum quod *Plinius*, lib. 19. cap. 11. describit. Eodem etiam in usum nunc est apud Hispanos, quo fuit Pliniano tempore. Nam ex crudo & exsiccato tapetes seu aulica, ibovata, coebes, molentes atque fines conficiunt: Coebes etiam illi in quibus hucus & *Uyx* palle advehuntur, ex Sparto contexti sunt. Sed ex illo aequali instar Lini macerato, deinde siccato & tulo calcamentum genus, quod ipsi *Alpergan* appellant, paratur, funes etiam & alia subtile opera. Praefertur autem id quod Valentino regno crevit.

2. *Gramen spartium 2. Claf. J. B. Gr. spartium secundum, panicula herba foliis inclusit C. B. Spartum alterum Plini Gr. Spartum Plini alterum molis Park. Hooded Spatweed.*

Claf.

Superiore tenerius, epheque valde rarus est usus, ut quod florens aut hujusmodi operibus conficiendis miras sit idoneum, plurimum autem ejus usus est Marciano regno ubi nascitur, ad linicae lacas, quos locis sustentant, replendos, ut nos stramine uti solemus, quoniam molliore tenuiorque sit junco quam primum genus, paniculam fert brevem, & pericarpio quodam, five membranaceo folliculo inclusam, ut Narcissorum & similibus fere flores.

Nascitur eodem quo superius modo, paullo tamen maturioris flores producit: nam Martio suis floribus onustum conspicibam.

- A. 3. *Gramen spartium spatum folia macronata, vel spica Socialis C. B. Spartum spatum pungens Oceanicum J. B. maritimum nostras Park. Anglicanum Gr. English Sea-Spatweed, or Sparram. Flandris Halon.*

Calma affurgit cubitalibus & altioribus, duobus tribusve geniculis interceptis, totidemque foliis vestitis, quae eos aliorum Graminum in modum aliquosque involvunt. Spica in summo teretisculi quatuor aut quinque uncias longa, crassitie in medio digiti marum hinc utraque extremitate minore, seu tenuiore. Semen Canario non major, verum teris, altera extremitate acuminatula. Socialiam quadammodo refert, e glumis tamen non aristatis componitur. Folia non raro calmos ipsos longitudine aequant vel excedunt, raris quidem plana & graminosa, verum ob fixitatem contractis lateribus adeo convoluta ut juncea videantur, in mucronis acies & pungentes deflexura, colore glauca.

In arenosis humilis & aggeribus ad maris litus copiosissime oritur, ubi late serpit Graminis modo, cruribus eorum, quibus per eos aggeres sine ocreis iter est permolestum, pungunt enim & cutim penetrant ejus folia.

Usus ejus est, ut lato suis cespitibus & valde conferta, atque oblique spargentibus sese rasilibus arenam firmiorem reddat & colliget in aggeribus, ne tam facile maris undis fluctibus elidatur, & ut facilius resistant suspensatibus, quae Oceano crebra: ut recte Clafus.

Haec species esse videtur de qua loquitur J. Cargilus apud J. Baulmann, Tom. 2. p. 47. Gramen maritimum pungens vulgo *Dent* vocatur, & copiose in arenoso maris litore nascitur, ubi Angli conclavibus stratis aestate quidem vicem constabant frigus, hyeme siccato calorem fovant. Alia res est quae apud nos *Dent-grais* nunc vulgo vocatur, nimirum Gramen capillanum *J. Bauhinii*.

4. *Gramen spartium spicatum folia macronata brevioribus C. B. Gr. spartium primum Tabernemontani J. B.*

Radix nititur fibrosa, longa: folia rigida, tenuia, pedalis, nervo medium percurrente. Culmi cubitalis & altiores, teretes, leves, foliis multis amicti. Spicae digitali longitudine, interdum longiores, colore luteo obliuore.

Ubi provenit, Tabern. annotans, nascitur in squalidis locis circa *Hertogenbosch* in *Glabetis*, et aliisque aliis Brabantiae locis.

Morum nec nobis per loca illa peregrinantibus, nec alii cuiquam gratis Tabern. hoc genus Sparti observatum fuisse.

5. *Gramen Spartium spicatum latifolium* C. B. *Spartium maritimum sive Oceanicum latifolium* J. B. *Spartium maritimum nostrum alterum* Park. *Spartium herba* 4. *Batavicum* Clus. *Spartium* 1. *sive Anglicanum alterum* Ger. emac.

Clas.

A Sparto loco penultimo descripto minime differt tota plantae forma, radiceq; sub terra condendi latè, spargendi licenti; quis tamen spica brevioris videntur, & Phalaridis potius quam Secalis paniculas imitatae.

Id Batavis, quibus valde familiare, insidens, vltibus ferit quibus iam dictum, etiam Palm appellatur.

J. Bauhinus Spartum nostrum alterum *Lab. iv.* hinc altem putat, quod in sabulosa collibus Wallachiae & Hollandiae reperitur, spica, radice, magnitudine, sennone acerofis ad Spartum 2. *Clas.* proximè accedens, foliis folis distans, quae palestra, Frumentacea & Graminis stiliati sulcati foliis latiora, coloris glauca.

Quamvis Parkinsonus hoc genus Sparti nostrum, & Gerardus Anglicanum vocat, nos tamen nondum adeò sulcatis fuimus, ut in litorebus Angliae plantas indagantes in illud incidere, ac nec ab alio quoquam fide digno inventum valentius aut audivimus.

6. *Spartum maximum maritimum Hollandicum spica Secalini.* *The greater* Holland *Spart* *weerb.*

Hoc duplo majus est & elatius Sparto maritimo Anglico spica Secalini vulgari. Spica laxior est, & glumo nimis conferta.

Locus.

In arenosis ad vicum Schevelingam uno ab Haga Comitum nullam invenimus, & quoniam tum ab aliis proditum putavimus, describere negleximus.

7. *Gramen pennatum, alia spartum* J. B. *Spartum Austriacum pennatum* Clus. *Spartum Austriacum* Ger. *Gramen spartum pennatum* C. B. *feather grass.* *Gramen plumarium* Park.

Clas.

Folia obtinet pedalis longitudinalis, gracilia, viridia, numerosa, plana immo, sed quorum limbi tandem coeunt, unde Junca modo levia, teretiaque fiunt, Sparti Hispanici foliorum instar, quibus non multum abfimilia sunt, sed minora & graciliora. Inter ea *vulsi* exiunt graciles, foliorum fastigium non superantes, qui spicam ferunt alia dissimilem, sed tribus aut quatuor oblongisculis granis, longè contortaque caudà insignitis duntaxat constantem, quae in dodrantalem, imò pedalem internum veluti pennulam, tenuioribus alarum Avis illius *Mammulata* sive *Paradis* vulgo nuncupate pennulis feruè respondentem definit. *Radix* subest è multis capillamentis graminisque fibris composita: Hispanici Sparti radice instar.

Tempus.

Semen maturum Junio vel levissimo aere flatu excutitur, atq; cum sua pennula, paululum volans, ubi decedit, statim per gramen arrept & terræ se coadit.

Locus.

Abundè provenit in monte Balensibus thermis imminente totaque illi castra moeritum, qui inde usque ad Danubium procurrit, praeterea ad sylvam *Lab. i.* aliisque apertis & graminibus locis Austriae & Ungariae, sed omnium uberrimè in virario illo Neapoli Austriaca urbi contiguo, in quo uberis laritque provenit. *Clas.*

Habetur & in Italia apud Taurinenses & Goritienfes luteo colore. Inter Viterbum & montem Fiaconem albo colore reperitur. C. B. hist.

- A. 8. *Gramen spartum juncifolium* C. B. *Spartum parvum Labellii* J. B. *Spartum nostrum parvum Labellii* Ger. emac. App. *Spartum parvum Batavicum* & *Anglicum* Park. *Small Spartweerb.*

Duras crassius, fibrae densa (inquit J. Bauhinus, qui ex sicco descriptis) [Johnson tenues, fibrolas repentes radices ei attribuit.] *Calvi* numero plures, imò parte foliorum circumscolorum volumibus crassescunt, alioqui sili instar, tenues, erodes, dodrantales, quos à medio ad summum usque confederunt, altera duntaxat parte erumpentes, eodemq; vergentes glauca, dura, tenues, longiuscula. Folia ubi stipulam non amplius involvunt almodum tenuia & fore rotunda, triquetra quatuorve unciarum longitudine.

Folia (annuctante Johnsono in Append. ad Gerard. emac.) è radice erumpunt, tria quatuorve simul membratula albicante involuta, inferius crassiora, & sursum versus palatim gracilescunt, ut in Schernarbio, donec altitudinem semuncialem adepti è membranula involvens emergant, & in terram reclinantur: Sunt autem viridia, juncea, costata, longissima vix duas uncias excedunt, inter quae *vulsi* gracilis, palmatis aut alioz exurgit, summas parte reflexa, duplicem feram glumarum acerofarum sustinens. Circa mensem Augusti perfricitur.

Locus.

In palustribus praesertim montibus frequentis est. Parkinsonus aliam speciem producit, quam *Spartum minimum Anglicum* vocat, Etia (ut *vulsi* videntur) sine necessitate multiplicam.

Gramen spartum Basiliense, sive capillare folia C. B. *Spartum Basili. cap. folia* Park.

Cum impet. ut è describat, nulla nec *vulsi* nec spica facta mentione, omittimus.

- * 9. *Gramen sparteanum Mompeliacum, sive capillare foliis minutum C. B. Spartum Narbonenſe Park.*

C. B.

Radixem habet ex fibris albis, oblongis, capillaceis compositam, folia capillacea, uncialia; culmos tenuissimos nudos, trium quatuorve unciarum, panicula parvas, & locustis minimis compositas, & per maturitatem rufescentes.

Mompeliaci in agris æstivo tempore reperitur. Frequens est (inquit P. Magnol.) in ficcoribus Læonatorum marginibus.

Gramen sparteanum Hollandicum capillare foliis minutum C. B.

Suspicio & hoc non differre à Sparto nostrate parvo superius descripto. Videtis descriptionem eius apud C. Bauhinum.

Gramen sparteanum variegatum C. B. Spartum variegatum Park.

Cui pars una foliis virer, altera rubet alternatim, cum nec paniculum nec culmum describat omnino.

- * 10. *Gramen sparteanum setarum equinarum referens C. B. J. B.*

C. B.

Hoc culmum est, & ex radice alba, setarum instar, folia cubitorum quatuor longa producit, que formi, & tenuitate & robore caudam equinam ejusq. setas referunt, ex quibus Java insule incolæ tapeta texunt. Hujus videtur facta mentio apud Clusium, ex descriptione navigationis Stephani van der Hagen verba Guineam his verbis. Ambonenses funium genus torquere solent ex herba quadam Sparto Hispanico non alimili, quam alioqui setas equinas quis esse judicaret; qui fones multo meliores sunt quam quos ex Cocci sive Nucum Indicarum cortice conficiunt, & melius aque maris & putrefactioni resistunt.

C A P. V.

De Gramine Panicæ.

- A. 1. *Gramen panicum spica simplicis Læon. An Gramen panicum spica simplicis C. B. Ger. emac. Panicum sive spica simplicis Park? Panic-grass, with a simple spike.*

Folius non admodum multis, tenuibus & brevibus capillamentis cinctis radicitur. Culmi inde exeant, nunc singuli, nunc bini ternive aut plures pro soli fecunditate, sesquicubitales aut altiores, pluribus geniculis, ad sex nique, intercepti, ramosi, ramulis ex inferiorum foliorum sinibus egressis, in spicas terminatis; tres quatuorve in eodem culmo ramulos spicatos seu culmos secundarios observavimus. Sunt autem culmi graciles, ad nodos inferiores nonnihil reflexi. Folia, ut in aliis culmiferis, ad genicula singularia, culmum aliquotiesque obvolvunt, à quo postquam abscesserint ad sesquipedalem aut bipedalem longitudinem porriguntur, latitudine durissimi digiti aut majore, hilarè viridia, in longum & angustum mucronem sensim coarctata, si dorsum stringantur ad tactum aspera. Culmus tandem in spicam exit angustam, tres uncias longam, eodem modo è seminum racemulis squamatis incumbentibus compositam quo in Panicis vulgari lativo, arista brevibus purpurascensibus undique circumvallatam, quin & spica ipsa in apice & foliis expositis purpurascit nonnihil, alias viridis est. Grana Panicæ lativi similia sed minoræ, per maturitatem e viridi albentia, interdum etiam purpurascunt ab extremis foliis expositis, minime autem flavent. Spica compactior est quam in lativo Panico. Nulla in arista aut glumis nobis tractantibus sentitur asperitas, at neque vestibus adherescunt; proinde diversum est à Gramine panico spica simplici C. B.

In exteris regionibus frequentissimum est: in Anglia rarè invenitur, in arvis demissa segote. Læon.

- A. 2. *Gramen panicum spica divisa C. B. Graminis generis quoddam Galia Domi canis secundum, sive Panicum sive spica divisa J. B. Panicum vulgare Ger. sive spica Herbærium Park. Panic-grass, with a divided spike.*

J. B.

Calamus & radix filis compluribus crassiusculis constante locis humidis ornata duos tresve cubitos altitudine æquans. Folia Atundinacea in acutum mucronem desinunt; Talum explicat palmarem & sesquipedalem, subulcentem aut e rubro nigricantem, crebris spicas compositam, denso granulorum Panicorum, glumis mucronatis subulcentibus, nunc mucosæ, nunc aristatæ, adque interdum in eadem planta, tricholorum stipiti confectis, libere tamem costæ dorso ut in Gramine Manna.

Variat interdum ludente natura, spica nulla & arista carente, aut arista longa armata, ut in descriptione Innensis; inde C. Bauhinus duas species non necessario facit.

Læon palustribus delectatur, in Germania, Italia & Gallia passim prævat. In Anglia rarè invenitur. In eisdem cum subsequente locis observavit D. Nees.

A. 1. *Gramen panicum spica aspera* C. B. Rough eared Panick grass.

J. B.

Radices habet teretes, frequentissimas, eoque nomine evulso difficiles: *Caules* plures, palmares atque etiam dodraxonales, geniculis paucis articulatis, oblique surgentibus, aut per terram repandi reclinantibus, denique actis raris ac colluntur. Singulis calami singula insident *spicae*. Panicum minus, *aspera*, vestibus adherentes per maturitatem rufescentes, herbibus, pungentibus arillis obloper; inter quas semina parva Panicum minus. *Folia* graminea, albicantia, hirsuta, aspera, partem culmi seu vaginam amplectentia.

Tempus

Invisi olivaceis herba, annua quidem: oritur aestate; semen maturat Augusto, sicut Autumno.

Locus

In agro quodam inter Rasas ultra Putneiam vicum, ad semitam que inde *Eschompton* dicitur; item ultra adificia *Nearlowes*, id est, boium stabula dicta, praeter Tamesin fluvium cundo a Trajecto equorum ultra Westmouasterrum ad Cheltesiam pagum copiosum observavit *D. Newton*.

C. Bauhinus huius synonymam facit *Gramen geniculatum Tabernamontani*, & *Gerardi*. *Parlourus* *Panicum hirsutum Dalechampi* vocat. *J. Bauhinus* describit sub titulo *Panicum hirsutum & Dentis canis* i. dicti: verum *Gramen geniculatum Tab.* ab hoc distinctum facit, & *Graminis panicum vulgare* levis synonymam huic accommodat: erroris nostri iudicio: descriptio enim (quam adhibet) non convenit *Gramini panicum vulgare* spica levi: sed speciei illi quam intellectum volumus, quae est spica aspera, vestibus pertinaciter adherescente: pro qua ergo nos eam usurpavimus.

CAP. VI.

A. 1. *Gramen Avenaceum dumetorum spicatum. An Festuca graminea nemoralis latifolia nuda* J. B. C. B. Spiked Hedge-Dat-grass.

Radix hinc fibrosa: *Caesum* cubitalis & alior, gracilis, geniculata, inferia nonnulli pilosius, superioris levis. *Folia* lata, pallide viridia, striata, palola, tractantibus aspera & ardentia. *Spica* trium quatuorve digitorum, ex pluribus spiculis parvis alternatim sine pediculo medio scapo adnatis consistens. Sunt autem hae parvae quae dixi spicae totalem componentem oblonge, strigose, & plurimis glumis squamatis incumbentibus, & in aristas longiusculam desinentibus coagmentatae.

Tempus et
Locus.

Tardius & post Solstitium ferè aestivum spicam producit & semen perficit: esseque in seipsum aggribus inter vepres & in dumetis frequentissimum.

Huic non multum dissimile est.

1. *Festuca dumetorum* C. B. Theat.

C. B.

Radix est fibra capillatius nigricantibus composita, ex qua caesum plures, geniculis distinctis, passim pilis asperis, ducunt, etiamve cubitorum, foliis oblongis angustis cincti exsurgunt; in quorum summo *spica* oblonga, locustis raris oblongis, cauli proximo & arista armata consistens.

Locus.

Basilea circa *Bisiam* in dumetis Julio mense reperitur: verum eam in vepribus locis siccioribus provenit.

In omnibus ferè, excepti solum angustia, cum nostro *gramine Avenaceo dumetorum* convenit.

CAP. VII.

De Lolis.

Lolium, a Graecis, quasi *lōm*, hoc est, adstrerim. Fieri enim creditur è corruptis *Triticis* & *Hordis* seminibus. *D* autem in *L. alba*, ut ab *Aethiopo* *Odionis Ulyssis*, à *Magna Labe*, vel dicitur *in eadem loco*. id est, *frigore perire*; sive quasi *alio loco*. id est, *frige* notat. Ita *Martinus* & ex eo *Puffus*.

Lolium autem spica strigosa, compressa, granis cum glumis utriusque ad scapum in eodem plano sitis à reliquis *graminum* generibus distinguitur.

A. 1. *Lolium album* Ger. Park. *Lolium gramineum spicatum caput tentari* J. B. *Gramen lolium spica longiore* C. B. *Darnel*, *l'ray* *Galle*, quoniam intrat.

Radix est fibrosa, tenuissima capillamentis cirtata, *spica* habet cubitum unum, duos, trive alia, *Triticis* partes atque paulò minores, quatuor vel quinque nodis distinctas, ad quorum superiorum, ut in calycis culmiferam, singula *folia*, *Triticis* angustiora & viridiora, eminentia, glabra, pinguis, striata, culmum ad proximum ferè geniculum obvolvenda, à quo postquam recedierit in *scapulo* aut *hypochaerem* longitudinaliter producit. Culmum in *spicam* definit pediculis, figura

figurâ peculiarî, siquidem ex culmi lateribus alternatim grana tercia aut quaternâ & quina, inò nota ratio sena aut septena, postilla spica formâ pediculis nullis exeunt. Singulis spaci foliolam oblongam eas sinu suo excipiens, exteriùs adjungitur. Grana Triticeis minora sunt, glumis seu cortice fusco & simpliciter inclusa, quæ in acutam & tenuem aristam, quæ tamen aliquando destituantur, desinunt.

Inter legetes, præsertim Triticeas nimis frequens habetur. Quæ de degeneratione seu transmutatione Tritice in Lolium, aliorumq; frumentorum & leguminum in sua vitia, à Veteribus & Recentioribus detecta sunt, superius in Parte Generali consideravimus.

2. *Gramen liliaceum latifolium spica angustata* C. B.

C. B.

Ex radice alba, arundinacea, fibrosa culmi aliquot cubitales exsurgunt, foliis paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spica angusta, uncias quatuor vel quinâ, longa, Phœnici vel Hordeo maximo similis insidet.

Basilicæ circa Clibem, ubi longioribus & brevioribus foliis variat.

Lolium calefacit & exsiccat, attenuat, resolvit, absterget. Frugibus ex quibus Cerevisia paratur Ferax permixtum ebrietatem promovet. Quod si pati copiosius addatur stuporem & valvæ tumulentiam ebriantibus parit. Hinc nonnullis Triticum temulentum, Gallo *Loray* quali ebriosa dicitur.

Triticum in Lolium degenerare Veteribus pleriq; & Recentiorum multis videtur: quod tamen à curiosioribus & naturali scientia penitus imbutis merito in dubium vocatur: qua de re superius lib. primo, cap. de specierum transmutatione egimus.

Quantis autem Lolium intro assumptum celerrimè vertiginem inducat, foris tamen cum axangia (adipe anteriori Plinio) admodum idem incostumatum tollit. *Theophr.*

Oculis officit, caliginem adferendo propter Vapores acres in cerebrum elevatos: unde Lolio viciantur dicuntur proverbio, qui visa sunt imbecillo, ut lusciosi & Myopes.

Lolii farina aliis medicamentis idoneis admixta, ad ulcera putrescentia, impetigines, lepras, strumas, gangrenas, dolorem ischiadicum, &c. à Veteribus commendatur. Consule Dioscoridem & Plinium.

A. 3. *Gramen liliaceum angustata foliis & spica* C. B. *Lolium rubrum* Ger. *Lolium rubrum* fœv. *Phœnix Parki*: *Phœnix Lolii* fœv. *J. B. Nid Camel-grass.*

Planta est perennis, radicibus geniculatis & geniculis fibræ demittentibus se propagans: caulibus cæcibus aut sesquipedibus interdum altis, perquam tenuibus, rarisq; geniculis, [duobus traditur & etiam quatuor] donatis foliis angustis, oblongis, stratis, pungibus, oblique virentibus cinctis. Ex inferioribus geniculis ramulos non raro emittit hæc species. Spica liliaceæ, spathamâsi longæ, aliquando panicæ colore rubentes, non raro tamen albe, minores & tenuiores quam Lolii albi, eodem modo ex spicis partialibus, strigiosioribus, pluribus tamen glumis constans componitur.

Duplicem hæc varietatem observavimus; alteri spicæ partiales (si ita loqui liceat) totalem componentes crebriores seu densiores sunt aut propius ad se invicem admodum, paucioribus glumis compositæ, & scapo medio appresse: alteri raris & à se invicem remotius sitæ, pluribus glumis contextæ, è latiore basi in mucronem acutum fastigiatæ, & à scapo medio extantes.

Ad vias & semitas inque pascuis pinguioribus frequentissimum est hoc genus. Locis nonnullis pro pumentorum pabulo facitur, est enim pingue & ponderosum adeoque pumentis saguandis aptissimum.

4. *Gramen phœnicoides foliis convolutis juncea ac pungentibus* J. B.

J. B.

Cæcis altorem æslanum atollit, internodiis longis geniculatam, foliis amictum sesquipalmariibus circiter, duris, rigidis, acutis, mediocriter latis: summo culmo spica insidet, sesquipalmum longa, alternante glumarum muricatarum squammatis compactarum posita, ad eam fere modum quem in Phœnice animadvertimus, sed majorem multo, colore ex viridi in flavum vergente: radicem apparet esse perennem, oblique actam, fibrosam, duram, albam. Ita ex sicca planta.

In maritimis Narbonensibus observavit Cherlerus. Duplicem differentiam notat P. *Alaguel*, alteram foliis viridibus, alteram quasi argenteis.

A. 5. *Gramen parvum maritimum spica liliacea* Ger. emac. lib. 1. cap. 22. n. 8. *Græm liliaceum minus spica simpliciter* C. B. *Edwart Sea Camel-grass.* *Græm liliaceum minus Parki?*

Fibræ plurimis, subtilibus, tenuibus radicatur, unde exant cauliculi numerosi (plures viginti in una planta numeravimus) sesquipalmariibus interdum, plerumq; breviores, & quod notabile est in hoc genere, & fere singulare, valde ramosi, tribus quatuorve geniculis nodosi; eodemq; foliis vestiti, quæ cum à caule abscesserint, vix producuntur in longitudinem linearem. Cauliculi autem summa parte in spicæ desinunt, duas tresve uncias longas, teretes, nec ipso caule crassiores ut agrè distingui possint, articulatas, recurvas: ad singulos scapæ articulos alternatim nunc ex hac, nunc ex illa parte, hinc glumæ cauliculi scapo ita cooperati & appressi, ut nisi cum elevatur inter florendum, rotunditatem eam nihil officiant, semen continent.

Ad mare litus, & in palustribus maritimi pluviosum oritur, ut loca indicare non sit opus.

6. *Gramen Loliacum minus spica simplicis* C. B.

C. B.

Ex radice capillacea radicali plures rotundi, duri, duarum unciarum & etiam semicalmares, folia paucis, angustis & brevibus cinch, exsurgunt, quibus spica duarum unciarum, angusta, Lohio simili insidet.

Locu. In agris Montpelienfibus frequens est.

7. *Gramen loliacum minus supinum spica multiplici* C. B. *Phenix multiplex spicata panicula* Park.

C. B.

Cauliculis est multis, majori parte reclinatis, unciarum quatuor: folia paucis & spica multiplici, cuius utriculus seminis parvum oblongiusculum includitur.

Apud Montpelienfes reperitur; ubi in maritima herbida se sepius legitur refert P. Magnol. qui

Gramen maritimum panicula loliacum, ramis eadem.

Quod in linceo prope *Prevalis* non longè Montpelio legit, aliorum tantum varietatem esse coniectatur.

8. *Gramen phalaroides exilis, humi sparsum Danicum* Lobelii *Gr. loliacum supinum* C. B. *Lolium supinum* Lobelii *Casp. Basilic. J. B. phalaroides minus supinum Danicum* Lobelii Park.

Ad *Gramina Lolacea* refert C. Bauhinus, Pusillum est, humile, humi quoque sparsum, radice fusca, curvata, colinis quamplurimis, duarum triumve unciarum, terulis spicatis, acutis fastigiatis, & exalbis apiculis praeditis: foliis lanuiculis & uncialis longitudinis: Tota herba per funiculosam albet.

CAP. VIII.

De Gramine Alopecuroide.

A Spica caudam vulpinam referente nomen accepit.

A. 1. *Gramen Alopecurus simile glabrum, cum pile longiuscula in spica, Onocodon mihi denominationem* J. B. *Alopecuroides majus* Ger. *Phalaroides majus* Park. *Gr. Phalaroides majus, sive Italicum* C. B. & *fieri etiam Phalaroides spica molli, sive Germanicum* C. B. Park. **The most common fox-tail grass.**

Radix haec fibrosa: caulis cubito altior, non raro bicubitalis, internodiis longis distinctis, quem inoffense suscipio deq. contractes licet, duobus tribusve foliis donatus, spicas sustinens sesquialtem aut duarum unciarum, mollem, cinerico colore splendens, brevis & molliculis pilosis glutinis compactilem, aristis mollibus longiusculis cinericeis singularibus donata. Folia non admodum longa, glabra, glauco quodam polline, averia praecipue parte obdacta, quae facile detergi potest.

Locu. In iconis Gerardi & Lobelii spica iusto brevior & crassior pingitur.

Minor Gerardum & Parkinsonum nostrates de planta adeo, ubi, obvia & vulgari, in praesidi & pascuis per totam Angliam frequentissima, tam obliquis & confusis scriptis, ut tam incivile videntur.

Inter prima mensis Aprilis, aut mensis Maio spicam producit.

A. 2. *Gramen aquaticum geniculatum spicatum* C. B. *foveolati spicatum* Ger. *apud spicatum* Park. **Spithed flete-grass.**

Spica per similia est praecedentis spicae, molli pariter, unico ex singulis squamis tam componitibus eazum pile seu arista brevi; nec bicubites sunt squamulae ut in typhano dicto. Spica distat gracilior est & nimis lanuginosa quam in praecedente. Caules infirmi sunt, crebro geniculati, & ad genicula sursum reflexi, procumbentes, & ad nodos, ubi terram attingunt, radices agunt, quibus locum idoneum tactum immemorem se propagat: e geniculis ramulos emittens. Folia modice lata, palmata aut sesquipalmata, levia, superne glauca.

Locu. In aquosa frequens oritur.

Histore Ebrodunensis auctores Gramen cum parva cauda maris, radice nodosa [male interpretantur non nodosa] reperit J. B. hanc idem faciunt, & C. Bauhinus notant, quasi ex una specie dicitur fuisse, quod hoc ab illo separaverat, ipsi potius reprehendenda, cum Gramen aliquantum geniculatum spicatum, eversa specie distinctum sit à Gramine cum parva cauda maris radice nodosa reperit J. B. ut rectè illa distinguit C. Bauhinus.

A. 3. *Gramini caudæ muris purpureæ aliquatenus simile J. B.*

J. B.

Obliquè *radicem* agit crassam satè, tenuibus fibris donatam, veteri prætorum foliorum cæspite amictam; ex qua è terra statim plucula prodeunt *folia*, graminea, vix triuncialia, raris puls ad latera obfusa, striata. *Calvi* surguntur aliquot pedales, cubitales aut etiam altiorem, teretes, rigidiusculi, paucis internodiis, versus ima potissimum, donati: quorum singulos oblongo intervallo sejuncta amictum foliola seuncialia, aut ad summum duas uncias longa, infernis alioqui similia. Summitati inhaerent *spicae*, quæ primum procumbentes caudæ muris purpureæ spicam aliquatenus æmulantur, tum figura, tum colore, præterquam quòd arillis nullis sit sepra. Mox divulsa & aperta elegantem glumarum purpurearum aut xerampelinarum & pulchrè splendentium thyrsum exhibet. Ex quibus *stipula* vel potius apicali utrinque bifida (dum nimirum floret) dependent, pulchelli, obscure purpureæ, tremuli: glomæ caeterum castæ, inutiles. Sapor Graminis vulgaris.

Siccò gaudet cæspite, arenosis item, squalidis & laxofis viarum marginibus arborumque oris incol-
Linn. tis. Junio floret.

A. 4. *Gramen Alopecurum minus Ger. Alopecuroides spica longâ major & minus Park. 1776-
des V. seu spica angustiore C. B. cum caudæ muris purpureæ J. B. The lesser
bassard Fox-tail grass.*

J. B.

Ex denso foliorum graminorum, glabrorum agmine aliquot emergunt *calvi*, quorum alii pedales, alii cubitales aut sesquicubitales, interdum purpurei, *folia* infernis lateribus vixitis, paucis atque exiguis articulis distincta: in summo *spicam* gestant purpuream, palmarem aut brevioram, teretem, caudæ muris formâ, sed confuso glumarum sterilius oculo refertam, ex quibus breves & renelle profiliunt ariste. *Flosculi* ejus sunt apices hircoli pallidi, ex tenuissimis filamentis penduli. *Radix* merè sunt fibræ.

Inter segetes perinque apud nos provenit.

Linn.

A. 5. *Gramen pumilum hirsutum spica purpure-argenteâ molli, nigrâ.*

Hoc genus graminis observavit nobisque communicavit D. Dale. *Radix* ei pro more fibrosa. *Folia* ad radicem longitudine digitum aut decem digitos longitudine ræto superant, suntque perangusta & hirsuta. *Calvi* teretes, erecti, uno alterove folio clacti & geniculo notati, alonidine sesquipedalari interdum semipedali aut majori, colore purpureo, in summo *spicam* gestantes uncialem aut sesquicubitali & longiorem, è purpureo argenteam, mollem, & leviorem, nullis arista donatam.

In montosis & campestribus sed raris.

Linn.

6. *Gramen Alopecurus spica brevi J. B. Gr. Alopecuroides spica rotundiore C. B. Alopecurus Ger.
Alopec. genuina Park. Short-eared Fox-tail grass.*

J. B.

Herba mollissima est, brevi *spica*, utpote duam plus minus unciam, sed rotundiore, propius ad vulpinam caudam accedente, coloris albi & rari, glumæ tomentosis vix apparentibus propter tomenti densitatem, arista longiuscula, mollicillis circumcirca radiatis. *Calvus* geniculatus cubitali & sesquicubitali, *folia* amictus graminei, parvis mollissimis pilis albis hirsuta. *Radix* parva, alba, capillata.

In Sicilia, Italia v. g. circa Baias, & Gallia Narbonensi prope Frontinianam oppidum, præsertim
Linn. in arenosis observavimus, verum & spica brevior erat, & calvus humilior, nec paralem altitudinem excedens, quam ei rectè attribuit C. Bauhinus; erat etiam summa parte pecturina.

7. *Gramen Alopecuroides spica aspera C. B. Alopec. spica asp. brevi Park. Gra. cum caudæ leporis
aspera, seu spica muris J. B. Rough-eared Fox-tail grass. Alopecuroides spica aspera
Bauhni Ger. emac.*

J. B.

Pluculos surgit *calami*, graciles, rigidulos, pedales aut sesquipedales, in quorum summitate *spicae* sunt breves, magnitudine & figura caudæ vulpinæ haud dissimiles, sed crassa aspera, utrinque quoque muricata cum arista longiuscula & leviter recurva, & quæ ex brevi reflexo in luminatate colmi tutant: in quarum sinu glumæ latent parvæ, inutiles. *Folia* mediocri longitudinis, rigidiuscula, glabra. *Radix* densa satis numerosam hirsutarum fibrarum prolem demittit.

Circa Monspelium in marginibus siccis laterum exposit provenit.

Linn.

C. Bauhinus hoc genus rectè describit caudæ palmari sursum pedali; nec enim altiorem nobis
viti.

8. *Gramen Alopecurus spica longâ truncatâ candidante J. B. Alopecurus major spica longiore C. B.
Gr. Alopecuroides alteram radiis vixitis, seu Pseudoschizanthum Monspelianum Park.
Schizanthum adalterianum Ger. Great long-eared Fox-tail grass.*

Calvus est bicubitali ferè, gracili, geniculato; *folia* graminei, glabris, ad tactum non aspera, squalida Schizanthi folia quodammodo imitantibus; *spica* palmari, mollicilla, tomentosis, candidante cum nitore vellem holosericeis glomæ circumcirca tremulis; *radix* fibrosa infirma.

In maritimis Monspelio vicinis observavimus & collegimus. Pro Schizantho à Pharmacopoeis Linn.
Venetiis & Monspelienibus sibi obtulimus fuisse Penn. scribit.

- A. 9. *Alopecurus maxima* Anglica Park. *altissima maxima* Anglica paludosa Ger. emac. *Altera maxima* Anglica paludosa, seu *Gramen Alopecurides maximum* J. B. Lob. Adv. part. alt. *Great English Marsh Fox-tail grass.*

Lab.

Calamus cubitalis, sesquicubitalis, bipedalis & quatuorque procerior, geniculatus, & folia illi Graminis aut Tritici; sed quinque uncialis sepe speciosissima, habitor, serena, spicata, caudatque panicula Montpelensium Pseudo-Ischaemidis.

Locus.

In riguis herbidis Comitatus Southamptonie proximè salinas & antiquas uides *Dreyton* vocatas, cuius mare, duobus mill. Anglica à *Portsmouth*, ex adverso Vectis insule plurima: necnon in ualis fossis lacustribus Essexensis Comitatus, juxta Thamesis arenosissima fluenta.

- * 10. *Gramen Alopecurides ardens* ac *Phalaridis*, *spica longicauda*, *folia lanuginosa* J. B. *typhoides* mille C. B. *Alopecurides minus* Ger.

J. B.

Duras & frequentes satis ab infimo culmo pendentes habet *firmas*, eisque candidantes. *Calamus* autem cubitalis, propter terram rubescens, folis pro genicularum numero oblectus, palmis longioribus, Hordiacorum latitudine totis molli canique lanugine tactis. *Spica* singulari uncialis aut etiam sextantalis, argenteo nitore micans, turbinata, glumis acrois, gracilibus, molibus, timentosis, denso stipam concervatis consistans.

Locus.

C. Bauhinus aut potius Lobelius, passim ad formitas reperiri ait. Si differat à Gramine Onocordo, nobis incognitum est. Et figura & descriptio C. Bauhini Onocordo graminis conveniant, praterquam quod folia angusta ei attribuat. J. Bauhinus tamen, qui & hoc valè à fratre Casp. circa Montpelisum collocatum & allatum, diversum facit, cui subscribitur.

- * 11. *Gramen cum cauda maris folia hirsuta* J. B. *typhoides culmo reclinato* C. B. *Alopecurides minus* Ger.

J. B.

Calami aliquot cubitum excedentes, intermodis circa summum nonnihil rubescentes, densis; rariocibus & sepe nullis superis, foliorum vaginæ multum involutis, quæ ubi à culmis recesserunt brevis satis sunt, & angusta, hirsuta. *Spica* trium unciarum, nitida, densissima tenuibus glumis compacta, hirsuta ferè; singule glumæ planæ, angustæ, in acumen unicus desinunt; tota autem spica normini divisa conspicitur. *Radix* capillaris, alba, tenuis, ex capite crassiusculo; an repat non observavimus Montpelis.

Locus.

C. Bauhinus in culmo secis vias reperiri affert.

- * 12. *Gramen Alopecurus altissima*, *Lobelia* J. B. C. Bauhinus *idem* hoc *seca* Gramen *Alopecurus spica rotundata*, seu *Gram. Alopecurus spica brevis* J. B. *Locus* tamen *diversum esse* videt.

Aliud (inquit Lobelius) genus quoddam est eandem vulpinæ Theophrasti, spica tamen minoribus ac brevioribus, nec ita lanuginosa ut Montpelensis. Culmos quoque multo surigè altiores, bicubitales: *Folia* graminis; *radix* fibrosa.

Locus.

Sesquimilari Brugis distansibus campestribus juxta *Merkens* copiosè provenire ait Lobelius.

C. Bauhinus hic nomina confundere videtur; aut fortè Chaberus apud J. Bauhinum.

- * 13. *Gramen Alopecurus minus spica longior* C. B. *Cauda vulpina Montpelensium* Ad. Lob.

Lab. C. B.

Tota planta potius alta est, *radix* fibrosa, *calamus* multus, geniculatus, recurvus: foliis quibus Alopecuri spica rotundioribus longioribus, angustioribus: spica trium unciarum, raris majorè, alba, Graminis panicis effigie, sed lanuginosa, quæ compacta est ita ut simplex videatur, cum tamen ex multis spica sic composita, quæ in se potissimum à predicta differt, & quod ei minus speciosa & molli sit.

Frequens est locismaricinis Montpelis vicinis ad Magallonam & Aquas Marianas. Copiosè videtur, inquit P. Magnol, in fossis circa stagnum, quæ afflatu calido solo hincantur. Non in Sicilia circa Modanam invenimus. Spicatum acule quæ molles sunt & numerosissima floriscant.

14. *Gramen typhoides maximum spica longiora* C. B. *typhoides maximum* Park. *typhium tertium* Ger. emac.

C. B.

Ex *radice* parva, nodosa, cui fibre exigue & plurimæ adnate, *culmus* rectus, sesquicubitalis, intermodis rariocibus distinctus exurgit: qui in *spicam* rectam, teretem, palmarem, virentem, in maturitate albescens, tactu mollem desinit: cujus utriculi copiosi & oblongiusculi arisis armantur. *Folia* est graminis, panicis oblongiorum majori etiam parte caulem vestientibus.

Locus.

Hoc copiosè inter frutera ad scabula Gapingensis Wirtembergici ducatus Julio mensè primùm observavit C. Bauhinus: dein non longè Basilea in sepias agrorum, & in saltibus Michelsville legit.

Non nullum differt à prima specie seu Gramine Onocordo, viz. spica longitudinali & loco inter frutera, ut ego idem esse suspicor, non tamen asserere ausus idem esse.

CAP. IX.

De Gramine typhino.

Gramen Typhinum dictum ab Alopecuroide differt spica asperioribus, squamulis spicae componentibus bicornibus.

1. *Gramen cum parva cauda maris, radice nodosa repens* J. B. *Gr. nodosum spica parva* C. B.

E radice fibrosa & vixit bulbulis nodosa aliquot emergunt culmi, cubitales aut sesquicubitales, tenues, laevs, & ab internodiis reflexi, quos ab imo statim plucula comitantur folia, glabra, brevia, angusta. Ex singulo ceterum internodio singulum prominere foliolum; summum spica includit parva, hispida, Lobelii Typhini graminis figura, bicornibus squamulis densissime facta.

In dumetis propè Baffordham diei latere à Basilea distantem reperit J. Bauhinus Augusta cum suis spica.

Huc synonymum facient Historie Ebrodunensis auctores, sed erroneè, Gramen aquaticum spicatum *Leb.* ut superius monuimus.

A. 2. *Gramen typhinum majus seu primum* Ger. *crnac. medium seu variegatissimum* Park. *cum cauda maris majoris longa majus* J. B. *typhoides asperum primum* C. B. *ex sententia* J. B. **The greatest Cats-tail grass.**

J. B.

Radices tenues; culmi habent principium bulbo oblongo simile, cubitales altioresque interdum, quatuor aut quinque geniculis intercepti; ad quos folia aspera [asperitas vix sensibilibus est] latiuscula, canescentia, palmata, [quae e radice exiunt longiora sunt] vaginâ longiore stipulam circumplexa. Summum cacumen palmarem, saepe etiam longiorem spicam sustinet, teretem, caudae magni Maris similem, mollem si sursum versus manu demulceas, asperam si contra, coloris cinerici, innumeri squamulis in binas breves aristas declinatis, dimidiatis foliis, aut lateribus canaliculatis scandulas imitatis, constantem.

In pascuis frequens est & agrorum marginibus, ad seminas iteri & sepes, solo praesertim humidior.

A. 3. *Gramen typhinum minus* Ger. Park. *Gramen cum cauda maris minus* J. B. *typhoides asperum alterum* C. B. **The lesser Cats-tail grass.**

Varietas potius praecedentis esse videtur quam species distincta. Differt ab eo statura minore, & spica brevior, angustiorque. Descriptionem eius videtis apud J. Bauhinum tom. 2. pag. 471. C. Bauhinus fibras quasi ex bulbiculis proemanantes ei adscribit & appingit.

In sabulosis reperitur, inquit C. Bauhinus, quod potius sequenti speciei convenit.

Loco.

A. 4. *Gramen typhinum maritimum minus. An Gr. typhinum Danicum minus* Park? **Sea Cats-tail grass.**

Hec species esse videtur quam Lobelius sabulorum & maritimis natalibus gaudere scribit. Verum nostrum pedalem quam illi attribuit altitudinem raro assequitur, sed palmarem fere est aut sesquipalmarem. Spica uncialis nigridula, una parte plerumque angustior.

In sabulosis maritimis frequentissimum est.

Loco.

Gramen typhoides spica multiplici C. B.

Graminis cyperoidis species nobis videtur. Parkinsonus Cyperum typhinum hoc genus appellat.

5. *Gramen supinum aculeatum* J. B. *aculeatum italicum* Park. *album capitula aculeatis italicum* C. B.

J. B.

Brevibus fibris radicitus: rami vero tereti apprimunt in orbem, multos, palmares & sesquipalmares, aliquando pedales, aliquos vero dactylorum uncialis, rigidulos. Ad quorum genicula striculi instar fissurae striatum glutinis numerosas, conglomeratas squamarum lobacatarum complexu comprehensas claudis, deinceps in mucronem rigidum & acutum, uncialem & brevioris, rectâ in laris procentum desinit. Extrimo vero cauli hujus generis * plura folia, & striculi glutinis gravidi oculati aliquid ostendant.

Iterum inter Liburniam & Pilsa, deinde circa Munsipelum copiosum observavimus. Graminis typhini species videtur.

* C. Bauhinus
tota folia
multum

CAP. X.

De Gramine echinato.

Gramen spica fibratamdi echinata C. B. *Gr. perperillam capitula rotunda* Jussu Clerici J. B. *Gr. echinata capitula* Park. *echinatum* 4. *Gr. emac.*

C. B.

Radix est geniculis nodosa, capillacea, alba: folia paucis, angustis, primis duplo minoribus, quae mediis sui parte festacum cingunt, quae tamen vix uncias tres superant, & per quae linear secundum longitudinem excurrunt, tamque subsperam reddunt; inter haec culmi festacarum instar tenues, laeves, geniculati, uno alterove folio à geniculi nodo incipiente cincti, & quidem tres vel quatuor, aeternitate inaequales, duarum, trium, quatuor, etiam sex unciarum efformantur; quibus singulis *capitulum* unicam, fibratissimum (quod locatum pallid) instar Tribuli echinatum, spinosum ac pungens insidet, quod fructibus densis compositum, quorum corpus in stellam spinosam inaequalem, radios quinque vel septem praedicum desinit, quorum medius superior oblongus, laterales minores sunt. *Flores* ut in aliis staminibus pallentibus tremulis dependentibus Majo mense emittit. *Semen* parvum, diaphanum, tricoecum Melampyri vulg. concolor.

Linn.

Loca sterilibus circa Montipellum crescit: inque Aegicolorum collibus: Wernaculi etiam ad molendina.

Gramen tenui dactylicum & pavi juncum J. B. *Gramen foliis junco brevibus* Mart. C. B. *minus dactylicum* Ger. *exili dactylicum* Loh.

J. B.

In rupibus & maris haurit in firmioribus radicibus tenuibus, capillaribus, nigrescentibus, ut vix evelli possit; cohaerentibus simul multis plantis. Foliosum marcidiorum vestigia demonstrant non annuam plantam. Folia alioqui vegeta sunt, longitudinis quoque vel sex unciarum, quaedam etiam breviora, convolutionsis ergo Junci instar torcitur, nonnihil rigida, cinerei ferè coloris, rufantibus Octobris sine calami valde tenuibus, dodrantalibus & pedalis, cum vestigiis parvae spicae. Montbelgardi idem aut valde simile observavit, cui folia virentia, tenuia, compressa, viridia, glabra; culmi plurimi, tenues, pedales vel cubitales, laeves, in quibus unum geniculum, praeter illud quod ad radicem, & foliorum ex longa vaginula: suba uncialis, spicae ferè imula, virens, vel nonnihil purpurascens, in qua quaedam partes ad phoenicem nonnihil accedunt, & in parvas aristas desinunt: in in *stiposis* vel apices minime, alii, toti plantae sapor subdulcis; in ceteris simili praecolorati.

Lobelus Gramen sicut exile dactylicum oris labellum & squallido aridiorque agro Galliae, Angliae, Germaniae & Belgii adest. Quam plantam intelligit nobis nomen iam constat.

CAP. XI.

Gramina spicata miscellanea complectat.

A. 1. *Gramen vernum, spica brevi laevi, an anthozanthum?* *Gramen melianthum spicatum* J. B. *Gr. spicatum pratense* 1. seu *spica flavescens* C. B.?

Radix tenuibus, albis fibris constat. Folia brevia, modicè lata, hirsuta, praesertim superiora parte. Caulis dodrantalis, interdum pedalis, tenuis, geniculatus, quem folia amplectuntur averis parte nonnisiquam purpurascens. Spica brevis, digitum aut fimum sedipidigitum longa, subrotunda, rarioribus glumis nonnihil exsertis, in aceros apices fastigiato, non aristatis composita. *Stiposis* seu apicibus purpurascens è tenuibus filamentis tremuli dependent, basidi utriusque.

Linn.

Floret vere inter prima sui generis, & in pratis ac pascuis ubique frequens occurrit. Iam Graminis Anthozanthi spicati huc bene convenit. Nomen etiam C. B. in pin. nimirum Gramen spicatum pratense III. seu spica flavescens.

Hoc genus pro Gramine cum cauda mucis purpurascens aliquatenus simili *J. Benthini* aliquando habitus: verum defectu ei non bene convenire videtur, idoque tunc mutatà sententià diversum opinatur.

2. *Gramen pratense spica purpurea, an utricale pratense, vel Gr. folia spicam amplectente* C. B. *Gr. spicam folia amplectente* J. B.

C. B.

Radix est praece simili, culmi multus, dodrantalibus, etiam pedalis, pediculis nigrescentibus distinctis: folia multo quam in illo angustioribus & viridioribus: spica quoniam brevior & castiore, purpureo floribus ornata; folio quod ex ultimo geniculo pedis, sic caulem obvolvunt ut non sperant (quod in praece non fit) & vixit speciem ostendat. Sapor dulcis est & a quo.

Linn.

In humida pratis non longe Montipello & Luglino, & circa Matiscoranam provenit.

- A. 3. *Gramen cristatum* J. B. *cristatum Anglicum* Park. *cristatum Bauhini* Ger. emac. p. 29. *pratense cristatum*, seu *Gram. spica cristata* Læve C. B. *Smooth excised grass*.

J. Bauhinus ita describit, Sefquicubitalibus affurgit *calamus*, perquam tenuibus, geniculatis, non sine *foliis*, quæ vaginæ instar satis longo intervallo culmum complexa, palmum longa ab eo recedunt, angusta. *Spica* quadrantalibus aut paulo longior, duobus veribus in unam partem vergentibus, glumarum pallidarum, cristatarum fimbriatarumve, *fulcolorum* luteorum fulcorumve tremulas fibrillas explicat, dorso spicæ glumis vacuo. *Radices* tenues & cæratæ. C. Bauhino *Radicum* capillamentis plurimis oblongis albicantibus, abundat, quæ in unum veluti cespitem coeuntia dorsiùm repunt.

Parkinsonius *Gramen cristatum Anglicum* à cristato C. B. diversum facit. Verùm descriptio J. B. *Gramini* cristato Anglico bene convenit, excepta longitudine spicæ: icon equidem spicam rursus laxam representat, & quæ de radicibus habet C. Bauhinus cristato nostro Anglico non respondent. Verùm cum quod describit C. Bauhinus, idem sit quod Lobelius misit, quodque in pratis circa Hackneum prope Londinam provenire scribit *Adv. part. ab.* minime dubium est, *Gramen cristatum* C. B. & cristatum Anglicum Park. unam & eandem specie plantam esse. Nec enim aliud genus circa Hackneum frequens est.

In pratis & pascuis ubiq; per totam Angliam abundat, & circa Solstitium æstivum spicæ promit. Locus.

Hujus aliam seu speciem, seu varietatem proponit C. Bauhinus titulo *Graminis spicæ cristatæ subbristæ*, radicem capillamentis rufescentibus; culmis tenuioribus, parte inferiori levi lanugine alperis & humilioribus; foliis longioribus, spicæ candicante, minus compacta, nec ita eleganter cristam exprimente, à precedenti differt. Specie altera.

4. *Gramen geniculatum Tabernæmontani* J. B. *Panicum spicæ aspera* C. B.

Radix ex pluribus fibris composita multos protrudit nodosos seu articulatos culmos, in alios subinde divisos; *folia* longia, angusta, acuminata, nervo per medium elevato; *spicam* longam, tenem, villosam, glumis albis constantem; in quibus *semen* parvum.

C. Bauhinus hoc genus ad *Gramen panicum* spicæ alperæ refert. V. supra in capite de *Gramine panico*.

5. *Gramen Avenaceum montanum lanuginosum* C. B. *montanum Avenaceum Clusii* Park. *Gramen cum locustis parvis candida*, *semine Avenaceo* J. B. *montanum Avenaceum* Ger. emac.

C. B.

Radix est ex multis fibris duris, rufescentibus composita, singulis annis anteriori serpente: unde *culmi* cubitales, tenues, leves, geniculati exsurgunt: quos *folia* oblonga, angusta, palmata & acuminata cingunt. In culmorum fastigio *spica* oblonga & nutans, ex glumis brevissimo filamento infidentibus composita, quæ exterius candicant, nec lanuginosæ: at interiores utriculi lanuginosi sunt, grana nuda Avenæ similia continentos.

Montepellensi sponte provenit. Clusius secundum vias, in montanis umbrosisque, hylis Pannoniæ, Austriæ & Bohemiæ nasci scribit, & semen Julio mensi maturum observavit. Locus
Tempus.

J. Bauhinus semen nitida lanugine obtusum scribit, quali *Carduorum* semina sunt prædita.

6. *Gramen Avenaceum lanuginosum glumis rarioribus* C. B.

C. B.

Ex *radice* fibrosa *folia* juncea, oblonga, *culmi*que juncea plures, cubitum superantes, paucis *foliis* infusque brevibus, culmum circa geniculum vestientibus exsurgunt, in quorum summo glumæ rariores, albæ, lanuginosæ, utriculum continentos, cui *semen* nigrum splendensque inclusum est.

In alperis circa Montepellum provenit, & cum Clusiano confundi non debet. In incultis viis montis Lupi sæpius vidit D. Maguel. Locus.

7. *Gramen Avenaceum lanuginosum ramosum* C. B.

C. B. ibid.

Radix habet fibrosam, unde *caulis* unus vel alter, cubitalis, geniculis multis distinctos prodit: *folia* est multo quam in prioribus latioribus: *spica* palmari albi, nonnunquam flavescente, ramosa, glumis Avenacis compactis & lanuginosis; cujus utriculi, *semen* parvum oblongum, utrinque acuminatum, splendens, pulchrum seu seminis Piyllii colore & formâ, sed minus, includitur.

Circa Montepellum ad radicem montis Calcari legit C. Bauhinus. Locus.

- A. 8. *Gramen spicæ gracili, aristis brevibus recurvis*.

In viis publicis, locis idis provenit, nec ante Autumnum aut Æstatis finem spicam producit. *Caules* tenuis, dodrantem altus, uno alterove articulo interceptus, & folio inde emalcente cinctus. *Spica* parva, unclalis aut major, reticulata, glumis rubentibus in aristis præteritis, breves, recurvas exsertentibus composita. *Folia* ad radicem pauca, angusta, brevia.

Invenit & ad nos attulit D. Dale, à quo pleniorẽm ejus descriptionem expectamus.

9. *Gramen arvense panicula crassa* C. B. *Panic. minimum radicum sive stragipellum* Ga. *Gramen cum panicula molli rubens* J. B.

J. B.

Constituitur capillaribus radiculis sub caespitibus foliorum una procedunt, tunicis involucri compacta; inter quae *bulbi* oblongi capitulum efformant, quae à radicibus statim multa proficiuntur, quaedam talia & trientibus, perangusta, mollia, glabra, in culmis pauciora, minora, in singulis tamen geniculis singula. *Calami* pedalis, minor interdum, lubido major, tenuis paniculam gerit uncialem & scissuralem, densam ex viridi purpurascens, glumis crebris exilibus, in breves interdum tortiles aristas, molles & quasi serices desinentibus; [pedis viridis & foliaceae stragipellum.]

Loc.

Genere inter legeros copiose provenit, quin & in mora ipsius urbis, alibi etiam in Germania & Gallia. Simile est hoc Gramen Graecum nostro montano speciei foliaceae graminis, nuncquid panicula crassior & magis conferta sit.

10. *Gramen montanum spica foliatae graminis* P. B.

Hae species spicam praecedens similem habet sed laxiorem.

Loc.

In summis altissimorum Cambriae montium *Suendin, Caderdra, &c.* verticibus inter saxa, ubi nulla fere alia planta praeter muscum provenit copiosum observamus.

* 11. *Gramen Cameracense repens* J. B.

J. B.

Radicem adspiciunt longam, tuberosam, foliis aequali, articulis praecinctam, & hinc inde reflexam, non tamen profundius radicatam, filamentis constantem pluribus. Scum protrahit haec ab unoquoque articulo *calamus*, continuo se innovans & multiplicans. *Folia* longa, acuminata, dura, Arundinis instar parva lata. *Calami* duarum fere spithamensium altius admodum angustis, & tenuis nocte flammis, tribus quatuorve noctemque articulis praeditis, spicam superioris parte profert pedalem, quae parvum continet *semen*. Folia cum radicibus laporem habent dulcem, cum adfrictione quadam & acridum.

* 12. *Graminis primi Descuridae speciei minima Thali* J. B. *Gramen caninum spicam paniculatum folio varians* C. B.

Nobis incognitum, nec alii praeter Thalius Botanico descriptum, nec iconi illustratum cum sit, Lectorem qui plura de eo velit ad Thalius remittimus.

13. *Gramen vesiculare* J. B. *Avenacum gluma variis* C. B.

J. B.

Repransibus graminebus accensendum, *radices* duras, geniculatas, longè latè, spargit, fibris profundè demissis, iam crassis, vix evelli potest è rupum cunis: *Calami folia* crebris vesiculis, dodrantales, *spicam* singuli gestant graminis arborisinsti, paulò breviorum, modo purpuram, quae colore ad obiectum lucis variante placet: parvum, *semen* longiusculum, ad lumen Graminis Mannae accedens, rufescens externè, internè albescens, involutum parvis glumis.

Adde ex C. Bauhino radicem albid rugosà membranis inter, *calamus* fragdem & levem esse.

Loc.

Genere in collo *La Bassa*, & circa S. Hippolytum Burgundiae. Solet inter rupes provenire loco soli expostis.

14. *Gramen panicula aereis* J. B. *Gr. panicula pendula aereis* C. B. i. e. *paniculatum arvense* 2.

Tenuem sinigrae dodrantis majorem *calamum*, per cuius fastigium confundunt quoque vel sex circiter *paniculae* splensulae, tenuissimae, graciles, teretes, acerosae glumis concaevae. *Folia* perangusta vix culmo cedunt longitudinali.

Loc.

Argentinae habuit J. Bashum: in faccosis & squalidis locis provenit, ut testatur Hist. Lugdunensis.

15. *Gramen minimum Dalechampii* J. B. *minimum panicula elegantissima* C. B.

J. B.

Est veluti gleba amphiscula, rotunda, *radiculis* pluribus brevibus, candidis: foliis digito non longioribus, terribus, spica valde gracili, parva: *bulbulis* rubens.

Temp.

Februario statim ad primum aeri temperam exorituribus, sapore initio dulci, deinde amaro.

Loc.

Nascitur in arvis, circa Moispelium frequens.

C. Bauhino *Radicis* pluribus curvis oblongis albicansibus componitur: *Folia* unciarum, carnis duarum longa, capillaria, casta, teretia copiosa: *Calam* molli, uno alterove modo distinctis, duarum, trium, etiam quatuor unciarum.

16. *Gramen minimum* J. B.

J. B.

Capitulum instar tenuis radiculae caespitem modicum obsident: *calam* minutissimi, plus minusve unciales, cocules, molles, tenuissimi in spicam desunt, alutis glumis graminis praetensa obtusam *Fidula* stipula à radice aliquando, emittitur, tenella, perperilla.

Loc.

Prope fontem solum magnam tempore Diatriae prope Nemausum collegit Charlerius, nec alibi usquam observavit.

A. 17. *Gramen minimum spica brevi habitum, nostrum.*

Fibellis plurimis capillaceis terre adherescit, è quorum capite plures emergunt *paniculae*, fasciculis aut duarum unciarum, tamen, rigidi tamen, duobus plurimum geniculis, (interdum tribus) intercepti, & foliis è singulis ortis singulis aliquoties, obvolunt, spicam in fastigio sustinentes perbreve habitorem, è locustellis, latris latis, glumis emittentibus brevissimis aristis donatis compositam. *Folia* non admodum numerosa è radice exsunt, angusta, vix triontem uncia longa. Imi culmi plerumq; purpurascunt.

Secundum Genus.

Gramina paniculata.

CAP. I.

De Gramine Dactyloide seu *Ischaemum*.

Hoc genus graminis inter spicata & paniculata ambigere videtur: panicula enim è pluribus spicis composita est, unde & Gramen multiplex seu composita spica, seu polyistachyon dici potest.

Dactylon appellatur eo quòd panicula in quaternas, quinas, senas & plures partes divisa, quasi digitos manus expansos referat. *Ischaemum* verò à sistendo sanguine nomen invenit.

- A. 1. *Gramen repens cum panicula Graminae Mannae J. B. dactyloides radice repente Ger. compositum ischaemum paniculata Park. dactylon folio arundinaceo mayus C. B. quod nomen huius nostris ut patet minus & saporis mentem convenit. Creeping Corks foot grass.*

J. B.

Duùm generum folia & culmos profert. Primum enim lentis longisque ad cubitum unum aut alterum *cauliculis*, solidis, crebro geniculatis, levibus, caulis nascitur, qui ubi terram attingit, statim per fibras è nodis demissa comprehendit, radicaturque; atque ex cassidem geniculis *folia* mutuo amplexu sparsa surgunt, brevia, angusta, hirsuta: deinceps adultius culmos producit erectiores, veluti superiorum ramos, pedales, tenuiores, *folia* amictos longioribus, hirsutis, & rarioribus geniculis interceptos, quorum summitas in spicis hinc inde, quatuor, quinque, sex, spica Graminae Mannae similes, sed minores, concinniores, imbricatos, non tantum circumcirca, perinde ut iam dicto Gramine, cui pars spicae interior nuda, hoc discrimine interim, quòd ea pars Graminis Mannae sulcata sit, in hoc verò in cristam elata. *Flosculi* sunt atro-rubentes. *Radix* nititur geniculata, reptante, subulci, alba.

Hoc Gramine (quod legitimum vocat Clusius) nihil vulgaris toti Hispania & Gallia [alde etiam Italia] in arvis, vineis, atq; etiam in maritimis, in quibus multò laevius & uberius crescit: nam ipsa radices interdum digiti crassitudinem aequantes evadere meminit Clusius. C. Bauhinus etiam hoc Theophrasti Grameni esse credit.

Huius minor species seu potius praecedens varietas habetur apud C. Bauhinum eius descriptionem in Theat. Botan. p. 117: vide. Hec varietas eadem videtur nobis vix in Gallia & Italia.

2. *Gramen dactylon Siculum multiplex panicula spica ab eodem exorta geminis. An Gramen bicorne, seu distachyophorum Bocci? An Gramen distachyophorum Col? Two corned Corks foot grass. An Festuca juncea folio spica gemina C. B?*

Radix huic est perennis, innumeris fibris quasi reticulato textu implicatis compacta. *Caules* pedalis longiora, geniculatis, paucis foliis cinctis, ex quo ad instar pili recti truncatae longioribus exit è folliculo *spica*, rubente colore praedita, quae per maturitatem Graminis dactyli modo, in furcam dividitur. Eiusdem spicae glomus in aristas tenuissimas & longas abeunt.

Floret vere, & usque ad finem aestatis.

Hec est descriptio Graminis bicornis Bocconiani, quae nostro Gramini dactylo Siculo distachyophoro non convenit, ut nostrum ab illo specie diversam asseremus: nam in nostro spicae vix uncialis sunt, & hirsuta. Quin & nostrum mules in eodem culmo habet spicarum pars è foliorum alis peculiari modo exorta. Nam è foliorum superiorum sinibus exiunt pediculi seu ramuli, tenues, longi, nunc unum, nunc duo tresve sunt, quorum unusquisque medio aut inferiore parte geniculum seu articulum habet, è quo exit folium pediculum obvolvens ad spicam usque. Atque hoc modo dupli vel tripli gradu panicula augetur.

Festuca juncea folio spicae geminae C. B. culmo est sesquipedali, rotundo, geniculato & ramoso: cujus similitudo spicae vix unciarum longae, molles, rufescentes, aristis oblongis armatae. Nunciamus graminis villosi similes, insident; semper duae simul una oblongiori tenui pediculo adherentes pinguntur. *Folia* habet juncea, longa, inordinatè posita.

Hec descriptio in omnibus p. 117. quam folia junceae plantae nostrae convenit.

3. *Gramen crucis* sive *Neum-el-Jalib* *Alpin* J. B. Bonni, *Gram. dactylon* & *Aegyptiacum* C. B. Park. *Aegyptian Cochs foot grass.*

Alpin.

* Gramen quoddam nascitur exale, radicibus repentibus, albis, geniculatis, denticibus cum aliquo arithmetica, communis Gramini proxima, digni albiditate, geniculatis ramulis affurgens, foliis communis Gramini similibus, sed minoribus: Ramuli habent quatuor spicas, Uchami vel Graminis longiorum similes, perfectam crucem figurantes, quam aequè omnes uno modo formant: ex quo ipsum Aegypti *Neum el Jalib* vocant, quasi dixerint Gramen crucis, in quibus sunt semina minutissima, seminibus communis Graminis similia.

Fieri
Uchi.

Maxima usus semina apud omnes habent, Ad eos scilicet qui tum reum, tum vesicae calculo laborant, atque ad frangendos lapides in vesica concretos: quod quum multis ibi est familiarissimum & quasi endemium. Mulieres radices decoctum tum ad peccos variolis atque morbillis correptos maxime sequuntur, tum ad lepra, ubi cepit uterque mensuras purgatione regiam evocare. Sunt aliqui qui pro secreto amico habent decoctum ex seminibus modice commixto paratum ad curanda exanthemata in febribus pestilentibus, quas pestilenciae nosse appellat. Ad usum ergo, valentium & ulcerum non parvum apud eos tota herba, praecipue radices habent usum. Aicut radicem frigidam atque siccam esse, terribilissimam partum: Quamobrem non desunt multi, qui ad movendum sudorem eam decocto familiarissime utuntur.

Loco.

Abundantissime in insula Java crecit non levis ac in Aegypto, Jacubentio auctor, ubi & inquam stellarum Vestingii reperitur.

4. *Gramen stellarum* & *Aegyptium* Vestingii. *Dactylon* & *Aegyptiacum* Park. qui in descriptione praecedenti hujus nominis.

Vesting.

Affurgit altitudine pedali, ramis rotando geniculorum aliquot internodiis distincto, circa quae angusta sem, & in acumen attenuata folia producit. Foliorum radice firma, canaliculata, & ipsa geniculis aliquot nodosa: subulci quaedam acuminata gustum pinguem. Calam in quatuor lineasque paniculas dirigitur, longitudinaliter dispersas, Uchami gramine breviores quidem, sed longe densiores: Aversa facie in longum excurrit validè carinè, & porrectis à lateri ramulibus mucronatis, quibus squamatis compactis spicae fibrosae congruunt, visore flavescite tendens, liguera munita est. Congenera hujus hinc gramina sunt. Nec mirum ullum in stellarum aliquid ab ea posse quam crucem tale.

Fieri.

Usum hinc medicam etiam obtinent, quamvis calculo intra vesicam durato frangendo vires parvi non possideant. Quae lapidem alias vesicae synagmæ circa sectionem eduxerit, ut alibi Prosp. Alpino scripsit in magna Aegyptiorum Memphis, quamvis curiose inquisiverim, neminem apprehendi. Hominem tamen resipiscit à monte Sinai, calculos extra vesicam in urethra inclusentem, compunctis suppositis ligno vesicæ, & meatu urinario per immixtum perne Anterie tubulum valde nitens, eodem extrorsum propulsis, ab agris ipsi acceptum satis & cognitum habeo.

Loco.

Circa Heracleam oppidum sive Rodionem primum conspicitur Vestingia.

Gramen dactylon *Africanum* Park.

Præcolente paulo altius exurgit, panicula tantillo longioribus & crassioribus, graminis ordinare disposita, cetera similia.

5. *Gramen* *diversiflorum* Cal. *Gram. sicut gemma* *Millepeda* simili C. B. *sicut gemma* *Colonna* Park.

Cal.

Radix admodum tenui, equaliter fibrosa, capillari, ex alio pallente nititur: ex qua partes ramosae exeunt, lupini, densè geniculatae, folia grammis parva, in summo binas semper proterentes spicas, ex una parte dextro per medium distantes utriusque pinnatas, ex alia vero quatuor angulis per longum, & in modo canaliculis tribus aut quatuor foliaceis fructuam orbibus emicantibus constitutis, in quibus parvum semina, tubum, angulosum, minus aragalline singula continentur. Spica verò è dextro parte Millepedam seu Scolopendram sive emulari videtur.

Loco.

Campetra est; *diversiflorum* appellavimus, quia binas semper in calmine spicas speciosas profert.

6. *Gramen dactylon* *latius folio* C. B. *Gramina* *tenues*, *Dens* *Caninus* 1. *sicut Gramen* *prostratum* *cal* *Galla* *oro* J. B. *Uchamus* *vulgares* *Ger. sicut* *Sylvestris* *latius folio* Park. *Cochs foot* *grass.*

J. B.

Calam ex radice fibrosa plures proterit, tribus quatuorve articulis nodulos, subinde etiam ramulos, suberentes. Folia tria breviora, lanosa, hirsuta, culmos longiusculi vaginâ involvunt. Folia singulis infidet culmis, palmatis aut lequapalmatis longa, quatuor, quinque aut plura seta commata, quorum alteri parti secundum longitudinem è bifori gluma flosco purpurascens adnati, aversa parte nuda, foliata: semina nilem glumæ conclusim, Panicæ graminis longiora.

Anima est planta, etiam hostis valde odiosa Dens caninus sylvestris tertius, qui solo apparere incipit. Ab hoc lativum, quod privatim *gramen Masse* vocant, non nisi cultura differre videtur, incipit J. Bauhinus. Quæcirca ad hoc caput sub uno & eodem titulo refert Gramen odianum & acuminatum 1. sive alium capitulo aculeatis italicum C. B. quam rectè videtur ipse. Gramen dactylon sive latius *epistemon*, atque Gramen dactylon *esculentum* *epistemon* C. B.

Cacumina

Cacumina potri maribus inferunt, extrahuntque, ut sanguinem eliciant, & hinc ab effectu Ho-
trufci *Sanguinellus* vocant. In Germanis locis feri ac coli sodio (inquit Matthiolus) non minore
cura quam cetera frugum & leguminum genera, fignam eius semine frequenter velantur in cibus,
quod in iure carniam pinguis decodum non minoreu cum palato inest gratiam quam Oryza,
cui ego facile perpolitum. In pala autem ipsam tundero oportet ut à suo relinuat putamine.

A. 7. *Gramen digitatum hirsutum* J. B. *dactylon angustifolium specu rubro* C. B. *Ischemum fisti-
vifera specu villosa* Park. *Dairy perennial* Cochis foot grass.

J. B.

Perenni radice & firma nitur, ex qua culmos emittit cubitales & bicubitales, tenues, rubentibus
geniculis nodulos, frequentis singulares, alius ramosos: *folia* tres quatuorve uncias longa, angusta,
& rari longis pilis hirsuta, subinde rubescentia, statim à radice partim, partim sed juniora (ex-
ceptis vaginâ) ex culmo oriuntur, panicula jubata, quatuor aut quinque spicas comata, Gramini
Mannæ similes, minoribus, purpurascensibus, molli lanugine villosis, ex glutinosa mucrona
acilla molli nâta prominente. Flocculorum staminula saturatior purpurea tinguntur.

In exteris regionibus frequens est locis ficis & squalidâ.

Ab hoc non diversum specie esse suspicamus Gramen Ischemi panicula Gallicum *Loberis*, cum
descriptionem subscribimus.

Gramen dactylon seiparium C. B. *seiparium Ischemi panicula* Park. *seiparium Ischemi panicula*
Gallicum Ger. *tenac.*

Lober.

Figura ei graminis Ischemi vulgaris; gracilis *caulis*, rigidus, geniculatus, cubitalis, in quaternas,
quinas, interdum senas & plures elegantissimas, lucidas spicatas canalicellas Ischemo graminis simi-
lis, fastigiatas: *Folia* item non dissimilibus, gustu Graminis dulcoribus.

Copiosè provenit in Gallia fabulosis vicinis castri Insulam locis vocitati (vulgo *Chasse de l'Isle*) *Lober.*
prope Aurelian.

Ex lupis prælongis, pratensibus rigidisque cubitalibus & longioribus radicem ceteris concinnantur *Ufas*.
scopula illa vulgarissima, nitentis omne conciliatrices, frictibus capitis accommodatissimæ &
usitatissimæ. Crene in Lombardia Italiae huiusmodi scopula laudatissimæ sunt. Gramen ex cuius
radicibus scopulas faciunt ibidem *Capriola* vocant, quo nomine in Hetruria Gramen Mannæ vo-
citari scribit Matthiolus. Fortè *Capriola* nomen commune est omnibus huius generis Graminibus;
vulgo enim non distinguit. Gramen autem quod nobis pro *Capriola* ostenderunt non videtur
differre à Gramine digitato hirsuto: idem tamen prolixo casu non audeamus fidenter asserere.

A. 8. *Gramen caule ductis* Norvegicum aut Denmark, *Gramini seipari regnum* J. B. *Gram.*
foliis juncea, radice rotata C. B.

Lober. Adv. p. 2.

Saxorum intervennis levi terra, sterili petreæ Norvegiæ, imilque marcidis rimofu caudicibus,
sylvarum Danicæ hoc gramen viget, densissimo, sparsoque rigidorum, juncorum, sesquianciali
altitudine, tenuissimorum toborum stipato, sesquipalmaribus, numerosis, circatis, geniculatis,
staminibus *calamula*, quorum summa folia lanifcula vaginule multar spicatas, unciales paniculas
claudunt aut amplectuntur. Jubata circinnataque dodrantalis *radix* buxi palbei coloris, totique
prolixior plantâ, uti Graminis scopari, cuius *aggrata* videtur.

9. *Gramen dactylon aquaticum* C. B. *aquaticum geniculatum* Tabern. *digitatum, atro-purpureum*
J. B. *geniculatum aquaticum* Ger. *geniculatum majus* Park.

Tab.

Radix est fibrosa, ex qua pluculi nascuntur teretes, geniculati, sesquipoliales circiter calami,
folia ad articulos graminis, brevibus, latis, acuminatis amicti, calamorum fastigis spicæ inna-
scuntur longe, tenues, digitalis Ischemi spicæ similes, breviores, atro-purpureæ Tabern.

Passim in lacustribus & palustribus nascitur. Quod si ita sit, mirum alios Botanicos hæcenus la-
tere, qui quicquid de eo habent Tabernamontano debent.

Ab hoc non diversum, aut saltem ei valde simile esse suspicatur J. Bauhinus,

10. *Gramen panicum specu nigra* C. B. *Panicum effigie Gramen*; *Lober Gramini Dentu canis spicâ*
acutisâ tenuissimâ nigra speciem J. B. *Gr. panicum*; *Tab.*

Descriptio (inquit) nihil convenire videtur, nec figura multum discrepat. Culmis est tenuioribus
[Gramine Dentu canis primo & secundo] geniculatis; foliis minoribus; spicâ Ischemo vul-
garis similibus, nigris; semine glutin exuto albo.

CAP. II.

De Gramine tremulo.

Hujus speciei est quibus panicula componitur pulcherrime, squamolis, & filamentis tenuibus dependit, ut vel levisimo flatu agitate tremulant.

1. *Gramen tremulum minus* J. B. *tremulum minus, panicula parva* C. B. *Park.*

J. B.

Ex radice rubescente & quaquaversum reptante caulis surrigit pedales plus minus, gracilis, vit uno vel altero distinctis articulis, *juba* fulgentibus parvas & solas vaginacoo, superiora parte acuto, & solum ipsam sepe superante, media parte laxiorem, quae ex squamulis delicatulis, rotundis, pallidis aut flaviscentibus & splendens, ex brevibus paniculis pendulis, tremulis, sed in unum tantum lato plerumque nutantibus consistit. *Folia* caeterum inferna graminosa, pallide viridula, angusta, acuminata.

Leon.

In pratis montibus Basiliensibus provenit; & vulgò *Fris leporinus* dicitur.

2. *Gramen tremulum minus panicula magna* C. B. J. B. *Gr. Anarettis alterum* Clus. *cur. post tremulum minus alterum* Park.

In cacumine aliquando tres aut quatuor ramulos exiles fundit, seminaque triangula habet.

In loco Graminis antea frequentis nascitur, antea *P. Magnus*, quod minor figura Graminis tremuli majoris C. B. optime representat.

C. Bauhinus in Theat. Bot. ita describit:

Hoc radice est minori [quam proxime loquor] caulis palmati, tenuissimo, uno alterove geniculo distincto: *foliis* tribus vel quatuor angustissimis: in culmo talligo duo triave filamenta, quantum singula paniculam squamulata sustinent, squamis interioribus atro rubentibus, reliquis pallidis, quatuorlo quam praecedens majoribus.

- A. 3. *Gramen tremulum* J. B. *tremulum majus* C. B. *Phalaris pratensis* Ger. *Gr. tremulum* (in *Phalaris media Anglica, primo et secunda* Park. *Quaking grass, Ceto quakes, and in some places, Rabies hair.*

J. B.

Radix fibris tenuibus, non valde numerosis, obscure cinereis, aut fuscis terram apprehendit: non multum se diffundit, sed uno alterove praeter culmum gemine emisso perennem plantam se esse prodat. *Caules* autem teretes, cubitali, duobus plerumque geniculis interrupti. *Folia* magna sui parti culmum cetera vaginam complectuntur, reliquam sursum breviorum, rigida: à summo culmo molli, tenuissimisque rubentis peroli glauca testantur rubescens, & squamulis pulcherrime ordine dispositis compositis, levissimis tactu tremulis, interea quam tremula majora, forma conoide, compressa. *Folia* quae à radice modice lata, & palmam interdam longa, plerumque tamen breviora.

Leon.

Hoc genus in paludibus per totam Angliam vulgarissimum est, nec aliud (quod sciam) apud nos invenitur. Maio mense paniculam explicat. In omnibus quae usquam illustravit Clusius regionibus praeter multis loci vestit.

In horto Medico Leydeni habetur quoddam Gramen tremulum perenne n. d.

4. *Gramen tremulum maximum* J. B. C. B. *triv. maximum* Hoffmanni Park. *Phalaris pratensis altera* Ger. *max.* *The greatest quaking grass.*

Radix ut in praedictis graminibus fibrosa, fibris albis. *Folia* quae à radice exiunt, semicircum lata, palmam & dimidium, vel decem palmos longa, glabra, glauca, & plerumque intorta. *Caules* cubitales aut sesquipedales, non solummodo teretes, quatuor vel quinque geniculis nodosi, totidemque foliis eos aliquidque obvolvuntibus armati, in summo paniculam gestam sparsam, & pulcherrimam aliquot *spicis* squamulis compositis, pendula, & bino squamarum ordine composita, dimidium digitum longa aut etiam longioribus, laminae subdupla, contractae. Squamae ad basin spicarum (quodam, reliqua à vobis albicans, lateribusque hinc viridibus styata, per luciditatem albicant aut nigrescunt.

In horto nostro Vere lectum non ante Angliam modicum paniculam suam explicat. At quod Amantio erit Vere lecta.

Leon.

Prope Milanam Salsit in paludibus spontaneum invenimus.

5. *Gramen paniculatum elegans* Ger. *Gramen amaru dillam* J. B. *Gr. panicula elegans* (in *Tringula major* C. B. *Phalaris pratensis major, seu Gramen tremulum maximum* Park. *Rare grass.*

J. B.

Caules semipedales, latis crasse in unum caput coarctat: & quo surgunt pedales cauli, graciles, latis latis vallis *foliis*, *caulis* cum trifligi occupant *panicula* longe pulcherrime, albicans, & spicis plerumque uniuslocis, culmi laminae, compressa, gemmae veris squamularum contracta, aculeo omni paleae venaribus, non tamen paleae, quibus non observare potest.

Primo nobis obviam fuit Francofurti ad Moenum, deinde passim per Germaniam, Italiam & Lœm. Galliam Narbonensem.

Hujus varietatem circa Florentiam & Montepesium observavimus paniculis multo minoribus magisque sparsis. Gramen tremulum propriè dictum non est, nec enim sicca filamenta tenuibus appendicæ levi statu agitantur, cum potius erecta sint, & pediculi rigidi inflexant; Verum ob speciem squamosas elegantes non dissimiles, ei non immerito subjungitur.

CAP. III.

De Arundine.

A Rundo, Græcis κάλαμος. ab *are* dicta est, eo quòd cieb' arefacit, ut volunt Grammatici. Arundo planta est inter culmiferas maxima, paniculis lamiginosâ, aquosâ pendens. Hæc adjungimus plantæ nonnullis Indicis, à Botanici Arundines dictas eo similitudinem aliquam, quibus an nocte predictæ conveniant nescimus.

A. 1. *Arundo vulgaris* Lœb. Ger. *vulgare palseira* J. B. *vulgare sive phragmites* Dufour. *arundo vulgaris* Teophrasti C. B. *Arundo vulgaris sive vulgaris* Park. **Common Reed.**

7. B.

Oculus geniculatam agit *radicem*, nervos subinde furcales oculisquæ continuo cauda protrudent, ex quibus *cauli* surgant, hominis altitudinem æquantes, aut altero tanto majoris, minime digno tenuioque geniculati, inanes: ex quorum nodo singula ferè culmum involvunt *folia* crassa, rigida & aspera nonnullis, undas dum lata curvæ, cubito longiora, venosa. Scapus summi in costatum, mollem, purpurascens *robore*, tandem villosorem, mollioremque, colorem cinicem reddunt, natabendam effunditur; quæ ventis haurientem debens sine semine spe abripitur, glans videlicet callis contexta. [Rochus C. Bauhinus semina non conspicua dicit.]

Nascitur in aquis refovis, veluti in fossis, paludibus circa fluminum latiorum & lacuum ripas, Lœm. ultra regionem notissima.

In omnibus anno primo subtilis latior, corpus gracilius, contra sequentibus annis: nam incrementis corpore angustior subtilis redditur. C. B.

Ubi est ad rugosorum tacta, lenisque ad valla & sequestra, unde & vallatena dicitur.

De Arundinis tribus eleganter Marcellus, cum hircos verba dixerimus, de Arundo præta usis bonorumque sicutum estimationem etiam maximè arboribus comparatur, nullibi quàm in ea natura liberaliter hauri videtur: nec aliunde magis illi monitò laus erit, quàm verò hoc fragili & inani fructu omnes ferè toto-orbe gentes ad omnem fortunam & vitam instruxit: quando una hæc lectricis, epulis, theatris, funæribusque tibus multiplices dedit: Una hæc silinda humana vocis percutiens retinet, & ad alios consilia & cogitationes nostras transfert: hæc una ad propulsandas injurias longe arcendos hostes militem etiam nunc in Onere armat: & in sulco operam invenit, in quo modo turgida regit, modo floræ materiam præbet, modo vitam sulcat, modo horum classem à fœore tutat, & de voluptate etiam dicit, accipio per hyemem infert. Quæ omnes parentis omnium nature in fructu hæc non committende laudes sunt. Rectè ergo Pinus, Arundines belli pacisque experimentis necessarias, æque etiam delicias gratas scripsit.

Arundines etiam inire & frangere eandem vinculorum quoque vim solum. Uruntur & traxerunt canna, ex illis instrumenta inique confectis pro his plomerandis: & chirurgi officios fractis colliganda adhibent.

Uruntur mentis quoque movere & elucere focuere radice tam servilis quàm sacri in vino vel aqua decoctum propinatum scribit Mathucos. Epilepsia in vino decoctum tutures aulat, si eo caput abluant. Erysipelas alique inflammationibus (etiam testium) fida vicinia tula & imposita moderant. Aliter tempore hæc per febrientis concive refrigerandi gratia sparguntur. Maculas ex variculis relictis licet radice cum lero hircino & melle pari dosi dicit. Sudores potentur moveri medulla contusa syncopi & pedibus adposita tiquis in lactum se componat & cooperat. Spicula oculisquæ corpore extrahit radix contra tum per se, cum com bullis suspensa. Quæ præterea habent Veteres de Arundinis verbes apud ipsos videt.

2. *Arundo sacra sive Donax* Dufour. C. B. *Arundo Donax* Park. *Ar. maxima & lortense* J. B. *Arundo Cyria* Ger. **The great Spanish, or Cypus Reed, or Carr.**

Radix nostra densâ, longâ, crassâ, conortâ, nodosâ, geniculis multis, radice Chære armillâ, quæ non alba, hæc hæc & illuc fibra hamum porrectâ, subtilique auctâ, quæ quædam novæ gemina promittit, cuiusque etiam rufiores cum grata dulcedine citari possunt. Calamus est duris, firmis, vacuis, duros cubitorem, mixtæ hauræ crassitudine, & non raro etiam pocrantâ, densis nodis distinctis, cortice squamoso, qui facile detrahitur, albero & flavescens vultus: circa quæ fida longa, lita, crassa, superficie ob fibras copiosas aspera, & circumferentia acuta, quæ mentecano cortice usque ad modum inordinatum calammum vultus. Paniculam lita pabam elegantem habet, densam, Milla modo sparsam, mollem, & lanosa celare nitentem, & purpurascens, quæ hyeme sine ullo lenocinâ vellago in auro dicit. [In frigidioribus fortasse regionibus, aut lita inclemente siccitate, Nam lita natali proprio, ubi sponte oritur, non semper producit, & etiam perfectæ minime debentur.] Calami quædam tunc hauri tenet locantur, sed illic regionibus è radice geniculis.

Linn. Hispanica dicitur quia ex Hispania ad nos primum delata sit. Servit in Italia ad colos mulierum, & Vinarum radices: in Gallia ad sepes. Nostrato epus calamis unctis pro baculo & virgula piscatoriis.

Urb. Ex ista hujus radice Arabes spodiaga parant, tamen ut non necessario, in non magno incommodo.

Arundo Italica folia in summitate densa C. B. multiflora Park.

Pro prima speciei varietate & loco naturae habeo, non pro specie distincta.

3. *Arundo ferruginea* J. B. *Ger. scriptura styriaca* C. B. *Arundo minor* seu *Elycia* Park.

C. B.

Radicibus & foliis est. Donaci non dissimilibus: calami crassiori, crassius tuberosi digitum, vel potius calami Cygni aequantibus, octo seu decem pedes alti, leviter, spiralemibus, prodris, colore sicut atro-rubescens, internodiis albo, gemmulis distinctis, altero ab altero plus doctrinae distantibus, quibus circuli albi fasciis similes circumjacentur; in axillis filiales alba rumpuntur.

Linn. Provenit (aitor C. Bauhino) locus humidus & pinguis in Provincia Galliae, in Coxyca insula & Graecia. Reperiuntur utiam, montes Amato, apud Hispaniam & Irakos, per totam apud Faventinos, circa campum vallium quam *Arundinis* appellant, quibus locum generalem characteribus pingentibus, & adhuc hodie Arabes, Persae, Armeni, Graeci & Turci (quibus perire Antifera in ista non tam / unctis, unde & calami nostris ex partibus Aetheris aut Oceanis facti nocentia obtinuerunt.

4. *Arundo folia Rhodi Romanensi* Vitis Zanoni.

Zanoni.

Radicibus longe latius sub terra repetit, flavo-aurantiis, calami quibus crassio, formae seu caritate in tuberosissimum parva parva, frequentibus tamen nodis intricatis, (et quibus fibras dote mittit tenuis, longas, lignitas, Hellebori albi similes) duribus & succulentis. Et per eadem nodis agrippis porrectis, figuris conicis, et nodis squamis conspicuis, quae extinguntur caliditate in fovea abigitur. Calami molli, surculi, graciles, lenti & plicantes vitium modo (Prope terram, tamen, ubi magis flos & plus sunt, facile rumpuntur) circuli nodi distincti; et quorum uniusquisque consistit folia, ab imo ad summum totius hujusmodi contraxerunt, elegantius foliata, nervis subtilibus elevatis, quae ea reddunt vasa pulchra, raris albis; amara vero parte glabra, colore argenteo et albam Arundinem, modo tamen illis angustiora, duos circos palmas longa. Calami isti cavum non habent, modo tamen illis angustiora, interna ampullarem, hincque intus cavilata, coctae, qui facile a lignis parte abscidit, totis, qui postquam debeat omnino viridis maris. Summi calami Mensis Augusto in cibum seu panem saltem trinitate ex multa parte & plantis spici compositam, doctrinalis longitudine, coloris vari, h. e. viridis, albi & purpurei.

Locum triduo indicat.

5. *Arundo folia vulgum Ravennae Zanoni. An Arundo folia geminata seu segitata* C. B.

Zanoni.

Et radice caput magnam foliorum crispum emittit, duos circos ultra [brachia] longum, angustiorum, ut vii duos digitos transversos latitudine aequant, nervo mediani percurrunt albo, in loco elevato, luperbilo sulcato, reliquo fuso line viridi. Calami in quatuor, quinque, aut sex inter dum aut plurimum unanum altitudinem assurgunt, recti, teretes, solida, & medulla intus alba, longiora replent, lenti aut complicati neque rumpuntur, neque fradantur: nodis prope terram una parte circos, latere rarioribus & longis distantibus, ad dimidiatum usque ultra. Ad quorum uniusquisque folium hujusmodi decidant, non tamen eodem ut margins coctis aut uniantur, parte interna levi, nervosum, viride, in curvum postea colorem transiens: reliqua pars folii a hujusmodi caudata, ubi nodo adjungitur lanuginem multam argenteam obtinet: Externa quoque facio aspera est, nodis tuberosis punctata; nervo crasso, inferne viridi, impendit ad apicem usque percurrunt. Sunt autem hujusmodi folia longiora & angustiora multo quam reliquorum Arundinum vulgarium. Summi calami occupat. Tuba aliam Arundinem tenens, pluma alba cum perperam hujusmodi raris, & in summitate, pro hujusmodi apice flavicentibus elevatis. Nodus crassissimus est, tuberosa, actus emittit albero, serus tacta, lignosa, dura, et qua oscurum nupte ubi radice crassissimae, longa, undulata, subulis subtilissimis capillate.

Linn. In Syria & Calabria Ravennensis invenit Jacobi Zanoni.

6. *Arundo folia maxima styriaca* C. B. *Ar. nigra* seu *folia, crassa & nigra* J. B. *Arundo nigra* Ghisi Ger.

C. B.

Calamus est rectus, folio & tubuloso, conis, laevi, splendente, strondente & folio.

Ex Italia & Syria additur.

Urb. Unde quoque pro Hispanibus & Luculis: quos Archetrisium etiam in aliis Principum argenteo circumstitum esse videtur.

7. *Arundo folia geminata seu segitata* C. B. *Ar. nigra* seu *folia, tenuis, flexilis* J. B.

C. Bauhino primum speciei est, calami crassioribus & circulis gemmulis caudis, albis fibris: ex quo hujusmodi haec, Arabes & Syrii nota consueverunt, ab eis & pro Scipione unctis.

Hoc genus in Italia, etiam in Rheno Bononiensi provenire auctor est Plinius: ibidem & Arnica observavit. Ceterum si hæc præcedentis species seu varietas est, ab Arundine Rheni Bononiensis superius à Zanoni historia descripta, toto genere differt: quamvis utraq; eadem usui infervire possunt.

Arundinis farctæ, toxicæ, figuratæ bacillus quem vidit J. Bauhinus enodis erat, crassitudine viti furculi mediocri, serratis impressionibus eleganter donatus, quæ serræ eminentiores reliqua parte, saturatioris ac ferè spadiceæ, leves, superficie tenus lucentes: reliqua pars pallidior est; tota quoq; zonulis nigris densè oneline positis cincta est. Lignosa alioquin epa est substantia, circa medullam secundùm longitudinem porosa. Odorem nullum in loco & evanido fructo deprehendimus.

Quæ Rauwolfius habet de quartâ specie Arundinum vide apud * C. Bauhinum.

* In Theat.
Botan.

8. *Arundo farcta flavæ* C. B. *Ar. naja seu farcta, seu toxica, gracile & plicatila* J. B. *Arundo farcta* Ger.

C. B.

Calamus est levibus, splendens, flavis, medullâ farctis, qui si parvi & graciles sint, flocci & plicari possunt.

Adde è Lobelio, rectis, lignosis, duris, farctis, crassitudine calami aromatici, aut Arundinis scriptoræ, (imò multo crassiores & densius) genicula duodenis, terdenis & quaterdenis pollicibus invicem distant. Superficies squamata serpentium dorsum simulat. Nec odorem, nec laporem habet ullum.

Quid Lobelius intelligat per squamatam superficiem nescimus: necdum vidimus ejusmodi cannas. Rectis Rauwolfius Cannas Indicas apud nos frequentissimas describit. Arundo (inquit) à mercatoribus ex India adfertur, valde longa, flexilis, utrus farctis, foris levis & flavescens, ejusdem per totum pæne crassitie, paucis geniculis, longè distantibus & vix conspicuis, cujus duæ perissimum species, major & minor. Ex majoribus robustiores in senum & imbecillum fulcra codant: minoribus, quæ tamen aliis formâ planè similes pro telis utuntur, quæ Turcæ Senico variorum colorum involvunt.

Ex India Orientali defertur.

Minoris speciei nunc dierum frequens usus est ad cathedrarum sedes texendas.

Locus?
C/ta.

9. *Arundo Indica versicolor flexilis* C. B. J. B.

C. B.

Gracilius est & fuccinatius Arundine Indica versicolore simpliciter dicta seu sequente, ad modum viminis flexile, ex quo calathi & alia multa pulcherrima conficiuntur.

In Bengala reperitur, ubi *Risa* vocant.

Locus.

10. *Arundo Indica versicolor* J. B. C. B. Park.

C. B.

Hæc Arundinibus Hispanicis crassitie similes, paulò tamen tenuior, medullâ plena, foris punctis verticillis notata, haud secus ac si arte ita picta foret, quæ adhuc viridis ad statum modum aut Salicis instar lentè inflecti potest.

In regno Bengale creciscit, & vetulis pro scipione infervit.

11. *Arundo repens vel Chamæcalamus* C. B. *Arundo humilis, rara ac insitata* J. B. *Harunde ramosa seu epigeus Lugdunensis* Park.

Lugd.

Calamus est, auctore Lugdunensi, humi sparsis Graminis modo, comice fulvo contactus, lineis squamatis cingentibus distinctus, cauliculos alios multos utrinque producenti, densa congerie stipatos, simili cortice, similiter, squamoso vagatos, qui rursus & alios gignunt, prominentium veluti nodorum, aut oculorum modo exsertos, plures superiore parte, quæ terram non attingit, pauciores inferiore quæ terræ inferneatur, aspectu pulcherrima densissima illa tenuium cauliculorum, laticulorum, congerie, cum ceteræ arundines folia tantum hinc inde mittant, nullos autem præterea vel furculos, vel calamos: solum nostræ Arundinis simile à nodis exoritur, sed microscopis magis, multiplex, & plures complexu involucrorum per ambitum tunicas inducit.

Hæc Arundo pumila in locis magnis Costæ Arabico & Zangbere plenis aliquando reperita est.

12. *Arundo Indica punicea mollis* C. B. J. B.

C. B.

Arundo, vel Scirpi potius genus, puniceo coloris & molli, quam parumper consistant arcu pro nervo adaptant, in regno Congiano & in regno Bengale ad Gangem fluviam nascitur.

13. *Arundo Indica fluitans* C. B. J. B.


C. B.

Arundineta fluitantia sive *Trombe* in Bali insula Linichottus observavit: & figura ab eodem exhibetur, ut videre est in Ind. Orient. historia lib. 11. cap. 9.

14. *Arundo Indica utilis* C. B. J. B.

Arundinis Indicæ admodum mirabile genus, variè se circum arbores vinciens & contorquens in insula Sumatra reperitur, centum, ducentum imò trecentum & plurimum orgyiarum longitudine, ita ut eam origo ac finis vix deprehendi possit; quod circuli vastius conficiendis valde accommodatus est.

Hæc ad Chinæ curas posteriores addita sunt.

15. *Arundo Saccharina* J. B. Ger. *Arundo Saccharifera* C. B. *Herunde Saccharifera* Park.  *Zugarcane*.

Molius inter Milaceas atque Arundinaceas plantas videtur Saccharata calamus. In quinque, sex, septemve pedum altitudinem attingit ordinariè, exceptis foliis (quævis viderem decem pedes longam, & sex supra quinquaginta juncturis constantem *Marg.*) crassitie quatuor digitorum imperitimum; multas habet juncturas seu nodos, quorum quilibet circiter quatuor digitorum intervallo distat ab altero; & quo magis distant nodi, seu internodia longiora sunt, eo melior judicatur Arundo. Folia superiora multa gerit, longa, acuminata [bicubitata ac interdum longiora, sursum erecta, Arundinis ferè angustiora, palustri Typhæ tam figurâ, quam positi similibus, labea & secundum longitudinalem striata, stolonis amplectentia C. B.] Paniculam producit, postquam longo tempore florit, aliquo modo Melicæ similem [*Marggravia* instar *Vide*, i. e. *Arundinis sagittaria*] Color Arundinis ex viridi vergit ad flavorem: ad nodos ex una parte albescit, ex altera flavescit, quasi duo annuli, alter flavus, alter albus circumlarent nodum, qui ipse elevatus est, & canescit vel nigrescit. Medulla Arundinis solida, succulenta, dulcis, alba. *Radix* crassa, geniculata, obliqua, & per transversum se propagans, ad Donacis radicem accedens, sed *dulcor*, succulentior, tenuis, lignosa.

Linn.

Arundo Saccharina sponte oritur in utraq, India, tam Orientali quam Occidentali. Scribitur etiam alibi multis in locis, ut in insula Canariis, Lusitania, Hispania, Sicilia, Creta, Cypus.

Solum amat pingue & humidum: copiosius obvenit pluri campis ad florum magnum ripis, qui hyeme inundantur.

Optimum tempus plantandi [in Brasilia] est mense Januario vel Augusto, aut circiter. Plantantur autem hoc modo. In terra elaborata sulci fiunt paralleli operâ ligonis; in hos sulcos ordine recto ponantur Arundines, ita ut mutuo sequenti attingat finem antecedenti; hoc facto talæ hæc inhumantur. Ad singula internodia germina sua protrudit hæc canna plantata, ita ut quodvis internodium det novam Arundinem.

Postquam sic progerminaverit Arundo, singulis tribus vel quatuor mensibus, pro ratione soli, ab herba luxuriante purganda est, nè illa plus incrementi capiat quam canna ipsa; ita labor tandem repetendus donec Arundo in aliquam magnitudinem adoleverit.

Spatio octo, decem vel duodecim mensium à plantatione Arundo hæc justam adquiret magnitudinem, pro ratione soli, ita ut tunc opta sit ad Saccharum ex illa conficiendum.

Sacchari conficiendi modum Fisi se describit.

Sacchari conficiendi modus.

Canne mature faste circa fundum, ac in ipso geniculo abscinduntur, quod in eo aquæ quædam humor contineatur. Mox amputate, frondibusque quibus maximam partem vestiantur resectis, in fasciculos coguntur, & curia imponuntur.

Molendina tribus gravissimis axibus, [erectis] ex solidissimo ligno confecta, circulari, ferreis obducta nituntur; inter quos arundo continetur inserta, & Axem se contingentium angustis compressis, liquorem fundit dulcissimum. Mola vel aqua, vel jumenta variantur. Ille aquæ longissimo canale deducta, lapsu impensivo ex alto in superius exiit magnitudinis lentes decedens vi circumagitur, hæc boum aut equorum operâ, quorum contentione exactis & fidelibus Canna exprimitur.

Ceterum liquor hæc, qui in Saccharum ipsum postea abit, ad 24 durescat hora *du*, *môv*, accedit, & ad conficiendum Saccharum prolixus fit mitionens, sed si diutius feretur bonum medicinali acetum.

Axæ aliteris, per quos lactus fluit, tum & alveæ per quæ decedit his spatio 24 horarum, vel una Tareisa (Tareisa est spatium terre cujus quadra viginti circiter est passuum, & tot canna profert quot per diem naturalem moti possunt) lavari debent.

Canna primò à torge axium excepta vicino denso sumitur, ut siquid succi in ea se reliquum penitus exprimat, tunc *Begajo* vocatum, quod tanquam inutile excrementum igne abluatur.

Succus, quem *Caldo* vocant Hispani, per canales & ductus ligneos in amplissimos arcos castor ducitur, in quibus coarctatur, tunc vehementer, tunc lenis, tunc quo mole agitante tempore fervescit, frigidaque alperione intensior ebullitio coarctatur, ut substantia minus consistat. Ab hoc succo in primo aleno consistente, modoque substructo igne, paulò faculentior & copiosius spuma auferitur, vocaturq, *Cogaja*, quæ solum pocius etiam *pelejo*, suppedita.

Sublatâ *Cogaja* liquor seu *Caldo* in proximum alenum, *Caldera de melle* Lusitana, effunditur, in quo coquois & prograndi cochleari, crebri foratimbus perulo à foribus liberatur. Ut expulsiua in modum fervens, forte quoddam lustrum affunditur. Hæc per lustrum percolatur, ac tandem lactus eo pacto novissimus excrementum, siquid habet, deponit. Hæc lustris mancipia videri sufficiunt. Vatum quoq, extidit, vulgò *Gaseja* dictum, conficitur, intermiscendo aquam, quod arduissime sperant insule. *Ros* aliquid vocant.

Porro minores qui subsequuntur Cacabi, *Tachæ* appellant, alii sunt ad concutendum, alii ad coquendum parati: in quibus succus jam dictus tamper condensatur, donec Sarapsi, & mox Sacchari consistentiam acquirat. Adhuc vehementi & assiduo labore, primum in majoribus, tum minoribus athenis inter coquendum capacissimis cochlearibus agrantur quatuor, & ad altitudinem viginti plus minus pedum attollitur, unde rursus in vase probatur.

In cacabis minoribus ob ignem intensissimum vehementiorem ebullitionis habenda est ratio, statimque temporibus olei modicum guttatim instillatur, ne ignis vehementi Saccharum aliquid detrimenti capiat.

Observatum dignum est, Si oleum majoribus inderetur athenis, in quibus liquor, primo *Caldæ* dictus, purificatur, Saccharo conficiendo plane foret ineptus. Vicissim si minoribus luxuriam fiat majoribus infundatur, æque impossibile Saccharum conficere. Si denique momentum succi Limoni vel acidi quid injiciatur, Sacchari consistentiam nunquam acquireret.

Formæ porro fictiles innumere, quando succum fluidum acceperunt, ordine asseribus perforatis in ampullisimis adibus (*Casa de purgar* vulgo) imponuntur, mox superimposita luto humefacto, dicta vasa à melle, quod subsulco antea colore Saccharum tingebat, repurgantur. E formis excelsim candidum à nigricante, *Melissale* dicto, separatur, & in frustra redactum Soli sereno exponitur, probosq; exsiccatur donec cistis recondantur.

Marggravius Sacchari conficiendi methodum & processum fufius quidem sed & confusus describit, quem si placet consule, ut & Franc. Hernandez qui non minus confusus est. Videatur etiam *D. Hogesii* Angli tractatus Anglicè conscriptus *Medicinæ Americane* dictus, & *D. Ligens* Historiæ Insule *Barbadae* dictæ.

Lutum, quo utuntur in Anglia ad Mel Saccharinum *Melassæ* dictum precipitandum, vel idem est ei quo ad fistulas Nicotianæ fumo hauriendo destinatas conficiendas utuntur, vel simillimum. Lutum aequali temperatione Saccharo in formas infuso superimponitur speculi modo. Aqua è luto defluens & per massam transiens Saccharum in granula cogit & condensat, mel unà secum devehans eluir & expurgat, ut in Saccharo coquendo & purgando exercitari quidam opinantur. Rectene hi an locus sentiant mihi non constat: aliud autem experientia certum affirmat Marggravius, nec aquam solam, nec lutum seu lutum solum Saccharum purgare, sed utramque junctam: nam seorsim quælibet materia illud corrumpere. Ceterum Lutum ad Saccharum dealbandum utile esse Gallinarum indicio compertum aiunt, quæ cum lutosis pedibus foret Saccharum calcassent, & argilla infecissent, deprehensum fuit partes illas latis candicare, quas corrigerat argilla.

Sacchari facultates & usus in cibo & medicina, quin & preparationum modi adeo numerosi sunt, ut singulos recensere & accuratius expendere vel justum volumen requireret. Sic breviter.

C. Bauhinus,

Usus eius ad condimenta, obsonia, & alimentorum saporis odulcorandos, ingratos, etiam inspidos suaviores reddendos; imò nullum nunc epulum magnificum, vix quotidianus victus, sine Saccharo placet. Acris siquidem lenit, acida remittit, austera palato gratiora efficit, & saporibus omnibus majorem gratiam conciliat. Equalem cum aliis cibis moderatè sumptura satis laudabile alimentum subministrat: colorem floridum reddis, urinam provocat, & alvum movet & id sua dulcedine ac lentore praestat: in nonnullis concoctionem promovet, si post largis assumptum cibum parum ejus in fine comedant: sed si largus sumatur, capitis dolorem excitat, quia difficilius, & quidem melle difficilius concoquitur. Verùm & pistores & coqui in frequentissimo usu habent: placentas inde & massas panis (ut vocant) effragant ac torrent: omnis generis animalia & aves & pisces & quadrupedes ex eo scite efformant, vel integra, vel eorum partes, ita coloribus fucantur, ut vera esse videantur: sic & fructus omnis generis, naturalibus similes & formæ & colore concinnant: in summo Saccharum non aliter quam facinam in omnem formam componunt.

Sic & Aromatariis ipsa aromata ut Cinnamomum, fructus seu nucleos Pineos, Amygdalas, Avelanas, Pistacia; seminum varia genera, Coriandum, Anisum, Foeniculum, Cassia, Papaver album, illo, modo corticis crassitudine, modo cutis tenuitate, contegunt & includunt.

Quin & innumera bellaria, dulciora, scitamenta ad mensas secundas influendas ex omni generis fructibus cum Saccharo conditis liquidâ & siccâ formâ parari solent.

Nec nimis frequens est Sacchari usus in Officiis, ad Sympliciorum, Conservearum, Conditorem, Electuariorum, Tabellarum & aliorum confectionem.

Est autem Sacchari in medicamentis componendis ut de Mellis triplex usus, 1. siccitate & lentore suo conservare; imò Saccharum Salis quoddam genus est, unde à nonnullis Sal Indicus dicitur, eodemque modo quo Sal corpora conservat: 2. siccitate eadem abstergere: 3. sapore dulci condire: & hoc omni suavia sic melle, condimenti gratia sepe additur: nonnunquam quibuldam medicamentis præter Saccharum, & Mel, ut magna abstergat, admiscetur.

Notandum, rectè à multis fieri dum Saccharum melli in medicamentis quæ mulieribus exhibentur, substituant; siquidem mel vero valde inimicum est.

Tandem è Saccharo cum aqua fontana, cum pulpa variorum fructuum, Prunorum, Cerasiorum, Citriorum, Grossularum, Ribis, &c. varia potuum genera parantur, quibus enumerandis & describendis immorari operæ petrorum non ducimus.

Antiquiores medici qui superiose sæculo vixerunt unanimi fore consensu Saccharum ad pedicis & palmorum vira, ranciditatem, tussim, guttis asperitatem, lateris & thoracis ulcera committenda. Ceterum apud nos in Anglia non ita peccatum in crumenam adduci, & nuptiâ infamâ læsore corpore, molles tam nostratibus, tum extraneis Sæobus & Tabis popularium in ebrietate præter solentem & prætermodum gualianam nuptas fuit, immoderato in cibo & potu Sacchari usu impetantibus. Et ne quis in Italici potus acie coactioni eas partes debet suspicetur; in Lusitanis (num) regni calida

eo eandem rationem, Tabes epidemica facta est. Lusitani enim plus Sacchari consumunt quam quavis alia gens præter Anglos.

De Scorbuto autem idem antiquiores quos diximus modici cum recentioribus consentiunt, eum à Sacchari nimio usu produci, cum dentibus valde nocuum, nec eos nigros duntaxat reddere, sed & putrescente & vacillare & excidere facere Saccharum scribant, quæ certa Scorbuto signa & symptomata sunt. Saccharum enim saltem acidum & maxime corrolatum continere ex destillatione patet. Scorbuto autem Sali fixo in sanguine redundanti debetur, proinde in ipse Salo volatili abundante sanatur.

16. *Arundo graminea aculeata* Alpin. exot. Park

In Creta insula, locis præsertim humidis, nascitur, supra terram serpens, micæ longemini, [plus quinque cubitis] multis *raris* calamus arundinaceis, ab una radice exornibus, digiti crassitie, rotundis, arundinaceis, geniculatis, inter quos maximus, ceteris tanquam *caulis*, crassior est & longior. qui hinc inde *arundine* longis *involucris* à *geniculo* geniculis *caulis* producit longos, graciles, geniculatos, quorum majori ex una parte à *geniculo* trinis geniculis *caulis* partes, graciles, quatuor numero, vel etiam ad summum sex, iidem prominent, qui à *geniculo* geniculis *caulis* utrinque emittunt, inferiori lata (qui latitudine uniusque calami à *geniculo* ad *geniculum* vestiendo occidunt) & superioris gracilis, parva, graminea, dura, spinarum modo in dorsum aculeos definitiva; ex quo hæc planta tota aculeis multis instar spinarum horret. *Caules* enim alii omnes à radice profluentes eodem modo & fasciculos producant, & ad folia se habent. Planta florilis ex toto est, neque florem, neque fructum, neque semina producent. *Hæc mihi vis perferat* *Alpinus*. Nascitur brevi radice, digiti pollicis crassitie, à qua paucule radice, in eadem breviter, fibrosa, exiunt.

Calamis duri ad Arundinaceam potius substantiam quam ad Gramineam accedit hæc planta: foliis è contra magis ad Gramen quam ad Arundinem.

C A P. IV.

De Gramine paniculato arundinaceo aliisque aquaticis.

- A. 1. *Gramen arundinaceum aquaticum* Park. *aquaticum majus* Ger. *maritimum aquaticum latifolium* C. B. *item Gr. palustre paniculatum altissimum epistemon. majus aquaticum* Lobelii J. B. *Great water sward grass.*

Lab.

Inter gramina vulgaris notitia est istud (inquit Lobelius) copiosissime reperitur ad aquas & rivus in Galia, Anglia, Germania, Italia & Belgio, possimum vero in Botavia, ubi etiam locatur optimo pabulo vaccarum. *Folia* habet pollicem lata, sesquicubitum aut cubitus duos longa, culmi quatuor aut quinque pedum altitudine est: *panicula* millacea: *radix* fibrosa. Ex inferioribus culmi geniculis intra aquas fibras frequentes emittuntur animadvertimus.

Loco.

Verè scribit Lobelius, in Anglia copiosè reperiri ad aquas & rivos.

Huic idem esse suspicatur J. Bauhinus Gramen aquaticum arundinaceum paniculatum *Tab. i. c.* Gramen palustre paniculatum altissimum C. B. cum quo & nos sentimus.

2. *Gramen arundinaceum ramosum, planifolium album* C. Bauhini J. B.

J. B.

Radix & *folia* est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrevit: *caulis* angulosus, albo *panicula* arundinaceam, ramosam, palmatam, albam, mollem, splendens instar Socii albi *folia* sunt.

Loco.

Non longè Montpeho circa *Peras* & Magalonam reperitur (inquit C. Bauhinus) ubi & nos quoque illud observavimus.

- A. 1. *Gramen arundinaceum aculeis glumis asperis* Park. *Great sward grass, with sharp heads.*

Radices geniculatis, è geniculis fibras alias, innumeris fibrillis capillatas emittentes, in limbo reptat & se propagat. *Caules* exurgit Arundinaceis, humanam altitudinem non raro superantibus, crebris geniculis, [sex septemve] interceptis, ad quos *folia*, postquam à culmo, quem intra sua parte involvunt, recesserint unciam aut sesquicunciam lata, dorsantem longa, glauca, superiora parte glauca & plana, proinde si durescunt dignos ducas asperitatem aliquam fontis, humidi Arundinaceum plantæ amula. Passigium occupat *Spica* seu panícula non multum sparsa, plerumque purpurascens, interdum albicans, sesquipalmatis aut longior, glumis aculeis Graminis asperi terè similibus constans.

Loco.

Ad fluxionem ripas nullibi non obvium est, fossis palustribus frequens.

4. *Gramen arundinaceum Calamogressi dictum, spica multiplex C. B. Gramen Calamogressi Lobelii J. B. Calamogressu sive gramen harundinaceum majus Park. harundinaceum paniculatum Ger. Herb-grass, with a manifold spine.*

Lab.

Babylonis apprime respondet, ac quam caninum Gramen akeru tanto majus est, *calamus & folia* rigidioribus, scabris, quibus ad harundinem vallatoriam non parum accedit; *radix* gemiculata, alba, promissiore & longo reptatu vagata, compressiore tamen & crassiore, Canario *gramini simili*, sed vallatoriam aequante: spicata Panicis aut Sorghi coenosa lanugine.

Icon Lobelii (ut recte J. Bauhinus) non respondet descriptioni: ut optime plantæ à nobis obler- *Lana* vate, in arenosis maris litoribus, circa Magallonam, non longe à Montipelo copiose nascuntur.

Pabulo haud coarctat (inquit Lobelius) nisi multum elatum, & penitus melioris admodum libo- *Picea* renti veterina, nec eo grege vescuntur, quippe quibus non modo ingratissimum, verum etiam ma- cicum, sicut & tabem conciliare creditur, linguam & oesophagum vulnerare & ardeare, sanguinem in ventriculum elicere unde tumefactio & inflammatio & mors plerumque subsequitur. Quid si Babylone fuit statum, ubi id maleficium adferre proditur, sicca & rigida, grex parvum obcol- hoc & alio duriore, minus curam illius esse jumenta illic enodam ut.

C. Bauhinus huc refert Gramen harundinaceum majus *Tab. Ger. J. Bauhinus* ferens descriptionem ambus convenire, quamvis figurae sint diversae, Lobelii autem icon non respondet descriptioni, ut modo diximus.

Gramen Arundinaceum spicatum C. B. harundin. minus *Tab. Ger.* non aliter à precedente dif- *Gr. Arundin-* fert quam quod per omnia minus sit & spica simplici oblonga. *paniculata minus.*

5. *Gramen harundinaceum majus J. B. arundinaceum majus montanum C. B. Scirpi primum genui Tragi, Calamogressi montana cauda, seu Scirpi primum Tragi Park.*

J. B.

Inter *folia* bicubitalia, semuncii angustiora, rigida, ex *radice* fibris validis crassisque, fundata vel- mas surgit teres, homine procerior, curvis, enodis, nodis: In fastigio summo *panicula* pulso longi- ores, in tenuis *spica* delincentes, rubentes à se invicem interdum longè distitas.

Copiose provenit prope pagum *Columbari* *Savonariae* & in sylvis inter *Lore* & *Lammot*: item *Lana* in monte prope *Krentzack* & *Laurath*, ac in monte *Salvez*, in durietis & humidis. *J. B.* In altis- simis alperis & humidis sylvis, notam sub Juniperorum fruticibus apud Melanathicos nascitur. *Trag.*

Juno mense caulis emittit, qui Augusto flaccescere incipiunt, ac firmi plantæ & rugosi evadunt. *Trag.* Qui de caulis à rusticis tuberculis leguntur, quibus calorem coentes & prelinulos in aere siccan- dos imponunt: sed & ex his raris pilatorum conficiuntur.

6. *Gramen harundinaceum majus J. B. arundinaceum majus Sylvaticum C. B. Calamogressi montana cauda seu Scirpi alterum genui Tragi Park.*

Multo tenuius, brevius & magis exiguum est precedente. Thallo Junci *Lychnanthemi* speciei media, Juncis *scirpoides* tenuis major descendit, stiles continens multo tenuiores teretisque, sed non ita perpendiculari rectitudine se sustollentes, pulso longiores, brevem & vix uncialem spadicem col- loris siccam calobentes. Broccubergo familiaris est.

Ex hoc nonnulli pilas quibus aestate adtractis Solis radios & calorem urantur, conficere solent. *Trag.*

- A. 7. *Gramen aquaticum cum longissima panicula J. B. Scirpoides Ger. cras. Park. aquaticum sicutum multiplex spica C. B. Flore-grass.*

J. B.

Calamus caulisibus, bicubitalis, fibris è panicula demisso radicantur, crebris paniculis nodosis, & ad nodos folia amicti latiusculis, dodrantalibus & longioribus, mollibus, vaginâ longi calaminum com- plectis; à nodo vero summo tenuis gracilescunt culmi, paniculam capitalem & minores numerosa proferentes, quarum singulares unciam aut semunciam aequant graciles, alteris glutinatum non ar- istatarum situ contextæ: singule glumæ circa margines cineræ sunt aut potius argenteæ, ut spicae varicoloris ex viridi & incano colore apparent. Radix plurimis fibris albis consistit.

Ubique in rivulis & fossis aspectu cernitur. *Lana.*

- A. 8. *Gramen paniculatum aquaticum minus. Gr. Melanthon fluitans sive in sepe D. Meret. The Isler Water-grass, with fine panicles. An Gramen tanquam saponem pen- nitentem dicit C. B. J. B.*

C. Bauhinus sic describit, Ex *radice* oblonga, capillata & nigra, *folia* pauca, levia, viridia, angu- sta, unciarum trium vel quatuor longa, prodeunt: inter quæ *calamus* tenuis, internodiis distinctis, foliis paucis, oblongis cinctis: parte inferiore lappata, mox pilorum longus, erigitur, & paniculam tenent, albam, glutinam exiguam donatam sustinet.

Agu Lochnonibus ubi gaudet, unde Lobelius ad C. Bauhinum Gramen dulce nomine misit. *Lana.*

9. *Gramen striatum Ger. Park. sive pilum J. B. paniculatum folio variegato C. B. Striped grass, Radix ribband.*

In horti ac deliciae raræ sunt sicuti in grata varietas, quæ Anaximaces minoræ, rigore tenuis non cœlestis, et in albis & viridi glumæ alternantem virgæ sunt. *Panicula* summo culmo susti- nit.

net palmatis, candidatis, acerosis, medocriore divitiis. Pro radice hirsuta nititur. In foliis hepatis plantae tripliciter interdum colore commitur, albus, viridis & purpureus.

10. *Gramen Arundinaceum maximum acutissimum* C. B.

Hoc radice est fibris capillata, caule cubitali, Arundinis modo viridi, gemulato & strato: foliis alternatis ut in Arundine praecedentibus, uncias quinque superantibus, arundinis, in aculeatum & atroce pungentem apicem fereantibus: Caulem non vilimus.

Leon.

In maritimis Mompela provenit.

11. *Calamagrostis alba* Norwicus Park.

Praecedenti [*Graminis Arundinaceae maxima*] magnitudinem non assequitur, durus tamen & alperus est non culmo, non foliis. Juba in summo amplius est magisque sparsa, tactu crasso alperior. Radix similiter plurimum oblonga fibra seu filamento consistit.

12. *Calamagrostis rubra* sive *S. Joannis* Park.

Caule & foliis *Gramen tomentosum* nonnulli referunt: caule tamen duobus tribusve articulis interrupto luto, donec trifido culmo alii; foliis angustioribus, acutioribus, utae perpermodum cubito longis & nonnulli etiam stratis. Panicula pedem aut amplius longa, in multas oblongas spicas densa, hirsuta inflexa multo, & purpureo-obscuro colore spectantem. Radix alba, fibra crassa, sub terra interdum reptans.

13. *Calamagrostis tenuis panicula* Park.

Folia crassa longa, angusta, per valentibus nonnulli leniora & tactu molliora, quae tamen junctura non aringunt. Panicula arundinis, siccioris brevioribus & densioribus magis compacta & arctius capenda seu spica composita, ab uno tamen latere nonnulli composita, fasciculis seu apicibus ex latera purpureis. Radix hirsuta parva, fibrosa. Panicula interdum longiora & angustiora observantur.

14. *Gramen Arundinaceum maximum* Rejones'se Park.

Caule crassa, robusto ad humanam altitudinem asurgit, ad summum usque articulata, foliis crassis longa, lanabulo, dura, alpera, stratis, interseculis tamen minoribus. Verum summos caules una cum foliis seu ex secundis semibus exant panicle acutula multa, longis & tenuibus pediculis insidentes: Panicula una pedem & amplius longa est. Radix in palustribus & fuffis aquosis longitudo reptat circa *S. Joannem de Luce*, ubi sponte oritur.

15. *Gramen Arundinaceum ferax molle* sive *spica* Park.

Praecedenti [*Gr. Arund. acutula glumis nostratis*] nonnulli simile est, sed crassa, angustioribus & brevioribus foliis, culmis humilioribus, articulis & foliis paucis donatis. Panicula Schemantia & Juliarina nonnulli simile, ut passim abeunt, qui venti arbitrio fertur. Radix fibra multa, tenuis, longa, ad caput juncta consistit.

C A P. V.

De Gramine Miliaxi.

A. 1. *Gramen miliaxiense* Lob. Ger. J. B. *Sylvestricum, panicula miliaxi* sive *gras* C. B. *Gr. miliaxiense* sive *gras* Park. *Miliaxi-gras*.

A Gramen vixit spica finale est almodum culmo & radice (sicut Lobelius) sed panicula miliaxi.

C. Buchinus ita describit, Radix est sicut crassa, rubescens, multa fibra longa capillata: ut qua caulem parvi rotandi, levis, hirsuti, gemulato, bicubitali, cum foliis viridibus, oblongis, stratis exurgit: paniculam habet Miliaxi, pedalem, rarisimam, glumis exiguis donatam.

Offendit nobis D. Teser. *Kobylis Graminis miliaxi* sive *gras* a D. Dooly, permissimo Botanico & Pharmacopoeo Londinensi observatam in sylvis ad latera montium circa Londinam, quae hactenus castra est: Alligat ad altitudinem trichostalem, caule sicut gracili, equitior vel quatuor, spiculis interrupto, longa interseculis. Ad singula gemulata, ut in operibus feri graminis, singula fere crassam alperiora, obscuriora, a quo postquam excellerit ad sesquipedalem & maxime longitudinem exaralescit, latitudine commutat. Panicula in summo sesquipedalem, sparsa, & lanabulo plurimum minime sparsa composita. Semina ad Milia seu Phalaris accedunt, longiuscula, & testa albicantia, laevia, Miliaxi tuncra.

2. *Gramen montanum paniculâ miliacâ sparsâ* C. B. prod. & theat. *Miliaceum alterum* Park.

C. B. prod.

Ex radice fibrosa, rufescente folia pauca, angusta, uncias quatuor vel quinque longa, una cum culmo tenuissimo cubitali, uno alterove folio vestito cingunt, in cuius summo panicula sparsa, ex locustis minutissimis composita.

In monte Crentzacenfi provenit.

3. *Gramen arundinaceum paniculâ miliacâ* C. Bauhino J. B. Park.

C. B.

Ex radicibus fibrosis albis unus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia Arundinacea unciarum trium cingunt, ad partem supernam, duobus nodis distinctam, folia duo angustiora longioraq; vestiunt: in cuius summo panicula trium unciarum, Mili panicule similis.

In agro Patavino repetitur, & à Gramine miliacæ à Lobelio proposito planè diversum est.

Locus.

C A P. VI.

De Gramine Sorghino.

1. *Gramen Sorghi effigie Lobeli* J. B. Gr. *Sorghinum* Ger. Park. *Gr. Sorghi paniculâ erectum* C. B.

C. B. Theat.

AD selquipodalem surgit altitudinem, foliis parvis, latis. Semen & spica Sorghi similes. Lobelius Gramen sonorum Flandrorum appellat, quia pueri ex ejus calamis fistulas efficiunt.

C. Bauhinus sic describit, Ex radice parva fibrosa culmus exsurgit cubitalis, geniculatus, foliis paucis, acutissimis vestitus: paniculam habet Sorghi effigie, ex utriculis pluribus, aliquibus in arditam hincientibus, compositam, quibus semen album, splendensq; includitur.

In agris siccioribus & incultis reperitur.

Locus.

2. *Gramen arundinaceum Sorghi paniculâ sparsâ* C. B. Theat. *Gr. Sorghinum alterum* Park.

C. B. Theat.

Hoc culmus est cavis, magna parte inclinatis, ita ut capillaribus radicibus terre affigantur, qui per folia (quæ longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum transiunt, & in summo paniculam ferè palmarem, sparsam, parvis utriculis donatam sustinent.

C A P. VII.

- A. *Gramen segetum paniculâ sparsâ* Park. *segetum altissimum paniculâ sparsâ* C. B. *Gramen capillatum* J. B. *segetale* Ger. *The fair paniced Corn grass, or Dent-grass.*

Plares ex fibrosis radiculis tollit culmos cubitales, bicubitales & aliores, aliis ex viridi in luteum languentes, aliis rubentes, duobus plerumq; interdum tribus, geniculis interceptos, ad quos folia longissima vaginâ stipulam involvenda, & postquam à culmo absciderunt in dorantalem aut pedalem longitudinem producta. Summiti cacumen in sebas explicatur pedalem circiter, atque Arundinaceam: panicule ex intervallis radiatim disponuntur, nunc flavescentes, nunc viridantes, sepius rubentes, lenia instar splendentes; in tenuium pedicellorum staminibus, theculis pusillis semen claudentes minutum, subulvum, acre molli, capillari & obtusum ferè fugiente donatum. Locustelle paniculas componentes perexiguæ sunt, fissuris purpureis utrinq; bifidis. Folia è radice dentis celsibus oriuntur, summa, in lætore solo cubitum longa, angusta, obtuse viridia, pulchrè striata stris plurimis, tenuibus, secundum longitudinem decurrentibus, asperiora quam quodvis aliud gramen nobis observatum, quod facile percipitur, si digni deorsum decantur.

In segete, locis præsertim humidioribus invenitur, nec raro in sylvis & pascuis locis arvis. Loc.

Ex his culmis cum paniculis lætissimis funiculo vel pino connectis rustici crumulas quædam conficiunt, Anglicè *Dents* dictas, quibus æstivo tempore campos ornare solent. Huic utri adhibetur etiam Gramen agrorum venti spica Lob. teste Johnsono apud Gerardum, & Gram. cristatum, teste Lobelio in *Adv. part. 2.*

C A P. VIII.

De Gramine nodoso.

A. 1. Gramen emoum nodosum Ger. nodosum J. B. ex. nodosum italicum vulgari Park. nodosum 1. seu Arvenacum panicula C. B. knottf-rooted Dogs-grass.

Flos hunc latus, paleis destituta, nonnihil tamen aspera sentiuntur, si in contrariam partem, seu dorsum a summo ad litem digiti ducantur. Quae ad caulis nodos veniunt, cultrum ad alterum fore modum involvunt, deinde dilatata abscondunt, infunduntur fore lata, palmum longi. Caules bicubitalis & altiores penulam in summo gestant bipalmarem, nonnihil sparsam, non raro etiam dorsum nutantem, vel saltem ad unum latus flexam, locustis avenaceis minutulis compositam, glumis argenteo nitore splendens cum mixtura quadam purpurea. Singulae autem locustae longius acuta purpureis, brevibus, molliculis pendere sunt. Radici bulbis catenatis nuberis, creberrimis fibris longis capillace, sapore parum subacido.

Loc.
Flos.

Nascitur in locis, non raro etiam in agrorum marginibus ad sepes; in domibus quoque frequenter. Saporis amari & acerbis sunt radices, equae valentis obstructions expulsi. & urinam citre ariet quam vulgare. Herba, inquit Marcellus, quae Gramen dicitur, nodorum 27, in vino ad modum decocta & expressa, urina colata, postquam strangurioso ex vini cyatho uno mixta data, adeo potenter succurrit, ut ibi sine tormento urinam facere capere, dari non oporteat: sed febriocantibus ex aqua sola dabitur. Ex quibus verbis apparet nodosum istud Gramen apud Veteres pro Gramine proprie dicto seu Agrosti habitum, & adversus calculum & Vesicae morbos commendatum quod, fuit. J. R.

2. Gramen geminum seu nodosum alterum C. B. J. B. Polara vulgi Celsus.

Predicti species est, radicibus geminis reticulatis, univiam instar canaliculi, quatuor aut quinque simul, ac si stylo essent transfixae, punctis: culmis cubitalibus, geniculatis, folia triplex, panicula seu nodi Milo, seminis Avena, sed brevioribus & tenuioribus acutis ut Oryza. Graminis modo radice propagatur.

Loc.

Circa Patavium in montibus Euganon lege C. B. Bahiens.

C A P. IX.

De Gramine paniculata pratensi & arvenae.

1. Gramen Arvenacum pratense dicitur, panicula flavescens, lassa parva. Aradon grass, with a pellucid particle.

Dorsum nonnunquam pedem altitudinem assequitur. Caules graciles, geniculati, subciliati: folia angusta, ex utraque parte hirsuta. Panicula in summo caule sparsa, non tamen dorsum nutans, truncis dispersis longitudinalibus, pallide viridis seu flavicans e locustis parvis composita. Singulae autem locustae duas habent aristas, ut ut biferas appareant.

Loc.

In pratis & pascuis satis frequenter occurrit, & aristas paniculam explicat. An descriptum sit ab aliis mihi non constat.

A. 2. Gramen agrorum Labeis J. B. agrorum venter spiss Park. Arundinaceum Ger. segnum panicula Arundinaceum C. B. Corn-field grass, or Dent.

Agroreum vixit speciem ducimus (inquit Labeis) quod spissum habent litem, compositam, paniculam, & a ventis committitur in alterum agrorum litem. Folium alioqui de radice magis longe fore arguitur est segnum gramen: Juba catenatum Milvaei graminis sibi hinc absumit est.

Loc.

Inter segnum aliquando observavimus, v. g. in agris prope Noringhamiam mense ab Albia op polo, necnon prope Barro mudi in Scythia. Arista Th. Willughbi collectum circa Londinum.

A. 3. Gramen pratense minus seu vulgare, minus. In Gram. paniculatum minus aliam & rubram J. B. Gr. pratensis paniculatum minus C. B. prat. minus alium & rubrum Park. Corn-field grass.

Flos albens, tremulus, minimum tamen firmis apprehendit, & novis affidit ut artem aggereans, periturus, emittit pellatim se dilatat, & dante crispae litem occupat. Flos in palmum longi, angusta, hirsuta, glabra, teretis & hirsuta. Caules semipedales aut duodecimales, truncis, vixit aut quatuor geniculis interrupti, non cretidi & firmi, sed plerumque vixit vixit paniculae rubrae, sed ad paniculae rubrae, paniculam in summo gestant sparsam, non tamen propagatam, unam prope partem spectantem, vixit portuante seu panicula singulari & dupli glaucum

glumarum squamatum incumbens, non aristatarum verſu compositæ, non multum diſtinctæ sunt paniculis Graminis tremuli minoris. Tenorum & lauculentum est hoc genus, gratissimum, bobus & pamentis pabulum, quo impensè delectantur & pinguescunt.

Pingue solum amat, nec quaris conculcatum aspernatur, adeoque ad semitas & agrorum limina locis perſæpe reperitur. Vere in calnum abit, & paniculam explicat, & delinops per totam æstatem.

A. 4. *Gramen pratense paniculatum majus* C. B. *pratense* Ger. *pratense vulgatum* Park. *The greater Meadow-grass.*

Fibris innumeris, tenuissimis filamentis capillatis, & variè implexis radicatur. Culmi pedales aut sesquipedales, tenues, quatuor vel quinque geniculis intercepti, foliis, totidem vestiti, angustis & raris nonnullis aspersis, in summo paniculam gestant sparsam & in omnem partem extensam, erectam tamen nec nutantem aut dependentem. Nimirum in una ex uno calis latere quatuor, vel sex simul pediculi locustas seu spicas sustinentes exeunt, deinde paulò superius ex adversa seu opposita scopi parte totidem vel pauciores, adeoque pari modo ex hac & illa parte alternatim oriuntur, sed pauciores semper donec ad summam paniculam ventum est, quæ in spicam simplicem terminatur. Octo interdum pediculorum gradibus seu ordinibus panicula affurgit. Locustellæ seu spicæ minores sunt, breviores quàm in precedenti, squamosæ tamen pariter, non aristatæ.

In palcibus, frequentissimum occurrit.

Locus.

5. *Gramen pratense paniculatum majus angustifolium* C. B. *Barbani* J. B.

Ex radice capillacea rufescente folia capillacea, quædam brevia, quædam palmum superantia, prodeunt: inter quæ culmi tenues, geniculati, cubitum superantes, uno alterove folio brevi cincti, in quorum summo panicula leviter expansa, uncias quatuor longa, quæ ratione loci strigosior vel lenior.

In pratis & dumetis ad ripam Wicæ fluminis Basilee reperitur.

Locus.

6. *Gramen pratense paniculatum medium* C. B.

Ex radicibus albis, fibrosis, duas uncias longis culmi profert plures, internodiis aliquot distinctos, doctantem vix superantes: folia est oblonga, angustis, nervo elato per medium divisa, utriusque acutis. Culmorum summi spicæ plures, binis sibi respondentibus, insident, in quibus summa Variat folia angustioribus & latioribus.

In aridioribus pratis, collibus nem. Siccioreis provenit.

Locus.

A. 7. *Gramen pratense paniculatum molle* C. B. *Park. Lenatum Dalechampsii* Lugd. J. B. *Gramen 6. capta 22. lib. 1. Ger. emac. Soft tufted Meadow-grass.*

Totum mollicillam est, tomentosa, obtusa non tantum folia longiuscula, sed & culmi eorum, genicula: paniculae mediocriter divulsæ spicam mentantur sesquicalem [cum posito è theca prodeunt] sepe palmarem & longiorem, colore plerumq; purpurascente vel ex purpurascente & cinereo mixto, interdum cinereo, vix ullis donatæ pilis, molles tamen non minus quàm folia, glutinis laxioribus, brevibus, acutis expertibus, plurimum strati unciali obtusioris donati, florum apiculis latis.

Culmo est pedali aut aliove, quatuor plerumq; geniculis intercepto, totidemq; foliis cinereis vestito.

Circa finem Maii aut Junii incipit apud nos paniculam proferre, inque palcibus abunde occurr.

Tempus
Locus.

A. 8. *Gramen Pratense paniculatum molle*. *Soft tufted Dogs-grass.*

Hoc precedentis adeo simile est ut diu pro eodem habuerim, verum in multis manifestè distat, siquidem longè major est & elatior; culmi quatuor aut quinque geniculis intercepti; panicula minus pulchre colorata: sed præcipua, & maxime conspicua differentia est in glutinis, quæ & hinc majores multò, & in brevis aristas terminatæ. Quin & è radicibus Autumnali præcipue tempore germina emittit, & sub terra reptans Graminis canini vulgari modo minimum se propagat, & extirpam perdifficile est.

In arvis inter segetes minus frequens Junio mense paniculam proferit.

Locus.

A. 9. *Gramen pratense, panicula densa, laxa, unam partem spollentis*. *Harder sparsed panicleg.*

Radix fibris nigricantibus constat. Folia ad radicem, solum in sterilibus, angustis & fore capillacea, vix palmum longa. Culmi doctantales & pedales, tenues, duobus sere geniculis intercepti, sine obvoluti latioribus in quæ ad radicem, paniculas in summo gestant laxas, unam partem spollentis, è spicis oblongis, squamosis squamis in aristas brevissimas desinentibus compositas; colore plerumq; obtusè purpurascente, interdum è viridi albicante.

In palcibus frequentissimum est, & sub finem Maii paniculam explicat.

Hoc genus cum in sepius vel fructis oritur folia esse longissima, (pedalia aut cubitalia) angustissima & fore capillacea, saturatis viridia.

Locus
Tempus.

A. 10. *Gramen paniculatum elatum spicis oblongis, mutis squamis. Paniculate Scabed-grass, with oblong spikes without awns.*

Præcedenti simile est, sed magis & elatius multo, spica etiam squamose ex quibus panicula constans longioris sunt, squamis non aristatis, circa marginem crassiores hinc incanis, reliqua fere purpuraticis, compositæ. Panicula interdum palmata, non multum sparsa, venis tamen latis plurimisque flexis, læviter etiam notatis. Culmi pedales & non raro cubitalis aut alior, tribus fere geniculis interceptis, gracilis: folia etiam angusta, glabra. Radix fibris tenuibus capillata.

Loco.

In paludis locis humidioribus plerumque occurrunt.

A. 11. *Gramen caninum americanum paniculatum. Panicked Sea-Logg-grass.*

In arenosis maris litoribus densis cespitibus nascitur. Fibre quibus terram apprehendit & alimentum exigit, breves cæcæ: præter quas emittit etiam germina seu flagella sub terra, quibus longè læviter reptat & se propagat, quorumque ut in *Gramine officinarum* extrema dura sunt & pungentia. Folia pro magnitudine & altitudine culmi lato lata, obliquis vixis, semipalmaria & longiora, carinata, duricula & rigida, in acutus apicem deficientia simul parte le mutis amplicidentia, ut totum germen ad exortum planum & compositum sit. Culmi sesquipalmari aut semipedales, in culmo altiore una altero nodo intercepti, paniculam in summo gestant brevem, nec multum plerumque sparsam, & locusta parvis squamosis, mutis non nihil interdum purpuraticis Graminis præteritis similibus compositam.

* In terra
culm semper
dura.

A. 12. *Gramen paniculatum maritimum vulgatissimum. The most common panicked Sea-grass.*

Radix fibris albis tenuibus consistit, unde plura exeunt germina. Folia brevia longitudinali vix palmari, perangusta, carinata, lacibus non adductis & quasi complicatis ut triticeis, seu pumosa videntur. Culmi lato firmi, pedales, duobus tribusve geniculis intercepti in summo paniculam gestant palmarem, non multum diffusam, purpuraticam, & locusta seu spica oblonga angusta, squamosis non aristatis compositam.

Loco.

Alia spec.
cul.

In palustribus maritimis ubique frequentissimum est.

Hujus alia species occurrit major & elatior multo, ad cubitalium altitudinem asurgens, Ripulis, crassis etiam triticeis majoribus, quam nobis ostendit D. Newton.

A. 13. *Gramen præteritæ paniculæ feri arundinæ J. B. Scabed-grass, with a sward-like panicle. An Gram. montanum paniculæ spiculis delicatiss. C. B.*

E radice fibrosa, alba plurima & confertæ, ut in aliis gramineis cæcæ spicae, pedales & interdum cubitalis, triticeis, in terram plerumque reclinata, tribus quatuorve geniculis interceptæ, & ad nodos fereve incurvata. Folia angusta, pro tenuitate tamen spicae lato lata, longitudinali postquam à caule abiecerint, (quoniam ut in cæteris gramineis aliquandoque involvunt) vix palmari. Panicula palmari aut sesquipalmari, purpurea, cum primo egreditur minus sparsa, immaturo inflexa Arundinæ æmulatur, postquam explicatur, non amplius mutas, sed eviguit, & in omnem partem diffusitur, tenuissimis & creberrimis locustis non squamosis, sed duabus duntaxat glutinis compositis constans.

Loco.

In paludis ubique vulgatissimum Junii mæcio paniculam permat.

Nescio an hoc referendum sit.

Gramen præteritæ repens purpurea spica J. B. Gramen caninum septimum Lch. Japonicum minus C. B.

Descriptio satis convenit nisi quid talicem sub terra hac illuc vagari scribat.

A. 14. *Gramen paniculatum laniis parvis purpureo-argenteis annuum. Small annual panicle-grass.*

Fibre radice albae sunt: folia perangusta & fere capillata. Culmo semipedalis aut dochrantalis, interdum altior, geniculatus, gracilis: Panicula sparsa locusta parvis, purpureo-argenteis hinc immixta tendens aristis perangulis & lacibus armata composita. Summos caulium & locustarum pediculi per maturitatem purpurascunt. Scapus culmi ubi primus paniculae emittit non recta deinceps asurgit sed reflectitur normis. Evulsa facile est hoc genus, & annuum.

Loco.

In sterilibus plerumque occurrunt.

A. 15. *Gramen murinum spica longissima Ger. strac. spica nutans longissima Park. p. 1163. Capons-tail-grass, i. e. Gramen Annaproven.*

Radix parvis fibris, serubis, rubentibus consistit, unde exeunt folia brevia, angusta, læviter quæ cæcæ plerumque tenues & infirmi, duobus plerumque, rarius tribus, geniculis intercepti, nodosissimi, fere, aliorum Graminum in modum, obrotati, spica in summo sustinet sesquipalmarem aut semipedalem, strigosam, angustam glutinam, & spica perangulis squamosis, glutinis in oblongis, tenues, purpurascens, aristis distinctibus compositam. Planta videtur esse annua & semine ad maturitatem perducto radicibus exarefcere.

Loco.

In muris & sterilibus permat Junii mæcio spicam producens, cujus aristæ versus apicem glutinosa lana floccatur.

A. 16. Gramen

- A. 16. *Gramen paniculatum bromoides minus, panicula aristata unam partem spectantibus.*
Small paniced Cat-grass, with awns.

Hæc species cum præcedente in multis convenit, nimirum radicibus fibrosis, culmi tenuibus, panicula aristata unam partem spectante, foliis angustis, altitudine parâ. Differt spica seu panicula brevitate latioraque, locustis squamosis eam componentibus multo majoribus & latioribus; caule pluribus geniculis, tribus nimirum aut quatuor, intercepto.

Idem cum superiore in locis invenitur: & interdum altus letici solo astringit.

- A. 17. *Gramen exile duriusculum, in maris & aridis præconiis, minus duriusculum Ger. minimum Montpellier's J. B. quod Montpellier Gr. exile durum appellari scribit. Gr. pratense panicula multiplex C. B. Park.*
Small hard grass.

J. B.

Duræ radicem fibræ, culmi paucis geniculis distincti, palmares & sesquipalmares folia stipiti prætenibus, culmo altioribus. Paniculae in metam fastigiantur, & versus unum duntaxat latus fluctuantur.

In maris & aridioribus provenit. Radicum fibræ tenues, albentes, culmi tenues, duobus ferè geniculis nodosi. Spica paniculam componentibus angustis, oblongis, squamosis, pediculis insidentes, quo a scapo medio aliquantulum extant.

- A. 18. *Gramen exile duriusculum maritimum.*
Small Sea hard grass.

Plurimis prælongis fibræ, tenuissimis filamentis capillatis, & variè implexis radicitur: è quibus multi exeunt culmi sesquipalmares aut majores, crassi lato & rigidi, uno alterove folio angusto cinctis, & geniculo intercepti, singuli in fastigio spicam sustententes duas uncias longam, è plurimis elegantibus squamosis, oblongis, non aristatis paniculis, hinc inde alternatim, duabus tribusve simul, nullo ferè pediculo scapo adnascensibus compositam. Folia angusta, modicè longa. Planta est annua.

In arenosis maris litoribus provenit.

Lucæ.

- A. 19. *Gramen asperum J. B. spicatum folio aspero C. B. pratense, spica multiplex rubra Park.*
Rough Grass.

Culmo est sesquicubitali, interdum etiam bicubitali & altiore; tribus ferè geniculis intercepto, aspero, potissimum sub nodis, & in fastigio. Folia longè vaginâ culmum involvunt, (ut aliis Graminibus) in acutum pungentemque mucronem desinentis, à quo deorsum si digiti stringas aspera sentiuntur: Paniculae tamen aspera, rigida & crassa, albicans vel rubens, sæpe minus sparsa, aliàs etiam magis, cum parvis paniculis, è pediculis longis asperis, antroorsum duntaxat vergit, ex latiusculis seu mulcatis composita, folculos luteos vibrantibus. Aliorum Graminum modo denis cespitibus terram occupat, & innumeri fibræ tenuibus oblongis radicitur. Folia quæ ad radicem non multum latiora sunt foliis graminis pratensis, longitudinis palmaris, semipedalis, aut dodrantalis.

In pratis & pascuis sub finem Maii & Junii incitum floret.

Lucæ.

- A. 20. *Gramen spicatum montanum asperum.*
Spiræd mountain rough grass.

E rupum fissuris in monte *Legheworth* erit denis cespitibus. Folia ei longa, modicè lata, carinata, marginibus asperis si deorsum digiti ducantur. Culmi tenes, cubitalis, spicam in cacumine gerens brevem, foliis longa, rigida.

- A. 21. *Gramen dumetorum panicula acerub, semine pappi. An Gramen planifolium Lob? arundinaceum panicula spadicæ multo majus C. B? spica candida, & serici modo lucens J. B? Gr. tomentosum arundinaceum Ger. Calamagrostis seu Gramen tomentosum Park.*
Duff-grass, with a pappose panicle.

Lib.

Folia est duris, rigidis & aridis, ad Schoenanthi folia non parùm accedentibus; culmi similiter rigidis, sesquicubitali aut duos cubitos alti, spica longè, denis, ex purpureo rubentes, pallescens, post maturitatem candida, & serici instar micantes.

Locs nascitur feticosis sylvarum quarundam Flandriæ & Angliæ, jumentis inonile.

Lucæ.

Hæc simde, si non idem, collegimus in dumetis quibsdam agri Northamptonicis & Essexensis: Ad basiu seminis lanugo papposa in circuitu adnascitur.

- A. 22. *Gramen Maris J. B. paniculatum montanum 2. seu paniculatum odoratum C. B. Gramen paniculatum Germanicum odoratum Park.*

C. B.

Radicibus candidis, geniculatis, fibræ crassis demissis serpit: culmo est bicubitali, geniculis paucis distincto; foliis angustis, longissimis, paniculam superantibus [cocantibus marginibus nâ convolutis, ut tercem junceum culmum imitentur, rigidis, firmis, pungentibus *J. B.*] suavem odorem spirantibus, cujus culmo panicula parva, leviterque sparsa insidet.

A Regiomontano (unde è *Borellia mistum*) *Gramen Maris* dicitur, quod in fasciculos colligitur propter odorem fragrantiam vestibus adiciant.

A. 23. *Gramen capillaceum locustella pennata, non arifata.*

Dentis cespitibus agglomeratis solum occipit, pro radicibus fibras tenuissimas in terram demittens. *Folia* creberrima, capillacea, solum sicut aut duas uncias longa. *Caules* teretes sesquipalmatis aut bipalmatis, unico articulo, oblique non longe à radice, diffusi, & solo modo emascente obvoluti, *paniculam* in fastigio gestantes parvam non multum sparsam, purpurascens, è locustella pennata, hoc est, è glumis ad modum penne villorum dispositis, non aristata compositam.

Observavit & ad me attulit D. Dale, in fucioribus collectum.

24. *Gramen longissimum J. B. sylvaticum paniculatam altissimum C. B.*

J. R.

Duorum trive cubitorum altitudinem nonnunquam superat, *foliis* & *caulis* terribus, triangularibus, pluribus, ex *radice* crassifuscula, perenni, nigricante, fibrosa: *paniculae* parvae, vix unciales, in aliquot veluti parvas spicas dividit. *Flores* ex apicibus lateris: *sapor* nullus insignis.

In montibus circa Genevam cubitum excedit: Montbelgardi in hirsis duas & tres cubitos.

Montbelgardi utitur hoc Gramine russici ad equorum terrena, quibus arena trahunt. Efficantur etiam ex eo Chlamydes pastores, quibus opilionis adversus pluviam utuntur.

● A. 25. *Gramen serotinum arvense spica lata pyramidalis.*

Radix fibris non admodum multis è castaneo albentibus, consistit, unde *caulis* emergunt plures ad sex sepeve, decedentes, raris pedales, tribus quatuorve geniculis distincti, graciles, *folia* vestito laticulis, brevis, pallidius viridibus, ad tactum asperis si decorem striga. *Fallicum* occupat *panicula* mollis, angusta, pyramidalis, tres quatuorve uncias longa, non multum sparsa seu explicita antequam floret, postquam maturit adeo contracta, ut spica parvis quim *panicula* videatur, & comam valde acutum representet, in quam formam Cupressi ab Hortulanis compingit & detondit solent. *Locustae* singulares minutis squamosis sunt, verum singulae granula continent, glumis in mollem cum aristam exstantibus.

Intra segetes multis in locis copiose provenit, Julio mense paniculam pennans. Annua videtur esse planta.

A. 26. *Gramen pratense serotinum panicula longa purpurascens. Gr. pratense spica Loricata D. Merritt. Late-flowering Meadow grass, with a long purple panicle.*

Radix fibris crassiferae sunt, albæ, sapore sativo. *Folia* modice lata, raris pilis prædita. *Caules* pedales aut cubitales, unicum tantum geniculum habent à radice non longe, ad quod duo aut tria *folia* orientur; *caulem* aliquandiu amplectuntur, quod hinc speciei peculiare esse videtur. Ex his autem *foliis* exterioribus & *caulem* & reliqua *folia* ad sesquipedalem fere amplectuntur, modicum (si aliter) interius ad alterum sesquipedalem, & interius *caulem* ad idem spatium. *Panicula* in summo non multum sparsa, tres aut quatuor digitos longa, purpurascens. *Flores* utriusque lateris purpurei.

In pratis humidoribus frequenter Julio mense floret. Montpelis sub finem Augusti observavi.

CAP. X.

De Gramine Avenaceo.

A. 1. *Gramen Avenaceum parvum procumbens panicula non arifata. Small lupine oat-grass, without awns.*

Folia ei pilosa, maxime inferiora & prope terram; *Caules* tenuis, non succosi, sed terram vix inclinari, decedentes & pedales, in cacumine *paniculam* gestant parvam, è locustis triangularibus, nullis aristis domatis compositam. *Locustae* si curiose examinentur tres quatuorve granula duabus glumis obvelatae continere deprehenduntur.

In paludis non raro occurrat.

A. 2. *Gramen avenaceum capillaceum minus glumis C. B. Anglo-Britannicum avenaceum, Danico nemorali simile Loh. an Gr. aven. variis grano nemorali Danico quilibet? nemorale avenaceum alterum, ex foliis strampelium, & lucidum Danicum J. B. avenaceum strampelium Danicum Park. Red Oat-grass of the Woods.*

Loh.

In sylvestribus Danie collibus & montibus (inquit Loh Adv. p. 2.) perlegam, exilique Gramen omnium foliis creberrimis, rigidis ceterisque unciali & bistarum unciarum altitudinis radicibus pedales & sesquipedales, caulis, lucidi & nitidi, aspectu naturali coloris ex fulco strampelium, in quibus è longiusculis *panicula* Avenacea terrena. In Anglia locis umbrosis, sylvestris, perlocum potius.

Gramen hoc à Lohelio descriptum diversum videtur à Gramine nostro avenaceo nemorali glumis rarioribus ex fulco strampelium, quod propriis accidit ad Gramen nemorosum avenaceum locustis rubris C. B. prod. Describitur tamen omnia hæc Gramina unam & eandem speciem esse.

Gramen

Gramen avenaceum rarioris glumae nemorense Danicum in sylvis non procul Cronenburgo castro Regio Selandiae Dantorum collegit Lobelius, arido solo.

3. *Gramen montanum avenaceum locustis rubris* C. B.

C. B. *prod.*

Ex radice tenui, repente, alba, fibris capillaribus utrinque donata, *culmus* simplex, levis, parve cubitalis, (rarius ex una radice plures exsurgunt) circa radicem purpuream, qui quasi in spicam tenuem definit, cupis glumae utplurimum ab una parte siti sunt, & foris ex nigro purpuream, intusque albi sunt; in quorum medio *striculus* parvus, candidus, pedicello donatus *semen* minutum continet: *folia* donata paucis, angustis, acuminatis, circa radicem brevibus, at circa culmam, quae duo triaue cingunt, longioribus, communiter spicam superantibus.

Julio & Augusto hinc inde in montosis & umbratis, ut circa arcem *Richenstein*, in monte *Muteto* *Luc. & Temp.* *Bathienisium*, & monte *Crenzacenfi*, reperitur.

A. 4. *Gramen avenaceum nemorense, glumae rarioris ex fusca xerampelina, usitat.*

Culmi semipedales aut dodrantes, tenues, duobus tribusve *folia*, femunciam propemodum latis, dimidium pedem aut spithamam interdum longis, tactu aridis, aspersis, & Graminis Avenacei diameterum similibus, spicam ipsam longitudine aequantibus; *Paniculam* in summo gestant raram, loquipalmarem & longiosam, e locustis raris compositam. Singulae autem locustae glumis duabus, exterius ex rubro nigricantibus seu ex fusco xerampelina (ut cum *Lobelio* loquitur) interiori simi suo utriculum unum continentibus, in quo *semen*, non aristatis constant. Radice est reptatrice.

Invenitur hoc genus in aggeribus seorsum umbratis juxta sylvas, verum non ita frequens apud nos. *Luc.*

A. 5. *Festuca Avenacea sterilis elatior* C. B. *Bromus herba sive Avena sterilis* Park. *Bromus sterilis* Ger. *Agriops Matthioli* Fors. J. B. *Great wild Cat-grass, or Drank.*

Radices fibrosae, implexae: *Culmi* plures, cubitales aut longiores, geniculati pluribus gemculis [quinque non raro] tenues; *paniculam* ferunt singuli multifariam divitum, cupis portionculae e longis & tenuibus velut filamentis pendulae, squamatis e pluribus glumis compactis spicam parvam mentiuntur, locustis Avenae non multum dissimiles, aristis donatae mollibus longis, interdum purpurascensibus. *Folia* modice lata, hirsuta, & ad margines pilosa. Cum planta in culmum abit quae ad radicem sunt exarolunt.

Majo mense ad sepes, locis viis & in agrorum marginibus reperitur.

Adversus infantum vermes tanquam singulare auxilium radice in vino albo decoctum diebus aliquot confusus potum commendat *Tragus*. *Luc. Foss.*

Festuca Avenacea sterilis humilior C. B.

A priori differt, quod humilior sit, culmis striatis, molli lanugine incanis, foliis brevibus, angustis, lanuginosis: juba minore, molliore minusque sparsa, sic & aristas non multis nec aspersis armata: An specie diversa sit aliis judicandum relinquimus.

A. 6. *Festuca Avenacea hirsuta paniculae minus sparsae. Gramen murale Dalechampii simile si non idem* J. B.

Radices fibrosae terram apprehendit: e quibus *cauli* multi, cubitales & altiorem, pro ratione soli in quo crescit, gemculis plurimum quinque intercepti, *folia* hirsuta & sic canaliculata vestiti. *Folia* distichon habet partium texturam, spicas breves imitatum, imo parte lanosae, in acutum deficientes, aristis mollibus brevibus glumae etiam molles, striatas, plurimum hirsuta [non raro tamen leves] armantibus. Aristae purpureae sunt, glumae circum oras canaliculatae aut cinerascunt.

Spicae partiales in hac specie erectae plerumque sunt, non pendulae aut nutantes, ut in Gramine de *Grus* *Montbelgardensi* J. B. cum quo plerumque Botanici hoc genus confundere videntur.

In muris & aggeribus inque agrorum marginibus & tumulis siccoeribus passim provenit, & circa *Luc.* finem Aprilis aut initium Maii paniculam producit.

A. 7. *Festuca graminea spica habitioribus, glumis glabris. Gramen Grus Montbelgardense* J. B. *Festuca graminea glumis glabris varians* C. B.

A precedenti differt culmis elatioribus, spicis habitioribus & latioribus, magis sparsis & dependentibus glumis glabris: loco etiam inter segetes: cetera similia. Descriptionem C. Bauhini huc non inepte quadrant, quos si placet consule.

A. 8. *Gramen Avenaceum danicorum paniculae sparsae. An Festuca graminea nemoralis latifolia* Milleri J. B. C. B? *Dusk, or Wood-Cat-grass, with a sparsed Panicle.*

Pluribus *foliis* crassiusculis, albertibus radiceatur. *Culmi* sesquipedales aut bicubitales, tribus plerumque nodis articulati, totidemque *foliis* una internodia aliquotque obvolvuntibus vestiti; quae quatenus stipulas obvolvunt longiusculis pilis crebris hirsuta, & striata, sunt, postquam a culmo abscellerint, in longitudinem semipedalem extenduntur, latitudine semencali, e viridi flavicantibus, striata, rarioribus & brevioribus pilis, usque ad margines & mediam cultam praecipue, donata, ut

summa foliorum partes glabrae sint. Summitas caulem occupat *panicula* sparsa, inflexa raris spicis, tenuibus pedicellis appensis, composita. Singulae spicae longiusculae sunt & strigose, & pluribus glumis squammatum incumbensibus, & in breves purpureasculas aristas distinctibus constantes.

Linn.

In sylvosis & dumetis ubique frequens est. Pessimis est Gramini Avenaceo dumetorum spicato, nisi quod stipulis sit majoribus & elatioribus, panicula sparsa.

C. B.

9. *Festuca graminea glumis vacuis* C. B. J. B.

Ex *radicibus* fibrosis simul junctis *caulis* alioque, garuculati, pedales, ad radicem lanugine pubescentes, *folia* angustis, paucis donata exurgunt, qui glumos plurimos, leves & vinctos, filamicis tenuissimis adpressentes, partim virides, partim spadiccos, aristis oblongis donatos sustinet.

Hæc apud nos in coltis & muris crescit (inquit C. Bauhinus) & cum glumis longissimis filamentis appensi sint, facile à quovis vento agitant tremunt. Hinc Montpelitenibus Gramen tenuissimum dicitur.

Linn.

In hecortum muris & juxta sipes passim reperitur (inquit P. Magnol.) Nobis incognita est.

10. *Festuca graminea effusa juba* C. B. J. B.

C. B.

Altitas exurgit *caule* viridi & rotundo, qui in *pubem* pedalis longitudinis effunditur, cuius glumæ angustiores & longiores, brevibus aristis cincti, pediculis capillaceis oblongis insident qui per maturitatem albescant. Inter segetes reperitur.

Descriptio hæc bene convenit Festuce cuiusdam à nobis observate Genevæ inter segetes, nisi quod juba non adeo longa erat in plantis à nobis visis. Fortè in letorei solo longiorem paniculam producit.

Linn.

In nostro locustæ seu spicæ partiales ex quibus juba composita, oblongæ squamosæ, squamis in breves aristas desinentibus, teras paniculam prodeunt.

A. 11. *Gramen Avenaceum montanum, spica simplicis, aristis recurvis.*

Radix oblique adhaerens castris demittit; *Folia* vix palmaria (in letorei solo nam longiusculam excedunt) non aliosmodum angusta, carinata, latis dura & rigida. *Caules* simplicidulis, tenuis, purpureasculis, uno duntaxat nodo in eis quas observari plantis prope terram interceptis, usque solo cum aliquousque obvolvente donatus, cætera nuda; spicam in summo sistunt dum trivis uncat longam, raris glumis alternatim fitis duo vel tria grana aristis recurvis purpureasculis donata obgerentibus.

Linn.

In lumentis tumulis seu colliculis Barroviensibus manu quondam aggestis, in ipso limite agri Essexensis versus Cantabrigiam inventum ad nos attulit D. Dale medicus & pharmacopœus Brantfordensis: idem inter Novum Mercatum dictum oppidum & Essing vicum, in agrorum limitibus, invenit.

Hinc transfereendum est ad Gramina spicata.

12. *Gramen Avenaceum maximum verticillatis cum lanugine alba, & aristis longissimis* Boiss. Monsp.

Boiss. Monsp.

Radices fibrosæ sunt, à quibus plures *caulis* bicubitales, nodis distincti exurgunt, *folia* angustis verticillatis: *Spica* Avenacea est, cujus utriculi oblongis pediculis insidentes lanuginem albam habent, & longissimis aristis donantur, que sesquipalmatae sunt & dum siccantur in modum spiræ convolvuntur.

Linn.

Maisi mense invenit cum spicis in sylvæ Valenzæ locis herbæ D. Magnol, præcipue circa Cavotte. Hæc non longe dissimilis est.

13. *Festuca longissima aristis* C. B. *Agropyrum humile* Tab. Ger.

Que ex *radice* pluribus tenuibus circa prædita multa parva, angustis & oblongis *folia* prodeunt: inter que tres *quatuorve* *caulis*, tenues, cubitales, quibus *spicae* Avenaceæ insident, glumis vacuis, spadicis coloris, aristis longissimis armata, que ex folliculo solvato prædeunt in unum latum recumbunt.

Linn.

Nos in Germania hæc observari non semel. Tabernæmontanus inter Wormatiam & Frankenthaliam notavit. Aristæ tenues concinnatæ in modum non raro utriusque.

A. 14. *Agropyrum Narbonense* Loh. *Festuca seu Agropyrum Narbonense* Park. *Festuca habitus Ger. Gramen Festuca XII. seu Festuca alba caputis duri* C. B.

C. B.

Radix est fibrosa, alba, pililla: *caulis* tenues, breves, communiter pedales prodeunt; *folia* paucis Truncis & Hordeis annulis, sed mollioribus *mutabilibusque* per latera prodeunt. In culmorum *folia* spicae parve ex duobus vel tribus capitibus duri, uniuscuiusque striatis *compositæ*, quibus *semitæ* Hordeis similes sed paulo minores et latiores, eisque terna, glumo tenuiora includuntur. Ab utriculo, (non autem à limbo) tenues, oblongæ, & acute aristæ candidæ erumpunt.

Linn.

In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi vulgarissima est, aristata & glaucosa herba (in agris inter legum triticum & hordeatæ *Tab. C. R.*) In hortis culta elatior & major evadit, spicæ ex quibus tenuis capitibus *compositæ*. In Sicilia aliud genus candidum, aliud nigrum, & aristis magis *hordeatis* habetur. *Ces. Nihil idem observari uti talis differentia.*

Ægilopi morbo potius fieri cepto quam jam longius progreſſo, non ſemel periclitati ſumus pro-
fuſſe. Exſiccatur enim adſtringendo citra calefactionem multam. Potui Cereali etiam addita ſo-
mina cerebrum temulentum ſacunt. *Lab.*

15. *Festuca juncea folio* C. B.

C. B.

Ex *radice* parva, fibroſa, alba *folia* pauca, juncea, ſemibitum longa, & *culmus* rotundus, cribra-
talis exurgit, qui in *paniculam* arenaceam, ſed anguſtiorcm, albam deſinit; quæ ex oblongo ſili-
culo (à folio conſtituto) paniculam longè ſuperante prodiit, cuius glumæ rari ariſtæ longiſſimæ &
argenteæ donantur.

In Valleſia ad urbem Sedunenſis paludem copioſè provenit.

Locus.

* 16. *Festuca graminæ arvenſis minor* C. B.

C. B.

Cauliculus eſt tenuiſſimus, ſtriatis, *folia* brevioribus: in cauliculorum ſummo *striculi* quidam parvi,
membranacei & palmati, palmi longitudine, racematim dependent ex tenuiſſimis & vix viſiſ per-
ceptilibus pediculis, quorum exteriores membranule rubent, quibus deſiccantibus *ſus* candidulus
emicat.

Paſſim in agris Hærcyniæ Saxono-Thuringiæ provenit. *Thal.*

Locus.

* 17. *Festuca pratensis lanuginosa* C. B.

C. B.

Ex *radice* capillacea, ruſefcente *folia* multa, anguſta, pedalia, unà cum *culmis* tenuibus, bipeda-
libus, foliaceis, molli & paucâ lanugine (culmus poſſimam) aſperſis exurgunt. *Spica* eſt oblonga,
anguſta, ex glumis oblongis ariſtæ donatis compoſita, & quaſi in paniculam parvam expanſa.

Baſileæ paſſim in pratibus.

Locus.

* 18. *Festuca dumetorum anguſtiſſimis & piloſis foliis* C. B.

C. B.

Radix eſt albicans, ex durioribus fibris compoſita: ex qua *culmi* aliquot tenues, uno alterove
geniculo diſtincti, & pene nudi, exurgunt. *Folia* ſunt brevia, anguſtiſſima, levi molliſque lanu-
gine hirtuta. Culmorum ſummitati *panicula*, ex ſpicis plurimis compoſita, quarum quælibet capil-
laceo pediculo infidet, multis glumis ariſtatis & candidantibus conſtat.

Baſileæ in dumetis circa Clynen reperitur.

Locus.

19. *Gramen Atroracem panicula longiſſima.*

In Sicilia obſervavimus hoc genus. Panicula erat longiſſima, bipalmari nimirum aut dodrantali,
modicè ſparſa, è pluribus locuſtis tribus quaſiſve glumis oblongis, acutis, non ariſtatis conſtantibus
compoſita, colore rubente: nec folia nec radicem obſervavimus.

CAP. XI.

De Gramine nemoroſo hirtuto.

Ambigere videtur hoc genus inter Culmiferas, & Graminiſobas non Culmiferas: culmo enim
terree, geniculato cum illis convenit, verum flores ſex poſius calyce hexaphyllo, ſeminibus
anguſtola, paniculâ juncea ad hanc accedit.

A. 1. *Gramen exilis hirtutum* Græc. *nemorofum hirtutum minus anguſtifolium* Park. *hirtutum*
capitulis Pifſii C. B. *Gramen Luzula minus* J. B. *Small Hairp Wood-grafs.* *

C. B.

Radix eſt ruſſa, oblonga, repente, pluribus fibris capillatis: ex qua *folia* plura, ſemidodrantalia,
modo latiora, modo anguſtiora, acuta, villoſa prodeunt: inter quæ *cauliculus* palmaris, levis, tenuis,
viridis exurgit: *paniculam* brevem ex pluribus ſpicibus compactam, ruſefcentem ſuſtinet. *Flores*
quando aperiuntur in foliola ſex atro-rubentia lateribus, pallidis expanduntur, è quorum medio
ſtamina ſava ſex, & tria filamenta pallida prodeunt.

J. Bauhinus calammum duobus articulis ditantem ſcribit, ex quibus folia duo, uncias duas longa emer-
gunt, alterum in medio, alterum in ſuperemitate, ubi comæ in tres vel quatuor (cum capitulis) divi-
ditur partes.

Floret ſub finem Aprilis & initio Maii in pratibus & palcibus frequens.

Tempus
Locus.

A. 2. *Gramen hirtutum elatius paniculâ juncea compactâ. An nemoroſum hirtutum V. ſex hirtu-
tum anguſtifolium major C. B? nemoroſum hirtutum major anguſtifolium Park? Hairp-
grafs the greater, with a major compact tuſſy like panicle.*

Duplo elatius eſt quam præcedens: *folia* duplo triploſve longioribus, duobus etiam tribuſve in caule
paniculâ multo majore, magis compacta, ex plurimis veluti globulis coactervata. In paluſtribus pro-
venit. Suſpicabar aliquando hoc non diſferre ſpecie à præcedente, ſed ratione loci dimittere at variare:
verum nunc aliter ſentio.

A. 1. *Gramen*

- A. 3. *Gramen nemorosum hirsutum vulgare. An Gramen nemorosum hirsutum Lob? Ger? nemorosum hirsutum latifolium major Park? nemorosum hirsutum major latifolium C. B?*
Common hairy Wood grass. Si hoc intelligant perperam major dicitur.

Dodranta est altitudine. Radix è fibrarum tenuium caespitè constat. Folia pedem dimidiunt longa, pallide viridia, laeviuscula, ad margines pilosa. Caulis seu culmulus eadem radice plures, gemculis tribus pluribusve interceptis, ad quos folia brevia, calicem aliquosque amplectentia; in fastigio paniculam gestat sparsam, in eo à Gramine exili hirsuto derivatam, quod strobili cuiusque succedentia valvula terminalia non plura simul congesta unicum caputulum seu globulum componant, sed singula scortum nascantur, alia sessilia, alia pediculis longis tenuibus appensa, qui non raro deorsum reflectantur. Flos ex illis sex foliis, quæ calycis loco valvulum terminale amplectuntur, & totidem intra apicibus constat.

Locus. In sylvis admodum frequens est, præsertim montosa.

4. *Gramen rure lucidum nemorosum sive Luzula. J. B. nem. hirsutum major latifolium C. B. non nem. hirs. latif. minus cybatera, magnitudine perissimum differens, ex semine Chabræ.*

Difert à descripto, 1. Radix magna, fibrosa, granulata rufa J. B. quarum C. Bauhino ex pluribus fibris nigrescentibus compositam ei attribuat. 2. Culmuli sesquipedales C. B. cum J. Bauhino dodrantaem altitudinem eis attribuat. 3. Folia cubitalibus C. B. J. Bauhino quadranta aut palmaria, rigidiuscula, acuta, serrata, extrosum striata, glabra, et in lateribus longi, canâ, tenerrime lanugine, in folium etiam totum utrinque incurvente, obtusa; Ita lanugo vel pili, qui facile decidunt tactu colligunt rorem, qui splendet noctu, irradiantibus stellis vel Luna, icl ut sit admirationi videntibus. Herbam perperam decidente rore invenire non possunt. Descriptio Graminis hirsuti latifoli majoris apud C. B. in Hist. in omnibus fore excepta magnitudine, qui excollit, Gramini nostro hirsuto nemorosum vulgari convenit.

Gramen ejusdem hirsutum latifolium minus convenit melius descriptioni Graminis rure lucidi nemorosum apud J. Bauhinum. Hæc autem duo Gramina (nemorosum hirsutum I & II. C. B. intelligo) specie convenire, seu unum & idem specie Gramen esse Chabræ vix mihi persuasit: nec enim magnitudine sola differunt, sed & foliis, & culmo, & panicula, ut descriptiones conferenti patet. Motus speciei foliis rigidiuscula, acuta, serrata, ex radice nitar caespitè prodeuntibus cum gramine hirsuto maximo nostrato convenit.

- A. 5. *Gramen nemorosum hirsutum latifolium maximum. An Gr. nemorosum hirsutum latifolium minus junctâ paniculâ Park? Si hoc intelligat, mali minus apparet. An Gr. hirsutum latifolium minus C. B? An Gr. Luzula maximum J. B? Panicula convenit: folia minus longa pungunt. The greater broad leaved hairy Wood grass.*

Folia hæc gramini qualia Gramini rure lucido nemorosum attribuit J. Bauhinus, nimirum palmaria aut sesquipedalia, rigidiuscula, acuta, serrata, semineum lata, extrosum striata, glabra, et in lateribus pili longi, canis mollicellis donata. Juba amplissima & lævè diffusâ, qualis Gramini Luzule maximo apparet Jo. Bauhinus, juncea: Semina ut in aliis generibus spæciosa, triquetra.

In Gram. Luzule maximo J. B. folia unciarum latitudine ferè æquant, longitudinali cubitali: nostro, quantum hæcenus observavimus, folia breviora sunt, perinde tamen interdum lata.

Locus. In umbroso laxo sæpe observavimus. Repertæ etiam Hampitulis non longe à Londino præ hylam.

Gramini Luzule maximo J. B. Radix crassa, obliqua, nigra, numerosis fibræ capillata.

6. *Gramen nemorosum hirsutum angustifolium minus panicula alba C. B. nem. hirsutum minimum Park. mali. Gramini Luzule esse flos alba J. B. White panicle Wood grass.*

J. B.

Perennis vix græpen folia est ad Gramini Luzule sive nemorosum folia accedentibus, consimiliter pilosa: et culmi majores, cubitales: horum manifestum discrimen: si liquidem in summo fastigio albi sunt, festuacæ, cum in altro non in festuacæ, sed in capula desinant, seu parvæ calycem terminalia decidunt, alique nigrescentis, cum hujus festuacæ albescant. Luzule modo quosdam habet pili, quæ etiam facile decidunt.

Locus. Plantam hæc quam describit J. Bauhinus, ad lustra montis Saleve & in colle la Rossie præ Generam observavimus. An idem sit quod C. Bauhino describitur sub titulo allato debetamus, cum ille strobilos singulos expansos sensu donatos foliis suo attribuat, unde totidem staminula prodeunt.

PARS SECUNDA.

De Herbis graminifoliis non culmiferis flore stamineo.

CAP. I.

De Gramine cyperide & Cyperis.

HUJUS notæ sunt præter folia graminæ & stamineos flores toti generi communes, caules triquetri in omnibus, & in plerisque, etiam setina. Horum spicæ seu paniculæ in normalis alia supra alias è foliorum sinibus exeunt, quæ Gramina cyperoides polytachia dicimus; in aliis summos caules terminant, quæ vel spicata, vel paniculata. In utroque genere maxima, modò radicibus tuberosis donata sint, Cyperi simpliciter dicuntur.

Cæterùm Cyperus *Kalmus* à radicis effigie pyxidulam aut vasculum pusillum imitata dicitur.

§. 1. Gramen cyperoides polytachyon.

- A. 1. Gramen cyperoides cum panicula nigra J. B. cyperoides majus latifolium Park. cyperoides Ger. Cyp. latifolium Spicæ rufæ, siccæ caule triangulo C. B. *Spizat vernal Cyperus-grass.*

J. B.

Geniculatim incedunt & præsertim radices crassiusculæ, Cyperi longi radicibus similes, à quibus pendent fibræ crassiusculæ. Folia cubitalia & sesquicubitalia, læta, carinata & striata, Cyperi paria. Caulis duobus cubitis interdum altior, concinne triquetrus, solidus, unâ parte uno vel altero folio ceu vagini cinctus, cæteròquæ nudus, per fastigia solus aliquot. Ipsi caucum hand multum superantibus donatur; è quorum sumis spicæ quædam emittant, duam trimumve unciarum, ex obscurè purpurâ initio nigricantes; deinde è squamarum singularum sinibus singuli exeunt utriculi, è variis flavicantes, acuminati, singula intus semina triquetra nuda per maturitatem nigra, continentes. Summitum caulis fastigium occupant tres, quatuorve spicæ, è spadicis nigricantes, contiguae ferè, sèditiores, semine castæ, è mollibus glutinis contextæ. Quæ & spicarum seminiferarum summa pars non rarò palmacea est & semine vidua ad modum supremarum mox dictarum. Caulis cætera cnothis, ad exortum foliorum è quorum sinibus spicæ exeunt nodosus est.

In aquis, inque aquis ipsi ad flaviorum ripas non rarò ortur, & Maio mense, aut etiam Aprilis flore & spicæ producit, inque multos annos durat. Per totam Angliam frequentissimum est. Linn.

- A. 2. Gramen cyperoides majus angustifolium Park. Gramen nigro-læte verni varietas major J. B. *Spizat narrow-leaved vernal Cyperus-grass.*

Hoc genus præcedenti persimile est, sed per omnia minus, in partem tamen altitudinem asurgit, caule concinne triquetro, solido, unâ parte folio aliquot concinno angustioribus, brevioribus & minus striatis, cætera è modo, & modo ad fastigium fert, ubi ad intervallo duo triève folia, è quorum sinibus spicæ exeunt angustiores & graciliores multo quam in illo: utriculi etiam semina continentes minus turgidi erant, verum compressi in planta non descriptæ, (forte ex maturæ non erant.) Summitum caulem terminant spicæ similes palmaceæ & semine castæ, verum pauciores & strigosiores multo.

Hanc plantam uslem cum præcedente locis unâ nascentem observavimus multoties, unâ spicæ Linn. distinctam esse minime dubitamus.

- A. 3. Gramen cyperoides folio Caryophyllo vulgarissimum. Gramen nigro-læte verni minor varietas J. B. *Sharp spined Cyperus-grass, with Tulip flower leaves.*

Radix fibræ magnis rubentibus constat, aliis etiam minoribus rubentibus intermixtis. Caules inde attolluntur locis humidis & lætioris solo non dico dodrantales, sed pedales & sesquipedales, triquetri quædam non tamen adeo concinne & manifestè, folia circa infimum duobus tribusve ceu toridem vaginis, altera alteram excipiente, obvolunt, deinde nudè ad fastigium ferè, ubi duo aut tria habentur, æquorum sinibus eodem spicæ spadicis virides exeunt, palmiculis longiusculis tenuibus appendicis, primi generis similes sed minores. Summitum caulem terminant spicæ graciles, elegantes è squamis seu glutinis oxideo spadicis, flavâ per mediam longitudinem loricâ striatis marginibus cinerascensibus, compactæ. Folia Caryophyllo latitudine & colore glaucis paria & similia, longiora, ten octavo flexa. N. Spicæ semine castæ in summo caule in prima spicæ intus concinne sunt, è squamis in acutas cuspides exeuntibus compactæ.

In pratis humidis verno tempore & ad rivulos copiose ortur, & spicæ producit.

A. 4. *Gr.*

Linn.

- A. 4. *Gramen cyperoides polytachyon lanuginosum*. **Wamp-spyked hoary Cyperus-grass.** *As Ge. 177. Norwegicum parum lanuginum Park? pag. 1172.*

Hujus tum folia, tum caules, tum etiam spicae in apice lanuginosae sunt: Nonnunquam tamen folia ad genicula distaxat quae tandem amplexantur lanuginosa sunt. Magnitudo ei Graminis Caryophyllae.

In summo caule duas aut tres spicas habentes gestat semine cassas; & inferius ad magnam distantiam e foliorum similibus duas aut tres alias, in quibus semina. His duabus nocti ab aliis congenitibus abonde distinguitur.

Loca. In paludis loca humilioribus oritur.

Figura Graminis cyperoidis Norwegici parum lanugini apud Parkinforum aliam plantam demonstrare videtur, quam Botanici Londenensibus circa altam Portam inquirendam reliquit. Ut & Gramen cyperoides Norwegicum alterum *ejusdem* in talis Sylvis apud nos nascens.

- A. 5. *Gramen cyperoides polytachyon flavicans, spica brevior prope summitatem caulis.* **Prillow'sh Cyperus-grass, with short spikes.**

Altitudine est dodrantali & interdum pedali: *Radix* alba, fibrosa; *folia* angusta, subus interdum pilosis, caule brevioribus: *caule* triquetro, duobus tribusve foliis inferius cincto, deinde aliquot usque modo, prope summitatem duas tresve spicas perennans, ex singulis scilicet foliorum alia singulas breves, habitores, flavicantes, e pluribus granis rigidiusculis, non exsertibis in acutum mucronem ut in Gramine palustris echinato, compositas, unica in summo masculis, acrota, flavicante spica.

Loca. In pratis & paludis frequens oritur per totam Angliam.

- A. 6. *Gramen cyperoides spica terribus erectis: Cyp. angustifolium spica longa erecta C. B.* **Cyperus-grass, with many erect spikes.**

Sesquicubitalem altitudinem assequitur. *Folia* angusta, canalicula, glauca, caulem aliquot usque amplexantur, longitudine superant. *Caule* triquetro quidem, sed ita ut vix possit duceri; in cacumina spicas gerit tres vel quatuor, aliquid distinctas, teretes, longiusculas, semine cassas, ad quam inferiam apponitur foliolum. Inferius e foliorum similibus exsertit duas aut tres spicas, habitores, teretes, erecte, duas uncias longae, e membranaceis subrotundis utriculis, pallide viridibus, mucronis ornati compositae.

Loca. In aquis & stagnis vadosis observatum in agro Warwicensi.

- A. 7. *Gramen cyperoides spicatum Ger. emac. spicatum folia Caryophyllae Park. Caryophyllae folia, spica dupli C. B. Gramen cyperoides verum minimum.* **The least vernal Cyperus grass.**

Radix ei longa, fibrosa; *Folia* angusta, glabra, viridia; *Caule* trianguli, foliis nulli, palmum & dimidium non excedunt, in summitate spicas tres quatuorve gestantes, breviusculas, pariter politas & fere contiguas, non e foliorum alia cymis ut in precedentibus, (quamvis interdum observaverim unam e foliis inferius limbo exsertam) superiorem acrota & semine vacuam, reliquis semine fixas.

Loca. Spicam prodegit & floret primo vere, ante reliqua genera, in paludis sterilibus passim.

- A. 8. *Gramen cyperoides spica pendula brevior C. B. Cyperus sive Pseudo-cyperus spica brevi pendula Park. Gramen cyperoides genui, Pseudo-cyperus Lobelii, spica vel panicula pendula ex longa pendula J. B. Pseudo-cyperus Ger. Wastard Cyperus with short pendulous spikes.*

C. B.

Radix est candida, nonnunquam nigricans, crassa, frequentibus fibris capillaris obserta, & verum Cyperum geniculis emulante, sapore herbaceo, inodora; *folia* Cyperi; *caule* cubitali, in summo spicae plures oblongae [cylindraceae] singulae ex singularibus pediculis oblongis dependentes, quae squamulae & flavicantes.

Loca. In palustribus & aquaticis, stagnis vadosis, rivorumque marginibus reperitur, non tamen saepe frequens apud nos.

Hujus spicae non exeunt omnes ex eodem caulis puncto, sed ex singulis foliorum similibus singulae; caule in spicam strigulam, acrota, semine cassam terminato, ut in aliis hujus generis.

- A. 9. *Gramen cyperoides spica pendula longior Park. spica pendula longior & angustior J. B. C. B.* **Wamp-spyked Cyperus-grass, with long pendulous spikes.**

Magnitudine & statura aequat vel etiam superat Gramen cyperoides cum panicula nigra. Spica in summo caule semine cassas singularem & habitore. Quae locusthim caulis longitudinem e similibus foliorum singulis singulae exsertit longe sunt, angustae, pendulae, flavicantes; quorum plurimum in eodem caule semine praegestantes praece tam quae in fastigio est acrota & vacuam. Spicae haec pendulae sunt non tam ob longitudinem & tenuitatem pediculorum quales ob ipsarum spicarum longitudinem & gravitatem & summam partem ob crassitatem suam ponderosiores; ex lunametro autem veticulis terminalibus evigis, acuminatis compositae. *Caule* infra quadrata folia, quatuor vel

quina, non spiciferis eam obvolvuntibus vestitur, ut exigua admodum pars caulis à totis inferioribus ad superiora nuda sit.

In fossis Noctuarum prope Brentnam in Essexia copiose.

A. 10. *Gramen cyperoides specu parvo, longissimi distantibus.*

Locus.

Caulis est bipedali & longiore, & pro longitudine tenuissimo. E foliorum alis ad longissima intervalla spicæ exeunt, ut in hujus generis reliquis, singulares, pediculis tenuissimis uncialibus aut longioribus appendæ, ipse graciles, [interdum habitiores] uncialibus aut longiores. Spica palmacea semine vacua, singularis caulis fastigium occupat. Folia ad radicem multa caules singulos circumstant, modicè lata, carinata sesquipedalia aut semipedalia, quorum duo tritro in unum caulem cum vagina amplectuntur, deinde ad longitudinem pedalem caulis fere nudus est, Spicæ plerumq; tres præter summam strigiosam & semine cassam in singulis cauleculis producit.

Hanc speciem prima mihi ostendit D. Martinus Lister, postea ipse observavi loco putrido & palustri prope molendinam *Machin mill* dictum sesquimilliam à Wicham oppido versus Camalodunum.

A. 11. *Gramen cyperoides strigiosum tenuis spicatum Park. Loh. in Illustr. Stirpium p. 60. Slen-der-careed wood Cyperus grass.*

Radix latè crassa obliquè incedit demissis fibris albensibus terram firmiter apprehendens, gemina obiter protrudens multa, unde planta se dilatat, & commodum locum nuda densa cespitosa terre superficiem occupat. Folia quæ à radice exeunt semipedalia, modicè lata, glabra, pallidè viridia, in medio carinata, & utrinq; lateribus secundum longitudinem reflexis, duobus internè sulcis, superne eminentibus poris exarata, ut in Cypero *Offianarum*. Caulis cubitalis & longior, versus terram plerumque reclinat, tenuis, triquetra, una parte uno alterove folio cincti, deinde longa interralis duobus tribusve alis, è quorum sinibus singulis singulæ exeunt spicæ longiusculæ, graciles & strigiosæ, è viridi lutescentes, prætinuæ (& interiores etiam prælongæ) pediculis pendulis, supremo caule in simplicem, tenuem semine cassam terampelinam spicam exeunte.

In sylvis copiosissime oritur.

Locus.

12. *Gramen cyperoides polytachyon minimum, specu per maturitatem albicansibus.*

Radix obliquè incedit, fibris subinde demissis, per siccitatem rubentibus. Folia ad radicem plurima conferta, palmaris longitudinis, angustissima, & in sicco ob convolutionem fere juncea. Cauliculi plurimi, semipedales, tenuis, recurvi, una parte velot vaginæ quidam cincti, cætera nuda, ad fastigium fere, ubi è foliorum seu vaginularum quarundam sinibus brevè ut plurimum spicæ (h. e. è singulis singulis) perbreves, ex utriculis aliquot turgidis & fibrocandis semina triquetra constantibus compositæ exeunt, summo caule in spicam tenuem acerolam, semine cassam, seminalem, albicantem desinente.

Sub monte Saleve prope Genavam invenimus.

Locus.

A. 13. *Gramen cyperoides palustre leucanthemum, junceum leucanthemum Ger. emac. lib. 1. cap. 22. n. 7.*

Folium.

In palustribus putridis & arenosis, *Dogs* dictis, in Occidentibus præsertim Angliæ sæpius occurrunt sub finem Juli paniculam promens, pedali altitudine aut paulo majore; caule duro, rigido, junceo, [D. Newton observante triquetro] tribus cauleculis distinctis, ad quorum unumquemq; ut in aliis graminibus apponitur folium. E superiorum autem duorum foliorum sinibus exit furculæ seu pediculus tenuis, duas trève uncias longus, cupa summitatis intralceat quædam velut umbellula, è foliulis seu potius glumis acerolis, elegantibus, albis composita: in summo autem cauleculo aut prope eum existant duæ trève simul ejusmodi umbellule confertæ, brevibus & tenuibus pediculis insidentes.

Affinitatem quandam habere videtur cum Gramine junceo aquatico *Ger. junceo polytachyo C.B.* inferioris inter Gramina juncea descripto.

A. 14. *Gramen cyperoides angustifolium specu sessilibus in foliorum alis. Narrow-leaved Cyperus grass, with short sessile spikes.*

Fibris albensibus tenuibus radicitur, & in densis plerumque cespitibus nascitur. Cauliculi tenues, pedales interdum & albiores, triquetri, inferiore parte foliis tribus spatioso angustis, longo, caulem ipsum longitudine non raro æquantibus, reliquorum hujus generis in modum, obrotati; deinde aliquotque nudi, superiore parte foliis iterum vestiti tribus quatuorve, infima caulem excedente, in quorum alis spicæ parvæ, squamose, cupuliformi etiam nullis adstantibus foliulis summam caulem occupant duæ trève, proximæ, admodum, & velut spicam compositam efficientes.

In agris fossarum plerumque occurrit, præsertim umbrosis.

Locus.

A. 15. *Gramen*

- A. 15. *Grasses palustris echinata* J. B. Ger. emac. *palustris aculeata* vel *mona Germanica* C. B. *ambigua Germanica* Park. *Marsh Hedge-hog grass*.

Palmarum & interdum sesquipalmarum est altitudo. Caulis in una parte prope terram tribus quatuorve foliis non admodum angustis, brevibus, obscure venosis, reliquorum hujus generis in modum, obrotati, deinde ad fastigium prope nudum, summa nempe parte duobus tribusve foliis vestiti, quorum sinus occupant spicae sessiles, teretes, echinatae, semuncialis breviores, & triangulares localis miserabilis, semina quoque triquetrum contineribus compositae, quibus supereminet summum caulem finiens imperfecta spica rufescens, longior fere duplo, vix quartam crassitudinis partem equans, mollis, non squamulis contexta. Radices prosum ager nigricantes.

Parvitate sua & spica compacta habitioribus muricata in foliorum alia sessilibus à congeneribus facile distinguitur.

Loc. In paludosis frequens occurrat.

4. 2. *Grassum Cyperoides cum spica aut panicula in summitate caulis.*

- A. 1. *Grassum cyperoides palustre panicula* *spica* Park. *cyperoides panicula* *spica* *major* C. B. *cyperoides vulgatum apertum* Ger. J. B. *Water*, 8; *Marsh Cyperus grass*, with *spiked heads*.

Ex radice longa, nigra, digitum crassa, Cyperi longi formae, geniculatae, hinc illic se diffundente, multum fibrata caulis sesquicubitalis, tribus angulis alper calurga; quorum folia Cyperi vel Arundinis ex radice prodeuntia vestiant. Causam hinc spicae curvis brevibus villatae, ex aliquot paniculae compositae, sessilis, & per maturitatem rufescentes, insident, quibus folia terma aut quaterna subsistant; quorum quaedam lata & palmam longa, quaedam brevia & angusta.

Loc. In foliis palustribus illiusmodis, ut fluvii ripis, ut Thamesi: J. B. B. ubiq; in aquosis palustribus & stagnantibus reperitur. Verum non adeo frequens habetur in Anglia.

- A. 2. *Grassum cyperoides palustre spica longiore caulis*, *Marsh Cyperus grass with leafy spikes*.

Caulis hinc sesquicubitalis, triquetrus, angulis ad tactum asperis, si deorsum digiti ducantur, infirmis, nullis, nodis, in caeterum spicam laxam seu potius paniculam longam minus spicam, locidam gestans, è pluribus spicis secundariis compositam, quae ex aliis ad hoc exiguis, subrotundis, squamulis consistant. Dens, firmus & archè compressis caespitibus nascitur hoc genus, radicibus adeo implexis juncoetum in modum, ut eisdem eas insillere possit. Ad summum spicae aut nullam apponunt folium, aut perexiguam. Quae è radice exiunt folia non admodum lata sunt, caule tamen nonnuncquam longiora.

Loc. In palustribus patetis & aquosis oritur.

Hujus aliam speciem per omnia similem sed nascentem, spica angustioribus & gracilioribus, spicam nascentem, non in caespitibus densis caespitibus, iidem in loca observantur.

- A. 3. *Grassum cyperoides spica è pluribus spica multibus composita*. *Cyperus grass, with a soft compound spike*.

Caulis hinc dodrantalis aut pedales atque etiam aliores, triquetri, concavi, nodos, una parte quatuor vel quinque foliis, eorum vaginæ instar aliquotque obrotentibus cincti, caetera nudi, spicam in fastigio gestantes quatuor, quinque, vel sex spica brevibus subrotundis, ad tactum mollibus, ex serrulis compressis squamulatis incumbentes compositae fragmentatam. Folia brevia vix quartam caulis partem longiorum aequant, latitudine Graminis pratensis minoris.

Loc. In paludosis locis humidis copiose provenit.

An hoc idem sit Graminis cyp. ex monte Baloni J. B. dubitamus, ob altitudinem minoris, folia minus brevia, nullam spicam subsistentem habens. Verum hujus generis plantae pro loci genio multam variant.

Ex quo haec scriptimus ostendit nobis D. Jacobus Newton amicus noster, rei Botanicae peritissimus ipsissimum.

- A. 4. *Grassum cyperoides ex monte Baloni spica densa* J. B. 1770. *palustre montana spica densa* C. B. 177. *palustre montana* Park. 177. *peruviana* Ger. 100.

Quod à praecedente differt altitudine majori, cubitali scilicet aut sesquicubitali; caulis tamen gracilioribus, neq; adeo manifestè concavi; spicae partialibus miserabilibus, non tamen minus crebris & caudatis; conrugato foliolo oblongo spicae subsistenti, quo interdum recta supra paniculam assurgens caulis Junco speciem refert; folia longioribus, angustioribus.

Loc. In pratis prope Hatham Colcestrensem in Lincia. Alibi etiam saepius idem observavit D. Newton.

- A. 5. *Gramini cyperoides ex monte Balen simile, spica totali è pluribus spicis composita. AuGr. 177. elegant multifera spica Park. Cyperus-grass, with a soft moze compound spike.*

Precedente major est & clarius, ut quod cubitalem altitudinem assequatur. Spicam habet è spicis multo pluribus & densius stipatis compositam, nec epillum magnitudinis omnibus, ut in illo ferè, sed solum versus cacumen minoribus, donec tandem in unam simplicem mascululam spicam terminantur.

In palustribus & aquis Maio floret.

Spica in hac specie coloris est ferrugini, & incho ad tactum mollis. Caulis concavus est, minus tamen quam in precedente.

Linn.

- A. 6. *Gramini cyperoides ex monte Balen simile, involucris, in maritima & arenosa nascens. Sea Cyperus-grass, with a compound spike.*

Radices crasse, crebris geniculis articulatae, è geniculis fibras tenues capillatas emittentes, hac illuc vagantur. Folia angusta, semipodalia, carinata, una parte, seu vagina caulem amplexantur, aliorum supra generis in modum, semipodalem, tenuem, nudum, eisdem, triquetrum, in summo spicam sustinentem è multis spicis compositam, paucioribus tamen quam in superiore. Singula seminibus (quae velut totidem squamis spicas partiales componunt) disco plerumq, tenuis & coriortem pilos emittunt, unde tota spica velut ferrugineo quodam capillino hirsuta videtur. Ob concursum caulis, & gravitatem feminum spica plerumq, deorsum curat.

In arenosis maritimis frequens occurrit.

Linn.

- A. 7. *Gramen cyperoides elegant spica composita asperiore. Elegant Cyperus-grass, with a rough compound spike.*

Radices huic albae, fibrosae: Folia angusta & vix $\frac{1}{2}$ digiti partem lata, pallide viridia, caulem aliquotum amplexentia, dodrantem longa. Caulis pedalis, triquetrus, nudus, enodus, in cacumine spicam gerens colore herbaceo seu ex viridi flavicante, è spica parvis quinque vel sex, vel pluribus paucioribusve, compositam, brevibus, teretibus, squamosis, squamis (quae nihil aliud sunt quam utriculi semina continentes) compressis & acuminatis. Ad spicam autem nullum apponitur folium.

In stagno quodam non longè à Middleton vico versus Coler-dale, in agro Warwicensi, propè Leam. Wrexham in Wallia, & alibi variis in locis observavimus.

- A. 8. *Gramen cyperoides palustre majus spica composita C. B. palustre cyperoides aquaticum spica composita J. B. palustre cyperoides Ger. 177. palustre majus Park. The greater spiked Cyperus-grass.*

Triquetrum Cyperi tollit caulem, cubitalem & sesquicubitalem, solum, eisdem, una parte quatuor aut quinque foliis, cum vagina instar includentibus, cinctum, cetera nudum; caps fastigium ornat spica, (Panicei quodammodo simili J. B.) siccuncialis & major, è squamis compressis, acuminatis & quodammodo aculeatis composita: Sunt autem squamae haec nihil aliud quam loculi triangulares, semina continentes, Milio ferè aequales, compressiss. Radices fibrosae, ex decaduorum foliorum fibris compositae, Folia mediocriter lata caulem ferè longitudine aequant. Ad basin spicae plerumq, apponitur foliolum angustum oblongum, aliaq, etiam sed breviora ad basim spicarum particularium totalem componentium.

In aquis frequens nascitur.

Linn.

- A. 9. *Gramen cyperoides spicatum minus. Gr. 177. spica minus composita Park. 177. parvum Ger. 177. 177. spica minus minus, composita C. B. J. B. The lesser spiked Cyperus-grass.*

Precedenti simillimum est hoc genus, sed multis numeris minus. Radix obliqua, fibris crassiusculis rufescentibus donata. Cauliculi pedales, terram versus plerumq, reclusi, una parte folia aliquot (sex, sepe quinque) cum vagina instar obvolvuntibus aliquotum, cincti, cetera nulli ad spicam usq, quae minus compacta est quam in precedenti, è spicis minus archè stipatis composita. Utriculi & semina illius similia. Folia angusta, carinata, modice longa, multo tamen caulis breviora.

Extra aquas plerumq, oritur, in paludibus humidioribus.

Linn.

- A. 10. *Gramen cyperoides spicatum minus, spica longè, divisa seu interrupta. The lesser spiked Cyperus-grass, with a long interrupted spike.*

Radix obliqua fibris capsulisculis demissa terra firmius adhaerens. Cauliculi dodrantales aut pedales, teretes, triquetri & striati, terram versus plerumq, reclusi, una parte sex sepe quinque folia angusta, carinata cincti, modica tamen. Folia necum omnia caulem ad tertiam ferè longitudinis partem cum theca obvolvunt & includunt, & interiora etiam superiora, omniaque è radice una cum caule extant, adeo ut una pars caulis ferè sepe quinque velut vaginae itaque: quod & alia etiam hujus generis Graminibus commune est. Spica in summo caulis longè, divisa seu interrupta,

rupta, è lex minutum septemve spica parvis, squamulis, sessilibus, ex utriculo aculeatis compositis longis distantibus [inferiores intelligo] coagmentata. Folia interdum lequipalmata sunt & leu-
gocera, caules ipsos longitudine vel æquantia, vel etiam excedentia, quo à reliquis hujus generis spicatis differet. Spicæ inferiores ad exarum solum videntur, angustissimam capillatam obtinent.
In palcosi loca humidioribus nasci amat.

- A. 11. *Gramen cyperoides spicatum minimum, spica decula aculeata* Gr. *Spicatum* ; Tab. parvum *monofolium cum spica aculeata* J. B. *numerosum glabrum* & *spica parva effusa* C. B. *The least purple spiked Cyperus grass.* *As Gr. cyperoides cæmetum mon-
tanum* Park.

Radice fibris crassiusculis, pro plantula molulo, nova in ambitu germina existerentia herbam propagant. Folia angusta, brevia, imò cauliculis ut in præcedentibus videntur, hinc autem à pal-
maris & interdum lequipalmatis, tenuis, triquetri, spicam in summo sustinentes tribus plerumq[ue]
glomerulis folliculorum aculeatorum leuina includentium compositam. Utriculi per matura-
tam extrosum magis reflectuntur quam in præcedentibus, utrae & spicæ magis aculeatae sen-
tuntur.

Loc. In loca palustribus, solo putrido & spongioso plerumq[ue] oritur.

- A. 12. *Gramen cyperoides seminibus dorsum reflexis palcosiformibus. flos-grass.*

Hujus cauliculus palmari in summo spicam gestat brevem, racam è seminibus paucis, palcosi-
formibus dorsum reflexis, spadicis compositam.

Loc. In palustribus putridis oritur. Parvitate sua, figura, colore & situ seminum à reliquis hujus ge-
neris facile distinguitur. Semina quantum memini triquetra sunt: Plantulam accuratè describitur
quando eorum copia facta erat neglectissima; in palustribus tamen non valde infrequens est.

- * 13. *Gramen cyperoides Tab. spica multiplex nigra* J. B.

Nobis cum J. B. ad *Gramen cyperoides* accedere videretur, verò quædam genus se noscitur
constat. Consule si placet J. Bauhinium lib. 16. cap. 181. & C. Bauhinium Theat. l. 1. p. 1. c. 13.
n. 7. cui *Gramen cyperoides spica multiplex* dicitur.

- * 14. *Gramen cyperoides latifolium spica spadicis viridis major* C. B.

Quod in humilis ad Sellam novam Montepelluli primum vidit, quòd P. Magnol abundare juxta
Ladum amicum scribit, an nova species sit & ab omnibus superioribus à nobis descriptis diversa nosci-
mus. Si D. Magnol accuratius descriptum nobis dedisset, hanc scripsissim eximisset. Nec numis
interci sumus de

- * 15. *Gramine cyperoides angustifolia spica spadicis viridis minor cyperoides.*

- * 16. *Gramen cyperoides numerosum Tab. J. B. numerosum spica sublonga recurva* C. B.

Radice fibrosa, foliis angustis, dodrantalibus, acuminatis, costis rotundis, pedalis spica
duas trève ex luteo purpurascens, trium unciarum sustinentibus, nobis incognitam, circa Mont-
spellum prætorum & sanorum margines oritur ait P. Magnol.

Præter has & alias adhuc quatuor *Graminis cyperoides* species novas, & à nemine ante se pro-
tas proponit & describit Parkinsonus in Theatro suo Botanico. Et sunt

1. *Gramen cyperoides Danicum glabrum foliis caryophyllis.*
2. *Gramen cyperoides spicata fusca elegantissima panicula Bayonensis.*
3. *Gramen cyperoides palustre Bayonensis.*
4. *Gramen cyperoides Bayonense bicorne panicula fusca.*

Quod ad singula genericè è foliorum similibus duas trève plerumque spicas prout: quod si ve-
rum sit, huic generi peculiaris esse videtur, quantum hactenus observavimus.

Horum descriptiones è Parkinsoni historia petas: nam quæ nobis incognite & suspecte sunt pign-
tas hoc transferre.

1. *Gramen caryophyllatum montanum spica multiplex* C. B.

Item,

2. *Gramen caryophyllatum montanum spica varia, cyperoides*

Item,

3. *Gramen spicatum angustifolium montanum cyperoides.*

Graminis cyperoides species esse videntur: quorum descriptiones in C. B. producens habentur.

17. *Gramen maritimum cyperoides* J. B. *cyperoides maritimum* C. B. *Typha cyperoides maritima* Lob.
maritima Næbomys Park.

C. B.

Radice nitida lignosa, longi, rufi, nigresce, geniculati, proleas teretes, fibrillæ capillata, mul-
ta villosa creta addita, lappæ & grana: folia longa, pallida, crassa, pectinata, lentis, sparsis & molli-
bus costis pedalis, tenuibus, lèvem mollem superantibus, capsis hæminatis capsis globosis, Ampelo-
picali magnitudine & figura insulas, cuticulam, squamisque fasciatam, ex luteo ruficæto J. Bau-
hino

lino rectius ex nigro rubescens] splendentique: cui folia plerumque terna, [duo utrinque Dalechampia] aliquando quaterna, triuncialia & veluti cornua prominente subiacentur. *Seminum* est reflexentibus, triangulis, mollicibus.

In arenosis litoribus prope Neapolim copiose provenit. Habetur etiam ad mare Mompeli.

Linn.

4. *Cyperus Botanicis dicta.*

Hi majores sunt plerisque aliis hujus generis, radicibus tuberosis. His tamen ob convenientiam in paniculis squamatis species nonnullas e minoribus accensimus.

- A. 1. *Cyperus longus* Ger. *longus odoratus* Park. *odoratus radice longa, sive Cyperus Officinarum* C. B. *panicula sarsa speciosa* J. B. *The ordinary Sweet Cyperus, or English Salingale.*

Radix est oblonga, geniculata, multis internodiis, sibi implicata, ut sunt radices Arundinum, & Graminis modo summo cespiti serpentibus, fibres multis capillatis, e puncto nigricantibus, succulentis, carne vero in sublucido albicante, odorata, solummodo, cum ob nimiam locorum humiditatem amaritudo non recte persentiat, vel subacris cum quadam adstrictione. Radicula quatuor in Olivaria portionibus est liberant atque ita continuata sunt ut in Filipendula. *Folia* habet Arundinacea, postea longiora, graciliora, duriora, dorso eminenti & acuto, ut tanquam acies manus evellentem laedat. *Caule* est cubitali, nonnunquam etiam altiore, erecto, emodi, glabro, striato, trajecto, medulla alba, ut in Junco, referto: In cupis cacumine folia minora, quadratum nullatim disposita, come, quam etiam superant, subiecta. *Panicula* sive *stipa* (Junco, Julio, & Angulio liberata, & dum floret Agallochum fore oleum) lata laxaque ex cacumine dependet: in cupis glutinosa, quam *semen* durum, cortice nigro vestitum & triangulum includitur. Quod *semen* (aut *Fallopium*) infestissimum in nostra Oriza, in nostris regionibus, & si comedatur inebriat ut Lesium.

In praes circa Mompelium, inque Sicilia & Italia observatur in locis cultis & palustribus. D. *Linn.* Newton in insula *Purbeck* dicta Dorcestriae Angliae cum invenit prope Sacellum quoddam, a latere Portlandiam insulam spectante.

Stomachica est, & uretica hujus radix: Usus praecip. in urina & menses citanda, cruditate ventriculi continuanda, hydropis inchoato preservando, colica ac vertigine discutenda, intellectu roborando: mallicata oris fetorem emendat. Cocta vel macerata in oleo, coarctata & imposita renibus ac postea calculum depellit & usum praeicat.

Si radicibus pulverulenta saccharum & mel addatur, & cum paucis vino fusi coquantur, deinde in taleas distillantur, & insulam affundatur *Gingiber* coarctatum amolantur.

Spiritus cum radicibus sole effocatus & aceto conspersus fructum turbant, & vestibus interponunt ut sui odoris gratia commendent Galli. *Ros.* Sic & Hispaniae & Italiae mulierum radices aceto paratas pro odore ac suavi fuffitu recondunt: alique etiam exinde pulveres conficiunt.

Radix pulverulenta ad 3 j. cum spica Lavendulae optime furtum expellit, ut & secundinas. D. *Palmer* ex dictatis D. *Hermann.*

2. *Cyperus panicula crassior minus sparsa* J. B. *An Cyperus rotundus indorum Germanicus* C. B? *Cyp. rot. littorea indorum Anglica sicut Park?*

Calamus tulle triangulari ad cubiti & sesquicubiti altitudinem, quatuor Ripant folia graminea, striata, crinita, aceto docto, gibba: in culmi summitate folia duo aut tria breviora, angustiora occurrunt, quatuor sive paniculae se explicant fusae, foliulis pallentibus. *Radix* e pluribus olivariis glandibus constat, colore sive fusco, immo albo, libidinis dura, dulci. Hujus adnata complura filamenta, glandibusque inter se contextus per filamenta sic calami crassitudine aequantia. Vires odore destituit.

Floret Juno & Julio suo nimio reptata molesta.

Plantam cupis descriptionem e J. Bauhino historia mutuatam dolimus eandem esse quam C. Bauhinus *Cyperum rotundum indorum Germanicum* appellat, minime dubitamus. Nam & descriptiones per omnia conveniunt, & C. Bauhinus se eam visisse ac copiose in horto Mompelgardensi a Joanne Fatre cultam: cui etiam idem est cum eo qui in scribibus & rivulis ad Scaldam amandissima Hispania provenit, Lobelio monente, cui *Cyperus aquatica Septentrionalis*: ut *Cassiaro* *Cyperus rotundus*, nigrae in odore radices habere dicitur.

Chabreas apud J. B. hunc *Cyperum rotundum odoratum* vulgarem C. B. facit. Verum si recte pictos sit, nec panicula, nec radices conveniunt. Notandum tamen P. *Megui* observare in Planta prope Mompelium nascente, quam pro *Cypero rotundo* vulgari C. B. habet, caules ex radicibus rotundis exire, ut in horto *Cypero rotundi* in horto Germanici epulenti C. B. pergamur, non autem radicibus liberis appendi recitatis, ut in horto *Cypero rotundi* odore vulgari. Nos certe in plantis nostris sicca Mompeli collectis invenimus *Cyperum panicula crassior minus sparsa* calami & paniculam. Fort: igitur *Cyperus rotundus odoratus* vulgari C. B. & *Cyperus rotundus in odore Germanicus* una & eadem planta sunt: de quo tamen ob rationis tanopeo dubitamus.

3. *Cyperus rotundus Orientalis major* C. B. *Cyp. Spicata & Cretica rotundus* J. B. *Cyp. rotundus odoratus Spicatus* Park. *rotundus Spicatus* Ger. *rotundus*.

Radix est rotunda, Oliva crassior, multis, modis quadam sibi tanquam filo, Filipendula modo, connatis, varia stris alperis, foeti subruhi, aliquando rubentibus, aliquando etiam nigri, immo albidis,

albidis, aromatici odoris, & acuti saporis. *Folia* est poaceis, longioribus tamen atque angustioribus; caule cubitali, anguloso, in cuius cacumine folia alicquot, stulte in modum disposita, e quibus spicae alicquot herbaceae coleris, femina continentes, procedunt.

In Aegypto circa urbem *Bozale* in multis humida copiosa *Rauwolfius* vidit: in Nilo flumine & pluribus Aegypti lacubus vel locis palustribus copiosissime provenit *Alquino* monente.

4. *Cyperus rotundus Orientalis minor* C. B. *Cyp. rotundus minor* Adx. *rot. odoratus Syriacus* minor Park. *minor Orientalis* Ger. *emac.*

C. B.

Hic illo duplo minor est; cortice fusco, villosa, priori sapore & odore similia, qui non modo in Syria monens vidit, sed etiam Illyria & Apulia, non sponte provenit in Italiam deferretur.

Hic similia *Cretica*, radice Olivae minoris rugosa, toris nigra aut fusca, odorata, aromatica & amara.

5. *Cyperus rotundus minoris Hispanicus* C. B. *rot. odoratus alio nomine Hispanicus* Park. *Cyperus rotundus panicula elegantissima pedis humilis* Chal. *cur. polk. quem in Hispania Galiciana Batis* vidit.

- A. 6. *Cyperus rotundus lateralis indarus* Led. J. B. *rotundus indarus Anglicus* C. B. *rotundus lateralis* Ger. *rot. lateralis indarus Anglicus* Park.

In Anglia *Borculo* & *Belgi* fluminum limoribus, lentisque fluviorum rivulorum, & maris alluvionibus *Cyperus* genus non indagans, radicibus longis latissimae spicae fibrosae, multa & bicubitalibus implarum filamentis *Cypero* rotundo parum oritur. *Folia* angulosa, caule cubitali & sesquicubitalibus, nudis, triquetris, in quo racemosa puba congesta. *Gusta* laballringit. *Radix* frigida & sicca, odore & sapore exopt. *Lobis*.

Feliciter nobis fuit *Lobelia* qui huiusmodi *Cyperum* in Anglia *Borculo* limore invenit. Nobis enim plantas ista indagantibus non comparuit, ab illis tamen observationem sudavimus.

Alia alicubi huius generis plantas describit & deponit *Parkinlonus*; nuncium

1. *Cyperum rotundum hircocum inodorum Anglicum alterum*. A superiore capitula alicquot spumosa nigricantibus, tribus vel quatuor simul parvis dactylis, caetera similia.

2. *Cyperum rotundum inodorum aquaticum*. Radicibus nigricantibus, rotundis, fibras inter repandens eminentibus; paniculis oblongis seu spicis e summitate caulium una cum foliis exeuntes a reliquis distinguitur.

3. *Cyperum rotundum inodorum aquaticum alterum*. Radicibus oblongis Olivariis fibras multas continentes cum praecolentis coarctat; foliis multo longioribus, caulis clarioribus, capitula brevioribus eminentioribus foliis longis intermixta, ab eodem differt.

- A. 7. *Cyperus longus indarus Sylvaticus* Ger. *longus indarus vulgare* Park. *longus indarus Sylvaticus* Ledeb. J. B. *longus, indarus Germanicus* C. B. *Gramen cyperoides altissimum, foliis & caulis serratis* P. *Bocconis*. *Kong-rostedt* *basilard* *Cyperus*.

Bos.

Caules huius arundinaceis, rotundi, granulata, hominis quandoque proceritatem aequant. *Folia* in singulis geraculis *Cyperis* vulgari more carinata, pale longiora, sermendum lata, superne angustiora, prope marginem & media costa serratae foliorum modo exasperata & serrata: In cacumine & loborum alis Juba. *Mili* vel *Junci* paniculae sparsi contractiores, foeculentibus etiam similibus minoribus & nigricantibus. *Radix* lutea longa, fibrata, porruis, Graminis canini seu dactyli modo laryens.

In palustribus provenit v. g. ad pagum *Hilum* prope *Canabrigiam*; in loco quodam paludoso ad mansura inter *Pantantiam* & *Morkens* oppida in *Cornubia*; & in locis palustribus ad fluvium *Tame* sub *Droghda* vico non longe a *Tamworth* oppido agri *Warwicensis*. *Observamus* etiam in *Lado* anno 1722 *Montepelliana*. *Montepellensis* pra non descripto habent: nobis descripta videtur & depicta sub titulo allato quatuor impertatib.

Cyperus longus indarus Sylvaticus C. B. Park.

Cum a C. *Batheno* in *Prodero* imperio descrypta sit, ut qui caulem & paniculam non vidit, oculis.

8. *Gramen cyperoides panicula nigricante* Park. *Cyp. minor, panicula sparsa nigricante* C. B. *Gramen paludum panicula compressa nigricante* J. B.

J. B.

Panicula describitur species paulo major est, diadantum interdum excedens, tora habuit; *folia* linearia, longiora: culmi & angulo distantes, tenuiter emolli; paniculae hinc fecit disticha, squamata, ut *caulis* ferè superne ita magnitudine inferiores, colore nigricante. *Folia* paniculae subpilis videntur habere positum, caridionque una se proportionem, sed majora quibus alteris.

In palustribus non procul *Montepellio* colligitur, nam in Italia ad ipsa *Pharuzza* mares in fossis.

9. *Gramen cyperoides panicula sparsa subflavescente* Park. *cyper. minus panicula sparsa subflavescente* C. B. *Gr. paniculum parvum panicula latè compressa* J. B.

J. B.

Paniculi hujus graminis radices capillares sunt, colore ruffe, palmum longæ: *Folia* parva, unciam unam, duas tertia longæ, tenuia: *Caule* triquetri, enodes, frequentes, palmares & sesquipalmares: quorum extrema scissiles, sinè quo pediculi ut plurimum (licet etiam interdum è medio producta pediculus brevis plures alias sustineat paniculas) impositæ *panicula*, umbellam quodammodo mentientes, speciosæ, Graminis amoris dicti non ita dissimiles, compressæ, semunciam circiter longæ, culmum latæ, binis versibus squamatis compactæ, colore ex viridi rufescente nitido: *Semen* minimum, nigrum. Subjecta sunt terna folia graminis, quorum unum reliquis multò breviora semper consistunt.

In humidioribus & ubi per hycem aque stagnarant per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem abundè provenit.

- A. 10. *Cyperus graminus* J. B. *gramineus* Miliceni Ger. *Pseudo-cyperus miliaceus* Park. *Gramen cyperoides miliaceum* C. B. *Whillet-Cyperus-grass*.

J. B.

Triquetrum cubitalis altitudinis caules surgit, quæ folia comitantur, eam unum medio tenui fore complexa, ubi à caule recesserint eam cacumen superantia, carinata, duplo Graminis latiora, aliæque non ita dissimilia. Summo caule fastigio Miliaceæ in lanam diffunduntur panicula, graminis confertis Junco grandæ, quorum exorta folia subponuntur, inferioribus nisi minoræ essent tunia. *Radix* fibrosa.

Varis in locis observavimus: v. g. ad ripas fluvii *Tame* prope *Tamworth* oppidum in agro Warwicensi, in anno non longè ab *Haverford-West* in *Penboochu* Walliæ; in fluvio *Blackwater* ad molendinum paulo infra *Bocking* vicum, in *Essexia* à *D. Dale* ostensum, & alibi. *J. Bauhino* *Genetz*, *Balfiez* & *Mumbelgardi* frequentè & copiosè Maio Mense florentem observavit.

Gramen cyperoides sparsa panicula Alta Porta Park.

Quenam planta sit Botanici Londinensibus inquirendum relinquo: an *Cyperus* supra descriptus, An *Cyperus* VII. seu longis inodorus sylvestris. An fortè *Graminis* juncoi quoddam genus. An nova & non descripta *Cyperis* species: quæ tunc curiosos vestigatores lætèmus effugit, & soli *Parlinsoni* se conspiciendam præbuit?

11. *Cyperus esculentus* C. B. *Trach* J. B. *Cyperus dulcis rotundus esculentus Trach dulcis vocatus* Park. *Cyperus esculentus seu Trach Italorum* Ger. *crac. Sweet Cyperus*, 07; *Russ. III.*

C. B. Col.

Radices est tenuibus, fibrosis, à quibus globuli rotundi, velut exigui bulbuli, ut in *Cypero*, dependent, qui ex aliqua parte magis exuberant, extremam divisiõnem habentes, ut *Mali Punici* fructus, *Mespili* æronum æmulantes, paucas lineis per obliquam circumductis ac si pluribus partibus conjunctis consistant: aliquando cicutum, aliquando fabarum magnitudine: vel ut *Columna*, magnitudine & formâ ad fructum minoris *Mespili*, ex genere *Scorante* acidentis, cortice scabro & rugoso, cum efficitur per transversum ut *Arundinum* radices strato, exteriori rufescente, qui exortia innoxia, idè sine cortice dici possunt: carne candida, solida, nec odora, nec medicata, sed sapore grato, alimentoso, dulcique & *Castaneis* proximo: foliis *Cypero* æmulis, arundinaceis, oblongis, dorso eminentie triangulæ & acuminatis caulis subulibus, angulosa, in quorum cacumine alia folia minoræ, Restiarum modo disposita: inter quæ flores Julio exorunt spicati, sive panicula *Cyperis* subflavescentis. Omnia verò quæ in *Cypero* rotundo breviora ac minoræ.

Nascentur in agro *Veronensi*; & alibi etiam, quæquid dicat *J. Ponsa*: in *Siciliæ* extremis arenosisque oris *Austro* expositis, aitore *Columna*. Nos etiam in *Sicilia* collegimus & asservamus hujus ut suspicamur caulem cum panicula, quæ bene respondet iconi à *Columna* exhibitæ, differt autem à panicula *Cyperis* longi *Montepellilani* quod minus sparsa sit, quod specie squamosæ eam componentes multo laeviores sunt, & plus duplo longiores, quodque magis confertæ & plures simul in uno pediculo committunt: color tamen non distat. Radices ob festinationem non eruimus.

Hanc speciem caulem nunquam profertur aut florere nec *Jo. Ponsa*, neque *Geinens* ipse mihi persuasit: alibi fortè, ut in *Veronensi* agro, raris profert. Nullam plantam perfectam florere & feminis carere concesserim.

12. *Cyperus Indicus* Bontu.

Bontu.

Herba hæc in summa quantitate circa fluenta *Java* crescit. Radices eam tuberosæ sunt non secus *Piperis* ac *Chambalani*, odore plane aromatica & *Caryophyllos* referentis. Unde eorum decocta per aliquot dies sumpta nervorum frigidis affectibus humore conductant, impennis multum adterunt levaminis in tremore seu *Paralytico* isto genere quod *Arabum* *Indis* dicunt. Inde mulieres hanc plantam etiam cœcis mentibus adhibent, nam diuretica admodum est. Ideo hydropticis quoque convenit.

Sal ex cineribus inde est conficiendis exsiccatis in ulcoribus præsertim tabacum & palmi *Cyperis* cunctis permixtis etiam inspergi solet.

An quæ differat à supra scriptis *Cyperis* neque ex descriptione, neque ex figura cœcis colligere possumus.

CAP. II.

De Papyro.

Papyrus nisi nomen peculiare sortita esset, ob caulem triquetrum Cypero potuisset accenseri.

Papyrus Nilotica Geer. J. B. *Antiquorum Nilotica* Park. *Nilotica* five *Aegyptiaca* C. B. *hinc Papyrus Syriaca* vel *Siciliensis* quidem & Park. No; enim non distinguimus. *The Paper-herb.*

Hanc ita describit eruditiss. Vespugius: *Arsurgit ab Arundines fibrosisque radibus* [Cesalpini radices lignosas, crassas, Harundinis modo geniculatas, numerosa subole in obliquum tendentes, sapore & odore Cyperum amulantes, sed intrinseca, lumbas Papyro Siciliensis arabicis] circa Nili Ragnantis ripas *caulis* numero, triquetro, non raro septem costarum mentorem speciosa proccuritate cum equante, tum superante. *Folia* circa utrumque scopi extremam, inferius ampliora Sparganii Cyperive instar repanda, superius minora, quae radiatum veluti calycem emittunt sube subscunt. Denso staminum ordine stipatum caulis fastigium castricum exprimit, & circa limum supra prostrati florei apices obliquatum circumplexati hederam thyrsum effingunt. J. Bauhinus sic floream comam describit. Floribus est perquam speciosis & luculentam in ambitu castricum effigiantibus, numerosis gracilibus thyrsum, denso & equabili comarum stipatu, & apicibus prominentibus, Ferule in modum collectis, non ut Cyperi sparsis: nimis ornate & minus clare. Cesalpini comam latam, ex numerosis parvis junctis triangulis constantem, in quorum summo flocci rufi, ei ascribit; *magis perspicua.*

Papyrus, quam Cesalpini in horto Pisano aluit, ex Sicilia palustribus delatam, quam, eodem anno, in Sicilia vulgo Pyperum vocant; quam J. Bauhinus in horto dicto Cesalpini benevolentia vidit, nobis non aliter discurrere videtur à Papyro Nilotica Veterum quam magnitudine aliique accidentibus à loci diversitate ortis: namque J. Bauhinus eam etiam Cesalpini ipse distinguunt; aliter quam magnitudine.

Frax & Ulex.

Ex Papyro olim charta fiant ad scribendum usum, conficiendi modum vide apud Plinium *lib. 17. cap. 11, 12.* Hec ante reperta fruges Aegyptiis alimentum [omnes enim Aegypti incolae & crustam & elixam & asiam manducabant, & succum devorabant, manducamentum autem expectant] stragulas, navium contraxum, vasorum utensilia, florem ad coronandum Deos, & calces horum sacerdotibus praebebat. Radix in usum ligni coquebat. Charta, refertur Alpino, foliorum modicis utuntur ad uicerum ora dilatanda. Ex scopis combustis cinere recentia ulcera curant, qui etiam maligna *supra* (si saepe aspergatur) non finit. Ex scopis recentibus aquam destillant ad oculorum inflammationes, caliginos ac obcuritates maxime proficiunt.

Charta ex Papyro in delinendum obscurat; novo chartarum artificio circa Annum 1470. (quo tempore ex Gallia duo viri Antonius & Michael in Germaniam & Basiliam veniunt, & locum actum illam antea Germanis ignotam amulorum) invento; Linex falsis usi devisa & haecida tandem tandem machina aqua motu donec in succum dissolvantur: hanc optime aqua dissolutam, non sine glutine, & coarctantibus, cribris excipiunt, qui flocci crassitiam retinentes, paginam reddunt super stramentum ad usum parata, quae ad priorem imitationem Papyri quoque nominatur, eo quod eandem nobis usum praestat quam cum Aegyptiis Papyrus praestabat.

CAP. III.

De Juncis & Gramine juncea.

Juncus caulis teretibus, fungis, panicula vel in summo caule effertente, vel ex quo latere inferius exserte, & multis lamellis marginalibus compositis à reliquis graminifolis distinguitur. Gramina juncea à Juncis distinguuntur caulis foliis articulatis. Folia etiam in his non tempor teretia sunt, sed in nonnullis speciebus compressa, in omnibus tamen fungosa.

Notandum etiam nos communem Botanorum sententiam socios nonnullas species Juncis admiscuisse, quae ad hoc genus proprie non pertinent, ut v. g. Juncum acutum maritimum Cambro-britannicum, Gramen tomentosum, &c.

Juncus autem à jungendo dicitur, quod cum flexilis sit, res eo jungi possint.

p. 1. Junci.

A. 1. *Juncus acutus* capitula *Sorghii* C. B. *maritimus* capitula *Sorghii* Park. *jugens*, seu *Juncus acutus* capitula *Sorghii* J. B. *Pucking large* Aca. Russ.

J. B.

Dense stipatos tolle *callos*, filicicabales, crassiusculos, rigidos, cortice spisso, medullis solidiusculis, albis, quos basin à radice, crassis fibris contexti, involvant *filicibus* vaginis, rubentibus, dodrantem circiter longe, conicantibus punctata crassa, Squa Austriaci formi non inter costam, qui hic

hic ruffas, emulantibus. Infra mucronem autem calicorum pungentem tribus quatuorve pollicibus exsunt florum seminibusque glomerata *capitula*, [liberotunda, splendens, fusca, Sorghi amula, *semen* minutissimum, oblongum, & subfusca continentia] quorum exortus subiectum est folium, indidem erumpens, ex latiore principio vaginam imitata, in acumen definita.

In arenosis cumulis ad Occidentale Cambriae litu Merionethense copiosissime oritur. C. Bauhinus circa tharmas Apomianis frequens esse ait, ut & non longè Montspelo ad pagum *Perandi*, imò in tota illa ora maxima passim provenit.

A. 2. *Juncus acutus maritimus capitula rotunda* C. B. *acutus maritimus alter* Park.

C. B.

Hic multò procerior est [precedente] inquit C. Bauhinus, [imò nobis observantibus nihilo procerior:] *radice* crassa, lignosa & nodosa, fibris capillata, ruffo cortice obducta: *calami* sive scapi permulta, duos cubitos superantibus, ad exortum ruffi tumuli operis, fungosi medullæ factis, in vertice mucrone pungente duplici, altero sepe uncia quatuor capitula superante, altero brevior, deorsum reflexo: inter quos scapi distant, pediculi prodeunt, foris leves ac teretes, intus veluti canaliculati: *capitula* parva, rotunda, aspera, Spargani formâ sustinentes: nonnunquam verò *capitula* plura, aspera, conglobata sine pediculo proxime eandem amplectuntur; quibus mense Junio *flos* capillaceus & candidus insidet, seu lanugo mollis, nivea & tomentosa ustis barbulae propendit.

In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi ad maris litus valde frequens est. Nuper etiam in Anglia *Loc.* detexit, in comitatu Somerseti D. Stephens.

Ex medulla & elychnia & alia à circulatoribus frunt, unde columbas commentitias volitantes, *Ux.* atque aere sese liberantes constatas vidit Lobelius. *Adv.*

A. 3. *Juncus acutus maritimus caule triangulo* C. B. Park J. B.

C. B.

Radix est repente, fibrosa: à qua alie radice prioribus exsiccata nascuntur: hinc *cauli*, quos ad radicem brevia *folia* tangunt, pedales, trianguli exsurgunt, & in extremitatem pungentem definiunt, & paulò infra fastigium à latere floccos racemosis rufescent, ex granulis tribus lateribus donatis constans, exit.

In maritima propè *Frontignan* & *Perand* oritur. Apud nos ad ripas Thameosis fluvii tam supra, *Loc.* quam infra Londinum, ut à fide dignis mihi relatum est: quamvis ipse nec ibi, nec alibi cum haecenus viderim.

A. 4. *Juncus acutus maritimus Anglicus* Park. *English Sea hard grass*.

Eodem modo radicibus se propagat quo alii Junci. Sunt autem scapi seu calami sesquicubitaliter aut altiores, teretes, leves obscuris virides, duriores & solidiores multo quam Junci levis vulgaris, medullæ densi & solidi factis, aboqui magnitudine illi non multum cedunt; ad apicem tribus quatuorve thecis squamosis ex rubro nigricantibus cincti. E scapo in sumum excavato, & in duo cornua, altero admodum brevi, diducto, sesquipedaliter aut dodrantali ab apice distante, erumpit *panicula* ampla, in plures partiales *panicula* divisa, una præ aliis longo pediculo insidente & supra reliquis eminenti ac si separata esset. *Panicula* in latitudinem minus diffusa est quam Junci levis vulg. colore albi spadicis unicolori intermixto, valculi triangularibus composita.

In maritima palustribus copiose oritur, ut, v. g. circa Camalodunum in *Essexia* & ad Occiden- *Loc.* tale Cambriae litus.

A. 5. *Juncus acutus* Ger. *acutus vulgaris* Park. *acutus panicula sparsa* C. B. *An Juncus foliatus* J. B. *Common hard grass*.

Radix propè terram superficiem obisquæ incidit, fibris frequentibus sulcis demissis firmiter deputata: Plurimi inde conferti junci à capitulis seu gemmis crassis & velut bulbosis squamis membranosis spadicis splendentibus obvoluti erunt. Hujusmodi membranosi folliculi, spadiceo colore splendentes, ac si politi essent, intimo reliquis multò longiore, intum juncum ad palmi & amplius longitudinalinem involvunt & obvelant. *Junci* sesquicubitaliter sunt & altiores, graciles, teretes, strati, cortice crasso, medullæ intus pauci, non tamen naves, è radicibus omnes oriundi, nulli (quantum nos observare potuimus) ex aliorum fimbis, ut scribit Dodonæus, cumque loci alii plerique Botanici. Forte alium & à nostrate vulgari Juncus acutus seu durus diversum describit: in acutos mucrones erunt; infra quos ad dimidii plus minus pedis distantiam erumpit *panicula* sparsa, rufescentis, semen in valculis.

In pascuis & ad vias publicas solo humidiorè passim provenit.

Junci *panicula* arundinacea descripta apud J. Bauhinum in multis ad Juncum nobis descriptam accedit. *Loc.*

A. 6. *Juncus montanus palustris*. *An Oxysiphum sive Juncus acutus Alpium Comitatus Britannicus* Park? *Wolfs grass*, *Goose-corn*.

Fibris masculis rubentibus radicanat. *Folia* numerosa, non erecta, sed plerumque supra terram expansa stela in modum, brevia, dura, acuminata, non exactè rotunda, sed superna parte canaliculata, unde rectius fortasse ad Gramina quam ad Juncos referendum est hoc genus. E modo foliorum exurgit *caulis* dodrantalis aut pedalis, firmus, medullæ factus, uno tantum folio propè terram cinctus, cetera nudus, juncum in summo *paniculam* gestans, è pluribus partibus compositam, quæ singula è singulis foliis, quod in caule ad eorum basin consistit emergunt. *Flos* Graminis huius exilis, hexapetalus.

hexapetalos, cum totidem in medio staminibus fimbriatis luteis. Succedunt capsula majuscula, fibro-
sunda, semen continentes.

Loc. In montosis palustribus solo spongioso & putrido per totam Angliam copiose nascitur: ut loca
indicare non sit opus. Prope Londinum in ericeto Hampsholensi.

Figura & descriptio Graminis juncei maritimi majoris apud Parkinsonium huic nostro convenit.

Parkinsonius speciem hujus minorem habet, quam vocat *Oxychontium* sive *Juncum acutum* mi-
norem, p. 1192.

A. 7. *Junci aquatici maximus* Ger. *levis maximus* Park. *max. holschianus* J. B. *Junci*
maximus seu *Scorpus* C. B. *Dul-ruff*, or *great Water-ruff*.

C. B.

Hic magnitudine & crassitie reliquos superat, & proceritate Typhæ æqualis est: ex radice crassi-
tudine fere cubitali, gemculata, hinc inde per terram repente, cortice atro-rubente intacta, intus
candida scirpa seu juncei hominis altitudinem superantes, murum digiti crassitie, virides (quæ califi-
cati albescunt) rotundi, nodos, medullâ candidâ, molli & fungosâ sarchi amollantur: quorum ca-
cumibus scorpiis reclusis petiolis intra canaliculâ, foris teretes extenduntur, qui summo apice floccos
seu paniculas ruffas, inæquales, squamatum compactas meta figurâ, interne latiores, superne acu-
minatiores sustinent. Semen Milli magnitudinis, triangulum, alterâ parte compressum, altera dor-
so elato succolito.

Hic ob fungosam & foraminulentam medullam levissimo vento facile hinc inde, instar Arun-
dinis vulgaris agitur.

Loc. In fluminibus, piscinis & stagnis majoribus, aquas semper habentibus invenitur.

Ufus. Juncorum multiplex usus est, ad tegenda, scabellâ pedum, ad cathedrarum sedes, sportas, &c. Inter
Indos ad tapeta, stragula, pileos, &c.

Juncus seu *Scorpus medius* C. B. Park. *Sylvaticus Tabernemontani* J. B.

A precedente magnitudine potissimum differt, & in sylvis sed locis aquosis provenit: unde *Juncus*
sylvaticus Tabernemontano dicitur. Plurimum descriptioem videtur apud J. Bauhinum.

A. 8. *Junci levis vulgaris panicula sparsa nostræ*. An *Junci panicula arundinacea* J. B.?
Jun. levis panicula sparsa major C. B.? Park? *Junci levis* Ger? **Common soft**
ruff.

Ad bicubitalem aut majorem altitudinem assurgit, scapa teretibus, erectis, minime nodosis, cul-
mo crassioribus, viridibus, glabris & nitentibus, medulla solidiore & densiore quam in sequenti
specie, unde ad ellychnia aptiores sunt, in mucronis acutos desinentibus. Dorsantali cu apicem
spatio erumpit panicula sparsa & late diffusa, saltem in locis ubi humor abundat, alius enim paulo
compactior est: in petiolis tenuibus valculis præpendent, multo quam in sequenti *Juncus* minorâ,
pallidiorâ, quamvis planta ipsa major sit.

Loc. In aquis ipsis aut juxta aquas.

Hujus medullæ usus est ad ellychnia. Ex cortice texunt funes in agro Staffordiensi, vide *D. Pic.*

A. 9. *Junci levis vulgaris panicula compactior*. An *Junci levis vulgaris* Park? An *Junc.*
lev. glomerata flore eisdem? *Junci levis panicula non sparsa* C. B. **Round head-**
ed ruff.

Hic à precedente differt caulis striatis, medullâ rariore & spongiosiore, unde ad ellychnia
inutilis est, panicula compactiore & valculis feminalibus majoribus, superioris seu cacumini propius
erumpentibus, tempore denique florentis maturiore.

Loc. In piscinis & sylvis locis humidioribus copiose generatò oritur, cum superior plerumque in aquis
tandem aut juxta aquas: locis certe humidioribus quam hoc loco descriptus.

Juncus Matthioli figura apud J. Bauhinum huic convenit, non item descriptus.

• 10. *Junci tenuis medullâ profusa nervol* Hist. Ingl. J. B. *Junci levis aliter* C. B.

Parum differt à *Juncus* levi vulgaris panicula sparsa: ut necessariè an planè distinctus sit.

• 11. *Juncus cæcuminis reflexi major* C. B. J. B. Park.

C. B.

Radix nititur capitata, & quâ parte alia aliis adherent & incumbent, leviter compressâ, cortice
nigro obductâ, fibrâ plurimâ dorsum & ad latera emissâ, & in unum cespitem coactâ: *Scorpus*
est sesquicubitalibus, ad exortum tunica atro-rubente & splendente tecta, qui infra cacumen incur-
vatum, pedis fere spatia, ad latera scirpo filis, plures pediculos emittit, qui foliacea, membranosa
& oblonga valcula, in quinque apices filis sustinent: quæ fructum angulosum, nigrum niemo se-
men, sæpe flavo, referunt continent. Vel, ut Ruellius, Melancranis seu *Atrocis* dicitur: fru-
ctum gæte utramque coherentium modo, in quibus cuspidatum semen clauditur. Aquei & siccio-
siter saporem.

Loc. Nascentur in aquosis & pinguibus locis, sed pura & præterlabente aqua fere madentibus.

* 12. *Juncus acuminatus reflexus* aliter C. B. J. B. Park.

Caule est selsquicubitali, rotundo, levi, apertillo: panicula umbellae simili, atropendente, pediculis carente, filamentis caeruleis, (ut in Aphyllanthe cornuta) donata: quam *caulis* duarum triumve unciarum, acinus sed mollis, patissime reflexus superat.

In Provincia Galliae provenerit.

Linn.

A. 13. *Juncus trifidus* J. B. *acuminatus reflexus trifidus* C. B. Park.

J. B.

Ex *radice* nigra, geniculata & fibrosa, longiuscula scirpi producuntur plures, dodrantales, valde tenues, quorum singuli per extrema in tres stylos palmares, tenuissimos, acutos funduntur: interque hos ad exortum videtur panicula paucis, exigua, ex rulo fusca.

In monte Fracho Lucernanum, inque Pyrenaeis & montibus Moraviae provenerit.

Linn.

A. 14. *Junculus unguis minimus*, Chamæschonis Ad Lob. *Junculus Labellii* Park. An *Juncus bonifii* J. B? An *Junculus unguis* sive *Chamæschonis* C. B? *Chir leati* Russ.

Transversam agit radicem, in superficie terre repentem, è qua obiter hinc fibrae albentes demittuntur, inde surguntur Junci crebri, qui paniculas producunt, tres uncias aut intermedium palmum alti, nodos, unico vel altero ad basin foliolo cincti, seta equine crassitudine aut etiam tenuiore, erumpentes, prope apicem ad latera, ut in aliis Juncis, paniculis brevibus compactis habitioribus (ut mihi videbatur) squarosis, absque pediculis, plerumque duabus, interdum uno, carens tribus, colore primum viridibus, tandem nigrescentibus in cinereo. Imo Junci & transversa radix spadicem sunt.

In arenosis & glareosis humilibus oritur.

Linn.

15. *Juncus exiguus montanus, mucrone caetero* C. B. Park J. B. An *Juncus hibernicus tenuis* Thalii?

Radix est pusilla, nigra, capillacea: *cauliculis* quatuor vel quinque unciarum, cum summo *capitulato* parvum, ex rulo purpureo, quadrifidum, in exiguum, rigidiusculum filamentum abiens infidet: *foliolo* ad cauliculi principium tria, juncta, unciam longa.

In Taurero Rastadiensi Austriae monte provenerit.

Linn.

A. 16. *Juncus Lycop panicula glomerata nigrescens* C. B. *luteiformis* Semm Hort. reg. Blaf. & Paris. Bocan. Mant. *Round blatt-headed* Marsh-Russ, or *Dog-Russ*.

Mey.

Radix habet ex multis fibris nigrescentibus, in unam cespitem coacervatis, compositam, unde plura *folia* palmaria, triangularia producuntur, inter quae plures ornantur scirpi cubitales, quorum unumquodque capitulum spadicem producit, scirpo adhaerens, ex variis foliulis compositum, in quibus semina alba, splendens, Licholperni majora seminibus minoribus continentur. Folia & scirpi versus radicem colorem habent atro-rubrum.

Provenit apud nos locis palustribus, perulo & spongioso solo ut v. g. Hannia & Teresham maritica prope Cantabrigiam. Repertur etiam circa Montspellum: unde à P. Magni pro nondum edito descriptis & describitur.

Linn.

A. 17. *Juncus parvus calamo supra paniculam capitulum longius prodeh*.

Semipodalit altitudine assurgit, *scirpo* tenui, gracili, panicula compacta, totius circiter totius longitudo parte à summo scirpi mucrone erumpente.

Tribus hisce notis, 1. parvitate sua; 2. panicula compacta; 3. scirpo supra paniculam longissime prodeh, ab aliis Juncis facile discernitur.

In Weisthorlandia non procul ab oppido *Ambleside* dicto invenit D. Newton.

Linn.

A. 18. *Juncus capitula Epipleti* C. B. *equaticus minor capitula Epipleti* Gec. Park. *Epipleti longi*, sive *clavatus* J. B. *Club-russ*, or *Agri-head* Russ.

C. B.

Radix est geniculata, Graminis aut Arundinis modo serpente, & innumera fibris impleta: scirpi cubitalibus, aliquibus tamen ad radicem duarum & tridem unciarum, ad exortum lubrico coctis tunc, tunc & fungos mollii pluri, equum verticibus capitula exigua, rufescentia, aliquando rotunda, aliquando oblonga, Alparagorum Epipleti vel clavae instar videntur: sive candidantes & villosa, in basi expositos. Mase & Juncis molliibus emittit. Septembris mense in hoc, quamzardum in localis luxurians grata, oblonga, nigrescens, dux, immixtus alba videtur.

Varietas obiter in Hyle vel scirpi, altera enim triplo laevior, aliam angustiorum sunt.

In rivulis tropantillans est: reperitur etiam in aquis stagnantibus.

Linn.

A. 19. *Juncus capitula Epipleti minor & squarrosus* C. B. *capitula Epipleti parvus* C. B. Park. *Fluting Club-russ*.

C. B.

Ex *radice* capillacea parca tenuissimis recurvis prodeh, qua in partu Junculis duarum triumve unciarum subsistitur, quorum aliqua erecti, aliqua reflexi capitulum minimum sustinent, & Junculis singulis foliolum tenue, capillaceum adponitur.

In

In Angliæ aquosis fluitat autore Gallenio.
Hanc speciem nos nondum vidimus: sed aliam à D. Rob. Plut. in historia naturali Oxoniensi ti-
tulo

A. 20. *Juncus omnium minimi capitula Equiseti.*

Quæ è radicibus capillorum instar tenuibus exurgit sote equine crassitie, altitudine tres uncias non
excedens, clavam in apice parvam alioquin hujus generis in modum, sustinet. Notandum autem
Juncum hunc non ramosum esse in modum præcedentis, sed simplicibus scapis à radice exurgere.

In paludibus communis Bellen humida totis prope Islandiæ fluvium. Hunc nobis communiavit
amicissimus vir seuque herbariarum peritissimus D. Dodsworth.

A. 21. *Juncus Alpinus cum cauda leprina J. B. Alpinus capitula lanuginosa seu Schenulagrus C. B. à capitula hanc nostram lepram cauda distincta. Gramen junceus lanuginosus aliorum Danicorum Park. Dares-tail-ruff*

J. B.

Crebris ex parvis radicibus surgit culms, dodrantales, interdum cubitales, striatos, foliis pro-
pter terram stipatos, quæ & ipsos culmos aliquoties involvunt, alioqui juncea folia in stylum ex-
eunt acutum, panisque supra radicem rufescentia sepe in fibras comosas siccant. Ceterum singu-
læ culmæ in echinatum caudam, canescentibus, tomentosis squamis compactiliter fastigantur,
mollis holosericum provocantem. Radicatur denique fibres aliquammodum fragilibus.

In palustribus putridis & comosis quas *Woffes* vocamus, ut v. g. in *Wiltmols* in Lancastria,
Eilemere meers in Salopia, prævalent. Inque montibus solo spongioso, aquæ bibulo & car-
noso.

A. 22. *Juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti. An Juncus montanus parvus cum parvis capitulis latis J. B. Dwarf Rush, with small Eglet heads.*

Purpureis fibres crassiusculis fibulatis, albi in terram demissis, crispis & velut undulatis radican-
tur. Imam junceam partem squamis crebris, pellucidis, nigricantibus obvolvunt, ut in alia sit. Styli pal-
marum teretes, latis firmi & rigidi in ipsa summitate capitulum exiguum gestant ex spadicis nigri-
catis, unde filamenta seu filamenta numerosa sicubi flavicantia erant. Folium in singulis cau-
libus unicum præbetur.

Majo mensis fuerit.

* 23. *Juncus Alpinus hibernicus C. B.*

C. B.

Ex radice aliorum Juncorum simili folia juncea exurgunt inter quæ culmi plures tenuissimi, palmo
minores, qui capitulum parvum lanuginosè albi ornatam sustinent.

In montibus Moravia: & in locis udis vallis *Grödelwald* Bernatum.

A. 24. *Juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti. Juncus parvus montanus cum parvis capitulis latis J. B. Dwarf Rush, with small heads.*

Longissimas fibres Juncea hac montanus illos crebris demissis radican-
tur. Stylis emittit palmata
aut dodrantales, teretes, multo foliorum propter terram involucri obfidos, qui cetera æquabile cro-
dela, in summo fastigio capitulum gestant duplo triplove brevius quam Juncus clavatus, inter squa-
mas longiores emicantibus foliulis latis.

Descriptio hæc & figura J. Bauhini latis apud respondet Junco à nobis sæpe observato in præ-
valis & locis palustribus circa *Mullin* in agro Warwicensi, & alibi in Angliæ. Fibre duntaxat
radicum venustiores non recte sunt, sed hæc illac reflexæ, & velut undulata. Imam Junceam
partem squamis crebris, pellucidis, nigricantibus obvolvunt.

Juncus filatus novimus J. B.

Cum nihil dubium sit quo referri debeat, omnino eam descriptionem apud J. Bauhinum requi-
ramus.

§. 2. *Gramina juncea.*

A. 1. *Gramen præteritæ tomentosæ panicula sparsa C. B. tumentosum Get. Gnæthaliæ Tragi, seu Juncus hibernicus J. B. Gr. juncea lanuginosa, vel Juncus hibernicus vulgaris Park. Cotter-grass.*

C. B.

Radix nitida crassa, fibrosa, rufa: folia est graminea, inter quæ culmi teres, crudi, paniciformis
cubitalis & bicubitalis exurgit. [Eam altitudinem apud nos in Angliæ nunquam quæd ego viderem
alligantur, at ne cum illam quidem] ex capsâ summæ particula tomentosa, Gestisio mollis &
tomentosa, nitida candore licenti ex paniculis, aliquando brevibus, aliquando oblongis, qui ex pe-
diculo quodam sine membranæ foliulo, ex tubo nigricante, obovato vel ovato profertur,
Junco de Julio mensibus dependens. Inter tomentum ad pediculum formæ oblongæ, triangulæ,
acutæ, rufa habetur.

In paludibus usque humida & siliiginosa præto oritur, & lanuginosa tomentosa à longè conspicua
se præbet.

Vi poller adstringens & condensans, quare in vino nonnulli decoquant propinquant, alii pro-
fluvio ac colica ab eadem causa exorta laborantibus. Lanuginis copia si haberi possit, tertio
operi fortè non incommoda foret.

Illandi lanuginos pappirive nate aut in elychnis contorquere vident, super quod dum liqua-
factum seorsum concretat, aut id sebetur, conficiunt sibi domesticos in usus candelas præcipue cla-
ritatis, quæ elychnis gossipinis & candela cereis anteferenda sunt: imò momentum horum graminis
in elychnium contortum hoc peculiare habet præ Gossipino, ut cum quis bipartito horum graminis
candelas Illandicas cum loco partiri gestat, non opus est cultro ad eas in frustra scindendas, quippe
ille instar fumo induratarum Lucanicarum Lubocensium aut Brunsvicensium lapidorum alia vul-
garibus, vel cæulis aut raparium Bartsfeldensium in modum facile distringi aut decerpi queant.
S. Pauli Q. Botan. Claf. 7. p. 125.

- A. 2. *Gramen junceum foliis articulato aquaticum* C. B. *junceum aquaticum* Ranboni Park. *aqua-
ticum* Tab. Ger. *Juncus foliaceus capsula triangulari* J. B. *The lesser Rush-grass, with
jointed leaves.*

J. R.

Magnitudine non parum variat, aliis palmaribus, aliis plusquam cubitalibus culmis, nodosis,
compressis aliquantulum, fungosis, ramosis, striatis. *Folia* & à radice statim, & ad genicula culmum
aliquousq; amplectentia graminea, acuta, articulata: scæulis, è culmo dirido exactis, & ad divar-
icationem insident capsellæ quinque, sex, plures pauciorive simul junctæ, triquetra, oblongæ, mu-
ronatæ, ex rufo nigricantes, nididæ, *semina* claudentes perispilla, ruffa. Sed & culmulis aliis per-
brevibus, oblongis aliis spæe quardam velut excrementitiæ, & ex foliaceo quodam genere squamæ
rubrescens, insident: vna præsertim & apricis hoc crebro evenit locis, ut circa Monthebergardum &
Basileam in palustribus Michelsfeldensibus: [apud nos etiam circa Cantabrigiam & alibi] *Radix*
qualis Junci, fibris admodum capillata, usque longis & juxta terræ faciem cocumbens serpit,
adeoque si culmi terram attingerit ex articulis fibras demittunt terram denuò comprehendentes.

In vdis & palustribus ubiq; terrè reperitur.

Less.

- A. 3. *Gramen junceum capsulis triangulari minimum, Graminis junci varietas minor* Ger. *cinac.
The least Rush-grass, with triangular Seed-Vessels.*

Præcedenti similis est paniculi pariter sparsi, capsulis triangulari spadicis, sed multis numeris mi-
nus, ut quod palmarem altitudinem vix assequitur. *Folia* juncea, capillaria, an vero articulata
in tanta parvitate discernere non potui. Fibris pro plantulæ modulo majusculis albescentibus ra-
dicatur.

In locis palustribus vdis, & ad rivulos frequens reperitur, ut in aquis Ericeti Hamstodiani
propè Londinum.

Less.

- A. 4. *Gramen junceum aquaticum magis sparso panicula* Park. *An Gr. junceum sylvaticum* Ger?
junceum foliis articulato sylvaticum C. B. *Water-Rush-grass, with a sparsed pa-
nicle and jointed leaves, the greatest.*

È radice transversa, in summa tellure jacente & repente, tum dorsum multas eruntit fibras alias
crassiores, alias tenuiores; tum sursum multos erigit caules, sesquipedales, *Folia*que, tribus plerumq;
geniculis interceptos, totidemq; foliis cinctos, quæ infima parte vaginæ instar eam includunt, de-
inde cum ab eo abscedant ad semipedalem longitudinem extenduntur, suntque totis concavi, &
crebris articulis intercepti. È culmo paulo eas apicem erumpit panicula, cum planta in aquis & hu-
midioribus nascitur magis sparsa & pluribus capsularum agminibus composita quam in præcedente.
Quantum autem planta ipsa major elatior & fir quam illa, capsule tamen seminales minores sunt,
nec adeò obscure nigricant.

In aquis provenit, non rarò etiam in sylvâ humida.

Less.

- A. 5. *Gramen junceum capsulis triangulari scæulis tenuibus, foliis ad nodos & panicularum di-
varicationem triquetris.*

Radix est tenuibus fibris capillatis, oblique actis. *Folia* & *cauliculi* non adeò densa & con-
ferta oriuntur ut in plerisq; junca. *Cauliculi* tenues & infirmi, longitudine semipedali, ad nodos
superiores folia prælonga emittunt. Panicula varis sparsa, capitulis longius à se invicem remotis:
è medio paniculis seu capsulis egerminant foliola multa capillata, alia simplicia, alia capsulas semi-
nales sustententia seu singulares, seu multas simul, è quorum medio, sursum erumpat alia folioleum con-
geries, pari modo se habens. Capsule seminales, quantum in tanta parvitate discernere potui, tri-
quetra sunt. An foliola articulata sint necne me legit.

Observavit D. Dale loco paludoso propè Beaxod magnam in Ericeto de *Tipton* in *Essexia*: item
loco consimili in ericeto propè *Barnwood* oppidam.

Less.

- A. 6. *Gramen junceum maximum* Lob. Ger. *cin. Gramen junceum foliis & spica Junci* C. B.
junceum maximum majus Park. *Juncus parvus cum pericarpio rotunda* J. B. *Rush-grass,
with round seed-vessels.*

J. R.

Palmare serpe, aliquando cubito nequaquam minoris, proferit culmos junceos, foliis circa innum
multis gramineis, statim è radice obliqua, juncea, fibrata crebris donata: quorum scapus in umbel-
lam

lum inconditam Filiperidale modo explicatur, cuius capitula singularia posita, rotunda folliculis nigricantibus semine obvoluntim gestant, tandem in tres coles carinas desolant.

Loc. In pratis humidioribus & palustribus provenit, non maritimis tantum, quantum ab copiosissime, sed etiam à mari procul remota.

A. 7. *Gramen junceum spicatum seu triglochis* C. B. *triglochis* J. B. *triglochis Dalechampii* Park. *marimum spicatum* Ger. *cruc. perperam*, cum procul à mari reperitur. *Arrow-headed grass.*

J. B.

Ex capite pendulis fibris tamibus complicatis radicebus nititur, *radices* tollens nudos, enodos, junceas, cubitales & sesquicubitales [rectius C. Bacherus pedales, rarius cubitales, quin potius apud nos didrachmales] interdum in locis squalidis palustres ferè; spicam à medio gerunt summo tenui longa serie *sefoli* turbinati, fœculi fœcè capitulorum Pyrolæ delapsis primulum floribus, non item magnitudine, [ex albo sublati C. B.] quas excipit serix nigra onatorum fructuum, qui acurgine coarctatis, inferius in triplicem barbulam alati, instar tridentis legitime distillant. *Folia* ab radice orta culmos comitantur palmaria & didrachmata, perangusta, plana.

Loc.

In palustribus frequens habetur.

A. 8. *Hyacinthi parvi* [sive *Gramen triglochis*] J. B.

J. B.

Oblongum habet comarimo, bulbam Allii Alpini in morem, simplicem albas, alias multiplicem, à cuius uno demissa fibræ radicanur. *Folia* tenuissima, glabra, palmaria, luteolum majora, tria aut quinque statim à radice occurrunt. *Cauliculus* durissimus, teres, gracilis, nudus, enodis inter folia surgit, palmaria & sesquipalmaria, longum gerens spicam, strobilorum luteorum (nisi saltem in sicca planta color) exiguum, è quorum medio proculatim stylus longiculus, ut ut cum eo sem rotat radiceonum capituli Pyrolæ delapsis floribus: Hinc stylus ille latis longo rixus pediculo triangulari apparet; in quo tria spicula superiora coherentia subeas delapsa, ut in percondente gramine.

Ego nihil ferè video in hac descriptione quod non conveniat gramini triglochis.

Loc.

In squalidis maritimo Gallie Narbonensis.

A. 9. *Gramen marimum spicatum* Claf. *aromaticum spicatum* Ger. *spicatum aliorum* C. B. *marimum spicatum alterum* Park. *Sea-spired grass.*

Fibra plurimis masculis, cum primò erumpunt albentibus deinde lutes radicanur. *Folia* ut in reliquis gramenibus agminatim nascuntur, juncea, superne plana, interne rotunda; sesquipalmaria & longiora. Inter folia exant spicæ palmares interdum & longiores, strobilis crebris purpurascensibus composita, singuli brevibus pediculis fulti; quibus succedunt capitula brevia, striata, per maturitatem in sex partes seu semina distillantia. *Cauliculus* spicam sustinens durissimus, teres, gracilis, nudus, enodus, palmaria & sesquipalmaria.

Loc.

In salis marinis ubique terè invenitur.

Male inscribitur hoc Gramen à J. Bauhino Gramen spicatum cum pericarpis parvis rotunda. Pericarpia enim non exactè rotunda sunt, sed oblongiuscula & striata.

* 10. *Gramen montanum Avenacum spicatum* C. B. *montanum spicatum* Claf. Park. *marimum spicatum alterum* Ger.

Claf.

Ex radice digitali, bidenta, interdum trifida, multis tenuibus fibræ superne donata capita multa producit, quorum singula *folia* sex, aliquando decem & plura, oblonga, crassa & nonnulla carinata, infima solo solo invicem complectentia, gustu amarissimo & calidissimo profertur: Ex quorum medio *cauliculus* palmaris, aliquando pedalis, firmus, rotundus, levis, nudus & enodus prode; qui in summo fastigio multos strobilos, ordine ab una caulis parte dispositos, herbaceo colore præditos, & in capitula conglobata profert.

Loc.

In pratis montosis Austriae & Hircyniæ reperitur. Similem atque in Flandria maritima frequenter legitur se narrant Clafus. Ego marimum ab his descriptis detestor [esse] [esse].

A. * 11. *Gramen junceum montanum subcrisellè* Spad. *Cambrobritanicum* Park.

Nobile hoc Graminis genus plurima tenuia, delicata, juncea folia, orbitum paulo minus longa emittit: inter que duo tréve *cauliculi* graciles didrachma circiter longi, foliis multò humilioribus, exsurgunt, in fastigiis gestantes paniculam seu capitulum parvum spicatum, squamosum, pulchre ornulicem, in fine seu medio ducum foliolorum membranaceorum, ima parte laterum, versus apices tennum, uno tamen semper altero longiore, sum.

Loc.

In altissimo quodam monte Cambriae, *Berwic* dicta, qui caput inter nubila condit, in herbis ferè perpetuis riguis, etiam cum valles & depressiora in circuitu sereno fruantur creto, Sole illucescente, à Lobelio observatum, qui (ut refert Parkinsonus) Nardi Gangju spicæ simili aspillati plantæ nomen ei imponere in animo habuit.

* 12. *Gramen junceum speciosum minus* Park.

Præcedenti per simile est, verum foliis multo minoribus, tres quatuorve uncias longitudine non superantibus, è duro leucophæo folliculo seu vagina radices capit inuolucris exantibus; inter quæ cauliculi aliquot exsurgunt, articulati, confimilibus foliis vestiti, capitulum paruum, Castanei coloris lucidi, quàm præcedentis minus, pro modo plantæ, duobus, etiam ei ut in illo appositis foliis, gestantes. An *Juncta* semine *Litholpermi*?

Gramen junceum sylvæ minus articulatis foliis Park.

Item,

Gramen junceides Junci sparsa panicula eisdem.

Et alias quas habet varietates *Graminis Junci* seu *Holostei Matthioli* apud ipsum requirendas omitto. Cum enim sylvas & prata circa *Altam Pœtam* pleraque eas varietates alere scribat; alii autem periti Botanici & curiosi Plantarum indagatores Londinenses in in locis *Graminis Junci* nullas præter supernas à nobis descriptas species invenerunt; *Parkinsonum* deceptum puto, & pro novis gramibus habuisse quæ jamjam ab aliis descripta fuerant.

A. 13. *Gramen junceum parvum sive Holostei Matthioli, & Gr. bufonium Flandricum* Park.
Gr. junceum Ger. *Gr. nemorosum calycula palustris* C. B. *Holostei Matthioli junceum* J. B. *Coad grass.*

J. B.

Matthioli *Holostei* vocavit plantulam, in palustribus obviam, palmum aut sesquipalmum altam, culiculis frequentibus, tenuibus, nonnihil rubentibus, & in ramulos plurimos divisa. Folia acuta, duas aut tres uncias longa, angusta, floribus secundum ramulos adeo, & in extremitatibus crebris. Succedunt vascula pusillum semen rufum, pellucidum claudens. Radices subsunt capillatæ.

An hoc *Coad grass*, i. e. *Gramen bufonium* dicitur, quia provenit in locis ubi bufones stabulantur.

* 14. *Gramen foliis junctis oblongis, radice alba* C. B. *Gr. junceum Dalechampii* Park.

C. B.

Radice est ex pluribus tenuissimis fibris albicantibus contexta: ex qua folia multa virentia, Junci modo rotunda, longa, etiam sesquipalmaria procedunt: ut & culmi tenues geniculati: Juba acuminata, è parvis utriculis conflata.

In frigidis & aridis reperitur, nonnunquam inter saxa ad roceria *Basilensis*. Simile est graminum *Leoni* *Junco Dalechampii*, qui suo florem *Arundinaceum* in paniculis purpurascentibus, gustumq; subdulcem tribuit.

* 15. *Gramen foliis junctis brevibus majori, radice nigra* C. B.

Cum descriptio hujus brevis sit, nec iconè illustretur, nec planta aliunde nobis cognita, quæ *C. Bauhinus* de eo habet apud ipsum *Leontæ* curiosius videat.

16. *Gramen junceum polysachion* C. B. *junceum minimum aquaticum capitulo squamoso* Park. *junceum aquaticum* Ger.

C. B.

Radice habet digitalis crassitie, per transversum latam, multis filis capillatam: culmi tenues, cubitalis, quatuor aut quinque, folia oblonga, angusta, ex internodiis prodeuntibus vestitis: Inter caulem & folium spicæ parvæ, ex atro flavescens, quatuor, quinque & plures, sibi invicem succedentes, prodeunt.

Humidis & paludibus gaudet. Forte *Gr. cyperoides leucanthem*, superius descript.

Leoni

* 17. *Gramen junctum maximum densi stipatum* J. B. Park. *Loeb. junceum, foliis & spica Junci minor* C. B. *junceum maritimum* Ger.

Loeb.

Radice & foliis est *Graminis marini* spicæ *Zelandici* similibus, duris & rigidis, cujus culmi spicæ gerunt *Junci aquatici*: alioqui maritimo *Gramine* haud malus est aut utilis.

C. Bauhino Radice cum *Gramine Junco* pericarpis rotunda convenit: Culmus est pedalis, foliis angustissimis, junctis, duris, firmis, quatuor unciarum. Culmorum summis spicæ parvæ ut in *Juncis* insident.

Ad litus *Middelburgicum* reperiri refert *Lobelius*.

Leoni

* 18. *Gramen junceum montanum capite squamoso* C. B. Park. *junceum ex monte Balde* J. B.

C. B.

Imum culmum amittunt folia pauca, dura, cæteroque nudam, enodem, dorsantalem, glomeratum è glumis candidis capsulæ limbo cæcunius gestantem: cui ad basin subjecta bina foliola acuta, adversa, alterum altero longius, parum tamen semantiam superant. Hæc *J. Bauhinus* ex *fissa*. *Caljar* frater sic describit,

Radix est parva, fibrosa, circa quam folia bene ternave, semipalmaria; coloris viridis, levis, enodus, nudus, pedem superans; cuius summo capitulum instat Phalaridis squamosum, in apicem definit, ex albo leviter rufescenti infidet; cuius utrinque folium rigidum subijcitur quorum longius unciam superans dorsum vergit; alterum (quod triplo brevius) recta effertur.

Linn.

Provenit in montis Baldi summitatibus.

Gramen junceum minimum capitula squamosa C. B. J. B.

Item, *Gramen junceum minimum altitatem epistemon* J. B.

Item, *Gramen junceum minimum maritimum epistemon* J. B.

Cum nec nobis, nec aliis cuiquam Botanico quod scimus post C. Bauhinum annovero, omittimus. Eorum histores sapis curiosior scire desiderat, C. Bauhini Prodrumum, Historiarum adeat.

Gramen junceum maritimum exle Plouffe Park.

Item, *Gramen junceum magis exle, paniculatum epistemon*.

Item, *Gramen junceum minimum Hisp. Matibula congener epistemon*.

Horum icones & descriptiones apud Parkinsonum videantur.

A. 19. *Gramen junceum elevatum minimum, seu Holostemon palustre ripari folio, capitula & semina Pijlla.*

Cauliculis tenuibus, infirmis, in terram resupinis, crebris articulis intercepis, nodis, ramulos emittentibus alteris adhuc divisis & lobosis, se propagat. Ad articulos foliola frequentia, Pijlla semper vixens folioeum annua, sed breviora, ut que leucitiam aut duas uncias vix excedant. Una cum foliis exant etiam pediculi nudi pari cum foliis longitudine vel etiam majore, spicam seu capitulum parvum, squamosum, Pijlla annulata sustinentes. Radices ramulosae capillate tenuitatis & gemulis demittuntur.

Ad nos transmissa D. Dodsworth. Invenio etiam inter Gramina sicca D. Philippi Skippou hujus specimina, a nobis collecta in Cambria prope *Malders* & alibi, quantum per oblivionem in Catalogo Plantarum Angliae illud omisi.

A. 20. *Gramen junceum, seu Holostemon maximum palustre capitula longissima filamenta demittit.*
The smallest Marsh-Plantain.

Folia albis mucibus & pluribus quam pro plantula modulo radicanit. Folia in orbem spargit crassa, succulenta, angusta, in terram reclinata, duos vel tres digitos longa. Caulis ex eadem radice plures vix digitum alti capitulum seu folioeum in summo gestant exiguum, compressum, unde exant quatuor longissima filamenta apicibus demissa.

Linn.

In palustribus & stagnosis sapis inveni, prope Cantabrigiam, Glacoviam, Pontancum, &c.

CAP. IV.

De Schenantho.

Schenanthus seu Juncus odoratus J. B. *Schenanthus Ger. Juncus odoratus aromaticus* C. B.
Juncus odoratus major Park. The Sweet-swelling Rush, or Camels-hap.

Radix nuda albicantibus, parvis, lentis, duris, lignosis, multis fibris exilibus summo cespiti sparsa (summodum adhaerens radices paulo crassiores, densae, geminatae, gustu valentissime rebus) Folia est palmum excedentibus, triticeis, robustis, crassis, ad radicem laevi, convolutis, & squamosis insertis, quae in terram condehrentem, nigrescentem, firmam, deficiunt, colore ad radicem albidiora vel subdura, prope verticem viridi, aut purpurascente, quae culmos ut in Aegyptio multi veluti nunciis aculei cingunt. Culmi multi ex uno radicum cespice, rotundi, nodis longi oberratione distantibus distincti, aliquando lignosi; non cum laevi, sed mollis fungui pincti tacti, & in summo graciles assurgunt; quibus secundum eandem genitrix serio Loli modo flos spicatus haerent, decedat, in quorum glomo aut calculis foen ribellis papposi tenuis, flosculi odore & sapore nodosa cum foliis insident. His semina (e quibus saepe apud Germanos planta excrevit) succedunt.

Ubi recens est haec planta, manibus confricata, pinguis est odoris & saporis non ingrati, licet videatur aliqua adesse amaritudo cum acrimonia, lucidenter linguam mordicante; quae tamen solis efficacior est in quibusdam febribus remissa Gramineis, valde tenuibus & carminis. J. B. Parkinsonus etiam observavit folia illa tenuia, juncea, quae in Officinae hunc passim habentur, multo acriora esse magis aromatica, quam caules, flores, aut radices: proinde, cum in defecationem abierint haec epistemonibus raris adferri.

Qui apud nos ex semine locerent multos pronit vel cespites seu capita e longis junceis foliis densis spicatis, & ramosa una parte amplectentibus, compressis, extrorsibus majoribus & crassioribus, internodiis pallidibus, tenuibus, rotundis, duris, rigidis, paulo supra radicem quovis apud nos nascenti

cente Junco gracilioribus, sapore acri & aromatico non injucundo, odore levi leni & delicato.

Park.

Nascitur, antea Dioscoride, in Libya & Arabia, latitissimas ex Nabathæa, proximas Arabicis *Lucu.*
Adfertur & ex Ægypto. In Campania & Apulia reperietur aine.

In Arabiæ provinciis, referunt Garzia, *Maccata* & *Calayate* tantæ copiæ nascuntur, quantæ in Hispania Gramen vulgare quo Animalia pascuntur. Sic et in terra Sanctæ videnda gratia in Orientem proficiscuntur testantur negotiatores ex Syria Alexandriam ducere Camelorum greges, quos *Caravanas* vocant, merces impositas ferentes: cum autem in solitudines inter Syriam & Ægyptum ad Arabiam sitas pervenerint, neq; pabuli, neq; aquæ copiam invenire: attamen loca sua ubiq; aridas velut stipulas, cæque numerosas, densas & stipatas, ex suo radicum cespite admodum odoratas nasci, quas inter eundem aut alia quoscensidum. Camseli depascunt: eo etiam paulo cunulos onerare, ne in floridioribus locis jumenta deficiant: quod vero superfit Alexandriæ & Alcam vili admodum vendere. Apud incolas licet in nullo sit pretio, cum gens sit rudis & sylvaris, quam ut eo & fo & sua jumenta lavent, attamen à natis in Indiam deferunt: in enim aliquos fasciculos secum devehentes ibi in usum Medicum vendunt, cum eo Modici Arabes & Perse qui in India degunt utantur, *Adober* vocantes. Sic & mercatores equarum maximâ copiâ in fasciculos colligunt, & in Hayes assuntur, et equis subternant, ne stercore, & urine fetore offendantur: nam simul atq; maduerit in mare abiciunt, & recentior subternant.

Monachi in Mesura & Angiillara Squinanthum officinarum non esse Veterum Schernanthum seu Juncum odoratum contendunt: quocum rationibus responderit tum Joannes, tum Caspar Bauhin; quos adi.

Tenuium est partium: calcæit, substringit, discutit. Usus præcip. in obstructis mensibus, epate, *Fern.*
liene; in Ventriculi inflatione, vomitu ac ingultu; in urina difficultate, Renum, Vesicæ ac Uteri dolore. Extremis oculis corrigi iocundum oris, roborat caput (Oratione) discutit uvula tumorem, roborat ventriculum, &c. *Schrad.* Exhibent autem vel pulverisati ʒ. possidere in vino calido; vel in aqua decoctus aut pure Gallinaceo. Vini Squinanthini ad prædicta usus; duplicem præparationem vide apud C. Bauhinum in historia: ibidem & aquæ stillatitæ.

Memini (inquit Sim. Paul. in Quadrip. Bot.) Henricum Meibomium, cum specificum ad vesicæ ulcera Schernanthum herbam & Cypen radices adhibere; a quorum usu topiis natus Juglanda ferè magnitudine ex honestissime matronæ naturalibus locis per trinas hinc excretis, qui duâ lato agram ulcere vesicæ vicinarumq; partium coniectam lecto afflixerat.

CAP. V.

De Sparganio.

Sparganium *lat. & arabice*, i. e. fascis dicitur, quod foliis ejus latis & vitibus modo lentis pro fascis matricis utebantur C. B. potius quod fascis latitudine sua & flexibilitate referrent: unde à Rusticis ad floreas & tegentes texendas in usu simile aiunt.

Pilulis suis echinatis, sphericis, Platani pilulis emulacibus à reliquis hujus generis abandè distinguitur.

- A. 1. *Sparganium ramosum* Park. Ger. C. B. *Sparganium quadrifidum* J. B. *Edmonis distichum* panicula vulgè *Platanaria*, quæ pilulis hinc *Platani pilula* *fontes*. J. B. Bot. in Theophr. hist. *Sparganed* Dur. reced.

C. B. J. B.

Radix est nigrescens, fibrosa, adnatis radicalis serpendo longè lateq; (se distenditibus) foliis à radice surrectis, utriusq; gladii instar acuminatis, Cypri latioribus, caulisq; superantibus, dorso sic prominente & alato ut triangula videantur, stringens manum infesto vulnere incidens: at que in caule alternatim disposita, paucæ, multo sunt angustiora & reflexa. *Caules* è foliorum medio prodeunt, leves, subrotundi, aliquando obtusi angulo prædito, pallide virentes, albi medullâ, quæ in tenuissima filamenta deduci potest, ferè, bicubitales, aliquando altiores, tortuosi, in ramulos, quorum singulis folium subcipitur dediti. *Flores* tuberculis ramorum nullo pediculo adnascuntur, aspergillum imitati, radicans in orbem staminibus albidis apiculos fuscis, sustinentibus constantes, nullo reflecto fructu semineve caducis; albi enim nascuntur pilule echinatae Platani, ex oculis singulis singulos acinos continentes glomeratæ.

Ubiq; ferè in aquis ad fluviorum ripas, & in palustribus nascitur.

Lucu.

Gramen bulbosum aquancum C. B. nihil aliud esse quam hujus plantæ radicem & folia, antequam in caulem abeat crura & depacta, nos docuit D. Dale; & plantam ipsam in hoc evellam ostendit C. Bauhin locu persimilem.

- A. 2. *Sparganium non ramosum* C. B. Park. non *ramosum*, sed *latifolium* Ger. *Spargan*, aliter J. B. *Dur. reced*, not *branched*.

Radix est peiori simili, foliis paucioribus, caule simpliciore non ramoso, minori. Notantur in paniculis herentes pilulas ser, fol & caulis alia eorum rostrata circumposita transfalga, quibus mollitas matiam barbolarum contractabilior muricatis Sparganii primi echinis; a quibus & illud

dispersit, et ibi in orbem acti flores glomerati subsequenter capitulis equales, tremulas staminum
luteorum fibras vibrant; eo in summo scapo ordine, ut verticillosum series apparat.

Isdem cum prior locis reperitur, non tamen perinde frequens.

A. 2. *Sparganium minus* C. B. J. B. Park.

Plantula est unciarum quattuor: è *radice* ex fibella oblonga composita cauliculis unciarum
duarum effertur, qui in capitulum exiguum subcorundum, eo aliud minus infidet, herbacei coloris
ac formæ, ut in *Sparganio minore* dicitur: circa quem folia utriusque quaterna vel quina, angusta,
cauliculis superantia.

Loc. Northiam in lacunis quibusdam curiosis, quarum partes superiores per æstatem exsiccantur.

Sparganium gustu est adstringente & exsiccante.

Quæ de viribus ejus habent *Vires* & *Recentioris*, quoniam nobis suspecta sunt, omittimus. Con-
sule si placet C. Bauhni historiam.

U. Ex hujus foliis tegetes & sterces olim rustici texebant, quò & *Ruellius* respexit & *Gesnerus*,
cum *Batoniæ* herbariis & *Officinis* hodie *Juncum* cabacatum vocari tradunt: namque orbiculis qui-
bus filis & uras pallas recedunt *casæ* appellare solent.

CAP. VI.

De *Typha*.

TYpha florum effigie turbinata & in clavam composita (quæ & planta nota characteristicè
est) quasi *Typhæus* teste *graminis* turbinem, aut *gigantis* stantiam minacem signaret, no-
men de lais valere C. B.

A. 1. *Typha Græc. palustris major* J. B. C. B. *palustris maxima* Park. *Great Cats tail*, or
Irish Marr.

J. B.

Altitudine procerum hominem æquat vel eam superat, sæpe sepe singulari, est ubi pluribus,
rectis, rigidis, tenacibus, levibus & velut perpolitis, æqualibus, solidis, longis geniculis articulata.
Folia cubæta aliquot longa, unciarum lata, anapini acie stringentem vulnerant, triangula, crassif-
cula, subterreâ spongiosa, longissima vaginâ caulem involventia, sapore subdulci, quarum alia
statim à radice orientur, alia è caulium geniculis. Cæterum caulis fastidium temerario in cylindri
formam sufficiens, in pappos tandem abeuntia involvitur, mox in clavam immitia, mucrone
palmarum aut longiore præsertim. [caulis caucum *typha* præsertim raris, multos flores profertur,
infidet, qui arida & vici lentis hinc & angustis panicula clava simili, ex densa lanugine compacta,
penion & obfusca colore, pedibus crassitudine, palmari aliquando & pedali longitudine succedit,
quæ tandem in pappum cinereum ventis abrupta evanescit C. B.] *Radix* obliquo actu serpat, novo
foliis pullulanti se propagant, ex albo infelcens crumlicosa, immo vero nivei candore, veluti ex
funiculis multis compacta, à qua frequentes dependent fibra concoloris, sapore demum, siccus est.
Oculi vero ex radice penulanti emergentes subdulces & teneriuscule sunt.

Loc. In stagnis & paludibus majoribus, inque urbium fossis & ad flavorem leni thalictum ripas
occur.

A. 2. *Typha palustris media* J. B. *palustris clavæ gracilis* C. B. *Typha minor* Park. Græc. *Ἐπι-
κρίσις*, or *middie sort of Cats-tail*.

C. B.

Folia est multo angustioribus quam *Typhæ* vulgaris & *gracilioris* clava. Alioquin à majore non
differt pulvis albuginosus in clavam compacto, & florum oblongi spica, tenui flavo polline resper-
sa, super clavam emulcente.

Loc. Cum prioribus hæc minus frequens occurit. Utramque speciem simul erigentem vidi in rivulo qua-
dam parte rivi nobiliss. Comitum *Warwickensis* *Leet* hinc & illinc in *Essexia*. Priori folia lanosa,
glauca, speciosior, nigrior; terra etiam floret. Posteriori hæc folia angustiora, pallidiora viren-
tia; spica gracilior, namque non colorata, stantibus quoque caucum spica sine clava: Altitudine tamen
ei non cedit.

Super clavam *Juncus* *nuttle* (obscure C. Bauhni) florum spica oblonga, clava paulò brevior
tenui flavo polline resperse evanescit.

Gramina hujus nominis in loco *Typhæ*.

A. 3. *Typha palustris minor* C. B. *Typha minor* J. B. *minima* Park. *Little Cats tail*, or *Irish-
marr.*

Radix obliqua, genicularim ascendente *folia* promè granata, longa, striata, angusta, acuti-
nata, aliquantulum rigida; & inter hæc caulem lequicubus aut duorum cubitorum altitudinis, le-
vium, junctum, rugulosum, eodem, quasi lanugine hujus *clavæ* partem, angustam, sæpe duplitem,
modicè inter se distans unius pedis sustinet, quarum interna minus, rotundior (construitur
Adversaria

Adversaria observarunt) superior verò major, duobus uncis ab inferiore distans & longior, cui so-
lum Triticeum, aliquantum intortum subjicitur.

Hanc nos eodem in loco ubi olim Lobelius & J. Bauhinus observavimus, nimirum ad fluvium
Arve quæ Rhodano confluit, propè Genevam. Cum tam primum vidimus perexigua fuit, clava
gracili & strigosa, ut non dubitavimus distinctam speciem esse: postea verò caput cylindricum
clavatum in tantam intumuit crassitiem ut suspicari ceperimus parvitatem loco potius (siquidem
extra aquas crevit) quàm plantæ naturæ deberi. Quod vero clava geminas in eodem scapo pro-
ferat perperam non est, & accidentarium esse videtur: nec minus quòd clava superior inferiore
major sit, vel minor.

CAP. VII.

De Acero.

Acorus quia *ἄκρον* id est, pupillis sive aciei oculorum caliginose modeatur, dicitur.
Spica quam præfert simplicem, elegantem Inul specie, eam ab omnibus aliis hujus gene-
ris satis discriminat, si alia notæ decident.

- A. *Acorus verus sive Calamus Officinarius* Park. *verus sive Calamus aromaticus Officinarius*
C. B. *verus, Officinæ sive Calamus* Ger. *Calamus aromaticus vulgaris, nullus Acorus*
J. B. *The Sweet-smelling Flag, or Calamus.*

Radix longa [quincuncialis C. B.] multis geniculis inæqualis, summâ terrâ obliqua seu trans-
versa hærens; externâ parte canalicans cum sub terra latex, supra terram extans vireosus, interna
parte candidissima, firma atque amara, innumeris interna parte adnatis fibræ crassis & albican-
tib, etiam odoratis donata. Serpit autem & summa tellure sese diffundit, è lateribus & singulis
ferè articulis seu geniculis propagines alternatim in obliquum spargens, ut brevi tempore magnum
spatium occupent: *folia* surgunt cubitalia & sesquicubitalia aliquatenus spatulae furidæ, angustiora,
colore herbaceo, margine lubrè rubente, & propter terram penitus rubentia, mediâ costa clatiore
[Clusio Irisis tenuifoliae majoris ferè, sed multo longiora, sapore subamaro, acris & aromatico, tri-
tæque jucundo & aromatico spirant odore, quem etiam resecata & exsiccata vel post multos annos
retinent.] Sub hyemis initium marcescunt & liccantur, incunte autem vere nova germinant, ut in
Iride angustifolia. Pro flore inulm seu nucamentum præfert, rigidum, & oblique furroctum, teros,
sensim in acumen desinens, squamulis imbricatis virentibus compactile, apicibus exsertis multis luteis
prodians è sinu mediæ foliæ, statim à radice cum aliis exorti, ut reliquis angustioribus brevioribus
itâ & crassioribus. Inulæ unicus, (aliquando teste Clusio) sed rarissime geminus: flocculis dum se
explicat pallidis, muscosis inodoris quadrifolis plenus: in paulatim deinde incrementum sumit, do-
nec humani ferè dugi longitudinem crassitudinèque acquirat, frequentibus tuberculis virentibus
tam eleganti serie dispositis ut recentem Pinastri conium æmulari videatur.

Plantam hanc non esse verum Calamum aromaticum seu odoratum Antiquorum Botanici erudi-
tiores consentiunt, sed Acorum verum Dioscoridis, quibedam & nos sentimus. Eorum argumenta,
& resolutiones ad rationes contra sententiam vixit apud J. Baulunum Hist. plant. lib. 19. cap. 18.

In illovis Hiera sive *Tær* Nordvicam urbem alluente, non longè ab ipsâ urbe, à Clariss. Viro *Lucas*
D. Thoma Bresson Equite aurato & M. D. observatus, nobilique ante viginti annos ostensus est.
Alibi etiam in Angliâ sponte occurr, nimirum circa *Holly* vicum in Surreia, à D. Brown S. T. B.
Collegi Magdalensensis, in Academus Oxoniensi loco inventus. Quin & D. Norstham M. D. in
agro Cestriensi eum copiosè provenire nobis retulit: ut non opus sit nobis etiam à Maocide, Tar-
taria, Lituania, Russia, Bichynia arceferre: Humidâ locis gaudet & secundum fluentia longè felici-
tius provenit. Junio, Julio & Augusto Inulm, producit. Sui generis planta est, nec operosa descri-
ptione indiget cum ab aliis omnibus nobis cognitis dabitur statim nota distinguatur foliis Iris seu
Xiphii & nucamento seu Inulo Pinastri conium recentis æmulo.

Vim habet Acori radix extalefactoriam & siccantem, partium est tenuium. Ufus præcip. in obstru-
ctione mensium, in dolore colico, in rupis & contulis. Ad urine deductionem commendat Fallo-
pius in vino tenui decoctam radicem cum succo Boraginis. *Schedæ*

Radices coactæ gustus sunt picidæ & ventriculo gratæ, cuiusque Turcæ manè jejuni adversa co-
ruptæ acris contagia manducare solent. Quin & radices Acori Antidoti utiliter admisceri scribit
Dioscorides. Tartarus quoque eas circumterrofolios, & aquam non bibere quin pelis Acori ra-
dix in ea fuisse macerata Clusio referebat Bernhardus Paladanius.

Radices siccate gratiorem spirant odorem; nam (ut rectè Plinius) recentium virus major.
In catarrhis exsiccandis, præcipue convulsivis, inque Apoplexia ipsa magnam habet laudem con-
dita radix.

Ad anorexiâ, Radix Acori quo acrior eo melior, sive recens usurpetur nimirum incisa cum
cochleari Juniperi, vel eadem in loco umbrato siccata, sed non preparata in pulverem radigitur, so-
ligendo substantiam intermediam acrem, & cum dimidio extracti Tormontille miscendo egregium
huggent pulverem stomachalem contra anorexiâ. D. Hoffe ex Emmulmeri præci. Aliquoties (in-
quit) observavi cum in declinatione morborum occasione salivæ viscidæ ac glutinosæ [male habe-
rant ægri] quod ex infusione radice Acori & Heleni recentium in vino optimè brevi habuerint,
dum sic saliva coacta & appetitus egregiè provocatus fuerit.

CAP. VIII.

De Zingibere.

Zingiber, *Zingibere* Græcis dictum, nomen accepit ab Indorum vocabulo *Zengou*. Omnibus Botanicis eodem nomine dicitur. C. Bauhinus sic describit: *Radix* est ad ternos vel quater- nos palmos, Arundinum modo, in profundum acta, inæquali, modicè plana, frequentibus gemiculis in laterales partes divisa, quoquovertum reptante, longitudinali sesquianciali, nonnunquam majori, pollicis crassitudine ac minore toris albicante aut in candido lutesca, carne alba, *frishah*, tenerè, per cujus longitudinem venæ nervosæ feruntur, gustu Piperis modo, fervida, acerrima, odore aromatico, quæ tulle Acoffa, etiamnum virida leviter adurit, mupusque quam cum succa est mordicat, & quo loca in quibus nascitur magis humida sunt, eo minus acrimoniæ retinet.

Folium est, (ut Garcia scribit) similibus Iridi aquaticæ aut Gladiolo [non Arundini] At Acoffa folia Lachrymæ Jobi foliis similia ei attribuit; alii Arundinacea, ut Linchotanus & Ruellius quod nobis verisimilius videtur; cum Lobelius & Jo. Bodæus à Scapel, qui plantam ipsam virentem viderunt, foliis & calamo novellam sive nuper evasatam arundinem præ se ferre dicant: & G. Pifo folia admodum similia esse foliis Arundinum testatur, ut qui nunquam viderit crescentem hanc plantam, Arundinetam verè dixerit quod primum è terra surgit. Unde joan. Marggravius & Fr. Hernandez folia Iridi aut Gladiolo similia faciunt, minus exacta comparationem præbent. Caulis ei haud crassus in pedalem aut etiam sesquipodalem altitudinem assurgit, Arundini similis, in fastigio capitulum Scorchadi quadrante simile gestans. *Hernand.*

Duplex est, femina, quam descriptimus, & mas, *Ambo* Mexicanis dicta: cui, describente Pifone, folia non ultra tres pedes in altitudinem excrescunt, asperiora sunt & crassiora vulgaris Zingiberis, unico nervo recto in longitudinem excurrente conspicua, caulibus hinc inde sine pediculo, inferiori solitariè, superioribus frequentiori coma, adnata Radice majore & crassiore, sapore acriori cum quadam amaritudine. *Hernand.* Radices diversæ sunt ponderis & amplitudinis, omnes tamen imbeciles & tiberosæ, atque in superficie terre sicut Arundinæ expansæ.

Nascitur in omnibus Indiæ provinciis, esculentis satiusque semine aut radice: nam quod sponte provenit flocci parvum. America non videtur naturalis, sed ex India Orientali aut insulis Philippinis in Brasiliam & Novam Hispaniam translata. Malabaricum autem habetur laudatissimum: Pingui solo, stercoreatque & probe exculto feritur (radice cui superse unum alterumve internodium in Erubem depacta) & statim à satu aqua dulci plus minus pro terre siccitate rigatur. Proximo anno à satu radix eruntur denso, ipsam loci. Zingiber. Vindemia ejus fit arefcentibus foliis, quod juxta initium Januarii accidere solet. Paulo exsiccatur limbo obducitur, nè evanescere natura humilitate terrore, cui alias maxime obnoxia sunt, assiciantur. At Linchotus affert evulsarum radicem certam molem argillæ sigillina tegi, & tumulum equisite contra omnem aërem & ventorum vim oblineri: sic enim & reconnoctas radices servari, & à vermium orofione promptius defendi. Apud Aromaticos radices reperiantur albae & rubens; sed diversa genera non sunt: rubricæ infectæ sunt rubens, cretæ albae, quo à terribilibus preserventur. *Scapel.*

Siliqua à Lobelo depicta & descripta non videtur esse Zingiberis, sicut illius speciei, quæ à Franc. Hernandez pro femina describitur, cui capitulum seu spica Scorchadi similia.

Ut condiantur radices, prius decorticantur, moxque in muriam vel acetum conjiciuntur, & macerantur per horam unam atque alteram, dein aequali tere temporis momento sub dio probe insolantur, ac denso stragula sub tecto cooperantur, donec omnis humiditas exhalaverit. Si aliunde transfere sint radices, tunc thebæ inclatæ & aqua irrigatæ noctu terra operantur, interdum oxo patant. His omnibus ritè inflatis ab exercitatio agricola, postea Saccharo non solum, sed muria vel aceto condiantur, nullòque tunc insigni calore palam afficiant, nec filamenta ulla ingrata in ore relinquant. Si immo tamen magno, sumisq; lotionibus fatigentur, pari quoque aromaticæ ejus acrimoniæ evanescit.

Viride conditum saccharo ex India affertur, sensibus & pinnis ac frigidis & male concoquentibus stomachis accommodatum, præsertim quod rocam conditam tussæ: valet etiam ad lenam in pulmonibus putam.

Indi folium Zingiberis in piscinis & coquario usi atque acetario utuntur. Radicem etiam viridem cum aliis hæcè minutim concisa ex oleo, sale & aceto acetari loco illa sunt. Præterea Zingiber rocam etiam remedio illi est præstantissimo ad Colicam dolentem, Colicam & Lentricam passionem, Diathoras duras & frigore natis, flatu venterique tormena, & grava in similia accidentia, ut multoties in India se feliciter comprobasse testatur Bontia. Ea tamen perpetuò adhibenda cautela, ut qui languens sint fervidore, ivera sint, ivera agri, parcillimè coquantur, quia Zingiber fortè omne sanguinem accendit & omnia venarum aperit. *Pifo.*

Zingiberis ut & Piperis magis in culinis quam in medicina usus est, cum hæc duo inter omnia aromata plurimum acrimoniæ & parum aromaticæ qualitatè habeant. C. B. Galenus Zingiber minus tamen esse partium quam Piperi Indi colligit, quod calor ejus, quamvis arge fortis, non primo statim occurrat sentitur. Caliditas autem quæ prohibetur à Zingibere dicitur perseverat, quam quæ à Piperis, unde videtur substantiam ejus & crassitatem esse & humidam seu aquatam. Naro ut ab arde caliditate flamma caliditate accenditur, atque etiam undequaque dispargitur; quæ autem ab humiditate, cum ligna sunt virida, & tardius accenditur & durat distincta; ita etiam in malis-

Discretis Zingiber aliam lenius emollire scribit, sed intelligendum, si sentire & alio recentis radices edantur, multa in eis adhuc humiditate aliam liberantur & emollirentur residua: ut videmus

videmus in Indis, nam vetustiores siccant potius & siccant alvum, facta scilicet proba concoctione.

Addi solent interdum hae radices medicamentis catharticis ad eorum vim augendam. Datur autem cum purgantibus vehementioribus eorum malitiam corrigunt. Zingiber Ventriculi & pulmonum factus abstergit & dissipat, supervacuo humore absumpto, cerebrum & memoriam roborando juvat. Hebetudini etiam visus quae ab humiditate provenit prodest. Venereum stimulat & flatu dilucit. Quocumque modo sumptum, sive recens, sive siccum, ventriculum roborat, & concoctionem promovet; Antidotis admiscetur.

Zingiber fuscum C. B. *Zingiberis speciei Mechinum dicta* J. B.

A vulgari Zingibere differt non tantum quod immaturius aut improbius sit, sed quod consistenter sit compactiore, duriore & paucioribus fibris intertextis, colore ex cinereo nigricante, acriore gustu, nec terebinte exedi solita, quod etiam conditur & in quibusdam Officinis proflat.

Zingiberi affinis cortice squamato C. B. *Zingiberis Mechini rara varietas* J. B.

Radix est Zingiber vulgare aut Mechinum referens sed elegantiore aspectu, multis nodis distincta, & ferè veluti Doronicum articulata. Corticem habet Zingiberi similem, coloris subcitri, pollicari crassius, fibrisque caret: gravis est ac subsida, fracta venas albas ostendit: sapore est acris, aromatica, & si caro non extela sit, gustu Zingibere multo acriore & sicciore.

Pona Doronicum Arabum nominat, & pro Doronico legitimo agnoscit, siquidem notè à Scapione & Arabibus Doronico ascripte conveniant, quo etiam pro Doronico utrumque censet: cuius loco multi hæcenus Aconito Pardalianche minore, quod facultatibus Doronico planè contrariis sit, usi sunt.

C A P. IX.

Arundinis quadam emissæ, suis locis disponendæ.

1. *Arundo Mambou Pison. Arundo arbor in qua humor levis gignitur, qui Tabaxir Arabi & Arabibus dicitur.* C. B. *Tabaxir sive Mambou arbor* J. B. *Canna ingens Mambou vel Bando dicta* Park. *Hy* H. M. P. 1. T. 16. *The Dambou Cane.*

H. M.

Radices gemulatae è geniculis fibras agentes, & præterea geminibus multis emissis reptantes & subinde furculos erigentes, hanc plantam ad Arundines referri debere demonstrant. Rectius autem Arundo arborefcens quam Arundo arbor dicitur.

Caulis in excellens altitudinem atollantur, ipsam *Tonga* superantes, sunt autem teretes, cortice viridi, durius geniculati, è geniculis novos ramos furculosque emittentes, & ad geniculos spurs oblongis rigidis, unâ, duobus, pluribusve muniti, intus fistulosi fistulis subulibus, ad duorum triumve hominum altitudinem asurgunt priusquam ramos emittant; cum teneri & novelli sunt, ferè solidi, & uno tantum angusto tubulo pervii, vetustiores intus cavi, & ad geniculos interserpimento lignoso clausi, & interiori membrana tenui albicante obducti, constantque lignosis, duris, albicantibus filamentis. Cum teneriores ex fusco virides sunt, nullo cortice à lignosis filamentis distincto vestiti, cum vetustiores ex albo flavi & nientis coloris; intus quodam calce genere in cavitate obducuntur, quæ usui medico reservatur.

Piso Arundinis adulescentis medullâ levi, spongiosa & liquida (non adeo sælla ut vulgaris canna Saccharifera) referat esse scribit, quam vulgus, grati saporis grati utendi causa. Nervosissimi autem pilones qui maxime succulenti sunt & saporosi, magis sunt in India, apud Advenas æqui ac Indigenas, quid hæc sint celebres istius compositionis Athar dicta, quæ in Europam involta in delictis habetur palatum delictu, & à me quoque non semel cum voluptate gustata est. At verè ubi hæc Arundines præcisa & annosa sælla fuerint, liquora contenti substantia, color, sapor & efficacia mutantur, atque paulatim protrahuntur siccis, & juxta intermedium vi Sali coagulatur, ac instar pomici albi induriscit, non mirum si suavitate expers sælla, peculiarem saporum cum parva adstringente, chora usi annuam acquirit, vicinque apud Indigenas Sacæ Mambou quæ quæ levior, albicanter ac glabrior se præbet: quæ magis inæqualis atque coarcti coloris evadit, deterior habetur.

Folia ad gemacula brevissimis petiolo insident, spithamiam longa, latitudine ad petiolum digitali, versus apicem leniter strætioea, vena in longum striata, nervo inferiori conspicuo malum percurrente; oris si inferiora versus fringantur, aspera, viridia.

Flores in specis squamosis, tritico similibus, nisi quod minores sunt, quæ nodulis caulium congregatis insident, itamine filamentis tenuissimis, dependent. Sexagesimo à lactone anno (ut ferunt) flores ferè per unum ferme mensem. Proxime ante florum exitum primum omnibus foliis spoliatur, & postquam deflorat coarctatur. Hæc nobis membris versimilia videntur.

His addit è Garcia, ramos erectos esse, nisi quod pulcherrimos quosque interdum incurvant ad pergulas & deambulacra, apud Indos frequentia, conficienda.

Pisoni Ligri seu matorie crassities tracentem uncias sepe superat, circumferentia sexdecim, diametere aliquando quinque est unciarum. E Clæse hæc; qui aliud fragmentum describit 27; pedes longum, cuius crassitudo infima parte viginti unciarum ambitu comprehendebat; singulorum internodiavorum longitudo circumferentiæ parti inferiori usque plurimum respondebat.

* Tabaxir
Garcia C
Aspa.

Dum adhuc teneræ & virides sunt Arundines ab Indis insecti & incurvari solent, ut magis aper
erant gestandis locis pensilibus, *Paloski* ipsi dictis, quibus insident tum viri, tum turbae
dum aliquo transferri cupiunt.

E truncis cymbas faciunt Indi, quæ binos viros capere possunt, non qualem illas excavantes, sed
relictis solum duobus utrinque internodiis per medium locantes, quas concident bini nudi, seden-
tes singuli in eorum extremitatibus junctis cruribus, tuncque singulis manibus remos, tres aut
quatuor palmos longos, quibus eas cymbas impellunt tanta dexteritate, ut eam aduerso rapidoque
flumine summa celeritate navigare possint. Atque in his vectos se locutos esse arbitrantur à Croco-
dilis. *Asiæ*: apud quem reliqua vide.

Quæ & ex hisce Arundinibus Indi nonnullis in loca domos suas ædificant, ut in *Terræ*, quæ
sunt & singulari industria innotent.

Tabaxie Persis *læ lapidifera* significat. Gerardus Cremonensis in Rhafi *Tabaxie* Arabum erro-
rone per Spodium reddidit, cum Spodium sit Tutia Arabum, cujus in externis remediis solum usus est:
Tabaxie verò in Arabum compositionibus intra corpus sumatur. C. B. Verum J. Bauhina * Gerardum
excusat, nam ille, inquit, reliquit nomen Persicum, & Bellunensis spodium vertit: Sed quid
alteruter aut ambo peccauerint si spodium esse putauerint, cum Avicenna ipse ducat spodium esse cine-
rem cannam, ut venti inter se confricatarum, & ignem ex eo concipientium, & proinde ex illo igne
castarum.

* Vel perinde
Aster nax-
rimus Garcia
est. apud
Cul. in East.

Ufus.

Tabaxie ad usus medicinz aptissima, ab Arabibus & Persis summo studio curata, auro & argen-
to ponderatur. Itali ad vulnera testicularum & virge utuntur. Valera etiam dicitur contra chole-
ricas passiones & dysenterias; Garcias internis & externis ardentibus convenire scribit, eoque etiam
in biliosis febribus & dysenteris, præsertim autem in biliosis fluxionibus utuntur: inque stranguria
& urina cruenta. Coctis & foliorum decoctum epotum servit ad sanguinem in corpore ex vul-
nere retentum expurgandum, confertque etiam puerperis, ad materis languinolentæ post partum
retentæ excretionem. H. M. Arundines hæc amputatæ & igne crematæ fortissimum præbent cam-
pore; cum autem cremantur ingentem odorem fontium, & fragora centum aliquot sclopetorum ex-
plosiones æmulantur. Aer tamen intra cancellos internodiorum ope conclusus, dum rarefit ampli-
tudo spatium desiderat, pariter transperiturum dirigitur, & vi sibi exitum querit. D. A. S.

Nascitur in arenosis maris littoribus.

Loco.

2. *Borhis* H. M. part. 5. Tab. 63. *Bamba* speciei altera.

Arboscula humilis est, seu potius frutex arborescens, sedecim circiter pedes altus, ramulisque terro-
ribus, glabris, nodosis modullis factis donatus.

Folia arundinacea, *ly* foliis similia, at glabra. Ad ramulorum nodos interdum spicæ proveniunt
coniformes, acuminatæ, quibus insident strobili albidantes, flammæ, nodum occupant globulo ob-
longo, è quo stili exiunt viridiusculi.

Strobili succulentæ *Fructus* oblongo plano-rotundi, scissurati, carne intus densa, allicante referri.
Proveniunt variis Regni Malabarici in locis sylvestribus, præsertim in *Batjour*, *Cornualor*, & *Tekes-
kur*.

Ufus &
Ufus.

Ex hoc succo Indigenæ sagittas conficiunt & corbes. Ex ramulis arundinaceis calami sicut scri-
pocis. Folia si in aqua decoquantur, eoque decocto exhibeatur mensuras obstructa provocat: eo-
dem decocto si in collaturæ troscis gingivas sanat, & odontalgiam tollit.

3. *Nala-ly* H. M. *Arundo* Indica *Bamba* dila tertia.

Est insuper tertia *Bamba* seu *ly* speciei, Malabariensis *Nala-ly* dicta, percolombis persimilis,
præterquam quod internodia tenuiora sunt & longiora.

Loco.

Crescit in *Calicut* & *Tekeskur*.

4. *Arund* *Ratang* dila Pflanz.

Hæc strobili, grato ut *Mamba* succo nigridi, vel crudi mandocantur, vel condimento Achar
induntur. Hæc minus concava sunt quam *Mamba*, sed substantiâ spongiosâ instar herbe ferulaceæ
factæ. Baculi exticcati strenuo sono collisione multas fundunt igneas scintillas. Fructum fert
hæc Arundo odorem & saporem, cuius acidaque quadam grata, rotundum, parva pale magni-
tudine, rotundum spicæ coloris putamine, duriculis, fragili, hirs perperis cancellatim ornatum.
Ex singulis Arundinis nodis ad summam usque ulque sementa hincmodi modo inserta & tenacia, folio-
rum quasi loco, emergunt, hincque fructus globulati, raro loqtare, sæpe copulatim adnascuntur.
Nocentem porro intus ferunt durum, ex quo coactis exprimitur oleum, non oleum solum, sed in me-
dicamentis toxicis, præsertim in ungendis nervis, utilissimum.

Loco.

Crescit passim in sylvis circa fluvia hæc speciei, in omnem partem flexilis, eoque ad omnia le-
genda utilis. Nam incolæ [*Indiæ*] hanc loco ad utuntur, & aley suas ex magnis Arundinibus
constructas clavorum ferreorum loco ligant; & nartis tenacitatem hujus Arundinis, quæ crassitie
dignæ humanæ formæ est, tamen in quatuor partes dissecatur, unde & corbes, & cune instar-
tum ex ea conficiuntur; anchorarum etiam pro nartibus funes in Javanis; & sane longis de-
rati in aqua salia quam funes, imò detinentibus funibus tos in anchoras quantumlibet graves li-
gunt.

5. *Tabaci Arundinacei ad Aphylla C. B. Tabaci Haytinorum, qui Mexicani vocant Pocoyel.*
Fr. Hernandez.

Tabacos vocant Arundinum cava perforatique fragmenta, sesquidrantem longa, pulvere carbonum extrinsecus illita, intrinsecus vero *Sili*, i. e. Tabaco, Liquidumbea, *Xochi-catl*, & interdum aliis cubusam calentibus plantis atque odoribus referta. Horum incensorum ea parte qua *Pires* pleni sunt humo ex altera tracto devorantur, velut quodam fuffimento, somnus inducitur, & omnis laboris atque lassitudinis hebetatur sensus. Quiniam dolores omnes, ac precipue capitis, sedantur, pituita fluens ad pectus expulsi, iuvantur asthmatici, & corroboratur ventriculus. Cavendum autem est nimius eorum usus, alioquin jecur intemperiem calidam contrahet: inque cachexiam & alios affectus inciditur incurabiles.

Que de tubulis hifce habet Monardes cap. 14. eadem ferè sunt, eorum tanta compositionem ignoravit.

6. *Arande Japonia flava, intercedis brevifolia, serculis multis stellatis angustibus.*

E minorum genere sunt, crassitie pollicari aut paulo majore, colore flavo, internodiis brevibus palmaribus aut sesquipalmaribus, in medio gracilibus ad nodos crassis & protuberantibus. Unanquamque autem nodum virge seu serculi multi stellatim ambiunt.

C A P. X.

Gramina quedam Brasiliensia à Marcgravia descripta, & per oblivionem emissa, suis Locis inserenda.

1. *Gramen parvum, ad Cyperides accedens, granula Avicennæ. An Gram. nemorosæ hirsutæ species?*

EX radice capillata multi prodeunt caules, teretes, tenues, spithamam alti, ad terram uno foliolo acuto vestiti, è quo tanquam vagina prodit canis. Summitatem autem caulis in orbem circumstantem lestem foliola angusta, acuta, duos circiter digitos longa, viridia quædam, sed ad partem ab eorum internodiis albellima. In horum foliolorum medio aliquot granula instar Avicennæ, sibi invicem sunt apposita, in quibus semina latent. Caulis & folia paleæ albis & mollibus vestiuntur.

Folius multi simul in summitate caulis unde panicula exit cum Cyperis convenit, caulis rotunditate & folliculorum paleæ ab illidem differt, & ad Gr. nemorosam hirsutum accedit.

2. *Gramen cyperoides Brasiliensæ capitula quadrangula. Gramina secunda species Marcgraviæ.*

Caulem habet triangularem, 14, 16, aut 20 quors, digitis longum, supra terram longis, angustis & genosis foliis præditum. In summitate caulis capitulum est quadrangulare, quasi è quinq, glandibus compositum, magnitudine pallule maxis, ad cuius latera quatuor foliola graminea extenduntur. Ipsius capitulum odorem habet quasi Chamæmelis.

3. *Gramen cyperoides Brasiliensæ multo capitula alba. Gramina tertia species Marcgraviæ.*

Indem caulem habet triangularem, circiter pedalem, atq, juxta humum duobus aut tribus foliis graminibus vestitum. In summitate autem in brevibus pediculis protrudunt sex, septem, aut octo capitula alba, parva se posita; quorum quodlibet circumstantur sex foliola viridia, acuta.

4. *Gramen cyperoides Brasiliensæ, panicula umbellata, granula scalata. Gramina quarta species Marcgraviæ.*

Inferius triangularem habet caulem, qui ad quatuor circiter pedum altitudinem affurgit: Folia autem quatuor aut quinque, sesquidigitum ferè longa, Arundinacea: superius umbellam multi acuti granula, quasi Echinosium scalis ornata.

5. *Gramen Brasiliensæ cyperoides panicula squamata in umbellam composita.*

Exilis radice, seu radice filamento, eminent quatuor aut quinque caules graminos, angustos, circiter tres aut quatuor pedes altos. Quilibet autem caulis superius dividitur in umbellam, ut Gramen cyperoides capitula squamata continentem.

6. *Gramen junceum Brasiliensæ Jacapè dactylem. Gramina decemtertia species Marcgraviæ.*

E radice geniculata, juncea, alba, longè latèque sub terra serpente exurgit caulis ad trium pedum altitudinem, penum simplex, instar culmi filiginis, teres, qui postea in aliquot folia dividitur granulata, angusta, in medio albam nervium secundam longitudinem habentia. Nullus est odor, nec florem gerit nec semen [rectius dixerit nervium sibi observatum.] Solo ut plurimum effluo nascitur. Valere

Virg. Valere dicitur contra serpentum morsus, si membra eo ligentur supra vulva ussētā. Pilo experientia sua commendat radicū junctarū decocta ad venena.

7. *Gramen digitatum planifolium Brasiliense.*

Caulis teres, tenuis, cæcis, gramineus in 18 aut 20 digit. altitudinem assurgit, in medio habens nodum, & infra tres, superis autem supra nodum unum solum acutum, gramineum: in summitate caulis quinque aut sex spicæ tenues, duos circiter digit. longas, crasso filo laevi crassitatis, coloris argentei, à quibus parvuli è cinereo ad purpureo-ceruleum colorem vergentes strobili dependent, tremuli, & qui vento abstripiuntur.

8. *Gramen elegans plicatum Pativum aut Milicium.*

In triam, quatuor, aut etiam quinque pedum altitudinem assurgit, ex radiculis filamentosis Arundinis modo. Folia circiter unum pedem longa, elegantè plicata, viridia, figurā pene ut Palmæ nociferæ majorem, in caule plura. Caulis superis fert spicam, sesquipodem longam Mili spicæ vel Panicæ sylv. figurā & magnitudinem.

Virg. Emollendi vim obtinet internæ & externæ, malvas, vices supplet: in fomentis etiam terebinthino conducit. *Pilo* qui Gramen hoc *Amogakka* nomine pergit.

9. *Gramen fœvæ capitulo squamoso, Japicæ Brasiliensibus Pison.*

E palus radiculis caules protrudit perquam multos, tenues, sanctos, pedum aut sesquipodem longos, qui inferiore parte gramineis foliis vestiuntur. Quilibet caulis gaudet capitulo ovali, squamolo, squandato, coloris lutescentis & ex pallido variegati: his superis strobili infidet trius quatuorve foliis composita. *Se hoc si verum, plane anomalum est huic generi Graminis.*

Luc. In palus ripas, rivulibus præsertim plures luxuriat.

Virg. Ad curandam impetiginem tumidè, curandis affectibus, à coarctato & acrimonis raris succo refrigerante quo scatur, parti attractum comulcor, mulieris, lactis & leviassus adfert purissimi intolerabilem mitigando. *Pilo*.

10. *Gramen fraxum Brasiliense.*

Ex una radice quatuor aut quinque folia emittuntur, & assurgunt in sex pedum altitudinem, familia Gramini Hispanico strato, perterquam quòd in unico folio una tantum stria sit alba.

11. *Gramen dactylum planum, Capivoca Brasiliensibus, Lactuca Per Galinaceis dillum.*

Ad duorum aut trium pedum altitudinem assurgit, caule tereti, geniculato, foliis ad genicula plus sesquiped. longis: qui in summitate in 20, 24, & interdum 30 tenuiores caules dividitur, quorum quilibet variis lamellarum, ad duorum, trium quatuorve digitorum longitudinalitatem argenteis vestitur panicula, quæ in medio semini gramineum continet. Caules egregiè vitescunt.

Virg. Radicem ad quodvis venentum in quovis convenienti liquore propinatam commendant Brasilienses. *Pilo*.

12. *Gramen dactylum altissimum Brasiliense.*

Bicubitalem vel tricubitalem sortitur altitudinem, caule & foliis gramineis. Panicula superis in duodecim, quodecim aut plures divisa, quorum quilibet octo aut novem digitis longa, coloris obscurè ruficentis.

Duodecima Graminis species *Mercurei*. Intra varietas esse videtur, panicula longior & pene pedali subtilissime composita, atque coloris viridis.

HISTORIÆ PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS TERTIUS,

QUI EST

De Herbis anomalis & incertæ sedis.



ERBAS *anomalis* voco quæ ob singularem partium structuram seu conformationem ab aliarum norma abluunt, nec notis characteristicis sunt præcedentium Generum aliquo conveniunt. Incertæ sedis sunt quarum nec Characteristicæ adeoque Genera quæ referenda sunt ob imperfectionem descriptionum ignorantur.

Has ad confusionem vitandam, & memorizæ juvanda causâ, in quatuor Sectiones distribuemus, nimirum in 1. Anomalis aquaticæ. 2. Anom. filiquosæ. 3. Anom. quæ ob convenientiam aliquam in partibus præcipuis ad superiorum generum aliquod reduci possunt. 4. Anom. incertæ sedis.

SECTIO PRIMA.

Herbæ Anomala aquaticæ.

CAP. I.

De Nymphaea.

A Nympha dicta putatur. *ἡ δὲ Νύμφη ἡ ἑρμῆος ἡ ἑρμῆος ἡ ἑρμῆος ἡ ἑρμῆος, quia equis amat loca.* Plinius deducit à Nympha zcloropa erga Herculem mortua, quæ in eam transformata fuit; unde inquit Heraclicon vocant aliqui, alii Ropalon à radice clavæ simili; ideoque eos qui biberint eam duodecim dies costu genituræque pervari, lib. 25. cap. 7.

A. 1. *Nymphaea lotus* Ger. J. B. *major lotus* C. B. Park. *Nemphar lotum* Brunf. **Water-lily, with a bell-like flower.**

J. B.

Haud temere herbam aquaticam invenias, quæ majore radice nitatur quàm Nymphaea, quippe quæ humani cruris crassitudinem nonnunquam assequatur. Harum quæ lotus est *radicem* habet torris virentem, inius albam, fungosam & porosam, lapore subamaro præditam cum quadam adstrictione, cui multa appenda adnata, crassitudine digitali, foris nigricantia, fibrisq; multis capillata: *Folia* aequè innatant, spatham aut sesquipalmem longa, latitudine palmari, formâ soleæ equine, prope modum rotunda, paullo oblongiora quàm candidiora pingua, lentiora, virescè splendens, superiore parte glabra & levis, inferiore vero fibres aliquot distincta, pediculis digitali crassitudine, cubitois duos aut tres longa, aut etiam longioribus, teretibus, medullâ fungosâ, creberrimis rectis canaliculis perviis: quibus ad exortum interdum concurrentibus pluribus pediculis lanugo candidissima, quæ & folia nonnihil explicata, hastæ mucronem æmulantia exteriore parte obvestit. *Flores* pediculis continuibus insident, lapore cum dulcedine aliqua strenuè adstringente, odore Silybri Cardamines, quibus, folis crassitudinis constantis, colore luteo præditi, exceptis unguibus, qui externa parte virent: intra verò septem foliorum quinq; duplex est corona, prior minutissimorum foliorum, quæ externis appressa rugosa conspiciantur, & similiter lutea, quo etiam colore prædita est interior, sed diluore, ex compluribus ligulis retroactis, & apicibus proceris coronam contingentibus; molium occupat pericarpium rudimentum ex luteo viride; quod delapsis coronis, subilque florem, totis jam viridantibus, luteo virescè sed nitente tingitur, papaveracei capitis magnitudine, sed formâ urceum affabre exprimens, turgido ventre in angustam cervicem desinente, quæ sensim dilatata marginis urcei effingit, stris extantibus asperatis, & orbiculi loco aliquotisque petulis: in his *semen* continetur, splendens, major quàm albe, Tricocco grano minus.

Flos hunc spiritum illum ardentem seu liquorem destillatum, quem *Aquam viræ* vulgò vocant, odore referre nobis videtur.

Locus. In fluvii & fossis palustribus majoribus, inque aquis stagnantibus majoribus crebro reperitur.

A. 2. *Nymphæ læta minor flore fimbriata* J. B. C. B. The lesser pretty Water-Nail, with a fringed flower.

Radix multis uliginoso cœno infusa est, crystallacea, è caulium nodis prodeuntibus; *folia* multis, longo rotundæque pediculo natis, gustu amara, aquæ innatantibus, densis, *caulis* teretibus geniculatis; *flores* lætis flori Cucurbitæ perquam similibus, quinque tantum foliis constantibus, non ut in læta majoræ numero stipati congestis, aut multos apices intus signantibus, per ambitum venustissimè fimbriatis: calyculo oblongo, lato & compresso, seminebus plano oblongis, lato, in ambu pilosis. Atriplicis ferè modo, gustu quoque amari.

Locus. In fluvii & stagna majoribus nascitur, non tamen almodum frequens. In insula Eheni abundat.

A. 3. *Nymphæ alba* Ger. J. B. *alba major* C. B. White Water-Nail.

J. B.

Luce ante floris productionem simillima est, rotundioribus tamen foliis, [Ded. & foliorum & florum pediculis rotundis.] *Radix* crassissima, cortice tegitur nigro, intus candida & fungosa, unde plurimæ exiunt fibre, quibus in fundo hæret; *flores* aërem longissimis, aquas trajectentibus pediculis hærentes, candore emaculati, nonnulli odorati, Liliacis floribus similes, multiplex foliorum agmine stipati; verum extrema folia exterræ parte ex albo virelunt, ut Ornithogali: medium occupant *filamenta* numerosa. Dodon. autore post florem *capsula* prodeit rotundam, in qua *semen* nigricans, splendens, Melle majus.

Nymphæa Brasiliensis flore albo, *Aquæ* indigena dicta, non videtur speciei diversa. *Flores* (obfervante Marggrave) duodecim constat foliis, oblongis acutis, angustis, albis, & quatuor foliis virentibus subita, lævi odore.

Locus. In fluvii oritur sed rarus apud nos in Anglia.

A. 4. *Nymphææ alba minima* C. B. *alba minima* seu *Morfe* vana Park. *Nymphææ minor* seu *Morfe* vana J. B. The least white Water-Nail, or Frog-bit.

In aqua fluitans multiplicat se flagellæ suis tenuibus, in quibus veluti parva capita, unde foliorum exortus, & radices tenuissimæ, fundum verè tendentes. *Folia* carinate rotunditatis, teneris, uncialibus, interstitio duplo majoribus, Alari foliis ferè similibus, sed minoribus, pediculis natis palmatis. *Flores* veluti è vesica prodeunt, masculi foliis ternis albis constantibus, Dod. medicatissimi.

Locus. In aquis pigris & cernosis tardè fluitantibus.

Veritas.

Hanc varietatem flore pleno odoratissimo observavimus in fossa quadam palustri ad læna aggeris seu calæri *Andree* castri dicti, prope portum hupum, in insula Eheni.

His a Læto Lobelio, & ex eo Gerarico, Parkinsono, & Bauhino utitur, *Nymphæam lætam minorem*, quam juxta amensiliensia Thamus fluenta in ulis scrobibus frequentem scribit: Item *Nymphæam albam minorem*, quam in Anglia, vel que Loeshano, Oronium, ac Bistolium dicit locis & trans aquas vianam pigras natis, profunda reperiri asserit. Ego & amici diu utramque quartimus, nequam invenimus in Anglia, aut ab aliis inde dignis inventis audivimus, tantum abest ut frequentes sint apud nos. Ego cerè Lobelio non minimum fido: nam & alias aliquot plantas sponit in Anglia oriri tradit, quas post ipsam nemo quisquam hætenus invenire potuit, nec puto inventurus est. *Nymphææ lætæ minoris* flore fimbriato in Anglia lætis frequens est; fortè hanc intelligit Lobelius, *Nymphææ lætæ minoris Septentrionalium* titulo. *Nymphææ albe minoris* nobis hætenus incognita est. D. Magnol Montpelienis in stagnantibus aquis circa Lateram cum ætate sæpè occurrere scribit: unam accuratè descriptam nobis dedisset.

Veritas.

Nymphææ utriusque, albe & lætæ radix, folia, flores, semen in usu sunt advèrsus fluxus, præcipuè verò gonorrhœam & pollutiones nocturnas, lemnis acrimoniæ, sanguinis æstum & remittentis. Extrinsecis sæpè adhibentur folia & flores ad febriæ æstus & vigilias sopandas (in lotoribus pedum, in incisionibus foliorum sil. lambæ, temporibus, plantis pedum.) *Sched.*

Multè ab læta planta usu cavent, eo timore ne in conatu tum vires, tum desideriam minuantur: comperit enim anax usum lemnis æque radice homines ruidere ad Venæram valde frigidos & tardos. *Plin. lib. 23. c. 7.* oritur generatimque privari scribit qui biberint eam duodecim dies.

Radix *Nymphææ* candidæ vino nigro decocta & pota mensuræ mulierum abundantiam sistit efficaci remedio, etiam in qua de omni auxilio desperarunt. Idem de Semine intellige. *Trag.*

Henricus Petrus radicum *Nymphææ* albe vino coctam & potam commendat in nimio mercurii fluxu, è Dolæ lib. 1. c. 4. sect. 18.

Turtæ perhibent per noctem flores *Nymphææ* in aqua macerare, qua si naræ inungant, vel eadem bibant, curant se à multo gravissimo morbo immunes futurus, & se ab eo preservari possit. Nos ex floribus albis conservam & syrupum conficimus que somnum conciliant, signis tamen quam Paracelsus. Simon Paul. *Quadrup. Botæ. Class. 2. p. 94. 95.*

Experientia suo in excoriatione palati vel Uvulæ & Lingue à materia calida adusta Aq. *Nymphææ* cum Calæa conducitur, ex observationibus Marcelli Cumanii ab Hieronymo Velichio oblat.

5. *Nymphaea alba major Aegyptiaca sive Lotus Aegyptia Park. Lotus Aegyptia Alpin. exot.*

Folia constat numerosis, magnitudine colore atque figura Nymphaeae albae foliis proximis, undiq; crenatis, pluribus lineis seu nervulis per folii superficiem variè discurrentibus, pediculis è caudice ex-
euntibus mixtis ut in illa. Ac nec folia tantum Nymphaeae familiae habet, sed & *capita*, & *radices*, & *flores* etiam magnitudine, figurâ, & colore albis Nymphaeae floribus fundes, singulis singulos pediculis seu caulibus viridibus, rotundis infidentes, aliquantum odore levissimi, ad Viole odorum inclinantis respirantes. Floribus succedunt *capita* rotunda, Mespilo magno magnoq; fructui Nymphaeae albae similia, cortice viridi contexta, intus veluti longos parvulos, folliculos habentia, quae *semen* continent minutum Brasiliæ semini simile. Pediculi tum horum tum foliorum longi sunt, digitum minimum circiter crassi, teretes, cavi, decem fere alterutroque ab eadem radice. Radix rotunda in oblongum, magnitudine & figura ut Pyrus parva, exterius nigra, intus flavescens, pulpa sanè carnosa & dura, gustu adstringens & subdulcis. Proximi verò aucti non superat magnitudinem ovi gallinaei. Indigenæ ex jure coctam libenter comedunt. Videtur cocti intus colore ovi rubrum imitari. Ab hac radice crassa & torosa innumerae fere fibrosae, tenues, colore albicantes radicales procedunt.

In locis nonnullis aquâ Nili fluminis, aestate de more solito aucti, inundatis, ac velut lacuum effo-
ctis (quos locos *Birket* Aegyptii vocant) aëre abundat, ut tota aquae superficies foliis contexta occul-
tetur, plantaeque tandem vivens supra terram cernitur, quoad tota aqua terrâ fuisse absorpta, atq; sic-
cata; quod fieri solet Novembri mensis, quo tempore Loti plantae sub terra occultantur, marcescentibus tum foliis, tum floribus, tum fructibus, cum tota sint planta: quo constat Locum annuam esse plantam.

Id propterea haec planta (inquit Alpinus) habere videtur, quòd quantacumq; sit aquae altitudo usq; ad illius superficiem creseat, florèq; nunquam intra aquam aperiat sed semper supra superficiem ejus, non multum tamen, attollat.

Quae Theophrastus & Plinius habent de mirabili hujus plantae ad Solem conversione, quòd scilicet flores ejus sole occidente se comprimant, capitula integant, ad ortum aperiantur & supra aquam affurgant, se in Nymphaea alba observasse affirmat Prosper Alpinus, ipsam nempe occidente Sole florem claudere, deinde se totum cum foliis sub aqua occultare, eòq; oriente florem primum extra aquam prompre, aperire, atque paulo post cum omnibus foliis supra ipsam affurgere: Nobis certe incredibilia videntur.

C A P. II.

De Tribulo aquatico.

Tribulus dicitur *mej* à *vois* *hâsson*, quòd fructu suo tria vulniscula infingat, vel quòd cuspidatum trifariam feriat. *Bod. à Stapel.*

Tribulus aquaticum J. B. C. B. Ger. aquaticum major Park. Water Caltrops.

J. B.

Ex uno capite *lobulosis* foliis multa, sesquialia, duobus quadrantibus superioribus serrata, supra glabra; subtus rugosa, Populneis quodammodo similia, pediculo palmari & sesquipalmari, fungoso & paulò infra insertionem tuberoso haerentia. Flores parvos albos loquantur truncari *fructum*, *capitula* armata, nigricantes, Castaneis parvis, pulpa nucleove non dissimiles, candido, eduli, gustu haud ingrato, qui, auctore Dod. & recens mandis, & arefactus, mollique coarctis in panem cogi posse fertur. *Radices* longissimae ex intervallo, veluti ad genicula staminum utrinque caeteram prominent, partim in aqua nascentes, partim humo haerentes.

Nascitur variis in locis, ac fere stagnantibus fluviorum partibus, lutosi lacibus, & urbium fossis, quibus limosa sit fundus. Inter Montebelgardum & Basilam observavit J. Bauhinus, ubi floret mensis *Junio*. Martiolus in plerisque Italiae fluminibus & lacibus provenire ait, praesertim in agro Maritano & Ferrariensi: neque solum in dulcibus aquis gigni, sed etiam in mari, quod non credimus. Nos fructus Venetis venales visimus.

Pleniorera hujus plantae descriptionem videbis apud Jo. Bod. à Stapel, Comment. in Theophr. luff. lib. 4. cap. 11.

C A P. III.

De Faba Aegyptia.

HEC planta à nonnullis Nymphaeae speciei censetur ob conformitatem in foliis caule & radice. Flos etiam caetera Nymphaeae similis solo colore purpureo differt. Praecipua differentia est in fructu.

Faba Aegyptia Bod. à Scopel. *Faba Aegyptia Descurida & Theophrasti, sive varia Colusa*
delectat. Park. Faba Aegyptiaca Descurida sive C. B. Fructus valde legum, Faba fœti
Aegyptia Descurida J. B.

Hujus fructum sic describit Clusius, Prægrande Papaveris caput, cujus summum fastigium trans-
 versum fuisse præcælum, referebat; membranaceis enim & rugosis constabat substantiis, lobulosis colo-
 ris, levi admodum, licet eja circumscriptura superior parte rorem efflet uncarum, sensus tamen do-
 crescens, usque ad pedicolum qui fœvis cui fructus succederat sustinuisse videbatur; apparebat
 enim quædam ubi fœvis imbraxisset vestigia: superior porro fructu pars præcisus erat plana, 24. lacu-
 nis sive cellulis serio quadam dispositu prædita, instar fœvi Vespertini; in quarum singula singula
 fœvisa, sive parva nucem, instar pomularum glandulam continebantur, pene unciarum longæ, unciarum
 in ambitu crassæ, quarum superiora pars fœvis erat & in macronem delineabat illi similes qui em-
 mam glandis partem occupat. Infima pars erigulam laciniam habebat, vestigium videlicet ubi pe-
 diculus illam in cellula retinens imbraxisset videbatur: nucleum autem continebat runcidum & sic
 obductum.

Hanc ipsam plantam in insula Java invenit Justus Heurnius M. D. & verbi Divini minister in
 India Orientali, qui eam Nymphae glandifera Batavica Javorum nomine descripsit his fere verbis
 Eja [fructibus] fungosis rugosis calyx est, globum dimidium referens, viridis coloris, qui duodecim
 vel septendecim loculis distinctus est; loculorum quavis glandi similiter fructum continet, ex violaceo
 nigricantem mela albidissimum, coeruleo viridi, adstringentis sapore & siliamari ut Glandium, sic-
 cutum ut Avellanarum. Cauda bicubitali saepe, rotunda, asper, fungosa. Faba ingentia, Batavica
 Nymphae plantæ familia. Flos eam nostratium similes, odoris validi ut olei Anisi.

Loc.

Nascitur in paludibus & ad ripas fluviorum. Hæc è Jo. Bodai à Scopel notum in Theophr. hist. &
 Parkinsoni Thes. ubi plura vide. Hanc plantam veram & genuinam Antiquorum Fabam sive
 præcisam esse nemini dubium esse potest qui descriptiones istar in considerat.

* Hist. Nat.
 Cf. Hist. Ind.
 Cuvier.

Jac. * Boninus plantam hanc vocat Nymphae Indica flore purpureo sic describit,
 Nostros Nymphae in omnibus tam in latæ, quam in montibus, caule & radice plantæ con-
 crevit: flos vero distans, qui in nostrate vel albus, vel flavus est, hic autem palidus purpureus, odore
 gratissimo nullo modo nostrate cedere. Fructus quoque & calyx longe à nostrate Nymphaea distans;
 qui in superficie huc plantæ conspiciuntur, tanquam si per modum cultri distinctus videret: verrucosus par-
 vas, in orbem distinctas super ostendens cicuræ 30. numero, quæ paulatim grandæscens calycem
 sibi unapertus effringit, donec maturata nucem Avellanam dempto putamine cum forma, cum
 nucleo valde referunt; laporem quoque ejus non male emulatur, qui tamen tartarus aliquo modo &
 aquosus est, naturam redolens elementum in quo crescit.

Viribus cum Nymphaea nostrate convenit, sicutque decocto hujus plantæ, à Malis odore, ut
 mur in calidis morbis, Febribus ardentibus, Phrenesie, Cholera, & in morbo dysenteria. Hæc
 è Jo. Bonino.

C A P. IV.

De Millefoliis aquaticis.

A. 1. *Millefolium aquaticum minus* Park J. B. *aquaticum fasciale ad silicem nodis* C. B. *Myl-
 ephyllum aquaticum minus* Clusii Ger. *Small Water-Willow.*

Clus.

L Ant. si fundentibus scapis præditum est, qui rotundi, virides, frequentibusque nodis intercep-
 tatis; è quibus tenues, capillatæque hæræ spargi, quibus telluri adhærere: superior scapo-
 rum pars palmam super aquas emittit, quam ad singulos nodos quæritæ æquum, parvisque to-
 bulis pendentes foliorum alæ ambiunt, vix unciarum longæ, virides admodum, que litam circa
 scaporum humilitatem insistentur, sicut in pyramidalem quasi formam scapi desinant, qui summo
 fastigio nodum foliosum quos foliosum alæ in singulis nodis ferunt, pusillos valde, octonius candido
 foliis simul junctis, nec lete explicantibus, præditos, qui deinde in quadam tubercula, quædam tri-
 bulos in capite habentia transiunt.

Loc.

In lacuna secundum rivum sita, nec profunda, observavit Clusius, Floræ & seminis mense Junio
 onustum: nos in rivulo circa Cangalvigam copiosum sicut invenimus.

A. 2. *Millefolium palustre gallicum* Ger. emac. *aquaticum flore lato gallicum* J. B. *Pal-
 aquaticum lenticularum* C. B. *Wooded Water-Willow.*

J. B.

Tenuissimum filamento totum est contextum, sique sive indigestis; appertis hinc inde crebris ambu-
 latis orbicularibus, Lenticulam aquaticam emulantisibus. Cauda tenues, dodrantalis, nodis, in re-
 tendis abeque parte superiore divisos, flos gerit luteos, maculatos, cucullum referentem.

Loc.

In siliis palustribus Lencolentibus & Elæntibus reperitur. Duas species observavit D. Des-
 marces & murem.

Vocari (supra C. Bauhinn) lenticularum, quia vesicula parve Lenticularis non tantum ubi
 tæ foliosum parti adhærere, sed infinite omnibus foliorum partibus Libydicantur.

Hanc plantam quædam alia Imperitibi descriptam observavimus, ipsi plenius accuratius & descri-
 bere constitimus. E radice lino adhærere vesiculosæ crassæ infusos, terro, crebrisque gemiculis di-
 stinctos, in aqua fluitantes, in ramulos rariore divisos. Ad singula gemicula singula creant fœvis, tam-
 14

si ramo ad extertum hinc inde insigniori: Tum folium reliquum, tum rami dicti ramulos alternatim ab hoc & illo latere emittunt, in tenuia & capillacea segmenta subdivisos, quibus accrescunt vesiculae, pelliculae aqua plene, quae cum vetustiores sunt nigricant & fragiles evadunt velut turbinatorum testa: has *lenticulares* appellat C. Bauhinus. E centro divaricationum ramorum exeunt subinde *cauliculi* crassiusculi satis, firmi, dodrantales interdum, aut longiores brevioresve pro aquarum profunditate, foliis nudis, [versus summities tamen quaedam foliorum rudimenta apparent] in fastigio *flores* gestantes nunquam, sex, septemve, pediculis *lescencialibus* aut longioribus, purpurantibus insidentes, successivè se aperientes, è calyce bifolio seu bivalvi, monopetali, in duo segmenta divisi, quorum superius galeae figuram obtinet, inferius labelli lati, in medio velut fimbriam habentis dentem. Sub labello laetiat calcar seu corniculum breve, incurvum. In medio flore tertia interdum lacinia occluditur. *Vasculum* seminale parvum, subrotundum, figurâ seminis Lathospermi, unicum intus includens semen, rotundum, sulcum. Folia juniora virefcunt. In extremis ramulis, nunc [Julio mense] gemmae insignes oemuntur, ad tactum admodum viscidæ.

Floret Julio & Augusto, & semen brevi maturat.

In piscinis, inque fossis palustribus occurrit, sed rarius.

Tempus.

Locus.

CAP. V.

De *Cotyledone aquatica.*

- A. 1. *Cotyledon aquatica* J.B. *aquat. acris Septentrionalium* Led. *palustris* Ger. Park. *Ranunculus aquatilis* *Cotyledon folio* C.B. *Marsh Pennywort, White Not.*

Ventriculis rotundis, crebris geniculis interceptis, vel sub terra, vel in superficie terræ reptando se propagat. E geniculis tum fibrilla seu radicle albe creberrimæ, tum folia, tum etiam pediculi flores sustinentes exeunt. *Folia* circinatae serè rotunditatis, crassa, digitem lata, per margines leviter crenata, glabra, pediculis semipalmatis aut majoribus summa parte hirsuta, eorum centra occupantibus insident, fibræ inde in foliorum margines velut tot radii ductæ. Ex alis foliorum exeunt cauliculi seu potius pediculi digitales, tenuis, infirmi, in summitate flores aliquot glomeratos [octo interdum aut plures] sustinentes. Singuli autem flores quinque perexiguus, acutus, dilute rubentibus foliis componuntur, & summitati seminum singulorum, seu fortè binorum, conjunctorum, nodorum insident, velut *Thlaspeos* cupillam compressorum. Interdum in eodem caule bini habentur, alius super alium, florum & seminum glomeris: bitu quoque non rarè ex eadem folii sinu exeunt pediculi floriferi. Sapor plantæ mihi potius amarus quam acris visus est.

In palustribus frequentissima est hæc planta: post mediam ætatem floret.

Panta est singularis & sui generis: folio quidem *Cotyledonem* veram exactè refert, verum caule, flore & semine immane quantum ab eadem differt.

Locus.

- * 2. *Cotyledon repens Brasiliensis*, Erva do Capiraon *Lafraus* Marggr.

Marggr.

Radix recta, teres, geniculata, alba, sub terra serpit, & ad genicula unius aut duorum digitorum intervallo distans, multa agit filamenta tenuia, & ibidem caulem [rectis pediculis] duo aut tres, etiam octo aut decem digit. alium protrahit, exilium, stragem, titulosum, ex albo purpureum, inferius in medio folium lentum habentem: quilibet autem caulis tert superius unicum folium rotundum, lætè viride ut *Nymphetæ*, non ita solum, in ambitu crenatum mox folii Umbilici *Veneris*: caulis in centro folii aut circiter inseritur, & ex centro insertionis tenuis vena ad circumferentiam disperguntur. Radix contra odorem & saporem habet radicis *Petroselinæ*.

CAP. VI.

De *Stellaria aquatica.*

- A. *Stellaria aquatica* Park. *Millefolium aquat. 17. sive Stellaria aquatica* C.B. *Alime aquatinnatans foliis longiusculis* J.B. *Water Starwort, or Star-headed Water Chickweed.*

J.B.

Lenticulae modo aquis innatat, longis, tenuibus, teretibus, infirmis *subosis*, pedibus & cubitalibus ac etiam longioribus, in ramulos subinde abortivis: è quorum geniculis non tantùm demittuntur fibræ tenuissime & albæ quibus radiceatur, verum etiam bina folia per geniculos oemuntur, *Alines*, semineam serè longa, ex angustiore principio sensim parùm dilatata: extrema autem ramulorum super aquam coarctant folia multa, alia alii imposita, lanora radiatimque digesta, decrefcntibus semper interseclibus. Ad singulos caulis articulos *folioli* bini oppositi, hinc inde unus, è foliorum sinibus exeunt, duobus foliis albis, ad se invicem flexis compositi, cum stylo albo pro flouculi proportione longissimo, hinc apice insigni. Flouculos excipiunt *vascula* spiritalia ex rotundo paululum compressa, quatuor lineis albis impressis in quatuor partes distincta. In vasculorum luminatibus emergunt pili aliquot nigri velut apicem constituentes.

C A P. VII.

A. *Militaria* *Arzoides* Gen. *Serratites* *frax* *Milovis* *Arzoides* Park. *Alis palustris* C.B. *Alis* *frax* *Arzoides* *palustris* J.B. *Water-Sengreen*. or *Fresh water-Souldier*.

J. B.

Folia habet Aloei herbarum similia, sed breviora & minoria, per ambum duris quibusdam, brevibus aculeis spinosa; inter quae vaginae quaedam erumpunt, cancrorum foeculis similes, quibus deflorescentibus flores exeunt candidi, trium foliorum, Ranae morsus perfimiles, luteola exigua flamma in medio gerentes. Pro radicibus fibrae longe sunt, rotunda, candida, crassioribus lyrarum fidibus, aut longis lumbricis perfimiles, quae ab ipso folia promente brevi capite descendentes aquae fundum petunt, quem tamen variis assequuntur. Exeunt ab eodem & aliae oblique fibrae, quibus uti Ranae mortis multiplicatur.

Luc.

In fluentis pignioribus, stagnantium aquarum lacubus, & fossis palustribus majoribus non raro invenitur, maxima foliorum parte una cum floribus aquas superante; reliquis stirpis partibus sub aquis conditis. Junio, Julio & subinde Augusto floret in Insula Elienii.

Ceterum fibras, quas pro radicibus habet, scelerati Agyrtae, in aquae plena phiala, quod majores apparent, mulierculis ostentatas impudenter montuntur vermes esse, quos medicamentis suis ex intestinis eduxerunt, teste Dodonaeo.

C A P. VIII.

Stratiotes Aegyptia J. B. *Strat. aquatica* *vera* *Dioscoridi* & *Aegyptiaca* Park. *Lenticula palustris* *Aegyptiaca* *frax* *Stratiotes aquatica* *folia* *Seda* *majora* *latiora*.

Alp.

Prope Pelusium, nunc Damscaram dictum, Aegypti urbem, in fossis aquae Nili decurrentes plenis copiosis provenit haec herba, aquae Lenticulae palustris modo supernatans, sine caule, foliis Cynoglossae, brevioribus, latioribus, densioribus, durioribus, infusioribusque ac albidioribus, a quibus pro radicibus exigua & rara quaedam lantigo pendet. Seda majori similis est; Nullo odore praedita, eo excepto quem ab aqua accipit; sapore tamen adstringente ac hieco linguam ferit, non locus quam Acacia.

* Lib. 4.
cap. 102.

Hanc plantam Antiquorum Serratotem esse minime dubium videtur. Stratiotes enim, teste * Dioscoride, fluvialium cognomen ex eo traxit, quod in aquis nascatur, inque in supernatans sine radice vivat, quantum solum habent Aizoo simile, ac majus. Plinius vero tradit eam in Aegypto tantum ex inundatione Nili nasci; Aizoo etiam similem esse, si majora haberet folia.

Stratiotes Aegyptia *Dioscoridi* *Veslingio*.

Cum in eodem loco, nempe in Nilo prope Pelusium observata sit ab Autore Cl. Veslingio a precedente non diversam esse suspicor, quamvis nec descriptiones nec icones per omnia conveniant.

Folia hujus, describente Veslingio, Aizoo quidem, sed majori illi & arborecenti similia dicerent, si majora multo forent pariterque latiora. Surrecta pleraque videntur, rotundaeque concessu striata, & citra male utatis dispendium plaris in longitudinem rugisque non ineleganter crispata. Circa exortum, ut solet, angustiora folia paulatim deinceps dilatantur: extremorum altero non in acumen exeuntia, sed reflexis leviter oris paulatim diducta sunt: caetera dilutius virescentia, Verbasci instar molliter utrinque hirsuta. Flores non observavit. Planta tota sessili base Nilo incubat aquis innatans circa radicem, quamvis radicem vicem demissa secretam versus tenuissima, fibrarum veluti filaments sustineant.

C A P. IX.

Len palustris latifolia *pumilata* Park. *Lenticula palustris latifolia* *pumilata* C.B. *Len palustris* *Patavina* J. B.

J. B.

Ad unam costam longiusculam adnascuntur utrinque, in alae modum folia densio agrimine multo se plurimum tangerentia, ex oblongo rotunda, semuncialis superius punctis minutissimis notata, inferius mulco obducta. His inferius copiose Lenticulae, aliquando singulae, aliquando tenae & quaternae, rugoso praeterea cortice donatae adherent, quibus semen copiosissimum minutissimum & havelcens includitur. Sapore est aequo.

Luc.

Hanc in fossis Patavinis aquae supernatantem vidit C. B. & in Silesia circa Vranislarum reperit.

Haec planta rectius fortasse ad Capillares refertur.

CAP. X.

A. *Graminis folia palustris repens vasculis granorum pipere amala.* Pepper-grass.

Peregrina hæc planta per terram repit foliis tenuissimis; in aliis foliorum globulo sessilibus profert granorum pipere magnitudine sætè, seminibus albis refertos.

CAP. XI.

Gramen Offitragum Norwegicum & Cæmbricum.

Hæc planta impropiè Gramen nominatur à S. Paulo & Bartholimo, quia non est flore stamino. Radix ejus crassa, nodosa, instar radicum seu raparum Rothfeldianarum folia longa, acuta instar Iridis, flos flavus colore saturato. Locus paludosis & humidis crescit inter alia dumeta prope omnes villas colonorum; primum gramen est quod vere prodit, unde avida sunt pecora ad decerpendum; ex esu hujus pecora male se habent, macie contexta, spina dorsi extrà protruberante (undè rustici dicunt quod dorsum sit fractum) pedibus ossibus, debilibus, ut ægerime incedere queant. Pro Antidoro Rustici semper habent ossa exiccata in promptu, in parva frustra contracta, quæ quotannis magnâ copîa colligunt, & conservant ad hunc usum; hæc avidè devorantur ab arthriticis bovibus, vaccis, ovibus, equis, porcis, &c. & in minima dentibus comminuntur, & deglutuntur unde salvatio subsequitur, & pecora convalescunt; alij pro remedio utuntur radice Tormentillæ, omnes tæcè tamen ossibus acquiescunt.

An hæc phenomena producantur à sodinis mercurialibus vel plumbeis, eorumq; effluviis, vel à superflua humiditate vernalis plantæ, contendant Philosophi.

Notandum est variare plantas pro diversitate solis, loci, & Climatis, in quibusdam enim regionibus hæc herba innoxie à bestiis consumitur (adnotant Bartholimo) & à Chirurgis usurpatur pro Centauro minore; in aliis verò tam perniciosa pecoribus & odiosa rusticis, ut ista loca circumsepant in quibus copiose hærrat. Vide D. Joh. Frid. Treubleri Observ.

Suspicitur D. *Tancredus Rehisus*, (qui omnes has observationes de gramine Offitrago collegit) hanc plantam esse vel Centaurium palustre luteum minimum nostrum Catalog. plant. Angl. vel Ranunculi gramini aut potius Aspidodoli speciem.

CAP. XII.

A. *Gladiolus lacustris Dortmanni* Clus. cur. post. p. 40. *Leucium palustre flore subseriale* C. B. *Gladiolus lacustris Clusii, sive Leucium palustre flore caeruleo* Bashini Park. *Water-Gladiol.*

Hujus folia dodrantalem longitudinem raro excohlent, crassiuscula & concava sunt, interstitiisq; discreta instar siliquarum albe Viola & similium, viridis alioquin, & dulcis saporis, ananibus urinantibus gratum pabulum; nam ad aliquot ulnarum altitudinem sub aqua latent, quam tamen caulis inter illa emergens superare conspicitur, floribus albis ornatus, Leucium flore simplicibus, cava illa & infima parte, pedicelo à quo dependent proxima subseriale coloris, formam parè referentes Gladioli, non procius tamen similes, quinque foliis constantes, quorum duo superiora ad pediculum reflectuntur, tria reliqua, quæ latiora, propendent. Floribus succedunt turbata vascula, rursu semine plena.

Nascitur in stagnis quorûm fundus puro sabulo subternitur, nullam alioqui plantam præter hanc valente. Sub extremum Julium florentem se observasse scribat Dortmannus apud pagum *Nierb & Wesserseld* in Drentia, nusquam alibi. Nos in lacu parvo aut stagno *Hulswater* dicto non longe à *Perrè* Combrælandiæ oppido copiosim observavimus.

SECTIO II.

Anomala Siliquosa.

CAP. I.

De Acæto.

Acæti potri in florem sui nominis versi fabula nobilis quem *Pæderota* à pueris, ut suspicatur *Kyberis* amore Græci vocant. *Melampyllum* etiam non inceptè à Græcis dicitur hæc herba, quod folium saturato viroce nigrescat. Planta est singularis & anomala, quam *Botanici* vulgò ob folia in Sylvestri genere spinosa *Cardus* annoverant.

U u u u u

• Dicitur

Dicitur verò Branca urfina à similitudine quam folia habent cum anterioribus urfi pedibus.

Acanthi folia veteres Architecti ob figuræ venustatem & elegantiam epistylis seu columnarum capitalibus insculpere solebant. Frondibus Acanthi (inquit Vitruvius) columnas Corinthias veteres Architecti coronabant, quantum effigies adhuc hodie nostris frequenter oculis offerunt. Vestibus etiam pretiosis figuram Acanthi foliorum circumtexebant: unde Virgilius,

Et circumtextum creces velamen Acantho.

Verùm an Branca urfina vulgaris sit verus Antiquorum Acanthus merito dubiatur, quia Plinius Acanthum topiarum herbam facit, Branca autem urfina operibus topiariis omnino inidonea est, nec enim ductilis & sequax, & in Animalium aliarumque rerum formas & effigies fingi apta. Ex altera tamen parte Acanthi descriptio apud Dioscoridem Brancae urfinae perbellè quadrat. Confule si placet Jo. Bod. à Stapel. Comment. in Theophr. hist. lib. 4. cap. 3. p. 308.

1. *Acanthus sativus* Lob. Ger. Park. *Sativus* vel *milla Virginis* C.B. *Cardus Acanthus* sive *Branca urfina* J. B. *Spanh urfine*, or *Beers-bjreech*.

F. B.

Acanthi folia humi fusa, pedalia, profundè laciniata, mollia, intenso virore splendens, pilosa. Inter hæc surgit caulis duim trime pedum, rectus, firmus, folis nudus, minime ramosus, qui à medio ad summum usque fastigium thyrsium gerit florem candidorem, quorum folia rictum imitata, oblonga, foliis coercentur viridibus, per extremum laciniatis nonnihil & spinosis, mollium occupantibus *hamulis* crassiusculis. *Semes* in oblongis continetur pericarpis, latum, planum, rotundum, crassum, foetidè luteum. *Radices* longè, lateq; vagantur, foris nigre, intus albe, sapore glutinoso & viscido, ut & folia: adeò vivaces ut vel minima particula in terra relicta gominabit; frigoris tamen minus patiens est.

In Italia meridionalibus circa Baas & Neapolin, inque Sicilia insula copiosè provenit.

Levu.
Voca.

Est è quinè, herba emollientibus. Uti potissimum externus est in dysteribus aliisque paragonicis, quarumcumque formularum & unquam in cataplasmatis. Radices, aurore Dioscoride, ambulis & laxatis commodant in cataplasmate impositæ. Potz urinam ducant & alvum sustant. Podagra calidis trite & caliditate utiliter illinuntur. *Pis.* Prostant etiam tabidis, sanguinem spuentibus, ex alto delapsis, lectu aliquo aut conatu supra vires laeso [ruptis atque convulsis Diolc.] non minus quam Symphyti majoris radices, quas substantiâ, lento succo & qualitate proximè refert. *Dad.*

2. *Acanthus aculeatus* C. B. *Sylvestris* Park. *Cardus acanthus* sive *Branca urfina spinosa* J. B.

Dad.

Sylvestris Acanthus caule, fastigio acuminato, floribusque cinctis, florum colore ac specie, tum & semine luxuriam refert, sed tamen brevior ac humilior: folia similiter ampla, multis incisuris laciniata, sed haudquaquam lævia, verum frequentibus, asperis, dura spinis circa marginum crepidines horrentia.

C A P. II.

1. *Leontopetalon* Ger. Park. C.B. *Leontop.* *quorundam* J. B.

Radix pagnam implet, rotunda, tuberibus multis inæqualis, cortice cinereo, pulpa virente in luto, sapore amaro. Hinc exeunt pediculi pedales, trifariam divisi, quorum singule divisionis bina aut tera gerunt folia, circinatae ferè rotunditatis alia integra, alia laciniata & veluti crispæ, colore ex glauco flavolente, venosa. Inter folia caulis exurgit, lutes pallidè purpureis striatus, in multis ramos divisus, foliis minoribus minutisque incisus ad genicula donatus. *Floris* in uncialibus pediculis foliis oblongis interjectis, in caulibus spicatum congesti, lutei, Ranunculi florum magnitudine, quinque stellatis oblongis foliis constant, *apicibus* luteolis umbilicum circumstantibus; quibus marcescentibus prolongantur pediculi in palmarem longitudinem, in extremo utriculo venosum Halicacabi sustinentes. *Semes* nigrum, Cantæ Indice semini persimile. Parkinsoni siliquas parvas foribus succedere scribit, crassiores & breviores quàm Fumarie bulbosæ, aliocum nonnihil similes, *femina* parva, rotunda conatentes: quin & totam plantam Fumariam bulbosam quodammodo emulati.

Levu.

Circa Halepam Rauwolfius reperit. Matthæus in Hetruriz arvis aliisq; Italiae locis se vidisse ait, nascique frequentem in Apulia.

Radix usurpatur in Halepo ad detergendas vestium maculas.

2. *Chrysothymum* Park. *Chrysothymum Dissectum quibusdam* J. B. *Leontopetalon affinis foliis quæru* C.B.

F. B. Rauwolf.

Alumidinem Leontopetali adsequitur, estque huic caule, floribus, radiceque rotunda (quæ interna parte rubra est) haud abstantis. Cauliculi tamen graciliores, in terram repandi, & ab origine filio modo tenues, in varios ramulos divisi, quorum extremis *stipulis* adherent conspicui, lutei, densiorèq; stipatu positi, quatuor communiter foliis constantes. *Folia* coliciderum dorso adherent gertina utriusq; & ita filii invicem opposita ut crucis figuram positi suo efficiant; atro-virentia, in extremo lacerata, dissecta ad instar foliorum *Quærua*.

CAP. III.

De Sefamo.

Sefami nomen inditum videtur *ἐπιτὴν εἶδος*, quod quandoque *εἶδος* denotat *concreta, impella, & apud meto*, quod subito & quasi impetu ad mellem propelleretur. Potius nomen exoticum est, ab Ægyptiis sumptum, quibus *Semysen* dicitur. *J. Bod.*

Sesamum J. B. C. B. Park. & *alium Lustrum* Gergelim. *An Gargila sive Sesamum Africanum* Pisoni & Maregrav? *Silp purging Spain.*

J. B. Vesling.

Per *caulem* cubitalem, rectum, firmum, crassum & pinguem *filia* habet seminealibus pediculis haerentia, crassiuscula, ex atro virore nonnihil rubentia, oblonga, acuminata [inferiora latiora & profundioribus incisuris serrata, superiora integris, ovis angustius patentia *Vesling*] & quorum alii *forti* emicant calathii formâ, oblongi, magnitudine eximia, monopetali, reflexis labello, intus alladi, exterius Violæ colorem induti, tenui, vesperis lanugine. *Silpae* rectâ secundum caulem ascendentes, non quaternis tantum sed etiam quinis feris, lateribus angulose, stellatam occupant *caulem*, oblongum illud, compressum, pingue, flavescens, *semen* in *caule* custodientes.

Ægyptiis tum in cibo, tum in medicamentis utilissimum est, quod cum reliquis frugibus, postquam arentes campos fecundis suis temperavit Nilus, celeri proventus surgens siliquâ minime fallaci cultorem suam locupletat. Parkinsonus, nescio quo Autore, Sefamum in India Orientali sponte nasci ait, in Ægypto, Syria, Græcia, Creta, Sicilia, in agris dantaxat, feri & coli.

Oleum feminibus expretum *est ἔλαιον Ζειδ τάλι*, i.e. Oleum bonum Arabes nuncupant, quod ad cibos in frequentissimo usu est, majorique pretio quam Olivarum oleum in Ægypto venditur.

Marggravius *radicem* teneram, rectam, multis filamentis præditam, exterius ruffam, interius albam huic plantæ attribuit, si modo eandem plantam describit.

Plantam hanc non esse verum Antiquorum Sefamum nobis cum J. Bauhino & Stapelio videtur, ideoque an vires à Dioscoride Sefamo adscriptæ ei conveniant dubium est. Is ergo omittis, quas proponit in libro de Plantis Ægyptiacis Prosper Alpinus, adferemus. Plantæ (inquit ille) decocto utantur in febræ ad ophthalmias, ad tussis, anhelantia, difficultatem, pleuriticam, peripneumoniam, & tumores duros scirrhosos: Mulieres pro uteri duritie inflexiones faciunt, & utuntur ad capitis furfures litorisq; faciei: planta & feminibus coctis cum melle ad exsiccatos nervos, ad combultas partes, ad calidas inflammationes: Decocto in clysteribus ad colicos dolores, & ad emolliendam alvum: Ad movendas menstruas purgationes. Oleum factumq; ejus bibere ut impungant mulieres in balneis familiarissimum habent. Oleo etiam ad multa alii Ægypti uti consueverunt, viz. ad cutis pustulas, asperitatem, atq; omnem defundationem ex humore melancholico tum epoto, tum in cibis frequentato, vel ipsis affectis partibus inunctis. Secretum apud quosdam ad cutis pruritus, ejus quatuor uncias multis diebus bibendas exhiberi, ad anhelantia difficultatem, pleuriticam desperatam, peripneumoniam, ad movendos menses, atq; ad vehementes stomachi, intestinorum, uteriq; dolorum cruciatu demulcendos intus & extra.

CAP. IV.

Balsamina femina C. B. Get. Park. *femina Persicifolia* J. B. *The female Balsam Apple.*

J. B.

Radix fibrosa & candida nititur: *Caulem* autem habet enormis crassitiei, cum altitudo cubitum sepe vix aequet, raro autem & parum superet: est n. vero coerulea aut ruffa, aut rubescente aut herbido tectus, ad genicula nodosus, succo satuo pregnans, glaber fore, cum interien rami, quos nullo ordine crassi tomento levi veitantur, *folia* denic stipati Salignis aut Persice, acuminata, per ambitum serratis, succulentis, sapore amaricante præditis; & quorum alii *forti* simul plures Pericariae siliquole profiliunt, calcari longo, ex carneo colore herbaceo, reliquis vero flos rubicis, pediculis brevibus insidentes. [Est autem tias hexapetalos, folio supremo lato, infimo huic opposito concavo & in corniculum incurvum producto, binis lateralibus inferioribus oblongis, latis & propendentibus, latiusque appendice velut geminis; superioribus duabus brevibus, parvis.] *Fructus* figurâ ferè Balsaminæ maris, acuminatus, verrucosus, in plures partes se contorquentes si digitis leviter prematur delibescens, *semina* ejaculatur parva rotunda ex ruffo fusca seu pulla.

De loco natali nihil certi traheum invenio. Tenella est planta: semen raris apud nos perbit, nisi diligens cura & cultura accedat; quotannis ferenda.

CAP. V.

- A. *Perficaria squarosa* Ger. *Noli me tangere* J. B. *Mercurialis sylvestris* Noli me tangere *dilla*, sive *Perficaria squarosa* Park. *Balsamina lutea*, sive *Noli me tangere* C. B. *Codded Knot* Mart. *Quick-in-hand*, *Couch-me-not*.

Col. J. B.

Summo cespite radice agit fibrosas, à quibus *Caulis* surrigitur cubitalis, tenerior, diluissimè virens, uti in imo purpurascit, levis, inanis, tranilocidus, copiosum succum insipidum pressis remittens, per intervalla geniculis, ad quæ topheorum podagrorum æmula sunt tubera, interceptus. *Folia* alternatim posita, Mercuriali hortenstisimilia, majora parum, latiora, & circa petiolum longioribus acutioribus dentibus serrata, magis lunata, basi latiore. Ex singulis foliorum alis petioli exeunt longi, tenues, in terram inclinati, tribus vel quatuor ramis divisi, ex quibus flores, cum parvi & inexplicati virides, & Balsamine floribus similiores dependent, per dorsum binis foliis viridibus colligati, maritimum monstrum magno hians ore representantes, parvo corpore, & caudâ tenui, brevi, recurva, & acutâ, bubulino cornu simili, ad Fumarie bulbosæ flores accedentes, quadruplo majores & magis sanguineis guttis respersti, cavi, inanes, huantes, divisura sive barbula sex distincti, sed inferioribus longioribus. J. Bauhino Nassurtii Indici floribus assimilés, minores, ex flavo rubentes, punctulis rubris saturatis, guttatis, in quorum medio exalbida stamina. His succedunt *siliquæ* duas uncias longæ, tenues, nodosæ, ex albo virentes, lineis virentibus striatæ, in terram nutantes, quæ cum perfici incipiunt, disrumpuntur, etiam ante maturitatem, vel vento impulsæ, vel manu tactæ, & *semina* ejaculantur etiam imperfecta, quæ oblonga, compressa, virentia primum, deinde cinereo & fusco colore evadunt. Autumni initio floret, & illas sine pericitur. Annuæ est planta.

Locu. Umbrosis, humentibus, uliginosis locis oritur. In Anglia rarissimè occurrit, ad ripas lacus *Wandermeri* dicti prope *Ambleside* oppidulum in Westmorlandia observatus: in transmarinis sylvis & umbrosis vadis ad latera montium locis Rhenum in Germania sæpius invenimus.

Virt. Miram hujus herbar vim in cienda unia pluribus experimentis confirmat Gesnerus. Aqua destillata in hac parte adeo efficax est, ut si copiosius bibatur diabete inducat. Hanc Vranillavie in calculo renum minime prædicant. Nonnulli herbar hanc per vomitum & coëssum purgare aiunt. Cuti imposita eam *esulom*. Facultate fertur perniciosâ, ac inter deleteria hâbenda. *Dod.*

CAP. VI.

1. *Hypecum leguminum* Clusii Park. *Hypecum* C. B. *Hypecum siliquosum* J. B. *Cymidium corniculatum* sive *Hypecum Clusii* Ger.

Radix ei simplex, interdum bifida, longa, annua tamen, exterius fusca [Clusio subhæva] paucioribus fibrillis capillata. *Folia* multis incisura divisa, Fumarie heræ, pallidè viridia & nonnihil glauca [Clusio figurâ, colore & aspectu Rute foliis valdè similia, molliora tamen & interdum longiora. *Nobis figurâ & sermone Ruta folia non admodum referri videntur, nisi Ruta nomine Paganium Narbonensem Loh. intelligat*] *Cauliculi* complures, nonnihil compressi, aliquotque foliis destituti, ubi flores emergunt foliosi. *Flores* pediculis insident, parvi, lutei, (& quantum memini) bifidi, aut saltem foliis duobus adversis, triangula, grandioribus & conniventibus donati. Clusius flores pusillos, flavos, latis odoratos, hexapetalos ei attribuit, sed mirandâ figurâ, nam duo-petala habent reliquis majora, nervo viridi formæ extrema parte (quæ obtusior est & veluti compressa) prædita, quatuor alia peræqualia sunt, & vix nisi flore expanso conspicua. *Cornicula* succedunt in singulis ramulis quaternæ aut plura, longa, plana, articulis distincta, & falce instar incurva: *Semina* in singulis internodiis nigrescens, longiusculum, quod difficulter admodum eximi potest, continentia.

Locu. Reperitur in Gallia Narbonensi, v. g. non procul Montpelio, ad ripam stagni, non longè à thermis Ballerucanis antè facellum, & abbâ in Hispania copiosè agro Salmanticensi, Granatensi, &c. Nos eam in lingua illa inter portum Meilanensem & fretum Siculum invenimus.

2. *Hypecum alatum* Park. *Hypecum alatum* sive *Hyp. alatum* C. B. *Hyp. alatum* *Discoforida siliquosum* Ad. Leb. *Cymidium siliquosum* Ger.

Leb. Ad.

Hæc nimis cognita, exigua & pulchra, non procul Aquis Sextis orunda, complura gerit *cornicula*, siliquosa, adunca, Scorpioidis dictæ modo, sed crassiora, *semine* intus præsepole distincto colore flavo, oblongo: *cauliculi* graciles, teneriusculi, & *folia* parva Carui aut Scandicis. Pectinis Venerei Fumarie incisura profunda: *exigua radice*: lutei *flores*, Maio mense Chelidoni majoris aut Emacæ, sed minores.

Discoforidi, Plinio, Galeno natura Hypecoi eadem quæ Papaveris succo. Ejus succus instar Opii somnium inducit ex observatione D. Hermanni D. Palmer.

CAP. VII.

Clematis tetraphylla Americana Zanoni, Bocconi, Moench.

Racc.

Rara hæc & peregrinae elegantiae planta à *Radice* perenni, lignosa *Caulis* praeurit plurimos, quorum qui vetustiores lignosi quosq. sunt, novelli verò teneriores, prolixi, geniculati, rotundi, graciles, junctis, lyrarum fidumve chordis pares, quibus tanquam capreeolis & viticulis usâ (leguminum & bacciferaum scandentium more) pergulas aut pedamenta proxime astantia, hortensicq. scenas scandit, quibus facili negotio innectitur easq. convescit: Folia quippe luxuriat, quam c singulis geniculis bini pediculi contra se positi nascantur, binâq. singuli *folia* sustineant longa, pulchre viridantia, ad Mali Perficæ sive Hemionidis vulgò exdilatate faciem colore suo accedentia, inter quæ medius exit *capreeolis* intortus, quo adminiculo cuæque propè assistentia apprehendit. *Flores* fecundum cauliculos ad foliorum exortum c pediculo unciali pendent, decenter incurvi, oblongi, cavi, rotundi, fortâ atq. magnitudine florum Digitalis hinc minoris, per oras similiter incisuris quinâ, variè divisi, colore qualis in Avellana nucis cortice, vel Cannella aut Cannamomo vulgò dicto conspicitur, quatuor vitâ *staminibus*, singuli *stibus* bini gerentibus foliaceos, nigricantibus maculis notatos. Subsequuntur *siliquæ* figurâ Smilacis hortensis, quibus *semes* includitur.

Hyeme superest, frigoris (in acerrimum fuerit) patientissima. Florentia videtur in hortis cultum.

CAP. VIII.

Cassaya Brasiliensis Margg. Euphrasia affinis Brasiliensis Siquisâ.

Margg.

Etiam *radicis*, alba in pedalem assurgit altitudinem, *caule* quadranguli, pallidè viridi, geniculato, tenui, qui partim terræ incumbit, partim erectus stat, ad genicula quæ terram attingunt sterum radices agens. Ad quodlibet geniculum duo foliola sibi opponuntur, Nummularie magnitudinis & figurâ, seu rectis Veronicae aut Chamædryos, in ambitu serrata & pallidè viridia. Ad quodlibet par foliolorum *stipules* minima provenit, quasi galeata, alba. Post hæc nascitur *siliqua* gram Avenæ magnitudine & figurâ, quæ sponte lo *apertis* semine effundit minimum, rotundum, obscurè flavum, minus semine papaveris minimi. Nullus odori est planta, sed saporis amari.

Hæc planta contusa, cocta in aqua ac pota purgat egregiè per superiora ac inferiora.

Folia in caule oppositis, serratis, floribus galeatis, semine vâculis incluso cum Euphrasia convenit, quo etiam poterat referri.

CAP. IX.

Mucosia Angolensis Margg. siliquis incurvis. Pentaphyllum siliquis mucosâ Angolens.

Margg.

In pedalem circiter altitudinem assurgit *caule* tereti, conorto, quem circumstant *foliola* parvula, & hinc inde ramuli circiter duos digitos longi, quorum singuli sustinent *stipulas* ex albo libuteo. Sequuntur dem *siliquæ* incurvate, obovatae, tenues, in quibus multum *semens* nigri, rotundi, majoris quam Papaveris. Usurpatur à Nigris in cibo.

Hujus plantæ, semen c Brasilia aliquoties missum nomine Mosambes d'Angola J. de Lant feliciter pullulavit, nec tantum folia & caulem produxit, sed & floruit liberaliter, & semen tulit, quod tamen à levissimo frigore, initio Octobris, cum ipsa planta corruptum fuit. Est autem (inquit) elegantissima planta, foliis similibus Pentaphyllo, stipula singularis conformationis, sed minus admodum; siliquis contortis.

Ex Africa in Brasiliam translata potatur.

Linn.

CAP. X.

Trofolium siliquisum Brasiliense, semine cochleato Margg. Caspionga III. Pisonis.

Herba hæc, quæ topice nascitur in *suo omnium Sanctarum* ex *radice* recta, paucis filamentis præbita, articulata penè figurâ ad utrius aut duorum pedum, altitudinem assurgit, in multos ramulos expansa: Sanguis *caulis* ramuli lignosi, atq. hinc inde acuta spinis muniti. In pediculo proprius in quolibet ramulo tria *foliola* sibi invicem sunt opposita, more Trifolii. Hinc inde proveniunt in pediculi digitum longis, *stipulis* ex viridi albi, magnitudine florum Anagallidis, tubula staminata in medio habentes. *Stipulas* sequuntur *siliquæ* teretes, circiter duos digitos longæ, in quibus semen rotundum, referens Limacis concham, coloris epuræ. Quando semen est maturum siliquæ sponte *dissiliunt* & effundunt semen. Herba odorem habet inter Fœniculi.

Salspice

Suspicio Trifolium hoc congener esse Trifolio liliquoso flore tetrapetalo, lib. 17. cap. 3. descripto.

CAP. XI.

De Epimedio.

Epimedium Dioscoridis & Plinii quamvis herba sit inter Botanicos non convenit: Discrepantes sententias vide apud J. Bodanum à Stapel Comment. in Theoph. hist. & Parkinsonum. Cur ita dictum sit produrum non invenio.

Epimedium Ger. Park. C. B. *quorundam* J. B. *Barrenwort*.

Radix obliquè agitur, nec altè demersa, gracilis satis, longè latèque sub terra reptans & se propagans. Hinc surgunt pediculi dodrantales, atque etiam cubito altiores, tenues, polii, rigidi, in ternos furculos divisi, quorum singuli rursus in alios ternos dividuntur, ità ut unicuique folium hæreat unum, hederaceum, ex rotundo oblongum, rigidulum, acuminatum, nervosum, averfa parte glaucum, superius ex viridi pallescens, juxta pediculum pinnis duabus subrotundis, quarum altera, altera longior donatum, circumcirca multis denticellis crenatum, tenue & velut membranaceum. Peculiaris quidam ramus paulò infra primam ramorum divisionem exit, palmatis aut dodrantalis, in ramulos divisi, quorum unusquisque plures. [*tres Park.*] *gerle floris*, privatis petioli hirsuti nixos, structuræ singularis quadrupartitis ità ut tetrapetali tantum videantur, cum revera octapetali sint. Petalis enim exterioribus quæ latiora sunt & rubicunda, exterius tamen ex luteo rubentia, & lineis albis striata, interiora minora & lutea arctè superincumbunt, unde inferiorum petalorum marginibus circumcirca se ostendentibus, hos negligentius intuenti tetrapetalo videtur, medio flavo marginibus luteo. Medium florem occupant spaces crassi lami, Floribus succedunt *siliquæ* tenues, oblongæ, [*coarctatæ*] semina compressa, rubentia continentis. Florem descripto Parkinsoni esse verum si adhuc curiosis observari desiderant, nec enim de interioribus petalis flavo mihi satisfactum est, an revera petala dicenda sint, & an quaternis; quantum enim memini, mihi conspecta singularis cujusdam substantiæ erant, & unicum corpus constituebant, in quatuor tantum obtusas laciniis divisum.

Leon.

Cæsalpius in montibus Liguriæ provenire ait. Camerarius propè Vicentiam in Italia. Bauhinus uterque in montibus Egaricis inter Balneum Aponense & Arqua, in Romania, locis humentibus & umbrosis. Nos in Alpibus non longè à *Pisobæ* oppido, quod territorium Venetum & Imperiale determinat observavimus, unde montium incolam esse apparet. Floret Aprilis aut etiam feris in regionibus frigidioribus. In hortos translatum ob importunum radicem reptatum coerceri requirit.

De viribus nihil traditum invenio, nam quæ Veteres de Epimedio habent an huic herbe conveniant non magis certum esse potest, quam quòd hæc quorundam Epimedium sit.

CAP. XII.

Guaiaca Timbo Pison.

Non sine & noxia qualitate reliquis *Timbo* speciebus simili, ceterum dissimilima apparet, quæ sola in Medicos usus recepta est, nec frondibus destituta sicut pleræque *Timbo*; sed floribus, foliis magnis, glabris, acuminatis hinc inde vagatur, atque in caulis extremitate tenuibus *siliquis*, levibus, cubito longis copiosissimè ornatur, quæ merito à Lusitanis *Faciano d' Impige*, live *Fabe impetiginæ* appellantur, quod earum cortex succum pilicibus quidem insutum, sicut & alia *Timbo*, sed impetiginæ & puerorum scabies, cæterisque hæc generis affectibus curandos, proficuum continet. Mentibus enim *plaviv* immaturæ, siliquæ & virides succo turgent præstantissimo, atque frigido & acro, quo si fiserit qui impetigine laborat curabitur, modo aliquoties iteretur remedium.

Fier.

Quando maturaverint siliquæ tempore æstivo, mox esciuntur, tuncque non solum tunicam externam, sed & succum atque semina quibus scateret paulatim inglescere & aromaticum odorem spargere comperio: verum tunc prædictis malis minus apte judicantur.

CAP. XIII.

Vanilla siliquosa Mexicana foliis Plantaginis. Aracis aromaticæ, Tiliuchitl, seu Flos niger Mexicani dicitur Hernandez. p. 38. Vagellas Hispani à vaginæ similitudine, Pison, Martell. Arum. p. 200. Lathyræ Mexicani species Animan. The Vanilla's, or Vanilles.

Hern.

Volubilis herba est, arborescens & amplectens *Hernand.* Folia undecim uncias longa, sex lina, figurâ Plantaginis sed pinguioribus & longioribus, viridèque infectis saturato: singula ex utraque parte caulis alternatim exsertentibus: floribus nigricantibus: *siliquis* longis, angustis & penè teretibus, nigris, oleosis muscum aut Balsamum indigentem.

Calidè

Calidis regionibus, humentibus locis provenit, & siliquis verno tempore proferit. Siliquæ binæ aequali resolute & potè urinam cient, menstrua erocant, cum *Micrasanthi* partum accelerant, ac siccandas mortuumque foetum expellant: ventriculum calefaciunt & roborant, flatus discutunt; humores crudos concoquunt, cerebrum confortant; & ad actus venenatos utiles esse dicuntur. Hinc *Chocolata* compositionem ingrediuntur. Elegantes Icones, foliorum, siliquarum, & feminum microscopio conspctorum extant in D. *Francoisi Reali* Experiment. circa res naturales.

SECTIO III.

Herbe anomale ob convenientiam aliquam in partibus præcipuis ad superiora genera referende.

CAP. I.

Trofolia sive Crabium marit. seu Hispanum Brasiliense. Caspoga L. Pison. Portul. Lusitanæ Marcgrav.

Sempidales aut paulò longiores caulis alipiscini, teretes, nodulos, rufescentes, partes humo incumbentes, partim nonnihil se exigentes. Ad singulos nodos duo aut quatuor folia habet, Hyssopi æmula, sed crassiora & nonnihil carinata, opposita: superioris autem *capitulum* oblongum sive ovale est, album ut in Trifolio ferè pro flore, habens in se aliquot *femina* parva croci coloris.

Folia & brevès ramuli decerpi ac parùm cocti superfusis aceto conduntur, & eduntur cum carnibus aut piscibus pro acetariis: excitant enim appetitum, movent urinam, & aperiunt viscerum oppilationes.

Hec planta, quantum conjicio, ad *Corymbiferis* affines, *Scabiosam*, *Eryngium*, &c. pertinet.

Anonymi Brasiliensis Linnæi quædam. Margg. Ad Lib. 9. cap. 5.

Margg.

In sesquipedalem aut paulò majorem altitudinem assurgunt caulis multi, striati, pluribus raris onusti, quorum quilibet eo loco quo è caule oritur nodum habet: rami inordinatè positi; folia ad exortum solitaria, oblonga, fastigata, venosa, ad tactum mollia, foliis *Oxylapathi* similia; interdum majusculo folio miniculum junctum, distat unum ab altero circiter sesquidigitum. In summitate caulis & ramorum extremitate nascuntur multe spicæ, parvule, virides, quatuor aut quinque dig. longæ, quæ sese aperientes *flosculos* peoniant minimos, flavos, tante parvitate, ut foliolum quodvis floris non sit majus cuspidè acutis. Radix alba, lignosa, nullo manifesto sapore. Perennis est planta & novos proleat caules.

CAP. II.

Caspoga Brasiliensis, Lusitanæ Eva de Nossa Senhora, seu Cipo da Cobra Margg. Pison. Lib. noni adjicienda. Convolvulus Brasiliensis flore scapitate, mimococcus.

Margg.

Scandens est planta, caulis tenerr, rotundis, viridibus, admodum lenis. Folium quodlibet scorum positum in caule, in suo pediculo rufescenti, duos digitos longo, & in exortu paululum incurvato, orbiculare, vel cordis latioris, ut pingitur, figurâ, consistentiâ folio *Perfoliatæ* simile, superius dilutè virens, inferius albescenti. (in quibusdam plantis folia gense omnia sunt rotunda.) Pediculus autem folii cusque non inferius in sinuam seu extremitatem folii, sed plus dimidio digito ab ora versus medium folii, ut fit in *Nasturtio Peruviano*. Ad pediculos foliorum etiam pediculis provenit sesquidigitum longus, *flosculus* sustinens pallidè flavescens, octo petalis constantem hoc modo: Quatuor superius adposita sunt parva, oblonga, his subest amplum, oblongum, adhuc magis inferius tria parva alternatim posita. In summitate pediculi inter quatuor superiora folia granum provenit, magnitudinè parvi *Pisi*, figuræ ovalis, interius viride, hinc rubrum. Radix longa, quasi genicosa.

Planta hæc nullam habet odorem præter herbaceum. Folia coctula & imposita contra morsum venenatorum animalium singularè sunt remedium. Radix contra calculum excellentissima est.

CAP. III.

Digitalis Brasiliensis foliis Gentiana aut Plantagina. Lib. 9. caput decimo subnectenda.

Margg.

IN pedalem aut etiam majorem excrescit altitudinem, caulis nodoso, partim incumbente terra, partim se surrigente; pars que terre incumbit crebras agit radicales. Distant nodi circiter trium digitorum intervallo, ex quibus prodeunt folia, unum aut duo minimum digit. longa, nervo & quinque aut sex venis secundum longitudinem ut in Plantagine, superius viridia, inferioris parum cinerescens. In summitate caulis duo folia parva sibi applicata inveniuntur, figura conchule quam misellam vocant, ex quorum medio folia nascuntur, eleganter curvata, folis tantum duobus obocandis constans, aliquot filamenta habens curvata flavo apicibus. Tota planta Gentianam aliquo modo representat. Radix teres, tenuis, longa, sine fibris, hepatici coloris.

CAP. IV.

Era Cidreira Lojicau Margg. : Coraza seu Melissa curata Brasiliensis. Ad Lib. 11. cap. 23.

IN quatuor aut quinque pedum altitudinem assurgit, caule striato, gemulato. Ad quodlibet geniculum duo rami sibi oppositi nascuntur, & indetum duo folia opposita, tam in caule quam in ramulis. Folium quodlibet duo aut tres dig. longum, acuminatum & in ambitu serratum, bevi insidens pediculo. In summitate caulis & ramorum quae prodeunt duos aut tres digitos longa habens foliis minimis, dilute ceruleis nullo albo mixtis. Tota planta maximi odore, nec ante annum quamvis sicca odor minuitur, graevior quam Melisse cum Cero mixtae.

CAP. V.

De Myosuro.

MYosuros ad Ramunculum accollit, idcirco Lib. 12. cap. 10. subnectenda.

A. *Myosuro* J. B. *Cauda maris* Ger. *Hilotes agnus* *Cauda maris* C. B. *Hilotesum* *Linari*, *Cauda maris vocatum* Park. *Mouse-tail*.

J. B.

Fibras numerosas pro radicebus habet: unde folia germinant multa, graminea, spissa, angusta admodum, versus extremum lanosa, tres quatuorve uncias longa. *Caules* ex eadem radice plures altitudine folia excedunt, enodes, teretes, nudi, non ramosi, *foveolae* in cucumine gestantes singuli singulos, musculosos, quinque foliis compositos, herbacei coloris, pluribus intus staminibus cum apicibus subulceis, succolente *clava* utriusque duarumve unciarum, tereti, mucronata, *grassilis* multis compactis, exotam marinam affabre mentiente. Ramunculus cognata est hec plantula, sapore acri. Aprilis mense florer, Maio semen maturat & exarescit radicibus.

Loew.

In arvis, hortis, ad vias, & inter legetes sponte oritur, sed rarior.

CAP. VI.

De Anana seu Pinea Indica ad Herba Pemiferam referenda, Lib. 13. part. 1.

1. *Nana Brasiliensis, Anana Lojicau Margg. Nana seu Stridula Peruviana & Anana* J. B. *Cardus Brasiliensis folia Aloes* C. B. *Anana seu Pinea* Park. *Mattacali seu Pinea Indica* Hernandez. *Pinea Indica Hispanis* J. B. 12. 17. 17. *The Pine Apple*.

Margg.

EX radice Carduo eduli perquam simili proveniunt quindecim aut plura folia, Aloes foliis x-mula [Aloes aquaticae foliis non valde dissimilia, minus tamen crassa *Claf.*] duos aut etiam tres digitos longa, unum aut sesquidigitum lata ubi latissima, versus extremitates angustiores & acuminata, crassa, lanositate viridia, in ambem denticulis praedita instar denticulati Laccii: in modo homini capendum provenit instar Cinarx fructus, epulmodi folioli acutis compositum, insignis Cannabae coloris, quod succolla tempore augetur, figura instar Serobili, unde Pinea nux & Pinea apud omnes ferè gentes dicuntur hi fructus: & dum augetur inter foliola eius prodeunt hosculi carulei, tribus folioli singuli constantes. Fructus quando maturat magnitudinem obtinet majorem Malens vulgaris [Alii autem minorem faciunt] figura ovalis, externis eminentis constans, quasi umbilicos humani, quae in senem flavescens coloris, per oras actem incarnati, quilibet autem in medio folium habet triangulare, serratum, griseum. Fructus odoris est suavissimi [adeo ut praetermissis dignoscere queant sales in quibus sit] saporis ferè instar Fragorum gracillimi [Linichotano qualis Mali Perfici bene maturi, Parkinsonio vini cum aqua rosacea & saccharo permixti unarum centium

* *Quidam Cr-*
onus adrem
sed praesentem
ei attribuit;
ut Adle co-
mm.

nium contentu delicatissimo sapore reliquos omnes fructus longissime superat] apponit succulentus. Cortex ille abscinditur, & fructus secundum longitudinem in partes secatur, & comeditur. Medium illius quod relinquitur intus secandum, instar pile quadratae, etiam ambolitur, & pro optima parte habetur; in sui medio habet modulum durum & lentam instar Passinae, quae abijcitur. Continet fructus in se granula ferrea. Fructus maturus superius plantam juniorem habet, quae decerpitur, & ita sine radice (nullam enim habet) terrae imponitur, quae sequenti anno fructum fert. Unaqueque planta semel & unicum fructum profert annuo spatio, & fructus novam simul plantam, quae cum plantatur venis eradicatur & abijcitur utpote inutilis.

Ex fructu hoc succus exprimitur & cum aqua miscetur, daturque in aggritudinibus à Brasiliensibus, prout nos Hydromel datur.

Ex provincia S. Crucis in Brasilia primum in Occidentalem Indiam, deinde etiam in Orientalem *Linn.* delatus est, autove Acofta.

Exhibetur fructus (inquit Fr. Hernandez) febrientibus refrigerari causâ, & ad excitandum appetitum, retineturque ore, ut sitim mitiget, & linguam humectet. Pilo febrientibus, tam vulneribus aut ulceribus infestatis peritus abstinentium ab hoc fructu monet; adeo enim inquit humores accendit, ut non solum impediatur restitutionem agrorum, sed & in pejus eos disponat. Ego potius cum Hernandez sentierim etiam in febribus moderate sumptum non inutilem esse.

Jaë Bonnus fructum hunc in taleolis dissectum aquâ aut vino paululum macerare necesse esse ait, ut erodens vi ipsi infusa extrahatur, aliâ calore suo palatum & linguam exulcerat, bullisque in eis excitat. Quapropter omnibus & singulis suscipitur, ut his fructibus moderate utantur, ne decipi à gratissimo sapore incurabilem dysenteriam incurant.

Mirum est quod de hoc fructu referunt Acofta & Linschotanus, nimirum cibellium ei inferant, si unius diei aut noctis spatio [horæ modæ Linschot.] relinquatur, fore consumptum in totam scilicet partem quae in vulnere hæsit. Hoc si verum sit succum ipsius fructus valde acrum & erodentem esse convincit; atque picro non sine causâ Bonnus ab immoderato eius usu cavendum monet; nec Linschotano assensendum, qui fructus hujus communis usu hominibus vix nocere scribit, nisi supra modum sumantur usque ad gulam.

Azoi majoris octu perlimis exotica planta *Label. J. B.* nihil aliud est quam Ananæ germina.

Adde ex Pilone, quod tum recens fructus liquor, tum vinum inde expressum urinae suppressioni & doloribus nephriticis succurrat, tum quoque venenis, in primis succo *Mandibaca* adversatur; quod idem illius radix fructu deficiente prestat.

Omnia hæc efficacius operatur liquor stillantis è fructu vi ignis extractus, si modica quantitate exhibeatur, largius sumpta nocet ob coctivam qualitatem.

2. *Ananæ sive Ananæ, sive Ananæ, sive Ananæ J. B. Cardum Brasiliam sive Ananæ C. B. Nana brava, i. e. sive Ananæ Brasiliensis Margg. The wild Pine-Apple.*

Acofta.

Aliis affurgit quam percodens, namque *truncum* habet haste magnitudine, levem admodum, rotundum, & Malt aureæ crassitie, spinis horridum. *Folia* spinosa cuspidibus prædita, & per ambitum mollibus spinis sepea. Singule arbores secundum radicem summa tellure magnam foliorum comam fundunt; majorum quam quæ in arbore sunt, quæque præcelsis intuentibus Aloes foliis similia videantur, peniorum tamen, pleribus spinis horridiorum & dilute virentium: Adnatis se propagat, alique stirpes ex aliis enascuntur, præsertim in sepibus & hortorum ambitu quos egræpi manant. Rami inferiorum simul glomeratorum capita proferunt, flaventiam admodum & tenerorum, suavissimi odoris, quæ nihil aliud sunt quam flos ipse: Ex horum singulis spica prodit, Anandini spicæ non abimilis, sed crassior, compactior & elegantior, odore Cedri. E ramis dependentibus fructus, *Ananæ brava*, i. e. sive *Ananæ* dicti, quæ cum domesticis nonnullam habent similitudinem, Melonia magnitudine; coloris rubri elegantis, tunc in partes driti quadrato-nodum Cupessum strobili seu nuce exsiccatæ, sed tuberculis foris oblitæ, ut præcelsis spectantibus magni Pini strobili appareant.

Marggravius hoc modo fructum describit. Ovalis est figuræ, Citrulli magnitudine, compositus è quadrangularibus cylindris, in extremitate quadratè pyramidalibus, per marginatos flavescens, qui separari ab invicem possunt. Cui hi sunt, continentes granula ovalia innumera pallide flaventia, papaveris majorem semine majora, suavia & dulcissimo rore imbuta instar mellis. Quodlibet corpus cylindricum separatim exprimitur digito in os, & granula illa rore melleo imbuta absorbentur. Fructus etiam transversim discinditur in talcas.

Succus Ananæ ferum coctodere dicitur non sicut ac Aqua fortis.

For.

CAP. VII.

Herba lanuginosa Brasiliensis Pilo:

Herbam hanc aspectu egregiam Lanuginosam appellare placuit, quod eandem & folia, eique exigua, pulchra, longa, & molli lanugine obducta habuit. Fructum fert rotundum & vitidum, lanuginosum, tenuem. Radicem habet parvam & sensum, non ingrati, sed substantiam saporis, cum quadam adstringente, in qua sola parte plantæ qualitatem medicam latere comperimus est.

Contra fluxus ventris à frigore natus, apud mediterraneos Brasiliensibus familiare est remedium. *For.*

CAP. VIII.

Ambuyambis Brasiliensis Marggr. Pison. *Convolvulus Brasiliensis*, flore ventriculo humani simili. Ad Lib. 15. cap. 4.

Planta & fruticibus vicinis se circumvolvit caule suo sarmentoso instar Clematidis. Hinc inde ad caulem enascuntur *folia* unum atque alterum, in quorum medio pediculus longus, continens folium foliariè positum. Sunt autem folia figuræ cordis, lata, nervo crasso in medio, & venis obliquis decorata, dilute seu fere pallide viridia (quali paululum albedinis viriditati est admixtum) Hinc inde quoque sunt flores egregie & pene mirabilis structurae; habet enim figuram ventriculi humani, & est magna, quippe longus absque processu & caule sex digitos fere: pediculus floris curvatus est, lithamam longus, viridis & striolatus, representans dextrum seu inferius orificium ventriculi humani Pylorum dictum; ab alia extremitate processum habet quatuor dig. longum, figuræ colli Cygni elevati, sed in extremitate retrosum inclinatam, representans orificium fundrum ventriculi seu superioris, Cardiam dictum. Secundum longitudinem autem processus ille superioris aperitus seu fissus est. Ventriculo huic annexitur seu delapsus incumbit tenuis membrana obtunda duple latitudinis quam Imperialis, sinistris venis rubris variè intertextis, haud male referens hepatis humani, ventriculo incumbens. Totus flos coloris est ex albo flavescens venis rubro-purpureis, majoribus secundum longitudinem, minoribus secundum latitudinem intertextis, & inter venas quasi rubro-purpureo punctulatus: nullus tamen est odoris manifesti.

Fructum non describit proinde quo referenda sit planta nescimus.

CAP. IX.

Rapunculus Brasiliensis tuberosus, seu *Bartaria Tojaba Brasiliensis* Marggr. Pison. Lib. 15. Cap. 5.

Prima speciem, ut & secunda, *folia* est lactescente, *radice* orbiculari, non tamen bulbosa, exterius incarnati coloris, interioris flavi, cujus magnitudine aut porri, multa filamenta inferioris obtinentes, tres vel quatuor dig. longa: *caulem* habet brunnum seu fuscum, *folia* pene orbicularia, & nervos foliorum rufescentes.

Ex secunda *radice* prodeunt *caules* quatuor, quinque, sex, & interdum plures, rotundi, spongiosi, foveolenti, virides, crassi, novem aut totam duodecim dig. longi. Cuilibet autem cauli insidet folium unicum, Sagittaræ figuræ & magnitudine, quando junior adhuc est planta, aliis triplo aut quadruplo major, & Petasidis herbe foliorum magnitudine, nervos habens conspicuos, viscosi & ad tactum molles ut Brasiliae, ac in ambitu circum duabus venis.

Radix cocta vulgo comeditur ut *Bartaria*, estque dulcis, singularisque, quasi moschati aut floris violacei saporis. Utriusque speciei folia cum caulis crassissimis etiam inciduntur, & pro oleo in aqua coquantur; mollescent statim & optime sapient.

Tertia *folia* est non lactescente. *Caule* cum prima specie convenit ut & Radice: *Folia* habet Sagittaria ut secunda, sed angustiora, pedalis circiter longitudo, superioris saturate viridia, inferioris albicans, nervo & venis ex viridi flavescens, & in centro folii purpurascens. In caule longo (qualem quodque folium habet) *floribus* habebat unicum [que Marggr. floruit] longum seu latum quinque digite monopetalon, cujus superior medietas alba instar corporis ellipsoi per medium secundum longitudinem scissi, & veluti in scapham excavati: inferior medietas instar vulvae, viridis coloris, magnitudine Juglandis & ejusdem figuræ, aperturam habens. Uno verbo totus flos figuræ est Cucurbitæ in medio vincit dum cresceret; per albam autem medietatem flos multæ dilatare albe regule, quamvis pars circa extremum folii quodammodo purpurascit. In medio flos stamen est crassius pentæ inferius, cylindraceum, in extremitate fastigiatum, longitudinis paulo majoris 2 1/2 dig. comitans coepedibus clypeiformibus ac vestium brevibus villis luteolis, qui facili abstergantur. Ita autem composita sunt hæc corporicula (que semina sunt) ut columna seu stamen leve & tenuis appareat. Flos caret odore aliquo perceptibili; clausus adhuc totus viscidus.

CAP. X.

Campomaga Brasiliensis dilla, *Lustrana Erva de vena* Marggr. *Campomaga Brasiliensis floribus* minima. Ad Lib. 15. cap. 5.

Radice habet semipedem pene longam, lentam, tenentem, rectam, alius radiculis interdum praeditam, exterius croceam (cum primò emittitur) sed postea diluti umbræ coloris evadit, interioris candidissimam subdilem saporis: e qua prodeunt caules tres vel quatuor; octo aut novem digitos longi, rotundi, nodosi, virides, ex parte rufi, partim humi serpentes, partim lurræti. Ad nodos autem prodeunt ramuli; in quibus indem ad gemacula duo, tria vel quatuor folia sibi apponuntur, aut opposuntur digitum longa, mollia, superior saturate viridia, inferior incarnata; quolibet insidet suo pediculo, semidigitum longo, nervis conspicuis praeditum. In summitate caulem rami sunt, continentes *foliolas* parvas, umbellatim positas, dilute rubro-purpureas, quorum conformatio ob exilitatem conspicua

spici non potest; sed adhibito Magnifico apparet hos flosculos esse instar florum Campanulæ superius dentatos, habentque in medio duo *filamenta*, rubro-purpurea, figuræ ut Campanulæ habent, paulum extra flosculum prominentia ductibus apicibus. Exemplum è conico cylindrico capsulo viridi, quod antequam se aperiat hilculum est & pingue, ita ut vasis facile adherens.

CAP. XI.

Refinarum Stachada facie Alpina exot. p. in Explorata Stachada facie. Ad Lib. 15, cap. 7. referend.

Alps.

E Radice lignosa, tenui, multifida caules emittit propè radicem in tres aut plures furculos divisi, longos, lursum oblique actos, qui hinc inde infarias ramulas ex adverso positis amittunt, à quibus eodem modo alii furculi parvi recti excurrunt; superiores verò caules primarii utriusq; & ipsi & furculi alii, veluti tenera germinibus ex opposito ordinatim positi, & siliis vestiantur, tenuibus, in acutum desinentibus, furculis absque petiolo laceratis, crebris utrinque, oppositis, in obliquum albicantibus, odoratis, Stachadis maxime similibus: totique planta Stachadi ita conspecta similis videtur, ut omnino Stachadem esse dicerent. Flores verò in summitatibus inter folia emittit, singuli ex foliis singulis excurrentes, parvi, & magnitudine, & figura, & colore floribus Rosellariæ coronari similibus, à suis petiolis pendentes. Quibus desiccationibus succedunt singulis thæce singula, parva, rotunda, Piperis magnitudine & etiam minore, ex v. id. albicantes, crebis minutis feminis continentes. Tota hæc planta obliuam respiciat odorem, holoem Stachadi proximum, saporè verò astringit, aliquantulum amaricam cum obliuam caliditatem. Perpetua est planta.

Ex semibus è Creta nullis Alpino orta est.

Luc.

CAP. XII.

De Polygala Ad calesum Libri XVI adijciend.

Polygalon dicitur à copia & libertate lactis quam vaccis & pecudibus depascensibus facere creditur. Est autem herba plantæ anomala, valculo feminale cum Thlaspi conveniens, cui idcirco subscribenda, flore singulari & sui generis.

A. 1. *Polygala Ger. nome Park vulgaris C. B. Polygala mult. J. B. Spirit. Boer.*

J. B.

Pertinet *radix* semipalmum aut palmum, intermedium unquam longa, lignosa, alba, vel nonnihil viridi, purpurante, gustu subamaro, nonnihil aromatico, caules proterit multos, alios surculos, alios repandos, tenuos, palmares & spheamros, in viridi nonnihil rubescens, *facie* alternatim adnata, crebris vestibus; spicæa sustinentes *filamentum* minutum, non una vice solo pendens, colore ceruleo, [alia carne, albo aut vario] labello exiguo, & in fibras tenuissimas digesto, galæ è duobus foliis, alternatim suberantibus & incumbentibus, latera claudunt alæ geminæ, palis, laticulæ, in orbem macronem dementes viriditate lincolæ per longam lignatæ & in rictu lateris apices minuti croci: basin floris exasperat [ad pedicellorum exortum, (qui breves sunt) in ipso caule] foliola tenuia minutissima, unam galæ incumbens, duo labello subita, qui delapsis thæce desunt. Flores excipiunt *vascula feminalia* Thlaspi, campanula, obtusa, bidentata, in duo loculamenta divisa, *femina* bina continentia. *Folia* humi sparsa & in caulis numerosa, illa subrotunda, hæc oblonga & acuta. N. quod alæ florum non desunt, sed paulatim acite in colorem viridem degenerant, & valculum feminale utrinque obtegunt.

Polygala læta seu vulgaris flore læuco non aliam quam Boer. colore diffuso videtur à vulgari Polygala.

In palcus, præsertim hecionibus, ubique frequentissima est; maxime montosis.

Si manipulus eius per noctem in vino maceretur, idq; bibatur, idem per alvum curè deperit nullo periculo; experimenti Galeni.

Luc.

Fran.

2. *Polygala frutescens Capus bene sive Bryonia*

Bryonia.

Radix possidet contortam, & pro plantæ proportionem crassam, extrinsecus cineream vel albam, intus candidissimam: exinde *virgula* affurgit dodrantalis, juncea & viridis, Sparti Hispanici *Clas*. virgulis non absimilis; *Folia* raris, angustis & acuminatis, vir unquam attingentibus, nullo ordine posita vestita. *Flores* sunt spicati, Polygalæ vulgaris plures similes, quorum colore ex viriditate flavo-purpureo. Nec fructus, nec semina vidi, hæc tamen à vulgari differe exillimo, inquit Bryonia.

3. *Polygala vulgaris major J. B. Clas. major Park C. B.*

Ex eadem intermedium *radix* procedunt quatuor, aut sex virgule dimidiate, pedales, graciles, læta & obliquæ, foliis nullo ordine depositis obtusis, angustis floris tinctori, aut vulgari Hyssopi angustifoli & minoribus foliorum amula. *Flores* contorti & spicati nalcantur summas virgulas occupant, Pomaræ floribus non multum dissimiles, longioribus tamen & dilataioribus purpureo colore elegantissimis, sive dilatioe rubore pulcherrimo nuntius: hæc succedunt petioli locali plantæ, Barbe pastoris valvula penæ similes, qui membranosee quadam veluti alæ integunt, *femina* bina plerumque continentibus, nigricantibus, hirsuta, longiuscula, que aperturam sicut ad latera maturitate bursalis de-

dunt. Radix crassiuscula, brevis, dura, lignosa, vivax, aliquot libris donata est. Tota planta amaricat.

Locus
Tempus.

In montosis Aultriae & per Pannoniam inter annum aliquam non occurrunt. Floret Maio & Junio.

4. *Polygala vulgaris coloris obsoleti, foliis angustioribus* J. B. An *Polygala acutioribus foliis* Menziesiana C. B.

Pauci aliquot affurgit caliculis, aliquando etiam singularibus, pediculis, alexoribus, magna parte nodis; circa una ferè subolis vellicis qualem in reliquis Polygalis speciebus angustioribus, acuminato, prope terram tamen existentibus latiusculis & brevioribus. Ramorum extremi quoque, *foliis* coloris obsoleti, & post hos vascula membracea, hinc foliis luccibus obducta, limbilique videntibus notata habent, sed rarisore stipata, eoque foris ut alterum post alterum rarisore positum esse videntur. Tota spica palmam ferè adaequat. *Radix* simplicis duriuscula, alba, nullis penè fibris perditis. Facies plantulae, h. e. partium figura & color facile tam à reliquis Polygalis speciebus distinguitur.

Locus.

In Galliae Narbonensis loca saxosis, collibus praesertim Ibericos prope Montpellier, aestate prompenter observavit Cherlerus: sit ab eo frequenter loco suo natali, qui tamen rarisore occurrit. D. Moens in Indica suo plantarum circa Montpellier nascentium Polygalam annuam, creditam, angustifoliam floribus coloris obsoleti, carnos. lincis virgatis caro appellat: rariorque esse scribit & pauci Botanici noant.

C A P. XIII.

Verbenae favae planta Brasiliensi Margg. Tetrapetala anomala ad spec. lib. 17. abstruenda.

Margg.

EX radice recta, basi crassa, multis radiculis praesertim ad latera, alba, gustu amaranthaceo, affurgit *caulis* angustifolius ac nodosus in sesquipolarem altitudinem; ad singulos autem nodos duo nascuntur *folia* sua opposita, sesquipolarem longa, per latera in medietate exteriori serrata, & ad costam opposita, carnali duo extant, sed opposita, cum similibus foliis ad nodos oppositis, sed non solum duobus, sed tribus aut quatuor foveis minutissimis semper punctis: & in hisce ramulis ad nodos etiam multi pediculi, breves, quatuor vel plurimum ad quemlibet nodum; quorum quilibet habet *capitulum* rotundum, cum parva prominentia instar cuspidis aciculae, quod se aperientem protrudit *foliolum* lactescens coloris, tetrapetalon, habens in medio multa parva *filamenta*, erecte stantia, quae representant plumam, ut ut foliolum quasi plumam apparat.

C A P. XIV.

Spica trifolia Aq. exot. Spica trifolia siccifera mobilis Park. Ad lib. 18. cap. 8.

Alon.

Mobilis haec planta non una quidem, sed duae diversi generis plantae simul esse videntur. Prima est planta siccifera, spica multis ramorum instar ab *radice* eximibus, colore subnigro; *foliis* oblongis, magnitudine angustae Hyacinthi floribus similes, albos, interseptos terentibus, dum recentes sunt suaviter olentis; à quibus sunt *semina* alba, rotunda, minima. Ab *radice* vero ex spicatum sicciferae capillamenta Cuscute similia, subelliptica tamen, albicantia, ut innumera ferè exant, spicas ex toto occultant, desinentia in folia parva, elegantissima Trifolii praesentis foliis similia, minora tamen, & distansca per palchre crenata. Tota haec planta lata est, in orbem veluti aëta, exteriora Trifolium simulat, interiora, nimirum in parte convexa terram spectante, siccifera tota esse videtur; & florentia multam elegantiam pra se fert.

Locus.

In Creta insula nascitur.

C A P. XV.

Verbenae Indicae longifolia Boel. à Scopel. Ad spec. Lib. 19.

Folia habet oblonga, ambitu incisa, in extremo obtuse mucronata, lamiginosa, inodora, prope radicem cretiora; *caulis* rotundum, semicubitalem. Cauli affurgunt *folioli* parvi, coloris obscurè pbrnicis, quinque foliorum, racematim ex caliculis subultra protrudi, modori.

foliola.

Floret April, si est, Antares in illa regionibus inter.

Julius Hourm, qui ex India Orientali misit plantam descriptis.

C A P.

C A P. XVI.

Cas ponga Il. Pison. *Portulaca Brasiliensis repens.*

Causa Portulacae, tereti, geniculato humi serpit & quibusdam fibris se firmat in terra, atque circa maritima luxuriat in infinitum. Ad quodlibet autem geniculum quinque, aut sex *folia* apposita, figura foliorum Lavendulae, verum crassa & succulenta ut Portulacae. Inter folia in singulari pediculo fert *foliolum*, dilute purpureum, quinque foliis constantem, deorsum incurvata, & multis ejusdem coloris staminibus in orbem dispositis, quae in medio adhuc stamen viride ovale continent. Radices hinc inde unicam agit, pennam assernam crassas, innumerabilibus subtilissimis filamentis circumdatas, & caulo serpente fibre ex illo variis locis prodeuntes se terrae infigunt.

Folia muria & aceto condiantur, & in acetariis usurpantur, sicut Crithmum marinum & similia.

C A P. XVII.

*Viola spicata Brasiliensis.**Aguara pinda Brasiliensis* Marggravii. *Nattensteert* Belgii, i. e. *Myosotis*. Ad Lib. 19. Sell. 2. cap. 5.*Marger.*

In sesquipedalem aut majorem quoque altitudinem assurgit, caulis geniculato, tereti, viridi. Ad singula autem internodia folia habet quatuor, quinque, aut plura, angusta, serrata & fastigiata, viridia, inaequalis magnitudinis. In summitate caulis spicam unum pedem longam, teretem, flosculis undique eleganter caeruleo-violaceis plenam, colore Violae Martiae nostratis, quam petalis fibroturidis compositis. Integer flosculus non male refert Violam Martiam, & paululum etiam ejus odorem. Radix illius recta, modicioris crassa, & multas parvas radículas adpunctas habens, adhuc filamentosa.

Reperitur & alia praecedenti plasse similis, nisi quod spica florum lata est, cubicis fortis insignis, locum repraesentans, viridis: ex foveis autem illis prodeunt flosculi caerulei ut in precedente.

C A P. XVIII.

Actosa Bulbosa Bod. à Stapel.

Spicatae altitudinem habet; Folia dilute viridis coloris duriuscula & complicata, longa, & angusta, quae quinque, vel sex, vel vario numero ex summo cauliculo exoriantur, caule ceterum foliis orbo. Radix bulbosa, exterioris lutea.

C A P. XIX.

De Galanga, quae ad Iridis genus pertinere videtur.

Galangae, recentioribus Graecis *Γαλάνγη*, Vocem Arabicam originis esse minime dulcem est; sed corruptam mirifico, ut sudans hunc tueri illi qui legitimum orrore velit. C. Hofman. Quisdam radicem Schernanthi esse volent; alii Acorum Dioscoridis; alii Cyperum eundem: Nè desit (inquit C. Hofmannus) quod efficiant distinguunt etiam majorem à minore: ego nihil video quò minus ab eadem planta sit utraque, quae Iridis forte sit. At peritissimi Botanici distinguunt, & pro diversis habent. Iridis tamen copiosam radices esse nos etiam cum Hofmanno & Chusro opinamur, quod pari modo foliorum vestigia, cum zonulis circularibus cincta sint.

Utramque Galangam Veteribus ignotam fuisse, & Arabibus non satis perspectam Botanici plerique sentiant.

C. B.

1. *Galanga minor* Ger. J. B. C. B. Park.

Radix est geniculata, & in quosdam nodos crassiores, (& juxta nodulos ex intervallis) nonnihil intorta, inaequali, levi, & adnatis in transversum & in obliquum tendentibus brachiata, crassitudine minimum digitum aequante [unde juncea crassitudinis apophyses pronascuntur, ea tere formi quasi Cyperi radices conspiciuntur J. B.] foliorum vestigia ex intervallo seu zonis circularibus cincta, foris rufa & subsicca, intus autem flava, [sed tam intus, quam foris rubens] dura, solida, venosa cum frangitur tritu difficilis, [matrice parva solida, sapore & odore longè vegetiore generosioris, quam major, & fervore aromatico notas fauces abunde implet.] odore valde acro, aromatico modo faciendo, & Cyperum quadantenus tum formi, tum odore imitante; Folio, autem Garciae, Myrti. Daurum palmarum altitudine fructu.

Sponte nasci aiunt in China, unde in Indiam deferunt.

XXXXX;

2. *Galanga* Linn.

2. *Galanga major* J. B. C. B. Ger. Park.

Radix est pollicem, & duos interdum pollices crassa aut majore, crebris pollicaribus apophyphis subinde donata [nodosa, inaequali, quasi ramis brachiata C. B.] cortice satis extenso, circularibus (quae foliorum vestigia sunt) cincto, fusco aut rubente, substantia solidiuscula cinerea albicante, punctulis (quae extrema sunt fibrarum) notata, venosa, Zingiberi simili, matrice magis fusca, fungosaque: odore acri (non tamen aequè ut prior odorata & fragrante) sternimenta provocante: sapore acerrimo, ingrato, ventriculum subvertente. Caules Arundinacei ad Zingiberis fere altitudinem assurgunt [Garcia binum cubitorum, Javanensis verò quinq. spithamarum] *Folia* longa, macronata, superius saturè, inferius dilutè viridia [Iridis aut Xyridis, nigricantia, angustiora tamen Penz.] Flores albicantes, inodori. [* *Folia* & flores Iridis amulantur] semen fatuum.

* IV. part.
Ind. Oriental.

Acosta folia Orchidis ei attribuit & appingit, caulem è foliorum involucris constantem.

Locu.

In Java & Malabar sponte oritur; sed in Java copiosissime. Scitur radice in terram desossa, ut Zingiber.

Neque *Acosta*, neque *Garcias* ab Hort. Clusio satisfaciunt in *Galanga majoris* descriptione, praesertim si ea quae Europae officinae utuntur legitima sit *Galanga major*: etenim ejus radices multò majorem habent similitudinem cum Iridis quam cum *Asphodeli* & Zingiberis radicibus. Et certe omnino sibi persuadet *Galangam* nostram majorem Iridis genus esse. Jo. etiam *Bauhini* cum *Patarvi* esset in horto *Cortusi* *Galange majoris* nomine plantam vidit Iridi valdè similem foliis & radice.

Virtu.

Radix Galange majoris ad omnia utilis est ad quae Zingiber, atq. eodem modo quoq. condiri solent: in usu etiam est ad orem excitandam, non secus ac cypares & Oleæ fructus apud Europaeos. Recens quoq. utriusq. *Galange* radix in tabulas dissecta cum carrubis pilicibusq. coquitur in eandem finem. Sed quoq. cruda sale & aceto & oleo inspersa cum pilicibus & carnibus assis commodè eduntur ad javanicam concoctionem. Malaharicis & Javanis non solum contra hominum sed & jurtur ad javanicam concoctionem. Malaharicis & Javanis non solum contra hominum sed & jurtur ad javanicam concoctionem. Malaharicis & Javanis non solum contra hominum sed & jurtur ad javanicam concoctionem. Malaharicis & Javanis non solum contra hominum sed & jurtur ad javanicam concoctionem.

Galanga medicamentosa est cephalicum, cardiacum & stomachicum, ad frigidos affectus magni usus. Ventriculum roborat & concoctionem promovet. Acidis ructibus commanuecta subvenit, flatus dissipat, halitum oris emendat. Colicæ opitulatur. Renes calfacit & Venerem excitat. Saccharo condita ad frigidos cerebri & nervorum affectus, Cephalicam, & artuum dolores conducit.

Cordis palpitationi cum succo *Plantaginis* utilis est, & ad lipothymias si à frigore causentur pulvis cum vino generoso aut aqua *Melissæ*, vel succo *Bocaginis*: quare consuevere Germani in quibus vena secta masticandam perhibere.

CAP. XX.

Radix Nivæ in Pisinæ Mantif. Arom. Quibusdam Ginseng & Genseng.

Folia *Pastinacæ* sativæ *Geel-pees* Belgis dictæ similia sunt. *Radix* magnitudine *Pastinacæ* multum cedit, ut quæ digitalis tantum sit longitudinis & crassitiei, in fine filamentosa: colore ex flavo albicante, sapore subdulci, non ingrato, pingui.

Locu.

Nullibi quàm in Regno *Cocæ* crescit, inq. mediterraneis ejus partibus, 100 plus leucis à mari remotis.

Virtu.

Hujus decantatae *Pastinacæ* usus est non solum apud incolas Regni *Cocæ*, sed & *Tankende China* & *Tepone*, adeoque ad illam tanquam ad sacram anchoram confugunt, quæ tamen non semper solâ & simplici utuntur, sed utcumque aliis remediis nativis mixta, manente *Nivæ* Compositionis basi. Illa autem medicamenta quæ adduntur *Cocæ* incole celant & tanquam arcanum sibi reservant. Quando autem animus est expugnare magnos aliquos naturæ hostes, ut motus Epilepticos, Vertiginos, Spasmos, Hydropos, Lipothymias, Choleras, &c. tunc medici robur addunt huic radici ex valido aliquo additamento pro vehiculo. At verò nulli alteri mixta omnibus languidioribus & cachecticis non solum in usu est, sed eam tanquam preservans contra malignos & venenatos affectus domi foelicque perpetuò ad manus habent, atq. bis terve de die exiguam particulam recentis radice masticant: unde mirificè virum restaurationem, oedifq. refectioem omnes se experiri testantur. *Hallerm Pysa*. Ob Similitudinem ad *Pastinacam* referri potest, lib. 9. cap. 19.

CAP. XXI.

Radix S. Helene Park. Rad. S. Helene, Galanga speciei J. B. Cyperus rotundus indorum ex Florida C. B. Apoyomathi seu Phatyliranda, Cyperus Americanus Hernandez.

J. B.

EX portu S. Helene quae est in Florida radices quaedam ad nos importantur serotae, oblongae, nodis distincte, quibus disiectis perforatitque sunt sphaerulae procatore, quae siccatu rugantur, ossisimque acquirunt duritiem: extrinsecus nigrae, intus candidae. Cortex adeo adhæret modulle ut unum fiat continuum. Sapor ejus aromaticus est & gratus, ut Galanga quaedam species esse videatur: Pollicari sunt crassitie aut circiter. Herba vero parvam habet caulis, & humi spargit ramos. Folia fert ampla admodum & viridia. Locis humidis nascitur.

Si Folia recte descripta & depicta sunt Cyperi species esse nequit, ut ex descriptione & facultatibus colligi posse putat Clusius. At Icon & descriptio Hernandez Cyperum esse convincunt.

Herbam Indi lapidibus terunt, eio, universum corpus balneantur fricant: asunt enim alstringere, Usum membræque roborare odoris gratia: Hocq, sepius faciunt ob insignem utilitatem quae inde ipsi resultat. Pulverem tenuissimum ejus tam Indi quam Hispani in vino infusum ad ventriculi dolores felici cum succellu hauriunt.

CAP. XXII.

Drakena radix Gez. Contrayerva Hispanorum seu Drakena radix Clusii Park. Drakena radix J. B. item Contrayerva radix ejusdem. Cyperus longus indorum Peruanum C. B. item Cyperus longus eodem Peruanum ejusdem.

Radicem Hispanico Contrayervæ nomine in Officinis notam peni Botanici Thomas Johnson & Joannes Parkinsonus eandem esse affirmant cum radice Drakena Clusii; siquidem radicis Drakenæ descriptio Clusiana radicibus ex Hispania ad nos allatis Contrayervæ nomine examissim convenit. Ea autem est hujusmodi:

Semunciali magna ex parte erat crassitudine & prælonga, subinde in nodos & inæqualia capita exuberans, atque in summis capitibus velis è crassis squamis contexta. Dentatis laniationibus ferè infusa, foris nigricans, rugosa & dura, quia reticosa, interiori parte alba: tenues fibras hinc inde adnascens habebat, quasdam crassiusculas & masculas, duras & lentas, è quibus alii nodi dependebant. Nullo manifesto odore præditam esse observabam, sed saporem habere deprehendebam nonnihil adstringentem, diutius verò manducatam tenentem sarrivæq, acrimoniam relinquere. J. Bauhinus in radicibus Drakenis diutius manducatis acridinem molestam adhuc sentiebat; unde non deest radicibus hisce caloris gradus quem Clusius desiderabat, quò minus esse possent radices veneno resistentes seu *Contrayervæ* Monardi, quibuscum facultatum ratione valde convenirent.

Monardus quidem radices hæc Iridis radicibus valde similes esse scribit sed minores & Ficulati folii odore. At Parkinsonus nullam cum radicibus Iridis in forma convenientiam observare potuit in radicibus pro *Contrayervæ* ex Hispania huc allatis, imò in multis differre ostendit. Petrus de Osma Folia Plantaginis quinquenervæ Plantæ attribuit. Deest etiam Aromaticus sapor in *Contrayervæ* Officinarum cupis meminit Monardus. Quicquid autem sit de *Contrayervæ* Monardi, Officinarum *Contrayervæ* nihil aliud esse quam *Drakenam* radicem Clusii certum est; quæ ad nomen ei indidit in gratiam D. Francisci Draci, qui ei illam donavit.

Contrayervæ, quasi dicas Alexipharmacum, appellatur Hispana, quoniam earum pulvis ex albo vino sumptus adversus omne venenum, coquens, tandem sit generis præsentissimum est remedium, uno sublimato excepto, quod sola lactis potione extinguimus, vomitione illud respicere faciemus, aut per sudores evocamus; sed & amara pocula eo pulvere hamulo educi solent. Ventris etiam a mala pellit. Febrem etiam quotidianam, tertianam & quartanam ante accessionem sumpta paroxysmum minuit, ejusque usu continuato planè tollit. Plura de ejus viribus videtis apud Parkinsonum.

Drakena affinis radix J. B. Clusii Cyperus longus indorum Orustala C. B.

Clus.

Radices hæc mberose erant, & quantum ex earum forma colligere licebat summa terræ superficie repentes, multisi, villis & fibris obite, fuliginoso colore præditæ, nonnihil tamen ad flavum tendente, salivam dum manducabantur insipientes & amara, foliorum quidem aliquos particulas adhuc retinentes; qualia verò illa fuerint nemo facile dixerit. Caterius magni usus apud Indos fuisse verisimile erat, quandoquidem Prorex Hispanus eas referret cum nobilibus aliis medicamentis in India Orientali natis.

CAP. XXIII.

De Zedoaria, quæ ferti ad Arundinæ, ferti ad Cyperi genus pertinet.

Zedoaria Græcis Veteribus incognita; recentioribus, ut Aeno & Actuatio *Zedo*, *Zedo*, & *Zedo* dicta est, ab Arabibus mutato nomine. Folis est Zingiberis, sed majorebus, longioribus & latioribus, ut & radice; sapore etiam Zingiberi æmulatur, unde in *Celso* Zingiber sylvestre, Garcia auctore, vocatur.

Hujus tres species faciunt, quas tamen omnes unius & ejusdem plantæ radices esse peritiores Botanici existimant.

Zedoaria longa C. B.

Radice[m] habet longitudine sextantali, trientali aut quadrantali, crassitudine minimi digiti, quæ utrinque in obtusum mucronem desinit: foris candida, intus ex cinereo in fuscum colorem vergente: caps[ul]a substantia densa, solida, pinguis & ponderosa: gustu[us] acque odore tenui, subamaro, modiciter acri cum gravitate quadam, ac valde aromatica suavitate, dum tunditur aut manducatur spirante, minima portione halitum commendante & in caput penetrante.

Eligenda est magna, densa, plena, non rugosa; substantiâ veluti pingui, lenta, dentibus propter soliditatem aliquantulum repugnante, odoratissima, nullis foraminibus pervia.

Ut diutius fervetur loco sicco reponenda est.

Loc. Sponte nascitur in sylvis *Calecut* & *Cananor* Regni Malabarici. Zerumbet Arabum esse putatur; Anguillare Costus Arabicus.

Zedoaria rotunda C. B.

C. B.

Substantia pondere, soliditate, colore, sapore & odore longæ Zedoariæ omnino similis est, solidæ figurâ differt, quæ globosa, unciali magnitudine; superficie aliquantulum inæquali, ac precifarum fibrarum vestigiis tuberosa. Ari bulbo similis, nonnunquam in brevem mucronem desinens, quo terræ adhuc hærens germen fundere consuevit.

Loc. In Java & Sunda copiosè nascitur.

A priore non videtur aliter differre, quam quod radicis partes sint diversæ. Rotundam autem partem Zedoariam; longam vero appendicem Zerumbeth, voluti res essent diversæ nominasse Avicennam existimat C. Bauhinus, ignorantem, viz. ex qualinam planta, aut qua regione ejusmodi radix proveniret; sed cum vidisset in frustra rotunda, interdum verò in oblonga concisam ad Sinum Persicum veli, duo genera existimasse. Reliqua vide. Radix resecta & siccata saccharo conditur: cujus usus præstantior & commodior quàm Zingiberis existit. C. B.

Zedoaria tuberosa foris nigricans C. B.

Rotundum hoc genus instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candidans, gustu usuali Zedoariæ apud quosdam Aromaticos Antverpiæ inveniri scribit Clusius, *Block Zedoar* ipsi dictum. Lobelius cum vulgari rotunda junxit.

Zedoaria Geidwar Avicennæ Garcia C. B.

C. B.

Radix est magnitudine glandis, epulæmque ferè formæ, colore sublucido. At dicimus rectius Anthoræ, vel Alphodeli bulbo minori similem esse, foris cinerices, intus verò flavescens coloris, duram & solidam, gustu acrem & excalescentem.

Hanc Garcia in regionibus Sinenſium provinciæ vicinis, magno emi, nec facile inveniri scribit, nisi apud circumforaneos quosdam & circulatores quos Indi *Jogues* appellant. Idem Zedoariæ vocabulum corruptum esse putat, & Geidwar dicendum.

C. Bauhinus Arabes triplicem plantam Zerumbeth nomine proposuisse putat. 1. Zedoariam Officinarum longam, quæ Zerumbeth Avicennæ, ut ex ejus descriptione patet. 2. Zedoariam rotundam dictam, quæ Zerumbeth primum Serapionis, & Zedoaria Avicennæ. 3. Egregiam illam arborem in Libano foliis Salicis, odore Citri, quæ Zarnabo Avicennæ, hodie incognitam nisi fortè sit Saffar Syrorum Rauwolfii.

Vires. Zedoariæ radix calida & sicca censetur, corpus impinguat & imbecillum reficit, ut volunt Arabes, flatu discant. Odorem sumptorum Alliorum, Ceparum & Vini aufert; morbi venenolorum confert, alvum sistit, uteri apostemata resolvit, vomitum reprimit & Colicæ ventosæ confert. Nostræ ætatis Medici contra pestilentiæ cæli contagia utuntur, & permultis medicamentorum compositionibus miscent. Ventriculo utilis est concoctionem juvando, etiam, & reliqua viscera calefaciendo. Germani ex ea Vinum Zedoariatum conficiunt ad usus prædictos, Zedoariam contritam & sacculo inditam in doliolo mulli cocti pleno suspendendo.

SECTIO IV.

Herbæ anomale incertæ sedis.

CAP. I.

De Pipere.

EArum quæ ambiguntur & incertæ sedis principem locum sibi vendicat famigeratissimum Aromaticum Piper omnibus sæculis omnibus terris ad cibaria condienda expertum. Cum enim qui plantam descriperunt de floribus ejus altum silentium, incerti sumus an eos imperfectos & staminosos, an verò perfectos & petalodes obtineat, adeoque an ad genus earum quæ flore sunt imperfecto, an potius ad earum quæ flore perfecto, semine nudo solitario, referenda sit.

Nomen vocem *πέπρον* i. e. *conspicere* Etymologus deducit. Verumiliter tamen est *πέπρον* peregrinum & barbarum vocabulum esse, ut *πέπρον* & *πέπρον* & pleraque in *πέπρον* delincentia: à Persis prolatum docet Galenus, qui proculdubio ab Indis hauserunt, quibus (teste Garcia) Piper longum *Pimprilum* dicitur.

Quæ de Pipere ejusque speciebus habent Veteres Græci & Latini manifestè ostendunt Plantas piperiteras in proclis incognitas fuisse, quibusque nomen incertum & vulgi fidem secutos in ejus descriptione Ruellius pro Piperis specie Smilacem asperam proponit, ut existimat J. Bauhinus; Matthiolum Ribes nigrum. Nos incertis & suspectis omittis descriptionem Piperis à Cl. Car. Clusio Esotici mutatam dabimus.

Piper longum à rotundo genere diversum videtur: verum quia viribus conveniunt, & Botanici ad idem caput utrumque, reduciunt; nos etiam de illis unà agemus.

1. Piper rotundum nigrum C. B. Piper nigrum J. B. Park. Round black Pepper.

Clas.

Valde sarmentosa est Piperis nigri planta, & adeò imbecillis atque caduca, ut nisi pedamentis fulciatur, aut juxta arborem aliquam, circa quam se convolvere possit, pangatur, humi procumbat ac spargatur, perinde ac Lupus salictarius: scota verò ac flexibilia sunt ei sarmenta, frequentibusq; nodis sive geniculis distincta, & quæ humi sparsa multas fibras ad singula internodia agunt, quibus se humi figunt, quemadmodum Clematidis aut Periclymeni flagella, ut in illorum nonnullis observabatur quæ fibras adhuc retinebant. Sarmenta porro ad singulos nodos singulari folium proferunt alternatim, Hederaceæ quodammodo formæ, vel ejus Cyclaminis quod hederaceo constat folio; cui tamen anguli desunt, neq; adeò crassum, verum multo tenuius, quatuor interdum uncias latum, formæ quasi orbicularis, nisi quod in macronem desinat; plerumq; tamen binas duntaxat uncias latum, quatuor longum, *Tamisi* sive *Betle* folio adeò simile, ut alterum ab altero vix discerni queat, nisi Piperis folium paulo durius, & nervos illos per folii longitudinem excurrentes crassiores habere videretur: nec illud in ambitu serratum est, ut quidam pinguet, sed perfolia æquale, & nihil funditudo habens cum Mali Assyrii folio. Omnia verò folia quinque nerva sunt prædita, quorum medius & crassior medium foliorum per longitudinem secat, reliqui quatuor minus crassi ab illo oriuntur, utrinque binii, in latera secundum folii præter longitudinem expansi, & illi quidem in nonnullis foliis æqualiter ex opposito nascentes, in aliis verò inæqualiter oriuntur, neq; illam proportionem servant. Cæterum folia omnia prona parte dilutiora sunt quam supina, atque per univertum folium venis oblique transversim evagantur. Ux porro ad ramorum internodia nascuntur teretes & oblonge, multis granis orbicularibus, nunc majoribus, modo minoribus, ipsi scapo sine petiolo annexi constantes, & illæ quidem non è foliorum sinibus, sed ex altera sarmenti parte, folii pediculo viz opposita. Non modo folia sicca acrimoniam retinent, sed etiam ipsa sarmenta, atque (quod magis mirum) ipsa radix quæ sub terra latet.

Piperis folia à *Betle* foliis effigie atque non parùm differunt. Piperis enim folia, quæ non tribus tantum sed quinque nerva per longum folii sere Plantagineis distinguuntur, carnosiora & solidiora sunt folia *Betle*, magisque ad ovalem figuram accedentia, & inde in acutum delincentia: *Betle* verò siliem nervis tenuioribus molliora & delicatiora sunt admodum, & circa petiolum latiora, atq; in summo sinuosa, ut ipsius Comi potius quam ullam ovi effigiem exprimere videantur. Piperis folium mapæ quod habuimus (inquit Columna) latum in molli erat uncias quatuor, & dupla longitudine, quamvis aliqua oblongiora ac etiam obfusca reperiantur, nec tamen in imo ita lata ut in Clusii figura, sed acutior circa pediculum, qui non lignosus, sed nervosus est, dimidi folii longitudine, Piperisque sapore. Hæc Columna nota in *Rer. pag. 576.*

Nascitur in plerisque Indis provinciis: verum in quibusdam regionibus vix tantum rotundat ex cultura quantum ipsis incolis sufficit: alii autem in locis, præcipue in Malacca, Java & Sumetra, adeò luxuriat Piper hæc Aromaticum, ut ipsè per totum orbem distrahatur. Seritur non procul à mari, & ad radios arborum, præsertim quæ *Fœfisi* appellantur, vel appositis peticulis quibus adnascitur more Vitis. Alitudo ei par cum ea arbore aut pedamento cui adrostritur. Sæpe cum veterascit & cineribus sinisque stercoreatur, excedit altitudinem filicorum forestarum, ut Lupoli instar cum scandere altius non potest, se demittat. *Pfs.*

Fructus

Fructus seu uvæ leguntur ante plenam maturitatem, in colorem primum adhuc inclinantes [alibi cum jam plene maturerint] & in tegribus palmis expansos soli exponunt, cupis calore intra triduum nigrescunt & corrugantur.

Reperitur etiam in genere nigri Piper quoddam, nutrimento defectum, cassum seu inane ac leve quod Brasilia Diotocoides vocat. Hoc non dubitamus nos asserere Piper esse immaturum. *J. B.*

2. *Piper rotundum album C. B. album J. B. Park. White round Pepper.*

J. B.

Magnitudine videtur nigro cedere, utrinque umbilicello tantillum prominente exiguo, albido five cinereo. Substantia ejus interior bicolor est, quemadmodum Piperis nigri, & cava in medullis (præter albam pelliculam quam habet) apparet; cortex quo grana integuntur nigrescens facile detrahitur, quod non fieret si esset immaturum, ut Galenus & nonnulli alii volunt. Sapore non minus fervido præditum est quam nigrum; imo eo calidius & odoratius est, Lobelio teste.

Inter plantam quæ Piper nigrum fert & eam quæ candidum tam exigua est differentia (inquit Garcias ab Ossa) ut à foliis incolis discerni possint, *nonnulla immine, cum Piper nigrum & album una eademque res sit*; quemadmodum Vitæ quæ uvam fert nigram ab ea quæ candidam fert, non dignoscimus nisi dum uvas habent & illas quidam maturas. Candidi autem plantæ rariore sunt, nec nisi certis Malavar & Malacæ locis rare nascuntur.

Guilhelmus Piso in mantilla Aromatica Piper album nihil aliud esse quam nigrum ante insolationem decoratam affirmat. Decoratio autem illa fit bene maturo Pipere ex marina macerato. Maceracione enim cortex exterior niger dehiscit tumescendo, atque ita facillimo negotio, grantum quod intra illum includitur album eximitur, & ad modum Piperis nigri exsiccat. Quem laborem laboris impatientia nisi fugeret, non tanta esset Piperis albi si cum nigro compararetur inopia.

Vires.

Piper Diotocoidi vim habet in universum calefaciendi, urinam citius concoquendi, attrahendi, discutienti, exterendi ea quæ pupillis tenebras offundunt. Commodum etiam est ad rigores per circuitum in febribus repentes, tum si bibatur, tum si illinatur; & commorsus à bestis venenatis auxiliatur. Educit etiam fetus. Putatur & conceptionem impedire si post coitum apponatur: Tussi quoque, & omnibus circa thoracem affectibus commodum est tum si delingatur, tum si in potu accipiat, Anguis item convenit illi cum melle; Tormina quoque, dissolvit cum teneris Lauri foliis potum. Pruritam à capite detrahit cum uva passa manducatum. Dolores sedat, & in sanorum ulu multum est, ac appetentiam movet, & ad intus admixtum concoctionem adjuvat. At pie exceptum strumas discutit. Deterget & vitiliginis cum nigro.

Piperis radix costo similis est, calefacit, gustum & humores provocat. Eadem si cum aceto bibatur splenem minuit; Pruritam vero à capite detrahit cum Staphide agresti commanducata. Hactenus Dioscor.

Ufus ejus præcipuus est in frigida & cruditate ventriculi. Magna differentia in eo est, si vel integrum sumatur, vel in pulvere. Pulvis in ventriculo singulum facit, hepar autem & reliqua viscera valde inflammat. Qui ergo ventriculo consulere volunt deglutunt integra grana, ut rectè monet C. Hoffmannus. Præstat etiam carnes editas & in furno coctas in artocreas, &c. integro Piper condire quam trito & comminuto, cum cibus enim coctum & maceratum satis acrimonie is communicat, quod & facit integrum deglutunt, nec tamen ventriculo noxam aliquam aut molestiam: cum pulvis interiori ventriculi tunice mucosæ oblitæ adhaerescens aut in ejus rugas se infundit, vel cardialgiam, vel singulum in nonnullis constitutionibus excitet.

Extrinsecus in apoplethmaticis, gargaribus, sternutatoris usurpatur; sedat odontalgiam, colicellam tumidam imminuit, nervorum affectibus frigidis conducit. *Schrod.*

Vis piperis (eodem adnotante, & ante cum Galeno) volatilis valde est. Videntur ergo, inquit, præparationes in quibus volatile evanescit. e. g. Extractorum.

Piper ejusque oleum egregie docantur in febribus quartanis à Zacut. Lusitano, Langio, Kunrad. aliisque.

Oleum Piperis extrinsecus in Paralyti egregium est medicamentum. *C. Hofman.*

Vulgus Piper longum in paroxysmo febrium exhibere solet: id quod non nisi in principio locum habere potest. *Schrod.*

Non bacca solum, quod proprie dicitur Piper, acrimonie prædita ignea sunt, sed & tota etiam planta. Nam & folia visentia, farmenta & radices, si masticentur, prorsus linguam faucisque urunt ac salivam, haud secus quam Costi Pyrothive radices, movent.

Piper longum Indi limamentis addunt, quibus adversus dolores artuum à frigore utuntur, & ita ut hinc hoc Piper sit, corpulque adlar Sanealum rubrum. Utuntur & contra venena, vertigines, catarrhos, oculorumque nebulas & cum successe.

Indorum plebs adversus duritiam stomachi languiditatem bibunt aquam cui infusa est satis bona Piperis copia: In eandem usum quoque eliciunt ex Pipere recentem spiritum turæ igneam. Utrumque, cum adhuc vires, Piper, longum æque ac rotundum, conditi muria aut aceto solet, & conditi in penam ad usum familiarem mensisque delicias. Eius usus frequentior mensibus pluviosis & in phlegmatica corporis constitutione.

3. *Piper caudatum J. B. caudatum racemosum Park. racemosum caudatum ex Guinea C. B. Pepper, with a cluster'd tail.*

J. B.

Nomen partim à sapore, partim à forma invenit: grana sunt Pipere & albo & nigro plerumque micora, quodam aequalia, ex rotundo oblonga, & pediculis utriusque turbinata, &, ut vulgare nomen præfert, caudata, colorem nigrescentes vel fulci, inter Piper album & nigrum media, corioce crustulicula, extenso, intantum nonnulli vel rugoso vel scirpo, modicam comprehendente Piperis vulgaris modo bicoloris, durissimam, in cupis tamen medio est conspicitur vacuus ille sphericulus.

Sapor

Sapor idem qui Piperi vulgato, magis aromaticum. Grana hæc racematim coherere. Uvæ modo. Uvæ hæc alæ breves & unciales sunt, nonnullæ tres uncias longæ, tenui stylo inherentes, longipetulo petiolo grana rotunda, vel minora, vel crassiuscula continent, vicena, tricina, interdum plura, legitimo quædam Piperi minora, non minus tamen fervidi saporis, duræ & solida, eisdem etiam pane coloris. An porro ipsa planta perinde arbores ac petiolas scandat, ut quæ quod ex Orientali India adfertur hæcenus Clusio intelligere non licet.

4. *Piper caudatum seu Nibendo* Marceg. Pilon.

Suffrutex est instar arborescens, excresecens ad trium, quatuor, quinque & interdum sex pedum altitudinem. Caulis illius lignosus, teres, viridis, nodosus, ad aspectum fere ut caulis Solani. Folia singularum sunt posita, quorum quodlibet suum habet pediculum qui ad nodos oritur: Sunt aut illa lata, figurâ cordis ut pingitur, vel vomeris, multis venis arcuatum secundum longitudinem elegantissime notata. Ad nodos istidem proveniunt multi Juli, quatuor, quinque, aut sex digiti longi, incurvati, figurâ fere ut muris cauda, virides, qui mense Octobri aut Novembri decerpuntur, & in Sole siccati nigrescunt, continentque granula rotunda, nigra, magnitudine seminum Papaveris, acriter juxta se in uvam composita, acris saporis, instar Piperis optimi Orientalis. Radix in aliis plerum tenuis dividitur, sulcas, insignis odoris instar Thymi & saporis qui linguam vellicat.

Aliud habetur genus à *Pisoni & Marcegr.* descriptum foliis angustioribus & oblongis, fructu grandiore & meliore, cauda Piperina longiore, in sylvis Bœthiæ mediterraneis frequentissimum.

Folia hujus plantæ medentur plicibus tibiae: radix valet adversis apoplexiis. Utraque, cum *Uva* summe sint fortis, etiam essiccata & diu reposita ad halitum calidum contra mala frigida usurpantur. Decoctum radicis & stolonum discutit atque incidit crassis & viscosis corporis humoribus; sanat hydropem pedum.

Aquæsum Piperis.

Folis præcipue à precedenti differre videtur, quæ Tiliæ similia sunt, paulo tamen grandiora.

Descriptiones harum plantarum inscunt & continentur vel Pisoni vel Marcegravia.

Cæterum Piper caudatum dicitur hæc planta à figura Juli caudam muris referente.

Radix calida est & acris, atque inter Antidotales habita; reliqua vide apud Pisonem.

Pison.

5. *Piper longum* J. B. *longum Orientale* C. B. *Long Oriental Pepper.*

J. B.

Piper longum macerata Borulacea simulatur, utriusque aut sceleratissimi longum, teres, aliquando planum, coloris fusci vel quædam reticulato verticillatæ plexo, in superficie asperum, cupis pro numero grana, pediculis scortim per axis inclusa. Sinapi grana parva, foris nigricantia, intus lobulata, gustu non cedente nigro vel albo, nunquam non statim apparente: pendent autem hi juli ex pediculo gracili, unciali, alteri fini inserto.

Plantæ à Java allata ramulos cum fractis sic describit Clusius. Botrorum maxima pari duarum unciarum longitudinem raro excedit; nullos vero minimi digiti crassitudinem æquat, sed graciliter est & æqualis pene ubique crassitæ, plurimis grana Milli repurgati granorum instar oblique secundum longitudinem dispositis consistens, cineracea quodammodo externa parte coloris, interna albi, fervidi saporis. Planta ipsa non longe dissimilis videtur Piperi nigro profertur plantæ: folia à Piperis nigri foliis non multum differre Clusio visa sunt, nisi quod paulo tenuiora, dilutiorque viriditate prædita essent, nam etiam breviora pediculo suborta, atque etiam pluribus nervis insignita: nam à medio illo nervo folium à pediculo per longitudinem secante non modo quatuor alii nervi exoriebantur, sed utriusque quini & sem, interdum etiam & plures pro foliorum validitate amplexudine, illi tamen minus eminentes quam in nigri foliis, & inæquali ovæ natæ, nulus etiam obliquus venulis per folium transversum evagantibus; & licet reticulata essent folia, ac per multos menses inter charta adhiærata, non levi tamen acrimonia eas adhuc præbebat. Fructus qui Juli quodammodo formam amulantur, ad singula inermosia ornantur non in sola ala, sed quemadmodum in Piperi nigro ex ipsius folii opposita parte, in altero videlicet ramuli latere, atque etiam alternis, perinde atque in Piperi nigro.

Piper longum intensa mordacitate præditum est, & sibiæmarum quoniam immaturarum, antidotis *Uva* item & theriacis medicaminibus oppositum. *Uva*. Nonnulli statim ab initio curationis uvule relaxatæ ab inflammatione pulvere Piperis longi auxiliari conantur; quod quidem petiolo non valet. J. B.

6. *Piper longum* Montardi. *longum Occidentale, dimidiæ pedis longitudinis* C. B. *An Piper in Florida* J. B? *An Tiliacæ Fr. Hernand? Rapa in Philippinarum insula.*

Toto Continente tractu, in quo Nata, Carthago, atque etiam in novo regno magnus est usus Piperis cupissimæ oblongi, quod majori acrimonia præditum est Orientali, magisque aromaticum & pucillidorem odorem spirat quam Axi sive Capivum, quantum præfertur Piperi nigro cum saporis tum suavitate censet.

Alæ cupissimæ plantæ fructus est oblongus, crassitudine quadam fusticuli, ad dimidiæ pedis longitudinem, consistens veluti multiis granulis circa pediculum oblongum congesto & continuo ordine dispositis feminis Plantaginis modo, quibus adimpleti pediculi nudi conspicitur. Recem viridis est: Sole maturat & nigrescit.

J. Bauhini Piper styli erat palmæ plus minus longi Myosoti speciei non absimilibus, crassitudine pari, sulcis, verum pulvere crispatis, nodis tamen & polio circa imam, oblongo, sapore acris usculo ad Piper accedentis.

C. Bauhinus

C. Buihpus Piper longum angustissimum ex Florida à Pipere longo Monardi diversum facit & Piperi longo seu Felsel Alpini eandem, ut & Pliniale peregrinæ Clusii, quam describit Cauliculo unciali longitudinis aut amphora, valde gracili, sustinente ut plurimum binas oblongas graciles quincuncialesque veluti spicas, longo pediculo subnatis, ad eò oblique quaquaversum striatas & rugosas, ut etiam Lumbicorum siccatorum, aut terminum limularum formam quodammodo referant, coloris fulci & fuliginosi, subacri & calidi saporis, odore autem Melilocum pene referentes.

Felsel Alpini Junci folis est sed crassioribus, è quibus scetis succus quidam flavus, valde acris ac exurens, totique Planga est calida in quarto gradu, magis quam Piper exurens. Ea utuntur emplastrum modo imposita ad contradiu dolorem, necnon ad frigidos articuloꝝ dolores. Calorem eius oleo Rosaceo vel Myrtino temperant.

Ex particula hujus plantarum multa & imperfecta vix quocquam certi colligi possit, de usibus generis & formis.

7. Piper inane C. B. Canarium à Canara loca natali dictum.

Nostrati Fegopyro simile est, coloris cinerici, intus cavum & repletum granulis aliquot exiguis. Manducatum pari pene acrimonia cum precibus deprehenditur, sed minus aromaticum. Epa nisi apud infimam plebem nullus est in Indiis usus. Hæc etiam diversi generis planta est à Pipere vulgari, nec suo quo referenda.

C A P. II.

Linnæi congruus Clusii congruus Clusii Ger. emac. Park. Linnæi peregrinum folia ferunt florum Aristolochia C. B. Incerta sedis est.

Hanc plantam siccam & mutam Ulyssipont accepit Claudius Cosier pharmacopœus Luterianus, à quo iconem ejus & solium retinaculum habuit Clusius. Sunt verò, inquit, ei (Claudio teste) folia novem, decem, aut plura, à summo radice capite pendentia, forma florum Aristolochia, tumentis albo & velut palcari prædito, gibbo dorso, infima parte angusta, sensim, in laxitatem crescente, supremi parte laxiore & aperta, quasque in hennycium formati: totum folium durum est, & tanquam cotacuum; suprema folii pars aperta, internè multa crassa vena, ex atro purpureis distincta. Radix non valde magna, & in quoddam ramos divisa. De loco & tempore florendi, deq; flore ipso nihil perscriptum.

Ipsissimam hanc plantam, referente Parkinsono, Joannes Tradescantius papor in Virginia inventam cum caule & flore, domum [in Angliam] detulit, & in horto suo Lambethano plantavit. Folia longiora sunt & angustiora, minusque exumescencia seu ventricosa quam in iconis Clusiana. Flores summo fructui seu valculo terminali subrotundo insident; quod tamen Parkinsoni icon (qui flores appinxit) non exhibet. Flos tetrapetalos aut pentapetalos pingitur.

C A P. III.

Tribulus terrestris J. B. Ger. Park. terrestr. Ciceris folio, fructu aculeato C. B.

Radicem agit prolixam, albam, simplicem, paucis fibris capillatam. Caliculus emittit plures, hinc stratos, teretes, hirsutos, geniculatos, rubentes, palmares aut etiam dodrantales, ramus multa divisis. Folia pinnata Lenticule aut Ciceris, ad singulos geniculos singula, alternatim posita, in summis tamen ramulorum bina ex adverso, Papaveris erratici in modum palosa. Flores pediculis satis longis à foliorum sinibus ortis insident, lutei, pentapetali. Succedunt muricata capsula, spinis masculinis hærentia, ad Scirpachæ accedentia (inquit J. Bauhinus) Nobis capitula ex quinque velut triangula constata videbantur, quorum omnium cuspides in centro concurrunt, reliqui anguli in longam & acutam spinam exeunt. Sunt & alie spinole breviores que pediculum amplectuntur.

*Tempus et
Linnæi*

Sub Maii lunam exiit, Julioque & Augusto cum flore & semine in calidioribus regionibus, Italia & Gallia Narbonensi, passim conspicitur.

Caesata sive Caesura J. B. C. B. Ger. Park. Dobber.

Hanc plantam ad Appendicem referemus.

CAP. IV.

Melanchium odoratum Alpina. *Quot. Nigella Cracca odorata, folio Lini, seminebus infumibus*
Park.

Alpina.

A Radice parva, tenui, fibris tenuibus multis praedita *caulis* plures producti, graciles, serotini, rotundi, palmum altos, foliis Lini ex opposito restitis. In caulium summitatibus *floris* fert caeruleos, Papaveris similes, a quibus *fibris* quinquangulatis *semine* nigra, minuta, oblongata continentur. At in cauliculis etiam alia *semine* minuta, rotunda, racemorum modo, alligantia pendunt. Quibus hanc plantam naturae humnoperare curae fuisse constabit, quod eam ne dubicaret duplici semini genere donavit.

CAP. V.

Fabrorandi prima species Margg. Inventa sicut: Si sui perfectus sit ad Lib. 9. partem primam pertinet.

Margg.

AD duorum pedum altitudinem attingit, caule lignoso, tereti, per certa intervalia nodoso, tortuoso & inequali, coloris grisei, quorum unum, duo vel etiam tres ex una radice procedunt, & in ramos se pandunt. Radix autem haud crassa est, sed in multis radiculis & filamentis dividitur, exteriora ex albo flavescens, interiora albicans, odore acrimoni, sapore acris ut Pyrethrum. In singulis ramulis aut internodiis pediculis prodeunt, digitum longius tria habet *folia* sibi crucis modo opposita, ad tactum ut Tiliae folia mollia, parum pilosa, nervo conspicuo & venis obliquis, ab uno ad quinque, digitos longa, totidem; lata ubi latissima, inequalis quippe magnitudinis, pallide viresca, inferne paulum candidissima. In extremitate ramulorum multa foliola parva vixabili figura sibi invicem confertim sunt opposita, in duos ramulos quasi cornua diducta, in quibus *filiculi* albi, tetrapetali, quos sequitur *semine* duplici palea tectum ut in Cannabi, fuscum, complicitum, parvulum cordis figuram, cui ab uno latere parvascicula valetur.

Radix valet contra venena.

Ferr.

CAP. VI.

Capitata Bryonia nigra folio Brasiliensi tricuspa Margg.

CAULE haud lento serpsit, & alius plantis se implicat: *folia* fert in pediculis, duo, tres aut quatuor digitos longa, cordis ut pinguis figuram, mollia, dilate viridia. In pediculis autem duo aut tres digitos longa, & superiora in quatuor aut quinque, divisim nascuntur totidem *floris*, Sem-lacis florum amuli, albi, & ad moderatam extremitatem dilatae purpureae mixti; in medio floris extat stamen album purpuraceum: in ambitu vero interiori *filis* egregiam stellam quinquangularem representat, quasi in illam impressa esset, alba coloris uti floris. Post floris exalio *triquetrum* corpus, fuscum, subrotundum, in tres Capulas dividitur, in quorum qualibet granum seminis est fuscum magnitudine & figuram modum Pisi inaequaliter dillecti. Floris unicum ut & planta, sine sapore manifestis.

CAP. VII.

Trochilus affinis India Orientali Xanthus sicut Breyn.

Breyn.

FRUITICIS equidantem (ut credit) ex India missi, qui Indis *Dum Lacet Lacet* appellari prohibetur, ramum delatibit Aitox. Is pedalis ferè exat longitudo, lignosus, sed valde minus; corvaceo ureano, subviridi, & quibusdam in loca obsoleto purpureo colore, tectus. Huic alterna foris adnata sunt *folia* novem, pediculis longis appensa, tenera, lata, angulosa, tenere crenata & perfectum folium incana; Xanthus quodammodo amula, vel modicam quandam figuram inter pampinam & Rose Sinensis *Ferr.* folia nocentia; in quocumque fugalis ab ipso statim pediculo costae subviridibus pallidisque septem expanduntur, & ex illis cunctis alii quidam nervi, raris placemas cum transveris fibris, in foliorum carne latentibus, fundentes. Ceterum è singulis *filis* foliorum alii *Prothos* emicat, è petalo parvo pediculis, qui basin plurimorum foliorum stellatim habet, consistit, è quinque conceptaculis lappaceis. *Trochilus* *foliis* longis albis tenuissimum involucri sermè amula, cui quodam duplo majora essent, dura, ac palea rigida quasi aculeatae. Horum quodlibet perfectum à summo tenditur, & *semine* unicum Anonis montanae praecoxo purp. frutescentis *Moroni* magnitudine, formam, colore & brevi incantibus lanugine persumis continet.

Cap.

CAP. VIII.

Dentaria affinis Echii fere, capsula aequalibus Hort. Reg. Paris. & Hort. Lugd. Bat. *capsula rotunda* Moerl. *psal.*

Mors.

Hæc planta inveniuntur vix *folia* prostrata, sub cœco Altrantia aut Disperis similia, eandem Dentariae *folia* referentia: inter quæ *caulis* palmari [uno semipedalis] *flores* sustinens quinos simplices aut etiam plures. Echii *floribus* similes [e quibus exiit *flamina* longa, terrena, apicibus donata, cum stylo tenui, bicorni, qui flore delapso in longum excrescit.] *Flo-*ribus succedunt *capsula* rotunda, Anagallidis *capsularum* æmula, *semina* solida in se continentia, Alperula odorata *seminibus* quasi paria.

Lemo.

Plantam hanc vivam mihi nondum videre contigit; ficcam curiose aserratam, in hortu Regio Parisiensi collectam ad me misit *sepius* in hac historia memoratus D. *Hans. Sloani.*

CAP. IX.

Cactica Brasiliensis, Herba Colubina Læstano *Margg.*

EX radice parvula, filamentosa multi proveniunt *caulis* circa se, semipedem aut etiam pedem longi, ex viridi rufescentes, paulum hirsuti, & unus digiti intervallo habentes nodos, & ad singulos *brachia* *folia* apposita, subhæret serrata, magnitudine & figura Veronice *foliis* æmula, abquantulum hirsuta, superne viridia, inferne albicantia. Inter *folia* ad nodos *caulis* prodeunt *folioli*, viridis coloris cum aliquantillo rubore mixti, in umbellam compositi. Tota planta fundit lacteum succum.

Firm.

Præstantissimum est remedium contra serpentum morsus herba hæc confusa & applicata. Valet etiam ad alia vulnera.

CAP. X.

Embryonis Brasiliensis Margg. *Lingua cervina caulisera Brasiliensis* Margg.

Margg.

Radix habet digitum crassam, interius medullam lentissimam continentem, variè contortam, exterius sulcatam, intus albicantem: E qua perdoce *caulis* lignosam, erectam, vixdem, sesqui aut etiam duos digitos longam, *folia* hinc inde onustam, que insident *pediculis* digitum longis, tenuis, teneris, duos aut tres dig. longa, lata vixdem splendens, nervo & vena prædita, quibus infusore lacte adhæret pulvis sulcus, quemadmodum in lingua cervina. Sapor radicis est acris.

CAP. XI.

Niamis Brasiliensis Margg. *Valeræ esse Herba corymbifera acris flore nuda.*

Margg.

Caulis est satis crasso, lignoso, tereti, geniculato, qui Poenulacæ more serpit, & hinc inde *fibra* in terram densitans *radices* agit, partim quos se erigit. Expanditur variè in multos *ramulos*, geniculatos, binos sibi obis oppositos, in illisque habet ad singula genicula *brachia* *folia* opposita, interdum etiam plura, inæqualia magnitudine: in extremitate autem ramulorum quinti, sex, septem *folia* sibi invicem apposita, oblonga, figura cordis, in ambitu leviter serrata, interdum & lacinata, dilata variata. In extremitate quoque ramulorum emittuntur *flaves* levis, magnitudine Cerati majoris aut minoris, consistentes solo umbilico rotundo & crasso, flavo, sine *foliis*. *Seeds* in umbilico sulco per maturitatem, ovales figura, planè compressam, ex sulco gyris coloris splendens. *Radix* densa, filamentosa, terrea, alba. *Folia* masticata linguam pungunt instar Serapi aut Nasturtii.

Firm.

Folia vel semen assitum Bubonis dorsis quantocius illum enecat. Præstantissimum est remedium contra quacunq; animalia venenata *ipsi* pondere e vino pota, vel si decoctum illius fumatur cum modica parte vini. Solor hæc herba cum piscibus coquit & optime convenit.

CAP. XII.

Herba lanuginosa Dillamii æmula *Pilon.* *Nidus patris Gnaphali æmula* *valeræ.*

In sylvestribus terrenis ficciotibus luxuriat tenuilla herba ex *radice* exili, filamentosa. Ad pedes *caulis* abundanti: surgit caule uno aut altero, tereti, ex viridi albicante, adeo lanuginoso, ut totus *gustulo* aspersus videatur. Pro vario maturatione *basu* ramuli longi hinc inde à terra surgunt & *serfim* expanduntur. *Folia* sulcare posita, inæqualia magnitudine, quadam tres, duos, etiam tantum unum *digitum* longa, in ambitu crispata, figura ferè *foli* Senecionis; que omnia cum *ex* *micula*

musculis more Dictamnii Cretici, lanuginosa instar mollis serici ad tactum apparent. In extremitatibus caulis & ramorum *flores* proveniunt, spicati congesti, parvuli, splendentes, ex argenteo subflavi, figurae fere florum Absinthii; quibus decidens stellula splendens argentea remanent. Folia odoris sunt singularis proximè ad Dictamnium Creticum accedentis si vel levissimè confricentur.

Succus recentè expressus & leniter aspersis cubicum & muscarum non solum pectus, sed & *Vires* aliorum insectorum ichibus malignis medetur virus extrahendo.

Cum nec flores nec semina hujus plantae accuratè describantur, ad quod genus propriae pertineant verè definire nequeamus.

CAP. XIII.

Curtum Ape Brasiliensibus Marggrav. Pilo. Leguminosa Brasiliensis fructu ovato cysta foliis appendicibus culta.

Curtum est sarmentoso ac lenso, qui se arboribus ac fruticibus implicat, habens ramos ramulorum & in quolibet quinq; folia, bina & bina sibi opposita, & quantum in extremitate: superiora viride splendens, ter inciluras habentia ut Serrae majore dentes, cetera inter haec folia ramulorum utrinq; alata, sive ambita cordiati folio ut in *lego* arbor. In extremis ramulis proveniunt longe spaci, ovulae *fissile* ex albo & viridi lutescentibus; post quos sequuntur *capsulae*, triangulae in summitate, propè exortum cylindraceae, & ubi maturiores ovali figurae, externis rubicundae, quae sponte in tres partes delinunt: cortex autem exterior rubicundus, par crassitie cortici Mali; interioris extremitas est ruber, continetque quilibet *fructus* duas fabas Hispanicis albo magnitudine pares, & quae quilibet involuta materie molli, albè, rari consistenti simili, ad tactum frigidè: ex illo albo involucre Fabae secundum longitudinem eminet, nigerrima macula splendens, seu potius semicirculo tali secundum longitudinem notata, reliqua pars Fabae fusci coloris. Continet deniq; Fabae interioris carnem Fabaceam flavam.

Aquis injecta necat pisces. Folia viridia, compressa vulnera primè, ut vocant, intentione sanant. *Ferr.*

CAP. XIV.

Utricularia Cap. bon. flori, Bod. à Stapel.

Hic folia quae bina habet utriusque inflata similia sunt & nervosa; *radix* bulbosa, ex duobus bulbis compacta [con Stapeli unum tantum exhibet] ex singulis uno producente folliculo A Justo Heurno habuit.

CAP. XV.

Camera maris Pisum.

Chittum longa est, caule tenui & lignoso, flore unico, exiguo, lutei coloris, qui (quod mirandum) quovis anni tempore se aperit, de die horè undecimè, manetq; expansus ad secundam pomeridianam; atq; omnes simul tunc eadem horè clauduntur usq; in posterum diem; quod sicut verissimum, ita & rarè oblectamento exillit; nihiloque per desertà peregrinanti horologii defectum ex parte supplebat.

CAP. XVI.

De Costo.

Costus, & Græcis, nomine, ut volunt, ab Arabibus mutato, quibus *Caf* aut *Cass* dicitur. Veteribus, ut Dioscoridi triplex erat. 1. *Arabum*, candida & levis, cuius furtive odore praedita. 2. *Indae*, crassa, levis ac niger oca Ferula. 3. *Perisicæ*, grava, colore buras, odore terrens. Arabes etiam plures species faciunt. Hinc magna disputatio orta est, an Costus legitimum habeatur.

Septatis, Arabes fecerit, Costum in dulcem & amarum divisere, quae tamen haecenus nihil fere habere, quod veri legitimiq; Costi faciem sibi controversia referat. Nec mirum, cum nulla nobis fere sint plantae peregrinae delineationes: uno tanta rerum est confusio, ut is quem dulcem vocant amarum, & quem amarum nominant dulciore gustu sentiant. His rationibus plerique moti Costum legitimum nobis esse negant, & solum rarietas vel in Hispania, vel in Italia ortas pro Costo legitimo in Officiis ostendit. Deniq; Garcia & Acosta unum duntaxat Costi genus esse credunt, & recentem incoaruptissimum dulce esse & candidum; ubi autem corrupti incipit vetustate amaritudinem contrahere hincque nigrescit. Haec omnia C. Bauhinus.

Costus Arabum C. B. Zingiberi effigie, Costus Syriacæ & Arabum Ad.

C. B. Inf.

Radix est Zingiberi cognata, substantia & figura candida, levis, pollicem crassa, unciam & *aliqua*

selequiniā longa, hinc inde tuberibus oblongis donata, intus fibrosa, sed pallefcente, etiam ad luteam inclinante, odore intenso ac jucundo, ad Cipressi aut Cedri Libani odorem accedente, gustu acri, interdum & buxæ visitur, uti vulgata, odore & sapore simili, sobamara (cum mix amari- tudinis utraq. Clusio) cætera similes. Terodines etiam ut Zingiber sentit.

Et Syria & Ægypto Venetias maximā copia advehitur, quæ Zedoariae aut Zingiberis est effigie.

Costus Indiam videntur C. B.

C. B.

Hujus radix facie & concretionibus Centauræ majoris vel Gentianæ radici similis est, gravis, solida, cortice pullo seu cinereo tosta, substantiæ candidantis, interdum ex cinereo flavescens coloris, quæ violæ seu radicis Iridis odorem, præsertim dum manditur, spirat, tantilla hirci graveolentia mixta, gustu peramara (salsicæ senescens) parte qua extra terram eminet caulis fragmentum inhaeret, quod Ferulaceum quoddam refert, & medullam fungosam continet.

Convenire videtur cum Costo à Garcia proposito, Sambuci effigie, & Arbuci aut Azimbri magnitudine, flove odorato. Præcellit, inquit, si qui intus candidus est, cortice cinereo, invenitur etiam odore baxi, cortice pallefcente, tantæ odoris fragrantia præditus, ut plerisque nares feriat, & capiti dolorem exciet; gustu minimè amaro, nec etiam dulci, tametsi jam senescens interdum amarescat, nam recens acri gustu est, ut reliqua Aromata, (scilicet ut Camerarium, substantiā intus albi, laxā, rari & friabili: facili in pulverem abeunte Acoffe) caule foris striato, intus multā medullā alba infarctā.

Loc.

Nascitur in Gazarata aliisq. Indiæ Orientalis provinciis. Indiæ medicis eo in multis medicamentis utuntur. Inde in Persiam, Arabiam & Turciam quin & Chinam regionem transfertur quibus in locis ejus usus per magnus est. Exigua admodum ejus quantitas in Lusitaniam deferitur.

Nobis cum Clusio videtur Costum hunc non esse Veterum Costum, cum ille, ut ex Dioscoridis descriptione facili colligitur radix fuerit, quod Plinius confirmat eam radicem discrete appellans: at hic [Garcie Costus] radicis minimum habet, & ferè nihil est nisi lignum suo cortice contextum.

Costus Moluccensis verticillata C. B. Ad.

Hic major est, & arboris masculæ cortex videtur: figurā Sambuci adularis & cineræci, rugis & plicis frequens, sapore & odore vehementi.

Costus Moluccensis lignosa C. B. Ad.

Præcedente minor est, radici Solani sylvestris valdè similis, colore diluto pullo, gustu urente ut vix ardorem lingua ferre queat.

Loc.

A Lunao Medico Rupellensi utrumque acceperit Adversariorum Auctores, qui à naucleris & Moluccis reducis habuit.

Costus amara Officinaria C. B. Heleni facie Officinaria J. B.

C. B.

Radix est nostræ Heleni per omnia similis, densior tamen & solidior, & ob cæci calorem magis percocta, quæ propter dilectā munda in essiccando flavescit, munda, in rugas nostræ contrahitur, quæ in concocta humoris plus habet, quo inter essiccandum exhalante flavescit, & in rugas contrahitur. Colore candidat rectis; antiqua, vel intempèstivè effossa, aut negligenter siccata liver aut fusca est: lincis in cornet transversis, medullā albi & magna, sapore amarissimo, ut & nostræ, non tamen adeo acri: inveterata ingrato admodum & viroso est sapore, medicato tamen.

Loc.

Et Comagena Orientis regione advehitur, & pro candido, i. e. Arabico Costo usurpatur.

Costus dulcis Officinaria C. B. dulcis Officinaria Centauris magna cognata J. B.

C. B.

Hic radix est crassa, solida, ponderosa, lincis multa à centro radice ad superficiem ductis, quæ Centauris majoris speciem videtur, etsi ejus odorem non habeat, & sapore sit subdulci.

Costus adularis insipida C. B.

Hujus descriptionem videat qui vult apud Camerarium, aut C. Bauhinum in Theor.

Costus Officinaria ingrata seu Thapsia speciosa C. B. J. B.

Radix per transversum in tabulas secta crassitudine plerumque manum complex, foris fusca, intus candidante colore: cortice crasso, substantiā rari & levi, quæ cum tenui rancidam aliquam pinguedinem olit, gustu supra modum acri, nasilloso, rancida, salivam cæci, & strangulationem communitat. Est autem Thapsiæ majoris species, in monte Gargano effossa, quam Agyptæ communem nomine cum Italici Costus, quæ Costum amarum vocant. Cord. in Diosc.

Vir.

Costus Dioscoridi vim habet exsiccandi, [adeo ut etiam exsiccet Galea] urinam cendi, menstrua dandi, & ad uteri affectiones auxiliarem, & in pectus & in perfusionibus ac fomentis. A vitæ morbo succurrit semineque pendere potest, convulsis inflammationibusq. cum vino & Absinthio. Sol & Venetia singular ex vino misce. Pellit etiam lumbricum latum cum aqua, ob amaritudinem quæ illi usit. Illinatur quoque cum oleo in rigoribus ante febrem accessiones utrimq. resolutis. Vina cum (ut contrahat ex Sole macida) aqua vel melle illius eruentur. Addeur etiam in malignata & Antidotes.

DENDROLOGIA,
SIVE
HISTORIA
Arborum & Fruticum.

Yyyyy

PRÆFATIO.

P R Æ F A T I O.

CUM Arborea ob insignem magnitudinem & staturam conspicua, cupisvis etiam ex itinere tantum vulgo oculis occurrerent: nonnullarum etiam flores inimitabili colorum varietate & nitore artificio naturæ penicillo depicti, aliarum fructus in elegantissimos schematicos epistodem digito ~~manu~~ efformati, intuentium visibus adblandentes, manus etiam ad se decerpentes invitarent: hunc factum est, ut quamvis herbarum ad arbores, non in Europa tantum sed (ut verisimile est) per totum terrarum orbem decupla fere proportio sit, Indicarum tamen & exoticarum arborum plures etiam quam Herbarum species Clusii & Bauhinorum temporibus observata nobisque tradita fuerint.

Verum cum earundem observatores & descriptores plerique, Botanices minus gnari, nec in plantis describendis satis versati essent, breves, obscuras & ambiguas specierum historias reliquerunt; unde maximam in iis distinguendis, reducendis & rite ordinandis per sepe difficultatem experimur. In tanta enim rerum & nominum varietate, brevitateq; & ambiguitate descriptionum exercitatissimus quisque non raro hæreat, suspensusq; & incertus fluctuet necesse est, & vel nihil omittendi studio specierum numerum supra modum augeat, vel entia multiplicandi metu eundem nimis contrahat & occurrat.

Hiscæ difficultatibus superandis, rectumque inter extrema cursum tenendo me omnino impari fator: ideoque sicubi in Arboribus exoticis Indicis & Americis disponendis erravero, lapsus autem erraturum vereor, Lectoris veniam implo-ro, quam me facile impetraturum confido apud æquos rerum iudices, qui rei difficultatem perpendant.

De A R B O R E.

Arbor prout eam Lib. 1. cap. 28. Jo. Bodzi à Scapel verbis descriptum est *Planta lignosa, altitudine & crassitudine inter omnes maxima, cui caudex pro superficie est perennis & natura simplex, qui in multis ramis majores, & demum ramusculos multipliciter dividitur.*

Hæc definitio nimis stricta est nec omnibus Arboribus convenit. Datur enim genus Arborum & ramis & furculis carens, nimirum Palmæ lili, affines.

Frutex est stirps inter lignosas altitudine & crassitudine mediocris, cui pro superficie stirps perennis, natura multiplex, quæ facile in naturam arborum staminum abscissione transcendit.

Verum quoniam difficile est certum aliquem magnitudinis limitem inter Arborem & Fruticem constituere, qui hunc ab illa determinet; cum ejusmodi breves non natura, sed arbitrio humano constet: cunctæ Arborea & Frutices præcipuis notis conveniant, quod utraque scilicet gemmarum sunt & substantiâ lignea constant. At non simpliciter caudice attingere omnibus Arboribus, neque multiplici omnibus Fruticibus conveniat, ut alias rationes, Lib. 1. cap. 28. adductas omittam, hos ab illis nuncimè separandos duxi, sed omnes unâ tradendas.

Methodum autem illam quæ in Arboribus & Fruticibus disponendis alibi usus sum, cum minus proba & naturæ consentanea, in nonnullis etiam vitiosa & erronea videretur, rejeci, aliâque ejus loco, & meliorem, ni fallor, substitui.

HISTORIÆ PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS QUARTUS,

QUI EST

De Arboribus caudice simplici non ramofo.



OC genus Arborea à Theophrasto *ἰσχυροὶ* & *ἰσχυροί* appellantur. Possent etiam pleraque, si non omnes, *ἰσχυροὶ* dici, quia unam tantum unâ vice in summo fastigio gemmam, eam tamen maximam producant, quæ in Palmis *ἰσχυροί* seu Cerebrum dicitur, quæque decisi arbor interit.

Hujus autem generis præter Palmas paucissimæ arbores sunt, nimirum Peponifera quædam, Mamoeira dicta.

Mulam arborem dictam, quamvis revera & propriè loquendo nec Arbor sit nec Frutex, Botanicos secuti, & quòd caulem habet pariter simplicem non ramofo, his subjungimus.

CAP. I.

De Palmis in genere.

CUM in Methodo Plantarum à me non ita pridem editâ Palmas arbores congenere à se invicem distrahi, & ad diversa genera, Pruniferarum scilicet & Nuciferarum, relogari animadvertentem; absurdum illud & à ratione alienum ratus, methodum illam ad examen denuo revocandam, & certiores Generum notas investigandas statui. Et imprimis Palmas dictas inter se conferenti, quibusque in rebus & inter se convenirent & ab aliis arboribus differrent consideranti occurrit illico, id genus omnibus commune, & solis ferè proprium esse, caudice simplici & indiviso seu non ramofo assurgere, & gemmam una vice unicam, eam tamen ingentem, concipere. Quocirca proprietatem hanc pro Palmæ characteristica, natura ipsa dictante, adhibendam censui.

At inquit, Botanici uno ore Palmas ramofo esse pronunciant. Agnosco: verum eorum Auctoritas me non multum movet, cum re non satis perpensa, vera & genuina folia pro ramis ab us habita fuisse noverim. Ramos autem illos quos vocant revera folia composita esse, non difficile est demonstrare.

1. Nam primò, Deciduum esse folio non ramo convenit. Ramus enim utpote ipsius trunci divisi quædam productio, pars est stabilis & perpetua; Rami autem illi dicti, seu ramastri in plerisque, saltem si non omnibus Palmis statim temporibus decidunt: proinde rami genuini esse non possunt; sed mera folia sunt.

2. Secundò, Partem pronam à supina diversam obtinere folii nota est, non trunci. Ramus enim teres & undiq; uniformis est. At in Palmarum frondibus costæ medix lupinæ canaliculatae sunt aut planæ, pronæ convexæ.

3. Tertio, Nunquam germinare seu gemmas protrudere folium arguit, non ramum. Ramus enim quotannis semel aut lapsus germinat, & furculus producit. At ramastri illi Palmarum cum semel expliciti sunt nunquam gemmas edunt, aut partes aliquas aggenerant.

4. Quarto, In folium desinere seu terminari folii compositi proprium est, à rami natura alienum. At ramastros palmarum in folia terminari notum est.

5. Quinto, Accedit levitas insignis, quæ ramastros hujus lignæ naturæ, (quæ plerumque solidior est & ponderosior) minime participes esse arguit.

Nec quem ab hac sententia deterreat ingens illa & ramorum æqualis magnitudo: Nam in Palma folio stelliformi, quæ folia & sunt & ab omnibus vulgo habentur, nihilo minora reperiuntur.

Obijcies, Palmas nonnullas (id tradente Theophrasto) bifidas exire, ut in Ægypto, *Staréq;* ita bifurcatas. Tradunt & Cretensum plures bifidas esse, quasdam & trifidas: in Lapæa verò genus quoddam quinqueceps nasci. Observatum etiam est ab Horti Malabarici Auctoribus in Palma Japonenti *Tolda Penna* dicta, ex uno trunco quatuor aut quinque vertices interdum enasci.

Respondet, Ramum illud & insolitum esse, & singulis arboribus simplicem plerumque esse verticem: unde non datur genus hujusmodi Palmæ bifida aut trifida, quæ semine lata speciem suam constanti naturæ lege propagat. Sed ut Palma multiceps sit, præter ordinem & institutum naturæ accidit, & quodammodo monstruosum est.

Norandum tamen folia decidua obtinere Palmis omnibus commune non esse. Si Theophrasto & J. Bauhino fides. Nam Dactylifera vulgaris inter *ἀειβάλα* à Theophrasto recensetur, & Jo. Bauhino observante, in nonnullis arboribus in Gallia Narbonensi à se conspectis, folia sponte non decidunt, sed præcidenda ea sunt à cultoribus ut arbor ad scandendum opportuna sit; alioqui si derelinquantur impenetrabili vallo scandentibus aditum intercludunt.

Palmam dictam esse quòd ramus sit expansis in modum palmæ hominis tradit Isidorus, l. 17. c. 7. Palmæ humili id nominis antio impositum videtur, cuius folia palmam humanam cum digitis extensis referunt. *ἄλεις* Greci & arborem & fructum simul dixerunt, à colore pomi factò utroque nomine; *πυρρὴ* enim & *πυρρῆ* puniceo colore rubere est, quo maturi in hac arbore fructus videntur. Phœnicæ autem regioni à Palmarum multitudine & præstantia nomen inditum voluit. Palma apud Latinos sæpe etiam victoriam significat. Cicero Orat. pro Roscio Amerino *Aliter plurimarum palmarum vetus ac nobilis gladiator habetur.* Causa locutionis est, quòd victori certaminis daretur corona ex Palma. Rationem ejus moris aperit ex Plutarcho Gellius, lib. 3. cap. 6. *Propter in certaminibus Palmam signum esse placuit victoriae, quoniam ingenium ejusmodi ligni est, ut argentiū oppressivissimū non cedat.*

Palmæ fructus Antiquis Latinis Palmulæ dicti sunt: posterior ætas Dactylos appellavit, quoniam eorum nonnulli oblongi gracilitate curvati humanis digitis similes essent.

Vagina flores & fructus obvolvens & protegens adversus cœli injurias *ἑλάν* & *ἑλάν* dicitur.

Dioscoridi Palmula seu Dactylus immaturus *πύρα* seu *πύρα* dicitur, maturus recens *πυρρῆ*, siccatus *πύρα*.

Palmæ fructus respectu dividi possent in eas quarum fructus pericarpio seu pulpa molli officulum ambiente consistat, & eas quarum fructus materia sicciore nucem includente componitur. Nos potius foliorum respectu dividemus in eas quæ folio sunt composito, eòq; vel pinnato, vel ramoso; & eas quæ folio sunt simplici plicatili & flabelliformi.

Palmarum autem notæ præter candidicem simplicem non ramosum reliquis hujus generis communem, sunt Folia habere striata & velut Arundinacea, flores tripetalos. Spathiferas etiam esse omnibus convenit, nisi forte Codda panna excipias.

C A P. II.

De Palmis folio composito.

1. Palma Ger. C. B. vulgaris Park. major C. B. dactylifera major vulgaris Johnston. The common Palm-Tree, or Date-Tree.

Arbor est simplici caudice in rectum se attollens, viginti passuum & amplius altitudine, ima & humo proxima parte gracillior debiliorque quam superiore: cortice densis gradatimque pollicibus, quæ nihil aliud sunt quam foliorum abscedentium vestigia extantia, scabro & inæquali, unde arbor ad scandendam facilis: sola inter arbores nullis ramis costans, autore Theophrasto, at posterior ætas alias præter Palmam non ramosas quamvis paucissimas observavit. Rami autem Botanicis dicti sunt reverà folia maxima composita. Ramus (seu potius folium) J. Bauhino descriptus tricubitali erat longitudine, minimi digiti crassitudine & ampliore, præsertim circa infimum, sensim ad summa usq; tenuatur, ut multum de crassitudine decodat, foliæ sere latitudo pristina sit notabilis, tandem in folia aliquot arcto ortu coherencia degenerat, triangularis, striatis, intus nonnihil fungosus, & quasi ex longis filamentis, quorum spatia facit medulla quedam, compactus. Hæc folia complura utrinq; adnascuntur, arundinacea, rigida, semunciam lata, (impressis superiora, infima enim dimidio sunt angustiora) in acutissimum mucronem desinentia. Adhasus ad ramum [rectiois folii costam] est obliquus, ita quidem ut hinc propinquo exortu, circa tantum infimum sint conjuncta, relicto inter conjugationes duorum triumve digitorum intervallo, at superiora agnoscantur pari tere passu pinnatimq; exsurgunt. Id autem quod spathâ involutum fructus sustinet, non male scœpis compararera, à manubrio siquidem composito, sesquunciam lato, sensim gracilescente, materie curi ramis persimili, in fila solibus, bacilli scoparum formâ cubitales & ampliores exeunt quamplurimi, gradatim ex intervallis modicis, ut totidem è vimine nastarum rudimenta mentiantur: singuli autem bacilli parte inferiore, quæ nuda est, quadrati, tanquam culcro præcisi apparent: superior paulo inæqualiter torqueter, & crebris tuberculis, quibus fructus adheret, asperari occipiunt.

Dactyli figurâ oblongâ mediante calyculo sessili bacillis adherent, cortice externo per maturitatem fulvo, cui subest pulpa pinguis & dulcis, huic verò subest membrana alba, in tenuia filamenta dividua, proximo officulum contingit ejusdem ut videtur portio, colore cinereo albo aut fulvo. Ipsum officulum oblongum, modo tenuis bruchi instar, modo crassum beneque habitum, rugosum, altera parte secundum longitudinem sulco profundo exaratum, adversa parte suspensâ liberosuâ notatum, in cupis medio impressis umbilicatis, cui intrinsicis respondet antrum exitum, conceptaculum germinis albicantis & molli. Detrahti ultimi membrana substantia apparet tubera, quarum acinis concolor, superficialis, nisi quòd ex sulco penitus se insinuat in intimam officuli seu nucleî substantiam, albam, duram ut cornu, adeoque vere ossicam, ut marmoris fragmента fractu inesturq; eisdem duritiam & colorem cum duritia & colore cornuam instans gerens, sapore subdulci, & haud infrenne adstringente, in cupis visceribus medulla later, quæ parte cartilaginâ refert naturam. Merum quòd situm in terra ita emollitur, ut decorticari queat parti exteriori ossia & lapidea & interiori ab uterore medulla.

Plinius succinctè & eleganter more suo officulum, quod lignum vocat, ita describit, Est illud oblongum, non ut olivæ orbiculatum: præterea cæsum à dorso pulverinatâ fissurâ, & in alvo media plurimè umbilicatum, unde primum spargitur radix. Multa candidissimè lignum hoc à carnibus discernitur tunico, alia corpori adherentibus, lævis, distans tantum cacumini filo adheret. Flores numerosi, tenuibus quibusdam villis appensi hærent, in magni racemi modum, sicæ Crocinis similes, sed multo minoribus, colore albi.

Ipsa verò vagina, Elate & Spatha præcis scriptoribus dicta, flores & fructuum rudimenta primò claudens, mox hians, divitias reconditas ostendens, qualem J. Bauhinus habuit pedale quiddam erat, tres uncias latum, modicè compressum, sed in medio nihilominus promberans, utroq; extremo angustius, intus cavum, substantiâ corticosâ, Arundinaceam diceret. Hæc novo accedente vere, cum novi in hac arbore fructus appetunt, tumer velut in frugibus spicarum vagina, aut in Aro seminis corticosum involucrium, tenerâ primùm, mox lignosâ materiâ, que usq; dum flores prodierunt cum latitudine aliqua in longum procedit, prolatis deinde floribus, & post flores racemoso Palmarum fructu, arefcit.

Infervit hæc vagina ad flores & fructus dum adhuc tenelli sunt fovendos & ab æris externi injuriis defendendos.

Palmarum quandam imaginem refert Brassica capitata, tum caule, ima parte propè terram graciliore multò quam superiore que sensim crassescit, necnon vestigia foliorum delapsorum existantia ostendente, tum capite, complicatis foliis fructus germen foventibus, Palmæ *ἰχθυόειρα* dictum, imitante. Hinc Palmæ quedam species nostratibus *The Cabbage tree*, id est, Brassica capitata arbor, dicitur. Quò altius affurgit Palma eò nimis ramulorum abscondentium nodis hæret, annohor eos penitus obliterat.

Radibus brevibus Palmæ omnes donatæ sunt, vis tamen densa & valde implexis intricatissimè, inter se, ut mirum sit Palmarum altissimos vastissimosq; caudices posse sic brevibus, tenuibus, paucisq; radicibus in aere subsistere, neq; sua multa gravitate, ventisq; etiam vehementibus saepe ipsas quatentibus humi concidere. *Alpa*.

Pars illa in vertice Palmæ tenera & medullosa, *ἰχθυόειρα*, i. e. Cerebrum Theophrasto dicta, Dioscoridi impropiè *ἰχθυόειρα ὄκλινα*, id est, medulla trunci, nihil aliud est quam gemma grandis, indè enim, Theophrasto ipso docente, & folia & fructus exeunt, cæque siquis auferat sterilefcit arbor & brevi penitus interit. Galenus quoque *ἰχθυόειρα* tenerum germen appellat, quod è summa ipsa planta produciunt. Hanc partem esculentam esse mulcis Veterum testimonio constat. Xenophon

lib. 2. expedit. de Cyri, *Μάλιστα ἐν πρῶτῳ ἐν τῷ Πάλμαρῳ τὸν κῆρον ἐστὶν ἐπιθυμητὸν, ἀπὸ τοῦ ἑσθίου, ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου ἐστὶν ἰσχυρὸν καὶ ἐπιθυμητὸν.* Galenus etiam eam citra famem à nonnullis elitari commemorat: & Nicander in Georgic. *ἢ τὸν κῆρον ἰχθυόειρα* illum vocat. Diphilus Siphnius apud Athenæum plenitudinem corporis efficere, largius nutrire, ventriculum gravare, vix distribu, sitim inducere, alvum coercere narrat.

C. Bauhinus etiam in Alexandria eâ velci Ægyptios ait, & quidem crudè, Canaræ etenim saporem referre: solere etiam Ægyptios rusticos Palmas abortivas requirere, quarum cacuminibus excis medullam eximunt & venalem proponunt.

Veteres Palmas sexu distinguunt. Theophrastus mares flores tantum sine fructu proferre, feminas fructus sine flore scribit, inquit J. Bauhinus. Verum Theophrastus utramq; tam marem quam feminam fructiferam facere nobis videtur, cum inquit, *Τὰς ἰχθυόειρας ἐν τῷ ἄρῳ, αὐτὸς δὲ δόξα, διὰ τὸν ἰσχυρὸν καὶ ἀλλοτρίον τὸν κῆρον ἐστὶν ἰσχυρὸν καὶ ἐπιθυμητὸν, ἀπὸ τοῦ ἑσθίου, ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου ἐστὶν ἰσχυρὸν καὶ ἐπιθυμητὸν.* Quæ & Plinius ita accepit, cum reddidit, *Mas in Palmæ flore, femina circa florem germinat tantum: Utriusq; autem prima cognitur Pami cura.* Nihilominus tamen nobis verisimilius videtur Marem flores tantum proferre, feminam fructum.

Tradit præterea Theophrastus pulverem florum mæris feminæ aspersum eam fecundiorẽ reddere, nec fructificare ipsas feminas, nisi juxta ipsas mas constitus sit. Et Hist. lib. 2. cap. 9. Dum mascula, inquit, floret, spatulâ abscidit quâ flores emergunt, protinus ut lanuginem, & pulverem & florem continet, super fructum feminæ decutunt. Illa sic eâ aspersione afficitur, ut suos fructus nullo modo amittat, sed cunctos conferret. Et in secundo de causis, ad hoc illustrandum & probandum apposuit exemplum in natura piscium, in quibus Ova edita à femella sequuntur mas aspergit suo semine, atq; ita demum fecunda fiunt ac vitalia.

Idem confirmant Plinius, S. Ambrosius, Cassianus Bassus, Ammianus Marcellinus, aliq; è Veteribus: Quibus astipulantur è Recentioribus Gualandinus & Prosper Alpinus, quorum ille assertit Palmarios etiamnum in Ægypto, Syria, &c. ad cavendum ne feminæ sterilefcant aut fructus ante maturitatem amittant, ita ordinare utriusque sexus Palmas, ut mares eo saltem intervallo à feminis distent, quo pulvis ventorum flatibus à foliis [rectius floribus] mascularum sublatus, in feminarum folia, seu potius fructus incidant: idque satis ad fecunditatem & fructus maturationem facere competentum esse: Hic [Alpinus] Ægyptias hodie ut feminas fecundent, pulverem intra mæris involucrium inventum supra feminarum ramos atque eos spargere tradit, & si hoc fecerint sine dubio feminas vel nullos fructus lanras, vel quos ferent non retinebunt, neque *ἢ* maturefcant. Et ad objectionem, quod in Arabiæ desertis sylvestrium Palmarum sylvæ reperiantur, que sine hominum cultu aut ejusmodi observatione optimos fructus ac copiosos producant, retinent ac maturant, responderet, Palmarum fecunditatem in Arabiæ desertis, licet arte non fiat, adjuvare ventos, marium è floribus pulveres ad ramos feminarum asportantes.

Atque hæc sane nobis verisimilissima videntur, nec audeamus tot gravissimis autoribus fidem derogare. Nam ex sententia nostra, primo in libro propolita, *Apies* in floribus staminibus incumbentes spermatis masculi in Plantis vicem præstant, & feminibus fecundandis inserviunt. Unde quamvis Plinio illisq; quos diligentissimos nature vocat non consentimus, Arboribus herbisque etiam omnibus sexum esse [individuis discretum] omnes tamen plantas in eadem specie, vel sexu differre, vel saltem androgynas esse seu utriusque sexus participes suspicamus. Nec tamen hinc sequitur earum que sexu differunt feminas fructum omnino non proferre nisi mas adsit, sed quos profu-

runt infœcundum esse. In avium enim genere feminae nonnullæ ova absque maris interventu aut coitu aliquo non tantum concipiunt sed & pariunt, verum ea subventanea, ut vocant, & irrita; in piscibus autem plerisque contra nullus observatur, sed feminae ova primum edunt, deinde mas super-veniens lac vitale in inspergit.

Verum quæ prædicti Autores habent de Veneris intellectu in palmis, quod feminae in mares nutrent blandioribus comis, quodque vehementi se mutuo prosequuntur amore, quem variis modis testantur, ut fabulosa & falsa rejicimus, & Lectorem qui ejusmodi scire desiderat ad J. Bauhinii historiam remittimus.

LXX.

Quod ad locum attinet. Nulla est, autore Plinio, in Italia sponte genita Palma, nec in alia parte terrarum nisi in calida: frigifera verò nusquam nisi in fervida. Et Theophrasto ipsaque experientia teste, caloris est avida, & frigidum ferre nequit; unde nè in Græcia quidem fructum maturat.

In Ægypto nascitur, ubi largè soavitèrque fructum progencrat, atque etiam magis circa Babylo-nem ac Syriam fructu præcellit Theophr. Provenit etiam in Arabia ad oram maris rubri; in Æthiopia Ægypto contemina, in Judæa, ut circa Hiericho copiosè, quæ idcirco in sacris literis *arbo palmarum* dicitur. Idumæa à Palmarum copia poetis celebratur: Syria quoq; & Persia Palmis fructiferis abundant.

Vidimus & nos Monspelii insignem illam Palmam quam J. Bauhinus, & florere & dactylos ferre scribit; & se etiam ex arbore decerptos habuisse tam flores, quam dactylos satis magnos refert; unde & reliquas Palmas quæ Nemausi, Arclatz, & alibi in Provincia & Gallia Narbonensi videntur hand dubiè fructus laturæ ubi ad ætatem pervenerint affirmat: Nam & Monspelensis illa centesimum annum superare creditur: Et vulgò ibi persuasum, ante grandem ætatem fructum non proferre, & vix ante quinquagesimum annum.

Amat loca salia, argumento quod ubi Palmarum copia est solum tale spectatur, ut in Africa, Syria, &c. quo fit ut ubi saligo non sit ope proxima salis subveniant Theophr. Idem & Plinius confirmat inquis, *Gymetar* levi salubrosque terra, majore in parte & nitrosa. Ergo ubi solum non est tale, saltem aspergunt, non radicibus, sed longis paulò.

Garcias memorie prodidit Palmas tota India nusquam reperiri, & fructus earum deseri ex Arabia in Indiam, ubi magna quantitate siccas celi, similiter & in massas compactas, abjectis nucleis.

Palmarum differentias non persequar, cum eas inter se non specie, sed accidentibus duntaxat, quemadmodum Pyros & Pòmos, distare existimem, proinde & infinite esse possunt. Confide de his Theophrastum & Plinium. Libet tamen de differentia colorum respectu adnotare, quod Prosper Alpinus cum Theophrasto consentit dari palmites alios candidos alios flavos alios rubros alios virides. At Vellingius flavos tantum & obscurius purpurascens meminit à se observatos in Ægypto.

Palmarum excellentiam sylvam in Arabia deserto Rauwolfius transivit, referente C. Bauhino, & tres Dactylorum species observavit. 1. Quales ad nos adferuntur. 2. Peninis rubros. 3. Flavos, primò minores, sed lapidiores.

Palmam medullam omnino carere auctor est Theophrastus: Arborem maximè longævam esse consentiunt Botanici quotquot de ea scripserunt.

Palmam prævalidam esse ad sustinenda pondera scribit Theophrastus: non enim flectitur deorsum ut cætera ligna, sed pondere retinendo sursum incurvat: At non tantum Theophrastus sed & reliqui Veteres magne consensu id tradunt. Verum Veterum auctoritati, in re quæ rationi & nature analogie repugnat, Amati Lusitani & Antoni Mule Brassavole experientiam oppoio, qui se falsum composuisse testantur Palmæ lignum contra pondera inniti aut recurvari, imò experientiam indicare lignum hoc debile esse. Nec me movet, quod Historie Ebroduntensis Auctores tot Classicorum Antonum consensum unius experimenti putati specie repere, prudentis non esse dicant. Fortè enim Amatum rem non rite expertum, vel in ligno non satis adulto, aut non rite secto, vel non adhibita mora temporis competente. Hæc inquam me non movent, cum ratio etiam experientie Amati suffragetur; & via sursum tendendi, si qua ligno et melle, majori vi & pondere proculdubio possit superari.

Hæc autem & alia multa à Veteribus tradita, incerto primùm auctore prolata, & in vulgus paradoxorum credulum sparsa, avida aure ab eo hausta, & pro vera libenter admilla crediderim; quæ postea erudit, partim experientiæ radio, partim quod passim cognitis & confessis fidem derogare nefas ducerent sine ultiores examinat scriptes suis miserunt, alique alios secuti, non quæ eundem ceter, sed quæ intus, magna sententiarum phalange veritate oppressa errorem confirmarunt.

Palme ligna ad ædificia & architecturam nihil valere scribit Bellonius: verum Alpino Ægyptios ex truncis domorum trabes facere ait. Utri potius fidentium? Alpino favet Theophrastus.

LXXI.

Palme folia, Plinio seculo, cum primùm novellas demonstrare gemmas, ad funes vituliumque nexis, & caprum levia umbracula simlebantur. Ad floreatum & sportarum texturam ut alba & idonea fiant viridia adhuc à ramis avellenda sunt, & sub tecto deponenda ad quadratum, & postea rursus tombo exposita, ad quadratum compli linenda, & à Sole resiccati donoc alba evadant.

Funis & e Palmæ foliis scopis; quæ verò ad nos ex Hispania adferuntur, & in præcipua æstimatione sunt, e Palmæ humilibus non e Dactyliferæ foliis sunt, quæ tamen furtè non minus commoda ad hunc usum forent, si haberi possunt. Flabella etiam & sportæ ex his texuntur; E catalicis autem cortice funes pro navibus.

Palmule bene mature non nimium pingues ventriculo gratæ sunt, plurimum nutriunt & corpus pinguisant verum concocti difficiles esse, & capiti dolorem inferre modici veteres pleriq; omnes consentiant. Unicus Arætus omnia bellaria caput dolore infestare scribit præter Palmulas, ficus & uvas.

Veteres vinum e Palmulis aquæ infuse faciebant; cuius præparandi modum vide apud Dioscoridum.

LXXII.

Palme fructus, eodem tradente, acerbis est atque austrius & contra alvi profluvia fluxumque mælebre in vino austero bibitur; Hæmorrhoidas quoque sistit, & vulnera illis conglutinat, recentis

centes autem plus siccas astringunt, sed capitis dolorem afferunt, & copiosiores in cibo sumptæ inobriant. Sicca autem sanguinem excreantes, stomachicos ac dysentericos esitæ juvant: necnon & trita cum Cydonio & cerato cenanthino vesicæ vitis utiliter illinuntur. Maxime verò caryotæ si comedantur faucium asperitati modentur. Thebaicarum decoctum potum catatonem sedat, & cum hydromelite vetusto sumptum vires recreat: Quin & ipsæ cibo idem præstant. Fit etiam ex his vinum ejusdem cum fructu facultatis. Decoctum eorum per se potum & gargarisatum vehementer adstringit & cohibet.

Palmarum nuclei cæterorum omnium more in fictili novo cremantur, deinde restincti vino lavantur, & tanquam spodi vicem supplentes ad ornandas decorandasve palpebras conducunt. Vim habent adstringentem, & spiracula cutis obstruuntem, ad oculorum postulas, staphylomata, cataractumque deflavia addito Nardo efficacem. Supercrementem carnem cum vino reprimunt, & ulcera ad cicatricem perducunt, &c.

Palmæ spathâ unguentarii in unguentorum spissamenta utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præcula, interna parte pinguis. Vis ei adstrictoria, quæ ulcera depalcentia sistit, laxatōque articulos committit, si trita malignatis & cataplasmati admisceatur. Prodest & præcordiis, & stomacho imbecillis, necnon & jecinoris affectibus convenientibus mista cataplasmati.

Ejus decoctum subinde affrictum capillos denigrat: Potum verò datum renum, vesicæ, aliorumque viscerum vitis confert; alvi utriusque fluxiones sistit: ipsa verò scabiem sanat, diebus viginti, si adhuc teneta cum resina & cera decocta imponatur. Ad eadem etiam valet fructus immixtus contentus Elate & Borassus dictus præterquam quod ad unguenta non sit utilis.

Quæ de viribus & usibus Palmæ ejusque partium habent Plinius, Galenus aliique Veteros apud ipsos vide, aut etiam apud J. Bauhinum, Hist. lib. 3. cap. 159.

E Recentioribus Alpinus fructuum in medicina apud Ægyptios usum enarrat his verbis. Ex fructibus tria sunt præcipue quibus sanitatis gratia utuntur, quippe spatha, pulvis spatha comestus, atque dactyli. Spathæ igitur membranâ tum pulvis facta utuntur, tum ex ea parato decocto. Pulvis maximum usum habet per os sumpta ad diarrhoeam, henteriam, atque dysenteriam; nec minus ad omnes alias vel sanguinis, vel alterius humoris non naturales rejectionses sistendas; præcipue verò ad hepaticum fluxum, hæmorrhoidum atque uteri cruentam vacationem, atque ad spurum sanguinis. Hoc pulvere quoque utuntur ad firmanda ulcera depalcentia, ad uvæ relaxationem, atque ad dentium commotionem. Decocto ad omnia prædicta quoque utuntur, sed sæpe cum eo misto prædicto pulvere. Articulis debiles atque fluxionibus mirum in modum ipsum juvat, eos firmando & roborando. Pulvere verò albo in involucrio veris tempore invento, quando scilicet palmæ florere incipiunt utuntur familiarissimè ad faucium raucedinem, tussim & ophthalmias cum saccharo misto; estque ipse dulcis, subastringens: mulieres cum habent familiarissimum ad firmandos menses retinendūque, fetum.

Eundem quoque usum habent Dactyli immaturi, tum in cibum usitati, tum eorum decoctum, ad spurum sanguinis & quamcumque sanguinis vacationem cohibendam, & ad henterias, diarrhoeas & dysenterias, ad vomitum sanguinis, hæmorrhoidas ediccanilas atque ad ulcera vulneraque simplicia perferenda; in frequentissimo usu ad nuper dictos affectus habent syrupum è dactylis immaturis confectum. Iisdem dactylis utuntur præbe maturis, qui tunc admodum dulces existunt, cum obscura adstrictione; ideoque eas frequentant ad faucium raucedinem, tussim, dyspnoeam, pleuritim ac peripneumoniam; nec minus ipsorum decoctum frequentant ad adjuvandas variolarum in pueris excretiones. *Hælleni Alpinus.*

Cæterum Palma officinali scitur. Serantur autem, docente Theophrasto, officula plara [Plinio bina juxta se composita, & superne toridem] juxta se in eodem foramine deposita, bina superius totidemque inferne colligata, quoniam infirma singulis planta est. Horum radices mutuo amplexu connectuntur, & statim primæ germinationes ita coalescunt, ut unus ex omnibus stipes gignatur.

Officula lata etiam apud nos in Anglia facile germinant, foliumque emittunt unicum, nervolum & arundinaceum; quod hyemes etiam nostras non raro tolerat, & sequenti anno alterum vel etiam tertium edunt, non tamen multum proficit, nec diu durat eruta planta, sed post duos, trêve annos tabescit & interit.

Notandum autem quod non ex fissura, sed ex opposita seu gibba parte ubi ocellus seu umbilicus cernitur germen emittat; quodque unico & singulari præbeat folio, cum alix pleraque plantæ (non tamen omnes ut perperam existimavit Jo. Bodæus à Seapel.) bina primo ortu folia è semine producant.

Plinius in Palmæ foliis olim scriptitatum tradit. Verum Palmæ vulgaris Dactyliferæ folia ob asperitatem durissimam & nervos crebros huic usui inepta videntur. Hoc ergo vel de Palma Indica coccolera, vel de Palma *Lævis* dicta accipienda sunt, in quorum foliis etiamnum hodie scriptitari testantur Rerum Indicarum scriptores.

Annosus Plinius Elephantis Palmæ excelsiores fronte prostrantur, ac ita juvenum fructus absumunt.

2. Palma Guineæ J. B. Palma coccolera ex Guineâ C. B. Nibala Indica altera Park.

Clas.

Altitudine & crassitudine sunt hæc Arborea navalis Mali, summo fastigio gestantes folia, deorsum inflexa, duodecim aut quindecim pedes longa, Arundinum ritu incisa. Sub his foliis nascuntur, brevibus pediculis inhaerentes uvæ humani capiti magnitudine, in quibus congesti fructus Pruni majores, coloris auri, quorum nucleos incolæ exarmentes contendant: Ex his exiit liquor olei limpidi instar, oleum de Palma ab insularibus appellatur, quem edulis miscent ad odorem colorisque gratiam conciliandam. Is liquor huc delatus frigore concrevit butyri instar, colorémque auream contrahit. Eam liquoram sive oleum qui residerunt, recentibus vulneribus & artubus contorsione læsa vel afflicta illita levamen atalibile deprehenderunt. Incolæ terebrâ perfossis arboribus lignum

pacillum indunt: ex eo foramine profluit liquor dulcis feri lactis instar, quo cum melle sylvestri commixto potionem conficiunt, vini de Palma appellatione, quo liberalis hausto etiam temulenti fiunt. Arboris materia rubescens flavis venis distincta, ad fabricas inutilis, quia filia tenuibus & gracilibus segmentis diffilit.

In Guinea circa metallicas auri venas abunde crescit. A Fr. Penino habuit Clusius.

Hujus Arboris synonymam facit C. Bauhinus *Palmam Ady* Roellio in Epist. ad Clusium; quam J. Bauhinus diversam statuit & seorsim proponit sub titulo *Palmæ Ady*, insula S. Thomæ, &c. cujus circa descriptionem subjiciemus.

Arbor est valde celsa & procera, Pinum altitudine superans, trunco crasso, nudo, erecto, *si meff. C. & O.* materie rara, succo prægnans, folis Palmæ cocciferæ similibus. In vertice plurima excrescunt germina, quibus præcisus vel caesim levis vas aliquod idoneum appendunt, in quo lacrymantem colligunt succum, qui vini vicem apud Indos tenet, & facile inebriat. Dulce hoc vinum est, vix post paucos dies aciescit: nec idcirco fructus suos facere desinunt eisdem arboris reliqua germina, quæ à ferro intacta manserunt. Hujus autem Palmæ germen non edunt incolæ: istus insula; quemadmodum Indi Palmæ cocciferæ.

* S. Thomæ.

Integer fructus Lusitanis dicitur *Caryocæ* & *Caryocæ*, indigenis nigris *Abangæ*. Cortex ejus exterior luteus est; huic subest pulpa seu caro fulvescens, quam pullum putamen osicm sequitur: hoc vero intus nigrum continet nucleum esui aptum, qui adempti pellicula candidus est. Fructus integer forma & magnitudine est Mali Limoni. Edunt ipsi hos fructus inflatos, frequenter etiam crudos. Nucleos integros inter edendum miscent Mandiocæ farinae. Hos credunt ipsi mirum in modum reparare languentes ex morbo viros: adeo ut suis agris bis tæve in die confortandi causâ tres quantorve Abangæ nucleos exhibeant. Præterea ex hoc fructu oleum conficiunt: nempe ut carni à nucleis avulsæ adjiciant aquæ ferventis bonam partem; deinde jubent ut pulpa in lebetem diu ageretur commisceaturq; exacte super ignem, deinde remotum ab igne lebetem tandiu stare sinunt, donec amurca omnis in fundum subleat; tandem oleum aquæ supernatans cochleari excipiunt: quo exhausto aqua fervente iterum assuâ operationem repetunt. Olei color croceus est; frigore concrevit, aliàs liquidum est, esculentum etiam, & ad eosdem usus ab incolis adhibetur ad quos apud nos oleum olivarum vel burinum, quibus tamen & odore & sapore inferior est.

Vires.

Olei hujus usus apud incolas vulgaris est ad inungendas partes corporis rigidas atque contractas, imprimisq; nervos distentos relaxare dicunt. Exercitatos etiam & quovis labore fessos toto corpore inungunt: nempe quod exercitiis similes corporis partes exhalant & exsiccantur, quod ipsum humectatione sua impedit hujus olei perfunctoria ac lubrica frictio. Hoc ipsorum acopon est & in frigore lassitudinis remedium esse prædicant.

3. Palma vinifera Thœveti J. B. C. B.

Arbor est speciosa & procera, perpetuo virens. Fert parvos dactylos austeros & acidos, ut non facile edi possint. Caudicem ima parte duorum pedum altitudine à terra perforant sylvestres Æthiopes indeque exstillat liquor gustu suavissimo, colore vini albi Andegavensis; quem vasis terreis exceptum ad usum reservant, & *Mignol* vocant, & ut facilis à corruptione præservetur sale aliquantum condiunt, alioqui facile aciescit. Apertissimum est ad odorem & sium. Ægyptios olim mortuorum cadavera antequam Balsamo condirent hoc succo ter quaterve abluebant, ita tutiora futura existimantes à putrefactione: quod unde hausit nescimus.

Abundat Promontorium viride hoc genus Palmis, quod annon idem possit esse præcedenti cogitandum proponit J. Bauhinus.

De Palma Indica nucifera Coccus dicta.

Coccus sive Coccus dicta est hæc arbor à vocabulo Lusitanico *Coccus*, quod Simiam aut Cercopithecum significat, à tribus fructui impressis foraminibus Cercopitheci faciem aut larvæ aliquis effigiem amulantibus nomine indito.

Nos in ejus historia describenda optimos autores, Gulielmum Pisonem, Georgium Marggrayium, sed præcipue accuratissimos Horti Malabarici conditores sequimur; omisissis illis quæ vel superflua vel incerta putavimus. Lectorem etiam ad Hortum prædictum aliquoties amandamus, quoniam omnia transcribere tædio nobis fuisset.

4. Palma Indica coccifera angulosa C. B. Palma Indica nucifera J. B. Palma sive Nax Indica vulgè, ferens Coccus Park. Insa guacuba, vulgè Cocos Pisoni & Marggrayio. Nax Indica & Coccifera. Coyoli Mexicanis Hernandez. Tenga Hort. Malab. The Coco, or Coker nut Tree.

Marggr. H. M.

Caudex est raro, recto, sed plerunque incurvato, quatuor, quinque, sex, aut etiam septem pedes crasso, 30, 40 & interdum 50 alio [Horti Malab. pedalem tantum crassitatem ei attribuit, & in ima parte, non maxima, firmi bipedalem: ut Piso affirmat partem caudicis humi proximam non crassioram aut firmiter esse quam quæ in summitate existat.] Cortex cinereus est instar Juglandis, & quasi vibicibus hinc inde transversim per ambitum notatus. [Hort. Mal. cortex nigricans quæ degladii noquit, semimalaribus coccifera ut nota, quibus pedes foliarum insederunt, striatus.] Legum ejus non multi est usus: constat enim ex meis filamentis, & est dulce, quasi lacteo succo turgens, unde arbore cæla à formicis appetitur [intus mollem, ad corticem duram, per vetustatem arborum etiam multo durior & magis nigricans; aeri expolitam intra duas trices annos corrumpitur, in aqua durabilis est.]

Caret ramis, sed in summitate quindecim, octodocim, viginti aut plura habet folia, magna, alata, in orbem dispersa, partim surrecta, partim prostrata, partim dependentia, grato aspectu. In exordio suo

fuo hæc folia alata quadam textura vestita sunt naturali, obscure grisei coloris, quasi crudum textum cannabinum esset, & successu temporis hæc textura se solvit, subsequente aëre, & à vento circumagitur. Quodlibet folium alatum longum est circiter sedecim pedes, ac in exorta pedem circiter crassum, dissectum in folia sive alas ordine juxta se positas aut oppositas. Quodlibet tale folium tres aut amplius pedes longum est, duos digitos latum, & versus extremitatem angustius, acuminatum, habens in medio secundum longitudinem nervum osseum, flavescens, ac transversim ordine subtilissimas strias virides (ut & ipsum est) ac totum carinatum cavitate sursum versus, substantiâ instar folii Gladioli, læte viride ac splendens.

Folia hæc Hort. Mal. rami foliaceos appellat, minus recte, siquidem, ut affirmat, decidunt alter post alterum temporibus ordinatis dum alii ex summitate caudicis de novo erumpunt; quod folio non rami convenit.

Inter folia alata ex summitate arboris oritur * siliqua seu vagina 2½ circiter pedes longa, crassa in medio novem aut decem digitos, fastigiata, viridis, striata, quæ successu temporis fulcescit, ac sponte rumpitur. Antequam autem rumpatur, eleganter intus compositus reperitur caulis, pedem longus, tres aut quatuor digitos crassus, in plures ramos pedales aut sesquipedales distinctus, qui ita aptè à natura in theca complicati magnam spicam representant. Rami hi onusti sunt triangularibus corpusculis magnitudine Amygdalarum albis, quæ rudimenta sunt florum, & hinc nucum: nam ruptè vagina rami hi se explicant instar arbusculæ, & strobilos exhibent luteos. Hinc succrescunt fructus, quibus insidens suo pediculo, pennam anserinam crasso, & cupule squamis constanti ex rusto flavescens.

Hort. Mal. fructus à floribus disjungere & removere videtur: nam in hisce surculis in capsula ferri & fructus eo ordine provenire asserit; ut fructus in inferioribus partibus prodant quæ gemma florum, & surculi arboris insidant. Flores autem parvis & flavo-albicantibus calycibus, trifoliatis exceptis, quæ tripetali sunt, petalis ad unam eam rotundioribus, & in vertice cuspidatis, duris, rigidis & crassiusculis, habentibus in medio sex stamina flava, quæ oblonga, crassiuscula, primum surrectis, dein decumbentibus apicibus dotata sunt, ac ex unguicula petalorum prodant, ac cum in stylam brevem, crassiusculam & albicantem, superne trifidam, sumque odore grato velut Lilis, licet debili, quæ postquam à capsula erumpunt confestim à surculis decidunt. Tertio à sativæ anno folia incipiunt desuere, nec enim antea ipsam magnitudinem adipsentur. In arbore grandi ordinariè 28 plus minus conspicuntur folia.

Constat fructus totus primum exteriore tegumento, secundo cortice, tertio nucleo, & quarto aqua. Exterius tegumentum externè glabrum, in totum constat è filamentis crassiusculis, longis coloris rufescentis instar Lini, referens stupam cannabinam, crassam ac crudam, estque in ea parte quæ nux pediculo adheret supra duos digitos crassum, in reliquis lateribus circiter unum. Cortex est crassus instar cranii humani, & ea extremitate qua adheret ramo tria habet foramina nucleum Cocci capienti. Nucleus hujus corticis seu in interiore ambli equi adheret nucleus, qui & ipse sui cuticuli vestitur, in sua convexitate (inter corticem ac se) rusti coloris, ad vilum ut nux molchata. Nucleus nucis maturæ crassus est 2 digitis, albus, lacteo succo turgens, sapore instar optimarum Avellanarum: denique in illa cavitate nuclei continetur aqua; pauca quidem quando plene maturæ nux, nec ad potandum grata, sed quando medietatis est, nimirum quando tegumentum flavescere incipit, cavitas illa est plena aqua suavissimâ, continet enim pintam Hollandicam aut amplius, pro magnitudine. Aqua hæc tum gratissima est ad potandum, dulcis, frigida ac clara. At tunc cum aqua abundat, nucleus adhuc mollis, nec ita gratus est. Ergo pro aqua haurienda eliguntur mediæ maturitatis, pro nucleo odendo plene maturæ. Ex nucleo maturo exprimitur lac, cui incoquitur Oryza pro pulmento.

Notat H. M. Fructus cum teneri adhuc sunt, & ex capsula cum stylo erumpunt calyce flavo-albicante, qui ex rotunda folii mutis circumvoluta consistit arbor & in totum obducit. Interna cavitas in fructu quando augetur hinc videt. Nucleus seu medulla fructus cum rotundissima est maxime oleosa evadit, ac ex oleo ceruleo, odore fortè oleosum, qui ingratus est, spirant. Pro diversa medulla consistentia fructus variis nominibus sunt donati, quæ hinc videntur; & quæ habent de mutatione gustus & consistentie in liquore. Aqua in fructu nonnihil dura ad proprium habet, quod ut liquor dulcis Sarsi, fermentatione ad oculum morbus est: cum medulla dura est, ac fructus exsiccati incipit, in illam infusa & aeri exposta saporem dulcem illi amittit & subacida redditur, idque oculi si vento mœviatur, sine ulla tamen fermentatione.

Magnitudo fructus interdum capitis humani, forma externa oblongo-rotunda & Peponis æmula, tribus angulis obtusis, ad partes futurarum, quæ in interiore cortice sunt, cocumbis.

In Cocci venustis ad partem eorum inferiorem intra medullam seu nucleum oculis oblongo-rotundus albicans, qui postea flavescit se prodit, estque tenerum germen fructus [plantula seminialis] qui eo terre mandato ex superiore parte per oculum operimentis minus durum seu lavis surculum novellum extrudit, atque ex inferna parte pirum dictum Lusitanis Pingo, quod magis & magis increfcens dum aqua interea exsiccat totam cavitatem adimplet. Surculus autem novellus ex oculo prodians extra operimentum emicans, paulò reflexus corticem exteriorem peterebeat, ac inferiori parte emittit radículas, quæ per corticem exteriorem primum obliquè decurrendo, tandem eo perrupto se terra hinc inde affigunt. Pirum quod in cavitate nascitur albicat & in strictiore parte, quæ ex oculo prodit sufflavum, exterius rugis in longum striatum, & granularum, ac oleo inunctum, intus fungosum, humidum, molle & albicans, esculentum, sapore multò dulciore quàm medulla, verum nonnihil fastidiosum.

Radix crassa, cortice rufescente ac nigricante, interiori ligno molliori, fibras læte transversim diffundens. At Pilo mirum esse ait truncos adeo proceros posse sic brevibus & tenuibus & vix terra cooperitis radicibus in aëre subsistere, neque suo multo pondere & fructuum mole, ventisque etiam vehementioribus eos sepe quantentibus hauri considere.

Cacumen arboris, quod à teneris ramis circumdatur, cum altior ac vetustior est in conum fastigiat, ac molli & albicante pulpa seu corculo, dicta Lusitanis *Palmas*, Piloni *Palma*, quod exte-

In arbore ordinariè sunt duodecim fascie [medulla capsula seu vagina] Cocci. H. M.

rius è variis tunicis sibi mutuo superinjectis conflatur, ac intus densum est, constat: hoc cum tenerior est *Tinga*, & altitudine unius cubiti, est dulcis ac grati saporis; cum majoris ætatis saporis minus grati ac adstringentis; cum vetustior est saporis dulcioris & gratissimi, amulans juglandis nostrates, quæ non cruda solum sed & cocta inter epulas apponitur, & cum *Brassica* *Cyprina* certat: ab elephantibus maximè expetitur qui ut eâ fruantur arbores hæcè eradicant. Ea ablata arbor moritur; quò fit ut qui ejusmodi germen edit non immeritò *Palnam* *varare* dicatur. Arbor toto anno simul flores, fructus immaturos & maturos continet.

Locu.

Amat autem loca maritima & arenosa propè sepes & macerias: in mediterraneis non, aut rarò, reperitur, aut si planterat infructuosus est, nec ibi justam magnitudinem assequitur. A 25 ad 30 ætatis annum in summo est vigore: 100 circiter annos durat.

Vires & Usus.

Ex hac arbore elicitur liquor *Suri* dictus, qui potus ut vinum inebriandi vim obtinet, saporis grati, subdulcis, subtilis & subacidus, cum primum exceptus est majori dulcedine, cum vetustior acidior, coloris ex albicante subcærulei & pallidi, &c. Ex eo destillatur aqua ardens seu spiritus: Acetum etiam & Saccharum quod *Jagra* vocant ex eo fit. Modum educendi hunc liquorem accuratè describunt Horti Malabarici Auctores; Capse florifera seu fructifera, quam Mammam arboris vocant, cuspidem incidunt, eiq. ollam appendunt, atq. infra cuspidem intervallo quatuor digitorum corticem capse obliquè secant, lectumq. versus cuspidem elevant, barbam, ut aiunt, efficientes, ut liquor ex cuspidè inciso per corticem capse dimanans, ex barba in ollam appensam infundatur, cuspidem autem incisum, &c. Reliqua quia nimis longa sunt, omitto, apud Auctores ipsos requirenda.

Bis de die, mane & vespere, ollas cum *Suri* detrahunt, interdum etiam meridie. Qui medio die detrahatur in ollis manè appensis dulcis est, qui vespere subacidus, altero die acescens, tertio autem die liquor acidus redditur, suum dulcedinem profus amittens. Ut acetum ex hoc liquore conficiatur, ollas in quibus exceptus est in calce per 15 dies imponunt, quo ad fermentationem vehementiorem excitatus, multam spumam ebulliendo, ac in fundum ollæ materiam albicanrem seu cinereum demittendo, mutatur in acetum.

Saccharum *Jagra* dictum hoc modo conficiunt: Ollis induunt momentum calcis, quantum sufficit ad liquorem instillatum rubedine tingendum, nec plus, nec minus debito ob rationes ab Auctoribus dictas; dein hunc liquorem coquant continuè cum cochleari movendo donec inspissetur, habeturq. tum Saccharum rubrum, quod album iterata solutione ac coctione reddunt: modum vide. E villosa materia tegumenti hujus nucis exterioris rudentes & funes navibus necessarij sunt, autore Garcia, qui incorrupti manent in aqua marina. Sed & ex his villis sunt nodosa cingula magni usus inter omnes ferè tenuioris fortunæ mulierculas Ulyssipponenses.

Exterior hic cortex circa initia edulis esse dicitur, & Canaræ spiniferos respere aculos, verum dulciorem esse, aptissimumque cohibendis diarrhæis, satietati curandæ, & ventriculo instaurando.

Ex eadem materia stupe loco nares obturantur ac stipantur, ipsisque admodò stupis præstat quòd putredini minus sit obnoxia, & aqua marina imbuta infletur denseturque. Ossis cortex diligenter politus, & argento decoratus apud plurimos hodie speciosi poculi vice in convivia venit; sed vim anaparyticam ei denogat Garcia.

Liquorem seu vinum *Suri* phthificis mire conferre aiunt & valdè opportunum esse urinæ, renumque vitis laborantibus. E nucleis contusis atque expressis lac extorquetur citra ignis operam, lumbricis enecandis utilissimum ad 3viij, addito sale, manè potum, præsertim in pueris.

Quin ex ramentis nuclei (additâ aquæ opportuna mensurâ) fervefactis ac multum agitatis oleum supereminere solet, dulce, liquidum, splendidum, & oleo Amygdalarum dulcium non dissimile gustu, quod sex aut octo unciarum mensurâ potum, additâ aquâ in qua Tamarindi aliquandiu macerint, ventriculum intestinisque leviter purgat, humores præcipuè melancholicos & pituitosos evacuans, cum tamen nucleus dicatur album coercere; at recens extractum sit oportet; vulneribus mire optulatur, nam & sanguinem sistit & laniem extergit, coercetque dolorem, & tandem cicatricem inducit. Quin ex frustulis exsiccatis nuclei, quæ in longinquas regiones transferri solent, extrahitur oleum utile lucernis, Oryzæ parandæ, nervis contractis laxandis, & necandis lumbricis.

Liquor nucleis contusis sibi febrilibusque extinguendis, calorigue contemperando idoneus est, modendis extergendisque oculis & emundandæ mulierum cuti. Emundat sanguinem, ventriculum & vias urinæ purgat, modetur pectori, ac pergrato constat gustu, plurimum præbet nutrimenti, & adversis biliosis febribus esse pono mirabilis *Hernandez*.

Multe præterea vires & usus in medicina aliarum hujus arboris partium habentur in Horto Malabarico, ad quem Lectorem remitto.

At non reticendum quod de medulla hujus arboris habet Jo. Linschotanus, nimirum eam [*Palmito* vocant] magno in pretio loco muneris ad opulentiores potentioresque mitti. Chartæ autem tenuitate ac candore formâ plicatili crescit, ut subinde 50 aut 60 plicas habeat togæ mulieris instar. Ex hac Indi chartam & libros instaurant; ex ea etenim charta tenuis ducitur. Virentibus inscribunt plicis, quæ tum siccatae litteras indelebiles habent, filo ferreo ante notatas.

Indis *Ollam* vocari refert supradictam chartam; constantque ex eadem materia omnes gentis *Annales*, libri & volumina, quam & signare nōeunt in epistolarum usus. Idem tradit & confirmat *D. Mendelisse* in relatione peregrinationis suæ in India Orientali.

Massæus Folia tum Libraris pro Papyro esse ait, (de quo tamen dubito, cumque per errorem folia *Lentæ* pro hujus foliis habuisse suspicor) tum etiam in vestes formâ facili simul ac ipso contextu nocti.

Idem unam hanc arborem omnia proliis ad rem nauticam instrumenta ac materiem præbere scribit: quippe truncum & ramos in malum, assamenta, clavosq.; comam in vela; Cuyrum in funes omnium optimos, filisque ad lantrum suturas; postremo Cocum ipsum, quæ ex eo conficitur in occra.

* Corticem
vires & usus
vires.

Quibus si addamus, præbere eam & vinum, & lac, & oleum, & saccharum, & acetum, & cibum solidiorem, & filum, & acus, & lintea, & vestimenta, & pocula, & cochlearia, alique vasa, & flores, & sportas, & umbellas, & chartam; omnino satendum est arborem esse *masjyon*, curque similem & æquiparandam vix in toto terrarum orbe reperias.

5. *Palma Javanensis longissima folia C. B. Palma Indica genu Lantor dactum J. B.*

Fructum fert exiguum, magnitudine Cerasi, colore qualis Aurantium, nucleum intus continet quem *Cocci* nuncupant. Ex hoc fructu perelegans fit oleum, colore Aurantii, elui jucundum, admodumq; salubre assuetis. Sunt qui hanc speciem Palmæ præcedentis feminam faciunt.

Hujus folia quàm reliquarum Palmarum ad scripturam aptiora commendabilioraq; sunt, unde Indi iis utuntur chartæ loco. Folia autem vix longitudinem æquant.

Similia folia, cum integra, tum per medium secundum longitudinem secta, Malaccensibusq; characteribus inscripta, ab Hollandis ex Java sunt relata. Ex his habuit Clusius cubitum longa, extremitatibus tamen recis [nam integra bicubitalia aut longiora sunt] secundum modum nervum per longitudinem excurrentem complicata, & binas ferè uncias lata, utroque latere exteriori secundum longitudinem tribus versibus inscripta: videbat & que quatuor versibus inscripto haberent, præterea librum 76 foliis constantem, non integri quidem, sed quæ extremitatibus recis, per medium folium secundum nervi longitudinem secta, utrinque quatuor versibus stylo ferreo exarata erant, ut apud illos moris est tribus locis petalo, in medio videlicet & duabus extremitatibus funiculo trajecta apertis utrinque binis asserculis, quibus contracto funiculo tegeantur. Sed & ea folia quæ nanciscebar, & aliquot alia quæ apud diversos conspicebam, ab una extremitate petula erant, & caractere quoquam in capite notata, ut funiculo connexorum series dignosci posset. Intellegebam porro ex ipsis Indis hos characteres nostro more exarari, hoc est a sinistra ad dextram ducto stylo, &c. Ea autem folia Palmæ coccoferæ non erant. Sed peculiaris illius generis Palmæ, quæ Javæ incolis *Lantor* appellatur.

6. *Palma coccofera figura ovali C. B. Cocco de Maldiva Park. Nuc Indica ad venena celebra, sive Cocco de Maldiva J. B. Quibusdam Tavarewé.*

Garc.

Niger est Coco de Maldiva cortex, & nitidior vulgari Coco seu Nuce Indica, figurâ ovali magna ex parte, nec ita rotunda ut vulgaria. Medulla sive pulpa interior, quæ siccata dura admodum est & candida, nonnihil tamen ad pallorem inclinans, in superficie rimosa est & valde porosa, nullo sapore excellenti. J. Bauhino fungosa, consistentiâ quam videmus in fungis nucum, colore foris in luteo cinereo, intus pallido, fibris variatum subinde ferrugines & croceis, gustu insipido.]

Integre quas vidit nuces J. Bauhinus pedem longe fuisse, rotunditate quantam vix ambabus manibus amplecti potuit: pars compressa erat sex uncias lata, in qua amplum foramen apparebat ab alio fructu separatum, ita ut gemellus fuerat fructus: conjunctorum fructuum * ingentem fuisse magnitudinem apparebat; utriusq; capacitas erat insignis: cortex durus & spissus qualis alius nucibus, externè striis obliquis longis excavatus, colore nigro, pulsatus ollæ modo resonans. Sic corticem etiam villosum habet ut alie Nuces Indicæ.

Vulgari famâ accepimus (inquit Garcias) insulas Maldivas aliquando continentem fuisse, sed inundatione maris submersum has insulas effecisse: in quo obrute Palmæ fuerint quæ hos Cocco protulissent, qui terrâ indurati in hunc modum conspiciuntur. Suntne verò ejusdem generis cum nostris facile judicari non potest, cum hætenus nemo folia aut arboris truncum videre potuerit; sed soli Cocci in limis epiciantur, nunc bini conjunctim, interdum verò singuli separatim. Sed has nunci colligere licet nisi cum capitis periculo, quoniam Regis esse asserunt, quicquid de mari in litus ejicitur, quæ res majorem auctoritatem huic Nuci conciliavit.

Eximitur autem ex his Cocco pulpa sive medulla, deinde exsiccatatur atque indurefcit eo quo venditur modo.

Commendatur ab ipsis incolis & à Malabarensibus (ut testatur Acofta) non modò à plebe, sed à regibus & principibus viris, ut in omni fere morborum genere ad eam confugiant tanquam ad sacram anchoram: verum præcipuè adversis venena valere creditur: Fiant & in eam gratiam ad illo pocula, quæ auro vel argento excipiuntur ad aquam bibendam, in quam ex cænula medullæ ipsius Cocci fragmentum pendere sinunt, sibiq; certò persuadent illis qui aquam ex his poculis hauriunt nullum venenum nocere posse, futuròq; immunes à multis morbis. Verum cum hæc alique quæ de nucis hujus viribus traduntur vulgi potius persuasione quàm certis experimentis constant: & medici nonnulli se nullo successu ad prædictos affectus is usus esse affirmant: alii noxam potius corpori inferre, quàm javamen aliquod aut emolumentum conferre se experientia didicisse dicant; iis recensendis & expendendis non immorabimur.

Quod atinet ad specificam qualitatem promovendi partum difficilem, & resistendi insultibus Epileptics ejus non unam experientiam habent spectatissimi aliquot apud nos Medicinæ Coryphæi, & testari de felicissimis successibus queant, inquit Gul. Piso: spod quem plura vide in Mantulæ Aromat. cap. 19.

* Capite humano multis majorem.

Viro.

7. *Tulla parva H. M. Palma Indica caudice in annulis protuberantes distincto, fructu Pruni-*
formi.

H. M.

* Dux tresse
digiti lati
eriam quatuor
bre digito-
rum interval-
lo à se mutuo
distansibus.
12.

In arborem excrescit justæ magnitudinis, 40 circiter pedes altam, caudice crasso uti *Tenge*, qui circularibus & extuberantibus annulis undiq; circumdatus, & cortice crasso, cinereo, squamolo, intus purpureo obductus est; lignum albicans, molle, cujus matrix flavescens. Cum vero arbor hæc primum e terra erumpit, nullum caudicis fundamentum sub dlo obtinet, sed Conus prodit foliaceis tegminibus coopertus, qui cum undiq; sese aperit, ac novelli foliorum furculi [folia composita] tribus semper insequentibus ordinibus (in inferiore sexdecim, in medio novem, in superiore senes octo) ex eo prodeunt, pedetentim foliacea illa tegmina sublevantur, ut qui primò, ferme planus erat conus apex, acutus sensim, tandem, rotundum acquirat cacumen, usquedum obtegentia illa foliola transivum concedere cogantur foliosis furculis, qui, quo magis adolefcunt eo magis explicantur, foliorumque illa operimenta versus latera diducant, atq; ita foliosi furculi majori spatio indigentes magis reclinant & ad latera vergunt, donec tandem ipsam caudicis peripheriam circumvestiant, languidis tunc & marcescentibus eorum primis tegminibus, que dein decidunt & sui stigmata relinquendo circularibus prominentibusq; angulis eam cingunt. Post hæc inter ipsas arboris frondes novus oritur conus, priori planè similis, è quo novelli foliorum alatorum rami [potius nova folia pinnata] demò prodeunt, que foliorum productio toties renovatur, quoad fructibus enitendis apta sit arbor; quo tempore conus in humani capitis magnitudinem augetur, ac undique sese aperiendo plures ramusculos reflexos fructibus ornatos exhibet, & simul ac aperitur novus ex ejus cavitate emergit foligerus conus, qui cum demò augetur aperitur, ac novellos foliorum ramos undiq; emittit, ecce novus intus adest fructipromus conus: que foliopromi & fructigeri Coni vicissitudines toties sunt quousq; viget arbor. Contingit quoq; nonnunquam ut ex uno trunco quatuor aut quinque, vertices enascantur, quem caudice ad viginti circiter pedum altitudinem aucto fructipromus conus non unum sed plures includit novellos conos, è quibus totidem prodeunt arboris vertices; id tamen rarò observatur, & singulis arboribus simplex plerumq; adest vertex.

Quoties folia cum foliaceis conu tegminibus marcescentibus decidunt (quod semel intra annum aut sesquiannum contingit) toties circulari prominentique annulo caudex cingitur & augetur.

Conus constat è plurimis, oblongo terebinthaceis, crassis corticeis, densisque lanuginosisve foliis, lanugine verò detrita viridi fulcis; que aperto cono erumpentibus foliis pinnatis (ut diximus) decidunt.

Folium pinnatum integrum octo pedum mensuram longitudine haud rarò superat, ejus pediculus saturatè viridis est, ac in superiore limbo exiguis spinis munita: pinnae autem seu foliola medæ costæ adnexa atro-virescentia superne splendent, inferne nequaquam.

Fructipromus conus è multis linguiformibus involucribus, veris fructuum localis componitur, foliaceis tegminibus involutus.

Sunt autem fructus oblongo-rotundi, prunis majoribus haud absimiles, quos tegit cortex glaber, viridis ac nitens, postea sublarvus, & demò rubescens, grati dulcisq; saporis, cui subiectus cortex rufus ac lignosus, nucleum continens candidum, sapore castaneis haud absimilem.

Ubi transversim dissecatur caudex guttae expromit pellucidæ, que radiis Solaribus incandescens crystallinamq; gummi inspissantur.

Linn.

Crescit hæc arbor locis montanis, petrosis & arenosis, in *Tiffour* & *Couvenada* Provincia *Malabar*, necnon in Japoniæ insulis *Rookum* & *Lequar*. Indifferenter quocumq; anni tempore vicissitudines suas patitur, & foliopromos fructipromosque profert conos, atq; à quinto sextove circiter sætionis anno ad centesimum & ultra frugifera est.

Ceterum arboris hujus tanta est fertilitas, ut recisus ejusdem ramus terre vel levius commissus in novam arborem progeminet: quinimo experimento compertum dicitur, rejectum trunci frustum novas radices emittere & in arborem demò renasci; quòdq; magis adhuc mirandum, si vel per annum, vel per plures annos è terra evullâ servetur sicca arbor, & postea terre committatur revirescere. Que de lymphæ hujus arboris cum ferro habent apud me certè fidem non inveniunt.

Viret.

Fructibus vescentur Malabareses cum saccharo Thomæo, alioquin alvum relinquunt astrictam. Succus è novellis foliis expressus atq; exhibitus intestinorum cruciatu compescit, stomachi ardorem sedat, & vomitui cruento modetur. Fructigerus conus contusus, & in cataplasmati formam rotæctus, lumbisque applicatus dolorem nephriticum tollit, & involuntarium seminis in gonorrhœa effluxum mitigat. At verò è fructibus tenerioribus in aqua decoctis medicamentum paratur, quod vomitum eundo ventriculum egregie expurgat. Ipsius arboris gummi assumptum quibuscumq; venenis resistit, atq; cum gallinæ stercore mixtum & locis applicatum viperarum morsus mirificè sanat. Ex arboris trunco Japonenses farinam, ex eisque panem conficiunt *Sagou* ipsi dictum. Deniq; ii Malabareses qui à D. Thoma se conversos profiterentur, templâ sua diebus festis folis hujus arboris ornant atq; hanc ab causam arbor hæc *Palma d' Igreja*, live *Armatoria dei igrejarum* à Lusitanis appellatur.

Cum Auctores nostri è farina trunci hujus Arboris Japonenses panem conficere affirmant, *Sagou* ipsi dictum, non video quid obstat quo minus arbor ipsa possit esse *Palmas referens arbor farinifera C. B.* seu *Sagou* Amboensium: nihil tamen affirmo; forte enim è variis Palmarum speciebus diversis in locis fiat farina *Sagou* seu *Zagou* dicta. Variant etiam peregrinationum conscriptores in historia *Zagou*. Alii enim farinam eam fieri aiunt è medulla capitis cupidam *Palme* in Ternate insula nascentis, cujus summum fastigium in orbicularum capitulum instar *Brassicæ* capitatae exuberat: alii ex ipso trunci ligno, malleis *Arundinaceis* contuso. De hac farina plura vide in capite de *Palma* solo simplici plicatili strobiliformi.

8. *Pinduba Brasiliensis* Margg. *Pinduba* Pison. *Inia Brasiliensis*. *Palma Brasiliensis caudice glabro, fructu ovi gallinacei magnitudine, & figura.*

Palme nuciferae species est, caudice ut plurimum crassiore quam Palma coccofera, proceritate aequali vel etiam longè majore. Caudex enim crassus ad quatuor, quinque, aut sex pedes, cortice gryseo seu cinereo, glabro, in quo vibices vix apparent, secus quam in *Coccoloba*. Folia fert ut illa alata, sed quae non ita in orbem dependent, sed maximam partem stant surrecta. Prope subiorum exortum etiam rami proveniunt dependentes, qui proferunt racemos, quatuor aut quinque pedes longos, plenos flosculis: post quos etiam racematim proveniunt *fructus*, vel centum in uno racemo, ovi gallinacei figura & magnitudine, aut paulo etiam majore, fastigium habentes acuminatum, altera extremitate insident calyci vel cupulae, foliis triangularibus constanti. Maturus exterior è viridi flavescit, vel etiam brunnefcit. Cortex exterior filamentosus est ut in *Coco*, verum haud crassus, sed duplam tantum crassitiam testae ovi gallinacei habens, qui incisus detrahi potest: illo detracto apparet pauca caro crocei coloris, nullo manifesto sapore, quae ab Aethiopibus cum farina comeditur: haec ambit nucem durissimam, ovalem, ejusdem ferme crassitudinis cum *Coco*, verum caret tribus illis foraminibus: haec discussa apparet intus in cavo, per interstitium more juglandis distincto nucleus magnitudine Juglandis, candidus, durusculus, saporis ut *Coco*, sed paulo hocior, nec tam suavis. Colliguntur per totum annum.

Ex carne crocea fit oleum croceum, quod in lucernis usurpatur, è nucleo limpidissimum per expressione ad condensos cibos quandiu recens est, & itidem ad lucernas quando vetus. Utrumque qualitate frigidum, & illud è nucleo expressum loco Rosacei olei usurpatur.

E foliis arboris fiunt tecta domorum, rosetae, coebes & alia.

E fastigio arboris gummum pellucidum, odoratum & pulcherrimum fluit, quod in locum Arabici nunquam venit.

Postremo medulla coloris albicans, & recentem Juglandem respiciens in vertice ligni continetur, optimum alimentum si cum sale & pane comedatur.

Lignum albicans & scabrosum corticis loco habet haec arbor, ligni autem loco sanguiam & intus filam medullam, facile combustibilem, è qua sane & fortissima lixivium norunt conficere.

9. *Palma Brasiliensis quinta seu Tacum* Pisoni. *Pal. Brasil. aculeata, fructu Pruni Damasceni magnitudine & figura.*

Arbor est mediocri altitudinis: si frondes spectes Pindovam, si caetera, Palmam dactyliferam representat. Truncum, ramos, atq; folia habet aculeata: lignum verò nigrum & durissimum, quo indigenae sagittas exasperant. Fructus producit rotundos racematim, Pruni Damasceni magnitudine & figura, 200, 300, & plures aliquando uno eodemque racemo. Sues & Simiae us saginantur. Oleum eundem limpidissimum exprimitur, iisdem usibus quibus nuce Pindovae dictum, magnique fit apud omnes passim incolae. Fructus hi externis nigricant: nucleo sunt albo non insuavi, praesertim recenti. Ex filis Brasiliensi filum deducunt tenuissimum & fortissimum, rubicundo Serico post simile.

10. *Palma Brasiliensis Septima, seu Aquè* Pisoni. *Pal. Brasil. vinifera, folia cinerea.*

Arbor est mediocri, foliis cinereis. *Fructus* fert racematim Pruni magnitudine, flavos ubi maturerint, dulcissimi saporis, nucleo albo ac pergrato, ex quo incolae vinum conficiunt. Nigritate illam appellant proprio idiomate *Catoi*. Familiaris est haec arbor Brasiliae Septentrionali non Australi.

11. *Palma Brasiliensis octava Iraibà dicta* Pisoni. *Pal. Bras. farinifera. An Tris Leci? id est, Palma Americana fructu racemoso* C. B.

Præcedentibus major est, familiaris in *Piratiningæ* sylvis. Ad summitatem illius circa ramos medulla continetur candidissima, quae cruda vel etiam cocta cum carne vel oleo inter bonos cibos numeratur: Substantia verò durior, candida, quae commixta cogitur in massam farinae similem, unde placentalae non ingratae fiunt; ex succo verò illius pulmentum admodum dulce & suave. Fructus quoque, producit lapidos & dulces: remedium contra famem illis qui per sylvas eas & vastas solitudines peregrinantur.

Letius *Tris* fructum rotundum tribuit, Prunellorum specie, sed in racemum congestum tantae magnitudinis ac ponderis, quantum homo vix una manu attollere queat. Sed veri sunt nuclei, & quidem Cerasi nucleis minores, quorum quidem fit usus. Sed & teneram quandam generis summitatem inter folia [juniorum arborum] quam in cibum cadebat cum Sociis.

Fructus racemis præcedentem Palmam refert.

12. *Palma nobilis seu Regalis Jamaicensis & Barbadosensis. Palmiste* Fratic. *D. Rochefort. The Cabbage-tree, or Palmetto royal.*

Rochefort.

Arbor est grandis, recta, altitudinis * imensa. *Radix* supra terram atollit in circuitu caudicis ad duorum triumve pedum altitudinem; sunt quidem ex parva respectu proceritatis arboris quam sustinent, verum adeo confuse & dense inter se implicite & intertextae, ut ei firmatae & stabilis sufficiant. Hoc insuper peculiare habet haec arbor, quod crassior sit plerumque, superne quam inferius. Cum junior adhuc est corticem habet tenerum, canescentem, ad singulos circiter pedes circulis distinctum, unde ætas arboris innoscitur, norum enim quotannis acquirit circulum. Verum

* Ad 250 pedum altitudinem extensus, non ad quatuor pedes.

cum adolevit & ad statum pervenit, adeo solida & compacta evadit, ut non amplius id observari possit.

* [Foliorum
complicatorum
cauliculis rami
vocat.]

Summitas seu fastigium multis ramis pulchellis, canaliculatis & politis exornatur, qui utrinque foliis innumeris viridibus, oblongis, angustis delicatis instructi mirabilem arbori gratiam & decorem conciliant. Ramuli teneriores, neodem plane expansi, in medio arboris recti astolluntur, dum interim reliqui qui circumcirca incurvati dependent pulcherrime coronae speciei erectos cingunt.

Singulis ferè mensibus unum aliquem è ramulis [rectius foliis] abicit hæc arbor, & corticem quandam exiit, qui ab infra primo abscedit, èstque quatuor vel quinque pedes longus, duos circiter latus, crassitie corii preparati; Indigenæ *Tacbe* vocant, eumque ad culinas integendas adhibent, aliaque, sicutum adium conclayia, quemadmodum & folia ad domus operiendas.

Ufus.

In summitate trunci medullam quandam continet, albam, tenerissimam & lapidissimam, gusta nuclei si cruda comedatur, verum cocta & condita cum foliis multis tenellis & albis, quæ eam undique contegunt & obvolvunt, inter delicatiora Antillarum fercula locum non postremum sibi vendicat. Galli, & nostratos etiam, substantiam hanc medullosam cum foliis eam involventibus *Côco de Palmiste*, id est, *Caulium* [Brassicam] Palmæ vocant, quoniam eam pisculis incoquant *Caulu* & aliarum herbarum loco.

Siquis hujus arboris truncum bifariam in longum findat, eximatque (quod factu facile est) substantiam interiorecm filamentosam & molliusculam, quod restat lignum ita excavatum, pollicem crassum, canales longos, aquæ deducendæ commodissimos & ad durandum firmos præstat. Ex eodem nigricante colore naturaliter imbuto, quodque polituram facile admittat, multa & rara vascula aliaque, utensilia detornantur.

E summo scapi cacumine eminet florum & fructuum involucrium, Spatham vocant, exterius carnescens, intus è rubro deauratum *fofolialis* innumeros flavos arbutuleæ seu scopæ cupidam virgulis adnascens continens: quibus decidens succedunt fructus rotundi, ovi gallinæ magnitudine. Spatha seu vagina ad florum & fructuum dum adhuc tenelli sunt tutelam comparata utraq; extremitate acuta est, medio crassa, ab uno latere rimâ in longum fissâ, è qua, cum maturefcere incipiunt flores & expansi requirunt, ramulus seu arbutula cui accrescunt totis egreditur in duas laminas *aurat.* Arbor hæc circulis annularibus caudicis cum Todda panna convenit, latitudine ciculenta cum precedente specie. Capite detruncato arborem perire affirmant nonnulli, negant alii.

13. *Urucuri-iba* Marggr. & Pil. *Palma Brasiliensis farinifera, fructu Pruni, cupula infidens.*

Palme species est, dactylifera per omnia similis, excepta magnitudine minore, & quod folia non sint spinosa. Flos ut *Guaræ*. Fructus (qui & *Urucuri* vocatur) fert racematum ut *Pindoba*: quilibet autem habet magnitudinem Pruni, & cupule squamosæ infidet, cuticula grisea, pulpâ luteâ filamentosâ, paucâ, dulci constans, intus continet lapidem durum, in quo nucleus candidus, edulis.

Ufus.

E cortice nuclei applicato tubo fit instrumentum ad hauriendum petum. E ligno hujus arboris (quod filamentosum plane est) celo & consulo, sine alia opera fit farina, Lusitanus *Farinha de po* dicta, Brasiliensis *Urucuri*, coloris rufescentis, quæ utuntur in defectu farinæ de *Alondra* ad panem conficiendum.

Rami hujus arboris, seu potius folia lentissima sunt, unde serviunt ad tegendas casas, & ad vincendum, adeoq; magni usûs sunt itinerantibus.

E fructu fit oleum ut è fructu *Pindobæ*, valde medicinale, imprimis adversus Raiarum puncturas venenatas; nec potest præstantius remedium dari contra illud malum.

In ipsâ arbore nascitur Polypodium *Caraguata*, quæ aquam præbet ad bibendum.

14. *Palma Brasiliensis nona* Murici dilla Pisonis.

Familiaris est præfecturæ *Coaræ* & *Maranhon*. Fructum fert unicum, edulem atq; dulcem, ovali etiam magnitudine. Cortice est rubicundo nigris maculis; intus vero rubro. Folia illius magni sunt ab indigenis, ut illis regularum vice utantur.

15. *Palma Brasiliensis decima, Mirabilis dilla Pisonis.*

Familiaris est præfecturæ S. Vincentii, cortice spinis armato: materie durissima, ex qua fiunt arcus nigri coloris. Fructus fert ovi columbini magnitudine, edules & satis gratos.

Nimis brevis est Pisonis in harum arborum descriptione.

16. *Jucara & Jucara Brasiliensis* Marcgrav. *Jucará* Pisonis. *Palma coccifera* minor Brasiliensis.

Caudex tenuis, recto, glabro, gryseo exurgit, more Palmæ cocciferae, sed vix dimidiet almondinis *Flaseni* parvuli, tripetali, ex albo subflavescentes, in ramo duos circiter pedes longo, in multos ramulos tripedales plus minus expanso, è siliqua flavescente egresso numerosissimi, in medio aliquot staminula flava habentes. Flori succedit parvulus fructus figurâ *Cocis* [Pisonis parvuli fructus, racemosi, instar *Palmarum*] supra siliquam (quæ ambit suo exortu, seu vaginâ, arboris quasi caudicem) folia in summitate proveniunt alata ut in *Palma coccifera*, sed breviora, nec alæ ita longe ac latæ. In summitate arboris plerumque, foliam convolvitur, stans erectum instar fistule. Admodum lentus est hujus ramus, & pro scopis, imò flagellis potest usurpari.

17. *Palma Americana spinosa* C. B. *Palma Hayri* Park. *Palma facie Hayri* J. B. *Palma Brasiliensis* sexta seu *Ayri Pilon*. The prickly Palm.

Arbor est ingens, *truncus* multis spinis armato tenuibus & pungentibus instar acuum, Rochefortio latis seu planis, digitum longis, denticulati figurâ, politis, colore è rubro nigricante: *folia* Palmæ sed longioribus, ligno marmoris nigro simili, quod ferri modo in aqua fidit: quare Barbari ex eo enses conficiunt atque monilia, adeoque durum ac validum est, ut ex eo sagitte qualvis ferreas loricæ penetrare possint. Fructum odit pile luforiz magnitudine, altero extremo quodammodo acutum, [Pisani rotundum ut ceteræ Palmæ, sed non adeo racemosum] nucleo intus albicante, pingui, sed non oduli.

Rochefortius arborem totam echinatum esse ait, per trunci ramulos & folia rigidis & acutissimis spinis, nec impunè tractandis oblitam, quæ si quem compungant periculofum nec facile medicabile vulnus infligant nisi remediis idoneis tempestivè succurratur. Quocirca Nigritæ antequam eam attingant igne in circuitu accenso aculeos amburunt. Fructum griseum durum, rotundum, nucleum esculentum claudere. Facta sub ramis incisione vinum quoddam inde ejiciunt Nigritæ.

18. *Arca* sive *Fausel*, sive *Avellana Indiana* *versicolor* Park. *Fausel* sive *Arca* *Palma folia* J. B. *Palma* cujus fructus sessilis *Fausel* dicitur C. B. *Arca* sive *Fausel* Gar. *Cannaga* H. M.

H. M.

Arbor est procerâ, altitudine *Tenga* seu *Cocci*, radice nigricante, oblonga, spithamam crassa, radiculas albicantes & rufas, quæ intus lignoso filamento sunt, ex se diffundens, *caudice* ad radicem spithamam crasso, in summitate paulo minore, cortice obducto viridi-claro.

Rami [verius *folia*] ex caudice decussatim bini ordine prodeunt, ex se mutuo emergentes, cum pede summitatem caudicis instar vaginæ seu capsæ rotundæ ac clausæ circumplectentes, exterioribus interiores circumdantibus, ac simul caput oblongum in summitate arboris quod crassius est ipso corpore caudicis inferiore, constituentibus: rami exteriores pede fuso ac rupto post successivè suo tempore decidunt. Sunt autem rami hi seu folia pinnata pectinatae, costâ mediâ cui pinnæ seu folia adnectuntur superius nonnihil cavâ, inferius rotundâ, colore utrinq; viridi: pinnæ seu folia bina ordine opposita, tres quatuorve pedes longa, quatuor plus minus pollices lata, ac instar flabellorum in duas trêse, etiam quatuor aut quinq; plicis complicata, & cum plicis ex ovis ramorum producta, in parte interiore in plicarum angulis eminentibus costis viridi-claris obrita, & intus venis in longum striata, contexturâ rigidâ, superficie plana, viridi-fusca & nitentia utrinque.

In summa arbore è foliorum sinibus exeunt vaginiformes *capsæ*, quatuor plus minus spithamas longæ, è singulis foliis singule, furculos floribus & fructibus onustos includentes, interiore latere concavæ, exteriori convexæ, superficie glabra & æquali, in medio partis cavæ striâ lacunosâ sulcatæ, secundum quam rumpuntur seu aperiuntur, exterius primum è viridi albicantes, post ætate flavescentes, exterius candidæ. Excrefcente theca folium è cujus sinu exit vi detruditur. Ramuli seu furculi capsis inclusi, ima & crassiore parte fructibus teneris dotati sunt, & in furculis tenuibus spicis solis seu gemmis *florum* in duabus oppositis partibus obducti: sunt autem gemmæ istæ parvæ, angulose, albicantes, in tria folia rigida, cuspidata ac crassiola se aperiennes, continentq; in modo stamina novem, albicantia, tenuia, sine ullis apicibus, tria longiora ex flavo albicantia, quæ à sex minoribus magis flavis cinguntur.

Fructus justam magnitudinem adepti oblongo-rotundi sunt, in ima & superiori parte strictiores, cortice crasso recti, pulpa rufo-rubefcente, intus in medio medullam albicantem [nucleum seu semen] continente. Cum autem teneri sunt hi fructus candidi sunt ac nitentes, albicantibus furculis appensi, formâ non rotunda sed angulata, maxima parte folii calycis oblongo-rotundioris & mutuo circumvolutis comprehensi. Quando fructus paulatim mutantur pro variis maturitatibus gradibus vide. Cum teneri sunt humorem multum & clarum, saporis adstringentis, in medio pulpa continent, pulpa paulatim auctâ humor minuitur donec nulla superfit, dein medulla albicans nascitur pulpa indurescente, & cortex tandem auro-flavus fit. Est verò pulpa cum tenera & humida est colore albicante subflavo, formâ oblongâ, angustâ & ad summitatem cuspidatâ, dura, colore ex rufo rubefcente, formâ minus oblongâ, crassiore ac magis ad conum accedente cupis basis est in ima parte fructus. Pulpa seu dura, seu mollis cum *Beryl* addito momento calca manditur, maxime autem mollis.

Cortex pulpa circumdans corticula exteriori densiori & duriori, quæ superficie plana & glabra est, ac primum albicans, dein viridis, post cum pulpa ac medulla dura est auro-flavi coloris, obductus est: reliquam corticis descriptionem, vide in H. M.

Quatuor plus minus capsæ in eisdem arboris capitulo simul reperiuntur. Septimo à latone anno arbor hæc fructum edit, aut si terra ferax sit quinto: vivit 50 annos, 30 in vigore durat, post languescit. *Fructus* post unum mensem quo è capsâ erupere aquam recipiunt, post tres menses fructus omni aqua repleti sunt; post sex menses pulpa dura.

Clusius scribit arborem hanc cortice adeo levi integri, ut nullam ascensum præbeat, nisi aptatis ad pedes compedibus ac laqueis, aut cincto per intervalla caudice vinculis quibusdam, ex sparto aliâve materia confectis.

Mirum aurores nostros non meminisse interiori nucleâ substantiam candidis rubentibusq; venis respersam esse Nucis moschatæ in modum.

Linnebotanus ad captum radiorem bene describit ramum floriferum & fructiferum vaginâ inclusum, Fructus, inquam, ex longo crasq; ramo in petiolis scopæ instar diviso dependens, magnitudine haud parva.

Linn.

In arenosis & maritimis tantum locis nascitur, mediterranea respuit.

Maximam hujus arboris fructui famam conciliavit quotidianus ejus apud Indos magnates usus, qui cum cum foliis *Bete* assidue masticant.

Pier.
& Usp.

Arecae ac *Betele* libum ex ligno sive arbore quam *Kastem* vocant etiam admiscunt, ipsaque *Betele* folia calce unguent ex ostrearum testis adfuffis confecta, quae tamen ob exiguitatem corpori nocere nequit. Hanc confectioem pariter deglutunt, succum nempe, nam cetera expiunt. Valet (ut aiunt) adversus frigidum oris halitum, firmat dentes ac gingivas, oscedinem, sive (ut vulgò vocant) *Scorbutum* avertit, atq; ideo experimentis constat, Indis os nunquam malè olere, nulli dentium dolorem esse, aut stomachosæ fœditatem, vel hujusmodi alia vitia, ad summam senectutem usque inviolato dentium ordine, cum interim os velut corneæ delibutum fœdo aspectu squalcat.

Ejus est ventriculum roborari, nauseam arceri, appetentiam excitari aiunt.

Secatum fructum (*Garcia* teste) sic parant, Contusam mucem *Fausel* in tenuissimas partes cum *Lycio* & folio *Betel* cui exemptus sit nervus masticant.

Multæ sunt hujus fructus varietates; tria genera è *Linichotano* proponit *C. Bauhinus*. 1. Latere uno pressius, altero latius ac majus. 2. Minus, nigricantius, durus, *Checano* dictum. 3. A cujus masticatione homo æquè ac à vino inebriatur. At scribit *Garcia* immaturum fructum stupefacere & inebriare.

Fructum quem formâ oblongâ *Arecae* subjungit *Clusius*, *Palma-pini* sive nucleo idem existimat *Lobelius*, affirmat *D. Sæm* commentar. in *H. M.*

Palma Babes Coyali dicta *Franc. Hernandez*, lib. 3. cap. 42. huic eadem nobis videtur.

* Hist. lib. 3.
cap. 189.

1. Describit *Jo. Bauhinus* Nucleum quandam nuci *Moschate* & *Fausel* similem his verbis, Formâ erat & magnitudine *Nucis Moschate*, non sessili & turbata ut plerumq; est *Fausel*, unciam longus, durus, sectioni resistens qui injectus in aquam sedit: in una parte pulcher umbilicus, in medio nonnihil protuberans: ab umbilico extoriebantur nervi nonnihil elati, albi, qui per nucem fuscâ seu nigricantem obliquè & reticulatim perveniunt ad oppositam partem.

* Hist. lib. 3.
cap. 190.

2. Alium fructum describit idem sub titulo *Fructus una parte sessili, velut salsæ distilli instar nucis Fausel*. Magnitudine erat *Joglandis* cum suis tunica, ponderosus, in aqua tamen non sedit, durus, sectioni resistens, colore fusco, globosus ferè nisi una parte nonnihil sessilis esset, non tamen *Fausel* modo, sed suo particulari, cui alioqui ferè similes habet falcos penè reticulatim distinctos: corticem duplicem, unum tennem, nigrum, lucentem; externum fuscum cum aliquo rubore, similem cortici *Nucis Moschate*, durum fragilem tamen habet magnum umbilicum album.

Hunc fructum à *Clusio* traditum putat *Exot. lib. 2. cap. 22.* primo in loco.

3. *Fausel* accedens nux *J. B. Exot. lib. 2. cap. 23.* secundo in loco à *Clusio* descriptus, sefcuncia-
lis erat longitudinis, uncialis crassitudinis, cutaceo putamine præditus, cineræci fors coloris, internè multis fibris constans, penè instar involacri *nucis Fausel*, inferna parte gemino & veluti duplicato calyce munitis, extimâ sive supremâ mucronatâ: nucleum, sive veris nucem, continebat nigrâ, valdè rugosâ durâ, *Fausel* non dissimilem; ad cujus genus non ineptè referri posse arbitratur *Clus.* Similem deinde accipiebat, cujus officulum erat durum, nigrum, multis villis oblitum, nucleum continens rugosum, durum, insipidum.

4. Nucleus pyramidalis *Indicus*, ad *Fausel* accedens venis. Pyramidalis erat, unciam longus, externa parte nigricantibus venis pictus, ad *Fausel* accedentibus, pulpa alba, dura; in medio aliqua cavitas, eodem modo quo in *Nuce Indica* magna: saporem manifestum in eo non experiebatur *J. Bauhinus*.

Siri gata Gamber *Indis* sunt *Pastilli* ex *Fausel*, *Lycio*, *Caphura*, ligno *Aloes* & *Ambari* momento compositi, quos potentiores apud *Indos* esitant. Sunt autem circumatæ præfusi roconditatis, plani, *Nucis Vomice* magnitudine & penè forma.

19. *Karon-Indel* *H. M. Palma sylvestris Malabarica, folio aceto, fructu Pruni facie* *D. Commelus*.

Quatuordecim circiter pedes alta est, cortice nullo, sed crustâ cinerè solummodo obducta, ligno albicans præduro, arctissimè unitâ.

Radix albicans, fibrata, odoris sylvestris, saporis unctuosus.

Folia pinnata ordine decussato è caudice erumpunt, è vertice solum prodeuntia, novellis autem erumpentibus venustiora decidunt. Horum pediculi seu costæ medæ virides sunt, glabræ & nitentes, intra planè, extus convexæ, necnon inferius spem oblongo & rigidis obtitæ. Pinnæ brevibus petiolis ex adverso costæ adharere, numerosæ, oblongo-teretes, acuminatæ, densæ, glabræ, vitore nitenti, ad exitum interiora versus clausæ, necnon nervulis subtilioribus in longum striatæ.

Floris rigidis, viridibus ac corticæis capsis primò occultantur, è quibus deinde apertis emergunt exigui, plurimi uni pediculo inhaerentes, tribus rotundis è viridi albicantibus sobolis, tribus albicantibus lanuginosis staminibus dotatis constantibus; odore nullo, sapore austero.

Fructus oblongo-rotundi, exigui, prunellorum sylvestrium ad instar, cuspidè duro ac lignoso in vertice dotati, ad basin verò calyce viridi, in tres laciniâs secto excepti, primùm virides, dein rubicundi, maturiores verò rubro-fusci, nigricantes & nitentes, cortice tenui & fractu facili obducti, ac carne albicante, dolci, farinacea referri; intra quam officulum continetur oblongum, rufum, sulco profundo in longum striatum, nucleum continens albicantem & amarum. Hi verò fructus ramis proveniunt visidibz, glabris & nitentibus, duos ferè cubitos longis, duobz, digitos lato, planis, rigidis ac lignosis, nullòque cortice vestitis, quorum tenerioribus albiciffis liquor effluit pelucidus, austerus.

Provenit hæc arbor locis montanis, petrosis & arenosis ubiq; in *Malabar*, imprimis circa *Warpauli* & *Trevanear*: quotis anni tempore flores fructusque fert, estq; non rarò ad sexagesimum annum frugifera.

Fructus

Fructus hujus arboris, quemadmodum fructus *Fausel* seu *Archa*, cum folio *Batei* & calce viva à *Vires* & pauperibus manducantur: avidè quoque ab Elephantibus experuntur ob *Palmæ*, hoc est, medullam suavissimam ramulis quibus fructus adherent inclusam. Ceterum folia, fructus, atque arboris partes validissimè astringunt, & fluxus quoscunq; potentissimè sistunt. Insuper è foliis pilosos contexit indigenæ.

20. *Palmæ facie cucifera* J. B. *Palmæ cujus fructus Cuci* C. B.

Evangelistæ Theophrasto *Palmæ* famulus est; similitudinem habens in caudice & foliis. Sed differt ab ea: Nam *Palmæ* individua simplexq; assurgit, hæc autem ubi pluculum adoleverit dividitur & bifida, atq; uterq; ramus rursus subdividitur. Virgas breves, nec multas profert: Fructum fert magnitudine qua manum impleat, rotundum & oblongum, colore flavicante, succo dulcem & gratissimum, non congestum ut *Palmæ*, sed per singula discretum, nucleo magno vehementerque duro, &c.

Ex hac Theophrasti descriptione constat arborem cuciforam *Palmæ* speciem non esse: Verùm quia Botanici omnes ad *Palmam* eam referunt, & pro *Cuciforæ* fructum describunt, qui fortasse *Palmæ* cujusdam sit. Nos quoq; eos locuti eam *Palmis* subiungemus.

Fructus quem *Cuciforum* vocant, describente Jo. Bauhino, pugillari est magnitudine, coloris fere melini, altera parte latiore, altera magis turbinata, *Cydonium* malum aliquatenus referens; Corticeposito, punctis notato, duro, cui fungosa subest substantia, medium digitum fere crassa. Nucleus minor quam figura *Clusi* [sub nomine *Bdellii* fructus] exprimit. Piri parvi formæ turbinatæ, nonnihil rugosis, lescunciam fere longus, unciam latus, cortice undiquaq; obtectis, nonnihil rugoso, rufo, tenui, pelliculæ interiori *Avellanarum* aliquatenus simili, sub quo immediate substantia candida, cornu instar dura [in sicca nostra] gustu lapido & suavi, ut *Nux Indicæ* pulpa, aut *Amygdalarum* dulcium nucleus, semunciam crassa. Cavitates duas habet; alteram in totius fructus medio oblongam, fructus formæ respondentem, inæqualiter tuberosam, pulvis ex *Oryza* facie, sed cornea duritie, cateroquin inanem; alteram in parte turbinata, paulo supra priorem incipientem, & ad corticem desinentem, oblongam, exiguam, quam exactè complet corpusculum quoddam, ruffum, molle, dulce, quod germen existimamus, à quo per majorem cavernam filum demittitur, duritie, colore & sapore cum nucleo conveniens.

Cordi Nux Indicæ minor, Theophrasti *Cuci* in omnibus præterquam magnitudine & figura, cum *Nuce Cocos* dicta convenire nobis videtur.

Arboris *Cuciforæ* descriptionem apud Recentiores non invenio. Fructus tamen *Palmæ Indicæ* speciem esse arguit, & quidem coccoferæ angulosæ C. B. De loco nihil certi traditur.

C A P. III.

Palmæ Indicæ folio bicomposito, fructu racemoso, Secunda pars H. M.

H. M.

Arbor est proceræ, nascens in arenosis, radice ex rufo obscuro cortice tecta, medio ligno molliore, fibris hinc inde vestita.

Caudex duorum hominum amplexum implet, cortice seu potius crustâ cineræi obductus quæ deglubi nequit, ligno exteriori ad corticem usque, intimo seu medio molli.

Folia (ramos vocant) bina ordine decussato è caudice prodeunt, * pedibus suis eam ambiencia quemadmodum *folia Tenge*, & reticulato cortice, cujus filamenta ex oris pedum originem sumunt circumvestientia, suntq; ad pedem seu bases suas pediculi hi tenues ac cavi, tomentosâ rufa lanugine externis oblitæ, ac tactu velut coriacei, interiori superficie albicantes seu ruffi; inferius latiores, parte superiori, quæ à caudice reflectuntur, rotundiores sunt, & duabus lacunis lati interiori utrinque in longum striati, ex quibus versis oppositas partes furculos foliaceos emittunt, qui angulati, & interiori striati sunt [furculus hujusmodi in foliis compositis ramis suis appellat *Jungus*] ad exortum extuberantes, exterius virides ac palola lanugine, quæ facillè deteri potest, oblitæ, intus filamentis lignosis laxè pertexti, ob lignum paucum leves.

His versis superiorem partem adnascuntur *folia*, bina ordine opposita, oblonga & velut triangula, exteriore latere longiore, interiore ad scapum seu costam breviora, quæ concursa suo ad exortum folii angulum acutum efficiunt: tertium latus folium anterius terminans, & prædicta duo latera connectens, cum interiori & breviori angulum obtusum, cum exteriori & longiori acutum efficit. Folia isthæc cuspidibus acutis eminent, suntq; contextura rigide, venis ex angulo exortis prodeuntibus, quæ certis intervallis velut nervi eminentes, in averia parte extuberant, superficie utraq; glabra ac viridi-fusca, & valde nitentia.

Floris & fructus in capsis oblongis, quæ ex caudice supra originem furculorum foliaceorum exeunt, ac unum brachium longe sunt, & quatuor vel quinque viridibus, scutellatis corticibus constant, simul proveniunt furculis numerosis, qui capsis apertis ex eis erumpunt ac ramo medio crassiori coronatim circumpositi, octo plus minus cubitos longi evadunt, & graves fascias constituunt, denso ordine arcè insidentes.

Floris spicæ, bini ex adverso, dipetali aut summum tripetali, petalis surrectis, cuspidatis, duris, rigidis, crassis, nullis venulis striatis, intus concavis, colore primum viridi, post rubescente, deo flavescente, alii aperti, alii clausi, atque adeo diversi coloris, alii rubri, alii cæruleo-rubi dilutius aut intensus, alii flavi.

Ex medio horum spicorum foliorum tenicac penicillis angustorum, flavoem, surrectorum ac striatorum foliorum, quæ instar staminum sunt.

Gemma fructuum juxta spiccos flores sitæ sunt, minores quam flores, rotundæ ac in ventre cuspidatæ, & cum cuspe anteriora versis reflexæ, quæ floribus deciduis remanent ac in fructus excrescunt; ingenti numero cum jam adulti sunt ramum onerantes, plano-rotundos furculis striatis sine petiolis adnatos, dum immaturi sunt duros ac virides, dein flavos, rubicundos & per maturitatem rubicundo-obscuros & nitentes, constantes cortice tenui, & carne intus molli & rubra, linguam acerrimè pungente ac lancinante.

Intus *semina* seu nuclea duri duo sunt, totam fermè capacitatem fructus replentes, formæ oblongi, una parte gibbi, altera qua sibi motu accumbunt plani, stris lacunosi, colore exterius rubro, ac carne intus coerulescens, albicante & rubra.

Chamæthiphen peregrinam *Clus. D. Syen* nihil aliud esse suspicatur quàm fasciam seu racemum cui adhaerent hujus arboris fructus; cui opinioni ut probabili nos etiam consentimus.

Palma coccifera fructu ex arboris trunco spinosa C. B.

Hujus arboris fructus ex stipite pendent, Pinæ Noci seu Ananas non dissimiles. Ad me scripsit *D. Tamerlan Ribesius* Arborem istam, copis eleganti Icon ex India Orientali ad Regiam Societatem Londinensem transmissâ suis sub nomine arboris *Sageveer*, esse hanc palmam, vel ei valde similem, quod fructus ex arboris trunco pendent, ut in Arbore *Jaca* dictâ, & folia sunt pinnata, ex adverso bina. A flore vulnerato exillat Vinum: me movit idem Amicus hanc Arborem esse veram Palmam ob ramullos Arundinaceos, folia acuta, pinnata, palmacea; & ab hisce notis facillimè distingui à *Jaca*, & Arbore Indica *Alamei, Mimæ, & Teddy* dictâ.

Hæc Arbor a genuinis Palmis differt situ fructus, qui in hac è trunco nudus, in illis è capite seu gemmâ prode vaginâ Spathâ dictâ inclusus.

CAP. IV.

De Palma folio plicatili flabelliformi majore.

1. *Palma coccifera, folio plicatili flabelliformi femina, Carimpana H. M. Palmeira brava femina Lusitanis.*

Radix est supernè fibris capillatâ, rectâ descendente, ac ramos transversos obiter emittente, cortice ac ligno nigricante.

Caudex ligno ex rufo nigricante constat, cortice in medio molli, exterius cortice seu crusta nigricante, quæ deglubi nequit, ut *Tenga*, obductus, ligno ad crustam duriore.

Folia (ramos vocant) decussato ordine summum caudicem coronant, pediculo quatuor fermè cubitos longo, supernè plano & nonnihil cavo, inferius rotundo, ac in oris ob cuspidem eminentes aspero & incidente, una parte spithamam fermè lato, summâ strictiore nec palmum latitudine excedente, prægrandia, in latum expansa, ac veluti flabellum plicata, in plicarum oris eminentibus costis aspersi obducta, in anteriore parte incisa, ac in plures cuspidem stricta, texturâ densâ ac crassâ, in longum venis densis striata.

Fructus externâ formâ similes sunt fructibus *Tenga*, sed minores ac rotundiores, & in vertice nonnihil plani, calyce arcto & majore, & foliis arctè circumvoluts excepti, prodeuntes ex capsis quæ tribus foliis arctè circumvoluts constant, ac supra ex exortu foliorum erumpunt. Fructus hi exterius cortice crasso constant, cui corticula densâ obducta est, in fructibus immaturis viridi-fusca, nitens ac glabra, in maturis inferius supra calycem nigricans & nitens, sulcis & fissuris in longum striata, superius in vertice ex viridi flavescens seu proliis flava; ipse autem intus pulpam habet densam, quæ primùm mollis & alba est, dem cum fructus probè maturi sunt, filamentis lignosis, tenuioribus ac mollioribus, dense perexta, ac succulenta, saporis subdulcis & non ingrati, odoris fortis ac eisdem cum carne fructus dicti *Scharca*. In medio hujus pulpe duæ trève nucleæ, oblongo-rotundæ, & plana, pulpa intermedia à se mutuo separatæ consistunt, constantq; exterius operimento crasso ac lignoso, cum venustiores sunt poroso, ac nonnihil duro, quod in exteriori superficie filamentis lignosis albicantibus arctissime obductum est, adeo ut minus glabrum sit quàm operimentum lignosum in fructu *Cocis*. In hisce cum teneriores sunt intus medulla est coerulescens & transparenta, crassa, mollis, gelatinæ consistentiâ, ac succulenta, saporis dulcis haud ingrati, quæ tempore valdè indurcescit, adeo ut mandi nequeat.

Non est hæc arbor *Talagaba* seu *Talipot*, i. e. Arbor umbrosa Cingalensium, ut opinans est *D. Syen*.

Linn.

Nascitur in arenosis.

2. *Palma coccifera folio flabelliformi mixtâ, Anpana H. M. Lusitanis Palmeira bravo macho.*

A præcedente in eo tantum differt, quod loco fructuum, capitula teretia & florifera proferat, quæ ex capsis præcedentis similibus exeunt è foliorum sinibus pariter emittentibus, duas spithamas plus minus longa, & nonnihil incurva, primùm cum caulibus albicantis, dein virescentia & fractu facilia, in superficie plurima squamula, quæ ex intortione aperta similitudinem eorum respiciunt, obducta.

Flora

Flores quos ferunt inter squamas ex suis oculis emicant in tractibus spiralibus ac non signatis ac sibi mutuo parallelis confiti: suntque stellatae, constantes tribus parvis, interioris coehleato-cavis ac rigidiusculis foliolis, quae primum cum capitulo albicantes, deinde viridescant, constantes; continentque in medio quinguo vel sex tenuia stamina, quae apicibus albicantibus, subilavis & grandiusculis ac striatis dotata sunt.

In hisce capitulis floriferis intra carnem proximè ex adverso oculorum florum *Gemmae* oblongo-rotundae, ad superficiem erectae, quae glabro loculamento ocluse sunt, continentur, quorum oculis flores inserti sunt.

Capitula isthaec & figura & texturâ suâ se geminae julae seu nuciventa esse produnt: unde arborum hanc à precedente specie distinctam esse non concedimus. Stantibus ergo natura legibus à Morifera exhibitâ non necesse est ut haec arbores distinguantur, cum altera florifera tantum sit, altera fructifera; seu distinctae, non speciei: quod idem & Salice & Palmae dactyliferae, & alii praeter arboribus accidit. At verò si fructum respicias secundum leges istas Palmae ad diversa genera reducenda sunt. Aliæ scilicet ad Pruniferas, quarum fructus pulpâ humidâ molli officulum ambiente constat; Aliæ ad Nuciferas, quarum fructus pro exteriori etiam tegumento materiam habet sicciorum. At neq. figurâ conveniunt Palmarum fructus, ut eam descriptionem attendenti manifestum fiet, neq. officulorum seu seminum numero: Alii enim & quidem pleraq. simplex officulum habent, alii geminum aut etiam plura.

3. *Palma montana folio pluviali flabelliformi maximo, semel tantum fructifera. Coddâ Palma, seu Palma montana Malabarica H. M. Cingalesibus Talaga & Talagâ, & Talipot. An Palmam referent arbor farinifera C. B?*

Palma Malabarensibus generale nomen est, quod cuiq. Palmae speciei attribuitur.

Magnam habet quoad folia similitudinem cum *Corimpans* & *Ampans*. Folia autem, cum arbor in summo vigore est, latitudine quatuordecim, & excepto spinoso pediculo longitudine octodecim pedes superant.

Postquam arbor haec intra annos triginta quinque, aut sex ad 60 vel 70 pedum altitudinem excrevit, nullis interea floribus aut fructibus prolatis, e medio ejus apice novum quasi caudicem emittit, qui trium quatuorve mensium spatio ad 30 circiter pedum mensuram assurgit, quo tempore folia pleraque decidunt, ac arbor altissimo ac levigato malo plane similis est. Deum novus hic caudex, duodecim aut tredecim circiter hebdomadam decursu, undiq. longos, rotundos ac laeves ramos, nullis foliis aut ramulis lateralibus ornatos emittit, quorum inferiores viginti pedum longitudinem obtinent. Atq. ex his ramis demum plurimi ramuli prodeunt, qui copiosissimis ac exiguis albicantibus foliis, in fasciculos quasi collectis, ternis quaternisve contiguis, tribus foliolis sexque flammis dotatis, instructi, jucundum exhibent spectaculum. His autem foliis post tres quatuorve septimanas decidensibus exiguae succedunt baccae, quae indies augentur, & sex circiter mensium spatio perfectas ac maturas exhibent fructus: quibus delabentibus novus hic caudex amarefcit, totaque arbor emoritur. Sunt autem fructus exactè sphaerici, cortice glabro, viridi, carnosio, aequo, succulento, subpingui ac subamaro vestiti; nucleus verò qui hoc fructu continetur, satis magnus, rotundus, albicans ac eburneus, carne dura & ossea infercitur: medullare autem corculum nunquam duratur, sed tempore consumitur, & cavitatem relinquit.

Hujus arboris epulique partium omnium in initio & prima germinatione, in incremento, in statu & vigore, inque declinatione delineationes accuratissimas, duodecim tabulis aeneis comprehensas, exhibent Horti Malabarici auctores.

Nascitur haec arbor locis montanis & petrosis in Malabar, nimirum *Mangatti, Tintijur, Katur, Loca*, & pluribus aliis locis. Crescit quoq. in insula *Zailon* provinciae *Menda Coria, Agrâ* & juxta *Blowden Malee*, seu *Adami picâ*. Floret indifferenter quocumque anni tempore, quanquam in Augusto non rarè hi folioli observentur, qui intra quatuordecim menses vix maturos exhibent fructus. Una autem arbor plura viginti milia fructuum producit.

Foliorum hujus arboris apud indigenas frequentissimus usus est ad homines umbrandos: integrum autem folium istius magnitudinis est ut decem pluribusve hominibus umbraculi loco inservire queat: quem in finem incolae extremas folii lacinas conluunt, ut rotunditatem quandam acquirat quo facilius sub ejus tegmine aliquot homines ab imbris radiisque Solaribus defendi possunt. Insuper folia adium tectis inserviunt; necnon pro chartaceis phylis Malabarenses us utuntur, adeo ut eorum libri non ex librâ, hoc est, arborum corticibus interioribus, ipsi ligno adherentibus, sed ex hujus arboris foliis consisterent, admodum durabiles, & si bene asserventur pene perennes: quibus sericeo stylo satis characteres imprimunt, unde superiore cuticula desulcente literae ingratè remanent. E fructibus autem globuli ad armillas, brachialia, moniliaque pro Domicellis [virginibus & matronis] tornantur, usque levigati & rubro colore tincti, pro genuino rubro corallo impertis facile oberudantur.

Ceterum arbor haec in Medicina vix ullum habet usum: nihilominus tamen succus è firculis fructiferis expressis vomitum excitando conducit ex morbu serpenti vertiginosis ac delirantibus. Fructuum theca tenella adhuc si discindatur liquor exillat, qui radiis solaribus in substantiam duriorum condensatus, ac mulieri gravidæ exhibitus foetum necat & potenter expellit.

Arbor haec à *Roberto Knô Navarcho*, qui viginti annos in insula *Ceylon* captivus detinebatur, in Historia quam publicavit istius insulae satis accurate descripta est. Hujus arboris (inquit) folium admodum tenax est & molle pergameni instar, & ut commodè circumferatur ab itinerantibus mirabiliter conformatum. Quamvis enim cum extenditur tantæ latitudinis sit ut vel viginti homines protegat & inumbret, est tamen flabelli in modum plicatile, usque adeo ut in magnitudinem brachio humano non majorem contrahi possit, & praeterea levissimum est, ut in partes dissectum in manibus facile gesseretur. Integrum folium expansum circulum propemodum implet; verum partes quas secum circumferunt triangulares sunt, eas autem capitibus superimponant, acutiore angulo anteriorum

trorsum directo, quò facilis arborum & fruticum densorum ramos obvios penetrent & viam aperiant. Milites ea perpetuo secum circumgestant tum ad pluvias defendendas, tum ad tentoria sub quibus internoctu quiescant. Flores graviter admodum olent, & propterea Cingalensibus adeò ingrati sunt & odiosi, ut siqua arbor eorum domicilii vicina crescat, florendi tempore eam excindunt, nulla fructuum ratione habita.

Medulla arboris antequam floret, (est autem tota ferè medulla pauco ad corticem ligno) esculenta est. Pinfunt eam in mortario, ut veteres frumentum solebant, & è farina panes seu placentulas conficiunt, quæ in cibano aut sub cineribus coctæ, panem simalagineum sapore referunt. In inopia Oryzæ ante messem frumenti vicem indigenis supplet.

Hinc forte Arbor hæc *Palmam referens arbor farinifera C. B.* fuerit à Clusio descripta exot. lib. 1. cap. 3. quæ in Ternate insula Aequatori proxima provenit, cujus summum fastigium in caput orbiculatum instar Brassicæ capitata extuberat, in cujus medullis farina, è qua panes fiunt, sicut etiam apud Amboenses & panes & alia cum lacte forcula conficiuntur: Quamvis descriptio hæc minime quadret nostræ huc arbori, sed potius Palmæ nobili seu Regali Barbadosi, de cujus medulla farina non fit. De eadem arbore farinifera C. B. accipienda esse quæ Clusius habet Exot. lib. 1. cap. 16. vel locus indicat. Arborem quandam in insula Ternate nasci, quam recisam in multas partes findunt, quas malleis ex crassa arundine factis contundunt, atque inde eliciunt velut farinam quandam, ipsi *Saggs* appellatam, scobi lignorum quæ ferrâ resecta sunt similem, ex qua panis satis albi placentas quadrangulas conficiunt Palmi magnitudine, quibus non modò vescuntur, sed magna ferè ex parte mercimonia sua exercent.

De farina *Saggs* facta ex medulla Arboris Palmam referentis, ex qua panem Amboenses conficiunt gustui gratum, & boni nutrimenti. Vide Additamenta ad curas Clusii posteriores. Ditiore deest hanc farinam cum lacte ex ipsa arbore hausto madefactam, quod pani multum gratæ addit.

Arbor adeò mollis est materis & corticis ut eam cultello mensario pane transcendere poterunt nautæ. Huc referendam putat Clusius arborem eam cujus meminit M. Dolus Venetus lib. 4. sui Itinerarii, de regno *Fausur* agens, his verbis.

In ea (inquit) provincia vastarum arborum genus est, quas duorum virorum ulnæ vix amplecti queant. Harum adempto cortice, qui tenuis est, succedit ligni materies, tres digitos per totum arboris ambitum crassa, medullam in se continens farinaceam, similem carni lignorum. Hæc in figuratum vas aqua plenum injecta baculo agitur, ut fursures & reliquæ sordes superfluat, puraque farina subsidat. Effusa deinde aqua fit è remanente farina massa, ad variam generis edulia conficienda idonea, pani hordeaceo colore & sapore similia. Illius arboris lignum ferro conferrî potest, nam in aquam injectum illico fidit & mergitur, directèque ut Arundo Donax finditur. Ex eo incolæ lanceas sibi parant, &c.

Ceterum & Palmarum Brasiliensium Iraiba Pisonis & Urucuri-iba *Marcgrav.* medullæ farinam sappeditant.

Cum ergo tot sint Palmæ fariniferae species, an Amboensis illa sit *Todda* panna Malabarensium, an *Codda* Panna eorundem seu *Talipot* Cingalensium, an verò Arbor ab utraq. specie diversa nobis nondum constat: non video autem cur non eadem possit esse cum *Codda Panna* dicta.

Ex quo hæc scripsi me monuit *D. Tancvulus Robinson*, Arborum istam, cujus elegans Icon ex India orientali ad Regiam Societatem Londinensem transmissa fuit sub nomine Arboris *Saggs* seu *Zaga*, non esse *Coddam pannam* folio plicatili flabelliformi Hort. Malab. sed potius *Toddam pannam* H. Mal. foliis pinnatis, fructuipromo cono è multis linguiformibus involucri (veris fructuum loculis) composito; & caudice in protuberantes annulos distincto.

4. *Palma Brasiliensis prunifera folio plicatili seu flabelliformi, caudice squamato.* Caranaiba & Ananachicarivi *Brasiliani* *Marcgrav.* Pison.

Arbor est Palmæ dactyliferae magnitudine & altitudine, ligno duro, rufo seu brunno, crassis nervis intus constante, nullius usûs; cortice exteriori gryscio, & cartilagine à terra ad quoddam spatium squamato, squamis ordine cochlearum positæ, quæ primò longiores, successu breviores fiunt, imò tandem decidunt, supernè initio factæ; nam arbores adultiores caudicis mediocritatem superiorem habent glabrati ut *Casaca*, inferiorem solum squamatum, squamæ autem nihil aliud aliud quam reliquæ ramulorum [foliorum verius] qui decidunt arbore in altum assurgente emascentibus aliis. Ramus quilibet [rectius pediculus folii] duos vel tres pedes longus, compressus, in utroque latere acuto duris spinis nigris armatus, figurâ denticulipium referentibus: unum in uniuscujusq. rami [folii pediculi] extremitate solum rotundum figurâ, & ita plicis donatum ut manuarium feminarum flabellum referat, viridis coloris, ab extremitate ad mediocritatem ferè introorsum sectum in multa carinata segmenta, foliis Palmæ dactyliferae similia: quodlibet ex his sectis foliis circa duos pedes longum est. Arbor in summitate ramos suos, [rectius folia] quaquaversum in orbem expandit, sursum, deorsum & ad latus, ut Palma dactylifera.

Inter ramastros seu folia ramuli prodeunt longiores, quatuor, quinque, aut sex pedes alti, in multos furculos, lanugine albescente obductos expansi alternatim, & quasi è vaginula prodeuntes, in his existunt *stipuli* pallidè flavi sine pediculis, tribus foliis constantes. Post hos proveniunt *fructus*, figurâ & magnitudine Olivæ, dum virides amari, nec edules, nec ullius usûs; at maturi nigrescunt, & indigenis esculenti evadunt. Secta hæc arbor nunquam renascitur è caudice; tardè quinetiam crevit & longo tempore opus habet ut grandescat.

Folia serviunt ad tegendas casas & corbes faciendos.

Piso duas species pingit, & sibi notas scribit, sibi invicem multum similes, nisi quòd mira foliorum & corticis conformatione discrepent.

Utriusque arboris scapus interior egregiè flammam concipit, & instar facis diu fovet, ita ut mihi (inquit) per desertâ peregrinanti solatio fuerit, non solum ad illuminandum, sed ad abegenda quævis insecta, & serpentes nocte vagantes.

Huic

Huic valde similis est si non eadem Palmæ tertia species, *Latanier* dicta *Rochefortii*. Folia expansa ad pediculum rotunda sunt, extremo plicatilia flabelli in modum, pediculis magis adnexa, qui e filamentis quibusdam trunci caput cingentibus exeunt. Hæc in fasciculos colligata casis integendis ^{Uxor.} ferviunt: membranz seu cuticulæ pedunculis detractæ, cribris, canistris seu sportulis, aliisque vasculis curiosis texendis idoneæ sunt, quæ Indi inter rariora sua & pretiosiora supellectilia habent. E ligno ipsius arboris, ut & *Palmæ Francæ* dictæ, arcus efficiunt, & clavæ quibus eorum loco in conficiendis utuntur, *Zagaya* etiam, quæ sunt lanceolæ quædam, quas in hostes suos manibus propiciunt; quin & sagittarum acies eo muniunt, quo non minus penetrantes evadunt quàm si chalybe cuspidatæ essent.

CAP. V.

De Palma Humili.

1. *Palma humilis Hispanica spinosa & non spinosa* J. B. *Palma minor* C. B. *Palmites* sive *Chamerriphes* Ger. *Palma humilis* sive *Chamerriphes* vel *Palmites* Park. *Palma folio plicatili seu flabelliformi humilis*. *The Dwarf Palm*.

Fructus *Chamerriphes* quos habuit J. Bauhinus magnitudine cranz & figurâ olivari, triplici cortice obtecti: externus colore castaneæ, in ruffo nigricans tenuis est: huic alter *subacet* crassior, colore cinereo, in fila ductilis: tertius ad nucis moschate colorem accedit, nucleum obvestiens duritie cornea, sapore dulcem, album, quem percurrunt linee ruffæ breves, ex iisque una ceteris longior ad centrum pertingit.

Folia, quæ sicca asservant, ita erant digesta ut muscum instar ex pediculo uno seu manubrio triangulari, non multum crasso foliorum dense stipatum agmen assurgat, quorum singula semunciam lata, striata, bifida aliquando, longitudine cubitali in cultratam mucronem definebant.

Folia nobis observata in locis natalibus, & e scopis vulgò venalibus exempta cuivis observatu facilia, ad pediculum palmi unius spatio integra sunt, deinde finduntur in folia qualia describit J. Bauhinus; ubi autem tela folii integra est ad pediculum, flabelli in modum in plicæ componuntur, plicæque foliorum diversorum speciem exhibent.

Hoc & J. Bauhinus alibi expressit. Quædam iniquis folia dividuntur, sed aliqua tantum ex parte, non ex toto, ut relinquat Palmæ manibus latitudinem præter digitos, ut in humili genere apparet.

Planta ipsa ad cubiti altitudinem & amplius assurgit, inferiore parte (ut aiunt) crassior, superiore tenuior. Flores edit ex obliquo e capillaceis quadam coma emergentes, & racematim coherentes, quibus fructus succedunt Palmulis vulgaris minores. Pars radici propinqua in globum extuberans internum germen quoddam, quod Cerebrum vocant, innumeri serè involucri circumseptum habet, tenerrimum, lapidum, suavi Carduorum gustu, proinde secundis mensis pro bellariis estur cum Piperis & Sælis momento, & ad Venerem excitandam haud parum prestare creditur. Bellonius Alexandriæ in Ægypto crudam mandi ait.

In insula parva ad Promontorium Scilæ Pachynum, inque maritimis Etruriæ observavimus non hanc speciem sed quæ foliorum pediculis spinosis est: eandem etiam esse puto quæ in Hispaniæ maritimis oritur: nam foliorum ex quibus scopæ illinc ad nos allatæ sunt, pediculi spinosi sunt.

Bellonius duas distinguit species nimirum, 1. Hispanicam non spinosam, quam à J. Bauhino descriptam dedimus; 2. Creticam spinosam. C. Bauhinus unam tantum agnoscit speciem: Et revera quotquot nos observavimus vel in Italia, vel in Sicilia, vel ex Hispania allata folia pediculis erant spinosis. Scopæ tamen Hispanicæ e duobus generum foliis, aliis majoribus & mollioribus, aliis minoribus & durioribus compositæ videntur, ambobus tamen pediculis spinosis insidentibus. Verùm hoc curiosius observandum propono.

Folia ad sportulas, teges & scopas parandas incisa sunt: sunt enim ad vertendas domos non ^{Uxor.} solum peridonea, sed etiam utilia, quod non confringantur, neque deterantur nisi tempore longo.

Baccæ suæ adstringente vi dantur contra omnes corporis fluxiones.

Chamerriphes peregrina *Clas.* vide Palmam Indicam folio bicomposito, fructu racemoso sive *Secunda* pars *H. M.*

2. *Palma humilis spinosa*, *Acitara* *Brazilienſibus* dicta *Marcgrav.*

Marcgr.

Folius est *Sigilli Solomonis*. In septem, octo aut novem pedum altitudinem assurgit, caudice satis crasso & acutissimis spinis ubique munito, unam etiam atque alteram de se spargens ramum majorem: Per intervalla autem ambiunt ramuli fruticem, duos, tres aut quatuor pedes longi, aduncis & deorsum versis spinis viridibus cum cuspidibus betinis splendentibus: in his ramulis *folia* sunt, interdum bina opposita, interdum unum solitarium, inodora, sesquipodem longa, duos & semis circiter digitos lata ubi latissima, foliis *Sigilli Solomonis* aut *Lili* convallium consentientia & colore planè similia, & in medio nervum secundum longitudinem habentia: tres aut quatuor etiam acutissimæ spinæ recte manant folium inferius. Extremitas autem ramulorum ad unius circiter pedis longitudinem caret foliis, indem spinosa, & in modum sagittæ tripliciter figurata.

Folia hujus plantæ antequam se pandunt arcib. sunt complicata in modum foliorum Palmæ, ramulo adherentia, deinde se explicant. Hinc inde in hoc frutice provenit siliqua, pedem aut quoddam digitos longa, teres, duos aut tres digitos crassa, & in utraque extremitate acuminata, *panhami*, *incurvata*,

incurvata, ubique per ambitum acutissimis spinulis obfita, primò viridis, dein nigrescit, & sponte se aperiens pròmit ramum ex se, more & modo Palmæ nuciferæ in multos ramulos distributum coloris ex flavo albescentis, cui *flosculi* multi, hinc copiosi globuli fiunt, qui in fructus abeunt, quorum *formam & consistentiam Autor non descripsit*.

Vera & genuina Palma species esse videtur: nec obstat quod unum aut alterum ramum majorem de se spargat: hoc enim Palmæ etiam dactylifera interdum accidit, &que insolitum & ineri occidentarium, naturæ aut lascivientis aut deviantis effectum: ut aliquoties etiam monuimus.

Alias adhuc Palmarum species partim è Jo. de Laet Indiæ Occidentalis Descriptione; partim è Purchasi nostri Navigationibus producit Johnstonus Dendrol. lib. 2. Verùm quoniam imperfectè admodum descripserunt, ut nesciam an à præcedentibus distinctæ sint necne, pròmittendas censui. Earum quas meminit J. de Laet in insula Maragnana nascentium nomina barbara sunt, 1. *Mouruy-wot*. 2. *Thaia*. 3. *Carona-wot*. 4. *Ovacurui*.

Palma Manicam Hippocraticam referens C. B. Palma saccifera Clus.

An hæc planta in Americæ Insulis nasci dicta sit genuina palma, multùm dubito; cum nulla pars describitur ab autoribus præter folliculum seu fructus thocam.

CAP. VI.

De Arbore meloniferâ *Mameia* & *Papaia* dillâ.

1. *Mameia* mas & *famina* Ger. Park. Marggr. *Arbor Platani folio, fructu Peponi magnitudine C. B. Item Ficum species fructus Peruanis ejusdem. Papaia Peruanis J. B. Papaia H. M. Pivo gæus Pisoni. Papaia Orientalis, sive Pepo arborecens Col. Annot. in Recchum. Mameia mas Marggr. Ambapaia H. M. The male Papa Cree.*

Marggr. H. M.

Radix rectâ in terram descendit, constans cortice & carne albicante, humida, pingui, sine ligno, laporis & odoris oleosi, gravis & ingrati.

Caudex assurgit ad altitudinem viginti & plurium pedum, pedem circiter crassus. *Cortex* cinereus est, satis levis & Juglandis æmulus, in summitate autem, ubi folia circumstant, aliquantum rufus: *densus, viridis* H. M.

Folia pediculis insident rotunda, cavis, rufescentibus, satis crassis, ferè directè à caudice extensis, sursum interdum & deorsum vergentibus 1, 2, aut etiam 3 pedes longis, ambitu orbicularia, pedem lata, in sex aut septem laciniis incisa, quæ singule anterius cuspidatæ sunt, & septem istorum incisuras habent, texturâ tenuia, mollia ac tenuia, & lætè viridia.

Folia nova è summitate caudicis semper erumpant, vetustioribus quæ in inferiore parte stirpis sunt decidua, & notas albicantes in ejus cortice viridi relinquuntibus, ut inferior trunci medietas nuda sit, superior foliis vestita.

Flores petiolis tenuioribus teretibus, tres spithamas longis, dilutè viridibus, in medio tubulo pertusis, ex alis foliorum ortis insident, multi, conferti, pedicellis brevibus, albicantes, odorè grati, quinque petalis oblongo-rotundis, in stellæ formam expansis compositi, calyce parvo, arcto & è viridi futeo excepti. Marggravius colorem pallidè flavum, ceræ æmulum flori attribuit. E medio flore emittuntur *stamina* decem brevissima, ad unguiculos petalorum in duplici serie affixa apicibus totidem, oblongis, pallidè flavis insignes.

Tempus. Floret toto anno, fructus fert nullos. At Marggravius falsum esse scribit fructum ferè nullum, nisi & feminam non ferè fructum nisi mas adferat. Contrarium enim, inquit, me multiplex experientia docuit.

At nos utrumque verum credimus: possunt tamen fortassè nonnullæ arboreæ androgynæ dari, quæ & flores & fructus proferant; quomodo urticis accidit, quarum nonnullæ mas flores sine fructu, alie feminæ fructus sine flore, alie androgynæ tum flores tum fructus sed à se invicem separatos & remotos proferunt.

Locus. Nascentur in arenosis; H. M. ubique in sylvis obvia est; Marggr.

2. *Mameia* *famina* Marggr. *Papajamarum* H. M. *Arbor Melonifera* Bontii. *The female Papa Cree.*

Mari similis est caudice & foliis, [minùs excelsa & caudice graciliore H. M.] foliis plurimum majoribus. *Flores* fert non in pediculis longis, sed ad ipsum caudicem ex alis foliorum egressos, magnitudine florum Gladioli, quinque petalis oblongis, flavis [albicantibus H. M.] ligule instar angustis, in cuspidem contractis, extrorsum & deorsum cum cuspidè reflexis & contortis constantes, odorè profundissimi. In medio stamen ovale est, pallidè flavum, magnitudine nuclei Pruni, cui insidet ovona egregia flava.

Calyx quo continentur quinque brevium cuspidum est, qui petalis decisis fructum inferius complectitur.

E medio cujlibet floris nascitur fructus, nec petala decidunt antequam fructus Juglandis magnitudinem conlocutus est, manente quoq; ad tempus stamine floris in umbilico fructus.

Fructus ita caudici adnati referunt mammae, unde & nomen meruerunt apud Lusitanos. Magnitudinem acquirit Mall cotonei aut vulgaris Melonis, & ejusdem figuræ: immaturus est viscidus, & incisus exsultat lac, maturus ex viridi flavus, carne lutea instar Melonum, densa & solida. Cortex eodem modo separatur & fructus dividitur, grandi intus cavitate.

Semina in interiori superficie inter fungosam carnem numerosa, in quinque series disposita, ad 120, 130, aut plura in uno fructu, ovalis figuræ, magnitudine Coriandri, superficie rugosa seu aspera, fusca, nucleo intus albo, singula involuta in membrana albicante, transparente & nitente, quæ detrahenda est siquis femina velit servare. Saporis sunt ejusdem cum Nasturtio aquatico nostrate.

Pulpa munda est quæ Melonum tum colore, tum sapore, sed inferior. Fructus crudus edi potest, sed ut plurimum solus, aut cum carnibus coquitur, sed non magni fit ob abundantiam.

Arbor toto anno fructibus opusta cernitur, & semper etiam floret.

Ex quolibet femine annuo spatio habetur Arbor fructifera, nulla autem durat ultra quatuor annos. Signum mortis est quod cacumen sponte corrumpatur.

Rarò reperitur arbor habens plus quam unum aut alterum ramum, maxima pars ramis caret, atq; ita speciosiores sunt.

Arbor cucurbitifera Ficus Nigrarum Thevæci *J. B.* huic eadem videtur.

Papayæ Orientalis fructum Petrus de la Valle ita describit. *Colonn. Annot. ad Recebana.*

Vulgari nostro Melopepomi similis est, sed minor, ovali estigie, laevi & virente cortice, nullis aut vix apparentibus striis. Interna parte carnem habet Aurantii colore saturo, sapore dulci, nostratibus simili, sed quâ amplius aromatica præ se ferente. Fructifera etiam satis est arbor, & semini colore nigrescente dum recens, & postea ad castaneum dilutum inclinans colore, quod Coriandri semen aequat crassitie, verum oblongius & dense asperum; modula candidante, sapore dulci, ad oleosum accedente.

Rochefortius duplicem *Papayer* distinguit, unam quindecim aut viginti pedes altam & pro altitudine satis crassam, minime ramosam foliis tripartito divisis Ficus ferè in modum, pediculis longis appensis, qui digni crassitudine sunt & intus concavi: Fructu mali Cydonii magnitudine, è summo trunco in circuitu enascente.

Alteram huic similem in insula S. Crucis nascentem pulchriorem, foliis crubrioribus onustam, fructu Melonis magnitudine, nec minus delicato gustu, cortice exteriori flavo, lineis quibusdam viridantibus distincto, innumeris granulis rotundis glutinosis & molliusculis, sapore acri & aromatico intus repleto.

Nonnulli fructibus crudis vescuntur, verum delicatiores cum Saccharo preparatis. Ventriculum *Vires* roborant & concoctionem promovent.

C A P. VII.

Variis arbores Meloniferas seu Cucurbitiferas continens.

1. *Guanabani Scalgeri J. B. Park. Baobab Alpini. Baobab sive Abrovi Clusi J. B. Abrovi arbor radice tuberosa C. B.*

Hanc arborem Scalger stipte proceram esse ait, folio magno, oblongo: fructum ferè Melonis magnitudine, cortice colore viridis, splendore Cydonii, digitals crassitudinis: carne intus candida, dulcedine lactis coacti: semina continere fasoolacea. *J. Bauhinus* fructum à Bern. Palodano mislum pro Guanabano Scalger sic describit.

Fructus est Cucurbitæ formâ, cubitalis ferè longitudinis, pugillaris crassitudinis, cujus cortice cucurbitino minimum duro detractò modula in conspectum se dat, ex albo tantillum pallescens, non ingrata aciditate prædita, in pulvisculum vetustate fatiscens, cui *semina* immergantur, pertinaciter herentia, turgidula, renum figuram imitata, cortice si ungue radatur obducta nuditissimo, coloris nigri, quibus nuclei insunt candidi, callosi, saporis strobili dulcis, tenui pelliculâ obvoluti. Cæterum grana adhuc medullâ involuta filis appenduntur tenuibus, quanquam semina sola nequaquam observavimus filis illis annexa.

Alpinus arborem quæ fructus *Baobab* dictos fert, foliis esse ait magnitudine ac figurâ Arantii valde similibus: in Æthiopiæ inflammatis locis nasci.

Fructus rocenter ab arbore excisus gustui admodum gratus est, acido sapore, quem contemperant *Vires* divites saccharo: sitim valenter extinguit, multumque refrigerat. Ibi eo utuntur ad omnes calidos *Ujus* affectus, febrilesque putridas, præcipue pestilentes, tum ejus pulpam cum saccharo comedentes, tum succum expresum cum saccharo potantes, vel ex eo paratum syrupum accipientes. Casyri-pulpâ in pulverem redactâ utuntur ad prædictos affectus & ad Lienteriam, dysenteriam, aliòsque fluxus alvi & uteri.

Huc cum C. Bauhino eandem specie esse opinor

- Arborum Æthiopicum fructum Bello J. B. quæ Abrovi arbor radice tuberosa C. B. Baobab sive Abrovi Clus. J. B.*

Pulpa friabilis in pollinem faciliè resolvable, acida ori grata, semina renibus animalium similia conveniunt: differt cortice duritie cucurbitina, quæ ab ætate esse potest, & pulpæ colore subrubro, qui etiam forte vetustate mutatur. Locus utriusque Æthiopia. *Abrovi* fructus pelliculâ crasso & summo arbori adheret, ad quem sulcorum rudimentum cernitur, in quibus lamugo quedam insit, ut in cotoneis malis; reliquo corpore, in quo nulli excurrunt sulci, laevi.

Plantæ è femine natæ Bello prima folia habuerunt mali quidem Citri foliis fimilia, nullo pediculo subnata. At ubi caudex pedalem altitudinem acquiſiſſet in ramos ſparſi cœpiſſe ait, foliaque protuſiſſe longiore pediculo prædita, & illa non ſingularia, ſed initio bina, deinde terna, quaternæ, & tandem quina ex eodem pediculo prodeuntia, quemadmodum in Pentaphylli, Lupini, Caſtaneæ equinæ foliis videre licet, quorum medium reliquis majus eſt, deinde illi utrinque proxima. *Hæc inſolens non eſt in alia planta foliis compoſitiſſis donata, ut prima quæ exeunt folia ſimplicia ſint & ſingularia, deinde paulatim foliorum partialium numerum in eodem pediculo augetur, donec ad juſtam ſummam perveniat.*

Radice firmabantur ſingulari in arborum genere, nimirum rotundâ, tuberoſâ, ovi magnitudine, appendicibus paucis & tenuibus utrinque exeuntibus, cortice tenui veſtita, quem tenuiſſima pellicula fuliginæ coloris tegebat, qui facile digiti attritu detergitur, ut tunc radix alba appareat, carnoſa, ſubſtantia Rhabano ſimili, ſed tenerior, in qua per tranſverſum ſecta multæ lineæ à centro ad circumferentiam ductæ conſpiciuntur, ut in Rhabani radice. Præmanſa tota ferè in aquam ſuccum vertitur, ſubdulcem, terreæ odoris, quique in ore aſtrictionem quandam relinquit, non ſine exiguo caloris ſenſu, ſalivamque copioſè elicit. Ligni materies ſatis infirma eſſe videtur, quapropter inter eas arbores hanc recentendam judico quæ brevi incrementum ſumunt, & fortaiſſe etiam brevi ſeneſcunt.

Babab ſive *Abovi Cluſi*, (quæ huic proculdubio eadem arbor eſt) deſcriptionem vide apud ipſum in *exoticis, lib. 2. cap. 1.*

Hæc arbor congener eſt & valdè ſimilis Mamoeæ dictæ ſeu Papayæ Orientali *Columæ* notis in *Recchum*, ſpecie tamen diverſa; nam & pulpæ colore diſfert, & pediculi longitudine. Fructus etiam *Babab* ſive *Abovi Cluſi* brevi quadam lanugine ſeu flore viſcoſente obſitus erat; cujus in Mamoeæ fructus deſcriptione nulla mentio.

2. *Higuero Oviadi* J. B. *Arbor Indica fructu Cucurbitæ forma & ſapore* C. B. *The Calibaff* *Tree*

Arbor eſt prægrandis veluti *Morus nigra*, fructum ferens *Cucurbitæ* rotundæ, interdum oblongæ, ſimilem. Ex eo pateras & alterius generis vaſa conſiciunt Indi. Materie eſt robuſta atque apta ſoldibus, ſubtilibus *Ephippis*, aliſque operibus fabricandis, Mali etenim *Medicæ* aut *Pumicæ* materiam eſſe diceres. Cortice facile delibratur. Folio eſt longo, anguſto per extremum latiore, à quo ad pediculum uſque paulatim anguſtius fit. Indi in aliorum fructuum penuria interdum hujus carne veſcuntur, quæ *Cucurbitæ* carni cum adhuc viret ſimilis eſt, Corticis etiam color & formâ *Cucurbitæ*. Maximus ejus fructus libram aquæ continere poteſt, minimus pugnum non excedit magnitudine.

Leoni

Vulgaris eſt in *Hiſpaniola*, reliquiſque inſulis & *Americæ* continente.

3. *Chroſ Theveti* J. B. *Ficus Nigrarum ſimilia fructu magno Meloni pari* C. B.

Si modo rectè deſcribatur folio eximè viridi, exquisitè rotundo, aureo nunimo *Gallico* pari: fructu magno *Meloni* pari, ſuaviſſimo, cum manditur *Mannæ* modo in ore liqueſcenti, ſemibus *Cucumeris* noſtratis, cortice cum maturuit croceo; à prædictis arboribus *Cucurbitiferis* ſpecie diſtincta eſt.

4. *Cboyne Americana* J. B. *Laurifolia Americana pomis copioſis magnitudine* C. B.

Fructum fert magnitudine mediocris *Citrulli*, qui quamvis elegans non tamen edulis eſt, figurâ ovi ſtruthio-cameli, ex quo Indi pocula conſiciunt, & instrumentum *Maraca* dictum quo in ſuperſtitione ſua utuntur: Folia *Laurinis* ſimilia.

Frequens eſt in regione *Americanorum* quam *Morpionem* vocant.

Cluſius hujuſmodi fructus hiſtoriam non malè *Guanabano* convenire videri tradit.

5. *Arbor folio Lauri, fructu Cucurbitæ ex Guinea* J. B. *Laurifolia Guinenſis* C. B.

Juglandis arboris celluſitudinem æquare, nec diſſimili cortice tectum eſſe ferunt: Folia *Laurinis* habere ſimilia; ad quorum exortum fructus in ramis naſceretur, initio quidem viridis, per maturitatem ex flavo ſpadicæ coloris interdum etiam nigris maculis conſperſi, interna parte fuliginofi, & nihil continens præter nigrum quandam pollinem. Mali magni ſimilis erat, & orbiculariſſimæ pene formæ, craſſo ſapique firmo cortice præditus; levis admodum pro ſua magnitudine.

Hæc arbor & præcedentes an ad hunc locum pertineant necne, non ſatis ſcio: ſuſpicor potiùs non pertinere. Verum cum fructus *Melonum* aut *Cucurbitarum* figurâ & magnitudine æmulas præferant *Mamoeæ* dictæ im præſentiarum ſubjungendas duxi. Ad Arbores pomiferas foret reduci poſſunt.

CAP. VIII.

Ambaiba Brasiliensis Marggrav. Pison.

ARbor hæc elegantem nanciscitur altitudinem, & ferè rectam, ut plurimum & sine ramis; quædam tamen & ramos habent, sed in summitate tantum. Cortex exterior similis ficu, consistens primùm cuticula tenui & cinerea, & sub ea crasso, lento, ac viridi cortice. Lignum album est instar Betulæ, verùm molle, & quod facillè potest scindi.

Caudex mediocriter crassities, & totus intus cavus à radice ad summum usque, & cavitas illa per interstitia semidigiti ubique distincta est transversali membrana, in cujus medio foramen rotundum magnitudine Pisi. In hac cavitate reperiuntur semper formicæ rubræ; ipsa coloris est hepatici. Versus summitatem folia circumposita ut in *Mamoeira*, quodlibet innitens suo pediculo, satis crasso, unum, duos & plures pedes longo, exterius rufo, interiori spongioso. Ipsum folium latum, rotundum, magnitudine integri folii chartæ expansi, aut etiam majus, in novem aut decem lacinias sectum, quarum centro infixus pediculus, à quo per singulas lacinias nervus rufus tendit per longitudinem, & venæ eminentes per obliquum; superius sunt saturatè viridia, & inferius cinerea, & videntur colorem in toto habere qualem sanguis cum aqua mixtus, hispida ut folia Ficus, in extremitate laciniarum lineæ cinereæ sunt fimbriata. In summitate arboris cavitas continet medullam albam, succulentam & pinguem, quæ Nigritæ vulnera sua fesciner curant.

Incrementum autem sumit arbor hoc modo: in summitate arboris existit theca oblonga, foliacea, incana, quæ continet in se unum folium, & duas, tres, vel quatuor minores thecas. Exteriore theca se aperiente arbor folio augetur, & sensim fit altior; folium autem hoc in theca adhuc absconditum orbis mensurali magnitudinem habet; cum theca naturâ sua aperitur, egregè complicatum ac reconditum jacet, & quod jucundissimum spectaculum novum illud folium planè incanum est inferius, ac dilutè viride, superius planè rubrum, ut aluta Prutenica, & eo modo splendens. In centro autem folii, ubi pediculus inseritur, in superiori superficie ceu stella rubra, è viridi subflava conspicitur, nimirum quasi centrum omnium nervorum dilutè virentium & subflavescentium, qui per omnes lacinias secundum longitudinem extenduntur. Exteriore theca aperta reliquæ minores successivè se aperiunt, & similia folia exhibent.

Flores producit hoc modo: in brevi pediculo ex caudice superiori, ubi folia stant, enascuntur quatuor aut quinque, juxta se pendentes, fere minimè instar, cylindræa corpora, sex, septem aut novem digitos longa, pollicem humanum crassa, intus cava & constanti gossypio, mollia, exterius autem acinis bruni coloris, ut flores filiginis nostratæ: his decidentes acini illi auferuntur, dentibus detrahuntur ac comeduntur. Cito admodum hæc arbores in eximiam altitudinem ascendunt.

Ignem sine pyrite & chalybe ita eliciunt Brasilienses: Fructum ligni aut potius radicis hujus arboris sumunt extectam, in eo faciunt foraminulum, huic immittunt bacillum fastigiatum ex duro aliquo ligno, & quasi terebrando circumagunt, pedibus fructum illud immortem tenentes, ac applicantes folia sicca arborum seu gossypium, sic eliciunt ignem.

In sylvis rarè reperitur, sed in arvis quondam exculta.

Pinguis è summitatibus hujus arboris expressus succus non solum recentibus sed & inveteratis ulceribus medetur. Folium quoque tenerum & recens, aut levior hujus arboris cortex si apponatur *Fires*, temperat & mundificat partem affectam.

Succus è gemmis expressus, qui facultate refrigerandi atque adstringendi pollet, puli de *Tipinea* inditis calidam ventris proluvium sistit: mentes denique nimium fluentes tum & virulentum genitalium profluvium compescit. Idem puerperis nimio menstruatorum profluvio laborantibus, in modum cataplasmatum umbilico impositum insigniter prodesse experientia sua confirmat Pison.

Ambatinga Pison & Marggrav.

Ramo est rubicundo & ligno minus cavo, foliis verò superius saturatè, inferiori dilutè viridibus, adeoque asperis, ut loco linæ quædam cum his possint levigari. Laquorem continet oleosum ejusdem cum succo *Ambaibe* usus & efficacis. Fructus fert magnos, tenues, palmæ longitudinis: maturiscentes dulcescunt & odules sunt.

CAP. IX.

De Musa seu Mata arbore.

MUSA Arabibus dicitur, *Pala*, ut potamus, Plinio à voce *Bala*, quæ hodiernum, ut olim, Malabaribus innotebat. Cæterum quamvis ab omnibus Botanice arboribus aconsecatur, vix tamen frutex, nudum arbor, censenda est, cum caule annuo sit.

Nos quoniam Planta hæc ad modum Palmæ *ambaiensis* est & non ramosa, ei subjungendum duximus, quamvis revera ab eadem genere differat.

De viribus sic Alpinus, Fructus substantia mollis, lenta, pinguis, dulcis, atque apprimè suavis eam ^{Ficus.} comedere affuecit, multum nutrit, sed stomachum gravat, difficulter concoquitur, succum generat crassum ac lentum quo viscera obstruuntur, præsertim hepar. Opitulatur tamen tussibus & spiriosis ex calore factis. Ejus decocto utiliter utuntur Aegyptii ad tussim ex calidiorum humorum destillatione genitam, atq. ad pleuræ & pulmonum inflammationem, atq. ad inflammatos renes, & ad urinæ difficultatem: aiunt & commanducatum vel decoctum Venereæ incendere.

Horti Malabarici Auctores hæc habent, Radix contrita ac epota in lacte vertiginem sedat; epi aqua cum Saccharo mixta proficue bibitur pro ardore renum; quin & eadem aqua simpliciter epota pro doloribus ex urina obortis confert, datim proficue us quorum corpus argento vivo infectum est. Corculum arboris seu medulla albicans qui fructum fert, tritum & cum melle ingis sumptum malis oculorum convenit, ad quod etiam servit buryrum, in quo fructus seu fici in frusta secti tosti sunt epotum.

Pro diversitate fructuum varias dari hujus arboris species aiunt: verum has varietates non sufficere putamus ad diversitatem specierum inferendam, non magis quàm in Pyris & Pomis, quorum fructus figurâ, magnitudine, colore, sapore, florendi & maturescendi tempore immensum varient, nec tamen ob id specie differre concedimus.

Omnibus Indiæ Orientalis ut & Occidentalis provinciis inveniuntur, necnon in Africa.

Ficam Indicam Linchotani Musæ varietatem esse opinamur, non speciem arboris distinctam. Eandem certè esse quam Horti Malabarici auctores describunt ex Synonymis colligitur, ut & à locis natalibus Malabarensibus enim *Palan*, Bengalensibus Quæli dictam scribit, quæ nomina ad Bala *H. M.* & *Kali* accedunt: inter species etiam seu varietates tum in Hort. Malab. tum apud Linchotanum unam invenio *Codalin* dictam.

Folia hujus quæ ulnam longa, tres spithamas lata (*Lapathi aquatici*, sex polles longa, duos lata *Lerio*) in variam supellectilem Indis in Goa cedunt, quibus & Turcæ papyri loco utuntur. Sarcoculus sæpe 100 sicubus prægnans est, uvarum modo in se compressis: Acini ex quibus dependunt sæpe in tantam molem grandescunt, ut à binis bajulis transversâ pernici vix gestari possint. Toto anno fructifera est, & Indis commeatum quotidianum largitur.

2. *Banana* Marggr. *Bananiera* Pisonis & Hist. des Antilles. *Arbor foliis amplissimis, fructu Cucumera formâ* C. B. *The Banana-tree.*

Marggr.

Tota planta est ut *Pacovera*; at turbinatum illud floriferum corpus paulo minus est: & flores parum differunt, sunt enim duos circiter digitos longi, & albo-lutei coloris, & dulcis odoris, estque floris scapus non iustar scapæ, sed rectus, attamen curvus, representans Canam Basilensium: sex foliola angusta prominent è puppi, figuræ ut in præcedenti & epistem coloris, sed stamen in medio deest: medietas anterior Canor etiam tegitur cavo tegmine albo-flavescente.

Fructus ut in *Pacovera*, octo, novem, aut decem digitos longi, plerumq. tamen non ita crassi, & sunt curvi sive lunati; substantiâ quoq. sicciore & meliores ad concoquendum.

Historia Antillarum Bananieram à Musâ in his differre tradit. 1. Quod fructus ejus duodecim vel tredecim uncias longus sit, versus extremitatem paululum recurvus, beachu propemodum crassitie; cum *Musæ* dimidio minor sit, sex pollices tantum longus. 2. Quod in fascia seu scapo non ultra 25 aut summum 30 fructus producat, qui non sunt ideo dense inter se stipati, cum *Musâ* aliquoties 100 aut 120 edat, adeo confertos & arctè stipatos, ut ægre à se invicem separentur. 3. Quod fructus carnem habeant firmam & solidam, aptam ut sub cineribus aut in olla coquantur, aut ut sic cetur in sole aut ad ignem, quo melius conservari queat: cum *Musæ* fructus substantiâ consistet molliore quàm ut his usus intersit.

In calidis Regionibus, & Insulis Americæ frequens reperitur.

Locus.

Pacoveram Theveti huic eandem esse existimo, nam folia *Pacoveræ* quam *Musæ* (quam in *Ægypto* vidit) duplo longiora esse scribit, fructum maximum pedalem, crassitudine *Cucumeris*, ad quem etiam figurâ satis bene accedit. Crescunt autem 30 vel 40 simul, in glomerem seu racemum congesti, & sibi invicem proximè juncti.

Fructus magnitudo *Cucumeri* respondens, & nomen commune *Pacovera* aliquem facile inducere possit ad credendum *Pacoveram* Marggr. & *Pacoveram* Theveti unam & eandem arborem esse: proinde & *Pacoveram* Marggr. non esse pississimam *Musam*, sed arborem specie distinctam, & fortasse *Bananieram* *Rocbefert*.

Repugnat tamen nomen & descriptio *Banane* apud Marggraviam, ut arboris à *Pacovera* distinctæ.

Arborem *Manicongo* nuciferam apud J. Bauhinum, lib. 3. cap. 181. figmentum esse suspicor.

Musæ affinis in regno *Catay* C. B. *Photel*, nonnullis *Ficus* *Pharaonis* *Thevet*. quam arbor sit nos latet, nec minus.

Musæ affinis altera C. B. i. e. *Banam* fructus in regno *Congiano*, formâ & gustu *Musæ* *Ægyptiacæ*, part. 1. Ind. Oc. lib. 2. cap. 1. Nomen ad *Banam* accedit & etiam forma, proinde eandem arborem esse verisimile est.

Arbor pomifera *Ægyptia* *Giraudeti* à J. Bauhino proposita, Hist. lib. 1. cap. 75. Nos cum J. Bauhino suspicamur à *Musâ* non differre, vide *J. B.* loc. cit.

Eloxochitl *Reechi*, quam Jo. Terrentus describit ex imagine picta, Follis *Musæ*, ex una parte saturatus, ex altera valde diluti coloris, quemadmodum *Olex* folia; Ramo nodoso ubi folia decedere, venis frequentibus in inferiore foliorum parte, folis in summitate ramus valde conglobatis; à *Musâ* diversa fortasse est, sed imperfectè descripta, ut nihil certi de ea statuere possimus.

HISTORIÆ PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS QUINTUS,

QUI EST

De Arboribus quarum fructus à floribus remoti vel
sejuncti sunt.



Æ in quatuor genera dividi possunt. Sunt enim vel,
 1. *Nucifera*; Noces autem voco fructus majores putamine duriusculo nucleo claudentes. Hæ vel sunt nuce duro & fragili putamine tectâ, *Juglans* v. g. & *Avellana*, vel nuce molliore & coriaceo tegmine obductâ: quæ indem in duplici sunt differentia, nimirum vel 1. nuce tegumento exteriori echinato undiq; inclusâ, eoque, vel spinis minus rigidis hispido, nuce triquetra; ut in *Fago*, vel spinis rigidioribus magisq; pungentibus munito; ut in *Castanea*: vel 2. nuce calyce seu cupula exceptâ; ut in *Quercu*, *Sabere*, *Ilice*, quod genus arboris *glandifera* appellantur, & dividi possunt in eas quæ folio sunt leniore & molliore ut *Quercubus* varis species; & eas quæ folio sunt aculeato, eoque vel semper vivente ut in *Ilice*; vel deciduo, ut in *Sabere*.
 2. *Conifera*; de quibus vide Sectionem secundam, his adjungimus quasdam baciferas ob notas illis convenientes.
 3. *Lanigera*; vid. Sect. tertiam.
 4. Seminibus vasculis membranaceis, vel membranâ extantibus auctis inclusis, vide Sect. quartam.
 Librum enim hunc pro hac divisione in quatuor Sectiones partiemur.

SECTIO PRIMA.

Arbores fructu à flore sejuncto Nuciferae.

CAP. I.

De Juglande.

JUglans quibusdam dici videtur à jovando & glande, ut Macrobius refert; tamen non dubitandum quin sic vocetur quasi *Jovis glani*. Nempe eâ ratione à *Joviglani* est *Juglans*, quæ à *Jovipater Jovis*. Nam ut dicitur *Marsiter* & *Diositer*, sic & *Jovipater* seu *Jovisiter*, ubi Jovis est antiquus nominativus.

Non est tamen *Juglans* *alis solum* Theophrasti, cum ea potius *Castanea* sit, sed ut nonnullis videtur, *Nux Persica* ejusdem, ut aliis, *Nux Euboea*. *Nux Basilica* seu *Regia* Dioscoridi & Galeno dicitur: *Persica* etiam & *Basilica* Plinio. *Nucem Caryon* (inquit Plinius) à capitis gravodine, propter odoris gravitatem convenit dictum.

A. *Nux Juglans* J. B. Ger. *Juglans vulgaris* Park. *Juglans sive regia vulgaris* C. B. *The Walnut-tree*.

J. R.

Proceræ arbor est, multis prælongisq; nixa radicibus, trunco ad binum ternumve cubitoium complexus sæpens crassifcente, materie ampla, rufa vel subfufca, multis exiguis segmentis scarificata, quibusdam partibus undulata crispa, robustâ: firmis vastisq; ramis brachata, cortice cineraceo, crasso, levi, per senium hinc, & in rivas altas dehiscente. *Folia* pinnatum disponuntur, conjugationes claudente folio impari, quorum singularia anapla, sesquipalmum longa, palmum ferè lata, principio & mucrone angustiora, venis obliquis à medio nervo deductis, cum tenera adhuc sunt rubicantia, suaviterq; olentia, cum adoleverint paucè viridantia, odore pucundo, ferè *Lauros*, sed
 graviori

graviori & vehementi, sapore adstringente. *Julum* profert longum, multiplici callo compactilem, cujus flavescens panicula brevi decidunt: tum flos emergit herbaceus, [ego pro vero & genuino flore *Julum* habeo, ut qui è staminibus & apicibus componitur] totidemq; calyculacea tegumenta quot flores periolo contrahuntur, quibus singulis singula includuntur nuce. *Nucem* sive fructum, quales simul multi confertim ex eodem pendunt pediculo jam perfectiorem tegit pulvinata calyx, acerbi & amari saporis, nec sine acrimonia, nigro colore manus inficiens, cui subiectus cortex rugosus, lignosus, in duas carinas apertis *nucleum* continens in binas partes ad modum ferè fissum, & pane quadripartitum, revolutionibus cerebri similiter inxqualem, primo mucosum ac inspidum ferè; deinde pro maturitatem callosum, candidum, dulcem, cuticula pallida tectum, extortum trahens ex candida, & ex acido-amaricante quadam substantia pulposa, cujus terrestrior portio in lignea, vel ex ligno membranacea quidam nucleorum dissepimenta abit, qualibus tenuioribus interior offis cavitas magna ex parte obducta est. Integri & maturi magnitudine minoris aut mediocri Persici, & pulpa viridi, seu integumento externo pulvinato [quem Festus vocat *culiculus* quasi exiguum culcum] atq; carnosio dempto, uncia ferè lanores, & hac ipsa latitudine longiores, ex rotundo in oblongum subumefcentes, sed delumbata utrinq; quà valvularum commissura est circinatione rotundi. *Nucleus duplici cuticula seu membrana tegitur, exteriori flavicante & sabamata, quæ demum adhuc recens est facilis deglabitur, cum arefcit aride adhaeret nec potest separari; interiori tenuiori & pellucida.*

Nuces Juglandes magnitudine, figura, duritie, sapore multimodis differunt. Recentiores sex potissimum differentias adnotarunt. 1. *Nux juglans*, sive *Regia vulgaris*. Hanc à duro cortice & frangendi mora *Moraciam* & *Moracillam* vocari tradit Hermolans. Non facile à putamine purgari potest. Suidam nominat *Casalpinus*. 2. *N. J. fructu maximo*. Caballinam Dalechampsius vocat. Nostrates *The French Walnut*, i. e. Juglandem Gallicam. Bonitate & pondere ad proportionem reliquis cedunt: non enim intus oppleta, sed magna ex parte vacuae sunt, nimis lapidae. Malis magnitudine ferè aequales, è quatuor cuppis seu valvis marsupia pueris gestanda sunt. 3. *N. J. fructu tenero & fragili putamine*, à Dalechampsio *mollusca* dicta, quod ceteris generibus mollior sit; episque putamen vel digitis facile rumpatur. Tarentinae vel eadem est, vel similis. 4. *N. J. bifera*: cujus generis Hermolans in Silvatiano Patavini agri viculo provenire satis constare tradit. Et Plinius nuper (inquit) Consularem virum audivi biferas & Juglandes nuce se habere profertentem. 5. *N. J. fructu serotino*. Nuce S. Joannis dictæ, quia ante diem S. Joanni sacrum neq; folia, neq; nuce ostendant; cum verò id tempus adest, pares reliquis nucibus quoad fructum & folia existunt; quales Tragus Vasconie ad Rhenum, binas etiam Giengenbachii extare refert; J. Bauhinus circa Tigurum aliquando vidit; Dalechampsius circa Lugdunum observavit. Has ego non peculiare genus fuisse existimo, sed differentiam quandam seu varietatem accidentalem & perennatam. 6. *N. J. folio serrato*. Hujus nuce teneritudine & longiori forma à vulgaribus diversa ab Hagedando late non modo germinarunt, sed etiam folia protulerunt, vulgaris quidem Juglandis similia, sed longè magis tenella, atq; in ambitu serrata. *Clas.*

His adde Virginianarum Juglandum duo genera: Unum forma & sapore parum ab Anglicis differt, putamine crassiore & duriore: alterum majus, cortice scabro & duro, nucleo magno, dulci & oleaginoso, ex quibus confusis lac conficiunt cum suis cibis miscentes. Harum arborum nonnullæ 80 pedes longæ. Parkinsonus duas Juglandum Virginensium species describit, quæ ab his videntur diversæ. 1. Prior, *Nux Juglans alba Virginensis* eidem dicta, arbor est erectior & minus parula, nuce rotundiore, minore, putamine multo crassiore magisque albicante quàm cupulis ex prædictis, nucleo etiam multo minore, æquè tamen candido & dulci. 2. Posterior *N. J. nigra Virginensis* denominata fructu potissimum à præcedente differt: qui niger est & rotundus, asper seu rimosus, putamine adeò crasso & duro ut validis mallei ictibus vix possit confringi, nucleum intus minimum claudens.

Ubi sponte proveniat *Nux Juglans* nescimus: in Italia, Gallia, Germania, atque etiam Anglia in viridariis & agrorum marginibus passim plantatam observavimus. Amat loca montana, humida & frigida, plerumq; lapidosa, Autore Palladio. Quod in Italia & calidis regionibus fortasse verum est, at in frigidioribus, ut Anglia & Germania, summitates ejus sæpius gelu peruruntur, si præcocius germinaverit: In Germania juniores arbores interdum perduntur, præsertim si loco humidior plantatæ fuerint, teste J. Bauhino, quod in Anglia nunquam observavi evenire.

Julos gemmasq; protrudit Martio, aut initio Aprilis. Fructum ante initium Septembris apud nos non pericit. Differunt tamen arbores hoc respectu, alix enim præcociores sunt, alix serotinae, nec ante Octobrem mensem maturantur. Diu est antequam fructum ferat hec arbor; viginti plerumq; anni prætereunt à prima satione seu germinatione è semine ad fructificationem. Multos annos supervivat, ac mirum in modum grandæscit. Cariem (ut annotat Tragus) vetustatemque non sentit. Teneram esse arborem, & in calidioribus regionibus locisque apricis feliciter provenire scribit J. Bauhinus, quod ut verum sit, frigidiora tamen non averfatur.

De satione & insatione hujus arboris consule geoponicos. Nucibus feruntur *Juglans*, nec inferi vult ut alix arbores. *Trag. Ruell.* quòd sanè nobis verisimile videtur, quamvis Palladius aliiq; contrarium affirmant. Ut res sit, nos cum J. Bauhino insationis multà curà non opus esse judicamus, si quidem nucum satio facilè ac feliciter proveniant.

Ut nuce in proximum annum copiosius proveniant, mos est hodie apud rusticos quosdam, ut nuce pericis decantantur. Hinc non inconcinne quidam alludendo cecinit,

*Nux, asinum, mulier simili sunt lege ligata:
Hæc tria nil fructus faciunt si verbera cessant.*

Verùm hic mos, quantumvis apud nostrates etiam usolevit qui & suum rhythmum habent,

Aaaaa ;

¶ Spaniel

**A Spaniel, a Woman, and a Walnut-tree,
The more they are beaten, the better still they be.**

rationali repugnare videtur. Quid enim aliud ab hujusmodi verberatione sperandum est, quam ut gemmæ futuri insequentis anno proventus spes deciderentur?

Umbram Juglandis noxiam esse pleriq; affirmant & capiti inimicam: Johan. Muis in Podalirio redivivo, p. 57, 58. Decubitum sub hac arbore dolorem capitis inducere experientia D. Boyle probat. Hic autem dolor (inquit) non provenit ab umbra (ut vulgus arbitratur) sed à vaporibus ex foliis arboris egredientibus, qui quam infesti sunt muscis etiam unicuique, notum est: nam æstivo tempore ad mulcas abigendas valde familiare est, ramulum Juglandis ab arbore avellere; verum quicquid est de muscis, haud facile id mihi persuaserint, imò cum D. Evelyno non tantum innocuam, sed & amoenam, & salubrem existimo ob odorem gratum quem folia expirant, & deceptos-suspicios qui se contrarium expertos affirmant.

Vires.

De viribus Dioscorides & Plinius hæc habent. Nuces Regiæ in cibo sumptæ concoctæ sunt difficiles, stomacho nocent, [bilem gignunt] capitis dolorem inferunt, suntq; tuffientibus inimicæ; [Plinius de ficcis, quæ unguinosiores sunt, hæc tradit; Recentes enim (inquit) jucundiores sunt,] utiles verò in cibis jejunis ad vomitiones concitandas. [Pro his Plinius habet inimicæ esse vomituris jejunis, atq; addit, aptæ in Tenesmo solo; trahunt enim pituitam.] Venenis quoque resistunt cum ficibus & Ruta præsumptæ, ac etiam post ipsa Venena hausta comestæ, addit Plinius angina prodesse cum Ruta & oleo. Largius chitæ latos lumbricos pellunt. Imponuntur & mammarum inflammationibus, abscessibus, luxatisq; cum mellis exiguo & Ruta. Cum Cæpa autem melle & sale contra canis hominisque morsus proficiunt. Eadem cum calyce suo perusta & umbilico admoxe tormina sedant: Putamen verò combustum tritumque in vino & oleo puerorum capite peruncto capillos condecorat, & Alopecias replet. At qui intra ipsum est nucleus tritus & cum vino appositus mensis sistit. Perveterum autem nucum nuclei commanducati & impositi gangrenis, carbunculis, Ægilopibus & Alopeciis præsentis sunt remedio. Aliis miscentur ad acrimoniam ipsorum extimendam: Plin. Capis.

Cortex Juglandium lichenum vitio & dysentericis prodest: Folia trita cum aceto aurium dolori Plin. Antidoeum Mithridatis ipsius manu descriptum constabat ex duabus nucibus ficcis item Ficus totidem, & Rutæ foliis 20 simul tritis, addito Salis grano: qui hoc jejunis sumat nullum venenum nociturum illo die.

Coquitur hæc nux, autore Galeno, facilius quam Pontica, i. e. Avellana, stomachoque est gravior, & multò magis quando cum Caricis manditur. De recenti nuce hæc accipe, nam sicca in succum pinguem transmutatur ut cibo profus sit inepta.

Corticis nucum exterioris succus expressus vel crudus, vel cum melle decoctus ad dandam consistentiam, in ore gargarisatus, ad uvulæ relaxationem, tonsillarumque & gutturis inflammationes vi sua adstrictoria cum tenuitate partium conjuncta utilissimus est Galeni experimento.

Virides seu recentes Juglandes ventrem cient. Galen. Act. Veteres & sicca potius astringunt. Concoquantur probè in Ventriculis frigidis, in calidis in bilem vertuntur.

Cortex interior arboris siccatus vomitum ciet valide; Juli five nucamenta lenius.

Tinguntur cortice illarum [nucum] lanæ, & refatur capillus primum prodeuntibus nuculis, Plin. *hist. lib. 15. c. 22.*

Inest quoq; Juglandibus nucibus propria quadam ac peculiaris facultas ad remoratos menses cientos, aliis medicamentis nihil proficientibus. Macerantur in aqua donec nuclei membranæ possint nudari; deinde nuclei ita expoliati macerentur in Aqua vitæ per biduum, eorumque duo vel tres quotidie manè jejuna exhibeantur per decem dies ante tempus menstruæ fluxionis.

Succus radicis violenter purgare dicitur nonnisi rusticis exhibendus.

Aqua etiam Juglandium immaturarum destillata ad multa commendatur, v. g. ad dissolvendos thrombos concreti sanguinis, ad vulnera & ulcera calida, ad anthracem pestilentem foris imposita. Ad eadem valet & foliorum Juglandis aqua. An verò aqua Juglandium refrigeret, adeoq; Anthraci conveniat meritò dubitat J. Bauhinus.

Nuces Juglandes post pisces sumptæ eorum coctionem adjuvare creduntur, unde illud Scholæ Sarnitanæ,

Post pisces nux sit, post carnes caseus esto.

Certum est etiam eas venenis repugnare præsumptas in cibis unde seivente pestilentia Proceres pariter ac plebs infima, quinetiam rura tostas jejuni mandunt.

In transmarinis regionibus Juglandes teneras & immaturas, cortice exteriori acuto cultello deciso atque etiam putamine duriore, in aqua frigida maceratas aliquandiu & deinde ad mollitiem coctas in syrupo è saccharo præparato leviter bullitas & in eundem demersas reserant pro Bel-lariis.

Juglandes virides decerpæ Maio vel Junio appetente, antequam earum putamina obduruerint, saccharo adscervatæ stomacho utiles evadunt. Imò ex nostra observatione Juglandes, dum virides adhuc & immaturæ sunt integræ unà cum corticibus & putaminibus saccharo conditæ, sive (ut moris est) in aqua saccharata decoctæ donec tenescant, deinde eidem aquæ ad syrupo consistentiam coctæ immixtæ ut ferventur, si duæ vel tres sumantur sub vesperam à cibo sumpto, alvum leniter subducunt.

Decoctum corticum exteriorum nucum Juglandium terræ superfusum lumbricos è foraminibus suis vel elicit, vel exigit.

Tragus scribit quosdam exteriorem corticem nucum Juglandium arefacere, inque pulverem reductum Piperis loco in condiendis cibis usurpare: cui ad saporem commendandum nonnulli pulverem foliorum Salviae adijciunt.

Juglandis materies mensis & utensilibus laudatis dicatur, & operi tectorio. In Gallia plurimi fit hoc lignum pro mensis, scamis, lectis, cathodis, scrini abaci & aliis ejusmodi, quae tela cerea fricant saepe; sic egregie poliuntur, & nitidum splendorem acquirunt. D. Evelynus fabros nostros oleo suo calido affricato lignum hoc expolire solere ait. Maxime autem aestimatur ob colorem suum varium, venas undulatas aut crispas, & materię soliditatem.

E nucibus tuis, calefactis & expressis elicetur oleum, quo nonnulli ad gangranas, carbunculos, agilopas & nervorum ulcera utuntur. Infusum auribus surditati prodest, & idem utile calidis doloribus illitum. Matthioli nullius in Medicina usũ esse scribit, sed ad lucernas & lampadas precipue expeti, quod durabilius sit oleo olivarum. Praefertur etiam pictoribus ei quod è Lini femine exprimitur; siquidem hoc cerussae admixtum tractu temporis colorem immutat, illud verò incorruptum perpetuo asservat. At alibi flatus potenter dissipare, & in coli affectibus à flatu genitis plurimum asserere auxilium tradit. Acrius eandem ei vim tribuit quam oleo Amygdalino, insuperque hoc privatim habere tradit, quod inaurantibus aut inurentibus conducit. Siccatur enim & ad multum tempus inaurationes & inustiones continet & adservat.

Iscæ [*iscas*] Paulo sunt spongiosa quaedam corpora in Quercibus & Nucum Regiarum arboribus nascentes, [Fungos, puto, intelligit] quae Barbari magis in usu habent. His inter cetera cauteriorum genera usos fuisse Antiquos idem Paulus testatur, in longis stomachi desfluxionibus, inque Hydropticis. Quomodo autem iscas ad ulsionem uterentur sic demonstrat Caelius Aurelianus. Fungos ligneos inferius ac superius angustos formantes [convenientius inferius latos efficerent, quo melius cuti insisterent] patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt concremari donec cinerascant atque sponte decendant. Id hodie imitantes Turcae sarmentum vitis bene aridum parti male affectae applicant & summitatem ejus accendunt. Hoc modo *Moss* dicta utuntur nunc dierum, ad Podagram & alios morbos. Ceterum creber est usus Fungorum Juglandium sclopetariis ad ignem conferendum: modum preparandi fungos ad hunc usum vide apud J. Bauhinum in historia hujus arboris.

Arbor vulnerata initio veris antequam folia emittit liquorem effundit copiosum, minus tamen dulcem quam fit Betulae succus.

CAP. II.

De Corylo sive Avellana Nuc.

CORYLI vocis Erymon non invenio. Avellanam ab Avellano Campaniae oppido ubi abundat dictam putat Servius. At Plinius Avellanas antea Abellanas patrio nomine dictas scribit, *lib. 15. cap. 22.* Abella igitur oppido nomen. Pontice dictae sunt haec nuges, quoniam in Asiam Graeciamque è Ponto venere. Auctor Plinius *loci citato*, Potius, crediderim, quia in Ponto abundant; nisi de Sativis seu barbatis intelligat, quibus forte Pontus patria; nam sylvestres passim spontaneae sunt. Theophrasto Heracleoticæ ad Heraclea Ponti urbe, cui & *scas* simpliciter, uti probat J. Bauhinus; Aliis Praenestinae dicuntur ab Agro Praenestino, ubi assatim proveniunt; vel quia Praenestini olim à Pœnis obsessi is famem toleraverint. Hippocrati de Dieta *scas* *avellana*, teste Casp. Hofmanno, dicuntur.

A. 1. *Corylus sativa* J. B. *vem sylvestris*. The Silberd, and the Hasel-But.

7. B.

Folia est Alti, sed acutiore, nec eum in modum viscido, hirsuto, modicè serrato, rugoso, suaviter odorato. Flos è gemmula erumpit coccineis filamentis compositus; simulque Juli longi, tenuiores quam Nucis Juglandis, qui priusquam decidant flavi sunt. [Ego Julos pro genuinis & legitimis floribus habeo, non filamenta illa coccinea] *Fruitus* simul aliquot juncti, involacris callosis, succosis, herbaceis, barbatis, hirsutis, adstringentibus & acidis obsepti, magnitudine dimidio minores ut plurimum Juglandis, oblongi vel globosi, putamine umbilicato, per maturitatem flavescente aut ruffo, levi, lignoso aut duro satis: cui subest pellicula, in domesticis quibusdam coccinea, in aliis subrufa, nucleum obvestiens albidum, firmiusculum sicut Amygdali nucleus, ejusdemque sapore dulci, lacteum remittentem succum. In Avellanis nucibus antequam nucleus formetur aut perficiatur ambiens pulpa est candida, fungosa, saporis acidi. Ipsi verò nuclei plurimum obnoxii sunt vermibus, qui omni intus nutrimento consumpto ipsam etiam putamen pertundunt ac propeunt. Ipsa Coryli arbor est ex radice crassa late se diffundente, nodosa atque crispa caudices magna ex parte aliquot emittens, in multis ac robustis subvisis stolonibus, virgisque lentas & obsequasales quales quotannis emittit novas, nec ramosa; molli. Caudex ubi annosus fuerit cortice obducitur incano, levi, & viscum nonnunquam producit, ut nos etiam observavimus.

Nuges Avellanae primaria divisione distingui possunt in Sativas seu barbatae, nostratibus *Silberds* dictas, & sylvestres seu calvas, Angli *Hasel-nuts*.

1. Sativae seu barbatae dictae, qua membrana exterior callosa, totam nucem contegit, utraq, eam siccata in barbae modum protrahitur. A vulgaribus seu calvis distinguuntur quod majores sunt & longiores, umbilico majore & elatiore, opposita parte acutiore, putamine nimis crasso, fractu sicilicet, gustu nuclei gratiore. Harum duas seu species seu varietates observavimus, Alteram nucleo rubra vel purpurante tunica contexto, quae sativa rubra 7. B. Sativa fructu oblongo rubente C. B. Sativa fructu longo *Par.* Alteram nucleo albi pellicula tecto, cuius meminere etiam C. Bauhinus &

& Parkinsonus, qui præcedentis nucleum gustu gratiorem & delictiorem esse ait quam hujus, quod & nobis probatur, unde & illud genus præ aliis lautiorum mensis adhiberi solet.

2. Noces sylvestres seu calvæ dictæ, quod putamen exterius totam nucleum non contegat, sed superiorem ejus partem nudam relinquat. Harum immenſe fere in figura, magnitudine, putaminum crassitie, nucleorum sapore, matureſcendi tempore differentie sunt. Dux præ aliis maxime observabiles: 1. Sylvestres vulgares, quæ in sylvis & sepibus passim proveniunt & minores fere sunt, *Pinsel-nuts* Anglis dictæ. 2. *Maximi Hispanice* nobis dictæ quia ex Hispania ad nos advehuntur. Hæ nucleæ Avellanæ sativæ albæ maximo fructu *Park.* & sativæ fructu rotundo maximo *C. B.* aliis Lugdunenses & Italice dictæ, unciali amplitudine, rotundæ, putamine ligneo cæteris omnibus duriore. Latiores fere sunt quam altæ, umbilico sessili, leviter compresso, nucleo duriore cæteris, gustus suavitate facillè cum sativis certantes.

E sylvestrum genere sunt vulgatæ illæ [in Germania] quas passim in hortos & viridaria translatos colunt, sylvestribus arboris & fructus facie similes, sed duplo terè majores speciosiorisque, utrinque, fere obtusiores, nucleo habitiori suaviorique, pellicula albicante tectæ. Arbor hæc *C. Bauhino Corylus sativa* fructu albo minore sive vulgaris dicitur.

Alterius adhuc elegantis Nucis sylvestris varietatis meminit *J. Bauhinus*, in hortis etiam cultæ, cujus nucleæ graciles admodum sunt, & quædam calamus scriptorium crassiorum crassitudine, præsertim circa umbilicum, non superant, *Cylindricæ* atq; torosâ fere figurâ, nisi parte inferna modicè dilatentur.

At specie fortè à vulgari Corylo differt genus illud quod in Macedonia nascitur, Arbore non quemadmodum apud nos multiplex caudice fruticosa, sed singulari, proceræ, & justam arborem æquantæ, foliis latis, Nucibus in grandem racemum pugni magnitudine congestis, cujus *Paulus Rubigallus* è *Buda* ad Constantinopolim legatus historiam Cædo retulit.

Corylus Virginensis Park.

Specie etiam differre videntur Noces quæ è Virginia ad nos adferuntur nostratibus minores, acutiori vertice, putamine scabriore seu minus æquali, duriore etiam & minus fragili, nucleo non perinde dulci & grato. Arbor quæ has nucleas fert *Corylus Virginensis Parkinsono* dicitur.

2. *Avellana Byzantina J. B. pumila Byzantina Clus. Ger. emac. peregrina humilis C. B. Nux Avellana Macedonica sive Byzantina Park. The Filberd of Constantinople.*

Supra cubitalem altitudinem rarè accrescit, sed pumilam semper persistere referunt. Crassos verò admodum magnosque fert tenuibus pediculis calyces, extrema parte in multas, crassas, longasque laciniis divisos, sede etiam multis laciniatis appendicibus obsita. Sunt autem si calyces foris valdè durâ asperâque lanugine hirsuti, interiore parte leves, continentq; fructum Avellanæ sylvestris & sponte nascenti fere similem, breviorum tamen, duròque putamine ut illa constantem. *Folia* quam vulgari Corylo oblongiora paulò, perinde tamen rugosa nullo ordine virgis adnexa.

Locus.

Tempus.

Vires

et Usus.

Corylus in sylvis & sepibus per totam fere Europam frequentissima est: At sativæ illa barbata apud nos sponte non oriuntur, nec scio unde primum acceritæ. *J. Bauhinus* in Asia non infrequenter esse scribit. Juli primo quoque tempore erumpunt nondum soluta hyeme: deinde Martio atq; Aprilis succrescentibus totis flavescunt abscidunt. Fructus Augusto mensis matureſcunt, nonnulli tamen serius.

Noces Avellanas stomacho infestas esse & difficulter concoqui, necnon caput gravare præsertim largius sumptas Medicorum Veterum & Recentiorum communis est sententia. At Lacuna id experientie & communi opinioni reclamare scribit: bonæ quippe matronæ Hispanicæ tostis vulgariter utuntur ad gratificandum stomacho, cerebrumq; confortandum non sine successu. Ego cum Bruynerini matronis apud *J. Bauhinum* tostas insalubriores esse existimo quam crudas. Recentes & maturitatem exactam non adeptas vetustis & siccis tum gratiores tum salubriores cum isdem cenſeo.

Quòd alvum sistant & dysentericis profint nonnulli scribunt: Alii & verius Dysentericæ aut Diarrhœe obesse potius quam prodesse tradunt, idèoque in ejusmodi morbis ab eis omnino abstinendum. Intestinis infestas esse experientia docere conatur *Tragus*. Pueri namq; (infit) si Augusto mensis Avellanas nucleas avidè devorant facillè in dysentericum morbum incidunt. Ad dysenteriam etiam pestilentialem nocuas esse vulgo persuasum est.

Quòd Avellanæ Juli, & cortices astringant & ventris fluores sistant affirmant qui de eis scripserunt. In *Plinii* sententiam quòd nucleas Avellanæ pinguedini corporis conferant, etiam plus quam sit verisimile, non solum posterior medicina sed & vulgus ipsum manibus pedibusque descendit: *Arthelolos* tamen & *asthmaticos* efficere ad satietatem eis vescentes vulgò persuasum est. *Dioscorides* tamen tritas & in aqua multa potas veteri russi moderi tradit. Quòd *Dioscorides* putaminibus isticis ac cum oleo tritis, glaucas in pueri oculorum pupillis denigrari prodidit, hoc illustri experimento factò abquoties se cognovisse & verisimum esse comperisse gloriatur *Cornarius*. Credat qui volet.

Oleum nucum Avellanarum efficacissimum esse ad tussim veterem & destillationes scribit *Tragus*.

Car Avellanæ tantopere obnoxie sint vermibus, Juglandes verò rarissimè is infestentur rationem duplicem reddit *J. Bauhinus*. 1. Ob nimiam earum, præsertim cum recentes sunt, humiditatem: humor enim *Aristoteli* putredinis mater. 2. Quia parùm olei habent, quo Juglandes abundant. Verùm ego potius existimo vermes in Juglandes non penetrare, præcipuè ob amarorem corticis externi. Vermiculos enim extrinsecus irrepere non autem intus sponte nasci affirmo, cum nec generationem ullam spontaneam è putri materia in animalibus agnosco: in nucibus autem illud patet, quoniam cortex fructu illius in quo vermiculus latitat semper perforatur, & in putamine exterius vestigium aliquod seu cicatrice foraminis apparet.

Vulgus Metallorum ad Virgulam Divinam seu Divinatoriam (ut vocant) quæ venas metallorum inquirat, præ cæteris furcam eligit colurnam. Verùm cum ex impari fontibus incantatorum

primò in metalla defluxerit; Metallicus (utpote vir bonus ac naturæ peritus) eâ non utitur, sed alia naturalia venarum signa observat. *Schwenckfeld. Agricola.* Qui plura de ea velit, J. Bauhini Historiam perat. E stolonibus seu furculis hujus arboris sunt virgæ piscatorum, & ad equos pigriores incitandos flagellorum vice. Ex isdem intortis fascium vincula: Mirum autem (ut faceret Plinius) contuso ligno alicui majores ad vincula esse vires. Ex isdem, cum satis excreverunt per medium in longum fissis circuli doliare efficiuntur. E contextis crates vimineæ, **Hurdles** nostratibus dictæ, ad varios usus parantur, ut v. g. ad septa quibus inter noctu ovium greges includant efficienda.

Ex ligno etiam carbones parant pictores, sculptores & aurifabri ad delineationes & præludia figurarum ducenda commodos. Ex hujus etiam ligni carbonibus pyrius pulvis confici solebat, antequam Alni carbones ad eum usum commodiores esse comperti fuerant.

Ex radice nodosa & undulata crispa vasâ & supellectilia varia formantur, quæ ad longos annos durant, nec facile corrumpuntur.

3. *Avellana purgatrix* C. B. Park. *purgatrix Novi Orbis* J. B. *Nuces purgantes* Ger.

Monardes has colore & formâ nostratibus similes esse scribit, putamine tenui, coloris spadicci, triangulares, medullâ inferiore alba & dulci, sic ut multi dulcedine illecti decepti sunt. At quam pinxit Clus. lentus & mollis contegebat cortex, partim ex cinereo candelicatis, partim nigricans: Hunc sequitur putamen minus solidum quàm in vulgaribus Avellanis: id nucleum continet Avellanæ magnitudine candidum, solidum, Avellanæ vulgaris aut Ilignæ sapore, tenui membrana obductum. Integra Nux altera parte sessilis est, & conjunctum binæ nasci videntur, ut interdum Castaneæ.

In Hispaniola insula nascitur.

Punitam & bilem infernè & supernè purgant. Earum vehementiam assatione infringunt. Coli doloribus præsens sunt remedium, flatus discutunt, & clysteribus injectæ mediocriter evacuant. Dosis est à ʒ p. ad ʒj. sed assandæ.

Quamvis mihi non constat, an Nuces hæc sint genuinæ Avellanæ necne, quoniam tamen ab omnibus qui de his scripserunt hoc nomine appellantur, huc referendas censui.

CAP. III.

De Fago.

Fagus à Dorico *εαγυ* pro *εαγυ* à *εαγυ*, id est, *edo*: sive quia ejus fructu homines vesciebantur ante fruges inventas, ut Eustathius ait, sive quòd vulgò saltem hoc cibo uterentur, quia exiguo labore pararetur, contra quàm fruges, ut is rudioribus seculis daturum tantum cibum fuisse videatur. Cave autem credas Latinorum Fagum eandem esse arborem cum Græcorum *εαγυ*. Hæc enim Quercus species est.

A. *Fagus* C. B. Ger. Park. *Fagus Latinorum, Oxya Græcorum* J. B. *The Beech-Tree.*

7. B.

Arbor est magna, patula, ramis diffusa; candice crasso, & procero; materie firma, alba, maculata, cortice levi, subcinereo, mediocriter crasso. Semo confecta cavatur, sicut & Quercus nonnullæ. Ante omnia notati digni in Fago oculi, seu longæ & squamæ illæ gemmæ, quibus facile vel media hyeme omni nudata fronde, à cæteris omnibus arboribus distingui potest. Ex unciam circiter plus minus longæ, angustæ, exacutæ & pungentes, ut & denticuliorum vicem viatoribus non incommodè præbere possint, involutæ tunicis crassis ac lucidis, continentes foliorum primordia, quibus emergentibus intomescunt gemmæ, & tunice illæ fatilcentes decidunt. Folia ad Populnea, ut plerique volunt, potius ad Ulmea quodammodo accedunt, firmiora, levia, & nonnihil lucida, integra (exceptis nonnullis in quibus aliqua serraturæ, seu eminentiæ longè à se invicem distantes apparent) & lanugine interdum, præsertim in ambitu obsita; sapore acido præsertim novella: quæ colore ab ortu ex luteo viridia sunt, notante Trago, mox saturatæ viriditatis. Quo tempore folia erumpunt apparent *fali*, ex longis pediculis pendentes, rotundi, ac multis apicibus luteis constantes, caduci ut Nucis Juglandis. Hos cum Trago veros & genuinos flores esse affirmamus, quicquid contradicat J. Bauhinus. Sequuntur *calyces* echinati, angulosi, hispidi, sed non rigidi spini, interna parte lanuginosi, carnosî sâs & succulenti, gustu acido, qui ad aperti quatuor æquis portionibus dividuntur; in quibus nuclei triangulares, levi & spadiceo cortice, qualis fieri in Castaneis, intra quem præter tenuem cuticulam medulla alba, subdulcis, pinguis, cum exigua tamen adstrictione, elui tamen grati. Hic fructus, ubi maturaverit ex calyce echinato sua sponte decidit, qui si porcorum & murum gulam effugerit, vere appetente germinans è terra erumpit binis per exortum latis & pinguis foliis, ut quavis facile observare potest. Radices nec multas, nec altas agit, pro arboris proportione, sed summe terre obherentes.

Arborem hanc Oxyam Græcorum esse, non *εαγυ*, Bellonius, Dalechampius, J. Bauhinus abundè probant, quos consulat Lector. Ex collatione descriptionum Oxyæ apud Theophrastum, & Fagi apud Plinium, quæ in multis conveniunt, (ut hunc ex illo descripsisse minimè dubium sit) id colligunt: cui accedit, quod Bellonius etiamnum hodie in monte Atho Fagum vocari Oxya, & in Macedonia Oxya adnotaverit.

Amat montes sed præcipuè humentes, nec aspernatur plana. Solo gaudet cretaceo aut petroso: non minis in Anglia quàm in Germania multis locis provenit, præsertim in Meridionalibus; unde miramur Cæsarem in Comment. fagum Britannæ denegasse.

Folia

Vires.

Folia Fagi recentia tusa & imposita calidis tumoribus profunt, eoque discutunt, & torpentia membra corroborant, teste Matthiolo, qui & citata laborum gingivarumq; vitis mirifice opulari afferit.

Aqua quæ in cavis Fagis & annosis Quercubus quandoque reperitur singulari remedio ad omnium generis scabiem & impetigines, Lichenasque facit, quod seipsum in pecoribus & hominibus experimentum scribit Tragus. Et sanè ob vim adstringentiam vehementem ad hoc utile esse verisimile videtur.

Faginas glandes ustas & admixtas cum exungia porcina calidè applicatas lumbis conferre calculosis nonnulli affirmant. *Trag. Matth.* Glires Fagina glande maximè delectantur ac pinguescunt: quamobrem cum ejus advenit maturitas, teste Matthiolo, innumeri capiuntur in Carniolar, Stiria & Carinthia sylvis; ut incolas manè videas saccos plenos una nocte captos ferentes. Nec Glires tantum eam appetunt, sed & mures, & sciuri, & turdi, & merule aliæq; multa Volacilia. Sues etiam in Germania & Anglia iis saginantur. At nobis sanè (inquit J. Bauhinus) Fagineam glandem, potissimum virentem & nondum exsiccatam, si paulò copiosius comedatur Loli instar caput turbare observatum, ac ipsos etiam sues asserunt ejus esu turbulentos reddi, & tandem obdormiscere. Fertur etiam pinguedo suum ejusmodi glandibus saginatorum mollior, quæque dum coquitur magis liquecat; quod idem de Querna glande vulgo traditur. Averse foliorum parti rubicantes, concavæ & acuminatæ pilule singulis pænè annis subnascentur, verrucarum modo extuberantes, in quibus vermiculi procreantur.

Ufus.

Facilis & in opere Fagus, quanquam fragilis ac tenera. Eadem & scilicet laminis in tenuia flexilis, capsula, ac scrinis sola utilis. Apud Antiquos & inde vasis honos. *Plin.* Miramur sanè (inquit J. B.) Fagum olim in tam nobiles usus vocatum, maximè ejus materiem, quam scimus facile putrescere, nisi sit perpetuo tecta, aut in aqua semper mersa, quod sæpe nobis observatum in lignis ad urendum sectis. Si enim sub dio maneant non tecta & madescant, facile corrumpuntur, & ad ignem inutilia redduntur: alioquin inter nobis nota ligna ad focum & carbonem utilissima, & præ aliis expectata. Nec concedimus Plinio capsis & scrinis solam utilem. Multa alia hodie præferuntur. Quanquam ad crassiora opera satis firma videtur, ut ad plaustra & similia: nostrates ad folium majorum quibus in fornacibus ferrariis utuntur valvas tabulas Fagineas adhibent, quia vix alix satis late haberi possunt: Navium etiam carinas ex ea ædificant, quia in aquis perpetuo mersa incorrupta durat, ut & Theophrastus olim observavit. Multa quoque utensilia à Fago fieri consueverunt, & pleraque instrumenta agriculturæ; non quia materies aliis præstat, sed quia copia ejus suppetit.

Sed non postremus ejus usus est quòd in tenuissimas laminas flexiles dissecta ensium vaginis firmandis interseritur, unde & cultraris bene nota; Quin & pyxides chartæ superinductæ ad linteamina tenuiora recondenda, & Galerorum capsulæ, aliæq; similia ex ea fiunt.

CAP. IV.

De Castanea.

Lib. 15. c. 23.

Castanea, Theophrasto *αἰὲς κάλανος*, non à castitate dicta est, ut quidam opinantur, ut à Plinio jejunis ferè dicatas dicente innui volunt: sed à Castanide terra nomen habet. *Nicand. in Alexipharm.*

Τὴ Καστανίᾳ ἑστραπτὴ ἄνα.

Plures autem fuerunt hujus nominis urbes, ut videre est apud Bodæum à Stapel. in cap. 10. lib. 7. Theophr. hist. A quamquam harum dicta sit Castanea non multum interest, proposito nostro sufficit quòd ab aliqua. Noces etiam *ἄμυρα* & *ἰνίμυρα* Græcis dictæ sunt, & (ut nonnullis placet) Euboicæ. At Theophrastus diversis in locis *ἑβούρα*, *ἑβούρα*, & *αἰὲς κάλανος* nominat.

Castanea corticosa seu coriacea putamine cum glande convenit, echinato calyce, totam nuccem regente, ab eadem differt.

A. 1. *Castanea* J. B. Ger. *faiwa* C. B. *vulgaris* Park. *The Chestnut-tree.*

Arbor est procera & magna, Quercuum annularum crassitudine, tantæ nonnunquam amplitudinis visa, ut truncum ejus tres homines vix complecti potuerint. *Ramus* extendit plurimòs: furculos fert tenues phœnicii coloris. Cortice vestitur lævi, maculoso, subnigro. Est ubi & in cinereum vergat, sed potissimum in ramorum extremis & junioribus arbuticulis. Materies robusta, non sentiens putredinem, quæ tamen ab onere incurvatur, in igne multum crepitat: cujus carbonem statim extinguuntur, proinde fabricis ferrariis expectati. *Folia* gerit ampla, uncias duas plus minis lata, quatuor aut quinque longa, tenuia, serræ instar incisa, nonnihil rugosa, transversis multis venis, in dorso eminentibus, à mediâ insigni costa extensis. Fructum præcedunt *nucamenta* dependentia, insignis longitudinalis, luteolis apicibus constantia, & Juglandis julis quàm simillima. Fert calyces echinatos, pungentes, erinaceis similes, qui intus villosi scenci instar tactu molles sunt, in quo continentur binæ aut ternæ nuces, aliis unica, ex lata basi in acumen desinentes, compressæ, altitudine unciali plus minus, ab uno latere planæ, ab altero plerumq; in ventrem extuberantes, cordis formam quodammodo, ut vulgò pingi solet, æmulantes: cortice exteriori obductæ non crasso sed veluti coriaceo, duro, ac lento, extenuis spadiceo ac lævi, excepta basi scabriore & subcinereo (qua parte adhaerit) internè

internè incana lanugine mollè pubescente: cui subjacet alia tenuior cortex sive membrana, rufa, crispà, & fissuris glandis sese insinuans; fragile, amaricans & astringens, nucleum sive glandem continens albam, callosam, solidam ac duram satis, qualis glandium fere Quercus, sed dulcem & gratam palato, præsertim si cocta fuerit.

Castaneæ in triplici sunt differentia fructuum respectu, qui magni, mediocres & parvi. Castaneæ autem magnæ & mediocres (observante J. Bauhino) revera non differunt, sed illæ ab his quæstus causâ à mangonibus duntaxat sèliguntur. Minores vix unguis digitorum & raro pollicis æquant aut superant, quarum vix decem aut duodecim unam magnam pendeant. Videntur & callo esse solutiorè, gustuq. prædictis longè inferiores. Hujusmodi fructus producunt castaneæ vel sylvestres, vel etiam late apud nos in Angliâ; unde cultum vel locum potius hanc nucum differentiam facere opinamur, quam eas specie inter se differre.

Gaudent in genere montibus & acclivibus; Septentrionali clivo (ut tradunt Veteres) regionum tamen non frigidiorum, nam cœlum Aquilonium non ferunt. In Italia abundant, ubi plebs montana magna ex parte is victitat. Habentur etiam in Gallia, Germania, atque etiam Angliâ nostra sylvestres. Incunt Vere germinant, nec multo post florent. Fructum circa finem Septembris maturant. Maturò fructu echinari calyces rumpuntur & hiant, castaneæque decidunt. Nonnulli paulo antequam plenè maturaverint prælongis peticis, sicut nuces Juglandes, arboribus decurrunt. Alternis fere annis agricolam uberi melle exhilarant. Aquas odisse dicuntur. Integrarum nucum probatio est ut in frigidam mittantur; siquidem bonæ & incorruptæ merguntur, vitiosa supernatant.

De satione castanearum Columella & Palladius fusi, Plinius suo more succincte & eleganter præcipit. Quæ radicibus exempta & deposita est Castanea biennio reformidat: propter quod comperitum est, commodius nucibus quam vivadicibus ejusmodi sylvas institui. *Columel.* Idem alius verbis tradunt Plinius & Palladius. Quod non provenire aiunt nisi quinis acervatim satis experientia falsi convincit.

Castanea, teste Ruellio, Juglandi, Fago & Robori insita comprehendit. Ego Juglandi insitam vix comprehensuram crediderim ob fructuum dissimilitudinem, at Quercui facile, ob convenientiam eorundem. Fructum inde meliorem evalurum promittunt; quod verisimile est.

Materies arboris adificiis, atq. aliis domesticis utensilibus admodum apta est: siquidem ex ea non modo trabes, tigna, aseres & pedamenta, sed & cadorum costæ, & eorum cunctus hiant; verum ignariis inepta, testibus Matthiolo & Lacuna. Apud nos sponde, cathedre, mensæ, cistæ, aliæq. suppellectilia è Castanea fiunt.

Castaneæ in cibis veniunt: aliquibus in locis ubi abundant molitarum farinâ ad panificum & ad pulcos utuntur, ut Bononiæ in Italia observavimus. Verum ejusmodi pilcos palato nostro non sapiunt: & rectè Plinius, præstant jejunis quondam imaginem panis, potius quam panem.

Integra vel in aqua coquuntur, vel igne torrentur, idq. duobus modis, vel in sartagine aut perforatâ patina ad ignis flammam, vel sub prunis & cineribus candentibus. Prius tamen quam cineribus aut igni credantur, cultello obiter vulnerari debent, ut è plage hiati status igne citatis evadat; alioqui ubi flagrantès incaluerint, concepto intus spirita magno cum crepitu profiliant, non sine adstantium periculo: consumitur etiam melius statuoosa illa humiditas quæ his incisè putatur, & equaliter torrentur. Præfertur posterior coquendi modus: nam in sartagine sossæ vel patella ferrea, ut in cauponis fieri consuevit, partim comburuntur, aut certè aliquid fuliginosi empyreumatis contrahunt.

In Italia urbani & lautiores Castaneas sub cineribus costas & decorticas cum succo Arantiorum aut Limonium & tantillo Sacchari mensis secundis inferunt, & sic præparatas *Piscines Italianas* vocitant. Pro plebens usus aliquoties in plateis urbium publicè, in sartagine fornacule portatili superimposita frixas vendunt. Verum quomodocumq. paratæ flatulentæ sunt, ventriculo & capiti inimicæ, viscerum infarctibus opportuna, colico dolori obnoxia, & in qui ad calculum proclives sunt minis commode, imò noxiæ.

Castaneæ glandes astringunt humilèsi, præbent effectus cum cæteris glandibus, sistant utiq. vehementer stomachi & ventris fluxiones & sanguineis excrementibus profunt, unde & aqua in qua integra decocta sunt bibita coeliaci, dysenterici & sanguinem excrementibus utilis censetur. Costæ quibus diximus modis & cum melle jejunis datæ tussilentibus prodesse dicuntur: ut & Elocuarum cum earum farina ex melle paratum.

Interior membrana rubens quæ corticem & fructum discernit præcipuè commendatur ad omnes alvi fluores & sanguinis rejectiones seu in aqua ad tertias decocta & pota; seu in vino austero in pondere: quinctiam cum pari pondere ramentorum eboris alba feminarum profluvia cohibet ex aqua albæ Nymphææ hausta. *Deid.*

Emulso Castanearum cum decocto Glycyrrhizæ extracta, addito pauxillo seminum Papaveris, confert is qui ardore urinae laborant. Camerario communicavit Crato.

1. *Castanea humilis* Park. *humilis racemosa* J. B. C. B.

Matura [sic] nucis Avellanæ est magnitudine, echinato calyculo, corio, membranâque tegitur. Sola nunquam suo calyculo includitur. Multæ simul racematum coherent. Gustu est insuavi.

Humilem hanc Castaneæ speciem non longè à Pilatino monte invenit Jo. du Choul, ante eum nemini notam, at neq. post eam, quod novæ à quoquam observatam.

3. *Castanea peregrina*, an *Ger arbor*? J. B. *Fructus peregrinus Castanea similis* C. B.

Figura & facie Castaneam non malè representat, nisi quòd eà parte quà sessilis est Castanea, hæc in gibbum elata sit, & concolor, consimili corio unversam integente, cortice spadiceo, Castaneæ similis integitur, nisi quòd paulò saturatior sit, & plusculis striis inæquali: à cupis summo ad imum mucronem hyli facie linea latiuscula cinerea, striarum itidem eminentis asperata protenditur. Superna parte (sive infernam dicere lubeat) linea corogali cingitur, intra quam pars clausa nigrior, nullisque striis donata. Impressio arguit alteri eandem adhaesisse. Sapor pulpæ, ex albo in fulcum inclinantis (fortè ob vetustatem) ac firmæ, amaricans ac ingratus. Cæterum oleaginosa, ut impressa aciculæ acies prodidit: juxta enim oleaginosum quid excludabat haud locus ac Nuci moschate ab acù punctata.

* Exercit.
151. part. 10.

Ger arbor * Scaligero juxta fluvium Nigir oritur, cujus fructus Castaneæ similis sed amarus. Jo. Leo tradit has arbores mirandæ esse proceratas, satis procul à mari in continente.

4. *Castanea Peruana* Clus. Park. *Peruviana* J. B. *Leporino reni similis* C. B. *Castanea Peruanae fructus* Ger.

Clus.

Sphæricæ pene est figuræ, nisi haberet latera paulò depressiora, præsertim ubi pediculo inhaesit, cortice satis crasso, fragili tamen & velut fungoso, obducta, coloris ex fusco aliquantulum flavescentis. Huic subsunt innumera, tenues quidem, sed firmæ spinæ, putamini quod nucleum includit tonaciter inhaerentes. Ipsam putamen tuscum est, non densum, sed lentum & fractu contumax, inferiore parte leve & splendidum, quo continetur nucleus Amygdalæ [suo putamine liberæ] magnitudine ac colore, forma autem Leporino reni similis, intus albus, sapore dulci ferè ut Amygdala aut Castanea vulgaris.

5. *Castanea purgatrix* J. B. *Castanea purgatrix* C. B. *Americana cathartica* Park.

Fructus est arboris cujusdam vastæ, Castaneæ similis, sed calyce levi, non ut earum echinato. Eo calyce fructus continetur Castaneæ non admodum absimilis, sed sine cortice & ferè quadratus, in duas partes divisus, medium intercurante, & totum deinde ambiente pellicula.

Ex maritimis Nicaraguae invehitur in Novam Hispaniam. Editur hic fructus viridis, aut contusus vino exceptus: si siccus, ejus pulvis ex vino aut gallinæ jusculo sumitur. Datur etiam tostus, ut minus purget. Quocunq; tandem modo sumptus sine molestia purgat, corpore ritè preparato, debito modo exhibitæ. Pellicula illa exterior interno sollicitè detrahenda & abicienda est, aliis numis violenter purgat & gravia symptomata inducit.

* P. 3. T. 32.
p. 25.

6. *Castanea* * *Malabarica Angelina dicta*, *Anjeli* H. M. *Angelina Zanoni Acoftæ*. An *Angelina arbor* C. B.?

Arbor est vastæ magnitudinis, sedecim pedum mensuram crassitie non rarò superans, multisque ramis, rotundis, hirsutis, lubalperis & spadices donata. *Legnum* solidum, prædurum, albicans, intus subrufum, crasso, viridi, ac intus albicante cortice tectum, qui insuper cinerea & austeri saporis crusta squamola obductus est.

Radix crassa, albicans, libeata, cortice crasso, candido, cuticulâ rubicundâ & squamosâ obducto tecta, odoris & saporis sylvestris & ingrati.

Folia brevibus rotundis ac hirsutis pediculis ramorum geniculis ordine decussato inhaerent, oblongo-rotunda, densa, glabra, longitudine spatulam, latitudine palmum æquantia, superne colore ex atrovirescente nitentia, inferne viridi dilutiore, necnon brevibus ac lanuginosis pilis obsita, adeòq; aspera, & manui tangenti adhaerentia. At vero tenella folia è vertice ramorum prodeunt, spadiceo-viridis, villosa involucre inclusa, ut in *Tilia* cernitur: ipsa verò arbor cum tenerior est, in tres plerumq; laciniis incisa sunt folia.

Florum loco supremis ramis julos arbor hæc producat virides, intus albicantes, peretes ac lanuginosos, longitudine spatulam, crassitie digitum æquantis, itaque siccati candellarum instar à pueris in ludis accenduntur.

Fructus *Angelica* digiti rotundi, crassis, spadiceis ac lanuginosis pendent petiolis oblongo-rotundi, cortice crasso, aculeato, seu potius echinato viridis & dein flavescente obducti, fructibus *Datura* haud absimiles, at pugni magnitudinem superantes: intus verò, uti in *Jaca* cernitur, alii minores fructus, oblongo-rotundi, ac sulcati intra corticem & medullam occultantur, fabarum aut castanearum ad instar, saporis acido-dulcis & vinosi, odorisque fragrantis: necnon integro fructu discisso lacteus succus exstillat.

Loco.

Crescit locis petrosis & arenosis ubique in Malabar, imprimis in sylvis *Kalyolan*. Singulis annis mense viz. Decembris fructus profert maturos, ac integrum seculum fructifera manet.

Virt.

Folia exiccata calefactisque artibus imposita eorum dolorem ac rigiditatem demulcent. Eadem resistentium intumescensiam ex commotione vel quavis externa vi ortam, ut & *ispakto* & *andip* *india* discutunt, at in pulverem redacta, & cum unguento albo caplurato forislocis applicita *Bones* venericos curant, vel cum radice curcumæ trita, atq; indies parti affectæ affricta, vi sua astringente vasorum osticia consolidando inveteratum hæmorrhoidum fluxum planè reprimunt. Fructus verò immaturus comestis diarrhoeam facile excitant, quam arboris radices & cortices pari facilitate sedant. At oleum è fructibus coctis expressum, vel intus sumptum, vel foris applicitum appetitum excitat ac alimentorum in ventriculo fermentationem movet: Idem cum affato & trito *Allo*, necnon coagulato lacte fixum & podici admotum hæmorrhoidum dolores potenter sedat.

Ex

Ex ligno ingentes ciste & naves fabricantur, & ex hujusmodi arboribus excavatis naviculas Indi faciunt quas *Mansjous* appellant, quarum nonnullæ longitudine 80, latitudine novem pedes superant. At verò naves ex ligno hujus arboris, quamvis duro, constructæ vermium putredini obnoxie sunt in aquis fluminum minimè salis.

CAP. V.

De Quercu.

Δ^{PR} Græcis generale nomen est, omnes arbores glandiferas complectens, quas una voce comprehendendi posse Latino sermone negat Plinius. Quercus enim inter *Jovis* differentias ab eodem recensetur. Verùm quoniam Quercus nomen à vulgo extenditur ad omnes glandiferarum species significandas, nos non inviti, cum J. Bauhino, (nè quid novi sapere velle videamur) Quercum loco genericæ vocis usurpabimus. Quercus Jovi sacra erat, quòd vite causa in hac primùm arbore mortalibus fuit, qui primùm glande vescerentur.

Et que deciduant patula Jovis arbore glandes.

Ovid.

Hujus enim fructu suos populos primùm aluisse dicitur, ante fruges inventas.

Civica corona, militum apud Romanos virtutis insigne clarissimam, è Quercu fronte fiebat, de qua differentem lege Plinium. Civica dicta est quoniam dabatur ob civem servatum.

Quercus vox vel primitiva est, vel ignotæ originis. Vossius fortè à *quercus*, quod valet *durus*, *asper*, dictam putat. Est enim ligni duri & corticis asperi: quòd non verisimile nobis.

1. 2. *Quercus vulgaris brevibus ac longis pediculis* J. B. *vulgaria* Ger. *latifolia mas*, *que brevi pediculo est* C. B. *item Quercus cum longis pediculis* quidam. **The Common Oak.**

J. B.

Vix ulli genti Europæ (inquit J. Bauhinus) incognitam potamus Quercum vulgarem, recto, crassissimo, vasto, ac valido *candice*, nec nimis firma materie; *crasso*, intus rufo, rimoso, scabroque cortice (in caudice & ramis majoribus, nam in furculis & ramis minoribus levis est & nigricans aut cinereus) brachiis longè latèque luxuriantibus magnam innoxiamque umbram loco inducentibus: *folia* longis, summa parè obtusis, ad latera profundis anfractibus & crebris sinuatis, præsertim in vetustiore arbore, minus in ea quæ cæca novam frondem emittit, glabris, nitidis, obscure virentibus, pediculis brevibus nixis, costâ mediâ trinq; flatâ & emicante, sed magis averfa parte, singulatim nascentibus. In hac arbore nucamenta seu *jula* observantur, in quadrantalibus tenuibus pediculis ex certis intervallis muscosi, ex apiculis sessilibus herbidis, eodem puncto pluribus exortis compositi, sic ut interdum verticillatim ligulam cui adherent coronant. Observantur quoq; & glandium rudimenta, tanquam globuli minimi purpurantes & hirsuti (qui mihi J. Bauhino * *holculus*) privati pediculis insidentia. *Glandes* in calycibus suis seu *cupulis* sessilibus, vel furculo proximè adherent, vel longis tenuibusque pediculis appenduntur. Atque etiam magnitudine variant, unciam tamen communiter longæ sunt, coriacea membrana rectè punctata, [porus leucophæa seu *barica*] nucleo calloso, acerbis & austero, quensadmodum & cupula exteriori asperiuscula, interiori levis, prædicto cortice multò densior, vix tertiam glandis partem capiens. *Aculeus* in summo glandis fastigio eminet, brevior & minus pungens. Sæpe ternæ glandes simul coherant, aut binæ, rarò unica prodit: pediculus eas sustinens inde nascitur ubi ramo folium adheret.

Arbor hæc in Angliæ sylvis & sepibus ubique vulgatissima & nemini non nota; nec in Anglia tantum sed per totam etiam Europam: nec ullum fere solum refugit. Ejus aliquot seu species seu varietates observantur. Dalechampius in Hist. Lugd. duplicis meminit, nimirum *mas*, quam descripsimus, & *femina*, in saxosis & asperis locis ferè nascentis, maris humilioris, cortice in tenellis furculis rubefcente, non ut in illa albescente, folio minore, breviori, angustiore, antrosum magis acuminato, tam densis laciniis sinuoso lateribus, ut eminet crispum videatur; lætius & nitidius virente, glande pusilla & strigosa: quin & feminæ varietatis in aliis quercetis proveniens, folio quàm *mas* breviori, antrosum latiore & magis obtuso, inferè pallido, cortice ramorum nigriore; glandibus minimis, in ramorum & furculorum vertice prodeuntibus, interdum ternis aut quaternis, sæpe ternis aut quaternis, rarò binis, rarissime singularibus, quasi digito retulis, aculeo minimo, parum è calyce prodeuntibus, sed ei firmiter annexis. Verùm non species diversæ, sed varietates poësis accidentales à loco aut femine ortum ducentes nobis videntur hæc differentie; ut & aliæ ab aliis Botanicis propositæ. At Quercum cum longis pediculis J. B. ab ea quæ glandem cum brevibus fert pediculis revera specie differre existimamus. Hæc enim glandem non brevibus tantum pediculis hærentem fert, sed nullis, ipsi calycibus earum ramis immediatè adnascentibus. Harum gemina conspicitur varietas, una cum majoribus glandibus, binis aut ternis; altera cum minoribus, ternis aut quaternis. Istarum Quercum differentiam vix ponere possumus; nisi quis earum quæ brevi aut nullo pediculo sunt folia inspicere velit splendidiore & paulò firmiora.

Quatuor primas Quercus species in Pinace C. B. hoc capite comprehendo. Eæ sunt,

I. *Quercus latifolia mas*, quæ brevi est pediculo.

II. *Quercus latifolia femina*, i. e. *platyphyllos femina* Logd. superioris descripta.

III. *Quercus latifolia perperuò virens*, qualis in Thurino agro ubi Sybaris fluit, Theophr. & Plinius meminerunt; qualis etiam Clusius in montibus Calpi fretoque Herculeo vicinis virere semper ait.

ait. Lugdunensis quoque, Hist. in Appennino & Andum Gallicæ gentis agris reperiri refert. Nec enim has arbores à reliquis latifoliis Quercibus specie distingui existimo.

IV. Quercus cum longo pediculo; quæ est nostra vulgaris Anglica; quæque sola, quod sciam, è Quercus speciebus in Anglia sponte nata reperitur. Nam quas D. Evelynus in Sylva proponit pro varietatibus potius quam pro distinctis Quercus speciebus habeo. Glandium autem respectu innumere sunt Quercuum differentie. Nomina & descriptiones variarum Quercus specierum à Veteribus, Theophrasto & Plinio, proposita, Quercibus hodie notis accommodare difficillimum judicamus, quod vel inde patet, quod doctissimi Botanici, qui id tentantur inter se minime consentiant. Quocirca cum nec nos quicquam certi habemus quod adferamus, de his omnino tacere maluius quam nihil dicere, & Lectorem adhuc incertiore dimittere.

Quercus latifolia amplissimè circa Viennam Clusius meminit, cujus omnes glandes oblongis pediculis dependentes quasi viridi quadam excrescentiâ, multis inæqualibus angulis prædita & scabra incluse erant, quæ resiccata gallarum modò dura & firma erat. *Hæ excrescentiæ proculdubio acedente erant, & insitæ originem suam debebant;* & proinde in enumeratione specierum Quercus nullarum ratio habenda est.

3. Quercus parca, sive Phegus Græcorum & Esculus Plinii C. B. Phegus vel Esculus J. B. Phagus sive Esculus Park.
Lugd.

Fagus Theophrasto dicta, vocis argumento Latinis Esculus, quòd glans ejus esculenta & dulcissima esset: Brevis est arbor, in orbem comosa, non erecta, caudice crassissimo: folio quàm Hemeri angustiore & breviorè, obscurius virente, infertè candicante, glande dulcissima, terete, longa, è brevi crassoque pediculo subrecta, calyce multum ejus complectente, tenacius hærento in ramorum furculis, ad exortum singulorum propemodum foliorum unica, rarò gemina, graciliore quàm in Latifolia & magis acuminata, aculeo suo magis pungente.

Reperitur & in hoc genere arbor, quæ glandem fert superiori omnino figurâ similem, sed crassiorè, altiorem, pleniorè, ob molis lux pondus è calice facile deciduum.

Esculus, si Virgilis credimus,

————— quantum vertice ad auram
Aetherias tantum radice in Tartara tendit.

Bellonius Quercus cujusdam meminit in Trachonide provenientis, quam Esculum vocat, & Græcis antiquis, erroneè, platyphyllon statuit, qui fert glandem, magnitudine ovi columbiti, qui possent vicitate homines tempore famis, ad gustum enim (inquit) Castaneæ accedit. Hæc Scalgeri Quercus peregrina seu Mauritanica videtur quæ grandem fert glandem, oblongam, sapore longè dulciore & delicatiore quàm Castaneæ. Nam Hispani, qui arborem *Escam* vocant, glandes verò *Velatas* has ob suavitatem sub cineribus tostas mensis secundis apponunt.

Arbor hæc diversa videtur ab Esculo Dalechampii, cujus descriptionem dedimus. Veleniæ nomen, & quòd glandium calycos pro cornis præparandis usurpantur, Certe speciem esse arguit.

Aliam præterea Quercus speciem memorat Bellonius à nostris diversam, quam Veteribus ignotam arbitrat, cujus glandes minoribus Fabis hæud sunt majores.

Nos cum C. Bauhino sentimus Robur primum Clusii Phagum seu Esculum esse Dalech.

De hujus potissimum glande intelligendus est Plinius, cum ait, *Glandes ejus esse nunc quoque multarum gentium, etiam pace gaudentium, constat: nec vultu insipia frugum arefactis molitur farina, spissatque in panis usum; quæ & hodie per Hispanias secundis mensis glans inferuntur. Dulcis eadem in cinere cocta.* Esculi tamen glande, vel sub prunis cocta, vel in aqua elixa, cum vescuntur rustici gravitate capitis tentantur & velut inebriantur, non aliter quàm qui Lolium pani commixtum ederint, ut testatur Dalechampius.

Ego equidem suspicor Esculum Dalech. non differre specie à Quercu latifolia vulgaris. Bellonii Esculam pro specie distincta habeo.

4. Robur II. Clusii J. B. Quercus foliis molli lanugine pubescentibus altera speciei C. B.

Clas.

Quercus ferè magnitudine in Austria, Stiria & Pannonia crescens, strigosus est Quercu, ligno duriore, folio minus amplo, altera parte nonnihil incano; exiguam glandem fert.

Considerandum proponit J. Bauhinus, quantum hoc Robur differat à Quercu vulgaris cum glandibus sine longis pediculis minoribus. Ego libenter eundem senserim, nè species temere multiplicentur.

5. Robur III. Clusii J. B. Quercus gallam exigua nuclei magnitudine ferens C. B.

Clas.

Humilior est, & interdum humanam altitudinem non excedens, alioqui priori omnino similis, tum facie, tum fohorum formâ canisæque, ut videatur illius pumilum genus esse. Fert hæc praxgrandem gallam, exigui Mali magnitudine, copiosissimam ramo ferè contiguam, &c.

In montibus Castellæ veteris montibus frequens est, & plerumque numerosis ab eadem radice stolonibus fronsæ. Harum ramis contortis, deinde fissis & exsiccatis tadarum loco rustici allicubi utuntur.

6. *Robur IV. Clafu J. B. Quercus foliis muricatis non finofis, glande fuperiori fimili C. B.*

Claf.

In arborem excrefcit puſillum: ejus item folia minora ſunt, duriora, anguſtioraque, nec adeo profunde incifa & ſinuata, ſed veluti aculeatis denticulis tantum ſerrata, interne quidem candicans, ſed nulla molli lanugine aſperſa.

Frequenter etiam iſta alii gallam ſuperiori ſimilem, & tuberculis acutis ornatam, pallidiora tamen colore.

7. *Robur V. Clafu J. B. Quercus foliis muricatis minor C. B.*

Claf.

Priori ſere ſimilis eſt, ſed ſtolonibus brevioribus, & magis contortis, rugoſioroque cortice: galle item extremis ramulis naſcuntur, aliis minores, læves & ſine tuberculis, colore ex rufo nigricante.

Naſcitur utrumque hoc genus in Luſitanie ſolitudinibus, itinere Ulyſſipponenſi, non procul *Ebroſa, Læcia* & ab incolis *Carvalla* nuncupantur.

8. *Robur VII. Clafu J. B. Quercus pedem vix ſuperans C. B.*

Claf.

Adeo humile eſt hoc genus, ut raro pedem magnitudine ſuperet: ramuli tenues & flexibiles, vulgari *Quercus virgultis* ſimilimi. Folia ad proximè deſcriptas accedunt, ſed aliquantum majora & molliora. Hoc fert glandem *Quernæ* vulgari brevi minorem interdum etiam craſſiorem, calyce planiore, admodum amaram. In reliquis generibus nullas obſervavit glandes Cluſius, præterquam in ſecundo.

Inter *Riofriso & Aldea Galega* ſolo arenolo, non procul Ulyſſipponè invenit Cluſius frequen- *Læcia* tiſſimum.

9. *Robur VI. Clafu J. B. Quercus humilis gallis binis, ternis aut pluribus ſimul junctis C. B.*

Humile eſt, nec humanam altitudinem excedit, fruticis potiùs quam arboris nomine donandum, tenuibus & lentis ramis; foliis ſecundo ſere ſimilibus, ſed minoribus, nec adeo ſinuofis, minorum gallarum, quæ plerumq. binæ, ternæ vel plures ſimul naſcuntur, admodum ferax.

Naſcitur in *Auſtria & Pannonia*, ubi Ruſſici cum ſecundo confundunt.

Mirum Cluſio tot *Roboris* ſpecies obſervatas cum nobis in *Germania & Italia* peregrinantibus nè una quidem occurreret. An ex diverſitate Gallarum certo colligi poſſit ſpecierum diverſitas dubio.

10. *Aquilops five Cerrus majore glande Park. Quercus calyce echinato, glande majore C. B.*
Arborum illeorum, Afris Maurorum, Latinorum Cerrus ejuſdem, Cerrus Aquilops, Afris Theophrasti putata J. B.

Hujus glandium calyces *Venetis* vidimus, ubi *Vallonia* dicuntur, ab *Apollonia Dalmatizæ* urbe hodie *Vallonia* dicta unde adferuntur, nomine accepto. Eorum uſus idem eſt qui corticis *Querni* apud nos, nimirum ad coria denſanda.

Glandis hujus calycem à *Valerando Dourez* *Juſtinopoli* allatum ſic deſcribit *J. Bauhinus*:

Cavitas ejus ſcſcunciam in diametro habuit, paulo minus alta, quem undiq. craſſa, rigidaque creberrima ſpicula obvallant, præruptæ rupis fragmenti æmulum, non minus ternis uncias in diametro habentem, interne hirtum: ſquamæ lævæ ſunt, in cinereo candicantes. An arbor ipſa à quoquam deſcripta ſit nescio: nam quæ viſuntur itinere à *Peſaro* ad *Romam*, quas deſcribit *Lobelius*, eadem eſſe puto cum nobis viſis circa lacum *Vollinienſem*, hæ autem *Cerri* minore & mitiore minutiq. echinato calyce erant.

Nec alia videtur cujus rami ad *J. Bauhinum* miſſi à *Dalechampio*. Folia habuit vulgari *Quercus*, ſed ut longiora, ita in tenuiores altioremq. laciniis diviſa, ſuperne lucida, ſubtus autem cinerea. Cæterum proximè ligno adherent fructus, calycibus hiſpidis & ſenticofis, unciam lætis, glande tamen nondum matura, ſimilibus planè calycibus *Quercus Burgundicæ* echinato calyce.

Folia *Cerri* nobis obſervatæ circa lacum *Vollinienſem* in *Etruria* omnino talia erant qualia hæc deſcribit *J. Bauhinus*, ſed glandium calyces diverſi à calycibus *Cerri Vallonia* dictis.

Uſus calycum eſt ad inticiendos atro colore parvos Gallarum vice: Sed illis tinctura diluſior, *Uſu* fugacior, viliorq. eſt. *J. B.*

11. *Glandia magna calyx Claf. exot. J. B.*

Quem ex *Wengandecæ* *Virginizæ* delatum habuit Cluſius parùm admodum differt à ſupra deſcripto *Vallonia* calyce; non tamen eundem affirmare audent ob loci natalis diſtantiã. *C. Bauhinus* Glandem *Virginicam* vocat.

12. *Haliphless five Cerrus ſemina minore glande Park. Haliphless putata, & Cerrus ſemina Dalechampi J. B. Quercus calyce hiſpido, glande minore C. B.*

Cluſius ſic deſcribit, Eadem altitudine qua vulgari *Quercus*, atq. etiam celliore aſſurgit, caudice erectiore, corticeque craſſiore & magis leæbro; Folia frequentioribus incifuris, ſed minus ætis diviſa habet quam *Quercus* [at à nobis obſervata in *Etruria* *Cerrus* folia habuit profundius ſinuata ſeu potius laciniata, quam vulgari *Quercus*] longioribus tenuioribusq. pediculis inherentiſ; ramulos breviores frequentibusq. nodis obſitos, gemmas minores, & aliquot gracilibus foliolis, cuſ ſtaminibus aut villis, ſepas: Calyces brevi craſſoque pediculo annotinis ramulis adnatos, non in foliorum alis,

alis, omnino hispida & molliter echinata, in quibus glans est querna, paulò brevior & obtusiore mucrone prædita, quæ Autumnio maturitatem consequitur. Adherent interdum inter folia multis squamis constantia capita. [Hæc excreſcentiæ quedam sunt, quales in Salicibus frequenter cernuntur, Rosæ dictæ] Materies ejus candidior, laxiorque & ad opera minus apta à Rusticis censetur.

Locus. Non modò in Viennensi saltu, sed etiam in plerisque Pannoniæ sylvis frequens est.

Quod habet de fragmentis hujus arboris in lapidem commutatis, non naturæ ligni sed ingenio soli in quo sepulta erant, aut vaporum cuidam petrificanti qui in ejus poros se insinuans totum lignum permeavit, tribuendum arbitror. Nam & alia etiam ligna præter Quercinum alicubi lapidescere deprehenduntur.

Quercus Burgundica calycis hispida J. B. C. B.

Quam uterque Bauhinus præcedenti eandem esse suspicatur *J. B.* sic describit,

Glandes non multo vulgaribus majores erant, aut certè pares: Calyx paulò major, inferim echinatus spiculis, non rigidis tamen, satisque longis horret, atque ternas & quaternas proximè junctas, non tantum singularem extremitati ramulorum adherentes. Folia verò parùm nobis à vulgaribus differre apparet, nisi quòd accedere videantur ad colorem foliorum Quercus pediculo brevi vel sine pediculo.

Copiosè nascitur in Apennino, & in Burgundia, quæ nunc Vesuntio Dolam.

Locus.

Hæmorrhoida cujusdam seu Quercus pumila in Nova Anglia nascitur.

Mentionem factam invenio in D. Evelyni Sylva, inq. Actis Philosophicis Londinensibus.

Vires & Usus.

Quæ materia, autore Theophrasto, spissa, dura, adeoque flexum nullum recipit, tam navibus quam domibus commoda; necnon in terra obvata durat.

Hujus foliis præ reliquis omnibus conservatum debemus melleum liquorem roremve ex acre descendente, ex quo apes mella conficiunt. *Batler. Traité de Apibus, cap. 6. n. 40. & Theophr. lib. de melle.* Plinius etiam lib. 16. c. 8. Constat, inquit, rores melleos è cælo cadentes non aliis magis insidere frondibus.

Aliquando idem præstant Acer nuntis & Corylus, sed parè. Idem *Batler. ibid.* Mirum sane melleum rorem harum tantum arborum non aliarum foliis insidere. An quòd harum folia densiora sunt, adeoque rorem facilius reflectunt & condensant, qui in aliarum arborum folia, (quæ rariora & spongiosiora sunt) faciliè penetrat & se insinuat? Adde quòd superficies horumque foliorum glabra & velut polita est, adeoque conducit ad humorem incidentem sistendum & congelandum: quemadmodum videmus speculi superficiem afflantis halitum ilico densare, & in guttulas brevi cogere. An fortè similitudo quedam & quasi cognatio intercedat inter particulas foliorum hujus arboris, eorumque poros & rores mellei, quo hic ins facilius & promptius adherescat.

Mirum etiam nobis videtur quòd apud Cœdum legitur, Constat omnibus, qui usque ad extremam senectutem apum naturam scrutati sunt rustici, apes ipsas mellificaturas tantum è floribus collectum liquorem in favis reponere, rorem verò melleum cum decidit haudquaquam ad favos convehere, quòd ipsi quoque (inquit) verum esse deprehendimus. Hinc quamvis mellito rore delapso ad eum frequentes convolant apes, minime tamen ut eum in alvearia convehant, sed tanquam ad cibum & pastum, quo adeò se replent, ut proflus inertes & ignavæ reddantur, multaque moriantur. Itaque rustici dicere solent, mellitos rores bonum quidem pastum apibus præbere, sed ad mellificandum minime conducere. Hæc Cordus. Nobis tamen planè contrarium videtur, illique qui apum naturam, actiones, totamque economiam diligenter & curiosè observarunt ingeniosis & eruditissimis, quibus plus fidendum quam rusticorum vulgo, qui receptas majorum traditiones sine examine sequi & amplecti, illisque mordicus adherescere solent. Observavimus enim rore melleo delapso integra fere apum examina, paucissimis domi relicta, evolare, miraque industria & maximè festinatione sese melle onerare, & ad alvearia convehere, multoties cundo redeuntibus, donec calor solaris rorem vel dissipaverat vel condensaverat.

Folia Quercum nascentium circa ripam rivuli percelebris ad oppidum Smolnicium in provincia Hungariæ Zepolensisi, non procul à monte Carpatho sita, Autumnii tempore delabuntur in rivum, & sic metamorphosi quadam in æs mutantur, sicut ferrum in hac aqua infusum in cuprum transmutatur: Ex observatione Wolfgangi Wedelii Ephem. German. Ann. 6, & 7. & Itinerar. D. Brown. Communicavit D. J. R.

Quòd ad vires atinet, Quercus omnis (possis & dicere omnibus suis partibus) autore Dioscoride, adstrictoriam vim habet; maxime verò astringit membranacea tunica quæ corticem & caudicem ipsum interspicet, similiter & ea quæ circa glandem est sub putamine. Harum autem decoctum datur coeliacis, dysentericis & sanguinem excrementibus: Eadem trix fluxione laborantibus feminis in pessis subduntur. Sed & glandes eodem effectus habent, urinam quoque cient (miratur Jo. Bauhinus qua ad facultate præstant. Respondeo adstrictoriâ, quæ sanguinem velut coagulando serum ab eo separant, adeoque illud copiosius per renes excernitur. Non alia fere ratione quam alumen aliaque adstringentia pituitam ex ore eliciunt, nam partes solidiores constringendo & comprimendo humorem in eis contentum exprimunt.)

Si comedantur capiti dolorem inducunt, & flatu gignunt. Difficilis sunt concoctionis, tardè descendunt & crudos humores gignunt: propterea eas porcis saginandis relinquamus: hoc enim pecus diffusum & grandissimum faciunt, ut Varro scribat, & testatur experientia.

Glandium & cornis decoctum contra toxica prodest ex lacte vaccino potum. Non probat hoc J. Bauhinus contra toxica assumpta, potissimum in principio: Si tamen vomitus vel alvi fluxus multum

tum vexent, rejecto toxico per vomitum vel alvum, prodesse tunc posse existimat. Crude ac irritate inflammationes illitu leniunt; vulneribus etiam recentibus utiliter imponuntur Galeni experimento.

Aqua è foliis Quercus juvenis destillata prescribitur ad album mulierum profluvium, ad dysenteriam pestilentem, &c.

Quidam glandes aridas adversus calculum exhibent, nescio quo successu, inquit J. Bauhinus.

Bartholinus de Medicina. Danorum domestic. refert Norwegos aliolq. Septentrionales in inopia frumenti conficere panem è glandibus quercinis.

Folia tenera & rubicunda, vino decocta collura ac gargarifata dentium dolorem sodant à fluxionibus ortam, sed sæpe hoc decocto calido os collucendum; quo experimento nos sæpe felicissimè usos fuisse testamur, etiam in inveteratis dentium doloribus. J. B.

Ut verbo dicam, Quercus partes omnes, cortex, folia, cupulae, glandes, ac etiam lignum ipsum, ad fluxum omnem alvi, uteri, leminis, sanguinis sistendum utiles sunt, & ad omnia quibuscunq. adstrictione opus est.

Lithotomi ad vulnus urethrae inflictum sanandum & consolidandum utuntur balneo è cortice Quercus in aqua decocto.

Corticis in lcohem commoliti insignis & frequentissimus usus est coriariis ad coria preparanda: & ad hunc usum aliis omnibus adstringentibus antecellere nobis videtur. Coria enim Anglica, quæ eo densantur, reliquis Europæis soliditatis & durationis respectu palmam præcipiant.

Carbones optimos è Quercu, tanquam materia spississima fieri auctor Theophrastus, solidissimos etiam esse ait & firmiores cæteris.

Ligni usum nemo facile declaraverit. Vix enim aliud habeas in hoc nostro orbe perennius, quòd, ad plures usus necessarios accommodari possit ac soleat, ut ad ædificia, naves, & instrumenta, tam ea quæ in terra, quam aquis usui esse possunt. Fiant ex eo dolia vinaria cæteris omnibus præstantiora & sola ferè bona. Hactenus J. Bauhinus.

In ædificiis immensum durat, modò ab humore nimio defendatur, imò vetustate ita indurefcit, ut chalybis aciem retundat, imò ipsius propemodum ferri soliditatem & renitentiam acquirit. At nec aliud lignum adversus vicissitudines humoris & siccitatis magis firma & pertinax, & ab usdem difficilissimis corruptibilis.

Navigis extruendis præ alia quacunq. materie idonea est, quòd tenax & flexuræ patiens, quòd firma nec tamen nimis ponderosa, quòd aquam difficulter admittat, quòd percussa aut globis tormentariis trajecta non facile findatur aut rimas agat.

Quercus autem Anglica ad naves fabricandas præcipue æstimationis est, aliisq. omnibus præstare censetur.

Quantis autem alia nonnulla ligna, ut v. g. *Buxus*, *Cornus*, *Ebenus*, *Lignum Brasiliense*, aliisque Indica, duriora, solidiora & ponderosiora sint, pleraq. tamen fragiliora, nec ponderibus incumbentibus sustinendis adeò apta & commoda observantur.

Nulla est arbor quæ præter genum tot spurios & excrementitios producat fructus ac Quercus. Hi à Theophrasto enumerantur, Hist. Plant. lib. 3. cap. 8. item à Plinio. Vide Verulamii Nat. Hist. cent. 7. exper. 635. Hi fructus arboris non sunt, sed excrementa quædam & tumores præter naturam insectorum moribus, lincinationibus aut afflatibus venenatis originem suam debentes. Insecta enim hujus arboris gemmas, folia, surculos teneriores pungentes, humorem aliquem venenosum per vulnus insillant, qui tumorem præter naturam excitat. Fortè etiam ova duntaxat venenato & fermentativo humore delibata, nullo vulnere inflicto ibidem deponunt, qui sufficit contagio solo succo nutritio alterando & in motus irregulares compellendo. Hi autem tumores & excrementa quamvis arboris respectu præternaturales sunt; à natura tamen destinantur ut sint velut matrices & nuclei, insectorum eorundem ovis excipiendis, nutriendo, fovendis, fructibus excludendis, editisq. alendis intervenientes.

Horum autem excrementorum notissima & utilissima sunt Gallæ, Græcis *μυρτὰ* dictæ. Harum multæ species, magnitudine, colore, levitate aut asperitate superficiali, pondere, figurâ differentes de quibus prolixius agere magis curiosum esset quam utile. Placet tamen Gallæ Officinarum descriptionem è J. Bauhini historia peritam subjungere.

Gallæ Officinarum vulgarissimæ rotundæ sunt, leves, foraminis pertusa, leves, paucis interdum tuberculis asperatæ, interdum multis & angulosæ, magnitudine varix, unciam amplè, quamvis magna ex parte infra subsistant; sunt etiam majores, rotundæ, interdum turbinatæ ac pyriformes, colore rufis, levi mallei ictu fragiles, intus ungue friabiles, cavernosæ, fungosæ, gustu adstringentes & acerbæ.

C. Bauhinus has species recenset. 1. Gallam maximam orbiculatam, quæ duplex *Orientalis* quæ fortasse *Galla maxima exotica* J. B. ovi gallinæ magnitudine, & *Provincialis* aut *Illyrica*. 2. Gallam oblongam. 3. Gallam minorem. 4. Gallam galericulatam. 5. Gallam angulosam. 6. Gallam umbilicatam. 7. Gallam Brasiliensem quinquangulam. Alias adhuc varietates habet J. Bauhinus, quas apud ipsum vide. Variant enim hoc genus excrementa pro natura arborum è quibus oriuntur, insectorum quorum matrices sunt, & fortè etiam locorum in quibus inveniuntur.

Quòd Theophrastus & Plinius scribunt Gallam confertum & subito orti, unæque die augeri nobis non videtur verisimile.

Quæ glandem ferunt (inquit Plinius) omnes & gallam. Alii Robori duntaxat proprium esse volunt, gallam proferre; Nos potius Plinio assentimur Quercum nimirum omnem gallam producere, ac non omnibus in locis: in Anglia enim nullus unquam auditus est gallarum proventus: quòd insecta illa quibus ortum debent in Anglia non inveniuntur, ut nobis quidem videtur. Gallas enim Quercus lacifolæ nostratæ simili, & specie (ut putamus) eidem in exteris regionibus adnascentes vidimus.

Gallæ tinctoribus magni usûs sunt ad pannos atro colore inficiendos: Ex iis etiam cum calchantho, gummi, & vino atramentum scriptorium optimum paratur hoc modo,

℞ Gallarum ℥iij.
Calcanthi ℥ij.
Gummi Arabici ℥j.

Gallas crassiusculæ contritas in vini Gallici rubri, (quod Claretum nostrates vocant) Sextariis duobus [a quart] infundas per novem dies, vas prope ignem collocando, & liquorem quotidie tudicula agitando aut commovendo. Deinde Calcanthum & Gummi immittas; & cum unum amplius diem steterit, atramentum usui idoneum erit. Literæ hoc atramento exaratz in charta diurnitate temporis colorem non mutabunt.

Gallæ vehementer adstringunt: Tritæ, autore Dioscoride, gingivarum & Columellæ fluxiones insuper, oca ulcuscula cohibent. Quod verò in earum medio est, dentium cavernis inditum dolores sedat. Coeliacis & dysentericis in aqua aut vino tritzæ, seu illitzæ, seu bibitzæ, conveniunt, necnon obsonis additæ; Item crematæ & in vino aut aceto extinctæ, quomodo & menses sistunt & vulvæ proidentiam. In summa, ubi quid adstringere, sistere aut ligare opus est, usurpandæ sunt. Tritarum pulvis intus assumptus in vino austero aliòve conveniente vehiculo certo experimento diarrhoeam sistit.

Ad bubonocelen, epiplocelen & enterocelen quidam pharmacopœus utebatur liquore stillato ex Gallis Orientalibus, & multos licet ætate provecctos sanabat. Liqueor non est oleum, sed aqua cum qua Sal quoddam volatile ascendit. *D. Hulse è Chesneau.*

Præter Gallas alia etiam multa excrementa seu tumores præter naturam in Quercubus observantur, ut v. g.

1. Pilule foliorum Quercus *J. B.* aquosæ *C. B.* quæ averzæ seu terram spectanti foliorum parti plerumq; adnascuntur, leves, fungosæ, pallidæ aut parte Soli opposita rubentes, sapore subacido & adstringente molles, exquisitè plurimum rotundæ, pîso non multò majores, & exiguam gallam raro sequentes, vorustatèq; corrugantur. Vermiculum iqtus alunt, qui in muscam figuratur, de quæ consilendus *D. Malpighini.*

* *Anatom.*
Plant. 7. 2.

Hæ in foliis Quercuum frequentissimæ inveniuntur in Anglia.

Ex adstrictions argumento iisdem viribus quibus Gallæ præditas esse non malè quis dixerit. *J. B.*

2. Excrementum Quercuum fungosum *J. B.* *Oak Apples.* *J. Bauhinus* sic describit,

Quercuum vulgariæ frondibus verno tempore etiam sine pediculo adnascuntur excrementa fungosa, rara, laxa, succulenta, acida, insigniter adstringentia. Magnitudo nucis Juglandis aut circiter, superficie inæquali, tuberosa, pulcherrimo rubore plurimum ornata, reliqua parte albida, aut Pomorum instar luteola. In quibus vermiculi hospitantur, qui in iis multas cellulas callosas sibi pro domiciliis effingunt.

Inveniuntur Maio in Quercubus glandes cum longis pediculis ferentibus. In Anglia frequentissima sunt & nemini è vulgo non nota, nec minus copiosa in arboribus nonnullis quam fructus ipsi: Botanici tamen nostratibus, ut Parkinsono, ignota fuisse videntur, adeò confusè de illis scribunt, & cum pilulis foliorum confundunt; quod & *C. Bauhinus* etiam facit. An Pilulæ in alis ramorum natæ Plinio?

3. Uva Quercina, quam *J. Bauhinus* sic describit,

Radicum Quercis fibris sub terra adnascitur, & circumnascitur, Juglandis magnitudine, ex pluribus velut acinis racematim coherentibus (unde & Uvæ nomen) compacta, substantiâ durâ, intus rubentis seu ferruginei coloris, medullis nonnihil albo, sapore insigniter acerbis & adstringente.

Hujus pulvere nullum præsentius remediûm in dysenteria, & in omni alvi fluxu.

Præter has à nobis observatas, & à quoquam facillè observabiles Quercuum excrecentias aliz adhuc enumerantur à *J. Bauhino* & *Calparo* fratre, v. g. Coccus Quercuum *Diosc.* 2. Nucule facie album Quercus excrementum, *J. Bauhino* observatum & descriptum. 3. Excrementum lanatum Quercuum *J. B.* Pilule lanatæ *C. B.* 4. Quercuum capitula squamosa *J. B.* Pilule è foliis convolutis *C. B.* 5. Quercuum squamæ candidæ, caducæ *ejusdem.* 6. Excrementum Quercus tuberosum *ejusdem.* 7. Foliorum Quercus gemmæ foraminulentæ *J. B. C. B.* 8. Nodi seu Verrucæ Quercuum *J. B. C. B.* 9. Quercus albumen *eorundem.* Excrementum tauri caput referens *C. B.* Joannes frater Gallis annumerat. His adde è *C. B.* pinacæ, 1. Excrementum moro simile, sed durum admodum, & fractu difficile, è *Theoph. & Plin.* 2. Excrem. pudendi virilis effigie è *Theoph.* 3. Pilule capillatæ, ex *isdem.* 4. Pumex quercina, ex *isdem.* Hoc etiam in loco agunt de musco Quercuum & aliarum arborum, quem Quercus excrementum villosum appellat *C. B.* de quo nos libro secundo inter alios muscos egimus. Hic etiam de Agarico Quercuum aliisque fungis tractant; de quibus nos inter reliquos congenere: Hic denique de visco Quercus & aliarum arborum, de quo nos inter Bacciferas.

C A P. VI.

De Ilice.

Ilex Ifidoro visum ab illiciendo deducere, quod mortales eam nondum repertis frugibus in vitam elegerint. Sed hoc ~~possibile est~~. Magis verisimile sit esse ab Hebræo אֵלֶךְ quæ à robore nomen habet, nempe ab אֵל robustus. *Voss.*

1. *Ilex arborea* J. B. *major glandifera* Get. *major aculeata & non aculeata* Park. IV. *seu folia rotundiora, mollis modicq; sinuata* C. B. *necnon I. seu folia oblongo serrata* C. B. *The Holm Oak.*

Clas.

Arbor est Mali aut Pyri magnitudine, multo frequentioribus brevioribusque ramis prædita quam Suber, quos lacè spargit. *Folia* perpetua, supernè viridia, infernè candicantia, gustu adstringente, foliis Suberis minora, & magis orbiculata, in adultis arboribus plerunq; sine aculeis, præter novella & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa & aculeata sunt: certè in tenellis arboribus, antequam glandem ferre inciperent omnia folia aculeata observabam. Multos in extremis ramulis fert oblongos *jules*, qui in flavos & muscosos flosculos, polline & tenui pulvere perfusos explicantur. *Glandes* è floribus non oriuntur (nam sunt inutilis) verùm in aliis quibusdam separatis pediculis: ex autem Quernis glandibus sunt similes; nunc majores longiorèq; modò minores & breviores, quæ nonnunquam ante maturitatem nigrescunt, & gummi quoddam reddunt, gustu calidam, saporis tamen non ingrati. Maturarum cortex sive putamen nigricat; nucleus candidus, firmus & dulcis est, præsertim majorum: utraq; tamen à nonnullis maximè expetuntur, illisque non minis avidè vescuntur quam nos Castaneis & Avellanis. Hanc ob causam in foro Salmanticensi, aliisq; Hispaniæ locis venales mensibus Octobri & Novembri proponuntur; ut non immerito dixerit Plinius, per Hispanias glandem mensis secundis inferri.

J. Bauhinus brachia ramulòsque Ilici incana lanugine obduetos esse observavit: inque foliis & ramis excrementum per vernum tempus nigrum & rotundum adnotavit. Theophrastus præter glandem granum quoddam puniceum ferre scripsit.

Differentiæ Ilicum mihi accidentariæ potius esse videntur, quam (ut cum Philosophis loquar) specificæ. Nam in arbutulis junioribus folia sinuata, aculeata, lata & Agrifolii æmula observavi, in vetustioribus oblonga, aliàs aculeata per margines, aliàs aequalia, neque serrata neque sinuata, & Oleagineis similia, prout ea rectè describit Matthiolus, quicquid aliè contradicant.

In Hetruria aliisq; Italiæ provinciis, præsertim ad mare inferum, inq; Gallia Narbonensi & Hispania, in sylvis, collibus, & campestribus maritimis passim & copiosè provenit. In Anglia vidimus arbores annosas & grandes quatuor aut quinque in Horto D. *Francisci Willughby*, Wollertoni propè Nottinghamiam, quæ tamen glandes suas ad maturitatem non perducunt: quoniam hoc genus arbores, etiam locis natalibus, fructum suum tardius perficiunt.

Phellodryn Theophrasti (quam & alio nomine Ariam eidem dictam probat J. Bauhinus) Plinius videtur eandem existimasse cum Subere, quod & Phellos dicitur, siquidem ea omnia Suberi tribuat quæ Theophrastus Phellodryi.

Phellodrys five *Cerro-sugara* Matthioli, cum nec ab eodem descripta sit, neque Clusio, neq; J. Bauhino, neque nobis in Italia peregrinantibus usquam inspecta, an ab Ilice specie distincta sit merito dubitamus. Si liceat suspicari ex icone (inquit J. Bauhinus) ea accedit ad Smilacem Dalechampii.

Phellodryos quinque species proponit & describit Historia Lugdunensis: verùm cum in collibus Rhodano vicinis, aut non procul ab eo distans, eas provenire dicat: nos autem ibi loci Ilicis duntaxat varietates quasdam, non species distinctas, observavimus, Phellodryas illas non arbores vel à se invicem, vel ab Ilicibus specie diversis esse suspicamur; sed Ilices majores foliis ludentes. Fortè tamen Phellodrys nigra J. B. species distincta fuerit, quam sic describit,

Phellodrys nigra id nominis à ramis nigricante cortice vestitis & glabris adepta est. *Folia* ab *Phellodry*. lignis differunt, quod rotundiora multò & laeviora, à Smilacis foliis quod longè breviora pro latitudine, minùsque candida infernis; à Suberis nobis traditi, quod duriora, spinis mordacioribus magis horrida. Calyx glandis, tradente Dalechampsio lavis est. Fortè hæc est Ilex folio Agrifolii D. *Magnol*, quæ folia habet spinosa Agrifolii, obscurè virentia; quam tamen ipsam à vulgari Ilice arborea specie diversam esse se nolle statuere ait, quodq; culturâ innotuerit.

At neq; Smilacem Dalechampii apud historiam Lugd. ab Ilice arborea differre putamus: cum primum genus in agro Monspehensi frequentem provenire asserit, ubi nulla præter Ilicem ejus generis arbor, neq; à nobis neq; à D. *Magnol* observata: alterum in collibus Rhodanum respicientibus, totòque eo tractu qui à Vienna Allobrogum Arelaten usque ducit, (ubi nihil aliud præter Ilicem nobis occurrit) observavit.

Aria & Phylica Bellonii quomodo ab Ilice differant, cum eas non describat, nescimus, quæ de his *Aria*. habet collegit in unum Jo. Bauhinus lib. 7. cap. 1. Hist. Plant.

Ilicis tum folia, tum glandes cum Quernis viribus conveniunt. Hæ autem subus saginandi utilis res habentur. Usus. Usum in cibus in descriptione attingimus.

E ligno sunt carbones ad metalla fundenda utilissimi. Matthiolus Hetruscis in pretio esse tradit, non modò quod ignem diu foveant, sed etiam quod (ut aiunt) caput minime tentent. Arborum trunci ad molarum fabricas & alia opera servantur ob materię firmitudinem & durabilitatem, testò Clusio: Plinius rotarum axibus Ilicem duritiâ suâ utilem esse ait, ut & malleis majoribus.

2. *Ilex coccigera* J. B. Ger. *aquifolia sive coccigera* Park. *aculeata cocciglandifera* C. B. The
Scarlet Oak

F. R.

Magnitudine multum cedit aliis Ilicibus, ut quæ non temere stolones duobus cubitis altiores proferat, còque non admodum crassos: *Folia* Aquifolæ proxima, minora, muricata, utrinq; glabra, verum non ita hilari virore nitida. *Florès* vel potius Julos copiosè fert, multosq; glandem verò maximam, quod in pumila arbuscula mireri, etiam ligna altera majorem, calyce asperiore. At præter hæc omnia triplicia excrementa in eis observantur.

1. Unum Maio & Aprilis apparet, quod nihil aliud est quàm grana in foliis rubra, parva, rotunda, parum oblonga, ex ipsa foliorum substantia nata, Pisi parvis similia, substantiâ intus alba, non ita abstinenti substantiâ fructuum *Oxyacanthæ Matth.* gustu nonnihil acido, grato, in quibus tandem vermiculus nascitur.

2. Alterum huic cum Ilicis majore commune, Maio mense apparens, ramis adherescit, sed satis breviter, copiosum, rotundum, nigrum, levi nitidique superficie, satis durum, intus hiquore albedo plenum, cui vermiculi innatant, tandemque inarescit, circa quod fervent sæpe formicarum operæ.

3. Tertium deniq; eodem cum jam dicto tempore conspicitur in foliis, reliquis notius & celebratius, Coccum potè insectorium: grana sunt rubra, saltem pulvisculo albo quo respurguntur absterfo, liquore sanguineo plena cum concoloribus vermiculis.

Clusius pusillam & valde amaram glandem Hispanicæ suæ Ilicis tribuit; cum ex J. Bauhini observatione *Ilex pumila Narbonensis* glandem etiam quàm arborea majorem proferat: quod & nos verum esse comperimus.

Linna.

Arbuscula hæc in collibus saxosis circa Montspelium, Nemausum, Avenionem, & alibi in Gallia Narbonensi oritur, ubi præcipuus cocci proventus: necnon in Provincia, & Lobelio teste, etiam in Italia, præsertim in Hetrusco, Romano & Senensi finitimo agro, locis montosis, glareosis, sterilibus, inter varias Ilices, Smilaces asperas, Terebinthos, Lentiscos, &c. Attamen, observante Clusio, non ubique coccum gerit. Nam in solùm regionibus quæ Mediterraneo mari vicinæ sunt, & magno Solis ardore torrentur orti animadvertit. Sed neq; istic perpetuò fert: cum enim frutex ad eò adolevit ut glandem alere incipiat, coccum non gignit: adeoque solent incolæ quadringentes aut adjectiores frutices urere, ut proximo anno novella resurgant, qui deinde singulis annis aliquot subsequentes coccum ramulis inherentem instar exiguorum Pilorum coloris cinerei gignit.

* Lib. de leu-
dibus Provin-
cia.

Quomodo gignatur coccus * Quinquernus declarat, Vere (inquit) medio torati imbribus frutices Coccum hoc modo ordiuntur. Ubi imus scirpus se in duo brachia partitur, in horum medio primùm omnium increfcit rotundam quiddam magnitudine & colore Pisi; hoc Matrem vocant, quod ex eo cæteræ grana producantur. Matres ineunte ætate æstiveque minutissimorum vermiculorum cavernam profundunt, fuscantq; in summitate. In animalia prorept nova soboles, colore candida, pro se quæsi, in sublime. At ubi canis, vermiculi geminantis furculi axillis occurrerint, desident & incrementis aucti nihil magnitudinis sunt. Inde liberis adolefcenibus albus color in canericeum transit, jam, non animal sed pisum rursus apparet. Tumq; ea grana maturitatem adepta colliguntur, jam coloratis vermiculis freta.

Alii grana non in divaricatione dumtaxat ramulorum nasci perhibent sed etiam in foliis ipsa. Grana hæc à Philosophis & Botanicis spurii quidam seu excrementiti fructus Ilicis pumilæ, & quidem solius proprii habita sunt. Verùm eruditissimus & ingeniosissimus Vir D. Martinus Lister, amicus noster sanimus, ejusmodi grana etiam in Anglia Cerasorum aliarumq; arborum furculis tenellis adnascencia observavit, eisque non excrefcencia esse judicavit, sed insecti cusculam opus, foribus suis excipendis & fovendis domicilium seu nidum efformantis, ab eodemque vulgulis affixa: quod & nobis etiam (quibus Eboraci grana arboribus adnascencia ostendit) videtur, cum insectis adultis & egressis à furculis facile abscidant & dilabantur. Ad eò autem similia sunt hæc grana cocci baphicæ, ut agrè queant discerni, eisdem etiam in locis, eodemque modo furculis adnascuntur, unde ab eodem insecti genere efficta esse verisimillimum est, quantum succus tingendo minus idoneus sit ob diversitatem alimenti. Quæ è Quinquernano arminimus huic nostre opinioni de ortu horum granorum, quod scilicet insecti opus sunt, non arboris excrefcencie, favent. Putamus tamen insectum istud ibi loca ubi granum effingit & furculo agglutinat, ejusdem corticem pertundere, & succum inde exugere quo calculus repleretur, quiq; vermiculis in cibum sufficit. Verum hæc ex conjectura.

Mathiæolus se coccum in Bohemia in Quercubus copiosè nascentem observasse scribit. Quod quantumvis nonnulli carpant & visent, verum tamen esse potuisse quæ à D. Lister observata protulimus declinant: imò verum esse non dubitamus.

Omnia in quæ Quinquernanus aliquæ habent de modo colligendi & præparandi coccum ad usum tinctorum, ea producimus quæ D. Verbeind Montspelensis Botanici & Pharmacopœus insignis ex propria observatione nobis communicavit.

Uta.

Coccum baphicæ, inquit, duobus usibus inservit, nimirum medicinæ, & lanis tingendis. Pro medicina usû oportet ut in mortario marmoreo mundatur, & deinde per cribrum trajiciatur, ut pulpa inde separetur, æquali Sacchari quantitati permiscenda. Mixturem hanc Conservam appellant, è qua addito Saccharo, Serico crudo, pomorum succo & aquâ rosacæ fit syrupus de *Kermes*, qui inservit pro basi confectioni illi tantopere celebratæ de *Alkermes* Melæ dictæ.

Pro tinctorum usû granum maturitatem adeptum colligitur, deinde in area complanata, linteis substratis, soli exponitur. Initio, quando humore abundat, bis terve in die versant, ne incallescât nimium. Cum pulvis rubicandus in superficie apparet tum cribrî ope separent, & grana deinceps linteis insistant, usque dum similis pulvis iterum percipiatur, quem secunda vice per cribrum transmittunt, atque hanc operationem toties repetunt donec grana nihil amplius pulveris reddant.

Notandum

Notandum autem quod primus pulvis è foramine illo exit quo pertunditur granum ab ea parte qua plantæ adhaerit: Postremus autem qui sub finem undique in grani superficie apparet, constat è vermiculis intra folliculum animatis eumque penetrantibus, quoniam foramen dictum plerumque obturatum est.

Quamprimum autem granula illa pulveris rubentia se incipiunt movere, aceto acerrimo irroranda sunt, & manibus contricanda, deinde in pilulas formanda, quæ Soli expositæ siccantur.

Si quis pulverem hunc rubicundum restare sinat, nec aceto aliòve acido liquore perfundat, & ut ita dicam, extinguat, è quovis ejus granulò efformabitur musca quædam minima, quæ per unum vel alterum diem huc illuc saltantes vgtantelive tandem colore mutato mortæ decident, amarore illo quem antea habuerunt omnino privata.

Granum evacuatum seu pulvere penitus exhaustum vino lavant, dein Soli exponunt: Siccantur in sacco confricant, ut lucidum reddatur. Quo factò saccis infundunt, jam venalem pulvere inde egresso uniuscujusque Sacci in medium immittò, ut innorescat scilicet pulveris ad grana proportio. Eò autem tingitur nobilis ille color quem *Escarlatinum* vocant. Coccus baphica vnhabet adstringentem, cujus ratione vulneribus nervisque stucians trita ex aceto convenienter imponitur *Disse. Plin.*

Eximie conferre hoc granum mulieribus abortientibus cum pari thuris pondere in potu sumptam Fuchius & Matth. testantur. Nostro tempore mulerculas Montpelienles & Nemaufentès in difficili partu & collapsis viribus ejus pulveris scobem ex vino, aut ipsam etiam confectionem *Alhermes* non sine fructu sumpsisse scimus. Medicis Montpelienlibus in quovis casu præcipiti, & morbis acutissimis, Apoplexia, Paralyfi & similibus, nihil præsentius esse scimus. *J. B.* Motus eam ad cordis palpitacionem, syncopen, mentis alienacionem seu desipientiam, & motorem sine causa manifesta celebrat. Quomodo autem Coccus baphica cor corroboret & exhilaret, cum præter adstringentem & amaritudinem nulla qualitas manifesta in ea percipiatur nos fugit. Olorem quem fenserunt fragrantissimum in vermiculis & granis ipsis inter præparandum Lacuna & Quinquernus, mirum cur alii aut non deprehenderint, aut non meminerint.

CAP. VII.

De Subere.

Suber Vossius à *Suo* dictum putat, quod calcamentis insueretur, feminæ enim non tantum hyberno tempore valetudinis causâ eo utebantur sed etiam æstro, ut viderentur grandiores.

Suber latifolium J. B. Ger. Park. *latifolium perpetuo virens* C. B. *The Cork-Tree.*

Suber quod in Hispaniis nascitur, perpetuo viret, ut Ilex, cui adeò simile est, ut primo aspectu plerumque fallat, nisi cortex crassus & dirumpi solitus errorem detegeret. Majus est Ilice plerumque & *candice* ubi adolevit longè crassiore, cortice item denso, carnoso, scabro & rimoso, qui nisi suo tempore detrahatur dehiscit, aliòque subnascente expellitur: eo detractò qui subest novellus ita rubet, ut procul aspicientibus arbores rubrici aut minio pictæ videantur. Suberis rami lignis firmiores sunt; *folia* majora, longiora, molliora, & supernè magis virentia, interdum nonnihil dentata, aliquando minimè, ut in Ilice. *Glans* magna, ubi maturuit nigricans, ligna longiora & obrusiore cuspidè, calyce etiam majore, magis hispido, & per oras molliter echinato. Glans admodum adstringentis & exsiccantis gustus, ligna multò ingravior: magna ex parte conjunctim nascitur ut Pontica nux, sed crasso brevique petiolo, & firmiore quam ligna. Ramulis nonnunquam adnascuntur dura & lignosa quædam cinerei coloris tubercula, adeò firmiter inhaerentia, ut nisi fractò ramo eximi non possit.

Clusius Suber in extrema Aquitania Pyrenæis proxima nascens folia non retinere sed hyeme abjicere observavit; ut mense Aprilis foliis prorsus viduate erant quatuor Suberis arbores circa *Bayonam*. Quare (inquit) Theophrastus non immeritò tribuit Suberi deciduum folium.

Matthioli Suber alterum oblongis angustisque foliis, quod Pisano agro nasci tradit, sibi nunquam visum faretur idem Clusius. At quis alius præter Matthiolum fide dignus illud conspexit?

Plerisque Castellæ novæ Batiacæque locis, & totâ Lusitaniâ nasci Clusius tradit. Circa *Fundes* & *Viam Appiam* copiosè nascentem simul cum Siliquâ Arbore seu Ceratâ observavit *D. Tancradus Robinson*, qui affirmat folia Suberum raro esse decidua. Uberrimè etiam in Oibienfi orâ provenire auctor est *Quinqueranus* in libello de laudibus *Provinciae*. Quæ de triplici cortice habet *Quinquer*, nobis non probantur. Detrahendis corticibus hæc est ratio. Quâ stipes telluri committitur circumscinditur ad lignosam usq; materiam, pariterq; in summis humeris antequam in brachia dividat scilicet, mox à summo ad imum finditur, detrahitor triplex cortex: Non explanatur aqua sed igni, nec demuntur nisi tertio mox anno. Quod si paucis diebus à tonsura largi umbres supervenerint, arbor interit; quod raro accidit, nimirum regione calida & siccâ, & temporum observatione raro fallente. *Clus.* à *Quinquer*. Alii ut *Lobelius*, & quidam rectius. Cortex geminus stipitem amicit; alter interior, qui perpetuo hæret; alter crassior ad duos pollices, rugosus, perquam levis, qui deglobitur & quolibet gentium defertur.

Cortex tritus ex aqua calida porus sanguinis fluxum sistit; ejusdem cinis ad idem valere dicitur. *Vires & Usus.* Usus ejus est ad anchorata navium, piscantium tragulas, calorum aliorumq; valorum angusti oris, ampullarum vitrearum obturamenta, feminarum calceatum hybernum, alvearia, & in *Estrema* dura Hispaniæ ad rugiorum tecta, referente Clusio. *Plin. l. 16. c. 3.*

SECTIO II.

De Arboribus flore à fructu disjuncto Coniferis.

Conos voco fructus squamosos, polyspermos in cono seu metæ formam plerumque turbinatos: hoc etiam nomine comprehendo fructus pluribus partibus crustaces aut lignosis per maturitatem dehiscentibus compositos, quamvis neq. squamati sint neq. conoides.

Coniferæ arbores sunt vel Resiniferæ, vel succo aqueo scatentes. Resiniferæ sunt vel fructu squamoso, vel fr. è clavatis tuberculis per harmoniam coaptatis composito, foliis brevibus, acutis in squamas degenerantibus, ut *Copressus*. Resiniferæ fructu squamoso sunt vel foliis perpetuis, vel foliis deciduis. Resiniferæ foliis perpetuis, sunt vel eisdem sparsim & singulatim undique è furculis exeuntibus; vel agminatim pluribus simul velut in penicillos quosdam coaggestis, cujusmodi est *Cedrus Libani conifera*.

Quæ foliis sunt sparsim è furculis undique exeuntibus, sunt iisdem vel brevioribus & singulatim nascentibus, cujus generis est *Abies*, vel longioribus, binis ex eadem theca seu tubulo egressis, ut *Finus*.

Resinifera foliis deciduis est *Larix*.

Coniferæ succo aqueo præditæ sunt vel foliis latis, majoribus Coryli Alnus, vel fol. minoribus Populi: *Betula*.

CAP. I.

De Abiete.

Abies ab *aber* Grammaticis dicta, putatur, ut à *facio facies*, à *specie species*, quod in altitudinem tendat: *ἄβητις* pariter Grecis dicitur *μαγὴ τῆ ἄβητις*. *ἄβητις* à *ἄβητις* à *ἄβητις*, teste Etymologo. Notandum autem, vocem *ἄβητις* æquivocam esse, & pro involucri fructus palmæ arboris interdum accipi, aut etiam pro fructu ipso.

Note Abietis characteristica in genere, prout Piceam Latinis dictam complectitur, sunt folia singularia ramulos undique cingentia, seu non ex lateribus tantum sed etiam ex superna & inferna eorundem parte nascentia, brevia & angusta, proceritas eximia.

Jo. Bodeus à Stapel multis probat falsi Botanicos qui *Sapinum* arboris speciem esse negant, statuntque *Sapinum*, Plini autoritate decore, inferiorem ac enodam partem caudicis Abietis, ostenditque Plinium distinguere *Sapinum* & *Sappinum*. *Sappinum* Piceæ Sativæ species est, *Sapinum* autem species Pini quæ cæsa regerminat. Pars autem inferior Abietis enodis *Sappinea* dicitur non *Sapinum*. Sic autem vocabatur pars hæc Abietis, quod enodis esset ut *Sapinus*. Recte ergo (inquit) Bellonius *Sappinum* arborem dixit. Vide Comment. ipsius in Theophr. hist. lib. 3. cap. 10.

A. 1. *Abies Park*. *Abies famina* sive *ἄβητις θαύρα* J.B. *Abies maritima sursum spectantibus* C.B. *The New-leaved Fir-tree*. *Abies Taxi folia*.

Descriptionem hujus accuratam * Joannes Conradus Axtius nobis suppeditat.

Est (inquit) arbor proceræ & excellæ, Pinum altitudine superans. *Caudex* ejus rectus est, inferioris enodis, æqualem ferè crassitiam habens usque ad ramos. Hæc pars vocatur à * Plinio, & Viruvio l. 2. c. 21. *Sapinum*; superior autem pars nodosa *Fusterna*. Errant itaque * Bellonius & alii, qui ex *Sapino* peculiariter genus faciunt. *Cortex* ejus est albicans & fragilis. Rami in circuitu circa truncum crescunt, interdum quatuor, interdum quinque, interdum sex aut plures, & hoc continuant usque ad cacumen, singula enim annis novam congeriem ita arbor protrudit, ut facile inde colligere licet, quot annorum sit [Hæc non peculiariter est hæc species, sed plerisque arboribus coniferis commune] Quædam ramorum sunt in terram reflexi, quidam non, sed peni fieri puto à pondere musci albidioris, qui sæpius copiosissime in ramis Abietum provenit. Utrique furculos ut plurimum habent instar crucis, interdum tamen unus tantum furculus ab uno latere erumpit, nullus ex adverso.

Scribunt autores quod folia utrinque ex lateribus ramorum emergant, quod tamen falsi *avilla* convincit: proveniunt enim non solum in lateribus, sed etiam in superiore & inferiore ramulorum parte, sed illa ita ad latera se deflectunt, ut intuentibus tantum è lateribus emersa videantur. Sunt autem folia, non ut alii volunt dilata, sed satiræ viriditatis in superiore parte, in averfa autem paululum candicantia [lineæ viridi distincta J.B.] quæ ex superiore parte erumpunt breviora sunt quam quæ ex lateribus & inferiore parte. Plinius scribit folia esse *infecta* *pellinum modo Piceæ & Abietis*. Quod vocabulo illo *infecta* vult equidem nescio. Sunt tamen folia ita ferè disposita, ut dentes in pedunculo, foliis Taxi similia, minime pungentia, in acumine enim in minutissimam furculam dividuntur, partes tamen illæ non ita acutæ sunt ut pungant, in medio lineæ secundum longitudinem notata. Lignum habet album, molle, & leve.

Radices non alitè descendunt, ita ut facile à ventis validioribus radice tenuis è terra eruantur.

Coni quadruplo minores sunt quam *Piceæ*, squamis constant in superiore parte latis, sub quibus latet *semen* subalbum, superius alatum, plenum acris & pinguis humore.

* *Traité de*
Arboribus con-
iferis, &c.
* *Lib. 16.*
cap. 33.
* *Belonius*
descendit Sta-
pelius, v. *su-*
pra.

Matthiolus & Bellonius rectè negant Abietem ferre florem: Thophrastum autem, & Plinium, & alios qui Abieti tribuunt flores sefolderunt primum prorumpentes piceæ coni, qui ante Solstitium proveniunt, & aspectu sunt jucundissimi. Alii enim Faxe magnitudine, alii etiam minores aut majores apparent, tantâ rubedine præditi ut nihil supra: singuli squamis suis sunt vestiti, & progressu temporis paulatim fiunt virides. Ego potius illis accedo qui flores Abieti tribuunt: nam ex sententia nostra florum stamina, seu apices potius, pulvisculum seu semen minutissimum suppeditant semini masculo in Animalibus analogum. Deinde J. Bauhinus alique autores fide dignissimi disertis verbis Abietem florere affirmant. Tandem autorem nostrum de Pinu, cui flores etiam fidenter negat, deceptum scio, cum & ipsè flores observaverim in eo genere copiosos, quidni ergo & de Abiete falsus sit?

J. Bauhinus conos plenius describit: Conos (inquit) fert oblongos, ovatos ferè, Piceæ vulgaris conis breviores & crassiores; Squamæ verò latiores multo, brevioresque, & velut hirsutæ, vel levi exsiccatione caduce, ut in Pinu *Cembra* dicta: neque enim hærent, ut in Pinu, Picea atque Pinastro. *Sylis conorum mediis, squamis delapsis, diu interdum in arbore rasant nudi, Clavos nigrætes vocant, à similitudine.*

Dodonæus, eumque secutus Gerardus, de Abiete & Picea confusè scribunt, unde concludimus cum J. Bauhino, Abietem & Piceam non bene notas fuisse arbores Dodonæo.

Quin & C. Bauhinum ex una specie duas fecisse opinamur, & synonyma confudisse. Abietem enim I. seu conis sursum spectantibus, sive marem C. B. & II. seu albam, sive feminam *eisdem* pro eadem arbore habemus. Certum enim est Abietem Pini, & feminam Thophrasti *Clus. hist.* quam Abietis sive secundæ, i. e. albe seu femine synonymam facit C. Bauhinus, ipsissimam esse arborem quam jam descripsimus. Abietem autem conis sursum spectantibus, aliam ab ea quam descriptam dedi, vellem quis mihi ostendat. Ego duas tantum Abietis species agnosco, alteram conis brevioribus, sursum spectantibus, foliis pectinatim Taxi modo dispositis, subtus albescentibus, quam scilicet descripsi, quàmque Abietem feminam Thophrasti peritiores Botanici, Clusius & Joan. Bauhinus faciunt: alteram conis longioribus, deorsum dependentibus, foliis nec pectinatim dispositis nec subtus cinereis, quam eisdem Latinorum *Piceam*, Thophrasti Abietem marem esse statuunt.

Interim hic monere convenit D. Plot in Historia naturali Comitatus Staffordienlis non rectè cepisse mentem meam, cum arbores illas in *Wortan* nascentes, seu masculis stantes, Piceæ generi à me adscriptas dicat. Mihi enim optime notæ fuerunt illæ arbores, quas non semel vidi & lustravi, earumque semina collegi in horto nostro serenda. Nota ergo terra ad Abietem in *Catalogo nostro plantarum Angliæ* ad Abietem cujus synonyma dedi referenda est, [non ad Piceam ut opinatur D. Plot.] nimirum Abietem *Park.* Abietem feminam sive *Wortan* dictam J. B. cui etiam, (ut superius dixi) eandem puto Abietem II. i. e. albam sive feminam C. B. ut patet, tum ex epitheto albe, tum ex nonnullis synonymis; quanquam fateor C. Bauhinum synonyma confudisse, ab Autoribus quibus Abietis & Piceæ differentie multis perspective essent seductum.

Nos in Sæviæ & Baviaræ sylvis, sed copiosius in Alpibus Helveticis & Rhaeticis Abietem observavimus. Axiis in Germaniæ & Bohemæ sylvis frequentissimam esse scribit: alibi etiam varus locis in montibus reperitur: Coni, teste Clusio, virent Autumni initio, & multam resinam fundunt: sub Autumni verò finem, & hyemis initium maturitatem consequuntur.

Materies ad multa utilis est, præcipue ad navium malos ob levitatem & altitudinem suam: nam in Alpibus Helveticis inveniri nonnunquam 120 pedum altitudine assèrit, ita ut usui adaptentur longitudine 110 pedum. Asseres & tabulæ abiegnæ multi apud nos usis sunt in Angliâ ad tabulata domorum & conclavium. Ex ligno etiam Abiegnæ in Germaniâ (teste Axiis) fiunt doliæ quæ picanur, cupæ, capedines, trues, capulæ, aliæque quamplurimæ vala cerevisiaria, aquaria, culinariæ: in frequentissimo usu est in Angliâ ad pyxides, thocas, cistas, loculos, &c. Pondus sustinent valde Abies & Pinus, remittuntur enim, nec temere rumpuntur. J. B.

Hujus resina duplex in usu est, 1. *Liquida*, quæ colligitur è tuberculis Abietum novellarum sed pauca. Hanc Officinæ *Terebinthinam Venetam* (at nostrates Argentoratensem,) falsò vocant [Inter corticem & corticem arborum juniorum oriuntur quedam tubercula, (*Dandlatten* Germani vocant) ex quibus si vulneretur fluit præstantissima illa resina, Laricæ consistentiâ similis, sed magis transparentis, amaricans, valde fragrans, & sapore Citrii mali corticem proximè referens.] 2. *Sicca*, quæ uti Thus figurâ emittitur, ita usum ejus amulatur. Modum colligendi resinam liquidam vide apud Bellonium.

Resina hæc à Matthiolo aliisque magnopere commendatur ad recentia vulnera, præcipue capitis, *Vires*, sananda; ad calculum renum & arenulas, ad urinam ciendam (uncæ pondere pota) ad arthriticos & ischiadicum dolorem. Ad gonorrhœam etiam virulentam confert, si aliquot diebus continuis matutino tempore sumatur.

Abietem Angliæ indigenam esse statuit D. Plot; nec ego sanè abnuerim, siquidem Abietes illæ superius memoratæ in vico *Wortan* crescentes ibidem sponte ortæ videntur; eaque reliquas esse plurimarum in vicinia oligi nascentium ostendit idem doctissimus Vir: unde Cæsarem in utroque genere deceptum pater, cum scribit in *Britanniâ Materiem omnium generum reperiri præter Fagum & Abietem*, Fagum enim plurimis in locis provenire apud nos certum est; Abietem aliquibus.

Abies, autore Thophrasto, provenit tantum femine, radix nullam penitus sobolem profert: deculo cacumine radicitus inarescit eodem anno. Nos verò quamvis hæc varus in locis iteret & inculcet Thophrastus, experientiâ docti affirmamus, ramulos Abietis decilos & terræ implantatos, non germinare tantum, sed & radices agere, & fortè etiam in arbores tandem adolescere posse: Siquidem ostendit nobis D. *Franciscus Willughby* arbutulas Piceæ seu Abietis maris lætas & vegetas, ex ramulis à seipso ante quadriennium depactis.

Hermannus in Catalogo Leydenti distinguit Abietem marem conis sursum spectantibus sive Taxi foliis ab Abiete feminâ Thophrasti J. B.

A. 2. *Abies* max Theophr. *Picea Latinarum*, *seu Abies max Theophrasti* J. B. *Picea Park*. *Picea major* Ger. *Picea major prima* *seu Abies rubra* C. B. *The common Fir-Tree*, or *Pitch-Tree*. *Abies conis densum* *friscantibus*.

Astin.

Procerā est arbor, caudice recto ut *Abies*, cortice rubefcente, nullo modo fragili, ut in *Abiete*, sed lento & flexili. Ramos habet *Abietis* ramis similes, & ita ordiātos, [decussatim positos] non quidem in terram deflexos, sed ad caelum spectantes; [ē contrariō ex J. Bauhīni & nostra observatiōne plerumq, in terram reflexos] *Folia* sunt dilute viriditatis, nec ita ut in *Abiete* pectinim modo disposita, sed ex duobus furcatorum latribus, & ex superiori parte prorumpunt, nec inferior profus est nuda, sed illa ad latera flectuntur, ut insistentibus inferior pars nuda videatur, quae autem in superiore parte crescunt, non ita ad latera flectuntur ut inferiora, *Abiegnis* angustiora sunt, breviora, curviora, acuta & pungentia. Surculi ramorum *Piceae* plura habent folia quam *Abietis*: In ficcis ramulis folia admodum caduca sunt, ut inter exsiccandum experti sumus. Recte negat * *Plinius* *Piceam* exhilarari flore, & immerito hanc ob causam à *Dalechampsio* notatur, qui scribit; *Piceae* florem oblongum ac rubentem quivis observare potest. Fefellit illum sine dubio color, petivitque conos tanta rubedine non esse praeditos: sed si diligentius inspexisset, sanè aliter scripsisset, sunt enim nihil aliud quam conuli prorumpentes & rubentes, & nihil omnino floribus simile praeter colorem repraesentantes. Nos potius assentimur *J. Bauhino*, *Clesio*, *Dalechampsio*, *gravibus imprimis & summo* *Austriacis* affirmantibus extrema ramorum hujus arboris incunte aestate julas protrudere singulares, pallescentes quoddam farina refertos, quam *Astin* id neganti: praesertim cum & ipsi ejusmodi julas in *Pinu*, cui ille pariter flares denegat, observaverimus. Praeterea nullam omnino in rerum natura plantam dari contendimus cui nec flos sit, nec aliquid flori analogum; nec enim sine semine maculo qui in apicibus florum continetur plantae ullius semen prolificum esse posse putamus.

Picea conos fert teretes spithamæ longitudine, extremantibus ramulorum annexos, & deorsum pendentes, quod propter pondus ipsorum fieri autumo, ex mers squamis coalitos; in medio scapum habent longum, cui squamæ sunt adnae, quae in medio late sunt, in superiore parte acuminatae ac tenues, in inferiore autem parte, ubi scapo annectuntur, angustiores, crassiores tamen: mediae majores sunt, infimae & supremæ paulo minores: Etiam dehiscunt squamæ non tamen excidunt, ut in *Abiete* femina. Singulis in latere exteriori annectitur longum & latiusculum foliolum, superius paululum incisum, in interiori parte annectitur illis geminum semen, magnitudine seminis *Cnici*, superius alatum, colore fusco. Semen plenum est olei capsulam fragrantissimi, linguamque acrimoniam suam ferentis. Totus conus, si recens ex arbore venit, plenus est resinâ, & gratissimum spirat odorem.

Locu. Nasquitur in montibus & sylvis. Nos in *Suevia* & *Bavaria* sylvis inque *Alpibus Rhæticis* & *Helveticis* observavimus & quidem multo copiosiorē quam *Abietem* feminam. Hanc arborem esse conjicio quae in *Suecia*, *Norvegia* aliisque *Septentrionalibus* regionibus copiose oritur. Mense *Septembri* fructus sunt maturi.

Uſu Legu. Materies ligno quidem facilis fabricis, sed in opere deterior, ut quae pro aëris constitutione intumescit, detumescitque, subindolē in aedificiis crepitans. Ad omnia illa adhibetur, ad quae *Abies* femina, non tamen ita frequenter. Lignum accensum, imprimis resinolum, fumum edit atrum, & omnia ad quae pertingit nigrore afficientem. Quando cortex vulneratur magna copia effluit resina, ex qua nostratos [*Thuringi*] picem destillant. *Astin* & *J. B.*

Quae de viribus *Piceae* *Veteres* habent apud ipsos requirenda omitto.

Cerevisia dietetica dicta, in qua infusi fuerunt ramuli aut summitates hujus arboris, in affectibus *Scorbuticis* bono cum successu saepenumero usus sunt. *D. Needham*. Idem affirmat *Mollenbrocius* de *Arthrit. vag. scorbut.* *Bartolinus* de *Medicin.* *Danorum* domest. refert *Norwegos* abols, septentrionales masticare corticem *Abietis* in modum frumenti.

Haec arborea (ut diximus) copiosam resinam praebent, cujus eliciendae modum apud *Germanos* his verbis describit * *Jo. Conradus Astin*.

* *Traicté de Arbores en Suisse, &c.*

Mense *Majo*, decreſcente *Luna*, corticem *Piceae* detrahunt nostratos hoc modo. Incipiunt in parte superna quae aëri pertingere possunt, & detrahunt corticem latitudine trium digitorum usque, in partem infimam, ita tamen ut pedibus duobus à terra plaga abis. Deinde sinunt corticem in arbore latitudine unius circiter palmæ, & iterum talem plagam inferunt, & sic pergunt donec tota arbor ita sit fauciata. Duobus aut tribus elapsis annis plaga illa ita sunt repleta resinâ, ut deradere possunt. Accingunt itaque, operatores se operi, & induunt tunicas lineas breves, ampliciores tamen, ubique confutas praeterquam in inferiore & superiore parte, haec pertingunt ad umbilicum, & resinam in rasura excipiunt, ne industria operariorum ab illa maculentur. Faciunt denique vascula quaedam, seu sportulas e cortice *Sorbi* sylvestris, figurâ cono inversi: has in terra ad latera arboris ponunt; quo facto deradunt resinam cultris sive radulis incurvis, ancipitibus, longis infixis baculis, quam excipiunt sportulis illis, & in acervum congerunt, donec in casas, in quibus pice destillatur, convehatur. Picem & Resinam *piceam* hoc modo conficiunt *Germani*; Faciunt in *Officina* sua furnum quadratum, oblongum, in quo duobus fere pedibus à terra ponunt duos canales ligneos, in posteriori furni parte tantum prominentes, utriusque canali imponunt tres ollas oblongas in fundo foramen digiti latitudine habentes juxta ollas illas tria relinquunt foramina, in anteriore parte pedem unum circiter alta, & plus dimidio lata, in posteriore furni parte minora sunt, quae loco fumariorum sunt, ut eo melius ignis è foraminibus anterioribus flammam emittat. Furno ita perfecto implent ollas illas resinâ, & unamquamque tegunt operculo: deinde accendunt ignem in foraminibus anterioribus. Cum itaque resina calorem ignis percipit, liqueſcit in ollis, & per foramina ollarum pice destillat in canales subditos, per quos in posteriore parte furni effluit. Canalibus istis supponunt vasa abiegnâ, aut etiam alia vascula e cortice *Piceae* fabricata; haec effluentem picem excipiunt & dividunt. Si nihil amplius fluat, residuum eximitur ex ollis, & implent eas iterum resinâ, sicque pergunt donec omnis resina

fina facta fit pix. Residuum seu caput mortuum resinæ in frustra magna quadrata cogunt, ex quibus deinde fuliginem urunt.

Alius est modus excoquendi picem liquidam ex ipso Piceæ ligno, per similes illi quem describit Theophrastus histor. lib. 9. cap. 7. Piceæ in Tadmam conversa stipites assulatim caesos super area seu pavimento è luto usto aut lapidebus antea preparato, & à centro undique ad circumferentiam paulatim declivi in struem aut acervum componunt, ei similem quem extruunt qui carbones faciunt. Struem hanc frondibus faginis pineisve undique contegunt & deinde pulvere aut luto comminuto insperso curiosè loricant, ne quæ fumus aut flamma eluctari possit. Ignem postea, foraminè ad id relicto, desuper accendunt, quemadmodum Carbonarii solent, qui liquorem ligni oleosum seu resinaceum ad unam subsidere compellit: Is autem ob pavimenti declivitatem in canalem (qui acervum undique coronæ instar cingit) ad id factum promptè delabitur, indeque per alios ductus in lacus aut vasa ei recipiendo destinata derivatur. Ex hoc in cortinas injecto, & tandem decocto donec omnis humor absumatur, fit *Pix arida & rasila*, Græcis *Παλιμωμ* dicta, Nostrates Picem liquidam *Car* vocant, siccam seu aridam *Pitch*. Hinc patet Picem à Plinio rectè definiti Resinæ combustæ fluxum.

De Resinæ & Picis usibus in Meditana & Mechanicis dicemus in historia Pinis.

In Nova Anglia pavementum, in quo pineas taleas componunt ad excoquendam picem, non à centro ad circumferentiam, sed è contra à circumferentia ad centrum devexam faciunt, & canalem inde ad circumferentiam, ad picem defluentem derivandam, ducunt. Ibidem etiam lignorum struem luto undique illito obducunt, & foramen in summa parte relinquunt per quod igne desuper immisso ligna accendunt; quibus jam penitus ignitis foramen illud obstruunt, & per foraminula aliquot circumcirca in lorica lutea seu tectoria relicta aerem admittunt quantum satis sit ad ignem fovendum, cauto interim ne in flammam erumpat. Foraminula quibus ignem moderantur, & vel occludunt vel aperiant prout res postulat, Registros vocant.

3. *Picea pumila* J. B. Park. *pumila* Clusii Ger. emac. minor C. B.

Clus.

Nunquam valdè assurgit, sed pumila manet, fertque quedam nucamenta Nucis Ponticæ magnitudine, è squamulis imbricatim compositis, sed è pungens foliolum desinentibus compacta, quæ maturitate desiccata concavas inanitates & veluti cellulas ostendunt; à summis verò & extremis nucamentis ramuli nonnunquam enascuntur, frequentibus, brevibus & pungentibus foliis obiti: sed tota arbuscula brevioribus & pallidioribus foliis quam superior prædita est.

Neque florem, neque fructum observavit Clusius.

Pinum tubulum sive tibulum Plinii Dalechampius vocare videtur.

4. *Abies Mexicana* Fr. Hernandez. *Aveveti & Aboboti* indigena.

Hanc arborem Hispani Sabinam & Cedrum ob materiei rubrum colorem vocare soliti sunt: verùm ad Abietum genus omnino referendam esse præter fructum omnemque faciem, materia suadet, quæ mollis ac lenta est, corruptionisque & vitio abundè obnoxia, maximè si terræ defigatur.

Sunt autem (inquit) quatuor, quod adhuc intellexerim, hujus arboris differentie, inter se magnitudine, colore & fructu distantes.

1. Quedam siquidem illarum altissimas Pinis longitudine atq. amplitudine superant, & candidæ esse reperiuntur. Earum nonnullæ 24 aut amplius pedes crassitudine æquant.

2. Aliæ, quarum materia quoq. candens est, & rubrum cor, sine modulla his cedunt, & nucleos Pineas resinâ refertas producant, sed quæ vulgares Oleas minimè magnitudine vincant.

3. Aliæ his quoq. interiores spectantur, sed rubra materie, & orbiculatioris coma.

4. Postremæ & quæ omnium minimæ sunt, vix Malos Medicas vincunt magnitudine, quibus materies rubea est & candens modulla.

Cortice omnes teguntur rubeo, foliaq. ferunt Abietina, etsi minora & exilia: Ex omnibusque resinâ, si non sponte, at flammis liquata fluxit. Forma esset eadem quæ nostrati Abietis, ni folia, ut diximus, tenuiora, rami depressiores & fastigia acuminatiora assurgerent.

Assilæ in vasa fictilia conjectæ operæque igne supposito resinam fundunt: ea tamen sponte non emanant.

Quibusvis regionibus proveniunt circa fluenta, stagnantive aut lentè fluentes aquas uliginosave loca: etsi omnium minima longe ab aquis & nasci & servari soles. Nullo tempore aut loco inveniantur flores. *Nimis temere hoc pronunciat Hernandez, nisi forte julis pro floribus non habendus censuit.*

Resina hujus Abietis vulgari longè acrior & calidior est & viribus vehementior.

Corticis, Foborum, Resinæ vires & usus, vide apud Hernandez, lib. 3. cap. 66.

CAP. II.

De Pinu arbore.

Pinus arbor Latinorum quo nomine Veteribus Græcis dicta sit non levis est inter eruditos controversia.

Nobis Veteres Græcos pro Pinu usurpasse J. Bauhino dubium non est. Idem videtur Casparo fratri, Carolo Clusio, Bodæo à Stapel, alijsq; doctioribus. Mihi Turneri nostri sententia probatur, nimirum Theophrastum *ελαιο* appellasse quam Latini Pinam: Plinium autem *στρω* Græcorum pro Pinu accepisse, quod Plinius Pityocampas Pinorum crucas vertat, non Piceæ. Galeno etiam Pityn Pinum esse, ait enim Pityn maximos ferre conos: Verisimile etiam patet Galeni tempore Græcos & qui eum secuti sunt semper Pityn pro Pinu usurpasse.

Nunc Theophrasto quæ arbor sit nobis non constat, J. Bauhino Pinastrum seu Pinum sylvestrem esse verisimile videtur.

Nominum mutationis, & errandi ansam præbuisse videntur Arcades, qui (ut scribit Theophrastus) quod ceteri *στρω, ελαιο*, contra quod *ελαιο στρω* vocarunt.

1. *Pinus sativa* C. B. *Sativa sive domestica* Ger. *urbana sive domestica* Park. *officinalis dura, foliis longis* J. B. *The manured Pine-tree.*

Excelsa est arbor, *caudice* recto assurgens, cortice scabro & subrubenti; materie robusta, subilava, odorata, pingui. Rami per intervalla eo ordine rotatim procedunt quo in cæteris arboribus confertis. Ex tuberculis passim in rugoso ramorum cortice extantibus *folia* enascuntur, bina ferè, circa imum connata, mox ab invicem abscedentia; quæ se mutuo spectant canaliculata, Junci mariani æmula & æqualia, duorum triumve palmorum longitudine, mucrone acuto & rigido. Coni magni, crassi, turbinati, archissimo squamarum contextu compactiles, quarum crassa, lignosa, lucida capita extantia tuberculorum agmine inæquales reddunt conos: singulares squamæ unciam latæ, duplo longiores, à capite resinam albam, odoratam subinde fundentes, lineisq; ex umbilico deversis donatæ, paulatim hastam versus extenuantur, crasse, sinu suo complexæ naturâ binæ unam aut alteram pitydem, oblongasti, ferè uncialem, torosam, pulvisculo atro-purpureo respersam, osse crasso, duro; nucleo candido, pingui, dulci, pelliculâ nitidi obvoluto.

Locus.

Copiosissime in Italia propè Ravennam provenit, quo in loco sylvam ex se facit amplissimam in longitudinem extensam ad mare litus: alibi etiam in Italia observavimus spontaneam. In Gallia Narbonensi ad aquas Marianas spontaneam perhibet Lobelius, & circa Massiliam; Incolæ *Provincia* eam terebrant pro resina elicendi.

Radix nullam ex se penitus sobolem emittit, ideoque trunco reciso profus emoritur, & semine tantum provenit. Proprium esse aliis arbori ut falso solo latissime fructificet, quemadmodum apparet ex arboribus Pineto prope Ravennam.

Vires & Ufus.

Pini cupiscunt, cortices & folia refrigerant & astringunt, unde in dysenteria & fluore mensium profunt. Diconocum aut infusum fununitatum Pinis in Cerevisia aliòve idoneo liquore ad calculum renium & vesicæ plurimum valere creditur, necnon ad Scorbutum aliòsque thoracis affectus. A turionibus Pini nulle hominum liberatos à Scorbuticis affectibus refert Hofmannus in Method. medendi.

Nuclei Pini saporis sunt delicatissimi, ipsis etiam Amygdalis præferendi, ideoque in Italia mensis secundis adjuvantur. Caliditate temperati sunt & humidi; maturant, leniunt, impingunt. Ufus præcip. in *Phthisi & tæbe*, quia nutrimus bene, quamvis non omnino facile concoqui vult Dodonæus; *in tæsi & distorsione pectoris vitæ* per se aut cum melle aliòve olegmate, quoniam exasperata leniunt; in *sephritis affectibus*, stranguaria, acrimonia urinx, &c. quos mitigant & dolores sedant. Augent item & lac & semen genitale, ideoque Ventrem languentem excitant & naturam calefaciunt, præsertim Saccharo conditi. Torus Conus seu Serobilus cum Marrubio recenti decoctus (inquit Galenus) si postea addito melle modico iterum coquatur, donec ipsum decoctum mellis accipiat crassitudinem medicamentum est ad thoracis pulmonisq; excretionem conveniens, veteri tussi & tabridini confert, ut Dioscorides etiam testatur. Aqua Serobilorum astringit, ideoq; utilis est ad faciei rugas delendas, mammarum incrementum impediendum, in procidentia matris, &c.

Novum dignum est quod observavit Casalpinius, & nos etiam ipsi, nucleos hosce non bipartitos esse ut alios plurimos, sed velut in alveo novellum Pinum continere, cujus radix inferius spectat.

2. *Pinus cui officinalis fragilis putamine sive Cembro* J. B. *Pinus sylvestris montana tertia* C. B. *Pin. sylv. altera fructifera, Tada arbor fusi* Park. *Pin. sylv. 2.* Ger. *defez.*

J. B.

Pini foliis breviora sunt Cembali folia, palmaria, itidem bina è tuberculo uno prognata, canaliculata, videntur acutiora tamen. Conus minor quam Pini, hoc commune habet cum cono Abietis, quod squamæ facile à pelliculo divellantur, in cæteris differt. Squammis compactus est minus multo extantibus & compressis, rugosis, non lucidis ut Pini sativi, nec firmiter compactis, extremam singularum marginem [non medullium] occupante umbilico. Pitydes binæ singulis squamis occultantur, dimidio minores quam Pini domesticæ, osse triquetro, turbinato, rubente, tenui & fragili, adeo ut digitorum pressu haud ita violente distiliat, nucleo crassiore, brevioris, sapore & substantia cum Pitylicibus domesticis eadem.

In Rhætia copiosissime nascitur, ubi rustici ejus fructu vescuntur, qui quamvis, Bellonio iudice, ^{Lincol.} minis duro saporosior, sic nucleo quam Pini vulgaris, adeo tamen vili venit, ut vectura dignus non censetur. Quinetiam in convallibus montis Juniperorum dicti & montis Senesii, per quos è Gallia Mediolanum iter est, nullus est pagus qui eam sub *Elvi* nomine non agnoscat. Gesnerus in altis montibus Rhætorum & Valleliorum nasci scribit, nec ullam arborem altius. Plinii Pinum Tarentinum esse voluit nonnulli.

Bellonius hoc genus Theophrasto incognitum esse ait, in Græciæ enim aut Asiæ montibus non nasci. Dalechampius Tædam arborem Plinii esse vult, Theophrasto ignotam.

3. *Pinus sylvestris* C. B. *Pinus sylv. vulgaris Genevensis*, & *Tæda* J. B. *Pinaster Austriacus major, albus & niger ejusdem? Item Pinaster, sive Pinus sylv. Hispanicus major* Clus? J. B? i. e. *Pinus maritima altera* C. B? *Pinus sylv. Magna* Ger. 100. **The Mountain Pine.**

Actium.

Caudicem habet* interdum distortum, sepiissime tamen rectum: cortex in inferiore arboris parte <sup>* Insuperum-
tur si eandem
notitiam ar-
borum intelli-
gat.</sup> plenus est rimarum atq; scaber, colore quodammodo cineræo, in superiore tamen parte plenus squamarum & rubicundus, in ramis tenerioribus Lauri modo hvelat. Sarculos ramorum habet fragiles, qui si frangantur apparent inter corticem & corticem minuti pori, ex quibus resina exsudat. Adultæ arbores ramos habent minime rectos sed sinuosos. *Folia* habent tenuia, rigida, multo longiora foliis Abietis & Piceæ, semper gemina ab uno veluti nubulo exeuntia, in ipso exortu connexa, in interiore parte, quâ sese conspiciunt, concava, acuta, pungentia, gustu adstringentia, undisquæ ramos vestientia.

Coma ex compactili squamarum acervo sunt turbinati; ramulis pediculo brevi, in nonnullis recto, in aliis adunco, ad latera sæ firmiùter adherent, ut cum novi erumpunt anniculi adhuc in ramis hæreant; quamprimum inaruerint dehiscunt. Squamæ sunt oblongæ, sub quibus semea latet nigricans, magnitudine Anisi, alatum, plenum albâ medullâ.

Arbor hæc optimam fundit resinam.

Descriptio hæc in reliquis bene convenit Pini sylvestris à nobis in Sævia, Bavaria, Austria, & alibi in Germania passim observata, sola seminis parvitate differt. Nostra folia habet longa, in viriditate nigricantia, conos satis grandes, minores tamen quam Pini fativi, oblongos, turbinatos, ramorum alas spectantes & reflexos, nucleis parvis, nec Mali vulgaris nucleis multo majoribus, quibus & figurâ suâ accedunt.

Habetur in viridariis nostris frequens in Angliâ, & ab Hortolanis vulgò, **The Mountain Pine**, id est, *Pinus Montana*, dicitur; excrescit autem in magnitudinem & proceritatem eximiam, quamvis cum sylvestris & siæ sponis sit, pleniùq; pumila manet in Germania.

Hæc proculdubio est quam Bellonius libro Coniferarum describit sub *Pinæ* nomine, caudice, cum in arborem excrevit, contorto, rubro cortice vestito, ramis hualco, sinuosis ramis, fragilibus, coma in latum expansâ, mediocri magnitudine, &c. vide. *Pinaster Austriacus major* Clus. duorum est generum, adeo inter se simulum, ut pauci nisi materiæ calores discernere queant. Alterum tamen genus latiore & erectiore est caudice, latiore cortice, majore cono. Alterum verò crassiore plerumque est caudice, scabriore cortice, foliis paulò crassioribus ac minore cono.

Pinaster sive *Pinus sylv. Hispanica major* Clusio, in Aquitania, inq; Pyrenæis & plerisq; aliis Hispaniæ locis frequentissima, quæ ipso momento, à *Pinastro* i. Austriaco albo parum & solis forte natalibus differt, in Pini fativi altitudinem excrescit, interdum etiam superat. Nobis observatæ quamvis satis grandes & proceræ, minores tamen erant lativis.

Sunt ergo nostrâ sententiâ *Pinus sylvestris vulgaris Genevensis* J. B. *Pinaster* sive *Pinus sylvestris Hispanica major ejusdem*. Item *Pinaster Austriacus major albus, & niger*, una eademque Pini species, ut & ipse Jo. Bauhinus suspicatur. Quamvis, ut verum fatear, descriptio Pini sylvestris Genevensis J. B. huic arbori non bene conveniat: nec enim conis in hac parvi & breves & non turbinati sunt, sed rotundiores, fragili & brevi pediculo adherentes ramis, verum è contrario magni, & longi, & turbinati; ut superius diximus.

Ex hujus arboris inferiore parte, radicibus vicinioribus fiunt assule illæ pingues ad ignem accendendum & lumen præbendum idoneæ, magni per multas Germaniæ provincias usûs. Strangulat enim humor ad radices descendens ipsas arbores sic ut in Tædam vertantur, de qua assule.

De Tæda.

Transseunt in Tædam quandoq; Picea & Larix, sed rarò admodum: Pini enim sylvestris proprius ac peculiaris morbus est. In Tædam autem arbor conversa dicitur, cum non modò cor ejus sed & reliqua substantia in pinguedinem mutata est. Hinc (inquit J. Bauhinus) Plinius non absq; errore Tædam sui generis arborem esse existimavit, & sextum Coniferarum genus statuit. Plinium pariter erroris infimulans Manhiolus, Bellonius, Casp. Hofmannus, Bodartus à Stapel, aliiq; Ego potius cum Dalechampio, Clusio, Parkinsono sentio, Tædæ vocabulum ~~quodammodo~~ esse, & nunc Pini resinolum & pingue lignum (ῥῶν ἄσφα) significare, quod lucernæ candelæve loco uratur, nunc arborem sui generis Theophrasto ignotam.

Quoniam assularum Tædæ ad lucernas usûs est, hinc tæda pro face quacunque, præsertim nuptiali, accipitur.

At tibi ego ignem thalamus tædâsq; parâbam.

Ovid. Metamorph. 1.

Ex hoc genere in Aquitania, apud Cantabros & aliis Hispaniæ locis, indigenas resinam colligere observavit Clusius, & nos etiam, nec in Aquitania solum sed etiam in Gallia Narbonensi, ubi arbores vulnerantur ejus rei causâ, singulis annis novo vulnere supra antecinum inflicto, donec ad

decem aut duodecim pedum altitudinem pervenerint, & humor ab ea parte manare desierit; tum demum simili modo ex alia parte, ac deinde alia aperitur.

Pinaster latifolia viriscentibus aut palliscentibus C. B. *niger, latius folia, jula palliscentibus* Park.

Clas.

Pinaster niger genus interdum invenitur, tristiore arbore, contorto caudice, & in latum sparsis rami, minore adhuc quam præcedens cono.

Est tantum varietas *Pinaster Austriaci* secundi seu *niger Clusii*: que nostrâ sententiâ non differt à secunda specie seu *Pinu sylvestri* C. B.

4. *Pinaster Austriaci tenuifolia* J. B. *Pinaster tenuifolia jula purpurascens* C. B. Park. *Tada sive Pseudo-pinus* Ger. *Pinaster 3. Austriaci* Clus.

Clas.

Crescit ad nonnullorum Austriæ montium radices in scopulis, & super Badenſe therma, quatuor super Viennam mill. in montium crepidine tenta gramine obſita, aliud quoddam genus, contorto admodum caudice, divaricata ramis, quorum furculi multo graciliores tenuiorēq; sunt quam in superioribus duobus generibus: *folia* item habet illis longe tenuiora & breviora, tamen hinc semper conjunctim ex eodem tubulo in virgarum ambitu nascuntur. Extremis virgis botrus sive Uva exiguorum pistorum veluti nucamento tenuiorum squamarum inclusa adnascitur, qui non vireſcunt aut flaveſcunt, ut in anecdota, sed purpurascunt, deinde in tenuissimum pulverem abeunt, succrescente aut flaveſcente, ut in anecdota, sed purpurascunt, deinde in tenuissimum pulverem abeunt, succrescente ex eorum medio novo germine *folia* novellis foliis, membrana vel vesicula incliſis, onusto. Hujus conus etiam minor est, & obſoſo plerumq; mucrone.

Hujus arboris ramos solent nostrates Oenopole ante ædes suas proponere, ut Viennenses Abicis tenuiores ramos, & aliarum regionum incolæ Hoderam C. B.

5. *Pinaster cono ovata* C. B. *Pinaster Austriaci* Ger. *conus montana* Park. *An Pinus sylvestris Mugo sive Klein* J. B. *Pinus tubulus seu tubulus Pin?* *sylv. Mugo* Mart.

Clas.

Humiliam non superat altitudinem, sed statim à radice in lentos & obſoſos, tamen crassos, rugulosos & denſo cortice rectos, ramos dividitur, atq; in latitudinem diffunditur: hos per singulas squamas hinc semper ex eodem tubulo simul prodeunt & juncta *folia* ambiunt, quemadmodum in *Pinu* & vulgari *Pinastro*, magis tamen carnosâ sunt, crassiora, breviora, & obtusiora mucrone præſita, colorēq; saturatius virent. Strobili unciales, squamatum compacti, Laricis conis haud majoris, sed magis turbinati rectiq; pediculo introrsum non inflexo ut in præcedentibus generibus, nucleos alatus ut reliquorum, & intercompactiles squamas latens. *Radix* crassa, lignosa, in diversâ tendens.

Nascitur in summis Austriæ & Stirie Alpium superciliis inter saxa & scopulos, ut plurimum ubi nullæ aliæ arbores proveniunt.

Pinum sylvestrem Mugo sive *Crein* sic describit J. Bauhinus, Parva & pumila arbor est respectu aliarum resiniferarum, & *Pinu sylv. Tauer* dicti, ramis bipartitis *Folia* prodeunt ex tubulo bina, tres digitos longa una parte rotunda & carinata, alterâ plana, similia *Pinu sylv. Tada*, sed colore magis viridi, pungentia Coni dorsum nutantes paulo longiores quam *Tada* aut *Pinu sylv. Genevensis*, ut & nigrores. Squamæ crassæ & estuberantes ut in illâ, sed manifestè differentes, quia eminentiè pulchre sursum vergunt, cum dorſo evidenti, immediatèque hærent ramulis, à quibus facillè divelli possunt: ubi *folia* decidunt sunt tubercula crebra. Arboris cortex nigrior, odoratior etiam videtur arbor. Ramuli rectiores pluribus foliis ornati. Resina alba, sicca. Martius & Cæsarpinus hanc speciem describunt ramis procumbentibus humi, spatio cubitorum decem, quindocimq; utilis ad cingenda vasa vinaria.

Dubitat J. Bauhinus annon hæc sit *Picea nigra* Corcyrenſis Bellonii.

Pinum sylv. Mugo Mart. C. Bauhinus à *Pinastro pumibone Austriaci* *Clas.* diversam facit.

6. *Pinaster tertius Hispanicus humilis* J. B. *Pinus maritima minor* C. B. Park. *Pinaster marit.* *minor* Ger. *emac.*

Clas.

Ejusdem ferè est cum superiore seu Austriaci quarto altitudinis, licet in lentos & obſoſos ramos divisus sit, non sunt tamen adeo crasso ruguloseque cortice tecti, neq; ita in latitudinem diffusi: virgæ etiam graciliores, *folia* estiva, Laricis foliis non dissimilia, non adeo tamen mollia, neq; ut illa decidua, sed immortalis viriditate præſita, ut superiorum *folia*: *Strobili* exigui & graciles, nucleos etiam pusillus & nigricans, alatus ut reliquorum.

Solo Murcæano regno hoc genus, idq; castillè, conspexit Clusius.

Opinatur Lobelius hunc non differre à *Pinastro humili Gallo* provincie & Narbonensis collibus ad Lapum montem oranda. Nobis *Pinaster* ibidem frequens idem videbatur *Pinastro Austriaci* primo Clusii, tertio in loco descripto.

7. *Pinus sylv. maritima cono semiter ramu adherentibus* J. B. *sylv. altera maritima* Lob. *obl.* *An Pinaster 2. Hispanicus* Clus?

Coni ex alveo bini, deorsum nutantes, crasso, lignoso pediculo firmiter hærent (quo nomine ab aliis differt *Pinu* & *Pinastro* speciebus) trium digitorum transversorum longitudine, in acutum meo doctèr mucronem desinentes, quatuor in ambitu uncias ad basin colligentes, squamis non multum extantibus compactiles, ad *Pinu* domesticæ conos accedentes, nisi multo essent minores. Ligno materies alba, cui resina vehementer odore subſtata.

In collibus versis montem Lapi plures sunt sylvulae ex Pinis hujusmodi compositae, quarum aliae *Locu.* arborefcunt, aliae verò pumile reperiuntur, inquit *D. Magnol.*

Dubitat *J. Bauhinus* an hæc arbor eadem sit cum Pinastro altero Hispanico seu minore Hispanico *Claf.*

Pinafter nobis observatus circa montem Lapi non videbatur differre à Pinu nostra tertia seu sylvestri *C. B.*

Pinus maritima major C. B. maritima major fructifera Park. sylvestris montana Ger. Pinus maritima Theophrasti Lobelius J. B.

Stipite, ramorum & foliorum facie perfimilis videtur Pinastro montano, sed ramis glabris, caudice nigrioribus. Conus phœniceus, brevior & superne latior.

Huc refert *C. Bauhinus*

Pinastrum alterum Hispanicum vel minorem Hispanicum Claf. Pinum maritimam majorem fructiferam alteram Park. marit. majorem Ger.

Quem *Cladius* duorum hominum altitudinem raro superare ait, inflexo & contorto caudice, ut plurimum ab imo ramoso. Folia illi majori Hispanico similia, sed breviora, dilucis virentia; conii etiam minores, oblongi tamen, turbinati & candicantes, multa plerumq. resinâ infecti, non admodum is dissimiles qui Austriaco albo cognominato innascuntur; nuclei quales in majore, nigra membrana contexti.

Murciano & Valentino regno frequens.

Locu.

A. 8. *Pinus sylv. foliis brevibus glaucis, conis parvis albescentibus, hortulana nostra, The Scotch Fir, i. e. Abies Scotica perperam dicta.*

Hæc in proceram satis arborem adolescit, caudice recto, firmo & minimè contorto, cortice minus scabro quam Pinastris vulgaris, cinereo seu albicante, foliis brevioribus, latioribus, glaucis, conis parvis turbinatis, & acutis, albescentibus, seminibus intus minimis.

Hanc aliquando habui pro Pinastro altero Hispanico *Claf.* Verum non convenit caudex inflexus & contortus: conii etiam majores pinguntur.

In Alpibus Stiriacis spontaneam observavimus *D. Evelynus* in *Sylvis*, hujus semina è Scotia à *D. Marchione Argathelie* ad se missa scribit, ubi propè lacum *Langlithum* dictum inter lacum & montem vicinum sponte proveniunt eâ copia, ut ex eis casu delapsis aut subversis, & ibidem jacentibus aliis supra alias ad hominis usque altitudinem interstitiis paulatim tractu temporis oppletis collis mediocri aggestus & elatus est. Ob elegantiam suam & pulcherrimum aspectum, nunc dierum in hortis & viridariis nostris frequens colitur.

Locu.

Descriptio *Piceæ*, quæ in Olympi Phrygiæ montis jugo nascitur apud *Bellonium* in plerisq. huic arbori convenit. Ea *Abietis* rectitudine constat, cortice, si ad alia comparetur glabro & subalbido: cætera omitto apud ipsum videnda.

9. *Pinus sylvestris, sive ut Bellonius, Picea. Sylvestris Ida Troada, cujus coni facile decidunt J. B.*

Piceam, quæ in *Ida Troadis* nascitur, plurimum ab aliis discrepare comperit *Bellonius* [*Arb. conif.*] Siquidem in *Ida Martio* mense breves pilos ut *Corylus* promit; quo tempore coni à montis Olympi *Piceis* decidunt, quod aliarum regionum *Piceis* non accidit. *Pediculus* quo coni ramis adherent gracillimus est, quare cum maturerint levi ventorum flatu deturbantur decutiunturq. ab arbore, aliorum fructuum modo, cum tamen in aliis ferè omnibus anniculi cum nuper nascentibus in arbore permanere comperiantur.

De Resina Pini, Abietis, &c.

Resina liquor est pinguis ac oleaginosus ex arbore sepius sponte, interdum eâ vulneratâ defluens.

Resina propriè dicta in oleo promptè solvitur, in liquoribus aqueis nullo modo.

Resina respectu consistentiæ vel liquida est, subalbida & odorata, è Pinorum sylvestrium præcipue generibus, vel sponte vel vulneratis effluens: vel arida è corticis rimis vel circa abscissos ramos, & quidem *Piceæ* vel *Abietis* exiens.

Scrobilineæ resinæ nomen accepit, quæ circa copos seu strobilos concreta reperitur.

E Resina liquida colo præs defæcata ut sordes fecernantur in duplo aquæ decocta, quousque omni lentore consumpto odorem amittat & friabilis reddatur, tamque arida ut tundi, teri, cribarique possit, sit candidissima ac ferè nivea etiamsi antea oleosa aut mellèi coloris fuerit. *J. B. è Dioscor.*

Spissatur etiam resina cocta sine aqua in corticis æneis subjecto primùm lento igne, deinde ubi coire cepit, carbonibus liberalius aggestis, & aucto igne, ut quicquid ferosi est exhalet: quod requirit trium dierum & noctium continuam cocturam. *Idem.*

Haud absimilis est coquendi modus *Chymistis* usitatus, oleum è *Terebinthina* elicientibus. *Phialam* ingentem luto oblitam, & resinâ ad dimidium usque repletam furno imponunt, & vas recipiens adaptant. Dein eâ cautione qua dictum est ignem accendunt. Fluit primùm liquidus sapor, Resinæ aquam vocant, *Pisselleo* veterum respondens, qui tanquam inutilis abjicitur, tamen ad ea valear ad quæ *Pisselleum* commendatur. Sequitur oleosus liquor, qui cum totus exstillaverit arida &

frutibus in Phiale fundo refina superest, Colophoniam hodie nominant, magni, ut & olim, in medicina usus. *Idem.*

Cæterum Colophonia varie significationis est: vel enim Resinam crudam ex Picea Pinove siccam, denotabat, Chie Mastiche per similem, è Colophonia advehi solitam, vel resinam liquidam ex isdem arboribus ab eodem loco missam. J. B. è Galeno. Pix Burgon. seu Burgundisaca videtur esse refina Piceæ secundum Parkinsonum.

Refina omnis confert præcipue tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle) urinæ ac afrociendi. Calculum pellit, Arthriticos affectus juvat, gonorrhœam sistit.

Extrinsicis Chirurgis usitatissima est in Emplastris, movet enim pus, maturat, & scabiei medetur.

Sunt qui Terebinthinam vulgarem (est autem ea Larici refina) in Cerevisia infundunt, atque simul deservere sinunt pro potu ordinario in preservatione calculi, viscerumque obstructions. *Schrod.*

Refina Abietina calescit & humectat, consumit & separat, articulos roborat, tumores duros dissolvit, dolores podagricos & ischiadicos sedat, emplastris juncta pus promovet: mundificat & incarnat renas, eosque à calculo purgat: specificum est in vulnibus capitis: Inprimis emplastrum modo clavus pedum aut manuum applicata dolores lenit, & partim ejusmodi tumores eradicat. *Wagnerus, p. 297, 298. D. Hulfe.*

De Pice.

** Cap. De Abiet.* Pix non tantum ex Abietis, sed ex Pinis, & aliarum etiam arborum resiniferarum lignis assulatim caesis & in stromem compositis, eo quem supra explicavimus modo, rudi quadam per descensum distillatione, vi ignis excoquitur.

Nonnulli ad usum subitaneos è Pice liquida, siccam faciunt hoc modo; Liquidam in cacabum ferream infusam supposito igne fervefaciunt eoque ut flammæ concipiendæ apta sit, deinde accensam tandiu deflagrare sinunt, donec absumpto humore sicca evadat, cujus cum in parva quantitate experimentum fecerunt, imposito operculo flammam extinguunt.

J. Bauhinus Pice aridæ duo genera facit. Vel enim, 1. Liquida eoque tantum coquitur dum ad visci crassitudinem coacta sit; atque hæc *Resina* nominatur, fortassis quod in pelibus (sive *Cæxæ*) pecudum consideretur ac venderetur: aut quod secundum scabiem sanaret, aut quod illis *grogis* perarum signaret. Officinis *pix navalis*, quod hæc naves picantur: Hæc ipsa cum pulverulenta injicitur aquæ ferventi, & trahitur, sive (ut loquuntur) malaxatur manibus sevo mundis sit futurorum illa quæ sili cannabina inungunt. Vel 2. igne tam valido & tandiu continuato coquitur, ut absumpto prioris humore (per quem aliis tenax est) fragile ac rasilis fiat: Hæc Græcis *ἔξω πικρῆ*, Latini Pix sicca & arida, aut rasilis, dicitur.

Historia Dioscoride sit è Pice separato quod in ea aquosum est, quodque eidem velut serum lacti supernatant. Excipitur *πικρὸν* interea dum Pix coquitur expansis supra eam mundi velleribus, quæ postquam haliu ex ea sublato permaduerint in vas aliquod exprimuntur, iteratimque illud tantisper dum Pix coquitur. Unde patet Pisseleum nihil aliud esse quam serum pice seu aquam pice distillatam. Hoc Galenus Pissanthios florem Pice vocat, Pisseleum autem piceam liquidam cum oleo permixtam. Ad eadem facit ad que Pix liquida.

Zopissa est *Pix navalis*, ex cera & refina confecta, derasa scilicet ex navibus, quæ diu in mari verfare essent, ac (ut vult Plinius) velut vitam illuc peregrissent: Eaque per intensionem *Zopissa*, quasi efficacior dicta, & quod abjecto salis marini callo stimula sit, *ἄριστη* appellata fuit. Multum digredientis habet facultas. *Dos.* in unguentis & emplastris ab $\frac{3}{4}$ ad $\frac{5}{4}$, & plures.

Pice usum apud Veteres duplicem fuisse Rei rusticæ scriptores tradunt: Unum ad dolia & ferias ceteriq; vasa ante quadragesimum vindemiarum diem picanda: cujus usus erat ad duratorem firmitatem vino præstandam (inquit Plinius) ne corruptatur, & sicubi rimosum vas sit ne transiliat. Verum cum hic mos dudum apud nos exolevit in vasis saltem majoribus; qui modum scire desiderat quo vasa picabant, hunc ad eosdem RR. serpentes remitto.

Pice alter usus erat ad condituras, ut vina infirma durare possent. Pice autem odor saporque Romanis olim fuit gratissimus in vino, quæ ob id Picata appellabant. De modo condendi vina cum pice opportunior erit dicendi locus cum de vino agemus. At neq; ad vina condenda nunc dierum illas, quod sciam, Pice usus est, unde nec de condituræ modis opus est ut admodum solitum simus.

Pice illata olim pilos avellere solebant è corporis partibus quas natura is vestitas esse voluit, quod *ἄριστη* & *ἄριστη* Græci dicunt; qui mollium & effeminatorum mos erat.

Quin & pice corpora hominum torquebantur: unde *ἄριστη* inter alia cruciatus & supplicio afficere significat.

Facit Pix liquida, tradente Dioscor. ad lethalia medicamenta [venena *Λεθῆρα*] phthificos, purulenta excrevantes, tusses, anhelationes, & humores intra pectus contentos egre excrevabiles, si cyathi mensura cum melle delugatur. Peruncta valet ad tonsillarum & uvæ inflammationes, & anginas, nempe, ad aures purulentas cum rosædeo [Galeno concoquit duras & crudos tumores omnes cataplasmata indita] necnon & ad serpentium morsus cum trito sale adhibita: pari verò cere admixta scabros unguis detrahit [& impetiginos *Gal.*] vulvæ tubercula * sedisque duritias discutit. Cum farina hordeacea uriniq; pueri decocta strumas circumquaq; rumpit. Cum sulphure, Pinco cortice, aut farsurebus illata que serpunt ulcera cohibet. Mannæ Thuris ac cerato permixta sinuosa ulcera agglutinat. Podum seditive rhagadibus commodè illinitur, ulcera replet & cum melle purgat. Quin & cum ura passa ac melle carboniculos purificantis, ulcera emarginat. Septem quoq; seu quodlibet emplastris uniter admiscetur.

* *Alii pice legunt.*

Calefactoriam vim habet Pix arida, mollit, qui movet, tubercula panóly, dífecit, ulcera replet, ac utiliter vulnerum medicamentis admifcerur.

Pix liquida jumentorum & pecudum ulcera fcabiensq, illita fanat. Nostrates cute ovium & jumentorum ulceribus & vulneribus Picem liquidam illinere folent; verum ad ea potiffimum contra mufcarum injurias tuenda quæ locis crudis & ulceribus, ubiqueq, cutis detritur & caro denudatur perpetuo infidentes admodum molefte effe folent, ovifque ibi depositis vermiculorum catervam ingenerare.

Noſvepicæ Picem liquidam Abiegnam cum cerevifia mixtam in febribus malignis magno fuccellu bibunt: Iis etiam Pix arida podagræ præfentaneum habetur remediũ. Th. Bartholin. Act. Med. An. 1671. Obf. 131.

Pulverem infuper & mufcum Abietis vulneribus periculofis infpergunt. In affectibus Scorbucis medicamenta è Pice præparata valde celebrantur à Claudero de Balfamandis corporibus p. 88. Habui à D. T. R.

Oleum Templinum dictum fit ex comis viridibus Piceaftri per defcenfum igne leni deftillat. Oleum hoc cum olea Rofacei partibus duabus mixtum folamen eſt in omnibus vulneribus, præcipue capitis cum fractura offis: impetiginem quintemiam fanat, verrucas confumit. Wagnerus Hiſt. Nat. Helvet. p. 298. Tranſmiſit D. Hulle.

Verum præcipuus picis uſus, in quem ingens ejus copia quotannis abſumitur, eſt ad naſes picandas earumque rimas & commiſſuras omnes obturandas & communiendas nequa ſe infilſare poſſit aqua marina.

Cæterum Refina liquida quadruplex. Terebinthinæ nomine dicta Officinis noſtris in uſus eſt.

1. Primò, *Terebinthina Cypria, Cypri Turpentine*, quæ genuina Terebinthi arboris lachryma ſeu Refina eſt, quam in capto de Terebintho deſcripſimus. *Terebinthina è Chio ex eadem arbore.*

2. Secundo, *Terebinthina Veneta, Venice Turpentine*, quæ Laricis arboris ad medullam terebratæ latex eſt.

3. Tertio, *Terebinthina Argentoratensis, Strasburgh Turpentine*, quæ ex tuberculis Abietum novellarum colligitur. Vide cap. de Abiete ſermina. Hæc à multis Terebinthinæ Venetæ præfertur nec immerito, certè triplo plura venit. In quibus à Veneta ſeu Larigna differt Caſp. Hoffmannus nos docet. 1. *Abiegna* longè pellucidior eſt Larigna; Idèò quidam (ait Matthiolus) Larignam colatam & ad ultimam claritatem perductam vendunt pro Abiegna. 2. *Abiegna* non tam lenta eſt & contumax, ſed ſubito abrumptur ſi digito immiſſo attollatur. 3. *Abiegna* eſt odoratior non Larigna tantum ſed ipſa etiam verà Terebinthina. Eſt autem odor Thuris. 4. *Abiegna* eſt amarior, & quodammodo refert ſaporem corticis Mali Citri. 5. Poſt annum incipit ita veſcere.

4. Quarto, *Terebinthina communis* ſeu vulgaris, *Common Turpentine*. Hæc minus liquida & craſſior eſt reliquis, nec pellucida, albicans, conſiſtentia ſere Olei frigore nonnihil denſati; Hanc Pinus montanæ ſeu ſylveſtris C. B. liquorem eſſe exiſtimo; ſiquidem à Maſſilia ad nos deſertur; ipſe autem obſervavi non procul ab ea urbe montes hoc genus arborum ſylvis veſtitos, earumq, plurimas deciſo non longe à radice cortice vulneratas ut resinam funderent, eiq, excipienda ficilla trunci appenſa aut ſubjecta.

Thus vulgare Officin. noſtrarum, *Common Frankincenſe, o; Parroſin* Pinæam resinam eſſe affirmat Parkinsonus in terram deſluentem & brevi indureſcentem; cui & nos facile aſſentimur, quia ab eodem loco ad nos adfertur, nec aliæ ſint in vicinia arbores resiniferæ.

Piceæ Burgundicæ noſtratibus dictam, *Burgundy, o; Burgony Pitch*, idem Parkinsonus Piceæ arboris Resinam eſſe exiſtimat, cum primò effluat liquidam, tempore indureſcentem, ut tandem friabilis reddatur: quod an verum ſit neſcio, necdum enim certi quocquam de ea comperi.

Suſpicatur D. Tamerlan Robinſon, Thus vulgare Officinarum non ſolum è Pino, ſed è Piceâ, aliſque arboribus resiniferis effluere in terram, & laxa, ibiq, in nucas indureſcere parte magis oleoſâ evaporata; unde candida illa gomme cum resinis ſæpenumero mixta, & à Plinio annotata inter Mercatorum fraudes. Olibanum præcioſius, & rarius, hoc igitur ſit Arabicum, Thus vulgare Europæum. Atramentum illud fuliginofum noſtratibus *Tamp black* dictum, nil aliud eſt quam fuligo resinæ vel picis concremata; propter quod Officinas ædificant fumum cum non emittentes, olium ad atramentum ſcriptorium in uſu erat, & ad colorandum. Adulteratur fornacum, balnearumq, fuligine. Vid. Phn. lib. 75. cap. 6.

C A P. III.

De Cedro conifera.

Cedrus, *Κέδρον* vocat in Græcâ, *cedrus* in Lat. à *cedere* dicitur quòd facile accendatur traturque. Prius Egmon minor Cedro magis convenit, poſteriori majori: hæc enim facile ardet ob resinam Cedriam dictam.

Cedri nomine duæ diverſorum generum arbores donantur: altera *hæciferæ* eſt folio ſpinolo ſeu pungente Oxycodrus inde dicta, quæ revera nihil aliud eſt quàm Juniperi ſpecies major: Notandum autem, Lignum quod ad nos ex America deſertur *Cedrus* appellatione, Juniperi cuſuſdam ibi naſcentis caudice craſſo & proterò lignum eſſe: altera *conifera*, de qua hoc in loco.

Differt autem Cedrus à Larice (cui alias simillima est) trunco majore, foliis perpetuis, conis plus quintuplo majoribus.

Arborem hanc esse Cedrum Libani, in Sacris literis tantopere celebratum, cujus usus erat ad templum Salomonis aedificandam, minimè dubium est.

Cedrus conifera foliis Laricem C. B. magna, sive Libani conifera J. B. magna conifera Libani Park.
The Cedar of Libanus.

Arbor est perpetuò virens, robustis ramis brachiata, ogyias aliquot crassa, ad summam Abietum nostratum proceritatem assurgens; quanto autem majores accreverint rami, quorum pondere gravatus caudex se inclinat, tantum de arboris rectitudine decedit. Rami (ut & coni, magni, rotundi) sursum spectant, longi, tam pulchro ordine dispositi, ac si artificis manus relectos aequatòq; apposuisset: sic ut eminè etiam circinatus equaliter dispositorum orbis egregiè appareat: ex quo etiam antequam cominus contempleris, facile inter hanc aliamque resiniferas arbores discrimen notes licet: ceteroqui magna huic cum Larice similitudo, potissimum in foliis, quæ parva, angusta, conferta, in extero fulcello fusco clavis musci terrestri longitudine & crassitie simili, quæ (ut ait Bellonius) ab uno furculo exorsa, 40 vel 50 simul, serie quadam in ordinem disposita, furculum radiantia prætoris penicillum referre videntur, odorata, subacida & cum levi amaritudine adstringentia. Sola inter arbores, dempta Abiete, conos in cælum tendentes mittit; hos sic describit J. Bauhinus. Quatuor pollicibus altiores, octonos in ambitu circa basin colligunt (quos nimirum ille habuit) paulatim in obtusum turbinem fastigiati, squamis compactè seorsum circiter latis, unciam altis, medio crassis, rufis, per extrema extantia planis, alia alius finem ita subeunte, ut quot sint earum circumcirca agmina, totidem zonis præcincti videantur: inferior autem uniuersusq; ex his squamis pari lambdoides mucrone suo haurit adnascitur, jugo elato medium percurrente, in valles laterales declivi, topidem confinalibus ex aduerso valloculis respondentibus, quæ totidem recipiunt nuculas, pomaceis aut pyræcis grana duplo triplove majores, formâ non absumi, rutilante quadam resina, dura sed fragili, vehementer odorata, evidenter acri facetas; quarum unicusq; uncialis, triquetra, tenuisque membrana affigitur, papillonis alam egregiè referens, ita quidem ut duæ membranæ uni squamæ majori averso incubitu respondeant. Cæterum pediculus conis validus existit, uncialis & sextantalis longitudinis, crassitudine tere extremi articuli minimi digiti, obliquus aut incurvus, cortice rugoso, & squamulis exiguis (ut in Pinastro) subinde loricanus, tam firmiter ramo adherens, ut divelli non possit nisi avulsa arboris parte. Coni porro hiantes se pandunt, ac paulatim diffusis roibus ac pluvius decidunt, relicto in ramo pediculo seu stylo medio, cui squamæ adnascuntur, firmo & tæreti, quod & in Abiete semina observavimus. Pediculus autem squamas non prius exiit quam duos annos excolescit.

Ramus quem habuit J. Bauhinus pollice crassior, cortice erat crasso, rugoso, foris fulco, intus rufescente, materie dura, alba, in ramulos satis crebros divisa.

Lignum colore erat undequam, rufescente, (qualem in Pyri ligno subinde conspicimus) postibus rotis fissile, solidum satis, modis tamen inter fibras sparsa mansa, ut lignum Quercum, ostendens, nullam cariem, nullam terebrationem sentiens.

Theophrastus eam Cedri trunco crassitudinem attribuit, ut eam ulnæ hominum quatuor vel etiam plures nequeant amplecti. Melchior Laffé apud J. Bauhinum Cedros montis Libani tam crassas fuisse ait, ut sex vel septem homines vix possent amplecti trunco.

Dodonæus corticem inferioris partis trunci, quæ à terra ad primos porrigitur ramos, asperiores esse scribit; reliquum vero lævem ac glabrum, inter ramos conspicuum.

Duas profert resinas, quemadmodum & Abies, alteram in tuberculis albam, nihil proferus amarulentam, nec gravis odoris: alteram sua sponte exsulantem, quæ cum retorrda sit, naribus admota, fraga redolent, odoratque gustatu percipiunt, sed ita pertinaciter dentibus inhaeret, ut non nisi cum difficultate auferatur.

Luc.

In monte Libani, ubi sponte oritur tantum 24 supputavit Rauwolfius; nec plures Melchior Laffé prædictus: Bellonius circiter 28: qui & in Amano & Tauro montibus se Cedros vidisse refert.

An Cedrus Libani Recentioribus dicta Veteribus cognita fuerit non levis est controversia. Hinc enim, Theophrasto, Plinio, Galeno, Dioscorido auctoribus, Cedrus etiam major, baccas, Cedridas dictas, fore, non Conos; proinde Cedrus montis Libani esse non potest, quæ conifera est. Ex altera autem parte, magnitudo insignis quam Plinius & Theophrastus Cedro majori attribunt Oxycedro, (quæ reverà nihil aliud est quam Juniperi species) nullo modo convenit: uti nec nomen Cedrelates, quod quidam, autore Plinio, Cedro majori attribunt. At neque, si Bellonio credimus, Cedrus minor in Syria reperitur, ubi Theophrastus miræ magnitudinis Cedros nasci scribit.

Cedrus autem Libani Larices non esse, ut Gualandinus & alii voluerunt, inde constat, quod Larici folia decidunt, Cedrus magna perpetuò vireat: Rami Laricis deorsum dependant, Cedri magnæ sursum spectent; tandem quod Larix in Syria non reperitur.

Magnam tamen similitudinem cum Larice obtinere Cedrum non est diffidendum, ut merito congeneres censentur arbores.

* Comment.
in Theophr. hist.
Ep. c. 1. p. 973.

Cedriam antiquorum Cedri lacrymam seu resinam esse, non Picem, ut nonnulli volent probat Rodanus à Scapel. quem consule.

Bellonius lib. de arb. conif. non Cedrum tantum Cedriam fundere, sed etiam Pinum, Picem, Laricem, Juniperum, Cupressum, quarum omnium resinas defunctorum corpora servare scribit: quem hac de causa Matthiæ non immeritò reprehendit.

Viret.

Cedriæ autem hæc facultates à Veteribus tribuuntur, Defuncta corpora incorrupta ævis servat, viventi corrumpit, mied differentia, cum vitam auferat spirantibus defunctis pro vicia est. Vestes quoq; & pelles corrumpit, & animalia necat. Galenus 7. Simpl. speciem esse tradit, ob caliditatem cum substantiæ tenuitate conjunctam. Commoda est ad oculos medicamenta, ut quæ illa vifum

visum acuat, & albugines ac cicatrices delet; cum aceto vero instillata vermes aurium necat, & cum Hyssopi decocto infusa sonitus ac sibila sedat. At Plinius, timuerim (inquit) vel gravitati aut vertibus aurium instillare [ob septicam vim superius tactam.] In cava dentium indita dentem frangit, & dolorem sedat: idem facit etiam si cum aceto colluatur. Plinius dentes quoque eo colluere timuerit. In anginis illinatur, & tonsillarum inflammationibus opitulatur. Hoc etiam, nec præter rationem, improbat Plinius. Phthiriales eo inungere non dubitant idem, & contra porriginem. Cerastræ serpentis moribus, cum sale imposita auxiliatur, & contra marini Leporis venenum ibitur in passo. Prodest & Elephantiasi laborantibus si oblinatur. Purgat quoque ulcera in Pulmone eisque sanat, si cyathis mensura sorbeat. Mirum hoc non reprehendere Plinium. Vermes & Ascarias perdyperem infusum. Ulcera sordida & excrementa in eis aures quædam inungunt. Co. Fit & oleum ex eo, quod Pissellæum vocant, vehementioris ad eadem omnia usus. Privatim verò Quadrupedum, & canam ac boum scabiem curat, Rcinas etiam in iis perdit, & ulcerationes que ex tonsura ipsorum oboriuntur ad cicatricem perducit.

Ex Cedro oleum nasci scribit Vitruvius: quo libri aliæve res perunctæ à tinea & carie non læduntur. Ad quod pertinere videtur illud Persii, Satyræ primæ

Et cedro digna locutus.

Item illud Ovidii Trist. 1.

Nec titulum minus, nec cedro charta nitetur.

Ego potius colorem aliquem cedri oleo temperatum potam intelligere puto ob verbum *nitetur* additum: nec oleo simplici, quod propemodum decolor est, aliquid notari recte dicitur.

C A P. IV.

De Larice.

Laricis nomen à Germanico antiquo *Larich* vel *Laric* dictum esse verisimile est. Apud Cæsarem voces Germanicæ in *ich* terminatæ, observante C. Hofmanno, mutantur in *ic*. Laricem autem Theophrasto & veteribus Græcis incognitam fuisse cum Bellomo putamus, qui ait universis locis Græciæ per quæ transit Laricem non apparere. Larix à reliquis confersis & resiniferis arboribus abundè distinguitur quod folio sit decidua. Verum de tempore quo folia decidunt non consentiunt Botanici. Matthioli folia non decidere hyeme, sed novo vere cum rocentia propellunt vetera affirmat. Matthiolo suffragatur auctor *Ætymologicus* J. Bauhinus, qui non Autumno sed Vere folia decidua se observasse scribit. Alii è contra folia Autumno decidere & arborem hyeme nudam esse asserunt; per reliquos C. Hofmannus. Quod autem? inquit, nisi omnes qui hortum medicum frequentavimus ceci sumus singulis Autumnis folia decidant. Ego J. Bauhino ut curioso & veraci potius assentior. Observent & licet hanc detorminent quibus arborum harum copia est, & insipientia animus.

Larix Ger. C. B. Park. *folio decidua confersa* J. B. *The Larch tree.*

J. B.

Candice recto ac procero Abietis æqualis est: *cortice* crasso, scabro, fuscoque [J. Bodæo cortex inferiore parte que ramis sobest crassus, asper, undiq. in rimas delulcit, præcisus interiori rubere conspicitur, reliqua parte lævis, glaber, nonnihil foris inalbicans.] Rami circa stipitem velut per gradus collocantur, longi, graciles, deorsum dependentes. *Folia* leniter odorata, ramos confuso ordine ambiunt, è tuberculis umbilicatis duodecim, viginti, aut triginta simul penicilli in morem conjuncta procedunt, tenera, perangusta, crassitudine porcinas fetas æquantia, uncialia & longiora, viridantia, [Scapulis breviora, tenuiora, molliora quàm Pini, haud aculeata sed retusa, adventante hyeme pallida effecta, (quod & nos observavimus) ad stipitis radicem decidunt] non ante Hyeme decidenda quàm alix initio vere succodant. Non igitur universa simul, sed singula paulatim recedunt, alii interim succellu ab hisdem tuberculis procedentibus dilapforum vicem occupantibus, ita ut non defluxisse folia, sed novæ juventutis habitum indidisse videantur. [At Stapelius aliique nudam hyemem transigere Laricem affirmant.] *Flosculi* seu potius conorum rudimenta Scapulis rotunda, è teneriorum ramulorum summitatibus erumpunt, arborisq. mirum in modum condecorant, quod in purpuram ardenter rubescentia, constantibusq. foliis miro nature artificio annexa, viatorum oculos non parum recreant, suntque odoratissima. *Coni* pertinaciter ramis hærent brevi, contorto, crassifusculo pediculo, nutabundi, naci Cupressini magnitudine, sed paulò longiores, squamulis compacti lamellis compressis, obtusi, tenuibus [ex rubro, ut inquit Clusius, purpurascens, nimirum dum tenelli sunt, & nondum maturaverunt] qui dum novelli & recentes sunt ex hisdem tuberculis è quibus folia procedunt, petiolo sursum reflexo nitentes, ut mucrone cælum spectent: illisq. intercedunt squamule foliaceæ, tenelle in stylum acutiorem detinentes que singule continent semina parva, alata, gemina, magnitudine seminis Cupressi, foris cinerico cortice, intus autem candido nucleo constantes, sapore dulci & Pincam nucem referente. Materies firma latis & solida, in rectum sessilis, fulva, crispantibus saturatiore coloris callis, pectinibus rectis, odorata, flammescens, odorem quoque, præcipuum nabis aspicans.

In Alpibus Rheticis & Valsicis abundè provenit. Nos in Alpibus Sciriæ & Corinthiæ copiosam observavimus, cum Vienna Venetias iter faceremus. In Viennensi saltu, tum aliis montibus

bus Alpebus vicinis, exceptis fumis jugs, abundare Laricem scribit Clusius. Plinius, Vitruvium, ut videntur fecutus, Laricem nec ardere, nec carbonem facere, nec alio modo ignis vi consumi quam lapides scribit. Hoc tamen falsum esse experientia constat, nam apud Vallefanos quibusdam in locis, non alia ligna in usum foci adhibentur, ac alicubi etiam in Alpibus ad ferrarias fodinas carbones ex ea fiunt.

Nec verius est, quod hanc perpetuò vivere dicit, cum Botanicorum omnium consensu solo sit deciduo: potest tamen hac in parte defendi Plinius; cum Larix (teste J. Bauhino,) non antè folia amittat, quam Vere nova producat.

Erravit insuper Plinius Laricem nullo flore exhilarari, nec natales pomorum recursum annuos vericore nuncio promittere affirmans, cum, observante Casalpino, flores ineunte Vere emergant in cacuminibus, in purpura valde rubentes, odoratique: Quòd si hi nihil aliud sunt quam conorum rudimenta, non immeritò Plinius arborem floriferam esse negavit. Ego autem in hoc genere non minus quam in aliis coniferis dari flores à fructibus non tantum distinctos, sed etiam disjunctos suspicor.

At verò quomodo Plinium Laricis morbum esse ut Tarda fiat scribentem excusum non video: in hanc autem errorem incidit quòd ~~est de~~ Theophrasti, i. e. Pinum, pro Larice habuerit, & cuncta Larici tribuerit que de Pinu Theophrastus scripsit, cujus proprius morbus est ut Tarda fiat.

Ufus.

Larix (auctore Plinio) quam Picea materiam præstantiore longe, incorrupta vis, emori contumax. Fiunt ex ea (referente Clusio) vinctorum pedamenta, & pali circa Neapolim & supra Badensium [Austriæ] thomas, ut que corruptioni minus sit obnoxia: item longissimi canales, totis supponendi & aptandi ad pluviam & imbres ex eis decedentes excipiendam: sunt enim ad hos usus commodissimi; nam cum firmi & solidi materia constant, diutissime Solis ardoribus, & aliis acris ignis resistere possunt, nec finduntur aut vitium contrahunt, eaque de causa non Piceis aut alterius inductione egent. Structurarum pondera firmissimè & diutissime sustinet, idque Baptista Albertus adnotasse scribit, cum alibi tum apud Venetias ex vetustis operibus.

Vires

Folia ejus & cortices adstringentiam facultatem obtinent: lignum magni fieri adversus elephantiasin scribit Stumpfius, Simlerus contra lepram.

Colligitur ex hac arbore resina liquida, candicans melis, veluti Attico aut Hispanico, colore & consistentia similia, que tamen non sponte effluit, sed ex arboris trunco emanat crasso oblongoque terebro ad cor usq; excavato; manantem inde Resinam vasculi quibusdam è Piceo cortice paratis excipiunt. Resina hæc Larix dicitur, in officinis Terebinthina appellatur, ejusque loco venditur. Quod novum non est. Nam & sua ætate Galenus rhopopolas Laricem Terebinthina loco vendidisse refert. Vide Bod. à Scopel comment. in Theophrast. lust. lib. 3. cap. 10. ubi è Galeno ostendit eos citra errorem hanc illi substituere.

Parkinsonius & C. Hofmannus Resinam Laricem esse quam Officina nostra Terebinthinam Venetam vocant affirmant; & C. Bauhinus hanc non tantum pro Terebinthina in usum receptam esse, verum etiam solo Terebinthina cognomento cognitam ait: nec desunt (inquit) qui in totum Laricis resinam esse volunt quam pro Terebinthina Officina habent.

* *Hist. Natur. Hist. ris*, p. 296. 297.

Ea (inquit Jacob. * Wagnerus) odore, gustu ac facultate est præstantissima. Externus ejus usus in scabie, plora, tinea, internus ad ardorem mitigandum in ulcere vesicae, nephritide, purulenta mitione ad renes derogandos. Dilutum quoq; ex Laricæ 3j cum vitello ovi & aq. Cardui benedicti egregiè purgat, inebriat pota, quod Rhæti lignatoribus familiare.

Pro usu Terebinthinae vide resin. Pini & Abietis: & cap. de Pina Sativâ & de Terebintho.

CAP. V.

De Cupressis.

Cupressus Græcis *Κυπρίων* vel *ἡ δὲ σίον μέγιστη τῶν κυπρίων* à partu parvium ramorum dicitur, ut habet Auctor *Γνωμοτῶν* l. 11. c. 5.

Cupressi autem notæ sunt, præter communes huic generi fructus è clavatis lignosis tuberculis per harmoniam in formam globosam coæpeatis compositi: foliola breviter acuta in squamas degenerantia.

1. Cupressus J. B. C. B. Park. Sativa & sylvestris Gat. The Cupress Tree.

J. B.

Procero, recto, crassoque candice surgit; cortice ferè spadiceo, materie firma, solida, odorata: supra medium in ramos abit, metam concussu suo effigiantes, unde Ovid. 10. *Metamorph. meta imitata Cupressi*. Folia Cedri retusa aut Sabinae imbricatum connexa perpetuò virentia [insunt tamen (ut rectè Casalpino) in nuper nascentibus foliola breviter, acuta, que in adultis degenerant in brevissimas velut squamas rotos furculos convestientes.] Galbuli Juglandis nuclei pulvinato cortice totæ æquales, contragosi, rimas agunt, in clavata tubera dehiscentes, inter quarum commissuras femina continentur ruffa, sublonga, altera parte rotunda, altera acuminata. Lemicalmo latiora, medullâ donata. Sapor acerbis, qui potissimum in pomo clacet. Lignum pallidum aut rubescens, nec cariem sentit, nec teredinem, firmum, durum, undulis nonnihil crispum, micis saturatoribus nunc longis transversisque, nunc parvis punctorum instar variantibus. Illi odor suavis, sapor verò vix ullus excellens, præterquam in cortice, qui evidenter lingue offert adstringentem cum amarore, obq; hæc ingrato in veteri quod excessu triginta annos.

Cupressus in Creta insula sponte provenire dicitur, ubi, Plinio teste, quocumq. loco terram move-
 rit quispiam, nisi feratur alia hæc gignitur proninque, emicat: maximeque [non aperto solo &
 sponte] in Idæis montibus & quos Albos vocant, summique jugis, unde nives nunquam absint
 plurima, quod miremur, alibi non nisi in tepore proveniens, & nutricem magnopere fastidiosa. Nunc
 iterum, tradente Bellonio Cupressorum sylvas nequaquam comperies, sed sparsim hic unam, ibi
 aliam in abruptissimis locis, aquas enim odit.

Theophrastus, Plinius & Recentiorum nonnulli Cupressum fervida loca amare, nec nisi in to-
 pore provenire aunt. Alii, ut D. Evelynus, experientia sua Cupressum frigus non extimescere, nec
 à gelu etiam intensissimo lædi aut corrupti affirmant, modo absint venti Orientales, at nec illis in-
 gruentibus facile periri aut periri nisi Autumno detonsam, unde, & Plinio ipso fatente, in nivosis
 Idæ verticibus durat, *bravique illæsa perveniat.* Verùm contrarium nos docuit levissima illa & asper-
 rima Hyems Anni 1687. in qua gelu post hominum memoriam vehementissimum & diuturnum
 plerasque Cupressos per totam Angliam crescentes perdidit & vastavit: nonnulla tamen ferocissimis
 eius insulubus animosè resistentes evaserunt. Quid ergo dicemus? Cupressum frigori moderato re-
 sistere, acerrimo cedere! an cum Bodæo à Scapel Cupressum frigida quidem natura sua odisse, quòd-
 que alicubi in summis montium jugis reperitur, soli cælique proprietati tribuendum esse? Ego
 sic censo Cupressum montes & loca frigida amare, sed regionum calidiorum, proinde in frigidioribus
 sponte non provenire. At verò cum Bramæ patiens sit, in frigidis regionibus, ut Anglia nostra, cul-
 turam facile admittit, & frigidibus specieis in proceram arborem adolevit.

D. autem Evelynus Hortulanorum nostrorum vulgarem illam Cupressum improbat, quæ Cupressorum
 ramos vinculis & fasciis circumligant, ut in metæ formam coerceantur; quomodo, inquit, aerem
 nè liberè ad caudicem accedat, eumque circumfluat prohibentes, ventilationis defectu plures arbores
 interimunt quàm hyemum nostrarum rigores; cum propositi sui facilius & felicius sine noxa aut
 detrimento arborum compotes fieri possent caudices decucuminando, & ramos in circuitu in eam
 formam detondendo.

Atque hæc occasione adnotabimus ex Plinio, Cupressum in quam velis formam duci & detonderi
 posse, trahi etiam in picturas opere historiali, venatus classisque & imagines rerum tenui folio bre-
 viq. & virenti supervehentem, fieriq. ex ea lepes tonsiles pulcherrimas ad hortorum & viridiorum
 ambulacra limitanda, distinguenda & exornanda.

Theophrastum abuti sensibus nostris rectè scribit Scaliger cum Cupressi semina prætenoia, exilla
 & surfuracea esse scribit, nec excusandi Matthioli & Lacunæ qui Veteres temere sequuti, quàm nat-
 uram ipsam consulendi laborem subire maluerunt.

Cupressum aquas odisse Veteres testantur; Astipelatur Matthioli, qui & flumina & lacus &
 omnes aquosos tractus averfari scribit, quo fit (inquit) ut in ejusmodi locis sita statim marcescat. Eno-
 ri etiam dicitur si copiose novella adaqueatur. *Thesop.* Theophrasti sententiam (inquit Scapellus)
 probat experientia; & hortali nostri damno docet, Cupressum & semine natam crebra rigatione po-
 rire, modicè lædi, pluvia etiam terræque humida nimis nocet. At Cato Cupressos satis irrigare po-
 bet quoties opus erit; consentit D. Evelynus, verùm Aspergillo potius leviter irrorandas, quàm largè
 inundanda monet, eimq. paulum læcrescentiam aquam parca manu affundendam, nam in levi, are-
 nolo & calente solo melius proficere experientia constat, quicquid nonnulli contradicant.

Cupressus Dni sacra, & ideo funebri signo ad domos polita; cujus moris quæ ratio fuerit videtur
 apud Jo. Bodæum.

A. Veteribus in mare & feminam distinguunt, quam distinctionem & D. Evelynus admittit. *Comment.*
 quæ meti est in fistigum convoluta femina appellatur: quæ spargit extra se ramos mar dicitur *in Theophr.*
 Plinio. Theophrasto mas est quæ omnino infæcunda. *hist. l. 2. c. 6.*

Cupressi materies ad durandum perpetua, unde ea ex qua valvæ templi Ephesini stabant, reso-
 lente Theophrasto, quatuor ætates reservata duravit: quæ & valvæ Templi S. Petri in Roma, ex
 hoc ligno factæ à temporibus Constantini magni Imperatoris ad Eugenium quantum Papam per
 sexcentos paulo minis annos non tantum incorruptæ sed nitentes & novis sinus permanserunt.
 Mortuorum insuper locali in Ægypto, in quibus cadavera condita (Mumias vocant) recondi so-
 lent multi ex hæc materia facti observantur; quos in cryptis illis arenosis sepultos aliquot antiorum
 millia incorruptos jacuisse verisimile est. Utius ejus est hodie ad mensas & tabulas & alveolos ex-
 ornandos, necnon ad Organorum musicorum tubos, reliquaque instrumenta musica. Sola etiam
 hæc (autore Theophrasto) nitorem recipit, idèque ex hæc condere operum lautiora consuevit.
 Tanti autem fiebat hæc arbor Antiquis Romanis, ut vulgò, referente Plinio, Dorem filiarum plan-
 taria appellarent. Cupressi autem materies ex hoc maxime laudatur, quòd neq. vetustatem, neq.
 cariem lentiat, & bonum semper odorem spiret.

Quod ad vires, Cupressi folia cum passò [vino Matth.] & modica Myrrha pota vesicæ fluidæ & *Vires.*
 urinae difficultati [involuntariæ mictioni & stranguriæ Matth.] auxilium præstat. Pilule verò contatæ &
 cum vino potæ ad sanguinis rejectionem, & dysenteriam, alvi fluxionem, orthopnoeam & tussim com-
 modant. Sed & decoctum ipsarum idem facit. Mollunt etiam duritias contatæ cum Fico, & polypos
 narium sanant. Removent item scabros ungues cum aceto coctæ & cum Lupinis tritæ. Compi-
 munt & intestinorum hernias impositæ. [Sed & folia eadem faciunt] putantur etiam culices fu-
 gare cum coma sufficæ. Ac folia trita imposita vulnera glutinant, soporunt & sanguinem. Cum
 aceto autem trita capillos tingunt. Imponuntur etiam per se & cum polema ignibus Sacris, Hæ-
 periti proserpenti, Carbunculis, & oculorum inflammationibus. In ceratum verò ammixta si impo-
 nantur roborant stomachum. *Disces.*

Galenus omnibus Cupressi partibus tribuit vim refocandi absq. insigni acrimonia. Amaritudo
 autem insignis calidas esse arguit; quæ & lignum à tinea intactum præstat. Nescio an verum sit
 quòd scribit Bellonius de Cupresso, nimirum hoc peculiare habere in Creta quòd ab incolis succis
 ex cespite tamen regerminat, ut nepotes stolonèque è radicibus caduz sylvæ modo procreantur,
 qui tandem in maximas arbores excreverunt: siquidem Cupressum quocumq. loco crescentem prope
 radiocum etiam succisam regerminatam suspicor.

Ad Scrophulas, & folia Cupressi nec duriora, nec teneriora; toto vino ostensperge donec in corpus coquant, & applica super Scrophulas. *D. Halse à Chesnean.*

Cupressum resinatum fundere superius annotavimus cap. de Cedro confusa.

2. *Cupressus Virginiana* Tradescanti. *Americana* Park. Tradescanti *Virginian* Cupressis.

Hanc arborem ob fructum (ut puto) & in parte etiam odorem, Cupressi nomen adeptam, quamvis folia ab ea multum differat, Parkinsonus sic describit, Aliquibus in locis America Septentrionalis in proceram & speciosam arborem adolescit, caudice ad 50, 60, imo 80 nonnunquam pedum altitudinem nudo seu ramis viduo, una parte tres propemodum orgyias in ambitu colligente, summa ramos grandes undiq; protendente, in furculos divisos, foliis multis ale in modum dispositis obfisos, tenuibus, oblongis, planis, levibus, ad tactum mollibus, non ut in Cupressillo quadratis, rugosis aut plicatilibus: quamvis autem ramulis hinc inde adnascantur, non tamen semper bina sibi directe opposita, sed inordinatè. Nuces Cupressinis nonnihil similes sunt, sed majores, crassiores squamis magisque hiantibus compositæ, semina intus majora claudentes. Lignum nonnihil odoratum.

Habbel fructus Paludani ab hac nucle non multum abluat, seu formam species, seu squamarum amplitudinem; ob loci tamen natalis distantiam eandem non autem asserere.

Me monuit *D. Tancredus Rabonius* se vidisse in horto *D. Aspinis* speciem Cupressi huic valde similem, vel eandem, sub nomine Cupressi Virginianæ foliis Acaciæ deciduis.

CAP. VI.

Arbor Vita Ger. *Park. Vita*, sive *Paradisifera*, vulgè *dilla*, odorata, ad *Sabnam* accedens *J. B. Thya* Theophrasti *C. B. The Tree of Life*.

J. B.

Quamquam non inquilina elegans hæc arbor, facillè tamen coelo solòque nostro assuescit, sic ut in iusta proceritatis arborem exerceat: caudice recto, nodoso, cortice cinereo aut rubente, materie Abiegnâ, resinosa, ramis perpetuâ comâ virentibus, & alarum modo expansis, qui in alios ramulos planos, alternatim è latere succrescentes divisi, abeunt denuò in multa oblonga folia, numerosis foliolis compressis, quaterna modum gibbosum complectentia ex ramulorum extremis aut paulò citra. Vere oriuntur flores, pusilli, flavescentes, quorum nonnulli deinde in conos parvos, sublongos, Pinci nuclei magnitudine efformantur, è sex tenellis squamulis compactos, initio virides, deinde pallescentes, postremò ubi planè maturaverunt nigricantes, qui in quatuor carinas dehiscentes, semina ostentant sublonga, quaterna, plerumq; paleacea, medio paululum extuberante, in quo modulla acris & amarificali sapore. Coni hi nonnulli detracti ferè aut tabidi pediculo excident. Hujus plantæ odor nobis non est gratus. [Mibi quamvis vehemens sit non tamen ingratus] de quo hæc Clusius. Tota arbor graviter odorata est, reliquas congenere longe superans odore, quem, si quis solum digus nonnihil duntaxat conficaverit, facillè eluere non possit. Hanc autem non modò viridis ex se exhalat, sed etiam multis in annis excisa & reliccata rocinet.

Nonnullis *Thya* Theophrasti aut *Bruta* Plinii censetur: nobis tamen verisimilius Veteribus profus incognitam; ut rectè Dodonæus, Novi orbis nova stirps habenda est. Galli *Arbre de vie*, id est *Arbor vite*, eòque secutæ reliquæ ferè gentes nuncupant, nescio qua ratione ducti (inquit Clusius) nisi fortè ob immortalæ ejus comam quam habet, aut odoris ejus vehementiam, quam salubrem esse existimant, hoc nomen indiderunt.

Locus.

È Canada Septentrionalis America provincia in Galliam primùm illata, & Francisco primo Regi *Arbor vite* nomine donata est: inde in alias regiones translata, & in Germaniæ, Belgii, Angliæ hortis frequens facta. Facillè enim rami depacti radices agunt, præsertim loco umbroso, & semli pinguique solo. Nascitur etiam semine: Sed tenelle plantæ, antequam in ramos dividantur & excipientur, *Oxycedrum Juniperumq;* majorem primùm enatas admodum æmulantur. Frigoris patientissima est; hyeme tamen fulcra & fuliginosum colorem contrahentibus foliis, quæ novo vere pristinum nitorem & viriditatem recipiunt. *Clas.* Non profundè radicitur, quam oportet majores fulcire, ne à vento decedantur.

Vires.

Ex sapore & odore facillè colligitur hanc arborem temperici esse calidæ, & partium tenuium, unde verisimile est digerendi & abstergendi facultate præditam esse. Parkinsonus folia tenera & cruda cum butyro pani illata & comesta ad tenaces & viscidos humores expectorandos nonnullis in usu esse scribit, verum aliquibus qui teneriore sunt constitutione non convenire quòd nauseam facillè moveant. Elicitur ex ea aqua & oleum per Chymica organa, utile ad dolores podagricos ritè impositum. *Cam.*

Hæc arbor, si rectè describatur, flore fructu prævio & contiguo, in nostra methodo ad hoc sèna proprie non pertinet, sed anomala est: Verum quoniam Cupressum foliis valde æmulatur, & quodammodo confusa est, hæc referendam duximus.

CAP. VII.

De Alno.

ALNUS, (Græcis *κάλυξ*) inde dictam putat Curtius quod ab amne alatur. Quid si dicamus, quod ipsa potius herbas alat? *Pascit sata* (inquit Plinius) & *sub Alni tegmine herbas succulentiores nasci observatum*. J. B. Hoc de gramina fortasse verum esse potest (quod tamen nobis non videtur) at nec frumenta, nec legumina, nec linum, aut milium & similia, rectè & feliciter sub ejus umbra frigida proveniunt, ut observavit Aug. Gallus.

A. 1. *Alnus* Ger. *vulgaris* Park. J. B. *rotundifolia glutinosa virida* C. B. *The Common Alder-tree.*

f. B.

Arbor est justæ magnitudinis, cortice scabro, fusco, ligno molli, rufescente. Rami valdè fragiles sunt, ut vel digitales levi inflexu frangas, (ob id *Frangula* hæc arbor dici posset) cortice ex fusco subcinereo, maculato, internè lateolo, amaro cum adstrictione, & ingrato, ligno intus albo & medulloso: *folia* vestuntur latis *Avellanæ* vulgaris, rotundioribus, nervosis, crenatis, viridibus, splendens, lento & viscido humore oblitis. Oculi triangulares ex cinereo rufi, interdum & virides, aut in purpuram quodammodo vergentes. In ramulorum fastigiis nucamenta seu *juli* dependent, simul multi, virentes vel rubentes, unciam circiter longi & fragiles, antequam fissuræ conferruminatarum particularum dehiscant, quæ ubi se explicuerint, duas etiam uncias longitudine superant, sapore adstringente cum aliqua amaritudine. Cæterum portunculæ dictas ad modum tanquam costam alligatas ambiunt staminula multa, ut in *Corylo*. Mense Septembri apparent etiam minimorum rudimenta. Eodem mensè veteres conos videas, privatis ramulis pendentes, binos, ternos, quaternos plus minus, pulchrè hiantes & apertos: item paulò ante, aut eodem tempore novos, magnitudine parvæ *Avellanæ*, primò virentes, ubi maturefcunt rubentes, & mox hiantes, ex imbricata squamarum compage coaggestos: è quibus & ante seminis maturitatem stamina purpurea prominula quadam observata, quæ fortasse florum loco haberi possunt. Horum gustus valdè astringens cum aliqua amaritudine: in quibus *semina* ubi matura fuerint parva admodum, compressa, inæqualia, rubentia, atq; in iis medulla alba, pauca, sapore manifesto destituta.

Gefnerus, *Tragus*, C. *Bauhinus*, *Bodæus* à *Stapel* & alii *Julos* à *Conis* non distinguunt, sed in conos contrahi stant: cum res sint diversissimæ *Coni* & *Juli*, exortu distinctæ, uno eodemq; tempore in hæc arbore observabiles: unde patet non timere fidendum esse descriptionibus florum, fluctum eorumq; partium apud Botanicos, sed res ipsas inspicienda. At *Julos* esse flores, quicquid contradicat J. *Bauhinus*, prædictis autoribus non inviti concedimus.

Gaudet aquis plurimum *Alnus*, ut haud forè alibi quàm humectis & uliginosis nascatur locis, ad fluminum ripas, inque palustribus cœnosis & ad aquarum scaturigines. Fructus communiter maturefcit Septembri, quo tempore & novi exeunt *Juli*. Vidimus sæpissimè *Julos*, conos veteres & novos simul. f. B.

Folia *Alni* viridia imposita tumores discutunt & inflammationes restinguunt: viatorum calceis immissa dolorem & lassitudinem mitigant: viridia rore madentia conclavibus dispersa, breviquæ, amota, polices is facillè adherentes tollunt. *Trag.* E cortice *Alni* cum sero detricto & rubiginoso per aliquot dies aquâ macerato color efficitur niger, *Atramenti* similis, quo nonnulli ad tingerendum utuntur, Sutores etiam ad coria denigranda. Cortex *Matthiolo* pro atramento scriptorio conficiendo gallæ vicem supplere potest. *Dodonæo* auctore cortex incipientibus inflammationibus utiliter imponitur, & ad oris & tonsillarum inflammationes ac tumores conducit.

Folia sive viridia, sive arida vetustis vulneribus sæpius imposita hæc ad sanitatem perducere feruntur.

Materies olim fabricandis naviculis infervit.

Tunc *Alnus* primùm fluvii sensere cavatæ. *Virg. Georg. 1.*

In adificiorum fundamentis sub terra posita in solo humido permanet immortalis ad æternitatem, & sustinet immania pondera structuræ. Vide *Vitruvium* ubi agit de lignorum materiæ: *Plin. l. 6. c. 17. Theophr. de causis l. 7. c. 17.* Cur *Alnus* sub aqua non putrescat sed duret rationem reddit *Scaliger*, quod humidum habeat communis naturæ: non enim aquam sub aqua putrescere, quod nihil invenitur peregrini. Veneris magnis etiam sumptibus *Alnus* accersiri solet ad faciendâ palatiorum & adificiorum fundamenta: palis etiam ex *Alno* in terram adactis inedicatur poris ille famosissimus unus arcus de *Rialto* dictus, canali magno impositus, & duas partes urbis connectens.

Certum est & indubitatum (inquit J. *Bauhinus*) palos ejusmodi sub aquis infixos temporis progressu lapidescere, &c. Verùm hoc neq; *Alno* proprium, neque materiæ ejus naturæ tribuendum censens, sed potius conditioni soli aut liquori cuidam vaporivæ lapidescenti, qui in ejus poros se infinat: nam nec ipsam ligni substantiam in lapidem mutatam esse facillè concesserim: nec *Alno* semper & in quocumq; solo accidit ut lapidescat; & alia etiam lignorum genera in lapideam substantiam indurata vidimus.

Experimentum *Kentmanni*, quod refert J. *Bauhinus*, de *Alno* in lapidem transmutanda nobis tentantibus non successit, nec cuiquam successuram potamus.

2. *Alnus folio incano* C. B. Park. *hirfuta* Ger. emac. *hirfuta & incana* J. B. *Doarp* Alder.

J. B.

Folia huic vulgari *Alno* similia, minus tamen rotunda: desinunt enim in acumen, magis serrata & pene laciniata, subeas *hirfuta* & *incana*, non virentia, nec etiam viscosa. Color quoque ramulorum diversus, non ita virens sed candidior. *Julus* & fructus ut vulgaris fert.

Loem.

Circa *Genevam* & *Montbelgardum* variis in locis observavit J. *Baehnius*, sed humidis potissimum uti praecedens. *Alunt* eam *Austris* & *Seirie montana* ad flumina: etiam in *Danubio* insulis circa *Viennam* frequens est priori commixta, teste *Clusio*.

3. *Alnus Alpina minor* C. B. Park.

Hoc cum prima convenit quidem, sed per omnia minor & humilior est, nec folia ita lento humore aspersa sunt: quae in *Alpibus Striacis* provenit.

C A P. VIII.

A. De *Betula omnium Anticum*. The Birch-tree.

Betula, (Theophrasto *Συζυγή*) quibusdam sic dicta videtur, quod bitumine scateat. *Plinius Gallias ex ea bitumen excipere* tradit L. 16. c. 18. Alii à *batuere*, i. e. cadere dictam malunt, q. *Batula*, quod eus viminibus caduntur poeri.

Hac arbor omnibus ferè Botanica *Betula* dicitur, nec plures ejus species hætenus observate fuerunt.

Fructu squamoso femina continente ad coniferarum arborum genus pertinere se prodit: folio deciduo ad populineam accedente à reliquis speciebus distinguitur.

Arbor est satis procera, sæpe etiam fruticans; Ramos spargit tenues, flexiles, magna ex parte dorsum pendentes. Multiplici libro vestitur: in tenera ætate rufum aut fuscum ostendit corticem; qui cum illa adoleverit subinde candidior apparet, in teneris philyras ductilis, in adulta arbore candidus, rimosis: qui huic lubest interior tenuis admodum, levis, ac instar membranz pellucidus. Crassiorum ramulorum cortices etiam inalbescant, sed minimorum puniceus aut spadiceus est, qui à siccatibus & aridis pellicule specie avelli, & ungue separari potest, quemadmodum & *incanus* ille in ramis majoribus levore inoffenso. *Folia* quæ primo exeunt plicata ac crispâ prorumpunt, viridi pulchreque herbaceo tinguntur colore, singula singulis, usque tenuibus, dependentia pediculis, ubi excreverint *Populi nigra* ferè, sed minorâ, minus levia, saturatius virentia, paulò angustiora, subpinguia, odorata, sapore amaro.

Fert *Julus* seu nucamenta longa. *Piperi* longo vel *Alni Julis* similia, è squamulis composita, in quibus semina parva, compressa; Ego conulos lemniscos à *Julis* divertos esse suspicor, nihil tamen tenere affirmo.

Loem.

In *Anglia*, *aquosis*, inq. *Ericetis* humidioribus frequens invenitur. J. *Baehnius* in arenosis maxime *Germaniæ* non infrequentem esse scribit. Apud nos in *sylvis*, *ericetis* & *montosis* provenit, sed loca plerumq. *humida*, quibus tamen non raro *arena* subest.

Ufus
et Viri.

Hujus viminum seu furculorum gracilium usus ad magistratum olim, nunc ad *pedagogorum* virgas, ad equos domandos, ad scopas, visco illitorum ad æcupia, ad fascium vincula, &c.

Piscatores *Northumbri* corticem delibratum siso bacillo interpositum accensumque usurpant ad piscationes nocturnas, tridentemq. adnatantes pisces confodiunt. Hinc è delibrato contortoque cortice faces ad nocturna lumina parant.

Lanones ex *Betula* verucula conficiunt. J. B. *Nostri* lanis *Corno* firmam ununtur pro veruculis conficiendis non *Betula*, quod sciam, fortè quia rarior est, nec facile parabilis.

In *Asia* & alibi *Circulos* ad dolia magna constringenda probatissimos è *Betula* parant.

Tragus, *Lonicus* & C. *Baehnius* testantur Veteres ante repertum chartæ usum in hujus cortice candido scribere solitos. *Valerius* nos (inquit *Tragus*) *Cæcia oppido Rætiaz superioris* nonnulla carmina in cortice *Betula* exarata. Et revera experientia teste, non inopi sunt huic usui exteriori illi candidi & membranacei cortices, qui veluti cuticula quedam in mediocri magnitudinis arboribus crassiorum corticem amplectuntur. cujusmodi quatuor aut etiam quinque, diversas nonnunquam separavimus; unde suspicamur novam quotannis huic arbori cuticulam accedere, vel ex humore qui paulatim per corticem transludat concretam, vel ex annua à cortice decedente tunica, spoliis serpentis in modum etarescente.

Folia calf. sic. atten. abstergunt, resolvunt, aperiunt, amara sunt, hinc usis non minimi in *hydrope*, *scabie*, &c. intus & extus adhibita. *Cortex* quoq. quia bituminosus calf. & emollit, adhibeturque in *fulsitibus* aeri corrigendo dicatis. *Fungus* ejus vi pollet adstrictoria, unde ramenta ejus hæmorrhoidibus inspersa ad miraculum fluxum cohibent. *Sebrud*.

Hac arbor vena nimis, antequam folia prodire, in trunco aut ramis vulnerata dulcem & potentum succum copiose effundit, quem siti pressi pastores in *sylvis* sæpenumero potare solent: quemadmodum & nos (inquit *Tragus*) non semel eo hunc recreati sumus cum herbarum causâ vastas peragravimus *sylvas*. Hujus liquoris vim & efficaciam in calculo renum & vesicæ inq. stranguria & urina cruenta non immerito celebrant *Tragus*, *Helmontius*, *Charlæonius*, & alii.

Hac arbor interdum circa *mediam* *Februarii*, cum scilicet tempestas clementior fuerit, succo ascendente percussa *lachrymæ* incipit, interdum non ante *initium Martii*. *Tragus* ad morbum Regum hunc

hunc liquorem commendat, alii faciem eâ abluunt ad maculas deletandas & cuti nitorem conciliandum.

D. Gualter. Noedhamus Medicus insignis & amicus noster summus hoc succo partim mero, partim cum melle mixto Phrulin Scorbuticam non semel curavit.

Ventriculi pecorum è quibus coagululum lactis nostri parant, succo Betulae conditi seu macerati caecos omnes qui eo coagulio cocunt à vermibus asserunt, certo id attestante experimento. *Trag.*

Ionthis facies certo experimento medetur succo Betulae, interdum, & praesertim mane & vespere, si facies eo lavetur, atque fiat eum sponte sua non deterfam siccescere. *S. Pauli Quadrup. Bot. Class. 2. p. 27, 28.*

SECTIO III.

Arbores flore à fructu remoto bacciferae foliis angustis, perpetuis.

Hæ merito Coniferis subjunguntur ob folia angustissima, creberrima, perpetua, succum etiam resinofum confimilem.

CAP. I.

De Junipero.

Juniperus à *Junia* & *paris*, quòd juniores & novellos fructus pariat antiquis maturefcentibus, ut qui pariat usq. ad tertium annum arbori suo inhaerente fructu. C. B. Græcis *Ἰουνίς* & *εὐρέ* si *ἴσθ' ἄγ' ἐστ' ἄγ' ἴσθ'*, quòd ejus odorem omnia reptilia averfentur, vel *διὸ ἐλίου τὸς δόξ' οὐκ ἀποφύθ' οὐκ*. *Idem.*

Ostendit Angullara Juniperum Dioscoridis & nostram unam esse ex Cedris Theophrasti. Oxycedrus etiam seu Cedrus Lycia nihil aliud est quam Juniperi species major. Lignum quoq. Cedrus nomine ex America allatum Juniperinum est.

A. 1. *Juniperus vulgaris* bacca parva purpurea J. B. *vulgara* Park. *vulgara fruticosa* C. B. *item vulgare arbor ejusdem.* *Juniperus* Ger. *The common Juniper-tree.*

J. B.

Plerumq. denso ramorum stipatu fruticat duntaxat Juniperus, aliquando in justæ magnitudinis arborem adolescit, ita ut in Hispania supra Segobiam quâ Madritum itur, ex ea trabes & ædium contignationes sibi incolæ fabricent; *caudex* tamen non multum crasso, cortice scabro & deciduo, rubente; materie firma, nonnihil etiam rubescens, maxime si siccata fuerit, odore resinoso, grato. Ramuli in furculos multos dividuntur, minacibus foliis, semper virentibus, aculeatisq. armati, rigidis, superne glabris, inferne virentibus, splendidis, raro unca longioribus, sæpe brevioribus, valde angustis, ternis plerumque simul per intervalla. *Bacca* per ramos sparsæ, numerosæ, rotundæ, umbilico in tres radios, totidem seminum loculos ostendentes distincto, donatæ, duplo majores granis Piperis, primum virefcentes, per maturitatem coerulescunt aut nigrescunt, in quarum lingulis grana tria oblonga, triangula, (nonnunquam quatuor Cæsalp.) pulpa nonnihil ruffa involuta, sapore acro, resinoso cum quadam dulcedine, tactu quoque ubi inveterarint oleoso & glutinoso; pro flore tribus foliis minutissimis oblectum infidet futuræ bæccæ rudimentum, tam exiguum, ut nonnisi à diligenter inspicienti animadvertatur.

Notæ pro fructibus calyce hæc foliola habemus, non autem pro flore, Pro flore enim non agnoscamus quòd staminum & apicibus caret, quæ flori præcipua pars sunt. Unde & multi flores petala seu foliola colorata fugacibus carent, nulli autem apicibus. Apices enim, nostrâ sententiâ, sunt vascula seu conceptacula seminum masculi in planta. Adq. idcirco Cæsalpinus rectè scripsit, Juniperum quæ fructum fert non flores. Rorid & Veteribus observatum, Nam, referunt Theophrastus & ex eo Plinius, Quidam Juniperorum duo genera tradunt; Alteram flores nec fructum ferre. Quæ verò non florent, ferre prædunt, bæccæ subnascentibus, quæ biennio hærent.

Per reliqua similis est huic Junipero quæ femina [rectius mas] dici potest, flores producens plurimos, aliis quæ fors tulit, sparsos per ramulos, aliis confertos, conorum exiguorum instar habentes, purpurâ cum croceo mixtâ pictos, ex plurimis corpusculis rotundis, papaveris semine minoribus, pulvisculo farinaceo factis compactiles, intercedentibus raris quibusdam viridantibus acuminatis foliis, squamatis corpuscula dicta obtegentibus. Videas autem cum dehiscant effigiem capituli Equisetii florentis, unicuique squamulæ adnatis apicibus ruffis. Cæsalpinus vocat flosculos amentaceos exiles. Cæterum tantum florum apparatus, quasi ad ostentationem comparatum, nullus fructus sequitur, sed in aurâ abiens pulvisculus vanam bæccarum spem eludit.

Nigred sententiâ, (si modo dicitur) flosculus huius non ad ostentationem tantum sed ad usum comparati: si quidem pulvisculus eorum apicibus inclusis feminarum bæccæ aspersus spermata masculini modo in facundia inseruit. Consentit Tragus inquit, Maio mense tenuissimus ac luteus pulvis è Juniperis in aurâ exolare conspicitur, quòd semen illius esse animadverti. [J. Baulnius perperam pro semine bæccam scribit.] Post hanc quem diximus pulverem bæccæ prorumpunt exiguæ, virides, quæ altero

demum anno, Autumno appetente, quod illis tempus maturitatis est, cœruleo tinguntur colore.

Locus.

Juniperus in ericetis agri Cantiani, Essexiensis, & aliis in Anglia copiose provenit, sed plerumq; humilis & fruticosa; quoniam Jumenta eam assidue carpunt & coarcent, & in arborem adulescere non permittunt: in hortis culta arboris modice magnitudinem & staturam assequitur. Invenitur etiam non minus frequens in Belgio, Germania, Gallia, &c.

Tempus.

De tempore florendi jam diximus. Fructus, notante Casalpino, maturescit anno secundo, ut aliquando fructus triam annorum contineantur, cum is qui maturus est servetur ad tertium anni fructum nascentem.

Quæcumq; in Junipero cernuntur (inquit Tragus) odorata sunt. 1. Humor qui ex ea, si ledatur cum in succo suo fuerit, effluit. 2. Radices & caudices aridi. 3. Bacce recentes & maturæ. 4. Folia acuminata.

Ufus

& Virtus.

Lignum præcipue ob suaveolentiam commendatur (præsertim si Maio mense cadatur) unde incensum ad aerem emendandum, & odores noxios aut contagiosos arcendos suffumigatur.

Juniperi arbor Maio mense cum pluviosa fuerit tempestas luteam e cortice sudat lachrymam, quæ insignis in copia tanquam fungi exigui arbori adhæret, nec magno opere odorata est.

Lignum vix sonitū venditatum, & carbonem dat tantum non æternum viventes: Chymistæ, tradente Matthiolo, asseverant carbonem Juniperinum accensum ac suo cinere obrutum ignem integro anno fovece. Trabes Juniperinæ fuerunt in templo Dianæ Sagunti, cui religione inductus Annibal perierit, ut est apud Plinium.

Rasura ligni non sine causa in cucuphis adhibetur, quippe cephalicum est, nervosumque genus insigniter roborat. *Schrad.* Fit etiam cinis ex ligno, per quem cinerem colatum vinum tam potens est indorificum, ut quibusdam exhaustis aquas vel pituitam ex toto habita. Ex arido ligno destillatur & oleum per descensum vel retortam; melius tamen elicitor per vesicam. Extrinfecus ejus usus est in morbis nervinis, in tibiæ serpagine & cancro, vulneribus & ulceribus malis.

Bacce in cibo estitate stomacho frigido utiles sunt, pituitamque que in illo coit digerunt, contra inflationes & tormina faciunt, vitia pectoris purgant, tussim, molentur, urinam efficaciter ducunt, venenosis, à corde repellunt. Eadem mentes & coxendicum vitiosos humores ducunt. Suntque Tragi iudicio, ad cibos condendos Pipere salubriores. Utiles etiam sunt in affectibus capitis & nervorum. Differunt autem bacce, alie enim dulces sunt & edules, alie acres & aromaticæ.

Lapponum Baccarum Juniperi decoctiones bibunt quemadmodum nos Caovæ & Theræ, sineque præcipua apud illos medicinarum pars. *Schefferus Hist. Laplandiæ.* Earum vires fuscè traduntur e Scharthio de Junipero, & Joan. Michaelo de eadem.

Succus extractus e bacca Juniperi ad prædicta omnia utilis est, & alia multa, si credere fas sit, quæ vide apud J. B. Theriacam Germanorum nonnulli dixerunt, tum quod sit efficax contra venena, tum quod Germanorum corporibus amicissima & maxime salutaris.

Oleum fit vel per destillationem e bacca contusa cum aqua mixta, oleum enim cum aqua ascendit, vel per expressionem e bacca contusa cum oleo olivarum mixta. Valet ad tormina aliaque multa. Guttule duæ vel tres puerulis verminantibus exhibetæ lumbicos quibus vexentur emecant & expellunt.

Vim diureticam in Juniperi bacca, earumq; oleo (inquit Cargillus) in me expertus sum sæpius manifestam, & tum ex illis paucas devoratas, tum panem hujus guttuli tinctum evienger violarum odore urinas imbuerè, non secus ac Terebinthinam vulgarem ejusque oleum stillantem. Cum generoso vino albo decoquenda, & decoctum singulo mane saccharo edulcoratum calculosis propinandum.

Ego fretus hac observatione complurimis commendavi baccarum Juniperi blandè contus. hirscentis solùm exteriori cortice infusum in vino, qui perbelle ab illius usu valuerunt, & à jugi nephritico dolore vindicati sunt: exemplo sit Laurentus Rosochiensis professor: is enim quotidie circiter 1. pugillam grossè contusarum aut dentibus comminatarum bacca Junip. deglutiebat, quo simpl. medicamento obtinuit, ut non solùm arenulas, sed calculos minutulos, imò etiam Lentis magnitudine, si non sine omni molestia, atamen dolore excrevit, cum ante usum harum baccarum læpe oppidò male habuit. *Sim. Paolo.* Spiritus & oleum non modo contra calculum sed etiam peccora vitæ valde profunt.

Elixir Juniperinum admirandarum virium in calculo, quod insuper stomachicum insigne est, &c. R. Bacca Juniper. maturæ. & electar. q. v. contundantur crasse, digeranturq; affusa aliqua aqua diuretica. Hinc exprime, abstrahendoque inspissa ad consistentiam mellis. Hujus mellis Juniperi coch. 10, 11, 12, &c. milce optime cum aqua vite Juniperina, digerens, aliquandiu lenissimo calore (Solis aut ignis) *Schrad.*

Bacce apud Germanos singulari remedio ad grassantia Pestilentie contagia depellenda usurpantur. *Trig.* A mistia sunt & alie Antidoti ex his bacca contra febres pestilentiales, quas laudo vel ideo quia medicamentum est domesticum. *D. Broulé.* Bacca in aceto maceratas, extirpatas deinde & in pulverem redactas in peste utilissimas esse scribit, in observationibus ad nos transmissis.

Aliaque Clusius Narbonensis Gallos e Juniperi bacca oleum exprimere, quod ipsi *de Cade* vocant, capitis leahlet, ut peccorum etiam scabiei, & ulceribus, quibus à tontione infestantur, adprimè utile.

Guttum Juniperinum sive Vernix sicca (Arabibus Sandaracha seu Sandarax, à Græcorum Sandaracha, quæ auripigmentum est, longe diversa) recent, pallida & pellucida probatur; cum inveteravit hæc flava & fræbida, mastice modo, quam mentatur in multis: Sanguinem undequaque flentem sistit, ulcera parva curat, cruditates ventriculi emendat, diarrhoeas antiquas sistit, lumbri-

* Præter V. servitæ manu. r. 1701.

cos necat. Schrodero Ufus præcipuus est in nervorum affectibus, resolutione, frigidityte, contractione, &c. & in capitis affectibus reliquis à frigidityte subortis.

Quod Vernix liquida seu Vernigo sit lachryma seu gummi Juniperi, falso à Matthiolo, Lacuna, * Vernix Castalpino, & aliis asseritur, inquit Cornarius. Nam factitia res est Vernix: non tamen à lachryma quid. Juniperi in oleo Lini soluto (ut multi volunt) sed ex scobe Succini in oleo dicto decocta ut post * Schroderum, Cornarium affirmat etiam Casp. Hofmannus. Ufus ejus est ad illustrandas picturas, ad nitorem ferri Parkinseni, conciliandum, ad tectoria oblinenda, fabris & pictoribus.

De usu ligni Juniperini in lue Venerea, ad modum Guaiaci, & pro eo substituto, cum dubium sit an prosit necne, nihil dicam. V. si placet Hist. Ebrodun. lib. 9. cap. 23.

Umbram Juniperi noxiam esse versus ille Virgilio multis persuasit, Juniperi gravis umbra, &c. Nonnulli etiam rationem ejus reddere conantur, quia sci. ob densitatem foliorum vapores è terra noxios exhalantes repercutit & diffari non sinit, unde ibidem stagnantes aerem prava qualitate miscunt. Ego potius Juniperi umbram salutarem esse crediderim ob suavem quem arbor expirat odorem.

2. *Juniperus major bacca rufescente* C. B. *Oxycedrus* Park. *Oxyc. Phœnicea* Ger. *Cedrus Phœnicea* Bellonia, sive *Oxycedrus*, *Quinsdam Juniperus major bacca rubra* J. B.

Folia quam Juniperi vulgaris duplo sunt longiora, latioraq., rigida, insecto mucrone pungentia: bacca duplo aut triplo Juniperinis majores, coloris non ut ille cærulei, sed rufi, sapore tamen & odore simili. Clusius sic describit. Junipero ferè similis est *Oxycedrus*, magna ex parte contorto ut illa caudice, interdum etiã in arbusculam excresecens, tenui & rufescente cortice. Folia habet Juniperi vulgaris modo pungentia, aliquantulum tamen longiora & rariora, terna semper circa ramulos simul nascentia, ut in Junipero min. Fructum initio viridem, deinde flavescerentem, postremò cum maturat puniceo coloris, Juniperi fructu multò majorem ut interdum Avellanam magnitudine æquet, & tuberculis quibusdam, veluti squamarum rudimentis obfitum, nucleos tres aut quatuor inæquales continentem, majores quàm in superiore, medullâ intus albâ.

Floret Juniperi minoris modo, & eodem tempore utriusque fructus maturitatem adipiscitur.

In collibus circa Monspeliam frequentem observavimus.

Provenit (inquit Clusius) pleriq., Hispaniæ & Narbonensis Galliæ asperis locis: nusquam tamen majorem videre memini quàm supra Segobiam & Guadarrama, itinere Madritiano, ubi arborum magnitudinem & altitudinem interdum æquat, trunco humani corporis crassitudinem æquante Cæsalpino. E fructibus Juniperi majoris cum maturi sunt vino remollitis exprimitur liquor, qui Saccharo exceptus utilissimus; utpote qui ex pulmone & pectore educit purulenta; ac tempore pestis præservativa loco esse potest.

Observavit D. *Tamerlanus Robinson* in Gallia Narbonensi itinerans incolas ex *Oxycedro* elicere oleosam seu resinofam substantiam, eodem modo ut è Pinu, & Abiete, in tedam converso, destillatione rudi factâ per descensum; quâ utuntur in scabie, & ulceribus peccorum.

3. *Juniperus major bacca cærulea* C. B. *maxima Illyrica* J. B. Park. *maxima* Ger.

Juniperi (inquit Lob. & Pena in Adv.) quasdam habuimus plantas non dispares fronde & figura acute Juniperò, sed fructu erat teres oblongior, mediocris Olive par, cærulei coloris. Videtur *Dioscoridis* major Juniperus.

A. 4. *Juniperus Alpina* J. B. Clus. Park. *Alpina minor* Ger. emac. *Mountain Dwarf Juniper*. *Minor montana folio latiore fructibus longiore* C. B.

Clus.

Cubitalem altitudinem non excedit, sed depressa est & quasi humi sparsa, multoque crassioribus & brevioribus constat ramis quàm vulgaris, lentis etiam fructibus, contumacibus & contortis: tenellos ramos ambiunt terna folia, æqualiter semper nascentia ut in vulgari: verùm latiora, breviora, crassiora, nec minus quàm illa pungentia, colore interius ex cæruleo candicante, exterius viridi. Florem non vidit Clusius: fructum autem in ramulis gestat, vulgari similem, paulò tamen (ut ei videbatur) longiorem, antequam plenam maturitatem consequatur viridem, ubi maturaverit nigrum, eisdemq., cum illo sapore.

Crescit in scopulis *Durrenstein* & *Efcher*: quibus duntaxat in locis inveniebat Clus. Augusto mense pauculas stirpes fructu maturo & immaturo onustas.

In altissimo Cambriæ monte *Snowden* dicto, in quo montibus *Westmorlandicis* in Septentrionali Angliæ parte sponte provenit: utrobique, monticulis *Sabine* nomine insignitur: Et revera validum Sabine odorem naribus offert. Decoctum summatum, vel etiam succum expressum equis vitibus, Vitis, Vesiculis ventriculo & intestinis hærentibus, Dots nostratibus dictis, laborantibus exhibent.

5. *Juniperus major Americana* Park. *Cedrus Americana* vulgo dicta. *Juniperus Virginiana* & *Barbadosensis*. *Nostratibus The Cedar of Virginia, Bermudas, Barbados.*

In magnam & proceram arborem adolescit [Parkinsonus asserit se vidisse tabulas ex ejus trunco cætas viginti pedes longas, latitudine cubitali, è *Bermuda* seu *Summers insula* allatas] ramosam. Folia parva, brevia, Juniperi vulgaris pefimilia, sed minora, eodem modo ramulis adnascentia. Bacca parva, vix Juniperi nostratis majores, nigro-cæruleæ pariter. Materia rubra, mollis, fragilibus, odorator etiam quàm Juniperi nostratis; ligni color variat, ruber, flavus, albidus.

Multis Americæ locis provenit, v. g. *Virginia, Bermuda, Jamaica, Barbados, &c.*

Ante descriptionem *Caroline* affirmat Cedros istius regionis, quod ad pectinem ligni, odorem & colorum,

colorem, Bermudensibus Cedris. (quæ omnium Americanarum præstantissimæ habentur) bonitate pares esse: unde & doliorum *schibus* & opercula ex eis facere solent, quæ liquores acerrimi & subtilissimi non penetrant.

Antillarum insularum & Jamaicae Cedros texturæ laxioris, rufioris & minus firmæ ac solidæ esse, ut oleum & spiritum Vini vix continent. E baccis decoquendo potum saluberrimum parant Bermudenses. E ligno mensæ, sedes, scaphæ, capsulæ, vasa, opera intestina, &c. fiunt.

Pulvis & ramenta Cedrina vestimenta in arceis reposita interpersa tinea & omne genus vermiculos evocant, ipsa autem nunquam putrescunt, neque vermes generant; ipse etiam observavi hic Londini, circumforaneos, & circulatorum ob cadaverum condituram celebres, scobe Cedrina multa corpora undequaque integere; ut mihi pene persuadeam artis hujus secretum (ut vocant) maximam partem in eo consistere, si addamus gummata nonnulla liquefacta ori, ano, auribus, &c. insula. D. *Tancred. Robinso* hæc communicavit.

Postquam Juniperorum historiam absolvissim, ab ingeniosissimo Amico & studiorum meorum adiutore maxime industrio, jam dicto, & sæpius in decursu operis dicendo D. *Tancred. Robinso* ad me transmissus est *Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus* à Viro longè celeberrimo D. *Paulo Hermanno*, Medicinæ & Botanices Professore compositus; in quo Juniperum Americanam Bermudensem, (quam ego cum Virginiana & Barbadeni specie convenire existimaveram, nec aliter differe quam accidentibus nonnullis à loci natalis diversitate ortis) distingui & separari video: quocirca libet hic utriusque descriptionem è prædicto Catalogo mutuatam proponere.

Juniperus Bermudiana.

In metam fastigiatam sua sponte excrevit hæc arbor Junipero vulgari tam facie quàm viribus similis. Est verò folia angustioribus, tenuioribus, in rigidas & leviter pungentes cuspides delincentibus, donso elegantiq; ordine ramulos ambientibus, superne glaucis, inferne hilari, perpetuo virore nitentibus. Flores fort exiles, amentaceos, purpureo-croceos: Baccæ rotundas Avellane magnitudine, ex fusco phœniceas, squamatis aliquot tuberculis obitas, in quibus tres quatuorve angulati arilli ritu congenerum continentur.

Feliciter propagatur per submersionem, circumpositionem, vel ramulos avullos & terræ infixos.

Juniperus Virginiana.

Præcedenti formæ & crescendi modo respondet. At folia edit angustiora, molliora & omnino viridia. Eandem exiget culturam quàm præcedens.

Ex his perspicio, Juniperum Bermudianam Junipero majori Europæ seu Oxycodro respondere, ideoq; non temere aut imperite nomen Cedri ei inditum; Virginianam autem Junipero vulgari mitiori, ut ex baccarum utriusque colore & magnitudine patet. Deinde Parkinsonum eundem nobilissimum errorem errasse & utramq; in sua descriptione confudisse. Tandem Juniperum Barbadeniensem, (cujus arbuticulam vivam ex ea insula delatam in navigio aliquando vidimus) cum Virginiana eandem esse, siquidem folia ejus Juniperinis minora erant, aliis persimilia, & eodem ordine nascens; baccæ (natis affirmantibus) cæruleæ; lignum rubrum, molle, fragile, odoratum; arbor prægranda & proceræ. Atq; hæc est quæ à nobis superioribus describitur, non Bermudiana, quam nos per errorem pro eadem habuimus.

Hic addit D. Hermannus Juniperum seu Cedrum ex Goa, quæ ramis est magis patulis, gracilibus foliis glaucis, tenuissimis & brevissimis, ceteroqui superiori [Junipero Virginianæ] videtur similis.

C A P. II.

1. *Cedrus Lycia retusa* Bellonio dicta J. B. *baccifera* I. seu folio *Cupressi major*, fructu flavescens C. B. item II, seu folio *Cupressi media*, masculinis baccis epuldem. Nicotoni III, seu folio *Cupressi minor*. *Cedrus Phœnicea* folio *Cupressi* Park. *Oxycodrus Lycia* Get. *Juniperus major* Clus. *The Berry-bearing Cedar*.

7. B.

Arbor est pumila, tricubitalis, [Clusio humanam altitudinem raro superans,] odore *Cupressi* grato, sapore adstringenti, amarescente cum acrimonia, caudice contorto non recto, multis ramis lentis & flexibilibus prædino, scabro cortice. Folia habet carnosa, & ex continua quaternorum foliorum multo connexorum serie composita, quemadmodum *Cupressi*: Flores Junipero vulgari & Oxycodro similes, flavos, sed extremis ramulis insidentes, ut in *Cupressi* & *Thuia*: quibus succedunt fructus magnitudine baccarum Myrti, imò ad Oxycodri interdum accedentes, rotundi, conæ *Cupressi* tuberculis nonnullis quodammodo æmulantes, primum virides, deinde ad phœniceum colorem tendentes, qui maturitate nonnihil mollescunt, sapore & odore Juniperi baccis simili, qui terna aut quaterna vel etiam plura grana, parva, striata, oblonga, resinosa continent, in quibus mandella, alia, Oryzæ quodammodo similis.

Vere flores, fructusque diu retinet antequam maturescat, uti Juniperus. Primum semine natus hic frutex & adhuc tener folia habet omnino dissimilia, utpote quæ altius Juniperi folia æmulantur, nisi breviora & paulò molliora essent: cum verò jam tertium aut quartum annum attigit rotunda & *Cupressi* folia formare incipit, ut inferiores rami pungentibus & acuti foliis, summi verò obtusis & rotundis onustis interdum conspiciantur: quod & nos observavimus, & cuius observatu facile est.

Hanc plantam non tantum circa Montpelium, sed & in Alpibus Sciriacis & Capinhiacis invenimus, unde non miramur eam ad Matthiolum e Moravia montibus missam. Locus.

Cedrus baccifera fructu minore caeruleo.

2. *Sabina baccifera* J. B. *baccifera major* Park. *Sabina folio Cupressi* C. B. à qua non separandum puto *Sabinam folio Cupressi alteram* eisdem. *Sabina baccifera* Ger.

Tota facie Juniperum majorem refert, nisi latioribus ramis prædita esset & magis divulsis; & appendices multas in ramis ut Sappinus produceret, atq. eundem in nascendo quem Taxus morem servaret. Transparentem resinam habet, duram ut Juniperi, velut fumo tactam. Arboris caudex sinuosus est, crassior plerumq. quam ut vir in ulnas capiat. Corticem vitæ habet, modicè crassum, materiam foris albam, intus veluti gilvam, cui nullam aliam similem reperimus. Est enim veluti indilutus quidam rubor, in subnigrum degenerans. Perperam comâ viret: suis sætibus gravida in hyeme comperitur, sed Lentilici naturam servat quod fructus perpetuò lux arbori infideant, deciditibus scilicet anniculis cum alii jam ad maturitatem pervenerint. Fructus autem qui non perfectè maturuerint egregiè virent. Cum autem ad maturitatem devenierint ex atro in cyaneum degenerant. Arbor ipsa elegantissimo virore nitet, quæ tota fructibus nigris sagillatur. Est autem teracissima, cujus baccæ vix Cedridibus majores: Amygdali bene magnæ altitudinem petit, multum ad Cupressum sativam accedens, ut à perito vix dignosci queat, è longinquo spectata; sed crassiori caudice constat. Folia omnino Cupressi correspondent, nisi frequentiora essent. Folia ejus gustatu amara sentiuntur, aromâque olent, resinaceum quid præ se ferentia. Os leviter calefaciunt *baccæ*, quæ in hujus extremis ramulorum furculis oriuntur, ita ut perpetuò singularis quivis furculus suam ferat, eamq. rotundam. Hæ merulis & turdis grassissimus sunt cibus.

Hæc omnia Bellonius, & alia adhuc plura, quæ nobis dubia & incerta imò contradictoria, videntur, ut de foliis Filicis in modum compressis & applanatis, quodque Arbori vitæ coniferæ Sabinam suam alteram, quæ baccifera est eandem faciat. Florem non promit sed statim seminis rudimentum apparet. De ligno quæ habet apud ipsam vide in libro de Coniferis; vel apud J. Bauhinum Hist. Plant. lib. 9. cap. 21.

In montis Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus sponte nascentem utramq. Sabinam vidit Bellonius, ubi sylvas faciunt. Locus.

Quæ J. Bauhino, Lobelio, aliisq. *Sabina baccifera* nomine descripta est à Bellomiana diversa videtur: nec enim in eam altitudinem assurgit (quamvis hoc fortasse loco debeat) neq. folia seu furculos habet panter compressos & complanatos, sed teretiores.

Certè arbor quæ nobis in montibus Germaniæ observata, & alibi pro *Sabina baccifera* ostensa est, adeo in paucis differt ab arbore * proxime descripta, ut pro eadem habuerim; tota siquidem facie eam refert, foliaq. baccarum parvitate & colore differt; quantum quidem ego observare potui: quamvis C. Bauhinus odore gravi Sabinæ, & extremis ramis in acuta folia desinentibus à Cedro baccifera * eam distinguat.

Describente J. Bauhino, foliis est Cupressi, unde inoffensè se demulceri patitur, sapore acri. Baccas fert Juniperinis æquales; quas virentes & ex albido cæruleo quodam colore tinctas tubercula quadam oblidant, maturæ atrocæ sunt. Fortè eodem modo differt à Cedro Lycia retusa Bellonii quo Juniperus minor vulgaris, à majore seu Oxycedro, baccarum scilicet magnitudine & colore.

Alterius speciei meminit Lobelius, ramulorum exilitate & foliorum lenitate duntaxat diversæ.

* Cedro Lycia retusa Bellon.

* Sabinam folio cupressi.

C A P. III.

De Sabina.

Sabina vulgaris Park. *sterilis* Ger. *baccifera & sterilis* J. B. *folio Tamarisci Discedit* C. B. **Common Sabine.**

Sabina Latinis dicta à Sabinorum regione in qua multum nasceretur, Græcis *Ἐξιδω* perpetua fronde viret, arbuscula humilis est, in latum magis quam in altum proficiens, odore gravi & ingrato, foliis Myricæ Germanicæ pungentibus, sapore acri. Baccas fert Juniperinis pares, per maturitatem atro-cæruleas. Has baccas nulli præcedunt flores, sed duntaxat baccarum rudimenta, incurvis pediculis insidentia, ex tribus, quatuor aut quinque, viridantibus tuberculis instar Myrmecie verrucæ parva composita.

Hæc planta sexu differre videtur: Est enim duplex, 1. Mas seu sterilis, quæ flores duntaxat profert, non fructum: ejusmodi se Montbelgardi vidisse narrat J. Bauhinus læpis florentem, verum nullas unquam baccas in ea observasse; sterilem etiam mansisse vanis in locis à se plantatam. 2. Femina seu fertilis, quæ baccas profert non flores.

Botanici plerique Sabinam vulgarem omnino sterilem faciunt: Verum id naturæ analogiæ repugnat, & J. Bauhinus disertè affirmat eam baccas proferre. In nostro solo & cælo raro, fortè nunquam, fructum edit. At in loco natali, Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus proculdubio ferax est.

Pices.

Sabinae folia hiccant & calefaciunt strenuè, in pulverem redacta & cum melle illita fluentibus ulceribus medentur, nigra & foetida expurgant, nomas sustinent & collectiones mitigant. Cum flore lactis temperata scabiei capitis puerorum unice profunt. Porro essentia tenuitate mentis quoque provocant, ut siquid aliud, & sanguinem per urinas movent. Partum quoque viventem interficit Sabina, & foetum mortuum epicit. Certè hoc nomine nimis nota est ejusque usus frequentatus feminis inhonestis & meretricibus.

Aqua è foliis Sabinae destillata maculas faciei absterget, & ut quidam asserunt, vertigini conducit.

Oleum Sabinae ventri inunctum, aut frondes ejus tulse & umbilico impostae vermes puerorum enocant. Decoctum intro assumptum idem praestat: verum usum ejus internum minus tutum putat Parkinsonus. Nos tamen novimus succi expressi cum lacte mixti cochlear unum saccharo edulcoratum maximo cum successu pueri verminantibus exhibitum. Estque sane medicamentum efficacissimum & minime periculolum, quod post alia multa incassum usurpata optatum saepenumero, ne dicam semper sortitur effectum etiam in deploratis partu. Equus etiam & bobus in eundem usum frequentor exhibetur.

CAP. IV.

A. *Taxus* Gcr. Park. J. B. C. B. & *annuum* ferè *Botanicorum*. *Smilax Dioscoridis* lib. 4. cap. 80. *Min. Theophrasti* 3. lib. 10. *The New Tree*.

7. B.

TAXUS perpetua frondis arbor, procerò stipite, Abietis & Piceae similia. Folia Abietis foliis optu & numero similia, dimidium culmum lata, non teretia ut Piceae, ab Abietis in hoc & spicantur quod infusiora minusque rigida, nequam explicata foliorum servent agmina, quin eodem vergentia ferè coincidunt: jam verò si singularia spectes Taxii folia, sunt ea Abietis acutiora mucrone donata, supernè atro virore splendens, infernè nitore destituta, unicoloris tamen & viridantia, nervo secundum longitudinem decurrente; cum Abietis elatiorem averla parte habeant costam, colorèque glauco sunt praedita, gustu amaricante. Porro autem in extremis ramulis circumquaque inter folia oriuntur perpusilla sed copiosa capitella, sublonga, squamata, ex quibus veluti strobili emicant, Juniperinis ferè similes, & virore pallescentes, qui deinde in mero & muscosos apices fatiscunt. [Cesalpini Taxum strobilos ferè amentaceos inter folia sine fructu tradit.] Circa mensè Augustum, uti observavimus, ferè baccas ex calyce ita emergentes, ut simile quid habere videantur cum glande; postquam verò maturare, quod fit mensè Novembri, nihil planè simile habent cum glande, sed figura quodammodo referunt florem Vitis Idaeae, quippe parvo, viridè atq; squamato calyculo, brevi pediculo adnato fructus inheret, grano Juniperino majore, supernè apertis atq; hians, veluti ex carnosa cute constans, colore pulcherrimo & splendente coccineo conspicua, immo cavus, succo praeditus viscido ac dulci, in quo granum latet Piperè minus, nec exactè rotundum, sed leviter compressum, colore inter pullum & spadiceum medio, cortice duriculis, modullam continens saporis non ingrati. Hoc granum fructus capacitatem non adimplet, sed undè ferè intactum à fructus pellicula in medio situm est, baccæ imò adhaerens, haud focus ac ipsa ex pediculo enatum. Suspensae autem tum cum longiusculis sunt, & glandis formam aliquo modo demonstrant nondum maturas esse: jam verò maturiores aperiri, & propter huiusmodi figuram acquirere rotundiorè. Materies bicolor partim rubet, partim ex albo flavescit.

Smilax Theophrasto arbor est glandifera è genere Quercus, cavendum ergo ne confundatur cum Smilace Dioscoridis seu Taxo.

Linn.

Taxus in montosis, saxosis & praeceptis locis oritur: in occidentalibus & meridionalibus Angliae partibus, in montosis sylvis & sepibus frequens est. Majores nostri in cimiteriis Taxos plantarunt, ob æternum (ut putat) frondis virorem, uti symbolum essent immortalitatis & aeternae vitae, quam ibi deposita cadavera post resurrectionem expectabant. Huius arboris fructus perniciosos esse & lethales non Veteres tantum, sed è recentioribus plurimi tradiderunt. Dioscorides eos qui baccas oderunt in alvi profluvium incidere scribit: Idem alibi Taxum potam frigiditatem totius corporis inducere, suffocationemque ac colerem mortem.

Fen.

Refert Celsus, lib. 6. de Bell. Gall. Carvulcum Eburonum regem Taxo (succo epocæ) se exanimasse.

Sunt (inquit Plinius) qui & *Taxia* hinc appellata dicunt venena, quae nunc *taxica* dicimus, quibus sagittae tinguntur. Verum ostendunt Vossius & Jo. Bodrus toxicum aliud veneni genus fuisse. Cervarium Festo dictum, quo Barbari sagittas inungere soliti erant, ut lethalia vulnera inferrent. Toxicum ergo à *taxi* dictum est.

Martialis etiam affirmat in Tridentinis montibus non veterina solum (quod Veteres tradiderunt) sed ruminantia etiam animalia devorata Taxo interire: pastores etiam & lignatores cum his edissent in febres ardentes incidisse & alvi profluvia, non sine magno vitæ discrimine.

Testatur etiam J. Bauhinus à fide dignis hominibus sibi affirmatum in montibus Burgundiae foliorum ut etiam corticum esse mortuos boves & vaccas: & à Jo. Luzzio Pharmacopoeo Kirchenherrense relatam in arboribus suis Turturem album cum torquæ nigrae baccarum eis perussis, & in pago Obereingensium Alunum degustata Taxo subito mortuum.

Nos è contra Taxum immerito in crimen adductum suspicamur: siquidem Lobelius ejus baccas innocuè puerulis in Anglia citare affirmat, seque gustasse sub hyemem non ingrato sapore, sed fano vel subaxaro, ibique porcos passim eas tanquam glandes comisisse. Gerardus etiam nostras tum semetipsum, tum plurimos è condiscipulis suis eas ad satietatem usque sepius ingestisse narrat, nec sub umbra tantum arboris, sed in ejus ramis aliquoties dormivisse, nec tamen minimum inde nocentum

aut incommodum unquam sensisse. Sed & Camerarius Taxum innociam esse tradit: acinos ejus rubros avidè expeti ab avibus, sed inde attonitas reddi, quæ faciliè postea capiuntur. Vel ergo falsa sunt quæ de Taxo tradunt Veteres, vel aeris constitutio & conditio soli hanc in ejus qualitatibus diversitatem efficiunt. Fatore equidem arborem triste virere, ejusque melancholicum (si ita loqui liceat) aspectum malignam aliquam qualitatem ei inesse subinnuere; eoque tempore quo florere incipit & succo maxime prægnans est jumentis noxiam esse posse, nihil tamen affirmo. Nam & Veteres ipsi de qualitate noxia & lethifera hujus arboris sibi parum constant. Theophrastus fructum ab aliquibus hominibus innoxie mandari scribit, folia etiam jumentis lethalia, ruminantibus nequaquam. Plutarchos eo tantum tempore noxam esse tradit quo florere incipit. Dioscorides non ubiq. lethalem & venenosam esse innuit, cum de Italica & Narbonensi tradat lethales esse, illam baccis, hanc etiam umbrâ. Fructum edentes avicalas nigrescere mirum. Taxum etiam Apibus noxiam esse nos docet Virgilius,

Sic tua Cyreneas fugiunt examina Taxos.

& alibi jubet,

Ne propius tellis Taxum seras.

E Taxi ligno laudatissimi arcus fiunt, crâq. olim in hunc usum expetitum maximèque celebrè.

Ituræ Taxo torquentur in arcus.

Virg.

Ligni porro materies, quod rufescat quamplurimis intercurrentibus venis, incorruptaque sit, lignaris fabris maximè expeditur, & plurimi sit, præsertim concinnandis mensis & hastis telisque concipiendis. Germani hujus asseres ad sua construenda hypocausta non exigui sibi comparant pecuniâ. Ex hoc etiam ligno parare solent Saltzburghenses opifices pulchros scyphos, cucurbitulas, epistoma, aliisque subtilia, elegantia & egregia utensilia, quæ per totam Germaniam distribuuntur. Ad dentes rotarum molendinariam, postes terræ infrigendos, velucolorum axes, nulli ligno secundum esse affirmat D. Evelynus: Commendat idem ad musica instrumenta, testudines, rotas, trullas, aliisque curiola.

Quæ de alio genere Taxi, in horto Pissano cultæ habet, cujus folia Abiegnis similia sunt, arbor ipsa fruticosior seu frondosior, frondibus crebris à radice sursum instructa; adeoq. densa ut sepes populus quam arbor videatur, quamvis præcæta admodum sit, quàmq. Taxum Antiquorum mortiferam esse existimat, cum D. Belluccius horti Pissani præfectus hortulanos qui eam interdum detondere solent, non ultra dimidiam horam una vice tendentes durare posse asserat, tam gravem eis capitis dolorem arbor incutit; odore noxio & viroso quem caesa expirat; vide apud ipsum.

SECTIO IV.

De Arboribus flore à fructu remoto lanigeris.

Harum duo genera sunt, alterum folio latiore angulosò nimirum *Populus*: alterum folio angustiore & circumscriptioe magis æquali: *Salix*.

CAP. I.

De Popule.

Populus à *πῶλος* ob frondium multitudinem nonnullis dicta putatur. Martinius ingeniosè à *πῶλος* tremo, ob folia tremula deducit, quod tamen Libyce proprium est. Semine pilis lanigeris incluso cum Salice convenit, foliorum formâ latâ & angulosâ ab ea differt. Græcis commune nomen non habet: nam nigra *ἀγνεσι* privatim dicitur, alba *ἄλκις*, tremula *πῶλος*, ut peritioribus Botanicis videtur.

A. 1. *Populus nigra* Ger. C. B. Park. *nigra* sive *ἀγνεσι*, J. B. The black Poplar.

In altum se attollit, cortice levi, exalbido, ac incano obducta: sed ramuli potissimum albicant, materie dura, pallidescente, ac minus alba, minusque fissili quàm Populi albæ; quidam volunt aridam & levissimam. Radices profundiores quàm in albâ: Antequam folia erumpant oculos prærudat mucronatos, odorato, luteo & pingui atq. tenaci succo prægnantes: Hinc folia Hederaceis similia, sed minus crassa, ex rotundo mucronata, serrata, atro virore splendentia, longis pediculis appensa. Producit & quali Julos, in longo racemo coacervatos, longis pediculis appensos.

Ad fluvios & in aquis oritur tam in Angha quàm in exteris regionibus. Aprilis mense aut etiam prius odorate gemmæ prorumpunt: Maio racemuli seu avæ, quæ Junio decidunt, aut certè paulò post. Loc. & Tempus.

Auctis est celerrimi & ferè incredibilis, quod ad aquas crescat. Consule D. Evelyni Sylvarum, cap. 18.

Plinius eumque secuti e Recentioribus nonnulli Populum inter eas arbores recentent que nullos fructus pariunt. Theophrastus de Populo variam sententiam esse ait, an sci pariat necne. At hodierna observatio fertilem esse convincit, ut ea de re nullum amplius sit dubium. Nonnulli tamen etiamnum hodie, ut video, Veteres errantes opinio sequi, quam naturam ducem mallet. Si enim nature codicem, hoc est, arbores ipsas inspicere dignati essent, ad Lydium experientie lapidem Veterum historias exigentes, nec Populum sterilem esse, nec albam in nigram (spontanea Metamorphosi mutari, quantumvis id Plinius affirmet, hoc Theophrastus variis locis incolcet, quantumvis auctoritate fuerint praedicti auctores, unquam credidissent. Quia tamen Salicem sterilem esse persuasi sunt, ut idem de Populo credant facile induci possint, cum fructus respectu Populus Salici simillima sit.

Primum illud erumpens germen cuius in medicina usus est, *Officina oculus Populi* vocant, alii *gemmae Populi*, Graecorum quidam *argue*, unde erroris occasionem acceperunt, qui non prima illa gemma resinosa sed julos in compositione unguenti ex Populo accipienda temere existimant, in quibus nihil resinolum. *J. B.*

De temperie Populi nigrae ejusque gemmarum, an sci calide sint an frigidae varia est sententia, de qua vide *J. Bauhini* *hist. l. 7. c. 8.* Verisimilior eorum sententia videtur qui moderate calidas faciunt: nec obstat quod Unguentum populeum frigidum sit, Auctores enim in medicamenta acco- pa nonnulla calida immittere solent, non ad totam compositionem calidam reddendam, sed ad frigido- rum vim deducendam, aut certe tandem retundendam. *J. B.*

Fru.

Valeat illud unguentum in omnibus calidis affectibus illitum: naribus inditum, & temporibus pulsantibusque arteriis illitum somnum conciliat. Ejus quoque usus est ad calidos dolentisque tumo- res. Quidam & feliciter podagrae calidis illinunt. Sed ne inveterescat cautio est, alioqui eas vires perdit.

Oculi seu gemmae adhiberi solent a sexu muliebri ad capillos extornandos promovendisque: utri- di modum vide apud *Matthiolum* & *J. Bauhinum*. Nostra observazione gemmae seu turculi ex- tremi post mediam aestatem laevum, odoratum, pinguem & resinofum succum exsudant; non gem- mae tantum initio Veris antequam in folia explicantur: quantumvis *J. Bodaeus* a *Scapeli* nullam a- state resinam in hac arbore reperiri sidenter asserat; & erratum exsorbentis esse putat in textu *Ficci*, ubi in descriptione olei *Agritis* legitur *Zadaf* *tema si is up Vira, in modo mai et erupendo is fusis*.

Ulia.

Annose Populi lignum pulchre crispante undarum discursu peramicentum esse scribit *J. Bauhinus*: idemque artifices Germanici ex eo varia utensilia, mensas, abacos, lectorem spondas, capellas, ostia, etiam cochlearia, [quadras, trullas] aliaque plurima parant. Plinius materiam lentam, adeoque scuta faciendis aptam scribit. Scutorum hodie usus in bello nullus, ex quo sci bombardae inventae sunt, uti nec arcuum & sagittarum.

Quaedam (inquit *C. Bauhinus*) floret & fructum non fert, quadam fructum fert & non floret; ideoque arbor haec est a sexu distincta: quid quoniam nobis nondum observatum, verum tamen esse mi- mi dubitamus, quoniam in Salice arbore congenere id dudum notavimus.

A. 2. *Populus alba* *Ger. Park. alba, sicut J. B. alba (quae sicut ab albedine dicitur) major* *bis folia C. B. The white Poplar, or Abele-tree.*

J. B.
Plurimum differunt Populi albor folia a nigrae foliis, totoque vultu aliam arborem docent: Sunt ea enim omnium maxima, Aceris majoris potius, in acuminatas circumfusas lacintas divisa, superne cum atro virore fortitima lanugine donata; at inferiore parte denso tomento incano cum *Tussilaginis* folia, sed magis niveo, pubescunt, quo etiam obfusi sunt cum pediculis longi rami. *Folia* observa- vimus mantis expansae amplitudinem facile aequantia. Quales sint flores vel fructus non observavit *J. Bauhinus*. *Lobelius* scribit catulos ferre ante foliorum extortum, & latifoliae Salicis modo odore Taber. scribit villosos esse, & e purpureo fulcos. Ligno est albo, quod facile finditur, cortice albo laevi. Et haec, ut prior, gemmas in primo foliorum germinatu fert.

Plinius, ut & *Theophrastus* a quo hausit, Populi albae folia in juvente circinate rotunditatis esse scribit, vetustate in angulos exire, quod & nunc etiam observari potest; e contra *Hederæ* angulosa rotundantur, quod & a *Theophrasto* traditum.

Lent.

Illidem loci provenit quibus nigra, minus in aquis & ad fluviorum ripas, in Anglia etiam sed non admodum frequens.

* *163. Plin. lib. 1. cap. 16.*

De hac arbore tradit *Theophrastus*, & post eum Plinius, quod partes foliorum pronas seu ter- ram spectantes mox post aestivum solstitium vertit supinas, eoque argumento rusticis solstitium con- lectum intelligunt: nobis nihil tale observatum, nec cuquam, puto, e Recentioribus fide digno.

Ex avulsione, talca, ramo facile germinat haec arbor, & celerime crescit, brevique temporis spatio supra humum augetur, ut vel ob loci ulum mereatur feri. Materies ad eadem utilis ad que Populi nigrae. Commendatur etiam ad calopodia & calcamentorum calcanca.

Fru.

Quod ad medicas vires attinet, haec ei *Diocorides* attribuit. Cortex unciæ unius pondere pocius *Ichthidica* & *strangoriz* prodest. Traditur & conceptum prohibere si cum mulino rene bibatur: sed & folia post purgationis cum vino pota idem praestare dicuntur. Tepidus foliorum succus aurium dolentibus stillatur. Pilule vero [*oscula*] quae primo foliorum germinatu erumpunt tinte & cum melle illata oculorum habitudini modentur. Plinius foliorum succum calidum aurium do- loci confere ait.

Populus alba humo tenuis facta usque ad radicem, & aqua calida in qua fermentum dissolutum persula fungos copiosos intra quadratum odet, eius quoque gracillimos. *Matth.* in *Diocor. lib. 1. cap. 97.* *Diocorides* utriusque Populi cortice in trusta concalo & stercoasatis arcocis imperio vim fue- gos odolis producendi attribuit.

A. 3. *Populus alba folia minoribus* Park. C. B. *folia minore* J. B.

Hæc non aliter ferè quàm foliorum parvitate à præcedente differt.

A. 4. *Populus Libyca* Ger. Park. *Libyca Plinii*, *Καπύς Θεσπρωτῆς* J. B. *stemula* C. B. *The Asp, or trembling Poplar.*

J. B.

Facile & brevi tempore in magnam excrescit altitudinem, radicibusque reptantibus latè se propagat. Cortex partim nigricat, partim albicat. *Folia* est continuè tremente, breviorè & rotundiorè quàm nigra, per ambitum crenato, [inæqualiter & profundius dentato] suprema parte vivente, inferna ex cinereo candicante, ac propemodum glabro [Matth. punctis quibusdam albis conspersam esse notat] *Folia* in extremo ramo interdum magis angulosa, & subtus incana ad Populi albæ quoadtenus accedentia, qualia minima.

Fort & nucamenta uncias quinque circiter longa, lanuginosa, cinericei & fusci coloris, arundinaceæ jubæ portunculis similia, quibus subsunt verticillatim quodammodo *apices*, perquisiti, albi. Oculi acuti, nitidi, spadicei.

E semine suo (Inquit Tragus) quod Salicis simile cernitur, revirescit.

In sylvis nasci amat, uliginosa tamen, & inter Betulas, estque in Anglia magis frequens quàm *Locus*. reliqua genera, & passim cognita.

Materies candidissima est & levissima, tornatoribus expetita. Ex eadem propter levitatem calopodia parantur, & in imagines exculpuntur. Cortex arborum juniorum detrahitur à nonnullis pro facibus nocturnis. J. B.

Gemmæ veris tempore digitis contritæ gratissimum odorem exspirant.

5. *Populus rotundifolia Americana* C. B. Park. *Pop. novi orbis* J. B.

Virgulta sunt aliquantum flexuosa, & per semipalmum palmumque crebra, geniculata veluti infertione commissuræque partium nodosa: inde exeunt è singulo pediculo singula *folia*, orâ exquisitè rotundâ, nec uspiam nisi quâ pediculus hæret intercisa, crassa, rigida Arboris Judæ; cui Populi alternatim exeunt prælongi loruli, stipati acinulis multis exiguis, planè Populi ritu, quare & hanc Populam Peruvianam vocare visum fuit; gustu perquam adstringente, aliquantum calfaciente, subfalso.

C A P. II.

De Salice.

Salix Latinis à saliendo dicta putatur, quòd eâ celeritate crescat ut salire videatur; Græcis pariter *Ἔλας* *μεγὰρ ἢ ἱσος*, quòd citò in altum abeat.

Salix pilis seu nucamentis è multis vasculis seminalibus compositis quæ semen continent pappo involutum cum Populo convenit foliis longis aut saltem circumscriptione æqualibus & minime angulosis ab eadem differt.

Salicium historia consula hæcenus & obscura nobis videtur; quocirca aliquam ei lucem fucnerari conabimur.

Multe Salicium species in Anglia nascentes observatz sunt, aliquæ fortasse adhuc inobservatz latitant. Has clarioris doctrinæ causâ in duo genera distinguemus. Primum erit earum quæ folio sunt compactiore & solidiore, texturæ quædam respectu densiore, profunditatis tamen tenuiore seu minus spulso: Alterum earum quæ folio laxiore seu fungosiore, eodem tamen crassiore seu spissiore.

Salix Folio compactiore & solidiore.

A. 1. *Salix maxima, fragilis alba hirsuta* J. B. *vulgaris alba arborescens* C. B. *arbores angustifolia alba vulgaris* Park. *Salix* Ger. *The most common white Willow.*

J. B.

Salicium maxima, in magnam excrescens arborem, *folia* est alternata, rarioribus, semunciam plus minus latè, sescunciam aut duas uncias cum dimidia longis, utrinque hirsuta & incanis (prioribus tamen nonnunquam glabris) potissimum verò parte inferiore & in extremitatibus virgarum supermararum. Est & ubi superior facies pilis propè destituitur. Sed & in eo variant, quòd interdum serrata sunt, interdum cretæ vixidum apparent. Virgæ adnascuntur multe florum spicæ molles & incanæ, quæ maturitate in pappum abeunt.

At nobis observantibus spicæ hæc seu Julia duàm generum sunt, alia florifera, alia seminifera. Florifera steriles sunt, & postquam flores suos flamineo expiscuerint brevi desunt & marcescunt. Seminifera nulla florum flamineo aut apicibus exhibentur, sed ex vasculis seminalibus sola, semina pappo involuta clauduntur, & per maturitatem in duas carinas debilitantibus, consistunt. Quæ hæc producant arboris femina seu fertili meris appellatur. Quæ autem florifera tantum, maris seu steriles. An verò hujusmodi arboris sexum suum perpetuè servant, hoc est, an quæ semel flores aut semina profecerint, singula anna constantè id faciant, an subinde mutant, & alterius flores & semina producant, nisi novè

dum compertum est. Hanc Salicis albae seu Perticalis distinctionem à C. Bauhino factam invenio in suo Matthiolo. Salix (inquit) *pericalis* vel est *sterilis* flores ferens amentaceos ante folia, vel est *fructifera* ferens racemulos, Populi instar, oblongis granulis.

Hæc arbor est quæ passim in Anglia oritur, quam Botanici (ut suspicor) in plures distinguunt species. Nihil tamen fidenter affirmo. Non enim mihi cognitæ sunt omnes Salicum species; nec quia mihi incognitæ sunt, non dari ejusmodi pronuntiare debeam.

Salicem tamen *roseam* non esse speciem à vulgari alba distinctam certissimum est. Nam capitula hæc squamosa, Rosæ imitantia in diversis Salicum speciebus observavimus, v. g. in *Salice alba* vulgari, in *Caprea latifolia*, in *Salice humilis foliis angustis subaculeis*, in *Chamaiceis*, aliisq. Nihil enim aliud sunt Rosæ hæc quam excrementa quedam præternaturalia, multis Salicum speciebus communes, ab insectorum fortè moribus aut punctiombus, aliòve nescio quo, accidente excitata. Extremis autem virgibus semper inascuntur, & reliquis foliis delapsis hæc quamvis exsiccentur & nativum virorem penitus amittant, per totam tamen hyemem, etiam severissimam, tenaciter virgibus adherent, & se cujusvis conspiciendæ præbent, quia sine pediculo in firmiter adnectuntur.

- A. 2. *Salix pumila angustifolia infernè lanuginosa* J. B. *pumila brevi angustique folio incana* C. B. *humilis angustifolia repens* Park. *Narrow-leaved Dwarf-willow.*

Clas.

Hæc gracilibus & cubitalibus interdum virgibus assurgit, lentis, quæ à medio ad summum ramulorum multas ferunt exiguas *florum* spicas, molles & incanas, maturitate in pappum & lanuginem abeuntes. *Folia* quàm pumilæ angustifoliæ prona parte cinereæ breviora, angustiora, superne viridia, infernè cana lanugine pubescentia & splendens. *Radix* digitum crassa est & tenuibus fibris prædita. Sed & virgula secundum summum radicis caput, quæ telluri coherent, subinde tenues & capillatas fibras agunt.

Locus.

Invenitur in Pannoniæ & Austriæ depreßis quibusdam cæcis sylvis & uliginosis pratis. Nec huic dissimilis, paulò tamen laevioribus foliis prædita, quæ passim in sabulosis Hollandiæ agris Oceano objectis inter gramina & Spartum nascitur. Hanc speciem seu varietatem eam esse existimo quam observavi in arenosis maritimis circa Sandvicum oppidum copiosè nascentem, quæ tamen folio erat utrinque lanuginoso & argenteo.

- A. 3. *Salix folio lato splendens fragilis.* An *Salix fragilis* C. B? Park? *Salix spontanea fragilis Amygdalino folio auriculata & non auriculata* J. B? *The Crack-willow.*

In mediocrem excrescit arborem, corticem virgarum ex luteo rubente, glabro; ramulis fragilibus, unde vulgò Cantabrigiensi *The Crack-willow* dicitur. *Folia* habet omnium Salicum quæ folio compactiore sunt amplissima, angustiora tamen quàm *Salix Laurini*; quatuor nonnunquam aut quinque uncias longa, unciam aut sescunciam lata, in acutum mucronem definita, brevibus pediculis nullo ordine ramulis adnexa, glabra, splendens, in ambitu serrata, superne hilaris virore prædita, infernè magis glauca, ad basin interdum auriculata, sed minoribus, furculis adnascentibus, donata, sepius tamen in destituta. *Folia* Salicis arboreæ albae vulgari similes; floriferi e staminibus seu filamentis luteis, apicibus polline luteo aspersis incumbentibus compositi; ad quorum filamentorum bases foliola lutea, singula bina staminula amplectentia, apponuntur.

Tum descriptio tum figura J. B. huic arbori quadrant, ut vix dubitem eandem esse quam ille describit. Synonyma adjecta non respondent descriptioni.

Locus.

In aquis & Salicetis frequens est.

- A. 4. *Salix folio auriculata splendens flexilis.* An *Salix folio Amygdalino utrinque viridè aurito* C. B? *varinialis nigra* Park? *The round-eared Shining Willow.*

Hæc in arborem, quantum adhuc vidimus aut observavimus non adolescit. Cortex virgarum teneriorum luteo-viridis est, interdum ad rubedinem inclinans. *Folia* alternatim posita, duas aut tres uncias longa, semunciam aut unciam lata, à basi ad mucronem sensim angustata, marginibus elegantè dentatis, superne hilaris virore splendens, saturatiore tamen nonnihil quàm superioris, subtus pallidiora. Illud huic speciei peculiare est (certè cum paucis commune) quòd ubiq. ad basin foliorum utrinq. auriculas obtineat amplas, subrotundas, eodem modo quo folia dentata versus folium in angulum excurtes. *Folia* floriferi mucosi, præcedentis similes, nisi quòd tria staminula ex unius folioli lati sine exant, non duo tantum.

Locus.

In Salicetis.

- A. 5. *Salix folio lauro, seu lato, glabro & odorato.* An *Salix latifolia non hirsuta cum gallis* J. B? *Wap-leaved Sweet Willow.*

Hujus virgæ tenuiores nigricant. *Folia* inter Saligna latissima, & Laurinis satis similia, glabra, superne saturis virore nitentia, subtus dilutiora, duas trève uncias longa, sescunciam & amplius lata, per margines denticulis parvis crenata, brevibus pediculis harentia, alternatim aut nullo ordine posita, sativo-odorata. Flores non observavimus.

Locus.

In montanis Westmoriandiæ pratis ad rivos frequens occurrit, & in montosi comitatus Eboracensis parte.

Salix latifolia non hirsuta descriptio apud J. Bauhinum huic plantæ satis bene convenit.

A. 6. *Salix folio Amygdalino, utrinque aurito, corticem abiciens.*

Folia huic quam penultimæ seu quartæ speciei longiora, angustiora, in prælongos & tenuissimos mucrones producta, obscuro virore splendentia ac si polita essent, figurâ sui ad Amygdali aut Persicæ folia accedentia, circa margines elegantè dentata, appendicem etiam utrinq. ad basim habent magis conspicuam quam alix Salicam speciem, præter auriculas ad pediculorum exortum utrinq. virgis adnascens, quæ minores sunt in hac quam prædicta quarta specie; in utraq. tamen aliisque omnibus ante folia desuunt. Cortex caudicis & ramorum adultiorum cinereus, rimas agit, & à ligno sponte abscedit. Color viminum luteus.

7. *Salix lutea tenuior sativa viminea J. B. sativa lutea folio crenato C. B.*

J. B.

In pulchras arbores adolescit hoc Salicis genus, quorum vimine nullam nobis notum ligandis viribus similibusque aptius, tanta est, tamq. lenta, rupturæ securæ flexilitas, ut meritò viminea ~~est~~ ^{est} dici mereatur. Cortice integitur vitellini coloris, amaro. Folia rara, acuta, palmum circiter longa, femuriam lata, supernè cum virore splendentia, glabra, incana, [non video quomodo hæc inter se convenient habere folia cum virore splendentia & tamen incana] infernè nonnihil pilosa, potissimùm superiora, exiguis per ambitum denticulis crenata, nullo manifesto amarore prædita; adstrictionem aliquam præ se ferentia.

Ab hac differre voluit illi per omnia similem, cujus tamen cortex tantùm pallidior, & quæ non minoris usûs est minoris commendationis.

Hæc arbor in multis cum præcedente convenit, ab ea tamen differre videtur, quòd major & procerior, quodque folia breviora subus nonnihil pilosa obtinere dicatur: nobis ergo incognita est.

8. *Salix rubra minimè fragilis, folio longo, angusta J. B. Salix vulgaris rubens C. B. angustifolia purpurea seu nigra Park.*

J. B.

Magni usûs est hæc Salix hortulanis ad ligandum; cujus cortex intensè rubet; folia oblonga, acuta, utrinq. glabra, sed subus nonnihil candicantia, argutis denticulis undique crenata: Vimen lentum, & ut liber obsequiosum.

Hæc pertinet varietas illa quæ vulgatior, cortice minus rubente, fortè & foliis latioribus.

Pasim in pratorum & hortorum marginibus colitur. Est & spontanea non infrequens. Basileæ ^{Locus.} & Montbelgardi abundat. Nobis hæc species circa Basileam non animadverta, si differat à quarta specie nostra.

A. 9. *Salix humilior folio angustis subcarnale, ex adverso bina, Salix tenuior folia minore utrinque glabra fragilis J. B. The willow Dwarf-Willow.*

Cortex ramorum exterior cinerei coloris est, & velut politus: Folia oblonga, angusta, non auriculata, ex intervallis bina ut plurimum adversa seu opposita, non crenata, vel saltem leviter, ejusdem fere ubique latitudinis, & non à basi ad apicem sensim angustata, ut in reliquis. Hujus Juli flori ferri omnium minimi sunt sive longitudinem, sive crassitatem spectes, ex staminulis seu filamentis luteis & foliis lanuginosis composita. Hæc densius stipata corpus nucamenti efficiunt compactum satis & lanuginosum, quod pediculo brevi foliis ornato sustentatur.

Observavit J. Bauhinus speciem hanc excrementum producere in ramulorum fastigio, Rosæ æmulum foliis confertim stipatis compactile, partim hirsutis, partim glabris. Ejusmodi excrescentias Rosarum æmulas & nos quoq. in Germania ad ripas Danubii supra Ratisbonam extremis hujus (quæ ibi copiosè crescit) virgis innascentes observavimus: necnon vesicas illas subrubentes, foliis intidentes, quarum J. Bauhinus in descriptione meminit, qualèque in Ulmi foliis reperiuntur. Hinc non immeritò quaerit idem J. Bauhinus, Annon hæc sit Salix angustifolia Pannonica Clusii, quam sic describit,

Crasso caudice & ramis in multo tenuiores frequentioresque ramulos divisus prædita est, quam vulgaris ea Salix, quæ angustis alioqui foliis, prona parte incanis est. Hujus insuper folia non modo subus canescunt, sed licet supernè viridia, quadam tamen alba lanugine pubescunt, angustiora sunt, in longiorem mucronem desinunt, frequentioraq. in ramulis nascuntur. Flores alii generibus similes, pallidi; semena, minutissimum nigrum, candida mollia, lanugine exceptum, levis aucte arbitrio hæc illuc fertur. Solet etiam hæc Salix alia quadam peculiari notâ à cæteris distinguî: Nam plerumq. subcubentibus quibusdam tuberculis, baphuco cocco fere similibus onerata folia habere conspiciuntur.

Juxta torrentes & adis locis crescit. Viennæ torrens sub urbe Viennæ in Danubium influens eâ ^{Locus.} maximè abundat.

Hanc Salicem eandem esse cum nobis observata & descripta mihi pæne persuadeo, quamvis folia in nostra (quantum hæcenus observavi) glabra sint, nec ulla lanugine pubescant.

J. Bauhinus in hoc genere foliosa capitula ramulorum verè adnata delapsis jam foliis in arboe manentia observavit: quod nos in Salice vulgari arborea alitque.

Quære annon hujus Juli ipsissimi sunt quos describit idem pro excrementis bombycinis, unciis longioribus, candidis, lanam tum substantiâ fungosâ, tum etiam colore per omnia referentibus teretibus atq. oblongis, quæ siquis aperit in singulorum modiculis, insecti quoddam minimum genus reperiet albicans, pediculum capitis æquam, in eo tamen diffrens, quòd teres sit atq. oblongiculus, depresso nullamque progrediendi vim in se habens. Cæteroque notandum, quòd in exteriori parte nucamenti hujus sterculorum, lutei apices toto se proferant ambitu, exertique suis fimbis conspiciantur,

tur, suis tamen longioribus petiolois excrementis subitanis toti involvantur obteganturque.
 In aquis prope Cantabrigiam reperitur.
 Cortex ramorum interior pulchre luteus aquam in qua per duodecim horas maceratus fuerit, eodem colore tingit, ut aqua instar vini Hispanici appareat.

A. 10. *Salix pumila angustifolia*, grana parte cinerea J. B. *Salix pumila bifida incana* C. B. *pumila angustifolia vicia* Park. *Chamaecha* fere *Salix pumila* Ger.

Huic generi, describente Clusio, graciliores sunt virgæ, ut plurimum pedales, nonnunquam dracantes duntaxat, rectæ, lentæ, sublavio cortice tectæ, uncialia folia, lativi Lani foliorum modo angusta, supra parte viridia, pronâ verò cinerea, & cum novella adhuc sunt omnino incana. Flos ut in vulgari flavescens, exigua, brevis mollique spica ante folia nascitur, ut in candidam deinde lanuginem resolvitur. Radix digitalis crassitudinis, obliqua, nigra, & tenuibus fibris donata est.

Locu.

Crescit hoc genus in udis caduis sylvis circa Francofurtum ad Mœnum. Hactenus Clusio.
 Huic nobis eadem videtur *Salix humida repens angustifolia* Lob. quæ in ericetis Antverpiani agri palmaribus & sesquipalmaribus cauliculis repit solo Rhamni in floribus muscosi, Salicis gustu amato.

Hoc genus Salicis in ericetis & palustribus, præsertim montosis, frequens in Anglia provenit. Folio est angusto, oblongo, supernè latè virenti subeus cinereo: virgis tenuibus, interdum pedibus, aut cubitalibus, sæpius humilioribus, & humi procumbentibus; radice reptatrice.

11. *Salix latifolia folis utrinque glabris, supernè splendentibus. An Salix pumila folio utrinque glabra J. B? Salix pumila repens* Lob? *pumila latifolia* prior Clus?

Rami per terram sparguntur minimi digiti crassitudine, corticis colore glauco in crassioribus, in tenuioribus virente, in plurimos ramulos divisi, adeò ut terram cooperiant. Uva arsi dictæ modo. Folia in ramulis crebra, alternatim posita, pediculis brevibus fulta, utrinque glabra, supernè saturo virore splendentia, nervosa, ex rotunditate acuminata, unciam, & interdum, quamvis rarior, sesquicentiam longa, Globulariæ Mospelitensium folia quodammodo æmulantur. Julus profert creberrimos, breviusculos, quam Soli exponantur purpurantes, è plurimis vasculis feminalibus, è latiori base paulatim fastigiata, & in duas carinas, quarum commithuræ faciliè cornuntur, per maturitatem depilicentibus, & tenui pappo involutam ostentantibus, compositos. Quæ flores duntaxat Julos profert folia habet longiora & acutiora, non minùs tamen splendentia.

Locu.

In altissimis montis Jura cacuminibus invenimus. Salicis pumilæ latifoliæ primæ Clusii descriptio huic nostræ egregiè quadrat: Locus etiam convenit, nimirum montium herbosa & aperta pagus. Nostræ ergò descriptio ex illius supplenda. Radix admodum crassa est pro plantæ tenuitate, crassiusque & obliquè sparsa fere firmata. Cui C. Bauhinus Salicem hanc repentem faciat nescio. Clusius enim id non dicit.

12. *Salix pumila latifolia secunda* Clus. *latifolia repens* C. B.

Clus.
 Similes fundit virgæ, nonnunquam paulò longiores, magis scabro cortice tectas, & in frequentiores ramulos dividas: quas similia cum superiore folia ambiunt, magis acuminata, supernè viridia, infernè splendentia, licet tenui lanugine pubescant. Hujus florum spica sive Julus crassiusculus est, infernè splendentia, licet tenui lanugine pubescant. Hujus florum spica sive Julus crassiusculus est, infernè splendentia, licet tenui lanugine pubescant. Radix cum superiore convenit, imò crassior quodammodo videtur, non minùs quam illa dispersa, virgis etiam secundùm radicis caput interdum fereas agentibus.

Salix folio laxiore seu fungifera.

A. 1. *Salix latifolia infernè bifida* J. B. *Salix latifolia rotunda* C. B. item folio & rotunditate acuminata ejusdem. *latifolia rotunda* & *latifolia oblonga* Park. *caprea rotundifolia* & *caprea latifolia* Ger. The common broad and round-leaved Willow.

J. B.

Hujus folia interdum palmum aut sesquipalmum longa, latitudine quadrantali, aut etiam palmari, nervosa; sunt & minora multò præsertim in arboribus adultis, pronâ parte incana & hirsuta, lupinè viridantia [magis scabra & rugosa quam in Salice folio compactiore] sapore adstringente sine morfu aut amarore, pediculis semunciali, cui sæpe auriculæ caulem amplectentes adnate. Carylos profert staminibus crocantibus plenos. [At Julus feminiferi in receptaculis racematim coherentibus semina lanugine quodam candido involuta continent.] Vimina crassiuscula incano hirsuto cortice amaricante tecta, tuberculis aliquando ex dulcedine leviter adstringentibus nodosa, fragilia: Interdum cortex velut fuligine obductus videtur.

Salix hæc foliorum figura in tantum variat, ut non satis sciam an species distinctæ sint necne rotundifolia & latifolia dictæ. Verùm quoniam species temere multiplicande non sunt, J. Bauhini potius sententiam sequor distinctas non esse.

Locu.

Ufus.

Arbor hæc in sepibus vulgaris est, interdum etiam procul ab aquis. Quamvis enim udis gaudet, non tamen adeò impatiens est siccioris soli ac reliquæ pleræq; Salices. Hujus carbo citissime ignem concipit; quapropter ad pulverem tormentarium expetitur. Præstat etiam delincedis in, quæ Piçtores ante accuratam operam inuanda sibi proponunt.

A. 2. *Salix*

- A. 2. *Salix angustia & longissima foliis crispis, subtus albicantibus* J. B. *Salix oblonga, incana, acuta folio* C. B. *An Elæagnus Dalechampii, & Salicæ 6. genus Lugd?* The Osier.

J. B.

Virgas cortex virescens obvestit aut cineraceus [ex nostra observatione vimina teneriora quæ in Salicetis quotannis exoriuntur rubent nonnihil & hirsuta sunt] suntque ex longissima & simplices, nullis adnatis virgulis donata, obsequiose admodum. Folia quoq. longa admodum, angusta & crebro agmine ramos stipantia, superius virescunt, inferius cum nitore ad objectum luminis vario canescunt, à nervo medio obliquis in margines nervulis exporrectis, in ambitu crispa magna ex parte.

Hæc riguis gaudet locis, & ad aquas plerunq. exit.

Ex hac potissimum, quod vimina proferat longissima sine adnatis, & lenta, plectuntur quasilli, *Usc.* sportulæ, vanni, cathedræ & anacintaria. J. B. Hinc & peculiari nomine [The Osier] nostratibus insignitur.

Luci.

- A. 3. *Salix folio longo subluteo non auriculata vimine subluteo, item vimine rubro.* The long-leaved yellowish and reddish Willow.

Hæc etiam in Salicetis colitur ad vitilia, si tamen permittatur adolescit in arborem mediocrem: virgis tenuibus subluteis; foliis unciam latis, tres uncias longis, acuminatis supina parte pallidè virescentibus, prona incanis, pediculis latis longis insidentibus, non auriculatis. Hoc genus interdum variat viminum colore rubro.

Hujus virgas annotinas summâ parte sub Autumnum plures furculos emittere observavi.

4. *Salix humilis repens rotundifolia.*

Hæc in palustribus præsertim montosis oritur.

5. *Salix humilis latifolia erecta* C. B.

C. B.

Hæc Salici latifoliæ aquaticæ acuto folio similis est, sed humilior, cum hujus virgæ rotundæ, striatæ vix cubitum superent. Folia minora sunt, ex rotunditate oblongata, in acumen delincentia, rugosa, parte prona lanuginosa, tactu mollia. Folia rotundi, parvi flavi. Hæc (inquit) cum latifolia repente confundi non debet.

Michelfeldæ in humidis.

Luci.

- A. 6. *Salix pumila montana folio rotundo* J. B. Round-leaved Dwarf-Willow of the Mountains.

Vix humo se attollit palmaris ista Salix, ramulis prædita rubentibus, iisq. magnam partem nudis; quorum tamen fastigia pluscula coronant folia, valdè concinna, ad Cotoneastræ folia quodammodo accedentia, circinata ferè undia, rotunditatis, nonnihil tamen in oblongum porrecta crassiuscula, rigidula, rugosa, venis sinuatis crebris à medio nervo exporrectis, glabra utrinq., sed inferna parte canescentia, superiore atro-virescentia, pediculis latis longis; ad quorum imum animadvertere est fortuita capitula lanugine Saligna plena: subinde verò & privato insidentem pediculo brevem simili tomenti Julum.

Hæc à J. Bauhino in Rhæticiis montibus collecta est. Nobis in rupibus à Boreali latere montis *Luci.* *Ingleborough* à Thoma Willifello ostensa & collecta est: necnon in monte *Wharfedale* è regione *Ingleborough*, trans fluvium subterraneum.

Hæc Salix rectius fortasse ad primum genus referretur: erat enim (quantum memini) folio solidiore & compactiore. Verùm quoniam J. Bauhinus folia crassiuscula & rugosa ei attribuit hinc collocandam duxi.

Sequentes tres Salicis species à C. Bauhino in Prodrómo descriptæ an à præcedentibus omnibus diversæ sint, & ad quod genus pertineant me nescire fateor.

1. *Salix Alpina angustifolia repens non incana* C. B.

C. B.

Ex radice atro-rubente cortice tecta cauliculi palmares, humi fusi prodeunt, qui capillaceis radicibus terræ affiguntur, ramulis tamen paucis sursum elatis: foliis oblonga, latiusculis, brevibus cinctis: flores ut in cæteris, quibus abscentibus nullus Salicem esse crederet.

In Helvetiorum Alpibus & monte Fracto frequens est.

Luci.

2. *Salix Alpina Pyrenaica* C. B.

Hæc ad semicubitalem altitudinem vix assurgit, virgæ tenuibus, ramosis; foliis oblongis, parvis, per circumferentiam pilosis holoserici instar ob minutissimos pilos tactu mollibus. Spicæ horum angustæ, unciales, molles sunt.

In summitatibus Pyrenæi montis collecta fuit.

Luci.

3. *Salix saxatilis minima* C. B.

C. B.

Hæc duas uncias vix superat, quæ ex radícula caudicem crassiusculum, vix semiuncialem emittit, qui in binos ternosve unciales ramulos, terræ incumbentes dividitur. Folia sunt parva, oblonga, subrotunda, atrovirentia, venosa; quorum medio capitulum parvum, subrotundum, velut ex multis bacis compositum infidet, quibus maturis apertis veluti ex triangulari capitulo mollis, candida & brevis lanugo effertur.

Locu.

In Alpium Helveticorum jugis faxis infidens reperitur.

4. *Salix Syriaca folio oleagineo argenteo* C. B. *Egyptiaca & Syriaca* Park. *Salsaf Syrorum, Salicis* (species) J. B.

Magnitudine variat, Betulæ similis trunco, ramis frondibilibus. Virgæ longæ, graciles, molles, & ex pallido flavescentes. Surculis mollicellis folia hærent Vitis. E ramis gemina spithamea hinc inde prodeunt, haud locis ferè ac in Ficu Cypriota: E quibus primo vero folioli mollicelli ac lanuginosi pendent, pallidi, Populneorum æmuli, naturali siccores, jucundi odoris. Hos legunt incolæ [Halepi] eo quod nullum ferant fructum, & ex iis aquam Cardiacam pretiosissimam elicunt.

• Infructum lanugini proculdubio intermiscetur ut in aliis Salicibus.

Hanc arborem Rauwolfius, eumque, secutus Clusius, Elæagnon Theophrasti esse censent.

Idem Rauwolfius ait esse *Arnabo* Egyptæ, *Zarub* & *Zarnabum* Arabum, *Zurumbeth* Serapioti communi nomine dictum cui & J. Bauhinus subscribit. Discrepantes sententias Botanicorum de *Zarnabo* & *Arnabo* vide apud J. B. hist. lib. 8. c. 21. veralis finem. Est autem *Arnabo* ex aromaticis, unde in unguenta miscetur. *Zurumbeth* Arabum siccatur & adstringit: Cor exhilarat, & confortat, compescit vomitum, muliebra sistit, flatu resolvit, venenatorum moribus resistit.

Calaf seu Ban Alpini.

C. Bauhinus & Parkinsonus pro præcedentis synonymo habent. J. Bauh. à præcedente separat. Ex revera *Alpinus* foliis majoribus & latioribus depingit & describit, quocum etiam consente eruditiss. Veslingius, annotat tamen varietatem eam potius accidentalem esse, & loco debere: ait enim inter Syros vicinosis, populos angustioribus foliis contractam plantam conspici. Eam (pergit) nulla infidet lanugo, nec à medio nervo productæ fibre ambitum foliorum divisum interstinguat, ut icon *Alpini* repræsentat. Ad foliorum extortum folioli emergunt singula, rubro leviter colorati, cordisque diahole sese stringentis figuram expriment, unde & nominis & virtutum ratio primitus deducta videtur. *Calaf* enim sive *Calaf* Arabibus cor denotat. Delitescens tandem folioli florem dicitur an laneum partem excludit, interfusis canoni flavescine pictum, quem in rectum existens inclusus stamineus scapus fulcit.

Vires.

E floribus elicetur aqua odorata, *Masalef* dicta *Alpin.* cujus frequens usus est in Affectibus cardiacis calidis. *Rauwolf.* ad ventena arcenda, ad cor recreandum, & potrocinem exsiccandam eam prædicant *Egyptii*, & in febribus pestilentibus pro secreto habent. *Alpin.* Per variolas deturpatâ infantulis cum Bezoar aliquot grana utilissimè exhibetur. *Vesling.*

Aquam in qua flores multi infusi vel bulliti fuerint, exhibent ad dolores capitis, & ad reliqua ad quæ aquam destillatam, estque ad quoscunque febricitantes maximo apud illos in usu. *Alpin.*

5. *Salix Arabica foliis Atriplicis* C. B. *humilis Arabica foliis Atriplicis* Park. *Garb Maurorum Salicis* genus J. B.*Rauwolf.*

Arbor est patula, haud tamen multum assurgens, cujus furculi extremi teneriores fragillioresque quam ut *Salicem* nostratum instar vimineo operi inservire queant. Cortex ex pallido flavescit, fissus & folia, quæ oblonga palmum exsert, duos digitos lata, per ambitum velut *Atriplicis* folia sinuata, modicè siccante & adstringente facultate. Fructum & florem se vidisse negat.

Scribit *Rauwolf.* ex ea aphronitrum, *Salem* petreæ vocant, optimum fieri ad pulverem tormentarium. Surculos sci. extremos cum foliis in cinerem comburi, affusisque aquâ macerari, separari & multa ebullitione coagulari. Sed pulverem illum nostrati haud æquivalere. Nihil certe aliud est quam *Sal* fixus istius arboris, quem ab alterius cujuscumque plantæ sale fixo non differre specie existimo.

Ceterum *Avicenna*, notante J. Bauhino, suo *Garab* eisdem pene vires tribuit quas *Salici*.

6. *Fraxinæ Æthiopice conifer foliis Cnoori, Salicis æmulæ* Breynii, cent. 1. cap. 9.*Breyn.*

Ramosus est valdè, ligno duro, subalbido, cortice è gryseo rufescente; Folia frequentissimis, crassis, duris, *Cnoori* similibus; quæ in furculis paulo minore, quò autem magis superoera versus tendunt, eò majora latera, spectantur: donec furculorum tandem fastigia coronando finiunt, ipsæ suo modo illis, pariter ac inter furculorum divaricationes, Globulos lanuginosum & penitus niveum, *Salicis Capreæ* Tabernæmontani catulo similem, sed minorem, & tuberculis subciliissimis strobili instar immanis de Pinastro exasperatum continet; è quo succrescente *fasciali* muscosi, *Salicis* quoddammodo similes, staminibus pallidis constantes, erumpunt. His deciduis globulis ille in eorum solum, uncialem & majorem, squamam in extremitate sua albida & lanuginosa, evadit.

Reperitur hujus speciei major, foliis majoribus.

Julius

Julus descriptus, fruticem hanc Salicis speciem esse demonstrat: cumq; florifer sit, sexu masculinus.

Capitis bonæ spei inquinatus est.

Nullius (ut rectè Plinius) tutior est reditus minorisve impendii [quàm Salicis] aut tempestatum *Locus*. securior. Tertium locum ei in æstimatione ruris Cato attribuit, priorémq; quàm olivetis, quàmq; frumento, aut pratis.

Inter primas arbores germinat Salix, Julos & flores initio Veris ostentans. Juli autem floriferi *Tempus* brevi decidunt; semiferi ad ætatem usque in arbore durant. Componuntur hi è multis vasculis feminalibus, oblongis, mucronatis, per maturitatem in binas carinas deliscentibus, & lanuginem ostentantibus, cui semina involuta. Semina autem sata germinare & Salices edere à Trago observatum & proditum: idémq; confirmat J. Bauhinus. Salix ergò ab Homero *μαλίσση* dicitur, non quòd sterilis sit aut infrugifera, ut nonnulli opinati sunt, hoc enim experientie repugnat; non, quoniam occyissimè amittat semen, antequam omnino maturitatem sentiat, ut Theophrastus, Plinius aliique statuunt. Nam Salices omnes semen perficiunt, nonnullæ etiam dum retinent: Sed fortasse quia semen virile infecundum reddit & conceptum impedit. Nam & folia Salicis contrita & pota intemperantiam libidinis coercent, & in totum auferunt ipsam sepius poæ. *Plin.* & sterilitatem inferunt conceptumq; impediunt. *Disco.*

Salicis cortex, folia, Juli refrigerant & astringunt; exsiccant etiam citra mordacitatem tum flores, tum succus expressus, quem medicamenti exsiccatoris reservant. Haud enim invenias quod ad plures res utilius medicamento citra mordacitatem exsiccante, quod paulum etiam adstringat. *Gal.* Hinc sanguinem expuentibus profunt. Corticis è ramis peims cinis clavum & callum aceto maceratus sanat; *Uña* cutis in facie emendat, magis admisto succo suo.

Succus è plaga manans cum floret ad expurganda valet quæ obstant oculis; item ad spiffanda quæ opus sunt, sciendúmq; urinam, & ad omnes collectiones intus extrahendas.

Plura habent Veteres de viribus Salicis ejusq; partium, quæ vide apud J. Bauhinum.

Folia cum ramis in cubiculis strata aerem intrigant & febricitantium ardores mitigant. In quem usum haud infeliciter etiamnum in Italiæ & Galliæ quibusdam locis adhiberi observavimus. Folia cum aliis refrigerantibus aque incolta ad lotiones pedum febricitantibus conducunt. Ex ejusdem ligno & bacilli rasorii parantur ad abradendam linguam causo & febris ardentibus laborantium, notante Camerario. Hæc omnia è J. Bauhini historia.

Salicis arboreæ ramorum usus est ad peticas pro Lupulis & ad stipites pro sepibus; ligni etiam olim ad scuta; nam cum lentissimum sit, plaga ei inflicta contrahit se penitus, eluditque suum vulnus, & ob id contumaciùs transmutat ferrum; & quòd levissimum sit, utilitatem eandem ingeminat. *Plin.*

D. Evelynus lignum hoc ad cultros mensarios extacuendos & poliendo alii cuiusq; non ligno tantum sed & cori præfert.

Præcipuus autem est usus viminum ad corbes, sportas, qualos, canistra, fiscinas, clathros, vannos, cathodras, cunas, anachlinteria, aliisque utensilia innumera texenda, in omni vita adeo necessarius, ut non immeritò Cato tertium Salicis locum dedisse videtur, ut superius diximus.

SECTIO V.

Arbores floribus imperfectis, seminibus in vasculis membranaceis, aut membranæ auctis contentis.

CAP. I.

De Ulme.

Ulmi vox (ut videtur) primitiva est: siquidem nullum ejus Erymon apud Grammaticos aut Botanicos reperire poterim. Græcis *ΥΛΜΕ* dicitur.

Ejus nocte characteristicae sunt folliculi feminales compressi Atriplicis hortensis folliculorum emuli antequam folia erumpant præcoci maturitate decedentes.

Ulmi duo genera à plerisque Botanicis Theophrastum secuti statuuntur. At nos hi in nominibus aut descriptionibus conveniunt. Nos in Angliâ tres observavimus species, quibus addit D. Goodyerus quartam. Ex sunt,

A. 1. *Ulmus vulgarissimus folio lato scabra Ger. emac. vulgaris Park. The Common Elm.*

2. B.

Arbor est grandis & procera, multis ramis brachiata: cortice juniorum ramorum seu virgarum ex cinereo rubente, nunc levi, nunc profundissimis sulcis eminentissimif, porcis secundum longitudinem exarato, interiori albo, lento admodum & tenaci, ut in longum facillè sine ruptura detrahi possit. Cortex arborum adultiorum pro eorum vetustate in rimas finditur, & admodum rugosus & inæqualis evadit. Lignum interius ex luteo rubescit, pectine in tabulis levigatis valdè con-

pore in antiquum statum redeat, celerrimèque Hirundinis, unde locus fabule factus est, aut per parentes, aut id herbâ Chelidoniâ restitui quod per se fit. *Antonius Nuck* in libello quem nuper divulgavit, *De Ductu (alveoli novo, saliva, Ductibus oculorum aquosi & humore oculi aqueo; Ductus huius aquosus in oculi bulbum inferi observavit, quibus humor aqueus assidue suppletur, & effusus intra paucarum horarum spatium restituitur: unde in vulneribus & puncturis oculorum non aliud medicaminis genus magis necessarium putat quàm quod mucagine quadam labia vulneris oblinere & viam quodammodo præcludere valeat.*

Quòd humor oculi aqueus sponte restituitur absque ullius medicamenti ope, experientiâ probat. *Expertus* (inquit) novi, loco saltem obscuriore servato animali (post corneæ lesionem & humoris aquei expressionem) decem horarum spatio, oculo humorem visumq; reddidit fuisse, & nuperrimè in Theatro nostro Anatomico [Leydensi] publicè idem demonstravimus in cane cui ex vulnerato oculo tam copiosè effluxit humor aqueus, ut flaccidus appareret oculus lesus: observantiam tamen elapsio sex horarum spatio oculi bulbum humore suo iterum repletum fuisse, idque sine ulla medicamentorum applicatione. Ipsum *Galenum* hoc non latuit, Oculos vulneratos restitui posse; Ceterum incredibile quiddam, nec fieri vulgò solitum in puero vidimus, qui stilo in pupillæ loco fuerat compunctus; nam cum statim effluxisset aquosus humor, tum pupilla ipsa minor est reddita, tum tota cornea apparuit rugosior, ceterum sanatus postea rectè vidit, collecto scilicet paulatim in eo qui effluerat humore. Et si fides historiarum Byzantinæ scriptoribus, testantur hi Imperatores Constantinopolitanos quosdam, quorum oculi pungente instrumento (qua de causa supervacancum hic dixisse) ita ladebantur ut aqua efflueret, brevi tamen postea oculorum & vigorem & præter expectationem visum recuperassent. Hoc si minus verisimile videatur, testem adduco *Josephum Zambecaram*, qui de Doctore quodam *Nerio* narrat sequentia, *Canis* (inquit) binos oculos scalpello chirurgico, quo venas aperire solent, dextrè confodit, & ex iis totum humorem aqueum expressit, ita ut oculi tanquam duo sacculi vacui corrugati manserint: cane deinde sub solis benefice naturæ tutela relicto, post sex horas & breviori forsitan tempore, ipsius oculos repletos fuisse, & ad statum naturalem rediisse; cicatricis nota solum remanserat, & *Canis* latus & alacer erat, ac si nullo affectus fuisset incommodo, & quod pluris interest, cæcus non mansit & acutè videbat. Idem experimentum in variis aliis canibus, super *Cuniculis*, *Indicis porcellis* & *Agno* rursus tentavimus, semper omnes intra paucas horas felicissimè sanati sunt, & adeò incolumes evaserunt, ut nè unus quidem ex ipsis ex insulso vulnere cæcus remanserit. Hæc autem quæ *Nerius* expertus est verissima sunt, sed locum saltem habent in oculis quibus pungente acu, aut alio quopiam instrumento, sed tenello vulnera infliguntur exigua: si verò manifestum fuerit vulnus, inimicisq; adactum instrumentum pungens aut focans, sanandi methodum quam supra proposuimus observare præstabit.

Ex hoc liquore oleum paratur, teste *Sylvio*, in vulneribus præstantissimum. Nobis verò hætenus observatum, inquit *J. B.* Olea quæcumq; in vulnere simplici minis profocasse: nam & eis fero fordescat vulnus, & glutinatio, quæ imprimis desideratur, impeditur.

Ceterum apes, ubi se post hybernæ famem *Samerâ* impleverint, profluvio alvi, nisi succurratur, intereunt. Hinc in regionibus *Italiæ Ulmis* confitis, rarò frequentes durant apes; ut prodidit *Columella*. Nihil tale à nobis hætenus observatum at neq; ab aliis fide dignis traditum accepimus.

C A P. II.

A. *Ostrya Ulmi simili fructu in umbilici foliaceis* C. B. *Ostrya* sive *Ostrya Theophrasti* Park. *Fagus sepium vulgo*, *Ostrya Theophrasti* J. B. *Betula* sive *Carpinus* Gcr. *The Horn-beam*, or *Hard-beam tree*.

J. B.

Procacior magna ex parte est, quàm ut ad vulgarum sepium humilitatem cogi possit, atq; adeò in insignem altitudinem sæpe excrescat, caudice crasso, cortice albedo, æquali, materie durissima & solidissima, albicante. Folia per ramos ulmea, ferrata sed longiora, denticulis in ambitu acutioribus, & velut in spinulas desinentibus, utrinque glabra, supernè hilaris virore splendentia. Ex ramis primo vere nucamenta quedam ac Juli dependent, foliati, oblongi, foliorum agminibus densè stipati acutorum, membranaceorum, ruforum, aut ex viridi fuscorum. Fructus verò in longo pediculo spicæ instar, foliorum angustorum ligalis alatis obvallatus, pyramidalis corculi effigie, striatus, compressus, lignosus: qui proveniens duo foliola Pomorum foliis serè similia producit.

Passim in sylvis & sepibus *Angliæ*, *Germaniæ*, *Galliæ*, & aliarum provinciarum occurrit.

Linn.

In hujus arboris nomenclaturis & historia admodum confusi & obscuri sunt *Botanici*, ut apud *J. Bauhinum* videre est.

C. B.

Lignum candidum est, solidum ac firmum, unde ad rotas molendinæ, cochleisq; ac trochleis, aliisque instrumenta, quæ magnis ponderibus sustinendis inserviunt expentur.

D. Evelynus commendat hanc arborem ad sepes tonsiles pro ambulacris in hortis & viridatis.

Vere vulnerata lachrymam exstillat non focus ac *Betula*.

Ad nos scripsit *D. Tancredus Robinson* mirum quoddam corpus ramosum globulos fungosos seu excrescentias in summitatibus ferens observatum fuisse inter corticem & lignum *Carpini* à *D. Dodartio*; & à *D. Marchand* gummosam substantiam instar lacæ & spiritui vini dissolubilem e trunco hujus arboris copiosè exillare, & longis filis dependere.

DE MORO.

Morum huic libro subjungendam duxi, quòd & ipsa julifera sit: an vero fructum à flore sejunctum gerat mihi nondum constat. Vocis Mori multiplex Etymon adfertur, Qui Latini esse volunt à mora seu morando deducunt, quòd arborum postrema frondes germinaque producat. Verùm Mora & Morus non conveniunt quantitate primæ syllabæ. Alii à *morosus*, id est, niger dictum volunt quia bacce ejus nigre sunt. Alii & rectius à Græco deductum existimant. Nam & arbor ipsa *Moræ* appellatur à Nicandro: Fructum vero *Moræ* dici Æschyli, Sophoclis aliorumq. auctoritate comprobatur Athenæus libro VI. alii *morosus*, id est, exitio, supplicio, infortunio deductum putant, quòd exitio quondam causa fuit illis qui excidebant. At quibus quæso aut quando? Nec desuere Grammatici [qui literam pro litera ponendo] *morosus* dictam arbitrantur, id est, stultam cum sit sapientissima, Plin. lib. 16. c. 25. Novissima urbanarum germinat Morus, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Idem L. 18. c. 27. Cum germinare videris Morum, injuriam postea frigoris timere nolito: eadem de causa sapientissima fertur. Verum Etymologia istas *morosus* explosit Vossius in Oratoris.

Cum Mori albe Julos longis pediculis hærentes observaverit J. Bauhinus: cumque etiam in Mori nigre iconibus juli longis pediculis dependentes pingantur. Fructus autem utriusq. brevibus, nigre brevissimis insidere dicuntur, suspicamur Julos à bacca disjunctos esse nec fructus insuadere, ut nonnulli volunt, quamvis nihil affirmemus, sed rem observatione diligentè determinandam relinquimus: imperentiarum autem, donec certis consiterit quò referenda sit, Morum huic generi subnectendam duximus, & Fici proxime præmittendum quacum in multis convenit.

Morus nigra J. B. *nigra vulgaris* Park. *fructu nigro* C. B. *Morus* Ger. **The black Mulberry.**
J. B.

Moro caudex satis crassus, contortus ac nodosus: altitudo justæ arboris; rami patuli; cortex rugosus, crassus, lentus: materies robusta & modiculus flava: *radices* numerosæ, magnæ ac robustæ, non tamen altè descendentes, sed sese diffundentes, si Matth. credimus. *Folia* ex rotunditate in acumen definita, interdum virginea, sinuata, per ambitum serrata, tactu nonnihil aspera, hirsuta, sapore subdulci & viscoso. Pro *floribus* Dod. autore Juli sunt virentes, lanuginosi. *Fructum* fert brevissimo pediculo hærentem, majorem & longiorem quàm Rubus, glomeratum similiter sed acinis minutis rotundis, primùm quidem virentem & austerum, post rubentem, acidum & adstringentem, per maturitatem nigrum, sanguineo dulci succo madidum, manus & os inficentem. Matth. aut modicam ubi maturuerit remanere austeritatem.

Situm florum in hac arbore fructuum respectu, at neq. formam eorundem nos docent Botanici; neq. ipsi hæcenus observavimus. Theophrastus, qui omnium curiosissimè eos contemplatus videtur, lib. 1. cap. 22. de eorum situ, Gaza interprete hæc habet. *Etenim flores hæc in tota fructuum integritate habet: at neque extrema seu summa insidentem, neque singularem partem ambientem, sed mediam incaleatam, nisi forte conspici nequeant propter lanuginem.* Verùm hæc non satis clara sunt, ut indo certo colligere possimus ubi disponenda sit hæc arbor. Scribit Cæsalpinus, non florere evidenter, sed fructum nascentem binis squamis tegi, quibus decidentibus velut sterculorum apices totis fructibus infidere, quæ sanè observationem merentur.

Morus alba Ger. Park. J. B. *fructu albo* C. B. **The white Mulberry.**

J. B.

Tota delicatior est, ut à nobis quidam observatum, eiq. propter bombycibus alendis, magis expetit: *folia* teneriora, angustiora firmaque, oblonga magis non minus Nigre folis serrata, aliquando virginea sed tam concinna divisura, ut Gallici sœpè Lalis artificis pictoris manu facta ad certamen provocent. *Julos* longiusculis pediculis hærentes plures sæpe simul profert, ut in ramo spontaneæ Mori ex Italia delato observavimus. Fructus non ut præcedentis niger, sed per maturitatem albus, sapore (Matthiolo teste) melleæ dulcedinis, quo fit ut minimè cum nigra facultate conveniant, minor etiam, ante maturitatem viridis & subviridis, austeriusculi sapore. *Radix* in ingentem sese diffundit longitudinem, magis quàm nigra, fortasse quoniam amplior, alior proceriorque semper quàm nigra habeatur.

Morum albam Veteribus non penitus incognitam fuisse fabula Pyrami & Thisbes apud Ovidium aliòsque è quorum sanguine Mori bacca aspersa quæ prius albe fuerant in nigrum colorem mutate sunt, arguere videtur: quamvis apud reliquos Veteres, Theophrast. Dioscor. Galen. Plin. & Geoponicos ejus mentio nulla. Quod si Ovidii ævo vel ante existisset (inquit J. Bodæus) nunquam Plinius scripsisset, minimum in hac arbore ingenia profecisse, & ex infusione nullam nisi in magnitudine observatam diversitatem. Et Cæsalpinus candidam, quæ hodie frequentissima est & optima ad Soricum præstandam, peregrinam quondam fuisse in Italia putat, ut etiam bestiolæ, quæ ex ejus frondis pastu sericum reddat.

Lacuna Morum hominum amicam dicit, & locis delectari quæ homines frequentant.

Lobelio Albe Mora multò insipidiora esse dicit quàm Nigre, ad nauseam potius quàm ad alendum nata, caduca, satæ dulcia.

Amat Morus loca calida, sabulosa & plerunq. maritima, planiora; nec temere in montibus *Morosa*. *Morus* vilam Plinius scribit. Frigidiora tamen loca facillè tolerat, & in Angliâ nostra non infeliciter adolescit.

Serotino germinatu florere, maturatque celeriter fructum Morus. In novissimis florent, inter prima maturefcunt *Plin.* Ergo, ut plurimum (inquit J. B.) mensè demum Maio germina emittit, fructum maturat Augusto, aut etiam citius pro loci temperie. Tardissimè senescere hanc arborem Veteres prodiderunt.

Scratur non tantum talea aut furculo sed commodissime etiam semine. Verum de satione ejus & cultu consulendi rei rustice scriptores.

Morum albam fieri per insitionem Mori nigrae in Populum albam fabulosum putamus: nam, ut saepius diximus, fructus furculi naturam sequitur.

Ufus.

Cer. Sreph.

Foliorum Mori usus est insignis in Italia, Sicilia, Hispania, Gallia ad bombyces alendos, & in eum usum Moros albas magno numero circa urbes & oppida ferunt; harum enim foliis maxime delectantur vermiculi. Quidam Mori foliis deficientibus Ulini folia & Urticae germina substituant: Alii Lactuca, Endiviae aut Dentis leonis folia praebent; quae omnia & nos experti sumus: sed junioribus tantum danda sunt, nam si majoribus paulo, aut nimium des, alvo fluida facile dissolvuntur & pereunt. Quocumque autem pabulo praeter Mori folia eos alas nunquam extrinam inchoabunt, & tela sericea se includent. Colligenda autem potius vetera folia quam nova, manent cum ros Solaribus radiis dissipatus fuerit: aut si madida fuerint diligenter prius abstergenda aut ad ignem siccanda sunt: nam nimium humor obest bombycibus. Verum de Bombycibus & serico agere hujus loci non est, sed ad Historiam Insectorum pertinet.

Vires.

Fructus Mori nigrae (*Mora Celsi* Officinis dicti) immaturi refrigerant, siccant & astringunt valide, [ubi aruerit *Galen.*] Itaque ad diarrhoeas, dysenterias, affectiones coeliacas, fluxus menstruos, expulsiorem sanguinis accommodati sunt. Extrinsecus in oris fauciumque inflammationibus & ulceribus profunt.

Mori fructus Dioscoridi (de maturo loquitur) alvum solvit, [initio pastus & ante alios cibos sumpta] facile corrumpitur, [post alios cibos] & ventriculo inimicus est. Plinio (cui etiam experientia suffragatur) refrigerat, sitim sedant, appetentiam excitant, si non superveniat alius cibus intumescunt: cui etiam adstipulatur Galenus. At e contra Horatius

Ille Salubres

Aestatis peraget nigrum qui prandia Mora

Finiet, ante gravem quae legerat arbore solem.

Alii etiam ventriculo grata & amica esse Mora volunt. Galenus autem conjectatur, Mora exiguum in seipis habere facultatem ejusmodi, qualis magna medicamentis purgantibus inest, cujus beneficio non modo facile succedunt sed corrumpuntur, etiam si diu in ventre manserint; immo totam adeo arborem in omnibus suis partibus mistam aliquam vim obtinere putat ex restringente & purgante compositam. Attamen in radice cortice purgatoriam cum quadam amaritudine exsuperare, adeo ut & latum lumbicum interficiat.

* Lib. 23.
cap. 7.

Maturorum succus ad stomatica medicamenta utilis stomaticen quam Polychreston vocat, sic describit, * Plinius sextarii tres succi ex Pomo, leni vapore ad crassitudinem mellis redigatur: Post additur Omphacii aridi pondus denar. ii. Myrrhae denar. i. Croci unius, simul trita mulsentur decocto. Neque est alius oris, arteriae, uvæ, stomachi jucundius remedium. Alios modos stomaticen componendi ibidem vide.

Folia vel sola vel cum cortice cocta odontalgiam sedant (gargaris.) Schrod. eadem trita cum oleo, [ex aceto Schwenchf.] imposita ambustis igni medentur. Diosc.

Syrupus mororum grata sua aciditate in febribus ad sitim extinguendam & ardorem temperandum utilissimus est: & item ad inflammationes, pustulas seu ulcuscula oris, palati, uvæ, tonsillarum, gutturis & faucium commodissimus.

Materies utilis est operibus quæ flecti postulant; estque solida, nec in aquis minus durabilis quam firmissima Quercus: aeternam esse arbitrantur, tradente Theophrasto, & vetustate Loti modo nigrescere.

Mora Virginiana Park. The reddish Virginian Huckleberry.

Hæc apud nos celeri auctu in magnam arborem adolescit, multis ramis & frondibus patulam. Folia præcedentis persimilia, palchra, ampliora. Fructus seu mora longiora, & per maturitatem rubicundiora, gustus non minus grata.

HISTORIÆ PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS SEXTUS,

QUI EST

De Arboribus flore fructuque aggregato.



Uoniam Arbores flore fructuque aggregato, seu ex pluribus composito per se Libro complendo non sufficient, cum Arboribus flore simplici quarum flos summo fructui infidet eas copulabimus, adeoque Librum hunc in duas partes dividemus, quarum prior erit

De Arboribus flore fructuque aggregato, seu ex pluribus composito. Posterior De Arboribus flore simplici summo fructui infidente.

PARS PRIOR.

De Arboribus flore fructuque aggregato seu ex pluribus composito.

EX Arboribus quarum flos fructui contiguus est, alie sunt flore fructuque aggregato, seu ex pluribus arcte stipatis composito, alie iisdem simplicibus & à se invicem disjunctis, nec pluribus in unum totalem florem fructumve coeuntibus.

Prioris generis nonnullæ sunt flosculis intra fructum occultatis, quas *Ficæ* dicimus, quæ flore omni careo vulgò creditæ sunt; alie flosculis apertis, iisque vel singulis, singulis seminibus insidentibus, vel singulis, singulis fructibus partialibus unum aut plura semina continentibus.

De Ficæ.

Ficus arbor (inquit *Vossius*) non ineptè deducitur à *עֵץ*, id est, *Ficæ novella*. Sed malim ab Hebræo *Fag* quomodo dicitur *Ficus* quæ nondam satis maturuit. At minime audiendus *Isidorus*, qui lib. 16. cap. 6. *Ficæ Latine à fecunditate vocatur, feracior enim est cæteris arboribus. Nam ter quaterque per singulos annos generat fructum, atq; altero maturiscente alter abortitur.*

Cæterum *Ficus* ab aliis omnibus arboribus distinguitur flore vel nullo, vel intra fructum edulem, dulcem occultato.

CAP. I.

De Ficæ Europæa.

1. *Ficæ* J. B. Ger. *vulgaris* Park. *communis* C. B. *The common fig-tree.*

HUjus caudex, licet sit ubi grandescat & contortus videatur, parùm tamen est firmus, ut qui virgineo, levi tamen cortice, infernè cinericeo, in ramulis viridi, sic vestitus, cum ligni parùm, fungosæ verò medullæ plurimum obtineat: Materie namque constat molli, rara, ampla intus cavitate, cujus inane crassè fungosæque medullæ, sicut in *Sambuco* ferè, refertum est. Ipsa alioqui arbor mediocris, *Sambuci* magnitudinem nonnunquam superat, pluresque ab una eadèmq; radice emittit stolones, crassitudine variantes & proceritate. *Radices* nuntur multis, longis, firmis, lentis, etuisu contumacibus, multis capillamentis fibratis, colore flavis atque *Rutæ* radicibus similibus, majoribus tamen multò, ut annoeat *Cordus*. Abundant cortices, sicut & folia fructuque adeò ipsi nondam maturi, lacteo copiosèque satis succo, glutinoso, odore ad *Rutam* accedente, quemadmodum & reliquæ ejus partes, sapore tubacri: qui tamen in fructu paulatim in dulcem excoquitur succum. *Folia* conspicua sunt latitudinis crassa, in lacinas plerunque quinque profundas divisa, mutis acutis quàm *Platani*, aspera [hinc *Anguilla* retinendis idonea] pediculo mediocriter longo, qui abruptus lac fundit.

Flores

Flores (ut omnes hactenus tradiderunt) non fert, sed statim parva fructuum rudimenta, quas *grasses* Latini vocant. Pilo aut Fabæ æqualia: ea paulatim crescunt, donec Pyri mediocri figuram & magnitudinem consequantur. Cùm ad modiam magnitudinem pervenerint, intra se *flores* (quod fortasse mireris) concipiunt, figurâ confertis staminibus similes, colore in candido purpuralescentes, è carne exeuntes, & ad modiam fructus cavitatem se dirigentes: quæ florum observatio Cordo debetur.

Fructus ex ferculis Pyriformes nascuntur, basi latiore cœlum spectante, pulposi & molles, virides, sed viroris quodammodo obsoleti, aut ex viridi rubentes, fuscive, quidam etiam per maturitatem ad flavum inclinantes, melleæ dulcedinis, carne pallida aut subrubra, innumeri granis luteolis, quæ *xyssipilæ* vocant, resperis; ex quibus seminibus nihil producitur, autore Camerario: odorem etiam spargit hanc in jucundum sibi, peculiarem.

At non movet me Camerarii autoritas ut credam Ficum ex semine non nasci; cùm illud præter naturæ ordinem sit, ut quævis planta semen producat toto genere infecundum. Semen enim à natura destinatum est ad plantam propagandam. Natura autem sine sui non excidit nisi ob defectum aliquem aut impedimentum intervenientem. Quin & Geoponicis pleriq; antiquiores Ficum è semine nasci fatentur. Et Cæsar in Cæsaræ majore, Ex Fici (inquit) tantulo grano tantis truncis procreat.

Lxxv.

Ficus in toto Europæo tractu temperationi calidiorëve, Græciâ, Hispaniâ, Italiâ, Gallia Narbonensi obvia, in hortis & pomariis culta. In Angliâ etiam in hortis frequens colitur, nec raro fructus ad maturitatem perducit, modò loco idoneo Soli exposito & à ventis Septentrionalibus tuto feratur. Sylvestris seu Caprificus in Italia, Hispania & Gallia Narbonensi passim provenit, in montanis & editis locis inq; vetustis muris & rudicibus.

Ficum multas species, seu varietates potius, recensent Veteres, Theophrastus, Plinius, Athenæus, & alij sumptis differentiis vel ex ipsa natura & nascendi modo, vel à maturescendi tempore, vel à diversitate figuræ, coloris & magnitudinis, vel à regionibus in quibus nascuntur, vel ab Autoribus ipsis qui primi vel invenerunt, vel observarunt, vel produxerunt, quas omnes persequi, (cùm nomina jam evanuerunt ex usu, & difficillimum, nè dicam impossibile, sit Antiquorum appellationes Ficus hodie notis accommodare) non necessarium duxi. Consule si placet J. Bauhinum in Hist. plant. lib. 1. cap. 56. & Bodardum à Stapel notis in Theophr. hist.

Hodie à colore & magnitudine præcipue Ficus distinguunt, in albas sci. & cœruleas, pallidas, virides, luteas, purpureas, subrubras, rugas, & varias; in minores & majores; item à loco unde adferuntur. Verum cum mihi persuasum sit, Ficum non minus quàm Pomorum Pyriformis, varietates à semine provenire, adeoq; certus earum in natura & definitus numerus non sit, sed novas indies varietate obtineri posse, omnibus enumerandis & describendis nec animus mihi, nec facultas superest.

Quæ de Caprificatione Veteres tradunt sic breviter complexus est J. Bauhinus. E putrescente Caprifici fructu culices geniti in urbana fructus evolvant, eosq; morli aperientes superflam humiditatem depascuntur, radiolq; una Solares intromittunt, adeoq; non tantum impediunt nè decidant, sed & earundem concoctionem & maturitatem promovent & accelerant. Hinc (inquit Plinius) Ficis Caprificis permiscetur ad rationem venti, ut flatus evolantes culices in Ficus ferat. Quæ plura de Caprificatione velut Theophrastum & Plinium consulat. Nunc dierum nulla ejus ratio habetur.

Hic tamen mos suspicionem mihi injicit, dari etiam in Ficus, sexuum diversitatem, Caprificos autem Ficus mares esse, earumque florem pulverem feminarum fructibus aspersum, non autem culices è fructibus evolantes, tum in perficiendis & maturandis, tum cœnchræiudibus fecundandis inservire; unde Plinius ad rationem venti Ficis Caprificum permisceri ait, ut flatus non culices (ut ille vult) evolantes, sed pulverem prolificum & feminalem in fructus ferat.

Ficum fulmine non tangi Veterum opinio fuit, at non minus rationi quàm experientie contraria.

Observavit enim à fulmine tactam Ficum Laurumque lib. 3. *Stapeliæ*. Carnes animalium, sed præcipue Avium, in Fica suspensas tenerescere, arboris nimirum affatu, iidem tradiderunt. Eisdem notæ est proculdubio hæc observatio cum præcedente: Carnes tamen duriores teneritatem tempore contrahunt in quacunq; arbore suspensæ. Aer enim carnem ad corruptionem disponit.

Eisdem commatis est quod fertur de Tauris, nimirum ferocissimum quemque huic alligatum arbori miscescere subito, tanq; manu ac subiq; tolerare, &c.

Ficus recentes, modò mature sunt, à Ventriculo ocyssimè & facillimè conficiuntur, imò quovis alio horario fructu celeris concoquuntur. Quod vel inde constat, quòd non solum citra noxam copiosius alij fructibus eas ingerimus, sed etiam quòd illis præsumptis si conlectum & parum cibi modum addamus id nihil incommodet. J. B.

Nos certe in Italia ante prandium Ficum (aperiameris sine ulla incommodo copiosè ingestimus, prout ibi moris est. Galenus ut salubrem vitam degeret ab omni saporaci pomis se abstinuisse tradit à 28. ætatis anno ad juvenitatem usq; exceptis exaltis maturis Ficus est, uvæ. Quin & amicus qui ejus mentis ab imbecis fructibus abstineret sine morbo fuisse.

Facilitatem Ficus glutinosam & salinam inesse probat J. Bauhinus, quòd ob lentorem manibus adhaerescant, & illas tamen abstergunt salis hujusmodi & niri modo. Hinc alij dejectionem moluntur, sine torminibus tamen aut perturbatione. Augetur saligo addito sale, quocum ferè recentis comedi solent etiamnum hodie in Italia & Galloprovincia. Est autem post sumptas Ficos affatim bibendum, nè in ventriculo subsistant sed facilius concoquantur & promptius descendant.

Veteres, Dioscorides, Plinius, Galenus in descriptione vitum hujus fructus admodum sunt prolaxi.

Pectoris & Pulmonum vitis, Asthmatis, tussis, &c. caricas conducere inter medicos convenit. In usu est duas triove caricas macerare per noctem in aqua vitæ, & manè dare edendas asthmaticis. Verum (inquit C. Hofmannus) exiguum est valde quòd cum saliva in masticatione descendit ad pulmonem:

pulmonem: efficacissimum est decoctum cum Hyssopo, quod magnum absterforium dicitur à Mesue. Arenulis renum & vesicæ medentur & urinam ducunt [virides C. Hofman. nam siccs hoc denegat.]

Virides etiam hanc habent laudem quòd sitim sedent & calorem extinguunt: sicca contra; præcipue in biliosis, & cum natura ipsorum convenientibus febribus affliguntur. Belescunt enim facile, ut Saccharum, Mel & alia dulcia.

Ficus maturimas & ultimas cavebit (monente C. Hofmanno) quicunq; humidioris est alvi. In primis cavebit in prandio, quòd febres generent putridas, si ob moram putrescant.

Hodie usus fere siccarum ficuum in duobus tantum casibus est: in decoctis pro puerorum variolis & morbillis: inque gargarismis pro inflammationibus faucium & tonsillarum. C. Hofm. At superius diximus eas Asthmatis, Tussi, aliisque pulmonum affectibus, unanimi fere medicorum consensu, appime conducere. Mulierculis nostratibus, appropinquante partu, ficuum tollarum elus ad partum faciendum est familiarissimus. Quin & familiare est super ficus spiritum vini accendere, brodiúmque ad tussim sedandam propinare.

Caricæ extrinsecus applicatæ maturant, molliunt, attrahunt. Cum fermento tritæ admixto sale bobones pestilentiales aliósq; abscessus intra paucos dies rumpunt. Eodem medicamento Regem Ezechiam Prophetæ monitu usum fuisse (2 Regum 20.) existimat Tragus.

Ficum frequentem esum pediculos generare præter Galenum Paulus Ægineta, Oribasius, & Recentiorum quamplurimi sibi persuasum habent. Quæ opinio & apud vulgus nostratum viget. An experientia suffragetur dubito.

Fici succus, sive is ex incisa arbore emanet; sive è foliis expressus sit, valde calidus est & mordax, ut sit inter caustica; debito tamen modo preparatus locum suum habere potest, in ulceribus malignis, lichenibus, lepris & aliis curis sordibus abstergendis foris adhibitus: Verrucas etiam quas myrmecias vocant ejicit.

Idem judicium est de grossis sive Fici, sive Caprifici (inquit C. Hofman.) Nam hujus præcipue habent non minus caustici quàm arbores ipsæ; ut intelligere est ex illo quod in aceto soluti sanguinem taurinum dissolvere valcant.

Hæc qui considerabit, mirabitur quomodo succus tam virosus in Ficu matura possit excoqui in tantam dulcedinem. De ratione hujus phænomeni Plutarchum in Sympoticis disputantem videas. At hoc in aliis etiam arboribus multis accidit, Pruno sylvestri, Cerasis, Piris, quarum succi amari aut ingrati, fructus maturi dulces. Plantarum enim succi coctione mitescunt; fructusque ipsi ex acerbis dulces fiunt. Hinc tamen documentum tibi parabis, quantæ sit operæ pretium distinxisse ficum perfectè maturam ab imperfectè: ut rectè monet C. Hofmannus. De immatura habemus experientiam Beuyermi, 11. Cib. 37. In cibo usurpatum multorum sanorum valetudinem afflixisse. Tales autem fere sunt Ficus quæ in locis algidioribus proveniunt.

R. Sarculos Ficus, in frustula incidantur, ad lbj. decoquantur in vini lbj. & aquæ lbj. β. Dosis ʒ iij. manè in hydropè. Egrege sudorem movet, ut asseruit mihi vir quidam religiosus. Chesneau.

Litere quæ lacte seu succo turionum Ficus exarantur in charta, omnino inconspicue sunt, donec charta igni admota vehementer incalescat, tunc autem velut ustulata se manifestant: quod etiam aceto, succo limonum aliisque acidis commune est. Hinc & Lac succo isto coagulatur in calcem, Plinio & Dioscoride testibus.

2. *Ficus sylvestris* Dioscoridi C. B. *Caprificum* Ger. J. B. Park. *The Wild fig-tree*.

Quidam Ficum sylvestrum à Caprifico distinguunt; verum * non necessario, cum usu solum * *Ficus sylvestris à sativa* Caprificandi differat. At neque à Ficu sativa specie differt *Ficus sylvestris* vel Caprificus, quòd hæc ex illius grano nascatur, sed accidentibus tantum à cultura ortis. Sexu tamen (ut diximus) forte differt Caprificus à Ficu tum in genere sylvestri, tum in sativo.

Hic addit C. Bauhinus † Chamæficum seu Ficum humilem, quæ omnium partium parvitate excepta, quòdq; tenerior sit & frigoris minus patiens, à Ficu vulgari non differt.

Pro diversa specie proponit Parkinsonus Ficum nigram sive præcocem, quæ tamen non alia in re à vulgari differt quàm Fructus colore exterius nigro purpureo, cærulei tinctura obducto, intus obscure rubro seu atro-rubente & quod bis in anno fructus producat.

Libet hic adjacere quæ C. Bauhinus de Ficibus in Indiis nascentibus habet. Variant (inquit) Ficus in India pro regionum diversitate: nam in Provincia bonæ spei fructus perpetuo ferunt (part. 8. Ind. occid.) & in Peru summa earum ubertas (part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 31.) Addit Josephus Acoستا in India Occidentali diversas esse valles, quæ integro anno fructus promant. Sic in Mala 13 milliarioum intervallo à *los Reyes* Ficus est, quæ parte dimidia, qua Austrum spectat frondes ac fructus fert, quando in montanis ætas viget, altera verò pars contrario anni tempore, cum in planis ætas. Acoستا l. 4. c. 32.

Ficus arbores, Monarde referente, ex Hispanica in Peruanas provincias delatæ plurimos & optimos fructus gestant: & ut folia isthac non deponant Deus singulariter voluit, quòd semper remedium præfens esset contra insecta quæ, Araneæ appellantur, quorum icibus virulentis lac ex Ficus folis manans, bis terve in vulnus instillatum remedio est.

Ficum specie fructus Peruanus C. B. *Papaie Peruvianu* J. B. *videtur esse Arbor Paponifera* *quæ* *supra* *descripta.*

J. B.

Annotat Benzo Hist. suæ l. 3. c. 18. Apud Peruviansium Mantam peculiare quoddam fructuum genus (Indigenæ *Papaie* vocant) Ficum specie modicorum magnorúmque nasci, quale nusquam in India præterquam in eo regno vidit. Arbor quæ illud Pomorum gignit proceræ & gracilis, fructus sapore dulci est.

Vel solum *Papae* nomen arguit hanc arborem esse superius à nobis traditam & descriptam inter eas quae caudice sunt simplici non ramoso, F. Columnae notis in *Recehūm Papae Orientalis* & Arboris *Peponiferæ* nomine, C. Bauhino pro *Platani* specie, titulo *Arboris Platani folio, fructu Peponis magnitudine, eduli, Lusitanis Mamoera dictæ* propositam. Unde eadem arbor à Bauhino bis pro duabus diversis proponitur.

Benzo fructum pessimè describit *Ficum* specie, unde proclivis in errorem lapsus est.

Arbor cucurbitifera, Ficus Nigritarum Theveti J. B. *Ficus foulu arbor fructu oblongo* C. B.

Suspicioe & hanc quoque ad *Papayam* referendam esse, nam & folia conveniunt; nec fructus præterquam figurâ oblongâ multum differunt. Solent autem Scriptores venustiores & historici parum accurati esse tum in describendis tum in delineandis stirpibus.

CAP. II.

De *Ficu Indica, Europææ analogæ.*

Ficus Indicæ tria genera sunt. Primum *Europææ analogum* voco, quia eodem modo cum *Ficibus Europæis* propagatur, nec funiculis è caudice aut ramis versus terram demissis, & ubi eam attingerint radices agentibus se multiplicat.

Secundum funiculis, quos diximus, è summis ramis ad terram usq; demissis & radices agentibus se propagat. V. Cap. seq.

Tertium fibris ex ipso trunco exstantibus & deorsum tendentibus eidemque accrescentibus, & in terram tandem radicatis augetur. V. Cap. IV.

* P. 1. F. 25.
P. 431

1. *Atty-ala* * H. M. *Ficus Malabarensis folio oblongo acuminato, fructu vulgari amulo* D. Syen.
annot. in H. M.

H. M.

Arbor est procera densis & opacis frondibus, latè sparsis, nasciturque in arenosis.

Radix crassa radicales plurimas fibrosas, tam subter quam supra terram longè latèque diffundit, cortice lacteo, qui sub crusta nigricante ex albo rubescit, ac incisus seu detractus pleniori rubedine celeriter perfunditur. Brachio incito aquam limpida & insipida ac subrubram liquoris frigidi ubertim exhibet.

Caudex ambitu unius hominis amplexum excedit, cortice crasso, radice concolori; furculi tamen teneri virides geniculati.

Folia pediculis mediocriter longis & crassis insident, longitudine ad latitudinem, quæ in medio maxima, ferè dupla, & petiolum subconica, æternis in cuspidem leniter contracta, tenuia, mollia, glabra, superne obscuriore virore nitentia, subtus diluioze, *Venerum per folia discursu descriptioem vide.* Spor foliis adstringens, odor nullus. In vertice furculorum conus oblongus & viridis inter foliosa involuta, viridula folia tenella recondens: quod & aliis hujus arboris speciebus commune est.

Floræ fert nullos: conspicuus intellige.

Fructus in furculis petiolis curtis, crassis nonnihil incurvis plures unâ proveniunt, plano-rotundi ac ad petiolum contractiones, nonnihil pilosi, cum umbilico in vertice, haud dissimiles nostris ficibus: cum immaturi sunt virides, & lacteo liquore, maturi colore rubicundo & minus lactei, esculenti.

Insunt eis ut in *Ficu grana* parva, tenuia, oblonga, numerosa serie, constantia ex capitulo rotundo & rectè caudula, quæcum ordine cortici internis insident, suntque instar folliculorum, in suis capitulis unum semen minutum nigricans continentia, primum albicantia, ex maturitate sublavescantia.

Fructibus cum maturefcunt formicæ innascuntur; hólque indigenæ habent in edulis, non verò eos qui altum sunt specierum.

His terye in antio fructus dat hæc arbor ut & cæteræ species.

Virr. *Radix* decoctum, ut & eisdem incisè succus, vase supposito exceptus, servit ad purificandum sanguinem, ad hepar male affectum, ad ulculos & fistulas manuum, oris, aliarumque partium. *Cortex* ad eadem datur in decocto, tritus ulceribus proficue imponitur, ut & parti laboranti morbo sacro Lusitanicè dicto *Cobralia*.

Fructus alvum astringit, estque proficuum pro pituita humorum, mala temperie corrigenda.

* P. 1. F. 27.
P. 47.

2. *Are-ala* * H. M. *Ficus Malabarensis folio cuspidato, fructu rotundo, parvo, gemino*, D. Syen.

H. M.

Arbor est procera, densis & opacis frondibus, latè sparsis; nascens in arenosis & petrosis, atq; in arboribus, ut *Atty-ala*.

Radix cum *Per-ala* inferna describendo convenit.

Caudex crassus est, ad duorum hominum amplexum cortice ut in *Per-ala*. *Surculi* novelli virides, geniculati.

Folia longa tenuibus pediculis appensa cordis humani formam habent, antrorsum angusta, ac longè lanuola cuspidata, quæ vomitioh sunt ad petiolum rectro-ibus ocis, quæ tenuiora rotundioribus circumscripta, foliola & omnia minus crassa quam *Atty-ala*, superne obscuriore virore nitentia, subtus lucidiora. *Cortex* fibrosus molle in utraq; parte emittit, nervi transversî inde egressi in *superior* parte maxime; nervorum per *folia* discursum vide.

Fructus ramis furculisque supra ad exortum foliorum in nodulis bini & bini, arcu juncti insident, parvi, rotundi, illis *Iry-Alu* planè similes, cum umbilico parvo in vertice; formicis intus carentes, continentes *grana* numerola *Aty-Alu* magnitudine, semen minutum nigricans in se recondentia.

Est hæc arbor Deo *Vishnu* sacrata, quem sub ea natum esse & flores sustulisse fabulantur; estque ex religione eorum hanc adorare, muro lapidum cingere, eima, seu lapides juxta positos rubro colore signare, quamobrem ab incolis Christianis arbor Diaboli nuncupatur.

Quod ad vires non multum differt à reliquis *Alu* speciebus.

3. *Ficus Malabarica fructu Ribesii forma & magnitudine, Tejela dicta.*
Tijela H. M. P. 3. Tab. 63. p. 85.

H. M.

Arbor est vastæ magnitudinis 70 circiter pedes alta, *caudice* crasso, octodecim pedum mensuram in ambitu non rarò superante, multisque ramis in orbem diffusis donato. Lignum albicans, cortice crasso, scabro, cinereo, intus rufo obductum, corpus matrix prædura, crocea.

Radix albicans, flavescente cortice tecta, fibris suis crassioribus profundè terræ inheret; sapor lacteus & subsalsus, odor nullus.

Folia rotundis ac subviridibus petiolis in novellis ramis densa congerie proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, communi virore supernè splendentia, infernè subviridia, insipida, inodora. *Fructus* ipsi ramulis inter folia sine petiolis adherent, cum formâ, tum magnitudine *Ribesii* haud ab similes; sicutque exiguae fici, rufis granulis plenz, uti omnes *Alu* ac *Teregam* fructus, insipida, inodora.

Nascitur locis sylvestribus, montanis ac petrosis Malabar, præcipuè in *Ambalakatti*, atque per totum annum fructus fert. Vesperulliones, quoniam fructibus delectantur, in hac arbore frequenter nidificare solent. Locu.

Ex radice cortice cum Pipere longo in aqua communi decoctum paratur, quod tussi inveterate & aliisque pulmonis affectibus medetur. Lacteus ex radice & fructibus expressis succus efficax in oculorum vitis remedium est.

4. *Ficus Malabarica semel in anno fructifera, fructu minimo, Tsjakela dicta. Tsjakela* H. M. P. 3. T. 64. p. 87.

H. M.

Arbor est procerâ, *caudice* crasso, candido, multisque ramis crassioribus in orbem diffusis donato, cortice nigricante, intus purpureo, obducto, quo leviter inciso succus extillat lacteus, acris, inodorus.

Radix fibrata, albicans, flavescente cortice tecta pincisâ & vulnerata similem planè emittit lacteum succum.

Folia rotundis ac viridi-albicantibus petiolis in novellis ramis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, densa, longitudine spithamans, latitudine palmum superantia, colore ut in præcedente, insipida pariter & inodora, nervis aliquot albicantibus ac eminentibus è media costa in latera excurrentibus. *Fructus* præcedentis similes.

Crescit locis montanis Malabar, præcipuè in sylvis *Parakasse*: Semel in anno, viz. Decembri & Januario mensibus fructus fert, atq. sobole fata ad quinquagesimum usq. annum non rarò frugifera manet. Locu.

Ex arboris cortice peculiari artificio chordæ torquentur, quibus arcus tenduntur. Necnon color paratur rubicundus, quo vestimenta *pauis de Cambaya* ipsi dicta tinguntur.

Eisdem habet in medicina usus cum *Atti-Alu*.

5. *Teregam* * H. M. *Ficus Malabarica foliis rigidis, fructu rotundo, lanuginoso flavescente,* * P. 3. T. 60. *Cerasi magnitudine* D. Comelin. p. 79.

H. M.

Arbor est procerâ, triginta circiter pedes alta, *caudice* crasso, cortice atro-viridi, intus albicante obducta, necnon ramis lanuginosis ac asperis in orbem diffusis eleganter ornata. Lignum ex albo flavescentis, molle, insipidum, inodorum.

Radix fibrata, albicans, cortice rubicundo intus croceo tecta, inodora, insipida.

Folia rotundis, viridibus ac hirsutis ramulis sine oedine inherent, foliis Mali Citrii haud ab similia, atro-viridia, densa, spinulis quibusdam tenuibus & rigidis omni ex parte vestita.

Fructus ad ramulorum exortum ramis inherent, *Alu* fructibus perfimiles, rotundi, lanuginosi, *Cerasi nigri* majoris magnitudine, viridi primùm, dein flavescente colore, ac granis pleni, insipidi, inodori.

Provenit locis sylvestribus Malabar, imprimis verò circa Cochin; per totum annum vires, fructusque fert, ac diu superstes manet. Locu.

Folia usurpantur ad scirnia, ac quæcumq. lignea, cornea, stannea & argentea vasa fricanda, atq. *Verru* scabrinæ sua polienda ac laviganda. *Radix* cum aceto è nuce Indica confecto contusa, & manè jejuno ventriculo assumpta vitæ ardorem compescit. Fructus eidem impensè refrigerant.

6. *Peris Teregam* H. M. *Ficus Malabarica foliis asperis major, fructu eidem rotundo, lanuginoso majori.*

H. M.

Præcedentis species est major atque altior, *caudice* crasso, candido, molli, multisque ramis geniculatis donato, qui cortice cinereo, subsæpero atque hirsuto cincti, intusque medullâ coccinea referti sunt. *Radix* albicans & lactescens, nigricante cortice obducta, necnon fibris suis latè per terram diffusa, inodora, insipida.

Folia precedentis similia, sed majora & crassiora. *Fructus* vel solitarii, vel plures simul juncti ramulis inhaerent, precedentis speciei fructibus intus ac extris persimiles sed majores.

Locus

Nascitur in sylvis Malabar, praecipue in *Parau*, per totum pariter annum viret, fructusque fert, & integrum seculum frugifera manet.

Vires & Usus

Folia usdem usibus interviunt quibus folia *Teregan*. Fructus confusi usurpantur ad aphthas; insuper ex usdem in lacte caprino coctis potus conficitur, qui hepatis obstructioni eisdemque scirrho potenter medetur: Ex usdem in aqua coctis Balneum fit, quod endemis corporis maculis leprosis tollendis conducit.

C A P. III.

Ficus Indicae funicula è summis ramis demissis, & radices agentibus se propagant.

HUjus arboris speciem fuisse puto quam Veteres Ficus Indicae nomine tradiderunt, quamvis nox aliquae ei non conveniant, v. g. 1. *Folium pelta Amazonica non minus*: cum omnes hujus species folia modice admodum magnitudinis obtineant, nisi, (ut vult Clusius) ad similitudinem potius referenda sit haec comparatio. 2. *Crassities ingens matrum plantarum*, ut LX P. pleraque orbe colligant, quod de hoc genus arboribus verum non est, cum haec trium hominum complexum ambitu vix excedant, nisi de specie *Atty miser-alou* dicta, quae omnium Indicae arborum vastissima est, accipias; quae tamen funiculis à ramis demissis se non propagat, sed fibris ex ipso trunco exeuntibus eisque accrescentibus augetur. 3. Propagandi modus ramis incurvatis terrae infixis; cum haec fibris seu funiculis è summis ramis exeuntibus ad terram usque demissis, & ibidem radices agentibus se propagent.

Plinium attendamus eleganter more suo hanc arborem describentem.

Ficus ibi [in India] exilia poma habet: ipsa se semper ferens, vastis diffunditur ramis, quorum imi adeo in terram curvantur, ut annuo spatio inligantur, novamque sibi propaginem faciant circa parentem in orbem quodam opere rotaria. Intra septem eam altivant passos, opacam pariter & munitam vallo arboris, decocta specie subter intuenti proculve fornicato ambui. Superiores ejus rami in excelsum emicant, sylvestra multitudine, vasto matris corpore ut LX P. pleraque orbe colligant. Foliorum latitudo peltae effigiem Amazonicae habet.

* P. 1. T. 26.
P. 45

1. *Ity-Ala* * H. M. *Ficus Malabarensis folio densifunicula nitente, fructu parvo rotundo coronato.*
H. M.

Arbor est procera, sed minor ceteris *Ala* speciebus, densis & opacis frondibus, late sparsis.

* Atty-Ala,
sive prima Fi-
cus Indica
specie.

Radice cum * precedente convenit.

Caudex anplexum unius hominis aequat, cortice lacteo, & cum detrahitur aut inciditur intus rubescens. Ex ramis hujus arboris filamenta seu radicle versus terram pendule demittuntur. Scutuli teneri virides sunt & geniculati.

Folia petiolis digitalibus haerent, minora ceteris, oblongo-rotunda, rotundisque ad petiolum & anteriori ora, ac parvi angustia & obtusa cuspide eminentia, latiora paululum ad cuspidem quam ad petiolum, crassa, solida, densa, utrinque nitentia, magis tamen in adversa & saturatus virentia. Nervis a costa media inferne eminenti conspicui, densi, parallelo ductu transversim ad marginem ferè excurrunt, ubi arcuatum flexi & sibi mutuo concurrentes solum cingunt. Sapor foliis adstringens & subamarus.

Fructus vel solitarii, vel duotresve simul, cum è foliorum sinibus, tum alibi hinc inde è ramis pediculis herbis exeunt, parvuli, rotundi, in vertice umbilico eminente coronati, cum immaturi lactis ac virides; maturi verò nimis lactis, colore flavo ac minus rubescens.

* Atty-Ala
Ficus

Grana * precedentis similia, sed minora, minimum nigricans semen in se recondentia.

Lac in quo cortex tritus & insulus (percolando peris separato cortice) datus vertiginis capitis confert. Ulceribus curandis prodest soliorum decoctum cum oleo, si cum eo corpus perungatur, quo cum precedente, ut & in reliquis viribus, convenit.

* P. 3. T. 35.
P. 69.

2. *Ity-Are-Alou* * H. M. *Ficus Malabarica folio Mali cotanti, fructu exigue, plano-rotundo sanguineo* D. Commelin. *Arbore de Rau minor* Luinianus.

H. M.

In proceram excrescit arborem, cupis *Radix* fibrata, albicans, nigricante cortice tecta, qui ubi inciditur lacteam succum stillat.

Caudex, ut precedentis, plurimos undique diffundit ramos, qui (postquam annos 40 aut 50 vixit arbor) tenues quoddam easque singulares fibras seu filamenta rufi ac cerei coloris [qualia in Cuscuta conspicimus Clus.] deorsum mittunt, quibus ubi terram attingunt firmantur, novamque quasi prolem generant, & in novos arborum caudices transeunt, qui rursus summa sui parte novos ramos in latera spargentes novis denovo fibris deorsum missis sese propagant. Sic alii deinceps rami in infinitum, ut interdum unica arbor suis propagumibus miliarie Italicum in ambitu occupat, usque difficile quoniam primaria arbor sine illarum omnium prolium parentem dijudicare nisi ex trunco crassitie, quae interdum tanta est ut trium virorum ulnis vix apprehendi queat. Ceterum non modo interiores rami similes spargunt fibras, sed etiam in arbore summi atque ideo unica arbor sylvam efficit densissimam, & non raro plura superstes manet secula. Sub eas verò arbores animi sibi parant incolae, ac fibras jam in truncos convectis, tenuiores scilicet rescindere solent atque ea ratione vultu concamerationes & umbracula faciunt, aestis arcendi gratia, adeo etiam densis ramulis reliqui majores luxuriant, ut Solis radii nulla ratione penetrare queant: imò

imò aliquot hominum millia sub tali arboris latera possunt. *Hec omnia à Clusiana Ficus Indica historia mutati sunt. Folia precedentis folii similia sunt, sed minora. Fructus exigui, plano-rotundi, colore primum viridi, dein foris & intus sanguineo, granisque pleni uti vulgares ficus, dulces quidem, minus tamen grati saporis quam illæ, quapropter avibus potius quam hominibus cibo sunt. Nascuntur inter folia quemadmodum vulgares ficus, hoc est, in novellis ramis, qua parte folia illis inhaerent.*

Nascitur ubique in Malabar, imprimis circa *Warapouli*; Viret per totum annum fructuque fert. *Lucæ.*

Ceterum ex arboris hujus cortice, radice & foliis in oleo decoctis Balsamum paratur vulnerarium. *Vires.*
Ex cortice in lacte ebutyrato cocto fit oris colluto que aphthas abstergit, flaccidas & erosas gingivas sanat, necnon vacillantes dentes firmat.

Descriptio maximam partem desumpta est à Clusiana Ficus Indica, cum qua (ut videtur) vel Operis hujus Autor, vel ejusdem interpres Latinus hanc Arborem eandem putavit. D. Commelinus, & nobis aliter videtur. Magnitudine excepta non multum differt à precedente.

3. *Tjerem-mec-aleu* * H.M. *Ficus Malabarica folio & fructu minore* Comel.

* P. 3. T. 36.

H. M.

P. 71.

Minor est & humilior precedentis species, eodemque modo crescit & propagatur quo illa.

Folia similia sunt foliis sequentis; [*Atty-mec-aleu*,] at minora & numerosiora.

Fructus eidem fructibus *Itti-are-aleu* persimiles sed minores, brevibusque petiolis inter folia novellis ramis inhaerent.

Crescit quoque hæc species ubique in Malabar, præcipue in provincia *Warapouli*: per totum etiam *Lucæ* annum viret fructuque fert.

Vires autem hujus arboris eadem sunt ac precedentis, præterquam quod ex radice cum calce & *Vires*.
Curcuma in aqua decocta Balsamum efficitur ad Epilepsiam & Leporam curandam.

4. *Katon-Aleu* * H. M. *Ficus Indica* J. B. *Indica arcuata* Park. *Indica folio Mali cotonei simi* * P. 3. T. 37.
libus, fructu feabus simili in Goa C. B. *Arbor ex Goa fere Indica* Ger. *Arbor de Rayz*, p. 73.
id est, radice Linnæus.

H. M.

In arborem excrescit proceram, imò altiorem quam reliquis filamentis è ramis demissis se propagantes; quibuscum eo respectu convenit: ut & ligno, cortice ac radice.

Folia oblongo-rotunda, ac in mucronem desinentia, densa, fragilia, superne glabra, atro-viridia, splendentia, inferne albicantia & lanuginosa, insipida, inodora: è costa media insigni plures nervuli ordinato ac parallelo ductu exeunt, qui ad oras arcuatum in se invicem incurvunt.

Fructus in novellis ramis, qua parte folia illis inhaerent, sine petiolis proveniunt, rotundi, fructibus *Itti-are-aleu* persimiles, sed majores, colore primum viridi, dein flavescente, tandemque rubicundo, ac granis pleni ut vulgares Ficus, dulces quidem, sed minus grati saporis quam illæ.

Crescit in multis locis Malabar, fructuque fert, & viret per totum annum, & aliquot secula sine *Lucæ* perites manet.

Viribus non multum differt à precedentibus duabus. Jo. Commelinus, quem sequimur, hanc arborem ipsam *Ficum Indicam* Clus. Exot. lib. 1. cap. 1. esse affirmat. At Auctores nostri descriptionem *Ficus Indica* Clusianam penultimarum speciei accommodarunt, nullam interim Clusi mentionem factam.

5. *Peralu* H. M. P. 1. F. 28. p. 49. *Ficus Malabarensis folio crassiusculo majore, fructu geminis intensè rubente* D. Syen.

H. M.

Arbor est cæteris procerior, densis & opacis frondibus, latè sparsis.

Radix crassa propaggines fibrosas tam subras quam supra terram longè latèque diffundens, cortice præ cæteris lacteo, qui incisus quoque rubescit.

Caudex quantum duo tresve homines *Ulnis* extensis amplecti possunt, cortice ut in radice præ cæteris lacteo, &c.

Ex ramis, ut in *Itty-aleu* filamenta seu radice multo numerosiores versus terram pendule demittuntur.

Sarculi teneri, virides, geniculati, pilosi seu lanuginosi.

Folia petiolis mediocriter longis, crassis hærent, majora & crassiora sunt cæterarum specierum foliis, oblongo-rotunda, versus pediculum latiora, textura densa & solida, utrinque lanuginosa, lanugine subras densiore, holosericea, superne obscuriore virore nitentia, subras pallidiora. Costa folii media valde crassa est & nervos laterales obliquè anteriora versus emittit, præterquam & binas hinc inde laterales obinet, pariter divisas: nervi omnes ad marginem folii arcuatum concurrunt, in averfa parte valde eminentes & conspicue, in adversa etiam nonnihil. Sapor foliis adstringens, odor nullus. *Fructus* ramis sarculisque supra ad osortum foliorum bini, & bini juncti & uniti, ramis solitarii acste insident, magnitudine *Atty-aleu*, at rotundiores, necnon colore intense rubescente, seu incarnato saturo; cum maturefcunt tomentosa lanugine obducti, cum umbilico parvo in vertice; in quibus grana numerosa, magnitudine eadem cum illis *Atty-aleu*, in se semina minutum nigricans recondentia.

Liquor filamentorum que ex ramis deorsum dependent, cum aqua simpliciter potus, vel in decocto datus mitigat ardorem febilem, purificatque hepar & sanguinem. Cortex arboris trinis proficius est pro morbo sacro parti affectæ applicatus. *Vires.*

CAP. IV.

De Fica Indica fibris ex ipso tronco excutibus eique accrescentibus angescente.

1. *Atti-meer-aleu* H. M. P. 3. T. 58. p. 75.

H. M.

Vaste magnitudinis est hæc arbor, caudice crasso, tenues qualiam & singulares fibras deorsum mittente, quæ ipsi caudici adhaerentes crassissimum eum reddunt, adhuc eisdem fibris arbor terra firmatur, multisque ramis in orbem diffusis longè latèque propagatur. *Lignum* albicans, molle & flexile, cortice subviridi cinereo obductum, qui ubi inciditur luccum stililat lacteum, acrem, odoratum.

Radix albicans, glabro & nigricante cortice tecta, necnon fibris latè per terram diffusa, læsa liquorem fundit candidum unctuosum, qui dein cum incisa radice purpureus evadit.

Folia foliis *Atti-Aleu* haud absimilia brevibus petiolis novellis ramis inhaerent, oblongo-rotunda, acuminata, densa, communi virore nitentia, supernè glabra, infernè nonnihil aspera, nervis aliquot è media costa, in duas inæquales partes solum dividente, in latera excurrentibus: sapor amaricans & acerbus. *Fructus* brevibus petiolis inter folia ramulis inhaerent, fructibus *Arctaleu* persimiles.

Locus. Provenit ubique in Malabar, per totum annum viret fructusque fert.

Initium sumit ex arborum quarundam caudicibus, aut è rupibus, vel antiquorum murorum rimis & fissuris, è quibus *Convolvuli* instar prodit: dein radix truncusque tenuia quedam filamenta deorsum mittunt, quibus caudex insigniter crassescit, cumque eisdem fibris terra firmetur, longè latèque propagatur, adeo ut arbor è qua initium suum duxit moriatur, hæc verò evadat maxima omnium arborum quæ in Indis adhuc dum reperta sunt, necnon secula aliquot superstes maneat.

In *Kandiate* regionis *Cochin* provincia, juxta templum *Bejkam* hujusmodi habetur arbor caudice crassissimo, quæ in circumferentia 50 obtinet pedes Geometricos, quamque incolæ 1000 annos ibidem crevisse affirmant.

Vires. Foliorum succus febrilis medetur ardentibus. Fructus quoscunque alvi fluxus sistit.

2. *Honder-Aleu* H. M. P. 3. T. 59. p. 77.

H. M.

Arbor est procerâ, caudice crasso, candido, fungoso, cortice cinereo obducto, multisque ramis latè diffusis ornato.

Radix nigricans fibris suis latè per terram diffunditur, sapore acri, odore nullo.

Folia sine ordine novellis ramis inhaerent, oblongo-rotunda, densa, glabra, fragilia, longitudine spithamam lata, quatuor circiter pollices æquantia, supernè atro-viridia, infernè subviridia, splendens, nervis aliquot in aversa parte eminentibus, è media costa ordinato ac parallelo ductu in latera excurrentibus: sapor austerus, odor sylvestris.

Fructus eidem granis pleni uti vulgares ficus, ac fructibus *Atti-Aleu* persimiles. Ab hominibus non comeduntur, sed à Serpis & cornicibus appetuntur, unde à Lusitanis *Ficus dei Baris*, i. e. *Sinistrum ficu* nuncupantur.

Locus. Nascitur ubique in Malabar, præcipuè in fluminum ripis, & locis montanis ac petrosis *Mangotti*. Viret per totum annum fructusque fert, & aliquot seculis superstes manet. Ab avibus feritur. Ex nanique cum fructus comedunt, exigua illorum granula (in quibus germinandi vis consistit) cum excrementis iterum deponunt, è quibus denuò arbores excreverunt.

Vires. Foliorum tenellorum succus expressus ad erosas gingivas, similisque oris affectus egregium est remedium, si os eo colluatur. Ex eodem cum Butyro recenti digestivum fit, ulceribus mundificandis & consolidandis perquam utile. Ex radicibus & foliis simul in aqua decoctis balneum paratur, quod sanande Lepre & Epilepsie conducere dicitur.

Adnotat ad hanc arborem D. Jo. Commelinus, eam præcedentis speciem esse; filamenta namq, non è ramis sed è caudice deorsum mittere, quæ ipsi caudici adhaerentia, crassissimum eum reddunt. Adhuc magnam habere similitudinem cum *Arbore peregrina* fructum ficu similem gerente quam Clusius persuntoriè describit; cupis idcirco descriptionem subjiciamus: nobis autem alia arbor videtur.

Arbor peregrina fructum Fici similem gerens J. B. Clus. exot. lib. 1. cap. 11.

Ramulis quem habuit Clusius cum suo fructu in uvæ modum quasi congesto, resiccatus durus erat, crasso cortice tectus, gracilis & digitalis longitudinis, coloris ex fusco cineracei, octo fructus exiguorum ficuum instar, crasso brevique pediculo nixos summo fastigio sustinens, fuliginosi coloris, cineraceis maculis conspersos, duros & latis solidos. Similem fructum habuit idem Clusius, non tamen tam copiosè ramo inhaerentem, sed singularem duntaxat, interdum geminum suis pediculis simul connexum.

Quam porro (inquit) hic fructus Fici vulgari valdè sit similis figura, & nonnunquam etiam adeo pusillus ut Cloeris magnitudinem non multum excedat, an ad Ficus Indicas circa Accusinem amnem nascentes referri non possit, cupis Theophr. Hist. Plant. l. 1. c. 12. & l. 4. c. 5. mentionem facit?

Nos commonefecit D. *Taverdas Robinson* Arborem Americanam nostrantibus the *Mangrove* dictam ad hunc locum pertinere ob ejus fructum & funiculos è ramis demissos, radicelque agentes & se propagantes; suspicatur idem Amicus prædictam arborem esse admodum affinem (vel eandem)

dem) *Pareurvier D. Rochfort*; in maritimis crescit, & ejus cortice utuntur in præparandis coriis, ex illaque funes, lintea, & lecticas faciunt. Ostrea interdum ramis adherent, unde quibusdam *The Oniter Tree* vocatur. Alia species Arboris *Mangrove* dictæ reperitur in Mediterraneis Indiæ Occidentalis, quæ ad aliquam prædictarum speciem fortè referri potest.

CAP. V.

De Sycamore.

Sycomori nomen adeptus est hic fructus à similitudine quam ad utrumque fructum, Ficum & Morum habet. Unde ridiculos eos esse ait Galenus, qui Sycomora dicta putant quòd *moris* *ovatis*, i. e. fatuis Ficibus similes existant; quibus verbis Dioscoridem notare videtur; nec quenquam hætenus inter probatos auctores Græcos vidimus qui per ω scribat, inquit J. Bauhinus. Dicitur etiam hæc arbor Sycaminus.

Est autem Sycamorus nihil aliud quàm Ficus genus fructu ex arboris trunco exeunte.

1. *Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens C. B. Sycamorus sive Ficus Ægyptia Park. Sycamorus J. B. Ger. The Sycamore of Egypt.*

Hujus descriptionem Vellingianam, quam cæteris accuratiorem putamus, dabimus: Proceritate crassitieque Morum albam adequat (inquit Rauwolfius) Dirimitur ferè ab humili, sed lata stirpe; in truncos binos ternosve peramplos, è quibus deinde ramorum consortim digestorum vasta & robusta brachia opaci frigoris gratissimam scenam latè æstuantibus obtendunt. Folia magnitudine & sinuoso illo ambitu, quem Alpini figura exhibet, prædita non sunt: Mori quidem foliis paria, nisi quòd horum densitas major & asperitas discrimen inveniat. [Rauwolfius quoque foliis Mori similibus donatam, paulò tamen magis rotundatis, in ambitu nullis incisuris crenatis serratisve scribit] Adde quòd Sycomori folia perennitate donata sunt, quæ in Moro circa brumale solstitium penitus delapsa vidi. Fructus cum ex caudice, tum ex ramis in crassitudine adultis, qua parte trunco propiores sunt enascuntur, non autem è ramis summis, quod scire licet rectè negasse Dioscoridem. Fici ipsi in tam sæcundo proventu mediocri tantum corpus faciunt, nec ut nostrates laxius ventricoli. Parùm extra natalem caudicem vulneratum colla proferunt, cavitate quoque intus prædita, quæ sublitico minutoque retrimento conspersa, non rarò vermiculis succrescentibus hospitium præbet.

Adde ex Alpino, Arboris hujus fructum tardè noq. perfectè maturefcere, atq. saporem aqueum & jucundum habere. Rauwolfius fructus bonitate nostris Ficibus inferiores esse ait, quo fit ut minoris æstimentur, magnaque ex parte in pauperum usum cedant. Bellonius recentes siccis præstare scribit, at nec hos maximè commendandos videri, quamvis in Ægypto magni fiant ex us reditus.

Multis fructibus nunquam caret, quos tamen non producit, nisi prius multas verberibus sepe laceatur, sic ut caudicis quoque corpus vulneretur, ex quibus vulneribus lac continuè exit, unde ramus parvus ficus ferens, interdum ternos, interdum quinos, interdum septenos, & plures etiam.

Plinius, Dioscorides aliique è Veteribus fructum non maturefcere aiunt nisi ferrens unguibus scalpatur. Theophrastus oleo quoque inungi debere ait post scalpaturam, idque ni fiat maturitatem adipisci non posse, propter affluentiam pabuli, siquidem scalpitu aliquid humoris prolucitur. Fructum granulis carere tradiderunt Veteres; & Alpinus atque Rauwolfius, ipsi *verrucculosis*, idem testantur. Nos tamen Bellonio assentimur contrarium affirmanti, nimirum Sycomori fructus plenos granis esse, *κακκωδης* Græcis dictis; nec enim ullos Natura fructus producit tota specie seminum vacuos & infucundos, cum fructus seu pericarpia tutela leninum gratia præcipuè efformata sint.

Plinius cum veeustissimis auctoribus verè scripsit (inquit Vellingius) Sycomori lignum stagnis immersum siccescere, hoc est ex raro fungoso densum magisque tractabile reddi, subducto quo prius scatebat lacteo succo. Cæterum quia Sycamorus arboris Ægypti, si non altitudine, certè crassitie plurimum excedit, parè quæsieris, an hæc arbor illa sit quam Veteres in sylvestri circa Memphin regione nasci prodiderunt tantæ molis ut eam homines vel terni circumplecti nequirent. Sycamorus ego ea crassitie plures atque etiam ampliores circa Memphin villas prædique conspexi. Veteres tamen Sycaminum à vastis illis evidenter sejungunt. *Velling.*

In Syria & Ægypto copiosè provenit: incolæ Cæyri umbræ causâ eam colunt.

Potum Sycomori alvo utile est, sed perquam exiguum præbet alimentum, stomachoque adverte-
*fatur, refrigerandi & humectandi alvumque lubricandi vim ei attribunt, unde febricitantium sto-
macho utiliter imponitur cum rosaceo. Galenus in curatione tumoris ex crasso vaporosoque spiri-
ritum in modum commendat emplastrum *διὰ Ζωαυπέρι*.

Lachryma arboris vim habet emolliendi, vulnera conglutinandi, & ea discutendi quæ agrè maturantur. Bibitur etiam, necnon & illinitur contra serpentum morsus, in scirrhum induratos licnos, stomachi dolores atq. perfrictiones: Celeriter verò teredinem sentit.

Fiebat antiquitus & vinum è Sycomoro, quòd facillè in acetum acre degenerabat.

2. *Sycamorus altera seu Ficus Cypria Park. Ficus Cypria J. B. Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice ferens C. B.*

Caudice, folio, fructu, admodum similis est præcedenti (inquit Rauwolfius) absque eo quod ut Sycomoro fructus inferius potius est in ramis majoribus ipsiq. etiam caudice, ita huic idem nascuntur non in ipsa ramis, sed in privatis furculis foliorum expertibus; spithamam longis plerumq. ad modum

modum conferti. Fructus ferunt hae arbores ter quaterve quotannis, parvos, ad cinereum coloratum tendentes, ex oblongo rotundos Prunorum instar, toto fere anno in arbore sua inventiendos.

LXXX.

In Cypro insula provenire vel nomen arguit. Nascitur etiam in Syria, Rhodo, &c.

3. *Sycamore foliis minoribus* C. B. *Sycamore foliis* J. B.

Similitudinem quandam habet cum Sycomoro. Foliis vestitur paulo minoribus quam Ficus. Fructus fert Ficibus adsimiles, parvos, luteos, sine granulis aut semine. Trunco, ramis, cortice, fructu, succo lacteo, & foliorum acrimonia plane similis est Fici. Fructus ejus nunquam ad perfectam maturitatem pervenit. Arbor est admodum fructifera, ut haud facile invenitur absque fructu. Non provenit ex semine aut fructu, sed ex furculis aut taleis in terram depactis.

Invenitur in insula *Majo* *Veridium* una. *Linsbaten*. Non placet quod habet de seminum carentia: Nos non agnoscimus tales fructus in natura dari, ut alias & sepius diximus, nisi forte Arbor huc aliunde huc translata fuerat, adeoque ob caeli solive incongruitatem fructum non perficeret.

CAP. VI.

De *Jaca Indica*.

Sycomoro subjungimus *Jacam* *Indicam*, non ob fructuum similitudinem, quae exigua est, sed quod ex arboris pariter trunco prodeant, nullo flore praevio: nulla certe floris mentio sit ab Auctoribus qui de *Jaca* egerunt: videntur ergo existimasse eam flore carere. De flore ergo diligentius inquirendum, quem huic arbori denegatum vix concesserim.

* P. 2. T. 26,
27. 28. p. 17.

1. *Jaca Indica* J. B. *Jaca* vel *Jaca* Park. *Tjaka-maram* * H. M. *Palma fructu aculeato ex arboris trunco prodeunte* C. B. *The Jack-tree*.

H. M.

Arbor est peregrina & procera, caudice ex albo flavescente, variegato, crasso, praeduro, multisq; ramis viridi-fuscis, geniculatis donato, qui cortice crasso, cinereo, rufo ac intus croceo obductis, ubi inciduntur lacteum succum stillant.

Similiter radix crassa, cortice crasso aequo, rufo, intus vero ad medullam croceo-rubescente tosta, necnon fibris suis late per terram diffusa; sapore amaricante, odore nullo.

Folia oblongo-rotunda, densa, glabra, brevibus ac rotundis petiolis ramulis inhaerent, ac longitudine spithamam superant, supernè colore ex atro-virescente splendent, subus viridi diluto; costis mediis crassis, & in averfa parte altè extuberante: distracta succum lacteum insipidum & inodorum fundunt.

Fructus *Jaca* dicti ex ipso caudice & ramis crassioribus [non minoribus] emouentur, & non raro cum imo caudice cui inhaerent intra terram sepulti sunt, oblongo-rotundi, seu potius conici, latitudine spithamam, longitudine duas spithamas, pondere 25 libras haud raro superantes: cortex namque viridis est, crassus, & squamis densis aculeatis, velut gemmis adamantinis, bullatim exasperatis, intusque albicans & lacteus [Acosta squamarum aculeos minime acutos aut pungentes esse ait, quamvis munitari videntur.] Ceterùm intus in fructibus hisce majoribus innumeri minores, fructus intra communem corticem includuntur; suntque hi oblongi, carne spissa, flavescente, dulcis gratissimique saporis & odoris, referti, qui singuli in medio unam continent castaneam, quae intra carnem tanquam sacculum confitit, ac albi, tenui pellicula, seu tunica interiore, cooperta sunt. Hae autem Castaneae oblongae, & sacculis inclusae, cortice tenui, cartilaginose, albicante & transparente teguntur, cui alter rufus subjicitur, nucleum continens densum, albicantem ac lacteum, ejusdem cum castaneis nostratibus saporis. Porro in medio ingentis hujus conici stylus columnaris, crassus, albicans & lacteus adest; cui tanquam communi basi fructus minores in orbem locati, inserti sunt una, & altera extremitate ipsi cortici è diametro adhaerente, inter quos numerosa observantur ligamenta coriacea, albicantia & subelava, quae & stylo medio & cortici affixa sunt, è quibus (discisso integro fructu) ut & è stylo & cortice, succus lacteus glutinosus, terebinthinae instar exsudet; quo aves capiuntur.

LXXX.

Nascitur ubique in Malabar & per totam Indiam: Singulis annis maribus exhibet fructus, mensis viz. Decembris, atq; à sexto circiter stationis anno ad septimum & ultra fructifera est. Propagatur autem hunc in modum: Integer fructus terrea committitur, omnesq; furculi, quos singuli minores fructus majori huic cono inclusi emittunt, ab incolis viminibus colligantur, ita ut in unum excreverint caudicem. Id vero peculiare hic observatur, quae arbores locis petrosis nascuntur crassiores sunt & minus altè; quae arenosis altiorem sed minus crassè: ut radix arboris cum aquis insula nullo profert fructus.

Arboris hujus ultra triginta numerantur species, ratione fructuum distinctè, quae tamen omnes ad duo referuntur genera: quorum alterius fructus, qui carne succulenta granissimi mellinique saporis turgens, *Veruca*, (Acostae *Bacca*) at alterius, qui carne flaccida, molliori & minus sapida referti sunt, *Tjaka*, *papa*, (Acostae *Papa* aut *Gurjal*) nuncupantur.

Ufus in cibo
& medicina

Fructus hi manu corticibus denudati in deliciis comoduntur, at largius comesti difficile digeruntur. Ab indigenis fructus teneri in edulis *Ceril* experuntur, vel murii in *Aryaer* conduntur, vel etiam in frustra concili coquantur, aut in oleo de Palma fringuntur.

Castaneae alicae castanearum vulgarium modo, dulcis saporis sunt, & inter bellaria ad secundae mensis delicias habentur [& Venerem excant, ob quam solam rem plebs frequentius is uti solet *Asp.*]

Acoſta] verum avidius comedit fauces peccatisque ardore, ac dein raucedine infeſtant: indigenæ quoque in edulis *Cari* hiſce utuntur, atque ex iis Sole ſiccatis farinam, ex eiq̃ue placentas, *Apar* dictas, conficiunt. Necnon corticula, quæ Caſtanæ palpati proximè ambit vicem *Arequæ* ſivò *Kanaga* iis præſtat in manducatione *Beti*.

Præterea è fructuum teneriorum cineribus lixivium paratur, quocum lotices linteamina eluunt. Ad hæc arboris lignum operi fabrili inſervit.

Acoſta pulpam flavelcentem, lentam, Caſtanæ involventem grati ſaporis eſſe ſcribit, optimi Melonis pulpæ admodum ſimilis, duræ tamen concoctionis eſſe & admodum gravare ventriculum, & ſi in ventriculo corrumpatur noxiis ac venenofos humores generare; quicq̃ frequentius hoc fructu veſcantur faciliè in peſſimum illum & peſtilentem morbum *Morxi* appellatum incidere.

E radicibus arboris decoctum paratur diarrhæam ſiſtens. E foliorum pulvere Bubali excrementis *Viri*, admixto cataplaſma conficitur quod callidè maxillis appoſitum ſpafmo cynico medetur. Lacteus fructuum ſuccus cum pulvere Calami aromatici tritus, oculisq̃, illitus Nyctalopæ conducit. Tritum cum aceto lignum uvulæ relaxationi & faucium tonſillarumq̃ inflammationi prodeſt. Radix cum fructus pulpa trita, & addito ſaccharo in emplaſtri formam redacta, ac loco dolenti impoſita maligno ac vermiculari herpeti cum vermium nece confert.

2. *Ponga* * H. M. *Juca minor ſylveſtris Malabarica* D. Comelin. *Tataia Braſilienſium* Pilon. * P. 4. T. 35. P. 73.

H. M.

Arbor eſt procera, 40 circiter pedes alta, caudice craſſo, præduro, cinereo, cortice furvo, glabro, inodoro ac inſipido obducto, necnon multis ramulis, glabris, ruſis, intus albicantibus ac duris donato.

Radix ruſa, inodora, inſipida.

Folia ſine ordine craſſis, rotundis ac fuſcis petiolis circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, denſa, glabra, colore atro-ſubviridi ſuperne ſplendentia, inferne viridi-dilutiore, odor ſylveſtris ac gravis, ſapor nullus.

Flores hæc arbor aut nullos fert, aut ſaltem non conſpicuos. *Fructus* verò iſtis ramis adherent, & hæc ſecus ac *Tijaka* proveniunt, unde Luſitanis *Tijaka do Mato*, i. e. *Tijaka ſylveſtris* dicuntur. Sunt autem calyces echinati pungentes, erinaces ſimiles, primum virides, dein ruſi, in quibus continentur pluriſima oblongo-rotunda, acuminata, ac ruſa *ſemina*.

Creſcit locis arenofis ac montanis circa *Cranganor*. Semper virescens & fructus fert.

Locus.

E viridibus hujus arboris fructibus contuſis cataplaſma conficitur, quod tumoribus impoſitum eorum ſuppurationem potenter promovet.

Vires.

E cortice & radice in aqua coctis fomentum paratur, quod œdematofis crurum tumoribus (malo Indis endemio, & *Pa da S. Thomæ* Luſitanis dicto) ſupervenienti inflammationi medetur.

C A P. VII.

Arbores fructu totali (ſi ita loqui liceat) è pluribus partialibus aggregato, quorum ſingulis ſinguli flores inſident.

1. *Arbor Indica fructu aggregato globoſo, Kati Tijaka dilla. Kati Tijaka* H. M. P. 3. Tab. 33. P. 29.

H. M.

Fructus totalis ex pluribus fructibus partialibus polyſpermis aggregatus, quorum ſingulis ſinguli inſident ſtoſculi.

Arbor eſt procera, caudice craſſo, præduro, multiſque ramis donato, qui cortice glabro, cinereo intus viridi obducti, atque medullâ ruſâ & molli referti ſunt.

Radix fibrata, albicans, ac fuſco cortice teſta, coloris ſaporisq̃e ingrati.

Folia geminata brevibus, craſſis, ac rotundis petiolis ordine decuſſato furculis geniculatis inharrent, oblongo-rotunda, glabra, denſa, ſuperne obſcuro virore nitentia, ſubtus dilutiora, ſapore acidiſculo.

Summis ramis innafcuntur *globuſa capita*, queſ denſa congerie in orbem ſtoſculi flavelcentes inodom inſident, qui è calyce candido, in quinque lacinas ſecto prodeunt, & quinque oblongis, exteriora verſus reflexis foliolis conſtant, totidem in medio *ſtamina* ruſis præditi, inter que oblongus, ſurrectus, albicans prodeit *ſtylus*.

ſtoſculis verò decidendis *fructus* globoſi, virides primò ſuccedunt, qui dein rubicundi, tandemque nigricantes & fragiles evadunt, & ſi aſperius tractentur faciliè ſolvuntur, ac in plures oblongos, virides, nitentes ſtoſculos ſcedunt; quibus numeroſa, albicantia, exigua continentur *ſemina*: ſapor intus aqueus, in cortice verò acidus.

Nafcitur in locis ſylveſtribus Malabar, imprimis circa *Cranganor*: quorū anni tempore floret *Locus*. fructuſque fert, ac diu frugifera manet.

E fructibus expreſſus ſuccus ventris cruciatus mitigat.

Uſus.

* P. 1. F. 53.
P. 27.

2. *Arbor Indica fructu aggregato conide Cada-Pilava dicta.*
Cada-Pilava H. M. *Arbor canifera*, *Macandou* Bontii.

H. M.

Radix cortice est è nigricante croceo.

Surculi superiore parte quadrangulares sunt & sulcis striati, nodulifera extuberantes.

Folia è nodulis binatis exeunt petiolis crassis rotundis, grandia, oblongo-rotunda, ad petiolum contractiora, inde oris rotundiusculis circumscripta in cuspidem tandem desinunt, textura crassa, mollia, plana, supernè obscuro virore nitentia, subtus pallidiora, sapore subamaro. Costa folii media crassa est & albicans. Folia superiora in surculis minora sensim petiolis brevioribus.

Flores supra ex fructibus proveniunt petalis quatuor vel quinque, oblongo-angustis, cuspidatis in stellæ formam expansis constantes, crassis, internis candidi, externis è viridi diluto albicantes, habentque pedem rotundum, longum, viridi-dilutum & albicantem.

Stamina quatuor, quinque, sex, pro numero petalorum, brevia subflava prodeunt: *styla* viridis, ad summitatem crassior, bifidus ac obscure rufescens, estq; pes florum, per quem is transmittitur, internis villo seu densis pilis obsitus. *Gemmæ* florum oblongo-rotundæ & flavo-albicantes.

Fructus in caulibus è nodulis ex adverso foliorum proveniunt, in petiolis longioribus, sesquialibus, rigidis, viridibus & crassis, oblongi, conoidei, ad petiolum crassiores, in summitate strictiores, externis distincti cancellis extuberantibus, oculatis, versus summitatem minoribus, ex quorum oculis gemmæ, quæ in medio oculatæ sunt, emicant ac extuberant, suntque colore primum viridi, [in gemmis oculatis albicante] dein cum maturi quoque albicantes intus carne albicante, odore cum maturi sunt tetro & stercoreo, sapore amaro. *Flores* qui supra in hisce fructibus proveniunt, cum suo pede gemmis ipsis insident, ac ex oculo qui in medio gemmarum est stylum suum accipiunt, suntque flores semper maximè conspicui plures arctè ad se invicem in summitate fructus, cæteris ex gemmis inferioribus deciduis.

Semina formâ oblonga & plana, ordinate jacent propius ad corticem, cum sua longitudine ad gemmas ex quibus flores erumpunt erecta, ac carne intermedia à se mutuo sejuncta, colore cum sicca sunt nigricante.

Bontius fructum nucem Pineam planè referre scribit, nisi quod tam acutè in conum non desinat, neq; tam lapidea sit duritia, sed mollis planè, sapore fatuo aut insipido potius: flores Periclymeni floribus assimilat.

Vern.

Malaii sub cineribus assatum comedunt ad dysenterias & cholerae orgasmum sedandum & sistendum; tum pectoris vitis Asthmatis, Phthisi, Pleuritidi conducere aiunt, propter vim emplasticam quæ in ipsius mucagine est.

Bontius Consolidam Indicam arboream denominandam censet, quòd in Nosocomio vim fructus consolidantem in hæmoptysi non semel cum successu expertus sit. Folia quoq; farcotica esse ait, & in vulneribus & ulceribus carnem egregiè generare & euzem cicatrice obducere: in quam rem sal quoq; ex foliis arte Chymica elici potest, quod præter consolidantem qualitatem etiam quevis inveterata & cacoetho ulcera munda reddit.

Succus expressus cum oleo è foliis Fici inferni decoctus podagrae convenit, si pars affecta eo perungatur.

3. *Frutex Indicum fructu aggregato conide Kaida dictum.*

1. *Kaida* H. M. P. 2. F. 1. p. 1.

H. M.

Frutex est spinosus & aculeatus, stipitibus numerosis, qui sæpissimè transitum præbent, ac per quos insipienti cælum pervium est, terræ impactus, nascensq; in ripis aquarum.

Folia cuspidata, longitudine quinque, sex, septemve cubitorum, tribus ordibus aculeorum, duobus in oris, uno in medio, munita, venis subtilibus in longam striata, colore viridi saturo.

Loco *Florum* fasciæ albicantes flocculosæ supra exortum foliorum prodeunt, quarum flocculi seu *spices* albicantes albidissimo farinaceo polline alperfi, petioli mediis candidissimis & nitentis ramulos obsident.

Fasciæ hæc in foliis oblongis, cuspidatis candidis, quæ quoq; spinis in oris ac in medio munita sunt, primum involvuntur, ac foliis apertis se produnt, ex diuturniore apertione rubescentes, suntq; unâ cum foliis involventibus odoris acris & fragrantis.

Fructus, qui fasciis flocculosis succedunt, oblongo-rotundi sunt & prægrandes, primum viridi-fusci, dein vetustiores colore rubicundo, in cortice confertis tuberculis exturgentes, ac in singulis tuberculis tribus aculeatis, ruffo-rubris, duris, lignosis papillis muniti, carne intus flava succulenta.

Folia super terram stratis indigenæ dapes imponunt.

Floribus ob odorem amœnum mulieres se exornant.

Fructibus vescuntur gentiles dicti *Polear*, uti & Elephantes.

Vern.

Foliorum simul & radicis succus pro balneo maniacis subministratur. Flores cum Santalo ac Camino ad potiunculam aptati, simulque comminuti atque hypogastrio inuncti genitales vires instaurant. Ex radice paratum apozema dysuriam tollit. Ex eisdem succo deponitur coquendo oleum antarthematicum.

2. *Kaida-Taddi* H. M. P. 2. F. 6. p. 3.

A priori hæc, ut & sequentes duæ species, in fructibus solum differt.

Sunt autem fructus hujus prægrandes, formâ rotundiores, in corpore diversis grandibus nodis, qui sulcis profundis & latis interstincti sunt extuberantes; suntque in superficie nodorum septem octavo passim minoribus nodulis, in quibus singulis papilla duricola rufa eminent est, interstincti, colore primùm viridi, dein corallino rubro, ac in superficie nodorum singulorum dilutiore, carne intus flava; in medio cavernâ vacuâ excavati, ac carne albicante farinacea; in medio nodo cujusque unum rotundum oblongum semen continent.

E foliis teneris exactus succus cum saccharo sumptus dysenteriz medetur. Ex maturo autem fructu pressus liquor saccharo mixtus aphthis adversatur.

3. *Perin-Kaida-Taddi* H. M. P. 2. F. 7. p. 5.

Fructus hujus oblongo-rotundi sunt, ac minoribus nodis, qui sulcis quoque profundis interstincti sunt, extuberantes, ac in superficie cuncta, nodi unâ papilla ruffo-nigricante dotati: suntque hi flavo-rubrescentes, ac odoris vegeti & haud ingrati.

4. *Kaida-Tjerria* H. M. P. 2. F. 8. p. 7.

Fructus hujus haud dissimiles sunt fructibus *Tijaka* formâ oblongo-rotundâ & angustiores, in superficie bullis seu oculis extuberantibus dotati & oblongis nigricantibus rigidis spinis in vertice bulbarum muriti, cortice viridi, ac odoris vegeti ac graci.

Suspicio hanc fruticem florem obtinere à fructu sejunctum seu aliquantulum remotum; prout & minus rectè hoc in loco disponi, sed ad præcedens genus potius pertinere. Verùm quoniam Auctores nostri fructus fasciâ flocculosis succedere in descriptione tradunt, præsentiarum hic collocandum censui.

C A P. VIII.

Frutices flore composito seu aggregato è pluribus flosculis densè stipatis, quarum singuli singulis seminibus insident.

1. *Alypum montis Ceti*, sive *Herba terribilis Narbonensium* Lob. *Al. Monspeliensium* sive *Herba terribilis* Park. *Al. Monspelianum* sive *Frutex terribilis* J. B. *Thymelæa foliis acuta*, capitula *Succisa* C. B. *Herb terribile*.

J. B.

Frutex est cubitum aut sesquicubitum altus, in multos divisus ramos, lignosos, foris tenues, rubentes, vel ex fusco purpurascente cortice tectos: per quos folia concoloria ferè nascuntur, Myrto vulgarî accedentia magnitudine sua, non ita penitus formâ: Ex angustissimo enim principio ad extremum usq. propemodum dilatantur, ubi interdum unâ aut alterâ arena incisa obtusum mucronem efficiunt, crassa, solida, amara. *Flosculi* extremis ramulorum plurimum, alias ad medios ramulos glomeratum congesti hærent, purpurei, è tenuibus squamulis contexti. [Clusio summis ramula singulares inhaerent calyces, squamatum compacti, interbris orbis florum Scabiosæ aut Moris Diaboli magnitudine, qui florem continent villosum & lanuginosum, ex caeruleo candicantem in medulla, at in ambitu omnino caeruleum.] Radix crassa, dura, nigra, lignosa. Omnia planta (inquit Lob.) amara, & inamerno Thymelææ aut Chamælææ gustu, aut vehementiore etiamnum à sexto anno.

In monte Ceti Frontinanz versùs Austrum opposito & in mare procurrente provenit copiosè. *Locut.* Quin & in aliis Narbonæ & Gallie provinciarum locis ad mare & Austrum devexis, & præcipue maximè (ut annotat Lobelius) natales suos delegit. Nos in collibus saxosis juxta *S. Chamas* Gallie provinciarum oppidum copiosum observavimus.

Vim catharticanam vehementem obtinet, nec minus violenter purgat bilem, pituitam & aquas quam *Vires Tithymali*. Quapropter non temere eâ utendum censemus. *J. B.*

2. *Catta-Schirigam* H. M. P. 2. F. 24. p. 39. *Scabiosa India arboræa*.

H. M.

Frutex est altitudine humana, nascens in arenosis.

Radix brevis, recta, una fascia albicantium ac glandulosarum fibrarum, quæ condensis pilis inter se implexæ sunt, vestita, sapore subamaro.

Stipes, qui ex radice unus exurgit, rotundus, pollicem ferè crassus, sarsctus, furculus è superiore maximè parte emittens, cortice viridi dilato, ligno subrubro, in medio concavo cavo, seu fungoso & albicante, concavo proximo molli, humido & subviridi.

Folia subinde parvis foliis, quæ ex eorum origine oriuntur, comitata sunt, formâ oblongo-angustâ, in inferiore parte lateribus strictis, inq. mucronem acutum desinentia, ad margines dentata; excepta parte anteriore ad cuspidem, & inferiore ad pediculum; textura tenui, languida in superficie raris, tenuibus pilis obsita, utrinq. ad tactum subaspera, superne obscure viridia, subeas pallidiora, sapore planè amaro.

Floret

Flores parvi, plures simul prodeunt cum pedunculis viridi-dilutis ex superiore parte foliorum capitulorum, suntque purpureo-rubro diluti, incisi quinque, cuspidatis foliis, quae arcu clausa sunt circa medium viridi-dilutum *stylam*, ex quo tanquam thecula emicat filamentum tenue, albicans, superne bifurcatum. Suntque flores odoris nullius.

Semina, quae in foliosis capitulis numerosa continentur, oblongo-rotunda ac angusta, in longum striata, inferius in cuspidem stricta, cuspidem basi capituli inserta, suntque singula superne in orbita penicillo longiusculorum, albescentium & subflavorum pilorum, ex cujus medio unius *foliolum* cum suo pedunculo viridi diluto emergit, circumdata. *Semina* cum sicca coloris sunt rufi.

Semel in anno fert flores tempore pluvioso.

Vires.

Pro pustulis corporis, si contrita cum oleo coquantur, & pars affecta decocto foveatur, conducit: in febre ex cholera orta confert delibuto capitis cum succo qui ex ea trita expressus est. *Semina* in pulverem redacta, & cum aqua calida epota pro tussi dantur, ac flatibus tollendis servantur, uti & enecandis vermibus in infantibus, leniuntque ventris dolores, ac urinam cient, partique affectae podagra, vel doloribus ex frigore abortis commoda sunt facta ex us perunctione cum aqua calida.

3. *Scabiosa Africana, arborescens seu Cupressi-pinus Capiti Bonae Spei Breyn. Scabiosa affinis arborescens Africana ericoides, sphaerocephala,*

Breyn.

Arbor est pumila, semper virens. Virgæ à Breynio descriptae pedales erant, teretes, pennae scriptoriae crassitiam pene attingentes; ligno subalbido, cortice rufescente ex cinereo tactæ, foliolisque angustissimis, triangularibus ac mucronatis, Cupressi instar ramulorum, squamata. His verò virgæ ramuli duas tresve uncias longi, graciles, valdeque flexibiles adnati, qui foliis Ericæ vulgaris per similibus, decussatim positos dense vestiuntur. Quilibet ramulorum superiorum Scrobulo, modo uno, modo pluribus, exiguo, orbiculari, lanuginoso & albo, juxta ramulum planiusculo, foliolisque firmiter adherentibus subtilissimè scandulato onustus, forma & magnitudine Fragorum, squamulis autem innumeris, intus villosis, ac argenteo nitore splendens, in anteriore parte foliolum viride monstrantibus, arctissimè compacto, cujus squamæ (ut autumno) processu temporis dilatantur. Lignum & cortex rami saporem * lalsum & nonnihil adstringentem, sed foliola cum ramulis ingratum, subadstringentem cum tantillo amarore præbent.

* Foris ex
a perleone
aque marina.

In Appendice hujus Historiam ulterius prosecutur & illustrat, ramulum tum depictum, tum sicum ad se transmissum à D. ten Rhyno, nomine *Ericæ noduligeræ capitula hirta ex purpureo fusci coloris* describens. Hic, inquit, affinitatem aliquam cum Scabiosis præterevidetur. Namque Scrobilorum inter squamulas *Periscarpia lanuginosa* & dura occultantur, Scabiosæ arborescentis Creticæ haud imparia, concava intus, *semen*, oblongum includentia, in superiore autem parte, calycis loco membranacei, foliis coronata quinque, crassis ac lanuginosis, quorum in medio foliolum pentapetalos, Globulariæ luteæ montanæ *Cal.* accedens; quem (etsi ad flavedinem inclinet sicca) purpurei coloris existimo, cum ejusdem etiam coloris mentionem in Plantæ hujus nomine D. ten Rhyno faciat.

Hæc Arboscula non ineptè meâ sententia, denominari possit, Scabiosæ affinis arborescens Africana ericoides, sphaerocephala.

LIBRI VIGESIMI SEXTI

PARS POSTERIOR.

De Arboribus quarum flos summo fructu insidet.

Arbores, quarum flos fructui contiguus est, sunt vel eodem summo fructui insidente, vel basi fructus coherente. Quarum flos summo fructui insidet, fructu sunt plerumque ex residuo calyce umbilicato seu coronato; & dividi possunt in eas quarum fructus pericarpio seu pulpâ humidâ semina vel univèrta simul, vel singula seorsim ambiente constat; & eas quarum fructus materia per maturitatem sicciore & seminibus inclusis componitur. Prioris generis arbores sunt vel fructu polypyreno, vel fructu monopyreno. Quæ fructu polypyreno sunt dividi possunt in majore fructu donatas, quas *Pomiferas* dicimus, & minore fructu præditas, quas *Bacciferas* cum vulgo appellamus. Quæ fructu monopyreno itidem vel eodem majore sunt, quas *Pruniferas*, vel minores, quas *Bacciferas* appellare liceat.

1. Primò ergo in loco agemus de arboribus fructu umbilicato, polypyreno, majore seu *Pomiferis umbilicatis*. His autem necessariò admiscende sunt nonnullæ fructu minore quarum scilicet fructus cum majoribus notis genericis & caracteristicis conveniunt. Sic verbi gratiâ *Oxyacantha* vulgaris seu spina alba, quamvis fructu parvo sit, ob convenientiam in reliquis notis omnibus cum *Mespilo Aronia* dicta, ab ea minimè separanda est. Idem dicendum de aliis multis speciebus *Sorbi* & *Mespili*, &c.

2. Secundò, de his agemus quarum fructus pericarpio donatus monopyrenos major, seu de *Pruniferis umbilicatis*.

3. Tertiò,

3. Tertio, de iis quæ fructu minore sunt seu monopyreno seu polypyreno, hoc est, de Bacciferis umbilicatis pericarpio donatis.
4. Quarto tandem in loco eas trademus quarum fructus umbilicatus materia per maturitatem sicciore constat.

S E C T I O I

De Arboribus fructu umbilicato humido polypyreno majore, seu

De Pomiferis Umbilicatis.

HAc Sectione comprehendimus omnes arbores fructu polypyreno majore quarum flos summo fructui infident quamvis vel nullum calycem habeat, vel calyx flori superstes non sit, ne quis cavilletur arbores hæc infertas quarum fructus umbilicatus non est.

C A P. I.

A. De Malo sativa. The Apple-Tree.

Malum priore producta à Dorico & Æolico μάλον pro μήλον est, quod non modò pecus & mammillam, sed & Pomi genus significat. Arbor ipsa Malus Græcis μήλα. Voss.

Pomi vox latius patet quam Malis: nonnulli enim Nucem etiam, quæ Græcis κάσσιον, hoc nomine complectuntur. Alii Nucem à Pomo ita distinguunt, ut Pomum sit quicquid foris habet quod edendo est, durum intus includit, Nux quicquid foris duriore corio tegitur, intus habet quod edendo est. Sed vulgo genus pro specie accipitur. Pomum autem à πῦμα five potius πῦμα (nam & hoc invenitur) dictum arbitratur Julius Scaliger: quia sicut tollerent eorum plurima, simulque essent cibo & potus.

Malus autem, cum sit arbor tota Europâ notissima, prolixa non indiget descriptione. Quin si indigeret, nostram in eo describendo operam superfluum reddit accurata J. Bauhini descriptio, quam non nihil auctam Lectori proponemus.

Arbor est mediocris magnitudinis, ramis magis patula plerumque, quam alta, cortice scabro, sæpe muscoso, obtecta, foris cinereo, intus flavo, ac lævi potius quam aspero, materie alba, vel candidante, fragili, mediocriter dura, & variis utensilibus præsertim domesticis parandis, atque ad torni artificium haud incommoda: radice non valde multa, nec admodum profunda, sed in summo ferè terræ obhærente.

Folia ex rotundo oblonga, vel obtusa, vel acuminata, infernè villosa magis quam supernè, præsertim nova, in ambitu crenata, alternatim posita.

Floris simul multi, ex brevibus tomentosis pediculis, suave-olentes, candidi vel purpurascens, pentapetali, apicibus in medio subflavis.

Ipsa verò Mala adeò variant formâ, magnitudine, colore, sapore, maturescendi tempore, ut dinumerare haud sit facile. In genere tamen Malum fructus est magnitudine & figurâ varius; quippe aliud rotundum, aliud turbinatum, aliud sessile, quedam etiam angulosa. Sunt etiam quæ ad pugni gemini magnitudinem accedunt, sunt & parva & mediocria, tunica omnia contexta vel pallida, vel flavescens, interdum rubra, aut ex toto, aut ex parte, rarius subcinerea, aut ad glaucum vergente, cui caro seu pulpa subest mitis, odorata in maturis, in immaturis & sylvestribus durior: sapore vel dulci, vel subacido aut vinoso, vel acido dulci; in sylvestri austera atque acerba. Periculis suis quodammodo, adhæret, eo ipso longitudine & crassitudine diverso, è parte inferna, atque ut plurimum cavata, rarius prominente emerso: in cuius opposito, parte nimirum superna, est id quod πύμα quidam vocant ex Polluce, alii ἑμφάσις, umbilicus nempe seu cavitas quedam, cui inutile illud floris residuum, [flos calyx] infidet. In ipso fructus medullis, seu Pithæ Scribonio dicta, femina latitant oblonga, altera parte obtusa, altera acuta, quæ petolum spectant, intus latentia, per maturitatem nigra, membranaceis quibusdam atque duris pelliculis [cartilagineis potius] ceu paricibus intergerinis, separata, ita ut singula in singulis latent cellulis, interdum etiam gemina, quorum medulla candida, sapore subdulci.

Mali omnem duntaxat speciem agnosco: nam quæ feruntur species varietates tantum sunt accidentibus quibusdam, magnitudine, figurâ, colore, sapore, maturescendi tempore differentes.

Has autem varietates idcirco specie differre non existimo quia sationi originem suam debent, suntque infinitæ, nullo certo aut determinato numero, cum ex semine lato novæ indies exoriantur.

Bauhinus uterque Pomorum varietatem ex infitionum maxime varietate ortam esse asserunt: Nos è seminibus satis varietatem hanc provenire existimamus; cum (ut alibi diximus) in infitionibus fructus furculi seu gemmæ naturam semper ferè sequatur. Non tamen negamus fructum infitione emendari & velut cicurari, succo ex acerbo aut acido in mitem evecto.

Tempus.

Mali apud nos in Anglia florent sub exitum Aprilis, & initio Maii: Fructus suos maturant aliter citius, aliter tardius, præcoces Julio mense & Augusti initio, serotinae non ante finem Septembris, aut Octobris initium.

Locus.

Amat quævis ferè loca Malus, si ferventiora excipias, sed maximè temperata, aut etiam humidiora (ut rectè J. Bauhinus) non tamen frigidissima. Rarè sunt in interiori Italia & Gallo provincia ob cæli fervorem J. B. Abhorrent etiam loca maritima, nec usquam nobis visa in ejusmodi locis; ac nè in vicinis quædam commodè coluntur. *Idem*. Concludit tandem Malos temperata loca quærere, quæ tamen nonnihil ad calorem & siccitatem vergant, ut nascantur saporosa.

Genera illa Malorum quæ C. Bauhinus in Pinace pro peculiaribus habet nobis non aliter differre videntur quàm reliquæ varietates. Ex sunt

1. Malus pumila, quæ potius frutex quàm arbor.
2. Malus exigua pallidus floribus.
3. Malus sine semine internis in fructu.
4. Malus non florens fructificans tamen; quæ duæ species sunt degeneres seu monstrose.
5. Malus folio Pyri.
6. Malus flore pleno. Naturæ luscus est, ut in Ceraso.
7. Mala sylvestria, Persica, &c. quæ & alba & rubra, & majora & minora. De his tamen pallè post specialius agemus.

Vires & Usus.

Vires Pomorum variz sunt pro saporum varietate: Acida, acerba & austera astringunt ac proinde alvum sistunt; verùm cum butyro cocta cibum febricitantibus præbent commodum, inquit Schroderus.

Dulcia sunt naturæ calidioris & laxantis.

Subacida seu vinosa naturæ sunt mixtæ, conveniuntq; ventriculo & cordi.

J. Bauhinus Aristotelis sententiam probat, ut Poma ante cibum sumantur. Sumpta enim, inquit, ante cibum facillimè alvum solvunt; at si post cibum, nihil ferè aliud quàm inflant, & flatu excitando molestiam creant stomacho, ut proprio periculo didicimus. Nostrâ experientia commodissimum tempus edendi poma non est manuum ante prandium, cum ventriculus planè vacuus est & jejuns, ob cruditatem & acorem, uti nec ante cenam ob eandem rationem: at nos, statim à prandio aut cœna, sed deus tribus, quatuorve horis post utramlibet refectionem, cum ventriculus nondum penitus exhaustus est, nec nimis repletus. Poma sanè sunt fungosa & spongiosa, quæ injecta aquæ immant, contra Pyra residunt, unde Poma difficiliter in ventriculo concoquantur.

Pyra five cruda five cocta facilis sero, meliusque digero, inquit *Idem*.

Quamvis autem Poma ventriculo frigidiori & humidiori fortasse noceant, calidiori tamen & bilioso apprime conveniunt, & alvum facilem reddunt.

Omnibus ferè Pomis commune est, quòd succus expressus admixto pauxillo Croci exhibitus veneno adversatur, & ventris animalia pellit.

Punctionibus lateris Camerarius inducit cataplasma ex pomo dulci, cui tunc contusum inditur, at simpli adferunt. *Idem* ad pulveris pyri empyreusæ extinguendum pomum dulce in Plantaginis latifoliae aqua coquit ad tabacum, dem cum lacte lacto cataplasmate vulneri inducit.

Nos in quotidiano usu habemus, ac magni facimus experimentum quòd è Pomis in aqua coctis paratur, & pulmenti speciei oculorum inflammationibus imponitur. Possunt & ex lacte coqui, vel caprino, vel muliebri, vel ex aqua rosæ, euphrasæ, vel ex alia aqua frigida. Ego tamen feliciter sæpius hoc medicamentum expertus sum, etiam sine lacte. J. B. Nostrates non minore commodo pomum putridum oculorum inflammationibus & tumoribus quibuscumq; imponunt. Memorabile est experimentum quòd refert Simon Paulus, *Quadrip. Botan. Class. 2. p. 82.* Recordor inquit honestissimam matronam mihi fassam, sibi à Lithotomo quodam Stralindensi femur gangrenâ correptum, omnino restitutum esse postquam illius suavis poma putrida confusa, & sine ullius liquoris affusione cocta, cataplasmati formâ semel atq; iterum applicasset.

Gelnorus in vitis pulmonis & dyspnoea Malum asium excavatum, & drachmâ thuris repletum, felici cum successu comedendum docet.

Deniq; poma comesta, syrupus, de pomis simpl. & compositis cor exhilarare ejus, palpitationi & syncope confert, inq; morbis Melancholicis summopere prodesse creduntur. [Caspar Hofmannus, quòd tantis laudibus par sit syrupus de pomis se vix credere scribit.] Pomorum etiam usus est ad nobilem illam confectionem *Althermes*.

Ceterum Poma commodissimè asservantur in loco frigido, & sicco potius quàm humido, in acervum etiam congesta. Verùm nè à frigore nimio congelentur diligenter cavendum: ideoq; cum gelu vehementius ingruat, vel stragulis injectis, vel copioso stramine, (quidam Avenaceum præcipuè commendant) contegenda sunt, vel in cellam subterraneam profundiorè recondenda; ubi à gelu etiam vehementissimo tuta & illasa latent; ut plurimorum experientia constat.

E Pomis confusis & prelo subjectis succus exprimitur, qui postquam fermentatus & partibus heterogeneis secretis probè defæcatus & clarus evaserit, potu idoneus redditur, nec vino nullius inferior sapore aut viribus. Variat autem pro qualitate & ingenio Pomorum ex quibus efficitur, ut & pro ætate.

Pomaceum parandi modus simplicissimus nobis omnium optimus videtur. Succum expressum vase satis capaci & aperto exceptum tandiu restare sinas, donec faeces crassiores subsederint, & efferverescere incipiat; deinde in dolum clausum & operculatum, cerevisiarum aut vinari simile infundas; ubi cum sese purgaverit & partibus heterogeneis secretis & ejusdem clarus evaserit, (quòd mensis unus minimum spatium postulat) in ampullas vitreas testaceisve angusti colli & oris exhaustas, eas bene obturatas in cellam aliumve locum frigidum recondas. Hoc modo paratum & asservatum Pomaceum in multis etiam annos durabit incorruptum, nec in vappam aut acutum degenerabit; quin si ex Pomis electis, & boni succi fiat, generosum & lenè experiem, quòque vetustius

eò ferè melius. Nonnulli ut liquor clarior & defæciator evadat, e dolis exhaustum in nova transfundunt, & aliquantisper denuo restare faciunt.

Insuper esset si omnes Pomorum usus in cibo & medicina enumerare aggredere. Sufficiat dixisse omnium apud nos nascentium arborum fructum longè utilissimum esse, nec sine insigni detrimeto in carere posse humanam vitam.

Pomorum Anglicarum laudabiliorum varia genera.

Quantus Pomorum numerus (ut diximus) incertus & indefinitus sit, celebriores tamen species seu potius varietates, quæ præcipuo apud nos in honore & pretio sunt, recensere non ab re fuerit. Cum enim Poma Anglica, palato nostro arbitro, bonitatis & nobilitatis palmam Europæ omnibus præstant, cur non & nos aliorum imitatione Patriæ nostræ in hoc genere divitias explicemus, nec minore quàm alias terras optimorum fructuum proveniunt eam abundare ostendamus? Ac nec inutilis erit ejusmodi enumeratio iis qui Pomaria consueverunt ad delectum stirpium faciendum, ut vilibus & fatuis fructibus rejectis, nobiliores duntaxat, & opimo succo prægnantes, quæ pari facilitate, utilitate autem multo majore plantantur, admittant.

1. Poma mollia & fugaciora, mensi secunda instruenda idonea, quarum nonnulla præciosa.

1. *The Sweeting, or Tuneting*, Pomum Ginetinum, quod unde dictum sit me later. Est illud omnium apud nos nascentium Pomorum mitum, ut præcoccissimum ita ferè minimum, quibus notis ab aliis discretum facillimum.

2. *The Margaret, or Magdalene*. Margarete seu Magdalene Pomum; mihi ignotum, hoc saltem nomine.

3. *The King Apple*, Pomum regium.

4. *The Aromatick, or golden Russeting*.

5. *The Flax Apple*. A Lino denominatum, nescio ob quam rationem.

6. *The Spice Apple*. Pomum Aromaticum ab odore & sapore.

7. *The Summer Queening*. Pomum reginale æstivum, nonnullis Caryophylleum. *The Silp-flower-apple*, ab odore dictum.

8. *The go no further, or Cats-head*, i. e. Caput felinum à figura & magnitudine denominatum; Omnium, mihi saltem cognitorum pomorum maximum, nec tamen succi illaudabilis.

9. *The Golden Pippin*. Pippinum aureum, chrysolinum. Multa sunt apud nos Pomorum genera Pippini nomine insignita, à Gallis fortè mutuato. Quoddam autem genus Londinense hortulanum, qui Catalogum hunc dederunt, hoc nomine intelligant non satis scio: nam quod apud nos in Essexia hoc nomine colitur, pomum est exiguum, sublongum, luteo aureove per maturitatem colore, unde & nomen, si fortè ab excellentia aut dignitate & pretio suo ita dictum sit, carne firma, solida, & ad verum usum durabili, unde pomis æstivis seu fugacibus accenseri non debet, quamvis etiam initio hyemis crudum esulentum sit. Ad omnes culinæ usus præstantissimum habetur, & Pomaceo conficendo egregium. Hoc nonnulli *The Sarford Pippin* vocant. Certè alia species est quam Parkinsonus *The Golding Pippin* vocat, quod Pippinorum dictorum omnium, maximum esse non minus quam optimum se ibi.

10. *The Good Housewife, or Bontradue*.

11. *The Giant-apple*. Gigas, ob magnitudinem fortè dictum.

12. *The Pomewater*. Pomum aqueum, olim apud majores nostros celebre. E majonibus est, exterius albicans, subco prægnans, acido, grato, & nonnul una amaricante.

13. *The Summer Pearmain*; quod nomen Pyrum magnum æstivum significat, cujus rationem non alicuius Magnitudinis mediæ est, exterius rubro striatum, carne firma, sapore delicato.

14. *The Birton Pippin, or Holland Pippin*. Pippinum Kirtonianum sive Hollandicum. Pyrum est, depressum, & in latitudinem diffusum, umbilico lato, unde & *Broad-ep* in Suffexia dicitur, dulci & pungenti acore imprimis commendabile.

15. *The Orange Apple*. Pomum Aurantiacum seu Oranganum.

16. *Summer Belle-boon*. Bellum & bonum æstivum, ut nomen ita & fructus Gallicæ originis est. Aspectu pulchrum, mediæ magnitudine, colore flavicante.

17. *The Paradise Apple*. Pomum Paradisiacum. Visu pulcherrimum & speciosum, colore flavo, verum carne levi & spongiosa, sapore dulci amaricante, minus laudabile.

18. *The Famagusta*, à Cypri insulæ metropoli nomen adeptum, fortè quod inde translatum.

19. *The Cobling*. Pomum coctile. Exterius albicans, e latere soli obverso rubore perfusum; cuticula levi, quam a coctione facile exiit. Crudum vix edatur ob duritiem & aciditatem, sed coctum vel cum cremore lactis, vel cum aqua rosacea & saccharo comestum inter laudatissima fercula habetur. Avaluatione vel ramulo deciso sentur & facile comprehendit.

20. At nec omittendum est in hac Catalogo *The Colard-apple* dictum, quod tantæ olim æstimationis fuit, ut Melopoli per antonomasiam quandam id nominis inditum fuerit. Nam *Colard-mongers* etiamnum hodie dicuntur.

21. Tandem nec nobis reticendum, nec a pomario excludendum Pomum *The Soys in wine*, id est, Osse vino intinctæ, dictum. Quamvis enim carne sit molli & fungosa, nec sapore præcipuo, tamen ob colorem rubentem quo pulpa interior per totam suffusa est, raritatis & spectaculi causâ coli meretur.

2. *Poma quaedam provincie nonnullis peculiaris; quae locis suis natalibus laudatissima habentur, & alio translata ferè degenerant.*

1. *The Stockin-apple, or Stocken-apple* ab oppido *Stoke* nomen fortè adoptum, in *Hertfordia* celebre.
2. *The Golden Renet.* Pomum renatum aureum, *Hartfordia* proprium.
3. *The Darling.* Pomum delicatulum *Cestriae*.
4. *The Angels-bit, i. e. Bucca Angelica* *Worcestriz* præcipuo in honore.
5. *The Harvep-apple.* Pomum *Harveianum* ab inventore *Gabriele Harveio* Doctore nomen sortitum, *Cantabrigiæ* suae deliciae. Grande est, colore è viridi albente, maculis plerunq; nigris infecto: vix ultra natalitia Christi durat.
6. *The Quarrington* *Devoniae*.

3. *Poma Hyemalis, & durabilia.*

1. *The Winter Queening.* Pomum Reginale hybernium, è lata basi in rostrum acutum producitur: carne firma & solida, sapore *Caryophyllum* rodolente.
2. *The Quince Apple.* Pomum *cydonites* seu *cotonci* formæ.
3. *The Winter Pearmain.* De cognomine æstivo diximus superius.
4. *The Dore-such.* Pomum incomparabile.
5. *The Pealing.*
6. *The Leather-coat.* Pomum duracinum seu *duricorium*, si ita loqui liceat, cujus non cutis tantum sed & pulpa tota dura est: nonnullis *The Winter John*, id est, *Joanninum* hybernium dicitur.
7. *The Pome-hop.* Velut *Rex Pomorum*.
8. *The Lozding.*
9. *The Purple-flower Apple.* *Caryophyllum*.
10. *The Pear-apple.* *Pyriforme*.
11. *The Greening.*
12. *Rones Pearmain.*
13. *The green Russetting.*
14. *The red Russetting.* Poma hæc *Rosertina* dicta à colore quodammodo ferrugineo seu rosso cute sunt undiq; scabra & velut ustulata, carne firma, & solida, succo pauco & bene concocto, sapore optimo, per totam durant hyemem, & saporis gratiam retinent.
15. *The Winter Fillet or Violet.* Pomum violaceum hybernium.
16. *The Winter Belle & bonne.*
17. *The Oaken pin.*
18. *The John-apple, or Deurans, i. e. Pomum Joanninum* seu biennale. Pomorum omnium durabilissimum est, & cum aliis poma mollescere & corrumpi incipiunt, maturescit & esui opportunum evadit.
19. *The Westbury.*
20. *The Winter-need.*
21. *The Flower of Kent.*
22. *The Winter Chestnut.*
23. *The Maligar apple.*
24. *The Short tart.*
25. *The Peimell.*
26. *Christ.*
27. *Winter Clary.*
28. *The Fig-apple.* *Ficoides*.
29. Horum nulli secundum, sive magnitudinem, sive saporem, sive durabilitatem spectes, Pomum *Pippinum* simpliciter & *Pippinum album* dictum, *Essexiensibus* *Renatum* [*the Renet*], à *Gallis* mutuato nomine: idèoque non omittendum fuit, at nec ultimo in loco ponendum.
30. Locum etiam aliquem, nè dicam principem, sibi vendicat *Pippinum Cantianum*, quod predicto majus est & succulentius, pythimene profundius depresso; saporis tamen gratia nostro judicio ei cedit.
31. Nec proorsus repiciendum *Pippinum Gallicum*, *The French Pippin*. *Pippinorum* dictorum maximum, quod quamvis carne molli & fungosa sit, sapore tamen grato palato arridet, & quod mirum diu durat.

4. *Poma Pomaceæ seu Cidra conficiendæ maximè idonea.*

1. *The Red-streak, i. e. pomum rubro striatum*, omnium optimum habetur, quamvis gustu minus gratum sit, & ad sylvestrium potius naturam accodat.
2. *The Dromsberry crab.*
3. *The Golden Pippin*, de quo jam dictum.
4. *The Semet-mois.*
5. *The Westbury apple.*
6. *The white and red Wast-apples.*
7. *The John apple.*
8. *The Underleaf.*
9. *The Winter Fillet.*
10. *Elliots.*
11. *Stockin apple.*
12. *Bitter-Scale.*
13. *Claret wine apple.*
14. *Kerier Apple.*
15. *Richards, or Orange Apple.*
16. *Coling apple.*
17. *Orlive apple.*
18. *For-whelp.*
19. *Pippins and Pearmain's mixt.*
20. *The Silly-flower apple.*

Catalogos hæcæ Pomorum, ut & Pyrorum, Prunorum, aborimq; fructuum, nunc dierum præcipuè celebrium ad me transmisit *D. Tancredus Robinson*, quos dictantibus peritissimis nonnullis & expertissimis hortulanis *Londinensibus* à se consultis in nostram gratiam conscripsit.

A. 5. *De Malo sylvestri sive agresti Angliæ. The Crabtree, or Wilding.*

Arridet nobis *Scaligeri* sententia, quam ex *Platonis Timæo* hausit, nimirum sativas omnes arbores olim fuisse feras, neq; à seipsis nisi cultu disserre, translataq; Malum agrestem ex feris locis cultu miscere, quod non heret, inquit, si natura esset fera aut sterilis. Verùm hoc intellectum volumus de arboribus quales nunc sunt postquam, *Adamo* è *Paradiso* excluso, terra maledicta est, non quales initio à *Deo* creabantur.

Quicquid tamen de hoc sit, neq; enim modicus hanc sententiam tuemur, *Malus agrestis* atque ejus fructus in tantum differt à mixtum genere, ut merito velut distincta species haberi possit. Eam autem *J. Bauhinus* sic describit,

Mimis ferè procera est quam sativa, tortuosior, ramosior, strigosior, materie, ut putatur, durior firmiterque. Multiplex illa ramorum & surculorum incondita divisura agrestem & incultum habitum facile ostendat. Sed & stolones tam è caudice quam è radicibus luxuriantes ut neglectum cultum, ita & propria rigiditate sylvestrem naturam produunt. Folia quam sativæ magna ex parte minorâ, constrictiora. Flores sativis similes, sed ferè minores, egregiè odorati, interdum subrubelli. In fructu differentia præcipua, qui parvus & rarè *Juglandem* æquans, magnitudine ferè *Mespili*, sed

figurâ

figurâ rotundior, longiusculo ac tenui pender pediculo, cortice seu cute viridi, tandem & flavescente quorundam etiam pulchrè rubente. Sed nec substantiæ mollitiæ, nec saporis convenientiâ, unquam ad sativa accedunt, ac ne quidem ad infimæ notæ acidissima vel austera: tanta possunt adstringendi facultate, tantique acerbitate, ut esoi planè inepta, nec unquam sunt apta.

Malorum aggregatum non minus quam hortensium & cultorum plures habentur species, que pariter enumerari nequeunt, nec si possent operæpretium id foret.

Florent cum hortensibus ferè, aut paulo etiam serius: tardius etiam maturantur, nempe Octobri. *Tempus.*

In sylvis & sepibus frequentes occurrunt non in Anglia tantum sed etiam in regionibus transmarinis. *Locus.*

Fructus vehementer austerus est, acidus & adstringens nec nimis succosus est contusus prælo expressus, cujus usus frequentissimus est in Anglia, Gallia, Germania, Aceti loco, *Agrestium* nonnulli vocant. Repositum per annum aut etiam plures asservant. Pisces eo coctos firmiores fieri & lapidiores existimant Galli & Germani, quod nobis etiam probatur, inquit J. Bauhinus. Succum hunc *Derjuice*, i. e. viridem succum appellat nostrates, à Gallis mutuato nomine. Cum flore *œstivæ* mixtus & impostus utilis est adversus ignem sacrum, scabiem, inflammationes quascunq.

Oculis instillatus eorum inflammationes & hippitudines specifica proprietate sanare creditur.

Ad Scrophulas, & Succum Pomorum agrestium calefactum, ulceribus diligenter eo locis & purgatis lanam nigram oleo è pedibus bubulis prius humectatam impone. *D. Halse* è MS. nondum edito.

6. *Malus Indica pomis angulose Carambolas dicta. Tamara-tonga seu Carambolas* H. M. *Carambolas* Park. *Carambolas Acosta* J. B. *Mala Goensis fructu oblongulari pomis vulgaris magnitudine* C. B. *erronei, fructus enim quadrangularis est, aut pentagonus.*

Ad duodecim aut quatuordecim circiter pedum altitudinem excrescit. Caudex pedis mensuram in ambitu vix superat, multilo, ramis in orbem diffusis donatus est, cortice scabro & fusco obductus. Lignum albicans, medulla intus albicante & molli refertum.

Similiter *radix* albicans, nigricante cortice tecta. *Folia* ordine parallelo ramulis inhaerent, oblongo rotunda, acuminata, crassa, mollia, glabra, viridia, supernè splendentia, infernè nequaquam: Odore sylvestri, sapore amaricante & adstringente. *Flores* racematim ipsis ramis inhaerent, atq. è calyce rubicundo in quinq. laciniis secto prodeunt, quinq. tenuibus, oblongo-rotundis, purpureis foliis constantes, quinq. in medio albicantibus *staminibus*, flavescensibus *apicibus* dotatis præditi: sapor is subacidus, odor nullus.

Fructus oblongi, umbilico exiguo, at eminente, in vertice præditi, quinque angulis crassioribus sulcati, qui tamen in medio eminentiores sunt, juxta unumq. caput non tam evidentes, cortice tenui, undè, carni archissime adherente, glabro, nitente, primum viridi, dein flavescente cincti, carne primum albicante, deinde eadem flavescente, tenera, succulenta, saporisque primum acerbis, dein acido dulci & suavis intus referti. In pentagono ejus medullio decem latitant *semina* oblonga, altera parte obtusa, altera acuta, rufa, glabra, membranaceis quibusdam atq. duris pelliculis, seu parietibus intergerinis, uti in malis, separata, ita ut gemina in singulis latent cellulis.

Garcias & Acosta fructum quadrangulum faciunt, in quatuor velut partes divisum, masculi ovi gallinacei magnitudine.

In hortis & pomariis seritur: ter singulis annis floret & fructus exhibet maturos, Sobole aut seminibus lata à primo triennio ad annum quinquagesimum usq. frugifera est. *Locus.*

Succus è radicibus expressus & assumptus æstum febrilem compescit. E foliis contusis cum Oryzæ *Vires* infuso cataplasma conficitur, quod tumores quoscunq. potenter emollit & resolvit: ex eisdem in Oryzæ infuso decoctis aut maceratis egregium fit decoctum vulnerarium. Succus è fructibus expressus pruritus, impetiginem, ploram, similesque affectus cutaneos sanat, si linteis parti affectæ subinde admoveatur: idem, si cum adusto Nucis Indicæ vino (quod vulgò *Araque* dicitur) propinetur, alvi cruciatus lenit, & diarrheam sistit. Insuper è foliis his contusis & cum sacco è Palmæ floribus expresso cataplasma paratur, quod inflammationibus quibuscunq. medetur. E fructibus extiocatis, & cum foliis *Betele* contusis pulvis fit, qui cum Nucis Indicæ vino adusto propinatus dolores parturientium promovet, necnon fetum mortuum & secundinas expellit.

Fructus maturi in deliciis comeduntur, immaturi verò saccharo vel muria & aceto condiuntur.

E fructibus immaturis succus exprimitur, qui in vestes incidens suo acore colores exedit: atq. adeo ad maculas quascunq. è linteis delendas frequenter usurpatur: colores etiam ad linteas tingenda ex eo parantur: necnon cum fructibus immaturis Auri fabri vasa argentea decoquere & deponere solent.

Dux sunt species, que inter se vix distinguuntur, nisi quòd altera dulcissimi plane sit saporis. *Folia* in hac arbore pinnata esse videntur, pluribus pinnarum conjugationibus media esse adnexa cum impari in extrema costa folio.

7. *Malus Indica fructu pentagono, Bihimbî dicta. Bilimbî* H. M. *Baling-bing* Bontis

H. M.

Arbucula est humilis, octo aut decem circiter pedes alta, caudice tenui, ramis in orbem diffusis eleganter ornato, qui cortice atro viridi, primum hirsuto, & spinis tenuissimis subaspero, dein glabro obducti, atq. molli & albicante medulla intus referti sunt. Lignum tamen prædurum, albicans, insipidum, inodorum. *Radix* similiter albicans, rufa cortice tecta.

Folia pinnata: pinnæ seu foliola singularia oblongo teretia, crassa, mollia, viridia, supernè splendentia, infernè nequaquam, odore suavi, sapore subacido.

Flores non faucibus foliatis, at ipsis ramis, necnon toti caudici inhaerent numerosi, & quasi in fascias spicamam longa collecti, atq. è calyce rubicundo, in quinq. laciniis acuminatis secto prodeunt, quinq. tenuibus oblongo-teretibus, supernè colore purpureo, internè pallidiorè nitentibus reflexis lobis constantes, decem in medio rubicundis staminibus, albicantibus *apicibus* ornatis mediant

flores cavitatem & albicantem umbilicum occupantibus, quorum quinque, elatiora extra florem prominent, quinque, verò breviora sunt: odor violaceus, sapor subacidus & gratus.

Fructus, qui etiam plures simul floribus succedunt, fructibus *Tamara-toga* planè similes, oblongo-rotundi sunt, ovo gallinaceo magnitudine respondentes, quinque, angulis crassioribus fulcati, cortice & carne ut in illa, nisi quod hæc primum viridis esse dicatur & uvarum carni haud abfimilis, ille semper viridis sit. *Semina* in singulis cellulis latent singula, interdum etiam gemina.

Linn.

Arbor hæc sobole aut seminibus in hortis lata ubiq; in *Malabar* nascitur, per totum annum floret fructusque fert, atq; à primo latioris anno ad quinquagesimum & ultra frugifera est.

Vireo.

Eisdem vires & usus habet cum precedente. Fructus autem quanvis maturi subacidi gratique sunt saporis, immaturi tamen acerbi, adeò ut stupor dentium ex acidorum esu contractus hæc fructibus comestis obfuscor: quod & Bontius adnotavit: qui se ex ejus succo syrupum conficere solere scribit adversus hepatis intemperiem calidam, & sanguinis phlogosin.

Es illam utimur (inquit idem) cum *Oryza* non decorata decocto, quod *Padu* vocamus, egregio jumento in febribus ardentibus & continuis; tum fiti sedandæ opime confert, cholera quoque impetum sistit.

8. *Neli-pali seu Bilambi altera minor* H.M. P. 3. T. 47. P. 57.

H. M.

Dux sunt hujus species (potius sexus) quarum altera quanquam floret, nullos tamen fructus fert, & peculiari nomine *Ala-pali* dicitur.

Ad octo aut decem circiter pedum altitudinem excrescunt.

Caudex albicans, pedis mensuram in ambitu vix superat, multique furculis foliosis, glabris, viridibus, in orbem diffusis donatus, cortice crasso, furvo, intusque purpureo obductus.

Radix purpurea cinereo tegitur cortice, ac succum stillat lacteum; sapor acris, odor nullus.

Folia foliis *Bilambi* planè similia, pinnata.

Similiter *fascalis* non furculis foliosis, non ipsi candidi, ut in *Bilambi* cornitur, sed ramis lignosis racematim inhaerent, exigui, uvarum stolis haud abfimiles, quatuor aut sex tenuibus, acuminatis, purpureis, atq; in stelle modum expansis foliolis constantes, octo aut decem in medio albicantibus *stira* præditi. Odor suavis, sapor subacidus.

Fructus qui floribus succedunt, ramis lignosis quoque racematim inhaerent, plano-rotundi, Ceraso nigro majori magnitudine respondentes, sex octove angulis fulcati, glabri, subvirides, utentes ac pellucidi, umbilico concavo exiguo in vertice ornati, necnon carni succulenta (Prunorum carni haud abfimili) subacidi gratique saporis intus referti, ac pellicula tenui, undiq; carni arcè adhaerente, cincti. Intra carnem ossiculum continetur, quod nucleum includit callosum, oblongum, è sex, cincti. Intra carnem ossiculum continetur, quod nucleum includit callosum, oblongum, è sex, octove seminibus, tenuis cuticula ope inter se junctis constantem, que detracta hac pellicula concave superiora, oblonga, supernè rotunda, infernè plana. Hi autem fructus subacidi & grati in deliciis habentur, & in edulis usurpantur, necnon saccharo aut aceto & muris condiuntur, vel in furno exsiccati ad varios usus servantur.

Linn.

Crescit ubiq; in *Malabar* & *Canaria*, sobole aut seminibus in hortis lata: per totum annum floret, fructusque fert, atq; à primo latioris anno ad quinquagesimum usq; frugifera est.

Vireo.

Radix hujus arboris cum semine *Sinaps* & cumini confusa atq; exhibita vomitum caet, alvumque movet: at verò cum fructu *Tamara-toga* si usurpetur, nimium alvi fluxum compescit & dyspnoeam sanat. E foliis cum aqua communi decoctum conficitur, quod sudores movet, ac variolas expellit. Ex esilem etiam cum Croco *Malabarico* (quam *Marya-Cosa* indigenæ vocant) in aqua decoctis balneum fit, quod quibuscunq; membrorum doloribus potenter medetur. Ipsi autem fructus summo opere refrigerant, atque ideo ad sitim ingentem in febre continua compescendam perquam utiles sunt.

Mala Indica *Acsa*, Bèr *Gartæ*, quam C. Bauhinus *Malum Maluccensem* nonnihil spinosam vocat, ad Pruniferum potius genus pertinere videtur. Fructus enim ejus *Zizyphis* similes esse aliis.

Mala Guianensia C. B. *Pinas*, quæ totius mundi potia superant, nec ullibi meliora quam in *Guiana*. Part. 8. *Ind. Occident.* Quæ annon fructum *Ananas* intelligant.

Mala Americana *Pyræ* specie C. B. ad Prunorum potius genus pertinet, & *Prunus Americana* pyrifera nostra sententiâ rectius dicitur.

C A P. II.

A. 1. *De Pyro Angl. The Pear-tree.*

PYRUS à πῦρ, id est, ignis dicitur, quod fructus ejus flammæ instar è lato in oblongum fastigiatur, & in i transit ut à πῦρ est ἵο. Verùm quomodo scribendum sit *Pyrisine* cum y, an *Pirus* cum i, inter eruditos non convenit. Optima *Pini* exemplaria ubique *Pirus* habent cum i. Alii *Pirus* à Græco ἄμϕω deducunt, truncato capite, ut in multis aliis, & inserto R. quomodo à *malum* est cotiandrum, à *malis* flagro, à *malis* putres. Sed unde ἄμϕω an ab *Apa* regione, id est, Peloponneso, an hæc ab ἄμϕω, quod verisimilius videtur.

Ut *Mali* ita & *Pyræ* unam duntaxat speciem agnosco ob rationes in capite de *Malo* dictas.

Est autem *Pyrus sativa*, (describente J. Bauhino) crasso eoque recto & simplici caudice. Altiis quam *Malus* assurgit, sed minus sit patula, ramis, usque plurimis, surrectis potius quam laterosum extensis, cortice quam *Mali* scabrore est, materie firma satisque tractabili, præsertim ad cypos & sculpturas

sculpturas apta, item ad tornum & alia, ex pallida rufescente, que siccata magis etiam rutila fit. *Folia* circinata ferè, vel ex circinato oblonga, marginibus aequalibus seu minime incisis aut crenatis, eorum figura pro specierum diversitate variante, longiusculo pediculo herentia, superne levia, solum dentata, inferne asperiuscula, albicantia, alternatim posita. *Flores* ferè quales Malo, pentaphylli, albicantes, apices purpurei. *Fructus*, hoc est, Pyra pene omnia, turbinata, circa pythmæna crassiora, & velut in Pyramidem fastigiata, in qua tamen figura multum variant, [imò non omnes eam observant] carne quàm Malorum densiore, satis succosa, sed plerumque acerosa, præsertim circa media, ubi semina foris nigra, intus alba, qualia Mali, cellulis coriaceis distincta continentur; pediculo ferè quàm Pomorum longiori. Colore multum variant, quemadmodum & sapore: In genere non tam viridus his color quàm Malo; neque cute tam levi contacta, sed aliis virenti, aliis araneosa, aliis subflava, variis rufescente, ut plurimum obsoleta, & leviter scabra. Sapor vel dulcis, vel acidus, vel austerus, vel acerbus. Arbor caret spinis. Radicem habet profundè actam (ut scribit Theophrastus.)

Pyrus in senectute fecundior, autore Theophr. & experientia teste. Περυλαριον dicta est, h. e. è radice emittens pollum: huic enim longè etiam subter terram productis radicibus stolones enascuntur. Salsis offendi aiunt.

Pulpa in hoc aliisque fructibus esculentis quibus data est, non tantum ut Animalibus in cibum cedat a natura concessa est; sed etiam ad seminum præsidium: quæ etsi coriaco amictu donata sint, melius tamen & felicius intra pulpam, vel putridam etiam, tota conservantur hycme quàm exempta.

Pyra pleraque calculosa sunt, ideoque à nonnullis calculo in humano corpore generando idonea putantur & ob id in cibus damnanda.

Pyrorum non minus quàm Pomorum genera, seu differentie numerosissima sunt, aut verius novis quotannis productis & æternum producentis infinite: nec tamen omnes quæ etiam nunc extant varietates enumerare cuiquam facile nè dicam possibile fuerit, cum unusquisque ferè pagus quadam genera peculiaria habeat. Sunt quaedam fateor in unaquaque regione aliis celebriora & passim cognita, in Gallia scilicet, Hispania, Germania, Italia, Anglia, quæ recensere Curtius, Dalechampius, Ruelius, Matthiolus, Casalpini, Aug. Gallus, Cordus, J. Bauhinus, Parkinsonus, Hortularii Gallici auctor, alique, ad quos Lectorem qui ea scire desiderat remitto. Duo tamen genera insigniora non apud Anglos duntaxat, sed & Gallos, & Italos & Germanos dudum celebria, nec minore in pretio & honore hodie etiam habita, indicta præterire nequeo: Ea sunt,

1. *Bergamata*, à Bergamo Italie urbe denominata, succo saporeque egregia, rotundiore formâ, colore herbaceo, qui nec dotem referat. Autumno appetente maturescunt, verum non diu durant, nisi paulo ante plenam maturitatem colligantur, & commodè reponantur, sive cocta sive cruda edantur utriusque, esui jucundissima sunt, inquit Curtius. Verum inutilem operam navant qui ea coquant, siquidem crudorum succus omnium non dico pyrorum, sed fructuum in Anglia nascentium, palato nostro sapidissimus est, & ut ita dicam, distissimus.

2. *Boni Christiani* dicta. Serotina hæc, uti in Autumnum durent, amplissima, cucurbitæ figura, herbaceo colore, subnigro, succo dulcissimo, ut etiam cum senserint crudæ per orbiculos in latum tenuiter dissecta, additâ aquâ rosacâ & saccharo edantur. Per summos enim calores refrigerare perhibentur, ut agris etiam contra ardores præbeantur. Curt.

Pyrus loca temperata amat; in calidioribus, ut Ægypto, referente Theophrasto, pauca oritur. *Leont.* Lato solo gaudet, nec tamen glareosum aspernatur, ubi Mali non proficiunt. Nihil frequentius Germaniæ, Galliæ, sed præsertim Septentrionis plagis, Belgio, Northmanniæ, Angliæ.

Pyrus, ut rectè Tragus, ante Malum plerumque, cum ceralo florem edit, Aprilis mensis aut tempestate Frigidioris etiam Maii initio. Æstate & Autumno fructus maturescit.

Pyrorum vires ex saporum generibus metiende sunt, Dalcia emolliunt potius quàm astringunt, acida & acerba astringunt.

Pyra esu stomacho grata sunt, & sitim extinguunt, etiam cruda, utiliora, autore Matthiolo, si potius. *Vires.* strema in pasta comelantur. Unanimi tamen consensu medicorum cocta crudis præstant. *Dequella mirè salubria sunt & grata.* Pin. Cruda semper cocta utiliora & ad corporis nutritionem meliora. *Matth.*

Cruda gravant stomachum, relevant pyra colla gravatum. Schol. Salern.

Nos pyra cruda bene matura, boni succi & melioris notæ, non insalubria putamus: epulmodi enim multoties copiosè ad satietatem usque ingestimus, nec tamen unquam vel levissimum inde nocumentum aut incommodum sensitimus. Non tamen receper sententiæ adversamur, nec cocta crudis salubriora esse negamus. Ad coquendum tamen aptiora sunt nonnihil acerba & austera; & à coctione sapulosa & palato graviora evadunt, quàm dulcia & mitiora: Arida & resiccata pyra ventri fluxus sedant, & sanguinis quoque fluores sistunt. Cum Fungis cocta eorum malignitatem corrigere dicuntur.

E Pyris non secus ac Pomis fit vini quoddam genus Apites Veteribus dictum, Latinis Pyraceum, nostratibus *Perep.* Dulce admodum est, & palato mirè blanditur, verum apud vulgus nostrum malè audit quòd assidue eo urentes pro potu ordinario scabiosos efficere solere credatur; quòd an verum sit necne nobis incompertum. Non diu durat, sed prima æstate accescit.

A. 2. De Pyraestro seu Pyro sylvestri. Wild Pear-Tree.

Pyrus sylvestris (describente J. Bauhino) minus procera ferè est arbor quàm fativa: verum furculosa admodum, & ramorum extremis spinosus, caudice rimoso, & hulco cortice, materie rutila & quàm fativa duriore, ideoque discos & tabellas ex eo conficiunt. Primum emergunt flores inftar umbellæ, ex eodem furculo seu nodulo multi, lanuginosis pediculis insidentes, pentapetalis, petalis albis, rotundis, cochlearis modo concavis, inter quorum singula intercedit subjecti hucusum- bilis

bilici radius, in viridi canescens: *apices* in medio multi, purpurei. *Folia* florentis arbore subtes & in ambitu cana lanugine obita, foliorum Coronei instar, supernè virentia. Splendida, aliàs utrinq; glabra, lucida, subrotunda, crassiuscula. *Fructus* non uniformes, sed aliàs rotundi & modicè compressi, aliàs ex rotundo leviter turbinati & longiusculi, austeri & acerbi valdè, nec edules donec fratescant, quod fere fit Octobri, semen intus continentia Pomorum seminibus simillimum. Extima alioqui facie Pyri speciem facilè repræsentat. A radice numerosos emittit stolonos, valdè spinolos, cortice rubicundo vestitos: Copta & rigiditate spinarum facilè discernuntur à stolonibus Malorum sylvestrium.

An Pyrus sylvestris cultu mutari possit in mitem seu hortensem quaestio est. Theophrastus discretis verbis id negat. Scaliger affirmat Pyrum feris translatam locis adhibito cultu deponere agrestem illum habitum simul cum aculeis quos adulta tulisset, simulque & laxatur illa densitas quæ videtur in ejus popularibus, unde transportata fuit ad naturam meliorem. Quod an verum sit necne vix ipsum Scaligerum expectatum credo.

Locus.

Pyrorum sylvestrium non minus quam sativarum plurimæ sunt differentie: passim occurrunt in sylvis & sepibus, locis præsertim montosis: loca calidiora refugiunt, unde in Ægypto nullum procius sylvestris Pyri genus; mitis etiam rara.

Tempus.

Florent simul cum sativis, sed fructus tardius perficiunt, viz. non ante Octobrem mensem.

Virtus.

Pyrum sylvestre [*Ægæi*] siccatur & astringit valida; longeque efficacius quam sativam: conciditur (inquit Plinius) suspensumque, siccatur ad sistendum alvum, quod & decoctum ejus potum præstat. Decoquuntur & folia cum Pomo ad eisdem usum.

Veteres & Recentiorum nonnulli Pyrastri fructum adversus Fungorum venenum commendant, vel simul cum Fungo coctum, vel à Fungo comestis confectum sumptum. His refragatur J. Bauhinus, & eruditis considerandum proponit an tutus sit usus Pyrorum sylvestrium cum Fungis; cum Pyra valdè adstringant vomitumque, & alvi fluxum compescant adeoque impediunt, nè Fungi per vomitum rejiciantur aut per alvum promptè descendant. Fungi autem, cujuscumque tandem generis sunt, quò citius à natura desciuntur & extra corpus pelluntur eò salubris, cum ventriculum gravent, aut lancinent vexentive. Reliqua apud ipsum vide.

Pyra Anglica celebriora.

1. Mariis applicanda, aut ad familiam modum & futuram curcenda.

1. Bon-Christien Summer- & Winter de quibus superius diximus. 2. The Bury de Reg. 3. Butter-pear. 4. The green Burp. 5. The Violet. 6. The Dove. 7. The great Bush. 8. Amadot. 9. Houfelet. 10. Messier Jean. 11. Great Sovereign. 12. Wood-pear. 13. Windsor-pear. 14. Spensfield-pear. 15. Dionier. 16. Great Bergamot. 17. Virgalous. 18. Koshea. 19. Red Catherine. 20. Double-flowered-pear. Pyrus flora plena.

2. Pyra mensalia seu escalenta, in viridario serenda, & ut adolescant facienda.

1. The Hill-pear. 2. The Primating. 3. The white and red Seneting. 4. Green Chiffel. 5. Sovereign. 6. Orange. 7. Natharine. 8. Anthony. 9. Sugar. 10. Lions-pear. 11. Pimp. 12. Berry. 13. Popering. 14. Dead-mans. 15. Scarlet. 16. Royal. 17. Donsuch. 18. Kings-pear. 19. Ladies-buttock. 20. Whulcate. 21. Oak. 22. Ice-pear. 23. Galcoigne. 24. Bergamot. 25. Winter Popering. 26. Little Dagobert. 27. Great Hair-ville. 28. Long Bergamot. 29. Slipper-pear. 30. Lewis.

3. Pyra collita, aut vino Apiti seu Pyraea conficiendo idonea in agris serenda.

In cibano coquendo, 1. The Dorwich-pear. 2. The black Worcester. 3. The Quince-pear. 4. The Bishops-pear. 5. The Arundel. 6. The Bell-pear. 7. The painted-pear. 8. Wardens of several sorts.

Pro Apite seu Pyraea. 1. The red and white Horse-pear. 2. The Choak-pear. 3. The pear. Dogberry and Warland-pear. 4. The Curgobian-pear.

Catalogos hosce ad me transmisit eruditissimus & amicissimus Vir, de hoc Opere deque ejus Auctore optimè meritis D. Tancredus Robinson.

C A P. III.

De Mala Cydonia seu Cotonea. The Quince-Tree.

Arbor hæc *Cydonia* à Cydone Cretæ oppido, etiamnum habitata, à quibusdam dicta potatur. Plinius lib. 15. c. 11. *Cydonia mala Græcia ex Creta insula advecta* scribit. Ex Serenus,

Aut quæ poma Cydon Cretæis misit ab urbe.

Hoc Erymon improbat Dioscorus, cujus rationes vide apud J. Bauhinum *Hist. plant. lib. 1. cap. 1. Coconum*

Cotoneum malum primus Cato, dein Plinius nominavit: quia (ut putat Lonicerus) lanugine [quæ ut ille ait Coton Græcis est] tecta sint: quod etymon Casp. Hofmannus etiam adfert. Verum apud nullum hætenus probatum autorem legimus, Coton vel cotoneum aut cotona esse lanuginem, sed barbarissimo ex voces deberi, ex Gallico & Italico mutuata, videntur, quibus *Cetes* Gossipium est, quod nec ipsum quidem quis propriè lanam dixerit. *J. B.*

Hujus arboris fructus Aurea Hesperidum Mala tantopere Veteribus decantata fuisse multis probat Goropius, & post eam J. Bodeus à Stapel, quorum argumenta apud ipsos vide.

Malus Cotonea pusilla arbor est, ligno contorto, intus pallente & albicante, firmo latis & æquali, cortice obtecto mediocri, non rimoso, nec valde scabro, inferna parte subfusco, supernè subcinereo, leviori atq; glabro. *Folia* gerit Malo vulgari æqualia, nullà in ambitu crenà incisurave diffecta, prona parte cana lanugine ubertim obsita, supinà verò viridantia & levia ferè, rariùs [& nonnisi tenellis foliis] lanuginosa, quæ lanugo facillè asfrictu digiti deraditur. *Floris* non multi simul ut in Malis, sed in furculis singulares, Rosis sylvestribus persimiles, quinque, foliis subrotundis ac semina latioribus, carneo colore præditis constantes; in quorum medio *stamina* multa purpurascencia, *apicibus* lateolis: flori autem toti subsunt quinque, folia, ex viridi canescentia, villosa, quæ postmodum *fructus mollioribus* foliatum efficiunt. Sub illis lanuginosum quid extuberat, futuri fructus rudimentum, quod cadentibus florum foliis incrementum capessit, donec fructus perficiatur magnitudine Mali, figurà variis, turbinatus, & torulis eminentibus tuberosus, parvus, magnus, mediocri, densa lanugine rasili obductus, pulpa melina, odora, adstringente & subacida. *Semina* in ipso Pomi centro, quinque, cellulis distincto continentur, cortice spadiceo, medullis albis, Pyri semibus non multum dissimilia, viscido quodam lentore lubrica, quem in aquam dejecta deponunt, & ipsam mucilaginosam reddunt. *Radix* copiosa, fusco cortice vestita, aliàs recta, aliàs obliquè acta, è cujus summo multi stolones virgati sese exerunt.

Seritur avulsione, in fine, viviradice, ramulis & talcis. Ipse verò fructus ex arbore pendens incurvatus trahit ramos, prohibetque crescere parentem, ut Plinius: habetq; hæc arbor omnium Malorum infima omnium Malorum maxima, ut annotat Goropius.

Cydoniorum hortensium duo genera describit Jo. Bauhinus.

1. *Cydonia minor, Mala cotonea minor C. B.*

Minora (inquit), quæ omnium vulgatissima, pagnum vix æquant, nam quatuor uncias rarè superant, circa pediculum turbinata, juxta pythmema latiora & quodammodo sessilia, angulis torosis inæqualia, & veluti per longitudinem sulcata, colore primùm virente, sed mox maturata, faturè aureolo, copiosa lanugine obducta, odore grato quidem, sed vehementi, & qui quorundam capita ita percellit ut ipsis dolorem moveat, præsertim si conclavi aut musco inclusa habeantur. Caro flava, firma, atq; quovis Pyro compactior.

2. *Cydonia major, Mala cotonea major C. B.*

Hæc ut prædicta magnitudine superant, ita & figurà variant ab iis & inter se quoq;. Omnia verò circa pythmema videntur angustiora, circa pediculum verò aliàs acuta, aliàs sessilia, imò & utrinq; sessilia vidimus. Cortice hæc longè leviorè tecta, exiguo aut ferè nullo cotone obducta; dilutior etiam eorum color sive flavum spectes, sive ex flavo viridantem. Caro minus firma quàm minorum, nec tam vehementem ut illa de se odorem spirant. Hæc *Scrutheia* putamus Veterum, illa verò *Cydonia simpliciter dicta*, & *malva* Dioscoridis, si modò nobis sint ea ipsa genera Cydoniorum quæ Veteribus descripta sunt.

His addit tertium genus quod miscellaneum vocat; C. Bauhinus *Mala cotonea media*, quæ proveniunt è Cotoneis quæ *Scrutheis*, vel è contra, insita fuere. Parkinsonus quinque recenset Mali Cydoniæ genera.

1. Malum Cotoneam vulgarem seu Anglicam.

2. Malum Cydoniam Lusitanicam, quæ duplex habetur, 1. Fructu Maliformi, magno & flavo, qui plerunq; rimas agit, gustu adeò jucundo, ut crudus mandi possit instar Pomi vulgaris; vulgari cotoneo quovis modo coctus multò delicatior. 2. Pyriiformi fructu, præcedenti simili, qui tamen non ut ille crudus esui aptus est, sed coqui requirit; nostrate tamen minor est, & pauciori Saccharo opus habet ut palato arideat.

3. M. Cydoniam Barbaricam, *The Barber's Quince*, Bonitate & saporis suavitate præcedentis æmulo fructu, verum minore & non rimoso.

4. M. Cydoniam Lugdunensem; fructu est mediocri, Cydonio Anglico simili, nec ita flavo ut Lusitanicum.

5. M. Cydoniam Brunswicensem; pomo pene rotundo, nec Malo, nec Pyro simili.

Præter hæc & alia proculdubio habentur alibi, & haberi adhuc possunt Cydoniarum genera: nam harum etiam non pauciores fructuum respectu à satione varietates quàm Pyrorum & Pomorum obtineri posse minime dubitamus. Siquis sua interesse putaret ut id tentaret.

Cydonia autem in Anglia, Gallia, Italia, Germania, &c. in hortis & viridariis passim coluntur. *Locus.* Amant in genere loca frigidiuscula, tam plana, quàm declivia, humidiora tamen potius quàm sicca: Nos enim in Anglia ad fluviorum & stagnorum ripas & secundum rivulos & aquarum decursus eas plerunq; plantamus.

Florent unà cum Pyris circa finem Aprilis, ferè citiusve pro tempestate & loco in quo nascuntur. *Tempus.* Poma maturescunt Septembri & Octobri mensibus. Barbarica & Lusitanica menstruo ipso Anglica anteverunt.

Hortulani nostri in Anglia nunc dierum Pyros Cotoneis inserunt, ut & plantæ & fructus firmiores, durabiliorèque evadant, horum etiam saporis emendentur. Prunus Armeniaca, *Mala* *Cydoniæ* *insite*

infite vel non comprehendunt, vel saltem ad frugem non perveniunt: oportet enim ut arborē cognatae sint, quae in se mutuo infite proficiant, eusmodi sunt Cydonia & Pyrus, item Oxycantha & Pyrus, Prunus & Armeniaca, Persicaria: Prunus & Cydonia minime.

Ficus.

Mala Cydonia stomacho commoda sunt; ob adstringentem facultatem, quae insigni pollent, utilis sunt coeliacis, dysentericis, cholericis, sanguinem exscreantibus, & in genere fluxu quocumque laborantibus. Plura non idem posse decocta scribit quomam amittant astringentem illam vim succi. Nos cum Jo. Bauhino coctione remitti adstringentem illam concedimus, amitti nequam.

N. Ante cibum sumpta alvum costringere creduntur, è contra à passu laxare.

Si depletio ledatur ab exsiccatione in febribus intermē, mucilago semm. Cydon. cum aqua spermat. ranarum extracta est egregia. Esmuller. in cap. de deglutitione lesa communicavit D. Hulf.

Celiberi Veratri succum, quo sagittis illis feris immodicabili vulnere conficunt, si ubi Cydonia mala tagunt. reponant, elanguescere & vim suam maleficam exuere usu deprehenderunt. Addit Cicutis praestanti suo odore lethaliū venenorum vires retundere, & eorum vehementiam hebetare, sicut venenam vendentes rem ita se habere deprehenderunt. Cydonia quamvis alvum astringunt, tamen urinam cient; proude in ardore urinae cum ulcere vel sine eo ab eis cavendum.

* Recensio
facillimum
est mala ali-
cunt.

Ex Cydonis tuis & expressis fit vinum, sed quo perduret quindecim sextariae succi unus * mellis adponitur, alioqui in acorem degenerat. Adstringit, stomacho commodum est, dysentericis prodest, hepaticis, nephriticis, & in urinae difficultate.

Mira Cydonium nihil aliud est quam decorticatum Cydoniorum, & ex aqua & spelle vel saccharo, adita etiam parte vini ad suavitatem decocta caro atque condita. Vel ex succo sit Cydoniorum cum vino cocto, addito melle optimo & despumato.

Cydoniatum seu Marmelata cydoniorum in usu est frequentissimo in bellariis ad secundas menses instruendas. Sic autem paratur, Segmenta à seminibus & fungosis eorundem conceptaculis purgata atq; decorticata, diuisa in aqua elixa, addita sacchari q. s. donec tabescant, deinde exempta, vel in mortario ligneo tondas, vel cochleari in vase idoneo premas & comminas, donec in pastam seu pulpam mollem aequabilem redigantur: Commixtis liquorem sterum affundas, deinde inuiel denso coquas donec debitam consistentiam acquirat, tandemq; in scutulas, siccilia vitreata, aut etiam vitrea vasa effundas, & ad usum reserues.

Si Marmelatam rubeam desideras Cydoniorum segmenta in vase occluso seu operculato, & diutius coquenda sunt: Operculum enim igneus particulas quae ruborem conferunt detinet ne auolent aut evaporent. Si Cydoniatum album velis in vase aperto res peragenda, nec tandiu coquenda segmenta.

Ante cibum natis magnitudine sumptum alvum cohibet, post cibum vero solvit. Ventriculo apertissime conducunt.

Multi medici condita Cydonia mala gravidis commendant, statuentes non modo fetum corroborari, sed quoq; usui venire, si saepe in vicinent gravidae, ut scitissimi in lacem edantur liberi venusta lacte vultus, ingerunt. S. Paulus Quadrip. Botan. Class. 2. p. 81.

Sunt & alii modi vari Cydonia preparandi vel ad cibum, vel ad medicinam, quorum descriptiones cauto, in Pharmacopoeo requirenda, aut etiam apud rei cognatarum scriptores. Consule si placet J. Bauhin Hist. plant. lib. 1. cap. 3.

Petavi non semel mel acidalum, syrupum, vel potius mixturam Cydoniorum ex solo succo ad syrapi consistentiam blando igne decocto, cujus effectum laudabilem & saepe valde differentem miratus sum saepenumero. Huius si cochl. ꝑ. infantibus, vel plus adultioribus exhibeatur, pituitam glutinosam incillit, & nunc tussi ex pulmonibus educit, nunc vomiti è ventriculo tenuique intestino, nunc deiectione ab hisdem partibus expellit, quodque maxime faciendum, robur simul affert agris, adeo ut hoc uno remedio, plures restituerim agros à plerisque medicamentis abhorrentes. Prunae autem imprimis conducit tum eracuanda tum corrigenda. Sylv. de le Boe Method. Medend. lib. 2. cap. 10. D. Hulf.

Est & seminis sua praestantia. Ea siquidem cum aqua rosacea madefacta ac mollita lento crasque humore ambusta igni, & linguae gulaque ardoe illa medentur; ad dolorem haemorrhoidum (in clyster.) ad scissuras mammarum.

Ceterum Marmelata seu Marmelada ab Hispanico *Marmelas*, quo nomine Mala Cydonia appellant, deducitur.

Com medici (inquit J. Bauhinus) Cydoniorum succum atque etiam substantiam stomacho familiarissimam advertent, qui saepe purgantibus lesi soles, medicinas purgatrices ei adiecerunt, & Diacydonium laxativum victum vel purgans confecerunt, cujus confectioem & usum vide apud Praedicos, & etiam J. Bauhinum loco praedicto.

Diacydonii purgantis liceti & non liceti, quod in secretis habere dicit secretorum suorum buccinatori, vide apud eundem J. B.

Mala Cydonia [J. B. C. B.]

Sativa per omnia semina exsistit, à qua raris distat minoribus tantum, caulice surgens roborē, parva terram minus fructuosa, sed singulari frequentius. Eadem numerosioribus scaturit floribus & largis fructibus. Fructus sero perficit, qui etiam sativae fructibus multo sunt minores.

Linn.

Nascuntur in Danubii petrosis ripis & collibus plurimumque supra Ratissponam & Keythemum oppidum usque ad Petras fauces, per quas Danubius labitur, frequenter inter petras, & vinearum sepius, autore Cordo.

CAP. IV.

Pemifera Indica Maliformis Guayava dicta.

1. *Guayava* Park. Ger. *Guaiaho pemifera Indica* C. B. *Guayava Indica fructu Mali facie* J. B. *Pela* H. M. P. 3. T. 34. p. 31. *The Goabo-Tree*.

Arbor est iuxta magnitudinis, 20 circiter pedes alta, caudice recto, prædure, sesquipedali crassitudine, multique ramis donato, [in Mali figuram exercecens *Maregrav.*] qui cortice glæbo, rubro-virente, saporisque austeri obducti sunt, novellis tamen omnino virentibus. In arbuscula ex insula Barbados in Angliam delata & à nobis visa, virga rubescebat. Curum feminæ virgarum infra.

Radix rufa cortice tecta fibris suis latè per terram diffunditur.

Folia decussatim brevibus crassisque pediculis ramis, furculisque coherant, crassa, oblonga, acuminata & nonnulla crispa, [nervo & venis parallelis linearibus oblique discurrentibus & subtus valdè conspicuis, superne profundis, unde quasi rugosa apparent folia *Maregrav.*] inferne scabra seu aspera, superne nequaquam, color ex atro virecens: [*Maregravi* pallidè viridis & splendens quodammodo, inferne non splendens; longitudo duorum vel trium, Clutii quatuor, digitorum, latitudo digiti aut sesquidigiti aut duorum digitorum.]

In exortu binorum foliorum alius pediculus brevior nascitur, qui florem fert magnitudine floris *Cotonæ*, quinque petalis albis, oblongo-rotundis consistantem, ac in medio multa staminula villosa, alba habentem, figurâ crista *Pavoninae*, apicibus flavescentibus ornata.

Fructus nostratibus pyræ hanc ab similes, [magnitudine & figurâ *Pomi* nostratis *Maregrav.*] in vertice umbilico præditi lacunoso, ac tenui & è viridi albicante cortice cincti. Pulpa pallidè sanguinei est coloris, (alio albicantis) dulcisque ac grati saporis & odoris etiam per maturitatem; intra quam numerosa, subrotunda ac prædura observantur grana.

Fructus pro diversitate temporis triplici sapore participat. Maturecens enim antequam mollescat ac flavescat austerus ac astringens est, tuncque coctus ventriculo prodest. Mox paulò maturior mediæ naturæ & optimus evadit: melius tamen sanitati consulit qui eum sive coctum, sive saccharo conditam, quam qui crudum mensis infert: accedit quod odoris & saporis sit gratioris & palato magis abundantis. Ubi verò flavedine & mollitie integram maturitatem acquisiverit, odore & sapore est instar fructus *Rubi Idæi*, alvum movens, nec ita salubris paulò largius assumptus, quæ facile corrumpitur & vermes producit.

In multis Americæ provinciis necnon in India Orientali oritur. Seminibus fata tertio anno fructus fert, manetque frugifera ultra 30 annos.

Radix hujus arboris quinque aut sex ulnarum longitudinem sæpe superat, extus rufi, intus albicantis coloris, substantia succulentæ ac subdulcis. Hæc cum cortice astringente in aqua cocta ac pota minuscè modetur dysenteria, quando indicatio est astringendi & roborandi. Folia sunt acida & adstringentia, odorata, balsamicæ dicata. Montibus & sylvis non innascenter sed planitiem & campos amat.

Addit *Fr. Hernandez* folia in lotionibus scabiem curare: corticis decoctum tumentibus cruribus operi ferre, & fistulosis ulceribus moderi, surditati quoque conferre, & dolores ventris tollere. E foliis etiam fit syrupus utilissimus adversus fluxum alvi.

Duas species describit *Hernandez*. Alteri fructus sunt longè majores, nox tam malè olentes ac delicatioris: alteri minores, cimices quodammodo redolentes.

Hortensieriam Malabaricam duas exhibet species, quæ à se invicem vix aliter differunt quam,

1. Foliorum & fructuum magnitudine.
2. Quod altera fructu sit rotundior & Mali simili.
3. Quod fructus intus carne purpurea, acidiuscula præditi sint in una specie, in altera albicante.

Quæ fructu est majore ejusque pulpa albicante, *Pela* simpliciter dicta *H. M. Pisoni Araça guayava* dicitur. Quæ fructu minore carne sanguinea *Malucka-Pela* *H. M. Pisoni* est *Guayava*.

2. *Pela* sive *Guayava sylvestris* *H. M. P.* 3. *Tab.* 36. p. 35.

H. M.

Arbor est mediocris magnitudinis decem aut duodecim pedes alta, caudice mediocriter crasso, multique ramis in orbem diffusis donato, cortice crasso, lignoso, scabro, furvo ac intus rubro obducto. Lignum albicans, densum, ponderosum, insipidum.

Radix itidem albicans, cortice fusco, intus rubro tecta.

Folia oblongo-rotunda, crassa, mollia, lanuginosa, in ambitu crenata, crassius brevibus, albicantibus petiolis ramorum extremis proveniunt rubicunda, quæ tamen postea superne atro viridia, inferne subviridia evadunt, longitudine tres, latitudine duos palmos facile superantia, insipida, inodora.

Flores brevi pediculo extremis furculis multi simul juncti insident, atq; è calyce viridi quadripartito prodeunt, quatuor crassis oblongo-teretibus, haecis, viridi-striata petalis constantes, minoribus staminibus albicantibus, flavescentibus dicatis apicibus, modicam floem cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ *sylva* prodit oblongus albicans. Odor gravis ac fetidus, sapor amarus.

Fructus Pyræ hanc ab similes, ac viridi, glæbo, necnon ac tharior cortice cincti, intusque carne densa & albicante repleti: intra quam oblongo-rotunda, glæbra, rufa, densa, sapore *Castaneæ* & *malantia* locantur semina: fructus verò immaturi valdè duri sunt, fetidi, saporis, ingrati; & quamquam

quam maturiores saporis subdulcis evadunt, non tamen ob venenatam, que prædita sunt, qualitatem comeduntur.

Locus.

Crescit arbor hæc ubique in *Malabar*, inprimis circa *Cochin* & *Perka*: mensibus Maio & Junio florere, & antiquis decidentibus novis frondefcit foliis; fructus verò sequentibus fert Octobri & Novembri, diuq; frugifera manet.

Cortice Apri delectantur, quem in finem venatoribus in usu est.

3. *Araca-miri* Pison. *Marcgrav.*

Pison.

Frutex est ligno, foliis & floribus ut *Guayaba*. Locus gaudet apricis; raròque in sylvis aut umbrifis nemoribus conspicitur. [*Marcgravius* sylvas in *Brasilia* hujus fructibus plenas esse ait.]

Flores habet albicantes, pentapetalos, cum multis staminibus longis. Floret bis quotannis; bis quoq; fert fructum, mense nimirum Martio & rursus Septembri. Pruna coronis *Mespilorum* infar, ornata, innumerisque acinis turgentia profert, que ubi maturuerint flavent, musteamque habent in se dulcedinem, atque *Fraga* quodammodo referunt sapore. Cruda potius quam cocta appetuntur, suavissimique odoris existunt & saporis. Oportet autem ut tempestive decerpantur; nam propter intensissimum Solis ardorem non minor injuria fit, si paulò tardius quam si citius avellantur.

Virus.

Conditus qui ex hoc fructu fiunt, jucunde refrigerant, astringunt & corroborant, locoque carnis *Cydoniorum*, conservæ rosarum, &c. exhibentur.

Ex foliis & gemmis optima balnea componuntur, tam contra internos quam externos corporis affectus: sunt enim adstringentia, sed præcipue radix, que & dysenterix medetur; atq; hoc peculiare habet, quòd sit diuretica, partiumq; subtilium.

CAP. V.

De *Sorbo*.

SORBUS Latinis à Sorbendo nonnullis dicta putatur, quòd caro matura sorbetur. Et sanè fracidorum illa pulpà vix commodius quam sorbendo assumitur, nè simul cutim & siquid intus seminum aut calculosi deglutias *J. B.* Græcis ^{ἄρα} & ^{ἄρα} dicitur. Merito à *J. Bauhino* proxime post *Pyrum* collocatur ob fructuum similitudinem in facie externa.

Sorbus fructu acerbo cum *Mespilo* convenit; foliis pinnatis, *Fraxinearum* æmulis, & floribus eosq; sequentibus fructibus umbellatim congestis ab eadem rectè distinguitur, à *C. Bauhino*, quem nos sequenti diis tantum *Sorbi* species facimus, nimirum *Sativam*, & *Aucupariam*, seu *Fraxinum* bulbam dictam.

1. *Sorbus* *J. B. Ger. sativa* *C. B. legitima* *Park. The true Service-Tree, o; Dozb.*

J. B.

Procera est arbor & ramosa, cortice rugoso, vel (ut ait *Matthiolus*) scabriusculo, colore ex fivo albicante, radice rara, crassa, solida atque descendente, materie rubente, solidissima atq; compacta. *Folia* pinnata pediculo unciali, septena aut novena foliorum uncialium, angustorum, in ambitu serratorum, costa per longitudinem decurrente, hirsutorum, supina parte virentium, pronà canescentium conjugatione, imparique uno aliis consimili alam claudente, omnibus ad costam internam villolamq; alligatis constantia, facie quodammodo *Rhos*, sapore acerbo. *Flores* eidem sterculo cum foliis insident ex pediculis uncialibus & festantibus simul multi juncti, quasi in umbelle formam, albidis *Fructibus* *Pyrum* moschatelinum parvum æquat, turbinatus, umbilicatus, magis minusve rubens, prout Solem sensit, (Scal. rubiginosum dicit) carne flavescente, & ante maturitatem aded austero succo ut strangulet, (teste *Carlalp.*) colore in rutilum transiente: At ubi velut fermentatione quadam emollita fuerit [vix mutato interno colore, quod tamen in *Pyris* fit] dulci satis & vesca non sine adstrictione. *Semina* *Pyris* sunt, compressa, lanosa, medullà alba, ejusdem saporis, foliolo membranaceo inclusa, tria numeravimus.

Locus.

Frequens est in *Italia* & *Germania*; in montibus etiam *Helveticis* frequens teste *Gesnero*. Amat loca humida, montana, & frigida proxima, & solum pinguisimum. In *Anglia* sponte non provenit.

Virus & Usus.

Sorba præsertim immatura astringunt valde, & fluxus quoscunque alvi, uteri, &c. sistunt. Ad hos usus ante maturitatem collecta vel in cibano, vel in aere ad solem suspensa siccant, & in pulverem redigunt, vel aquâ calidâ molliunt, vel vino decoquunt. Nonnulli melle condunt. Conditæ aliorum fructuum modo, h. e. cortice & ossibus mundata & in aqua cum sufficiente quantitate *Sacchari* decocta confortant stomachum, appetitum excitant, & frequenter compescunt fluxum & vomitum.

Sorba matura seu fracidâ nimis astringunt, & alimenti loco edi possunt in quibus alvus laxior. Amatis aded parùm astringere ait, ut merito non constringere aut constipare sint dicenda. Minus constringere quam *Mespala* concedimus, non tamen proflus non constringere.

Extrinsicis vulnera constringit pulvis exsiccorum.

Ligni materies solidissima est ac compacta, ideòque ad mensas parandas lignarius fabris expetitur, quemadmodum & virgæ à bibulcis ad stimulos parandos. *Matth.*

- A. 2. *Sorbus sylvestris folia domestica simili* C. B. *Sylv. sive Fraxinus bubula* Ger. *aucuparia* J. B. *Ornus sive Fraxinus sylvestris* Park. *Quicken-tree*.

F. B.

Arbor est mediocris, humilior plerumque, stipite recto, ramofo, quem cortex tegit spadiceus, punctis notatus, cui alius subjacet luteus, putidus, amarus, [cortice fulco instar *Alni. Logd.*] *Folia* pinnatim digesta, Sorbi domestica majora, quatenus observare licuit, eodem modo serrata, acutiora, rigida, non tomentosa aut pilosa ut illa, sed glabra, supra virentia, infra candicantia: Hæc ita variè ludunt, ut aliquando diversas existimaverimus plantas, donec in eadem arbore diversitas nobis agnita. Sunt enim ei interdum folia nonnihil utrinque hirsuta, & utrinque ejusdem coloris ferè, mollia, profundius incisa, potissimum in arbusculis adolescentibus, sapore amaricante. *Florès* umbellatim coherent multi, candidi, odori: quibus succedunt *baccæ*, acinus Sambuci aquaticæ pares, ex flavo miniatæ, sapore acido insuavi, in quibus *semina* aliquot oblonga. Oculi satis magni, longi, atro-purpurei, quorum squamis intertexta est incana lanugo.

Sorbum aucupariam vocitavimus quod ad aucupia conferat, illicientis avibus.

In montosis & uliginosis oritur, in Wallia & Septentrionalibus Angliæ plurima.

Aucupes Germani fructu ejus avibus insidiantur; Baccæ enim ejus à Merulis, Turdis & ejusmodi avibus magnopere appetuntur. Sapore sunt nauseoso & ingrato, ut non solum gustantem capere frontem cogant, sed si plures edantur vomitum etiam cieant.

D. Needhamus Medicus insignis & vetus Amicus noster Baccas succum acidum hydragogum egregium præbere ait, itémque Scorbuto sanando aptum, Wallis in frequenti usu, ubi vice diætæ purgantibus quotannis exhibetur.

Liquor ille qui verno tempore è vulnere insiccto extillat assidue potus ad Scorbuticos & Spleneticos affectus à nonnullis commendatur. Verùm ex conjectura potiùs opinor quam experientiâ.

Nobis enim arbor vulnerata lachrymam nunquam fudit. Fortè non adeo hæctenus felices fuimus ut eam horâ opportuna feriremus.

C A P. VI.

De Mespilo folio laciniato.

Hæc duplex est vel major non spinosa *Cratægus Theophrasti*, & *Sorbus torminalis* Plinii credita; vel minor & spinosa, eaque iterum duplex vel mitior, fructu majore, *Mespilus Aromia* dicta, vel spinosior, fructu minore quam *Oxyacantham* vocant.

- A. 1. *Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, sive Sorbus torminalis* C. B. *Sorbus torminalis* Ger. *torminalis sive vulgaris* Park. *torminalis & Cratægus Theophrasti* J. B. *The common Service-tree, or Sorb.*

F. B.

Figurâ differt à vulgari Sorbo. siquidem *folia* Sambuci aquaticæ folia æmulantur; acutiùs tamen & argutiùs incisa atq. serrata, pedis anserini forma, excurrente in singulos angulos nervo, utrinque pæne glabra, potissimum Autumno; apparent tamen pili in pediculis uncialibus & fescuncialibus, sapore subastringente, situ alterno singularia.

Florum dispositio quæ in vulgari: hi ex pallido candidi [Cordo favacei, candidi] quibus succedunt *fructus* rotundi [non rarò pyriformes] umbilicati, quales *Oxyacanthæ* vulgaris, coloris ferruginei, punctulis albis notati; cum sunt molles, saporis primum austeri, tandem ubi mollescunt aciduli, grati: in quibus callus, vel crusta bina vel terna *semina* continens, Pyri seminibus similia, minora, pæne triangula, coloris ferè castaneæ, nonnihil subaustera, modullâ albâ. *Cortice* teguntur rami spadiceo subluteove, astringente, amaricante; caudex verò albicante, lævi. Excrescit in magnitudinem & staturam Pyri æmulam. Materies alba, duræque. Oculi imbricatas conorum scandulas imitantur, rotundi ferè, non acuti ut in Sorbo Alpina.

Nos cum J. Bauhino & aliis putamus hanc arborem esse *Cratægum Theophr.* & Sorbum quartum seu torminalem *Plin.* nam descriptiones ei conveniunt.

Fructus maturi & jam fracidi eam acerbiteriam quam cruda habebant ex parte deponunt, & sub-acidum acquirunt, nec injucundum saporem, relicta tamen etiamnum aliqua acerbiteria in callo qui eis inest. Alvim astringunt sicut *Mespila*, eis tanquam singulari & præsentî remedio contra tormina [dysenteriam] utuntur qui *Harcynios* montes accolunt rusticis, ut testatur *Cordus*. *Matthioli* eandem etiam eis vim tribuit; quam incisè nos quoque in parte experti sumus.

Rob. Sorbi, speciatim torminalis est nobile specificum in diarrhœis epidemicis, item in diuturnis, quæ ab usu fructuum horariorum superveniunt. *Etmüller* cap. de Diarrhœa. Communicavit *D. Hulfe*.

Eadem omnia possunt quæ Sorba domestica sed inefficaciùs, eodem autem; imò, meo iudice, efficacius, certè febricitantibus aptiora sunt cum refrigerent non minus quam astringunt.

Locis sylvestribus & in levis proveniunt frequentes apud nos in Anglia, nec minus in transmarinis regionibus. Fructus ubi molles satis suaves sunt & gustu grati, pueris & mulierculis expeditus eibus.

Scribit J. Bauhinus, In Comitatu Montbelgardico fusos ex ligno parari optimos, & arbores in eum usum conquiri.

2. *Mespilus folio laciniato spinosa fructu majore esculento.*

Mespilus Aromia Ger. *Aromia Veterum* J. B. *Aromia sive Neapolitana* Park. *Api folio laciniato* C. B. *Lazarole* Italis.

J. B.

Folius ad Spinum album accedit, sunt ea tamen majora, crassiora, in tria plerumque segmenta primaria divisa, aliquando in plura, profunda, altioribus incisuris & rarioribus subdivisa quam ut serrata dici possint. Rami & folia nonnihil pilosa sunt, magis tamen his illi. *Fructum* fert roccundum, rubrum, umbilicatum, Mespilo vulgari minorem, in quo nuclei terni, Cerasi nuclei paulo majores, triquetri, duriusculi, oblongi. *Flores* albi.

Arbor hoc adeo similis est Oxyacanthæ vulgari, ut sola fere foliorum fructisque, magnitudine, hujus etiam sapore suavi acido & grato differre nobis visa est. Spinosa est, sed ubi magis domestica spinis caret, etiam Theophrasto monente. C. B.

Locus.

In sylvâ Valena propè Monspelium provenire eam scribit Lobelius *Adv.* & D. Magnol confirmat, qui ex vicinis pagis, Septembri mense, fructus copiose Monspelium deserti scribit, qui saccharo conditi stomacho grati sunt, alvumque constringunt.

Usus.

Fructus maturi ab Italis pro deliciis crudi appetuntur in cibus: nec tantum crudi sed etiam saccharo conditi & asservati eduntur. *Lazarole* autem Italici dicti sunt ab Arabico *Alzaror*. Nobis certe crudi grata aciditate placent hi fructus, & Mespili delicatioris vili sunt, moderatè admodum astringunt, hisque qui alvo sunt laxiore cibus sunt utilissimus.

A. 3. *Mespilus Api folio sylvestris spinosa sive Oxyacantha* C. B.

Oxyacantha Ger. *Oxyacantha vulgaris sive spinus albus* J. B. *Spina Appendix vulgaris* Park. *The White thorn, or Hawthorn.*

J. B.

Firma est siquæ alia materies Oxyacanthæ vulgaris. *Caudex* mediocriter crassus, & ramis lentis firmisque, operi topiario maximè idoneis brachiatus. Spinis horret rigidis & acutis, multò etiam ligno durioribus. *Cortex* furculorum juniorum rubet, adultiorum cinerascit. *Folia* Api seu Mespili Aromia, gustu viscido. *Flores* odoratissimi, consortem nascuntur ex sesquinnialibus fere pediculis, albi, pentapetali, apicibus ut in Pyro rubentibus. *Bacca* per maturitatem rubra, velut ex umbella pendet, Myrti baccis majores, umbilico nigro, pulpâ glutinosâ paucâ, molli ac subdulci, singula officulum continentes unum vel duo. Unum si fuerit rotundum, at si duo, per medium divisa globulum efficiunt, & interna parte quâ committuntur caveolam ostendunt incurvam. Durissima sunt & propemodum ossæ. Ramiis tria in una bacca inventantur. Variant & figura, sed communissima orbicularis.

Marum Parkinsonum nostrum Tragum & alios secutum fructum exiguis nucleis, aspera candidaque lanugine involutis retortum scribere. Hoc in Rôla sylv. fructu deprehenditur, non in Oxyacanthæ.

Locus & Tempus.

In sepibus passim provenit, tam in frigidis quam calidioribus regionibus, nec ullum fore solum aut celum refugit. Maio mense floret. Fructus Septembris maturefcit, & in multam hyemem ramis foliis jam viduis pertinaciter adhærescens cernitur.

Arbustula hæc ad vivas sepes commodissima est, 1. Ob densitatem ramorum & acutissimas spinas, tam quod frigoris patientissima sit, tum denique quod radice non reperit, adeoque nec solum late occupat, & quotidianam agricolæ molestiam creat Pruni sylvestris modo. Est insuper ad sepes totiles & opera topiaria præ aliis opportuna.

Flores odoris suavitate commendantur; quamvis nonnulli odorem eorundem minus salubrem existiment nescio quo experimento.

Virtus.

Quæ de hujus fructu viribus tradunt Tragus, Matthiolus, Schwencfeldius, quod scilicet astringit & omnes generis fluxus sistit non probat J. Bauhinus, nec enim subausteria est (ut vult Lobelius) sed gustu aliquantulum glutinosus & dulcis: At neque contra assentitur Angullaræ eam ventrem laticicare & fluxus provocare. Nec tamen negat aquam ex floribus pleuricis utilem esse posse, aut calculosis prodesse. Certe fructus vel aquam destillatam, vel ficcati pulverem, vel infusum in vino conferre adversis arenulas & calculum consentiunt Botanici.

Quamvis Oxyacantha frutex potius quam arbor censenda sit, cum fructu modum plerumque non excedat, commodum tamen locum nata, si permittatur, in proceram & justæ magnitudinis arborem adolescit.

Parkinsonus duas adhuc alias Oxyacanthæ species seu varietates producit.

Spina acuta humilis.

1. Primam è Dodonæo. Spinam acutam humiliorem, cupa folia angustiora sed oblonga: Bacca læteo Croci colore rubentes: Spina ipsa humilis est, nec ita facile arborefcit, rara quoque & in paucorum tantummodo hortu apud Belgas reperitur. *Dod.*

2. Secundam vocat Spinam bifloram Britannicam, quæ quotannis circa natalitia Christi Domini floret, paulò serius citiusve pro hyemis temperie, quibus etiam succedunt bacce antequam folia erumpunt: neruntq; usitato tempore, Maio viz. mense, denso floret, adeo ut fructus virides simul & maturus eodem tempore habere conspiciatur. Hujus Generis arbor habetur propè Glasfenburiam Somerseti oppidum, *Spina Christi* dici solita, altera reperitur in paludis Romanensis vico *High Street* dicto. Nos tamen fruticem hunc à vulgari Oxyacantha non differre specie existimamus: sed vel casu, talem initio existisse, vel arte aliqua tactum. Solo enim hoc accidente à vulgari discrepat.

Frutex hic Oxyacantha Theophrasti esse non potest: cum folio sit deciduo, nec Spinæ Mali Medicæ similes habeat: at descriptio Oxyacanthæ apud Dioscoridem ei satis aptè convenit. Mespili tertium

tertium genus Plinii videtur C. B. qui eum rectè Mespilis annumerat: Siquidem Mespilo Aronice dicte adeo similis est ut fructus magnitudine & sapore tantum differre videatur.

Materie ejus (inquit J. Bauhinus) nihil magis expetitur ad tornum, propter duram & firmam atque tenacem ejus æquabilitatem, quæ proximè ad Buxum accedit.

Oxyacanthum baccis albis in Agro Oxon. crescere affirmat D. Plot.

CAP. VII.

Sorbo affines foliis integris.

- A. 1. *Sorbus Alpina* J. B. *Sylvestris Aria Theophrasti dilla Park. Aria Theophrasti* Ger. *Alni effigie lanato folio major* C. B. *The white Beam-tree.*

FRigidi caeli amafia egregiè adolescit recto & robusto caudice, atq. cortice rubente, potissimum extremorum ramorum, materie alba & firma. Oculi primum emergunt sublucè, acuti, squamati cum fimbria nigricante. *Folia* Alni ex oblongo rotundata, rugosa, prona parte incana, supernè viridia, serrata, sapore adstringenti, multis nervis parallelis hinc inde à costa media ad latera excurrentibus, pediculis brevibus, lanuginosis. *Floras* conferti Sorbi torminalis modo, umbelle quodammodo instar, [tetrapetali *Park.*] candidi, odorati: quibus succedunt Poma parva, Avellanâ minora, rubra, pauca quadam lanugine obducta, umbilicata, pulpi luteolâ, sapore acerbo primum, quæ tamen mollia reddita gratiore sapore incipiunt commendari; in quibus *semina* aliquot spadicæ, Pyri ferè, minora, medullâ albâ, eodem pene sapore, cortice quodam duriculo obtecta, ut in Sorbo torminali.

Non placet J. Bauhino hanc arborem pro Aria Theophrasti sumi, quæ eadem videtur Phelodry.

Gaudet præaltis & frigidis montibus, iisdemq. sylvosis. In montibus sylvosis & petrosis in Anglia *Locu.* frequens occurrit, præsertim in Occidentalibus Insulæ partibus.

Fructus non ingrati sunt, nec perinde adstringentes ut Sorbi torminalis, unde rustici in Burgundia eis avidè vescuntur ubi molles evaserint, & ad hyemem. Fugaces enim non sunt si bene asserventur. Tussis non aliter quàm Ziziphi bæccæ leniunt, & spiritum adjuvant.

E ligno firmi & solidi fiunt baculi, item carbones qui diu retinent ignem.

- A. 2. *Sorbus sylvestris Anglica* Park. *Red Chest-apples, or English wild Service.*

Fruticis modum & staturam non excedit, stipite & ramis incano seu cinerascete cortice testis; *foliis* latè ad Viburni accedentibus, per oras minime incisè aut dentatis; floribus coloris mulcosi obsoleti, quibus succedunt fructus Pyri sylvestris magnitudine, exterius rubente, saporis acerbi Sorborum immaturorum. A rusticis tamen matura, meliorum fructuum inopiâ non rarè comeduntur, postquam enim decerpta & aliquandiu reposita fuerint mitiora evadunt.

In agro Westmorlandico nasci dicitur.

Suspicitur D. *Tancredus Robinson* hanc sorbum esse sorbum pyriformem *Lobel.* observatam in agris Worcesterensibus & Staffordiensibus à D. *Put.* & D. *Plot.* vel sorbum pyriformem horum Autorum esse sativam C. B. superius descriptam, quam Angliæ Indigenam esse denegavimus.

Clarissimus *Hermannus* in Catalogo Hort. Leyden. aliam speciem recenset sub nomine Sorbi Virginianæ foliis Arbuti Brey. item Botitius sorbi, seu potius Corni Javanensis speciem. Idem *Hermannus* habet Mespilum spinosam sive Oxyacantham maximam Virginianam; & Mespilum spinosam sive Oxyacantham Virginianam nigram; Vide ejus excellentissimum Catalogum Hort. Lugduno Bat. An. 1686. edit.

3. *Pyracantha* Park. *Pyrac. quibusdam* J. B. *Oxyacantha Theophrasti* Ger. *Oxyacantha Dioscoridis sive Spina acuta Pyri folio* C. B. *Ever-green Thorn.*

J. B.

Frutex est spinosus, cortice nigricante testus, cujus per ramos aculei, alii unciam longi, alii breviores, sursum ferè spectantes, rigidi; *Folia* juxta aculeos, Arbuti foliis quodammodo similia, alia sessilibus longiora, alia unciam longa aut breviora, semunciam aut unciam lata, leviter acuminata, quædam rotunda, pulchrè per ambitum serrata, glabra, potissimum inferiora, siquidem superiora interdum nonnihil lanuginosa sunt, nitore illo, quem superna facie ostendant inferiora, destituta ferè. *Floras* pentapetali acervatim congesti ex luteo rubentes. Fructus Oxyacanthæ vulgaris persimilis ex aureo colore ad coccineam vergit, densius & velut racematim coacervatus, acidi gustû grana aliquot continens, Parkinsono granula quatuor vel quinque, ex luteo albicansia, triangula, nonnihil splendens.

In Gallo-provinciæ & Italiæ sepius visitur sed non ita frequens *Lob.* Nascitur etiam in Alpina *Locu.* rum gentium Bramovicum & Ebrodanensium saxosis convallibus, maxime quæ torrentes præcipiti cursu vicinas terras glareâ & arenis obruunt.

Quamvis Bauhinus uterq. hanc Dioscoridis Oxyacantham esse velit: nobis tamen potior videtur sententia Parkinsoni Oxyacantham Dioscoridis nostram esse Spinam albam: siquidem Dioscorides Mespilum Aroniam Oxyacanthæ folio (quamvis alii Pyracanthæ legant) esse tradit: Mespilis autem Aronia seu Anthedon Theophrasti Apu folio est, quæ quidem figura Spinæ albæ foliis convenit, non autem Pyracanthæ vulg.

CAP. VIII.

De Mespilo foliis integris & congenitis.

1. *Mespilus vulgaris* J. B. *vulgaris* sive *minor* Park. *Germanica folio Laurino non serrato*, sive *Mespilus sylvestris* C. B. *The Medlar Tree*.

Parva est arbor, foliis quam Pomi longioribus, angustioribus, Laurinis ferè paribus [Matthiolo Ceraforum] internè incana lanugine pubescentibus, supernè quoq; nonnihil pilosis, sed saturatiùs virentibus, aliàs serratis, aliàs non serratis. *Flores* singulatim nascuntur candidi seu dilutè rubentes [quinq; petalis amplis, obtusis, in medio bifidis compositi] Cotonæ mali: quibus succedunt poma exigua, fulva, perquam acerbi saporis, Pyris sylvestribus paria, hirsuta, ex angusto principio in umbilicum latum excavatumque delincentia; ex cujus supercilio emicant quina folia oblonga, angusta, acuminata, que florem antea tegebant. In singulis autem pomis quina ferè officula, compressa, triangula. Caro dura, alba, adstringens valde: que tamen fracida reddita acidulum suavemq; acquirere saporem, & mensis secundis instruendis inservit.

Luce.

Passim hodie colitur in hortis & viridariis Germaniæ, Italiæ, Galliæ & Angliæ. In Germania etiam spontè provenit: v. g. inter Argentinam & Badenses thermas in sylvis. Quæ non infitz sunt, spinosæ ferè sunt & parvos edunt fructus: Sed major, & præstantior nonnisi culturâ comparatur: inferiturque aptè Pyro Sylvestri aut Spino albo. Floret Aprilis & Maio. Fructum perficit Septembris fine aut etiam tardiùs.

C. Bauhinus etimque secutus Parkinsonus quatuor genera distinguunt.

1. *Mespilus Germanica folio Laurino non serrato*, sive *Mespilus sylvestris* C. B. *Mespilus vulgaris* sive *minor* Park.

2. *Mespilus folio Laurino major* C. B. *maxima sativa* Park.

3. *Mespilus Italica folio laurino serrato* C. B. *minor folio serrato* Park. J. Bauhinus in *Mespilo* vulgari minore se utriusque generis folia, serrata & non serrata, observasse scribit.

4. *Mespilus fructu albo* C. B. *fructu albo magno* Park.

Vires.

Mespila ejusdem temperamenti sunt cum Sorbis, & ad eadem valent, vomitum, dysenteriam & omnes in genere alvi fluxus. Ventriculo noxia esse aiunt, præcipuè dum duriscula & acerba adhuc sunt; nam emollita & fracida facta adstringunt minùs. Si decocto immaturorum colluantur os & fauces, reprimit fluxiones in fauces, dentes atq; gingivas. Paratur quoq; ex *Mespilis* ficcis, succo rosarum, Caryophyllis, pauco Coralli & nuce Moschata cataplasma, quod applicatum regioni officii ventriculi potenter compescit vomitum ciborum. *Mespila* virid. in magna quantitate devorata multos diarrhæa pertinaci laborantes sanaverunt, aliis remediis nihil proficientibus. *Forsk.*

Folia similem cum fructibus vim obtinent.

Herbariorum plurimi officula in pulverem detrita tam ad renem quam ad vesicæ calculum contendendum & expellendum commendant. Nec Herbarii modò, sed & Practicorum pars major id faciunt & passim in suis libris calculosis præscribunt; atque ità quà primùm data porta est, ceu impetu quodam ruunt omnes, inquit J. Bauhinus, magno mehercle & artis & rationis ludibrio; qui adeo in strenuè se opponit, & multis probare nititur contrarium. Ipsum si placet consule.

2. *Chamaemispilus* J. B. *Cotonastr folio oblongo serrato* C. B. *Cotonastr Gesneri* Ger. *cinac.* *Append.*

Hanc ex ramo sicco sic describit J. Bauhinus. Rami crassiores fuere quam vel *Cotonastr*, vel *Diospyri*, cortice nigricante striato obducti. *Folia* plerunq; indidem plura oriuntur, non ut *Cotonastr* rotunda, sed oblonga, alia palmum longa, fuscunciam lata, alia fuscunciam aut unciam longa, semunciam lata, utralibet in acumen desinentia, per ambitum serrata, utrinque glabra, nervosa, atro-virentia, pediculo satis brevi hærentia. *Flores* densi velut in umbellam, Sorbi Alpinæ more digesti, pediculis lanuginosis, modò brevibus, modò longis, in extremis ramorum hærent: quibus *Fructus* succrescunt eodem dispositi ordine, Sorbi terminalis fructibus similes, oblongi, rubri, umbilico mediocri, in quibus grana continentur oblonga. Clusius plantæ quam *Cotonastrum Gesneri* putat flores purpurascetes, pentapetalos attribuit.

Luce.

Hunc fructem in summitate montis Juræ non longè à Geneva invenimus spontaneum: Clusius in Sualben jugis.

3. *Lata Guineæ, Mespilum, officulo lævi, spadicis colore* J. B. *Pyro similis ex Guineæ* C. B. *Claf. exot.*

Hujus officulum à *Mespili* forma non erat valdè ab simile, præsertim prægrandium *Mespilorum*, & læve, & spadicæ coloris, in medio nonnihil tumens, & paululum ab uno latere scabrum & subulatum. Fructus exigui Pyri est magnitudine, magis tamen rotundus, coloris ex aureo lævi, interdum etiam rubentis instar Pomi, tenui cortice præditus, qui detractus in tenuia stammina sili modo abest: Sapor cum dulcedine astringens, ità ut valdè refrigeret; unde Lusitani istic degentes in febribus ardentibus exubebant. Pulpa ipsa coloris aurei saturi ad rubrum inclinantis, lenta nonnihil & viscida. Singuli autem fructus quina semina surrocta continent, quemadmodum *Mespila*, cujus separatim tenui involucre testæ, Serico crudo candido simili. Arbor *Pyro* similis est, humanam tamen altitudinem non superans, cujus folia ex atro viridia sunt, & Pyri folia magis orbiculata.

+ *Mespila*

4. *Mespilo similis fructus Americanus* J. B. *Mespilo similis fructus venenatus* C. B.

Observavit Lærius in Brasilia in maris ripa multas arbusculas fructus ferentes Mespilis nostris similes, quorum efus perniciosissimus. Sylvestres si videant Gallos & alios peregrinos monent ut hos fructus vitent, dicentes *Tpuebi*, id est, non sunt boni.

5. *Mespilo non valdè absimilis fructus officulis spadiceo coloris splendidibus* J. B. *Fructus* 3. cap. 14. l. 2. *Exot. Clus.*

Clus.

Mespilo Setanio non erat valdè absimilis, ejusdemque penè magnitudinis, capitè tamen non planè ut illud, sed in angustum contracto, vetustate rugas contraxerat, & satis fragili cute constabat, fusco, nullus ferè saporis, qui tamen ore retentus nonnihil adstrictionis cum pauca acrimonia conjuncta possidere videbatur: quina introsum officula Mespili instar continebat, majora autem & non rugosa ut illa, sed valdè levia & splendida, spadiceique coloris & nucleum continentia.

6. *Mespilo valdè similis fructus sine granis* J. B. *Mespilo similis fructus fuscus* C. B. *Fructus octavius ex navigat. Batav. Clus. Exot. l. 2. c. 15.*

Mespilo valdè similis erat, uncialis magnitudinis, tertius ac pòlmus, fusci coloris, adeò autem fragilis ut paulatim compressis difrumperetur, valdè levis, materiam continens fragilem & spongiosam, valdè salsi saporis, in qua nulla grana observare potuit Clusius. Corona autem illa superna summum fructum occupans alis carebat, quibus Mespilum est præditum.

C A P. IX.

Diospyrus J. B. *Alni effigie lanato folio minor* C. B. *Vitu ldea tertia Clusii Park. Vaccinia alba* Ger. *Amelanchier* Lob. *Pyrus cervina* Italis.

J. B.

PUlcher est frutex, & qui multos à radice statim stiones edat, homine etiam proceriores, eòsq; etiam ramosos, cortice introctos spadiceo. *Folia* primo pullulati plura simul ex oculis proveniunt, incana lanugine sobens pubescencia, superne viridia, quæ adultiora decussa penitus lanugine utroque glabea sunt, Pter foliis similia, magnitudine varia, unciam aut sexunciam longa, latitudine semunciali, aut etiam plusquam unciali, per extremum rotunda, circumquaque crenata, pulchris frequentioribus nervis obliquis à medio recto donata. *Flores* inter lanuginosorum foliorum rudimenta orientur plures juncti, candidi, è quinque foliolis longiusculis compositi, inodori ferè, quos *baccæ* excipiunt violaceæ vel nigre, umbilicate, quinque lacinis coronatæ; sapore dulci, suavi, in quibus *semina* plura, [dena & interdum plura *Clus.*] oblonga, nigricantia, Pyrorum seminibus similia. Fructus Gesnero Cerasi est magnitudine & figura: At baccæ Myrto potius similes sunt quam Ceraso, & umbilicate.

Variat foliis obtusis & acutis.

Locus montanis, præruptis & saxosis potissimum gaudet. Sic Helveticis, Austriacis, Sabaudicis, ac *Loen* Burgundicis, aliisque montosis variarum regionum provenire solet. Nos in montibus circa Genèvam, inque lateribus montium Rheno adjacentium observavimus copiosam. Suavis est opis fructus, atque ita aptus stomacho ut qui copiosè etiam ingesserit non gravetur, ut testatur Gesnerus.

C A P. X.

De Malo Punica.

Malus Punica, Græcis *Ῥαδ*, Dioscoridi & Theophrasto *Ῥαδ*, quo nomine & fructus donatur. Flores sativæ Punicæ *Ῥαδ* dicuntur Dioscoridi l. 1. cap. 152. & Gal. 6. Simpl. At Gal. 6. *Ῥαδ* *Ῥαδ*. Cytinus fructus rudimentum est, quod deciduo flore primùm apparet & formatur. Et Plinio l. 23. c. 6. Primus hujus pomi partus florere incipientis Cytinus vocatur Græcis: & in hoc ipso Cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quæ Balauſtia vocari diximus. Verùm *Ῥαδ* sylvestris Punicæ flos est Dioscoridi l. 1. c. 154. Officinæ Plinium sequuntur, & Punicæ tam Sativæ quàm Sylvestris flores citra distinctionem Balauſtia vocant, quibus Cytinorum appellatio de sativis ignota est. Cytinus Theophrasto Calyx est floris, quo flos continetur: adeo ut Cytini significatio apud Græcos ambigua sit.

Mali Punici potamen, quòd tanquam corium fit, cortice durius, nucis involucro tenerius Malicoenum vocant, quòd Græcis nunc *Ῥαδ*, Dioscoride monente, nunc *Ῥαδ* *Ῥαδ*, vel *Ῥαδ*, i. e. docorticare dicitur. Plinius l. c. vulgus ex Punicis acerbis coria perficere novit, ob id Malicoenum appellant medici. C. B.

Malum Punicum à Carthagine, ubi laudatissimum proveniat, nomen accepisse volunt, à Granis verò quæ intus continentur Granatum, non à Granata Hispaniæ regione, ut nonnullis videtur, contemnam ante Ciceronis & Varronis tempora ita fuerit nuncupatum. J. B.

1. *Malus Punica* J. B. *Punica sativa* C. B. *Paré*. *Granata sive Punica* Ger. *The Pomegranate-tree*.

J. B.

Humilis & haud magna arbor vel potius frutex est, ut recte J. Bodæus, quamvis interdum culta, stolonibus abscessis in iustam etiam arborem crescat, ramis tenuibus, angulosis brachiatis, quos armant spinæ rigide aliquot, oblongæ, subrectæ, cortex obducit rubescens. In his folia incondita, Myrti vulgaris æmula [vel oleæ] vel etiam majora, non ita acuta, ex viridi in levem quandam rubedinem vergentia. [J. Bodæo rufi viroris, pediculis annexa rubentibus, rubrisque intercursantibus venulis prædita] averfa parte nervosa, odore gravi, præsertim si manibus contractata naribus admoveantur, [J. Bodæo canum halitum, felisumque urine graveolentiam aliquo modo referentia.]

Ex ramorum lateribus flores emicant punicei, pentapetali, quorum medium occupant complura *stamina* cum suis *apicibus*, cythino infidentia sive calyci, qui puniceo etiam colore fulget, uncia longior, corticosus in plures lacinias mucronatas, totidem scilicet quot flori folia, facessens, quæ umbilicum postea Pomi succedentis coronant. Est autem Pomo magnitudo varia, omni fere amplâ, & maximis Malis æqualis, rotunda fere, nisi quod utrinque leviter compressa. Cortex modicoior crassius, duriusculus, fragilis tamen, ante maturitatem viridis ac levis, post puniceus & rugosus, qui tandem etiam ad spadiceum accedit, Intus luteus, gustu adstringens, numerosis acinis plenus, visio abundanti ebriis, dulci aliâs, aliâs acido, interdum medio, favorem modo dispositis, carnosus membranisque disseptis, seu parietibus intergerinis, circumceptis, amaris, modò candidis, modò purpurascens; ipsi verò granis gigartorum vis limibibus, quæ constant ligneo cortice & nucleo amaro, non tamen sine adstractione.

Reperitur singulare quoddam lupus Mali genus, quod nullum in acinis semen continet: Verùm hoc accidentarium est, & ex lulu quodam nature.

Distinguantur Mala Punica saporum respectu in dulcia, acida & vinosa, seu in dulcia, vinosa & media: quæ genera aliter etiam distinguuntur, ut v. g. magnitudine: Dulcia enim sunt multò majora & speciosiora, & granis majoribus. Perhibentur etiam dulcia cæteris magis scabro esse cortice. *Aristoteles* dicuntur non quibus nulla inest granorum duritia, sed quibus minor.

Locus.

Amat hæc arbor solum cretosum, maculentum, sed in pingui quoque provenit. In calidis Meridicem versus regionibus sponte exiit, velut in Gallia Narbonensi, Balearibus insulis, Italia & Hispania, ac præcipue in regno nunc appellato Granate; quæ à frequentia Malorum Punicarum nomen accepisse creditur. [In finibus Granate parçæ, quicquid scribat Matthioli; nam hac in parte majorem fidem habentis Lacunæ Hispano. J. B.] In frigidioribus regionibus, ut Germania & Anglia in ortuolorum duntaxat hortis culta cernitur, ubi etiam hyeme curiose contegenda aut reponenda est, ne à frigore violatur. Et tamen umbras amare aiunt & rigationes.

Temperamentum & Virtus.

Poma omnia in genere censentur boni succi, ventriculo convenientia, sed pauci nutrimenti: omnia (autore Dioscoride) Venæ impetus excidunt, ea præcipue quæ frigida temperaturæ sunt, ut acida.

Dulcia eorum, syrupus exhibentur in tussi chronica & pleuritide: in febribus minus commoda sunt, quia inflationes, caloremque augent.

Acida frigida sunt & adstringentia: stomachica: unde eorum ut & syrupi ex iisdem confecti usus est ad itim, febres biliosas, gonorrhœam, picam gravidarum, oris putredinem & similes affectus.

Vinosa (acido-dulcia, Granata *mixta*) medice sunt nature inter dulcia & acida, cardiaca & cephalica Usus præcip. in Syncope, vertigine, &c. Ex malis hæc ad usus supradictos succus exprimitur & fermentatus deparatusque, vinum dicitur.

Varios modos parandi vinum Granatorum vide apud J. Bauhinum. Simplicissimus videtur sequens.

Acini maturi diligenter à cortice & membranis repurgati prælo committuntur ac exprimuntur, mox vinum saccum ad id accommodatis percolatur, & in vasculis id excipientibus desudare sinitur, defæcatum reponitur assulo oleo ne vappelcat aut acetat. Utilis est potus ad firmum febrientium extinguentiam.

Potest etiam ex succo expresso & defæcato, admixto saccharo, & decocto, deinde fermentato, parari vinum generosum & inebrians.

Flores, tam *Balaustia*, quam *Cyini*, nature sunt terrestris & valde adstringentis, unde creberrimus eorum usus esse solet in omni genere fluxionibus, v. g. diarrhoea, dysenteria, fluxu uterino, &c. Extrinsecus in pulverem trita & inspersa intertriginibus aliisque ulceribus celestissime ad cicatricem absque erosione producant: sanant etiam omnia ulcera, rossillas, uvulam, &c. in collutionibus. Scorpionibus etiam adversari dicuntur.

Cortex (*malicorium*, *psidium*) ejusdem nature cum floribus est; Utilis etiam ad coria preparanda, & ad atramentum vice gallarum. Addit Constantinus, Malicorium vino decoctum & potum omnes ventris tinea necare, maxime eas quas *Ascarias* vocant.

Nuclei iisdem refrigerant, astringuntque, imprimis qui ex pomis acidis collecti. Breviter flores, cortex, nuclei [adde & folia] ad ea conducunt quibuscumque, adstrictione opus est.

Ex Malis Punicis confusis cum suis corticibus exprimitur succus qui purgat bilem flavam, ut scribit Celsaplinus. Hoc de Punicis dulcibus accipit J. Bauhinus, & corticis amaritudini tribuendum censet.

2. *Malus Punica sylvestris* C. B. *Ger. agrifol* J. B. *The wild Pomegranate*.

Domestice & cultæ per omnia similis est, asperior tamen & spinosior.

Passim hæc sua sponte luxurians in sepibus Narbonensibus. Nobis non videtur specie differre à *Malis*

3. *Malum Punica sylvestris major, seu Balauſium majus* Park. *Balauſium flore pleno majus* C. B. *Balauſtia Hispanica* J. B. *Balauſtia* Ger.

7. R.

Balauſtia flores sunt ampli, Punice cujusdam sylv. densissimo foliorum purpurascensium factu stipati, gustu adstringentes, non Cytino oblongo ut in sativa pomifera Punica seu simplici, seu multiplici flore, (qualis nonnunquam reperitur) sed compresso, lato sessili, cui color ex flavo purpurascens, corum durum, lignosum, in lacinas quoque divisum. Adeo multiplici folio interdum constant, ut Rosæ videantur centifoliz colore saturato.

4. *Balauſium minus* Park. *Balauſtia flore pleno minus* C. B.

Folis atro-virentibus, calice crassiore, flore minore, tristiore, saturata purpura punicante à priori differt, inquit C. Bauhinus.

Cortex Granatorum menses movet, & febres intermittentes sepe fugat, ab experientia Tachenii; abundat enim quodam Alcali aperitivo, quod patet multis experimentis. D. T. R.

C A P. XI.

Malus Limenia Malabarica fructu umbilicato.

Katou-Naregam H. M. P. 4. T. 13.

H. M.

Arbor est procera, caudice crasso, candido, multisque ramis donato, qui cortice cinereo odorato obducti, ac fungosi intus medullâ referti, necnon spinis fulcis, nitentibus & aculeatis insuper muniti sunt.

Radix flavescens, fusco cortice tecta, amara, odorata.

Folia persimilia sunt foliis *Mal-Naregam*, præterquam quod nervuli è costa media exeuntes crassiores sint, & inferne magis emineant; quo fit ut in plicas ea ac rugas crispentur.

Flores plures simul juncti extremis furculis proveniunt, & calyci viridi in quinque laciniis acuminatis lecto inhxerent, viridi-flavescentes, odorati, subamari, quinque subrotundis foliolis constantes, *staminibus* candidis octo aut decem medium obsidentibus; inter quæ *stylus* prode exiguus, atidem albicans.

Fructus Limones pusilli sunt, tenuioribus sulcis striati, ac in vertice calyce florum surrocto coronati, atro-virides primùm, albis interstincti punctulis, dein aurei, cortice Limonum cortici haud ab simili cincti, carneque candida, acidi ac vinosi saporis, intus referti; intra quam numerosa continentur *semina* oblongo-rotunda, plana, candida & nitentia, duplici ordine locata, ac membranaceis quibusdam pelliculis seu parietibus intergerinis sejuncta, ita ut singula in singulis latent cellulis.

Crescit frequenter locis arenosis & petrosis circa *Parakari* & *Kaymaal* provincias Malabar; Semel *Loc.* in anno maturus fert fructus, mensibus viz. Decembri ac Januario.

Succus foliorum egregium capiti expurgando habetur erithinum. Idem cum Pipere longo, *Zinzi-Vin.* bere, & saccharo exhibitus tussim sedat, cæterisque pulmonis affectus è causa frigida natos potenter sanat. Insuper è foliis hisce in aqua cocta Balneum fit, quod lassitudinem, necnon artuum doloribus tollendis mirifice conducit.

C A P. XII.

De Ficu Indica Tuna dicta seu Opuntia.

Quamvis Frutex hic Theophrasti & Plinii Opuntia non sit, cum illa, ab Opunte oppido circa quam provenit nomen sortita, herbula sit non frutex nedum arbor, mentio tamen Opuntia Indica arborea, aut fruticosa dici possit, quia insigni proprietate è solo radices emitendi cum Opuntia Theophrasti convenit, nec alia quævis præter eam, quod hæctenus audivimus, arbor aut herba. Quinetiam Opuntiam hodie (ut puto) in Locride frustra quaesivimus.

Cum dico Tunam è foliis radices agere apparentiam potius & opinionem vulgarem sequor, quam rei ipsius veritatem. Quæ enim folia videntur revera non sunt sed potius rami. Nam, 1. Folia non germinant, aliisque ex se folia emittunt, sed rami. 2. Folia intra annum saltem spatium in justam magnitudinem extensa postea non augmentur. In hac autem stirpe quæ dicuntur folia quotannis augmentur & incrementum capiunt, & in nonnullis speciebus lignescunt. 3. Addit Gul. Piso, Folia contigua tantum esse arbori, è contra omne quod rami vicem subit continuum: Se autem in quibusdam Ficibus dissectis radices immediate continuatas vidisse frondi. Tandem, 4. Folia plerisque omnibus plantis, etiam semper virentibus, tandem decidunt; at in hac proprie loquendo perpetua sunt. Verum argumentum hoc non concludit quoniam dantur nonnullæ v.g. epiphyllispermæ in quibus folia durant quandiu caules: ut neq. quod hæc fructum è foliis dictis emitat; nam epiphyllispermæ quoque idem faciunt.

Forma tamen externa lata & compressa cum foliis conveniunt, & à ramis differunt, quæ in omnibus aliis stirpibus teretes sunt.

Dicitur autem hic frutex Botanicis Ficus Indica, ob aliqualem fructus cum Fico similitudinem.

1. *Ficus Indica major Park. Indica Ger. Indica folio spinoso, fructu majore C. B. Opuntia vulgæ Herbariorum J. B. The Prickly Pear tree.*

In magnum interdum evadit fruticem, cui folia magna, longitudine nonnunquam plusquam pedali, latitudine sesquipalmari, ex oblongo rotundata, pollicem crassa, infima etiam multò crassiora durioraq; supremis, foris membranâ tecta, plurimis tuberculis asperata, è quibus spinule albae, acutae, facillè contractanti adherentes, insitòq; aculeo stationem nativam deserentes, succo intus turgentia, colore herbaceo, tactu viscido, salivoso, qui exsiccatus granulosis arenæ tenuissimè instar attritu digitorum resolvitur, per quem discurrunt nervorum plurimorum mediocriter crassorum reticulati plexus; atque hæc quidem folia ex aliis foliis sicando connexu succrescunt, quibus etiam plurimum pro caudice utitur & in brachia diducitur. Posthæc cum tempore incrassantur magis, & sunt rotundiora, imò ligneam tandem substantiam acquirunt, præsertim inferiora, tùm & spinas magna ex parte amittunt. Femora crassitè interdum acquirunt, ut nos in Sicilia observavimus. Foliorum pinnis insident fructuum rudimenta multa, similiter spinosa, è quorum umbilico flores emicant, calathi Balansthæ quadantenus effigie, succulentiore magnitudine, multi, lutei, multis foliis ungue latioribus, Rosarum foliis similibus constantes; quibus marcescentibus fructus maturatur, Ficum magnam adæquans, superne umbilicatus, pulpâ sanguineo colore manus tingente infectâ, gustu subdulci, sed quàm Ficum insuaviore, granulis tactâ Lentis fere magnitudine, sed sinuatis & inæquali ambitu donatis, isdemq; concoloribus in sinu. Gesnerus in fructu gravem quendam odorem esse annotat.

Cùm primùm exit hæc planta foliola duo emittit crassa, succulenta [aliquod Sedi genus emergere dices] macronata, è quorum sinu conjugali ceu pili quidam candicantes & purpurantes, futurarum spinularum primoordia simul exserunt, quos non multò post folium sequitur isdem vestitum & hirsutum totum, nec latum sed teres fere, quod tamen temporis progressu paulatim in latitudinem comprimitur, fiuntque aculei cum tempore etiam durusculi. Radicula novella plantæ simplex & albicans est.

Exstillat & gummi hæc arbor, Succino sivo colore & substantia, si duritiam eximas lapidosam, admodum simile, & glebulis concretum, & Tragacanthæ fere in modum vermicularum, adeò durum, ut dentibus comminuerè vix sit. Candelæ admodum flammam non concipit, sed comburitur, nec tamen ullam odoris spirat fragrantiam, masticam quoq; nullum saporem effatu dignum exhibet.

Læta. In omnibus fere Americæ provinciis & insulis, exceptis maximè Borealibus, provenit. In Europæ etiam calidioribus regionibus facillè comprehendit & in magnitudinem proficit. Vidit Camerarius Neapoli altero tanto majorem quàm hominem, caudice duro & lignoso. Vidimus & nos Romæ in horto Pontificali Vaticano *Belvedere* dicto non minores.

Observavit D. *Tancredus Robinson* hanc ficum Indicam producere fructum maturum in Gallia Narbonensi, & Regno Neapolitano, ubi instar sylvestris plantæ loci Indigenæ ad vias, latera montium, & inter scopulos copiosè crevit.

Cultura. Tam vivax est hæc planta, ut cum seminulo lato, tum folio humi medio tenui defosso crescat facillime. Frigoris impatiens est, ideòque hyeme reponenda, antem & loca nimis occulta odit. Humore nimio corrumpitur & putrescit: ideòque ab Autumnalibus imbribus & quæ verno tempore cadunt peræpe leditur.

Multæ hujus fruticis species in America reperiuntur.

In Mexicana provincia *Fr. Hernandez* observavit sequentes.

1. Prima, *Tebae-Nachtli* vocatur, quod albus fructus ejus sit: *Folia* fere rotunda, parva, levia rarissiq; horrentia aculeis: *Florem* luteam: Fructum spiniferum & candentem; & in fruticis attollitur magnitudinem.

2. Secunda, *Cae-Nachtli* dicitur, quòd pallentem proferat fructum. Foliis constat amplis, orbicularibus, multisq; & prolificis, horrentibus aculeis; *flore* coccineo, per extrema pallidè, & pomo luteo ac raro.

3. Tertia, *Atlatu-Nachtli*, seu Tuna ex albo in rufum colorem inclinans. Folia fere angusta, oblonga, impensè aculeata, & nonnihil purpurascèntia, quod est huic tantum generi peculiare, cum cæteris omnibus viridia sint: fructum non valdè spinosum: *florem* extra luteum, intra verò ipsius Tunæ colore.

4. Quarta, *Tlapalnachtli*, id est, coccineum. *Folia* fere tenuis, angusta & oblonga, sed breviora præcedentibus, ac minus spinosa; *florem* ex albo rubescèntem & parvum; pomum non adeò spinosum, sed coccineo flammatoque colore præditum.

5. Quinta, *Tzapnachtli*, ob similitudinem quam habet cum fructu Mexicanis dicto *Tzapoti*, folia fere squalentia, ovi figurâ, quibusdam horrentia spinis, & *flores* in his luteos ex albo in coccineum colorem vergentes.

6. *Cæca nachtli*, seu herbacea sylvestrisq; Tuna, in arboris magnitudinem attollitur, multis aliis concava est, foliisq; constans rotundis, parvis & spinosis, sylvestri fructu vix Juglandem nucem magnitudine superante, sed spinis horridiore & pallidis floribus.

7. Est & *Xacolonachtli*, simili formâ præcedenti sed tam foliis quàm fructu acida.

Sunt & alie præter dictas hujus fruticis seu species seu potius varietates, pro diversitate regionum in quibus oriuntur, quemadmodum apud nos Pyrorum & Ficum.

Ficus Indica lævis pilosa C. B. diversa species videtur. Hæc ex Creta nuda; eique duplex, altera folio rotundo, altera oblongo.

Ficus Indica humilis C. B. Ramis est reflexis, & veluti repentibus: flore magno luteo. An *Ficus Indica spinosa minor Park?* *Ficus Indica folio spinoso fructu minore C. B?*

Species illa quam primo loco descripsimus eadem est quæ in Insula Jamaica & Barbados, *The prickly Pear-tree*, id est, *Pyrus spinosa* dicitur, quæque in Europa frequentissima est, cujus fructus aliquot comesti rubro sanguineo colore unquam tingunt, ut aduicationi sit.

Tum fructus tum folia refrigerant & humectant, salivolaque sunt, quo fit ut eorum succus ex *Pires* pressus febres ardentis maxime extinguat, & sitim expleat. Grana sicca & adstringentia sunt: Hinc Poma cum granulis loco cibi sumpta alvum sistere dicuntur: gratum præbent alimentum refrigeransque, etsi flatuosum, & corruptioni obnoxium si largius sumantur, quemadmodum alii horum fructus, æstuantibus jucundissimum, Succus plantæ aut aqua stillantia admirabilis est adversus biliosas febres. Auxiliantur radices ejus cum Hieracii quadam specie Enterocelis, & Erysipelatis mediantur. Indi succo expresso pro aqua utuntur; & *D. Hughes* se fructibus hæc in insopiæ aquæ per sepe sitim sedasse refert.

Experientia constare aiunt folia eorumve succum vulnera recentia mirabiliter sanare. Tumores etiam & apostemata, quæ nautis plerumque accidere solent in Americam trajicientibus, potenter discutiunt. *D. Hughes* folia charta madefacta involuta, & sub cineribus tosta ejusmodi Apostematis cataplasmatibus formâ applicare solebat, successu supra spem & expectationem prospero, ut nullum vel præstantissimum medicamentum compositum ad hunc usum æquè commodum & proficuum fuerit.

Montanis magna ex parte in locis proveant referente Hernandez: at *Hugues* in depressis præcipue ad maris litus. Gummi plantæ renum & urinae calorem temperat. Locus.

Species illa Tunæ quæ vermiculos *Cochinille* dictos producit & alit *Nebetropalis*, seu *Nepal-wedzeli* Indis Mexicanis dicitur. *Hernand.* studiosè colitur, & à pecorum armentorumque injuriis diligenter defenditur. Interdum sponte naturæ, interdum hominum industriâ vermiculi hujus semina [superioris anni] seu ova tunis admoventur, quæ brevi animalcula excludunt, cum adoleverint & ab incolis extirpata fuerint Grana perperam dicta. Hæc toti Europæ inferuntur dissimulo commercio, quinque mille sexcentas septuaginta arrobas, anno 1587. una classe in Europam traductas refert *Acosta*. Curam & culturam grani tradit *Herrera* his verbis. Est illud [Granum dictum] vivum animalculum vel potius insectum, à cimice formâ non multum abluens, cum primum plantæ se applicat pulice paulo minus, è semine erumpit Acari magnitudine, & arborem integrum atque adeo totum hortum implet, & semel atque iterum quotannis colligitur. Arbores certo ordine instar Vitium disponunt, atque studiosè colunt, & repurgant à zizaniis: quo recentiores sunt plantæ eò copiosius & præstantius ferunt granam: inprimis autem necessarium est ut à variorum insectorum injuria defendantur, nec minus à gallinis quæ granum devorant. Uruntur vulpini caudis ad plantas detergendas, ne novella insectorum seminaria lædant: ubi autem jam satis adoleverunt, magnâ curâ eximuntur, nocanturque aquâ frigidâ aspersâ, atque in umbra ficantur & conduntur sicilibus. Eadem & cinere injecto enocant, deinde abluint, atque alii insuper modis suffocant, frigida tamen enocata ceteris præstant. plurimis modis granam à mercatoribus adulteratur. Optimum longè granum dat *Tlaxcalam*, cujus indigenæ præstantissimam tincturam ex illo conficiunt, hoc modo, Comminuunt & macerant in decocto alumini, & ubi refederit cogunt in tabellas, quas Hispani vocant *Grana en pan*.

Hanc Tunæ speciem describunt *Piso* & *Marggravius*, *Jamacaru V.* nomine.

Ad nos scriptit *D. Tancredus Robinson* Insectum illud, seu Vermiculum exiccatum *Cochinill* dictum & Ficum Indicam depascens, evadere Hexapoda, & proprie nominari posse *Scarabæum Mexicanum* punctatum seu maculatum nostratibus *Уадр-роу* dicto similem; cujus elegantem Iconem exhibuit ingeniosissimus vir *D. Edwardus Tyson* M.D. in *Philosoph. Transact.* N. 176.

2. Ficus Indica seu Tuna prima, seu *Jamacaru Brasiliensium prima* *Pisonis*.

Adeo inter se variant Ficus Indice Tunæ dicitur, pro natalis soli diversitate, ut nisi flore & fructu, tum interna qualitate convenire deprehenderentur, ad diversa genera pertinere viderentur.

Prima species Fruticibus aut arboribus adnascitur, tenues radices habens, quibus se illis inserit. Folia ejus crassa, solida, instar Aloes triangularia, vario modo sibi invicem opposita, ut in Ficu Indica. Folia viridis, turgentia succo viscido, sed insipido; in extremitatibus angularibus foliorum rudimenta fructuum sunt, & spinule acutæ juxta se posite quatuor cineræ.

Provenit in ejus summitate flos suavis odoris, ceterum Nymphææ majori similis, exterius constans multis foliis viridibus, angustis, oblongis, & in medio horum columna flava, rotunda, superius in multas partes diducta.

Fructus ovi figurâ est, & plus minus magnitudine, triangularibus eminentis conspicuus, cute tectus instar corticis Mali Aurantii, interne & externe colore elegantissimo cæca lactæ & cinnabru mixto. Caro interior alba, succulenta, saporosa, feminibus tigris, splendentibus referta, quæ simul cum pulpa comeduntur.

Præterquam quod ob delectabilem fructuum fragrantiam & ob succum ex acido dulcem, ab æstuantibus expetuntur, febricitantibus inprimis & biliosis conveniunt recentes, quod grato acore palatum afficiant, & sitim sedent, cor ac ventriculum mirè reficiunt. Succus denique ex hac planta extractus febribus ex bile ortu medetur.

3. *Jamacaru* seu Ficus Indica 2. *Pisonis*, prima *Marggrav.*

Frutex est arborecens, mediocri magnitudinis, caudex tereti, griseo & stellatis aculeis obfito: superiores rami dorsum propendent, quorum exortus sunt longi processus, teretes, stellati aculeati ut caudex. His ramis versus exteriora insident folia Tunæ modo, ovalia, compressa in ambitu aculeis singularim positis. In superficie utraq, foliorum eminent tubercula quædam: color autem ramorum illorum & foliorum viridis est. Fert florem albicantem, qui ex illis tuberculis foliorum enascitur.

sciur, & in multa staminula definit. *Fructus* haud multum à precedenti differt sed minor, ceterum gustu & dignitate illi par.

4. *Jamacaru* III. Pisonis 2. Marcgrav.

Arbor est magna & procera admodum, *Casaba* etiam Brasiliensibus dicta. Primum erumpit è terra folio uno octangulo, cuius anguli teretes sunt, æqualis omnes crassitie, quasi exsculpti essent, ordine spinulis in stellula modum positus armati, & inter qualibet duas tales stellulas transversalis quaedam lineola eminet. Huic folio alia plura Tunz more adnascuntur, in altum erecta, brachium crassa, quodlibet ab uno ad sex pedes longum. Successu autem temporis folium inferius corticem griseum acquirit, ac in caudicem lignosum & crassum abit, spongiosum tamen & facile caduum. *Folia* verò quæ caudici proxima, ramorum vicem subeant; cetera foliorum. Caudex vetus, & ramosa illa folia spinas deniq; amittunt. *Flos* caudici huic solitarius provenit, albus, magnus, sequitur fructus ovo anserino duplo major, ovalis figuræ, externis obscure ruber, qui comeditur est, grati saporis & refrigerantis qualitatis.

5. *Jamacaru* IV. Pisonis tertie secunda species Marcgrav.

Teretibus est ramis & nodosis, ad quos nodos sunt spinæ ut in cæteris. Trunco est admodum spinoso, eoque rectissimo, verè Pinum diceret, si altitudinem & rectitudinem consideres, verum in cæteris differt, quòd foliis potius se invicem protrudentibus quàm ramis in arboris summitate decoratur, quæ rotunditate & crassitie palmam, longissimis spinis digitos manibus amulantur. Fructus Auctori non innotuit. Caudicis medulla est Sambucina facile mollior, quæ secta arbore continuo exsiccat, abies, in levissimum pulverem, qui decidit, moxque ablato spinoso cortice relinquatur scæpa concavus, arundine levior, miris cancellis, quasi ex arte fabricatus: qui si ab igne accendatur, flammam luculenter fovet, facisque loco Auctori iter facienti de nocte inserviebat.

Varietates Ficus Indicæ seu Opuntie in Horto Leydeni cultas sic distinguit clarissimus *Herrmannus*.
1. Opuntia major folio spinis longissimis & validissimis armata. 2. Eadem folio minori rotundiori & compressiori. 3. Opuntia maxima folio spinoso lanissimo & longissimo. 4. Eadem folio spinoso longissimo & angusto. 5. Eadem folio oblongo media. 6. Ficus Indica minima folio subrotundo. Hisce addi possunt Opuntie laves seu non spinosæ, aliasque varietates à flore & fructu desumptæ. Vide Cap. primum seu Ficus Indicæ primæ Historiam. Ab Amico quodam admonitus sum aliam speciem in horto non procul à Londino inveniri folio triangulari ensiformi (profundè canaliculato) stellatim aculeato.

6. *Jamacaru* V. Pisonis, 4. Marcgrav. Nocheznopalli Hernandez. in quo Coccos Indicus nascitur.

E radicibus tenacibus, in terra haud profundè latentibus nascuntur triangularia aut etiam quadrata *folia*, viridia, unum, duos, tres, quatuorve pedes longa, quibus alia hinc inde adnascuntur ut in Ficus Indica: quodlibet eorum latus duos, tres, vel quatuor digitos latum, suntque duplo crassiora quàm *Jamacaru* quæ fruticibus & arboribus adnascitur, sed illius longiora sunt: in angulosis extremitatibus aculeis munita, unum, duos, trève digitos longa, flavescens seu lignei coloris, sex, septem vel octo inæqualis magnitudinis juxta se posita. *Florem* fert ut præcedentis, sed minorem. *Fructus* figuræ oblongæ, tres circiter digitos longus, quatuor in ambitu crassus, constans cute crassa, succulenta, egrègiè rubra, compressa per longitudinem facile finditur & deorah potest, continetque pulpam albam, succulentam, friabilem, & quasi in multos globulos conglobatam: hæc multis seminibus nigris, splendens permixta est, Aquilegiæ similibus sed minoribus. Pulpa cum seminibus comeditur, est boni saporis, dulcis, Ficum vulgarem superans.

Ficus.

Succus è cortice rubro expressus acidè adstringentis saporis est, ut succus Ribium immaturorum. *Folia* autem hujus plantæ succulenta sunt, & succum dant herbosi saporis seu Brassicæ similem, qui si amarus esset, planta hæc Euphorbium esset: nam per omnia convenit cum ejus descriptione. *Euphorbium* verum alia & diversa est planta, quæ ab Horti Malabarici auctoribus describitur & depingitur sub nomine *Schadida Calli*.

Hæc species Tunz in Nova Hispania profert Cochimillam, quæ tamen hic locorum sedulo indagantibus nunquam apparuit. *Pise*.

7. *Jamacaru* VI. Pison. Brasiliensibus etiam Urumbaba dicta.

Caudex est recto, solido, spinis validis, inordinatè positus armato: cui in summitate multa *folia* crassa, spinis horrida, palmæ figuræ, ramorum vicem subeuntia adnascuntur.

Locus.

In desertis mediterraneis tantum reperitur.

Item geminam Ficus Indicæ speciem non demonstrat, ut neq; descriptis nimis brevè & succinctè.

Temperamentum.

Omnes *Jamacaru* species frigidas & humidas, licet gradu differentes, comperi, exceptis granis quæ sunt sicca & adstringentia. Quamobrem gummi quod ex illis destillat, fructus, folia, radices febribus aliisque malis ex intemperie calida natis sive assumpta, sive extus admota moventur.

8. *Ficoides seu Ficus Americana Cerei effigie spinosa & angulosa* Hermannii Hort. Lugd. Bat. *Cereus Peruanus spinosus, fructu rubro Naca magnitudine* C. B. An nostratibus, *The pyrite* Ip *Toch plant.*

Hæc superius Lib. 17. cap. 6. pro Euphorbii specie descripta est. Verùm rectius puto à D. Hermannio ad Ficus Indicas referatur.

Idem Euphorbium Dodonæi ab hac planta distinguit, cum qua Bodeus à Stapel eam miscuerat.

Idem Euphorbium *Dod.* pro ipsissima planta ex qua Euphorbium Officinarum proponit, contra sententiam & assertionem D. Commelini, quem nos sequuti Schadida Calli *H. M.* pro Euphorbii planta tradidimus, nimis ut videtur securè.

Alterà varietas Cerei Americani in Horto Chelseano prope Londinum à D. *Watts* colitur. Hæc planta sicut Tuna seu Opuntia plurimas varietates seu distinctas species producere solet.

Ficoides seu *Cereus angulosior & spinosior* in Hort. Leyd. reperitur.

9. *Melo carduus echinatus* Pennæ & Lobitii Ger. *Melocardus Americanus* Park. *Melocactus Indiarum Occidentalis* C. B. *Echino-melocactus* J. B. Ad. Lob. Clus. *Pomum spinosum Opuntiatum* Munting. *Ficoides Occidentale spinosum Melina facie sicuti relictu* Hermann.

Planta hujus generis mediocri quam descripsit Clusius, 12 uncias longa erat, infimæ partis terræ insidentis ambitus 25 unciarum à qua in metam assurgebat, 16 profundis sulcis, totidemque clavioribus costis prædita, quarum singula novem tomentosa tubercula habebant, è quibus decussatim acutissimè firmissimeque & tanquam corneæ decem spinæ, unciam æt plurimum longæ, interdum etiã ampliores prodibant, inter quas binæ, (in majoribus ternæ, in minoribus singulares) surrectæ erant: ex autem sessili parte plantæ, quæ viz. supra terram incubuerat, & veluti formicæ instar curva erat fuscæ & nigricantes, mediâ parte ex spadicæo candicantes, superna cineracæ coloris, cuspides verò purpurascens. Summa parte plantæ (quæ foliorum experta erat, & radice tantum nitentur) densissimum tomentum emicabat ad uncie altitudinem, trium verò latitudinem in diametro, cineracæ coloris, exterior ejus pars viridis erat, qualis ferè foliorum Tuna, parte tamen terræ proximâ in albo pallefcebatur: interna pars sive pulpa candida, spissa & admodum lenta, ut in tenuissimâ etiam lamina secta & digito extensa vix frangi posset, Cucurbitæ quodammodo saporem referens: Pulpa medullis & ipsum cor minus album erat, nullamque cavitatem habebat: supremæ autem pulpæ pars, cui tomentum inhærebat nonnihil purpurascens: ipsum verò tomentum tenuissimum instar lapidis Amianti, & candidissimum erat, in quo latebant multe exiles spinule purpureæ, quæ supra tomentum se exercentes, rigidiusculæ erant. Ab extrema pulpa rari quidam prodibant in tomento latentes folliculi membranacæ, sive vaginæ, coloris sanguinei elegantissimi & floridi, unciam longi, superna parte crassiusculi, infima aqua videlicet pulpæ adhaerent angustè & tenuis, pleni semine exili, nigro & splendente, instar seminis Amaranthi purpurei: Summo horum folliculorum capiti inhærebat oblongam quidpiam tanquam flosculi rudimentum, quod supra tomentum caput extulisse videbatur. Radices crassiusculas, longas, lentas & fibrolas, insuper alias in ambitu minores adhuc retinebat, ex infima sede productas.

In insula Maiô appellata & vicinis circa maris litus eruta fuere.

Lacæ.

Abrahamus Muntingius in Herbario Belgico exactiorem exhibet hujus plantæ tum iconem, tum descriptionem. In icone repræsentatur fructus Tunæ formâ supra tomentum eminentem cum flore ei insidente: quod descriptio operet novi, cum Belgicam linguam non calleam, mox latec; interdum deest tomentum.

Sunt & aliæ præter dictam hujus fructicæ seu speciei seu varietates, quemadmodum Ficus Indicæ; in Horto quodam Hollandiæ, & in illo Reverendissimi Episcopi Londinensis D. *Compton* apud *Fulham* (plantarum & ingeniarum artium Mecænatem in æternum celebrandi) Echinomelocacti alteram varietatem cultam observavit D. *Tancredus Robinson*. Sulcis seu canaliculis, rectis, & obliquis spinis, flore, tomento, fructuque variis, quoad situm, figuram, magnitudinem, colorem, saporem, &c.

C A P. XIII.

De Rosa.

Rosa à Græco *rhôda* fit, s in f mutato. *Rhôda* autem, si Etymologum audimus, nomen habet ab *ῥο*, quasi *ros*, & *ῥοδία* *rhôdia*. Ita autem dicitur ait *ῥοδία* *rhôdia*, quia *ros* *ros*, quasi *ros* non dicatur etiam de bono ac grato odore. Plutarchus melius, lib. 1. *ῥοδία* *rhôdia*, cap. ult. ubi scribit ita vocari, quia *ῥοδία* *rhôdia* *rhôdia*. Censet ergo Plutarchus fieri s *rhô* & *rhô*, quia fuit ab ea odor gratus. Vossius putat integrum esse *rhôdia*, quomodo *Æoles* pro *rhôdia* dicunt. *Rhôdia* verò dici censet *ῥοδία* pro *rhôdia* seu *rhôdia*, idque à Chaldaico *רזא* hoc est *Rosa*. *Vej. Etymolog.*

Rosam omnem initio candidam fuisse fabulantur Poetæ & Turcæ, illi ex sanguine Dei alicuius, seu Veneris, seu Cupidinis, tinctam erubuisse; hi ex sudore Mahumetis rubedinem contraxisse sibi persuadent, ac propterea ejus folia humi jacere non patiuntur.

Ceterum

Ceterum Rosa tum ob venustatem & amplitudinem floris, tum ob ejusdem fragrantiam, omnibus seculis, omnibus terris summo in honore & pretio habita est, omnibusque floribus & odoribus prelatata.

Rosam Pomiferis accensuimus; quoniam fructus in nonnullis Pomi magnitudinem assequitur, in omnibus figura potius ad Ponium accedit, quam ad Baccam.

Rosam in genere sic describit J. Bauhinus, Est (inquit) frutex infirmus, Cael. & citò senescens nisi recidatur, ut cum suffruticibus ambigere videatur, rami aut potius virgis duris, lignosis, & ut plurimum hispida mordacibusque aculeis horrentibus, noti rectis, sed modicè recurvis, frequentibus, foliis subrotunda, asperis, per ambitum serratis, quinque, & septem ex uno nervo sive pediculo coherentibus, sibi invicem oppositis, supremo singulari: floribus primis herbaceo inclusis calyce, qui tumescens in virides alabastris fastigiantur, quibus dehiscentibus flores panduntur (vel simplices, vel multiplices) in calycis sui medio stamina quaedam capillacea, lutes apicibus donata complexi: femine in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus subsunt, per maturitatem rubentibus, & in quibusdam nigricantibus, duro, lanugine involuto: radicibus duris lignosis, in diversa tendentibus, stolones crebros emittentibus.

Porro Rosæ partes Medici numerant octo. 1. Capitulum illud solidum, lanugine quadam repletum, floribus substratum, seu basin totam Rosam sustinens, Calyx vocatum, qui nempe cum glabus rosæ totus nondum apertus sed adhuc connexus dicitur. 2. Cortex, [rectus Calyx] aperta rosâ in quinque pinnulas seu lacinas divisus, Alabastris quibusdam dictos; Harum duæ barbatae sunt, duæ imberbes, quinta ab uno latere barbata, ab altera minime. 3. Floris medium illud croceum, quod capillamentis infidet, Anthera Offic. [apices.] 4. Capillamenta Anthera seu apices sustentantia. 5. Filium, nomen, cuius 6. Ina pars candida sagax appellatur. 7. Lana in capite contenta. 8. Semen lanugine includum. Cortex cum lana & seminibus inclusis Fructus rectè dicitur, quarum maturitas tum ex colore rosso, tum ex mollitie æstimatur.

1. *Rosa rubra* Ger. C. B. *rubra, flore valde pleno, & simplicis, & simplicis ferè* J. B. *Rosa rubra Anglica* Park. parad. **The red rose.**
J. B.

Rosæ rubræ frutex minor est quam albæ aut rubellæ, virgæ non ita crassæ, spinæ multo rariore & minores, nec ita molles; aliqui rami etiam sine spinis: folia ex longiusculo pediculo, cui in principio velut auriculæ, foliola sunt terna vel quina, [plerumq. quina Park.] utrinque glabra, spernè magis virentia, subrotunda. Flores sive Rosæ rubræ, magnæ, quædam plenæ admodum, coloris intense rubri sive purpurei, quædam paucifloræ, odoratæ omnes & potissimum siccæ. Flores sequuntur fructum sive capitula sublonga, rubra ubi matura.

Flores colore plurimum variant; alii colore sunt intense rubro sanguineove seu in rubro nigricante, plenæ admodum, foliis omnium Rosarum amplissimis; alii pallidiores sunt & ad Damascenarum dictarum colorem accedentes: alii adhuc dilutiores Rosæ caninæ ferè colore; omnibus tamen folia seu petala ampliora sunt quam Rosæ Damascenæ vulg. apices etiam croci in medio multo plures. Odoris gratia & suavitate quarum Rosam albam superat, Damascenæ neutiquam conferenda est. [Odor quamvis satis validus est, nobis non admodum gratus videtur.] Folia probe exsiccata & reposita tum colorem, tum odorem diutius retinent quam Damascenæ folia, quantalibet curâ & diligentia asservata.

C. Bauhinus huc refert, 1. Rosam Milefiacam flore simplici rubro, vulgo Rosafina. 2. Ros. ex rubro nigricante flore pleno. 3. Rosam Milefiacam flore simplici rubro. 4. Rosam rubicundam Saccharinam dictam, Graculam Plinii. *Cem.*

Ebrodunensis historici auctores huc etiam referunt Rosam rubram pallidiorē C. B. item Rosam saturatius rubentem *eisdem*. Verum utramque erroneè: Posterior enim est Rosâ. Prænestinæ similis *Clus.* quam & ipsi distinctam speciem paulò post faciunt: Si autem per priorem intelligat Rosam holofericam dictam, nos eam pro diversâ specie habemus.

2. *Rosa Damascena* Ger. Park. *Sativa* IV. *flore purpurea* C. B. *rubella flore majore multiplicato* *flore pleno, incarnata* vulgo J. B. **The Damask rose.** *Clusio Prænestina* dicitur.

Rosæ hæc fructus sunt præalti ut albæ, spinosiores tamen in multo. Ejus rami abundant spinis aduncis & mordacibus. Folia non virent ut in rubra, nec polita sunt ut in albâ, terna, quina aut etiam septena, panè rotunda. Flores multi simul, ex longis pediculis hispida, calyce etiam hispido, magni, pleni, incarnati, odoratiores dum virent rubris & albis, imò omnium non dico Rosarum, sed florum in genere longè odoratissimi, ut quæ halitu suo suavissimo sensum mirificè oblectant, citra ullam omnino offensionem aut satietatem.

Damascenæ dicuntur quoniam ex Damasco Syriæ urbe advectæ creduntur. Per totam autem propemodum Europam in usâ frequentissimo sunt ad Syrupum ex multiplici earum infusione parandum.

Hyemes nostras etiam asperissimas facile tolerant.

Rosa versicolor.

Rosæ quædam meminit Clusius, cuius flos multo dilutior erat, Prænestina, & ferè albicans, perinde tamen magnus & plenus, in quo nonnulla etiam folia observavit media ex parte candidantia, altera purpurascantia, vel similis coloris venis alperis.

Alterna [aut eisdem] Prænestinæ similis forma & magnitudine, quæ ut plurimum dimidia ex parte candida folia haberet, reliqua rubra, aut tertia duntaxat ex parte alba, vel nunc integra alba, modo integra rubra inter se commixta conspiciantur.

3. *Rosa Provincialis rubra* Park. parad. *rubra flore valde pleno* J. B.

Hanc J. Bauhinus in urbe *Provinci* Gallie se vidisse scribit valde plenam & rubram, quae in varias Gallie partes exsiccata distribuitur, quia valde odorata. Ex hac conferva sicca ubique paratur. Huic flos densissimis ferebus foliis multo minoribus quam in vulgari rubra, odoratior etiam quam illi. Calyx spinulis horret. Folia duum ordinum, duo semper sibi ex adverso opposita sunt, quantum verò in summitate medium inter ordines locum occupat, omnia in circuta serrata, glabra, superne viridia, inferne canescentia.

Frutex ipse paulò minor est quam *Rosae Provincialis Damascenae*, cortice viridiore, nec adeò rubente. Folia magnitudine paria: Flores paulò minores, petalis non usque adeo confertis & numerosis, colore minus saturo quam in *Rubearum* optimo genere.

4. *Rosa rubra humilis sive pusilla* Park. parad.

Rosâ rubra vulgari minor est & humilior, alioquin ei non ita dissimilis, spinulis paucissimis vel nullis. Flos multiplicibus confertis, arcte stipatis foliis constant, minores, minusque expansi & paruli quam rubrae vulgares, petalis adeò aequalibus ac si fornice resecti essent; colore rubro minus saturo quam *Rosae rubrae Provincialis*, odore languidiore rubrae vulgares.

5. *Rosa biflorica simplex & multiplex* Park. *R. rubra pallidior* C. B.

Virgæ hujus vetustiores cortice obscuro seu nigricante teguntur, stiones novelli viridi obscuro, paucissimis vel nullis omnino spinis muniti. Folia saturatius virent quam in aliis plerisque *Rosis*, septem plerumque eadem costæ seu pediculo communi adnexa, cum in aliis plurimum quinque duntaxat observentur. Flos aliâ simplici quinque petalorum latorum serie, cum multis in modo apicibus croceis consistat; aliâ duplici, exterioribus latoribus & majoribus, interioribus minoribus, colore rubro saturo seu languineo, holosericum cremelinum dictum referente: interdum etiam flos magis multiplex est, sedecim aut pluribus foliis compositus, magnitudine ferè æqualibus. Omnes odore infirmiore quam *Rosa vulgaris rubra*.

Hæc C. Bauhino *rosa rubra vulgaris* minus rubet & flore simplici plerumque est, & foliis latissimis, cujus frutex spinis communiter caret.

6. *Rosa pusilla Pannonica flore rubello* J. B. Sylv. 14. seu *pusilla rubens* C. B. *pusilla rubra Austriaca* Park.

Podales atque aliquando cubitales etiam ex eadem radice profert virgæ, virides, lentas, inferne paucis, superne multis spinis rigentes; foliorum alas rubrae simillimas, quinque aut septem foliis, superne viridibus, inferne candicantibus constantes: summis virgæ & ramulis innascuntur satis magni calyces, sive alabastris, hirti barbatique, quales in *Rosis* rubris simplici foliorum ordine constantibus; ex quibus deinde sese explicant magne, non omnino odoris expertes rose, pentapetalæ, initio rubrae, deinde paulatim remittente & evanescente rubedine, carnei fere coloris, multis lotis staminibus floris umbilicum, quemadmodum in aliis *Rosis* occupantibus. Fructus ruber, rotundus, omnium maximus, & Pyri in modum turbinatus, fulvescente pulpa, inæquali alba semina continet.

Floret passim in caduis sylvis, aliarum sylvarum marginibus, sublimioribus & desertis agris per Austriam inferiorem & universam Pannoniam Junio: Fructus maturescit Augusto.

Hæc eadem videtur *Rosæ versicolori* Park. parad. quam Anglicè, *The York and Lancaster Rose* vocant: est autem *Rosæ Damascenæ* varietas potius quam species distincta. Odor *Damascenæ* remissior.

Nec diversa videtur *Rosa crystallina* Park. parad. quæ non aliter à precedente differt quam colore virgarum in flore pallente saturatiore seu intensius incarnato.

7. *Rosa Provincialis sive Hollandica Damascena* Park. parad. *Hollandica sive Batava* Ger. maxima multiplex C. B. *Hollandica rubella plena, quibusdam centifolia spinosa frutice* J. B. *The Damask Province Rose*.

Ad staturam & magnitudinem *Damascenæ* æmulam assurgit; cortice rubente tum à *Damascenæ* frutice, tum ab aliis *Rosis* facile discernitur. Folia etiam majora & rubicundiora aliis. *Rosæ* colore incarnato cum *Damascenæ* conveniunt, duplo triploque majoris, foliis numerosissimis dense stipatis compositæ, extrinsecus majoribus, intrinsecus pusillis, staminum locum explentibus, & in ipsam calycem reflexis, adeò ut stamina & apices, siquos habeat, vix compareant. Odor *Damascenæ* ad albam nonnihil accedens, *Damascenæ* certè longè inferior, non tamen ingratus. Variat interdum flore albo C. B.

Antequam plene explicatur flos admodum concinnus, venustus & speciosus est.

A Gallie urbe *Provinci*, in cujus agro provenit, nescio an sponte, an aliunde translata, nomen accepit. Videtur equidem species *Rosæ* distincta, verum de eo mihi non certò constat, cum reperiantur ejusmodi & rubrae, & albæ, & luteæ, cùmque stamina & apices in flore nondum observaverim. Forte arte aliqua & mangonio tali initio effecta est.

Hujus varietatem observavit Clusius, priore aliquanto minus, hoc est, mediæ inter *Prænestinam* & *centifoliam* magnitudinis, alioqui colore, odore & formâ conveniens, quæ *Rosa centifolia Batavica altera* J. B. multiplex mediæ C. B.

8. *Rosa sine spinis, flore majore* C. B. *sine spinis* Ger. *sine spinis simplex & multiplex* Park.
Rosa acanthus, flore pleno, coloris rubelli J. B.

Claf.

Multis statim à radice affurgit virgis, humanam altitudinem interdum æquans [Rosæ intensè rubescens altitudine, figura & effigie J. B.] Si fertili solo & loco umbroso pangatur, ut plurimum verò longè infra eam magnitudinem, & cubitalibus duntaxat aut sesquicubitalibus, levibus, & sine spinis, viridibus, flexuosis, in varios ramos diductis; [quorum tamen summi propter floris calycem, & folia furculi horridiusculi sunt, ex densissima apicularum nigrarum & asperiuscularum congerie J. B.] Folia habet alata, hoc est ternis aut quinis uni costæ (que subsæpera est) inhzrentibus, binis semper inter se oppositis, extremo impari latis amplo constantia, fusca viriditate supernè nitentia, infernè canescentia. Extremis ramis insident flores, oblongis hirsutisque pediculis inhzrentes, multiplici foliorum numero constantes, Prænestinis [Damascenis] majores, medi inter illas & rubras coloris [quem ornat varia vagaque venarum purpurascens delineatio, subter verò folia ex incarnato candicant omnia J. B.] jucundi odoris: fructus brevis crassus, pæne orbicularis, maturitate rubens: inæquale semen lanugine involutum continet. Radix repens, lignosa, dura, aliarum instar.

Aliud genus Rosæ sine spinis invenitur, non valdè dissimilibus virgis, quod minores & rariore foliorum texturâ constantes flores profert, colore pæne sæcum vini rubri, quod C. Bauhino Rosa sine spinis flore minore: J. Bauhino R. sine spinis colore pæne sæcum vini rubri.

Florent hæc cum reliquis mensè Junio.

9. *Rosa rubella sive incarnata similis* J. B. *Rosa prima Prænestina similis* Claf. hist. C. B.

Prænestinæ, quam vulgus Provinciale vocat, valdè similis est [Rosa prior Clusii præter vulgares] nec illa minus altè affurgit: in solo flore discrimen est, qui circiter quadragenis aut pluribus foliis, paulo amplioribus & saturatius nonnihil rubentibus constat, multis staminibus flavis umbilicum occupantibus, alabastræque multò crassiore ac brevior: odor minùs suavis & albe ferè proximis.

Valdè frequens est Viennensibus hortis & totâ Austria, nullius tamen apud illos usûs, quàm ad eliciendam aquam stillatitiam. Floret cum cæteris Junio, interdum etiam Maio.

Locus & Tempus.

10. *Rosa folio crispo rubello seu incarnato* J. B. *Rosa folio subrotundo & crispo* C. B.

Rosæ Damascenæ varietas esse videtur, cum non aliter ab ea differat quàm folio subrotundo & crispo, flore rubello sive incarnato.

11. *Rosa sylvestris rubella parvo fructu* J. B. *An Rosa sylv. odoratissimo rubro flore* C. B? *Rosa sylv. tertium genus* Trag?

J. B.

Hujus frutex parvus est, cubitalis ut plurimum, formâ similis Rosæ intensè rubæ, curvis nonnquam spinis, sed raris: foliis ut in illa quinquepartitis, rariis in septem foliola distributis, serratis, glabris, supernæ parte obscurius virentibus, denique ejusdem ferè & coloris & formæ, sed rotundioribus & minoribus; flore non parvo, coloris rubelli sive incarnati, ut vocant, quinquefolio, jucundissimi odoris, cui succedit capitulum cum pediculo insipido.

Locus:

In collibus circa Genevam, v. g. *la Bassie, Champe, &c.* observavimus Junio florentem.

12. *Rosa rubella flore parvo simplici, non spinosa* J. B. *sylv. minor rubella flore* C. B. *que vulgè à mensè Maio Matialis dicitur.*

J. B.

Minor hæc nullis horret spinis, pediculo duntaxat floris nonnihil aspero: foliorum autem glabrorum conjugationes præter extremum impar tres sunt vel quatuor, serratorum, superius virentium, inferius albicantium, glabrorum: rosæ sunt parvæ, quinquefoliæ, odoratæ, coloris rubelli. Fructus rotundus, parvo Mespilo paulò minor, per maturitatem rubens, grana tomento involuta continet. In hortis sæpe altitudinem hominis excedit.

Locus.

In montibus propè Genevam sponte provenit, nobis & J. B. observantibus. Ad radicem montis Albii prope Tigurum *Gesa*. Coltur etiam in hortis.

A. 13. *Rosa sylvestris inodora sive canina* Park. *canina inodora* Ger. *sylv. vulgaris, flore odorata incarnato* C. B. *sylv. alba cum rubore, folio glabro* J. B. *The common wild Hyat* o; *Dogs nose. Cynobatus & Cynorrhodus* Officinarum, *quibusdam the Dog-tree.*

J. B.

In magnos hæc excrescit frutices, magnis armatos spinis. Folia sunt latis magna, utrinque glabra: Flores simplices, quinquefolii, albi cum aliquo rubore, in medio *flamma* lutea. Succedunt *capia* longa, primum viridia, deinde Coralli modo rubra, que ubi planè matura mollia redduntur, sapidi gustûs cum aliqua aciditate: à pilis quibus semina involuta sunt inter edendum cavendum. In hujus virgis spongiosæ villosæ sæpe visuntur.

Locus.

In locis passim invenitur, omnibus in terris.

Ab hæc ego speciem diversam non puto

A. i;. Rttfam frlvtfirmeJor** Ger. r>'v,%btoJ<rdta CB.felt*OIBTMX B^lnsm<cm dillam
J. B. fjlv. sdvrtm five Eglentertmflore fimftici Park. Cfct ftofft 2J:iflr.

Non alu qulppe in re quam foliomm odore ab ea dilfjrt: neque in ejus defcriptione Bocanid qui diverlim velint conicntiunt, aut notas diftntnrtronis certas adferunc Gnmque inter alus Ro& caninas hujus generis una vd altera (parfim Sc rarius in lcpibus occurrar, & nunquam plum Jimul, vcniiimile eft has ab earum lemne nafci. I Iis adde quod Rota Eglcnrena tranfplantando interdum degeneret &. odorem amittat., ut oblervirunt Gdnrcrb & Lobeliuu.

Nobis (uffragatur TurncniSj inquiens, Ego hanc nihil aliud quam fuavcolentem CynosbarJ (pcicim c xiftimo.

Ab hac non aliter quim flore multiptia feu pleno diffirt Rola Eglentma flore pleno J. B. fylv. flore pleno icu mulcplici C D. & aliorum.

Rola; fylveftiis flore odoratg incarnato varietatem obferyavit nobileque ojlendit D. DAIL, quam6: nos quoque dudum obfervafle menunirous pomo fpinuhs led rarionbus oblito, rorundiore quam Cynorrhoi vulgai is & hilarius rubente, quodque barbular feu calycu radios non abnut, quenudmodum vulgaris Cynorrhoidi pomum, lid in hycnicm ufque rennet donee fradus matureLunt.

A. I+. Rofs fylwiffris filters (fan mike wijfrat. Rafojylv. ftlu gl*he, {tare }lmi mibs J. B. An Refit jylv. 4. />rat) Trag? j. *. R*f* ffwjhut 17, {tusrviafu tmiiis CB.' An Reffi Ctmin4 humiltvr frtrtru nXundan t). Ploc.

Differt a vulgaii Rola canina virgts gracilioribus, fpinis rarionbus & multo minonbus obtitis; floribusalbis, longioribus peditulis indcennUis, pluiiibiilque (imul inumbelU rormam (c componennbus; fruAu minor 8c rotundiore; rolms minoiibiu & ad Roll- piinpmellx formam quodammodo acced^ntibu?. Plam* tota nunoc eft Si liumiliorC^norrhodovulgan. In lcpibus rrcquenseft.

J. Bauhinus Jioi.un liiam fyh'cfrem folio glabro lie dckribit, H<u ibus eit multts hmul jun&is, ROIK mofchaot in modum, majnribus, onmino aibts, odoratillimisj calyubus eoninu^ pdliculis rubentibus: foliis leptems, plam- glabris, Rotr (ylv. albX Imilibtis. Non iu in altum exccriot, nee ita robulcos profert ramo> uc Rola fylv. vulgaris, led multi'im ferpens, ramis qmbuldum parutu lpi* nofis. riorcc Junto & Julio, panto t.irdius quam reliqu fylvefr*.

Rola (vlvcltris C*falp. virgts luimiUoubu&.&inintu l, nolis, floiba< albi, nobii d dem cum hac nofra videtur. C Bauhinus ail KoUm tiuniikm (lore .I>o Clatu refer., minus recte no r. l. lententi.i ; diver lam cniin Ipeccim puuinuj. ViJcndum ijuuil dir>.:ii alt hac Rola I impetris repens alba C. A pumila campcli rris alba Turk.

Q'nosbati Hores qualicinbts convenire viJentur cum RoTis fativm, led inajoretu vim adftnngendi v< h-incnJj promde in proHuvio uteri nibro & .ilbo (umm.v (unt a-ftim.itionii,

Fruftus vi lichenmptca majcime commendantir, in qua umen excellum exempri arilli. Stl rad.

Pulvis ifte in Anthens Cynqsbati repenbilis, crocci colons & liimc volatile, eft gcmnum hi! phur veg^abile ab Arch.co ubiimatam, cgegls dotatum poteftatibus: oil conianginci liint pul- VereSjViz. Alow! ex JulisCoryli, lumiruuubus Pini, inulco terrcitn davato, 8c in Anthens JUitorum alborum. Uabent cgrcgum vim anodynam, loponferam, cardsacam. H*%enJtrnmi Cp» ttUg. p.48. idem tradit Wtidum Jefuifbm* fUns* r>»m. Ego in phthiicLi Si. convullivij arTati in phrenefi, 6c dokmbw Ijni^ndis utiles die exiftimo. O. TmrtrJ. Rvim'im..

" aP^ ^ ^" 'eminiSui Cynotban rq -oQ 8c ballam: ca lubitania, CR^K^* efficaaz ui Lithifsi ; flammam .i no concipit, & continet ipfius ellentiam pUntjr. IU^ttUtm, CjuiintfeUf. p.70. Duo Hydropici pro dclperacKlubtti j.t intsgnu valcrudincm refctknh funt a diurno i lu decott fnicium Cynosnati integrum turn aiillii in vina. I UgfWbortL CyiiwlutuL p. 1 f4. Idem affirmatur de hts flonbus a Wclclio.

I Iujus poma cum maturuenmr pitpam continent (aponsjaim aadiute grati, ad appetitum etcitandum Ecatflum fcbnlcm compclcndnm perutilem.

Ex hac pulpa cum Siccharo Offidnx noftr Conlernvam paranc, non modb ad febnles zflus, fed 8c ad ScorWicos affectus calidiores utilillirrum: venrem etiam Ientter aMrtngit, & dcHuxioncs iidtt, ut t.iccim pahto admodum griumelle, vcmnculo acceptam, &: concoAioncm promorcfc.

Ex hac etiam pulpa bcllaria Sc faumeuca mulu, parare norunt ooa flc macronx honeftx ad nienlji (uaindas infimendas.

I'lanabili ad holec annos (inquit * PImiub) fuit rabidi canu mot fib, pavoremaqu* porulque • lufl.nM. tilercm odium. Nuper cuju(iim militajitii in prxtono mater vitlit in quiete, <t radicctn fyl- 'o' »J- * •• (5

omna veltis Rola blandizam fibi afpectu pndic in fructo mitteret filio bibendam. In I.uliunu to ge-¹⁹. * 4- rebatur, proxima Hispanie parte: cafique accidit, ut milas a morfu canis in- inicnte aqua* eipa- velcere fuperveniret epiftola orantis ut pareret religioni, fervatitque ell ex- itea quiliq' msauxiltumlimiletcn! avit.

Iu h')i« ramis, fraftis prwapue alitcrre Wit, vcl ab infeao aliquo ownpunai* per xftatem mul- Icolum quoiUlam oarpui Iwabacdi 8c rubelcentBcobris l>ccc> crelca, »»d # BtJegum^Ixjbelius, * Bolognar Spongiant alu appellat vulgm f Germantem fb. aro Nonnbergat'i] quui luppolitum Officinis per- fornnum inainibennbui provoca, ©«t ^((ilafF; cujui aneres ad .lylunam, ancas ad vcrma^ am dicitur expcllentos Carrier, laudar. Spongwlam hanc li maden^ »e«niculii exiguis albis intus refer-/, * Spongium t* m infentes, qu.v per totam hyemem in ccllulis fins k<antes, monis decimum Man inlctiuetm Bf^*** •*** annm taufcarum tbrnii prodcum: quarum nonnullr acul so fea Ipculo e can. da Icmper prominena *~c"ft atolantur, fie ad Mouffeti Soncaudat refeni polfunt, a.hx ei omruno deltitumitur; fie m hot fotefTX' iexum dlricrcmit. L);(nptioncm mulcarum vide ui Cm, Lir.uk.

A. if. R*f* fmMdsfpnmfijm* fiiim Pmf^gUkr*, jl*rt*lh J. B. Urm. tot* flv.f<>
UitU, fm ri*f», j»t fpms, fmSK^Jkm. btm, tof* *rTM* Tik<t>*m. W*
tjuiaem. toft fylv. *mf*r» mam G B. JL'Pimfntid fiv* pemifirs mow Parl^Ktf-
ftmfM&M fid* Ger. ** frtmprtul tUU.

Fr. Ml eft panrus, humilif, cubitalis aut fummuim fequitur .abicdb, \ugu fptnofitEnn*, folia min-
mis, PimptndJje toboruni xn ... unde ei nomen quatuor conjugationuin; Roli* trigus, candida,

Lucu.

In labuWti 8c petrofo • equens nalcitur. Repetui aiunt cum & fine fpanu, C. Bauhinus fe utram-
que habuiffe ait, & Parkinlonu* in eodem aRro u ... nifi « a^*
An^u fpeom iUam qur Ipinb caret nondum videni ojtntigit, noe puto apud nos orti
dente; at neq, Jan inter hasdiat d^niialem leu (pccitKam quam vocant differentiam. I line unien
nejn iinmerito C Bauhtnus ad idem caput reduut Rolam pomiferani i, & Ko(ua
... iil Tmb. quxlpinofa. Rotar pomitera; otulo Looclium de: ... i, iiclbm nofra-
ccni cum Camerano & C Daunino lentio, quod cam Anglur perquani familiare tn die ^
quaimb negli&emcr ne dicam faUucamdclcriplerit,S: fine foam depinxene, un
bttavit, amion Rofam Tuam rubdlo parvoflore funptki non fpttlotam liucUliReret.

Roa; pomiterx Ltk Camerariut eandem facie Kaljm canipefrem odoraram CLfii; cui & ego
Jibenrer aJftipuJor; quantumvi* turn ! Bauhinus, tumCafrano fraterdivcHam facunt, & Clitus
ip(c videatur dtftinguere: liquidcm delcriptio qu i CJuluna, excepto domodcxe, Rolx noftix P'''*
pmcllx c ... iat, quam adponemuiut LeAon nidteium permittamm.

Roa camqeeQnsodorata, inhc iile, cubitaliDuf aJiquot, auc ad iumumum, loti L .A.
... ma, duns, lignolts rubcloennbus, dcruhlimo fpinamm v*
... rmjuentes cont'ulb oratnc oriunrur fptnoli ramuli, vindc>, (nguli fiam fives fulfines, album,
oduramm, penupctatan, I .tex aut Canccllx Rotir vulgai» xqual.

mim, (.urn iiti M/ttbtm luteU, medium rluru umbiliaim occuatntibiti. Vrvim rotundu^ b:c
v-inde^ dbnde plenam macunutm adeptui IURCI', craftt, angui<
... Folia. tunc inter cum quat luteof Itni^lwm tea note*, fie earn quarao agge
venk, iwe a Pimpinclr fblt
mwtUraoCrn
lr roofrn
-udorw. RJ&*

Lucu.

ura, lignob in Jivcsla ten
Invenrur multis circa Vicnmm loci*, prxteratn edicioribus & montofk Floret Mow, qi.
pore ruftiae mulicm pturnno» ejuj dfeKvio*, ob txlons padani^ venalei m forum dferunL frw**
Augurto nuturclut.

Kola fpmdilfena pumtb Horc rubro
uxtcum vaneti> eft, coiore tlouii*

16. toj-m umptjtrtm ffmu trrtMtm ktJUram jC B.

Ftore eft Ungukc rubro, vere & autumnno prodaintc, q
exigui» Cu lor 11 in mooto Pilau Lugdujcnhuni.

17. Jt^i j5/w/r<f fmuftrs msjm Park. C.R toft /MM /iw/S, /<i> i^i/j J. B.

Folitt eft paJmum (ac longn, qxunquepartira, ad rubcLun ploum pxnc accedeacibus, nuda
Iotundis, Inn,, UtMu, fubtut hiriutie quadani knbus tadu 8c pxncanoe», capKiW five
fructibus fpinofis, ;j;ji(UtiiiM AvclUnx nxundz ex pediculb brevibut, fpinoltt; per lamulot iunt
fptur f jrlofcv.

C ftmhuwa Rofam fuam lytv.jwniitcram nupren) (ylr poniitaa Lob. nu^orem faoc, alnozem,
[aii.o^KKcm, pauollima aculeu, folm tiui-iri!>i;ipalide vifaibout; Ac Balicar lotit b
w privetura laibM: quam dcknbk J. Bauhiuu a monte Calcari alUu dt. Ab (ac diveris » ..

mm

A. I * R*f* ftmiftrs msjir PatL parad, 4. r. ft/*, MMATJ i m r w/rjr. Che grc,ltrf
Xppic nofr.

... virga; crafGorM iunt, cottice ob
nthil, Iptnnaufliukulu autwrtK i.
iijitenx. F*U* pallde vuidia^ quimjuc fimul in eodem communi pediuilo, rarius p... Vim**
parvi, limp lice*, powapctali, inodon, aut levita oioriri, Rot I^Untenr panim n ijofc^ eoJa"
ctiam colon rubdlo perhii, capculo Ipinoio intidentes, fie aUbailm baibaiuib aharum roianim
in V arnice fe, umbilito geitantia, fie (pmuU* odam rerinenrta, per matunutm pulJw< rubcnoJ,
tenmu nmla, alba, dura, f... <rcxt:ndj, lanunne tovoluu, pntpj molli indula vontbcuo*. P^i^A**
^>mm» >L teiKauo decora Jpcuc & (utiinio alpedu poouj quain rionao W

Lucu.

In Septentrionalibus Angliæ ntoniofiw WcA moxLooJu puu it, Lbonceoiu wnk<> cop*o^l

19. Rofa

19. R/f' ann.tmin.-j: m. duplex Park. ... >> flor* p'''w Ger. oJorc Cntnjnami, flert pbm>
C. i. ... & *ii 8^{ma} <***>*** J- ii- Cfjc trouble d m u
inou ilcfc.

Descriptio > Jo. Bjubini quamvis brevis huic stirpi apprime convcnit, & id cam ab aim Rolls diftw-
guendam fufficit.

Frutes (inquiO eft alpsris, duris fpinis arautus, in altiaidincm CttU nugnam, multis vircu ru-
beabbus '• lde excrefcens. R. < huic parvj; , ex breribus peiculu, plena; , odoratJ. AtUe g x Clufo,
Foliorum alx quans aut lepto aii ioiiii zqtillj inter fc ip.uio dUlantibus conftantj uno Kmc, alters
ind<- gemularum conjugatum iue (cmper aiiitrcmc, itnocjuc in cautncn excuiuc, toloni liiperru
p a n infern ca lidntis. Flos mulnpliti fblionun puilloruniglomcraaonecoiiftxt, oolors
rubsltt, Cmiwtioiiii txlore rcmillb, undi; nomen. RuJtx hiii admoduni Jerjiit, & i vivax eft* novas
Tirgas lubindc producens.

Maii meoJB initio, omnium Rotarum prima floret, iu hortis noflru frequenntTuiM cftj unde pri
mum del.iu, .UK ubi Ijwiue proveniat incatum. Dampu

Huic Ipsde ciiLni eftj acudennbus nonnullu divcrij,

20. R/3 Cinnamon fmfJtx l'urk. amtam. firntiictjUrt Ger. tier*tim*mn*i fmfUx C. B.
cim*m*nt* fL-nim jtirubomtw jjnmfj J. B C^e (i l c innamon ftofe

Pirkiniunus virgas bujus minus rubere ak quAm CJUS qu.rflorocV multiplici. C-Bouiiunus lunc
habet proRoli \JUI [(iiccl;iin>] Albu niuntU proi« Tieumm Gtf* qu. anrede. I. ~ ~ ~ ~ ~
Rolam M.m Aibti monas Gqk. 'divcrfiud iatit' a' Ciumom ^ ~ ~ ~ ~ ~

11. Rffa fflvtflrm R*{jU* ParL. Ttjr toln 2?:itr of ~~Spufcovp.~~

Stolones crebros, htco-mbentes i radice eniittit, tuberculis hie illic crumpenubu* iirquaJw, qui-
bus inliilent Ipinat: ut in Cynoibato vulgari. Felt* nan idinodum crebra, paiva, quam ui ilia mi-
nora. Rofi firapliccj, jurv-i, eolure incarnato laturo.

11. R<fi jhtjlrjt Vtrgimufit Park. Zt)f V^irgiiia 25;tet fiofc.

Sriptum & i. miorum magnitud no Sc craffitio nulli Ro(je cedit; Virg* fit fuiculi ituvclli v; ~~ales~~
lunt, vcmll ~~ores cancellant~~; pluri ~~iuaculc»03iu~~ bus, cum i uaUu.nhui JKJUOC mteiniixtii, oblitj.
Ft/wiiv' ~~idi oblcuro nictna, parva & pro-jmchluni i otunda, multa uni c~~ Ax cotijug4tiiu adtii:4.
Rofar liiti; & fimplicis folis quadantenus firmia. Floro fummos ra no* occupant, parvi, penupcuti,
paliide pwpurci feu; auratus inca tuti, Cynonhodi vulgarb iloibiu iiniilcs, cadud.

1;. Rsf alb* Get. Angliet albt Park, a^4 vulgrk major C. B. tmJutd flau fr fimtfln*
J.B. £ll£ bAlte Ao(c

Virgis affurgu longis, iignoti*, fiingois, in quibus fpinai acute, aduncx, rar>, cortex alioqui poli-
tust I oltob qunu vc\ 1 jpciu, aeruM, gUbrj, (ubionga, qmitni pjait rotunda, 'pediculi
dorto (puu>(o mterduin : Exocttw randi tsljtti pluresci podiculis lioii nuuicibu> inharrent: qubu>
apertii apparent rolxpulchr, odoriferje, alkr, nuWonm toliorutn; (iticenJum aim ncbguntui
pauc. I proiluauit Iolu, mli Jiud gonus tic) quuiutn interior 4 tntueit. xteriora TCT6 nufora Ac
atopliora, in tncdto *p%.ti liycos inJudcnaa. SuixJunt frmJm lonuvii, n^Mi ubi nuturi, in qui-
bus graiu itrij laiu laVoluta. Odor huic Lwguidus.

Duilm eft genert.ni, alter J itarc nunrc it pleniore, tjur in utubrois interdum ad ofto aut deem
pftlumjlutudinCiii airurcit, liipite in hoc generc aaHiflSino; altera flora minore & timplioicr.
Rote uanulceiu- ilitituJmcrv vix excedn>: Illiui nores itru prjrcipuc parte verkis tunduni aliquid
rubens rinchiram oilendunc; hujus candidi punoru 6c impermixti colum lunt. \x uincn duat nort
fidentor (pcae dtfferre, led acodeuabus dunuxu quibuldani \ Soli am ccdi aut culiur* divedkate
ortis va i ure.

At neque Rofa inuriuta a> alba minors dtfTerre (pcae ccllenda eft, cum lolo floris colorc in-
carnat0; quldctnque nujore exponhonc difaepct.

24 fo/i J^ni^ J. B. *ih* mtr OR

Elegan; cfl, iia_n „ug'u. folis n Itis, dense (lipaas: qux flngula ft cvelluitur Candida iunt,
cum vco fimul calya in harrent in, flore intcjrjt), videtur quidAim dduri ruboru cmicarc

Et hxc pnoni vanctw cifc rid

Confiderandum ctiam quantum ab cadem difficiat

: j . R>ft tmmilufart mlh CUfu). Q. Mv.U>MsM> fitr* C. B

Cluf

Qua? humili cfl Si fruncob, foliis tlli qiur album Horem fe< [wr(imil>: fed qui floret, licet aJbt,
wngc minorcv, ~~noy, unq~~ mi plane icfccxuluantcj, cfuticnt cum alba vulgari odoris & cokmt, qui
tatnen plm urnci adniinim habet. Paulu lcnui ilia liora. Plumnum JLc<deic vidaur ad Gr*o>-
in 1^lmii.

sJkiPr*- D-ttur criam &c Rota Provinculis alba, cujus mantio in Paikintoni barto, uwjue Catalogo bom
t*lu. OxoatcnGi hibctur.

26. ^ s myibata mm* An fimpL.t J ft mjikes fimpict flore CTL Gtr. mwfitsts fi*f!< *
Park. C#r flpulfc fioCr.

Mapjos habet flolones, reftM, craftbi, ftatim j r, idic< prodcentes, dcccM inter dum aur duodedw
pedes alms, in quibus fpinx rarx, interdum .i trunco nibrr ac robuitx: Kami ta&a client UrvtS
nifi inrcniu'm (pin* intrrcnrent, in quo quiddjm lubent commune cur, Rots albis lativa, ac oif-
ferunt ab Incamxa *dg° <!<£°. quartan rami tmdijitc vakjc (ptnofi 1-ira, qux nnn
multum diferunt a Rons albe 6c incarnaos, nilt quod minus rugola 8c magis acuta, glabra, ju-
peme cam vindicate, inferne albidiora cum pilit vix apiuici, in circum terra, i. g:JT u-pu
rirmim habent fepttm foHol.i, interdum nozem nujori ex partt I bi invicem oppofita. In t-ob>ranj
p^j^U parts infema fpina; vjdt: adunx. Raim exxretu diviti in alios . unaatt*, qri u'i.ulam
qn>li bnugine cWucuntur 8c rubent: paoca habem folia, abuniUntque mutti> rWnb
teitibus, qui prius nuam fe efpondant tonga apparent capuula.mollu St hufua. Apertz roU vrt
diein durant, 8c meoiocm lunt nugmtudinis, alar, [habent nonnunquam unguis rubemes qui Juti
Hint amequam expanduntur] pentapetalc: Afitt lutci foliolU deodentibus ntgrclaint, reUao in
mediouno magno hiHiito, davam abqtrenus expntnenre. CXlor cum ftiugnis, mol Hum
proxirnc rereren, 6por amanis; jdftndionts nan mi^nx pardecepij aliquam accniunLtm in Taud-
bus relinquent.

Dt loco natali nobif non ennfat. Frequem in hortt colinir; frigorii wiSemctiorii i
eft: tnde colligir<rcai>dif>reni akqtum regionem cfus parentcmcl:-

Qtur florc eft pleno, hulja dtntaxar varieus noba cncictur, nun Ipeoes aliqua diftmAi-

>7. R>f* mtfeits wnjm J. E X&mtfih** ffitks mtjw Ger. Atfi Htfftmu* mftk**
fit* Park, parad.

Ei htnc C Baortmu* pt* pf<cofanri* varterjte habet. Frotex eft robuftn, rertiu, fpinofi, ut
MafchMa minor ; in ranorum lummkatibu* ex pe<licdo ran* aliquibus ipum ^ailcacu Rolx ca-
fcuntur, ptemnqie quinquo -i: feptem foils conitantes, magr-. Uxr, cum abquo rubore, ut pt^
ttffimium dereRitur cum exfkeamur, odor6 foanEnKX Floret Jfuroo.

Hzc ex florendi temporewra fit genuuu Rofr moluhau; ipedo vix eft contend*: iIL cniö
bon inre fincm ,-tirata Sc Autumni tntium rtoret.

Alum Ro(z roofchatz fpedem fpurum, torte prxcedentij vanctatem, proponk Parkinibnu*, tn-
It; Itior;?-

18. R*f* mftbsTM mmlsifUcm dlmtm, dm Damsfaw* *li*, vtl vtmm Cinnamom f,-c

(tipite & rimtiti> brevtoribut, fuliw paulo amplionbta p lltina v-cnnbui, Bonbut itidcro
m<oribu*, odon: muJto rcmiffiore, Horendi tempore pnore feu pr<otK<c a Ro(i mofdiaea
rnlitaii dtnVr, crctra ei funila.

Temp'ni rWendi & odor drterfo, fpecie a Mofchati diftnaam arpmnt.
Orcram Rolr mofcruir odore capw terwanr, 8c porcrrntlinie alvum jubduennr, non minu*, au-
tore Vlanardo, qaaoi Scammonium, ift ut li lex vel odio rbfia acetano miluicns, totntnpunjato-
rium roddav. Idem conhrniac Amanu, hiftonam redtaru mulieni, qui ex guitato oondko harum
nManim I uccum c ltnp:* ncorunonen) cum ftonuchi rotwoe coonxenL Qpapropter ab ea
uoquim a peroiolb medxatnenco abltincndum luadenc

Crfm.

29. Rt> fimpit rirum Park. ptad. fmftr nm Claf J. B. mrfitsfd fmftr Virtm C B
rbergtrtoi

MDITB ftatim a r*Ace htannar larmnt tttm Sc caditrt, mil t/i* i'aJofulliriej, aur ad
panctcai apptctet; win non valde cralla lunt, fed lenta, viridia, fpinis rubelcentibus, hami inflar
xkiiHa*. fe miic^k yenunteram ojnverfoobraj an plunt ye fotanmu, Roiorum RCnaJ, ciquos
akernarim ambiuntur a fbtmnum alti, lepim interdum, teJ quinq, nrphimom folin prziitu, ei
aJvolo (bfe Iprtiantibta; horum duo, que laxiari ale Icdi, qui ramum amplctritur proxinu, t>
nora lunt, btna aba qux fuccodmK »H* duplo pnw numt, qumrutii cur enuni alam occupant V
imparcm numen.m r-nicm omnium maximum: tincuu autem i nerro medium tolitui ocrjt***
ainunt venai habent ad tolli nra> excorrenta: in ambitu (one (errata, At prx viridita: . Iplendent,
ncc derlutint ur in aim rotS fed emm hreme permancot Noro rcre ex fkgdlo itis five fiamen-
M e toliorum alts muin onuntur novclii rami, uuitw quidem cum rorni nooiuhtl purpuraJ
<W<fic verb toJorcM mVtem conenhenra: quorum noonulli li-mmn rjjhgn remoi aur goitcnw*
Vnut It**., uncultbof, gradtibui pedicula iubnnoi, cjianque fotut prnc unccilibts confaue*,
Y*tulu% nirci ^n.iKrtt, . qmflHi nucctm tfl-A titmsnJx prOMB^, curdr<g, ttitii * ^ low mignita,
& inter illa capicellum hufurum albicans. Bontodor fuavis eft, & ad KuU rwiUiur Bore
plici odorem valde accendit, lot! ricv ij-i Burs lemu TJ

Hujus lemen Patavo miffam.

o. *Rofa htts* Ger. J.B. /*/«/*//« ftrk. parad. C.B. *The single pelletw flose.*

Rarior & fpeciofe eft Roflutej, fpinofo vicgis, *fJicUgUhns*, quims vel feptenis, nx n/ifiJ/um homWis; /fon*w Juteis, nmpi/abus, cum graviHte oJorath, /to/ro brei'iore, vcntnarfiore, Reptit & multum fe propafit.

Parkinfbnus iarmenta cram & lignofa ei attribuit, paucis aut nullis fpinis in veten ligno Ilperfitibus, junioribus feu novellis virgis & ramulis, creberrimis fpinulis, pilorum inftar tenuibus, obliis; folia minora, rotundiora, pallidius virentia, eleganter tamen circa margines crenata, plura denique ad unam coftam adnexa [feptem aut novem] quam in alia quacunq; Rofa fativa: *Florem* minorcm, quVm Rolx noiclutj; majorre, trujorem quim EgUnccrix.

^ I. *Rofa fufM /W etw J, R lutea multifix* Ger. C B. *JEU pmlitUx fvi ftan f/nw* Park. ad Ilje bmitik pciiotp, Q; pdiotD pjatiiiicr Hofr.

Non alia fere in re gulm floris ttudripiickate a precedence differt. Flosautem pcrampus eft, 6: lytuotus, turn muldpEa foliartn derm^I ftipatorum lenc compofitus, nt Rolx provmaali Damafcenx feu centifotu: Bauvicx hac in parte vix usltt. Florum adeo fcrax eft, ut dumdm corum paitem ad nutuntsicm non pcfJuc.it; imo paucos admodum pcrfiat 5c integros expandit, plerilq; ob humoremnium, f imbiibusplfrunc^copiofisflorendi temporcdcadennbiis) comiptis aut vitiaus. Oporxet c/go li Horcs integros & perhaaos ikfideras, ut Ihrpcm juxta parietem plantetj 8e florum gemma* tenellis pi j. a<L atnputes, pauCU rddibj quas ne hac quidem curi adhibid facile explicit tn rlorw iindequiuj, (vjftctos.

Hinc nonnullis duplex nabctur liujus generu Rola, quarum altera Horem totum expandit, alter* vero lmiclaulb Bore pernunct.

31. R*/i fuiviriJit & tgndt* C B. J. B.

Si in tenclas Agrifoln arbutcutis Rofx inferantur virides flores producere fcribunt aliqui apud Canierarium. <iiimvis interdum anniconftitutonc fnguiwre & humidiorc herbacci coloru Roli fnc calyce provenienc.

Eft & jamdiu vuicre, ut refert LoSclius, Cocrulcai Rofas in hortii Julicn. Sedopdrin ego (are hoitos, li cuent, ubi proveniantj *Si* qui in re *differant* a reuquURoin. *J.H.* Imo ego oulJlibiexare put Q, cum a tempoic Lobctu ahum little cii lilejtmni.

%o. *Jtfs fjtwhu AmjhUtem /hrt Pbrmtt** Park. p*mtt4 Comut

Virg*schujusnovellxtenucs, mbenta, adultiore obfeuri dnerei, fpints aliquot obikx non admodum aaflli aut acotis: *Folia* p.iulo magora Rotx lutcx, limpLui folits, alia* non multutu diffimilu. *Flat* fiihilia (junt, florum lefe conlat, colorem tuipumcco, ite gcece: Qux colons direrfitas varium (ipe llorem rdeVit, lincis quibudAm flafii per colorem phoenkcum trdentiflunum di- pntis, [uciuulo lpedaculo. Hnjjis Rolx umbilicum tenet pappus atropurpurus, mille hlamenm & apitbui luteopalklis fntui *Capitulum* Bori i.b]:<tum rotunduni m, ut in llyrefftri ROU. O doretn habet vcluti melli*. Floiet Maio. Parkifonus pro Rblxtutcx (pecic habet; falt diverla eft.

34 *Rtfa stntiKm tMlnJtrum -w/j[* JiiU: JUAM JUr* furottr rmitott firftmm* Ferrarti. -C{(# niatittjip Aote

Rofx Dainaflcnx vulgan non multCim dtHimtlm eft : nee odore nldc inferior. Per nuximam xftatis piricni florerc pet fe»o at, non umen fingulis talendu floret^ uc ngmen innuere videtur. Ferrario obfervante deniioibus ttvit aculcis.

q(. *Rof4r*bro& tlkwieidURofd tumuli VMlgodttiM*, ^ea^unb-p-fioft.

Rofac rubn vulgari excepto florw colore fimillima eft, eiulque progeruej videtur, proccnorttmea iquanto & tamofior. Mos coloris refpechi omnium Rourum long^ pülKenimu* eft, albo & IU-roclegantiftlm^ vugatusleuvanegatui. Figurajmagnitudo, odor Rolx rubre. In wMm ftirpo intor multas variegatas uru »d altera non raro RoU oenitui rubra apparct, quooriginem (liam tawtur.

jfi. Xq£ *FTsmff*rt**(; Park. parad. *fmfmtk (britm, *l«k*in *r*fm<* Hort. Reg- *Paul* <9e f rankfo;6 flf

Virg« huius JUDKH es corticc palJi<^ purpurafcente obteguimir, foinuli* namtnfn pilorum inftar tenuibui oblttac: .veniftwrei pauofflm (pinn donantur. Capimlum qpod lioo lubeft cique pro ball inlcnit HUMi ell quam in quaT« «lu Rolx (attnt fpeoe, *Fim* ipie nullipUx tit, & crat_ .deoque intunufci: dum adhuc in Rcnmu dt, antequam erpltcemr, « calycem mm, at pJerunqu* & prjproperoortu *CXCM*: Color inter Rolx nibrx 6t l>atnaken« medhw: tHnbtkuiti flon* ocof par: glomm ktiM & dentin xftaminib> • & «^J» artie fhpain oompttm. C«tycs lcgrtwntJ t* hoc genero prxttr liarum umiuuui Rolaxum ordiitern mtload Utera bwbulitautta fam,

37. Rjf*H**EirK*PirtparaA XM Hungarian fiofr.

Rosa Hungarica virgata; bus fnnis nrit o... Rose vulgaris rubra flaturam & magnitudinem assequitur, raro excedit. Flos ipse magnitudine, foliorum multiplicitate, & figura Rosam rubram emulatur, verum pallidior est, & si curiose spectetur masculis rubens dilutioribus eleganter resperis rubore velut irrorato, apparet. I)Jor quart

Alir vaucut... Rosarium in hortis reperiantur, ut Rosa punicea Cives. Rosa Arborecens non descripta SMsL prodromi. Hist. Scot. Rosa Caplana seu Rosa Pimpinellæ folis minor nostras, floce eleganter variegato Catalog. Hort. Med. Edinburg.

De Rosarum temperamento, caliditate sint an frigida non levis est inter medicos controversia: qui misal, nos earum vires & utilitates quas humano corpori præstant breviter indicasse contenti erimus. In usu sunt rubrx,

Virt,

In rubiH p*** permixto, quæ it quidem... non umen abw, hitmido quodjn;

Sucau ergo I I & liiLXim earum ad a... I & liiLXim earum ad a

Dai -JU autun li... -JU autun li

fera in fopernu qia partibibconli/lic [un ' & facile evaporat j at a... Si roba atriix 111

interns dulitefcic. ilet d* R*fi' ruhru tnu:ipnJ<* f**t; turn Dsmift... Pcgit Dodon.r.s, P

Juari 6c pajitiunom c; iiepar, renes K. aha vilcra debiiu conti... uubus utih: Jt athiifler. i

Ratxidufi), debtttem & humtdum fixanc & corroborant; ffluorem mulicbrem. & superfluam me...

I • cypertui (iim (inquk Simftn t'aului) pulverem Rotaruni ex atrorubendum Jil. potiJcre... -lh vktbun bi

Apices * <... Anthere dicti, reficcant similiter & astringunt, & potentia quidem quàm...

Rosa, t... nullam... ca-

Calyces quincem & alabastri iidem viribuspollent, unieia dentes à corruptione servandos, &... (in... roborandas simttor aceti Scyllit. 5c aqtx c calycibui Rofanim dciliiUu Jqita portio, &

co sepe os collatur, annotante Monardo Hispal. Sed (inquitUodonxui) u.mhjsudoit dehit, nu-

um utilia sunt, humaneque nature minus amica.

Notatu dignum est, quod quamvis Rose decepte celerimè exsiccentur, atque inter siccandum...

urium floi; i:ii pteno Jcambulant fr.i. iuliam iunbu& percipim, rjuoJ argumenra est oio-

iclolubltt & djQipabili contiAcrc.

Folia Rosarum m renibui iubfrata coptani (cmini* immunise... umen Iji I

ulUm renum noxam. Ex Kibis etiam aridtt Sc expu... iiniuj Diapaliuaia olini ticUant

E Rolu muka paraiBur medicare... v g.

I. AquadestilLita. Matiluolut trali* rttren in MB, chaUm pr^cipi^ cominendu,cii, vjltt meullKn dcltJLn** longillime prjeivn; nee imtucrrio. Nam &c cni^icutia wnie hoc n civaur, noc j'ua pnvamaliquain aut noxutn cjualicatem a rali»contraha, uc in metalhas

Rdnggram eit & cardiaca, ((rticu* Unguentes reacai & confortat, vel odore suo, naribus admo-

temporibus ea loca, vel in suffragia: Valet etiam ad rubo-

Dainafecnariun aijtu mu!:u odoratior c, purgatiua, necnon ad capitis d... Ibrem.

iccoca, unitimicxioj & alii*, qux rolupc imlr gratia GM... u-Ci, est in wina ut ra ulluni libi locmn in

Conserua rosarum, qua: tit uuwlciklo roCt... pa: tern uum cum dupk

l>U.ii in mortario ininiwtco piftilJw Itjtnco, A^...

Conserua rosarum, qua: tit uuwlciklo roCt... pa: tern uum cum dupk

Conserua rosarum, qua: tit uuwlciklo roCt... pa: tern uum cum dupk

Conserua rosarum, qua: tit uuwlciklo roCt... pa: tern uum cum dupk

Conserua rosarum, qua: tit uuwlciklo roCt... pa: tern uum cum dupk

~ 4. Syrapusex Rofis ficcisparratus ad cadem vale; atque miuper f.ingumti hrevorem rimprcar, Sc febdnranabus utiliter exhibetur,

5. Mel rofarum, quod fit ex fucco roiarum expiieno & folus conttifiscum melle mraijJervcfa⁢ & expreffis Scdeinde colatis, colaturi decocti ad conntftentain mellis. *llu\ta u[liu mii'gms & fns- quenscfhngargarimiis & colliationibus, al ulcea, oro, fauciuin, gutrurisalMiumvc paraum mandanda & SJIUIKU, Scad humores co conruentes inhibendos, quieorum confolidacioftcm impedire iblent; uliirpacur cti.im in dyllenbus ad rchigerandum Sc detergendum.*

f., Durrrhodan Abbas ut *Sc Aronutkum rofaum* m obi t ruction ibbus vifcerum calidn looim habet, cftque cardiacs infignii & ad eadem v.ilet ad qua; predict* prxparaoones.

7. Ai-ctum Roiarum inflammation© omnes iiat, incidjt, purg.it, roborat. Mulri criam UHB eft ad fhmnum inducendum, vel aqua rofacu mtxnini, & nanbus admotum vet cum aliis hypnouis tempobus applicatum.

8. Oleum Rofarem calores omnes (edar, infUtationn mitigat aut prohibet: membra Jcbilu confortat, digeftivam facultatem & calorem luturalem exatat ^ corroborat, aim ctiam unguentis & medicamcns admiltctur qua; refngcranii & adJli ingendu mJervuuK. Kt autem ex rolii reccitibuscontulu inojeo olivarum coctis in MB. Scexpreflk

9. Unguenrum rolaccum tiidem fere uiibus iniervit quibus oleum. PluHmtun valet in pnnaplo apoftematum; repercutk cnim matcrum, (cdatdolore eorunij (ta cap) m febric Muto, & inquitudinem : refngcrat icbre* ardentet, epar & ftonudiuni calctaut: cum unguent' Populcs nnixum, & fmnti ac temporibm illttum fomnum provocat PapuUSj ukufcuU, & cruptioes quatcunq, calidas refrigerat & compe&k.

10. Syrupus rolirum iblutivui fit ex roiarum tbbis vindibus moilo per intutioncin mfdi't j'cr decoctionem. ftr inftiifwui ieeratzm miiliotics.hoc ei^cx inmllo in quo ptunci Rofamm nrcno multa maccrata funt, nobtle & (ccurum pui gator him m edictmeii tum paratur(inq ut Ama tut) quod 8c pueris ruicxhibccti poteft ; utillimnm quando expur^aiKine alia potentioii ut opus non eft, aut ua non efpedit. Humcclat porro & refngcrat, ideo etum febnum ardentium calores ni- niidS (cdat, fie vilcerum inHammatioes mitig.n & titini extinguit, ut ait Dodoiuus, & expencntia confirmat. Eft lane medjcantentum lene, benignutn, turum, multi uws, Sc magni in niorbU cabdn prfcipue ibUmims, (jwidqic ob vim adltnfton.ini in dyienteria Sc alia alvi fluxtbus non lecus ac Rliib.ubaiurn cumargrorum juvamento uliirp.imr.

Paraamr etiamcx Rolu Damafbenb Coolerf a 6: Mel roGtum carundem cum Syrap ovirium. Utitnur ctiam (inquit C. Hofraan.) IL>CU roiarum incarnacarunt ad *Eleduar. re. (icJtfaet** r<f. Ljtnimq, reupu & fuccum roiarum & Scunmonium ei *lem quantitate. [At Parkinsoni ^ E- Itfturtmmrof. c liccu roUruru rubrarum I* *Explovanum eft (inquit J. B. hilt.) contra jjur Mm caltdam, Sc malw tuniona calidu^ N* *haridolus; fortiter purgat; sanat tertianas fimplices & du- plis, & rcltqui 1 1 11 union* *iai<j pot* *eft calcar aBarom injilicinarum. Alia adhuc modicamcai* *i [urantuij quorum vires ex dicbi iftimari pollint.*

Bdk Roiarum Dimafcenarum efficcata inodoramenttsnon poffrcmum locum obtinent, a. ma- tronis noftrn raWd expenta ad puWercs Cyprios quoi vouunt & ad Sacoilfs cum aliis iuavelcolntibia itiferdendos, quos in arc is inter velles 6c Itntcamiiu rcondimt, ad ea odore iuo imlw<nda#Eads<i vel in intiito vel in pulvere exlubita latu rcharer purgant [Coftxui in icro laflis capni bibenda *prelco ibic] Uade oonftai nm* *carhart. .im, faltem in noc genere, parurcnuj Sc volaiih opa: inter .nJum exluke* *& evanclat non* *inkrrerc: at neq, in paitcillaqu* tindnram Jkcolorciii com- monkai, cum Kolarum* *Damafcenarum uolor, quan..* *un a4hibca», magnacx panc ficc- ndo cvjnclut.*

Ro(J autem, prxpiente Sylvio, mediocritcr apertx lereno totlo tnjnt* *ve&x*, codem die ut liue setttni Snlj ii tnc*, [jepe vertendo. N.im vix umbra (iccavent, quanqum id diet oj>< *ma; li. tatas arelle, & rate tctreo reconde*

Roias proprietate quadam tefto Ixderc (cnbit Futliffus.

Roi albi non minus rcfrijerant & exiicc:ani qudm rubra; aut incarnate; non almm tamen in medkiiu ufum lubent quim ut ex le aqua.ui fillen^ qua: fpcedtiu propnetate oculis projelle co- nimqueruborcni & inflammationeni icnircSc tinarc oeditur. Albas Dumalcena* exterit tn'pur- ^ndoexcdlen *icribit* *ianardus.*

Scmina dura qux capitibtuRotarum inliint in pulverem redact), ac c vino pota calculum pcllero (Tiago tello) tradunt. Eandcui lacultatem iuntullilpongiolisquxlylvcllnbusadnafcunturRoi^ *li* *pulverem redactx auc in vino decoelx cjUJ* lumantur, tnbuimt,* *Vaum cum Dodonxo con- tentu* *Bachinus nec feminis,* *„ nee (>ngiolji, ob eontm adftrkhoncti) 6c (Jedtatcm ad calculum & unruti* *miculatem quaxp,im valctc, nifi per acciilem, rnes torroborando, &. refingcrando.* *Oim eruni nonnilt calidi laicsngnant calculoi, te * *cro illi durtctici validioribus valde debet UB^ tar; mirum non eft roborat* *i indvi^Ciict ut pellcn.U ulcul' i aptores tint. Reliqua vide apud Dc.»!*

Succui e fru<3u rubm nururo totuqtic lua lubfti *nta* *tulo exprelliu, poftv* *^muitiq,* *in pulvereru rodactus gonurrheza:, 8t tarn rubtii, quani alba mulieniui p-* *horis fingula;* *i expeu- mento medctur.*

In genere Mediuicnta itum celebrantur in curjtfone \$Anh\U *ntnim,* tabjdo- nun, Sz. pulmoi *tlenbergio aliilquc.*

tgrc^ias vitci & mcaciam ni *icdicamentorum & Rofis prxparatorum in phifia, p-* *Jdajtra calculo.* cantmi rabuoriim n *"Jonbu* a* *, partium • in* *lefbibus itfi>nha,us, vulncribu, inilamv* *-, Scorbuto, mohiliU**

"nil. Vuic apjt Cirolum Rolenbergum in Rhodolngu lua. dttcuimodoiv.il Rofanni rt&i OOCWBOI cfe ab excmplo ptobifur in *Efbrm. itmm* Ao. I*- Obld-v. 140. quod line [wnem,otaa nihit oJerc illo oanbta nwlt *igratu & acceptu. (IL*

Pro Medicamentis & Rofis Perficis feu Alexandrinis, aliisq, vide Monardum apud Car. Claf. SEG.

SECTIO II.

Vt Arbtribui frn8n umbilicato hnitudo momfyrmo majorty feu

Dt Tnmfferis umbilicus u.

CARL

De Arhrcpruwifera InJtcjfnicUpfriftrmi, Jambes difta.

I. PnmM MdlAsrit* fnSm unhtkt*t> Pjrfjmm Jmky Jt8* imwr. Jumhi Park. 1. B. Pitffl. JK i ^ ^ i W - ' II. M. PttJkfffinU frxim Mtluafe C B

* P. 1. F. 17 p. 37.

H. M. Acoft.

Arbor est, defenbente Acoft*, grocera Ge vjflj, maximim Malum aurwrn zquatu, mulet* & denis rums tn Latum expanJtt, midtimque umbram przbcmibuj brachtan, itpcttiique pukhernnu. CmJtx ambsu brechu uniu amplexuuii paululum exc&k, coroce onereo fedui, ur 8c rami majores, fed mags rulco, Wcult tenores Tindi FtU* bino online ex adverfo lufcuntur, peooltt curta, uafU>,vtrklibus tnidentia, pJthernma, la*vu; cupidara, ad p^riolum quxj.ftncla, f>tthanum [palnium JUC ampltui At*ft*\ longa, duo* trtfve polUget lau, craw & denta, pane [upema fanirattui, tnferni dilmiib vtienna, la pot e aftnnRCnti ac nonnilui lubacub aut vmoio iin. oooril nulliuu, netvo incedum longKudineni peruirTente u nsnte, a quo mukx venz OWKKJX fie fen: parjllela: in Utra cxuimtnt >!* in petiolo [pudman) looga (ipra et oi igme fobomtn ommtur Lp^ura funaJo* to r: unantes flores, feu in fumis liirailb pfures fimul ad tres, quatuor, vel quinque tn petiolis bte [pud exhibet,] tetrapetali, fev nJjro purpuraJcentef, vivid! admoJtim colons Actj*] ex viridt albi. antes petalis ex oblongo rotundis, ixru* concava feu cochJcatis, riaklis, btiucuk iliftannbus, &u I. M. E n :>ito nW ad petaloruni unguis onus exic denlus pentLillvs ftjmimm oonfenoruni, longiiftuJorun^candidoruni, *fmk*e* albicitnte Haveleci [ambus inignium; & in eonim ntedio y:;]i albk am cralliolus, farractus, & in apicem declinent. C*)* flora quaotor bfcvibu>, btb Ac fubromndB fojus conitat. Sum autem flo-ro, dum in rigof e lunt inodori, car i auton ;'accetant (quo tempore e viridi flavefcant) acido fea Vinolo lunt odore; L«uAu A<?* - [colorum vite fimil lunt.] Prdla rotundi, primum virides, cum <1 nuiniitatem accedunt et. albicante fubflavi, probe maturi magis flavefcunt. In vertice umbicumXu emollam habecx »i. amior calycis folis retidus ad modum Poni aut Pyri: Constat autem externa .^laculi (cumcnKM' ni tenuiffimi, carne humida, intus magis albicante, lata cavitate in media, ac ad uitcnorem cantu fitpeitvian filunenm nonni illis fungos & albicantibus obducti, in I u mcUm, Utet ronmdu*. en i ate min r, bius Si liber, qui corou: ext; I ruTo, ac fr-dkco diluto, intents iaai ac viridi diluta palpi, lapons anun, & ajftru>enti», qux vel fimp& eft, vd Ui duostrelve nudcos jjugulatot relolvitur. Acolbe ifuulmm *!k*m, Ja,*m,mm fitmtimr Tttmlum, tjuult mmJm TtrJUo mtit tf wugnamdm, Uvt, & tsmJUs htrjatJ^ mtkmJttHm ft*-8mm untmrt feriuu.

FraAm fapor duloi eft Ac grams, ac odont RoUca, valde oimcni, quern ctuni in fapote ciptrai; fngxluieft fit humtdia atque Admodum toner A*jI*.

KMJIX cralla eft UrimoU, aki in terrain dekentiere, axt*x cuterico, intu* ifvu, ligoo •albe-cante.

Poft qtuimiro anm fit fructifer, i ructum i fxtia codcii) aiim• pctfkir, & niuviuarn fine fl Ac fuStu cnnlj^nur, oini inicnj tan, i floribus, fru&i: viridi & matu 0 (empCT (in: "in.fli, JII de-cidenubus, aim nmurefcenctbta, a un fubmafcerbnui. Cu. [pudenti vero rami ad iructu* coll gen-dot tactfc ab at bore i«>cljui tur; unde conitat lignum elle fragile.

Frudui ants rdtffjuo* abot inito matife chi lolent. Conftantur ctum turn frurtw turn „rOt, «tqcc <a aflerrantur, ILUOLI tnje dteate fiii" iii*fcbnbt;) extuiguunr, fpiriculque rules co« ant.

* P. 1. F. 18 p. 38.

i. Jambes fntr Acoft*. X<r\$tkm*m *IIM. Prunus Malabarica frulla unu tixm, Pyrifum Jdmin JUt*§ wupr.

II M.

Hec quae, ae arbor ettdli eft, A precedent! dirfeif, r. C W K « aaffi.-vjnc, it qm ambm n><f homm» iniplexum impki; conice excenUs lubro, u rufo nrciocnit K nu>Li, allrinffentf, acidi

"•• jMnktlb Haminao brwnore, apiubu* flans leu (ubnjfo, fit honbu ipli.pwjxjicon.U" imen» PuU>™J>j« »tn di color* 4. A^<fc« majorAui, pyntonmbus, cum rtmtmftmt jdiump*^ ten 4rhl, w. *ialuni rybcfcencihm, cuniida aum paite Imcnruferu ftruu: nuJco cavuatum fructu amplen-

B» in anno ftudw fin. FntOui lutem deJicauor eft <; aim precedentis. Cortex alboreis tibus, >» ui U^te atidocuotu drfenmiam tii la.

Jambes

jambosarborem ex Malacca ptenfera in difljus quafque regioncsob riorum fragrantiam & frufus iuavitatem tr. n(beam fbrunt, inqijt Gul. Pi(o: Inpninu Jutem o< porpetuam fli>rdin 8t fib-Anna viciflitudinem, quod alcera arboris tiKdiomc irondbiti* & nonbus orba, ajtera paj*s ti-u<ltibi> maturis & immature oncretur, donee frondes recupcraverit, iti ut m perpetuo, tempore vemali fimuj atque autumnAli, &ui concerTum fit.

Flores & frudus *Jamfot* frigid* & humtebe funt quiliticisj infigitiiter fraKrantcs, ac proinde inter primas tiulcias omnibus pariter incolii habiti. Plururn qioque usiis pafim In mediana exiftimt. X. ji*. Fniitus enim crudi, 6c flores laccluro condm ab xfi antibus igru cum (icclclu ulurpantur, quod fuocola frigidicat lititn in febribus cxbnguant, (pinculi, rkala confoitent.

Blitti ft Jumbos fyhtfiru H.M- P. i. Tdi.^a. p.4^.* HHJMI loci mm tfl, f*J*J Prumfrat fisn im> frittclui ddnsftmt rtftrtnia,

H.M.

Mediocris c(t niagnitudims, 14 drciter pedes atta, craflo, cinereo, lignofo *tmkt* teda: lignum albicans prxdurmn. *Rams* ac luiculi gnicubti, necnon renjioicicijJilianguii & alui, pntniini IU-bicundi, dcin (padkuij votillioresver6 alupnvanac rotundjores. *R*Jix* nigricanccoiouce ceda. Fo/wbreuibui, pb>U, purpurcis acalatts pettolis, exailvcrlo ucplunTimm ramwis inherent, oblon-^o-ortjuda, gliW.1, daiIJ, virorc mtenti, longkudtiti: (ex, larituduic quanior ferme pollicet (upcran-cu; odor nultu*, lapor aullerus *Fterri* inodon ac audi, Jlonbus *Natijmbom* haud abltmilcc, fex o!>long<Meretibus, jcuminatis, tenuibu*, purpurcis cooftant fobis, iingub bievi ac quattrangulo pediculocxersmU ramulis innafecntes, necnon bto, profuncoj aallo, viridi, in lex ban 1 as Icclo <-ceptt cilyce, quiaptartnu liffuper emitt ft*mfu* robuofti, citiindntia, oblonga, purpurea, mUcundis falcatis «*pichi* eleganter onuta. *Pnmu* maU iinnt pjano-rocumia ac laca, oblcuro rirorc ni^ tencia, in vcttice *fyih* oblongo, JiibvuiJi tluuta, ad balm vero ialyce piano, lato, craJlb ac vindi exccpra, qm oblongrt Titos cupules laic extendfinSj ac exteriora *votsia* rnedens ftclbm exarte refert. Cncntm fiufui hi, quanquam matunorcSj duri funt, came incus albicante ac (icculiinta, iaporilque valdi acidi referti, mtraquim plurima angulata, albicanna obfervantur/MUIM. Infieper rluftibus hifce tranfvcriiin diffcdis lcnium totlicuii elegancer in [pcaola: arboris formaniper carnem difpofin albicanccs(coficrunt; qui umen ab aens atudu inox plane nigrclauit, 2c It a-fnioerm licjtiore eflent imbutL

In tli:mt;ium ripii alnjqiiclocis aquolis plutimum h*c arbor nafutur: femel in anno, *msttle* viz. *Ltem* (i Augultoj *matuOG* exlubct rruftus, & ± laouiu anno ccruo aut quarto ad vitcJimuni ui uter fin- ^*m t--fitfera manct.

Tru^tus .iitem hujmarboris abindigeniscoquanttir, *Se* cum alii* din* ci>mclumur : *taccat i fm-firm.* " M f exprdlui 8c me Hi j. lummi aphtnit medetur, IK *non Job* n;tAnnbusxlurn potentercompcrcir. E foliti, contufis uuupl.tnu tonhdtur, quod capiu rafo in febrtbui connnui* tnipofituii Ion mum conciliando delirium lolvic.

3. *Jsmtet* (lyvtffTU MalabaTKJ SjtjhtvaJt dtStu. CaijM Tijimbw H- M- P. J. T. M. f. l (.

Arbor eft vaftaj magnitudinis, caudice criflb, ramu cinereo, lapom amari, oilorifj, (ubacidi, June itulii in oibcm diitubduiuta. Lignum ex alborUvelbens, denlum, conicc vindi, innis albi-cinte cindum, qui crulu nigncante, loibia ac alpera tniuper obduAu* elt, *RtJix* craft, rum, albniinte cortite mutuu, necnon tibrir luU longc tateu, per terram dtffula : tipw aatsfic amana, odor.ingr.iuus ac ccircit. *Folia* icL-111 molliun plura lunul juiidj, crallb, br evibut, atro pttrpurn pctiolis) ramutonim exncmii iMoveniunt, oblongo-tixi;n.U, acurinruu, cralla, ilenlj, in imhicii creciut.i, lupcinc coloice aco *vndu* *ip* *ndencu*, *nuclin- vim.iidilmion;* *Ipitluiuuii* «c *ampbu*longa*, pakarna laa; colhi *maH* & riridi albiatt. Nipoi jmarus Staaii, odor Cuuit ac Ponuim rinofauu macumia icdolens. Vctullii)raai;teni tolia ntn iofitf h.igilia fiunt& dccwltit, .ittjtie lui Aignura in ramt &mmcw rclinquendo, ranis cubenbus cos dngunt. *FUnt* inxlori ac atmri, Honbu* N<. *thSchtmku UMLA* abiunilcs, icdem ramubmm excremu inter expanla folia provcniunt, cuilibus n 1 minim rotundis, ncvilibus, nurpurcii, glabris, nitcnubus, ac *Auu*, tres, quiOictrve utnas luticas Inngts, qmbus plureshincinuc aahzrenc, atq, c calyce aailo, rocund", vmdi-puipurco, btprtico aut cnpartito piocdunt, quatuor oblongo-totLiulis, acuminati), ^rAili-, ex vindi albicanfafu*. acpeU lddi flis conlhntesj numerofii lbmtnibut *purpurcii*, *Havicanubui* *apshut* *de* *ott*, tneaiam Ho-*d b b* occupantibus; *ifter* *mxftnu* *prodit* *oblongu*«, purpurcus c *ficha* p-*dictnuin* eminent *Fntitmt* P>m nolhatibu* luu<i abimules, at intctuiiUtioro, ftipcnu* anguftiorcs, quamor angulis craffionbus lulcari, &: in vemec calyce Horum (iirredo coronati, oor-tice tenui, undic^ cam ardifferne adhartiw, gUbro, niwnw» pnmum virtdi, dcin ex Candida rubefcente *inAi*; uarne albiunic fle *i coraccut rv. *ficante, densa, lq* ••riloiw ingratiac anuti, in-tusTCRtti, intra quani nudow lotatur obiongo-rotundiu, aim forma, tum (ubllantu 6: Upore glan-di *pciiimili*^.

Nalcitur locii rylvcftnbui ac hunudis m V** *Otiunfr** aliilque prwinai* Mabbar: perpo- Um, tuo rronct, flore^ ac frudw fert, quamobtein Brachnuntt S<i*f** i> c. frullifera arbor nun-aipatur.

Kthnici 7f'' Tai peregrirutora furcul* hujus arborii flonferii & fruAifens (cle oxorrum, eVf i *ut* ieros de colkt fuipeiMunt, 8t ad prece* numerandat uiuntur. Porro *ial'u* in edulitt dint: *fiic^u** <folis exprcllii, & cum olco Palmur in unguenti toniillentum coctis lcbiem lanat, ii eo pan *afic* i unganir. Nuclei fruituunta pulvcrem rcigumui, II, *diarrha* im lanat, li cum limn t*-*pno*, &cc3uro fli laic cbut>rato mixtui-exhibcaur j li wo cum iiruabere 4c IUUAJ Unionum I'-*natur*, twdmo niftlaur: uruu human* ii admifccatur, quibuicuiKi, venciui antiducum eft: «'''

vino ii propinenir coiccam passionem lanac j cum aqua mixtus 8c exhibitui, TCI foris applicatus
krmorrhoklum dotoresplacar; tandem cum lade muliebne epoa yominim area necnon K
ram aliofque morbos bibotot curat; at OCUB «dh)bicut conan atftdibu* condit.

4. Jtmkt fjtvtfür* SmmftrwM Itfhu dtr.

Tijms Samfrev*! 11 M. P. 4. T. 7. p. 1 f.

Ptxcedenti perquam iimilti eft. nee proceriute tedit.
tudix tamen ex albo flavelcem, riaratj, amara, inodora. Ftmu purpurci, ftuStm quadranguli,
fapom primo dufcu, dan arruri & ingrjtL

Locus
Tempus,
Ufus.

Provcnit in vann provmaii Malabar, locii mm 11 um iHtginofo 8c aquolk Smgulis anou ma-
euro* exhibet thidus> meniibus viz. Jantuno, Februano, Martto & Aprili.

Axbori» hutus Itenum durum dt ac loluium, atipje open hibnli accotnmodum: Cxtera*veto par-
te» eundeni plane rubent ulum cum S*mjh*vsJt.

f. 7«i4#i j^/w/frii iMtfM, MaJla-katou T»pmbou K *tF. 4 7:8. p. 17.

H. M.

Arbor eft mediocris magmnuinH, 14 circiter podo alta, caudke aibicante, va:» ramis in orbem
tliffiilBdonstn, qtn corrice Icabn), primum nifo, deindnereo, laporu td iiringerat, ii, odorti que fyl-
vdtm obdurti liinr. Radix Hav. cens. r I'o cwucc te^ta, iinrtiioia, iniipula, inodora. Fila ge-
minau brenbus pctiolis online decudaxo raciuil» inherent, oblonpvfDtumL, acuminata, craiia,
denfa, gtabraj^am>>Tidia, lupem/ nitentia, mfcnK noquxqium; nerru aliquot c -ofta media al-
biciuuc, KM avert* pane alre extnberanre, in latera excurrnbnui: laporao dca & aufterus, odoe
nulum. h'Urtt exigin Tilix Horum magnkudine xmuli, purpuiet, modort, actdt, numc
tencioribu* proveniuru, *A calrce viridi in manque rocurmia, cochleat s mltar .oncava lol
lecto itihxrent, <pin o., am lex cram*, mollibut, lubnxun.iis, ac extnora vciuti rejicxb pcuus
ftanrn; in quorum medio pilm prodit, indent purpureu*. fope
litate fbecedunt /r>^j lubrotundi, nugmtudme Prunu hand abluuiuio, umbiKO Ltto q
tn vofice prrdki, curate riridi ancti, urn^q, ilcnU, acnit ac ingir
quam nucleui toctrur albicam, indent j
Njfcitur frequenter loos montane in Paroc aliis, prmmciB Malabar: quocantui nuturo. fort
fructu i, niaile viz. Augufto.

Locus
Tempus.

CAP. II.

Prunus frtrftm umtd*:*!*, pprformi piw/V tntm-fi. UmMmi, II M />. 4. r. «. ^. 41.

ARboreil procera, ^oarcircr pcde&alta, caudwe craft>, niuluii], ram>lgnf>^ Ut6(, iM'utf
donatos inti s viridi; necnon f rculu nuroeroin, ngki: fufco, i{labr>, ac nitentibu> (pmf

mlupcr dotam, undique onuti iunc. lignum albicam ribtofunt, ticniuni, WKtKc unerdh
innurufaocl !.»pom liibanun rectum, cuiia mamx rubtiundaj prailura. Rtdix
riti> cortice drxSa, laponi aman, odoris terrefttrB. Wi sa denf ., lEnnoioi brerib> *c rottuf
tii> pcoofa jmvemunt, obfcmgo-rotumia, aaintuup, aaib, denlj; Klavachupenq atio-vnitii*
loterna fubeicibui do*ap enope onickum cedt & rrotum; llurpufctm quindm blnag JioHoiit *»
niuutx toUuii* conAnnet, qttaiqac in medio Hivdcentibus tibns ywfa* doari* trjditt. m¹¹*
quo limhi pnnbdi/y/wniNrwiw, exMtm: fapor ingrao^ odor nuUcfc HfdkuiJ pan ttmii-
& afcM/h* py(toftie», fabrkdtt abtttu MM. ab a onib undt. nwence*. **
in veiricounibilitocofoiuii, carne^ vind<, denu, iuctt.tenci <nuri mrutre
atlum Krret rubjcamdam, Nudcum mefadem candidum, fufto pntnum A* ciUn* H
deiiu auren ingratuin rahnquentorn (aportni-

r<mtf
If-jri..

PrOMnkloci*campeftnboi 8c ar<od> in Paim si aliis, provinciis V4alsUr. Quotann
nonnunqoun bit, <naoin> fen (m&tu%, Januario, »it 8c Maitki meniibus, dnuque fu^
rrunct.

Ufus.

Cortex, Horn, fni^ii ralent adretru* Manum, PWenjodwn alinlqnc cephalicos affcau*
E cortKf m aqua OMmonJ dacortiohtj qiut icteum, in-dropcm, akijque chrunwai njoboip^
tenner amat.

Radivu correx cum Santalo rubro tn pulrerem roUrtus, ex euque cum lade iiii liebricat^W¹¹*
confectum *. uigmoibus impoiKam bobcniboi Vcocrea modttur.

CAP. III.

Trmnti Bnfilitnfii frailu umhilitato Pjrifonm, t\$*k Cerofmo ftri.

Ibinb* BrsfilUnJihits Marcgrav. PiC

MITCfT.

ARbor cortice, ligno St nafcendi modo G**wfr* fimilw, ramos tsmen lubet ut nofra Cera-
(us. *Fell** fert duos aut tres digitos longa, [teretia *PiQ* membranacca, fupcrius taturare
viridia, inferius paliida, uno neruo fecundum longitudnenij nullis vents tranfv&ifo, day
temper libi invicem oppoiita : in ramonim qiwcj, extremirare duo rruffhislibi oppontincur, in (iis
pediculis digitorum lonsis prope opDofita folia enan; fUvi ieu aurei coloru, mignirudine prom, (e4
rorandi & versus pediculum turbinari, umbilicati, umbilico i flore reliquo, cuttculi tenui vcfhti,
carne fucculenta fulva, faporis acjdmfoili ac paulatini anuricint.j, hand inRran, odons
& vinofi. Continet lapidem, (ia-pe duos, in uno latere pianos 8c tonjunrtm, citera
magnimidine C;raaiini, qui contmce jntus nudeum album, anuncamcm. SimilU ell f
net facile dignofcuntur

Magn.i copii line rxm comeditur hie frudus, 8c ab incolts venum expomrur. Per ralcoLu cranf-
plantatur; ob excellenriam fruAuum ex (ylvb in horcostranLU.

Inter folia hinc iiiiJe uudta floret cum pediaib adnalcunrur, albi, uc in G**uA* ferc, *Pifi*.

CAP. IV.

Fritniferd Inl_{ka} fruflu tmbili&to [*iuOt> GroflittrLe fimli,

Bella Madagam H.M. ?4. T. J9, f. HI.

H.M.

ARbor eft fpeoiii atque prarcelfj ptunWbn j uuUkt craflb, albicinte comet obdufto, ri-
raoIUq, vindibui, furujoiu imus niedulli rctertB plunmit donata R*J>x albicaiw, flarc-
tacnttcomce re^a. Upon* acris. *Fait** Modif(an) folhi a. in forma tum magnitud, <: ii-
milb. *fUrt* luavcolem«, inijpi.li, plures f m4 juodi, extremis rami
in qnino,banjos acuminatu (cAo intuncut: cunftane i> ex unico t.n> o
aliquando trilv.l., Ciperni .ilSo-ftnato & lanuginofa, inferne vindi-albtante, aainque tcnuibuj
ftiminutit medium ocuip.innbus, inter qu<j?/*< prodt candidtis, oblongus, ctpitulo rotundo. *Fm-*
tins fibrocundi, viriics, gUbn, UVH crispis haud ablimils, at quiiiq, iiigulis (ulejti, & calvee flo-
rum furreflo in venieccoronan, tenui pellicali ancli, carnt^, vtndi&adftringente intus nifertijin-
tra qu.nn *ifuulum* tocotiir candulium, *nudtum* indudens albtantem.

Crefcitlocismontankfic arcnolii In M**z*tu: Semper virtt, floret ac rruftufert, Atiq, frup- *Ucm*.
ra manw.

Exarbor foliicijupJjfnu conficitur, quod nunoribus tmpositum porenter cos emollit 8c roa- *Vires*
iraL Ex Uldem in aqiuocoda Apozenru prxparatur^ quod uinam movct, & mcoftma obfruda
provocat.

CAP. V.

frmufr* BrdfiUenfu fruclu umklitsit, »ff<j firut*, fin fmlcttt.

At fitswgsftu Ctrtfm Brfiliuau Pifonis & Marcgrjv.

ARbor cfl tig'iri Cerafi noRritis aadx, nifi quod truncu* contorbor hinc io3i cum tunii
diiftiargacur. *FtiU* habet Lru, fupeme Taturate vindu, inferne ailuoon, biu iemper
"tact. oppriHta. Ad fbllorum exortutu multos fen ff<m, m podjculo cenrnitt, albol, qua-
tuor lulus confUnic, & multw ftajninulis. Hor< Uquitur fr<a<j minunu, m*gnirutiine vertiaUi
iutaouMw., rotundi & odks proffandi ftriaft_(i) umbkkopndiui; cut<cu> rdhtur nunua,
ceraiuu, pup.[^] qtIOq| t1, iniaiu fuccuie,,[^] ftp,[^] ^ i ^ & Jubanuri, uimque gran moon adftnn-
Knui bpuiem tonnnw rocunduin, paulum comprdTiim, albicanttm, fund d<nm, inquonucieM
titur albicans, amar fapons: <^i lapis, f_Rnolu non [X>refl i Upide fruflu M ^ r < ^

f m & » Icainda: nwnCe detuab nan lolum led argril prodefle (bient: ventnculura mun Unaud-
dum mire rchaurtr, flatus difcutiuju, naulcam ftofn^hrreprninunL *Vires*

Ohm fylveftni [antuna crai Ywz arbor, nunc ob utlitr 8c efcgantiam in honis Ufiuonmm
liur.

CAP. VI.

Pniwfr* Indica magnitudinis.

Katus-Thuks ILM. P. +71 18./ 59.

THdrex fpcuCi eft minor fit humilior, craffitte Pruno haud abfiiruli uulut, conux obdu^d
ciocreo, necnon...iuiul*jirmttbu*, quadrangulu, ac fukatis, plurimus idcnt orruto: L*
mm albkon>, irufcitu urn, Lniipidum. AWix purpurca. ^#/M Rcm' <> ra-
oblaog<>-rotLknda, tjjijij, JCJIU, gUora, iiperne cotore atro-viikb nicecw, in-
iunum lonaa, tret quaiuurve circuer liigitos lata, inliptda, inodpr<>
flavlcence. >'<;« t furculoruni excremii inoiiori ae inlipli wiuncur in Jii* t'ornuni
ofi, quorum ilnguli ad floret Lilac accedere vkktuur, oblun^i, cimijiii, quin
molluKu, & i extroi Cum rcfleiiis fubutt aiDantet, qtiinque atbicantibui, credit 6t
acnmuwci* J?4MMJ# medium occii^N**^!^ ftucttm, Nuiim favelcent cor Jiumnxiiiic xiw##
oblongo-rocutJi, cxiguoin vertice umbittco prxdio, f>Ubro ac I
dens can. 'liii-rUvd'wcate, iucaikati, dula rdati; lacra quam 4fmu*m cominctur, *»tk
>uum, duiceni.

Naiotur ubtq, in Malibar^ prdmun circa Hmftk: temper *irct, quocannii floret,
rert, menfibi>; vo. Augufto, Septembn & O4ob; i, at diu fnigiferj non dL
FnJctus loco Aicqux leu Kannyr cum tobo Betel frequenter mamlucuuur. Arboiu cortex exu>
caru* & ia puiveremredaichu Uo\, exhibwui bib ardorem tompefcere diarur.

CAP. VII.

Amgdala m\$mm Indus, frmilm mxMtdXm, mmdnmuiU, trrtctc fmlvtmrnta trtfiU* stile.

Parus H. M. P. 4 T. 15. p. 33.

ARSoreft prxelQ 6c fpeaofa plurimum, ta tiruter ped« altt, caudkx 16, edes plus minus
crallij mulri/q, raniiii ongc lateq, dafufa, accortice crjHI, unrcu, intut rufo, obducta,
dotuoo. qui vulneratus lachrymam fundit refinoUm, candidam, pelluudatn, «!«' atam,
acrem ac amarum, que r. Jiii (blaribus undejn H-ivdut, Ipiildut, & run mltar hJRI!» evxaK.
lignum Jenlurn, ex albo fl. •^M U4a H itt, ii i i, ol r M BOB hwl!
fus longe Uttq, per t terram dafufa. Flos sine ordine crallis, rotundis ac cineris perolis ramuli ii-
habent oblongo-roturda, acuminata, craffa, densa, glabra, fplendentia, longitudine fpathamam, lat-
tudine palmum fuperantia, fupernc viridia, inferne c verdi flavcfcentia; Lapor amarus ac refinofus,
odor nulluj. Flores circa ramulos teneriores candida lomeratim non fparfim producantur,
(cnioi i pone •. •. •. umellis umbellae fpecie paruluntur; conftant c quins, oblongo-taretibz, craffis
candidis foliois, atq, calyce albicanti in quinque lacinas acuminatas f. w> innxicit numi
ma nuda sine ramulis. Frufta' nuaim JiiRlandn
ma mundana v. uuij petiol craffis, ign ac rotundif pro*"
tiotes, infcnut angulboio, & calyce :orum vent'a caulc oniat, quot tejjit r»ub>inittS
cottvi, conaceui, *t>o purputcut ac tnbtt anguk* lukaruij out hu&unuruotkhiluc piaoc, 6ctn-
i timinuf, ac nucleumeiiubot majarem, oblonto-rocondun, undw. - uocaU f»***im<
uti in nuc' Avelbiu te.-n.tur, Mpuru I. haman & fubaltrngenta. Hec autem pulvinata calyx qui
frudum ambit faribu* incifunf vainer at
que acris •irtu ptxmui Sit. hancanda inftar fpileiot. aciUui r Ielcit.

t rcficit ubiq, in Malabar; perpetuo •otklct; linguln juniu nututvM profen frurtut, menic <v-
April, & non raro; oo I u gpera niaiict annot,
Ex .nborum tenerionun crunctt nuli narato Bow : ex ille, cum prorcAwrci funi ec<jvair*
navicula majura (Ats>ij~') init oonndum, qua.um ttooauUc 60 in plures homines veba*
poffunt.
Retina quauj radh, cortex, frudus, JUtque aiboffa partti fundunt cumolco tnpofiore vtt par-
ciorc excocta, JO> liquid* vcl dm a* kx> uUirpatur, tntfiper thn(-.) in Uaihan thurk loco
adoletur.
E folis difcos conficiunt gon cdet In quibe* arbotn turtnileureitaimcvi.iiiunc 8c (errant
Fruftum nodi concti, & cum. j qu calya fcoer Porphyro em levigati ventriculum :<boranr/
nauicula & vomitum tollunt, & ventris cruciatu nni i^nt, Ckoleram fanant. Ex arboris refina cum
Sclami oico diluata praftans fit balffamum vulnerarium. Lhicro pulvenlata fit ex W^afafo^*1^
mo ihig, Vene jj Jt^'.m'j potentc unit,

Locus
Tempus,
Vires.

Locus
Tempus.

Vires
Ufus.

CAP. VIII.

Arbtr India VriqitfrA frucfu umbtitcto certutfo Vrrfta fimiti.

Raft-A ^dsr* It M. P. 4. T. 16. f. (5).

A
Λ til ;, ramis iubtmerets ac vindibus, in orbem lonj>c btct), tütFuiw, donaca. Ijgnum albi
X j . cms, denfiim, cinereo cortice obductum; cuius niitrn purpurea. Radtx crafl,i, deaia, na-
vulcensjurvo cortice tecta, necnon profundi- terra: inhzretu, h'brilq, iiiiis Uu-pcr eamdirlula, iaporc
acn 8i IIIII o,odoro gravi. Felis brevibas ramulis inhxrent,oblongo-rotunda,glabra, mollia,fupcny:
viridia, liibrus (ubviridu (aporeacri & amaro, odorc nullo. hiwu brevtbus at vindi-ruicis petiolis circa
eotdem cum foliis ramulos proveniurit, vindlque ac protundo ctlyd inlident, o l « tcreobus,craffi*,
den (is, acumtnam, candidb foioi is couftantes, qur exerorlum rerie\jupici bus area peiitulum co-
cunt; tlccin aut duodceim candi m'mAÜsfidminiila mtdi.nn Hom ^avitatem occupant IIIH,
inter quæ* fjlu* prait albK i is, apice ort Mm oblongo-rorumlo; OJor (uavj*, fax>r vnarus. L'o-
nbusfucccduncyrirc/w globoli, • morum minorum tru^ mitudine xmuu, exiguo in vertice- pixritti
utnbilico, cortice cnih, molli, tonicntolo, ptirpurco, mtulquealbicantcciiKti, necooa carne ru-
bicuud.l, futculcnu, vibbiia, tenaa, aciJtnuc (apons, intus rcferci; iitra quam 4^nr/wwtocarurob>
longo-ronindtm, rubicundum, nuo'ium includem candiduni,amjro^ulceny
N.itbtur locis, i is & niontann m KMMEBMM aliiUj, piovinaa Malabar. Semper fron- L*c*t.
det,floret, fmgctq,, acdiu (upcrit* tnanet:

Exarboris MiisoimoieocoAis unguenrumconfidrrur vulncranum. Raiiix catlurciet eft, luimo- i;Tr
relia, troths ac pitntolos per alvum editCtt. fructus .utem raro comeduntur, quoniam irapense
languinem calcfaciunt.

CAP. IX.

Letm *fh*r Park.Gcr- Ltm trier fruiim Ctrsi J.B. Lotus /nil* C«*fi C. B. £Jtf Jpttlh
lt(C : i,l tft, Unit* m-tor, *fig*r*fyharm.

J.B.

L Ociidirt.i arborm.iRtia eft, caudice craffirimo, r.intisCcrali inrt.u bnchiata, fed tn Ijtim-
tmiL-m nnRis tituni in atminlrncui extenit^oortioe Uvi Iiilubiilo (ut Ocfalpimis ait,ut Matth.
in ca-rulciim nigrefcenrej folhsUtmitongionbtts, Sc tnagts in acutum odlnenobra, tnfe-
nore paitenonnjhil incank, 1 pern.i viriibnbus, mgoi>, in ambj: terratis, in icuttun ^dinenti-
bus, queni hitnobts cum lico videntur habere counnuiw. Ad un amquoda, fere lolLini dIUca
(ubmgrj, Ceraib (ylveftn fimilb, minor tjnicii, ex longo pedtculo, pulpam paucam albam conri-
n^iii, ami dukedine altnngenteni, graratn: nfficulum ad IrruAut proportionem uugnum: bocca
tou fioriffima, ut vtx ca quk latari poflk FloicuU, telte Cxlalpino, ex binu foltoli(conftant, (iinv
inn titiam iniidentibtu : Dacermgrj; oHkulumdum, vdtinmdnaKUCum. intus unicilemtntt
incilulla ilulcn.

Si tlotis Gum rate del cribe Cefalpinus, in tmltri n methodo ad hoc genus martinet.

Muloi hah.i- 1 locis reperitur fpontanea: nos circa Romam in fepibus e btSmriam, necnon in
GJIHJ Narboncti circa Montpelium.

Atlx>r hxc db rum p<uit cupis frmftuum duicedine capo UtyrtU (bdi, cum Lorophagts per-
niant(O ut cis ftuerentur rjium ad (oas reverti malucrunt. QJII cnitn gratia erte potuit tarn
ficc. & cxliicci ponu, nth forti in ii* regionibus carnolior atque «iam fuivior quam in no-
ltns tic r

Alibrem hoc in loco 4 nob» cJ.B. defcriptam ipiiffimam Theophralti, Plinii alionimque Ve-
terum Lon:m cile pro certo affirmare non aufini; jdcnjuc an vti cs Lot« ab us adcript* huio
convenum n; cio. I fructus adstringunt & alvum tiftant, matun nuntk RarjKntomm decorum
»el mruluni tiykn; aneis feminilque profuvio l i jorantiba confert. Rufati; avóky cu imredditca-
pillo* f quod pt«ta Diolcoiklem fit Serapioneni na»o cradit) coldirn^ defluenta contmet.

SECTIO III.

De /frbortbusfrnttu vmklicato humulo tjm p<ilypnnis, quam ttwHopy, feu De !Bacafcrit wnbilkatts.

CAP. I.

D*Uv* nifttt fh* Grtfmtdru, Cfjf Ocojstfrn imRi.

U Va crifai diAns est hie frutex ab troortu 5c vduti cnfpU fol: & acims quos product* Grojtjliru vero i dura tlla membraiu feu cudcula, qui oWucuntur acini nri, rainducaa crepant tnfUr membranx qux durumpitur jf.fl. Aim IU d&a put:; i quod Erudus Grodbt referaL Cote vox est Gillia Grtjilur Luuu facu: cur auctn Gulu iu CurnotUtel Grofluhrum Vetenbes tun Crxca qtum Lituui incogtuum, certe mdkum optnamur.

Grffffulanam fie defcnbttJ Bauhuiuj.

Frutex estbtucubulftic tncubitJb, oc ettatn major, numeroU (lolonum iegste lusunam, in rJinukx lubdiriftit. cotnee purpuraate [in aJultiot IU.I ram», rum in |uiuoHbu» vtrgu & circu* 1M albjoy] materic fere buxco ccioie u llicantes, foink lotiRt; aculis, acuis ac rigidu ad iolwoa* exottum [vtflim junuuut, rtnjtuUr&iB, b»n»*ut terniv Ft - ungenm lat J, noanunuutm amplwra, r^ nihil ratundi, mp^1-1 tiiviU IABU modo ^iffiiAa Rmti luperios fatuo o virore l^ctidentu, in* icruui Jilutwr*, utiinqt - hufufa [pilis rarioribus], lipora AODO, ex breuibut polxilli. t pul* cheili, parvi, liuti led n - nnnihil gravi odore, timul multo ex eodem tuberculo ex quo folii i prodi - ntes, quibus fubfit • globuli hiiUiti rui - arum bac - carum niduncnu, ex (oliolu qumis Ltrim, rubentibtis, extr - licxa, ut radiatira r - ellam ex - primant, qux totidem adrutaiqiuJ^ linjjubi albk-imc>, tmui hirfuui lurrjtentet, Horc; a reliquum eocav'cm ei&aunt: inter frnguLu j.:t;iii linyjitU* Impiia Hasimu recti 1c (ollunt, a rubr» ilufHo - rum folii* iimilicer oru: et glofc - nt, alba lanugwwarcauriimi - ni

I. GroiluUna

tiroduun a spinosa fatua C. B. Gre^Tulana trujore frudu Ciuffii, uberitis rulixns, majores foliii U baixn . aredita; que (ut poto) cultura evadit t tits. 3. Groflulana fro< - ti maximo, hifp - x>, margariunum fere colore. Nofrratoi GroftTulitui bam maxinum Belg* am vocant. Goli i ca 4>n;>OTbu*, IJMu longionbus& vahdioribut, i - rtuxmto albicante, aut Margaritarum propincoium . lorCj fundcinonnulliij, Cl [p&ari Gool - Itfi TP dicitur) Ipinulis innoc - v k i. UlploOt UpOfs QCBOwO - utnrj jltL-.j, rotii. litionbut C. S. Hoc genut (ddoibeme Clul'k>)an - rinos nigronbulu, est folis; Ipinus ad fingulos loborum - ciort.i biuii vd unicjtn lukia, i - dum etiam nullas, beves & vulgari multo infirmiores, pneter aim iiiiite»8t iongr brci - fim ramis cortice ex tuk • i ,>• irilu-tuc :'. :^ nOflioBOW ; HUAm vii.ni imiiuu.ij est vulgaris . in - flar virentem, qui maturus purpurafat, plenas autem matur •*tc ex in. pura atrum colorem contra - hit. perinde ac nonnulla grana. Triplicem hunc - jji» vaneutom dek - hit Parkinsonia. Nimirum, 1. Jam delcriptam fructu obfcure purpurafcente. 2. Antram hinc simile - baccis minoribus, ru - btLUiKitO^ - bus acili cum dulcedine. 3. Tertiam vulgari fructu luteo per omnia fimilem excepto colore pulchre rubente. Forc Grof. vulgari fructu rubeo C. S. Item Ungaris mino - rem nuriuajn uvani a - ire knbit +. Hit addi poce - um jxo - Jiiinnt.1 jionu ParkankMus Groflularia cœrulea, cui folia majora & primo exorta rufcandiora jRnbutt quini fine (eatnd< varietatis predictæ, baccas in ramulis ramis litas, minores etiam quam præ - minora, colore cœruleo Pruni Damalcœni inflar, qui pariter ietergi poteft. f. Gioiiularia virdis hiflata Park. Scinz huc : iiores: frudm vinda etum cum pl<nc nutun, IpumU leu lew inno - cus obftri, gultu prærelle - lua ombttt tiuki & grata Ex hujut Jenumbu enau luni 'lante bac - cis lavibus & mino - 1- III: - nji>Dd aono utruleo non ipuiiuU, <, nam in hor - tis nunc haberi ait C. Bauhinc.

Am< in#Uji «aa», nee uilum fnju> rdbraudit: in GaJlu Narboncft, lulia, t^^^ ca - bidociba regionibus mir .at fafquem IKX ruli in hoitu fere repcnair; per tu am Heive :u>t 'n •* piba vulganfima.

H pibus hœmum opel Mnprimtf comnv^Li d! . Facili m erum lu'urur, defuc fruacM ti propagat lo - ptam, & Ipinis his manum prolabet, & acims jucundi lapore placet. Gys. Veris inno pobet ac virelet Martio, fepe etiam ante. Floret Apria: Fructum fert Maio, quem Junio & Julio perficit.

Tmpu.

Fructu

Frmfms immatunu adhuc & aciHus coquitur turn camibus & .pilubus, mm liuui luo luiwcido
cibos commendat E bacets bmatnris probe uxiis, comuiis & Uocbara edulcoratij ami tremore Vfn.
laAislautifiimuni ferculum parant nofrates. Placenta: Mam annum Jdt^Hjnt.l, qius Tmrtja
rocan, ex cis Hunt.

Ipe autem nuturiu frufius (mquir J. Bnunimis) puens, paupenbus & gravidis nmlieibus (atu ex-
petitus, imo apud nos dtdorat & dclicationes meliora genu non .ilpcrrwpuiir. Siint autem adco
uuuniz & ventriculo .imicv hi baccar, ut nemo unqum, quod equideo aiklivcnin, excatum est
quamvts ad fjctictatem u(q,ingdlerir, vel minimum nocumemum lenient.

Immarura:)ulculu inco&c febritntibus non fine utilitate cl>ticntur. I-Yigular namqtic funt &
.iiftngcnnstiu.ilic.icis. Quapropterdivci-lituodi adnunftiaii polTunt cKokiiUj, c.ilidii, &bilo ru-
fcitis corporibus, tamfaiiis, (ludmigns in intiiititius & Conmmemk Valenc contrA gravidarum
picam: Appccuntiam ain exat.int. Orane ventns proHuvni, potiffimum vero Dimha'am 6c
Dj'fctitei Mm St Iliacim p.tffioncm compluint, ut tradit Mud nolus. Com cncnilamur aiam ad
hxmoirhagiain tjoarocanque, Gonorrhoeam 8c fluorem albutn. Utiltter ctaxn appliuntur intiinv
mationibus talidis ;: Erympciatis.

ReAi- aivan monct Parkmionus immaturanim cfum kn^iorem, qnumodacunque pr^piarcntur,
ventriculis fhgidis & Hafibus obnenais noa peniancdunij ne dolore colicis aut tormuu indticant!
Nobb equidem liberior carum cliis in quocunque ventnoito bnprobondus videtur, non uni unod
flatus exatent, quim qudbdcbxitipcrantcm addkatem inteftinonim tunicai interiarti corrodere
Be violare aptx limit: in condiroenris amon8cwntmmani, ii modus adfnbcatur, egregiar (unc: in
cibis etum prohanMB modo tion (ootJmi Si nimta (jmntit.ite lum.innir. Matrooz noftne cum
Saccharo conJit-is afferrant pm Bellirii*; lobncitamibirs autem conveniunr.

Vinum cci.im L^ matpris parajit no(tijt'j> hoc modo, llai^ui indoluini rtiilisaqu* ferventis q.f.
affRmdunr, fit vafe exaae daufo per n«quacione hcbdnui.hj.is tettam (iitnnr, douce;Iwiuor twect
rum fucco Pi ibinta penitm jnirparRnatub njent, bacca; autom plaaac at&Aa: 8c inlipuLt reddan-
tur; dcinde exnaufftim com iacauro inaop illas vitas infindum, quas probe obturatas ad tcm-
pus refervam, donec liquor cum faccharo inncm mtutu& 8c fermenutu* in generofum 8c vim emu-

CAP. II.

Dt Riheftc.

A. I, Rtiel vultit frKciu r*ero Ger. ^n *iJm ruhtr J. B. frttcJm rmbrt Park. Gram-
iaru muUiflici terne, fvt «W» ff «s brrtn/ii rtArt, fvt Rtbu Qfemtnatt C. B. fleD
Currimrjj.

MUltis ftolombus, paaim cratCs, bicubiulibw 5c rriaibtulibus, autaumalrioribusexunzit,
J l'padiccoaut tiierco, raatnc inhrma, virente, cum ampb nuttice (cu nxxluU,
U« crifpx folm Hmlia, fed nwlto laria, linuata, nwllicAj (iiperne viremia, eb-
hrt, intone mold lanugmc cancLcima, fapore liibalhinjenic, acido & no...nihil acrbu. hlmtt
racrmtim coherent plunni, ex pediculo tenui, unciali & fetquanciali, acido, quinque folia pal-
lide virentibttt, .ors extralium reflexis conftantes [rectis unico folio in quinque lacinas profunde
divifo, nodi, h. c. nullo calyce excepti] fennalis lex fettilibus, exiguus umbilicum modum, qui ex-
lore obfolero e*, & Jff« vire
parvijTOtnodij Groflnunis rmno, initio nrenro, per niatunt.itcii> rubri Iuu» aadulo grato tur-
gidi, plunbus Icmnulls (aeii, Boretu in vertke Rctant%.

I>jffim in hortis colitiir, April' t^TM^* *1« «« pro Vcris confititure florcru, Julio femcn nia-
tctnm I ubi Iponte provenit nonduni didictmta: huimdis tamen deleAari videtur.

Ribes Ar>bum elle non potefl; jiquidem neq, aptolos profert, neque loiu obrina rotunda,
qux Scrapto Ribis iw as taat. Yctonitii Grjcas incognita&: iudita videtur.

Hojujtriuftu* omnium confcnlii utiliter exhibentur in qui ardentibtu febnbtu laborut, noquenon
hisnm calibsalvi Hufioncs pariuuunr, auwic Trago. Namque hi acini, l>-ut & lerapia, & cdcg-
mau, anf, Rob i'ut vocant? de Kibes (hoc eft, fucuo inpillatus ad melliscortliftentiam, vel f'
iccharo) (tmi iiiiinlain rcltmguujit, vottitimes iiltunt, obi appetncutu in itan^ cho-
imunt, dylentcnus ex cabda caul a proliint. "Quidam bawhano his batxas (on-
diunt ficuc & (ttccai ctiam in So!« Gccant 6c aliavam ad caidcin aifediane*. Rdjqius
i-antlia caLtem VIICS ubtinct.

R tlx; ! ? u u flJ a ? a i u w - riores fo...!« r'ftingtut, bilem rempoar, & (ukn fol«: adftrkioria
vi ad tholerain noibum aliiqnc bdiojas alvi Huxionci, ad hrnwi^tin, uvuU tumorem, &c ufiii
effit potctt.

Matronz nofrates Kibium luccas in OIJTH mdius in balneo Mai ir (it rocino coqtunt, donec
luccas copiofe csfiat. 5 i inSaaiufi n.8 * decoquunt ad gbctinj; cofititenciam • (Glati
nam Ribium voarttj & pro delcario ad mentis fecu KUuiftruendai relcn'anL Ut ea aiLta »
u, & adomncsululupradiAo*conmt.*iiiijnu. "R^* -w>f

Exiisdem can i Saccharo vinum parant, cademmethodo qua vinuni ex imserifjn oofftehnenti-
tumetn U xueem liebitam, g«ncro(um , p :jnu* ventriculo uratuia
vehement tftingM telb est Fam

3. Ribes vulg. rit «Jm, S&M kutm fir*, J K vulg. frutia «/* Ger. frutia <lb Park Gref
fularia lortofi frwHm MmrpntM fimdt C. B White Currants,

Btccit altw, pellocxlH, Manorial pa-rtc refacmibw (apore *h solo jacandk cortice frutic
candidiore, ftolonibu* [Parkinfo] elaoorib^ rctwnbu , crathoribus, a precedente differt. Ego
pro pntcedcnos poofe varietare qmm (pectedifhnaa habeo.

j. Riiti fnSn rmhv m^vrt Park. CrefuUrU hrtnmf.t wtmivnfmBu twin* £ 8. A* Ribes fnt
rubente J. B? Groat red Currants.

Hanc fie deicribit Clufitu, Amplionbus eft rohbj atmajore fri-eh, licet acidi fapors ut vulgaris.
Hupacoam/oi variat; qim qui in vulgari herbacei colons eft, in hoc eleganter rubet & pomccib
eft. Ad hanc fpetiem annotac C Bauninus, ci:ltt;ri aliquindo m arbocem aliiic^ & .lanis Ave¹
laru matrtibus, acidiffinu laporu Florennx nfonl, reference Gefnco m lib. Ac h; tta J Bauhino
deicribenw Ribft rkire rubente rirmior trace* eft n;lgan ac robuftior, cortke rubelcente vellita:
F»i» hiifutK, ad tadum Ixnbut, anulons ut vulgare, fapore tan: illum acido, longis filium ra-
cenii* cjuos Muo mcnc piofen, fere paimaribi, figurd fere Uvz :ii-r-x rionbia limilil>i <, obic-
too rabore pttdios^ guorani hmbna quinquapanica albefat, iapore liiuoda

4. Ribes moncarpu J. EL Grefularia Jifit*8* lactu C ft

Cbf.

FruAurn fen ruJgan fimUem, panto majorem, canfertn tamen in edon poicubnon nafcen-
tem, led itnfpilarein, ut in ura cnfpj, reference J^ < Jazeta.

Ex Angha jccrpit C jrofuj de Taffii Vx enpar rubro frociu apfxltarione. i r fane verifimilis
eft Lva- cnfpz qium Ribw fpeae in fuale, .am in Anglla ej-luwxit Kibea nobis nulquam vila aut
audita fuerit.

A. j Ribes Mfmm imltm \ U. Am GrefmUr* v*ifsrt\$ fmclm JuUt C B? Gr*fmUri* five
firm am.
'B.

Fruticar ut praxdem tend vimine, anereo cottice contecio. FtiU ex alternw ruberculii a
liaiul aliquot, cum floret, plulquam dimidio mmora vjsarn Ribn fo!ns, ora crispae equalia, in
tres acutot angulot cicmitu, in anibmi ferrau, Icviflmit hulua, lupernc atro-virenria, i
Tirore fpleryjencia, excurrenc in anguloi tingulo* nenro (am cheo, gullu luUluki, c
muncialibut hiriun. Flmu ex tubcruiB Cui Jem ratemarim cohxcru, ni.mcuHi ut in vo-
baed, Jed tiortbu* Ribs vulum . '<>' —i-W/-4««~ folis tamen quinis pennic & spi-
cibus nltinttt, odore t?if i mo. Singularibus tofculis ad pediculum adnalcitur foliolam concolor,
tenue Ac oblonKum. Utx brerior
Singularibus tofculis ad pediculum adnalcitur foliolam concolor,
Salera & Jara, ubi & J. Bauhinus, obterravimus. Prove
Eboraceni invenit D. Dolfwort.

in moooubui orca Gencvam, akft
in roowitHB In tg

1. Bauhinu) hupa fvonyma* (ant Rthcs caodidiorit
vultfirem firiftu iuulo C B. Ribo genm quoddam <. Xirutx Alpo ilunt, n
miniti;um a viilgan ilifTercii, rniitu omen non \ crum tue (pc
fen a Ribe v; lo Irudn, non inlapore acido untiim. Dari aucm cjulnwdi
Ribit vulj^ariv i vcnltmile eft: proirule GfoJlularum vtjgjian frt.
planum ab hlc divetCurt & Ribts vidgans frudu aodo varietatem cile pucu. Sdpi.
Hum vcbis rmtdo allacit rune nofrun intdJigere ob locum luuletn, quamrit nuJc cam mi
minimmm a vulgin dtfcfOmn facuc.

iu to. (cti'lylv. rubra C. A. Gronulatii tubra- five Ceanodii UTU genut or u

A. 6. RiktntfTmm vmlgt Julmm fJu ilmm* J. B. pmSm *'t'' Park. 1. Ger. emac GrtfrnUn*
mm jfnft frmdm •»/< C ft »!arh Curr.itir rf. Squinancy brnrftf.

Prutia hue f**u vitiginea, Uta, xrtttt parte ICTH« pilofa, mlone fuctOa. Ftttti ex eodem ru-
bereulo pliiiet, ata taccmatin) dig. Uvz crifp r flonbuj , • tumiles, concavi, •; uuiq, folioli, n-hen-
obui extrudat i rcAcxH, toci¹. im lurrectis p illtde vuencit* . alternanto c m qutnn Hbru concolo-
nbu) iu: ftibus in moio rinds; odor, qal & fotin, grj •: baccz oblongs^ colos e nigro, q^
five nut urz, five immature acide font, turn fapore ptrain Racro, partini uigiao.

Ad nfonim ri^a* m Anglia nakmir, led mm adniodum frequent Oblervatimuj Abu
nia- m Jgro Onubrtgienfi: DrunKimtx in Bedfordicnlj, in OimbcfLndia quoque 6c U
•gro; nr.non in (icirai nuftri *d rivum infra Brantnamclrluwem piojieriontan //; ;. /J-
u *qu«, unde Geinero in Citajogo R i o lytr. jqiatakum Mi<nx rart oJor« meriv
<Ktx- Tibet Galtit Piper hortenie dtatur, tcttc RLCJJW, quid itwrn Piper cotore fe
muletv.

Nonnulli, tette Parkinlo
men Angicum argit.

j. Riitt vtum Ar«hum J. B. Ribet Aribtun filim Tttaptt Ju C. B.

Hunc Racwolhus *fie* Aefcribit, Veri Rirci Arabum *cau!*s habit afperos, longitudi. f. cr. f. j. ^ . tali, craflituciinc pollicari, colore riridi, interne (u: cti. tm meminit Srapio) *rufefcente* vel purpurafcente. Autumno invem Septembri menfc fine noroSc faninc duobus tantum foliis prae- dicitur tanquam primum prorumpencibus, rugofis, rotunda, l'ctaiitidis foliis Itqualibusj t. • adica, lij, craflis, brevibus, qua: etiam grato ilio acido iicco licut St caulis plena flint.

Hanc eandem pucat uterque Bauhinus pro Ribe a Bellomo defenpcam lib. de Conifer. *quatuor* defcriptiones non conveniant in omnibus, Hzc Spiot Celtice nafcendi modo aliquo pacto runtram referi i liq'ndeni iub nive ferf perpetuo demt, fisio **Lfpuhi** acini **pm&a**, ni *ffmAtvs* Llet & rotund IUJ, fit »! Papynim accedens. Baccas ren ex (Inu medio toborum rubras, ut in Lium Alcx^n drina, i Iypogloilb Sc Ruico conlpicimui. Septena utplurimum a radice alFurcunt folia, in a- rorum medio midiis vel raocnutim dtpendct, ct quo is (uccusqui etpnmmtur turbiditi est, la«Si (que albedmem iiabet, ideo aliquantilper (ini & inloUri **ddkf** dunce clarleat & depurctur.

In Libano n.dicitur, li A Ccdns paulu akiiis uique atWn»cipitmm montis i/eendtra. Ilaiepi ag-1***. novit Rai^wolfui R- rettri nomine & addo fa pore, ubi non]>a»a c]ui quantitas apparatut alit> mictend.i, przeipucad Contaminopnlin.

Viribui convenit cum vulgan Ribc.

Cxtcrum KxC planta nee arbor eft naque fmccx, fed ad Herbas cpipby]tol;jjrnus refdiri debst.

8. Riiti Neru/rgKKm fruStt mmbtUto. Chtmtmrm iktrm Norwegica J. B. Clut. Park. Qls- mjrrubm folia Vitis C. B.

Ribcicum (inquit Hoicnu qui liiftoriam hujus Clufio communicaTtt) foliolis 8c fnichi pro fia propottione adeo ajmulatur, utnon dubitcnr temum Ribefii (pceicni appellitare. Dodrafiulis eft, corae pctiolomm nigcanc fctis Luts, difledis Vitis foliorum modo: BJCCX in cujufque pediculi apice quamulurimx conjunctx tanqiam in umbella, non ut in vulgan Ribelio c tmiltii oblongis racemuhs pendentcs, rabent; aadidx, laporis valde grati. Incolu *TaUbttrm* nuncupannir.

C B-iuhinus m Prodrum, reccnit Ribem montan. Oxyacanthuc lapore. Duplex Ribci in Helvetiwnjn Alpbibus reperimi : altera, qu* frutke 6c h>tiis, icd nimonbus vulRiriconvcnu : li-udum habet rubrum, hortenti duplo, fere maxime ifem, lapore Oxyacanthje tmeiui refpondentem, in Valdianoruni montib' wrepe tur: altera humilior efi, 6t per omnu minor, baccis vulgari minoribus, minufq; acidis, in Bernianis montibus provenit.

CAP. III,

De Vitt Uta feu Vtuxinh, Ofictxk Myt'tS».

VActinium Latinum ab Wyaunthodeducit Salmafius in *Ttxht'. tJSjntr, jhlti jmtu**. *tum* pro dimitu: L.in »*V9w .i. elev (u) beHant *iaaJrim6t ia*Lnm, btetam * per • etferentes, M tan & tu(p.ro f*8t«v«t, Si>i>f pit) SrjAff, (Jt limiltj. Et fanè Vaccinum Virgilio, Thoo- criti Hyaunthum elie, & de Gioic diu luce cUrii eft i. unic inepte id nu>mc> hojut fructu fiv; &u) ...jbuttur-*

At iveq; Vitii Jdxx Theophr. defcripiti fata apte repondet ulb huius planu ijicic*, ut oftendit pott Dodorucum J« Iknljtus a Sc. ipel. Verum cum Vetercs in defcribendit pUntis **ma raid** curati crant, hxc autem planu ad Vitem ldxam accedat, non video cur ad id genus non poffit referri, eod'mq; nomine generico inlignitL Myrtilli autem dictintur hi f-niliui abcorum limilitudine cum Myrtt baccis.

A. i.

j. B. **IU* ftim fdr«*U***, *realis*. Jv C. B. *llmijtii* f*hetimJu msjtr* Gtr. *Vtctpu* mfja fruti* mtjrt* Park. <Ihc grtat 53ilbrrrp faufh.

JR.

Fructuofus eft)ixc, virgulm fcfquicabkalibM, icrentwi, ramofu (.Oufiu* ram» habere Caibti mterdtim *tmni* dtfitios, lento*) tomcc Ipadicco [modo dneno, mod> nilxtcentc *Cimf.*] obdu- * { * . nial eric lats loiala ScdenU: in nuibtu/*it« Vita Idarv. *algaris an [uloix nui: nmudini p'r* . oblonga, mav, >«ifidj, Rtabra, nee lIBO modo ut ilia fcfTata, inlenore pane nonnihi! (Iaica | exilidit TM. venola I ljporo.utffifiR:nti & nonnthil i dlo praei i, docuhia, [J9»» vulgari nmi- fa, ex candid'i purpura -cin, concavw, Libiii in quinq; crenis dntis U exteniu rcHcnu, luit intui ftjmitiulis *Ckf. J A'rf«Jumperinuvel Myrtj I.. eantiz »arci umbilic. urn habent LtiorcmjCXt.jm medio apex pro.tit, quo Hi ut quim Vu« liLe* anguilox tacer mini* fotundx lint: hxtent atixm pediculti lonRiufculw, iaporepr>dnx Rtat», IliHacido & vmolu, quibm continentur grana aliquot minuta, iuWutca. [*Kd,fix* eft dura, lignola, muk» Kbit* capiltua.] Satmencu live raiui proou» bentesli] ¹ inde ralicu -saguni.*

MnntotK jMRidtigaudet. In Alpbibus Ailtriad* 8c Scinacn invenit Ouliin, in BurpinducM Ac alibi j. BauhiuK N-H in montofu Cumbetlandix, medio innere inter *Htxsm* fle *Fmtiopf* 'a, oblci v-mtma. cnpioiiiiii autem propc ncum *QtmbUibj* ad lextutn *Jo* oppido *Ptrnb* Upukm* val qux *XvwmC*\$ti>m* tia.it, utiobi.(ui palaus paluffnbok

Baccis

ljfif.

Bscis incbriandi vim incite rcfcrunt verutorc* S: aratore-; testantur Du Choul, Camer. alligie, pixlertim copioliin devvam. FQJM & virgulu cundem Silefiach ulum prestant quem Lecum Alpinum infedoribus Alptni>

A. i. fitM Urn* fruSm nv* J. & UM film ;**titmu /Juno bmc *imtnt. fan. fxt« U** Ger.

7. B.

RamU est flexilbat AC dun OGculuntur) promincentibu*; in quibus nullo ordine digesta sunt folia, prio: is Ledi Alpini foliis pjrcn timili virencu, inten inhzreona, giiftiii valde adftrngenti*. In lumnih germinibus;> Cerali nonnunquam rrugntrudinc, oblongb & tcimibus pcAu te rubrt, postremo "tgri, facculenu*, Mmi mgtjti Upoi duncaxat ftwtms, alba, nunicrn utplmni^ n i; .LIU. RjJtx li, ranii per terrjm ljaift lirnliw hbui nonm/

Locu.

In uniu Sntfflien jugi (juxta Did menfe Aujrufto cniebat Cluhui. Flwcm nod oblcrru Hanc cile (ulpicor cujus in CdtLfUm. A*glL mentionem Tea no tints crifpis 0 Aterrtt. qujm milii oAcndit Thomas Wlttiklbji, propcHUUtUf vium septem ab Hopz (enlbl mil liar. Uxo inagno uualcentem ad IJurium Gmlf in Coniitatu Luiuitnr.

A. i. Vttm I Ideo angulata J. B. f*Um vil mpi Q« . ngra vug ^rm Park. Slack K

7. A

Vvipilm fruncu plemngic pedatihus, interdutn tubtnliii uncuni circitcf lon^a, flu(quAni fcntincum I.UJ, at Its crenan, fjprvc [urtim tado, pnti(Tinum prii (pedicujjs} hxrent inter tolia bulljt;. croceo Succedunt bacar (nguUresquoque, junipenn: quim nigr, iimbkatx, lapore jtrato At aado primu njuleabundi in ore relinquunt, purpuro-vtoUu immctijuntur muju, pam, rubenha. Radix turn ttSU, turn obliquaquiuvcrium aguvi^ c Ju^uia etiam ajrre ftotones cnuttem,

Locu.

Nal<itur tarn in Alpi> lodl Gernunur, GJIU, A humCcbt, Jotn putu.io At (poaftinto, aquas t

Tempus.

Ftof« Makx Frurtu* Aufrulto, inteitiuni enam Jul.o maruroi e bUtr tu, Dcxinoro irjJence, fi IRHJT t.ni, & aim tnanifesta ad/li^ione tmCCaot. Ventncula t.jenoum rebnum adores niidgatt, aivum reprimuntj von urn curant, adwnut cholenm morbum profunc, Sed aJ hot -> aim Sacduro rel melle mfpifljes ipTa bacca Uxtffi prtferendu*, quoni.i gtjtr cum (tnt, crudz li edintur rentnculum tlcbilem Ac rngkium offetdbnt, aJviimtjue penurbi porius quani .iciftngunt. Cafp. Hofman. Myrdliot locoaprkonatw Ac bene matum nuttatcnut eu trwittit'n ascendere pom ut alvum tngkia/n cntdtate fat pertufbent,Ate.

Tempus amon- tum & Firt.

Uom MyrtiUo* nijtiot recte Ac M otdine MynUlubftitu podeputac cum h» conditioatkuv. 1 • St xcentuMiale, non laliti & HiJuua. i. Si non evtetc namrt ;. Non »IHJCV ku f«** decepti. lci, educati. 4 Non lci. CSM cnuut, qui ob aqiKriutem mukam muttuni teh igaat, ad- fringit parum, fed in Rob dentatum.

Pam tenuo buic (bcoo indie, eumq, etUm vehomencer idftiinnwt; uftendunt nour pvnein cluibilei manibua & ori itundncanaufn biprdlx. H U K W ucuntuf tinaore ad inrtoenda "

Palliores & nwtarupldwbaocB htloe bbencer vefcuntur: ium luavitac iiu cum abqt.: acidi- tam conwoAa guitui plaoant.

Myrrilorum v: a AC ulus inScofbuto apod Nurwegos TIM apui Sun. Pauli. QuaJiip. Botail' Clul. 7. p. 406, 407.

A. + Vou ldea femp mrmrfimBmr di J. B. ldea, folia fmktmU* mm trtmstu, fruila re in CE Vmtmu br* Ger. n4r« I uuu folia Park. flrtDWwJU*]; bcrnr*.

7. B.

Ramis lurre funcfit rotundjinon anjpilofB, dodrantalibu*, qua vefiunt folu Ur* 4'«m V«t« ki n MKuiofar aut nuRiw, obionga, modo per Ottremum rocunda, modi le •un. ton fertju. in quibui nern fubcut pooffiimm apparent, «Jhi nWiinticc Ac «man* •enum cohmm in nrxulanim ciircmtt, Lull oorrvallfum Hwibut bnula, aKx, «J' terdum blande r«***; qttb»4dip«> htt* (jmlker racemofiv hrrtdnmt, (ex phn muu>rr" t innorM macnitudine. ex albo Iun6re rubencev Upore aofc> vaMc tucundo, ci famli Vaccinii parultra, ca munerfa grana parvula, laca. Radix obliqua ferè, tenuibus ca- pillamentis fibrosa.

Cimerano dcknbents: Bacoē in furnitare ceu corona quadam denticuliti: font.
 Gaudet 6c hxc locii lyivofo, laxolis & opacis. Apud new in AtiRlia una aim priore in cricctis
 pravanic led mufzu rarior. Copiofjm oblii vayimus in monabus Eboracenlibut, Starlbrdtenibus Der-
 bichenbus, &c iiccr Eneas.

Fforet MOJO & Junio: finflm Septembri demum nienw pa rede maamtur.
 Cum bate* lint addx magifquc adfringentesextern, nec pennde iucoukntac ut Myttili fiold. Rr«.
 tatem utiqiic fngidam itccamq, robebum. Quapropter ad cot uh& ubi adit ridione opus c(l accom-
 modari pojFum, ui v. g. ad Di.TirhceiT), Di'femcria:!! 8c pradidos plerolij, iifidui. •

Poilis & ex harum lucco Rob conficere addito Sacch.iroaut mdle ad vicefm caiores & fitini
 in febrifeSCaliS*. Qiiidam ad cm'juim.tCiCommnicntLuit additis aromaribus. Hjeconinu j.iku-
 huus.

- 5. *Vk'u Uaa foliū e*moſic & tltut pmSdtu, five IJ*s rsitx Dtcfcaniu C B. R*Jix HXM f*M*> & Uva Urli y B. Uv* Urft C</OH Ctmfu Park. Vcttm* Urfi fiu Uv* Urfi tftui Clfi Ger. cmac.*

Viti Uxx rubra: affini eft, a qui tamen manitaflī differt, liquidem f>H* hai>< ilcniūou, ad
 Buxum icciciencia, ex oblongo rotundau, angulhnre ad pctoilum cervicc, umnque rugola, nec
 nervos ut ilia prater unicum quJ fecunduni longirudinem 'dcairrit exhibsntia, guftu cum anurque
 adftngentc, qacmadinodum VIMS Id. fhiAu nibro. Ibrencautem ea ramis lignoJis pedakboi,
 conx tentti & fadtē colentē te#u. Fura rjcemnli, concavi, rnbu. Fmttiu ut in Vii i'empte
 virente uccmotus inextrenitace ramulorum.

Diibitit J. Bauhinut an l/va urlī CUF. cadern lit Inuc pbnt.t, prxcipuc ob iconcm, in qua pin*
 guntur fiervi tranlvccili, qui in K a dice Idia noltii non apparent.

Nos in montibus Jura, & Sateva, necnon in colle /• Bafie dkJta propc Gencvam hanc flirpcm Ltait,
 oblenavimui, ubi 8c J, Bauhinui, qui etiani in Vegimb Narbonx montibui 1c eandem Icgijle af-
 farmac.

- 6. *I'ttit LI*a rubr* RtvMric* b*c<u infipiu fmi fruct Cam. Idea foliu lengh atHmūMtu, b*ccn rnfrrt mftidu C. B. I'tcawd riirm tefijtierihi ftlui Park. Cm.*

Fruticulus est fupinus craffiore caudice quam vulgaris [ea forte que rubro est fructu] qua-apud
 nos paffim cum nigra [forte angulofa] in fylvis crefcit, & Stein-beerlin vocant: folis nam ob-
 longioribus, anguftioribus, acuminatioribus, per Autumnum rubentibus: baccis rubris, infipide.

Crefcit circa /• loiucum in campu aljwii- m
 HIK plenum refert J. Bmliimis dcl Kolin.iinoni (vlvcfJre minus noftrat vtll^o dictumi t c. ad
 Vici lAxx jilfiittin Polifoiim montanam. Verum cum Rufmarinwn illud (utnito) bacuKaum
 non lit, led Eric* n>(xlo Icmia prodocat, proinde 8c ETK* Rejm*ruu foln nobis dicatur, co ic-
 ferti nondubct, led poniis ad Vices [J-vas.

Vna Idea Critica elatior Park. Ctrfm Idxm Ctitta Alpin. exot.

Frubcultu ifte pUret emittit virgu, tenucs, lignofa*, ntgricintn, Itj(iio duro, albo, inodoro, gudu
 linRLum nonmhil BiatofccwMDi in usaoloi plurachvitat, ad nodot, inxqualibm inrervallit, (tint
 veltius, lingulanbui nonnunqujm, jilurtmuni taiii an bms, rarius totus quatermive ii'iml, dmiulcu*
 IU, fiibroouHBT, dm nwrinci noiuhM dentatu Uumlruui ne quadam Agrofola foborum, minimi
 ttmeft i n d o » 8c aoiloacn, luperncob; curē vis i iibus, inferne canicouibus. In fummis raniula
 & ad noik e t'oliuam IIIH exeunt fiom muln, ai Ceratit tonun limtles, fmguh bn gis infidē me*
 pedioiltj, quibus (becodunt /^wdw parvi, ex rocundo obtungi, mbentes, guilu)ULuiūo, Fabac niag-
 mtudjnc corolla in vert ice villola inhgniti, pur (iccitaterti mgri.

*Van U** Crttiet h*rmlif Park. Chumtttrfm LUs Alpin. exoc*

Pnccedente humilior eft muko, furculis pliribui, tenuioribut, brenonbtu; in quibus ad intervalU
 flia terna quatenue interdum litnul, propemodum rotunda prxoodcmii modo, vcrum mtnora,
 •no)lor.i, Lcxora, miniiijitc denuuanea aum in w; color tctiammimiklatu oipema parte, nec
 #k o mctno interne. Ad nodos paniterunaciiin hilus exeunt podtuli longi, fiftmm multot alboi,
 racemtm compados (iilbncto, qua exciptant httm minorci, auombento, *A Tertigem villoli,
 Myni baccii nonnihtl liniiln, i pajdonbia 8c rooncaru plcbc vulgo con>c(lr.

CAP. IV.

Cafia ft:** lAht Ger. Tttud MmAttmurn/mm Park. l*m» MmfaUmfum J. B. QWw fa. nfm hmiftT* C B. Ofi* Pirn? ^*

- 7. 8
Cubttalu eft ant etum btatbtulk hie (max, in roulus virfpilti vane divilut, jfuJtaj, friatit*»,
 lenta 1, viretcentcy, interdum etum ntgcantei, przferrim cum ttovclU fluil h'tiu purpu-
 ralc atia, angulb, lata longa, intwdum folm Linana: prouma, tai- ris amar. I' « u«
 Rioca vulgò dicti, odors juoiodoj piano Galliuin n f n n n prsditi [U . tx vandi flarcicntes,
 Chl.

Clri'. adlndonat tculMt, in eoiem pediculo congdi) **«-» Uri* inaRnsr, per maturiurem rrt
brjtj Alices [Lob. glurinofjc raldc; CMiuUluka, lentx un*km nonntliil aenmunu exuents]
in quibus OIKUI nudeus medulUm amooent iilum, (ubJuJcm. Camcrario baccr June fipore &
txiore uirRata

Virt.

Tocus fruex iJftnngentem nonmlu uudiatem habet. RWJ* dura S: Itgnofa, Gibrulio cralloque
comece VJIJC adfrinzente te&a-

Loci.

In lulu ad mare interum multis in locis, m qoc circa Monfptlmm coptolani obfervavimus.

Tempus.

Floret Juno, interdum etiam i AprJi & Miio FdjftiuOciobfi, volant- maturefcit.

Cum ttxiii i rutex, ut diximus, alit: 5^{eni} 1C» tonvenire in alvi fluxu am 1; mibus affectibus vo-
nlinule cfl.

CAP. V.

i> PfrhlymtHt (em Cifrtfeht.

P lvmcmim dici potatur quail »K«»MW%, quu adrrumculii fu conco'vit 5: Hindu. Capri-
folium quod folia lint extremb t'cibui captcolata. L<* A-i
Ddcriptio Peridvincni *jx:1 Lh*>(omleni, tcepta rjiW, quam trailim ac rocundtm di-
cic, Capriolio noftro vulgan Uta bene convenit. Vciiim ob railicem dif par em anibt^irur AFI no-
firum PtrKITmenum non *9<*»n *****><>' Htf I>oft. L S.C 195. ouam «*»^3v** aut **
vodtant. Voiimde nominibui Axinaue, noftn non eft infituiL Stiffi it nobis Caprifoli & Pe-
ridymem rtomina pro hat planu utu recepa die.

A. I. PrrKijmi**mfivtC4fnftlinmv*Jr*rt Paik. 'n« frr'.Intitm) IJ. ff iatam Germa-
•KIM CD. P<T*!jmcml,^: CoillttlOIH IJlOtp flit l|lr. Dj IPooO blIID.

ttaju&TMAx liRmilj, reptetrntcum fun »dnati»: fUittL \M*, atteruc np» indtga, tenui. longi-
lijpioIJ, k in rjtuulo* patti
oion medlige antcqtutn bgnck.n:t] / m ad RCI
HKJLJL, dilute vucru, inrciore umen parce ru>;> inca
plmcs panter cnin-iut, oblort^ anu
mil<, ci awniculito angdlo i:
polJi.itmiinc Ipeftabilci, inrti cari, /smnttm aliquot c med>> cicuitttbut. Colo
KTIium havdeens. hmim adjm Sanibut:
jmtm ^'n''^''^!0* SICCO aUuKUIT I
ourarolvk t4m *»Ac &
intvdm reOo (ucci motu ligituii Itpeduo
Um turfckencaTidimi:

UamiS
Ttmfn.

Ligna quibus fo... ourarolvk t4m *»Ac &
postinacitor ligat, ut lape vestigium in imprimat, und
tutices quos vincit monstrat figurā in cochleam con-
tortos & in c
Hec jxxk* in SceptentnoiuUbuu tegii>mba, Germani.; Anglia, Be'. no, &c. in frpib r'tequen*
c(K Per totam tere ad Jtem Hocett Maio !
mure florere incipit, nec tandiu Jurat m note. l'nroo verc, tnio Fcbruano uu.-, um mense folia
edere incipit. Fructus sub Autumnum nucidbt.

2. Pmel/mtmmfivt C*frfV.i.*M Gmmsmtmm\$mt r*k£* Park. Dutch Hensp suchle.

Vliior dr & dinor, niagilqec rantofa & patuli quint praxolcro, alis simlis eodemque modo
frutibus aut adnucula vicinis se circumvolvens: Folia quoque similia habet, paulo majora:
Floru etiam, Parkinsono describente, majores; nobis tamen flores singulares non videntur majores,
sed potius graciliore tubo, at
dam adhuc in gemma f... nCAMaquj
tur rubentes, explicati etiam rubem extents, «ntm» cat
Germanice origines oie lmbit Pariunw.ni*; quoon m nobit vkletur noque J. 1
noque Calparum epa memant j.

3. Perilymenum ftrfA.*. J a C a Ger. ftrf*I*i*m fu* ltshtwm Park. Perfoliare, 02
double Hensp ftichlr.

A vulgari noftro & Gemumco .iffirt foliis prne gbud*, romndionbwt, & pciaJk breviffi-
n., quorum quardam ligat la-pe uicuituij, & a vincuin uajatj, pertuljvc, fuprenu
buli inftar modice concava, lapoc c (ub>aai,« qtiurun attyla honsprodeuntptax
amandifim, faavi etiam odore, ara albetcente, aut in latum lan velcente, fupremu
limiles, breviores tamen uoiore cs purj g
5c minom: ex mo no emineat ' imma aibida. fow* glomenciffi
tur, colore rubro diluore, acinorum Sambuci magnitudine.
Cliffus modum quo flores rufcuntur diftinctus * i>lenii» dcaibk; Folm cfl l*oorib.>r & bo*
M C | uhwlv extremos ramos an 'btcnotu, ui quorum lincuin lent pkratxh ttato W*1'
tur, praecoxores & nimis odorati quim in pnnu (MUC ^ tblu kyHIEnw vaKjjnr
In !aba & Gallia Narboncuti urxur: Monlpeln liotemobkrvant J. » April & Maio in

Locus U
Tm' «-

AfMb

4. *TtTcljmtmimptrfolirtw* Vrt^tiimmm fimpervirens & fierm Hcnaxn hort. Lugd-Baf.*

Elganci perpetua coma vigec ac floret. Penclymeno pcrfoliatu prarooknti videtur conformist fed omnibus partibus minor Ik gr.ialior. *Fob** fant paulo rotundiora, lucida, inferna parte magis incina. Flore* id fuminos viriculos ordine qtiiai vercicHlato prodcuntes, odore equidem jullo c-vtdenti funr, ait colore amoeniflimOj fulgenci cocco fp-Cndente, eftigictiuc tubum venatonuin jefbelli expiimunt., oiitiuy in qmque a:quiles crenas hoiuaio. L inwio profluunt *ffamm§* lutea apicubw tum//i> pallidolongiois. Smgults flonbiis lubjctturcapirulum parvum li'jrbaceum, (u-tinim, fmctiui inchoamentum, quod in baccani aME more coiigencruni. In Horto inlfauibfiiiui Reverend. EpifcopiLondincnf. D, *Cemptm* apud *h'ulbtm*.

Vchcmc;ucr calefacit & ddiocat, id quod guftu cuam ipfo deprchciwatur, fiquidem folia in are .iliqui-.in,Im rctenca & deguftata, ardorem & act imonia; lenfum lingua* unpt irr.uuit, unde r<t< colligtur ca attenuaiitu, digerejicis, diliolvntb qualicatu cilc: tan turn abcit ut cormn decoihun ad orb fauciumt}, tumora & inflammat tones inapiootes in colltionibus & gargarifrau uuk fit: prouc, invetrato errore, nequicqtMiii recUtnancibu» medtai, a vulgo hade n us ea ulurpaiitt crdiitumeft. li'.cm iii^ndum de aou.i toiiorum .mt tiomm dclill.iM, quxad colJcm uiuis .1 vulfrutrecuqucur, non in Angia untum fed & in Germanu ; forte locutii lubere poilu in tuittorlbui tauemm .1 fngidis liumonbtis ortd

R^contiores autem caldem feri viiet Caprifolio fun mbttunt quai VctCfej PeiLlynicvj Judicare crunt iplum tradunt ulcera hutntda Be (brdida, lanare imuccigines fk alut u^r> t<idiut<t JJC-nem abfimere, dilEcultati (pirandi conferro, *uitM* celcentawin tacere, calculi pellere, fagiei inaculas abftergere, &c J.H. Cicerum Uatnlylra in eorum unguentorum ulum veue quac ad capicis yalofita paijntur. Vide Match.

Ltqtiorcm Pendymeni ftilatitium cum fanine Lavendulx lolitm eft ad parcum faalicandum ad [ij. vchi]. propiotre Kondclerius.

£ Capnioiu Horibus coolictur oleum j,t(mini lucccJuicura. 5. *PMUUMS*. Quad. Bot. Ciafl." 1-

CAP. VL

De Perkiymemo retlt.

X *PiTulfmnuMTttim fraZiM rtAro Park, reftum fruiturtiba & tujrr* J. K rttftm Germanicam Ger. Cbamxceraftu Jnmeterum fruit* gtmne n&rt C.B, fipUftit D>OHll f uckle, wity t(6 bcrref.*

7 »

Suo uudiccj nullius fiileri indigum furgic hoc Peridymenon, futicibns anntimerandum, cul *f4t*CoV* hrminr vii!., *ditz* molliora, minus nervoia, utnnque hirlma, bina oppofita: quo numem quuxjiw//.Tfj, uni cidimque pC-ticuloiniidemes, ex folio inn alts erumpunt, ex luteo palli [centes, Pendymeni vultani form.i, minorej unien, lupenore folio liirlum reflexo, fimbruia, inferiore demiflo iig'Jbotc, iitegro; quibut t)«ci.lentibus *hmstm* gemellz lutv ailcuntur, cidemuedictllo teltiuni inftar appejix. per m_uuncatem o.bcnc», Sambua aquatice, iipore nauieoia

lit loci* ubi (pome oritur baccT p:rp«ao xquali» fere irtagnitudints fum: at in Belgven horm etilmm (ob.crv.intc Cltilio) vtx unquam -rqualej ad mamritaem perdueere deprclinditur., at cum ntu excretcat 8c turgida fiat, alteramfcmpcr exilem, plenam tamen remanere.

In Germania ad icpes & in dumetis vulganiliinum habetur. tfvudus Julio maturefcit. *L>cm,*

Nallu huju aut aliorum Pendymeni t<6i generum (quod haft^nu* nonnnuj in mediciiu ufis cit.

». *Vtrulymnum TtSwm frwFlu nigf* Park. Cb*m*ctr*fut Alftms frmdm mgr* £#M<M> C B. Ptrh tytmim rtdum felio jerreto J. B. rtHum SsbmJicim Get.*

P*tc ymene rerto vulgan multo humiUui eft, huminimque ilticudinem ranffime atmgit: multa gracuiore & rai k«« hjbet nioM, albn-ante coruce tefctot, *ftlid* pnore teneriora, *Ungtan*, in arn-
•sniliil fermta, iuperne vtrentu, infant minusincuu quam priml Tendlt* fferminibus
Ititr inter *oha gracUa pediculi, unum interdum, fed buK» utplunniim /*»" ItHhnenres, iupsi ion; minore* & tnenorw, non pallefcento ui dli, fed ptrpunfconta, quil-u« (iccedunt genielli *fr*rm*, wqui tragn ac in piiore, etun rqualci, ntgn taniem, non rubri, iucculentij gullu ingrato.

Rarum eft inventu. No* in fj-Wb junta (acdlum Branonk lupra primariutn Carthutianorum nbtbtum obfervaMn.ui: Clufuw in rnonubw Shn^'^fc Auftnacu fit Sttriacn FJoret aim alii*
Pendymeni generctxit, lemen Julio maiurdar,

Bacca Chanurccrah Alpuu romttum owvere aSrmant nonnnli.

j. *ffulymfmrtBmm frmSmnAnCa. ntf*
 MM *rtwumm tkmtt, mft tx ataJaut m* **J** **C** **I** (**Gij*tri**, «*
*Cb*m*ftntlpmt9mm \wiirc Atfmmm J. B. Chamacer. Alpina, frulla raito rarnm, «••*
 w tamcl mttM« C B-

7. fl.

Prutev ligru medulla alba, f-»« <°» ** Xjlofteum liitiatonw teodir, brerb tile quuleni
 fit ubi n-unior cubko* «p»t, ran. ofaceo comec obdurth
 Mm dtffa, fed nupn muko, acuminau .btm, n« ulquani fano, biiuop-
 pofiw Ar#« longmfoiU, td Bon: vmem »fl > hun-
 teZrubcutat, ex adverfo fiw pediula^ longti, ex alt^ fobon;; rubc<
 mwtfaim (<rinu,t«Kiium ocdiunounsjexlonfcODediculo^CefililuiutuJlijeco mfuart &anuro
 rimn.*, ui f« connet gruU krv fex lepecnive, we pluij, alba, I.KJ.

*Per..Irmenum IV. C*fi quod Bouma pro urn deknptn luhent, ftnSmn tubct pteni*
 umcam, *rtrb* gemtnum, utnetti genimo Hni lucoedit duplki in lumnio ubi Henc* mkrlemc
 m<c notjtun, fed unicum granum continenteni. At Ch*m«cerafcis Gefncn proct ab t; in *
 birur, & j nobb etiam obfcivar* eft, fru^u* obnn« f^meUos, liiiRul.)(que (unquam *oclla* aut
 pupillisnotitot, Ac lemma lex iepcmve aut plura continence*, non umcuui litmr.ixjt granum-
 Xylofteum nonnullii quiii iigncm oflcum ob bgni tiuutKtti d».

Loco 8
Tempo.

Epens eit, idle Cli.ho, in montibus Pyrenaa & AUobrogio, led omnium akin>umt(limur
 in I'jflnoniCB, Auftruci* & Stinicii. Floret Apnli & Maw, tnidiuiKf, Julio & Augufto pictuKfc
 pctnur. No* in tponribm jura fie Sileva Gencrz naiut lam licquemem U

*4. Perichymena nStmfam t*nl*J, B. Park. Ga. Chamacerajm montana fr*a* faml''*
 rmimCB.

*Epibem com Ptaridrmeno lartmfotw altnudinw, fed craffiukulo eft flrpitc, mulcos in ramo**
 divi*, m^riunte corocco oUiutn*. qui ic*ber eft, & **pkrunque mukn UKM** hut;; in t k m
 1 radttc « mulos rtfot kfc di»WV: itendh nmulli purpurilcum, & incjn j bnfntM! pube
Mb contfarkf tfitJ ut in rebquii P^nd>-meni ftencnbui, iEi <uo3 boccat rubrtf
 fert non difliniilu, exficcants 8c amariukuli guuus. *Finn c tneltoftim ramulorum al<* pediculo
 inhxrntes protm (feminos, mdimento frudia ut uteiom innixoi, puhlooi, pallekents, ca«*
 & in qmque laanui diTifoi, utrttquorum Pendynicni lurre^li Renauni florvs, i quorum umhH
 Iko prwicunt quinque fUminuL Bava, appemba! inlignita >«»«« luiguUrribut baed», uennqo<
 inter bha breri pedicul dependemibu* cunftot, ChantierUo Gdneri nugnkidine aquaUo,
 fed longionHb paulo, cotora carulci, qux vtnolb & aodjulailo lucco plerut manut rubro color*
 mfienint, fit mulu pUn-a feraaa cooucnr. K tdi * late .urfWitur 8: mtildt fibrn prxdtu eft-

Loco.

Oofcif Inonte a^l u d x a cu|Bld4m nwnti (ugo Af*J<t TOCIU connui, ad tuuuh-4m viz que*
 kl Twratn (upwiorii Sort* SafexouricnLm aiupem pmkn«ndi praxcllum ntttuem duck,
 In olar (HIAUIII «liligai«< toU>gunt fc in timfcium *uhm* reponnrw.
 Videtur nolm ruberc muka coramunu aim Chamcceralo Oden, inqwt J. Bauhmui.

CAP. VII.

Pimpinella fpenfa Park. Pateris ifim, folia Pimpinella fpenfa C B. Pateriam uis/dam fca Pim-*
pinea fpenfa J. B. Pertrmi Labala fca Pimpinella fpenfa Cmmtsru Ger. Pimpinella fpi-
nifa (in femperviventi hkmk.*

C *omnes stolones itatim ex r^dce rubente (jpora (tea 6t nonnihtl avancanm oriuntur, cor-*
 ,iti citenore inunn, teneto, oil slim luMic rubem. F«4* tendii, lonpulculi* in pe-
 c\ jdrsrth polka, fupcitu umnqM rirouia, inforna ekwrea. noilz Pimpinella
 imilu. & **' P*»' T^te uml(>tounoir herb«ca colom, ftclLiti, paivi qtubut fucec-
 aJbkantes aim pauxillo Mm, ontine quodam ad *runt** (effilo. Rife noftri
 tic in unHilcufuJque baccat nmhilWo flore. JUuirulhi ddot-

Loco.

perperuo vinct &L mulro annotdurat. Adftngendi vi polJft, vulgarterque*
 appciliur. In decliti montu Ljbam pane iula ruit JUu*
 m totaGrreu itumno Icmcn immi I i folia pnmura erumpunt, qux turn hj
 contacta lidentur, & Alplenn fol u quodammmodo murantur, fed lomr mutora fuat, que
run, m^or. « - « - **RcJiqtom jWcriP***,^{0***1} Hon. Bcl li videapudipfum.ED.: ad Clu-
 ,-linum^anc Ujmmum Diokandu S«rben cfe contendit. Argumenta quib a hij

Loco.

In lan, ti, alrj Awnbu i n 1 uuirpttur: ana ejutui aqua decocto*
 r,ti, alrj Awnbu* i n 1 uuirpttur: ana ejutui aqua decocto
 r,ti, alrj Awnbu* i n 1 uuirpttur: ana ejutui aqua decocto
 r,ti, alrj Awnbu* i n 1 uuirpttur: ana ejutui aqua decocto

iapor iubafriiogensj odor nullu. Flores liuvcolentes, viridi i-purpurafentes e foliorum alio lam-
 mifque caulibus [picarim exeunt (viz. limgulis iiiiiculis flore* muua in (picas . . .) u)
 qumque plurinim oblpngo-roti*: alis, acu . . . in. tcis, tenutbulque foliolis conform . . . aqua calca vi-
 ridi, in quinque ladnitf tenminaas CcQa inhxrentes; tandem breviffimu, tenmffimw, candidiftjue
 (iammutu, oblonfets ac dnercolt. urts apialmt orn.uis medufm rloris cavititcm occupanabiu; inter
 qux firm praminec viridialbiairK, planus, upitulo oblmigo alhkante, Ftoribus fucccdum baaa
 rottindx, extguo in vertice umbiloi prxdii, virides pniiuim, dem purpuralOMUL'S, lime nigiiicjn-
 t« & (plndentj5, craiHore cortice cin&t, carn^ejuc intus denli, honudaj iaQonlque (iiMulcis fle
 libiften tts referrx, incra quaiii Vmm* cotitincnwr Icabra, an^ulola, membr.inaceis pLLiaalis,
 ceu p. ijb'. Ls intergenns lejund. l. iri uc tria qtata6rve plcrunqm: in (ingulis lament eel lulls

Niamf circa C«4J», femper viret; nunirotbtsquotanms ^rt fructu^ Mirooviz. iS:Septembri
 men fib.

Locu S
 Tempus.
 Virtus

R4AIS (iccata, in pulvrem redl&a & i cxlnbiu, fiwum niomium ac (ccunJinas poll partum in
 utero relidis expdfit, necnon mcnilriia obftrtura prervocaL Frudus imnutui Jiiriiiauru com-
 pefeotj & nimium mcniium flmm iminuuunt.

CAP. XII.

Bteaftr* Iniuu fruBu turn <fuiJrip*rtitt> w> *>trtk mn&ihct, quadricapalari.

Pes-Pennagam. H. M. P. 5. t. I4, p. 17.

ARbutcula Iminilis est, duodecim circiter pcJes alta, ctudctt meiiocrtter cra{&, n multifque ra-
 mulis tn orbem di(fun) donato : Lignum albicans, cinercojac lanuginofb a»mce muntum-
 RIAIX Ponnagam radici fimilis: quematmodum & folia prxcedentium atborum folionun
 atmula." Flertt circa exremos r.iniuulos oblongis 8i Horigcii ptiolis confertim provoniunt, iuntj,
 fpica: fai potnis virgular pturnolJ.; viridi-navelcentcs. BTVUM fubrofUiidi, * quiiuor anguhs con-
 fiances, virides, qiiadnpanto in vertice timbilio coronati, qmtuor diliindu locujls Jtmn* ooiin-
 nentexifjua; obloiiig.l, nib, ntrenia.

QSOik in Atj»g4tti, lemper viret, quounnU Horcc, fnldumque profert, menic viz. Au- i-tcm &
 guOa ^ Trmfm*.

Grteriim ex radrcis t' foliorum (ucco ciini nielle coAo linimentiim panttur patentifHrnutd ad-Mi
 verius v. rien-wlnim ajiiiiuliuirii ictu* morUifvi prxltdiuni. Idem prxIUt balneurnj quod c* foliis
 hifce cum AJiio deco^Us conficitur.

CAP. XIII.

Bseciftr* Jnitt* sJfeltnm aim fimtla, fruSn mmktutu & cstjwUf tnetett.

Katapa Part. 5

n.M.

ARbor est humilis, 13 circiter pedes alta, haud ita crasso caudex, multique rotundis viridi-
 busque ramulis donato. Lignum albicans, densum, rufefcente cortice cinctum, necnon
 molliore intus matrice refertum. Radix albicans, furvo cortice tecta, amara, olens.

&& jji brocuniU ferc, aoimiau, m ambitu Icviter acnata, mullu, Ixvu, fupernc jtro-vindu 5c
 fplndentiu, interne fabviritii-i, cofti media rotunda 8c albicante, odore nullo, (apore amartx
 Fhfitit ad foliorum alas bini ternive iimul junfti proveniunt, inodon, ainan, pencapeuli, llelli-
 fibrues, vjrides, dileo medio divctii a ptulii coloris, navelcentc^vi/- (idmumlu qumque viridibus.
 fltvelcencibus apiakm ornaro, ac inter petals expands utnbdiain octupAndbui ; inter quxjhita pro-
 die vinlis brevii.

Flolailis fiicedunt Buc* rotunda; tricoter, umbilico trifido in verace corotutx, calvdauc eti-
 RUO arce inturrentei, labvindes, alb'icame tjnilagino («]uc comcecineta:, qui tenui pellujita in
 pwobdurtuj est; Inttu connentur ftnns tna, triquerra^albicantu primum, M per nurunutte
 nigra, MAXH, membrancu pelbaib ab invt^ni icjunctj, tu ut tinvula in itngulB lament Jocuk-
 ni.-rids

, C reficit var. » Kcgni Malabaria locu, prxiertim in agri* Oryzar culture dicatMj quot immune* £««
 icrvare tmur j] inXoa» cujufatnque aeaem, tenconbus plantu lumraODen noun. Semper Vi-
 r«f quotanni, flores, fru. lunique r«rt-

Ex arboni radite dcooftw wnhutur, qu* Maniacii medendli (ummc UCJB pefhibotur.

Virtus

iapor iubafrriigcns, odor nuffus. Vlatt fuaveoleii! i-purpura(cen< e foliorum alu lum-
 mifque caulibus Ipicatim exeunt (viz. iingulis (urculenoresmuJeo in (picas dypoftwfiiKncnnbus)
 qumque plurti. pngp-rocnndis, icumin.itis, tenuiWiique fbholis confantts. at i vi-
 ridi in quinq; hinciniasa cuiiini. ir factu mhxrentei; tondeni breviltimis, tenuillimis, ca
 ft«minulu, oblii), is ac cinereb-ftatis apieb m ornata medullu flora caVkaceni ocep
 qlix Jhlt* prominet virnii-albicini, planus, capicuiu oblnngo albicante. Floribus fuccilunt batex
 rotunda:, exiguo in verrice umbilico prxditXj, viiiiis pnnium, dart purpuriicemes, hinc nigrican-
 tes & (plenJencec, crilHoro cortice cinftar, carn^que intus denfi, humida, lajxinlque fubdiucii &
 lub<lllrinEctis referee, intra quani fimm* contincruur leabr.1, angulola. mcmbi .inaceis pclhchis,
 ccu'parictibfis intsrq-ii-inis icjunctA, tti uc trk qiaru6n*c plerunqtis in imgutis i-Kiten: cellulis.

Nalettuf circa Cochm, femper vir <; maturos bisquotainus fiwt i'mrtu*, Mamovis. 6iSeptemb Vi
 meniibus.

RtAix lccata, in pulverem rcdafia & exhibiu, ftwum mortuum ac (cctndiias poll partjim m
 utero rdiafc expellit, necnon incnftitw obfrtri^ta provocac. Fniciu* inimatun dunliauni torn*
 t, & minium iicniiium tiuxum iminuuunc.

Locu &
 Tempu.
 Virtu

CAP. XII.

Bdectfr* Indict fruUu cutit ^uadrftuie m Virtue nmhdea, quadrifapulari.

Pee-Ponnagam. ft. At. P. J. T. 24, p. 37.

A RbufciiU humitis eft, duolecim cirdter pedes alta, C*MJU< mediocriter craffo, mulufquen-
 ZA mulis in orbem dirfulsi ilonato: Lignum albticans, cinerco.ac lannginofb atmcc mumrum.
 JL JL^ RaJtx Ponnagam raid iimiiis: quemadmodum fit fblu prjcccdcnriuni arborum foliorum
 acmula. Fkrtsdxc* extramos ramulos oblongis Si Borigtis pcttolu confenim provsnium, lumq,
 ftiicj: Cai potiijs vir^ulx plumolic, viridj-Havlcctes. Frutim fubrotundi, • quatuor angulis con-
 rtantes, vitkics, quadnpartito in vertice umbilico coronati, quamor diUin&is loculis low<w conti-
 nent exigua; oblonga, rtifa, mtentia.

Piovcnit in Mjr^j;,,, Sniper viret, quounnii floret, Fnl&umque profcn; menfc vi2. Au-!••»' tf
 gull a Trmfu.

T Ceterum ex radice e f...
 diorum Jiiceo ami nulle corto linimennim parattir potenti film um ad
 •ertis renen-icArum jnimalium unit taorivivi prxiviau. idem prxflat balneum, quod ex foiiu
 hike cum Allio d^o is conficitur.

CAP. XUL

Escafera iIUSM aJfolmum *Ut fiends, fr*8tt umlnlitstt & cdjatUto trtcvett,

* fyttf* Part. J. Tsb, 47. II M.

H. M.

A Kbor eft hiimilis n orcircr pctles alu, hat: ita cor lie c^mJut, multifile rotundtt vindi.
 DUKUv iimiuU UUTUUI 1 .ljCUUM • ! » << » U
 ni'lliore man matnce refcttum. Rjuit* albions, furm oornce tecl», JHUU, grjvcoJctii.
 Folia (iibloifnda fcaiq;ultt atnnot^ Irganibital bicar, ctumltan, mllfaicctria; o&tpere&itio vindia SC
 fplendntia, infernc fiibviridia, colti media rotunda & albicante, odore nullo, la pore amara
 Fivftnit ad foliorum alas bini ternive iimul jundi proveniint, inodon, aman, pctapctali, ftelli-
 for:nei, virid<, difco medio divert i a peulit colons, rtavlcctent^vi/- {Ummulu quinque viniibus,
 flavfcctitims apiabat ornac inter petala eicpanlii umblicum o&upantibus ; inter qux/tyLt pto-
 dlt viri:», brevis.

Fla(cu'lis fuccdunt Rate* rotundi, tricoccxj umbilico crifido in TCHKC corotucx, cilfdau* xi-
 guo arete mhxrentes, lubvindes, albicante cartibginioiuc comce cineta:, qui cenui pellicyli tnf j-
 per obdudus dt; Intui coiuiuentur fimm* tru, triquetra^aMcantu primumt at per nucunutAin
 niRra, iuiaja, membraneb pelbculis ab inrkc/n icjuuiutJ, IU ut tuiguU in iioguU lament locuk-
 menttt.

Crcli.it v,inis Regni .VLaia baria loco, prileniin in agr> Oiyue culrur* dicaoi, quo* immune* L*m.
 Iervarc tctur ab mlcetU cuiufcunque flenens. tencnoribu* plant in I umiudam noxiu. Semper ?i-
 m, quouiims floret, frudumqueTett

tx arbom radiu: decoctio wnriutur, qux Manucit medcndji lumme uoh* pcilubetur.

Viri.

CAP. XIV.

Bsmftr* hJk* fltnkm fficatm, fr»d» mmttlusf me*.-*, isBt

Cmwvvti HM. P. J. 7». 4(f. 89.

U.U.

ARbor est M/I* maonttuduii, 40 ptufipura pads aka, <»Ar« criilo. mukflfoe ramtif o-
nova in orfeem d*Ful» ortuto. Lignum albtans, nutnee nifcleciv -an*
auinanerec. ^ crem U tom fuccum fillat. **,(
comcednda, qui: :nnacn\ Eastum (becum AiUat, fV/uo¹ n-U,acu-
miiuta.craflLt, Jenfi, (tfabrj, (upemcatro-viriJu, infernc(almridu; mtu» Jen Udte tureend^ mc-
<U cofti « vindi Albkante. K*/»/i liiaveolcnres, vui^-albicame», in ipica-
Hircult* prorennint: Sum it gemmulr ciigur, UAeo fiicco rur^ - umbilico yf*
mmmSt tnbui iurrecdk, 4pc&M omi'' ant ^*.-r^ tricocer, viride*
rerrice coronarx cxirio, tnpartito, aao-vindi, JcernmoUfiteo iwxofurgentes, intO(q,<. .
/muw ttuu, dura,iibiumia,rotuniU
Nifarur m variu Regni WUUbaid locn nbginofe, prtfeemm Qrci Cechm in Jtqyx & P**
Efoltiin aqua co&s balneum confiatur anti-arthnticunv Eodem datoelo it ulcora an:
8c.TCrmioia Lrentur/ vcran nicantur, ac ulcera pocenter mundantur. Ex lacteo arbprii
fit pulvere CarcapuLr piluk hum qu* in hydropc mir» taudibtu extol luntur.

CAP. XV.

Bacifera iUUsfrmd* tltrv rnim Utmlit ttrmsftmms tmttm*tt.

t II. M. P. J. T. si. ;. 41.

ARbor est procera, ;odrcucrpdcjakj, <***titt molioencer crallw, muttidjue ranmla in of-
km diftuftt donato. Ligntsn denfuii, albicans, comce*ancreo obdu^uni. RdJat rubc-
(ccm, albicante co«cice,cixWtL F»U* pccual* longts, nxun-
muloi proveniunt, obiongo-rocmida, acumuura, aafia, denla, Rlabra, iuperne colore vindhniico
Iplen<»enti4. infenc lubnndu: a pedwlo ad apteom tulii conlpmuit nervui deocurric: od ^ & li*.
niort «ticam turcubi Iptuiim pravauunt, cilya<juc exlguo iubiuU
tgnilque' IJI ;at*
flnfcul* iinifub* iuccedunt frwdm, rotundt, tribu*. uiterdum cjiuruor, aiigulo conlUjnes, vumb*
nibefcence*; toHdem Hiftinrtij locwln ftrrn* lotida oormnenr^ oncula ntrgicame ac tuunte tth
tecti, mciulti atbi, n rocundo oblnnR-i, &pore adjhingente am lubtqueruc Irdau
Proven i in P*m: temper viret^fiorcf, fnidumq, icrt
E (Mm'ic hudibQi ant melle toruulb aupUfnu poramr, quoi) idJau* ac motitbu* Serpentutu
aliorun^*^ reneoatorum anntaiium tmpotimm eot potencer lanac. Ri*iu mu, & caupialtiut
mi loot ootulM impodca linfmnrn tnafulafyro daW»» & cotuuliuna auat.

t. Bsttfn* tmJhsfrm&m Imtfmmfa mm tskwlttnkw Utmim trrw fimm* cmt.

^ < C ? « H (M H . M . P . (. 7 . 22 . 7 . 41 .

AHen FMMVMB (padei est, fed minor. JUu et hir»a, annuoca, aacrik JWM p
ademit liouiu, at minora&luave.okmta, bmuker/IWtj Paniu BB&ul* hadd
la: phmr quo* tamen abmflafguinlapper*Haf* m« qw I«inagam deAliukan
trJbm fw^iM i* rortndj, in vernee uml«bes u turn fiUmeoavuni fubndjum at l
•tnoioium coionaii, tenui purpwakertte ac Unu«ho(o cottice ondi: Nucetn contutent alb*c**
Km, thadifhnfl»loc^iikWw>l(Wi/«»^ ^,mg>aii<u>nucmia.
lck h attnol«in Bsyfm; Icmperyiret, quuanit raacuroicxhibet feudw, fcat*

GAP. XVR.

Arbor Indie baccifera fruch umhilicalo rftun. In Ctra/i mj^mtu. Jiu ditotet.*

gingoism H. M. P. 4. T. \-. p. 59,

Parcelfacit arbor atq; spectofa plurimum, aintudine r?o, craflme veri n pftom men/i; ram
arater *qtuns, multife^ ramis in or ban lottge Ltccq, ttithiis doiuta, qui cortice vindi obdudi,
ac IpinU lignoiiis, craifis, longis, ic ngniis muniti fiint. Lignum albicans, prardunim, cor-
ticeelabro,, cinereo, illjis imcHhnt<> [vanitis, (jjxnisacri-anutt, odori arbor, omattei tintum. il^-
<Ac fungoCi, ruffj cortice flavfcctent teda, odorau, .tmar.i. *Felu* brevtbus p<iolts circ.i ramorum
(pinas (qua: Undem in ramulos exocicunt) prowenwne, oWongo-rotunda, craffa, mrtllw, glabra,
fupcnc viiiiui, iiii^mt: (i vindi fiilcaj odorau, .imara, ncrv'is alitjua c cofb media albicinte, Sc m
averta pane ajtc excubcrante oblique in Utera excurrentibus. *Fla* ad toBoram exottura iriticm fpi-
nis provenit, pleruncjuc unus, alitjiutuk* duo aut plures, infij<.i, calyci cocodoj m deem Lid-
nias (crto, c deceni terctibitis, ccilli, dclitls, fubviiiibib, intus c<mdicis folioit condans, quir ex-
trocium 1 ellex\ apai^m circa taunknt caunt, pponimentibus deceni mi nit is *ffKibm*, quo* pallkia
fijmta (i;ftinent, (jtiorum mediumobtinect piftiiluni Itaitiirbus concolorj odor (iiavu, fapor ama-
ms. *Fruim* globoli, Ceralbrum rrujonini ntagnitiulinc xmuli, cxiguo in vertice tinibilico prxdm,
coiticecincinli crakk>, purpiirafccntCj qui mature firu&u Iponce dchileir, carnciicficiicolenta, <ljl>]-
pratique lapoiiis, incus refertii intraquamduo triiive, acn, gbbn, planomtunoi, incus candidicoa-
rinentur nucfet 1 li antetn fruAus avide experuntur & in ticlidis comeduntr.

Ocfctlocii petrolii, aronofisScomotitanisin *Mtngmt* alilqvic provinab Malabar perpetuofron- *Ltm*.
dec, friiEcll, fiart, -it iliu lupcrtes manet.

Emblema Kcgix Ma(citati> Milab.n cnfibus habetur hxc arbor, quod (lores diademab impenali
haud ablimjles rittiiis inkercant (mnis.

Succus ex aibons radicecxpidfus *vama* nccat, necnon bliofbs & pituttolbs humorciper alvum
cxpmg.it, 8t aquas hydropicoiuni duat. Radios pulvii antidotum habetur vencrura noiiibus fer-
pciutini, aliorum^4, vcnenacorutn amnulum.

CAP. XVII.

Baccifera TnJie ftofttllu sd fdtorum txsrw* tmfrtu, fruit* JKOCCH.*

T.jirtHhKtr MilAtrn^Kt \, M P. j. T. 57. f. 73.*

ARbuceula mmilis eft, leu potius frutex, lex fepicmve ardtter pcJ« alcus, catidke medioen-
terendfo, mnltid'i ramulis anercH, ipiniirifidismunitis.ac in orbctn diffuiudonato. *RM*-
i/wrubeLeni, lu.ivc olcus, amaro. *nk** binJ, cenu Tel plura fumul juncta circa uulo*
provenit, oblm go-rotunda, craffa, ikiiu, giabra, fupernc atro-vindia, fplendemia, infernc fub-
vinda, I, hlrfuw, r colta media craffa, roca: !J, Si in iverla parte CXIUIK-
icxonunnu colm!*, *Aux* in Ic tnvicent aroiam in dcteruntur: fapor fubamarus. *Flores* miodori,
fubvrides, exigui, plures liiiul jtiiv ti ad tols >am 6t Ipinaium exortuii! *pentape**
tiodos, (e qmque viz. loliolis jv unanato c^ flclLu in modum ex> nfa conftante, qux tamen
fijmJ decidunt; calycique cwuo viu.li, in quinq; lacinu acuminatas fectio lltretites, *fitmnm*-
la quinq; viriili-atLicitibus, ruvo.rufccntibus *tpthm* omatk nieduni Horis cavttacem & uitiSih-
cum oc;upantibus; interqua: *jtjim* prodit craflus, albicans, infemO pitis cuvliidi* f.bljtus, fiipenii
cutbidatiu, nodulo rocundo flavcfccnrc. *Flofcub* i « « (iiccdunr. virid<, pUna futiuidx Jicocca
umbilkobto in vertice coronaur, mtiikj, came virtidi, liumijj ac aniaraicfcui; mra quamduo
licantur J>^JM obloiiiga, ieorfim locua.

Ptvenit in variis Regnt Malabanci Ioc<, prilcitmi in Bellangc; Scmpor rtfet, floret, fni&inv l-*at,
quefert.

E folitf m aqua coftit (it oni aJlubo contra .iphchu. Radius contuli ia *}U> decotftam licpatu
oMcmAionaapont, Unguinfmqia: purgat, & cxhilarat paudentm.

CAP. XVIII.

Brucauli IL M. P. (. ^ 4 i. f. 8j.

Baccifera Indica fofcniu umbilicatu, baccu umbilicatu -AV.

ARbor eftpwca, urckerM*li nugoitudinc, mukiJque vindibw ramulit in oibcm d
dona"jj lignum albtcaiu, iioitlc, corrice cinctum fubcinereo, adftingente, gravolent.
Radi: fibrau, ruffH, furvti ty:ti< ancij, fubilla, unctvola, gravolent. *Fala* oblongo
rotunda, acumituu, aalli, denlj, glabra luuen, c atro-vindia, infernc fubvinda, odore
grat

gravi. brei exigui, pugjufa, luareolentcy, ffHatim exticitiii rami.lit jnoveniunt, calyque txiguo, roc undo, viridi ;xirpuron trtic inharrenr, quatuor acutnuuti* c\ panilla, fol: olt con'fantes, totidem fmmtdm tenubiB, purpures ifctctti nruti», acCJUin otCBpantiU», inter qux;/A» pr»dit ciattof, objongioc MoLulU lucteJunt bat-s dtcoexx, noonunquam uicocot, ex'^uo nigricame umbiKo in vertice CXMWUU, vitklet, motor*, luWaJ0e, camUgtnoio 6c qtuli canwo oxnee a nAz; qui reniii rhidique pelliab abdwlvj. eft, tanilque tontina bini tenure jtmms, dura, ci«««>aJbicanni, dillepiriKntii ah tnvicem (cfunAa.

Loco et Tempore.

Prorenir loes monun» 8c ljl»eftrim» Regni Malahand, prxfartm in Vmtmm & A Floret Julio Ac Augufto menlibtu, Novembri auttm & Deccmbn maruim ten fiudu*, fupcrfto nuiwc

Vires.

tx Itioua tohorujn cum recciin butyro nuxto hnumentum piratur, quod in cathunculonin) ufurpLre UikiK. Dcoociio curtn.ii iplim ahWru diuredca habetur. Ex ridx» cortkc UJIII/i iwti ii cuniutu in cbutyrato LtnC laumentuID conhattur, quod aJ Artiu itico* duluco cotlendo i I pan

Cir. XIX.

Baccifera hUus fr*3» wmitUitt rxtmtft, mmtf/rtm fmtjtiti II. M. P f. T j. ^, 9

Rbor <fl Pruno iiugninitine 'inuto, r*#J«r haud ici tenui, anerao, liporilqu* amin cortic* munito, necnod ranuulis (ubvindibu* in (xbent dilfulli otnata *.. bteim, mgrkJUite coi: . (ajju-n artu o-dulot /V/u oblong in «aibmi ictTMij dcmla. aimxluick I mcmJM^ MlpkUot tuiioio coalUoto, qui. Flolaitit ptri molo lucfidtUK fruOm n>: Tukka, doin (. ac ntgncaiu coruinentoi officulum, <juod nuUcuni indtuuii oJtr C4DCCIII, dtileit J

Loco et Tempore. Vires.

Nalcitur locs arenolis ac petrolis in uMimprtr 6c CmJtmnt, Iemper nr«, quounnti rloret, iac men u oolorutn vitu corrigere ferunt-. RaJicii corta cum G ,ulurs pu 10 aqu i u>do pona umbanu-j qui venti* dotoriUu pUcaitilb min(i« utntctt.

CAP. XX.

Baccifera W>V: umbelata*, frulla mmtitfMt, /rut*, mtmfptm. K*rcK**ht If M. P.5. T. 11. P. 31.

ARSrtr cfl 4? ctrcirer peJeislu, «*/^« oafPi, denfo, enmee oWurto CTirto, a n c n o. Di » rubefcente, multiloie rim-ili» nodorn at genkulatadonato. RdJ,x irvkm aatia, hbrau- dccl; fuperné atro viride ipl.-nJ-Tiai, fubnu diluoorx fiUrr umbelletn ntodutn loogk 1c' In drei rujto'uiti exurtunt pravemuat, inoJori, extgia, liinttj, qiuli gemmuU, e fep- tem acuminatis, veru* *iit]uc foiioh uxiltintci. tx umbJtco prwhunr JtmtnU qmuov quorum fepem albicans. • sfnikn enfen ctn^idifnne omtu, ffofculi fofaU intercc: veru; fepem veru loogiora, rXUTkll I flavique nodulis doata, modum foliuli cavitatem occupant, aliisquo em- nent; inter que fyle prodt albicans, fuperné velut ftelluli cambdi fepem cupulatum exornant. Pralle confimili modo frequentes fuccrefcunt, funtque haeze rotunde, umbelico erguo in vertice pradtz, peltim virides, dein rubefcentes, tandem rubro-nigricantis, ac retinofis albicanobifque ftris obduetz, cari i cavilubia ndi ac fub!ooil rdottgt, («r quM) officulum locAntr wo-pur purcun.

Loco et Tempore.

Nawkur u!*i,in MaUiurj lenipervirt, quocumh noretsc mtftumictt. At*ww folio J ; Enime>Bflecmi«iafarib«iu>0»7«ainfufoodBorkcollucitf pichs curandis fumme utilis.

CAP. XXI.

Baccifera Indica frulla umbelate, racemife, candida monopyren, rotunda. Pelata-Kandi H.M. P. 5. T. 10. P. 19.

Rbor est mcA» BtatntttMlin^, caudex duro, iftcmc, fit m u>uu munito. Nonnunquam os unica e radice excrefcunt. Ralis rubelcum, odora, aromatica. Filla geminata ordine parallelo circa ramuk. pror«mm(. oblongo-rotunda, acuminata, craila, denfa, glabra, fplendentia; colla in ift inam, ac infernè enanens e qua nervuli plurimi parallelo

parallelo duetu versus (upciora excurruiK, qui in to mvjeem .n-cunm d... maticus- Fforti raccinanm in fiirculis premjniunt, fuave olentes: conlhut u u... foliolo feu catyce, (id in goinq, bves Incifur^s fou lacmias divifo, nu... vefcentibus ac rotundsi ftkibm ornatii, radium owupmtiW, inter c... redus. Flonbus fuccedunt fmSm roaindi & in vemce calyce, IJL... nati, vi rides primi'im, dein albicantes, tandem candidij tenui petlicuta cm At, Intu... molli fabdulci, adfringsnee, odoritqae aromjtta cirne referti, intra quani tenuc c... iumNvcU»" > ineludens rotunduni viridem, aromatioim.

Provenic in CotromtaJt vidnifijoc loos montanis &c petrotu. Semper' virect, floret & IVOAun) Ltm fert.

Folia cjus dicata, &c in pulvcreni redafta, acauc cum la&h (cro cvhibtu diurliccam (aturrt, Et foffil in aqua cociis Balneum paratiir contra qtioTeunfj, arrumii do!

1. Tijera-Kanneli H. M. 1. Tak. 50.

Prxcedentis fpecia eft, dque niud mulrum difmilijSj prxrerquam quid lumiilior fit, odo cireuet ped« aita, candtcc baud it i enft), ramwitque 8: (urcolis onertor&u in orbctn JirFulis dunato. JIJix pariter niblceni, amara, aronucica. Fdts oblongo-rotunda, acomifUO, tra(U, dcnU, gb- bra, I)lendenua, nen'is aliquot £ media cofta albicante inlateracurrentibui: odor fit liporaro- maticus. Fii/i/< in fua'ulii multi limul |unc» proveniunt, inodori albitantcb, hexapctalt, nutre- rofis fiva candidis, lubi [avcfceaobui tjttthm oniatumciltiimoctupjntiliiib, inter quai Jljlu, prod), aln. am, furectus. Fic. • ij^i iiccddunt Race* okoccz, niide* prninni, dein albkancct, ccnu pel- LC.1.1 cuiftse, inttilqin; carn molli, aado-amara ac uoauaa referat, intrj quam trucontinentur femma, dura, rotunda.

Cref it vaim Sicgni Mil.ibarici locis, prxfertim in Btyp'm, Artt ZcBurJrve: Semper virect, flo. LITUI, ret, ftu*unqi fert.

CAP. XXII.

Bdctifera M.*b*TK* fmftu tambtuatt Trmtifmiu, tmkt mm ntuU*. Ftrm-SUra R M- P t- I 17. p. 57-

II. M.

A Rborcilnifxm.i^fitrudink, , pcdcs.ilta,c*xjictc -oSdtirtofiir-

I, rxitiuttTirtidibta, ceufmndibm um!>p> ito. RJJL niancanc enrnce ttdta, aromanci Mb geminau, ordine paraltelo; cxrrc inbaerenr. cblongo-roRmda, ac in mucroncm ddincnri.ij d^nf.ijgLiSra, atro m dentia, nervtilis plurimts i medti cofta in Uttra CTCurrentilrJi; lapor anunis, o.ior armnaticm. FLn 1 •(btongis d r a ramos tcniorci proTcnimt, term, quaterni aut plurts fimul feri con- cfti, modori, anun: conftant 11 c ca^ce exiguo rotundo, riridi albicante, numcrofis\$*mm>lu al- Licantibui, luteis 4p:rJw ornans, medium occupantibus. Flonbtu luccJunt frtdm pnmomni x- trnuh, oblongo rotundi, <nterrii! gibbi, ititctitti IcTuCf Knuofi, exiguo juxta vcmean umbilco prx- din, «ro , :nxa, carn inrus fucaihmca, albo•ratcfeente, amaro dula & aronu- ricdrc^crti; intra i:.. :., rufi p= toevi tf

Nafcitur ubi<i bar, pncfe viz. & Septcmbn meniibtM, m± per : •lam new I I inet. Ex arboris eordoe in -lijju onSko tit 01» collntio pro Aphttt. Radix (iocats^ putvcrf;iu bita diarth«Mm, dyfenten*m & Tcnctinum cunrt I cotifiditur fauauum affiAibui (olcodM uttlc t^nr.

CAP. xxin.

Rutiftr* Uitt* wt&ttiti, fntH**mitUcm» migrt, tffctAe Mat mtut. Km* H.M. P.5. T. i-

A Rbor eft proccra, V arciter peda alti, audicc mediocriter crallu, dnereo cortjce myiko, tflquelno tUJix cratta, fibrata, nig^Ufts. AUbiu & bma fbi irrucem oppofita, oblongo-rotunda, ac in mucronem definen dens, glabra, "p"l"i" * "1" U excurrunt, qui in Ic in CUA- nm dcterumuTi. Up.. in producenti. fJV,, candida, molli, cii cacicic- Ipcae pj in tuor ri' nunicrolii \$*mm>lu flarackci ffuAm ,ntibu». in albicantibus, Ploribut fuccedunt Frvdi rotundi, virides primim, dein rubefce iit«, randem nierioi

wMni Rcgni Malab 1 i'i lou>; i, i cocannis floret, fructumq perficit. Radix varis mo lii i!urp«ur ad ocufotum palpcbra 1^ .

I. MM CAP.

CAP. XXIV.

Ram f... r«amfd frm8» tamklcM* nta... AtolOmh: MtUhtrrrJlm 11 M
P. f. X i6.p.Ji.

ARbor est Mali nugnimdine, < j>J<t mediocter crasfo, tmultifcju ramulis in orb
dmuto: Lignum molle, ff ivefcen*, fiirvo cortice munttoni, cuju mat;
R*Ji* rorvi.acro, inodora. F*U* oblangorotanda, aeimioici, cratla, dcnlra, RW*** fu
ipem 4tro>tr>dia & Iplendenria, infenrf fubrindja { cofta me... St in J>erfj pate
E qua nerruli tranlverfi plūm lypenora venut excumint, <ui in I... arcuitim
P^or fi&<cri*, odor nidlo*. fhfcult v<idi fulciae mrentsracetnanni iu
c*lycn)i:e exiguo, rrxumbirdc iniueot: itint Ganmx rocundx, c\igar, in tre* quanioreve lo'es in,
caluras ten lacamas divite. Fio! oitn fuaxditnt iUi-c^r fibrotundz in vrbce unibilico, in toti Jem quot
Gemule incifuras (ai l.Kinus divifb, cororutr, viridifulu, came uuus aquti ingrati ac lylvellm
(aporu refertx; mm quam (cnien concinaur Jolklum, oMongoratumdum.

Provcnit mulm Regm Malalurid tocb, prxferem m r> tm^wmi: Semper tint, quotann> ^
maturu* eikibet frudw, Aprile TO. 6C Septembri
De rinbus nihil conilar.

CAP. XXV.

Frutes JmJtau... ,fisnkm vmtalmm/rmUm... N*J*m.Sikt, II H PL F.15
p.11.

FRutexeft aUmwine Juonimbommiim, ru(ect> in *rcnoti^ & pctrofu. oonice extenui niffo.
in«u> albK^mc. Smrtwt* nr>rdU nruia & alia, quitudr kiLv

Kjnni buw rjmo* jmpkaunnir, diverlrb rtu, JIU Jdtiurluni l.rtcaj. ij** tleurlutii u
jlu I uiniijuc oblong4, nl balm UntSrru, nule n] apt
n ucnori fc daudemu, ficlacterum ons T<VK emerio
><, micnoj led precipuc fupcrni pute, qua aum Lautiniu i
ttnnentn & anufi. Coda media in extcrion tantum pane cminct. FURtt viUi
: -RjtifT\ brevbiiiv lurnxht ac renuibm pectulis, parro ailpiduo alrce exceptd inliJcnr, <r
i > ceicfT! ad ranvmjiii nodLkM vertKiUatim Jt'j, ecuiit l>
caudi n gennixubtu liut

ofto arnitea feu porpure
fcu pufpuiw co>n», *aMiMnaa» npdui & (urreftus, « umbtbeo cahra emkam. Fruimi /J^
pir>* ac rocundLx boecx, oororucx in reracc umbiliuo, qui calyx Boriun eft, ootore pnniuin vi
Mem alWantt, feu fuWliro; poftci purpurakente, ulnmo in tocuni iv
came • ola,coraj] • duica 3c nonnihil Aiiiftringentti, eunoneiMtf
uiiim, (IUI cornce ntz (oi J^utlicodiluto, lotus pul; . tpon luUnaro

I decudum cum oleo Icmt pro prunru in anyone parti> aSe&x.

C*r. XXVI.

Arbor lacifera Brasilia... kPifoa

ARhor ell audits coatono, uxtke aiwno; film Muti rvcntihtu, (qwe niulfji coftai ha
bent. & quai mgola funt) TO tucker dupiw km>, direct I
m ff: odorem MAfxjtif cum Rodnarino
pnirenit podicului, duo* tome fattm. kwigtu,
fercn Jn Oc moln m i

um habeo; 8c poA irojuentctu uLm impnnt (jikierogumiri 4rdoro>

mmfw l i Bniflu nemonbui rafla eft 8c akiffima, bfrmdutUTimo &: oofitrt p>
rodnam optimo: cdbUn two & campii ad Vntf miiwcm molcm *liwj>t, VIA Prunum *ir
quans, foliofup malo miora, fructuif, terz nufis agrefles.

Folia & flores cum Cam** uritiffiml adhiberrtur ad lotionem pedum, m dolore capita. E flwibta Vf*
mane adhuc rorulenrts colleais item i foliu aqua dcfstillattir, qu*; ~~stingerans pzelent.~~ & mun aifi.
cans oculoram mrlamnrwriorem oprime temperac.
Pulvis ligni in carbonem reda&i ocuus inrhrus coniett in nubcaiU, &c

CAP. XXVIL

*Maiuca Bnfilhtfibai Marggrav. Temiftrs Brsfduxfis fr ~~alia~~ retmtit, turn fulfa mt&t ~~ph~~
Tno.*

ARborcfrnicdrociis magnirudinis, clegantu lubens/i/w, bina 8: biru fibi invicem oppoiu,
Jiniilia foli^Malabatfari venis, conljfcntii & figura; nimirum ties nenri miiRiiioreslecun-
oiMi loiiRitiiiiincni folii tranlcunc, & adhuc m qunlibcc Utere unus tenuis, ut quinque fine
in ujiiverium: tran(Verfim .luteni niultx veni parallel* roAx curntm: (OJM infcniu funt
alba, Lirnipnoti, liipsius iamrate virnlijj l^leotliiltTiri: rami.li luniore* meant Sc ad t.u turn mol-
les; ficcaci co Utcic quoJ virclyat ci'adunc nigerrir: ~~pol~~ iro adtpceJu. Fbrtt Autor non delei-
ph't. Fmilsn roft&us, m.ignuuiilnc f&ine ~~Py~~ n me ~~chatell~~ i, SC pcdculo inftar l^*n infidcni, cute
te&us l^i-M, fju.indu iiuLiimic purpurco-rulj, umbilico qunqucfolio ocfloni manubiu. Pulpam
conrinot mdJn CMffins conflitenti.; palldam leu albiibm.plurimuacinismimnii & rctcrum, dulck
iipons. Frurt.is enim (ji:uido minims nullii est, &i cum oigim premirur prodit pulpa qux deglu-
titur.
Brazilianfes non gaudenhveta hoc fmdu, fed avibus derorandum rclinquent.

CAP. XXVIII.

Bseaftza InJit trftlt*, ratmofs, ecmu mAdtsttu tTtcKt*. Tijtrttt-TbdU. H. M- P. +
* T. 59. p- 61-
//. //.*

ARborcula est humil, ~~Septem~~ ~~circ~~ iier pedo alia, caudice pedem cralio, albicame, corticcob-
cinefti>, .inurn, **mnkflqne** [imulis vinJibui, rrungulararbui ac gettiotudf donao.
ilbicuis, ljpfnw .ini.u l, cK^r-B tencllii **FUu tenu** IKTIUI area **nmuloram** Rcn-
elos proven iunt, OIIDIIKO louiriiia, ^ainunau, l^ iatn«a, lupern color c atro-vindi nit en-
tia, infeme (ulmrida & torncntoJa; cofta media crafla 8c ncm inde exeunta infernc lanuginoh" j
odor (LLIVIS, fipor acos & amarus. Tehenora vco hujus arbons folia nibicunda iunt. Fhni haud
ieou ac *Kateullika* flores lurculnrum extremis racematim provenium, uxrula, fobolorum Ihparu
obvalUti, vinditjuc &acuminat>calya inlmrcm, c quinqucoblongo-rotundis ac yitroriiim renextt
folii conilantes; quinqc cterulcii *finnmAm*, rlvclcentibus **fnbm* ornatis, ac extra flbrenr late
eipanib, nedian etoi onrkamn S(umlnlicum occupantibiis, mter qiiir *fylyut* prodit ex albo cteru-
leus t: in acuminat> iivUut: odor luavi*, lapor lubanwrii. *Fmiliu* uibrotandj, tiiquctn, in vemce
CTiRUo-umbilicopixiliti, K>bf, nitente^ pnmum atro-purpurci, dein turvi, intttf inolli taxnc re*
ferti, cm *trc*, ~~meludf~~ ~~antur~~ *tin* eueui, vindes, liporc l'abacco.
Crefcac locii arcnoln ubi^, in Matibar, prx(cmni in Provmua *M&a***, temper viret, qucxanrut *Lmm*.
act r'ruftulj fert.
Ex huitw (oliboleo buryove mcooclis nnpientum confiatur, quod Cephatalgiar, Ophthalmia & ~~Vou~~
aununi minimi medctur.
E raJice aim Xinzibre 8t Coriandn femine aqua* incodi. Apoiema confiatur, quod cih-
buiitn, coctinnccin promova fifcnaulcam fan.it.
Fruffus concuii U in lade ebutyrato tocti vel infuii alvum movent Sc aquas hydropicomm du-
cunt.

Annotatio.

Mytrum & Hedcram ultimo in loco poft Indicas bacaferai ponimus, quia cum carum fruchu
pauo came lint, U per matunutepi lerc licet, anibigerc videotur uuer eai quc *imiU* ~~2000~~
iunt & <lux fructu hiundta

Cir. XXIX.

'De Myrt 9.

MYrtus Gricu Ml*^l * Ml*^l* i Myrfine Atbcniengi puella, ^;lcritud>ne 8t robore in-
tinnij amica Palbdi, quam juvau* ab ea cyHu & Pt ~~alia~~ ~~loq~~ iaruj mtercmit, imiitl
X T X dudw, quoi dcRantii crtenlqucnaturxdoobu* rchquii vir^imbus p^rllnct: Aib. ~~cola~~
in (Umonuar locum luccedit, temper Minervx ut Oiw diwa. Si:nt qui vclint iic vocauin p"V*?"
Myrrha auandam ~~zmulam~~ ^-lw« grarunt, cjuj poilent bicculx, ut annoum Ad>crfana: qu**i*">
duUtun adhut tit, uuum,tir<dl uwotuttlj pnuj Myrrru an Myttu* Nobn fane (inqu<.)^{Blu}
bum)

hinuO lottftj peou ndctur nomina dcri/uo, & Mynhx odortm huge divcrJuro a Myni •'accis agnolcioius.

Myrnim Vcnen fjcirm dkai'mque Cani: rarius ab eo tCm, qwa multr* habczi ulus in mor» mulKwibus: Stni in qubufainq, mmoniK rict admim km piunnum [weft, jf. fl. Noftpotn* isaflenrimtir qui ob od< > dicaum putani: Verier i crum conalundt odores & uneuenu piunnum vi!.

Mytitut Colin perpcfui-v .tibu*; bacai ombukatd cum plartbtu intiw (enuntbiu alb.

et Clit lea Ipcie** s annotat (c in i Hispanica fua peregrinatione titfiiuc locn multa gone a Myrtorum obferuillc, nec dubitare quim ex rarione maior adhuc varietas oris poff; Not i tii!! Bt MjtTum Tarentirum dn

I. Afyrfu (trnmmu Ititu4 C E tfna A^rfai fylwjltu fJtm ttMijhm* qttffilem. Myrtu latifolia r. g. & dkd, fMtv* & frvtfr*). a <p<r ranmion

Hujus generis fativa in arbores facile adolefcunt, ramis flexilibus ac lentis, rubro cortice, foliis longinickis, perpetuèque virentibus, Punice amalis, quanquam in nigra nigriora, in candida candidiora fpecientur. Flores omnibus infident candidi, odorati. Baccæ oblongæ, aggregatæ Oleis quidamenut reterentes, multn lane Ivlvdlnk* nuftxcv

Inter lylreffro quoq, alba & nijj'a reperimr.

Myni quart um jjenm live Bnicim ijW. tuuc eandem putat)• Hi •ms, quod & dcf^npno & icm, & loot* faadent: Folu tamen paulo breviora & pto longiuul; e latiora pinguntur ijum fiunt Mvrti (.nmmuith It

Hac ai-tem Myni Inev: univcrfa ferè Ticheni maris litora virefcunt; nec Ty, nhenà tantum cnam Kotiuni & Nejpobтана. NMOCRC nullam alum Myrti fpeciem in i'iLa obferuavimus. Piovenit aiam tntiatiopnntncM, prope Ballenun in feptbuioopkkf&

SoteAofttUtta b c, naJbamnon edc ipocicm icfkaratam 4 nigu, diflerrcumenco-lore, ootflkuim ede wranx^ in Iritu.

SecundunimansAkvandnti mile*, quod perpoud i *CM» H.gAniir; marinmu gaikknt. r, qturn Pucunun bbuLr man ruum rctenutt.

1. Mtnmi B*t*s I*tfiU imjtita ChC J. B. imftitM B*tus I, W /J<r £<vw CB. Baccæ latifolia Oct. latftU mtxtms Park.

Ramis est fatis crassis; foliis dupli- magnis, ac interdum ad Lauri tenuifolia aut Arbusti foliofum latitudinem ferè accedant, dilutius, ubi virentis coloris, odoratis. Ramis hæc floret aut fructum fert, quas texendis fepibus, quas tondere folent, ea plerumq, utuntur. Nusquam hoc genus vidit Clufius nisi in monasterio quodam Hispali, Hn Lrtiilin Mauritano- rum Granatæ virdaribus, in quibus pfcinas & lagas claudabant fepes illo Myrti genere constantes, & ex alio quodam non multum huic difimili, minoribus tamen & paulo densioribus foliis.

3. AfjriMi Ujtilis txmus VuV. Ufa* Artj« a. vtt ftiut Utti tmfirmt **f(tm>i*, C B Mfrtt B*itt* Utifilt* JitmUtm gamt J. & * iG i JV; r.

troticaf, ^, \ radtce plurimm denlbi, aaitw fiinwfque r<M pi omit: /</u luper* r\jJr tpet i hab<, led a*ie6n akentu, ut pme mutwi lele <MU. <miib>, «UNI VIII B plcmta, ndoraim; an luccndit paulo oblonjnor / * / • quim m T* ere mctptt pufpnnUcsm, ttmicm plcnam macuriutetn Candida incurraque urana in le continent In i Complutensis ar- ito, inq, quibaldn tn hora* ConUbut hanc (peciem vkik Cl.

4- Mirtmt imftif Bt!guM C B. Imftitm Bdytm ftni Rimnm J. R Wn maxima Cer. latif U t I'fc

Latifolia Belgicæ ptinu rxnetB amplo est (nlio, quxli umen latifolijc Bttkx prune magnitudi- n. Alu paulo minor .it, interdum vegetiore, virdiorique folio, quoutdoqoo pallidiorc & t*

Tertii denfiore est fulto 6c maRa mucrofuro, eodenque none rtjfebon: Ac Lrtiorci

MI n>cdto est IQK> non multtim aHtmittit est quarto genen Clmf. i. c. TUMI* tubemui; led mono fullcicfMibut, Ionian etu tmmniu. L. I^

5. Mjrttu angustifolia txth* J. B. Parfc. B*tit* angustifolia O B.

EaJom est foborum dcnfiraie & fcne qun Iktica exotica Luifulia Ci*: Vcram tni... ft rural u is vinince J fruttu criam majore 3c magis OrUlcui.no, qui 1 cliquorum... iilt.ir alba Sc lnrtea graiu tert; minara tamen quim Myrti Bxcica: btlfolLc.

6. Mjrtat minor vufofru C»B. nffwr Pork. Ger. Tdrnttga J. B.

7. ft

Nofiro coelo (loque reliquis notior est Myitus Tirenuna duplia tripUcive (enc difpofitU foltis, crebris parvis, iil.in riroic tutiJis, iragrAimbus. Flam quin^, folus c.intkiis altojiun more amil.im, quorum mtidium ocuipanc numcrola ftainuu, (xlarcgrato &L amibik liittx (per nutuntoteni kiud (ecus acalix) nigrefcunc, ftmtnt pjenr inrtsKo, albo.

I Lvc omnium frequDUfGo& oil in Sspntentnoilium regionum honis, quia fauJc propagatur ft-nulisaur lured h dep

I Iuljis titles [pecics leu virictata propontc-P.irlunfotius, alterant folio icuto, ilteroni rotuntkire BuVi liunua: folio, non alu in re diveriim.

7. /U;rf«j Jemfttts fru'dn *U* J. B. fmSm dlb* Ger. demoted mme\$m* fetiu frut}* dh*

Saris atte fruricat tcncllorum Be rubentiiim rAioniin frequentii ilcnCij foiiis omnium tnoilnis, (tn^riilioribuiCs: imyji ruicronatis, quam in ulb Myri(\ (jruraciu »irentibus, tiagr.uitb o... par ivtiquis, mm ccLimtiuctu), qui UIHQ quiiem virec, nutuntau; autent no a Otgr^ck at idtquo-ruin,lc.l culbidiu manec

In Alia luliic Mynuni ciWervirit Bellonius.

II jth alum guldem ipveni ri fpeciem guldem formx fci)*per omnia rencnorem, exiliofc folio trsetic li us. Hujul modi Myrtum angulbore & mmoi-t: fobapiui Robmujn vicit J. Uauhiuu. His addunt I'arkinlon... ns Si Cortiutus

Mjrtum flori fltno. <ZSt 6oubU flotUttCb

!! cc M... tricariz modo mult... tplici petilorum, fubrulentium umci), ordine flores compositi habet, que in medio densa congesti... I IcvitertUC Crtp.it.1 01 tulitur <... subjecto capitulo globoso. Folia que oblon... ant & in acutulum macronem desinunt majore Myrti speciem hanc esse... IIIAI ant. Porc; ut nulla species Myrti pluribus floribus luxuriet, tt4 nulU ell flom datur... Licate uimmenda-tior.' Nec emm geminu... exacti mentis spatium florem decant, tepe truncell... z Jur.ir, net g<... ementiam innoxie sustinet. Tanta fertilitate floret; ut nunq... Lara line <lis tovreiitr, quonan inc... ementiam innoxie sustinet. Tanta fertilitate floret; ut nunq... Lara line H< >re ilqirchentiaciir r pric... him occupant novu Raro in* Icmiini proli)it, quvJ ple-nirjuc pUmii Hore muln... pica donatq; commune est.

Nos bane (ut pleratq, alias plants lia-o pleno) pro varieuce untiim [Myrti communis Ita-lic*] habcmis non p: o ipcae all aim otnnibiu uiitincta, qua- ob pukhruudincni fit qrtutum a cu-nolis <pcmur, 5: ituilMjie tolitur.

Myrtus in calidioribus regionibus Italia, Hi[pania. Gallop; ovincia sponte &c copiose [*] venit: in In, ... ditoribus minime durat, ne i jtorte (i. ... nem culta nisi per hycimen reponatur. Ob perpetua Locu. tronui ... ii, & oorecui iuaviliuuKim in ... pretio est, & quadem merito. Ad opera topiaria nihil aptuii, mini l.i., ... tefte J. IUuhina Uc n magna frigora terra nequit, ita facile a Solis afflu patixpcii entia didicimus 7. i. I'loicn: M yrtu pro ratione loci, calidioribus, frigida tardius, com-inuntto g&am, Ionio&Jiwot ... nentibus. Fructum apud nos in Anglia raro ... t nunqtum perficit r1<r/>*. Myrtus. Surculo depido ferkui', rauli emm (.omindujhlu, pneicrom Taretukuij nam Luitolu paulomotufinr ell.

Gaiukt Myrtui |URI repurgatu: «i in altiorsm procentatem aiktclut. Degcoerat in fiutktfm tu/ierbro puigetur.

Myioiljnum * DiofconJo vocat id quod Myrto idnafcitur, irttquaUe, vernicofum, inurne- • i , cap: : cni j;:e, ijuod [V'Luide quah nunus Myrti uauiliccin ampbditur. Ac Hippocran ip(c arbori* tin- n*. tfhj, qui^i aider *»»«< VOOCJ til appeLLtui. S:d * Pluiio Mvniuiuiiii «it vt nuinex (jliciljis *^M- c. 16. Myrti baccis factum.

Vs tum ipi Myrto, turn cuim fiuftui iilitriciona. Gileno vatenur tldiccat. Turn iolu, coin I. ... germina, tum fructus, turn lucal* non ntmm inw le in alturtiorv tidi.li.1. Folia anda vira ibut pus onocant. Scitrandendi tamen on nu vim habon tum fors imposita, tum intro sumpta in carput, m< de in cibo dantur languent i eacmmhui, • discique erfane laborantibus. Virentibus baccis lactus expeilis Romacho utilis est, un i imque occ Prodest cum vino a Phalango demochi & a Scorpione itra. Fructus quoque; uc dCwOehim capiK in extremitatibus corpons tuta latur. (Cum tenuissimo vero polente polline im-pollina octiloruni inHann nationes lent: qui • 6c. ad agillos illinunt. Vanam porto Myrtites, quod exprefFo & aliquannu in fervefacto fructu fit (aliter enim paratum accedit) paricomptum crap uLaiu irectet 6t*J caJci quoque fructu valet. Utile quoque ipsam in deflectionibus vulvarum &Wij pro-mans fluxione vulve laborantibus, detragit etiam hirtutet, ulcera capiit ma-cientia, unique fiv oc A nantu, & i j-apuUmm cruptiones, Huenta qooque i oc A vocant, velun caam<)u«d ex oc A s.onvcnit; etique Uuri 6i XR oc A ofWBU ; yuiliginci quotjuc cnwiadat. Ad aura purulent* denigrandola, capillos imundant;

infirmitatibus. Sed cV coram succo eadem efficit. Ipla vero folia trita & ex aqua aluta humidis tke-
 nbw 6c partibuioniniU: fluxione laborantibus, cariacisque profunt. Similem admiffo tico em-
 phaano, aut c. co aim vino raleneni *d he: \-
 nyAtdas 8c condyoniata. Aient
 humemibqih adcoque ictrum via
 bent. Otrorum aenuu aut etui
 Elpt iinirui & lolu> li.teus arikjto vino vctere aut 4<
 liccatui litum cwie . (qoc amkw.

Myrdanuni magis quam Myrtus attingit. Tulum vero & vino austero addito coactum in pa-
 ftitij, fccarum > in umbra iSciuii porru est nam fructu, tum folijs, cerad*, .

Qua- pnteru habent Pluuii, Galenus, Sethi, alitque rule apud J. ; -tuimuni //./ . ft. & S

UtH internut fotirtnim aut ktccanun nunc dienim ririor est. A'iftbcri umen podunt in dur-
 thera 6c expukione Un^

Sviupi oua est ad caurrfiot etlidoi, tenuet praopuccum p<tu> occupant
 Oleum duplex est in Offic- aJtenun 6tex bat Myrti, uenim ex foliUuleo cunar. uni infusa
 Atque ut iufferenru J<, qutw ex bj
 quitCalp. Hofman.) non r. icubiopi
 internjijntb"j(debilitate f^c tot rohi drciut me lino.

ulutet Mytti omno depemient a vi ikxandi, atilti IHRCI; . h vjute odora. Myrti
 mmtmitt tr* Utrm, Seren.

Aqua e Aonbut Mytn dcfillata ob odorii kuvttitem myropf> , plurimum expetatur.

Pbnm apud Antiquot, antequam Piper icpeinctur Myni baccai illtu* obtmuuii
 quotiani etum generali obiorum nomine mde tracto, quotient-
 que nrifpne aprorum Upar conunenduur, pfcmoQuoainonftmaddh Myrtus.

Varios modos faciens vinum Myrtweij, K Okani Mnnnum apui Vetera '-,, apud Plinium,
 < Columellam, Dioscoridem, t jtxiem, PaJbdmtn. ConluJe ctutn *ic Iiu & ootunt viubu* fi puca-
 \- IUuhiinnti, toocBooo onto. Itell'i
 dum Macoianet R>
 Galkx Quercu* bbro; Phi'Tfyi IV'
 naiA unia>ininuli vivo veltaiu inclufo prxditum obfervavk Bellonna.

& C*miw ft* Mjrtm AmtntmH fjlvtprrt Pttbn. Mifggrar.

Doa- hujui fpocie* in ((tbojii term, lenta ueraque ligno & i
 antum, utrKHoncn i W»nim, h W n V frufiuam,

1. Proe a
 b
 flores & fructus confideret: castrum interna qualitate tam fuperat, quod folia & flores optimi non
 k>lutu odant, iod fructui nijtn adtnodum ki

x. Ptfirtw
 .uwumque majnicudine prxiuft
 ac proinde fructus inter delicias Pharmaciae
 oblongis; alternatim i lliappolitn, led rarooppoftii

Semel per annum floret. > ad Scorpk>nem acccdawt, unigtatoodac olfa^fhiin, quaniniioo
 colore vilum reficiens. Flo enim tetra:
 4lc*ttxu*ajbic<.

Frucfm 0000
 tine, tam fokaxit, led Ccraloniin mote copulatum pafin.
 & pedxuEb di> tmikenta, rocondo umbiJico papillari ptx&ti, qui fi tcnipcfire aveUan
 tiitRent nptunt>, led undem :
 ckum tenet oortKJ ioJuium. Crtcnwn ttunuJtun rchuuot, uarfobonnr, arftiitnq, lee
 &Jbmenc4?olinfuni&trvdtuuntiuuuiiimpnib ukaixA, atque aim null* atlfittingenilo ft: <
 dntc iklo moJentur. fclnu intCKii fimrfixUxi*
 hibennr. A
 uc praHac quaxutxt. Mytiut \ OIRJUV.

3. i emia Myrti ii tpeac* hie repericui, cjuj Mytitut alba appetlaur^ fed infrcqyauiio est.

9. Myrtus
 Herma.

Ligno > est cin.iidiffimo cbooi inftar, (blulo, ponderoti; oorttee fiabro, tenui Ramn j
 formicato ambe
 colore citri fragante, Up<xo aronvMKo levker adnngente. Ad luinnKii ramo* pradcutu UILCOII
 candidi daphan

Vi
 BHAH
 i. U>a;uti
 i iJi<ii, indudenuiadnumnBipwl rmm *iMptiimi i
 decoAttin, oblaviti tenu dijtu, Luem Ualkant MRWOK
 i, alUque utemlit expehoir.

Alia* TarwuM lotentet Hermanns, ut Mfrtum (aim Buxi contotov. Mm. nuninttm folijs
 tali Rraiuir wali:ukd^

f<<<n>> Myrt. f m mloct Niit MoUutr. uuUculn rubndMf vul*? .
 M>>t h W i i m n i Myn. AJncmam humifani folia MyroUioww, o

CAP. XXX.

De Htedera.

Hedera, Grxcis Kiww, nonnullU ab hcrendodi&i videtur, fed male aim antepcnulnrnain airripi.it, utide emrn in .intiquU& me! ions not* codicibus male icnbt per * nemo non vul«.» Alii tier* fonbunc, & ab iJtnJc tiidam volunt. Etcmm arborum importuui amafu & vclut aflcnumx, corticc rimofu impa&a maceriai vemftiores demolicur, Be radicals propafi-uionibus arbores amplexa cnecar & evedir, prxfertini ilia fpeacs qux major fi: arborea diutur. Lt mini fane (inquit Voitiui) hare poitenor placet iwfuju>a. Neque obftatquod in antiquis codicibus per H (cribitur. Nam addtturca, qucmadmodum Ponnttusquoque Icnfit, ut in acculamo utroque dativo atque ablativo plur.ili & verbo tJrrtm, nlmU fit eJriu Jift inguatur.

Kiww Grjtcistiiibim puttnt ,t Cillo, quern pulionem Liberi patris tuille Urea fabulantur, & in nminis fui fruncem converliim, dum .iJminifter cum eoDco ijlieni illiuttterrrepciiit. At probabiliior et)pmologia eft «'^^''' i. & verme feu circultone, qui in frnropma, hordoo fie tnboo nuiime nalcitur, cui natura eft Icmna IIII mlpidc potiiis, qium ore exiguu foiviminibus terchrare, itnde «jnKk< pumes ob tilulolis ac (xirolu CWUCH diatur. Eoicni modo pliau hare «>>> vocatur I porofi textura, & inniiiiLTB fpiraculis per via, qua vinutit ti jiiifnuttir.

Plant a hxc 0 nonnullis non inept a Pardiua appellarur., quod alieni nuadra vivw, 6c partem faitem alimnt! ab .nboribus qu.h Jtnpleditur exfut>at. J.IITCIII inqu.nm alimcmU non cnim (ut vulc TIKophrailus) a pud nos nalcni ulli liedera; ipecies li in ten lii liiccidatur durat, necemontur, quii contra rium csprientii con ft at, Sc noftra tit. aliontm. Miramur at; tem toe lluderjc Ipedes in Grxcia inveairi quot rcccnlct TlieophrjltiH, aut ubt c.« viderir, cum m omnibus quas nos laftrainniis rcRiombus unica tantum hi&cnus obfantta fuerit. Nam Icederam helicen <iicQu, provolutam Sc lfcuilem, a Ottjtote a<borca & fectiionem alier ilifferre cum Traeo, OcJjlpino 6c J. Bauhmopuumus, quam vel rat lone xuib, vet loci ubicreleunt: hincsum loluni hen quod aut forma difcrant aut tru*ia

A. Htir* (emrnuHH msjvr & mow J. D. srkerta C. B. ittm <wj>r fimiu ejuldcm. *Arborea fivt (tandni & cerjmioj* tsmum)* Park, turn HeJrr* Mix ejuidcm Si Ger. Clltllmtg, o: btrntb 3 top; alfo bnrren, o: ncrping *Jbp.

jf. ft

Sarmsntit reituiuiu longo 8c en-abundo reptaru proximu arboribih aut partetibiu innixj jlu petit, quz femel apprehendit pro ndieb ufa, barbctio ribranim propaj511 JI . radical in alieno kJo agent, ice m.igna pjiteniRofo, ctnecroo, m novdlh ramk viridi, nuterie alba tirnu. Ftis nult or* pediallis hiiipalnuuibui <JL pilmanbusappcnfa, magna, neriivola, ngiila, fupeme ex atro via & fpendentia, inferne ad lutoim lannllum ex virusc dedtnantia, iinuola, triquetra, allis n> (ooda, in mucionctn exacuuntur, lapore icccante Sc acn, Fieri> in larmctorum Mtremjutibiis, hcrbacras tolusradutiiconilam, totidcinque lutcu *f\$ahm in orbem aicuynadi multi umbetiz initar. Corymbi fuccedunt per maturitatem lujjri 1 acini tinguli lemunda longtoribus peditulis infidens, baccu Jaaiperiatsequakti taSkt & qua utnnque compreffu, arailo umbilicato, cm abeft ile reiqui acini OKor, mTcripQ, vclut opcreuta unpoliu urccoio, cupa centrum ddieruc prominu- 1 Lj5 niRCr ftlyu: intusiifttn^tiscipimenco 11 tcrnbrjna>, 1 uu III ili 11que pu;xilb. LOCUIMcontinentur fmitu, unum, tluo, tna, quatuor, qumque, oblonga, nibki, {ureitilj, cuixulioni convoluto timiti,t, cuticuU tcinn contefla, incut pulpola, confraitc Orjv-r cum gTuma loi; aut pulocubr e pane fyncomittonoji ablunilix

Obicrvant Cxfalpino, cum ad earn xtatcm accenent Hcdera, ut fructum ferre po/fit totam mutat facicin mnttramgne, mm per ie cngiti'r, fit quidem in untum ali<jian,io, ut nullutu reiinqttamr conjunctionis velti^uim cum repente hcdera. Quantdiu cnim araxa ell tiulu rert in .mgulo> delntentia, ad lummum qutnos, quorum duo utnnque prominent, unit to itanmo Folio: quauu-terp magu adulcli.it, folia fit pauQores ctltunt an^loio obtdiorelque &c ipla mafora hunt fit vtrenti-ora, &c unicolor.i, cum ab inito cadem puuHa iirn, nign 8c nuculu albU [] lecundum venuj diftmddt; alinuando infem^ (ubrubentia, cum autem erigitur folia iotundantur, obbteratti ex coto utrinq; angulis omnibus. Iblo co qui in lurruno eft rclnrio,

Hedera paffim nalcitur aut arborej, in lylvis, aiBpil & hortii, 3: ad adiHdorum muroL Sylva- rum opat.4, vkta Be Booth perreput, ut rede J. Uaulimus.

UtJn-4 Dtamjfm DaUthsmpt J. & ptte* C B.

Legl.

Ex congenctibui nign> tiilm m lubct minus atrum, minima aogulolum, craltim, carnofinn, ro- noium, in acumen filli^iatum, net admodum denlum, in corymb** aano* lucco*, aurco nicore fiJ- genres ex congenenbu alpeih: maxime p uljiros. Ilxc r4>ii^b> bradiii> reUju-inim mok> viUnai arbors enecat, (iicco eomm exhauUo. Rjrn in Gallta provcail: ne*; rariu* puto in aim ragbag btu; eft cnim, ut mihi videtur, vanecu qujedam bedew, baccatum cobte i Tulgan diftsreni.nucio- admodum & ARI ilolium bacc> lutei ab Agrttbiio communi: quod rariui ctum oo:ui

Quilic liedera, auiorc Uiolconde acrn cft, altnggit, itervo* Ledt. Int:rnui hirdent rnlbruffi ufa (quta capiti ncvrotouque genen adverfanir) ranu e'r. Extern,* crebz i, icrwnbu* extK- candu & (aiiinJi-: m fonicals ibinrummaoonetuunili* imponinn iuuou.ii: lolium 1 attrmtm- jtrvvUtt, immmktijM ifc ptatAm tlwtnim vi /** mtr*dmt; m ounn turandnj in

M m m m m m

puruknunim dolore icAWA •. Veteres folia cum vino > ooAa ad ambufta & ulcera maligna conimen- dam, 6c nuculu lolarcs; cum accr cocta aut cruda cu iu pancinu lictvojis proiinr. Arthiitiy qindam tlolenti parti impooum cruda 1. Lu Hovax, qubuj aliqub inpfilctiaium Icvamen ie fen- (fle narr.it, atieo ut per multos anno* non aim topics ttda fit. Antmtm it Hql* in Centuria ob- fenrationum OUerv. f. Floruro liaurarum pulvn quantum mum difpioruni apicibus coroprebcd- dii, ex vino Ubituj Buxutn dytentenaan fifht.

Aam drachma pondere cum vino aTu mpti mirifho: calculum pellunt 8c urinani movent Ail menb lupma£» mirame Dallas craduur rmedmm, fi acini «t Hedom arbore* in puJy *n triv, cum aqua itiUinm Pukjpi 6c pauatto Croci biKantur CJIHU, uique ovanc, diebus alijj** con- nuu.

Qumqoeaut fex acini ante poodorum cerumen comecti ebrietaem aroore dkuntur.

Baoox porf*m per (upenora fit inhrriora, unde i nonnatla contra tebre* exhiberi iblenc. StBU |Httv« baotamm hederar plenam nwtarkMam adtptanim largj doti exUbRui arcanum elt con- tra peitem. Remediam elt Alexs Podemontani. D. Boyl. De utilitate Phlofophia experiment. ad me- dtamsm. R F*na Hederx qux vergunt ad Septenmonosi bene matura: tn umbra hteat in pub wcretn reAgantur. Dot 5 (. m vino albo provocaado iudorem. Expemun (itpc nmedaank I aut- (km meminit & J. Bauhinui c Camcr. Corymbofum puhroratoruni fenjpuki* unu ex atjtu McntM MKtinHaefficaxcft ad vewriculi dolorej: Alicobi & pefte oooeprb oxhibear, quibui (udoic* <J> duntponMer.

Oleum «? bied» deftillanone dixum praftons d» ad frjgkk* artua-lorum morbw; nienfooa* oJculot pellk, &rdida ulcera excerpt.

H«dcrhoc4 natura peculiar c habrt, quod pnnu eju» fola fnt onRuJola & taiu, poiteriwa^ (unsna rotunda. . Sola anm natura alias kudendo procederea tlmpha ad vanum, inqu« C m- mmm In IM AUJwm* Ofitm*L kki. cap. loi. Idem tunen (quod pice illiudaen) obler- vatur tiam in Apifbbo, tn Smyrnio Crertco, m &» aqtunco maximo, Thijipi rcto DKHCona» », Alilique quamm rbba tots & ad radhxm tmiuca aut Urinatt, tupenora Integra lunt.

Vulgo pftatur 6c Wochera ex Euonwno fe alk n fctt, Wimmabl aqua (cparari, it vas ; ofage rinuw aaoaynafernt brevicum pemunctuemoo aquini

aim vtiniini I'ikucrt: :cout mn iubolionimque partiuin. j In h... expo- i imenn vciutem ut inquirerem, « ligno Hederx (cum mibi fructum oboverit brachii magni- dine) pocula connet curabam, quor q tapie&t p- tei, aqux urum mruniibam ; qux per tres dies iuuua ubt ftrclfcnt, paulatim una craniudabant. tx quo de expentnenu rritate ludiwixn lens qntm pocenc. H'trw. JU»/; lib. i. cap. 17. p. 1 -

IJRUIU Hodenr dc ratlice , LU craffiuttile confucnt, 4 iutoribus in cum ul. an parri- folcr. nt poAquam cukdk» h*x ad conum difermdim idoncos ad cocem exacuc mt, alperores cram tune ilk» acqoalo BEvajatMquo raddant ad tiiAotn bgnum ultra ckratjue uwxr do: quod pze aJio ad buac uiuiii tdooaun fuAicmir, tone obowlbbcm lubilantu iptius, qua; ctum aawi ;>^dii pan

Gram haaca aM t triticat notuuhil fimii. Scurii alitquo *vii« in «r*» 8L templo- ram ndfe faarb a i lh inventa fueri, occa onem m dederunt, fie LI1 imagtnaid), & in

1BC_ott in mnia Hede jtUcnrvnu tea gbommiex laruro virore fen ntf(rcCxn*, VBTCO tutor*, fed non peBando, dura lam conipartjqc conMMnaa, non tamen unilonm, rubiginoiis intecur- lannbut nuu: haul dtSculter in poffincm redifpatr, laporem inipmnens Itcum lumi tntucuO' dam, con Jon qutiam ainai-irudmc, itlivarii cnocco colon: emgent *'^ miff it adraotum clarafi* It pwuiiiMBi ecat riammajn, aidore fere thurk, & ne rum quidem liquidot Haftftaodt rdr nam) Bouhinui rubram, odoraum, pcUuofam jpiftu acron, charuni Mjbuenwa otei inftar> teru admoum rlamnam conapicntem ut exte/x rdinr, tn caOdlo L Aksttt urope Qeeff*^^ N«c ditfraJeadw* niuiii jmw»ij4ikiem Woiccftrsfm Anglia uaUcttam : tanui umaopudi*01 iaajatai

In t«aco»ftiyiu*t4brKjn poteft i bejao htAen, norulqocimponxur femcl mitwUe. Exporior •d qaoqu« in mofftanacuk, oulbui toco paorum flobakB ex DOC hgoo hederaco a Tonuar* imucut Hiiponoi nrwrnaaMmi fine. ojtajK earn avsham, Ac nonndi ienwJ in

SECT 10 rv.

f>e Arboribtu fruffti umbilicato ficco.

CAP. I.

WXUM qwinmfam sim C*rytfh)Ul J. B. Amomum «.W mueninAtm eV Ctryefbj&m Plant Ctufo fufitcatxm Park. Catjefiyllw mtmmu.- frulla va wJi, CnjefbjBm Plmu C li Pptr eJeritkm Jsmutcmft nejlrMihu. jfctotft fttmFD ^r.lillitr.'l prppet, 01 3U[fpiCC.

FKudus, Ppter tdartmm Jtmnctst did us, nunc dienitn copw&ti infertiir in Anglam, est qua in frequenti usu in culuui u<jlhi> jd thoi ttmiiicmlo*: > vulgo 'XII fpire, tfat6 oiumum Araitutuiti inlhr tili-c, iappelktur. Orbitularbel), Pipem gn.no pkf mnqc n u ^, Interdum umen MJUIU ant ctiam minor, cortiot Gi/Oj rugoso, omuiko (cu cwuUi lunmra renm wstduus quidnparuto, duos conrinens iuuckos (ut A^ic J. biulwiu*) mgros, iteo-vinotd membrana COAM, (jui itu-rgrino p^nce difpfcuntur. Tota rcrc fiuuii Hgr<i extcnu pdchni MiU granati, col ore excepto, responder. Mporc est aaiul culo, ar nuuicOj JJ Ca>yuptiylly>i ^txodente.

Cluniru fru&ts deienpeia minus exjct.i est; ait enim cum apenuni Icmcn conancru 10 btuu panes icidil', cam notter fruAus non unuti indiuat paitci (ciffile, Jed duocontmcic lemna, duobut diiuiin. Ic mutuu fen.ii'.it.i, leu panctc uitergeiioditdula: \x-terca um!>:lci leu ex-rolLr in Jummo trudu ne verWo (judcm m^niitit, ut dubitem sn cundoit irmSum delciib. t nccno.

Not plantain ipfui] nondum Vidimus, neque (juilquam post Cluiium, quod (dmus, cjm Jdoipfit, rdiquam ergo l'criptionem e Cluiu exoticis mutuatam dibimus.

Incubant, da crant eraai & binb terniiljus gra n Ijccrc rotei.<- iio inlhorit'is quidcin nit, pro loci Quiun)fi J -im^ *mc ramuli occupaverant ratione: nulla autem inter illa repert quae ferratas haberent os U, fed xqtules omnia. n (ccanre it: Litra oblitjut' excutTCntibus praedita, eorum mucrone nunc angust iore, ootulo tanmn, nunc latiore & quad orbiculato, cinceracei ex ipadico celoris, & satis acris laporis: rati Dui qui addjti I J crant, tenun, (jmdranguli, ciiwraca Colorii corrice K eti, annotini videri. i iti Ij^adkco, TCintntCi adnuc velligia ubi toLa adhxican [s<L ut plurimum ex aduerso nata demonstr: ihan; & illi ciwtn aaiufoih (apofB perinde ac fcii., i nec ingrati odoris. ! dix uni ad Clufium tranfmilla que hujus truticas fo ^lucif roacet ic crat valde dura & firma, interna parte alba, externa & sub cortice late ntefulcj f o> verufatatem torlit.ni J uratautcmRctni: vero brevion., c\ xitievniimibcft) .. tjuadam adlitic adii.i nte fructum Ch nu

Nullu* CVA \3&zn\n tn medians uftscft: vcriim calfaciendi, adf Bt efficcAndl vi pol-jerc oior Uporque ilemonltraui, & reliqui prjelbre palfcqux Oryophylli aronntici: tvec incepti ob rvlorem conlitiilm & Linbilitn quadripamtum ad Caryo

In infuii J-imiici copiof prorenitj 8c compofniunem Clm>Utt inptdiur.

l*f>.

Xv. xnlm! jtu Pptr T*v*fa Fr. Hernandez l**.%o. <<f, J. Piper Oiiap* D Kcdi.

!l' hic idem putatur, est autem libo; magna, Mali Medice foliis, floribus coccineis Mali Punice forat, sed odore florem Mali Medice, atque adeo picandiore. quod etum t' illa ipsa vincit at; fructu orbiculati, acinolo, racematum dependente, primo viridi, tuox futvo, ac tandem in nigrum colorem inclinante, acris odorato, & omnino testio hcco utq. calido.

Pipers vicem fupplere potuit, & pro Carpoballamo aut Carpetis • ii;!'(lir.i. Roborat car vcofn- Km, cullititqbe, utc no confert, flatum dilipat, obftructions aperit, •nium & mcn(o)evocit, signu pel- lie, colicis & liacis opulatur, venterem excitat, crallos Pc lento* liutnorci incidit & concoquit, aliiqtie przt.v que apud autorem vide.

Folia . nnjui Pi; peris seu Caryophylli America iiii iulicrit Ja voren i acrem & »alde Ardmaicum; Pi- per oJoratuni Janu aciente noftram esse hoc Amomum seu Caryophyllum i, 8c Xocotochitl (eu Piper

Tavafa Fr. Hernandez, & Piper Chiapa Franc. Rodi a D. Taverda Jctonca primum .-(lociuj rui Alceuti c quidam fructus in infi S. Laurentis nalcens meminit Garcia, Avellanx m .; nitu- dme, aut ea in • pta, qui Caryophyllum redolct, sed incompeti a idnoc ului. Car> ophyllj od<e &>

CAP. II

I. Caryoph. seu aromatici fructu limp C ft Crpshjk Park. Caryoph. Indici j. B, Cmytfb.vtri Clait Ger. Cloves.

Caryoph. r>nhyUj vox Nuett folium %'. officat, verum cur id huic arinuti nomen imponitur, <J' re latet. Nostratibus Cloves, Galli etiam Clov, & Hispani avi in modum capitati est, Belgis etiam Negles eodem

qukfAi relit, me nela •v*, A LannoCljvu^, qouCi Balthinus magnus Causci crassitudo quantum Pilone content C. B. Gar Cortex ..neni Pyri aut Mali c> atnbint^ i jane hununo corpori. Oicx: Fotium Pyn nostratit f < -inia & Bodbcus a Stipe ma. Myriad. Cw&a aliique tolu Latin ci jlaibu nt, ac:vo firtguU rolia per me fronts, &MrYub>ltfela:aulP> dltongi

BaiJilrtl. ' aVRnts coJora lunt rultetnoli. lonjjinkhnj* dtunun circexer un. guilqu, nooiuhUaronuao. HtswUixrcm 9pc CaryophylU aliquot: pan ore*, quadranguix apparent. Ex prxtlktn ramulit (quontm atvetliit imo) ten prxo^ii goti affigmnir, iinfufirci, Icmunoi iongiore, externc (uligutoiicolotis, quiquinJor daiocceUii raduck Je<. tadxc ini'ulet, i rolncCtuamitMtunimplicataaxueitun; quibus patentibufbx t nmc rufefences fie inter ha us redick. htl aJtud ell<j.. cen*, portrono n>>ekc ^momno tl. M^M> iJinmci cfle flonbut Cc cariilci cotonv, vero mwluiup flmci rputci enlam.] Sipor rccemium [Ctryopf* ftnc airurore, wk> . »m J UCU r Cor JO afhingeni quw; mi jruneni Suooookagmo(b & rubente. Florc auteni ctuilo i mtrni loofi umen (emper rcnumem, incuc oxticcm degencram ; nude t Jk fed ifemlnum, ut durtorern licntwtqtc difficubcr (rjetlem, IU panirti liiu> 4ttKnattez fenix rtoantem, m^ruin, iri iuat pams M tnofl commitU, tiffilen tunikLt Garyophyliu* u: irnuoopoltt Amufbjllmi appellbmt >imi akj

Ramulus quem Clafus cubtuk-ni aut.,s cfl tn nmuloi altornadni ex nlverio ruf'oentcs di li i ftrjehiotes tencitltucramuli cum candilam lunouei nctz ramulos terminabant. ito» qor ruIacoJoriicrant, 3e

lime . m JIKJIIJUC eonun fequiccj^ qui fmdha fparlun ; anni inhxence* \ Myrtinorum modo defcribant & depingunt.

CaryophylJi ui Motuoa> iululis fpoite proveniant. Mol ivut autem |uua /Equatoran (iwr uiea Bora m Auftrum c in non aniplut noena Ic uia diftit. Earum maxima ultra laoa* k. Omiubut k*fiim eft Adcoandu & fuculofofum, ut IKKI tolu masi-' m flos in amba non habent. Cuiusmodi flos in amba non habent. Cuiusmodi flos in amba non habent. Cuiusmodi flos in amba non habent.

toht-tT IIIWJItBI CoJJii/erol in flumen aliquod, atq. ita in mare delata queant. Quan aliquot lo Ctcttei ta fpoite ignis & magno ftrepitu eructantur. Unde caetera quidem fertiles folos Caryophyllois praienuu Certe que ad vitam neceffaria ea incolae coguntur omnia petere a vicinis ut uia Molucce dicuntur fub unius Reguli imperio funt Ternate Makian & Macian Quaruqux Batacorum aliam fibi Regulum habet. Ha quatuor olim abundant Caryophyllis folebant, nunc peiwtiM m i. Batacorum avaritia, a quibus reguli aliquot miliens imperialibus extracti ex pacto dene* fbunc^n) omnes in Caryophylliferas arbores eradiciunt. Batacorum enim, ipfo Pilone fatente, ut uni lacro fludent, fua introitu putant, ne tam nobile Aroma vifcofo fertilitate Divina. Ita Avatna lege, modo, ratione carens audez ipi natura Auctori, omnique b an i > n s : • • tin ! rn exprobare benignitatem & liberalitatem. Moluccenfium interea caetera Tole rna, qui fua pari Hispanus facit, Caryophylla fatis abundanter ferunt: Qu au<lmoiium&: Ambouw, arwnouifliarwuaucft, & auvz batchctu lie^

att oopii. niUi luuinc fepe fructu quam folu numeroiim. Noqu< tamen per annis confiantia tempore mni iUcm, tenx>*« quando feiximo

Logonur fmel duntaxat in anno ab Octobri ad Februarium. Pars manibus leguntur; pars A-rundine longa aut e fuccula flagello dicuntur. Ab his periculum tamen est, ne non late aut provida aut experta manu fucculorum extrema quatit, cum certa in loquentem annum violentia etiam fporze jadura. Moxen ubi videtur Caryophyllis, cum fructu rudimentum fit, & pucillitudo

G. N. 6

Amufbjllmi

• * ' ' g ' r

exple "

, n . L » ' !

! * • •

POTTO ex tnfulo q

niUi luuinc

Logonur fmel duntaxat

wgtftmac'ijfimi xJh.cTtnf, uUa tfuMi*mva vuUntff^time denti fift. Cum * vindctin.imiuni *
est, univerfium fub arbore folium exherbatur, quo facinus legantur decuila Caryophylla, [ali rego-
tes aut linteae arboribus fubftrerni aiunt.] Recens lecti rufi funt, & leviter nigrocanes. Quia ut per-
fus evadant nieri & ficcantur & infumantur, atque ne teredo invadat marini tepidi alimantur.

macerantur, itrumq; licet LC prparati per uaverfuro orbem difh ihuntur. Quo apcl-1 c'f&Si w
lunt ibi plcrumq; purgari a pcnolis conficunt, & hi corh'm ventii; qui LuJit.mis ^ M) vulgo *** >>>f-
fw/i diantur, & nodic in nuampluniiiis locisj pottEmum Gcnur & Lugduni Saccharo incru-
ibntur. GuftuSt odorepauloquamipli Caryopnvlli remiffio-c funt, fed ume.l jucundiffimo a c' * ^ 1 ^ /
liiviflJmo, quxq; nuihni moruicando palato cnflidim inferum. Folia qtiinctiam ac cait^x nan Lj'j^ ^ , ,
tanu odoris gratii fragrant ac iptum Cjrj'ophyllum, non uni<n profiis odore d:Jlioiuntur, ie&Jumt t>u;e-
Cir<opi>yl'los nonnihl redolent, atq; ctiam ooruum iiporem rterunt.

Caryophyllum d'diges n i i s' l b d d t i p & copiotareni liquorem dii'ulfum ungue. m' s' f' J'
ve< acu< puuam excludam, o'oranini, frangi contumax ac lefth, recens linkuam matficanri
un.a cum tancibus pariu .iduwriis, aac & arornatiaim. Annotquinq; lavari potic ait Sylvius toco
te upemto.

Caryophylli calefadunr & cyficcant. F.t fariCj CaJor cam eft liuc Aromatt cilentialis & genuina, fv<. Dcujo in India emendatur, ft vasauquixi com acjua arbore liquore adftct frelte Lmfchet.) id omnc mtra duos dies, ctiaiti a quatenus diftatur.!, ingciiti licciatc Carj'ophvNonim exnaumcr* ut Ixpcnuinero expcnnienn* comprobaum . Hoc nobisquidem minus vcnlimile vkletur: «m- firnut tamenGinl. PJO hit ve< lodi venditur mt vendita [Ciryophyllb] tradiniri biduo anta ioleni ill ho<reis live Carvopb^, lorum conditoris & jxinere nugnum & laris capax ra^atcjjic hoc ic- plerc .iqita. Qua: omnis imcvi exkifans lubit in Cai-yophylla, & ponder>Ji<r.t red.ijt, cerro InOOi Quin invenitur)c;c Caryopliylhn in tantum JHUKUS atKhim, quantum ruit III.L* .ipp<iliix. (.>us expjnnienti noftratum aliqui haul ignan, addctum hoc faak Ik loerofium, non (t-mcl bmat funt. H-icaquiC va< <raciOj It lulttocclerior (it, calidis forulle *r*2uuMbut Corj-u- phyllonini demtur: attiactioneni ulLini propfic dictam dari non toncedimus.

Carj'ophylli omis hakturti commenkatic, itcu mulieres Indorum tranuenter manducant in Conftem iincm, alucque aim um gentiunt A i oculi ictem confciTC, & nubcucas exicrerc dicuntur; Ven- triailo raLii addunt & hepaci; vomitum competant & nauicr adverfincur. Vencris incentivuni Hnt Sen^hnu Conducunt porro contra mwbos omu< Cerebri bigKios, ,, A lexiam, fplatum, para lx ink kdurgunt, Ihipoicm. [idem five kJfimento, live clu faciunt contra acrem pelti- ferum.

Prscipuus autsm Oryophyllonim ufui eft cuEnark n\ condiment.! Ce crnbamtnara : adao autcm ^xpetuntur & pl.it-j. ut sine <aryophy Itiititipo r^ti delpii. antur. Nec eorum tantum pulvis om- itibus pin>inoiliini fercolb 8c jntinchDUJ ait mdoctur, fed Be R.IJIt.v, capono^ gallt Indit,b abolez lin^ j vaccarum ubera, alutjuc emfino di Caryophylla tranfita allantur: quim & in (Vii- ctus trangi, & condm:ras, ut Mal.^ Pyia, Cxiron-a a muli <rculs c onfuerenmt Ufurpant hem .iii olnAoriob & veltia m odores: in quern ufum Mala Auramu Caryophyllu infills h'ecare iblenr.

QudamCereviz art vino pUTOohyllii incodiSj aut coruru pulvwe nodulo indulb 6c in vale fiilpenlo, oiioreni& liporeni juandum conuiuni.

Ulus eft cfiam in ventn culo dica< as loins fie lacailu turn ad vomiruni, cum ad ventnculi do- lores a CMifi frigida.

Qlitdam piiWerc Caryophyllorum capuc (pargunt contra capitu dolores AC fjavfclitiM. CaryophvIU vui& aceto 6: (ale apud Mataon» condmmt, rclte Gato, i fed hi* ceneriora iaccharo ajlervantur in magium ;;aljtj armnitaicm. Noftn qao^ fioquK J. U) Onvpltlv!' fac- chare inCTuftarc lblent, non tnconcinno aJ ptacendutn patattii, fie calcUuciiJum rrigidum (lo- machum mvento.

E Car>oph>tlis quoq;dcftilLitur Oleum, ouod quilibet pollere Ballamifacultadbu! afienmt urn incernotjymcxternoilu. tfttamen proculiubtocalidiusmulca

E lijribus&Carj'ophyllis adhut nddSwj Indjepanturac Luittana: ficniinx dcfillando cli au< aqtum V-Ll [pintiim, mira odons luavitare fragranrem, 6t cordti 8c cercbri irFe&ibus tngulan po- te te convenientem, inprimis aotem Paralyteai illi (peoj Bmhtrj didx.

Magnata iniiiper aotam ex infilionc (Jaryapliylui-um viridium Daunt, durable rald^, Be ci- Us coukndis .ic venu i^ulo roburandu atque onctraVipi promovenox apndtmujii: Atbtr id ap- pellant.

Annotat Garcia crjflora illt 5t annotuu Guyophylla in ~>)*v* iofuta expai, rum ad obfbtiu totulictuU, rum ad suudkamenta.

Aibor twe gumtin quoddam (iu poma Itdinam (lindit, trocci oolons [ex atro nikfcenrem d*ff] fiagtlcni aduwilliitii 8c6ocam, nutluni guitjiin iaporem odiactioneni [mJi forte id vetultare acoditj odoretaincn ubi adoletur (ran, (-iyyuphyllanjm: tacto ardot, daraque incendu d*ti. De hujw vmb^nilnlociri ti. i utheademde qua Ancntia pritdidit, quod fulpicirur CluCm, Toc- b l w u : Muiltaterdpo

Caryophylli r''>{*x-<Umt*mt)Q. Bod. aStapcl^KJiw, Tjhinfca Popoua W< Pilon. Carya- phylf R'g' illWmu.

Baravis CdTjeptyllim Regotm vocatur, quu MtJuccenfibu* regub & magnatiK:^ ad (uperftmonein tilque in pretio eit, non urn ob guftum & fnRrantum, etli c^ni pr* aeteni haba extcUendortm, quam ob fingulareni ionium, imo nnutem lummam, hUdenu* eniin pittcr unam fcaJwrtn abocem ticg ant reperta m, 6c (junletii m 16U inluLi M*kt<*. Arburum rumm akre timi eft "u- M m m m m m] fx,

JOT, utr.ii), umeii crtem lupra delcnpn* (unite, cicepu procentatc. Frusta aunt codan (uat odore
tc uporr.

Eo arbona hafceiruIgiribiK Cujophyllifan nonIpcae diferrtputo/cdadmonfhofixiim Ve-
(taaMjttim nriimcm pemncic.fturtum<L nihtlahud cfc qium Carrophvllum .!iotiuncum vitlgait
fptdiLn killim erutii led fphnuU rionferi carenrw dtvi(un> L nle ipocum equidem pnt
intern) fc fund eft minim, uc Autoru Scholii in E/iiwii,Ciww, Aa i i.Oblin.vatu uluxpcm.

Caryophyllo aroma M

j C B

In his urom uncumm lonjptodinem, rei ctum ampliorem, & unculc
rai t\.(i.ilcnpmu>,-<. i* , ^ ! .:« Clulii. Tona fufcm crat, nec valde levis, fuperna qia-
tLnr jja JccuiUtum . miaoi prailuut inltar Ciry'°P^vl'°ru''i A omaticorum, m,
fene an . jfAKKSt portutiu, pncante ex faramirt tdtuti catkl craba au tenui j. ^8*
lut'otanc, (Cxm mhl ahiv cil qium fudci ntinu pan, qui in hudu contutetur, in niafore «^afi''^x
k cara, flificutiirtKulniiiiDcij, in minore anf(u,Jb & mucronj-a: Fructus ipse denlodux^que
coniLterai , .nttus, utoiitro m apenn puikt, ie. uttunxj, UUi lapork An vero hic fructus tal-
•ttimem ci a<|uc nuniur alpertmne oomnuciMlet ignoro, inquK C Jultut. qiJ ctum 1c v>
genos • fnOu:n Caryop . ivlli atonunci rttofhon, in fructum urn l< tornianti> Jumaxtf magnitu-
dine, as £inc vaUc limiit erat, ut pmo tntuku ip<i impnentc

CAP. HL

De Caryophyllo spurio seu Lyfimackia frutesca Indica, non pappo. D. Herman.

* P. 2. F. 45.
P. 95.

1. Caramba * H.M. Caryophyllas spurias Malabaricas flore latere minus D. Commelini. Lyfima-
ckia Indica non pappo, flore latere minus, filiqua Caryophyllum aromaticum
D. Hermann.

Suffrutex est altitudine sesquipedali aut bipedali, nascens, in irtnofii u iulis. Radix fibrosa
est, & valde capillata, exterius albo, fungolo
no & fibre, intus lignola & humida, colore viridi claro. Caulis qui ex radice procedunt pa-
rum angulati, virides seu etiam rufescentes, glabri, intus humidi. Sarcia teneri valde viridi diluti
ac diffinis angulati. Folia nulla vel brevissimis petiolis herent, parva, angusto-oblonga, casti-
data, ad petiolum quoque contracta, textura tenui, valde mollia, fuperna versilia, fubena dilutiora.
Costa mollis albicat, & in fuperna parte notabilis eminet. Flores fructibus
parvi, colore in totum flavi seu lutei, quatuor petalis oblongo-rotundis, unguiculis ab invicem
flantibus, tenuissimis, ac in medio in longum nonnihil stratis compositi. Stom. m. luirecli, br>
via, albicans ac flavicula, specibus subflavis: inter que fyles crassifolia, viridi-diluta, capu-
crassiori, viridi-
partis consistat.

Sunt autem fructus qui fto i nfhent oblongi digitum aut sesqui equat
gulis ob rotunditatem minus disturtL A<l lunbiliam
Caryophyllis, cum caulis caulibus ligni; J mijuiem fuliorum inf-
dentis, colore primum viridi
..mcentc, pulca rubri> hJ^o Stmtm* parro-iotundjj pnni um ex v>
rib flava, dein colore languine
tKuwo, polt tvbn>ntf(icanuat leu ctum tvfft,

Floret hic frutex tempore pluvioso.
Planta tria & in lacte acido epota sistit fluxum dysentericum; capiti admota ejus dolorem sedat.
Ego decoctum epona flaribus distillando, urinae cauda ac lumbis i a
ferre. Succus cum lacte dulci sumi
vicia cun meik diti rul& p>ant. (ut{tfu6cuMeftp(o nmunaiatt (eu arJorc Semiuu m

Lyfimackia U.-J Mt /Wff^li hat* flirt fmBiff m*)W* Caryophyllo

Cura precedenti in ptunma coavetut: venwn r*lm huM&c ftipitti aafkvet lot F&JM ferni
<adem, nisi quod longior & aafuflaria. /Ttni eoJeni Hcu, peuJorum numero, forma & colore,
rt itanien etiam & stylo conveniunt, veru m n' i vo furii. / vltis quibus flores infident, quadru-
plo icme longiora snt. Ac aaffiom • nam in prima ipocie, formi & colore in simi c%.
pno nu,{iirti..niic fn/bmm raulib nunwreban, luntque oiam rocundjoU, pmnum ifecantW, dein
nisi colore.

3. Caryophyllas spurias MiMmmw f< **f**!M ffm
Lyfimackia Indica non pappo repens flore pentapetalo, fructu Caryophyllide.

Est plantula nascens in aquis, ac in ripis aquarum cum caulis super fundem repens. Radices,
que ex caulis hinc inde ad exortum minorum cauliculorum exeant, fibrosae sunt, albicantes ac
rubescetes,

rub(c<nt«, aoujc&fillulora: CmUt craft, funRoli, hituloi, ccretcs, tanas ac nuances, in parte foh obverfa ruiwicntes. *Felt** pedicuhs alias brevibus, alus longlonbus, planis ac vindjalbcfcenabus nixa, obionRO-rotunda (unc, aicccrius ronimi.i oi.i, ad pctiolum ftria.,, texturi moiliaj obfuro virore mrcnna, in finibus luis pl<ninqc gcmiina furculoruni fbliacemum continentu. *Flora* hinc mdi 4 tbiomm alis provenmnr in penolii ferine (clcundaiibm, flju6Lbus)n(Jdcntcs,m.i jorei cjrctris, quinqc petals, obtongo-rerundis, tenuibus, oolore albicanee & jj unguis crocco, vniJU obliquis frutis, compofta E mecBn Hore (ai umbilico trudiU *ftmws* iurrofta, viruii-diluta decem cum apicibro (ubftavfe cmicant, ac com 'wsftyiu medius, viritii-iiilutus acalbicans, craffioiuj qui nodulo piano (ubflavi colons, ac quinqc finis radiato dotacus eft. *Calyx* quinqc foliis oblongoatipidads, tenuibus, vmdibus, Sc inter folia npanltsconftat. *Fritilui* quibus Hora mnatcuntnv, non ipfis caulibus immaliatc iniident, ut in priccdcrmbus (pedebus, iol podtailorum ceniium interventu adh.ncnt, (untc^ longioresquam in *Corambu*, minoics vcro qu.nn in *Cmu-Ctromlm*, crif fine majori, inrus dmij ac hUmenhs lignuii pcrctxti, inter *quxfmin** leriaum in longitudine conlita font: Semina autcm nonruhil oblonga Sc albicanna ac majuaiU.

HISTORIE

HISTORIC PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS SEPTIMUS,

QJUI EST

De Arboribus Pruniferis, quarum flos * Bafi feu imo frudtui adhxret.

fir?3*.*




Arborum Pruniferarum voco que fructu majoris proficiunt officulum intus unicum, geminum, pericarpio seu pulpa etiam per maturitatem humida unda, **ISKT**urum *d ihtnm *H<tm fh.au Pnuufonni cum nudo uma nudo, (cu nulrif (iffiailo tceda

Hujusmodi arborum in eas que fructibus sunt ad singulos flores singulis, vel que fructibus ad singulos flores pluribus, cujusmodi est Theka H. M. Prioris generis arbores sunt vel fructibus in singulis pediculis singulis; vel in eodem communi pediculo pluribus, quas *Racemosas* appellamus. Que fructibus sunt in singulis pediculis singulis sunt vel iidem pediculis brevissimis donatis, vel pediculis paulo longioribus, vel pediculis longioribus. Prioris generis sunt, *Malus Armeniaca* u *Perfica*, *Amygdalus*, *Nux moschata*: Secundi sunt Pruni proprie & stricte dicte: Tertie Cerasi & congeneres. Que fructibus racemosis aut umbellatis sunt dividi possunt in cu qux liru&u nudo &mc. AC que fructu Calyce excepto. Que fructu nudo sunt dividi iterum possunt in officulo fragili donatas, & officulo ligneo & lento: utrumque tandem genus in eas que officulo sunt monospermo seu nucleum intus unicum claudente, & eas que officulo polyspermo seu multinucleo. Officulo leno & ligneo donatae sunt, *Manga* & *tybma* dicte & affines, item *Perfea* arbor & congeneres. Officulo fragili preclite sunt *Oliva* & *lines*, *Pada* *Theophrasti*, *Machaleb*, *Lauro-cerasus*, &c. Officulo fragili multinucleo est *lyca* sive *Sebesten*, &c.

Arbor urn Trwuftrarum TabuU.

Arbores Prunifere quarum fructus majores cum lint, pericarpio seu pulpa roollt "f*F'^IT": unicum rarissime geminum ambiente constat sunt vel fructibus



Albe Stiofore, officulo fni&m compreflb Sc minus craJlb ac dura, pulpa molli; Prunus Luteo aut licibido minus pulchro, ofGculo duriore, arbore ipQ

f Nmffmca, fruflu tcret, oblongo, valde acido, ofTiculo eham rereri, dunf iimo ;CoRsui nMt.

Spini, fbtm crinerviis, per ambttum icraos, fmdu Oliva: figuri, officulo parii, & i;*Olivx iabro; ZIZYPKUS.

Longf in hoc Renert, trnftu brevior & ad bafin larioe, rotundiortQft quim fint l'runij & olGcuio packer brevior ac tuniidjorc; ORAIUJ.

Racemij aut confertim naftentibus f<i in codem communi pediculo plunifus; iifque vel odcults

f Mwfprrmts feu iimcum intus nuclcum cbuJentibus, qux vet liint frudu

Nudo, calycc unacum flore deciduo, officulo

Fragili; fruAu iplb vel

Pruniformi, liquore pinpii, Oleo d<<So (catenre, folns (alignis (ubtus inperptuis, ofEtulofrudtltunfimo^ Icabro; OLEA. Cerafformi, folio

Prpptuo, lato,oblioni;ofcrnito,fni<ilu majotcdulci; LAURO-CEKASUS. JD<ulw>, (eu fmdu aniaro, Ccraii officulo, folm BetuUcas MAHV HE; Icuqiijc nudueftduta, orttculo tik Ion go icabro, toliu. Ion-gioribus IUKLS incanis; PASUS Tbcophr.

Lime Si l,(w(i nervis leu tii>i is ligtiufe extenus undequaq, vclut tomento obfito; fructu ipjoku rctntocrii uc in VIANOU live AHIA; VJ IyntunTU, nt In Psi: %>'; rd Pnmifermi ut m ACAIA, fitc

Calyx at/Unit, utin CINNAMOMO, Viduazam, K*rjI,Eltp, &a

Poy f, foa plnr<< nudeos continsntibu; cujuimoJi font, MTXA fire Stbejlcu, M>TO-L bJlajius Emblica, &c.

Ad eandem faciem plaribus, Titnu H. M. A/*) five Bontiu

HisadJimos duaiarbora pnirufaras fi-uAuma)>>rebinauuuiofficuU continents: item duas frafriu miclco nuJo, icu nutlo om^ulo tc&o.

CAP. I.

De Mala Armeniaca. The Appicoch rrtt.

MALI Armenuci ab Armenia dida Ronunis, autore Diofomde, Prxcoaa dictmtur, quod ante nlios rupees fruttus maturctam; noniiuantur & Prxcoqua. (iaUruu etiam loibic v<titshilus arbori nomen. [U]b**A[*w4]Tbeac-enim omni ram frudum; tum Arborcn ("wuw; licet * alibi JVxcoqua ab Anneniadi diftinguere fidetUTj dim UU K<< prxfantiora * v" "i. NivMimi> roiquirecnoordKB Grad* hi truftu* (fittiunt proculdubto a Latino Prxama ""*.*. e'l: a quo for uc noftrum 3,p;iC0fh, & Gallicum ^iffitr profluxit. Plinii Prtcocu mala ""* Perfica numerat, & corrn duo fpnera fade, Supentu amplam & nwgnum, & vulgire parvum & frigolium, etiam Armenium dictum- I*Iteru j" autem Prxocia a Perfica, quod illu folU htiora, Pymm aut Popdum nigram referentia: o(U piau & kvia, cum l'ciliumun rugola lint & cavernoli.

< ^<<w<<* mtU mmir* J. B. A W- Antnue* mum C BL Ger.

Magna eft arbnr.P ortice nignorL a quodam cedentu ntbedine (ubindc (lc : T < rdperla, acaminaw. >, & pinnulis liibiniic *A pediuulum aunculjci, (apoc adtio. flewj ex rolco tubote {ullciif, IV Prati* ffitimi flmtkm itmiUt vidtmMrJti mtjfrti i FruihJ <en> praooori. ""> fmmtyu mijer, tnti! 'cm, carne (b&dkn licerorcq, qnlm l" cam >>>*. M ultra altq .1 div. mi, At reveri optinu Perl

nUi.i. ctum opnmu jioftio guLuo lapidiora & delicatiora v. knttr: in genere ran
 manuci Perucu fporc excellent] gufturinoi, que ob officulo facile abicidit, non ita rugofa ut
 Periconim, comrrctfo modke, i mulomimus ut utrinque prominat, nucleum claudente ad officuli
 propomonem, lea minus longur quam Perfica, & pro proportione craffiozem, fapore minus amaro
 ijLim iliiL., & no.ir.ifn! id Ann gularm accedente, non fine impreffione Aromatica.
 rnaiusain q^btffim * Marum reponit ferbet, at Parkinsonus fe ad nunquam obfervare po
 cuttle at. Qaimvu umen tile non oh traverit, non valco cur res ita fe habere non poffit, cum A
 mygdalis cojpnu arbor trodum aaciao anuro tntcn am producat.

1. Anmmsts mdd m*;* J B. CR Armeniaca mala major Ger.

Hxc piula minori Peri ia&, Ulcem utplorimmu. impreffo lacini filcata [; lod mtrnrita
 icnc qutn AmKnofflnrinonbus iWdort^ piu.odorat/ maculofa, alteri ex luroo pa
 Hum naanjm pfenr^ coam MaJo ArmeniaPi i, ab iuv) latere criftatum, fractu handqua
 e pnrfffta noomrnl eranat. Nam pocterotum qoW uifitione hrc tompirau
 in pnwerjni cicrelbt arbotvi & OJttt. credatur, raro

fit* Phodi nitrx J«TM» <iwnj«''' al emergunt. Flu
 a^C^lir fon'' n figur, ca succolunt fractus Perficozum quodammodo fpecie, aureo colore cum
 nriwo,undct-r •• nriwo,undct-r •• nriwo,undct-r •• nriwo,undct-r •• nriwo,undct-r ••
 nofaini, noo t , lfa ^ ? Wt i Mltmni tT
 Qtnti vero noonulii a mirvxibis mtinofK nuiora baben porfc cwtaam efcpe
 lumminora quaint i» (« moTeff m hoc fBW arborAui; *tt Ja Armenu«
 oculatj, nunorj
 Hi, <] i C. Bauhinus tertiam l-rf—. nmiurum Mala AimcniJ
 Gelfcov candicans, gultu fuaviffima, nucleo oblongo, dulci ut in Amygdalis.
 + A: Park. parad. tota habet nuclea fimul complicata. Fructum raro & parce ad
 modum i vulgaribus Armeniaca non aliter differt quam colore albidiore, nec per ma
 tari

Armeniaca mafcula Park. Folia habet viridiora & tenuiora quam vulgaris Armeniaca; fructus
 raro aduectum, nec copiofos fert, non alia in re quam fapore paulo delicatiora à vulgaribus di
 verfa.
 6. Armeniaca mafcula longa, à præcedente oonaJ, er differt quam fructu paulo longiora ^
 7. Armeniaca mafcula parva, fructu cil minore quam cupifris prscoden
 nuci Aljtcmu, paulo majore.
 ». • (lkuJ'j incu*
 At n: i, Parkmlbniif en

fero, cum produe> aduam numeru fe potiffima (ut loquuntur Philofophi) infinita, nova indices
 ex
 .nutw leu MI) gflo onmer. .coliinf.jf MirttoiotAJ
 Inbortabvin I hove naturant.

Ex noftta obfervatione Poeta Armeniaca Anglica Italic: deguffare
 contigit, longi funt periffantiora.
 Bonaute Perfica fuperant: nos enim, ut illa, in ventric ilo oorrumpunrur, DC, tam facile ace
 fcent, vulgò etiam fuaviora habentur, unde & ftomacho funt gr (tuxa. I-cbr* tamcti canfare di
 cuntur non minus quam Perfica, verum eas breviores & que facile lo vunnir. CumSaechatoc
 dita & affervata, five liquida, five ficca inter præffantiffima dulciana fev. bdUru i matronis noftro
 habentur, ex in etiam Scribete, Cartis dietæ, omnium optime funt, five lautriutcm adetxi
 immaturi, Oleum è nucleis Armeniacorum expreffum mifficè valere tradunt munctum ad inflam
 nut-i hemorrhoidas, & ad ulcerum tumores & long. impodimcna, & «nwf ad J arum dolere.
 ofuna |r. potklere «um vtni Crcriu \j. calcaks pellrt, & coucm IB at. J. R. è Ma
 thals.

Munifcus arbor Petri Crescentienfis nobis *jlt» Annenuca rtdttw.
 Caterum Armeniaca mala que apud Hærolanos Londinensium parum hodie funt, & majore
 ftudio colantur, funt, 1. Ag. •*»• & a hxxium de primò allatum, à Joan. Tradefcanto, de
 quo jam diximus. 2. Meffimms duim pccorum, cupa notumis rationem me neficere farcor, de quo
 tftum Iupia. 3. Teriffim. 4. Ammw* %. Afr— lupra*baum. 6. Romanum.

CAIVII.

I *f Mai* ftr/kd.

R Atto • niu obtia efl, lijuilem Mab Pofn &ta func a Perikk. uadct i-unun ad
 veta. C
 Mala Perfica ab Armeniaca & relijs a coojenenbu Jiffctt tolu totv angufta.
 das officulo rugo & falcis profundiorib. •exarata
 Nuciperica autem à Perfica fructus sUbncfs djdaau*

Leno U
 Impu.
 Fica.

Mala

Malm ferfic* J. B. & alitriatt, CfC J)drfc itCC.

7. B. macniculinis arbor est Perfica, caadwe i.tti era (la, r.imis brichi.KA, cortico rubem*; & fibtuieo. ~~Abra profu...~~ Medium oca paw / «•» • mulca, tanguifcula, ourpurantu am alba, aim pans, magmuidinis fab. Inlident auteni Hores, fine pdicults ramorura tuberculisadnati, ctlyubus rubencibus, in nuinq, to- ligla acuti fde pxpkanribm. Ponu nonnibil rocunda, ilcnio villo cometuotJ, ex lur«> hcrlyiqca., alias puldm flava, alias punicea arci decotaca, came alba vd pallida, interilum rLiva, rari as ru- bente penitus, -uic (aligning guttis cruentata, (apore duduL tub, pemuau advtUi offiuihuan vL do- krencce, m qiubulilam u mai fj^cdebus facile (eparabUi, (quic Ixi. utatis nota .Mtx.'tui) cujus profun- dis lukii & I:robicalis paffini to Iniiiiuac. Est acuem ofii... rta, fed interna tacie levor politus, externa multis lakis profundialculis nullo ordine canaliculata, buni valvis confans; in quo nucleus callolus, oblongus, exacutus, albus, flavefcente cuticula vellinis, qua detraclti geminus, h. e. e duobus folis feminalibus compofitus, confpiciunt, amaricans, non tamca guflu infuan. Folu oblongaj Salius, aamiin.ua, acnauj Amygdalini, quibus pofimila, majora, fapore anuro qualis in Peruocvnrn nutkb, ingratiore utacta Matrcu» ruffa, & circa media fore p- iicca, Qts Iniii.i, ob id ad conn art. licum p x (liHCxpCQU.

HXL arbor nott iniltam .vcactn aovVKVj uc emm ctu Sc pforopte atWekit,& adiii^jcjn perve- uc, tea nan niulns aainb j^it fnoSbtBHGBiAk ad imedtunv

Valiis PerJka 1 heophnfto uulifta videtur: nani que de Pu lia ant Peifca lubct huic aibgri ou* nimi: convettituK: fc l'limui l'a l^nn A Perlica maiiir'dlcili(tii)^

* Makxrua Pericorum multx fpaacs teu vancutes turn J Vutcribm, cum a R«uonio ~~ibis mono~~ r.mtur. DitUrencix autpm luniuntur ve\ \ UKO muh, vel a figuij^ad A conititio: u W uoluit- t.uccanus, qun i efpechi alia duraciu diaincur, alia pra-mollu; vd Bi^^. vel a colozu pulze, vel Jcrrirateut tardie.uc proraiicndifit matureicendu

IJuracinis, auto re Plmio, queni (a)juuntur inulti c Kccentioi ibvis, caro Hmiiter adhrret (illi, i cc Jacile avelli am feparari powlt. At vero rem ipfam mci(intcs» inqiiic j. U-mhiui, contrarium ii[jilunmunniepreficndiniiii. Unimvurofanclu^lcmiitiGallU, Italia &cCkrman* u obfervavimus, maRia ex parte Perlica quibus pulpa luec oflobus, extern fete clle moHtora, ,w intcnkm pemtus macola & linc -ulenu; hrnuo :l[ucuiiion adlucret: qiKxlScnuitrftexpeiencuointinat. Commodiffim i autem di vito Perficoru m, me jottice, cit pntio in ^a IJL um corpus pectus ..itcr ligno adharer, & oi in quibi I icale & fpona a ligno> abicctin utrumq, autem genus vel a -^twi- tudinis, vel uolotifj vd figura; >el fapori Jcrrcfpo&ti fti plures fpecies fubdividi potuit: quibus non miinoiabo. i(iouiev i .um celebriores li''*^ nodie pradpuoin Ixuiore liint, i C. JJoiihiii) punaco, J. 11. biftona, li ,ilus recentioribus proponam.

1. Perlto nimiru albi J. B. mj^ntiuiinb parvorum Malonim Aimeniauarum, alba, hiiltutj, pulpd albd, aiih-uviiijolii, Julii hne& Augulfu matureftunr, gudti iapkli: Ollt tmu vaUc [ur- oculaumen. Ah PcliciaA'ftivaj ArnicanuLis Itmilia, ftvcPerfica S.Jolunn& Ncui probac j. Ikuiliuu.^ (f&Mhutt (apOfCn iirne linulem cum Armuiuds babet c lcribk: iui cium non la- beic cum Qpoicai, neccoajii qui ck parvis Perfica [ciibnuu uk m tra3unt.

1. l'rica par-i alba J.B\ carne taciK- l-jparabili a nuce, lapore ewinneinbluli, oilkuUs u/tc urn profunda, iwc »J fraiuauer lulcatts, I d fropci :.nnibittpuodb 8c forAuuiu.JirciciUi. Ilu- geouieiV, ni tailor, quod nol Iraribut, -Thf Jpntniffil prattl di citur.

; Perfica mciiou-ia albida J. R. Tanica v -ibuncm c\ luwo palkfixncc, came alba, iieilec ab olliciilh (pArabili; prxdiebt. magnitudine fuperio a.

4. l'critui alba maxima J.I l' carne fapida funt nudds non n> altum adherente. j. IViii^i lwca ntedKJUia /, if. Lstuiv. lutea fiinr, lui p lpa firmifcula. 1 laule aWuedn ab (^ Upon& gi-«i: oounrotunda Cuacccterik ^rnUin.lioietum 11. qua fulcata.

(y Perlica maxima luca J. B. laptd-t 8cdarni(cola lime p;lp.i, qua: fault ab&e&t abouo: ip- lum ^IIBL¹¹ Utura HavcdiWj & propemodiim cfocca, &c uiogimmiine mligni, <)ui uxoucum icti

. IJT. a .i: 1 mucofo&fiicculenu 7.B. Pomum adapciturum fc kviter prdTiuon facile la kjiw- rem tliitHuit, ei *ckk) ac vmolo aliquiifanuriamii habciu, pnderum drw extima. Putpu mo*- dicas .ilibus iillwret, unica not.i nexn probaiar bonitacu.

Mcminicai.un l'ciliuorum poranonimj qux luibui projid [blent. Pr<4ifa omiua (inqua) c^c lime comctuola, quamvis alia mima.

8. Perfica Hispanica, M,Uc»mt* quarandam J. B Malm V*rfti>>»mU*Mt*Part Perfica dura carne amida, aliquando ex albo fubrubente, am <.*.*.* imtu C B €»t Melocotonc VMok

Folia & flores Perfice: Fructus majores, tardius maturefcenres, fed dururniores, pulvinato calyce, foecis rubente, atq; ex una parte maculis nigris notato: palpi intus Pomu, diffculter os deficiente [officulo in ipfo Pomu fepius delinfcenre, in quibuldam etiam ita in fruflula diffracto, ac fi id mal- lico effec factum, quod afpectu mirabile quomodo id evenent, fruclu nondum aperto J. B.] Os ip- lum compreffibus ovium uEtrorum IV tiorum, alba non-ferens nante, adolefcit ficuti infra ... m, fragilis qu>tliw li mtcgium l«. Cam firma, & i_lux l(eJUlbc^ 1 ita ftrapa ii ttaic Potnrr , i.enu lubriikli* iiccului: qua offi adharer ^urpura atque langiiinci guflu fuavis, fa- l>uu, vin., la, cute .lura, villota. Totiu porro figura fublonga, & quam reliquorum angulofoe. Sri anlonus Melocoton judiard iquis Perficis du !'«« au, qiol eutenimtem ku at ycem habet incurvum, & guflu it rdbmm ikhuuot #

- 9. Perfica parrj gtabra "J.B. caro nudes adhrcc & non admodum (jpida est.
- 10. Perfica magna & fpcaofa, came u(que aJeo mbra, ut Giroumm inftar ringant. Perfiu focco quafi lingumco C. A licenudeolunclxiifbnrubetuCj aku tugro, ujquit CBaiinDtB.

C BtoJuntn in ptnace fcotem enumerzr looes.

I. Perfica molJj came & Tuljputt, rinda & alba.

II. PeHica (ucoo quali fanguineo. 9 J. B.

Ha- dua- Ipeoci f imj * IUIK, camem CiccoQm & flaccidam habent, qoc u nudco tota recedit, Be u en j, alia parra, r^ariam proriur vtndu, quxdain^; mmaaxl>nibr>pia<; alia came alba havdeenre, alumbriut ianRuinoIncu Ydear

HI Pertica dura came Candida, aliquando cl albo futxiibeme. Uzc IUIK McJocotonw

Duncuu (mqu) ob camem dunorcnfi fie nommau, (UJC Khodaoiu dafta, aw ob odom l' tatem, aut good pleruoque rubro colorealtra (ui parte niceanc, aliquando pi>ni magnkwltnc, & j anguloio, circa w rebente, quod aliquando per mciuiin drvltum, altquindo inpartediffHip- reperimr, & a noftrii Perlica Mofchata dicuntur. Honmi, ut 6: k>juentium ca<< dura & to tenaafim^ adhzrer, qux aliqtando ctum intut Dkorate rubet.

IV. Peticadura came buioa. Et hjrc Mdocotonca dtuntar.

V. Perlica zftir/, Anneniicis limilia, lire PeHio S Joann. Hxc font minima alba J- B: Eonim quxapod ooihodie pneapoo in honore 6t prtoo htm, 1. E>t Wim JgutmrD Perficum - nuce molchau denomirurum albm. J, Cbcctb #nrnrg, Idem rubrum. % Etu & %f- Deach. ie. Trotanom tut forte Trocenfe a Treat, 1 e ^ropt* urUe GJIL.J. 4 d wy * "11,11 Deach. <• Eft JbftOf, j<bautaim_6. Eit Soirtir. uir, BurcRaleniv. - Zfir r.itlp, ington. NM prxoox. 8. C&r ol&prfofiffon NoTtnRton. wn Mff, Mukjtum nokcen o. Perlicim. IMIMudncrte, Mltm*. 1. Moxclia. 12. Rumb- bofiunt. 14. Bellve. 15. 16. 17. 18. J^OBffU.

• I M i , Pirt P*f>A J. B. <1> f

Nuciperfica arbor est humilis, Perficid - una minor, tnam & ramb matonbw albtcu* cor- bee nll Amr, dilr. fed maiodbui Jt-r/J h

Amr, dilr. fed maiodbui Jt-r/J h, rouA fit rotundua quani flata, nuU aJ latin iwn & fceda nuce in qua nucleus Amygdali aut Per i mtru. * Parkm&ow ui P*rtidife came <t n>br* opuuc

1. Nuciperfica mofchata ab odore fructu dacta: ifo eadem loquuti putatur. 2. Nuciperfica Romana rubra, feu rufcufa. Florem habet amplam, purpurafcentem, Perfice fundo extenu rubente, utriusq; videt: fructum extenu pulchre rubentem, agnumatim nalcenent

mi^ntorum feri Inftar renuibut PruAui exteriw rubent & adlinRuloi itodu ttnguli otw^iant> tntm aim plen^ mitunuc pilhii crudtor ndetur. & manus prodi.

• Vi^r/i* TM-IJ^ OUFa & minor*. H*c a nonnullb omnium prxflannTmu habentur, 6. fr^attfrijks *ikt, qtir non ridk Paikmfermfic Pr>Officnte etkin qutndo nututa citcfitb> <<^ die dknncur >c tpecic ab iUem diffinaa. Prater prakU in Catalojo N w p ^ ^ L

nrp, utTumqoo A cotore dtnanwtacum, w & 9- <JK frlletto. i.e rtivuxa 10. < 11. CkK ynWffe, piAurn fiu rtrMcatum 1v Aljtoianum, a kwj d^tum, Oferum beat (c i m i Perlicain JujLindcmaita nataocdamur) fed, f ut rett^ C- Bjuhinn; i dux i),wni rWtus K^ber <t fmda Kabet cum JuffLndc, trrtwe eueriore nrtdi adhuc xsAL

VII. Amjrltlftrfkmm J. & Park. Perfa Amygdalidis CR Ekr Almond pr.wb.

or est inter Amytd*Um ik Porfiam ambupsw mareric, folw, fruAu. F*lu enim <blongt, feaiti, peJtcuV> pluUuam Icrounaaij, vtrentu, (jporcanuro. hU> quinqc cooibt tolioli* do, colke tafnc 1, unyoc lintuinoo, Ibtmmbus mulc* purpurantibut ex utntflloo pmiinii nienft, Gtmfa puTrinw dcnlioc 8c copiotior quim AmvRiUiit; nunut vv*

IX beet AmvpiaJarum, ut Perliotamen nj<ofciro; nudeu* qualk AmTgrfiife aum anMqtum dureluc puumen condjunt. NuUeut rero oOula ut Amy^W

* ^ fc ^ U dc quo J. BMhrnoi Ik rhettricar. (Lrc (bboto mod-m IUTIUam, ut Ipero, contrai* : anuluu, inluioims, 1* aibwor, dM**" ta AdbkNeG^ & IWiw

utrumque progenitorem latorum mallo novum adhiberi genus, ta ex AdbkNeG^ & IWiw vita prioribus fecula excoerent, utriusq; parentis ingenium referent, & eugem finit adoptans: hoc est, Malum quod fere amula facie Perficum Pomum mentitur, intra dulcem Amygdalam & fauce & gulla repreciter, ipfum recte utriusq; parentis Amygdalo-perficum noxtabit.

Ex vulgatu wfiñmi4 mcdtt bant •v^rittatm imtu> ort*m turn fiat, cum frueim fmrtmit am %tmMx •
turam perpetuo fyuatitr.

Prater enumeratas alias adhuc Perficorum fpecies proponit Parldnfonu*,

(, Perfua albmmajer*; cuncula (iint & carne alba, bom faporu.

1. Perf alba mmora; parviute (bla a pcedentibtis differunt.

%o. Perf. mcarinna tnum generum, bina rotunda, tertium oblongum: omnu colore funt a' bicante, rubro perfila: rotulum minus vuigatii:* eft 5c majH il'rotum.

4. Perf. tmsnsitgmnJia, pcedenti rotundo (imiiii funt fed majora, & fcrotin.i.

y. Perf. ftrragmta aut ruffa, omnium i requentifema in Anglu, gultu nun adeu grato aut lau-
dabil.

Perf. Ijlatdita, pulchra & palato giata.

7. Ptrf. NrvitigHmtnts, Ehc ^rttHngton ptiitl); colorextcnus c fmii albente, clatere u-
men foil oppolicorubicunda, faporc optimo, circafettum & Bartholom.vi niatura.

H. Perfica Jit Treat; magna funt Scoblonga, ex albo flavicantu, extunlo. ui lubentia, preebcu-

9. Pnf. Regmalta, pulchra 6c grandia c tlavjante fufca rubro laturo velut obumbrata, faport ju-
cundo, circa leflum S. Barthotomatt matura.

10. Perf. Romans; inter laudanfCnia habentur.

it. Ptrf. Hifpamcti coloru funt extends ex oblcuro rubro (Uvicante, intiii alba.

11. Ptrf. tuersi colore CXtnnliaisobiort; bruncco, la pore aqueo; cmU maturefuint.

15. Perf. Alktn**a) fcrotina funt, 6c (apous non contcmnendi.

14. Prrj. AUnctfia duorum generum longa6c breviora; utiumq, landabrle, brevius ramen (k-
pidius eft.

1 s- P*rf Cers/iwd ob parvicatem dida, boni funt fporu.

i 6. Perfica flare fUno Ger, tmtc. in curiorum hortu frequens.

Multa adhuc alia Perficorum genera it curiosis in hortu aluntur, qnr, ut fuppicor, non fecm te
Pira & Poma, fationi origin cm uum debent, unde novis quotannk cnalcentibus eorum numetut
liiriutus aut mecttus eft, ut omnibus enumerandU ncmrffuffuiat: Quocirca nos jam diftk content!
enmus.

Pedici quibufcimque locisproveniunt, ut tradit Palbdius; Se4 & c pomis, & ironibus, Sc ilura-
bilitate piwicipi funt, ti cerium calidum, folum arenofum fiebomtdum (ortiantur: Pnudia f«6,
Sc maxiloe ventolis, mil objcAu altquo dstendjntur intereunt. In Italia, Ililpama, Gallia, Ger-
mania, An^lia & per totani Europam in hortis Sc vincii i'leqientilEiii* iuor. At in frigidtoribus,
ut ad trugem perveniant dciendi poffuluu: undo juxta panctctn Si > meridur, < oppoittur i'ercica*
ilamarc noicic, nun ut partetu ob[C^hi h venti» Scpcentrioti. ililjusdefendantui, turn ut Solarium
adtorum calore ex. ivH^xmnc Kcminatofux h-uctus ad inanimate n perducant, qm .1
icmlti ftanrn A Horc ckpiium cenelt & invalidi intenrent & deoJcrenr. ^uinctuni ramii fuper-
rluis amputatu rcltquos eitendunr, p.iriecti applicant, St vinca* adaAii da vis, affigiint, ut libero ra-
diu> aditu faiffto, ranii. Jurculi, gemmx omnej eorum bunctiao fruancur, Si t'eporc exhilarat* turn
fioia explicenc, turn friiihu pcccoq^Lian.

Florent Maitio & Apnli, cardiusaut emus pro natura loci. FrucVus magna ex pane fceptem-
bn perficetur. Pra-cocia pafBm Augufto maturantur, fit in calidis icgioiibus ctiaian anus. De fit-
aonc, infinonc reliquauc cultura confulantur ref Ruffica; fcriptores.

Gaknus 5c Paulus Perf icorum omne genus damn ant, ut pravi fucci, 8c qux noxam ventriculo in-
feiant; Suadent itaque &. ut initin refeduum ante alien CIMM fumamur, 6c ne aqua iupcibi'tja:-',
fed vinum mcracum, Addit Paulus cos qui crebnus lit ad faucutctn velcuntur ffbre COITIJ*; |x-
dae 6c nervoj ptopnaate quadam.

Ego tamen non video cur I'linn & Diofirn idis fententu, Pertica fix ventnculo ttillM die, &
alvum boium pi-afiare, nec alium m innocamorem cibum^ omntno tamnetur & rejktur. Nec
enim venfimiie eft, fruftum adeo lapidum Bcdhcatumj ijui DOftn ijuidcm palato pr* •mtiibui fiig^.
cibus arndet, li ut a natura ipfa nobu ad odendum commendata tridentur, noxiam p'rofiiSc in-
falubrem) cSe. Oportet tamen ut delediu Pomorum h..beatu, 9c ut niodut in Siingrendji Icrvetur.
HJpar de Pericortim noxa a Galcno 8c aim ditta fum, de praroollibus uitelligenda cih credit
Amatui: fecus enim ait cite de Chiracinis, ex quibus optimos fpirat odor, fuivi^, putui Hi Ipintum
recream: mm eorum Upor debeatifCmus eft, cum quadim auftentate, qua mediants Jlomadio
eoduck & ipliin> roborat Imo omno pncipn Hitpamm 6c viri del'otitlmi ca poll v>awra.
lomedunt, nonnili vino prhu infuia, 8c nullam tnde noxani cvcnire perlentiumL

!)itfculter adicrvamur l'criica, quia non aliud pomum togacius, ut rede Phnius, unde 1 matro-
nis iiolliit, aut Conkdonlnis quo* vocant, raio condiuntur. J. E.Jauhintucondjeiidi modum hunc
praz nbit; nte lefta nunu, decoitaticque 6c officulii xcncipUi optime puigau cum aqua & : lac-
char^ decoqtuntur ad contiflentiam iyrupe debkam. Mnilier pUcent a-Rmtiitibui, piilertim Jici
&c lingux ardtatQ teuak, reingcrondo corA>borant, 3c in omnihni cafin moibtt appiint^ amdu-
cunc

BralTirota Tib cinenUis coAum unum vel alterum Per licum igioantibuj Cm orterebat. Obum
vero dcliatiiTimum clle St argrii perqitam gratum aiffimat Am-ituv.

I >lia obamarotcm luum in crenfia am V^bt decora 6c pueii* exhibita lumlxco* inrcftmorum
enecantficerpellunt. Gaiamt tnti &: umbilium impoltu *^ preftate an. IUikitilonu>cami I yum
lenma- lolvcre tciibit, ji littliuicmi tpiawitaw exlubentur.

I dem p'raz fiant ^ Hors. effi^aujeiiianrquim R. de Damafcar in quem ufum ex uilem c; m fco
charo contulis fit conferva, mane potiffimum jejuna exhibenda; led & fyrupus paratur ad predictos
effectus optiffimus. Recen Martiolo, non tantum alvum depchant, led & vomitiones client,
& Hydrocorum aqua rris citata, led non abique agrocantiam labore. Aqua de-

KU{ led ;

Gantui

pdlancintcai

Itillaurioiium nuLu uoci delei.

Nnnntm

Gummi arbooi commendir ad JIH f... .uium, impengutcen, tumatci
 rtunun Jiteri*, fpumm Unaunij, .omniendjeur.
 dm id przi jtioi irfidu^ videapnd JJ <• in hist. c Valeriano, Matthiolo, Gelneto-
 Nadcot commendac Mjrtffioth id rauro tomv
 prxlumpcat J id Alopocum [ititonim k in acceo deodonim pulna.i i .] Oleum contulomni ad
 fomoum uuiulunduin, *i hemicrinUm irmpmhif ilkum; *j coltcam um pucum aujm
 nbts tnfufum: *d iluui^i julHonem & cakufum, aaituor uncum potum. Aqiuni
 nun fa Ccraionim loo. ffonifn Samboci nunifwloin vioiCraKi libratnlw»m
 decem dies in hmo lepuko, lidttiluuni rrwuni in modttm rcnuni c^laJoi pdlere K

Persea malva Afrtta na nova fere incarnata fimplici. Amygdala Africana vulgo Hort. Lugl. Bat.
O Httmmmu

Com pit) ro amtat nrguUs hpc&» Betilo
 m ohtulim tendencu mucronem, Vt*i"
 m aebrianbui tona fie mpi iniu iptj, prak
 nuiffim* uvmuiLuH vtlia, *clut in cumnu
 pnjnj i>ujf j)K., raid cola*, ifUwktwei qwiwf, t*.
 IKt'loiuiu (cue t dmi, tol<Ht>, ut «b*.
 w l'Hiintii, luWiwti tjuikm b.nid
 *i: 1>. llcnucnu>(poace bm
 ftri Sequent liibaur*

3. *Umari vel Camarinda Plon. Marcy. Arbor Praefera Brasiliensa, fructu Persei oster*
mli.

Persea Marcy.
 Arbor vix mediocri altitudine, in campis gramineis ample ramis suis expanditur; caulis quidem
 mollioriter crasso, nam plerumq; tres, quatuor aut plures juxta se nascuntur, ligno albo, Berulinum
 fere referens: in ramis autem ramulos habet, tres aut quatuor digitos longos, perpetuis spinis ob-
 fitos, & in eis foliis cylindricis, Cassia fere sumilia sed paulo angustiora, vel directe, vel alternatim
 opposita, saturant viridia, nervo focalium longitudinem & venis obliquis, vix dignum longa.
 Post florem (quam dicitur non deseri) parvum, flavum, succosum fructus formae ovalis, magni-
 tudine Pruni, ad visum & ad tactum referens Perisicum nostras, coloris autem ex viridi pallide fla-
 vescentis, carne quov, flavescens, pauci, dulci, quae amba lapidem magnum, ovalem, albicantem,
 qui continet nucleum caulem. Maturus fructus mense Martio sponte decedit.
 Crudus coactus turbat ventricolum, & facile excitat vomitum: siccirco integer solet coqui, &
 tunc citi.

Fern. Linn. U. Trop.

FnquMiftm. est h<, irW * Wi ^ - J ^ * ? " * ti u " u m
 quov Menfe VUm.
 AtarU

4. *Persea effusa in Taprobana C. B. Arbor Galipis fve Colles J. B.*

Tarvet.
 Folis est parvis, quemadmodum & arbor, quae filic. am catharticam fert, Minis i>revK>ux», »*»
 tice flavescens fve croceo, fructu crassiusculo & romndo ptli h Jw <iaiur, in quooi. «x Avellanae
 par coarctatur, quae nucleum includit valde amarum mj qu Tingur id ntodun ndicii Angelicae sapo-
 rem refert.
 Fructus 4M<diad<m Jttim .uniuiDtlMiim est. Eo amen nuJaa, quinvh JRI: rna, longè pra-
 flanzor, & |BOoleum dicimM ^MfiMtant (ipod qtwt tue «bor nttixvr) JJ Hep: s & Linnè do-
 lores valde prouocant, fve inrus fimplici, fve liom munchuu : quoa 6: amaiLtm lit.-.; . . .
 jrinoolx Tilarohg*¹ in lura, fuaum jm<ft ramadiua.
 m irbnte minat ptntmi i<iH9Jmum ia 4tfo*-i pr<d>A(> aim nediocn oteo fotntuffi. &
 cataplasmatis *»n)j pirtibw* bbwtdwt radiCifuaL
 Hanc arborem Persea r*ffincm effect.idaiaptiMKfKinawt': at, quia tamen C. itjuuiiu», ndq*
 quo argumntu>>, en reiert^f. fructus beayni mu *cl aullo pedkub sbori proxime Athartus depu-
 gntur, no. qtiog, em) [Vtiiew lui>unnu;

Fern.

CAP. III.

De Amygdala.

Amygdalus, Graeca Ἀμυγδαλία & per contractionem Ἀμυγδαλίνα vocatur: Fructus Ἀμυγδαλίνα
 & Ἀμυγδαλίνα. Amygdalam Graecis nominant itcrodtuwAkuMlrnutiumteft
 ἡ ἀμυγδαλίνα ἢ ἡ ἀμυγδαλίνα, quod post viride putamen nucleos fcarificatos
 ostendat, & in rimulis dulciter, quas ἀμυγδαλίνα vocant, Atheno testis.
 Latinis etiam, ut Catana, Nuc Graeca vocatur, quoniam Columella Noces Graecas ab Amygdala
 videre distinguit, unde Ruellius eum per Graecam nomen tantum Amygdalam amaram intelligibile
 suspicatur.

NaxU Amygdala, a Naxo infula difta Vcteribus Garcis maxime commendamur: Secundas partesCypri.i fitn vendicabat, CKIX prater caicrorum morcm rcpando cactmiinc prodibanr.

Amygdalus a Perfica cui alias perfimilis eft, dtfFsr pnlvinato fructis cjJlo minus [j>]lg fit per mawritatem (tctore, olEculo longiore, larvi, Cc frobiculis infailpeo.

I. Amjgdrf* ftiivaCR. Amjgi. Jultu & amwra J. B. CfC SlniOMJ tTff.

J • B*

Tarn ar#a fblns Amygdali eft cum fcllis Perficar Jmilitudo, ut difficulter dtftingui poflinc, O(K longa, artgufta, acummata, crenarj, v.ilde obturo amarore, maiore autemlentore prsdjtL • Ftm quoq, non jbiimilis ntl majore candore pjimcipara [Alibi dicit/e Patavn obtervafle Hores tuq, adei nonous Ppiiorum fim]es, uc factle cis, qui priis non viderint, imponantj nih tonjnis florendi divorlum, & cortex Perlicorum c&rtki limilit dilcrirnarent] folia pneit. Pomum Periico non incepte comparet, led comprelliini & in arcum tenliim pulvinato callo, rminiifpiffo, cduli, aciduioej, dum tenoreflj ffontc in marunucm tendente fruAu dehjfeente, & farii officulum larre Itipcmctalibiis Icrobiguli5.pcr\mni relinquente. Putamini aliai fragtii alias dura nucleus inert duk», cuticuli ccnui, rufa, veluti pulvifculo re(persi OMLI&U*, tam in culinr quirn in Sepl.ijir u!um; vel ani.irus Offidnil maps xpencus. Lachrynum quoque plorat in gumini concrefcntem arbor ipli. Radix qux ex medio trunco dclcndit faucore Theophrasto.) prxgrandb etl, & a!tt demilla c<<6 germinat.

Amygdalaruni pluri Cint diflvrentiz, maxtmc Celebris eft in dulces Sc amaras. Mjttfiolu\$ Dukitim plures facit dirferentias: nugn.is, poms, mediocres, comprefTas, rofundioro: <)uamm nonnullx duriffimo integunruropennicno; alu trigili. His addit J. Bauhmus Aniyedata bnu-ginc Ctrentia : item Amygdala*, vulganbus per omnia limiks, triplo tamen ant quadrujo minores, & ad proportionem gracilem nucleum continent^ ealtjuc ex obfcrvptione Cordi dmim^eneruin, dulc<< & amaras.

Amjgdatr fragili & flebili putamme, infit J. Bathinus, multipliti ratione l vulgatfe differunt. Amygdala Primn pucamen ntiln toMinibus-habenc punAacum auj fcarificatiim, fed quwlammodo liilatitum fng in pua-pociis, cm extrinlecJs vcnulaj albi est came leparata rdiduz adKzrenc. Patmido imtialit feri, Ion-ginido uncii maiofj cortex quim jugiandn aut Amygdali fragtlior, ut Icvulimo digitorum prelFu yci qu-uvis lujjis generis pucr decennis faalc franpat, nihilommiis pulchros fe bene illiculcntoi intiis concilia nutloK, nclcioquid inipfo «um guliu, fi reflc judicamiu i vuigjmdilcriminiiii-000HMI

Amygdalorum niaximorum, mediocrium Ac minimorum defenptionn vide apiid J. Diu-ntmim.

Apud nM nmimixniniatur Amygdala jodjritca dirt.i, mix & major* dint, 6c longfora, & anfcuftiora, y.iffii>r.i.um<n 8c (cretior.i, ndgaribot VafentMtfm, guitu etum deKcabow.

Loca •mat Amrgdaliis) calidior.i ; unde in Belgio, Get mania fupcnore, Angtia rrudiim raro perfiat & matur.it. In [t.ilhS: Gallir parte Meridional? abundar: in GaWo-prtmncia Djlphn.wiqc Amygdjlitcoiilitx fimt planities patctiffim.t. Dumni, fioaimjCaiculoluimiuc folum (ut ait Palladium) ca-lumquecalidiffimunj Amygdalis longe commodos eft qium humidius; nam li (olufti alium lit & pingue, ninm pabuli ubertate Ulcivientici ftenckunt. Kauwojt. tradit circi Tnpoljm in lepibui iylveJlres provcnire Amygdalas, quiuC llauhintu a lativUlpciediBindasficit.

Amygdala otnouim prima Horc iA caidionbus, M Inlia, auftore Plmio, menlc Januatio, Manio ver' pomum maturai: Min;m inquit J. B. mtra montcin mantra hen Amygdala: unde'placet lecti^Plinii, non matmatj iLnKontis. >i qobauMfl dicat tenello* fiu^iis qui ofia apu lunt did poile mativos, pernotlicet, mudn couoidat unpropc di diu. Nam pio].ne loquendo Poma tum demuni matura lunt utm ex Arbonbiu dacidupt. 'Aniygdjlz autcm, Mai. modo toffe, etiatn ui Apulu^ regione calidiffima, Auguflo demtim Icgiintui.

fauu m Anj>gdalli uti & Perfitti ahilqus arboribus pro cUmaruro dircrfiute variat florendi ...jipus. In Italia cnim & Gallia Narbonenli Febniarioaut ctiamj->"uanotJorcent Amygdala*. P.J-lavi ;siLugduni Febrtiario SiMartio, Gency* Aprilis prmipio, Be iti llalilcx, aut Kiarlio ll mitius in cocium verii. In genere tamcii rtorc lunt praeoci, atiarumti, .trboium llores prarvemoue, qut li per tempeftar.em hct menii: ctum Pcbnuno (c apctunr,

De larione & calnira Amygdalarum mhil dicam. DJ hii conlulecjuii Theoplrir*fti»» PIIOJUI, Co-iroella, Paltadiui, ajuqucici iuliuXL;i,>wro.*

De ulii AiuyBdalarum in cibo c medicam li tufiu* agece vellem. omniique qux ab aliis Jitb lunt & adhuc diti poUait pcfcequi, vix Iniegnim vo'mm: la I . Brevuau ago ftitleui multa onut-t • pene Bof4Li » culque quide maicna Medk i icmpler: it requiurenda.

Ann K>BU- dukes mutntni nutnuni Sc corpui pinguctauunt; quaiwunivUGalcnuj CJU Icvitalere Vuu. f*TM*: Galeno oppotunus Diutlii apud Athcnauni, Sln>eort* Sethi aliiniimq, audoriutcm, 8c Quofidiani m lare e iperieonam. Ilumorurt acrimoruim lemunt, Icmcn gcnitalc augent, unde tabjdit & macilentii convenium. Exhibentur aut<m prxctpue in emulionibut.

LactB AmyRd.ilini parandi modut delt.nUt j. t. buhinm hhvertns Amygdjlarum dulum i cua-cula expurgJMrumfqtMxt htacjui teptdj, non lerventc, ne oleo l iubitant u (wovocetur in Jthim, ficque Uc non bene album hofret,) qnawum volet, iiii]- vd ml Addi [oltituit Icmiia Meloiium 8t Cucurbitamm itifcm detorticit ad j. i. iiniuni LJAUCS & Papawb albi ((refngerare tnag» volaj (onwiumque pUddom, non violente i, quod ht opum, accwlcrc) Im^ I J. vel q. C.;;itull-dantur in mottario marmoroo, qKxi omnium optimum ail liatK rem, lcalim affua aqua cocti j. am decodbw m hordei vel etian iero lartii pro ratione Itopt; fiance per liicum, &. in U .o trigiancalo rclerva; turn awac^lcir. Pofii* cum Iblo hordeato ic AfRTgdaBi }>ararc.

Sunt qut moo auto; Itate Avicentit, dtcenti* Amygd in commarcK d>''' leram, libi pci iudent ion tutum crcmumfeu lactic Atnygdaliaiului in febricit >tuibuv,& wM^1. flo-machian

nuertum bilioitium habent, Uule inUinnwe, nuRere ad caput • apores, vulnerato capite is non uiendum, extiure doloren? uipittt. No* in cremore LufluoiUtem il lam non obleruauimus, nec quicquam nooimentnrurn pm dloruin, beet in febobta Ac cUtdi* nmxxts sapna uti fumos, ut utamur ipli indies, erum in a olitro corpore J. H. J. Babinio nolha ciurn expenentu iuttrag«u» qui Uc Amygdalinum ommio fbUm fc Icvamme, infebribut txpe potavuuu*, nee ullumia*: vcl leviSimuin notunicntum aut incomnxidum I

Olco Amygdaliarum dulum, in raucedine Sc faucium *fp ocxfanciui re medium. Pulm mum'die nor etploratum inq I I \d O.ilwpu.

Fiat ceLeg fiero. Nojreccu .IIMJLUT; to un* HcJe-x to c aJeoque bibendum p,

vice; Ibiemus, fed Ixptus repcccK JJJUML- Hit, eique iup. LJchix; oko J. Dauhini funt i | j (cqin

**«(«), 8c ad mulu efficix, bUndum, gratum. ncræ: Sdmui quid poOk in coltco dotore . i!?!tc

nuximo futxdlu multonci exhibcinurt. Sed rocenter opotxet clfc expidlum pei fc, vel in lure carntuin I' ennfip*» >! r ram & I m proper

renumdoky«li«i«i». L: ic unuu jodum infantim niftk- uibus ajrn recen venni> twrn^lycntij aim Sic t tun J peni-

dare, impinguare, conferre hectica, i onnem & Ittcitateni imirturarum & alitnim commodare scribit. Conuenit etiam mulieribz iic naugetc, ariiini(|, vulvx fit urinz in|ech:m per le

iiuuwium vd aim oico Tai t j; i nixtum [cum mclJf DJO(C.) mai' i Sole aut ctum trj^ore j.-. nil • nihtnr • - :«i "nipt • Dolicores: quod vero illis

GtuomS Anivrl'i'it-rn ad mutta a>mmemlat I \ aftnngacfc

cctc J_a)ir, J. Biuiiiv- nan vuici i it ali.niRCje per quoy

nem >c Rlynnando, vifcido liquamine in humore aliquo duiblututii, qua tutme tiyicucicnu pnxWlcputar. *

Maenu nil ntlfc ficc»,atten.aper. exurgunt, diuienu funt, obAm&onct fccoff* i, utrique referant. Extrmfctui ICICIKIHO tolluit li maftkitx lilmantar, cap*1*

:c (in hontalibuyj Amygdalai jnur.i c rixvc IJ pracuniancur ebtctuteni at oenS Plimnt & Diolorides tradunt,

, rtn, : I - J. ui in Sympot I. u v - i i !> . : - i . . M liipor, nuiuhabc; t|j

AmytdaU* anMravvulpecuB* I ulc* «fle «u.fui«. \lj<ctflu> Violin* in id*, C^p, tpotu^efl jrcxcfu

btpcnen&a com pef cum vcmciitillinium

(j^i tic hiLultatibu Amygdabnim diflerere vult finquitt C I luinuri)

i, I loc imprimn deba prx oculb habere good paknus moner 6. Stmfl enam dulco habert *!e- qutd amarorw, qui tanien -i dulcedme finunir. Hoc clarum laat xu*, ob (juam amardaint *c md. Hinc omno detet lorii & abftergente tatukate pnllent.

∴ Detnde ti hoc debec animadvncrCj ut live JuJubut, lira amaru vclit uti, utatur ranadti, rum retuiUte aquca htimtdraj aUuuntur & oraporat, *do6que evadunt

•tlcuia-. % Ab t«c perulet temum, qioufc), progredx (ant ilLr qtur nondum Icicilnlliter funt rand- dx <uar enim nxcHiiilmir tunt, quu plunnum habent (ublhtitLr illiui aipic*, q

∴twillan:m oKILrtat penkut, vemriauofuntanikiores, live alimontt live in. ja mm«<1* taput tr i intern ptogtc- rdctnoie*. Recen<

ue aurem lurtr, qux exnu fnlvillinur, plane Be noti i nx. i vclv prxtermittendum, lentper tt in omni

∴lute oWwrcntem fiuUco. Ilk tarm qak te I ibmu

. cntduluumftacrem rancidaxwn, quWb vtdet caulani Hactent (

nun tcnclUt jrwequam uflioila induiucunt menl» (ccunili*infetunt, & inregtai iuu cu⁰¹

regumentu cficant Itali, funt ue rererj fubaodo lapore palatu*& vermiojlo avvepu.

Ex Amygdalis contalis cum Saccharo & aqua tofacca hunt de * iIU nUcoux ^{nlff}

ptJifO mufice gratificanti. & pndpcm m>lt • belUru Wum ^{v(n)}

∴lcm Cum Aim!" & ovis conquafam debita proportione mixt n & caotentperatt

Mi illa nofratrbui utxoponi cipetita & in praci tUc ujten) in diUmi Lnqumc Ki nldent udau cum Saccharo & aqua rola

inliiper nwlu dukiwu, pafcx & cupedic ct uJcni eftewntut turn Utm turn xgru grata & la-

Integra cum ficibus auc *ima* paffis comeduntur, & Saccharo etiam wcrantantur. Quoinque atitcm mo; In fumpzt gute blanduntur, & ventriculo etiam n probe commmmntur convenient. Alias enim ti non ponitur atcranrur denubus, adco denfa 8c oompada ell earum iubiUntu, ut particulis deglutnii inregras rejuftas vidcas, quod oblcrvavic J. Bauhimis.

Vanflebs in Itincrano *too* jKgyptbco obfervat, inundatione inopiente aquam Nilt pnmv vindefcere, dein.le rutwre valdeqvc turbidam & cccnofim fieri ad accdlum /F.chiopia diluvii; quires valde injommoda Stnouva cilitU iftius & ficc* region is incolis for«, ni caller ent artem aquam facili nccotio depur.indi Sc clarificandi ; qtiz hujufmoji eft : Aquarii nempe & bajuli quimpnnum hydros fuas feu cantharos aqua rplevcnnt, intenora eorum patli ex Amygdalis conruis parata arfndi oblinunt, quo aqua brevi fxcibus lecrasj.fcu ut Chymtci loquuntur, prxdpitis, clara 6c cryftalli tnfrar pcelluada evadic. Amygdalarum dcfelhi jut inopii ex Armcciiacuruin nuclei* pari modo contulu pafam p.trant ad eundem utiirn. Quin & iarirum Fabiruni cundem ctfectum prrtarc Vanllebius ab £gypdu edofhu cH,

i, Anygslxi ImJuM MM Hort. Reg. Par. Hart Lugd. Bat

Herman.

ArbutuKi effruticooi, radice tenui, alba, reputnee: Caudice digitum crauo, niuouatuin'e pedum ilunicimc: ramis crebrU, gracilibus, quos pallide flavelcens tegtt cortex; Folik, nor^jui 6c fuidtbus ab Anygdno iativa non mi t pa rv irate differentibus.

Floret vere, rrudui Aurumno pcrHic.

Ttmfm.

j. AUarmsm. * H. M Amy^iUU lulu* Jo. Nicuhoflu iriner.

H.M.

Piroodfi eft arbor 8c (peciofa plurimum, ramis dccuffltini in alifK minores divi») brachtata, ita Bt vclur alx expanfx vHcmnir, ac, uti in Abictc, Pinu fie P*njs, iurium versus magla gracilcliant frondes, donee pyramidu krtr rormam actmgat. Liga* eft albo, pnduro, comet glabro, exnu cinereo, mrus rubtundo mumto ; ramulis vero tencrionbus, viridibus ac lanuginoois. IUJIX cterca, mbicundo cornc ceeta, inodora, mjpida. *job** brevtbus, rubtcurulU, ac vilbhs petiolis plura fimul unda, ac inorbemcxpanfa, ramulis utnncqz inhzrenc, obiongo-rotunda, lplcndenru, elabr.i, longitudine (ciquifpitkimam, latitudinc (pithama'ni cirater xquantia, iiperni vindu, uv ferne e vmdi flavefcemia ac lanuginola : (apor amarus, odornuuu. *b'irtt* exigui, motion, ac inlipidi, tenuibus, rubicundu ac lurluru pctiolb inter expanli folia rainulii (uti Ribium hoi a) n-atim coluient, quimjuc acuminatis, doilu, imu*albicandbu*. cxtus vindtbut fbW> (onftandeci in inedio cnuibus, albicanbm *fimmAm*, cot *tfutbm* dotaut, med^i norb civitatctn Ac ihcum occupjnnbus, qtunquc n^iiruni Jle!;, ni inter foljola c^*t>*t n unque verft *ered* tis inter *r^ux fjlrm* prod it viridn, hirlufus, tpiiii *fnu* U* rudi men turn. *Fr*8m* obfongo-rotundus, comprctus 5c m arcuni tenlits, Amygdalx petiimitis at niajnr j cortice pnmurji viridi, gUbro ac nicebre, dan rufo, Icabro Sc duro obdudus, eo vero in maruritatcm tendente dchilccntc, 8c faalc officulum leve, oblongo rorumlum rclinquente, putamini duro nucleus inert albiuns, lapore Amygdali, prrtcrquam quod inter masticandom, fecus ac Amygdala, [wnitus diftblvitur, nulli rertunente iplius nuclei fublanti.i. 1 lie autcm nucleus duobus con ft at albicantibus ac rorundu *ioh* lli, lpiraliicr convoletu, qux in medio juxta longitudinem patens foramen rclinquunt, tin apparet ii nucleus in aqua calida tamifper maceretur; tune enim convoluione iic taxata6c ioluu, nucleus induofolioU rotunda Candida, qui pedunculo brevi albo inlident, Ic ex pandit.

Naftitur hxc arbor in (ylvii *MtUlur*, loai prxTerum arenolk, plurimumque in Iwnu oolitur. *fm*. Ter ngulit annis nuturot exhtbet fmaus; cumque floret antiqua decidunt toJu, ut pnrpoe m loos ubi (lores erumpunt, Uque *ah* anno tcmo ad Ho. non *tub* frugifera ma:

Ex (bins arborw (HacentuUsconticerc norunt indigenz, qua* comedunt. l'uliorum fucats cum *i%*,)(\$ Oryzjc inftitb mixtus 3c exhibirus humoret biliolut temperat, capita dolorem ex Ufa aliiicinorum ty«. in ventriculo fermentatione or mm lanat, necnon »cernmi* dolonbus collets medetur, £ folus tennenonbus 8c fucco betco nucit India: unguentum tic contra luUcm, lepram, inipetig;nem, ilmi-leiq, cutancosaffohis: cademque tolu, oleo Palmr oblka, ac tons gutturi impuiiu, taticium tumorci rcfolvuit Fruihium nuclei in dclidu tomcJuntur, ex ul^lavCiiuilgetar ud ex Amygdalii, necnon oleum e)pnmi(ur oleo AniygiUlirum perlinule, prxtorquam quod nuoquam rancorem coo-tnfak.

tf. Amjgislrm v£thttfit futim htlefttrtt** Brea

Il.ijm ramum duntaut ad ic i D. *Brytnif* millim dclJibit D. Brc>niui hi* veibti, li ex virga *''j*^*^*i''^4' ^R''* nun.crailuic, podili, per duomm aut trium digitorum inrectvallu geniculispro-tuberannbiw dilhnaa, con (I at; aipii lignum (ubjJbidutn, ruud durum a. *Intc indipulum; ««»* «« craflo, obfeure cinereo, mulos punehilu fcxrgineu guttato, ac pef longum *ht*; *Intc ftra* :o, non-nihilq, lanuetnofo obdurtum. QuidJibet gemculum /WM icprena, *mronx* modo, lumm» ordine, piantarum Itellatarum morecimindant, vinJu, luiium *Ipectunu*, *OHcuuin6gui*, ni.igniru.linc, duritie, afq.craiiitic peiiimitia; pedtculit enam lemunculibia *tciooporbua* inhrrenru;«(cd ve-fiulutibrtlq, cralltoribus U obtiquMnbui prxdtta, ac circum nurgino Icirau. In k\undo ficter* rio»ero genimlonimintenorun, (upra foitionun exortum, *fflticx* *idciitui cuffi, lignci, c^ tutto emorri&meant, duas aut tresunciai lonjn ; qui dicum vugtm *ftell'* *form*:i in orbcinagun-tu", Hi minim in tnodum fructafix inuJtu, pettolot brevo, craOm & lignotot Kababuj, otiutt, ven** podicium anguftionbus, in medki craffionbus tunikiitM ventnoin, ••nrrin nonmU »» *ficas*, •w *JI recamuu hmilmque papdlis apicem excunnt, otnotnr. Cttenim* *frodm* *ll*

cum Amygdalus Europii thorni liint pan' quibus nuginiuc cutdem nonnihl cedL/ir, fed <-
 nuftace maxime antecdum, ob pulcherrimum deniis i... lore M £f™~
 momum vergent... poliacum edum quo adeo fete a N...
 tarn IcnescmoUet, Jed adpedu ctiojn & iplendore tam*qua...
 ftanrtfTimi conreAora Hoblerioonim manus cjabomre IUotelRatuioctes poflet Sub pulvuuto *oc
 mirabil callo officulum latet, non nini* duru infrudum putaniipc, nudeum conuent tscok-
 crem, culus laporem odoremq, obleruaie accurate uoo iicmt

Locum

Oritur in Promooiano bonx (pa.

5. *Amygdala Guyanensis* ClaCexoL L » .c.6..C B. *AmqgisUGwmafi y*i*mmJt tmmtgut**
cum tubercula J. B.

CW".

V*ilic crtlfb & duro punmine crac przduus ut non immerito Nine *ppelUn qucat, triangule
 quodamnwxW) fonnx: intitna cnim pane ten- rceblinca erat 8c depreffior, binat uncut longa, de-
 tnde abejus lintr duobis excremis in orbem IU aifctgebat, ut... fornurct, jq
 pxncuntarunij qua parte \»ngc uailior eratSc nueis cumchatj mulctis tubcruil» per univelum
 corpus iparin, coloni ex tubctcentc fpadicci lla m mnas panei IcvU ППКИН m nuv I
 (kprenendebatur, quideni cum nucefigure, pcllc five membrana opcrtum ntt'i, led inrcnore parte
 ondtidiflimuni, arq, in bmas panes feparatuni, inftar Amygdalx, cm «ijm limilcni laporem habebat:
 qiiii de uiui, wquic, non inceptc (bf (an Amygdala Guyaoealt* lire Guyaiiica djci poiiic

6. *Amygdala Peruviana* C. B. *Fr. 2. cap. 18. l. 2. Eust. Cluf. Amygdala Peruviana cortex triangulari rugoso J. B.*

cty:

i i JC Amysdalr Pemanxnomenindtcum, quu t'ortc operimcmum quo tciu I
 Atn>K<iahm tegit, aut quu nudeu* qucm umbnet Amygdala: nucko rvm certe (in-
 quit Cluliu*; hup» quam, apertobam nadeut fie fiibftanna & Upore Amy^daLr nudeum vjld*
 rafatfaai, led offit live bgna conies qut nutieunt amcincht farnu uam trunRiiUn*
 cr.it, doribUto, m buia Uteri an? loti liclinente, raldc tugoio, qutinudmodtun &. utrutnque U-
 tut: lupitu p»r» «MTO n»«oU, tod an«uft* & condfrnna. In aquam conimta ture \ux nod
 mergbanir, beet nudeum adeo inregram haberec. ut ttxum bfneum comcem exptner.

Tra ultima* arboret vcratSt Renuirus AmyjpiaU fpecin effe non affirmo, nec ewm (do an
 character genericus ut convenit; quin potiun contranum lulJMubr. Vemtn quotuam a fiotam-
 ci(pentionbas ad Aaivgdjlm rdeiuntwr, nec mihi axillae quo rcferru debcaot, recqxam len*
 (entuni Icqni maJJelt (juani ablque probobilt ranone aiuii norire

C A P . IV.

ZV fftw Mofchata.

NUx mokhAta fee mvrft ICJ Rccenriot ibui dida, Vectribn incopiica, nonnullis (ut C Baa-
 hino) credicur. J. ftitihino. tit & Gallandtno, C«w«f»» ThcopJirafci, OMUMMM & £>
 r^M Pjini dfe vuletur. Idem 8c Cin/i*#/*it»Gilcncli; i.lpiu«Lr.

Ob fioicm frudtu contiguLm, & fiaAm Linuninoi^ni, puJpd demialuique amvenientia*. *r-
 boron Kane ad Pmntferat potiu* qLUni iuctterat referenda m tenlco, & Maio Perticx non No«
 JUUn di lubjungendam. A reuqus autem hulut genera diAinfuttur tnpuii tiuctu* iinegumcam*
 macloo ov«to, eueriut nflolo, pulpa tntenora renn riavo-rubenubuj vani, a/unuacj.

Nux mofchata Ci Qer.Pvk. ^ n M i M w ^ ^ ; k « J. B. Cfte #uhiug trrrr.

Nuoemmofchathamconditatn, prxt *b India adfrfrsr, lie de&nba J. Bauhinut,

PeHi.um maJum mediocre zquat, pftni'imque pulrtnato mtcgmir, juelandii aut Pernci iomo-
 icm, calyce; huiciubdl medtoaHcrafiEiuduibputamen leu owtcx itgnolU, nullo necdoroc, nCG
 fapoce, inru* cinercus, torn ex nigro Ipiikew, viUca l» Kinc inde dtpreffii uuqualb, quai ex-
 nmo Ac huk um ilifh) coraci intaictta MMM dkta exulct, reticulato plexu certu iocn duium *b.
 hun curtkem obroWem, pemoicius circapedtoUtm adnxrent, aWiui liber, & tncubitu dunuxtf
 Jevi appreuV fault neROtio ardJenJut, colors ex rufaro navclkenoi, Upo.h tucundiffimi arom*
 nu, acnukuli cum anurw*quodarn, rclut okacem quanoam punAararcouacm, qucm kao*
 piMUi* reddk ouctvut, quemTulftboainciNuvcm ntolJutJ m vocant, i)iv. x nuKniriidinc, aibx*
 We aoefccuTinlocu* fie rugol... jlbicandbm vena undai;... vel fine allo or-
 iliMcinde ddcioiaabat*(ubttanua loiidi, led in pila rijjpii, necditfiaJrcr m iufladiffil^{en**}

NucatronMERlcamoLKatT: uoorofijuuOlifan,quod/i
 dicitur: aliorum longior... totundun, quod mm.

i m u h f a ? * * * »M»h arfo. tt kwoci dtinftput. t. Trmam roc« Nuuoajofclutani
 -K.XI»f..ot.p*,*o i-T c num KM.6. oblonga

I. N<xmofth*tf*3* m**Jo C. B. mfmm retunda fivt famina Ger. Nux aromatica feni- na J, b.

Deferipnonibitii aliorum impa-fiftii omiflts, accuratun Gui Pifoni* adhibebimus.

Arbor est I'- li-.* Malisaut Pyris hand difimilis.

Corriocdnenceoeff, t ligoledidjoto, medulla ex lico rufc&entt fit/<< parvis pediculjs i- ramisquibus arbor luxuriat, altcnunm 5: fC cacemcitr, rar.. i, a ^ k. nuia, gUbra, & nervo unico redo aim plufculi* vculis oM: pas perdisa. Ea non recent» t uuum amenta manu fragrant, fed & cum ciurucntt ftenmonjam fervanc, & i vim Arorruncam inJtertem uc cil; eciim uiui Indigent* queant. Aw floribu. raliu i iIK & magnmlitK pares & Sore fimiles, quiqtie taale cadaiic & parum fragrent /i-<a*r fucoikns circa pediculinn noiiralii! rurbimms.CMeraorbicuUtior, non iplu raiuorumraftiftiiluTonir> \ Nucis Juglandis, nequcin folwramaiis, led in iplu hincuwle ramulorum amariu. Qui iletionut funnuh Nads opcrniientini yreth C rufgium, vrbolunig, pnto, fititij, dehtumft, dcinJc

>>

hiKK purpurcis, •Brdfque macuiis, Kuc apud nos Amenui i l. Jj. Villus iite HHA til (us) Nili... Moluccenlium uium ticmm, plerique a Moluccenlibus diffuidam] & quiJcm liib, li Pilom cre dimus. Alu in xVlolu: mv^ nntridimfic in Ztilm, led inftudier^s. BMIJ* autcin inf^U mxl q fiu, a Sceptentrione ad Auftrum fc wcurvaiis, t;tj; nam vltati foli... mi toiiJt tur, briga tr» Lucas, unam Liu, EU hax arbor annofa, & pcrptuo vircii nucis gerens, alias aliis niacufiorw. Proinde Temper quiawn I unoinanno. Vindemu prima fit Augurio&Sceptembri: alrcra Maruo cii L. I crta alio arguo Tmpo. airo tnoico, prout favcit tempeibs corli. L^i; nucis niii beni mamra: non debcut, alitur j' font durabdes, l.cOs, cortiabus exemprij litcanmr pnnum aj Solem. Sicc.itis aJmutw M Poftca Nuclei, quo, Nuos vocanuu, i.iwantur take ilac en«n lola tmx praiitantur tontra torru ptioncm, & omncm cuam enenum iniurum, & apti per univerfiim terraruni oibcm K>nei^ ruvi-gioonibus tpuulcra Oi«mu: (unt quibus color eft ex rufo anrcctis, fed imerpoUcus fnii uuibut dam albuionbus. i—w.

Hunt Itruam varw quOcm am depafcunmr, led maxim6 Colotnb* genus album 6c pan-um, qn* Az^kem: nucamento, mactz hax l3ic Matii liunc aim Nucce cr.ptunc «t devoranc, n oc nifi re- plectawiRlujvc. i bginam tlcfehnt. Nodrate ibi mcr... fore* Col. tttmSva Ku-i :iK>(uininc. QIUJJ itCKrii p: nJenacr ceo nr Jirx uiagBrmuuc, ucpt (uit corupti, tenipi exten> i nJenacr ceo nr nglcaumincaliscntcnpumq.,. teninicxic i*ul* Cludo Arbordl wcdU, Pym haud muior, toliU Uunnn, mini s tamen Juris, & paulo interdum Iwioribus. Verbis Arantu Mta propioribu>,li appendices dan is, altera itun i non ex adverib n licen- tibus, m ambka non krrati., pcdailii brenbuc. FraSw img.ilaiK aplmtum « tankribui ex- peraii ram.lii dependet, interium hni. Exteris denium fruct ^openmentumCika cuiufiim illuJ inbn i-i-q,ulciii» idents formi pradama, clq.: ctiam pirte niaruiuin duhiicit. Macis co- lor micio adebrufam Bcd;Rans eft w ad.m:atwjicm panat, ill aai expoiitus piiUlatim'lllain cle-

Non ideo mare* dicuntur qui d(Rn)ita« Ac faoilute anteccllunt, quad narura nuioritateni & longituditwrn tajllec mum praedlennr. Cuiippe (mquit IMb; loem ic rCi lubct. Nam ou inT turn mole ca-teras (upcrum .antum 4 ha dpaaiwiir vimite aranudca, ommbulque dtx.bu- Ghawnucisenuw b.nobilnncooocn«. NonwiiwA qipbc rubet, ^uiU ^fc&t nonra- tyne aliqiu led fupertitione men, obknqum Nozem in dbe v** Jjuni IXJIT0 €« oe« lit Vencrem, ko ftruuuro. M..a>ta,nenc|u_Muamv« c|c«m,Ui nuoo, ooe lit, adeo ell i ibuk DC ma oiOb apud iuo* lit u, p.aiQ. Uude i. *bo. ex quToalatur inter gterc) &. ivlvicitio rubcaur negligatui^.

holwea loi)Rionbui p qwe iiverJiim pedem Romanum Muenc hog Ud- iFiipliu'. iidvu,) crafliionbtm "ercvolwi ibus, piona pane toJicRxnubus lupana vi- idi- Nutc nupre, iunr, non lblutu obbi*c, (ii & qui t* non c i>-

K C 11011.'At ccphalica & ucrina. FUna difoioc, aKaioncm pi. |

In dyfcenteni* ali.lrjuo ^ N w Mofduu tuaiw cdebrari potcft, quandoquidem divafi. & cultato, omnn ui hoc aftdu MWIU,^ conuoo- taw oicoU lubftantia ULnk S

ooWoi pcrutat, 6C iunio; Lorrorborat; tc rreitis pari adfringt & extitcat ulcera, u m11U de Dylen- rcr. t. to.

Nw» moJdiau oodka w Jmuno in omniU, f, id* o^el^ miMw P^Ht

arperum ex Indiu Nuco molchar* laaJuro condiat pro bellam* id epola* buttons. Delicanore* <tum nucimenco tea entriorecorrice vindi delcdantur folo, cuma ipliNuCtprxrterundum', efi tmmaturus, tarn propter o&ons fuartutem, quint propter (aporit adfrin(cenns, atq, ob id ftoaocho amici iicunditatem. Docurt interca uiu* non ooinino innoni> cli. i i a delicias, net, Miinun quan- go fine, fed quando cum fun nucibus fumunnir. Pollem a i m, eique in hgn. FauuCSft nircooo. qua hequcnao. c a tit largiore uiu fporolot inrchunt afTelhu. Hint non aiutumk vert efi qud tra- it D. T*vti*nr, nimirum, cum hr nucn tmturelcere inuipiunc AVCT Pa;adilucai hamm vqckida- nini aridai nugms gregibusad Moluccas mful.» conuolare, non (ecu* JC Tunics vindcmixrempfirt in Gallum; Nee tamen debcin fin* impure fruunnir, rum cum tnidibu* hike ad farietarm fe injprgirJrunt, vemgwe oorreptx in terram veluc ebrra: deaduot,, ubt pcneum crura fannkx brt« comeaur.

Nuca tpfJu ficcarai [immoderate lumptas J eadem facalate dorurai die comprotut litftoni qium lurttt Lobclna; nimtrtini, fe tn Anglu vocitum ad geiwrolim matrotum prngnaxitem, (\$** cum liimmo defideno ardc duodenm Nuoes molctutas tanquim panctn tommanduuifct, incedf in delirium vel poritu ebneutem, led pod impctratam quietem & loninum copiofum^j-epcUendbtit capiti admotu, conualuir.

Vulnus cuiuJam militucitu confblklatum ab ufu Nuca Mofcufx interne (iintpex rel'crt Tacho* niusin lib.de morborum pnnape p. no. Ilic fruauscoim oelcbratur x LtFtiurk iWcdel*> m raJnenbtts conlolidandii. f. Bauhmii cum in Apertnims montibus frigidam auidius btbdlet (o- bito rntidit in tnfignet t d i ca dolores fiatibus in feroto veunribus accedence ounorc, line tamen idj» hernu praccedente au: fibfcqicime Cum ciffimaret le in monte pne dolortbuj pctotunim, tnners focim Ofwaldtu G*ktUi*vrr amtcobculK Nuces mofchatai, qtui (cum habetur. l>;vi>rat» quitttloc iubito per D.G. & hoc retnedio Uberatus tuit a dotonbui, atqac iter perateat lolpes fit tpcotamit. ptU tmfnum trfmmntntmm.

Ad paralylin pimum deghiritioni infementium NJX mofchata roafticata Ccdeftotiu eft cgr fr ia. EtmmB.

Exprimmir e recentibu* contufi* 6i in Sartagine fenfefaa»oJeum L communi. ad mul- u uttic T, g. 1 venis rorouna 6c dotora nphrinc<M (in Itquorc caltdo exhibimim > ad tormina inhunmn un tAum, ad nervontm aiticulonimq, djuturnot dolores k fngqps exc rator. itilccu* conulut blande (bttnum temp<ibui illitum.

Matin feu (cendum iitroltKrum Nuco aim Macerc Grxcnum oofundunt C R<' centionbuj Bofinta* non pabci, ncinitate nominum, ut rerJtmik ct, I ducti: ,um umen h<c duo mutnim inter le difTerant. Macer emm cortex oil radiett in SUidhr ujlccitii, lubftanttx Jr* i & terrcftrions, fie ob id liftcndn alvt Huxibus delhnanii Mbca t omxn tegumeaaiin Indicx. ft: quidem egregic aromatt^um efi, fnult6que & Iptrkuuiu calure plenum, undo flic t!* fhgtdoi altecta, item >, venciatio* lolct uiurparL

Madiautcm ille ptultjtum ex ptenn nutiurtut, & aJhac tolere efi elegantiflinwcoconco, con- diri apwl lut* laic & aceto (old, & intern pnur menijt J exctandum appetuuni. Poftcaquam Teru matuniH MJCH, adimmr Noct fle etfkcMor *d Solan. cxilbAulque cum cura repomiur, fava- ttirque. OJore temper quidem Rratw efi, fed reccm mire rucundo: fapoc aromatico & luarkef jn'jro, fie qui quandam a te li.citatem on relinqtut. I JI Jem vira qu* Nud o adcribuntur; quu tamen partium tenuwrum exiftir, ideo & operandoefficacior, & riURti penetrara habetur.

Macii oleism uc oleo Nucn quanntate cnit tic qoaliute antecellit: magilque commentiatu in nervorum aHoAibus Ac alin fngid> morbit: qum St. Podagram (mtrabile dictu) pedi oblutun fa- nare Oonrmburgtus refert.

Ad rtrnura utro inclulom. Accip. Nocetn VfoffHutam non vitiofam, decid. in pane* tuj. Pi unam lupcr urbane accenkn, &£ tumum acuput mutter pa in&ndibulum, terq, id faciat. Hoc reme" ' Bonne mulieiem 1 .venem Omvk Haitnunnui- Cutnntunkavtt l>, ii- 3c.

• f «. Td.y ; »Y« m j n f u * m * j # j f r m . s M * U * r u * . T t n t m - f t i i t * U . M . A v & m A t m i * * f t m u o b l i e - f * f * ^ C l u C N » J » [m . J u J t H r n f * , m r m f t m f i m i l m A W t m f t h M M J . B . / W H M r ^ « >

Sic

Arbor eD provera, f**/w# cnflb, mukilque ramk denfi* doiuto, qut cortke ful»o obduajWP medi.IU mca» nx>Jli, haud (ecu* at in Sambuu obferuntur, referri ftmr. t^nam albtcam, pondero- fii, tnodorum, intiptdum, corooe obduaum Ipdiceo^iibro, mtm albicaui, qui cuticula tenui, niRrujirc mluper nninitw efi. Rtdt* itnlem albicam, curnee diterco, fragrant: fie (ubamro an&x Filt4 oblong" imuntia, Acuminata, denta, ((labra, malt A.. rraniz tolu haud a liimtlu, ex- cepti ilU appendice, nui hufus arbom tolia caient, breui rorunJi* pettolii ratnulli tnhe- rencia, f ;<rnt colore atrovindi fplendencu, mien; vridi dilenore: • ipor lylvellrn ac atarbufc tiuvL VUru extgui, circa ramulm tenortorei ubnj, inter folia brevth^, rotundti ac rintfo* ^Mnojr :i pfoducuntur, icnumque porrectn columella umbdlr Ipecie p*o' eoffam not o i MhMfaaMittobM cdfo^ wd hH MqHttorM b m i a d f i n i ^ * diTi, in cupc , medm /; /• prxiif albtcamfle bretif; odor nullia. Up wm.te-ni i t pluo uHtfuncctm ramulti inharrent, oblongo-roninii, acoroAaMri' o cum formi, an iic viriii flareicenCB, oorti arnolo, moUi.ac pol- vinaro, lapore acido-diffingent. cJkxiitjae mgrtn tarh, JugUrd* in tmVuin 1 < . .*** f men for cortex lignofa, mulo nec lapore, necodore, innu unartw> tori* ex i' l' ha* Mm tfMoewtk l'interpcta quardm tub- flantia, vere Maci imila, explet, ronalculo plazu certa portem obvolvem, co- lora ex rubro flavefcem, oocem varo cortex lig- ac bponi ktul tu grsti ac *«« Mao»; pamipro

nolb nucleus adeft oblongus, dadylum tain magnitudne q. am ngura rercrens, ool«i» j. e cnerci, ac rugoliis, necnon Nuci Mofcluu: mari perquam Jimilis, prxterquam quod vix ullu* Jipor odocvc in hoc nucleo reperiat.

Crefcit ubiq. in fylvii M*hbv\ femel sue bis quocannis maturoi profert fhiftus, Junki viz. aut !««» & Decembri 8t januario menlibus, diuque truenra nunct. itmfn.

Noccs h.r nullmi in medicina usus hint Verum Mercatdres Turor Sc Judsi noccs Mofcham no-ciWs manbusj & tn.iun vevx tu.ici admifcere (blent & emptores rallt,rt,, Snulitcr c nucibti eanindanquf m.ici oleum expnmunt, 5c genuino nucis mynfttae oleo adnn/ictiL

Qecerum not.indum ell (ut.in hiuoria Faucl edxca monuinus) Lobehum in Oblerv. ATCIJII Indicr genuioblonguni Cluj. kieni cfieyeti&n turn nucleo l'alm.tpmiquod (inquit J. Bau iunus) an ci conCinioHuisvi conGd«r«ndum eft. In caJjm (encuncu eft & dc Arn. Sycn note in Hort.

P«ww H. M. P. 4. T. j. p. 79. Truwftrs ftu ftutifna Malaka Om Nymphaea fn&» funds, torstet pulvinaAv. H.M.

Arbor est v.\(li magntiidmis, alritmluic 90, craTitie vco duoilcum pojum menlurjtn ararer xrtjnm, muttilquc ramis inwlxuii longc Utcquc JitRljji J0ii.lt,1; qui cart.ce glabro, prinwm «ndi, dcimlc rufefccnte muniti, ubi mciduntur albiunteni liillaii liqiiorum: lignum aibicam, cortice obdudum craila, Iquamofo, nigricante, inciu purpurafecnte; iluuc rulncrMts bchjynum fundit haresfecntem, njdoam actenacem, qiu: Solbardorc inRiunmuiuiiqcm n*»: raro exlocatur. Radix fibrati, albfcuu, tlivfcfcntc cortice teita.odot is Rravis, lapurh a^luTn genta. Folia geminata l irdine' par.illclo tirci r.imutoi brevibus pcnolis provenmnt, oblongo-rocun. a, Nymphaez folis haud abhntilijj cr,iffi"j, deiia, gLibra, bliciwenna, tuppento atro-vimlu, inferne Iubvridia, in ambitu deaurata, cofta media aalla & in * adverfa pane aUc cxcuberantc, cqua mmimeri exiles 8c pxnc invillbiks nervub luperiora versus exourrunt, & ultra folii medium omnino e^ancicunt; (jlxir aCili.*. FURU raocmaam circa exrrcmos ramulos pctiolb longis proveniunf, Tt ifolu hepattci roi ibus aim forma, rugnitudine haud abllmiles, otlo cinJidii, trailis, rotumib ac intus oocaya Ebtiolis conftanres, denta vtridiom jhmmnlrom, tuvflcnubus »fuikm ornaiorum congene medum flofiaKetckaRm & liiibtlcum occupants, inter qu.t albicans emergit pjlm \ odor Juavis, lipoi nullus.

SintiJt plane mckb frttBm ratnulisadnakuntur, njjundi, elabri, viridffl, nitsaseij iiMturioret veto mklcctc!, coroce cral^cjininlu.nioIliacpulviiutOia^ponique audoamari tecli nuosjuglanditiii modum; Iv.iic fubafl puumen (eu cortex iignofus, albtcam, S'attrmm includenf, oblongorocuaJuro, ex aibo ri.wcli.emcin, &pon»priroum d... deinde velle unari; qui diilciluj (luud ieu •. ac arboriiLo.t^x) t.tcli ymam tu iwk cinuum ac refiaoiim. fyepntut - n dt- attrm.

SintiJt plane mckb frttBm ratnulisadnakuntur, njjundi, elabri, viridffl, nitsaseij iiMturioret veto mklcctc!, coroce cral^cjininlu.nioIliacpulviiutOia^ponique audoamari tecli nuosjuglanditiii modum; Iv.iic fubafl puumen (eu cortex iignofus, albtcam, S'attrmm includenf, oblongorocuaJuro, ex aibo ri.wcli.emcin, &pon»priroum d... deinde velle unari; qui diilciluj (luud ieu •. ac arboriiLo.t^x) t.tcli ymam tu iwk cinuum ac refiaoiim.

Provefiit ubiqcin MaL • arenotii, pra-learn.circa Artgnti: quocannit bit fiuAuii fcit, Mirtio viz. it Sspontbri menlibu* »\ |o» non r*ro frugifera nunet tonoi

Ex liiitit uilliccamoleom expnmitui ad luccmamm ufimi: idem illitum membrorum dolores collir. Inlupsr ex veterc hujulnoii oleo cum cca flava ungu^ntum conticicur quod leabict medctui. Vmt.

Ex arboni conice & fohis in arjuacomuni codlis cgrcaium ht collyriuiu. £ comce radicbtw detrado 6c in aceto rruccrato excradum paraturj quod ocpnalcom (anat, ii caput co fncctur. Vp chryma exarborc & frudtbus Ilillans, colliccia 2c exhibits, vonucum UX, alvum mova, aJ^oiiw humora vitiolo> liirlutti deorEumq, rchemcncr expurg.u.

C A P . V .

Ctrsfut Brtfihenfu MtfavUtk* itB* Pi Ion.

Air h*: Cerafum alritudinc aon (olim, fed Sc lien o, folis, fructuolque ^ zmuUcur, que li I longinquo confpidatur, iintllmu aoparct: olim lylycitra I nc in harm Infionorom colirur. Floret menlibus hvKmios, moxtj, fign frudut mhnnaflmcintBf.iicac ^itmRimudmc, fed figuri noimihl diffimik*. rruhmiafua&xtufidi imprdfiore*, 6c pediculi> brevionbiis, >, c>xnic non in-

quod pelltculi velhamur tenau, aalla priui coiorii. ratter duriorcm qucm continent h, p>ilct,cvpidlm cniu.i'fops inlt -r c^ Vun, grato, ideoque jb omnibus pjrtter tnj)IU lni Vun, Q'ia temperate cttl.ks eft hie lucaja, 3c nutnt . hibctur; turn inpm'n contra frigidof peOorh iffoftm, vdlbloi, vcl ili'it p *. guttur dcnv.j, & a'p;tam arteriam nui.* afictim maunwperc muLerc compc

CAP. VI

De Pruna.

Prunis Afuncx ongw mft videtur. N*ni Promts (ylvefrk in Afu, Judore Galeno, *r)* & vncarur. Vel :x Greco «F*« dicitur. quicvent occurm. apud Theophrastum, f) modocadem I* ut renltmle die oftendit j. Hauhinut, herrtttkhium illwi Nicaulri in Georgia *»'» • Wu*yfr VAUR, quod cum rfcww "re ar- fcor eucilli c larabri* tut* prodcant: ur errcnt, qui i MM©- granum fit **«« didum volunc, ita enin) •MiTTr- MalumGranarumdict; qiKxl njtuix rcpieritt; addc fic MUUKIAIV iuicdia re Analogic, nam non »«*««* (cii "«««*U fenbenaum crtct. Pruna Khodta &c Sicub Tocamuf

i. ?nmf*iv* C B, ZI)(\$IIMI ZltC.

Nooof eft Prurnn quam ut longa rerbomm fane deftnbi debeat. Mediocri> eft altkudtns * cnffina: F*it* Pomi \ inio nnnora, 6c pro magnitudine loogtora & aiwultiora] niRrvxa, gUbra. cremta. fUrti ut in JyUcftri candidi, majores, pencapoalL Caudci (atit htmui, craJli>, matnc . rubefccnte aliquintuluni, led™lcbre rurili circa mterna, pra-icrtm voufttorum, duti ms< ntili dmi (ura quini titocylenej quidam pulpa; fcnw tunica abhndca; magnitudinc, tiKuri, cot caUo lapore, mhn« propenradtmi »arianrei. C^ compreflum, mjRiu parte obfcmgum, denu fragile, nudeum lubanunun guftu conrinet Pnmi, audute Theophtatlo radice nkunoir tonga, on- mcfolj mtjifta « mofc & opu^

V? £4 f

iiwnini (mquk * J. Bod«M a Scapel) in&ati lunt genera, 6c inexplicabita d cultti Sc iludu> infereodj tvenrx, aim Nod N M*io & Amy^tUto inlcrantur, qux Uticm lutctim adopMink « mber^ ut ingniovc i'liniut QtUr* reipoftu jiiint alba, tririiiu, CCICJ, rubra, ntgra, caxrulea, ex cir:uK ita\$ \$*f'», aotia, dulcu, medti lapom, M^M«Mt Cnr nugna, mel i, longa, ivatj, aaiminata, pynftbtmia; {I**it*, mojlia, dura, mediocrtca; tn quibutdam am ncaor mHi jb oik abledck, & hxc in genere boniutt* nuca eft; in alls inimijior pemnjii :) aJKrrer Pmnortint drfTrentui c vans raribtu (jiu Vererikw, qui reccnitoribu* dcloiptas proponir J. Bauhutui prou confult Not bnore uncum Ipccho, qux nunc dj<um in pexapio honore Be pretto lunt becviter

Inprirtii* autem ingenue tatemur nobk nonJurn tonftare, an qux vulgo habentur Prinormn cio invra pccw i&Krant, an acctdenobtn tantum nonnullt a Urionc, 6ct*onccuni altluu (variant. Venfmute cquxiem »U«ur ditloiena. tut^e ad modum Pornorum 6c Pyroi. obtmeri, quod adu nunierolv ltnr, novjr), 6c ntaior^xa incognitr indm in lucem pnkant • quod- quo Schwenchfeldiui, actor fide dignut PmniJaih-la obtonn 6c ocrntlea ex Prumxuiit lentine nalcj jrftinvct. j. q-.ikm fLuhinut te opponem profalo, mquk, nobti hoc nunquam Inherit Sthwenchfeldiit). Onltderent Agrtucura- ftudwO, an ex IVuwvum Cercorum ieminc, hoc elr, a fpcae diliiuutj, poflit naiaalia ipedes, nenipe J'ri.niibUyU cccmJea; rjuAd bii non ut ve fi: At lummtu Vtr pro confello & tiidubiutoicmii, tjaaA nobt dubtiii fit Genum TKler., iijinm.ii; Pn.nj lure Ijicuc tiittincta die; in<'> contijjiii,iuex hoc experimctito u la. revera non ditrcrre Ipcdc, led actidenobta untum qutbuUani a laboneoto* «tra cauffem Ipcad btjtwiincni vnurc Venim nihil aifirmo, led rein curioitt detenntnandam •Bqoa

i. Pmru omrubm kaiht J Vctcnbui & RetentioninK cclebrau, funt Da/rufecna dicta, i Syria Djnialto cognoNiuuta; quanquam lulptcor non idem Pruni gem * cite qitoil apud va; in* A hocnumttic venk. Ruclui. <inJuni lignunt, dftin. • <tnbu«.'J. Bauhlnoi Ln,na in h>>«o Montbdkiidko Due tub** purpurea eft krtbw, TAUC rotunda, qtbw pulpa S> oatcok facie abiccdit, ex bre* pendunt, toruici qua<Um nebuU rclperta, tota concoloria, etiam a ihuc unnianira, val officala continencia, p*f*f*j, Imiilu otffciJtt Ceraiotr. j irfofidnb C>IKVJj |xoitatic tub nomine Prunorum Damalcenorum: quanquam Pa kinlonusPrw illa C>A not et G iubet. Et C. Bauhinu Dim ficca adferantur magni copul pro Damalceni iubet. Et C. Bauhinu Ikdkxio (Doncnje: qua* autem nuckum Ujnuki. u hn diftnguk & parvam non malum Cerulo majorem habent & a fca Ujnuki. u hn diftnguk & parva dulcia atro-virentia lfinflfllll. Caterum Prun; Danukena nlim Pjiiadii itatc, non quam hodie, ficcabantur in sole per crates loco ficcove difpofita. nim Dtoiooryiet ventrem fuffere dicat; Galenus tunc & in fubducere fcribit, quod omnium feculo- rum experientia confirmat.

1. Pruna Brcolentia ,t Bngnalcntu Pmn. = 11. fipon ad tLircdinem utnen

icepimus: oblonga crant liait Bcoffucubj qua: parra, duriilitm, nucleum continent!! modioi
ruin, gratum r.imcn.

EC i Brtgw'i Provincij; oppido, lo» fuo narali di&a {unt, noftri corrtipte TTMMIBM, Dama-
foenii olim omnium pnsftintiffinw Bmgnolcnlia hodie palmain praripuerunt boniiate, dlubnuie
Be [apidmtc, iniquum Advirlanorum auctores

; Ptanm MyrobaUiusdiA* J. B. Pr. frudu rotundo, mgro-purpureo diikt C.fl. * Facile ado-
leleic luce aibor, 8i m vaftam excreckit amputudinem, majoraqufl, clui umi liititnde in alios diyifi
pacatn adniouum Brxbent uenbram. Caudex multo tywrc & rrattonic oculbcomcc pdittu
eft qum rcliqua Prunokim genera; rctierion<r.inn, graciles animodum, werrimocomcc Teflian-
tur. Fitts qwKUmnoJo msdu inter Prunum 8c Ccralum, tuncib, per ambjtuni icrrata liint. Fin
iJ;a,tenuior qaim in vulgan. Frmiim, cuiusalterriiisaniis tiiractfEmuseft.rotundui.oblonRo
teimtgie peicnto intci folia pendem, adpftu jucunditi, par taitu viret, mantnuiem adcotus pur.
ptiri mgno tonniJLi nitct: camem lacculenuni ac [ulato grata m, 8c nucleum hon aonwdum
magnoni hibet.

Floret cum alia qiis RoicrL novo vcre; fubjulti hncm & Au^uRofruAui manariuwtn
tar. In Csrirci palani Jiorto crevit, undeprimum codelat* incrxutu.

Cur huic gciten Truni Myrobalani lit appdtatio datj, taterur fc nciuire Clufius: n.im, inquit, nec
fru&us iimilis dr, neq, officub, <lux reliquii Pruni genciibii* ii<nili.i habet, licet pai-va, aim isRiti-
moruni MviDIMbnorutnollicul^dvc nudci*, (JUC canaliculata Itint & Itruta, qmcquam comniue
hibL-nt, nudo natum eft ahud genui minors Fruftu 8c dulckm pulpa. wctera iimilk.

o: o gaudet & liumida Ccclo tejniiiore mchuiadolclcertputamr.qujmvH & fii^i
dmt poffit lullirK'i: Non tetnerc in nionnbus viU Pruntu, irnjut Win. LOCM (tlareohv 6t arnois,
Lttaminc, cajuca Prutu 8c vermikulota non pfrindctuii: autor Palli^ui, Gignun-
tur liclic in rrtititbit cogniti orbis regionibus, led potilltmum ubi terra lit lohtafic hortcnlw. Flo-
retit Prunum, cum Ccnw Aurili: ant etijm citni: ante Pircn: Floicsautera tblu antevcrfunt, Fru-
ftum direhmodc n.itui.uic, Julio, Augusto, 6L Septembri mcutibiu: etijue contumadsyxx Bru-
nm, J. H. Seruntur ofiIHU, aut Iblomixis leu viviradicibus. Repunc ciiini radiobm, &c tibindc (b-
boles eniittunt

tus cfailctus eft, fed reatriculum male afficit, alviimq, fbtit. Plinius Pmna (lonucho Vim,

iitiltlinu CIIJ (uibir, led brevi inonicito. Alii luea modiocmer boni cfic fiunt, faalc comunpt
8t cgcii, pa N(i (juukni Pmna ii pnonuua lunt & hurnila, tn ventriculo oomimpi
i^ncikum etameft

o: Sj i -in quo dulcion dum iicipiuoc i rtktiiofrariara
entnuilu ita-
iit-ocondificader-
vja, utmorisell
D; qui cali
lsfunt, vciunoilo tonvcnire,
8c vgris vel febnotantibuj permitti polU line ulio notunicnto putanr.

Pmuj omnia, etiam liccatj, alvum lolvunt, k& nu^is rctfentu ex foitcnuu Cilcni & omnium
fexi mddicorum; curit tamen expavanna nofra in umvedum non tontimut. De ptent mat^rit
8c molliibui, (uciojulct abundanubat id conceiinnib, iu>mfe aculu&i accibii, necdum plane roi-
tuns Pnorj qui.l.lbuinlint nr.iii i ^ corrupmount tomitii ^citiicuii 6i tiicui gipcumc;
quod & Qamaiccoa LK it, quod quivit JI fctplu uukcxperin inHeit, ii ca <jopiulw» tfe-
icrcv

iifL<ia pafia aquJ dococladonoc tuntecant, 6c piilpa eoruni tener* cv< < V J —
ap^i j menft lecundb infrantur. i
nt motlo parc^lum-i**

I, Pn:rj. fit Elediuvtim Dupninu i i Jonines cau^Lu & liccas Ico. | iat,
qtiiips cum iuniedandt 8L fefigcranili vi polle-tt

pri., 11, uva: proliint in vino decctda ta fubinde r< orf-
iicolluere prardpit Apollottou apud CiaUiwin.
Ex* cilti>, (• x:) ixrritraumit, ht apwi
noi Sjt. p irgam, <;;iin audaaili r. i t etuni Syrupo RtiU
Gu'mini Piunonim agglutnandi vr in \ u;u |
feoride, tJim& noc J. liauhino, nec vha preb<% Ex aumta la-
tut

**, fit aJ uuluortm manubcu dpc-
i, vel cum <ikv

& .tu, li natura owi h>bc< d
A. 1. Pnmw jilwfwnt Ger. Pat It. I It C. B. ^MC* <WMU Sthrod. **toit 7i<r .•

Aror frnitko& v Pruntittyk Icpibtu rocltlima, r*Jtu» wultiplka icputu te pmpagam, m
! tt.i, fc minatihiu lj unereo. Htrti juKc
Jjemilb profci i oj odoniii.

es IMHUI
led multii
,valin, <*qnumAod-
taiidcirt nu<

ficubm continents, Cerdi oflwulo par, aut piulu minus, led longim. In *nulem nucleum* majuJgu-
Jum conunen*. Radice niRra eft; Grpc in tuberei 8c nodo* media ra^lice Ic rebxat

Linn.

De loco non eft cur muita dicamus, quod paffim fere provemat, in lepibus, fyf vertnbus, lyivii, da-
mem, colliibu) & piano. Incommoda dt ad (cpa viv» ob nimiunt repurum: commodior mtdto
Spin* alba, verum lente crefcit Ad fepe* raorrua* Spinx alb* prxto; rur, quod duraWwr lie Horer.
A wilt Sc Mamo. feriu atuilvc pro Verts confituaonc Septanbn & O&ohri rndum naturat.

A. Prunus *hk>Orm* major J-B. Pruna *fjlvofria praxia* C a *tbk biatk* inb *tuhte*
Dullact-tert. frilla nigra & alba.

Hrc in horto* rrarorcmir, inque juftam Pruni magniwdinera excrefat, nec tam frequenobus fb-
fm horret, rVuduqiw eft duplo iriplove nujore, (uccufcentiore mmore, (uanore, quique aliqwnto
casiu maturat.

A. *Frimm fjlvjtjr**, *fn&w nkn ditrin*, & *ograto*,

Nec caudjcc, nec foliii, nee flnre a Pruno fylwftri majore noflrjtui Clir blarh Sull.Hf *tert*
dido duicf. Sola divci lius eft in (ructu, quern hoc genus obtinet (ubrocundum, rubrum, pd *line*
quodam arrukixntc, qut digirij taalc Jctergi i>otcO, obducibim, raignitmime pm djctx Pruni *tro-*
cVis, lapore acci bo & aimricante quique comciemcm icre llrangula.

Linn.

A D. D*U oblervau eft hzc arbor in Jcptbus lecut vum publium, uno minus milluri tram ^oP'
pidum Oielmsfordiam verfut Brantriam in EJJlexia Item prope *httkmf* vtcuni, ad vum qu>
inde CogefluUiam duor. Tandem ad dinudii mUlians diftinaam a Clara Sudblor optpdo itr
nere E.imruno, in(epik.s.

Prura lylvefrn *fnidb**. & deflorfecnie arbore unbrci candeerInt, mucatur in oblongum quod-
dam & inane corpu* quod Itali *Tmrcm* vocant C*f. C*«. At hoc non pccuJmc eft Pruno lylve-
ftri, w volunt C*t. Ac Omer. led aim eciam Prunn acaderc oblervarintUf, Debercur autem cut
dun inlcit'n, quod hue turn tenellum cornpungit, fit ova lua ibidero deponit.

Vern.

Prutu 1 *fvofria* *pr-tx*ecameni Ac adlhinf(cntcm vim obcinent. Ob tmtnenlim acabm<eni
<lcni.oni!i : m *li vel jaia coquiuntir*, »cl mne uAulentur: nonnuh Uition y *••• j ••• a m...*
«de6 ut edt poffiik. Melte condu not. unrum corodLdonibut noilum* proponcruia *fiunt*, led
dylencerias eoam & aJvi pronuviit Uborannbu* eirubenda. Ad *aAem* bur & decoet *um & vi-*
num ex hit fruaibus *confitwa*, quod ad Julum *tt* Auguftum ulq, menJes diligenter *adfcvare con-*
venti.

Aqua c flonbio deftilLtu & data, ad' larcrum dolorem tingulaii Ucit npenmenta Ea veru
efficauf f uent> Horn recente per noctexn vino fbrb & Optimo macerati in MB. licitillentur. *Trag-*

Adveni vini penduli vuia nihil effcaduv Prum> l>Kcitsilx» repenur. Piuna *antepam flavo*
ingucicir ootore leguntuf, & in nioruno tula, pt *o magnitudine vafa multa aut pauca vino imp-*
untur, *cumque* proSc vino afiutionecrebaux: *mixta fuerint*, obturatur vas per dies octo vel decem:
tum intra paucos *diebus* diet vinum rctutucur. On *prum polifit Pruna fyl. tula & in acre ficu n^*
alio per totum *ajrtuni conlcrvxn.*

Flores cwKiroci vi polient, undo ad airum fubdoOBWim in vino macerjn, atu in Sf rupo cre *ben*
infufionib *ut panto, exmbentur.*

Fructus <d ea vaieni ad qua; adftriAione opus eft. Cnnlule [i placet Matthiolum, q^u] toum *fi-*
vcftrij P^rW^rP^r.*^{nt}*' ****<nn:no Uculutt pnrtare luibit*, quo cum etiam conlcnt St/iwencM-
JM» At flora ei opee oporttik. Folia, rrudu*, oorrex refnferant,exliiJcxnt&L adJlriiaLnt w»^{***}
u&teonmin natnorrhagiananuni, inproHuviolari.uten.&c. frequem.

PruticUorum mpcUJ mtuil&tut Acaat luccedancuni hodje lubctur, qui rctcigrai, liccat,; *ringit*
non tecut ac Veter urn A u c u.

Germ»r»inob*lc» <c <k<ro Vinum PnincUorum parantj ex Prnnii (j.'vcftrious ma*im, td *gela*
frculi* in narmes toa», <c contutii m multum umtedik a/omir-oj lapota, quem a «ran» *con-*
tutit acquit, *hand impratum*, in fluxionibus & alvi profufvria *ub non admodum fufpectus fit calor*
aut feber, probatum. J. B.

H .jut Arbomfummi quod fpoote erludat in aceto Uunun *tt* illitum herpeut Luut. Videqu*
oeifeipionanai D. a~k, PhiJoto^h. I *ranick. N. 41.*

Caterum laint noArttet, qunum hodr deUotiora habentur Pmorum genera, fucc/ique
miciorek feneicijofe im>irJK tuuinMTu.j;., adeoquequibisnortoi luot & planuna pricrpw in*
nVDCredcbent qui Prunit lerend» At «*l^d» openun dint; Ctulofum uenexuin *ft antiorum*
httb

ttt rrb. blur, flrtD ambrr pjtmffttwaL Jlr omnia memorat *Parkinlonu.*

Ittr VioUt plum rrD, blur. anD dinb*r. Pr. violaceum.

The ni< trliWil. i. c. i *anum K>mp4rabi)e>*

The bWli anO grrrH JDanuffrw. Danuiccnunt niRrum 8c vmde. Ai U pajlunloou* afto''
Iccontleum.

The •^BJum. Prununi Maurooerfum a iocum dtdnm.

The Darbarp. human Btrbanaim, ex *Shoe* fitrbtrk.

The)J|Wob,ii,iir plum. Dutini eft ncnemni, <Jwm & rubnttn.

The Jlpntorh plum, piunum Armauaafcrmt

The *Chinamo*^ B f c Prunum Cmnaootncum

The great Mogul •*» Catop plum.

The white, red, and black pf.u plum. Pniojuia pynfannr-

Cfje grew <onrrlu plum.

Che OPufcle plui«; Horum tria genera rocnlct Pafkinfoniu, i. lugrum, 1, mbmtn,). al*

Stlr <C.tiitioia plum. Pruium Catuonicum.^

ZVt Inline MID Uliiff pninrltl. de quibus iuperius egimus.

Che Botuoa tiuRium.

*ZAc IDlirarni plum, i e. Tnticcum, quia circa mc(Es Trincci tempui numrefcit.

Etir Clutter plum. Prunus raccoia.-

Che <Diifcn motljtr plum; aitw Prunum Mofetudclinom, aliis Ceraiinum.

Cite O?arblf plum. Prunum iM-ugatum, marmorcum,

Ujc 'Uiiipcn.il plum. Prununi Imperiale.

Ctjf pf.uh plttm. Pninum Perfittito;.

Cfir prafcoo plum of rrural roLOUR^.

Satr plum. UtUf, nrlotD iino rrD. Prunum

<I?uniirg plum. Noca molchatj: armulum.

^lirfefli plum. Prunum Turciaim.

P:ime pium, laft npc.

!cliammas plum. IVunum Cjlerulanim Auefli.

c lytitrr Pfiii plum. Clir ijAinafons o? E.

r Orrporit mE> "B ii iirc art fjoob To: p:rrfrtbrig, lioc eft Prunum pvlifarme,

mini ten DcL'Oorli Bt ^Suliiltc dicta ore alits icianca liinc in Sacdiaro condica addVHM

Hit rercofflnia ac plura adhoc alu Prunorum genera recnla 6t broviter dcfctrbic Parkinibnus in Paradtjbj qux apud ipliint vule I. c

Prunu aniiuniiram varios ffudus exoaco* J. Bauhimu In Hitlot. Plant &c C Bauhinui in pinacc p. 444. mmitum •

1. PTMI* Cm£nna Uta. Ogrgb* arbor rru&u luteb Prunii firwli Pigafcta; in dclcr. Regni Congtani; qui Prunorum llavorum forma fruftus profert odore & fapoi c amoenos admodum. Ex hulj n a n ferie quadam conce'tis (epimenu efficiunt, ut apud nos ex Ipiaarum virgultL. Etiam ex UP m porticus& viruiriia exfruunt, ut a Sole tuti finr.

i. Prun>m Brijfilmung HivMrult Amer. Pruni fiu&u J. B. Arbor eft proccra, corttce craflb, craflbj elui Luui zratn, irbore retcncr detrado. Ltrixi] coloru argentei, lig-

ence, gtiliu rere iallo aut nix, qui recens oolorem la^c qux maceracooaut tn medweru inazmtLKinc, aurt o^ry/i co-

lon, nuclum mris & Is quibut 3c(0<Si> eii appeiims uuli-iraonbut fida J quiodcno quO4,aiuiu tHtduin prorerc At not

ne (ilrji in pretio apud Americanos quoGuaiacum, & nonnullis idem putatur, iv.,

quod tatnen non prohibet Thevetm. Am<icani eins dcaxiourunrur ai tLirandum morbim illis di-&um Piaut, qui non minus mlu> quant Lues Venerei his reKiontbiu. Lignum recens in aqua decoquunt por tici qujuorve horas, donec aqua vini rubelli oolorem acquirit- Dccodo quindccun aut vjgitr. (jutinuii utaitijr An tenm victu.

J. Htuno Jim cliincniis C.B. 1. e. Manykara H M. de quo infra.

4- Pruno finn: Be nutlco cinrea De qui noj inter frudut etoticos.

5. Prunu liiiulii obUmgii ljudiccuSi pulpiatba C. 1L de qui cuam IIIICI laictut exuticoi.

6-1 JX Guinea C. ft. 11 gjolyprmo* elt, tc proinde Po-

num n ..m.

- I Guaicntlf C.B. Inter rrudtsexot.

8. Pmn Emttiffnid i.. H. lircgn arbor foliuiMyrtij frudu Pruni cerei, offe

t niagnitudine, bnii

9. Prunus in una fpecie C B. Nucei infana, Belgii Prunula infana, putamine fufca, effulca m<mhrt>* mm mtads *li*

Erac lure mix prorfuiorbicularis formz: namquiambkus^fireapediculopsrlongitudjii om, liva per tranlve E)in medroei pjulo plus quim biurum uociafum crat, puumincoo taWedenlo, la-

itcti iimio confians, fons iuffulco 8c mm htn, mrcrna aurem lurte Inaduxi cotorts 5: U< orticulum tnenhi iitucantf contmens, niKffquadam pulpi tertum, pruno (ylrcftri nec fur mi, nec

:m, infima &. Iciliil parte, qux periolo rdpondebat albi macula das ampli quo nuJctu tmeratct cotoni, dunufculm latebat PIpta mix brevi filil q

it, quam maxima ex pane iijjiJreni, itadun> *Uftm Reninum limuJ c<niun-ctum nati intelligebam in arbore Cerei 1 nugiikudmeai jquante, cut folia eifent xxtga te angulli,

Mali Perfice follii noim, liffiititii.

Occafionem cur iftuis, nitix felix Prunula fatua feti tlnana Malt Pr upike*i vide a pud ulium Extr la 2. ta., 26. rtquoc fdlicet ca vorirunt, capita vemgine flt menctf alknatione

irrepti font, mirabjua bmgmarincci & phaaufntau habueruii pfo natuw aifuf^ temperimento; tmo c>anucrunt imagines Kcperca iinnt hxc pmna *i linum qucwUm (ui Africa ut puto) 11.

\ for. ab /Equators vavt* polum Ar^Ucuni.ubi Ortupitriccott> vela omfpueban 1 naimc,qui aiuneodi non jlwndabant, id animadrencotes, aorum excmplo idem facerc aniuo, ea lego-

come lenint

Hormanna in Ca:Joj?. il. Lqd. tubet Piumum Zeytuucam fpinoCuQ folinSt fiuchUa Atun-

da. Hu addo

10. *Valla-Tevgam* H. M. P. ;. T. 6u f 8;. *Convolvulus Indicus arborescens fructu Pruni a-malo.*

ConvolvuliB est arborefcere, humiis fa, fcpccnm orotflr pedes «km, tmUt tinui, candido, cortice furro obdudo, ramtitamen lanuginolB UK undtq, wHanm i-i.rtvvolvulorum innKwumpro- (erpcntibti donato. IUJtx roticiniata, • i.>icim8c LuSettenv • HJMHC iiucciJ, motw- ra, inltpida. f«/w decuffitim ramulu inrurrcnr, dcuU, pru; um profunde incita. dcin oblonRtWO tunda, acummau, fpmuKi undiq, vcitiu. »c *Pirm-Ttrtjnm* folii- limula sed me nora. »* ite tum magiutudine. mm figura Prunorum imtili, incu* Ac extta *Trrttm* 8c ft»w-(tr^i fructibus haud abimiles.

Ocfck tn JWM Niaiabar: per totum annum viret, fruduJque lot.

Folu ii!3em uibus inlerviunt quHus folia *Ttrt^sm* 3c *Firm-Tm^sm*. Succtn o radtee caprellis & afCumptut aln crucutui lenit; fimUir e foliM cum bdc duki cantuiti cvp c illis dyfenteriam cunt. JUd»ci« cortex cum CorUndn Icniuic in pulTercmradactusScexhibitut nilU, aiihsiuti, linn- bbiu, thoracis jlfedibu* medetur.

11. *Niasa Brasiliensis* Marcegrav. l. 3. t. 4. *Prunifera Brasiliensis fructu rotunde albescente.*
Mars -

Arbor dl ila, conks Rrytco, fiipenw in mukot rimot contonoi ten noJot»«panC», m ramff fuba nmuloi ikarium opperfitos, urt Sc tolu in nmti oppontt» «c unicum in eitrenuuK ' m- ironim in quoiibet duo ui tria pinafbbonun, 6c quaaun vel tepamam <bliunum> obton^, ve pemc liturjtff virilu, intere dilution; Ac nenro ac venaobliquu coolpicu* brevi pedicuJo inltJten- tit. *Friuhm* fert gtakiN lubrii nugnkadine, robinilum, albtccmem, brevi paitculu mknce- aitkuU [ullhij, c-ifno altu, bpora (iibanun. Intui ituem habet lapidem dunvSi nblonpim, fa- fk zntem. Muurus Uccidit, coitiptur &. oimeUitur.

II. *Iv+Umtm Bnfitmfu* KUcgT- JW» *Brasiliensis, frmil* \$\$\$, nmlt* Amygdala* (a- pra.

Arttor alt cortice fusco se tin « indc in rjirm fpinnfk. A/M fert oblonga, Utte vindia, *brasilica-* la, id taAum mollu, nerro lecondum longitudinem & aliqunt venuobliquu, plorunq, rarorlum *** cHrucis: trt fonionbut rarmil» qutbulHam foikanc tibb oppoliu, in aJuJtictbu* Sc, picril., liiti alccrn- njtim potiu, duo »ol tru juxta Ic, brovt pediatlo innkouu. Ail pdiculo* (btioruin ndauinir *fa- f**, minimi, vel Wkafii, vel duo auc tret pina Ic pontt, qutnq, tlib conlb

Hot lequttur (*mHmi*, pruni nofratB (Uvi nu^niudinc & rtRura, Ham* quoque, cuticula & carne ut Pfunorn, lapom boni, lubaciduicuU, fe ait a.lmutus lapor Amrgdalaruni amararui. Intu conuict la idem *tmrl* b*j_r Lami, durum, led nan ki cralium, 6: q; a facile denticibus frangitur: continem nuchmn *Avellane* medocora figura & magnitudine, substantia | & sapore linulou Ainvj- dala dulcior.

Fructus est adulu; nurarm Januano fie Febi uario sponte *idc* & colligitur.

Dantr & aiu Ipcoet t/«4« cujut radices aquam pnbent ad biocndam, a Pfoa itdeicnfh,

II. IMw Pifoa *Pmtfirs Brsfilatfit frwB** wupt, r*J*tiimi *tabrofa*.

E l»nf{tqio (inqutt) profpicienti, nugnirudinc, ftruaura, & frufta, pwraOms*cI U'«?« la ridetur. Trunco dt breuiore, nec atSo, led ramn mubi tortuolb, tmbcllc qtudem fabrK -is divi- <J«Lr. *FtiU* fort baud nugna, Ixria, Utque nrentu, guftu autctn acida Ac adfinngenoa: /**** albhcantem; *frmiimm* ex aJbo Havelwcntctu, Pruno irujon tinuleni, led came duriore, Ucet pauf* quod tntu> narnum contincat lapdem^ Ikut fruchii *Atmt*, qui ubi maturucnc menfibu* P****, upom lit *ymm*.i. c% aodo dulut: tin minut, adco eft ouftenat, tu (laporem denticibus mterat, prouid^qM tune ctdem nfti cui tola, tubest «d rdngerandua & a flectadfringe .-vatur- ** *Jtx* autem cut peculun quid or* ccerii arbomm radcJbw concede quoJ *longt* lanque bl dkerfi Ac cralb, ponderoLrniol»iuboralub«rraluxunct, it pondiai, hy ram atque coiontm, extenu* dmremn, oondtret. nMlon» radice» Bi: 17* <itn> &

quibte tamen abUd M pcUcuW. d^erantt quippe inrcrn* coalncmnr im-ci w>W«, mall medulU, Guawtex daac tinilb, qua: maoduou ui *tfiutXm* fiiRiduni lucoim, COM paiato graofimum Iblntur. Febnoiantet, xdtiaMO, perefrinatocei ;(e qoam piutie* tm expema; neque aquat dulcedu

C*r. VII

De N/rddmt. *Myrobalaues.*

MYrobalaues Arabum inventum esse putatur, à quibus ad Græcos recentiora, ut Acharium, epi cognito derivata videntur. Ex sententia Arabum, ut ostendit J. Babinus, quatuor distinxerat carulem genera sunt: posteri vero Chelbas & Citrinus differentes fecerunt: quales tamen vix essentialiter differre (libum

(filrem ut in Offit hoc natmne habencur) quis cxiJKriuwnt, qui «* mwr je ewtt.- amtlucrif. Hums MOMBtte lunt Monachi ,n Mdaem, qui ChebuLu & Cfcinat vc;i(ii,uc ex una & cadom aifcore efle alfirnunt, Citnyis immutitras, Chebular veronuturas: Joubertus Cordta ti D l'eiu & Lob. in Atv. aliiqut Quitms ic oppon* Garetw, bqwcns, Fallumur um ii qu. onrnu Myrobal. Renera m «dem arbore tufa putant, quim qui Hav* & Chebuk unmm, Nwi, «, Z iunc diverfi arborum genera, bq«dd m.igh mirera, in region:JUi 60 aut 100 leutts inter ic rfi ftamibus luffTM;i' i 11 ;w f ^ facile 111, ilhmor, 1 i veritas ar ^ d f c il arum productrices ; de Citrins & Chebu

Balioua myrcpilla Gixcorum Vcterum ab I m djvcrfa videtur

Offiaab quuiq, lubentur MyrobalAnormn fpecies, qi« hoc difflitlio comprchaiduntur.

MyrebaUngrum fttett ffmt ^utrt^ut bonstrum C,mm, CW«/w, BeUtrum, Emitiau, J»J*.,

Ceterum M neris. Emblice

enim, (altem in methodo noftra, ad Mvx* live Scbdlcn acn ,ix.itmenc

Myrobabni d rdjquii Pruim Jiffimnt coftis aliqt Jajluilim imitu^Ln Si & oft culis maionbusciallionbufque mwl-ti minoribus.

1. Mn**U**< lnJU* Part Ger. Mjr<i*Um JmLt, wxrt /<r ««/«« J. R IM iarts \J* Cx

.7- »»

dimidio minores flint dtimis Uve BcHertci*, Rraalwro, net > t ,Ux vci.ruol.v, rugol piccx niRrCiUnis, iutillajm.i ubi ftanpifimr U.ca umc en Hypocistidi, MU uotij B.tunimi, modomcnw lapo.c plus eit Salca timilites, fru. ' oifaBo)w.) H» a.lmU iavolalotur»Il. m Officus iUx anguUc nuff" ^ paulo niafors, niicEo donate qua an c^dem turn Indis

.tu.n Uko nuclcum imra fo nutlum habere laibK, quod immacuniicft 6c adJiucado-fecitm, od quodiim evitacw iccutumm ntwleum excepwrz ruditnentura: uuo.1 ?eiumeU, NuUci eium mdimennun m» ctian, ,n nonaulli Mtrtrimn, 6c qnira iaak (K pocft.

2. Myrobalanus citrina Park. Ger. A^r^«» «;r,« j. B. tortu, citrini, hilem pargan ta C. B.

Citrinx, à colore flavescente, qui tum in superficie, tum in substantia penitiorè conspicitur dicta, ex rotundo oblonge sunt aut turbinatz, nuda Myrtica magnitudine, aut majores, rugolè, protra ore Itbmdc apophyh floai irfcori btt videntur .ullufiil- n ecnon quim, coftis, quas lepe ^<km altt imortfedunt, per Jongum decurrenibus. Cuticul* cucnor. itatim I, best nulfiratus calyx, trag.lu, gummolus, (apore mixw atwbo cum obturo tiuclani colore & acon :: W u r do- indi puuiien infigniter oaffom, coftii donatum, per tocan. fublUntum veluti f. .aiaiiwIenauT finbtaibspci'puli ii^ concreu q ^ n , nxllijpoe plcn.s, nuJcum daudciu longum, u u p u S pchhaiU teelum, .liivitn. minusacarixim, olcaninoliml »r-t-***.

A l b w ? obt toto cilo dicitur. Expendat' «*» (inqim J. Bauhuiui; an forte a Chebub diffie-

3. Myrobalanus Chebala Park. Ger. ptutam fmrgmMti CB

J. B. My-

On iimile*. nujores m., ilque tur l> i u j c f u n t i d i q u i a l i , , l i t e r c o f t a s e l e v a t e , r u g o l e , c o - l o r e o b b n w , & a d f u b , c u m i n c l i . a n t e , p e n H i u * e x r u f f r n g n e a n ^ , (a i < r e a d i i r c a l i o v e . O M p u t a m e n & b e f t a n ^ l , l u m > u v e r n o l u m u t C i u i n a r a a i V i w d c i u m c o n t i n e n s m .

I ArbomfoluPeriicxfimUciredicuntur. Parldnfonuioffiaailaminhje fpcac minu* cfl; fenbit in prxcaicmc, nuclcum cuam mmorem intas ennnnerc: unde eadem o:m iJla OkSmoi. tell (ucm dti opinantur), matumtiS, N H i f e r e n s . N o m l S o n d u m c o f t i t u r , & n o n i f , a c s ^ c s s u ^ r s i l l i

4. Myrobalanus Emblica Park. Ger. Myrobalani Emblica in segmenta molliora habentis, angu- lise J. B. Myrobalani Emblica C. B.

In epa ca sunt, pulvinato calyce omnium copiosissimo, nigro, sed non mado, more carnis etiam in penitiorè substantia pro costarum ois commissuris sponte deliscente, carna fragmenta adferri solent; sapore Indarum acido, parum acerbo. Os leve, ut putamina Citrinarum & Che- Piracea vel Pomacea, spadicea, triangulari, spcnetque in partes fasticis. fructu minimo nascuntur. Hanc crebro integrari cum nucleis servavimus. J. B. & Parkinsio- nus crebro ad nos adferri conditas scri- b C 40110 dOM£, toaium * m;rt gwun-jnc, Bt quu ab omtubw Boatuclui Myratulanu i i i n u r p ^ non pertinet; verum ob non separandum dixi. 5. Myrobalanus

5. MyrtkUmt Mtrtd Park. Ger. Myrbalan B*tr><* ntw*Jmrti J. 0 Myrbalan rana

J-B. ca

our airera oarto (cifile)i
v>jr, nui
no, this fernigineo colot*, beet peniuo:
umen angulium, brt*w» & rotund**, t
Chebuk: cavtatem autem poffida Ion,
plerunvL nurctdus.

k folt* Urn in ^ tubaneooat
iterant, fccant & affi ingum. uc\
pcrea ultu eft iptamm in alfertibui i
; JI», ant morbu ingkti*, in deHuvio capillonim. in
7qoo<tjmen iicntK'ant) in vintnculi, heparKj omnii.m mim »''•<'> i
A Mcluc contmandantur, ut dicat corpus HondumSe juvenile Ierrare, e\Nl.li are, co>
rem wis & ludodscommen'iarc. bunt mini c numeropufgamium. Purgint autem Chctxtlz, Bd-
lencz & tmNier piruwam: Cienna: bilem Aavam; Iruut an jm.

*culjni icoriimfi: in fubftantu exhibicx Cqui modiii eihibondi cum purRare volum
non ell in ulu i minimum purgant, (cd vchementillinc aflnngunt, & hoc cumaf[u quo K
venlantur, ut Melue, vel longiut decoquunrur, ut Melchms in Dilpenlanxxx

Joilretiafi . quoroodo qukbm in Dykmerudant, lit Sc KhaaarWnimJ exigi!
viUdt adlhingunt [imo all:inj;unt tan:•tin . H 'm. J II... gmpltut fat
purgant ic oarctin aUmnji>nc quam in deooda Tamcn, ut Garcias Jenb
Qconcuex<incuni ifi IWGDAO fen tn doii nmoo otunt rw^ CXJQJQKX ffitjtn n^>*

I(xentci)
uVa lilht, he contra languuix. ChcbuUc eoani
liw.vcni mam, appcKnciAnnnvuntjOkbonem promo

pmrtciu rqtccam tcM*, uaiunt, &c
Tn
>S quam eihibendi non (in a obnoia ComRuur hoc in
adntixnapcncntStuf acibut & diureti. inaoiocatx 1. Acrinionii
on dckxmUnfi led ninu'i nrde operentnr. ;. Qpod corrugc
cuii & i)!t;it!non:m: qux <luo incomnioda corrtgunnir per pinguu, munge
oico AmrRiiiUrum dtitutim vel bunri dum jercruntur Sc comminuuntur,
,u aut Curium hthilam. Ii e J. B.

C
netuf ntilh*. DuUtat
ubAanna nnninte ptiif^int, Media in non dan: nifi cum aliis, » R. in EJe<». Ele-
il amech Tryphera Perfica, ecc. idq, peopttfo* m reninbm •
Pp icorti (utnuique euidem vult die rjooncui
,u nunquam aJcndciu, contennu Jil ad jnl.

6. Myth*U*t fatm Ranvttf) j. jl.

Ilie : uctus M: roKabni qundam fpeaem prx (e ferre ndaur, & Rauvroliut qut njiit qt>f3*>n
cenlere Mpohahni Ipeocm die kaptit; lib arborem Tidae non iKullie, i epci ui amen in P™*''
thru. MapiKudine&iomu Olivam Hii inicam xquat, aut glandtm Quemam IWR nam, colom
bmmii, *erruci» ram atpomot, alioqui la-vn, nonmhtt canuLtn», fpim drculanbui pracuUtui; 5°*
> cull TeAiftum, i in Da. tylt* oflendu. l^tCili hii.
tionc> Upote antartcanic, rffi ., pero & camilato = ilu-tcut. Nuclei
-c tn Myiub. Bellwiui, utrimq, turbinate, canaliculata, Amygdalina ni-
clei co- iiiUcnru, [nnguM,cotorii mdtm oWcuii, peluail*i

7. Atynkst-m fsvm ftml C R Hiba fca Hrcu India Prtm fmm\ B.

Arbor ...
br> (abbnccte apud Indot convnendatifSma manmcc
6 a domivdtibui caput nonquam Rrarait iunt }otu einxxIKX Fruc
k IJmikrn rorma, uaiftuibnc & IJ>HC, pauca carne, grandwee bgi.
ria* it iico NfluVm, ut plerk), eundeni etleconrendant.]

jrk OKUnmlv & oocoe odnrau ft aqua ad ayra roboranda, 6c fucandMi
•nnuii tonlttnjpt & dcnlat, in queni uluni etum balnea hunt ex CJ ianeni
JnnJneoumu Waqudouoat, -pouapta.
l«uau» tibbm aft, & laula difcftiani*, (^ dcotibta moleftui Ac nouu cU hUj-

8. *Frm3mt MnctaUm* * >gr* cfxnU fimtl* mtln fahfufa C t t FT. I o. sap, j j. fo, te £,,,. CM
*Myrobalanifrt** ifuuh now VMUH Jijfimitlu frail tu cxel tort J. B.

Myrobalani nigra officulo non vaUe diffimilis erst, major ramcn, iiarqualis. fuo «ternoeor-
 tice (iicqm habuic) aut pulpa denudatus, & Jimtaxar fut fibi pcrfuaticlj.it Clufius) iraad s alicujut
 ofltculyin, quod confra&um (at&crallo puumine pra'duum die obicrv abac, &. nudetun continere
 fubfufomi, atque in binas pane diviium.

9. *Fruit** MjTiktMi* < \$c*Ufimitlu, nitr tctrbm C B. Fr.mmv 10. etf. 13. / .1. £x<r. CluC
M i l i j j i f u l o f i m l i t a n g w o f m), B.

Officulo Myrobalani nen, magnitudine, ncq, ctiam fbnni difpar crat, cum (uo officulo ab una
 ptrte hexagono aut hepugono, ncrvw obUqt- per univerfum dilpcrii. b auteni nigra cute veriut
 quam pulpi tc<ius crat, acidi fjpois: Officulum autcm duro puuinine a>tift.ibui, in quo nudcus <
 rubro hilveicens, non infipidi guftiis, led Amygdalun dul^m vaufUm refcrenrii,

10. *MjTokaUnt fani frudm Imiiej. B.*

J.B.

Extima facie ad Myrobalanum quodammodo accedere vidcbatiir. Magmtudinc eft pxne Nur-
 risJiiRlaridis hgura tmali MyrobaUnus Bellenci, iur Ficus, autP)*runi, ledpaulu *rtataodor*, an-
 culotus, cobrc cs pullo rufctence, ca pwte quaadiarftt in turbinitam apoph)iin ext<nu*tu<;, Pon-
 dus love (arts, fublantia ComoG fare, colon; cinerco, nullo Jajx>rc niaiulcilo prxdua. *Quid m* qm
 vilicribus laterct nefcivit}. Eauhinm.

11. *Mjroidlani urtniu Artie* did**. An PtlhHtcujufJaMMjrtyaltwftTtfrullmi

Lmfcbot.

In iniula S. Marix proveniunt pdcherrime Myrobalam, quas Aretca vocant. OWcure rubent,
 & lapidcm continent inligncm. Guitau luiguan \$c fauces adurunt in tnodum Pipcrts. *Arte* tft*
z a m e a n u a e [r o n j a a n a] p r e c i t .

11. *MjrshlMt (Hrwjt tiufua mtdefimtl* fruiim tavm J. B.*

y.ft.

AIKJUA hute fmdui (innlitutio crat aim MyrobJjno utrtna. UncLiin tanrum longcu, Parvi l'ri
 motto t'ormui UJ, parte una **Utiore**, alter* Anguliorc In eo coftx nutabiles (ex, incerpofitis aim
 minonbus, ina-quaiibus: aciculi pciforurimuj, cam* rcpertuj eft. Color fordidus cum virort
 Apuci C. Bjuhiituni vidit.

C A P . V I I I .

De Ziypt.

Ziznti m percRiru die videtur. Zil.yplii autem notx quibus a rdjqu» oonoenenbut di-
 (linguirur (not fblu trincrvia^ flores herbacci vel luteofi, fruAiu Oltvana, leu nonnihl
 turbuuti.

11. *Zixjfhft fiv* Jnnismtjtr* Park. Zkjfh* fmrot & fjlvtfi. h R Jtqufa oujerti fi!<Mgji
 C B. 7.<;<w Artimmftvt Ztz?pbm DoJmuei Ger. tftt t j 11 b ttfC.

(^ zia Offidntz notas Jujubas fart, aibor eft domctici, id in fruticetn fpinofum Eialc dege-
 ncratiz, telle Cxtalp. alioqui iatis nugn.l, dipt.* redo, in rimot pture> bradiuto, quibus in ccnui-
 bus furculu i;iuti pedkuh* alternatini adnatLuncur *folia*, uncum aut IcLuncum lonu, femandam
 «tt aoctani fereckta, in obtufum mucroncm dcfincmu, iplcndidovLorc uidJa, mba (ccundum
 longitudinem d^currentiiMu ncrru, per ambicum Iccraca ; ad quorum or tum rjmi i;)iu> 1101 rent,
 aliU jtdundm brcrioribut, altb red» lotiRhtriixu (Ted cxi in fenelct aculeis caret, inquit GcblpJ 00-
 dtmq, loti ^rr, i plunj fere limul exeunt, pedicubibr affimis ut fere fetiles vi.;;ancur, Ribes» Bo-
 nbuspolti-... hcrbate*), apiuili* conoolanbus. Ho lice frail.« cxapium, fonni & mag-
 luniduie <... nno craffioroi, per nwunutm rubente*. rcl. ut tit Ctlalp. ex pt&ido m-
 greleccntet. (juili lumo uitecli, pelikuli ajfliufciiiJ, pulpam lubalbitUm, moUcm, hirtgolim, m-
 lex dulcedims contcgente, tui immenntur oi&culum 0 longum uru. I, acutum, ruggfum, m quo
 nedeus compreflui, Lenm «u(oi« mltr, rufi pc icalli tactus, i «>HC anuro.

Gaudet urlo & *Uth* calidiore, auc cene tcmpei. in Hispania, J:ali* & Gallic Narlxtneniii
 hortu«>litur. Clulius (uibit nunquam (ponte nalcctent*^ ic nlam. Foae nutlibi temnitn lu*
 jube mapre* *btix* (ponte nalcumur: Sj-Wcftre* noi in Italia (ponte*ncn vidimus. E ivlruftribz
 vero i... ine, inlitione & culm Utivw inia... tacta exiltimant. Sj ivefh a \ Montpeliu frequen-
 occurrere i... it: Acnobis urca Monpeliium tv... m obfervatz funt; nos, D.Magnol m ii...
 carum meminit. In ruiMbuifit divb nuriniu prop* Tropum Olabru utboculani Jpont
 pofit creta met ridirmth

Tempus.

Florent Maio Scjunio: fructus leguntur Autumno vel post, una cum jrculu, & in nunipuiw colitRMtpoft aliquot dt: rum infol Irionem laqueantxrt fuppen* untur: Pofc Ircmo decerpti in capfuas reponumur ad media* ufus. Sunt qui decerptt Zaypha, 8c cratibus t -getibukl, tnfrata undi Want quoulque rugoti ibidem fiant.

No* Vencaii rocente* apud Mdopobs abunde venalet vidimus, quamTi* palato noftro not) n turn arndcanc.

An UXK arbor Vctenbts Gnrcw cogntta merit ambigmir. Vtdc apnd J. Bnuhtntim concertanona dc nonumbuk Inclirut 0" jophr. fubLoro, fttPlinum fbbotibi Loco dc Loco Athouri locuio*, *c Ij*at\ Ather

S<ic>Galeno(qa* pfarm,Jo\MM) puitantj »tx qutapum ad lam m pemnenr aittnw- borum proft(t<ioncm- Mulicram enini

Ficus.

^ oonooc)Q difficile ' i rccentiofU.' Gr., vocitz idr lunt & hunihir, hlcoque f<brum ard, inn acrdmem fedant: adpedomfle pulnrns riria coiu

nr jfoctritcm, fpinndi dijfi^ltarem; necnon ad rem:m & velicx vitn, urin.T ,irdotrni, &< i I • ;bin:im in I^itmonum viniv nun a CJIKU utintm c<itii, (cd 6c 4 frijnda or-

ieodnm putat; C<II<M Macthiojum Sc altra, qui ut (olis d iltnonum cali.lt* io; enm rtm dulcn?c nxxierati- calidx. Ratio & nperiemia d: man 1 bere vim contempcravit ulult.4 8c acre* humotes.

S. Zix.Tfbm fkf J*j*fa mmer Park. JMIMI* mmmi ntw*J* C B.

Jutobr nwnor<, Plimo Tnber< jppelbta* < (enremia Cordi, coJore, nicore, came, moth len- tore, Ctpore &: nudco majoro imiMiitur, in camen muiora (tint, nec oblongr ftd rotundr^ atque lunillrer (Utodjr.

Ailciuntur hx quoq, ex Italia.

V ZAjfhm.Jlvt.JtiahfjlvrfniPuV. Za,jftsftvtf.). R, JwjmiAfylyvtjlrMC&

r

Fruwi PahBro fi miln eft-, nan (bKim falin, ftd rJ mis & fpinis, quatuor aut quinque cubitos altus, cuti>rami Te terra m Mr erus onntorquenr ad rormam femicirculi, fpinis abundantes crassioribus & fimiliter acuta, bu II* Jrmin illtpoftiv. WM dj\wli' a fiant ut in Sorbo. Pradus fimiles Jujuba do- mesticis, nisi quod: nmlto minorej, 8c timiliorcs OxTcedn 1 t I auri fructibus. qui ubi maturaverit roberit, 8c clui apri hunt: non urnen nudoqm atTc'i, ideoq, rqrurunur. QJitbufdam in ioca fru- Awht in rin am emittuntur ut fuavius reddantur.

Len.

Reperitur in apw Vaunenlibut retceriirc l'uuiu: Not (ui disimuO <> CaLibna prope Tro- punt oblenranmos.

Ficu.

R. Ziaz. It. Maccrentur in (p. vini donee raide nugunt: Accipe 1 Jit t| mane & km. Mir. in en ru incft prxterrandi 1 tuflL Hartman.

4. Onoplia spinola & mm fpwfm Gar. emac. a (C. B. Nakea f. in Rhama vel Jofuke). B. Ono- plia spinola * & mm ..?<*/*, Aw /fcfM>w ZatT?*- *&* Park.

Arbor eft fimpit Ifctlui) Pm mtfdiociu alncudine, [Loci rugnitu.iine Al(>ino; vidii Vc lingua Cayri Aegypti trunco tam enorm", nt h>:; quamv-s p:ocerus cam aniplexu unifeic non pollet] cibus caudicern & uitKa cqcpc cortex exaJbtodus ad doenocan tencin>. M* Pauun /An/ le. aut Zayphi rutilr feiomr ula, [twriii tigorf Vdliirtg} binai uncu> J<iri Ri unam lara, i (iiorum petmlo n<vi tm crassificuli in tntjm lon^mdincm porriKunnir H< m •••, i mcj unam utruq; propagines minores habentur, reliqui duo externo pocium i iore, lupc iUpiL... fatura viriditate nicensia inferne ttd Cioorj. nam aliquantulum tend-^tia, qux ramot altetm inoni>natc am<itunt

[Denfitas foli 1 f t\ nofttate Pkfomin*x eft. ^f^t 3 Flavida ac ' fnboun eionuni uot' fi nalcuntur, ex virore quc 1 Um ahK JIKO, Halo lortim I lora mltar [Jujuba floribus plan- - Itmtln Alpis] pecu- liaribus longis petiolis i iiguli lutctex. h. vltis succoat pccum exiguam [hyveft c] I lora habitudine quam exactissime re :cicm]>K pmaitein alrenim quis fimpit rn ttiC) , paratq; per oculos tuos Mo- lytilum Aromam t- conf^icere, (oto nuclen quem N**<J wwinet Kenietkn b

nitidine iuparantem Leral i, interdiifn tamen Nfu i 11 ctiam Nakea po l>> vidi ntjforj, quatqve de>>*mi mbore purpurakarit. r,] furva g 1 i cum i.me grao, oflteukmi in Ic c aptinens Olivz mltar. Mit:i ai;t;ni tit; nain 01

novo vere & Autumno fingulis annis f. iAon protort. VcmaJti tanien pterunquc ad fn:(pmi 000 per* en it ob imbntnn c<> 1 m, fed a renmbus comimpictir,

Onoplia spinola del' jiu> ipinu J non fpinola mttime difct; nam rebqua faae* utriqn* fi- nlla.

In i m t o fbfaa per tomm annum rrttna. Mfm. at in Creu, oWavame Bclb, pa bynema

Ficu.

*n = it. * Fructus ante maturitat ;m ifhtngunt, unde carunt tfat frequent (ft ad (omac(D ah lique relaxa- tionem homandam, succo *el per ^H fumpto, TO con Oyrtenb, 1 mfctt ' Qu i" p"1*~i febrt xg'v ea imhdge m, btandtntci trum fanc certam a ffruiux, cmotumar am mltos, inquit Veitlingia.

Succo pefecte n •MM, m optin... •• <J purjindam bikm e temr>>'!'^ >/•<< uChn, prxapneque niaroh { tamen j arum nutrant, facta ut

Ceraia in Rhomacho obrumpitur, i corem dm immnderai* iniklfrwiji Ap<d pno>*no> i

Egyptis & Turcais. • & nugiwt n

• & nugiwt n

• & nugiwt n

• & nugiwt n

AlpinusOmnaruni A therm effe esifititat Inrtcarborcii, cui con lent it Clu... Verum nota non cofwemiint. Vellingio puce, que in JEgyptusarbora... Coccyzales scriptis Theophrastus, & prarupuc qwwi tru&um lcr.it magnitudine & nacui Melpili* proiimu... non coacte ;(U; deduci pollimt. Plinius »utem lunc Prujium aigypnain vocac An lit Lotui Polybii apud Adic-turum inquirant quibus animus 6c otium est.

V j. P(r<r>)>jyWA/Mj*j>*fWK«CBauliiniH.M P. 4 r.41. ;.8j. H.A/.

Arbor est proccra, caudice craflbj andidi^ liHmfo, furvo intuit, rubicundo comec emcto, necnon ram nits, prunum viridibus& lantigtanoi., dan rubicund it Ion ge LteainorbcmdilKilu, doiuto, <juil ail rbUorom exortum acini* & rigid;* Ipiiii inluper muniti limt. R*j:\ tiln.iu, alWaiu, conks te&.i jwpurco, intus furvo, inodora, iniipida. Wu p-anlib iwundts atterrutim urea ramtlos juxra fl>in:is ptoveniuiit, obloneo- rotunda, cralla, denfaj (upernc aero-y if id u, 5c ijilcndcmu, inforni iub- nridhec LimiRinofa: odor 6t ipor (ylvctfus. FUFculi plure* 1. orum ctori area ramulos prmcniunt, quina wrctibus candidts, c viruli ; 01 bem c>panli> toliolii • conftantcs. Foliola hax imeredunc tocidcm albicuula, Hat AuAft*m>iu!,i, me- dium occupanw vindi ac bifido ffito; odor gravii & fawlui Fntlm turn rot-mi, turn r; lagnitD- dinc Olms hind ii id miles, at exigui acutiqe Ipina Jovwdpsdotiti, pnnuun iu- tiit KM cs tick] rubtundi^ limili; quoquo Ut Qliv3 olitculoni contitwuic^ »n. It* mtus aJUCintj ; lapor acidiu 1 tail IB CC gri tw^

Crclut loebarenojis circa VaUtrn. Quotanms b> fm&um prodiat, Martin viz & Sepremu MIKU. £.,,, (ibut, uqot .1 10, Eackini anno ad 1 OJ. nun raro t'rujilei'a nutmt.

tui maiuri ab [ndigems tomedumur, niuiti^ m.iruri vco laic 8i acctoin AtijMmr condunttir. Kntt Arbc>fis tuli.i Liliupantur ad gannm qualcunq, fncanda*^: polictidas.

Efolii' in Luic dulci cochi pono paratur, qus GonorrW* virulenta; medcrur: t'pfa vco folia ooAa umbilicocat.1pl4m.1ftt in tnodm impofta dyfuria/n & llrangunam totUmt.

Cortius exprofila liicciis aptnhanim tur icmedium.

Succose radicecxpiellui, atque cum Ridm fcfBine Si ladis fero exhibitiss pot enter vcnirem fuh- ducir, vktololq, humores cspur(aL Eradicii p< If ere turn Ory/a iartva fie bucyro CaupUlimni, (jurnl fronti idnKHlin iclirlain OOOQpck & lomtium provouc lv lu^ILcin S;Unn UIM c*xl* Ballanium conlii;(t<r, q'j'fhi niemb<i> dolentbw* illiturn, arthntici.

HaiK.trbticiin pi'ojii'.i.i In iica C. H. lubet D.ConmicLirua., 1 nto;n- tDentatus dV. i it revera delicti, bene convenit. Mirm tam< n in bifiora lupis arbors nullam Lacca ab Autohbui 1 u nionem factam. Jube n'i iJliui htiloiuni C. B. P. MC & Anfti lub- itts, ut Luvti>[i intoti llll in de .uimlerre.

r ySijii>ii Inim C B item Mjlt MjtKcfti/i n/mnibi' ffitatf c\\\\im p. 4;;. iff Wuafriuji jf<. Magtu est ajltis> juu>Afko & WlorbLufpmi;BtrSc BopiofijF.dana. f>(<« minu* roruuU (iut Klili (oliii, utncdI oa i-inulcruur, litpync latu<ate virent, inferaicaiMbcwtfle pubelcuro ut Silvue folia, gutlu aoitr muentc Flwt* cv^ui, candidi, qiiuique foliiciti conUntcs, uioii *; i: Fn8*i ju)u- bis Intuits, J'II alii* mj^ici fie luavtrci, nuuijium veto tani probe nuoiretcentcs, ut conlct'ari iluc- tat Si in fltui 1 CRII juiulu.', & perpetuo iiomuhil adlhianxiu rcuwnut: mule uAlx-

P gmtr tnuvunc | -, (jiunudnKxli 1*, Confpsi.iui lire arU>. . onuJla, ^u^ i I U>> rant: llocquamvij , 4 mulni ttmen 1 caturi&Lacca poctui Uchrj'marum t ,m fttmini n-odo I; • larc & conccfedet pueatiir.

Repcunir luctibor in Malacca, MaLibir, TVdaguatc, Sumatra aliiqque India; pro*u L*rm. Jujuba IniUca C. B. huic proculdubio eadent cfl, ium& dekripoo & numen Incbonai iW<i OOO> vunmm.

ii (inquit) liujus fubrotunth ot vulg.ws Jujuba- venol.; ,Um tata, diuilonga, nui'^inctn crenisc^alperata, pane aver(amoli, rutelccmc lanuginf tuti Itoix nomiu tlem tamuloj cm Liccaadnata <rat. ExIndia D.Tcrenuu tnilit.

Dt Lsu*.

Lacca gummi, ut in Officinis Kabetur, concretionc bacillis pertusior circum nata adlu-teli.it, fupcriore rugula, iniquali & velut granulata, pellacida? colore rufo, flavo, aut ex tubtD ntgn- c-v>Ct, !• no cavernola, nictio ,juy ujjy, rhabis libitantur in antro continens, lapoe iuilltcevi- dento: Ipatum colore rubrodngit, qua longi apparet floridior fi cum aqua mifceatur. Prui>ni>- pofita bollat primo, l; vcm rvixem 1 tinotum Ipirans, tandemq, flammicet. Vi detracta bacillis corticem ferè locum rapit, & Ut Iallicata qua adhaerit apparet. Bacilli ducarum triumve unca- rum ant bnporci contce tegunt- fars crai |b, mdino Je^c; nuterio ut Coryli, led m. allot cti

Dc hujus i; cnerit,01W & fiend'it<nio n<n t'mlUt. Nam qtioi Gamut refert à magnis fori u^ alatis -tun; laborari, 1 a-ia incl con ficunt, mater, m ex ipla 4ibmc c thgentibus, nobis non vi- detur verifimile, led \win (utj U.), : ubarc, vet qw tami- . h i w . ribus effillare liquorem uam, & dolum Sola vi in eam quam videmus formam concrefcere.

Lac legitimum hujus gummi nomen est. I item Jier vhoiUHMUam 1 lac que ufo est, in Lac five Lac, id est, Mellu craftiondillbWanif j m IVjfwir-jJfc iW<rr^<a ubii nuc! , Trv nominatur. Duplex

Duple* habetur : caquz cum bacilli*, vii cnim (me en adrertur, qt;jni I-accam Stmttn vocant, quu ex Sumatrai infula, nonnullis Taprobana Annquorum credit^ habetur : at earn qua; in gl«» line fuixults arfenjlr Laccam C*mttrtt nomuunt; & alters fadim, qua infeAores uninrur, c,iur« fias differentia* rubec. Quxdam ex fece Braiito & Coed conficitur, lire ex gummi 6c liquore Dr» fdi. Uccam TCTMI refini 6c ceri interdum aduherari annotavit Acofta.

Lacca Vetenus incognita tirirt ridetur. Nee cnim eorum fententiam probare poffumus qui Cancamum D»(cond» die exiftimant- Cum Lace* non Ik odorata, nee fuflittonibu* apea, ut Cancamum.

Vires & Ufus.

Lacca atrenuat 6c aperic, (anguinem penficat, fudorem oet, dmreoca eft. VUa prxap. m 00- ftrud. I jcn», »efic«, fellii, epans, fe hinc in hydropc, iclero, afthmate, apoftemate pulmonum : «n expellendis va iol», mofUH», atque pctilenti contigio, in cicndu menlibui, 8cc Stbrt.J.

Ad oppila. «e» tarn hepam quim fpicnu, ut & in hydropc 8c idero 4 piettlq, medica iinaninu contentu praecit itwntur trtxJulu Dial-itcxiiiici- J. B.

gs]acca etiam n bacilli parantur ad obl^rundas cpiftolas, Ceram lltfpankamrocanc

Alw** 8e cona vervecna Lacca conmU 8c uiina reteri macerat* nibro colore innci ex alreft pane rradte Clulius ex quorundant (enteniij.

Cum Lacca in Ceram Hifpancam redaAa, 8c Conchyliorutn fplendicantmm in minutifinifi fvagmenthigna, ubuhs, aroiLu, See. incrulUnt ad clegantum.

pKitores, aliique Medurud utuntur Lacca ut Venucc, eamqoe vine cotoranc, it ddblvunt in fp. VinJ, Tel oL Terebinth.

CAP. IX.

Ve CtrMf.

CR ^{nu} juwh Aftt videtur quod duntic At rinikate Cornea, velp«n» jGrrco f;^* P^ ^{fi b} orarum. »<^» autem dtfl* di quod CaUaria- inlur dc,1 ^{Note en»} func flora luteuli; Fruftut obloogw tmtt leu qrlindrucuij officalo intu* «rco durttfimo angulft cartcate, lptnn carere

I. CtrtM mst Ger. Park, hntatfit mm C B. yi«w /« itmtftut }. B. thr Cornelian

7*.

Arbor procera Urn eft Cornm, 8c malm runts brjchiau, cortice (ubrubro vel anrcn, materte alba, hnw, lbtida & dor* (enmeem Icabrum 6c aditnn>cntem valdc dk ii \U(th.) Flori prum ml omnium profert tn linionim (utcuu cxirem n fidente*. numeroto*, brariffinto pelculoappeniottj Equ*ruorrolxik, evuavelinrra purpuranribu*, alii* faUutek, mrv* cowrutt, lu«eoli»: tmrJ qux Aha conceuria nbbU mcerto numero, tenera 6c mltiora ex quorum concarftu apica anollnrrur odoni, noveni, denl, hirliiti, qtuin qiuterna crocea toli<jb exptKanrur, jttwwU oigua lute* connenna. SaWequunrar frm&wi obJongi, ad Ojivani accodentet, gradlkxci, piinum viml«, pcttet mfcfi, hnpici, matores, manut purpuri ruili infidentet contrtti, tornu li:i adjurubu acc#- deuces gu>u [ximum ucrbo, at ubt mjinrannrcrmol]ufucrtitactdo-diild6c luan cum quadam tamai jililrk'tj^fk.; orti ennnnetet oblong J, reretu, quaiia fsrc in olivi^ durttfima, m quonm angulh^uvitjtiixa nuclei Ijtiuni exigui, boduica, graokt, quiq, vtx itcngnciuni queant. Foiit quidu Virgx Unguineu leu Corno Wrnwur. gJabra, venoCi, per or» «qilulu.

Cornum maicm in horteniem 8c iyldlicm difflkgmw. Horteniii rruh'u cojore uiut: naio coimtvjnKerruber eft 6c officuto longtotc; aliquanoo cenc colore, rariut aloet: laturanut etiam rubet oftikulumtf, rubet crafGui 8c breviu>OC hoc cf>, incjuK C Hauhwua, CJCXWM nurti aliud Jjcn.^ Cte. Hg. cui uncn runuloi quam vulcahv mris logge fragiliores tribit Clafus, folia > ulgant n IntLnora. J Riulim:* quotj, OKHJ <<: j . iv. : . . idFeL Platen n mj^nn MC&tok* dilcrentu, alia Am alceru unto 6c tigre tnplo nu|on, liwcukniKxJ, faturacc cotonu, 9i porpuri tui majiui inhciencu, guJtu nunoitbw non minui Uptda- Sum Ac colore rubromanui oon infocntia.

!«*..

Oxnut ivl^cllii* niuliii in locu invercurur, in Mtlnu, nultria, Pann«M Not in agro Pedemontarvt & MeUioUnenti in lepibu* earn ubterravitutj 1 ^{folium} :...:clU : led culti ti in arbor- rem pulchram evadic. Quod J lermoiaot e Theophrasto ruulilic vjdeturj nimffum Fruitus lylyeltri* (Ljkwelque cilc qunT utbanx, 8c plemtvj, etum nu)orci, ut Co* net omneoi caknri rcipuM, Ac negligi Jdidert, nobnnon ndetur \entimile: ideoque anccqium dcreipU * «wa imento conficentjoe ratione eaj* roddenda non crimui tolkiti.

Tempus.

n pfwovereaowqiuoiuluerumpent. Manto,ti. in calidioribui Febraano mente; pro*'*'1 *taoftKixioncSL (emperamento, 6nu* acuirein eodem loco: Augufto, Septembn, mier*in> icmum rnuffun matmc.

Vires.

Corna refrigerant, cxi^ant. M'.VtnguM, ""^"p""T^M^rt^ftM>ltMnftt. Umc conTeaiUl* *?ur in ikinrHM ac hlcnoM: aroorein febnlem ac litint grata (u aodkata teiuunt ac r*.

Eleduanum ad febres, ad fluxiones biliofas, ad fitim, ad excitandam appetentiam utilis. In diarrhoea & dysenteria exhibentur fructus calcicati & pulverisati ad ʒj.

Corna

Corna (TCCJ contrite Be cum olco Myrtino aut omphacio mtxu in Emplastro fbrmam, prarfenti auxilio (tint ail vomitinnes ventrkulo tmpoliu : contra iuxuni auteni alvi abdomiru inducU, contra menksimmodicos paffini AC coccygi applicata.

Cornum litvrem caveri opoitet dici alvcina, nam flore cjus ikguftaro aivo conciu moriuntur apes. Tint.

In Hetruna abftinent demorfi a cane rabido per integrum annum a quorundam lignorum, prarfertim Corni mans & ft^gana: conpAu: Siquidem (nt tefantur ii qui rem experimemo ccwijwrlam liabent) " harum virfte ranatper marubus tencincurdeince concalefcant, illioodcmuHi rabie nrur. AUnb. qucni vjljl.

R Folia quoq, 6t germma guftti a«rba funt, ralent^rq, ilcfiixanc: it-jq, mixinu vulnra gltitinare poilint,

J lu[Ui lignurii omnibus lignL durius perhibetur, ad radios Sc dente> rotarnm utihfTiim:im.

2. Tijerou. Ponna H. M. P. 4. T. 9. p.81. CWmm Malabarica fitu Nymphaea.

Quanquam minor Ponnx fbeaes habetur, Umta -tque proceneft, troruibus umbrofii in lctam duiliu: lignum puuuuifti, rubiamdunijCraflotie nigricante corticc cinlhim, ut Perms. R*Jtx ruh, crocco iniuftque rubicundo tort ice te&a, odun^ gravii, lapoiU aiifbnngemis: ci reri »!ilicla Udirym.iin lumlic llavdeLTitcm «C rchnofim. Falsa Ponna: iinulh, at mi nor a. Siitiiiter fbrtt Portnx floribus limilis, pactetquao) quod non ex cAo, led e quaruor plerunq, confitait fbiolU. SmJm oblor. li, cUbi, viridci pnum., dcin nibicundij aado dulcet, Comis noftratibus aim figiir.ii

Crefcit loca arenofis ; quuurmis t:udus ren, Augufto viz. 8c Septembn rncn(ibuf,diu(jue [iiperAes Ltem) nubet.

Y itelm lit ab imlizsnii conicAimur: E nuclei* quoque corum iicata oleum exprimitur ad lam- P d Uiu> in mediuna nullus.

CAP. X.

De Cirje.

Cerasus Theophr. 2. hift. 17. fru&tm iWm Diok. I. I. ft ff7. Ccialia ik Cerafa; item < , ! •. Pontico mmiitpio, unde Imcullii? Rom anorum imperator, Mica dcbu.ito, pi iimim m Itjluni ailvircinintulit, & fin entilit> nomine Cdra tiutu appellavit, Atlwiarulib. j. St Plinm Lif. c.*f auAoribas. A' •ro ante id tempo, in a mmiidiipuiiprintoidiis Ceralos in lulu iponuneas fuiffe, quamvis foruTe negle&ai & inculus mini IK' dubita

Ceraforum lulu funt genera, (cupotius vanctates, quas C. Baulunus in Pinacc exptca:, CeraU, inquit, ilia lunt iuv.i, alia (ylvdIru. S.itiva trucbisfoiTna,colorc, (aporc; [atide&L magninivlnu] vaiunc Sciu enim pomi /%«r*, i.iriiiintiore, longiore, rotundiore, conta ctiam fy*r*; 6t alia pediculo lon^iui'e, alia be voce, lingula vel pluribus mu oocuntibus, iti ut c\ iinn penulu vel iingub, vel teriu,quitcrua, tj.nni depeodeant, vel in raoeni in xinru oocervctiti. Cere albo led rarius, param (i.bio, pamm can ilicante, & qu Edam in numritue par>ni ex tandido rubent, iluxdan< magH.oauedaai ; laq; coro », (ux Pruno inlita liuit; n! ro, rubefcente, nonnunquam in atrum vergentc, nigroaiam, quxnam ni^ntino, 6c (ictio bngiuneo Ubu fit mamu inncciciuc. S*fetv duld, autero, ex duld & C acido aJmixio, i' a amaritudine quad retinent, nun tamen mgratx, Amerina; drfta: lie alia ninua fua d' lccine fufidum panunt, .< ia ob nuan • aco:eni teipuuntLir, aluobi redundantiam in breralucari

K>re& i- eniore fivo aquola ccaiftantj & in quibufda n caro peniotcius nucteoadiarret, qui m alii* fragilor, & nudco non mlwvic/L Sylvc/tua ctum varunt nuRnicinline, figuri 4t faporc.

Nos ex lativis profpccw diffiiKtis lutcimis, i. Ceralam vulgarem fructu romndo, actdo, rubra. am imrtu coiibcodula ; Ccralum auillltmum (an^neeo (ucca j> Cera: am majorem fructu n 4:0 J-JVVO, luWiiki, mgrocoloio imitaente. Fuite cuam & alia: nonnuilc (pe^o diftunt. Csratum unien ilorc pleno, pro ruturxlulu am vancrare quidam actidcnuli liabenuu.

1. Cerafa [circa rstan '1 itina dr *i..i'j, ^u.t n-i^'u Ctrsfv fttiv* C It 1 Cerafa acida rubula J. B. Cerafo Anglus Park. -oali*~> Gaz. I iif foinnioii ^iifllifh Oitrrn irtr.

7. B.

Ex majoribus Cerafis funt quae acida, rubio colore dilutiorc & nonnulla a hi< per ntaruritem faturatus rubent] carne haud admodum dura vel compacta. Hn '4m«r vaU- IJJIUI, p<L-um probe maturis, non tantum acida, led quodam 110J0 vinolm; quamrit alia alts* in hoc gene a, quod culnii dkan illigr<(in noftr.itbvj

Ipa quoq, tota rotundior 1 lunt. Gunmu c\ le fundit iuodum, «uia pan I'tilque & vtciru loca tub Hi; num qua), & rami multi fia^lwi. o wr t* I

tor* ten* Ctrsfm, h'U*Jr(» noltr<ttHu dirfa i Ceuio Angbca, frufiu trjjore & dulooi (dillect. Forte *£c
«M,*4. iant Cerala ictva majora C. B. i. e. CcraQ Hiljurtica £**. Gtr. Goccv* tatnen fc alibi in r³-
vidimu* Cerala Flandnas multo majora, & nthauum nitgarittm fere dupU.

2. Cera/ ««£ f ruzmta [Aims, tvimt mutmtftmn* J. R An Cerafa acidiſſima **fi**
fact* C ft D. tf«r*»m w ttw. Ujd. bmt im ftmm.

Inter U^fior* quuUm hoc Ce ->i cenut habent, cum ob ritwfani faporem, ctrna
titan, Lt equidem cenſemus. Non eſt *»»» « "bonun ilwudo qux fykefra..
nbutaodonim toulcum qooqued*«nait Non cum loicnc ianucnot rano*
ramihs tenmwibus qium *^crxonin« donauc Cunt, pendenobut f<c & ni Ba
4.,...:i'. v LiuCtul BX loOgJUMOlop-jjoift
deoto, cime firmiore, a^ivi v.ilde, mdruni

Vatt.

An Ceuſa acwilitinu Unguma) lucco C JI? qnx in attiofe arbare prorenuiat, &
pectiautum habeni.

Commode exttccintur pro ntiauoui febrienabta, puipam etum excoquum Riillocnet.
rant ex tis contufil cum vA* u cu nudea, & tnxm cum vino bono, id vtmi genu* quod tefnpor*
Ctwmhi in uiclidis Kibent nntii worn. Modum annoendi vidajipud J, B.

Bnfi pediuiltt U*m At aci,Julimo, faooo Unguineo ah aim omnibu* t.n-''c
Aittngatur. More. :lxu dicitur, qiumrtf Pai bniunui pro Niorellu iliud proponat.

A, ?. Ceraſa major ac frlm/trm, fru3m fmUmUt, mgr* «JW* mfcu*t C EL Cm/m

Lemma C BauKini huic Ceralb apud noi (ponte nafccnn apprime conrcrut. Ed cn>^m arbor.
& piot^a, rrurtu pai. : ca> n^ro colore intiacle, pcdialiti kotR''* *
abnrum Ceralorum tcnuwribui.

Jnu» Ceralitn)>Ivctircni fruAo rubro 8c mgroquatn Tocat fie dafaibit,
vtnorc luadico aut cinerco, nuoJoiOi I
Vulgari nonne arbor eſt, proccra, recta; cortice
fclonjy. Prum folia longiora, demc
crenata, ſplendida, libanata, quali vagna
t'Uyf ex cucti
icubui u;c U\4niJIIIXU, nonniriil rubenubtu, ex i>:litt <quinque, ratyjrilit & ta in Pyro ^'
n medio >. Am croccB donau, quibuf lonpor // * ^
on\$ in quinque lacini is rHcTOj, nonniliiii purpuraicento din & hx ^
oblenjvimo i hortuUnum lngemow prxdicre lolicum rufurum (xralbium provemum: il^
co cnim hut fi quod irutore aitectum faale nigreckk, renuentibus nihilonti^
Integra, n i riorum peculu. Frudus lucceda rotundm, HIKVII am-
ilKuime utta w, duk H ui quootiicukini ortMculatum Lrvc, durum,
nucleum continens album exacerum, amaricantem, flaveſcente tunica con-
tinetur. Gummi ſtillic flavum, « ruffim fie d>> lum.

I lrt (ſcrlpt J. Bau quadruplkt rarietate potilEmum dillectento fruOut KtRnit: Ki
& tugium. & utnunque ^iorera, vel ittinoretu Sc macnorem. Mjfor u
ber, quitrn mſpt ddbo teni, culiu ulb, ut oquidcro ccukmus, effcAm. Minor nu
cjjum cultw Riurui, tain ruUv qium ni^er plening, amancai, led catenut ut pncraLente d
I JttuT Jrfenitrt CmJ «» m\$tam jilvi/trtm frmdm wjir#, ft^« ^<J **
p<J/itM ^ fia&mm rimm p-ft.

Ex hoc jHxiflimum genere melon noſtii torrent, it EleAuw. confciunt pro puerorum obo K
condimenta.

4. Cera M C B.' Cbc «cact <hcrpp.

Specioſis hic Cetabrum fradwmagauteft, oblongus, ad enrdu fimmm alMpiatenuaaoeden%
drnc dura liiJuUque, duki, ocilometalbo nixUi, nucleo magno. FoJuttw jora ſunt quam Cera
d C f t f a l d ^

Lava.

In Jwrtij law tVoquouU UnC Vanant toJore ntbro, albo, tuplicante. Horum A<rteulr app<<
tentillime ſunt.

f. C<IM> /U# f/» J. B. Ctr.lmt-fi* fU*p*t CB. utm Or. iwtnffit fm rift* q
€>•</* Jbr* mmUfUt Park, furad. O*,*^1 >»*^A- M'' ^A''' tier. ir<w O. mair
/iw* ^WMTVI /r<j_M f^<j emidaa -tt)f Double flotort 6 Ct<rrp.

Not alu w « dtiTot a Gerafb vulgan Angbca tut Flandiica oium riomm pcuiorum « * * ^
ita ſunt. Duriſſim it amnfeſterum eſt, AJrarn»nore>nunut muki plica lmt, Kx di.pauooT
JMiffni daobut D ibulre conftint; aJtchii pienffimi lt:nt, & c plunbe* I
petalorum compoſiti. P sx CcTalM tlone rol>o, poAcrior Cxmſia pkno Bore C Bauhino
* atwrn & ^ » ntenlum led pwaoro It Ifurlbi profenmt, Ub autan qtu: plcno Horc eſt)*:
tmnoitod^I^onwcuka k

ctam alixta, ut Solaribus radiis feveretur, nullos unquam fructus obſervare potatle ſunt.

6. Ceraſa

6. Ctnfut txmtU CD- J. I). Park p. irai ChsmxtzT*f*\$ G<ir. •£!]: Btthttf Cherrp.
CUf.

Vajix altituditui tvenitur Chamxcrafi fnicex: nauj mterJum in uibitalem, bicubitalem aut ampliorem magninidinematrollitur, umbrqis videlicet locis & tenui fob; li- autem K<is & ju<a lemius picrumq, supra pedalem altitudinem non ailurgit. Tenucs St knftt> hibirt rjmulcw feu virgas, nigricanto a CUWro corne obdud.<, qux c\ nitci vllis qiu:dam tubercula & t vclut gemas pioieruii, undo unquam ex Cachrye aliquot evigua toliola, Myrti TirCJitiav fr>lib .r(|u|u proiituit, ilmi'ilqin; floroj binij term, quarerni aur qium ids csjilictnc, candkli, pentapculi, mukis in niello (taminulii pweliti, Ceraii viifgaris rioribuipjiiimilcs, mioorettaoi in : infra hos flores ang, etiam in extreme rows ex aliis tubmailu exeunt {inc iWibut folia fupenoribiis nuiora, Ceialivulguris iccrbo fa-uctu foltomm forniam imiunna & in ambitu limiliror trenata, longc tamen minora, & an a (findkaiB fplendentiiij fubanun guftus; II> (ieccedit cxinuus fmcitu, (otuiidu^i can* , matuntaty; niber, exfioctnta mmufque gr^ti (aporis qu.iin lunt auda t.^ala, Ofcio intui nucleu. Raiix era (la, tonga, dura, paucis hbrts pr^dita, prormidum (X^tem, fit quxiitficuUci erui pufilir.

Pafitn in Partnonia, Auftia infisioze ZL Moravia editionbus licdfque iocis nalatur; ad vineto- Utmr. rum cci.im in ujihbu* fitoftm in.rgmitjui 5: ad puUcasvias.

Not- Non pcuii.irc ell Ch.imxceralo^C)iiiTiii> alias Honrcrai minoriW. fi alia vcllicas, alias rorw*
?*(t t.iititn pro ducere, led Ceralo, 9bo, l'mno, aliilquenoiiullii aiboik-iLonimi ne.

A. 7. Certjin fjlvfirh SrttentnendU Aafht* frmtlm rwhv, ptrve, fireriuu. ZllF tDtlo
• ftjtrn Veichtt 'Ctitrni, toitl) [null late npr trim.

MttencsCer-tfi ntKr* iimilis. Caudcxin infiRnem tmgnitudinem excrefut^deti ut Orgyiam non-nufuju.ini leu tiuto uin.is anibini exccUt. FtUa qujni t-crjj mgnr lottgtora btiurji, ne & acm ion-bus JdnciculK indlj. Fnltis pirvus, l'otumlia, mber, quique ante inttium Sepcemb'is plena 1 macurittORI nun fleqakqrj quamvis arbor cum pnmu iui generis florcat, tune quoq, aocrbui uc vii olctido tit Dificula !,ca promptf fterminant, rjueque IKU- eatwgunt virg* feu trauCaile Cerala bortentibui nikiesklii aptidinix cenknnir; (urailu in ai bores proucras cewri audu adulefcenribus, ft udtus cti.im prvenec & gullui gr.uos udentibus,

Ad npas tluviiTelx, prope BtrnrJi-cujlU opptdum copxMc oritur, obfervante D. johnlano, qui & Jelcripuocin ejuj tranlmdK.

8. Cer*f*i MM ft.UtMie pimra ftrtni J. B. Cw. <> ptJxul* plurA Gir. Cn-. TictMef* it' I
C. B. Crr. trjmkiffa ParKk(M 1*kl ZN(flititfi&jit(iClitft@Cfrrckp.

Hoc genus modo duos, motio tr<, fxcpc etum quatuor aut qutnq, uno pediculo profeit fuclus, noc aliter a Cera(b mlgari tiSm.

Nos pro luuinanttt natur.c ciu.tu aut partu motifrofo habemtu, nec fpedcin diflmftam confi-mere putamus, cum in ejiiem arbore plures. deatuc fhtdui foburii, icu in lingulu pedicutu iinguli, cumque fpe^iem (iam non iemmi led Holonc aut inlinonc product.

Cerafas rstmef* j. ft Ger. 8c atioi um.

Nondivctfa videtur a prcedante, etum C IUubiu imliao, giuniim (inqiu) racotawn uvx modo dependent; cum tie pnrcedenti diiillr, Alifjuibus trna, qtucerna, quinave poua cilo l. .iou pediculo.

Cerallu arnac ca-li ftacum frigiJum, (alum vero pofttionu rnimafijf. In tepidis re^ionibiu parra proveni, Caliduiunon potct lultinere. Montana v< collibu* wllliuu regione Inatui. PmU idJ. Per totan Europan fr<lijemilfinB eft. Nuiqujni meliora habrniur Ccmli quam Lugduni, inquit Anitius, cui altipuUmr'j. Bauhinus, icu hoc loci paturr, "Icu'potius cutmrx diligemi 6c-beatur.

Flornc onincs in Germanu, atque ctiim Anglia April) mente; in calidionlx> bawl dubic oatu. fiuitum numrant Juroo & Julio pio Ipcaciujuiivoriiticc Lit apud not prxoox quoddam(enut ijjwl Maio menk HUUI clut, to-jyj idcirco AUult* dida.

De Unone, uiluoine reliquidque cultura Ceralom anilulanur Rei mfticr Sc 1 loitkultui * (Iri-

Cerala recentia alvum Uxant, Can refringum. Item duku alvum lubducunt, icl minus giau
funt stomacho»» AtiJa tk kultera pituitQnotrcnicntaMique ventnajt* funtapta, l'1 afringunt
Aqia acidoruiti itaiatitu, & cnvla ipli in int:nftibut f'ebnkm ardorem ceMnpduutt, fitini ex-
iguunc Sc abi appicutuni concilunt. Cum Sacduro condita *entricu)o gjiti fum, & inter pri-
fjiuiHinu dulekciu a nutranii ooftht habentur: venini ob humotctu aquatum abwidantem dm ai
fervari nequunt.

i>aj)(4u<i Gorajonw •ddarim 8c artftannun m afie.Au hyppebwdnaoo fumroopws r<lore,<>6
hoc un- co ram<d> coapb rns convsJii lid L-v<Hre noo rarer'ommb> C<^/. 41. <d
D. de Maigvy.

Cerala dulcia in morbis ca (ta, E?ilop(u, Apoptnu, ParalyC, peculiarttet proficu* cenftntur.
Riffus apud J. <.

lam Nobili ApopleAico, qui per era dies loqui non powrat dedi S?. Ccrafeum fit loaucUm
mot recuperavii. Hw. */'• in lua Otymu, cap. de frurtibu*.

In Wlbude 8c aliii loquek ntia Uvcwr01 frbiffime cum \$z. Ceriforuni nigromm • Tum cm.
igniter cephiki, Ciminopfrt robwant mufcuW lingu* & Sp cv> uiui dicitmtw P. J F***
Dulcium

Dalchum nig, orura recnri ... ait J. N ... roxyftiampi ... nutri ... juenri tiiii est ad mon ... hinum, !' ... re habetur 3 qmbi ... panes n ... Ex < crafis vina ... u potion ... lutta ex C C:JII* recent ... nan parar ... imequam fermencetur.

Ex < crafis vina ... u potion ... lutta ex C C:JII* recent ... nan parar ... imequam fermencetur.

Oleum e nu ... lets Ccralorum per expreff ... macula* Si kntigtinet cutts aurerre ... xxj, Kjbctur Arthnruli, ... CerJori ... no dilutum diurnrx m(li medet ... -ptenium invitat Celebratur ctiim vi luhT ... Nonnulli et minus noccam Cc:afa (i ad (inecaicn ... utire n.beni- Vfr

IOm notra temanribus id nutecefEr. Nam pluitbu* Ceralonim ... per aliquot jvift <U« grancarcn & doloretn I ... itim ortmn, qw «gre nee m)i plurium dterum ipano eKpullu nuckis ... Forté ii (uibia Tencnch tonm robuftw eft & validSor wulcm vcl etum pluta line noxa devorart

pd« ... Pailera qui plurinium CcraJii deJeaenmr eo tempore quo Cerala matura (unt lonp ... nujora Halere hcoatj quam alia*. Unde colltginjr Cerala hepar augcre & corror ... mentum eft Arnolii VilUnotani, de cu p vennte dubiio: nee umen ii vcrum dfet mde fequitBf ... quod iLc dolucx. Nam (one magpirudo bepato morboUm pociuj qujm Unam ejut conlbtLtw ... i.em arnut.

Ceralot ... iodie in bonore Be pretto (um Cattlogu*.

Je. etc EMu Cbrrrv. ... ttfart-ptiln Chmp. + Um**

J:lie Carnation ... Chr Xmtirr fhrvv ... purple

blarh Chfrpp. i;. Luur Wardi Ccratum. ftufef IParOrf €|»rmt. 14. ... ZUc rlufrr Chtnp. > (. Ceralu* nana. C^f EHMrf CIJtrrp. Vmo confioendo pr^ ^ ^ ; ... riflima /ubentur Ccrafum Matiolancnic magnum & Ccrafum Morelbn. C|»

Paco-catinga Brasiliensis Marogr.

Ad Cerala ... terri poteft. De luc uotiim babec: FruAm ferre to uram tongdlw norem, *f ... pom: a col ... ui Cccari polle fle dai fetrari

Ih?i**f,4 ft* Orsfm BftfUvm Pifono eV Marogr.

A I hunc pocius loaim (ut lufpioor) perttnet; nee enim calyx flora reliduw die ndeturund»" ... licta de quo loquitur.

Mtrnmvt J. DtUtt* bU.taU. Lb. 16.C II.

EM hac ikotaiai fatur, noo mukuni iblodjn kPnnoj fcrai »c;c;e |gia% fructus inflar Cera ... forum, JOORB podiculu, offiatto exigito, camecrocet 8t iuan

CfthmmI TtttMi*/mm J.dcUa.M

Arbor eft mquit Cerafc w«o fimilb ItyAu* fendem exifw RMniifiimle^ipi fiBtam. ... nide glwinoUm lunduot, k ideo ab littpuk C«r-/- x««^/# appeUanmr.

C A P. XI.

De Olea.

CJ LM Grwai f»i* Urinum nomen I Qrwo (*tom d», ... oleum. *i*i* aurem I *f* lft k w t d kAri ... Olea primitiva arbor est folis perpetuis, fructu rucantibus, pulpa liqore pingui fatente, officio duro scabro.

i. Otta biro* J. B. C B. Ger. Park, fctc OliUr-trfC.

J.n,

Metliocris imfmirudinis arbor est, quandocme procera & pixgranJis (ut rectf Stapelius) rinuv m htum am plum-), thillilis J J. Bauninus Iwun valde pinilim eile ait] rrunco nugna ex pane nototo, materifl fequalker Ipifij. fitii luli>U, alicdbi & critpi St intort.i, gulhi amaricann, colon: meet Bxnua &: Iflubocotn fere mcilto, nonnuniuam etiam macutis titriulq, colons iavitcm convolutu con- (pctfa, pnwntlni cum ad piftani juti.: wmiillentum jwrvengj, adteConlo. Cortex «tn tmoco quam ramis obduca::ifecollo[isurii:rci, livu,glabbr. [CoEdb in tirt rUvUs] fi/;< oblongi 6c angufta, Sali'1 Emilia, acuminat-i, incifuns AC mAtiirellis vcais, (excepto unito tiorvo iniigni J [^1-cuk> ad acumen oppoitum exairrente) carenti.i, enfi. pinpiUj ngtcla, iupeme coloit. Aim vitenus, ceft^ (aturatius virends [reriib (.ordui, tn vmtii daveicemis j inferiu* candcentii, TIMJIS tj men pilli oMiu, um b'evihus jtdiculis hxrentu, ut (ufculiijuali inlerta vvdeantur [c\ jjvertii ut-pliiium bini Stepl.J ex [juorum alii profemntur pediculi, ijuibus fbrti ucciiunm coharemct lufflinentiir, albicantes, SiiiibiKinii linules, ft quatuor fotiolii ri>ctu» riulimcacum t.complectentibus context], CK herbido cjuuik.inrcs, qm nnn omtis ad frugem psvelliumM in Emopa : in u vero lo> Cts quihis propro eft tixt arbor perfenisnt ldotjtice conceitx epttbacczconfisnMBnt zmuUntur. I lofeuit liicoilunt fruHwt figure ovji-, got RLitidium nci, magmmdine v.nii. Nam in Hif[unu naf. BUCCij rjiifw Ohvi li. pascas v<3cant, mediocre. PrLiiuin .v<jiunt; Itaieje plcrrquc He Nbo- nenfoi TiimedJocreragUnnem liipenuw, qiumvuci lint habttioioiximilioiclcque, >tnnuni vides, pol (l i i cant :>, per matnrirarem purpuralcento, tandem & nigntantes, qui.rdini ecum ex pur- puceo putificanti jclt rarius: Soni & qua; in Hiljwnia .like limit i ut an*at Chatus) Ijporc vaJdc ac i Ik .mum, 8t nekioquida^tbitatis 8c naufeoli aiinirmim.habenti:, odtUn in matnrirtft molli- bus, earn.: pnmiim dura, nutuiitate molli at pingui, otikululum lignulum, oblongum, utrinq, acu- minatum, & in hoc propoitionanun nudcum uniaim rubentd. Qui vem in lis continctur liccut piiigui-. ukum fit duke, aquofm, qui ainarus, amurca. Foiiionim quoq, fapor amarui cil, nun line acrimpnu tauten. RaJttbm nicitur (inquit Cordub) paj tun xndus, paumi obliquu, in liimiuo cdpka oWscrentibus, matcii trunci motlo (bliu.

Lofitanicz Olez (inquit CiulinO rmmores Oliv.u proferunt [ItJquoa, Lucciifw quanimOliT* ai>uil nos bmatiffimar, alixque It.ilicx] I&l multum olei, eiulque pamutJSm L>fbente*. &c etum •JIUIUIX quac in Gallu Nai Uincn & Unica nalaintur olcx mitioreni rVufui'ii iemnt,ex quo pitt ol

E Novembri, Djurnib'n, Jjnuano 6t Febnurio in Ut.uwtcnh" regno : namque ameanoni Sternunnir deiniie m pavtnerittku liiunt: deindB mole i ippu- nuntiiir, 8t tonatlanexpriniuntur, ., mce aqua; iu'cnsm oleunt icJdiint Nonnulli ofavai .iii itnfpobarltj i . admotu fcalis manu legunt, ne lequendtannj ipeni Aecufii %c\ inimk'is pixnputu. Veoaineoter entmlabonm Okx pAtooffit 8c aeoimeiuufn itibus kx antiquifiima ruit, Olejm iu)lrinf,ito neve VLfbraco. Plm.

Immacuras pkrumqiCondiun per Htftpaniafh Si Gallium Narboncnlcm: nucnluinetiain maturas & nig bmenti loco apud noi cum camibui jittis- prrlcrom veiveunis, cluancur, m accu* nb etum ulurpantur. Itali nicnm fecundu inierunt, & cum pane edimt, li'ciunt appetum, . ntainun, humenicm vutitriL-yluni extiocjuu Be contortant.

Ok-i Minenra; Jk.itJ Uerdqueavt, vel (iiuul Mincivx nmniu uilirt, vel ut Maniaiu<> GipelU, ifciplinx, quaium ilia Dea ett, Olooa lucinarum i ur.

O! mat padfqM index erat, pratiile venii i ab ib dillinguunt.

Oicaruni dirtctentia; defumptx dim vel ,i (brma, v:l I cakn, »el I l u nc, vel .1 l>d ranetace, vel ab invntoribu*, qiw hnci bl*. Vctctc* vaiu

tr.iJiitert gneia^ quorum nomina (pcaebui h ii<: quo*, nos iii Ji'ii inmoiarjrmui. Coymbades * PlinitB difhndum RCI ar : JHUI olivai*

't.isoleo fuo puras imutantes efle voluntj & ILiltiUil^, i, c. i ab ib dillinguunt. Alii Halm > i> 8: ColymbaJcs confunJunt.

Olejrani ntem tot ditfetentiz non oUervanur quot Pomonni, Pironu\, Prunoi > quit arbor lutura Jui minut apta eft ex lemene nata varurc; vel quu agiicularum non imcirmt i

idit, colcnij & (pxiuo moJo unnotandil adf6 nktfirin & diligencc* ie prsbac. Hit adde ar- Itigulioris cacli miniu paeni (it, Gallic inici*, Ann¹¹* Hortulaim, f1ul "

n l^icbui producendb fit procurandii maxiine ainuli & occupati lunr, te 00- lendam non permittete.

~ Olive maxie * um itilferentut a C Rauhino & joasne fratre rccenlkx (imt, I lilpame*, pi nail i>aiocnbu» rqualci, Cc Hguri itmilet, qux etli liccuienta:

funt Karne inuU^, am i wnien miipKm iubem, uruka: ulet ininia r&Uunt, amurcc pluSj tdCx; axtttC l< l4X>C b.< I

i, Oliy* mmora, t. |<, Uitenlc*, P . ., exdem loiliuunur, NanSooftnla 8t BJC- txx < >lm old iun.lt

Oblong*, atrovirentes, ad Uciim ComaUem nata^ q'uamm uteri), Bauhmia mcinimt, quibus i,tidii>6t luaviu>, (ILMHIVHSC macrx lun Jrtvxlurn rdpcehj maximarum Hi-

(paru * C lljuruu* ounem duraiii ciiefe oJU hrmiter f ^ 11 v l'limut menii

i M .rd k nxundiores, plunmuiti "lei habencofc qua: QUvrbt vogantor Carl. r AUnb. Be t

vbor. I ut Matthiolui

- 3. MJULKIJT 8i oblong, oleum parcius sed dulcissimum reddentes, quae nomina à radiis delump-
 po Raggun diaintur Cr/. Ifaj Ok* minores xofent, nfa, in cibo utuntur.
 ;. MahHCi & jHil;x)kHC* adaMiJmiruunuqaEJlr.q
 diflene ib Hiffuntas iuiims; mm btatthioiu HI pjlti, -
 4. Suot quitdaii q
 Ct y t d (
- 1. Olnr* nu(or«Won(i, anRutaU. amygUli lotmi, rajj
 perkur, (uarifiuna eii tube* <otr
 s. Obw meduobloaf; > angula, vulgo *auricula*, vulgare Buna ill: est.
 V Olnra media obiwi
 im habet oblonjpim ri
 4. Oliva nuiwxobk{i{ai vulgo *ptbmlmi*, in MfM etunt loot i(U rcpCi
 5. Ohva mah>r lutrorunda, vulgo *tmfnt,m*, inter olivanun (peon ifU injxiii est, fie 1
 am pjrwi^it Icrvacur.
 6. Olrra media rorunda vmdior, tdfp> vrrJ*Ut, ifta iimittter ad oodilurara c<llijytur;
 tie* repermir, qua* albtidior est, & rugln hi**.* J:
 7. C'I*J m<.lu (omruia prxcox j vulgo » «ra, aid naturefat, & ab n jore cidir
 5. OliTa minor rorundi racemoia, rutgo *bmm&***, in ncentulu» VCLIU aitiRclU est,
 men rubuk.
 9. Olivi minor rotunda rubro-niKnum, vuigo [iUtr**], non omnuw mgra est, led rti

10. Oliva min « roruiwia, cr rubio (k mgno varkg>ur rulfjo f>i*» j allr (rfunm* vai n* in iocs
 ruJci
 Ofca neq, fngidutn, Mq, pntfandui
 1 norm cult
 pkreque tamen a radice sepulkiU:
 ram jttfcm natun flan» ddiderat.
 .enlu collium cotivallo iWLi

Solum Oleum
 : X Ltta, lat>uxivcrif.
 aiuntosi RLJ *
 Lbuli.
 1*
 ii

{line <tboecm muki enciHinunt. ult
 : non r\\ ere, aut non esse fer. team; owxi ramen
 QIWLIII & Oteam tam pemnaa odso
 1 Vlniw^Km VKlencur vontinniu qnx teruntur de bt.
 I >ten(e ma^iti n pane omno Oicr tWent, ini;
 rardutt, uSi qiumTtt diigentiffime oolanrur nthil pr<ter tWi
 & moda u'tligciiii li(>crii.)obi(er iinimu)- Optima aui atldccerpenJ..
 ntebacxa nigrelcre; tune attdn /></^ tcu Dmppx vocaium.

Oiiras a un
 Conlbnni, I
 ;a knte aitmih
 c>>t>hi4fta& Virjjilioamoribus led q;
 oka* <>*«, nt quu dui<re «mm loo. <*>ter auttes coevertuat. De
 Ket iiltiorlaiptorek, fad pracupue 1
 in 1*1*1

HBQHi ^niit^ :iti^< 1
 lain a K ociaro anna took
 ram lubimk amautemi-
 Ac KcmiitU'C &> railtto a^rc h* tuni Licet experimentum est, que con
 i.H tuj^md if*, 0. IJ6. 1. cap. 15. p. 15.
 iium onmuin c cruda at i, iHtudu
 M|ntU uiim

U. 1
 «*w rnliautin fibnUn*fcnriwii
 ludet previKit.il, im
 wm, &
 Quaeper

Quapropter finquiiint : tluhiure'non debenu, *Olivam lectam* pmo quoque tempore p emen-
dam. Ergo ut primum antea uera uera, subtratis tegetibus aut panis expandi debet, quo
aquositas ex iplo refocetur, & à foliis ac virgulis repurgetur. Hac enim commissa olei duntur-
tati obfunt. Tum diligenter mundata protinus in torcular deferri, & integra in filicinis novis includi,
præloque subijci, ut quantum possit paulisper exprimat. Postea resolutis corticalis emoliri debe-
ram, aduasti bnis **Gaoarm integri** (alii in Jiugulos modios. Quod defluxent in labrum protinu*
decipuUtor deple.it, & in firtillo Libra, **hale** uiiii pr.vparau defimdat. Hoc emm (iuviffimuni est
& tenuiffimim. N.int znds 8; piumbcis **vioatr** (*Jkuxa*. **Loogi** iicliions laporU ell oleum quod
tmore vi prxli **quafi** lixivium deftaxcir. **Namfi** nudci confringantur olci (aperem viiunt. De-
teriiselt quod ex reliquis tracibus premitur, (cd paulo graviore pondere Hoc coitivum nun nulc
dixeris oleum. **Sed tetiatiooemuJt6dererius** oleum exit.

] vitns oleittnendandii confik R !l. icipiores

Ohsu condendi tolioti Ricrunc V«cres(verba sunt Ctterlerj) qtiatiqi:im itvera mlul j
qu.im pabthii bUndimenu. Tarn ingentolus fuit venter ut & amari, nec ih ipla iiaiaa p
luz(iuoq.voluj«.iu pUccrcawReric. Quid qartogulUi hormiuiiOii.v. *fnemaimti*, live imtmuri,
at (ii.viutcti invctiic ars, quam non potuic natura. l'unmos cat cnndictuli noJm trididemm
ColumdbCel'allailius, tjuasapudipls i-eqiiircinlosoinittiuuis. Nan. *munc dierm un* ioocoocunij
licnplcificiia nuxlg, muru exaceco &c (ale (Mrjti condit-r ad *noi feti* adleruittur.

OliTjrquim?»peT matuntacem nigrac (unr, lapore quoque acn, jmaro 8c nauleojo, oleum o
mca ^uodind^ Aprinum teic pellqpdum nil, nonmhil fitviciru, &pore< *uici & p.uto, ondepMd*
Mn hunc Si *pornaquex* (ai anireux inhrerc. LauiLitflijnuni JUCIII apoJ noltrat*
habet it oanm Sc liipotis maxtni. ox>ers est.

(I rx nuturz ex Veteran fegnrtu eeaipenceolidxfiintj ven'un facile corrumpuntur, ventri-
cni&q,oculis ac vell aeaooeot; coitciadx camen &illtx nonuillftuntSetaiixiicuIoicreurgiiiiDt i
nmnamra exficant 8c afrinauat Colymbades aJftngerc, ventnculum roborarc, ajj]x;tentiani
re diixbamur. Qtixaanos adtenitur conditx iunt ancequam iumrucruiu, mtclligo tamen
ttalat ni.Ki! i- fi: nigrat etum mterdm condire.

irum folu reEigarant, exliccintBe aitngunt, Ufus externusfic prxcip. in fluxualvi, men-
Gam, in herpctibts fii innilibu^ Oculi raaliuimentis (autore Diofcondej ob vim (iiim mitioreni
conv^nicntiora (unt Oleaftri foliii. Quid intra frurtus nudcum z\\ cum Sdipe Si farina Icabrot
ungtis- exouit. Succem Eruticf aceoffi refnns deltilLuu Cuuc hchcia> i: iures, nunuuu ulcer A.
Plures foliorum :;ils vide -ipuil Plii^ua

Olea • niatenes prxaptuc oommendanooii est apud operarim pitVore>, Sc fta uarios, à q b u o l
p«ll.-'ites operam is delideratur, aim Ebeno, propterdeiiQm 8i nadUbikm qu> lubn^niunt, I
forem subruflum & varium (ucin tinK-i) Aqualuiti atitibi iinduktim) q cem ductus & nerri m-
: referunt Adnos albtinoti inenltj ud poodaro vendicui*. I-ini[judibiti, adfqtM nlt>u>mc-
dbanias infervk.

Otei dfu&aded multiplex est turn in uho, turn in medicina, utomtits explicare pUi tjnpori* Sc
i lei requirere : quam itiftituti nolln opens ^io patitur. Dc fin couluLmlu> tjalcnuj cum Dio
feorii - ihiquc tkiiu c vetenbui, turn c acomick

Follioncm Ronuilinn, refercote Plinio cum ccteiimian aJinum evecdentem D. Auguftus ho^ei
interrog^arce, qui.iiiMitniaxitncratione vigoreni ilium initiu u>rponfque tuflodiiet, idjxmdilk in-
rusmiii, foilsoico. Cardatiusetiain tru pfaxipiic \$iloogprkatom taoreaffirmat, numi m LAC,
mcl, oleum: uuelhgic accem mm foru inunctunt, fed intra aHiunptum 8c in *abis utatam*. Oleum
& tulum omere uzm ic.c AnfotoLi autuitvtt^ utiquequod utrunique ad piuiugandam hum quint
lie condu

Oleum nature s cflit videtur, undeaqox innatar, nec cum h *umidis aqua permifce-*
im'i fciquamvbimul cumiilisafptetar oblevitJtem liiambrevi F*; cypedic Si. Grrlim afLeiiilit. E-
odi .intern huiitU [oleofa & aquea] lintul agicaUj conqualEta Si per minima milta colorem
album contrahum & laetit Ipedem exhibent.

Olsun ad uGun per Lmitatcin onimum Ci>quit Dk>(o>rido) quad ex imnuturu Olivo expf imitur,
undo om i Jicitur. Excellit in hoc concre receni, niinnnc mordax acq, oioMtiisi. Tale
ad i nguentorum c (impolKioncii able. ,Qumctum propter adfringendi vim duitujio acconuno-
datum, *Que fi co* otineatnr, gmgtvas contrahit, defico hnnat, futiores cohibet. Refngcrar, Ikar,
afringit, adob ucmultatcompolitioncingreditur. •

Oleum ex OlivU mituni exiieiluin calU^it &. humcrtat moderate [Vcnu calidiu^ est recent ij
emolht, di^ent, vuluciaiium ell, alvum laut [aim Cctevilu calkla atlumptum j|.] ariditatem
[it, in nuna ventns truiigat. tncatus unnapos Uxat,ero[6s jbflegit & conlbtat. Ex-
I to Jyftci iliw, f uiofibus CJIIJ], Sec Cum aqua tceptda allimpcum ny>
Tet vomitutu, .t conn a vcnena.

In V^Mq* > Jiroderui)uliuifGmum est VulncratK quotidie exhibarcoleum
oiiv.v.Jti cum < crevita cal ia, qao adeu large uoiotur, utquou, ludor oleum redoleat.

Ad almm laxan*it;i tffmflnm ptoitofiti oleo intmdum & Gene madidum quottde mane Co-
medendutn commciiiii.mir: quod pmtLMum luaviuctt iiaoaant nobii lubere videtur, inuutt Cncr-
leriu. V.P. BorelUobienrat

O!cot>dorci n cJlatur Pliniu *Oleum eti> « fuembra recreare culcin dickur*
BwnWa reacam i Vctciibu. *ulitannimum erat ole • corpus inungere, quod*
vigorem & robur ei addere exiftimabant, to tunum *confervare. Veru* n hie m< jamdudum obfo>
kv neq; immetto noitra lententia, pa tiiti quod ejuhiii^i inunCho rei lorditla tuibtt videtui nit-
um etiam quod cutis poros oblti ut, & tranlpiiaoonem impciut, qui nihtl (ajuun *oorfom* 'turn-

Oho quidem non Age* untum, ted Ik ornnu ir.fctf* cuninutm: Pim. 11 e. tp. quod Ck- rid Vir M. Malpighius m Bombyce alitq, expemimio «rom invenit. H?no obvia est, oleum mcicui Ipiraeda (ire pom quibia acr anrahitur 6c rtdtcor obi ammakulum IIIKO moiiur. Nee enni minimts hilce infcilrt rclpv»oo nunui necdi. Titjm <juim mjjoj-ibtn animiliUi*. qum jxxns nugK, dim vji.i tn hi* ten cicipicni,Jo majors proportione, plura, nuglif, per omni corpora parto ftifperU tn his (untqium in ribus illts.

* Hippoc. 1. cap. 5.

Oftcttn picemf puum extraliit, quod aqua nan faat W«. Vuleatum est (mquit *Senrifrtu-) lit figts nunum piceinquinavcui, cam aqui non mandet, fod olco abquo aut pingue Itq-icu. • ac.

Ola luprcnu rppo meltor est, mm inu ab amurca tuibatur. Summuni v. remotiffimum ik a nociva pane, nec fua Ipiffiuw ak »cre ixJfcu. p/««nti. Sj^if. Idem (ur apud M*er<A m Segnul. qui &*iru molum regKXiem,niell» inutn oppnunt die

Omun Aeabmdi moidtn vide apud Diotcortilam: item niodum paran^i ule diAum.

Otewn eriam e« oW (urodu pw«nm »J m^l« nw«>{>erunt I>w!coriJ«. & GjL-rius; qiaa- qium itlc exolet luraalonnn pfil|p*tiac dlad oleum hen dicai. hit in olco dlo conhaendw tao- runJiiti fohti grfmini ill* !«*«*

Dc Amurca mud tw lupema d«mii». Midttpk* ejui ufos dcfenbiHir a Catope, Vanonc n» Galmo Cohancllj. Aroorei fchp af«*» terend*meftow, utrormicenrat^ -i Mac,6cM Curail»noce»t, »w«e mure* btdant. Qiitrt& luram parkmm actedona 6c pivimencahorrcoru frumcnii roftjA^«iam contra tctedtno ac noxia ammalu unorcj alpergL Conirrentiic tna^tiix ad afc*» mvetersta. Reliqua vide apuJ autores ettans. Cum cnini ratiuru hodie medicina uis » ncc * f^1000 ^ Q ^ P*r*bilt» non ait operx pmium plurade ca dicere

r* Get. />». Ab JW#, /'M«« WM. C a QU*f trjrvt Otu fljlvfrfm). R. Pa tnilb <E>ltbt rut.

Cum Oleam Ciavinj a iyUcftn cukara uniiim Merri agnoCant Botanu, 8c tanvam (1 g M t t & » T i » o f t « m j f a i t v , f c h r l r e l h e n i c < l i r i v * n t l d o o t u l j ; i ^ i i c O l e j f t i u m a b O I < U n . . C M f e d a c c i d e n t i b i t a n f i i m d M i c r r e f t a t b e n d u m e f t : p r o m d e i n q . . > n e n o n o p u t d t g m u s p r o t i u .

y. «* I/nw caudKM & ramorum magnitudine Ofcar 6tivx non cedjr, homm tamen fitm^ f-peratuf, adde quod 6c fptna* per nmot poffidet [quarum tatnen Chiltuv m (kkujxione Ole* triv. Luiiejmcj; noil mcunur] tt&s mnur*, ncm liillimili interim figura. 1. Bt/br ccnurim compactfntdum prxcaium.^iivor timdent, led nunoreni, ftngoho . , no re mordati prxdttum. Adile c Cluio conwemhun. t^ium lativx Izriotem o turn niui>' curvo. Tota arbor intlenker saura cit.

O o d n Theophnffo pooihanhtt qmbotljuti OPMHIII UC to Olca dtitra tichiibt, GongnX hoc malum «<wnt.

i oxotuOlympSonifn nAoi«» coranan lobtoi apod Gnrcos tradit Pitniuv; \- < ex quo prkntn lletcula oorofwmu dr, ad iiu ulq, tempora durifle furt,

MjmWoifejtn fie Otnm Athemv ijiut traditur edlta in ccratninc J Minerra. Cncmm Ojcaller xque areillaj & caltilns amat acOfcfeum, & ciMcm in Ioc» provenir.

D>e viribui foliomni OluUn multa habent Dtofcondf Be Pliniia, qux apud tp(n lee pollut: not n>n iiiiultum hoc rc(p>^u differre ixjumus jh Olex Cmrx tolm, nili quod ^ oprando effica- ctora itnt; nee oleum ab omphaano Jill.it, tuli quod calkiuufik, potenciu aDngtc &. umen ci- ttrgu, 1 fix in uboa non vena, Itqum umen co quotUic barhumi vet u;:u upillot inunxent ca w twm morabimr.

Am*m *M Dmftmtft. Cfcim & denua captlloj inhtbot, (ur&ro 5c capitii uicera nunaiuia.

FJsmeh Ilu«in 6c DMcondi, in Sp^vc markimn Pimm, PJmjrreni DWcon.li, ex Olei, manat exquodam caudkx D*f*. pmgpc,crajfimtclk. retina tenuiu*, iaporedulu [meili. rim] non line naufca, ahum tolfcs, bdem prvipuedctrahw, duobittqrstha m Scniiru aque data. t&> bi- bere lorpeicmit, at dni penculum, uti liint cx&wndi-

IUvontcbtoi hiftorur mantrum Iwxm attulcnmtPcnafcLobelwi in Adr. cum inquitur, < I Monfpdii m vinci» mel ii>c EUnnwli (qu., led renilimum} caudicc mlnaatu tun- dnx: niniurum ei Olca arbore rugjari perqi.

ik cond>o, crnemie rete mcUeum oon (oTum obJo;c, (apore. led etum durancon moor- efpertn afimunt, (eq, c rimott* oortictbai paxtim (calpeilo itaciitn Utn eicepdSt noa i ad eiMORandum ted coam ad amkw impertiendu. Verum Donmli propenrdum nuuM nliivji. nigricanre qoilqaatn rteriet md tftui Luncl)«<uKtn |> itilLKit, prxleraa kftt maioitbiu tnaiCM,c quibca bmio mcQe Vqiair btex gkmnohn dtucbat, ;

TM*W>>>kqwndki, higore dentior er«debat, atque non urn Mel quim Maimam fpdk, Upon, coamaaaB, onumn »udk» *1» ocgufUrant. Hcc fie ^uta |*ubelw»* <J^w • «.

ibonii, Dvffu que bdirrnum f^ tvit Scamtonex limtle m j ntwiotMofed nmz Amtnnatao aibmtlant] qnam OUIInmgnum iimt dU fit, rerta ab C>|w ruljari oat Ura. Catemm lacrynu tirfl-» *J

1 earn •c vwb hebetudman IUkum ttvetc, unnam 8t nnles oera» «^ dolom lwt«, ,pania (allefe, iimp^iiBibft. In medicamentis quos, curati

1 juty. cit

O/ct Arilioechs GrfUitphiaascujus ptopigm fromitbas Olympomm ndaets conKufcantur (i modo folk cms forma* rotiquw olcu courrand, fupinam nan pyonim parts™ habcbant vindio-rcm, quoJ umcn prxter cum nemo proJidiCj inonlrrola potiu* various, qtwtn non Olc* tueaio vtletur.

ElxoftaphylosetiamGcoponntin AutorisOleam uvim% <aftt' rdipwn) eiuftdem farin* eflc v't. deenr: nsewmen puravcrimhujuffnodi fructum produa eo mJitionis gciwre quam ablaetariancrrri vocant, nec alioquoisvuigjri, ut illevult.

Vifcum baccis rubris & purpurafixtibus in olds nafci obfavarunc Bdlonms & i.hilim., quodeai ftenles reddit, undc Olivetorum Domini ramos mtegrs & nuximam pattern crdere cogutuur, n* vinutn latuii t'erpac.

3. Jambolens Garcia C D. J*mM<mk Imlt* fttit Ariutt J.B. 7*»WJ<m P*rw.

Frurex eft Mym cffigie, cortice ejuldem fcre colors cum Lennlci cortice: roJis Arbuti, fed Myrn virentii foliorum iapore. Pert is ftu&urn nttpnbu* OIIYW (CardubentlbuO liniilem, ted, gulhi admodum adftrmfcentem, 8c faucei contraHentem. Muni oonditur Otivarum modo.

Nul'uni uffim in mediant obrinct, led cditur cum Oriza co<us, rum appetdani excitat j noa Vfit. tarucn adniodutn Cilubns sftinuiur.

4. Qks MdUharu* Ntmh Jih, fr*8» r*a

* Aria-bepem f... Numb Aofa W-M. ?. 1 T.tt. ». At 7. Arbor Indica Fraxino fmiia, Olea /TMa»C. B. Numb folio & fructu Olea J. B. t. 1. 1. 6. 2. 8. Aciderach floribus alba fem- per wea; Her nun.

Arbor eft proceri, ciudicccrallo, cialbo flavefcnte, cortice cindo ntgricante ; necnon ramulu info, ecu frondibus umSrtis in Utum iliifilis,ornato. RMJIX a-irti, albiotu, atro-purpurco cortice u&a, graveolens, araara. A<M atrnrafi circa tenemres raiuulm proveniunc, ohlongo turunda^ acurmnara, in ambitu proiindo (errata, tenuta, giabra, nitentu, Kraveoictitia, amara ; nenrti ali-quot e media colb nifcincaJR- cxtuberanre, ic fltu'm per hr^k-Jmat) medium mxquaJitcr (e- cantj in Aiterj excitrcnbnui. Flora pcoo/tpobots obftractmarfncplebovenJpn, ciigui, catuidd, in- odon, cjlvd que exguo, vuidi, in ijiin j, llacunu ttitmlftfrm 1880 in herent, quinquo w.taihu* (uliolii conitant>j medium occupance calycis tmbrato, exi <xio, fubtiavn, jttmnmU lieaem anti- nante, necnon lun^uiti 1 mncm, fym, extremas calycis oras otjjitin >>> iuperanreni, tun I fo- cusa^inNara(1bjuicic<)Ku<> KxnWim proventum t, oblongo rut umli, Oltvts minoribus mnl hud i>lt miles, prtm foen<> dein purntiMltente*, cenui pellicula oniti, carne (jolcofj, acn ac ainari intus refem, mtra quam officuJtun locatur oblongum, nucleum incluLtns albicantcin.

Creokit loc» areno/ts circa Trnwmvr, ncemb in Tmtwerjn, JtjftmfMtium, ahiique mfula; ZtUdH Locus. has. Semper two. Qjiounnis riorft & fiiiium dat.

£ frueSbosOleum expn'muur, c quopictorn colores confiaunt pannH goiTviums pinpjndis. PM U

E folia in aqua aotta, balneum paratur, vanolit expellendif, 6c axttcolorun dotoribus nmiganda Vjm. mile

£x ii(3cm rohts ficcan^, pulventattt, ficcum O!co \$ fru^ibtK xpre/Tu miun ungueruum oonti- tur, quod parnUudolcnubtu,convullit & (juuiio aHvOt* utihrer inungtiur: & vulaera, pundurai & contractiones nervorum mr<i.

Folia iBDi (ioaai live per m fimp<ii- (atm, am aim rtno.aur aqua, auc (jllinaf iu(cuJo mixtus, five umbilKo Enrpoftntadt (rjus, aut ctim fellii bubtili, a ceo ant Aloes taiuillo, ad omntt gonont lum- hicoi c'p'ellendns penitilis eft CJuamobrem ramiliaic atimodum 8c perquam lalubre elt niediu- mentunitWinil>!<Mal.ibjr tncolH, quonum bmbriidi valde iunt abnoxii.

Garcia^ & Aofota Nin>bo arborem Fraxino comprant turn inagnitudine, turn (peck extenu pro- aA innitmcibH, qianivi^ folia Fraxincii dillimilia lint.

feritudo.

K*rtbt*fi* N,mi* slttrs II. M. P. 4. 7*. <i. p. 109.

Arbor eft prxctHa fie fpec>U plurunum, caudice pracraftb, atbtcante, cortice obdudo nign- cancc, graveolente, amai o ; necnon plurim donato laniiJu rubicundii ac bnuginoik SUJat albi^am, atro purpureo coctice tea*. F*i» Aria-bepem roKi* haud abiimiua, at rmnon, oJont in- gran & liibhurci, iapofis aodo-arrun. Plmti haud fecuiJtiUtus floret raccuiatim praveniunt, exi- pii, catiaidj, erarooowotM, calyciqtic cxtguo, mh>, III quinque laciniai aointinaui fertu inhxreti- m, qmnquefobol>at- minai ximpoliu: loltula hitc intercrajdutK docem ifimmmU Candida, njtn *fuAm <> rutij medium occurmre /;/# «nui, albicante, Ctpttulo m d b ftwrf* Ana-bepou fru- Abui fimikt, ac rocundi & intenliorc purpura unftt

Prowetut j>lunbus loci* in Malabar, prajfertim drca Af*ti*)m*A-. Semper rirer: quounni* bit ttoret Ac fr iict.im c>itt.

E fru diUti fitlee oleum exptmmir. E« abfora fotm ttnenonbw in lade dulu coAm tc coatc. Fict. :apUlma ooncxur, quod (erpennum aUocuma, vaomatunim aninulium tmriibui mtdctu. Ei liMcM cum Ans-hfm folm in aqua coctit Apo/^ma paratur, fdsob* paulentialibut alu ^, rnxbu nuLignu perquam utile Radii quoquo BKKIO lumpta jtruni'mofat-

6. Ok* fjtvt/r* hUl*Sf*Tu; frmQm JmU*. Ptrm-Jur* H. M. P. 4. T. M- p. (t.

H. M.

Arbor est vafsa- m jgniriunK.caudicecraillb, cortice craflb, cincreo, intuptirpureo, 1 indio; non ramula vmdi tulcs, pktmmlqua virgula puUulannbus donato; lignum albawajs, acnlum, iib*c fum. /U4x itiiisu albtcam. mbKundo oUlwtj conice, qui tutiu.L nigiiicanu iniopep toctus est tape* (Lbamarw, odor tertctfro. F*lt*, quar pnmo exortu rufa ac pi tata circ 1 ramuk. teneriores prKj eniunt, i hi c&cnevorunt oblongorot.,nii lunt, m liiwnifi, in -1mbau crenata, denfa, glabra, acre viciata, l_f>|endcntu: fapor aodU pnum, dan jnuru*. I iro fuavo-olentes, candidi, extromil : arcuhs in :cr foba prateniunt, tnaAm nimum q iumam]< ngis, quibus breuibus petiolis ad-harent, quinque oblonpi, at in pjunma tenuia HUtiicjita, cenu inftar, circa extremitates diuifis roliolt* cooftuwes at% cuyu viriji m < ung, lacinus acan iinaut lefto inharente. rufis aliquot fa-mtm\ u crettb nwdiam riorn caviuct ; our jfftm promi: ilbicim, cupa tula globuks euguiu, croceut. Fr^Sfm 1 iari fertilitate i ixiot succedunt, cum formi, tun) liibftan-iti fle nugmtxlincMliuui mafonbui in ules, fim.l<n quog, oonnente* nuclcum: M J:uri cartulo-purpurei, acido tiulecs, graik]ue bptirn>, mtnut. iari vero fi ;velcentes,aufte:i, lukar

Leon & Tempus, Ufa.

"rovent in Mangati ali -que Movuiutt Malabar ; quDeaontf b> Roret rructuitjue fert, Martio viz. & Octobri menibus, diuque fuperflcs manet.
OK, rum fructus hi in iclicitt uitnoii -non Gecharo condiuntur, acuti Olivx inwona & accto Icrvanrur pro jUidsr, iniue cum cib> inter praodendum 6c ornandum comctfi renrttcahint roborao, ac aUmctorum tn co teinwrnaooeni potnter |u?ant.

7. *Linarda Brasiliae* Marcgr, AT** Brsf&ffii i*mm Elam fimU fmUtn, f&»i fpmstm, jUftU* virtiuiMm, frmdm OUv* fpai & m*p#mJm.

Arbor ca alta, caudhx tuad *i crarb. cortice giabro, ac gtiico. Creclit fere ad rnodum Fa Sen in rainu>duo temper libi oppoBa, & tenium toltuium ii BSWI tolia pi i bmis, interdum tenus puiuntm' coj iugtinoniba' fto' m' f' m' oim ITTM" loioioi, CJ,trec:, i, vii, UJ, mo] ita iik* r di* toast antenu* acamuuu, tnftu {<:->. I: .ami ctorttai t gta cam iudim, & vena oblique uicurrentibus. Ad foli iouvtuunt ooprijjtyiWi; raocmiam feu vernalb 1 in congelit, plane parvuli, quatuor >r foliola vini dibtttcor tdlirx fi>; >ola autem tIU rindu in ambicu J ba lincolli f i nt cirvuiw*U* & in n>iiKr nVx> luiw abnuoc f*mmU Oivefcvencu. Poft fiorem (equitur / raitm, ma uadms gm hR i Olive, colore M>li gtanan, habou intut pulpam oiiorilcram, Ila est & LtJuynu jrboru. ' tex qwpe vulncrattu una nocterdinam fundic <xWati(fiam>, odore Anedn 1 uocentis contily qu< po A ic culuKt pijteft : uifililk^uiii habet Minna;* oolpran n riidi p illide flavescencom j ac commodc tractari manu tu potest- intignts est ad rulnra'capttit, fie ad oirniu ad qux gummi Elms ulurpatur.

Leon, Ufa.

Coi am exere t<ro non incadam fi maza ^m | . K m max fy * r j j j x odorem. In annoit. 6: dfu-> nemorAu i limlkfcleakj quod tamen tKiftroOfffcinaniam,urpote rceaan- Iti umni topKo, live ftmplex lit, five oompolitum, ii vJnerf Se ad interior* mala adco eipcDntm, uc vis ulli unquam emplafiro (lotiucululi »el ceraco a inquit i].:im liuiu Viioera citim roborare, flattu dii&furc & dolonbtu tdiciter to* quociturn cxj> citu*.

8. *Azadaraeth arbor* Frtxmt f lu, foci carlio C. B. Azadaraeth arbor J. B, Azadaraeth Avuim* Park V.tt.jfbm alia Ger. Zbt Dead trff.

Iusta magnitudinis est abor, cortice in novella lam, in aduunuka fcabro & rwnoio- I'''''''' au, obtco longitwa, c toiioln tmikitdbt mutuo relpondenobw, ad coftam ^ ^ m MBWdbMoaoiMMi^w n H '. bai k nar^in*--!! & ^ '''' hpnema u a tmfca* but. [Clul Barbceaprirur fb)i» amipaRUj Ftrnn c loogn pecbculodod^ante tnxflrtt in rar ulcolorum extrem n <d amrntm foborum copWC racenurini enluuMW*, panri, odorta, ia- >ore ndiu, « qurn-4, foliulit expanln omAante*, in quorum modio \elun calyx (ongMifaitui, at ptif pureo ntrgKam, w quo flau uua Mutibui lucovdunt baas multa-, lutcar, magnj, aman cum dul* aidant, iniiNi vindes, nuturiute camicantef, magnirudtne Melpili Attmia*, firtiiU, in-)trati Ijpoftb. in q-AU« nuiJa duri, elegankt anguJo4i, tune peiuagoni, nunc hesagotu medullam continent aliam, . tiic ingrtjanv,

De loco natali hujus arboris, ,bi lu. fpointe pro%cutmilnl com rradmim tveokx In hortff <*> man virdarin fit iuz, Hispania > Gallu, atqic etum Anglut froquem colitur. Vena que huc arbori (si m...) odi> Azedaraeth lit) ab Ankenna mbuuncur, vide apud J. B. *» que [lit: Avicenna tradit (in nolmaihe . ataiati plami in< >erne uni, >vtoQj3*» « m oon intink* ^opemodum ali utUc*. VI. uo fuafer Martholia ut onna careant, qu hanc arborem in virdarin alunt, ne forte 'Uprudcrr, en, ^pn(Nam & Rauwolfius tefur uctus a d i d f l e o * nq, ufi canis moei, colit Chidius tota hyeme in arbore durare nullis deguffantibus aribus. E. uos Montachi conficiunt, id preces dinumerandas, hinc Arbor de qh irt / Ib Ab & itUtrat. bua Dead trre dicitur.

CAP. XII.

Pntwfr Md*h>Tte* fru&» rac<»*of» ptrve, atri, face Un3oru> KMtom-Tijttm fr* Cbr* H. M., P. 4. T-9- p-19-*

H. M.

Prxelfa est arbor & speciosa piummum, *tmUkt* craffo, multique ramis *longi* larfque difper-
fis, ac cinerco cortice c&is ornato, rarrmlis tamen tencnoribus vindibui *Lteittm* albaro,
denfum, furvo ac Unuginofco cortice munitum, itque vulneratus lachrymam hmdit rubtcun-
dam, glutinofsm, graveolentem, acernmam ac uremem, qux radits Soianbus tandem nigrdat.
R4JIX albicms, furvo corcicc te&a, inoJora, laporis unduofi, necnofi .icns & urentii. *Ftiut* inor-
ditucim circa ramutos piovmunc, fmchinum arcircr lonea, & polltcern aut lcfqntpolliccm *Uu*, lu-
perntf eolote atro-%id: nicencia, fubnis dilutiora. Cofta media tirnnq, alte extuberac. Sapor
acris 6c urens, liccunitj, continent rubicumium, itidem atrem & urentem, cut^mq, exulccianteni uti
Ranunculus. *Fivrt> t* rarrmlonim extremis racematim profertj peciolre o[longi], vifidibu* &c lurlii-
tis, candore inliges., tencros, (iiaicolmcjsj qui tamen odor in fmgularibus vix percipitur, fapori
acris ac uremif, c auim), pculu acuminack, lanuginofis, & in orbem expanfis compofitos, in quo-
mm medio tibrx alba- rubicundii *Sc* ntgncancibus *apicibus* ornata, quarum nonnulla inter foliola
expanfje, nonnullje vero ercaat cernuntur. Floleubs pan rernlitare (necciunt *frmHm* parvt, ex ro-
tundo oblon^i, *wtjs* arrulck m.^onbus, qua: Grxus Bifu^w djcunrur, cum tormi, turn nugiuru-
Sae perquam Jimilw primum vijides, paulo ante matunutem elaud & tanu^inoli, tandem rtu-
tuFfcctens arrexcerulci & glabn, imuique came (iibfuica, luccuicnu, necnon gfanntwl, acri ac
urentereturn; intri quamolltciluni locitm oblongurn, nucleum cotuinensaltwanteni. unduolium,
amaniilaiium&c lubaucm, forma AVCILMU- haud ablimilem.

Dacur huius at buns vari<ra\$ fru^u rorundOj nigricante, cetera limtlis

Nifatur ubtque m Malabar, locis cum lylveftnbusj turn monunis, necnon in fluminum ripts: *Lous.*
perprou frondetj floret am fiurtus rert, manctque liiperOcs ad loo. non rar6 annum. Colimr
pleruntf, in agns ubi Orj-za aut frumentiim provenit, ad aviculas Uelcteni clui quatiuce pellendii.

Carterum ex ligno iwviculi; Hunt minoro, Indigents *Mny*m Avx.*

Lachn'iaa c corn*., necnoa fruduua lucai acn & (jlutiiiolo, adntixu calec. pi^orcsumnturai] *Vf''*
Lina gofEpina vanis hgurii nulelebilli cotoro pirtgemL. I-*ruduun* tiecodto in iactc duki pota Sea-
bii, t^'''i >-ti'in >D>. • ! ca f fagida, volt^ni, oohdd cruciatu»», alltejue alfittb e vltc .iU,
pindnm & ruraloQni hurort'Smnm conduc K. SOCCM i fn6tboi & arboiis curnce expn-
ac dentiUis adnot.:-, »U)it.il^uni Uiu; n^cnou r. moebus frigidis app. icatus cutem erodendo ac
vlicuLis exuundo, cm .tpo n.

Reperiuntur inter Inctos qmby* arbor h*c noxiutn est venenum, atq, ex levi ejus actadu totum
corpus mirum in moJum incuniat; quoJ IJMpeonu bfte, butyiOj auc olco atfumpco profinns nn-
tyaair.

CAP. XIII.

Prwum'hUic rstemest, fn&u prfwmi. Tm* II. M. P. 4. T. 10. p. \.*

fit Al.

Arbor est procera, *OmOtt* crasfb, ramb fiUbrii, vitklr uncteei, hinc itiite in orbem JjrKifis
donato. Lignum ex alborlarefcens, c<itic;ra(C>, *gtabrOj* cinerco, imiucroeo tedum,
culjis nutux don, irufoftri-ita. *Rtiitx* albaru, fiirvo cortice anda, immorJ, inJijuda,
necno; fibris fuis lunge Uteque per MTtm <iJTu. *Fain* juxta ramuicft extremm nxundis, vtndU
intennbus ac oblongis petiolis, plara simul juncta proveniant, oblongo-rotunda, acuminata, denfa,
glabra, longitudine fpathamam, lantudine palmum facile fuperantia, fupeme obfcuro virore fplen-
dentia, fubtus dilutiora: odor nullus, fapor fylveftris. *Flores* itidem extremis farculis inter folia
proveniunt, in pediculis communiUis Ipithanuni longH, quibus racrrrutim adhxrene etigui, (uave-
olem., inipai i, (jiiinq, i>WortRiMMUnis c viiidi albtcantibus fbltolu vix apertnconitante*, ad6
ut gemmis non minus quim Horibus af&niUari quwnt; decctn ex albo Havetcentbtii *ftmmmlu*,
apicibus ornatis, median: ti >i is caviuicem occupanoboft Flofcults pan teniluate *fruiim* iucceduntj
pjrfortnet, Prun» nujonbtu nugnitudine haud ablimitet, cortice tenui, undique cat ni adhxremc,
fjtabro, nitente ac rublaindo cinch, «rne viruli, inunilenta, inttpida, innw refitti; intra quani ol-
lailjmi locaturoblonjjo-rocundum, nucleum tontincni candidum, grau (jporii, ac Nod AvetUne
hatui abnmilem.

Crefat Ioc<arenofii m *PdJmjtt*, *B*JUtt*, alnfijue protinciif Malabar; fempw froodflit, floret, *Lous.*
ftlqic Tert, atq, non rar6 duo fmiRifera mana (eculi.

Hujui liRnum open rabrili accotnmodiim, cs oSque ingentw cifta- Sc nave* fibncantur: necnon t>fa &
« arbonbus excavatts NaTtcula Indi konh.ii.nc, quas *AUni*— appellant. (v.

Fruftuum nuclei in cduliii funt, tique in pulvere renacli endemia: illi Cadiexi* (qu, *Pitas*
luuuni* appcltatur) medentur, «q, oculocuni v<u emexidam 1 Adhxc exprertiim ex nkfem oleum
capilk hi nut capi» inunftum ArborU cortex Anndomm habetur noxio veneno, njod ex atbora
rr<_t ejiive FiucitUuquoainq, moJocontnihitur; ilqitcmmunllin^i contrine d
fttiU pauxillo tune exhibetur. Infupcr tortitrt huiui Si tadinc fUSEOL own O-iaa fl lacto deco-

CAP. XIV.

* P. 4. T. 19. 1. Prunifera fntm vif unio parva, nucleis ignavis. ?«rmfi» * HA1. Aritrifamm* Ntrf*. t a-

ARbor est procera, caudk* admodum cwflb, muluique rirno in otbemdirTufb donato; qui cortice atjo-porpureo, intiu vindi obduAi, ac medulla inrui fv.n^cni fit albk.mte referri (unt. lignum ftiYctaim, praJunmi, cofctke phoeruceo, intu* iuib uiKiua, ir.<xior fipidum. A*/'» fti«rcens, albicante comce teda, necoon fihns lu» longi Ueque pe. «f ram dif- fua; fapor (ubdukis. FWM buu Sc hiru iibi tm'icem oppo^ci tencrut ibu* lurculi ium» ob- Ionjp>rotunit, acuraiiuo, dcmla, icptcin uiicui lonRa, tro qtututnw Uta, Jt;o nn lu, iuperne Ipicmentu, infemi naju*quam: odor fuvis, ijpot iubiulu. /:;.-.* in MiMum tiblor OR um di- Befst, cwrcmn rimuli* conrentunt, ftellni, Sambuci floribwfonna hauJ Abfimile*, quio^ teniHw*. oblonKCKeredbiu, c rufo viridibus, nitentiliui, iimtt cutdula & lanuginolit fuliolu c> i.iitantes, A*. t»nM.» aliquot allwcinnbw, aurcit sfuAm JLxiut, incduni Aoiculi canowm & unibiikum oecu- panttbut; inter qux /; /w prodic Ktvcltxn*, eupius, ipiu* fniaii* rudimentum. At verA «iff» nomni gemmulx vtx qturuor mennum fpaito in tioiculo* (dc etpandunt, luntque rorundjc ac vir- do, ffcxnon W/ct vindi inquinoue fubrocunda toliou divifo mhacrew: odor nuUuj, fep« lobaltrm- j^cn*. *>*3wpariter raccaam rreiqicfH* lixxrelot obtot^o-rotundi, duo plauikfc j civo artil- lime iimul jincti, und o pnimim at lanugnoii, nuiinora vcro lubHavelcentet 6> riat, at ficcati &tn ruggi fit fiifeu Tencnora, autem Fajuimodi frikftui arnc inru* ilbioante, moili, *t vilcofi

p* qux undent m... in nuocn tocundam fie fiilcam, Nudeun mn» toncincutent candiium, durum, acrcm, modorum-

Crefat variu in lylvH Malatwr; perpetui nret, quoomni* matura exhibct fniAus, aiqoc • Qn» Uaook anno 4.i usnd imum nan rat A fnigifaa -

Ex irb-iri. huM luuw ctibar* te peaum fiunc fiurttu tunni* Urandii & abftergendis iii nr, (apoot r«») • & aqua MI lcvoqueiida fit depuraoda. LjuKicm fpumateinporilwitttttMri

Fruchiun m Mui tixnmii: •• sihibeaur, coboot ovciuiot (B^b *14' { McuM vixw modi* ad alitx arfecih-

KUil in MU conwmnu decoA> balneum nt atunhruKum. niter Sc nxxnu Zaat- berc ac O m m finnine in idua communi decofki utuib tnta Sc xhuUu paralyti, iwaioti I I :olonbut luodcrar.

A; r Japonia Americana.

Brazilianum Pilo Max|tr. Mm*/* Sponaria non edulis O B. Ssfun* ffktrt-U *rb*m J. B. Fr. exatum 16. cap. 16. lib. 2. Ess. CJul

Pumili i est arbor, comce bnereo ut Fraxinia, Itgno molli fie fragili, ramii conform inftar Rub* . Sals. late viridia, lonR.1, non (errata, Iplendentu.nuaruor, quinq, aut tex digitm longa, o p j ^ ^ | vel foliarie posita. lum inordinate pommrur- Flmlm est exiguu. In linfnunbut um Ju multof fert fructus; quilibet proprio p&itulo inliJrt, dupltectn rotunotm eminentum habctb iillar na> num aut mammarunt, nugnitudine glob iut rai(o:c, rotundui, flavus, inftar cerx splen- dem & transp. -ixicni, ut utglobdu ake qui int> Utet rtden potiit, qui rrodu oamtufo tumentit, nam am; Ueft carkai: cafo»ircunijc<rta haudoaili, aitiioili teda, lena fit gknin- pomi vixm etpteai, ooJeni cium modo (pununi excttae: ajnatiHinu Cipun*, HOC ab ulU x*t g* itatur; idou & creber cju* ulut vlliiivcnnt nota- Glohului in fiuitu concnati niger, JunjSniiB. rotundus, magnitudmo CenUif ac in co nucleic alb»»» pelbadi n di inftar Avelluu: tc*> a, figuram capis Pistaci cum suo rostro h. iient, ipante jrrilibib>

Ex his perforata sphenula fiunt ptecatonx, Dxao prxftantcm & kvwra. Frustia riKiile Octot i mature, ut.

Non valde dissimil, crit ofliculo siipenorii fiuAu*, qui Nuot purgatnci* appellatione niittcattit (inquit Chofra) j return wbiutLireni, ut die Kabebat iomuni (c can Jem nugnitudincni; hu|ut> coin tioii aJconigef.fedtulcu* potint, inquoapporeboni iubUvcftentesqua-dam ven*. Al*> ruttu cmprcenhurn hufic, & nucleum duntaut alKuus fruAui die apnarbat: nam "chua verficolore substantia c •fiftart dcprehendtbMur, magnu macula jJbt> tuka; ^itiUWLT fc Uu» molli (ut quai cukello tine Jil&vuluic toudi poOet) penuixni

C A P . XV.

•ifat ffitvfrtu amara, Mthald fnuta J. B, Ctttfm XV, fat Ctrtfo •\$%!* C.B. Mthald Gefatri Ger. MacbaUb Gtrmamcum Park. <fm C. Rauhuuum rfrttxnJtt, ijujJ attfmdat Ma dtaitk Mlftbiolt & Gtfneri. fiorll CfjCtrp.

J. B.

Arbor est Cerafo (jtis fimilis, ramota & fitjbulofi, caudiec, tefte Dal plerun^ "intorto, cor tico lirtppi, Icjbro, Juboncreo, ramorum vcr6 cortice ex eorruico ntgricanti; Lrvi, colore ocuJis non ingrato; rajicibms crafiis, mulcis, brachjatis. To/w Betut.tcos timilia aut Po jnili meir, niinoraj paulo minus lara qulm longa, cohunni- in anibitu Lrennu, Pruni lytv-Lcciuu & pallidius rircmu, vcioyofi. Flcrtt odoni grJti, penupctali, ci-cbris ftaminibus nisimin oupancu bus, feu nits intus candklis, apicc rubro coronam, Ceraiorum Hort-... pedu- cuhsbrevibuvvix unallibus, plunbus ab uno pediculo longiore & r... qubus succo- <\K parvus frufm, cFfigie CcraJi, rotundtis, nigefj am.incans, daduri... !iai...i Ccrafi, fii nuclo .wuiicatite, ciuMimijiic iitwns cum Cc.-tii nuclei*. H... > lucaq plena; purptiuxv qui exprdTus in... que munda feundida rioiilifUnii purpu; i tmgir, cotori roe nigefj nec 6 b >1 diutiffim^ p...

ndum & collium locis nafcitur, non tafteoneni per Rtnoonitonj llekeriam, Gal- Bun & Gerauntam i CJnde Gethcrus Charuic»afum petraxam aui Pi... n tlcnoninandam putavie. Nos in lupibus ptop^ Giatianopokhj qua iti« .id nuxunum Carthutiinurum urnobium, obferravimuj.

dafn M itluLb Syriacum A Germanico feparat, 6c C B-uihinum reprchenJit quid ea m Daluthampiuu Arbulculam qtue Arjbibui Machilcb dicitur; (t ex Sj-na advchiuur ubique uici LiiK-tunniii per (;pis nalcu .iflerit, fed irboCc humiiorc, fiuctu minus Kabtto, nudo 9c femine reunion; & grariliore, fbljo imuniiorc, I lore .ilbo, &c B^Uontum libi retulilte, iini- nibiK ejus, quxodorata (unt, utiLiigduni illos qm Ciuroiheccas odonbus imbuunt. Undeconilac Beltomuni: cu Machilc... leb Syrucum oprime cogiutum fiuit,a GetminitO circa Lagdununi tulwente non divcriiim exiftin...

BaccisirucuiiTurdi, Merul*. alia que avicula avidit Emiwcantur. Nuclei hujis frndut calfa- i; i; ctunt, eniolluur, li; *in.iti<» Robulo* ntgredtuitiir, pilliik|uehomdtorej 8: dunorocmolliuuit&at- tenuant attractu crebro. Marti, quib; n n6b & tx> fiderandum.

An... alt i W » (cu Lacara lit, ut... AnPJinu Vacanimm. ut nonnullt «ifti- mant, oatnino mcrtufu eft, neq, ex eorum vab» unrumliber colliiti «ut amdudi p<xdt.

cfiv. XVI.

A. Cerafo a Avmm mgrt & TJtcamf* Ger. rac*m>fm ftmilu mm tJn'i C. B Ctrsfm rtetmf* ' quib; \Um, elm ?sdm J. R O. avinm rttimf* Park. ^1)C tOdfc <CIIIltt ttjCtpp, 9) SMrtjt Ctjrrrp..

~^Audice, runts, cortice, crenatifque fJtu ad Cerafum qu.nn p... maturdqtue thiChi, aut en BUCUro, inh-a raddunmr can...

^ Ion git 11 .i Cerali falu abell; viden poffine. igo, rtoemanm convent, ut in Labumo, Ceralorum rtoribut iimil^ .nonnilnl odoraci, t.in.li.ii, pcua- peuli, apicibus luceti, pedipilo iciimtitiali. t'niim mzri, duko, iv>n tamen adnxxlum grati, otli- ctilo diiro oblongo, dabro nuclem cotuinentc. Dakcn. (dibit ibics iuritiinil- redulere, nee nit- oifadenti Rr.iw>qu,im Mali Cimar flora: 1-ruclum gullanti accir>um, MelpiUoei''' grave quikjatn cum niAiulitur, lujibusaHijnt'ent Id ci adntracion^ n ;> ibler... Ira mooodu uiveni- L*m. n-Ku'HB Ualilex vianitj mqc Lodutingkii, item dm Gciicvam & Lugdunum pro. venit.

SeminA German) commendam ad epilcpiiai puciocum ap[wnU tolia ScbwMthf. Frodta cibui avicula gran'a, quo 8c piftfi <tc4cf>ittur, ventm guftut tngruu lunij ^ tacile naucam movent.

C A F . XVII.

Lauro-cerafo t G<r. J.B. Clof Cmfm /<» /jurnw C B- . " ' w T>*frtJw<nM, _^w r^/w Parlc. €%t Cljtrrp 2><p, common Ip tallto rfr latrttl.

7. it.

P... ti eft arbor Lauroccralu*, Tonuu aemx, Otriorum loh.» jcqiantii, ruln>i t kl 'uortm triumvc digitorum Utitiuine, obker per mjigi... rwc mi^nti-, larvu, pmgiuuloil*, t... tn percomt nernu aaffi... r, una« line ordinc in oral MOITU . iud it i m... m iicuf , tnniultt jlte;nu4. Kjniilorum ugttci fitMi ell, lignum interne album. I OHHlf< * * * ^ a "

venillis *rtma fen fullu* Ly inter lupcnoro anni folia, digiuli> longttudints, eniEukLilas, M < *mbna*
 bferi pedtuito numcrott, & ratemi in niodium confetti lufainiur jwo, cindidi, penuptali
 t> in umbilii ambitu ftimim:lis[>rxdir, odorii unien expertet (./••'] Succedit *fruiimt*, |
 duldt, Ceraio ptulo major, lublonRiu, ex ciErujco rubdeen*. Sub pulpa, *non kma** biiu ant
 ecna/ptina (win frudu CotiftantmopoJi j i t : ium millo) plurimum acedentLrad Lixi At
 femina, Icduffioilum unkutn I Ceraali officulo fume, longus tament, *lq* Ore amaro, adCereLinu-
 cfeot accedente, naq, fiutuJe quicquam habet cur: *Guayana volgo dicta.*

Ltmt.

A Trapezunte piiroum ConiKinuno[^] in alata dicitur; r; inde in lulijni, Galliam, Gernui
 Anglum, iWi f<|iiciitiliinu lubet^i in ltdnu M »ir>darib, felicitere, yV ^ ^ ^ HMCI, tmtt.
 pchath: " il enim frigoris patitur illima, Sc lifemo noftras ei. Itta tontem-
 uimLHchcndit, *crillime creick & in a* bonan JLOZ nugwtiv *anis brevi* :vi<lf; <ipcnb
 minia commoda ob ramos lubio crallit *anis brevi* :vi<lf; <ipcnb
 rnrwt & lignofoi, n 8: folia *j6boi* (cd nudo* in coi

Ego can nj. BaiihinoexiAimo Ctufumduot tVnriUicoofuditTc, oempe Laanxerafi aim'
 cans. Nce enim mthi venlimile vtdaur "mum eidanque irboretn l;udu» tanrope:c differenwi
 proferre.

De vinbys htifui irborn ejufve tmiuum in malniru ttihd tradifum invent*'.
 —————

• CAP.. XVlll.

CtfJim AtaacMmm Hernandez fc» Ctrfv JmUm lulus.

A *numi* Rbor eft medioer» mjRnkudww, fJm AmyGAU ant Ccrafi otAam. minutim ferrat^
 nimi tattiatant <iepwklenobu; < qoibi. *acini hunc Ceraia noftraub" >""ia, color,*
 i «, ^mtuilincgffibui 6c nuefciiiimilev N - :un paululum luniaodi <
 3, c<quifiliin matuntatem alicuti duke* & guftii* aratill: *Temperato cereo gaudet, & apud*
 Floret rere *erUm xltamn largitor* *& humana diligentiâ provenit.*
 T tnpncfibulinic JI^w^ luapec duuuu t *critica decocti per quandeck n*
 < -m liip>T jutl'ici t rftu aruani knit. Ji» ton *ulatur. Ex fructu*
 inl*>iati>, & 3]. pundre lunijiitt, dylnterianicurat, Ptlrtt inHjmrntiwiibuj opu *ulicam frequen-*
 :c pane Gt potio: led alunennun mdancholicutii prebet, & i *is n*
 :eft. *Triplicis hant tales* r, turn dentet nigiedinc inhcit, ememiin tantcii da *diatru* akm P^'
 Prunorum carcer a. *irbon*, (bd fructuuntum ditTecun^ (iqtudan A'I<IM <J;
 i i arater magmcuditic: *UtimMtlm* piulu nunorem; acuniiaii.ni minim
 unnrerthn »CTO omnea ra«cnum tkpmwnteni

CAP. XIX,

1. M**gd *Indica fmBm m*im mufmm. Af**gm* Park. Mm%om fivt Ami* J. B *Ftrfatj*
 <)# C a ^mjgdslamrtftrtm t'rwrtim hrfum J. ft *&f flPongO Ircf. '

//. lf.

V *Alta* (lire aifeur, Jkitihitw 40, crafiitic ih pedum, niulcilj, ramu in ocpem lon>; *latet,*
 1 dtvuti: qui cut nec gtabro, ann-vindi, at mtente tnuitt, ubi incidunnir bquo*
 lant fuffium, liLweolcmem, aoctn, amamm. L w w albicam, moU& ^c,*^1^
 cortKc oUuaum ctalfe, IUBio, & nicrkante j Uquu ndneratu* itufcm uchnmum fuodit f
 ;m & tenMetn, quic *rub* *colanth* *(i(pnimim aniiiv cotuHUNOHnylptdiw.* *¶**.**
 albKam, jcortioc *atio*, pwpuren, at incut craodoteda, nocnoti riUu lias tatepor (ctjtn In
 (apor artu:i>, odor aromariau. fWu buu, tenu am quattrn *poJc*
 fiatrent, r(Morten rotunda, «xnU, elabra, lnn|ptL *ine ipahamam, latitudine p... fupercantia,*
 fttpe me (pkndoitia cnlore nndi-tuku, Infcmc viridi dilution:
 ft in utriqre paxte ahe extubcrum, c qua n<mili aGquot tra *n HCUB, 10 TCI* 1*
 < n] ropntora ver«u* cxeumint, in ambitu non farau; *odor huz* r», lapnraronut:.
 smpeMU ptcnjpqre lubmb/a (urn. *Feru* ramuorum ciiftmr* racem
 i-i rin *calreco* vimii inquinuc UcWM ledo prixi
 ht. |p<J^ *kennbuJB* *stiff* dotatit *Uacet ludi vim modum inter flBth*
 ui quarum mctM) /;< podkafitui: odortiuvbac meUcus, lapor aromickuk *Fructu oblongo*
 **«Mk, plani, adutut levit: *finuan,* ~nx\\ fonnx luui abitnulct, ovi *am anterimum magnitudine*
 f'tpM||m_ aflhi, niKOCa. ;riman v' tdct, altm in: *stiffi p... in viridi flavescetes, tan-* iWluiii.,
 ^u'ne tlivckente ai, lucculsnu TMAJi l'cHiu aut pntitaJ *truni carni hand abfimi)*
 acat primum, deinde acido-dulce, gratiqe (jpottt intia (Won, ac PCIKU! : *renu,* v||t,1, *Ijj
 mentiofa acia. Intra carnem officulium (oe *incuru oUonpnii, comprefLtn fc Unu[inololum[i^f*
 quaqueq tomerto aut *iuui>t>Ui. tranverfi im *t OUMJUC extwtentiibt^qpecitun^*
 rum cimen & valde *a m. fknd weieum mJudit, calUum, oblan^im*
 oblonge, cadente magnitudine, [candidum & *in Gave.] amaricantem non te-*
 men gultu mltavam

Crefit

Crescit foliole aut semibus lata in i mold) movinciis, ud tn Malabar, Goa, Guzarate, BJI agate, BengaU, Pegu, Malacca.Ormi:/. si

Arbor hxc pciperuim frondet, I ngulifiqu: annis ferncl aut bis matures profeir fiiiAu*. Colii- fncn*ii tempos cA a ciliJionbus regionibus menlc Aprili,in ferpnnis M->io 3c junm; mterdiujj eruni Odo ni 8c Novembn : atque a lationis anno lixto rel fcpimo ad centcfinium ulque frugi- few eft.

Csterum fruehtum horum haud (ecus ac Pomorum & Pyroram nofti atium vanx Jjncur fjv qux prorgoam natura 6c divcHitate plurimum van.mt.

Species autem illi line officulo, palaco admodum grata, vanecas tjneum leu degener fruehis no- bit videtur.

Edi tur luc frurtus in tirmnas (cctus, aut iiro: vino, ant ami vino maccrjtus; contlirus etum Sac' charo nt coninrodus alfcrvari podet: atque interduni cultcHo adapentur, & c in Cus medirullioni Zmgi ntt Allium, Sinapij Salcumolcofi: aceto mferguntur/ ut velciim Oiyia cdantj \c Olrvarmii condjt.irum tnodo.

Atque lux: modo condin htijus generis frudui ljodientini .id nm adfmnnir; nobis etum obser- vaniibiisoblonEorotunJi, plani leu pauLjlum compreHi, a>llatiu Icvitci iiruuti, rcoali turntr haud abltmiles; quilesco dstenbunt & depingum Honi Milab. Auctnes.

Quod ad temperamentum atunct, liigidutett & liumilliishie triwta, quamvis Medici Indi con- itarium affirmant. Unum hic cctiitit.uico pro carniutn afiaiamii condimento, eodem .mod. s, c, s, Cucumertis condim-Qu t^vntfdiilllis. Ljus ulliculbialiatisdv i>ii>ijl.ki.i ulth jiuuit,i(U>ii veiiim itk; deprehendit Garcia.

Ligumi aborif cum Sunlo in nfu eft comburtndis Gemilmni .cidavaibiis, utpotchm. rini facnuc: hinc SCCCKO ciltt liuntfcalet, in qwbus cadavjra rccoudunt: mtonci .uitcm molJior ell] ncc diu dur*.

C.iulesvicem Ar. 'na feu &ui*£>t fubcunt in manducatione Btttt; itdemque ciLinau ac in pul- vewn redacti vermicas tollunt. Evhilni tenenonibus <.ortiubus Avantcet, hoc oil, Ricim, (cniine (amiini, Sc ParpatUgant decodin tit, qux ttiffi, .illhnuu, ahilque thoradosai lectibus fummopere prodell- Arbotis cortex in p^ilvcrom redactus, & can [ufculo gilliruceo'exi^ butus fanguinem ex caluahaibi extanralatani & coaguUtum egregk- ilillolvit. Exprdlib c axtica ficcus cum albumtnc ovi S: tantilk) Opii aiCimjmis prWcnanenni contra durrhurmi, dyienteriam 5c teutumum eft ren> diuui (imUkwaarbomgmni & rionbusOnput. additoOpiitSc Fid- is pauxilli> niluU canfici- untur, que cuicunque ali fructu HIMW....

E nuclea hccatis fanna fit, ex eaque vati.i ubotum genera omticerc nonutt indigena. Hic fructus defcribitur a Cluio Exce. lib.1. cap. 16. fruct. 4. Amygdali facio fruttj c xotucus hifurtus J. if. ilill lib. j. cap to. \el ipfo juico, nihil rfad eft quam Mange fructus.

I, Amhiltn H. M P. I. F. 50. f-91. Mangg *\$nm fitrt f*rvt (ftButa, UCZM msjtrt t>, Scyn.

Arbor cil proocn^ nUDU in .ilnmi minus, Utc in tranfverfumliirunucn-j n.iL.nii,,,- ut areno- (i>: RaJtet longa, ^>erauillu ribri^ cjpjiilau. C*x4tet crallo, ad unius rtotrunn am, flexum, <>ni,c veltito crallo, ligno iUIII : ranut vcaJhoribuscinerett, tencrionbus vihdibuiSt emulco tore con- fperfit. Folia c^iijjtliu ex iltitlcti jJinnamm leu thliolorum ;• cum impari in extrema colla. Stint .yit-iii pmnac oblon go rotund .-, liin^imdinc ,ut taaaidincn term: M>IJ, antem * (Itluorc- li QOHA medu ncivi tranlvctfo refto ze parallelo « factu exeur, &c vide. F r^i in lui- cubl tJiiun, i vetiidioruni rjtnortim fummiunbiu > ; cellis, plures final proveniunt: Suntque In iurenli (ui& lulu) Liporu .Kitii & ^larum amart b^mili> ci <tu in (ru&tbu Mange, od .c quoiuuc * lufti & toiOk Sunt Aitem Hores parvuli ac jil>i, vclit ilclluu- > r^i in lui- cubl tJiiun, i vetiidioruni rjtnortim fummiunbiu > ; cellis, plures final proveniunt: it: Suntque In iurenli (ui& lulu) Liporu .Kitii & ^larum amart b^mili> ci <tu in (ru&tbu Mange, od .c quoiuuc * lufti & toiOk Sunt Aitem Hores parvuli ac jil>i, vclit ilclluu- > rum, ipworiirotundinBi in nilpidem contrada, ncuiou li^idiulcuia & nitentu in nu'dio flore. corculun) ell Hivuni, ttictiit primordium, qutxi fann* aroiraltani decem ve! duodecim , pro minrcro petalorum, parva, tamu, aibicuuu, ttntat Hiv is. 11 meditulbo OKCUII quinqve vel te\ minutx cufpidez vel l^ultciruticnt. Calyx quirujuetuliuu, vellw^,>!>li(>un» tumicm petalo:um, folis albica .nf:bu5 ac bievi-fculpidatis, Ciim florum gemmx erump unt omnibus las folas noiarur arbor, ac quaodiu floret, us demtuca clt cum itictibu> rurfus nova i-dia refumens. Fr dm in fur- culis flouferis petiolis longuiculis crallis, bnguid>, pand> Sc dnere .falci plurei limul pctideiu, oblongo rotund, duri, fimile truitibui jWjJt*. colore per matuntatem u id .claro, dein fubj .<>. ac aciditate munda p .Itui Scodoraiui, palpa .clca .;nti : din o ac grandi in mod .olle, quovl (> .1 fore fructus capacitatem r .filit, ac extci .is nervis -itgiuili* albicj .ubus renformiter ftriatu contex- rum e ft ac hinc inde tub cont vtura laciKiliKi) a . punctioni pe 1 ium, tnriu durum. Bu in anno floret, Sc 1 fructus fert.

Fit xum menfrum fuppe .liitn promovee radiu pmtcidis i .lita. Coriex ejus trita, & in lacte Firt. tads spoon oj 1 .ctieriz coufct, ad quod etiam IV4I HCC us ejus mifcus cum . .za, ex qua genus .nus, compari nomine Apes dictus conficitur. ! ijni] docofti proficue datur in gonorrhoea. rulioruni fuccus cu m fructu arboris truo a ^nbu indinu corum dolorem fedat.

V CstAmkdtm H- M.

A poor* dffert foli* minui RranAbu* ac mima oWong*: Fruau minus oWongn, nonnihil ro-
tundiort *c p*ulo minors, &por> *c*k>-anuri; ob quern mtnt lunt in cdtifim nee tam uberi pm-
ventu in Ciroiln.
Vtribujcum pnrcedeme convenit

CAP. XX.

Manga fructu venenato, officina cordiformi nuclei gemino. OJJUm If. M. P.t. F.49. p. 71. Man-
ga fructu venenato C. B.

K M

ALtmicto d dmim trtumre hominum: JUMx fibeas uptlUtas in bttitn fubtuftemmw<*<
tortilealNi'^intc (iiUald 6C fubanuro. CMJVX hoimnU ampl\um tmlct, ramos tortuo-
fix cUiundem, liRno nWliffinw, medulli mtm ru(*, comoe h<co-<n<c> fulco, amaro
& morJja, in (urcut* tnerb virnii t'ulen, modulli virkli 9c lumida. ftJi* pctic
albfctntAui tfident, angiiſta, oblongi, lingtucfennu, *d peaulum ftrida, intiwlum Urto", in
aifp*icnibrwemfitan<uftumcontrjai, tenorlcrall, toUU, Udsj, moitu, km, glabra ^, ni-
ecntu, nuxirfte fuptna oirtc, qai Si oblcuic rirvkt ; bpoſC aituro & pui>g^ntc E coſta media
cnlll*&xlbuntc nemili Talk lubtilia trz.nlicrlo ac parallelo duAu exeunt, venuto luf
mtertextt. Ftwe> umbelbnin, pctmlu longn, cra(Tu, Ungiitiu IUM in iurnnii* ram
punt, quinqtic ptLalt + ltlm, culpidatu, una parte contraltiontu, uno latere rediore altero
in iituti inflexo, unguibus croceis, compoſiti calyce quinck folw oblooco anguſta culpidati, cra-
IHMB, micnuj albicantibus, exteris dilute viridibus conſtante exceper. E medio florum emicant
Pdiiumnl tcnuu, quinqtic ctaffiolo, Atris, ſtratis ac ſerrectis apicibus dotata, cumque in ſylw
tenmt, liber, albtura, cum noduk) craio ac pyiifuntri m vem
**n eſt prec

MC pandU appenli, erandet Pomon.m mitar, oblongo-rotundi & n< nihil platu, tenui lulo in
parte mag i Lomptela, per loi^uin fruci, pomirc raide leva, camce cxiaLi< unni, glabro ex
viridi flaveſcente. ad cumocm intus pdpa tentii, jlbmnte tt Udco, liporo aqua.

In medio ei eſt gra ndCj fiortnihil conlitbrme, dumin, exterUH lub pulpa null lato interſitio, ſi-
laments lignoſi & J lbn rertuttanm penxtum, ac inter uncelk
>iitque nucleoufcw <lbo>, imcilcpwMaw erado, diuo ac cartilacin> ſo a ſe mutuo ſepuncto,
oblongo rotundiois, qua interſeruntur aliacent platis, altera parte SOBMBdh longitudine ad
longitudinem officali parallela, & inaion enil die ad equa bafin, ſapore amaro.

Acolla hanc IpecMtn hcAdai*, "" forte diverſa ſit.
Sylveſtrc genu* MmgM h*v*t nuncupation, dilute viict, aliquantuJum Iplendct, lacteo ſacco
abundat, paucot, catnc prxiitum eſt: rum aalto comce lolummoio integicur, oflkulum p
mm fielamUpneuni, Corona tamen null mapiitudinc eſt.

Adlb prarlentiyct veneni, tit imJigenx illb Jc<c mutuo penmint: rum (i qua paululum. ei <*<
iiico nwratur. Inrer dum oleum admilocnt Jd AACUCNOAM eſt vim, utceJenorem penuewn >*"
rar. Sai qoocunqtit untlem modo torpnun adeo oclumu pOMw; ut iudenu* nullum fit icp
aiiudocum ad lEtus nn compdecodam.

CAP. XXL

f V < C B J B . P < / i - - > * * Cicr. - r * * r C / & < Park. Laurus Indica Aldini.

PYri nniilneFL >" latum diffuſa perpetuoque vicrwe conu, i annulis ex viridi pallidicantibus
Folia illi Lauri latifolia, ſuperua parte videntia, inferne cinerei coloris, firma, nervis aliquot
per obliqua diſcurrantibus, odore & ſapore quidem commendata, cum adſtriptione tamen
linguam mordicant. H>i IJUH foe, coſMoTus, jraccmittm compj^n^, pallid^, I ex folioli con-
flans. Fructu per inu, Pruno finul», 4<mdc (uceflu tempom Pyrii modus» aW****
kjqw Upore ; n.xkum cimi*>cdigK: unuinet, RuffCaHanexaut.'... *

Solo Valencino regno unicum arborem vidit Chiſus, in monaſterio D. Virginis cui cognomen
** J<fi> t pmo ab
conſecta Chiſus, Autumnu maturum fructum ferre intellexit.
Perſia Theophrasto & Galeno Medocordes, l<Juarth>.

Galena.
Perſiam cum Per- •canuloeandai.ett i>nnull.>oluni_q.< Suiter al. unde refutat, licet Theo-
phraſtus utraque regio mnmct. fatea, dectuibate Theophrasto 4 Hiſt. 3. folio, floribus &
ramis totique adeo form-1*^0 tuinlmft, lod (olio p<rp<two. F* c. Fructus Pyri magnitudinis, ſi-
gura

led minorcm fit molliorcm, tarcnm valdc dulcem *fy.c* Mulrrex lusnoti non co... ivcnhinti¹
 a Clufiodefentpx, id^quei vel iplo^fatonce, diverla eft Ktc ab ilia; an eadera lit ci quam Pii-
 niusdcienbit, adcoq; Pliniana Perfca divcHa i Theophrasli, ut Clufto videttr, mqui
 H.inc arborem prodidcre nonnulli in Perfide qtudeni *exiol* un dta, Qanflacun *verò in Aegy-*
 ptum, natuni rnut.liti cibo idoneum fru&um protuiillc. *Diefcyr*, Idem narrat S: Galen *Plinum*
 qooqc Tenenaoum cum cmciatu in Perfide gignt, *be* poenamcaus.i a tegibos tranflai am, terra
 mtaratam Pi;rc(a dili^aitiores rratidills; affirmat: quod tamen cruditiore nCR.iik refertj fed »
 Perlio Mcmphi (aum: quibus & iio^ lubknimus: non tãiiL-n negamus dan in Pcilule ejufmodi
 arboreni vcnatam i Penea /tg^ptiaca (JKUC dtlhn&am : pra^lcrnm cum 3c Rauwolhus llubar,
 Porli.inum quendam tncratorem indkaiK libt devcnetiato (irudu Perfexeis notonomine ^cj "«;
 propterea ab tis ncligli. Lanrum Indicani A Mini aim Perfea Clulii eandfida arborein clle »D.
 7^mer.Htít»J(m, admomtus lum ;~idcoq,eju\$ delaiptioncm lul>jdam.

LVTMi ixdsiM AldiltL

Ex Indjcis qliibudam (eminibus, qu* raccnurim brevj pedtculo quinq, rel (cptcm *simul coh-*
 rebant, bajcirum Liun vulg.1: i> for mam lubcimbis, vet inn nnn rexunda cranr, *led Q^longuifcula*
 & panim, acumtnata, parrx OIVJT Hguri, ab extra nigra & rugola, ut Laun baooa; cruu eft
 planta, brevi in magnam aldtudinem i *solifca* ••: folia aurem OJOK & Hfturi [jurum nfrlateni
 non pamm .tmuUbancur, un *Lauri vulgaris&* Regit diAx media) vel pouiis Cedri tuttis limJim >,
 uftiora

nonemm itadon acludda hint itcut Laura Colore fihu (.l.b>indi; Hysuie fqas limt \a
 & cilnr.i,i citrindtutit ac rubent; li-ngimdcinc ahqua excctlum p-iimum, ilia Iomijijinmi *tan-*
 turn xquant, Utitutiinc VOKJ nonnulla lexunciasexcedunr. Mania aturiiiM3iUprttno bint, poftc*
 cum dulcedins pauca mualaginola, &: otiozem nfrtratis Latiri reterunc, 1 oimt uni aucem pediculiSi
 qui erai(tor elt> arqui: cn.mi runoronibgnaoi Ublulct.i (ant: led rtiiruni quanta tnuuUgo in ore
 fentiatu vifada fr. lenta hb nunlis: id nulli alia in re unquam oblervavi, quanvis ultra nitlla
 plintai deguftavtiiiin. S&M nique calis apparet unquam tn.inis cuntmunibus uiuaLagnv
 bus, ut Cydoniom Si Plyllii, flic nec i*ditibui Altluca;, (kt. Hue *aSfie* a^ud^ioi ilu.cm nun
 produxir.

Terficdtuc: fmiht fru.lui nucUo ventnttt Mitt-rju j. B.

Cithrrctici TCl veius leptica ell It *opus fructus facultas, quo Indus quidam Aethiopiann (ut refert Vires.*
 BfmfaoJ .i.tk-scrura nuttgu* & in *vetere: atis ulceribus icauebant in pulverem redacto atq; imperfo*
 curabar, exela *cin* i.putrida. Eun lem pulverem cum *elychalo* etiam impofuit ulceribus *ibut* «d p-
 nerandam *carricri* & (ileus ad *cremora* m perductidit i *ER* h fructus in *infusa* -Urritit* Awix
 admoium viii^ansMqix>cnarn in dbo fi^quenter ucueur, mi *gnitidine* Malt Aulj li vel Aiiiriimii,
 nccn i Pcrfianullbffciculo Haulc namtuuuMi cujo>ioncremari pulvis *tdciqui* luodo diaa mi
 eit. NudaagtiiintsooatineturadeoiKVuus eft, Sc delete *ia facultate* pnditit, utfivehoma, live
 belh.ico v^li^cui' p. *fantanei* n morte *libi molitur, cui* nullo romcaio occuru ^xxcit, unquam
 lubliuutu in .x. *corroiv* umaliquo.l *medicamentum* fumpti *Ice**

Venfimile ell tucium hunt; CUM *em esse cum fructu Mang* gx (ylvcftns feu *MJH&H* krjvm ab A*
 coftadcla-ipta/ Quod (i *OJ*UJM* cii^u tu a.bo;-, mtmmuclteru:hujus fjuctih nuctetquliucis
 nulUnt ab Autunbus Hoiu Maiabauu nictittunen) fadani.

CAP. XXII.

Schageri Cottam * H. M. *Cornm AblbrxJ, feUn cu\$il*U,* <\$adv temntt dfuc D- Sycn.

* P., F. 56.
f 16,

B M
A Rbafcula eft humili-, Humana aitttudine, flatten* tn arcnofts. *RdJix* furculotribrofc* fpar-
 git, cortice *fil* • c .ticula ntgnacnte lin^uuieo, *IKK*-o albicante, ta „iii adftiing^ntii. O>^r*
brachi crasfit J: \$HT<UU vciultion *s cineres, tenarores* fpadiceo-clari. *Folia* petalis *cu* ti
 nixa, quam prim *E* Ipeciel multu ni.i|>..t, oblonga, c>il,>hUu, adpctiolum Uticavttats, ctitlpj, fu-
 peme *laturo vireo* -l'liin nitenna, tubtu* JarKnc: cexturi craii,t, it in prona icii mt^ma
 obnervo.utn ouiaentuni *AL* Ivjbia. Prtrcr toillam mcdwH, e penulo laterals dujr, hinc intle
 Bat, exeunt. / *ores* in *nitnu* (irailii pluro limul piovciiiiuu ac tres plerunq; juncti, quatuor
 aut qtincjuc pccilti, ublimeanMundii, aiiRuftii, lurrctis, ex viridi albicantibus & lublavolentibus
 couit>lit<> mtu* conuvit; Juh. *atque in medio congeriem numeroforum* *lamellam*, tenalium, flavo-
 rum, nitLinJo* at parvot *apice* gellantium, ac *fylos* viridi-dilutum, ex g *ijbulo*, qu *peimord* turn
 firuUu> clt, cnicjRcj. *Calycis* folis anguftis ac flaviufculis foccineti. } *ovis* sunt baccæ ob-
 longo-rocu. *de, ac nonnihil* *confon* nct,ad penolum ftiictx, per nuturitawm tligrx Scnkenta, (a
 pore; *rimam* acido, qui ex m *mentis* dulcefcat, atque ind *can* clt in cJuliis.

In i medio durum, ex albicante *subla* turn it grandjuli-ulum ac pviilijmic ofliaiUim eft; qmvl'
 in tocum .iibmentu deniu, qux in aiau vatiut ail Te uivccin oidjnaic conduct a tint, eft ub-
 dudkum.

AnWiri merabrorum j:ftmpicndn fen'it Succui eitpreflu*.*80 a i m *->wtum (umptui: Dfc. *odo es Pen.*
 abluitu: pro columelle tumctat *tx* rclaxatKJia. Faboruigui *ccus* cum laccharo iponuax *duci* pro
 twpatc *ac fluxu* ventris; lui lottu pro otis imftulii: in angina cum wxlem IU.OJ mixto cum **ono*
 guttur commode *ntur*.

CAP. XXIII.

Pram BrifitmjU /W «ri«ni/J, %w mtmt fr* *0aU.

At*)* Pifcna, Atsjs f* rf- Irmmtmrn Brsflkmfikm NLircgrar,

Mmtpiv. Vtf.

I'N aUuuJincm & maRninwWni procenr Tilix aflurgit, cooke rugoth & c anerco altricanc in* ftarSambuci. W« itii lunt Utvu, Jirofle iibt mviccm oppouta, dint, cm, «1 quaniur (ligi- tat looei, inxqtula magnitudiuro, fcfqui vci duos dkko* bu, aaiminaa, IptcrukntU, nervo lito (ccumiuiTvionRitüidinirii, tojitsjugbmiti haud ibfimiJu ledacueiora. FUJcmUi (en copiofos ''' magnw necmm cmgcftw, ex jlbo (ubdivcfcenta. Pdl riores prodeunt fnms far*, noilranb^ Hgura fit magnitiulinc (imilia, paufilb cure, aodi (apor», Lpidcm connencu nugumn, « mentis it^ noluconlUnteni, ntxuunim, venini denbbw cedentcm, quinuJcmn oontinci ex Havoftentcm,

1-biu ituiui arbors i imo Sc liRium) QporU eft cgrqn^ acnit & attnngcnCB, ac ad appetkum pt'' Itracum revocanluüi & luini laJ.uüiam in febnw uduter udirpantur.

V-jnc He indnrus aJearna alias ex lunioribtüi tului tntu, grJoJEnii faporis.

Ramus arbors dealui & terra: impLuuttut breri radtoet ant, fie in anwrtn adoL /cit.

lignum ruftimfc Icvcuiiuocr, aijus fex» ulurpan pocoC Runt Cc opercuia ex co ad oboi- TITHii JjRCIUJ.

Frudu* gran dl acuru, &: intsr tragonma locum fitt# venJicac, maturus ftatim decidit & fuaviffi- mum odorem (ptrat.

inter refngeranta fie aftnngentei rubaur, ulque *deo ut innuturm dantibus aiferat p qui ex nunducaiiunc dumnt *licujui tigtnt toUttur. Na^aabttadb At aftuotibut protuntj & cotff* imfonh alri ikixus in pretiu futsu, Vinumes inoanfiexnr, quod two* inebnu.

Gommx 6t I Jixwii Una & xgrom m jweunn exhtbeww, ex quibutoaaca''' cmJ rue (punu too n N .artmm, qut ocul* tniki in rUrnucione* inxt, nftun cUnhcat* nx- roi Sc nubcculas oculorum tollit: dolor i; cm cm fjetlc o* Jicfiat-

Pe'u, luaa, oculi*& cortex extemi* fm Si. intern* arfcAbu* medentur, quz omnu io'K^B^3'' rifniutti oontn gutruru inllimm.inonm &: Jimilia' mala prxparantur, vel in Uracrocontrs ffiv^0* Ctctnu* peiuniac cofpor» GtUoitii octus adhibentur.

Peculiare habet INK arbor, qu«J volu»» J'icx nigrwudinc, nigrb & *ure« plumb C^ anter »dhca; incuicuiiratjbui raniorum arfabfc fie continue pcodukx luw nidm coajlrucnc, * mltiduz ferpenmm, aliorumque noxxAum uitoiorum dedinenc Pif*.

CAP. XXIV.

De Curtij Jhe Ctutjt arhtilm Brihltnfih** dilu.

V^{aria}* (inquit GuLcniu* Pi(b) arbores e/cdCc Gaxjt, cjuUctn generti fuAv proJuainf, nc, nugti«Nuc taptde orila hgurx tnnu referw, quorumrruchium ad inin'''''''''''''' miiiitia vktile lpcu& contigit.

1. C- />*« Pifonn& Marcgm. ^*#rfrwifr* fktfitimfi^ fmO*MUM, fiale lignu.

CupufmAuiC«»7«r^ .itofur: aJiinkiine, tWiditate Ac duraaone ipOm Qaerqum fuperai, Bf numque a i'&cn m prctio haUrum ell: lontuc eegkur gr>loo. Kami /W» nabent akenudm po* Itu, oblonga, lingua- fai tigud, ad uAom fciftar com Htlpanki [nwrcm, dooem, duodcum 4i< quatuordoom dintut longa, quatuor, quimtucaw fel Ub» Atw«fr*«rj luneriui dilute virU.u, Ui^ ntav ochtar oolorB, neno emnente kvuoium lungitudinem, fie vena oobquu, partim xquaJiba pantm inaxmaUbi distinct. • nine trulc molb Unugfm obdtiAa.

r in long: itermgefti, inodori.pam, AITL Fltxct Januario, & Man ant Jun*» fructum nucuf.it Subtnde alterum arbom Una uno anno, alterum lecurtdo truitm p:urcrtn terno quidct, quarto donum rota fru^ih.Jni eft.

Fructus pomum vulure nugnkudine excedk, informtt rotunJiucu fie rubcroCu. Color* utis eft ml) i pans fecundari, tut *tn, ve) coma* fuki Betulx: pulpa ntolln, AIM, grati ac dclcis fi- pars & odori, partem recer. tern imulam. 1-am inctn uMuentumagnicudme Ac f figura eft ori Anierm, co m iigno|j hiriuto, i««umcni nudeum jJbfcantBro, nan cdulem Jed i inobicalcm, confidencii nocis Ccor adfringe IK» ouattats.

''rachna epa plus minus cala yttmo cum luodTa ex KIMWO datur wti««nc»nti raocra dyfen- teriam. Idem pnribtnudamt ulam duplci quann utc exiuUum ad liftmdw qw>l« tangam fluxu.

1. *Gmttanb** Pifcniis & Marcgr. *Pnaiftr** *Brrfhcvf. mimr, fr*8* jtursmi* m*g>nta,:*

Quantum prxcedenti altimdmc cedit, tantum elegancia tim (uper.it: Anrantia tamea major. *Folia* fert in fitmdfs congcfra, femipcdem fonga, (accurate vindi.i ni t...ri...•. fj...iJentu & crafia infit.ir Pergaincni, ad tartum Ixvu, hguminucisjuglandtsfoliis non tiifimili.i. Inter cop...ola folia ati ftondium cxremtrates in iplis ramulis copioll *flam* provcwint, Rivi, ojorc & magnitud...dine Horum Tilut, [Tnevtns pediculij, c caiiie rotundo] cavi in nol.i ac rocurou, umco folio confranrm, *Skupt* in circumferencia (dlTuris ad medietatem ukjue, qm Hons globulunt in (ex veluti fohol.i ili-(pefcunt: in medio civitatis ftamen infar pilx quod aha ici ftaminula cucumltanfj ex m6dio tu)ulque(cgmentiprodcunba^&fpongLc-forme copulcuium gellaniia.

hntium icrt rotundum, Auranix manntcudinc led non rigura, vcrum fuperius paulum tiithrnatum, abftjue OOFQaa, tlivciccnrii & purpurco colons, inodonis fjuando integer, (ed conuliis ^alil^Hnl odoreni tpiiAt, ruulcaUiniiuin, came dava Sc Iblida, dulcu tapons. Ijpu comemus Juj>[jn^s eft magnitudinc, fed ficura compreffiori, alnra pane gryfet, jjtca unibr* colon's (pkndemii, cui nucleus incluliu c(l, uUcm utibus dtucus ut liipra. Decidit fpontc qiundo matuius eft, ajis cdu!» non eft, rum Ude acri plenus cfl antequani dccidaL>

Diu floret, ardique fru&ficac idque tcnlibus *xfova. CxaAcx.* vulneratuj Uc acre «fudat inunlc.

\ *Gum ib** Pilonii 6: Marcgr. *Fntmfer** *Brdfihexfu M**g* *§**.*

Prxcedentibus *Guttm* minor & tenuior ell [Tiliif magnituJmCj led caulice non ita eraTo Jfm.l

AJw fert lingux figflra, circiter ojunque digicos longa, iefqukiigiram lataj l^tc riridia, [jJendenta, interne alba lanuginc obduAa (qua: tieitit aWlerp potelt; junior! tot.i hnuginc olwud.i fiavcfciim,Ultcmatim polita in ramuUs, &c aa qlieclibet peiiicuium brevc m folmrui uvula proger<minat una, dor veltres jisndlr, veilitx globuhs parvis albicancihus, qui Icaprientci prciduii *jloft*iot* albos, lex parvis toliolis confantcs, In medio *mxAtiftmmiU* alba cumupiiim piliidu hftr fcoparum leaceamm ftanr croia.

Frustum fert ellipticx figur*. niagnicudme ovi gallinacci, interJum & rrurorem, inich vmdem, ubi maturuit Havum exteri is, utrini cuacuii tcntn, quz taalc (paratur, teetum. Julpj rjuJcm colons, niollis ut pyrum ctnulliturn, tiUmencola, ob nlamcna qux exterru lapi.tt frif hii *adhxrent*, (jui tii.igiinus.oY.iIisxteriusexalbo llaviilkXiu.vjMoluf, tncitioctcr dm us, ncccrjjJu.^ rmgnt : mtleurn c\ ll.ivooiitarnati colotb contincHi, ficoMBj .imaricant! (ajwu%. Cam am cm (im^tiu intuit *pauca, dulcU* (apnrb, qotfi ii)uk.tH> ilulecdini ailmivctit clt

Julio terc 8c AuguitoHorct: Marno tVudum maturac.

C A P . XXV.

1. *Mjx* fvt Stttftt**. R Ar)^, y^w *Sthfit** Park. *Stitfitmt, hhxs, fvt Mjxtrj* Gar. S

TL *JTT*c*f* ilidam votunt hanc arborcin «wtrifkA»< i. c. humore lomo£ lurilnis lidilbntc: i X / I Ham & hunc fru&um limili nuicofo tencore reCertum cflc. Sclteften Aral... & C>rfici I T A BB *di:li* eft, id • 3L*^*<^ Auguftui, in cujus honorem ita denomuuu cfr: vcl a Sebafta Simanfc mctropoli, ubi olim crekebat: nam c Syria in /Egyppjum tranllaum rcfert Al-

Scheftna, defcribente J. Bauhino funt fruchis parva ferottnii Prunis pares, nigrwantes, turbinati, in aaimen delincntes (in rucas contnufti qua: in Offiunii habentiu) calyti i...facile recedenti, quakm in Da^lis vuicmus, (ed longc majon, & acetabuli biflar <j.»w.wo, cinere i feri colons, riorum pulpa Itra eft, vileida, duki fapore prxdita, pertinacicer oTfiuilo adhxctuens^attod...tibus cnlKsdonatur, ^liis comprdlum Pruni nofrads oiCcultim tmiutur; in cujis ucroliber fine foraminulum apparct, atque es inferiore quoq^, qm vchn ccmnos, vet terno mucronct acun» Rnditur, geratiod retud nidimentum eitilit. Nuclei ttibus tocults leotlim tretconnnentur, oblongi, mangulircs, .Ubi, Mdonum Tulgari magnitudinc ScUpore, quique codem modo vetultats rancelcimt, qui pan mbura b recendbuc alias unicus nucleus oiSculo tlaisJitur. Elifendi plena, majora, pinguu, carnoli, qtixque liniin non redolent^ calra adlrrcntu, ccredine non arrola.

A rhorn tpfia duo (inquit Alpinus) lunt genera : Alcrum ivKcftre, Ptuno liinile: alter dm do- meft... In twwnbuuc cralEoribiB a lylvelhi dilicrent. L'traque atbor floto fert allx*, par- Tt»,Geranitproximoi. SyWefrit fi-uihu rert minorcSj urdiut manuetoewo, miperfedxsc, u'squos doineftica Scheften prorcrr.

Folu Scheften, atlnountc Vdlingio, extremis (uUovalem magisroturkiitatemqLui.i angutofij acumen prat le frunt, (uperiore ambku per fpatta inaqualia wnii inafum daiuu, & nom quom Icgmeoto vcbti fubdiifto munlita. Frufius breri inldecc calivulo, rotundus cen foque unibilio) !eviter adltnauj matur*i |am<atepelluddot, non bfiuti jUaccidinc toe I nkiUt.

Vere ftww, Autiimio fenjen mamraL In CBptOtft Alt!.

Mysa Pnmts minu* in pda center J. Bihmw. In palroonum atfeafcw, toque, pluns Uamuf
 Myr
 piwam, oahrtpnaram, l'leuntin, Pcnpneumnum fit a< TOCB raueflman P*TM CT ipin decocto,
 un.i; & unitas cor tptiCKKioprj iracem St pulmone* relpaenre* ingrediuini. Velling. s:Li
 Succum expreffum excellens prebere remediur i cactnin ad fkucei Ubenbbus lillendit traJit.
 Ex pulpa ipi... rum optimum rifcum cotAiiunt Alftypcii; quippe Sebceiten mature* confundentes
 atque Uvante*. Sum aliqui qui mafttcando pulpam ab ode expuentes irifcum paranr. I
 hoiuiii tVuct. um in valo collectam; amm quoad iquci hUmmmai aUtmurur buUienta. Vifco
 ununtur oroiK. emplaftri modo ad omnes fcri 10(cot) <>n>or<>, rfohnt atim cos fit crooliit onutem
 iuicicitim. AUqm ad tuffim " *» P»r«« bok» aim Luxluro cando, & ratiica itquirKic puJrcfi
 miiltii lUefeu* iumunt.

pollent tractu* f tejto Manhwo) dqedaria facuutt non toon «c IVUIU, tain Grarewniii <V^{um}
 Arjibum teftimofik), i.l qund aura comiuroi>4tur quothiiiani oxpeuenni Eorum pdptiilracK 13-
 naniere ifevorju, «ui .ul lummum 11- coldem ic« prxbet clfatiy qoos Cillia VXXJKJ. f niw
 datur ex /ilc f*£>riuujitibui. LiJcm continiut Anuaa.

Acacia folia MtUhrmt frmim reimtJe, fnmt m**<t> D,,
 An Myrabalanu Emblica?

// .1/

•refft altmuitnc (jtucuoec fmxmnum, ranwdcnlts trjn^criim «idfui», nilcemin wencfaS.
 troi i *Ww ualU, jiftiMiiih hbri> upllata, cortkeextcmn nig:kante, U nonnihil rubelcento.
 c*«/«* amitu ad uniut braditi ampicxum, fiorace nignea' te, ut & n nut. fi la pinnata, plus lpa
 rhamam lon ga vel folitaria, rd buu, rema, (juater ave ex co .lem nodi:lo exurunotr:
 lubola brevi luma perolis colla modic adno -J, paiva iunt, obioug, anguJU; latitudine aquali obi-
 que, plana, tenuia, folida feu denia tenui e, uno untum per medium decurrenrc nervi. fupernc
 obscuris, lubtus diluata videntia, no turno tempore bppoiau ad te muivo adducto daub. Flori
 qui foliorum colla, feu c •tficoM* KJiiiKH mawuw to eontni wt'ctum p-trtc, ui & rans, plures
 puncti infident, parvi, lex , ctalU ai^ultis, albkaiUitJU uompofiu, O U D / M M in toodk) ai
 nodulo feu apice flavo intigni, »Aorw miffiu*. Gtm* rio<uni locuntir fltaJbtCimo. *V»v à fo-
 ribus delapfa ramis & ferculis archc infident, pino-rotuiiii, dun, Mute <hnia crum com
 ac nonnihil tranfpirent, io fubulibus videntur. q. trtrin vemce concurrinr. io tunnum mtig
 fipore grato acklo Sc (uluftnngente, un
 dlifulucet, quibu> tructus infident, p rtc interiori taita nudantur. In ma*.
 him eft, iuiriim, Jigmt; filamentis e ibitum, lev iaferibut rotundtola, q:»iim tiuoppatt
 proniinent, con/lam, ac per lex intermedia wterftuu, qux anguJu admicti Itii:
 turn, tn <ua:nm lingulit unkura comiuctur / M M , IUIvum, triinguiarc, du>:
 & uno r<undo drcumlcrtptum, pnnum tihkjMt, dcinde obluirc nib; .it*.
 • tincti, ut it tnf tu« L hccati & in ujuvcfeni i >do «ado Jpili<
 c\lnb*g; Huxui dyfantBrico confarum- Ulent in decoAo <Lifi pthet
 charodcoodi de notu < ycnigineni ledam. Aqua ex
 tructibus dactylis iu atdon locorb rectin
 convent.

•j. Mf* fjrtfsmu tffU>U tr:fftrm». Tijm-Timt H-M P.+T. n.p.jj,

//. Alt

Arbor crt vaAa: nueniruduw. <caudice crailn; oortice iudem cnifa, tithm, cuicrcio, unis rubc
 CMMi^ o'.orn jrr>mjcti, faporis acriculca li oixluuiffi; necnon pluribus donatoramulu
 non raro hufatis. Lignum aJbtans, niai:ke vinddcente R*dm rubicunda, corriac i
 fonnitacta, amara, odorua. Ftits line cfdme rottndh ac ifperit peoolif urci tamulut
 nuuui, lara, ex rondo in MOtnen ddtenna, in ambtfu fqrnu 8c horrentia, luperna pane
 vuidu, intenu lubvukiu, ttika nonmhd alpera, hi:luu, lapore luKunaro tc tiniingmt, a
 artmatioe, nemt 5c rtn» aebht kttennta. fl>» inter foliolos l. ilot CWJICUIM fpttbaniam
 loop* pmemunt; qwbi>racenutwn |xt>>t> Linimma(>adhnent, rnbu Mongf> rotunda, candi
 itii, tnoilibujL extenota venuidknu foliuMi ton/tawc*, atq,OWOOROt n^indo, albic-nu, hufuto,
 & poltculo viihii meufpK^* 'ubnitu caiyd uKxrentet: mbtti rtiTelcendbu*/«!• iIn, nK
 but *f*tki ornatB. medMni nWiscanratem Ac tunlwicuni occu; antibus, nter qux fijtm pu
 indem flajfoeni: odor ntilliH. lapor aouno. fiy/j* hun» arboru pyriformes lunt. AWJ
 crallionibus fulcan. ir *ftim nu^nitudme zmuli, cxir.
 Ijimiin obJko and), cirncque denia, furva.odorata, amara uilus refeni j
 r'hrret oMonjjo-rotundum, (nqoctnim.tra induderu nucfon candidoi, attiaim, fin
 ttiMCCW> ! met>branacc» (jmbul<iim, nndi aibtannbui djJlcpitiKnt a ab invk.
 lylvofhibus, parntB, afei<ly, mniiuim in r**lw, aJujqueprtwi
 anno ftxct ffuAulque (if t, Ueccmbn viz. & Jamuriu
 net.
 Kom caJa'aot, fikk U ac pnumta humotd inodtt, aitentut, di^ihtau
 on a^tut hi.i./>Kurwn duck- Uem cone i cunt |;udut pujpa m pulvcnm i
 ttnn terturuMi lcl ternittenteni tutic I-r.4ium nuclei cwuefti fyiun Uuiu.

Arbor trifida pumifera &*.«£, tjfemU tmmUt. fcf**** Marcgar.

b

Arbor est cortice ac ligno Sambucina. Fert folia in pediculis dactylis
 nentur) & in quolibet terna more Phalolorum, fuperni vicia lolradenta, into>* • vicia alle-
 cantia, fuperna etiam pilola, interius magna hufata, nervo & vena confpicua. Ad quoniam pedi-
 culum

culum foliorum provenit enam peJiuilus qui fe{t fbrtt petttapsula.; poft quos iiiquo; bat pediculo longo coneetti confj>iduncur quanior auc quinq; /ragm nu^nitudine Vvx (pin* aur Avdlan* DU- OS, rotundi, immacun, rfcio & {weakmesoaacuBi albicimibus confpenti; maruri vzeo oblongo purpurei, ni^rlo;ntes, (Jindulis almetitibui nbiq; notati. Dftrafta cute {ub)acct caro, iib ipU nmdeni purpurea icu bamru, b tenns aiba, 6c in medio lapis dums, figuri 6: majjiutudin* Amyg- Ailx, continem tra nuclcos, altxfe, parvos. Comcduntur aan£U cute, fit (tint tapora du<ii pa- rum rmnitctfi.

Fruftus nwturefcit menfeFdiruario.

Il> ob olticuU m jilunbus cellulu plures nucleoi conrincnm (ub|uogcmu5 fradus quofdam mi- norcs qui bacurum movluni non excalunc.

C A P . XXVL

3 Ak* btceifer* M*Ulr>itM tfumlo fruiiii tri"ftmff. Pdrilt II. M. P. f. TA ;. p. 5.

J4 Rbor dV proccr.i, caudice craflo, albicante, cinerco cortice nUluilo, multilque atro-purpu- f\ rea ramulis in orbem ditfuus donaca JtsJix Harelcetu, lubalbtcante OHTIU: JcJM. r.i, er.iveolcns. F«/M gemuuu, brevibus ac rubelcenobus penolu area extrei online parallolo provenitint, obTongo-tercna, acuminata, 8i in ambiw (errata, cralU, Act iittentia, iibviridi.i, cofti mctlu pinpur.ikciite : lapotcatnaro. FUJLHU rainorum excreiii matiin proven hint, Vins vuulcr.r ftnfiidw bnd abimiks, quaruor ffmfira & acununatts ibliolii fiiillantes. Ititxioii, .iiii.ti). Fluli:ili> ifc^ulcntibii lucccdunt tacat, rofun<Lc, tnp.utit.i", vitidi-rube- joaont, glabiou.iirjqc cornee dnEtx, carne intus liiccut^nta, atifliinguce, ac i no tor A icUrtjc, intt.i quamoffieulum onndntttst albkans, tn.t continens Icmiai oblongi,Candida, imara. ii RcRm MaUbaria locis, prx(cram area Mtufn, feraper viret, Hoiet Augufto, Lnur (g fuctiimt), msturat Nuvembri & Dccembri meniubui, acque non raxo bb in anno nwtutt* cSiibet f'''^'.

Radix fit foiu laugiinu confUtutioem mcLncholicam corrigunt, ac acido* Ullijlque humerciVif/. temperant.

Ex foliis cum i.tins taran in laOco Nucii Indtce (ucco iwiw pouo confiutur, qux cum externt- rum, cum internalum lli-inon lwiduni dolouUii mici^uuii eattduce

C A P . XJCVII.

Futttx hdtitftr MtUbtricm fitrthns amieufu fimfliici *£UuU tttrsftrm. Bum! 11 M. P. f. Tab. 4. p. T

Jfc Rbu(cula bumib trt, dttKbdn dititer pcdvalta, ttuJiti cenui, famuli* in otbem Jiriulii t i channel orato; qui coroce primura vindi.dcw lukioerco, faporilque aab •CMOONKI J. A. OMIKII, jt |, n«>li fv albicame ntc^ull.i iatus referi : u : I ignam umen pxtlui-uru, Al- D>it<L>, inlipiuluin & inolcMiini. RtJtx liniiluer jll>ici'lis, mbektita *,"uce cinf<», vonudo, /o- la & dine dacuflato iwcintj tuilii, fubvi abba, circa aniuolos jtmveniunt., ablongo rotunda, acu- rntruu, trjili, gUbra, liipcinc colore atro-vi vdi fipeni ;nri.i, inkrni vindi dilunorc, cofta nicJia vnuli, &c in arerft p.irtc n U i i:tubcrAntC. Odor E: Lipor arotiubau. flw<i ftuve-olentescirci iiris Mtnubs glomeratun IIOJI Iparium producentur, icilimq; porredts columnctliumbellx ("peek: rundiinmi : cunlbnt iis tjtiatuo i oblonxo-rotundii, aifpiditis, tiffin, mteniii conuvis 6c all- ontiusJ extenii* viriddecnabm, atq; m (Icll* nuxiuni cpaniis foliolB, ofto canJidb, fiiire, is, lais ac humiliter expantia ;Umt9*lu medium ouniuntibus, inter quz f>lobulu prtxlic vinJel. zns cum bali flavelcento. i i iribus lucccdunt Frmtlm (ubrotundi & foO qiwutnLiten, cum affMk breri in veruce, craflo viridi quccorqec anett, came intiii vindifuica, odorii tiporil(juc arot tanci referi, iima <ii4in ., .tu/<mccontLnaurquadrip4rutum, quatuor Candida ac obJongorocundj in difti: its loculis contragr..)imm*.

Ex arboris radice in Sefami oteo coda limmenmm paratur contra oephaLcatn artuuoiq; dolorc* M poret & fructum perhit.

Ex arboris radice in Sefami oteo coda limmenmm paratur contra oephaLcatn artuuoiq; dolorc* inveteratos.

C A P . XWIII.

rl* huafa* mftlu H>UurKs fimftut tflk*b cam flmr&m wait*. Mid dm ' ft \J. Lofc * P. 3. T. 6. urn Cariih*.

A Rbor elt piocera, \$o drcker podtt alu, caodice craflb, niiltitjiic ranm cinero> iiallis, lupernc q. iilarulii ic gcntoiUt'u donato, Lj^num p anderolui eO., ci albo i ubelcom, corucc niuoitum citicrcu, inctu Havciu^cc /U/< tuih, ilbium, llavdce

anct», tnodora. tnlipidt. W« fi. na siml per... ac alio petiolis circa extremos ramulos
 proveniunt, nMongorotunda, aaminara. & it< inobitum in imbitu crenata, luperné atro-vidua,
 infern^ lubviridu, nitentu, (jlab flexuosa, digitis conficta sua... at infipida, teneriora
 ramcn luhaipca & n^gr^ia. Fi*fmll odori, infipida, circa extremos ramulos oblonga, subviridibus
 Urruginofis a: quid ram penoln racematim pro... calycique exigu subviridi in quinq, laci-
 nias aaimtnarat tc&o tnhsrrent, o/ritu; ttanto, >... uno sapore, rotundo, concavo,
 quod intertus cctulcum. csteriu* ctrrufo-albicam, St nuaroor minon: ... bicantibus
 citmii*, interne »iodi-ditum cum lwi-... purpurafcente, haud loco ac in *Herbo Tri...* :itr ilk
 nbu» videre est, qiuraof ftamimbti* at <*m om..
 qii* y?j*« i^1-...:iti.lo ri i
 ctiftit hau^ i'''... iii^Titet viiiiies p!Jmi''iu, ticin nip-.. JI
 |oogo-ro*.in.'i.m, cUbnjm, tres (t...ra referri, m...> qaam t^gk^mk^m IOCWJT ob-
 Provenit in mult is Regni \hh(ujki xxi) >, ...raferum circa *Mogari*, temper vicer, quotannis
 fenicf, nonnuntjium Iw, floret, frufthm\, Cat, A... superflca manet.
 Cxteruni lignum u bom open Fabn\ft accommodum. Ex folio 6C cortice cnnti fis, ac in On***
 infisfo ecu apozen a confiditur, <p>d dolonb I'tim powncr medetnr, necnon i...
 in utero rdkrla* npelht_ & lochu «puf;;... Idem insuper • irb (write; ac mulieribus preter modum
 ojffis ac obd't* einthen (olectpro pntu, ut... fensim attenuentur & gracilefcant. Succus e vmi
 coru:t cum rraturr Nucit Indiuc lad-... exhibitus diarrheam sanat, ic colioot doiert
 httpK jrVori-, titi Sc P*4l-v*8> ramuli* t'...neriores simul co...triln & in aqua ctx
 tr J febro imcterataj, Anhtitidcm & qooftunq, anuum dobrev

Um
 I'itttS
 Uja

C* r. XXIX.

ARSor est valte magnitudinis, 'tl-Ft*** aktor, rjrnul» viridiKti, tjuadran^:'... S^L
 nois, in orbem diffusis ornata. ...-stratum, cor... tum furvo, levis nro.
 ... craffa, fibrata, al...
 I ;<num alt-... ticemuw...
 RJ... ^cim.rtaRo mtulqiiie fljvek^nte cortke ft, ...
 IOtn brevibi» peodre^'lino pinlylo \anf n rotundti, cr*(& >...
 (K>1. i, mollii, tumentLi, lupenc jtrovndii, tnicrn...
 Nalcitur montans ac petrofis locis Regni Exalaborici, praefertim in *Cadente* & circa *Cochin*;
 semper vicer, quotannis florere & fructu... chin) tiat, ac d w x n m uln... annos superflca manet.
 Lignum arboris oper... labnli accommodum- Aiihar, infignes epilo; m vita extolluntur in dia-
 rthca, dysenteria & tenefino. Ex fuK« cum pipere f. fentine > ?JJ*.f*i. in Oryza infuso cocta
 locum fit Serpentuni, ScOfpionum, abortimqus vcnoutorum .tiunuln.-...
 am : cocto modtatDennim oonfictmr id langatoem et ulu m corpore coagul.: :m mid-
 vendum.

Locu.
 Fies &
 Uja

C * r. XXX.

M... ilna arbor est, quatuordecim circiter DOdB...
 albicante, I4ITO, tortice obaaCro t(air<•... furvo, multia, viridibus ramulis in orbem longi
 lateque diffusi orruta Jt*4... rita, anstringem, odors ingrati ac sylvestris. Folia exigua,
 oblongo rotunda, craffa, mollis, numerosa iro ftirc.toi p...
 viridia & splendens. Flores exigu, subvirides, exigu brevibusque petiolis ad foliorum exortum
 hinc inde circa ramulos proveniunt, sex nftmtnf reofh... constantes, numerosa intus tenuibus
 oindut p(0dx globulin, (pa fenli... incrementum sumens ac actus in
 Flos excreta, marcescente ux m ?.., adeo ut tkn, a...
 Sunt autem Fructus hi rotundi, tribus angulis sulcan, & lato cav...
 purpurafcentes, tenui; <Ita... la cincti, caruque levis densa, .-^unrc, fiibdtJa rdetir,"
 Nacula continentur tr JRil'S I... rivei coloris, sex includem fo... <oblomp! triquo«fa.
 cata, ac membranaceis quobdliam pellicu...
 :tt...
 Nalcitur in variis Regni Malabarici locis, praefertim circa *Grangaur* : quotannis florere & fructu
 fert, diuque superflca manet.
 E folio, fructibus & radicebus in aqua cum Pipere longo & Cimini semine coctis potus confici-
 tur, qui in Asthmate, tussu, pleuriti, humilibusque Pleurionis affectibus valde commendatur. Folia
 cum cortice in Oryza infuso cocta, & in cataplasmata formam redacta, ac numerosis inq...
 tuitur

Locu.
 Fies

tenter eosnuturare kruntii. Ex arbons atma cum la&e, racile 8c butyro cot (o ballanus paratur, qusin incus iumpcum & forii iliitum plcunudem tanare Jituut.

Tijeria Niruri.

Precedenti (inqiiuntJ pcrfiniilis est, nec ullas diflin&ionb notas aJJucunt; nec ii guram ad- dunt. Crelac abunilj circa Couhm.

C A P . XXXL

De Cinnamomo, Caffu ti; CmteSa.

NON i. MOTSiut inter cruditas, an Cinnamoniuin Vet cram, Cinrumomo hods- erno feu Canelle ca- mum Veterum fuer- rabis nascens, Cor- lem res lit, an JivcHi, fit hodie penirui ignora. Revcr.i ii Onrumo- it qtuk ab illit delcrtbitur, f urculi (cii virgtiU- reues rruaas non tiag- Verum quoniam fabulosa, Canelb nofra die non pocest, m ex defcri^tonc patcblt. iii, in Ai.: •adantur, Ceterum lc

i ego potiu; n tiara* .ib I i nurdis, Scalifcert & Anuti (cntc runm Pro- pendeo, V 18c Kcccctionim Cinnaniomiini neuion Cailum uorunJeni unam & candctn rem eile. Diofctoides scribit, Caffiam cfle virgulu craflitoniLis, l'ipcris folns: Cinnaniomi dclcnptioicm pro, liis omittir. At Thaophr. Calliam & Cmn.wnwium niagnimdc Vttic, multos ranins lignol^ habere fcnbic. * Plinms Cmnamomuni drat Fruticcm cfle, duorum cubitOidi alti- • j_ tudine amplillimum* palniirjiic ntimnum. Galentis t. AnuA. arcim Ronum debwm c Barbaioiuin region_ • tradtr, lonritudine cubtonim quatuor cum dinmlio, & licit Caffiam Ci Qmumomuin di-

Cinnamomi prloru pertiuiics. Qtuc cum ita lint, CRO cum Garua (entio, urn lonea ditti- lirjue via oim; ium erat pretium, majore in hominibus licu aditerab i- icufnconl ibuiiand ta- cileruent i febat, ut diverfa illis indereur nomina, tamcti plerunque quidem eicnt gene- iii.in i fropar locorum igitur diftantiam, Atq; hacc regiones a mercatoribus, probt cognita Caffia hiftoria Veteribus non fu- i umendfliam fi-pcin Onnamomum tranfmutaci: (ic Cadii (ur- i In Ir>o ctiam ab ii i: NJIH IIIOJU. icque Cinnamomu jjaut Arabesn.ilci jnultb iKobjt lacn Uaiua>; qua: a

At inqoia, Veteres latere non potuic quid ad fe pro Cinnamomo adforretur, cortexno an vir- gulx; illi aute exprefc affirmant vi- ;ulas fuille:- proinde CmnKinumi leu CaiielU nortra Ve- ferur;i Cinnamomum in cifc non potell, Imd lioc non unpc ltt qutn iJcm fueric Nam (ut recte Calp Hofmannus) (^iod in,ignju tn planta ij)la nolib alien diifiaihatcm, cfl quod mruuta in ratio afferendi ad at. Antijuitij ctim roca pUnu, cortex cum lrgno ajKctebatur: at cum mint- aduerfam efl lignum tantum non inutile efl, cortex tantum fut alatus: & fit hodieque. Hac quam a Dodoro & alijs (inquit) nomina Botanico Dodoro jm> Ca<>opl n ituec ramulos Cinnamomum quum efl, Pemp- . I. ltr.%. <Jf.I . SjrmM:* (VH vtr^mln tritum

que om cjr:rr:ih; i ti; r. rt; u legum mam i'titrm /unt Ctmjmemum. Itanc appcobo opinioj Omnibus eaaa nocis Veterur -tint Cinnamomum. Sunt nigra, ci vtnofo in cir.crairu •; lunt enam livii lwc rirgulta, tenues lore Bact' .re acn at mordaci cum calcificatione & bfiwwf qu.id.im, ncque (ut Galcuu>oWeivavn) ;. v ;U: o i

tiam inferant, i utJin coam ubi uianiuantur m.imtoli _ teruot: (am frangitum a fit- am efl dubium cur Cinnamomum i VetcnunoUc noncroLun. inferaqaUjCurttaau raur. Quaic nulli i n louim Oaleno, Dto(. hoi non 1 , ubi bam mrcatu- ^ plulquam iso milliari « liut iitxbui Vocnuu nuu; i tam aromaticum ac preflantem ferre fructum, vel quod in Zelan- i (Uucum tutit, i prabable videtur, &c.

Verum ratio, iitj Dm) p. iadent; Cum .mm Reccii:>ortc qia (uai-ia vai;nt (C D J ium faente) Cinnamomum Officinatum, vulgo Canelle dictum, legitimum Antiquo UTUU Caffiani cu- fliment. Galeus autem Cinnamomum proteris simile efl: opinio Caffia affirmet. Ex alio, Caffiam Cinnamomo genere proximam ufque adeo efl, ut ex ipfa Cinnamomum quandoque oritur, ip- denturque interdum Caffie arborea integre in quibus aliqua Cinnamomi virgula e Caffia ramis produant, Caffiam denique in Cinnamomum tranfmitari. Cams, Theophraltis aliique Veteres cortexem in Cinnamomo tantum uilem eflc fcribant non lignum; probatalis inde inferri exifti- mo, Cinnamomum noflrum hodiernum, Cinnamomum Veterum, eorundemque Caffiam ligno- unam eandemque rem eflc, nec aliter differre Cinnamomum Veterum a Caffia comonden, quum Cinnamomum five Canellam Officinatum noflratum a Caffia lignea ipfa dicta; que Garcia tam- na non aliter a fe invicem differunt quam nalcendi loco & accidentibus inde oris: liquidem Cin- namomum feu Canelle cortex efl Cinnamomiferz Zeilanice; i Caffia lignea cortex efl-

dem specie arboris in Malabar nascentis. Garcia verba sunt. Verum cum mercatores cam quar in ^ZJidan naca esset Canellam ab ea quam ex Java &c Malavar fumpferunt differre CDnfpicerent, diversa illis indidere nomina, cum ramen ejusdem generis essent cortices, pro fbli coelique varietate folum differentes, ut plerunque idemfructus pro regionumBc fbli varietate fuavior fieri aut a naturalibonitate degenerare lokt.

Officin* noikrx Caffiam ligneam h Cinnamomo feu Canella distintam faciunt. Cassiam enim Cinnamomo craffliorem plerunque esse, colors rubicundiDtem, subftantia duriomn., fbliorem & compaftiorem, guftu magis glutinoso, odore quidem & sapore CinnamDimun referre, optimo tamen Cinnamomo imbecillioem & minus vegecam esse, ex accurata obfervatione Tho. Johnfwi.

Eft ergo mea lententia (utjamdixi) Cassia lignea Offic. Canelk Malabaricar cortex; Ci/inamomum feu Canella tarundzm, Zeilanix. Non tamen id fidenter affirmo, cum J. Bauhinus fanbac Caffiam ligneam saporem (iium aromaticum (qui in Cinnamonio feu Canella paulatim evanescit) confervaffe Qtiā post triginta annos^ &c * Jacobus Breynius utramque harum [Caffiam ligneam Sc Canellam] peculiarem aiborem agnoscere se dilucide demonstraturum promittat

Epbcmcr. German. An. 4 G25. ubf

Diversas Recentiorum de Cinnamomo Sc Cassia fententias omitto. Cum enim plena & accurata Cinnamomum arboris descriptio Sc historia ab auctoribus evanescit: Sc hinc dignissimis ratiocinatio, hinc observatio plane esset iis recensendis, & vel confirmandis, vel refutandis immemorati

Caeterum Cassiam sive Cassiam vocari si vel dictam volunt, quam arabice dicitur scilicet Cinnamomum. Etymolog.

F. Cinnamum Jive CantHa Malavarica & Javannfis C-B. Canella feu Cinnamomum rz J. B. Cantilla Ger. Carua H- M. part. I. Tab. 57. C)C CiliuPIUOLI QIVCC pf

H.M.

Arbor est ad quatuor^ quinqueve hominum ahituilinsin aflurgens. Radix crassa, resta fe in tsram demittens, ac hinc inde fibris tranfverfis se affigens, cortice Illi exteriore^rufta rufocinereo; liib ea rubefcente, qui fortem camphoraceum odorem spiratj maxima rricus: ligno est duro, solid^ & albicante^ odoris nullius.

Caudex ambitu amplexum unius brachii implet, diffundicque numeroslbs ramos &furculos, #fife cum rami5 cortice vestitus viridi, qui dein cum state rubelbit^ ac cum pellicula tenui lignum ambit. Be cmfta cinerea obduftus est. Eftq, 15 cortex suo temp ore. deglubitus^ & in sole exsiccatu ipfium Cinnamomum. Verum quod in Malabar habetur est minus acre Cglomfi, au velut fylvestre-Cortice omni ex parte deglubito arbor emontur. Lignum intus durum est, albuhi, inodorum- rnis late stratis, hincque forma oblongo-rotunda, longitudine ad latitudinem fere duple, in immunitate culpudata; media parte latissima, ac cum minoribus & tenuioribus lunt propè petiolum. Longitudo maxima spirantia & acoplus: Superficie sunt plana, in oris albicante zonula seu nervo, quæ ex petiolo excurrit prcini^a; supèrè viroris vegeti & vividi, Hibtus dilutiora; cum genera liint Coloris hepatici, prouc vetustiora iiccipra, Be magis rigida ac fractu facilia iinnt, & in minore ambitum contrafta, & versu in ten or a en Ipa. E petiolo tres cofts viridi-dilute ac flavefcentes excurrun^ media laterahbus nonnihil craffliore, in resta Be averfa parte extantes; laterales dua: primum brevi intsrvallo redtis graffibus meantes, ac ad mediam junfta^j inde obliquo ac annulatum inflexo duftu anteriora versus alte ascendunt, aoproxime ad cupidem progrediuntur; ubi in venulas subtileSj qui2 versus cupidem deferuntur, difparent: ex coltis extantibus plurimx fibra: feu venae intimo traftu per ipfium folium tranfverfim egrediunturj subtili cancelliformium venarum contexta comitat^, fiintque in majoribus falis nonnihil eminent^ maximè in resta parte. Folia fiint forti ac aromatico odore, prascipue trica, ipfium Cinnamomi odorem /pirantia, it lapore quoque Cinnamomij sed minus vegeto.

Flores petiolis viridi-dilutis, qui (lipra ex origins folioruin prodeunt plures congregatim feu urnbellatim proveniunt^, Rintque stelliformes ac parvi, constantes sex foliolis, e viridi dilute albicantibus^ parum oblongis ac rotundis oris, anteriora versus contraftis, ac brevi collp feu pediculo odons amfni: in medio corculum est, constans ex duabus stammum feriebuis, in exteriore stamina fsx, viridi-clara^ supra alia emicantia, infuperiDri parte plana ac latiora; in interiore itidem fex, tsnuil ac parva, cum nodulis feu apicibus flavis ac craffiufculis : atque in ea fene ex Iis infuper tria stamina, cum illis qua: in extenore ordine familia paribus intervallis emicant, compleftentia stylum tenuem ac viridem, in verticenisgricantem, qui ex capiculo viridi oblongo, quod primordium fructus eltj ac in pedicuh (uperiore parte concinetur, egreditur- Flonbus ad pediculum adest calyx arftus SC exiguus. Gemma: florum rotundiola.

irufiis Jiint bacca: oblongo-rotunda:, terete forma inftar glandis quercina^ arfte inclufi in calyce profundiolD, craffiolo, viridi, qui sex cupidum est; fiintque superficie glabn, primum viridifufci ac nitentes, ac puntulis albicantibus confperfi, Be turn sub cortice pulpà viridi-clara, q^f flaviufculum; unfluofum humorem exfiadat, &c faporis fubacris, adstringentis ac unftuoofi contentenque sub pulpa corticis unum grandem nucleum, oblongo-rDndum Qc gjabrum, qui cortice tenui, cartilaginob obteftus est, Sc pulpà densa, ex albo rubefcentis, ac incarnati colon's, & humore unauofDj qui m filam,enta prDtrahitur fuffula, Be iapDris magis acris &c minus adstringentis est, constas; dei_n CQm matLiri fiint cEruleo-fufci SC nitentes, qui color est in tenui extenore membrana, incus etiam pulpè viridi, fporis aromatici U fiaman Be acris, ac pulpà nuclei ex rubro rsmJo* lcentB constantes.

Flores hanc arbor femel fert in anno, fg. Januariy.

Hinc specie candem esse existimo

1. *Cinnamomum five Canelam Zeilanicam C.B. & aliorum. Laurum Zzylanicam baccis calyatlatis*
Herman. *QLfyz Cinnamoiv€m of Ceplon**

Quamvis omnibus filiis partibus tangere nobiliorem 5c praefantiozem: nam fut idquanturPhilofbphi magi5 5C minus non mutant fpeciem. Zeilanica quippe Canela non fecus ac Malabarica folium habet tribus nervis infignibus fecundum longitudinem decurrentibus pr2ditum, ik: fructum etiam profert cum calyce glandi quercinic fimilem, ut Sc D. Knpxius, qui in infula Zzilan ID annos captivus detinebatur, in fua arboris hujus defcriptione diferte affirmat 5c D. Hermannus innuit, cum Canelam Zeilanieam, Laurum Zeilanicam baccis tjalyculatis, ex qua Cinnamomum, inferibit, literis ad D. Syev datis.

Ex hac etiam Hiftoria, Cordym recte defcripfit tur Folia tur fructum Caffia:, a quocunq; tandem edoftum, conftat, quantumvis invito Jo. Bauhino.

Folia, inquit, habet denfa, Laurinis familia, multo tamen majora. [D. Hermanhüspirirer & D. Knpxius folia * Lamina eiattribuunt] ad Citri potius Folia accedentia, utrinque faftigiata, Eer- * 4ut *Lauri*
nas individuafq; venas per longitudinem tranfeuntes habentia, quarum media craffior, re Claue eft *cera J**
reliquis duz leniter curvantur, eque a tergo eminent, 5c evidetiores funt quam inrus. *Un defcri-*
ptom noftraurinfo eminent] Fructus Fert Laurinis baccis fimiles, calycibus feu cupulis glajidium raodo infidences, qui rariffime adFeruntur.

Qux Garcias habet de duplici hujus arboris cortice ad modum *Suheris* nobis fufpeaa fiint, quoz ds deliberatione femel triennio fafta, nee enim, puto, renafcitur cortex fern el detractus. yz, drh eft autem, exemptum corticem cinerea ilia tenui 5c fcabra exteriori pelliculafefibrari in jaminas Tecari atque ita convolutum ut trunci unius rami integer cortex videatur, in Foleficcarir Minores duntaxat arbores decorticant quamvis majorum cortex non minus luavi Be aromatico fie odore 5c lapore, ut nos munzt Rob. Knoxius.

Ex cortice ramoso Oleum cum Sale volatili, Camphora dicto per deftillationem extrahitur, efit, anti, cum quz fmoal afcendat, levius, confiftentia clarior & tranfparens, ac volubis fubtilitate, Ddc fit fmoal ac vaxca. fapour oracris & profundè nemerant. unffam & particulis tenuibus &

facile fe diffipantibus in libero St aperto aere. Camphora candidiHirna eft, 5c in odore Camphora communi excellentior. Ejus particulae in oleo primum deftillato natant, ac ejus partibus infenfibilibiter permixta flint, olei tranfparentiam ac claritatem minime obfulcantes; dum autem oleum refrigeratur, particular Camphors natantes ac fejunctae; una: aliis formã fatis irregulari fe affigunt, conftituentes primum haftas oblongas, quibus partes alia: de novo accedentes, velut tranA verfi acus ad reftos angulos fe affigunt, atq; ita, graviorez fafts decidunt, atq; ad fundum oJei fiibfidunt. Verum hie nDtatu digniffimum eft, quod dum fe affigunt in duos vorucoFos motus, qui per horizontalia plana Feruntur, cierr, ac primum quidem tardius, dein fenfim velocius, atq; oleum ad iuam fuperficiem ubi prius refrigeratur, 5c ad Fundum plurimis particulis Camphors, qua: ejus rranfparentiam adimunt, imbutum, cum in mediD adhuc fit clarum feu magis tranfparens: quin 5c particular Camphor*, quz fe fibi mutuo affigunt, paries oleofas primum intra fe includunt, eas vifui fubducentes, quz dein particulis falis ad anguftius fpatium versus inferiora detrufis, fe ab iis refoolvunt 5c ieparant, fiiperiora prz levitate petentes. Eft autem Camphora haxmaxime diffipabiliff, Be fimma celeritate flammam concipiens, ac nullam fscem poft deflagrationem relinquens,

De Oleo quod cum hoc Sale attollicur hxc notanda occurrBnt. i. Quid odore 5c fapore Camphoram maxime arpuetur, a. atque adeo Facile dillipabile fit, ut licet mpannos incidat colors aliquo tintos, nulla relifta macula evanefcat ac difletur. i. Promptiffimum quoq; eft, ut ipfa Camphoraj in flamma concipienda, in eo fpiritum vini ab aqueis particulis dspuratum refrens, totumque brevi tempore depafcitur flamma albicans 5c coerulea. g. Super igne poftum 5c calefaftum etiani cito confumitur, abitq; in Fumum albicantem, qui igne admoto flammam prornpuffime concipit. 4. De eo quoque expertum eft, filinteum eb madefaftum incendatur, linDeo remanente illfcb, plurima5 ejus partes ignem depafci: extinfto autem igne linteum illud primo acrem Camphora-ceum odorem exhalat, eo autem debilitato 5c evanefcente, gratum aliquem Cinnamomi odorem fpirat. 5- Prarterea Oleum hoc in Sulphur vel Sal-nitrum, veletiam in illofales fimul mixtos conTperfumj iisprorfus illibatis ac ilbdis, a flamma in totum conlumi ac depafci; quod fi puvis tormentariu5 eo imbutus fit, flammam concipit eo accenfo, fed nonnifi tardius 5c poftquam multx-particuk Olei depafci fiint. 6. Singulare quippe experinjentum eft, quod fumus Olei, qui ex eo calefafto fiiper ignem exhalatj per pannum triplicatum feu quadruphatum exceptus, ad ejus fuperficiem in falem candidum concrefcens, quod ipfamet Camphora eft, Fe affigit. Cüm 5c hoc oleum ut purum Be clarum fit, cum tempore particulas quafdam camphoraceas dsmittit. Relatum quoq; nobis eft jnlocis frigidis, quo erat adveftum, de fuo fluore remittere.

Oleum quod ex hoc Malabar. Cinnamomo extrahitur, tranfparens, clarum, flavum, rutilans, ac fragrantis quoq; odoris, 5caqux innatans; cum ex Cinnamomo Geylonenfi, prater oleum innatans etiam extrahatur quod aijux fundum petit.

Oleum ex FDIUS primum turbidum eft, cum tempore flavefcens, ac tranfparens, colons viridefcens, cftque Fapore quoque dulci 5c acri, odorem cinnamomi tenuem fpirans, in aqua fublidens ad fundum.

De Camphora 6c Oleis quz ex variis hujus arboris partibus vel deftillantur, vel excoauunirir' D. Vaulm Uermannus literis ad D. Sym datis fie infic.

Mira nature diverfitas in hac arbore confpicitur. Deftillatur exradicis cortice Camphora eiufa mo, Vires H8 oleum. Ex trunci cortice oleum Cinnamomi; ex foliis oleum Caryophyllorum; exfructibus oleum Juniperinofimile, cum paxillo Cinnamomi ac Caryophyllorum mixtum; exhis 5c excoquitur oleum pingue, craffum mftar cera:, ad emplaftra, unguenta ac andelas conficiendas commodiffimum; medicamentum lidem interne 5c externe uirpatum lumme anodynum. Oleum hoc referente D. Knoxh, confiltentiiBe colors febum refert, sq ic diirn durum & candidum effe, odors Fragranti, quo

quoin, utigentisutuntiiir indigene ad dolores leniendos, &c ad lucernas, non tamen ex eo candulas conficere, quod niam nemini prater Regem licitum est candelis uti. Quinetiam folia contufa Caryophyllos potius quam Cinnamomum redolere scribit idem.

De Canellae vinbus placet adhibere quae tradunt Horti Malabarici Auctores.

Radicis cortex in decocto datus, vel in pulvere cum melle-feu faccharo Icrvic pro tuffi & phlegmate expurgando: idem contricus & permixtus cum aqua confert in podagra, fadla perupotione. Cortex ftipitum in decocto datus confert quoque flatibus. Idem in pulvere datus cum aqua calida dolores ventris fedat fluxumq, ex frigore obortum fittit. *Nofiratzj non Jim fucceflit lafti, vl *yifo-galo, *vel Cerevifite Cinnamomum incoeuunt ad diarrham (iftndam.* Decoctum etiam Cinnamomi recentis in vino rubro nimios menfium fluxus cohibet, Eph^m. German. An. io. Ob/bv. if-

Foliurum fuccus cum pipeie &c faccharo datus pro doloribus ventris, Be renum flatulenta materia ferviunt. Folia in pulvere data cum faccharo conferunt in vertigine capitis, uti & Flores in pulvcrs cum ifaccharo & aqua fngkla dati.

Oleum quod ex cortice radice[^] cum Sale Volatili *Camphora* difto, per deftillationem limul BX-trahitur, in ignium 6c multarum est virium: optimè confert in omnibus affectibus paralyticis P[^]-terius in tempore applicatum: in podagra furnum ac prarfentaneum est remedium, vehementiss partium affectarum dolores illico ledans iis inunatum[^] ad quod etiam confert intus fumptum: in affthmate aliifq, affectibus pulmohanbus fanandis intus fumtum etiam maxime confer[^] uti & nialignitatem rebrium corrigendam[^] 6ftquefidorem pellens[^] in gangraena k fphacelo, aliifq, affectibus, ulceribus malignis optimè quoque prodest, juvatque etiam pro Impetiginibus, doloribus artuumj ventrisj. qcolorum, necnon tumoribus membrorum ex frigidis Be pituitosis humoribus obortis; prz? tereainpedum contufione ut 6c vulneribus, fenfium partium ftupefactum reparans; prodestq, in rheumate feu fluxu capitis; ejus odor, qui illico ex titillatione fternutationem quam rhsuma cieci fittit; in flatibus difcutiendis quoque effeacax est intus fumtum; appetitum quoq, excitat ac calculosis prodest: fúntcj, hx vires experientia[^] comperta: *Camphora* fervit in affectibus uterinis ad ~~vocandam~~ ftrua, fudores quoq, ciet.

Oleum corticis arboris confert in affectibus ventriculi[^] in torminibus ventrisa frigore ortis. A ~~q~~ Cinnamomi; ut & florura Cinnamomi deftillata, cardiaca habetur. Oleum ex foliis prodest ~~cl~~ riu5 applicatum in Colica; fummum remedium paralytids. Eorum aqua conducit in affedtionibus cardiacis frigidisj daturque inpononibus ftidorifens.

QuE Antiqui & Recentiores habent de Cinnamomi viribus, non raultum differunt ab bisquerecentissimis, nimirum conducere ad putridos Bcerofos humores in ventriculo ftagnantes; ad crassos etiam & vifcidos; prodest omnij generis obfturionibus, unde laudatur in hydropo, iftero, w* culo, ifchuriaj menfibus retentis, artufque difficultate, Bcc. Laudatur etiam in affectibus peftonij tuffi, affthmate, ice

Infula Zeilan non minus frequens est Arbor Cinnamdmifera in fylvis Be sepibus quam Coiy-lus apud nos, nee ab incolis pluris a-ftimatur, fed sine delectu unã cum aliis arboribus ad focum inftruendam vel alium quemcunq[^] ufum czditur.

Sufpicantur nonnulli Cinnamdmum ad nos ex Indiis del a turj olei fui maxima parts ibidem fpoliari antequam navibus hue deportandum imponatur, quippe quod hie deftillatum pauciffimum oleum pcebeat.

3. *Zamta fffoftris Malabarica. Katou-Karua H-M. Part. 5. Tab. jj. (Qfyt Jteat IUilb €XV[^] nainon[^] Erce of tje fl[^]ountain[^])*

Pixcedenti haud abfimilis est, turn odore[^] turn fapore, nifi quod inajor fit Be altior. *Folia* icidem przgrandiaj oblongo-rotunda, longitudine duas fphthamas, latitudine duos palmos circiterquantia: à pediculo ad apicem folii ties nervi craffiores tranfeunt, è quibus tranverfe mult[^] venulae excurrunt. *Flofuuli* in umbellas expanfi extremis ramulis proveniunt, inodori, viridialbican-tes, pentapetaloides, quinq, viridibus brevibusq, *flammuUs*, viridi-flavis a pi culls ornatis medium oculi[^] pantibus. *Flofculis* fuccedunc *bate** exigux, Ribium noftratium inftar.

PrDVenk locis montanis in *Berkencour*, *Teckencour* aliifq, vicinis provinciis, femspr viret; Julio & C Augufto menfibus floret, Decembri autem & C Januario maturos fert fructus, dñuque iuperftes ~~ibid~~

Ex Arboris foliis in aqua cotais balneum fit contra quofcunq, articulorum dolores. Ex radice cortice cum Cardamomo & Nuce[^] mofchata in aqua cofto potus conficicur ad ventris tormina fedanda proficuuus.

Multas Canellz K Cafflix[^]pecies adducit J. Bauhinus, ut,

1. Canellam feu Cinnamomum vulgare, craffiore carries.
- x. Canellam ad vulgare Cinnamomum accedentem.
3. Caffia: Molylitics nomine datum corticem.
4. Caffiam ligneam fufcam aromaticam, Cinnamomum ex Sarmatia diftam.
5. Caffiam ligneam fufcam aromatici flc glutinofi faporis.
6. Caffiam ligneam fufcam aromaticam acriorem.
7. Caffiam externaparte infipidam. Quarum defcriptiones apud ipfum videantur. Nob[^] cnimuc diximu5, omnes ejufdem arboris coraces efflovidentur pro loco natalcaut state arbois differentes.

4. *Malabathrum & Folium Indum Officinarum*. J. B. *Folium Indum feu Malabathrum* Park. *Tamalapatra* Ger. *Tamalapatrum* Jive *Folium* C. B. *Cadegi Indi, id zfi, Folium Indum Arabibus* eidem.

Cum Folium Indum feu Tamalapatra, (obfervante curiofiffimo Fab. Columna,] à Cahellse folio, excepto fapore, vix poffit dignofci nervis illis tibus Be folii reliquis fignis fimilibus, ut non ovum ovo magis fimilefit; non eft cur in eo defcribendo labremus, cum in Hiftoria Cancllac jamjam abunde defcriptum fit.

Scribit Diofcorides Folium Lentis paluftris modo aquæ innatare, nulla fultum radice. De Malabathio finquit Scájiger) Veteres fomniafunt. Qui enim omnes Arabias Be univerfas Indias penetrantushodie nulquam folium illud mirabile compertum habemus.

Garcias quoq, Garcos in hoc falli affirmat, Folium enim Indum non aquis innatare, fed in pro-cera arbore nafci, procul ab aquis cum multis aliis in locis, turn in Cambaya. Tamalapatram Yocantj quam vocem Græci in Malabathrum coiruperunt.

Nos autem, tantisper donec promiffum impleat, &c diverfiffim effb probet Jacobus fireynius, cum Am a to aliilque doctis fen timus Folium Indum Officinarum Caffiæ odratae folium, effc, aut falctri Canellæ fylveftris Malabaricæ proximo defcriptz. Cum enim id affirm en C Ruellius,, Cordus^ Amatus, Lacuna, alii; Cum Garciascribac Folium Indum Caryophylla quodammodp redolere, qu^i odiirem Canellæ Zeilanicæ foliis tribuunt D. Hermannus Sc Knoxius; cum ipfe J. Bauhinus fqui contrariam fententiam æCur] in noftro folio Indo\ ejufq, partibgs quædam effe quæ re/pondere videntur Cinnamomo Vecerum fateatur; cum illud ipfiffim Canellæ folium a plerifque etiam doi^is credi fenbat Valerius Cordus; cum deniq, fruiffum legicimz Canellæ (utj jam confctac) interdum unâ cum Folio Indo vulgari ad nos adferri fe intellexiffb refert Clufius, unde &c Jq. Bauhinus ilium profolii Indi fruiffu habet"; Be Clufius Tamalapatræ feu folii Indi ramulo eum appingatjFolium Indum diftum feu Malabathrum ipfiffimum Canella: feu Cinnamomi folium effe, vix ullis frpereffe videtur dubitandi locus.

Malabathrum viribus cum Spica Nardi conveniri dicitur, urinam potenter ciere, oris halitum Virtu emeridare, veftes ab erofione vermium tueri.

5. *Cinnamomum fi ve Jlamua Yzruana* C. B. *Canzlla Teruana frttffu Pileo Jimili*. R. *Laurus Americana odorata*. QLfyt SUMcucaii Cinnamom Crcc.

Arbor eft à Cinnamomifera genere diverft, defcribitur Monarde. Media: magnitudinif^ eile fertur, & immortali coma prxdita, ut reliquar Indict arborea, foliæque habere Launnis familia. Fructam effe parvo pileo feu pecalib formâ fimilem ea latitudinis qua Thalerus nummus duftus, interdum etiam majorem, extrinfecus Stintrinsicus ex purpura nigricantem, intends levem, foris alperum, cujus margines craffitie jam diftum nummum arquentj fummitas. verD longè luperet, Bepediculo præditafic, unde ex arbore dependeat. Guftatum eandem faporis fuavitatem Be odoris fragrantiam habere quam legicima Canella ex Orientali India delata, cum nonnulla adfrictione conjunftam. In pulverem tritum Be eduliis inlperfum eandem illis faporis Be odoris gratiam conciliat quam Indica Canella. Arboris corticem qui craffis eft nullum Canellæ Ipirare odorem, aut iaporem referre aiunt. Folia trita tenuern quendam Canellæ odorem fpirare ferunt; fed primaria vis in folo fruiffuoniffit contra quam in Orientali Caffia. In Provincia Sumaco nakitur.

Diverfam arborem quis crederet quam ex Hiftoricis Indicis defcribit Clufius, folio Laurinoj fruiffu racematim cohærente, quicaiyce Subcrino fimili contineturj ampliore tamen. Be magis cavo, colore nigricante. Hujus arboris fruiffu, foliis,, cortici Be radicibusj [licet Canellæ laporem^ Be odorem habeat] longe calyces præferuntur, quorum duntaxat pulvisin ufu eft. Nam Uanella: modo cum cibus decoquantur, tantum abeft utluavitatem eduliis cuncilient, quin potius eorum facuhasfi; iaporis gratia decoctione evanefcit.

Verum Locus eandem effe liadet^ exfententia Cluffi commodius defcriptam abhis Auftoribjjs-

Calycum pulverem turn ad alia, turn præcipue ad Coli, inteftinorum & ftomachi dolores præ3- Vires'. pinant. Ventriculum roborat^ flatum difcutit, uris foetorem corrigit, cordi prodeR, & colorem faciei commendat. Adaadem utilis eft ad quæ Cinnamomum.

CAR XXXII.

Vidimaram H. M. P. 4. T. 57. p. 77. *Frunn Malabarica fruttu ractmofo, calpe exctpfo.*

H.M.

Arbor eft mediæ magnitudinis, caudice craffib, albicante, cortiue obdufto craffib, fquamofa, furvo, ac lineis purpurcis ftriato, odorif^ gravis, Be faponariam aquam referentis; nec non pluribus ornato ramulis cinereis. *Radix* albica^ns, furvo cortice tefta^ inodora, infipida. *Folia* inordinate circa ramios longioribus petiolis proveniunt, oblongo rotunda, acum^inata, ex parte leviter in ambitu crenata, denla, fupernè cobre atro-viridi fplendencia, infernè viridi dilutior: levius folii medius craffuSj Be præterea in quolibet latere unus tenuior fecundum longitudinè nem excurrit: odor ingratus aclixivioius; fapor unfubJiis. *Floras* candidi ac Ciaveolentes, petiolis longis circa ramios racematim proveniunt, viridique oblongo Be acuminate calyci inherent, ffx oblongo-rotundis,, acuminatis, craffis K extrorlum reflexii foliolis confctantes. totidem albicantibus
fiamif

ac etiam duo grandia *ojjkula*, oblongo-rotunda, nonnihil plana, fpadiceo-fucii & nitentis colons.

Bis in anno floret.

Efloribus aquafn ftillatitiam indigenae echiunt, *qux* odorata eft, 8c «pota melancholicis ac fe- *Vinu*
bricitantibus proficua.

Gravidis in difficili partufructus tnti commodè dantunn aqua calida.

CAP. XXXV.

Trttus Chinwfis duplici infruffn ojjlculo,

Manyl-kara H. M. *Frunus Chintnfis Belgjs. An Pruno fimilis fruBus Cbimjis* C. B.

* P. 4. T. af

ARbor eft procera, caudice craffo, multifque ramis longe, lateque diffufis donato; qui cortice atro- viridi obdufti, ubi inciduntur liquorem exfiidant unftuofum, inffpidum, ihodo- rum. Lignum cinereum, cortice obduftum denfo, fcabro, fufco, intus ruto. *Radix*: fls- Velcens, faporis -acris, odoris lylveftris. *Folia* craffis, rotundis, ac viridibus peciolis circa e y t r ^ j ^ ramulos numero (à proveniunt) obloago-rotunda, atro- viridia, craffa, denfa ^ glabw, fpleftdentia: media cofta folii craffa, rotuqylaj ex viridi flayefcens. Manibus fi confricentur hxc folia vifcidurrij lafteum ac acrem fundunt liqnozem, quo mediante eadem teneriora arftc coiTphcata fiint. *Florei* magnitudine Tiliac flonbushaud abfimiles, itidem circa extremos ramulos inter folia rotundis, lanuginofis ac purpureis petiolis glomeratim ^ non fparfim producuntur, fensimque porredtis columellis umbellx fpecie panduntur: triplici conftant ordine foliorum acuminatorum ac ruforum, quorum, finguli ordines fex continent foliola ac medms plat ^ è er6Sfus eft; inhsrentque caljci craffo, rufo ac lanuginofoj in fex lacinas acuminatas fefto, fex candidis *fiawinibus* rufis *apabm* dotatis mediam floribus cavitatem & C umbilicum occupantibus, inter *qux filius* prodit, ipfius fructus rudimentum: odor fiaavis ac melleus, fapor nullus. *FruBus* turn forma, turn magnitudine Olivis fimiles, immaturivindes, nitentes, fuccoq, vifcido ac lafteo referti; maturiores vero purpurei, intufq, rufa, ficculenta, ac acido-dulci camp referti, intra quam bina, frarius unum j locantur officula,, oblonga ^ glabra, rufa, nitentia ^ *nucleum* concinentia album ac amariufculum.

Arbor hæc nullibi, nifi fobole auc ieminibus in hortis fata; provenit in Malabar: Chinx 5c In- *Locm**
lularum Philippinarum indigena eft, indèque in Malabar ijllata; hinc *Mcmyl-Kara* quafi *Kara* è *Ma- mlhdi* infulis appellatur. Quotannis maturos fert fruaus, Augufto, viz. Sc Septembri menfibufj Iem- per viret, diuque frugifera manet:

FruEius maturi inter bellaria comeduntur, ^ppetitum agent, K concodtionem promovent. *Vir?sm*

Ex aiboris foliis cum radice *Curcuma* & Zinziberis foliis coftis Be contufis cataplafma conficiturj quod tumores quofcunq, potenter maturat.

Ex kfdem in Sefami oleo coftis, addito cortice hujus arboris pulverifatoj litus paratur, qui affedtui paralytico endemioj Indis *Berberi* didlo, fajando liimopere conducit.

CAP. XXXVI.

Ihacu-rapari Brafilienfibz Marcgrav. *Trunifera umbeUatafruBu uniform cum iuobm ojjiculis.*

ARbor eft mediocrijs cortice grifeo. *Folia* Fert in frondes congefata, ab uno ad quatuor digicos #longa, lætè viridia ^ foliis Perficac baud abfimiUa. In cujuflibet rami extremitate umbella r enafcitur, plerunq, in quatuor brachia rhombi inftar expanla, quodlibet brachium ite- rum ifl multos pediculos, in quorum quolibet *flofculum* provenit, calice albo, digitum bngo, fupe- rius in quihquangularem ftellam divifij colons obfeurè coa-uleo-purpurei, inodffrus. Sequicur *fruftus* Pruni equini magnitudine, figurà renis ovilli, in fuperficie glaber, cuticula lutea, & inte- rius carnem luteam habens, odoris ut Sapo Hifpanicus; Carni autem involutiduo lapides figure el- l p t u z . comprefli, duri. Fructus non comeditur.

CAP. XXXVH.

Trunifera vejicariafrufu multiplied ojjiculo in (ingulis quadrat a.

Theka H. M. *Kyati feu guercm Indtca* Bontii.

ARbor eft praccella, atq, Ipdciofa plu'rinnim, caudice przeraffo, cortice craffo, fcabro *J-J7.*
cinsreo obdufto, necnon ratnulis viridibus, geniculatis ac quadrangulis plurimis don *ac*
Lignum albicans, durum, glabmm, irriatum, quercino ligno haud ablitnile *Radix pura*
fapons adffringentis & fubaraari, odons fubacidi. *Folia* getninata ordine parallo "ramus inh-
rent, oblongo-rotunda, acuminata, denia, craffa, fuperne fplendentia, inferii ^ nequaquam, du <
ipthamas aut amplius longa, Ipithamam lata: odor acidus, fapor auftrus. Manibus li confri-
centur

R r r r r

centur hęc folia fuccum fundunt, qui illico fanguinis infar atro-purpureus evadit. Flores exigui, fuaveolentes, circa ramulos tenēiores ad foliorum exortum petiolis longis, quadrangulis ac fulcatis proveniunt, pensimque porre&is columellis umbellae fpecie panduntur: confiant quincj; vlt fex fubrotundis, candidis& extrprfūm reflexis foliohs, inhzrftntq, txiguo 5c acuminato calyci: foliok hęc intercedunt totidem *Jdminula* alba, *apicibus* luteis donata, medium occupante *fylo* fubvridij acuminato. Tandem fūpveniunt veficx magnae, virentes, fūperius apertas, in quibus tres quatuorve, fligiieo tamen fepimento ab invicem fejudli) locantur. *FruBus*, fubrotundi, virides, lanuginofi ac hirtuti, necnon came viridefcēte inodora, faporifque amai i & adftntgentis, referti, intra quam v/*Jiculum* continetur quadratum, ex 4K0 fufecens, *nuckum* includens exiguum, aJbicantem.

Locus. Crefcit ubique in Malabar, at pr*fertim in provincia *Aujmcoylte Calicolan*, ubi integrz: fyra ingēmium harum arborum reperiuntur* Semper viret, quotannis floret fruftūmq, fert: menfibuSj viz. Augufto & Oitebri.

Vfa & fires. Lignum hujus arbpris Quercino ligno haud abfimile eft, operi fabrili accommodnm, atquenau-pegls acj navium fabricam in ufū, fed in aquis, praefertim dulcibus, teredini facile obnoxium.

Gentiles, nefecto qua fuperftitione ducti, hoc Ibluminodo ligno fua vel conftruunt vel reparaftt templa; Eē retulic Princeps *Calicolan* fe integrum templum ex unica hujufmodi arbore xdificare curaffe.

E *Foliis* tenerioribūis purpureus conficitur coldr, quo panni fericei & goflipini tinguntur." Etiam c^erahxc folia indelicis indigene comedunt, ex iifque coftiscum faccharo fyrupus fit, qui aphthis m^Hetur- ,^x fioribuscum melle coftis medicamentum pij-atur^ quod affūmptum aquas hydro-picorum educit. Radix ficcata^ contufa, & in pulvrem redadla, ficquc exhibita fanguinem ex cafu alicubi concretum difflvir, E fruftibus tenerioribus contufis uii^uentum conficitur herpeti fanando perquam utile.

CAP. xxxvm.

* P* 2. F. 9. *Trunifaa ractmofa Malabar tea* fruftu comprējb* nūcleo nudo. Panel * H.M.
p. 9.

Frutex eft altitudine quinque fexve pedum: *Radice* capillata, cortice cinereo aromatico *te&**. *Folia* in brevibus & craffis petiolis oblongo-rotunda, ad petiolum contradiora, in medio latiffima, cuspide modo obtufb, modo anguftiori, utnncq adverfis extantibus nervis ex cofta ftnata, ac inaequalis fuperficie ex groffo plunum nervorum undique decurrentium cancellifa¹¹¹¹⁴ contextu; coloris vindi-furdi. *Flores* in racemis longis hinc inde ē foliorum finibus egressis 9¹¹ fiftunt, candidi, quinq, petalis rotundis ac anterius rotundo-cuspidatis compofiti, odoris haud injucundi. *Stamina* decem, velut angufta foliola albicantia, *apicibus* parvi* flavis dotata: *fylysin* medio craffus 8c fubvindis, in fummitate habens capitulum flavo-albicans, eftque principium ac germen fruftūis. *Flores* fequuntur *fruftus*, qui funt baccae piano-rotunda; in vertice habentes fpiculum feu nodulum, qui ftyli germinis fui capitulum conftituebat, fiintq, odoris aromatici, semulantis odorem Piperidis<ai *Capō Molagb*, & gingiberis viridis, cum immature funt colore viridi albicante, ac cortice, qui craffiolus eft, aifero feu minus flavo, ob gemmulas viridmfculas hinc inde eminentes; ex maturitate primum albelcunt, dein ciim pUne mature funt colore albicante eburneo & ad perifaim vergente, corticeque glabro nitente ac nonnihil tranfpārente^ carne fucculenta & fubdulci: /untq, hx in eduliis.

Incus unum rotundiolum, planum agrandiufculum [mm continetur, quod tenuiffimo ac viridi cortice etkm cum maturum, ac pulpā albā odoris aromatici ac faporis fubacris.

Flores fert toto anno.*

Vim. Torius plants trita: 8c deco6be vapor in parte affefta exceptus fedat dolorenr arthriticum- R*&* humoribus evocandis tnta, & cum aqua in qua Oriza maceraca fuit in lotionē adhibita infervit: eadem trica & in aquafumpta appetitum acuit, in decocto data flatus difcutit. *Folia* in capitis affeftionibus conferunt, uc praccipue in phreneft: *eorum ficcus cum oleo deco<Stus & auribus immiffuSj wrum dolorem fedat: decoftorum vapor ore attradus dentium dolorem mitigat.

CAP. xxxix.

Oepata H.M. P. 4. ^ 45. b 95.

Arbw Indica frtttu conoids, cortice fuhinato nucleum unicum, nūfo oficulo ttitum claujente.

H. M.
Arbor eft pracellā Sc fpecio/a plurimum, altitudine 70, craffitie verò 16 circiter pedum *menfiram* arquans, multifque ramis cinereis, longè latēq, inorbem diffufis, donata. Lignum albicans, cortice munitum cinereo. *Radix* fibrata, rubicunda, rufb cortice teftaj inodora, niucilaginofa, fapouifq, fubfalci. *Folia* geminata ordine parallelo brevibus pegoljs^{circar?} mulosprovenimr, obbngorotunda, craffā, denfa, glabra, nitentia, fiiperne viridia, inrernei UD-cinerea, inodora, infpida. *Flores* racematim proveniunt, exigui, fuave-olentes, calywg, vmai m quinq, herniasacuminatas fefto inhirent, quatuor oblongo-rotundis, acuminatis, luteis, atq, man^r bin. alweannbus petalis confiantes, inter qux totidem albicantia, bifidis *aficus omaXi* f<wv*J intercedunt, medium occupante *fylo* cxiguo, candido. Part fertilitate *flonbus fruftis* ^cedunqj confformes ac pkm, cum cuspid? in vertice, cortice viridi, craffib, carnofo ac pulvinaro *g^g

Amygdala: in modum: huic includitur *nucleus* fabam majusculam cum forma, turn substantia &; odore referens, & faporis amari, qui dum in involucro suo adhuc continetur, germinare incipit ac radicis foliorumq, primordia emittit.

Provenit locis arenosis ad ripas aquarum lassarum prasertim circa *Cochin*. Singulis annis maturescunt fert fructus, Augusto viz. & Septembri mensibus/ atq, per feculum non raro frugifera Jijant.

Lixivium e cineribus praestantissimum panis eluendos; Piftores etiam coloribus admiscere solent ut piftum adhaerens firmius queant.

Fructuum nuclei in Scyllis *Caril* ab indigenis expetuntur amaritudine per diutinam macrationem & cotionem in aqua liibata. Infuper e fructibus hifce viridibus cum f oliis *Adamboe* coctis 8c addito butyro contufis cataplasma fit quod tumoribus impoficum potenter eos emollit, & maturat: cundem in finem cataplasma hoc variolis 6c morbillis imponi solet, ut citius vel maturentur. vel ditcutiantur.

Fructus magnam cum Anacardio habet similitudinem.

CAP. XL.

Frunus Icaquenfis Rochefortii.

Arbuscula est fruticis in modum parva, perpetuae frondis honore gestifera; parvis Jonquifculis, bis quotannis floribus innumeris pulchellis albis aut violaceis iperftrictis, onusta Floribus liicedunt frufus parvi, romndij magnitudine Pruni Damasceni, qui maturitate albi aut violacci evadunt ad modum florum. Valde autem dulces sunt hi fructus Indis quibusdam qui juxta finem Honduras degunt in deliciis habiti; qui eorum adeo avidi Be amantesfont, eaque tanti faciunt ut ipsi *Icaumfa* inde denominentur: Proinde quando maturefcunt pruna excubias agunt Be armata manu vicinos arcent ne furtim aut aperta vi ea rapiant, aut fruteta depopulentur,

Trunus de Monbain Rochefort.

Pracella est arbor pruna longa, flava odore fatis grato producens. Verum cum officium grande pulpam feu carnes pauca habeant, non ragni fiunt nisi forte ab ib qui potui *Oukou* vel *Mobby* didto ea admifcent ad faporem gratioretn communicandum. Quo tempore maturitatem adepti in terram decidunt hare pruna, Porci in fylvis degentes ex eorum effu, quo multum delcftantur pinguefcunt admodum.

Hacc Arbor gummi exfidat flavum odore intenfiore quam fit ipse flus. Ramuli avulsi aut decifi terrae impafsi facile comprehendunt & radices agunt, unde ad lepijientia vivariorum quibus pecora includunt fructuiffimus eorum ufus est.

HISTORIC PLANTARUM

LIBER VIGESIMUS OCTAVUS,

QJII EST

De Arboribus Bacciferis flore inio fructui
cohxrente.



Accipit VOCD fructum minorem pericarpio seu pulpa hursida donatutij cui femina seu nuclei induduntur vel folicaria, vel bina, terna, quaterna aut plura.

¶ua: fructu sunt monopyrenoJ hoc est fingulari seu unico intus officulo airt nucleo, fola fructuum parvitate àPruniferis distinguuntur.

Bacciferx arbores font vel fingulis acinis fingulis flonbus liccedentibusJ vel pluribus acinis confertis ad fingulos flores, ut *Rubus*.

Primi generis plants font vel baccà calyculatà, hoc est, calycs à flore uiperfite excepà, vel baccà nudà, calycs felicec unà cum flore deciduo.

" Qua; baccà flint nuda sunt vel eadem monopyrena feuunicum intus nudeum claudente, vei pypyrena, nimirum Pbi duobus incus nucleis, vel tribus^ vel quacuor^ vel pluribus.

Draco arbor quam ad hoc genus refero infigni nota foliorum gramineoruin ab aliis omnibus dif- ferr, ut perfegeus unum fubalternum confthuat.

Librum ergo hunc in quatuor Seftionespartiemur.

Prima erit de Bacciferis fructu calycuTato seu calyce à florerefiduo excepto!

Secunda, De iis quac fructu sunt nudo &c monopyreno, f^u unicum intus nudeum femcùVe daudente-

Teitiaj De iis qua? fructu flint nudo 5c polypyreio, five duos nucleos feminave continent, GYG tresj five quatuor^ five plura, quibus admifceo eas de quarumnudeorumnumcro nondum mihi LDfilitat.

Quartà Unique de iis quarum fructus eidem flori liccedens ex pluribus ackiis componitur.

SECTIO I.

Dp Jrbwibus bacciferis fructu calyculato.

CAP. I.

I SaJTafras Ger. Park. *Safiafras five lignum Yavavum* J. B. *Saff. Arbor ex Florida Ficulneo fo- lio* C. B. *Anbuiba feu SaJJafrà, major* Pifo. ^ h u * -irTMfi p, rls, *

Maxima: hujus generis Pini sunt magnitudine & formi: nam præterquam quod sunt trunco unico, 6c Palms infarnonramofo, valido Sc refcto; ramosin cacumine habent coronis in/lar ornatè expansos ad infar Piniis repurgatar. Cortice sunt tenui, glabro ex gP** nigricante [aafio, fulvi colon's, alio tenuiore cinericeo tefcto] veluti odore, ita &c fapore admodum aromaticD, adFcEniculaccum acccdente. Ramis hxrent folia viridia, tenuia, ficulneonim aut Vi- iisjalbx smula, odorata, multoque magis cxliccata: Tenera adhuc Pyri foliis familia sunt, vwquq uUumangulum oftendunt, inquit Monard. quod confirmat Tha Johnfonus in Gerardo Luoema- culato: qui Saffafras arbultuli a fe vife in horto D. Guliel. Coys Stratfordii propè Londinurn ramulum defcribit & deping,c Foliis infimis integris fle propemodum Pyriforbibus, ft^{11,11,11} rSt^{TM,1} fpides divifis, eodem ^ ramulQ orper ^ fJis § floribus J, frluaibus Monard: S W j incogn.es. At C B a u h i n i s fructum oblongum, rugofun,, longiffimis pediculis donatum a altitib Parkinsonus ex relations Jo. Tradcfomh. # < TM, parvw, lucew, ftaminsw Corm^{marK} H a r i b u s p c d u m i s

perfimiles esse tradit, quibus succedunt pro fructu bacca: parvae, nigrescentes, palycibus parvis exceptis tunc simul racematim congesta; pediculis longis infidentes. Radices nunc crassae, nunc tenues, ad terrae superficiem expandunt, unde arbor extirpatu facilis, quarum cortices arborum corticibus lit Ddorariorum ita Sc in medicina praevalentioribus FcEniculum recipientes Cluffius Draconis herba: gustu affimulat.

G. Pifo Monardis descriptioni circa lignum Saffrae non acquiescendum esse ait, siquidem affermat Saffrae Florida: lignum decorticatum vix ullius dignitatis esse cum Brasiliense eximia dignitatis Sc virtutis habeatur, atque a cortice liberacum in aliquot annos immune fervatur: Duas adhuc alias hujus arboris species describit Gu. Pifo: I. Prior albicante sc flavescente est ligno, ac proinde Luffitanis *CeJro branco* vel *Canella* ob odorem dicitur, Bradliensis *Anhuijtanga* vocant. Foliis est parvis, angustis Sc tenuibus

i. Akera leu tertia specie Sc *Anhuihamiri*, quantum duabus prioribus magnitudine inferior, tantum virtutibus superior, omnibus pariter Brasiliensibus in quotidianos usus reperta. Folio est Læun, scilicet minorij fructu dorifero & nigro ubi maturerit, eoque simul cum cortice ligno folijs ic radice intense calidis.

J. Bauhinis lignum *Saffrae* sic describit. Cortice tegitur interius fungo non nihil molli: matenes subiacet alba vel ex albo rufescens aliqua interdum etiam ex parte ad cinereum vergens, mollitie Be peptinibus Tiliaceis, odore Be sapore suavi, aromatico ac nuculo sc lubrico quodammodo Anifi.

Nascitur in maritimis locisque temperatis [in vastissimis Sc distitis latibus *Tifon.*] non tanquam *Loctu:* in Florida fed & in aliis America: regionibus etiam Brasilia ipsa.

Folia contuGs imponunt Indij sicca etiam in medicos usus afflumunt.

Ligni decoctum, fed maxima radice ejusque corticis, multi usus est, quod videracius vel fatiracius pro igni viribus, state aut temperamento fumendum est. J. Bauhinus cum Monpelien agerit ligii cum suo cortice derasi in tibus tantum aqua fontans libris a medicis Monpelienfibus infundi solere ait per horas IT. deinde ad lib. Ij. conuimpti Dnem decoqui & C de colatura thj. mane furai calidè. Meliifque confemus (inquit) cum celeberrimisejusloci medicis in duas tantum doles sic parari quam in plures, fum quia adervatum gratiam odoris amittit, cjm quod facultas illius facile evanescit. Est enim tenuissimarum partium.

Refidentiam prididit decocti infundebant pertreshoras in lib. 16. aq. font. decoquebatit ad lib. ii. cDnfumpt. colatoque per manicam Hippocrat. Saccharo, Bolcheti titulo, aut fine eo, propotu ordinario utebantur, hberaliori adhibito viftu quam in 4pcofto Cjuaicino, quo nomine frequens ejus lictis in corponibus macilentis. Hac ratione magno flicceflii praxfenbebant ad podagras, ichiadas, veteres fluxiones, obftrudiones confirmatas febres nochas & antiquas, Be singulari propomodum experimento ad FoEds virginum colores. In lue Veneiea idem praestat quod Quaiacum., China, Sariaparillaj simili ulu Sc utilitate. Valet Sc ad membra refulata. Ventrem solvit cyathus mane calide limpcus: Pailionem caehacam diurnam fanat, flatus uteri Be cruditates conliimit certo experimento; mentes mirifice provocat, fterilitatem etiam emendat. Macilentis confert Be carnem aagec: Multi etiam ad peptis sc morborum CDntagioforum pTarcautionem aqua vd decocto ejus utuntur.

Monardes ad frigidos ventriculi affectus Be flatu commendat, necnotè ad concoctionem prono-vendam sc vomitu compescendam. In morbis choracis fngidis efficax est in capitis doloribus tarn novis quam inveteratis. Calculosis utiliter datur iisque quibus arenulz gignuntur in renibus. Advsrfa est lis qui urinae ardore laborant Halitum denique oris emendat. Haec Monardes ad quum Leftorem qui plura velit remitto,

Notat Schroderus Inltar Panacez in catarrhis haberi.

Ugno Saffrae ditto [uhjungit J. Bauhinu Lignum Anifi]*

A Tho. Platero medico communicatum, odore Anifi Be quam Saffrae suaviorem esse, materie solida, subfufca, peptines reiftos, maculis tranfverfis ac splendicantibus interdentibus, quales ferè in Fagino ligno videri solent. Facile finditur. Flammac admotum facile adolefcit K luculentam flammam praebet; fed odorem gratum non reddit ficum Saffrae.

2. Saffrae arbor folio crmatv Muhting.

Hanc depingit & c describit Abrahamus Muntingius in Herbario Belgico quern consulat Leftor, No5 enim linguam Belgicam non intelligimus.

CAP. II.

Tinda-parua H: M. P. 1. F. 48. p. 87. *Arbor Malabarica baccifera, cortice albicante glonnrato fiore* D.Syen.

Arbor procera est, nascens in arenosis. Radix quae fibris terz fs affigit cortice est crassa, subflavescente, molli, laetescente, faporis adstringentis; ligno albicante. Stipes ambicu hominik amplexum inriplens, cortice est cinereo, sublaeteo, qti fiunt Be rami Be furculi. Folia brevibus petiolis hinc inde infident, oblongo rotunda, nonnihil culpidata, ad petiolum etiam ontrafta, in margine denticulata, intus sublaetea, textura rigida feu dura, fupernè obturatus vinctia

R r r r r j

f c b r a

lūmslucidiora: *Nervorum dulcis & divifons in foliis nihil habent fingulare. Descriptioem fi placet vide. Flores* in capitulis plano-rDundis, petiolis fimplicibus, curtis infidentibus, per furculos hinc inde, ut gemm* plures units prodeunt, quatuor petalis culpidatis, dilutē virentibus compoiti. *Stamina* quatuor, ex foliis longē emicantia, *apices* geftant albicantes, grandiu(cubs *Stylus* in medio breviffimus cum capitulo albidnte. *Futtus* funtbaccaē rotundiola:, calyce quadrifolio primū arte teftae, è vertice ftylum bifurcatum ejicientes, primū vinde, dein albefcentes, per maturitatem rubicundi Be parūm nitentes. Unum capirulum gemmeum nonnifi unum Fruftum proFert. Sub cortice exteriori tenui untis nucleus rotundus, vindis contirietur, qui proprio, nonnihil cartilagino/oj rufeFcente cortice tegitur.

Radix trite &c cum aqua Oryzae in lotions adhibita morbo facro cbnfert: eadem trita Apofematis Imponitur. Folia decofla inFomentis aut cataplafmatis quofcunq, dolores leniunt, & iu pueris peris Juvant.

CAP. III.

*Frutex haccifer Malabaricus fruBu calyculato, rotundo, monopyreno. My fax dttus. Modra-canni H.M.*part. 2. Fig. 19. d Modra. i.e. myfiace dita. Caniram fficks eft defcript. P. 1-*

F *Frutex* eft alrtwdine duim hominum, nafcens in arenofis. *Radix* craflā, exteriū cortice flavo feu ruffo, qui albicante farina feu calec obduftus eft, intus Ji^no fufco-rufoj K grati ac aroꝝmatici odoris. *Rami* cortice funt cinereo, il/que Ipina: uncialcij lignufa: tranlver/ac hinc inde innafcuntur. *Folia* in brevibus liirculis qui intervallo ab exortu fermē undali ad utramque partem lignofā Be fpiratim intorta barba munitifunc. [Hincplanta *Motzra-cann* dicitur. Nam *voxmodira* in lingua Malabarica myftacem denotat-] proveniunt, Be in fuperiore eonim parte quac iipra barbam eltj 8c inFra quoque ad eorum exortum brevibus pediculis appenfa, funtque oblongo-rotunda^ anteriū obtusē culpidata, ad peciolum nonnihil trifita, virt>rc utrinque claro, liipernē parūm nit^ate; ad exortum duobus foliis culpidatis anguftis velut auriculis comitata. *Flores* in fummis fiirculis pediculis vix femundalibus infidentesj duo trgfve fimul produncr^ confiti in calyce viridi-flai'e(csnrequinque culpidatDriim fohorumj fiintque dblDreflavo 5c parūm nitente, conrfantesquinquii5P^ra^ Jis tenuibus, DbJongo-rotundisj SL venulis tenuiflimē in longum friatis^ unguibus albicantibus. &^ *mina'm* medio 1^ Jongiufculaj fiibflava conlpiciunturmodulis flavo-rubris dotata, inFeriis albicantia, quz in calyce miitio unita rapitulum medium albicans circumambiunt; e cujus vertice prodeunt alia quinque *ftamina* parva, lubflava, cum viridibus nodulis feu *apicibu**. *FruEtus* rotunda: baccac ftnt, inferiori parte in calyce arfto proFunde^ infidentes, glabri, nitentes^ per matuntatem flavi K fiubrubi, iūb exeriori pellicula came valdē rubra, denfa,, humic)a conftantes. In m'edio officulurri jlbicans, durum, in longum venis friatum, parum nuclei concinens.

In lotions corporis adhibitus humores evocat. *Radix* inflammationibus fedandis 6c turn on bus reblvēdis conFert trita Sc impofita : eadem pra:(entaneum remedium eft pro iftu virulento colubri; nfiirpatur quoque pro febribus, praccipue inFanciumj intēftinorum torminibus, dolore colico & vermium enecatione; eftque fudonferaj urinam cicns arcūlque *—oborans. E Tadicis cortice **Albopharmacum contra vnzna** torniatur.

CAP. W.

Baccifera Indica frutlu culpidato monopyreno, calyce refiduo excepto. Btfaal H. M. P- ?• T. JX> p. 2,3.

H.M.

A Rbor eft mediocris magnitudinis, *caudice* tenui, albicante, cortice cinereo fufco Dbdufto, necnon plunbus ramulis fubvindibus ac fubcinereis donate. *Radix* albicans, craffo, fubruffoque cortice tefta, faporis amaricantis. *Folia* circa extremes ramutas brevibus petiolisproveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, mollia, flaccida, atro-viridia; cofta mediā crafla. Sapor am* nis, odor acris. *Flofculi* numeroji racemati^proveniunt, candidi primum, deinde ex albo rubeftcentes, fuaveolentes, calycique exiguo, fubrūro, in quinque lacinias acuminatas fefto inhscunt quinque obJongo-rotLindis ac ftellae in modum expanfo, foliolis conftantes, quz totidem incercdunt *fiaminula* alba, furrefta, fubrufis *apkibus* ornata, medium occupante *ftylo* exiguo. Flofculi fuccedunt *Bacc* rotunda:, rubeftcentes cum culpide in vertice, inferiori calyce quinquangulo except^ came fucculenta ac fubdulci intus referta:, intra quam officulum locatur albicans, plano-rotLinduniy nucleum continens candidum, amarodulcem.

Proyenit locis arenofis, przfertim fertili folo circa *Cochin*: quotannis floret fruftumque pro X)C at^q^e a prirno lationis anno ad decimum quintum frugiFera eflē folet.

JUJ.

t. tenenonbus folis addito zinziberc in aqua coftis gargarifma paratur faucium afte^jj^ E bacus mbutyro Fnxis unguentum conficitur, quod Front!Tac cemponbus iUtum phrencticis vaia prodeUe dicitur. Nuclei verb 5arundem affumpti lumbncDs necant.

CA 12

CAP. V.

Baccifera In die a fructu oblongo, calyci incident mbnopyreno^ ojjiculo comprejjo. Kaka-Niara H M, P. j. T. xB. p-SJ-*

H.M.

Niara (pecies est fed humilior, quatUrddecim circiter pedes alta, caudice tenui, albicante, dDr dee munito furvo, intus flavescente, necnon ramulis viridi-fuscis, in orbem diffusis, dona* to, Radix fibrata, nigricante, intus fibrubefcente cortice cinfta. Folia oblong o-ro tun da, crassa, denla, glabra, fuperné atro-viridia, infernè fubviridia : fapor fubacido aftringens, odor nullus. Flores extremis furculis proveniunt, inodori, quinque Dblongo-rotundis, acuminatis, rigidis^ crassis, colorifque carneifoliis confantes, totidem/^iww/^ralbicantibus, flavo-nibe/centibus^ri^ ornatis medium occupantibus, inter qua fijlm prodit viridi-albicans, ipfius Fructus rudimentum. Floribus iuccedunt bacca oblongo-rotundae, calycique exiguo^ viridij in quinque laciniis fefto inhaerent, virides primum, dein albescentes, post rubefcentes, tandem nigricantes ac nitentes, came intus fubnibefcenti acfubdiilcirefert^ officulo albicante plano-rotundo-

Provenit inPorca & c Moutan\ Temper viret: quotannis floret, fructufque fert, menfc viz. Au- Locu5 gufto.

Exprefli5 E foliis fuccus, Be cum lafteo nuds Indies jucco exhibitus lunibric^s necat^B sc carn^ Virid muria pot us eoddem expellit.

CAP. VI.

Tragu H-M- P. 2- F. 25. p. 41. Frutex baccifer Malabar km, floribus pentapetahs, binis>im& bazzà nigrd in calyce Itelliformitr expanfo.

H.M.

Tripedali est altitudine, in arenosis nascens, radioe fibrosa, flava feu rufa, faporis & c odoris nullius. Stipites & c furculi teretes^ verum in liimmo quadrangulares, vetustiores cinerei, teneriores ex viridi Ipadicei Be tomentofi Folia petiolisrotundis, tenuiter pilaiis (eu tomentosis, bina conjugatim, 5c alterno ordine furculis ddnabuntur, ex^rdiformiaj uufpidata, crassa, pilosa lanugine obdufta Sc veluti inftar. Jena^, viridia^ fubtus dilutiora^ faporç fubamaroj detriptioncm duftils neivorum vide, Flores bini una proveniunt in petiolis rigidis, oblique liirredtis in furculorum fuperiori parte hinc inde luprà ex Drigineparvorumac fe mutuo ordine decuffantiurt foliorum, qux quidetn cum majoribus forma CDveniunt,atlonge mlnora manent,Sc minora funt quo apici furuulipropiofa. Sunt autem flores candidi, quinque petalis compofiti, oblongo-anguftis, ad unam magis partem fitis, quacin medio una venà ftriata liint, infidentq, pediculo albo [tiibo feu collo^ fubflavo calyci amplo, laxo, quinque foliorum culpicatorumj quæ in medio antcrius nervulis ftriata funt- Stamina è medio exeunt quatuor^ tenuia, Candida, longa, cum aficibus higricantibus lunulatis incumbentibus: item fylus tenuis, candidus^ in liimmitate viridis ac bifidus, è primordio fructus, quod ex calycis orificio fe exferit, prodiens. Flores odoris (unt gravis mals-blentis. Floribus delapfis (uccedunt: bacca: nngula:, a calyce laxo primim ill tDtum comprehenz, dein c calyce Stelliformiter expanfo, ac exteriora versus reflexo emicanres; fiintque primim virides, deinde ex viridi-fufco cærulecente Sj post cum planè maturxnigrx ac nitentes, cortice tenui, intus parum fucculent^j ac comeftz non-nihil adurunt. Semina qux fructus in^tdtum replent^ ac in fingulis duoj tria, vel etiam unum continentur, una parts rotundiola funt, altera plana,3 vel duobus planis lateribus confantia, in laterc rDtundo nervuli5 emirientibus caicellatimftricitaj ac colore cum ficca exrubro nigricante.

Radix proficua est pro lienteria 6c intestinoruni torminibus 6c dolore colico/ in lafte acido vel ^{Virid} etiam vino data. Eadem in pulverem redaifta ad puftularum exiiccationem confert. Foliorum iiccus epDtus lumbricDs in veritrs enecat.

CAP. VII.

Baccifera Malab. rauemofd, triptala fructu oblongo tricocco3 caljcc except. Tsjerou-Tozam H. M. part. ^ tab. 56.*

H. M.

ARbutula; humilis est, caudice tenui, albicante; Cortice cinfro nigricant^ intus viridi, multifque ramulis geniculatis donato. Radix flavescens, rufo cortice tefta, odoris ac faporis ingrati. Folia oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu leviter crenata, lenia, fiiperne atra-viridia 5c splendentia, infernè liibviridia ac lanuginofa, nervis aliquot c media cofta al^ bicante, 3C in averfa parte extuberantc in latera excurrentibus : Odor Be fapor ingratus. Flores in-odon, vindi-albicante5 racematim ad foliorum alas in furculis proveniunt, calycique viridi tripartito inherent, tripetali, b tibus viz. oblongo-rotundis, acuminatis expansifque foliolis confantes, medium occupante globulo viridi, b quo exlurgit fylus tenuis oblongus, è viridi flavescens, capi^l^ rotundo. Fribus pari modo fuccedunt baccx oblongo-rotund^, tricoccx, virides, calycibus^exceP^,

cna

cna intus continentes *femina*, viridi-albicantia, amara, membranaceis pelliculis ieiuncta, ita ut fingula in fingulis latet loca a mentis.

Locus. Provenit variis Regni Malabarici locis, praeferunt circa *Repolyn*: temper viret, floret 6c fructum fert.

Virvs. E floribus, fructibus Be cortice in olco coctis linimentum paratur, quod capiti munitum cephalalgiam {ware fertur- Folia recentia contusa & parti erysipelate laboranti imposita id tollere dicuntur.

CAP. VIII.

Frutex baccifer Malaharkm fructu vafycz txcptO) fuhato tripjreno* Katou-Patsjotti H, M- P- ?
T-7. P.IJ-*

H. M.

Arbuscula humilis est, caudice tenui, albicante, cortice obdueto cinere-rubescente. *Radix* (ubalbicans, rufo cortice cincta/grave-olens, unguosa. *Folia* oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, craffa, superne colors atro-viridi splendens, inferne subviridia mollia tomentosa; nervis aliquot c media costa in latera excurrentibus. *Flora* ad foliorum axillam racemata in arboribus inherent, tribus rubra-flavescentibus, subrotundis ac intus concavis foliis caudatis nullis. *FruBus* calycibus quinquepartitis excepti floribus pauci modo succulentis subrotundi, interius in acutum mucronem definites, tribus angulis illicati, craffo vtriusque cortice tefti: in reeditulio tria latitant *Jtrnina*, oblongo-rotunda, triquetra, purpureo-nigricantia membranaceis pelliculis ieiuncta, ita ut fingula in fingulis latitent cellulula.

Locus &
Itmpui.

Provenit variis Regni Malabarici locis, praefertim in *Candennatt*, femper viret, quotannis fructus fert Septembri sci. & Octobri mensibus.

In re medica nullus ejus usus est

CAP. IX.

Frutx baccifer Malab. fructu calywlatv, tetraoccoj umfo Utfo. Tjjocatti H. M. P. 5. Tab 48.

H. A4.

Arbuscula est humilis, duodecim circiter pedes alta, taudict tenui, multi-que ramuli ligulati donato: Lignum albicans, rufescente cortice densum, matrice viridescente, molliore, adix albicans, amara, aromatica- *Folia* oblongo-rotundaj acuminata, in ambitu leviter crenata, craffa, densa, glabra, splendens, superne atro-viridia inferne subviridia cocta media craffa, qua plures exigui nervuli ordinatim adprominentes dentatafque, oras exeunt: laporamarus. *Flores* frutescentes in odon, umbellatim extremis lacinis proveniunt, calycique nibro-flavescenti, in quinque lacinijs oblongo rotundas fecto inharrent, quinque oblongo-rotundis acutellz in modum expansis foliolis constantes, luteis aliquot stammulis irreftis acuminatiffque, medium occupantibus: inter quos cap-^{ay} Arwproditanum albican Sjquinquepartitum, e cujus vertice ay exit tenuis, albican S jlongus, aculpra flaminula eminens. Floribus deciduis luccedunt *Bacca*: tetraoccar aliquando pentatej, subvirides primum, at permaturitatem rubentes ac nitentes, calycique atro-rubenti inherent: lapor acid-amarus. Intus continentury w w* quaterna plirimum jalbicanlia jrenalis figurar j fap D jisamaro dulcis

Locus,

Provenit variis Regni Malabarici locis, praefertim in *Landnatt* femper viret, floret, fructumque profert.

Virvs.

E fains cum fero lactis decoctio conficitur, qua: in Cardialgia valde commendatur- Ex nucum fructibus & L fructibus in aqua coinum codhis oris colluctio he ad erolas gingivas ianandas, dentefque vacillantes firmandos. Ex radice cum Cumini temine in lacte cocta potus conficitur, qui poterit vomitum fedat. Eadem radix tanquam amuletum ventri appenla CDHCDS dolores mitigate perhibetur.

CAP. X.

*Baccifera Indica fructu calyculato, subrotundis cuspidato, quadripaxtito, Utraynnv. Acara-Vatsjot-
n H.M. P. 5. T. 8. p. if-*

Humilis est arbuscula, *Katou-Vatsjotti* zmula, *Folia* tamen minus lata, &c in ambitu non crenata. *Flvrs* candidissimi, luaveolentes, ramulorum extremis numerosi. proveniunt aq, calyci vindi, in quatuor lacinijs subrotundas fedo, inherent, quatuor oblongis ac versus exacerpra reflexis folijs constantes, stammulorum albicantium, carneis ac subrotundis apertis ornatorum congenec mediam floris cavitate & umbilicum occupante: inter qua: globulub prom oblongus acuminatus, quadripaititus, quatuor (eminuni, in fructu dem lucrefc. nrium rudimen Frum Jubrotundi, cum curpijcm YBrlie5, quadripaitici, virides pmmum, dcin aero-rubentes acm

tentes, e calyce florum oclclub confantes, quatuor oblongo-rotunda, fubvindia, ac diftindtis iuis pelliculis inclufa femina continences; fapor ingratus Be fykeftris.

PrDVenit etiam bcis moncanis Be petrofis in Candznatt: lemperviret, 5 Septembri Be Dftobri men- *Lucus*. Cbus fructus, Fert.

Ex ejus foliis in Dryzse intufo coftis garganlml paratur, quod apthhis pptenter medetur.

Virtu

CAP. XL

Baccifera Malab. fruttu ublon^o, tetracocco, calyculato. Niir Notijil Mflabarenjibus H. M. Tart. 5. Tab. 49.

H. M.

ARbuscula humilis est, feu potius frutex, fex circiter pedes altusj *caudice* tenui, albicante, cortice cinfto cinereo, intus viridi, firculifque rubro pupureis ac nifentibus pluribus donato. *Radix* lignofa, fibrata, albicans, flavefcende cortice tefta^ graveqlens, amara. *Folia* fine ordine ramulis inhscrent, oblohgo-ratunda, crafla, glabra, lenia, nervis aliquot e cofta media albicante in latera excurrentibus: fapor acris, odor gravis. *Flors* petiolis longis^ tenuibus, rubro pupureis, in ramulis Be extremis furculis proveniunt, candid^ pentapetaloides, perianthia exgepti fjuinquepartito, viridi-pupureo, *ftaminulis* quinque tenuibus, longis, purpura-^{ipkijidenti}^crocels ^{Jalcatis} *afaibm* ornatiSj medium occupantibus: inter quac *fyylus* prodit tenuis, Innjir, ^{pürpnj} ^{STcen} Floribus fuccedunt *Bacca* oblongo-rotund^ tetracoc^aEj virides primumj dein pupuralcentes acnitateSj calycique profundo arfte inhaerenc, came intus (iicculenta ac fubamara fefercx, intra quam femina continentur quaterna, oblonga^ triqueera, dura, nucleis albis, amaris.

Nalcitur locis aquofis & C fluuiliinum npis circa *Cochin? Porca dr Paroe*.

LQCUTZ

Folia ficcata in pulverem reda^ta, ac quotidie cxxhibita cum Saccharo & c Oryzx infufo luem y^{reJm} Veneream lanare feruntur. Ex iifdem foliis coftis Be piftis cum ovi vitello cataplafmataratur, quod bubonibus inguinum Venereis impofitum pote^nter iis prodeffe ftatuunt. E foliis Be radicibus in aqua coftis balneum fit, quod Phrenitidi^ niani^ aliifque cephaliciS affcftibus perquam udle cenfeur. Ex radice in oleo cuda linimencum fit antiarthriticum.

CAP. XLII

*Mail Anfchi * H. M. Rhamnzts Malabaricui*fructu racemofa calyculato.*

% P. „ P. 424

ALtitudine est trium hominum, ramis denfis Be opacis, late fparfis: *radice* crafla Be DroRindè fe demittente, fibras hinc inde exferente, corcice cefta cinereD lub, cutic:ula rubeicente, albicante ligna. *Stipzs* paulò minus hominis amplexum impletj cortice cum ramis cinereo, ligno duro Be albicante. *Folia* in furculis tenuibus, qui bifli, terni, quaternive fimul ramisj craffioribus erumpunc, bina Be bina, vel folitaria, breviffimis pediculis infidenr, funtque parva, oblongo-rotunda Be angufta, cupidataj ad petiolum ftrifta, texcurà tenui, fuperficie plana Be glabra, virore communi nonnihil nitentij fapore fibamaro, odore nullo. *Flores* in (umms firculis^ plures racematim junfti, parvis, tenuibus, rubris peciolis infidenr, odoris haud Injucundi, qua cu or pet alls GX albicante fubflavis, enfpis^ latiuclulo ititeryallo a ft in vie em diffantibus, quae poftea magis flavefcunt, CDnipolici- *Stamina* in iis ofto, albicantia, *apicibus* grandiuclulis Be fibflavis dotata, que bina Be bina c foliorum intervallis emicant: in medio fe prodit globulus dilute viridis Be rocundus, qui primordium^ eft fructus cum ftulo albicante in vertice. *Calyx* quatuor foliis cupidatis Be viribus conftat. Floribus deciduis fuccedunt III racemis *bacc** rotunda: cum fpiculo in vertice, & C calyce fuo inferius arfte contents, *ftaminibm* numerosis replete, Be carne inter lemina, laporis adfringentis, primum virides, poft rubefcetes, tandem nigricantes. *Sernina* (un£ oblonga, cupidata, angulofa, cum ball rotunda ad corticem fita, ac alia in parte fuperiore, alia in inferiore baccarum, cum ftriftiori parts leu culpide interiora baccarum repicientia, primum lubflava; matura fufca auc ^{u₂ t₄ antia.}

Flores fert feniel tempore pluviolo: nalcitur in arenolis.

T. 11111
^ ifocum;
Vim_m

Radicis decoctum conducit in podagra: Foliorum cum Saccharo in iftero; item folia fimpliciteif in lafte pota: Eorundem fuccus exprefflis Be in lafte vaccz cum Saccharo epotus urinantibus nueriam albam Be purulentam prodeft.

CAP. XLIII

Fmte baccifer Malaharicas fruttu caljcttlato, mtundo, rtibro, pofypyreno. I. Scbtiti H. M P n, F. 13. P-17-

H.M.

FRutex est unius hominis altitudme, in arenolis nalcis, 8c petrofis. *Radix* profundè in ferram fe demictic, cortice extenus rufo-obfcuro, uti est B^{if}ipitum & ramorum majorutn corcex, intends rubicente, cum in ilhs albicec: Ramorum fBpsriorutn cortex exterius cinereus, intus albfcens; ac tencriorum caftarico-Fureo-rubefc&ns, *Foliain* ramis Bdiirculis bina, guJpidibus ad is invicem

invicem inflexis, oblongo-rotunda fiunt, ad petiolum oris rotundis, in fiimmicate parum acuminata, craffioliarum textura denfe, lenia, fuperne glabra. Be Dbfcuro virore valde-nitentia, fubtus dilutiora, fa-pore adftngenti Be amarb. Turn cofta folii media, turn nervi tranfverfi in fupina parte non-nihil eminent, hi autem refto Be parallelo dutlo crebri Versus marginem folii excurrunt. Flores in fummis ramulis umbellacim congefti, petalis quatuor (raritis quinq,) oblongo-anguftis conftant^qu^ afterius Be ad petiolum reftis oris fuffita Be velut cancelliformia funt, colons utrinque incarnati, in-terius autem magis intendi, acpoftea ubi flaccefcunt dilutionis ac flavefcentiV, infidentque pediculo tenui longo ac furrefto, incarnaco-iaturD,feu rubro Corallino^ac nicente calyci parvo quatuor cuXpi-duni minorum; odoris nullius. E medio flore ftyliis parvus emicat cum nodulo TLipene bjfido ru-broobrcurD Be nitente, inferne globulo viridiin calyce gui rudimentum fiuftus eft inlidenSjac in ovi-flcio pediculi,inter petalorum unguet quatuor lingua: feu ftamuncula parva rubra in/ita fiunt^qu^ in-flexa velut quatuor uncinuli funt, qui unguiculos foliorum in angulis intermediis arripiunt. Fruit** fiunt bacca: calycibus fiis arfteinfidentes: cortice glabro^ per maturitatem fDrmx rotundioisj ac >-lore rubrD-obfcu-rD-fufco, dein rubro laturo ac nicente, fiuntque came albicantea parum humida^ In hifce baccis, quae Juices ac in eduliis funt, duo, tria, quatuorve officulaalbicanria infim^ Q^a femutuo contingunt plana ac duum lateruni, in alia autem parte rotunda, ac nucamento DTCD mi-nus durc conftantes, puipa intus viridi.

Flores Be fructus fert toto anno.

Floras hujus fmiticis Gentiles Deo *Ixora* in facris offerunt.

Fru.

Radix trita Be in aqua frigida epota fervit pro febre calida ac ardore manuum, & prodeft e^P^m entibij^L: ^<irjP^r:/; cum aqua frigida in perunftions adhibita iedat dolores capitis; epota in la#^5 *?~3T& arderclbif^renum reftinguencis cortfert, ut Be gonorrhoea; cum liquore *Suri* in perundlions corporis affectu vinolis prod eft j atque eodem modo ufurpata cumlafte *Coqui India*: fervit pro pti-ftuJfj aliifque momis curaneis exficandis.

Ex cDrctice, foliis & flonbus extrahitur fuccus, qufmixtus cum oleo *Sirgclim mtus* iimitur ad mi-nuendam plethoram.

i. *Btm-SzUtti* H. M. P. i. F. 14. p-19.

Hujus folia quam praecedentis longiora funt, antierius magis cupidata, &: ad petiolum *מריקובל* frifta, Be minus craffa. Flores albicantes fie fibflavi, pede autem quo calyci incident nonnihil *קוסי* rubelcente, ac in iis *zR ftytys* fuperne bifurcatus^ ex urificio alte emicans, flc ftamina quatuor *עצות* longiufcula, apicibus flaviulculis donataj *frubus* magis oblongi, ac colore primum viridi, *אנד* viridi-diluto Be fubflavo, came intus fucculenta Be albicante, necnon officulis albicantibus- *ל* rdiquis cum precedence convenit.

FruftL5 fun: in eduliis, ac faporis fiibdulcisfarinacei.

FJores hie frutex in anno rarius f?rt;

CAP. XIV-

Guaiacum Patavinum latifvlium & angufifilium Ger. *Guajacana* J. B. *Arbor Guajauana* fivt *Guajfcurn Patavinum* Park. *Lotus Africana latifolia & angufifolia* C. B.

Guaiacan^ proceritas quinta arboris magnz: in ramis *folia* alternatim polita. Nucis [J^U^ Jandis] Folii fmgularibus zqualia, acuminataj atro virDrc fplendentia fuperius, fubtus magis albicantia, utrinque modice hirfuta, fed magis parte averfa, brevibus petiolis harrentia, iapore mixto, fubaufferoj bviter amaro, tandem Be fiibdulci. Flores radiatis cajycibus in/Tdenres ramis apprimuntur, man quklem majores, fceminx non tanrum minores fed etiam calyce ilJo deftilutij quos nullus fequitur *fruttus*, qui tamen maris florem feffilis excipit, magnitudine Be colore Pruni fylveftris, fapore dulci fiavi^ in quo *fvnina* aliquot^ Pomorum feminibus paulb majora, ejudem cum illis colons, tanta duritie ut vix dentibus atteri poffint. Cortice veftitijr h^c arbor tenuifi rugofo, fufco. Materies ci fpiris in orbem circinaa^ colore cineracco vel fiibctErulco, in omnibus a Guaiaco valde diverfa.

Parkinfbnus *flores* huic atbori attribuit tetrapetalos, ex purpura obfcure rubentes, caJyce pariter quadrifolio exceptos, qui Be fruttum etiam ima parte pbducit adinfar Sebeften. Fruttum fubrptundum cum parvo acuminein faftigio. Africans onginis efle dicitur. Scribit tamen Ge/nerus Ic audivifle nafci earn in montibus circa Veronam, Be e raniis ejus aqua maceratis rufticos Vi/cuni parare. Quod non videtur verifimile, cum^ Guaiacana tenerior fit quam ut montium iftorum *הגג* per hyemem toleret. Nos tamen itinere a Lericio ad Lucam in defcenfu mDntiumnon *לוג* Luca Etruna: uibearborem invenimus quam turn pro Guaiaco Patavino habuimuSjpfammez *זרע* fuiTe non audemus fidenter aflerere, fed duntaxat fimilem. Qui per ea loca in Italia percgnnantur-diligentius obfervare poffunt.

Viru

Matchiolus iidem cum Loto viribus pollere Cradit,

CAP. XV.

*Prut ex Indicus baccifera frutifera calyculato monopyreno, Nigmdq dista. i. Negundo mas & fxi-
na Park. Negundo arbor mas & fosiina jr B. Piperi fimilis fruttus friatus Q B. Uara-nofa
H- M- Negundo fxiina A coils.*

* p 2, F. J. F.
/> 13*

H. M

FRutem^{ft} fefquihominis plus minus altitudinis [Perficac magnitudine Garciae, Amygdalae Aco-
ftae.] nafcens in arenofis.

Radix fibröfa exterius fufcefens, intus albicans, cortice tenui 3c fibamaroj diutius autem
xnanfo fubacri-

Folj* in communi pedicuta plerunque terna, bina fibi mutuötoppositaj unum in extréma cofta re-
Jiquis majus, oblongo-rotunda, antcrius cupidata, margines xquabili, textura craffitisi mediocris Be
nullia, fuperficie lenia, fepernc bbeuro virore nitentia, libcus pallidioraj lapDre amaro Sc acri.
[Acoftx Be Garciz folia Sambuci fimillima videntur procul intuenti[^] fimili modo per ambitum fer-
rata, in mare arbore *Acofti*. iupernc virentia[^] infernc lanuginofa Be hirtuta foliorum Salviaemodo]
odore gratoLavendulzarniulo [Acofts folia Salviam odore Sc (apore referunc]

Flores muhi limul in pediculis communibus Teu furculis, c[^]nddulis fupra ex or turn foliorum binis
Be binis ordine decuffato egrefliiprovsniunt brevibus pediculis hxrentes; purpuj^o-cterulei, ^qo-
quo folia odore fed magis vsgeto, quinq; petalis difformibus è uollo Campanir^{Drmi}J^aBrir^o ^qo-
jurreftum eft Be latius, interius concavum fit pilotum, uci Be collum floris quod aci[^]us[^] [^]fiJlii [^]pr[^]vil[^]S[^]
eft intzrius⁵ sft pilofum, q[^]uatur reliqua petala in latutn ferm[^] expanfa[^] Be ma[^]s inter fe familia
liintj nifi quod qux folio lurrefto proxima func[^] parum laciöra Be rocundiura, duo reliqua a n[^]tiara
versüs contraftiora.

Stamina quacuor tenuia, furreftaj purpuro-coerulea, cum nigricantibus Be arcuatis ^{afmbus} [^] [^]
ea *fyfus* tenuis, purpuro-CKruleus, versus folium c[^]ruleum cum eupidebifido inflexus, qui ex ru-
dimentofruftiis, quod inter calycehi eftj originem (umic.

Calyx, qui floris colluro inferius arfte arripit, quinque brevisusj viridi-dilutis; cupidatis foliis coi^v
ftat, ac coftulis tenuibus in longum friatus eft.

Fruttus fiinc bacca? rotund[^] parum oblonga?, ejufdem ciim floribus odoris, maximam partem à
calyce comprehenli, quatenus calyce teguntur colors viridi^{diluco}, parte fuperiori qua eminent[^]
primurn rubefcences Be nitentes, dein cum ficci in It a r a tram en ti nigricantes. In medio eft oblongo-
rotundum oftculurrij durum, came viridi Be dura, quz etiam ex maturitate fruaus minus mollercir;
involutunij concinens nucleum albicantem, qui fkpore eit nuUo.

Oleum exradice per deftillationem extractum clarum eft fubviridefcens, faporis dulciSj acris & C
penetrancis, odoris grati.

Adeofrequem eft (inquit AcDfta) hujus arbons uJus ad medendum in his regionibus [Mala-
bar, Bee. J utnifi Deus recifos ramos multiplici f[^]Cura renafci faceret, jamdiu fuiffent conliimptae
arbores, aut certe maximi pretii nunc sftent. Sed quo magis prsciduntur rami eb felicius renafcun-
cur, & perpetua fronde virent-

Rami teneriores, folia, flores, fruttus contufa aut in aqua decofta, vel in oleo frifta aut elixa uti-
liter imponuntur omnibus doloribus ex quacunq; caufa provenientes; przfertim verb in arciculo-
rum doloribus ex frigida caufa natis, acque in tumoribus Be contuionibus mirabiles praebent affe⁵
Non defint qui fupra vulnera admoverint, unaque nocte dolorsm iuftuliffe materiamque digeffitHs
affirmene.

Ulcenbus etiam vetuftis folia trica imponuntur feluii iupceflu, quandoquidsm eorum materiatn
digerunt eaque emundant, Be ad cicatricem perducunt. Et fane in vulneribus, apoftematibus *He*
CDntufionibus adeb utilem experiuntur, ut chirurgorum operam minime requirant. Mulieres ho-
rum foliorum decofto omni tempore univerfum corpus lavant, tantaqueinvafit perfuafio apud illas,
Negundo ftare5, folia Be fruttus utilia efle ad juvantiam conceptionem, ut cum qui contranum per-
fuadere conctur lapidibus fint Dbruturx. Mafticata folia orishalimum emendant. Haftenus Garciae
Be Atofta.

1. *Bem-nofi* H. M. *Negundo mas Garcia & Azojt**.

H.M.

Hujus folia in petiolis terna Bcpaffim quina proveniunt, funtque oblongo-anguftiura, in culpidem
anguftam contrafta, ad petiolum rotundiora Be laciflima, in anteriori parte magis minulve tenuiter
crenata, colore viridi minus fufco, fuperne clariore; quod in extrema cofta eft folium maximum
eftj bina illi proxima majora pediculis paulo minoribus pollice, cofta? mediae hzrentia: duo reliqua
vald[^] parva hint Bé petiolo communi infidentia. In reliquis cum przedente convenit-

Folia ferrata Sambuci aemula hanc ipeciem Negundo marsm Garcia: Be Acoftx efle indicant.

SECTIO II

Ve Arhribus bacciferis fruttu nudo mvinpyrenv*

CAP. L

Oka fylwjtris folio molli incano C. B- Olcafter CappaJocicu* Park. Ziz, ipbus CappaJouica, bujdam Oha Bohzmica J. B- Zizyfha Cappadocica Ger.

J.B.

yL Rbor est juft* magnitudinis [Salicis magnitudine Dal-\ radicibus multis, craffis, hue... diffiuis 5c loci plurimum occupantibus, per fummam terram vagis, ftoluncs multos mitten- JL A. tibusj qui nifi avellantur matrem emaciantj avulfi vero & depafti vivunt Be arborefcun... ramis patulis. Corfe* albicat, in ftipite valde rugafus Sc craflus, inramis tenuiorj [1^v15 J, B.] & mojli quadarii lanugine pubefcens. FO/M mollia, longius a Zizyphi folijs recedunt, Sa- iignisprDpiora [iino OJea: fativs familia,] alijs alternating alijs Jiullo ordine per ramos nafcentiaj... Vem nontamen iniucundum odoreni /argentcs&: capuc ferientes. Bacc* fublonga;, exiguis Olivis aut Zizyphis finiiics., alba;, fungoli, & duki came five pulpâ, [apice in iummicate aciculae nmiH Matth.] /aporis aciduli, offeo mcus nudeo, canaliculate). Rami interdurn fpinofifunt. Matcries flavicaMfon

In Syria nalcicui, *nque iEthiopia Be monte Libano, notante Rauwolfio. Sponte etiam p nire in Bohemia: fylvis autor est Matthiolus: In feibus cum Rhamno Be Vitic juxta urbem C^ dix in Regno Granatenfi Cluf. Floret xftatis inico, fructus Autumnomaturefcit.

JNj n dubito (inquitDdleehamp. apud J. B.) quin ex hujus floribus przftantiffimi odori aqua detillari poflit, oleumque parari-odoris eximii Be fragrantis.

In icons hujus arboris apud J. Bauhinum velut corolla feu umbilicus multorum cufpidum fum^k fruftui appingiturj unde fupicor fidiem iunimo fruftui innafei: corolla enim vidstur^fle calyxrs fiduus. VeruTi Matthmlus nun umbilicum feu corollam, fed apicem in fimmitate aculeo fimiteni eJfe icribit j ut dubius.fim de fitu flons in hac arbore, adeoque deipfius loco in nofra

CAP. II.

A. i. Arbutus Ger. Park. Arbutus, Qomarus Tbtophrafti J.B. Arb. folio firrato C. B.

J. B.

* Vt inmm- re AtLo., te- tante Bel<0- w&

A Rbutus^ quamvis locis nonnullis in juftam arborem adolefdt, plurimum tamsn frutex eftj f^ conU3rMs ftolonibus fcabro cortice iuteftis, in quibus perpetui vuoris folia, Laurinis familia & panaferi, craffa, virenciaj per ettremum tantillum purpurafcentia, circumqiaque cle- ganter creni"- Flores tanquam ex amento racematim penduli^ pulchrij fimiles fere flori- bus Lillii convallium, concavij albi, odoris jucundi. Hos excipiunt/rwff^ Fragis fimih8, fed multo majoreSf exafterocond^aceroh, ante maturitatem lutei, rnaturi autem rubentss, lapore valde grato Sc dolci pr^ditJ. Ssmen [ut ait Clufius] Milio non multo niajus^ inque fructus meditullio con- rentum, nihilominus tenui obduftiTi membrana.

Huius fructus Plinio Unedo dicitur ex argumento unum tantum edendi. At vero GalenusUe- donem fructum Arbuti non efle, ihd EpimcLdis arboris fciribir. Hinc in diver/a abetint Botanic^ alii Plinio adveriannrur, alii cum defendunt. Nofta fententia Unedo Arbuti fructus est nonEpimlidis; Sulpefta fiqklem nobis cum Jo. Bauhino videcur Galeni fententiaj quem fcimus in Italia fuiſſe pe- regnum, Ideoque Plinioj qui Italus fuit, citius falli potuiſſe. Si autoritatem ſpeſtes utnnque fere par pondus. At pmfefto non placet [inquit J.B.) Galenus EpimelidiUnedonis facultates Be vires tribuens. Nam fi-Epimdis lit Me/pilus (ut plenſque doftis per/ua/um fcimus) quis dicat ejus fru- ctum noxam afferre capiei aut ftomacho efl^ mDleftum, quem plencj, medici ftomacho familiarem dicunt. Ac forte Gal en us de fructu nondum fracido IDCLICUS eftj quo tempore vere Unedo dici poſſi^7 nam nb unus quidem ejulmodi fructus abſqus difficultate Be frangulatiDnis periculo tune temporij edi poteſt, Arbuti aures fructus plurimifine noxa vorantur a nonnullis.

LocnJm

lj f^n SK^iar, Italia: Be Gallia: Narbonenſis fylvis Sc dumetis paſſim & copioſe provenit: quin & in Hibern! quoque occidental pane reperitur ffontanea. Scribit Bellonius in montibus Atho tanto- rere grillo, cek A o valibus vicinis Arbutos f qui ucl plurimum alij loſis fructu capti) in q& A U^11" nudius all^10^5 cvadere. Variac aures fructus mngnitudine & i fapore.

Frory B T&ar.

re-?rhmi v M «n*cylDn Grxcis dittus, vnculo incommodus eft, Sc capitis dolorejn inducit, ^ Diofi q> rid «- Plinius, Galenus. Mihi finfi (inquit J. Bauhinus) quocies comedi holoſoro q A Diofi q> rid «- Plinius, Galenus. Mihi finfi (inquit J. Bauhinus) quocies comedi fc<< vCmnpU^l hl fructus Ac Clu^l^s lc multos feniell line ulla noxa edific ait BC revera fapore June non u^u, ad 6grato ac Fraga, dulci lanin^ cum proprio K peculiari guada*"

guftu acerbo, quem vix exprimas, utrefte J. Bauhmus. Paravn in *Ano venales vidimus*, 6c a te-
huioris fortunz hominibus non minus in Italic quam Hilpania appetuntur.

Amatus ex Arbuti foliis & floribus aquam vitreis organisi elici tradit, eimque feryari "tanquam /?-
craftiffimam adverfus peftem 5c venena antidotum. Mattioli pulvèrem offis de conic Cervfei ad-
mifcet. Eam verò aquam ftatim lpo morbi lmfio propinandam aiunc. Frufta deletantur Turdi
& Merular. Ex ligno etiam carbones optimi fiunt.

Scribit Plinius hoc folium Pomum fimile fruftu terras gigni. Verura non adeò fimilis eft hic fru-
cius frago cum Fragum femina habeat in fuperficie pulpa, hic autem in ejus nieditullio: & aliae ar-
bores fruttu* edunt Herbarum fru&ibus fimiles; v. g. Morus.

i. lidrachne Park. AdrachneThtophrafl J. B. Arbutus folio non ferrato C.B.

BMU.

Frequens provenit in Creta, montibus Lends & alibi inter faxa, fruticis potiùs quàm arboris mo-
do: perpetua fronde virec, foliaque habet Laurinis adeò familia, uc fob odore dignofcantur: nam
Adrachnes folium odore caret. Caudicis Sc ramorum omnium cortex adeò Jsvis, rubens & splen-
dens eft, uc Corallii rami effe vidcantur: ftate rumpitur cortex, &c in tenuiffimasbraaeasdecidit 5
quò tempore neque rubens, neque splendens cernitur, led medium quendam inter pallidum Sc ci-
chiaceum colorem adquin- Florem & frustum bis ut Arbutis profert, & hiinc quidem adeò fim-
lem, ut alterum ab altero nullo modo dignofcere queas. Differt tamen arbor hanc ab Arbuto; quo-
niam tantum provenit in montibus, neque folium ferracum habet, neque corticem caudicis (L-
brum. Ligni mateies dui iflima eft, fragilis tamen, quac flecti non poteft.

Ruftids igni ltruendo fervit, Be ad vericilla conhcienda, mulieum fiifis appen^{5m}at

Theophrastus recenfet hanu arborem inter eas quae detractò cortice non intereim^C &c perpetua
fronde vireat, hyemeque in cacumine folia retineat[^] quoH iEafe habere à medtfervatum eit.

Vocatur hanc arbor in Creta, & tota fere Graccia 'A^jtAa. Hanc Bellus,

Hanc arborem Bellonius multis locis in fua peregrinalione obfervavit; fcribitque iter facienti Ha-
lepo Anciochiam in tumulis nafcemem fibi conipe[^]um, cujus ramos luo frufla onuftos quilibet eo-
rum qui comitabantur abftulerat, ut in itinere ederet, maturus enim erat, elegantique fuo colore
fingulos ad edendum iivitabant: Racematim autem cohrebant, magnitudine Be colore fruftus
Rubi Idsijnollilque ut Arbuti fruftus.

Quin arbor hanc à Bello defenpta fit 'Aj[^]ut/w Theophrasti nemini hifloriam ejus apud Theo-
phraftum legenci dubium effi potelt :[^] aftipuiatur etiam nomen Gracum hodiernum 'A[^]g[^]utA*.

'Aj[^]ut/w monence Plinio ab 'Av[^]aw differ[^] cum ha[^]c herba fit, *Portulaca* Lacinis difta, ilia
arbor.

Arbuti autem vox vel primitiva eft, vel incertar originis. Nam ab 'Aj[^]ut/w fieri non placet, cum
*Aj[^]ut/w Juniperus fit non Arbutus.

Hanc Arborem Z. *Whetkrus* obfervavit in Achaia propè Montem Pentelicum non procul ab A-
thenis j fruftufque vidit Smyrnae. Locu^t <

CAP. III.

1. *Terebinth* Ger. J. B. *vulgaris* C-B. *angustiflora filio vulgatio* Park* ~~The Sarpentine.~~
ttz*

Arbor eft Terebinthus, fed quas Clufio teftè, magna ex parte fruticat, ramis longis, rari-
cinereo cortice tedbis, nec ea quidem, quantum animadvercerimus, frondifus per hyemem
tenax. Primus fere eft florum verno tempore apparatus, quos è ramulorum tuberculis co-
pious in longo racetno producit, mris ftamineis hbris purpurafcentibus contextos. Hinc fs expli-
catis in alano hbris, quaquam non femper equali fize, Laurinis fimilia, fed magis obtufa: [Pitta-
chis, & ejufdem odoris Cluf.] unguentum ut in Serbia nafcentia, fubrobentia, quae crebris obliquis
ramulis occurrunt. ~~Fructus delapfos hbris excipiunt, parvi ex racetno hilibus abeant. Ca-~~
pobalfamo Offic. pacne fimiles, rehnojo lentore vilcidi, nucleum continentés [ex cperuleo vire-
lcentes, ta&tu pingues & refinolT, manufque dum colliguntur inficientes.]

Fert etiam vindemiarum tempore concavos quoddam folliculos leu veiculas, foliis &c ramulis in-
hserentes, quales fere in Uimi foliis nafcentur, ied pallido aut purpurafcente colore: interdum
etiam extremis ramis oblonga & L cartilaginea cornicula [rubentia, quatuor, quinque, aut fex digi-
tos longa, aut etiam longiora J, B.-\ varrà formà excelcentia, concava, quz (uu etiam folliculi)
aperta lemorem quendam continere deprehenduntur, cui permixta cinei ea & fuliginofa exci-
nientia, atque exigua animalcula alata. *Horum Cormculorum rneminzrunt vlnes fere qui de bac arbore
fcripfrunt: ' nihil auteik aliud fitnt quam excrefcenitite quadam ab infeBtis folia & furculos confungenti.
busy & ibidtrn ova fua defomntibts, excitat[^] ut infrviant matrctum Jeu uterorum loco iis fwend is
& excludndis, fuetibifque editz alendis & frotegendis, miri nature frovidentia**

Adverlariorum auctores, Theophrastum (ut putò) lécuti, Terebinthumfempervirentem & per-
petuis foliis effe fenbunt. Veriim Bellonio, Rauwolho, Cxfalpino, Clulio, teftibus *EyVhin*if* & *JL_v*
*7nr&vLi*iu* folio deciduo effe affirmantibus omnino ablque haefitatione credendum.

Terebinthus libenter provenit locis ficcis, lapidofis & Soli expofitis, ut teftatur Matthiolus. Autore *Locur.*
Diotoride in Judara, Syna[^]Gypro, Africa & Cycladibus mfuhs. Clufius in plumis Luffitania^f Hi-
ipanise &c Gallic Narboneniis locis, Iponte naici tradit ubi interdum in arborem adolelcit, fed máxi-
ma ex parte fruticat. Addere potuiffet Sc Italia; ubi nos earn obfervavimus. At nufquam, quod
novent Clufius, commemoratis locis relina è Terebintho clicitur. Lobelio tamen Terebinth* ar-
bores

S f f f f f

bore in Valeria fylva MonrpelienliuTijferb vulnufculus inflctis fxius nonpauca Terebinthinam extillarunt lucidam. Bellonius in Syria & Cilicia copiolam inveniri, ex qua giunni colligitur, quod vendendum ferunc Damafcum : quod vero in Cairo venditur adferri ex regions Turcis dita Afamia, i. e. Mefopotamia Be Affyria.

Tympui. Vires CJ Tpl

Floret Monpeliimenfe Aprili: Septembri cum fructibus legit J. Bauhinus. Terebinthi folia, fructibus Be cortex ftradente Diofcoridis qua pollent adfringendi vi ad eadeHj ad qLc etiam Lenti^cus conveniunt fimili parata modo, ltimptique. Ejus fructus efculentus est, at ftom.icho noxius: urinam verb ciet &c excalefacit. Est 3c ad excitandam Vnecem aptiffimus. Ex vino verb potus conca phalangiorum morfus prodeft. Semen Plinio in capitis dolore bibitur.

Bellonius testatur veterem niorem in comedendis feminibus Terebinthi nunc adhuc durare in Cilicia Be Syria fibiq, ahquando rutticum Arabem occurriffe ducentem* Camelum Tftebinthi fructibus Dnuftum, ut Damaki.venderet.

Species flint Galla:, magnitudine Avellana:, intus cavx, provenientes ex excrefcemiis foliorum Terebinthorum Itafclilorum. Has circa finem Junii colligunt Ruftict Thracia: & Macedonia:, & care vendunt ad tingenda Serica fubtilia diverlis colaribus in urbe Bource, i. e. Prufa Kchyniac Colliguntur autem vere, cum primum eformat-E Galhmi magnitudine fiinc: qllo tenipore niil colligerentur in longitudinem femipedalem excreferent ad formam comu. Eum duntaxat in ufum 6000 pondo quotannis infumi-

Terebinthina vocata, defcribente Cordo, est Terebinthi arboris refina, colore Candida, Hib... Terebinthina vocata, defcribente Cordo, est Terebinthi arboris refina, colore Candida, Hib... Terebinthina vocata, defcribente Cordo, est Terebinthi arboris refina, colore Candida, Hib...

AtquiPer- J> autoreBcl- S S

pauJatim arefcit. Siccam impoftores Thus feu incen/um Vdcant, Ik pro thure vendunt: Thus autem verum... nDninteJJipentes ha:cduo vocabula, alterum Grazcum: aJrerumLatinum

tcrcfs Mafti- cben, nccden- fitw b*ren, nee in ore dip Jmvtait.

Refinas omnes fautore Diofcoride antecedit Terebinthina, proxima huicLentificina. Ga!enu5 Lencilianam prxtei t. Quomodo hi concihandi videapudJ.B.inhft. pi. lib. ;. cap. 10. fie C. Hot-

Vis autem refine cujusvis (Diofcoridi) molliendij calefaciend; difcutiendi diflipandive, 5^ exp^{ur}r gandi. Tuffi ac tabi conveniunt in eclegmatp, per fe aut ex melle; quique ex peftDre e^uci pportbt expurgaiir- Unnam quoq, movent, cruda concoquuntj 6: ventrem emolliunt: ad agglutinauios palpebrarum pilos conferunt, icemque ad lepras cum arugine, futDrio atramento ac ni»¹⁰: ad aures denique lanic manantes cum melle Be oleo, necnon adgenitalium pruritem funt utiles. Eniplaftris quoque, malagmatis ac acopis admifcentur, & per iz ilhta: auc impofitae lacerum doto-ribus utiles funt.

Galeno cum adfriftione nioderata adjunctam habet amaritudinem quandam Terebinthina P^{er} quam magis etiam quam Mafticche digent: Ob eam quahtatem ineft fit abfterfio^ tanta quidem^{uc} Be pfbraflanec: lifdem facultatibus Be ventrem movet.

Recencioribu5, pur gat thoracem ab omni immundicie, item jecur, fplcnem^renes & ve/icam. CDHfertveteri tuffi, ipirandi difficultati, iputo fanguinispuilvilentD, vei nginolis, calculofis, & pecuhari-ter etiam Ifchiadicis, Podagricis^ Chiragricis : aperit, mundatj calfacit Bi roborat nervDS.

In ipecie utiliffima est nephritjcis &c calculofis. Hinc Prafticim curationearenularumpoffiuam micefactum est iymptoma, prcautionis ergo utuntur terebinthina, fed cofta ut dicimj utmiiiis calefaciatj magis adfringat. Idem fit in ichiade, paralyf], arthntide data bis infepimana, vsJ il* lota, vellDtain aqua Cichorei. Hofm* Magnse autem ipfius laudes in Podagra &c omnibus' arricu- Jaribus malis, ii accipiatur, ut docet Avicenna, quarititas nucis Avellana: iinguis macutims a p- |Lno- Necmirum quod calculo confert etiam Podagra: prodeffe^ cum cognati fint hi morbi, K candem caufam contmehtem leu materiam habent, unde non raro in fe mucuo tranfinutancur.

Exhiberi poteft i. Perfe, placentulis quas oblatas vocant Involuta. 2. In aqueo liquors adjeftj tancillo vitellj ovr, fie lafteum lei- exhibit liquorem. 5. Infpiffata aliquantulum, &c in pilulas re- dafta. Verum ob evaneibenciam fpiritus prarftant modipriores. Schrod.

N. 1. Terebinthinam vcram Dfficinis dfe ignotam : Officmalemq, effevel refinam Laricaam, vel refinam Abiegnam e tuberculis Abietum novellarum colleftam-

N. 2. Ddoris vim manere etiam in urinis utentium, qua: violas quodammodo redolent. Au- divi Cinquit C Hofman.) qui diceret, in doloribus partium genicalium prarfentiffimum elle ano- cfynum.

Verno tempore ramulDrum pullulantia tencla Terebinthi efracta HagelJa, iplo etiam Narbo- nenfi aut Monpeliendi agro inftar Ficulnea: arbons Jac fillant, quod concis exceptuni 8c adfe- vatum ill limpiddflimum, tenacem, refinofum hticem abit, qui dum recens est, id ^ in nti.ifto futPlinii verbisutar) in laneamveftem fuffis neq, maculam facit, neque li eluatur velhgiuni auc notam reJinquiti fenefcens tempors craffeicit, nee abluicur niJi ovi vicello addict). Lob. ^ Ballamo.

Terebinthina deftillata, feu oleum Terebinthinac proximum est oleo Balfami, vd parumcalidioO & confert omnibus xgritudinibus frigidis, fed pracipue nervorum.

Oleum Terebinthinac deftillatum iingulare Jolacium Prxbet in doloribus nephriticis intus nim- ptum : extenus illitum, & L' cahda mmi dju affritum parti; dolenti in nervorum iol iiv;... tentionibus aut relaxationibus egregium auxilium pnbet, prxfereim li cum fpintu vim defatiffimo adhibeatur. Modum ehciendi hoc oleum vjde apud EbrodunenJis Hilt-plant, auftores lib. i. ca. p. Wm Vel etiam in pharma copoeis vuJganbus- juntaqui Terebinthinamin Cereviffa infundunc, Be limul defeiverc finunt propotu... caiculo, vilcenimque obfruffionibus. ScbroJ.

Diofcorides etiam vinum Terebinthinum parars docet e baucifens ejus ramis culis &c in multo fervefactis : quod quoniam in defuetudinem abiic, omitto.

Apud Veteres cam commendabiles erant Aiparagi Terebinthi, ut ctiam in hyemem rdcrvarentur.

1. *Terebinthus major ~Piftari<e folio Ad. Lob. latifolia Ger. Park.*

Huic folia multo latiora 8c rotuniora quam vulgari Terebincho, vicina Lauro Sc Piftachia: adea uc erninus intueritemi fallant. Aft non folum folia laciora 6c rotundiora habeC quam vulgarisTer. led 6c fructum duplo auc triplo majorem, quicquid dicat Lobelius in *Adv.* Raro autem cum frudn videtur quia lylvx Valenae ubi oricur arbores certis annicirum incervallis excinduncur, ita ut ad juftam magnitudinem pcnrenirc non poffint, ut fru<Stum producant. Hanc idcirco, quia finefruau paffini c'cnicurTerebinthum Narbonenfsm fterilem vocavit *Hart. Reg. Parif.* uterque *D_m MagnoL* Hanc C.Bauhinus cum Terebincho Indica lequenteRauwolfii mifcec Verum quam Vis Fructus re- fpondeat: folia Camenrotundiora Piftaciae differunc.

5- *Terebinthus Indica major fructu rotunda J. B. peregrina, fructu majore, Pifracis familij eduli C. B. Terzbint'hus latifolia Ger. Park.*

Hujus nuculae Piftaciae boiicate non cedunt; in quibus pnter laporem falfum inert mediocris qua:damficca5 : Piftaciae ctiam facis fimiles liint^ fed breviores &c rocundiores, ex racemis psndenc uc ilia, vel potius uc bacca Terebinthi, pro qua etiam nonnullis habentur, pDuffiinwj^P^&ia^rbores lui5 maximè foliis longiufculis Terebinthi roliis fatis fimiles, qua nota facile quouiu5*srPiftacik^fbore diftinguuntur, cui folia rotundiora fpeciofioraque, ut tsftatur Rauwolf. *tffp* inquilini perinde ut nos Avellanis vefcuncur.

Copio5e provsniunt in Agemia aut Perfia/ Mefopotamia 6c Armenia.

Locus.

Hanc J. Bauhinus pro Terebintho Indica Theophrasti habec; quam plerique botanici Pifta- ciam effe volunc.

4. *Terebinthus Indica fructu pamo, ad corculum acudmti J. B. peregrina fructu minz & aosrho dull C. B.*

Terebinthi Indicae alcerius nuculx cum fuis putaminibus magnitudine ferè liint Pifi., rotundi- tate accedunt ad corculum auc Doram, id eft, Indicum Milium; in exteris fimiles prcedenci.

Ibidem ubi 5c prxs'dens nafcitur. RauwolfE cui *Bd. 5* scrap. Avic. Be RhaE *Botm Souger Arab.*

Incola? perinde ut nos Pinebs nucleos cDmedunt. His Perfc plufquam his mille annis ante panis uRim vicam liiftentant, 8c eciamnum tociusSyriac incolae cum pane vefcuntur, 6c propter colo- rem inter viridem 8c coeruleum medium Arabes veteres Granum vinde, Bellonio atceptancej ap- pellarunt. C. B. Alu hpec deTerebintho vulgari accipiunc.

CAP. IV-

De Lentifco.

Lentificum diftam putac Ruellius quod liquore quodam lencefcac: Lcntorem quippe foliorum atcreftacu quihbec percipic, inquit Lob. in *Adv.* Vel fortè Lencifcus ob virgularum lencicu- dinem dicitur; uc Stapelius: vel potius quod ipfa lentefcat arbor, dum refinam fundic, uc *Vollu5.* Graced 2^©-, ^D TS 94^ fcindo, findo, quod lignum ejus facile finditur, quodque ejus 9/M> hoc eft, fegmencis feu fragmentis e ligno lciffis iolereqz uci ad dencifcalpia, ad nitdam albo- r^mqz dencium, uc etiamnum fit hodie.

Maffiche *wnrk [jarifi^* i.e. maffichando dicitur; nam 8c olimSchoiie in mafficatoriis ufur- pacaeft."*

Cerce Graci in infula Chio earn perpecuo in ore habenc, Be ad muha ucilm effe ejus affiduam mafficationem fibi perluadenC.

Lentif Arab. Ger.Park. J. B. vulgar is C. B. €f)e ~~DePiftachia~~

Multi5 fruticat Lencifcus ftonibus, mediocriter craffis, flexilibus ramis brachiatis, cinereo COL- tice Dbduftis. Interdum in juftx magnitudinis arborem excrefcit, uc obfervavic Clufius. *Folia,* minora quamPiftaciorum aut Terebinthi, Glycyrrhiza: foliis paria, fed Buxeorum folidicace [No- bis obfervantibus Glycyrrhizx foliis minora erant] ex viridi nonnihil rubencia, conjugacim fine ulla impari ad co(Um canaliculatam rubefcencem annexa, in Ipinulam plerumque ddenentia, inque eandem ferè partemvergentia, perpetua, jucundi cumquadam grayicace odoris, {aporeacidulculo & adfringsnte. Iis interdum tolliculi vel veficulae quaedam adnaffuntur, culicibus exiguis referci- haud Texas quam in Terebinchinis auc Ulmeis- Ad als imum exonuntur *flufculi,* veluci racemuli rubentes, velcobre ex herbaceo pallecentes, nonnihil purpurafcentes, qui in fructus abeunt dimi- dio ferè Pifis minores, in ftylum minucum definemes, rocundos, rubentes Be per macuritatein nigri- cahtes, acido5i nucleum concinentes parvulum, durum, nigrum, medulla intus alba. Fructum Cxfalpinus oUagiaofum dicit, nudsum viidem-

Sffffz

In

Lacm.

In Lcahz, Sicilifc Narbonenlis Calliac laxofis collibus, orà prsiertim mantimã, Lenciicum copiofiSimam obfervavimus : nee minùs frequens, teffe Clifio, nafcitur inLufitania, Bztica, regntf Valentino, & uoto illo traftu ad mareMediterraneum obverfb : ubi nunquam (quod equidem vidcrim) juftam arborisJlaturam 6c magnitudinem affequitur ; forcè quia ab hominibus czfa aut à jumencis depafta 5c coercita non permittitur adolefcere. Nam quando non czditnr fed negligitur (ut plerifque locis ad Anam flumen obfervavic Clufius) in arborem jufta: magnitudinis excrefcit.

In fbla infula Chio, Bellonio autore, refinam fundic Maftichen diftam. Alii in Italia quoque Maftichen præberSJ led non copiolam tradunc, uc v. g. Matthiolusj (qui tamen fibi contrarius in Hift. Germ. dicit, infola infula Chio Lentificum Maftichsn funderej Gefalpinus & Lacuna. Nos cum in Italia Sc Gallia Narbonenfi peregrmaremur nufquam Maftichen /undenrem vidimushanc arborem, neque quisffde dignushnbisunquam retulke vidiffe. Idem dicit J. Bauhinus. Argumenrum ramen ab Autoritace negativum nihil CDncludic, in loquuntur. Neq, enim fequitur noil dari in Italia arbores Maftichen fundentes quia ego auc mills forcè alii non viderimus, & plus valet unius tdtimonium fe vidiffe affirmantis adprobendamaffirmativam, quam vel millenegantium, ad neganvam ftabiliendam.

Verum nonnullis Terebinthus refinam fundens ab Italica Ipecie diftinfta videtur. Qui in Chio aliquandiu hasferunt Clulu retulerunt Lentifici arbutculas ab iis qua: in Italia nafcunrur noinihil differre. Et Camer. Sunu, inquit, qui velint Italicam Lentificum a Chia in CD tantum differre, quod fruticofa fit ilia, hie verò arborefcit, etiam fine cultu. Audivi ex quibusdam c Chio oriundis arboreSjj^ua^AlaO^hen fejun longè proceriores pulchriorèfque fylveftribus effe, qua: tamen ejdem ievB^nafcia Ja&a;. J. B. verum Bllonio potias, cunoiò obfervatori 8c veraci^ fidendurn, qui LentificDs qui in Rovincia & Italia proveniunt, fimiles dicit nafcentibus in Chio; Maftichen tamen non fundere.

Tempuj-

Floret Lentificus magna ex parte Aprili vel Martio. Fructus Oftobri Sc Novembri primum matureicir. Ter autem fructumferre tradunt, fortè quòd tribus diftinftis temporibus eundem perficiar. Cmr. ex Arato,

*Jam verò fernper viridis > femprfo gravata
Ljmtificus; triplici folia est grandejeere fctetu:
Ter frugzsfundzm, tria tzmpranonfiratarandim*

Ciceronem nonnulli infeitia: accufantquod %om Lentificum tranftulerit, cum vox Lv& apud Theophrastum Kantiqiores (SrscoS Scillani figmficet. Ciceronem quomodo defendacj. Bauhinus, auc pDtiù5 Cherlerus, apudipfum vide.

Virtu

Lemificusj autore Diofcoride, omnibus fuis partibus, germinibus &c foliis, fructu, ramorum K radice cortice adfriftona eft. Exprimitur K liiccus è cortice, radice aut foliis in aqua decoctis, auc etiam è foliis viridibus tritis, qui valet ad fanguinis rejeftioneSj alvi profluvia Be dyfentcriam in potu, itémque contra (anguinis ex utero eruptiones, atque turn ipfius uteri, turn fedis procidentias. In fumma denique Acacia; & hypociftidis vice co un licet: nomas arceft^ urinas cter, dentes mobiles collutione firmat atque ftabilit. Eadem ferè habent Plinius & Dalenus.

Porro dentifcalpia e Lencifco parata turn prificis, turn hoc fecuJo, magnatibus Be delicatioribu5,pr^fertim, in ufu quotidiano habentun

Cherlerus fibi aliifque ftudiofis faltus K colics aridos Narbonx peragrantibus inJerta in DS folia non modo liaviter Ipirabanf, fed etiam luim arcebanf & fauces humidat luebantur.

Oleum Lentificinum fimiliter atque Laurinum c maturo fructu confectum, ac prius inlpiflatnmj fcabiem jumentDrum canimque fanat; Peflis, acopis & ad Lepras tollendas accommodatis medjeamentis apte 5c utiliter admittetur 5c fidores quoque cohibet. Gal. in defluvio capillorum LentiJcinum oleum valte commendat, habenamque adftntionem, fpontfque nature tale exiftere quaJs eft ipfum Ladanum. QLiarenec^ expercum fe^ neq, mente concipere pofte ullum prxfiantius pnamacumad defluos capillos quam quod exLadano 8c Lentificino oleo permixtum conftat. OJcum hoc ad gingivarum inflammationem fummpere commendac Aftuanus, fi moderate Calidum ore coniinetur. AbHilpanis oleum fructuum Lentifici in maximo habetur ufu.

Itali lignum Lentificinum in diarrhcEis Jaudant, Be decoctum exinde paratum. Tranfiidat nempf ex hoc Maftiche: unde in ejus Jocum decoctum Maftiches ceu ftomachicum nohile in dianhce^ ufurparipotest; quod etiam quorundam medicorum fuit fecretum. EtmuU^rax.

Lencilci varietal habetur in hort. Lugd. Bat. foliis minoribus Sc pallidioribus.

De Rejina LenSifcma Maftiche difta.

Hujus grumi, qualesadnos importati in OiHcinis habentur Dryzac granum a:quant, bngè etiam interdum majores, candidi, pelluddi^ fragiles^ qui ftatim iib dente difilliunt, mox tamen.fr^{atur}2 omnis denuo coic concinuata niafticacione, lentefcitq, mollitic cen [fine adharfionisad denres metuj quam rurfus exuitfimulac aerem (enfit. Prunisinjeftaflammam concipit, piomptms tamen fumac quam flammefcitj contra acThus, guttiff, affatim deftillat, id quod Illun negatum, odorfmq, n D n ^gracumilparat. Sapor Jevit^radfringens cum calore modico.

Oh_m adulerabarur Thure Be refina ftrobilina, fed odore fraus deprehenditur^ aufapore gumm₁ de_mnce lenc_cfcen_u^ Scimus finquit J. B) inter Maftiches glebas non rarb reperiri glebular gumm₁ T₁agacanthifcArabici.

s ^ S S ^ ! ^ ^ ^ ceraTyrrenics candorc fimilis, denfior vel plena, arida, friabilis, odorata-

in Si? K_{lbr}, X_n a^L_{auco} n=ni iEgyptiacam Maftichen commendat: hoc autcin e₁ importat fctio₁ m iola Chn, <p<in₁ ubi Lenrifci arbor_{es} uh dilige<tia 6c cura^excoluntur, uc nun lui₁ uo₁us in cana₁ p₁ca

rēm fūmptus fianc quā apud nos in vinstorum culturā ; nec immeritō cūm. potiores incolarum hujus inlulae opes in IVtafiche confittant. Nifi, enim diligentē cūra coleremur exiguum, giimmi proventum darent. Maftiches proventus in Chipinfula rantus est, ut fingulis annis Turcico imperatori pro 4000 aut 5000 ducatorum pendunt, in deductionem ejus summae quā illi tributi hominē dare debentj i. e. iaooo ducatorum fingulas centsnas hbras iq\$ ducatis actimant. Quicquid, cjs Jiipereft Jibi refervant. Mercatores Galli Maftiches pretium idem perpetuo esse confideramesj exiftimant atq; etiam referunt incolās collefta ejus certa quantitate reliquum abjicere. Sej falluntur* Nam, uti diximus, magna: impense in Lentifici fructibus colendis & curandis taciend. Quia vsrp Turcico Imperatori fingulis annis pro quatuor aut plurium millium dugatorum stimulatione pendunt, cūis pretium vsi augere velimminuere non licet. *Bettonim Obferv.*

D. Thevepot Peregrinat. parr. 1. p. 9 j. miranobis de Lentificis in Ctiio cultis narrat, nimirum torūdās eas esse Vitium infitar, & humi provolvi, ftu per terram repere. Reptantes haec arbores menfibz Augufto 5c Septembri compungunt, h^u foraminibus in cortice fattis Maftiche exfidati Be in terram defluit, ubi in fructula plana indurefcit; Haec indigene colligunt, Be in cribroadid coniparato [a tanging J&ctoe^u] agitant uc pulvis ieparecur, qui operariorum facie adeo pertinaciter adnacet, ut abq; oleo elui nequeac. Viginti duo in in Rilarpaci ~~fun~~ quorum agri Lenrifcisc Dnfiti, ut numerus arborum per omnes simul cuharum fit circiter 10000. pro quibus annuatim Tuicar Lim Imperatori pendunt 300 Maftiches ciftas, quz simul efficiunt 27003 *Oguas* fingulis ciftis nonaginta ogijs atnbutis. Pgua autem unica 400 drachmas concinet.

Vindemiz (fi ita loquuliceat) cempdre omnes mliilac aditus vigili cura custodiunt & obfervant, ne quis Maftichen suffuratus effugere possit. Quicunq; aucem deprehensus fuerit istius crijijinis r^{tas} ad trireres illicd ablegatur.

Matthiolus etiam Maftichen ex arbribz defluentem in terra circumpavita cpnerefcere scribit Mulstantur autem inquit, festāmanu qui Lentificum Maftiuhē fundentem in piDpno vel alieno agro excidentti

Maftiche pota fanguinis rejeftioni Be veteri tu(Ii utilicer adhibetur. Stomacha quDque est utilis, ruftūmq; movet: additur etiam in dentifneia Sc faciei Illirus: quippe quar nitorem curi conciliet. Quin Be pilos ocalorum fluentes glutinat Be cohibet. Commanducata ons halitum commendat, gingivafque cohtrahit.

Dleum unguencumve a Veteribz e Maftiche Chia cohfici folitum est. Modus praeparandi duplex extat alter fimplex, alter compohms. Pior Maftiches ^iij- in ol&i Sefamini sextario coquuntur in vase duplici, altr^u Maftiches §iij. Vini boni albi .jv. alii viij- t)l. rof! 1f in vase duplici coquuntur ad vini conlumptionem. Cerebrum, nervos, juncturas, ventriculum, hepar conoborat, tumores duros lenit, dolores ledat. Pofterius hodie ferē tantum est in ufij quod practancius est priore J. B.

Ad omnem ventriculi dolorem (ut reFert Matthiolus) vomitum Be naufeam mag-ni faciult hoc remedium Alfarabius & Matcharns de Gradi. i^u: vitellum ovi n. j. Mellis depumati cochl. ij. Maftiches gr. xv. Concrita Be commista indantur teftz magni ovi Anfeiini fi haberi **polity** Be in calidis cineribu5 aJTentur. Ad dolores ventriculi topicum.

In pulverem redigitur Maftiche inipergendum linteo aut alutae, post calefacta impolita ventriculo vomitum Be dolorem compefcit. Vel IVpanem toftum, tere lubniflimc, cui admifce Maftiches §ij- Sacculo immiffa Be calefacta ventri culo imponantur. Contra omne alvi profluvium, praecipue verò hypercatharfin. Cingitor ardriffim^u mox prunis injefto pulvere ex zquahbus partibus Maftiches Be Thuris fliffitum ano excipito, exemplo fiftit. Egregium fie probatum ad invoceratum coxendicis doiozem. ViC Myrrhs Be Maftiches ana part, aequales contrita coquancur in oleo Chamamelino. Eo calido ifiungatur locus dolens. Emplaftrum ad arthritidem a frig id a cau(a. ft Maftich. Cymiñij Puleg. Salv. Bacu Lauri ana partes squalis. Subadta cum nielle ualidē applicentur. Hsc eJ-B.

Coquitur § I Maftiches in aquae fte. iij vel iv. Be datur pro potu ordinario in Diarrhoea. *Schrod.*

Extenfe fuper alutam Maftiches frequēis ufus est in defluxionibus ad dentes, temporibus applicitā alutā. Cum enirn in vafis cutaneis fere sat macsriaj ipfa quidem intercipitur, vala autem clai^u duntur. Iniifdem malis frequentatur iuffumigium, pncipuc fi non fuccedat affixio, Be argumentum praebet de via intrinfeca. *Casp. Hofman.*

Cxterum Chinenfes tam viri quā fDemnac Sepueri Maftichen fere Temper in ore habeht, ad Toborandos dentes Be gingivas^u necnon ad haaitum oris emendandum Pantbus etiam Be bifcoAisimifcere Bcincoquere folentj ad eos guftui delicatiores reddendos.

Summā Maftiche in Dmnibus affeftibus in quibus adfriftlonc opus est, prs aliis medicamentis commendatur.

C A P . V -

Park. Acolti. Vavttta [m Malleamoth* H. M- P. J. T. iu. p. 19. Pawatt arbor fdiit Mali Aurea J. B. lib. 1 5. cap. 4. Arbot Malabarenfium fruttu Lsnitjci C. B.

A *ls. M.* Rbifcula humilis est, fett potius Frutex, triunt circiter pedium, [o&to aut noveiti Acofta?] altitudine, caudice tenui, albicante, cortice cirifto cilereo, ramulift), viridibus, in orbem diffufi5 ornato, [Acoftac non admodum ramofo.]

Radix fibrata, albicans, faporis amati, odons arbmatici [Acoltx alba Be infipida cum nonnulla t^umen amaiicudinCj odoris propemodum expert]

Sffittj

Folia

Folia geminata parallelo ordine ramulis inherēt, oblongo-rotunda, acuminata, craffa, viridia, fupernē fplendemia, infernēnequaquamj media coita ē viridi albicante, odore gravi, iā poreacido vinofo. [Acoftx folia rara, Mali aurex foliis minoribus familia, excepta appendice qua carent.]

Flares in umbellas expanfi extremis ramulis proveniunt, odori, quatuor candidis, acuminatis, ac ftellxin modu/n expanfis foliolis confiantes: folia harciDridem interceding fiaminula alba fimiliter expanfi, medium occupante tenuilongo candido//^.

[Acofta: ftaris odor Periclymeni florum zmulus.]
: Flonbus iuccedunt 5*cr<* rotunds, glabro^viridi-fufco ac nkente cdrctice teftx, carneq, intufageua, viridi faporifq, fubacidi referta; intra quam nucleus conrinetur rorundus, dura carrilagosat, pelliculi cinftus.

Locus: CrefcitmultrisRegniMalabaricilDcis, prsfertim in Warapuli: femper virer, quotannis floret, ac maturos exhibet fruftus.

Ex arboris radice cultrorum capyb conficiuntur. Foliis ftercorantur agri. Adhxc ex folis m Palm* oleo fnxis linimencum fie id Eollandam impeciginem K vano as cxliccandas: Ex iifdem m aqua communi coftis fomenrum paratur ad hxinorrhDidum dolDresplacandos.

RadixcumzinzibereBccrocoim pulverem redafta^ & cum Oryzarinfufo exhibit^ hydi o^m Janat, feroiuaces /uperfluas per vias unnaiias potenter educendo.

Acofta ad duo pr^ipue hunc fruticem commendat,

I-Advei-5115 alvi -proBuvia, in quibus tarn en lift en dis tmlcis alns medicatnentis imbecillior elt
-> 2H generis Eo^T^P^i^Ca c; uran^ praicrrim c mera bile Dita. Truncum aut radicem
-]--^O^f^ rreeoftornacerant, & C aliquot horas quiefcere finunt ut acefcant hrc aqua, Eryfipelas
i mi i ui y bibendamch propinant /ufficiente quantitate bis in die purgato prius ventriculp;
oenficie ea ^ ^ benc us qui jecoris inflammatione laboranc Be febrium ardonbus : ~~codem~~ addite
can^ em aqua^ Tarnar^ indi momento vulnerum Jabia circumquaq, inungi folent ad fli
nem pculb d m

CAP. VI.

Lentifcus Feruana Q.B. Lentifci Veruana Jimilis Molle diSla Park. MoUe J. B. Molh Jive Motif Clufii & Lobclii Ger. Aroeira Maregr. Arozirafivz Lwtifcm Pifon.

J-B.

M^OlJc arbor eft prDcera & patula, folis Lentifci, longioribusmulto, angLiftioribus^ acuti^{ti} natiSj larvibus, obliquis venulis a nervo per Ion gum decurrente exporreftis, conjugatim ad coftam latiuftulam compreffam alligatis^ per ambitum zqualibus tantillum r-Dnnun- juam per extremum ierracis. [Folia in tenella incifa liint, in adulta nee difleffa, nee crencita, uC in Sorbo aucuparia adolefcēte &: adulta obfervatur.] Flores peculiari ramolo (urculo hsrēt numeriolidimi perpuffilli, Jtcllati, vitigineis pares, [Marcgravjus Aroeira flofculos tribiit ex albo fub- luteos, quinquefoliolis acuminatis confiantes] quos bacca excipiunt Afparagi bacciferē pares aci^ imleSj pingues, rugofum officulum nucleatum continentes, /apore & odore baccarum Junipen acfi cum amarore aliquo. Folia trita Fieniculi odoremreddunt Cluf.

Arbor vulnerata refinam funditfragrantiffimam inftrar Lentifci. Refinam hanc feu gummi & fenbit J. Bauhinus,^ additque magnam habere (imilitudinem cum eo quod in Officinis proftac nomine Gummi Ehmi, niii quod paulo videt^ir candidior.

LobcliusMolleniarbDrem veri Balfami fpeciem eflē vult, verum erronee. Odoratum illum J^a ticem ^7^*^7w?f melius dixiffet Balami fililem liquorem, quāfl Mollem arborem veri ~~Bali~~ ipeciem.

LoCUJm

Abundanter nafcitur in convallibus 3c locis planis Pernanac regionis^ ut referunt omnes qui ~~Occi~~ dentaliura Indiarum defcriptiDnem dederunt. Bacca: maturefcunc menfeJuliD.

Vmt.

Cornels decofto crurum dolores & inflationes fumma cum utilitate foventur-

Ex ramulis fiunt denti/calpia unilflima.

Ex fruftu cum aqua decodlo pro cofturx modo fit aut vinum feu potio admodum bona^ aut acce- turn, aut m el.

Floforumdecoftum dolonbus e: frigida caufa ortis auxiliatur.

Gummi lafte diflblucum ocubrum caliginem abftergere dicitur. Corvinus Romanus ejus 5§ egregii alvum ciere propra experienciā J.Bauhino teftabatur.

Pulverem corticis vulneribus Inlper/um ea mundare fie Tanare fcribit Monardes. Dentes eodeni fricati ftabilmnturflc gingivs ab/cedentes lanantur.

Folia contntainfignem 8c nobiliffimum odorem emittunt: in eorum decofto intihifti panni^ K calidi vulneribus, aut pulvere corticis illius infpcclo impoiti curationem eorum acceleranc K humo- rum eō defluxum prohibent.

Granum maturum habec in fuperficie parum admodum carnis fūavis be palarn grata; reliqu^{um} amaricat cgregic. Conficiunc ex iis potipnem confricando bJandc inter manus in aqiu calida donec dulcpr omni5 defricerur, cavendum enim abamaro quod pDtum corrumpir. Percolanchanc aq^{iam} lervant^aliquotdies donccfa:ce5fublTdeanc: potus eft Jimpidus, gratiffimus atcj, adeo falubris, P^x lertim illis qui affectibusrenum aut vdkx laborant, maxime fipocioMayziadjiaciav. "AquacqdBin piemus coiSa evehuurin opiimum mel, Sc Soli expofua, addicts nefcio quibus rebus. v^{ar} m^{ar} p^{ar} mum acetum.

Temporeparaxyrmifebricitan^Empincorummorc, exhibene cum fuceftu ociilds lcu gounn^{as} arboris BX aqim nofturno rori xpolicos. ft>.

CAP. VII.

Vifcum feu Vifcus abiEolico *E'MK* pro ifr*, quod idem fignificat. LatiniEoIes fequuntur. Unde eft qu5d ii non tantum aperum fpiritum in V convertiunt, quo modr» ad *Etr-yn&t* eft Vefper fed Be lenem, ut in **Oiv@-* vinum, *ii** vomo, «T*\? vitulus, ***<&>* rideo, S*j <f ver, *>** vicus, *** W** vena, *i** vis, aliique quæ apud Caninium lgi pdflunt.

Vifcus elt planta parafitica, feu Frutex arboribus aut fruticibus aliis innafcens, baccifera., monD-pyrenos.

A. I. *Vifcum Ger. vulgare* Park, *hacvis albis* C. B* *Vifcus ^uercus & aliarum arborum* J. B»
ififfdtqC allQ iK^fTeI* *Aurem Virgdi ramus* *sEmid. 6. nonnullis exifimam.

J.B.

Multi5 ftolonibus fruticat, cortice teftus coloris herbacei, ac interdum flavefcentis, minimi digiti ferè craffitudine, nonnunquam craffior, quos incerpiunt genicula, c quibus rami frèquentes propagantur, nodofi 5c lpfij fimilemq, fibi fobolem procreantes ramulDrum. *Folia* bina oppofita. *PartulacaE* fdliorum forma^ oblonga, per extremum rotunda fere, CDIOHS herbidij craffa, nervis reftis *Plantaginis* pentaneurx modo fecundum longitudinem donata, faporis fubdulcis Bcfubacris. *Flqrs* turn ad genicula, turn extremis ramis hxrnt parvi, lutei, quadripartiti, qui in *baccas* abeunt confer-tim CDacervataSj uvx enfpaè fiipares, [irnDtiuhb minpres] eodemque modo ilriatas^ albicantes, pellucido, lepto ac tenaci liquorc plenas, odore quodam grato, vinofo; fapore jucundo, quibus immerfa iint grana, non tamen nigra, uc vult J. Bauhinus^ fedpotius argentea, fingulis fingula, lata, compreffa, cordis effigie.

Vifcum multi5 arboribus innafcitur- Vidimus in Acere minore flcFraxino in vivario ferarum *L46* (Parcum vocant) *D. Francisci Willughby* Middletoni in agro Warwicensi, in Corylo, prope Brantriam in Eflexia, in Tilia, Ulmo^ Salice, in Sorbo Aucuparia, & Rhamno cathartico. Malis Be Pyris necnon Oxyacanthæ frequenter, aliis arboribus rari5 innafcitur- Apud nos rariffimè invenitur in Qjercu. At Qtercus latifolia, tsfte Cluffoj per multas Pannonia: (ylvas Vifci feraciffima eft. Et Bellonius inter montem Athon & urbem *Ceres ScTricala* nullam effe Quercum fcribitj in qua non proveniat vilcum, omninb diverfum ab ea quod nafcitur in Pyns, Pomis & aliis arboribus, at non indicat in quo differentia confiftat- Multas alias arborum Ipecies enumerat J. Bauhinus in quibus vifcum nafci a fe Be aliis obfervatum.

Vifcum Amygdalæ innafci (inquit Tho.Bartholin. Aft. Med. An. 1671* Obf 67 J nemohaæ-nus opmor animadvertit; id tamen frequens eft in Provincia Gallicana, præcipue ad urbem Ciltetronemj & L in moncanis, ubi ad vias pubheasin Buxis Be Amygdalis Vifcum alte progerninat Be CD-piofc. At J- Bauhinus in Amygdala femel obfervaffe k fcribit.

Theophrastus 5c Plinius Hyphear Be Scelin a. Vi(co fpecie diftingui ftatuere videritur: Verum erroneè. Si enim res diftint* iint, cur a tot feculis, a tot poft Theophrastum autoribus, non ab aliquo declarator? mirum tandiu curiosos Botanicorum oculos htuiffè Sc diligentiffima ferutinia eluffè. At neque diftmftionem illam Vifci probamus qua: defiimitur à differentia arborum quibus innafcitur, ut fpecie diftinti fint qui arboribus fpecie differentibus accrefcunt. Quòdque Theo-phraftus prodic perpetuam frDndem agere in arbonibus *PJ^BI^ nalcencem, adnacum verò arbori-biis quæ amittunt folia, in iis quoq, fentire difpendium^ experientias repugnat, fi quidem quod Pyro, PoniOj Amygdalæ, aliifque multis quæ folio deciduo iunr, innalcitur, perpetua frohde viret, riecun-quam folia amittit. Matthiolus Quercui, Robori- 6c Caftanæ innafcenti appetente hyeme omnia folia decidereaffirmat, penes quem fides efto. Nobis certe in nulla haftenus arbore obfervatus foliis pmnio ulla anni parte viduus. Quinetiam diftintio Vifci pro baccarum numero in (implex Be polycocon nobis minus arridet. Nam Be nos cum J. Ban hi no in cadem arbore aliquando binis vel ternis, aliquando pluribus baccis racematim coaggeftis Vifcum obfervavimus.

An hujus fruticB femem (perfectum cum fit Be maturum) fiii generis plantam aliquando producat necne controvertitur. Affirmativam partem tuentur Ariftoteles, Plinius, 8L univerfi Antiquorum cætus; Vifcum nempe ex ipfius baccarum femine, per alvos turdorum, Palumborum csterarumque id genus avium, poftquam acinorum pulpam concoxere, reddito nalcit. Hsc eft natura finquit Plinius) ut nifi maturacum in ventre aviuti non proveniat. His fe opponunt,, Be pro negativa depugnant Jul. Scaliger etmq; fecutus J. Bauhinus Bcplerique recentiores multis argumens, quorum tamen nonnullis facile refpondetur. Diifficilior eft refponfoadargumentum quod defumitur à fitu Vifci in ramis. Quomodo enim femem Vifci confiftere potuit in ramis tenuibus, exiftis in quibus aves vix poffunt confifter^ iifque ventis agitati5, Be crebn5 imbribus complutis? fjUDmodo in prona feu terram fpsrtante ramorum parte? Cui tamen non fine aliqua probabilitatis ipiecie r.efponderi poteft, excrementa avium vifco paftarum de ejus natura participare, 6c proinde iemina lis delibuta ramis agglutinare poffe adeò firmiter, ut non facile yentorum impetu aliave tempeftatum vi dejiciantur.^ Nos fanè non libenter, Ipontaneam aut squivocam generationem admittimus: cumque, ut reftc Theophrastus, omne femem fit propter generationem, abiurdum nobis videtur, nec verifimile naturatn femem aliquod perfectum magna etiam Copia creiffe tota fpecie ad generaciDnem inutile 5e intracundum.

Yilcum Veris initio foret: Baccs tamen per tDtam hyemem in frutice durant. In quacunq; TempM aium arbors nafcitur noxam ei affert, ut fciam incenmers poffit teftc Theophralto.

Vifcum

Vicia [3
Lijm.

Vilcum ad aucupia ex hujus fruticis baccis turn olim tum etiam mine dierum aliquibus in locis parabatur. Baccas in aqua decoquunt donec difrumpantur, postea contundunt Be tandu Javan in aqua quoufque furfuracea excrementa exirtiant. Paratur optimum ex Caftanae Vifco. Quod apud nos in uffi est Vifcum e cortice Agrifolii fie. In Damafco e Myxis five Sebeften paratur, quod Venetias inde tranfvehitur.

Vifcum feu gluten ad aucupia para Cum mulci apud Veteres in medicina ufus erat. Vim habet emolliendi Be difcutiendi cumores, paroides Be abfeeffus refina: parique cerz admixtum: Epinyftidas quoque in Jpleniofanar. [Strumas ficcat, comitalibusmederur. *Flin.* ~\ reliqua vide apud Dio/coridem, Phnium &c Galenum.

Ligai ufus prscip.ac fpecific. in Epilepfia. Prarfcribitur etiam contra Apoplexiam Be Vertiginij tum intus epotum, tum vero collo appenlum : Quibus in morbis mulcum pr^ftare tum veterum tum recentiorum medicDrum unanimis efftentia. Scimus quofdam [inquit]. BJ Vifciligno in vjntp macerato non inutiliter ufos contra Verriginem. Pulvis Vifci (maximè duercini) non Epilepfe tantum medetur fed Be menfes movet. Arcanum etiam eff contra Pleuritidem femel atque iterum & tertio in aqua Gardui Bt Papav. exhibitus. *D. Bowie.*

J. Bauhinus contufim Sc aquis conveniebtibusmacer^tum adversus vermesinteftinDrurn, inpueris aliquos fuafi /IID ulbs Icnbit.

Vifci Oxyacanthoinnafcentis pulvis vino albo autHifpanicifinufus, 6c duabus ante paroxyfmo hori5 exhibirus^ ioii fiibinde reperita fi opus fuerit, febrem quartanam non raro fugat Be perf^ fanat.

Commanducat^ fruticis frondes & depaftx à jumentis Sc vaccis à rufficis noftris ad fecunda5 remorantes ejici^ndas utiles cenfentur.

QubA Vifciis QLiercinus prz aliis in honore Bcpretiol^ Druidurti fuperftitioni tribuendum autumo^ qui Vilco &c arbore in qua nafcebatur^ [fi modo ea Quercus fuerit) nihil habuerelacratus. *Tlin. lib.i 6. cap.44.* Aiunt Sc Druidas /oiitos fuiffe per adolefcetes iuos vifcum fuum anni principe niittere; quo vifo clamarent omnes Annum effe novum: atque hinc manaffe quod juvenes hodicque anni principiD oftatiin difcurrentes, ftipemque carmine pofcentes appellant id a^uilamuf quail *A gui fan muf;* i. e. Ad Vifcum annusVLis. *Voff, Etymolog.* FtECunditacem eo potò dari cuicunq, ammah ftenh arbitrabantur Druidae, contra^ vencia omma ells remedium. *Flin.* apud quem plura vide.

Eft Vifcum Corylinum inEpilepfii Be aliis capitis affeibus longè efficacius Qiiercino: Sed non nafcitur in Corylo nifi post cente(imum annum ex opinione Henrici ab Heers. *Job. Hdf. Junckzr** in Chym. experimental, curioia. p. 618. *Utrovif utaris fzrinde ejfi futo.*

1. Vifcum baccis rubris C. B.

ClufTus non procul Hifpali in Hifpaniz Vifcum copiofè in oleis nafcens oblerVabat. Habuit verò id baccas non albas, quales in aliis arboribus nata^j fed ex rubro purpurafcentes. Bellonius qu u qu Obibrvac. cap. Bj. limile vifcum in oleis Hierololymirano agrd crefcere funbit. An hoc a^vulgari baccis a lhis fpecie difFerat nobis non conftat.

3. Vifcum Induum Ger. J. B. Park. *lattfolium fenis circuits utrinque infulptis* CB.

Ex Indicis plagis accepimusj, (inquit Lob.) hanc nufpam nifi in ramis &c truncis arborum en^ fci folium, ritu Vi/ci, quod quia multum adumbrat, *Indicum Vifcum* vocavimus. Sefili^ fed tranP ver/III excurrente eft radice ce/pite, gramineis genicellis, Be Polypodii quadantenus fed albicantibus: *Culmis* item ex pallido vjrentibus^ a medio fummo tenus craffioribus, fungofis, ftriatiSj felquipedem Jongis; in quibusfolia femper virentia^ Vifci effigie^ led duplo major*, fungofiora, Be fecundum nervum medium folium intercurrentem circulis utrinque fenis, non parum admirarioni^ moventibusj veluti fcalpro infulpta.

Plantis Capillaribus potiùs affinis videtur quam Vifcoj tum ex radicibus, tum ex circulis Foliis in^ fculptis.

4. Vifcum Indicum aliud J. B. Vifcum Ferwvianum Ger- Park. *Vifci modo arbor ibm Indie is advfl* ferns* C. B.

Ad. Lob.

Eidem LCEID Be natalibus ramonim arborum Indicarum debemus hinc; exlpite latiore fefilis e^u dicibus incumbit, fibnllis Cepaceis radicata^ undeproximè furgunt folia invicem convoluta^ tuniceaj infenus ferè palmum Jata, numero^ quadantenus Aloes aut Seyllar, Be lupernèin ligulas praetenuis mucronata5 delinentia, purpureum, ftriatur, concavum, alis donatum fcapum HaftulzRegiar ant Aloes, duorum aut tnum cubitorum ambientia, quz multis glumofis filiquilispicancur, Avensfit^* magnitudme verò Be fericeo tomento candido Apocynum Be Afclciadem repnfentant, Be femi^ fed Conyza: exili; guftu falfo, ingrato, nitrofb, fortè quia in aura marina adolevit, ut Abw i^iic in fabulecis.

Plantae efl Graminifolia, à Vifco diverffilina.

5. Vifcum Oxycedri J. B. Cluf

In Hifpania finquic Cluf; in Oxycedri ramis menfe Oftobn^ obfervabam plantulam digiti Ifn- g,tiidine, ramofam, geniculatam, vindem, mterdum flavefcentem, ramulis Myrica: recenter ena^5, live *Sikamm* nonnuUis dift^ fed pau^16 minonbus, conftanem, quorum extremis interdum vcto^ fru^

fructus in his rebus Mufci qui in arboribus aut (axis nascitur fructui perlucens. Acido autem Be perquam adstringenti gustu tota planta haec est, Dxycedro velut Viscum in aliis arboribus nascens,

6. *Sedum arborescens* Bontii. *Frutex parasiticus baccifer Sempervivi xirmlus flore odoratissimo.*

Bont.

Arboribus Mangiferis Be Quercibus cuidam speciei, quam Indi *Kiati* vocant, Visci instar, accrescit. *Folius* est oblongis Perficaria?, *ib&* crassioribus *longb* Be succulentioribus, qualia sunt Sempervivi majores. *Radices* edit mirabiles, teretes, ex quibus fibras demittit, quae vel lapidem, vel arborum apprehendunt, Be sine limbo vel terra sic affixa crescunt magnitudine glandium, forma sic figura tali quale est manubrium hastae vel lanceae quibus Perfe sic Turcae equites etiamnum utuntur. *Florem* profert parvum, Anagallidis florifimilium, fed album, &c tam aromaticum odore, Citri aemuli, ut me in vita nil quicquam odoratius percipere sciam. Unde etiam apud Malaios nil ad cerebrum &c nervorum vires: rum praeternaturales affeausaeque conducere fertur. Hinc quoque in praesentibus Be cholera conserua ex floribus Be foliis hujus plantae singulariter est remedium. Comperi quoque egregios ejus effectus in dyfenteria: habent enim folia qualitatem astringentem, sic laporem planam talem qualis est in Acetosa patria, led paulo longiore. Flores quoque nondum non minus cordiales sunt quam Buglossi aut Boraginis. Fructus medium, digitum longi, la parte mucilaginoso sic fatuus, Be per medium iranversim difsecti femina ostendunt paulo majus quam Milii, itidem mucilaginosum, quod decussatim sicumest, ut ferme arcem reparantem, quatuor suis vallis Be propugnaculis exornatum, Conducere dicitur ad venenata vulnera, unde sic ad istius venenacorum animalium utilem esse conjicere licet.

CAP. VIII.

De Philyrea.

Phillyream Diofcoridis mulci cum Philyra Theophrasti confundunt: alii Be rectius (ut existimamus) eas distinguunt, *Macahb* autem Arabum Phillyream esse Dioscoridis J. Bauhinus probat. An verb *MahaUbku* Phillyrea ea ipsa arbor sit qua: hoc nomine nun: vulgo innotescit non ita manifestum est. *Rauwolfius* scribit le yidiile Halepi apud aromatarios parva femina alba, *Machalsbj* qua: dmo cur rice concinencur, longiuscula, acuminata obdudta tenui tunica, Pistachiorum modo, quibus utuntur ad odoratum saponem. Et Monachi qui in Mefuem commentati sunt senuunt *Mahaleb* esse arbutulum in Syria notissimum, spinosum, foliis Olivae similibus: ferris grana quasi racematim inramis, ut Lentifcus; paulo crassiora tamen, e quibus Syri oleum exprimunt valde odoratum, ex quo conficiunt saponem olfactu fuaves aliaque plura. *Hac omnia quomodo conuenire possunt Thilyrete vulgaris nun video.*

I. *Phillyrea angustifolia* J. B. Ger. Lob. *angustifolia prima* C. B. Park. i. e. 4. *Clusii. ittmavgu-*
trifolia fecunda eorundem, I. e. 5. *Clusii. [j]sarroill leaded [sic] u r t.*

Clus. J. B.

Humanam altitudinem atque aut etiam superat, ramis tamen minores & frequentiores habet quam Phillyrea latifolia ferrata aut lacvis, nignore cortice t est 05 (^cortic cin^rcDj mat eric alba] *Folia* ex aduerso respondentia, Oleas tri, angustiora, viridiora, amaritudinis non expertia. *Flores* ad foliorum exorcum multi utrinque, ramulos coronant, Olex fimiles, ex herbaceo albi: quibus Jucedunt *bacca*, Myrtinarum magnitudine, rotundas per maturitatem nigrae [caeruleae vel potius violaceae] brbViflimi5 pedicellis racematim ramulis adhaerentes, dulces cum aliquo amaro: in quarum unaquaque o Jiculum parvum, durum.

In Etruria copiose provenit, necnon circa Montpelium, in locis *Garrigues* distis. Magnitudine *Lum.* insigniter varia, unde Phillyream quartam Be quintam *Clus. f. 9* specie a se mucuo distinfctas non arbitramur. *D. Magnol* etiam fulpicatur Philyr. quintam *Clus.* nihil aliud esse quam varietatem quartae

i. *Phillyrea latiusculo folio* C. B. *latiore folio* Ger. *latifolia, foliis fire'nm [err at is* Park, *folio Ligustri* C. B.
Clus.

Minor est ut plurimum Phillyrea folia Hicis, duorum tamen hominum altitudinem squantem sic vidille scribit Clus. Ejus rami (in quit J exalbido cortice teguntur, aliquantulum rugoso. *Folia* habet ea qua? folio est Alaterni aut Ilicis angustiora, nullis crenis ferrata, ejusdem ut in precedentibus cobris, adstringentis gustus. *Flores* Olear fimiles, pusillos, ex herbaceo candicantes, confertim inter foliorum exortus nascuntur: *fructum* deinde rotundum, superiori fimilism.

Desertis Bxticz locis nascitur, imo circa Montpelium frequens est. Reffe Lugdunensis in Gram. *Lmwa*, multoties ac lti ejus tractus saxoli glareosique rupibus crelere nDtat.

Hoc genus foliorum figura, colore, magnitudine mire ludit, unde Phillyream arborem Lobelio J. B. I. e. lacfolium lacvem C. B. ab his nun distinguo; quanquam in eam magitudinera excrecere non observaverim.

3. *Phillyrea latifolia finofa*, feu 1. *Clufii* QB. *item folio leviter ferraty*, feu 2. *Clufii* ojudefri*.
P^hll. latifolia aaileata Park. >w /i//0 /^r> ferrato eiuſdem.¹ *FhilL folio Alaterni* J. B. tffff
 /l/fo 7//w^o ejuſdem. *Nam bos duos ſpccie differre non puto.*

Cluf

Prim a varietas alcius aſnrgit quam Ilex cDCigera, ramifyue Jiabet pollicariSj, vel etiam ampliorw
 craſtitudinis, cortice viridi fed caiilicantibus maculis aſperfo ceſtoſ: *Fdlia* Ilicis coccigerae majora[^]
 viridiora, craſtioraj in ambiru nonnihl /pinoia, ad[^]ringentis quidem guſtus fed non ingrati. Hujus
 flo* Ciuiio non conſpedus[^] fed *fruttm* Lentifcino azqualis[^] e foliorum alis dependens, maturitare
 nijjerj officulum continens.

L. 1. 1.
 Varietor.

FJ equens eſt in Luſtania: inculcis circa Eboram.

Secunda varietas prxcedentem magnitudine luperat, multis ramis, candicante corticij obteſtis
 prxdita: *foliis* Alaterno priori pine fimilibus, firmioribus tamen *Be* minimisnigricantibus, iapons qui
 dem aliquanrulum acris, fed in quo amaritudo fentiat. Nſque iſtius *forem* conſpexit Cluiius[^] ipnini
 autem *frnSum* racematim inter folia propendentem, magnitudine granorum Pipens aut fruſtus
 Myrti, rotundum nigrum, calidi guilds, offeum *Be* durum nudeum[^] candido ſt fragili cortice ob
 duſtum continentem.

L. 1. 1.

Variis LidiTania: locisin feibus crefcit: nobis obſervantibus in Etruna copioſiſſime locis alperis
 & faxofis: icem circa Monlpehum in praeruptis clivis non longe a ſpecu Frontignanaj ad mdnteni
 Lupi *Be* alibi.

Vim.

Folia magna varietate ludit, ut a qualis in diverſas ſpecies diſtraſta ſit.
Phillyrea folia, tradente Dioſcorido, proinde ac Oleaſtri obſtrringunt, proinde ad ea prodeſt
ſed peccant maxime ut ad omnia ulcera conuulſiua, ſed etiam ſi decoctio ea
quz aſt ſclione m^de, q^uad
 colluantur. QPⁱⁿ ^ P^{dtum} decDftum urinas menſefque ciet. Qua: Arabes habent de viribus Ma
 habb. f quam Phillyrea: Dioſcor. eandem eſſe ex ſententia J, Bauhini fupenus diſtum^o.^{VJAB apuc[^]}
 y ^ j/ Apud Recntiores nullum habet Phillyrea in medicina ultim: ob perpetuz frondis honorem
 expecitur ad & pes conuilis in hortis, viridariis Cc ambulaCns.

CAP. IX.

- A- 1. *Samhucus aquatilis* (ive *paluſhis* Ger. *ſaluſtris* *Jive aquatica* Park, *aquatica* *) > B. *aqua*
tica flort ſimſlici C. B. JDatCC iQittt*

A^{7s} Qiſarum amafia hxc Sambuci /pecies[^] indeque cogtiominata, arbuicula eſtquinque aut *ſax*
 cubironim altitudine[^] caudicc craſtitudine iiii manum complente; ligno tcnero, candido,
 «E. JL fragile *Fungoſi* intus msdulla[^], poliſo cortice cinereo obte^o genicularis ramis gemellis,
 ordine utrinque uno brachiaco: ex quorum geniculis *folia* exeunt lata, angulu/a, rugoſa, Aceris mi
 noriſj velSorbi torminalis foliorum axnula. *Flares* nonnihl odorati, in umbella candid[^] tarn iati
 "aliquandoj uc pollicis unguem a;quent, quinquepartirij fed circa umbilicum continui: maximè verò
 qui excimi in ambitu lunt expanduntur, mediis intra umbellam exiguis concjuſtj feru/que fe ex
 pandentibuſ, flavicencibus- Acini rubri feu fanguiner, magnitudine baccarum fpini albi *femen* con
 nent planum[^] latum, rubrum, cordis eſſegie. Ha: bacc[^]j autore Trago, ingratiplanè Hint faporis,
 ità ur deguſtanti nauſeam & faſtidia continua pariant.

Lw*.

Ad A^{uas} 8c fluviorum nſas, inter alnos in Germani[^] Gallic, Angliar, Italia: pratenſibus udis,
 conualliumque marginibus vilkur. UmbelJac cum flonbus Maiokta? con/piciuntur: Autumno bac
 oz perſiciuntur, nihilominus integra hyeniB durances, quo tempers turn rdiquſ, turn potiſſimum
 Bonoi aveſj fiimmoperc eas experunt, ut non raro etiam illis inefcata; capiuntur[^] notante TragOj
 cujns iudicio in edegmate exhiberi po/fent ad vomitiones ciendas. Hujus bacca: ad 5 ij. in ju^ſ
 pingui alteraro comà Abiinthii fero/itates per vomit[^]m benignè evacuant. *Prxvot. Mtdu. P^oim*

2. *SambuchS roſea* Ger. J. B- P^{ark}. *aquatica flore globofo plzeo* C. B. Qfyz: ~~C. B. J. B.~~
 J. B.

AmabiJi^o florum candidorum, magnorum, quinquepartitorum, unaque fe expandentium, glome
 ratorum pils nivez funds nomen apud vulgus Germanicum invenit) inſtar, ſpebtaculo hortos de*
 corat fugiperda iſta aquatica Sambucus. Fbribus parvis deſticitur, cſteraparcedentiiimilis, *mil*
quod flores propemodum odore deſtituti vidcantur.

CoJore floris purpureo interdum fed rarius reperitur[^] quſ Sambucus roſea flore purpureo *Ger.*

Tota hoiitenſis crediturha:c finquit(Dod.) K culture mangDnio talis faſta: quod & nobis vidu
 tur. Ciini enim fruſtum proferre a nſmine haftenus obſervata fuerit[^] non ~~ſpeciem~~ ~~praxvot~~
 diſtintamj Jed ejus tan turn vanetatem natura Judente effectam verifimile eſt.

Ob florum in coymbos conglobatoaim elegarviam in hortis colitur[^]

CAP. X.

- A. *Laureola* Ger. Park. *Laureola femper viremiflore luteulo* J. R. *femper virmsflore viridi*
~~quibusdam~~ *Laureola mas* c. B. ~~iditaf~~ **Haut;** d&purge-3laiird*

AD cubitos duos Sc.altiis grandefricti ftipic lento, aliquando fimplici, aliquando in ram 05 aliquot diWib, quern fubcinereus feu albicans cegit cortex, Be fraflu contumax, & flxuoilus, foliis fere nudum, qux circa fastigium potiflimum gent, eaque fati frequentia, adeo ut in orbem umbellae inftar diradiari videantur. Laureorum azmula, nee per hyemis aſperitates caduca, ex anguftiore^pnncipio ceu cervice fenfim dihtata, craſſa, glabra, nigricantia, ſplendentia. E foliorum linibus egredimtur pediculi unciales, craſſiſculi, foliolis aliquot concavis velut totidem fquamis veſtiti, in faſtigio *fiof'culoj* plures geſtantes cohertos velut in umbella, ex herbaceo luteolos, ti tubo oblongo in quatuor lacinias acuminatas, foliorum armulas expanſa, fruſtum rudimenta intimo reſeſu compleitentes, quſ in baccas excreſcunt Juniperinis pares, nonnihilo oblongas, primum virides, per maturitatem nigras, nucleo intus duro, Cannabis femine paulo longiore, medulla interioris Candida. *Radix* fubelt in aliquot partes diviſa, longa, craſſa, lentaj quac difficulter evelli poteſt. Toti planta: fapor fervidus.

Irr fylvis & fepibuſj praefertim umbroſis, fati frequens eſt. Februario KMartii initio floret. Fru- *Lotus* [5
 <ſus ſiſtatis fine Sc adventante Autumno maturitate confequuntur Be nigri fiunt. ^ Tempw.

Daphnoidis Dioſc. Be Plin. vires huic convenient, ſiquidem folia guſtatu os fauceſque vellicant ^{Yrej,}
 & inflammant. Eadem feu arida, feu etiam recentia potu pituitoſa per alvum dejiciunt; vpmicus
 quoſtie ac menſes cient: quin Be commanducata pituitam c capite extrahunt, 6c menſes tnovent-
 Cſterum quindenx ipſius baccſ [quins denacve Plinio] purgationis cauſa fumuntur.

Folia commanducata os Be fauces (ut diximus) inflammant: intus ſimpta ventriculorum admu-
 dum ſubvertunt, vomitum cient, partes internas laedunt & adurunt: Empirici nonnulli turn folia
 turn baccas exhibent hydropicis ad hutiiſſes ferofos evaculndos. Cxterum, inquit J. Bauhinus, non
 teincrc hanc plantain aut aliquam ejus partem pra:cripli:riniU5 ub inſignem acrimoniam, *qua tamen*
in aceto macerando corrigi poteſt.

Pulvis hujus in aceto macerate, exſiccata; K comminutx cancriſ inſperſus prodeſt. Frigida Be re-
 pellentia conveniunt in Cancro occulto, jn tilcerato non item. *D. Bowk.*

CAP. XL

De ChaniaUa 6? Thywd&a.

CHamadaram 1C Thymelaeam eodem capite comprehendo, quia 8c flore Be Fruſtu Sc facultate
 conveniunt.

Ratio nominiſ Chama:laea manifeſta eſt. Thymelzam diſtam volunt quaſi Tithymzlz-
 am, qubdOleae ferat folia, Be Tithymali inftar alvum lolvac: certetum foliis turn qualitate Tithy-
 malum refert.

Hujuſ generis notſe Characteriſticae liint flores monopetali in quatuor lacinias acuminatas ex-
 panſi, baccae mbnopyreni, viſ acris 5c cathartica.

Hue etiam referri potuic imo debuit Laureola.

- I. *Chamalaa Germanica* five *Mezereon* Ger. *Germanica*, five *Mefereon vulgè* Park. *LaureU*
folio deciduo, flore purpureo, *Officinis Laureola femina* C. B. *Laur. fyl. decid. five Mez,e-*
rtion Germankum J. B. ~~518; 333333.~~

Frutex eſt ad trimum cubitomm interdum altitudinem-excreſcens, *radice* in aliquot partes diviſa,
 minimi digiti craſſitudine, vel etiam craſſiore, longa, ak[ue] demittente, alba ex qua affli-
 gunt *virgu* plerunque fingulares, lent2, teretes, tenues, Dblequioli, cortice duplici teſtac^ exterior
 cinereo, tenui, fragili, interiore exteniis vivente, interiori albicante, valdc lentz & fraflu contumaces,
 lanuginem quandam bombycinam dam divelluntur oftendentes, cui ſubelt lignum candidum, foli-
 dum, medulla pauca praeſticum. *Flores* z& ramulorum latera fine pediculo, nunc fingulares, nunc
 plures ſimul juncti ex nodulo ante folia prodeunt, palliduli, ex rubella purpurafcentes; colore ad ſp-
 res Perficx acc^dentes, oblongi, in quatuor foliola mucronata, reflexa diviſi, odore fuavi, in medio
fiaminula aliquot crocea. *Folia* ex tuberculis plerunque plura ſimul, colore herbaceo, Laureolx folio
 perpetuo accedentia, molliora, nee ut ilia ſplendicantia. *Bate** cum matutate rubentes, quac refic-
 catx nigricant, quarum interior nucleus Cannabis femini ſimilis, medulla Candida. Toca planta, ut
 odore gravi eſt exceptis floribus, ita fapore acerrimo Sc urentiffimid-

Amat loca fylvatica 8c montana. In Germania Sc montibus circa Genevam Be alibi obſarvavi- *Loc*^{*}
 nius. Flores (ut in deſcriptione diſtum) folia antevortunt, Be Marciomenſe exeunt. Bacc^ in vir-
 gis diu durant. In Anglia non habetur foontaneaj fed obflorum praecocium apedulum pulchm
 & ſuaem odorem noſtraſibus in pretio eſt, inque hortis Sc viridariis magno ſtudio paſſim colitur.
 Variat floris colore pallidius rubemc, Be alba Hujus baccſ Officin. Coccignidii ſc graua Cniciia VD-
 cantur, *Sviand** *Cwd**

Kres.

Mezerei vis est ignea, acernna, exulcerans &c mordens; commanducatum fauces &c [Etopha] Jil adunt, diu multumque vexante impreflionc, Lobelia Be experientia teffibus- Febres accendit^ comis pncipuanimque partium vires exfolvit, validiffimè bilem biliojalque leiofitarcs purgans. Corrigitur macerando hor. 14. in aceto (uc Elleborus ac Elufa) J fucco mali Punici aut Cydonii, Porruhar, mucilagine /em. PiJ Jlii. Alii corrigunt infundendo in vino 5c iterum exficcando: Alii triduanam maceracionem in aceto requirunt, fingulis diebus novum affundendo., &c tandem aquabene eluendo.

Verum Folia, Cortex, baccx quoin Ddocufci, pparata: &c: cDrreth: ob nialignitacem ranfimein iifum vniunc, nec m, li in cuiorum medicamemorum in Dpia &c cafi aliquo dciperato exhibenda fuit, idque magna confidratione.

2. *Cbamxla Sabaudica folio utrinejue mcano, florz albo.*

Ad psdalem ^ icfquipedalem alitudinem affurgit virgis in plures ramulos tortuosos Sc id genicula feu divaricaciones reflexos divifis Be subdivifis. *Lignum* ejus lipra modium fragile est, *cortex* c^ nereus. *Folia* Mezerei Germanicij fed multo minora acuminata, utrinq, hirfiita, glauca flinimos ramulos occupant: in quorum etiam extremis *Florzs* exiftunt quatuor aut quinquas auc plues fimil conferti^ pediculis rfullis, nullo calyce excepti^ e rubo longiu/culo in quatuor Foliola acuminata, alba expanfi, ftaminula crocea intus continentes. I^ oribus iicedunr *bacca* longiu/culae, qianim rudimenta tantum vidimus; nam planta Maii initio cum earn irivenimus in flore tantum erat-

LKUJ.

In fylvo, Jis ad latera monris Saleva: prope Jenevam. Folia (icca deguftata etiam poft vicennium^ icrvorem Be acrimonnm manifeftam probebant.

3- *Tljwca Ger. Park, filizs Lini C. B. Monfpefiaca J. B.*

Cluf.

Frutex est pollicaris iritcidum craffitudinis, cubicalis vero alitudinis ant amplior, Be in multis virgas diviliis, cubicales, tenues, pulchras, reftas, qux fepiunc perpetuo virentia *folia*, Lini fere, fed majora, laciDra, non obtufa cupide Ik Chamxlara, neij, adeb fragilia, fed miLionata, len:a, K gum-Jnofiam quiddam /i denribus acterantur prabenra. *Flores* fere in exremis virgis copiofos, recrapctalos, Dleac fere fimiles, candidos, racematim fere propendentcs; deinds *fructum* baccarum Myrci incerdum magnitudinc, paulo longiorem, initio videntij poftca Coralli modo rubruTi, came fucci plena Ceralorum inftar; fub quo later unicum *fzmn* > nigra fragilique pellicula obduftum, 5c fervidi laporis medullam obvolvens. *Radix* lignofa est &c dura, in tenellis plantis Raphani modo efformara^ craffo cDdice tefta, fed quemadmodum tota planta lento & admodum tenaci.

Locm.

In Italia & Gallia Narbonenfiagns deprefloribus inter alios frutices pafsim provenit. Clufius per rDtam HiJpamam locis apheris nafci tradit.

Hujus fruftum coccum feu Granum Cnidium Anciquorum Botanici peritiorcs exiftimant. Dfficini5 Mezerei Germanici bacca: pro cocco Gnidiae habentur. Cocco Gnidije vis ardens 5c fauces adurens: unde miramur Perdices &c aviculas Thymelara: baccis avidiffime velci. Ait grana no iunt baLCz integrx rubra; (qux forte efeulenc^ funt) fed femina qua: baccis celantur. Ruftici HiJpaniarum fingulis annis propè infinicas aviculas hoc femine curvatis virgis Sc quibufdam hneis dlloficis venantur, teftibus Amato &c Clufio-

Cavendum monec Camer. n^ qtiis radice vefcatur, quia paucis horis perimit.

4. *Thymd*a, foliis Folygaltv glabris C. B. Sanamunda glabra J. B- Sanamunda Monfpefiaca glabra Park.*

?-?.

Lencis 5E obfequiofis est ramiSj cDftice tectis flavefcenrej in fila Mezerei Germanici in morem duftili^ per qtiDs-agminacim confeendunt. *folia* crebra^ Myteis familiaj unciaj plus minusDngitudine, vix iemunciam lata^ in acumen deJinentia, glabra: e quorum finu per integrum fere ramum *fiorzi* oblongi^ parvi, ex luceo herbaeei, quatuor foiiolis decullatis confiantes. Succedit granum r^" cundum, fingulare.

Locai.

In niaricimo traftu Narbonenfi prope *dgdz* oppidum collegit J. Bauhinus.

Vim.

Mycono audre vis purgandi ei vehement Sc qujm in Chamzlsa valentior: nam 5 p. pondere potentiffimc alvum move: ac aquas evacuat, nonlme tornunibus 6L magnu cruciatu.

5. *Thymzlaa foliis candicantibus, Serici inftar moUibus C. B. Tart on rairt Gallo-provinci<z Lob. Ger. MaJfilmifiHm Park. Maffilhn. Sanamunda J. Clufii J. B.*.*

J.B.

Fruex est cubitalis, valde ramofis, radice nitens alte aifhi, craffi, quem cortex tegit mir^ oblcquoifis &c lentus, in minima ftamina non fine floccis quos lanam dicas carptam, diiftilis, quali cciaii cortice veftiuntur rami^ fed fupcrfratodenfo tDmento albedo, 5c quafi argenteo. *Folia* Myrti T^ renting magnitudin^ nifi quori per extremum fine paulD latiora, in acumen tamen obtulius dclinsntiaundique Januginofa &c taftu niellia, albida vel argentea, lucida; inter *qux flores* exeunt, Ol&* iimiles, *Cluf* oblongi^ in qiatuor foliola per extremum divifi, colors luteo. Fiuftus [iueinadn^ Odum ex relatu accepit CJui-] Thymeba: fere, fed nigricante colore.

- Idem Clufius folia carnola *zffc* dicit, aliquantulum hirfiita, gummofa, fi mordcantur amara mitio, deinde acna Bcadurcinia; ramos cortke exteriore nigrefcent^ obduci, alio intcriore lento; q^i non bene tonveniuiii: planta: a nobis obfervata in rupibus maricimis non lojigè a Salerno in rVl III 55^ m mirLlm Lobsliu m feparare Tarton rairz Gallo-provincia: a Sanamunda 1. tW- rnm. J. J^a^ illam j^ is ad mare deVcxis, prarbricimo, collem *Mont rvnd* vocarum, fqualiduni, aridum, glareofum, pluvna fhiricac. Freqvens quo^ est (inquit Clulius) regms Graiwcni Be Valw- m n J H S r. »TM» 1«TM. Vvnd wmporel hoc est, Martio & Aprili floret; ^ »« £

Locus 13

Timpur.

Folia sint adurentia, uti d'ftum: ob purgandi Facultatem rufficis HiFpanis ma*igno in uFu. Sed eF- ViresV
frxnis Sc exuperans e jus purgandi vis, (in quit Lob.) non raro dyFenterias fluxulque immoderatos
accerfit: ideoque non nili rcuiftis Be cum cautions exhibenda.

6. *Thymdaa foliis Kali lanuginojis faljis* C. B. *Sanantunda* 2. *Clufii* J. B.

Cubitalis altitudinis Frutexeft, ramis lentis, flexilibus, carnoFo 8c denFo cortics inteftis, qui Fub-
Jata exteriore cuts per totam plantam, prarFertim circa radicsm, Lini auc Cannabis modo in filadi-
duci poteft- Supenorss ramuFculi denforum, conFertorunij lanuginoforum, Be veit tomsnto quod-
dam obfitorum *foliorum* comam pariunc, iuperiors miiijprum &c nYucronatorum^alfi nonnihil gu-
ftiis, ied deinde acris fle calidi. Exornatur hxc coma flaveFcentium *flofcolorum*, Olsx fimilium^
nunerofa Fobole. Radix craffa 5c hgnola fuperiori fimilis eft. Fruftum hujus obfervans non potuir,
quandoquidem Februario florentem invsniebac pstrofo 5c lalsbrofb locoj mantimis Baeticae, inter
Calpen Be Eftepona, montibuFqus Granatae proximis.

Drachmae ppndsre cum decocto Cicrum iumpta mirifice purgat per iriFeriora. Circa Calpeh, Vires IJ
ubi vulgo Burhalaga appellatur, nullusilius uliis pr^tsquam ad xcalfacindos Fomaces- VJw_m

7. *Thymdaa tomentofa foliis Sedi minoris* C. B. *Sanamunda tertia Clufii* Ger. Park. *Sefamoidz*
parvum Dalechampi Sanamundi ;. *Clufii* J. B. *Cneorum Cxfalp.*

Nos Fruticemhunc in iniula parva ad promontorium Sicilian Pachynum diftum (Te breviter deferri-
pfimii5 *Fvlis* eft Illecebrae: caulibus 8c ramulis incanis^ut Be fiipina Foliolorum parte : *Flos* parvus, lu-
ucusSqualrifoliuSjfsu pocius monopetalosin quatuor lacinias fsftus: Folia in crucis Formam difpoita.

Cludis fie delcricbit, Superiorss duos magnitudine excedit, candidioribus Be mukb lsntioribus vir-
gis. [Reftè J. B. Ramos Faritum denfa, Candida, cineraca Janugo obvolvitj quae in majoribus vir-
gis parciore,] quarum cortex fiipra mridum lentus eft Be Frangi contumax: extremi ramuli Frequen-
tes, &c fsre omnino tomentofi, procumbentem comam habnt, 6c Frsquentibus *foliolis* obfiti iuntj
carnofis, parvis, Iliscebra: valdc fimilibus, ursntis etiam Facultatis. *Flores* Fupsripnbus fimiles, inter-
dum herbacei iint^ aliquando pallentes. Ssd neque lltius Fruftum Clufio Dbfervarc licuit.

Floret cum Fupenonbus: invenitur autem totoilb traftu mantimDjMeridisi objeeto, qui ab Hsr- *Locus*
culeo Frsto ad Pyrsnaros uFq, excurrit.

Cxfalpinus Fruftum Thymstacaz limilsm^ tsnuirem^ femine nigro hiic Frutici, fi. modò ipfius
Cneorum fie (utpikamus) attribuit.

Viribus cum pracedentibus convsnit,

8. *Thymdaa zsethiopica Tajfirinx foliis* Breyrt. *Cent. 1. cap. 6-*

Hujus Fruticis ramus dodjaotalis a Promontdrio bons Spei ad D. *Bzwrnngb* allatus teniis eraf,
in ramulos duos ahus diductus, quorum finguli ruiTus in virgulas tres aut quatuor reilasdividebantur.
Lignum hujus mveiUTij cortics obduftum rubicundoj qui in candidiflimamlanuginem fsricsam, cor-
ticis inllar Sanamundx Clufii, diFcerpi pDteft ; *xqub aCfolia*, vix Femuncialia, angufta, craffiufcula
at^ acuminata, Pafferinae quodammodo acmulaj guftuimtio paulifpsr adflringente j led aliquantum
niant mucilagmem abundè rsddsntia. His Foliolis ad excremicatem ufqus denss \$L undiq, ftipacz
funt virgul^ ubi tandem circinato cDngefta, acuininibus fuis furfum tendentiouss illas concludunt.,
& ex csntrd fiio liirculos duos aut tres perbreves tenucFque emitcunt; quorum finguli pariccr liiperi-
ore parte minutioribus quibufdam1 Foliolis coronati. E Foliolorum *mzdio flofculi* tres auc quatuor, pal-
lidi, in lacinias quatuor psr extrsmum diffsti, Thymslsa: fimiles emergunt, in ima parts vs luc al-
bum, tomentofum calyculum olendentss.

9. *Thymdaa affinis facie externa* C. B. *Cneorum Matth. fuffrutex* J. B. *fvrx* etiam *Thymdaa*
minor Cordi Ejuodem. Thymelaa minor five Cmorum Matthibli Park.

Suffmtex sit elegans, cui multi rami, giuciles, flexibiles, lenti^Iurculofi, ab ima prptinus tellure
emergentes Sc humi diffufi. *Fdia* nullo oraine dilpolita ramulos ambiunt, viridia, cucanea^Thymc-
lsac verac proxima, ingrati primiiim, deinde amari l^poris, nulld auc perexiguâ (quantum quidem
guftam deprehendere licuit) acrimonia^praedica. m *Flores* in lummis iurculis lex, feptcm, aut plures,
conFeTti, tetrapetali, ex rubrp purpuraFcentes, Centauiii minoris florum pznè armulij ingrati etiam
Scamari lapons, alpeftis tamen pukherrimi, acc^ odorati, caput fi diucius naribus admoveancur
tsntantes. lis fuccedit *fruBus* exiguus, Thymelx^Fruftui haud diiimilis, non rubsr quidem, fed
candidus, oblongiuFculus, *femtn* continens cinereâ membrani cefum, rotundum, Thymelacx grand
par. Rridix longa, minimi digiti utplurimum era Hi tu dins, interdum nigricans, majors vero ex parte
tJavelbsns, lenta, liiperna parte nonnunquam gracilior, unde rami flexibiles 8c lumi diJperfi emsr-
gunt, &L iibinde feajndum alarum cava latis craffas fibras flavefcntes agurit.

J. Bauhino Folia circa virgultprum Faftigia coiiFsrt^ viTEncia, Thymskx multo breviora., obtufi*
ora, glabra, qua: nota: optima conveniunt.

Provevr in multis montibus Vienna Auftriae vicinis tanta^abundantia, ut rufficx mulieres dum *Lccui*
fibrfous abundat multos ejus manipulos in Forum venales affsrant exornandorum tncliniorurn gratia;
alibi etiam in Pannoniac lylvis, 8c licciioribus pratis prope FrancoFurtum ad Mcnum. Aprili plsruncck x
floret. Fruftusjuhio maturfcit. Fbret interdum cer in anno.

Floibus candidis variantem conipexic Clufius inter Ericas props FrancoFurtum loco difto.

A CneoroMatthiDli J. Bauhinus divsr lamfacitThymela:am minorss Cordi: CBauhinus aliique
hancilliu5 fynonymam Faciunt. Nos in dsfcnptions Cordi nihil Fers mvenimus quod non convaniat

Cnicus, nili quod "Radice gustu ad aliquot horas fauces & palatum Coccognidii infat exalta-
 ciente & scarificante efficitur. Nos circa Bafiliam scilicet in Germania fruticulum tribervimus,
 quem pro Thymelara minore Cordi habuimus, verum radice non deguitavimus. Minim tamen
 videtur laporem radice folioium cancum distare.

10. *thamdaa imana & lanuginosa* J. B. *Alp'm* incana* Park. *Alpna folio fubtus incano* C B.

Cnicus
 Refto ftolone fruticat ramis, habet admodum flexibiles, tenaci cortice & qui difficile dirumpit
 potest ductos. in admodum conferra, ferno, Ja, Dap, Jinoidis foliorum formam imitantia, multum
 tamen minora, Be incana lanugine, mferne praefertim, pubefcentia: flora fimul coipectos, tetra-
 petalos, dilutiflime purpurafcentes, c Janugino/is colorifici argentei calyculis prodeumes, Fruity
 non tricocum fed unicum, ob Jongiu/culum tenui, miniatam membranam reftum, ficculejita carne, K
 fervidum nucleum in e continente prarditum.

Loci*

In ^{OLIS} *fokins* cultam vidit Clufius, bifque interdum in eodem anno florentem. Frigoris im-
 patiens: Clufius Vienna Auftris, aliquoties ejus remen terze credit, & natas glanmas
 Jummiq, cura confervare voluit fed fequens hyemsiemper-CDfrupit.
 Italic originem fuam deber.

C A P . XII.

A. *Viburnum* Park *vtilgo* C.B. *Lantanayve Viburnum* Ger. *Lantana vulg, aliis Viburnum*]. &
 Cij* pliant jfBcap'tvee, Cjic H3apforinqff' tr«, Ger.

7-5.
 X" T¹ c frutex arboreus est, grandis quandoq, licet in amplitudinam magis distendatur
 I—1 in alrum alfurgar lienosq, confat fungoso 6c medulloro. E radum fummo caite vagant
 M. X ramos digital, craffitudine emittit bicubitales eturnq, Jongior cortice ruffo fannace
 pulvisculo confert, in Dauca ac viridi, medulla araphlunia ac alba. i/wad Auiuni ve j y
 tiui ad Sorbum Ajpina accedentia oppofita, lata, fublonga, craffiuscula, in ambitu crenata, hir-
 fitta, & pi,lv, Tculo albo, maxima in parte qua: ob id RUD magis candicat, confperat gustu
 adfringente. Flors in unibelli, odore florum Sambuci, candidi, paduci, quinque petalis, extiwini
 modis: c d x n, j u d t a p u s j i n g u l i s, in quibusdam ramis quibusdam intrinsecis, longis, albecula
 Quis excipit fupervientes a c a primum vrides, deinde rubrx, per maturitatem nigres, com
 Drefta < > Br i j t n x / Tipore tamen nojtro palato minus grata: quamvis e rufficis multo iis
 maturefcant fupra paleas aut fcenum reponere alterno stratu blent. Sir

Loci

mnis continet b j j j a fo]o maxime inculto & argilloro. Jtate floret, dtius aut Teri
 In apibus non gmerie-K conditione foli- Magna ex parte acini rubefcunt Julio Augufte
 pro tempestate g n b n Tia turefcunt, uc testatur j. B.

Vitae

Tia rui" bacci itcant Sc adfringunt, unde ad tonfflarum K gutturis inflammatione
 pr-ocidentiam dentes vacillantes, alvi fluxiones commendantur. Folia in Jixivio &
 CDita apjia denigrant, & eodem fluentes fittunt. Paratur c radicium corticibus sub terra mac-
 ratis fc fubinde decoctis ac dm tufis vifcum ad aucupia haud inutile. Matth. Dod> Vereniur cuj
 j. B. he MatthiDius mulra tribuerit Viburno qua: iint Rhois cum eadem aliquando putar, Ruc

jCircuis paratur optima aqua ad oculos. Lamtr.

Ruranoftra (inquit j uellmsj ^/k r w appd Ja Ji fluxu ferè inviflam, & ob id facibus ligandis
 utunur; prout & alibi fere paffan ubi provenk; unde peritiores Botanici earn Spiream Th
 phrafti elle exiftimant.

Grterum *ViburyHm* a viendofeu ligando diftum est: Viburnum enim non est alicijus particu
 ffUtij? norffin apud Antiques: a Recentionibus huic afori ut proprium tribuitur, quia rami s &
 g j t i n t i und Sc Lantana dicitur.

C A P . XIII

De Rboe.

i. *Kbits five Sumach* J, R *Rbus folio Ulmi* D B. *Coriaria* Dod. Ger. *ohfymorum* Lob. Ck.
Sumach five Kbits obfonigrum & coriariorum Park. CQIIIHOU ^Hinach,

RHUJ arbutula est, altitudinem hominis fuperans, parvulis ramis, fubhirtuto corrice, potest
 circa fastigia vdfittis { e quibus folia alternatim exeunt alara, Sorbi, quinq, aut i &
 CDijugationibus, ex intervallo Jongiu/culo dilpo/itis conflata., cofta: renui h'nim hacren-
 na; lingularia folia oblonga, acummata, hirtuta, ferrata- Ramulomm fastigia inter folia fo
 luftinent racemacim congefta Sambucinis fimiles [Czfalpino rubn & minutij quos Sc
 grana excipjunc, oibiculara, Lexiricul modo compre/Fa, rubentia. medu, Ja exigui, curicul
 x haud 4ltd de/andit, perfumma wfpituni/wrens.

Incollibus circa Monfpehum, prope Caftrum novum, &c Garrigues ditis copiose provenit. Clu- u-
fius magnum ejus proven tum Salmanticensi agro. efle, ifticq, qustus gratia diJigenter coli obferva-
vit. Multi finquit agri eo confin; nee minore lbi curaquam vineta, alioqui nee tam Izteafliir-
git, Be fi cultura abfit degenerat ac fylvefcit.

Czduntur fingulis annis enati firculi cubitales ad radicem ufq, aut firmam tclJurem, deinde
deficcantur, in pollinem rediguntur, & in ufum convertuntur ad paranda coria^ qui ufus in tota
Hifpania celebratiflimus habetur. Tardè fructus fios ad maturitatem perducit.

Rhus Pbnicum, Syriacum, Obfoniorum, Coriariunij Rubeum apud Galenum non funt arbores
fpecie diverfi. Sed Rhus Dbfbniorum nihil aliud est quam fiufus; Coriariomm quam folia Be
fruticis ramufculi; Rubeum quam ejus femem immaturum, cui major adfringendi facultas ineft
quam maturo, cujus acini quadantenus nigricant.

Folia &c furcubs teneriores hujus fruticis non minus olim quam ftunc dierum ad coria pfiffanda
perficiendaq, celebres fuiffè nos docent Theophrastus^, DioicorideSj Plinius: unde patet ea adfrin-
^entis K deliccancis naturae effe<

FruftUs ejufdem non minus ufitati fuere ad cibps condiendos, vel j&H IOCD, vel cum Sale mixti
ut Vetres teftantur, qui ufus etiamnum hodie à Turcis frequentatus^ft, uc fcribit Bellonius. Nam
in Heraclea ubi in vicinis montibus abundat, magnos faccos venales videas hujtis fructu plenos, qui-
bus contufis cum lale Be allijs suis cibus non infuavem gratiam conciliare norunt, apherfo hoc condi-
mento tam afflis quam elixiscibus.

Notac Sylvius Rhois fuccum efle vies Omphacii in Gallia Narbonenfi.

Cùm ergo (ut diximus) Rhois folia Be iemen aftingant, -refrigirent &C exficcentj hinc fluxum Vim.
quemcunq,, alvi, uteri, Tnenfium, hzmorrhoidum compefcunt, vomitum fiiftunt^ bilem obtundunt,
leu intusin jufculis Be forbitionibus lumpta, five extus, adhibita. Dentes denigrantj putredini Bc
Gangrxnae refiftunt: utilia experimento fe agnoviffe tradit Galenus ad cruftas Æ uvulae inflamma-
tiones. Gurnmi dentibus indicum odontalgiam fedat-

Rhi^nomenacepepit à colors coccineo acinorum. Avoce p5©-Latinorum ruffum manaffè con-
tendunt. Bod. d Stafil

Rhus non videtur pertinere ad hanc claflemob paucam velnuUam pulpam nudeos ambisntem;
Peritiore5 tamen Botanicis^ quos fequimur hue eamrefcrunt.

a. *Rhus Virginianum* C. B. App. *Sumach Jivi Rhus Virginiana* Park. **Virginian Sumach**
C.B.Fark.

Arbufcula eft Rhoe vulgari major. Rami ex ftipite pullulantes tenella cervorum cornua c crani-
nomodo erumperttia adD reFerunt^ ut obiter intuentem fallant : fimiliter enim hirfuci funt, eun-
dem colorem, eandem figuram haBent. Carfi aut vulnerati lac pallidum reddunt, quod brevi in-
gummi formam gaffecit. *Folia* alata muko majora quam vulgarisRhois, ofto, decem, aut pluri-
bus foliolorum conjugationibus compofita^impari extremum nervum feu coftam njediam terminante.
Foliolahacc^multo majora funt, acutiora; molliora, viridiora quam Rhois vulg. per margines ar-
gutè denticulata ; quodlibet uncias quinq, autfex longum. Folia fuperiora Jafmini albi folijs fimi-
lia funE. Spicè in fummis ramis. multo majores quam Rhois vulg. ad taftum molles Be tomentofij
craffi, fufcaè, c multis brevibus floccis compolitat, inter quos fe produnt multi *flofcutij minuti*, floccis
longè rubicundiore5; quos fequuntur numerofa *fzmina dense ftipata^ valde rubra, orbiculata
comprefla Lentium infar, quibus Be minora funt, fub cortice exteriore cutaneo nuculam parvam
nigricantem habentes, tetta, duriufcula nucleum album claudentem. *Radix* Jongè lacècj, fub terra
reptat, ftolones fubinde emittens, etiam procul à matre. *Fruetus
porus.

HujuspedeshumiliDr habeturin Horto Academico Leydenli.

^ *Rhus angustifoliwn* C. B. in *Prod. defcriptttm. An Rhus Virginianum hum'ih* Herman.
Hort.Leyd.

Inpaucis differtà precedente folijs, brevioribus nimirum, anguftioribus, minus prDfundè crena-
IS, Be minus viridibus- Forte convenit cum Rhoe humili Virgin. *HQTL Leyd.* Brafiliam agnofcic
matretn.

CAP. XIV.

A: *Cornusfzmina*Gzx. C-B. Park. *Cornus fzminaputata, T'irga fanguinea* J. B. C0e fritiale
C0rnut, o? 2?OJf fterrp^tree, o? ©attcr-tree, o? 3puzkmoob.

EX fructibus familia est quae Corbum feminam vulgo vocant, multis stolonibus junctis;
ramis plurimum oppositis, corace spadicis, sed ramorum sanguineo, odore vinoso praedita,
lucido alba & dura. Folia ad Corvi lacerz quadruplioniè ascendunt, atroviginis
quatu rubore alperfo, bina cu opposito nalcantia. *Florera* umbella gent odDratos, candidos, qua-
tuor folijs radiatis consistantes: in medio oblique surgunt totidem ejufd...
Hercu Moderatis vel Juniperinis yvres, sanguineis peculis appensa, primùm virida, per
maturationem nigricant, lacuna in umbilico parva perforata, in quibus villicularo pulpa vicante, acerba
mivaivj necne aiJ«ui-»»»» —r - V v— ^13 nuum, amarum. *L'gni* mat a-
ries, autore Matth. dura oflea,, Corno mimme cedens, virgis CornD tenuioribus, robustis^ nodolis,
C0rnut, o? 2?OJf fterrp^tree, o? ©attcr-tree, o? 3puzkmoob.

Gefalpingo t; i-cnis niger, ut in Ligitltro rotundus, ofls binas cantateshabentc, in quibus iinguli, feminrt connentur.

Lean,

In lepibus & sylv: I fen fruteflis paffim provenit tam in Anglia quhn in extern reglonibus. /Eftate flora. Bates Septembri tmturanrur.

Ugnnmlaniontbus ad verucula conficienda in frequenti ufuf eft; nam durum admodum eft & j-cniteus, necq; carnes facit. penetrat exacucum. Trams ad utenfilia & rufica inftrumenta, po-

numm... ad carnos pertinentia conficienda expen ferbit do aurabonitum. Carer. tradit fealos ex hujus ligno aquam stillatiam elicere, qua foli ftremas ffiqua id fieri poffit ratione) penins difcunt; fua nimis maturare parum & diminuire.

Fructum ingultabilen i omnibus animafibiH produce Corniis fcemina. At Csfalpinus ^ turdis multum expen afferit: ^Li contj-idic*Do!io!ta:us, b.ucas fapore ingratas, & vokrem nulli dehaeratas eife (cribens.

Anamenta roa in a Tridemmo oleum ad lucernarum udini conficiunt e Cornus fcemin« baccis decocto prim» in aquaj dekide torcukri exprcQk Manb.

In daorofis a cane rabido eundon habere emSbam dicitur hujus lignum qnem habet Corm maris.

Modestius in I. penult, ffi ad Iegem Pompon, tie parricidis, antequam Gcco p.tricida; indereii- dlr> ostendit (more fuifle ponmm, sc virgis Eanguineis CEdeicnmr, necropeex hac arboreJiimp«> non, ut quidam legunt, fagineis, autj uc .Un incerprtsntur Jai^uine rubentibus, quopiam n«^{elii} ci: mms habentur & m ixime infamc. Afojfiwj & ex oo Dohcbamp.

Ufac ibus Vfrga (anguinea dicta est Jiac arbor; ni potiikguod virgx ejus magtia ex p ante rubeant languinis inflar.

CAP. XV.

Be Rhamno.

RTT... neminis exymon non occurrir, • fa «oant Fmrices^uottatn Bacdfcrw fpanofos, quo- ram nonnulli fructu fant

moJTOpvreno, l'tms loops validis qui hulus loci hint

1. Rhamnus fpani oblonga, fere candida, n a B. cortic* tifo MonfatUnfu J. B. frimm Clufi, fm alia Ger. fexunda Monfatium, fivt prints Clufi Park.

7. B. Frax est magnus, totas fpinis armatis, incabdice quidem magnis utOxyac i&is, & quod oblei vatione dignum, grandiores illi ...-TMJ r..... ramulis minoribus, cortice albicante: & mat aculcas parvojj non minus rigidospungen- ciccere longi, rigidi, acuti, ex ramis crani, alios p mat aculcas parvojj non minus rigidospungen- tift, eodem loco fella magnitudine vari i, Rami utw darn fpinis cortice teguntur eificreo, folia luffimant Sabes, terna aut quaterna, indidem orta, fraeilia, cinticantur, fuccdenta, nuiioinfigni um thii.i magna, Jj>nr parv«:] Fkni pauci, Laurcolae {olio - [lubcosnJei j. -8.] extremis oris in quinque cre- decado fimiles, parvi, longuiculi, candicante - uinis quodtiam rtidiraeatam relinquir finquit Clu0 At Ca;fal- na drcit: quibus decalombis fer- pino obfervantur baccas for n

1-***

1) Liffitanicq; Galit Narboneofis lods, autore Clufio. Noe circa Mon- Libem copiofitu obfervavit. Floret Martioj pariter atque Au- 3 (uccreictirtv folia, interdum dccniua.

Ufa.

Haps folia Salvia... icx & alus quibufdam Qaftella; lods, aittore Clufioj cum turionibus ex oleo Hi nienfis; nonnullatii enim acrimoniarn cum aciditate conjuniS.ini habeatj q^ut conciiat.

2. htmml frlmi Clwf.i fptckt aliera J. B. Park. Rbamnm niter Qlufti flare pstr^reo Ger. einac. alter fiau f lps, fiere purpttree C. B.

Cluf. obfervante Clufio, primo fere fitnliis eftj icd luimilior, & frequentioribus ramis fruticans; & magis carnortSj (alloque guitij fuperiore c*idior : Flsribtt: ejufdem plane turn illo formo, fe purpureo plan

Uno tantum lico itivcmr CliiliLisjuxwHoriveianmrbuin, Orcelim Vetenbus didamj ac flumen lunc Stgaram appellataro,, Itegni Valentini extiemis limitibus.

A, J• ':-• • <timut Salkii folio oxgnfte, fruffu flavefante C. B. futmtus Chtfu Ger. cm Dejardis Labelo fve Uurdk Park, Khumnm -velQleafter Germamait}. B. Ballaw

Thorn, o jogn.

Frax est tricubitali altiti:dinc, quibusdani in locis .trboretca^s, at ramis rigidis & frangi con' rumacibus; Olix totis sed angulioribus us, Jupeiiie viiidibusj mra-ius candicajntioLis, perpetuis. W*/- eul totis ramulis adnalcantur ad blioram exornis Jiiibacci, muicofi, qiubu? fuccdunt b-ttc.t Je« acim rotunditate fe magnitudine .iyrtij in ic nunitirofa congerie racematim compa&j' j^{3t} alH⁸ arde appaati affruq; pccaligoo penoii appendicj colore rlaveicentre ac lutco, niaturrate crocato, fapore acido ac peracido, unco minus oiideo ant vin«ceb, non lapitlofb ut Corni, JTM^1* j*?y * hta facile atteratur. Baccz per totam hyunc .nvrgisadhxielcunt. Kadice niritur muklfad^ dituaia- To

Pro-

Provenit in arenosis maris littoribus prope Satidvicum Cantii oppidum Be Delam. Item in maris firnis aggeribus Lindfeise Lincolniae copiose. In Galliae etiam & Hollandis maritimis plurimis locis provenit. Nos in arenosis prope Auguftam Vindelicorum Dbferamus; inq, glareosis ad Rhenum & Rhodanum amnem.

Floret junio, post Autumnum demum baccas maturat, quas subinde (ut diximus) tota hyerne Tempore retinet.

De viribus nihil certi traditur. Scribit Carrier, adinos purgatricem habere facultatem à quibus clam affirmari. Addit camen, parari ex cis Robj quod vehmentur acidum fit sic attenuans incidens ut Berberisfere, commendarique ad dyfenteriam: quae quomodo conveniant in quibusdam.

4. *Rhamnus nigra Theophrasti* Park. *Urtia Clusii* Ger. *Jurtia Jlorhrbau* baccis nigra CB.

Clus.

Fruitus est, frequentibus ramis spinosis feribis nascentis, & c Pruna sylvestris ferentis magnitudine, cortice nigro laeis, & longis (pinis armatis. Folia ex quibusdam Cuberculi ut in prioribus multa simul nascuntur, longa & angusta, carnosa viridia, lapidis adstringentis, & c Rhabarbari faptem utcumque referentis, perennia. Flos veris initio parvus plurimus, & c Inferum juxta folia nascens. Flos nigrum fructum fert, parvo Pruno sylvestris fimbriis rotundum aereum.

In incultis Granatenfis Be Murciani regni locis invenit Clusius inter alios fructus frequentem: ad quem postea missus est ejus fructus ex Hispania Lycii nomine ex quo natus plantae.

Lycium Hispanicum Lob. Historiae Ebrodunensis auctores conjectantur non diversum esse ab hac Rhamni specie cum Clusius unam tantum plantam ex Luis Lycii nomine donacam in Belgio provenire tradat (himirum hanc non duas. Vide locum.

Fruitus decocto membra relaxata & diluata atque etiam podagra: dolores utiliter foveri incola referent.

CAP. XVI.

Copiaba Brasiliensis Marggr. Arbor baccifera Brasiliensis, fructu monopyreno folio sesquipedali.

Arbor est altaj corticcinerco, superius in ramos differtur, habens obovato-angulatis longis majora minorave, bina fimbriam opposita, in extremitate tria junguntur & funeque oblonga, acuminata nervo & venis paulum rufescentibus, superius viridiora, inferius diluta. In extremitate ramorum mulci sunt congesti ramuli, quibus folia infident; ibidem & c proveniunt rami fidi. (quos tamen Auffvr non deseripit) quibus succedit rufus baccis Lauri magnitudine sic figura, initio viridis, per maturitatem niger, paucissima carne fibulosa, a qua cutis craffiuscula Facile detrahitur. Lapidem continet ovalem, hanc durum nucko alba Farinacei (aporis, non eduli; fmsu tamen comeditur: exfuguat Brasiliensis fuccum & c expuunt cutem. Macurus est mens Aprilis.

Folia huic arbori pinnata sunt pluribus foliorum sesquipedalium conjugatiotibus composita.

CAP- XVII.

Arbor baccifera Brasiliensis fructu Piperis resipiente. Tindaiba, nonnullis Ibirá. Pifoi.

Fifv.

Juxta Olindae promontorium speciose ut plurimum naschens ob acrimoniam fructus extersaque qualitates Piperis Brasiliensis aemula. Folia fert exigua & acuminata, Be Oliva: foliis similia. Lignum ejus tenue, Præcerea est admodum arbor, & c in fumam alitudinem restat affurgit.

Mensibus pluviis acini illius virent, sed maturefcentes mensibus Decembri Scjanuario rubent, at decidunt: qui si fuerint deficcati nigrescunt, uruntque linguam, & aromaticum quid sapiunt, ablatofemine nigro oblongo, quod in illis continetur, quod Juniperum redolet.

A jejuni manducati stomachum debilem corroborant, Be discutunt flatum. Tiim contusi sic applicati moribus serpentum medentur. Ex eisdem fructibus in pulverem redactis Be exsiccatas gargarismata conficiunt contra frigidum gutturis affectum. Excoquantur ut referentur in officinis. Culinis quoque vicem Piperis prestant.

Exarborii denique gortibus funes igniarum, quibus milites ignem foveant, conficiuntur.

CAP. XVIII.

Baccifera Indica trifolia, fructu rotundo multo firmo, pediculis longis, Mvago-Mtnam H. M. P. C. T. Xj. p-49- Cerafo affinis.

H.M.

Arbor præcerea est, caudam craffius, multifidam, ramulis rotundis, viridi-flavescentibus aut timentosis donata: Lignum denudum albo-flavescentis, cortice mucosum craffius, cinereo, aspero. Radix rufa, graveolens, infipida. Folia terna simul juncta petiolis longis, rotundis ac timentosis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, lupernè lanuginosa, inferne

Infernè lenia, nervis aliquot è cofta media, viridi- albicante ordine parallslo *m* latera excurrentibus: odor &c lapDingratus. *Flofculi* numeroſi petiolis longis ac lanuginofis infident: conftanc ii unico, rufo Be pilnfo foliolo leu calyce, *fiaminulis* tribus candidis *apkibus* ornatis medium occupantibus. Singulis folculis finguk luccedunt *bacuz*, rotunda:, atro-virentes ^imum, dein viridi-albicanes ac lanuginofi, carne intus vifcoſa ac fubdulci refertj: ¶ intra quam *fmm* continetur folidum, albicans, nucleo candido.

Locus. Nafcitur fylveſtribus Regni Malabarici locis, p̄fertim in *Tarn*: femper viret, floret & fructum fert.
Ufus in medicina nullus.

C A P. XIX.

Irutex Indicus baccifer hexaptalosifruftu rotundo monopyrmo 'nigro. I. *Tsjtrou-Paml* H. M. P. 5*
T. 16. p. 31.

H.M.

ARbufcula humilis eſt, atque tertium genus *Narum-paml* ſuperius deſcriptar, cui turn caudicej turn radice & crefcendi modofimilis eſt. *Folia* fine ordine ramulis inherent, obJongorotunda, acuminara, craffa, denſa, glabra, fupernè atro-viridia Be iplendentia, infernè nibviridia, coſta media craſſa, è viridi flaveſcence- *Flores* rotundis., viridibus ac JanugiHofis petiolis circa extremos ramuloſproveniunt, rubefcentes, calyciq, exiguo, fubviridi, ac tripartito inherent, fexobbngo-rotundis, cupidatis, acftellx in modum expanſis foliolis conftantes, medium occupante *capitulo* globoſo, albicante primuin, dein ruſefcente, punctis minutiffimis infuperficienq-tato, quod ipſius fruſtus rudimentum eſt. Floribus fuccedunt/r^/ rotundi, nigricantes, glabn, carne intus fucculentra acido-dulci referti, intra quam *officulum* continetur rotundum, nigricans, w *chum* includens albicantem.

Locus. Crefcit multis Regni Malabarici locis, pradertim in *Angiccaimaal*; femper viret, floret, tructumq, fert.

Uſus. C^terum expreſſiis e fonis fuccus, Be cum opn tantilJo in imtio febnum mtermittentium exhibitus iUarum paroxylmos micigat. Ex iiffim in aqua communi coctis femicupiumparaturad arthriticos doJores placandos.

a- ~~Arbufcula~~ H. ^ P, J^ ^ J^ h II* YrxcdtM* frutkk minor ſpeacs.

H.M.

Arbufcula eſt humilis, quatuor circiter pedes aJta, *vaukz* tenui, multifque ramulis fubviridibus donate; Lignum albicans, corcice cinereo, intus viridi, faporisacris &C aromaticumunitum; necnon ruſefcence ac fungoſa incus medulla /efertum. *Radix* verò infipida, inodora. *Folia* obJongorotunda acurninata, craffa, deiiJ^glabfa, fupernè atro-viridia 6c fplendentia, infernè fubviridia, nervulis aliquo tenuioribus ac vix conſpicuiſe coſta media viridi-albicante in latera excurrentibus; odor grams, fepor fubacris. *Flores &c Fruſtus Tsjtrou-panel* floribus Be fruſtibus fimiles.

Locus. Nafcitur locis montanis circa *Mangattl* femper viret, floret & fruſtum fert.
De viribus autem nihil conſtat.

3. *Kahſjerou-Taml* H. M. P. 5. T. 17. p. 3; . *Tamil** minor foliis rminorilm aromaticis.

Arbufcula humilis eſt feu potiusfrutex, atq, quarta *Narum-panel* ſpecies, pra-cedentibus haud abſimilis, pnterquam quod folia minora fint, oblongD-teretia, acuniinata, fuave-olentia, aromatica.

Locus. Provenit locis moncanis & petroſis circa *Paracaro*; femper viret, floret, acfru(2uni profert.
Vinbus cum *Narum-paml* conveniſe

CAP. XX.

Corimi-Panel H-M. P. ?• T. 14. p. 17. *Frutex Indicus baccifer^ jbrz bexapztaoj frHfln rotund^ racentofij mmopyreno.*

H.M.

ARbufcula hxc *Narum-paml* ſuperiis deſcripti altera ſpecies eſt, fimili^ue modo, ac pari altitudine excreſcit. *Radix* albicans, cinereo ac lanuginofa cortice teſta; faporisacris, odor aromaricus. *Folia* fine ordine ramulis inherent, obJongorotunda, acuminata, craffa, denſa & glabra, nicentia, ſuperne atro-viridia, inferne fubviridia, coſta media craſſa. *Flores* racematini proveniunt, conſtantq, fex viridibus, oblongo-rotundis, ac extrorfum reflexis foliis, medium ^{alm} pante globulo piano rotundo, viridi, qui ipſius fruſtus rudimentum eſt, Floribus luccedunt *bacc** rotunda:, primum virides, dein rubicund*, came fubdulci intus refenx, intra quam *vjjiculum* locatur rotundum, rybro fufcum, *nuchum* continens albicantem.

Locus. Publicm Malabar, Bepnfertim locis arenofis ac pgtroſis in *Candtnatt*: guotannis Rvret, ⁱⁿ *Ar*, medibus viz. Julio & Augufto.
Vinbus cum *Narum-paml* conveniſe

CAP. XXL

Arbor baccifera-Indicaraczmof tetrapetafo florz, fruffu rotundo monopyrtno. Kasjavo-maram H. M. p. 5. r. i? . 2. 37-*

H-M.

ARbor est iusta: magnitudines, caudice mediocriter crassa, multifc, ramulis nodulis donato. Lignum praedurum, albicans, furvo cortice munitum. Radix fibrata, albicans, rubicundo cortice cintra, inodora, fubastringens. Folia geminata ordine parallelo ramulis inhaerent, oblongo-rotunda, acuminata, glabra, nitentia, fuperne atro-viridia, inferne fubviridia, fib-acido-astringentia. Floscti modon, fubecerulei primum, dein purpurafcentes, ad foliorum exortu racematim furculis proveniunt; calyciq, exiguo, rubicundo ac quadriparco inherent, quatuor fibrotundis foliolis conflante Sj odto ftantinulis, rotundis apvibus, ornatis medium Decupantibus, inter quxftilus prodit tenuisj furrecaus. Fruttus rotuddi, glabri, nitentes, virides primunij deinalbicatites Be fubecerulei, tandem coeruleo-nigricantes, carne intus ctEruleo-albicante, fucculencia dulgiq, referti: intra quam officulum continetur, nucleum includens albicantem.

Crefcit locis fylveftribus circa *Lochin*: Semper viret, floret & fructum producit.

Locw.

Ex arboris foliis cum viridi curcum in oleo coctis linimentum conficitur hyatidibus pellendis mile. *Vires.* Foliorum ficcus cum lintis pone aures positus ly?pitudinem curat. Ex radice in oleo zytz litus paratur contra Arthritidem Be Cephsalam.

CAP. XXII

Eaccifera Malab.floribus fpicatis diptalis, fruffu rnonopyreno. Watta-Tali H- M. P.5. T. 31. f. 63-

ARbor est iustae magnitudinis, ID circiter pedes alta, caudice mediocriter crassa, multifc, ramulis in orbem diffufis donato: Lignum albicans, denfam, cortice munitum crasso, furvo, incoctisaporis unftuofi, necnon medulla intus refertum flavo tcente. Radix itidem furva, fibris, aculeis, aculeis. Folia fibro-rotunda, acuminata, oblonga, rotunda, petiolis circa ramulos puvantibus, fuperne eleganti virore fpicantibus, inferne fubviridis, inodora, fimplicia. Nervis abiguat: media caula viridi-albicantem, hirsuta, & in areola parte extulstante, in latere extulstantibus. Flosculi ad foliorum exortum fpicatum proveniunt: Sunt ii gemmae rotunda, mucofij viridi-flavefcentes, qux apertae duobus collant foliolis, binis ftaminulis tranfverfis, extenora verfus reflexis, pluribusq, flavefcentibus apicibus ornatis. Flosculis iiccedunt Bacca rotunda viridi-flavefcentes, inodore K infipida, unicum intus includentes/cwewrotundum viride.

Provenit variis Regni Malabarici locis, praefertim circa *Cranganoor*. Semper viret, quotannis floret, fructumq, fert, Januario viz. feFebruario menfibus.

Tempus.

Arboris folia cum viridi Tabaco 8c Oryz infuio trita, aculcibus inveteratis Be verminofis im-*Vireim* poita, potenter iis dementur. Ex iisdem in aqua coctis balneum paratur, adversus algidas febres. E floribus Be frudlibus uontufis; & c in nodulum colligatis, lacteq, mulisbri mcoctis conficitur errhU num, quodalgidis febris mederi fertur.

CAP. XXIII.

Arbor raamofa Brafiliana foliis Apocyni Breyn. Cent. 1. cap. 3. finz nomine Marcgravo defcripta & dzpitfa, Lib. 3. cap. 18. p. 134.

Breyn.

ARbor est Prond alacundinem affigens, ramis perarcentis, umbram jucundam fpargentibus, fca quodeternendo deorsum infilant, cortice cinereo cedis: Quibus Folia gemina in acutius ramulata, ducunt sibi invicem opposita, brevibus pediculis appendent, magnitudinis & figura Apocyni! Clufm duriora & rigidiora, fuperitis lzvia Be hilari virore micantia, inferius propter denfos Be lubtiliffimos pilosmollifcula infar Serici atque ex cinereoargenteoq, colore fplendentiaj nervo confpicio per longitudinem, Be compluribus venis in latitudine prsdita- Ramorum faltigia inter Folia Flores in peculiari pediculo triunciali, breviffimis petiolis more Berberis, numeros & densius dependentes racematim fuffinant, & quaternis vel quinis foliis flavis congestos, multis in umbilicis arboris ftaminibus pallidis & fubulibus praeditos. Quos Saera fandiari accipiunt: rotunda Ribefis magnitudinis, sed latei coloris, quoniam ex fucus observare licet. Matrica est alba & lenta, Salis ligno fuffia.

CAP.

CAP. XXIV.

*ArhrBacciftraIndie*fruttu cufpiJatommopyrevo. Mala-Voenna H. M. P.\$ T.jp.ii.*

H.M.

ARbor est procera, caudice flavescente, cortice obdufto cbjrulo-albicante, rugD/b, necnoil ramulis Jubcinereis aplanuginofis, in orb em diffusis, ornato. *Radix* rube ft ens, furvo cortice cinftajamara. *Folia* brevibus, craflis ac hirlutis periolis denfâ congerie circa ramulos proveniunc, oblongo-rotunda, craflis, denfa., glabra, fplendentia, fuperne atro-vindia, inFsroc^o fabviti-
Tidia aplanuginofa, media cofta crafla, viridi-albicante^h hirtuta :apor amarus. Interim ipiis ramis
Gemma proveniunc fubvirides, exigui, rotunda:, quadripartite, quibus apertis quinque prodeunt/o/
culi, quatuor vel quinq., oblongo-rDtundis, viridi-albicantibus, ac inferiùs fubrubeftentibus faliohs
finguli contantes, otto vel decem albicantibus furreftis *fiaminulu*, flavescantibus *apicbut* ornatis,
medium occupantibus, fofculis parimodo fuccedunt *bawx*, oblongo-rotunda: cum cuspide in vertice, r j i d f f o,
glabrs, nitentes, laponis fubaman & aromatici, unum^h intus. Ne deum continentes.

LOCK

JMalciturvarm RegniMaJabanci Jocis, pra/ertim in Rapoljn: femperviret, quotannis floret, fru-
ctibus fert.

Virts.

. *Folia* aim ficcato Elephantis finiD in pulverem redafta, 6c reliftis poll curatas variolas *akufcibis*
InlperJa, iildem meden feriuntur.

CAP. XXV.

Fruttx Indkus bacciftr fruttu ractmefc cufpiJato, Ribium Jmili, monofyrzno. Tsjtriam Cottam
H.M. P.f.r. II./>.ZI.

H.M.

ARbucula est humilis, caudice candido, CDrtice ubdufto cinereo, inodoro, acri. *Radix* AT
bicans, acris, inodDra. *Folia* craflis brevibiffque petiolis circa ramulos proveniunt, oblongo-
rotunda, craillij denfa, glabra, luperne viridiaj inferne fubviridiaj cofta media albicat:
ftpor adfringen5 K; Jylveftis. *Flofculi* racemntim provequnt exigui, fuaveolentes/ con-
ftant ii quinq, viridi-fucfis, (fibrotundis ac expanfis foliolis, quinq, c'viridi flayefcentibus *fiaminulis*
medjfirif occupantibus: inter qua: *fylus* prodit terims, viridi dilutus, upitub fubrotundo. Flofcujis
iucedunt *baccx* rotunda: cum cuspide in vertice, primum vindlalbi&ntes, dein rubeftentes, carni
inrushmana laponfque acidi refeita:, Ribibus noftratibushaudmultum ablinales, praterquam quofl
unicum rantummodo in iingulis continetur officulum fcabrum, albicans, plano-rotunduni.

Lozus\

Crefcic multis in locis regni Malabarici, prxfertim in *Warapoult St Fahrti*: femper viret, quo-
tannis femel, nonnunquam bis floret fruttumquefert.

<ft/

Ex arboris foliis in aqua coftis fit oris collutio, gingivis flaccidis ac pratumidis curandis utilis.
Etiam ex cortice in fero ladlis cum femine cumini decofto gargarifina paratur, quodaphthis poten-
cer meden dicitur.

CAP. XXVI.

Kari-vetti H. M. T. 4. T. fap. 111. Arbor bacciftra Indica racemfa^h acinis dlongis monopyrwis,
flor? tetrapetalvuk.

H.M.

ARbor eftrafdiocris magnitudinisj caudice crafla, flavescente^h CDrtice obdufto cinereo, mul-
tifqus ramulis rufis ac quadrangulis donatp. *Radix* fibrata, albicans^h coitice cinereDj in-
tus JLifo teda, madeira, laponis acris. *Folia* bina & bina fibiffafejern oppofita, ublongo-
rDtunda, acuminata, in ambicu ferrata, crafla, denfa, ^ibra, atrc^h Bpdia, (ipernè fplendentiaj
in^h rri nequaquarrij inodora, in^h dila: fofta media atro-^h Tenella folia c ramis prodeudtia
pnmum rubcinerea funt, dein purpurea, tand.Smque atro-vindia evadunt. -F/o/cw/i^h extremis furcu-
lis racenianini provenJUH, exigui, fuaveolentes, infpidi, purpurei: confant ii unico foliolo, fed
in quatuor prohindas lacinias divilb, fie ut plura videanturj binis *Jtamivulis*^h luteis *apicibm* ornatis
medium Decupantibus. Flofculis pari modo fuccedunt *bawx*, oblongo-rotunda:, rubro-ccErulearj
intufque carneiucculenta & amara refertx, intraquam officulum locatur candidum, glabrum, nu-
chum includens albicantem^h fubamarum.

L.oeni

Nafcitur ubique in Malabar, przfertim^h circa *Cochin*: femper viret, quotannis fruttus fert, m^h
viz., Augufto, diiique frugifera manet.

J.ocr.

Siccus efoliis hujus arboris expreffus, Sc cum fero laftis exhibitus egregium eft vomitoriumj h^h
m^h blyofoc puifofDS perfipiora educendo vejtriculum potcner expurgat.

CAP. XXVII.

Vahfiam H-M. P. 4. T. ji. p. 67- ^rW Bacciftra raczmofa. Vitu pribm.acimr aujcongʒʒ, comp-
prejjiis monopjrenx.

H. M.

ARbor eft praecelfa atq̄ie fpeciofa plurimum, altitudine 60, craffitie feptem pedum menfu-
ram circiter squans, multilque ramis cinereis in orbem longe lateque riiffiifo donata; Lig-
num atro-purpureunij glabgim ac flexile, cortice obduftum nigricante, craffo, molli, intus
slibicante, qui inciliiris alicubi vulneratus illico purpureus evadit. Radix fibrata, albicans, ffrivo cor-
tice tefta. Folia geminata online parallelo tetiuoribus ramulis inhaerent, obJongo rotunda, glabra
mollta* fliperne colore atro-viriti nicentia, infsrne viridi dilutiore. Floras ramulomni extremis ra-
cematim proveniuntj exigui; Vitis viniferac flofculis perfimilesj inocjori, inhxrent^ calyci exiguo,
fubviridi, quiuor acuminatis ac viridi-flavefcenctibusfoliolis Conftantes, u&u flaminulis a/bfcantibus,
flavefcencibu5 apicibt/s ornatis, medium occupantibus, inter qux ftylas prodit fla^efcens ipfius FruAns
rudimencum. FruBs/s pari frstilitate fluribus fiicedunt, ac icidem racematim pr&v^timntj uvarum
aut ribium adinfar, fuintquebacuac oblongo-rotundac, compreflac^ virides, tenui corrice umdtx, in-
tufque came fiicculenta ac infipida refertar, intra quam olligulum locatur viride, obJongum, com-
preffim, nucleum includens candidum, ac psnè infipidum. Inffiper prater genuinDs hujus arboris
fruftus qui floribus lucceduntj alii arboris daudici. 6c ramis undique adnafcuncu^ genuinis fruftibus
majore5, rugofij forma renali, viridi-dilutD cortice tefti, carnèque viridij ifenfa, at iuu/nida, fapo-
rifque acerbi incus referti, intra quam exiguus ac rubicundus vermiculus fiibinde AD/pitacur. Hi
fruftus nihil aliud funt quam Gallx Jtu tumorz ex infetorum yuncHunibm excitati> ut Jint ouorum rz-
ceptaimla& fetuum tzmrorum alumna.

ProVenit ubiq̄ie in Malabar, locis viz. petrofis necnon in ahciquiffimarum xdim teftis: quo-
tannis maturos exhibec Fruftus, Novembri ibi. BcDecembri merifibus: cum verò floret antiquade-
cidunt folia^ iis prscfertim inlocis ubi flores emmpunt j atque fobolstafa ab anno decimo ad quin-
quagefimum & ultra frugifera manet.

Ex ligno autpm hujus arboris enfium ac cultrorum vaginæ conficiuntur.

Cortex pulverifatuSj Be cum biituro in unguenti formam redactus fpa/mo cynico^ aliifque con-
vullionibu5 è gravibus vulneribz ortis medetur; item ulcera qux^is maligna dolorè/que arthritises
ianat. Infuper corticis hujus fuccus aphthas curatj 6c affumptus dyfenteriac remedium eft. Idem cor-
tSX cam cortice Codam-pulli in pulverem redactus & exhibitus alvum movet, humorefque pituitiofz
6& atrabilarios ducit. E fWuis & cortice in aqua coftisSemicupium paratur fbeminis panturis, ut fa-
cilior 6c felicior fuccedat partus.

C A P . XXVIII

MaUam-Toddali H-M. P. 4. T. 40. P- 85. Baccifera Indica racemofa, florum ftaminulz hini5
azinis monopyrenz. Ex defcriptione flos fummo fruttui infidrt -vidztur, undc perimt ad genus egʒ
riqp qu<e fruftu funt umbilicato.

HM.

ARbor haze mediae magnitudes eft, caudice craffo, denfo, albicante, cpruce obduftofurvo ae
glabro, necnon ramulis lubviridibus 6c lanuginofis ornato. Radix albicans, rubicundo cor-
tice cinfta, fapor acris 6c amarus, odor aromaticus. Folia brevibus ac lanuginofis petiolis
alternatuii ramulis inhxrMMtobDIigo-rotun^a, acuminata, in ambitu ferrata fc horrentia3 fuperne
atro-viridia, infernè fubv^H nervis aliquot è media coftain latera ext?urrentibus; iapor acris 5c
aftringenj odor fuavis. ^ffull circa QHTUIDS ad foliorum exortum racematim proveniuntj fiint-
que gemmulx parvz, liibvirideSj è vertic^uo candidiflima/«wiv«/« pilis plumatim obfita, velut duo
exillia cornua, tranlverfim emittentes: odor nullus, fapor acris. HSE verp gemmulae maturiores/r<<-
Bm ennfituunt, iique (iint baccae exigua:, vindeSj carne iucculentā 6c amara refertx, intra quam
exiguum locatur ofliculum glabrum, rubicundum cum xiucleo intus, (apore Ceraforum nucleorum
scmulo.

Provenit locis tnotaniSj attamen humidis ab imbribusfrequentibriiis, necnon in fluminum ripis
circa Uombottoi quotannis fruftus frst, Septembri viz. 6c Oftobri menfibz, atqueper 6a non raro
frugifera manet annos.

Arboris hujus partesj radix, cortex, folia, fruftiisj fpecificum habsntur adv^rfus Epilepfiani, Phre-
nitidem, fimilefque cerebri morbos remedium.

CAP. XXIX.

jippel fit* Nafla AppzUa H. M. P.I. F. fx. p- 99. Arbor baccifra Malabarica flare ~~ambrosia~~
odoro, fructu rotundo monopyrtno, Tetrajroma Indica.

A Arbor est mediocris altitudinis radice crassifolia, plurimas fibras pilosas transverfas ~~compositas~~
colore croceo, ut Be odore; vaudice quingue aut sex palmos crassif, ramos surrectos in altum
diffundente, ligno albicante, medulla ruffidifca. Surculi teneri virides funt, quadrangu-
lares, Be in unoquoq, latere iulco ftriati. Folia bina 1£ bina petiolis brevibus rotundis infi-
dent, oblongo-rotunda, anterie brevif Be angufta cupide, ad pSolum rotundá orá, in oris fliperi-
bus minutis ac rarif apicibus alia magis, alia minus cminentia, texturá crassifufcula, folida, ac ~~subtilif~~
plana, glabra, fiperne obfcuro virore nitentia, fubtus dilutiora, Ddore acuto, haud ingrato, ~~in~~
amaro 6c fibacri. Cofta: Be nervi fiint viridi-clariffima. Flores umbellatim proveniunt, ~~in~~
parvi, albi, feu ex viridi dilute albicantes, quatuor petalis^ minutis Be rotundis compofitij uno ~~in~~
iculo Be Jatius fe aperiente, magis etiam albicante quám reliqua ffiamina quatuor tenuia, albic ~~in~~
apicibm rotundis albicantibus dotata continent myfylum-tenucm, albicantem, feu viridi-dilutum, bi-
furcatum, viridi globulo, qui ex calyce rotundo emergit, ac primordium fructus est, infidentij
odoris fortifnon injucundi. Floribus fuccedunt bacca rotunda:, quae cum immatura: flint colons VI-
ridi-diJuti, maturz autem magis fufci feu nigri, intus officulum rotundum continentes.

Semel in anno fert flores Be fructus.

Vires.

Decoftum totius plantis in fomentis fie lotionibus capitis totius corporis, Be fpeciatim arthnticis
conducit-

Radix contrita fie epota cum aqua lienteriac conducit; item cortex contritus Be mixtus cummelw
in cacaplafniate- Radix cum aqua marina codta fedat dolores podagra:-

Oleum ex radicibus, autpotius earum corticibus extraftum, tenue est Be daruro, colons aureo-HaVi
& rurilantis, odoris vegeti Be pergrati, faporis fubaens Bfubamari, pro deft in febre frigida., uti K
doloribus ventris flatif^ difcuuc unftum in panibus ~~in~~

CAP. XXX.

Draco arbor Cluf Ger. J. B. C. B. Park.

Cluf.

P Rocera est arbor, Pinum procul intuentibus referens, adeo xquales femprque virentes font
rami, Hujus truncus crassus, odto auc novem cubitales r^ww, zqualicer nafcentes 8e nudoSj
fiifinet, qui in fummo fiffi in alios ternos aut quaternoſ ramos, cubitales aut paulo ampli-
ores brachiali/que crassitudinis definunt, nudos item Be sine foliis, in flimmoftantes capita plena
cubitalium foliorum, unciali latitudinis paullatim in mucronem definentium, media cofta denfior
fle eminentiore, ut in Iridis foliis, tenuium Be rubentium in lateribus: mucronem planeprepararfs-
tanc ea folia, femperque virent, Be Aloes vel Iridis modo invicem amplexando nafcuntur. Truncus
perquam scaber multis rimis dehifcit, humoremque fundit per caniculae zftus, qui in rubram ia-
chrymam denfitus, Sanguis Draconis appellatur, ob quamianc caufam arborem hanc ©raconern
nuncupavit Cluius. Materia trunci firma est, ferriimque difficulter admittit, tffba. veluti fibrif
tranverfim Be oblique excurrentibus confter: at rami cum multoluccoprargnantes fint, latis facile
czdi pofTunt.

L. 104.

Olyflippone primum vidit Cluius pbft monasterium S. Virginis Gratia.

Raiius fructifer ab hac arbore avullus, Be ad Clufium ab amictfquodam miffus, pedali amplioreVC
longitudine erat, cui inhxrebant alii ramuli mulco fruifu racematim compafto onufti. Frufti co-
lor Havefbens, lapor aliquantum acidus, magnitudo exigui Ceraii. flip^m fummis ca pi rib us nafci
verifimile est, ut in Palma daOyli nafcuntur, /path á ^ i e n ut ill^pbludi non intellexi, in quit:
Clufius. Hujus porro arboris recentia capita tenella iunt, 8e humilium Palmarum five Chamarrhi-
phus modo, cufus cerebrum in deliciis est, edipoffent, nifi amaritudo prohiberet.

Sanguis Dra-
cwij. quelcens,

In infula Fvrtus fanti { h Canariis un^ eft) propè Maderam provenire auftor est Aloj^fius Ca;
damuftus: in infula Mad era Thevetus: in colore baccarum differunt. Nam hie flavum dicit, cui
fubferibit Clufius; Ille Venetum, id est, creuleum. quae quomodo conciliari poffunt, inquirant alij-
Cztemm Sanguis Draconis Officinarum Gummi est fcuRefina obfeure rubra, igni admota facile Ji'
cwij. quelcens, inque eum nijefta flammam concipiens, non tarn en lu cui en tarn; compreffii aut ~~in~~
colorem ruBrum fanguineuni, feu cremefinum vegetum, reddens; aegrè tamen Be difficulter li ~~in~~
quovis, Icu aqueo feu oleoio, folvitur iivs permifcetur.

JYWI

Aditringendi vi pollet, ejiifque ufus non infelix est ad muliebresSe dyfentericas fluxiones, ~~in~~
tas excr caciones, firmandos comraotDS dentes Be roborandas gingivas. Jm Bauhmus ft nuUam infis-
wrn -vim ammdc<vmiffit feribit m Ugitima ad reprimendos fluores [anguinis. Aurifabris Be Gemmar^{is}
nium ejus die Incbic Parkinſonus ad encaufta, Be fuppoiiti pro folio, fut vocantj adgemmas ~~in~~
lapices pretioſos illuſt^{is} & n^{is} indiores reprafencandos: Vicriariis etiamad vicra colore ~~in~~
tjngenda, pro feneftris, & LL-

C. 104.

Plinius

PJinius Be Solinus, qui Cinnabarin Indicam fanguinem feu faniem *cffb* Draconis elifi Elephanrorum mDrientium pondere, permixto ammalis utriusq, (anguine tradunt, mercatDrum fabulis decepi ita credidisse videtur. J. B.

Aliorum erroribus refutandis non opus est immorari, cum veritate detesta (ponte fua concidunt.

Tacori folia Draconis arboris familia deferibit Clufius, cubitalis vel etiam bicubitalis Jongitudinis, uncialis vero laritudinis infima pars, deinde paulatim in mucronem gracilefcentia. Incolas [Kayana[^] Be Wayapock, ubi nafcebantur] aqua macerare dicebant, contundere, & in tenuia ftamina diducere Lini auc Serici infar, quin & funes ex illis torquere ad tigna in iuis fabneis colliganda Idoneos.

Arborifhe an alicujus aherius plantar folia effent non adfcriptuTi.

Pro fabula habeo cum Parkinfitno 6c«Lugdunenfi quod credit Monardes deDracunculi figura hujus arboris fructuLi a natura infuulpta. Fructus Draconis arboris Olyflippone ad Clufium miffua Cerafi erat magnitudine aut Dxmyrfines, rotundus, tenuipelle conteftus; qua fublata offeus nucleus confpiciebatur, qualis est in fructu Rufci, fed is nullam animalis, nedum Dracunculi Canto arificio fabrefacti figuram referebat. Vsrum rocundus erac, Be kvis, Be torus oTeus, uti diftum.

SECTIO III

Ve Abwibtis bacciferis fruHu polypereno.

MEMBRUM PRIMUM.,

*De Jrboribus baccifris fruHu dipyrem feu gzrrimu in jungulis b*cas nucko.*

CAP. I.

*Dt Jafmino fen Gelfmino**

JAfminum prilcis Botanicis incognicum flore ex oblongo tubo in quinque laciniis expanlb totidem folia aemulantes, perquam bdorato foliis pinnacisj bacca drocca ab aliis fruticibus bacciferis diftinguatur.

I- J *afminum album* Ger. Park, parad. *uulgatius flare albo* & JS: *Jafminum fev* *Gelfminum* flore albo J. B. *Wfyxtz* *Uxdtiz*, o? *3(cTiiTia*[^]

J.B.

Longiffimis Bclentis[^] licet tenuibus viminibus, Be nifi iuftententur appbfitis pedamentis prociduis donatum est, cortice viridanci inteftis. *Folia* feptem ad nervum alligantur, acuminata, Vicifolliis fere pariaj glabra, acro-virentia. *Flores* velut in umbella, fuaviffimi odoFi[^] exobbngo, gracili tubulo in calathum quinquepartitipn explicantur, colore candido. *In frigidivribus regioniibus marctfem flores nullo fucezdente fruBu, unit nonnulli frufu frorfm defutui, fecur! nimis affmrdunt, quos & nos olim fecutiin Catalvyrflantarum Cantabrigunfinmidsm traddimts.*, Verum niinc meliis edofti turn a Domino P. Hermanno, turn JSr. Triumfecti Romano, fructum proferre., nimirumbaccas fibviride5 *fiminarotunda*, nigro circulo notata concinehtes agnofcimiis.

De loco hujus natali nihil certi tradxtum invenio, fed utxeffe Lobelius in hortorum[^]ngiife apri-
"cs Be pro prsdiorum cavardns furculo pangicur, adque orriimenta pefgularum pedamentis[^]erigitur adfornices.

Jafminum album ficut odore fragrat, ita[^]Viribus miitK[^] pollet: Oleittr[^] ex floribus-corifeftum
c[^]rudos difcutit humoresj frigidis ap catanrhofis confeit, Be hyberno tempore utile est, Quibus auctem temperatura concigit calidior, his dolorem excitae capicisj Be (i diutius odorecur, periculum adfert languinis c naribus profluvii. Praccipua ejus utilitas ad concraftos induratofque artus, articu-IDS/tendines[^] nervofque calefacit, emdlhc, aperit. Uteri morbos afcet non *ioiUm* hypogaftrio 8e locis muliebribu5 illitum, fed etiam potaaut enemate ufurpatum. Simili modo prodeft & doloribus colicis quos fngidus Be vifcidus humbf concitavit. Praccipuus florum ulus est ad diapafmata Be odoramenta, ad Chirothecäs Be linteamina odore fuaviffimo imbuinda.

x. *faminumfw Gelfeminum lut'um* J.B. *humilius lutetun* C.B. *Jafminumluteum* Ger.

Jalmini vulgati ritu frucitar, virgulti[^]i vWdantibus,artg|titofis, ftriatis; in quibus *folia* aliäs terna, Polemonii Monfpelienfium ritu, fedaCutiora, firmiori quam in alboj, iriterdum duodecuolp majora, ad Trifolii bituminofi culti folia magnicu[^]cliti? accedentia, alias verb pirjnata ex una duabiffire conju-gacionibus coftz annexis, impari iemper uno alam claudente. *Fivrü* eo ordine Be fitu quo, m Jafmino

Jalmino five vulgaco, live Hilpanico, folnis obcuis luteis. *Fruilus mediocris magnitudinis, niger, oblongus, bin a continens fema magna: nigra, oblonga, qua fe mutuò ipeffant plana, alstra parts modicè globola.*

g. *Gzftminum Inrlicum fiavum odoratiffimum* Ferrar. horticult. *Gdzrmmumfi've JafminUm Indicum fiavum odoratiff.* Park*

Perrar.

Lsvi cortice, Amaranrum reference purpurat: in duo fismè cubita attollitur. Ab imo caule ri-niofùs, plunbiis virgis, icidem in ramulos brachiatis, fruticat. *Foliis virctiaturato, fplendidoque co-lore conipicuis, oblongis, Punica: Mali foliorum inftar duriufculis, denfis, rfbn incifis, non deciduis, binis ternifve in fingulos ramulbs coeun'tibus, alarum afpectu per virgarum lacera expliCatis. Floribus autem flavet omnino aureis, vulgaris-Gelfemini fimillim^ ^ediculo innixis, per flimum ramorum in umbellam diffufe, Hifpano Gelferrno minoribus, diucius vernanibus, invalefcenre cum fti'ps niajora qupcannis incremenca capientibus, ejus floris, quern vulgò Saponiriam vocanCj facie, retuii^ iuaviflime olentibus, arido Mam è cadavere odoratam animam /pirancibus- Poft florum gemnias baccis gravefcit, minufculas oleas magnitudins, primòque virore exacquantibus, à macuritate demde flarencibus, macurz inftar liva: tranflucidis, indufumque nigellum &c Jongulum, quale pyra ^m' cludunr, femem indicancibusj hie præcerea iolicarus planèque unionibus, Illic gemellis Be \ohxianr tibus.*

Culcuram exigit cum Hifpano communem. Humorem imprimis amat Be Solem. Gelidam Ssp^{ba} tencionis animam odire, imòeciam quidcunq; hyemale frigusculum in tantum reformidat, ut viridiffima folia luceo pallorc tingat, corticem laevore ac rubore decorum minutim granosa luiddaquis icabile afferec ac decolori et, prolcrcpente demum aritudine cito fenefcat &c pereac. Nee frigora can-cum horrec, fed per zftivoò fervores ficentibus herbis czteris expedito gutCatimque propinaco roran* ris CCEL neftare lsditur. Ecenim floris folia vel leviffimo roris a/perfu pallefcunc, affiduo etiam in-fulu exalbefcunr.

Ramis lubmerfis propagacur: modum vide apud au ft or em.

4. *JafminHm luttum indgv dftum bacciferurn* C. B. *Jafnunum luteum five Trifolium fruticansM aliisYoUmomium* Park. *Yohmomium fi*vz Trifolwrn fruticans* Ger. *Trifolium frutum, au-i- rj, fa^ ^ojmomum, fiore luUv* J. R

Vario implexu fercip radix alba, ac ex pluribus prDgrminat locis; unde tricubiales aflurgunt ra; niii anguloJij virides^ in quibus alternatim furculi /urgunt, *folia* producentes lacto virore fplendentia, rerna fere, uc in Trifolio: (ingulf porciones ad Rucz.vulgaris portiones accedunt, fapere ingrato & fbrvido. In ramulorum extremis *flores* oriuntur JaJmini facie vel Arthritic* five Primula: veris, quinquepartiti, lutei. IIS decidencibus fuccedunc *bacc** fatis magnar, rotundx, rubrxj in quibus concinetur *jimen*, fimils fere Pilbvulgari riniori, incus album, ingrati fapois.

Circa Mon/pclium infepibus Dblervavimus, *ncznun* prope Scalpam in regno Neapolitano. Flo-rencem vidimus finquit J. BauhinusJ menfc Martio, Aprili, Maio flcjunioj baccas autem feren-cem cipiè^è nienlc Augulto, qux per Autumn um &c hyemem duranc.

5. *Jajwinum humilium* magno flore* C. B. *Hiffanicum flore majore> extexè rubmte* J. B. *Catal- rncym* Park, parad. *Candiflorum majus* Ger. Pitsjegam Mulla H.M. P. 6. T. 51. p. 91. *ti.M.*

Ramis e/l paulò firmioribus, & Vitis modo luxuriantibus. *Folia* è contrario fibi pofitis furculis in fingulare folium latiufulum exeuncibiB, innirctia habst rergemina, cateris minora, parum clor-gatrij in cupidem anguftam dedufta.

J. Bauhino fuliojuni cpnjugationes tres quatuorvc cum extremo impari alam complent, at *folia* bna folia ex oblongo wunijantur^ non in mucronem^ vulgari m t p definnur, iiftjue latiora propius plerunq; fe *mntuo* cDntingunt, extremumque adeo folium impar contraftiusac brevius quam ill vul-gari exiftit, .. - -

Foliorum Hiperncie* glabra 5c pjana cft^ averla verò facies cofta enAente &c in plurimosubtiles didudta venulas dotatur. Saparamarus, color f vindi nitdkior. *Flores* fiptem oftòve è calycoquin-quies mcilo. in cacuminc furculorum erumpunc, quinque confiantes petalis, ex angufto patulis, non-nunqu4nr ad oras purpurafcentibiis. Gemmae oblonga: è purpureo albicanteque colore rubent. In; ter *Jlamina* bin a, pufilla, albidula, flavefcntibus ornara capitulis/7/w candidus oblungo apice albu erigicur. Olore fragrantiffimo omnibus pra:ftac fpeciebus.

Arcnarum amam ig^lyjs ad *Ambalacatti* non modò, fed & in hortis frequens eft. Semper *fulva* habet \uj.& fibres: , t . . ^ ,

Cortex cunì folijs ex DIEP butyi oque coftus, donec in his unguenti craflitudofiatulceribi^ *ab-* i^nhu4 p agch xpud rpydctur.

6. *Sambac Arabvymji<vz Qdftminum Arabkum* Alpin. plant, i^gypt. *Jafminum five Sambac Arabum Aljino* J. B. *Syringa Arabia fdiis Mali Auranin'* C. B. # *Nalla Mulla* H- M'

P.S.T. 5D.

Fru: hi^huiTii/erpi^ cDtiolvoli inftar qua:vis objca a furculis rotundis, vindibus, Jjgoniis, g^ minutiffimu & rari5 piJis bbfisj obvdvens. 7i M
amJtmM m *miTM**»» fwifim *ffifcrite, yifarmnt* ferpmJ* stiuu & ***niit if* m cam obvj Sar Jaji Jij Ut rff
um < juaJnifo< cubtyom qhum porrdgetar? Mf
mi Uuru ad a*fi*ms ^m tam ban, aTdu^m aiUtimmvfl luatvor pdum dituidmm crtfi
Jeri

[scribit, enim supes infima parte pollicari est crafitudme, folida materia confans, & «^ difficultr femdi possit: is dmbm digitis super terram, aut pauh amplizs, in tenues &. longmfculos ramos dividitur Vc- flingius itiam rUmos fluxus omnes facili obfeejuio admittere tradit.

Radix albicar. Folia latiora, in cupidem exeuntia, contsxtu flida, rigida, glabra, virore utrici. niteritia, nunlero bina, brevibus Be craffis jnhasrenc pedunculis j intermediac.ofta,venas e viridi flavefcentes quaquaverfum fpargic frequentiffimas. Ddbr ipfis nullus, ispqv amarus est.

Alpintis folia Mali Aurantii proxima ei attribuit. Ltffius nvn dijilmilia Syringe alba: fylis filri videri scribit, teneriora tamen & in ambitu mn crmata sempvr ex adverfo wafentia, altzmatim.

Ex novies incifo calice anguffiffimo liirculorum fummicatibus innituncur ad rres numero aut pin- res flores albiflimi TepCem, oistDve, fepius decem conftantes petali^ parte anteriori ftriaLoribus &^ inflexis. *Stamina* duo flavo apice donata una cum fylo parvo yirenti eminent. ; Iphi aucem flores altero ab apertione die inarefuentes rufefcunc.

Fr. Alpinus fimflkzrn ofto prtalorum infiore ordim exhibet; at ego (inquit Veflingius) duplicem fe- fuis agno <vi, me otto, fed deeem aut Juodecim fztala rofea fcrie brevior tubulo digefta. Caccmi floref nunu devtrn, modo duodecim foliis conflantes, & quando minimum nowm, duplici ferie difpofitis obferva- <vit, odvratijjimi Jafmini Hijpanici odor em etiam super antes, <vel quafi fiorum Mali Aurantii & florum Jaffoini Hijpanki fimul pennijforum vdorem referent es; quia fimilitudine Veflingius tiam florum odor em vomparans cum Zaccini conzrenit.

Verperino tempore pb gratiffimum odorem inforoempti a mulieribus in corollas sc varia orna- mentorum genera colligancur, quinimo echnici in facrificiis eos adhibere funt confueti. Maxima anni pai te florifera, per univerfain Indiam ill h&rtis colitur. Frultus vel rarD, vel adultiore clemuni xstate ferris folet.

Florutt>ullis est magis ad ofnatum corpons quam adrnitacem, nihilominus paranc oleum quo utun- *Vires* tur mulieresin balneis ad uterum calefaciendum *He* laxandum : ut partum etiam facilioremreddaht *Vfus* > hoc oleum Be bibunc calidum Be ipfoliniunt etiam extrinfecas uteri partes. Ucuntur quoc^ co exte- riüs inungentes thoracis regionem, turn per os ipfum calidum bibentes ad tullim anhelititlque diffi- culcatem. Be ad pleuritim lethalem, & ad peripneumoniam, atq, ad dolores vehementes stomachi, intestinorum atq, uteri. Parant hoc noftri unguentani ex dulcibus Amygdalisj velSefami feminibus, ex quibus odore florum Jafmini imbutis oleuiti expimunt valde odoratum. *Alfn,* "nferitur Jalmino vulgari.

7. *Hudda Mulla* H.M. P. 6. T. ji. p. 89. • *Uelfeminum vd jfafminum Catalanicum\ multiplex*

H.M.

Convolvuli more, unde Be Convolvulus domefticus dicitur, ramis fiis inlongitudinem mirabilem protenfisj rotundisj ligno medullaque yirentc, & pilis breyibus ob/itis, vicina c&k-pore ampleaitur. *Folia* plana, glabra, craffiora, virore utraque parte nicentia fuh obfoiroj in dbtulam defrientia, coilis e viridi practica eminentibus, pedunculis craffis, curcis, intenus planis ramis adherent. *Flores* poiypeta- tali^ candidi, floculishic illic interfperfis viridibus; ab gratiffimum, qualem Be flores *Mulla* vel *Mo- gan* fundunc, odorem avidiffimè expetuntur:

Cukura Be uKis *Nalla-Mulla* eadem elh

Rabidi canis morfus contnta 6c; oleo frixa externè applicata folia farianc. Veneno ferpentino ra- *Virtu* dix cum Calamo aromatico ex *Oryza*: aqua decodta occurnt.

Plartha hsc ex fententia *D. Comelini*, a proxime pra?cjsdrti nihil differe, nifi quod duplic^ vel plenos feræ flores. Idem 5c nobis videtur.

8. *Tsjeni-Mulla* H. M. P- 6- T. 49. p. 8y. *Jafminum Indicum flore albo odoratijjimo.*

H.M.:

Frutex hie ramfculos decuffato ordine habeC gefinlrts, e (padiceo virefcentes. *Folia* oblongs acuminata, craffa, mollia licet, glabra, fupernè intensè virentia, infernè diluciora, utinq, nitentia; gemella peduriailis curtis inhacrent, media eorum cofta: viridi, iupina in parte eminence. Sapor odörve nullus, Suaviffimi odoris *flores* pencapetalis; albi, quinis antheris granditrfculis ereftis exor- nati confpiciuntur.

□mfddci5 montanis afi*W*Iare fc *Terate-v'di*. Ufushaftenus ignoratur.

Lotus,

2- *Tjiregam-Mulld* H. M. P- S- T. 55. p. 97. *Jafminum Indicum flore poljpetah exalbido, frufu minori.*

H.M.

. Frutex est hominis adacqans altitudinem^rotundDs, duriolos, geniculatos latiffimè di/pergetis furculos, qui novelli minuciffimis pilis obteguntur. *Folia* 5 viridi nitentia, glabra, Itcvia, colta in iuperiore corum parte uci *Nalla-Mull** ftnata, gemina^ libique e conrrario immediatè oppofita in ceniculis proveniunt: liintque obngisra, antenus in anguffum Eontrafta, in cupidem longiorern dedufta, in ons cnlpata, ad petiolum verò ftriftipra: Sapor ipfis amanis, odor piulus. *Flores* exal- bidi numero ternano auc quinario, E calyce fex plus minus incifuris diftincto protuberantes, fex leptom, quinimo dillof confans fpepetalis, anguffis, Cmibus, entprlum in^ oris vald cenicofis* *Stamina* duo breviora fylufyue eodem ac in pracedencibus fefe habenC modo. *Fruftm* infidencel calyci, Ceraforum minprum modo glabri, nignances^ pelliculâ cenui, came molli, e ru bro niera ac fubdulci conftantes, *fzmen* rotundum, ex albo internigrans Be pilofum continent

Db jucundiffimum fcuaviffimum odorem florum, e quibus muHeres coronas fibi conficiunt, in hortis colitur, nunquam flores aut tolia dimittiyis.

Vann.

Folia o!co incocia balsamum fundmit, IT capiti inung.imrj octiloruni quicvis rolfens vitia,& vifmt corroborans; horum pulvis cum Croco ac pinguediie curi illitus prurignem ejus demit: ex radice ad peculiarem ufum expnmitur oleum,

10. *CatuTitsjegam-MuH** P. 6. T. 5;. p. 9;. *Jafriwum hdicum flort pljbttek, candido, eTU rufffeentibus,*

H. M.

*Mull** feu Jafinini fpecies est, & fimih *NalU-MalU*, furcdis fclummodo languido viroc in fufcum vcigentibus. *Folia* diffiuuli imgnitudme ac figitra, modo oblongiora, fine cupide tanienj modo Janora, contrarij inter in fem per pedicu's oppoiira fiint, ante aia viroc oWcuro nitentja, iaporc amara. *Flerti* (epteni, dccenij imo nonmmquam undecim pct.ilis, c Ion go ^culwiis^ pr-cateris quoqite anguftionbus, in oi ban expanii, <; calyce virentij (enis inciuris diilindOj «f ihni, quamvis III oris clemc^i- niticuncntSj panllo laciores quam T>jtregam-mn!la pnxlcunt- Prx-ter *fiamma* duo colore ad vjioreni inclinaro, (jblongis, CTOceis, planis *aptabas* praidita, <*>w interme-dius albicans, eiongatOj vindi Be crafiSufcuk) ornatus capitelloj e gemmula, qua: huic tion comica & ruf :fchcs est, aifriigit: odor jucundiUimus.

Lena 1(3 Tbapm.

Arenolo crefcit Wo ad *Cnmgamor* & *Catoer*, aliilque locis pluribus. Sempiterna viret •tbmi. Floret menfc Juuio -alioque.

If. *KatK-TjftregtrmMuHa* II. M. V.6. T.54. p^J. *Jafmimm Tndicum flore pcljpitak candi- >M> htcclu majert.*

H. M.

Abitacula UHivc Giulis est fubvii-e^entis & lignofi. *Folia* fitum Scfignam eandem 20 Tjftregam- *Mallo* o^itincnt. *Flora* ititilem caJnldtd!mt,in000IT equidem, icpten), odove *itnth*s, proteiKIS, atu leatijjoepatal^ttpetumhioanguftiori Scin fummitatecomplanatOjplures numero dijaiiomtn - *innitiiisuf*, quod in *7sjwgam-MuU* iecus *itli* habec *Frailm* iidem ut in 7>Jtregw *Mullil*, fed II^!!

Lena

ix im.it .1; era & fa :ofatnoita<-ique. In *Cringanm* & *Cotlan* plurinia est; omnibus nos

n>«.

Hujusfoli m tdJuntnaa. Radix vero cum Calamo exhibita aromatiCO optimt cujcfvi niorfibus meddnur.

ji. *Kat-Mala* H. VI. p.6. T.16. p. 99. *Jafnmum htdimm flort fntaptaU candidiffimu fradia* i ;am-Multa.

H. M.

Arbitacula est liominis airkndmrfn vix excedens. *Rami* dtiri, vetuftiores t rubicundo fufci i *Radix* capillaris, rubra, in [imm Ipatiatur. *Fetis* idngiora, antcrius friaa, in cuipkiera ex *dentis* gibba, lupina arte e fateo rutennta, pron.i Candida, vena reaa in pane emmeote ; *ijvilita*, coloris rubri s. *Floret* ,i)billimi, qumjue, imo c laerc rotundisj craifufculis, extioiiuoi r^ *heris* conftantes petalis, e *rafyce* fatisar<So, quinqmes indto emergentes, *Tij&egam-mitla* pioxui* *lunt*; ma cum duo *us* exhibui ,capitati(que *r.ininnbus*, fiibaltdus, e captulo tiuAus primordiufB *confimr* ite prodic *ffylia* bih.!^ m fommitate tener rufecens. *Fruitus* *Tijirwam-mull*, *positum* videri.

item.

Loca gaudet tnttofs, Si piovenit in *Oediampera* & *Amjttaamal*; (empiterna fronde: *Quintili auto* Sextilique: *menibus fionbus'eiornanir*.

Tjfa.

SLJ. *Ilor um* oloi in^rvircoiaioni, & praterea nullutn prxtatufum.

f±T

H. *R*v*?cu* * H. M. 5«» *Jafm'mum Indkum bamftrnm fiare alba majort, nofta tltnth vel Arbo. ruf it tin die aheia.* D. Comclui.

Arbor est proetra, *aa*Ji\$*a crafloj denfo, albicantej cortice obduAo atro-purpureo; gkbrOj ino- doio, infipelo, nocnoe I am lis a ;o-puipurcis, intu^ique rim^oiiSj ceu frondibus umbrolis in utum *ordin* decelato rotund;wa rufe ac laimginolis pcnoljs ciici j^amulflBbveiuuntj objango-r^anda, *acuminata*, moll • i.glabra, deiilaj fpiciidonti.), tupem^Iio-viridia infern^ iubviridia; cofta media *caffa*, rotunda, alb^:it. *Flores* in'raims Kiierionbus nakiintur, pedicu's oblongisj rufe. ac lanagi- nota, e folioyom mte na fede prodcuntik.s inhiT^ntesj topi oil, hot est, ternjj quat:jii aut plures *linal* fere congelli, *candidi*, jafinini aut pocius Hy.icimm tubcrofl floribus forma, nta *gnitudi-* noque ptes, *fruticul*as foliis, ut illi, confUntes, Jed pleniore, Inmultipliciqtie foliorum *textur*z, *duob* fragrantillu ni, & luud muitum & Jafmini aut Tubcrofe floitun oiore diflimiies. Solent aut- tum nocu in flores expicari, & Ol ieme^oic^ nmulatq, ab lplms radiis illuilrai l incipiimr, liico dc i *dere*, vel ant^petu quidam, vel *ptx* Rttau (uei tcnutate, quem radii Solares abknuint, nam quosS(I nrtu *strangit* dentu :in arbore harrent. *Fionbus* *pu*dw nonnunquam (iicedunt, gl^boli, unities, • *iguo* a b .;eje mubilico pn-Liiti, tenutq; corticu undi: tune iignofts iubef cortex, «*» **/-* :m, romnd liiHj nlbicii! com j iii[wrisamaro-diilaj ScatiltngcniK. , /- *Non* provent ipente in Malabar, *lo* i oHuade adveAa elt. Sempcr virec, (ragraociOta>6ft i 6" *flors*, qui Sole occidunt: explicanrnr, 8c oriente deddunt.

Lena

Von.

E fuis lapp *bons* in aqua uoebis potus coofictur, <Jui niuliersbtis partuncntibus exhibKus pa^* ^r; t<*r- *Cottex* m pulvcrem rtdaAus, & ukanbas irifpcEu feeem MIKCH U fui'g^0"

Hortus Leydenfis Ho^*». 'kibet *Jafminum AnivjaMium* trtfolium ckforatilGmum flore aHw. 11 *D. Wat* 1 o l * e i " « recq«Jaininura novuni latifoliura ab inlula Aar««Ai^ida. «Jaininura novuni latifoliura ab inlula CAP.

CAP. L

De Liguflo.

Liguftrum à ligando did verifimile eft, quia virgulta ejus ob lentorem Sc gracilitatē facile
fleantur & circumvolvuntur.

Liguftrum vulgare non eſt Cyprē Grascorum probitur, quia nee in arboream magnitudinem unquam excreſcit, nee folia ejus capillum rufent: quae Cypri apud Dioſcoridem note font. Unde neque *Alcanna* feu *Henne* Arabum eſſe poteſt, cum Arabes pleraq, ſua de *Alcanna* ex Dioſcor. capite de Cypro tranſcripſerint.

Floribus racemofis albis, baccis nigris dipyrenis, viminibus lentis ab aliis fruticibus diſtingitur.

A. I. *Liguftrum* J. B. Ger. *vulgare* Park. *Germanicum* C. B. 3d^o tet, 0\$ ~~Phlegmat~~

J. B.

Frutex eſt elation radicerti hirc inde per obliquum fpargens, crebris virgis lentis & in ramos diviſis conſtans, Cortice cinereo obteſtis; praefertim vero ſpites & rami craſſiores tali entice veſtiuntur: nam ramuli virides ſunt[^] materie albida, dura. *Folia* bina adverſa fitu ex intervallis diſtuncur, oblonga, anguſta[^] figura ad Salicis *Folia* ijuodammodo accedenria, fed breviora, craſſioraq,, atrovirentia[^] lxxvij nitentia, giſtu acri 6c ſubamaro, noti fine adfritione. *Flora* in ramorum fumifis profert fuaviter olentes[^] candidos, racemati[^] congeſtos, quorum finguli qliaternis, quinis aut ſenis foliis conſtant, *apicibus* ex luteo herbidis, qui decerpti ftatim flacceſcunt, quos excipiunt *bacca*:^M racematim quoq, in pyramidis figuram aggeſti, *Hederæ* baccis minore[^] laeviores ac nigriores, *Juniperinis* aruales, initio virentes, per maturitatem nigricantes, continentes bina grana, hinc gibba, inde comprefſa cortice ſpadiceo, carne exalbida, vel digitorum levi preſſu fragilia; ſapore a m[^] a c injucundis quamvis quibudam aliquid dulcedinis habere videantur.

Variat interdum, adntante Trago, floris galore luteo j fed rariis. Foliis argentatis & auratis. *Brey.*

In fylvis, vepretis 8c ſepibus frequens eſt Angli[^] Germanic, Galliar, Italic, & c Florec tota *Locus*. ferè adtate.

Foliorum decoctum, eorumve aqua deſtillata commendatur ad ulcera & inflammrptiones oris gar-Vim.
ganfatu, ad carbunculos[^] pudendorum ulcera, & C ambuſta collutu. Floculi aceto macerati, Tionſiq, impoſiti capitis dolorem tedant.

Acinis Liguftri maturis quidam rubello vino nigrum inducunt colorem. Solent etiam illi tam nigrum quam Venetum colorem praefare, quo nomine ab his qui chartulas lubrias aliaſve pidluras va[^] riis coloribus illuminant leguntur.

Hyeme baccis veſcuntur aves, praefertim Merulx ac Turdi. Frutex propter lenta & flexibilia vimina, furculofq, denſis, & folia hilarè virentia ad topiarias ſcenas expetitur, quaſon ineleganter conveſtit. Redte Laurebergius, Inter omnes frutices arboris 6c herbas nihil eſt quod in tot figuras & elegantiaſſeſſi, fledtiaut formari tendendo queat ac Liguftrum. *HorticultA.* i. c. .; 0.

Vires à Matthiolo Liguftro traditis ab eo potiùs effiſtas rationabiliter, aut aliunde mutuatas cenſet J. B. quam experimento cognitatas. Ex guſtu (inquit) quivis facilè vel mediocriter verſatus univ[^] ſplants vires probabiliter assignare poſſit. Ac pro veris Be compertis prodere non debet.

x. *Liguftrum mjrtilifolium Italicum* C. B. Park-

C. B. prod.

Hoc ad Liguftri vulgaris modum excreſcere 8c in ramos brachiari audio. *Rami* rotundi ſunt, lxxves, nonnihil rufescentes. *Folia* atro-virentia, vulgaris foliis Be latiora 8c longiora. Myrti Liguftri folio nomine Patavio habuit C. B.

Liguftrum fol. laciniatis ad Syringas pertinet:

5. *Liguftrum Orient ale, five Cyprus Dioſcoriſis & Tlinii* Park. *zſEgyptium, Cyprus Gracum, Elhanne Arabum* J. B. *Lig* ſſEgyptiacum latifolium* C. B. *ium Lig* 4gy? Agufſifi-Hum* ejufdem.

Fruticis potiùs wgetioris quam arboris proceritate adultam in villis [[^]Egypti] inquit Veſtingius, partim compertam habui, conſiſta ramorum (ſylvaj cultorum negligentia latius implicitam. Olivx foliis non abſimilia producere vidi, fed latiora, *Qc* ſub grato virore magis tenella, ſapore acidulo (ubadfringente: nee ternis tantum quaternilve ordinibus tanquam aliis, fed pro virgularum longitudine denis, duodenis, pluribuſque ramorum latera ftipant: He tamen ut inferiora folia amphora, ab his fuccedentia deinceps ad extremum ulque rami paulatim mi[^] on fiintur. P*VIKKP i[^] ab his i[^] ix ullo ſuperſtite xrenum, ulque rami paulatim minor confpiciantur, P*VOVKKP i[^] apicem vix ullo ſuperſtite. *Flares* Alpino colons cinericei non albi, Sambuci floribus pro>imi minores tamen; *Rauwolfio* ex luteo pallidi ſunt, odoris fuavis, admodum acuti, *Mofchi*. conco[^]lores floribus baccilli. [*Semen* ei pulchellunr, ſpadiceum, pyramidale trigonum eleganter exprimens, baſi ita ſequali ut furreſtum latruncuh mftar ftejt J. Bauhino Bacc[^] numerofiffimx, noſt[^]ltis Liguftri baccis fere pares, magis ſeffiles, colons cinerifer[^] [in ficca] quatuor decurtkatas impreſſiones oftentantes, femine refertx. copphlimD. minuto, *Melochix* 8c figura anguloſa 8c magitudine ſquali, coloris ruffi, ſaporis frenue adftngentis, Idque citra omnem morſum.

C. Bauhinus Cyprum feu *Alcannam Rauwolfii*, a Cypro Alpini ſeparat, partim ob diverſitatem figurarum, partim quia *Alpinus* florem ſcbeinereum Satn[^]uci flonbiis mmorem Eihannas ſiir

Uuuuuu i

tnbuit.

cribuit Veriim quod ad figuras accmetj Alpini iconem damnac Veilingius Be viciofam esse offendit; neque floruni color aut magnitudo multum diverstdefcribitur à RauwolfioBe Alpino; utean dem ab utroque plantain descricpam non dubitemus.

L. v. u. r.

/Egypti incola est, ibidemq; omnibus notissima. A Turcis Be Mauri tanis ob fuavem odorem moschi armulum quern flares exhalanc magni fit, Se diligenter custoditur, nè hyeme pereat.

T. r. e. r.

Cypri folia ex Diolc. adfrictoriam vim habent, quare oris ulcera, & aphrhas ipfas commandu- cara mcentuij [item ulcera capita maruniia., Be colledfiones Be condylomata. *Flini*] Ee illita turn fu vidis alijs inflammationibus, cum etiam carbunculis profipnr. Eorundem decoctum igni ambuftis & luxcis applicatur. Ruhnt Be capillos *tru* Sc ihlta -foijj., five in Stmtliii fucco niaduerinr. FJox ex aceco *u. us* Be fj ami induftus capitis dplorem fedat. [Folia aut eorum fuccus ftomachi? iilinun- tur *SL* vulvi cDncitatx. ???!] Idcni combuftus in cruda olla nomas fanac, & putrefcentia plhera pcrle^ cimi melb. **SUCCLIS** Cypri nervis, articulis, 5e algoribus pro defc. Acini contra phthiria- iin, iceni contra intertriginis uriles: fanant Sc gajlinaccorum picuitas, Ca-rerum quod ex florepra- paratur Cypnnum unguencui^ (oleum vocat PliniusJ odoracum est, ac neryos excafacie ac mol- lit, iiquidem fervent! natura praidicDrum medicamentorum milturam accipit.

Addit Paulus Cypnim aprc rçmedn̄s hifce admHbcri quic ad liēn em conficiuntur. Hsec ex Ve- teribus.

Magni porro iEgyptiis (ut iccibU BelloniuO ex Cypro reditus. Folia enim ficcata in pulvenem redigunt ad Unifturas ikvas. Nam per cōCum Turcicum Imperium confuetum fasminis manus, pe- desj partefque piloJas flavo ruf6que colore tingere^ viris verò eodem ungues rufare: additōque alu- mine capillos puens ram maribus quām fcemellis inficiunt; necnon equis pilos^ pedes., mufcariuiii- Regionum illarum feminis decorum hibecur, femora, opigafruiunipaitefquepudenchsflavo colors rintas habere, id quod hoc pulvere sifiām ^alneo cgreflāc: Tune enim tintura faciiūi im- bibitur.

Veilingius flores *Elbannc* mulierum [in iCgypto] potiffimūm delicias esse scribitj caniftri/quB plcbis in balineaderri, in quibus illis, lymphaur, dicam an lymphatics totos dies inguini cuticu- *lx*^t perpohenda; operam dant. Dccoftu foliorum in aqua hmplci crines defluentes firm ant, & in^fftum pedicLilDrum fodalitium excludunt.

Eodem illo unguibus hemicycli forma diutius ha?ren,teni notam appingunt: atq; ut olim Conferi- pti Patres lunulacis cahjs ordinemfuūm, lie illis lunulatis unguibus nefcio quod elegantly fpecimeU prohtentur, aurantii mall.colors confpectiores.

Folia appofita in ufu frequentiffimofunt ad dolorem capitis. *Alpin.* Ex pulvere foliorum cum aqua mulfa paratur emplaftrum ad pedes exfiidantes fctentefque exficandos efficaciffimuni, [pe- dibus appoifum Be per horam retentum.] Pulvere etiam hoc ad ulcera oris gingivarumifepuden- dorum maximè utuntur.

Duas Liguftri Indici fpecies proponit Bontius quem confule. Una est Alcanna, altera est Ligu- flium Indieum *Garcia* Negundo diftum.

C A P. HI.

De *Aim nigra bacciftra.*

A Foliorum fimilitudine *Alni* nomen adepta est^ quamvia à vulgari *AJno* toto genere di- verfa, cum baccifera fit. Foliis latis subrotundis, baccis^ nigris, vi cathartica, ab aliis fruti- cibus difcretu facilis est.

A- I- *Alnus nigra bacciftra* J. B- C B. *nigra Jive Frangula* Ger- *Frangula* fwt *Alnus nigra* baccifra Park. Cfjc blach StlDcr-trcr,

Arbutula est quæ complures à radicibus reftas edit virgas, fex vel otto cubitos plus minus *altas* pollicaris craffitudinis, in ramulos tenellos divifas, cortice exteriore igcidem fufcoj fed glaucis *mar* culls asper/b, quo detraflo alius apparet croceo cingens. Ligni materies Candida Se fragilis^ madoo tenus rufefcente quadam medulla farfta. *Folia* ad Ajnum afcendentia, vel^ ut vult *Matthæolus*, Corni Be Virgx fanguineae, per ramos^ ex oblongo rotunda, in mucronem obtulum *delinat* arro virore nitida, nervofa, ex -quorum *z*^ls *ftyfculos* coacervatos profert, fed fingulis fingulos pedicu- lis nixos, parvos, pallefcetes; *baccu* fuccedentibus^ primūm virentibus., dein rubris, dein nigr^ ingraci planè /aporis, [Tragax malignum dicit] in quibus grana *bilia* *Lerubus* niajora, *compit* ^ in quibus nucleus. Radix per liimma cspitum vagatur.

Locum

In Jylvofis udis perfopc reperitur turn in Anglia, turn in exteris regionibu3. Floret MaiD, Sep^{lBinr} brific Dftobrifriiftum maturat.

Ficra

Flavus hujus arbutulac 6e medius cfrtex, tritus cum aceto, 6e fcabiei illitus^ intra paucos dies illam faruat & exficcat. Etque hoc experientiam fingulare. Idem in aceto de pectus puvridis decu- tibus colluctatæ prodelt. Corni vis inest non modica cum exficcans cum adfringenti; ideoque *Rhabarbari* modo alvum ducit, & vilicera roborat: idem blem & picuitam expurgat, quibetiana hy- dropecurum aquas ducit. Deponitur curtax cum Eupatorio comm. Poniōe *Abbintho*, *Aggimonia*, *Culcitra*, *Lupulo*, *Cinnamomo*, *Frenetili*, *Apii*, & uniusque Incybi radicibus ad hydropeim, malum cutpuru habitum & Ictericam; dactōque pccandus id affectis *fy.* poudere. Cortex ab arbore du- Jbran fleDefin ip]D itamn Veris principio. ^mumbra liccari, tiquidem viridis vomitones iri^ Quod ne facm eciani decoctum duobus tribiilv* diebus quieteac oporecr, d^ nec flavus cdor in mgram reicatur. Caip. Hrtmanno corrupcio hie fubglei-

Dodon^us ob violentiam purgationis conicem hunc Rufticorum medicamentu...

Novi(inquitSchw5nckfeld.; ejus ufu Agricolas hydropicos factos & pxne; fuffpca...

Flores aphbus,rati. Folia laetum feruntur bobus ac przdupè yaccis pabulum, quzhorum pafhi li...

i. Alnm nigra bacciferarUgofore folioj feu inajor J. B.

Per omnia major eft hac fpecies, caudex, rattii, reliqua: cortex exterior tennis, Foris finertiis, in...

Fcha quam ui Vu gan Alno nignOra, mult^ ambliora, p'almo longbTa ^ uncii...

In Burgundiz montofis aſperis prope S. Hippolytunij & alibi provenit. v. J. B.

CAP. IV.

A. I. Berberis dumetorum. C. B. Berber is, Park. Berber is vuigo, qua & Oxyacantha futata]: B.

Nter arbores Be frutices ambigitj modo humiliorj dense frucicans, modo procerior caddice...

Sponte nafetur multisin locis, incultis, lytrofii, frutetis, campeſtribus, montanis, ficcis ſcaquoft!

Bacca: refrigerant Scaftringunt^ppetendam excitant, ventrigulum roborant. i?roinde cum Sao Vires...

Quod ex acinis exprimitur vinam anterius addiuſq, eft quAm ^Hod ex Mali Punid fucCo fit...

Maturi acini vel per fe vel cum ramis decerpti in umbra ficcari folciit, & a^ intinfus ad oati...

E follis vindibus tenellis Malo tnenſe fiunt intinfus haud fecus ac ex Oxalide ad appetctiam exci...

Cortex lixivio maceratus flavo colore tingit. Radicum cortex medicamentis adverſus iſterum ad...

Vinum album tenuè, in quo medianus ille cortex Berberis^qui inter extimum Be ligrio adhkriter...

Alitur autem in hortis curiordrum, ut 8c Berberis acitris majoribus.

SimonisPauh. elegans encheireſi's parandi Tartarum e' fuccho Berberum; Ouadrinr. rh i» Berhriaci...

Uuuuuu 3

tari comparès; quern ac priorem vafi vitreo inditum bhndiflimo calore exficca & ufuì (erva.
On & ventriculo gratum faporem concilia^ corruptioni humonim Be sftibus febribus infigniter refill ir.
Berberis VDX eft Arabica Averroi Sc Officinis ufitata. Spinoiis eft frutex, fruftu in racmos congeJlb, oblongo Sc cylindraceo rubente, acido.

1. Noela-tali feu Berber is Indica Aurantia folio H- M. P. 4. Tm ç6. p 119-

Arbor eft media: magnitudinis, caudice mediocriter craHb, albicante, denfo, cortice obduftD cinereo, niucifq, ramulis yiridibus dojiata. Radix rnfra, nigricante conice Cfla, necnon hbris fiis lacè per terrain diffufa; (apor aftringens, odor fylveftris. Folia fine ordine ramulis inherent, obJnngo-rorumla, ac in acumen definentia, Mali Auranciae foliis haud abfamilia,, exceptà ilia appendice, quà hujus arboris folia carcnr, crafla, glabra, denfa,, acro-vindia, fplendentia, inodora, inppida. Flofcuh racematim cohxrSnt plnrimi, ex pediculo tenui, unciali & Ibfunciali, aciduli, inodorì; cDnftanni b gemmulis exiguis, pallide virentibus, flammulx^ tnbus exiguis ^lbicanuibus, flLipe/ementibus- Flofculis fiicedunt bacc* cylindrace^ tènues per maturitatem pulchrè rubentes,, /apofs acidofic luba/tringente, Berbensfruftibusperlimiles.

Lrvvj.

Trees w
Ljo..

Crefcit ubique in Malabar, prafertim area Rtpoljn: Semper viret, Be per 7onon raròfrugifera nianec annos.

Ex JiuU5 corrice haud fecus ac 4 cannabe funes texuntur.

Fruffu5 in ddiciis enmeduncur, iique impensè refrigerant, uti Berberes.

Folia anridotum habenuur morfui colubn, Heretimandl Makbarenilibus difti, cujus morfu homines qmdem non ftatimintereimr, /ed interim tocius corporis carnes corrumpuncur, com purr el cunt, dcudunr, tand^mq^ poft CDC ftulJrias debicum natura; peifolvunt^ nil! utancur potu qui CH folix niicB cum falko Mangz fruftu in aqua coftis conficitur.

CAP. V.

Bacciftra Indica florih* ractwfs, fruffu flam-rot undo, dipyrtno. Kandm-Kara H. M. P. f- T. «6.p.V-

H. M.

Arbor eftiuftra: rtiagni^TM^5» ^ig^n» circiter pedes alta, caudice mediocriter craffo, mubniki ramisin^orbeiTi- longè larfque diffufis donaco, qui cortics cinereo tefti, ac /pinisiji^P^r Jnngi5j craffis, acuminatif^, uti &c caudex, muniti funt. Hx aufem fpina: ornus yirulen- ux acmali^ nic.ui5 expertes non lunt, utpoce vulnera ab eis inflifta non rarò lethalia oblervari folent.

Radix fibrata, albicans, atro-purpureo cortice cinfta. Folia oblongo-rDtunda, temua, leJia^ viridia^bina auc terna fimul junfta, circa ramulos proveniunt, inodora^ iaporis ingraci. Flofcuh luaveol^ntesj in racmos digeiH, ad foliumm exortum circa ramulos proveniunt, calycique viridi eXi* guo inharrent, viridi-albicanres, monoperali quadripartite hoc eft, ex unigo foliolo, in quatuorla- Linia5 acumiaaras divilb, confiantesj ftaminulu^ aliquot albicantibus, lubrufis aficibns ornatis^ medium occupancibus, inter qu^c ftylus prodc craffiorj candidus, capiculo viridi. Flofculis liicedunt ifcirc^ ptano-rorundx, virides primim^ dein flavefcentes, tandem maturiores purpurD-uceruleaTj carnequeineLis/iicculenraj dulci, gratique laporis refertac; intra quam duo continents oflicula furva^ plana^ carneimercedente à ie invicem difjunfta.

Locr Gf
Tropu.

PrDVcnit in variis Regni Malabarici locis, przfertim circa Cochm: bis quotaiinis fruftus fcty; Mai no,, VJZ. Be Septembn menlibus, ac iemper viret.

Ufus ejus in Medicina nullus.

CAR VI.

* P. 4.T. 16- Nyalel H- M. An Sambutm Indica Bon til ? Arbor baccifera racemofa, fruff* corticofo3 Jh pyreno. p. 37.

H M.

Arbori eltproceraj 4ocirciter pedes aha, caudice mediocriter craffo, cortice cinereo obdu#<V multile^ramisrufecincibus in orbem diffiifis donato. Lignum albicans, inodorum, infipi* dum, niatrice rubicunda. Radix rufa^ furvo cortice cefta. Folia geminata, ordine p^allclo bicvibus peciolis ramulis inherent, oblongo-rotunda, acuminata, denla^ glabra, colore arro viridi Juper^nententia, infernè diffufiora, infipidaj inodora j coftà medià lignos^ e virid^ albicance, rotundã. Flores exiguij candidi, nunieroiij racematim circa extremos fluxulos pro??ti, "nt, & finguli cilyci viridi, in quinq, lacmias fefto inharrentj quinq, temùbus, latD-rocunffo orbeiTi cpanfis foliolis confiantes, quv^ ftaminuh albicantibus, apicibm flavefcentibus fal? natiSj medium octu^antibus; inter quxftylusprodc lurreftuSj itidem albicans^capicello flave^oringrarusacfididus, rapornullus. Flofculis fuccedunt fruftm globoli, numerofi, rainisa^ niodum, quibusmagnitudine haud abfimileB fiint, cortice craffh, flavefcente, candido & laurpalm^ cinniti, canifque exalbo carnitea, nalliparete, /eculenta i uba nj candido & laurpalm^ cinniti, canifque exalbo carnitea, nalliparete, /eculenta i uba nj albu curculca Cùti:uli oW u^i, Japoruc^ dulci aiftringemis, muiibranacco diftpinichD

Proccoir

SECTIONIS III.

MEMBRUM SECONDUM I

Uedrboribus baciferis fructu tripyreno.

CAP. I.

DP Alaterno.

Alaternus à Phillyrea differt foliis in ramis & furculis alterno online fitis, noli binis
 ius uc in ilia: Daccis tricoccis, cum in ilia monocDccx fine; quamvis externa facie
 fimiJes funr. & uccrque perpetua fronds. Nofrates perperam ^Jaternum PhiHy
 Voiant.

I- *Alaurnu major & minor Park. Alaternus Plimi & Alat. bumilior Ger. Spina Bourgi*
lydijnfium & Alaternus J. B- Philyca elatbr & huwilior C.B.

Alaterni fruticis femper viremis duo genera fiint finquit Clufius,) Unum arborefcens
 longis ramis, non admodum craffis, necj, in multas alas divifisj flexilibus dcinde virgultis, quz ex-
 rerno corticc candido, virefcete incegunnir, Jarente iib eo membrana quadam flave/cente^ quæ
 lignum Ambir. Ramos veftiunt incondite ordine dilpofica *folia*, media inter Olez atque llicis folia,
 magnKudine, leviter perambicum ferrata, craffiufula, ex vindi nigricancia, guftu ingraca, 6c cuili
 amaritudine paululum mordicantia. Ad lingulorum foliorum qua in ramis nafcuntur exortus^orw
 Ole^fimiles^ CDIDHS ex herbido pallefcencis, racematim ex oblongis pedicellis dependent. Vere,
 inferdum eriam media hyeme. Nullum in hoc frustum vidi.

Alterum multò humilius eft, ramis brevionbus, cortice qui hos ambicex albo viridiflc purpura-
 fcete coloribus fimul mixtis infecto. *Folia* illi fuperiore minora, magis circinatx totundicatis; in
 ambitu ccian lirrata.

Ex foliorum alis *fares* longiufulis pediculis dependent, ut in fuperiore, illis tamen m^joreSj, SC
 coloris niagi5 herbacei; quibus iuccedit *fruitus* racematim cohrens Lendfcini magnitudinc, imitij*
 viridisj dcinde nonnihil rubefcens, qui tibus nucleis conftare videtur. Pleniorcm Sc nigri cobr^{is}
 maturicace Heri arbitror. J. Bauhinu *Baa** parvx, nigrXj rotundx, in quibus iemina tria, Ka uc 5X-
 ficcarx baccx tricocca: videigicur.

Prinium genus Ulyflipponenfi agro locifque vicinis in Lufitania obfervavit ClufTus: Alterum
 ctiam nidem locis, prxterea multis *Bxtics*; tum Granatenfi regno Be Valentino. Nos in Italia,
 prxcipue ad Marc inferLim, necnon circa Monlpehum in colibus faxofis frequntem obfervavi-
 mm: Foliarum jnagnitudine, figura & incifturis multum variat, quinetiam magnitudine Sc ftatu-
 ra^ pro rations loci in quo crefcit: utipeuie diiTerrevix putem Alaternum primum Befecundum
 Clufii.

**FarcturClullusutriufq, lui Alaterni nullum fe ufum novifle: fed Ludtanof afteruifis ejus cortic«
 in aqua decofto pifcatores fua retia fub^tilo colore inficere : & tinftores c fragmentorum**
 quod pallet, decodtione nigrefcenreni c^ccEruleo color em conciliare.

Quamvis autem albuicula hie ob medicas vires Celebris non fit, ob celeretn tamen aufuni,
 renneni nirida: & velut perpglics frondis virorem; quodcj, tDnluram fadl^ adniittat, K hy
 ctiamno/lras, nDjinimis afperas patienter tolerat, ornatus Si ipeftaculi gratia, in viridaril5 no-
 lvis ftudiose colitur. Sericur autem iemine commodiflime, vel etiam ramulo terr^ infixD.

Vidimus olimin hortoRegio Parifienn duos Alaterni variecatcs, alteram foliis ex albo, alterain
 foliis exluteo variegatis. Habentur 5c in horto Leydenfi ^D.Htrmanni. Idem Hortus habec Ala*
 ternum feu Phyllicam fullis anguftionbus 5c profundius ferratis.

i- *Alatrrms larifilia Celastrus ditia Herman. Hort. Leyd. Cehjfruj Theopbrafti Cluf cur. poff.*
 C. B. Park.

Cluf.

Humanam fuperat altitudinem, firmoque 8c duro caudice conltat, atque in freijuentes
 Avילו, qui dum novelli funç viridi cortice integuncur, annocini verofufco. Numeroia habe
 ex adverlb femper nafcentia, densaque ferie congefta, fiipina parte iaturata viriditate pr
 • PJ^J^ aucejT^ djluciora, perennia, hoc eft, qua: non decidunt nifi novis Be recentibus jam natis, uc in
 qnx)ribli^ ^percriid virciubus plerunq accidere folet. Splendent verò prae lzvore ea folia^ nc
 Alaterni foliorum magnitudincm fuperant, unòpleraque flint illis minora, prxlertim annocina, *P^X
 ramulorum infiniã partem occupant five veftium, nec in ambitu jnt crenaM, praeftrrim novella
 quã crenarum quandani formam habere videntur, jttamen vcre c^nata did nequeum: amariui-
 ran June lapons. In novellorum ramulorum excima parte inter folia nafaintur uncialis lonprutli'
 t Pj 3014 Jai^ nences /I^ niquc aut fex v^rvus fitfimplu, quacuor plerunq aut quinq foliolis &
 tiavo virekemibu* confcanc^ fuavi^r odorates, ra^aum LnciTdfloiculoium modo ^ P ^.

non ut Tini aut Sambuci umbella: infat expansos, qui feò admpdum aperimur, Sc nonnifi excremo AikumriD auc Hyemis initio, imò etiam quando mitior aura veris initio. Hadtenus Clufius, quibus addit Pet. Paauius, Arbor hzc in horto Leydenfi Anni 1610. menfe junio fructus rudimentum oftendere coepit, producus breuem pediculum, cui adhxrebat bacca, Myrti baccis magnitudine fimilis. Hzc quamdiu in accretione erat, viridem, iuftam adpeca magiiKudinem rubrum exhibebat colorem, qui paulatim ex puniceo corallinus reddebatur, adeo ut Afparagi maturam baccam [de minoribus loquor] ce vide;e dixiffes. Ardebat gracillimo hoc color ad Augufti ufque Iniaum bacca; tune etenim paullackn corrugari incepit cucis five exterior iuperficiss, iimulque color em mutare, ac ex rotundo oblonguj fieri Incepir, frifcedinem namque contrahebat, tandemque aduftam nigredinem. Pofitquam decidiffet repertum intus femem unicum, obngum, quodiimniodo triangulare, uvarum vinaceis admoduqi fimile: cujus cortice (durior is erat &L quodammodo offeuf) diffrafto-prodiic gianum quoque imicum, tedtum membranula crocei colons, eaque ablata medulla live cam, durior, albicans, ei fimilis quam nux Avellana oftendere iolet.

Rami5 porro facile pangi certum eft.

Hxc arbor in horto Academico Leydanfi colebatur, unde dslata non dicit Clufius,

Si confians fie huic fructui unicum duntaxat femem continere ab Alatrno genere diverfa eric cUS parens.

CAP. II.

De Sai/hhuzo.

SAmbucus &A Gratis à Sambuca mufico infrument^ quod alii peftid^ alii magadin vocantj didta putatur. Alii ab tutors cui nomen Sambyx denominatam malunt. Nobjs vox incertac originis effevidetur.

Sambucus flore 8c frudlu in umbellas aut racemos compofito, foliis alatis, ramis medulla plurima faris pauco ligno ab aliis arboribus facile diinguitur.

A- I- *Samhucus vulgaris* J. B- Park. *fruSiu in umbella nigro* C. B- *Sambucus* Ger. **Cont**moil tElter.

In arboreatn proceritatem excrecit, c^udice plurima paite lignofu, in quo exiguum admodum medulla tamen (atis fragili findique facili, quandoque ramis fins frucico)Ja pfrmanet, cortice icabru, rimolu, cinericeo colore fordefcens. Rami tam&n gcbaculi^ prfefetim juniores, geniculis ex longiufculo intervallo articulati, materie pauca confiantes, medulla plurima alba, eaque leviffma fariti, quorum cortex lzvis, dilute dnereus &c quafi argenteus, fed nuper exeuntium viridans. Cinereo fibeft alius, lignum immediatè invstifns, Medianus Officinis diftas, totus herbidas ac viren^, nervofis tamen, fiis fibris neutiquam carens, quorum eciam maceries uaudiçi duritie multum cedit, magifque exalbida j Ramos paculo obfitu *folia* veftiunt, terna aut quina, mesrdum feptena, raro oftona ad coftam unam annexa, oblonga, acuca, ferrata, atrovirentia; guftu amaro, & nefcio quid proprii ac n^ufeue^ habente, odore gravi, virofo, fed contuforim graoioe. *Flores* in patula umbella, non ingrati odorisjalbr, pscapece^li, cotidemque ft a mimibus ad luteum vergentibus & umbilico, exiguo petiolo innixi, & horum liirlus grandiufulco, donec candem omnes in unum communera au infignem coeant, *Baccæ* initio virentes^ per matLr^katen^ atro-purpure^ fuccum concolorem reddunt, grana continences exigua, plana, oblonga, communiter terna- In excremicatibus ramufculorum, Kad pediculos florum iolent fape nafci veluc pediculi nigri. MUCIDS ftoiones emiccit è radice.

Aquarum accola eft, ut obfervat Theophrastus: Apudnos autem nontantum juxta aquas fed ad *Loan* & macerias &C fepes, alifque ruderatis & incultis locis nafcitur, prafercim humeftis Sc umbrofis, Maio *Temp*™, floree, interdum adhuc Junio: Baccæ maturefcunt Autumnu- Gemmas fe folia tempeftivè admodum procrudit, nimirum Martio 6c Aprilis initio.

De viribus 6c ufii Sambud integrum librum conferipfit Martinus Blockwitzius, cui titulus *Anatomia Sambuci*.

Corte* Sambuci interior [Medianus OfEc] educie ferofos humores, unde BcHydropicos juvat. *Vires*.

Turiones feu folia tenera in vino decofta, auc in acceariis fumpta non pennde fiunt efficacia, 6c imbecillioribus magis conveniunt. Iidem in pulverem redafti, 8c ex jure Pifnrum poti duram alvum emolliunt. Cortex interior ambuftis impofitus ad ardorem igneuni exringuendum utilis effe perhibetur: Diofcorides folia recencia molliaque illita, ex polenca ad ambufta commendac. Aftuanus eciam ad recens ambuftumSambucum imprimis laudac.

Flores difcutiunt, emolliunt 6c relolvunt, fiidonferi ac anodynifunt. Ufus pracip. intinfecus iti Eryfipelateprarcavendo Be abigendo, quartaana curanda. Excrinfecus in uolico dolore, in Eryfipelate combufti, Bcc. fimpofici) *Schrod*.

Florum umbellam f inquit J. Bauhinus, JJ domeftici noftri polentx immergunt, frigunt, Atumq, inde parant edulium ac falubre. Poffunt eciam cibo aliquo peinnfcen, rel cum ovifngi; nam blandè dejectionem mDliuntur. Reficcati verò flores fimul cum humidicate purgatidi pocenciam amiccunt, digerendi Sc atenuandi recinenc. *J. K*

Acetum in qup flares macerad fune in cibis ventricub gratum, appetentiam excita^ crallbs crudofque humores inddic 5c attenuat.

Bacc<e Kidem Sambuci alexipharmaca sunt & fudoriferx. Spiritus è baccis elicitus inter præcipua est diaphoretica; itémque antifebrile nobiliffimum. Vinum ex eorundem fucco velmero[^] vel cum vino albo aut Rhenano compofiro mira præstat in hydrope. *D. Needham.* Scribit Camerarius flicurii acinorum ad mix rum iufculo gallinz, in quo multum radicis Petrofelini decoxit. Be exprelluni plurimum confsrre hydropicis.

Nuclei five femina Sambucina abftergunt ac per alvum Be voniiciim purgant vehementer.

Decoftum corcicis mediani Sambuci velEbuli cum Syrupofapaveris ad fudores movendos valet. N. Narcotica ciureticis vel diaphoreticis addita fuidores magis fWdmoventj uc paret in theriaca *Be* nutritatio cum opio. *D. Bowie.* Ad pedum inflationes. ff Folior. Sambuci q. v. coqiein oleo cuius laic, & fove.

Ad Arthruin, R Folia Sambuci, immittantur in ollam vitream, adeo[^] ut fine plicatims[^] oJam impleant, optime fipe premdo : tege operculo; per annum Jub ccra reconde: in fiuperiori parts crufta deprehendeturj in infenore oleum[^] quonihil efficacius[^] jape probatum. *Ilorz* iaccharo CDn dki ad idem valent. *D. Hulft* è MS5. nondum edico.

Sambucus ventriculo minus nocua est quàmEbuliis. *Folia* ctiam nan ici fetsnt, baccarque non tanram evacuanđi vim habent.

SLICCD infpiffat[^] e baccis Germani crebrotuntur ad movendos Tudores, & pucris ctiam prxbenc cum pane: quo S: quidam noninfeliciter ufi funt. in iis qui ad hydropem proclives fuere. Coquundir baccz ex aqua, 8c cnbro tranfraituntur/denU[^]que coquuntur ad fapa: conlirtentiam-

Prunes in Sambucum mlti, f fi Camerario credimus, qui fe expertum ait) quamvis non ratioc comprehendat, fructus ferr purgantes. Nobis rtfiutrum vaifimile, neque Prunum in Sambucum infitam comprehendere; neque li comprehendat frudium purgantem ferre.

Contra Ei[^]fipelas apud noftrates in fjrequent[^] ufui est fofus ex aq. Sambuci part. ij. & Sp. Vin part. j. Ratione Be experientia ejuifmodi praxis nititur: quippe Sp. Vim aptus est in^{na} fgralern^o J^o dinem reducere fubtiljcate fua Be paicularum motu diftortos cutis tubulos Be fibras- P^o n^o A^o r fipelate affeftx pafes hoc meJicamento izpius levamen nOtabile fenuunt. Antonius de Heyde Dberv. 16. VuJgar&ek hoc medicamentum Londini. EgD fepius ufus Tum aq. flor. Sambuci cum oleo Sambuci mixra & conquaflata, bono cum Tucellu; interdum addidi fp. e bacaz Sambuci. N^o rarò etum oleo Sambucino Be Vino Cananno mixtis Be conqualTakis Eryfipclate affeftis curaVJ. Communicavit *D. HulJe*, Ixpe in hoc opere diftiw, fepe dicendus.

Adfebrem miDtidianum, & Corcic. rad. Sambuci ?, - Afan I nj. Cinnamomi Ji. p. Coq. iff laffe Be propinecur paroxyimo incipiente. Movet fimul & C lemel vomitum & leceffum. *Cfo*ne**

CXiercetarp. *Mgm.* p. ^M r <r L . - -J- n. J - i r, Ad combuftiDn^{eiU} " cortic. Median- Sambuci, qua: vindis elt, q. v. decoque in oleo quoulq, conlabefcar. a A - ceraC par^{ATM} «a uc unguentum mineat lucidum; quod plunes fum expertus. Cbfintau. J^o r^o.

Horcus Edinburg. *Sutherland.* habetSambucum humiliorem frutsfesntsm foliis eleganter vane-gatis.

p± x. *Sambucus jruBu albo* Ger. Park, *frufu in umbda viridi* C- B. *Sambucus acinis ah* his J. B.

Jam defcriptx quoad fronds, flores & materiam fimilis est, nifi quod odorem attinet ad Ebulum quodammodo accedere videatur. At infignis differentix naia eit, qubd acinos ferat albos- Tragii5 ex candido luteos dicit, ac in catftris vulgari fimilem, nee multis viJam putat.

Variat f inquit G. Bauhinus) baccis viridibus, in aliis albis vel ex albo flavefcentibus.

Sambucum baccis albis in Anglia obferyavic iilgeniohfltmus Vir & L eximius Bocanicus *D. L^oonar-* *de The* :st M.D.

3. *Sambucus laciniata* J. B. *foliis laciniatis* Ger. Park, *laciniato folio* C. B.

FaUs multifariam fiflis Be valde laciniatis a vulgari Sambuco differt. Fiores alioqui & tacer ei iimillima:.

Datur Be Sambucus humilifivs Ebulus folio iaciniaco C. B.

4. *Sambuc ractmofa rubra* C. B. Park. *ractrho{a, fteinis rubris* J. B. *rawmofa vel cervix* Ger.

7-*

Quonquam cum vulgari Sambuco mult a habeat communia[^] fie ut flonbus 5c haccis vidua in^{re} Botanici nonverfatD facile imponere poflet, foliis tamen est paulo minus fcEtidis. At in flpri^{^115} & baccis conflimum difcrimen. Flores enim nullam umbellam faciujt[^] ut in vulgata, fed in^{ra} cemum oblongum digefti, ftellatij coloreex albido in luteolum languente. *Bacc** cDniimili^{^1D} racemacim fi equentes fuccrefcunt ex rubentibus pediculis, ipfac quoque per maturitatem coccins[^] jucundi plani: laporis, ex quibus nova: plantulae fi ferantur progignuntur.

LOCU:

InMpibus Carinrhaciis, montibus circa Genevam, to. fylvis juxta maximum, CarthuHanoim^o crenobium obrervavimus. Nafcitur enim in montofis & algentibus locis, maxime in opacii uG nouique lylvis, Burgundiaciis, Lotharingicis, Germanicis, Bcc^o toijcmcumSol^{and} fiCU50C^o e dbfervac Tragus; unde intelligi poteft fmftiis hocB fngi*o^o iw die qualiracis Camerarius quott ceftatur fngidas^o efTebaccas, ioporoids reddere bdui^o i[^] nimgue corum ufum est noxium; Jui ctiam fubLbit bdi

Cervam Sambucum racemofam licet St Solanum lethale magno defiderio inquires fe didiciffe scribit Tr^us. Ubi namque locorum eas ftipes pr^Venire intellexit eb fe confert. Hifce cervus iinici^delfe Satur, folia utriufque non baccas decerpens, &c.

Pr^crea, p^f qioJ non minus admiratione dignum eft) obfervavi Cervum Iblum foliis harum planGarit^i velci, non autem Cervam, nii ea pra^gnans fuerit, Sc Cervum in ucero gefstaverit, turn enim, &c. *Trag. lib. 5. cap. 14.* Sane apud me fidem non inveniunt qua: Tragus hoc in loco fcripfit, quamvis ie expertum af&met: nee video quomodo hacc potuerit ubi^t^are.

A. 5. *Sambucus humilis five Ebulis C. B. Ebulm five Sambuzm humilis Ger. Park Ebtltff five Sambucm herbecza J. B. £)fcDatf ^Uttj HDaH iHOJt, 0 ^t^t^t^t.*

7. a.

Arb^r non eft, at neque frutex, fed verius herba, adeb ta^t^c:n Sambitci aetnula, ut illius ^{flomich} puniilKadjuftione, apud Graxos, fob voce ^fiu^d^ promerucrit. Rarb hominisftaturam aflequitur, magra ex parte feftiucubito non akior, caule herbaceo, llriatDj Sambuci ritu medulloibj hibernis meniibus contabefcente: ad quam accedunt Be flia ordinacius difpofica, e tnbu quatuorveconjugationibus ad rachim annexis, imparique extremo folio cpmpolita; bdore graviore; quorurrtingulariaSambiadnis lwnjiora, acutiora: pares tamen umbellx albae flofculDrum quinqpaiticorQm, odoratoriim, &c nefdo quid nucleorutn PBrficorum magmatis fpirantium, fed Blll VIX ferendorum. ferugineis apicibzrs, quos flamina (tiltinent Candida: qmbusfatilcentibus acini luccedunt^per maturita^em nigri Sc torulis multis ariguloli ante maturitatem, &: pzne trianguli^ poft verb tnagis rotundantur, fucco fuo manus mtla quadam purpura inficientes, fomzna continences ternaj altcra parte gibba, altera angulDfa. *Radix loiiiga, digitalis craflitudinis, non lignofa^ lat^ iparfa.*

Ad vias publicas, inque agrorum limitibus & cremeteriis non rarb occirrit, Fbret Junio Sc Julio: *Loqm* Baccas Augufto Sc SpccmSri rtiaturat.

Eaflem dicitur obtinere vires quas Scimbucus, eafque effiacadorrs. Cortices & feminula Vim habent educendi aquarn- Conferunc lgirur in hydrope, arthritide, cacterifquemorbis a leio ortis. Ad hydopicorum aquas educendas ab omnibus fere botanicis celebratur radieis Be fbminum decoiSuiii. Vertirn quoniam vchemencms purgat, corrigi debet.

Infiufui core. rad. Ebuli valde violentum eft, decoftum minus. Coftura, auftore Fernelio, vis ejus purgandi pent &: exfolvitiir. Poft radicem (inquit Cafp. Hofmannus liint acini 6c femem Ebuli- Puto aparagos &c foia etiam mitiora effe.

Ebuli non minus quam Sambuci cont.ifa folia Be irhpoiita ambuftz parti earn p erf an ant*

Ad podagricDS dolores lemendos valent & folia in lixivio cofta, atque extsnus applicata in fo-nenris, utnos etiam in parts experti lumus* Idem led effiacius pra^ftat oleum fcminis per exprei-fionein.

Acini ejus, ut SiSambuci fingunt capiilum.

Ad Lienis affectus, ft Aq. ftillat. radic. Ebuli, Cape circiter 5 iij. per decem aut dubdecirri dies mane jejano ventriculo. Eft experiment. D* Du Val D. Medici in dolonbus, inflationibusSc obilruftiombus Lienis. *Cbefnzau.*

C. B. habet Ebulum fol- laciniatis, quam Pona Ital- ex horto Nobiliffimi Contareni ad sum mi-fit. Vide-Ponam. LiHortoRegioPanienfihodie: cultaefit.

CAP. III.

*Tee-Tjstrou-Yonnagam H.M. P. 5. T. 1%. p. 4J. baccJ trkocca**

H. M.

Major Ponnagam fpecie&eft, altiufque excrefcit, czteroqui ei valde fimilis. *Fructus* tamert a pr^cedentium fpecierum fruftibus quodammodo differunt. Sunt iidem *bacca* tricoc^j hoc eft, ex tribus globofis latsribus confantes, ac fi ex tnbu globulis unitis fint format^ viridi-Havefcente5, lanuginola:, tria diftintis locuhs *Jzmina* continentes, fubrtdunda, nitentia, Nucleo incus candido.

Nafcitur montanis Regni Malabarici locis, praefertim in *Canjocir*: Temper viret, quotannis floret ac matures exhibit fruftus, menfe circiter Augufto.

CAP. IV.

Aaccifira Indiva floribm Hmbellatis, fruftu rotund tricocCo. I. kareta-Amelpu H. M. P-5. T. 33. p. 65.*

H. M.

Arbuculaeft humilis, iepem circiter pedes Get)metricos alta, *cdudkz* tenui, albicante, furva cortice obducto, ramulifque viridi-fulcis Sc geniculatis pluribus donatu. *Radix* fibrata, uigricans, amara. *Folia* geminata circa ramulos provenihnt, oblongo-rotunda, acuminata; craffa, denfa, mollia: glabra, fupern^ atro-vindia & fplendentia, infernelibviridia, inodora, infipida. *Flofculi* candidi extremis^idrculis numeroft proveniunt, pDrreffitque colurnellis umbellx Ipecie panduntur, quinque cvaffis, acuminatis, mtus candidis; extus rubefcentibus lineolis ftriatis foliolis confantes, quinque *ftarmnults* albicancibus, fubrubeftcentibus *apcibm* ornatis, mediam flbris cavita-tem &c umbilicum occupantibus, inter qux *ftylts* prodit purpureus, fupern^ bifidus. Flonbus mar-Cefcentibus aut decidencibus, eorum umbilici in *frulim* excrefcunt j *Ba^as* viz. Cricoc^aj rotuadas, colove viridi-flifco ftriatas, ae^ tentes, inodoras^ infpidas; CrBlbit

SECTIONIS III

Membrum Tertium.

VeAboribus 6^s Fruticibus baccifms, fruttuttrtyraiofm tztracvct.

CAPITULUM

De Vitz vintfera.

Vicis non à vino, Ut vbluit Varrb quatuDr de L.L. fed lit' Dpnatus a •Vetri[^] quodj Fectus * In Eunuch, atligare, Nonius iricerpretatur, TMWM Sc infltfr. SaneVicis lenta est facileque infletr-43-4-4-tur, uude & ba cemiibhñfn hit inlignC, quo' ntilires cardebanr, uti -ofteildit Vtffius in llytmolog. •

Vinum i vi, uc quidem Icribic Varro quatuor de LL. Sic autem Jicitur quia vim inferat menti: Uide Plinianum illud, *Safienttam vino vbunhrari*. Aliis placet Virium dici quif vitinum à Viti. Egft cum Voffio in E[^]mnlDgico plane' cchlo Vinum dici'ab ?F@-J ^ @- verb' effe* à Punicp 5E Hebraro /rfi», quod Be fenfic dodifimus Angdlis Qaniintis. *Etyrnolog. Vvijf.*

↑ ^ ;/.£.

Notior est (ihquic J. B.) Vitis Virifera iji[^]AluVdelcrfii ntbbat, fed gratificemur frigido fubc- <2s S[^]aprençioni: uc vel leftione n^viffle difcant nDttifiaii' etarrt iplis neftarej Hquoris parentecn, j)e Vitiurn qu. nihil abjeclius incuenci videri poffit, fflehi' opis indiga, ridicarum Be pedamsmcmi admiliculu innicens, corcuolo ftipite, hifco rimorþque coreicc hiulca, quix ubi cepidiorem beriignioris neliauram fcnic gemtnas prociidic, in Pampinos pofitmoduhi; ut familiari illis comparacione iirar, Lupi lalicavii abituros, minimi! .tarneh iriamocna ilia apredine horridps, led :larto virorC; fplendEiites : ica uci diximus IUIHD fubhica, capcolorum beneficio admiñcula lita complexa à contemptu vimhcatum fuf z it[^] flofculorum lliaveolencium quinque" fibriljis he[^]bidis, Jufeolos apices/lift in en ci bus compdAihuin [Cjcfalp. flofculpSparvos &c canidos ut Olea: ei ictribui] racemis divicem colono ipeni exticac uvarulu, i] ^{ua5} A[^]5? .nc coloru putes Dbligacam gençroitatcmj dbhra, alias rubrica, alibis uigricie unftas, alilvc colonbus indgnes producit; tanta talique lapomm viriumque varietate quantara-qualcñique" tam^Tailver/a quam Jctunda' wletudrnequbtidic experimur. Florcin fadJic CxJalpinus) nem in fummD frullit fed in lèdehabst, ac plm'a femitia inçommoni coricceptaculo: lirevi tempore in magnam Alitudinem Cfcfcit, icà ut liifi crebra ampuCacions Coerceatur nuilicidine vicularum tuxurians lylvalc.lt. *Folia fert ampk, varit: lacriia'Ca. ut Ficus, quos Pampinos vpcanc,*

Vicis Theophrasto, uc Be Varroni, arbor est. Verum ciim alienx opis ihdiga, nifi in prðpiruici fine qux arripiac, humi provolvatur, Arboris homen non merscur, quamvis caudex interdum in humani cruris auc cciam femojs crafficiem excrefcac. Prifici magnitudinis refpectu arbojibus annumerabanc, qua rev[^]ra drbbres TlonnuHas vincit. Plini[^]m atendamns id demonjVrantem, VDI. 14. c. 1. Javisimmulaturus in i[^]be Populomq. ex una [Vite] conpocimus, tuc xvi. in sumptuon; i[^]ca: MaBilis parum, Mxipontl teshplm. Juronis: viginis columnis iteric. E[^]noni nunc icalis es- E[^]non Ephelice Diana Landine Vite una Cypria, ut fctubt, quoniam ibi ad p[^]ccipuum amphiçid- nem exeunt- Nec est ulliligno diutnno- natura. Hucpercinat qua: de earum proceritac[^] rainbruni Be palmitum mira, excenfione & dentitatd Jiabet. Nulb (inquit) fine crefcunt. Villas & domos ambiri (ingularum palmicibus 5c fequulCibits loris memoria dignum. Una Vicis [^]Roms in Livia: porticibiis Ribdiales inambulaciones umbiofis pçrgulis opacac, eadem duodenis multu amphorii foecunda. UlmDS quidem ubique exfupcranc : miracimque altitudinem earum Ançia ferunclegatum Regis Pyrrhi Cineam facece lulifb in aufteiorcm guftum vini, *mtrib mamm ejus fndzn in iam aha trics.*

t>? Vitiufn genmbii.

C. Bauhirus Vitem dividit in fativans S^E fy[^]lvestrelri.Sariva [iiiqiiit) alia major est, cu^s plurimrf fpecies; alia minor. *Majoris* uvx & colore 5c magtudine differunt: Alccrius namque aoini aut vindes albicamiHve, auf tulvi, aut latuCatD rub ore nigri cant, auc ccErulei, auc llibrubentis-colons: alix acinis oblongis magnitudinèSc formã Prunorum, qriil[^]</iw[^] dicipoceft: ali^rDCimdiS iifq[^] VE] magnis, velparvis: aliajacihirfiinc frequenriaribus, alia: rafionbus. Sum qua: gfanis ant vina- ceis carenc, inçrdum unicum ycl akefum granum habenc, Rarius uva barbara reperitur. *Minor* ^v.er6 est acinis nigris, rariffimi: albis aiic fulvis, nucleo[^]minimo ac fnolli. Saporis etiamdiffcniñt ut dulci,acerbñj mulcaCo, quac Vicis AptiañaPlinio.

In foliis quoque differena est, aliamajora, profundiuscniã, ut lcalica, foliis adpediculum ufq in lacinias[^]cutas divifis, alia mihora funt. Sic alia ceniura, alia craffiora, alia viridia, alia rubenna, alra,maculit[^] alia ad taftim duriora, molliora, alia kvia, alia denique rubijtag. lly C Bauhinus.

L. 14-ti- De uvarum generibus breviter Plinius, Uvarum genera magnitudine, colore, faporibus acini* innumera, etiamnum multiplicentur vino. Hic purpureo lucent colore, illic fulgent rufo, nitefcent viridi. Candicans enim nigraque vulgares: Tument vero mammaram more bumasti: Pradongh daftyli porriguntur acinis, &c.

Genera vitium innumera Sc infinita esse non fecus ac Pyrorum ficPomorum apud Veteres etiam in confilio fuit, cuij (utrefte Plinius) coridem pzne fine quot agri, & nova Indies producentur Sc ufque producentur.

Columellae Sc Plinii gevo celeberrima: apud ipsos videri possunt. Utriusque autoris confensu principacus datur *Amin&is* propter firmitatem fenioque proficientem ubique vim ejus vitam. *QLinque?* harum genera, &c

Proxima dignitas *Nommtanx*, rubente materia, quapropter quidam rubellas appellaverunt *VJ-neas*, &c.

*Apian** apes dedere cognomen, praeipue earum avidi, &c

Arque haftenus, inquit, potissima nobilissimas datur peculiaribus atque vernaculis Italk. Cetera: advenere *I ChioThafove*. Verum cum Plinii & Columellae exemplaria in omnium manibus iuno non opus est plura huc cranferibere.

Nomina Vitium antiqua speciebus hodie notis & ob nobilitatem praecipue culcis accommodatis perdifficile forec ne dicam impossibile. Nos ergo, quibus nec otium nec facultas liippecir, id non tentabirpus. Nonnullas tantum vites quas inter se & ab aliis omnibus species distinctas esse suspicamus proponemus.

I. *Vitis Corinthiaca five apirina* J. B. *Uva paffk m'mores^ vel Patfula Corinthiaca* C. B. *Vv** *Corinthiaca* Park, (*fatft Entwalt* ©JILC)

Folius est (autore C Bauhino) rotundis, crassis^ fubtus incanis in pauciores Jacinias obtusas divisis.

Lobdium Corinthia quae vocatur uva, nomen patriam testata, effigie nihil plan^ differt i com^ muni- Sed algidioris coeli impaciens, gracilitate ram turn racemorum sine exilitate acinorum sipejatur, qui gigartJS carent, funque *^vW*, ut qu^dam Mala Granata arillis vacua- Botri emm ii^ racemuli ipsi conflantur adnulis Piperina ac Sambucina grana xquantibus.

Ebrudonem hiftork auctores huc etiam referunt Uvas paitas Indicas gigartis carentes C. B. Quae sequuntur e D. Georgii *IVbeder* Itinerario translata iunt.

Uvx a Corintho denominata circa urbem eam hodie non inveniuntur crecentes, ab incolis^ forte negled:^ quia deunt mercatores quibus eas divendant, nec enim operx pretium foret vites colere, non permittentibus Turcis naves majores *Smum Corinthiacum* ingredere. Vites quibus innascuntur aliarum fimiles iunt, foliis duntaxat non nihil majoribus. In *Zacyntho*, *Cephalonia*, *Nathaligo*, *Mefalongia* & *Vatris* praecipue coluntur, ubi turn incolae; ex earum mercimonio quorundam faciunt uberrimum turn Venetis ex earum vestigali ingentes redditus quotannis accedunt. Siquidem *Zacynthi* infular folius anrfoa vjndemia quinq, aut sex navigiis majoribus onerandis sufficit: *Cephalonia*: tribus aut quatuor: *Nathaligo*, *Mefalongia* & *Tatra* uni. Pretium in mille pondo Thaleri fex Coronaci plus minus duodecim; tantundem etiam Venetis pro tributo (euportorio dependitur; qui ex hac fola merce lucrari feruntur quotannis quantum Claffi fuae inftrudae Be alends sufficiat. UW qux in his infulis coluntur nigra duntaxat funt^quamvis *Placmti** Italic hujus generis albas vidisse mmini: Sunt autem omnes apyrenae. Augufto menfe cum maturerunt decerptas humi fitratas rariore fitu exfict^nt: ficcatas&a fordibus repurgatas colligunt, & ad apothecas (*Serraglie* vocant) deportant eafque per foramen in tefto ad id reliftum uvis defuper immiffis feu infufis ad fumrum ufque replent, ubi fuapte pondere fublidentes adeo cohaerefcunt trevi, ut quando eximenda: funt *Forram* ends acuminatis eiFodi requirant. Cum in dolia inferienda fiinc ut venundentur mercatoribus & alio tranftrantur, nudipes aliquis in vafinfilis, uvafque fenfim immiffas concuJcandopremitt & confpatij ut in anguftum coaftis dolium plures capiat^ & aere excludo fruftus diutius incorrupti durent. Hsc de vite Corinthiaca ad nos tranftrifit *D. Tanmdus Rvbinfon*.

i. *Vitis folio Apii* J. B. *lariniatis foliis* Park. € 0 e gDarflCp^int,

Peculiaris fblii forma hanc Vitem facile ab aliis difpefcir, quippe non tantum plerumque minus Vitigineis vulgaribus, fed & profunde difteftunij ex pluribus quodammodo foliis apparatus videri poffit, fingulis fegmenris in Apii foliorum formam fuodivifis, itatenuiter, ut plurimis etiam vinito* nbuj quibus obtuJi, non agnolcerentur pro foliis vitium, rara sine divjura. *Botros* fert albosj donates acinis iatis magnis, non mulcum compactis, fed paulo ranoribus, valde dulcibus K iapidis.

Varietas potius Vitis a fatione initio orta quam diftinfte species videtur: verum quoniam ob elegantiam suam & raritatem fpeftabilis nec minus ob uvz prstantiam jamejudum nobilitata^ ab omnibus expetita fir, sine fpeciali mentione 6c defcriptione pntermittenda non fuit. In *Ca^log* ⁰ *Vitium fcltoruma* D. 71w^ .K^ /> /w ad me trahimiffo hanc fpeciem Canadensem cogn⁰ ¹¹ *Canadensis* originis fit, proculdubio non accidencibus quibusdam fed tota *Canadensis* cognominata est, quia a Cornu denfium plantarum hiftoria: inferitur.

3. *Uva pajfa major G*y*r&' Gracis fortè C. B. an potws, Uva arinis oblongis magnitudim & forma, Frunorurn ejufdem ?*

Hx magnitudine eximia, fed przcipue forma Olivae Hifpanicae aut Pruni annula ; at alijs omnibus uvarum generibus facile diftinguuntur.

Hi funt (ut puto) quae ad nos ex Hifpaniis Uvarum infolatarum [Jlaifills? of tje: £>ivi] nomine deferuntur. Eas auem hoc modo exficant, Botiorum feu racemorum quos ad hunc ufum deftinant pediculos ad mediam partem tranfverfim incidunt, adeoq, ficci nutrimi magnam partem intercipientes impediunt nead uvas copiofe affluat & d parçe admodum derivetur. Raceios femiteftos in vite pendentes relinquunt, donec paulatim calore folis fic aliment! inopia exficcentur: cum fufficienter exficcatos fenferint demetunt Be in vafa recondunt.

4. *Virginia P^ik. jlv. Virginia P^rk. Qtt}£ ittittl ©inc Of Virginia.*

Labmfis feu Viti fylv. Europaex caetera fimilis, acinis folis differt, qui minores funt, paucio ficcoj gigartim verb duploma. Harum tres fpecies feu varieties funt, 1. Acinis albis minoribus. x. Acinis majoribus cEiuleiSj acidioribus. C. Bauhinus è contra ex Hariot. defcript. "Virgin. Uvas tenues acerbas facitj majores dulces. 3. Vitis Vulpina ditaa corce rugoioire folio paruni difleffo Jed duntaxat Jerrato, acinis albis vulpem obolffntibus Be relipientibus.

5. *Vitis fyheftris trifolia Canadznfis Park.*

Ortu Scflagellis, necnoti fcandendo mo Jo cum reliquis Vicibus fylveftribus convenit, foliis diEfert, dimidio minoribus, trip^rtitò duntaxat iivifis, ad pediculum ulque cui infident oblongum., glabrlinij pertingente inciione, adeD ut terna videantur in unoquoque pediculo folia, craffiufulca, of leurè virentia. Fructus urin reliquis fylvdtribus pauca carne, cute Be vineis craffis conftat.

Uvarum genera in Anglia hodie maxime cebbria, qmbus comparandj & cohndis Vinitores przcipue operam dant, funt^*

1. Mofchatellinae albas 8c rubra, rJljc folijtC ant) ttb Sl^Ufcabinc. Sapore dulci flint, came nrma Be folida, turn acini, turn raceini maximi funt. Parkinfonus racemos nonnulbs fex libras pendentes obfervatos tradit, acinos dimidiam unciam.

2. Parva:nigrae feu Connthiac^ Ckjc finall felactf &&\$, 0? ClullergrapC, 0; Cuccant^ qra e.

3. Uva Canadenfis feu Apii folio. Qlty CanaHd. P^rk : grapf.

4. Uvx Frontinianz duum generum, albac Be rubrx fapore flint dehcatò qudD vel vinum indè expreflum declarat generoiffimum Be mofchum redolens.

5. Aurelianenle rubrum 8enigrum, <efyt rcti aill blivP^ cD?Icai10.

6. ^Tljc. ^atfill Of tje ^III grape* Uvs inblando in vite pendentes exficari folitje. Has maximi flunt turn acinis, turn racemis; colore per matuncatem rubente.

7. Cljc 25udet:gcapi. Emaximiseft^ alba, omphacio magis quam vinoidonea. iEftate tamen fervida maturelcej mitis Be palato grata evadit.

8. yCfje t5?ape ile SHrfui^ Uvi Arboiiax rubrac five nigrs J. B. à loco in Burgundia ejus nominis difts lpeftandx pukntudinis fiunt: acini magni, fublongi, ovales^ carne firma, dulces tamen. Difficulter maturelcunt^ Ideoque frigidioribus locis non conveniunt.

9. Cfjc 33lirfaru6t:grpC^ Uva. eft alba, dulcis, fpeciofa, przcipue xftimatioiis circa Panhos.

10. GLI^C a^ufcat^gtap^ Uvx Mofchate, Apatix Plinio, C. 6.

11. Cljc Ctliavp:grapC. Uvae Canannx à Rheno hue tranflata.

Dantur etiam Uva: ijon tantum cuticula exteriore nigra, fed Be iucco intsiore ex purpura nigricante feu "fanguineo.

Quod ad locum attinet, Vitis (ut refte DodonaEiis) coelo calido laetatur; ftiuofflimi tamen Ly^m non defiderat, fiigidum verò Be glaciale non fuftinet. Eleganter Columella, Vicem nos caExeris fipitibus jure prseponimus, non tantum fructus dulcedine, fed etiam facilitate, per quam omni paene regione, Be omni declinatione mundij nifi camen glaciale vel przfervida, curx mortalium refpondet: tamque felix campis quam collibus piovenit^ Be in denfa non minus quam relblita, iipe etiam gracili atque pingui terra, ficcatque Se uliginofa. Deinde quæ cui regionis ftatui c«U folive refpeftu turn genus Vitis, turn cultura conveniat exponit, qu^ apud ipfium requirenda omittit.

At fi voto Cinquit) eft eligendus vineis locus Be ftacus^ctEli, ut cenfet veriffimè Celiis, optimum eft folumnsc denffim nimisj necrefolutum, foluto tamen propius nee exile, nee lEciffimum, proximum Camen uberi, nee praeceps, fimile tamen edito campo, necficcum, nee uliginolum, modicè tamen jofcidu III, quod fontibusnon in profundo terra: fcaturiat, fed ut vicirium radicibus hunioreni Jubminiftrèt, eumq, nee amarum, nee ialliim, nè faporein vini corrumpat. Coelum porro nequæ glaciale vinca, n^cprorliis a^ftuolum defiderat, calido tamen potius quam frigido ktatur, Imbribus magis quam ferenitatibus offenditur, 3e Jblo ficco quam nimis pluvio eft amior: perflatu IID-dieo lenique gaudet, procellis obnoxia eft. Haftenus Columella.

QLID regio calidiot eft èoUvx felicis maturelcunt, Befucco meltis concofto vinum geherddus pr.tbent, modò calornonlic intenlior quam uc eum vitis toleret, ut in InAis, Arabia felice, iEgypto aliif^ regionibus intra vel prope Tropicos jacentibus. Hinc in Hifpania, Gallia Narboneni., I^lja, Sicilia

Sicilia uber est potentis vini proventus: in frigidioribus, ut Gallicae parte Septentrionali & Belgio vinum tenuius est Bt oligophorum. In Anglia, ubi vites palmitibus luxuriant, 6c uvarum etiam teracilliferae sunt, ob defectum tamen caloris fucus plerumque emdiore est 6c acidior quam ut ex eo vinum fiat; nisi vites parietibus affixae, hinc Sohemeridiano expptitae, radiorum tapore rest exi one reduplicata foveantur, inde à ventis Septentrionalibus Sc Orientalibus parietum objectu defendantur; sicut in colle ad Meridiem prono 6c à pnedictis vendis tuto stantur.

De Vineis instituentis, de feminis editione, deque Vitium pactione, positione, pampinatione, ablaqueatione, putatione, reliquaque cultura prolixè agit Columella, alique reiruficae Scripatores, ad quos Ledorem remitto.

Vites autem, pro Idcigenio, vel i. arboribus dicitur, ut ohm Ulmis 6c Populis; Nunc dierum in Lombardia Italian agros frumentaceos adeo densis arborum ordinibus conferunt ut desuper intuenti vites videantur; juxta fingulas arbores vitem stantur, quae ramos ejus conferant; Vitium autem palmas ab arboribus ad arbores tradituras hinc unigenis vites dicitur. In: et arborum ordinibus tunc cum locum, ut agri simpliciter pactionem hinc, fructu, uvarum, ligni. Hinc pactionem vites dicitur. Vitis in vites dicitur. Vel 1. Pergulas 5c ambulacra opacant unde *Yrgulana* dicitur. Vitis jugis incumbunt, quae edamensis canterifque tranversis constant, ilque vel directis tantum vel in lacitudinem etiam fufis, cujusmodi vites *Compluviat* dicitur. Vel 4. palis periticique firmantur; altitudine humanae alicubi etiam majore: cujusmodi vineas in Germania fecit Rhenum & alibi plurimas vidimus quae lupuletae nobis apprimè referunt, ni periticae humiliores elient.

Dejiq; nonnullis in locis, ut circa Montpellier, statim se vites sine ullo pedamento. Stipes vix excedunt cubitum, 5c palmes veteres fere omnes quotannis abscinduntur. Novi autem herbarum modovaganrur per arva/ 6c fucum rerrz passim vix bibunt, ut Plinii verba usurpem. Hujusmodi vineae Salicetanoftraari Tulantiur.

Notum est (inquit Paulladius) majores uvae, pulchrae speciei, granicallofi & ficcoris ad iueniam; feracillimas verb, & cunctis tenerioris, 8c sapore nobilissimae. Be maxime quae citius deflorescunt, vindemiis esse fervandas.

Vires.

Vitis vinifera folia cum claviculis trita & imposta capitis dolores mitigant, itemque stomachi inflammationem Be ardorem cum polenta. Id ipsum etiam folia per se imposta praestant, quippe quae refrigerandi adstringendique vim habent. Potus eorundem fucus juvat dyentericos, sanguinem creantes stomachicos, mulieres malacalaborantes. Lachryma vitium, quae veluti gummie quaeque circa illarum caudices concrevit [in vitibus nostris cujusmodi gummi sponte exudans non invenitur] ex vino pota calculos pellit, inuncta lichenas perforas lepraque nitro affrido praeparatas sanat. Eadem cum oleo facius pilis illitis pilotho effectum habet maximeque liquor quem accensa fermenta vitium viridia exudarunt quo 8c peruncta: myrmecis tolluntur. Cinis autem fermentorum 8c vinaceorum circa fedem conaylomatis 6c thymis illitus ex aceto medetur. Prodest 5c luxatis ac viperarum moribus; quin & contra Jienis inflammationes facit cum Rosaceo, Ruta 8c aceto impostus. Plures adhuc cineri Sc lixivio ex eo parato vires ascribunt Botanici: Venerunt cum cineres lignorum eorumque lixivium non multum inter se differre nobis videntur, nisi quatenus lalem fixum copiosiore aut parciore contineant, eas omittimus.

Uvae, ex sententia Galeni, quemadmodum inter fructus Autumnales principatum obtinent, id fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumque pravi fucci habent, praesertim cum exadam maturitatem sint adeptae. J. B. Quia licet uva recens alvum turbet 6c stomachum inflat ideoque eam esse in febribus interdicitur: qua: vero decreta aliquandiu pependit propterea quod ea ventilatione magna humiditatis portio decessit, innocentior est, ac tum stomacho utilis est, tum appetentiam ciborum restituit, atque adeo segris languentibus proficua; 5c alvum emollit. Ceterum magna est inter uvas differentia, dukes enim riliagis nutriunt & corpus pingue faciunt, ventriculum miant & alvum (ubducunt: Auferunt: e contra parum nutriunt & ventrem cohibent.

Memini me alicubi legisse Matronam quandam Germanam toto vindemix tempore per unum aut alterum mensem, quo uvis visitabat, nullum omnino potum haurire solitum, unde patet uvas litem restinguere.

Vix Pa (te non a patientia distat Turnout vult Plinius, quasi folem passim, fed a pando quod ad folem expantidantur. Montpellier Uvae Pallas hoc modo parant, Racemos binos hincillinu filii ligatos vitiosis acinis fornice detractis, ferventi lixivio, addito olei paululo immergunt, quoad flaccidant tantum 6c corrugentur; deinde periculis imponunt ut ficcescant, ac post induum quadriduimve infolant, ut Columella docet, J. B. Uvae passim, vinaceis exemptis alvum leniunt; pectoris angustia ruib, exasperatis faucibus 8c renum vesicarumque vitis, maxime conveniunt, unde 6c Piffanis distis inimiscuntur. Zibex distis h. e. Passim maxima: seu Damascena: exemptis gigartium in aqua fontana vel fistulata convenienti infusar, potum aegrotis exhibent satis gratum, litique convenientem. Passim apyrens Corinthiaca: distis aciditate grata cominendabiks, refrigerant magis 5c febncitantium Pculis utiliter incoquantur. Gigarta vim habent adstrifloriam, conveniuntq; in vomitu & alviifoxu, five intrinfecus, five extrinfecus adhibeantur (torrentur fd. ac teruntur.)

Knacea, id est, filiqua: cum gigartium expreffione multo refidit, magnarum virium perhiatur in arthriticis doloribus fedandis, Ji membrum affectum vinaceis per se calefactibus imponatur. « passim calore suo ac Sc penetrant dentes & gingivas vdiicant, maleque afficiunt; & quæpter comeftu ad putredinem disponunt.

Liquor illis generosus ex uvis, ut Jioris est, calcatis vel sponte effluens, vel torculari expreffus fermentatus vinum vocatur, quod nomen à Græco AOC- factum est, spiritum leni mutato, autem ab Hebraeo «w Jan diximus.

Vix uilis facillime explicare omnino supervacuam est, cum non possint non omnibus notissimi. Licet tamen hic mferre de vanonum à D. Hallstede & Antonn de Heide Centuria vanonum qua tertium ordine de tribus 8c ad me missam. Ad Aphthas pratermirtendum videtur,

panis videtur, quod in quibuslibet agris aphthofa videtur non crassa lingua & palato a deo pertinaciter adhaeret, ut Ianicinus gangraniosus sed à deo dicitur Raparum, Hordij, Bui que contra Aphthas maximè conducunt, intra paucos dies abstergeri baud potuerat, xpi licet à fube inuicines essent brevi tamen fugatur potu vini Gallici: quia particular aphthofae fubinde acriore stimulo, ad sui libel rationem egenc.

Genera vini Veteribus celebrata recenlet Plinius lio. 14. c. G. D. Augustus (inquit) Setinun1 eunfts prstulit, Be fecuti Principes, confella propter experimental See. Nascitur fupra forum Appii [Setia oppidum est in colle a Terracina quinque millibus diffitum; hodie *Sezza* Antea CxciibD eraC generofitas, celeberrima in paluftribus Populetis, finu Amycland, quod jam intercidit Be incuna coloni, locique angustij magis tamen fossa Neronis, Bee. Secunda nobilitas Falerno agro erat, & ex eD maxime Fauftianp. Exolefcit quoque hoc copia: potius quam bonitaci ftudentium. Falernus ager a ponte Campano laeva petentibus urbanam coloniam Syllanam, nuper Capua; cantribucam incipit. Fauftianus autem circiter 4. mill, a vico props Cedia, qui vicus & Sinueffa G. millibus abest: nee ulli in vino major auctoritas. Solo vinorum flamma accenditur. Tna sju5 genera, Aufterum[^] dulce, tenue. Quidam ita diftinguunt: Summis collibus Gauranun gignij mediis Fauftianum, imis Falernum. Non omittendum autem, nulliorum qua: celebrantur iucundum faporem uvac effe. Ad tertiam palmam varie venere, [^]/[^]w[^] urbi vicina praedulcia ac rora in auftero. Item Surrentinajn vineis tantum nascencia, convalescentibus nTaximè probata propter tanuitatem, falubritatdmque. Tib- Ciar dicebat copfenfille medicos ut nobilitatem Surrencio darent, alioquin effe generofum aceturn. Certant Maffica aequè ex monte Gaurat[^]p Puteolos Baiasque Diopeftancia. Inter Grxca vina maxime celebrata fuere Maroneum in Cherfonefo Thracix, Xhafium[^] CreticLim, Coum, Chium, Lesbium, Iariurn, Smyrnuxum, Sec. Inter Asiatica Cyprium, Bemontis Libani vina. Reliqua genera vide [^]pud Plinium loco citato. Npftri enim infituti non est omnia vini genera quorum nomina apud[^]eteres Be Recentiores occurrunt enumerare. Sufficiat aliqua eorjm qux apud nos hodie in ufa Be pretioliint breviter indicaffe. Ea lunt c Gallicis 1. Pañlinuii, tenue Sc oligophorum, ubi berie maturum grati faporis 8& studiosis aptum, *Vin Je Paris, Champagne*; a. *Uampanum* omnium Gallicanorum delicatiffimum: ?. *Burdegahnse* (eu Gravianum. COU^r inon Claret *WVZ*, u? *2avt\$ Wimk* 4. Vinum *Burgundiazum*, 25lirgUlilip HDtdC: inter Burgundiaca autem primuin locum obtinet Beauenl?, fecundum vulgare proverbium Vinum Belnenfe fupet omnia recense. J- *Vinum album vulgare*, CoilimOD idljite 3@xne, 6. *Vinum Frontinianum* generofiffimum & mofchum redolens. 7. *Kina Aureliamnfa* magni fiunt in Francia pb generalitatem Be falubritatem. 8. [^]ermttasc, Vinum Eremiticum.

Ex Hifpanicis ufitatiffima & notiffima funt, i- Caftarinunij *catAnty:J&atk* omnium laudatiffimum, generolum & c lene[^] naturae ami cum. 2. *MaUcense* vetus, [^]alagtl j&nth, praecedente etiam opimius Be pinguiSj ad ii copiese fumatur caput gravans. 3. *Xwanum*, (&t)ezyp^r j&atfl, aufterius Be palato minus gratum. 4. *Alorienft*, 3HlicatIt H9int, rubrum 6& crastunij palato quidem gratum[^] at ftomacho minus utile Be caput gravans. Huic non multiim diffimile est gemisiUud, quod noftratribu5j Ctllt tDinc dicitur. Nominis Yatio mihinondum cognita. Adfertur etiam ad nos ex Lufitania Vinum Portuense [^]02t0 JIOH Wih[^]fc&. rarius. Vftium Madera: Infula: ex majori parte in Americam transfertur. Ex Italicis pauca importantur[^] ex Hetruria *Vinum Fhrmti- wwwrfcrH[^]ftomachocommDdiffimum* 8c in conviftibus faluberrimum- 1. *Vzrdza* dj[^]umjtidem ex Hetruna, album, dulce Be lene[^] magis gratum palatoj quam ftomacho utile. In Italia ipfa celebrantur, Venetiis *Vm.Mal-vancum, Mafoafia*, Canarino proximum, ne>n in Italia natum fed III Greta iriliila; *Vicztinum rubrum, dulce . & piccante* ditum. In Hetruria *Falifcum* five de monte *Fiacone*, Roma: *Albanum* Dlim celebre, Be de monte *Pulciano*; *Syracufanurri* ex Sicilia infula; Neapoli Vinum rubrum *Lacbrum** *Cbrifti* dii5tum, Sc Vinum Grzumad radices Vefivii montis ortum*

Vinum Mofchatellinum rubrum ex infula Creta defertur. 3ietl fliyilfcaDilic.

Ex Germanicis Rhenana folaaat non procula Rheno rerhotae origims ad Jiosimpurtantuiy ut Nicrinum *fyztat T&int*, Rinchovianum, Hochamore, Mofellanum, Be *Baccher**c,

Vinum autem aliis potulentis quibuscunque Cerevifiar, Melicrafo, Pomaceo, ApiiLi, exterifque c, fruftibus faftitiis turn voluptatis turn falubritatis relpeftu longè antecellit. Nunc dierum vina aufteriora quamvis palato minus arrideant, venrriculo camen commodiora Be cibo coneoquendo rha- gis idonea cenfentur; ut vina rubra Gallica Be Florentina, qua: aperiufcula 8e ftiptica linguae Sc palato fentiuntur; quam alba, quaelenia Be dulcia. Verum fi omnia qua: de vinis difta fane & adhuc dicenda refant perfequi vellem huic fbli hiftoriznon unum volumen fufficeret. Qui plura velic legat *Andrea Baccii* eruditiffimum opus de Vini generibus Anno iy?6. Rom[^] impreffLiTi, in quo quicquid ab Antiquis Be Recentioribus ds Hiftoria Uvac proditum occurrit complexus est, una cum Obfervatiombus plurimis propriis Be animadverfionibus in Vina Graca, Italica, Hifpanica, Gallica 6e Rhenana, eorundem culturas, locos, nomina, varies prsparandi Be traftandi modos, morbos Be remedia, vaforum veterum Be novorum multiplicem varietatem, eellas, Bee. relpicientes-

Omphacium Veteribus ficcus erat acerb* 8c nondum maturz uvae, Sole rehecatus Be denfatus ad confittentiam Rob. Recentioribus est fuccus Uv[^] immature expreffus, colacus, in dolia reconditus, fic vafe elaufo affervatus. Utrumque refrigerat Beficcac j hoc non ad medicamenta tantum led ad ciborum condimenta Be intinfus utile est, naufeam ac cibi faftidium tollit, appetentiam excitat, alvi fluore5 repnmit, ardores ftomauhi alioimque vifcerum mitiga[^]. non modo intus fumptum fed Bt foris admotum.

DiDfcoride autore, Omphacium Veterum oculoriftu daritati confert, eorundemquecabritise Be angulis arrofis, quod hodie de pomorum fylveftrium agreffa verum expeimur.

Schroderus Omphacium calidis morbis omnibus feliciori juvamento effe ait quam acetum, quod prater refrigerandi vim & caliditate acri pollet, fecus ac Omphacium.

^s«p», Gizcis 54^{''}^*) W[^] ingenii non nature opus est, mufto ufque ad tertiam partem msn-
K decofto. Plia 1.14- c. 9. Be 1.13- e x . .

Defrutum C^v \mz\lx idem est quod *Sapa* P^Jinio, nimirum muftum ad tertias decoctum. Plinius *Defrutum* a *Sapa* diftinguit, quod fit muftum ad dimidiam decoctum. His addit *Palladms*, *Cafanum*, quod ait fieri cum duabus partibus deperdnis tertia refnanfenf.

De viribus 8c ufu *Sapa*? hihil atfinet dicere cum jam dudum in deiuerudinem abiit.

Lora Garcis Aim'e/a fbu vinum fecundarium, fie ex maceratis aqua vinaceis. Tria ejus genera Plinio. Decima parte aqua: addica quae multi expreffa fie, & ita nocte ac die madefactis vinaceis, rurfiifque praJo iube(Stis. Alterum, quomodo Grarci faftitavere., rertia parte ejus quod eNpreffum fie addira aqua:, cpreffittque decoiftoad tertiaspartes. Tertium est faecibus vini expreffum, quodf^catim CaCo appellat.

Sfirim Vini. Spiritus vini feu Aqua Vitae est liqiiior h vino deftillando in vafis idoneis elicitus. Calidus est & ficcus, pentetranciffimus: Eximii u/iisin animi deliquis^ ut vel naribus admotus Ddore /IID animam re- vocer^ in cordis palpicatione ac tremorej reffitic pun^edihij in rantum ut carnesvel cadavera eiinirgr- fa, diu iervan poffinc incorrupta; (pirirus languenrcs refocilJar, apoplefticos Be comate opprenos juvat. Extrinfecus refolvit rumbres frigidos ac fiihoths, arcet coagulaciDnem fanguinis in contufionibus, cruoruniquerefolvit ac difcutit. Nihilis ccrpiose 5c frequenter pro potu brdnario iimpcus caloremriarm^Ieni paillarim ^itinguit, ventriculi tonum relaxar^ appeticum profternic, to- camqie natura: cecDnomiam ilibvertens tabem 8c mortem inducit. Menftruum est (ut vocant Chymici) hoc est, folvens/ad tinfuras exerahendas aliaque nobiliffimum.

Azetum. Acetum fit ex vino vel in loco nimis calido detento, vel diutius reifervato, vel SoJi expofito. Arts fit cum vinum aut cerfiffia coquitur, refrigerati/quefermentum, autpanis calidus hordcaebUS [qu^ unus Dmniumpraevalet] autPift, autHordeum toftum impo^hitur. J.B.

Aceri ufus frequentiffimus est Be fere quotidianus in cibo & medicina: in ciboadconfeftimenta Kin- tinfus. A^petentiam cibi excitat, Seconcoftionem promove^acidum ventriculij quDCibi maxime conficiuntur, rob^*rando.

In medicina ufus est ad acetum febrilem contemperandum, putredinem arcendam, phlegmaticos & glutinofos hum ores incidendumj ut exeretioni &c expecttbarioni habilesfiant. Excrinfecus ica- biem^ prurirum, hcrpetem, &c. calorem eorum contemperandoj 6c malignitatetn corrigenda ja- nat. Nervis, nervDSilque partibus inimicum est: corpus qu^qus extenuat, unde macilentis ejus ufus incommoduseft. Memorabilis in hanc rem est hiftoria quamnarrat R Strada de beJJo Belgico 1.8. Chiapipus Vitellius generalis castrorum praEfedus iib mediam fere aetateixj increfcente^adeo mol^ ut a facia e collo demiffa luftinendus cfler venter, vidensinde qgotidie tardiozem h reddi ad belli munia, vinofua Iponte fibi interdiCto, acetum exindebibere ad viti ufque finem pcrfeveravir, effecitque ptdetumelcente abdominc, dffluentcquc ventris pcle^ qu^ipfe Jk rhoracis inftar involvs- batj oAogmta feptem Jibrarumpondo decreviTe compertus fit.

Adufpen/bsaut fuffbeatos etiamfi fpumam emittant, da bibendum acetum muJum cumPipere, aut Acetum cum pulvere Pulegii & Pjpere. Tres lervatos vidit Chnftophorus ^a Vega, *tbzfnca*.

Ad rineam IV Zinzib. f iij. decoque in Aceti acerrimi &c Butyri ana tfe/5 quoufque Acetum (iccon- fiimptum: deinceps contunde & cum Butyro fiat ung. quo man^ K iero tinea inungatur, Bi jnw^3 quatuor aut quinqu^dies fanabitufj (inquitlib. Arcanorum) *Mtm*, Obfervationes e ChefheaucX- cerptas tranfmiffit *D. Hulft*.

Vapores aceri in peffe ufus est eximiusde quo medici cotifulendi.

Tartarus. Pro Tarcari Hiftoria, ufii, praeparationibus, &c. vide chymicos fcriptores; plenam uvae hiftoria- m fcribere mihinet locus nee opportunity est. Tartarus est vel albidus vel rubefcens j albidius magis ^ftimatur^ ut pun or Zc minus terreftis; optimus c German] a defertur. Ejusp^rparatioies habentfacultatemattenuandi^ incidendi, fcaperiendi.

Creniore Tartan ad oP dato ardor ventriculi jam deiperatus fuic iublatus. Etmuller. prax. cap. 8.

Ad fingultum ex inanitione Rf Vini Hifpanici Be Sacchar. q.CF. Syrup, liimat xger frequenter. Ex Manu/crypt. *D. Fagt*, Medici Suffblaenfis.

Bulimos curatur oprime per Vinum, quod quo i^etuftius eo meJius. Malvaticum pr^* c>tens convenit.

In pica Be malaria Ipecificce commendatur a quibusfilam aqua pampinorum viris vere ex vitiumfur- culis ftilians.

Quidam faniffij maturinglunt obnoxii, hos optime curare /olet haufus vini Abiinthitis.

TumDr cancerofus omnino curatus est in quodam viromihi familiari ex u/i vini-Rhenani- lib. f. cuiinfundebantur Raphan. Sylv. Jij. per horas duodecim; in cujus ufu perfeverabat per dies otto Vel decem matutino tempore. Ex MS. D- *Fifht*, M. D. communicavit- *D. Hulfe*.

Admixtionem fanguinis ft pulv.foL Viris qua: poft Vindemiam rubelcunt Si. cap. in Vinalbo. E lib. Arcanor. *C&efmau*.

De Spintu Vini illud adnotandum quod illis qui cDnficitur ex frumento multo magis anodynus nz quamalius. *Muis* inPodalir. redivivo p. 51.

H: Uvas /u/pen/as putridas, projice in aq. ferventem per horae dimidium ; eas fupra ardentem pruna5 injice, fumiimque excipiat mulier fepties in die ad deturbandum foetum mortuum. Mirabile (*' quit ZacutusJ quod in tarn facili remedio tanta visrecondita fit, quod ego feliciterfum expert, tb.3. Prax. Hift. c. 17- ObfejV. i. •

Spiritus Vini vulgarem ('25^andp, i. e. vinum uftum) cum pulverizat. Zingib. mixtum, » former jnffullatum in ejuiaemlatens cum partf affectanarsm^ vel parti do!enti applicatumj ab » penentia frequemi commendat *D. Halp^* in* OdontaJgia, cum alterutra cxgingivis afficiturabiqueuu dentiuin carig aut cavitatp.

CAP. II.

The Slenjium (ive Tfia Japnmfihts Breynii. Cbaa₃ Hzrha Japonic J. B. lib. 17. c. 1. C. B. f. 147. <LJC €jje g? le a \$€Jant.

The compluribus Be den(is ramis est frutex: Foliis obfcuſ viridibus, per circuitum ferratis non ta» Chamaelsagni, quàm Spiral Theophrasti fubftantia Be totp habitu aequalibus, iāporis exficcantis, cum quadam amantudine - Flares proferens (quantum ex piftura, Be duobus, at impelfectis, exjaponia tranfmiffis flofculis conjicere potui) Cifti freminae Be Goffipiimediam faciem obtinentes, uberrimoSj quinis foliolis albicantibus aut pallidis confanteSj itaminulis multis medium florem occupantibus. His demum fuccedunt/rw.J^f, dum adhucvigent fut ferunt virides, reficcati autem cortice magis rugofo, ex fpadiceo fufco veftiti, in quibus non minùs quàm in Coeds Oricntalibus mirabili varietate mutabilis Vortumnuſludit: quidam penitus gbboli liint inftar diaoruiTi Coccorumj eā etiam inagnitudine, aut duplo parns aliquanda majores, femē tantum unicum continent: alii contra geminaci, five in duos loculos difpertiti, alii verò trigoni, forma Be magnitudine à fructu Riopo fimili J.B. nan adrijiodum abludentes: Hi tpaturi ubi fe aperiant in tres, illi in duas dehifcunt partes, quarum quzlibet fimen continet, quſd vd orbiculare planè ai Styrcacis, vel quia minùs fplendet, adFructum exoticum ij.a)jacobo Garetd acceptum Cluf. propius accedens, vel in una parte feffilis, nonnunquam etiam triquetra est nucula, tenui putamine ScLvij fpadicei feu lubrufi colons, excepta bafi [qua parte adhsefk] albidā, confans, quo nucleus fubalbidus pallidufv^ ac valdè rugo/us, guftu prinium duki, poftmodum amaro Be naufeabundo, tandemque calido Be validè exficcante, cuticulā tenui Be rinerea obduftus, continetur.

Catalogum Autorum qui dehocfructe fcriperunt vide a^>udJac.Breymum Exot. Czntur.i.cap.fi. quibus add^ D- FecblinBclgx Traftatumdc Theaanno 1684. editum, in quo hiiloriam ejusplenum traditj Be contra Sim. Paul^j uſum ejus defendit. M. DnFour hiftoriam Thc^ Lugduni impreſſam 16B.; Be Traftatum quendam Anglicè conferiptum Londini 16B2.

Verum omnibus quae de Thea ſcripta ab aliisfunt ObſervationesD.^/Aff/wi ten R&jwe,magni Imperatoris Japonic medici, praEferendas cenſemus; qua: apud Jacob. Breynium habentur in Appendice ad Exot. centur. 1.

Semen hujus Fruticis circa menſem Februar. terrz (ni nimio indurata gelu, vel nive altiùs teſta fit) mandantjaponeſequenti methodo; In terra bona, dulci, non ialla^ neque limolā, neque arenofanimi^ fed temperatajTotundum ad octo aucpaubl minus polliam alcitudinemfcrobeniefrodium^ cui à 40. ad f o. feminales foljculos confertim injiciuntj, exinde ſcrobem operientſs, ſundemque inhorrefcente bruma ftramineis ftoeis tegentes. Hs autem feminalia capitula community in ſex^ octo., decem, ad quatuordecim^ Be quandoque plurcs pauciorilvs fructes, propullulan^ quos ablqs ulteriore cultura naturae ingenioque ILID relinquunt agricola.; niſi quod eòs abinutilibus herbis repurgent. Stripes autem quo in ſpiffius glomeramſn altiDrenique apicem /rarius tainen ſupra quatuor aut quinquepedes) exfurgunt 50 melioresjudicantur, mollioribus utpote magifque benignis fohis, quſ rarerer intra primum triennium decerpunt Japones: decerpunt autem plerumque menſe ſiio tertio, qui ordinarib juxta noſtrum Aprilem eſtj nonnunquam adufque medium Maii procurrit (anno mirnirum intercalarij quovis triennjo recurrente) quando matres cum ſuis infantibus Be ancillis folia hzc calathiscolligunt, novella òc recens edita ſubflaveſcente ſuo virore fie parvitate à virentibus foliis facillimè diſtinguenda^ cūm parum adoleverint ficca tempeilatej quacunquē diei hora, inprimis intenſiore Solis ſeſtu, avulla circa velſeram portant domum.

Turn fingula folia ſulae ex ferro patlla: Simcar, nitiAc, candenti atque obliquè collocatae: [ne tnanus comburant] injeſtanq eademque manibus aſſidue verlant, ufquedum flacceſcant, mundis tune ftoeis papyrove imponenda, acperflanda flatellout ftiſgeicant; hinc in planis ex Arundinē Indica confectis corribus conteruntur, donec compaſte criipentor: hinc iterum in pura Be modicc candeſacta patella uti antea manibus continue verſantur donec mediocriter induruerint, dcinde patella exnuint Be ſlabello frigefaciunt, Be in tertia ac quarta patellis per gradus minus calefaſtis revolvyunt, ut majorem ficcitateſ duritiemque contrahant. Tandem ollis intrinſecè vitreatis bene claula fervant^ Se in urbes pagolve venalia tranſferunt. Poſtquam autem per Sextiduum circiter ollis referata fuere, eafdem aperiant, foliorumquedeleftum, minora Be teneriora à majoribus Sc durioribus /eparando, faciunt, ultimāquevicein quinta patella ſecuritatſ ergo ficcant, in annos tune durabilia, fi accuratè obturata teneantur.

Pro Imperatore Be Magnatibus majors ſtudio Be cura colitur. [Prope Miſko urbem locus Daſi diſtus tocius Japoniae in hoc opere princeps eſt] Frutices nemp^ à nimia pluvia, vd intenſo ardorſ frigora^ve, citerifque aſris, injurils &c pravis purgamentis, volatilibus reptilibuſve infeAis ſtudioſe prasmuniuntur, juſtongantur tempore, Sec,

Congrua tempeſtate ſcrupuloſa foliorum fk electio: tenerrimi fruticum rahiufculi primaevſ in apice foliis nudantur; quz eapropter canſlima potentioribus refervancur emptonbus; hie autem à mediocribuſ; hare iterum à majufculis, hornotimis tamen fingulis, fegregantur: omnia in umbra ficcantur-

Ruricob Be tenuiores folia eo quo diximus modo pr^parata promifcuc in ſeneo cacabo aqua repleto lento coquunt igne. Be fic toto die pro communi potuin foco liilpenſiim fervant; doneg lteratis tinſtura folia ilia debilitate rejiciantur,ingefſtis protinus novis. Primates autem Be bcupletiores cives nulluminredomctica opus majors diligentia, faſtu atquenitore Be artificio curant quam fui Tchia p-aeparationem. Quandoquidem qui in carteris parciſſimac ſunt fupetleſtilis copioſo Be fupexbo inſtrua famulorūque apparatus impenſeimo ad ſuperſtitionem ufque geſtiunt.

Infrumenta font ex electo Dphite mola (quali noftrates lēmen Sinapi conerunt) qua fuuni *T'chia* in tenuem poliinē commolanr. Prxterea fornacula, ex mixto cum aliis metallis sre Artificiosē fusa, cui aquā plenam cucumanij ꝥꝥ cadem mateia confectam fuperirripouunt, uttemper parfto fit Lympha fervens. Hinc exiguis cochlearibus (ex teftudineo cornu aliōve pretiofo ligno, Vel ctiam merallis fabrefādilis) viridem ilium ac bene fragrantē pulverem *Tchia* catycibus suis infundunt, ac Juperfusa cum mundato hauftro infundibulōve aqua rēvida pulverem hunc minutulis, 5X Arundine Indicā crenamm formā artificiosē concifis, *fstit* tandiu quaffant donec in fūmam elevecur. Famulnsqui in hoc opēra occupantur omitto. Sinenfes autem (quorum merhodum noftrates fequntur) fervefātam in cupreo cacabo a quam ficcis integrifque foliis *Thee*, lingulari *ollx* prius Inje. Jlis fiperf. indunt, cinfuramque extrahunt, quam limpida aqua ad gratam amaritudinem temperacam calide fbrbent, faccharumque uclurrum una maflicant, uti BE noftrates, rariūs autem Japonēs, tamēfi >AVWJ?^A. Deinde novā affiūa aquā tinfuram iterum extrahunt fecunda vice, quā debillor est primā, poltea felia abjiciunt qua: (ociisnavalibus .meliorum defeftu acetariorumvicem fupplcāt. Japonēs autem iisdem foliis rubentes papulasac cutaneafudamina curant; atqus in tin-aoriaarte eadem f vetufta hcet) ufurpant Mauri.

Locus. Fruticis hujus natalc folum vanuin est in *Japonia*: plurimus in regione *Fifien* crefcit. Hurpo g^{all} dec neque arenofa neque lucofa nmus, neque declivi neque acclivi nimis, aprica Be temperata plaririe Jartior : multis aūtem in locis interipfa frumenta in pulvillarum lins rutices Thea: cDnfitosin- rearj. In *China* etiarti cfecit-

Pretium pro folioruTi magnitudine variat. *Quantum* namque *magnitudim furfum decrifcimt tantum pretio accrefcunt*. Tanta est autem pretii differentia, ut una libra hujus The[^] pluris veneat quam ceitum libræ alterius : Foliorum verò bonitas in grata fragrantia f proxime autem ad Fteni accedentis D'dorem, tantiiper aromaticum accedit colore viridi, [nam parum maflicata friftaque ubi fuerint, viror vividus emicare debet) iāpore fubamare dulci-

Virr. Has ei vires tribuunt Sinenfes, Sangufnem purificat, horrenda pellit infomnia, vapores à cerebro arcet malignos; vertiginem capitifque dplorem, prarferim à crapula ortum mitigat; hydfopieis CDnducitj egregie enim dmrecica est, capitis rheumata exficcat, humorunxarimoniam CDrrigit, DDfruditionc5 vifcerum tollit; vifum inftaurat; quippe quantum ego exiftimo Jnc decoftio *T'chia* primariuni Japonenfibu5 est antidoton contra vifiis imbecillitatem acoftilorum, vkia illis ft-equentiffima, 1c ex affiduo Oryzz calidæ Be fid *Sactfui* potu Be ulumaximc contractta, AduftDshumores tempera^ calidum emendat jecur, induratum l^nit lienem ; fomnum coerct, in iis przfertim qui rariūs *Thtt* bibunt. Corpora porro reddit vegetibra; inptimis autem hebetiores a fomno ac torpore fenfus ex-pergefacit, cor exhilarat, timoremque propullat, intestinorum tormina ac flatus compefcit, illōq; qui uteriiminfctant difcutit: vifcera virefqueroborat, reminifcendi vim exfufcit, ingenium acuir, bilem temperat: nephntidem tollit medicamen hoc lithontripricum; ego faltem nunquam in Japonibus vel minimum calculi, fiverenum, five veficis indicium reperi, fat fedulo licet inquitivcrirn; ac tandem dulces in amplexus vertit Dfilcium thori.

Ad fpecifica ftomachica pertinet herba *Thes*, non tantum ftomachum roborans fed 6c à calculo & arthritide przfervans, &c capiti inprimis oonveniēns. Prafervat ab ebrietate, &c fomnum arceffj Sc ftomachDinprimis conferc. *Ettmulltr. Frax. cap. Jz* chyleEos lzfionibus.

Qux in BontioC Pilonis hiftoriis hujus plants reprehendit 6c emendat apud Breyinium vide.

Quiōd in Europæis regionibus quādam fanitatis incommoda acqū efficaciter norr arceat potuissil *Thet* quā apud Sinenfes yel Japonas, non prxiparandi utendive modo adeo imputandum cenfeo quā quidem affiduitati usus Be temperatori viftus rationi.

De nocumenti5 hujus potus hxc apud *Antmum de Heyde* Occurrunt in Centur. Obfervationunij **Obf. 76.**

Tinfuram È foliis *Thee* mediants aqua calida extrahi vulgo notum est. Ejus potum aliquando quibusdam conducere negare nolo; tamen ut eum omnibus ucilem putem adducinequō: quippe verifimile videtur emolumenta quscdam *Thee* adfcipimab aqua calida pDtiūs esse deducenda. Hnnc potum quibusdam nocuiflēvidecurexperimentofaEpius probatum: inter alia hoc patet fequenti hiftoria, mulier vegeta Be fana, potui *Thee* addifta, conqueritur de frigore acri interiora concutient&j pra^fertim noftu, quod aJJppotu derivandum putat hanc ob caulam, quia CD potiffimum corripiturubihuicpotuiūndulfit. Meminiante aliquot annos virum robuftum conquettum efls de frigore acri in abdomine, quod cciam potui *Thee*, quem quotidie fiimebat imputat. Cornmunicavit *D. Hnlfe*. De pDtu *Thex be Coffee*, hacc occurruntin Muīs Podalirio redivivo- p. 59-

Sed quid fentiendum de potu Goffar &c Cari Ego cū Lugduni Batavorum ftudiis operam dabam ; pertotum annum Cephalara miferē laboravi, Sc poftquam potui copiofiori *Tee* Sc przeipue quidem *Coffee* qr.ōtidie fumendo afluevi, lemper immunis ab ea vixi non tantum, fedScabomni ahoinconmodo, quamvis antea itā vixenim, Illi mortis haberet vices lentē qux trahebatur mihi vira gementj, qui per rotum quinquennium cum longa morborum fene acriter confiftavi.

Etp. 85- EgonDnullo5 novimeorum familiarium antea haud parum à nephritide cruciatosqui nullum incommodiim inds amplius perfenferunt poftquam potum CofEe fatis magnā copiā at ftmptēre.

Cacerum h^c arbor reftiusfortaflead eas quæ fruftu ficco funt refertur.

Quidamex Driente reduces affirmant Magnates Ghinenfes Bc Japonenfes decoquere gerunds KTMres hujus plania:, majDres vires iis attribuentes quam foliis.

C A p.. HI

De Euonymo.

Euonymus, i. e. boni nominis, wf ivn[^]mv n[^] <sw[^] ^HfuqSir, utvolunt. Euotymi autem de-
scriptio apud Theophrastum Be Phnium arbori ita vulgo difts per omnia non convenit. Quo-
niam tamen hocnomen ulurpavit per me retineat.

Adeo pauca. pulpa nucleos oblinet, ut reftius ad Arborea qua: fructu ficco funt referenda videtur.

A. I. *Euonymus vulgaris* Park, vulgaris, grants rHhmibus C. B. *Euonymus Theophrasti* Ger.
Euonymus multis, aliis Tetragmia J. B. &>pl[^]bl[^]Z& OJ fBcfttoCO&*

Jam^B est arbutula, aut certe frutex arborfeus, akitudine quatiior aut quinque [imò feptem
aut oftointerdum] cubitorum: cujus ftobnes larto viore perfuh, 8c nuper naci ramuli, propter
corticem in quatuor angulos excurrentem, quadrangulares apparent[^] non fecus ac fi dolabra arS
perpòliviflk, ipfo aliqui ligno interno tereci, albo aut flavefcence. Cortex vires. Rami crebrò
intervallo in oppofitos ramulos dividuntur, *Folia* oblonga, acuta, crenatft, & Peridyeni genere
Chamarcerafi diftx foliis (imilia ge zqualia. Paulo post veris iniciuni *Flors* profert pallidos, auc
herbaceo iiodam colore confantes, ex quatiDr foliolis congèftos[^] quibus totidem alcernacim po-
fita calyculi folia fubjiciuntur, parinuDicro *aficibm* luteis umbilicum curvolutn vindantem *cumfijlo*
CDicolofe occupancibu5. Singulis[^] flofculis fin[^]uli liicedunc *frutlts*, feu fingulae filiqux quadran-
gular, mbente5 aucpunicea: [rarius albx C. B.] totidem diftinftis loculis *femina* parva folida con-
tinentj cuticula croceaintefta, medulla alba, hguia femini cannabino familiaj hoc eft, ex rotun-
doobbnga, fed majora, fapore amaro, cum obfeura quadam dulcedine naufeabundo. Ipfà etiam
arbutula dta gravem & L injucundum habet odorem.

Matenes ejus fie fatis fahda, fiftilis tamen 5c zqualis eft: ea cum adhuc fucco turget carfa diluto
croceo pallore etiam Buxum provocat,

Nonnulli TetragoniamTheophrasti effe volunt, quòd ramiobiinearum quatuor ruffarum, dprfi
modo extantium, refta per vindem corticem porreftarum difcurfum quadranguh appareant, quod
huicarbonpeculiare eftj &c quòd in fructu quadrangula filiqua fie. Quod ii TetragDnia fir, Euony-
mii5nonerit, nec enim vsriimils eft eandem arbor em diverfis norninibus&: locis tradidiffe Theo-
phraftum.

In feptem frequens eft tarn in Anglia, quam in xterisregionibus. Maio [infrigidioribus locis] ^{i9, Ujm}
flore: Aucumno appetentelliquae quadranguls purpureocinguntur cobre donec penitusrubeftant,
poftea (ua fponte deculTatim quadripartite rumpuntur, ac hiantes ita pendent in hyemem ufque cro-
ceasbacculas vel fernina oftentantes non injucundo aipeftu. J.S.

Euonymum pecon noxiam effe, ut Theophrastus tradit, fe fcire ait Matth. & Ruell. nequepecu-
dem, nequecapram[^] novellarum etiam germinum avidam, hanc atngere fcribit. E contra Clu-
fius fe in Pannonia obfervaffe a capris m[^]ximè appeti, eafque ejus foliis fine noxa avidevefci;
quod nobis ob ingratum hujus plants odorem &: vim catharticam minùs verifimile videtur.

Hujus trE5 quatuorvebacc[^] tarn pervomicum, quam per icceffum purganc: Emolliunt etiam &
refolvunt exterius appofitfc.

In lixivio coiax capillos flavo colore tingunt.

Pulvis exficcatum in ulii eft apud n oft rates mulisrculas ad pedicubs intcrimendos Be furfures
capitis detergendos.

Ex ligno rufi muliebri ncu celebres in Germania 8c Galliadetornantur, unde *Sc.Fufanuw*'&c *Fu-
faria* dicitur. Nonnulli ad dentifcalpia utuntur.

Tnplicem proditum eft parari ex hujus fructu colorem, flavum, fipoffeftum S.Joan. Baptiftac
dum adhuc viridis eft collectus cum tantilb Alumints parum bulliat; viridem 6c fulvum.

2. *Euonymus latifolium* Cluf. C. B. Ger. Park, *latifolia* J-B.

7-B-

Vrgas habuit cum id reperit Clufius cubitales duritaxat, lentas 6c fraftu contumaces, quas am*
biebant bina *folia*, ex adverfo femper nafcentia, leviter inambito ferrata, EuoiTymi vulgaris foliis
non abfimilia quod ad formam attinetj fed longè majors, Citriae mali foliis amplitudine non ce-
dentia, vuidia, guftùs ingrati Be amari; *Radice*m digitalis cràffitudinis, fumma tellure in cubita-
lem longitudinem excurrentem, multifque flavefcenribus fibris dona tarn. In horto culta poftpau-
CDsannos humanam vel majorem altitudinem excrevir, ampliora folia nafta eft, floréque ac fe-
men tulit. Maio enim menfe obbngi tenuéque inter infima folia pediculi nati liint, è quibus
aliquot dependebanc *Flofculi*, quatuor albicantibus foliolis Be ad carneum quodammodo cobrem acce-
dentibu[^] *pracilici*[^] formà perfimils Euonymi vulgarisflonbus; quibus /icceflit fruftus ut in Vulgari
quadrangulus., mterdum etiam gainqae anglis prsdicus, major tamen & C quafi flatus, maturitate
dehifcens, Sc alba grana, aurea pulpS inulufa, nonnunquam Augufto, fed potiffimum Septembri
menfe continens. Sub Autumni finem folia abjicic, Sc extrema ramubrum cupide obbngam gem-
mam, fpem future germinationis novo vere producit.

In Pannonia interamni, mine Sclavonia difta, uno tantum in bco invenic Clufius in fyl[^]a ilia ^{L. 177.}
qua ex *Greben* arce defcenfus eft verfus Warafdinum.

3. *Euonymus Yannonhui* Ger. Park, *flortphtzniceo* J. B. *grants riigr is* C. B-

J.B.

Arbucula est aut frutex homine altior, cujus caudex Berami tuberculis asperi, ac veluti notati. Be ratni iint pulverulenti: folia ferfata Pruno fylvefri familia: flufculi aliquot fimul ex Jon- gis petiolis quadrifolii, fimiles Euonymo vulgari, phuenicci colons. Ciuf fie fufius hanc de- fcribit.

Bicubitalibus, aut etiam rajoribus ramis aflurgit, digitali, interdum pollicari craffitudo, lentis 8e obfequiofis, denfo cortice obdu&is, viridi primum, deinde multis nigricantibus maculis asperio, qui in iumrno dividuntur in plures ramulps, ordine Be ferie quadam inter fe oppofitDs, quos exor- nant folia, fimiliter ex adverlo fica, latifoli^ Myrti foliis paria^ tenerioraj levi brque in anibitu crs- nata, guilu primum exficcante^ deinde. amariufculo^ Be calido; e quorum iinu in obngis gracill- bufq, pediculis unus, bini aut ad fumum^ terni fofculi, fplendentes 8c purpurafcentes dependent, tetrapetalijUmbilicD quadrat^ K lureis ftaminulis quatuor angulos occupantibus, Coggyiix flon, non mulcum ablimesj major-es tamen. Fruttus fuccedit in quadranguhfiliquis, vulgans Euonymi iimilibus, fpongiofus, aurei coloris i iis dehilcentibus tenui filo propendensj in quo grana exrinia parte nigra & fplendemia, Fraxinell^c granorum inftar, bina interdum & terna eodem locub & pulpa comprehcnla.

Lom:

CDpioynaficicur in fyjvofis utriufcj, Pannoniz montibus; fed qui Alpes attingunt earn alere de- finiuit. Invenitur Be in Moravia.

Dantur Be alii Euonymi, Be Euonymb affines- qui ob feminum^cDnceptacula per maturitatem licca ad alium locum pertinere videntur. UtEuonymus Virginiana capliilis elegancer bullatis ^Af^ nifter. Euonymus Virginiana Pyracantha! folio ejufdem. Euonymo aEenis iEgyptiaca, Kc. C.15. Euonymo affinis .Ethiopica, &- Herman. Hort. Lzyd.

C A P . IV-

A. *AgrifoliumSzZT*, *Agrifoliunffi^ve Atjuifolium* Park. *Atjuifo Hum Jive Agrifolium* WjroJ. B. *Ikx V. Jive acukata baviftra fyllo Jinuato* C. B. fIEJ^ Iq It^ tccr.

J.B.

Alicubi in juftam arboris magnitudinem excrefcit, fcpuis pumiJum ut ad frutices referti poffitj perpetua frDnde virer. Caudex Be rami lenti, flexiles^ J-cves^ cortice duplici muniti, externi viridi [in trunco utplurimum cinereo] interiore palJido; odore cum avellunt, ture cdam fapore, ingrato, f^c^t: : materi^ chlora albave^ dura ac folida, ac circa Hi- ts rn a nigricante, qua: p^c pondere in aqua fidic, Buxi aut Guaiaci inftar. Folia fatis magna, denfa, ilnuata^ longis Be ngidis in ambicu fpinis horrentia [interdum licet rarius fuperiora folia Laurinis iint familia; fine acuhis^ quod in vetulis-arbonbus copiofius obfervatur] colore obfeure: viridi, fplen- dente, ex pediculo brevi, fapore non ita ingrato ut cortex, Flores pulchri, parvi, chlorij quaternis foliolis, totidemque apicibus confiantes [in quorum media bacc.*: rudimentum] cohferi ut in Lauro, brevibus pediculis appenil; quibus luccedunt hacz* parvac, rotund^ rubra; umbilicata?, guftu fub- dulces, cum tetro quodam fapore: intus CDntinentur fmina quaterna, triquetra, oblonga, friata.

Qiji Agnfolium folio Jeni diraTum ftatuunt a vulgari, nx illi multum hallucinantur, nam ve- tula: tantum arbori accidit ut talis fiat; non tamen rarius fut vulc J. Bauhinusj fed iarpiifime 6e ferè temper apud nos. At neque propriè Agnfolii varietas eft; nam fupè in Jpinofiffima Aq«i- folia occurrunt ejufmodi folia non Ipinofa, ut cuilibet obfervare licet.

Fruftj autem color in hac arbore interdum variat. Reperitur enim alicubi in Anglia Agnfo- lium baccis luteis quales nobis often die D. Dale ab arbore in agro Wifloni Suffulc^c vici non procul a Butrs oppidulo, loco paludofa nafcente decerptas.

In Anglia frequentiffima eft hare arbor in fepibus inq, fruteftis S^ faltubus potiùs quam iylvis, prslertim in lapidofis 6e glareofis, incultis Be defertis. Reperitur etiam non minus frequens in Germania. Viderur etiam gaudere montolls Be frigidioribus regionibus: in calidioribus rarior eft, & fruticis menliuam vix egreditur nifi colatur.

Hare arbor noiinullis ^yEit Theophr. 5. hift-4- videturj quorum fententiam refutat J. Bodsus a Stapel. Pliniiramenlib. ib. cap. 18. 21.14. Aquifolium an fitnece in medio relinquir.

Vires & Vfa-

Arbor hie operibus ropiarijs, in 5eprentrionaJibis pr^fertjm regionibus pr^c aliis commoda & C opportuna eft; cum fit frigons patientiffima, Be perennitentium folio; urn virore afpectui grat^j nectonfuram re/puat; eoq, etiam horculanis acceptior, quod nee radicum repratu, nee importuna ramorum luxunc molella iit, nee tamen minus denfa Be multiplicata fi^Dnde quam quarvis a^3 arbor friuexve tDnfilis^ quanrumvis hoc nomine earn iniprobet J. Bauhinus. Vidimus in ^Adi^

• in Cann^ad^i^ ^ Joan.-Evelyn * tonlitem Agnfolii fepem denfiffimam, pulcherrmani ?oo prope p edeS von longi i longam.

Londmo.

Ex hujus a^boris corticibus vikuiii parant noihates hoc modo. Delibratis Junio aut Julio men- iiDus^ quotquot videtLir auc opus fuerit hoc genus arboribus, cortices detracti in aqua fontana decoquantur donec tenenimi evadant [eoufq, donec cortex ii abJcedat auc iepareturj quod dLIDL^cim fere horarum fpatiuii exigic. D. Evelyn^

CoJosinaceiTum humi cum Filice SSS componas, aqua pius CUIOSL- fparata ffroncibus aut herbis quiburLinq, fuceulentis obvoluti Se contefti ad aliqu.im crallKieni in cdlam aliumvc J^um Ingidam re con dan Cir. Idem] Be per duas treffe fcepeimanas fermentan & compui-rcfcerB Jinas, d in

Vi muuiliagihem abeanc: Exsmptos deinde in mnrario randiu turidas donee fingi fdj-maria, poffunt inftar mafia: farinacearl Maflam in aquam profluentem fubmerfam manibus verles & dijigenter iubigas. Aqua brevi fordes omnes Be recrementa obhaerentefcj, corticum reliquias fecum auferet cluerq., vifcorefiduo puro Sc deEccafo; in fitili aliquovafepet quatuor adhuc aut quinq, dies dpfpumando, donee fe penitus purgavent Be perfecerk: deinde in novum vas tranitum rebrvetur ad ufum.

Baccx ad calicos dolores utiles funt; craffos fiquidem pituitofosque humores per alvutn educunt decent auc duodecim numerolumptas, uc ab nis'accepifle fe aitDodDnsus, qui earum experimencum quandoq, fecerunt.

Zythagalum faftum ex cerevifia 8c lafte, in quo deebfti fbnt hrijus Foliorum aculei, mire con* ducit ad dDlorem CDlicum Be tormina inteftinorum, ut infemetipfa aliifq, experta eft matroqa quacdam nobis cngnita poft alia medicamenta fniftra tentai?a, a muliercula quiadam vaga Be uircumforanea edofta. Non video tamen cur noil Be fDliorum ipfbrum decoctujn idem praefet-

Baccxaviculis, przeipue Turdis Iliacis diftis, hyberii tsmptore terra nivibus operta inalimsntume'sdunt.

Matchioki5 radicum decoctum in fotu ad articuloruiti duritiem, tumores diffblvendo, ofla frafta ferruminanda commendaf.

Frondes Be ramuli baccis onufti natalitiis Chrifti Domini parietibus Sc feneftris appenduntur ad ^des Drnandas.

Lignum ponderofimj firnium, album, ad molendinorumfabricas utile eft, 2.A ea quae torno elabrorancurj aa manubria infrumentorum ruficorum, fcuticarunij BCe-

In Catalogo Hoiti Academici Lugduno-batavi, a D.Hermanno cdti/hafce Agrifolii feu mavis Aquifolii foliorum refpeftu varietates invenio,

1. Aquifolium foliis ex luteo variegatis.
3. Idem Foliis ex albo variegatis.
3. Idem foliis oblongis fpinis & limbis argenteis.
4. Idem foliis fubrotundiSj fpinis Be limbis argenteis.
5. Idem FDIUS oblongis, (pinjs Be limbis aureis.
6. Idem foliis fubrotundis, fpinis Be limbis aureis.

Aquifolium nbinatd filii superficiei Cornut.

Hanc plantam oblervavit 3D. *Tancredus Rohinfon* in pulcherrimo horto Reverendiffimi Epifcopi Londinenfis, D. H. *Comfton*, inter multas alias novas Be rariffimas plantas cultam ab ingnioffimo Viro Be peritiffimo Hortulano D. *Georgia London*. A vulgari Agrifolio facile diftinguitur foliorum figura, quae non ambitu modo fed tota iiperficie fcabra funt Be fpinis horrida.

CAP. V.

Baccifera IndicafruBtt tetraspermii in foliorum alls feftili. Scherunam Cot tarn .H.M. P. I. T, 16-f. 13. Corni feu Sorbi species-Hontio.

H.M.

FRutex eft duim triumve hominum altitudinej nafcens in arenofis Be petrofis. *Radix* profunde in terram descendit, permultas oblongasj tenues fibras, capillamentis hinc inde veftitaSj tain a latere quam ftibus emittenti cortice cteriusrubicundo obfeuro intus rufo^faporis adfringentis, iilphurei Be infefti. *Stifites* induti liint fcabro cortice, cinereD^ interius viridi 5c rubefcente, intus ad lignum albicante^ qui in plures tenuiffimas planas corticulas /h quibus compref fis Be implexis fomites ignarios conficiuntj refolvitur, 6ft% adfringens; ligno intus albicante, ac proxime ad radicem cavo, aliasfolido. Tarn ftipites, quam rami longis craffis lignofis fpinis hinc indemuniuntur. *Folia* pediculis brevibus, rotundis, craffiolis fulta, oblongo-rotunda funt, ad petiolumparumcontractiora, acinvertice rotundo cupidata, fuperne plana^ faturovirore nitentia, fubtus dilutiora, faporis adfringentis. *Flores*, qui in liimmitate ramufculorum fuis periolis ex origins foliprum proveniunt quafi fafciatim fine calyce, funt viridi-diluti, odoris nulliUS, conftantq, dupljci ordine foliorum, quorum quinq, quae exteriora cupidata, furrefta, Be interiora versus nonnihil inflexafunt, quinq, quae interiora rotunda liint^ Be tuperiora versus punttulis eminentia. In horum medio ex umbilico y?y<r acuminatus exurgit, paulb infra acumen quinq, tenuia *stamina* ftelliformiter ejiciens, qtzc nodulis albicantibus, ac dein flavefcantibus dotata liint. Florum petioli^prodeunt in fua origine foliolis acuminatis. *Fruttus*, qui liirculis infident parvi Be rotundi funt, adinftar Pirorum Lauri, fuperficie glabra, primunj virides ac nitentes; dein colore nigrp cum maturi liint, Be lapore fubacidD, concinfntq, quatuor grana feminis alba ac tranfparentia in propriis fuis loculamentis.

Foliorum decoctorum vapor ore exceptus dentium dolorem mitigat, Be vermiculos in dentibus *Virtf* cnecac.

CAP. VJ.

Frutex baccifer Malabaricus flosvulis pentapctalis ramis inhartnibm', fruffu Utrapyrtno. Patsjotti H. M; P; 5- T. 6. p. 11.

H.M.

Arbutula est humilis, septem circiter pedes alta, ac Patsjotti fimiis. Fo/w ordinē decussato ramulis inxreru, oblongo-rotunda, acumiriata, in ambitu crenata, crassa, den/a, glabra; splendentia, nems aliquot e medla cōsta in latera excurrentibus. Flosculi non fufculis id-haceis at ipfii' raniis inhscrip-ti' t'fintf, taftrdidiv ahkfringOH-otundisBc.acuminatis folioJis-constantes, nurneroffs, staminttis albicantiōus, flavefcencibus apizibm ornatis, medium, dccupanribus, inter cū'ix fnylas p'romt'dii' uiri, obtiifus. FloGulis (uccedunt^accir, nKuidjCj^ quadripartilKe, viridi-llawz'cejiteSj quarLioV iniril^'cDj' tih37itesy^awi/wnibiDUn^a,soU cōre-romada. Proyenit in Candenate, temper.yircr, frufus fert Septembri Be Octobri mensibus. Ex, huijū fblis in la'fte VacChO 'K SttlknijOieffXDte phalicum.

Locus. yj.#m

CAP. Viii

Frutex baccifer Ma'ah, frufu pUho-rotuhdo pilofofetr^pjiho^ ai'rie^fuiil'ouradi H-M. ? f

Arbutula hiirnilis qft-feu. pDtius/ftytexj .fci^rcife^ craio, cortipe y^Jhtp fpadiceijj .r^mulliq, ejal^i^j^ plofi^,at^lifjt^inDfis ihorbem diadlis ornate- Radix fibratij rufecens, nigriuanpe CQuiacetipta^afcriSj itbrnatica'. F^iariblongo-rorunda, actiminaf^f MI ambiru crenaca^lpinuJifctexi^feifAt inq^ pbfta^ Vraffi, alpera, acro-virwa, Juprcnc/fplentjentia^ Infrjfi& neijuaquan^: Xagpi: ^TSVUSJ ^DniktidTIS- Flirh Itiodori, pluis fimul jLin6ti petiolo longo in (urcusis proveniunt, quihq, dblDhgD-t^fetibus^ ^WmiHatis^ymrus^albicintibus, extus viridibns ac iibapperis, 5c exteriora versys.r^flexis^foliis constantes ftaminulis aliquot albican-ti^usj flavefcenbiiSj^a^j DxqatjSj. medium pccnjpamb'ds; Trifer gisE^fnyhs pfoi^it viridjs, furrefluSj capitulo piano. Floribus fiicedunt bdec* piario-rbtunJx/ ^irtdes^rihim/ deth^flavefcences ac croceaj longifq, albicantibus pilis obficac: intus continentur officula quatuor, dura, albicantia,, ** cleos inekidenfij candidos amaros.

Locus. yj.#m

Prave!nit varijsKegnrMalabarici IDC*, prarlertini circa Porca, Cochī Be Calicolan :. temper viret^ quotannis menfe Julio floret, Novembri autem mafuros fert friffus. in aqua c'ftis Apozema conficitur, quod in Artliritide perquam

CAP. Viii

Frutex indiem baccifir floribus umbdlatis, fruffu tetracocco. Smdari H. M. P, 5. 7^ 40. p. 79.-

H. M.

Arbutula humilis est, LIJCCJII circiter pfides &it& vauJte medipwit^ crasfp, raipuli^ dib in DJ bem diffuis ornato- Lignum albicans^ furvo cortice cinftum, riēnon riifeicents intus medulla refertum. Radix nigricans^ odpra, lipori^ hand ingratt. *&/** oblpngo^ rotunda, acuminata^ fuperrie atro.viridia au splendentia, infernē (iibviridia; eofta media-craifa, lignola, vindi-albicans, iic in averria parte extuberans, ē qua plures exiles nervuli fuperiora versus exoriunt. qui illi fit ilbiGentia^acacanthidēfannitū^: fapor lyldris aq ingratt. Flores exiguij fuaveoientes, candidi, calycibus exiguis fubviridibiiSj in quinq, ladnias acumfnacas feftis, inh^rentes, extr&itii faniuiis Unibdlatim proveniun^ pentaphyllj, ē quimis feil- at:umiiatis foliolis, inferius jun-ftisconstantes; tptidem ftaminulisalbicancibus, rufefcentibus apuibus ornatis, medjgrw. Dccup.apti-būV: mtrrqu*/;/^ 'pfodie omguus, rmi&iialhiwn** apAipei^je. bi^clus, cpjus.bafis e(l gjobulus e^j-guus, vindi5. Flosculis luceedunt bacca CBtracoccs, aliquando pehcacpec^yiri^es,primuTi.^ n i- cjhcesj d^llawdecemesy tancemaliniarēshgricantes, carne incus, referca: nicudenta, nigricatefj aromatica, intra quam quatuor plurimum continentur officula fēbraj triquetra, albD^flavefcenria.

Locus B CrKfCt' invadit* Regni Malaiiaaiici Ipcisi Lpra:leitini_cuca 'Cr'ngan?or, \ Je'iper yir^tj, quotann^ .floreit au niatlifos exhibe fnuitiis, meafe.yi&Serptembrir "In Medicina vix ullum habet ufum.

CAP. IX.

Frutx Indicus baccifer, floribus racemosis fructu oblongo, tatrafyrenoa Perin-Pamli H. M. P. 5,

H. M.

FRutex feu Arbutula humilis, quatuor circiter pedes alta, caudice tenui, albicante, cortice obdueto cinereo, intus viridi, arduatic. Radix densa, albicans, furvis cortice tefta, faporis acris, odoris aromatici. Folia geminata ordine parallelo circa ramulos craflis ac fubviridibus petiolis proveniunt, oblongo, rotunda, acuminata, tehuia, fuperne colors atro-viridi fplendentia, inferne viridis dilutiore, cofta media crafia. Floret racematim proveniunt, candidi primum, dein rufefcentes, quinque, fcretibus, acuminatis, excorlum reflexis foliis confantes, totidem albicantibus fiamintilis flavescencibus apicibus ornatis, mediam flaris cavitatem Be umbilicum occupantibus; intus quafitius prode flirreffus. Floribus delapsis luceedunt Baccæ oblongo-rotunda, acuminata, craflis, duro Be atro-viridi cortice tefts, pulpa intus albicante primum, dein lubcarulea, aquosa ac infipida refertx. In medullio decuffatim quatuor lacinant famina albicantia dura, oblongo-rotunda, membranaceis pelliculis a fe invicem fejunfta.

Nafcitur Regni Malabarici variis mloisj praefertim in Berkenkour: femper viret, floret & fructum edit.

E foliis hujus ficcatis & prunis impofitis fuffumigium fit, quod paroxyfmus hyftericos potenter folvere fertur.

SECTIONIS III.

MEMBRUM QUARTUM.

De Arbutibus & Fruticibus bacciferis, acinorum grans yd pluribus quatuor, vel numero nobis incognito, iff nondum exphrato.

CAP. I.

De Rhamno Cathartico feu Spina Cirvva.

QUATUOR arbutula hzc in fingulis acinis plura quatuor grananon contineat, quia tamen granorum numerus nobis nondum exploratus elt hue earn retuhmus.

Ai I- *Rhamnus Catharticus* J. B. C. H. folitivvs Ger. ernac. *Solutivus* fve Spina infz & oria vulgar Park. 25ucct) & jr, u? common @urging & fjozn.

J. B.

Celebravit Rhamnum catharticum ufus in purgafdo multus Be felix, arbutulam fepibus alicubi familiarem, cortice externo nigro veftitam, cui duo alii fubfunt, alter viridis, alter luteus, materie pallida, dura, ramis latis crebris, iifque fere ex adverfo fitis brachiatam, duris rigidifque Be longis lpinis foliofis minacem, aculeis praeterea aliis minoribus horrentem. Folia ad Prunifolia accedunt, acuminata atro-virentia, crenata, nervofa, adfringenri lappre. Fhus herbacei coloris, parvos profert, quatuor apicibus confantes, multos fimul juntos. Succedunt baccæ frequentes ad radicem fpinarum, ex longiufculis pediculis, Frangulac pares, per maturitatem nigra, fucco virente plena in quibus grana terna vel quaterna, Pyrorum granis pſenf limilia, figura fere triangulari, cortice nigricante, medulla alba, non ingrati faporis, quæ facile ungue premente franguntur: fapor baccarum amarus, Be afringens, & qui facile guftanti naufeam moveat. Habet Be fuccus earum nelijo quern fibi peculiarem odorem.

Locifencicofis, fepibus Be lylvis nbn raro occurrit in Anglia, Germania, Pannonia, Bcc m L*ctjm Baccæ hujus fruticis tria colorum genera prbznt. 1. Meflis tempore leftae, arefactae Be tufe, inque aqua Be alumine macerata: luteum feu croceum potiùs reddunt colorem, ad chartas luforias fle coria cingenda etiamnum in ulji. x. Aucumno cum maturitatem affectuE nigra: evaferint collefts, tufe Be in vitreo afervatae pulchrè viridem exhibent colorem, quern ^ipgtCCn vocant piftoribus accommodatiffimum, 6e in magno ufii. 3. Circa feftum S. Martini in arboribus adhuc haerentes filegantur, PuniEum colorem reddunt fut perhibet (Tragus) iis qui coriainfidunt, Be charta5 piftas calorics illuftrant utileni.

Baccæ purgatrices (impt, atcj, craflam pituilam Sc biliofos quoq, hum ores per alvum educunt, ut nonnulli yolunt: Reftius earum vires zftimant qui ad picuitam tenuem Be ferolos humores eaducendos utuntur. Nos (inquitj. B. ^ peculiarem earum vim in fero Be aquofis humoribus educendis experti fiunu5: quapropter non rarè earum fyrupus ad uncias tres hydropicis pncrripsnotabili cum luccelfu datur, at% etiam exhibetur aridarum pulvis a 5j. ad \$ij. nonnulli baccas numero exhibent i 15 a dio. Yerum ob vehementiam mollibus Be debilibus iniubftantianonfunr exhibent.

Yyyyyy

benii

benda. In fyrupo verò f pergitem) quo quotidie Be frequente utimurj ctiam in deljcatiffimis naturis nullam moleftiam efiatu dignam unquam deprehendimus, 8c folvendo corpori accomodatiffimum à multis jam annis cognovimus, etiam in nobis ipfis. Syrupum parandi modus in Pharmacopceis vulgaribus exeat. J. Bauhinus fie fieri jubet. Succu baccarum rtiaturarum'extrafti & nee depurati Jib. V. Coquantur cum melJis optimise Sacchari ft p. ad Syrafi confiftentiam. Adds pro unaqua, libra fyrupi Cinnam. 6c feminum Anifi conquaflatorum ana 3ij. in pecia ligata imergantur. De hoc tuto ab 5 j. ab 5 ij. liimi potett.

i. *Rhamnus catbaticus minor* Q B. *cathartkus minor Pannum cm* Park, [olutvus minor Ger. *fi-luttvus fumilm Yannonizm* 1. *Clujii* J. B.

Clufl

Bicubitalibus affurgit ramis, in multas alas divifis, cortice Jzyi, Spins infectorix fimili teftis, q^{ti} membrana fupenore decrafta ex viridi palkfcit 6c amarjufculi faponseft. Ramuli paucis ipinis horrent, fed ipfi in fpinas plerunque defnere folent. *Folia* illi vulgari fere familia, irinDra[^] anguftior[^] ad Priini fylv. fivcSpini folia plurimum accedentia, guftu linguam exficcante : *flortn* ut in vulgari congeftuiij ejufdem coloris &c forma, hoc eft ex pallido herbaceumj tetrapctaJon, minorem tamen habet: *radictm* ut in aliis fruticibus lignolam.

Exit frequens in Leytenberg 8c vicinis montanis fylvis. Maio floret Be Julio fructum perficit.

In planta ficca J. Bauhini folia ex eodem tuberculo plura oriebantur, brevibus pediculishaersntia, undam plus minus longa, femunciam lata, acuminata, circumcixia crenata, *Ixvia*, Baccac licc[^] Terebinthi fructum rd[^]rebant, turn magnitudine, turn formá turbinata, in acumen definente, psdicuſ fwinuncialibus app[^]niar.

5. *Rhamnus foliir ohngis far at is* C- B. *Bavaricus* Park. *Bavarian Dahchamp* J« B.

Lugd.

Hominis altitudinem fiiperat, cortice eft purpurafcente, Ipinofa[^] foliis c^{ten}ſis, palliis^m omnibus ferratis, fed aliis longioribus Be anguftioribus prima lei. ramorum parte, nee Ilici diflimilibus, alljs brevioribus Be rotundioribus circa ramorum extrema, Rhois folia utcunque zmulantibus, fpinis inul^{ti}ſ[^] tenuibus fed acufflimjs fuliofis ut in primo Rharnno, *Matth*.

Botanicí Ingolftadienfes orandi lunt uc hujus frutiuis hiitonam illuftrent Bcperficiant[^] addita fl^{Di} rum 5c fructuum defcriptione.

4. *Rhamntts SICHIVS pnta[^]byttos* Boccon. *ad baccifir. THOTMOCCOS refsrnd.*

Eleganshic fntex compluribus virgultis Pruni fylveftris modo exoritur, 5c humansE procentatis. niodium nonnunquam fuperat. Huic rami multiplices[^] duris 6c craffioribus Ipinis armati. Foia in fingiilis pediculis quinas[^] quorum fingulajafmini lutei foliis funt anguftiora, indivila, verſus extre- mum latiora atque rotundiora hilari yirore nitentia- *Flores* candidi[^] pluresab uno pediculoj tenuij longOj racemofò penduli j quibus fatifcentibus (iiccedunc *bacca*:[^] Myrtillorumbaccis fimiles, aftma- jore5 per maturicatemrubrx, putamine ofleo & L duro pncdita:, in quo nucleus tenui membrana VS[^] ititus.

Prope Panormum in agro difto *Fundaco dtW Abbatt* ad fepes. In Africa etiam nafci nonnulli fr- cunt. A coloni5 Be villicis circa Panormum dicitur *Zacc*tu*

C A P . II.

De Lycio.

Lycium Veterum quid fuit hodie ignoratur. Lyciui^m autem £ Lycia provincia unde alktum fuit diftum creditur- Lycii hiftoria apud Botanicos recentiores valde confufa eft &c intri- cata. Nullam novimus Lycii notam charafterificam qua ab aliis fpinofisfruticibusj Rharn- no prxfcrinj diftinguatur; quocirca frutices hoc nomine à Botanicis donatas Rharnno fubjungeir- da5 duximus. Nee tamen puto, generc inter fe conveniunt ftirpes omnes Lyci[^] diftae.

1. *Lycium Gallic urn* J. B. C. B. *Talurus alter a peregrina* Ad. Lob. *item Lycium latifoliutfl* C. B- *latifolium Monfaliacum* Park, *item Lycium Gallicum Avenivnenje* ejufdetn.

J. B.

Spinis rigidiffimis horret DxyacaJithi Matthioli fimilibus[^] circa quas *flores* parvi, multi fimul[^] brevibus pediculiſj quibus fuccedunt *bauc**, *qux* matura: iub pellicula continent *femina* oblo[^]S^{3*} pohta, (triatea; exficcata: bicocci & C tricocac apparent, baccis Spins Burgundicæ fie latis finj^{ll} amarac valde; Lugdunum adferuntur nomine *Grant tintorii*. *Folia* ad Prunum fylv. nonnih^{ll} cedernia, cenuia, minora, in ambitu aliquantulum errata, nenrofa, decidua. In ficcis nullum dep

Nafcitur in afferis Be iaxofis circa Avciidnem fl& Carpentoraften.

Lycium Dalechamp. defcribicur Spina trss cubitos alra, cortice in cinereum pallfccente, raoc^{Xns} multis hgnofis, aculeis foliolis, fniftu Piperis magnitudinc, nigro, ailnexo bievi Dediculo, nunc^{ll} Rulo, nunc cordis figiira pro nucleorum numero, c^{ll} cujus faftigio pilus dup^{ll} Jubtiliffimus eminent, fapore ingrato fit valdt amaro. Daccis ad ringendum fncuin^{Mrsoc} itumur 6c vocant *Cranum thchrmm*. Hinc pactt Lycium Dalechamp., eandem P^{Un}

LOCUJ (3
TempM,

Locw,

LOCUJ,

¶ Tw cam Lycio Gallico J.B. Be C.fl. Paliurum autem alterum peregrinum Ad. J. Bauhinus Lycio fuo Gallico idem existimat, Be D.Magnol, qui ilium props Monfpalium obfervavit, in eademeff feftentia. Lycium ergo 4. five latifolium C. B. 6c ? five Galhcum ^» una Be eadem PJanta funr.

- t. *Lyrum Italic'um* J.B. Park, r'tew *Rhamnm folutivm Fannonictts* z. *Clujji* ejufdem J.B. Ly» *cium facis Fruni fyL five It abeam* C. B. *item Lycium Buxi folio* ejufdem. *Lycium* *vulgatius Park.

Spina infectoria Pannotiica 2. Clufii cubitales habet ramos, minimi interdum digiti craffitudinb, plerunque minores, nigro rugofoque cortice obduftos, iupenore parte in ramuloS divifbs, qui tenuiore Be lxxiore CDrcc tefti phrunque in acutam Ipinam definunt. *Folia* Myrti aut Pruni lylv. pociusj breviora tamen Sc minora, viridia, per ambitum nonnihl ferrata, guftu primum adfringente, deinde nonnihl amaricancq. *Flores* inter folia herbacei^tetrapstali : *Fru&m* deinde Spinzin-fa t) E vulgari haud abfimiles: binis, nonnunquam eciam ternis, commiffuris diffinfti, inico vireo Sj deinde per maturitatem nigri *Radix* affla, lignofa, dura^arab fibras in latera Ipargens.

Nafcitur copiose in monce Badenlibus thermis imminent^loco petrofo 8c falebrofo. "

Confiderandum BotaniciS proponit J. Bauhinus quantum differat hie Rhamnus a Lycio Gallico: *Lxxv* verum offendit J. Pona non differrecum a Lycio Italico; uujus baccas duntaxata Cortufo miffas ex monte Baldo delcribit J. Bauhinus. Similes finquic) erant baccis Lycii Gallici, colore^tamen diffeerebant: erant enim purpurafcentes &c fefe nigrae: Semina in baccis ad Berberinaccedebant, breviora tamen, lucida, polita, colore fubfufco, aut e puniceo in nigrum vergente, paene triangular inter ea quardam fulcata: Saporem amarum non deprehendimus, fed alias ingratum. Quzdam etiam bacca: angulofa: apparebant.

Lycium Matth. quod C. Bauhiqus ab Italico diffinftum facit, Be *Lycium Buxi folio* appellat, J. Bauhinus pro hoc habet, Be recte noftro judicio: iconemautem *Matth.* quern ic alii adhibent, fifti-tiamefle demonftrat. Vid. Hift. Plant, lib. 6. c.26.

Lycium five Pyxacantham Narbonenfium *Adv.* quo pertineat turn C. Bauhinus, turn Joannes frater dubitant: hie ad *Lycium fuum primum* feu *Buxi folio*, ille ad *Lycium Gallicum* refert fed dubitanter.

5. *Lycium Cretenfe*, five *Berberis Cretica* J. B. *Berberis Alfina Cretica* C. B.

J.B.

Lycii Cretenfis baccae differunt a Lycii Gallici baccis, non enim ficz monfrant angulos, nec etiam funt amarx- Differunt etiam a baccis ex Italia a Curtufo miffis, lunt enim tales qua: paC (ulas Corinthiacas diftas referunt pellicula fua corrugata, argumento recentes lucco refertas fuiffe. Madefactx charcam purpureo acviolaceo eleganti tingunt. In his grana funt minora, nec ita lucida ut in Lycio Cortufiano. *Folia* quoque differunt a Lycio Gallico, lunt enim anguftiorajoblonga Se circumfcriptione ovata.nec in bngiufculum pedicium ut ilia definunt. Hanc plantam Bellus he defcribit.

Frutex eft ad quatuor aut quinque cubitDs aflurgens, totus fpinis horridus, fpinafque tres fimul (ut in Berberi vulgari) referens *Folia* habet parva ad Buxifoliorum formam accedentiaj leniter ferrata: *Flores* copiofos, luteos inftar Paliuri, fed minores, quibus fucCedunt fruftas, aliquantulum longij ut *Berberis fruEtus*, coloris autem nigri, /aporis inter acidum Se dulcem medii, in quibusvel unum, vel duo granu^ continentur. Cortex ligni non xv^s ut Berberi, led alper & pallid us eft: materie5 ligni lutea atque radix elegantiffimo luceo inficit.

Oritur in akiflimorum-montium convallibus. Differt autem a Berberi, -cujus folia majoj-a lunt, *Lqzus* & C fruftus racematim nafcuntur. Legitihium vero *Lycium* non eft, quiafruftus neque rotundus uc Piper, neque amarus eft. In Libano etiam monte frequentiffimus invenitur.

4. *Lycium Cnticum altrum* Park. A*W<v & *MlvapjyJk*^ i. e. *Amygdala petrea*, licet cum *Amygdalu nihil comrnum babeat*. Bill. Ep. i.

Brf.

Frutex ell ad duorum aut trium cubitorum alcitudinem affliirgens, denlus, *folia* parva firmaque ferensj fpinis totus plenufeil, *Bufruttum* rbtundum ferme, parvum ut Piper, habet, cum admatu-ritatem pervenit nigricantcm. *Radix* lignofa eft, maxima eaque firmiffima. Hebr^i exhujus fruftu . elegantem colorem luteum parant.

- 5- *Lycium Indicum fdiis Fruni* C.B, *hgitimum Rawwolpi* Park. *Lycium in Libdno proveniem* Bel. Ep. i.

Frutex fpinofus peregrinus, Arabibus Hudhadh, incolis Zarba *Rau-wolf*. in plantis montis LibanL

6. *Lycium Hifpanicum folio Buxi* C. B. Park- *Lyciufn quorundam folio Myrti Tarotinis ant* *Buxi* J.B.

Cluf.

Frutex eft fpinofus, multas ab radice virgas proferens, cubitales, fepenumeru arppiores, reftis, pulchras, tenues, rubentes, multis ramulis praeditas, qui in acutam ipinam plerunque definant, ta-Jnefti aliO5 hinc inde fparfos aculeos, breves interdum Be infirmos, nonnunquam vero oblongos, fir-mos, & t inuki5 foliis obftoSj ut in Rhamno primo habeant- *Folia* nullo ordine digefta, Spini, fe& mulco breviora, Myrci Tarencins aut Buxi quodammodo smula, guftulenta, 8e cum aliqua acidi-twe.mordicantia. Nec ftarcem, nec fruftum vidit Clufius.

L. 220. Apud Complutum aliique Cattellx veteris locis, &c BaetiEe parts, quam vulgo Extrmaduram vocant, circa fluenta, Be declivibus loris, hyme exundantibus nascentem observavit Clufius.

Castellanis scoparum ufum prsbet: componitur etiam in falciculos pistorum fornacibus calfaciendis idonsos.

Lycium Hispanicum Lob. non hue refert cum Lugdunensi J. Bauhinus^ fed ad Rhamnum 3.C/*/ C. Bauhinus cumque fecutus Parkin/onus pro diffinfta^ycii ipecie habent, & Lycium Hiipaiicum folio oblongo vocant. Judicent periti.

7. *Frutex exigua foliolis cunfrtu C. B. Tamox9 Cluf.*

Pedali altitudine affurgit, fr&quentibus ramufculis praditus, qui adeo exiguis & confertis foJiolis onulti liincj uc raniufcubrum lignum vix confpici poffit. Ea ex cineraceo virentia iunt Kextrem* amaritudini5.

Locm* In incul'is nalcitLfr.

8. *Lycium Garcia five Cate J.B. Jjc Indicum futatum Garcia Park Lycium foliis Eric* GB' Arbor fpmofa zx jud Lycium feu Cate txynmitur Bont.*

Garc.

Arbpr ex qua iiccus Cate Indis diftus extrahitur magnitudins eft Fraxini^ folio minuto Erics vel Tamarici fimillimo. Florere aiunt; fed fructum Ferre negant: muhis fpmis horret. Maceries ligni robufta, dura, denfa, pondero^ qcc (utaiunc) putredini obnoxia, fi^s 3olibus exponatur, me aquilimmergatur.

PorrD fucci extrahendi h^c eft ratio; Ramos hujus arboris minutim concifos elixant: deinde copundunt, pofmodum cum farina *Nachani* ffemen id eft nigrum & minutum, fapore Secalis concienti5 panibus aptum) & cujufdam nigri ligni, quod ifthic nafcitur fcobe (inrrerum fine eo) pahlil auc tabellac Formancur, qua: in umbra ficantur, n^ Soils ardors earum facultas evaporeC.

Locus. In Cambaya, Balaim, & pluribus aliisIndix Jocis provenit: in Sinarum regionem BcMalacam deporcatur.

Vires. In mafticatDriisj ad gingivas molliHcandas Be relaxandas confirmandafque plurimus illius cum cre ufus eft. MSdicamenrum eft cum amaritudine adfrfngens & exficcans^ ad alvi profluvia curanda, & oculorum dolores tollendos optimum, in quibus plerunque optimo cum iucccfu usifur (inquit Garcias.) Ex ligno propter duritiem Be pondus piftilla fiunt deglumandz Oryzae idem in mortarijs Jignei^ fex palmos in ambitu continentibus.

Caterum *Catm* Indicam Lycium Veterum effe non polfe (lit opinatus eft Garcias) facile offendere: fi quidem Lycium Diofc. folia Buxi habeat, & pufilla fie arbor.

Bonrii5 paulo pleni5 hanc arborem defcribit l. 6. c. ?. Creberrimis in quibus in trunco K ran^ fpmis eft obfitu5 foliis fere Sabinac vel *qrboris Vita*, led non tam pinguibus & craffis. Cxterum Fabas rotundas fert, punicea coloris, in quibustres, aut ad fummum quatuor nucis clauli latent^ tanta duntie uc dencibus frangi nequeant: Hifce p!#ri apud nos loco fpharicarum laterkiam in Jufu ftd utuntur. Sapor foliorum afringen5j unde eorum expreflo in ulcenus ufis eft Bontiusin aJiorum riedicamentorriin defctu: idem c cortice & Foliis mukocies praefantiffimum excoxir. Lycium CU' prelli aut Arboris vits fpecies videtur.

9. *Lycium Indicum creditum Abjno Park. Indicnm Alpino putatum J. B. Lye. Indicum aherftf* CUzegJ C. 22.*

Alp'm.

Fmtex eft multis ramis reftiffimis, ab *radhibus* multis, duris, lignofis obliqui incidentibus^ lofligitudine ti-ium cubitorum Be plus obfervatis furfum affliigens; ramifque Ipinx acutiffimz,8c longz mulrarque in/imt, quorum quardam foliolis veftita (peftantur. [*Fvlia* circa fpinarum bafesnon quaterna tanrun^ fedplura difpari magnitudjne confurgunt, Olivar foliis minora, ma^ifque tenella, nec in acumen anguftata, fed Buxeorum ihftar rotunda *Vtjling.*] Flores ut minuti, lie numero5 exiltunt, lion ventricofi, fed a contradiore tubulo fenfim ampliati amabilem in rifum hulca labia diducunt. Sinum inrinum flavedine tingunt, purpureis aliquot punftis receflu foliDruin, infriptij *rpliqua cor** pore hyacimhi ferrug^nem Violis permifcentj utroque tamen dapfli halitus gratiffimi expiratu longè fuaviores. Ex his fructus nign, parvi producuntur, Ebuli fructibus profus fimiles, laeves^ guft^ amaii & adfringentes.

An fuccus ex hoc frutice paretur quem Lycium Indicum vetuftiffimi Auftores nominarunte^ notis planta; facilius divinari licetj quam ex jEgypriorum /ermone Colligere, inquit Veflingius.

L. 220.

Supra ripas rami Nili *Zalig* vocati decem milibus pallium fupra Alexandriam urbem invenit A^ pinus.

Fructus

Qui ex vicinis Arabia arque iEthiopia locis hue in utribus affertur cqundenfatus ficcus, rite paratus fit, Lycii Indici indolem minime obfeuris fignis exhiber, inquit Veflingius. ^dulterinum effe putat, quod neque amantudinem habeat, neque incenfum rubefcentem C. 125. ? DC Allico in om^ us ulceribus utunturiEgyprii, prarfertim oris, aurium^ narium^ fcjtinoumque; ad fputu; etiam fanguinis, ad dylenteriam Sc diarrhttam, ali6quefluxus Ut. 11. Thum quacumque partem a fluxu humorum vaknter defendit.

Modus prarparandi Lycium Indicuffi ex Acacia quadam fpecie extat inEphem.Gerniaa UBJ.i. p. 9, 1^ 11.

101. • *Lycio affinis* [^] *Ægyptiaca* C. B. *Agiahalid* ^{*} *sÆgyptiaca* *Lycio affini* ^{*} Park- *Agiahalid* ^{v&ryy} ^r *tium folio* *Buxi*, *an Lyziwn* ? J. B.

Arbor est magnitudine Pyri Jylv. ramis raris non junctis, in rectum inxqualiter delatis ordinatim acutiflimis multis fpyiis obfita; *Folia* præ feferens Buxi proxima, tamen latiora, pauca^rara, fingula vel bina [etiam terna plurave] arqualibus interfittis adnata: *Flores* ljabet parvos albos, Hyacinth! Orientalis floFibus fitniles, jedminores; à quibus prodeunt fruftus nigri Ebulifimiles, guftulubahian Be adfringentes.

Mihi fanè hsc planta non videtur diverfa à præcedente, fi quidem magnitudine præcipue differre videtur 5c foliis Buxi imulis. At Veflingius præcedemi folia Buxi attribuit, quern nos in eo defcribendo ficutifucus.

Quid quod frutex ille quern Veflingius Cayri in hortis xdibus Confulum Venctorum proximis vidit, *Agiahalid* Horculanis didtus, quatuor vel quinque cubitorum altitudii^p^pfjudice *Vz>tg* Alpini erat.

CAP. HL

De -Capfare.

Capparis Bodaro à Stapsl dicirurnon quòd in campis proveniat, ut vult PhaVorinus, verùm, quòd furori 8c melacholia: medcatur, «[^] ^{v&mi} ^{v&v} ^{£&v}.

1. *Capparis fpinofa folio rottmdo* Park, *rotundiore folio* Gcr. *jpinofoj fruttu minor** *folio roton** 4o C.B. *fpinofa* J.B. **apc** ^.

Jmporcunius nihil Capparam luxuriantibus longè lat^qus radicibus Vetsres prodidere. Ipfe^aucem frutex muki5 etiam ftolonibus prardicus est, quus aduncs ipinac deorfium Ipcilantes Ruborum in modum armant. *Folia* alterno pofitu nafcuntur, circinats roconditatis^ alias modicè acuminata, uncias duas uircicr lata, parum variants longitudin^ laporis perquam amari. Ex horum finu pediculi fingulares exeunt, longi, quibus capitula infidsnt vindantia, quz explicata *florem* exhibent candidum, RDJZ parvulus zmulum, medium obtinentibus infinitis fibrarum cirris. *Semen* pericarpio oblongs OfV2E aut glandis figura, ulauditur^multum] parvum, [Parkinfbno durum, fufcum, uvæ gigarco non-nihil fimile.]

Locis arenofis Be ruderatis gaudet. Nos in muris Be ruderibus Romæ, Senarum, Florentix K alibi ^{L. H. M.} in Italia obfervavimus foontancam; cultam circa T^lonam in Gallo-provincia, ad muros 8c macedarias. In foraminibus fci. murorum lapidorum, trium vel quatuorpedum intervallo prope terrain ad id factisj Cappares plantant. Gemmas florum adultas, antequam tamen explicantur, colligunt, 8c per trium quatuorve horarum fpatium in umbra (parfas rclinquant, donee flaccetere incipiam, ad impediendum nè fe aperiant. Turn vafi immittunt, Sc acetum fupèr affundunt afferculo impofito Vas contegentes, adeoque conteftas uttiduum refitare finunt. Deinde exemptas leniter premunt, Be recenti aceto infundunt per altsrum otdiduum. Eandem operationem iterum repetunt, expreHis gemmis K novo aceto tertium affufo. Q?o perafto^ eas in dolia cum acet^ reconduunt. Nonnulli falem aceto admifcent, quod genus muni przftantius habetur 5c Cappares ad triennium integras Be incorruptas fervat^ nee colore nee fapore a recentibus difcernendas.

Gemma: hoc modo conditx ad nos tranfportantur Be in frequenti ulu fiint ad intinfus pro carni- ^{F. H. C.} bu5a (lis Be elixis, nee minus pro pifcibus: appetitum augment, Be concottonem promovent, hepatis Se lieni conferunt obftrufiones eorum referando.

Lobelius *in Adverf.* majores Cappares quamvis pretio viliores pra: minoribus, qux^ariores funt, commendat, quòd minus combibant muriam. maJDres, Bee. Quas vocat majores nelcimus, forcè intelligit fruftus, qui interdum condiri folent, Be Capparam longarum nomine advehi, tette Parkinftmo. At nunc dierum rarus vel nullus eorum ufus est in Anglia, proinde Se imporcan defierunt. Qiantunivis autem Lobelius alilve in Capparam conditarum ufum declamitent, nobis non minus ventriculo commodis quàm palato gratæ videntur, nee ullum unquam in quotidiano earum ulu nocumentum percepir^ius, aut alios percepiff^ audivimus.

Memorabib est (fi modò verum) quod fcribit Plinius, Ferunt (inquit,) eos qui quotidie Capparin Italicam edunt Paralyfi non periclicari, nee Liejjs doloribus. Diofcorides Cappareos hudtus fplenem liquare afèritj fi duarum drachmarum pondere cum vino bibantur ad dies 40. Coxendicum quoque morbo Be refolutioni opitulatur, ruptis item ac convulfis. Ducunc Be menle Sj Be picuitam de capite detrahunt. Dentium item dulorem ledant cum aceto cofi Be colluti.

Eadem omnia, auctoribus Diofcoride Be Galeno₃ prxftat cortex, radicis imprimis, lienes ici. induratos liquid aliud juvat, turn intus affumptus, turn foris iNpolitus, menfes educit, ulcera exterget Be deficcet: ad dolorem ichiadicum valere dicitur Be affeftus arthnti CDS: Vitiligines etiam cum acedo difcuuc, & choeradas [ftrumaf] Be duros tumores digerit, idoneis ad eamedicamentis miftus.

1. *Capparis fpinofa folio acuto* C.B. Park,

Non alia in re à precedent differt quim figurâ foliorum, qux acuminata fiint.

3. *Capparis non spinosa frubiu majore* C. B. Park.

Capparis vulgaris (au&ore J. Bauhino) interduni fine fpinis micffque invenitur. Scifbit Alpinn Cappres Alexandria majores quam alibi inveniuntur provcnire, quos *Cappar* qimque appellant, ex quibus cortices radicum in usu habent frequentissimo ad venues necandos, ad mpvendos menfes, atq, ad quibcunque tumores duros, przfertimque lienis fanandosj pro quo indurato membro exhibent dcufftum per os niulcis diebus, exterius ex corticis pulvere & aceto fado emplafiro. In Arabia arborefcit Be hyeme folia recinet.

4. *Capparis arborefcms fruBu Juglandis wagmtudine* C. B. Arabics non Jpinosa Park. *Cappar** arborefcntes J. B.

Cappares in Arabia inenimus pumiariam Ficuum akitudinem zqnantefj ut nobis confcendend^ fuerim adearum fructus colligendos, ovi gallinacei magnitudine & feminaintus contmentes, Piperis infiar caida: ipli Cappares Juglandibus magnitudine non cedunt. Vi vero album Sinapi in vinum Vernachiam injiciunt, neferveat, fed diutius dulcedinem luam retineat; fie Arabes jftarum Capparum iemina in fuis Vinis commifcete folent, ut dulcia ea confervenc. *Billon. Obf 1.1' c. 101*

f. *Capparis Sicula duplicata fp'ma, folio acute* Boccon.

Bocc.

Fplis eft Paliuri, acutis in mucrone, fed medio fubrotundis, inordinatim di/pofitis & arinexis caulis, colore ex lutco languefcente, glutinofis; ad quorum exortum fubtus gemin^ ut plurimum fpina: adunca: adiafcuntur. *Caulis Fht> capfula^* Semen a Citeris Capparis /peciebus nihil dilreparant. Planta eft perpetua, prope Agrigenfium fic^uens, acque oppidum diftum *laTpn* diFalmi*, ubi nuncum non raro vidimus.

6. *Badukka* H. M. P. 6, T. 57. p. 10\$. *Capparis arborefcms In die a Badukka difta, flore UtrA-petah.*

H.M.

Arbutula eft. caudice brachium craffo, in hominis plus minus akitudinem adolefcens. *Folia* aculeata ipiffa, molliaj e yirore /atura^ eminente ab ^dverio cofta, fapore fyjvefri funt, alternatim brevibus pediculis ramis inhsrentia. *Flora* e calyce rigidiore, quadrifariani divifo, albi, bini t. s. r. u. s. aliquando finghli, brevibus, e viridi fufcis pedunculis in foliaceorum ramulculorum fummitatibus in/iltentes, quatuor conftant petalis quorum bina digitorum minorem Jongg, ab infima parts in h^m turn, ubi dicitur frequencioresj excrefcencia, tenuia admodum, utinque plurimum d. d. d. p. annu gine, venulis friata, levitrcque erefta tint; bina vero ex angufto latiora, ecomleb alba opponuntur. *Stamina* vero plurima, in coeruleum vergentia, fterne albis, inferne cinereis exorflata api' cibis comitatur *stylus* longior craffiorque, magis csruleusj in cunum definens.

Locw.

Arenarum amans in *Chanotti Sc Badoos* vulgatiffima, atque ob florum elegantiam culta, domeftica eft, florens niefte Januario, plane equidem, * teftibus Indigenis,, fterilisj fed femper frondens. *Foliorum* fucus aprinse admixtus axungiac linimentum antiarthriticum, decofta vero cum floribus Judze bu5 A olja p o l u m alv Limpurg^ tioneiblicitatem prarfant, cujsexceptus vapor oris mundificat ulce vahnLjhns ra. 'P^ ^^fru(ftuScum lafte affumpti Vener^m extingunt. *Sfymodo hoc? cumfruttm nulh* nature analo- fti-*

gia ad contra- fionj baccis- avr,

7. *Solda* H. M. P. 6. T. J8. p. 103. *Caff vis arhmfcms India flore fempetah SoldaMa.*

H.M.

Vires,

Arbutula iftharc ramis eft fpadiceis. *Folia* b Jato in cupidem excentia, fiipina in parts fumme virentia nitentiaque, in prona e cinereo rufiV, e fpadiceis enalcuncur pediculis, coftalubms loluammodo eminentey multa/que divifainvnaSjintertexta. *Florum* quina perala oblongaj draffa, carnoJ2j intus glabra, albidula, poftremo in flavum vergentia, exterius villofa, e fpadiceo rubella funt; e* alboflavefcens, oblojigior craffiorque//^ in medio turgidus, ubi multa eum circumveftiunt purpurea *ftamina*, in Jpadiceum excurrit caput.

*Lg m,**

Solum diligit arenaceum; florum, quos menfe profert Martio, medio flylo includitur *fe'wen* perrexiguum. In *Cochin* ut plurimum reperitur nunquam dimittens fo^, quae appofita tefticulis eorum diffipant tumores, pulven/ata medentur Enteroceli.

Ha't Sc praxedens arbutula, e genere *Capparum* funt, monente D. Commelino, Be videntur carum eile quas Bellonius *Cappares non spinofas*; & *Cappares Arabicas fruffu ovi wagnitudine*, Pipirz infianvocat.

CAP. IV.

Erica trecta baccis candidis C. B. *bacciftra Lufnanica* J. B. *bacafira fruffu albo* P ^
fa uniuifolia* Ger. *Mittenc* ih in'ic ****
Fruftus e. c. b. c. 2. a. b. l. 5. a. a. u. r. e. n. s. m. mulis; fragilibus, nigriore quam reliquis cortice. *liHilif. I. n. t. l. S. m. d. m. labctj A A n. R. rior* & ciaBiDra, trino ordine circum ramulos dilpom. an IF, Zht, I, m? I, m. A h A 3111 ad e. friffionB guftus. Septembri & Odobn frudum A ieliquis ditw. cm lummis ramulis inhamcm gerit, pulcherrimum, candidum rraifparentem, obfciorf K j A 2411.*

aequales uniones forma Becolore referentem, iucculentum, acidi faponis, tria grana dura plerunque continentem, qui Novembri efficcatur Be Fponte dccidit. An floreat ignoro (inquit Clufius) in-cok negabant & frustum paulatim intumefcere, graridiulculumque fieri donec maturefecat affir-mabanc.

In una Lufitania hoc genus obFervabam, non prDeul Ulyffippone inter *Riofrio* & *Aldea galega*, ubi qui Tagum trajicere volunt naves confeendunt, Be eciam fupra Ulyffipponem folo adniodum arenofb copiofo fuo fructu albo onuftam, ut iniciD Manns grana lfti frutici inhaerentia exiftimarem, adeo procul afpicientiimpofuerunt.

SeptembriBc DftobriFruaumFert, quiNovembri efficcatur Be per fe decidit. ^ FryftusSeptembri & Oftobri menfibUlyffippone ipvenicur; Febrientibus exhibent ad fitim qua premuntur exftin-guandem: avideetiam FrufusiftS a pueris & mulierculis expecitur. Si Acacalis eft, aquam in qua maderit ejus fructus ad collyria^ qux ad e^dcand^m oculorum adem convenient addi tefib eft Diofcorides.

A. 2. *Erica baccifera procumbens nigra* C. B. *Ificif. procumbens* Ger. *baccif. nigra* Park- *baccif.*

Humi diffufa eft, fie latas oexupat areas, multis ramis lignofis/flexilibus tamen, confans, exatro ruFefence cortice tefis, qui intrdum fibras agunt, ut latius ferpere, 6c fiifficiens alimentum at-trahere queant: Aflurgentes ramubs numerofaambiunc Foliola, ternis, interdum quaternis verbis dilpoita, craffa & carnofa, fuperioris Ferè familia, faporepiimùm linguam efficcante^ deinde acri S^ linguam vellicante. Puffilli ad foliorum exortus flofculi, tnbus foliolis confantes, colons exhsrba-ceo fubaltracantis, purpurafcentibus ftaminulis prsditi. His fuccedunc rotunda *baccx*, Juniperinis haud minores, initiovirides, maturirate nigra, Bc purpureo fugco, uci mora, plenae, in quibus ltiulra in:qualia, Be veluti triangula grana. *Radix* lignofa Sc dura eft.

In montibui udis Dsrbienfibus, Scaffordienfibus^ Eboracenfibus Frequens eft. Obfervavimus^ti-aminEricetis elatioribus Warwicenfibus 6c alibi in Anglia, *Crotfrbctricif* & c *ctafic-ftertic*^ in-coloc Vacant- Clufius in *Svebzrg ScSnealbm* celfitTimarum Auftriz fie Stirisc Alpiuni jugis, menh Julio & C Augufto florentem BcirnmaturisraaturiFque baccis Druft^m invenit, & c.

SchvvenckFeldiusplantanhanc w^o^SW6^ appellari polTearbitratur, qubd efus baccarum ejus uberi-
capitinoxia qua:dam inferat lymptomata, ad quae ddira! fubfeqnantur geficulationes, ratigns
nonnihil inteiturbata, utis qui ipfis ufus Fuerit copiofius Simiarum inftar fe^iabere geftu ridibundo
videatur. Hmc plantam hanc deleteria facultate minim e car ere contsndun^ 6c ab ejus eiu omnino
abftinent^ aliifque Fruftuum ufum fanfte interdicitur.

Fruftumhujus plants in Dania innoxio^ devoracum effe, Be in alimentum plebeiorum cederè fie-queritiffime tefatur D. Ol. Borrichius in A6t. Med. Tho. Barthblin. Ann. 1^7^ *ObC* 58. Jicec MatthiDlu5, Thalius, ScS^nnstus, necnon SuhwenckFeldius, ut vidimus, fcribant hafce baccas capiti noxia5 efle 8c deliras, geficulationes inFerre. Sed Facultates rerum variantur pro folo, aers Bcc. ~D_mTancred, Robinfon. Ego tamsn. vix credo ullibi venenatam effs hanc baccam.

CAP. V.

Caa-Opia Marcgrav* PiFon. Pao de Lacra i«r^0^f. *Arbufculagummiftra* BrafiUenJis, fruftu *Ceraft* inagnitudine, *gummi* Gutta-j srtioufimit.

Marcgr.

Arbor elt haud magna, cortice è cinereo ruFefcente, ftris brunnis, ligno lento, in mulcos ramos fe fpargens. *Folia* habec folida, inFerius ex viridi quafi ruFefcentia, fupenus dijuce viridia Be lplsndentia. Florum illius in umbellis congefitorum exDrda fiint globuli brunni, mag-nitudineLentis, qui fuccedente tempore protrudunt floresj quinque Foliojis confantes, ex viridi flavefcentes, mteriustomentoalbo vefitDS, *icftawinibus* fubtilibus luteis reFertqs. Floribus fcc-cedunt *batcte*, primo virides, cerasi magnitudine, rotunds, molli cortice teftae, quc diffefte è cortice fuo liquorb aliquid, eleganter flavi exudant: intra cDrticem autem continetur pulpa alba, çonftans meris cylindri5)uxtafepofitis, qui invicem adherent. In extremitate ramorum quifruftus Ferunc femper duo *Folia* acuminata brunni coloris compafta funt, & c quali lemiglutinata, haftamfeu vena-bulum figura reFerentia, quae decrcpta è pediculo luccum emittunt croceum.

Si cortex hujus arboris incidatur, praefertim quando incipit florescere, & linguatur per unum atque al-
terum diem, vel tri: la fimpliciter, xocso rubram, quae coagulatur, inchoa mullis, sed fanlim indorefcit.
Convenit colozs Be confitentia cum *Gutta jmi*, Be purg.it eodem modo, atque diffjlvitur: eft rufioris paulo colozs, crocei Ferè, Be tingit colore aureo paulo iaturatius. Diffolvitur in fpintu vini; Bè tinturam reddit croceam.

Olim affrifu hujus refinse in aqua diffolutae impetiginem tollebant. Licet minoris efficacit^ fie *Vir* quàm *Gutta gamba* quod an infitae tarditati an pra:parandi modo fit imputandum dubitat Pilb, tamen à 3(5. ad 3 j. per integram noctem in aceto Scyllitico aut Sp. v. macerata, & c ex vino propinata vexi-trem folvir, fortitèrque per inFeriora exonerat. Reftius in pilulas conglobacum exhibetur, quam in-forma liquida, qubd ob tenacitatem difficilhmè difflbvatur.

CAP. VI.

Jabotapita Marcegrav. Pifon. *Arbor baccifera ractmofa Brafilinfts* > bated trigond proliferd.

Pijo.

Litoralibus Brafilia: locis luxuriat. Arbor est mediocris altitudinis, cortice griseo, in ligno molli & Lento: *Folia* fert alternatim opposita, dilute viridia, Bern certis ramuliscopi-
oios flosculos, racematim congestos, pentapetalos, flavos, suavissimi odoris. *FruEtt**^uoque,
qui maWescit Martio menle, provenit racematim, muirum in quolibet pediculo bacca,
magnitudine nuclei cerafini, conica fere, vel quasi triangulansi cuilibet autem baccae ala.tres
quatuorve infident sine pediculis, ovaes, ejurdem cum inferiore magnitudes; oranes colors nign*
in Myrtilli nofrates, Be eodem modo tingentes, carent acinis, & iunt Japans adftnngentis: affwn
non solum ubibus dicati quibus myi tilli Europ^ ^d 8c oleum in quotidianDs ufus pro acetarps TO-
ceptum ex iis exprimitur.

CAP. Vn.

Bartifera Indkafirft'' rotundo > *cufridato, Ctrafi magnitudine, polypjrtno. Anavmga* H. M. p. 4-

r.49. P¹⁰¹,

J4 Rbor est mediae magnitudinis, altitudine viginti, crassitie vero Tex. circiter pedum ftienfiram
V\ xquans, mulciFque ramis Furvis intufque viridibus donata: lignum albicans, denFum, cinerco,
labro ac amaro cortice munirum. *Radix* ruFa, fibrolij nigricante cortice tefta, fptida, a-
mara. *Folia* alternatim ramulis inhaerent, oblongo-rotunda, acuminata, & C in ambCU
do crenata, glabra, den/a, colore atro-viridi iuperne splendentia, inFerne viridi dilutioiCj
Quot c media costa in latera excurrentibus; Fapor amarus^ odor ingratus. *Flares* exigU^
odori^ faporilque amari, brevibus petiolis ad Foliormf exortum ramulis inhxtentj atqup
tuor rotundis, intus concavisconstantFoliolis; Fexviridi-flavercentibus^miW/^r, rubicundis apici-
ornatis medium occupantibus inter *qux fylus* prodit viridi-flavefcens, capitulo rotundo. *Fr**-
awgloboli cum aifpide in vertice, CeraForum magnitudine zmuli, virides, glabri, ceni pellicula
cjni, carneque viridi Fucculenta, faporilque amari incus refertj; intra quem numcjb
Tufk MaliPunici in modum diiponuntur.

Provenit Jocis arenosis, in Malabar, praefertim circa *Cochin*; Femper viret^ quotannis maturos iert
Frustusj menFe viz.-Augufto.

SucciiS eFruftibus expreffus Be exhibitus fidoresmovet, ac njorbis mali^his medetur, necnon
xam Fervat alvi^an.

E Foliisin aqua coctis balneum fir, quibuscunq; articulorum'dolDribus tollendis utile.

CAP. VHL

Baccifera Indica flonbm adfoliorum txortus, frustu [ulcato dtcapyrmy. Pevetti H.M. P.4- 7:55
p. 115. *Solanumfomniferum Amiquorum Alpin. exot. forte.*

Arbor est juftxmagnitudinisj *caaJice* crassb, candid^ cortice obdufto cinereo, mukifquera-
mulis cinercis donato. *Radix* fibrata, albo-flavefcensj rufo, intus purpureo, cuiccefta-
X JL *Folia* geminata, ordincparallelo ramulis inhsrent, oblongo-rotunda ac in mucronem
nencia, crassa, glabra, mollia, nitentia, fapore acido atringente, odore nullo. *Flosculi* pjures limul
junfti ad foliorum exortum ramulis inhwent, exigui, inodori, infipidi; fex terebibus, acuminatis,
fubflavefcentibus^ ac extrorfum reflexis foliolis constantes, medium occupante *fijlo* exiguo, can-
dido^ capitulo flavo. FbfcuHs fuccedunc *Uu** piano-rotunda; acuminatae, decem angulis
fulcata: purpurci, glabrz, nitentes, intufque in decem loculamenta per membranaceas qualdam
pelliculas dillinfiti, in quibus tdtidem locantur/*«««, oblongD-rotunda, tnquetra, crocea, glabra,
intus Candida, amaro-dulcia, ita ut fingula in fingulislatitent cellulis.

Provenit ubique in Malabar, prxfertim circa *Paloerti*; Temper viret, quotannis fructus fertj men-
fe viz. Augulb^tque per o<aoginta non raro frugifera manet annos.

Ex arboris fojjiis unguentum conficitur vulnerarium.

CAP. IX.

*Arhw baccifera Brafilienfis floribus fiwv, Uva crifra fr*fv. Murtzi Brafiunfts* Marcg¹¹¹¹. Pilo-
Aaacgr.

Cortice est cinerco, & ligno fragili, *folia* multis, fer^ in frondes congestis, longis, K «» extra
mitate latioribus quam in exortu, non ferratis, colore Be lanugine Verbafei foliis
junioja plant sunt hirsutaBe ruffa. *Fustulw* fertfpicatim congeJtps, luteos, cum fuis
quinque, petalis deorlum incurvatis, orbiculatis, figura aunltalpii cum manubno rubro: li: apd
aiuem nors SM&nttaminula multa, ex flavo albicantia. *Frufta* sunt bacca: magnitudine *Be tiff**
ut u d d d d d

Lociti S
TrdBw.
Virus

Lociti S
TrdBw.
Virus

fructuum Uva: Ipini qui comeduntur. Maturi gratissimo quidem acore palatum vellicant, led ftu-
p3rem tandem dentibus inferunt, fimiilque adfringendo intense refrigerant. Quapropter probe
condiri folent, 6c loco Berberis quibusfapore Be efficacia fimiles fuht zgris ad refringendam fitim
Bcftomachumrecreandum ftxhibentur. *Pifo.*

Harum arborum quatuor minimum diverfe fpecies numerantur. Earum dua: maximè celebres/
Be in ufù habentur *Mureci-petinga* Be *Mureci-guacu* ditae-

Arenofc 5c fitientia loca eas producunt, qua: omnesmeiliocrisaltitudinis iunt.

Locus.

Primi generis [hicdefcripti] corticibus retia Be uoria tinguntur, Be contra putrefactionem mu- *Vires*
niuntur. Bsrriban ex iifdem potiones conficiunt ad purgandam alvum^ quod à me nondum com-
probatutn eft. *Pifo.*

C A P . X.

H.M. P. 4. T. iD. p. 6; . Baccifera racemofa acinis vhhngis folypyrenis Arzc.*

H.M.

A Rbor hxclicèt nullam cum 7i&ei«fimitudinem haberevideatur,ejustamenlpeciesIndis habetur;
A\ eftque procerà, caudice denio, albicante, corticeDbdufto cinereo, necnon ramulis einereis
ac glabris, in orbem diffufis donato. *Radix* flirva, odoris-fapDrifque lj'lvetrif. *Folia* in-
ordinate circaramulos proveniunt, oblongo-rocunda ac in mucronem definentia, fupernè atro-viri-
dia & nitentia, internè fubviridia 8e lanuginoia^ craffa^ denfa, longitudine fpithamam, Jatitu-
dine palmum aquantia, inodora, inGpida. *Flores* exigui, è viridi albicantes Be fuaveolentes
racematim prDVeniunt, atque *calyci* inherent exiguo viridique: CDntant ii unico foliolo, fed in
quinque profundas lacinias divilo, fie ut plura videantur; quinque flavescencibus Be acuminatis
hbri5 medium occupantibus; intra quas *jtylm* prodit ereftus, capit^lo viriii. Floribus pari fertili-
tate iiccedunt/r«ff»j3 oblongo-rDtundi, viri^es primum, dein rubicundi, glabri ac nitentes, *Arc-
tjua* frutibus tenerioribus haud abfimiles^ fimilique carneintus referti^ intra quam plura conti-
nentur *Jemina*, obIDngo-rotunda, furva, glabra^ nitentiaj nee minus dura, duplici ordine locata,
ac membranacco diflepiementOj feu parieteintergerino fejunfta: fapor aufterufj odor nullus.

Crefcitlocis montanisBe arenofis in *Teckznkour* : femper viret, quotannis floret Be fructum fert, *Loeui*
ac diufrugifera manet.

Ex arboris foliis cum melle nrdicamentum paratur^ quod exhibitum fudares movendo zftum fe- *Vitw*:
brilem temperat Be variolas expellit.

C A P . XI.

I. Vitadagou H- M. P. j- T. m 30. ^ 59. Baccifera Indica fruttu rotundo atropurpureo pentacoccv.

H.M.

A Rbufcula eft humilis, feptem circiterpedes alta^ caudicz mediocriter craffa, albitante, cinereD
- ^y cortice munito, multifque ramulis viridi-rubefcehtibus, ceu frondibus umbrofis in latum dif-
fufisj dona to. *Radix* fibraua, albo-rufescens, inodora. *Folia* obiongo rotunda, craffa, mol-
lia, glabra^ fplendentia liipemè,, nequaquam infernè; rtervis aliquot è media cofta in Jatera ex-
currentibus : lapor iubamarus. *Flofculi* albicantes, quinis fubrotundis foliojis CDntant ; odor nullus.
Floculis fuccedunt *Bacca* rotunds, atro-purpurafcentes., quinque intus continents *ftmina* flblida,
triquetra, albicantia primum, dein rubefcentia, tandem nigricantia.

Nafcitur variis Regni Malabarici locis^ pra^fertim in *Angizcainal* femper viret, bis in anno *Locus*
fructus fert, Martio fcjl- Be Septembri itienfibus. *Temp*
W.

Efoliis contufis Be cum Selami oleo coftis linimentiim paratur, quod abdumini illitum difficij *Vireu*
partui fuccurrere, Be retentas fecundinas ^xpellere fertiuy :

x. *KalVitadagw H.M. P. Jft. ;i. p. 6i.*

Przcedenti perfimilis eft przeterquam quod *folia* itiinora fint Be magis teretiaj *Feres rubicundi* :
Bacae mali Aurantii coloris, addique faporis.

Provenitlocisniontani5 Be petrofisin.T'^w^w ; viretperpetuo, quotannis floret fruttufque fert, *Lcw*,
menle circiter Februaricr.

Vires cidem funt quæ pracedeitis.

C A P . XII.

*Arbor baccifera Brafilienfis cortice faponario fruStn magno in qumquz partu diffilimtt, pdyfptrmo
Ibcipuma Brafilhnfibtrs Marcgrav. Piè*

Marcgt. m

A Rbor eft inftar Cerafi fylveftris noftratis, etiam ejufmodi pine *folia* per ambitum venuftè
frrata obcinet, cortice ex fiifco cinereo. Ad quodlibet folium, five illm5 pediculus, bre-
vis enalciturpediculus continens *flvfculi* parvoSj quinque conftantes foliis flavis deoium
flexis, quafi quinque uniones affixe cflbnr; in medio multa ftaminula flava extant: fiincque
flokuli

flofuli in umbellam congefti. *frum* fert orbicularem magnitudine globuli luforii, primo quidem viridem per rotam hgnatum tuberculis fufcis: immaturus adhuc concilus coatinet materiam lentam infarvici: maturus autem nigrefcit, &c in quinque partes aequales fponde finditur, continens *fmina* fu/ca fuis cellulisinclufa, magnitudine feminis Sinapis, figura *tx* rotunda quail oblong*.

Vfi*.

Cortex hujus arboris detraftus glutinosus eft, Be derala exeriori cute fulca^ feu rfcens, feu ficcus ufurpatur, egregiae faponis vicem impiety & turo adhiberur ad omnia ad qua? fapo Hiipanicus. Longe prarftat fruftui *Sabaon* feu *Quity* ille enim acrimonia fuâ nocet vefibuSj hie autem nsquaquam.

Loom.

Nafcitur ubique in Brafilia, maxima copia.

C A P . XIII.

Frutx Indkus baccifer fruffu rotundo Vdjpyrmo. Zourott-MotUi H-M. ?.\$ T. 39. f. 77-

ARBUFCULA humilis eft feu potius frutex, quatuor, quinqueve pedes altus, *caudice* tenui, cinereo corrice cinftOj necnon ramulis viridibus, aculeis armatis^ plurimifque virgulis pullulantibus donaro. *Radix* fibrata rufefcens, inodorajnfipida. *Folia* in ramulis aculeate proveniunt, oblongD-rotunda, in ambitu vix grenataj craflaj denfa, (iipernè atro-viridia & fplendens, infernè fubviridia/nervulis aliquot è media coftain latera excurrentibus, fapor ingratus, odornullus. *Fhfeub* iubvirides, graveolentes, quinque acuminatis expansifque foliis confames; numerolis *fiamn»lv* viridi-albicantibus, flavefcentibus *apicibus* ornatis, ac in Drbem expand medium occupantibus. FJolculis fuccedunt *baccat* rotunda?, virides pnm^m dein rubra; Be per maturitatem nigricantes ac nitentes, came intus iuculenta & acida referta;: intra quam *fmina* CDntinentur dura, offea, alpera, angulofa.

Locus.

Nafcitur in *Baypin*, aliifque focus arenofis circa *CocBin*; fernper viretj floret, fructumque fert.

Vires.

Ex arbons foliis cum radice in lacte vaccino coctis pocus fit, qui Antidotum habetur contra icpencum morfiis. Excorticein oleo frixo linimentum conficiur contra Archntidem. JFructus ~~ca-~~turi in delrciis ab indigenis come duntur.

C A P . XIV.

Arbor bacciftra Brajilitijis floribus umbtUatis Tilia. Caagua-cuba Brafilimfibm Marcegrav.

Marcgr.

ARBOR eft parva, erefto *caudke* affurgens, haud craffo tamen &c fine ramis: fuperius autem jngennbus vefitur foliisSj copiofis, fequipedem longjSj plus quam pedemlacis cum infignibus venis, ad taftum mollibus Be hirfuis, liipern^ vindioriDiis quam infernè. *Florejfrt* parvos, umbellacim congeftos, Floribus Tilia: fimiles, albos, quinque foliis confantefSj & in medio habentes umbilicum *Juccumj* odorem quoque florum Tiliac. Cortex arboris cinereusj lignum fragile. Fructus maturus eft niger, qui ab avibus CDmeditur.

Arbor trifolia Brafilienfis Topuli trtmula foliis. Iperoba BraJUitn/ibus Marcegrav.

Arbor eft cortice cinereo. Be punftulis albis variegat. *Folia* fert craffiufcula, ferè familia foliis Tremulz noftratis, ex viridi cinerea, in quolibec pediculo duos aut tres digitos longo tria mure Phafeolorum appoica. Lignum arboris album jnfatar fietulxj ad varia utile

C A P . XV.

PvutaletJja H.M. F-4- T. J7. p. 117. Baccifera Indica baccis oblongis in umbzta: firmam difpofitis.

H.M.

ARBUFCULA eft humilis, *cattin* tenui, ex albo flavefcente, cortice obdufto furvo, multilquC ramulis viridibus, quadrangulis ac geniculatis donato. *Radix* albicans, cinereo coitic5 tecta, fapons unftuofi *fk* fubadftingentis. *Folia* geminata ordine parallelo circa ramulo⁵ proveniunt, oblongo-tereria, acuminataj craffa, denfa^ glabra^ fupernè viridia, nervis aliquot è media cofta aJbicante in latera excurrentibus. *Flores* exigui, inodori^ iniipidi, extremis Tamuhs proveniuntj, porreffifque columellis umbelje fpecie pandunturj ac collolongiore inhaerent calyci candid* lanuginofb, quadripamito, quatuor cceruleo-purpureis^ acuminatis Be exrrorfum reflexis foJi¹⁵ confantes: foJiola hare totidem intercedunt/^wfW* alba cceruleis *apicibus* ornata, medium p^{ccu}, pance *ftyfo* purpurafcente. Flofuls decidennbus fiicedune *bacca* oblongs fiibterulea; intu^Q ieminibus niimerDfis ac furvis refertz, aromacia; inodors.

Locus.

Crelcubicuquin Malabar, prsfertim circa Cochm: femper viref. Julio *Ef* Ailgufto m^B flofas fee; ac diu fiiperftes non eft.

Vires.

Ex arbons folis in lacte coctis potus p^ratur^ qui fomnum prohibet, necnon Lerhargo^{allP} vefopor^{ad} laborantibus prodeft. E foliis fibribus, cocacacade, aliifve ej us parti bus w aqua codtis balneum ha Epileptic aliifque fpatmodis affectibus utile.

C A P . XVI.

Nalngu H. M. P.*. F- *&- P- 4?- Fruttz baccifir Malabar. Fhribus umhllatis pentapetafx, fruffz nigricante polyfermo.

H. Af~

Frutex est ad altitudinem diuim homintini affiirgens^nafe^rifq^ in arenolis. Radix fibrofaj cortice ufglcente Be fufco, qui intus albicat, coruulo in medio ligni fubrubro. Rami Scfurculi nodofi, ILperiores angulati, virides, ligno pauco, maxime ad corticem, Be in filamsnca fifili^ corcuo inti s molli. Folia in pctiolis qui ad exorumm extuberant, pinnata, e pinnarum foliorumve brevibusBe craffiolis pediculis media:coftx adnexorum, binis, ternifre acC etiam quinis conjugationibus 6c imparicoftam terminante, compofita. Sunt autem turn cofta media, tumpeciolifoliorum punttulis afpen pinnae ipfac ublongu rotundae, antenus parum contraftz, ac cufpide angufto brevi eminences, in ina;gine ronundis denticulisincifae ac crilps, lataribus versus interior em parcem contraftis^ textura densa, duriola^, fuperfic obfueo virDre njtenc^ liibtus clariores, fapore adfringenti: quz in extrema cofta est omnium maxima^ ac anrerior rotundioris orz. E media cofta^ quac in fupina pajte pardm eminet, nervi bini aduerfi ordine exeunt obliquoannuhri ac parallo duftu proxime ad marginem, Bc. Flores umbdlatim proveniunt in petiolis planisj qui in medio friati, ac punttulisfubafperi funt, ac e nodulis caulium erumpunt, parvi, quinquepecalls acuminatis, deprftm reflexis cDmpoficij colons albicantis ac vindi-diluti. E medio flore cminsc capiculum album^ quod in vertice deem denticulis brevibus donatur, [tylum parvum cum globulo viridi-diluto ex quoprodic in fe recondens. Calyx {Jorum parvulus estj confans Foliis quinque cufpidatis, viridi-dilucis, quibus arte floremapprehendic. FruStw forma piano^ rotundi, per maturitatem cceruleo-nigri, earns intus lucculenta^ fucco coeruleo acnonnihil unftuofo: comefti os adurunt pungiintque : lempna.oftoauc novem fingula continent, inorbem unolimplici ordinefitaj ac mediante came frifttfc a (e mutuo diftinta, mncque cnnmlaterum, quorum duo plana ac unum rotundum. Be colons ruffi.

Bis hicfrutexin anno flores fert tempore pluviofo Sc xftivo.

Tempts.

Radix in decofto data dolores flomachi CDmpoficij uti Be dolores colieos Be inteftinorum tonnmfr. Deco&tum ligni epotum fedat Imm in sgotis. Folia trita Be igne tofta vctiginem Be debilitatem capitis tollunt iis appofita. Eorundem decoftorum vapor exceptus proficius est pro dolore archricico. Succu5 exfolu5 teneris expreffus fic epotus flomachi concoftionem adjuvar.

C A P . XVII.

EacviftraIndicaumh&ata forj pallido fintaptato^ raro^fruftus ferm. Ramzna-pou-Maram H. M. P. 4. T. 61. p. 1x5.

M.H.

Rbor est procerus, 70 circiter pedes alta, caudict craffh, denfej, albicante, cortice obdufto furvo, fcabrofoj ramiililque plummis, in orbem longelatcque diffufis, donato. Radix flavescens, nigricante corrice tefta, odhra, aromatica. Folia petiolis oblongis circa extremos inferne subvolutis, odor suavis, fapor ftrictus. Folia hae: edia deviduat, baed ficut ac Modyam folia, ftigmata fui relinquendo circularibus promin^itibusque an^ulis arbor is ramulos cingunt. Flora extremis ramulis racematimhszrentj (tiaveolentes, quinque acuminatis, pallid e rub in tibus, intiislanuginDiis, ac ftellxin modum expanfis foliolis confantes, medium occupants flylo candido, apice ornato tripartito, fupereminente in extremitate plumula albicante. Flonbus/i<i?^ raro luccedunt; teftantur tamen Malabarcnfes nonnunquam baccas ferre hanc arborem oblongo-rotundasj flavo-purpurafcentes.

Crefcitlocis montanisin Berkencour.

Locus*

C A p . XVIII.

1; Nirtiri H.M. Tart. 2. Tab.zj. <An Fruttz Indicus baccifer Vitis Idaa found* tlujii filii Breyne ?

H. M.

Frutex est altitudine feptem aut osto pedum, nafcens in arcnofis. Radix in brachia divifa, ac fibris capillaceis vefita est, ligno duro, ac cortice afrinzenee, qui sub cuticula fulca rufer est. Stjppites ac rami cortice ruffo, qui faporis fubdulcis 6c adfringentis est. E ramis hinc inde prodeunt furculi foliacei valde tenues, viridesactenuiter pilofi^ quibus folia breviffimis petiolis hinc inde alternatim adhaerent/parva, oblongo-rotunda, tenuia/plana, glabra, fupernè obfeuriusviridia, fubcus dilutiora, fapore nullo, nifi quodd diitius tnacticata leviter pungant. Flores in furculis foluceis ex alis foliorum prodeun^ brevibus ac tenuiffimis petmlis, parvuli, quinque petals conltantes, rotundis, inferiDii parts rubiis, antenori ora albicantibus. In medio est jlylus viridis, cradiolus, priiTiordium fruftus, cum duobus Itylulis ex adverfo oppolicis, ac cinftus ad onficium florum quinque flavis nodus. Fnttm phino-ro:iindiH, caeruleo nignjapore Tubduli Be fubafringente, incus cum macuri func fucco aqueo coemleo repleti; femin* paiva ajigufta concinentes> crilatera, duobuslateri-b>s planis 3euno rocundo ciraimfcntpa, permaturitatem nigncantia. pulpa iicciilenta intus cce* iulea.

R. d. d. d.

Virus

A. If ... PrO i ... ationc ventris; V^l = tiam alicujuspartis tumefactione, trita & impofira in mo ... apoitematis matrandis frvium trita 8c cum ladle acidq iis appufia: ad qjoa ctum CDuduat foJiorum 5c corticis fimal tritorum cum aqua calida locio.

z. Katou-Nirouri H. M. l. j. T^44.

Arbufcula Jiumilis est, pscedenti valde fimilis. 'Flares exigui, rubefcentes, tenuibus viridibulgue pedDjis ad tDliDnim exortum, Sc extremis furculis proveniunt, fex oblonga-rDtundis ac expansis fff- JioUs conJtantes. Succedunt iitfcc^ piano-rotunda:, tricocca: plurimum, lubro-ccErule^primum, oein ca: iuleo nigncantes/ww/w* Tex femilunaria intus continetus.

Locw. Viru.

PrDVEnitlocishumidisacrenoJis circa Cochm: femper viret, floret fructumquB fert. t.rolns in aqua communi coftis oris collutio conficitur ad erofas gingivas fanandas, dentffque vaciJantEs roborandos. Ex foliis cum fructibus, corrice ac radice coftis balneum fit aniar- tnticum. Ex radicis cortice cum Pipers longo 6c zinzibere cofto potus paratur, qui ad ventrioi- lum roborandum, pituitoioique humores incidendos Be attenuandos fumme utibs perhibetur.

C A P. XIX.

De Fruticibus quibusdam exoticis Vith Idee foliis aut fru&u.

1. Frutex Indica baccifer Vitis Liliaceae secundae Classi fcb^, Breyn. Caja-manis Tniisj i. e. lignum dulce.

FRutex videtur arboreus, pluribus tenuibus ramis diffusus. Rami, quos nactus est Jac BreynW ... "trinqe ramulis insquali urtu, plus palmaribuV dilfimi: V^yam A^l^: in S^uib^p^it=r, alternatim, tarn plana difpofitione ab im^ ... pythoneo parvo, fex granulis oblongularibus refertus.

2. Frutex tsEthiopicu baccifer foliis Myrtilli Breyn. Cent. 1. cap. 5.

Solitudinim incoJanon procuJ a PrDmatorio bona Spei-, lignum habet durum fic^Ibum, cortice f^fr^ZlruceJcente obduftum; in multos autem difcefcitur ramos, Be hi in plurimos dense confipa- k^S T^5^UDS nulJa fe>=d^B^ftafed confurafe brevibus ppediculis mfidenria, per ambitum ... craffiora Sc fobdiora ambiunt. Baccas nigras, avibus maxime wperitus g^r^e.

Al^ac^en^m^P^T^TM differt a defcripta, quod denforibus acminoribus ramis, angu- Itionibus Sc oblongionibus fbliolisparditus fit. Hujusfruticis mentionem fecimus inter Myrtds.

3. Casagonyo Brasiliensis Maregrav.Pir Frutx lactfr Brtfititnjs, fru^iu ... Myrtilli.

Snfrutex est infar ... magnitudinem. C^& est plane lignolus 6c hirtutus; Folia ... JevitH fwrata, rribus cminenribus nervis fe- rT 3 ... Confpicuaj Cranf^erf^TM autem multis venulis intertexta, fuperius magisvi- triSr?^m^r^US^ac^Pr:Et^ea fuperius tuberculis pertotum, inferius ferebuculis featent: quodlibet tuberculum pilum habec albe/centem. Fert fifths in pediculis parvis duos, tres, quatuor vel quinque, in racemum hbi appofitos, albos, pentapetalus: poft quorum cafum nafcuntur bacca: ni- gar, magnitudine baccarumjuniperi, dulcis laporis, qua: comeduntur ab jEthi&pibus, 6c fuccum dantinfar MyrtiJhferé.

Viraj. Locus.

Foliorum pulvis ulceribus ex caufa calida ortis infperfus optimè ilia curar. JNaJicur pluribus locis in Brafilia.

C A P. XX.

Frutx baccifer fructu ai finguis floret multiplier.Narum-paml. H.M. P z.F. lo.P.U-

FRutx ... altitudint: quJniJUcf, VC pduiIJ ac Btl, anijuxraarboresquasamphaurad duara ... fibns longh crafsisque terrxie firm^f rfi^> quoque ac f^mtUs rubeAc^ente, odorearomatico vegetiori quam prarcedens [Panel-J ... nign^cant. Fp/i^ petiolis curtis craffiolis append, oblongo-ang ... culpide acuto venulifque parum exfantibusltriata, atquu adeo ... faturus, ac etiam cunt nuore, f^g^a ... ddiffimili5folwCiiviamomi. f/pr^ brevibus petiolis infidg^

lex, rarius feptenr, petalis compofiti, rotundis, oris in cupidem contraftis, craffis, rindis ex umbilico in planum explicatis, ac cupidibus orbiculati in rinda flexions qualiter interiora versus in tortis; [unde flores rofas repraefentant] colore primum viridi-fufco, poftea magis Be mans rubefcente donec tandem rubro-fanguineo-furda evadant. E medio horum florum (finojv potius, folliculi dicendi funt) capitulum emicat rotundo-planum, albicans, in cujus parte fuperiori geniculat oculatz ac plandens agmine in orbem confrae flint, fubflavo primum colore quibus multus fine temporis humor unctuosus exfudat, poftea, up & capiculumi diurni ruffefcento aut ex ruffo lfcen^ Fruttus cum adhuc tenerrimi ac velut prima germinafunt obnigo-anguft acv Qluti T pica Mn cap^ tiffc florum, gemrijis ejus oculatis infita, quo capitulum rotundum/picatum repr^ fojit^ it: pum autem in ft ftam excrevere magnitudinem petiolis longis tenuibus ac furreais gemm^ (is Qculatis, in lid nri ag ca^ pitulum in prbem corona infar cingunt, fiint-que oblongo-rotundi longitudine ferme uhkis pollicis, latitudine dimidu: per maturitatem ex flavo rubefc^ ntes; oddns arom^ cici minus Vegeci, gingibeis; viridis xmuli.

Snmna, quibus frudus in totum repleti, plana utrinque oris rotundioji^ exceptis iis qui in extremo Frutu lunt, quae ab uno latere convexa, ordine luper fe invicem velut totidem cafeoli lateribus fuis planis in latitudine fruttus fita, membranarum tenuibus ac ad oras carne tenui fruttis liè multo fejuncta, ac fub cortice fruttus extuberantia, per maturitatem ex viridi Tubflava cum venulis fuffefcentibus, ctm plane licca fubrufa.

Oleum ex radicis corticibus per deftillationem extraam Tciitti aqua asc^ ndens eique innatans te- Vir nue^ clarum 6c viridescens, odons minus grati, pingue 8c fubinarum, reftinguendo ardoil jecoris conducit, inque dolore capitis^ &c. cholera exufta; halitum malevolentem regcit, juvatque pro fulcisons, ut Sc radix trita mixta cum aqua & inun^ Eadem in rinda aqua epota additoimento Sacchari confert in Febre frigida & in ardore jecoris: eadem trita in aqua falfa feu marina fervit pro vermibus ex putrefactione humorum natis, facta inundtione membrorum, Ejuftdem cortex trims Be in aqua epotus, proficuus est pro phlegmate 8c pro Angina, atque eodem modo juvat in febribus ac in fluxu hmplici ac dylenterico, ut & in ardore hepatis Sc oris aperturis ac fciftis.

Hanc arborem pro Nimbo Garcia: 8c Acoft^ habet D. Commelinus: verum tum icones tum descriptiones nimium diftant: Siquidem Nimbo Garciae Fraxini magnitudine est, cum Narum panel quinque aut fex pedum tantum altitudine effe dicatur, nec fructus modum excedat. Deinde flores Nimbo pentapetali funt 8c albi, Narum panel vero hexapetali, 8c rubro-languinei: tabulis nec nomina conveniunt. Vires autem attribuunt Nymbo fuo Garciae & Acoft^ fequent55. Folia, trift, fe vulneribus cum hominum tum jumentorum cum fucco limanum impofita miraculose ea fanant Fohorum item fuccus peruths est fiye pfer os fumptus, folus, auc ex vino, aut MIII^ juiculo, five umbilico impofitus folus, aut cum fellis bubuli momento, auc aceto, aut Aloe ad necandos 8c expellendos omnis generis lumbricos: ideoque familiare admodum Sc falubre in medicamento est Malabarenfibus quoniam lumbricis valde funt obnoxii. Magni^ est etiam eorum ufus tum florum Sc fruttus, in articulorum doloribus, tumoribus, membrorum debilitate 5c apofte- matibus.

Olei etiam ex fruttibus expreffi magnus est ufus in nervorum doloribus, quo vulnera, nervorum pnturas & contraftiones curant Malabarenfes.

CAP. XXL

Baccifera Indica flore compofito. Mala-Ehngi PL M. Fart; c, Tab itz

Arboreft juft magmtudinis, 10 circiter pedes alta, caudice craffo, flavefcente, ckereo cortice cinfto, ramufque vridibus plunbus donato. *Radix* albo-flavefcens, amara, inodora *Folia* oblongo-rotunda, acummata craffa glabra, bvia, fupernè atro-viridia, infonè viridia, inodora, media, cofta albicans^ *Flores* inodon, albicantes, oblongis tenuibrtq, petiolis circa ramulos proveniunt, e quinq, flonbus fiftulanbus compofiti; fingulis florem totalem componentibus flofculis fuis privatis calycibus donatis ftammibus bims vridibus medium occupantibus; irttet qux capitulum prodit vridi-albicans, e cujus lummo plus emicat craffior, brevis. Flofculis decidentibus fuccedunt *Fruetus* oblongo-rotundi, viridi-flavefcente5, cum culpide nigro in vertice, craffo ac amaricante cortice cin^i, intra^ quem continetur *nucleus* albicans, fubamarus.

Credit variis Regni Malabaricilicis, prsfertimin Baypin, Warapmli, & Angie caima^, femper *Locus* viret, quotannis floret: 5c fruttum profert.

E folijs cum Piper^ & plamo aromatico in Sefami oleo coftis linimentum paratur, quod invertigine, n-pilepiti^ imihbuz, cephalicis affedibus valde laudatur capiti inunftum.

Ex cortice cum thure & aunpigmento unguentuin conficitur, quod hepatis region! inunc Sum affaibus eju& pDenter mederifertur.

Fruauum nuclei cum pipere nodulo inclufi è collo geftantur pro amuleto ad arcendam Epi- lepham.

CAP. XXII.

Tangaraca Marcgr. *Tang or. II. Pifon. Erva do Roto Lufitanis. Frutex bacuifir Brdjilitifis, fieri ftarmvofo, fruttu dzUtvrio.*

FRutex est magnitudine Ribefii, cortice cinerefcente: *Foliis* oblongis, viridibus, mukis cpftis tranfrerfis intertextis. Sum autem ramuli & folia direfte fibi oppofita, Be hare fuperne viridia, infernè canefcentia, adtaftum quafi levi hirtutie pradita. In extremitate *ramorum*/K^pr^{on} venit, purpuro-brunni colons, magnitudine davellinarum Indicarum, plenus, petalis quatuor exterioribus paulo longioribus quam reliqua, figurà vomerfej quibus inferius addtant ofto ejus *rami* ^{flire} minora & L medium totum floris spatium conftat foliolis parvis purpureis, morcflorum *ramorum* quorum medio prodit una bacca cterulea, magnitudine Myrtillorum, ad vifiim quaij gemma Turcois flori cItst impo(ita) Bcflos ut holofericum brunnum, fed cave tibiab clii, eft enim *ramorum* nenunu

SECTIO Q^UARTA.

T> Arboribus t? Fruticibus fruÉtu ex multis acinis amp yfif?

CAP. I.

De Pvygono hatzifzro, Uva marina ditto.

RAmulis B£ furculis Equifeti smulis, foliorum carentia, baCcis Mori familibus ab aliis *Fruticibus* abunds diftinguitur.

1. *Tolygynurn baccifsrum standens C. B. Ephtdra five Anabafis Dod.Park.*

DoJ.

AdEquifeti fimilitudinem accedit, verum major & altior eft; *caudice* iibinde aflurgit brachil crallitudins, in alas diftributo, à quibus tsnes[^] deids oblongs plurimis gsniculis articulate virgix proveniunt, Equiferi cirris fimiles. *Flofculi* circa gnicula mucDfi[^] minuti, pallentes vphC Corn[^] qups *fruÉtu* excipiunt rubentes, acidi, fued pleni., exiguis moris haud abfimiJ[^] in quibus femem. *Radix* dura eft B6 lignoHi.

Afturgit in magnafepe altitudinem, quandoq, brevior ac humiliur confltit: rariffimè fblivria, pone arborem vel fruticem fer[^] Temper nafbitur, quarum etiam alcirudinem aflequitur.

Hsc li juxta arbufculam primum adolefcentem nafcatur prout ilia crefcut etiam attollitur, t[^] m[^]fch in crefcendo illj fiet., eciamli in lm men lam akirudinem arbor attollatur. Vidimus enim *Y)*[^] tanos non minus cdfas Abietibus in Hsmo monte nafcentibus., qu[^] Ephedram ad fumum ufq[^] faftigium deduxerant, fine davicularum, fquasnullas habetj ope aut adminiculo ramorum *ramorum* tern. Si vero juxta fruticem aut arbufculam nafcatur, humilis manet, nee fupra earn *ramorum* *ramorum*.

BiUonius.

Parkinlnbus nofter, nefcio unde edoftus, alferit hanc plantam cirris feu radicidis *b ramorum* emiffes, corticibus arborum hederac modo fe affigere, eorumq, adminiculo fcandere. *Hijum* cirrorum apud Bellonium auc Dodonarum nulla nientio., quod fciam.

Defcriptio Dodonzi adeo convenit cum Clufiana[^] plantar infequentis dercriptione, ut mihi *plena* perfuadeam unam fc eandem plantam effe quam uterq, delcribit; an eadem fit de qua fcibit BeU[^] nius mihi non conftat, potiùs diver/am puto.

2- *Vva marina major Ger. Tragos fivz Uva marina major J. B. Tolygonum baccifcruw maritumU[^] majus Q B. Tolyg[^] baccif[^]ve U<va marina major Park. Volyg. Flmii majus Clui. \$\$ greater fra gmp, P? &t)vub1\$02ktaih*

Humana interdum altitudine fruticat[^] Spartii, quod Hi/pani *Rttamo* VDean[^] modo, bra *ramorum* craffitudinis aliquando ftipite, oblongis ramis nigricantibus, qui dcinde mulras virgulas ferunt, p[^] dales, tenues, multis internodiis djftintfas, ut Equietum ferè propendentes, fine foliis, ad *ramorum* adftngenti5 /aporis: *florem* fbundum internodia cpnfertum, minutum & mulcofiim, *Eorni* non abfimlem, pallidum: deinde/rwff<w exiguis moris fimilem (ut quidem mihi *ramorum* nam. florentem duntaxat videbam) rubentem[^] fucculentum, acidum, in quo pauca *ramorum* ferfeffiniilia

In Sicilia propè *Panto Czrchlo*, obli[^] vavimus humanà altitudine, valde fruticolini.

Pantho Murciano, nufquam alibi fibi conlpcftam.

AuguftD maturefcit.

hujus generis quas in Sicilia obferavimus color ramDrum adultiorum cinereus crar, gularum juniorum obfcurè viridis. *Fhrei* nodos Teu ucnicula 75iticillatim ambienres, lurei, c It mbus compofitt Baccas nondum protulcrar.

3- *Uva marina Minor* GenTragps Jive U<va marina minor J.B. Polygonnm baccifiriim maritlmum rrintts CB. Volygontm bacciftrum immus^fivt Uva marina minor Park, Cf)e lfeffer j&ga-
grape, o? £lj?ub^o?toil_t

Frutex est parvus, vix interdiim paltum excedens, nonnunquam cubitafe, *stipite* iignofo, fim-
Jilici, quipost ex uno velut capite complures proferc ramDs viridantes, friatos, fraftu concumaces,
adfringentes, medulla vifcoda [qux reficcata rtibelcit] plenos, crebris geniculis intercsp_{tos}, inq_u
frequentes ramutas rurfiim dividing quibus ex articulis duntaxat est exortus: atque in his quidem
nee folia, nee folioriim ulla comparent veftigia: Verum b ^eniculis Equifeti njodo prodeutes ra*
muli *flores* in (Limmoftuinent glomeratim congeftpsj multos, parvos, luteos, in *frutum* abituros
Rubi moris fimilem, ex acinis rubris cbmpaftilem, fapors dulci^ nee ita tamen uti mora gratum,
edulem tamen. Hifce *femina* infant gemella, oblongaj qua fe mucuo fpftant plana, altera pares
leviter in gibbum protuberancia.

In arenofis litoribus propc montem Ceti & Frontignanam, inque faxofis collibus vicinis^abunde; *Locus!*
provenic. Freijuentern invenit Clulius in quodam colle fecundo a Salmantica milliard totiusfer^
Hiipania: meditullio, longiflimca marij quod fatis mirari nequic, cum antea nufquam obfervaflec
nifi maritimi5 locis- Verum nos alias aliquammultas maritimas plantor in mzdurramis interdum procul
d mari nafcehtes objrrrvinnis, utn.g. Kali Ipinofum, Caryophyllum maritimum, Althzam vulga-
rem, Sec.

Equilecum montanum Creticum *Alpin. txot.* huic eadem plantavideatur; quod fi ita fit, fruaur_n
vel Bauhinus, vel fquod potius credo; Alpinus minus reffe defcribit^ nihil taincn temere affir-
mare aufim.

CAP. II

*Arbor Baccifera Brafilhnfis, frufu tubtrQuilis inapali^ Mori amulo. Tataiiba Brajilznfibz Marggr:
& Pilbn.*

ARbor est cortice cinereo, ligno intus crocgi colons, partim & rufefcentis. *Folia* fert acu-
minata Be ferrata, Betulz folijs quodammodo fimilia^ in ramis hinc inde pofita- *Fruitufft*
fert mediocris Mori magnitudin^ rotundum, e tuberculis compofitum, pallidi colons, multa
filamenta exterius habentem, fuica, non admodum longa, Comeauntar hi Iruftusut Moraj vel
per *thj* vel addico Saccharo K affufo vino: intcrius continent albicancia granukj per carnem
difperfa. ^ * \ ••

Lignum arboris valde durum est, Be diutiffime ddrat, tatal intra, quam extra aquam Be terrarij *Vfml*
Jemper viride. Optimum est inter omnia, Be excellit lighD *Mafarandiiba* quomodocunq, uuurpetur;
Exligno yetere parant tinturam egregiae flavam. coquendo-

Nalcitur paffim in lylvis, prxfertim maritimis: Fructus maturatur menfe Maio.

*Locus C?
Tempw.*

C A P. III.

RubuSj Gra:icis B*V@, vel quod virgulta ejus rubeant diifta putatur, vel quod mora ^DS
CDmprefla fanguineum fuccum reddant.
Fructu epluribus acinis arfteftipatis compofito uni Be fimplici-flori liiccedente, folijs
in plura fegmenta partitis, necnon parvitatj Cc imbecillitate fua a reliquis frucibus bacciferis di-
ftinguitur.

A- I- *Ruiusmajor fruEluniigro y^R_m Rubus vulgam, five Rubusfrutumgrb C.B- Rubus vul-
gar* major* Park. <Sje common gamble, o? 35Iach-btrrp>buff).

Nihil vulgatius norunt diimeta Rubo, qui ex radice riodola importuna feracitate fc propagans,
longe lat^lcnticofis Be mbrdacibus farmentis, angulofis, rubsnribus vagatur; Si vicinis fulciatur
in altum craffiores emittit virgas, quac tamen K ipfe gracilitate & proceritate fua nimia in terram
retraftz ac curvata^ defixis in earn capitibus radicantur, Virgx Ipinis aduncis BC pungentibus acu-
Icis veftiuntur; quibus pratereuntium veftibus fefc-affigunt, eolq, remorantur. *Folia* terna, aut
quina in eodem pediculo (errata, apera^ dorfo acufcato, inferna parts candicantia, fupcriore nigrL-
cantia, ficco adfringentiq, fapore przdita: hyeme vix decidentia hifi altera fuccrefcant. *Florxi* albi,
vel ex candidorofei, rDfiilz inftar, *apicibus* concoloribus: Mora rubra per rtiatuntatem nigrdfeunt,
ariftis quibufdam aperiufcula^ acinis par vis, gultugratOj dulti. Magna tamen est in hilce moris
faporis refpcft^ diverfitas: alia enim dulcacida func Be paUto grata, alia planè duicia Be natfeofaj
alia^amaricantnonnihil^ alia fatua Be aquare font.

Freq^cns est ubique in feptibus Be dumetis. Maio menfe, Be interdum etiam Julio Sc Augufto flo- *Locus (S*
res conifpicui (iint. FruSus Augufto Be circa Autumnmn maturkatem-alTeqUitL^r. *Tempw*

Omnibus propcmidum hujus plants partibus mulcas vires attribuunt Veteres, de quibus Plinius Sc *Vrrr*
piofcDridesconlulendi. Galeno Rubi Folia, germina, flos, fructus Be radix qualitate adfruingence
participant, eaque non ob/cura- Fructusimmature altringic potenter, matUFUs temperator c/l K

Jubatrington; hinc in cjläubicung, proHuiis, vomitu, fluxu alvi, ureri, narium, &c. utilis est: Extrinfecus ip aphthis aliisq, ulcibus oris fuc^ vderibus adftrii^gendis: Conimendatur à nonnulJis, necprateratidnem, ad Scorbutum; (iquitem nee facie, nee qualitatibus niulcùm differre videtur a fructu Chaimmon^ Alpine, qui ad hunc niorbum fpécificum est. Quocirca lion est cur eorum est ram /evertr pueris interdicitur. Dices Galenum affirmare dolorem capitisinducereDpiosè iis vefcencibus. Ac Tragus (eid nscdum expenum esse scribit. Verùm finquies) testatur ipse Tragus mora illa vehementer refrigerare, ita -quidem ut si quis aquam (uperbibat eum horrores febriles continuo obriicre polFe. E lonna J. Bauhmus fe Jipiùs comediflecopiosè, nee nocumentum fenfileair, quamvis frigidumSc humidum ac pituitofum haberet ventriculum. Apud noftrares iniames liint quod achores 6i tineam capicis caufare cradancur^ unde & d^CijlidiCtric^ dicuntur &c hoc nomine ab CDUm I^i pusri decerrencur. Hoc egopropopulan errore habeo; necputo eorum ujiini hoc refpectu nTagisnocivum diè quam aliorum fructuum horariorum, quifi copiose nimis ingerantur in vencriculD purrelcere apci^ imi, Sc hujusmodi fortè affectus inducere.

E fucco mororum Rubi vuJgaris expreffo & fermentaou cum tantillo Sacchari parari potest vini quoddam genus /acis generofum Be guftui gratuni.

Flores li/clem viribus pollenc quibusfitustus immaturi.

Foliorum decoctumin garganfms & collutiombus ad aphthas & ulcera oris uti, Jiflunum cenetur- Rubi vulgari5 bacca^ iuccum exhibitj qui in forma iyrupi exhibitus maxims efficacia: e/lin dyfuna. D. Nudbam*

A. 2. *Rubus minor frnBu ectruleo J. B. repens fruttu aejiio C. B. Ger. emac. minor, C. B. repens jvr Humirubm Park. 5DrBD bcrpp 23uffj, 02 £>x\\$\\ 35jdm6lr.*

J. B.

Contiaftior hie Rubus^ proximè jam ditto minor, parùm aut nihil interdum • humo ie tollij reptatu gaudens, farmencis long^ latèque diffusis, Trago humi ferpemibus, tcnuiffimis, cC acuièa^ flagelli5 nunquam fearrollens, led protinus deorlùm vergens, &c folns minonibus, minuique Jencicollis, Trago auftorè Lupulorelpondencibus, nili quod magisnigricant, fpini/que asperionbushorref, Flores limile5j Trago ex candido rofei, ftellaci: at fru^us, qui minor, primò exortu viridis, p ^ poll riibroj, per macuricacem carHo VBI cxruleo coloje fihgitir, pilofus UC Rubi prxcdsneis, gutti^ pari, non injucundo veluc arboris Mori: radice nodofa.

Inter fegetes & in arvis demtfla fegete, inque Ijdvjs carduis frequens reperitur; ut interdum ^011 tD5 agros occupc tam cidcos quam inflikos.

A. 3- *Bdihns hlteus [fmofus fruttu rubro J. B. Idxus fpinofus Q.^Q. Idaus Ger. Park. 2075 ftafp ficcrp^ 25ufJ, fta\riboi(c) oj I^mD^ bcrpp.*

J. B.

Rubiis Idaus vulgari illo lenticofa minor Be micar, brevibus &c fere innoxiiis fpinulis horridus, interdum iis umninu carens, potiffimum Cinque Tragps) in virgis pnmo anno profillentibusj fir^ mentis tenuionbusj tei ecibus Be plarunque reftis, incubitalibus Be alcioribus. Folia cerna auc quin^ in ala: moaum difpofita, pediculo fefcunciam aut duas uncias Jongo^ Izvi annexa, Rubi vuJgaH^ foliis fimilia, fed cenera ik mollia, fuperius atrD-virentia, inferius incana, ut farina alperia videantur (inquit TragusJ fapore auftero. Flores albos excipiunt tnora, per maturitatem rubentiaj intef acinos pilis donata, dulci vinosoque carnei coloris fucco ebria- Tragus ait odorem uti F^ Violam Martiam fpirare. Radix est Jonga/ per terram late fe ipargens, quotannis iurculos produced qui fecundo anno. flores fruttufque proferunt.

Quiin hanc planra fit Rubus Idius Diofcoridis minime dubitandum.

Locw. Uliginolis Be umbroffis fyJvis, Jicofque minimi: apricis, necnon gorulentis Be arenofis laxis gaudet, ut recte J. Bauhinus. In montibus Walli^, inque Septentnonalibus Anglix udis &c faxolis invenitur. In fylvis eciam humidis agro Warwicenfi obfervavimus.

Vim, Hujus baccx eafdem vires obtinent quas Rubi vulgaris mDia^ magis tamen cordiales funC, Be guftui gratiurcs.

Aqua e mons Rubi Idxi deffillata, vel eorundem conferva Be gelatina, vel iyrupus e fucco p^ ratus, ad febres ardentes conducunt, turn propter manifeftam retrigerandi faculcateni^ turn prejpt3r odorem fuaviffimum vfolaceum quentf exfpirant, faporemque gratiffimum inter dulcem & acidum^ quibus Be naribus Sc palato lh commenaanc, corque roborant Be exhilarant. Gefherus iy'' rupum vel fapphyrijns Be fmaragdinis antefere non dubiravit, jdque expertus in feipfo Be aliis.

Ex moris Rubi Idaci exprimi potest vinum ad u/us multos, nimirum ventriculum imbèllu^ alvi fluxii5, variofque gingivarum, dentium, uvula:, palati, alianimque partium affectus.

Qui cibos in ventncuJo continere nequeunt, Be fi equentibus vomitionibus infestantur, his fru^u^ Rubi Idari devofarus, Be folia recentia cu/a ac foris fipmacho impolita mire prolum. Trag. Turn ^01 liorum tcnellorum decoctum^ turn folia ipfa trka Be impodta, turn aqua deffillata poca & iJJI^ in, inflammatione5 quafcunque Tedant 6e reftngunt, ut Tragus Be alii volunt.

Folia Rubi lixivio decocta, fi iJlo caput aliquDties abluas capillos denigranc.

Vino cui ijjufu func Rubi Idzi mora faporem & odorem garum communicant. E^ u^ pulp_a cum Saccharo laudariffima Bdlaria fiunt.

Rubus Idaus fruttu albo C. B.

Vix alia in re quàm Rubus colore à præcedentibus differt, unde nec fpecificè diffinita cenfende est.

4. *Rubus hUtts nm ffinofns* J. B. *Rubus Idaus lavis* C. B.

Gignitur frequens (inquit Lugdun.) in Allobrogum monte Gratianoppli vicino, quem vocarit *La Mom* caulibus multis fsquipedalibus, ut Idzus Chamaebatus jure nominari poffit, flibiofis, fine fpinis Lillij, folio Rubo Idæd fimili, averfa parts candido & lanuginofe; fru&u rubro, fed non ut in liiperion rotundo 8c dulci, verum ex granis fie coagmentatOj ut in metae modum faitigietur, acido fapore etiam cum maturuit. Incola, vacant *Des Afnes*, Be ab Idzi Rubi fructu probe diftingunt, quem vacant *Des Amps*.

Hiftona Lugdunenfis hanc habet pro Chamzebato feu Rubo Idzo altero Tragi. At õftehdit J. Bauhinus Chamxbatum ilium eße Rubum Alpinum humilem *Gefn.ku* Chamaerubum faxatilm C. B.

Rubus montanus odoratus Vaxk.

An &c quid differat ab hac planta confiderandum vide dſcriptionem apud auaozem. Sufpicor Parkinfbnum aliquo modo deecipum: nihildum enim de tali Rubo in Anglia nafcents aliunde inaudiui.

5- *Rubus odoratus* Cornut.

Cornut.

Hujus fmcicis *nadix* Rubi vulgaris modo per futnma celpitnm vagatur. *Folia* Fert ex longo pediculo leniter hirtuta, latiffima, in angulos exeuntia, *moKO7niJv*, hoc enim vocabulo Theophrastus peculiarem iftam foliorum figuratnj quæ Viti, Aceri majori 6c Rubo, communis eft explicat. Alijbi Theophrastus folium Rubo tribuic 'A>fwAf, hoc eft, Viticis figura, quacum, revera Rubi folia conveniunt, quod ad divifuram attinec. Folia ifthasc fragrantiffima Hint, paremque Agrimonise odofatx auc Pimpinellae odoratac Ipiranc odorem: fine ordine circumpoica (unc caulibus^ qui plurimi Sc ramofi a radice fe attullunt, farmentofi^ flexiles, medullâ pleni, fpinis vacui^ molliter hirtiti, Nudantur foliis Aucumno, prſfertim in cacumine; cym̄s etenim in hyemem ufque prorogant moia5] quo tempore 8c ipſae cadunc, unice 6c arefcic caulis, nee enim hyemis inclementiam patitur, fed quotannis renovari folet. *Flows* fart in lummo magnitudine Sc figura Rofe fimplicham quam Caninam vocant^ pentapetalos petalis finuatis, colore dilutiffimae purpurae violaceae; in cahci^ fui medio mille luteos apices gomplectentes ut' Rola: fucceditque tandem fructus vulgaris Rubi hortenfis figura, non adeo gratus fapore, fid forma^fimilis, & rifuxp&' £ nſ&-7*(w& id we pœf, h. e. quamplurimis acinis Sc granis rubris ita congſtus uc Malum Granacum exempto corrice perbellè referat.

6. *Rubi facie fmiticoſa f I ant a Lobelia* J. B. Park- *Rubus exoticus* C. B. *Ulava Her culis* R. S. Muf.

Quern Lobelius bacillus hujus fruticis defcripſic, carpi craſſitie erat, longam haftam xquans, 5c CDrice nigrodenſo veſtitus, tuberculis craſſis, fetiticoñs, creberrimis in davac modum muncato, folidoj gravi Be praedurp lignD: unde Plan tar̄i a Rubo diverſam eße patet. Obſervac D. Grevius lpinas mere corticales eße ut in Rub^ non ligneus, proinde Sc frangi faciles.

Rubus Momcoccoj Hermannii *Cat. Hort. Lugd., Bat.* Rubi vulgaris vanetas eße videtur-

C A P. IV-

*Champacam**l,y[- An *flos Indicus Chamfacw dttus Bontii?* An *Champe di5]i fares Indici Gar-* *
ii*J.B. CB? * P. I. P. 14
f - 31.

H. M.

ARbor eft procera, denſis frondibus, late ſparſis, nafcens in arenofis. *Radix* cortice eft rufo, faporis amari Be peracris. *Caudex* hominis amplexum implens, cortice craſſo cinereo teftus faporis amari 6c fubacris, ligno albicance. Surculi rotundi cinerei, in apice ubi novello genuine expullulant fpadicei coloris. *Folia* petiolis uncialibus infidenc, fpichamam Sc amplius longa, latitudine quatuor auc quinquepollicum, in cuſpidem oblongam anguſtam contrafta, texturâ duriola, plana Be lacvia, liipernè obſeuro virore nitencia, infernè clariore, lâporis acris 6c amari: coſtâ mediâ craſſâ, in averſa folii parte eminente, a qua obliquo 6c parallelo duftu nervi anteridia verjus exeunt, ac a margine reflexae arcuatim in fe inviceni incurrunr, *ut in aliis multis foliis obſervatur.* *Flores* in fiimmis furculis e foliorum alis exeunt, petiolis craſſis, lenibus, furreftis ac ſecuncialibus^ acuti ac fragrantis odDr̄is, petabrum oblongo anguſtorum triplici ordine compoſiti; petala in exteriori ordine oſto^ tripla ferine laticudine eorum qua! in medio ordine oſto etiam plerunque lunt, verſus fummitacem magis rotunda, 6c nonnihil cuſpidata, minus tamen quim medii ordinis. Qtn̄ in intimo Drdine parvula lunt, brevia, verſus^ fummi tat em maxime cuſpidata, dilutè flava, ac veluti *Stamina* craſſioliola, inferius circilmambienria ftylum craP ſim, terecem, nonnihil conipuni^ fpicis parvis, viridibus, craſſioliis, cuſpidatis ſcutellatim circumdatum, ſuntque fpicif in cuſpide, quo inferiora verſus inflexar, rubefcentes, Be rudimentatn fructus concinentes. Floribus^uoque fapor afringens 5c acris eft. *Fructus* racematim pediculo medio craſſo & toiuofo petiolis craſſis Be curdis circumfidenc, oblongo-rotundi, cortice craſſiolo pnum viindi, ctm̄ maturi lunt flavo diluto albicanp, fapore peracn, odore minus grato.

Stamina intus fe invicem proximè contingunt fine ullo interfepimento, ſuntque uno Utere rotundo, ad fructus formam, reliquis planis ubi fe mutub contingunt: conſtantque cum matura pulpa renui, humidâ, ſublaſtea^ qux membranâ incarnato-rubra eft inveſtita, intus oſſe grandiuſcub

Flares

Zzzzzz 3

Flores bis fert in anno, Fru&um non dac nisi aim vetustior est.

Radix ejusque cortex iiccatus tritus & cum lacte spisso, *Dayr* disto, mixtus Be impofitus a^{peda-} matis maturandis & aperiendis incervit, in pulvere cum aqua calida exhibicus menftrua &c ^{fufum} expellit.

Flares tripi & cum oJeo deco&j facta inunctione cephalalgic, oculorum affe&ibus 6c ^{poda-} gr;g conducunt; iidem in olco per 40 dies infolati eadem pra&tant.

Aqua c floribus destillara odonfera est, &c *COT* exhilarat.

Garcias formam florum *Cbampe* distorunij aut stirpeni cui imafciuitur non describir, taiturif^ cit, eorum in Indiis magnum ufum esse, fie odore graviore quam Liliu album.

Sunt (inquitj odoribus adeo dediti regi&is illios incolaCj ut plsrunque cibo abstineant, quo nabent unde odores sibi comparare possint, ideoque non immerito proniores in Veneremelt cententur. Munera que a teiuioribus offerri blent Regibus pradisti func flores 8c Ro& noltraces, quibus folent cubicula Regis infernere.

Nominis affinitas, florum gratiffinus odor, aliarque qua; huic Pianta: ab Autonbus adienbuntui circumstantia: non difficuJter mihi perficiant eanaem eflecumea que a Bontio cap. 45- ^{obca-} bitur, inquit D. Syen Comment, in hanc Arborem, quamvis fateatur ejusdem clefcriptonein ^{ram} dfe, mutiJam, quin 8c ^brfan vitiolam: cujus fontentis nos quoque fubicribimus.

HISTORIC

HISTORIE PLANTARUM LIBER VIGESIMUS NONUS,

QUI EST

De Arboribus Pomiferis quarum flos imo
frudhii adnascitur,



Omiferas arbores voco quæ fru&um proferunt majorem, pericarpio donatum, & in
plerisque polypyrenum. In plerisque dico, quoriam pro Pomis habeo fructus om-
nes majores cortice craffiore aut duriore teftos, quamvis unicum duntaxat intus nu-
deum contineant, modo pulpam humidam iemen ambientem habeant. Ad Pru-
num enim conftituendum Tequiruntur officulum intus unicum, pulpa feu caro hu-
mida illud ambiens & c. cutis exterior tenuis ac membranacea.

Hujufmodi arbores funt vel frudlu membrana tenuiore tefto, vel cortice craffiore, coque vel
molliore vel duriore-

SECTIO 1

Tomtferx fruEiu cute tenuiore feu fnemhranacea tetta.

CAP. I.

Sorbta Spuria Malabarka Katcu-Kakjiam difta, Katotrkalefiam H. M. P. 4. T. 3;. p. 69.

Arbor eft mediz magnitudinis, altitudine vlginti, craffitie verò leptom pedum menfuram
H.M. rarè fuperansj multifque ramis nodofis donata, e quibus ramuli foliofi in orhem eleganter
n. m. diffusi demum emergunt: [<juos ramulos foliofos vocant vthil aliud funt yuam folia com-
fit a finnata.~\ Lignum albicans, przdurum^ cortice munitum furvo, fcabroj craffo^ nulli,
intus fubviridi. R^x^albicansjfurvo cortice tefta, inodora, infipida. *Folia Kakjiam* foliis familia^
at dsnla, fragilia & in ambitu (exrata- *Flores* iirculis pblongis racematim inhaerent, atque e *calyce*
libflavo, in quinque lacinias acuminatas tefto prodeunt, quinque craffis, denfis^acuminatisj flave-
fcntibus, extrorfumque reflexis foliolis confiantes^fto in media citrinisj acuminatis *faminulis* ;
inter qdx *fyflus* prodit viridi-flavefcens capitulo viridi^ globofo. *Fruclns* globofi, glabri, lubvi-
rides, tenui pellicula cinfti^ intufque came denfej fucculenta, fubviridi, faporifque adftringentis,
referti: intra quam quinque locancur rufa *ojjlcula*, feu potius femina, formâ fabarum a:mula, nu-
cUum continsntia candiduiHj amaro-dulcem, acrem.

Crefcit locis arenofis circa *Cochin* quotannis maturos exhibet fructus, diuque frugifera manet. *Loan* B
Flores cum fertj Septembri viz. fie Oftobri meniibus, antiqua decidunt folia. rsup p 11.

CAP. II.

*Arbor Pomifera Brafilhnfis fruttu hispido Tomi magntudim> feminibus flurimu minimise Apziba
Brafelejnibus Marcgr.*

Aiacrgr.

Arbor eft vafsa, atque in multos ramos expanfa, cortice cinereo. *Folia* habet quafi in fron-
des congefata, longa, in ambitu autem leviter ferrata, fuperius faturate-viridia^ inferius ma-
gis incana, & denfaquachm lanugine veftita. *Flores* fert ftellatos, flavos, quinque foliis
confiantes flavis, & quinque ahis ex viridi flavis, fpaavis admodum odons." *Fruitum* pro-
ducit magnitudine Pomi aut circiter, orbicularem, compreffum, hispidum^extenus, infar fpongi*
marinaeScvillofum, ex mucofo colore fulcum, quibus maturuit intres partes fponfe dchifcit, con-
tinecque

tinēccus intLisglobulam ragnicudins ficis ficcaz, conglobarum *feminibus* obfcure brunnis., magnitudine grant Sinapis, /edcompieflli quodammodd.

Fruftus apud incolas nullius eft ukis, ligno utuntur ad *Cinchafi e.* letnbos pifcatorios & *Jacodas*, quibus uftmtur "in fliiniibus trajiciendis atque etiam in man.

CAP. III.

* P. 3. T.41. *Tomiftra Indica trifilia fructu Vrttniforwi cattdato.* Niruala # H. M- *Tafia Brafilimfium familia*
D. 49. " D. Cdmelin.

H.M.

ARbor eft vaftac magnitudinis, 30. aut 40. pedes aha, paucis ramisin orbem diffiisij co'rtice glabro, cinereDj albicantibus interftintopunftulis, obduftisj .lignum pr^durum,flavefcens. *Radix* albicanSj corcics cinprD tefta graverohs eft at fere iqjpd;da. *Folia* terna fimul petiolis teretibus, IaAgkudine Ipithatnam sequaitibus, prbveniunt, oblorigb-rotunda ac in mucronsm declinentiaj glabra, virore nifentia, lubacida, manibus confri^afuaveolencia: E cofta media, infigni plures nervuli ordinato aparallelo duftu exeunt. *Flores* iiararorum extremis, tenuibus, oblongis, glabris viridibus proveniunc petiolis, iiquis quatuor obltfig^rotundis, acuminatis albicantibus ac ftriatifconfantc foliis^quz tocidemincus exiguis, acuminatisfubviridibus FoliDlifuntrnunHaj niime-10/15, viridibus ac rubris *flamimlis*, purpurejs oblongis *apuibns* dotatis, niediam floris cavitat^m K umbilicurn oCcupannbus; inter quac viridis prodit *fijlm*, oblongus, crafftis, furreiftus, apicerotundoj faturato- viridi elegancer ornatus^ e quo dein *fruEtta* erricrgit: odor fuaviflimus & vino/us. *Fruit* us vero viridibus/DblongisJ craffis, rotundis, b'gnofis pendent petiolis, quiarticulatimflorunijunguntur pediculis, uti 5c hi geniculatim ramillis inherent; funtque oblongo-rotundij virides, cortice cinereo tenui obdufti: intus carne humida, albicante, quadripartitaj odoris faporifque vinofi ref erta, intra quamnumerofa coniiuntur *fzrmna* flavefcencia, pridura^ angulata &c plana.

LDCW f3

Loci petrosi & arenofis provenic imprimis circa provincias *Mangatti* Be *Volga* in fluminum fl'
Tp p'is: Menfe Aprili folia decidunt, verum lequente Junio &c Julio dum floret no vis denuo frond ell& foliis: at Novembri 5c Decembri menfibus maturos fert fructus, vixque annos 40. Frugifera manet.

EPM:

Foliorum fuccus linteis exceptus^ K inguinibus adhibitus urinarii ciet. Idem prxtant fruftus contufi Sc cum Sale, camphora Be felis ftercore in cataplafmacis formam redafti, &c diftilocisap* plicati. Cortex in aqua maceratus, &c cum zinzibere Bc pipere longo in kfte vaccino Be oleo Sciamii ad humidum commptibncin excoftus, egrsgium przbet exficandjs frigidis humoribus linimentum- a Semen cum Dryzae infufo coftum, Be dein cum butyro recenti contuiim ac carapJafhiatis forma abfeedibus applicatum potenter eos emollii: ac maffirat.

CAP. IV.

Tomifera Indication Rhodydendri, fruttii Vyrifirmi. Modagam H. M. P. 4 T. c8, .p. iig.

M.L. A

ARbucuJa hxc altitudine duodcckn, crafftie vsro quatuor pedum menfiram circiter xhuat, ramuli/quc albo-viridefcantibus^ in orbem late diffufis doriacur; lignum albicans, cinereo cortice cinftum. *Radix* albicans, furvo cortice teiSa. *Folia* petiohs alatis circa extreme ramubs proveniunt, oblongo-rDtunda, craffa, denla, glabra, iiperye^ atro- viridia Be fplendentia, inferne liibviridia, cofti; media albicante. Ctm decidunt foliaj fui ftigmaca-relinquendi circularibus prominentibuffct annulis, arbors ramos cingunt. *Flores* plures fimul junfti extremis ramulis proveniunt, odori, candidi, Rhododeudri flonbus fimiles, calicique viridi, in quinquelaciniis (tefto inhaerent, quinque fubrotundis foliis confantes, totidem albicantibus, luteis *apcibus* Drnatis, *flaminibm* mediamfloris cavitatem 5c umbilicum occupantibus, inter qux *fijlus* prodc albicaais, capitulo viridi, *Fruitus* pyriformes, virides, intus fungofi, adfringentes^ nuraeroli, minutiflimifque

Krauculis refert.

Lvc m

Provenit ubique in Malabar, praefertim circa Candsnate; Semper viret, floret ac fructus fert, fed diu frugifera non manet.

Viret,

E cDrice Be radice in aqua coftis Apozema paratur inveterato capitis dolori tollendo utile. E foliis pgtio cDnficitur ad menftrua fuppreffa revocanda.

CAP. V.

Arbor Vrumftra Brafilinjis frutvu ovali, polypyreno: Mangaiba Marogr. & Pifon.

Maz

Abor est pulchra, caetera & fortissimissima; magnitudine & figura nostratium Castanea acidem aequat, aut etiam superat (supra altitudinem Prunij Europae non emollitur, quam fructu, praecipue vero ligno & foliis emulatur) In multis canis variè describitur, qui in aliis tenuis ramulorum seu furculis desinunt, ut in Beola. Cortex coloris fulci cinereo albesci, ramulorum autem simillimus ramulis Beulae junioribus; lignum lentum, exigua in parte, fraxinum aut concilium lacteam hincdit humoreta. Fructus sunt parvi, solida, egrugit virentia, bina sibi semper opposita.

opposita, nervo in medix fecundum longitudinem, tranfrerim autem venulis five lineis fibitiffimis parallelis praedita. Flores gignit Jafinini modo dispositos, calycibus fequidigium longis, Be Jupenus in quinque foliola acuminata expanfis, ftduluae figura, coloris albi, odoris iuaviffimi. Fruttu rpag-nitudinem habet Priinorum nostratum, aut ovi gallinaei, rotundiufculus aut ovalis, quam Soli expjnitur aureus, rubrifque maculis diftinctus [Marogr. exviridi flavus, ac in uno latere egregiis piinfutulis rubris infignitus, qua: in quibusdam plura flint, in quibusdam pauciora, in aliis nulla] Tenuiffima cuticula tegitur, pulpani continet albam, moll em infar butyri, gratiffimi vinofi acidiffimi faporis/ quic licet iequax ac duftilis videatur, manducando tamen nihil tale deprehendit; orique inferca ftatim liquefcit; Semina lutea, CDmpiefla fex feptem, duodecim, auc plura continer, ovalis figure, in media umbilicum habentia, cute infar Amygdalarum dulciumfed lenta, intus habentia nucleuin albiffimum dulcis laporis, quare Integra cum fruttu degluciantur. Fruftus non eft edulis nifi fponte decidac, nam in arbors exiftens plenus eff lafte acerbo Be amaro, adeDiit vix p quidem immaturum atcingant, decidens in terram illico maturitatem affequitur." Maturi quotidie magna copia sub arboribus colliguntur, 6c qui non plane nielles per noftem feponuntur Be niollercLinc Probe maturus facilis eff digeffionii, ardores vifcerum domac, 6c febricitantibus auxiliatur. PoriD haudfacile hxc pomanoxam, etiam abunde jejuno ftomacha manducata inferunt, nifi quod frigida Ikhumida fugaciaque alvum dejciantj flatulque excitent.

Exfpirame hyeme, menfe nimirum AuguiJOifidre incipit, ultraque novem menfes prunis oneratur Be ornatur. Seri non plantari amac in terra ficca, ubinulla copia luxuriantium herbarum.

In finu ortinium SahiSDrum Integra fylvx Ipotitaneae reperiuntur.

Lacut.

CAP. VI.

Su-pm Arbor & fruttus Sinnjis Mich-Boym J DA (I on. Dendrolog.

A Pud Sinas tantum nalbitur. Eft Kaurei Kpurpurei colons. Magnus Pomus excedit: carnem mollem Be rubeatn' cum- fimili pellicula refert; Dflicula hinc inde interius abfcondk; cum ficcatur FicubusEuropzis fimillimus eff, be per multos annos confervatus a Sinicis medicis lacpenumero in pharmacis adhibetur: Arbor onerata purpureis hifce pomis graciffimum exhibet a peftunij qux ne ab avibus decerpantur continuis vigiliis custodiuntur.

In calidioribus regionibus Januario^ Februario Be Martio j in Septentrionalibus Junio^ Julio Be Ail- gustu mature! cunt.

CAP. VII.

I. Arbor pomifera Brafilimjis fruttu tripyrzo Jito Brafilienfibis Marogr. PiE

C Drice eff fufco, qui multa punftula, hinc inde fparfa lutea habet. Folia bina fibi opponuntur, fex, feptem, oeto, auc novem digitos longa, paulb plus quam duos lata ubi laciffima, non ferrata, nervo conCpicio Be prominente Iccundum longitudinem, venis in quibulclam fibi invicem oppoficis, in quibuRam akernatim pofitis.

Pofftlorem (quern Auftor non defceibit) fequitur fruttus, magnitudine glabuli lufoiii, major aut minor, obfeure lutei colons, qui in fe tria ovalia fetnina continet, magnitudine feminis Pomi- vulgaris cuticula obfeure flavâ tefta, nucleus autem illorum albicaL

X, Jito prior Pilbti. Arbor kacciftr* Brafilknfis, fruttibus in racemos uVarum fimillimos con- gftiis.

Hsc arbor PyriEuropz^ magnitudine eff, undequaue obvia: Foliis tenuibus. oblongiSjacmina- U5, nervo eminente fecundum longitudinem ex^urrente, parvo pediculo cauli ordinacè appoficis. FruBus racematim copulatos profert. Arbor ut ob fruttuum rarum afpectum milri^ nota, icâ paucioribûs ejus radids qualitates probè confant- Si ulli figura, colore, tocâque prorfus facie racemi uvarum è longinquo afpicienti videantur, hujus fanè arboris fruttusiiifit; quorum tamenuv* inu- tiles habitac, lignaeque intus exiftunt. Toto anno apparent, verno tempore ktè flavelcences, mox triftis rniinati colons fiunt, rihilque promittunt, ut neque folia, neque lignum iplbm arboris: fed forum in cortice radicis, acri Be calido, quod ad remnDftram faciat confiftit- Cujus efficacia indo- mita ad turbandum K purgandum corpus tarn ale à natura pofita, ut non impunè ab imp&rito vulgo traiftetur. In pulveiem redaftus ab indigenis Be robuftioribus agricolis Luficanis contra invet- ratas obfruftiones capitur indifcreta quantitate, femipugillus circiter. Mihi rarior fuit illius 1415, idque nifi deficiente forcè benigniore medicamenco, mediantibus tamen correftionis, Be quac vim purgatricem infringunt.

Ni idem huic cum p̄cedente nomen impofuiffent Brafiliani, Bacciferis potiùs adnumeranda effct.

Vi_{rej}

CAP. Vlit.

toapoiba Brafi Uenfihts Marcgr. priina fpecics. Fomifera Brafilienjts fruSta cupuU infuhnH, [minibus fingulis dupltci pttlizulx inruolutis.

Marvgr.

Rfagi akitudinern 8c figuram excrefcit, cortice cinereo, cui aliquid fufci admixtum; infar-
dulati panni. *Folia* habet folida, oblonga, inferius dilute virentia, fupcrius faturiora. *K ip*
dsntia, infigni nervo, fecundum longitudinem at nullis pxne venis corilpicuis: pediculi
deceptus fuidic aliquid laftei. *Flos* innicitur pediculo quifque iuo magitudine Rose, & f
rolaceis confat, fuave-tulientibus unguibus: medium occupat pro umbilico globulus refinofus,
magnitudine Pifi; r/ina ilia clara eft ut Terebithina, glutiiola, flava, o&oris tamen injucu
hunc circumdant rhulta ftaminula rubra arte fibi invi:cm adhxr^ntia. FJorem fequitur *fruttu*
iulz infideas fere ut glans; immaturiis fecundum longitudinem concifus multos feminum
continet, magnitudine & figura feminum Mali, tranverfih p&r longitudinem pofirorum; q
aUtem fem en includitur pdliculx fiiz riibrs, afque altsri pelliculx miniacx involviti. Caro
eft flavaj Be fuccum exudat flavuitt.

Cortfx licet craffus fit facile fe feparat i ligno, quod fragile eft, cotinictus in fs
mollsm qua: facile extfahi pDeltj ita ut lignum remaneat infar fittula:.

Altra fpeci?sm

Altra eft arbor, cortice gryfeo, "inamplis ramos fefe expandens; foliis in fiondes conge
oblongis carinans, foliis *Mured* fimilibus, led non lanuginofis. *Fruttu* globuli luforii magnitudin
rDundo, per macurititem exteriis viridi, interius rubelcente, Be multis granulis Fici modo rerjitD,
licco, faporis haud manifefti, ita ut comedatur quidem a quibufdam, fed riullius fit pre'ei-

CAP. IX.

Japarandiba Marcgr. Be Pifonis. Arbor pmifra Brafiliznfij florz rofic, fruUtt rotundo feginzr
Juptrius win ablate.*

Altra r.

Arbor eft cortice cinereo, lubnigricante infar Alnij ligno duro, rnedullolo; ramis p
Folia fine pediculis ullis [cum pediculis Pifo.] inordinate &c copiose circumpofita,
Jampaba familia, pedem circiter longa, acuminata, leviter quafi crenata in ambitu,
fecundum longitudinem confpicua, mulcifque nervis eminencibus fecundum latitudinem decurren-
tibus, tres tantum digitos lata ubi latiffima- *Florzm* fert infignem, orbicularem, diametmm fere
num digitoruin habentem ofto craffioribus foliis conftantetn^ figure, magnitudinis, colons 6c odo-
nis rolarum: in medio ftant multa *fiaminula* erefta, in Drbem compofita *be* infar Lunulx incur-
vata, Be-quafigbbum reprarrentantia, apice flavo Be tremulo. *Flos* utem infidet craffo ligneo perfu-
culo fplerunque binj aut term in tali bifido aut tnfido pediculo) *Florem fequitur fruffvs* Mali
magnitudine 5c figura, fed fuperna parte planus, ac fi pars abfciffa eiJet, extus gryfei, intus flavi
colons, continens multos nucleos, fatuos^ anguloJos, hepatici cDloris, Jplendentes, magnitudinc A-
vellanarj cordis figura.

Ramorun paucitatem foliorum frequentia compenfät, quibus folis, quatenus haftenus *contifo*
Vi&wnedicatrix infica eft. Hare autem vel Integra, vel confufa, hepaticque regioni applicata aunties
hypochondriorum refiruunt: cifdemque mails, fi rife ex arte praparentur, acque in apozemate W-
hifc^anturcondunc, acproinde.apenentium numero ^dfcribendafint-

CAP. X.

* *Decript:* *Arbor vcrinata Manciml* Jitta; Macanillo *JD. de Laet. Aratimfana Marfg'av. Pifca*
RcdExper.natural, p. 766 (88) t ^Q11ct) mcl(Q^T)rc, *ExftntnUDU* Pancredi Robinfon-

In arborem excrefcit haud grandem, ramis *Araticu pnhz,* fimilibus, fed foliis longè
crj5 quatuorve digiros longis, fefquidigitum latis, figura ut folia Pyri noftratis\ flore
in tocum luted, exceptis unguibus internè, qui languinei /iintfruttu minorB, per njaturis
flavo (alia* viridi)*pulpa intus aurea, odore cafei putridi, nucleis multis ex flavo albicantibus.

Fruausproperfrigidamliam qualitatem eft venenatus. Profundè autem radices agit
D>x; ampl^ craffihimas, longas, hgno levi infarSubcris, ex quibus dypei formantur, q>os Jag
auc gladiorum iftus penetrarcarnequeunt.

i *Arca Hun?ina* germinal-e lolec. Notatu autem dignum eft (inquit Gul. Pifo) ejus radi^ni in-
lultribus crB|ccn<m profundè in terram delcendere, (quod ramen in diis Brafilix arboibus haU^
facile, conTDicw). unde credibile noxiam ejus ^ ep ^ ^ .LapIuatern, quei fruttum nocere confitj
ex inficw. *Bivri*gore acquirere. Ejus autem fruttus adeo venenata qualirarc malignus cft,
cerreitibus comeltps iplbs Itacim cnecc, ut tctatur Jcfuica quidam apud *Frana[cu]*

in Experim. natural, p. 76. Verum RocheFortius alii Fucus Cancros iis impune vefci scribunt. Minim autem Pifonem &c Marcgravium de venenata Be maligna qualitate fructuum hujus arboris adfer per Funforie agere, ac si excessu frigiditatis tantum nocerent qui Fa iis nimm ingurgitarenc; cum alii de Funefta Be perniciofa eorum vi admodum tragice declamitent. Hinc dubius aliquandiu h/ An Araticupana Marcgrav. Be Pifonis eadem efflet arbor cum Mancinello RocheFortii Benollratiurri necne; verum cum legerem, utmDX dictum apud Franc. Redi Araticu pand m Brafilia etiam Cancris terreftribusnoxiam & lethalemnedumhominibus, omnis mihi ferupulus exemptus dft, fie in fententia D. Tancredi Robinfon confirmabar eandem effle.

Addic Hughefius nofter Arborea hafee Fructibus plerunq; abundare admorem Malorum SylvefrumEuroparum, iilq; adco pulchris feTpecidifis, ut a decrpendo vix fe pocuric abflinere ad fitim reftinguendam qua inter iuneranduni interdum pccitiebatur. De maligna 6c venenola qualitate Manchimllo arbDrisRochefortiusinHiftor. Infularum Antilles prolixè agit.

Arbor eft (inquit) afpectu pulchra, foliis Mali fylvefris, fructu Pomi Apiani vT Afia\ Ilmillini, ab uno later^ rubro ftriato, arpeftupulcherrimo, Be odore perquam grato^ ut facile ad ie gultandum invitaret facultatis no^ciz ignarum. Quamvis aucem guftu dulcis fie, adeo^ maligns tamen Be functz qualitatis particeps eft, ut comedentij non brevi aliquo 14 horanim, fedzernoBc ex quo nunquam evigilaturus eft fopore opprimac.

Crefcunt non raro hoc genus arborea ad litora maris K fluviorum ripas; quod fi contigerit poma LQCUJI in aquas delapfa apifcibus vorari, quotquot ea deguftaverint mortem certam incurrunt. Diu autem in aquis incorruptadurant, cruftam duntaxa C è Fale petræ iblidam lapidex Fcix ddritei contrahunt.

Cancrici lib hifce arboribus verfantur malignam inde qualkatem participant^ ut ex eorum elu nun pauci male affetli fuerint, 8c in morbos inciderint Tj quocircamedici quo tempore pDma matu- ra in terram decidun^ a cancris comedendis abftinere jubent/ quotquoc faluti fux conlultum cupiunt.

Sub corticetrunci Scramorum, continetur aqua quxdam glutinoFa, Qc kftisinfar Candida, vehementer maligna Be perniciofa: cumque in viis publicis plures occurrant Mancinelli, fi Forte ramum aliquem inter eundem manibus conricesj exfilistinde lafteus ille fucus venenofus^ quifi Forte in camiffiam feu interulam incident maculam illi inurst Fordidam a?grè eluibilem; ii in carnem Tiudam, ni confectum Frigid a illam abluas ^IOCD tafto, cutim inflammat Scpuftulas excitat. Przci- pue tamè timendum oculis, in quos fi Forte aqz hujus caufticacBc venenolac guttula incident inflammationem vix tredibilem excitat, 3c per novem fgre dies vilu privat. Ros aut pluvia Foliis arboris infidens aliquandiaeundem producit sffetum^ cutim aqu^ fortis infar adurens.

Umbra hujus arboris lidmini noxia eft, Be figuis Forte fab ez^ dormiverit totum corpus inflatum lentietmiro modr?. Accedit ad malignas Mancinelli qualitates, qu5d cibisigne exejus lignis accen- fis Fatto coiftis aliquid noxii imprimis quo edentium os 5c Fauces urant.

Harum qualitatum confciilndi Antillani toxicis fuis quibus fagittas illinunt ad plagas lethales in- fendas tum rorem Foliis arboris deluper incidentemj tum Juccum Fructuum perpetuo admifcent.

Retnedium affetuiyn ab hujus arboris fucco aut rore induftorunij quodpuftulas excitatas brevi fanatj inflammaci3n&mq; Scinflationssfedat 5c compefci^ eft aqua quxdam clara intra teftam Li- macis Militis diftcontentaloco afffto applicata, aut obum fine igne ex eodem inFesto elicatum. Hxc ic plura RocheFortius.

Haec etiam arbor effc videtur quam J. Bauhinus Arborem vtenatam aliam vocat, qui, defcribente Theveto, FruaumFertPilz palmac magnitudine, viFuFpeciofum Fed venenatum, cujus fucco Barbari fagittas imbuunt^ iis contra holies ufun.

Huic eadem hobilis videtur, tjumvis minus exactè decripta,

Tetlatiarn feu arbor urem Nieremberg-Hijt. exot. l. 1 y. c. 14.

Venenata qualitate cum Manchinelloconvenit Lacenim (inquit) ita adurit, ut contactumini- mo etiam perumbram piles deflure Faciat. Corticis qui Frigidus Be ficcus decoctum articularum dolore5 folvit. Exmateria quzvirofem Chalcantizmulatur fiunt leftorum Falca. Cimices quidec concipere non folent, FedFabrorummanus Be oraita inflantur dum illam contreftant^ ut mjtis diebus non dstumefcant- Uofiratts vliam Ammca coloni umdaviium Xahula, a, Sondas, altdcjue fupelletti- lia ex * hoc ligno faciunt qumiam infita qua aliam quamcunque matzriam arrodunt & cgrrumpunt bane * JAanzinlli, non attingunt. Nieremberg. Arborem effc rnam Jcribit, materie firma, Fructus virens, uncdonis Forma Be magnitudine eft. NaFcitur in Frigidis montDfifque locis TepozJani, at calidiora non refiige- re ait, nam apud Halt in os invenitur.

C A P . XL

Uarandas Indica Arbuti facit J. B. Carandas Garcia C- B. An AuKuba Ovitdi?

Arc Rbucuk eft Arbuti magnitudine, Foliis fimilibus, copiofb flare, Wore Periclymen, Fructu exiguis Malis perfimili, nigricante per maturitatem, gratiffimo uvarum Fapore, ex quo à nonnullis vinofus lioccus exprimitur. Fructus autem virans magnitudine eft nucis Ponticz cum fuo putamine, interdum major, luccum nonnunquam extillansviFcidum Be lafteum. Editur à nonnullis Fructusmaturus cumFale. Solet umen cum vindis eft muria Be aceto condiri, K ita adfervari ad excicandam languelcentem appetentiam.

Nafcitur tum in continenti, tum in Balagac.

Auzubara

Auzubam Ovidius in hunc modum describit, In Hispaniola infusa vafta est arbor, pulchraque materia firma fere utili, *Auzuba* nomine, fructu quidem longe suavissimo ut siue Pyra Apiana, (moschatellina vocant) sed qualescunque, eoque viscido glutinoso abundet qualis est qui in Ficibus immaturis, idcirco molesto his qui eo vescuntur, nisi prius fructum in aquam abiciantur K ladleum succuri digitis exprimant, qui in aqua didit.

Arborum proceritas differt. Ergo an eadem sit vel diversa arbor illarum regionum investigatibus decernendum relinquimus. J. B.

CAP. XII.

Jacaranda Brasiliensis Marogr. *Javaranda alba* V&xn[^]frutturnahmagnitudim &craftitium

Incipit in Europa fimi Jis in apricis locis mediterraneis reperitur: *Folii* parvis, acuminatis, directis sibi oppositis in ramulis alternatim sitis, tres circiter digitos longis, non ferratis, inter se obfuro virescentibus & fuscus est vinctus & bicoloribus sine splendore. In quibusdam versus exteriora multi proveniunt ramuli, qui quasi racemiacim per mulcos dies habent globules nuclei. Ceratini magnitudine, coloris olivacei, quile aperientes in quinque finduntur folia, deorsum in Jina, qua interiustatu & virescunt hinc olivaceum splendens: his infidet dulcis odor, unicus & in medio autem flare eriguntur multa *Jacaranda*, alba, *apicata* inter sitis magnis infocomparum letacearum modum. *Folia* fuscis & *P* magnitudine Be *craftitium* aspectu raris ob infucatos natura: lulus, quod gibbosis K admodum Be contortus apparet acque pb gravitatem Temper pendulus. Haud enilis est cobtus. Incol exinde coquunt pulmentum quod dam stomacho imprimis amicum quod *Manipoy* vocant.

Altera speciei lignum est nigrum Be bene olens atque durum. Frequens est in Bahia omnium Sandtorum.

CAP. XIII.

Jibuti ab a Pifo. Marograv. *Arbor pomifera Brasiliensis fructu tuberoso per totam arboris longitudo in mm extenso exzunte.*

Arbor est recta, procerata atque elegans, vastissimis ornata ramis. Fructum fert cinerei coloris, parem magnitudine Limonii, licco dulcij tenui pellicula, infarvix bene mature, quahtatim temperate atque salubris; fabricantibus jucundissimum. Non fert flores & fructus in tubere quibus radice usque ad summam ramorum per totam arborem conjungitur dim catervatimque extuberant ut contiouus possit racemus quam arbor videatur.

Species quardam hujus arboris invenitur in fylvis *Pagi Tabucurana* fed fmdtis fert cum aliis minime comparandos: ex quibus incolarum exprimunt vinum dslicatum & C dulce, quod nil statim ebibit detenus se & c in acetum dgenerat.

Utraque hxc arbor nonnisi in vastis Jilvis provenit, Be frequens est in praefectura S. Viricentii & fte Emmanuel de Morais.

Quamvis fructum hujus arboris flore omnino carere non censeam, poterat tamen ficubus qua; etiam flore carere vulgo creduntur subjungere, in memoria excidisset.

CAP. XIV.

Arbor ractmofa Brasiliensis foliis Malabathri Breyn. Cr>M. cap. x. *An Mum Brasiliensis* Marograv. *fructu rotundo & zuz lenta, pulp* molli, foliopyrtm* Vid. p. 1501.*

Arboris Canella: mediocris fere forma, iidemque concinna ferie positis ramis se effert, quarum minores denso tomento obfita candida lanuginosia K partim brevibus partim longioribus articulorum distans intercepta. Ex quibus & bina adversa, & alternatim disposita, pediculis uncialibus inharrentia exeunt, Folio Malabathro *Officin.* yalde acmula, nisi quibusdam latio- ra, Be parte prona, sicut pediculi, lanuginosa sic alba siipina vero atrovirosplendentia cernuntur: sicca autem cu quod virebat: habere evadunt nigerrima, tollit ab arboris in quibus; unde mero admodum nec alia apparet quibus si ex corio Hispanico contacta essent. Per unum quodque folium longiorum non grandes ac à tergo cujus cujusque tripliciter costae quinguae; quarum maxima, mediana folium tranlcurrens recta, reliqua: autem omnes arcuum modo inflexae, inter quas venae minores rectae luci parallelae per latitudinem nonnihil liirum tendentes, K ex his fibra: oblique innumerabilae per latitudinem, maxime vero per longitudo pulcherrime & costulae intricatissimae, & Ex ramulorum apicibus racemus suavis potit originem, pulcher, palmaris aut dimidiis unguibus, dicitur in ramulis juncturae autem, ex ramulis autem ceteris in appoiia Lunectui, Urn. praeletem infiores, in minores iterum divisi, qui ut Be reliqui plunmis utnque granulis latis, a Lunacemorin Dnabhoirencibus, aliquantulum modo majonibus, nec vinibus, lesa ad aJbo. ad Brnigineim nonnihil rendentibus, onufti. Hie racemus, quoniam plane lanuginosus ac arboris ramulculi, Cuius piona foliorum pulcherrima, a tactum tam modicis est quam optimus ex Brwn-

ilia pannits. An flores Szfrus exBotri granulis prodeant, enucleare non potuit Tac
 Hand arborem esse ipfaromec Muivam Brafilienfium Marcgra-v. nobis minime dubium v?def?R^{US}ik
 partium abutroque [Marcgravio & Breynio] defcriptarum exactam innotis adferiptis
 tiam. Vid. p. 154.

CAP. XV.

Tomif 'era feu fotih prunifera indica nuce reniformi fummo fomo innafcente, Cajous ditfa. Anacardii
 alijpecies C. B. Cajoas Ger. Park. J. B. Acajaiba Pifonis 8C Marcgravii. Kapa-mara
 9k^M, F^R*, T^{*}h⁶? - € & * € a * 0 U * * Caft U C w * Atiacardium ouidntaU Cajou
 dictum ojjiuh rent letorisfigura Herman..

H.M.

Arbor est mediocris magnitudinis [at Marcgravio affiirgit in Fagi altitudinem BcPifoni[^]w-
 tum lenta folent inter viburna Cuprejji, tantum inter caeteras Brafilia: arbores eminent. Forte
 in Brafilia, ubi indigent est, ad majorem freritatem attollitur, qudm in India Orientali ubi ad-
 vena & aliundeillata creditor] caudice crasso, candido, cortice cinereo, intus purpureo, odoris fuba'
 cidi, faporisque adfringentis, tedto_j 8c ramis atro-viridibus, eleganter in orbem diffufis donato Ra-
 dix albicans, cortice furvoj tenuibus filamentis psrtexto, obdufta. Folia fine ordine ramis adhsrenc
 oblongo-rotunda, glabra, yirqre fplendentiajnervis aliquot infernc eminentibus e cofta media deir-
 la in latera excurrentibus. Tenella mambus confrifta glutinofa funt, Be fragrantem ftjiranc odorem -
 vetuftiora autem priuquam decidunt plane rufefcunt. [Pifoni folia, fi nervos, fi figuram fpedles*
 Juglandi familia.] FlofcUli fuavolentes, ae melleum odorem fpirantes, racematitn ramtdis[^]extre'
 mis inhaerent, atque e calyce exiguo, vindi, in quinque lacinias acuminatis fefto, prodeunt quinque
 teretibus [angullis acuminatisMarcgrav.] reflexis, pnmum e yiridi flavefcntibus, dcin hifis tan-
 domque purpureis conftantes foholis, fiamimts quibufdam tenuibus, flavefcntibus[^]apkibm ornat[^]
 mediam flons ravitatem occupantibus: inter quxfijl*, prodit, qui ex ipfius frufus germine emerit"
 •Fruto* tum figura, tum magnitudinePyrisnofratribus haud abfimiles, glabri, fplendentes, primim"
 rufi, don vhdcs, tandemque flavefcntes, earns intus e viridi fkvefcnte, fungosl & aquosl refer?
 ac tenuipelllicula[^]ca[^]ma[^]: odorfuavjs, fapor vhnofus,acris tamen 8c aufterus, finondum probe maturi
 iunt. Hujus vero fruftus alten extremitati Nux qufdam firura & magnitudine Leporinum renent
 referens, viz. altera parte gibbola, oppolita lacunam impreffam habens, adnafcitur, quar cinereo teei-
 tur cortice, prater quern alius Nudeum completitur pallidum, ea forma qua Sc totus est fruftus fac-
 culentum, Amygdale dulcis fapore, fubftantia molliore. At vero inter duos hocce cortices qui cum
 mi fere latitudine invicem abfunt, tophaceis cavernulis coerctetur melligo, craffiufcuk & lenta find
 Ceraforumcoloreficconfiftentia, fipore primum adfringente, moxinfigni acrimonia lineitum &
 fauces vellicante, fervata tamen adfridliene.

[Poft florem primo prodit Nux renis figura, a[^] incrementum capiente, inter illatn & pediculum
 paulatim excrelcic pomum oblongum, ovale aut ctiam rotundum, nam in variis arboribus finirava
 rnt, atque etiam colore rubro vel flavtfeente. Succus ferrugineo colore linteamina maculfae, qui
 difficulter admodum elui poteft.]

Provenit ubique in Malabar: at Brafflis indigena cenfetur. Singulis annis, Augufto & Septembri
 Menfibus, ma[^] uros fertfruftus, man[^]tque frugifera „o circiter annos. In Brafilia, auftore S r c
 gravio, florcreincipit Jreaftnem Augufti, maxime aut em floret Septembri, Decembri & Januana
 maxima est copia fruftuum maturorum. Repentur in Jamaica. Januana

E fru(aibushifcepotu5exprimitur, qui debito modo fermentatus vino/iisfic & inebrians
 ftus [toftus] caftaneis longe antecellit, fa[^]prfmque non minus gratum habet quam Amygdala
 Crudum nemo fecure ore apenet, quod contmuo cutem abradat, magno dolore eorum an[^] In
 temere eum refecant, ideo cultro aperitur. Guttur peculiarn natura fruftus hi cum delitit
 untur [crudi] ftungunt, guftu acn & auftero: ideoque in orbesfcinduntnr, adjunftd aqud vel v[^]
 no, faleque mjefto, quibus modis acrimonia ilia mitigatur, palato ita gratiffimi • ventriculum robd
 rant[^] fermentationemjuvant, necnon vomitum Senaufeamtollunt; leviter toftis vefcuntur Indi id
 Venersm ftimulandam. Succus vero tfruftibus hifce expreffis diarrhoeam fitit, & diabetem fanat.
 Nuees rJamms admotz flagrant.

Ex melligine, quam gemini cortices continent, copidum indigens eliciunt oleum, quod piftori-
 busadnnteamina qua:vis indelebil nigncante colore pingenda in ufu est, eodemque oleo fi lienum
 ungatur, contra putredinem praefervatur. Infuper acri illo oleo nihil priftantius esse ferunt ad li-
 tiam[^] 11 6, 211165, k[^]em* vermicu[^]os necandos, Sec. exterius illito.

Arbor hzc vulnerratafiinditgummipellucidum, confiftentia[^] Be colore plane fimile optimo gum-
 mi Arabico, Marcgra-u. An ex hoc fit confectio Cat tee, feu Caffk, vel Catechu ?

irialienles annos atatis Cux perCaftaneas Cajū, computant, fingulis annis unam recondentes-6
 **%> ? UCem Var? ^ f[^]n[^]TM durum. Idem. Vermes non facile generac, undc navibus idoneum

Eft hzc arbor fruftus refpectu singularis; Poterat fortatc redlius ad Prunif^{cras} referri.

SECTIO

Aaaaaa

SECTIO II.

T> Arhribus fruttu conoide squamofv ant rzticulatD Anvna &* Aratku diElii
afpms 6 20 62, 6 20 62, 6 20 62.

CAP. J.

De An on a, Aratnu, Durione.

I. Tomifera Indicafrubu cmoide fqHamofoM viriJi. Atamaram H. M. T.%. Tab.zy. p. 31. Abat
Jz Panvob. 22 di.

H. M.

ARbor est mediae magnitudinis ad viginti circiter pedum altitudinem aflurgens: cortice tegi-
p turfungofoj intus rubro. *Lignum* albicans, pradurum, cujus matrix vindior est, inortora,
guftu iubamara acfubauftera: paucos diffundit ramos, quorum uc Be ramulorum ac virgul-
torum cortex vindis est, cinereis interftintus punftulis. *Radix* flavescens rubido tegitur cortice^graj
veolens est/aporis vero uniftjofi, K impliirimas divifk fibras, qua: tamcn per terram apnlate di-
fundunrur. *Folia* obJongo-teretia arque glabra, foliis *Malakatsjambvu* haud abffimilia, nbi tanjen c
regionenon re/pondentia, fuperne viridia fi^nitentia, fubtus/uhviridia, raanibus confnfta-unj uo,
U, inodora. *Forts* iinguli fuis pediculis cohzentj foliis ornatis minoribus, qua: poftca deciaun,
pcralis conftantcnbus^ craffiSj triquetns, coriaceis, Incnpiecus albicantibus, excrinfecus vero dllu c
viridibus, odorem corio ufto acmulumj fi adoleanrur^ fpirantibus.

Csterum e floris ftamine *fruttm* emrsiej feu potius *Uonus*, qui maturus magnitudinem habet Cui
vulgaris, exteriusrviridis acilriatus^ interius vero albicans, necnon medulla fucculenta iaporis grad*
Ddorirquefuavi5, refertus. In his autem frutibus^cw;w« dura, oblongo-teretia, glabra, nibe
necnonplana at utnculisjnclufaj locantur; eaque fucculenta Sc albicante fuftus pulpa
obdufla cernuntur. At vero fruttus ipfi immaturi decerpuntur, qui fponde per fe M
infar mitigantur K comeduntur.

Nullibi in Malabar Ipont^ ontur, fed ex Infulis Philippine in Indiam delata fuit. A mat h cum ca-
lidum &c humidum, StfiiiD equinofubaftum, atque ngaCidnc Scfervidis folaribus radiis gaudet-^

Tempus.

Porro poll primuni biennium aut triennium arbor hare demum frugifera est, Apriliviz. MaiD^j
turn Augufto acque Septembri menlibus floret fruttufque fert: flares namqu: qui menfe April*
emergunc, Augufto circiter ma euros profcrunt fruAus^ quiquo msnfe SepTcmbri prodeum proximP
Februario perfe^aum exhibent canum. Non rarb ad quinquagefimum annum & ultra frugifera estj
modb CDncien5 adhibeatur cultura.

Vires.

Folia hujus arboris minucim contufa, & addito file in cataplafinatis Formam redafta, tumDribu^
malignis impofira, potenter eos maturant. Fruttus verb immatunin aqua communi cum pauxill^
zinziberis; decofti vertigini medentur; at fufficienter mitigati, & in del^cis comefti valde refrige-
rant, alvumque reddunt laxiorem fi aqua fuperbibatur.

* P. 348-

Fruttus huicfimiliinjus a #Reecho depingitur iib titulo Ahate de Panucho. At D. Hermanns
Anona: Maram H. M. /ynonymumfacit.

Li-ci & Lumyen arbor es & fruttus Sinenfes

Michaeli Boym in Flora Sinenfi depifta: apxcedente non multum abludunt. *Lid*, inquitifru-
au5Pnifera: aibons fruttumreferr, fed *Lumjen* hcvilimam pelliculam habet, uterque /apit fraga 8C
uvas. Junio Sc Julio menlibus maturefcunt. Sinenfes pulverem ex illorum nuclei's bibendum prxbent
aIgd5. Si difti fruttus.fine lylveftres nucleos grandes Be de fiibacida carne pa'rum; fi tranplantati
nucleos exiguos & de came dulci plurimumhabent. Caro est colons unguium humanorum. Re-
cens collefti li falica aqud afpergantur per plures dies cxinfervanturj abftaftoque cortice recentium*
faporem prxftant.

3i. p. 301. 2> dnona Indtca fruEiu parv9 i/iolaceo Herman, H. L. Anna Maram 3 an Anon Ovizdi, H.M.
potius Guanabanus Ovidi, fruttu fauamato J. B. Pjrp firmlu fruitm altzr in nova H. B.
CB.

H.M.

Pracedenti haud abffimilis est, nec proceritate codit j *Folia* tamerianguftiora/mag/ti,
ac pluribus ornata nerVulis, necnon aitori virore nitentia.

Fleij apriombusvixdifferum. *Fruttus* verb licet non, uti *Atamaram*, h compaftili
quoniat ftrLe CDmP^cd undique glabro, hyacinthino, ac cenai cortice ubdufti
magis cedam, quoad cetera ramen plane cum iis CDveniunt. Hxc quDque arbor pr
ci: Malabar perE^tina est, Be clonginquisregiombus delata.

Viribus cum p^iore conVenit.
Guanaban I?^/ ICDI^Ua: habetur apud J. B. Turn*. W. i. r^55- «ni icone hujus plant* »
H. M. adch I?^aeconven^ tuciamquee, ufdemfcieie fruttus die minim I dubiumi he
Guanabanum autem Dviedus lie delcribii :

Procera est arbor Kformosa, folio ferè Mali Medici quam Limoniani vocant, fructu pulcherrimo, mediocri Meloni Sniagnitudine, qui tamen interdum in capris pueri magnitudinem excipit. Cortex huic fructui viridis, flos qui certis quibusdam squamis distinctus videatur ut troybilus, Ixvioribus tamen, neque ira tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit, neque crassior qualis in Pyris. Caro candidissima faporisque delicatissimi, quae facile pinguedinis lactis infusa in ore resoluitur. Per ejus carnem parva fuit minima magnae cucurbitarum fforminibus aliquanto majora Benigrantia.

Frigidus est hic fructus, Be pe aeftus utilis. Nam tamen quis integrum Guanabanum devorer, nullum inde lentie nocumentum. In Hernia est ligni materia.

Per univervam ferè Arnencam nasci tradunt.

Proceritate, Be fructu colore rifferre videtur ab Anona-maram. Clufiu ait cum Durionibus plane convenire Guanabanum Ovidi: Quod fuit affit, Durio minus refte deienbitur a Garcia Be Acofta fructu Melonis magnitudine, denso corric fepto, eoque multo is brevibus aculeis crassifq, ac pungentibus Drrenteintusconcamerationssquatuo fecundiim longimdinem habent, fingulas tria aut quatuor receptacula continentes, quibus fingulis fructus in lunc admodum candidi, magnitudine DVI Salinaceij guftu fuavi Bcc.

5. Anon Ovitidi, Hispanis Mangier bianco, fructu minor* luuo..

Adeb in paucis differre à Guafiabona, ut (pecie diverlam vix putem.

Anon (inquit) arbor est cujus fructus magnam cum Guanabona habet similitudinem, cum formam turn came & (emine. Sed & ipsa Anonis arbor Guanabani arbori fimillima est, 6c magnitudine, 8c formi, Be folio- Duabus verb in rebus differunt Primùm quod hujus fructus minor fit Guanabano/ corticis color luteus, qui in Guanabano viridis est: deinde quod meo quidem iudicio granor fie palato Anon quam Guanabanus, utpote firmiore carne. Utrumque magno in pretio habent Indi America & diligenter in praxiis liis colunt.

Annonam à Guanabano specie distinctam non esse Jolephus Acofta I.4, c. if. affirmare videtur, Annona, inquit, five Guanavano Pyri est magnitudes, Pulpa bucyri modo, cui grana plurima nigricantia includuntur. Nihil tamen temere affirmandum.

Fructus hic Hispanis Mangier blanco dicitur; Manjar autem bthno Hispanorum sum fructum esse quern nostrates America: coloni C)lt Cliltarb lpplf vocant J. Tancredas Robinismus à quo dam negotiatore Americano edoctus est. Idem ingeniosus. Amicus nofter aliorum relationibus Schifto-riis cum descriptionibus Aratku quae apud Pifoneii be Franciscum Rsdii habentur diligenter collatis exinde collegit & CliltarD 30ppU noftratium eundem profus fructum esse cum Aratku tertiam, fsu Aratku Afe eorundem Autorum: cujus Xentenciz 6c ego libenter libscribo. Descriptionem autem eju& Be hiftoriam paulo inferius dabimus.

4. Anona Americana fructu majori, Soortack parvum vulgè Herman. Hort. Leyd.

Nomine (inquit) Soortack parvi ex America hue in vesta sunt lemna oblonga, angulosa, nonnihil depressa, flavescens, Anona Indica majora, quae fata protulerunt fobolem pedalis longitudinis, cui alcerno ordine adstant folia Lauri amplitudine, lxtcvihdiaj luuida, glabra.

5. Aratku prima feufimpliciur diet* Franc ifci Redi Experiment, natural, p. 75. Araticu ponbe Maregravii & Pifonis. Noftratibus Jatnaye* & Barbados infularujn colonis, QLL & QIDZ, & pp, et Dm Robinfbno via etur.

Maregrav.

Arbor est caudicis be ramonifn figura, ac colore corticis ut Malus Aurantia, fed foliis, flore Sc fructu difference, folia habet circiter femipedem longa, alternatim opposita, elegantia, fuperius faturate viridiaj crassa Be ad tactum folida, duos xnc digitos lata, linguae hiimanj figurà, Be in extremitate acuminata. Hinc inde flos provenit magnus, egregius, magnitudine fuperans fforem Fririllaria: totus flavus, exterius compofitus e cnbus foliis cordiformibus, fefquidigicum longis, Be crassif inftra corticis Aurantii Malj, ereftis, quae in fui medio concinenc alia tria minora, Be dimidiac crassitieij quorum quodlibet (emiglobum concavatum refert: tria autem hare ita compofita Be extremitatibus fibi impofita funt, ut globum integrum, interiùs cavum, fle magnitudine Juglandis referant: globus hic Ir cavicate fua Stamen habet globojum, magnitudine Avellanac, luteum, 8c in ftamine apicem parvulum, rotundum. unt autem Be ftamen Be apex tuberculis exiguis luteis prazdita, quavidencur in pon in cute hominis argentis. Flos totus flavus est, odoris fuavis fed nauleabundi decuduij fingulis diebus multi feaperiunc, Bepolt aliquot horas fponde decidunt, ftrepitu excitan-tes inter cadendum ac fi baculo aliquis feriret arborem, gravis enim est flos Be grandis.

Florem fequitur raff/w, qui maturatur prarfercim Decembri Be Januariam Non est autem edulis nisi Iponte decider, tune enim inftra pulvis mollis est: est autem figunc rurbinaez, quatuor aut quinque digicos longus, ubi pediuulo adha:hc eptem auc octo digicos crassus in ambiru. Externe coloris est ex albo Be yindi mixto, Vel plane pallide virens, & l videtur quasi cutis h squamis compofita efflet, ita enim lineis viridibus pallide virenes squamx ddineatz funt, Be quzlibet harum habet tuberculum in medio exiguiimj rufcum, ita ut nucem pineam ferè repraeconce. Mollis est; cum fponde decider, ita ut inftra cafei veteps putridi digitis decorticari possit. Concinet carnem feu pulpam fubflavam, quz quasi ex pyramidibus videcur compofita, filamentis quibusdam intermixta Be multis nucleis feu feminibus. Pulpa Ddore Aon male refert maffam panis fermentatam cui aliquot mellis admixtum; faporis ex dulci fubacidi Be lubacris est. Eo loco ubi pediculo inlbdit Euttus, durioris carnis corpus, fuppoicorii-figura, in fe continet, quod feorfum exrahi potest, quod comeditur Be pro lauriffima buccula habetur.

Szmina ovalis flint figure, compressa, magnitudine Fab*, glabra ac dura, colonis flavescentis, splendenti^ quodlibet pellicula alba obduftum; intiis est nucleus albus, dura substantiz, (apone non male referens radiscm Helenii, icà enim in dulci amarefcit.

Virti.

Fdia igne adufta, & cum oleo apoftemati impofita maturare faciunt, aperiunt & optime fanat.

6. Araticu-Ape Pifo; Marcgrav. Redi experim. Nat. p. 77. Nofiraitbw <@)Z Cliffnrfe SEjJpfo An Anona Ovkdî ?

Defcribente Marcgravio, colore tan rum feminis obfcure brunneo à prima fpecie differr.

Pifoni ei per omnia fimilis eft: utraque enim ponia ex acido dulcia profert, efulcanta, fed fyJveftria 5c frigida, ac propterea quibufdam non expetita, figura & magnitudine Nuclea Pines; fubstantia & carne intus molliore & flavescente, feminibus ex fulvo nigricantibus curgida.

Lufitanus quickm Jefuita apud Fr.Redt'm Exprim. natur. Fructum hunc melioribus cotus orbis comparari poffe ait. ^uomodo hoc convenit cum prxctdmte Pijonis' defcriptione ? quamvis nulli allquo modo hmilis appareat. Segmenta ejus acucis quibufflam cupidibus quafi diducuntur, licet omnes eodem cortice leu pellicula jungantur. Semen nigrum eftj aureo quodam fulgore nitelcens, Remiffib polJec odore He non ingraro: cum jam perfecte macuruit, pallido colore iuffiuuSj nigns maculis feu punctuljs undique perfufus eft. Facillimè frudus ifte gladiolo difsecatur, & partes jam ivife videntur ut duac capfub feu vafcuJa eo cibo referra^ qui vulgò ex «arne gallinis cuti jaccnaro & lafte contufa parari foletj eoque maximè blando, fuavi & fngidiffimo, vel ficuti pinguior pars Ja&is qu^ fupernatat, albo faccharo permixta, ideo nonnifi cum cochleari coramqdc iplo, ve fcuntur. Cortex Imperialis moneta: craffitiem minimè excedit. Truncus, folia S: nores minus pulehra apparent quam p'mE Araticu fpeciei-

Ex fententia D. Tancndi Robinfon, hxc fpecies eft quam ndfrates Effe Exfuita Sijpfo-ora vocant. Siquidem fructiis pulpa (ut aiunt) cremoris feu floris laftis faccharo perruxti ^pofon ex confitentiam habet, ideoque nonnifi cochleanbus excepta commodè edi potest; qu* de fructu Clf n5 npple djfto narrant Coloni noftri Jamaicenfes & Barbadenfes.

Fructus Araticu quem defcribit F. ncc. Redi Experim. nat. corticem habuit cetera latere, fed conferam fpiculis vel spinis, hinc, abculis, non pungentibus, & à plapo ipfius cortice appedo p' rini adurgentibus. Color corticis hujus exarati fructus in ferrugineum propendet, nigro nictu qui ubi jam maturuk in croceurr obfeuriorem, intermittis fubinde rubris maculis propendet. Jous ufque adeo feminum plenus eftj ut 170 in uno numeraverim j quorum fuis firtguJa gellulis, ex & nuiffima oicmbrana compofitis, & cortici quafi alligatis confiant.

Semina, fi figuram & magnitudinem fpeciei, Amygdalas referDnt. ^ Follicili feminum quot* fubstantiam foJiculis fyninum CicreoJomm perfimiles funt, extrinfecus leves, nitidi, & colons ex flavo rubri, fed intus candidi, asperi & rigidi ob membranulas quafdam duras, qwx k fupeific^ felliculorum affurgentes in ipfam medullam feminis penetrant. Semen ipfium candidum eft, & figuram ellipticam habet, & à membranulis accuratè iticifum eft.

7. Durio Garcia dr Atopa. Arbor fomfen* fruclu acuhato Melonis Magnitudine C. R Durio Acojtx J. R

Acofia.

P«grandis eft hac arbor, materie valida & flida, craffb cinereoque cortice teda, multis v* mis luxurian5, & copiofum fructum praben5. Flora habet ex albo nonnihil flavescentes: folia dimidii palmi longitudine, duorum aut amplius digitorum latitudine; in ambitu, tenuiter ftrra, parte externa dilutius, virencia^ inteina verò fituratiore viriditatCj & quodammodo ad rufum tei> flente prsdita: frutSum Melonis magnitudine, denfb cortice feptum, eoque jnultis, brevibus crasiffique &c pungentibus aculeis horrente, foris viridi & veluti ftriis quibufdam quemadmodum Melo fecundum longitudinem diftinfco: intus verò concamerationes quatuor fecundum longitudinem habetj fingulas cia aut quatuor receptacula continentes, quibus finguli fructus infunt, admodum candidi uti laftis pingue, magnitudine ovi gallinacdi, eustu fuaviore odorator^ que quam fie condinnetum illud ab Hifpanis Manjar bianco appellatum, fex Amygdalis contufo, farina, lade, aqua rofacea & faccharo compofitum] non tamen, adeo molles aut glutinofi : nam qui candore illo non furit praediti, fed flavelcunt, putndi flint, aut acris injuriâ pjuviave corrupti. Optimi cenentur qui tres duntaxat iruAus in iingulis concamerationibus, deinde qui quatuor obtinent: nam qui quinque habent improbi cenbncur. Non (blent autem in fingulis malisplur^s rjuam viginti frudiis conrineri; iique finguli inclufum habent nudeurn, mali Pfrfici nucleo fimilem, non rotundum^ fed oblongiufculum, guftuinfipido, quique guttur exafferet, velut Me/pila vindia, propterea non eduntur.

Qui edere volunt hunc fructum, psde levicez comprimere 6c frangere folent propter fpinas quibus obficus est.

Qui nunquam hos fructus edeunt cum primum illos olfaciunt videntur putridas cpcas odore i fed poftquam deguftarunt pivt reliqujs cibus bene olere & fapere cenent.

Eft verò tanca in exiftimationG apud eos qui guLe dedk'i funt, hie fructus, ut puteat rucmum co polTe facian.

Tanta tamen eft hujus fmflus in Malaca abundantia, ut finguli HDH plenis quam quawpr Maravedis veneant, prlxercim nieniibus Junio, Julio & Augufto: nam relkiuis pretium intenditu^ P^o

AT 1111 arjieri o.
f jnavaona Dn^ uo ^ Rna eft Betele cum hoc fludu ^ tipathia, qnz profedto tanta eft, « fiqq
S. pomat, c. 2. Pkaiam, xi c aut
Hicmactem: & TrfntUr ^ ^ ^ cant omrie, Et G cui ex Durionum immodico efu venoiculus in
gravetur, folio Iktfc ibpra ventriculum inrpofto, ivbtib miei, tur inflammatio, ^

morque tollatur. Et si à Durionum efu ingerantur aliquot Betele folia, niillain npxam (entiet quantumvis multos ederit. H*c ^uam-vis fidm meam firanguht d * D. Mandelfp tamm confirman- * Inner, in tur, IndianOrient

EL Anona fruEiu fouamofo pyriformi, mohopyreno. trufus fauamofus pyriformis C.B. Bdly inful<2^{al*} fructus pyri formd ajpr J.B.jlaly infulafruttus aspero cortice * CluH *Exot lie 4

Tres uncias longus erat; ejus ambitus ea parte qua pediculo inh^hiffe videbatur fex pamS uhiarunij fuperna verò parte anguftior 8c veluti in metam definens, ut quodammodo Ficus aut Pyri formam armularetur. Apero teftus erat cortice Be ab infima parte iirfium verEjs denfis ordinib⁵ velut fquamularum fibi mutuò incumbentium ornato, quæ fejungit nequibant, fed cum integro cortice non valde derifo eximi poterant, flav^hcentis chloris dum recens ex conditura exemptus, deinde fubfulca. Continebat porò ille fructus pulpam albam, odoratam, inftar pyri fufcitam, fubflantia autem non valde abfinitate albu illi condimento, quod ex Amygdalis purpurgatis & conculis, lacte, farinae flore, aqua Stillatiz & humibus rofmaro & fâcham fieri folet: [Adangier Mâns] folidiorem tamen^h nee adeò glutinofam, iapore (quia fruttus muitâ conditi fuere) valde fallo 5c linguam mordicante, continentem in media officulum folidum, pinè uncialem 5c in metam a& furgentem, formâque ipfum fruttum referentem, inferna parte craffiorem, liiperna anguftiorem; pulps autem integra: adjunttos obfervabam binos auc tres grumoSj & C velut ex craffiore fruttûs parte dependentes: Etenim corticem fecundum lpngitudinem fiifurn facile integram à pulpa fepearare potuit Clufius haud fecûs ac ferpentis exuvium, quia pulpa non adhsrebatj nifi paululum ei parte qua ex pediculo pependerit.

C.Bauhinu5 ab hoc diverfum facit fruttum ex Baly in Jull Pyri magnitudine cortice inftar pifeis fquamarum apero^h nucleo utio vel altero Linfcdt. part. 3. Iiid. Oriental, g. 59. 8c parr. 4. c. 6. ti> tub Fruttus cortice fquammofo: quern Clufius Sc J. B. cum hoc conjungunt; quamvis enim * au- *Part.i.HiJl^a Nar.Bat. in Ind. Orient. *Exot. lib. i.

9. Araticu do putto Pilbn. An Baly infulze fruttus aspero cortice Cluf ?

Excrefcit ut Vana, 6c talia fert folia: Fruttus congefti, oblongi, cepae junioris oblongâ figurâ, virides^h qui interius finguli duo habent femina Amygdala: figura & L magnitudine, at in una extremitate acutiora, coloris coracini fplendentia, in quibus nucleus.

CAP. II.

De Juanahanv.

ik Quanananus Javanmfis * Botitii.

^{Bont.} V IX, inquit, frutex dici pDteft qui hiinc fruttum profertj Be vix ultra medium humans ftaturae affurgit: farmenta potiùs emittens quàm ramos, quæ egregiè flavos flows feruntj quibus Guanamhan fruttus fiiccedit, qui quinquangulus eft, Be Cotidem commiffuras habet, prominentiores paullum, qua: aperta: femem oftendunt inftar Ciceris, quod viride primum, mox maturefcens ex cyaneo atrum fie fplendentem colorem contrahit; qualem videre eft in Corallo nigro expolito- Fruttus hie in fuperficie lanofus eft 5c pungens, ut in foliis Cardui benedifti etiam fit. Folia referlint pkne pentaphyllum n oft rum.

Apud MalaiDs eorum alius ufus non eft, quàm quòd inter caetra legumina ab iis coquantur cum jure gallinarum aut aliarum carniû^h & c etiam flatus excitant ut camera Piforum 6c Cicerum generaj atque nefcio quid faftidiofi lapiant: unde etiam infuetis alvum movent.

2. Guanabams Afrkanus Pifon. in Bont. Gnanabanus ficulmo folio Mutiting.

Tifon.

Planta eft fruticefcens foliis magnisy Cardui vel Acanthi non diffimilibus, cum profundis pro vario nature lufu inciluris, eaque caules larmentofos cingunt. Ex his fuperiùs ernerguntjow flavi, quibus fruttii5 oblongij craffi (iccedunt, cum multis ftriis & c eminentibus inciluris per longitudinem excurrentibus, definuntque in coronam ex otto foliolis tenuibus conftantem; quæ corona his Gui^h nœnfibus fructibus peculiaris eflè videtur-

D A P. UL

Aninga-iba Pifonis & Marcgr. Arbor Brafilimfis aquatica folio Nympha* fruifn Tticulato> pulpâ albâ humidd,

Marcgrav.

S Uinque aut (ex pedes ex aqua erigitur, ittiico tantùrrt caudice fragili, quafi internodiis di- I vifo, cinereo inftar Juglandis, in cujus fummitate aliquot folia, magna, lactè viridia, craffa, lsvia, figurâ psnè Nymphza: auc Sagittalis, nervo refto Be venis cranfverfis confpicua^h ngula pedicuo innicuntur ultra pedem. longo,, iicculento. In eadem caulis fummicacc inter folia exfirgic flos uiicus^h magnuSj concavus, folio unico, incarnato conftrans, coloms pallidi flavi cum (tamint craffb, flavti, in medio floris concavo, Huic iuccedk JHIUS, qui fruttus evadit,

A a a a a a 2

perpscus

perpetuis quadraris CDntans, ovi Struthionis plus minus magnitudine Be figura, colonis viridis, ip-
tus refertus pulpâ albâ humidâ, quæ maturefacta & exiccata farinacei fit iaporis, & temporæra-
mis comeditur. Cujus tamen excellis cum evidenti vitje periculo fit, quod pbfrigiditatem & C natu-
lentiam, more Fungorum terrætrium luffb cation em minetur.

Lignum earum qua: ad arboream magnitudinem excrevsrunt ad yaria mechanica ufurpatur: cum
enim Jervis fit., tenax, fuberofus tDtus caudex, Indiçenz 8c Nigrice: exinde langadas potiffinium
cñficiunt, id est, rates fuas ex triligino copulato ad fluvios rapcim trajiciendos. Medica autem
qualitas ill bulbosâ fua radice confillit.

Amvga Jirmpliciter difta, [tu I. Pifonis-

Eifdem locis ftagnantibus, ejufdemque akitudinis confpicitur- Caudice itidem unico, iw qui
difpesciEur mox in vanos caules craffiufcHos, molles Be junceos, Mulac arboris infitar. Ind5 B,
unoquoque caule folium prargrande, oblongum, i'aris venis con/picum fastigiatur. Flore elt u j
atque magno & candido; ex quo progerminat/n*##f haud vulgaris, primo virtdis, mox c
nerco flavescens, Dblongus, craffûs, compactus, ac veluti granis 8c punftulis diftinftu^; w
edulis defectu melioris alimenti.

Viret,

Vizxqwez An'mga radice est craffa, bulbola, quac fpla foliis Be fruftui harum
cina prarferenda est. Quippe cum tenuium fit partium & deobfruens, in varios ufus
Lufirar^is Be Barbaris.

Contra hypochondriorum & renum, inflationes ac obfruftiones fomenta- inde connz ^
Oleum exprefliim pra:ftantiffimum etiam habetur contra pradifta mala, atque olei Nymp ac
Capparum vices fiipplet.

Si ex radibus denicjue in urina humana coftis balnea fiant, eaque aliquoties calida rei e
fummo wxiffunc folatio contra morbos articulares tarn inveteratos quam

Arborfrufu nuzisYinideJirmi C B- Vint* nuzisyte'm Mtlznm J. B-

The'vet.

Magnus est, Nuci5 Pincac pecie, corcice luteo, quo (poll a tarn carnem in particulas difleftarn 11
guffaveris, faccharum ore continere dixerisj cum pauxilla Nucis Mofchatz portiunculâ permlX^an*
Hoc Barbari ad iedandam ficim utuntur.

Fnuftui Nan* farisfimilis est^ nifi quod in arbors provenit, Mori ferè proceritate, nigro
veftitaj folio quadanrenus mbeftente, longitudine & C latitudine folii Angelica.

In Necumrz mans Indici infula invenitur.

T'mofimilis Orient^alıs C. B. Piniformâ [libagz J. B.

Ex Orientalibu*regionibu5 Zibagtsnomine aPaludano ddatum est femenj colorsnigrum,
mine donatllm, ex quo prodllC plants, Pini formâ, led tencnor. C

SECTIO TERTIA

Arfons<Pmifer<zfruttu corthfy floris calyce baftadbtrete.

FRUttum corticosum vocamus qui non membrana tantum tenui pulpam ambiente fed cortice
craffiore eo tamen molliore cingitur, cujufinodi funt Mala Citria, Limonia, Aurantia, &c
Horum plerique polypyræni lunt, quibus ob convenientiam in rchquisunum vel alterum monopyrenum
adjungimus.

Nè quis autem objiciat hoc fafto confundi ArboreasPruniferas & Pomiferas, fciat nos-pro Pruni-
feris haDere non omnes quofruftum obtinent majorem pericarpio donatum monopyrenum, fed in-
luper requirere ut is tenui tantum membrana contegatur.

CAP. I

De Malo Citriajive Medica, flTfC CittOH

MAJUSCitria, Gracıs MaJus Medica ScAfflyria diatur, utroque nomine a regionibus, und? P
mum in Grsciam aJJata, AuAo.

Cum Veteres feripferint Mala Medica non mandi, conjedatur J. Bauhinus Mala aurantia n0
potius quâ Citria Veterum Medica fuiffe Tantum enim abest ut Citna hodie non conw>nta
uc pr* ceteris omnibus in maximis ddiçis habeantur: nifi quis JinqvitJ MaJit probate ratione
SiiiS. n on lile6 ^fonwfc VETeres a Citriorum estuj quod non fuerint cdulia, £d Am t

X dcal i Citrii nonnta in rem magni pftlii potilis aArva nda duxsnnt.
tanquam Cedrum nonnta "tare apud Veteres Graces negat. Sufpicatur ilJe Citrium
& Jra Vullio joph obatur, ?' fuit^i Propter «>«" f o, r ^ . inquitj. Bauhinus. Ha
puffantz earn G I M H ? a l l a d » difcnrii Citrus, n Italia pmnum CMJUCJ hunc folers
earn Galli* Be Hifpani*, ubi nemora Jam K camp ^ Pccupat *com,nunicavir. Citrium

Cacterum Citri vox squiyoca est Be pro duabus arboribus accipitur, altera in frugifera cujus ligno lnen/z olim fiebant; altera pomifera, qua: alicer Malus Medica 6c Alyria dicebatur ut Plinur difertis verbis docet. Confute Etymologicum ClariffVoflii.

Citrus, defcribente Cordo, a/bor est fruticofo veluti Cotonea, brevi trunco, longis ramis, craf fis, lentis Bcobfequiofis, viridi glabroque veftitis cDrlice, ferenda? frufluuum raoli valde imparibus, & ad terram pronis, ideoque fubjeftis per tranfverfum haftilibus furcifque fulciendis. *Folia* Laurinis familia, denlidia tamen, mukokemajora, & adjudlandis magnitudinem accedentia, oblonga, utrinque acuminata, egregiae viriditatis fplendorifque, prxfertim fupernè; infernè enim pallidiora flint, [per ambitum (errata) tota hyeme arborem fuam exornantia, odorisacsrrimi, late fpirajitis, qualis in Melifibphylo fencicur, cum gravitate quadam cimicem imitante, [jin(ftLiraquaclam pediculoinhsrencia; Soli fi objiciantur, infiar foliorum Hyp erici fora minibus vifum fsre ffugiencibus undique punftim trajefta cernuntur. *Bod.*] Spinis armatur fiib omnium foliorum annexibus longitudine uncialibus] reftis ac vindibus [J. Bauhino rigidifculis, flexilibus tamen nee ita infctis] *Flows* virentes gemmarum calyculi emictunt oblongos candicantes [fepiufculè fonnfècus purpurantes, calathi effigie, folidos, odoratos, ftamimbus in medio tenuibus ac capillaceis.] *Horum* duplex est genus; fterile 6c infoecundum quod colo caret; Be fertile, quod in medio ltylum exgrit penfum colo invalutum xmulantem ac cuique a tergo frufluus rudimentum annexum.

Frutns florem fequuncur iinguli, bngitudinB non raro dodrantali, figurà ovaâ, interdum etiam globosâ, fuperficie rugDsa tuberosaque colore primùm viridi, in matuntate verò aureo feu citrino, odore foliorum fimili. Cortice ambiuntur tenui amaro &c fervido, cui fubeft t caro carrilaginea durarque coiffntentiae, colore candido, fapore, acetoli, conditae capitate Braffica: truncos referens. In medio malo caviras qufdam est, (iicco vehementer acetofa, fuis membranis contento plena, xxi\W\riurnt?M-immixta funtoblonga 5c femundalia [tmia^ utrinque fere acuminata, cute foris flava ftriataque, midam ambit infus candido duplicique nucleo confanria, quibus amarus, tenuis 6c mediocriter fervens est fa-fro cortice. U-por, praefertim cutis, nucleus enim dulcedinem quadam admixtamhabet. Radicibus nititur copio-b^{CD}. iis 6c tenuibus.

Fruftus Citrii inagnitudine variant: quidamenim in molsm excrefcunt Melopeponibus parent ita ut ad poiidus librarum decem nonnunquam perveniant, hi nullo fere fucco func; adferuntur autem ex Liguria 6c Adriatici maris intillis: alii Limonum magnitudine funt: alii paulò majores, quae à lacu Benaco alportantur. Formâ etiam differunt citria; nam alia pra^longa funt^alia rotundiora, alia in varias figurâs hotninutn induftnâ vafis figulinis indufa formancur. Quaedam fapore remiffiore funt, quaedam^vehementiore. In colore etiam differentia obfervatur, nonnulla dilutiora, alia iaturaciora funt; non multum tamen differunt natura^6c viribus. Nos omnes has differentias aedden-tales 6c à fatione aut forte etiam infitione ortas fuppicamur. Q Bauhinus quatUDr diftinguit/pecies:

I. Malu5medica fimpliciter ei dicitur-

II. Malus medica maxima, pulpa plurima.

III. Malus medica fruflu ingenti tuberoso, Citrangula quibufdam.

IV. Malus medica ab Imperatore Carolo V. ex Hungaria in Hifpaniam delata, qns omnium Mali medicac generum acidorum luaviffimumj ut Clufiusin fua hiftoria refert.

Parkinfonus nofter in Theat. Bot. fex recentef 6c defcribit varietates: efe fiint

I. Malus citria major.

x. Citria malus minor, five *Limonera*, quae a praecedente differt foliis minoribus 6c brevioribus; floribus etiam minoribus Be faturatius rubentibus: fruflu minor longiorfque, corticemediocricer craffo, flavo, minus fcabro, fucco copiofiore cum paucioribusfeminibus.

3. Citria malus five *Limonra* pragnansj alium fruflum minorem in fe continent. Fruflus est monftro!

4. Liioneradulds; Hifpanis Limones Imperatoris.

5. Limonera acida.

6. Limonera multiformis: Has quinquepofteriores Ipecies^imDperas Clufiodiftas CBauhinus, 8c reftius nofta fententia ad Malum Limoniam refert. Hisadde e Ferrario 1. Malutn Citreum vulgare bduatum. 2. Malum Citreum Curbirinum vulgare. ; Malum Citreum digitatum feu multiforme. 4. Malum Citreum dulciffima medulla, apice non ita plerunque cupidato.

D. Tavernier in peregrinationibus fuis per regnum *Tunqm* duo cftriorum genera Dbfervavir, alterum flavum, alterumviride, utmmque adeo acidum Be immitte ut mandi non poffint auc deglutiri abfqueinfigni offenfione ventriculi. Succus tamen, quemadmodum apud nos Aqua Fortis uliir-patur admundanda metalla, cuprum, ftannum, ferrum, antequam deauranturj ut 6c ad tintfuras prxdpue Serici. In ufu etiam funt pru'lixiviis ad candorem linteaminibus conciliandum, eaque emacuknda. Quin Be per tDtum Magni Mogoris Imperium Iuccoifhoc Ciciorum utuntur ai pannos lineos Calcutico5 dittos candefaciendos, unde interdum adsò nivei 6c lucidi evadunt, uc plendorBtiimiD intuentium ocubs perfringant 6c offendant.

Citrii Mali partes omnes, cortex exterior Be interior, pulpa feu fuccus, Be femina, eximii ufus funt in medicina; 6c contrarios fibi invicem effectus producant. Exterior cortex flavescens valde odoratus est &c aromaticus, fapore amaro, exiccatus cardiacum est infigne Be Alexipharmacum, ventriculùm frigidum Be flatuoliim calefacit &c corroborat, flatus potenter difcutiens, humorefque crudDS ibidem aut in intefinis cpntentos concoquetis 5i digerens; maficatus h^itum oris emendat: ciborum concoftionem promovet, 6cmekncholix cDnducit: in hypochondriacismorbis, ut in vaporibus, flatibus, palpitatione cordis, obftruaionibus 6c imbecillitate viferum plurimumcommenda-tur ab experientia. *Herman. Grube dz. Malo Citreoj p. ?6, ?7-* Pulverem corticisexterioris Limonum Be Aurantiorum ad eadem valere verifimile est. Saccharo conditus inter bellaria menfis fecundis infercur; Eleftuariis etiam cardiacis admifcetur adverfus comagionem Be affectus przdiftos. Q.^{Lim} etiam alvo laxandx conducit, in quern ufum ex eo paratur *Ehttuariurn dt Citro folutivurn* ad humores figido5 6c pituitofos evacuandos utile; tutb etiam ufurpari poteft cum bills phlegmati admifcetur.

Interior

Interior & alba pars corticispzñè infpida est, nec ullum habet in mdicina ufum; infervit tamen pro confectiõibus dulciariis, 6c apophoreris.

Caro feu pulpa interior aut fucco inde expreffis quamvis fucco Limonum minus acidus fit, vi tamen refrigerandi ei plLirimum antecellit, inquit Parkinsonus: in febribusardentibus &c pestilentialibus apprimè utilis est, ad veneniim refringendum, aestum contemp&randum, bilis effervercentiam & fanguinis orgafmum reprimendunij luim extinguendam, fpiritus recreandos, appetitlim acendum: aiunt 5c ebrietati reliftere &c vertigini conducere.

Semina cardiaca funt & alexipharmaca, adveisus jftus fcorpionum aliorumque animalium venentorum, necnonpeftis &c variolarum cpntagia cor''muniunt; ventriculi &c mteftinorum. vaines enecant, menfes provocant, abortum caufant, humidi ès crudos &c ieroiDs digerunt & exficcant tam interne in corpore, quim exernc in ukeribus humidis Be ichorofis.

Memorabilis inprimis est hiftona, quam Achen'o narravit civis quidam fuus cui iEgypti mandata fuerac adminiftrario. In maleficiD deprehenfos quofdam illead ferpencum morfiis damnarar. Produftisillis Scad theatrum euntibus deftinatum lanonum fupphcio in via forte caupona quaedam, nuieicordia CDmmDaj quod in manibus tum habebat Malum Citrium dedit. Accèptum verb illi comedenint; & paulò pofit ingentibus ac ferociffimis anguibus oblacij cDmmorsique ab AfpidibusnihillLrfi func: qui tandem cum illorum cuftodem militem interrogafflet, nunquid b'ibi/Tent aut ediffentj ut id comperit quod id acciderat, niniurum, abfque dolo Citrium illis traditum fui/le^ pyfridie aiteri rur/um dari iuffit akeri minime: per callus hie confectum perit, illfco altero qui Citrium comederat: indeque multis &L expertis cognicam est Citrium adverfari venenis omnibus.

Citriã innoxia &c quaii recens collecta procul mitci poffunt, fi arboreD mufco iingillatim involvantur ramulunim WEUis cera vel creca fuperlitis. Fzrrar. Hefperid. l.i. c. 19.

C A F. H.

De Mala Limonia. %j)t LIMONIA.

Malus Limonia Citriac feu Malo medicac congener efr.

Limonia nomen haud temere apud ullum probatum vel Gratum veJ Latinum rem invenias, videturque pofteriuris feculi efrinventum.

Differt a Citria Malofruftu minore, cortice tenuiore copiofiore pulpa, aaque acidiore.

Mains autem LimDnia niagno caudice cifurgir, [CircaJa^um Benacumin eamfeiattoJJit proceritatem in quam aliisinlocis Sahces &L Ulini Calzolar.] ramSfque habet tenuioresj loiiigos, firmisj longi5, virentibus (pinis armatDS, [lifque aliquantulum hamatis, mulcoque pluribus quam Citria, quo fit ut ejusvirga? quandam Rubi imaginem referant. Cord.-\ Folia per ambiruii nonnihiJ /errata, minora quam Citri^ conhniiicer foraminulena, denfa^ viridiaj ac glabra. Flos purpurafcens foris f J. B. purpureu5) quam Licrix paulo minor, alias non diflimilis. Formn Porno oblongs turbinata, rugoflj &c tuberculis inarqualis, fed minus quam Citria; color pallidior, magntudo minor: in eo etiam difert a Citric*, quod cortice pulpofo tenuiore^ miniifque carnofoj ficco uberiore donetur, eoquacacidiorej in interdum nihil fere nifi fuccum conrineat. Semèn non muJrum diQjmile amaricaf.

Hujus ctiam arbons phirima: ipeciesleu varietates habentur: Quatuor recenfet Cordus.

I. Primum anferini DVI formam ac magnitudinem habet, odors inter Citriam atque Arangiam Malum medio.

I. Secundum globofiim minufque prxdifto, utroque capite veluti eminentc umbilico infigne cetera fiii parte fruticoliim.

3. Tertium obloiiigum est Gallinarum ovi figura & magnitudine.

4. Qiiartum tertio a^quale est, led globo/uni, & fuperficie magis aequali.

C- Bauhinus inpinace novem confituit fpecies.

I. Malus Limonia acida, de qua didium.

II. MalusLimonia major dulcis: fruftu minbre ic oblongis Limis fimili Cluf.

III. Mai. Lim. folio/errato, fruftu oblongo cortice tenuiffimo, qua Liirtas primum gellUS Cuf.

IV. M. Lin^fruftu rociftido orbiculato. Limas alterum genus Cluf.

V. Limone5pra:gnante5, alium fruftum minorem infe continentes p^/.

VI. Limones variarum figurarum, toti fere carnei Cluf.

VII. Malus Limonia minor dulcis, Limonis genus in Hifpania, minimu fruftUj vix nucis magnitudine, otloie carterisprxftantiore, excelliore arbore.

VIII. Liiionum 5ylveftrium in 5yria provenicntium inque iEgypto Sc Africa meminit Scagher, pomis admodum exiguis acididimis.

Limwum d Ferrario & UommdmQ Jefcnptorum Catalogum fequentem D. Tancredo

Limonia d'ibitus. Liguficus, inTgniter variat, ut Limon S. Remi, Cerie/cus feu Citriformis, Genuofidij q'ia fruftu pan'o rocundo Fufilla Fila nominatur.

Limones Neapolitan multum variant, utLimm Eajvtanus figura ultra vulgarem modum ovata, at cacumi falgitata: Limon AmalyhitamufamvL oblonga, apice admodum eminence: LimonP* r'p'la

LtmIn rJmmHm^lo vè^ Rivoj infigniter cupidatus, nonnunquam digicatus. y^grandis Doniina: Laura.

Limon Imperiq^TM & rotundam ovata vulgaris Italicus, vel Olyffipponenfis, « folijs Sc ficutto fup'le di

Limonia Pyri effigie, vulgo *Pcetta fwz Spatafora*, ifque major & minor, lvis vel friatus. *Term** wnfimilis *Limonia*, fed oblongior Be anguftior.
Limonia Spatafor a-Rhegnus, craflb mucrone faitigiatus, Aromaticus, cortice punftimlacunofa.
Limonia Rhigmus fruflu racemofa oblonga, paulatim extenuat³ in apicem cuppidatum.
Limonia finatus five *uanaliculatus*, fumnia parti muliebrem in papillam extuberante.
Limonia friatm Awalphantis, Mali Citrii magnitudine, cortice perquam verrucolb Be fcabro.
Limonia Sbardmius fubrotundus, manens floris apicalo Velut rofratus.
Limonia Rvfolinus, umbone retortum in mucronem emifo bene faitigiatus.
Limonia Florentines Barbadorus, foliij ferratis, viridi atre piftis, Be Hypcrici irtodo punftim per-
 tufis Be tranflucidis.
Limonia Scabiofnus Lepra facie.
Limonia varii Citrati, laeves Be fcabri Be alios Limones fepe includentes.
Limonia Vftudo-citratus, *Barberinorum*.
Limonia atratus Jylvefiris.
Limonia globofus Ponz, inui, ifque quintuplex, Ligufticus, Rubens, Komanus[^] Chalcedonicus^{Sj} Tri^{*}
 politaniis.
Limonia fpongimus Calabriz rugofiiS-
Limonia fyoynus (fpongiolus) Liguris verrucoitis:
 Lima eft multiplex, dulcis, acris, agri Privernatis Romana, citrata-
 Lima Citrata oblonga, fcabiola *Sc monilrofa*[^] quandoque Be fibrotunda.
 Lima fubrotunda fpinis craflitie & longitudine valti Qimis Piorum in hortis Romr.
 Gaudent Limones codem coelo calido, cura ac cultu quo Citria. Ad nos defemntur ex Hiipania *Locus*.
 & Italia, in i^{uas} regiones ex Media & Peria primu inveda, nee enim ponte i^{bi} proveiifunt-
 Limonia cum guitu reliquis omnibus [Aurantio 6c Citrio] fint acidiora, ideo ficco frigidiora *Vires* (3
 eTe probabile eft. Valent ad efclem ufus ad qux, Citria; ad venena tamen minus efficacia, id *Vjus*.
 ad arftuant-smurbos potentiora habentur. Ec hxc quidam comedunt, non integra[^] (ut Jo. Bauhi-
 nu⁵ ait) fed cortice denudata &c in laminas concila[^] aperfo multu Saccharo, quoftodo mag-
 nam cum palatu gratiam ineunt, fitim potenter reflinguunt Be febrilm ardorem compefcint.
 Succu Limonium iunt admodum efficaces in difTolvendis calculis Be detergendis partibus. *Herman*.
Grvbe dt Limonia. p. ID. Idem fcnb^{it} *Craty*, aliquej ut *M. Blegny in Zodiac*. *Mzd. Gallico An. x.*
 p. 117-
 Syrupus de fucco Limonium magni fit ad calculum Be obftuptionem renum; iterti ad fitim Be
 aeftum in febribus ardentibus: cordi &c yentriculo robur addit, Be bilis effervefcientiam compefcit:
 ideoque haud infeliciter imbecillitates, lipothymias[^] flu[^]uationes[^] vomitus fiefingultus fp^{ri}bibus arden-
 tibus fipervenire folitos curat.
 Cortices Limonium non minus quam Aurantiorum Saccharo condiuntur pro bellariis, 5c ad *CoC-*
 dsin ufui valenc. Candiuntur Be parva incegra ad varios ulus.
 Aqua e Limonium, ut Be Citriorum licco defillata cofnieticum infigne habetur.
 Suc:o Limonium fcibuntur liters occultis, quifigni admotz manifeltantur. Eorum acido facco
 tam elegantem purpureum colorem conferva: R) farum, aut etiam Violarum aliorumq^{us} muhorum
 conciliabi⁵, ut nihil fupra. Ninc Be tinftoribus utilis eft ad colores multos tranfinutandos aut fi-
 gendos, qui magnani e^{us} quantitatem iniument.
 Ad nephriticis affectus R Ligni querc. derafi 5 j. aq. font, ft vj. fucci Limonium[^] iij: In-
 fund. omnia per xlii Dras fupra cineres calidos, pollea coq. ad tertia: partis conliimptionem: coletur[^]
 Dolis 5 vj. valde prodeft calidz jecoris intemperiei, ulceribus renum, ardori urinis, led prscipue
 pituitam fallam Be vicidam e renibus Be vefica evacuat- d[^]liir. 5e frangur. caufam. Poteft ex hoc
 decofto vinum dilui. Mihi communicatum k patre religiofo- *Ubefneau*. Excerptit D. E. *Hulft*.

l. MalNarzgam * H. M. *Malm Limonia pumila pylvestris Zzilanic* fruflu monopyrenv* D. * P. 4. T. 12-
 HermannL ^{pl-1-}

H.M.

Mediae eft magnitudinis, cortice glabro, uinereoj colons lapgrifque aromatici Be acris obdufla,
 ligno albicante, denfo, praeduro, arftillime unito; ramis foliaceis e caudice erumpentibus[^] fpinis ri-
 gidis, e fufca flavescencibus obfifis. *Radix* albicans, fubrubro cortice teftaj ot[^]pris aromatici, laporis
 am a Il. *Folia* juxta fpinas circa ramulos proveniunt, oblongo-rDtunda, acuminata, denfa, glabra,
 cum forma, mm colors, odore, Be Japore Limonium pufillorum foliis haud abfifilia. *Florts* plures
 fimul junfti extremis furculis iithxrent[^] exigui, candidi, odorati, quatuor oblongo-rotundis, acumi-
 natis³ craflis ac mollibus foholis confiantes, *faminulis* multis, calycis in modum junftis,
 medium occupantibus j int^r *quxftylts* prode craflus, albicans, fuperius planus ac rubescens. *Flo-*
 culls fiiccedunt/r^effw ovals, turn figura, turn magmtudine olivis haud abfifiles, at in vertice exi-
 gua fpioula dotaci, Colore primu viridi, in maturitate verò aureo feu cicrino, uti Limonia: cortices
 anibiuntur tenui, guftu amaro, atque in mediis fruaibus cavitas quada^m eft, CICCDD acetofa ac fuba-
 niario, fiis membranulis contento plena; cui inclufus eft nucleus oblongo-rotundus, acuminatus, al-
 bicans, ruffa obdufti⁵ pellicula, odore fapor[^]que Limonium[^]folia referens.

Nafciturlocis arenofis acmontanis ubique in Malabar. •Floret plerunque Junio, Julio, Augufto *Lucw f\$*
 Sc Septembri menfibus, atque dein matures profert fruflus. *Tempus**

Decoftain oleohujus arbons fbilia, ac capiti applicata cephakam tollunt; corund[§]nque fuccus *Vir**m*
 prxftans habetur errhinum capiti purgando, Expreflus e fruflibus endsmiae illi cachexise *(pitao)*
 medetur. E Toka deniq, radice pilula; formantur antipafmodic[^].

HicfruflbquamYis in reliquis cum Limomo convenit, in eo tamen differt quod monopyrwios
 fit.

5. Mains Limonia Indica frulfa pu/illo* Tsjerou-Katou-Naregam H- M. P-4- T. 14,

Arbufcula eft humilis, ad fex, feptemve circiter pedum alcitudinem aflurgens, caudice tenui, ramulis/pino/is, cinereo cortice obduftis donato. Lignum flavescens, przdurum/inodorum, ijilipdum. Radix fibrata, flavescens, faporis amarij odons ammatici. fylia oblongo-rotunda, in arwtu leviter crenata, odorata, aroniacica, peciolis alatis leu foliofis circa ramulos geminata proveniunt, duobui Viz. tribiive panbus, cum fimplici plerunque folio in ex&remitare, adeo ut petiole* facile quis folia judicaret, Be tria extrema folia fimuljunfta vulgare prafcnfe trifolium non nialereparient. Thru brevibus peciolis ad fpinarum exortum inramulis piDveniunt, & calyci vindi, in quinqueJaci-fias acuminatas fetfo infidene, candidi, fuavc-olentes, amari, quincq Dblongo-tLTetibus, K in orbem expanlisfoliolisprzdic^fepcem, oftovein medio albicanlibus ac laj^iginofis/^w/Waf, Havelcentibus apKibvs docans przdici^ inter qu* stylus emergit, icidem albicans, capirulo flavefcente. FruSus pu-iilli Limones font, roeundi, magnitudine uvarum zmuli, vinides primum albis interftintfipunttulis, dcin aurei feu citrini: cortice arnbiuntur Limonum cortici haud abfimili, arque in mediis fruftu* caviGas quxdam eft fucco acetDJo, fubamaro ac aromatico, luis membranulis. contenro plena, can immixta funt tria oblongo-rotunda, acuminacaj Sc exalbo flavefcentia [tmina, membranacejs pelliculis a tb invicem diftinfta.

Linn.

Vim,

Provenit loos moncanis ubiquein Malabar, prafertim circa Candenate, fttnp&rgu?flw^{ec} ~~et fru-~~ ftusfejt. rd ^{es} . Hujus folia prsfentaneum habentur curand-r Epilepfia remedium. Radix alvum movet, lu D^r expliciCj necnon'cruciatibu5 colicis ac cardialgn medecur. Fructus fie can ftomachum TO ~~bcj*~~ ~~du*~~ ac alim?ntorum in eo la:lam fermencanem relticuuncj adhzc aeri ex vanolis feb'nb ^{u, ^ u e t m a n s} & peftiientibus contagiolo pocsncerrelilunr, acque vanis venenis prjrltamiffimum cenJe ^{ntuc a r-} dotuini.

4- Mains Lirnom* Indica, floribus umb*Uatis> fruElu parvv. Moul-Ila, Im Mwl-F.Uvm^mIA. M*

Arbor eft medixmagnitudinis, quindacim circiterpedesalca, caudict cralTo,ramulifq, geniculatis,in orbem longè lacèq, diffiills ornato, qui corcice viridi-fufco laporis liibacris Bearomaciaci cinfti, Kera'- fe9 duris, ngidis acurifq, (pinis in Riper muniti Junt. Radix rufefcenSj aromanca^ liibaftingens. Fob* in ramis viridibus, rpcundis, bina oppofita, oblongo-roninda, acuminaca, molliaj fnerne acro-viridia, Infcrnelübviidia/iplendeniia: Nervis aliquot è media cofta albicante, acin averfa parce extube-rantBj in lacera excurrentibus: fapor/ubacns. Flofculi in umbellas expanli extremis ramulis name-rofi proveniunt, nuatuor oblongo-rotundisj' fubviridibus acuniforrribus foliolis confiantes, totidein ftaminulx viridi-albificantibus, fl^vefcentibus apiuilm ornatisj medium occupanubus; inter quæ fyb* prodlit exiguus, vindis. Flofculis liicedunt Fruit us rotundi, cornc cincti viridifufco, craldj, inx-quali, odore corcicum Cun, lapore quoque, at acnore & ardente, pulpaque incus referti iuculema acida. Qiiam ob caulam cibus incoquuncur Limorftim & L Pipen's loco. Hinc & L Saccharo vcl nielli Cundiumuf, Bt comeduntLir ad ventnculum roborandum, coftioneni piDinovecndani & vermes r15-candos- InJuper munâ Be aceco condiuntur in Atsjaar additis viz. AUis, Sinapi, BIZinzibere.

Pars U
Uju,

Linn.

Provenit in Falattanjirri, ubi in horns' ftudiose colitur. Semper viret, floret, fniftiunq ferr.

tAF. HL

De Mala Aurantia. ~~Ch~~ ~~Staur~~.

J.B.

PAjadiforum noftri feculi, ubi id folum Be cuelum concedit; delici^ funt Medicoruin malonim Ipeciesaternz frondis viror^ Be frutauumuberequovis temporeproventu K luxurie, aluspnm- m c Honbus sliittantibus, aliis adolefcencibus, aiis maruris, atq, his quJrlcm fimul pnnibus plcrunq, p)4centB5. Notiflima yeroreliquifq, vulgaciora lunt Aurancia dida^, quibus aurcusille Scru- ulus coriicisfulgornomen dediifepotuic. Hie aliis magis orbiculata^nonnihl comprefla, parum ru- gofo & c foraminulenro luteo corticejnterius tamen albicante non mukum fpiffo (foeminas Vacant^ vcl crailo [mares didicanc^ amariflmo 6c evidiinter calido figuntur,' quar tamen ante niaturitatem vindis tegit cortex. Sapor iico pro imruritatiprogreffLi aut generis varjetat acidus, dulcis ac me- diuSj feminibus arqualibusj multa medulla fardlis, amaris. Folio peculiaris forma, femper virentij, & C Hypenciinfarinnnirispjopenioduni forañinulispervio^ quippe quod gemellum videripofli^major Laureo, acuminato, nee crenaco, alio ceu corculo iibjedto. F/w, uc K fruftusj fragrantis odoris [q^l* Conio cicumic virus nonnihl redolerti viderur 3 colons candid^ ftaminulis multfs medium ^WT dentibus^ pulchrior quàm in Citro, be odoratior, intus fubciennus, per orain verò limbi purpura/c^{am} ^{le}s- Arbori, qua: mulcò major quàm C^ri, cortex viridis^ (pina: rigidx fed rara:

Aurantiam ab auri pertus colorè fiftum puto quàm ad @UUQQ Gallic oppido, vel ab Arantia Achān urbc. Aurantix enim nDinē prifus incDgnicum, non-ante in ufum venit quàm A ^{lirantJUin}

^opp^{um} dli ^{ec} Kllm cff^s
i. Buki
iōim Pti T *? -alu m Aurantium potius quim Citrium diftum, Theophrasti Sc Plinii Malum Mo-
U C A T M S i n n u i m u O fulpicator; quod Auftores hi MaluniMedicum non c ^{omdi di-}
n n l j i Au. amid V G d n i f e f t. U * * * Mito Dmto minimj quod totum manditur. ^{Veruro}
Pace rlet ^u S T A n n u m d r t i c x e p t o r c u l d n t n m d t. & vulgē enmeditur pro ^{libo, &}
Pulpa enim ImJoy Auramil HHIlo PAh^{lol} c^l m i n u (qu5 acid ^{a quām} vs!

vel Citrii vel Limonii: Be IDS in Italia 6c Sicilia obieiyavimus rufficos & nautas Aurantia mala cum pane prorefeftions comedentes, nunquam vero vel Linioña, vel Ciena. Dantur etiam mala Au* rantia dulcia quæ mandî ipse nDii negat. Eft mluper in Europam nuper inveftum Au* rantii quod dam genus, efculentum, Chineafe dictum, faporis delicatiffimi, cujus etiam cortex una cum earns comeditur. Quocirca quod Domitianus Matianum malum fuper crenam limppfit, non Dbitat quo minus Malum Aurantium hodiernum vel Ceftianunij vel Matianum Plinii fuerit/

Requirir idem, utScaliger vel alms aliquis iubilitatis profeflor relpondeat fine cunftatione alteri argumento quo idem probare nititur. Aurantia f inquit) exficcata vel in multos annos odorem limm retinent, ideoque vellibus interponi ad odorem communicandum 8c arcenda noxia aptiffima effe. Citria verb etfi exficcantur quoque, flint tamen evanida, adeoque nec odore nee ufu commendabilia.

Aurantiprum plures ippecies feu potius varietates effe nec pauciores quam Citriorum aut Limonum cunftat.

C. Bauhinus ilta genera proponit:

I. Malus Arantia major- Cujus pluragsnera effe ait ab infitione prodeuntia: pleraque cortica amaroj cralloj aureo: alia fubvirente: alia cortice tenuiffimo^ fubruberentCj medulla dulci: aliqua & cortice dulci: aliqua in uno poma duo genera botrorumhabent: alia abfque feminibus: Sic Si pulpa: fapore differunt; nam aha acida, alia dulcia^ aliavinofaj five media funt.

II. Malus Arantia humilis.

III. Malus Arantia cortice dulci eduli; an Chinenfe?

IV. Mai. Arant. unico grano-

His addit Parkinfonus Malum Arantiam fylveftrem, quæ tamen in Europa non invenitur.

Ferrarius has habet varietates.

Aurantium ficciore medulla hybernum.

Aurantium femine carens, quod vel fubrotundum, vel ublongum Limonis effigie.

Aurantium geminum \$t criſpo folio & C flure duplici.

Aurantium ftellatum Be roſeum.

Aurantium virgatum 6c friatum.

Aurantium foemina five foetiferum.

Aurantium hermaphroditicum five corniculatum.

Aurantium calloſiim multiforme.

Aurantium Dlyſtipponenſe, Sinenſe noſtratibus & Belgis, quod è regno Sinarum Dlyſtipponem tranſveſtum fuerit. Circinſe eft rotunditatis, mediocreni fupra modum rumens. Caro cum Ipfâ cute confunditur, & editur jucundiffimi Novem ipicarum medulla bJandè mordacis dulcedinis tam vehementer flavescit, uc aurumin earn ditabuiffc credas. Corticis iniiper feu potius curieul^ glabritie Be feminum paucitate a reliquis generibus difmguitur. Adde quod in hoc genus fruſtu pulpam vituJamj cinoiâm, aut corruptam nondum vidcrimus.

Aurantium Indicum ex infulis Philippinis.

Aurantium dulci cortice Be Sinenſe.

Aurantium omnium maximum.

Malum Aurantium Lauri anguftis foliis:

Malum Aurantium umbilicum Rolz inſtar gerens; fruſtus quidam monſtroſus aut prxternaturalis effe videtur.

Malus Arantia hermaphroditica^ fruſtu medio Citrio, medioque Arantio,, odoratidimo Herman. Cat. infitionis ingenio produca videtur, applicacis ad fe mutuoMai. Ciena: &c AuranczTürçu^ pſv medium fecundum longitudinem fiſſis, aliocv aliquo artificio permiffis lbminibus; ad cindejn t&z modum quo Mulus Afino equam ineunts generatur.

Huju5 arboris defcriptionem vide apud D. Hermannum in Catalogo Horti Lugd. Bat. qui habet Malum Aurantium Indiuam fruſtu omhimit maxima Tuptlmwn diſtam mēdullā palleſcence 6c rufefcente/

Gaudent Aurantia iilHem locis ac regionibus quibus Mala Medica, ubi paſſim abundant in hor- *Locus.* tis Sc viridariis^ maritimis praefertim traditibusj uc in Liguria circa Genuân?, & in infulis Stoechadibus *Ukru* diſtis propè Dibiam Gallo-proyincix, ubi adſo familiarem effe Aurantiam ſcribit Lobe- lius, utſemper virentium lucDrum amcenitate& Pomorum f^ura pei^ni neutiquam inquilinTvideatur. Nos in inlula Melita in Magni Magiftri viridario arbores fatis grandes & procebs vidimus malis rtiajoribu5 zquales. Abull-teBCiatil in Sicilia & Italia, nee rptus in Hiſpania. Hiſpa- lenſia apiid nos in maximo pretio fiint .:Peregrinac tamcnſtint hæ arhores in Europa & aliunde initio advea^quemadmpdum Citriſe Be Limonia^ nimirum ex Afia. Aurga Heſperidum mala non- nullis creduntur, quz yerifimilius Cydortia fuercj ut^alibi diximus.

Flores mali Aurantia odoris gratia in pfaetipuo hbnore funt: decerpri x^iam per maria in bn- I^{f^J} E^J ginquas regiones peiferuncur, Be aqua quoqtia'fra^rantiffimi udoris ex iis paratur arc ddhllcitoria ^{UJm} quam *Napham* Vocant: non tantum ad delicias, led contra peſte.ni Sc morbos CDiitagiolbs utilerf, K cordi amicom, qua; Be ſiidores movet, Hiſpani partijrientibus in difficili partu propinant cum pauxillo aquæ Pulegii.

Cortex amarior eft ac proinde calidior Citri corticej faccharo "conditus verminantibus pueris utilis futurus ni amarorem reſpuerent. Per aliquot dies aqua infuſus amarorem deponic & edulis evadit, deinde conditus laccharo non tantum menſis fecundis inter dtlicatiffima bellaria inFertur, 'ed Be medicum uſum habet, in corde Sc ventriculo roborando, inque iis affectibus quibus Citri* conducunt. Modum condiendi cortices Arantiorum Bt Ilimbnum vide apud J. Bauhin.

Pulpa interior feu fuccus mitiDr eft minivque acidus quim Citriorum Be Limonum fuccus, fn- gidus tamen & guſtui gratus, Be ad appetitum -excitandum utliſj- ut^ Be ad ficim extinguedam in febribus. Nos certè in ſſbrili ardore magnum inde folatium multoties ſenſimus.

Mala

"-Mala Aurantia scorbuto fanando efficacissima eile perhibentur, ut quidam etiam fblo effi em-
dorum diuturno percurentur.

Malum Aurantium Hilpalenfe integrum cum cortice 6c carne comeftum ante acceffum fbris
intermittentis, praefertim tertiana?, perfarpe paroxyfimum avertit. Be febrem ipfam profligat.

Oleum e corticibus expreflum igne pine qualitacis effe comperti fumus (inquit J. Bauhinus;
quod facile patebit ei qui corticem recentem juxta candslam praeflerit, ut exiliant guttulas infar ro-
115, videbit ftrepicum Be fcintillulas flammeas excitari ac fi pulverem lilphureum in flammam in-
jeciflet. Sunt qui exiftimenc eodem modo expreflbs cortices in oculos clarificare vifum.

E tenellis deciduifque Aurantiis fiunc gbbuli ad moniliaj 6c ad preculas numerandasj odore Jua
commendabile5.

Semina verminantibus puens utihter dantur. Ex lemne terra commiflo arbufcula: pmo anno
prodeuntj. quae in acetarii modum comeftz, admodum palato fiunt gratz, ventriculum iniiiper cor-
roborant Be appetum excitant, autore Dodonaro.

Ad lumbricos, H- Malum aureum, perforetur, & digitis comprimat, ut fuccus exprimat. Deinde oleo Lini Be fucco Abfinthii Rutzque paribus portionibus impleatur pauco Theriacar Be ta-
ring Lupinorum addito, panimque bulliant. Hoc linimento pullus, tempora, nareSj ftornachi
6c umbilicus Jinantur, Be videbis mirabilem operationem. Ahxiu Hocremedium femper mnipla-
cuit inquit Chefheau. Habui aD.£ff»//f.

2. Aracynappil Malts Auranti parvis firnilu fruftus J- B. Malo Aurantio parvis fruft' & m ^
Its C. B.

His fructibus, quos binos videbat J. Bauhinus, fi non fiiiffet appenfa fchedula, cui erat ixici^ptum
ihh D. Paludani nomen AracynappilU, mihila aliud iudicaffet quam parva Mala Aurantia, ~~cras~~
cnim eodem modo Dibicularcs, rugoli 6c nigricances lapores eodeni.

3. Arbor ptegrina Aurantio Jimili fruttu Cluf J- B. C- B.

Palmaris erat hujus ramulus, quam vidit Clufius apudPaludanum, eNigrirarum regione ~~dlatu~~
miadran^ulus rugoJus, nodis dilUnAus fragilibus. Bini (emper ex adverfo huic rainulo innafcebantur
farculi, Juffincnc5 brevi craffiq; periolo fruftus, e calyce velut quatuor fquamis confantē prodeiu-
5j unciahs utplunnum magnitudes, orbiculatae forma:/ rugolbs, nigros infar Arantii parvi re-
iicacii: intus.plcnos fungofa quadam pulpa fculi commixta parva quzdam grana, pacna ut in Fic
bus) adftingenus initio Japons. Nulla porro in co ramub foliorum veftigia^apparebant, ut dubira-
npoiTcc, An hac arbor ex illarum fie numero, qui pedicub five ramulo *uM« luos flores Krru-
fius proferunc, uc Aromatici Caryopl>ylli. Grana Ficuum limiliahujus fruftus pulpar admafra, ar-
borcm ad Ficis potius perrinere arguunt quam ad Auranuas.

CAP. IV.

Adami C. B. towa Adami JB- Malm AJJyria <vd Foma Adami Park.

Proxima Aurantiis fiunc Poma Adami mincupata, fi fruftum fpeftes, orbiculatum ilium qui-
dem Be aureum xquabili Auranciorum fiiperficie., fedmultis numeris majoremj 8c nonnun-
quam ad umbilicum veluti ambclium, colore magis fulvo quam Aurantia, Be odore ignav-
fcarne Citri Jimili, fed gultu meliavi, multo inarim Juceu pragnante, lapone Aurantiis abfque
Atv:rofolium in Limonum aut Citronum familiam coarctae iubet, ut cui nulla fubjecta poma
nam pon quibus pertinetur unibus conueniens fiunt, veluti 8c Jpns virorque peronacis fue foli-
fity Citri.

Pomum Adami diftum volunt^ quod in fuperficie ceuinfixorum dentium veftigia habere videatur,
quafiab Adamo pnnio homine commorfum fuiffet.

Eju/dem originis eft cu"l rchquis congeneribus Be in eifdem locis colitur, us tamen minus obvia,
necita palTim noca.

VSreij

Viribus cum malo Citro convenit: peculiariter autem ad Jcabiem valere creditur, ii per medium
iedtum, Be cenuiffimo Sulphuns flore aJperium, deinde cinsre fervenci calhfaftum corpori fcabio»
affuceiir. DaUcbamp.

Norat Clufiusluccum hujus fruftus ut Be Mali Aurantia: brevibus folliculis comprehendi, cum i^l
reliquis generibus folliculi feuveficula: fuccum continentes oblongiufcula: fiint,

CscerumPojni Adami feu Para dill, Lumiadifta, varia: recententur Be de/cribuntur f. fi"
mirum

Pom um Para diffruftu obi ongo-

Pomum Adami fubrotundius, idque vel Rheginumj Nsapolitanum, Romanum, vel firtuin ftrc
all a poma includens.

Lumia five Pomum Adami Spataforum nothum.

Lumia five Malum Aflyrium Ollulo: p f t u.

Lumia fupis m f d u.

De hinc, terra fimo, ytidnc, inliuDiB, propagatione, trafflacione, collDcacione^fctrcDracione, nr
gatione, injunio celestibus, morbu, renedilis 8c ulibus Malorum Citriarum, Limmium 6c Aui'US»
um prolixo agi Ferracius ftrc fci Benupcniiui Commelinus, quos cDiillilatLeftw.

plea

Olea expreffa Be defillata ex harum feminibus, fpiribus Be corticibus, prarcipui ufus funt in Media- Vires.
nics Be Pharmacia. Succus e medulla expreffus iuvant in febrilibus, fcorbucis Be calgulis affectibus.
Cortices ficcati Sc pulverifati in affectibus ftomachicis Be flatulentis (prarfertim in frigida intemperie)
commendantur.

Turgx populique DFientales varias condituras ex hike preparant, & luum Sherbet ex horum fuc-
cis Be Saccharo componunt.

C A P. V.

I. Carcapuli Park. J. B. C.B. fruttu mah aureo nemulo. Coddampulli H, M- P; I. F. 14. p. 41.

ARbor eft procera, denfis Sc opacis frondibus, latè fpaxfis. R« & craffa brachia feu ramos
fubtus ac fupra terram late diffundens, cortice albicante flavo, crufta nigricante obduftoj
ligno albicante Bcfubflavo: incifa pervifcolium hurrionemj qui faporis eft nullius, exliidat.
Caudex quantum duo homines amplefti poffunt : corcice eodem quo radix, ligno albicante. Folia
conjugatimbina furculis adnafcuntur, petiolis brevibus, oblongo-rotundaj in medio Jatoria, ad utramq,
xtremitatein fenfim concraftioraj culpide vertus unam partem nonnihil inflexa, textura craffa,
fpiffa ac folida, fupernè obfeuro virore nitentia, infernè diJutiora, veriulis à media cofta oblquè
liirliim tendentibus infernè apparentibus, Be nullis praeterea confpicuis; iapore acido. Flores in Jtū-
mis furculis breviffimis infidenc pediculis, incarnati Be flavefcetes, quatuor petalis rotundis^ parum
oblongis Sc concavis, craffis Be denfis fine venjs.

In medio florum emicac globulus viridis, fudimentum fructus^ in ofta latera oblonga per ftrias di-
ft in ft us, in vercice capiculo feu umbilico, quod ex gemmis albicancibus conftat, donatus, quem
circumftant?^?/wff furreLa albicanca, apices flavo-rubros iuftinentia. Flores autem odoris iint
nullius Befaporis lubacidi. Calix quatuor pallidis concavis foliis conflata. Fruffus uncialibus peciolis
appenfi, grandes fune, rotund^ ofta, novem, decemve coftis extuberantes, capitulo in vertice paN
Vo, quod etiam coftuliftriatum eft, primū virides, deinde flavefcetes, cum maturi albefehtes,
iapore acidD-dulci. In mediD pulps[zmina, oblonga, magnitudine unius articuli, cOmpreffa, co-
lore ctEruleo-nigro."

Frufus Acoftae Mali aurei cui egrtex exemptus eft, magnitudine Be forma, ex grurnis pariter
confans, fed non in illo feparabilibus, tenui levique 3e iplendehti corcice ceftus-

Siccus ex Malabar in alias provincias defertur.

Eo ucunur in cibis, magnaue apud in colas illius eft laus in curationibis, fed infer omnes qux ex- rr- /-
perientia CDtprobaca: fune eminentprofluvii albi cujufcunt^ generis conftrictio, in iis praefertim iij-
mio Veneris ufui hoc malum concraxerunt. Edicunt vero aut ipfe fructus maturus, auc ejufuccus
cum oxygala fiimitur aut illius exficcati pulvis: cum oxygala autem mixtus Be cofta oryza mirificè
appetitum dejestum revocat. Utilis etiam eft ejufuccus Sc exficcati pulvis in oculorutn caliginibus
& fuffufionibus. Familiaris eft fructus pulvis obftetricibus, puerperis enim exhiber? folent ad psllen-
das fecundas, Be ad purgationes atquelactis ubertatem prxftandam, turn etiam ad farilitanduiTi par-
tum magna^ ut aiunt, efficacia.

Carcapuli Linfchotani, quem C. Bauhinus cum prxcclznti wnjungit. Carcapuli Je Brym

Hu)U5 fructus aliquot intus continet lapillos: guftu eft admodum auftero, magnitudine Cerafi,
ipfa ftiam arbor Cerafo noftro fimilis eft. Linfchot.

Dehocfriftu Be arbore in Annotacionibus D. Sytn ad H. M. hzc habentur, e D. Hermann* literis
ad ipfum datis- C. Bauhinus in piriace utramque arborem Carcapuli Acofta Be Carcapuli Linfcho-
tani (iib sadem fpiecieperperam comprehendit. DifFerunt enim inter fs flore ac Fructu, licet in reli-
quis conveniant. Prior fructu eft acido, filcato, aureo, mail magnitudinej altera frudlu dulci, ro-
cundo, Cerafi magnitudine. Prior Ghoraka Cingalenfibus (impliciter dieitur^ altera Karma Gboraka.
Ucraq, jrunmi Gotta fundit, Praefat autem illud quod ex Kanna Gboraka.

Conhindi autem non debet (inquit D. Syen) gummi Gotta hie defcriptum cum vulgari, qu^i ^h
EliilzIndicacaeEniplanta colligiteftaturB.ontius cap. 57. & ab Indis vocariLow^w tambodja, quod in
Cambodja, vicina regno Indis provincia frequenter proveniat-

C A P. VI.

Caniram *H.M. Malus Malabarica fruttu cortkofo amaricant, ftmine piano compreffb D- Syen, * P.I. F. 57.

t- *7.

ARbor eft procera, ramis denfis, late fpaxfis, nafcsns in areiiofis. Caudex ambitu amplsxum
duDrum hominum implet, feftque ut 8e rami majores^ cortice cinerfio nigricante aut
rubefcente. Surculi teneriores exviridi fafcifunt, nodofi, CDitice aniarO. Folia ex nodis^
H.M.
nec conuoluit, fupernè nonnihil nitentia, infernè ftrudo, fupernè valde amara. Praeter collatim foli
res, duftu arcuato antrorfum^ excurrerites. F/tirtj in iurculjsex nodis umbellatim^ in
parvi, quatuor, quinque, vel etiam fex petalorulri dilute virentium, curpidatorum Be craffiw^
Bbbbbbb cum

cum pedunculo craiib, parvo, vii idi, calyci ar#o guinque foiorum aifptdatonim miidentes forma tx-ternanaua djffimilcs CaryophyNis, odoris debiJis, haud injucundi. Stamina quatuor vel quinqae txxayieibm loneis vjiiii-dilutis e mcidio emicant, inter quz fjlus viridi-dilutus fupra'apices eminens, qiii e globulo vjruii prodit. Flores cum in gemmis promicanr, omnibus foliis vctuftis arbor eft fpo-jiata, accum gemmis fionim iimui tciieila foliola velut novagerminaprorumpereconibidantur. fr*-tins, qui folitat ii, vel ettam duo, tres, quacuor, plareTve fimul furculis petiolis curtis adnet&mtur, ro-tunda mala fiat, glabra, abfouc rags, ccJore aureo-flavo, came per macuntatem Candida & nWK^f noia, corrice craffiufculo & fragili, fiintqucfaporisvaWeamari. Semina, qua; intra carnem fradus conlicafunr, forma rottmdiolaptanaac compreflkj cum pknis fins liipcrficiebus jacentia in Jongitu-dinefru^hiSj coiticc extenon per maturnatem initar vebai viridi, fiintquepulpa valde anura.

Tota arborobamarindinem Celebris eft.

Flores fot tempore feptiro, pJuvjofa fraStm.

Tempus. Viru.

RaJtx vel in decoAo ve! in infufo propinata cathartica eft, prod&lq, febris pituitolis, doloribiB colicisj inteftinorum torminibus, ventris fluxjbus. Condiicit in podagra fi cum ejus decofto P¹? afe at Foveamr; in vertigine inque atrabilisj (i ejus decodum cum lafte vacae mixtum ad dei-butionem capitis adhibeattir. Cortex contricus 6E mixtis cum aqua in qua fiit Oryza riava; bib n^m sum reprimt. Succusej foiiisexpreflus ac in decociodatusctpirisdoJores ledatj Jargiusepotus vene-ni vireshabet, mortem inducens, mftercorchominiscomefto Jalusct.

Uriisfeminumin fmAibusper duos amios continuaius, (iirapto fingulis diebusuno autduotrasm-mero, efficit ac morius vcnenatus Colubri, vulgo Cobra Cafella di&i, nullas noxas adferat: /* &***

CAP. VII

Laursfma Javtotnfit C B. Mtngofiam Garcix J. B. Bont. l. 6. c. 17.

Phiu est arbor (mquiGaraas) Mala vulgarj finis, fiufukumh fa [jjj] /**« Laurim majora & l«IOM oSe feribk ampliflimorum foJiorum

/**« Laurims majora & l.«IOM oSe feribk, ampliflimorum foJiorum Mali formam n»s» fercntia fee auc feptem craffioribus vents ex utroque ncrvj medu Jatcre proeocB* , intwturfenribus creberrimis iubcLftTiniilijue venulis, at qua parte atnra erajt rⁿ mis file contexto j-etc conftare vitterentur, {apore acriufonla. Qiixdam porro toJia; lⁿ tiorj quinque, ant fexuncjarurt Jongitudinem habebant, trium latitudinem, ant amp^l . ^ pro fotiorum magnmidinc, ciqqcinaraStunon dentata aut crenati.J Bontius folia ^{ous}..?_j(fe w & trunewn & ramos, niii quod fpinoli non fint, Mad Citrci arborem a-mulari ait, & a[^] . ^ diftjngtrreencur, qoa in ^/^o/<w foiiis nallus eft, proculdubio afpectum falkrent, ^ onincs Index fructus longL- (ApiJiilimus eft. Cortice refl-rt plani J^Ialum Granatum iEU wu. ^ c<xk'mque mode aftrmgit turn paulo majore amarore. In bah iea inienare pane ^{tmislr} ^ caudatn tribus vel qiutuor oua/ feparflfi corticibus, Kfflutforibus, ut Ill Rofi v^re eft. In tirtTino coronan, gefScm" i » t raa=os h*b« «* nuclei in ajwr«, M^ngoftano, came nivisinfar « S i m S r i s » a^{klua} » ^{do f x} al»quando otto, pro radiorum indubitaco jntys occladuntur. ^ n i r

Linn.

In Java inliil* circa &mt&* emporium nafatur.

CAP. VIU.

Tapa Brasilia [iht] Marcgrav. Pifon. Femifira trfili* Brafdunfii frutfm cortkofo *»&"

Martfira-v.

ARbor ha-c in fr^K^l anⁱ ^t icreus' akitudmem aflurgit, cortice vat, cmero, ac mukos ramos: fr^l au^{em} j nⁱ iuoijbs: pdicuoio tna, Jibi oppoita, laivia, fpiender faturatitSj interne diftuse virentiaj quatuor autiei digitK longa- In n^o, rum 10, ?o» arlt p^{ures} pediculi fiint Ceraiini, in. quibus iingulis fiaf confans quatuor fa*. liolisalbiSj d^jnun Jon^is; quodiibet habet fiium periolum, digimm rere longtinij figur.i fere ven** buli & nerviim fecundum longitutiineni, ac venulas obliquas vnefcntes, ut folia alicujus arfw* SiOOa h&* alternatim polita quatuor foKola brevia, virejcentia: inter omnts iiac ehafcuntur/"" oimrJU multa, (ubruffi, circiter jefquidigitum longa: in medio denique horum erump^t pedicuJ^{is} duos aut (ciquidigirum longus. Frutium fert rotundum, magnitudine mediocris pomi[?] qui qu^l?. aiaturtut ii.n uiftar Aurantii, ac corticem illi a-qualem habens; interius autem plenus eft <P^{ms} duni/niagnitudinc/eminum Ceraibrumj oblongis, flavis & nucleumcontinemibus album; an lapides .ly^iii eft pd^a albai molliSj dulcis /apons ac nauftabundi odorjs, Edulis d^{fructus} . Lignwn bujui.um)iiiifiagile, medulla alba, Sambucma.

Fau.

Folia hujus arboris contra excellentiffimum lunt remedium contra malum hic perfamilare, quod vocant Buchu de cu li exterius applicentur; tedarumque inftar ano indantur: omnes denique favores pofitum fua caliditate, dolorefque mitigant. Prater haec auribus indita refi-tunt dolor

=* capita ex oalore na tot. lotis m^l «P«nii«ur Ipecics: Ptoris lignum judicatur dariffimum, omniurr: que in his p**»P»»p»i putricinis quifi expersonuu coriptioni retiftir, acproi-tunu Arbor lubctur mfrugifera.

Altera

Alterà [Pifoni cognita] foliò eft gUbro, rriagno, unD *nemo* L efto Be rarioribus venis obliqui pradito. Fructum fert Aurantio malo majorem, cortice craffo, dura, fulvo, cinereifque maculis variegato, quo melleus quidam liquor continetur, dulcedine fia certans cum Saccharo cui nuclei multi funt permixti, qui exiccato liquore Pomi ftrepitum edunt ut capita Papaverum. PrDpeftoris mDrbis in ufu habetur.

Vireti

CAP. IX.

Karin-kara H.M. P.4. 7!i;. p. 49. *Mains* Indica, pomo corticofi Juglandipart, *mmopyrtm*.
H. M.

ARbor eft medibcris magnitudihis, caudice mediocriter craffo, candido; cortice furvo, fqa-brò, inodoro, ac amaro obduiao, necnon ramis viridibus in orbem diffuso donato. *Radix* rufa, albicante cortice tefta. *Folia* fine ordine brevibus, rotundiſ ac fuleads petioli? circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, denſi, glabra, fupernè atro virore fplendentia, fubtus viridi-flaveſcentia; cofta media albicat: fapor amarus ac auftrus. *Flores* albicantes, magnitudine *Paenoc* floribus, formã verò Geniftx aut Labwni fimiles/ aut in ramulorum extremis, aut è lateribus in tenui ligula dependent, atque calyci viridi, in quinque acuminata magnitudine inzqualia foliola fefto, inherent, quinque oblongo-teretibus, craffis, candidis, folio**lis* confiantes, fupremo reliquis multò majore, lato, furfum reflexo, at inferius aperto hiatu dchlicettte; è quo numerola prodsunt *flaminvla*, Candida, apicibus ornata: odor fuavis, fapor amarus. *Fructus* nucibus Juglandibus magnitudine fimiles, rotundi fiint, globofi, ac duabus protuberantiis ad verticem ftriati, viridi-flaveſcente cortice cinſti, càrnſque intus albicante, primùm denſa, dein molli, pultacea ac fubdulci refereti, intra quam nucleus locatur rotundus^ bifariam aut trifariam diviſiſ, fibviridis, ruſã pellicula teftuſ, fabarum fapore ſmulus.

Crelcic in locis fylveſtibus *Malabar*, perpetuò viretj non rarò bis in anno maturò fert fructus nienfibus, viz. Aprili 6c Oftobri: at non diu liiperfc3 manet.

Low

CAP. X.

I- *Pomifera Brafilienſes fruſtu tres nuceſ continent?*.

CDrtice eft grifeo feu fuſco, hinc indi ramos fuos direſtè projiciens. *Folia* habet in ramulis oppoficis oppoiita, ad tactum dura SC membranacea, longa, folida, foliis *Araticu ponhe* quodammodo familia. *Fructus* m^turus fl^yus, rotundus, Pomi magnitudine, cortice paris ferè cum Aurantio malo craffitiei, qui incifus facile ſeparatur: Continet duas aut tres Caſtaneas, ovaleſj magnas, uno-latere planas ubi invicem appofitc (iint: has pauca ambit caro, albicans, fa^poris a ens &c fubamaricantiſj qua: comeditur. Caſtans a non eft: edulis.

Arbor incifa lac crbeum de fe fundit.

Propè finum Aquapetida invenit Marcgravius, fruſtu maturo menſe Martio.

toewj

J. M. P.

x. *Pejuea five Pekia fecunda* Pifon. J. da LaBL

Folio eft glabro, magno, uno hervo recto Be rarioribus venis obliquis prardiro. Fructum fert Aurantio malo majorem, cortice craffo, duro, fulvo, cinereifque maculis variegato, quo melleus quidam liquor continetur; dulcedine ſua certans cum Saccharo, cui nuclei multi funt permixti, qui exiccato liquore Pomi ftrepitum edunt/ ut capita Papaverum. Ab orrinibiſ paſſim Barbaris peregrinantibuſ fruiliſ ob dulcedinem gratam. expetitus 5ft: Europzeis tancùm pro peftoris niorbis in ulu habitus.

CAP. XI.

Pomifera Brafilienſis fruſtu corticoſo ovali, monofyrzno. Pitoma Brafilienſibtiſ Marcgrav. .
Marna .

ARbor grandis eft Be ramoſa, cirtice gryſeo, coryli noſtratis cortici haud abſimili. *Folia* inſqualis magnitudinis, à tribus, ad oſto digitos longa, pediculis brevibus infidentj &c bina ſibi opponuntur, quemadmodtmi & L ramuli, hie illic tamen folium folitarium invenitur: iint autem oblonga, anteriùs acuminata, auris Afinina: figurã, fupernèlxtc viridiã ut *Caju* folia inferiùs paululum pallida. Ad foliorum exortum duo ramuli enaſcuntur oppofiti [interdum unicus] tres, quatuor vel quinque digitos longi, fpica: modo in totum numeroſis veſtiti *ſioſculis*^ quorum quilibet fuo infidet pediculo brevi^ parvulus, in quatuor crenas feftus, *ſiamina*. novem, Amidigitum bnga, erefta, crocei colons, *apicibus* tenuibus rubicundis, continet. Pediculus flons colons eft melini, flos ipe ejuſdem cum pauxillo rubro mixti. *Fructum* fert unumquemque fuo pedicub innitentem, elliptic^ figure umbilico autem inſtar punſti eminente: exterius colons eft obſeure flavefc^ntis, cortice carneo, folido quidem, fed fragih ferè, majoris craffitiei quam cortex eft Caſtanex, ſub quo latet pulpa, pauca, albicans, gelatins confiſtentia, ſaporis acidi gran K ad ſtringentiſ, qu. Ibonte a cortice craſto ſc ſeparat Be comeditur. Conunet denique in medio fui

Bbbbbbb z

nudeum

nucleum magnitudinis taftanea; elliptic* figure, cuticulâ teftum flavefcente; ipfe autem incaſnari eſt colons, pulpa albicante, Be facile in duas partes iquales diviſibilis; fapor eſt amaro K adfringente, minimè equè edulis.

CAP. XII.

Zumbulu-II. M P. f. F. 41. f. 75. N«* Malabaritaunttuofa flore cucullatò. D. Syen. An Adbatoda Zeylanenſium Herman? Append. H. L.

H. M.

ARbor eſt præcæra, ramis ex medio caudice in altum, minùs verò in latum diffuſiſj, naſceps in arenolis. Radix cortice albicante, craſſa, molli ac libamaro te&a, ligno albicante, n- bras longas emit tit. Caudex ambitu unius Lorn in is amplexum excedit, cortice craſſioloj ITIDIU, albicante obduſtus, iatus albicans, odiyern calcis zmulum fiindens. Rami nodulis diſtin^j cinerej ſiirculi tenenores virides. Folia long is &c craſſiolis pediculis nixa, conjugatim bina, alter- jio ordine c nodulis egrediuntir, Ipithamam Be duos trdlve infuper pollices longa, palmos duos Ja- ca, adpetiolium maxima latit^din^, indcque fenſim contraſta in cupidem oblongani deſcunt: I cum minora formac rotundioris funt 6c minùs oblonga) tomentofa larlugine obma, maxime in aver/3 parte, /uperne virorc fatuio 8c nonnihil nirente., /ubtus diluciora, lapore amaroj odore nul- Jo. Coſta 8c nervi foliorum in averſa folum parte eminent, ſic à margis reflexi arcuati multip- licibus duiabus in iz invicem in<urrunt; reliquam nervorum difcurſus per folia deſcriptumern vide. Flores in ſiimmis ſiirculis plures ſimul breviffimis pediculis proveniunt, flavij cuculprum ror- mi, laciniis quinque rotuniolis, craſſiolis, ^juarum una majufcula eſt & latior ac extens Jongius propendens, nuatuor reliqu* extrorſum reflexs, incifi, lupernè quàm parte inferion latiores, co- loris interius flavD clari, exteiùs, ubi tenuer pilofi lunt, flavo-fufci, odore nonnihil debih K nou injucundo. Stamina quatuor flavo-albicancia ac nonnihil inflexa verſus major5m laciniam, 274 btm grandiuſciilis ſubflavis dotata, ac inferion cuculli parte interius inlerta. Stylus flavo-albK 275 ſiipenus bifurcatus viriis capitulo, quod rudimentum fructus eſt, infider. Calyx brevibus in urf eſt cupidibus, ardtè flores indudens. Fructus, calycibus primùm in tocum ſie arftè excepti, 276 go-rocundi hint, parce liiperiori craſſiores, hincindè tuberculis exturgentes, carne intus ſiic 277 ta, flavà, libdulci be amara, cujus humor expreſſus unftuoſus flavo intenſo ac rubefcente color3 manus tingit, cortice cra(To, primum virides dein flavo-diluti, odoris quoque debilis non injiic 278 In medio continerur unum officulum, albicans, oblongum, durum, glabrum, pynformej ac acu- tis tuberculis hinc indè emin^ns, parum nuclei in fe continens.

Bis in anno fert flores.

Pura.

Radix in decoſto data addito pauxillo *Oryzx* prodeſt in fpbre ſymptomatica comitante arthri- tin. Eadem data in laſte addo vel in oleo *Sirbelim* proficua eſt in ſladbus Be dolore thoracis. Euf- dem cortex concntus 5c in aqua decoctus jivat Si, febre frütida; per coſtionem in pulvrem 279 da ft us fervit in podagra, faft^ perunſtione partis affe^tz. Li laſts acido datus inteſtinorum 280 dat tormina, ad quod etiam confert fucus foliorum epotus.

Locus.

Hanc plantam obſervavit D. *Tancredm Robinſon* ſimul cum aliis novis & rariffimis plantis calden ab ingemofflimo Hortulano *D. Georgio London* in Horto Reverendiſſimi Epifcopi Londin 281 D. H. *Compton* Prziilil nunquam fatis laudandi: ſie ad nos ſcripfit hanc Arborem Malabarica¹¹¹ cTe Adhacoda Zeylanenſium *Herman*.

CAP. XIII.

Courondi H. M P. 4- T. fop. 105. Arbor Indica fact* rotundo, cortict molli tmdtum unicum nudum glandi ſimiltm continents.

H. M.

ARbor eſt procera, caudice craſſo, denſo, albicante, cprcice obduſto njgricantCj (cabro a^c aſpero, ramuliTque plurimis intus fungofis donato. Radix albicans, cinereu cortice ceſta, acris, graveolen5. Fdia geminata, urdine paralleſ circa ramulos proveniuntj oblong⁰ rotunda, in ambiru leviter crenata, craſſa, denſa, glabra, iplendentia^ ſuperne vindia, inſtr^{nc} ſubviridia, nervis aliquot c media coſta in latera excurrentibus; fapor aſtringens; odor n^{ull}ns. Flores ſxiguij vindi-flavefcent^s, vitis viniferac floſbulis haud abſimib5 ad foſorum exortum 282 ramulos proveniunt copioſi, hoc eſt, ternij qua term aut plures ſimul fere congeſti, quinque tff- rotundis foliolis conſtantes, numerofis^t/*w//J medium occupantibus, inodon, faporis adfrin- gentis. Fbribus pari fertilitate/rwffwj liicedunt rotundi, purpurei, craſſo, carnoſo, molli, 283 que crocEo cDrnce ciniti, Glandi fimilem nucleum intus continent^ qui ruſa pellicula 284 odoris ingrati, /aporſque aſtringentis eſt.

TemLr


P'

V*rts.

/v Naſatur locis montanis ac pecrois circa *Faracaroj* Temper viret; fingulis anms mature 285 ftus, Decembn, viz. 6c Januario menſibus, diique frugifera inanet.

Succus 4 ſcl^ hujU5 aH)oris expreſſib5 6C cum ferolatlis calidè exhibitus diarrhea: « 286 priſtant nudci iruftuum quoque modo lumpb.

CAP. XIV.


ArUr Indica Mamti ditfa C- B. Mamay arbor J.B. Park. €i)C S^ammeC, fl^OitUli, 0? 
 t.rte.

Variant in hujus arboris descriptione hiftocici Indici. Gomarac arbor est formofa, fimili modo virens uti Juglans,, alta lataque coma, fed quæ in pyramidem aliquantulum definat, Cupreffii modo. *Folium* longius quam latum : materies ligni fungafa : *fruttus* rotundus & magnus [in inliiliSj, in continenti longus &c craffior Be guftu jucundiore. *Benz,o*] carne Malum Cotoneum referens, fed fapore Perfici duracini: huic inliint terna quaternaque ofla, interdum plura, fimuljunfta, valde amara.

Ovisdus Arborem fpécialifliniarn *zfib* fcribit, magns Nucis Juglandis proceritatej *foliis* paribus ant majoribus, craffionbus; altera pars viridioribus, palmum longis &c ad proportionem latis.

" Hujus *fructus* est gmnium qui in infula Hifpaniola proveniunt guftui fuaviffimus, quandoque perfectè, quandoque imperfete rotundus, pugtios duos magnitudins squans, aliquando minor; cortiue contegitur fulvoj modice aipero/. Pyrorum fylveftrium rim nin durior craffidrque efflet. Sunt qui unumy alii duos trève concludunt nuuhos, in Pomi tnedio, interftitiis diftinftoſj acinDrum ritu membranula tenui op^rCos, delibratx caftanez colore, quorum pulpanj fi fecueris judicabis caftanear, prarcerquam lapDre fimilem, fed interior acinus fellis est amaritudine, delicatâ tuniculâ cDnteftus; quam inter 8c priorem illam membranulam caro five pulpa intercedit ferè fulva, Perfici Duracini guftu^ aut meliore; non tamsn tam fucculenta est, nsque tam odora- Pulpa^ ifti digitalis est craffitudo ift majoribus, "minor in minoribus pomis. Scaligpr negat intra nudum feu medullam alterain medullam latitare aniariffimam; (e enim in nucleo difleto nihil tals pbTervare potuiffè : Verum Oviedo potius Credendurti- Hugheſius nofter neque truncumj neque Tamos, led praecipue rarnos, hujus arboris adrtiodum foliðos sfle, led teneros^ fpongiosos Sc difcindi faciles, fcribit.

E ramis autem incifis defillat liquor pellucidus copiofus, quern confeenfa arbore, Be ratno aliquo vulnerato, cucurbitâ appensa indigenae excipiunt. N6runt illi ramum itâ incidere, ut vulnus icerum claudere Be obturare poffint, adeoqus impedire nè liquor effluat: internoftu ergò vulnus apertum relinquunc, interdium illud obturant, aliàs enim fi interdium permkterent extillare, foliarium radiorum vis adeò copios^ iuccum evoCaret, ut arbor nimis exhaulta mori poriclitaretur : quinfial liquor interdium emanans minus lalubris habetur, ntpote cruda Bf incDncofta".

Liquorem hunc Vinum Mammeyanum [O^Oimn D? CoDllpJOinc] vocant: parce^ autem il- Viriil lui bibendum est, nee plus uno cyatho una vice. Est enim diureticum infigne, facile penetraC Sc inciit, cahulo praeavendo Sc diilulvsndo efficac. Mirum alios nullam hujus vini 
 fcre..

E earns feu pulpa hums arboris optimam efnciunt confervam.


Duutn est generiim, alterum fruau majore cujus offigulum falfo Avellanae Indicae titulo a * Clufio *Anmt in depingitur Be defenbicur. Occurrit etiam elegans ejus Be accurata icon- in muſeo Calccolanano: *Garcia lib. th* Hujus dcriptionem inferius inter fruttus dabimus- Alcerum fruttu minore, cujus officulum defen- ^i6. bit Clufius Avellanar Indicae minoris nomine erroneo.

SECTIO aUARTA,

chores Cucurbitiferæ.

ARbores Cucurbitiferas VDCD quæ fruttus proferunt Cucurbitis aut Melonibus Emiles, cortice per maturitatem duro cinftos, quorum perlique pulpatn intus mollem, humidanij femina ambientem continent: quibus ob fimilitudinem in reliquis unum vel alterum fruftific, co fabjungimus.

CAP. I.

*Cucurbitifera trifolia Indica fruttus pulpd Cydonii xmula. Cydonia exotica C- B- Uovalam * H. M. * P. 3. *
 An Malum Cydonium Indicum Bontii ? Bdi fm Serif eh Btingaknftim, Cydonia eorundem Gar- f • 37.
 cia J. B.

ARbor est procera, caudice ex albo flavescente, variegatp, craffid, prarduro, multifque ramis donato, qui conice craffo, lignofo obdufti, ac (pinis oblongis aculeatis muniti linr* Rami autem vetuftiores fpadiceo-fufci, teneriores ab una parte viridcs, ab altera, qua radiis Solaribus e^onuncur, rubicundi, uti Be iporum fpinx. *Radix* fibrata, albicans, ac rufo cortice teffit. odoris gravis, faporis dulcis, deinde amariufculi. *Folia* terna fimul ex eodem pediculo nafcentif, oblongo-rotunda, in ambku crenata, nitentia^ fuaveolentia, auftra, manibus confrifta unftuola. *Floras* fuaveolentes fex, feptemve uni pediculo inherent, atque è calyce viridi in lacinias fefto prodeunt, Be quinque obbngo-rocundis, craffis, reflexis, extenus viridibusj

interiis albo viridibus confiant foliolis, multis in medio subviridibus *stannulis*, virentibus apicibus d[> nacijs prarditi, inter quos styhts prodit oblongus, craflus, furreftus, qui ipfius fruftiis rudimentum eft. *Fmitus* mala rotunda excerna forma referunt, quos tegit subviridis, tenuis cortex, cuius eft us alter prxdurus, lignofus, Be p[er]ne ofleus, carnem continens vilcofam, subflavam, humidam^ faporis acidulicij intra quem [tm'ma plana, Dblonga, alba, gummo pellucido /UCCD intus turgentia, recondita sunt

Locut. Nafcitur in Malabar inque infula *Zeilan*. Seminibus Jata feftu vel feftimp demum anlid fruft^ fert^ quos tamen fingulis annis Decembri Be Januario menfibum maturos exhibeti ac integruin fsculum frugifera manet.

Vires 13 Fructus teneri faccharo vel aceto condiunturj maturiores vero in deliciis comeduntur: immatur diarrhaeam ac dyfenteriam fiftunt.

Ex arbors cortice Be radiculis cum aqua communi decoctum paratur, quod melancholiam hypochondriacam, cordis palpitationem & lipothymiam fanat- Ex cortice pulverifato & cum Mellis niixto Eleftuarium conficitur, quod mane lumptum alimentorum in ventriculo fermentationem promovet, capitis dobre mac vertiginem tollit. F[>]lorum decoctum afflimati medetur. Ex *Aonus* aqua defhllatur Cardiaca Be Alexipharmaca.

Solent Guzaratenfes medici (ut fcribit Garcias) uti hoc fruclu teneroadhuc & immature, acet* vel Tatcharo conditD in inveteratis alvi profluviis fiftendis. Quocunc^ autem modo preparati in dyfentria profliganda magno cum fuceflii exhiberi ioteric. Plura vides apud Garciam-

C A P . ir.

• P. 3. T. 41.¹ *Tomiftra Inuica tinEiaria Janipaba diEla. An Pamijica Maram Malabarenfibus * H.M. J. f. fmba Brafilinifibut Pifon. & Marcgr. Gnipat Park. Porno ftilits Brafiliana Co. jnnif f peeywa Brafilianorum, nucum folia, five Gevipat J. B> Jumpa RocheforC.*

ARbor eft procerca, altitudine 8c, craflific quindecim pedes non raro fuperans, Inuill^? JS^{uni} mis donata: Lignum prxdurum, albicans, nigricante aufteriquo fapone Cortice obftuc^o Radix itidem albicans, niericante cortice tetta, Be fibris fuis Jate per terranl dittula. f oblongo-rDtunda, glabra, denfa, nitentia, craflis, brevibus, viridi-flavis petiolis, rubicunda *prov*

folia au ingrati [Marcgrayh « folia 7 « y - * * lingua: bubuk fifird eft fmlnt, ffdl'! »TM Jlgj fal]nata, pedem aut fequipcdm ligaf fupBum /plendentu ac d. Intc vir.nt.a, infenuj fatura & non Jplendcna] A pedicub ad apicem FDIU nervus decurrit CDnrpicuos.rotunijus, vnaia: Jja¹ vel inferne eminens, t quo plurimi exoriantur nervuli, contortuplicati, cM]gu. f/sm/et, 7 vit; J. L. fl a-albona v. r. centcsj brevi pedkub extremis fur culismulu limul junfti infi dent, atque zealjcr v. kara ve vefecenteprdeunt: confiant ii unico folio, f^ in quinque profundas; lacusajL d'v ± ' A L A J d d c c

2 CL • H 4 c • H 4 O s Inciani Hun* i^viratem BL umDIUCUm occupanti Dip- dantur, numero fibris uE, illi n. ov. v. h u D nar c. f. r. n. s. Erufus, qui etiam plures fimul quavifimus de aromancus, illi n. ov. andiurculd excipiuntur, exaite rotundi sunt & pilarum obtinent bus luccedunt, ac i^ JumbificD prxditi, K cortice primum viridi, dcinde rubro, villofbu lanu magnitudinem, " » X^{uni} in cerco cinfti, earns intus albicante, fubvindi. Be aquofa feu *potus* guftu, tanquam *scro* valde nidi primulu, deinde acido-dolicis referri; intra quam ofto aut decem f. h. u. f. s. J. p. o. l. i. q. u. e. v. a. l. d. e. n. i. d. i. p. r. i. m. u. l. u. m, deinde acido-dolicis referri; intra quam ofto aut decem f. h. u. f. s. J. p. o. l. i. q. u. e. v. a. l. d. e. n. i. d. i. p. r. i. m. u. l. u. m, ac n. r. i. c. i. l. i. s incluia in orbem lo- f. h. u. f. s. J. p. o. l. i. q. u. e. v. a. l. d. e. n. i. d. i. p. r. i. m. u. l. u. m, ac n. r. i. c. i. l. i. s incluia in orbem lo- f. h. u. f. s. J. p. o. l. i. q. u. e. v. a. l. d. e. n. i. d. i. p. r. i. m. u. l. u. m, ac n. r. i. c. i. l. i. s incluia in orbem lo-

Locut 13
Tropis.
Vires 13
Ljus.

Nafcitur ubique in Malabar: guovis anni tempore fructus fert, quanquam Aprili & Oftnbri menfibus plurimum floret, atque a feptimo circiter lationis anno ad centefimum Be ultra frugifera eft.

Arboris liiju5 folia cenella cum aqua tnta (quam medicaminis formam pleriq, Aliaticipro more habentj ac potui data, vel eciam fuccus & fructibus teneriDribus exprefTus, cgregium eft ai aphthas Sc lingiix filfbras remedium, fi ore contineatur. Idem ficcus oculis inflillatus ophthalmia coiulucir. Arboris cortex in pulverem redadlus, ac cum *Oryzx* infufo, Be expreffo e matura nuce Indica lafteo fuccomixtus, acque febricitancibus exhibitus, artum potenter extinguit: infuiper decoctnm ex hoc cortice paratur, cui mel aditiffcetur, idque aflumptum ventris tormina fedat. E k^m minibus oleum expnmitur, quod cum zinzibere Be femine Cuminifumptum hydropicis fuccurrit, infuiper alvi cruciatu lenit, eandemq, evacuat. Fructus vero maturiores cum inclufis feminibus fcv nudei5 ab indigenis conieduntur. Succus deniq, glutinofus, gummofus, pellucidus, qui e fruftibi5 haud inatus expnmitur, radiis Solaribus concrelbens ac rufefcens, feu ex rufo nigricans. Be velut vi-refcens, optimum evadit gluien, quo ad quxcunq, arafflimeconjungenda utuntur incok: 9^{lm} J adinoduni Judii Be Luficam in compingendis libris fblo hoc glutine utuntur, quique ob id ter^{edin} muiquam ubnoxii funr, &c,

3mijm.

Immaiurus Fi^{ua}us [J^{lin}ipabi] concifus Be cuti affliftus tingit colore ex nigro fubccEruleJ^{an} -> B quivnuHDmodDcluipuceft.Jedpoft dfto aut iivDcm dies fponc evanefbir. Lignum feuranius « c r- pcus codeni modo rmgir. Barbat in lypoliis fui5j Be ad bellum icuri /plfin fe hoc liquore inhca-B uc rembilliDi es holhbus vidcamur. Mirum Horti Malabanci auctorcs nullam huPqudiratis K ulus menCidneni - & « r. c. j. - fi mo J 6 Badci?1 fit arbor *Tnitijh* - m f * m* Si *Jam:aba*, cum omnu qui ^ 7 *' nifaba Icriplwum eju5 mcmncriiu, Uufiu^Thevecus, Lcrius, Pifo, Ma.xyrviau5, Hernandez, K^o cher^{oit}U.

chefortius. Ego cognatam potius quam eandem judico: quocircajanipabs hiftoriam è G. Pifonis Hift.nat. Be medic. Ind. mutuatum fubjiciam.

Una ex præcioribus Brafilia* arboribus est Janipaba: quæ figura convenit cum Fago. Corticem habet griseum feu tanum; lignum fragile & medullolum. Rami foliis vestiti oblongis, lingue bubulz figurâ, fed in utraq; parte fastigiatis, septem, octo, vel novem juxta se dispositis, unum aut feliquipedem longis, liiperius splendens ac dilute viridibus, inferius faturateviridibus, quæ fingulis annis, mensè imprimis Decembri, decidunt, nōiomnia quidem simul, fed pars illorum diverſi tempore: Mox nova prioribus multo lztiora & majora acquirunt, idque fingulis mensibus.

Florem gignit exiguum mensis Martio Be Aprili, extem Narcisso haud multum diflimilij quibdorem Caryophylli Carthufianorum æmularur; coloris albi cum unguibus mterius flavis; in medio floris ftaihen craffiufculum flavum habens ac inliiper inter duo folia floris corniculum pallidum, è media floris prodiens, deorlim incurvatumb

, Fructus illius magnitudinem habet Mali Auraci, vel majorem, rotundus, cortice tenui, lento, * Junpapf^ cinereo, fub quo primùm continet carnem folidam, lentam, fucculentam, flavescens, faporis acidi Wx*^m & *^s* K refrigerantis odoris grati. In medio autem fructus est. cavitatis repleta, feminibus mlliori pulpa circumdatis, ejuſdem cum reliqua carne faporis. Seminis grana fiant compressa 8c fiborbiculata, ^ autem Jiccu: ferè ut Manjaiba, quæ unâ comeduntur. Immatura ppula viridia iunc, mox matura, Mespilorum infar, putrefcunt, atque eliii apta fiunt. Cruda non cocta appetuntur. Saccharata & condita lautiora Junt. Contra fluxum ventris feliciter exhibentur. Ardore palati Be stomachi compeſcunt, fanifcus & zgris folatio fuit, nifi quod fortioris sint odoris, caput afficiunt. Immacura poma crita^ & in capitafinatis formam redacta, ulceribus malignis Be davis luis Vcnereae imponuntur, ^ VinuYn quod ex illis exprimitur in eodem ufus rclervatur, fed vetus redditum calidius exiit, minufque adstringens. Ex porno nondum maturo vi ignis liquorem extrahunt * indigene quo adversus eadem * Brafilia. mala utuntur.

Rochefortius fiarrat Fructus hocce inter dscidstidum strepitum edere bombards non abfitpilem quod indè aeddere ait; quod Ipiritus quidam feu flatus intra pelliculas femina involvences inclulij cafu illo commoti veculis diruptis cum impetu cgrdiantur.

Fructus hujus tinctura fapons elui nequit, verum intra dies novem aut decem fponde evanescit. Cum poma decidunt non aves tantum fed etiam porci qui ilia comsunt, carnes atque etiam adipos colore violaceo tindtas obtinent.

Cluffius ExDt. lib.2r. cap. 7. duos describit fructus Janipabac fimiles.

Prior orbicularis erat pacne figuræ, è Brafilia allatus; formâ non valde diflimilis Junpappeejwa Brafilianorum^ teneriore tamen cortice prsditus & c fuperna parte planus^ atque quodammodo in tenerum umbilicum definens, continebat autem interna parte multa femina rugofa^ Staphiliagrix feminibus non diflimilia, nudeum tinctum in binas partes divilum. Psdiculus cui inha?rebac triuncialis longitudinis erat.

Alter, etiam ex Brafilia allatus, paene ovali erat figura, infar Mali Eitrii five Limonis liiperna tamen parte magis mucronatus, tres uncias longus, ejus ambitus lex unciarum erat; duro lento tamen corcice præditus: intus verò pulpanigra cotinabatur, quæ propter vetustatem in pollinem profuis refoluta erat. Cacterim hunc fructum lectum fuisse arbitrabatur Cluffius antequam maturitatem adp? quandoquidem rugofo erat cortice & c plerilque locis vclut in lacunas contra ft o.

C A P . III.

- I. *Arbor vucurbitifera Americana folio subrotundo.* Cuiete Marcgrav. & Piibn. 'uuljrl corrupt^ Cochine. Higuzro Wviti J. B. Park. *Arbor Indica fruffu Cucurbit* fvrmd & fapore* C. B. ffc Cakcaftj^tree.

Marcgr.

Arbor cortice grileo, ut Sambucus, CDntDrte nascitur, longos habens ramos, Be in As folia frondatim Be alternatim posita; nimirum rami habent alternatim tubercula digiti intervallo, Be ad quodlibet fex, septem aut octo plia^ arte fibi oppofita, femipedem plus minus longa^ planè angusta versus exortum, versus extremitatem verb fenfim ampliantur, fefquidigitum lata ubi latiflimaj in acumen quoddam obtufum definentia, fupernc^ faturat^ viridia Be iplenduntia, inferne dilutiora, nervo conſpicio fie venis tranſverſis przdita. Non folùm in ramis fed 6c in caudice paſſim proveniunt duo, tres vel quatuor tons juxta se positi, in pediculis digitorum ferè longis, ipſi quoquedu5 Befemis digitos bngi, figurâ paene Liliij, quinq; incifuris in quinq; acuminata folia dehifcentes, coloris ex albo Be viridi mixti. Be fecundum longitudinem valde elegantis nervis, ac hinc indè venulis dilute purpureis varipgati; in media autem quinque ftamina ejuſdem extant coloris, quorum quòdque corpus in fummitate habet flavescens, Be lineolis nigris variegatum, quintum Be medium ftamen [ftylus] figuram habet aurifcalpii j huic autem flos infidec 8c detrahi poteſt, ut affum carnis fructum de veru: odoris flos est nauleabundi.

Post florem fequitur fructus, variz magnitudinis 8e figure, vel ovi Struthionis, vel rotundus Be magnitudine capitis humanij vel obngus, initid viridis, per maturitatem niger ac durus, intus connens femina Cucurbitis; modo, fufca feu obſcurè brunna, magnitudine feminum Cucumeris, ac nucleo flav^cente; exterius autem quafi fadfa fimplici femem convolutum videcur. Immaturus fructus pulpam albam (iccu)entam continet, odoris ferè ut Naſturtium, fed cui dulcedo quidam est admixta; per totam deniq; pulpam non in medio tantum ut m.Cucurbka, femina ilia difperfa funCj qua per maturitatem fufca fiunt.

Saccharo immaturus fructus conditur, ic in febribus ufurpatur: maturis utuntur incok patinarum, poculorum & lagenaruoimodo. Piacparatur hocmodo.

Maturu*

Maturus fm^his aqua: calei-afcx Immergiçjr, Be plene coquirur: hinc incifo foramine ligno duro excavanclus eft ¶ Sin fecare in patinas auc alias Hguras illas velis, funiculo craffiore fectionem qium propofiti circumluga cofto fruftu; be malleo ligneo pulfa funiculum, fie Iponte fecabkur; cukro fi reni rentes operam hides.

Arbor hæc certis annr temponbus omnia folia amittit, biduo autem pöft itenim foliis onufta cernitur. Per ramos incifos, & cern implantaros facile propagatur.

L. 11. 11.

Familiariffima eft arbor omnibus iniulis America Be pxne toti continent!, K Aib nomine *Higuero* Oviedo defcribitur.

Pulpa fructu matura non eft edulis, fed ad placandos capitis dolores, praefertim ex fervore Solis natos, infignc rmedium : Si convnicnter temporibus fic fronti formâ cataplafinaris applictur.

Arborem hanc *Calebaffir* titulo lie defcribit Rochsfortius in Hiftoria infularum Antillarum. Altitudine magnitudine & Torma Mali vulgaris majoris crefcit, ramis crebris; quibus folia oblonga, angulata glabra, pbfeure vindia, per excremum lubrotunda agminatim adnexa.

Plants colors func cane/bente fgrileucr vocac) cum viridinnixco, maculis nigris autinterdum violaceis gurtati, quibus fuxedunt *Fuma*; bniTTbus pediculis nixa, magnitudine Be figarâ adeo varia, ut difficulcer invenias in eadem arbore bina paria & fimilia. Hoc habent commune omnia, quod tice integantur duia, iignblo, "ea crnffitudine fie foliditate, uc pro vafis [lagenulis, calycibus, /typhis, cochlealibus } inlervianc. Matena intus replentur fungofa, per macuritatem violacei *Lobelia* uti dicitur in eodem gradu admodum, alba, quæ tarde maturefcunt: quin & liquorum quorundam continetur, odoris viridissimum, et sapore non parinde grato, quoniam ex his Ledi bibunt. Fructus huiusmodi JCU puma huiusmodi vinificatum oc iuniz^ -aauiis cortex leu criuia exterior UucurDita: mouu !>>> fecit.

Cutigula viridt derasa cortex interior albus; unde fiftylo ferreo per cuticulam adaito aliquid fruftui infcnb-çs inculpafvr/exliccaco eo pulchram Be elcgantempeciem fcultura exhibet. Fructu Hiaturqpfcllicula exterior e vindi leucophaci cvadit, magnitudine varia Junt (ut diximus) hæc porru, iparvs pib ad Melonis maxim* molem; ut eorum nonnulla; medulla omni Sc pulpa inter Dre per foramen in extremitate parvuni extrafta, quatuor aqux sextarios [duas quartas Anglicas,] capiantT*]u6dquæad figuram attine^ alia oblonga funt, alia rotunda, alia ovalia.

L. 11. 11.

In tylyvia copiosè invenimur hx arbores, fiintque per rotum annum fruftiferi, pomis allis recess natiç aliis adolefcenribus^ AIUS maturis, alus vvtghtuoit firmul onultx.

Indi fruftu5 hocce expolijunt, variis colobus pin gun t^ aut etiam figurisperbell^ inculpiunt in liqu: omnis quocis rati abiciunt, ppxodea, lagenulas, calyces, patellas, fymboia, zuccheria, &c.

Cæteris Tlucvci foliorum refpectu ad hanc arborum accedit: a: fructus videtur esse Papayz. Est enim (inquit) is augno Meloni par, hævillinus & cum manditur Maltuz modo in ore liquo icens, femina intus continens qualia in Cucumerenoftro reperiuntufj cortice cum matuivit croceo, folio arboris emicè viridi, exquiltè rotundo, aureo nummo Gallicopari. In infula *Zipanga* pro: venk: vide fupra in capite 7. libri 14. p. i; 71-

HLI]U5 feminibus Gambals filum trajiciunt, cruribus alligant, Sc pro tintinnabulis utuntur.^

Higuero Oviedi^ cujus defcriptioiem dedi loco jam citato, hue rferendam cenfeo., a/borcinç, & Mammo^ra toto genere diverlam exiftvno.

1. Arbor cucurbitifera folio longo mucronato fen Laurino. Arbor folio Lauri, fructu Cucurbits ex Guinea J. B. Laurifolia Xjuintnfis C. B. Arbor peregrina ex Guinea CluT ex l. I. r. Q. MS, an d precedents divzfa^ & Laurifolia Americana pomis capitis ragnitudine C. B.

Juglandis arboris magnitudinem square, nec diffimili cortice teftam effeferuHt: folia Laurinis habji'e familia, ad quorum exortum fruftus in ramis nafceretur: Erat quern Clufio miffi Garetus, imgni mali in/tar, & oibicularis parne forms. Nam duftâ à pedi:ulo per longitudinem frudi5 menfurâ ad alteram partem pediculo proximam, decem unciarum fuiffe repertum eft; quam ea qua: Fructum per medium tranlveriiim ambiebat vix (uperabat. Levis erat pro fliamagnitudine^ K tiaflo (atiffi)ue finvo cortice prarditus, forislvzi Be fplendente, ex flavo fpadicei coloris, interdum etiam njgnis maculis CDn/perfo, intema autem parte, fuliginoiij K nifcûl continens prater HJgruni quendam pulvereiD.

Proximè ad hanc accedi^ ut ego eandem fulpicer, *Ehojne* Americana Theveti Be Lerii, fructum ferens magnitudincidiocris Gitrulli [^ capkis infantis Lerio] formâ ovi Struthjo-cameli, non adu: leni, cortilLeducrO] quicm perforant, Be faciunt ex iis infrumentum iis *Maraka* diiftum Be pateras, ad poxaiKluuii. Arbor jplâ folio Lauri eft- Idem fiadec nomen vulgare corruptum praecedentis uei quoti occurrit apud Pifonem, nimirum *Lochine*, non multum diverfum a *Choyne*. Hujus d: ptionem fuperius dsdimus pag. 1371- lib. 14. cap. 7. Hujus etiam arbors, aut przedentis p<oculus Ipc^iei, frustum ellc fulpicor Lagenulas Americanas *Cluf exot. Iib., z. cap. B.* defcriptas, forma p*o oibialLari, duro, kvi, ipadicei colens corce praditas, extima parte funiculo trajeftos Be quodari modo connexos. Use fortL'func quariun meminit Americus Vefputius in Navigat. 2- quas viri^ collo fuJpendunt, quarum una herba plena eft quam mandunt, altera farinâ quam bacilli mad^ flo herb* alpergunt.

Harum Arborum cucurbitifcarum mentionem fecimus inter Meloniferas & Papsia.

CAP. IV.

Macocqwr Virginkfiwn foris * Cluf. j. B. *Frufus orbicular is, grant** wrdis tffigit C. B. *Exvt.L.H

ORbiculari profus formā ftrat, quatute unciarum diarnetro, cortice duro przditus, forishevi Be fubfufco, intern[^] nigrā mejhbranā indufto, per quam fparfe quzdam fibrā à pediculo adfumum; continebat verb pulpam nigram, (quia non recens fed ficcus Be vetuftus) acirtijue Be quodamodp falſi faporis, in qua plurima grana involuta, fubfufci coloris[^] plana., Be cordis (lit[•] vukopinjgicurj Formam referenda, medulla albicante praedita.

Clufius facile fibi perfuaderi fiveritj huncfrui2um illuvti eflē quern Virginienſes Macocquer appellant, 6c (magnu aliquopericulD liberati, vel bello defunai, in lactitis lignum ftmfto igni affidentes) pulpa feminibuici, exemptisj implant lapilljs aut craffioribus quibufdam granis, ut majorem ftrepitum agicatus 5c commotus eclat, bacilloque aptantes rnanu tenenc[^] perinde acBrafilianifuum *Tamaraca*.

Egopocius *Macocqwr* Peponis ſpeciem[^] eflē exiftimio, nam Macock VirginierifibusPeponem denotatj Zc * C-Bauhinus ex defcriptione Virginia: habet[^] Macocqwr peponibus, melonibus K cu-[•]?#». ftjj, curbicis valdē fimilem eflBj, cujus unutu genusmenfruo, alterum bimefriiipatiomaturefcit[^] Fruftus autem delcripcus à Peponibus valde diverlus, efl.

Idem Clufius fruſtum huncnon valde diffimilem videri Icribit *Higuero* tetralyllabo Ferd. Dviedi, quod egD non invicus conceſſerim: nam à Junipappeewyaj quacum J. Bauhinus ronferendam proponit, diverfam puta.

CAP. V_r

Arhm du& cuctirlitifere impzrfctē dcfripta.

I. *Arbor fruttum Mzhnis facit proftrtus* J. B.

GHa efl hzec arbor in infula 5. Marix Indies proveniens, ex qua creſcunt fruſtus Melonis facie, cortice duro atq, lignofb, plurima intus continentes grana, vi/cida, lata, alvum cientia. *Linfchot.* ex brevi hac defcriptione an haec arbor eadem fit alicui b Cucurbitiferis defcriptisj an diverſa cplligi nequit.

I. *Arbor ZmurVittzra Tabacenum* * D3 Last.

* *Juſ. Ornd,*
/ 17-c.IS.

Folia equ5 longiſſima funt, fed anguſtiora BC.obtufa. Fraſtus trunco Be majoribus ramis innafcuntur, grandes cucurbitarum inſtar, Be qui faepe duas ttopas Be dimidium, ut Hollandi loquuntur, capiunt. Cortice teguntur non quidem craſſi fed duriffimo 5c penē liga^o, qui pulpam ſpongifam optinii ſap ons tegit. Singulis prope anni menſibus fiinditur.

Locismodicehumidifnafcitur.

Succus dicitur alvum Be fanguinis profluvium fiftere.

An Be quantum hxc à ſupra dſcriptis differat confiderandum.

Locui,
yim

CAP. VI.

Juracatia Brafilknfibus Marcgrav. Pifo. *Arbor peſniferā Brafilienjis ſpinofd, fruſtu* Mamao *fimili, ramofa.*

A^{Marcgr.}rbvr efl alta, reſta, caadice iriferiūs craſſibj qui verſus faſtigium magis magifque attenuatur, cortice grifeo, ligrio molli Be taſteſcēte. Caudex autem Be rami armantur ſpinis brevibus, craſtufculis, duris. Et ramDS quidem in orbeoi projicit, fed inordinatē, fuperioreſq, inferioribus breviores, nec[^] ramuli magis ordinatij in quibus *folia* in frondes congeſta, *Mandubaz* rndo, figurā Be magnitudine, luperiūs ſplendidi viridia, inferiūs incaneſcentia, quinque, ſeptem, vel novem in ftellz modum ſibi appofita. Florem fert Be fruſtum ut *Mammao* mas vel *Yinoguacu*, pctiolo longo dependentetn, tres digitos longum, craſſitie duplici pollicis humani, ftriſhaudprDhindis fecundū longitudinem, vel quaſi lineiſfolimnotatum[^] cobriſextenūs 6c intenūs crocei, ut *Mamma*[^] ſaporiſcjuſmodi ſubftantiz, &c fimilimodo granis refertum, magnitudine Be figurā graniHordei, ic carnehaud manifeſti: immaturus adhuc laſteſcit ac vellicat linguam, maturus autem ſponte decidit 8c comeditur crudus at% coctus.

Folia amittit ſingulis annis, Bemenſe Martionova protrudic, nine tioret Be fruſtum Fert qui fine Tr«f«.

Aprilis Be Maio maturatur.

Fucina dicta per omnia minor elt mare, abàs fimilis.

C A P . . VII-

* P. 1.F.35.J. Marotti H. M Laurifolia Malabarica, fruUu ojfo, nucleos continent* D. Syn. ***

Arbor est procera, ramis densis Be opacis, late tranfverfim diffusis, nascens in arenosis. Radix ei craffa est, famos late fpargens, cortice exterius nigricanre, intus rubefcente, laporis s&ftriugemis, ligno albicante. Caudex quantum unushomo ampleftatur, ligno albicante, cortice, extenus ex vindj nigricante, sub exteriore crufta rubefcente. Ramii cinerei, teneriores viliofi, ficutus ac Prilertini fucis Be fylvefris odoris sunt, qui in foliis est debilior. ac arbor coto annouberi provencu fert, uc Be fruftus copiofos. f U m qUD(* ex ^ minibus fruftuum cducitur dolores iedat, fcabiem Be prufitum colfit illitu; ocu^ lal(is humoribus infestatis confere: cum cinere mixtum vaccarum caetsrDrumque jumentorum apoftemacis commode imponitur. Icon fruftum umbilicatum reprarfentat. . A n veroflosfummofi-uftLiinnafcaturnon conftat, quin potius contranum ex defunptione colligicur. Ambigic quodammodo hicfructus, uc Be fequens inter Cucurbiciferas Be Nucifera*

C A P . VIII

Cacao Gv. Cacaq five Cacavate Park. Cacao America five AveHana Mxitana J. K AmyeJaU fmdis Guatmalznfis C. B- Cf)C CACP <\$X&

Quatuor hujus aboris species habentur, fnonnulli quintam addunt) magnitudine inter ft differentes. Dmnes locis riguis, pingui Be uliginoso hly gaudent: In nova Hijpania, Guatimala, Nicaragua, Htfamola, Cuba, Jamayca, See. turn fponteproveniunt, turn magn* Ituc^o coluntur. Omnium fruftus ejuflem fere funt facultatis, minorum tamen pocionifcus magis inlervjunc, majorum nummis atque commerciis. Omnes Solarium radiorum ardois, nofturni hignons Be ventorum tempeftatum adeo impatiences, ut fponcanea: nonmfi in vaUibusutnbroliis appareant, culta: patuUm quandam Be umbi ofam arborem juxta pUntari requiranc (Cacar tjuavMthfi, live matrern Cacavifera: appellant,) ut i cteli injunis ejus veluci sub umbonc cuiores inC Omnes facile cicuran te patiuntur; Hifpani^ccrri Integra ex ipfis arbbreta Be plantand Be cmit, non JecusarqueinturDpa vineca atque oliveta. A t fecundo artacis anno fruftiheant, Be iquodlibet anno bis: vindemiantur emm primum & uberiore fruftu cuca Juniuni, iccrum circa Januarium. Ab anno vigeftimo devigeftunc Be ftenlefcunc.

1. Cacava quabuul

Omnium maxima, Arbor est mediocris, trunco Pruni noftratis craffitie, non tamfen ufque ^ corriceglabro undique cinfta, egregie frondofa, ramis quaquaverfum excenfis Cran¹⁰¹ ditormi perbellc referc" ea ramen, cum penirus adolevic, aliquanto magis in circuitu pat^{ujaj} elacior est. In foliis etiam non magna est difcrepantia; hujus enim paricer acuniff^{13^} um area margines equaliora, oblcarius virldia, Be Aurantii foliis familia, fed aieg^{11^, 11^} quae veficulae turlicin emergunt. Floi ei magnus, Becobre ex flavo albefcens inftar Croci: fructus turbinari, quo^{TMula} vir <>wj oblonga Be lanuginofa filamenta. Ex his deinde piwnciunt Magni cuTm7turtrcmf T f de Jorcua; mlllo jurecveniente p ducunt F ^ A iunt crocco ex lut^{Cn X. J. W.} magnitudine, craffitie, pondere non cedunt, colDr^{Mp} lbr nwLioftipiri iatllixrent "S" n" * lonB¹¹¹¹ Vallis: nuclel viceni, ^^ criceni, qu^{JrtfjK}

t A feprimo out cnllr. Hugh«. r</pif.

pelliculâ fulvâ vestiti, quâ fublata videritur non abfimiles reni vaccind fecuhdum incifuras quibus luntdivifi. Subftantia eonini intus eft tenuis, 5C fpadicei fere coloris, in difpares divife particulas, fed qua: arête infer le harrean, adeoque fit pinguis ut ffonte humor, quantumvis fit lentus, aliquando extillet; imb oleum ex ea abundantius quam ex Amygdalis exprimi poffic. Pulpahsc fubamari, non ingrati tamen feporis, multi nutrimenti, temperamenti fubfrigidi atque humidî. Hughefius noftras fru&um accuratiusdefcribit, eft is initio viridis, qui prout magnitHdine augetur> itângurâ Sc colorevariâ ad perfectam ufque maturitatem. Nonnulli fubrotundi flint Pomprum ihtar, alii oblongi Cucumerum forma, verum pleriqueovati, Melonibus non abfimiles; magnitudinē varii, à Mali iyveftris adPyri maximi aut Melonis mediocri molem; ejuftnodi etiam cortice duroj minûs tamen quam in Melone craflb, fefti: quo vel leviter incifo nuclei ftatim apparent. Pnete-rea exterior pars fructus feu cruftae tuberculis quibufdam inzqualis eft, (ecus quam in Melone^ velut ornatis causâ a natura factis, protuberantiis iis quae in Pomis Vulgaribus non rarò cernuntur fimilibus, obtufis, extremi digiti magnitudine. Color fruiliuum pro maturitatis rations variat, ad quam quò propius accedunt, eb colore rubence feu incarnato, ut vocant, magis funt tintidi & ftriati, prscipue expartefoli obverfa admodum Pomorum vulgariuum; unde 8c matiiritas cognofcitur.

Nuclei *Cacao* difti membranulis finguli fingulis includuntur, gelatinam quandam lafteam includentibus, qufcin ore illico liquefcit. Nucleorum numeropro fructuum magnitudine variat, aduodenario ad tricenarium & ultra. Magnitudine funt Amygd^Urum vulgariuum, non tamen adeo comprefli, membranâ tenuiffimâ feu cuticuli cinfti, ante Hiatuntatem albenteSj cum plene maturuere obfeurius rubent^ exficcati & *Chocolate* conficiendae idonei nigricant magis, & ad chldrem renis bovilli accedunt, quern 5c incifiiris fiis imitantur: in primis autem hifce feu filuris pinguis quidam & oleofus humor invenitur.

Cum fructus collegerinc corticem exteriprem (qui nullius fere usûs eft) incidunt, & nucleis exemptis abjctiunt. Hos psliculis exutos & k mucilage adherents dcterfbs, fuper ftoreis aut lineaminibn5 expanfos Soli exponunt, donee humore omni evocato perfecte exficcentur.

Nuclei probe (ut loqui amant) curati guftu (ut diximus) fubamari fiint 8c pingues feu oleofi, calore temperaci, ut nonnullis videtur ficci 8c adfringentes, quod non probat Hughefius; uti nee Pifo, quifubftandam *Cacao* ex craflioribus fipiul & tenuioribus partibus compofitam tribuit. Nam in pulverem (inquit) redigicur primurn, & fblâ mox, etfi frequenti tufione, pinfitur, Be in maffam cogitur: Quod cum fiat fine ullius rei admiftione ratio^arguit aliquid ei inefle tenacis 6c bkuminofi humoris! Multa infuper eidem, quibufcum fuapte natura immifcetur, infunt ignea, quae neceflario incidere 5c referare detent corporis meatus, non verò pracludere, ut quidam volunc, nifi hoc intelligatur ds crudo, vel tofto, vel Saccharo condito, quo mulieres in Indiis nimum vefci amant unds uteri, alvi 6c hypochondriorumobftrudtionem incurrunt difficillimas. Verum totum hoc oritur, quodd interior ejus fubftantia denemm inciJione non exatfe comminuitur, necperfecte commifcetur: requiritur enim artificiofa molie verfatilis contritio, atque tune demum fiiquid noxae fuiperfit frigiditatis aliorum calidorum commiftione temperatur. Hughefius negat ullam, mulieribus Iridicis ex horum e(u, noxamacedere; feque iacpius efitaſſe cruftos magnonumero turn in Jamayca, turn inter navigandum, nee tamen ullum inde nocumentum fcnfible affirmat. Eleftione tamen utendum, nee efitanda5 mucidas^ cariolas aut ullo modo corruptas feu vitiofas: verum integras, pingueSj benè affervatas fie fapidas. Afibrit tamen nuces hafce quantumvis diligenter curatas exficcatas 6c reconditas à marina tamen aurâ, inter vehendum, aerifque mutatione 5c humore nimio affici, fitum conrathere 5c paulatim corrumpi, ut multeanquam hue appulerint cariola, mucidae aut aliquo modb vitiofi inveniantur. Reftat enim ctiam in optipie aflervatis unftuofitas quaedam, quae eas CCEO humidior ad inuorem 5c corruptionem difponit. Hinc ma(Ta Chuculata: qua: in America conficitur longe przftare creditur ei quae ex nucleis hue tranſvecais in Anglia paratur. Afferit autem turn Hifpanos, turn etiam Anglos arborum harum magna Pomaria inftituere^in quibus eo ordine eaque diftanciâ^plantas difponunt quo noftrates Cantiarîi Cerafos folent in Cerafens. Solum autem initio Uvigant, & ab inucilibus herbis expurgant, quas etiam deinceps curioſe evellunt, ncarbores eis fuffocentur, aut detrimendum capiant.

Dè Chocolate.

Chocolate Hifpariis reliqtiiſque Europaci, *Chocolate* Mexicenfibus, aceipitur vel pro Maſſa ipſa h nucleis *Cacao* vel Solis, vel cum aliis fructibusaut aromatis'mixtis, confe&a, vel pro potione inde faſta. Simplicia alimentaria 5c aromatica qu2 *Chocolate*: compofitionem ingrediuntur haec recentefent Pifo 6c Hughefius.

i. *Atollâ* i.e. Mayzii five Frumenti Indici farina, in aqua ad modum pulcicula: foluta.

i. *Acbiote* feu *Acbiotl*, i. e. grana rubra fructuum *Urucu* è quibus paſtillos faciunt ad tingendum ntil^ quos & L *Chocolate* admicent ad gt-afuni firtiuI iaporem & colorem communicandum,

5- *CbiUi* feu *Cbitte*, i.e. Gappicum feu Piper Indicum: quibhiam valde calidum eft pauca quantitate ad orexin excitandam *Chocolate* admifcendum eft, n6h tarita ut fanguinem inflammet.

4. *Mecqxcobitl* Mexicanis quam fie defenbit Fr. Hern, volubilis eft hferba, biſos dodrantes longa, per terrani reperi^ folia ferens magna, pingua, obrotihda, odora 5c acris (aporis, *caules* tefetes, Contortos, 8c praetrquam unde pediculi oriulitut lsvds^ per terram repsntes, at circa fingulos fokurom extortus radices oriuntur fibrat^ capillifre par^s. Fructus Piperi longo perfimilis eft.

Nafcitur humeftis locisregionum ferventium, qualis eft *uaubnahuaemlis* 5c *Hociacoeotbehts*,

Calida eft 6c ficca, ad Piperis longi ſpecies attin ens. Bibitur cum *Chocolate*, cpi gratum faporemconciliat, corroborat, ventriculum c^leſaſcit, oris halitum einendat; craffos lentofque humores attenuat, adverlatur venenis, iliacis 6c eholicis contert, unnam evocat, menſtrua ac partus emoreuos trahit cum *Tlilxochitl*, vivofiiue accel^rat, obſtraſta referat, frigora 5c exiis ortos (flores tollit, rigoribus februm opitulatur.

5. *Xocbinacath* feu Flos aliricuk, *Orejuelaf* HugheC Oregioclck *Chf* ex.

Hujus

Huju5 florem folum ChDColactfimmifcent, [olim immiJcere folebant] ad odorem Be faporem Jiavcm ei addendum.

6- Vaymillm feu Banitns^ i.e. Ttlxocbitl Hernandez, de quo* alibi diximus.

7- Rper Tavafeï five Xocochochid Htrnana. Piper odoratum Jamaycenfe noftratibus, CarP^ balfamum D#«». Hughefius inter fimplicia Chocolatam ingredientia recenfec, de quo alibi diximus.

fl. His addfc Pifo liquorem quandam refinofumj Tn^xPHw, quejn Indi Holli, Hifpani Ulli norri-Tiarunt, deftillanuem ex arbore Holgyahuytl difta, feu Chilli, qua: ftipite eft larvi, Kc. Hicriarius admifcetur Chocolate, cunc potiffimum cum Diarrhoea: aut Dyfenteria: mederi volunt, nielicque quatuor Cacao uncia unica Holli mifcecur. Verum C^c*? nuclei ob pinguedinem, & gummi /ftft ob renaciffimam gluten primum debenc torreri, ne viscera obftruanc Be cachexias projucant.

Hie aliaqiiB vegecabilia finquic Pifo j Novae Hilpaniz patria^ non idcirco putavi, recclenda, quod omnis potid Chocolaca fimul ea recipere debec, fed ut ex iis quifque fibi maxime conveniens eligat. Indi ante Hifpanorum advenumfimplici Cacao farina contenti a compoficionibus abftinebant, fanaticis potius tueads foliciçi, quam palato gratificandi.

Injamayca Cacao nuclei crafe contriri in panes feu mafas libral?ajic bilibrfes trifer^5 efformancur abfque ulla mixtura- Hanc pafam antequam pro pocu utunrur radula in fobem i^ pulverem teniffimum comminuunt. Atque hanc mafam a mercaconbus K naucis in Anglian* farpe allatam, ex optimis eTe pafcis qyx Chocolatz haberi poflunt aErmar Hughefius. Nee ening conveqjr, inquir, ut nuclei in renuiffimas particulas cDmmnuantur, hinc enim aens impofiffionibu magis obnoxia evadic mafia, & fpiritus foluri facilius evolant, relifta pafsa fatua & rufpoda.

Varios ChDcolacam paradifi & componendi modos defenbunt P^ & Hughefius. 1. Laca nuclei5 probe curatus, & in fuba, vel fupra jentum ignem in vafe convenienti ficutos, detracti, curiclis in mortario marmoreo tundunt & comminuunt in particulas renuiffimas, pafsam inne ernientes quz vei leorim, vel addito DVOK tanna: Mayzu tantulo in idtuos, p^ aliafye mafas formari potcft, vel in pyxides immicti; qua: fuper affres feu tabulas, xquales lupposito folio aliquo aut chaïta munda in umbra ficcanda, (in Sole liquefcunt) adeoque brevuncp-referit paf.1; Be ad hebdomiadam, menfeni, anni dimidiunj, auc etiam incegrum annum pr^ ulu qu tidiaht lervari pDcdt.

Si nucleos fupra ignem exulcas uivciidum tibi eft ne adurantur. Nuclei non tundendi funr, ne plus arquo oleffi evadant. Panes & roculz Chocolaua: curiofc compingi Sdae debentnemis aut fiffunshient, ade6que acre fe infinuante mucidi brevi fiant, nee diuduren-

2. Nonnulli fopra lapidem ampluma:qualem^ja:vem Scperpolitum cDmmolunc nucleos in renuiffimam farinam. Supra aijum deinde qucm in promptu habent lapidem auc Jaminani ferream farinarn exendunt, 6c fuppoico JentO igne quantus fufficia adimpediendum ne lamina: adhirecat,manibLi5 iubiguht & efformantin rjuafcunque placuerit figuras^ vel fcorfim, vel cum tantillo Nottjyppx cap diaca eft: Acque hie fin^Urt) optima eft Choçolata: pafsa, utpote fimpliciffima, quaque In olim ante Hifpanorum adventum ufi funt. Tanturn enim abeft (ex Autoris noftn fententia; uc niixciitaj illx 5c varia lri^rediençia Chocolatam meliorem reddiderintj uc earn potius depravaverinE iL plah^ conupenne.

3. Hifpani 5c noftrates CDS imitati nucleorum Cacao pafsa: adiciunt vel ChiHe, vel Achioie, VS aliud quodvis a fiipradiftis ingredientibus^ vel plura eorum fimul, qux haberi poflunt^ pro guffi* conficientij vel pro utenrium conftitutione, velmedentis fcopo addita tandem facchari q. I. aitem qua: mafae admifcenda funtfeorlim debent comminui Be in pulverem liibtilem redigi. thodum conficiendi madam Chocolate compofitam hanc credit Jul. Pifo.

Cacacius carterague ad mixturamhanc pertinentiapiniuntur Japide quodam Metatijsnomine ad hujulmodi udim excavato: Animadvertendumaucem eft i. Ut omnia quo meliusfrangi ante coreantur^ingredienria, prarter Achiotm. 2. Ut liligentiaadhibeatur ne adurancurnjgrumq^ CDmrahanc colorem, auc nimio admota calori inficani fuam exhalent virtutenij amarumque acquirartefaporem, Prxcduncin comminutione CinnamomumBc Cbilli, quz fimul cum Anifonioluntur; pofremoautem loco Cacacius ipfe, qui paulatim confingendus reftat; fingulis quippe viciou quoties quid de eo mola: fubjicicur circumagatur lapis ut facilius diflihat, mehufque conteraqi^ deinde in ahenuni poll Cacarii comminuti ingredientium pulveres mjiciuncur, qui-lignea fpatula cidem perniifcentLU-. Cq lift a in unum mafalapladi rurlus fubditaj cui fubjetta; a ni^rint prunx, prquajn optime diluicur. Cavendum tamen eft, ne vehemencior iuponatur DC butyrolus iimJo calore effervefcens humor effundatur, Achiocem-velim Cacacio admilceas, *? cum co molacur^colofemque melius acquirat; carteri pulveres cribrD antequam confundantur fecffi debent. Qiiud li JuffiLics fada fuerit conentio f quod videbitur cum nulla amplius putamina^P" parijerintj fpachuU maflz pars eximitur, quzftatim fundecur in orbem, acque in arcufas tune re; ponitur^ CLinque congelalcit dura coijijit. De modo efficcandi arborum frondibus auc chaj^ munda luppolica eadem hdbet qua: fupra exHughefio retulimus-

Ehudei5 Cacao oluum exprimi poteft quemadniodum ex Amygdalis, S£ ad eadem utile ad Amygdalinum, acque eciam fflicacius.

Ilideni etiam nucleis Mexicani ohm aliarque nationes Americana: pro nummis ufe fr^ iaAnuuiucuntur;e61queimicati Hifpani eospro mercibus permutant- Modus quo ex inafli laia: potus paratur Gul. Pifoni duplex traditur. Primo quidem modo diluicur Choçola^ rngida, Ipumeifque ejus humor cuidam infundicur pollubro, id ven\ quod remanetigni nque Saccharo. Hoc poftquam incaluit cum fpumea ilia a qua fejunfta fuic icerun aquam, & C in vafe repp^ nni acque bene delata eft reliquarum calida cum Saccharo in vafe convenienti mifceti & hauriri. Si placu^nt fingiit potare Chocolatam, diluic Chocolatam in aqua, molaque vertitulis fubditis fpa

mam elides, qua magis augebitur quo diutius Cacacius ipse omniuitur: effusam in xquali spumam paulum impones; id quod remanens miscebis cum Saccharo, supraque spumam immittes, frigidamque potabis. Verum non confert omnibus temperamenti huiusmodi partibus obnitiis frigidis, tacem.

Ufitatissimus huiusmodi potionis prarparandi modus pro vulgo, agricolis & fervis in Jarnayca alioque infulis nostrae ditionis hic est, referens Hughefio.

Rotulos vel massas Choepkta; penitus exsiccatas. Be aridaj (nam duas, fere septimanas à phria cdmphitione requirit, ut probe fermentetur Be efui apta evadat) radula finneain scobem subtillem deterunt quantitate sufficentj. Deinde aqua frigida, clara quantio potus est (quam in huncufum paratam habent) panis Caflavac distac aequalem aut paulo minorem quantitatem quam sic pulveris Chocolacar infundunt; qui in frigida facile liquescit & dissolvitur. Sojuta Caflava aqua illam vasa idonea infuram supraignem suspenduntj Be cum bullire incipit chocolatum deralam infundunt, 6c ad horum paene quadrantem decoquunt, sepe interim liquor em versando. Decoctum in pelvim auc catinum effundunt, Sc paulillo Saccharo edulcoratum, cyathis hauriunt Sc calidum ebibunt. Atque hoc quotidianum est jentaculum fervorum ge operaribrum, sine quo labores suos improbos Sc aerumnosos tolerare nequirent-

Sunt quoque pro aqua Chocolatam cum lacte temperavit, aut lactis Sc aqua quibus partibus. Verum tamen nostro palato fapic, minusque obstruit qui paratur ex aqua simpliciter edulcorata, Chocolata comminuta, BCDVD uno aut altero. Ova enim efficiunt ut aqua & Chocolata uniantur 6c in unum corpus quasi coalescunt. Atque Atolls feufarinam Mayzii, Be Caflavam contritam admiscunt.

Alias potionis prarparandae modus vide apud Hughefium.

Carterum potus hic moderate admodum siccitatis est, quotiat obstruentis naturae esse videtur. Quinque vel sex unciae mane cutissime forbentur panni fere anni tempore.

Potus sumptam potionem femihoraxatithora: integra spatio quietere oportet & C à laboribus cessare, hanc concoctionem impediatur aut turbetur: à cibo etiam aliquandiu abstinere convenit. Czterum Chocolata stomachum corroborate ciborum concoctionem promovetj tuffi Be asthma conducti, fitum mirum in modum refrigerat, continuato usu corpus pinguefacit, diaphoretica etiam esse 6c fidoriferas vaporibus blandis ad caput elevatis omnium inausit placidum Be tranquillum, adeo copiose timent Be vires reficit ut commode satis absque ulla alio alimento eo bis in die hausto vivi possit. Lahore immoderate defessos Be exhaustos finitice recreat, Be vires instaurat. Cuicumque constitutione Se corporis temperamento convenit, sic sine periculo iimipoteft, à quovis sexu, ztate, conditione, etiam non pblervata exacta dofi, modo ad fatietatem sumpta nonnimum gravet ventriculum. Ut verbo aBvlvam cardiaca est, Be analeptica egregia, potio hanc verè neftarea, multi Be optimi nutrimenti pabulum, inquit HugheC Be supra aliud quodvis alimentum, praefertim intra limites Zona torridae corpus reficiens hanc pinguefaciens. Quin Be fumme commendatur (inquit Sdiroderusj ad roborandum vitam balsamum, Be Venerem proritandam, Revera omnium qui in America aliquandiu vixere unanimi consensu & testimonio saluberrimus est iis regionibus Chocolata: potus, adeoque necessarius incolis Be advenis, ut xgre sine eo vitam tolerare, nedum labores suos obire possent.

Medici ad varios morbos Chocolatam accommodant, medicamentis copD suo convenientibus amixtis, v. g. ad ventriculum roborandum Croco, ad fluxus alvificendos Cinnamomo, nucem moschatij aut limatura: chalybis cantillo; ad tuffim Be raucedinem Amygdalis earumve oleo Saccharo aut Saccharo cando. Bee.

D. Quatremain M.D. Haemorrhoidas feu ficos ani in seipso curavit, partes affectas butyronucis Cacao inungendo- *D. Stubbes de Neftare Indico*, p. 180.

Phthificus fere deploratus robori sum Be fanitati restitutus erat prarter omnem spem à quotidiano ulli Hiicum Cacao, feu potionis Chocolate. *D. Mundy in lib. Je ptulthtis*.

Ghymicam infuper analyfin nucis Cacao, è *Lz Febure* aliorumque Chyriicorum scriptis excerptat ad me transmissit scem eruditissimus Vir, D. T. R.

Nucleorum Cacao non decorticorum unctae osto in pulverem comminutae Retortis inditae, substantiae adeo fixae Be difficulter resolubilis se effe prodiderunt ut modica ignis vi nihil redderent praeter album quendam liquorem aquae instar chrom Sepellucidum, idque pauca quantitate, quem pro phlegmace habuerunt: Austo igne ad eum usque gradum qui spiritui vitrioli elicendi sufficere decem horarum intervallo elevatus est spiritus Vaporum specie lactei candoris, qui praeter aliorum spirituum morem in phlegmate libidit ad fundum vasis recipientis; tandem adhibito igne vehementissimo reverberii in vegetabilium destillationibus minus usitato, ascendit oleum intense rubicundum Be velut sanguineum, verum pellucidum valde, quod refrigeratum crasse citinstar olei feu butyri cer. Destillatione perasta Caput morcuum Be Jvij-pendere deprehendebatur; Spiritus (i): oleum siijfr reliqua materia in operatione affluenda. Spiritus non admodum fervidus erat sed penetrantissimas, nec gustui, nec olfactui ingratus, quod modum esse sblent h (anguine aut carnis elicit). Oleum pauciter mirifice pun git Be penetrat, fale volatili cujus magnam quantitatem continet Hordum separato, fitque valde aromaticum Be cardiacum. Spiritus brevi acefeir, quod acetum copiosum continere; prodir.

Cacao similis fructum J.B.

J.B.

Cacao fructum magnitudine paxne quabat, membrana fusca testus, psr medium fecutidum loxigudinem divihbilis, ut Amygdalae, Avellans, Glandes 6c similes, non oblique ut *Cacdy*, eisdem tamen cum illo fapoi & forfitan ejus genus.

HISTORIC PLANTARUM LIBER TRIGESIMUS

QJTI EST

De Arboribus Fru&u per maturitatem ficco.



m autem dividi possunt in I. *Nnfr*as, qua: fructus majores producant duro nuculum continentes, 2. *Bacciferas*, Baccas voco fructus minores pan^ro
3. Frudhi alaro feu mejnbranulis aufto donatas, cujufinodi dn^ deer ix
4. Lanigeras. f. Multifiliquas. 6. Dicoccas. 7. Tricoccas, Kc
Nos diobus prioribus quia numerals sunt duas SecSiones affig
una SeAions coinprehendemus.

SECTIO I.

De Aboribus Flore ad imum Fruttum Nuciferis.

CAP. L

De Aboribus Fruilu Jicco squamifis.

1. *Talmapinus* fi'vt conifer a J. B. *Talma conifer* a ex Guinea [quantã ad pediculum converfs C B
Tccoll, *Talma montensis* Fruttus S.R.Muf

HUjus fructum sic describit J. Bauhinus, Figura ex magnitudine oratus, cortice ornato fol-
vo in spadicem pulso & splendante, dorso satis, retrogonis squamulis pyxidat

§;ulu* per univeiii fiudtiislongitudinem de/cendit, uno infrgn^ exteiifiue ampliore canaJi eodeifl ^
dine ac defcenfu inter oeteros confpicuo. Parte iiperna apex eminet, circa quem longè minuti
squamulx reliquarum ferieni claudunt, & indiftum apicem fattgianrurj pulchro prorus 8c vi
iloaitificio. Ipfcfructus concufu (onorus intus contentum nud^um prodir.

Fructum hunc cum iplã arbore Lobel. & Penain Adv. sic dtscribunt, hujus arboreip Q¹³, u¹²
dam hybridam ex Palma & c Pinu natura ludibunda conflãfle videtur. Eft quippe lignum W.
fungosi Palma: pro^ (um texcuni, in villos delilheis & c /quamofa cute loricacum^ fattigio
juncroffis & in oibem exortis lurculolTs ligulis 40 aut 50- compaftili verticulorum & Itju¹²
ièie pyxidariu airculatis pedem longiSj rDtundis^ paruin comprelGs: quarum fingulis conundãte
lingulinunicrofi com altiüliiferuntur^ triceni aucquadrageni, quimedioerem conum Cadi conate
riuntit, pulvillis in quincompan digetis, nãculatõque & imbricacim exuberante venulofo nucis
cortice, fulco, tãtu, pulco, crãffis & concrecione Nucis Indice; intus nucleum glandãrofo
DDiujigãu [iciyuiuntiani auc auas unãa^ fungãfij tuncinejice, praauro, inque Lãvina agrã fia:
till, guilu Glandis & CaffmeaT] qua: funt ei genti panis fupplementum.

Fructuj hi cumramo cui undecini inba:rebant a Cluffio in *cur. pofit*, deicribunturj fiib ^no cao
rici aibonSaucfruticisrami cum fruttibusquamoffis: locum vide.

Lobel. in *Obil* Avellana:Indicx genus oblojigum *Clnf*. idem cen/et efc cum *nuckohuP* Pulmã
Pini, quod & D. Arnold. * *Sjtn* affiimat.

*lii or D. Grew in *Defcnpr. MaJ. Soc Reg.* fcribere nullum autorem fitus *iquamifis* hujus
lino^ cum apigibus ici. ad pediculum converlismejuuifle, (iquideai tum Clulius tum *Bauhinus* opis

* *Woir in*
Fav. Indol.

3. *Talpa conifera fyuamis furftm emverjis C. B. Fruttts ftrepinus Ahiegna: nuci ferjimilis J. B. Cluf.*

Cylindr^{Did} erat formā, ties uncias longus, binarum unriamm ejus ambitus/ multis veluti fqr> tnis, imbricum modo difpofitis confans, in medio nonnihil CDinpreffis, oris tenuioribus & quodammodo villofis, infar pznc abiegni ftrobili, fed brevior colors ipadicco, gravis & nucem vel nucleum continens j nam agitatus crepitabat 8c fonitum edebat; brevi fragiliyu^ pftdiculo fūbaixus eflevidetur. Nucleus oblonga: formae eft, durus, fbldusj, quique confrailus eyebras venas oitendic> quales nux Faufel Be nux mofchata habent: Detsrius Be bevigatus pro infigni aliquo Be raro lapide ab impoftoribu5 interdum obtrudi folet,

4. *Fruftus fyuamofus whicuJaris major, Juglandis magnitudim G. B. Fruffus alms pregrinus de- * Exot* / gam * Clul! Fr. peregrimis ehgans fjuamofus J. B. c- 3^*

Formā non diffitilis erat proximē fequenti, fed longs major, ut qui Juglandem externum lium viridem corticem adhuc retinentem craffitudinis iiperaret, orbicularis pxne figure magis taliari deprefli, Be quafi in umbilicum lidentis fiiprema Be ima parts, (inter quas trium ferē unclarum erat interftitium) Be paene fex unciarum ambitu. Conftabat verb veluti fyuamis elegantiferie in obliquum difpofitis ab extimo versus petiolum tendentibus, illifque quodammodo ihtūis 5c lacunam habentibus per longitudinem: Squamula: autem petiob prpximē furfūm vergens nonnihil yidentur: Nucis color lpl en dens Be ipadiceus, eaque nudeum confinebat; Nam cpmota Se agitata ftrepitum edebat: valdē tamen levis erat pro ejus craffitudine.

4. *FruElns ftjuamofus orbicularis minor AveUante magnitudim C- B. Fr. txilis Cannae de Bengals* creditts Clul Exot. 1.2. c- 3. J- B. An Fruttus Canna fm Arundinis Rotang di&# ?*

Parvae Avellanse nuus magnitudine erat, valdē elegans, orbicularis, nifi extimapsarsinmucronem abiiffet: Peciolum cui inhaerebat brevis, tribus appendicibus velut calyce fraftum imā parte apprehendens, qui tanquam fquamulis ferie quadam in obliquum difpoficis conftabac, ab extimo verſu? peciolum vergentibus. Flavefcebat autem Be inanis^rat. Abdalu Guzaratenfis Cannx deBengala fruttum efle, fed exilem fie immaturum dicebat; quod & nobis videtur, & forte Canna: feu Arundinis Rotang diftXj de qua inter Arundines egimus.

5. *Fruttus fju'emofin orbicularis fuhis reftis, ohliquis & tranſverjis C. B- Guyan* fruftm tlegantijji- * Exot. I, %i mus * Cluf Nux Indica tejfellata prehans. J. B. c- 4-*

J. B.

Amplitude) ei quern delcribit J, B. fecuncialis, exactē propemodum rotunda, nifi utrinque levitec feHilis effe. Inrernē finum Be pediculi veftigium habuit. In cortice decus praccipuiim, qui culmum craffus Be firmus fatis, exterius laevis, (plendidus, Ipadiceus, totus teflektus, fulcis ac friis impreffis per fingulas tefellas fecundiim longkudinem excurrentibus, Be rufus aliis oblique Se intercuffatim, pulcherrimo mehercle naturae emblemate. Corcicis interna pan fangofa, Sc eadem psns qux intenoris corticis Cadanex, tarn colore quam fubftantiā, fed deniior ac minus villola Nucleum continet, magnitudine ferē Juglandis, fed rotundum aut certē rotundo proximum, fiiperne umbjli- ED przditum fatis infigni ā quo per ejus longitudinem iilcus infignis delcendir, fubftantiā offeā, qui ferrā diffeftus ebur politum colore, l^vove 6c duritie. refert, lapore quidem nullo manifefto, aut qui vetuftate exoleverat-

In uno hujus generis fructu, quern vidit Clufius, fquamae magis diftinctae apparebantj Sc ā fummo ad imum progredi manifeſte conſpiciebantur, non ā pediculo ad fummam partem; quod in duobu5 aliis obſervare non licuit adeo arte Be firmiter cohrebant, ut ipfum cerium live mtegu- mentum fulcis duntaxat diftinctum videretur.

J. Cluf Guyana.

C A P. II.

Malm Indica pmo cucitribitaformimonoſyrmQ. Iripa H. M. P. 4. T, 51. p. 6f-

H. At.

ARbpr eſt procera, 60 circiter pedes aha, caudicz craſſo, denſo, cinereo, cortice obduſto nigricante, intus rubicundo, necnon ramulis cinereis Sc lubvindibus plurimis donata. *Radix* rubicunda, flavefcente cortice teſta, necnon fibris ſuis latē per terram ditFuia, fapor acriſj odo;; nullus. *Folia* gerinata ordine parallelo ramulis inhserent, oblongo-rotunda, glabra, denſa, fupernē colore atro-viridi nitentia, infernē viridi dilutiore^ nſrvulis exiguis plunmis c media coſta in prona parte extuberante, Sc folium per longitudinem medium inſqualiter feeante, oblique in latera excurrentibus: Odor nullus, fapor iualtringens: *Flores* inter blia circa ramulos ſparſim proveniunt, exigui, candidi, inodori^ ē quatuor acuminatis foliolis conftantes, qua; intercedunc °fto *fiaminuh* alba, *apcibus* rubicundis donata, medium occupants j^/g candid, qui ipſius fru- nvis rudimentum dK *FruBus* oblongo-rocundi, comprelli, inajquales, ac filco frnti, cucurbitis formā hAud abJimiles, cortice craſſo, coriaceo, necnon carnpfo, molli, ac pulvinate teſti, Amygdalr in modum; qui fructibus in matuitatem tendentibus, in utroque latere dehifcit, jēlēq, apſ- rit, ac *Nudeum* relinquit albicantem, tenui pelliculā dndILmi, dcnJiun, compaftum, inodorum, fepDrifque adftnngentis.

C e e e e e x

Creldc

C A P. V.

Arbor Brafiltenjis nuciftra, fruttu gminum nuchum continens Anda Pifotiis Se Marcgravii.

NON procul à litorenfibus, nunc itiediocris, nunc finima ahitudine pro terra temperie ex-
furgit arbor *Anda* quz ligno est laevi, raro Be spongioso, multique uiuſ. *Florem* factum
magnum Be concavum, aurei coloris. *Folia* nunc copulata, nunc inordinate Be folitari-
pofita, in extremitate acutinatata, neruo refto Be venis obliquis confpicua. *Fruftum* feu nucem
fert cortice duplici, exteriore cinerice [viridi iriftar Juglandis *Marcgr.* interioris ligneo prsdur-
o Be perforato, [una extremitate acuminatum, Be unolaterè fiſſuram habentem ;] quoduxglan-
des continentur, jecinori leporino non valde diflimilès, Be nucis Caftaneas fapore quodammodo
references, licet virtute Be qualitate differunt. Una fiquidim atque akera cruda manducata alvum
ducit, quibuidam Be vomitum exciſat. Validac est operatorioſij quamobrem zgris morbo fraftis haud
tutò exhibetur, niſi corrigatur Be in Eleſtuarii aut pilularum formam redigatur- fit duas vel tres
Caftaneas, contuſas Be cum faccharo deſpumato excoftas, additd Anifi Be Cinnamomi momentd,
gratiflimum non iblum erit medicamentum led Be tutiffimutti irifantibus iifque omnibus qui apw>
gantibus iolent abhorre.

Lufitani de indigene ex eadem nucè oleum expntent, quod lychnis affundunt, atque eo corpus
inungunt- E cortice autem uftulato in cola: optimum Be familiarè remedium contra veitris fiu-
xum, iifque quibus poll aflumptam nucem alvus immoderacius ruic, ſubminiftranr.

Barban corticcilliusutuntur ad capiendos pifcesj aqua enim in qua maceratus fuerit omnia anima-
lia foporantur.

C A P. VI.

*Iba-cura-pari Brafilinſibus Marcgr. p. 119. Arbor mmjret Brafiliznſis fruſtu friato cucurbitifirmi
multos nuchos wntimtz**

Marcgr.

ARbor *folia* habens in frondes congeſta, pedem longa, duos ſc femis digitos lata ubi latiffima,
lingua figura, ad pediculos a cut lor a quam in extremitate, figura foliis *Janipabjs* familia,
nervo lubrufo ſcundum longitudinemj Be aliquot venis tranſverſis conſpicuis.

Fruſtus illius magnitudine reſpondet Aurantiò malo, fed figura (imiſis eſt pan'o Peponi
aut Cucurbitis; nam rotundus eſt, Be paulum comprefſus, ac qnaſi friatus, tot frias feu cavitates
fecundum longitudinem habens, quot intus Caſtaneas continet, nimirum quatuor, quinque, ſex,
aut ſeptem, magnitudine nſtrarum Caſtanearurti: Cortex exterior viridis; interius in tot locuk-
menta dividitur. Cjuſlibet caſtanea cutem fragilem habet^ Colore IfabellinD difto, feu flaveſcent>
Be plendente: Nucleus albiffimus edulis eſt.

C A P. VII.

*Nucifera Brafilienſis cortice fruttus ligneo quatuor nms continnt. JacapHcaja arbor Marcgr. Ja-
afucaio I. Pifon.*

Marcgr.

Altiffima eſt arbor, cortice gryreo, duro. Be inaequali, inftar veteris *Quercus*, ex quo àtra-
mentum ſcriptorium conficitur. *Folia* juniora ruſa funt, vetuſtiora viridia, Mori foliis fimi-
lia, in ambitu ferrata, quodammodo contorta Be incurvata, alternatim in ramulis ſibi oppo-
ſita. Poſt florem [quſm nondum videre licuit] *fruſtus* fequitur, quilibet ſuo pedicub craſſo, ligiieo
dependens, magnitudine capitis infantis, figure ellipticè, inferius veluti in conum obſiſumfaſtigia-
tus, ſuperius five ad pediculum depreſſus, referens poculum cum ſuo operculo; cortice ligneo Be
duro, ochrz coloris: operculo autem remoto ſnam ipſemetfruſtus maturus ſe aperit) decidit oper-
culum, Be fruſtus interius in quatuor interſtitia diſiſus videtur: Be in quolibet loculamento caſtanea
invenitur, pruni magnitudine, cortice ex flavo ſubcinereo, rugoſo, qui contuſus nucleum exhibet
album, optimi ſaporis. Nucis pariter maturitatem confeſcutac excuſſo tegumento E calycibus ſponte
decidunt.

Semel in anno matureſcunt, media videlicet hyeme:

Tempus.

Cxterum arbor in falibus Be mediterraneis locis adeo luxuriat, uc juſto exercitui ſufficienti fu-
ſtentaculo fruſtus ejus aliquando fuerint- Sapore Be excellentia Piftaceis adacquatur, 6e Venerem
ſpitam dicuntur exdtare.

Potiones Be pultes tam ad Medicinam quam ad epulas ex illis comparantur. Oleum quoque pin-
gue ex illis exprimitur, Amygdalino calidius: Prſtat aſtatis quam crudis veſci quod caput infe-
ſtent. Tahts duritiei pyxides funt ut Tepuycriſ non modo vaſa potoria, fed Be dilcos Se ollas
inſiſant.

Dux reperiuntur ſpecies ſibi ſimiles externa figura, fed qualitibus internis difcrepantes - nam
altera ſpecies calices magis deformes producit, eorumque nucis digmtate inferiores habentur, quip-
pe BX immoderato illarum ufu quibudam capillos defluxilie incola: ceſturtur.

Utriusque lignum putredini mire reficit, unde De fummam simul duritiem moleididorum faccharum axes ex illo fabricantur, carteraque arborum multum anteceljit. E cortice exteriori iicato Be contuso fie fluppa rufefcens, quo ad obcuramsnta utumur 6c naves.

C A P . VIII.

Ind vllid ^

Arbor Totocifera Drdlanepum ^ indigmis Ademonie Totocke De Laek

DeLatt.

Rbor est vaje ptercera & rafnola, foliis grandibus, 8c quae forma non multum ablundum ab Ulmi frondibus, obfeure virentibus, nifi quod postica parte nonnihil videntur candicare. Nullos Fzrtflores fed certas gemmas quae colore nihil differunt a foliis, quae fenfunt crafcunt 6? protrudunt friiBum grandem, mole interdum capitis humani, pasne rotundum, ariticaparte n'pnnihil compfeTum, cortice ligneo, duro 6c admodum craffo, exeriori friato 5c tuberpfio, cploris fufci &c pacne nigri. Dividitur interius certis fpatis in fex veluti regiones, in quarum fingulis cpntinehtur octo, decem, 6c interdum duodecim nuces, arfte inter fe conjungtar, quae finguk iterum ligrieo, duro, & fatis craffo cortice teftz funt. Sc varia: format, pleraque tamen triangulares, una parte convexiorej cum tribus veluti futurisj valde rugofe Be apera, minus tamen quam exterior cortex, tres uncias longx, Be fefquiunciam latz, colons roffi Sc interdum cinerei aut fufci. His continetur oblorig nucleus totas implens infar Amygdali, rubicunda membrana teftus, came candidiffima 6c flida, 6c nonnihil oleo/a. Sapore videtur magis accedere ad Avelanas quam ad Amygdala. Horutn tamen ulum in omnibus egregie potest iipple, etiam ad tragemata faciendaj uti a noftris fuit obfervatum. Barbari attribuunt ipfi facultatem Venere excitandi.

Quoniam arbores qua: hunc fructum ferunc adeo funt ales, & C fructus adeo gravis & C dturus, Itlis macuris non audent Barbari lylvas ingredi, nifi valida parma, aut alio tegmine caput tefti; nam fructus decidenes initar iilicis capuc illis coiriminuerenc.

C A P . IX.

De Cawpbora.

C Amphnra feu Caphura in paies fufilesingentescoafta importatur pellucidos, 5c Candidas totids, fafitii Nitri infar ^ qui pulfu etiam tinnicum edunt argutum, fiibftantia pinguiufcula, 8c quz facile flammam concipiat, quam in mediis etiam aquis inextringuibilem pertinaciter retinet, fiib dentibuslentefcens, fie exigua portione totum os veluti inflammas, odore vehementi. f B*

Csterum nifi diligenter affervetur, ex operucujacis etiam caputlis nonnunguam evanefcit. Affervatur tamen fecur vafe marmoreo aut alabafirnoy Lini Be Pilylii femine fcpulta.

Non una ex arbore colligitur: nam ex cortice radids C&nellz Zeilanicz deftillando elicetur, ut in Hiftoria ejus arboris oftendimus: Be exradicibus arboris cujusdam Japonic ^ minutim concifis fie in lebetem ameam conjefis., quibus aquam ea quantitate fuperaifundunt ut radices modicc Dbtegat. Lebeti autem imponunt pikum vel operculum ftramineum, in acutum faftigiatum, moxque ignem admovent modicum, cujus ope partes radidis volatiles feparantur, adfeennunt 6c diito pileo cryftalbrum infar adhifcunt, qui viciflim aufertur, mundatur, rursufque fuperimponitur. In infula Sumatra, ex alia arboris fpecie obtinetur; non tamen deftillatiohis ope; fed

• Epbemer. Gsrman, n, j s jin. ii. D J. 133.

fponde concretam ex arborismedulla eximunt indigene; qui, referente * U.Grimm. foftquam extefignis, illisnotis, perdpunt arborum divitem esse Camphora; ffoliant eam omnibus foliis, cortice, ^ excerno ligno ufq. ad medullam, qua; ab eis finditur. In hac medulla Camphora eleganter in forma coagulata, infar tenuis cryftallim foliatifalis refidet, qua: a medulla ab CS fepararun Nobis autem videtur ut Be prardifo D.Grimm. arborem Camphoriferam Borneenfem fpecie diftindtam non ei. fe a Sumatrana. Si quidem modus colligendi Camphoram apud Borneenfes non admodum diverfus est aprsedidlo SumatranorLim, ut legere est apud Breyonium, Cent, i- c.6. exrelationeik/«fj&. Sladi, in Tradlatu cujus titulus, Rccbzrcbzj & Ubftvationsn/ituelUs far M. Boccone, hisverbis, Caphura de Borneo, qux mejioris notar Be rarioreft quam Japonica [Libra ejus, teftz Garcia, tanti emitur, quanti centenze libra; ejus qux ex China adfertur] in ea infula ab arbore ibi Liono difta profertur. Huicarboni rune lemons cum Caphura afundare, & L quafi mrgere, i?y?r Graci eleganter dicunt, norunt, fub ortum Solis aurem applicant, 8c notatu dignum frepitem percipiunt; deinde iplam ampuram in partes diffecant, quas findunt, Solique ut ficcentur exponunt, ficcatas in parculas gDmminuunt, & Daphurx fructula eximunt, cribroque a fordibus purgant; fi majufcula fructula offenderintj 115 DCUIDS leniter K leviter confricare folent. Hare autem Caphura plurimum a JapDiica di/ ^ m-gifau-lara & C perfpicua est, nee ullo modo, utjaponica, fponde evanefcit 6c con/umitur ^

Ceterum [ut re<fte annotat D. Grimm.) H Sumatranu Be Borneenfes artetn callerent deftillatoHa ^ longz majoreno quantitatam Camphorus impetrare poffent. Percepit enim ille, quod lignum illud, uti odore Camphorae videtur carere, multum tamen Camphorae in fele adhuc continere. Si eorum transfecum (loquit) lenz difcinditur. forat radices & multum albentis miquedibus. Miquo autem videtur quod/cribic

purficarionBin CamphDra: Japonenfes adhuc latere Matdolo- his miquo etiam fcilicet, a E S j TM o m n e m nudem Venus impolarj ique igne & acc virentis argenti fic ut candidifcat

Frrj,

Camphora Veteribus Linz in Japona, Arabibus primo ccederari corpra est CdidaM. fit * > frigida non convolvit inter malicos. v<uftiDrCS frigiLn pff ft ^ cuunc, so argument qa j j ^

nerem extinguat & libidinem compeſcat, quodque ophrhalmiis & oculorum inflammationibus, tum etiam ambuſtis impoſita, niſi Frigiditatem referat. Recentiores e contra calidam affirmant, quorum argumenta, Inflammabilitas eximia; odor aromaticus penetrantiſſimus, ac ſapor acer; facilis evaneſcentia ob parvum tenuitatem; qua: ſententia nobis probabilior videtur: Ad contraſta autem argumenta facile reſpondetur. Dato enim quod Venerem arceat, non tamen propterea neceſſario frigidam concludi argumento funt Ruta, Vitex &c fim. Ac nee Venerem arceat conceſſerit Jac. Breynius; ſiquidem obſervatum plurimos Camphoram quotidie purificantes tamen fecundos 5c multa atque copioſa fobole Felices exiflere: Nee ſcio (inquit) an multa in medium exempla adduci queant, Camphora purificandae operam navantes conquieſtos, ſe propter traſtationem Camphorae in opere conjugali impedimentum auc remoram aliquam ſenſiffib. Et quanquam forte non iiegandum, quoclam dari quorum vis naturae Camphora penitus extin&a, tamen non neminem novij qui contra Veneris irrtamenta hac refin& ufus, queri folitus eſt, ſe multo magis ad ralia opra incitatum. Deinde, quamvis in mulris affectibus, ut in oculorum inflammationibus, Eryſipellate, actu febrili, &c. refrigerantem poteſtatem obtineat, attamen hoc (inquiuntj non per ſe fed per accidens folum evenit, ac eo ſere modo (ut vult Breynius) quo per ignis calorem candekque flammam aduſti membri inflammatio extrahitur, vel ut immoderato Piperis uſii calor nativus foras pellitur, intusque debilitatur, eaque ratione corporis temperies in frigidam mutatur. Alii alios modos quo hzc praſtare poſſit comminifcantur, quos parcam quoniam non fatifaciunt, parciiti quoniam non omnino extra dubium eſt an JA his affectibus conveniat Camphora, & annon potius obſit quam profit, omitto.

Camphora reſiſtit putredini ac venenis; utide frequens ejus uſus eſt in peſte, malignique moi bis, & febris purridis. Suffocationi utrinae (ubverit Aqua Melilfe in qua Camphora extin&i fuerit propinata. Uſus externus crebrior eſt in Epithematis f. Frontalibus refrigerantibus &c paregoricis, quibus ut commilceatur ſolvi ſolet in ſpiritu Vinij vel conteri cum nucleis feu femine aliquo oleo ginoſo, e-g. pineis, fern. Citrull. &c fim. *Svhrad.*

N. Spiritus vini Camphoram immiflam bevi diſſolvit, quae in forma olei ſpiritus liiperficiet iniiatabit.

Camphoram faponariis pilis admifcere ſolent ad cuti nitorem & laevorem conciliandum.

Somnum inducit Camphora Foris aut intus exigua tjuatitate ufurpata: Siquis vero (aeſius odoretur &c naribus adhibeat cerebrum exiccat & vigias creat, *Garc.* Applicatur in Inflammationibus & C debilitatibus oculorum.

Camphora inter fortiffima Alexiteria non immerito a viris doctis numeramr; putredini mirum in modum reſiſtit, vapores putrefacti & corrupti membri repellit aut corrigit, in magnis tainen capitis & ventriculi doloribus hac caute utendum eſt. *Fabr. Hildann De Sphacelo cap. n.* Camphora mihi nihil aliud eſſe videtur quam Sal volatile oleofum, ut ex ejus analyfi manifeſtum fit. *D. T. R.*

i. *Arbor Camphorifera Jafonka Bffcyri. cent. i. cap. 6. & Hort. Leydenf*

Arbor haec exuberante copia in Satfuma Japohiae provincia, Tiliarum noſtrarum inſtar ſpecioſa proceritate adoleſcit, materie firma, ponderoſa, ex rufo ſubſuſcaj multis ſacis ſegmentis ligni inſtar Juglandisfermij ſcarificata, laporisamariulculi & aromatici, odoris vehementioris neſcioquid adjuniperi lignum vergentis qux non blum ciftis aliisque machinis, ſed extruendis etiam palatiis. in illo Regno infervit. Hujus ramus ex Japonia tranſmiſſus ſpichameac circiter longitudinis tenuis erat, rotundus laevis extrinſecus nigricans, intus albidus, lapore aromatico ad Camphorar accedente. Huic alternatim in zquali lerie ſeptena adnata ſiint Folia, ſemunciali & tehui pediculo, ex ſuſco Ipadiceo praedita, Lauri Leodinenis Batavorum, qua formam & magnitudinem non diſ familia, niſi quod magis plerunque acuminata, inferiori parte albidiora ſubſtantia teiuiore, cum Juglandis foliis melius conveniente: per cujulvis folii medium ſubruſus vel flavelcens nervus porigitur; ex quo alterno ordine, nonnullar ejufdem quietn coloris, ſed magis ad viridra tendentes venae conjpicive ſuſſim in latitudinem ſparguntur; inter quas venulae rurfus quaedam teneriae, latitudinem folii tranſeuntes, ea quodammodo, ſi accurate obſerves, Formam, qua lineae tranſverſe in folio arboris Canelliſe apparent. Haec vero folia contrita odorem (pirant aromatici/ quemadmodum etiam faporem calefacientem, attenuantem &c ad Camphora: vergentem.

De floribus extremitati ramulorum innafcentibus nihil adhuc memoratu dignum percipere potui. Fruſtus autem his ſiſcedentes odore quam folia Fragantiores, t calyculo oblongo, verſus pediculum ſaſtigiato, petiolum tenerum atque parvum habente emicantes: ſub quo nuclea orbicularis, ex nigro ſuſcaj non valde dura occultatur, intus coloris nigri & ſplendens Nucleum continens ſubalbidum bifidum 5c pinguem Faporis aromatici, 6c acrimonia haud ingrata linguam tiſtillantk

2. *Arbor Camphorifera Snamatrana * Grimmii-*

*Ephemer.
German.
An. ii. Obſt
[53]

Propè *Baros* in Occidentali parte inſulx Sumatra: creſcit hcz arbor, magna & denſa, cujus lignum ob duntiem & firmitatem ad arduſcia perurile. Caudicem habet reſta afcendentem; ramos fuos ordinate explicatj elegantis ſbrmae. Folia magna 5c carnoſa, anterieus acuta: quae contrita odorem ſpirant Camphora, qui tamen ceſſat, ſi aliquantifper contineantur ob volacilitatem Camphorar. Formoſus producit *ſusQus*, parvar nucis Avellari* magnitudine, oblongo-rotundos, tenui tunica indutos, quae rurfus, inſtar Nucum Avellanarum alten elegantis Forms tunica: incluſa jacet* qux diverſos habet colores, ut rubrum, purpureum, flavum & viridem; incegrum fruſtum contegit, & inſtar Tulips ſuperius ſefe aperit.

An ab hac diverſa fit Camphoriſera Borneeſtis inquireridum, *Liono* infulanis diſta.

Haec deſcribente *Matthaco Slado* apud *Breymum*, arbor eſt minor glaciſſorquetjaponica (qu* mſrdum vaſtum *QJucrum* zcquat) ejufque trunci diameter ſeptem practerpropter digitorum longitudinem

gitudinem obtinet; ipsi fungosa est, medulla: Sambuci non valde abfimilis; truncus ficuti Arundo variis nodis diffingitur, illamque arborem, qua *Fynak* dicitur, amulatur:

CAP. X.

Helutta-Tsjampacam, five Uaftanea rofta Indica H. M. P. : T. 53. p. 65. *Cafiana Indica florida*.

H.M.

VAft* magnitudes est, *candies* furvo, variegato, crasso, praduero, glabro, multifque ramis, Tiliarum infar, in orbem diffusis donato[^] qui cortice dducuntur era^{to}, glabro, fulv^D; ocloris aromatici, faporis amari Be acerbi. *Radix* fibrata, rufa, glabro Be flavescence cortice tefta; fapor amarm, odor aromaticus. *Folia* brevibus pctiolis ordine parallelo ramulis inherent, oblongo-rotunda, glabra, denfa, fiiiperne viridia, inferne rorc fubcoeruleo, futi in uvis cernitur) obducta, nitentiaj nervis aliquot fubciliffimis Sc vifum pxne fugientibus e media cofa in lafera excurrentibus; odor itidem aromaticus, fapor amarus & acerbus. *Flores* forma 8c magnitudine Roc fylveftnbus feu Eglehtinis perfimiles[^] calyci quadripartito, exiguo, denfo, viridi in. hzrentj quatuor candidis[^] rotundis., ac teneris foliis Conftantes, tenuium ac albicantium *filamentorum*, flavescencibus *aficibus* dotatorum congerie mediam floris cavitatem Be umbilicum occupante: qdor fuayis, rofacus ac violaceus, fapor amarus. *Tr&Bus* glob oil, quatuor angulis eminentiibis fulcatij in vCrtice acuminati, per initia cum maturefcere incipiunt glabri &c fubvirideSj matunratem adepti rufi ac rugofi, cortice prinum urafb ae molli, dein rufo acdurDj caftanearum coitici perfimili, obdufti; intus autem tres quatuorve continetur nuclei, turn forma 5c magnitudine, turn liibftantia & lapore Caftanearum xmul. Fructus vero teneriores circa bafin cenax &c glutinolLira exudant[^] vvv/j[^] cujus odor acris est K aromatipus.

Locus.

Arbor hac ubique in Malabar, prxdpuè in Provincia *Mangatti*, ob florum jucunditatem ftudio-Sc colitur, quos Julio & Augufto menibus fert. A fexto (icionis anno quiDtannis maturos fuftns exhibet, atquenon raro terna fecula frugifera manet.

Virei.

Radix cum zinzibere recenti cDntufa, fi aflumatur, Judores potenter expellit. Similiter arburis cortex cum affiimptus, turn Rib pulveris forma vulneri adhibitus, ferpentum moribus medetur. Ex foliis in lafte dulci coiSis, & addito oleo Palms contufis cataplasma conficitur, quod vertici impofitum vilcidD5 Be pituitofos in cerebro collectos humoresincidk, attenuat, & per nares expurgat: ipfum vero foliorum decoctum potum phlegmata incidendo, attenuando ac expellendo tuflim curac. Fructus recentes cum melle cofti alvum emolliunt Be laxant, ficcati autem, aftringunt; ex iilque oleum exprimitur[^] quod artubus illitutu quocimque illorum dolores jucunde tollit.

CAP. XL

Styrax arbor Ger. J.B. *Styr. arior vulgaris* Park. *Styrax folio Mali cvtonci* C. B. Clje ~~Storax~~

Caf. J.B.

CAudice est Malo cotoneo fimili, candidiori cortice tafalp. *Folio* etiam ell Mali Cydoni[^] minore, fubrotundo, vel in obtufum mucronem definente, fubtus cana lanugine pubeficente, iuperius glabr^D & viridi. *Flores* fert in novellis furculis Arantii, candidos, plures &; fimul pluribus foliolis conftantes, odoratos: *FruEtum* magnitudine Avellanac aqualem, incanunij caliofufco, amaricante, qui in duas, trSs, quatuorve carinas dehifcens exhibet lignofum officulurr, buxei colorisj nucleum claudens aliquando unicum, quatuor 1 in sis fulcatum, aliquando geminum angulolliimj interdum Be tertium: *Hoc accidentarium zlfefutu*. Nam naturd unicttm ojiculum unicum t ant urn nuckum includit. Medulla interna inluavis.

Locus.

In Agro Romano 5c circa Tufculum in fepibus Sc ylvis copiofe oritur; ubi & earn ante nos Cxialpinus obfervavit.

Cordws fructum ut reperitur cum ftyrace exa^{aiu5} defcribit his verbis, Nux Styracina gbbofa! ficura: fructus est, mediocris Avellana: magnitudine, duplici cortice nucleoque conftans: Exterior cortex carnosâ liibftantia, Be in viridi czfio colore, fupremum Amygdala: putamen refert, uin maturitate tribus rimis in tres partes dehifcit, alterum lignofum, durum, flavum aut fiibruffum corticem offendens, quo contineatur nucleus pinguis, oleofus, guftu acris, odoratus, & C rdinofi Styracis qualitatibus refpondens, fed multo acrior Be fauces fcarificans. Qua: defcriptio adamuffim congruitStyracis fmftui à nobis circa Tufculum collecto.

Styrax refina duplicis generis in officinis proftat, ficcus & liquidus.

Siccus, Officinis Storax Calamita à Caruiarum calamis fie difta, in quibus olini[^] (autore GaJf no) è Pampliyilia apportabatur, est arboris defcript* gummeus refino5ufque/uccus concretus, aridus, odons fuaviffimj.

Non fine caufa in calamorum internodiis ogclufus advehebatur Styrax, fi quidem Parfcinofus nofter obrvatione Be experientia propria Styracis gummi fyncerum, arte & prarlo folo à'/*^{dcii} puratum Sc fluidum effectum, non folum commiffuras & articulationes dDliorum verum lignum etiam ipfum zftivo tempore peneCrarej & effluere affirmit, adeo ut vitreo vase probe obturato illud relervare neceffe habeat. Cannarqm autem internodia nullas habent nmas, nullas commiJuraf, ineeque ad gummi Cam ofloracum & fibijie Coniendum gDmmodiiora funt.

N. S. face arbor in Italia achTTM am paucam ferr, ut alia: mult* qux in fervida regione multo

Cxterum

C^{at}erum cum Styracis limpliciter mentio fit, ca vox de Calamira accipienda est. Vim habet, teste Vires. Diofcoride, calefaciendi, exiccandi, emolliendi, concoquendi. Facit ad tuffes, deftillationes, gradvedines 6c raucedines. Convenit etiam ad uteri praedufiones Be duncias: Et menfes potus & appo{f-tus ducit. Alvim quidque leniter mollit, fi medicum ex ipfo cum refina Terebinthina devoretur, Mifcetur etiam utiliter malagmatis difcutientibus Sc acopis. Uritur autem 5c aflatur Sc torretur* 6c fuligo ex ipfo fie velut ex Thure. Quod verò ex ipfo preparatur in Syria Styracinum un^{ueri}tum calefacit & emollit fortiter, capitis tamen dolorem inducit, 2c gravitatem ac foporem efficit.

Invenio, inquit Plinius, pom modico [Styracis] triflitiam animi ref olvi, largiore contrahL Magni usiis est in odorarmentis & iuffiurnigih.

Praefertur Styrax pinguis, lentus, fragmentis albicantibus rufescens, vel flavo colore perfeveranti, qui dum molitur melleum liquorem reddit: improbatur furfurorus, riger, ne inodorus. Schrod.

Storax rubra Officinarum, C- Bauhino cortex est arboris, quem Thus Jndarorum Be Thymiana vocantj quo Judⁱ in fuffumigijs frequenter utuntur: an N^{ap}^jf f^{eu} N ^ ^ . ^ / Diofpridi 1.1. c.xi. quod ex India defertur corticoiim, Mori libro (imilej quod jucundi odons gratia iuffitur.

Styrax liquidus est liquor pinguis, infar Balfami crastuSj graveolens. JSchrod. J. Bauhino meller & tenacis fubftanti^a est, coloris fufci, aut ex fulco rubentis, aut ex cinereo fuTci, odors valido, atque ob vehementiam fere ingratoj in quo tamen videtur apparere remi^{us} ille Styracis calamity odor, multo tamen magis fi linguae admoveatur confpuiuus, dum in nares inde pauca quantitatis ana thy mi ads accendit, iapDre autem acriculo.

De Styrace liquida magna inter Autores diffenfio est; Aliis, viz. nihil aliud est quam Stafte/ i. e. Myrrhac colamen. Quod falsum est inde constat^a quod Myrrhas lachrymal ob fubftantij fimilitudinem in quovis aquofo liquore diffolvatur, Styrax autem liquidus minimè, fed in oleo Be pingui, ut aliae refine. Aliis^a ut Cordo, fattitium quid ex Styrace Calamita in vino ac oleo foluta, admiftaque refina Laricea excofta, quæ decoftio ubi refrixerit, Styrax liquidus ad fundum fededere dicitur^a ad fuperficiem mittens oleofam fubftantiam liquidiorè; alii expreffu idem moluntur. Serapioni Styrax liquidus est oleum ex nucleis arboris Storaciflux expreffum; at cortex fruds ex quo oleum expreffum est, Styrax ficca eidem dicitur. Avicennae Styrax humidus fit per decoctionem corticisj estque colore nigro.

Fax remanens eidem Styrax ficca dicitur, 1. 6. c. 32.

Facilitates Styracis liquidi iidem funt quas Diofcondes oleoStyracino attribuit, de quo fupra.

Styrax liquida C.B. Styrax Acer is folioli

C. B.

Ex radice rotunda, nigricante^a rugofo, liriato^a & quali articulo cortice tedro, folia terna etiam quina, oblongis, tenuibus, nigricantibus pediculis donata ex uno veluti tuberculo prodeunt^a quæ Vitiginea funt, foliorum Aceris vel Platani infar, in laciaias ternas, etiam quinas divila, nervofa, per circumferentiam crenata, 6c mucronato culpide.

Ab Honorio Bellihabuit C.B.

In horto infructiflimo Reverendiffimi Epifcopi Londinenfis D.J/. Compton, culta est harcplanta ab honeftiffimo viro & C ingeniofflimo Hortulano D- Georgio London; transfiffa fuit è Virginia à D. J- Banifter. Q. an fit Acer odoratum Virginianurh Herman? Fructum hujus Styracis Virginiani, conglobate 8c echinatx figuræ est, qualem in pilulis Platani 8c Spargann videmus, mihi affirmavit "D. Tancredts Robin/on, qui eum obfervavk in celeberrimo Mufeo Clanffimi D. W. C. Medu Templi \ ideoque quaerit an lit Placano occidentali affinisj vel lanuginem feu pappum ftrat?

C A P. XII.

Staphjhdendron J. B- Nux vtjcaria Ger. Park. Fiftacia fyfoeftris C. B. €)C 25Iall&Ct put.

Dense fructat Staphylodendron, nonnunquam in arborem adolefcens, cortice virente aut ruffo, niaterie virenti, medulla^a amplâ, albâ, molli. Folia Sambucinis proxima, vel Fra- J L ^ xini, acuminata, argute^a crenata^a quina aut feptena ad coftam annexa, imparialam claudente. Flores longo Be pendub pediculo intervallis verricillatim oriuntur, ita ut eminenti racemulum mentiantur, odore Sambuci, quinis folijs radiatim expanfis, albis, mucrone interdiii foris nonnihil rubente, totidemque candidis, item liirreftis, coeuntibus leviter mucronibus, ut concavam urceoli figuram exprimere poffe videantur, qua: interceding totidem ftaminaalba, apicibus luteis donata, medium occupante^a o albido, bifido. Superveniunt vffica: magna:, virentes, in duosDCilos ecu fcrotum difpertitæ, in quibus duæ nucleæ coharrentes, putamine fragill^a & C tenui [refuiff5 Parkinlbnus lento, duro Be frangi contumaci] colore flavo aut hibrufo, in quibus nuclei C3- rio virefcenti obtefti, fapore nonnihil naufeofa. Ex nucleis calvariæ commodè exprimij poffunt fculptura levi.

In Anglia ffonte narkⁱ hanc arborem pro certo affirmare nDn audemus, quamvis Vidimus circa Pontem-fraftum Eboracenfis provincix oppidum in feptibus; & c in Cantio circa Attiforiffiam gpidum fpontaneum inveniri apud Parkinonum Iegimus. At in Helvetia varhs locis nalci idoneos autores habemus.. Provenit etiam in Italia Be Germania. Videtur (inquit J. Bauhinus) udis & huiidjs gauders locis-

floreit Maio, nudso5 maturat AutumnDj msnfe Septembri, jf. B,

Tragur.

Scaliger hujus nucleus fap.orePiftaciorum die, feque ex hac arbors Piftaciorum medulJam efitaffs feribit. Fniatur ille, per nos licet, deliciis fiiis, tarn lautum ferculum ei non inviderns: Qjii veteribus contenti Piftacias novas Scaligero cedimus, quibus ad fatietatem ingeftis palato fio quantum yolet gratificetur. Nobis naufeam potius cDmmovere Be ventriculum fubvertere apte videntur quam efcidoneae.

Nullum, quod fciam in medicina ufum hafcent. Pauperioribus tarnen multis in locis gbbulos prebusnumerandis exiis conficiunt.

C A P . XIII.

I. *Tiftacia* Ger. J. B. *Nux Tiftacia* Park. *Tiftacia feregrina frittv ractmpfo, five Terebinthus hdi-c** *T&eopbr. c. B. €Jjc Jiffar)ia P? fiffidfcnuftrece**

J.B.

Pl(lachia: arbor, trajjente Rauwolfio, trunco eft craffo, ramis expansis, cortice obduftis cinereo: In longa cofta e ramis propagata *folia* conjugatim difpofita habetj quanquam non ufq; adeo exafte lempsr relpondeant finguiorum foliorum ortus. Sunc ea vero nunc fubrotundaj tunc in Jnucronem acuminataj nervola, Terebinthi foliis, nifi iis majora effent familia. *truBm* Dificinistotiffimi^ Avellana: magnitudine^ oblongi, acuminati, una parte in gibbum criftatum emi* nentiozem prosuberantesy altera depreffiori, in acutum faftigiatij oppofita parte, qua pediculi quo adhaerent veftigium, obtufi; lignofb, lento, fraftu contumaci, ac propemodum inter offeum & i cruftaceum medio cortice, fedtenui, lsevi, candido tefti, cui rugofus alius, ac fere aridus, coriaceus, tenim 8c fragilis fuperfternitur, colore fupremo Amygdalae putamini fimilis, in exoletis nigen Lignofus cortex nucum modo in duas partes feparari foJet, interdum fia ffonte hians. Nuduum continent ruffa pellicula conveftitum in flavo virefcentem, dulcedinis liiavflims, pinguem, halitum etiam maflicatu commendantem,pracferim recentiores. *Flores* racemofi^purpurantes Terebinthi.-^^

Rauwolfiifolia rotunda huic arbori attribuit, 5£ lanẽ iis quae ex nucum fatu nobis ortae flint tali^ fuere. Sunt nobis (inquit J. Bauhinus) rami Piftaciz in quibus folia acuta j 8c à Lobelio aliiſque folia acuta pinguntur, QjiaprDpter diligentibus CDnidj, andum relinquimus an fit aliqua inter Piftacias diverfita5.

Plerique Botanici hanc arborem pro Terebintho Indica Theoplifrafti haBenf^ Et iane Terebinthi Indies defcriptio apud Theoplifraftini latis Ctonvenit Piftaciz. Verum cum in ipla quoque India repenatur arbor correſpondens, &c quae nomine quoque conveniatj maluimus potins pb referre qua: ds Terebintho Indica TheDphraftus feribit, quam ad Piftaciam. Arborem autem illam demonſtrat Rauwolfius, capite de Terebintho a nobis proponendam. Piftacia Syrjae multis in locis reperitui*. Rauwolfius narrat, cum tenderet ex TripoU in urbem Damandt 6c Halepum, fe vidiffe circa urbem *Sermin* lylvas arborum Piftachiorum^ &c circa Halepum quoque admodum vulgatam eſſe arborem-

Vires.

Pittacia ftomacho grata flint- Eadem five edantur, five trita in vino bibantur contra reptilium beftiarum morfas opem ferunt *Dioſc. Plm.* alioqui eodem effeſtus habere quosPinei nuclei aiunt.

Galenus Piftacias tenuioris eſſentfe eſſe feribit, fubamari quid & C odoraci habentis: Obſtrutiones itaque liberare, maxime Jecoris; veruntamen etiam thoracis pulmonifque, parum nutrire. VB-rum Recentiores pleriq;e apprime nutrire Be Venerem ftimulare volunt. Quibus de cauſis Bellariis inſtaurantibus & reficientibus admifcentur turn ab Hi(panis, turn ab Italis & Gallis medicis; imò rantum illis tnbuitur, ut vix ullum fit medicamentum analepticum fine Piftacio. C. Hofinannus £ contra fidenteraffirmat falſam elle opinionem de ^TIUT^PI*, quinimo arduoia eſſe ait in calidioribus non minus quam Amygdalas. At Vejierem augent.; & maximus earum ufus eſt in Italia, teſte Braflavob: Quicquid faciunt flatuando faciunt ob excrementitiam humiditatem. Haftenus *Hofmanni*: cui ut6c Galena, & fequacibus oppono quotidianam experientiam Be Medicorum praxin; quibus plus tribuendum quam Hofmanni auftdritati, aut ipſius etiam Galeni.

Oleum PiftaciDrum potum internos dolores fedare perhibet Matthiolus, quibus origo fit a pituita vicida Be flatibus: Idem prodeſſis contra ſpafmium Be paralyfinj Be interno ulu facers ad generationem.

2. *Nucula exotica Piftacii ſpecie* J. B.

Ad Piftacium fuo clauſum officulo accedit magnitudine ſie forma^oblonga, fiDnnihil anguloſa, SC convexa, inzquali putamine fragili, fuſco, rugofo nucleum comprehendente folidum, coloris obloletij pingui, rancido, [in noſtris faltem vetuſtiſſims] faporeprarditum, quem obvolvit teneriff quxdam pdlicula CDIDHS cinericei.

3. *Tiftachia Virgimiana fyfozfrtris trifolia* H_m Blaf. *Stafhyhdtdnn Virgimianum trifvliatum* H_{er} man. H. Leyd.

Fuliorum temã difpofitione, feminumque in Veficis parvitate à vulgari facile diſtinguitur. Vehcas eſſe tricapſillares feu tripartitẽ divifa^, Be in unoquoque loculo feu ſcroto unam nuclam H_{er} Jemen. conanere obſervavit vir in re Botanica maximẽ induſtrius D. Sam. Doody. H_{er} iitadua feuStaphylo dendron referendum eſt ad arborsfruftu ficco tricocco.

C A P. XIV,

Castanea eqmna Ger. Park, *eyuina folio j^stifido* ^B. *folio tnultifido* C.B. ~~De Bore: De Bore: De Bore:~~
tice.

Magna factis est arbor, quanta Morus, 6valde patula. *Folia* palmata font, exfegmemis plurimum septem compofita, quorum fingula Pinnae marinae quodammodo annula, ex angufto admodum principe fenfim dilatantur, tandem in pbtulum mucronem definentia, per ambitum ferrate, longitudine dodrantali, qua parte latiffima funt palmum circiter lata, a cofbt media obliquis ordine nervis in ambitum dire&is, colons liipernē atro-virentis, infernē hilarioris, iapore amaricante< Porro coeunt hae omnia in unum cummunem longum pediculum; e&stque pediculi fitus oppoiitus. *Flores* multi iimul in ramulo ex ala foJii extremam rami partem occupante prodeunte, longiuſculis petiolis fubnxi, quatuor foliis non valde amplis conftant candidis, quorum bina (uperiora reliquis paulo ampliora violaeas ex puniceo maculas orbiculata's in medio imprſſas habent, c florurn^ autem umbilico plurā flava ftaminula prodeunt in aureos apices definentia. *Fruſtus* ipſe non ita in conum definit ut vulgatx noſtrae Caſtaneae, globofior, altera parte fpadiceus, qua vero echino adhaeret impreffionem cineraceam oftentat, cui coxlici nulla intercedente lanugine pulpa noſtratibus Caſtaneis fimilis ſubjacet. Echinus ipſe multo ciaſſior 6c firmior quam diiſſe, exterius ruſus, interne albus, duruſj ſed rarioribus brevioribufque pinis obſiſtis, firmis tamen 8c infeſtis, colorēque flavicantibus, qui per maturitatem in tres partes dehifcens Nucem oftendit, ipſius lateri infima parte inh^rentem, non a pediculo, ut reliquar.

Hanc ſcribit Cluſius Autumno cum folia amiffi, protinuſ amentaceum quiddam extremis ramulis gignere, 6c turgidum quaſi parturet, pingui ac lento humore conſperſum, in quoxulices & hujufmodi infecaa hcreant^ totaque hyeme ita perdurare, donec ineunte vere, 8c premature admodum germx in folia ſe explicent. Cdrticem ramis tnbit, novellis quidem virentem, adultis autem cinereum, ſub quo lateat alius fucculentuſ, viridis, lignum ambiens j ut in Sambuco vel Acece latifolia.

Conſtantinopoli 6c in Creta naſci fertur: Certe Conſtantinopoli ad nos tranſmiſſa eſt, 8c habetur in hortis noſtris frequens. Frigoris patientiffima eſt, umbraque 8c aqua ut Platanus deſtatur. Equina dicitur quia equis anhelofis prodeſt, Matthiolo 6c Cluſio tradentibus.

CAP. XV.

De Manihot five Tucca ex cujus radkt fit panis Cajjavi di&us.

Quamvis quem fructum proferat hzc arbor trihi non conſtet, quia tamen foliis digitatis Caſtaneam equinam xmulatur ei ſubjungendam duxL

Manihot Indorum five Tucca foliis Cannabinii C.B. *Manihot Theveti, Tucca & Cajjavi* t-B-UP-ucca five *Mandhca. ex qua Cajjavi fit* Park. *Maniiba & Man dub a Braſilienſibus* wju±
radix *Mandihoca*. Pi(on, Marcgrav.

Tifon.

Fruentib complures Indiarum regipnes ad hanc ufque tempora caruerunt: ea tameri quibus hominum & animalium ſuſtentatur vita/ frumentūque vicem ſupplent deſiderari benigna mater natura noluit. Radix enim fativa feu altis^ qua: *Mandioca* Barbaris appellatur, in farinam redacta, Be in panem coacta cum optimo pane ſimilagineo certat. Quā plantā licet Angola & HiC panioleae, atque aliarum infularum incolx gaudeant (ubi racicem hanc *Tuca*, aliis Mexicanis *tuauh-camoſth* preparatam 6c in farinam redactam *Cajjavi* vocari Monardes teſtatur) Braſilia; tamēna-, turalem, ſummōque ſtudio ibi cultam conſtat. *Alii omnes America ppulos a Florida ad Frctuni uſque Mazellanicum hoc pane uſoi^ affirmant, quanvis Fmmmtum* Mayz dittum illis non deejjet.

Plures hujus ſtuticis dantur ſpecies, quæ licet prima fronte inter ſe haud diiſſere videantur^ tamen ab experientibus agricolis dignitate, caule 8c cortice diſtinguuntur. Prima ſpecies à marii accolis Braſilianis vocatur *Mandiiba buara*, quſ albicantibus eſt radicibus & truncis: *Mandiibparata*, *Mandiipeba*, *Mandiipuch*, *Mandiibimana*, *Aipi* (qux iterum plures habet ſpecies, quarum nominavide apud Marcgravium) *Tapwina*, *Aipipoca*, *Mandijupeba*, *Aipimacaxera*, qua? omnes rubentibus ſine 8c lad:efcentibus radicibus S>c caulibus. Omnium harum ſtirpium radicibus K caulibus ſolum *Mandihoca* nomen inditum, 6c alimentofis, medicam^ntofis, venoſifque qualitatibus licetimpani inter ſe giadu, pollent.

Frutex eſt ad quinque vel ſex, ut Rochefortius 8c Parkinsonus, ad ſex, ſeptem, vel oſtoy ut Marcgrav. pedum altitudinem aſurgens, caule lignofo * tortuoſo nodoſo, fragili, medullam lhra #
fe continente inſtar Sambuci. Ejus craſſities pro ſecunditate foli coelique temperie varia. Superius in multos expanditur ramos, qui iterum ramulos habent, atque in horum quolibet tria ota, tuor, quinque, ſex, aut ſeptem *folia* anguſta, oblonga, in ſtell* formam diſſimira, framul otos
Hellebori nigri ſimilitudo ex p turibus foliis di ſtatione ſpſſitēs aut ſumntatē pediculi quaſi e x
codem centro egreſſis componuntur j ejuſdem fere vinditatis cum Pzonia: folio. *FleſcuL* ſert flayo-pallidoſ, pentapecalos, multis ſtammibus luteis in medio: *Semen* autem Ricini femiii ſitii. Je, *ihd* inutile. Radicem Paſtinaç* haud diſſimilem producit, qux ladteum trahens fuccum ab oculis pronimpentibuſ, e trunci internodiis natis hoc liquore egreſſe intumeſcit. Terra:

Terra minimi glebofa aut irrigua uc Canna faccharifera gaaJec, id ficca putius, fjtiente BC montDla, atque in tuberculos, quah a talpis, egefta. Adeo humiditatis Dinnis inimica eft., ut zftivis duntaxat menfibus terra cdmitti velir, idque locis apricis ac minimè utnbrofis. Cum aut cm adedr acclive ac arenofum fblum requiratur, malunt incola: deniffima demoliri nemoraj demolita exure- re, eaquearvis K fegetibus (Chocas Luffitanis Wleftu ^c. Extra teiram duobus vel tribus.furçulis g-rminant, qui ubi oftavo, decimo atque dujlcimo menfe liquefcere incipiunt pro femine Hint. Hoc frugum noftitium diffrimine, quod Mandihoca: nihil de fructu decedat ad filii propagatiDnem^ noftris decedat, quibus ipfi fructus femenfem faciunt. Per radicem nulla poteft fieri tranfplantatioj nam ea extra fta è terra, Be tafta ftatim moritur.

Ties hujus plant* trunci, frondibus fpoliati, figurapropernodum pyramidali, haud profunde fimul terra: grumis, trium circiter pedum inter fe diftantia inferuntur, prominente/que ad palmaealtitudinem fupenus Je invicetn amplectuntur. Qui foliis licet. denudat> hovis tamen illico veftiuntur, nee quicquam radix inde detrimet! patitur, mtdo caulis integer Be illarfus maneat.

.Dignitate 6c mole excellit Mandihoca, fi anni terneque temperies ficca fuerit. Turn erilm quarlibet radix fequipedem, vel duos., interdum etiam tres pedes longa evadit, craffitiem haftens brachii, vel etiam cruris humahi quando fatis adoleverit.

Ratio habenda^ utager aziZaniis, qus valde fuppullulant, ter quaterve repurgatur, donee plante adoleverint, ad ofto nrmirum vel decem menfium Ipatium. Maturitatem affetutae radices, quod annuo circiter a plantatione fieri fpatio, ad tertium vix fib terra durant: akerD tamen plsrung, anno part illarum putrc/cit Be corrumpitur: ideo ad fummum linquuntur annuo fpatio, & denovo per taleas plantantur. Ingruente nimii humiditatis neceffitate exfeindi ftatim poffulat femennousante jntix matuntatis tempus.

Mandiba qua: vocatur Mandiubumana> omnium citiffimis crefcit Be maturefcitj atque optima inde conficitur fauna. Hxc planta maxime gaudet folo arenofo, Sc magisambufo quam reliquac. Pnmaria omhliJ^ in'que quotidiano ufu Be lucroproduciturpromifcue in quavis csirra, vocatirq, Mandiibparatii

E terra evulfi radices vix par friduum durant, etiam fi fideliter horreis recondantur. Mundatr 6e a cortice, quern tenuiffimum habent, liberate mola: crufatili, a duobus hominibus circumafta: admoyentur, ferrique cuFpide conccruncur, Be^ontufarum radicum farinam excipit alveus- Rajiira deinceps torculari vel prelo fubjicicur, quo magna vi humor ille /uperfluus Sc noxius exprimitur^ ut icca atque ab/que ulla humiditate maneat. Mox cribro Urupeba difto percolatur. Exinde planeafto fiftili aut a:neoinjicitur, in quo fubfrufto igne circumagitur tantifper doHec coquatur. SemiçDfta vero &adhuc mollis efculenta eft, 6e voz&tm' Farinba relada, quod eft. Farina cofta non Bxiicata. Reliquum quod fiipereft, Se rfervare volunt, fupra major em vel mindrem ignem prc arbitrio mifcent, atque exaftehecant. Farina enim hac quo plus exficcata Se excDfta eo durabilior eft: Oprimè tamen ficcata Be fideliter ab'aere defenfi, ultra annum vix fervari poteft j nam fi vel levidima uligo eum infecerit corrumpitur, unde non parvam militum ftragem in caftis excitatam vidi. Quapropter noftri Barbaros ifritati earn in bblos, quDSVOcant Bejus, paltillos Be liba coguntj fuporque craticulas modico igne in dura tram in penu aliquandiu rcondunt.

Ex hoc frutice expreffo manat liquor Manipuzra barbaris didtus, qui vafi infufus poft duas ho'ras fundo adhaerefcit: ex quo alia fit farina, melior pripri, ac majori affluentia ifloris, quam cremoreni de Tiyiaca vacant. Ex aqua farina: in fundo fubiidente bolos quoquifi conficiunt Tipiaceto didtosj optirni Upori5- Turn Çilmmn quoddamfeu potius Amylumex ea fit, atque eldem ufu infervit. Hie liquor Manipuera, quod dulcifit faporis ab Animalibus avidiffime haufus vi quadam venenata ca ftatim extinguit: ex radice tamen non expreffus f quod minim) cztera animantia excepto homine nutrit. Praterea raviice a fole exficcata alia fit farina Be pollen albicans, imo Be panis filigheus Sc bifcDftus, qualis b tritico (cui Be limillimus eft) pinfitur. Hoc alimentum integrum Be non cc^nminutum pro jumentis fle pecoribus, quibus in pabulum cedit,refervatur.

A vermibus Be integris formicarum cohortibus ha: c planta milBrèfolet inLHari^tnagno agricola- ruijn incDinniodo : non folum folia atque caulem, fed ipfam quDqire radicem depopuLintur ferarum greges' Be animalia domeftica. Ipii Brafiliani,iEthiopes & noftratium norr pauci hujus plants folia amant adco, ut contufa, cofta Bcproba condita pro cibis Be Lafucis apponant J qua: in maffam eformata Manitoba nuncupant Brafiliani.

Porro radix hac: quatuor aut quinque dierum fpatio in aqua macerata Be empllit Mandiopib'a di- Eitur, qua: aflata maxime ab agreftionIndorum & barbarorum multitudine expeticur Be manducatur. E fedimento hujus confitentix Farina mollisnot^que melioris conficitur, quam Brafiliam Vip^ba^ Luffitani Farinha fre/ca cognominant.

Ex Mandihoca contula, butyro Be faccharo inignes fiunt boli vel paxt ad edendum optima:.

Pulvis deniq, genus paratur ex Mandiopeba₂ quod nomen accepit Myngau petinga.

Mandihva ilia mollis, illis Puha, igni impofita exficcat, exficcata appellatur Carimd. Ex k/c Afri panem optima notar conficiunt, quern Mufam, vel Ang», interdum Enfonde appellant. Om- nium autem prxftantiffinum pulvis genus condiunt, quod vocant Mingan dz Carimd, cui aiomJtum loco momentum Pjpens Brafilienis, Be flons Nhambi admilcent, quod Dptimi cum fit faporis, ft- niratiquc cDnducat,rcquens in prandiis cflefolet,nec/iiviterfe vivere exiftiniant,nifihoc aUnien- fo utantur. Sanjs, ^ atgUe ^gns 'ejufmodi pulves, emulfiones, atque adeo p'tifanas faluberrimas indeconfeftas exhibent. Tipioca Jiquidem & Carima pDta, vel Syrupi fpecie cum aqua florum Au- nacorum & pauxillo SacchaJi exhibita ^Di [^ p l e r u n q u e e f t . Tipioca, fi mulca lotione defx- cata atque çificaçaprobfc ab omni humiditate refervetur, tabidis Be dyfentericis ex arts propinça medecur, rebencianccs, animo deficientes, veneno infectos refstituit. Prxter hare violente exercitio fraftis vires recuperac, fudor&que ImmDdlca5 ^ m ^ i t Ptifkna illius fimplex. QLia/cunque h^ morrhagias, imprimis ex vulnere infliftas turn inturaffuinpta, turn emplaftri niodo appliwa c<- hibet.

Ex *Macaxera* optimum fit vinum, ierum lactis fepore referens. Mandihoca rafa vulnenbus Be ulceribus antiquis imposita ea mundificac atque attemperat.

Manipuira cocta crasse pultis in modum, alimentumque convenient existit. Quod si *Oryzam* Be faccharum cum aqua destillata ex floribus Aurantium fupennfundas conferva gratiflirnxformam induet, mutatoque nomine *Marnieladade* MandiDea appellatur.

Postremo illa species *Macaxera*, praterquam quod vipem farinae praeditae suppleat, igne etiam afflata absque ulla alia preparationis comeditur, ac *Macaxera* appellatur.

A ceteris radicibus abstinentum est, quod praefens lint venenum. Dantur enim quardam quas citius combusseris quam ut virus fuum deponant, Sc ad edendum idonei reddantur. Quin ipsi indigenx olim minus exercitati in feperatione alimentofi 5c venenofi, aliquoties mortem oppetierunfj nuac eruditores facti, non solum illispraccipuo existit vitae fiftentatulD, led omnibus Europaeis in America degentibus: idque pani triticeo praferre nonverentur licet minowshabeatur nucrimenti.

yEthiopes 6c Braxilliani inter edendum pugnos fariM^ plenos in DS injiciunt, ut manu quoque *ah* ore longius remota vix tamen mica ppreat. RarD aut parum inter prandendum potu utuntifj, quod farina aquam nimis imbibat Bectomachum inflet. Cum aratrum ejusque ULLS hic ignoreturj Be improbi ac multijugi laboris tacdia dedinent^ facilem hanc &C minus serumnofam agriculturam, tairi vitx ac rei familiaris tuendx, quam aeri corradendo egregie adhuc ampleftuntur. diuppe unius duntaxat mancipiinduftria Bclabore centum tuberculos [monticulos] aliquando uniu diei decur/u abiblvnt. Hujus autem farins una, quae viginti cantharos noftraces contine^ aut fefqui *Alkeira*, h. e. modius unus aut lefquihomini robufto Be laboriolb in menfem integrum plerunque liificit. C^Lem niodium fex, aut feptem, aut ad fummum oCto folidis comparaveris, *Rochefortizis unum Urra jug^ rum hac radice plantation plurim pzfonis alendis fufficere fenbit qudm tria optimo frwmnto fata.*

HEC sunt quae ufii Be fedula in hanc radicem inquifitione a rufficis Be expeiientia propria rscificere potuit Gulielmus Pifo.

Uum autem ufus hujus farina tarn late pat eat > ut non pauciores ed mortahs vefcantur quatn frumento ipfo^ <vafijfimi nmpz orbis Amzricanip Uri^uz incda^intzgram zjushiftoriam huc transferibere nonpiguit; p&fer-tim cum alivrum minus accuratas hiflonas & defcriptiones conferendi & examinandi-labore & t<zdio nvs levet.

Alterius adhuc *Mandiboae* lylveftris meminit, ejusque iconem exhibet Pifo, quam fruticem arborifcentem vocat, caeterum lativae fimillimajj fi caulsm Be folia connderes, verum dignitatis longe inferiorem.

Notandum autem quod omnium qui de Mandihoca fcripferunt confenlu fuccus e radice expref-fus umnibus animalibus venenum est praefentaneum; postquam tamen a horas fletit qualitatem fiam malignam Be perniciofam amittit.

C A P . XVI.

I. *Guaidcum* Ger- *Guaiacum* Jive *Lignum fanffurn* Park. *Guaiacum magna matrice* C B. *Fru-Bus Guaiaci futatm & folia* J. B.

Hanc arborcm plene Se accurate 'defcripfit JD. Terrentius Lynceus, *notis in Res Medic. N. Hifpan. Fr. Hernandez*, § atque idcirco ejus defcriptionem mutuabimur-

Guayacan est arbor Juglandis vellicis magnitudine, cujus cortex colore extrinfectis cinericeo, Betulx fimilis permixtis camen multis maculis viridibus, intrinfectis vero iubruberj non admodum denfis, fed immodice durisj craffitudinis nempe femidigitalis; is ligna recenter ca:b adeo firmiter haeret ut VJX ferro feeparari queat, progreflij vero tempore facile fbjungitur,.

Lignum in extremis colore qui in Buxo interne nigrefcente confpicitur/ Be meditullium ejus ell maximum, totiimque adeo lignum fplendida quadam donatum duritie.

Pinguitudo ejus refinaceum quid fpirat, uriturq, odors non infuavi, Be ab accenfj gummi profluit, quod prxdurum est ubi refrixeric.

Pondus ejus quale nullipsterca ligno; nulla ejus quantutnvis minima pars in aqua fluitat, led mergitur continuo &c iufidit, unde lignum est fortiffimum, quod duritis omne robur fupcrat, & idcirco quam minimshiac, necse facile videas quod nmas traxent.

Sapor non ingratus^ amarus ftatim, cum acrimonia mici palatumac fauces compungens, qui felmel cognitus nunquam errare finit emptorem in cognofcendo.

Qecoftum ejus sftate ultra tertium diem non perdurat. *Folium* craffum, parvum^ duium, viride^ multis venis dilinftum, qui dam Arbuto comparant, alii Buxo; in ramo hcum habet ex oppofico alterius, ut in Siliqua yel Lentifco videre est; quaterna yel fena ad medium nervum adnexa.

• *Flores* inulti, quasi umbellam vel corymbum conflituentes, pediculis viridibus iniiftunt palhd^ lutei hexapetali, multis e medio itaminibus prodeuntibus; in quorum medio rudimentum fruftiis Burlam pafforis effigie refert.

Fruftus a quibusdam Caftaneis, ab aliis Prunifimilis refertur, duobus Lupinis fibi cpnjunftis, aliquando etiam tibus, ut Clufius refert; vsl Aceris fruftibus, fed fine alis confat, cordis figuram eleganter referentibus; leviffima porro diftraftione unum ab alterD, licut Be Aceris fruftus, dividitur.

Longitutlo est tranfverfi digiti latitudo paulo minor; cohr tdius corii caftamus aliquantum corrugatus Pruni inftar. In conjunctione cum altero fruftu msmbraeft, denfitate, odore, duntie P^rfiniis, el qua: Juglandis femel bifariam dividit. Conum externum corrugatum. mollius^ internum vero nucis nitrno putaminum dtjritis Be colors repondet,

Nucleus intus conclulus colore Be vanis venarum duftibus Nuci myrifticx vel Buxi radici admodum fimilis. Hunt fi dm in ore volvas pulpam quandam abradis qux aurimoniam maniffellam

linguae imprimit, & nucleus in recenti fructu manet colons castanei, in aliis ver& omnino niger.

Nudeum fi fecundum longitudinem findas, duritiem Daftylorum offendes, totumq. oleum, flavum in recente dnereum in obsoleto. Alb* autem Jinez tranfrerfim parallels totum pertranseunt, ut admodum eleganterLyncurium five Belemnitem radiis Be splendore referat.

In medio ejus concavitas est longa à fummo ad imum pertingens, sed sine ulla fere latitudine, qualis in Euonymo etiam confpicitur, ubi lemnis duo ovalia sed plana, vitidia quasi foliola sejuncta in fummo uniuntur, eoque extrorlium versus cornponunt, ad modum plane Euonymi, nisi quod cor in Euonymo versus pediculum fit constitutum.

Locus.

Crescit haec arbor in Hispaniola, Jamayca, Be in Continentis regione *Nagrando* dicta tanta copia ut numero superent Pinus Hispaniae.

2- *Guaiacum fropmodum sine matrice* C. B. *Lignum SanBum* Terrentio & aliis. *Guaiaci genus alitrum, quod Lignum Sanctum, Mo praestantim, & ex infula S. Joannis de prtū divite affertur, quo maxime utuntur.* Monard.

Arbor est admodum similis Guaiaco, sed minor, magnitudine Populi, stipitibus magis spinosis; cortex magis quam Guaiaci pustulosus cetera similis, cinereus maculis coniperfus intus necesse vero obfere rubet, 6c in recenti hgoetiam facile separatur.

Lignum à Guaiaco differt medullio, quod in hoc est parvum 8c in ramis nullum. Ipsius ligni color magis albicat. Be ad luteum quandam colorem vergit, medullium porro nigrum ad vinde inclinat evidenter, imò cyaneum est inviridi.

Traffanti nullus odor occurrit, simulatur tamen Guaiaci odorem, ut in decocto & oleo ejus destillato patet, qui tamen in integro non percipitur, adeo terreis partibus pernixta est, ut ne abflammato quidem nifparum admodum defluat, cum tamen per destillationem plus det quam à Guaiaco extrahatur.

Pondus Guaiaco idem est, xque enim uho in aqua subidit.

Sapor amarus, sed acrimonia longe major &c evidenter, adeo ut amaritudo ab hac oppressa non fatim percipiatur, ideoque Piperis infar fauces pungit niordicat, & pulvis ejus naribus inditus sternutansnta ciet, unde lungi ab incolis ob vires Guaiaco praefertur tum in curanda Lue Venerea tum innultis aliis morbis, quamvis immoderato usui nimium calefaciat. Decoctum ejus 6c amarius est Bi magis odorum quam Guaiaci 6c intensius flavet.

Folia exigua, Rutaceis paulo majora, Lentifci modis bina sex adverbis posita 6c ita urdinata iunt ut nullum fit impar in extremo.

FUS Vincs-pervincaradmodum similis est colore Be figura, sed aliqua longitudine ejusq. foliola quasi duplicata sibi superposita apparent.

Nascitur copiose in infula S. Joannis de prtū. *ricco*. J. Terrentius arbores haec specie differre concludit, licet genere proximo convenient.

NDtat C- Bauhinus hoc genus in plura alia genera dividi, eò quod non unum colorem habeat; quoddam enim nigricat quoddam etiam ipadiceo colore flavescit, quoddam prarterea omnes istos colores discretos habet: Quare Manardus &c ex eo Macthiolus tria genera notarunt, quae licet colore, magnitudine & pondere inter se discrepent, unius tamen esse arboris, contra quam Fallopius credit. Matthiolus statuit; 6c causam refert in ligni maculato, quo enim maturius eo nigrius, Sc quanto minus adoleverit tanto magis albicare aferit. Probatur maxime quod ruffum, Ipadiceum, flavum, lividumque colores simul mixtos habet.

virtJ

In lue Venerea curanda nullum est medicamentum decocto Guaiaci praestantius aut certius. Nam si ut decet procedat curat, sicutque tempore decoctum illud propinetur, certissimum est huic morbo fanitatem perfertam adferri, nec recidivam pati qui simili lue laborabat, modo in idem coenum sibi in die pro ovola t d enu o.

Convenititem hydropicis, athmaticis, epilepticis, morbis vesicae Be renum, doloribus junaurarum, omnibus morbis ab humoribus frigidis 6c flacibus procedentibus Be diuturnis, quibus inutilia fuerunt ordinaria medicamenta, praefertim si morbum Gallicum subquantur. *Monard*,

Ufum decocti in curanda L. V. Hispani ab Indis edofti surn. Magnis doloribus morbi Gallici (quern ab Inda muliere contraxerat) Hispanus qui dam torquebatur: ejus famulus Indus, in illa provincia medicum agens, aquam Guaiaci propinavit, qua non solum magnis illis cruciacibus liberavit, sed pristinx fanitati eum restituit. Hujus exemglo plurimi a Hispani simili morbo infetti curati sunt. Unde brevi per totam Hispaniam Be univariam orbem ejusmodi cura evulgata est.

MDrbus iste Indi Occidentali familiarissimus 5c endemius in hunc modum in Europam propagatus fertur.

Anno 1493. CD bello quod Neapoli gestum est a Rege Hispania: ad versus Regem Galliae cognomento magno capite *Chnflopb. Columbus*, ex prima illa professione, quam Novi Orbis inquirendi causa suscepserat, rediit, Be detestis 5-Dominici alii que infulis, inde Neapolin (ubi turn Rex Catholicus erat) pace cum Gallis facta viros Be mulieres hie duxit. Commemorandus ultro citroque mercatoribus, Hispani primum cum Indicis mulieribus, 6c Indicis Hispanis consuetudinem habuerunt: deinde in Italos Be Germanos serpsit hoc malum postremo etiam ad Gallos se fie per iverisum

Initio varia fortitus est nomina, Hispani putantes se a Gallis originem habere Te Gallicum nior- Dum nuncupant, ruiaci GM SX3 k i p i m a n e s s e Neapoli eum confectos Neapolitanum vocarunt UG T P m ? W ^ ^ u m contubernio hanc fbabiem ad 1 c manasse videntes icabiem Hif[»n> canis apper Ln Fruitt, ? * f f i n l D T M T M T M Serpiginem Indicam eum vocarunt, inde enim prima HUM mail on- neentum n i a A f t u o r i R i n e h u s n w b i A medicis rune cempons difceptatum est. b i c e

Ligniminutim concjfi aut ejus fobis ^xij. corticis ejufdemLigni contufi fij. in fex aqua; fextariis maceranCur fiaili noro, aliquantulum capaciore, 14 horarum fpatio : fiftili bene obturato lento Sc luculenco igne coquantur ad quatuor aqux fextariDrum cinfiimptionem. Cofta aqua refrigeratur, colatur, Be fiftili novo aflervatur. Statirri fupra idem lignum quod decoaum fuerat injician- tur denuo ofto alii aquæ fextani, coquunrurque ad duorum oonlumpcionem: coletur hare aqua, Be feorfim aflervetur. Sumitauracem hocmodo.

Infirmus purgato corpore ex medici confilio cubiculum 3elfgit apricum, quo neque aer, neque frigus penetrarepoteft. Leftum ingreffus diluculo aquzprioris calid.r ^S. fumat, Be egregiè ope- riatur ut ludarc poffit duarum horarum fpatio: deinde fudorc abfterfo lintamina niucCj Be indufium calefaaum induat: quacuor deinde pod horisMVX paffi illi dabuntur Be Amygdalar, panifque bifco- tufsj neque affluenter, neque parce, Be de 3qua fecunda bibec quantum faris erit, etiam lnteidju. Ofco hori5 poffquam corned eric ex priore aqua calente denuo undas decem hauriat, fidabit item duabus horis 8c a /iidore uci luperi5 mundabitur. Unâ poll fudorem horâ de iifdempaffis, Amyg- dalis 5e pane bifcofto coenabit^Bc ex aqua febtinda bibet. Scrwabitur hie ordo quindecim diebus prio- ribus nifi vires nimium collabanturj quia eo cafu etiam praeter iupradifta pullus gallinaceus afflus con- cedetur, In minus robuftis^qui extremamillamviftus rationem ferre nequeunchovem diesfufficieht, quibus elapfis pullus exiguus affliisfimiliter cDncedetur. Si verbxger adeo teiui^eft valetudine,ut pridiftam iftam viftus rationem millo modoferre poffi^abvittitio pullusgallinacBUS-exiguus iHi d^htfur, cibi quantitatem fenfim augendo. Elapfis 15 diebus, 16^{to} purgabiftr 5 x. pillpæ Caffias fiftul^per cri^r brumtranfmiffi, aut alio liinili medicamento, 8C ei die tenuiorem aquam^tiveringcundx.decoaionii. bibet: 17. die ad priorem ordinem redibit, fumctque mane Be vefperi aquam prioris decofiliiviv^ fu- dabit, eadèmqveviftus ratione litetur, nifi quod pulli loep dimidiam gallinam edere pDterit, eLiufai finem diztat aliquanto plus; eamque viftus ratidnem ad vigCfimum ufque diem producyt quo-iem- pore per cubiculum veftitus Be bene amiftus ambulare potent. Quibus elapfis denuo purgabitur, &C per alias 40 dies aquam bibet, feleffiffimam viftus rationem obfervando in rebus non naturalibus, mulieribu5 abftinendo Be vino, cujus loco fimplicem ejufdem ligni aquam^pt fi earn faftidiac aquam in qua Anifum*6eFiEniculum decofta funt bibet, eritque cofna fobria^iWine carnybus. HSEC, inquit, methodus Luem cujufcunqve fit generis radicitus extirpat. Alii aliter fentiunt, neque hanc peftem abfque ope Hydrargyri extirpan poffe affirmant^ fi penitiis radices egent;

C2Eterum de preparatione Decofti Guaiaci ejufque utepdi rations incurandaLue Venerea con- fulantur Fernelius aliique medici.

C. Bauhinus Guaiacum cujus ramulum cum floribus Be fructibus pingit Clufius notis ad Monardem à duobus prxdiftis diftinctum facit, Be citulo Guaiaci foli5 LenciJci proponit: ..quam reifteipfe vi- derit.

-Palm<2 fanEtiz fimilis arbor J. B- Guaiaco occiduo Jimilis drbvri Hark.

Huju5 furculi quos habuit Lobelius rami erant arboris grandioris, reai^eortice arbutea Lig, fci ^ Citri., carnofo, nudo, Laur? latiore, brevior, nervolb, horum in lummiiJixrent folliculi pallidi, co- riacei, circinatz rotundita^admodum compreffil/nummo CorDna: GalUcajtpares^ quorum media inliinc femina Lentis effigieSe colore, compreffiora, gullu amaricançe.i

Hanc C. Bauhinus Guaiaci fui fecundi feu Guaiaci propemodum fine matrice lynonymam facie-

Talum fantum India Uccidu* Ad. Lob. Park. Guaiacum Dnentâfr. C. H.

Species eft hacc à Guaiaco diverfa, quamvis fimilis, nempe nonvafta ut.Fraxinus, fed oinor 6c ei coticolor Corcice: folia cujufmodi Plantago, fed craffiora,, minora, pinguiura, breviora: Jructus Juglandi5 magnitudine, alvo liibducends idoneus.

CAP. XVII.

Andra vulp^Anglyz Pifonis Marcgrav. Arbor nucifra Brafilinfis, fruttu ovi figura & magni- tudine,

P. f. r.

DkUae fpecies fub nomine *Angdyn* in netnoribus conlpiciuntur. Utraque extsrna facie inter fe fimiles, fed interna qualitate multum differences^ quz facile utique dignplcuntur, quod alterius cortex, lignum, Be fruaus amariffimi fine, inftar Aloes j alcera major nullius ma- nificati fit faporis, ex cujus Fruaibus feræ pinguefcunc. Utraqueligno eft duro, Beadzdes fabricandas apta. Utraque cortice cinereo, foliis Lauri hmilibus, fed minoribus, oculis feu gemmis nigricantibus, è quibus plurimi flores fragrantés, copulati, purpureo Be cieruleo colore infignes, prorumpunt. Fru- aumprofertDVí figura^ Be magnitudine [figurâ Juglandis, ovi gallinacéi magjiitudine Marcgr.] primb laturate viridem, fed mox nigrefcentem, qui uno latere quafi facuram monftrat.

Fraao duro putamine nucleus apparet ex albo flavefcens, amaricancis Be ingrati faporis cum ad- ftraione quadam, cujus pulvis ventris lumbricos expugnat, ea^ tamen caucione^ ut infra Icrupuli Pondus exhibeatUTj nc medicamsntum in venenum abeat.

SECTIO SECUNDA.

Ve arboribus Fructu ficci 'Bacciferis.

CAP. I.

De Lauro.

Laurus, unde Laurea [inquit Voffius) Græcum videri possit. Nam apud Hefychium legas *AMJJ&V ti tilwlw*. Sed li'a Græcis, potius putem esse à Pergsa voce ^pf, qua; idem ngnabat, He/yeh. AĀ^H Jūpir U^y<Eiu. Sin Latinis originem debet, fortassis erata/rftw, id est, *forgo*, nam *fanguinis purgafidi habzt pottfatem*. Vel, si Veteres potius audiendi, prius fuit *fovjuf*, estque id a'laude." Servius ad Edog. B- *Cur tamen triumphant*! Lauro coronantur hac ratio* *fi qtioniam apud Vittrzs d laude babuit normM nam Laudumduebant. Nee tantum laudum pro lauro, led & pro laurea olim laudeam vel ludeam dixerunt.

&Apn Etymologo quasi *Jh^dvn* dicitur, hoc est £*W *Mt&uvw****, quia nempe *iw *&*\$!*>* quod Etymon non improbat Voffius, apud quern plura vide.

Laurus Gen *Jj^VBlgarn* C. B. *major* *Jiw latifolia* Park, *an minor* ejusdem? *QLt/C_COITHUOII*

J. R.

Laurus plerumque multis ftolonibus luxUriat* vel mediocris arboris altitudinem affecuta, allDqui in jufts niagnituainis arborem excrelcic, pr^fercim rsgionibus eahdionibus, caudice snodi, cortice teniij materia rara^ nee mukiim valida. *Radices* habet crassas, inzquales fie ubliquis. *Cxtzrum* perpetui viroris est, niijidi in junioribus, in adultioribus laturationis. *Folia* ei oblonga, dura, acuminata, led mucrone alias acutiore^ alias obtufiorej fefcunciam aut duas unçias lata^ palm a longiorsj versus pediculum K mucropem paulatim angustiora reddita, quæ fecundum Jongitudinem percurric coftareiftaj obliquosinmarginesnulloordineneiToseXporrigens: faporacer., aromaticus Be fūbamaru5. Adherent auccm folia ramisviridantibus brevi pediculo. *Flora* fecundum ramos exeunt conferti^ hederaceisquadantenus fimilesj majors albi [LDBSJIO flavefcetes] multis in medio apicibus: quibusfucceduntbacc^ Cerafis minoribus pares^ oblongx, colore pi l m lum viridi, ubi maturerint nigr£, qviz sub cortice tenui nucleum bindum callofuni ac durum^ cum aliqua acdmonia amarum ac pinguem claudunt-

Laurus (inquit C.Bauhinus) quaedam floret tantum, flore copiolb, racemofb, Cuv^niTheophrastus vocat) Befrliftum non fert; alia fiftum fert, in quo etiam differentia :alteriusin rotundo modicc oblongus est: alterius uDungus^ gracilis, Be utrinqueovato mucrone turbinatus. *Laurum* filmine nonici veteribus perfiiafufuit. Hilic Tiberius Imp. qui tonitrua prxter modum expavic fcehorruit, tonante celo, contra fulminum metus, nunquam non Lauream coronam capitegeftavit. Verum quam hoc falsum Gefuperftitiofa crfidulitatefundatum experientia quam adhrLa-cuna^ elegantiffimarLauri Romz in palatio Ducis de Caftrofulmineidtx luclalencer ostendit.

Eadem superftitiDnenitur obervatio ilia de crepitu quern folia fie virgx Lauri ioter urencum edunt. Nam (i crepuiffentabundeac fonantius hand dubic portendi felicem eventum rebantur; quod fi tacitadeflagrãffent, triftem Be inaufpicatum.

Laurum Apolhni facram inde fabulantur poeta; qubd virgo Daphne quam deperibat in hanc arborem cDnverfa est. Vide Ovid. *Metamorph. i.*

Triumphantes apud Romanes coronam Lauream geftabant, vel Lauri ram urn dextrâtenebant. Sed Be aliter praeterquam in tnymphis etiam vitlorize nuncia fiit Laurus: nam Be tabernacula, fie faJces, Be liters Be naves militumque jacukj lances, pila Lauro in earn fignifi cation em adornata ilint, W Be Plinius affirmat. Be Ebrodunenfis hiftoriz auptores adduftis e^emplis ostendunt.

Laurus CCEII frigidiDris impatiens est, minus tamen quam Myrtus. In Germania Angliaj Gallia Be Belgm nonnifi fata Be diligenter cuka provenit. Quod fin Germania hyeme tegenda Be hypocaufto refervanda est, recte ienbit Turnerus in Anglia felicius adolefcere, virereque quam in Germania; apud nos enim earn curam Be tutelam non requirit, fed inteita Be sub dio relifta hye-nKm, niiprarter foil turn aspera fit, facile tolerat. Quod si quando fngore perufta Be CDrupta ilc aradice denuo repullulat.

Locus. In Italia ipDntanf am obfervavimus non infrequent em in Iyivis Be fepibus. In monte Atho mgentes Be przaltxLauri fponcanenafcentes ardorem Solis omni temporereprimunt, teftè BeJJonio, qui quinquepecies in Garcia noravit: quern confule pro ufu olei baccarum apud Monachos.

Tempuj. Floret Martio Be Apnlj Bacca: marurantur sub finem Autumni cum Olivis, Se nifi decerpantur per totam hyem em ad ver ufque in arbore hxrent.

Vim. *Laurus* c^ Calcfaaori^m [emollienteinque *Diofc.* dsficantem *Gail* naturam habet, Be roms, oc cort.ee, &baccis. *IcaNuc* decoctum ex his, maximà e folhs, infeffii vilv* ac vefic^ vitns convenit. *Virena* fohatrita Be iilita vefparum, crabronumque ac apum, Kern fbrpencum venems rehltun^ maxime Sepis, Dipfadis Be Viperx. [Prufunc & menlibus fcminarum cum DI=O ^fta *Vhn.*] cum polenta autem qux tenera funt crita ad inflammations Deulorum, cum Ruca tctmm, cum -Kob.

Ceo capitis dolores, aut cum Irino. *Non temcre uUndumfoliis Lauri existimat J. B. in inflammation^ bits oculorum & testitum, ant etiam in capitis doloribus, fro inflammationibus ergo inflationes legi matteL* Eadem proJiunt fuppiriis trita cum melle. Cortex radice cavendus gravidis- Jpfa radix calculos rumpit, jecinori prodest tribus obolis in vino odorato pota. Folia verò pota ftomachum gravant, & vomitiones movent. In Graco Diofcor. legitur <se%>j w swa?K, id est, mitigat, pro quo legit Cornar. M^{TM*} i.e. gravat. Sane in altertro msmbro claufuls errorem fubeffe ostendit eoram inter se repugnantia. Verum is J.B. iudicio^ion in primo, sed potius in postremo. Certum enim, inquit, est turn experientia, turn ex Galeno, Laurum aromaticam esse totam, & amaricari- temcumnonnullaadfritione, hepatis amicum, qualia ventriculum tantum abest ut subvertant, ut naufeabundum corroborent potius: hinc Lauri folia a Recentioribus non ram cum nonnullis cibariis, praesertim piscibus coquantur: nec ulla inde riuafea accedit, sed cibus istis conditus lapidior ac ventriculo gratior redditur; unde m& voceni in textum irrepsisse Be expungendam esse, Plinium aUtem corrupto codicis usum existimat. Verum nos Plinium Diofcondi faltem cosevuth, si non antiquiorem, alibi ex Salmasio ostendimus proinde Plinium & Diofcoridem ex dio antiquiore autore quae eadem habent exseripsisse, ideoque cum in facultate illa vomitus movendi Plinius & Diofcorides consentiant, posterior claufula: membrum proculdubio sanum est, prius corruptum & per illud emendandum, ut recte fecit Cornarius: five verum fit folia vomitum movere, five id res vera refutet. Cap. Hofmannus proposita quaestione, conferantne an la^dant ventriculum^ respondet. Tot auctoritates faciunt, ut credam hoc posterior potius. Ideo cum Marc. Vergili Be Cornario pro <sr&vm apud Diofcoridem lego^pu^a- Pergunt Diof. & Plin.

Baccis magis quam folia calefaciunt, menses trahunt appofitis tritae, vel pota. In edegntate Critae Cum melle aut passio profunt tabi, orthopneae 6e pectoris rheumatismis; tuffi veteri detradlo cortice in vino pots: nam Be concoquant Pituitam & extrahunt Vim. Noftra xtas non ad pulmonis Be peitoris morbos baccis utitur, sed ad ventriculi, jecinoris, lienis Be vesicae affectus turn baccas turn folia, exhibet: refrigeratum ventriculum concalfaciunt; concodlionem crudprum humorum promovent, languentem appetitum excitant, cibi fastidium pellunt; jecinoris ac lienis obfructiones aperiunt, unnas cient, menses movent, Se ad fecundarum expulsiorem fauunt. J. B. Ad juvandum partum deglutiantur septem bacca: Lauri antefomnum. *Chefneau.* Contra f corpionum istus ex vino bibuntur, Sc vitiligines emaculant: & Addit Plinius, Epinyftidas ex oleo illitse, Ee lentigines & ulcera manantia & ulcera oris, 6e furfures. Cutispruriginem liccus baccafum emendat Bcphthiriafin.] Expreffus ex iis fucus aurium doloribus auditivis gravitati auxiliatur cum vino veteri Sc rofaceg ihftuillatus. [Perun6lo5 eo fugiunt venenata ottnia. Prodest contra idtus & potus batica: cum vino ibrpentibus Be fcorpionibus de araneis refittur. Ex oleo 6C aceto illinuntur Sc lieni & jeuniori, gangraenis cum melle. Et in fatigatione etiam aut perfricstione fucco eo perungit nitro adjecto prodest. Siint qui celeritati partus multum conferre putant radicem acetabuli menfiira in aqua potam, efficacius recentem quam aridam] Diofcoridi cortex radice calculos rumpit, partus necat Sc hepaticis prodest tribus obolis in vino odorato potus. [In remedio uv# jacentis quadrantem pondo baccarum foliorumve decoqui in aquae sextariis tribus ad tertias, eamque calidam gargarizare convenit]

Laurus folia trita olfactu fubinde pestilentia: contagia prohibent, tanto magis si & urantur] Hinc Commodus Imperator, Herodiano tradente, tempore psftis, confulentibus medicis, ad loca Lauris abundantialaureatus fecerit. Herbac enim perpetuo virentes, autonbus S.Grembj^Cardihtci& aliisque Helmontianis, sunt pestis alexiteria, corruptioni refittunt, seque defendunt. contra aestum & frigus, unde nobis planis signavit Dens, illas plantas perennes femper esse ad manum pro quotidiano usui generis humani, Continent enim in se balsamum, omnia corruptionis propugnatorem.

Adversus bourn coriagine, tradente Colum, proderit Laurum decoquere, & ea calida terga fovere, multoque oleo Bf vino confectum fubigere, atque per omnes partes apprehendere Sc attrahere pellem; idque optime sub dio Sole fervente.

Medicamenta varia ad Lachrymas Oculorum, Ambuptionem, Aurium gravitatem Be fbnos, Coli^ cam, Uvulae relaxatignem, urin^ retentionem, partum facilitandum, capitis dolorem, hemicraniam & baccis autfoliis Lauri parata vide apud J.Bauhinum Hift.plant.lib.4. c. 1. p. 414.

Olei Laurini multiplicis mentio fit a Veteribus Be Recsntionibus. Aliud e baccis recentibus contufis exprimitur: aliud e baccis contufis vel etiam integris, in aqua ferventebullitis: oleum aqua: supernatans in vasa colligitur. Aliud per distillationem elicetur fie, ft Bacc. fcij- contufis super affundit aquae tepidae lbij. vel iv. Postquam aliquandiu fteterint distilla per Alembicum vel Veficam, Sic prodibunc oleum & aqua per tritorium feparanda.

Dicitur etiam oleum Laurinum quod fit e foliis aut baccis Lauri in oleo omphacino decodis.

Oleo Laurino vis inest exalfaciendi, emolliendi, spiracula venarum aperbndi, Be lassitudines allcctiendi. Quin & malis nervorum omnibus, doloribus aurium ac distillationibus confert: rerium vero yitio ex fingere contra laborantibus jllitum est pra:stanti(Emum, Sc maximè fiquid aliud utile. Ob vim quae exalfactorem Paralyfi, Spaffino, ifchiadicis fiugillatis, capitis doloribus inveteratis, distillationibus, aunbus m calyce Punici calefactum Illinitur. Colo dolenti clystere infusum mirè prodest, ut Be horron febni. Verum in calidis & bihofis temperaturis ab eo abstinentum. Vermes & pediculos tamagrdes, quam dotnefticos fie lendes enecat \Imò hoc facit oleum quod Gunme] In genere utilis est in atFeaiWfrigidis maxime exterius illitum; intus sumptum naufeam movet.

Schroderus de Oleo fillat. hac habet. Dificutic infignker flatus Se ventolitates, pricipue in spafnus gpavidarum, ut5e in cohca. Siderata membra illicu restituit, aunbus inditum dolore comP^cit, audkumque confortat, delet Impstgincs, lentigines Be quacunq; facie maculas D-ninue ichorosis capicis dolonibus medetur: phtinahn Be tineas curat.

Est autem frum Laurinum ad Hydropem, ad dolores a flatibus aut causa frigida ortos, dolorumque unlc est.

Eaeduanum etiam tie baccis Lauri flatus distipat.

afumpta: purgant deordim non laevi tocius corporis perturbations, auftore Parleinaldo. Unde miror Lobelium scribere ftornos iifdem valde quam libenter vfci, turmacimque ad illas conuolare.

4. *Laurus Sylvestris Cretica* Alpin. ExDt. Park.

Nafcitor in montanis Cretan infilae, pumila, fruticofa, ferens virgas oblongas, graciles, nigro CDitics obduftas,, denfis veluti nodulis inzqualiter utrinque 6c jn medio p&dtis infeftas, lignoalbo, duro, fsr&equs guftu infipido praeditas, utrinque ramulDS producentes, breues,, virgis plane fimiles, at graciliores, in quorum cacuminibus fpeftantur/o/i* Lauri Sylvetrisfigurâ, colore, craffitie atque duritie familia, fedpaulominora, in acutumque delmentia, pediculis brevibus inhxrentia, numero quinque aut fex, auct plura etiam limul in ramulorum cymis inordinatim pofita, ferè Dmninb inodora₃ linguam excalefacientia cum levi adfritione. Singuli veròramuli habent unum aut duos aut tres br&vKTimos caulculos, fibiles, duos, lignof&es,, tribusvel quinque p&ochis minimis p&xltoSj fingulis fruttum rDtundum feremibus, Pipens magnitudine, in tres partes Lathyridismodo difleftum, cortice tenui, rufo veftitutu, cujus quachbet pars cominet fern en uni cum albicans, oblongum, magnitudine & figurâ Tritubo valde fimile, fubftantia fragilij non expers odoris gravis, guftu amarfcens atque linguam excalefaciens. Ex fbliorum, virgamm & quadantenus etiam fraftuum cum Lauro TinDfimitudine, Laurum Tinum feu fylveftrem merito vocandum cenfuit Pro/p. Alpinus. U/us in medicina nullus haftsus comp&rtus. Conjefturas Alpini de vinbus Dmitto.

CAP. III

Coffee F rut ex ex cujus Fructu fit Pot us.

ion vd Ban arhor J. B. item Buna, Bunnu & Bunchoj Arabum ejufdem. Bon arbor cum fruElit fuo Buna Park. Euonymojimilis ss&fjryptiacafructi baccis Lauri fimili CB. mah *j&gyftiacam, mque tmim JpuTjtama, mqm culta in zsUjrypto inuenitur, fid in Arabia jdicz tantum. Bunnu Rauwolf. Buna ex qua in Alexandria fit pno CluC

ARbor hsc (inquit Alpinus) cujus femina ex Arabia felice alportantur, Euonymo familis eft, foliis craillioribus^ durioribus, viridoribusSj perpetupque ridentibus. Nee flores, nee fruau5 defcribit. Vidiffe fe ait in viridario Halybei Turc^ Veflingius, cuni in JEgypto peregrinaretur in viridariis quae ibi accedere licuit arborem hanc non amphus confpexit.

M. Dn Four Mercator Lugdunenfis qui tractatum de potu CofTET edidit, ooinium qui de CD fcripti extant optimunij aiboremfui breuiter Be imperfectè defcribit. Cerafos noftrates minores proximè refert, turn ramis Be foliis, turn magnitudine, fiquidsm Arbufculae Inodum non excedit. Rami ejus tenues admodum funt, folia parua, folida feu cotnpafta, ipilTa, viridia, qux liibito decidunt, inde-fru&stii5in arbore nudi K folibus expofiti ad perfectam maturitatem reftant. Qyalerh ferat florem anemine traditum inueniD.

Fruftum fie defcribit J. Bauhinus, magnitudine aequat aut certè parum fiiperat Ricini noftratis femem, olivari figurâ, una parte filleftusj vpl utraque, cortice exteriore craffiore, nigricante, interiore tenuiorej Be qua nucleum fp&dat rutilo, altera facie ynericea. Utroque corrice detrafto nucleum CDinpeimms durum, Daftyli officuli eEgie^ lacuna fecundum longitudinem iilcatum, pallentis cinerei coloris, laporis amancantis Be ingrati. Ab umbilico ad oppofitum mucronem oilendit gemina grana.

Rauvolffiu5 fruttum hunc in duobus locellis totidem grana flavefcencia continere ait. Vemm fat fus eft, non enim binis locellis diftinctus eft hie frui&stus, nee bina grana aut femina continet, fed unum Be fimplex granum feu nucleum in binas valvas feu lobos^ exteriore parte gibba, interioris quâ committuntur plana, Be in medio per longitudinem fulcatus, (ulci feu foftulæ labris margini. bufve introrfum convolutis, ut finguli lobi feorfim c&oncham Veneream perbelle referant.

Ex his nucleis toftis, in pulverem redaftis 8e aqlia ded&lkis turn Arabes, turn iEGyptii quin K TULCSE ornnes per vaftum illud imp&rium potionem parant Coava feu Coffee diftum, jcolore nigrunij non ramen₃ ut vult Rauwolfius, atramenti infar nigerrimum, quem pitiflando forbillant ex teftis Be porcellanis quam jofliint calidiflimum, fwz inquit * Veflingius, otii fui obletamentum, five bonx valetudinis nrmamentum quzrant. Venditurque hie potus in publicis tabernisj quarum aliquot mille, eodem teftè, in una urbe Cayro habentur.

Utuntur aitem hoc decoftoj Alpinò aitore, ad roborandum ventriculum Frigidiorè^ adjuvandumque concDiaionem, 5c non minus ad aufersndas à vifcibus obfruftiones, iniuje tumoribus hepatis Be liensj frigidisj Be antiquis obfruaionibus. Uterum etiam excalefacit He ab obfruftione liberat; unde in familiari ulii eft apud Dmnes ^Egyptias Arabafque mulieres; ut femper dum fluant menfesj ipforum vacationem, hujus decofti ferventis multuni paullatim ibrbillantes adjuvent: ad promovendos etiam in quibus fiippreHilunt ufis hujus decofti, purgato corpore, multis diebus mills eft.

Potus *Coffee* celebratur maxime vi antihypnotica, ut nemo ferè fit ex ejus potatoribus qui virtutem ejus in fomno abigendo fatis efficacem in isipfb non fit expertus. Hujus pharnomeui arcio-^{1D} »am quam reddit Clanfl, Willifius, quoniam non ulque quaque nui fatifacit, * apud ipfum re-^{p/ar^cajt,} quirendum oiilitto. Qya: de ejus uiu oblervavit Be prapeit adcribam. H^ic pocus commumffimo,^{*ftion.?an.u} licet in uf^ ac in quibusdam cafibus apprime utilis Be valde medicus fit, in aliis tanien forfañ no-^{Sett. 7. v. 3} xiu5 aut mijiii. falutaris exiftit. Nam ex vulgari oblervatione Cojffepotatore5nirniim. icilenti fe²

tabernae Coffeariae quam in Cayro ipfa inveniuntur. Nee in Londino tantum, fed 8c in omnibus per totam Angliam urbibus & oppiis celebrioribus eulmodi taberna? occurrunt. Mirum interim cantum thelaurum unius gentis pecilium esse, tamque lucrosae stirpis plantaria intra unius provinciae angustias coerceri. Mirum vicinas nationes extimulante invidia aut avaritia ea jam pridem non videri depopulates esse, vel iemina aut viviradices dolo furripuisse. Mirum quern vigilem Draconem Caovetis suis tuendis praeficiant indigene qui omnes infidantium technas &c conatus frustretur aut eludat. Nee enim dubito quin in eodem climate eadem foli constitutione Sc temperie caeli gaudente fata, &c feliciter adolefcere & ad fructum pervenire possent. Mirum denique unius regionis messes totius Orbis expensis sufficere. Oportet utique ut Sc terra fertilissima sit, & latifundia arbutulis confita spatiosissima.

CAP. IV.

De Buxo,

BUxu5 a Graco mEG-j foliis perpetuis parvis, odore gravi^ mateie folida ponderosa fkvicante, fructu tncufjide & tricapsulari cum lex intus feminibus lucidis (padiceis, ab alia quacunque arbore facile diffingitur.

A. I. *Bums* J.B., Ger. *arborefcens* C.B. *arbor vulgaris* Park- (f) e SSOJttCee*

Perpetuae frondis arbor est, densis ramis brachiata, cortice scabro, albo, materie durissima, flavâ nulla intus medullâ, valde a^qualij ponderosa, adeo ut aqua in jedla re<sta fidat, imò nee pariem sentire in aquis notat Matthiolus. *Folia* creberrimaj aeterni viroris, lama, Myrtinis obcuriora, firmiora, interdum concava, & quod notatu dignum duplicia, quacque diligenti vel cultello ita^ a se invicem separari possunt ut tenuissima & ferè pellucida akerius plants esse exercitatissimo cuique videantur: suntque Buxi folia odore parum grato, faporetamen ingratiore, quorum ortU5j ficut Be ramorum ferè est adverfiis: ex quorum alis fecundum ramulos globuli racematim coherent, qui mox in flocculos ftamineos flavescentes explicantur, quo vascula excipiunt, urceolis familiaj viridia, Myrti baccis paulo m'mora, fupenore parte umbilicata, 8c tribus vel (fbatuor veluti anillilis donata, in quibus *femen* concinetur lucidum, Fraxinellse femini simile, flocculi pen tape tali herbacei aut luteoli bafin fructus excipiunt, qui in fummo tricuijis est feu rribus anfaJis donatus 8c in tres cellulas ftu loculamenta diviots, quorum unumquodque bina femina oblonga lucida continet. Radix magna ex parte nodosa; tuberosaque, parte praefctim liiperna & ex parte eminenti, qua materies ejus crilpa & elegans ad varia opera expetita. Reliqua radix non magna, nec profunda, materie cum ligno eadem.

In colle quodam prope Darkingham Surrei* oppidum, 580JC h)il) inde ditto copiose provenit. *Locus.* Amat frigida, aprica, montes. Nulla magis quam hac glificunt monies Sc colles in Delphinatu & Galloprovincia. Quibusdam etiam aWiofs ad Septentriones, dnrosijs inculcis frutescic & arboret cit. In Helvetian, Sabaudis Burgundiaeque montibus non infrequens. *J.B.* Nobis itinere à Gene^ va ad Lugdunum copiosum observavimus. Floret communiter Februario & Martio. Fructum fert Autumno, quo demum femina perficit, cum fructu diu arbori adhziurum nisi avellatur. Aprilii nova germina promit: (ed prius lignum fecare conliiltum ii magis flavum cupis.

Durities ligni cum amarore teredines in eo nafci prohibet. Ejus materies pertinacius ferris reficit, earumque dentes replet arqualitate inertis, qua de caula artifices alterna indinatione egerunt scobem. Imprimis verò (inquit Plinius) materies honorata Buxo est, raro cnfpicanti, nee nisi radice: csetero lenis quies maceriae, filentio quodam 8c duritie ac pallore commendabilis, ipfa verà atbor topiarie opere, *ad quod experientia teste non alia accommodatior, ut qua oh densè subnafantes furculos&frondes in ammahum alioTumve effigies cornpmi & detonderi fra alia quaamque atarf.*

Quidam (ut Amatus) erroneè Buxum cum Guaiaco eandem esse arborem putarunt: in lue Venerea ideal praefare decoctum ligni ejus cum deco&o Guaiaci afferunt Amatus, Praevotius 8c alii. Lobelius quoque virgulta, lignum Be folia decotta Guaiaci modo fudores elicere (cribit, hujusque decocto Famulam pauperulam Anglam à lue Venerea vindicatam. At Dicoloribus propter ingratum & tetrum odorem rejicitur. Nunc dierum tarn à pauperibus quam à dicoloribus repudatur, nee in ufum medicum venit. Fernelius folia Buxi inter purgantia recenset, veriim hodie ea nemo praefcribit.

Alii ligni scobem astringere atque exiccare aiunt, unde decoctatn in aqua alvi profluvia fanarc tradunt, 6c cum vino rubro prodeffe in doloribus dentium afrigidis fluxionibus.

Decoctum Buxi in lixivio pilos mirificè generare ab experientia confirmatur, *Ephm. German.* An. ix. Oblis?.

Infuiio fohomm tencnoi urn Buxi in vino albo, calidè colata 8c propinata cito fanat colicam flaculentam. *Bkgnv^ Zodiac.* An. i. p. 75.

Sunt qui oleum e ligno Buxi destillant' fummè narcocicum idque magnopere commendant in Epileplia, Oilontalgia, dentibusque corrolis. V. *Qtercetam Pharmawf. rejlitut.*

Hodie pestinum dote commendatur buxi materies ex qua laudacissimi fiunt; inio &c olim fiebant. *J. B.* Fiunt & pyxides, nomine etiam communicato, cochlearia, cukrorum manubria, latrunculi, dolorum fistulac, nucifrangibula, radii textorii, cochlea trochi, radii Machematici, amuffles^ Jegu5E, Quadrances aliaque instrumenta Mathematica & uenfilia innumera.

Et ut uno verbo dicamus, inquit J. Bauhinus, ad ea quacunquc torno elaboravi possiunt, nihil hoc Hgno lautjus, prxftantius, sequacius. In hoc enim ligno fcnlptore exccent artem ? mm politiffimas

mas quarumcunque rerum icones, plantarumque imagines ob insignem ligni kvorcem, ut velivas non rare repraesentent ex eo parant.

Verum radicum topi ob varias maculas Be intortos lineas difcurfus ad lautiora opera praeicipue expetuntur.

Buxus aurata Park.

Natura lura est, non alia in re k Buxo arborea, vulgare diffens quoni marginibus foliorum per zftatem flavis 6c velut deauratis.

Buxus longiuribus foliis in acumen luteum definentibus. *Herman.*

a. *Zhanuebuxus minor* Park. *Buxus foliis rotmndionbus* C. B.

Ad duos aut tres pedes tantummodo attolitur, fed in laticudinem diffunditur: ramuli huic numero tenues admodum j folia valde parva, Myrti. T. renSina^ rotundiora 5c dilutius virentia quart! Buxi arboreae, crebros continue furculos e radice emittit qui fubinde radices agunt, unde facile propagatur.

Magni lupiore feculo usis erat in hortis ad areolas & pulvillos limirandDS. Quoniam tamen quantum zterno virore &c tonfili in elegantes, Schematitinos faciliter vifui adblandkur, tanrum pdore quem exhalat tecro olfactum offendit, delicatis prsentis feculi naribus fastidita & facefl&re jutt, ii viridariis nostris exulavit.

CAP. V.

De Tilia.

Tilia, si Papias credimus, quasi *Telia*, quod lignum ejus ad telorum usum fit utile ob levitatem ejus. Ac Martinus a. A. r. *penna*^ nenips ob foliola albicantia pennas referentia unds umbellatim folculi efflorescunt.

Csterum Arbor hzc ligulis foliaceis oblongis com muni flofculorum pediculo adnascens, floribus pentapetalis, fructu rotundo paivo monococcoj cortice lento 5& ad funes texendos habili^ d reliquis hujus generis non difficulter distinguitur.

A- I- *Tilia vulgaris platyphyllos* J. B. *fxmina* G. r. *femina major* Park *fern, folio najort* C. B. €^ e common Eime, Sine 02 SinDcn €tff.

Grata late patentium, inque attegias fornicat Drum brachiorum umbra placet Tilia, caudice mirum in modum grandefcente; CUJUS cortici nigricanti fie in veculis crailo ac niofo, in mjnoriibus necraflb multum nec fabro, fei Izvi ac fibincreo, fubeft tenuis, lentus ac dulcis Jiber *otius arbons nomen indeptusj fi non potius ilia hujus: Philyram dicunt. Materia alba, nioljis, facile cado cedit. Extremi ramuli fragiles funt. *Folia* lata, ex rotundo in acumen definentia, in ambiru ferrara, inferna parte minus hirfuta quam fuperna, qua: fere glabra. Ex horum alis oriuntur ligule long^ albicantes, foliacea?, ex quarum cofta media pediculus emicat, qui in tres, quatuDr, quinquave periolos abit^ quorum finguli florem fuftinent iuaveolentem^ quinque foliis ex luteo albicantibus confanterrij *apicibus* compluribus luteis, ftylo albicante: totum florem obvaliant: calycu dehifcentis quinque fegmenta^ albida, pingua. Frudus Pifo majori arqualis, rotundus, aliquantum in oblongum vergens, angulofus^ hirfuitus, non durus^ intus claudens femem velnucleum iubfufcum, dulce.

Folia feminalia in hac arbore [obfervante J. Bauhino] in quinque coitimuniter divifuras veluti digitos ^fleda^ extremis &c media cteras longitudine (iperantibus, quod rarum 8c /ingulare.

Thalius excremeitum feu vitium uvis Qyercinislimile obervavit in Tiliarum antiquarum radicibus.

Botanici mulri Philyram Theophr. cum Phillyrea Diofcoridis, qua^ longc alia phnta est, confundentes gra^ iter lapfi funt, de quibus confide ft placet Joan. Bauhini hiftoriam.

Tilia, PUnio autorBj montes & valles diligit: item aquofis gaudec montibus. Pjngue ktumque folium defideratj in ftercorato optime proficit: in andis ac faxofis a?gre adolebit. In tDto Germanise traftu, in urbium & moenium areis in deliciis habent, ob opacitatem^ quam vel perfe, velin attegias difpofita, deambulantibus recubantibusque tempore aestivo prsbec. *J. B.* In Hollandia? urbibus pra?cipuis Plateas ad canalium eas medias dividendum ripas Tiliarum ordinibus utrinqu^ conitatas obfervavimus. In Anglia eciam ad ambulacra expetuntur: Sunt enim ad aipeftum piJ* chrz, caudicibus reftis, cortice la?vi &c arquali [antequam vetuftx] folio amplo^, ramis & frondibus feu coma totain conum fastigiata; nec olfactui minus grata: fuaviffimo florum afflatu^ *dati* 4^ e faluberrimo.

Turnerum & Gerardum erraffis exiftimo cum in Eflexia Angliae hoc genus copiose *proponit* alunt, nam cuamvis ipse Eflexi* incola fum, neque inibi neque alibi in Anglia Tiliam *proponit*

vulgarem platyphyllon fonte nafcentem vidi. *Suz* frequens in feftibus 5c fylvis apud nos invenit *J. B.* Be aliorum.

fpon? de S. K J U m o : fructum maturae All 8 uft ^ 9 u i m D X Septanhari adaptus fiflicet ac fua

Hoc *[1687]* *finem* J unil auejulli initium florem explicuit, quinqw. petalis aJbb

aut pallidib; leciuribus pao. *petalis*

pbala alternatim interjacebant) confructum, cum plurimis intus ftaminibus^ luteia apicibus docatis, & ftvlo longiorefructusrudimento infidente.

A- 2. *Tilia folio minore* J.B. *fcemina folio minore* C. B. *foem'ma minor* Park. *Clje InniMealJctJ*
oe toilfe 2i tss, o2 in cu tte. Pseudopipzrifera Cat. Alt. *w 7ifi* /i//i t/7_w; c B

7-5.

Non minus patula est arbor quam pradipta: *Folia* tamen mulch sunt minora, ad Betuhe accederiaV cplorefere PopuliLibyca^ nignora quam prcedentis, nbn perinde hirtuta, sed firmiora, rigidio; raque, Scglabra: *Flores* tamen fimiles nifi minores eflem, colons ejufdem, pallidi, odorati, forma accedentesadBerberimjUmbellam fere efficient^ fex, feptem, oftD, novenij auc ctiam plures ex lutep foliolo feu amento prodeutes, faporo acido cum lentore: quibus fuccedunc fmftus parvi, hirtutij angulofi uc in alia. Materies fimiliter alba^lenis, fed cortice magis fcabio Dbdufta.

Hanc facile credidcrimus pradipta firmiorem-& duriorcm: tDta enim arbor tdrofior.

Haec eftilla fpecies quam in Effexie Angliar lylvis &c feptibus frequentem diximus, nec minus in *Lews*. *Lincolnia* ubi a rufticis (ut nos monuit D- *Martinus Lifter*) *Baft* dicitur, quoniam ex ejus corticibus funes texunt; cui ufui *Stolim* adhibebantur. Invenitur & alibi in Anglia multis in lous.

Serius floret Kfructum perficic quam fuperius geius.

Baccl feu fructus duplici tegumentDj exteriore cutaneo *Sc* molliore, interiors ligneo & duriore Be nuded intus contento confat.

\ *Tilia toximofolio* J.B. *Montana maximofoho, an masTheopbrafli* GB?

C.B.

Tilia ma5, nova arbor, craffb caudice, rambla, materia ut Tiliarum robufta [ceterarum alioqui materies mollis] etiam pricis Be neotericis Herbariis testibus J; B] cortice lanuginofa fibrufo: *foliis* magnis qux vix rotundantuij ut in fcEminafit, fed in acutum angulum definunt, Mori fativac foliis quoad formam fimillimaj eo excepto quod profunde lint ferrata, exvirore nigricantia, prona vero parte fplendentia, *Tiliae feminaE* vulgarisfoliis triplo Be quadruple majora: in qua Raftenus nec florem, nec fructum videre licuit: quam tamen ab annis 17 nunc oblervavi in monte Muteto^ vix horac fpatio aburbe *Bafiliea* diftante. *J.Bauhino* folium hirtiutius apparetin dorfo, quodnervoruni eminentia decorat.

Cortex ic folia *Tiliae* ficcant, repellunt, urinam acmenfes cient. *Conicis* mucilago in ambuftis a^KVfj. vulneribu5 magni eft folaminis. [Cortex commanlus Be illitus *Dod.*-]

Folia trita Beaquã conlperla pedum mmore% difcutiunt,^adaphchas eciam & ipafmum flatulentum in gravidis fingulare remedium habentur. Eorundcm (uccus expreffus] cum vino mixrus, & calidus artubu5 infrii5tu5 fpafrnDeidembenefaeir.

F/orwpartium tenuium & cephalici liint, eorundem odor perquam fuavis eft. Aqua deftillata in frequent! ufu eft ad Epilepfiam^ Apoplexiam, Vertiginem- Commendatur etiam ad cordis tremo- flim, uteri dolores, calculum renum fanguinem confufione aliqua concretum. Aliqui tritos *Tiliae* carbones adifficent. *Dofis* ^j. aut ^ij. Quidam adverfus ventris tormina exhibent. Mulierculac etiam ea utuntur ad faciei fucum.

Bavcx in pulverem redaftz in dyfenteria alii que alvi profluviis fiimmopere laudantur \ cum aceto tritac & in nares inditae adhxmorrhagiam- 'Baccac aliquot dslgluticz valide languinis e naribus profluvium compefcere dicuntur.

In Cortic *Tiliae* interiore, *Philyra* difta, recenti adhuc olim fcriptitatum.

Sutore5 tabuli5 ex hujus ligno faftis ad fecanda coria utuntur, quoniam ob mollitiem cedit ferro nec ejus aciem retundit, tontraac veteribus vifuni- *Quin Uculptoies* fimulachrorum ex hujus materia omnia parte fimulachra exculpunt. Levis enim eft, tenax, facile fecatur, diu durat, nec tredini obnoxia eft.

Carbones hujus omnium optimi funt pro pulvere pyriD corinciendo, item pro delineationibus pi- ftoribu5 expetiti.

E cortice funes (ut diximus) *Sc* CDrbes, lagenx, & cunae, ut *Theophrastus*, vel potius ciftac aliaq, yafatexuntur.

'*Bafilica!* & alibi pauperiores adventante hyeme *Tiliae* folia recondere folent pro vaccariim & caprapumpabub, utirefert *J.Bauhinus*.

CAP. VI.

De Fiticejive Agno.

Hie frutex^A>y©- i.e. Caftus *Grarcis* dicitur, quod iis à quibus eftur, aut bibiturj aut fubfternitur Caftitatem confervet, Galeno fexto fimpl. autore: quare matrons Athenienfium in *The*. *nidphmris* *Cercris* lacortV^{cu, v7[4]} i. e. caftitatem cuftodientes foliis ejus cubitus iibi fternere fblebant, *Diofcoride* 5c *Plinio* referentibus. Officina: inepte *Agnum* Caftum appellat, non advertentes *cafium* nihil aliud efle quam expofitionem *Agni*. Aw>@' dicitur, quafi vimen3 ob invittam vir garum flexibilitatem. *Vitex* Latinis à vinciendo aut viendo ob eandem rationem. Semen quibuf dam k *Piperis* fimilitudine *Piper Eunuchorum* appellatur.

Folio digitato, *Cannabis*; armub, feminibus rdtundis, calyce exceptis, nudis, viminibu^ lentis ab alii5 arboribus diitinguitur.

CAP. VIII.

I. *Amomum verum* Gtt. emac. Park, *racemifum, quod verum credimj Amsmxm. C. & Amomum*
 १०००००. *Cardamomi vulgar is facie, Jim Indices raczms J. B.*

HUjusplanta tota à nemine, quod fciam, defcribkurj fed ejus fructus feu uva duntaxat à Nic. Maronea M. D. infuo de Amomo cDmmentariohis Verbis, Eft ille parvus racemus, abfque pediculis ex Lino farmento enatus, fibi ipfi arfte coh^rens Be convolutus in uvz modum, confans decem aut duodecim ad fumum acinis, feu folliculis fibrofis femutò comprimentibus, tanquam de communi loco inter fe decertantibus, adeò uc fibi invicem parvas cavitates imprimant. Racemumftinet lignum teres pollicari longitudine, fibrofum odoratum, acre, foliisconfertim exornarum, tumpuffillis fquanurumferie diftributis quapartefolliculorum eft expers tum longioribu5 foliisiènis fingLilosfolliculos ambientibus, quae vicem quandam praefant calycis illius^ quem in Nuce Avellana confpicimus; exlongioribusfoliis tria quidem confanc longitudine femuchiali, tria verò paulò breviora funt; eadem folia tenuia flint, fibrofa, acria, odorata : fed quae privatim folliculos complectuntur, smulafunc foliorum Mali Punicij fuís cacuminibus fspe contrafta, rarò Integra^ utvix extra Amomi acinos emineant; quod evenire credendum ^ft, quia mutuo attritu foliorum fummicates confringuntur in longiffimo itinere- Acinorum craffiludo 6c figura orbicularis exiftit qualismediDcris Uvei acini- Ornantur folliculi Amomi externis tenuiffimis filamentis^ feu nervis quafi lineis per longitudinem duftis, ternis etiam prxditi funt parvis fulcis, totidemque intece detibus exiguis eminentiis, quae triplicem internorum feminum feriem circumfcnbunt: iingulos folliculos replent tres feminum phalanges, tenui membranaabinvicem fejunfta, unaquaeq, autemphalanx pluribus confat feminibusangulo, jis eadem tenui membrana involutis, adeocj, ftiiftimlibi cohzeritibus, uttrium duntaxat feminum longiufulcolorum fpeciem przbeant.

Racemi tDius Be ligni color idem fpeftatur, in aliquo pallidus, in alio candidus, in alio verò ex pallido ad fubrufum vergens, fed in can dido folliculo femina infunt plerunque evamda, in fubruffo femina folidiora Be perfeftiora frequentiffimè obfervantur: feminibus angulofis color externus ex rufo nigricans adest, incernus albus- Semina interna eadem flida font quidem, fed frangibiliaj nonfraiftu concumacia ut Cardamomi femina. Racemo odor ineft validus fed *U>JKI ingenitus verò non afcittius, qui vulgarem Lavendulam quodammodo redolet, fiiavior tamen; exemptis à folliculo feminibus major odoris acrimonia inert, minor autem odorisgratia : eadem ratione &c racemus, Be nuda femina ach iapore funt pradita, fed in racemo hebetatur acrimonia, in nudis fsmibus vehementiorpercipitur, quae vulgarem caphuram quDdammodolapit,

Deinde oftendit Maronea omncsnotas,, quas Cim Diofcorides^ tum Plinius Amomo aflignantj Indicohuic racemo convenire; unde nunc dierum k peritioribus Botanicisprogenuino Antiquorum Amotno habetur, quamvis non defint in contrarium rationes, quibus recenfendis&vel confirmandis, vel refutandis Immorari non neceffarium ducimus. Hie cerce Cardamomi fpeciss videtur. Cardanujmum aucem &c Amomutn verum cognata efle vel nominum affinitas evincit. Aliorum opinioneSj Amomumvel Rofam Hierichonticam, vel Cubebas, vel Piper racemofum, vel Piper jEthiopicum, velPedem columbinum vel aliud quid exiftimantium, refutatione non indigent.

Caeterum, (inquit Maronea) Amomi uva, cujus noticia injuria temporum deperdita per aliquot feculalatuit, denuo inlucem prodiit opera Cerchini Marcinelli Veronenhs Pharmacoprei, qui ex remotiffimis Indis regionibus verum Be legitimum Amomum ad nos tranfmifit.

Amomum [autorepiofcoride)vim habetcalefaciendi, adfringendi, ficcandi^ fomnum inducen- **Virg.**
H, dolore excimendi fi fronti imponatur, inflammationes etiam ac melicerides concoquit ac difcucit. A Scorpio iftis cum Ocimo impositum prodeft- Podagricis auxiliatur, Ipfojqc lenit: Oculorum item inflammationes 6c eas qus in viferibus funt cum Uva paffa. Ad menfes Be in peffo &ininfelibus commodumeft. Decottumvero ipfius potum convenic hepaticis^ nspiriticis, podagricis. Admifcetur etiam AntidDtisBcprstioffiffimis unguentis.

Amomum GalenD AcDro fimilemfacultatemohtinet, nifi qubd AcDrum ficcius fit, maJDreaudem concoquendi facilitate Amomum.

Przepicius autem ufus Amomi apud Veteres erat ad unguenta. Qux confant Amomo, inquit Plinius, omnia actiora fiunt, maximeque nares feriunc: acerrima per fe Amomo. Hinc Regale unguentum appellatum, quoniam Parthorum regibus ita cemperaturj Amomo etiam confat.

.1. *AmomumJ)uriurn* Ger. Park- *Amomum Jpurium foliofum* C.B. *Amomum vtrum* १०००००००
 J. B. *Hamama Arabihm* i. e. *Pes Columbians.*

J- B-

Amomi nomine a Valerando Dourez infigni PharmacDpffo accepti aroma quoddam magnitudine fpcicarum ftoechadis Arabics, cujus tamen porciones feperatae his anguftiores erant: duas fimul junftas vidi Pedem Columbinum hirtutum exprimentes. Confant autem foliis mulcis fquamaram imbricato poffitu compaftis, ex luteo albicantibus, fimile aliquid Be colore Sc forma cum Drigano habentibus, odoratis^ fapore vifcofo amaricante Be acri.

An hxc fit Garciz Amomum quo fe a Nizamoxa regc Decan donatum fcrcbit, quia defcriptionem ejus non adjecic, nefcimus.

3. *Amornnfvit Tfrndamomum* J. B. *Amomis Cluf. ad Garz.* C.B.

J- B.

Ab eodem Valerando pro Pfeudamomo Be Amomide mihi exhibita funt fragmenta feu partes quaedatn nonnihl Amomo praecedenti, fimilcs, inter quas lignes aliquae porciones, nigra, in quorum extremitatibus apparent paites fquamolx, breviores quam in Amomo, minus albicantes, fapons vifcidi, ut nobi5 quidem vidstur, E 5 5 c c c e

4. *Amomam*

4. Amomum racemofum ligno AJpin. DeMed. Egypt. / 4. r.io, ^gyptiis Hamama.

Eft, incejuitj ramulus brevis, graoilis, multis obliquitatibus, atque pat-vis, denfis., contor tis ramis przdituSj verēquaceracemouvarum figurā familis. Efttamen \gnuſus, durus, frangibilis, colors corticis quidem nigrD, fubrubente: ligni verb vel albo, vel flavo przdicus, valde jucundum fcaromaticum odorem fpiransj Ted nullius faporis. Vide (inquitD. Jonftonus in Dendrolog.) annon potiushoc pro ATTIDITIO Diojcoridis feu Armeniaco, feuPontico fumeremalis, fine verborum violentia. Non aJiumfuiflē credo Garcix ramurn quern collatum defcriptioni Diolcoridis venuitflimē quadraffe refert-

CAP. IX.

Zbus myrtifoliaMonfteliaca C.B. myrtifolia Ger. Plinii myrtifolia Park. Tlinii putata J.B.

J.B.

Amulis quadrangblis bicubitalibusdonata eft, [cauJice pollicem craffo, fragile cavo Sambuci inodo, cortice cinereo maculoib, membrana rufefcente fibjjefta, tzttoLugd.''] perquosor- quadam /o/w oriuntur bina ut in Nummularia K Jujubis; Jujubarum quoqus hns imiliaj led acutiora Be majDra multo. F/orw parvi, virid^s Hv^ chlori, racematim quafi conge- eum apicibus multis, partim Tiigricantibus. FruStm Pi forum magnitudine, pentagon^ cujusfe- mima (ut notat Lobelms) intra angulo/am tunicam inclulā fiint cochleata.

Locus,

Circa Monfpelium copiDse provenitj prarfertim ad ripas Ladi amnis.

Cum frutex lie, Rhus Plinii Myrtifolia eſſe nequit quz herba. Verum quia qualitatibus fuis Rhoem imulatur, & hoc nomen fibi ufurpavit, per me licet etiamnum illud retineat.

UJw,

Ufus ejusnullu5 haftenus innotuit przterquam ad coria firmanda^ .quo nomine notiffimam Kufir tariffimani confcac Narbona: dicit Lobelias, J.B. Verum D.Magnol ad colorem nigrum, vulgpo Roudou, tinctores eā uti fcribit. Botan.Monfp.

CAP. X.

* Pi-F.ai. T 35-

Manjapumtram * H.M- An Arbor triftis Myrtofimilis C.B? Arbor trifius Garcia? & Acoftai? J.B. r. 1. /-4. c J4. Park.Ger.

H.M.

Arbor eft grandis, trium quatuorve hominum altitudine, denfis Sc opacisfrondibus^latcſpar- fis, nafcensinarenofis: Radix (ubtus iupraque terrain ramDslpargit. Stips ambitu ample- xum unius brachii zquat, Corcice cinereo. Garcia? Arbori trifiti magnitudinem Qlete, folia Fru- nli tribuit. Acofta magnitudnem & formam Trufij Fabric. Mordents apud {Zlufrum altitudintm trium hominum, in quu pulchre cum Autonbus noſtris conwrnt; folia Myrti. Surculi quadrangulares^ ac nodulati, fpadiceo conice obdufti. Avofia rami tenuesfunt, & cirtaſer jpatia nodulis difiinBi. Folia in nodulis pediculis brevibus craffiolisper intervalla bina fimul oriuntur oppofita^ adpediculum lata curvitate, anterijs in anguftam cupidem contraftajtextura craffa, fuperhcialpera, fuperne obfeu- ro virDre nitentia, fubtus dilutiore, fapore aftringente Bcfubamaro. Acoftaz folia mollia & lanugino- fa funt fartt awrja, qutmadmodumfere Safoia folia, & viridia nonnihilque ajperaparte fupna.non adeo lerrata in circuitu ut Vruni foliaj mqu taru multis *vtms pradita: quae defcriptio cum defcriptione flC jcone H.M. convenit. Florzs in furculis ngidis bino ordine ex alis foliorum egreſſjs, oblique exten- iis, &111 tresramulos curtos brevefque clivilis proveniunt, quini fimul in fingulis furculorum ramulis. Acofta paulb alitr, Ifingulorum foliorum fedznafci ait pediculum, quinquz capitula [urnma fui parte fuji- nntntm, qua quatuorfdiolis fubrotundis conftant, e quorum mtidio qmnpilores xziliunt, candidi, elegantes, Mali A*re*floribm magmtudme pares, tenmores tamen, elegantiores ET odoratiores & pedkulo magis adru- brum cjuam ad flavum cvlorem tendvnte, quo Indi t dull a tingunt, qutmadmodum nos Mroco. Flores odors fuavi funt optimum mel aemulante, albicante Sc aqueo colore, lex, fepteni, oftovej petalis compofiri, ad unguet fritaioribus^ versus apices dilatatis, fummitate excavata in medio velut bicornibus, textu- ra tenui Be rigida, in Sole valde cDruſcantibus, venulis vix conſpicuijs niſi ubi coJore albicante attrito rnenibranacex funt pelluriditatis.

Sunt autem pedicuhflonimj quibus e cajyce oblongo profundo, viridi, ora fuperna rotundo, emi- cantj vaginula: breves, femunciales, crocez, in quibus duo (lamina flava, apicibus crafflSj furrefris, flavo-aibicantibus docata. Pediculi ficcati croceum cDloremacquirunt^ ii/que Indigenac cum ligno Santali mixtis atque tritis corpusinungunt. Fruttus Jiint rotundo-planiac comprefſi, coioie viridi, in niedio unafititura^ exuberante ad verticem utrinque perdufta: in quibus duo rotunda CDmprefſa<?#>na, quz utrinque fub cortice extuberant^interſepimento niedio aTemutuo diftinfta.

Fructus huiusmodi in India videntur, et sunt effere, per Indiam fructus huiusmodi in India videntur. EEO Clm D.C. Jf. nio Arborem hanc eade ni eſſe cum Arbore triiti Acofta: U aJiorum, tas mukasco

RUS nullk sc fi? uXUS uoTMm ArbDus m A if de die, quamprinum Solanbu^ radii iUnfranhir, cu- WJ a quibz? o > Verum tClm, Fab» «0 * Paludano t.ft»D[5] .Hud cDpS duniaiat concern* pertingsre poſſiunt, minois faciēda vidwur hsc difficjras.

Lib. XXIX *The Arbribus fructu per maturifiatem ficco.* 16QD

Flos sapore est subamancans, quem cor refocillare incola: centent. Nam & Gentiles ibi mēnici femē ejus inter cardiaca referunt. Volunt etiam nonnulli aquam stillatitiam floram cū lisutilem esse, admoto liheo panho hācincinftb: in querr ufum, 3c etiam ppter odoris am ftudiosè colliguntur ab incolis,

CAP. XI.

Edera trifolia Eanadeafis Cornuti. *trif. Firginien'is* Park. *Epmtdiutn fruktans Canadenfe* *Trifolii nēnifibus.*

Com.

Folia habet Phaeoli itibdo tripartita, flamaribus ferè pfidiculis nixa, qui ficco turgentlatteo dum rumpuntur, verum paullo post ita nigrefcente ut atramentum videatur. Cujus rei gratia a plerisque habetur parcipuus tingendo capillitio, cōnfectisque ad itinfuris infertu nuperad miraculum ufque id prsttit. Ex tenui Be pallido florz luffco-pallidos corymbos profert sparfiore race-mo, in quo pulpa nulla est, aufaltem adeo ficca vix ut compareat; fed in ejus acini^ przter/^ew rotundum, duriffimum, cineracei colons, membranateftum aridā fccorrugatā nihil continen vifum effi Lignum obtinet cderaceum (longè tameh mollius ac medullofius) quod mirā varietate lafcivit nunc emm viget ac fine admimuloftat, nunc ortisabradice ftolonibus per fummam tellurem errat^ ac fi proximo panete conferatur tenaces in rimas ejus deducit fibras, ramulofque mittit qufhelicis modo radican-tur.

Floret Julio menfe, femina mature/cunt Septembri. Folia quotannis amittit.

Duplicem fpeeiem diffinguunt, alteram virgultis procumbentibus^ alterant virgultis ereftis,

Jo. Bod. aStapelnotisinTheophr.hift. lib.4. c. 5. p. 564- inter alias plantas exoticas Behandc-
denbk tkulo *Apvcyni trifoliati Indici vulgo Efimidil*

Ouarit t>. Hermannus in *Cat. Hort. Leyd.* An ereftior hujusfruticis ippecies fit *Hederar trifolii* Canadenfi affims *Indica*, Arbor vcnicata quorundam *Hort. Reg. Paris;* quī^ culta est in Horto opulen-tiffimo ReverendiffimiEpifcopi Londinenfis D. ft *Comport*, Rei Botānies Artiumque MiCenatis Il-lustrillimi.

Hzc arbor à quibusdarhnominatur Arbor Virginiana tinfctoria.

CAP. XII.

Edra quinquefolia Canadenjts Cornuti. *Vtiifuoptius Hedzra qumqtiefolia Virgmhnc* Park, parad.

• Corn.

Non enbdi fruticat trunbo, fed lignum habet larmentofum, geniculis articulatumijVitis more medullofum. Cute verius quam cortice obduciturj kvi, firmitque novelis vitis palmari^ cum tentur inter fe, tird^ friatur. Amplitude fruticis tanta, quantus paries aut arbor qui-bus velut adrtiiniculis fustinetuF. Pediculi longiores ex alternis *quibuslibet* hinc procedunt; rubri : *quibusfolia* quinque *fun gple* *er fto* *que ne* *los n f* *u r.* Adnascuntur hinc inde ex al-terafoliorumparte *tlac* *yc*li*, qui in piures fibras enfpas spai^guntur, quarum extremkates limo *tura* callo teguntur. Hisvdut mambus pproxima quso, comprehendit. *Be parietum a/pentatibusilla* queat fese, quos tam jucundofpectaculo obveftit, ut ad topiarum opus nihil commodius natura produxiffe vidcatir- Nee enim ruinpa ^ft xoihcns ut *Edera* riortras, quam ob caufam eam à donibus procul arcent qui earum diurnitati cogfulunt.

Sapor huic acidus acparum acerbus. Necflorem, ricu baccas vidit Cornutus. Folia ut przes-
dentishyemem nonliiftinent.

Flores, obfervante D. Hermanno^t habemus ex Annótatis *D. Palmer*, cb^mboff, mufcofi; bac-
z rotundsHedera in modum. Fructum obfervavk eruditiffimus Vir Be inlignis Botanicus *D. Leo-nardos Plmkmnt* Be cipulas esse affirmat, multa miriuta femina continentes.

CAP. XIII.

Spireafbeophrafii Cluf. Gcr. Sp. Thebplra(H forte *£lu*(iv J.-Bt Park, ^piftttt SBilldti Of Theo-
phraftus. *Frutzx jpicatu* filiis falignis fertatv* C. B.

Cin.

Duonim cubitorum altitudine aflurgit, tenuibus ramisfeu virgis^ puniceo CDitice obduftis, pf^ qud sine ullo ordinepirfa funt hequemia, lbrigiufcdla Be angufta *'folia*, falignis proxima, per ambitum *I* errata, fiperte dilutiore yinditate pra^fcita, internè veluti *Zerugine* apherla exhecantis cum qtadam amaritudine conjunaguftus. Extremi ramuli digitalis ferè longitudinis la-
cis crallam *fijem* ferunt exiguorum flodeforum, uvz in morem congeftorum, pentapetalorum e quorum umbilico multa ftaminula produnt, colons cum fuo flore ex albo rubefcentis five carnei nullo peculiari odore pra;ditorum, nifi qualis fer^ in flore Olea est: *Ulise* Vaneitibusruccedunt puffilla, penragona capitula, qua: ad plenammaturit^tem pervenientia tenuiffimum Be quodammodo pulvercum fmen flavelcens effundunt.

ABriga *Sildwad* Clulium miflus est. MspfeJulio floret, Tub Augufti finem (emen maturefcit. *Trmjb.*

SECTIO TERTIA,

Jrbom 6^s Frutms Fruttu Jicco diverforum gmwum compkttms. lit v.g.

- J. h^o TRuftu membranulis extantibus velut alato donatas; cunjulmodi fiint Acer & C Fraxinus.
 H i- Lanigras, feu Floribus Be Frutibus fpiuatis ut *Tamarifcm*^ feu in pillulas echinatas
 A conglobaris, uc *Tlatanxs*.
 3. *Conifer as*, ut *Myrtus Brabantka*.
 4. *Multifiliciuas*, uc tyttfite *H. M.* & Anonymos foliis Ribefii.
 5. Frwff* *Fetajoide* donatas^ ut *Paliurus*.
 6. Fr. *Bivalvvi dicocco* praditas, C^r/w C^riw.
 7- *Fr. Tricocco*, uiUydi-Avanacu, *Tira-Calli* qua: font Lathyridis feu Tichymali Fruticefcents In-
 dicifpccies, Chameka tncoccos, *CanfibiH.M.*
 8. Fr. *Ptntacocco*, Pocatsjetci *H. A.*
 9. *Thlafpzos amulis Jihcults*, ut *Rofa Hierichontua* diftaj gux vera Sc genuina *Thlalpois ipe**
 cicseft.
 Ia. Seminibus mulcis parvis invafulis ficcis, ut *Cebipira Brailieifurrij Amwtti H. M.*
 ix. Vaibulofubrucundo fminapary^a concinencein imo tiore oculicatOj uc *Erica*.

CAP. L

De Acere.

A Cer hsc arbor Voflio difta videtur, quia acris, hoc eft, duri admodum ligni fit, pDtius quam, ut PerDtto videbatur, quia acria in ea arcifiuum ingenia exerueantur juxta illud Plinii lib. V G- c-15. *Awr tjufdzm* (acTilia) *amphtudmis, ofcrumdegantidacubtilitatCitrofaundum*.
 Acerisnota: font folia laciniata auc angulofa, fenuna bina junftaj valculis duris membrani^ sx-
 tantibus alatis indufa.

A- I- ^acer minus Ger. emac* *m/mm five vulgar** Park. *Campzfrtz & minus C.B. Vulgar** *mri folio* J.B. ^C CoitiiTiOJI ^fclplc,

7. B.

Caudicc ramifque eft plurimum lulcatis rugDififfimej matefig^alba, i^K fragile 3c fiffili medulla farfta. Ramuli minores adverfo pcrunque fitu oDnjugatim onuntur. Ramorum cenuiorum cortex tenuis, fufcus, qui unguibus facile abraditur, fubeft alter etiã tenuis flavefcens [Ramorum cortex nobis obfei vantibus- cinereus eft cum aliqua ruboris tindlura] *Folia* Hederac flilis quodam-
 modq familia, quintuplici diviura primaria incifa^in principio tenera, molliaqu^ quotemporelaftei
 quiddani fiindit, temporij progreflu rigidifcunt, pediculis longis virentibus aut rubentibus hz-
 rentia (bina libi Contraria) *Flores* tunc multi expediti lanuginis, interdum ramotis, multoq
 in novem, decem aut undecim fegmenta partita, coloris herbacei, divif. lamina vireicentia auc
 rubenda apicibus luteis una cum tylo bicorni obvallanca. *Semen* CDnceptaculo g^mino alis Jibel-
 larum aquaticaium expanfis figura fimili, hirfuto ocluditur^ in extremis membraneo, qaa coitus
 eft alarum turgidulo & C nonnihil elevato, intus duro 8c pxne oHeo, cavo, iri qua cavirat^, *fepten*
 nieduHofum Be virens vel pallefcens latitat, faporis iubadftngentiSj non ingrati tamen. A *un-*
 gentior eft fapor cpcticis& folioruinj nee fine amarore.

Nocatu dignuip eftqubd quaxivis Acer majus *be* minus arbores lint congeneres, plant^ *em*
 feminalis longe aliter complicatur in unius quam in alcerius femi^ ut exaniinanti *be* expli^nti
 pacebit-

Tragus Aceris folium Saniculac non male fimile effe fcribit; corticem. incanum; arbojcsni mpdi
 humilem, modo magnitudine infigni: *raro tamen apud nos in infigmm vel ahitudintmattolitur^ *ud*
crajfitiem extenditur.

Arbor eft paffim obvia Be nemini non nota. Gaudet praeruptis & c fylvoils (inquit J. Bauhinus)
 at apud nos in fepibus ubique occurritj omni fere folo.

Floret Apiill & L Maio, Septembn fruauum maturat.

In nvarioferarum *D.Fr. WiUughby* in agri Warwiccnfis vicb *MtiiUton*^ lion prbcuJTamivprcha
 appido vifcum ferens obfervavimus.

V^tenbus len- folebat ad maritandas Vites non fecus quam UJmus.

Aceris radix, Plinio prodente, concufa c vino jecinoris doloribus utiliflimeimponitur.

*Si latus immeritum morbo Untatur acuto,
 Accznfum tinges lapidzm jirtidentibus undis,
 Hwc bibis j aut Aceris radicem tundis, & una
 Cum vmo cap is j hoc prof mi medicamtn babztur.*

Acér

Acer operum elegantia & subtilitate Ceras, non Cedro ut vulgus commutat scribitur, sed quidem cum maximis amplexibus fuerit uodammodo crispatur: plerumque apud nos laudatibus dicitur suppellectilibus, orbibus, mensisque, Sec. J-B. Excrefcentiae tuberosas praxipue commendantur ad frinia, pugillares, reliquaque cunofa, ob intortum, crispum, Be varie undulatum Inacularum difcurfum/

i. Acer trifolium C.B. MonfaJJ'ulanum J.B.

J.B.

Arbor ell medincriter procera, ramis ktis explicatis, cortice quodammodo purpurafcente; folio Aceri vulgari fimili, in tres tantum culpides five angulos divifo, craflb, venofo, ex longo pediculo pendente, parvis incervallis ucrinque fito : fruftu gemino, membranulis duabus cohſientibus, allmufcarum (imilibus.

In Delphinatu non prouul Gratianopoli eundo ad maximum Carthufianorum coenobium obferuavimus. Reperitur etiam in fylva Falena nonlonge a Monipelio; 8c in rupibiis ad kvam Capri juxta Ladum amnem.

A. ?. Azr majm, mult is falso Platanw J.B- majm Ger. wajm latifolium, Sycomorm affo dictum Park, montanum candidum C.B. fttfjc.gCCPtCi: \$\$@%TQz> Cgminunlp, ptt falflp, the g ronois €re.

J.B.

Arbor est speciosa Sc prDera, rubenti cortice inteftis ramis affatim brachiata^ materie multum renitente: foliorumvero ampla latitudo, quae viciginea, aucAceris vulgaciffimi forma, licec acutioribuslaciniis quinque prsdita, fupra atrovirentia, infra pxne incana, utnqus glabra, fapors adfringente cum amaritudine. Ob foliorum amplitudinem Sc formam Platani aemulam cum Septentridnalibus populis per xftivos calores prſcipuam inic gratiam. Flores mufcoii, ex herbido albidu, calyulo continentur lanuginofa. At alati fruftus ex vulgari cognitu funt faciles^ per omnia majores, ex longo pediculo pendentes plures, fed finguli bini foliacei bipennem-expanfam Be invsiiam, aut Libellx alas imicati^ micleDS in medio qua alx coeunt itidem gemino utriLulu duro Jatis continent, magnitudinis (eminum Arantiorum albicantes, guftui non gratos.

Humeftis &c altiffimismontibus gaudet. Nos in Saleva monte non procul Geneva obſervavimus. In Anglia non provenit ffonte, quod fciam, adeo tamen frequens habetur in areis &c caemiteriis, hortprum ambulacris Be circa nobilium aedes, utmerito pro indigena accipiatur. Nuper tamen minore in honore effe caepit quam olim, ob folia decidua quz cum initio hyemis primis ftatim pruinis decutiantur, in terra jacentia humore in putrilaginem illico fblvunturj horcolque Sc ambulacra inquinant Sc corrumpunt. Floret menſe Maio : fruftum macurat Septembri.

Materies candidior ab arculariis Be menſariis ad vanusulus expetit- Quadra Be orbes ex za laudatiffimi fiunt.

Veris initiis cum germina novella turgefcent, antequam explicentur in folia, arbor hanc in trimCD, ramisj.aut radicibus vulnerata dulcem Be potulentum iuccum copioſe effundit, non fecus ac Betula. Quin Be Autumno quoque poſt delapſa ftatim folia. Be per totam etiatn hyemem : quod primum obſervavit Be nobisindicavitClariff. Vir, Be chariQimus amicus noſter, D. Martinm Lifter. Notandum tamen hoc ei nonaccidere quacunq; coeli conſtitutione ahc aeris temperie, fed gelida taatum Be leviter pruinoſa.

Succus hie Saccharum non obſeure reſipit, unde Canaclenfes Americani exeo Arundinum liquoris in modum decocto Sacchari quoddam genus conficiunt, ab arundineo difcretu haud facile, cujus portiuunculam munere mgenioJiflimi Beerudiciffimi Viri D.Franciffi Afion R. S. olim Secretarii, hb

Eft Aceris occidentalis Ipecies folio minore iubtus mcana^ iupri atro-virente, qux Acer florefcens Virginiana audit; hxc inodora eft-

4. Awisrnaris varietas J.B. An Acer montatmm Park? Azr montanumflavum Jive criftum C. B? An Acmont. unmjimk & azutis foliis ejufdem ?

J.B.

Prxditfo foliorum amplitudine minime cedit, nec tam altis finuutn diviluris, nullisitem ferraturis, fedextrcmorum acutie exquisitiffitna, ut cum quavis etiam acicula certet, pari nervorum divifi- ra^ fed minus frequenti inſerna^ parte: non incana funtut prxditfi folia, fed dilute viridia, fplendican- cia; fuperna (aturitiuſ viridia, non tamen adeo ut priora. Tota ceterum folii facies molliorj delicatiorque, longionbus etiam haerent pediculis. An in flore Be fruftu aliqua fit diverſitas non- dum obſervavimus.

Habemus folia in montibus prope Genevam colleſta^ quz defcriptioni Bauhinianae examuffim quadrant.

Acermontanumfoemina C. B. colore eft magis flavo quam mas, ligno duriore Be venoſiore magilque cripo, citiiffique floret. Germani, inquic, ob flexuoſos venarum difcurſiis ad opera lautiora Utuntur, lignum nobile vocantes; ex hujus radicibus cochlearia pulchra conficiuntur.

In hDLto Edinburg. Sutherland, invenio Acer Maj. foliis eleganter variegatis.

5. Am majus folio rotundiore minus ladmato, an Opalus Italarum?

Hujus folia habemus in Italia Be Sicilia colleſta quz magnitudine ad Aceris majoris vulgaris folia cedun^ Iongis pariter pediculis nixaj verum rotundiora, minus profunde lacinata, laciniis etiam ifegmeati. bufidibus.

Non pediguli tantum fed Be venx icu nervi foliorum Inligniores rubent,

Arborem ipfam, quod piget, non descripfimus, quia à Botanìcis ante nos pridem defcriptain fuiffis non dubitavimus.

6. *Acer Virginianum Jiw Canadens* Virginianum vboratum* Herman. Cat. app- *An Styrax Attris folio?*

C A P. H.

De Fraxino.

Fraxinus Gracis *Mijr** & *Siv Tei^©-* etiam CDgnominatur, i. = trinodis, quod ramos ordinatos *9£* numero pares habeat. Lacini nominis Etymon probabile apud Grammaticos non invenio: nam à *Frap* dici^ quod in fragofis locis nafcatur; auc à **&& fepimentum*, quod ad fepes coniciendas utilis fit, minus placet.

Fraxini nota^ funt folia pinnata, folliculi membranacei oblongi, femine extrèum inferius leu quod ad pediculum eft occupans, non ants Autumnum maturo; flores ftaminei congefti, ante folia erumpentes, Be brevi evanefcentes.

A. I. *Fraxinus vulgatiór* J. B. *txnlfvir* C. B. *vulgaris* Parl- Common ~~Styrax~~.

~~Species peculiaritatis arbor crasso, fimplici, erecto, calidoque caudice adolefcit, cortice cinereo, unde fortaffe nuncupata Anglium *Shib*, raderis alba, crifpo pectinonem difcurfu undulato, valde raris, binis ex adverfo politis, brachiata. Firis eidem bino ordine inter fe contraria, Sorbi riuulo pinnata, quadruplici, quintuplicive, aut etiam fextuplici pinnarum conjugations ad coftara annexa, quam impar folium terminat, Isvia Be interdum crenata, ficco fapore fubamaro, aenque ac mordaci prsdita; quern etiam faporem lingua impnunt quoque fructus qui peculiari furculo numeroft dependent, quod inverfatn avis linguam referant, inde in Seplaffiuiomen adepti Ex his finguli fercunciam circiter longi, parum culmo 1 adores, infima parts ^à pctiolo remotiore] membrane^ à medio ad pediculum medullá farftifunt, alba, guftu acri *S£* amaro. Radices fumrnatel' lure gaudent, Be in fupercficie terrae latè extenduntur j unde & arbor c^Iw^Mijr* reat à Theophrasto dicitur.~~

**InHift.Lyjr.* Scribit * Dalechampiuslc globofos *muhos*, quaks tradit Theophrastus, in Fraxino obiervaffe, &c collegifib hyeme jam definente: esse tuberofos^ veluc ex reficaru nupcniuis glutinofb mufco concreto5, guftu nunnihil adfringent^ lignofu intus no do mufcofum corpus fuftrinsnte. N^ J. Baihinus neque nos quicquam tale in Fraxino haftenus obfervavimus. Si quod tamen eufimo^ di fit, jihhil aliud eft quàm excrefcenciaqufdam à punitioneaut: afflatuvenenato infesti cujldam excitata.

Cum dicat Columella Orlium esse Fraxinum fylvaticam leu montanam, ac Theophrastus referat rupium Fraxinum colore^elle luteoj & Germanorum *Wald efcher* montana fir, colore luceo, ut experienciá fibi compertum esse scribit Turnerus, recte nobis videntur facers qui FraxiniLir montanam Be lylv. Germanorum esse Ornum Latinorum & Fraxinum fylvestrem Theophrasti ftatuunt- 3.^R

*Locus** Nafcitur Fraxinus squc in montofis [fed humidis] ac planis; nec minus in calidis quam in frigid 15 regiDnibus: in Anglia ubiqus frequentiffima ell in fylvis ac f?pibus. Auftu facilis est j Sc feftinantius germinat.

Fraxinum duplicem faciunt nonnulli^ *marzm* feu ft&rilem quz flofcolorum racemos nigros dnn-taxat fert, *iefveminarn* leu fertilem, qua^ femem feu linguam avis didum producit- NDS in Fraxinis verno tempore qufinudi flonim ftamineonim congeftorum racemos obfervavimus, anre folia cíumpentes, & brevi evanefcentes: nec tamen infrugifera:, (quantum meminimus) fuerunt *hs* arboresj verum port flores etiam fruch.15 protulerunt, quod 3i Parkinsonus affirmit.

Ligna Fraxini poft vindemiam Be Arfturum ca:dcnda prscipit Theophrastus: nam fi vel citius, vel leuius quam par est czdantur, teredini obnoxia erunt.

Correx interior Fraxini fut refert C^falp.) aquamin qua maduerit cceruleam reddit.

Fraxinus Homeri przconio Sc Achilles hafta multum nobilitata est. *Tim.* Porro tantus est materiei ejus ulus, ut Fraxinum pra: aliis copioffimz materia: causa naturam generaffe scribere non dubitant^ Plinius: quippe quz obedientiffima fie in quocunque opere, tandemque pro haftis CDIT" ID melior. Corno lexiór. Sorbo lentior. Eft lane Fraxini lignum tenaciffimum ac duffimLini- Multum tamen intereff inter virgam feu folonem h terra enafcentem: Sc famum & franco arboris adulti decerptum lentoris repectu j hie enim valde fragilis est, cum illis tenaciffimum fit. Ad ephippia & L tanflas conficiendas expetitur; ad aratra & crates, rotarum canthofe modiolos, ad hedas, vehicula &c icalas, ad menlas, cochlearia, pocilla; ad circulos pro dollis^ manubria Kcapulos organorum quDrumcunque, pugionum^ Bcc. ad ligones & palas^ aliáque ferè omnia infru; menca ~~folia~~ confubiffimum est. Denique (ut pergit J. Bauhinus) Quicquid ex lignoneii ~~de~~r, iCa ut iuibtile, fabrefaftum^ etiámque forte esse debeat ut magnam vim Miners quear, non melius ex alio quim ex illo parabitur.

fraxini femina contrita & cum vino pnta lirinam ducunt. *Hipp.* -1 - r *

r S f ! r f f ^{femi} ^{vlnD} ^{CDfta5} per triduum ^ Porcello, Be in quarto die occide ipfum, & Ciederetdsu) noninvenis rplncra Gal

Fohorum Waxini ^{oh} ^{fuic} ^{pvu} ^{lo} ^{bauhin} ^{ap} ^{araram}: ficcant valid*, curant ^{que} ^{mir} ^{re} ferpentum, fa Vectribus fides. Dc ^{an} ^{up} <hu inter ferpemes *be* hujus arboris ramDs ^{id} ^{**}

refert * Plinius, quæ quoniam iè expertum affirmat adleribere non pigebit. *Tanta est <vis, inquit, *Lib. 16C.13 ut n\matutina quidem occidente jeve umbras quum fint longijima, serpens ejus arbor is attingat, udeo earn procul fugit. Experti prodimus, fironde ea gyro claudatur ignis & serpens in igmm potius tjam in Fra* xinum fugere ferpentm.* Idem etiam fe expertum prodit Ambrosius Paræus. At Camerarius contrarius fe expertum scribit in fserpentibus Germanicis: & D. Charas in obferv. 8c experim. de viperis non ita pridem Gallicc editis aferit fe factò circulo e foliis Fraxini, qui habuerat circa tres pedes diametri viperam vivam in eum immiffisse, quæ: folia (ut videtur) nihil verita, illico sub ùs fefe occultatum ivit. Vel ergo deceptus erat Plinius a magico quodam impostore, vel aliani arborem intelligit.

Cortex & lignum Fraxini ficant & attenuant; lienis duritiem fpecificè emollire creduntur, unde 8c in poculis ex ligno factis (1 quis affidue bibat lienem extenuari aiunt, eoquæ nomine Be corticis decoctum quidam exhibent, quo etiam aliqui vice ligni Guaiaci felici fuceflu utuntur. Corticem medianum Fraxini in exteris regionibus in Febribus intermittentibus frequenter przscribi obfervavit D. T. R. Eundem 6c in Anglia cum fuceflu exhiberi audiviffe retulit idem, in Obfervationibus nobis communicatis. Foliorum Be fummitatum feu furculorum teneriorum fuccus quotidis mane pauca quantitate potus hydropicis conducere dicitur. Sal Fraxini fudores movetj diureticis medicamentis mixtus: idem efficit & deco&um corticum.

Semen, *Lingua a<vis* diftum, calfacit & ficcat validej conducit epaticis, pleuriticis, calculofis. Chymici moderni, & præ aliis Glauberus, ad calculum renum 6c veficæ conterendum miris illud pr^conis extollunt. Cum nucleis Piftaceis, Pineis 8c faccharo comeftus coitum juvat, Ex&ecari poft plenam maturitatem pulvis non ad calculum tantum, fed etiam ad i&erum 8c hydropem remedium est practantiffimum, atteftante D. *Bowie*, medico infigni.

Semina Fraxini ad 5j- cum vino exhibitum ex Plinio Hydropicos curat, & corpore obelbs ad maciem reducit; Arabibus etiam maxime commendatur. Epiphanius Ferdinandus hiftoria 82. D. *Hulfe*.

Semina Fraxini viridia, feu potius fructus collecti ante maturitatem in Anglia muria ex aceto 8c Sale condiuntur pro acetario.

2. *Fraxinus tenuiore & minor e folio J. B. humilior five alter a Theophrasti, minor e & Unniort folio C. B. fylvatica feu ptraa Germanorum Turmro forti*

Varietas potius Fraxini est quàm fpecies diftincta, cujus folia pinnata fegmentis dividuntur tenuioribus fructibus acutioribus, perinde tam en ferratis ut vulgaris Fraxini- Rami pluribus & crebrioribus tuberculis, foliorum pediculo fedem daturis; inæquales.

Ex Lugduno vicinis montibus habuit J. Bauhinus.

3. *Fraxinus rotundiore folio J. B. C. B.*

Huic quoque folia conjugatim difpofita, fed quæ Piftaciorum folia referunt, fubrotunda, minora quàm Fraxini vulgaris, in ambitu ferrata, in quibus medietas interior ad nervi inum brevior quàm exterior fize confpicitur, id quod in Terebintho Be Piftacis usu venire lubinde obfervamus.

Ex Italia attulit G. Bauhinus.

Ex hujus ramis 8c foliis in Calabria aftivis menfibus exfidat Manna, & in granula Solis calore concrefcit. Nam Mannam vulgarem Officinarum non eflè rorem coelestem aut mel aereum evidentiffimis argumentis Sc experimentis probat tum A. Jtomarus, tum Pena & Lobelius, necnon Monachi qui in Mefiim commentati fiint, nequicquam reclamantibus Matthiolo, C^falpino 8c aliis. Quænim evidentior potest esse demonstratio Mannam ipfius Fraxini humorum feu ficcum esse gumminodo exfidantem, quam quod e trunco aut ramis vulneratis extillat? quodve experientum certius fcefficacius ad id evincendum eo quod Pena Be Lobelius tradunt, Ramos magnos Lartcis 6c Fraxini præcifos, atque in vinariam cellam, quo zftatis tempore Manna coUigi folita est, afportatos, Mannam poftero die, quanquam non perinde nitidam oftentaffe,

Idem quoque mihi cum in Italia peregrinarem confirmarunt tum alii Calabri, tum precipue eruditiffimus Vir 6c fedius naturæ operum indagator D. *Thomas Cornelius* M. D. Neapolitanus, Confentiâ Calabria oriundus, testis *ivriſſm* 6c omni exceptione major, qui in ramulis Be foliis à feipfo experiundi causâ linteo circumvolutis 8c curiose contectis Mannam fæpius collegit; quod expert mentum ante eum ab Altomaro aliifque factum legimus. Frustra ergo vel huic veritati confirmandz argumenta accumuiaremus, vel ratiunculis aliorum in contrarium allatis refutandis tempus infumeremus. Quæ utrinque adducte iunt probationes refponfionibus apud J. Bauhinum videri poffunt.

Mannam autem in Calabria fingulis annis circa vel paulo ante caniculares dies 5c Scxtiles pluvia colligunt; cum autem pluit ceflat fluere.

Eft autem Manna duplex: quæ è Fraxino colligitur.

I. *Spontanea*, eaque duplex, vel corf orir, ut Vocant, *velſilH*,

x. *Coaffa*, quam *Sforz, atellam* vocant Calabri.

Obfervant collectores in Fraxinis Mannam emanare ex ramis ea potiffimum parte quæ foliorum pediculi eidem anneauntur.

Notandum etiam, non manè priufquam Sol valde perurat, ut quidam falso retulerunt, coUigi Mannam, fed mendie Soleque ferveridiffimo; non enim à Solis calore rarefcit, folvitur aut evanefcit, fed potius concrefcit, 8c dunor ac candidior redditur. Atque hoc refpectu, Altomari expert ^{me}to, differt Manna *Calabrina* a *Bombivina* dicta, &, ut verifimile est, *Mafikhma*, reliquifque Orientalibus, quæ fortaffe funt rores creleftes concreti feu mella aerea. Hanc fe ferro ac laten ignito cum *Calabrina* granis quibuldam injeciffe refert, cam ejus quæ ex foliis, quàm qua: ex ramis

Be caudice colligitur; illam autem protinus folutam flicliquefastain: hanc verò aridiorem duriorēque redditum: Soli quoque expofitam *Bombycinam*, non quidem ita repente, fed fenfim liquefadarn; Calabrinam verò duriorē redditam & albidiorē.

Notandum infuper colligi Mannam omnem quidem ex Fraxino Be Orno; fed non ex omnibus individuisj unde in Calabria veriduntur tales arbores quae Mannam dant, ut fenbit Alcomarus-

Frica

Mannar, referente Oefalpino, ufis est in tDa Italia ad alvum leniendam diffluta? jure aut fern, ponders duarum unciarum aut trium, mitiflimum enim est medicamentum, foliim tcnues humores educens, biliofos & ferofos. Tutò exhibetur fenibus, puerisj fcEiiiiis etiam praegnantibus K delicacis. Non ipse folus (inquit AltomarusJ fed omnes ante me Be juxta me in hac regione Medici hac Mannā bono ac fblici fucefflii citra ullam noxam ufi iint, przf&rtim ad alvum moUendam. Lenit etiam thoracem 5c asperam arteriam.

Cautelae in ejus usu (inquit C. Hofmannus) du^ funt. 1. NE detur cruda fed cocta. Habet enim non minus quam Caffia flatuoEim quid. x. Ut decur cum acribus^ Thymo, Hyilop. fcc. ut aftio fit celerior-

Eligenda recens f anno non vetuftior •) granis minoribus & rotuidioribus; qualis est Manna fohi, Candida, lucida, guftu dulcis^ Be cum his omnibus folida.

Jam il quiratur, tur Fraxinus in Calabria Mannam fun da ^ in aliis regionibus non item^ qn^ ram Be ego cur Lentifcus in Chio infilla Maftichen manet, in Italia aliJque regionibus, minime; Relpondeo autem id evenire vel rarione temperie c^li, vel conditionis foli, vel utriulque, vel forte^ etiam peculiāris naturae Be conftitutionis iplarum arborum.

C. Hofmannus Mannam Orientalem K Europeam ejufdem generis esse Dpinatur, fed neutrum melleum quid, verū fuccum feu liquorem arboreum: cui fuffragatur Garcias, in Hift. Aromde Manna Orientali fenbensj compertum fibi, esse earn gummi vel refinim arbqris Perficas di&s. *Quaft*. Deinde, cum certum fit Europzam esse arboreum quid, Orientalis autem fit illi per omnia fimilis; quidni fit ejufdem naturae? At verD fi ejufdem nat^K fint^ cur tahta diverfitas liquefastionis &c indurationis relpeftu? Experientiam appellamus.

Locw.

Obfervavit D- *Tanczdzus Rubinfon* in Regno Ncapolitano itinerans multas cicadas fugere SC depafcere Fraxinum humiliorem, undē fufpicatur Mannam facilius extillare per aperra vulnra feu foramina ab bifce animalibus perforata, ficut in India Orientali *Lacca* ex arbonibus ab *infetlis* exigitur, Be preparatur.

Ante chartarum ufum vetsres fcripferunt res fuas in interiori cDrtice Fraxini, Tili^j Fagi, aJia^ rurnque arborumj in arundinibusj papyro Niloticā, palmarumquefoliis; poftēa metallicis [prseferatim plumbd5) laminis, in linteis, *Oc* ucrisj in msmbranis feu pellibus animantium.

4. *Fraxinus florifera Botrjoidzs Morif Fraxinus Americana florida.*

Aforif.

Hacc à vulgari FraxinD parum differt primointuitu guoad foliorum difpofitionem K corticem ꝑ fed florum profert racemos, dodrantajss^ albos^ pendentes, filiquas feminales nundunij vidimus. HuJUS pi an Cam ficcam ad nos tranfmifit D. *Umftwv** *SI^OMO^&X, 14^****** \&e* v^f/i-

Lachv.

In Hortis repentur Fraxinus Halepensis; an ab Orno diftinguendus?

CAP. III.

De Myrka Jive Tamarko.

MTeXH forte Srf wpwJiffS, quod ftllo Be fluo denotat, nomen fumpfit^ quod juxta fluvios nafcatur. Regius ^ " T 3 ^ & ^ Jq quod Jugere figmficat, quod ut rabular tradunt, Cinyre filia in hanc converfa fit. *Hefyfb*. Erat autem Cinyras rex Cypri: *Cei lu&d* in pboruni effet corona: quodque lignum ejus in Felix habitum cftet. Vide *Jo. Bod. d Stapel*. comment, in *Theophr. Hift. lib. 4. cap. 7. p. 408.* qui plura habet.

Ejus note funt folia Cupreffii feu Ericz vulgaris, flores fpietatij xnulta femina lanugine involuaj fimul conferta racematim in fummis ramis.

1. *Tamarix major five arborea Narbonensis J. B- altera folio tenuiore five Gallica C. B. Tamarifcus folh tnuort Park. Narbonnfis Ger. Myrka 1. Cluf CaiHflrigt**

Magna ex parte tantummodo fructat, interdum in vaftam arborem adolefcit^ [in Cotonei ma^ nitudinem caudicēque abit] fabro caudicis corticej rarhorum verò punicante. *Folia* habet Cupreffii aut Erica: humilis vulgaris, coloris ex viridi ad cinereum tendentis: *Flores* extremis ramis in oblongis pediculis confertDS &c racematim compactos, eMiguos, foris purpuraicentes^ ciim expanfi funt candidos, pentapetalos, qui deinde in exiguumfemen tomento involutum efformantur, exig^5 veluci valvuis inclufum j quibus matuntate dehifcentibus cHuit, ut in Salice, Populo &c fim- T^P^ que in anno floret, Vere, iEftate, Autumnoj recentibus floribus femenjain evanescens lem- P^cri ffe quibz.

Ulm,

Ura^ Ed^ prope Monc^ = lium abunde Dritur.

allu lienK nir Grind alli Archiepifcopi Cantuaricnfis Tamaricem Angli debent, *quatin indura-*

Nulli perarorem in Y^ xpsrtus, primus in Angliam cranftulit. *Cambden. Ez Jabeth* neque in Gallia perpecua coma virentem vidjt Ciulnis, Jed m> germina protrudentem. *3. T^ome*

1. Tamarifcus folio latiore Park. Germanica Ger. Tamarix Germanica Jive minor fruticoCa T B fruticofa folio crajlore five Germanica C. B.

J.B.

Aquas amat fin quit J. Bauhinus) Tamarifcus noftras, radke crafla, Sc qua: crus arquet craffitu- dine, cortice craffiufcub, infigniter atnaro tefta, qua multam ftolonum veluti fegetem emittit, virgulDrum fragilium, purpuraicente cortice obduftorum, Be in frequences ramos diviforum, oa quos folia bnga coherent lerie, Erica: vulgaris, majDra quam Tamancis MDnfphehensis, dftanji verfu alcendentia, calore fere glauco, fapore adftingente,, longitudinis palmaris aut femipeddis. Flaues fpwatm in extremis ramulis digefti, foliolis confanc externis virefcencibus, aliis purpurafcentibus, aftiabi in medio lateolis. Sequuntur calyculi fiv^pencarpia mucrtinata; quibus dehifcentibus pappus evoJat delicatiffimus, candidiffimus, appfno iemine miniltiflimo, coloris rari.

Clulius Myricam Pannonicam magnum fruticem efle ait, nunquam arborefcntem, bsumam tamen herentem: Flaues ex albo purpurafcentes quinque foliis tdnftare^ Gallic* Myric^ mapnbus.

Secus prpfluemes anima ac quindcque exDrb,tant₅ fluyios, non raro t,am circa paludes nafatur, .lola Frequenter fax,fo: humidiorB.fiquidem Sc lapidofos amat traftus, ut refl: Dodonarum, NDS IDCIS conhrailibus circa Auguftam Vindelicorum, Lindaviam Sc Genevam obfervavimus

Floret Maio & Junio, ac demeps tota fere zftate flores & femem profene nan dsfinit.

5. Tamarifcus *sEgyptia Gallifera J. B. Tamarix vEgiftk, arbor C. B. Tamarifvus vE,yptia ral las ferens Park

Tamancis domefticuni genus, autore Alpino, in ^gypto fpeftatur, proceritate fijjunW ad m n dum a fylveftri Europe diverfum, quod ad magn^ Oliv* magnicudmem crefcat; audi&qnb' efam in" quit, fupra ^gyptum, in \ocOSabit ab lis populis vocato crefcere ad magn* Quercds maeniml ncm, cujus ra lignis carbones faciunt, quibus tota JEgyptus 6c Arabia ucitur, ex⁶,6qu^e H^{end} T^u tavafacDnficiunc, ad multorum xgrotonuti ufum. Folia fert lyl^ftris Tamanic, fojiis tamen longiora 5c graciliora, apparctque multa Capillamenta viridia, qualia in aliqubus Equifit- tis vifuntur, ramo appenfa, femper virencia. FruZtut fert panCD\$ raras vind^ dine, duos lignofbs,, fine nnd>f,fc videntur ejufdem LftantiieS Z, figura inter ft differunc, quanquam in omnibus fuperficies afpera U msqualis 0 ah. longi, ah, breves, ah. rotundi, alii lati, alii craffi, aliiqu_c gracile, txift non veros fruftz, arbor, efle exiftwo, fed excrefceMias fr^ernatural I "Z arbor nrafce am

I hac erioa fpecies in JEgypto, aulw: Ballunio, ^ umida locus flumina ontur, non rare, Locm:

Hujus Galls ut Sc cortex, non paucati fortita: font aftriaionem, adeo ut eall fint (mquit Galenus) nifi quia acerbitas evidens eft in galla, at Myrica: fruftu?^t emp:ratore illa eft ina:quahs: immifla emm eft nature ejus multa partiurn temiitas, atque vis fane.galk non accddic. Attamen ubi gaCa ad mahum non ft ^i J l Z d omnia ad quz il la in.mur, ad eadem Sc cortice.

Decofto foliorum in vino potum lienem abfumit. Diffe. fuccus exDreffu?^ TM v; u-u. Tim. Ade6_ue mirabilem hums arboris antipathian contra folurn hocTfcerum Sinu?^ tnent fi ex alv_{CD} faftp bibant fue fin= liBncinvaui. H.nc ex ejus Jignf ut Hm ^ l ^ dierum detornantur pocula, in quibus potus licnofis prabetur Clufis* « I- 7 TM W nunc fuhs Francofurti ad M^num venaha mlorat,, qmbus conSmuilSuor^S J*** ^ jufmodi etiam doliola ex Epifcopatu Salisburgenfi artific.ose conftrufta Venmm ?^* . E lia deferr. fenbit j. Bauhim,, Confimilium vaforum ufus eft enarn apud Sti o s ^ ^ T ratuffi lienem, autore Alpind. Eodem tradente Tamarifici hgni ufus ft tum in JF* ^ u magis hipra vEgyptum, ubi harum arborum copiofus eft provenus, ad m n m ^ ^ ypcu, turn fere null, aha ligna ad comburendum habeant/ MulierB^decofto ex T l J ^ ^ T d pro utuntur adStendas menftruas purgafones, ex quo parant ^ S f a ^ u s m m mourn injiant decoftun, : idem ^uoque ffruftus ffacer_B aiunc- l s fiquidem utuntⁱⁿ S to fangumis, in henterns, 6c in msnftrws plus jufto fluentibus, atque h^monhoidamTmñ?" dico Dm: Dm: eam comddis atque collibantes ipfimum decofto firmammy atque in U cancit I) do [Cm dcrMule enr Utuntur etiam ad r ocularum lippitidines in tollyn s atque ad Dreis la vera c.n,s quoque corticqm Be fruftuum ulcera curat. At^e h* vires&J- fectus funt quos Veteres ttiam Tamarici tribunt. V

Dm: ligna multa decoctum, juva feos qudm moltri ex Gillaiaco ad c<>"nda m Luem V.neream facere folent, quod collibent fprols, fcahufis, atque ^smultispuftulisficulceribusaffectis, ft! licori quo fuccedat: idemque faciunt in mchacholi raro obftroctio atque indurata: liens conpctatis. n f f t e r i i nigris & hydropticis B x r q rigo- Loco impora V aere contraftam vure fcripti Alpibus non feos Tamarifici qudm Ghinaii i q cotto prongan. won gn.m adeo gravia funt qu* ,n JEgypto infeft. p.tiuntur E x c E impetum punor corporum CDnftitndj tum fllTfudorun. pw continuum aens d b S* & ^ I i ^ Jim frequentiffimum ufium coniueta profufib. V.d; fepms peffime aiffectos, Be in^ffi < w r o / defeviente morbo, cum extrema omnia fruiftra alibi tentata fuiffent; in hac rcri n . p f i r e , nam. prfidiDfum vim noxiam lufm Bvafifls. Vejlin.g% r c g i o n e c i t r a m a g -

CAP. IV.

De Ylatdno.

Platanus à VKAW difta eft, turn quòd folia habeat latiffima, turn quid ramis fie patulis & late diffiifis.

Notæ Platani charaferifticæ fiint folia latiffima., lemma in pijulis Janigerij conglobata.

I. *Platanus Orient alis* <vera Park, alij, autoribm Jimpliciter *Platanus* dicitur. *Platan. Orient, pifolit majoribus* Herman. €)e 39UIIU:*€m.

Platanus, delcribente Cordo, arbor eft magnr, ampla? Be in latitudinem diffuse Nuci fimilis & arqualis. Caudice aflurgitrobufto, non ita procerò, fed ftatim in ramos divifo. Cortice tegitur lzvi, cunò fimilis, fubinde iingulis meniibus explores Be Jcabriores tunicas exuente, unde lemperfiib arbors hac adulta ftrati confpiciuntur cortices. Rami ejus nullo ordine in alios crebrò dividuntur ramosj furculi Nucis fimiles. Virgx Be furculi ex intervallo nodis Be gsniculis praeinguntur, ex quibus fingulorum annorum germinationes Scacceftus furculorum numerantur. *Folia* habet magna, lata dura & robufta, dod ran tali plsrunque quoquoferus atpncitudine, fcfquiuenciali, pfdiculo, ant Jfingiore liirculis adnata in quinas aufftenas partes inftrar palms humansE divifa, hyme decidua, Aceri (imilia, nill fingulz eorum fibrs in plures partes utrinque diffeftac effent. Venx à pediculo ad omnes fDlionim partes Be cminentes angulos evidences derivantur. Vere cum germinavent fecus folia etiam globulos quofdam producti, longis Sc gracilibus dependentespediculis, undiqueafp^ri5j Be veluti lanugineis folculis plenos, paulatim in majufculas pilulas excrefcenfeSj parvo Caftanea: echino a:quales. Sunt autem hir(utae hz pilulz Be lanuginofar, atque totae ceu aculeis confntantes fid mollibus, Spargann fimilibus. Cum Aucumno ad matutatem perveniunt p^Julae tots facifcunt & diftblvunturIn tocidem femina quot aculeis afperatae fuerant: Singulaenim femina in fuperficie pilula: in acumen definunt. Porro ea /emina parva flint /sc oblonga undequaue flava, alpera Be pappoJa Unugine involute; quo fie ut confradaE pilula: nihil aliud quam pappoJa lanugo effe appareac, Amianto con rko fimilis: ea fi cafu in afperam artem recepta fuerit frangulaCj ideòq,inter Venena à quibusdam Veterum recenfetur. Materia arbori fatisrobufta mixtae cumFago Be Quercu fimilitudinis. Auftu facilis eft arbor, fi aptum nafta fuerit (olum, quale eft pingue, rarum, riguumj nani in a^peris & C laxolis contumacicer adokfir^ & tortuua nudofaque evadit. *Hafitnm Cordus.*

Quod ad locum in genere&ttinet coilvenit inter omnes qubdgaude^t riguis & i paluftnbus; aquarumque ripis. In Italia /ponte non nafci teftatur Anguillara j quod etiam è Plinii verbis colligitur. *SeJ yuis, infit ille, non jure miretur arborzm umbra gratia tantum petitam ex alieno orbe. Platanus ilia efi, per mare Ionium in Diomzdis infulam, ejudtm tumuli gratia primùm invefta, inde in Sicilian* tranfgrejjaj atque inter primas donate Italic, & LC* In Ot±in IAIUIA Jppnee provenit; itetn in Lsmno; in Monte Atho ubi magnitudine comparari pollint Cedris mDntis Libam, autoreBdJonio; necnon in CaftagnaMacedonia monte inque Tauro Afif* & C alibi. Quinetiam in Sicilia ad radices montis *JEtux* na(cí aiunr. De quo tamen dybito; cum nuljas in ea infula fpontaneas obfervaverim, \$c Phniu5 Sicilia: peregrinam fauat.

In urbe Roma muhas vidi adultas & C fatis proceras hoc genus arbores. In Anglia etiam propè Verulamium multa: vifuntur, à Nobiliffimo Viro, Be toto orbe celeberrimo, D Francifco Bacons Barone Verulamii, Vice-comite S. Albaní fats; ut à D. Francifco Willughby cemorfaftus fui.

I^a Creta prepe Cortinam urbem Platanus una eft infignis utriulque lingux monumentisj nunquam folia dimittens, alia in Cypro. An fuerint unquam iftiufnodi arbores, dubium nobis videtur: quod fi fuere, cr non pecukare aliquod genus Platani confituebant, fed caii quodam Be extra Drdinem natura: tales evadebant; nee enim Pjin ID credimus femine fatas regenerafce vitiunij ut ilJe vocat.

Errant qui Aceris ipeciẽm majorem pro Platano habent: quamvis enim foiorum aliquaifit fimilitudo, allis camen notis à Veteribus Platano adfenptis/ ut v. g. fruftus formi, manifeftc diffenint.

Sed minus adhuc ferendus (inquit J. Bauhinus) eorum error qui Tiliam Platanum efbputanuit nam in hac nee folia conveniunt.

Tenemma Platani *folia* [Be cortex *Tlin.*] in vino decDiSa mox illita oculorum fluxiones fiunt, ac cum (Edemata, turn phlegmonas [viridia trita Be illita *Gal.* J levant.

Cortex in aceto coftus ad dentium dolores colluitur, è vino Scorpionum iftus reftinguit *Vlin.* Sunt qui cum cortice combulto medicamentum deliccatonum Be abfterforium efficiunt ut cum aqua lepras Ianet, per feie autem illitum ob humorem nimium ulcera vetera Be iordida.

Pilulae vindes in vino pota: ierpentum moribus auxiliantur, excepta: autem adipe igni ambuK* fananr, vel frigoreaddic Plinius: tufi autem cum aceto acri, magifque Scyllite, fanguinem om^lll fiunt. Eclentiginem Be carcinomata, melanias quoque [mdandriaque] veteres addito melle eniendant. *Vim.*

nipilularumque lanugo fin aures fle oculos illapfi auditum vifumque labefaa: alpeu ram etiam rtenam in piraCa offendit.

In m^CV; Ifu bus D1^o n de Galeno, Plinio: Hodie nullus ejus, quod fciam. in m^ zinz wca efi. Bellonius, cymbasparanc exmagAi? truncis Platai* ^yudis, fmo

Czterum Arbor hac quod vafta efler, quod patula, quodfoliis ampliffimisj umbra? facisndz percommDcla, à.Vetenbus Grascis & Latinis præcipuo in honore habità &c literarum monumentis z-hbrata efl. *Nunc efl* { inquit * Plinius) *clara in Lycia gèlidi font* focia amoenitatt, it inèn adpofita, * Lib. i%ci domicilii modo cava, 8D atque unim pedum fpzcu, nemorofa vert ice, & fe v aft is protegens ramn arbo-^{TMp.} * < rum inftar, agros hngis obtinens umbris: ac mquid defit fpzlcunca imaging [axm^ intus crepidnis corona mufcofos complex* fumkes : tarn d'igna miracuh, ut Licinius Mutianus ter Cof. & rntper ttiam provincial tpus higtus, frodendwn ttiam poftens putavit, vpulatwn> intra earn fe cum dubdeicejimo comite> larjri ipfa toros prabeve fronds, ab omni afflatu [ecurum, optantem imbrium per folia crepitu^ la>tiore ofudm mār-morum nitore, pitlura variztate, laqzarium auro cubuijfe in zadem. Aliud xemplum Caii Principis m Veliterno rare mirati unius tabulata, laxifyueramorum trabibus scamna patula, & in eaepulati, cū ipfe jars zjzt umbra; quinzQim conviruarum, & miniftmi capacs triclino: ejuam caenam appzllavit Me nidum**

Tlaturan Occidentals aut Virgmenfis Park. Platan. Occident. pUnlis minoribus Herman.

Hac etiam Arbor magna efl Be patula ; folia præcedentis aequalia,, non tam en adeòpruFundè in-cifa aut laciniata. Pilulx feu echini fphaericeaparker rotunditatis, minus tamen apenc Be aculeate flint; caetera fimiles.

E Virginia in Angliam cranftulit Joan. Tradefcantius.

CAP. V.

A. *Rhtfs Myrtifolia Belgica Q B. Myrtus Br ah antic a five EUagnus Cordi Ger. Rhus fyl<vi-
fir is, five Myrtus Brabantica <vel Anglic* Park. Gale frutex odoratus Septentrhnalium El*-
agnus Dod. j. B. gftotzt JDilloto, &au\z, £>utcf) a?prtl^*

Lignofu5 efl frutex, ftrmentolus Dod. eubiti altitudinem raro attingensj [imòapiid nosnon raòfiiperans] in ramos multipliciter divaricatus, cortice.rufo ad fpadiceum vsrgentslaevique. *Folia* quodaiimodo acceduntad Vitim Idseam fruticosam, vel ad parvam Salicem, gla-bra, led quodammodo incana : atque in quibusdam illorutn ferraturis apparent. Ramofum extremis inlident capitula yeluti Juli, nmltb minores quam in Betula, fquamati, perelegances, quippe qui diluco fpadiceo fplendicent. Cortex amaricat non fine adftriaione; maceries Candida.

Lubwliu *flofculi* func ex luteo pallidi^ quibusfuccedunt feminum crebrifaCemuli, confert^: coll-flati quafi fpicis, in quibus *femm* pingue, odore Stoechadis citrine led vchementiore, Sc Tnfolii ~~quodadornò a.~~

Radix, tefts Dodonaeo, fiibefl lenta ac dura- Totus frutex cum gravitate quadam odoratus.

Gaudet locis incultis & ericaftris, aquofis Be paluftribus ut reftèpodona:us. Invenitur plurimus *Locus Q* in indila Elienfi, locis udis & paluftribus, folo fpongiofo: alibi etiam confimilibus in locis reperi- *Tempujm* jnUS, ut v- p. in Septentrionalibu5 Augliar, 6c props Wareham oppidum ill Comitatu Dorceffria; Maio ic Junio floras apparent, Julio 6c Augufto femem perficitur.

Sapor egregie amarus infignem habere vim ficcandi ic difcutiendi monftrat; (sd-prz-fertim v a^{prz}rl. lre tarn fumpturn, quam admotum ad lumbricos necandos &c pellendos Dal. prodidit.

Huju5 folih feramulisacdiuconclavia peraeftatem ornant noftrates, odoris gratia, quiem flores & fummitates fiiaviffimum exhalant: Eadem in arcis inter veftimenta recondunt, non tantum odoris gratia qucm communicant fed 5c ad tineas abigendas.

Hujus ufu Polonos doftq^ efl enecare pediculos porcorum iibi relatam fcrib^ Simon Paul-Jus. Si enim fuibus in haris fiibftsrnas Chamslxagnum, fpatio aliquot horarum pediculi in'er-moriuntur omnes, nee lendes poft dein animantur. Quin 6c in faltibus in quibus eham^laeagnus crefcit nunquam ftabulantur aut cubilia fua habent ferpentes, imo *nb* quidem accederc ad eos, ruulcb minus eos perreptare unquam vifi funt.

Flores nonnulli Lupuli vice Cerevili^incoquunt, qui caput admodum tentantem 6c cito temulen-tiam inducentem earn reddunt.

In traftu Bergenfi 8c ahis Norwegia: locis vulgus parare HDvitunguentum ex pulverata Chamsc-heagno Scbutyro Maiali admodum effcax adversus contumaciffimatn fcabiem : *S.-Pauli, Jquadrip. Botan. Claf z.p.tf.*

Nota lunt hodie Theae arboris folia a Sinis ufque ad nos delaça, ex quibus in aqua communi de-coftis addito Saccharocando conficiturpotio non injucunda, Be lalubris credita, cuilimilem ex foliis hujus fruticis effcicatis parari aiunt. Quin Simon Paullus affirmat ipfius Myrti Brabanticae folia ells Theae difta, tarn longè petita, tantoque in horiore habita. Verum toto cceloerratj 6c Thea arbor tarn longe a ChamarEeagno differ^ quam China ab Europa diftat.

CAP. VI.

ArUr Indicaflöre maximo, cuimuh innafcuntur filiqt* Syalita H. M- P.]?. T. 38, ^9. p. ^, H. M.*

Arbor efl procera, 40 aut Jo pedes aha, *caudice* admodum craflb., cortice itidem craflb mu-nito, qui cuticula cinerea fquamosa obduftus, intus albicans, ac copiofam aquam adftrin-X ,\, gentem ubi inciditur exudans. Similiter *radix* craffa efl, 8c tend, rubro-nigricante, ftua-mofo, intiu verb ad albicantem medullam purpureo cortice tefta, neenqn fibris fiiis lace per terrain diffufaj lapor acris, odor nullus. *Fvliã* oblongo-rotunda, fingula craffis; intus wiyjs.ac¹ Jianuginoiis

lana... ut, longitudinalibus spiribus...

...Pomis vinosis ferè affluunt...

Cpescit in multislocis Malabar, prscipue circa Cochin & provincias Mout an...

Fruittushi obniam aciditatem in deliciis vix CDmeduntur...

CAP. VII.

Anonymoi Ribellii fylis Icon. Robert.

Rutex est sui generis, foliis Ribis, floribus penrapetalis dilute albidis...

A Canada Be Virginia delata. fuit hie planta.

C A P . VIII.

Valimus Lub. Dod. Ger. Taliurus fivz Rhamnus 3. Diofcondis Park. Rhamm five Talimw...

NON semper humilis est, verum interdum adeo excrefcit, ut arboris tueri nomen possit...

Fruitus fur de/cribit Cxfalp.) depreffus, ex tenui pediculopendet, pulpa quadam fungo...

LOCUJ 13 Tenjus.

perfuademus Theophrasti Paliurum esse hancphntam: Rhamnum ; alio Paliurum. Confule Jo. B...

tumant j nee enim ullum genus Rhamni aliufve fruticis Ipinis acutioribus ngidioribufq, horridum nee impunè traftabile temere reperias: Hinc.& fepes vivarnominum pecudumque incurfibus arcendis CDmmodiffimae ex BO parari fblebant.

Adfringunt, ventremfluentem cohibent, digerunt Bepnymata curant Paljuri Folia & radix. Fru-^{Vires} ftus veib tantam obtinent incidendi vim, uc Be calculus veficae comminuant, & peftoris pulmonifcjj excretionibus auxiliantur. Semina contufa ad tuflim commendantuij us, e U a n i ^ arenulas Be caku- lum utuntur Monlpelienfes medici.

C A P . IX.

Caritn-Curini H. M. P. 2. F. 10. p. 31- Frutx Indieus jpicatm Jiorihusgahatis, vafculo ^{divabur} *dicocco.*

RAdix ei fibrofa, albicans, faporis in cortice fubamari. *Caudex* rurculf^ue viridi-flu^{^^^} ^{tricu-} lati at fupra fingubs geniculos extuberantes. *Folia* peUolismedipcriM^Virldi-riifci^ ^{anguz-} dis bina adverfa, alternacim fica hzrenc, oblongo-rotunda; & petiolum^cpntrria^, antenus in culpidem definencia, textura minus craffa, mDlia^ iuperficie leni, mpern^ pbfcuiriis yiridia^ pa- rum nitentia, fubcus pallidiora, fapore nullo. Cofta media & nervi inde egreffi in flipina ntiam parte eminent- *Flores* è iinubus paivorum ScrDCundo-cuIpaCorurnfolioruni, qua: furculos bina Sc bina, alternatim fita^ dense Be firrefimcircumftant, exeunt, viridi-coerulei., galeati, conftantes tri- bu5foliis, viridi-coeruleis, quosexgalea ad unam pattern protenduntur, ac pediifiquo caLididp^npii- nihil inflexo, ac fuperius nodulatD ac longiufculo., quo calyci quinque anguftiflimorum, yii;idiuin & cul^idatorum foliorum, tenuicer pilorum Si friatorum infident^ habentgue in nodulq pedun- culi cui galea cum fttiis ex tranlverlo atrifta eft, bicornes eminentias ex viridi lubcrerulea5 adpo- fticam galeac partem unam laciniam tenuem viridem, lubcoeruleam dependentem, funrque fibres unionis-nullius. Folia in medio interiis friata, duo oblongo-angufta, Be parum cupidata, medium quDque oblongum & c latum, ora anterius rotunda terminacum.

Per pedunculum albicantem tranfmittitur Jlylusa; bicans, qui b vertice germinis capjula: femina- lis oritur, Floribus deciduis ecalyceprodeunt capfolae feminales, quz piano rotunda: ac cupidatac funt₃ ac haftiforme5, pediculo oblongq digitali conftantes cortice viridi, intus lignofo, ac in medio in longum friati, ut & c in oris unâ ftria qua: utrinque per niediam luperficiem pedis excurrit. In fingulis caplulisfeminaduo, ad utrumque latus unum, coniiita fiint, per interfepimentum metjjuni, quod ex oris capful a: ubi friata eft inftar latacfimbrij excurrit, a i, b mutuo diihriEta,3 valde '^,01^ preffa, rotundiDla, ac inftar cordis cupidata, cum luo cupide caplulx cu/pidem refpicientia^ per maturitatem fiibflava feu fubruffb-pallida, fiiperficie ob. pundula eminentia, maxime cum iicca fuht, fcahra, faporis nullius.

Radix decofta Bfirmptafervit pro doloribusarthritis, decodia cum oleo Bcbutyryp vires adaiiget j eadem trita & i cum oleo *Sirgrfim* data mitigandis podagra doloribus fervit, Decoiftum ex *radice* & ^r ^{ir, B} *filiis* epotum frangit calculos, eadem quoque virtute funt *folia* cDntula K alligata fuper ventre. Suc- CUS ex foliis extraftus fervit pro calculo. *Folia* in decofto data in dyfuria profiint; eadem epota in aquacalida intufli& doloribus calculi conducunt, quam etiam virtutem habent, fi cum aqu^ca- lidaad perunftionem ventris adhibeantur.

i. *Bern Curini H. M. P.X. F-il. >. 55. Frutex Indicus Jfricatus florum ftdkulis brvriorihu?*

A praxedenti non differt nifi in foliis Be captilis feminalibus- *Flores* in fummis furculis è nodulis ad quo5 Folia quaterna, parva, albicantia, cupidata fita iunt^ exeunt [Sunt autem folia hictenuia 5C nonnihil tranfparentia, coftis viridibus, quae ex cofta media bin^E ac bins excurrunt, ac prope marginem infe mutuo arcuatim deferuntur, friata, tria magis junifta ad floris exortum] & quidem finguli è iingulis nodulis, albicantes, odorenullo, collo minus longiufculo, calyci, qui quinque Viri- dium, cupidatorum foliorum eft infidentes, quatuorpetaliis tenuibus conftantes, uno ex collo feu pede firrefcto, quodlatiffimum, interiis concavuiT^Bcincufpidem CDnfriftum, tenuiffimum & tranf- parens, enfta media Be duabus lateralibus verfus culpidem è collo inflexis excerius ftnatum ;"tnbus □ ^{ftas} ex collo tranfverfim ad unam partem expansis, quorum quod mediuni latus eft, BE iib- rubris radiis ac undulis in colorealbo cenuiter variegatum; eftque collum florum nervis tribus, quz ad tria tranfverla folia excurrunt ftnatum. *Stamina* duo albicantia, folio furrefto ex adveiTotradtus coltarum lateraliumitiifte adjacencia, ac cum apicibus iubviridibus, qux brevia filamenta tanquam appendices demittunt, arcuatim ad fe invicem nonnihil inflexa; ac cumiis confpicicur *ftyhr** feu fi- lamentum albicans medix cofts folii furrefti ftrifte accumbens, quod ex globulo oblongo virfli, qui in calyce eft, excurrit. Flonbus delaplis calyx fe claudit gemmas oblongas feminahs ton- Jituenis.

Radix in decofto data inlervit pro febribus, ac capitis corphrifquemalis affectiDiibus. *Folia* frixa ^{Vires} in oleo, dein contrita ulcenbus fanandis applicant

CAP. X.

Codi-Avanacu H.M- P. i. F.34. p. 63. -4» *Lathyrus fruthfcens frutiū infoliorum ah echinato.*

SUflrutex est, nascens in arenosis, altitudine duofri triūmve pedum, ramis in Jatum diffusis. ^{A:3j*} tepuisj fibrafque tenuiffimas alatere ac fubtus emittens, ac fbrufa. F»//^[^] quis hinc inde in iurculis breviffimis petiolis proveniunt, valde parva flinty angusto-oblonga, pJana, ad F^T'^*³³ mollia, in margine minutiffimis condensis, ac viridi-dilutis denticulisfeu crenulis incite, habentque Coftulam in averfa parte eminejitem, quz Be in recta conspicua est. Flores in brevibus petiolis c foliorum alis oriuntur, funtq, gemmulx ex viridi-flavo dilute/ petjolis circumpofir^[^]. FruElus iis iuccedunt fingularesj fructibus Avanacu fimileSj uo poce tribus lateribus oblongorotundis circumfcripti, in medio laterum acutrinqueaftriis uno fimplid or dine amleorum feu minuriliitio- rum fpiculorumimuniti, verum parvi fiunt. Stmina quoque in fructibus cria continencur, intra figgula latera canquam in propriis capfcis fingula forma cylindrical & magiscinerea, minufq^ de fpadiceo par-
 VirJ. cipiantia, colons /urdi. Flores 8cfructu5 totoanno fert, fed tempore pluviobf uberiores niultitudinB-
 T^{otius} plantx fuccu5 cum vino epotus fluxm fiftendoproficius est: idem cum oleo coiftus uiific^r bibitur ad vires debiles reparandas. Oleum quod ex tota planta paratur capiris ablutioni commbdtim est ad ejus vertiginem tollendam.

VirJ.

* P. 21 in D.

Tandi-Avanacu *H»M. feu Riánw vulgaris major.

A Vulgari Ricino in eo tantum differe quod altius affurgat, quodq, ftipiribus Be ramis fie valde ru-
 bris feu miniacis Be nicentibus: Foliis, flonbus 8c fructibus paulo majoribus. Semina eadem, fed
 majora 6c paulo planiora, 6c inter fpadiceo-fufcum & nirentem colorem cineris undulis ranonbus
 cuniper/a. Ran or est quam Avanacu Hvc Ricinus vulgaris.

CAP. XI.

* P. 6. F. 44.

Tiru-Catti

*

H.M.

Tithymdm

Indicus

fruticefems.

H. M.

Radix tenuior fibras e latere conicit; Stipes affurgit simpliciter, terebi, crassitie fereat unius bra-
 chii, minime lignosa, conice viridi, subpilis, ramulos emittente tenues virides, e nodulis,
 QUI JOSEPHUS...
 fufcum, alios deorfum, qui in fummirate quoque ramulosminores ex eodem nodulo in tranfverfum dir-
 fundunt, achi in alios tenerioresfurculos dividuntur. Stipes ut Be rami teneriores viridi-fufci, verufti-
 oresviridi-clari. Folia hinc inde rariffime confita in cauliculis praecipue tenuioribus, vel fingula, vel
 in fimmitate plerunque tria quatuorve fimul^ minufaila, oblongo anguita, jDngitudix unius ferine
 Dollicis, plana, craffiola, in interiors parts in medio fulco friata, CDIOFB vindi, fubcus diluifora.
 Xotus fruccs, ftipes> rami, cortex, folia lafte acri, linguam adurence fecatent. Floris in vertice flircu-
 lorum proveniunt in ramulis craffis, curtis, viridi-fufcis, qui plures fiml c vertice emicant, parvi,
 quacuor vel quinquepetalisrotundiolisjinagis arte tanquam inunum nodum unitis, fupenus pJanjs'
 incus lafteJs ac viridibus compofiti. Fruffus fiiccedunt oblongo-rotundi, fimiles fructibus Ana-?ami
 forma & c rolor?; indudentes tna femina, familia feminibus Naiturtii noftri.

vSrs

Radix in decocto data fervit pro torminibus ventris. Lac ejus cum butyro decoctum purgativum
 est viribus quoque cum *Schadida-caM*, id est, EupjiDrbio iifdem.

LOCUM.

Nascitur in arenosis.

Tithymali propn^ difta fpecies est.

C A P. XII.

Chamaejasme tricoceus J.B. C.B. Park. *Arabum tricoceus* Ger. ~~Arabum tricoceus~~

q. B.

Flurax est cubitalis ac bicubitalis, minor quam *Thymoclea* Monfpeliaca, magis lanuginofus, rogo-
 jus, lignum^ inarrus, miamuiw ptui ra mvms : JOHUrecuionDus, latlontnis, K Viridioribus, te-
 nuifoLam Phillyream referentibus: inter *inzfiores* parvi, luteoli, tripetali; quibus fuccedunt/^
 mina cricoeca, primum vinda, maturitate vero ruborutn indueitia,peUiculaamari ac fervidi guft^
 obdudta, in fructe fuo perenniaut funt Tithymali five Heliotropii verrucofi^urajdentibus fraftu con-
 tumacia, medullam albaih continencia, ubi exficcata fuerint fuf ca.

LOCUS.

Inter Monfpelium flc Fi oruignanam in collibus laxofis plurimam obrervavimus. Squalid^ fervidi,
 jaxoh & mamimi foli amalia est. Non in Gallia Narbonenfi tantum, fed & in Hifpania a *Chifo*
 inventa.: afmulto vegetior Be viridiorin MonfpelianD agro quam inHiipaniis.

VirJ.

^?^?atibus ma^na ex parte cum Lanreola convenit. p. In...
 Magnos tamen (Joquit I. Rabinus) fures...
 Magnos tamen (Joquit I. Rabinus) fures...
 Magnos tamen (Joquit I. Rabinus) fures...

fepius denial lura rcrenm 3). aut ij. d=dimus pkr 8C fzpius alu's Cathartics h)-dr>gi>gis TM j | ^
 part

perbonofaneventu, fed non admodum multum excernit, nee aliquo erTrzni motu, ut fblent Lau-
reola Mezereon Germanicum, Gratiola feaha. Qion perparum aut nihil mterdura movet, mfi
remixtis quibufdam lenientibus aut fimihbus cathartics. Puenetiam dacus nee tormina nee vo-
m S o n e s f e d d aquas celticC Bfferum, Attrocompulbi & Abadammifi d d dropico, non ullurti pra>
coliciendas, quo modo libetarius urelat r Roudelcius. J. R.

CAP. XIII.

Canfcbi * H.M. Arbor racemofa Malabarica fruEtu tri^uetro D.Syeri.

* > . ^ 6 . h F r i d g .

ARbor eft procera, nafcens in arenofis. Radix craffa, ramos fibrofos quaquavei (urn ejiuens,
cortice exterius cinereo-fulcD, intus rubefcente, ligno albo. Caudex ambitu unius hominis
amplexutu implet, cortice dnereo, intus viridi cum ramis majonbus tedtus; furcuh noveh
virides & nodulis diftintfi, medulla ramorum & furculorum faica. Folia e nodis exeunt, peciohs
loneisVpithamam 8c amplius tonga, duos ferine palmoslata, oblongo-rotunaa? ad pe-olumatiffi-
m? * S t S r a verus in cufmdetn oblongam contra^*, tenuia & molha fuperne obfcunus, futusdi-
ktiusviridu S u e parum(plendens, fapore adftrmgente Scamaro ' E p e n o l o q u e . ^
feu nervi. Seunt in fupina parte folii nonmhil eminentes, quarum difeufufiftribunones per folm
S r o n S r S vide. Efoliorumfinubus exeunt furculi floriferi, in quibusflores racematun bicvibus &
tendbwpediculisinfidentesnafcuntur, petaliscufpidatis tribus, ranusquatuor confiantes, numerous
S H X S U I * , viridi-dilutis, ftylo viridi circumpofitis, ^apiabus viridi-d.lutis, leu et.am flayeicenti-
CcVUtefcntibus dotatis, haud diffimiles flonbus Cit-Avanacu, odons riullms. Sub tempus exph-
c^ionis eemmarum in. flores omnibus foliis fpoliatur, & n x rurdis tempore frufuum re^utnit.

FruBus qui e longiufculis, viridibus petiolis dependent, funt pjano-rotund., tnum laterun^uae
ftriis diftintfa fuM, atque in vertice ubi ftriae concurrunt gemmula eminentia, carne denia, etiam
per maturitatem colore viridi.

Intus in medio continbntur tna femina, per tenue. interlepimentum a le mutuo diltintta, qu
forma trilatera font, uno latereexteriori rotundo, ac duobus quibus interfepimenta continguntplanis.

CAP. XIV.

frutex Malabar. flere pettafetah fiettato, fruBu fntagono & pekacocco. Pocatjetti H.M. fart. 5.

tab. 51. •

ARbucula huncilis eft, *decem drciter pedesalta, caudicehaud itacrafTo, albicaftte., cortice ob-
dufto rubiaindo, ramulifque viridibus, fungofj intus meduUa rrfertis, plunbus donato.
Radix fibrata, albicans, rufo cortice teftaj amara: Folia fine ordme circa ramulos provem-
unt obloheo-rotunda, in ambitu leviter crenata; glaka, denfa, Fragilia, fplenderitia/modora,
amara • nervis aliquot exiguis & pame invifibilibus e media cofta in latera excurrentibus. Flores
Tjetiolisobdongis circa plumofas virgulas proveriunt, inodon, quinqc liitcis, acumin. atjs, & ReUx
in modum expanfis foliolis confiantes; quibus totidem alternatim pofita calyCUi foliol* vndia
f^ciuntur nove m apidbus luteis umbilicutu incurvutu viridantem cum fijh candido quinquangulo
S n r i b u s . Singulis flofculis finguli fuccedunt fruilus, feu . fingub^^quinquanguk. ruben-
toridem^ diftinlis loaiWijemma parva folida continent, cuncula rufainteda, medullaalba/hgu-
t?exi-otundooblonga, faporenaufeabundo.

Provenitlocismontams&petroffis circa Kandenate. • Quotannis bis floret fruftumque fert, Mar-
rnyvk. eiSeptembrLmcnfibus, atdiufuperftesnorieft.

Folia contufa, in pulverem redaava, 8c ulcenus inperfa luxumntem acfungolam carnem tol-
hinn EademaffumptafudoresnievendoFekisintermittentisparoxyfrnumminuunt.

Ex cortice Be radice pulvenfatis ac cum olso tnixtis unguentum conficitur ad fcabiem fimilelque
cutaneos aSsdcas.

CAP. XV.

Rofa Hiericbonua -vulgo <£&*OB.Park. Rofa Hiericho JX.rhlafti Rofa de HierickodittrnMnnt.
&Ofc of l^tEriciQ* . An Myagrum Arabicum ? Zanon.

X" Ignofis &c confertis ftatim a radice natis frutidt fiolonibm, palmarifeus aut paalo majoribus,
I craffis, cinerei colons, in nunjerofam ramulorum fobolem cancellatim divançatis, lupenore
, ^ i partc omnibus iii globum velut coenuribus per quos filia rara, unçiam ieicunciamve lon^
ga iemunciatnlac^ laciniata, cinerea, hirtuta. Flofcuii intrinfecus fecundum ramos ubiqueracc*
matim quodammodo "nafcuntur candidi: quorum unumquemque feqmtur vafculum duobus loculis
membranula difcluffis totidem femina orbicularia, comprefa, ruffa, acria contmens, bmis fupra le-
culos extrinfecus velut auriculis prominentibus, ex adverfo pohcis; ex intergerino calycis pariee
furgente^/o longiufcula Radix fatiscrajT^lignola, fimplex.

Monfonus fingulis geniculis fingula Folia adhaerere aic oblonga, atrgulta, olea: Foliorum armujj; e
quorum finubus fingulis finguli exeunt flofculi, tetrapetali ex herbaceo colore albidu. Unde appa-
rect

F f f f f f a

ret earn veram Be genuinam Thlaïpeos fpeciem efle, Sc inter Thlafpi fpecies reponendam fuifle.

Abfurc' admvdum 8c prxtzr rationem Rota, dicitur hcz planta, cūmmhilcum Rolā commune habeat. Bellonius monadium quondamimpoftorem hujusnominis autoremfuiflhrefert, cum tamen circa Hizricho nuthuam'rzperiatur, fcd in Arabia de'erra ad htorā maris in tabulo. Sj're/rūe/ii ram en ejus fpeciem in Syria: tedtis Se ruderibus invenit Kawolfius. Hanc a pluribus annis m hovto meo cōlo, cum facile Be crefcat Be floreat [inquir C-Bauhinus.)

Plantam hanc Arriomum Vetemm non effey prouc mulci opinati funt, conftat, quōd nec 10m alba Vitis proferac, necullofeū recncsfeuvetusfpilatodore.

Radiceaqu^calidzimmersaplanta quamvis iicca Be contradta expanditur, quocunque tempore, non natalitiis duntaxat Chriffti, uc impoibres vulgo perfuadere folem, nec panendi hora tantum partus tempore immiffa fe expanditj uc illi. fabulantur.

Rofa Hierkhontzq Sylveftris C.B. Park.

Parvitate fua B: loconatali à precedente differt-

Afbyllm Indkum J. B- Rofa Hivrkkwtic exficcata fimilis C. B-*

In infula 5. Vincentii plantam Hollandi copiose invenerunt, & vocarunt *Blatterlo's* quia multa foliaexaftchabebat. Tencnores ramulos Scorbuti curationi abhibuerum nonfine effectū. *Ind.Or.* Part. 1. Fig. tti.

C A P. XVI.

*Arbor Brazilien'is floribits jpeiofis fcic'atis, pericarpio ficco. Cebipira Brafdiznfibiis Marcgr. Cffc
piraguacu, & Cebipira-min Pifon-
Marcgr.*

Alhuv eft grandis K ramofa, quae lignum habet durujn, afpeftu ferè fimils Fagino, ex quo rptemacninarum Sc curruum fabricantur^ cortice gnfeo cum fufco raixco^ In ramis habet ramulus alternatim fibi DppofitDS intervallo femipedis fer^ in quibus alternatim vel etiam diectc ilbi opponuntur folia parva, duDs digitos circit^r longa, 5c f. digiti Jata ubi latiffima, figuri * familia foliis Buxi, fuperne laturate viridia & (plendientia, inferne quafi canefcentia. *Flora k^* CDpDfffi_{moSj} in quohbet ramulo quidecim, viginti, aut pkires, luo quoffibet pediculo brevi infident, magnitudine florum Pomorum, aut paulò majores, quinque petalis conftantes, quas prodeunt è nigro-calyce, illfque infident. Duo folia floris majora funt, & C prope Jacu ofto aut novem parvula *fiamina* alba, *apicibus* nigricanribui. Floris foliis decidentibus nalcitur è Itiedio *Siliquula*, ex viridi Jubflavefcens, jn qua femē con tine tur. Foliola floris omnia fiunt corrugata uc *pōpōqur* Goffypinu5 Lufitanus: Color illorum dilutt crerujs cum albo; luperius floris folium *propl.cak-* cem maculam habet rufefcentem, & C eft inodorus.

Flore't menfibus Oftobri 6e Novembri-

J^m P^{UT}-
varcz.
j:gorC_{CBj} qui artiarus eft Be afringens. Balnea Be decofta fiunt prztantiffima adverfus morbos à frigor? natDS, pedum &c Ventns tumores, dobrè(que membrorum *Curimntos* Lufitanis diftos: ipfam denique Luem ^eneream non inveteratam fonnfecus 6e intrinfecus adhibita reftituunt, fado' rcfque provocant.

Cum verò adfringendi facultate fimul & C acrimonia quadam agant, fcabiei, tineaeque, Be alii5 qufdem generis cutaneis affedibis medentur.

C A P. XVII,

*Amytiti feu VttMali H. M. part. 5. tab. 74. Arbor Indica fioribus ftizatis, fminibm parvis fr
vafculis fa**.*

Kari-vetti Be Pe-vetti Tab. 54- & yf. part.4.defcript. fpecies eftj atque arbor humilioo /?- circiterpedes alra, caudice msdiouriter craflb, cxtice cinfto cinereo, incas rufefcente, rā* mulifque viridibus pluribus dona to. *Radix* fibrata/rufefcens, oioris Se faporis lylvd^{h11} acaraari. *Folia* oblongo-rocunda, acuminata, crafla, den/a, glabra, atro-viridia fuperne & c fr^m dentia, inferne fubviridia; fapore amaro. *Fbfculi* inodorij viridi-flavefcenSj ad foliorujti^{*/} circa fureLlo5 (picatim proveniunt: conftant ii unico foliolo, fed in quatuor profundas^{ad} divifo, ficutpluravideanturj *faminults* albicanfibus flavefcantibus apigibus ornatis medumri^{of} pamibus. Flofculis emarcefcantibus *femina* perquam exigua, nifa^ inodora, infpidaj vafcul^{cc} per maturitatem indu^ fuLcedunt-

C A P. XVIII,

De Erica.

*-1 Ricam Martinius ab st frango deducit, quia calculos frangendi vi pollet.

^M Ericis notis fune ftaturfl humilis, folium perpetuum, flos nudus, § plerunque urc^olaris':
^E Vafculum feminine in imo flore ceu calyce dauifiim j in fterilibus, fqualidis Be paluftri feu fpongiofo folovigere, quod pauciffimis plantis copceditur.

A. I. Erica ^fulgaris Park, vulgaris ^{fi}v* ^pumila Ger. emac. folio Myrica I, fzuvuljraru glabra
 C. B. vtilgaris hmilisjempn virem flore purport & albo J. B. Common I^fotlj, 0? 3Ling»

-7. *'

Frutex humilis eft, raro /upra cubiti altitudinem affurgens: [vidimus tamen in motitofis Septentrionalibus Anglix putrido 8c fpongiofb folo quæ etiam duos cubicosuperare] radicibus longiffimis, fraftu contumacibusjfpadiceis: virgultis numerosis, lignofis, duris, ramofis, colore itidem jpadiceo praditi5, vel in nigro rubercentibus. Folia frequentia, femper virentia, quatuorvcrcicLilis fquamatin incumbentium foilolorum minimorum confanc^uc fupernedeorLiminficienti cruces continue videantur: ad Cupreflum Be Tamaricem accedunt, quæ f ut ait Cluiius) temporis (iicceffu in ramules eformantur. Flosculi veluc fpicam exprimentes fecundum ramulos a medio ad lummum ufque proV pendent, bullati quodammodo, tetrapetali, elegantiffimo purpura dilutions col ore, InCerdurri albi, perbrevibus petiolis append, quorum meium occupant apices ruffiL

Septentrionalibu5 regionibus, (ut recte Clufius) maxime familiare eft, locis incultis: praefertim autemin niDntofisfrigidis, foloputrido cienofo Bc fpongiofo, quod aquas combibit Be humore per-^{tu}petuo turgwt, ubi nulls fere alia: plants proveniunt omnia late occupat. Rarius in calidioribus invenitur.

A- Erica vulgar is hirsuta Ger. Myrica folio hirsuta C. B. Myrica folio tomzntois & incanis
 foliisClufii J. B. vulgarishirsutor Park. ConWlun rOUgl>ICatob i ^{ca} J.

Noftra fententia à pcedente non differt fpecie: cum, teftè Clufio, praeter hirlitiem ei per omniafimilis fit; nee minusfrequensoccurratquamvulgarisglabra, non lous tantum inculcis(upra Windelbram (ubi earn obfervavit Clufius) fed ubique in Anglia.

Turn fic=U5 Erica: turn aquaflurum deffillata ruborem oculorum tollit 5& dplorem mirigat: quin ^{Wres} Sc colica laborantibus uciliter exhiberi expertus eft Tragus. ^{TJJus.}

FomentaSc balnea fidatDria I floribus confecta podagrica Be paralyticis membris c^nducei^ccdmittur. Aqua, in qua vulgaris Ericis folia decocta funt, iimpta tepide tarn mane quam veiperi per triginta dies %v. ponders, tribus horis ante cibum valet ad vefics calculos comminuendos 5c expellendos, experere Matthiolu Verum id felicius fucedere idem notat, fipoft id tempusmale affbfti in balneum decoctionis Ericis ingredi, atque ibidem morantes fuper Ericam decobtam fed e jubeantur, idque pluries repetatur. Addit Matthiolus ie novilTe aliquos, qui fervata viftus ratione, hujus tantum pDtu vefics calculos in minimas partes comminutos ejecerunt. i \^uis hoc credat ?

Oho ex Ericis floribus confecto ad tollendos herpes foedos & Inveteratos totamfaciem occupantesRondeletium magno lueceffiuulum fcribic Clufias.

Nee mel quod de Ericis floribus legunt Apes in Anglia adeo Imprubum eft, ut fcribunt Diofco-Tides &c Plinius, fed paulo duntaxat coloratus.

Ovium gregibus Erica hyberno tempers pabulum prsbet, Be ignibus fovendis inopia Jignorum Infer vit.

In Scotia materiarii b terra pulla inculcato ftramine ex aqua fubafta leviter, & akernis Ericis ftratis, extrorfum utrinque fpeftantibus comis, concurrentibus in medio lignofis radidibus, parietes cum cafarum rufficarum, turn hortorum artificiose exruunt: qui vinculo ftraminis 8c Ericis nee pluvias metientes, nac attsrentium jumentorum affri&ibus concuffi in multos annos durant. ^{Jae}m Cargillus apud J. B.

Scoti montani pro lefto fpe fubfternunt Ericam, radicibus deorfum, frondibus lurtim verfis: adeoque icite hac rations leftos concinnant^ ut mollitie cum plumis certent, falubritate longè fuperent. Erica enim naturali ficcandi vi prsdita fupervacuos humores exhaurit, nervifque ebr^um muleftia liberatis fuum vigorem reftituit, ut qui vefpere languidi 6c feffi decubuerint, mane vegesi K alacres refiirgant.

QLidam ex radicibus Ericis calices affabre componunt. D. Sibbald. in Trod. Scot.

A- 1. Erica tenuifolia Ger. virgata fvvt fexta Clufii Park, humilis, cortice cimreo, Arhuti flovf
 C. B; ramuluurnU, floribus faturatimtus purpurtis J. B. 3fi^leabc& I^catf}*

Ahitudine eft pedali ant cubitali, plures ex eadem ^adice caulei cmittens, teries, fragiles, cor-
 ce cinereo teftos; germina tamen novella rubefcunt. Folia terno ordine pter intervalla ramulos
 ringo minus crebra quam in quadrifolia paluftri mox defcribenda, perexigua, angufta, acuta
 viridia^ glabra. Efoliorum finibus exeuntramuli terno pariter ordine: verfus cauhum K fur-
 rum liimmitates Flores, tonga interdum ferie, crebri, tres tamen plerunq; fimul, brevibus Oc
 tenuibus pediculis rubentibus appenfi, monopetali^ concavi, urceolos lmitati, faturatus purpurei, £
 calyce quinque iegmencis anguftis compofico- Flos quinque intus (tarnmufo occultat apicibus ni-
 gricantibus

gncintibus in Jtgnia. Stylus ftammulis longior è floris Dfcuta apparet. In imo flore vaiculum est
Jeminale parvum, globofuiHj fzmina parva continet
In inculcis & fterihbus frequens o ecu IT it.

A- 3- *Erica Brabantica folio Coridis bifurcato quaterno* J. B. ptmilla Belgarum Lobellii, fccparia noftras
Park, ex rubro nigrkans fccparia C. B. major flore purpureo Ger. emac. quoad drcjr. itcto

Humilior plerunque est quàm pnecedem, [Erica sexta c/«I] & in terrain refcipina, pedalibus
tam en interdum caulibus, ramofis. Surculi minores mbercunt, minus tarneh quàm prxcedentis,
lunrque incan.-i. hnugins hir/titi- Folia crebra, quàm illnis latiora cra/lioraque, hirfiua, quatem
ordine per inte valla latis crebra caules cingentia. Flores in fummis caulibus 8c lamulis velutin v/om-
tellis confertij' & non Tecundui' longitudinaline' Ti eorundem alii supra aliDs longa ierie difpofic^ ut in
p.^cedente, brevibius pediculis harrentesj majores quàm fiipradifta; yerum colors cameo auc rubro
iijlutorib, totidem ftanunula occultantes cum vafculo feminali fimili: ftylus qudque è floris ofculo
cminet. Capitu'Za anequam flores explicantur admodum hir/uta videtur.

Locui.

Inpaluflnbusputridisfrequens est.
Hue etiam puto referendam Ericam Anglicamparvam capkuli hifutis jr. B. quam fe a D. PetrO
Turnero ex Anglia liccam accepisse fenbit.
Jehnfbnus apud Gerardum hanc pro quarta defuibic 5c figuram Ericis fecundae Cluni pro ea ex-
hibet, fed perperam. Quid velic C.Bauhinus perEncam fuam hifuram Anglicam noil indclligo.

4. *Erica Coris folio bipido Cerinthoides Africana* Breynii.

Breyn.
Ramum psdalc m à Protontorio Bona: Spei acceptum fie defcribit Jac.Breynius.
Ugnolu5 erat, durus, cortice ex lubrufo grifeo & reticulato teftus: quern sxoinni parte temere &
finecito 01 dine multa ambiunt folia, viridancia, crafla, nervo per loigitudincm excurrente, Eric-
ca; baccifers Mattb. magnitudine & forma congruentia, nifi in ambiru pilis quibusdam rigidis veluti
fpinulis, exafferata effent. Flora Cerinthz florum zmuli, in rami apice brevibus pediculis; deni'
& duodni in orbem conferti, ex rubeo colors lepidè purpurafcentes, hirfici, fitulofi., ventriosiqu^
in quatuor lacimas paiTasora divifa habentes, Be ex totidem fblolis hifucis acuminating quali ex
calyculo provenientes admodum magnified fe oftentantes in quorum alyo ftamina quaedam apici-
busparvis prxdita cum ftylolongiore occultantur.

Erica Africana umbellata flon purpuno Bartliolin. Atf.Med.An. 1675. I t eni

Erica Africana arborefcens flore cameo ejufdem ibid.

Has non defenbit, fed earum duntaxat icpnes exhibet, quas apud iplum vide.
Prior harum pracedenti à Jacobo Breynio defcripta: cadem videtur.

5. *Erica Coris folio maxima alba* Park, foliis Corios, flore albo J. B. major flore albo Clujii Ger-
folio Coridu I, feu maxima alba C. B. <?Cot fiBJitC^fotocrd I^Cftl),
Cluf

Locus 0
Temfus%

Hare omnium quas unquam conipexit CluTus Ericarum maxima, humanam altitudinem interdum
fperat, fruticofa admodum^ Hgno duro, ex rubro nigricanta, foliis exilibus 5c brevibus, qua-
terno ordine raniDS ob'dicntibiSj guftu amodurn adfringente; flore copiofo racematim pxné cotos
ramulos occupante, ut interdum majores rami pedali longitudine onufti confpiciantur. Eftauteifl
iios concavus velut exiguum cymbalum, oblongusj odoratus, pulcher, albus.
Nafciur in Lufitania; /olitudinibus inter Ulyffipponem Be Conimbricam cdebrem ejus Regni A-
cad?miam: inveniebam etiam, inquitj circa Tagum decimo ab Ulyflippone Milliari. Floret
JSlovenbn, Decembri K Januario.

6. * *Erica Coris folio maxima purpurafcens* Park- foliis Corios qtatrm5, flore purpurafcente J. R
maxima purpurafcens longioribus foliis C. B. major flore purpureo Ger. Qua t pim ply

Ejufdem fer^altitudinis est cum prturfedente, etiam fruticofa, tenuioribus tamen ratnisi
cunio coJoris, exilibus fimiliter foliis quaternis ramulos simul amplectentibus, quorum
oblongiJbuli flores in/idem, fuperioribus limileSj color? purpurafcente.

Eccm

Tora etiam adfriAionis particeps.
Provenit eifdem quibus fupenar bcis: ilJa etiam frequentior, 6c eodem tempore floret; fort?
duntaxat varietas est.

A. 7. *Erica folio Corios muluflora* J. B. *Erica Coris folio fecunda* altra [pecks Clu-
folia dense fruticans Navbonwfis Lob. Retiit5 Erica Ahietiformis dicmtvr. 5

H u f a q f r b o t o n z diws m Iris t ameil niimens TM o TM finquit XB
minora quidemrat, fed nun totupliciter] nee mini eifur cofica purpurafce
in ulciov = diuz. Crebra admodum lunt folia, qux in ramulis velbgia relinquunt qualu in A

vel potiùs Pìno rejifta cernuntur: ramulì enim non mañent poliùt illis decidentibus ut in majors Monfpeliana. Extremitates ramulorum abundant copiofilimis *fwibus*, ultra folia emmentibus. Hi flores plures velut ex parvis nodis erumpunt, e pediculis tenuibus, longiufculis pendentes, purpurei, calyculati, ex quibus *apices* multù prominent, oblongi, nigricantes. Hanc fpeciem à J.Bauilino defcriptam circa Pedenatium via qua indè Monfpelium itur copiofam obfervavimus: item eundo à Monfpelio ad oppid^ni 5. *Lupian ictus* vias. Eandemfed hmiliorem in Anglia inveni- JIIIIS eundo ab oppido *Helfion* ad PrDmtonium ffjÇ Hi^arb ^poillt diffum in Cornubia.

Ffec planta diffincta eft ab Erica Coris folio II- à Ciuffio depidta, nec in parem altitudinemaf furgitj fed plerunqne intra cubituxn aut felguicubitus fuffiffit, quanquam in regionibus calidis elatiorfit quam in Anglia. Cluffius hanc defcribere videtur proaltera fpecie EriuxCoris folio fe- cundac: nonmultum inquiens diflimilis, quæ Narbonenfi agro frequens, longiore paulò & copio- ifore eft folio; flore purpureo, minore, Be extremis ramis confertim naltente. NLillunij quantum nos in ficca aquinadvertere poffumus, certum ordinem in folioruin circa ramulos fitu obiervat; Sunt autem crebra adnodum 5c conferta Abietinorum in modum ut ramulos occultent.

Huic fimilem fedminorem obfervavimusin rupibus inter Bolzanum 5cTridentummen?Februa- tio florentem.

B. Erica major floribus ex herbaceo fupureis C.B. Park. Coris folio 3. Clu£ foliis Corhs tjuaternis., floribus hrbactis, deinde ex albo purpurafcentibus J. B. 02Cat l^tati) tptifl pllltplif^
Eren f l0ocrj?.

* Pracedentibus perfimilis eft, fedpaulcì humilior: aliquantulum majora Be latiufoLila nigrioraque *pmuki- liabetffAtf, quaterms ordinibus circum ramulos nafcentia : plurimos flores per intervalla lecundum & antepcn- ramulorumlongitLidinemnafcentes, fuperioribus forma fimiles, herbaceiprimum colorisJ deinde ex albo purpurafcentes. Tota etiam adtrifloria facultate pradita.

Supra Ulyffipponem frequens inter fuperiores, plunbus tamen locis occurritj uti etiam circa *Locus & Tagum*. Floret Decembri Be Januario. Tsmptm.

Gerardus pro Erica majors flore albo *CluJm* iconem habet hujus fpeciei.

9. Erica arborefcens fioribus luteolis vel herbaceis minimis J.B. [coparia Park, major fcoparia^ foliis deciduis C.B. pyramidalis Ger. 25cfome^J^eatl),

Cluf.

Hxc etiam fruticola eft, duorum cubitorum altitudine, nonnunquam amplior, fragili ligno, tenuibus 5c miniitis 0/ij, ut in Corrua prima ferè, viridibus, que in deficcatis nonnihil ramis facile defloant, Be veftigia fiii relinquunt: iftius flos reliquis rindreft, cavus etiam 5c hrbacei colons.

Extremis ramulis capitula è multis foliis compafta nonnunquam gignit, his non multuni abfi- miliaj qua: in vulgari Be duriore Thymo aliquando confpiciuntur- Capitula hacin bac Jpech & nvs mini obfervavimus: ejufdem nature funt cum rofa ditis in extremis Salicwn i/vrLr; fnt^ite nhil aliuu quam folia degenerantia ex InfeElorum punSturis,

Vulgareeft autore Cluffioj toti Hifpanix Be Aquitaniac: natnque Ipatiofis illis folitudinibus & in- cultis bcisfupra Burdegalam, nullum fere aliud virgultum confpicitur: nota eft etiam Narbonenfi Gallic fcopisfaciendismaximeidonea. Nosin luco Grammuntk) propè Monfpclium ; inque eri- cetis propè Liburnum in Italia obfervavimus.

1a. Erica arborefcens Monjpdienfis, flore purpurafcentv, ramulis termis J. B. Er. termis per inter- valla ramulis Ger. O B. Er. Coris folio 5. Cluffii Park, i^eatl) foitl) tljjie ^2auf)€0 nt a joint*

7-A

Hujus ramuli cuticula tenui cinericea lu'nt inveftiti, terni faepe tnaJDribus circumpofiti, foliis tioti ubique przditiij iis tamen Corruade fer^ fimilibus, longiufculis, tenuiblis^ deciduis: in ramuloruin extremitate flores ex cceruleo purpurafcentes, fatis magni-

In montibus Ligurii prope Genuam obfervavimus hanc plan tam infigni ftatura, humanam alti- tudinem long^ fterantem. Maxima eft ex omnibus quas nobis haftenus videre contigit Ericisj cortice cinereo hiriuto, foliis parvis, brevibus; floribus diluta purpura obiter tinftis. Loco pra- dido Aprilis menfis initio florere coepit. In lylva Grammontia prope Monfpelium ad tantam alti- tudinemDnaffurgit. Alibi etiam inmontofis Galliae Narbonenfis oritur, inque incultis lupra U* lyjltponem III Lufitania.

II. Erica procumbens dilute purpurea C.B. Er. Coris folio 7. Cluffii Ger. foliis Corios, flore purful reo dilutions cohris J. B. procumbent five fupina pattiùe purpurea Park- \$blz JfHltpJc lull) i^ntf),

Chf.

Mukoş teretes humiqne procumbentes ramos hab^t, pedales, interdum etiam cibitalcSj ex atro purpurafcentes. Hos plurima gracilia ambiunt/0/10/^, Tertian Cluf. foliis psnè fimil^, paujo tatneri longioraj quaterms plerunqne, interdum quinis veribus ordine difpofita., adfringente guftu. Fhfculi in (limmis ramulis oblongi, conuavi, purpurei dilutions colons, ex quatuor foliolis ejufdem ferè coloris prodeuntes; qui maturi Be reliccati nigricans fle rnutum femèn continent. Radix dura, Jignofa, in diverfatendens: lpfì tamen procumbentes rami humiqi^e diffufi tenues capillar6fque fi- bras nonnunquam agunt.

Copios^ admodum crefcit fupra Seeboft, in afcenlii *Herren albeit*, magno mill. Germanico fupra Gamingam: invenit etiam Cluffius in Stinacarum Be Auftriacarura Alpium praakis iugis, ubi Ju- nio Be etiam fenus floret: inter Pragam 8e Noribergam etiam Junio florentem colbgir. NDS hinc «n Alpbibus Stniacis colleftam habemus, locum non recordamur. iz, Erica

12. *Erica tenuifolia calyculata* Ger. *scoparia altera* Pavh. *birfuta* Anglica C.B. *ramulis & foliis Corios ternis, floribus ex rubro purpurafcentibus majoribus* J.B. *Cons folio lz. Cluf.*

Cluf.

Cubitali panē est altitudine, fruticosa, tenuibus virgulis przdita, quæ ternz femper circa majores ex intervalhs nascuntur: *folia* similiter terna ramulis innascuntur, exigua quidem sed latiora quam in superioribus inferiorē. Terrain infestante parte nonnihil candicans, hirsuta, gustus adstringentis. Summi rami ad foliorum exortus verricillatim exornantur per irridrvalia ternis perpetuo floribus, aquali inter se (patio nascuntibus, Be in imam partem convertis, majoribus quam in reliquis generibus, concavis, ventre magis turgido, colons ex alba purpurafcentis, numero sex, novem, dudscinij quindam aucpluribus.

Lorn E?
T...

Irdem cum *Erica baccifera* Lusitanica Lulitaniæ arenosis buis crecit ut plurimum. Floret Decembri mensis 5c fribinde fetmū exiguum nigricans profert.

Milior cur C. Bauhinus hanc Anglicam denominavit, cum nullibi (quod ego unquam viderim aut audiverim) in Anglia inveniatur.

13. *Erica procumbens herbacea*. C.B. *fupina herbacea* Park, *parva foliis Corios yuaternis, fiore herbato, foliacis capitulis* J.B. *fupina herbacea* Park. *Er. cruciata* Ger. *Tha! Er...*
ffolurrd I^rnt^

Cl.

Pedalem altitudinem raro superat, magna ex parte humi procumbit, *foliis* quaternis ramulos contrario exortu femper ambientibus. *Flares* fecundum ramulorum fumam longitudinem inter folia dependentes cavi, pufilli, in quatuor angulis definites, herbaceo colore praditi, dsindefemen. *Radix* etiam dura & lignosa.

Lorn.

In hinc montibus non longe à Lindavia Germanicæ ufque collegimus sub finem mensis Augusti, jam tum florere incipientem. *Ericæ scoparia*: circa Montepelium nascens similis est sed minor multo tam en longioribus & crebrioribus in caule Be ramulis.

Maxima copia nascitur (inquit Clufus) in ascensu mentis illius qui superandus est iis qui Gaminæ ad Seehof vicinque bea proficisci cupiunt.

14. *Erica procumbens ternis foliolis came a* C. B. *parva Vannmka foliis Corios ternis, fiore capitulis Thymi* J.B. *fupina cVernea* Park. *Coris folio nona illujh* Ger. *emac. Er...*
flotocrcD leaning f\$stattf

Cluf.

JEquali cum precedenti excrecit altitudinis, tenuibusque virgulis przdita est, humi diffusis et purpura nigricantibus qua summa pars in multos plerunque lamubs dividi solet. Foliorum inordines Be versudigesta ut in rebquis, tenuia admodum, *Ericæ* fextx in Hispania & G alii a nascens foliis familia, terna femper, quemadmodum in illa, aquali inter festu virgulas ambiunt: Summiramuli onufti [tint concavis Be oblongis flojcvlu, extrema parte in quatuor angulos fectis, coloris? cum quatuor illis foliolis unde nascuntur camci, oaua ftamualn mgncontibub, ftlôque purpurafcente e medio flore-emergentibus: *Semen* maturitate nigricans exiguum habet: *Radix* aliis fimilem, lignosam. Adnascuntur interdum hujus etiam ramulis viridia capitula e latioribus foliolis compaata, capitulorum Thymi modo.

Lorn.

Invenit Clufus apud arcem *Stichfain* in lylva illa imminent qua ad Sneberg ex arce iter est, alia item ad finiftrani oppidi *Neukirche* fylva. Be nonnulls rrtontanis Pannoniæ iylvis. Floret ut plurimum Apriji Be Maio, quo tempore apertu venustissima est.

Hare est illa (pecies quam nos ad Jatera montium eunda à Tridento ad Bolzanum 6e in rupibus Martiomenleabunde florentem obfervavimus.

- A. 1 J. *Erica fupina maritima* Anglica Park. *AnTylygonum pufillo ihermiculato Scryylli folio* Lob ?

Cauliculos fundit plures dodrantes, teretes, tenues, ramofos, per vetustatem lignefcentes in terram provolutos juniores rubentes Be interdum velut farinam albicante reperfos, crebris geniculis diftintos. *Folia* ad fingula genicula multa cbnferta velut in agminulis, vix tertiam unciam partem Jonga, angusta, marginibus reflexis, glabra, obicure viridia, sapore nullo eminenti. *Floras* hinc magni, Be quantum memini pentapetali, pulchre rubentes [D. Goodycrus apud Gerardum emac & Pongono pufillo Bée. *Vena* ramulose finibus feu agminulimediis emergentes plures attribuit, in quorum unufcujusque fastigio EDS unicus tetrapetalos, pallide purpureus: radicem extrinsecus nigricantem interram alte descendentem sapore valde atnaro se nonnihil exalfaciente] Fructum autem nondum obfervavimus.

Locis*;

In palustribus maricimis, praefertim arEnofis fa?pius occurrit: vidi in Lovinglandia Suffolciæ: prope pontem Yarmouth feu Hierx ostii oppidi, item in palustribus Thurrington vici trans Coiceftnam in Eflexiâ, necnon ad margines fostrarum aggeribus arenosis juxta viam qua: Camalodona Goldhanger ducit ad alibi.

HISTORIUM PLANTARUM LIBER TRIGESIMUS PRIMUS.

QJJI EST

De Arboribus & Fruticibus Siliquofis.



SILIQUAS appellamus Folliculps feu feminum conceptacula in Jdngitudi- nem produftaj five ea membranacea fiint aut coriacea, five cruftacea auc lignea.

Notandum autem nori omnes in univerfum fructus quos filiquobfis accen- femus in longitudinem produftos eflb, fed nonnullos breviores &c tumidio- resj tjuos tamen quia reliquis notis cum filiquofis conveniunt ab iis nullo mo- do feparando5 duximus. Sic quaecunq; plantae folliculos habent bivalves cum feminibus ad rachin annexis urib ordine fitis, cujufcunq; tandem fi- gure five bngae fivebrevioris &c fubrotundae folliculi funt, Siliquofi nobis cenferuntur.

Notandum etiam non omnes in longitudinem produaDs fructus filiquis adfcribendos^ fed ejus duntaxat plants generis cujus plerxque Be pDiores ippecies iftiulmodi fructus producaat. Sic cucu- nieris anguini v. g. fructum filiquam non dicimus quamvis longus Be anguftus fit, quoniam CUCLI- meris vulgaris fructus ejufmodi non eft; feinina^ autem in longo ilia eodem moao dilponiuntur quo in brevior.

Siliqua: autem tiometi prxcipuo jure Bepej^ anfonomafian quandam nobis convenire videturbl- liculis bivalvibus, quorum femina rachi adnexa ftint^ &c uno verfii in eadsm linea diipofica.

Librum autem hunc in quinque Seftiones dividemus.

Prima erit De Arbonbus liliquofis flore papilionaceo-

Secunfla De Arboribus folio decompofto feu ramofo, cujufcunq; forms flos fit.

Tertia De Arboribus filiquofis flore pentapetalo.

Quarta De Arboribus fruticofis mifcellaneisj feu anomalis & fui generis feu minus cognitis.

Quinta de Lobis feu filiquis quibufdam, quarum arborcs, minus cognit* necdum quod fciam de- fcripti funt.

SECTIO PRIM A.

Vz Jrbvribus 6" Frutkibus filiquofis flwe papilimacw.

CAP. I.

De Arbore Jud<e ditta.

Arbor Jud'if Lob- Ge'. Park. Jadaica arbor J. B. Siliqua fylv. rotundifylva C. B. Cercii prior Thzophrasti quibufdam, Colpaa * Theophrasti aliis. "

*3-H/? 14.

Cefcit interdum. in arbor em juftac magnitudinis locis cultisj fed negle'ta Be fponfe nafcens * ^ £ , inter frutices potiùs quàm arborès plerunq; cenfenda eft. RañorSs fert rariors, aherna-pi^i^az!i^ liiri ex lateribus nafcentes, cortice ex purpura nigricante teftos, qui primo vere antef^/w (Unt folia, aut iis primb germinare incipientibus inferiore parte ternos aut quaternos flores firhul Genift^ aut jofit os foitt, Geniftæ aut Piffrutia formu, adure purpura u qd de G, [*du mquos fbi q. n. n. *o. texti, & quibus du. i. b. f. d. o. r. a. m. a. s. p. e. c. i. d. i. n. e. f. u. p. e. r. u. n. t. , r. e. l. i. q. u. a. n. t. a. f. u. p. e. r. u. n. t. a. f. u. n. t.] u. n. c. i. a. l. i. b. u. s. e. t. r. a. p. e. r. u. n. t. a. f. i. c. i. t. m. e. d. i. o. m. u. l. t. i. s. e. m. i. c. a. n. t. i. b. u. s. % fi.] Folia deinde ex interyallis prodeunc, Afari fere, minus tamen Trlpoides\ cdrnoftj cif cinatae propempdum rttunditatis, nervola admodum uti Ariftolochiarumj Sc dura, in-a icon ciufi- periore parts viridia, inferiore vero nonnihil candicantia. Floribus fuccedunt m^mbranacea: pui? ** h. g. 15. j. n. o. Purafcbntes)? fi)^ & quodammodo tranfparentes, cDmprefle, digitalis longitudinis [uncialibus; ^*r £ ^ longioris pediculis pendula; palmari aut lelquipalmari longitudine, membranacc*, purpura- /un]upfiore fcentes, compre(fe, unciam Fere lats] in quibus fmina coloris fpadicei, dura, Lencibus majora, ^ ^ dunta- oblona. Aliudje4f bifido.

AHud genm. Aliud genus invenitur per omnia fere fimile, prater florem, qui in hoc candicat, cum in fii-
 periore purpureus fit, Be corticem virgultbrum, qui candicat potius quam purpurafit.
LCCUJ. Spontg na/cukur primum genus Granatenfi regno, Be quibufdam aliis Hifpanix & Galliz Narbo-
 nenfis locis inter fegetes. NDS in collibus Romz vicinte Tiberi imminentibus, poftca in Apen-
 ninis montibus, vidimus..

2. *Siliqua, fflvefiris rotundifolia Indica C. B.*

CB.
 Semefl nummi inftar rotundum, planum, deparii magnitudine, cfaflmfculum., tuftum, a Teren-
 ce ex India accepk CBauhinus cum hac infenpeione, Semen Nummularia: eft arboris Judae Indi-
 es, CUIS flos magnus, elegans Be odorosus eft.

5. *Arbor Juda Americana.*

Huju5iamulum floribus onu/lum vidimus in Mufeo infruftiflimo Ornatiflimi Viri D. *GuLCourtint*
 Armigori; Folia ejus nun perinde rotunda crant ac Arboris Judae vulgaris, f^d acuminata, flores
 longé minores brevioribus etiam multò pediculis infidebant.

4. *Siliqua fylvefiri Jimilis C.B.' Acacalis quorundam five Kif?ntftn foliis Ceratids J. B. An Dio-
 furidis Acacalts?- C.B.*

Ex ut^nni femine.enata teriella planta inftar Ceratiae pnum erumpenEisy rotundis foliisqua-
 trmSj utrinque coflxannexis binis: Cauliculus fubhirlutus: qux fub Autumni initium rur^us exa-
 ruit. Semen altera parte rotundum latiuftulunj altera in mucmnerri colledtum.

Semen hujus Caynna: & Kifmren nomine à Paludano ex Syria reduce accepit QBauhinus..
Viri. Tarn vulgare Conftantinopoli ad ocLilorum.morbos eft remediumj ut tintum fit proverbiallri:
 Si do leant oculi babes Chefmefen.

C A P . II.

*Silijua arbor Jive Ceratia J. B. Siliqua tdulis C. B. dulch five u vulgatio Park. Ceratia filiqua fi-
 ve Ceratonia Ger. Caroba Diff Fontis S.Joannis Germanis Be Belgis. C^ C^Ofctg.
 J.B.'*

ftulw'n&f^0" [filiqua modice admodum intorta & piDpmodum refta plerunque eft] calidioris fbli aman-
 thylo uc traduittj caudice in magnam exerefcit altitudmem, late ramos Ipargens,
 Singulargia hveni pediculu ad collum, crebris obliquis v. aculis in furgentes excrefcitibus, fuparuis atro vi-
 gina, cralla, rigida, nervofa, crebris obliquis v. aculis in furgentes excrefcitibus, fuparuis atro vi-
 core fplendent, optentis pallidior. Novemb. & Decemb. Julium idlar Juglandis fere in flores ex
 rubco purpurafcentes fole aperientem emittunt: deinde filigae, non raramu digiti indici aequalis,
 fed & altero tanto interdum longioras, latiores, modice intortas, compressas, callo duri, edoli, fextima
 claudunt membranis diftineta, fecundibus Caffia folubvz fere aequalia, minoris rament, culore ipa-
 diceo obruciore^ compressa modiCc, altero fine in acumen leviter definentia, altero latiuftulo,
 & *pfiM^J<TM pulpa buxea, dura, & L leguminofi quid refipiente.

Quin h^c arbor fitSiliqua Plinii, w^ri* Be x^e7Wia Grscorum, minim I dubium eft.
L. vi. In Apulia. & regno Neapolitano vel ffonte ontur, vel faltem frequens colitur. Jiners à Nea-
 poli ad Romam obfervavit D. *Tancredus Rybinfon,*
 Vedingius paucas harum arborumin i^gypto vidit, frequentiores in Palfitina, plurimos in Ju-
 dzx montibus^ & ^ circa i a cram ibidem urbem.

Vires. Siliquarum (ut reftè Plinius) cortex ipf? manditur^ eftque melleo ac dulci fapore. Viridesum-
 ptx, autor eft DiofcDrides Be poft eum Plinius, ftomacho incommodz flint Sc alvum folvunt.
 Eardemficatx alvum fiftunt fle ftomacho commodiores fiint^ unnamque cienik Quamvis omnes
 qui de his fruftibus feripferunt, ficatos alvum fiftere affirmant, nobis tamen contrarium eveni^
 fiquidem quocuoq Venetiis (ubi magna CDpia venales/unt) de iis comedimusj non folum nau-
 feam moverunt, fed & alvum fubdlexerunt non fscus ac pulpa^Caffis, ita nt ventriculuspoftca ab iis
 abhorreret. Non tamen negaverim poffe impunè iis vefci qui affueverunt.

Egyptii, tradente Alpinoj mel ex filiquis extrahunt dulciffimum, quo Arabes Sacchari loco
 Caffias folubvz recentis ac parvas, Lingides, Myrobolanus, & admodum argue eadè molles fru-
 ctus condiant. Hujus quocuoq nullus ufus eft frequentiffimus ad chyftices, & aliqui etiam per ne-
 fumentum. Sed fubdolerent alvum: indè etiam alvum non minus eadem molle C^gic
 ibi ad excretionem movetur. Utuntur etiam rcnum inflammixionibus intus extraque appofito.

Ad tulfientes athmatico5 iplum non fecus quam Caffiam exhibent^ valdeque ipfos juvat: nec
 minus decoctuni ex hUr^ eadem hxc prfstat.
Qu?rcds "Etwih?^TM^omachi fl^qw & *Titi* comeftacft cgregia; item fynipus ex

Siliqua purgatrix C. B. *Caroba five Siliqua ex Guinea purgatrix* Park. Pona ltd.

Hanc bcofuonaturaliin attorem grandem excrefcere; quamys in Italia minor plerunq; Sc humilior fit Crefcendi modo & foliis a praecedente non multum differt. *Flos* qualb fie a neminc haftenus (quod novimus) traditum aut obferyatam. *Siliqua* brevis, crafla, incurva, &, uc ait Pona, Anacardio Cajous difto nonnihl fimilis, tres circiter uncias longa, exterius fpadicea [brunneam vocant] quemadmodum vulgaris *Caroba*: dorfo per totam longitudinem convexo feu arcuata linea in ventre feu concava pane elata quatuor vel quinque *femina*, rotundiora minufq; comprffa, liimma parte magb circinata, itna acutiora quam *Carobae* vulgans, continent, laporc, acriore, quique guttur propemodum adurat.

E Guinea allata eft haec fpecies.

Hanc arborem florem papilionaceutn proferre aUcrere non auhm: aln oblenrcnt quibus ejus copia fa<aa eftj & fi loco alieno a me diipofita eft in fuum transferant.

Lorn.

Siliqua African fruffu minore.*

Huius filiquas duplo triplove minores *Carobae* vulgaris filiquis vidi apud generofiff Virum D. *GuldrHumLourtmé* Medii Terapli, *hSanclaCruce* tube delatas.

C A P . III.

De Acacia Americana.

i. *Acacia Americana foliis Colutea Monococcus, filiquis echinatis* Hort. Lugd. Bat. Hermanni.

Acacia Americana Rohini Cornut. *Pseudo-acacia Americana Robini* Park.

Cornut.

Arbor eft caudice amplo 8c duro, cortice nitido & iibnigro, nee fpinis armato ut [^]gyptiacac aut Cappadocicz [Acaciae] fed laeyl Firmiffimis radidbus haeret. Cacumina bunge lat6que diffunduncir, multiplicibus didufta ramis, teneris, medullolisj aculeis crebris & acutis horridis. Oblerva tamen aculeos non rotundo ftvlo minaces, ut Rhamni, fed ex bafi in amplam latitudinem compreffa acuc gracilefcetes ut Rubi auc Seds canine. *Folia* in eodem nervo funt utrinque dena aut odiona, uno femper extremOn nervi claudence. Peculiaris eft in eis noftis fenfus, ftatim enim fub veperum in fe addudta per media phcantur, donee fequenti die Sol poftliminio reverliis aperiat. Floret Augufto : flos albus eft, Pdo fimilis, in uvam compofitus, ut Gytifi, non adeb tamen fragilis, nee deorfum nutans, fed fe in fublime erigens. Succidunt *femina* Lenticulae familia, quae fingula fingulis nucleis, duris admodum, Be ex omni parte echinatis clauduntur.

Totius arboris foliorum iuccus aut decoaura vi lumtna ad rerngerandum & adunngendum eft. ^m *Fera*

Hsec arbor non Cut vult Jo. Parkinofus) ad fpartum Spinofum referenda eft, fed ad Glycyrrhizam echinatatn pertinet, quacum Be foliis & filiquis monococcis, eredis, echinatis, pluribus in eodem iurculo feu communi pediculo glomeratis^ in tantum convenit, uc non immeritb Glycyrrhiza echinata arborea diei poffeL

X. *Acacia Virgintan a filiquis glabris. Arbor filiquofa Virginienfis ffinofa, Locus noftratibus dicta*

Part

E Virginia in Angliam dudum tranflata eft arbor huic non multum diffimilis, magnitudine 8c ftatura eximia, cujus truncus cortice lxvi integitur, ramuli juniores virides lunt, & ad unumquemque articulum fpinis acucifculis obfiti, unde Sc folia egrediuntur praecedentis familia, eodemque fitu ad rachin annexa, impari uno alam plerunq; terminante, quod tamen interdum deeft, breviora nonnihl & rotundiora. Nondum [tempore Parkinofni] apud nos floruit, nedum fructum protulit. Qua tamen ad nos c Virginia allatae funt filiquae tenues erant, oblongs & aliquidantum comprefli, ad modum filiquarum I^burni, quibus tamen longioraj tenuiora 8c nignoraj femina parva, fubcinerea, fpbndentia, rotunda, compreffa daudentes.

Hxc Arbor fepiffime falso vocatur *Acacia Americana Robini* ab Hortulanis noftris, annotante ingeniofiffimo Viro D. *Leonardo Plitcknet, M. D.*

C A P . IV.

De Colutea veficaria.

Coluteam vulgarem Theophrasti *uKmiw* non effe contendit Jo. Bodsus a Stapel. *Colutea* autern veficaria infigni nota, filiquis veficularum infar tumidis, ab aliis omnibus arboribus fruticibus diftinguimr.

1. *Colutta-veficaria* C. B. J. B. *Veficaria vulgaris* Parl. CD/II/M Ger. 25dffarb £¶¶¶.

Arbor est non magna, in multis ramis divisa, materie fere Sarnbiicij duriore, intus non medulla. Jata fed cava; CDrice gemino, exteriore cinereo, interiore viridi vestita: Folia multa; novemvel undecim ad unam costam alligata, ut plurimum opposita, Glycyrrhiza:, Hedyfari, aUtSenae modo, led Senas folijs niolliora, rotundiora, nee in acutum mucrbnem definentia, fupernè glabra niagilque viridantia, inferne albidiora. Be hirfufa, guihi amaro.* *Fhres* ex longo pediculo multij ut in Pifis K Cicerulis, ciocei, forma fimiles pncdfitorum flonbuSj, Be Genifhe angLilolae ac rotundas: Quiibus de-cidentibus fuccrefcunt folliculi, membranacej, pellucidi/ interdum rubentes, fpiritu veJuti quodam distendente turgidly icà uc preflu digitorum cum crepitu; elifo aere., diflilianc: in quibus continentur femina ad folliculi futuram tanquam costan^ quae maturo femine dehifcir, pediculis brevibus appnsfa, forma renis, antè macuritacem lutea, fapore Fabarum feu Pilbrum, per maruritatem minor, Lentes zmulanria quodammodD,minora tamen.mtundaj nee icà nigra fere^dura, compressa, lacuna in medio pr^dita, laporem pnftinum retinentia; amaritudinem in iis nonfentimus, uc perhibet Matchiolus.

Locus. In Icalia muljs in locis invenitur, uno prx ceteris notabili, in lateribus & prope/iinimirationem monci5 VeJiivii, in alcenfu ad craterem^ ubi nulls fere alix plantar. QtyTervavimus eciam circa Monfpelium.

Virus. Hujus folia, fed praecipue femina, non solum purgant per inferioraj fed & vomiriones mDvent, veluci femina Geniftx; func autera vetricub Be vilcenbus inimica, Ideoque nonnifi robuftionbus exhibenda.

1. *Colutea Zeilanca arg^nta tota D. Hermanni- Hort. Lugd. Bat.**Herman.*

Frucicat altitudine humana: radice pallefcente^ bi^chiata, Jignofa: Caule fimplici, aliquando multiplici: Ramis non incomptis, jncano molli tomento obfritis: Fo/wperpetuis, fubroCundiSjCraiTis, albenibus, lanuginolis/ ut plurimum feptendeim costam mediam binatim cingentibus, unico in fimmo impari: Floribus papilionaceis, luceSj Geniftx-Hilpanicac amplitudine, in spica palmari arfaum coacei-vatis, pendntibus finguis ex pediculis parvis, incanis^ marginibus crenatis: Siliquis coriaceis, bivalvibusj teretibus, digicum longis, vencio(T5), aliqdot quafi ifthmis interceptis, deorliini pfeftancibus, incus Be extus incani, albenis colois. Be in molliculum mucronem productis, claudencibu5 parce quac protuberat fstm gbboliim, durum, fiicum; niagnitudine Ciceris.

Abundat in vepretis maritimis infilac Zeylan, dista ab indigenis *Mundu Murungu* > i. e. Muruhgu • L. Aromat. maricima. Videtur enim habere quandam affinitatem cum Moringa * Chriftoph. Acofta:, quam Ci 35- Zeylanenies *Wattu Murunju*, i. z. Murungu hortense VDcant.

CzterLim gustanti deprehenditur acris; amara, ingrata & naufeofa, virtute purgandi przedita, fed ob ignaviam Be malignitatem a foro hiedico prorcripta.

PrDpagatur facile per novellos ftolones a radice aflurgentes, per fubmcrfionem autcircuppfi-tionem, ut Be per femina vere terrac commissa. Frigori libdufta cota hyeme viget Be viret.

D. Hermanns Hoi ut tarn dividit in K. ^ ^ . e. c. sil^^^mz Siliquofam deinde in duo genera* fibbdividit: quorum primium fert femina cylindrica, oblonga in filiquis bivalvibus articulatis: Alterum, cujus quatuor in Orients offendit species frucefcentes, fill qua 5 producit bivalves, ventrio-fas^ quafi ifthmo interceptas, ieminibus intus rotundis j cujufinodi est planta defcripta.

5. *Colutea z^thiopka fiore purpurto Breynii; Cent. r. Colutea v^thiopka flore Thxnkeo Barba Jovis folUs Breyn. Frodrom.**Brejn.*

Planra Autori noftro defcripta ex femine Africaiio, circa Promontorium Bortt Ipei collefto, enata^ caules plures fequipedaleSj lignofbs, friatos, incanosj medulla candidiffima fartos proferebat, lapore dulci: in quibus hinc indè sparla eranc/o/i^ è compluribus incanis foliolis, Ciceris fyl-veftris anguftionbus, uni costae quatuor iinciarum utrinque inhxrentibus^ unoque extremam alam occupante, compofitu. E fingulis ferme alarum cavis liirculus prodibat, duorum aut trium digito-rum tranfveriorum longitudine, floribus Colutea: vulgaris longioribus, Be florido colors BX fuave-rubente purpurafcentibus & media ad fummum cacumen decoratus. Quilibet verb illorum flirum ex incano, friato, in quinque fegmenta expanfo emergebat calyce: ex quo flore delapfoFp//^c/sr Colutex vulgaris, ten^r, membranaceus pellucidufqus fuccrefcebac: in quo femina ficuti in vulgari continebantur compressa, reniformia^ liitura folliculi fuprem* pediculis br&vibus appensa j quac tamen ad justam perfeftionem non pervenerunt.

LOCUM.

In HDrtisfiequens est.

4. *Colutea humilis veficaria Sriaca florz vxrulw Breyn. Cent. 1.*

Rarum hoc Colutca: genus Syria: mloCis editispropè Halepum occurrit: *RaJict* fufca, anipk^ d Rhap na i craffitiem longitudinemque "accedente; qua: *Cohculos* fundic palmares, terram versus reticatos, quorum iuprema: parti novem auc decem Lencis adhsrent/JJ/tf pennaca: inter qua: /^^^ emrgunt ColutsyEchiopica: aft violacei colois, inque orbem dilpofiti: quos folliculiexcipiunt

Lab: nores in Herbaria Rauwolfiano obfervavit D. Breynius, qui eam pro Aftragab (cm appnm, fi m, 15) in Herbarij ^ , 6 & d tr: i p c

CAP. V.

Barba Jovis C. B. Jovis barba frutex Park. Jovis barba pukbre' herns J. B. QH)t

23(t)
J.B.

Arbutifolia est fruticosa, altitudine humana [nos tam altam mm observavimus] cujus materiam duram atquellignolam ferè incanus Be lanuginosus regie cortex Kami huic frequentes fatis. *Folia* quinque aut sex, auc septem etiam conjugacionibus contexta, quarum singularia Lentis foliis paria, villosa argenteo colore fulgent. Ex pediculi foliorum ala appendices singulares exoriuntur, lanuginosae, quarum extremis inherent acervatim congesti *floftuli* lutt, quorum finguli non magnitudine fed forma Genifta; flores armulantur. Succedunt *Jiliquae* angustae, breves, molles, cinerea; *lmina* duo vel tria in rotunditatp oblonga, ex cinereo nigricantia continences. *Radix* dura, lignola. Admodum tenera est 5c frigDiis impatiens.

In clivis maritimis Hetrurisc & Regni Neapolitani copiosam observavimus. In Promontorio Ceti propus Montpelium, ubi eam oriri tradunt, nec nos nec D. Magnol invenimus.

De vinbus auc uibus in medicina nihil traditur.

CAP. VI.

Arbor filiquosa irifolia Indica, florz papilionacso Jzliqua grandi pilosa unicum intus fab am cmtintntt.

Plafo H- M-

H.M.

Trium hominum longitudinis est, unius crassitie, cortice exteriori cinericeo, ficco, fragili, qui è nigro rubea investitur tunica interioris vero molli, quamvis crasso, quo inciso gummosus, languineus affatim exsudat liquor, lapore subdulcis. *Radix* fusca eodem cum caudice liquore est liicida. *Folia* crassa, prxgrandia, Brasilicx Sabaudae hybernacae imitantia, e lato rotunda, lesqui ferè spithamam longa, albo nerveo obdusta limbo, taftu subaspera, colore superne è viridi-fusco nitentia, inferne dilutiora, terna pedunculis rotundis crassius, cubitalibus furculis inherent. Venulz quae e media majori erumpentes in refta duntaxat parts vifiuntur, in se invicem revolutae fupinam fuperficiem frianc, asperitateni diuSto modo caulantss; faporis expercia. Longiore derifoque è ratno, iupra foliace Drum exJurgente, petiolis Ipiffis, lesqui ferè unialibus, panimper dmentofo plures alcerni proveniunt *fores*, papilionacei, grandiuiculi, tetrapetali, colonis coucinei, *Muricu* adeb fimiles ut cetera exindepeti queant: odor ipds auris. Calycis verp quinque cupidati petiolus partim tomento/us est. *Siliquae* permagna fphamam longa; tres pollices latae, nervis eminentibus, multis pilis dum adhuc virent decumbentibus obfitae, lateribus paene contiguas, perplans, cortice interiore cartilagineo, candido funt, oioere subacri. Harum in veitice una valde compressa ac complana reperitur/^^ cDrice tenui, rubro, pulpa in duas se dividente partes, alba: maturis feminibus filiquz rubent, quae priusquam faba confpicitur in justam excrefcunt magnitudinem. Faba folitariar magna: mdula filiquae perdulcis est faporis, graveolens.

Crefcit in *Cran^anron^ BzUanga*, mulcifque aliis Malabarici regni tam montanis, quam apricis locis copiosa frondens. Bimula flores Septembri & Octobri; fructus Januario fequentibus fert mensibus. Quadragenaria empritur. Aft xami terra impositi confcitim radicanur. Lignum gc folia gentilium caeremoniis inferviunt. In pulvefem redacti fructus aflumpti lumbncos enecant j cortex eo modo cumzinzibere xfiuiatu, exhibetur in morfii viperino.

CAP. VII.

De Anagyride ^ Lahurno.

Anagyris, diffum putant a natali (bio, uC Anagyrum pro frutice non fecus fumamus, quam Anticyram pro Hellebore. Stephanus ^ m^Kiw Anagyrum locum esse aic in Attica, qui adtribump'ertineatErechtheidem. Duplex est, non foetida, quz Laburnum Plinii putatur, & cEtenskuveraDiofcoridi5. Foliis in e3dem pediculo ternis * floribus & c filiquis in oblongo pendulis ab hujus generis aliis diffinguitur.

- I. *Anagyris non fattida major, vel Alpina* C. B. *Anagyris* Ger. *Laburnum arbor trifolia. Anagyridi fimilis* J. B. *Anagyris non foetida, fivz Laburnum majus* Park. 3&eam^ttCfPl^ttBr not (tintting*)

J.B.

Arboris mediocris magnitudinem affequitur, ramis brachiatum, cortice virente, ma Eerie, dura ut suffici palis ex ea confectis agros fuos sepiant. *Folia* ex uno ruberculo plura Tnfolii Aphahii/inferne subhirsuta K. ex vioro pallida fuperc glabra, fetifque faturo virose tincta, pedibus hirsutis, corac; longitudine varis, linciale ex pabularia. Partis ex eodem suberculo cum folijs aut in ramulorum extremis, aut è lateribus, in longa carvi tenui his tuafque Be incana ligula depWent, dodran-

G g g g g g g

dodrantalr, inrerduim breuiore, flavi, GenifleUa; floribus /mules, e foJiis quaternis, lupremo rdiquis rnltp majorc, Uto, Curium .reflexo, nigrore intus nonnihl maculoib; bina a iateribus, qnartum ro-fratnm, in quo apices crocet, complexu fiio coercent ; Omnibus hoc gtnm ftrirbut ^ttas flare pafilif rntceo iudmth, hujufwcAt ftrt fores fimt-

Laburnum Plinii videtur die hac arbor: nee obftat quod Pltnius florem loneitudie cubitalem efle lertbat, qua; in hac arborc palmi longitudinem nonexced.inr, ut objitic Mactfiolus; Nam fide digni reiqi.e herbaria: permit fc in monte Jura cubito bniores florum racemos vidifle referutn, ix trader. Camerariets.

Leni.

In montibus prope Geneva in, Salcva & Jura, (nque A1 pi bus Ss band ids obferravirmis. A'''io & Junio aut etiam Julio menhkis gram in raoaobns fpc&saio floret. Ex lemne facil* provenif.

Silyute Laburni, delcribente Solerio apud J. B. Pifonim hortenfium liliquis dtpHes funt, cotn-preffioi-es, fra<au contiimaces. In extremis, ac nonnunquam jitermediis ip^tiis concinecur Jtmn Lcntis magntudme^ex ktimdme fubrotimdum, ima parte, qtiaji% iue per petjolum hsrec, tantil-lum extavatam, renis priorus effigie, quod antequam matunieric viret, pofit matunratcm \arium, diu'iun Si ob favorem iplenditum eft, Vaaitioniis variegatis.

•1. Labmnum fpinofum Mam'ucmtvm foL Glytyrhiz^e, fitrt alba Bteyn. Prod.

3. Annuls ism fxtens minor CB, Laburnum minus Park.

Pramiemi, magnitudine excepta, peromnia furiieem cle aiunt. Stamm huic humilior. jFis*, nores, femina dimidio minora. Non modo non ingrati, fed nullms eit lire plama odoris.

J- Baulinusduci Labunia efle vix putat, led daas figuras unis Laburni apud Matthiokien, qai confudit Anagyndis hittonam cum Laburno: cum quo Sc ego lubens fenlifsem, fi non obicivaflem in Catalogo piantaram Hoiiti Lcydenfis a pei-itiffimo Botanico D- Pa»U Htrmattno ftnperrime edico lianc pro diftin&a ipecic propofitam.

4. Anj^-rh fatUi CB. Ger. Park. Vtra fxtija J.a @t(C ftnhins 95fait'twfofl.

T^Diirn finiiis frutex eft Aiborefcens. f Fruticofa ftrirK magis quam arbor eft, inquit M.uccl'iis, N.-j tartit;j wdimus tonfur.i putationitjue ooa&Afa, ad leg i tun a m arboris alntiKfinem crc/cere,] ra* mi* frsqaeotibus ltt:s donates, coaicc CinqmtClufms) ex vmdi nigricantej, materie palfida. Fc!<<t terni, obiong.i, a^nmijata, fiipei'ias vventia, informs aJbicantia, odore adeo gravi & tetro prxdita, potiffimum li terantur, ut tranfeuntibus fco ftetore caput or&nd.mt, in unius pedicLili uncialis cipw mlova. Ex foliorum iedibus & alis tiorex ex cilyce in quatuor lacinias fe&O, glauco &C velut ar-geateo anicant bmi, tern: .nit quaterni, obJongi, quatpor foliis conflantes, Geniftac fere atit Cvritt mo ioj i d'quorum {iiprepuni, quodque rdiqua inegit, breuius eft & mihitnc rHexum ut in •lim, colorc intense aureo, reiiquis pallefcenctibus, ♦ quorum finu apiculi plufcuii emicant Hori concolo-roi. Ftoi-ibus [iiccoiunc filujua: digit. jii longkud^w, poliicaii \rer6 latttudine, carrjlaginefe in q, tenia aut quaterna jtmnu, n istuis pluicollii liniilia, i-enis form.l, qua; initio albyw, dd rfeindo ucm>contrahunt tandem per maturitatem ex leo iigricant, ut apciffimni Diofcorides aiM^ju* dixerit, cum in eodem frutLilon beuc maturo ttes djfferentes colores confpiciuntUTj ut dtligenter notavit Clulius.

Tempus & Loca.

Floreit Maio & Junio menfibus, grato inter alios fices per (ylvzs ^edaciilo. Nos in riiti nctibus fupra Mcflanara, & alibi plaries rum in Siciia, turn etiam in Italia oWermimns. Clufius «i laxolo colle prope Arelatem urbem in Gallia, cum frequentem circa Hiipalin & alibi inHJfpania.

J. Ana\$Jris fztida aktrarmtdo folio CB. Anag. Crtika AClufi dverfti Honor. Beffi tpi-ad Cluf.

De hac J. Baubinus, Licet, inquit, Honorius Belli fe in Creta paffim, (ectis vms different em A-nagyryn ab ea quam hie delcribo ob(erv: i(re dicat, qua: lotundiora proterat folia j non tamen ob fola folia qua: parum variant, diverfam exitfimo facientiam, cum pmertirn exofus odor & facilitates a Veceribus huic adfcripta: eandem eili dare demontrent. Facilior etiam naturx lufus in folis quam in viribus.

Virti,

FoJia Anag^Tidis fcodiix trka & impofita tumores reprimunt: ficca inpaflbpotamenfes ac fit;cun-das movent, iietuni mortuum ejiciunt. Semen commanducatiim vomitiones movet, nee feiiisn tjn-tuni fed & folia, unanimi botanicorum confenfu.

Accidit interdum (inquit Hon. Belli) ut capra: 8£ oves in Creta fame vexattf hujus folia depa-cant, licet odoris lit ingratifitmi, & poftet ex ha rum lade caftuseonficiantir: quo fi forte ign.in:^s al:qub vlcatur aut lac bibat, fttatim exutentur turn vehementiffimi romitustum fluxui ventris: Et cum hot; tipillime accidat, multi in difenmen vita," veniunt, quam ob caulam frutex omnibus lit uxofas*

Quod Laburni floresapes non attingant, Plinius eitmq, fecici recentiores Botanici, affirmant. Sa-penimero aucem laburnum ob iigni duntiem & nigrorem proEbenovarwr, ex quo pulchre fiunt poctinum the. ex. J.B.

6_rh «fi^l» * *rbor hdiea inca*a & fm torofu Kayan J&*. Tlora Pawn H. M. C*:jffl
• H.M. " firi Tr, ^n *taii «*flft & T'' Oreh; Breyn. Prod. Tifw* Arbortfw f''» * f^d*
Arbor eft fruticofa, radice rufta - obf ^ «ntice, inodom, caudice fefq^pe m craffo. Julia Salicm effigiem habentia, ex objongo anguJb) qu'inque ^ ^ ^ ^ ^ aa.k.lt.i, neiVIS B" »

ta> nutnēro terna, Vipolicaribus friatis etiam ē furculis breviffimis ^{pediculis dependent, fupercne le-} nia, ē viridi fufca, infernē hyalina, odore fimul 3c guftu haud inerara ^{in extremi-} tatibus furculorum, propē fo Wum exortutu expullulantium ermiDutif

quorum unum adunoutn, -venis ffnatum lateribus albicamibus & t r £ i L i s r T M ^ A P ^ A
 mediu orx leviter Gnuatum exi/hr. Duoi eretfa, oblouga, tfava fqJloJa prope Jam. tncuAwuu
 circumpleEtuntur. Stileis hamato mcumbens folio, candidusinnovemfiainenra.,croceisapicibus do-
 nata, divifus, ftamine quod filamentum flavo capite ornatum tranfmktit crocea gemma nodulato"
 obtegitur. Eorumcalixenofushirfutufque, odor autem nulluseft. Succrefcentes floribus filiyuj,
 dīgirum auricularem toto longitudine, tum craffine unobabre, pilofa, ruculis intertextis, ē vniōi
 dūnce sunt, cortis; fububro, cartilagineo, uti expanditur eraspirente, multis venulis intertextis.
 His includuntur quacuo rija, cartilagineo interiepiementis a le mutuo mitincia, immatura virentia,
 glabra, nitentia, matura rubentia, quxdam ex albido flaventia, fitum tranfrerfum obtntentia, in edua
 lia ob gratum faporem relata, quinimo propterea in agris pinguioribus fedulo excoluntur, & ubivis
 venalia exponuntur.

Leguntur menfejanuario. Fnitex ipfe/emper frondens brevi emoritur. Frdi.
 Apozeia ex foliis aflumptum haemorrhoidum fluxum nimis copiofum retardat. Cum Pipere con- Vler
 trita folia gingivarum immunditiem, dentium tollunt dolorem. Decofta in-Oryzx.lotura femina &c
 cum butyro in linimentum redacta fpontaneam ac dolorofam artuum propulfant laffitudinem. Para-
 tur infuper ex iis quoqus falubris contra variolas potio.
 Hxc Planta crevit hoc anno 1687. in Horto DJJoedy.

C A B . VII.

*Cytifus fpmfm Acacia dicit**. *Acacia trifolia C. B. altera trifolia Ger. fecunda Ky alter** *DioCcon*
</>Park. Affalathm fecunda trifoha, cpue, Acatia fecunda Matthiolo trifolia J.B.

T T T U n c f m Q e m H o n . Bdli fie defcribit, pro Afpalatho fecundd Diofcor. vero & legitimo,
 . — 1 qmque in tota Graccia nomen adhuc retinet. Ligni materies alba, duriffima Sc gravk
 . *. . * . eft; medium autem ligni mgrefcit, odore carens: flores habet luteos, Geniftsamulos,
 parutu odoratos: vento autem lpirante eorum odor fans fuavis manē longius percipitur, fuccedunt
 parvae filiquain quibus tria quatuorve femina continentur. Folia Rute fimihafunt, terna fimul
 juncta, licet aestate ipfa amittat ut Autumno aliis induatur. Spinis totus frutex fcetet, validis, du-
 arum triiinne unciarum, quarum nonnullae bifidac aut trifida?, friatae, reliquoque ramo contlores
 quarumq, non commiffuris modo, led ipfimet etiam medietati ex longiufculis pediculis folia harent*
 trifolia, exigua quadam ac vix quidem confpicua hirlude pubekentia. Radke nititur firma lisno
 fe, odoris experte.

In Creta ex hoc fepes comiciunt, totaeque hylvae ex eo confitare fpeftantur. Vere Lobelius univer- Lob.
 fum Tyrrhenum, Ligufticum atque Mediterraneum littus, uti pleraque Italia loca hoc fruticē ftatere
 fenbit. Eundem eciam in Sicilia circa Meffanam, & Gallo-provincia prope Tolonam portum obfer-
 vavimus.

Potuiſſet hsc planta Cytifis annumerari, cum quibus in omnibus praeterquam lpinis Convenit.

C A P . IX.

Cytifus adulterine five Alyffon frutkans Ger. Cytifi facie quibusdam Alyffon fruticam Park Crti/I
facie Alyffon fruticans qwrundam Lob. J. B. Pfwdo-cytifus fore Leucoi Inteo C. B.

Lob.
EXoticus hie frutex floribus luteis Leucoi minoris aiftate lucef, e fparfis, numerofis anfra-
 ftuofis Polemonii friatis cohculis. Folia Cytifi, habitiora, albida, hispida, fetaceis pilis ri-
 gida: Radiee lignola, duriore, & in folliculis lemene.

C A P . X:

De Genifta vulgari trifolia.

G A l e n f b u s f t u d i e l a p u t a t u r V e A A R e n u i n A r f l e x i l i s f i t , v e l I U O & g e t i u b u s m e d e a t u r
 Folds in eodem pediculo ternis, viminibus tenuibus angulofis confertis ab aliis filiquofis
 & flore papilionaceo doiatis plantis diftinguitur.

A. I. *Genifta angulofa trifolia J. R. angulofa & scoparia C. R. -mdgmi & fcoparia Park. Ger-*
nia Ger. et etiam Cham, genifta ejuſdem ex fententia C. Bauhino & J. B. P. fententia. fententia*
J. B.

Fruticosa fupra est, frequenter in magnam altitudinem elata, hominis
 dūm hūmilitate multo, c

angulofi, virentes, lent* & flesti nedique faciles, non rare quoque in alias divife, in *quibus folia crebra, hirtuta, priora Trifolii, alia fimplicia, acuminata. Flora fpeciofi, aurei aiiu flavi, Laburni, majotes, papihonacei, ftaminibus recurvis cum apicibus croceis. Silica compreffij laræ, nigra?, hifutar, in quibus femem Coluxex veficari^, fiifcum, comprdlum lucidum [alibi femem planum, durum, fubrufTurrj Lente minus eiattribuit.] Radix multifida, nervofa, lenta, flexilis^ lutea**

Genifta flor c albo Rara apud nos avis eft, nigroque fimillima cygno.

Locus 0
Tempui

Per univerfam fere Germaniam, Galliam, Angliam atque Belgium in paucis, przfertim arenofis, glareofis & fterilibus frequentiffima habetur. Sponte nafcentis (quod mirum!) nulla veftigia obfervare potuit Clufius in Pannonia & Bohemia, neque tota Auftna Sc Moravja. Floret circa finem Aprilis 8c inicio Mail, & inrcrdum Terns pro veris temperie.

Vires.

De viribus Genifta: fie breviter Schroderus. Genifta vulgaris fplenetica & nephritica cenfetar, hinc & hepatica. Calculum pellit, ierosos humores educit, tam per vomitum, quam per alvum & c urinas. Hinc ufus e'us infignis in obftruffionibus epatis, Jienis & melenterii, adeoque in Hydrope, catarrhe & arthriticis affectibus. In ufu June flores, kmia & fummirates. .

Folia, ramuli & fimmitates Genilk, cofta in vino aut aqua, ebrumve ffaccus utilia funt hydropticis, & omnibus obftruffionibus renum ac veficae; partim enim purgant omnes ferofa^ & aquofos ac fupcrfluos humores per alvum, partim per urinas. Eadem prarftat femem, fumptum circiter pot-dre drachmae unius *Dod.* Purgat Geniftz /emen non minus potenter fere quam Spartium aut Helleboris J] [J. pondere ex hydro melire ventriculo jejuno fumpcum. Quare ejus magnus eft ufus hodie contra Podagram. *Matth.* Idem confirmat Lobeliu?, femine Geniffis icopairix vomitum non fecus ac Spartio Diofc. fepius ^ij decocto propuiato citra magnam contentionem fe moviffe fcnben5. Verum flores receens decerptos iaepiffime qnamplurimos & per fe acetariis inditos vorxt (inquit) plcbecula Arverna & Aquicanix maxima copia innocuos non modo fed etiam admodum gultui /iavcs; nec quicquam vomkionis nauieave, aut tomotionis movere fbent. Quin apud Brabantos^ & Anglos non minus gsmmantes dum adhuc virides iint condiuntur (ale & aceto flr> i'CS, menlifque inferuntur, Capparum Oleardmve pari commendations. Creduntur eniri non modo cordi vires, ac ftomacho appetitum augere, fed etiam obftruibones referare ac calculum frangere. Idcirco falluntur falluntque qui hocce flores Officinis vomicioni ciend^e ficcandos prsci-

picant.

Hinc patet divertis partes ejufdem plants diverfis imò plane contrariis facukatibus pollere. Eadem differencia obfervatur inter Betonix radices, ejiilque folia & flores, ut in ejus hiftoria monuimus. E contra Lapathi femem alvum obftruit, folia fubducunt.

Eleftuarium florum Geniftic pulverifac. & melle rofato except, ad fcrophulas expertum, fi eo quis uratur continué *D. Hulfe* c MS nondum edito. Ego non multum auxilii inde expeftem.

Pulvis feminum cum hydromelice exhibitus in bene tumido^ hydrope, iaerO utroque ~~habet~~

pc 7at.

Aratur ex Genifta ramulorum ac virgultorum aridorum K combuftorum cinere cum vino tenui albo lixivium quod ad cachexiam & C Leucophlegmatiam a nonnullis valde celebratur, & potenter oiudem anufos fe ferofos humores cum urina per veficam expellit. *Ham.* Ego non multo plus n w u w i i i ^ u ^ m > ^ b alcerius cujufcunq; francis.

fperemabhoclixio^o^m^a^ ^ ^ ^ Hofmannus, f i Germanica intdligatur.

Verum ~~de~~ ^{fmine} J, fdeiTi fcimus habere quidem *wWyn*; fed non quale Helleborus, ~~ve-~~ TM ut TM n h a n u s, Oleum, Ficus Be alia talia, & c quidem in tnpla aut quadrupla dofi, quis non ftatum ~~de~~ ^{mpl} illa encomia quæ Geniftx noftrati ab ignaris dantur. Idem dicit de virgarum TM 0 Summit fe libenter abftinere ait a Genifta^ quia omnia quæ fcribuntur incerta & dubk ~~habet~~, ygc^ in nos ci non penitus aftenimur, cum qua: de fummitatibus & feminibus traduntur tot ~~habet~~ raves Be fide dignos autores habeant: nec putamus Italicam Geniftam tantum preftare Germani-Zx quantum Ille valc; imp vix omnino praftare 'cathartic* facultatis reftedu crediderim.

Genifta Arabica, *quæ* a noftra diverfa, planities ad montem Sinai obfite funt, qua? etiam in Arabia fbilitudinibus nafcitur. *Bellon. obf.* Sed quid? (inquit C. Bauhinus) qui hanc qultam fuam Gemfts non fpinofe fpeciem facit.

1. trifol'imm fruUx Genifta folio J. B.

E^cãlia allatus ell quern defcripfit J. Bauhinus hujus Plantac cubitalis ramus, Genifta: facie, ftrjatus, fungofus, in alas alterno pofitu divifus, quarum commiffuris folia harrentj ima parte trifoli*j extrema iingulana, Gemftae apprimc fimilia. . Ramorum extremis veluti fpcfaticm, fed majore pofitu, ftofcolorum capicula^ ex longiuftulis pedicellis alternatim hrent, flava Cui ficca oftendit) o^ longa, ad quorum infertionem minuriffima foliola adnafcuntur.

CAP. XL

De Geni/la hitmil'u

- i. *Cbamagmifta foliis Genift* vulgaris* C. B. *Cbamagemjta Pamomca* Park. *Cbama&ni/la* G. cl.
Gzniftida filofa J. B.

Cuffi ut exeft cubitalis Be bicubitalis, radice longa, oblique ferpente, fibris aliquoC donata. Vu
mint habet lenta, tenuia, teretia, in mukos ramulos angulofos, friatos divifa, per terrain
k^J ut plurimum fe fpargentia. *Folia* * admodum exigua, inferius lanugine cana pubefcentia
fli p™ glabra. *Fhrzs* ad ramulorum latera multi; crocei, ex hirtuto calyculo. Afpalathi Mon-
fpehenfis, yd geni/ta: vulgans forma Be odore, ied multo minores, exterius pilofi, intus elabri.
Succedunt *filiqua* parvz, unciales, Jatiufcul^ hirtuffc, in quibus plura *ftmina*. [Cytifi generibus fi-
milia C/4.]

In ducatu WiitembergicD &c alibi in Germania: nediDft in multis PamiDhi* Idc is ad viarum *Locus* 5
& fylvarum margis editis, fkcis atque defertis. *Jm* B. *Cluf*. Plunbus etiam in Jouis *Garrives* di
ttis prDp^ Monipelum CD^IDSC nalcuur. B^». Afow^ Floret Maio, yuandoque eciam Aprih.
Val E. Bauhinus ex una fpecie duas facit, cum Geniftata minimam Legd. fub titulo Genifta ra-
mofa foliis Hyperici proponit, & feparat a Geniftella Pannonica T. b. cui tinolum facit Chamag-
genifta foliis Genifta vulgaris; vel J. Bauhinus duas fpecies confundit, & ad idem caput reducit.

- A. i- *Gtniftzlla tinBoria* Gsr. *Gemfia tinUorla Germanica* C. B: *tinfforia vulgaris* Park:
Tintorius flos J. B. 45^) tteetl 0? Kjeirtf toCcb, Oj U^ & tunc.

E r^c? lignola^ per terrain plurimum diffufaj denfa viminum feget fruticat, tenuium, cubi-
taliu Be longioruiij teretium, quibus alternatim adnafcuntur *folia* HyfTopi, majora, interdum
paria^ fupra infraque atrovirentia, fatuo lentore mdndentis os implentia. *flows* in thyrfis lutei,
Genifta: angubfa: fimiles, verum minores 5c nonnihil pallidiores: quorum fingulis appofite *Jili-*
qua unciam longSj latifcula!, glabr^ in quibus mulca /ew/H^parva.

In pacuis nimis frequens eftj fiquidera vaccarum eam depafcentium lac amarace inficit, unde
& butyrum &c cafeus ex eo ftdta amarefcunt.

Herba ejulve HDS lucem vel flavum colorem pr^bet, Grafto autem fuperindufta viridem efficit.

Solent enim pittores ex caeruleo Sc luteo fimul contritjs viridem efficere coloren-

Variat foliis latioribus & anguftioribus, ramulis modò ereftis, mod5 procumbentibus.

Ut forma Be temperamento Genifts fimilis^eftj fie facultatibus haud dubie sidem relpondet.

3- *Genift* tintoria latifolia Lucenfis* } B-

J. B.

Hoc nomine exhibita ab Agerio, in montibus Lucenfibus collefta, furculo eft lignofo, defu-
friato, nodulis ab ima prsfertim parte CDntorto. C^uem ad intermedia mox alii ftipant minifw,
latis numcrofi. *Folia* quam in vulgari tintoria difta multb latiora, molliora, brevioraque, altern-
natim pofita, vinda, & averfa parts fubcinericea, per ambitum leviter hirtuta, nervo infeni per
medium excurrente. J/wluteus, hians more reliquarum. In ficca nullus guftu* notabiJis.

4. *Qenifta tin&oria Hijpank** Park, *tintoria frutescens foliis incanis* C. B. *Geniftella tintori** Hi-
spanica J. B. *infeforia* Ger.

Cluf.

Ad duorum cubitorum altitudinem crefcit interdum hie frutex, nudo ftipltBj enadi, recto, di-
gitali craffitudine, candicante cortice teftoj qui in multiplier brevesque ramulos tenellos 5c fragi-
les fumma parte dividitur. HDS ornant *folia* Lini aut Thymelzx, frequentia, fuperne virentia,
inferne verbincana Be argentei plane fplendoris; guftus initio exiccantis S: nonnihil adfringentis^
deinde fubamari. *Flores* fummis ramuhs nafcuntur, fpicatum congefti, Genifts tintoriz Germa-
liics fimileSj lutei. Tuta planta elegans eft: appettn.

Qpo tempore floret fub ea crefcit Harmodori quoddam genus elegans, pedalis altitudinis, bra-
chialis interdum craffitudinis, multis ftofibus a media feapo ad fumum ufque exornatum, mag-
nis, oblongis, luteis, extrema parte hiantibus, 6c in quinque partes divifis. Totum humidum eftj
pingui oJeaginDsaque materia turget.

Nulquam hujus fruticem confpexit Clufius quam Murciano regno fecundum vjas nafcentem, &c
Martio menfb florentem. Nos in monnbus fylvofis fupra Neapolin Italia: versus Camaldulenum
ccenobium obfervavimus.

Hunc fructum quamvis elatior fit quam ut humilis dici debeat, quia tamen Geniftells tintfo-
Te fimilis cJt, hie locum habere permiffimus.

5. *Geniftella montana* Germahica Park, *lagepodoids major* Ger. *herbacea, foe Chamafpartium* I B
*Cbamagentfia fagittal** C. B. >r '»» y o,

J. B.

Herba eft pdtius lignofa quam frutex, rarb cubitum excedens. Ramuli molles hirturi *Ambu**
^fbrus ktis mllbus ornati, internodiis velut, diitina,; ae ad fogula internodLS. unut
oblongum, obtufum, pilofum, fine pedtculo, majus quam in anguloia, nee triplex ut in ea. In
yngamm Rimmitate *flares* parvi, lutei, hiantes, fpicam Fere efficientes, quibus fuccedunt *MW**
pilox. *Radix* lignola, cubltalis, in aliquot portiones magnas diviGi,

Locus. Clufio piano est p&que altero ex altero nascente folio, quod deinde in cauliculi convertitur. In paucis Germanic ftenlioibus abunde provenit multis in locis : item circa Genevam.

6. *GtmftitU pinnata altzra Hispanica Park. GtniftlapinnataGzr. herbacca flatyphyllos].Jl. C&magimfta caule foliato C. B-*

Chf.

Chamargenita peregrina *Ulf.* vix paltuari magnitudine aflurgit, admodum tamen fruticosa, foliis Ch;ima:lac2 proximis, brevidfibus duris Be carnofisj aliquantulum in ambitu finuofis & t crispis, rigjdiufbulirqLiej uno ex altero e media Foliis nervo prodeunte quemadmodum in fuperiorsj interdum etiam binis ternifre fimul exorientibus: hic vero nervus paulatim intumefcit, & in ramuiuin convertitur; fie cum tota planta foliofa fit, Be nonnifi foliis confans videatur, fit tandem adinodum fruciofa- In extremis iitis foliis quini fenive aut pluirzs Flores, fimul junfti ex vilbfs calyculis nascentur, minores quam in Genifta, aurei plane colorisj nisi bina inferiora folia incana Janugine pubefcerent.

Defcriptio J.Bauhini nonnihil variat a Clufiana, quam vide apud ipfium-

Locus. Ghamargeni/lam peregrinam in fblis Valentini regni locis incukis & alperis florcentem obfervavit Cluiius mens Alartio.

7. *Chamagenifta Crttica C B. Park:*

Haec virgulis est palmo minoribus, humi diffusis, tenuibus, rotundis, fibricanis, in ramulos alii quoc duarum triumve unciarum divifis: foliolis oblongis angustiflimis., binis aut ternis ab eodem exortu, led altero icniper longiore prodeuntibusj incanis. Ex foliorum alis flosculi terni aut quaternij parvi, lutei, Genifta: rioribus armuli. Siliquas non vidit descriptionis autor C. B.

E Conrarenii horto habuit. Parkinsonus hanc habet pro Spartio Cretico Alpini

Hic addit C Bauhinus

b. *Uhamageniftam folio articulato, i. e. thamapartium Narbonense Tab.*

9. *Lhapitf]remflain mntanam bifpidam, i. e. Genifi* minorh fpectemTab.*

CAP. XII.

De Spartiv twm spinvfo.

1. *Genifta Hispanica Ger. juncea J. B. Spartum Hispanicum fruUx vulgar* Park. Spartium arr borefcns fminibus Lenti Jimilibus Cfi. J&Dailifi)2320)111»*

7. B.

FVRUCSX est ad quatuor vel quinque cubitorum altitudinem excrefcens, interdum minor. Vmina juncea, teretia, obfequiofaj viridantia; per quz dum floret & C novella adhuc planta est, fparfa Hint rara quzdam folia, decidua., oblonga, ramis concoloria fere. Flores invirgulariini lummitatibus multi, lutei magnij alpeftu kto, fidnbus fimiles Pifbrum & Cicercularum, guftu dulces. Floribus liicedunt. fliqua iirrefta., uncias quatuor vel quinque longar, comprefse aliquanrulum incurve, col Dre fere Caftan eqr. In iis ad ia circiter fzm'ma, vel pauciora^ comprefia, rubentia, lucida, Lente minora, non ita circinata. Lentem potius referunt quam Ervum aut Viciam, quicquid fcribit. Matthiolus. Sapor leguminofis quails pi(brum.

Hanc plantam Diofcoridis Spamuni elle Botanici peritiores confentiunt. Nee obftat quod Diofeorides 5partii vijgas *pu^< esse fcribat: nam quiamvis in hac primo exortu raris quibusdam foliis veftitx fint, ea tamen brevi decidum, ut maximam partem Foliis vidua cernatur.

Cxteriini ad Spartium Diofcoridis Plinii Geniftam omnino referendam elle existimat J. Bauhinus.

Locus. Inralia, Sicilia & C Gallia Narbonenfi vulgatiffima est. In hortis nostris ex Temine facile provenit, nee mulram curam aut culcuram exigir, vcrum celeri auftu ad frugem brevi pervenit.

plurib Vinbu5 cum Genifta vulgari convenit, qua tamen efficacior est. Pituitam Bi ferofbs hum ores vomitu Be dejectione valenter expurgat, unde hydropic^ lichiadicis^ arthriticis opitulatur, urinam movet, Be calculum in rebus frangir.

Hujus etiam flores, autore Diofcoride, cum aqua multa obolorum quinque pondere poti romitiones faciunt: Cum tamen Geniffce vulgaris flores plenis difcis multi in acetariis ex mnl¹⁰ oleo vorent^ nee quicquam naufeent. Oleum e flonbus extnnfecus illum lienis tumores ric. Flores quoque ciun melle rofato aut ovo ftrumas refolvunt

1- *Spartium Hispanicum lob is rot undiufcults, florz luteo]m B. alter urn monofpermon femine r&»' j&li C. B. Hifpamcum minus, mmofttrmm^ flore luUo Park Vzudoffartium H*IP^{mm}*

Chf.

Cubitali pkrumque ftipite alTurgit, pollicem craflb, fcabro K ftriato cortice redto, qui in pldr< cubital^ Virejll'es k JtriatDS ramo5 iiviclitiir, fie hi deinde in j u n m ftriata, virides virgulo- hs, pMijjwdUadlBic & primum germ.nains aliqimt foliis cxoinantur, Ljaonl T² P^{ant} fl^o

dicob, c quibus dependent aliquoT Bovifru, Glycynh:^ vuJsaris auc TnfiJu piatsntoflAJ

pa^mè finiiles, lutei, inodori. Succedim^t cartilaginei, ro^cundiulculi *lobi*, vulgari Fabse, qua^d in jumentorum pabulum cedic perfimiles, ex flavo rufescentes; in quibus unicum maxima ex parte *femen* (ra^ro bina) concinetur, durum, nigrum, exiguo reni fimile, quod in lobis agitatis aufconculis crepitat & -fonitum edit. *Radix dm** & lignosa.

Vanis Castelk utriusque locis crefcit, arenofofolo, & Maio floret: Semen maturum est limb. ^{Locus & Tempus,}

^{%4} *Spartium Hiffafticum flore candido* J. B. *Hifpankum majus fare albo* Park, *tertium fore albo* C. B. *Ffhtdo-fpartium album t!* <pvM.w Ger.

Cluf.

Praecedente longè majus est, & hominis altitudinem fiiprans, *virgulis* qua^m illius tenerioribus, lentionibus & magis obfequentibus, *flare* ejufdè^m cum fuperiore format fed paulb majors 6c omnino albo: lobi etiam conveniunt, fed minores funt & c minus *femen* continent.

Gadibus duntaxat & locis vicinis aurà marina^m perflatis Clufio conl[^]edlum est, arenolb 6c fteri- ^{Locus* @ Ternpw*}

D. Hermannus hanc fpecièm pro praecedentis tantum varietate habet. *Horu Lugd. Eau*

4. *Gtniflte Hiffanica affinis* C. B. *Pfeudo-fpartium Hiffancum* Park.

C. B. prod. . . "

Suffrutex est cubitum fuperans, *cauk t[^]nui*, tereti, candicante cortice tecio, quim plurimas>virgas tenuiffimas dividitur: quarum aliqua; palmum fiiperant, alis minores lunt: circa qu[^] *folia* longiufcula, anguftiffima & rariffimaj ita ut virgac p^{*nè} nudae appareant. Summis virgis fliigulis unicum capitulum rotundum[^] villofum, molle infidel ut in Caryophyllo maritimOj ex pluribus *floribus* Geniftellx tinctoris forma, fed minoribus, pallidè luteis compofitum. Nam quilibet flos ex calyculo villofb, hirtutic albo prodic.

In montibus planè faxofis ad aguas blancas D. Albinus collegit.

~~5. *Spartium*~~ *triphylon* C. B. *Chamajpartum montanum triphylon* Park. *Gtnifta radiata five fiella-*
**ris* J. B. *An Spartum minimum montanum trMyllon* Col?

J. B.

~~Publica est planta, ramosa: Caulis latus in tres dividitur ramos, hi rursum in alios bcs, aut ter, aut quater, fempit^r ceteris: uterinodis duas utricias longa: fides ad unumquodque periclitum lex Verticillatim, caulis circumcompofita, ut in Gallis vel Aparine, faciora quàm Gallis & molliora, incalialia, hirtuta, uti tota planta. In vicinum valdè teneriorum angulo fortitudo^m convenit: *flares* densi Geniftarunij, eo ordine quo in Anrhyllide leguminofa, lutei (i rectè memini. . .~~

Spartium fuum minimum triphylon fie defcribit Columna, Frutex est ampins, ~~Æ~~ quicolorum nioacibus *Cornino* faxofis, nudis devexis, in imo lignofusj jnnumeris alis divifus, cornam conficiens rotundam. Caules primam juncei velut Juncr folia, qui deinde lignofi, ftriati, flavefcetes ex viridi fiunt. E fummo vero tnbus geniculis virefcetes, acque lanugine alba obfiti atque ftriati • fingulis vero geniculis ab aut auqculx hairent craffa; dura; in imo nudx, lignofe; ex quibus cùrti tenerior eflk anno priore planta foliola terna, utrinque admodum tenuia, albicantia, ac veluci capillaria, Abfotam maris minora producebantur, ficuti in plants cacumine confpiciuntur. Alarum verb fiimmum aut acutum est[^] aut in minima foliola definit; aut capitula quatuor vel quinque fimul congefta, in quibus *flares* lutei Sparto & C Geniftac fimiles ex utriculis parum hirtutis minut que luteis albicantibus, ad invicem oppofitis: quibus fiiboriuntui; ///[^] breves, unciar longitudine, hirtuta/ ex viridi albescentes, in acutum deiinentes gladii modo, parum convexo dorff circa: acietn, in quibus quatuor includuntur *femina* dependentia, coidis figura^m imicantia. Tota planta bicubitalis ad fumum, caudice crasfcete fruticis inftat.

6. *Genifta five ISpartium pttigans* J. B.

Duos ramos defcribit J. Bauhinus. Prior fetquicubitalis erat, firmus, rigidus ac penitus lignofus, cortice craffo amaricante, ligno interne albicante, in numerofam virgarum prolem temere ac nullo ordine divariacus. In virgarum extremis aculei quidam apparent. Totus porrò ramus virgultorum densb ftipatu Uvar niaunae adfiruillis quodammodo est, nili qudd nufpiam uno ex articulo gemini aut plures prodeant firculj. Ramoruni extremorum potiffimum geniculis *folia* hairent parva, angufta, cinericià quadam lanugine vtftita: lifdem quoque/orw ex longiuculis pedicellis[^] hairent lutei, Geniftae vulgaris.

Poftenor colored ramorum divifura[^] fimilis, verim qtiàm ilia fenticofior & ftrigofioiv, quippe numerofioribus ramulis veluti in fpinas definentibus, quar facilè rumpuntur, innumeris nodulis torofus, vix pedalis, incurvo ligno, Kc.

J. Bauhinus hanc Lobelia in *Adv.* defcriptam putat nomine Sparrii aphylli fruciofi junceis aculeis, lanatis capituh; qu^a Lobelius perperam pro Erinacea Clufii lubet. Condile J. Bauhinum.

7. *Spartium Cretkum* Alpin. exot.

«Planta est. procera, denhfijmè fruticans, furculofr; quippe ramulis à craffis Veluti caudigibus rotundisj vindibus, dense maculis parvis albis punctorum alborum modo mfeftis, nafcentibus loncis iubclilibus, furfum reft[^] aftis, flexilibus, rotundis, cortice viridi przdita. Hi deorfum ramulos nful² tos habent, utrinque inzqualibus mtervallis inordmatim pbftos, & in nmedio ramis foliifauc nudi¹ W*L & poft^{ea} fiifuni in fpinis dense fruticant. Folia, flores frfiliq^u Apfalathi funt

Tenera germina, flores & femina valenter per alvum 6c vomitum pituitam 6c ferofos humo- ^{Vires}
s gurgire dicuntur.

8. GenijfaarborsaCmtcafoHeferteto Zanoni.

In hoito Autoris Arbutifolia; forma adriam cubitorum altitudinem, trium quafisrve imcdaram craflitiem exci evitj *tsudict* ab imo ad lummum uJque ramofo, ramis raldii Jentis & flexilibuSj corrice Jcabro ferrigineo, Tenis iuteis obfcuris ftnatoj qmque facile a ligno abfcedit. Lignum cortice dc nudamm forisvinde apparet, inrus coloris paleacei. Rami in multos ramulos minorespariter lentos * & plicatiles varic dividuntur, & hi demum in furculos^//< plurimis vefitos, parvis, anguftis, oblongis, craflis & carnoisJ nullo online pofitis, cum margnibus reflexis, ut folia concha: formam imitari videanmr extremis tamen fibrotundis & retrorfiim reclinatis, m aculeum fbJidum & duruni, non tamenpungentem terminatis; knugthe infiperalbicante tegiuntur hae folia & ad bafinduasintsdum appendicacan audadas obrinenr. E foliomm ahs in lupremis ramuhs exeunt furculi nudi, lanupnofi *fora* m pctliculis bmo ordine e furculis exeuncibiis duo, cres, quatuojTe finral junftij flavi, valde exigui, odo: e admodum grato Geniftar acmuloj papiliomcei. Floribus delapijs refat in calice a i u w j ^ f perexigtu 8tbrevis, 6 fiavo mfcens, apiceacutOj unicum tantuimn fememcontincnSj rotnduirij planum, lucidum colore obtcuro. Sapor foliorum afringens, acidus & ex/cicans; florum fabas recentss refert. Planta eft perennis, foliis perpetuis.

Diftert autem itiultimodisa SpartioloAlpini, ut defciipdones conferenti pateblc.

CAP. XIII.

Gen'illa argentea J. B.

SJ.B. *Urctdo* hrec adofecit lignofo, multiplidj in multas alas tranfverfiis divifoj tereci, argenteo. Ad ramdoram exortpm *folia*, jhuerent fingularia, oblongaj angufta, argentea hirftitie obfita. *Fni'* Has furculorum mremodiis atque extremis hiret finih's Carpobalfimi Officinarum vulgans, cal yculo fol i a to con wntis, (pad icei<)loris, *coi* tico (its, in iii nimo apkul a acuta dona tus: in q *uojeme** concineturnKi-umi rocundumjrof^fenijnc tereevanidum [infieca quamdeicripi;tJ.Bauhjnus] ac proinde nulJo I... Itu digno praedit. Surculi & folia modice amaricant.

Vel bane, vjtci (imiem pi.intvr propeMonipdimn inplanirie quamtrajiiivimus cundo ab oppldulo S.Lupiani ad inonrem i.i.pi oblm-avimus

CAP. XIV.

, Dc Genifella fpitxj.

1. Gniſta acaltata Gr. P.v.k. atifkſta filuſa J. B. Jp'mefa minor Germanic* C.B.

HOrridus frntex eftGsnifteUa aculeate, GenifM trifolii artgulofa minor, denfls tamen ramis frnicam, in qwbus *fuli*.t il; f-ta .ilteir.o poiitu nafcuntur, Gcnifta; vulgaris formi ſcuminatt: M prater folia longis creberrimifque fpinis mtnacibus armatur, majorefijue ipinac minomm fobolemi infeſto rtiuciorjc pun gentium e lateribus pariudCj *Flora* lateij (picatij Gcnifta; tinctorj; vtllgaris *Simtn* in cxigiis nliqub. JRWx lenta & iiblutea.

Botanici noſtrates (Gerardus & Parkinſonus) plantam hanc cum Geniſta minore aſpalathoide inipaite confundunt.

In Gerniania patſim occurrit, prjlerrim in arenofis, feais vias, &c.

Adli.'ingentem cum amaritudine ficujtitem obtinet, ac promdc valcner & citra mordacitatetii exfecantem. b't ran in pauca contraham (inquit J. fiauhinus) idem GeiuJlella quod Hippuus poteſh

z. GniſteUa Jpinofa mentis Vmtofi J. B.

Fnitici hmc (aljus ramus palmaiis J. Bauhino darus) priorcs ramuli pliies, Alls uncias longi, fpitit jnntpei-inis ornatt alii Jongiores quatuor uncianim cirater, *fdii* luriutus, longiulcul^ &«*• ufculis, fed quanaftvukari genittellaipinofaaBgufrioribus.i'7w«infunimitacibus allquot.aurei, majores quam in prxdifta Genifra.

Si ha;c noil eft particularis Geniſta, certe egregia eft varietas.

5. Gniſida Mmfheliaca ſpinofa GB. prod. *Spinofa miner H\$4*»ic* viUafijſmia GB- pin.

¶ViWw eft paimaribusj in terram reflexis, quorum pars inferior In breviffimos ramulos ex-pa^ es dividitur, a incendio *verb* furfiim vilfofi funt^ quandoque in ramulos bra j... longis, vntibus /i... minonbus fepe additis, vefiti, fpinifquearentei Sumirutanbui isjiuula; vulgari finules, mfident

T?ff: l orrudam ^... "5"V", F nwnntis Lupi^ copioiorem vidimus ultra montem *i... »i...

jimilew

Simibm fed per omnia majoren, cauibus pedalibus, Foliis rarioribus, fpinis longioribus, minufqus pungentibus, fribus majoribus Be aureis, quafi in fpica dilpoicis. Ex Hifpania habemus, inquit C. Bauhinus.

C A P. XV.

De Genifla fpinofajeu Scorpio.

A I- Genifla JpinoJ0 Vulgaris Ger. emac. (pinofa major longtoribus aculeis C.T&. fpino[a major <uulgaris> feu Scorpius Theopbrafi, 'quem Gaz,a Nepam tranfultit. Park. Gmi(tdlec Jpinojue affinis Neya imbufdam J. B. flit?, 3Ef)in0 P? <00?t^

Cluf.

CUbitali aut ampliore [fiipra Burdegalam Bayonenfi itinere tanta altitudinis aflirgit, ut duorum hominum altitudinism aequarenonnunquam videritrij craflmdine verò brachium humanum Cluf parem etiam in Anglia fi permittatur ftaturam & magnitudinem afflequitur.] altitudine aflirgit, mulcis virgis ex atro virentibus, friatis, denfiffimo Ipinarum vallo obfitis fruticosum. [Ramuliadso conferci funt, & Ipinz denfe, ut to turn caudicem &c ramos concegan^ Be vix lumen ipfum nedum oculi aciem tranfinittanc] Spinxaudem robufta: fatis, vindantes, ftnatx, glabra^ fxpiusj aliàs pib brevi obfitEj nova fpinarum minorum e latsribus egredientium fobole fiEcund^ fo//^ nulla nifiprimovere apparent, brevi detidua. Flares Geniftx minores, pallidly interdum tamen adeb rufefcentes utrubere videantur^prsfertim lub Autumnum:*5/%>^deinde fuccedunt breves, cylindracea^tnagna ex partz inanes^liquandotamenferentes exiguum/ew^paUidum autliibufcum uc Genifla vulgaris S^pt^ntrionalium. Radix fingularisin alias tenuesfe ipargnSj SC interdum late le propagans.

Non defituitur foliis hie frutex, nee fpinam pro foliD habet, ut nonnulli exiftimãrunt, fed vera folia emittit in furculis cenellij parva^ exrotundo acuminata, interdum longiora Sc anguftiora, fiipernè ex cinereo viridia, fubtus argentea aut incana, quæ brevi decidunt. Floret Maio Be deinceps per totam æftatem ad Autumnum Be Hyemem ufque-

In Anglia bcis incultis, arenofis, fqualidis Be fterilibus frequentiffima eft, nee minùs in Belgio, Gallia ScGermania. Quin 8c in Gallo-provinda regions zftuofa ip(illimumhunc fruticem obiervavi, Ulus hujus eft ad fepes, & exfittatx adornaces cabfaciendos.

i. Genifla Jpinofa arborefcens Africana Bartholin. Aft. MeJ. An. 1675. "

A PromontoriDBons Spei Hafniam allata eft h. D.StoUe cum aliis multis quarum figuras ibidem exhibet Bartholinus.

3. Genifla (pinofafloribus rubris D. Wheeleri Itimrar* p.Ji.

4. Gtnifla finofa major brevibts acuhis C.B.

^ T Non videtur nobis a præcedentè (pecie differre, Otfervavimus equidem in Anglia Scorpii vadètatem priore humiliorè* fpinis brevioribusj tenuioribus^ pallidius virentibus, non tamen minùs crebrisj quæ fub Aucumnum prædpue floret, quando prior maxim am jam partem florcre defuit: verùril cum noverim quot eademplanta pro loci diverfitate alnlque accidentibus fades induar, hancab ilia Ipecie diverlarft efle aflerere non aufim. Utcunque five fpecie diffrantj five non, H8c eadem omnino eft Scorpio minoriin Gallo-provincianafcenti, hoc eft Geniftz fpinoæ majori brevibus acule- 15 C. B. nee enim ullam ego, qui utramqus in loco natali florentem vidi, differenciam obfervara

PD:01.

Scorpium (Ive Nepam Anguillar^ hujus Synonymam facit CBauhinus; verumfloris toler 1000 convenit. V. J.B.

C A P. XVI

De Affalatho, E& varih Spartii & Genifla & fphofa fpecie&us.

1. Affralathus x. Monfclimfis J.B. alter MonfjthnfisVzck. Genifla-jpartium Jfrinofum majjofloti lutw C. B.

Uluf.

TOTA planta cubitum non excedit, fruticofa admodum & ramosa, molis horrens fpinis deorfum induratis, firmis, acutis, in quibus enofcuntur pullilla folia Lentis magnitudinis, viridja; molis ramosa, fceda, in quibus enofcuntur pullilla folia Lentis magnitudinis, viridja; f/orw in fiimiDribus Be rigidioribus fpiniscerni, quaterni aut plures fimul nafcuntur, Gtoidibz fimiles, rjinoiesj colonis nunc lutei, nuncpalbrcentis: Spw^inparvis/%<^ exiguum.

Affalathus fecunda nobis obfervata in aridis Be flenlibus faxohs collibus circa Monrpdium, Ne-mauffim Be alibi in Gallia Narbonenfi, planca erac bicubitalis, ut reftè J. Bauhinus: qui fribus ajorem Meliloti Dfficinarum afcribit, fagorem nullum manifeltum.

Floribus cum Saccharo fermentatis ad nrmandas Ce reftaurandas collapfas vires utuntur Salmanti-Cniw5. Luf.

I. AffA-

z. *Afpalatho Monfpelienſi affinis Scorpio** z. *Cluſio*]. B. *Gmifta-fpartiumfpnofumminm E-3. Park.*
Genifta (pinofa minor (iliqua rotunda Ger.

Cluf.

Pedisaltitudinem raro fuperat, totum denſiffimis fpinis horrenſij quæ non confufo ordinej, ut in fupenore [Genifta fpinofa feu Scorpio vulgari] nafcuntur, fed feriem quandam fervant, gtlmper contrario inter lè exDitubinae nafcuntur, yirentes quidem, fed languidius quàm fuperiois, neque alia: ex alijs. Summis ramulis inharrentj bini aut terni flores, fiipenori fimiles, lutei colon's, menſe Martio, quo tempore exiguas brevifquc//^^, vel potius femina Ervi nlagitudine, incluſa membranâ quadam multa incana quæ lanugine hirtuâ deprehendebam, denſiffimis ipſius plantarſpinis occultata, ut ex fupenore aftace deciderant: adeo vero canefcebant, ut inirio Araneaium telas effe exiftimabam. 2^^/xlingularis, fed in plures deinde propagines ſparſa, dura & lignoſa eſt.

Collibus Granac3c vicinis itirfere Cordubeni^ nee ufquam alibi Cluſio confpeſtum eſt hoc genus. Dubicat Cluſian ſie Echinopoda Cretica Hon. Belli; plurimum certè (inquit) ad illam acceders mihi videtur.

5. *Afpalathus alter fzctndus Qltifii Park. GeniHa-fpartium fpinofum ma jus 1; fiore paUido C.B.*

Cluf.

Afpalatho altero primo *Cluf.* robuſtius & aliquanto firmius eſt, nonnunquam alcius excreſcens: *Floj* > ip> tub pallidioreſtj alioquin ci non multum difſimilis.

4. *Afpalathus alter trt'wshirfutmV^x^ Abrotani faciè incana J.B. Geniſta-fpartium (pinofum majus tertium hirtutum C. B.*

Cluf.

Ad cubiti nQnnunquam tngitudinem accedit; plcrumque tamen minor eſt^ & pedalis tantum alcitudinisj Còtum etiam tenerius: ramuli in multò plures ſpinas diviſij iſtar denuoin alias, ſie ut ſingulæ ſpinac totidem Abrotani muhifida folia videantur, niſi aculei obſitterent, qui à negligentius incucnclis vix obſervantur. Vere ex ramuloruai lateribus ſxigui alii prodeunt ramulculi incani & hirtuci, quibus adnata funtmollia Bt incana Lentis/ofi^ major a quàm in primo gen ere : infummis illis ramufculb^or^j priori fimiles, & fore majores, lutei nafauntur.

In Cantabri5 duncaxatj tertio k victoria urbc millian, ad radices Pyrenæorum, quâ iHilpaniam ipeſtant., obſervavit Cluſius.

5. *Gmifta erinacea J. B. Erinacta Hiſpanka CluſiiPavk. Geniſta /pinofa humilis Ger. Geniſta-fpar*
 tmm fpinofum^ folijs Lenticula2 firvibus ex ctzruho purpurafantibus C. B.*

Cluf.

Planè nova 6c tota elegans eſt hzc pknta, dodrantalis, in orbem per folutn diffuſa, multis ſpinis virentibus, live aculeis horrida. Flores Geniſtar, ex cueruleo purpurafcentes, minores, calyculis incluſi hiſpidis, villoſis, omnino fere' in can is,, bini aut terni fimul ſemper conjun<ſti. *Foliola* interdum dum floret producit, fedraròj eacue pſrpaucj, Lencic=ulc: fimmH*, ^u^ cOlm brevi marceſcanc 5C decidant, tota planta maxima ex parts line folijs ſpeſtatur, & C multiplici ſpinarum vallo Erinaceum in iz convolutum reprxſentat. *Radix* lignoſa & C magna eſt pro planta: proportions.

Nafcitur regnoyalentino, affluenter auten circa *Siete Aguas* oppidulumj ſeptimo aburbe Valen* tiamilliaii, Madritiano itinere, aſperis locis & fecus vias. Aprili florentsm obſervavit Cluiius: Semen videre non potuit.

Inzote Erizv, hoc eſt Erinaceum vacant, ob rationem modo diſtam.

6. *Echinopoda Cretenſibus J.B. Ecbimopoda frutex Creticu* Park. Genijla-fpartwm fpnofum apbjhn
 alterum>trihm azuUú femper jmSu^flonſfs luteis C.B. An Scorpiw ſecundas Clui*

Bel.

Echinopoda (inquit HonDr. Bellus) vulgatiffima in Creta planta eſt, & multum cum Erinacea Cluii convenit, niſi quòd folijs caret, & flores luteDS profert^ totaque viridi colore cernitur in orbui diffuſa, U Erinaceum minim in modum multitudine (pinarum reprzſentans. Spinae terns fimul in ramulis nafcuntur. *Flares* in lummis ramulis proveniunt, non tamen plures fimul conferti, fed pauciores: quos apes nun quam attingunt.

Planta hzc non in Creta tantum fed SL in Chio infula K per totam Grzciam vulgatiffima eſt.

Falbtur (inquit H-Belli) Dalechampus Athenzi interpreſ, quòd per Echinopoda Cardui Chii genus intelligeret; cum ea revera fructicis genus fit non Cardui.

7. *Gmifta-fpartivrnſſinofum folijs Polijroni C.B. fpinofum Sjriacum Park, jigul & Almagi Ar*
 bibu5^ Planta ſpinofa Mannam reſipims J.B.*

7-B.

Frutex eſt cubitalis aut altior, denſiffimo ſpinarum acutiſſimarum, graciljum^flexiliumque K'P^a'' tu referus. Ex quibus plurimj pendent/fom rubelli: queis decidentibus fuccedunt *fili^ua* rubenjj quales in Scorpio Monfpelienſi me vidiffe memini, femine CDncolori farftar. Ex hac Hallep^ pL^noy um qno ddam Manna: genus legunt, cuiusgrana CoriandrDnoftromajora F^'^? *Be fapore* Manna; noftrz Lanecz perfimilia. Surculis porro infinitis propemodum d^* reretibus, 6c à trunco eleganti ordine hinc inde' iparſis, majori fere parte Cufcud DWUIS, velut in Thynio. Fdha ad Ipiurum exortum hxrent oblonga, Polygoni figura, cinerea. *Radix* lads Long*, purpurea.

Manna in hac arbuſcula i^enta *TtnnMim* aut *Tranyb'm* Arabibus dicitur.

Provcnit in Perſia flc circa Halepum : iccm circa *Kacka* urbem M^{le} potamic.

Folia ejus calida: iint ficc^{que} naturae. Florum ufus incolis ad purgandum; quibus fe purga- *Virtu*
turis manipulus unus ex aqua coctus in fingulas dofes fufficit.

8. *Spartum fūnofūm Creticum* Alpin. exot Park.

Alpin.

Stipite ligno aflurgit, nigricante cortice tefto, multos nigros ramos lpargente, m virgas junueas
fibtilesj nigrefcentes iterum diviJm, quibus in cacumine fpinac dura; nigrefcentes, triangular. In
liircolorum exortu folia in zv&zm exorcu quina[^] parva, tenuia. F/omluteijparvijSpartii Creticifi-
m&f, q u i o / % « ^ p a r v c fuccedunt.

9. *Spartium Jfūnofum faundum* Alpin. exot. ffūnofwn aliui *Creticum*. Park.

Alpin.

Ramos poffidet craftos, rotun dos[^]afperos. *Virga* vjpinas acutas/triangulos multos facientes defi-
nunt. *Folw* duplex or do. Ad exorrum furculorum ex ramis Spartii lunt familia, fed tenuiora, ex
uno exortu trina, quaterna vel quina, poft in virgis reftis utrinque crebra Tragacanthac modo, ufus
ad apices fere virgularum, quibus fubtiles, duræ Sc acutze fpinxuperfunt.

Nafciturin Crcta cum priore.

A. io- *Genifta minor a^aUthoidts feu¹ Geniftajpinofa Anglica* C.B. *Gznifteila minor* *Afpalathoides*
J.B. *Genifta aculeata* *Gsr. GtnifteBa acttkata* *Yzrk. ffi&bU flir? O? ©rttp J13[^]iIV*

Virgar cubitales 5c altiores, ramofi, cortice cinerco tefta: è radice exeunr. *Folia* glabraj glaftca in
furculis novdlis&vegetis parva[^] fibrotunda, Chamaefyces paria, in adultioribus aut vetuftioribus
plantis anguftiora Be acutiora. Ex alls foliorum egrediuntur aculei, foliis aliqūDt minufculis veftiti,
& ipfi interdum alias parvas fpinulas [duas aut tres] è latsribus emicntentes. *Flores* in lummis ramulis
velut fpicatif papilionacei[^] flavi, è lingulis foliorum alis finguli, quibus fuccedunt liliqux breves,
habiciores.

In ericetis K humidioribus folo fpongiolb frequens occurrit.

CAP. XVII.

Arhorei E¹ *Frutices nonnullos exoticos* *Genifta & Spartio affines completeni.*

1. *Eahel-Schub^BHM. Genifta fpinofa Tndha* *vrrtirillata, florepurpuro-ctsrule* *OjfwSpartiumfpino-tp[^] Fm 43.*
fum *filiqua* *gzminatfl.* *l.* *B7.*

Frutexefft¹pinofusj nafcens in aquofis; *radicz* fibrofa, capillata, albicante. *Cauks* geniculati,
fupernè plani[^] ac ucrinque fulco ftinati, virides ac etiam rufefcentes, pillis longis Be albicanti-
bus densè obftiti, intus Ir[^]nofi cum corcub aqueo Btviridi, feu eciamalbjcante, è geniculis ramos
paffim binos ac alternatim emittentes, ac in geniculis fingulis fpinis fex^A hinc inde tribus,
longiffimis, lignofis, dnrisj ac ieniter versùs inferiorainflexis[^] aculeifque à fe mutno averfis muniti.
Folia, quæ in nodis plura fimul ad (pinas cauliculis circumpofita funt obJonga & valde angufta, pi-
lifque longis albicancibus in utraque parts obdufta[^] F[^]Jn[^]pera, in margine'erifpa, teneriora ex
viridi rufefcentia: Cofta media viridi-dilutior eft, fubtus eminens 5c craffiufcula. *Flores* verricilla-
tim è geniculis prodeunt lupra ipinas, ofto plus minus fimul, papilionacei, collo brevi albicante &
calyce foliis oblongis, cupidatis valdc pilofis[^] vindibusac etiam rufefcentibus compo/ito erumpente[^]
petaladuo lateraliacceruleaiiint, fubpurpurea; petalum, quod clypeum vocamus, in fuperiore ora
In treslingulas feu foliola, qux versus exteriora reflexa funt reftis inciluris profundè difciflum eftj
coloris c[Eruleo-p[Ur]purafcente, itiaximè inlingulis; petalum quartum anguftum[^] c[Erulei] quoquelüb-
purpurei coloris eft, in duas lingulas feu foliola, qUz versus exteriora reflexa func, refta inciftra
difciflum eft. *Stamina* quatuor aibicantia, craffa, arcuatim inflexa, *aficibu** longis, liirreftis Bccceru-
leis dotaca iunt: cum iis fe prodit filamentum longiufculum, albicans[^] è rudimento fruftus ortum,
Sunt autem flores odore nullo.

Semina in *Jiliquis* lignofis, nonnihil cupidatis, in duo latera [loculamenta] per ftrias intermedias
diftintis, ex ficcitate rufefcentibus, ac foliis calycis, qua: etiam rufefcunt, terè obteftis, in fingulis
lateribus [feu loculamentis] tria quatuorve, forma rotundiola, feu etiam longa, plana[^] coloris cum
licca func fufci feu fpadicei.

Eft & alia fpecies *Bahl-Schulli*, nafcens in arenofis, quæ caulicubs *He folia* habet viridi-claraj[^]rw
verò albos ad cceruleum nonnihil vergentes.

Radix indeçpaodataurinam provocat acfuppreffam ciet, unde & hydropem curat[^] praefertim *d*
cum oleoFicusinfernali5 decoquatur. Eadem przftanc folia decofta 5c condita cum aceto. Ex
foliis fit pulvis, qui cum oleo expreffib ex flonbus Ficiis infernalis epotus tumon pudendorum vinli-
um folvendo conducit.

a. *Gtnifiellaftinofa Africana Laricis folia* Breyonii.

Brey.

Suf&ut,x eft lignofus 5c Ipinis horndus, Geniftellaeminori Afpalathoidi *J. B.* quadantenus fimilis,
5^{ui} mtnulcosdifpeticurranios: horum minores in cam, in quibus fpin* acute & tenue^sj femunciani
long[^] alterno ordine, acquali quodam intervallo circumpolit* cernuntur. Singularum fpinanum
exortui F[^]U viridia K cenuia iubnafcuntur, numcio decemauctredicim, plura pauciorave femper
conjuncta,

conjunct*, ex uno cuberculo, uc in Larice, auc Corrua 5. Cluf quibus iimiliora, prodeuntia. Floret verb lemper luper ipfa fpinarum fede, plerunque folitarii, faepenumero etiam bini oriuntur, neque quicquam a Geniftellz aculeacur recedunt. Hi in filiquis femuncialibus Be incanis Sparrii minimi montani rriphylli Col. non aucem mucrone furfum reflexis, femina cria vel quatuor flavefcentia Geniftelle relinquunt.

Locuu Propè Caput bonae ipei oritur.

3. Myrto-gwifia Cap. fona fpei Breynii, Cent. 1.

Breyn.

Frutex eft arborefcens, ramis multis, quorum juniores fragiles Be Genifta: inftar anguloſi: quos incondica ferie dilpofica, nullis interveniencibus pediculis ambiunt folia carnofa; Myrti Lauren foliis hmilia, vel majora, quorum medium in longitudine neryo fulcarur, ex quo venulz complures diffunduntur, qua: omnes extremitibus fuis non procul a folii margine fingulari ordine Be ferie concurrunt. E ramoruni apicibus Be ad foliorum fingulorum exortum petioſi exeunt duD, tres auc quatuor, ex quibus floret aureo colore fdgentes propendent folitani^ Geniftae aut Cytifi florum effigiem reprarfentantes; quibus delabentibus filiqua prodeunt longſ Be compreili, Geniibe etiani reipondejires, quantum ex nonnullis minus maturis colligere licuir.

4. Gnifta arhvreftns Afrkano Styrazis folio, flore cosruko Breyn. Prodr. Arhr Jliquoſa Afri- zana Genifta femim Bartb. Aft. Hafn. Arm, 167;. Dbfm 131. Crotalaria arbor Africa Sty racis folio molli, incavo, flore cosruko Amman- Charaft. Plant.

Herman.

Malo Cottonex feu Styraci arbori fimilis videtur hſc Geniftaj Radice lignofa, alba, caudice recto^ pollicem craffiori^ lignolo, cortice in viridi pallcfcenre, ramulis firquentibus, vimineis, o^fequioſiſj ad cacuiiina incanis, quos denib alternatoque ordine ambiunt folia Scyrads facie, rotunda, craf fiufcula, Candida fcricea lanugine pubefcentia, inter qua: erumpunt flares, plerunque fingularesj raro bini ternive,, papihonacei, cLCiulei, exiguis fulti petiohs. Hos excipiunt fdiijux bivalveſj bre^, rumidiufcula; incani, claudentes femina reniformia, fufca, deprefla-

Gaudet irriguis ad Promnncioſiuni Bona: Spei. Vires cum Genifta conveninnt.

Ec Synonyma Be defcriptionem^iHcimanno debemus, apud quem etiam iconem vide in D> fcripr.//orr. Lugd. Bat.

H^ arbor cuka eft in Horto refertiffimo Rêverendiffimi Epifcopi Londinenſis D. H. Chapman.

y. Genifta-Spartium cxruhum Capitis Bomt Spei Breyn.

Arcy^m

a TL

Geniftx vulgaris FemL facie nafcitur hic Frutex, denſis Be crebris ramis, anguloſis, Hexilibus, non omnino lanugine quadam deſtitutis, guſtu aromatico; quos Folia veſtiunt, unguem humanura ferè longa, anguſta, in fruticis inferiori parte terna fimul uni petiolo inh^rentia, in ſuperiore ycro ibilitana, appendicilas ju^ra b.ifiin anguliffimas Trifoliorum ritu habentia. Ex ram Drum latenbuſj necnon aliquando lummiracibus furculi, denſa Janugine adeg pubefcences,, ut caneicant, copioſiſſimè nronalcuncur, foliois incanis ac carinais inſtai^!ſaDin^ pſſic ramUlorum Jquamau. Flares in iummis ramulis veluci /bicatos, vel acervatim, ex cſrubo purpurafcences, & figura qua Erinacea: Cluf. geric, è calyculis friatis gutcatirque in quinque ſegmenta delinentibus^ ac, Hypenci fdliorum inſtar intortis propenſionibus ſparſis, canuſcula. Iſolea ſpinae exſcapitur exiguè, par- bre^, Scorpii a. Cluf. ſed glabra & ſpadiſi coloris; in quibus è ſuſco ſpadiſeſſo ſemio, ruzioſa- ſta: ſuſuſuſu, Sparrii a. Hiſpanici Cluf. perquam ſuſide, ſapore viſcido & leguminoſo.

6. Gwiſt* *ſnis arbor Africana Monuſpemos, flore cxruleoj foliis pinnatis Hort. Lugd. Bat. D. Her- nianni. Genifta-ſpartium wrtileum Africanum foliis pinnatis Breyn. Prodr. Genifta Ruteri

Herman.

Us reliquis Et nonſignibus ruziorum Promontorij Bone Spei Inſular hic frutex una cum proce- dente, à qua & facte, & cryſtallandi modo non ſolum abſtude. Fuis profert in principio uera, uni petiolo adſtantia, in progreſſu ſu^ ^iinata, Villicia, angUlta, ajpiciuicuid, i< amilia ucjinnum/ ordine veſtientia: quibus ſe ab imD ad fummum ufque circumſtant flores coacervatim papilionacei, pallide cærulei, prodeuntes ex utriculis oblongis, membranaceis, quinquifidis, iubhirfutis, clauden- ubus ſingulis (emen unicum, nigrum, lucidum^ reniforme, tenui ruſca membrana^ quaſi peculiar! illicula, cæctum.

CAP. XVIII.

Anonymus flore Colutea Cluſii, Myrto-gwiſia quibudalii! Chamabuxuj Jlv Chamafyxot fW^J' Jam J. B Chartabuxus flore Colutex Ger. C.B. Tftudo-chamabuxus Park.

N. /T uitis virgultis, tenuibus, lentis, ſpithamam circiter Jongis przditus eft, qua ^)r^TM*^Xſ ^ VX b g^unc fibriſ demiffis radicanur: alioqui Bcradicem habetfarpc nori muſto 'P^1^7^6 per ramDs incDidlu^xe^5,0^ " " ^r " P^1^1^1^M pIura Poffidet ^^^iJbSviffimis hz-

j^res cmiuant, Colucea: ſcorpoidis flonbus fimiJes, imiui pi" J ^^^

tefte Cluffio, odoris expertes, nonnullis verò locis odoratiflimi, Be tsLirciffinam quidam frjgraa-
tiam aemulantesj tribus foliolis confapt, quorum duo alba funt, & alarum modo furfum expimfa, ga-
leolà exalbidà eorum exortum mtegente: tertium folium in oblongum vduti tubulum convolimini
eft, fiirfum per lanuginem apertum, per extremitatem braccæ modo efformatumj arq, luteumj & ve-
tuftate interdum omnino purpurafcens auc rubefcens. FJonbus fiiccedunt latx gc compreffij *filial**,
Thlafpi latifolij fill qu is paul6 minores, virides, qua: bina plerunque [incerdum uuicum tantim]
continent grana, exigui Ervi magnitudine, colore ex cinereo nigricance^ hirfita^ Sc veluti quoddani
animalculuni emencia, Polygalæ vulgans majoris rubrx feminibus haud abiimiha, fed minora,
quac aperientibus fefe per latera loculis iponte decidunt.

Variat interdum floris colore ex purpuro-rubente K flavo vario.

Fruticulum huncvariisGermania: in locis obleruimus. i. Irt fylvis montolis Scaphufiam inter ^{L. NEW.}
& Confantiam: deinde in planitie quadam props Auguftam Vindelicorum itinere Monachienii:
tandem in montofis non longè à Tiguro Helvetia Urbe plurimum menfe Maio florentsm. Lota
vid. apud *Zlufm*

CAP. XIX.

j. *Frutex Indicus, flore papilionaco [anguinzo; folijs pnnxtis', fruftu viduus. Tsjude Maram H. M.*
P. 6. T. 60. p. in.

H.M.

FRutex eft humilior, ramis geniculatis, corcice candido, teneriorej ligno pauxill^ medulla
fucculenta, è viridi diluto., in incernodium im.i parte quodammodo CLirgefcerTibus. *Folia* ex
angufto in cupidem exeuntia, plana, glabra, craffiola, cofta ftnata utnque eminece, è vi-
rore cum tencriora iunt nicentia, dein obfulca, colore variegata flAvefcence, uoi vetultiora in al-
bum vergentia, ordins geminato coftis craffis, interius plams Sc candidis, aliquando rubefcentibus,
ramis adhaerent; iaporis funt non plane ingrati. *Flares* tetrapetah, in exortu in fanguineum vergunt
coloremj unum eorum petalum retro incurvacum, interius coc^earis cavitacem exhibens, lupernè
bifidum elt, cofta intermedia eminece, caeterorum Crium è lortio ang'iftorum, in tranfverfum ja-
centium duo qux ad latus fita liint, magis coarftantur. Inter *jarbina* duo, *apicibm* oblongis ru-
bris, ftnatis capitata, *ftylus* procerior obferuatur.

Areqarum amansj oriundus ex *China icManilhas* inMalabancum inveAus regnum eft. Percn- *Locus**
His in hortis colitur, vires ignoranrur.

2. *Tsjerz-Maram* H. M. P. 6- T. 61. p. 109.

HuUS fruticis ramus corticis rufi diluti flavefcantis parumque albensis eft. *Radix* albicatis^denfa,
fibrofique. *Folia* planè ut in *Tsjudz-maram* fefe habentj, excepto quòd longè iunt anguftiora, ma-
gisque flavefcencia. Be ordine confitio prodeuntia. Floribus fimul ac Fructibus deftituitur; *nobis non*
videtur hoc vtrum; potiùs <vnd peregrinus Jit fruBum in Malabar a rarb proftrt. Allatum è China Ma-
labarenfes in hortis colunc. Virium planè eft ignocarum.

CAP. XX.

Yongarn feu Minari H. M: P. 6. *Arbor Siliquofa flore papilionaco: fab/s Ungis & I at is fUna*
farte Jibi invicem Inzumbnrxibm,

H.M.

ARbor eft excella, craffiore matre quam ut homo complefti queat, ligno candido mollio-
rique, cortice gemiho, exteriore qualis in ramis vetuftioribus, e cinereo obfeuro, inceriore
viridi lsto, fragranti odore Glycyrrhizam recentem referente. *Kami* pine morion, tene-
riores corticem habent prafinum. &*&* yillofa, nigricans, aens, graveolens. *Folia* grati odoris,
nulhus faporis, cupidata; mollia, glabra, fupina fulca, prona parte dilutiora func., guina auc feptena,
impari è fiirculi l^tioris Himmitate dependente, numero, paffim prodeunt^ mediana flavente cofta in-
xertexta. *Flores* tetrapetali, quorum gemmi aculeatac convoluci Follj adinfar emicant, odorati, papi-
lionacei^ *Uametti^valli* proximi, albicantes, digitalibus petiolis, furculis coinplures adherent. Horum
duo rofei coloris oblonga/iffij tertium patulum, *Frequentiffimis venis lineatum; quartum plane in-*
curvatum eft. Stilus denlior, exalbidus in novem *fiaminula rubellis apicibus* dividitur; è quibus unum
hh'lutum cminet geniculatum, fruftiis germen concinens. *Fab** noftrarum aemulances faporem,
acres aufterxque font, duos admodum pollices longa:, unum lata:, ea qua plan^E fiinc parte fibi in-
vicem incumbentes, in longum fita:, icà tamen ut earum umbilicus filiquarum relpiciat dorfum :
primùm virideSj ficcx rubentss, rugis traniverfisinacuales. Infuper quoque flores Jpunos fundiint
fruftus, qui font noduli cinericei, Candida pulpa, nunquam filiquas edences.

LociS moncanis petrofique in provinces *Faracaro- & C Mangatti* p:ovenit; idque tarn facilè *ui Locus 8*
Vel terrx impo^us radice tur ramus- Ab anno decimo qtnro fructifera, ad quinquagefimam *fu-Twp*TM-
perftes eft. Flores fruaufque ab Aprili ufquejanuariam exhibet, frondeslempervirentes,

Lignum foco infernic. Balneum ex folijs paratum flatus Arthncidifque dolorcs, iiffitus febrim *Vires* GT
depllit, Eorundsrn fuccus in tempore adhibicus venenatos curat ferpencum morfus. *Vfus**

CAP. XXI.

* P. i. F. 55. *Coliwl* • H. M. *Polygala Indict minor filiquis recurvis* D. Syen. Nil five Indigo fpvria.
f- 103- H.M.

I*N dūm triimve pedum altitudinem aflurgit\ radice fibrofa, albicante feu ruffa, fapore amaro Be lubacri, odore nullo; ftipiē quatuor digicos craffo, ramos rranlverfos emittente, cprtice ri- nereo amaro & mordad, Jigno duro. *Folia* pinnara, pinnis ad Coftaui mediam adnexis brevi- bi5 penolis, parvis, oblongo-rotundis, ad apicem liibrotundis 6c latioribus, adpetiolum in anguftum reftis ori5 conraftis, lupcrnē viridibus, fibcus hyalinis ieu ex vindi fubcaTuleis, laporis fubacris & C fubamari, ac languidi ardoris fi dūcius mafticentur. E media cofta feu nervo venae iūlraē tranf- verfx obliquo ductu parallels- versus marginem excuTunt^ utrinque confpicua'. *Flora* papiJionacei ftipe, FDIIO inferiore carinato ex viridi albicante; lateraha duD valde faturo K rofaceo juboietindla lunt. *Stylus* viridis, cavus inftar theci, filamenrum viride quod ē germine JJjqlLoib prodt [hoc propriiftylus eft] compleftens, ac fupenōri parce inparva acreniTiā lhmuncula apicis/ flavis doca- ta hflīi, uno ad concavam partem filamenco libero. Floribus lūccedunc filiqu* angufta, tenues, plana: & ad imam parrem nonmihil inflexi^ duos trēve pollicis longs, glabn, ex l'ubro fufcefcen- res. *Simmaintus* l'ejunfta, oblongo-rotunda plana j longicudine fua ad filiqua: longitudinem paral- lela.per matuncicern nigricantia.

Prater filiquas Fructus nothij virides, tenuiter pilofi ac durioli ftirculis /ipe infidere con/piciun- tur qunn verticefunt foramine pertuli Be incus cavi. *Hi mhd ahud funt quām GalU yixdam* [e* excrejeentia, tumorefee ē funtturis infeEiorum ortat.

VirēJ.

Succii5 c planta excraftus addito momenta meUis fervic pro oris puftulis, ore cum eo pemnfto. Radix mca & defcofta in ladle Coqui India conducit in morbo fācro, ffl. a pcrullA. In e

CAP. XXII.

Noelvalli & Vanni-vallt H.IVffP. 6. T. zz. p. 39. *Siliquofa Indka flore fapiUmact?*, *Sihqui**.
plants brvvibus duo ant tria fzmina ijtbmis diftmcla conttmntibus.

H^{H.M.}IC frutex ramufculis fuis prōaima maritat arbores: corcice eft nigricante, rubris inperli niaculis, ligno vindi medulla pertcrebratos, radice fubialfa atque inodora. *Felia* Fraxiīi Jmilia fulcacis inhxrenc furculis^ craffidra^ fplida, glabra^ mcznua, fupernē magii fufca, interne diluōra^ ubi 8c cofta eminec lignola, dayelcens; lapor iis fubacris. Inodori /lores 1} ca- lyce monophyllo rubicundo papilionacci, longis ē iurculus dependentj candidi, tctrapeali, quorum unumlacius iDtundiafijue & incifum in cacumine levicer quodammodo infleftitur, duD lateralia ob- longiora exeriora verliis incurvantur. *Stylus* uc in *WtUia Tagera*, hand ablimitis exalbidus miio- rem in lē CDrinet alium iūbviridem c calyce crumpencem. In gemmis comprcfEs unum Jatius fo- lium cetera compleftitur. *Stitqu** longitudine & c gracilirare digirali, perplanx^ duo tria ifthmis di- flinfta fēmina, fabarum rudimenca incus includunt. Iphi fabarible percdftae cinenceilunc coloris, ingraci laporis.

Tropw

Locm.

Vir^ E?

v'us-

Augufto floresj permatturos fructus Decembri Scjanuario menfibus, frondes perpetuas promit. In infula *Baypin* carterilque Jocis fluviorum ripas obveftiunt.

Comeft.r immites fabar alvum cum torminibus iblvunt. Folia in cataplalma rcdafra Eryfipelati conducunt. Cortex Cannabinum zmulans in funes redigitur.

CAP. XXIII.

••P-i.F-ii dgty * H. M. *Galeg* affinis Malabarias arborefcens, filiquis tnajoribus articulatis* D-Syen.
f. 95.

QUanior vel quinque hominum altitudine eft, trunco quantum homo amplefti poteft: ra- mis ē caudicis fummitate Sc ex medio corpore lurredtis in ahum, irjlatum minus expanfis, nafciturque in arenofis. *Radix* fufca, fibras capillatas longe lateque diffundens, fapore ad- iuuī tHi. Lignum molle, corculum intus mollifinium cortice incifD extillathumor tenuisK aque- us, qui poftea increafibfcie Be gummofus redditur. *Folia* pinnata, fefquifpithamam terme Jongaj pinnis adcoftam mediam adnexis binise regione adverfis^ pdiculisbreviffimis^ anterius vergentibus, iintque pinni p^rvx, oblongo-rorundae, extrcmaora etiam fubrotunda, fefquipollicemfermi long^ diguuni rrmfverLim late, ā bafi ad apicem arquali fere latitudine, testura craffioU & valde mt^ Wa liiperficie lemflima, ftiperne fatiraLius, infernē dilutiū viridia; odore ii terantur fahacco. ^ cofta media venula: fubriles egreffli folium permeant. Folia internodu pinnis oppoficis ad lc mu- t'ō adduftis clauduntur. *Flius* in liirculo leu pctiolo communi ē *folidrum* allis egreifo ^ [J^ e* plurclve una proveniunt, papilionacejj [petalaaudem hoc peculiars habent, 1¹⁰.] ac in l¹⁰.] *Stylus* viridis, cavus inftar theci, filamenrum viride quod ē germine JJjqlLoib prodt [hoc propriiftylus eft] compleftens, ac fupenōri parce inparva acreniTiā lhmuncula apicis/ flavis doca- ta hflīi, uno ad concavam partem filamenco libero. Floribus lūccedunc filiqu* angufta, tenues, plana: & ad imam parrem nonmihil inflexi^ duos trēve pollicis longs, glabn, ex l'ubro fufcefcen- res. *Simmaintus* l'ejunfta, oblongo-rotunda plana j longicudine fua ad filiqua: longitudinem paral- lela.per matuncicern nigricantia.

foliis unguis petalorum circumdans, cobre dilutē viridi. F. Joribus (uccedunt / % ^, quatuor spithamas longa; digitum traniverſum lata; teretifculae, reſt*, vindes, eortice craſſo: in quibus *Fab** oblongis ſinguhe in propriis loculamentis parietibus carnoſis ſejunctis, cum ſua longitudine longitudine ſiliquarum conhtx, nonnihil extuberantes, faporis fabacei, Be ſimiles plane Phaeolis noſtris ^{ni/} quod minores, per maturitatem albicantes ſeu ex albicante ſubvirides; iunctus in edulis.

Flores Be fructus fert tempore pluviolb duabus tribulve in anno dto ahno, ſed ra-

Radix mixta cum urina vacca: Be impoſita tumores dilcutit. Cortiuis fuccus cum melle permixtus *Virtu* in collutionibus anginae Be oris puſtulis prodeſt. Cortex coctus cum aqua ſie com eſt us pro variolis conducit. Foliorum fuccus naribus attraſtus juvat in Febribus quartanis 6c inveteratis die paroxyimi. Decoctum foliorum pituitam Be phlegma, necnon bilioiſ humores expurgat: in vertiginis capitis *SL* cholera con due it ſi folia uſta in aqua edantur. Fbres in decocto dantur pro catarrhu, quomodo etiam ad luxuriam incitare ſerunt. Eorum fuccus oculis itmifliis pellit nubeculas Be viſum reddit.

C A P . XXIV.

Biti Malabartnifibus H. M. fart. 5. Tab. 58,

ARbor eſt procera, caudice craſſbj multifque ramulis in orbem diffuſis donato- Lignum atro- rubefcens ac purpureo-friatum, denCim, ponderoſum, iibacidi odoris iaporifque, cortice munitum cinereo. *Radix* icidem atro-purpurea- *Folia* oblongD-rDtundaj denia, glabra, ſuperne coloris ſubcinerei, inferne cinereo-viridia, nervis aliquot e media coſta in latera excurrentibus, odor gratus. *Flores* papilionacei, flavefcentes, racemis oblongis numaroſi proveniunt, quibus Siliquz ſuccedunt.

Crefcit iDcismDntanis in *Calicidaj Atsjmoil* Be alibi: ſemper viret, quotannis floret Be fructum *Locus* fert, dūque ſuperſtes manet.

Lignum ob ſingularem ejus duritiem operis fabrili accommodiffimum cenſetur, ex eoque varia *Vfus* ſiunt domeſtica inſtrumenta.

C A P . XXV.

Karin-Tagtra H-M. F.6. T.i. §. p.45.

HLC ſpecies humilis eſt, Corylo ſimilima. Cum praecedente^ quod ad *folia*, plane CDII- venitj excepto quod hujus rotundis oris leviter ſinuatis ſunt. *Flores* papilionacei, diffuſi, mes, candidi, tetrapetali apparent- ^iftjw^cum caEterarum reſtae ſunc, hac incurvatx fa- bas furvas nitentes continent.

Montoſis lociſ in *Candnate* aliifque regionibus familiaris eſt, ſemper virentium habetur in nu- *Lews* mero.

Ufus plane ignotusj niſi quod e radice paratum oleum capillorum reſtat profluvio. *Vires*.

C A P . XXVI.

*Rtdangu H. Af. P. 6- Tm 17. f- 49- Siliquofa Malabarica fili^uis fothamii anguſtiſlimis contort***
H. M.

FRutex eſt duos homines altitudine squans, trunco craſſo, ſemipedali, lignD candente, medul- la vero viridi; libro ubi ficcus eſt cinereo^ intus virente. *Rami* autem cortice glabro nitentej venis rubentibus friato, tenuiores hirtuto, obducuntur. *Radix* perquam fibroU in tranſver- ſum diffunditur. *Folia* tenuia, lenia, e longo anguſta, pollicem longa, anterius rotunda, lupina parte ſufca, prona verb dilutioraj hirtuta, ubi talis quoque in culpitem exiens multipliciter diviſo coſta conſpicitur; *Tſiapangam* modo communibus liirculis adhacsnt, deſceſſoque jam die collabuntur: fapor iis ſubſtringens. Inodori, flavi, papilionacei, plures exuno prorumpunt petiolo *Flores* tetrapetali; quorum unum exterius internigrans, interius flavefcens folium eſt, duo verb anguſtiora atque ereſta, flavo colore fatura, quartum e viridi atque albido nitens/unt. *Stilus* ex albo ni- tens, Be circa medium inflexus in novem filamenta *apicibm* flavis dotata finditur. *Siliqias* ſpithama longiores, quamvis anguſtiſſimae valdeque contortae, dura ac ſpinofa cuſpids donatar, virides primb languidique iintj femi'nalibus loculis ab interioris cartilaginea contraſta pells productis ſepiinenta fe- minum effluentibus, protuberantes; aft veteraſcentibus iis evanelcunt ac ſubliqent extuberantix, ipſe vero filiquae elongantur, rigidaque incurvatura inflectuntur. *Fab** primum e viridi nitentes, exfic- cats perquam parvac Jiint; coloris e cinereo ſufci nitentis, faporis nullius, vel plane fylveſtris.

Natale ſolum diligit limoſum udumque, ad urbem *Cochin, Nari*, aliifque frequens eſt loci� *Ho- Locus* ^{ts} rons mcne Marti0: fructus Decembri leguntur. [^] *Tempus*

Balneum e ſiliſconſectum omnes dilcutit tumores- Epilepfia apthifque laborantes pueri florum *Ww* [«] *ccofar* ⁱⁱ ^{^^} curantur,

SECTIO SECUNDA.

De Arboribus & fructibus Jiliquvis folio, decomposito fm ramvfo.

C A P. I.

Siliqua sylvestris spinosa, arbor Indica C B. Coral arbor Jiliquosa J. B. Arbor Corallii Ferraf. Flora. Siliquosa & spinosa trifolia Indica, Coral arbor ditla Park. Tuinamtiiba Marcgrav Mouricou * H. M. Arbor fabifra Javanica Boa Tfmkr'wg ditla Bontii l. j. p. 134,

* P. 5- T. 7 fl

Arbor est cortice cinereo, ligno fragili, in Mali fylvestris amplitudinetn excelcens; cui rami decifi 8e terra: infixi novas progsQerant arbores, ideoque ad vivas fepes ab indigenis ufurpantur. Juniores arbores spinis acutis in caudice Be ramis armata: fiint, adultiore amit-
tunt Ipinasj Be in ramos varie distnbuuntur: iliac nunquam florent, hae contra: ilk femper habent foliorj ha: interdum nulla, fed tantum flores, nimirum Decembri fie Januano: post flores demum erumpunt Folia floribus decidentibus: utrarumque/i/i* funt familia, fubrotunda, feu potius cordis fublterioris figurá, inferius tomentofa, fuperné glabra Be dilutiora, tria femper fibi appofita more Phafeolorum, in pediculo femipedemcirciterlongo; Be talium pediculatorum tres, quatuor, quinque fibi appofita funt in frondis modum.

Flos magnitudinelndisfloremermeacquat, unico confans folio, crenato, furfum erefto, ad cujus latus interius cum adjacente tunica è qua prorumpit dulcis liquor contjnetur, ut in flore *Faco*, rprmicis gratiflimus; 6: ex eadem multa habet *ftamina* carins in modum ad ktus leniim prodeuntia, co^lloris liffignis miniati, line odore tamen: ftamina vergunt ad brunnum. Arboies florentes longe confpici poffiunt, inftar panni miniati expanfi.

• FiDnbus cub 5e topiose decidendNi5 feijuuntur fruftus, viz. copioii *flitjute*, ubi maturuerunt filfc^{ae}, ab uno ad quinque digitos long[^], digitum craffz, teretes. Be in tot ventres elatar, fie loculamenta divi^{ac} quot continent phafeolos, quorum quilibet magnitudinem habet nucleí Avellana: aut Fab* feu Phafeoli vulgaris. In totum est miniati coloris Be prope hilum qua fufcefcit parvam habet iuaculani nigram: interius autem ex albo flavefcit. Nullus cjus ufus apud incolas. Turdj, tefts Bontio, eo avidé vefcuntur.

Ex defcriptione Marcgravii Be figurá Be defcript. Cluffi folia hujus arboris videntur effe bicDmpofita feu ramofa. Privata feu particularia folia in arbore juniore, defcribente Ferrario, nullis incifuris interruptp, fed xquabili Be prope rotundo ambitu circinata leviter faftigiantur; ipfius etiam Hederx rotunditatem, amplitudinem, craffamentum, duritiámque referunt.

NIDUricou H.M. in nonmJlis (iffetit a Tultiamtiili. \>f-irr-gnv, jit <intact; m an ipfcie eadem fit. Csterum Mouricou Malabarica Elephantis arbor Belgh dicitur, ijuia Elephances iummoperc hoc deleftantur ligno, utpote leni ac molli.

F. 1736
L. 1736

Lignum Malabarenfes in enfium ac cultrorum efformant vaginas: una cum cortice ad veftium SaraJas diftarum lotionemj flores in confecttionem *Caryl* adhibent. Caeterum folia pulverifata ac matura cum mice Indica cofta donee unguenti craffitudo fit, Veneris CDnfumunt bubones, dolores offium /edant. Contnta teniporibus applicata cephalarz opitulantur 6c ulceribus. Mixta cum Saccharo *Jagra* ditto ventris dobres, praelertim fceminis reprimunt, quod prxfat cortex aceto k-vigarus, Be nucleus pelliculá rubrá denudatus[^] fi ilfiglutatiir. Foliorum fucus cum oleo *Sergehm* affumpti5 dolores levat Venereos; cum *Oryzae* infufione haufus fluxus tenetjCum foliis *Beteleira* in pultern redaftus vermiculos in vetiitit ulceribus przfocat, exoleo coa^{us} pforam Beprurium tullit.

Ties varietates Arboris Coral difts recenfet *Hermann*TM in Cat. Hort. Lugd. Bat. I- Spinis ex albo virentibus Be feininibus rubentibus, *Erabudu* Zeylanenfium diftam. U. Minor em ipinis SC fsmiibus nigricantibus, Jacerabuda Zeylanenf HI. Maximam Amencanam.

Arbor Coral in Hortis frequens eft.

C A P. II.

De Brafilia at lore difta..

I. *Brafilia arbor* Park. *Brafilium* lignum). R *Vftudofantaltm rubrum* Jive Arbor *Brafilia* C B- *Ibira-pitanga* *Brafilimfibi*H Maregrav. *Ibira-piPanga* five *Lignum rubnmrYifan*. 25?ffil

Marcgr. Pifon.

Alta est Bevafta.tantaEinterdnm craffitudinis ut tres homines ampleitivixpoffint: cortice *faro*, brevibus ipinis armato; ramis alternatim oppofins[^] in quibus Be *Tawuli*^{cm} oppofiti, uti^l Be folia ad eundem inodum, in[^]qualia nimirum paria in eodem rarnulo, circitsr riiguum longa, figurá Buxi foliis familia, craffiufulca, faturatè yiridia fplendeniia, [^]n^e petiolis ra-
IIIHIS innitencia 5e quidein non extremkate qua: medio folii refpondet *ibd* versus alterutium *Jatiffc* *Hac foliorum defcriptio fubob^{ura} eft; uidmtur tamtn turn ex figv*> fum ex defcriptiom folia bicompo* pta eife, ut in Filice am Planta fenfiri-va, primum ex fur cults feu ramulis (alii tarfos vocant) deinde h pinnulu, lid ut. fcapm; feu cofta media hinc indt emit tat fur culos, & unufquifait furwlus him indi pin* wdas fen fdwUi abfque impart tamm in extrmti wfti* *fiHo** Hinc

Hinc indè etiam in ramis prodeunt ramuli, fequidigitum & amplius longi, niultis floribus quafi in unum congeftis onufti, pediculis femidigitum longis infidentes, quinque foliolis confantes, quatuor vulgariter cavis, & quinto repando, quod rubrurti, & in extremitate fua flavum, reliqua flava; duo repando proxima unguës habent rubros; in medio flaminula flavo[^]pallida, apicibus flavefcentibus: odoris ejuflëm* at fragrantioris, quain Liliũ convallium.

Sequuntur flores *filiqua* oblongs duorum circiter digitorum, planas, compressa, exteriùs aculeate, obfcurè fufcæ, in iè continentis fabas aliquot exiguas, fplendentes.

In locis man vicinis non apparet, fed tantim in mediterraneis fylvis, unde magno labore ad littoralia vehitur. Floret Decembri.

Tinfutura hujus ligni rubra toti orbi efl notiffima. Sed minima moles tarn vafta: arboris tirit, Sempta enim magna parts ligni luperioris fola matrix tibiam circiter craffa rubri efl coloris; Cc ad tingendum utilis.

Lignum efl frigidum & ficcum; mitigat febres, refringit & corroborat infar Santali. Macgrata in Frigida inter collyria contra ophthalmias ufiirpatur cum fuceffii.

Ligni ufus efl ad multa opera fabrilia, Iphaeras luforias, cultellorujn & gladiatorum manubria[^] battillo[§] &c efl enim valdè denfum &c ponderofum, necnon politurac eapax.

1, *Brafilio fim'ih lignum Vtrnimhock Germanh dittum J. B. An fte&toctr nofratibus?*

Hoc lignum (inquit J.B.) à Brafilio nobis Genpvae pro Santalo rubro exhibitò differ[^] quddnon fidditj habètque qiiò cum Fagineo ligno nonnihil cbveniat [fi colorem demus] pfele^{Dim} maculis illis tranlverfi5 atqie crilpatitibus per fubftantiam ejus fparlis neque dulcorem ilium maficatum prafert. At fuperius paulo dixerat lignum *Vernimhock* ponderofum admodumeflè, Be in aquam injedum ftatimndere, folidum Ebeni infar, rubens; infeftores eo uti ad tingendum: additogumnii 8c alumine elegantem colorem rubrum pro fcriptura prsbere,

Vernimhock nomen accent à Fernambuca arce Lufitanomm in Brafilia conftruaa, ubi Brafilienfes indigene cum iis mercimonia exercent.

CAP. III.

*Ligno Brafiliano Jimik₂ feu Lign. Sapou, lamis tingendis percommeJum C. B. Tfiapangam H. M. part. 6- tab. 2. cujus lob us * Clujio fub nomine Lobi membranacet nigri defcribitur & depingitar. An SogtDCDtl nofratin* Rafliphout Belgis. Acacia tintoria Herman.*

Intra binortim hominum altitudinem proceritas, intra palmam craffities fuffitit. Cortice efl cinereo, intus fulvo, ligno admodum duro, rubello, mitura arte ruffo: *Ramis* in latera pronis, intro albicanibus, (pinis intercurrentibus curtisfic deflexis: II[^] fibrofa, ex albo rubicunda, inuodora, cortice cocco, nigricans: obdueto pellicula. Folia pollicem longz, digitorum latta, rotundifolia, Orni unice, craffiore furculo, fpanu pincato, ex ordine appendencia, media upita ab averia parte hiultas venulas fundente dividuntur. Odrbr us gratus, fapor verb fubacris & aiTiaticans. Sole occidente ineftimis lateribus fe includunt contrahuntque. Flores inodori, flavi racematim è ramorum foliis deftitutorum extremis furculis erumpunt plures, decapetali' petalis pacne rotundis, tenuibus, quorum quina exteriora cupidata[^]arum ac fubviridia fiznt uno medianorumexiftente, venulis trajedlis rofeis, minufculo[^] cui adftat oblongum, viride, totum florem fuccingens folium. Emicant ex floribus decem geniculata, e flavo viridia *tamma*, nigris femilunulatis *aficibus* icurvatis infrudla, Uti & pede communi piano, lanugine albedo fruftus primordium Continentis. iEquabiles, compreffli, fuccrets *flitijua*, petiolis adhaerentes polliqanbus, quatuor trant verfos pollices longz, duos propemodum latae funt, dorfo craffiore, culpidato, ventre pauxillum incurvo; maturae & L ficcs cortice funt duro &c corneo, e furvo nitente, intrinfecus Candida obdufto cartilagine, què ubi teneriores funt tratifparet, poftea verò involvic atque difjurigit *zmina* oblonga, fthplana, è cinereo fufca, è tranfverfo lingulis filiquarum dorfo adhxrentia.

Arenarum cupida per univeriurn Malabar ob ornatum ulumque frequens colitur. Sponte in *Locus* (S *Trevaancoor*, provinciis *Goendre* & *Ellè de Soroan*, ahifque montanis naicitur locis. Ab Aprili in *Tempus** Septembrem ufque floret. Fruftus carpuntur exeunte anno. Tnma fruftifera, vitam in iootra[^] hens annos, quibus nunquam deftituitur frondibus.

Ex ligno, quod ubique venale exponitur, rubro, aquaz incofto tintiira elicitor nigra (Atramentum vocantj quæ cum Alumine diluta rubrico/a evadit, maximoque ad lintea & alia rubella colore imbuenda in ufù efl, calce verò obfeuratur. Quòd (i iurculorum lignum albicans calce perfrixeris ilico rubeicic, quo exiftente molliori flavet. Ad opera pretiofiora magi/que iùbtili elaboranda manu, hoc lignum adhibetur.

Figura exhibet folia bicompdfita ad modurti Acaciae aut Frucicis fenfitivi.

CAP. IV.

Glans unguentaria QE *Nux Bzn five Glans unguentaria* xxi. *Ralarms myrepfica* Ger. *Mst unguentaria* J. B.

Nuces unguentariae diff: oblongae sunt, nuclei Avdana: magnitudine, aut etiam nuclei cum fuoputamine fed minoris, figuratriquetra: putamine tegunturalbicante, mediocriter craffib, fragili, cui nucleus subest craffijufcula Ringosa pellicula, nivei coloris obduftus/albidus, Ayellanae nuclei aut Amygdalae confitentia, pinguis, quique nobisjaminnucibus antejo annos repofitis non rapceferet, fappre tantum amaro prxditus. Hujus generis nucuk alia: feffiles, alia: oblonga majores, minores; effigies triquetra, fed rotunda Sc glandis smula huic nomen generis aptavit. Nafcitur autem in filiqua admodum eleganti, palmum longa, carinula bifori conflata, tereti, gracili, binifque loculis ventriofa, nempe ima mediaque fui parte qua protuberat, glandem fingulam fingulo claudens, fumma vero acuto ftulo roftri infar, vel Rhododendri, vel Periploc* repentis, acucum mucronem protendit: intus fubruffb colorej f oris pulb, cinereove, & L fecundum Wjfcudinem ftnis rugifque exarata: coriacea tota flexilis 6c corticofa, infipida, fubaftringens K fic-

VeKres in Dercriptione arboris inter fe non conveniunt: Theophrastus folia Myrti ei attribuit Plinius Heliotropii, Diofcoridis Myrius. Aft dicendum, Myrti & Heliotropii folia, quod ad figuram attinet non multum inter fe differunt, & quoniam *nupiv* & *pudim* voces quoad elementorum quibus fenbuntur formam affines & (injles sunt, facile a librariis hxc pro iCa in Diofcoridis textu poni potuic: vel dicendum Diofcoridem inter ipfas arbores, non inter earum folia comparationem infituiffe.

Arbor ipfa, tradente Bellonio, Betulam refert tutti magnitudine, turn ramis fimilibus, & trunco albo, ita ut e longinquo videntes certo crederent esse Betulam. Tobias Aldinus, feu potius Petrus Caftellusj arbutulam in horto Farnesiano e femine natam accuratius defcribit. Foliis autem erac bicompositis feu ramofis. Nam nervus feu cofta media totalis folii lirculos feu nervos hinc inds emittit juncis non majores, quibus aff intervalla longiora bina conjugatim adnascuntur foliola, nulb impari alam terminantc fed nervulo media in tenusm fctam excunte. Foliola in firculis ima rotundiore cuspide liint, Heliotropii foliorum infar, media acutiora Be Myrtinis fimiliora, fumma minora & angustiora, ad Polygoni folia accedentia: Omnia hyeme dscidua cuin lirculis ctiam K cofta media.

Lacuna, duas Nucis unguentariae species facit ^A *Majorem*, magnitudine Avellanae corticij fragillij triplici cofta, medulla alba, tenera, oleaginofa, acri cum levi amarore: *Mnorm*, Ciceris magnitudine, cortice ad nigrum accedente, medulla ingrata, quani perniciofam exiftimari ait: majorem folam esse in usu. Forte in hoc Mefiie fecutus est. In magnitudine differentiam agnoscimus, at species diverfas dari non concedimus, nee tamen prsfractae negamus.

Locus.

In Arabia prope *Vbaragou* in itinore k Cayre ad mumuli suavi rnrferur; aucorc Bellonio. Adfertur vero ex Syria & Aegypto in Europam, atque illuc purat Matthiolus ex Arabia advehr, & forte etiam adhuc BX Ethiopia, ubi ait Diofcorides nafci. J. R. In India non nafci opinatur J. Bauhinus, quia neque Veteres neque Garcias inter Indicas plantas earn recentent, aut in India nafci tradunt.

Vires/

Diofcorides aliiquis e Veteribus multas ei vires adferibunt. Purgat fupernè & infernè, educitque bilem ac pituitam.

Ufus/

Mefiie Glans ipfa humiditatem habet excrementofam 6c acrem, qua ventriculum fubverti naufeam excitat Be viscera conturbat. Pituitam craffam & lentam vomitu ac dejecSione purgat: quare confert colico affectui pituitoso fumtus/balano clyftereinjeftus, cataplasinatè ex ipfius medulla, hordei farina Be melle appofitus, Be calors suo nervorum frigidis affectibus, spafmo, tetano, contraftioni. Tumores quoque duos, ftrumas, nodos refolvit cum melle: Hepati aut Lieni obfrufto Be indurato cum farina Lupinorum Sc fpica confert impolifa. Diofcondes tritam Be ex pofca drach. pondere potam lienem abiumcre fenbit. Oleum auri infufum tinnitui, fibiJo, furditati auxiliatur: Cicatrices fcedas, lentigines, alphas 8c cetera cutis vitia emendat. Parvus autem fruftus ad omnia est valentior, mobile purgat, vires dejicir, fudoremque frigidum movet. Magnus ne ventriculo noceat facit adatio. Ea enim humiditatem excrementofam Sc acrem horum fyptomacum caufam coquit Be refolvit, tuncque folum dejecSione purgat. Acliduntur prsterea ipfi, prafercim coquendo iemen Anifi Be Ferniculi. Hinc etiam Mefue, & rest Ben antiquam recenti praferit in usu medico, quia in przdifta humiditas aquea evaporando confuAipta est. Eundem in moduni Afan etiam folia, Be radices violenter purgant per fuperiofa & inferiora ubi virent, propter tale aliquod Jerum acre; h excicentur amittum vim illam malignam & vehementem. Quod idem evenit quoque Iidi, qua: virens unt Be pungit violenter, excicata non item J. B. Idem etiam obfervavit D. Grevius de radice Ari, quz exciccando acrimoniam ftam amittit.

Unguentarii oleo utuntur pro conficiendis odoratiffimis unguentis, in qua: Be mo/thurn, ambram & zibethum addunt pro chirothecis 6c manicis aliiisque fufficu perfundendis aut illimentis. Porrb prs omnibus aliis oJeis hoc potiffimum celebrant unglentarii, non quod aliqua odoris prstana commendetur, fed quod folum nunquam vetustate rancorem contrahat. J. B. Alii tamen ejiis loco addunc oleum exprcfum e nuclei's Ceraforuiij in quo folvunc Benjoinum. *Hturn. in Med. praff.*

a. Niix Been Zeylanka, Jiliquid triemguUJtminibm alatk, Moringeros Lufitanu, Katu Murundi,
Zeylanenfium Herman. Cat. App.

Hujus defcriptionem expeditamus in Museo Zeylanico D. Hermann!.

CAP. V.

Avacia Malabarka zhbafa Intlia dtfa.

U.M.

BInorum hominum implet complexim: libra est cinereo, Jigno candido, fulcis qitfnque; & quibus spinæ -erumpunt ftriato. *Radio*: est adftringente, fibrofi, nigro cortice, in tus rubente. *Rami* cinerei, ligno albidiore, pronis fentibus duobus in fulcis frequenter obfici. *Folia Nilkamaram*, nifi breviora eflent, poterant videri, ihferne ftriati, uao nervulo in exbrtu lit Sc Tnultis venulis donata, infernedilutoraj fuperne fiimme font virentia. *Flores* odorati, cai didi rii-bris & gemmis erumpentes, Acacias Indies in modum folior&m acuminatorum, fiugul^ bi_nj^ J unxiw nunquam terni^ pedicellis pollicaribus in extremitate fiirculorum prodeuntes, penicilJis teimium fila^ mentorum, quæ minutiffimis capitata apicibu* verfiis omnes fek extendunt parteSj. oriiantur" Fruftus perplanac &: longaE font *filiqua*, utrinque cuspidad^ cortice craflib; duro, fubpurpurafcents nervo^ obfept*, finguk aliquando geminae e forculo dependents. Ipfa: auteni f_bx niolJes fob-amaræ, oblohgae 5c planæ, tranfrer/ariae bolbiticarion imitantes in carne aibicante includunt/ " Narcitur, quamvis fparfim, in multis arenofis petroffique *Malabar*, ut & *Cranganoor* locis, "nunquam in caudicem adolefcens. Flonbus induitur Julio 6c Augufto, fructibus maturis fob hyemem- h-ondebis femper virentibus, quæ decedente die fe compliant. Horum velut & corcj^is fuccus cum pauxillo falis exhaustus ventris fedat dolores: ipfe cortex qipitis lavaraento utilis addkur qui in pulverem redadtus lummo cum levamine ulcricibus inffergitur.

CAP. VI.

Acacj<z foliis frutex Mefopotamicus Column^ notis in Recchum p. 467.

Col.

ELeganshzc &raraplants, Acacia: foliisScramulisadfimiljs; necamarorem, acrimoniatnaut AUu Fcetorem refert, nee maniteftam aditnngentiam okinet; *foliis* eft pennatis & fenk pennarum ordimbus utrinque diflbais, ac Jobulis fer£ viginti admodum exiguis ut vix oia— redè exprimi potuerint, mcifis. Spinæ ex li^nofis ramulis uUieo cortice veftinis aon fimul b. in exortu Fohorum, led diftintas habet, & umcam tantum in illorum exortu. *Semina* pallea proferteffigiePyrifedmajora^niinora parum ^gyptis .Acacia, comprcira, kvia, ninda & colore fpadiceo, filiquis five craffis lobis contort^ obelis, medulla pallente-fungofa turcidis obliau^ difpofita indufa^ necut in Acacia .EgypDa vera, cujusfiliqua eft depreAT latitudine eontenta *Florem* ignoramus cujusfit generis, nam in heco ramulo non aderat Fruticem VTM. tonrcnra- borcmfubUmceffe Petrus de Valb Romanus eg ues, ^Uoll^t J Z ^ l ^ ^ r T h 4f- nnanam altitudinem non excederEj & juxta flurnen Tigridem in JVlefoporania, & in deSta-ArT bia juxta Euphratemvel parum diffito loco repenn, cujus fliquam ab incolis ad faneuinis fluxibus cchibendum utilem ufurpan accepit, 5c vulganter filquam-W, atiam ut Ceratonium Cbepnub dicit, genericD foi-ran nomine filiquarum.

CAP. VII.

Vty Braflienjihus Marcgr. Acacia affims foliis & floribus.

Marcgr.

ARbor eft faturate virens & fpinofa, Scorbo Aucupariae nafcendi modo figiuraque fimilis' irt ±\ multos difpeditur ramos, & fere rotunda eft, & in ramis etiam ramuli alternatim funtopw pohti. *Foha* habet minima, eodem modo difpofita quoin herba viva, 8c in extremitats ma_ quai bicorma quo differunt a foliis Tamarindorum, quæ pariter faturate vindia, 8c praterea acidi lapons, cum h^c nullum faporem habeant manifeftum. Si lapore eflent acido 8c filinua' ferrent* cum Acacia conveniret. Non tamen femper arqualia folia in hac arbore fibi opponun- tur, fed mterdum fohtarium ell in extremitate ramuli. Pert flofculos prope ramulosin uvam gestos, albos, longiftaminulis, ita ut pilofi feu fpinofi videantur. Lignum album elt acle cortice ex gryleo rubrocut Sorbus aucuparia.

CAP.

CAP. VIII.

Mimosa Malabarica flore fntafzah, filiquis lamginofis. Kal-Toddavaddi H. M.

AD tres quatuorve pedes: affurgit. *Radix* ruffa & capillaris. *Ramis*, qui primū rube> deinde virides, pilis non modo, fed etiam fpinis diverfe magnitudinis innumeris, deorfum deflexis obfepti flint; adherent furculi kr& digitales, foliacei, ex adverfo gemini, rubefcētes, fpinulis quoque ejufderi coloris hirti. *Folia* proxima *Int*(i*₃ per ordinem contrariis inter fe pediculis annexa furculo, elonga, angufta, anterius obtufa, pertenuia, lenia, nervo fubtiliattamenramDfopradata, furdi funt virons. *Q*#* fi rarigantur illico, more *Toddavaddi*, veluti complicanda: manus fe demittunt. Sc cum oppoficis foliolis fepe quafi complicant. *C*j mu^i iarnen attolluntur, acqueinSolis occafum explicantur, quo difceffofponte collabafunt. *Florts*, qui in pbcioli5 longiufculo, rigidis atque fpinofis, libpurpureis hie illic proveniunt, quinis collant petalis, quorum quatuor tenuia, lenia, latiora, ad unguiculos verò ftriftioraj Circa ambicum exiguis rugij crispata, flavi colons, fed abutraquefacie^nternigrantia flint i ex his duo anteriora erplanat ad petiolum fepe reclinant; duo posteriora oblique erefta iefc mutuò refpiciunt. Quintunti inter duo ^OTcans rigidum crafumque eft, ejuftlem at dilutionis colons. Ex medio prbminenha/*w*0 infbrp^ drtē compafta & lanugine obfta albicante degem funt, el viridi albertia, fupernctenuiaj internigrancibus flavis apicibus dotata. Calyx quinques infeftus, permollis & purpureus. Siicrefcēte5 *Siliqua* duos digiti articulos long^j lanuginoOe, Be atris interperfe maculis binas, ce/nas^ rariū unicam indudunt fabam, tranfverlariam, accrbam, lubviridem, matiiram in nigredinem vergentem. Saporenoftratesreferunt-

Locus Nafci amat locis petrofisumbiosirque. In *Zmdtnau^ Ttckmcowr^* alifque locis plurima eft. Semperfrondet.

CAP. IX.

Guaibi-pocaca-hiba Brafilintfibus Pifoniş & Marcgrav. Arbor Silica tortnofa j>utrefcēte> FraximJla foliis Breyn.

A^{Marcgrav*}rbor .eft ligno, cortice, medulla, DOor^At fragilitateSambuci aetnula, elegans,, in mulco5 ramo5 divifa, qui in extremitatibus fuis longa germina protrudunt, in 8c iis multDs ramukfej ternosaut quaternosjuxtafe pofitos. Bina *folia* femper fibi opponuntur, brevibuspediculis innitentia, ad taftumdura infnar membranacex charts, exterius *Salvia*: foliis recentibusvenis Seviditate *filimia*, fuperius diluti viriia, Jaos aut paulò «mpUu. ^gitosUnga. Inter ramulos eriam foliorum prodeiiint pediculi, duos aut tres digitos longi, qui iz aut 24 *flofulos* umbellatim, congeilos fuftinenr, figura florum Primulz veris, quorum quilibet confat quinque folioli^, dilute flavis : in.medioautem.ftaminum loco pr open dent multa filamenta, fequidigitum longa, quæ quoad medietatem lutea funt, exteriore medietate *Crocum Orientalem* rufo colore & crispitudine referuntj 8c in extremitate cujusque vifirur punftulum flavuq. Flofculi font foaviffimi odoris. *FruHus* fere in *Silifm* quatuor aut quinque digitos bngis^ anterius faftigiatis, cetera parallebgrammis acpdullum compreffis. In utraque laterali extremitate quaff futura fitioribus ufitata font claufe [Pifo Arborem *Siliqux* dulci didx comparat, funt enim, inquit, illius *Siliqux* dukes, tortuofb 6c deform^ primum quidem virides, mox maturitatem confecutx fiunt nigrs 8c putrefcunt.]

Locus
Vim)

Apricis gaudet campis, mirific^que peregrinantes deleftat florum elegantia 8c odor?.
Radice medulla ex albo flavescens, a leviori cortice liberata in taleolas diflecat, eaque aqua fontanamacerata per noftem fiibdio, 3c aliquiDtics pot a non uni malo medetur. Urinam eniin cunftantem ciet, renum 8c veficx obftruitionibus opitulatur, ejuoque decoftum vel folum gonorrhcEas reflicuiffe vidi, Succus corticis recens oculis inditus earum inflammationes tollit.

Folia hujus arborisaccuratius defcribit Jac- Breynius his verbis, Frondes feu folia ramofa quibus obumbratur hsc arbor a Sambuciniş foliis longe funt diverfa. Quaelibet enim illo5 pedicub rotundo, ftnato, leniter hirtuto, dilute viridi, dodrantalis longitudinis, candidiffima medulla farftt?, conflata: in quo Suffragines tres aut quatuor, holofericej utrinque ex oppofito, per interftitiauncialia 6c fe^uncialia, fummo ordiqe difpofita cernuntur. Ex his fuffraginibus, infimaz plerunqz raro longioiesuncia: fecundae duplo majores: tertiae tertia adhuc partej fed quz quarto aut ultimo locate breviores iterutn fe fiiftunt. Minimamm aut infimarum fuffraginum unaquxque foliis uno autduobus, fubfequentiumtribus aut quatuor; reliquarum quatuor aut quinque, Fraxinellx figura 8c magitudine aequalibus, utrinque nbi mutuo oppofitis alaca .eft. Reliqua videtis apud B^y-niui.

CAP;

CAP. X.

I. *Talega-Vaiamli* * H.M. Arbor filitjuofa Malabarka, cordato folio, fruflu maximò oUoHgo * p. it p_m fa; planOj femine membranaceo* D.5yen. j_w 77,

H.M.

Arbor est procera, nascens in arenosis, ramis minus in tranfverfum diffusis. Radix fibrosa, ramos quaquaverftm cmittens cortice craffo, molli, exterius rufo, intus ex viridi flavescente, fapore fibamario, ligno albicante ac ruelli, quod facile in filamenta prorrahitur. Caudex ambitu unius hpmis amplexum implst, ifque 8c rami majores cinereis tenerioribus virides, * scabri Be punctulis asperi, grandibus nodis, ex quibus ramulos tranfverfos binos 5c * Verbis fi, binos ejiciunt, extuberantes; medulla fungosa 5c albicante ligno paucò, atque adcb valde leves: qm̄tibusfoli- Cum vetustioresfunt, decidunt, notas relinquentes, in quibus etiam novi erumpunt, Folia pinnata ^{TM^{um} PTMTM*:} Fraxini modo, costâ mediâ, cui pinna feufoliola utrinque adneantur, quinque, fexve cubitos plus ^{^ J 1 ^} minus longâ; pinnis inpsciolis curtis adhxrentibusnucro ternis, quinis auc septenis, una Temper utrinque ad- extremam costam Dceupance; cordis humani figura circumscripta Dne ad petiolum rotundis, anteiuis hxrent Jescerit, cupide angustâ eminentibusj cectura tenuibus Be mollibus, liiperficie kni, fuperne latiiraciüs, fubtus ^{here} videntur) pallidiüs virentibus, lapore fibamaroj odors gravi. CostasBc nervipinnarum in averfa folum parte ^{nc emmr:} eminent. Floret in fummis ramis plures unâ proveniunt, in petiolis craffiufculis, grandesj camp;iri. ^{^ d d d d d d} formes cum CDIID oblongDj & ad unam partem nonnihl inflexo, calyci oblongo-rotundo & pro- jn qua&inqnc Fundo infidentes, fbxpetalis craffiolis compoitiij quorum quatuor quæ ad conuavam colli ^{\>xtzm plant a*} fed fo- iint, exteriora versus maximâ reflexa, reliqua duo ftrrefta &c minus inflexa, omnia fungofa non 'w tantim, venofa, ad oras cnlpa, duabus tribufvelirprofundis exterius per longum ftriata, colore, maximè interius ex albicante fibflavD; exterius in colli convexa parte, foliifque lurreftis[^] quæ versus earn partem Jita funr, ftrris rubefcentibus tinti, odore fuetido. Stamina quinque craffiola, Sc nonnihl reflexa, ex albicante fubflava, quibus incumbunt apices lati, flavi[^] bifidi. Stylus tenuis, albicans, ftimmitate in planum excenuatus, è piano albicante Be lubflavo capitulo, in fundo clycis fito, quod rudimentum fructus est, erumpit. Calyx craffiolus laxè collum floris excipiens, in ora parum cupidatijseft. FructusRoYibus deciduisfuccedunt prargrandes, formâvelut machaerse, tres fphthamas longi[^] palmum lati, digicum fermè craffi, cum oris ad unam partem nonnihl reflexis, corticecraC fiolo viridi, tenera ac humida carne, quæ dein in lignofam duritiem evadit, in cortice exterius in niedia in longum in ueraque parte uno fulco ftriati. Membrana lata coriacea medium fructunij juxta cU5 laticudinem in planum extenfa, in duo loculamenta dividit, in quibus fingulis femina innu- mera connn[^]nrur, Jato-rotunda 5£ valde plana /bu compreffa, cum umbilico lungiufculo menibra- naceo, albicante involucro amifta, 5c latâ membranâ pellucidâ, albicans circumcincta, jacucqu5 feriatim in planum in lui5 involucrisj alia proximè ad unam, alia adalteram Dram: nudaca fuis in- volucris viridia funt Be den^e carnis, fapons nullius.

Cortex arboris fervitpro confolidandisraftuns Be fcifluris tritus 8c cum vinoimpofitus- Radix Vires] in decoctodatain hydropeprodeft. Folia tenella trita & cum Croco Malabarico ulcenbus admota aij ianationsm conferunt.

2. *Pajanèli* * H.M. Arbor fidiquofa Malabanca[^] folio major* muwonaty, fruUti maximo p&.*P.i. F. 45; Iong9 piano, [hmim mzmanaciv D. Syn. t-7% Bo-

H.M.

Eft arbor procera, ramps in altum, minus in latum diiFundens[^] nascens in arenosis. Radix in ramos sparfo[^] ex quibus hincinde circa caudicem novae firps expullulant, cortice craffo ex cinereo nigricante, intus albicante, faporis fubamari, ligno albicansj laxiore[^] quod in fi I amenta facile protrahitur. Caudex craffitie * praecedentis, lignoquoque fragile 5c in hlamenta je findente, cor- tice ciner^o fufco. Folia b caudice egrediuntur, ut in praecedente, pinnataj costâ mediâ longitu- dine pari, viridi-diluta, Sc nonnihl scabra feu punctulis aspera, rotundioLi ac in una partej quæ cum -interiori petalorum convenit angulo acutp eminentc, nullis ex tuber ante nodulis, ut in prima fpecie. Pinnæ feu foliola bina 8c bina adverfa, multo majora funt quam in prima fpecie, ipitha- ^{maon & amplius lobos, f x m u b b b g z, h s u o n d i f f i s u n o, q u o t u n a q u o d c a l u i u s f f t i g i u m r e - f p i c i t, d u p l o f u r t e a m p l i u s e f t & r o t u n d i u s o r e r e l i q u o, a c e x i n t e r i o r e p a r t e p a t o l i e g r e d i e n t e,} ddoris maleolentij5, texturæ craffioris, luperne yiridi-fufcaj fubtus dara. Flores prxcedentis fimiles, in quinque lacinias feu folia incifi, petala quam illius multò craffiora, magis fungpla, ac in oris pibfa, feu lanuginofa funt. Stamina tantum quatuor *apiibus* albicantibus. Calyx Jpiffil ac rtlucofo ^{f a p u o d e t a m f l o r a m a n t e r i o r f u p e r f i c i e s i n u n f t a, i n t u s o b d u f t u s: f u n t q u e f l o x e s, u t i f o l i a, o d o r i s m a l e o l e n t i s f e u e f e d i i.} Fructus plane idem.

Foliis ejus pitfis Sc tritis, 8c unâ cum Cardiaca, id est, Myrobalano citrino maceratis in piro- Vires] [is utuntur ad tingenda linteamina colore nigro, qua in fuis exsequiis gerunt. Vfufn

Radix trita Be decocta in oko pro capitis dolors 8c gravedine fervjt fatti pcrunaioDe: Cortex radicisjn decocto datus tumoribus rcolvendis commodus est. Decoctum ex cortice 6c folris tritil tritis in undione corporis pro puftulk ac ulceribus fervit.

Quamvis arbor hsc non fit folio decompositò feu ramofD, quia tamen filiqua umnino cum ^{ra p e} dente convenitj Be eodem nomine ab Indis infignitur unâ tradendam duximus.

Fractum huic valde fimilem, exceptâ fuperficie scabrâ, vidi in Museo 4kiflimo excellentiffimi Viri D. Guililmi Coartine Medii TempJi.

SECTIO TERTIA.

Ve Arhoribus 6< Frutkihuf filquojis flore pmtapetah.

CAP. I.

De Sena Alexandriā ^>^ affinibus.

Ouatnvi5 Sena revera herba fit, non Arbor aut Frutex, quia tamen à Botanicis fratidbus annumerari folet, Be à nobis in hifturia herbarum per oblivionem omiffa eft, hoc in loco ejus hiftoriam trademus.

Sens nomen ab Arabibus fluxit, fi quidem Sena Veteribus Gratis & Latinis incognita 8c indifta. JŒsenz notas charatfterifticas facit Paulus Hermannus Stamina falcata c' flore exierta Be femina in filiquis bivalvibus unicapularibus, quafi per articulos junftis.

i. *Sma Alexandrina five foliis acutis.* C.B. *Sena* J. B. Ger. *Sena Alexandrina* Park. J.B.

Sena quam ex Driente infitores important prima? eft notae: *vaulhtts* cubitalibus aut paulò altioribus, lignefcentibus ex quibus alternatim exeunt pediculi tenues, palmo longiores, ad quos ex mediocribus intervallis adnexxunt foliorum quator aut fex conjugations, nullo impari alam claudentej quod animadverterimus adhuc. Singularia autem *folia* ex vindi in flavum declinant, pi^p ximèque coftac adhacrefcunt, Glycyrrhiza: foliis iimiliafedacutiora, guilds nonnihl vifcidi & C amari, rmm fine naufea aliquL *Silyua* falcata^ comprefla: ^ nigricant, *femm* continentes parvunij gi-garti5 fimile, fed compreflum, album vel nigricans.

Cordus flores luteos Be pallefuentes, quinque foliis in cavitatem aliquam reflexis conftant^s Se- Ìx acatribuit; Matthiolus pariter *flores* luceoSj pentapetalos^ Brafflicz fimiles.

Sena Gracis 6c Latinis Antiquis nufquam defcripta invenitur: nam Be Averrhoes novam herbain efle adfruit, K Prifds ignotam.

Camerarins Senam Alexandrinam, ne quidem in Italia, ultra annum durare, ideòque pro frutice haberi non poffe ait. Nee Ício an in loco natali longioris xvi fit.

*Locus** Amat calidas regiones, frigoris impatientiffima eft. In Septentrionalibus provinciis fata prove- nit quidem, verum ad frugem non pervenit, imo tantum abeft ut nee filiqtas, nee flores promat. Sen aiunc in Syria, Perfia, Arabia, inde in iŒgypcum deportari, ad Alexandrian^ unde ad nos defertur.

Virv. Purgat Sena non tantum bilem utramque, Ted 8c pituitam: imo in melancholia Be atra bile creditur habers Prxrogativam quandam. Vim ejus cathartiuam ad ftuporem ulque extollunt pleri-

* *Medie Dffi- tin.* " Lobelius Matthiolum reprehendens, folia fi per ft, pulvere, infufo aut deuofto dentur turbarum multum ciere, 8: inteftina ftDmauhumque torquere aſerit, ut vel plebequla conqueritur. Hoc ratio etiam diflat: Vifcofum enim illud quod in lingua relinquit plane adftipulatur experientis: aftipulatur etiam virofus ille odor, Cynogloffii aut Punic* fere fimilis; quale quid etiam tam in infufb quam in decofto fentitur. C. Hofman.

Quia calida 6c ficca eft corrigitur flor. Viol. Borag. Prun. & £ quia flatulenta, quo minus Ventriculo obeffe poffit, Cinnamomo, Galanga, Zingiber.

Quoèunque autem modo datur, in decofto qdidem minus flatulenta eft fed debilior; in iaŒifo autem flatulentior fed fortior. Debet autem decoftio efle mediocris, ut Meſſie parcipit: nam cum faculars purgatoria fit in fuperficie diutina coftione evanefcit.

Datur in fubftant. ab S p; ad JjŒ. in infuf." a 5ij- ad 3v. vel ad 5j-

Exhiberi poteft (inquit Schrodeus) omni a^tafi Be vel iplis pra:gnantibus; debito modo corrc- fta-

Infignes ei vires adferibunt medici turn veteres, turn recctiores. Mirifice prodeft uapitis dolori, delirio, amenti^ Epilepfis, refolutiini nervorum, fcifluris totius corporis, Phthiria, fcabieij puftulis, pruritu, &c. cor exhilarat, vifum acuit, & auditum firmat quoquo modo fumpta, vifcerum obftuŒtiones aperit, anget juventutem, feniumque retardat. Folia in capitis pŒrfuffionibus utiliter decoquantur; prarferim additd Anthemide.

Folia exhibentur a ftipitibus feu pediculis avulfa, rejeAis ftipitibus.

Ad Sen^ prarparationem purgantem fine igne. IV Folior-Sen. mund. q, f. Punatur in lagena vitrea fatis capaci affundendo aquam vits^ tinfura-Cinriamom. imprxgnat. ita ut qaatuorvj; quin que digitis excedat; dein vale bene glauio finatur per biduum, Be poŒtea ucwe. Dofis uoch. ij. cuin jufgulo. D. *Hulft* e *CheŒeau*.

1. *Sena Italic* a Park. *Italia* foliis obtufis C. E *Flortntina* J. B.

Caule conftat cubitali; *foliis* fimiliter difpoŒtis ac in Sena Drientali, fed midcb fnajonbus, nervofionbiis, non acuminatis, fed per extremum latis ac pznis cordatis, guftu glutinojo. *Flores* feit luteos, *filiquas* comprd'as Sc falcatas, anguftiores Oricalij li <ã urrinque per medium iniqualter excuberanep, *Œrminifas* nigris compreffis, hguarã cordis. Utuntur

Utuntur hac Medici loco Sens Orientalis ad piirgatos acres humores, fed longè inefficacior est ad eum uliim.

g. *Sena Oriantate hexaphylla, Tola Zeylonenfibus* Hermanni. Hort. Lugd. Bat.

Herman.

Radicem fert albam, tenuem., fibrofaniij annuam: *caulicnos* dodrantaes, herbacenSj primùm erctos, poftmodum reclinatos: *Folia* in qualibet cofta fex, bina fibi oppofita, fubrotunda, unguem lata, pingua, faporis fubacrisj ingrati, cofta vero Dieracei haud in gran. *Flores* congenenibus fimius, aft minores, pentapetalos, ftaminibus in medio concoloribus, 8c ftulo falcato., longiori: *Siliquas* compreffas, anguftas, recurvas, imicapfulares, bivalves, quafi articulas feu ifthmis interceptas; in quibus *fmia* oblonga, teretia, lucida, fufca.

Sennaefpeciebus turn ob lamina falcata quæ ex flore exferuntur^ turn etiam ob feminain filliquis bivalvibus, unicapfularibus, quafiper arciculos jundtisj annuieracD.Herwtfww/w.

I. PaiDmirioba primam fpeciem *Yifanis* \ quam *vozz Semam Occidentalm,* *vdory Dpii virofo,* *Orobi Pannomicfoliis nwcronatis, glabrOfn* : Cujus defcriptioncm vide in lib. 18. p. 91 x. Hift. noftrac.

x. Paiomirioba fecundam fpeciem Pifonis-, quam *Smmam Occidentalm* > *odere Opii minus virofo,* *fvliis glabris obtufis* appellat; cujus defcriptio Hift. noftrsE loco citato habetur.

5. Lotoaffinem yEgyptiam C. *Bm* quam Sennam Orientalem retraphyllum *Abfm* diftam nuncupat-Defcnbicur Hift. noft. lib. 18. p. 921.

4. Galeg^ affineni Sophram didtam C.B. quam *Sennam Orientalm fruticofam Sofhera dicta*^H in-feribic; 6cPonnam Tagera Hort. Mai. Tom. i. p. 101. facit DefcnpciDnem vide Hiit. noft. hb. 18. pag- 911.

5- Chamxcriptam Pavonis Americanam filliqua multiplici *Brtn.* cui *Senna Occidentals fdvya, multiflici foliis Herb* mimofa* tirulum facit.

6. Chamzcriptam Pavonis Brafilianam filliqua fingulari *Breyn.* Cent. 1. p. 64. qliarum duarum defcriptione5 habentur Hift- noftrs p. 981^ 983-

C A P . II.

Tagzra, H. M. P. x."F. 51. P. 103. Senajpwria Malabariza,

Plancula est altitudine triunt quatuorve pedum, nascens in arenosis. *Radix* fibrolaj nigricans aalignofa. *Cauli* tereteSj lignufij virides. *Folia* in caulibus, qui ad exortum nonnihl extuberantj Be interius ftinata funt, brevibus pedunculis in duabus funcbus bina fbina proveniunt, oblongD-roCiinda Bclata, ancerius rotunda ora, ad petiolumftriata, texura craffiola, (uperficia planaj ad tadtum lenia^ viroris (iirdi. £ cufU media qua: in (upin^ etiam parts nonnihl emineCj nervi ferme paralleli, qui folium in prona eminent, annuarii duftu exeunt.

Flores formã Be colore * praecedentis fimiles fei minores. *Calyx* vindis quinque oblongo-rotun- * *Vmnam Td-* dorum fie viridium foliorum. *Stliqua* flonbus liicedentes, reftae quoque &L oblongac, led ylzni-g&* hoc est bres Be anguftiores quam illius, feptem pollicum. *Faba* qu^ in iis continentur, rocundiolac funt, ^ Jfrr^ cum iiii longitudine jacentes in longitudine filiquarum; iaponis fubacris, primùm virides, deinds cinereir 6e nitrites.

Folia nta ferviunt pro iftu apum in inunftiDne partis affeiftz. *Semina* triraac cum crocounfur- *Viru-* paca conducunt pro puftulis Be ulceribus, Be cum lucco plants *Vtla-Caitn* fervit pro malo nato in unguibus iis appofit^

C A P . III.

I. *Arbor exotica Jpinofa foliis Lentifci* C. B. *fpnofa Indica muricatis filiquis* Park. *Lobus* *ixyfofi,* cum *Pifo duro cimrti coloris* J. B. *Lobus ezhinaUts* Ger. cmaC *Bonduch Indorum* Pona leal. * P.i. F. 11. *Caretti* * H. M. *Lobum eebmodem Clufu froducens fpina, Inimboy Brafil.* Marcgr. h 33-

H.M.

AD humanam altitudinem afurgit^inferiori parte caulium repens fuper terram. *Radix* ei fibrofa, nigricante Be tenui corticej ligno intus albo, odoris nullius. *Stipitej* virides, denfis aculeatis fpinis in totum muniti^ intus C3rculo fungolo albo. *Folia* pinnata, bina in ramulis ex adverfo fita, è plunbus pinnarum conjugationibus, breviffimis peciolis hsentium compolita, duabus ad exortum fpinis rubdbentibus Be deorfum inflexis. Sunt autem pinnx feu foliola parva, pblongD-rotunda, utraque extremitate ex rotunda cufpidata, vei-sus interiora nonnihl daufa feu crispaj texturã folida, craffitie mediocri, fuperficie plana, glabra, fuperne faturatius viridia, fubtus lucidiora, faporeamaroBcfubacri, odorenullo, fubtiliffimis nervis Be venulis oblique anteriora verfus in longum ftriata font compolitaj unum quod minufculum Be latiusLilum est ac interiora verfus nonnihl inflexum feu concavum lineis rubns traniverlis variegatum est- Staitiina decem furreCta, albicantia, dilute viridia, pilofa, apices obJburt flavos geftantia.

Calyx

Calyx quinque foliis oblongo-rotundis Be renticulis nonnihil incisis, versus inferiora nonnihil reflexis confat. Port *florzsfructus* e calyce erumpunt echinati, oblongo-rotundi, valde plani, exterius in utroque latere numerolis Ipinis longis, acuminatis, rigidis ac furrefts obfti, pnum virides, poftea ex rinereo nigricantes, duri, interius ad corticem carne craffiola viridi, qux plummis guttulis htic indè circumdantibus eft irrigata Ddufti, ac lata in media cavitate.

Fahx incus duz, tres, quatuorve ac etiam lolitaris, umbilicis, tenuibus, albicanibus, echini dor- Jo annexe oblongD rotunda: pnum virides, maxime versus umbihcum, cummaturaacficziunt cortice duro, albo-cinereo, venulifque nigris undulantibus ftriato, intus albiffimae ftint. Putamen adeo folidum & durum eft, ut fructus faxeiideantur, & cum difficultate CDnfnnglpo¹ lint. Hinc ex America mflum accipimns titulo fructus lapidei, funtque qui nucem Bezoardicam appellant. Nucleus guftu eft irnpense amaiDinfar Lupini. Hie ffuftus J. BauhinD *Hift-1 & 1- E⁵* fenbitur fub citulo Fruftiis peregrin tanquam torno elaborati argentei: eftquefructus i. cap. 3D.lib.2- *Exot. Cluf.*

Multis in locis tarn in America, quam in India Orienta Ji nafcitur.

Fruftus e filiquz exempCLis, & a D. *Gwrg'w Wilmzr* Scrafordi[^] pr>pe Londinum latus, eadem aet^{ab} te non germinavic tanriim, led ad bicubitalem fere altitudinem excrevir, quaquaverliim ramos lp^{AT} geris; parvis, acutis, aduncis Tpinis tarn per caulem, quam per ramos oblitus, foliis alatis leu pi^{naa} ti5j *Lycus* Virginiani aernulis veftitus. Sequens hyems plantam corrumpir. *Park.*

Hujus etiam generis effe puto fruticem quern depingit & defenbit J. Bauhinus lib. 5. cap. 47- TMD titul[^] Fruftas omnino rotundus luteus non fplendens cum fuo fruce.

Radix Be *Cortex*, contriti, necnon folia cnta feu in decofto epota, leu externe impofita; item Fab[^] leu cum lafte *Coejui Indici* citar 8c impofitfc, feu in pulvcrem redaftz Be cum vino epDts her- niofis comoribus cbnduCunc, ac infuper flarus diffipant, dolorem colicum fedant, ftomachum debilem confortanc, menfes movent, &c. in calculo etiam prodeite dicuntur.

Johnfonus apud Geranium fibi a nbnullis relatum ibribic hos fi utSus venenatDs elle; ab ah5, vomicLIm valide ciere.

Hanc plantam Marcgravius fie defcribit:

In Cynosbati magnitudinem excrefcit. *CauJex* & ramuli pleni Ipinulis hepatici coloris, lign¹¹¹¹ aucem incus medullpfum iriftar Sambuci. Habet in quolibet ramo muhos ramulos fibi invicem Dppoficps; in ramulis porro *folia* icidem oppofita, a quaCLiDidecim ad viginti in uno ramulo, qui i/W* quodhbet par foliorum duobus munitur aculeis. Sum autem/b//* ktè viridia, Iplendentia, fere cy- lindraceaj. Bcupum circiter digitumlonga. *Flcresfenin* fpicam congefctos, luteolos. Hos fcqunn- turlobi, Ipinofi, hirluti[^] colons cum maturuerunt hepatici, in quibus lingulis continentur JUD gb- buli duriffimi, cinerei colons, glabri Be Iplendentes, qui quaflato lobo ftepitum edunt: nucleus inte- rior ex albo flavus, amah lapons, inftar Lupinorum. Lobus autem per maturitatem diffilit K effun- dic globulos-

J. Bauhinus duas alias hujus fcuftus varietates defcribit lib. 3. c.48. alterum titulo Fruftils peregrin- ni tanquam torno elaborati flavi: alterum tit. fructus Indici tanquam torno elaborati viridis.

2- *Arbor frinofa Indita fdiquU -v'dl<>fis ~*~>~Q>~TM~*, a - i - r - r r i ^ - . H.M. F. 6. r. io. p.; ^ -

H. M.

A precedence diffbr, quod hie flores proferat fimlices, juxta furculorum exortus pofitos, deca* phyllo5 e viridi luteos, ftilum rubrum emittentes. *Siliqua* > *Kakamulla* effigiem habent, cortice lunc denfoj fubfufco duro, intus helyolo, foras villofacj non autem echinatXj unicam duntaxat fabam continentes, quas perplana pilosaque eft, led prsdurd & apud medicos in ufu.

Loo*.

Nafcitur propè montes denfflimis in fylvis, in Provinciis *Zandanata*, *Cottate*, ut & aliis locis. In hac alii maturefcunt fructus, alii turgelcunt, alii, florenf.

Fruftus hujus arboris extat in Mufeò refeitiffimo Clañflimi viri *D.Gulidmi* Co»rri»[^]MediitTempli-

5. *Lybits cebmatus Molucenfij* Ponz. *Lobus orbicularis fufctt5,fpinofis tubzreulis obftis bims fhafw- los nigros continent* C. B- *Fruftus* 4. l. 1. c. 15. *Exot. Clul[^] yw Indis Samfarantam.*

Cluf.

Orbicukri5 erat hie fructus live bbus, uncialis magnitudinis, irifima parte in mucronem definen- tZj fpinofc lubrubentibufque tuberculis undequaque obftus, culcelli dorfo non craffioi[^] pedicLilum ad orbis latus habens, &c tDius lobi color fulcus. Omnes autem hujus generis quos conlpicie[^]at Clufius in media pertufi erant, ut funiculo trajedti ad commodius fle wcilius (ut arbitrabacir) re- ficcandum fufpenderencur. Singuli verb lobi live fructus binos phafeolos continebant, lemimum Anagyridis formam & magnitudine, prorfus nigros, ut conjetturam faceret eos lobos antequam pBrtLinderentur j non adeo pianos fuiffe, led ahquatenus tumentes. Indi *Samfarantan* appella* bant: Qiiandoquidem autem filo trajedti adlervabantur, apud illos aliquo in ufu fuiffc necelk[^] eft* fed quali intelligere nequivk Clufius.

C A P. IV-

Morina Lentifci folio, fructu ma^{no} angulofo, in quo femina Erui J. B. Arbor exotica Lwtifci foli& C. B. Moringa Ferrar. Flor. Park. Acoft. Moüringou H.M.

H.M.

QUINOS homines longa eft, unius complexum crafty cor ties obdncta riigricante,intiis albedo, odore 8c fapone Nafturtio auc Rhaphano ruftico Jimillimo. *Kami* funt ligno albicante, hbro viridi. *Radix* vefticur corde ex albo flavefcente, trunci iiporcm rekrente. *Folia* bina fibi invicem oppofita* cmmunibuspecidhs fpithamam fere longis, cuktalibus flircLilis ad verticem ufque adnafcuncur, diminutis fenfim peciolis: funcque elongo obtufa, tenuia,mollia taftu Schnia, media cofta prominence, nervis aliquot in lafera cxcurentibus donata, iupernè è praffno futca, infernè exviridi laetiora : odor Fabis fylveftribus proximus. *Flores* candidi, decapaltali, petiolis incurvatis b ramorum cacumine dependent; quina externa fbliola oblonga^ extrDilum ftek in modum expanfa refle^untur; quorum bina pofteriora niajori, crina anteriora minori dilant intervallo. Incimorum latiorum quatuor inferiora obtegunt, quinto ex inferiorum medio prodeunre, è regions arrefto. Hxc inter, elevatum foliolum proxim^ medianus fe erigle cofus in decetn flaminuk è viridi albula extrorfim inflexa divifis, quorum paria uno grandiulculo, flavJ^fcante pbtgunturapice. Foliola (vnfk₂) maxime interna rigida funt. Calicis latioris^ ac cvSridi fulci umbilico infidet globulus, frudlus germen, oblongns, quadanyenus pilaff filamentum prodens albugineum. Odor iis gratiffimus & melleus; Decidujs riicedentesfloribLis/rwffOT funt^porcis ahioribus friati, fequicubitales, cortice colons herbacdi, intus carne £Xab^da, *Jemimbus* repleti candidis: in deliciis ob gratum faporem habici, graciles; qujppe vecuftiores, eminentibus fingulis in lateribus cDtilulis ligneis, craffelcunt, ficcique rubent. Tribus fruaus lateribus trigona inclufa funt femina,, cai tilaginea pellicula, nudeo incus albente, membranis alata tenuibus, fecundum filluarumbngitudinem dilpolit.

Acofta turn ipfum fruticem, cum ejus ramDs valdc fragiles effe annDtat, Fructum pedalem, Rha-phani crafticie, otto angulis infigitum.

Arrenarum amans non modo in Malabarisc, vsrutn Be in Zeyloniac, alioimmque India: locDrum *Loau*. hortis ac villis ob fructus folumrhodo coficur, qui Fabarum more venals quobvis micuncur. Floret menfibus fttivis. Fructus nunc in anni exodio, nunc exordib, aliquando in iitroque leguntur. Septuagenaria vel oftuaenaria excinguitur. *Folia* iucurefcentibus novis ei decidunt.

Exfoliis, radicibusj cortice & fructu parantur pilule anciipafmbdicx. Hujus arboris radix ftefte *Virej* *عشبة* Acofta) Unicorru Be Lapidis Bezaar vices iupplec, veraque theriaca eft, 'qua vulgo MaUbarenfe\$ uCuncurLim glirium morfim, liicci ejus naribus hautiad maniafn; epoci ad lancinationes artuum ex frigore; Folidrum ad turn ores V en ereos dilcutiendos, ad pedum lumbricos; Sujci artorisaddolorces Venereos,foliorum advermes in ulceribus enacos^&cvide in//. M.

Alios u(us corticis trici ex aqua Dryzx ad oedemata, K adjefto Cumino ad odonCalgiam, ad vsnenatjLim glirium morfim, liicci ejus naribus hautiad maniafn; epoci ad lancinationes artuum ex frigore; Folidrum ad turn ores V en ereos dilcutiendos, ad pedum lumbricos; Sujci artorisaddolorces Venereos,foliorum advermes in ulceribus enacos^&cvide in//. M.

C A P. V.

Siliquofa Indica jlorz Fapilionaceo Jecapetalo filiquis latis monopermis. Kaha Mullu vel Kaka MouBoti H.M.F.6.r.12.7.33.

H. M.

BRACHIMUM crassa eft, ftno Candida, cortice leucophxD & rcabiofo. *Aami* ejus fpinofi, medulla periofoli, aiiquanCulum contorquencur. Radix odoratius vibrat, fiiblalfa. *Folia* fpiffa, folida, glabra, iummè viridia, è longo aculeata, ex adverfo gemina, furculis, qui duobus fpini\$gaudencaffiguntuf, primùm lenicer conltriaiva, ubi rhanduncur fubacria, inodora. E gemmis fiilvis jfrnu papiliDnacei, lucei, fiirculis pollicaris longitudinis juxta florem inflexis è pedunculis adhcz^refcuncpolyphylli: Deccmnamque A/u<r;^phaudabfimilesconfanc foliolis, quorum ex inferioribus unum inflectitur, caeteris cochleari fimilibus, quatuor inceribra ^ longo latorã funt. *StylmYarut* ut *Mouringo*, nifi quod in novem findaCur/^w/w^; odoris, licet languidibris, gratiffimi. *Sill-t\$u** laciDres, liuro corcice, incus exalbido, {ingulf narti fDlumbdo grandiore in involvunc/^ ^

^ Arbor paluftrium cupida in Mali excre/cic altitudinent; vivit prope C^orri, *Parou*, *Waraplz*^ *Locus* ipque in locis ad fluminum ripas. Effloret Junio Julioque. Fructus edit fub ahm^initrum matures. Tc *مرفأ* Ffondibus nun quam nudatur.

Medicus ejus ufus plan^ incognitus, nifi quod cortex ex la&td chnfntus vaulno diabctem gonor- *Vit* rnaeamque pafiinet.

Hujus *ut* K pzeedenjeis arboris flores decapecali eTe diciuntur. *Vemrn* forte quinque exteriora pctitla difta func poems calycis quam floris;

Lobum huic valde fimilem vidi in Museo infruiffimo eruditiffimi & C ornatiffimi Vin D. Gulitwi Courtim ſub nomine *Bondud* LXXV.

CAP. VI.

Arbor Indica fliquoſa flore pentapetalo, filijuis inſpiram wntortis lanuginojis. Katou-Conn H.M.*

H.M.

Arbor eſt prxcelfa, craffiſſrque quã ut dup hominẽs completfi poſſint; ramis patulis umbroſifque, cortice Be ligno fpadiceo, rubra medulla donata: *radict* longc aberrante, cortice ac ligno rubro, fapore infipido, odore gravi atque ingrato. *Folia* oblonga, cuſpidataj reniia, rigida, iuperne c fufco nitentia, inferne dilution venoſaque, gemina ut plurimum, parvis inauvatiſque peciolis, furculis adhacrent. *Flores* candidi, odorifque expertes, e iurculis ramofij quinque oblongis conſtantes foliis, cuſpidem deorfum demittentibus, conjunſtim enaſcuntur. Horum e medio, ftaminum vice^ fafciculus filamentorum tenuiffimorum eminet. Calix autem parvuſj quinque habens cuſpides, florem arſte involvit. *Siliqu** figura ſpirales,, contorKE, craffiori'' bus nervis extuberantibus fimul & c lanugine obſitx, aperris oris criſpatis, internum c croceo rubeſcentem oſtendunt corticem. *Fab** in iiliquis protuberantes, latioribus intervallis a fe invicem diſjunctim gemmularum more dependent, glabrD atroque cortice nitentes; pulpam habentes praiinam duabus viſibilibus pelliculis diſtinctam^ Odor iis gravis^ (apor planẽ fylveſtris.

LOCUJ.

In quovis proveniunt ſob, przcipue circa *Parou* Sc *Rtpolin*, Fruſtibus aut floribus ſempervirens jugiter veſtitur.

Vires.

Foliorum decorum canitiem avertit, lepram fanatj quod prſtat Be cortex cum Saccharo in paſtam redactus.

CAP. VII.

Wzllia Tagzra H. M. P. 6. T. 9, 1 o. p. 17. Siliquoſa Malahariaa fiore pentapetalo; Jili^uU Iovrij^plavis, diaphragmatic ſtmina [zchdmnbus inlzceptis.

K.M.

In ciaſſitu'dinem brachii, alcitudinem hominis adoleſcit, viridi involuta cortic^ Hgno admodum pauc^ramis rotundk atque viridibus. *Folia* e longo rotunda, permollia ac glabra, plunbus venis, media e coſta exorcis friata, glauca^ foliis *Tagera* proxima, communibus petiolis prafinis, ſuſcipiſj contrariis^ inter fe pediculis adherent. *Floribm^* quiminores, foliola quz arboris poterant viderij quinaſunt, lutea, ſingula cnbus nervulis parumper eminentibus intertexta. Be calyce penraphyllo obicpiuntur. Horum in medio decem ex albo viridantia, oblongis majoribus, flavis^ port^ m^dum obſcancibiis donata *apicibus*, conſpiciuncur *fiamina^* eminente uno viridicato, ob Jongiore atque incurvo fabagineo germine Succedentes ſiDribus *Jiliqu**, duas palmas pr^pmodum longar, per plana:, digitum tranſverlum lata:, laeves, in tranſverſum poſita includunt *femina* elonga, tranſverſij quoque interfepimentis a fe invicem fedufa, aliquantulum ſub cortice excuberantia.

LOCUJ?
LXXV.

Colitur ob folam elegantiam in hortis, in quos e fylvis circa *Vanam* ac *Pettette* traducitur. Piacipiti ſtares exhibet ſtatej feu menſs Sextili: Semen maturuin Novembri. & Decembri menilbmj arenolos amantes IOCDS, ſempiteinã virenc comã.

Vires*

Si radicem excipias, quicquid ex arbore exhibeas, addito CuminD, Saccharo candido & laſte finit gDnorhram virulentam. *Folia* laſti incoſta vaccino vel in balneum parara arciculareni expellunt morbum. Cortex cum Saccharo Be aqua lacvigatus Djabete commodus eſt, Radicis cortex cum Croco virente ladte exceptus Podagrxd & *Sum^da badda* Malabarcnlibus diſtx ſiccurrit.

CAP. VUL.

• P. i. F. ii. *CaJia ſijula AUxandrina C. B. ſiſtula Ger. purgatrix. B. ſbluti^ua vulgar is Park. Zorma * H. M. k&z o?Dinatp purging Caſſia u? puDDing^pip^trrc,*

H.M.

Arbor eſt procera, [Ju^landi trunco, ramis, foliifque proxima *Alpva*] *Radix* cortice eſt fufco, ramoſtranſverloſpargens. *Caudex* ambitu unius hominis amplexum excedit, cortice cinereo, ut *ScramiapreSj* obduſtus, furculinovelli virideſiunt. Cortex adſtrngit K Jibamarus eſt. *Folia* e quinque pinnarum paribus impari coſtam finiente comppiita, pinnis feu foliis partialibus ad bafinlatis, ad cuſpides friaionibus *Qc* acutis, fecus quã in -Caroba, mollibus, denſo mediocriter craſſis, glabris; ſupernẽ laturatiore virore nitentia, ſubtus pallidiora, fapore iibdulci K ſubamaro. *Flores* * longis tenuibus^ viridibus furculis feu pediculis ha;rent e foliorum alis cxeunibus, plures junſti velut racematim, eo modo quo flores Laburni, (jnguli petiolis triuncialibus hinc inds appenſi, flavi, quinque petalis oblongo-rotundis K nonnihil criipatis, anguſtiſinferiusunguibus,, ex vena media latiore veniſobliquis friatis, compoſici. Medium florem *ft am^ma* occupant decern, tna majora flava cum grandibus apicibus flaVD-fuicis, BCc. ſeptemminora flava cum grandibus panter apicibus, feu femibifidis flavo-fulcis Jinguis. Ex medio longum filiquarum viride germen prodit, verunj non ex omnibus floribus. *Calyx* quinque cuſpidatis foliis conſtat. *Siliqua:* Horibus luccedentes^ ad duſim cubitDrum paulatim longitudinem excrescunt, forma cylindraceã, diamerrouciali, colore per maturatcm nigricamej cortice ligaofD, ſ?u potiùs cartilagineo duro conſtantes, interim diſtin-

**Duasſpitha-trw bngis.*

ct.

ft* in loculamenta per. diaphragmata, feu orbiculos cartilagineos, tranfrerfos ac oanII-Lc'' ^
 cbi tici mteriDii affixi, & in medio redta fiffura, ad eandem cortis paiteni ftruri Orbicf f'' P''
 fubdulci, qua: primum albicat, dein flavefcit, poll ex rubro nigrkat obdHfti funt In hññ y''
 involute funt, oblongo-rotundz, orbicuh adjacentes inferiore parte, & cum fca Ion JT n t d''
 fpondentes longitudmi fiffur\$, tencrac corcice albicante funt, pulpa intus viridi fubacda n! ^
 ne pplucida & nervofa circumdata eft, fapDre nullo; cum matur* 6c flec* font cor ic V d ra ''
 bio-rulco obducuntur. uuro, ru-

in regionibus calidis, ut iEgypto, & omnibus Ferè India: Oriental prvinciis, oritur

gyptm dilucub per Caffiarum loca deambulare, frpius odoris causâ confueverunt: "quippe auri Lom''
 a Caffia, l-TMlllllll A graViffimum, Oriente P^iertim fble, odorem fpirancibus, ad ipfos delati %/%''

Quod ad eleaionem attinet, ea eft vel Fiftula:, vel fucci nigri & dulcis.
 Fiftula: bonnatis nota: funt, i. Ur fit recens, h. e. ut non dm repofita fuerit, Egypti rubem
 non utuntur recentiffimis, led faltem poft quartum menfem, quandoque iuniores r:actioréique

2. Qyi fiftulam quò majorem eo meliorem pronunciant fallunt, >* r- J
 gredinis ratio eft. Verus color eft cum rubedine nigrefcere. ^ .Eadem ni-

% Alpinus, Quod aliqui çannas optimaşmanibus concuflas fonum non edere aiunt fal/lim
 tiat. At eruditiffimus Veilingius crepitantes a concuffu fiftulas optimas efle vendaces quòdâm Sw
 os Alpinoperfuafiffedicat; cautiores enim mercatores crepitacula ilk a folidiore fû«ftu f S S''
 fè vidiffe, fie, fiqua fiftula: parte fe diftintfius offeram eatenus obrumpere: Arida enim incre if
 Jemina continent, 8c pulpamento melleo deftituta, humore tenui quo redundabantdirculb

Pulpa ipfa ties notas habet, prae nigredine fplendens 6c pinguis lfe: dulcis ferè ut Pruna fed c
 aromatica quadam acredine. Qua: enim vel acerba ob Immatuitatem, vel acida ob vetuftacem
 vitio eft. Summa, Quaxunque Caffia cum dulcedine quodam arqualuer afficit fauces, nulle mōdt
 mordicans, illa eft bona, quacunque fit fiftula. C. Hofhum. Et paulo poft, quamdiu dulcis e f t T T
 dm (ecuruseft ejusufus. » Canu

AtFallop^ius maturitatem Caflisexaciditate dijudicandameflè ait: fi enim mordicet valdcfauc
 indicare quod fit matura. Nos cum C. Hofmanno fentimus. -55f

Colleftas fihquas, iEgyptii continuè in opportuna loca fie daudent, ut nullus aer inerediatfr
 cum ex minimoaenscontactu Caffia: corrumpantur. Alpin. mgrediatar,

Pulpa Caffis purgat bilem 6c ferofos humores, 6c convenit in ardoribustum externis tui
 fanguinem, contemperans & puriorem reddens. Affèdtibus pedloris à deftiUatione acuto, n
 rum conurato mirefubvemf. Pulp^ h^c cumSacgharo cando Sc liqui, ita pro f e c r « o uti
 gyptuadrncumveficarcfeviciaj Proinde c j u s frequenri ufui fe à calculo prflervant. Mona
 cum eo Matthiolus pro infallibili prafervativo habent 3iij quotidie tribus horis ante prandium

Tamen monet Fallopius, intutum efle ufum ipfius in ardore urinx. quòd ducat ad beum ai
 8cmorbum augeat. Idem obleruavit Fabric. Hildanus Epift.tf. Tactum

Habec Caffia, hære duo mala, Humiditate enim, iua diffolvit tonum ventriculi, 8c flatus ei^nit-
 Undenec humidis yentricuh nee hypochondriacis & flatulemis, nifi carminativis & ftomaS;
 (v. g. Onnam. Maftich fern. Amfi), correfta convenit. Scbrod. Praftat tamen (inquit C. Hofman!
 nus) abftinere ab illa in hypouhondnaxis ob mteftinum debilitatem.

Caffia etiam utuntur (verba font Alpini) ad tuflim antiquam, dviDnDBam affhma Rr, ur,
 CUniAgarico: pro calidis articularum dolonbusj maximeVs^ kf j S^ ra^ j Semfbui^ pfrSENf^
 plaftri modo iplam adhibent. *A^* uuramaus partibus em-

Saxoniam pro leaione dixifle meminit C. Hofmannus, Capitis dolores poft dbum nnn ^, - c
 lidusquam Caffia poft cibum: quodpoftea invenit apud Hel.dEum; q u S a ^ fe 5 ? h o T ^ ±
 pertinaciffimam ophthalmiam. c mod o

Omnialenientia 8c inter, ea Caffia fumi debere aiunt modico ante cibum tempore, quod alii biho.
 no, alia unâ hora, alii iemihoradefimunt. Vid.C.Hofman.

Errare eoscribit Camerarjus, qui exiftiment femina Caffia: purgare, cum potius aftringant: ca-
 juscontranum (eexpertum affirmat Fallopius. Garcias etiam Monardi idem afferent*comradicit

Cortices filiquarum moveremcnciesSc pellere fecundinas quamvis Ambrofius Paraus, Sepulveda
 8c alu amrmant, maxima tamen pars medicorum negat.

SiliquasOfliamm^ perinde, ac Phafeoli, parvas, vindes, in aqua prius parum bullitas, Bcmoxiri
 umbra ab humiditate ficcatas iaccharo vel melle condiunt, atque ad ufum lervant puerornm delicata-
 fumque mulierum. Exhibenc vero ad lummum eas ad jiiij, atqus ad lj puerls, ad fupradiftos
 affeclus

a. Cajjiafigula Brafiliana C.B. Jotutiva Brafiliana Park. Cajjia filiqua Brafiliana purgattix com-
 preja Lob. inPharmac..Rood Tapacoaynma Brafiltenfibus Marcgrav. & Pifon. COOM'
 Jfi Brafiliana flare mcarnato Breyn.
 Marcgrav. Tfjo,

Arbor eft alta Be magna, atque in plurimos ram of late expanfa, colore exterius ex cinereo alh!
 cante, Foha fert ord.ne lib, oppofica,^ paulatimque furreftim ftantia, figure cylindraces, duosdr
 tos longa 8C f digit lata, breviffi,mo ^xcuVo iiiiitentia infar foliorum, Sena:, dilute virid a f n S S
 Wuca, ad taammollia, rufefcente nervo fecundum longitudmem, Be vsnulis fecund^ ffd'
 nem ordine pofus p d ita. Foha de tipicam cogefco Tineramalis, pentapetalos, Z> trITfc
 milunarihus corniculis, que cum/^w^junaimpofitisforrefcta ftam coloU in? r-LS ^.

d'T m ^ -Se-nfpiciuntu, ^ ^ ^ m m ^ ^ ^
 vt ^, > m P f o ^ 11 ^ 11 ^ 11 ^ os < r c ner pedeslong^ qu, nqu, e digitos cra H r : au' r wilylum
 v f : inunoktere eimnenm duplex eft fecundum longuudinem, malt, rumpS^ fi ^

da agglutinata esse fibercortice; non exacte teretes flint, fed paulum rompreffix, ram tranfveia incifio ellipfin defcribit. Cortice flint duriffimoj lignofo, qui lit frangatur malleo conanideber. Siliqua porro intus multas habet cellulas, craffitie pennz anferina^ diaphragm atis diftinftas, in quarum qualibetnucleuslatet Amygdalae magnitudine & figurâ, colonis ex albo flavefcens, fplendens, bevis, durus, per longitudinem Tinea fubruffa in uno latere divifis, medullâ intus alba, corner lubftantiz, pulpa immerfus glutinofaj nigricante, inftar Caffiz folutivx, fed ingrati &c amari lapDris, qux ante maturitatem aftingit, poll laxat alvum. SummitaCes foliorum vulnibus 6c puftulis medentur.

Foliorum Be flDrum hujus arboris pleniDrem delcnpationeni vide apud Breynium Cent. I. cap. ii. Hujus pulpa uncia Una, adnotante Lobelio, plus purgat quam undz duz alenus Caffit, nimirum iEgyptiacs.

5. *Caffia Americana fabactd* D. Syen. inHori-Malah

Siliquarum loco fabas longiuftulas 8C vulgaribus non diffimiles profert, quibus continetur pulp* ejufdem fermc cum vulgari faporis Be efficaciae. Ipfa arbor radice niticor craffa, rotunda, qua: in plurima filaments cortice nigricante obdufta definit Caudex cinerei eft colonis, (caber, fubftann^i medullofej quern ramuli inordinate ambiunt, foliis veflici liibrocondis, ex glauco viidibus, brevimmifquepediculis donatis. Florej videre non contigic. Stmtn, quod pulps involvitur fubrotundum eft fomprefsum K nigricans, Pifi minoris magnitudine, ex America Infulis, quas BiUi ks jintMr* ?o cant, alia turn.

CAP. > IX.

I. *Tamarinits* Ger. Park. J. B. *Siliqua Arâhicd quaTamarindus* C B. *Balam-pulli, feu Madtram**

H. M. P. i. F. a. j. p. 39. *ut amarum* (C. C.)

Arbor eft grandis, ramis densis, in latum diffufis, Alpino Pruni, Garciz Fraxini, *Uglandis* Caftane^ve magritudine, Marcgravio Tiliz maxims. Radix craffa eft, brachia late difflindem, cortice rubeccnrc. Stipes en?Liſ, ambiru duorum hominum amplexum iquanSj cortice craffo, cinereoin crunco 6c ramis yftuffbribusj mfuixulis minoribus vuidi, matcic firma non fungola. Folia pinnata, Filicis fcemina: Foliis (milia Acoft*, pediculo communi & L cofta cuf pinna: aaneftumur VJX ipthamarn loigo, in quo ordinat^ poita pinna: feu foliola parva^ polhcari fermE Jongirudine [paulo pJus femidigitum *ohgl Marcgr*] latitudine ferme iemidigitali., aqualis unilique latitudinis, paulb tamen verlus apicern anguftiora quam aA pediculum ; bina autem exacte Jibi ubique opponunturj & nullis ferè pediculis inhiruunt, de arte fe mutuo attingunt, apicibus fubrotundis. Sunt autem foliola tenuia, texturâ folida^ plan?., inferne dilute viridia, fiipfne faturatiis: ac infern^neivo fecundumlongitudinem eitinentej Be. venulis tranfverfis fecundum latitudinernerh, fed Valdè exilibus prædita, quæ fuperne vix Gonplciuntur. Egreciam aciditatem fapore rc; ferunt, fit ideo in febribus iicis exdnguendz gratis mandlicantur. Fhres in lurculis leu pediculis c Foliorum finibus cgrellis ofto aut decem fimul, Aureae Mali floribus admodum imiles forma exeriorre Be odore *Accjira:*, ofto petalis [H.M. feptem] confiantes, c calyce craffiob & rotundD, [odore nullo H.M.] petala quatuor exteriora Candida poftmodum parum lubflavefcunt, oblonga^ cufpidata tcnua, nulJisvenis friata, [ACD/IJ: quatuor ineriora alba funt &; craffiora] uria interiora exremo rotundjoraj in ons tenuiter crippata, colore albo venis rubris variegato, duobus tertio longionibus & C htioribus tertium autem furreftum eft minuffDuluni, concavuttij cufpide parvo acufflavo eminens. A cofta; bina b petalis extenoribus eleganti nervo radiata funt.

E media flore [Acofts quatuor] tria cnalcuntur *fiamina* tcnua Sc incurva fie viridia [Acofti-Candida Kcorniculorum modo inflexa] primo in unum junfta^ poll verfus folium furreftum divariata, exteriora^ *apidbm* primo flavis^ poftca cum flores fubflavefcunt rubro-fufcis dotata. *Stylus* ftaminibus craffior, inter ha:c Be folium furreftumprodit, qui filiquofum germen eft.

Frnftm lignafis & craffiufculis petiolis ramis appenfi funt; *filiqu** oblongs, craffzjnglandulas tres quatuorve extuberantes, cortice craffiolo, extends rufo, interius viridij fragili, pulpa per maturitatem piDlii, &c flavo feu rubro-fulca, ad corticem ex petiolo lignofis filamencis fed rariz in longum pertexti, acidî fapors gratiffimi j fub carne filiqu* in membranacea Joculamenta Jn quibus femina^ diftinfta: funt.

Semina quadrata (iint Be plana, Lupinorum armula, dum adhucimmatura funt cortice viridi^diluto K nitente^ amaro^ pulpa intus alba, fbJida & den^a, fapore adfringente, maturitatem con/ecuca: in offeam duritiem cortice rubrofufco cvadunt.

Floret femd in anno, menfe Novembri.

FDIIJ Sole Occidents lit in Acacia aJiifque *fzk* contrahere folent, eoque oriente aperire, ut *tradit* Alpinus. At verb fructum five filiquam fngons virandi caufi folns fefe involvere ut Alpinus 8c Acofta feribunt & miraculi loco habent, miM cum D. *Sjtn* fabulam red olere vide cur.

Creleat hacc arbor in Arabia felici, inque India Orientali & Occidentali five America.

Tamandi humorum acrimoniamrempaantj bilem purgant, eufque5c languinis feivorem compofcunt, febresacutas Bcifteiuin faftaUt, ficim acornemventriculi hepaciijue ardorem extingunt, vomitum fiftunt.

Turca; flc Arabes actatelonginquum iter fufcepturi (ait Belbnius) Tamarindos cocunt, magni Tn Turcia uius, non medicine fed ftii reftingnender gratia.

Ltiuntur^gyptii, r^erenrc Alpino, foliis Tamarindiin pueris ad vermes newndos, atqueipbrum vel mfulo, veldecoftlo adblvendum alvum. [Medici Imli (autoie Garcia-U Acofta) Iolia trita p«tibus corporis Eiylipeilate inefctis imponum.] Arabci

Arabes condiunt filiquas parvas ac virides faccharo vel melle *Carob*, turn etiam gradiores factas atque maturas condiunt lparum pulpam saccharo, quam per itinera, qua! in de Ferris Afrira locis faciunt, f e cum viat ores de Ferunt. Qua fepe calefacti ac ex calore itinereque inikmmati valde fitientes refrigerantur, atque fitim reftingunt, per alvum plurimum calidorum humorum Fubducentes atque evacuantes.

Infebris verb peffilentibus, atque omnibus aliis ex putridis exurentibus, aquam in qua multa copia Tamarindorum in Fufa fuerit cum Siccharo ebibunt: potus liquidum ex calore ficentibus jucundiffimus est, maximeque refrigerat & fitim extinguit. Practerea ad gonorrhoeam ufum Tamarindorum frequentant. Fallopius etiam in gonorrhoea biliofa laudat.

In bilis redundancia, ianguinis Fervore Be ebullitione, fici in Fefta, morbis cutaneis Sc prxfertiim Iftero simplex medicamentum ex Caffia filula cum Tamarindo, una cum Saccharo vulgD ditto *Jagra dz c^ww^ablndis datur, fluod leniter alvum flvit. H. M.*

Affertur ad nos Tamarindi Fructus, non integer, fed contufis, ut bene CDmpaus non admittat aerem externum.

Annos tres fevantur in vase vitreato, ftrifti oris, & bene obfructo, & in locum purum & perfilatilem fepofiti, nifi excernus vel cabr vel humor putredinis initium ipsis actulerit.

Nonnulli Tamarindum Arabicum ab Americano diftinguunt. Nobis una eademque fpecie Arbor videtur. Siliqua tamen *Jutay* fuis Tamarindi Brafilian^a *Pifon*. brevidr Be magis compj ellâ eflb' videtur.

2. Tamarindi facie fructus Inikm J. B-

Tamarindi feminis majork fere figura eraf, unciam longus, tertiam unci^a partem latus, compressus, Fufcus Si paidb minus quam niger, fiipernè quâ adhadiflc videtur levicer umbilicacuSj in ternè acutus, utrinque linea ovata ad Fructus figuram impreffâ notatus.

CAP. X.

tarandas Gmi CR Car. Mica Arhff^k]^ CmtlddMH An Auzabâ Dviedi?*
dare.

ARBUFCULA est Arbuti magnitudinejfoliislimilibus, copioflore, odore Periclymeni; iruftu exiguis Malis perfimili, nigricante per imruriratenij graciffimôque uvarum iaporCj ex quo 3. nonnullis Vinolis iuccus exprimitur. FI-LH^US autem virens magnitudine c/tnucis Ponri- ex cum (ûQ^pucamine^ incerdum major, iuccum nonnunquam exfliJJans vifcidum 6c Jafteum. Edidit à nonnullis Fructus maturus cum Sale. Solec tamen, cum viridis est, muriâ aut aceco condirij SL ita afTervari ad excitandam elanguefceAtem appetentiam^

Nafcitur cum In Continent!, turn in *Bdagau*.

Locwi

Nifi ipse eandem diftinet, aliam arborem exiftimaffem quâtn deFcribit Bontius hoc nomine. *Folia*, inquit, *CaradieMzhiis* diftix cum Tamarindi arboris Foliis plane conveniunt, *Fructus* maturi nucibus tanquam nuclei inclufi, finguli fingulisj fecus ac in Tamarindis. Colors hic fructus est, aperto nucleo, aureo, quern @?ailge noftraces vocant, 8c caro ejus exterior gratiffimi est faporisj neque dentes cam acid us reddid quam Tamarindorum pulpa, fed de dulci fapore participate ne j, laxativa Faculcate praedica est ut Tamarindi.

Clufiu5 Auzubam Dviedi 1. 8. c. ix- huic Fere fimiJem ait. At ilia vafta est arbor pulchraque (cum haec pumila lit)materie firma Scutili: fruftu Jonge fuaviffimo, ut funt pyra Apiana, mufchattelHna difta, fed qui lafteD fucco, eoque vifcido & glutinofa abundec, qualis est qui in ficibus immaturis; idcirco moleftu5 his qui eo vefcuntur, nifipnus Fructum in aquam injiciunt, Klafteum iucum digitis expriment, qui in aquafidic.

Fructum huicfimilm obfervavi in Mufeo *D.Gulielmi Cuurtine* Armigerifub nomine Tamarindi American.

C A P. XL

Tala H.M- P.I, F.45. p.Bi. Arbor MahhamafntaphyUos U^fctns^fili^m
D. Syen.

H.M.

EST arbor valie' procera, ramis tranFverfim late' fparfisj nafcens in areiiofis. *Radix* alee in terram rtefcendic, radicalatè diffindens, cortice rufo, Jattifluo, & valde amaro- *Caudex* crassius ad duum triimve hominum amplexum cortice, uti Sc rami, cinericeD ac laftelcentCj lignolevi. Ramiveteres è nodis plerimque ties quatuorve (urculos diffjndunt. *Folia*, ternâ, quaternâ, quinav, e fimul fummis fiirculis in nodo infident, tranfverlum in orbem expanla, oblongo-rotundaj extremo fubrotundoaut etiam culpidato, adpetiolum angufta, textura iolida, dcnlâ ac lafte turgentia, Fuperficie plana aq glabra, iliperne obfeuro viroremcentiajbutusdilutiore BCalbican- ia, fapore amaro. E *cofia* cradsj viridi-albicante, craffiufula Sc lataj etiam in liipina parte non- hil eminece Vena: lubtiles numeroz tranfvedim refto acparallelo traftu proximò aMarginem P^ogrediuntur, indeque reflex^ in fe lnyicem incurrunt. *Flirts* Faficulatim proveniunt in lureuhs nodofc 8c viridibus, qui fupra *Folia b* nodulis ramorum quos complectuntur redtâ prorurnpunt, Quatuorrci vel quinqueramulifloriFeri è fingulis nodulis exeunt, linguli quinque velplures iimul flwesinfummitats; geftances c^viridi albicantes, quinque petalis rocundiolis, versùs unguiculos an-

Iijiiii \

Buftioibus,

guftionbus, ad oras criſpis ac rigide extrorſum inflexis, non ltriatif compoſitis, pediculo albicami, inferno Be flipernecraftion infidenteSj calyci arſto quadnfolio cinctos, odoris jucundi & foitif, fed gravis qui catarrhos Be gravedinem excitat, Be caput offendit. *Stamina* quinque tenuia, pilis albicantibusobſita, apicibus flavis&elibens donata; interque ca ftylus albicans, tenuis Be liber, nodulo albo capicatus, e capitulo parvo viridi, quod rudimentum fruſtiſ eſt, Be in calyce fitum, ortum du-cſns. *Fruſtus*, qui plures iimul in furculis naſcuntur, 5//i^e e funt, cubitum fermelongtf, anguftaj comprefſi virides, lacte turgid*, infe recondentes numeral* *femina*^e parva, plana, oblonga, cum fua longitudine iacientia in longitudine fiſtuarum, ac ex anteriori Be poſteriori oculo penicillum argenteDrum filamejitorum ejiunt, inunam feriem per filamenta implicita, colore viridi-flavo feu rufo.

Terroſa,
Vitis.

Flores fert fermel in anno, injaiiuano-

Cortex trims Scin decoſto datiſ commodus eſt ventri leniendo, ftamacho roborando, (addito momenta (alls, Be piperis) flatibus difcutiendis, ac ardoribus jecoris reſtinguendis: *JemtriUisSC* in aqua calida potus lumbncos enecat: cum aqua tritus Beimpoſitus ulcera purgat &c fanat, Bcdolorem arthriticum lenit: *idew* cum fame*Cudu-Pariti'* coſtus in oleo aunbus intillatus flirditati confert.

CAP. XII.

Trin-courigil H. M. P. 6. T. 14. p. 43- *Siliquoſa Malabarka pntapetala, Jiliquis tomzntofis**
H.M.

Arbor eſt Pruno Atillima: *Radice* ligni albiancis atque in circuits diftinAi, libro *quoi* ad colorſm fanguineDj cruſta obduſtoatra^e nullus odorif, faponſaens. *Ramz* lignocandido medullat^e cortice ipadiceis. *Folia* lungiDra, anguſto cuppide aculeata, fupcrficis glabra, ſpiflaj rigida, Pyri paulo breviora, numero quina, viorcliipina parte faturo, premd dilutiDra, utraque nitente (iinc: venulas: ucrinque conſpicuafrequentef per totum oberrant folium, cui fapornonihil pungens, odor lentiffimus. Exigui perianrhio quinquies incifu ſtelligiformes, candidi, pentaphylli flores perfeſti, in iurculorum cacumine ramulis innati, dena nivea flavis decorata capitibus habentC *stamina*, quorum quina, pecalorum ex unguioilis quſ ſxeun^e paulo planiora lunt; *Stylus* infuper al-bentem, craſtum. *Siliqu** vero cortice colons aureoli^e interno rigido, cano, exerno tDnientolb, ni-tente, in dorſo, ubimaturuers hiantes, fabaceum indudunc *fer** c longo rotundum^e pellicula tenui, mg^eUa, iplendenti involutum pulpa conſtans^e in viridem indinata, umbilico iiliqu^e in angulo excubrantiſ duos in lobos divilunij adhsrens.

Locus E&
Fpw

Arenofis *Angz-caimal* vidnis, aliſſque ut in infuk *Zeylon, Taniturt & Alican* pratis abundantil^e *florifera Auguſto, Decſmbri* vero nonnunquam bis in anno maruros fert frtuous. *Cx*CBrum e nimio rigentibus rrigore membris motum reſtituunt conuſi fruſtus, quorum el obis expnmitur oleum aphis convenientiffimum. Folia in balnei formam decoſta tumores reſblvunt CE-dematolos, incantatifque fuccurrunt hominibus; quod idemprzftat ex aqua *Oryz* contnea *radix* aliaſ oleorum inferviem ction.

CAP. XIII.

Padri H. M. P. 6. T. xfi. p. 47. *Siliquoſa flon pent ape talo, fili^euii(hngu anguſti), quadrant in-tortif.*

H.M.

Huc arbori decem hominum altitudo eſt, craſtities uniis. *Rami* teneriorK virides, ligno ſimilique medulla circa medium Havd conſtanc. *Radix*, cortex, folia, fruſtus plane inli-pida atque inodora. *Folia* i rotunda ball acuminata, ſpilla, mollia, prona parti; dilution^e lupina fufca, iibi venarum porcis medianā lignoſā e coſtā aliquot numero diduſtis (triantur^e) gs-niella ubique, peduhculis e fpadiceo nigris, communibus cubitum propemodumDiigisJpadiceis quo*ni* genculatifque adherent furculis. Alt propriis furculis plures ordine geminato tenuibus peciolis ad-figuntur perfeſti *flores* lutei, Caryophyllos imitantes, quinque e calyce fubruffo prodeuncibus *fn*lis, circum eras, ubi pallent, criſpatis, venulas in averfb latere habentibus, lanugine cana acjuolli obdu-fts. Quatuor iis tenuia, Candida, longioribus croceis infrata *apizibw* (lamina ſiint. *Stylus* paulo etninentior e vindi alſns, circa imam craſſior, fupremam friftior partem. E floribus prognatac *ſylus* e ſtelligiformis, anguſto cuppide aculeata, fupcrficis glabra, ſpiflaj rigida, Pyri paulo breviora, numero quina, viorcliipina parte faturo, premd dilutiDra, utraque nitente (iinc: venulas: ucrinque conſpicuafrequentef per totum oberrant folium, cui fapornonihil pungens, odor lentiffimus. Exigui perianrhio quinquies incifu ſtelligiformes, candidi, pentaphylli flores perfeſti, in iurculorum cacumine ramulis innati, dena nivea flavis decorata capitibus habentC *stamina*, quorum quina, pecalorum ex unguioilis quſ ſxeun^e paulo planiora lunt; *Stylus* infuper al-bentem, craſtum. *Siliqu** vero cortice colons aureoli^e interno rigido, cano, exerno tDnientolb, ni-tente, in dorſo, ubimaturuers hiantes, fabaceum indudunc *fer** c longo rotundum^e pellicula tenui, mg^eUa, iplendenti involutum pulpa conſtans^e in viridem indinata, umbilico iiliqu^e in angulo excubrantiſ duos in lobos divilunij adhsrens.

Locus E&
Terroſa,
Vitis.

Moncoſis frequens locis in *Teckincour, Calicolang* aliſſque provinces cxTurgit. Floret Januarius;

fruſtus leguntur Aprili Maioque. Longzva in praccellam excreſcit altitudinem. Foliorum decoſtum viſcerum^e rigorem intolerabilem expellit. Linionis huſſque cprnmixti Tucci medentur mania: Corticis vero luccus cum fruſtu *per** iibaſtus immodicum inhibit fluxum men-ftruum. Radicis cutis cum calamo aromatico Be zinzibere contnta, foliorumque *Tadri* lucco *dmix* u exhibentur morfo a purcfacirite colubro, MaUbarcnſibus *Fohnga* diſto.

CAP. XIV.

De Mandaru feu Arbore Jilzquofa Malabarka fvlih lifidk.

Arbor Fixe à Jacobo Zationi Hiftor. fuas capits 20. depingitur fub titulo Afitrac five Arboris S.Thomas. Eodem arboris S-Thomz nomine prim* fpeciei famulus à D. Paul. Herman, ad D-Arnold. Syen ex infila Zeylan tranfmiffa eft, addita ratione, quod in floribus apparent ianguineae ftriae, ab effufo D. Thomae (anguine enate, Docuifle enim creditur D.Thomas in Malabar & Zeylan. Hake autem arbores eadēdem non eſſe cum Arbore S. Tk. 3025 Aculte five Macere Zononius Sc Syenius cenſent.

- I. *Cbwanna Mandaru prima* * H-M. *Arbor S. Thorn** D. Hermans. *Arbor Jiliqmfa Malaba** P. i-F.ji. p. 57-
rica ; foliis bifidis, flore purpurafcente ftriato D-Syen.

H. M.

Arbor eſt altitudine quatuor hominum, frondibus denſis & opacis, lateſparſis: *Radice* craffa, in latum ſua brachia diffundente, cortice ſub exteriore cruſta nigricante-rubro: Caudice unum fermè pedem craffa *Folia* petiolis brevibus infident, extremo bifida, ut caprarum pedes, ob id Luſitani* *Feè de Capra* diſta, interiora verſus nonnihil clauſa, lateribus oblongis ac rotundis, arttawfiim leniter contraſtis, rotunda: ad baſin incurvature, fuperne plana, colore viridi-furdo, fubtus viridi-fubce. rulea, ac in margine nervo ſubtili viridi-diluto circumdata. E petiolo nervi undecim, nimirum coſta media in fifſuram terminata, & ad eam hinc inde quinque, flavefcentes. *Flores* in petiolis longiuſculis ſiſpra ex drigine foliorum proveniunt, odore Fragranti ac roſaceo, petalis quinque rotundioribus & parum oblongis, ad unam partem magis fitis compoſiti, quorum unum quod majus eſt ac latius 6c rotundius caeteris, furredum, colore intus purpuro-rubro, ad umbilicum flons flavo purpureis maculis hinc inde notato, & venulis purpureo rubris variegato; ad oras purpureo dilutiore tingitur, exteriori ſuperficie magis albicante: cſupra quatuor oblongiora, colore intus roſaceo faturo, exteriùs diluto; horum duo qua: majori proximè adjacent, interius in ima parte fiint colore albicante, feliqua duo interius in totum colore fermè roſaceo: funtque venulà medià latiori, ex qua venul* obliquè anteriora verſus excurrunt, ftriata. *Stamina* in medio quinque vel ſex, *apicibus* furreſtis ac viridi diluto flavefcentibus dotata, verſus petalum liirredum reflexa, quorum duo vel tria minora ac magis incurvata colore candido, tria reliqua roſaceo, ac cum eis *filiyute* germen in ſuo petiolo lé prodit Calyx unifolius ftnatus à parte petali iure<eti florem fuccingsns. Port flores *Jiliqu<e>*, valdè comprefſae, reſta:, glabrſe, ieptem aut aſko circiter pollices longas, prodeunt: *fabm* continentes planas ac oblongo-rotundas, per maturitatem ruffas, feu flavo-rubefcente obſcuro colore ad ſpadicium yergentes, in propriis loculamenris longitudine ſua ad filiquas tranſverſis, corneo ac duro interfepimento à ſe invicem fejunctas, cum parvo in vertice umbilico filiquarum dorſo adhaerentes.

Toto anno haec arbor fert flores, tempore pluvioſo uberiorè proventu. In arenofis & petroſis *Timpus* (3) fiaſckur.

Flores cum Saccharo decodti proficue uJurpantur loco ſacchari roſati pro leni purgativo.

Locw_m

Vim:

- x. *Cho-vatma Mandaru ſecund** * H. M. *Arbor filiquoſa Malab. foliis bifidis majoribm* * flore i* * p. 1^{re} - 33-
unſims purpurafcente. p, 59.

Hſc quoque procera eſt arbor, denſis frondibus, late ſparſis, naſcénſque in arenolis. A praeſente differt *Foliis* majoribus, profundiore ſiſliira incifis, latribus antrorum paulo contratioribus" tactu lenibus, in averſa arte, ubi venulae inter coſtas media minùs extant, colore magis hyalo at in fupioa parte Taiuratus viridi. 2. *Floribm*, qui unifolio, viridi-flavefcente &c rubefcente calyce, craffio, plicato, 6c fegmentis in inferiori parte feneftrato fuccinguntur; petalis oblongo-angultioribus, unguibus longiuiculis & angultis conſtant, coiore purpureo valdè rubicundo, quo eorum quatuor tota ſuperficie cam exteriori quim interiori imbuuntur, unum ad unguem intus & extra ftriis albis venulas inter purpureas depidulum au variegatum eſt. *Stamibus* craffioribus, & ad exortum ſex, ſeptemve parvis filamentis comitatis, colore purpureo valdè diluto feu albicante. *Gemmis* florum quinquangularibus. *Siliquis* omnium longè maximis, ii aut etiam *Iſpithamas*, xquaqibus, latitudine pollicari.

In reliquis conveniunt.

Radix maſſicata-confert in dentium & capitis doloribus; trita & C impoſita, in dolore podagrigo *Vires*. cum gingere ficco trita 6c ir*uruitione adhibita. Fohorum decodtorum vapor dolore corporis fedat in parte affeſta exceptus. *Flores* ſimpliciter comeſti purgativi ſiml. Cortex flores 6c fru&us ſimul triti Sc mixti cum aqua in qua macerata fuit *Oryza* lerviunt apoſtematis aperiendis & maturandis.

3. *Velutta Mandarn* * H.M. *Arbor filiquoſa Malab. foliis bifidis minor, flore candido* ftriato * p. 1. F. 34.
D. Syen. 16 1.

Prſcedentibus humilior eſt Sc minor, altudine unius hominis, *Radice* minùs craffa necprofiindè jn terram deicendente, *Caudice* unum circiter brachium craffij, *Folts* profundius inclis longioribus & verſus ſimmitatem in cuſpidem contraſtis, fuperne ad ftrias coſtularum nitentibus', fubtus ex viridi flavefcentibus, nervifque craffioribus extantibus inter coſtas ftnatis, *Fhribm*, qui calyce feneftrato viridi 6c cenui lucungunturj albiffimis, nullis mactilis tintis, inodoris, petalis qvunque rotundiulis

diu h5, parum oblongisj venulis (ubtilioribus ftriatis compofitis. *Staminibm* decem candidis cum *aficibus* flavis ac nonnihil firreftis in faftigiis, inter qua tenerum filiquarum germen, e cujus vertica filamentum craffiufculum exit. *SMquis* tarteris minoribus, longitudine quatuor aut quinq, pollicuni, latitudine quoque pollicari, nonnihil incurvis verfus unam partem, ac dorfo rotunda latoque circumfcipit. *Fabis* oblongo-rotundis, craffiolis feu minus compressis iis *Chovatma Mandaru*, ac m. Jto minonbusj colons flavi minus rubefcentis.

Flores bis terve in anno fert, tempore pluviofp uberiore proventu.
Vinbus fere convenit cum pcedentibus speciebus.

•P. i.F-35- 4. *Canfchena-pcu* * H.M. *Arbor filiquofa Malabarka, foliis bifidis minoribus, flvre albo flav-*
T-61- *fcenz friato* D. Syen. *Mandaru quarta species. Flos Divi Thorn**.

H.M.

Arbor est altitudine duorum ferme hominum, ramos quoque denfos tranverfim diffundeis i *caudirt* feime lempedem craffib. *Radix* intus corculd est flavo. *Folia* tjuaam praxerientium, multo minora, antrorfum rotundiola, reftioribus ad petiolum oris, nullD fert: angulo incurvatis utrinque valde lenia & lanugine pilola, odorc forti^ maximè cum terumLjr noftuiro tumpore duobuslobis adduftis fe claudentia. *Flores* calyce unifolio viridi fuccinguntur, albo flavefcentesquinquepetalis oblongo-rotundis, lateribus unguibus mutuo convolutis, compofiti; e petalis quod magis furredum est & anguftius, & oris ad interiora contradlisj ad unguem infignicum est macula purpureo-rubiciindD-obfcure^oloris, quae folium parvum in fummitate acuminatum reprxfentat. Odor eis nullus. *Stamina* decem, ut in rdiquis, albo flavefcentia, pariter incurvata, apicibus oblongis & flavis ornata; cum germine filiqux in medio.

*Sliqv** longitudine font ut illxprimz fpeciej exteriusvald^lenes Sc lanuginoix cum teneriores iint.

*Fal** valde parva? in loolis /atis latis inter/epimentis diftinftis, eudem ficu quo in fuperioribus.

Flores bis terve inannofert, tempore pluviofo uberiore proventu.

Qui de viribus habent vide apud auftores noftros.

In Horto Reverendiflimi EpilbDpi Londinenfis *D.H. Cympton* crevit hoc anno 1687.

CAP. XV.

Moullava H.M. P- 6. *Siliquofa Indica flort pentapetalo luteoj filiquis Unibus Wrafftrmi fere.*

^T^*VUic fefciii-hominis altitudo, duarum palmarum craffitiè est. Graveolenti libro circmc^
U— I gitor lubfufco; ligno est folido Be albente, nufquam non ipinis duris Be acutis obfita: JE^
JL. ^L dice lignea, gravi^ ingrata, terrae irrepente, refinolaj ubi lxditur, adhxrente; gravi cum odore, cum fapore. *Folia* Buxo ^mimuj litf^ r. -jy-j -> -j^r^mm p . ^ ^ virklj mcntia, pronâ dilutiora funt; -mediam coftam eminentem iarpus iubdivifam habentia- Inodon, lutci, profundo e calyce prod^untcs *flares*, qtiinque foliis Hyadnthina imitantibus confiantes, obiongis, longis ferij in molium corona furculorum foliaceorum fummitatibus adhaerefcunt. *Stamina* iis quina, infenus alba lanugine, fiiperius *apicibus* obfeuris ornata. *Stylus* ejufdem, nil! quod vertex albicet, generis ac colons est. *Sliyu** autem fubpurpurear, taiftu leniflimz, lato t calyce, brevibus petiolk furculis inharrentes, quatuor plus minus obngas, furvas^ infipidas, ingratafque tranfverfarias indu-

locus 13 In infilla *Bay fin* aliifque arenofis, aft rans crefcit in locis. Vernat ubi tempus hyemat: fructus macuti coilguntLirNovembn Be Decembri menfib: ieinpiternamhabet comam.

Vim. Medicum nullum prxfat ufum, nifi *Pollias*, id est, paupenbus, quifoliorum funlbnaribusadmiilb capitis dolores vertiginelque fibi adimunt.

C A P. XVI-

Mandsjadi H. M *Arbor filiquofa Indica florefpicato pentapetalo, /iliquv longis> nodops fabis coc-*
cine is.

H.M.

PRocera est arbor, binorum hominum craffa complexum ligno duro, librD craffib, fufco, (qua* inoio, intus rubente, qualis fere radicem obvolvit, qui tamsn prDxime lignum albicat. *Rami* lignoadmodum paucos, e viridi fufco, glabro tamen nitent corticc. *Folia* obtiuis oris ob' longaj renua, mollfa, lenia, fupina intense virentia, prona parte dilutiora, alternating vindibus ffculis, fpichamam propemodum bngis; qui binarii. e ipadiceo rubefcentibus quoque abis, interius fulcortn, cisj e'urcuJis prodeunt, appendentia confpiciuntur. Odoris funt Fabacci, guftufubaman- Arfto brevique e calyce fubcrocci pentapetali *flvres*, anguftis foliolis acuminati, extrorfim reflexj, frequencinunero, ccnuibusfimul ac brevibus pediculis, furculo duas palmas excedent, agglurmancur. *Stamina* una cum *fijh* eminence viridi, qui fructus primordium est, decem iis funt Jürri:ftf quoque exornata capitulis, odor melleus. *Silvias* ties palmas longar, tranfvejfum dijgitumlate^
mma feu fabas includum aleè extuberances: fiintque cortice primum e viridi fulco, nccap ^Padie
Jiigricantc, nonnulJis venulis pertexto. Semina rotundis fpaiis inter /c diffidentia, oliis ad inltar
P^r^u^a, tunica craffa, coccuica, glabra mtentia, (aporc Fabarum finullima iint.

Arbor

Arbor hsc inter proceriores Regni Malabarici arbores caput extollens quocunque crefcit fob, Loan. maximè tamen in *Mangatti, Cochin, Ferqutncoitir* aliisque loci* frequens. Anno demum à fatione vigeſimo flores Septembri menſe; maturi fructus in fine atque initio, quamvis 5c aliis tempeltacibus anni, frondes femper confpiciuntur. Ufqus adeb longzva eft, uc 1ao annos perdurare putetur.

In ulu quotidiano lignum ob foliditatem variis operibus infervit. Foliis pulverem redactis Ethnicis in carremoniis utuntur. Semina verb haud ingrati faporis, prxterquam quod a plebsiis five coſta, five emminuta in farinam^ UDmsdanLur, magnum prſflant ulum aurifabns &c gsmmarii^ quippe bb aequalitatem granorum vice in ponderandis mercibus adhibenrar. Singula namq, *Masjdipa* quatuor pendent granaj quibus utuntur Aurifabri; qui quoque ex contufis hifce feminibus aqua madefactis una cum borace glucen ad elegantiora turn nova turn diffracta vafa conglutinanda cunfijunt. Medici vero h foliis contritis potipnem lumborum fedantcm dolorem parere n&mmc.

H*² arbor folio eft bicompolito feu ramofb.

CAP. XVII

Arbor Indica Jiliquofa^ floribus racemofis^ }>entapztalis> ftliqv foliaczis, ad fingus fares timis.

Fongdion five Fzrimaram H. M-

H.M.

Aliquando, priufquam in ramos fe difkmdit ad 53 longitudine^ crafficie ad duodecim & plures excrefcit pedes. *Cortice* eft cinereo^fcabro^propradicem^ubi excepta craffitie qua:fflic major eft, idem eft jgraveolenii. *Folia* extrorfum crifpata^acuminata^ denſa, glabra^ fiiper nenitentia, infernc paululum dilutiora, falciformia, gemina plerunque brevibus pedunculis communibus ^ Jurculis Jignofis dependenc. Coſta verb intermedia averfa, in parte fumme eminens ad oras ufque extenla, arcuatim refleſtitur, multas fubtiles fundens venulas. Odor ipſius nullus. Inodori, abſque calyce pentapetali prodeunc exalbidi flores plures racematim petiolis viridibus rotundis fiipernc angulatis inlifcentes. *Stamina* ut in *Mandsjadi* colore 8c numero acqualia flint: *ftylm* in vertice tricufpide piano ac viridi capitulo coronatur. *Siliqua* foliacea: tenuitatis e iingulis florum pedunculis terns: prodeunt^ lateribus carne intermedia cenui &i pauca CDnglutinat, digiti ferme quatuor articulos longa:; pollicem latz, fibvindes, crallion nervo, qui una cum czeris furculum pxne efficit, donantur. Hie: lods fingulis in filiquis anneſtitur *femen* e rocundo aculeatum, quod totum circulum pene implet, viride. Sapor leguminofis fed languidus, ipſi fructus perquam pituitoii funL Siliquide om-tjes ad maturitatem perveniuntj externarum cnim una vel alter a decidit.

Creſcit pinguioreſolo circa *Moutan, Tarca & Bardelle*, ut Bt pluribus aliis locis.

Lccus.

Flores Maijunioque, fructus verb Novembri Be Decembn fere menſibus, frondes femper, quſ lit & flores b finibus erumpunt ramorum, qui exinde elongancar. Longarvis annumeratur.

Lignum in cultrorum enfiimque formatur vaginas. Folia comma aquam eleganter tingunt. Contufo e cortice excoſtum oleum corpori illitum humores vkiofos educit. Excillans ex arbore fiic-cus, cum laſte ebutyrato epotus, flacus difcutit. Fructus cum *Munja* tricuratij Oryzaeque decoao iinmixti cephalalgix ac ophthalmia oculis injeſti medentur.

CAP. XVIII

Nagam H.M. P. 6. T-il- p- ?7- Sili^uofa flore umhtllato pentapttalo, ftUqnis iigitalihm, [2,di< ceis, monofpermtSi ad unum florem pluribus.

H.M.

Altitudine quatuor, craffitie unius hpminis eft^ hgno candido, rubea medulla trajeſto, coitica cinereo: *radicz* odorc gufluque fylve/tn. *Folia* ejuſdem ac radix odpris faporilque, oblonga₃ cuſpadata, denſa, ngida₃ in fupeore parte glabra, fubobſcura, inferiors cinerea funt, coſta donata craffiori, in ligneos nervos porreſta. *Flores* umbelhfen, pentapetali, rubei, furculis ra-inuloſis inlidemes, globulum rufum ftylimque breviora includunc. Flonbus c fingulis quaterni imb quini exoriuncur fructus. *Siliqua* digitali longitudine, fpadicea:, cortice fubamaro, unam finguke inveſtiunt fabam, pelle candidam, intu* malle Be fungofam, gultu amaram Be adfringentem.

ArenolTs licet, paludofis tamen, gaudet IUCSS in iniulis *Bndurti, Aroz,* aliisque intra *Zrangmoron ig^j* *J & *Porta* ficis frequens, Augulto, Septembri^ Novsmbrj flurifeia^ Martio flc Aprili fructifera, perpeceb *Tenj*>usm

Foliorum fuccus cum Nucis Indies oko v&ntri illitus lunati^m ejus incumerccniam diupellit.

Fur,

CAP. XIX.

Zodagapala H. M. P. I. F. 47. p. 8; - *Arbor Malabarica laftefcnu, Jafmini flat odoro, fili-
gama oblongis* D. Syen.

H.M.

Pra:cedehtis [Cumtu-pala] altitudinē est Be craflkie, colorē corticisinradice rubrofusco, in caudice rufo, Be fapore minus pungenti ab eā differt. *Folia* in furculis bina opposita, petiolis curtis appndfaj, *Curutu-pala* foliis familia, verum majora, latiora, cexcurz minus folidix, ac venulis numerosioribus inter nervos tranfrerfos pertexta. *Fhrts*, qui supra ex origine foliorum uncialibus petiolis proveniunt, a *Curutu-pala* flonbus differunt petalis texturā denfioribus, & in oris haud crispatis, angustioribus, calyci arcto infidenabus, odore fragranti. *Stylus* 8c *fiamuncula* quinq, parva, ut illi flors *Tola*; *Siliqu** quoque oblon^D-angustae Junt, *Pal** Illiquid hmiles, fed craffiores ac minus comprefli, viridesjspirhamam plus minus Jong^ . *Stmina*, quae quoque numerosa in ih recondunt, font etiain planaBe obbnga, ac paulo majora *Fala* leminibus, cum sua longitudine jacentia In longitudine iiff-quarum, ac ex TDIO anceriore oculo penicillum argenceorum filamentorum emittentia, p̄rque ea in unam ferieni implicita, coloris cum vetustiora fiinc viridi-flavo feu rufo- Nascitur in arenolis-

Viru.

Cortex feu trunci feu radice cricus Be cpotus in lafteacido, alvi fluxum quenicunqu^ uc & hzmDrihoidum, fiftir. *Radix* trka, Bcuum aijua in qua *Oryza* fuic lota^ decDfta anginac aliifque tumo-ribus corporis fotu concludit; doloriarchricico pvti affeftx impofica^ dencium dolori in ore detenta; lumbricos quoque enecat.

CAP. XX.

Curvupala H. M. P-f- F. 46. p. 83- *Arbor Malabarica Utftfms fimbriato flore, frnttu circA
cuspiddm reflexo* D. Syen.

H.Af.

ARbucula est unius duorumve hominum ahitudin^ caudue pedem craflb, corticefusco, lafte-
fcenBe in ramis cinerq; *radix* minus alec d^miTa, ramulos laterales lace diiEindence. *Folia* petiolis brevibuiac craflis inidlen^ ublongo-dotundaj ad peciolum contra fta, &c antierius in uiffidem oblongum deinentia^ texturā folida, laftiflua, fupernē iaturo virore nitentia^ fubtus pat-
lidiora. Co/la media albicat^ ac in fupina parts nonnihl eminet^ unde plures nervi ubliquu an-
Mulan 8c fatis parallelo duftu ad marginem ferē excurrunt. *Flors* in fuperiori furculorum parts
proveniunt in petiolis rotundis^ tenuibus^ languidis, quam prxcedentis majors in totum albi^ quinq,
petalis Dblongisj ad unguis liriftis, ad unam partem Inflexis^ f onl ab inflexura fibrotundis^ criffis
Be tsnuibus, in medio crafliolis) nullis venulis friatis, compofiti, quinque calycis foliis viridi-dilutis
8c cuspiddatis fuccinfti j odoris grati & L debilis, *Stamina* quinque *apicibus* flavo-albicancibus dertaca,
ac inter ea *fylus* viridi dilutus, bifidus, ueroque curpide nodulo ccrmtnac, c globulo oblongo rotQn-
diolo ac viridi, qui fruiStus germen est, erumpens. Succedunt *fructus* bini acbini ex tranferro fici,
oblongo-rocundi, exterius cuspiddati^ ac deorfum maxime ad cuspidem reflexij duobus lateribus ro-
tundis, qux acuo margine coeuntj conftantes, 8c liiperiori latere protuberantes, cortice craffo,
dum immaturi func lafte manante & C obfeure viridi, cummaturuerc exterius flavo-aureo^ intus
flavo dilutiore, aperiuntque fe in fuperiore latere, ubi fatura per mediam longitudinem friata
iunt. Scnuna intus quinque, fex, feptemve^ oblonga, figurā valdc irregulari accommodata ad aho-
rumfeminum circumpolmiram, membranula exteriore Corallina ubdufta^ ac incus conftantU ^
ficulo fusco minus duro, in quo nucleus albus cominecur.

Florcsfert tDtoanno^ maximē tempore pluuiuo.

Viru.

Radius cortex tritus &c epotus in aqua calida fluxum vsntris fiftit, ac prodest in dyfenteria in
l5te dacus. Idem tritus cum aqua Be apofteniatis appofitus ea rcJblvit:

CAP. XXL

Arbor filiquofa Malabarica phribus ad (ingulos flares lobis. Cavalam H. M. P. I. § 49. p. By.
Nux Malabarica fulcava, rnucdaginofa fabacza. D. Syen. *An Tilabo Cingahnjum.*

KM.

ARbor est procera, ramis denfis, tranlverfim fparfiSj nafcens in petrofis Be arenolis. *Radix* cra/ta, refti in terram descendens, hincinde, a lacjreac liibtus fibris veftica, cortice albi-
cante craffoac minus durOj qui faporis effaquei Bclubamari. *Caudex* quamum homo am-
pleftipDceilj cortice craflb ex^uis cinericeo, ac iubcinericeo viridi, lignoalbo, quod con-
fradum in filamenta piotrahitur. *Foka* petiolis mediocriter longis, ad exortum atque ad folium
excubcrancibus infident, fpthamam, Be duos trclve inluper pollices longa, latitudinc longirudinis
ferine fubtnpla, rotuniisad petiolum oris 8c cenuiter con era it 15, ac antierius in mucronem paryum,
versusunampaicemreflexumdefinenria, crafltic mediocri, plana, lenia, glabra luperne K,nircn-
tia, colore ucrinque obfeure vindi, fed iupernt: iaturatiore. *Floras* in furculis ramol^ vuniDUB ac
pilofis, vel iolkarn, vel eaam bini Sc bini in iimms furculorum ramuhs cumpimt, quinque, petas
ls anguftis 8c culpiddis, cupidibus imrorrum Hexis, ac muruo ad unum nodulum usicis a. claulis,
quorulam feneltratamicprie^ Cant, ad oras extiorum reflexas pills tranlverlis longmlailb

exterifis viridi-fufcis ac fubruffis, interim ex viridi flavefcntibus, oris valde lenibus, rubro-fufcis, qua: infar rubri Veliiti font. E medio ftaminulum viride exit, cum apice feu nodulo cralliole 8c flavo. Ubi flores in gemmis prorumpunt foliis omnibus nudatur arbor, qua: cum fru&ibus rurfus refumit. Floribus faccedunt fruBm duo, tres, quatuor, aut quinque fimul, rarius folitarii, initio in unum capitulum fpadiceum & villofum, totidem laterum quot fru&us funt anSe junfti, tandem cum jufta magnitudine font, relaxato capitulo in tranfverfum rotundi ac parum oblongi evadunt, coitice craffb acduro, aureo, qui came interiore albicante eff', ac intus membrana lacunoiaj cartilaginea ac lubflava obduftus, ab una parte dorfo emicantes, ab altera futura ex pediculo in ventre per medium in longitudine fulcati, qua prse maturitate laxata defluit materia vilcofa feu gehrina, qux infar mucilaginis exteriorem fsminum liiperficiem lubricat, eamque hinc inde obducit.

Inhifcefru(aibu5, qui lata capacitate funt, Fabae, novem circiter vel decem, ois futurx umbilicis affixa: font, utrinqus quatuor vel quinquej verfus dorfum dependences, craffac rotunds 6c oblonga: pollicem ferCj ac glabrar, cortice duplici tefts, exteriore infar cuticulx tenui, &c per fabae maturitatem nigerrimi, nitentis, adeo fragili ut in minuta fruftula, velut cortices igne aflati, ex attritione hifcat; interiore craffiore, duriole ac puniceo, exterius obduco pulpa mucilaginofoa &C albicante, intus veftito tenui & fubruffa pellicula; qux nucleumfeu pulpam Fabz albam ambit; funcque Fabae toftai in eduliis.

Ego hofce fru&us pro lobis potius quam pro nucibus habendas cenfeo ob nliquas bivalves & limilem intus feminum feu Fabarum dorfo filiquae annexum.

C A P . XXII.

Cara-Schulli H. M. P. 1. F. 47. ^ .91- Frutex Indicia jpingfa Capparis forma, Silitjua bivalv brevi.

Frutex eft (pinofus, nafcens in arenofis; radice fibrofa, capillata, albicante, dein rufefcete. *Caules* lignufij nodofi, pilofi, virides^ corculo in medio albicante, fungofo, in nodis (pinis lignofis, longiulculis, tenuibus^ acutis ac nonnihil inferioris verfis inflexis muniti; quic bina: & binae prodeunt, ad diverlas partes tendentes. *Folia h* nodis ad exortum fpinarum prodeunt, parva, craffiola^ rotunda, parum oblonga, pilofi lanugine prona maxime parte obdufta^ fapore fubamaro & fubacri. *Flores* in fimmis ramis ex origins fuliorum, e medio duarum Ip in arum exeunt, pentapetali, colbre plane cceruleo, pede longiufculo candido & nitente calyci infidentesj, odors quoque nullo: fiint autem petala oblongo-rotunda, tenuia, venulis fuis oblique in Ipngum flruta. E medio florum emicant duo ftamina Candida cum apicibus oblongis, furreftis, fufco-ceruleis, Sc cum iis filamentum tenue,, albigans, e globulo viridi, qui capulae lemnalisrudimentum eft, eniergens. Calyx quatuor foliis conftat, duobus grandiufulis oblongo-rotundis, totidem minucis cupidatisj utrifque pilofis, quorum pleniorem defcriptionem vide. *Capful** (erainales oblongac, quadrilatera: ^ & in planum comprefse, in latenbus planis feu latioribus viridi-diluti, in anguftioribus viridi-fufci colons, cortice lignofo ac duro, in duas camerulas oblongas, in quibusvcwiv^ continentur, bina in iingulis, plana, rotundiola, lanuginola, primo argentea, deinde rufefcentia^ fapore fubamaro, interftitio lignofo, ex medio anguftiorum laterum produfto, diftinda.

Tumoribus refalvendis, fi in pulverem per ignem redacta ac aceto permixta adhibeatur in per-
Ullftionccorporis: In pulverem contrita & mixta cum liquore *Surie* didto ex *Coco Indico* apofte-
matibus maturandis ac aperiendis fervit. Radix in decofto data urinam fuppreffam movet; addito momento *OryzsE* proficue datur pro tutnore ventris. Foliorum quoque decoftum cum momento
OCTE^{mtl15} fumptum membris tumefactis extenuandis comrodum.

C A P . XXIII.

De Balfamo.

Balfatnutn dicitur *Mr** ^5 ^ «^Stt/, quod cceleftem divinaque meflem reddat. HeJy: chius & **i> iJsv zb * & ***> *Soluv, Calum*. Refius Balfamum ell vox Orientalis, q. *Belfamin*3 quod in Orientalibus linguis Principem aromatum iignificat, imo pura puta vox Hebraica efle videtur *K&K<m(MVi Bal* enim (eu *Baal* Dominum (ignificat, *Satmn* pinguedo, oleunij unguentum, quafi unguentorum PrincepsfeuDominus. AnBallamum hie refce coUocavsrin nclcio, qualcm cnim florem producat nondum difcere potui.

I, *Balfamum verum* J.B. genuinum *Antiquorurn Park- Syriacum Rut* folio* C. B. *Balfamum Alpini* Ger. emac. *Gfyf true-natural 25nUoin €wt*

Atym.

Arbufcula eft viticola, qua: excrefcit ad altitudinem *Elhame* leu *Liguftri* vel *Cytifi*, *folia* pauciffima gerens, *Rutac* proxima, non tamen iis candidiora, ut *DioR*;. Sed potius *Lentifici* tollis familia, fal. colore yiridi-lubalbido, perpetuoque virentia. Ejus lignum gummofum len6que. ap-
plet, cobre exterius iubrubro, cujus ramuli eodem colore confpicui funt, longi, refti, graciles, paucis foliolis ordinatim referti, foliaque limul terna aut quina aut feptena alx adnata, aliquo pafte *Lentifici* foliormn acmula. Sum autem ramuli odorati, gummofi, digitifque contrefcati eis tenaciter
dh

adhrentes. Flores fert parvDS, albos, Acacizfloribusproximos, ternos fingulis alis appenfos, quafi in Umbellac forma, fumme odoratos (odor paululo tenipons refoolvitur) a quibus [twina prom.v nant flava, folliculis nigris fuhrubefcentibus contenta, valde odoraca, intiffique humorem flavum, melli perfimilem habentia, fapore fubamaro parumqus acri Jinguam ferientia., Dpobalfamumque redolentJa, Terebinthi fruftuum figura: Be magnitudinis acmula, extrema aculeata (k medium craf Jum obtinentia.

Opobalfamum, cum pnmum eduftum, colore, ut audio, eft albo, qui paulo poft in virideinj tertio in aureum, fit demum in melleurn muratur [longo tempore:] Ejus ficci eriam fubftantia imprimis turbida crafaqueut oleum ftatim ab Olivis expreffum cernitur, poftea tenuiffima atque clari(fiffima, demum Terebinthi modo craflefcit, odore eximio imprimis atque aciuiffimo Terebinthum reddens cumfuaviore odoris fragrantia cernitur^faporeque amaro, acri 5c adfringente. Leviffimum eft in primis diebus, atque ufque adeo validi 6c acuti odoris, ut aliquibus inter odorandum fanguis e nanbus cruperit, & pfe multa ejus levitate in aquam ftillatum non defide^ fed ex alto ill cam proietum parumper in ipfa mergitur, fer&que contijua affluens iupra totaiti aquae fuperficium tDum expanditur, eique mifcetur, 8: citiffime in ea diflblvitur, ut ab aqua maxima cum difficulcate feparerur: in qua paulo poft concrefcit atque coagulatur, coagulauumque ftulo totum ab aqua eximitur, quod tunc colore laftefcit, feu album quale lac vifitur. Quo hie (uca? anndJior eft CD fie inDdoratiDr^ atque ad motum fegnior^ Be fenio confectu^ crafus vduT Terebinthina evadit.

Bdlunius ubicunque nafcantur hi frutices duorum aut trium cubitorum ahitudinem eos non iuperare fcibit, fic pedali akitudine cum fint, in multos graciles ramulos, an/erins pznux cauli^ haud craffioresfindi. Alpinus in Arabia: fob id Lycii^ Terebinthi Be Pyracantha: mngnitudincm, & majorem etiam excrefcere audivit.

Bellonius folium accuratius defcribitj Folia utrin^ue in nervo nata, ut in Rofarum, vel Fraxini, vel Jiiglandis foliis videre eftj Ciceris tamen foliorum magnitudinem non excedebant, ficque conftruffa crat ipforum feries, ut poftremum foliolum extremam illam occupans imparein numerum efficeret, eratque reliquismajus; fafto enim ab illoprogreflu aliqua fenfim minutiara fiunt.

Lew.

Quod ad locum Ballami attinet fcibit Plinius Balfamum uni terrarum Judae: ennceffumj q^uon; dam in Auobus tantum hortis, utroque Regio. Theophr. pariuer in valle Syria: gigni fcibit ill duobis tantum, utiferunt, hortis- His etiam confentanea fcibit Julhnus.

Diofcor. lion folium in convalle quadam Judarx fed Be in iEgypto nafci teftatur, aliique in eadem fencentia funt.

Straboj Pau/anas aliique non in Syria tantum fed Be in Arabia quoque, Sabrorum traftu ma^, ritimo provenire tradunt. Petrus Bellonius Be Proffer Alpinus Arabiam felicem Ballami locum pa trium ieniper fuiffi^ nunquam Al^ptum autjudaram cDnteridunt: quod Jcmpr tuminjud^a, turn in /Egypto planta hae inhortis culrafuit. Non folenc autem (pontanea: planta: tanta diligen tia collij neque enim ca indigent: quodquein Judxa dudum perit &c evanuit; inque iEgypto ftipius, novis plantis denuo ex Arabia adveftis. Jofephus etiam, Balfami flantam [in]quk) cujm bodie ferax nofira regio vff, Reginam Saba in Judifam attuliffe aiunt. Quo ctm Strabone C^f e^ncit. Sic rem expedit Bellonius^ quancquam putat Theophrastus Balfamum nulloquam fylveftre rperit^ CDntanter tamen affirmare andemus, Be omni, fic cclannum in Arabia Felce: exiftere, unde lignum Scruftusabomnianoquicace cum aliis mercibus Arabicis delern folita^ quod ex Mithiudatica Annoto, ex Dioicor. Diodor. Siculo, Paufania, Scrabone, Corn. Tacito facile effet probare, ade6qus infitores Cayrini deBalfamointerrogati reiponderunt quicquid Xylobalfamaut Carpobalfami unquam vendiderunt, cum aliis medicamentis Mecha Arabia: delatuin; ubi crefcunt in monte quodam arenofa propeurbem: arbufculas autem qua? Matsra? yEgypti vifebantur, magnis fumptibus hinc rranfveftas.

LiqiiDrhicpreciofiisincifioneafta e virgis emanat Junio, Julio Be Augufto menfbtis, traJente Alpino. Incifura autem, ut vult Theophrastus, unguibus ferreisfaciendo, quocum confentit Diofcorides. At PhniiSj inciditur, inquit, vitro, lapide, oTei(vs culcellis, ferro hedi vitalia odit: Quod 6c5oiinu5confirmat. Ego cum recentioribuspennde effe exiftimofive ferro, five alia re quavisincilio fiat, modo, ut Plinius, incidentis manus libretur artificii cemperamento, ne quid ultra corticem violet. Alpinus partimfponde, partim ftipite ferro Icarificato Dpobalfamum deftillare Be in vitrea vaJa recipi fcibit.

Folia, ut tradunt Pena Be Lobelius, exuit Decembri, quibus nonnifi menfe Martio nova fufficiantur. Quod fi veium, jam corruiit omnium tarn prifcorum, quamneotencorum recepta opinio effe perptuifolliimi. Et fanè inter nocas a vecenbus proditaSj quibus Balfamum dignofci poffi^, rfa eft, ut pirpecub vireat. J.B.

Opoballamiim, ad vulnera iananda omni arvo celeberrimum, tanLcque efficacia? habitum, ut aliis unguentis oleisque vulneranis pretioffimis nomen fuum communicavit; ideoque Empirici K Ag5^ite ut medicafflenta fua commendano: i apud vulgus redderent ea Ballamorum appellations honffitarurit. Nee defint exempla vulnerum etiam periculDfbrmnbrevis remporis fpacio BaHami lijiore perfanatDrum. Quin Be fordida ulcera expurgat, ut poft Diofco.idem Alpinus fcipfir: cujus de vuibiis Be ufu Balfami hodierno apud /Egyptios verba adferemus. In venenacis 8C domorlis h ferpchtibu5 atque iftis a fcorpionibus cum epocum,ftiwi illitum maxime juvat, quod S: rccres Djofoor. & Plin. tellantur. Inpefte utab ejus contagio defendantur, nihil majus habent guoiirilius 8e unil5 utantur, fingulis riibus ejus iemidrachmam deglutientes.: Mulcaque etum jxitridas fjbres eo epotoilli fanant, largiore ab ipfo erumpente fudore. In Chronicis febribus j crudis mgidilquchumoribus obffruftionibufcj, vifcerum nihil utilius Be prxtancius expciiuuitur niuMdpob.il-lami hijus binos fcnipulDs vd drachmamper os quotiaie exhibere. Dculis viliim dperdim, aC-que auribll5 auditum infillacum reltituit, aurilLinque dolorcm aufert. Modeftius Wmizts milorum clarifati flurmuim co?7fun2 zaligin^m difcuttrt & aunbus pr^uam utiU riji fmfot> -P^erca ad cun-

VulfoS ex humiditate Ac frigiditate, ad vertiginofbs, epilepticos, reblutos, trcmentés, ad tulsimie ex fngido humore, orthspream, 8c omnem fpirandi difficultatem, pulmonom fluxiones, humiditatek 6c dolores, ad ftomachi fngiditarem, cruditates, atque ad oriines flatuum moleftias, ad uteri frigidaiti liurnidámque intemperiem, ad prarfocaciones, dolores, fterilitatem, alboS fluóres, ad lnrefcēpram urinam ex frigiditate, flatu vel lapidibus, ad calculofque in renibus vilenter frangendos ac nbitergendosufus Opoóalfami eft apud dmnésillos populbs notiffimus, & ad hxc omnia mala preftantiffimum illi auxilium experinntur: Mulieres vero jftgyptiæ fteriles eo tuiti fuppoficb, turn epoto, tumuffito feliciore fuceffu frpe ad removendam ftrilitatem utuntur.

Pro Cofmfcico etiam inflgni a nulieribus habetur: utendi modum vidsapud *Profp. Alpin. In * & *Picini* *Egyptiacis* *Carpobalfami* *rumm.*
Gonorrhoea daturprcmiffis prxmittendis.

Carpobalfami nomine in officinis habentur (emina Terebinthi icingriirri bblndga forrii 8c niagnitudine, psdicub brevi donata, cortice rugofo fufcb, quatuor coftis in totidem quadrantes diftincSo, cui iubeft tenerum putamen albtm, lacpe cáliim, interdum nucleo pirtgui, dulci, nifi vetuftate nimia rancefat, gravium: alioqui fapor effbetis, cujufmodi in officinis aflervari folent grana, nullus; nullus odor. Alpinus duplex genus diftilguit, jam defcriptum, Be alterum oblongius, 5c ex medietate folliculo teftum, odoratum tamen 5c aromaticum.

* *Xylobalfami* nomine vertditarlur exoleti ramuli, qui necfaporem, ile^odorem ullum evidenteni *Xibbat*^^{num*} ieniibus mgerere fblentj contortij digitali craffitie, duplici cortice intefti, exteriore tenuiore, rugofo, cinereo, iritiriore cradiore, fufed, textui^a fatis compadta: noddfi iunt adniodium, fie iriultis tenuibus ramulia brachiati. HoS, ut Sc fruaus prsEdidtos, pro falfis, adulterinis & (uppojitijis habent plerique Bocanici. Verum Profp. Alpinus, qui omnium optime novit, vsrum effe Antiquorum turn *Xylobalfamum* tUm *Carpobalfamum* affirmat. Virgae autem parv^tempore omni bdore sic fapore defticuuntur. Tanta eft enim (inquit) illius humidise fubftantia?, in qua odor fapóque fundatur tenuitas, ut cito exfolvatur^ fimiilque cum ea iapor atque odor evaiidcat. Cxterum (e-Jnina & lignum BaKami iidem facultatibus donata^ funt quibus fuccus: Veriim efficaciffimam vim habet liquor, proximam huic fruftus, mínimam vero lignum. *Diofc. Alp.* 'Ad robur ftomacho cortiliandum horum pulverem cum decofto (pica: Nardi ad binas drachmas exhibent: idem praftat decoaum: utuntur & w i n fpirandi difficultate 5c tufti frigida: ufum etianl frequentiffimum habent pulvis 5c decoftum ad humiditatem uteri exficcandam, ejuftque calordm fovendam. Suffitum ex his frequentant ad omnes uteri morbos ácaufa frigida concitatos. Haec Alpinus de jEgyptiis.

Apud antiquos Balfamum ob odorerri praecipue expetitum ad unguenta. PJinius omnibus ddori- bus praclatum affirmat: unde & liquor lfte interdum duplo^rependebatur argento.

Qui plura de Balfamo vclit, Lobelium confulatj qui integrum de co libellum conferipfit j Sc Alpinum, qui Dialogum de Balfamo reliquit. Et Veflingii Opobalfam. Vindic
Lobelius Opobalfami cujufdam craffi icu concreti 4 fe^affervati meminir, Terebinthin^ Cyprié veteris five viecx aut Refinaceorum liquorum inftar denfati, gkbae Benzoini fere concretionem, fap- pore acri 8c colore fulvo, niaticanti ut Maffiche lentefcente.

Huic forte idem Opobalfamum (blidum j^.-B. & Paludaho ad Ducem Wirtemberg. rniiffLinij quod ita folida eft fubftantia ut flexioniinterim non refiftat, pellucida &c digitis duftih, non fm- bili ut Colophonia, quam colore rutilo egregie refert, unifofmi, odbre^ fuavi Benjoini, quern fra- grantiorem cum adoletur adpirat naribus, nee fegniterflammamconcipit. Sub dentibus lentefcit atque us inhaerefcit.

Balfamifers Arbores Americans ad hoc genus non pertinfent? quin & ipfx inter fe genere dif- ferre videntur: alias enim filiquofs funtj ahs ponus nucifers. Verim ^uoniam omnes Balfamif& rarum titulo fuperbiunt, non leparandas ~~lura~~.

2: *Balfamum ex Peru*. J.B. An *Cabureiba*(i>vi *Balfamum Terwvianum*J?^vbi>. *Cabul Jba* Marcgrar. Forte diffrmtia fola eft in loco natali.

Folio eftexiguo inftar Myrti, cortice Tinereo, digitum craffo, tenui membranâ miniati coloris extenús cooperto, fib quo flavus liquor, quo totus cortex turgere fblet, latitat, qui vetusgratiorefri fpirat^dorem quam fit recens fit^ fitque cnddtentia: craffioris 8c Colbris puniceí: Cortex contufusSc; in maffam redadus fuaviffimos effiat globulos 5c alia multa. Lignum illius iingularem ufim praebet in fcdificiis-

Revirefcente arbors circa Februarium 5c Martium Luna plena^ ex larlb cortics defstillans pendu- lis vafculis excipitur Balfamum hoc fragrantiffimum *Cabureieica* dittum.

itdes nonlblm, led lucos integros gratiffimo odore^ Peruviano perquam fimili, inficit. Sub- Jlantia eft compafta 8c tenAci, fed caleaftum fequaci 8c duftili.

Circa fluvium potiffimum *Jerniro*, Be in diftrictibus D- Vincentii Si Spiritus Sancti quam in Par- *Locui* nambucenfi crebrius reperitur.

Ad internos &: externos affectus non inferiori gaudet qialitatē quam *Copaiba*, calidum eft & fie- cum, diffolvit, digerit, confortat. Aliquot illius guttulac per os (e)unis exhibitis Afthniari prolunt^ ^{nes*} intenipeneni quoque ventnculi, vifcerum langubres inveteratos cbrrigit: tepidum pe&ori & hypoU chondriis illitum eamm oppilationes & fngidkates tollit. Irrigatione & friaione capitis & cerebriex Panno rubro corroborat cerebrum 8c praefervat a Spafmo 5c Paralyii, imò debilitarum omne nervo^ um gfcnuſin priftinum vigorem reftituiffe faEpiffime ftintus experti. Iri nsvorum punfturis acrimo- niam faniei, unde tot dolores. 5c convulfiones oriri folent retundit. Cacterum Lufitani ac: què ac *Brafili* i adversus vulnera Sc morius venenatorum animafiuiii ineffe illi virtutem quandam fin- gularem teftancur: adquam Animaha infindii fob' naturali confugientia, coi ticemque deteren- &a parti lxfi prxientiffSmum invenientur rnedium.

Alia ell fp,ies hujus arboris, rubefcentis coloris, odorque Cedro Drafilienfi, quae incolis *Acati* <a- *mg* dicitur, *HQXI* dillimilis- *Hac omnit Pifo*.

Franc. Hernandez Arborem Balfami Indici, Mexicanibus *Hoitziloxitl* dictam, id est, refold affluentem, sic describit:

Mali Medicis magnitudine est, *foliis* Amygdali, majoribus tamen, rotundioribus & magis acuminatis, *floribus* in extremis ramorum flagellis luteis, initio loculorum oblongum forma, led precedens tempore quorundam veluti foliorum ceteris longiorum & c latiorum, in quorum extremitatis cavitate *femina* inclusa continentur, candidantia, & in quendam pallorem inclinantia, oblonga & paulisper concerta, femiribus Mali Medicis familia, aut verius his quae Haytini VDCant. *fl. 4aniej* K faccharo in crustare frilent.

Inciso hujus arboris corcice ftipitove quovis anni tempore, sed praeipue exactis jam imbribus, liquor ille nobilis destillat.

Regionibus provenit calidis, qualis est Pannucina.

Icon repraesentat florem papilionaceam, cui proculdubio succedit filiqua seu kbitis.

ILBC arbor esse videtur quam defendit Monardes cap. 9. fob finem, eique duplicem tribuit corticem, unum craffiim Suberis modo, alterum vero cenuem; fructum Ciceris aut Pisi grano non majorem in extrema filiqua, angusta, digitum longa, alba, tenuitate regalis simplicis.

Ballarni duo genera sunt, alterum quod exincisa arbore ejusve cortice exstillat, tenax, albidius quod praefertantius; altissimum coctione, modo Indis usitatissimo, dicitur ex rubro ad fuscum vergens, quod vilius. Balfamum ex (Peu J. Bauhinus sic describit) Liquor est ponderosus mellis confectus, densus lentoris refinacei: color ex ruffo ad nigrum vergens: odor fragrantissimus Styracis, ad Benzoini suavitate non nihil accedens, & quifera fragrantia totum adeo conclaveperfundat, dumque feberet, fapor subacris, linguam mordicans. Dentibus acritus, lentus, nec illico separabilis adherescit. Flammam facillime concipit igni admotus, fuavitque olentem fimiliter fumum spargit. Aquarum injectus mox in aqua petir, in qua existens si vel statim digitis atteratur albescit; nec ideo lentum deponit, sed infar Refinx digitis etiam niagis quam dentibus adheret.

Monardes eumque fecuti C* Bauhinus alique Botarum duplex Balfami Indici genus distinguunt quia: force nonaliter quam elidendi modo differunt.

1. *Balfamum Indicum ex arbore Tunica malo majore, Xjlo dicta, foliis Urtica* CB- *Balfamum Feruvianum* Park.

Pro hujus arboris fructu depingit Parkinsonus filiquam longam angustam, colore pullo, qui Balfamum Peruanum, aut Benzoinum odore adest referebat, ut ibi plane perluaferic ejusdem arboris fructum esse.

Clusius eandem hanc Siliquamlib. ? ExDt. cap. i. ? Lobi oblongi aromatici titulo describit, & Cur. fofi. ejus iconem a Joan- Pona ad se missam scilicet pro effigie fructus Ballami Peruani, descriptionem vide inter lobos.

2. *Balfamum pinis* Monard. *Balf album* Park: *Americanum* C. B- *Goaconez, Uviedo,*

Sunt [inquit Monard.] earum arborum ex quibus hoc genus elicitur in America: continentis, magnitudinis Be ad radicem usque ramose, duplii fere corlice, alacro craffo Suberini nido, altero tenui incerno, maceriem arboris complectente, Ex eo quod inter utrumque corticem est spatium indidne Balfamum educitur, alba limpidissimaque lachryma, foavissimi odoris, quod in lignis facilius statim prodit. Et certum est illius guttulam potius esse alterius quod decoctione extrahiur arvoa seu 2 J libris, tametsi miraculose ejus viderimus effectus. Fructus hujus Pili magnitudinis amarum, qui alba filiqua digitum longa includitur simplicis Regalis Hispanici tenuitate.

C Bauhinus huc refert Lobum oblongum aromat. Clus malenoltro judicio si modo hujus arboris praecedente distmta est, quod mihi non constat.

* Exyt. 12. c. 29. Jr. i.

Balfami Peruanum fructus Aius J. B.

Balfami Peruanum fructus meta forma J. B. *fructus minor* Paludani Clus Exot. / . I. c. 10

Item

AvzUana Indica pro Balfami fructu mijla₃ *ejusque floris alia minor* J. B.

Item

Nuxjve officulum Cypocis *finzlis Nuci Balfami Peruvianum* J. B. Clus Exot. lib. 1. c. 10.

Horum omnium descriptiones vide inter fructus exoticos. Ex his autem aliis quae lupiis allatit deicriptionibus constat Ballami Peruvianum arborem filiquosam esse.

Virtus

Ceterum de Balfami Peruviani vinibus eadem habent Monardes & Hernandez, quae Pili multo adhuc plura, nam intus sumptum ad urinam educendam commendant, ad juvenilem vigorem diutius conservandum, quod exemplo confirmat Monardes, ad colorem emendandum: in urinae Ios efformatum ac vulva: obdimm, fecundas & i fetum mortuum crasere, S: fertilitatem tanquam profligare affirmant, aliique infoper juvenamenta praestare quae apud ipsos vide.

;. *Balfamum de Tiji* J. B. Park. *Tglutanum, foliis Ctrati* (imihbiu, *tnoj candidum est* J. B.

Arborescunt quibus colligitur hoc Balfamum pumiljs Pinis fontem similes, plurimos ranaos quaque yerlum spargentes, foliaque Cerana: (Huiusmodi obincunt) femper virentia. Inciditur cenus & tendit cortex Ferventissimo Sole (nam in die ob frigiditatem nihil effluk) liquor effluens cochlearibus terea nigra faais excipitur: color est rubro ad aureum tendens, media: inccr denlum & hquidLim G. niifentij: glutinulus admodum K ubicunq; reponatur tiimter inhvens, lapore iluJci & gTMo

hec (I fūmatur naufeam movente, quemadmodum reliqua Balfama, odore excelleniffimo, Be LimDnmnfragrantiam quodammodo referents.

Earundem ferè virium eft cum Balfamo Peruviano, quas prolixè defcribit Monarnès[^] quem confule: ea5 paucis compleffitur Schroderiis.

Advehitur ex concinentis quadam prDvincia inter *Cartagena* Be *Nombre Je Dios* urbes fita *Tolu* ab Indis difta.

Antecellere videtur facultatibus ei quod e Nova Hilpania adfertur (Peruvian! nomine) efficacque ^{yir[^]} eft ad omnia ad quaeBallamum Arabicum. Calf Be ficc. attenuate refolvit, vulneranum eft, peffus expurgat. Bee. Uiiiis prscip. in Afthmate 8e Phehifi, in ventriculicriKlitate &c dolors. Extrinfecus doloribus à caula frigida quibufcunque Se mprinlis capitis, Arthnticis & Nephricis: in defluxiomibus ad DCUIOS cohibendis, in paralyfi, in ventriculi imbecillitate, dolorej inflatione (inumarLim cum oleo Nardino) in lienis imbecillitate, in tumDribus quibuFcunque ac cedematibus, in contraftura: parotides infuper feu fcrophulas, ceccas curaç. Inprimis autem celebratur in.vulnenbus confolidandis, defendendis, prarfertim fi ofla quoque funt contrafta (quippe fragmenta expellie[^]) in vulneiibus articularum, fedionibus nervorunij punfturifj conriifionibus[^] Bcc.

4. *Copaiba* Pifon. & M[^]rcgray. *Arbor Balfami fir a Braftlknfis fruBu monofperwo. Balfamum ctrharum cjuarindam flantarum quas Copaibas vocant [Brafiliam] J. B. e Majf'co. An Fr. mm. 3.CXO. l. I. Exot. Cluf ?*

Marcgr.

Arbcirelt fatifproceraj cui lignum rubmij quafi minio vulgari iaturatè rinfuntij duritie Fagi-noarqualcj ex quo affres lati fiunc ad varios ufus. *Folia* fere obrotunda[^] aut etiam DValia, quacuor aiit quinque digiDS longa, duos aut duos V. femis lata ubi ladflima, in pediculis digitum longiSj crafiis, uti (lint Knervi₃ poltica parte maxime eminences. *Florzm* feit mediocrem, quinque fohis obrotundis confantem. *Fruttus* eft filiqua obrotunda, magnitudinis unius digiti, mfca, quæ fi digkò prematur facillè aperituj continensnucleum Avellanae nucis magnitudine Be figura, cuticulâ nigri membranacea tectumj qviz ad medietatem vefitur pauca pulpa, lutea, lenta, molli, odpris inftar Piforum CDntiiforum: ipfe nucleus contacte earns lenta, inftar cornu emolliti, cedente dentibus, faporis haud manifefti, coloris aqueij qui Gomeditur. Siliquæ maturaE decidunt. Simi2 has filiquas depopulari amant.

In denlis nemoribus mediterraneis reperitur; in infula *Maranhou* valdè luxuriat.

Locus.

Oleum feU Ballamum dat limpiddimum[^] confiftencia[^] & odore olei Terebinthini deffillati. Ab * *Caudks*: incifo * cDrtecad medullam ufque Lunâ plenâ tanta quantitate deffillat, uc (pacio trum horarum ad duodcLim libras olei effundat. Si nihil fortè profluat, ftatim vulnus cera aut argillâ obMrandum eft, ne quid effluere poffir[^] 6c duabus poft hebdomadis cum ftenore moram compensaffe videbis.

Non foluni mirificapollec vi mundificandi fit conblidandij Bt ad qua:vi5 vulnera, (inprimisner-^{Virti} vorum) prima, intentionis reftituenda, mDisufqueferpentum curandos Be cicatrices tollendas, fed Be internè exhibitum infignsm prxbet utilitatem; quippe tres vel quatuor guttulæ in ovo forbili bis vel ter manè fumptac dyfenteriam vel alios ventris fluxusfiftunt, fluxiones etiam muhebres Be gonorrhceam.

Ejus falutares vires in circumcifione experiuntur Judaçi[^] fanguinem ex crudeli illo vulnere, antes non paucis exitiali, profluentemeocoercentes.

Plenque Americans adnotante G-Piione, communi nomine omnes Refinas odoratas 8c gummi vocant *Copal*; variâfque illarum fpecies pecuhanbus diftinguunc nomîibus. leâ Braliliani arborem hanc, refiniferarum facile principem, *Copaliba* vel *Copaiba* nominant.

Hac plants, Maftéo perhibente, cernuncur affrittu animalium attrita:, qua: à ferpentibus veneliatis aut à feris ifta ad remedium illud naturæ inftintu is conferunt. Idem tradic Guil Pifb ds Cabureibji.

5. *Balfanwm fruBu racemofa tx Hifpaniola* C.B. novum fructu racemofv J.B. *Maripmdam* * dt* j.j. 2014

i* -

Ad duorum hominum proceritatem interdum aflurgit, caulibus cinsreis, *foliis* viridibus, fuperiore paitemagis quam inferiore, grandibus, cofta craffiore & elatiore per medium divifis, pediculis non virentibus fed rubefcencibus. *Fruttus* fct racemofis, bngus, Inllar manus digitate; acini ejus rari, virentss, Be quandoqus rubefcentes, qui maturefcendo magis ac magis rubfcunt. Succum ex so hocmodo extrahunCj Cymas Be alparagos teneros colligunt, alii racemos addunt, Bcexhifuc- cum expriment, quern in aqua coquunt ad dimidiasj deinde magis ac magis ad Saps aut Mellis craffitudinem. Refidere finunt Be ad ufum reponunr. . Vulneribus S>c ulceribus minifce medetur, ea extergens Be fanguinem repnm ens. Ex ejus (ummitatibus deffillatur aqua, prarfantior aquavits, vulnsribu5 utiliffima, Bcmorbis omnibus qui a frigore ortum habent, uti dolori ventneuh aut partis alterius, fi aliquot diebusbibatur. Foliis yEthiopes loco fittularum ad hauriendum fumum Tztl- utuntur-

Mavipendam Jeu Balfamiferam arborem III. Franc. Hernandez fie defcribit, -

Frutexftfpitesferens vigmtifere.dodrantum altitudinem habentes[^] ramofque fufcoSj ac folii haftarum mucrpnibus paria craffa lataque, fed fuperna parte virentiora, Be fparfim purpurafcentia c rubeo, Be appenfa pediculis in coccineum colorem inchnantibus; fructu racematim dependens, Be oflo pane uncias longo[^] concinnato acinis purvarum fere fimilibusj fed tamen rarioribus initio vK lentibus, deinde rubefcentibus Be tandem e purpuro nigricantibus. *

Superior defcriptio ab hoc fonte profluxitTe videtur.

SECTIO aUARTA.

Abores filiquofa* Mifcrlaneto, vd ammalas^ vdob defcriptimes imprrfettM nobis.
 nmdum-fatis cognitas tr p~~re~~as, c~~af~~p k~~fl~~ent.

C A P. 1.

De Locufila arhorc nvratrhufus difta, cujusfiliqua Lobus ex Wingandecatuw Clufio, ex ftntntll
 traditi £0/0»7c7D.LeDnardi Pluckner, M. D.

Ualem ferat florem haec arbor nondum difcere potui, cuha eft in Hoi to_ in frudtiflimo Rsvve-
 rendiffimi Epif copi Londinenfis D. H. Lomptvn.

Arbor filiquofaex Virginia lobo fufco fcabro C.B. item arbor filitjuofa ex qua gummi Anime elicir**
 C.B. Jetaiba Brafilhnfibuf Pifon. & Marcgr. Arbor Brafilienjis filiquofa & gummiferaM
 gitmmi Animv fimili. Lobus ex WinganAecaoiw J. B. <%)Z %U\%Mt&+

Vifo.

Ligno eft duro, aJbo, acidificiis K machinis aptiffirao, cortice lento, punftulis ex albo flavfcen-
 tibus varicgatoj & hinc inde clypeiformibus maculis ex albo fubflavfcenctibus. In ramis continet
 folia duo veltriafibi oppofita^ hgura^ parva, kA oblonga, viridiaj ad taitum larvia, nervo fecundum
 Jongitudinem, ikvenulis tranfverfis inferne^ confpicuis przdita. Fruftum fert in filiquis oblongisj

* Colarij ca- compreffis, dmiufculis, coloris hepatici & quail lacvigati, E filiqua frafta promanat fubftantia
 fianej Marcgr. rnohlflimajfilamentDfa, fubincarnati colons^ laporis farinacei & (iibdulcis, quae cruda edulis eft. Huic
 Maznitudme farinacex fubftantiz tres utcunque lapideSj compreffli, glabri^ * nigri involvuntur, t fig"ra K
 dflTam, fi- magnitudinis daftylorum.

ENE 3 vaiK
 Marcgr.
 Fre.

H^c arbor relinam dat odoriferam, quam Brafilienics vocant Jetica-Eica, Luffitani vero AnimtM
 ^b fiiTilitudinem quam habet cum Anime novx Hilpani^ . Eo non folum medici, fed Be vulgus fa-
 miliaricer utuntur, prarcipue in capitis dolonbus a frigore ortis. Solus autem illius fiiffitus ad robo-
 randum non folum caput, fed & reliquas corporis partes frigore affbtas valet. Suaviffimi eft odo-
 ris ic facilis confumptionis. Vi quadam aromatica & i peculian^ iio calore hoc gummi pradlare,
 ac partibus nervolis illitum, vel fimplaftri forma apphcatum prodefls multi mecum experti
 lunt.

Folia arboris contuta lumbricos enecare, fi exhibeantur, conftanter indigenac teftantur.

Interior corticis fubftantia rafa, & L aquK inap^lit^ ^ ^ ^ ^nt^iAt^ ve^tolicates *d potiuncuJae
 fbrmam prxparatur, alvumquefimul movct.

Arbor haet; fpiffa & L fpcciola in Parayba: prsfertim diftnftu provenit.

Locus."

Gunimi per meatus corticis interiDres decidere certiffimum eft; illud erlim tdhire effofla, fiib
 arbons trunco 8c radice occultatum extraherfolenr. Quod potiffimiim ficub finem xftatis, men-
 fe Febuario. Mnnardes ex vulnerata arbore in Nova Hilpania colligi teftatur, haud aliter
 quam Maftiche aut Thus.

Hujus arboris Jobus a Jo. Bauhino accuratiffime defcribitur & depingitur lib. ix. p. 456. appiffa
 etiam planta novella u femine orta.

Arborem noftratibus, tije Jlocud ^Crtt eandem cum hac cflc mihi perfuadeo: namque Sc b-
 gura Be defcriptio fruftus apud J. Bauhinum Locuftx noftrae fruftui conveniunt, Be folia arboris te-
 nellx folijsjetaibxrfpud Pilbnem.

Hujus arbons Jobus, fed feminibus exhaustus ad me tranfraiffilis eft a periciffimo Botanico D.DooJ/g
 Pharmacopreo Londinenfi, qui iconi Lobi ex Wivgandecaoiw Clufii ejiiffque defcriptioni fati benB
 refpDndebat. Folia arboris, qua: una mi(Tr, idem amiciffimus Vir Jetaibac arboris a Pifbne depift*
 Foliis quodd formam familia erant, nifi quod nervus feu cofta, folium per longicudinem dividenSj
 non medium percurrerat, fed tela folii ad coftam exterior multo latior erat quam interior K arcil-
 ata. Erant autem folia glabra, denfa^ fiiperne^ iplendentia Laurinorum confiftencia^Be quodammo-
 do etiam figur^, nili quod ob telam folii diftam in latitudinem evagantemab unolateremagispro-
 minerent Be arcuata client (An tamen hoc conftans fit in omnibus foliis hujus arboris nefcio) tres
 infuper circiter digitos bnga, fefquidigitum lata, erant hie folia. Addit prxterea idem D. DoodjM
 fe ab Amico quodam qui in infula Antego aliquandiu vjxitj a quo & folia accepit, edoftumj Ar-
 borem ipfam excel/am eTe^ caudice crallu, coma in cacumine frDndofa^ Be patula^ umbram yxx-
 bence fpaciofam, ob quam prarcipue expetitit Be in longinquas regiones, ut v. g. Novam Angliamj
 tranfcur niaceric , alborno excepto, fubrubence, dura, lolida, & quando lxvigata ac polka afj^
 ftui pulchra, muln in mechanicis ufuis, prarcipue ad molendinorum Sacchareorum rotulas cylindrol-
 ve. Hinc etiam arborem hanc cum Jetaiba eandem effe conjicio, fiquidem Jetaiba: lignum, tra-
 duntur, valde dngroa eft, & ad trabas adducturum argute axo Mz:thofonon uafpua-
 Coactice Jaxi, albicaoc. Florem ob prarcipuatam arboris fe nonquam potiffie objaxat. Pulpa
 ficutie intriviana. Florem ob prarcipuatam arboris fe nonquam potiffie objaxat. Pulpa
 nut*** bin uuiure IUDIucco cue, upore acino, inneque au imm CAHIB"m ab indigenic
 comeii. Hie de/ripuo, (inquit D.Doody, cui titnos affBuiumrJ adeo exacte cDnvenKcum KD-
 cheliortUna Arbons Zourbary dift* Hiibr. Antill. cap. 6. Art. lo. ut dubicare nequsam candem
 arborem cffe. Vnle Be confer.

Hujusmodi lorum prolixè iatis describit J. B. his verbis. Infrens erat ^{era/Km} rⁱ;n; t^{ex} u^{nc}la⁵ longus, tres latus [Clufianorum alter fex u^{nc}la⁵ longus erat, in Jam, alter u^{nc}la⁵ longus u^{nc}la⁵ binas latus, uterque u^{nc}la⁵ craffis] extenus fubaffer, tubercdis minimis inarqnaljs, duriffim⁵ ftanei faturati colons una in parts, oppofita vero fiifi nigricantifque magis ac fplendentfe in Ivnt⁵ nutate una reciidumlongitudinem coniiderata duftu fuo continue in tumoreni maeis acina furgit; ex oppohta vero IDDI parte fulcus infignis ipfi impreffis confpicuus apparct in latitudē lobi media parte .evidenter intiimefcit, ad latera vero fenfim detumefcit, tumore folumrnX²* extrema longitudinis parte pediculo oppofita liberalius excurrente: pedicula denigneplufquam uncialem obtinetoblique infixum, duobus internodiisprzditum; ad lobum tenuior eft & rotundū? affeiturculusfurculque, .ultenusveprogredito densus utrimque in carinam caffior Be⁵ evadit, donec tandem in extremitatemlatam teretemque abeat. Aperti jam lobi craffities p^cnn^a: fcriptprisvijgariscraffitiidineni adimplec, fbfstantia albicante fdfciqus donata: cavaras ejus unda liseft, intenus plufquam fuGa nignEanrqu⁵, ad pediculi regionem extrcmum anguftior fie & in

tum tenuiffimo pulverefufco afpergii: inficftqus : cruftam habet interiorem cavkatem undine d^{igi} cingentem, qux tenuior cum lit, levi opera areliqua craffiore fubftantia abfttrahi avellimueⁿ rpf cui fubeft fplendens qusdam lubftantia, fufcedine itidem fibi confueta oblita imbiuan^{Ue}

In Clufii lobo latebant quinque aut fex officula verius quam Phafeoli, unciahs Ionritudinjs Av I lana magmtudine, dura, nigra, album nudeum.continentia, Aniygdala; vel Avellanx JaDor⁵

Alium hujus generis; lobum habuit Clufius feptem uncias longum/ o i latum, minus craffum W nore 8ccolonjs magis lpadicej, qui plenam matutatem nondum adeptus videbatur, ex infila H⁵ hvs Ifabellae vicina deferta 6c Inculca dslatus.

C A P . II.

Arbor Jiliquofa Brafilimjis Caaroba difa. Caarvha Pifon.

Albor fylvefris trris potiflimum glsbofis Parnambucenfis prazfeftura: deleftatur. Si minus fehu fblo crefcat panne arbufcuk vix zquatur. Florem Fat e^crulea purpurafcentem id⁵ quemefe Junio; Semen autern mgricans, quod maturefcit menfe Septembri • FrukL rarum, led inuulem, Phafeolo maximo fimilem, qui maturus faftus aperitur manft

Eiuifolia oblonga funt, lingus figuraY dilute viridia, nervo fecundum longitudinem & coffis phl⁵, quis smmentibus przdita.

Guffu font amara; ficcata ac contufa fomentis ac balneis peridonea. Qua: ex illis conficiuntur [^] remedia, etiam interne aflumpta, exficcandi, mundificandi ac fanandi vi poll^{en}c : quod felidPr⁵ in plummis. dironicis Sc articularibus morbis, imprimis autem in Lue Venerea curanda Pifo^T expertum aijt. Ead^{rn} trita, atque in emplaftrum prxparata, ulceribusque applicata mififice mi⁵ funt, morbumquB radicitus fepe expugnant, pra[^]tim fi repurgato primūm corpore' corum decn⁵ iftum per aliquot dies bibatur, Be fudores provocentur. E Haribus quoque componunt confervam⁵ ad Bundem ulum. Hac omnia Pifo.

c A p . m.

Flanta leguminofa vEthiopica folijs Rufci Breynii.

Breyn.

Hujus ramulum, duntaxat dodrantalem vidic Breynius. Ills autem lignofis erat, trianeula⁵ ns, 8c fup³nus in ramulos, duos divifus; circa quem fine certo ordine Iparfa Junt frequent⁵ nOna/oh*, pediculis penitus carentia, dura, folida, Rufu[^]mula, majora autem, Sc fi accuratè eadsm obfervet, in ambitu Jemter ierrata, antfriujs in mucrone acuci/Timum 6c pūngencem exeuntia, in bale hnuola, 6c planè ficut CDrculum quod pingi folet formata, multis nervis icundūm longitudinem excurrentibus, pallidi coloris, tranverfim venulas multas habentibus nota⁵ ta. Florum forma me latet. Fruttix verb ramorum cacuminibus iniidentes, filijua Junt teretes unciahs longitudinis, ngidi, tumidiufcula: membranceae, 6C ex purpureo-fpadiques, qua: ^ calyculis cjufdem coloris* 8c lubftantjs, inlacinas quinque definentibus prominent, feminibus inanes nempe prius apstac quam a me compefta;

CAP. IV.

TentafbyUa filiquofa Brafilimjis caudice ftivofo midia parts in vntrem intumfemtt Saamouna Pifon. wmvim*

Sliqua: alpeftu mirabilis, excelfa Be patula fanè eft hac arbor, iifiem fvlvis mprl[^]Prr[^] • k⁵ labJba conf[^]-nda; ou, iupe.ore Sc mfer.ore trunci parte o r & E t i n medio duplo plus obefa infar amphorx adeoque tumVda apparet, ut percenSal«"m aimntcum ixmorttur. Ex ramis psdiculi emergunt long, Vinapbyllum qu⁵ it protrudes, "Sirfe drii⁵ iūij

liirn & ferratum, multis obliquis venis vestitum. *Siliquas* fert oblongas, Pifa rubra continentes. Totiis tiincus substantia est intus alba, medullo/a &c plane fuberofS, exterius cinerei colonis, validis & horridis fpinis a pede ad verticem ufque ob/effa.

Vires!

Ex turgidis fpinis, rafis & contufis fuccus elicitor eximius, cujus vel exigua quantitas. inflam-
matis & involuntarie lachrymantibus oculis affnitus medetur, turn manifeste quoque vium acuit,
& robur III addit.

CAP. V.

1. *Arbor Jiliquofa Brafilienfis foliis pinnatis, cofid medid rmmbranulis utrimiu extantibus data.* ~~Br~~
Bzlgis <vulg. Lotus Marcgr.

Marcgr.

* *SIIOJ ramu-* ^V Rbor est haud magna, rambs 6c ramulos pppofitos habens alternatim, & in ramulc
losvocat mhil 1- duo, tria aut quatuor paria foliorum acuminatorum, itidem oppofita: *Caulis* ad quodlibet
aliudjunt J^ ^ foJium alatus cordis figura, ut *Sc* reliqua- fpecies. Florem non defcripfit Auftor. *Fruilas*
tinnia " est liliqua fabacea, comprcfla, flava, duos, tres vel quatuor digitos longa, intus quatuor, quinque,
iQX3 ^vd plura *Jemina* tranfverfir\ pofita continens, veltita pulpa nivea, quafi holofericea, adta-
ftiithi frigidiufula, fapons dulcis gratiflimi, qu fponfe feparatur ab invicem, pro numero grano-
rumfeminis, Be dentibuS feparatur a feminibus, Be comeditur, ^ftque b&pi faporis: Semen autem
minime, quod est olivacci coloris oblongum, filile in duas partes fecundum longitudinem- Fru-
dus maturatur Maio.

i. *Arbor filiquofa Brafiliana> filiqua hffrida ferruginea, Ceraton'us facie* Breyn. *Inga Opea Tiiba*
Brafilianorum Marcgrav.

Breyn.

Arbor *hxc* Sorbi facie nafcitur, ramis plurimis laterorfum extenfis, cortice cinereo, & C potiffi-
mura circa faftigia inftar Rhois fubhiriito veltitis: quibus *folia* alternatim adnafcuntur, uni coflar,
fefquipahnarisferlongitudinis^ craffi Be hirfut^ denapl^runque ex adverfofitaj per intervalla in-
hacretia; fingularia vero folia ad Sorbi quodammodo accedunt & quibus potiffimum difcrepant^qud
latiora, nullo modo ferrata, Myrti Laurcz effigie, fed paulo majora, ac nervd rufefcente, Be venis,
fibris, pilifque ferruginds, tarn in fupina Iplendidiiffima, quam in prona parte, dotats funt. *Flores*
brevifSmos pedunculos, articulis duobus interceptos habentes in ramorum extremitatibus feptem plu-
relv'e quafi in (pica brevi coherent, ut credo, tubulofi, 6c albi feu lutei coloris, in modum pleranjm-
quelngarumBrafilienfibis. Hi locum fuum poftmodum fponfe concedunt/ % ^ iublequentibus,
quatuor aut quinque uncias longis, unamlatis, comprcflis, forma Ceratonis, anterieus adunco apics
prominentibus, Be fecundum longkudinem ad utrumquelatus, veluti Pilbrum filiqux, filo quodam
circundatis; quodinvifibileinterdum obpilos hirtos ferrugineos filiquam hanc elegantiffimam im-
PeHSC ita veltientes, Ut Caffcu & C_a | ΔΔΔ velut el Tn^Lzzr*x kolajericoA conFe^a videatur.

Csterum *Inga-Opea-piiba* Br^filienfium ftebrcviter defuribit Maregrav. Arbor est cortice cinereOj
in muko5 ramos expanfa: *Folia* fibi direfte oppofita habens, duos, aut duos Be femis digitos longa,
rufefcente nervo, ac venis Sc pilis rufefcentibus fuperne *Hē* inferne; ramuli juniores item pilis ve-
ftiti. Poft flores proveniunt *filiqua* paralhogrammi figura comprcflac, Be in totum pilis ~~hufc~~
~~rufis~~, in quibus continentur femina-

3. *Inga aliafecm* Marcgr. *Siliquofa Brafilithfis, Inga dicta, filiyiU UngiJJimis contort is.*

Marcgr.

Arbor est CDitice fufco, in multos ramos expanfa; *folia* oppofita, & ramos alatos habens^ ejufdem
pxne forms & t condicionis, nee diftatmultum a cacterisfpeciebuspracerquamfruClibisqui flores fe-
quuntur, quinque, fex, feptem, pedes longi, ex viridi fubrufefcentes, contorti, Saechari periidiaci
figura, vel cDnfeftarum radium Pitiipinell*.

4. *Arbor filiquofa Brafilvnjis foliis pinnatis^ cojia media ad fingtda pnnarum paria appendicibxs Au-*
rant' tar um amulis alatis. Inga Brafilienfibzfs Marcgrav.

Marcgr.

Arbor elt cortice fuf^cente ut Alnus, ligno lento. *Folia* habet longa, non ferrata, viridia, or-
dine fibi invicem oppohta, Sc prarterea raitulos inter folia appendicibus alatos, qua: cor effigurat,
Be viridia funt ut folia ipla. Ad exprtum autem ramulorum in ramis majoribus cerni femper juxu
fe invicem proveniunt pediculi, felquidigitum longi, in quorum fingulis duodecim, quatuorcedm
aut quindecim, plures paucioresve in uv^ modum enafcuntur ovalia capicula, qua: *ihic* pandenta
dant/orrw, conftantem quinque foliis albis, leniter hirfittis inftar ferici, figura fforum Lillii conval-
lium parne fimiles. E medio autem flons exit manipulus filamentorum albiffimorum, fericeorumj
longitudine duorum digitorum. Flos porro dukis bdoris ut Tilis. Filamenta ha:c in extremi^{taCC}
apices lutos Dbtinent, ac ftant erefta inftar plumarum, 8c decerpto flore marcefcunt.

Huju5 generis plantain Rom aliquando vidi in horto Henrici Corvini, qui earn pro China Chjn^
oftendebat.

Ha: ATboresInga: diftat peculiar em habent foliorum ftmfturam. Eorum cnim cofts, media: ad
quas panna conjugacimannexzliint, inter pinnarum conjugations appendicibus feu alis-utnquB
audtalunL, us limibusquxadbafofoliDrum Mali Aurantia: cernuntur, dua: autejn huiulmodi ap-
pendices fimul cordis figuram referunt. Hujulinodi plantain Romx cum eilenius ilobjs olttffcur
D. Henrici5 Corvini in horto fuo trcfcentem pro China China:

CAP. VI.

De *Syringa*,

j. *Syringa cceruka* Ger. C. B. flore emeruleo, Jiye Lilac J. B. Lilac Matthioli] five *Syringa*, flare cosmho Park. 25lcto ©ipc-tree o? Silac*

J_m fl.

Arboris interdum magnitudinem acquirit, plerunque tamen fruticosa est, raJice nultum reptante 8c pullulante, eoque plurimum multiplicante, *fiolonibm* robuftis: cortice exteriori in cinereo vifefcngte detracto librum oftentans viridem, fub quo lignum fblidum, firmuni. In extremitate ramulorum funt craffi ac turgentis gemmae. Folia bina aduerfe, contranoque orcu ferie quadam cruciformi difpoiita, Afclepiadis folis quodammodo fimilia fed latiora; vel Apocyni rotundioris aut Populi nigrae, fubrotunda, in acumen tarhen definentia, mollia primum cum flore^t poftea duriora Sc firmiora, utraqueparte glabra, pediculis unciabus aut amplionbus appenfa, fubamara Sc nonnihl acria. Flow ex pnvato lurculo imbneato foliorum ftipatu obvallato (uaveolentes oriuntur, in jub* formam difpofiti, numerofti, fine foliis, quorum fingui ad flores Laurenla: flore decido accederc videntur, oblongi, rubentes, aut ex ru^ore coerulei, quinquepartiti, quatuor apicibus croceis, ahe reconditis farfti. Sublequuntur veluti *filiqua*; rubentes, comprici&j vix unguem iong2e, ex brevibuspediculis, quas maturaecin duas partes fepearantur, 8c pulchre hiant; in quarum interfertiis fecundum longitudinem porrefta latitant *femina* longa, angufta^ compreffa, fohacea, tenuia, Clufio bina in fingulis.

De loco hums natali nihil ferti traditum invenio, nee enim cauda vulpina Turcarum *Bellon*, obf. effs potest, cum ea fit follo temper virenti. Cujufvis tamen coeli patifns est. Aprili menfe floret. Et. ob florum pulchritudinem & fuaveolentiam in hortis colitur, quamvis nuliis in medicina Ufus fit-

Syringa Africum vocabulum C. Bauhino videtur. At Cluho placet hanc arborem Synngam a virgarum reftarum longitudine 6c fungola: interioris medulla copia dici, qua exempta ramuli fiftuloi fiunt- Floris colore interdum variat. Habetur enim flore purpureo, 6clafteofeuargenteo.

a. *Syringa Perfica* five *Lilac Perficum incisifoliis*, *Jafminum Perficum diBium* Park. *Agem Lilag Perfarum*, jive *Lilac incifo folio* Cornut. *Syringa cosrulea* Ger. J. B. *Ligustrum foliis laciniatis* C. B. *Syringa Perfica-purpurea foL laciniatis*, dr foL integris.

Frutex est nunc trium, nunc quatuor cubitorum longitudine, ligno molli, fubalbo^ multaque intus medulla alba repleto, cortice pullo aca filice rubence, millique pundtulis fubluteis maculato. *Radix* fubest lignofa 8c fibrofe, uc Punier. Varietas est peculiaris in folio, quod in humiliori iV-mulo Gelfemini divifura laciniatur; in editiori aitem fine laciniis est, refertque quodammodo Liguftri vulgaris folium: cui magitudine Be figura est aequale. Biferum est: primus flos ante Solstitium racematim cohaerens dilute purpurafcit> efflatque odore vulgari noftro longc iuavio-rem. Alterum floris tempus, est ferus Autumnus (quanquam apud nos id accidat raro, 6c fi quando contingit tunc temporis in florem profilire, non ille perfectus eile folet, nee pari copia fubnafcitur) Excipit florem *filiqua* brcyis 8c latior, qua: acumine extenuatur, utrinque lineola difcrera, qua pars per maturitatem media diffinditur: apparctque *femen* fubnigrum, vulgaFi ilmile, fed

Foliis *Jafminum* Catalonicum proxime semulatur, unde a nonnullis *Jafmini* nomen ei inditum. Verum nulla alia in re cum *Jalminis* convenit, fed in omnibus cum *Syringa*; floibus in fpicas digctis *Syringe* ccerulex adeo fimilibus, ut vel obiter intuenti *Syringam* esse fe prodat, quin ficflorendi tempore, 6c fruftus figura, (qui huic *filiqua* duraeft6cmucronatajafminobacca) ajafminodiffertj, Sc ligni natura, (quod huic album medullofifim, cortice kvi) Sc denique feminis totiusqus fruticis fapofe, (qui Lilac initio fubafper, tandem fub finem leviter aftringens, Gelfci>ino aiparus, acer Sc mordicans, ac fummopere adftringens.)

Jafminum coeruleum *SerapiDniseflevidetur*. *Agem Lilag*. florem *Perficum* fignificat: *Apmznm* *Perfidem* fignificat, *Lilag* florem.

Variat foliis integris, unde *Agem lilag Perfarum*. folio integro *Cornut*. *Jaiminum* *Periiuum* tollon laciniacib *Sutherland*.

CAP. VII.

Syringa alba Ger. alba, five *Philadelphia Athtnai* C. B. flore albo J. B. flore albofimpli Park.

VAlde elegans est hie frutex, multis ab radice longis virgis praeditus, reftis, cinereo cortice tedis, digitalis aut majoris craffitudinis (quae tandem brachialis intrprum evadit) nodolis fc quodammodo geniculatis, multam medullam in fc continentibus: hac demum in mulcos tenellos virides ramos fparguntur, quos ox intervallis bina (emper *folia*, contrano pediculorum extu nafcentia exornant, Laurinis majora, oblonga, per excremum mucronaca, rugofa, viridia, in ambitu crenata, amariufculi primum deguftantibus (aporis, deinde acris. Flores extremis ramulis infident, terni/quini, fepteni, nonnunquampluies, bini fempar inter feoppoliti, extremo impare-coaitant ii quatuor foiiis acuminacis, albis^ numeroftis fibris pallidis mediam floris caviuicem 8c umbil-

CAP. X.

Ifora-Murre H.M. P. 6. T. 30. p. 55. Fructus Indicae fructu t styli apicet grejfo, sextupl. h, in jpiram convolute confiante.

H.M.

Pruni altitudinem arquat frutex ifte. Ramis est cortice crasso, duro, colore cinereo, intus virenti, sapore subamaro, obductis; ligno duro candidoque. Radix flava, gustu amaraj olfactu hand ingrata. Folia crassiora, rigida, fupina parte hirsuta, aspera, Mori asiimla, Jata, per ambitum crenata, vel plura, vdfolitaria > brevibus capillatiffque pediculis e viridi fuscis, ipsis rarijs infistunt; costarutrinque eminentes tres quatuorve epetiole prodeuntes in minoresle munduntjguilu amancante: Flores hinc inde ramorum e nodulis yd linguli., vel bini, vel terni plurifve iimul brevioribus, rigidis, scabris luteis peciolis erumpunt inodori, tenuibus & translucidis colore aureis confiantes folijs: horum iinuin, ftyJoaccumbens erigitur petalum, quatuor verò lateralium inftrarum expansbrum duo minora angustiorave oblique actolluntur; duoiriferiora latiora & ampliora subtus atrisaspera maculis, deorsum incurvantur. Hsc inter aureolum, aft inflexum, virens procerior styhs extollit caput. Fructus autem styli capitulo tranfverfi velut pedunculo inherent digital e fex velut funiculis, in quos pra: ficcitate poftea se resolvente spirali modo in coniformain contom: Semina plura e viridi frufca funiculis fingulis inclufa continentur.

Arenosis proveniens locis singularenoh postulat solum: confpicitur inter Cranganor Be Mangatti, ut Be in alijs regionibus, fed rarior. Februario Sextilique mēfibz floresj concinuo fere macurum exhibet femem. Frondes ei nunquam decidunt.

Vires egregias in empyemate stomachique affectibus praestant radices fucus, vel ipsa forinfecus adhibita. In exanthemate quoque Be Paneritio similibz vitis summo pere conviciire fertur.

CAP. XL

Katou-TulcoUi H.M. P. 6. T. 13. p. 41. Fructus Indicae flore Jtpetalo capfula oblonga hinc bina fructibus continente.

H.M.

Frutex est hominem longus, cujus ihodora e radice fibrosa ruffa geniculatus carinatusque exfirgit duncaxat unusj fradtu perfacilis, ramulose geniculis procuberantes habens gemellos oppofuos. Rami ut sc firculi pertenues ei fiint, colore fuscij teJieri, pilis rugofi. Folia hie illic furculis infident rara, elongo angusta, longitudinis pollicaris, e viridi fusca, inferne dilutiora, quae lapsis flonbus ramis decidunt. Flores purpurei e foliaceorum liircolorum erumpentes extrematibus, folia habent elongo angustissima, eredta, extrorsum crispata/ quorutri unum angustius inferne candidum venis striatum, alterum latius est. Stamina bina exalbida, purpureis oblongis apicibus, duabus quoque gemmulis exornata, albens fibi e calyce viridi exortum ad junctum habet filamentum. Decidens floribus e calyce capfula enascitur feminales, ubi calyce excipiuntur e longo angustiores, capitulo compresso oblongoque sunt, virides hirsutae, iicca lignoli, cortice albulo. Ipsa verò complanata, effusa fusca, duabus in cellulis intersepimento quodam distinais, prope capiculum bina utplurimum repenuntur, fabae figuram arxiulantia, odore castorei caefitta.

Arenosis ipsis frutex apricique gaudens campis circa Cochinchinae & Varapoli multus est. Flores Januario, femem maturum Martio Aprilique dat mēfibz. Medicus internus usus in stomachi doloribus atque interaneorum inflammationibus est; externus in scabie herpetitj.

CAP. XII.

Avpam H.M. P. 6. T. 1 & p. 51. Siliquosa Indica flore irifetalo filiquis mētibz pulpa abfque frminibus replzta.

H.M.

Hujus fruticis caudex bis terve divifus cortice vestitur e cinereo viridi, inodoro, acido adstringentique. Rami ligno albicarite, medulla viridi perfolla, nodis interfinti sunt. Radix rubra in capillaceis dedufta fibras undique se diffundit. Folia ex oblongo angustata in cupidatj exeuntia, fupernē faturo virentia, inferne furdiora, cofta majori ramulosa, venis nervifque intertextaj crassis, curtis, interius planis, fignula duntaxat adherent petiolis. Odore sunt haud ingrato, sapore subacri. E purpureo higgelli, inodori, rotundis ac tenuiffimis e petiolis prafrumpunt flores bini ternive fze conjuncti, tibus latioribus cupidatis confiantes foliolis, externis niveis obduais pills; quorum in medio confpicitur trifariam oblongis, tranfverfis, rubris taminibus divifis ftylw* Floribus cupidatj teretefque pulpam carnosam abfque feminibus, faltetm confpicuis fabrefcunt.

Locus delectatur arenosis & C apricis, in Artgatti Sc Mondabelle aliifque locis copiofus est. Flores Locustae & fructus in anni tarn exordio quam exordio, frondes temper apparent.

Quodcumque hujus fruticis gum oleo in unguentum redegeris ad plbram vctuffimamque valet ut Virtus.

Foliorum cum Calamo aromatico contra serpenti venenum; fusciam vero Reguli serpentis (*Cobra Capella*) veneno reficitur radix ex Limonis contrita succo, in nodulum ligata, naribusque pro errore immittitur. Eiusdem junioris colubri infringitur virus eadem radice cum vaccino lacte propinata: quemin finem etiam cataplasmata est Calamo aromatico atque hac radice confecta adhibentur.

C A P. XIII.

Waga H.M. - Arbor Indica filiquiflore utraque tft Uato [ili] uis bipalmaribus plants.

H^{M.} *Ec Intif* perfimilis est, attamen/pinis carens, altas maritat arbores. Rami ejus virides, carinati, atque ubi novi prodeunt furculi binis donati sunt foliis. Radix atringens & C amara. Folia parva, elato aculeata, uno elatere convexa medio reflexa nervis intus viridia, extenus rubea, petiolis rubicundis ejusdem colons lurculo per ordinem adhzrent; quæ vel fbla, vel cum ramismota ftatinij qd inclinap fsmper folent die, se contrahunt. Flwis quidodris sunt mellei, caliculo inclufi rotundo, constantes foliis quateris oblongis, stellarum modo expansis, tenuibus, mollibusque fivis, propriis racemosis furculis suspenduntur. Stamina i aut 14, eminentia tenuia lenia, quorum inferiorem partem obducit lanugo, apicum sunt rubro fufcorum. Hac inter caput ejusdem colons ffurtyjm oblongior craffiorque. Frutiushinzs palmas squantes; /?-liqu* (unt duos pollices latz^ tenues ac pra^ planae, exsiccatæ rubefcentes^ cortice intus niveo^ fabas adtingente, amaras, teretes, paululum planas, tranverfarias^ e virente fpace continentis. Floretut Intfia.

Uti. Provenit quocunque TDID denfis ylvisin Farapouli, aliisque Malabarici Regni locis femper rentium interponitur numero.

Vim. Hujus arboris iuccus una cum Limonis & C virente Curcuma in Nucis Indies oleo diu coctus ilinendo prodest leprarum multi inliiper usis est in ulcibus inveteratis.

C A P. XIV.

Arbor Malabarka flore vario, filiqua nuciformi. Kar'm-Nioti H.M. P-6. 7! 18. p. 31.

Arbor est tanta: proceritatis ut fex hominum superet altitudinem. Caudex ei hominis craffitudinis; rami cortice nigro, ligno albo, fedi amaro; teneriores viridi iint- Radix turn odore, turn sapore gravis atque amara. Folia peramara, craffa, folida, glabra, vecustiora facile fragilia oblonga^ obtusa, recta in parte est viridi fusca, inferne dilutiora; e craffis rotundis, ferè pollicaribus proveniunt petiolis, costamultas albidulas fundente venulas^ divisa- Flores circa ramorum summam Les in furculo pertongd, romiffis, parvulis, pufpurcis petiolis plures conjunctim inherent, cibus, Sc quatuor, & quinque interaum, ad invicem innexis constantes rotis exangufo lati & oculis lenibus^ colore ab uno latei e fubflavo in album vergente, ab altero prope modum fanguineo, utriusque nitentibus, e calyce in quatuor lacinias difleto prorumpunt. Stylus mediaffinus brevis craffusque, filamentum oblongum h fufco flavum emittens fiamina oblonga, croceaj apibus quæ donantur rufis comitatur: odoris plane expertes. Succelli floribus frufus pedunculis curtis, timentosis fasciati elongo cauli feu petiolo appendent nuciformes, quamvis aliquo modo planioris, cortice craffo, ligno fungoso ac levij qui includit unum nuchum duos in lubo^ cute est flavo rubente divi/um, guftu amariffimum.

Uti.

Arenarum amans propè littora invenitur in infula Baypin, pone Paloerti, Arrzatti, aliisque, locis, ut Scininfula Zeylonensi. Flores ejus Januario, frufus Martio Aprilique mensibus frondes semper vifuntur.

Vires.

Folia balneum prxtant febrEs fugans algidas, contrita vero Eryfipelati occurrunt; temporibus adfricta cplubri cujuscunque adverfantur veneno. Eorum DICD incoctus iuccus linimento Piydracis est. Efructibus autem pmò conficitur oleum articular^ dein potio chalsrsmoedens morbtr. R^{an} dici Boream versus exreclenti magicas Malabarxi atnbuunt vires.

CAP. XV.

Taina-Sdulli H.M. P. 2. F-48. p. 95. Frutex Indica spinosus foliis Agrostoidi filiqua racemata breviss.

Frutex est spinosus, nascens in arenosis, radice fibrosa 5c capillata, albicante; cortice craffo^ lo, albicante, mollitetta- Vaults teret^s fimtj vnides, nodulati, spinis quatuor, traiffve^ duiis, aukat, Sj ac ibi invicem ferme oppositis in nodulis circumdati. Folia ex spinarum ^gine bina simul exeuntj petiolis brevibus & crallis^ denia^ rigida Sententia, obfeure viridia, leu flavo-vindia^ utinque in oris tribus cuspidibus aculeis eminentibus, qui alternatim versus pi onam & lupinum foln partem contrafti funt, cum uno in vertice, munita. E costa media ncm in culpir des exeunt Flow m liimitate caulium bini una proveniunt, uno constanc petalo grandmculo, latiori & oblongo, quod versus exreora cum fupenori parte fuifque ons nonnihl reflexum eir, ac ngidum Be craffiuleculum, pihs meertis albicantibus obductum, ungue roundo caiyci mlidens^ o-

lore cEruleo fubpurpureo : in rtedio longkudiniv ubi extuberant ac craffiores funt B>C gUbrī fine fpinis, colore cnerulo-purpureo magis fatiūro, fubcus diktriore Be albicantes ac nitentes, odore nullo* *Stamina* intus quatuor, longiufcula, craffa Be albicantia, fuperne barbata denfis, albicantibus feu etiam flaviufculis fpinis, ac bina & binain feinvicem decumbentia: inter qua: emicat filamenturri tenue, albicans, in fummitate bifurcatum, exortum e globulo feu capitulo oblongo in calyce fito, quod rudimentum fructus eft. *Calyx* folli rDtundis Be fibi mīUuo circumvolutis confat. *Qafful** feminales grandes funt, oblongo-rotund*, inferiore parte paulo craffiores, Be nonnihil planar, in duabus oppofitis partibus, ubi rotundiori fuperficie funt, in longum una ftria notata^ atque in vertice uno fpiculo nigricante eminentes, cortice per maturitatem nigricante, in profundiol^ viridi-diluco calyce confiti, formā externā Be magnitudinefructus Ar^ua referentes. *Semina* m duobis loculamentis in quz fructus perinterfepimentum dividitur, continentii; in fingulis bina, obtangorocunda, parte qua ad coiticem fructus adjacent convexa, cum immatura funt Candida ac nivea^ Be corcice craffiolo, candido & velut iungofo, intus nucleō albicante fubviridi, faporis fubamari-

CAP. XVI

Nir-SchuUi H. M. P-2- -F.46. p 89- *Frutex Indicus flort dipztalo hbiato, filiquj gem mat 4 actt- hat a.*

F^{H. M.}rutex eft fpinofus, in udis nafcens: *raicit* fibrofa, capillamefttis denfis veftita, cortice albice, intus lignofa. *Caulēs* virides, geniculati, Bead articulos extubcrantes lignofi, corculo aqueoaut viridifeu albicante, ramulos e^fingulis geniculis binos emittentes^ alterno ordinej iuperne quadratos, 6cin lateribusilico ftriacos. *Folia* pariter adgeniculosfingulos bina, petiolis languidīs innixa, oblongo-rotunda, anteriū roçundis pris in cupidem contrafta, ad pctiolum ftriftd^ tadtū mollial plana, glabra, lligernē obfeunū viridia, fubtus clariora, in margine limbulo rubr3 acuto circumdata. E foliorum finibus *forts* plures, ut quatuorvel quinque fimul prodeunc, dipetali inodori, *Babel-SchuUi* flonbus fimiles fed minores, collo anguftiore, cobre purpurcoeruleo valde diluto, 8c maxima parts albicante Be nicentej pctalis minū profunde in orisleu labris incifis, quod latius eft, interior! parts punftis rubicundis feu nigricantibus, quz pilos cmittunt, notatum, nulli-ILSpariter odoris. *Stamina, apices & C fylus* tafe habentut inBahqSchutti. *Calyx* foliis parvis, cupi- datis glabris confat. *Siliqu** firrefra!, quam in *Bahel-SchuUi* longiores, teretes, lignofs, durx, fuper- ne aculeate ac pungentes infar Ipinarum, in longum fex ftrii lulcatae, calycis foliis rigidis maxi- marn parscm arfte contentac^pcr maturitatem ruffian duas cslJulas *isu* loculamenta interificio ligno- lb in longum divifc, in quorum fingulis *femina* plerunque (ēx rotunda, plana, ex rubro fafta con- lineuntur. *Nir-Svhufa* dicitur quianafcitur in aqua: nam *Nhr* Malabaribus aquam iignificat.

Folia in pulverem trita, K cum oleo Ficus infernalis mixta, tumores corpDris BC^pudendorum vi- *Vires* rilium diflipant; ut de foliis *Bahri-Schttli* diftum eft-

C A P . XVII.

De Neribjve Rhododendro.

Frutex hidad Apocyni genus pertinet quocum partibus prascipuis^ filiquis Sc feminibus convenit, Vcrumquia locis nonnullis fruticis modum exceiit & in arboream magnitudinem excrefcit^ nee fucco lacteo turgeat, Apocyni in modum ab herbis feparandum 6c cum arboribus conjun- gendum duximus.

I. *Nerium five Oleander* Ger. *Nerium five Rhododendron flore rubro & albo* J. B. *Nerium flo- rhui rubefcentibus, & Nerium fioribus albis* C. B. *Oleander five Laitrus Rofea* Park. ©Ie= antoer, 02 flofcfrnp*

J_mB.

Arborea eft planta, *caudice* refto, reftifque ac firmis ramis brachiata, croceis feu ex viridi palls- fecentibus² in quibus *folia* multa acuta³ longa, unciam circiter lata³ utplurimum terna fimul orien- tiaj interdum bina, ubi rami dividuntur, tranfverfum iere digitum invicem diflit^ rigida, durajCraffa, liiperiore parte atro-virentia, ut Lauri folia, inFerne magis propter asperfas hinc inde maculas, albi- da, exficca. Supremi rami in furculos aliquot divaricantur; quibus incident *lores* multi fimul junfti, odori^ pulcherrime rubentes^ quali fere colore Rolk incarnatz confpiciuntur, aut albi, divifura quin- quspartita Clematidis Daphnoidis: fingulifque divifionis partibus imerne adnata quzdani trifulca ap- pendix: in medio apices quinque fimul junftij albi^pilofi. Floris yero longiveluc calycis imum ex- crinfecus pbvallant foliola intend rubentia. *Silijua* marcidis floribus fuccedunt quales Apocyni vel Afclepiadis furfum fpeftantes, pappoib femine plena.

Nalci in maritimis fie juxta flumina autor eft Diofcoriies, Be experientia L^i.nrmaL Paffim ad aquarum fluentia in Creta reperitur: Autores Anguillara 8c Camerarkis: quin & in Siciliaadriivos c monte JEtna delabentes: Ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis Sencni- bus. *Matk* In traftu AlpinoBemontUDfo Liguria: inter Nicxam Sc Genuam cum iiliquis copiofif fime *Ludfr* In montis Baldi parva infula Monachorum minorum Francifcanorum ex faxis nudis- propeaquiam pullulans abundanter prov^enit floribus rubris Be albis. *Vona*.

InnonnulJjs Cret^infulis ad sdigulanimTrabes conficiencias apmm eft, cum alibi parvum fit. Vi₅ ^{Ujw:} de Lib. 1. cap. 17. p. fi. **BRAC**

Ferr.

Diocorides 8c Plinius Nerii flares Sc folia mulis, afinis, canibus, ovibus & Quadrupedum plurimis venenum esse tradunt; hminibus verb contra ferpentium morfus convene £ vinopota, Sc magis Rucáaddicá: imbecilles etiáhi animanteSj ut pecus 8t capras, fi aquam bibant in qua folia ea mael-int rnorí. Aft Galenus_{3t} cui magis credimus, Nerion foris quidem illitum digerendi vim obti^ nere, intro verò in corpus aflumptum perniciosum ac venenosum non solum hominibus, fed ple-rifque etiam pecudibus esse.

Csterum Nerion Jo. Bodseo a Stapel dicitur hie frutex a w particula privativa & %&u** amo quafi inamabilis herba: Alii a nymphis Ncreidibus nomen impofitum fcibunt. Alii amí T« vn ?m* quòd corpus minime flidumreddac^ fed potum repens intolerabiles exciter angustias: intinefic enim venter, &c fubiequitur univerii corporis inflammation omnifque humidi exftintio. Rhododaphne dicitur á flore Roíx fimili Sc foliis Lalirinis: Rhododendron, i. e. Rulè a arbor, quòd alicubi in magnitudinemarboream excrefcac^ BcRofeD flouefit.

Dò florum elegantiam ScperpetuE frondis honorem in hortis noftris ftudiose colitur.

a. *Nerio fimilk arbor* C. B. *Nerii facie arbor* J. B. *Nzrii facie arbor* Indha **Park.**

Huic arbori propendent fliquac de ramis Si furculis, Sambuci paluftri₅ medullofis, pal lid is pulliV nodofis, fefquipalmum 3c pedem longis vaginis, cutaceiSj uno cohxu feptenis aut novenis, iungulis gracilem Lampecram effigianribus: intits taruiuntur pdliculis cepaceis &c timentofis^ adeò exiuiunf <erpentiseminentibus, 6c quiddam cadaveruli anguini fimile involventibus, utpuens horrore fit & illudat. Confimili florum exortu exeunt calyculi herbs (anfts aut Stramonii.

3. *Utrion Indicum mguftifolium floris odoratis fimflibus* Herman. Hort. Lugd. Baf.

Huic funt folia angufta, flores incarnati, nonnunquam rubentss, odoris grati, cetera vulgari^ Kerii omnino paria. In Bdgiam advexit D. de Reede,

4. *Nerium Indicum latifolium flaribus odoratis flenis.* Herman. Cat. Hort. Lugd. BaL

Vulgare Nerium per omnia xmulatur, nifi quòd flores multiplici petalorum ferie fint conftrufti, ad amplitudinem Rofx mofchats, colonis incarnati, propiorc co^lo dilutè rubelli, odoris luaviffimi, ob quem de collo geftantur ab Indk Golitur in hurt is Zfcylonenfium aliorumqueOrientalium.

5. *Nerii filic[u]£ tiffigie* Kaye Baka J. B. *Fruffuj Nerii jUi^Ha figurd* C. B. Cluf exot. I. 3, l. 19.

Teres, infraque digiti minimi craffitudinem eratfruftus, qui integer fex unciarum bngitudineni fuperafle videbatur, immatura; Nerii filigu<e formam quodammodo refsrens, denlbortice praditiSj foris rugofa friatouque &L veluti innumeris tuberculis obüro> inftar Dnagric^ pellis, five corii 5 quo vaginas liis cultellis Bcacinacibus excipiendis teguntTurcz, nigro ahoqui, nifi ea parte quac pediculo proXima, ilia etlim ruffa erat. Acleo IpUdus erat unuscxhis fru^ibus, quem perlongeU-r Sinem Tecare tentabat clufius, uc frangeretur cinus 5c in partes diffihret quamfcifuram admitteret. In confracti tamen pariculis lanuginem quandarii oblerabat, illi non valde dimmlem quac in Nem filiquis conl^icitur. Dum recens eft edulsm esse affirmabat Abdala Guzarate onundus.

CAP. XVIII

t)e Gelfeminu fpuriis filiquofis.

- I. *Gelfemifum Hedtractum Indicum* Cornuti- *Gelfem. indiCum maximum flare fhceniceo* **Ferrar.**
Ffeudo-apocynum Virginianum^ aliis Gelfeminum maximum Amerikanum flore fbxnueo **Park.**
Tecvmaxocbil Afexicmis.

Cornut.

Vlvaçi & lignofo eft *ftipite*, ligno raro, farmentofo, madulbfo, colore pallidojCorticeafperft, fubnigro, multiplicat ut qui extimá parte rimis hiukusinplures fibras radicesipociem gerente* finditur, Vitis in modum. Rami undiquaque luxuriant, Sambuci rnoe^ medulla pleni, te¹ nues, geniculati, herbacci [caulem plants tenuem, geniculatum, lentum atque erraticum tribufe Ferrarius] *Folia* utring, adyerfa ad genicula oriuntur, Sorbi inftar aut Mollis Cbfii more divili, fimilitrque ferrata, guftu initio fungorum, tandem line morfu leviter lic:ante. Septembri menis in apicibus ramorum corymbus denfor apparet, puniceis quibusdam velut.racemis in orbem circumaitis: globuli illi *florum* gemma: funt, qui ienfim in calathos oblongos colonis punkei dilutionis extenduntur, fofmámque capiunt quam Digitalis Recentiorum [hiulco officulo in quinq; labella refupinato, imo ventre fubftrifto, medio turgidulo, cervke anguftiore: quibus defluxis, Cx arido calyce *Jiltqua* porrigitur, in viridi lubrubens, digitum longa, ima parte fummaque ceniii^ mediá curgefts, infra liipráque intercurrente prominulo coro bipartita, [trmhibus gravis> ut in Juceo Lcuçoi, rminuris, rufis, membranaceis. Quanquam hzc membranx tenuis involucrocircumiepra, rnultiplicique lene propu innumerabilia circa nigrum 3c molle diffepimentum, lingulx ipagine interjeftum, cbnfertim conJertcque conftipantur. *Ferrar.*] Ederaceum appdlamus quxi ariiinguU tUernodU Jialbacuralperitas quaedani^ innumeris villis compofita, qua proximo parieu auudmini-
 cillo;

culo, aut propè confitis arboribus adnectitur Sc tenaciffimè adhaeret, Hedera: infar, adeòque quan-
vis iuate naturà caducum ad excelſa faſtigia evadit. Cirri autem hi quibus adminicula apprehendit, non è toto corpore ut in Edera, fed ex unis genioulis oriuntur. Radix per humum fiimmatii repit; nee femine tantum feritur, led & avulſis ramulis. Namque tot initia radicum habere videntur quot nodos in quibus aſperitates fibrolae quas diximus fi humo mandentur radicem aliquandoef-
formant.

^m Gzlfeminum Jive Jafminum luteum odwatim. Virginianum ſcandens & femper wrens Park.
Park.

E ftipite propè terram mediocriter craſſa, lignoſa virga aliquot (Caules vocat autor noſter) exoriuntur, in plures ramos fe dividences, iup&rque arbores proximas aut aliud quidvis obvium latè expandentes: quibus ad intervalla brevina adneduntur folia Myrtinorum a&mula, majufcula, glabra, inter fe contraria, alia (iupra alia, quemadmodum in Syringa Arabica flore duplici, diC poſita. Flores tres quatuorve firaul in extremis ramulis, Gelfemineorum nonnihil fimiles, t bngo tubo in quatuor angulos exeuntes, non tamen in folia (en petala expanſi illorum infar, flavij odorati: quibus (iiccedunt filiqua parva; flaveſcentes, glabrs, paululum comprefe & oblonga, per longitudinem in medio divi (feu bivalves; feminibus parvis, comprefſis, ſubſuſcis, altero extremo membranulis velut alatiſſi Sc in utroque filiquae latre afis ſupra alia arte velut aggeſtis feu. coacervatis replete.

E Virginia, ubi fpõnte oritur, in Angliam intulit Joannes Tradſcantius ſenior.

CAP. XIX.

Arbor filiquoſa Braſilimſis flore campanula. Jguera-iba Braſitim. JibHs MaTCgrav. & Pif

Marogr.

ARbor cortice rugoſo Sc gryfeo, in ramis oppoſitos habens ramulos, &c in his tria, quatuor aut quinque folia, in frondem congeſta, pediculis ſuis tres circiter digitos longis innitentia, pal-
hde vinda, figLira Salviar, femi aut digitum longa folida, & ad taſtum dura. Flores fert
fkvos, duos digitos longoſſi figura Campanae, fuperius in quinque partes feſtos, totidem in-
tus ftaminibus brevibus, flayis, apices pallidos geſtantibus; ita ut arbor florens tota flava appareat, in-
tar arboris quam Luſitani vocant Pao & area: nam racematim congeſti funt flores, & arbors h*
pauca habent folia.

Flores ihquitur Jiliqua longa & comprefſa, nullius uſiſ.

Nafcitur locis granimofis tam humidis, quam ficcis, 6c floret menſe Decembri.

Locuil

Cortex contutus & codtus oleum fuppeditat ad vulnera fananda itemque ad ulcera in ribiis aut Vfus.
aliis partibus efficaciffimum.

CAP. XX.

De Arboribus nonnuſtis Kanda Indis dittis.

ARbores hx an Siliquofis, an Cucurbitiferis fructu corticoſo aiinumeranda: ſint ambigimus.

i. Candd H- M. P. 6. T. 31. p. 57. Frutex Indicus ramis demijjis radices agentibus fe mu-
glicans, fructu oblongo, terete corticoſo.

H. M.

Frutex eſt hominis complexum implens, tantoque numero novos è flagellis prono pondere de-
flexis, terraque liiperficie duntaxat leviter infertis velut ftolones erumpentes, emittit ftipites, ut ip*
ſim matrem difficillimè queas invenire. Ramotum geniculorum lignum intus duritiac firmac, cor-
tex cinericeus, intus rubens, exterius ſufcus eſt. Ipn autem rami, ut Be furculi in conum faſtigiatij
folioſo involucre tenerum germen involyente in fuperiori parte foliis abundant, inferior! deſtituuntur.
FolU geniella ordine decuſſato, petiolis longiufculis è viridi dilutis, interiùs carinatis, longaj
aculeata, denſa, folida, fuperficie utraq; praeplanã glabraque, virore in redta parte penè ſufco ni-
tenti, in averſa dilutiore, è geniculis prodeunt, coſta media craſſa, in prona folummodo eminensj
mulcas libtiles venulas intus ipiim folium ſubcuntes, excernè haud confpicuas, reliſtu ad margi-
nem limbulo, parallelo duſtu aft obliquo, anteriora verſus decurrentes, producit. Sapor fylvsſtris 6c
adſtringens. Flores rolis proximi, è flavo rubicundi, duodecim petalis rigidioribus, oblongis, eredis,
introrfum quodammodo contraſtis, ac duabus cuppidibus anteriùs eminentibus, ut & hlamentis e
craeco in ſufcum yergentibus confiantes in foliorum exortu prorumpunt. Plurima verò in medio
fiaminaong's elaciſq; apkibus è rufoalbicanibus capitata confpiciuntur. In (uper languidealbens/?y-
lils ex umbilico affurgens. Eorumc*/** oblonguſin duodena anguftiorajacuminatajCraſſa/igida divi-
fus folia fix parte vinda, ex parce rofaceus excernè, internè exalbicans eſt. Gemmae verò elonga: cu-
fpidat, duo ftamina inter f'iorum unguiculos recondita fi diviſis exhibent. Deciduis floribus Vuc-
creſcunt fruttm, fpithamam longi, pollicem craſſe, rotundi, clementer in acumen exeuntes propè
caligeni craſſiores, comce ſpilfo & (ubſufco, carne intus alba ſelignofa, quodanipiodo fungoſè me-
dulla intermediã rubra; fi quod facilè fit, trangas, intus vides pilis emmentibus leviffimis candidis
obiitos, germen velut furculum foliaceum viridem continentes. Hi fi in terrain arenoſtm decidunt

uc cuppis inhaereat, aculeo in CDmillura foluto, mox radices agunt^{6c} in plantas adolefcimt. Terra falla Sc areno/a huic arborum generi apta, unde in ripis falbrum lacuum carterifque locis paludpffis, praefertim *Cochin*, frequens eft. A bimatu fert maxima parts anni fhiftum, flores aucem femper: quinquagenaria montur.

Vires & Vfus. Radices lineorimi inferuiunt tinCturis, ut folia agrorum ftercorationi. Cortex quo utuntur coriani &c lotrices ad veftes purgandas, fi ex oleo teratur donec craffitudo fordium fiat, illitu finit artuum laffitudines. At lafte & L butyro recente exceptus, opitulatur ex hepatealbo (ut vulgus loqui amar) Lefis.

a- *Karil-Rmdil feu Kami Kandel Candeld arbor flarihus in evdzm fedicuh Urnū₂ fruBu anguftiort.*

Arbufcula eft cum precedents plane Coliveniens, ni/i quòd altitudine ternos fuperet Homines, neque in tot dividerur itipites. *Folia* figura prorfus eadem aft longè minora^{adeo} ut quatuor auc ijuinque demmn pollicum fint, petiole minoribus imponuntur. *Flores b* calyce odto laciniis, qu^{ac} l emanates fe retro fleunt prxditD, candidi, fupra fbliorum exortus terni, rariùs hjni pediculo in-nixi prodeuntj DDID etiam habentes acuminata p^{ra}tala, ftamina exallida^{adeo} rubris exornata apicibus. *FruBus* pracedenti per omnia lidem, excepto quod digiti minoris latitudine craditi^{ac}que fint^{ac} tene^{ac} ridres cortice viridi, vetuftiores è rubro coerulei. Loca uliginofa valdè defideratj frequens Ideòque ⁱⁿ *poytea* aliifque lpcis, Annotina fructifera fertur, ut Be jo implere annos. Decidui frwStus utin *Kandil* eodem modo fe irradicant.

Vim: Tenenores in eduliis (unt; Caril in fole exiiccati etiam cum nucis nucleo eduntur. Cortex autem in ferolaitis decodtus inteffinorum tormina^{ac} dolores flatufque tollit. Huic ut & fructibus af^{ac} fuffi5 *Vdadambu* ficcus, oleum *Marotti* in vulnerarium unguentum coquantur. Eidem fi cortices minutuLr nucisIndic^{ac} ac viridi areicx fruftui additi contritique exaquadecoquantur pura^{ac} aphthi3, fi os Cū aJJuatur/ipiùs medentur.

3. *Tz-KdnAd H. M. P. 6. T. 34. p. 61- Candela In die a fruftu longiore & craffiore, flore satrapetalv.*
H.M.

Proximè defcrip tar urn Ipecies eft, pluribus ftipitibus fruticeTcenSj trium hominum longitudineJ *Folia*, quæ ni major a craffioraque effent, mox enarratarum poterant videri^{ac} prona parte dilutiora, inter nigrantia, craffis^{ac} è viridi albicantibusappendentia pedunculis, coftàperquam cralà atque emittente donahur: SapDr adfringens. *Flores h* calyce craffiorigido, quater, infefto bini Btbinierum-p^{ra}ntesA candidi^{ac} poftèa ramem rubefcentes; curtd rubenteque pediculo communi virenti inferuntur: confiant in quatuor^{ac} ex oblongo angultis^{ac} culpidatisj circa oras lanuginoiSj hilitifque petalisin calyce farina alba quali confperlis. *Abicim* verb duodecim; decemynovem^{ac} rariffime undecim^{ac} elevatis, acuminatis, luteis, breviffimis/7w>4llj infertibus, mediūm acūm globulo fetus, principium continente occupantibus. Odor quamvis debilis non equidem ingratus. *FruBus* oblongiores ceteriSj longitudine enim duaSjVel faltem fevqui-fpithamam excedunt, craffiorefque, funt^{ac} prscferim circa apicem leviter faftigiatum. Tencriores vkrcntj dein un» ex parec corciec rabercencec, capirulo craffib, oblongoangultifque funtcollo, cui median te articulation e fruftus alhgancur; intra orificium fuum furculum foliaceum exiguum, aculeatum rubrum, qui ex fruftus procedit umbiicoj recDndentes, £odem modo ut in aliis *Kandil* decidui'fruftus fe iolo irradicant. -

Locus. Ad *Cochin* ac *Cranganoor* copiofa eft. Viribus cum proximo delcripta cojvenit.

4. *Tsjerou-Kandel H- M- P- 6. T. 35. p. 65. Candela Indica humilivr flore txalbido fntape- taloj fruftu rnajore.*

Hujus intra feptem pedes confittit longitudine *Folia* gem in a oppofica brevibus pedunculis in huc- rentj planè quod ad texcuram eadem £ precedent!] nih quòdlongiora, orifque funtrotundis- *Flores* exalbidi quina petala craffa, rigidiufcula ft ellis in modum expanduntur j quorum ex interfittis numerofa, nivea, produftiora^{ac} fulcis capitibus nodulata, filamentis cnfpis & C cindentibus concomitata erumpunt *ftamina*, quibus adeft bifidus candens *ftylas*: odor non ingratus fed debilior eft- *Frufus* funt fimillimi *Pee-Candil*.

L. 1771. Salfa petit loca aquosaque. In Paroe aliifque locis plurima eft.

Vires & VJ. J. Lignum combultioni mfervicj cortex verb cum exfcuatD Zinzibere aut Piperi longo, *tripaliyo*- cant indigene Be aqua Roiarum tntus iiiabetem curat.

f. *PouKandl H. M. P-6. T. 36. p. 65. Candela Indica floribus fntafetalis odoratif. frufti minor e incurvo.*

H.M.

Priorum iTmiJlim^{ac} altitudine duorum hominum eftj paucioribus ftipitibus è radice protuberan^{ac}- *Foha* ciim fingula, turn gemina rubris brevibusq; adnata petiolis, ca^{ac}terorum formam fle texturam habentj excepto quòd oris planè fint rotundis. *Flores* prz caeteris teneri, candicantes, pentapetali, conjundim è peduncuLs graciJibus, è viridi dilutis dependent, fbliis retro fe fleftentibus- ^{Staf-3-£-f} Quina, Candida, *aficibvs* grandiufulis, ex albo cinereis, ftriacis parumper Sc intortis, una cum /; " niveo acuo prodeunt. Ob gratiffimum odorem pluris veneunt- *FruEtus* combinati canriem cum citens habent formam, quamvis paulò funt nunDies, Jevitèque incurvati, Be in acumen en- nentes.

L. 1771.

Per tQtum Malabaricum regnum copiofi: provemt- Fratici bngivo femper *Bui*'^{ac}s Junt, quibus *GentiJes Cwmb*'ms duSti ucuntur. Medicos non habet ufus.

6. Kada-KandH, H. M. P. 6. T. 57. p. 67.

Frutex hic ramos habet A fusco atros: . FB/M crassa, glabra, oblonga, antèrùs leviter u'nuofa nulque incite, alternatim ramos ambientia, costà medià nullas conspicuas fundentè venas (X ra-
ducuntur. Flares quatuor, qmqueve foliorum, candidi, Hyacinthino more, pmpnisinnitèntēsS' r ob-
hs, <w>/w«quinquealbula, rufis donata capnibus, è foliorum interstitiis erumpentia & Stylul'cu-
bent viridifculum. Floribus mfequentes deaduis vindes, oblongi fructus sunt, utmq, psrplani A'la-
filamentis ligneis pertexti, virentem habentes medullam, in flore Verb calyces confatuentes
Arenofum dibgit lolum. Circa Warapl, quamvis 6c aliis in locis, multa est. " Lacui.
Ignotarum habetur vinum.

CAP. XXI.

Arbor Mexicana fruBu Cajtanea cocciferCBIBD'ubri'CGGfex. I. 2. t. 14 BIXa riTMV7; «. «
Brafundibu: Marcgr. Pifo. n L ^cto/Herindet Orellana seu Orellana folicul'ne
lappaceis Herman. <^0e SI^fllCatD, 0? OUCOUtree.

Frutex est arboretens [Mali Medica: magnitudine ffen^] ligno alboinfar Coryli, cortice, fruce-
f0&I habet alermtim posita, in pediculis trra, quatuor aut quinque digitos longis, /dam brev-oi' bS"
oblonga, mucronata, cordis ut pingitur figura, quinque, feXj etiam decem & duodecim digitos W a
nervo ielindum longitudinem, & vems obliquis mferius prominentibus pradita kee v-ridia
Ad extremitatem ramorum in brevibus pediculis muhi enascuntur flores. in uvs figuram liipdfij
quilibet magmudme Rofe, quipque fohis confans, albis incarnatodulitis: In mbdio ineens niim?
rus ftaminulorum luteorum, apt abas purpureis. Vrx fenfibilem aliquem habet odorem
Florem ieuuatur fructus, nimirum Jiliqua, Myrobalam, oblongi forma^ feu pyramidalis rotunda
duosauttr'es digitos longa^ magnitudine Prun. [quatuor mo'dids diftmda anguhs, DJS i C j f f i
longitudinem difcucmnt Hern.] qua: immatura virefcit extenùs, matura rufdeit, estque co^ h S -
ob fila que habet prominentia, fed non acolota. In qualibet filiqua ultra ^ aut 40 g La^'fulò
quodquepediculoimntentiacontinentur, hgura conicac acua, auc exigui Pifi, at in d Sns' l i
nbusquaiidigitocompreffa. ^ranorum^ color infigmter mimatn.-fc fplindescens, a que Sf &
madens, «a uc ad taftum mfciaat manus egregio mmiato colore. Grana r'ecnt.a moll' W fe?
ftar ^anorum Pom., quodlibet exteriùs puntulo argentw notatum. Siliqua mamTM fboni ?' -
nt. Grana fi*aa ev^unt obfeuro rubra, hihibminus tamen ut ante rinturam "on^S- ^
centia five ficcata ufarpan poffunt Tnta fimpliciter in aqua fimplici feu ft, llat. t. a SgrSam dart
tmaaramminiatarn, qu^potapsr fe prodest contra vana venena, & est bom sapofis, S m a r a
& quid aromatic, fapiens. Cplledlain maflatn cogitur, fpha:rukq, & tabella: n multo, annnsdu
rabies inde conchiuntur, & in Eumpam tranfmittuntur. Cum unna mixta tarn perrinat color;
tingit hneos pannos, ut in posterum clui non poffit. Magifterium etiam inde, more Cora Hi D??
parant, & in ufus refervant. Brafihenfes patinas fuas 8c lagenas e Cucurbitarum corticibus faftaJ
hac tintura extenùs tingunt. IUDUS "Ctas

c o S . C o a a CUM "g Gallinacea vel alia "g " «&" Croci optima & bonum f_aPDI-em iui

Barbari maximi faciunt hatic arborem, eamque coliunt circa tuguria sua: Viret toto ^nn r
aumauferteyerè: & turn matenes ejus crd. fokt qu^e-utiliseftad i_gn'em eJficiendùm^ntZ
Silica confneando inter fe- Hujus propnetas Be usds ligni mentionem faftam invenio TD RO-
ebefort in Hift. Infularum Antillarum, & D. Hughes in Medico Americano.

Cortex idoneus est ad funes 8c rudentes, qua: robuftiores sunt Cannabinis

Tindura cum aliqua aqua ejufl'em temperature haufita aut foris adhibita mitigat zftus febriles
fiftic fanguinolentas dejefitiones, dilcutit tumores & abfeffus, quapropter commode mKcetur potfo^
mbus refngerantibus, atque etiam cibus.

Milcetur etiam delicate potioni b. Cacao, Chocolatd difta: ad refrigerandum & bonum colorem
atque laporem illi concihandum, efficitque nè quavis quantitate haufita noceat: illius quippe ope fa
cile digeritur fine ulla cruditate. Mitigat dolores dentmm à calida caufa natos, promovit urinam
ifdat ficim.

Tinturam è fructu fadimt hoc modo, Sumunt grana benè matura, eaqueinfunduntaapa: cali-
dai, fie ex uabfidentia tabellas Cdnficiunt.

& Silyandum tamen (mqUIC Jo_ de Latk) dl'plicem t'n^Liram ad nos affbri j Unam fimplicem
imam, coccineam, cujus ulus est ad fucum foeminarum, [inffilani etiam Americani cor-
pora lua ea inungunt elegantia: caufa & ad Bellum ituri ut ternbiliore, hofibus videantur] alteram
Cum Keina mixtam, Be in magnos globos coaftam, cui Be credo fuccum radice admixtum- tin^f
cnimcroceocoloie magis quarxniniato.

Granum parvum figUra & colore Unã, non multum diTnnile exinfula Barbados Nona i
ad nos defertur, quo in panes coadto rintfores ttuntur pro pannis colore Limonis inficiendi
IS.

C A p. XXII.

Mffigle Vyri foliis, cum filiyis longis, Ficui Indie affinis J. B. Mangms feu Mangles Urtia ff>z-
ms Guaparaiba dicta Pifoh. Faretuvizr Rochefort. ri(O)e fl^angrobc^ Crff^*

Owed.

ARbor est inter eas quae in Occidental! India vulgar!ter nascuntur, feleffiffima, tum ad aedificiorum fabricas, tum ad reliqua fabrilia. Crescit uliginosis locis, litore maris, ^lfugit-
tensilque humiliorum & tuerentium in mare delabentium ripis. Folia habet majocibus Pyri
foliis similia, crassiora tamen & paulo longiora, sibi opposita, crasse nervis, ferebatur longitudinem, &
multis ~~nerve~~ ~~longitudinem~~ ~~latitudinem~~, later viridis. Flosculi fert multos in capitulo ~~oblongo~~, pilis. Si-
liquasbinos palmos longas, aut majores, eaque crassaSj Castix folitivac fructibus pares, fufci colo-
nis, **pulpam** infar coaguli, five medulla: odium similem continentes, qua Indi aliorum edulium
penuria vescuntur. Etenim licet amara fit, salubrem tamen cibum esse ferunt. Ego tamen (in-
quit Oviedus apud Cluf in exor*) ab ejus usu in morbum incidi^ tamecli adeo deditatus non sim,
nee ab iis cibi5 abltmere in penuria foleaili, quibus alios vefci videD, quineciam nulla urgente ne-
cessitate deguftare non piget, ut commodius describere possim; caque de causa hunc fruticem de-
^guftabam; fed Brutorum animantium *fte. iylveffrium* hominum potius cibus dicendus videtur. [Fru-
dtus decidens CancrDrum terreffrium potius quam hominum est pabulum] Admiranda acem ejus
arberis est natura, plurimx enim simul crescunt, multique ejus rami Jeorfiim vergere Be in radices
converti videntur: nam pmer multos, quos eredtos foliilique onuftos atque ab invicem fejunffids,
reliquarum arborum infar habet^ frequentibus etiam ahis crassioribus Sc tenuiffibus *Jvvfout ibfe*
ad aquam demittentibus^ aut sub terra aut arena radices figentibus przdita est: qui ubi apprehende*
rint, alios ramos sursum vergentes proferunt: etenim nun minus firmiter harent quam primarms
arboris truncus, (*ic ut ex jnultis caudicibus simul connexis videatur arbor.* Lignum arbons est gra-
vgj folidum, &C corticem habet brunnum, qui coriis prseparandis Be denfandis infervitj Quercini
loco. Nam Cluercuum in hifce terris nullus est proventus.

N. 22.

Radix arborisSj qua: mollis est Be humida, fiffa &C toftaj calida punfturac venenatae utriusque pif-
cis *Niqui* applicata, ejus dolorEs fedat, &L membrum lxfum restituit, licet prim a fronte dolores EXA-
iperet. Magnum fanè rcmfdium est, Sc a pifcatoribus primò inventum nobifque tradicum.

C- Bauhinus qui alias non parcus die foist in speciebus multiplicandis hanc arborem refert ad
Ficum illam celebrem Indicam *Arbor dz Rays* diffam. Verum non hoc proprium est uni dunta-
xat arboris speciei funiculis ip terram demiffis Be radices agentibus se multiplicare, fed pluribus
commune^ utvg. duabustnbufveFicusIndiespeciebus,, huicarbori, Sedoarborelcent^ *Kai d. Scv.*

z. Creiba BrafilienjibHs Marcgrav. *Manguz fm Mangle* firina species* Pifbn. *Arbor Brafelian**
foliis Salicisj in quibus Sal concrefcit, floribus Utraptalis.

Arbor infar Salicis pumilx, tali ligno, ejus denique figurar, foliis itidem fimilibus^ fed paulo
crassioribus: *Folia* autem dire&è fibi invicem oppolita h^L>ct: in extremitatibus autem rarHulurum,
inter Cria, quatuor &L incedum duo folia, duo proveniunt pediculi, quilibet ties, quatuorave quin-
queflofculos h^bentes congeftos, ex albo dilute flavefcentes, tstrapetalos cum quatuor in medio/^z-
minulis nigri5 firreftis, mellei odoris.

Folia hujus arboris lucente Sole falem albiffimum continent in fiffa fuperficie, quando verò ccelum
nubilum est, aut tempus nofturnumj fal difolvitur &C infar roris adharretj interdiu autem ficcus &C
albilimus digitis detergi poteft: ac tantum ex duobus vd tibus foliis haberi poteft quantum juf-
CLIO faliendo fufficiat.

3. *Ctrzibuna3 Mangue, 1. Species* Pifon.

Nee radices in terram agit, nec tam tortuofa flexu luxuriar. *Folio* est crassò^ glabro, rotundò
dilute viridii *florz* albicante; exiguo/r<t?<& valde amaro, nucis Avellana: magnitudine, quocimi
Palumbi *U* excers volucres defeftu melions aliinenti fefs ingurgitarunc, earum caro adeò amare-
fcie, ut vix efculenta fit. Corticis exiftic rubro, ex quo Rhois coriaria, Europ^a haud inferior,
conficitur. Pifcatoribus quoque ad retia tingenda in quocidiano usu est.

SECTIO

SECTIO QUINTA.

~~Lobis~~ *ftu Siliquas qualdam quarum arfans minus cogniu, rmdurn, quod jViam, de«
fcripte funt continm.*

C A P. I.

De Lohis Brafilianis * Clufih

* Exr. & *
tap. 1.

t. Lohus Brafilianus ingws Clif- Siliqua Acacia formā J. B. Arbor filiquofa Jughndis folio
Brafiliana C. B.

Cluf

Przcellā est arbor, in Brafilia nascetis, Juglandis foliis praedita, fructum in lobis aut filiquis gerens, articulatim distinctis infar filiquarum Acacise, fingulomm articularum eriam medio tuments, quo viz. femem continetur. Erat is quem descripsit Clufius x^{psdes} Rotnno5 lungus, quatuor uncias (ubi latitudo* major J latus,, atqu^{planus} infar pr^{dirftarum} (iliquarum Acacia:, cinraced quodammodD polore pnedkus, qui tamen ante macuritatem leftus fuisse videbatur, natn fsmna contraftaBe rugufa eranc, orbiculari pznc figura, Nuci Vomica: nun valde ditlmilia, quodam Vefligio imprcfib ca parce qua lobo adhsEferant, colons ex albo rufufcentis. Semen maturum colons efi fpadicci ftH leucophai splendentis, diametro /efcunciali[^] , craxjitie fzmmiali. Muf. R. S. Nun probat filiquas a Bauhinu arti:ulatas did D. Grsvius, fsd pocius inter femina ifthmis Int^{rc}ap^{taj} numerandas cenfec.

1. Lobus Brafilianus craxfui humidus, Citrii fimifle J.B. Arbor filiquofa Brafiliana hh latijimo C. B. Lobus Brafilianus alms * CluC

* Exr. 5b. 3
cap. 2.

DUDS hujus gsnris lobos habuit Clufius, Alter ofto unciarum Icingitudinem habebat, ±1 latitudinem, planus, durfo gibbero Be alvo craffioribus & magis cumentibus ipfo meditullio, quia fortē ad plenam macuritatem nondum pervenerat quum legeretur- Spifficas tamen dorii & alv[>] ā lacunarum in quibus femsn latucrat gavo uncix unius, matsrie adprime fungosa uonftans; Jkuunae binas uncias longae, numero deem; in quibus/iwwi quafi quadrangulare, unciam longuin, oblique ficum. Lobi color extern[^] ex fufco cineracus.

Alter longē minor erat, colors ex fufco rubefcente foris prsedituj, qui per medium feftus odli duntaxat lacunas offendebat[^] in quibus femsn imperfeum, Citrii mali lbmini non valde diffimib, Uterque lobus £ Brafilia allatus. Be in prxaka arbors natus.

3. Arbor filiquofa Guimjii lobo fpadicto fufco C. B. Magnus lobus ex Guinea Cluf. Lybus magnut zx Guinea foetidus cum grana Arboris Judx J. B.

Valde platius erat hie lobus pro amplitudinis ejus rations, natn cum deem uncias langus effet, 6c trium unciarum vel ampliozem lacidudinem haberet, vix quadrantis uncix erat ejus craffitudo; maturum tamen fuifls fsmna in eo reperta evincebant. Lento autem & veluti cutaceo cortice cotillabat, ex fpadiceo fu(cu) coloris, frequentiffimis venis ab infima filiquae parte ex pedicub dependente furliim Be in latera utrinque fparfis praedito atque quodammodo ornato : medullam five pulpam continebat palbfcentem, fatis gravis odorisBe caput etiam ferientis, imb cerebrum offendentis, qua involvebantur aliquot grana dura, ex IpadiceD fuica, non valde diffimilia granis quae in Arboris Judae lobi5 reperiuntur.

Incolae illius regionis in qua nascitur grana fructu comprehensa in pollinem comminuunt, quo VJutl ad vulnera curanda utunturj iatra corpus verb non afflimenda lunt quia perniciofa.

C A P. H.

~~Lobis~~ quadrangular is magnus granis Lenticula nigrls J.B. Atbor filiquofa lobo yuadrangulo fyfev C.B. Lobus pmgrinus quadrangular is Cluf.

LDbus hie quadrangularis erat formaCj feptem uncias longus, parne binas latusj prominentibus Be protuberantibus quodammodo in acumeii dorlo 8c ventre, ac longo utrinque fulco ā capite ad infimum lobum laterales alas (iiperatite, ejus color fufcus Be iplendens. Continebat autem hie bbus in media fpina aliquot femina, horum unicum nigro Be splendente cortice teftum erac, Lenticulz fer[^] magnitudine, cui fuberat alba membiana viridem pulpam contine non infuavem, fedinfar nuclei Piftaciorum, fervidiore tamen fapore. Iphi lobi ala: intus inatns, nihibminU5 ubi circa fulcos intumefcebant, fufco quodam dulci, quails pjens Ceratiōrum, p^{rc}dit^z ff^z deprshendebantur.

e ^TV IH.

De Phaeolo Coles ditto*

- i. *Arbor Jiquofa Africana, folio fere Pyn femine Fabaceo C.B. Thaeolus V. perBjrrfoütJive Pbaeol/s Coles Cluf! Coks Cacao formttm. juodanfplepdo referent, extern a parte rugofus & nigr J.B. item Cola fruftus ad Jitim ejuodem libmz. cap. 16.*

*Exot.Ub. 3. JT^*Ozs (inquit Tobias Roelfius apud * Clufium) fruftus arboreus eft: huicqu^ arbori folia funt cap.7.

I fere Pyn, fed longiora. Fruftus Bobnx ftiajbris five Fabsc nofratis fimilitudinem gerit, ^^ nifi quod filiquise Boonis PhaeelJive longiores^ major efque funt Be colore Candida; in quibus funt quatuor aut quinque femina feufabae: harum fingulx fuo putaminealbofuerunt tedta:; quo ablato interior fruftus pars ex rubicundo colore purpurafcit, cinnabarifqus ac minii colorem habet: Facile etiam decorticatus fruftus in duasfemifles Jfponde finditur, nti nofrates fabx. Coles fruftus exiccatLis valde durus ac folidus eft, uc minim fit quod referant ftomacho conducere, 8c qusmlibet potum magis fapidum fieri prsmanlb Coles fruftu. Sumunt autem hos fruftus Africa incolae in traftu juxta Promontorim vlrde Temper jejunij, pcrferuntque, ut perhibent jejuniumj totdie ab i ties aut quatuor ederint.

Fitiftus hie, obfervante Clufio, *Cacao* formam quodammodo referebat: magnitudine unciali aut minors, iaporis non ingrati 6c adfriftiDnis particeps; gravispBrro erat Sc in aquaminjeftus **fubfi**debat.

Ex defcriptione nomine 6c effeftu fitim extinguendi apparet Cola fruftum ad fitim J* R. hm^ euhdem effe.

2. *Coles fruftus alms fitntlis, niger, fplpdens cum macula fubruffa J. B.*

Cum *Coles* (inquit Clufius) quandam affinitatem habere videbatur hie frudhis, feciinciam Ion-gus, femunciam Jacus, dorfb tamen latiore, rugofus aliquantulum 6C fatis levis, folidus tamenj nee cavus, hecin binas partesdividus, niger, Jplend&ns; fubruffa macula fatis ampla przditus,, ea parts qua putamini adhxrebat: lobo enim vel laltem aliqu? cortice teSus *fuffis* videbatur.

Exot.Hb.i. ? FruBiK peregrinus ex Bengala * Cluf] J.B. obhgut cineraews rugofus & gibbofus C.B: cap. 14, *Coles fimilis.*

Quinque pxnz uncias erat longus, totidetrn ambitu cptnpkftens una parte gibberofus, rugofus SC inxquali cortice conltans, fatis craflb, duro Si lignofo, cineracei ex fufco colons, qui binas nuceSj five verius nucleos contmuiffle videbatur, eSfque uncialis longitudiniSj in quatuor partes dividos, Valdè duros, coloris ex fufco fubruffi, faporis adfringends 6c linguam exiccantis; poft aliquod tamen tempori5 intervallum non ingrati, fed vires reficientis Be ficirn fedantbj quo in ulii apud indigenas effe mihi facile perfuaferim; cartè.^ fubft&ntU & colors &c &pore plurimum accedere videbatur ad fruftum *Coles*.

CAP. IV

Loli mtmbranaczi^

- I. *Lobns cortice cartilagineo rugofo fufco, duplici crifia finwfa dynatut C. B. Lybus cartilaginwB. ex infula Mauritiï phaeolo five Faba nigra J. B. Tom. 2. p. 172.*

Cluf,

DUOS hujus generis lobos naftus eft Clufius: Erant illi diverfx quidem longitudinis, squa-lis tamen latitudinis non valde craflo, fed cartilagineo potius cortice tefti, brevi rufaq, lanugine obdufto, quam adhuc retinebat in lacunis, ubi attnta fie deterfa non fuerat, fu-pernâ &c inferna parte duplici ciifta finuofk 6c femunciam fere, lata a pediculo ad mucronem uf-que lobi piodufta pndito: Phaeolos autem continebant psne unciam latos, orbicularis forma: non tumentes tamen in medio, fed depreffos, quia plenam maturitatem non erant adepti, in am-bitu undeqnaque fere veluti annulo cintos, ut plerique hmiles Phaeoli, valde duros Bè nigros, nucleo tan^Bn albo praeditos, quo recenti vcfei licuiffet, quia non erat ingrati faporis. Iftbrum au-tem Joborum unus quaternas uncias longus erat^ tr6fque Phaeolos continuerat; alter ternas dunta-xat, Be binos Phaeolos habuerat: uterque autem binas psne uncias Jatus.

- i. *Lobus peregrinus cartilagineusj Pbaezolo expuniceo nigro, fanquaw annulo cm&Q J.3. p:regrinwB cartilagineus Cluf*

Quatuor uncias cum femiffle longus erat hie lobus, binas autpaulo amplius latus, cartilagineo potius quam duro Be lijnofo cortice conftans, dorfb infignito duplici crifta cartilaginea & fubruffa, ad extremum ulque lobum protenfa: rugofiis-autem erat cortex, 6c colons nigr yenus quam flifci: licet porro ea longituiine eflet praditus, trcs tamen phaeolos duntaxat continent, orbi-cularis form^, media parte aliquantum tumentes circiter unciam latos, in ambitu terc unrtqua-que tanquam sinnulo cintos, valie duros K ex pumceo nigros,

L. B. J. J. J. J. J.

C. Bauhinus hunc Lobum 8c precedences art idem caput reducit, nee ego abnuerim. *Maeott.*
 * species esse videntur, 8c Leguminis scandentis non arboris fruaitis.

;. *FruBus Jubrotundm durits, tleganter rubms C. B. FruBus ptrtrgrinus ID, Mates nomine ttect-*
*fiat * OaC*

* *Exot. lib. x*
cap. 30.

Castiac foluth'z ant Ceratiorum femem magnitudine zquabat, cui etiam formā fatis respondebat
 tumidum tamen aliquantulum 6c colors differens, qui in hocce regie rube" erat, ut in *Oxyar-antn*[^]
 yulg. fructui, folidus, durus atqus in aqua Jubfidens Be imum petens. Siliqua ant lobo aliquo includiim
 iliffesrihmile est.

4. *Lohm cortioe rmembranacto, atro, tumido Q B. nigr fr'tmus tumldm * CluC FruBus est T/ia-*
pangamH. M.

* *Exot lib. a*
 "r. 31.

Cluf.

Binas uncias longus erat, unam latus prorfus atri coloris, tumidus infar lobi Ciceris, nee formā
 Valde illi ablimihs, major tamen, niembranaceo cortice fatis duro confans, qui prx iicitate de-
 hifcebat Be convolvebatury quemadmodum parnc leguminum lobi, *femindeju* confinebat bina auc
 terna, nigra, circinatae Fere rotLinditatis, plana tamen fquod mirum in adeb tumido lobo; forma
 non multum tiiffiniili articulis Lobi Acacis, non adeo tamen turgentia in medio, tenui admndm
 membranā tefta, eaque etiam nigrā.

5. *Lobus ivsmbtramcetis atro-fpadiceus, planr/s Gthttnlis O B: m. tr z. plants * Cluf*
Cluf.

* *Exot. lib. 3.*

Hic lobus pminno planiis erat, alioqui valde fimilis precedenti, binamm etenim unciarumlon-
 gitudinem habebat, unius lacidudinem, extremitas paulo latior erat, color ex atro Ipadiceus.

<6 *Lobus mtmbranaceas plamu nigr J. B.*

Omnihio pknus erat, alioqui forma¹ valde fimilis Lobo quadrangulari *Cluf.* Binarum unciarum
 lungitudinem habebat, unius latitudmem. Extremitas paulo latior erat. color" ex atro ibadicen.
 E *Guinea* delatus est.

Hos bbos arborum fructus esse conjeaatur D. Grevius in Defcript. Muf. R. S. p. *HA. ntRr*
 quartam speciem quam ibidem defenbic Fructus quadrati alterius lobi titulo, iunctioneafn una
 BxeremiatB ii unc. latam, altera unciam tantum, fcunciam in medio cratem* ubi utrifuae'ntu-
 nicleic. Duo margines oppofiu convexi, reliqui duo concavi, glabram *Be* ex /padiceo ffrigran.
 tzn.

CAP. V.

Lobi Mifcellaei.

1. *Lobus quadrangularis Clufii Exot. l. 3. c. 17. C. B.*

Lobus hic quadrangularis est, quatuor crassioribus & continentioribus nervis praeditus, qua-
 drangulae
 in buias partes alidrum leguminum infar dividua, qu* vetiitate duriciem uontraxeram.

1. *Lobus obhngus aromaticus Cluf qui est fructus Balsami Peruvian arboris Cluf cur PD(T 7V*
buz aromaticus subfufcus T^bimbi cornkulis fimilis C. B. item Balsamum Amvicanuin
ejuldem. Lobus Ivngus Atomatkus, odore fert Bekuini J. B.

Cluf.

QuinDS fenarVe hujus generis lpbos a Morgano habuit Clufius, qui variz erant magmmainis,
 fconnulli lex duntaxat digitos longi, alii feptem, quidam etiam odto uncias longitudine fupcrabant
 finguli viK femunciam erant lati, omnes tereteb 8c rugofi, subfufci coloris, ea parte qua pedicul^o
 inhsferant nonnihl recurvi, extima parte obtufa, breviter forma non valde diffimiles quibusdam
 teretibus Sc oblongis corniculis qua in Terebinthi arbufculis obiervantur, qui aperti lin binas enim
 parces aquales fecundum longitudinem aliorum loborum infar dividebantur) nihil continKrs de-
 prehendebantur quam tenuem quendam pollinem nigrum Be fphndentem, tenaciter interiori lobi
 parti inha-rentem, odons fere Belzuini initio, fed figuis naribus admoverct capitis eravedinem in-
 flucentsm.

Hujusmodi fmflluin pollinc albedo refertum vidi in Mufeo D. *Gultelmi Courtine.*

3. *Siliqua Thymiamatis odore J. B.*

Cum J. Bauhinus hanc eandem eff. cum precedente facile fibi perfuaderi patiatur
 hos de ea l'bdremu. Cava *Brai* Se plena mmimis femimbus, minoribus quam *Peti/nies*[^]
 d'atibus, sub dentibus fndeatibus. Rehqum delriptioncm ride apud * J. Bauhinuin.

* *Totn. l.P.i*
 t- 437.

4. *Siliqua*

4. *Siliqua longa cinericea granis Colutete* C.B. *Siliqua Semine Colute** Cluf J.B.

Cluf

Dabat Paludanus Clufio filiquam tres uncias longam [licet interdum brevior reperitur] siliquam gracilem, rugosam 8c inaequalem, cineracea cute constantem, quae fecundum longitudinem in binas partes dehiscit, multa grana continens, plana, dura, Colutesc granorum fere acmula-

*Exot. l. is. z. 5. *FruBm cvmprfflu* quadrangulus* <venis candicantibus & nigricantibus ut Coles jruffus distinet Bus C.B. Fr. 6. *Pardunyi** Clul.

Cluf.

Hic nudus omnino Bevari* forms erat, quem Iobus inclusum fuisse arbitrabatur Clufius: Etenim nonnulli plani erant, Be quasi quadranguli, alii oblongiores, Be aliter pauciores obtusi, e vero quibus multum contigerant compressi, omnes tamen fere rugosi, nigricantes, 5c caridicantibus quibusdam venis distincti, in binas partes divisi, ut reliqua legumina. Substantia autem interior subfusa & folida, Beejus lapore etiam a firing 3ns perinde ac fructus *Coles* superius descricus.

*Exot. l. is. z. 1. 6. *Orucoria frustus Jiliquofa* J. B. *Orucoria fruttus arbor is Juruwa* * Cluf

Cluf.

Siliquam refert majorem, crassiusculam, compressam, fecunditiam longam^ unciam fere latantem siliquam partim partim autem subfusam, utrinque multis majoribus Be minoribus, partim ad latera refta decurrentibus liliis, partim ad siliquam incurvatum duftum oblique dispersis: petiolum gerit exiguum^ teretem atque fuscum, *Siliquam* totam fulventem^ a parte petioli superiore pergendo deorsum, latiusculam, unciamque fere longam impressionem obtinet: quae dein rursus in ascensu superioris partis gibberoia rotundatur Be attenuatur. Partis exterioris circuitus plusquam lemicircularis in ambitu magis quam tres uncias longus est, latiusculus, atque in medio nervum inhaerentem fortitur, qui si evellatur siliquam in duas partes xquales dividit atque fejungit: Concufta feminis intus latentis manifestum praebet fonitum argumentum. Siliqua vero liliis aliquid similitudinis habet cum siliqua Senae. Dum aperiretur facile fectioni cedebat intus vero substantiam filiquis, ipsam fatis, utrinque exhibebat Be duftiusculam, unicum tantum nucleum Phaeolum xmulantem, compressi tamen continebat, lxxvi tenuique tunica rugosa investitum, colore aliquo modico violaceo imbutum superat pulpa duriuscula, albicans, quae nubis nonnullam dulcedinem gustando imprimere videbatur.

Vfus.

Fruftus contufivel confracti fuccum in vulnera infillare feruntur. Indi ^/^^ in colza ea confolvianda.

7. *Siliqua oblonga cinericea granis ZoluUa* C.B. *Fruffus 12. cap. 10. hb. i.* Exot. Cluf

Cluf.

Siliqua istharc tres uncias longa erat, licet interdum brevior reperitur, fatis gracilis^ rugosa Be inaequalis, cineracea cute constantem qua: fecundum longitudinem in binas partes dehiscit multa grana continens, plana, dura^ Colutesc granorum fere acmula.

8. *Lobus fibrosus brevis* Muf. R-S. *FruElui reticulato corlo* Beflrs.

Tres proxime uncias longus est, si latus, unciam fere crassus^ valde fibrosus 8c flexurisc renitefisc tenui Be valde laci membranam intus obduftus, cavitatis interna unica est Be non diffepta autem cellas divila; unde apparet unico intus nucho praeplano replentem fuisse.

C A P. VI.

Fal>£ purgathes Es? *affines.*

1. *Fabafive Phaeoli purgantes* Park. *Phaeoli purgatrices* Gr. *Phafalm Now Drbis, frvt Fobs purgam latijima cordis figura* *J,B, *Faba purgatrix latijima zx infula D.ThviTue* C.B.

*Tom.z.

*17-/- *7S-

J.B.

Hujus generis variz magnitudinis habuit J. Bauhinus. Alias unciarum duarum latitudinej alias feicunciali, utraque orbiculatas fere, latiores tamen paulo, ubi finis parvus quasi liqua: adhaerunt cavas, digiti fere crassitudine, modice compressas^ spadiceo, durofriato & lucente cortice mteftas. Quod intus continetur, ceste Clufio, albunifirmum Be in duas partes naturam feftile, sapore primum quali fere sunt omnia legumina, led illico linguam mordicantem fleacrii quo fir, ni fallor, ut purga Jidi facultate fent prardita:-

Hujus lobi icon ad Clufium missus quinque duntaxat unciarum longitudinem habebat, binarum laticudinem. Duro autem crassoque cortice lobus constantem, colorisque erat ex cinereo fusci, de crasso pediculo pendens. Binas phaeolos folummodo continuifse videbatur. Horum alter, ad Clufium cum icone missus, binas uncias latus erat, fecunditiam longus, sumpta ab hilo quo lobo adhaerentem ad infimum fructum mensuram, planus, medio tamen aliquantum extuberans lacvis, coloris nigri K splendens, quia perfectam maturitatem adeptus erat, alias ex fusco spadiceo: plerique omnes quos vidit Clufius, cordis ut vulgo pingitur formam habebant, hoc est, ea pane quam lobo adhaerentem plerumque erant caevi, atque propter hanc formam, K quia in infula S. Thomae nascuntur *cor S.?* wTM* a quibusdam appellantur.

Fabarumpurgatricum folum fertile Carthage Nomen Dei Kinfula D. Thorn* di^a-

Cxtcrum

C^terum (ut Monardes pr*cipk) pdlicula ilia tennis qu* per medium illas interfecat & cy^rum Vim' nimoJam anteriorem *mulatur cum cort^-abjicienda est, ahoqui tanta vehem^4* u^E^ & inferne purgant, ut in vie* defcrimen finnestms cDnjciant. Atand* deirde fure utiliff monia inflngatiir, deinde in pulverem comminuend*. Datur hic pulvis vino aut factaro exia cfi= ^cochlcaremiiini, deinde hafufus vmi fumiEufe^Apud Indos hoc medicamentum cdebr^e^p^ iumendi facilitatem: nam sine molestia bilpm, pituitam & crasfos humores muko leniusSrVr^t ob quam Avdhna: cathartica aut Pinei nuclei catharici purgat. Datur in ftribus diuturne^i^ dolanbus & incedhomin n^biſj Dofis a quafevmrio numero ad fenatum, pluriumVc aut^m^c^ ornm pro argi viribus-

Hujus varietatBtii bngjoren-'tt&thk }. Bauhinus qua: ab Wb, quod eminentius est/net ffwih faat^adoppDfitampmeita i^rillicteUtatoc, longitude duarum erat unciarum ficut ab Drbicuk- majr, crasfius par.

2.. Vhafeolusprtrgrinimi&ms, coloris Quanta cum magm hilo Uv J.fl. Puf, Ni^rrit^r^nt Clul. Exot. lib.5. <?>. it. J.-. g^ft>f>w

Sjhquziis fimiles flint qua: a LobeliopingunturP^/i5r</?/w>i Clufii nomine a Brasiliai t men & purgatnee Faba diverfa grana concinentes, hac enim minora, lib majora: orbiculatal? muncialilatitudinc, cortice duro, kvi, fpadiceo-obdufta, leviter compressa, quorum hilum firi fundius, canaliculatum, non pullumut in Brasiliano fed reliquo cortici cDncolor, nee ita p Snfl^ turn longumve, ut quod duas duntaxat tertias orbita: cingat, cum Brasilianus Phafeolus brevem itth^ mum relinquat. Corace fepirato, qui crassiusculus mulrum d^b inteno illo colore remittit DUIDL' in confpectum fele dat, lupeiheic quidem tenuis ran coloris, intrinfecus alba, dura, sapore Vicix^

3. Thaftolas five Faba arborefems <* Guinea laujjima, fepe yuadrata J.B.

Purgatricibus Novi orbis Fabis compressior est, trium unciarum. latitudine, auutior ad hilum oppofita partelatus, Be tantum non quadratus. longitude fefcuncialis. Cortex Caftanearum CDr^ti<ni^ A S X^ fpadiceo nigricans, ^^^^ marefcenstent fubftid d^!

Hic eandem esse non est cur dubitet J. Bauhinus Phafeolum peregrinum I. cap. 7. lib. 5. Exot. Utraque enim a Bern. Paludano missa est, Fabae arborefcencis ex Guinea appellation^ nee magnitudo^ figura aut color multum diverfa. Variat autem nonnihil magnitudine, figura Sz crasficie.

Nsc dubium est quin Lobus hujus fuerit quem Clufius capispracedente defcribit sub titulo

4. LobiFabae arborefentis, qui J. Bauhino Fab* arbortezntis longijjimus lobus^ Vhafeolit latis plants fpadiceis. C. Bauhino Arborftiquofa Guinenjs fruftu Fabace^folh longijjimo, C. B. -

Valde magnus erat lobus, viginet unciarum longitudine, durusque & crasfo cortice predictis rogo- foque, colons externaparte nigricantis & fuliginofa, interna autem fere fpadicea, concinens magnus feptem phafcolos > unciali- & fuliginofa, interna autem fere fpadicea, concinens magnus ris ex fpadiceo nigricantis Sciplendens. In alio hujus generis lobo, quae videbat Clufius, uncia una praecedente brevior, color externus fuscus erat, quem crassiores vena: live idia: m adpxtremum uiquelD^bum. ftenndum IDngitudinem Aut^z exornabant. Inrer^la. g^e a pediculu ceoadrubredinem tendebat; ipse Phafeolus planus erat niger Be iplendens. Hujus etiam generis fiant

5. Fabaarbwefczntis fruttu5, Thafeolus pergrinus fecundus *Cluf.

* ExotA.-2.x-f.

Superiori non valde diffimilis, fed longe minor; fefcunciam viz. tantum longus, unciam latus, planus, rugolus, fpadicea quodammodo colorisj nervo qui eam ambebat cminentiore. Item

6. Vhafsotas peregrinus tmus Cluf Exot. I. x. c. 7.

Lobo indufus fuisse videbatur, forma ovum columbinum Ferè exprimebat, longior uncia, ambita fefcuniam fere comprehendens, exalbidi coloris, cui flavi quidpiam circa extremam partem, qua lobo inhsferat permixtum j circum verò locum quo lobo adhxferat fuliginofa macula^erat irifignitus, laevis alioqui Be fplendens^ gravis Be ponderofus. Necnon

7. Vhafeolus peregrinus quartus Cluf ibid.

Quim etiam lobo comprehensum fuisse non est dubium j erat autem crassiusculus, ejusdem paene magnitudinis cum fuperiore, tDtus niger praeter exiguam maculam iibalbam, qua proculdubio inhaeferat lobo, durus autem & c solidus Be in aqua fufidens.

Filium^i Exotici filiquam longam falcata femine ex toto albo vidi in Museo claberrimo D. Gualteri Cyvrim Armigeri.

C A-P. VII

*Piper v>iopicum MatthioU Pdrk. *y&thiopkum filiquofuni J,B. *s&thiopicum fivtV'tia J>G> obfangum nigrum C-B.*

Silli^{J^B}qu⁻* plures ex uno tuberculo pendent, unciarum duarum, tiiurti, quatuorve longituainSj rotunda; pennse anferinz craffitudine, nigricantes, incurvae aliduantulum, thoriis pro contentorum feminum immero distinttz, alioqui etiam rugofe, nbris longis, lentis, fraftuque Gontumauibus context* : interior fubftamia exrubrp nonnihl est cinerea. Semina distinttis comprehenduntur loculis (carnofoparieteunumqueniqie distingente loculum) ex rotundo oblonga, difficulter e, fiqua avellenda, magnitudine minimi Phafeoli, foris nigra 6c nuda, materia durior e, fiqua, textura cancellata, praefertim juxta pediculum qua integitur lavos apum imitata. Sapor tarn fihqu^ quam feminum ad Piperis nigii faporem accedit.

D. Grevius femina vcl minimo Phafeolo dimidio minora effe scribit; at n^que faporem habere Pipensnigri, fed pDius Caryophylli, ut quod non valdd acre lit, fed admodum aromaticum, prs/cim ad Jgnem excaleaftufn*

. Lobts Fiperi *s&thiopico fimilis ClufExot. l. 2. c 16.

Cluf.

Non valde diffimilis erat iEthiopici Piperis lobis; nam Be illorum inftar articulis distinttus, SC grana in fingulis continjebat nigra, craffiufcula, rugofa, acrislaporis; alioqui lobuscraffioreratPiperis iEthiopiuiJobis, cof tice denlo confans, foris rugDfo; colons ex rufo nigricantis, iuperna &L infernaparte, duplicinervo a pediculo ad extremum lobum excurrnte. Pluribus aliquot ~~est~~ fudidum *Fiu*th veriiimile est, nam port guaitum articulum pracifus fuerat.

HISTORIÆ

HISTORIC, PLANTARUM

LIBER TRIGESIMUS SECUNDUS;

Arbores & Frutices vel anomalas vel minus cognitatas
exoticas novas & in Europam nuper illatas exhibens:
Necnon Fartes quafdam Stirpium minus cog-
nitarum.



UNC ergo librum in duas partes dividemus, Altera erit

De Arboribus partim anomalis, partim ob defcriptiDnes imperfectas minus diffinae
cognitis partim denique novis, exoticis Be in EuprDam nuper adveffis, qua? nondum
apudnos flares 3t fructus dederunt.

Altera de Partibus ftirpitum minus cognitarum, nimirum i. De Corticibus, BcLignis. i. Ds
Floribu5 U Foliis. %. De Fructibus. 4. De Succis five Gummi fint,
five Refine, five mixtae & mediae inter utmqne nature.

P A R S P R I M A ,

De Arhrlbus nonnullis Exotkis.

C A P. L

Arhores Indiaz t\$ Exotic ex Hiftoriis Arvmatum Garcia & Acoftce*

I. Macer Veterum C.B. Maar DiofcoriJis & Gracwum J. B. Macer Gracorurn Park. Vim*
affinu, frufu vejiculis mzmbranaczis & feminz intus imltsfo compofito.

Qui Macerem Grzcorum 8c Macin. Djffiu. unum &c idem eflē opinantu^ n^illi multum
hallucinantur. Macer enim cortex craffus eft, Contra Macis tenuis: Macer perquam
atfringit, Macis faporefubacris eft: Macer temperatus eft, Macisealida. Prxterea Arabssj
kiitSerapioScAvicenna, de iis, utde rebus diverlis, diffinētis capitibus agunt, pc Avicenna
Macerem Taltfajar radice corticem vocat. Tandem Veteres qui de Maceie agunE nullam Nucis
Myrifticac, cujus operimentum eft Macis, mentionem faciunt, quodnon verifimile eft eos ignorait
potuiffē, aut filentio prarterire voluiffē, fi illorum Macer cum Maci idem faiffēt. Quin Plinius
apertē Macir corticem rubeurn radice magnac eflē affērit. Maceris arbor, defcribente Acofta, vafta
eftj Be multis ramis prscdita, Ulmo multb major, cujus folia fex aut feptem uncias longa fiint, duas
latā, exteriore parte dilutiū viientia; interiDie fatura. Ea nop alium fructum habere creditur
puxtze Jernzn quoddam, denarii magnitudine., tenue, CDrdis effigiej color flavo, fapore verō Amyg-
dalaē, aut nuclei Perficprurn malorum, tenui 6c Candidā tunicā teftum, quod veicā quadam ex te-
nuilTimis duabus fjmul junāis Sc tranlparentibus membranis conftante includitur: ea autem vclicat
Inmedi folionaficcurjalihmagnitudine quod ftimili, fed c^fide obtufiore & circa pediculum an-
guftiore, color^e medio inter rubrum 8c fulvum, iniquaH, 5c multis fibris, a pediculo ad extremita-
tem re ft a lined ductis crippo Be rugofb, haud ablimalis III qvx in Ulmo naicuur, paulo tamen latior
& planior.

Succolafteopndita eft hacc arbor uti Moms, radicefque habet Ilici perfimiles, magnas, craf
fts> inlatum Be profundum diffufas, Be cortice teftas craffb, alpero^ fcabid, duroque, cinereo fo-
riscolore, iuuriusalbodum recens eft, cum ficcus flavescens & admodum afthngens; Succo cum
aLlfritione nonnihil mordicante, qux tamen moidicatio bj evi evanefcit.

Radice

Vires.

Radicis cortice recenti trito, cum oxygala feu lafteacido mbito omnis generis dyfenterias Sc alvi profuvia mirabiliter intercedit. Quamvis uero, uel de canariis, uel de malabaricis. Aliqui hujus corticis laci & in pulverem redacti feruorisiani per noctem macerant in. leri la. eumque bis in die propinant, mane & uesperis; deinde medicamento sumpto Dryzai sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinaceos coctos macerates & tritos in Dryzai decoctione statim argroexhibent: interdum si necessitas urgeat, Opium admifcent. Solent uera etiam Arabes cujuncunque generis alvi profuvia opio mice molcluta admixta curare.

Hujus item radicefus falutaris creditur ad vomitus compescendos, 6c ventiugulum robrnranrium cum aq. Menthae Sc Maftices pulvere. Plus aurem pollere afferunt Indici *Joguts* hnjus arboris portiunculam in compescendis vomitibusalviqueprofyiuviis. fiftendis quam magnam quantiratem corticis Myrobalanorum, aut Areza^eamque pra;ftantior em esse *Coru* Malabarico. Przte rea *Macrefm* & *nm* omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare, & caiculum in renibus frangere: tum etiam eD5 qui fingulis diebus mane ucerentur liberDs fore a calculo 6c a coli doloribus, nec lebriari poffe.

Similitud. nominum Macer Be Macrej & c. convenientia in uiribus hunc corticem Diofcoiidis Mauerem efls arguunt.

An *Cortex ad alvi profuvia in Novo Orbe* Monardis? Prefert (inquir) novus orbis pragrander arboremj foliis cordis effigie, nullo fructu. Ejus cortex digiti craffitudine auc amphor, folidusj durus Sc ponderofus, tenui candicante pellicula integitur. Similis est admixlum CDitici Guyacan, uti *Gentiana amani* Sjinanifette adfringans^grati tam en feu aromatici odoris particeps. Ca:terum anraticudin&m Monardes cortici fuorribuitj Cujus alii quidem non merninent^quantuin quidem nobis conl 0k

a. *Manga affinis Amhare. Ambare Indka* J. B. *Arbor Indica foluj Juglandh, fructu JSfuds magnitudim* C. B. *Amhans Park-*

Acofta.

Craffa magna que est arbor, *foliage* habet Juglandis foliis magnitudine repondentia^ fed noli ejus forms, dilutius virentia, Bemulcis uenis elaborata, que illis magnam gratiam addunt: *Flores* exiguos, candidos: *Fruttus* nucis Juglandis magnitudine, dilutius vrentes, Sc cortice quam illa leuiore, odoris gravis, & gustus acerbi dum adhuc virent: coloris uel b flavi in mature gratioris odoris, Sc gustus grafa aciditap commendabilis, medullam continentes cartilaginofam & duram, ^ duris nei'vis oblique intertextis constanter.

Garcias fructum hunc immaturum adhuc cartilagineo quodam cortice virefcente integri fcribit.

Ljfr.

Propter fructus gratam aciditatem cum Omphacii feu Agrestacmodo cibus admifcent Indj: maturiim ex fale Be aceto edunt: excitat enim edendi appetitum. Adversus bilioibis humores uilicm zffz perhibent. Sale SC aceto conditus diu aJTervari potelt.

Nobis Mangs/peciss esse videtur aut ad Mangam proximè accedere.

;. *Coca Indorum folio Myrti*. B. *MyrtQ* *fimilis Indica fructu racemofi* C.B-

Acofta.

Pumila est arbor, folio Myrti, uel (ut alii uolunt) Rhois coriariorum [quod ueluti aliud folium simili forma in medullis delineatum habet] molli, dilucius virenti, fructu racematim cohxrente, uti Myrti fructus, rubeht quando macurefcit, ejuclfinque magnitudinis, quando uero plenum macuritatem adeptus nigricante: tum uero heiba: est mellis, qua: collecta in caniftris ad ficcandmn reponitur, ut melius confervari poffet. Hiftorici Peruviani omnes referunt incolas istius regionis *Uocam* a fummo mane ad nadlem ufque perpecuD in orerecinere, tamen earn neque mandant, nsque deglutiant, quod earn affidu^ in ore habentes famem & iitim ab/qu? rnoleftiz facile poffunt tolerare etiam perintegrum diem. Hinc rrfagna cura feritur Be colitur in convallibus mDntium *Andzs* diftorum. Maximo in pretio apud Peruvianos est, unde multi ex ejus mercimoniofolo^ditidimi crafere. Ex foliis dencibus atntis &c cum aliquanto pulveris conchyliorum uftorum admixris rrochifcos feu orbiculos uonficiunt, & iccandos exponunt. Qiiando lis uri uoluncunum orbiculumin ore fumunt eumque exfugunt, fubinde in ore nunc hac, nunc iliac uerfante5, 6c quandiupoffunt retinentes: uno abiupto alium fumunt, &c deinde tertium, fie pergentes toto tempore quo li in longis idneribusconhciendis opus habent, prxiertim d per loca fiantj ubi nulla aut cibi aut aquæ copia est. Si uoluptatis gratia uti uolunt, lolam Cocam mandunt. Plura uidefis apud Acoftam.

Ljfr.

4- *Arbor exotica fructu racemojo Charamais dtfts* C.B. *Cbarawei Acofta folio Tyri* J. B. *Char ami* Park. *Turcis & Per/is Ambda.*

Acofta.

Hujus arboris duo flint genera, unum niepili amplitudine, foliis pyro fimilibus, dilute virentibusj fructu Avellanis simili, admodum flauo, elegante in multis angulos definente, fapore omphacii & c. grata aciditate, quem uel in^naturum, uel marurum, uel fale conditum uulganter eduntj ai orsxin exCitandam: uel aliis edulus quibus aciditateri conciliare uolunt admifcent. Alterum genu* ejuodem est magnitudinis, foliique habet Malo minora, fructum uero priore majoreni j cujus de" ^ o cum Santalis aduersus febres utuntur Canarini medici.

Crefbit in fyluis fle montibus procul a mari diffitis.

Ljfr. Virts

E primi generis (quod lecondum aquas hafcirur) arboribus feligunt Etecanini & Cananij earn quz longius a mari abest: hujus radice corticem [cui lafteus luccus igeft] quatuor digi™™ longitudine fumentes cum drachma Sinapi probe terunt Sc afthmaticis exhibent: ualemer enim purgat per aluum Be vomicum. Qiiid li immodici lublcquatur euacuano, *Caramblyas kruttum* uunum vmdem edunt, uel aceti Canarinihaftum fQmunc (quod nihil aliud est quam aqua decoctionis uiyzar, uno aut altero die refervatadonee acefcit) & c. fi profluuium non ceftat, xgn5 caput rngiaa uolunt. At qui5 hoc aufc apudnos \ auc que hujus niecbhc racio nurito quxne J. #

H<omnuAnfta.

5. *Arboris*

5. *Avacari facie Myrti* J.B. *Myrtm Indica* C.B.*Garc.*

In Malavarica India: provincia pufilla enafctur arbor, major fructe *Coru*, qui foliis, floribus & fructu Myrto perfamilis eft. Fru&us ejufilem etiam eft cum Myrto fapons, mulcò tamen aftrin-
sentior. Hanc arbufculam trifolium olere ferunt. Nafcmr in montibus. Aiunc mine effe effi-
caci* a'dversusin veteracasdyfenterias, acauft frigida pröveniencas: ut fie fenex quidam Lufitanus
in filia fua expertus eft, cortice trico Be in aqua Oryzæ macerijtto.

6. *Com Canarica Arbuto* W *Malo aurt** fimilis J.B. *Com, foliis Mali aurt, fionlateo Acoft**.
C.B. *Lufitanis Indiarum mcolts Htrba Malabarica. Com arbor* Park.

Arb.

Arbor eft pumila, Malo aurea: fimilis, cui etiam psrfamilia habet *folia* _M fed qua: medium nei>
Yum craffiorcm habent, alrisofto auc novem in latera excurrentibus. Flos luteus eft, odoriferè
exoers. Ac Garcias folia Mali Perfic*, flores candidos, Penclymeni odorem smulantes, ei acti-
bui Radicis corcxdiluco virore pradicus eft, levis Be tenuis, qui fi frangatur aut vulneretur mul-
to lafteofuccouianac, lenciore 5c magis vifcido quam qui ex Macere fluit, guftu infipido, amari-
tudinis tamen alicujus particeps, frigidus fie ficcus, plus tamen hccitatis quam frigiditatis pot-
f dca.

¹ Huius v'uencis corticis fucco, licet admodum ingrato, plurimum utuntur Malabar incolx/turn *Vim:*
Gencilis, turn Chriftiani, ob admirandos quds præbec effectus in omni genere profluvii, turn in
Liencia, cum in Diarrhoea Se Dyfencia, a quacunq; caufa prognata. Septem uncias manè,
Be tocidem fub vefperam exhibent, fi neceffitas urgeat. Sed quoniam fuccus amarus eft 6c ingratus,
abejus potu-ferum propinare ad os colluendum iolent.

Lufitani corticem radicisdeftillanc, atq; utuntur in hunc modum. R: comas in pulverem triti
² viij Ammeos, Apii> Coriandri licci, Cumini nigri nonnihiloftorum 8ein pukerem redadlorum
ii a \\ \\ Corticum MyrobaL cheba ?vi). Butyn vaccini non faliti ^ij. Laftis acidi q.f. ad pulveres
iftos excipiendum. Deftillantur in vafe idoneo. Liquoris ftillaticii unc. quatuor yd quinque, cum
aqua Avellana ImJicx, vulgò *Areca* nominate, auc aq. expediculis Rof. ij. propinant alvi proflu-
vio laborantibus, feme! in die, vel bis fi opus fit: incerdum fi neceffitas urgeat trochifcos de Carabe
vel de Lemnia terra admifcent. Ilico autem poft ejus fumptionem Oryzami cum Oxygala exhiber-
folent. Clyfteres etiam ex eo confedi fubnoiaem injicunt.

Tametfi autem Garcis femper bene fuceffit hujufmodi aqua^ ufus, fatetur tamen Malvaricam
herbam ab ipfis Malavarenfibus prxparatam magis przelentaneam opeem adferre. Ea verò paratur
ex iufdem ex qtubos di<Sta aqua rebus, cenuiffimè tritis^ SC fete aut jufculo Oryzx probè cottar ma-
ceratis. Acofta huic liquon longè prfert Maceris corticem vindem. licet mukò ingrator 6c
fumptu difficilior fit. Salutare etiam eft hoc medicamencum debilcati ftomachi, turn etiam vomiti-
tus compefcit cum aqua Ment hæ Be Maftiches pulvere fumptum.

CAP. II.

Ariores exotic à Jacoho Breynio defcript**.

i. *Arbor Kauki Indvrum* Breyn. floribus oJvraîs.

Breyn.

K¹ *Aufo* Indorum ob florum fragrantiam a Javanis, apud quos oritur vaide aelHmataj Tilis
ferè fpeciofe magnitudine & forma: Arbor eft patula, ramisdiffufa, cujus juniores ramuli
cortice lzvi, ex-albido acincano funt obdudli. Foliis ornaturPyri foliorum facie, ex cir-
dnato nempe oblongis feu ovalis figuræ, trium, interdum quatuor, unciarum longitudine, latitu-
dineduarumararotrmm^nervumeraflum perlongitudinem & nervulos tranfverfs habentibus; at
confiftentia dariore ac firmiore, brevioribiifque pediculis infidentibus. Ex foliorum alis &c ramu-
lorum apicibus Flofculi oriuntur orbicularis fere formæ, ^ j>arvi, Pifi majoris magnitudine, duo, treSj
quatuor, plurcfve juxtale, petiolis brevibus, latuginofis infidentes, fimul pofiti: quorum quilibet
ex multis petalis anguftis & parvis, è rubello albicantibus congeftus; 8c calyculo foliolis oftio, acu-
minatis, lanuginosifque, alternatim pofitis conftrufto, penitus fere circumvallatus. Flores hofce ob
iuviffimum qaem expirant odorem fills aut quorundam foliorum nervis cum *Mogori* & *Tjampaca*
floribus trajeftos in urbisBataviae forovenales exponunt Java? infilac indigene. Aqua etiam ex iis
odorata & coïdialis elicitur, ejuftdem psne lUis cujus nobis Rofarum usus.

a. *SanamindatmixCluftiaffinif foliis Polii* C. Bon* *Spei* Breyti.

Breyn.

Frtitex eft lignofis, Rofmarini facie crefcens; cujus rami albalanugine circumdati, & foliis vi-
ridibus, fubtus autem candidis 8c lanuginofis, conferti, Polii Lavandulac folio C.B. perbelle referenti-
bus, quibus verò magnitudine, non aucem craffitie, oedunt. Ex ramorum latenbus nonnunquam
aliquot; fed circa illorum faftigia furcunt multi infar Chryfocomes Columnæ in umbellaminor-
dinacani difpofiti, unciales 8c biunciales, foliis minutionibus donati enaicuntur; quorutri qulibet
plerunq; unicum, (raròduo) Pifi m^nitudine, circa bafin parvis anguftifque foliolis cinftum
tert *Cafitulum*, ex duodecim, tredecim, vel plunbus, Sanamunda: tertia: *Cluf.* planè convenienti-
bus tubulis aut flofculis compofitum; qui ex crinfecus plans: albjdi Be tomentofi, in quatuor auc
NF m m m t m m m m m * ^ *quinque*

quinque foliola per extremum (ubtiliter divifij atque inferius circa pedunculōs fquamis nonnullis minutiffimis ferruginei coloris prarditi.

AdLibri XXVI. Part. i. cap- ult. referenda est.

3. *Chawalarix five Cbtnopoda Monornotapensis* Breyn.

Breyn,

Aiunt, in quit, juxta Bonac Spei promontionum deferta Fruticem echinatum quendam, frequentiffimis ramis undique pilofis divaricatum, qui per interstitia brevia invicem ambiuntur a viridibus Laricis in nodum in acervos congeffis foliolis, femunciam vix attingentibus anguffis, pitafis, pallidis anterioribus aculeo, Bcnervo per medium craffo dotatis. Fert in ramis Be ramulis, inter furculorum divaricationes gbbum album, hirtifumvalde five villofum, Ceraiimagnitudine, ex foliolis compluribus iis qui ramulos veffunt muk6 hirtifioribus, Be arcuumrnodoinflexiscontextum: in quainter folioL flares flavi enafei dicuntur.

Si fruftu5 Be ffrren cum Echino Alpini convenient. Echini nomen huic inderetur frutici, co aptius cum folia Be globi forma Echini animalis in orbem congfti fe przlencnt.

C A P . III.

Pruno Jylveftri affinis Canadenfis C. B. *Hyperiwum frutfam Ammcanum flore alh* Park.

C. B.

FRutex est felquicubitalis [plurimis virgultis ad humanam fere altitudinem affurgens *Park*] caule lignofo, rotundo, atro-rubente cortice veffito [cortice albicante *Park*, forte hie de adulationibus virgis, ille de novellis Be junioribus loquitur] in ramulos brachiato. *Folia* habet *Ru*ta; hypericoidi familia [ex angufto principio in fubrocundum apicem dilatata *Park*.] *Flores* Pruni fylveftris floribus iimiles, fed rnulto minores, copiofos, candidos, pediculis obngis uncialibus, Si capilli modo tenuibus, calyculis virentibus liiftentati, iniidentes; in quorum medio hlamenta plura exgua, Be tenuiQima. Flos nulls fruflu fuccedente in hortis noffris decidit. Foliis etiam est deciduis.

C A P . IV.

Arbores exotic a Culiel. Pifonz & Gevgiv Marcgravh exhibit**

1. *Cuipouna arbor Brafilienfis* Pifon.

DE hac arbore pauca hanc habet Gul.Pifo, Mufti multis & eximiis dotibus excellere agrefem hanc arborem teftantur. Fluribus flavis decoratur Ipccus ilia cujus IQCCUS C cortice rrafo expreKis Be cum aqua limpida mixtus ulcera inveterata Sc purulencia mundificat eaqus w r n c explet. Prztercaex eodem iucco atramentum conveniens elicitur, quo etiam ad cingendos pannos ucuncur. Gluten quoque efficax exinde concinnatur,, in ulii familiares receptum.

a. *Mucmtaiba* & *Moataiba Brafilimfibus* Marcgrav. *Pyrifirms Brafdiana*.

Marcgr.

Arbor est figuram grandis QiiercusautPyrilylveftriihabens, cortice cinereo, glabro: *folia* Pyri noffratis familia. *Flores* nun defcribit Auftur. Lignum ex albo Jubflavum est \ medium autem ex ruf^ jigricat; optimum est 6c duriffimuin.

In fummate hujus arboris SL fummisillius ramis nafcitur planta ilia Ipithams longitudine, qu^ radiculis nititur in ramis, Btradicepaulo craffidre: in hac ordine reperiunturj oEtu₃ novem, vel dec^Ti globuli flavi, inftar myrobalanorum ftriati Sc fuperius acuminati, in quo acumine folium extactexautfeptem digitoslongumj anguftum, dilute viride, Sc ad flavum inclinans^ nervoinmedicp fecundum longnudinem.

3- *Arbur Brafilienfis fruttu ovali, Avellau* magnitudine^ Piperis guJtuM & qualitate. Ibiru Brafilienjibas* Marcgrav. Pilbn.

Marcgr.

Arbor Iktula: figura crefcens, cortice fufco Sc punftulis albis notato, tenuiffimo; lignoJgn₁₀.

In ramis ramulos alternatim pofitDS habet, Be novem folia itidem oppofita, tres circiter diq₁₀ longa^ angufta, acuminata, figura foliorum Salicis, fupernè faturatè vindia? glabra, fplender₁₀ infernè cinerea; Sc mollibus pilis cinereis quafi lanugine tefta: qua: ftantia in arbore deor₁₀ fe indinant. *Flores* fert alboSj lex obngis foliis confiantes, odoratos^ ad fingula foliorum p₁₀ affa binos. *Fruttus* est ovalis, & magnitudine Avellanz, faporis aromatici ac aens, qui loco PipWis in ubis uiiirpatur ficcatus Be in pulvsrem redaftus. Habet enim infignem vim aromaricam, ne

• *Cafficuni*. «a acris est ut * *Pimenta*.

Vft.

Corcex arboris detraftus loco finium ufurpatur, est enim lentiffimus. Ex eodemenam hunt fumcuh fulphurarii, ad fclopeta explodenda neccffarii. Quando detrahitur albus est leparato ex[enori fulco, Be ftatim fit rufelcens quadrants hora.

Floret menic Februario.

4. *Trupif*

4. *Trupif*

4. *Tupeifava five Scoparia Pifon. 246. Lufitanis Bafourinha.*

Herb* nonfylvis fed apricis campis gaudet: vix cubitum alta, tenaci, lignofo, unico pierunquft caule aflurgit, cui a fundo ad verticein ufque perpetui ramufculi adnafcuntur, ornatè expanfi Jupar- ne pyramidis inftrar: Qyi undequaque plurimis anguftis, exiguis Be acuminatis/oiar, ftellatim com- paffis, hinc inde fibi invicem oppofitis veftiuntur. His inferti apparent infiniri oculi, virides, acicul^ capitis magnitudine, è quibus flofculi dilutè albicantes Be cuerulei erumpunt: Ec poffillos rotunda corpufcula inftrar baccularum, quibus continetur *jemm* minimum, fufcimi. *kadke* eft refra, brevi, Candida, filamentofa, qux ficut Be tota planta maniFefto fapore Be odore caret.

Integra herbs, prxfertim juvenis, decofta, balnea, fuffumigia admodum funt anodyna, emol- *Vires.* lientia Be attemperantia, ut toe infignibus Malvis in Brafilia luxurianribus praeferri-debeanr. Nee memini me in tenefino, humorrhoidibus, ani inflammatiombus vel doloribus praefentius adhibuiffe remediunij tarn familiare, five externè ut fupra diftum, admotum, five per clyftres injeftum.

{. *Gotland'ma Brafilimfibw* Marcgr- *Sorbo Aucupari** [imili floribus umbdatis*]

Marcgr.

Procera eft arbor, Sorbo aucupanae ex parte limilis, cortice cinereo, caudice in multos ramoS dilperfo. Lignum illius indium fundit de le luteum fuccum, qui fpohre effluit, ac poftea indurefcit, ita ut inftrar picis fit fragilis, nullius odoris, nee usus, quod fciam, apud incolas. Et quid ha?u arbor ripas amnium arnat, radices habet multas, varie extra ripas fuper aquas contorte expan- fas. *Folia* habet fibi invicem oppofita, angufta, acuminataj folida, lxvia, viridi^, fpleridentia. *Flores* fert multqs umbellatim, qui ita proveniunt; primu elegantiffimi, miniati colons in fingiilis pediculis faturate rubentibus, femidigicum aut plus longis enafcuntur, feptendecim, oaodecim, viginti juxta *k* in una umbellaj * rudimenta floris confantia ex foliolis complicatis ovalis fere fi- * *GERMANA.* gur^ fiintj Be magnitudine Pruni iylveftris, eleganter quinque lineis obfeure rubefcentibus fecun- dum longitudinem quafi diftinfta; haec paulopolt fe pandunt in florem, quinquefolium, elegan- tilfiro^ rubrum, conftantem quinque foliis cavis feu femilunaribus, exterius curvatis: in medio ex- tac ftamen fatuPate rubrum, figura plane ut Caryophyllus aromaticus, cuiuperius adhuc quinquan- guJaris ftellula rubra impofita cernitur.

Fruftus ab Autore defcriptus non eft inventus.

6. *Anil alia fpzc'm* Marcgr. *Caavhira fscunda* Pi fun. *An Qladio affinis* C. B.

Marcgr.

Ad duorum aut plurium pedum altitudinem aflurgit, caule rotundo, geniculato, lento, fuccu- lento, Be quafi fpongiofb feu arundinofo, viridi, & hinc hide breviffimis pilis rufefcentibus veftito. Ad genicula tarn caulis quam ramorum/p/i^ fine pediculis duo femper oppofita ftant direftè, tres vel quatuor digitos bnga, angufta inftrar foliorum Lyfimachix, viridia, Be ih utraq, planitie pilis albis brevibus prsdita, ad tactum paulum hifpida. Ad eadem genicula ubi folia funt nine iridè eti- am duo pedieuli juxta fe pofiti, erede ftantes, duos vel tres digitos longi, fupenus florem album circumarem fuffitentes, magnitudine Belhdis, circumcirca minutis foliis albis j in umbilico minimà ftamina alba. *Radix* femipedem aut paulo plus longa, paullum curva ^ paucas radículas habens, lenta, lignofa, cortice obfeuri colons veftita, quz detrahi pot eft. Planta hxc tota cum fua radi- ce fucculenta eft, U figuis vel caulem, vel radicem frangat, ftatim fuccus effluit crerulei coloris.

Fit ex ea *Anir* folium herbam contundendo Be aquam affundendo: linquitur ut fubfideat, hinc ds- trahitur, Be in Sole ficcatur quod confedir.

Hxc planta toto gnere divsrta eft ab Altera Anil ex qua *Indigo* fit,

7. *Tremati Brafilinffibus* Marcgrav. *Trtmaç* Pifoni. *Frmx Brafilknfis flirt compofito*, in pap* *pos abwrnU**

Frutex arborefcens Mali Punieae figurè eft fimilis, cortice Sambucino, ligno albo, Be medullam continente. *Folia* habet viridia, haud magna, fequidigitum longa, fine pediculis ramis adhzren- tia, afpera, mukis venis confpicua. In extremitate ramorum fert multas umbellas magnas, floribus lufefcentibus onuftas, quibus aliquid purpurei admixtum. In medio autem fupt multa ftaminula flavefcenria, ut florum Hieracii, Be codem modo definunt in pappos: exactè odorem referunt Styracis, ut 8c folia trita. Poll flores provenit in illis pappois capitulis femem minimum, rotundutn nigrum, multò minus Papaverino-

Brafilienfes utuntur foliis contufis in oculorum dolonbus 8e rubedini

Viru

8. *Uuirapariba W Urupariba Brafilwfbt** Marcgr. *Arbor Brafilienfis folio rawofo, floribus wag- nisM pentapetalis flavij.*

Marcgr.

Arbor eft alta, lata, 8c medioeris uftatitè, folia lvs in frondes congefta fereus, nimicm quolibet Frons habet quatuor, quibusque, aut fev pediculos, novem aut duos digitos longos, in quorum quolibet quinque folia, quodlibet fua pediculis innitens, junctim exiftunt (tactis tria aut quatuor folia) in- squallis magnitudinis, oblonga, furcata: viridia, fplendentia, ad tactum membranaea, nervo in- vident. In magnitudine K venis uDiiguit^ prsdita: Menie Lecumbi arbor fimo folio- *UIGATA* fit in toto ftatis, ficut pocrudis cognofcimus, flavus, in *UIGATA* ^ aucamplius digitos longos, iup- riorè in quinque quail rona ICCIOS, nuc lidnnniu^ inodoros. Florens, arbor tota apparefflava, & C *longitudinis*: digaoici poceft ad tria vel quatuor milliaria. Floribus decidmibus folia icerum crum- pum,

Alia occurrunt apud Marcgravium Guirapanbz species Cap. 9. p. 10B. descripta.

Arbor est magna Be ampla, cortice limilis arbori Guayabac. *Folia* fert parva, in ramulis oppositis opposita, in quolibet ramulo aequalia, paria, cylindracea aut familia, faturatè viridiaj nervo iecundum Jongitudinem, Be venulis transversis vix conspicuis praedita. Lignum interius colons est obfcurè olivacei, ad nigrum vergentis; exterius tamen ex pane est pallidum, B{ illud interius aman est faporis, si viride masticetur.

Ebeni species est, quare & a Portugallis *Ebeno* vocatur.

Folio decompositD feu ramolb esse videtur.

9. *Viqueiro Lujitanis* Marcgr. *Arbor Brasilimfis wicifera fruEtu longo tubulo pradito.*

Marcgr.

Aitissima arbor & rarissime ramos suos e^ pandens, CDrtice gryfeo aut fibrufecijite; in ramis autem ahenatim poficis Fert ramuloSj quofdam directè quofdam alcernatim oppoicos inque his oppoica fibi folia parvula, foliis pzne herba: vivae/familia, bctè viridia. *Flores non defiribit anih.* Fructum habec longD tubo^prarditum.

Hzc arbor dat copiofam refinam, mollem, vifcdjimj inodoram, colore picis qua^ utuntur ad VD-lucres ca pi en das illinendo lupsr baculum utnos/olemus vifcum j radus tainen SolisituifeicK, quare ii cav^endi.

Dux dantur fpecies, micis & c fylvetris.

ID. *Anonymos Brasiliana floribus umbellatis albis hexapetalis.*

Marcgr.

Caudice est recto, sic mediocris iltitudinis^ cortice cinereo, Jigno fragili 5C medullofb; fuperius in multD5 ramD5, fed folns ferè nudos difpefbitur: *folia* tamen habet in ill or um extremitatibus in frondes congefta^ quinque, fex, feptemve juxta fe3 fupernè dilutè viridia, infernè albicancia^ quzdam oblonga^ quxdam pacn^ rotunda, nervo l'e-undum idngicudinenij 6c vsnis cranferfis ordins iibi oppudtis. Inter folia in frondibus etiam proveniunt pediculi duos dricer digiros longi, qui fupèiU5 multos *flofculos*^ oblongDS3 in umbellam uongeftos fulinentj albos, hexapetalos, luavis odpii5.

II. *Anonymos bavuftra foliis falignis Brasiliana* Marcgr.

Marcgr.

CDJ cice est cinereo albicante, multis ramis varè inflexis pradito. Lignum lentum^ quasi Saligim Dbtinet: *folia* autem oblonga^ dire ft ^ fibi invicem Dppofira^ folida^ lxviaj lupernè egregia vindjtate fplendentia, & ad taftum inftar holoferici. In extremitate ramorum fert multD5 *flofbulos*, fpicatim leu racematim congeftos, fuo pedicuJo,, deDifum incurvatD inflndntes, lutei colorisj K racemus florum eJegantiffimè est dilpofitus: poll floras nafcuntur baccz Ribium magnitudine.

I z. *Maratatabiba Brasilien/ibas* Marcgrav. *Arbor Brafilienfis foliis digitatis.*

Marcgr.

Arbor caudice recto aflurgit, noil crallo, cortice cinereo, fuperius autem duorum aut tffium pedum longitudine pediculi enafcuntur, in orbem pofiti, quorum quilibet continet feptem, Q&o, numerum aut decem folia in orbem difpofita, fex, feptem, octo aut novem digitis longa, fuperne viridia, infernè inftar Saria glabra, indigni nervo & conspicuis venis praedita, folis Ambaibe lubltantia & colore fime familia, pediculo infidencia duos aut tres digitos longo, cui è longinqus eadem Arbor videtur.

15. *Tangaraca L Pifbnis. Erva do Rato* Marcgr. *Frutx BrafiHtnf.vtmnofa, floribus umbellate rubris,*

Frutx est arborefcens. Lignum habet I en turn j & in ramis ramulos oppofitos. Be duo femper fibi oppofira, vel eriam tria fibi oppolita foliola oblonga profert, dilutè viridia^ eminence nervo fecundura JonRitudinem, Be conipicuis coftis fecundum latkudinyn przdita. In fummitate ramorum ^)ica nafcitur ex flonbus multis umbellatim pofitis confans, oblongiufculis, cylindraceis, rubris; P^ diculi autem florum crocei colons Be longiufculi Aim.

Vires.

Flores & c folia praefemiffimum funt venenum. Radix verb max exhibita tutum apud incol^5 re-medium.

14. *Tangaraca III. Pifbnis. Frutex Brafilienjis wmnofus floribus umbellatis aunts.*

Planta est fruticefcens radice craffa, foliis nunc alternating nunc fibi directè oppofitij csterurn craffioribus & i rotundioibus quajn priores Tangaracz. In excremitatibus ramorum pediculi longij ex quibus?o/c<li umbellati producuntur, prim5 albicantes, mox aureo colore relucentes. Una^ adveni ignari^ gratoque illefti colons temeritatis iux nimis niagnas psnas aliquando dederunt, modo eos olfecerint aut traiftarint.

Vires-

In halum foliis, flonbus Be ieminibus tam altè pofita est visdeleteria, ut vel ex leviffimo ^{coru} ^B gulhi corpus intumefcac, mens turherur, oculi mcipiant caligare, vertigines anijiiique dehqinao riantur, denique mors ipfa fequatur, nifi quancocius praefentiffimoremBdiD obviam ^{catl} ^Λ ^κ AntidDta prarfantiffima iunt radices *Jfecacuanha* & *Caafa*: His proxima radices 3* ^Λ ^{*} ^Λ ^Λ *Jambu*. Quin iplius *Tangaracx* radices tutiffimum ccnrenturremedium, magna quanrare <n bje^.

if. *Curupicaiba Brafilienfebus* Marcgrav.

Arbor corticefulco₃ Sc infar Berular crefcens: *folia* habet oppofita, quinque aut feptem in un ramulo, Jplendientia, acuminata^ non (errata, Becula; foliis viriditate limilia. *Florem Auctor non d fcnpfft.* ^ In inerioribus ramulis proveniunt folliculi, primurn vindes, deinde rubicundi, magnitudine & hguraPiftaceorumj qui quemadmodum Sc lignum fpirant odoremferè ut *Idea*.

16. *Guapereiba Brafilhnfibus* Marcgrav.

Arbor eft ligno gravi SL folido,, cortice brunno. Ramos & folia habet oppofita, atque hsc quidem craffa, nerve fecundum longitudinem, & multis venis fecundum latitudinem, adhsc kte viridia, magnitudine Pyri foliis scjuaia. *Flofcuhs* fert multos in calycibus longiufulis^ ex viridi fublu-teos. *Frattus* [tvm tamzn auctor non defcribit) decidens Cancrorum terreftnum eft pabulum.

17. *Jecuiba Brafilienjibus* MarcgraV-

Marcgr*

Arbor latis aha, cortice fubcano : *folia fat* in ramulis alternatim oppofitis^ fibi invicem direfte vel etiam alternatim oppofitaj Be in extrcmite unum folitarium, tres digitos circiter longas acuminara,, nervo fecundum longitudinem Be venis tranfverlis. *Florem* fert ccerileum. Ugnum hujus arboris egregium eft ad varia lculpenda, nam ex ruffo brunnum eft, &c nigro undtfum.

18. *Frutex anonymos Brafilianus fiors Kziri* Marcgrav.

Marcgr.

Cortice eft gryleo; *folia* habet alternatim oppdita, carinata, fcaphz figurá, circa extremitatrtm autem dentata, Iste vindia, Jplendida, venulis obliquis, elegantibus prxdira. In extremitate ramorum fpicatum proveniunt *flora*, flc Ipica flonbus adhuc daufis coloris eft fanguinei elegantiffimi, hinc fit flavaj &c flores fe pidentesfunt flavi^ pentapbtali: cuilibet autem petalo fubjacet folium acuminatum pallidum ; in medio Boris *ftamina* lutea congefta. Flos luavis odoris, ut Keiri noftras.

19. *Ibza-futeruna Brafilhnjlbus* Marcgrav.

Ligno eft duriffimo, ita ut aciem cultri retundat. Arbor magna Sc ramoia; fert *folia* alternatim in ramis oppofica, tres aut quatuor digitos longa, figurá cordis, fed in extremitate acuminata, tenuia, luperiús dilute viridi a, inferiús paulum pallida.

lu. *Tyri fylwflris faun frvttx Brafilianus ivmmiatui* Marcgrav,

Marcgr*

In modum Pyri fyl. crefejt, ligno fragili, cortice cinereo. *Folia* fert Pyri foliis familia, denfa, fuperiús Jplendide vindia, inFenus dilutms, alternatim ordine quzque fuopedicub craffo brevi appenfa Be deorfum indinata. In extremitate ramorum proveniunt quatuor, quinque aut fex in racemum dilpofita corpufcuk elliptica, Pifo majora, qua: fefe apeñentia *florem* promunt tetrapetabn petalisalbisjeranis^interiúsex albo viridantibus, magnitudine Lychnidis, inter qua: in circulum dF pofitafunt ftaminaalba,alta, IID Be fupra numero, fefquidigitum longa,, fili Senci craffi craffitie fuperiús flavefcemem fpongiolam adjunftam habentia. In medio autem flon* & horum ftaminu^l lorumaliud ftamen, duos digitoslongum, f_{or}t_{us}, flav^fcens, ercaum flat, fuperiús habens SSn^l draceum capitulum. [Stylus hoc non Stamen] Flos Sc vífu jucundus eft, Be fuavi R_{ofz} odore^l ditus fed non itaforti. (*Rdi^ua^on fupplwit Auctor*) Ramulos, inquit, hujus plants appenfos habui in mufeomeo ad libros: nu6lu ad quemlibet exortum pediculicujufque folii, ut Sc ad quodlibet fo liuin floris exudarát guttula Jplendidi cryftallini humoris, quaii plants affix* cTet, feminis maions Sinapi mole-

CAP. V.

Arlores qucedam zx If or to Malalarko qu£ Jleriles, florfyue S^l fruflu aut faltzm fruttu -vidua ejjc fermtur.

Arborea hujufmodi tota fpecie fteriles 6c fruflu omnino deftitutas dari nequitquam concedi-
nmi5j nonnullas tamen rarius fruttum proferre agnofcimus, quarque hujulmodi iint quia earum fruttus ab indigenis non fuerint obfervatz, pro fterilibus habentur.

I, *Nandi-Ervatam* * H.M, *Syringa Malabarka la&ftevs, flore mveo, pkno, vdoraujjiwv T)* * 54
Commelini.

Funiculu5 eft quatuor pedes altus, nafcens in arenofis. *Radix* fitrola, cortice albicante feu fub-
rub^l, in ramos fe diffundens. *Stipius* ex radice afliirgentes cortice func fcauro, cinereo, cum ramis finis nodulati. *Surculi* tenues Be novelli virides. *Fofa* c geniculis ex adverfb bina petiolis brevibus &: viridibus exeunt, oblongo-angufta, rotunda, antierius cufpide parvo Be angufto_j qui versts unam partem maximè inflexus eft, eminentia, ad petiolum ftrifta, intus laftea, mollia, liiperfipe l=nia, fupernè obfeunore virore, fubtus dilutiore nitenria." Cofta folii media, & nervilaterales etara in
M m m m m i fupin?

liipina parte eminent. Folia odoris & faporis nullius flint nifi fylveftris. Flores in petiolis, qui fipra ex origine foliorum etiam duo, tresvel pJures-fimul oriuntuiy plures jundtim proveniunt, rofarum acmuli, in torum candidi feu nivei, odore fiiavi 5c grato, decem petalis oblongis compofiti, antenus Jafioribus, craffiolis, rigidis, acvenis fubtilibus ftnatis, duplici Drdine pofitis, qua: in extriori ordi/ie funt quinque, in uno latere reftiori linea ftriata iunt, acmagis craffiola, in altero Jatere rotundiori ac tenuiori margine, Be crippo feu corrugato, exterius nervuloftriata, qui proximemarginem reftum exortus in sum duftu intlexo incurm; quinque ilia qua: in interiori ordine funt, larcibus in utraque parte rotundiolis, ac non exadte nniDrmbus circumfcripta, ac in oris undique corrugata. Flores autem calyci quinque parvorum Foliorum, pedunculo felcunciali, qui exterius viride dilutus &c fubflavus^ incerus flavo ac croceo rore^ quo ungues folioi'iim cingit, conlperJus eft, infident, Gemm^florum cDnicse.

Sub tempus quo florum exortus infat, folia omnia dccidunt^ novaque finiul cum floribus erumpunt.

Fru&tu5 num ferit dubium: *irno'ferre certum, licet ah Autoribus nojiris non fuerint obftrvati.*

Hie fruticulu5 totus laftefcit, in anno bis tcrve flares ferens.

Vires.

Succu5 ex ea exprelKis ag cum oleo mixtus dolores oculorum fedat^ fada capitis perunftione- *Radix maticatajBi* in ore detenta dentium dolores fedat vermes enecando : cum oleo decofta lervit pro omni mdifpoitione capitisj &c prfercim ejus dolorem fedat, fafta perunftione: eadem trica & in aqua cpota lumbncos enecat: urita cum fucco Limonis & oculis indica nubeculam tollit.

2. *Nandi-Ejwatam minor* H. M. *Jafminum Malabaricum foliis Mali Auruntiflore mvèo odorfl'*
ifjèW Xadi □.

H.M.

A pnore tan tum differt, quod foliis fit nonnihil minoribus, quodque flores fimplicioribus ac minoribus foliis conftant, putatanrum quinque qux Hint familia foliis florum prioris (peciei, qui in exteriori ordine Jita funt.

Joan. Commelinus hanc plantam pro Jafinini (pecie habet, quoniam flores Jafinini floribus fimiles funt, ciimque folia foliis Mali Medici relpondeant, appellari pofle cenfet, *Jafminum Malabariwrn foliis Mali Aurantiflore mveo odoratiffimo:* a precedenti autem omnino differre judicat. Nos potiU5 aflentimur Autoribus noftris teftibus *wri'7fj&tf cpngcnersm effe affirmantibus.

^ *Ben-Kalefeam* H. M. P. 4- T. 34. p. 7r. - *Arbor Indie a fglis alatis, flore & fruBwvidua,*
H.M.

Arbor eft mediocrii magnitudinis, caudice mediocriter craffo, Icabro Scnodofa, multifq, ramis viridibii5 ac nodofis, in orbem longè lateque diffufis donato; Lignum albicans, odorum, cortice obduftum craffbj cinereo, intus candido. *Radix* craffa, fibrata, albicans, CDrticerubicundofquamD^o obdufta; odor fiiavis, lapor acris Be aromaticus. *Folia* geminata ordine parallelo ramulis inhxrenliaj [*quos ramulos vocant nihil aliud funt ejudm foliorum compojitorum cofta*) oblongo-rDtunda, glabra, fiipernè atro-viridia Be fplendentia, infernè liibviridia fle lanuginofa, in ambitu quodammodo crenata; odor iuavis, lapor aftringens. *Flores* aut nullus fert, aut inconlpicuos, nee magisfruftus; nam quOS pro fru&tibus acfcribunc exocrocenti^ iunc Gallarum smulz, inic^toquirL matrices, ad foliorum ortum; vel ipfis foliis innafceites, oblongo-rDtundae, acuminata:, primum virides, dein purpurafcentes, glabri, nicentes, intus cavar, ac fubitantii farinacea refertar, intra quam unum ake-riimve infeftum volatile c Papilionum genere holpitatur: fapor aqueus & fiibaftingens.

Linn.

Nafcitur ubique in Malabar, &c frequenter in agris colitur ob-folia, qua: cum inhneni colJigi fo-Jent, ut iis agri itercorentur. Semper viret diuque fuperftes manet.

NDS negamus ullam arborem dari totalpecie fterilem, ideoque Be hac: proculdubio finflus feit quamvis nondum fuerinc animadvert

4- *Asjogam* H.M. part.\$ tab. 59. *Arbor Indica foUis adverfijj .florc Jlavestnte* *caris apertatide,*
vdoratO; fruftu mndum compwto.

H.M.

Arbor eft mediae magnitudinis, quindecim circiter pedes alta, caudice mediocriter craffo, albi-Canter, fufco-nigricante cortice cin&to, ramulique paucis in orbem diffufis donato. *Radix* albicans, nigricante cortice te&laj inodora, profund^ terrâ: inhsrens, fibrifque fiiis lat& per cam diifu^3- *Folia* ex adverfb bina circa furculosproveniunt, oblongD-rotunda, craffa, fpithamam cuxicer longa, media cofta viridi-albicante: odor Be fapor ingratus. *Flvres* odori, flavefcentes, in fafcias colletti, numeroft circa ramulos provenjunt, conflantur ii e tubo oblongD, in quatuor iubrotunda fegincnta expan/o, ofto tenuibus, rubro-iplendentibusac longis *fammibus*, atro-purpureis *apicibus* ornafis medium Oicupantibus; inter qua: *flylus* prodic viridi-albicans, craffiis, iurreftus, acumine tereti. Quil^5 fert fruftus nondum compertum eft.

Linn.

Provenit variis Regni Malabarici locis circa Ethnkorum templa, qui iftiufnodiarboresftudios^ ibi colere /blent, earundemque foliis Se floribus uti in carremojis fiiis ad templa ornanda. Scmpet vi,et, qnotannis floret, Decembn viz. &t Januario menfibus, diuque fuperftes manet.

Vires.

^E foliis contuli5 fuccus exprimitur, qui cum feminis Cumini pulvere exhibitus colicam paffioncm ianare fertur. Foliorum pulvis cum Santab citrino acfaccharu affumptus fanguineni reficere *c purgare didtur.

5. *Talijr-Kara* H. M. P. 8- 75- *Arhvr Indica fpinofa fore & fmctu vidua.*

H.M. Arbor est procera, 30 circiter pedes alta, caudice crasso, albicante, cortice cinereo-furvo, glabro, ramulifque plunbus, in orbem longe lateque diffusis donato, qui oblongis, duris, rigidifque lpinis infuiper muniti fiint. Radix albicans, furvo cortice uesta, odoris gravis, faporis adstringentis; Folia oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu leviter crenata, crassa, denfa, splendennia, iiper viridia, inferne subviridia; nervis aliquot e media costa in latera excurrentibus: odor gravis, fapor fylveftris ac adstringens. At verb folia tenenora e vertice ramorum prodeuntia plerunque rubro-purpurea fiint. Flora & fructus quodhaftenus faltem in dtefcit, non feit.

Prdvenit variis regni Malabanci buis prsfertim circa Warapouly Temper viret diuque fuperfcit Low. manet.

E radice in aqua cofta potus conficitur, qui acidos rallofque humores per diaphorefin pdtenter Vjrej. evacuat. Ex foliis cum viridi curcuma in oleofrixis paratur linimentum, quod ad febicm tollendam valde laudatur.

6. *Ben-Momja* H. M. part. 5. tab. 57. *Arbor Indica foliis alatis, flore & fruttu vidua, Ben-Moenja ditia.*

H.M. Arbor est procera, triginta circiter pedum; caudice tnediocenter crasso Furvo uortice cinfto, ramulifque rufis lignofis at geniculatis plunbus donato. Radix albicans, amara, aromatica. Folia geminata in furculis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, tenuia lenia, labra, fuperne viridia, inferne subviridia: odor gratif hortenfis. Nee flores nec fructus Auftoribus noftris innotuerunt.

Provenit variis Regni Malabarici in locis, praefertim circa Aroz Be Voedegoyl. Semper viret. Locur.

Ex radice cum aqua decocto fit alexipharmaca, quae in febribus malignis valde extollitur. Ex cortice cum calamo aromatico Be fale in Oryza cofto potus conficitur, qui vomitum fan-guineum E morfu (erperitis excitatum protinus fanare fertur.

7. *Amdpodi* H.M. fart. 5. Tab. 51. *Arbor Indica flurib/ umbellatu, Utrapfalu.*

Arbor est iustae magnitudinis, caudice albicante, cinereo cortice obdufto, ramulifque viridibus fe geniculatis pluribus donato. Radix fibrata flavescens, inodora, amara. Folia geminata ordine dculatj pcciolis rufis circa ramulos proveniunt bbjongo-rotunda acuminata, crassa dcnla, jnolia glabra, fuperne splendennia inferne nequaquam: nervulis aliqdoc e media costa in latera excurrentibus ad quorum exortum noduli exigui, virides in averfa folii parte confpiciuntur odor acidif. Flores exigui, candidi, extremis furculis numerofi proveniunt porrefctifque columelis umbellae fpecie panduntur, quatuor acuminatis foliolis confante Sj inodori, fapore fubamaro.

Crefcit locis petrofis ac montanis circa Candenatei Temper viret. Junio Julio/Augufto tnenfibz Locus floret: FruBus verb nullos fert affirmantibus indigenis: quibus tamm fides minimi h abend a est.

Radix vero hujus arboris fecum gestata Antidotum habetur ferpentibus vsnenatis, atque ideb Vires. magnivulgb sftimatur.

Cum exteris Amelpodifpcciebus (annotante D. Comelino) nullam plane habet fimilicudinem.

8. *Bzlutta Amdpodi* H. M. P. 6. T. 48. p. 8;. -Frutex Indica foliis bims adverjis, floribz pentapetalis candidis, unguifan luteis.

H.M. Frutex est ramis fibviridibus. Folia contradis inter fe pediculis furculis innitentia gemina, e longo angufta, acuminata, ad pedunculum quoque strifta mollia, spiffa, glabra in fupenore parte subviridia, inferiore dilutiora. Cofta, quam lririfta etiam prominentem habent, in plures difper-titur. Saprbs expertia, intus parum laftea fiint. Flows in furculorum fummitate provement quinque habent petala oblonga, candidiffima, ab uno lateris finuataj ad unguiculos croceo cobrs leviter tinfta. Odor ipfis nullus.

Montanis gaudet locis: Reperitur in Teckencour, aliifque tacis plunbus. Floribus exhilaratur Ucw m. menfe Julio Be Augufto, frondibus Temper, fructibus verb nunquam, fi credere fas fit us <jui retulerunt, proculdubio deceptis.

Ex aqua, fi ufum roges medicum, contrita & aflumpta radix ferpentium occurrit morfibz fi Vfuf in Anna,

9. *Tondi-Tèregam* H.M. P-4- T. 60. p. 12;. *Arbor florz tetrapitalo odor at o> frubtu nulU.*

H. M. Arbor est procera, 60 circiter pedes alta, caudice crasso, ramulis rzftis, longis, atro-viridibus latuginofis, asperis, fungosa intus medulla refertis, plunimis donato; lignum albicans, nigricante corcice cijftum. Radix fibrata, albicans, laftefcelis, rufo, intus croceo, cortice tckla, inodora, faporis acris. Folia geminata ordine parallelo, petiolis longis circa ramulos proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, in ambitu crenata, crassa, mollia, glabra, fuperne viridia & nitentia, inferne subviridia SC lanuginofa: odor fiiavis, fapor aromaticus. Fhfculi pediculis oblongis e foliorum interna feds circa ramulos proveniunt, term auc plures fimul congefti, purpurei, nianibus confrifti fuaveolentes, calycifque viridi, lanuginoro ac quadripartite inherent, quatuor acuminatis foliolis confantes. Foliola hsc intercedunt totidem ftaminda purpurafcentia, mediutn occupante/y pulchri rubente, capitulo albicante.

Fructus hunc aiburfm nullos ferre Malabarenles teftantur; at nobis fidtm non favunt.

Crefcit

Loeuj. Creclitloris arenolis &c petrois in Mangatti. Semper viret. Julio & Augusto menibus flores ferr, diuque superflues manet.
Vires. Ex arboris foliis in latis fero coctis fit oris collutio pro aphchis. E cortice Be radice in aqua decoctis Apozema conficitur, quod xftum febrilem temperat, hepatis obftrufiones rferat, necnon herpetij feabiei, iimilibiifcus affectibus medecur.

1 D. *Arbor Indka ZtLW®*, floribus odoratis pntapztalis, ptlah uno lutev, rtiijuis candidiffi Sida Pou. H.M P.6.r. j9. />.ID?.

H. M.

Rami ligno albicante, medulla viridi, corticefulco obdufti funt. Folia acuminata^ fpiTa, felida, glabra, c viridi umbrofo fupernc nicentia, infernc furda, cofta albula, venifque fiibtiliffimis fiipina in parte confpicuis intermixta, e craffis contranis inter fe pediculis gemina^ ramis inhirefcunt. Floras numero plures c calycs quinquepartito, in petiolis communibus proveriientes, textura^ Be afpectu graciffimi, odors amEniflimi, quinque lationbusj, anteriorein parteinnumcra in filamenta divifis, quorum unum luteum, quatuor alia candidiffima tranfverfim quafi obtegit, cuntant foliolis; fiamimbzts vero denis^ candidis, craffionibus, furreftis, croceis capitibus, ftyh medium occupanre vindi, eminentiori, Ievit6rque inflexo. Flonbus deciduis tres gammula virides, altz, quz introrfum folio funt ersfto, confpiciuntur. Prorfus tamenhabecur fertilis, quamvis quidam in feneftrue fructiferam przdicent.

Tropium
Lecyn.

Floret menfeMaiDj Junio, Julioque. Petrofis, glareofis deleftatur locis^ quapropter in montibusParacarij Mangmi &c Panpani vifitur. Rariflima, ob florum elegantiam, odDriique jucunditatern in fummo honore eft. Nullum mechanicum nsc medicum habet ufum.

CAP. VI.

Arborts qu&dam Chinenfes.

I. *Tipa arbor & fructus Sintnfis Michael. Boym in Flora Simnji Jonfton. Dendrolog.*

FRuftu5 ciim maturefcit ad flavpm. colorem declinat. Noflratia Pruna laporc imitarur. Arbor pukherrima eft, folia, (&-ik>ribu5 confpicua jucundum prabst alpeCtum. Officulum folidum 5c ovalis figurz habetl

Plerique colligunt fructum Februario Be Martio. Duleiffimi eft (aporis, &c pelliculam fimilem Prunis continet-

x. *Fructus inriominatus Simnfis M. Boym in Flora Sinzufe Jotifkon. DendroL Ficus Simnjis florid* e radiabus frustum emit tens.*

Arbor eft procera, folia maxima, quz medium homincm cuntegere poffuntj producit : hoc admirabile habec quod media radice tclure inhxreat, ex alia au tern parts radice patente/orw rubros Be fimul Fruaus fimiles Europzb ficubus prognsratj qui cum maturefcunt rubent paululum, ied interior caro &c fapor eorum figuram &c faporem ficuum repraefentat. Julio Be Augusto maturefcunt.

3. *Cerafus Simnfis fructus pulpd fibaad. Johnfton. DendroL. Item, Arbor Sintnfis pnguzdim Sibi inflar firzns Martin. Atl. Sin. zjufdtrn.*

Quod 1105 in ingentem faepe perduxit admirationem [inquit Autor Atlantis majoris, tomo Siiieni p. 119.) eftillud, qubd pinguedo in arboribus crefcat, ex qua velut e ievo candelzoptima: albentes, rafts manum non polluentes, extinftque fetorem non emittentes, a Sinenfibz Ktzuyeu vocat^, parantur. Arbor eft iatismagna, Pyris noftris folia Be figuram non diffimilis: album edit floret uti Ceralus. Florem iubfequitur bacca admodum rotunda, Cerafi magnitudine, coiticem tcnuem BC nigricantem induta: caro contenta albet, nucleo prxgnans, quern baccis matuntatem adeptis p&f corticem rimam concipientem videre eft. Baccas hake cDliguntj & fi in calida aqua coquanrur camdiflblvitur; ctemplo tamen a refrngratione iterum, uti feyunij congelat. Tune refiduus eft nucleus, quern imponunt aqui, uti nos Olivas, ut oleum expnmere queant, quo tamen, non pr uibo, fed in lampadibus utuntur. Hyberno tempore folia hujus arboris planè ceu cuprum rubefcunt; tandem decidunt, praebentque (cuni pinguedinis quid dam ha bean t in fe) mirum qirantum, Id- bilevaccis Be ovibus pabulum.

Poterac hxc arbor ad Csralus referri.

CAP. VII-

Arborz Exotice e Jo. de Laet. Descriptione India Occidentali & Nierembergii hift. Exot. Clusio, J. Bauhin & aim.

I. *Murucurifera arbor** De Laet.

KRbor est in Brasilia procera, Be Pyrd fylv. admodum fimilis. Fructus, qui incolis *Murucurifera* dicitur, cespugnum capum habet. Decerpitur viridis, Be bene mitigatus Be fapit Be digentur. Quia ut fapilms colligatur prouuntur arbores, ideo rariores extant. E trunco incifo lafteu5 emanat liquor, qui confitatus ufum cereae in tabulis confignandis praebere potest.

x. *Irucaba inful* Maragan* * De Laet-*

*JW. occid-
L.16. p. 11.

Arbor oft vafta, Be pa tula ramorum opacitate in vertice lafciva; Foliis parne ficulneis, floribus flavis, fructu Pyri forma, cortice subflavo, carne intus lapida Be optimi nutnmenti, ut credunt.

5. *Cofovkb Occajfiu ejufdem ibidtm.*

PyrofrDndibus Befruftu fimilis eft, nifi quod hie flavior Be oblongior, Be tria intus perdura of- ficula continet. *Oumery* fuftumfen, magnoPyro finalem, qui ubi pknè maturuit inter, optimos primum bcum fibi flagicat.

4. *Paltifcra arbor De Laet. Ind. Occid. l. 10. c. 3.*

Arbor eft grandis Be ramofa; fructum ter quatŕve fnole Pyra Europxa excedentem producit. Quia colore Be formâ noŕtris fimilis eft Pyrum ab Hifpanis vocatur. Peruani nomen Paltz à pro- uinda ubi copioŕ nactur indidere. Corticem habet tenrum Be lzvem. Medulla tranŕverŕi digiti crâŕlitie uŕficulum ejufdem cum fructu formx ambit. Cum Saccharo condira exhibetur xgris. Fructus in inhila Hifpaniola butyrum emulatur maturus: In Mexicana minor eŕt, Be cutem ceniore- m habere dicitur.

5. *Agnacat Scaligzri Fyri Ipecie.*

In ea Indie provincia, quæ sub terra Laboratoris eft verŕus Ifthmum Dariem, arbor eft Pyri Facie Be magnitudine, perpetuo Tolio, viridiffima nitidiffimâque fuperficie. Fructus quoque Pyri fpecie fed colore yiridi, etiam cum maturus; medulla intus concolor, dulcis, pinguis^ butyri faporiŕ. Valido5 adŕb ŕfficit ad coitum ut propius miraculo fit ejus efficacia.

6. *Amatz,ffuitl [tu Vmdo papyracea * Nieremberg.*

*Hift. ExoA

Huic materia eft levis fiŕparum a Ficulnea diftans: folia Limonis, fed magis acuminata, coma- ta: *fruttus* Nucum Ponticarum ma^nicudine, candidis dilinŕti punŕtis. Be gra^iula Ficulneis formâ 6e naturâ familia in fe coŕtinentibus. Proviŕtuit locis calidis qualis eft Chieda. Jus decoŕti corticis radicum febnenribus valde prodeŕt. Folia umbræ tantum gratiâ expetuntur.

7. *Tz, amotl, quam Hait mi Ceiharn vocant Nieremb. l. 15. c. 71.*

Arbor eft tnagnitudinis vaŕtac, materie lenta ac brevi, foliis novaculæ formâ. Duac. ejus Ipecies; Aherafolii5 Malî Medicar, quæ largos imbres durh viridia 6e tenera funt effundunc: fructu orbicu- lari albis maculis diftinto, ac granulis granis ficuum fimilibus referto, eduli, Be laporem noŕtradum referente. Indigene Hifpani Ficum Indicam vocant. *Alterâ* latioribus, fed tamen obtulioribus 6c nigrionbus, unde *TUmail* vocare malunt, fructuque minpn. Hoaxtepecenfes Mannam iuper cam cogunt noŕtrs Be formâ Beviribus fimilem, fed paulò duriozem Be glutinofiozem.

B. *Jaruina Nieremberg. l. 14. c. 104.*

Jucaia: infulac arbor eft, Ficui fimilis, eodem tnodo frondofa, BcPopuli altitudineŕti fuperans, non folida quidem more aliarum arborum, nee inanis tamen uti Arundo, fed uci Ferula potiùs auc Sambucus; cortice lubricn aut lŕvigato. Fructum creat feŕquifpithamalem, rriollitis Ficus, fapî* dum Be Jalubrem fanandis vuLnenbus. Folia diuŕŕa ferè a fe invicem membra reŕtituerc dicuntur.

p. *Arbor Sycomoro fimilis ininfula Mayo Ind. Orient. f' & -4-i^1? -*

Arbor eŕtpatula, 3e qux ex taleis in terrain depaŕtis oriatur, foliifque minDribus quàm Ficus ve- ŕtatur. Friiŕtus feit parvos, luteos, fine granulis, abŕqus quibus haud facilè invenitur. adpo ~~fructus~~ eŕt. Hoc peculiars in ea quod fructus nunquam ad macuntatem pciv^niat*

* *Ind. Occid.*
l. 13. u. 4.

ID- *Zumana arbor ditfa* * De Laet. *Gacirma* Nieremberg. l. 14, r.j*.

Arbor Ipfa Be fructus Mori fimilis. E fructus fuco iyrupus paratur contra tuflim Be raucedinem. Maceries arboris adeo dura eft ut exficcata Be collifa ignem filicU initar ejiciat.

* *Ind. Uccid.*

XI. *Jequitinguacu arbor* * DeLaet.

Friiftus fert fragis fimiles, quibus leminis loco continetur duriffima Faba, orbicularis, nigra, BC inftar Thracii lapidis replendens amariffimo cortice. Supplet egregie vicem Saponis, Be validius quam optimum imegma Lniitanicum detergir. Brafilix indigsna.

ti. *bnboti* De Last. *Ind. Occid.* l. 16. c. 11.

Mangas foliis fimilis eft. Fert fructus Perlicis iimiles, intus Be extus, ubi maturuerint plane luteos: necnifi cum fponre decidunt edules.

i;. *Cumpicaiba* De Laet. *Ind. Uccid.* l. if. cap. 8.

Folia Malo Perficae familia habet: cortex vulneratus vifcunij quo Barbari in aucupiis utuntur fundit: ipfa fiicum lafteum ficulneo fimilem, fingulare advcrfiis vulnera Be puftulas remedium largitur. Diiferre videtur ab ilia quam Marcgravius delcribitj Lib. 5. cap. 17. p. IJX-

* *Ind. Occid.*
l. 3. r. 15.

14; *Duchaminifera Virginia* * De Laet. *An Pijbamin Virginianum Park.?* *Lvti Africans* *fructu arbor C.B.?*

In Palmar altitudinem acblefcir, 8c *Fru&um* fert Mefpilo quidem non abfimilem, primo viridè deinde flavum, ubi matument fiibrubicuidum: qui tamen inter Pruna compucatur, Immaturus aufterior eft, 6c fi fnafticetur os cum exquifito dolors aftningit, maturu5 graciffimi eftfaporis, SC omnino pr^codbus fimilis. Incols *Fuchamias* vocant.

15. *Trunorum Indicarum in infula Maragnana vafczntium dczcm gmtra rzctnfu* J. de Laet. *In JL Occid.* l. 16. c. 11.

1. *Titom*, mole, frondibus Sefruftibus Pruno {Itallis, fed fructus luavior eft-

1. *Awnonbo-vib Acajou*^ Pono valde fimiliSj fed fructus illius fimiliores fiint Prunis, nifi quW crocei funt coloris, fuaviori (apore, officulo perexiguo.

5. *Yachica*, Pruno admodum fimilis, floribus flavis quidem, fed fructus illius Prunis omnino lult f. mly lutei colorisj nucleo Candida \$c iuavi.

4. *Cayoveen* Be 5. *Mukay em* parum differunt a prxcentibus.

6. *O-vagironi* nafcitur utplurimum in arenis ad licus, nee adolefcit fupra Fructis iliodum. Fni- dum feit inftar majoHs Pruni, rubri coloris.

7. *Momzii*', itidem amat arenofum lltus. Fructus illius a en ons eft laporis.

8. *Muroure*, non mulcum quoque abludic a Pruno; flores frt luteos, fructus inftar Ceraforum longis pediculisj pfe exiguoj came crpcea Be luavi.

p. *Uva-ova Jjoura*^ ingens arbor, frondibus Pyri, floribus candidis; fructum fert *Fancorii nun* abfirmilenij cute flava, dulcis iaporis, DIIC interiii5 fattfi ad Perficorum modiiij mideo Amygdalis paulo majore Be ejufdenifaporis.

ID. *Cotwvich ajoup*, Pmni arboris mole, frondibus caftane^ floribus candidis Be luteo colors mixti5. truftum fert inftar minuris Pomi, flavum, officulo intus exiguo, nucleo autem eduli-

His adde 11- *Jacarandam* Pruno arbori admodum fimilem, fed foliis latioribusj flore candido; qu5 fraftum fere duorum pugnorum magnitudine, fie ubi coftus faerit edulem. Barbari coquunc ex illo pulmentum quoddam ilomacho inprimis amicum Be falubre, quod vacant *Manipoy*. Ob n^{om} minis convenientiam fupficor hanc arborem eandem efle *Jacarandac Marcgrarv.* l. j. u. 15. p. M xl&^m

M. H. Evet.
l. 14. c. 3. 1.

16. *Macaxocotliftra arbor* * Nieremberg.

In parem cum noftris Prunis attollitur magnitudinem, fimili etiam confat materie. Radic^ K folia fibi refpondenc. Fructus *Macaxocotl* feu *Pomum Qyrvum* dicitur. Commune eft omnibus friiftum adhacrefcencem ftipitibus ramifque prius quam folia proferre, quod paucis admodum arboribus evenire iblet: h foliis ial/amenra condimencave acida concinnari, emoljite alvum: ^{nd/1} admodum (uave aut lalubre praftare alimentum; acque earundem arborum cineris ope puelijj flavefcere capillos. In quincuplici verb finc hxc Poma differentia. 1. *Cacaxocotl* ditfa, qua: ^{nd/1} funt Brin longam protrafta formam, nucum Juglandium mediocrium magnitudine, offibus m ^{nd/1} firmis, extra Be intra lentis, friatis, Daftylorum forma, callo modico mollique Be fuco ^{nd/1} intus luteo, quale eft ipfum Os- In cibi hxc ufum veniunt, Be ab aliuetis noftis praferuntur. Al^ Lini emolliunt, Sedulci acidobque fapore palato funt graca. 1. *Atoyaxacotl*, qu ^{nd/1} la, colore lueo, orbicular! forma, odore praftantiorc, minore nucleo, rotundoque Be ^{nd/1} diore. v *Uox. ticc. 0c9t!*, ut Mexicani vocant, quiz a multris in Myrobalanorum referu ^{nd/1} Palhdiora iunc, majora, maculis perfperfa, gratiorifque calli. 4. *Atoyaxocotl zbichiluc*, m ^{nd/1} omnium, colonis coccinei, fed qua: fiivicacodoris reliqua viaoinr. y. *Ubicbiacotl*, ^{nd/1} manancia, nucum Juglandium magnimrfine, colore Pafiw, uberiorc quam reliqua callo K ^{nd/1}

nucleo. Nascuntur in calidis quibusque locis, campestribus, Wtenfibis Be humectis. Corticum aiorum dscofti jus scabiemac crurum tumorem curat, pulvis verb ukeribus medetur.

17. *Tzopilott Xirnnis*, * De Laet.* Ind. *Orchid.*
L 7. c, 10-

Arbor est grandis, foliis longis Be angustis; fructu longo Be granidiuculo, officula quaedam amira, mofchum redolentia, Amygdalorum amarorum fapore, quern putridum post se relinquunt, continence. Extrahitur ex illis liquor quidam oleofus Be emolli6n5; quique Amygdalarum amararum facukates obtmere videtur.

18- *Ajubatipita Brafilimfw* ejufdem.

Arbucula est quihque aut fex palmos alta, Fructu Amygdalis fimili, fed nigro; ex quo oleurtl quifilm colons exprimicur. Eo artus infirmDrum inungerc Barbaris fuecum.

19. *Amygdala Granatmfis* De Laet.

Tereti est trunco Pinus infitar, &c genus quoddam Amygdalorum profsr renem Dvilbrum effi- Bis, oblongum, fapore fuavi Be Hifpanienfibis acmulo.

2D. *Jucaia arbor* Nisremberg*

Ma b Punicx fimilis est, fed frDndofior. Cortex Caryophylli odorem prx fe fert, cinnamomi faporem, &c zinzibris amaritiam: quotannis nulla gkndium jafura dsrahicur. In ramis columbarum hofpiciay Be quidem tarn multarumj uc sb ex proximis regionibus venatum trajiciant, BC naves columbis onerentur.

x1. *Arfar NaUivenfis CanJou Diifchafii JOQR.* Dendrol.

Suberi ligno affinh est, par Juglandi proceritate: caudici^ qui fungofus Be Subere levior, cortex candicans: fructus nullus. Lignum in afferes fscatur &c exuritur, miri Ac ^teru ulus: Ejus yr,ji enim beneficio graviffima quacque etiam mills pondo de maris profundo educuntur. Cjngitur pri- inu funequad lubmerfiim est hinc per lignum perforacum (unis ccajicatur, additis toL ejufdem parckulis quocncelTaria operi exequendo effe norunt.

2z. *Tlatanus Indica Acaba ditto*, Nieremberg. Hift. exot./ 1J- c 85.

Sitnilis est csteris Platanis angustioribus tamen foliis, fructu triangular^ decem unc. longo, candido callo, ac nuclei5 multis Be nigris, Cicere-paujo minoribus mollioribusqus K orbicularibus: ex quo Platanu genereilntea conficiuntur.

a; *Flatanustnd* fulvornawata* ejuldem *ibid.*

Fructu parvo est & tenui, in tres pracipuas diffrencias dividiturj Tokgdata, Goyot Be BoUngm VDcatas, Fructu odoro, Be oris halitum in muhashoras commendante, faporis gcati & noftris Apianis malis, fi exquisiti maturaerint minimi cedente, colorque extra viridi, au diverik magnitudine, temperad natura, aut paululum Frigenti, fed aliquanto humidior. FJa<im Be pitujcam generat, vncrem emollit, Be qris commendat halitum: quin post cFum mos est Xndigenis ab omni potioni5 genere, ne ob immodicum humorem putrefcant, abstinere.

14. *Urmi CbiUnJiam* * De Laet *Hifpanis MurtiBa.*# *Ind. Orchid.*
L. 11. c. 7.

Fructu5 fert uvarum in mDdumracematiin colletofj Piforum magnitudine, gran Drum Mali granati forma 8C colore, fapore inter fcavem 6c acrem medio. Exprimicur ex eo liquor daius, ad vinum quam proximè accedens, qui faeces fua fponte egerit: fit Be laudatiffimum acetum,

25. *Guvavirap Brafilinfium* * De Laet.* Ind. *UcciJ.*
L. 16. c. 2. n.

Arbor est procera BC vafta, frondibus perexiguus, floribus rubicundis, fructu uvam criipam-
refereat.

26. *Johualxochitli aim Cykaquabuttl, feu Flos orbicularis* * Nieremberg.

* L. 14/C. 37.

Sambuci *Urbis* folia fari, *Urbis* florum orbicularibus ac pallentibus, in corda contractis, multis bianibus coarctantur, unde acini racematum dependent, unius videlicet, dein coarctati, purpurei canaem. Kadix: est rehnoli laporis- Diciitur toha imposita pefton lyncopen tollere; ex aquae epedididit em clere, Frixu expreffis prius fucco corpus impingare^ pulvis iniperius ulcera inlanabilia curar^ Be refolutu acuterino affflu laborantibus prodeffe.

* *Ind. UcciJ.*27. *Enguamba Untvapnfium* * DeLaet.* Ind. *UcciJ.*
L. 7. c. 2. n.

Arbor est mediocris cortice rubefcente, ligno filico, medulla pallefcente, foliis ktis Be concavis, quzdiftinguuntturnervulispertimflavis, partim rubris; flonbus racematum pendulis 5e hsrba- ceis, Fructumgro, pleno grams, e quo exprimitur oleum Havum ad cumores refojvendos Be ad- verjus plagas. Nascitur in iaxo^s IKIS.

aB. *Vilifn.*

* Mft. Exct.

* & *EtijlqoTlthipipiaaromifidamm** Niereinb.

L 15

Duo genera flint, *Mas* & *Foemina*. Major ille & amplioribus foliis, int̄rque faxa nascitur: minor haec in planis. Utriusque radici tubercula suffea, pugni magnitudine, innascuntur. *Stipites*, qui fuscj & enodes, tranfvicim fi fcindas, in pelliculas qualdam membranis ceparum fimiles findunt. Folia Laurinjs imilia, fumma, parts impense acuminata. Proveniunt in humectis imbrofifque IDCIS, Btarbonbiik' advolvuntur. Uius radicis in venenatis moribus 5c pDtionibus, fed lentē op eza cur.

29. *Arbox Laurifolia Sinenjis Martja AtL Sinic*

Arbor est procerā Kmagna, foliis Lauri similibus. Inramorum summitatibus racemi prodeunt, rily guiUW *uxinjvis fufius*, led ran or in Ion zis pedunculis depended figurā Cocculij magnitudine Nucis Juglandis nuci Pines parvae amides, Iquamofa cortic&ad membranx crassit̄m accedente, cui incus nucleus licculentus^ albi coloris, odorisac Japoris rofacei. - Maturus purpurei est coloris- Officuliim intra carnem occultat. Vacant Sinsfes *Lhbi* > Lufitani *Lhhias*. Nascitur in *Foqukn*§ prarcipue in *Fochm* metropolis territorio copiofe. Nucleus ad infar tragematis rolacei congelatili-

Eft Sc altera ibidem, quae flores \S*uzi prafsrt, arbor proceraj foliis Lauri aut C inn a mo mi. Flos minimus, flavus, in racemulos difperfus, lbaviffiroi odorisj apertus in ipfa arbore diu perftat integer, nee flaccescit. Ubi decidit, lriterjefto mehfs fpacio, repullulante arbore rurliim novus Accumnali tempore gignitur: Turcx Limonum fucco maceratum ad tin genius equorum crines adhibent- >I f* k imik* ^Uaāa ex so. Prod it per totam i-egionem copioliffimū in *Quanjrji*.

JVddi hiftipotest&uftus Sihonfis L.ww^c*Tea DracDnis oculusdiAuSj fupiore minor, corticis du- JJQF^ .TOagi^Defqaamoiaj-ex. quo liquor^ vinuiri incolifSj exprimitur^ fed ranui. Diftrahitur P^ totum impenunij led iucco evanef^ence non tarn gratus.

; hid. De ad.

. z^Arbor *Uvifefabactnfis** De Last.

Matei-je & Fibra ligni *Brafiliani* infar: folia pacae orbiculata^ fructus Cys haud diflimilis, ft'' poris graciffim. Nascitur potiffimum juxta litora.

*Ind. uccid.

21. *Igciga& Iptairvka** DB Last.

Illaproducit/pedem Maftiche gratiffimis odoris; cortice illius contufb edit liquorem quandam album^ qui condenlatu^ fupplet vicem thurisj &c emplafiro adhibetur utilisr in affe&ibus frigidis. Eft Sc alia ejufd̄ni fpecies quam Igtajgicamj id est^Maftichenduram infar lapidis_ appellat; adeo ehim dura Be pellubida^ est illius r^fina^ ut psene vitrum etfc videatur: Barbari com- Diunitr-utumur ilia ad hftilia vaia in ^ru ft an da.

3X. *Ambulon Scalgva C. B. 432.*

Scal.

Amchit infula fert arborsm.,. cujus c̄ carric?fructu5 e^it. car^didu^j Sajechari ipecie, Be magnitudine *Coriandri*, *Ambulon* ei nomen est-

*Ind. Occid.

JJ. *Ovajerova Moragnanx* *De Last.*

(10. r. u.

Arbor est altafic vaftaj fdiis *Quercus*, fed paulo majoribus floribus dilute flave/centibus. Fm- ftum fertj pedem longum, majorib. melonib. parsm, extra Be intus flavLinij fuaviffimiBe fragran- tiffimi odoris, fed exihbus *Si* nigricantibus nudejs plenun).

*HiJt. Exot.

34. *Texofitifera Mexican** * *Nieretnberg.*

l. 14. c. 6i.

Arbor est mediocris, permultis Tpinis horrens, foliis Mai or dm noftratium fed afeperioribus &* &- ratis. Mala tert noftratibus Juiiha fed parva, nee nucibus Juglandibus majora^ lutea^ ante n^2 z curitatem przdura, poftquam maturuere adipi mplitudine quadam paria, ingrato Japore, fed 19¹¹¹ a mulris non habetur inliiavis. • Semen [quod in fingulis pomis triplex) lunaturn, magnum, bus angulis &c uno dpr/o, infigne, lapidi duritie ngn cedid. Mexicaniper miffa prius ut p p 1 empriifvenditant. Diutius ut in corrupta ftrVentura aqua niri confyergunt. Germina tufa aquafumpta exanthematis medentur. Montofc locis ipontepDVemt.

• Lid. Dccid.

3 5- *Pacourii infuU Maragnane* * De Lael

i: S: r. 11.

Vafta est arbor, Pomi frondibus, flore albo, fruftu duorum pugnorum magnitudine, corticis midium pollicemcraffo: bijios aut ternos haud infuaves nucleos continet- Cortex coftu^ ut charo condituj in delidis.

• Hid.

. 3 6- *Wamcaht infula Maragnana** * De Laet.

Magnitudine, frondibus, floribus atque fruftibus a Porno non multum abludiv. Sunt i ted nuclei ob infignem aenimonjam non manduntur.

37. *UwCava ejufdem infula* * DeLaet.

*JW,

Pomi arboris eft magnitudine; frondes Aurantia:, ftas fubcroceus; fructus infar ovi oblongus, flavus, Be palato gratus.

58. *Uva-pyrtp ejufdem infula* * De Last.

* ^^

Arbor eft aculeata, Foliis Juglandis, floribus è flavo, ramleo Ec rubrD colors eleganter diffintis, Fruftus, quern fert orbicularem flc msnfis pergratum, nonnifi pluviis menfibus decerpitur.

59. *Lycos fruttus in infula Magador, in arboris ramis & foliis carentis cacumim futamim fibrolo; nucfeo Amygdalino fart.%Ind.Uccid,m Fr. capitis magnitudim C. B.*

40. *Igbucawi Brafilianorum* * Ds Laet.

*ind. Occid.
I. 11. = 9.

Arbor eft prxfectura S. Vincentii perFamiliaris- FerC fructum exiguis Mali's fimilm, intus exiguigranis refercum, pr^fentiffimum [uc fertur) advclrus dylentBriam remedium.

41. *Melocorcopali Scaligero- Evrcopal Theretò* Lugd.

A Corcopal Indiae provincia nomen fiimpfic. Cydonix eft magnitudins & Foliis. Prsgrandem gcrir fru6cum, Mdoms figurã, eodSmque fulcaum modoj intra quem terna quaternãve grana, acinorum uvx facie, acore Cerafi. Eft Sc edendo quia fuaviffimus, Be ad medicinas quia pravos humors5 per alvum expurgac utilis. Ex notninis idencitate Carcapuli eandem lufpicamur.

41. *^uanhyyac OcuiUnfium* * Nuremberg.

Arbor eft magna, ferens Mali Medium folia, fed tamen auuminata. Cortex adfringic, gravem odoremfpiratjcalidaque & ficca confac temperic Fluxum alvi coerccet ac elicit fudorem. Nari-bus Infillatus fuccus liernutamentum excitatj caput purgat^ atque ita febres tollit it capitis arcet dulurem; quarum rsrum gracia in annuos ufus recondi conLlievic, Nalbitur Ocuilse faxoHs locis.

..a
H^, i^ c. 74,

43. *Feguza Brafilimfium* * DeLaet. *Pequeaftvc Pekia Pifonis, dequafupra.*

*Ind,occid.
I. 15. c.7-

Duas flint (pecks, *Una frii^m Ar^ntiq m^lo* fimilm, craffo corcicej quo me lleus quidam cum faccharo certans dulcedine humor continetur, cui nuclei aliquot fiintpermixtij productit. A^cerius lignum (quod Lufitanis *Setim*) omnium qua: in Brafilia nafcuntur duriffimum 6c graviffimum, idemque omni5 putr^dinis expers judieatur; proinde navibus fabricandis expetitit.

44. *Gojavz Maragnana* infula* * De Laet.

* j ^ Deci^
I. 16. c. 11.

Fruticis eft fpecies qua: arbores complettitur, folib Campanellz, flore eleganti 8c palmum latoj echinatis 8c ftella: in modum diduftis foliis, purpurei colons, Frmaura fsrt ovi magniciuinc, Ted rotundioiemj granis plenum.

45. *XJ^va^uytou ejufdym infuljg* De Laet *ibid.*

Folia fert longa, flores BtEru^s,, fructus A w ^ iis baud abfimUcs, fed fuaviores.

DeLaet ibid.

Frondebis eft Pomi fed magis patulis; floribus c luteo 8c rubro mixtis. Fert fmftutn Malo Aurantiu forma Sc fapore haud diffimilem, nudeis plenum.

47. *Vznm Simnfiium* Martin. Atl. Sinenf *Lufitanis* Jamboa.

Arbor (pinofã, Limonia^ major : flores albi iuaviffimi odoris. Fruftus capitis magnitudine: cui cortex Pomorum aureorum, pulpa rubelcetiSj uvac non omninu mature fapore, qui fufpenfus domi ad annum durat. Provenitin *Fokien*. Ex floribus fragrantiffima aqua elicitor. Ex frui2u liquor pro potu exprimi folet.

48- *Pytabaia* * Nieremberg.

* H^f. E. 11.
I. 14. c. 11.

In fcifliiris iãxorum nafdixir. Odit pingup icftum: fructus acro-dulci mixtus, lapidus quemadmodum malum Punicum: Ruhri colons intus Be extra eft: Malum aursum xquat magnitudine.

49. *Pekey inful* Adarignana* * I?e Lagt. *vadm. wdttWJW Pe^* J?H^fM* & *S***

* Jw / DecitL
U 16. Cm 11"

Tarn craffum habet truncum, ut vix trium quatuorve homjnum complexii ambiri poffit. Fron-des fert Pruni; fructus duorum pugnorum magnitudine, cortice craffo duroque, qui intus tres quatuorvefructus, luteos, forma renis, optimi odoris, faporis non ingrati, offe aculeato continet.

50. *Agouti trma zjufdem infulus De Laet ibidem.*

Foliis est Aurantiorum, fed levioribus, faribus rofcidis, fructu amplo, cortice viridiore. Concludit incus acinos Granatorum infar, exiles, dulces Be palato non ingratos.

51. *Uhebebañiu Thzvzi J. B. Arbor Braffix folio excelfijima Americana C. B.*

Mirar altitudinis est arbor, cujus rami alii aliis subeunt, folia habet Brafficz: firgulos ramos oneranc fructus pedem longi: fert Be eadem gummi rubrum. Dum in America efflet Thevetus, iek. m. p. ab CD loco quo subfitebat, obfervatam fibi hanc arborem tradit, quam eminus artificio pDtius quam naturá Arburamur quilpam effitam.

Ad hujus arboris fructum finguir) innumerae convolant apes ex eo alimentum petentes, in Foramen ejufliem arboris fe recipientes, ubi mellificio & cerae incumbunt, Harum apum duo genera defcribit, Alii nostrarum apum magnitudine funt, qua: mel optimum conficiunt, ceram flavam. Aliud genus dimidio minus, quarum mel bonitate fiiperat, cera t?imen carbonis infar nigrz est. Harum favos depopulatur beftia qliaedam *Hurat dhSa Tamand** Beftia mellis, de qua agere non est hujus loci.

Fructus *Uhebafo* quam vis ab apibus appetatur, hominibus tam en non est edulis, propterea quod non fit nisi in maturo loco.

* Lib. i. cap. f 1. *Timpinkhi arbor lafffeens* * J. B. 68.

In omnibus continens Indiae oris (inquit Monardes) lafteus quidam fuccus elicatur exarbufeulis Malorum iimilitudine; Indi *Pimpinicbi* vacant, r cujus ramis recis lafteus humor illico manat aliquantulum denfus & c viscofus.

Hujus fucci trss aut quatuor guttx fumptz validiffime per alvum purgancibilem & c aquas: Bibitur ex vino aut deficcato pulvis deglutitur, pauca quantitate propter nimiam vehementiam. Vino aut jufculo affumpto ejus operatio infringitur Be ceflac fubito. Idem traditur de Ritino Indico *HwandzTj.*

52. *Arbor vinifera Coutm, Juglandi Jimilis J. B.*

In Canada provenit arbor (inquit Thevetus) craffitudine Be figurá fimilis Juglandis, cujus ufus diuincogniclis manfitj donee quidam exfeindendo arborem obfervavic fluere iicum boni laporis, qualis optimi vini Aureliansntis aut Beaunsntis. Ejus fucci iubitú collegerunt quatuoraut quinqus magnas amphoras.

54. *Arbor Braflia-na Juglandi fimilis nucibus carens C. B. Lignum Copau firrh Juglandis tig* no J. B.*

Scribit Leri in Braflia provenire lignum, quoniam n^m^xAnt c^^^u cujus arbor fimilis quodam modD Juglandi, non umeti nuce ferens. Aflicres, uti vidit, pro utcnfilibus adapfati cafdem cum Juglande venas five fibras habent.

5J. *Arbor tin ft oria J. B.*

Thevet.

Glandiferarum noRrarum craffitudine est, fructum ferens Daftyliis parem, ex cujus nudo oleum exprimitur^ miris virtutibus prxditum. Aquae permittum earn croceo colfite plane inficit^ quo ringunt pocula ac pileos quofdam ex Junci vel Dryza: palcis contextos. Prateea id oleum odors est VIDIZ Martin olei noftri lapore. Quamobrem multi piiccs, Oryzam aliófqe cibos co condiunt.

Lvau.

Oritur in Senegx regno ubi iEchiopes degunt.

56. *Baxana arbor venevata J. B. Arbor fruttu wtnato, radicz vtnonontm antidote CB-*

In infula deferta prope *Ormuz*, Queionne diéta arbör est *Baxana*, cujus fructus vel minimum gultatus moxluffocat: id quod ipJlus ctiam umbra przftat, (iquis vel quadrantem horx sub ea noretur. Cum tam en alns in regionibus cjufdem arboris radix venenorum omnium (it Antidote illic lechalis, necnon fle folium iplius & fructus qui *Rabuxit* vocatur. Hzc nobis non veriiimilia.

57. *Jwwi Amaz, 9tium Clul! Arbor txotiw foliis alatis C. B.*

Lluj.

Hu/us fpecimen accipiebat Clufius, terces, inzquales, angulofos bacillos, rufcentes, in quibus inter bin as appendices alternis nafcebancur alata folia, five verius alx tenuiffimx & c firmiffimx y yuagnis Be plunbus fuliolis iingula lacera occupantibus pra:dix; ut avicularum pennas opinari quam poffetj magna quidem ex parte deciderant ilia, veftigia tamen ubi hacfillent faris adhuc & nifefté apparebanr. Iftis alls tanquam penigillo nubiliow inedsc uti dicebantur ad corpora W variis colonbus pin gen da.

58. *Miftpi, nonnuUis InZis Cajahaba* C.B. Cluf Exot. l. 4. c. 14.

Ad arbores fe applicars Hedera: inftar referebant nautse, ejuſq; adhuc viridis 8c recentis taleas
»b incolis cenuiter contundi, U ftupra.rafturas alligari; ofla enim frada ferruminare. Interné niul-
tis fibris cDnftabat fructum ad Clulmm miflum, quibus mcolas utiincellige bac ad coJligAnda tigna ia
luis xdificiis.

59. *Frutex India Orient alts Lavendul* folio* C. B. *Arbor Lavndula folio* J. B.

Admiranda hanc erat arboreti frutex, cujus ramiolum petuum longitudinem non excedebat;
officudinis diametere circiter duarum unciarum erat; cujus de friffum in nodofitas caput non-
nihil extuberans deiinebat, è quo feſquipedales quinque minorea rami profiliebant, adsb eleganti
ierje ac ordins difpofiti quafi humanâ indutria fuiſſent infiti, inferiori ramo facie quidem fimiles,
fed molliores magifque licculenti. In horum cDmolis faſtiis o//^ adhuc inharrebant, virencia, for-
mâ, magnitudine &c colors Lavendular folia valde referencia,, fedfucci plena, arotmaticum quid-
piam ſpirantia/ medium inter Angelica? lylveſtns radicem, gummi quod vbcant Elemi, BcKuni-
gundis herbam qualibus totum ramum veſticum fuiſſe ipla in ramis veſtigia indidum faciebant.
Quantum verò exrefeftions ramorum Cluſio colligere licebatj denâ ipiffaque medullâ inftar Sam-
buçi ram Drum pr^diti fuiſſe videbantur.

Ex India Dnentali in Angliam delacus eſt hie frutex, 6c à Jac. Gareto ad Cluſium tranſmiſſus. *Vires:*

6^ *Oxyacantha Arnzrkan** *Galli calcar ditfa*R.S. *Muf. An Mfiful Virginia frnttu coccineo*
D. Plucknet.

•• Huju5 baculus ulnam longus, abſque ullis enacis ramis in Muſeo Reg. Societ. affervatur, diametra
unciali, cDnſſitentiâ feu ibliditate Ligni Oxyacanthini, ſpinis validis cinſtuſj alternatim undique
poficis, eo ordine afcendendoj ut in eodem latere iuperior ab inferiore 45: circicer diftet;
craftitie Galli calcaris majoris; 6c reſtiffimae; non merè corticales ut in *Rnbo Be Uva* criſpa, fed ex
ipſo bgno egreflz ut in *Oxyacantha* vulg.

Hujus Oxyacanthac feu Mepili folia 6c fructus ad me tranſmiſſi ingenioſſimus Vir T).Sam. Doodji
folia denticulata. 5 pin a eſt craftitie Scfigura Galli calcaris: fru<StusSorbi aucupariz baccamrefert.

Planta In die a fanguine a panacea Park: l. e- VI. *fanguine as fudvrt excitans* Monard. in *Epif** C B.
Htrba mortem aut vitamin morbis prantmtians Monard. Lugd- C B. *Arbor Vzrvrzos ftimu**
los domans in Epif. ad Monard. C. 13.

De his confulatur Monardes^ apud quern nulls earum defcriptiortes occurrunt: Mihi certè magna
ex partefabulz videntur ejuſmodi narration^ Idem diftum ſie de Arbore aquam fundente.

Herba hdica ad ruptutas utilis Monard. Park.

Hnjj5formam obſervare non potuit Monardes, tantum dicit miram habere faciilitatem in ruptu-
lis puerorum SCadul Drum, eique ufum Indum quendam recenci concufa Berupcurz impofica^ adhi-
bito miro quodam ligaturar gencrc, quo fine braccis non minus firmicer ligaci incedunc quam ſi braci-
cati eſſent. Fortaſſe ligatura Ibla ad curam iiffcciflet fine herba.

CAP. VIII

Atbores Papyriferte.

I. *Papyracea arbor Guaiabara* J.B. *Guaiabara in infula Hifpaaiaola ex Oviedo* Lugd. Q B.

Ovied.

Hifpanis Vvero diſta eſt haccarbor ab uvis, quod pro fructu uvas ferat. Materia eſt rube-
(cente, rotunda, denla, atque ideo optima, praefertim ad carbonem, ramis expands.
Uvas edit rarius ſparſas, atque a ſefe diſtinſtas, Moris ſere concolores, exigua earum
pajte el'culenta; nam Acini ſunt Avellanae nucis magnitudine, nucleum tarn craftum concludentes,
uc parum carnis ſuperſit. Folium maximum", palms manûs magnitudine par eſt, viride, aliquando
rubrum, craftum & acq; ſpiffum ut eſſe poſſunt duo Heierz Folia limul junſta. Hiſpani in Hilpani-
ola eo pro charta utebantur, tarn prona quam liipina parts literas aciula pingentes, modo recens
eſt folium Be eodem die decerptum: venulac autcm cum tenues ſint, Icribentis manum parum auc
nihil rsmorancur- J. B. ex Oviedo.

i. *Papyracta arbor Cop&ia* J. B. *Copey in infula Hiftanioh* C. B. *Copzia* ~~Amſterdam~~ *Nuremberg.*
Dvied.

Guaiabara procerior eſt; folio ſpecie quidem fimili fed duplo majore [ſpithamxum latitudineK
rotundum ferè] craftiore, Be ad lenbendum apnore cum acicula aut ſtylo ; &c quod venula: tenuiores
ſunt minus ſenbenti impedimentum afferunt. Chart* luſoria: ex illis ab Hiſpanis ſiebant. Fructus
parvus cftutiPrunum, eſſii fatis aptum. Exhau at bore pix non aliter elickur quam bFmvi. Vide
Nuremberg. Hiſt. Exot. lib. 14. cap. &§.

Nnnnnn z

Papyracea

Papyracea arbor amplijvnis & tmuijimis foliis Nic. Cdftini apud J.F. A & C. 5. noil alia esse videtur quam Ckww Malabarenfium, quamvis Papyri ulim Malabaribus aut Ceylonenfibus paritare non legerim.

Papyracea arbor *Tal.* in provincia Magni J.B. C.B. quaenam arbor fit ex iriiperfecta & obfcra defcriptione Theveti colligi nequ. Quod dicit chares Lium praefare in tota India, Palmam Lwckr diffam effluipicari quis poflet.

5. -XijTM* *Martyris* Nicremberg- /-14. c. 86. *Arbor Papyrifera* Xajuz difa.

Non multum differt à Muza. Habet folia tam grandia ut quodque à pluvia tutetur in raput pertentum hominem totum ac filaneam penulam tergo injeciflet. Mirum quod de so scribitur, Folio à radice qua est rbori compactum erud (facile namqu5 per demiflam cuiusdem captum folium detrahic ab arbors) in interiors illius teigo philyra albuminis ovi pelliculis familis reperitur Candida; ea, uc ex aricis juguJati corpore pelliSj excoriatur, tolliturque afuo eortice Integra, nihild minor Arietina vel capina membrana, cujus opeia utiuitur omnes ac fi membranas iplas afleque-ientui neque minus tenacsm eTe iniquiunc eam philyra m. Forcipibus tan tum fcindunt quantum ad prEentemfcribendineceffitatemfuffidat, Fruftusporcospinguefacitj clique hominibus incdm- mudui Palmar potius quam Muxfpecies videtur.

4. <-F* *pjrus arborea tmuijima ex Jvva* J. B. *Tapyrus ex Java* C. B.

Cluf

Librum arborisfcribit Clulius habuiffe fe, tenuillimz membrane infar candidum; quo omnis generis fcriptura perind^ atque vulgan Papyro excipi queat. Eum in Java infila aliarum mercium permutatione Franc. Draci comites acceperunt. Anpannus elibro arboris quo in inlula *Tidore* freminz pudenda tegunt; qui hoc modcf fit. Delibratur cortex^ 8c aqua maceratus donee mollefcit lignotilhditur, atque quahbet longitudine ac latitudine dducitUTj ad^o tenuiter^ utSerici vehinfar venis tranlverfim difcurrentibus contextus videatur. *Figafita.*

j. *Vapyracta, arbor cujtH lihnr fuipmicei color is* J. B. *Arbwis liber fubpunice coloru* C. B.
CluJ'.

Libri hnjus fragmencum Elulio dercriptum pedalis fer£ longitudinis crat, quatuor uncial ktum, adeo laevis ubique Be aquabilu fuperficieij ut ne charta quidem fcriptoria magis xqualis fit. Id rar metfi neque denflun, nequecrallum in 6tamen pagellas nulla difficultate feparari potuit, qua: perbellè firipuram admitterentperinde ac charta fcriptoria, nee atramentum tranfmitterent. Et.ficiuis (Inquit) majorsm curam in feparando adhibere voluiffet, in plures adhuc pagellas haud dubie dividers potuiffet.

6. *Filum arboreum Xenulfiuuin & candidijimum* J. B.

Candidiffimi fili glomus à Gareto ad Clufium miflus quern ex arboris eortice confettutn. fcribatj candidiffimisj validis tamen ftaminibus confabat, filo atiam à Lino auc Canaabe dedudolongè validionbus, v pedeslongis, exuna parte refciais, ut longiora fuille yeriffimils ellec, ex quibus vittu acfamilia admuliebrnci ornatum pertinentia commodiffim^ fieri poffent. *Cluf. ExvTA** 1. c.4. Hu)ulm)di filiflamina ex Anglia habuit J. B. tres ulna^ longa^ alba, Serici modo cenuia 6cfirma: non munitus iudicaret eTe Cannabina.

CAP. IX,

*Arbor fzbrifuga Perwiana China China & ^qineptina & Gannaperide ditte, Hijpanis Talos defa-
lentura, Cortex arboris Cortex Yerwianus vulgo dicitur, inque vul'verem rzdactxs Pulvis Fatrtf*
[Sci. Jefuitarurn] & Pulvis Cardinalis de Lugo. AngL (\$IX)Z rluits 30101011.*

HUJ5 arboris ramuli iconcm ex Italia adRegiam Soc. Lond. miffam opbis communicant Cl. Vir. D. *Goodall* M. D. qux vera Be genuina videtlir; maximè quod conveniat cum defcripciDne *D.Badi*, qui fe iconcm arboris exaftamRomx, e' Collegia Romano JcJuitarum naftam refert. Videtur Jinquic) hzc arbor aliquam habere fimilitudinem cum noftratibus. *Cluf. folia* ejus videtur Jimilia cum his qua: funt Prunorum rubeorum, fci. nec nimium patulis, nec acuminatiSj praterea filamentis intextuntur ambo, feper lineas finduntur. In flonbus videtur miffi convenit e cum floribus Malorum Punicorum, qui calculum coronacum referunt. Hanc aliqui andn unà cum aliis in2:5 incifanij Deo voleiue, p^iblico exhibere cogitamus.

AntoniusBcillLisMercatDredebrisj honeftus vir, qui multos annos in Pemvia commoratus; eMv & hiftonamarboi5 Italic5 con/criptam publicavit, referenteBollo, nafci eam aitinRegno Quiccnfi, peculiar! quodam loco, nui patno Indorum fermone dicitur *Loxa* fwi Loiaj diftatque 60 Jsucas ab urbe *uito*: locupique oDtinere inter montium coronam.

Vir.

Corricis pulvis debita dofi exhibitus adversus febres omnes intermittentes tutumj certum K minim fallax eft remedium, etiam experientia noftri. Egregius Vir D. *Thomas Sydtmham* M.D. *Cluf. Fcbres* ititermircntes Specificum vocat, cujus ope nos nunc temporis tum humoies ilia: na quatuor rcdundantia febiuin e(fnciam CDlocabant medici prioi eSj tum eriam Dizrani K ruzioz qnnd-
cunque fufque deque habemes, ac nihil nifi iietKodum pulveri exhibendo debiram DDIBV antes
Ibopumrefa attingimm, vix ab illu abeirantes unquam nifi argruni lefto nulla necellitace
dicimus dum in ejus ulu eft. Tanta tameu eft hujus remedn vis, w non obtaijre 50 uicwnn

quòd fci. Febris à le&i calore plus quam erat opus intendatur, segrim nihilominus ad fanitatem uclurimum reducat.

Pulverem hunc ante tnginta annos, cuni prlmo in Ailgliam Inv^dus efler, ad februm intermittentium curationem in magna exiftimatione & frequenti ufq; fuifle memini. Verum animadverib; eiinj quòd fci.riimis parca dofi exhiberetur, paroxyfmum tantum unum vel alteruiri aitt forte plures-avertere, necfebrem penitus expugnarej verum argrotimi plenmq; reeidivam pati; ob fufpiciones nefcio quas in carnen adduci. etEpit, & paiillatim in defuetudinem abire: Donee nuperis annis D. Roberti Tabor, dofi ejusvalde aufta, rion minus felici fuceffii quam incepto adaGi, Fcbribus omnibus profligatis, ufum refocitavit. Hie enimnonintra fcrupulos fubfiftebat/fed ad drachmas & uncias afcend&bat, indeq; voti compos fa&us, magnam& libi &c pulven famam conciliabat.

Vinum Gallieum acorticePeriianomtra breve tempus rubore pellucido tingitur, ut & pluviialis aqua,, (ed^iluto magis^ reftificatus autem vim fpiritus multo intenfiore: hinc ut pateat hijnc (piri- turn corticis Peruanj tinfura: extrahendae gejuinum menftruum efler. Notatu lignum tinfuram^ifti fbbres fedandas squè efficacrn efler ac corcicem, qui extrafta liiptaurà viribus deftitutts repentur. Antonim^ iu Hade in Centuria Obfervationum Obf 70. Ycrum quieqmd dicat hie autor, ega [D- Hulfè] aliiq; media quibufcum conlietudinem habui corticis pulverem in iibftaritia cxbibitum ^fficaiffimum efler femper comperinlus, etiam adversus contumaciffimas febres & qux infufo ejus iiiiiniè Cedebant- Quiin &infigniffimus Vir D.Martim Lifter M. D. mihi aferquit infuium nihil valere, totdrtique ejus operationem fibtilioribus bulvens Dartibus in liauore adhuu a defitcacione xefiduis deberi.

Ab eodem etiam edoitus lum pulverem corticis vetuftions expenentia prbpria non minus-effHacemefle ad profligandas febres quim recentis, aliquoetiam relped:u compmdioremj fiquidem diurnitate cempbris vis illi cathartica quae in recenti obfei*vaturj 8c aquess ut verifimile efl t>artu inhsret, paulatim evanefcit.

.r D. Sponvi libra Obfervationum [urhrjkwcs &Ats febrifugis, fe accurata & diligent!inquihitque KablEa coitiperiflè ait, Coititem Peruyiarium didtum non trunci aut ramorum arboris efler, fed radicum; illorum enim, ut in particulis quibuldam ad fe miffis expertus efl, minime amarum efler. Quae obfervatio alicujus uius efler poteft iis qui in nbltro orbe hujis corticis luccedaneum quzrunti Ego (inquit) nonriullarurn peniculum feci. Radicum Periac cortex alperitatis multum obtinet, parum ar maroris; unde apparet conducers eum ad diaiTheEam: Radicum Fraxini pariter asperitatis pludmum & aCredtnis pungentis ob copiam Salium quam continet, quae febrifugam iuam vim ei confert: Denique Cerafi nigrese radicum cortices 5c asperitatis^Sc amaroris parricipes fiint; earum itaque pulvis in febreduartana exhibitus illam quidem diminiuit^ jion tamen planè fultulit; ut nondubitem Etim debito modo ufiirpatum, & iuftadofi exhibitum ad:febresianapda5 uciliffimum fore. Qgi plu^ radehoc Corticevelinu, confidant medicos qui de eo ex profeffo fcriplerunt-

Nos cbmitionefecit D. Tancrefos Robnfon^styLm^D. iconetn folli arboris febrifuge in Mufaeo G- Viri D- G. Courtine afervatam non bene quadrare figure D. GoddaR, Sc D. Redi, quia folium non liGjue adeo acuminatum, led acutiis & fubrotundiim efler videtur, quale fere cernitur in Ponnd Be Tfitroti^Formd Hort, MaJab. quae in India appellatur Kina abIndigenis, ex obfervatione ejufdem AmicL Sunt qui dicunt eandem femini^arbons (quod Hifpani Patrio iermone Pipitas di Quima voclnt) fiigandarum februm vim ineffe i eflque fimile (ut aiunt) femini cucurbitis: Alii dicunt Pipitas fru^him efler illius arboris; addunt etiam refinam quoque ineffe arbori, nefcio an ejufdem virtutis cum cortice & lemene, fruftula quandoq; ligjij admifcentur cum cortice, fed nulla amantie aut viribnsdonantur. Obfervavit Bollus arbores febrifugas Peruyianas plerunq; omni cortice fine nuxa (poliatas cerni, quod & Suberi commune ell-quod fie potius juvatur exuta,, ut fcrihit Piinius.

CAP. X.

Fruicuh; Alpinis floribu umbellatis folio Spiraafinore & angufioli.*

SEmpedalem altitudinem aut fpthamisam vix excedit, virgulis pluribus aflurgens teretibus, rabentibus^ foliis veltitis altematim pofitis, non admodum crebris,lelcunciam longis^femuticias latis, aijutis mucronibus, ad margines ferratis, denticulis acutis non tainen aequalibusj glabris Quantum in ficca difcemere licet. Summas Virgulas occupant flares velut ill umbellas difpofiti, qui cum plantulam invenimus Septembri hienfe jam praeterierant. Semina ut & vafcula isminalia quah lia fint ob parvitatem eximiam jin ficca dare difcerilere non poffumus.

Hanc ftirpem itinere à Vienna ad Vnetias in fummis Alpihus loco confragolb prope Pontebam Locutl Imperialem didtum oppidum invenin^us cum aliis multis ranoribtSi Cui per ea loca ker facient, cam inveftigent, diligentiùs obfervent & defcribant.

CAP. XI.

Arbores drFrutices rari & exoticid nobis nupzrrim obfwvati in horto cultiffimonoviffue & degantioribm magno (ludio ntc minori-impensa undique conquijitis ftirpibus refztijjimo RwerendiJJirni Domini D. Henrid Compton Epifcopi Londinenfis, qui & ipfe, quoties à gravioribus curis vacat iis contmptlandis animwn obleEtat, & aliis curiosis & induftriis libero ad eas obftrvandas dtfcribnddfyue aditu permiffb Hiftori* Ylant arum augznd* iUuftrand<eqe dtjgnat.

1. *Angdica arbortfczns]pinofa> feu Arbor Indie* Fraxini folio, cortice fpinofa.*

HJEC folia habet ampliffima, ramofa ad inftar Angelicas; Lobi feu folia partialia licxxmuhj fed glabriora; coftz foliorum fpinis obftitae funtj non admodum crebris, sft 3t trunuus arboris. Foliorum infiper pediculi latiufulca & velut membranacea bafi caudici &c ramis adnexi flint. Folia hysme dsddunt. Vidimus in horto Chslfeiano hujus gsnrsif arborsm^ quz ftarurâ humanam altitudinsm^ craflitie brachium fupsrabat^ fumma parts in ramos dilvilam. Sunt autcm germina feu furculi, quos quotannis emittit, admodum craflifj foliis urebris obfti. In quantam altitudinem excrefcataj quo aztatis fux anno florsre indpiatj cujufmodi florsin ^ fruftum producat, quâmqus diu durec nefcimus: umbelliferam Camen effe fiifpicamur.

A D.Baniftsr c Virginia cranfmilla eft.

2. *Arbor Tulipifera Virginiana tripartito Auerisfulio^ mzdii UziniA vdut abfcijid.*

H

In pncipio Juglandis armulam arborem adolefcit^ cortice [in junioribus arboribus] aliquot dneraceis maculis afspratOj odorisignavi aromatici^ nonnihl ad Sajjafras accedsntis^ materis pallida^ molli, medullâ paucâ ruffâ. Ramos fpargic inaequales, ordine inconcinno: ad quorum nodos c digitalibus pediculis prodeunt folia inftar Acens minoris^ trilobata^mtida, quail forties eiTentrefsta, palmum arapla, fupern^ vindia, inferne in can a, aliquotqus nervis exdorfo craffiore prods utibus inferipta, fupcfiori Be intermedia lobo productiori, frontatoj, binis lateralibus in parvum obtufum mucronem abeuntibus- Singulos vero ramDS g^ fcJia exdudit parva oblonga thsta, in duas foliaceas pinnas dchifcens, quae ramis Be foliis adolefcitibus exarsfuunt & decidunt. Fhru forniofiffimosTulipisliiTihs profsrjtj quos ficcatos vidimus. Floribus omnium quos confuluimus Virginia incolarum Bcadvenarum confenfu fuccedunt pro fruftu Coni ercti^fle ut videtur ^uamofi, fub fin-gulis fquami5 bina fsminaj alis msmbranaceis dñata, utin aliis Uoniferis daudentss. Huic vb convsnientiam in partibus prscipuis adjungemus aliam, quamvis in horto prsdifto non repcriatur,

3. *Arbor Tulipifera Virginiana Acer is tnajvr is folio, corns eretfa.*

Arbor hare 4 precedents differt foliis in pluresJarjnas, jninũstamen prpfundè fèftis; media: lacjniz apice tancum, coqoc non ut in praecedentè redta propomodum linsâ abfcifto^ fsd angulu obtuic incifa. In medio flore coni ru dim in turn tonfpeximus.

Hujus ramulum ficcum vidimus apud illuftrsm Virum D. Gulkrrwm Courtine Msdii Tsmpli LoA(L

4. *Laurus Tvlipifera foliis fubtus ex cinem aut argent eo pur pur ant ihus.*

Hujus arboris folium turn formâ fuâ, turn confiflntia Bcglabritis ad Lauri folium accedit, p^irits ad margines equals &c minima incifum, verum prona: fiiperficiet coloris ex argenteo pulchrè purpurafcsnte ab eodem differt. Flurem autcm ipedoJumTulipa: zmulum profsrcc nomen arbori impfficum indicat. Fruftus hujus non conus sft ut praesdentium, fed bacca calyculataj autors D. Jo. Baniftsr, qui Arborem ipJanij m fallor, Laurum Tulipifram baeds calyculatis inrpfif.

5. *Zdrn a'Goafalso'dic^ta> rittiùs Sabina Goeyfs.*

H*c arbor ijec Cedrus eft, neque Juniperus, fsd potiùsSabinzIndict Speciss. Non enimbaCca5 producit, fsd cunos è fquamis compactos, aliarum Conifsrarum inftar. Folia, odor, fruftUSj

• Ex obferva--[qua& Sabina: vulgari ftenli credits * conulus fquamofus eft) Sabins fpecimefle arguunt. none acuuraca Hanc arborem in Hiftuna ex fententia Hermanni pro Juniperi fpecis defcripfimus.

6. *Nux Juglam Virginiana nigra.*

Hujus in hiftoriajuglandium fiiperius mentionem fsdmus, eamqus D. P. Hermans in Catalogo plenius dscribit: cujus defcriptioni adde Folia b duplo plunbus pinnarum conjugationibus vulgaris Juglandis componi. Nam cim vulgaris noftratis folia quatuor duntaxat paribus conit Virginiani hujus ofto plunmum componuntur: funt stiam pinnule tñnorssScpsr ambitumi le colors viridiorc j ut cum arborsm primò vidsrem Juglandis fpedem effs vix credsr potusrim: r quamdeibriptionsmvids in Appendics.

7. *Arbor exoticafoliis Fraxini inftar pinnatis, & furratis> Ntgundo ptrpzra** crdtta**

Folia, quatenus obfsvavimus in plarita juniors^ duabus pinnarum conjugatiDnibus conl [partial] impari extremam coftam quibu^ pinni adnexac func, terminame- Pinn^lingui

nearum magnitudine aut ampliores, in acutos mucrones exeunt, dentibusque majoribus Be etiam minoribus inordinatis obiter incili flint, iumpra praefertim parts- Folium impar, quod diximus, extremam costam terminans ab angusto principio fenim dlatatur ultra rnediam partem. E *Virginid* (ni fallo) delata fuic.

An Arbor hæg Garcia Be Acoftx Nfegundo fit nefdmus: Folia ab eorum defcriptionibus ablundunt.

8. *Styrax arbor Virginiana Accra folioy fotius Platanus Virginiana Styraclm fundeni.*

Folia quinquepartita divilura ad Aceris accedunt, media lacinia produftiore, per ambitum ferrata, majora paulo, longispedunculis nixa, nervis purpurafcentibus. Fructus pilulis sunt rotundar, Platani pilulis fimiles, proinde ad Platani genus flobis referenda videtur.

Plenam sc a ecu ra tarn hujus aliarumque ftirpium Virginianarum defcriptionem Be hiftuiam ab exitnio Butanico D. *Joan. Banifier* expelliamus.

9. *Corylus maxima folio lattijimo Virginiana.*

Hujus virgas tantum juniores & folia vidimus, quia & fortia & confilientialua textura feu ad Coryli fcJia proximè accedunt.

Lpto affinis Coryli folio podart. Icon. Robert, non est haec planta, est enim annua, flore albo papiliunaceo, macula viokcea notato; cui fcedunt filiqua fmina nigra continentem.

ID. *Oxyaquantba, Sfinafantadifta. Mtfcifos Virginiana fruttu vocrinw* D. Plucktiet (rutilo C.B.)

Folia hujus magnitudinis & c aliquatenus etiam forma ad Ribesii folia acoedunt, minus laciniata circucirca argutis dpQuculis incila. spins validiffim^, prslongSj acutx, furculos etiam ipfos quibus adnascuntur cratitudine xquantas efoliorum linub. exeunt. Fructus plures simul in lummis yir^ul5, umbilicati, pufchr rubentes/ feu coccinei, pauca pulpa quinque incus officula ariftè invicem commiffaj dura Be frangi cbntumaria continent, Melpilorum in modum.

tixt (ni falbr) 3ft Dxyacantha Americana Galh calcar difta, cujus mentionem fecimus inter ~~Arboris fupar t 45~~ N. 64

11. *Arbor trifolia wnenata Vi^lnianafolio hirtuto.*

Fulius hirtutis, eorundemque pediculis & c costis rtediis nervifque rubentibus k Vits Virginiana tri- & lia djffsr.

ix. *JLhiU Virginianum Lentifci foliis.*

Folia integra ex pluribus pinnarum conjugationibus componuntur; quinque aut sex numeravimus. Dofta media quibus pmmulac aaneftuntur, membranarum foliaceis aliigutis utrinque extantibus à conjugatione ad conjugationem extenfis augetur, Ingarum in modum aut etiam Lentifci; eâque ut & nervi pinnarum feu foliarum partialium medii rubent. Folia minime ferrata lunt quò à Rhois vulgaris Bf Virginiani differunt, multo etiam minora lunt 6c brevbrahujus foliis; in acutos tamen panter apices delinunt. Florz racematim in extremis ramulis nascuntur: Nam in horto Fulhamenfi floruit. Arbdr est gummifera.

15. *Arnoufn Virginianum Corni fxcina facie**

Hunc fruticem olim Lpdini accepimus Amomi Novz Anglic nomine. Virgis rubris Be foliorum figiira Cornum faeminam refert. Obfervante Cl. Viro D- *Leon. Plucknet*, fructus sparfim cfohorum alis fxit- Qjiantum haftenus vidimus humilior est mukb CcM-no foemina vulgari.

14. *Smzzio arboreftens Virginiana Atriflicis fitia.*

Herba est, fruticefcens, virgultis ligneis^ humanam altitudinem fuperans, Folia crebra Atriplicia i>es anferinus difts aimula, fed rigidiora nullo ordine ramulos cingunt. Summas virgas occupant flores coacervati lutei, nudi.

15. *Solatium pmiftrum frutescens Africanum ftinofum fignicans BvrOginis flore, foliis minus profundè laciniat, (pints mnlti longioribus majoribm & cnbriaribus borridum.*

Differt ab hujus generis Solano feu Chtinda abHermannino in *Cat. Hort. Leyd** defcripta foliis minus profundè laciniatis, fpinifer caules & folia longioribus Be crebrionibus.

Colitur etiam in Horto Epilcopi, Chundsc fpecies nullis praterquam in flois calyci lpinis donata. AHam plamam ibidem confpexij quam Solanum Beta: folio vacante.

Mukarum h prsdiais arboribus folia Be ramulos habeo ex dono amiciffimi Yin Be diligentiffitni Bocanici D. *Sam. Doodj-*

C A p. XIII

Arbares quarum ramhs exficatos 'vidimus apud infignem Botanicum^ D. Leonard urn Thuzknet M- D:

QUercus Virginiana Caftanes folio,
x. Arbutula Zsyhanica Acerb folio bacciferaHerjnanni. Hujus multc ipecies foliis ad-
verfis, 8c alternis; glabris, Bt hirfutis.

; Ejufdem alia ipecis5 fpinofa, foliis alternis.

4. Laburnum fpinofium Americanum flore rubro Muntingii.

5. Rhamnus Virginianus Prum folio; fructu nigro, officulo compre(Ip p, Ranifier.

6. Thymelza Africana floribus rubewimis Hermannii.

7. Acer Bengalenfe foliis Laurinis-

8. Rhamnus Orientalis liguftn foliis, fpinis atro-purpurcis recurvis.

y. Arbor b Cormandel fol- amplis Myrfinicis rigidioribus.

10. ArborIadicajuglandis folio balfamifera; qua: liiccrevit in Hoito maxime Rverahdi Epifco*
piLondinenfi5 D.Henr. Compton.

11. Arbor Aromatica c Cyrmandzl laurinis foliis binis tern live.

ii. Arbor vensnatx limilis c Madrafaptan: an Katoil-mail Elou H. M.

13. Frutex aculsatus Orientalis Illris folio ; an fie baccifer non bsns memini.

14. Frutsx baccifsr foliisMali Granatz c GormandsL

1; Frutex baccifsr foliis Roriimarini obtufiSj 6c carnois, plurimis ex uno pundto prodeundbus.

E CorwatuUL

16. Frutex baccifer foliis Lini vel Caffiae Poetics. Exeodemloca

Prater alias multas, quas in Horto fuo ficco, pnnium tjuos unquam vidimus dom est iris K peregrinis ftirpibus referciffimo, curiose aflervatas idem eruditiffimus Vir nobis uonlpiciendas benigne obtulit: ND5 autem ob angustias tetnporh quibuspremebamur obfervare BCadnotarenon putuimus. Earum Cacdogum brevem^ Hiftonam ab iplo D. Plukat expea biu

PARS SECONDA.

T)e Vartibts flirpium minus tognitarwn.

SECTIO PRIMA.

Zfe Cortkibus nonnuUis exvticis.

I. Cajfi* adulterine vel Vfzndv-caJJI* nomim datus cortex J. B- An dnnamomum feu Catlit crafEor,
Pftudo-cajia C.B?

HD. C nomine exhibitus cortex, craffitudine ferè femunciali, Maceris squat corticcm, colons ferruginei, puntulis albicantibus alpsrfs, fuperficie tarn convex^ quam conuava lsevji
fubftantiã nulli5 fibris intertextã^ fa pure nullo evidenti.

2. Lignum aromaticum fen prtius cortex Monardts J.B, CaneUa ex arbors Clul. C B.

Monard.

Lignum hoc, quod quis primointuitu Guaiacum putaret, adolefcens candela fragrantiffimi odoris fumum excitat, alioqui infipidum Be inodorum haud fecus ac lignum commune aliquod. Corticis verò odor aromaticus prsfantiffimus, fapor Macis aut Nacis mofchaçe, eoque etiã vegetior ac lia-
vior, aroniaticã fiiã gratiã vd quodvis Cinnamomum 8c acrimonia lpfum adeo piper iuperans, fic vel ex levi dentium attritu omnes fauces pervadens ac tota ferè die imbuens.

Lignum quod pro hoc habuit Clufius non minus grave erat quam Guaiacum, candidius
licet nigricantibus aliquot venis diftinctum j illius etiam cor nigrum erat infar Guaiacij
valde tenuis erat, uc qui vix percipi poffet, lapor verò nonnihil calidus.

Clu(i5 in ea opinions est iph ligno aliquas ineflc facultatesillis qux Guaiaco tribuuntur non diffimils.

3. Laurifolia Magettanica cartice acri C.B- CortexWinteranw acris five Canzlla alba J. B. An Ligni
aromatici Monardis

Uuf.

Willielmus Wyntrr qui D. Franc. Drake ad Magellanigum ufque fretum comitabatur Anno 1567,
ulterius non progreflus, navim cujus praefetus erat Anno inlequente in Angliam reduceb.it, ac
rolleltum ifthic corticem refer&bat.viliori Candls cumiibftantia turn cobrs non valde diffiml

plerunque uamen craffiozem Scinceracei coloris, velfufcum excerna parts Sc Ulmei corticisinftra fcabrum, interna verb nonnunquam difflbaum flemulcis rimulis hianteni Tilia? corticis modoj ali- quando valdiⁱ folidum Sc durum, odore nori ingrató, fed perquam acri lapore, linguámque tk fau- ces non leuius urentem quam Piper.

Pliirimm accedere videtur ad Ligni aromati Monardis cDrticem, quamvis fingukrem illam odoris fragrantianj quam fiid tribuit Monardes in hoc CDrtice deprehendere non poruit Clufius.

J^ABauhinus hunc corciceTi fie defcribit. Canulatus ell, craffitudine Caffize Jigneae fufca; fragilis, cDrtis parte gibba cfnereij cDnvexa fufci, per fubftanciam cinerei Sc fulvi. Saporem iinprimit c veftigio luculenter acem fubamarum &c arpmaticum, qualem haberet Zingiber multum cum Zedo- aria pauca confufum. Sed cum tenuium fit paitium, fervida ejus acrimonia, non icá muhopoft evancfcit, remanente fpavi (aporc cum aniaritudne grata.

Aiboris ipfilis folinmⁱ cviridi albicac; Populi in mbdum: baccas fert racemacim compaftas, vel pluras fimul confercas Oxyacanth'z inftra^{um} cum pluribus in fingulis granulis.

Corcicem hunc Canellam albamnon efle, ut a mulcis falfo creditum Fuic, oftendit Parkinfonus. Nam Canella alba difta cortex eft albus, in tubulos convolutus ad mDdum Cinnamomi, nee to multo ccaffiorj fagojis quidem fervidi, fci rteque Cinnamomum neque Piper referentis. Ac cortex Winterannf mko craffiW fell; nee ih'tvbulbs cbnVolvitur, fapore acriore, colors obfeuriore Kad CinnaniDmum accedente.

Virtu

Hoc cum recens eflet^{um} nautac, partim m'elle condito ut acrimoniam deponeret, partim exficcato & in pollinem trito, ut illi elfiliis Canella: aliorumque aromatum vicem pra^uberet, ufi luntj poftca camen adversus Scorbulliniy quo eorim honriulli in ilk navigations affettu fuerant, optimo fipof c cumuflirpiriunr.

4. Camlla alba Park, alba juorvnlafn J. B. Cinnamomum fiv Canella tubis rrimrihu alba B- C

In dblongos tubulos Cron&momí innipdum convplvitur tarn extus, quam intus albai Cinnamomo CTaffior Sc leltittrj fagoj c^uacr^u aromatici3, Ga^u ophyllfos referente potiusquam Cinnam. fed remiffiore. Clufius duo ejus genera obfervavit. Unutn niaioribus/longioribiiurque tubis^u &c etiam ccaflis, quod ferro Aherum tenuius minoribusque cubis^u quod prfETendum. Utrique generi extimus cortex Teabr vilius5: aliove inftrumento tcterfusBe zquatus videbatur. Craffiori color minus albus, minorque acri- illonia: tenuiori major acrimonia^u Be color tnagis candicans majorque fragrantia.

5. Cortex eriporiors J.B/rimreys acri fapore C. B.

Cluf

Hujus corcicis fragmenta ad CluTum miffa vefuti in tubos media ex parte tJonvtruta erant, cine* raceo colore, fatis vero acri. (apore praedita erant, valde fragilia; qua: vel in minutas etiam partes frafta & protrafta velut tenuiffima itanuna, inltar tel^u. Araneorum, ut Jana autem Candida oftende- bant, quemadmodum Enophori bulbi folia Be fquamfce radius ipfius. An a radicibus, an ab arboris ^ucuju5 ramj^u defrafta fuerint ignoravit Clufius.

6. Cortex antirbe9*9»+*i*~r J r » XXrtzx arboTtSXTmoJtmto ad catarrbos C B-

Virtu

ReFert Monardes à Péru miffum efle^u Cfaftm quehdam corticimj exvafta arbore Ulmo fimili turn amplitudine turn forma detraftuni. Feruntnafci ad ripas fluminis cujufdam 2f leucis à Lima di- ftanris, nee alibi facile in India reperiri. Indos capitis defluxionibus, rheumatifmis, aut alioqui ca- pitis gravedine laborantibus hujus arboris corticem in pulverem tenuiffimum comminurum nanbus indere: humores enim infigniter educere, eaque rations liberari: quod verum effs expertum fe te- ftatur.

7- Pacal arbor J.B- Tacal Indis arbor jam defcripta minor C B.

Virtu

Arbor eft proximo defcripta midj6 minor. Nafcitur etiam ad fluminis cujufdam ripas x J leucis à Lima dilJantis. Hujus ligni ufti cineribuscum iapone mixt15 Indi ad tollendoslichenes.etiam fordiddllrnosutuJi- tur, cumqui in capite nafcuntur, turn qui reliquas partes corpons occupant.

8. Finns cujufdam e Nova Scotia cortex. MufReg. Lond. Grcvii.

Hurcinnafcebantur hinc inde tubercula multa feu nodi, Fab* equine magnitudine, concavi. Be Terebinthiná quadainliquiddj pellucidá, fragrance repleti, quamprout deftillatincoli colli6^{unC} ^u pro Balfanio utuntur.

Maffa

InEphcmcríd. German. An. undecimo mentionem faftaminvenio cujufdain corticis MaJJoy^{JB} ^u te Nova: Guinea: in Indian delati, quo trito Be aim aqua in pulcem reda^u ^u incol^u corpus inungunt tempore frigido autpluviofo: Eximic^u enim calefacit, punftiones &c tornj^u na ventrisledat^u gracxqueft fragrantia. Indi plerunque alium corticemadjungunt fimilicer W^u ^u dum & aromaticum in ialulis Moluccis nafcentem, Be CulUawan vocatum.

OihUwm.

Q. Arboris Tjrat cortex adnaviyia. J. B.

Suntarbrjres (inqiit Jo.Stadius^u in rezone Tga Tuera diftar, hafque integras^u corticant à fumi- mo ulque ad irniin, &c uc correx illxfus decrahatur peculiari apparacu arbores cinguiu^u ^u adtw in monrcs prope mare feninc, &ignibus excaleaftos in utiaque exercim^u ^u anc: perniCLiuni liqna tranlverfa religant ne dilatentur; Be fcaphas icá contoinum, ^u ^u vpl 50 vus armato5 bello invchsrc fufficianr.

Cortex hie pollicaris est craffitudo, latus quatuor circiter pedesjongus 4[^] alii etiam longiores lunc, alii breviores. Has illi scaphas fumma agilitate impellunt, Be quolibet locorum 15 vehuntur. Si mare impetUDfium est fubtrahunt eas in terrain donec ferentitas redeat. Ultra duo milliaria in[^] alrum non progredmntur, fed fecus lkus pro libicu procul excurrunt.

10. *Lawang arhoris dib-t<e cortx e Java major? miffks* Hift. MuL Reg. Soc. Lond. Grevii.

Probe mafticatus eundem planè faporem reddit quem cortex ligni *Sajjafra*\ ut arborem iplani vel Saflafizc ipecein, vel ei congenerem esse veriimile fit.

SECTIO SECUNDA.

X)e Lignis Exoticis.

1. *Teno abfou arbor Amricana J. B. Arbor fruftu orbicular* vmenato C. B.*

C[^]Drlice est odoris planè admirandi, foliis Portulacz, valde lpiilis[^] perpetuò virentibus. Fructus edit magnos, grandioris Pomj magnitudins[^] orbiculatos pflae luforia? modo, minimam edules, imò venenatos. Singuli fenas nuces incus habent, Amygdalis noftris fimiles, nifi quòd latiufulz fiint Be magis compreflæ: in fingulis finguli nuclei Conduntur. Hi ad fan an da vulnèra mirificè profunc, quibus etiam utuntur Barbari, fgtittis ifti[^] aut quovis alio modo in ^{preliis} vulnerati. Ex his contufis oleum exprimitur rufum, còque vulnera illinuntur.

x. *Goan arbor Tutia cùt nucleus cum putamim J. B. Goan arbor & fruttus, I cujus cimribus Tutia Akxandrina conficitur Garciz.*

Tutia quānos (inquit Garcias) hie in India utimur, Bee. è metallicis conflata non est, fed ex eorutn est generequa: Diofcoridi *VTOWk appellantur; nam ut retulit mercatpr quidam, Tutiahzc in *Quirimon* Perfix regione, 6c *Ormuz** Hnitima conflatur ex cinenbus arboris CLjufclam i ft hie nafcentis nomine *Goan*, quaefructum ejufdsm nominis profertj cortice 5c putamine confantem: CDrticem verò Be nucleum putamine claufum edides esse. Hanc Tutiam Alexandrinam voca[^]non quòd in Alexandria fiat, fed quòd è *Sjuirimon* Orruz delata, deinde in Alexandriam exportetur; ex qua tandem Be Italic Be Gallic communicatur. At nos (inquit J. Bauhinusj non vidimus ullam haaerius in Dffieinis Germania, Galliac Be Italia: Tutiam przter Cadmiam botryitea

3. *Lignum Molucenf, Tavana ditum, frutn Avztiana J. B. Mofaccenfe, foliis Malvx, frutlu Awtana: minon, uortite moUiorz & nigriante, Pavana imolis Lugd. C.B.*

Atofia.

Arbor est domeftica, Mali Cotonei magnitudine, cijus folia Malvac vulgaris foliis iunt {imilia; fructus verò Avellanis, fed minor, molliore cortjee flc nigricante.

Invenitur in Moluccis. Seritur coliturqz in hortis diligenter, nee alibi facile invenias: tanti *LQCUJ*: enim ab incolis xftimatur, ut peregripo ne ad ejus quidem conlpeftum admittant.

Semen ad aucupia utile est. Ejus pauxillum cum Oryza cofta mixtum avibus fylveftribus expo- ^{Vk' m j} nunt, *qux* eo deguftato illico decidunt ioptae Be ftupidæ; *quix* verò avidius id edunt moriuntur, an- ^{^/WJ}. cequam **illis** auxilium prsberi pofliti quod est ut frigidà caput perfundatur.

Lignum in pulverem pelle caniculx marine aiu limà ferreà redaftum, intusiimptum aut foils impofitum, omnibus venenis reiftit. Ad viperarum, regubrunij aliorumque ferpencum morfufintrò afflunitur magno commodo ex aqua rofarum vel vulgari, aviimque jufcubpulveris apta quai> ritas pro neceffitate Be natura sgri, modb x gr- non excedat: ipfifque morfibz inrpergitur. Eadein ratione ufurpatur ad vulnera à fagittis toxico illitis fafta.

Robuftiflimo cuique pulveris dimidius fcrupulus fummomane[^] datus (crena autem diei pracedentis parca esse debet) evacuat omnes humores, praefertim craflbs, lentos, Be melancholicos: convenit quartanis diurnis, febribz continuis, Iliacis cohcfique dobribus, flatibusj hydropili, arcnullisj renum calculis, urinae difficultatibus, faEviffimæ cholericæ: paffioni, articubrum & tibiarum inveteratis doJoribusj fçirrhis Be ferophulis. Omnis generis lumbricDS necat[^] Be appetentiam dejectam revocat. Obfervavit etiam illius prstantiam Aeofta, in inveteratis capitis doloribus, hemicrania/ apoplexia, aurium tinnitu, arthritide, vetriculi Be uteri affeftibus Be afthmate. Si nimia fiat evacuatio[^] bibat arger dimidium gyachum *Lama*, h. e. decocti Oryzi, aut aviculam comedat Se cito ceflabit. Accedit, Quòd neque fretorem, neque tardium[^] neque metum dum fumitur pariat, poflitque lin& Diits obfervationej etiam iis qui lûa negotia foris peragunt propinari. Exhibendus est lummo manè, nee cibus aut potus concedendus donec purgatifint quantum neceffarium videtur, turn demum cyachum jufculi gallinarum tepidi detur, reliquam diartar obfervationem vide apud Autorem. Biliolis calidifque vetriculis nonnihl moleftiac parere donec cibum fumuntBe nDnullis vomitum excitare viltis est. His pulvrem nonnunquam dedic Acofta fyropo acctofb aut Carambolâ conditâ exceptum, aut Ill cacapotia-cuni faccharo rofaceo effbrmatum. Solet interdum in nonnullis ani pruricum 8c excDriacionem excitare[^] aiqucin aliquibus, [fed paucis admodum) hecmorrhoidas.

4. *Lignum nphriticum* Park, *nphriticum caeruleo & flavo tingens* J. B. *ptreginum aquam coeruleam reddens* C. B. *Coatli [m A^ueus ferpens* Hernandez.

Hernandez.

Aliis *Tlapalez, patli*, feu' medicina sanguinis coccinea. Frutex est magnus, stipitemierens enodem, crassum. Materia Pyri est, fohis Ciceris, minoribus tamen, Rutaceifve fed majonbus; flore luteo, elanguescente, parvo Be longinfculo, compofico in fpicas.

Locus.

t- Prdvenit regionibirs moderatē calidis, qualis est Mexicana; Be interdum etiam fervidioribus, qualis est Qiiauhchina censis.

Vim QJ ty,

Ejus usu (inquit Monardes) jamdiu receptusest [in Hispania] ad renum vitia, lirinx difficultates & incommode: postea experimento compertum est, ejus aquam in jecoris Be lienis obstruccionibus utilem esse. Fit autem hoc modo, Lignum affulatum k. minutim concifum in optima Bclimpidiffima fontana aqua maceratur, atque in ea relinquitur donec aqua a biventibus affumpta fit: deinde novam aquam ligioaffundunt, arque hoc toties repetunt donec lignum nullam amplius tinturam reddit. Dimidia circiter hora post injectum lignum coeruleum aqua colorem dilutiorem contrahit, qui fenfim pro temporis diuturnitate intenditur. Adulteratur ligno Illi fimili, quod aquam croceo colore inficit. Addit Hernandez JFobris extinguere Sc colicis mederi; atque hac potentius prxtarc fi-radices *Mel* adjiciantur, quanquam ventriculum laxent. Exolevit post quindecim dies virtus. Minim vero quod faporem aqua non mutet.

Ex nostra observatione lignum hoc aquam cui infunditur flavo Sc fi diutius relinquitur croceo colore tingit. Si aqua fci. colorata phiala vitrea excepta inter lucem Vi oculum collocata per radios refractos spectetur. At verofi oculi fitus fit inter phialam Sc lucem, Sc aqua per radios reflexos spectetur cerulea apparet rinfutura; ut cuius volenti facile est experiri. Quod idem in vitro croceo colore tincto observatur: quotquot etiam radii a vitro ad quendam reflexiluntur coeruleum exhibent, quotquot vero per vitrum ad oculum tranfeunt colorem flavum croceumve reprsentant, ut totum v it rum in hoc fitu flavurii, in illis cteruloim apparet.

5. De Santalo. ^SaunDer^

Apud antiquiores Grzcos nullam Santabrum mentionem invenimus; fed apud Arabes, qui nubis offenderunt Be cira genera fecerunt, *Album, rubrum* Be *citrum*.

Santalm citrinum Park. J. B. *pallidum* Ger. C. B. ~~Yellow Amber~~.

Decorticata Santali titrmi qua? adferuntur fragmenta truncum arguunt fatis crassum. Est autem hancum folidum, ponderosum *, peffimibus reftis, quo fit ut haud difficulty in reftas affulas findatur. c^o ex pallido rufefcente, aut verius flavefcente, ac nonnihil in citrinum vergence, unde nomen; fapore arotatico, arharicante, cum acrimonia totum os implente, Be ad caput uique penetrante, favi, odoTe fragranti, mofchum nonnihil amulante, aut fane ex eo ad polarum odprsm nonnihilvergetite.

~~Santalo~~ OM <*U>-rrw J. B. CD. B. O^r- Park.

Parum colors differt a citritio, magis pallefcit, Pyri ligfio quod pallidum fit colore fatis fimile: alioqui eadem fibftantia, eadem t^xtura, Sc peffinesidem. Sed odore inferius, quippe qui debilis vix percipiarur, uti necfipor.

Scnbit Garcias inter utriufque Santali [a'Jbi & palJidi] arbores tantam esse affinitatem ut pallidum a candido differri non poffit, nisi forte ab ipfis incolis qui eis mercatoribus vendunt.

Cacterum (inquit) Sanralum in Nucis Juglandis magnitudinem accollitnr; foliis admodum virgatis, Lemifci zmulis: floi ex c^eruleo nigricat: fruftus Csrali magnitudine, primum viridis, deinde niger, irifpidus Be zmodum caducus. Inodoram ferunt dffarborom nisi detracto jam cortice excuatum.

Locus.

Nafcuntur hac genera in India ultra Gangem, plurimum vero in Timor Infula qux undique portuofa est: inveniuntur etiam in Verbalipoitu Javas, vehemstgr quidem odoratum, fed brevi isfcens. *Garc*

Qjaitufn ex hac Sandalidelcriptioie colligere licet, inquit CluffiiSj valde erit dubitandiKn^ le^itimum Sandalum pallidum habeamus; quandoquidem scribit vix in Lufitaniam defcrr, ejus prtium majus fit apud ipfos Indos quam apud Lulicanos. Fieri igitur potent, ut aliquod odoratum lignum nobis pro Santalo hgttmo obrudatur.

Vim.

Lignum nec epatica non ac carozia: vix ut utat in hypochymia, palpitatione cordis, obftrictione epatis. Externitudo in catarrhis, cephalalgia, vomitu, Epatis uncoepone calida (in Epichem.) nus dnis, Be quidem Tctius ex guftu 6c effectis ea cahda esse decernunt. Elcftuarium JDiactron Santd^n, quod ab his nomen accepit, pradcribi folet a medicis adversus ca^dam heparis riam^ ejufque Dbftructionem & c iterum, necnon ad ventriculi Be vfcruni debilitaceni.

Garcias magnam Santali albi Sc citrini quanritacem per univerfam Indiam abfimi fcibit quia omnes Fere cjusincoli, five Mauritania five Gentiles illo in morcariis lapideis concub & c aqua ceraco fibi univerfum corpus inungunt; deinde ficcan finunt ad a: ft us corporis colndDs, & c conciliandi caufi. Indi enim plirimum odonibus delectantur.

Sambarana.

Invenitur f in quid idem) Be in Malabar odorati ligni genus, SAHMIO albo perlumile, quia febribus indigena: inungunt, lingua Malabaiica *Sambarana* appellatum. Commendatur at Jifa K inflammatifDps, atque Sancali rubi modo co untuntur.

Parkinfbnus

Theophrastus Ebenum cobris gratiam reconditam Be afsrvatam non acquirers scribit, fed natura ftacim. Vtrum D. Tavernier infignis peregrinator, de Mauritii infila agens, affirmat, E-beni arbor cum quamprimum creta est in afferes ferra "difficandam esse; afferes autem illis per biennium, & incerdum etiam crjennium si lignum densius fit, ad septem aut otto...pedum altitudinem in terrain humidiorum demeritis speliendos esse, antequam materia tractabilis Be opsribus fabri- bus idonea. evadat, inque affulas fissilis, Be politura capax fiat. Addit insuper Ebenum difcindi Be ad usum prseparandi opus valde difficile & laboriolum esse, etiam prae remigatione in trir emibus, ideoque fblis fervis &c mancipiis a Belgis deputari.

Alia etiam ligna hoc modo in terra defossa diuturnitate temporis Be colorem nigrum Be duritiem Ebena parem contrahunt, ut Ebenum genuinum menciatur.

Ebensus coifficiente Veterum testimonio oculis utilis est. Scobem ejus oculis unice meisri dicunt, lignoque ad cotem trhp cum passu caliginem difcuti. *Flm.*

Hodie varia opera ex ea fiunt, thecXj arcu^ abaci, capfella, fpeculorum theca, peftineSj trags-matotheca, fellac plicaciles^ iinagine, Be alia propemodum infinica^ eaque velper se pura, vel auroj argento aut ebore vario artificio adornata, qualia Venetiis Be Auguftae Vindelicorum videre licet. *J.B.*

Anglus quidam ex brevibus intervallis convulsione flatulenta premebaturj post varia auxilia quas mucosijm vacuarent humor^m, &c roborarent nervos fblo Ebena decocto ad 40 dieSj cujus uso copiosissimilidorprDliciebaturignvvalUt. Zacut. prax. Obfi 44. exAdverf. *D.Edw.Huift.*

7. *Lignum Brefilio fimile cxruko tingens J. B. An HogtDttb nvfratium ?*

Haud ita diffimilis ^rsfiliu ed, colors-& peftinibus iirdem; lapore tamen luculentiore., 3c cum dulcedine nonnihil acri, Be odore grato, quem acquifitum negant: fed lignum esse recentius quo uduratus. Hoc leniter masticatum coeruleD colors cingit^ ideb a cinftonbus expeti aiuncad Luruium Sc celarum tinifturam.

8. *Lignum candidum fimgofum, en is vicem prafaw J. B. Lig> Uyt fungofum e Java maj ore.*

Hoc, autor? Clufip Bxpt. Li. c. 8. valde leve erat^ ut nihil nisi Sambuci medulla quodamm modo vidretuij fungosa materia confans fit Candida^ cortice admodum tenui, 8c quasi membranaco testa, cinera^ei coloris^ ad culcrorum obscuro aciem excusdamv^ldē commoda.

9. *Lignum kvifiimum J. B. Sybtri affim lignum^ fomitit vkem prabens C. B.*

A Jac. Garetohabuit Chejlerus hujus ligni fragmentum, quod leviffimum erat, per tranverfum feftarodila lui circumferentiamajori ex parte rotunda, in quadam parte totum fungofumj cujus fupereft etiam aliquid corticis tenuis, cinerei, totum Suberi simile, flavescens, diftinctum circulanbus lineis ignem facile co^icipiens, odor nidorulentus. Defcribitur idem Clulio Exot. L 1. c. B. Utile est ad jgnem confervan^um fomitit lpco, non fee us ac fangus aut ellychnium.

10. *Citra Indii lignum J. B.*

Hujus fructulum ad J. Bauhinum misit Coldenbergius, peftinibus contextumFaginis, traniverfis micis interlucencibusj odoruiij colore fubrubente, lapore nonnihil aromatico cum quadam (alfe-dine quam accidentamm fupicabatilr. J. Bauhinus. Idem Coldenb. difquirendum propoliic num effjt Veterum Citrus arbor, ex qua rtenlas precioffimac parabantur.

II. *De Ligno Colubrino.*

Lignum colubrinum diets sunt hoc genus ftirpes quod Hnguls mirum in modum utiles sunt adversu5 colubrorum virulentis iftus Be morfus. C. Bauhinus Clematitides vocat quia phraquus farmsttitix sunt fleperarbores repant.

Hoc autem lignum Qu^mpdo deprehenfum fit ferpentium morfibz prodeffe vide apud Garciam: nobis enim fabulam reiipere videtur ea narratio.

Lignum colubrinum J. Garcia: J. B. Park, ihmaitit Indka foliis Verfica, fruttu Perichyma-ni C. B.

p u n i i trium pal mo mm altitudine affurgit, pauch virgulis, qua tu or aut quinque duntaxat, tenibus. Radix, qua: niaxime in ufum venit, veluti tgniorum noltraruin Vitiuni radices, multis capicibus auc nodis it: propagans^ itautfemper radix aliqua extra folium se exferat, Be radice una, * empcaaliz in ejus locum fuccedant. *Radix* hexcandido-cinerea est, flida, admodum amara gultu- Folia PerJicz mali, magis tamen virentia. *Flos longh* a foliis racematim cohacret pulcherrinio C? lore rubens: Fructus Sambuci, fedrubens, 5c durus, racematim cohrens, velut in Periclymeno : infila Zeilan Be multis aliisregionibus Be in Gox continenti nafej tradunt.

Tentur pnmum ha:c radix, Se ex vino aut aqua cDrdiali propinatur a lerpente percuffis; ten Kiam ad cotem Sanrali m^d^ Be vulneribus infpergitur.

Vires Gf
v f U J -

F. B.

Colubrino

Colubrinum lignum II. Garcia, Clujio JcandeM J. B. CUMatitk Indka fpinofa foliis lute-â C. B;

Arbor eff (cum folapiovenit nullis vicina arboribus) Malo Punicae fimilis, fpinis brevibus & hrmisharrida; cortice candido, denfo, rimofa fcamario, non tamen veluti prioris cortex: *Fuliis* eft luteis, afpedtu pulcherrimis. Hanc autem (fi juxtaaliam quampiam arborem proveniat) per fummos ejus ramos ferpere, atque Cucurbits modo amplefti ferunt. Materies *Cluf. firma, Candida** venis quibufdam diftinctaj non diflimilis Fraxini ligno; cortex candicans Be quafi cinereus: utraq; verò deguftaM'amaro lapore effe deprehendebatur.

In infilâ G0211afci ferunt, fed nunquam Garcia: videre contigir.

Commendamr adversiis venena veluc primum, 6c eodeo modo uiurpatur. Solsnt ipfum lignum *Virtu* cum cortice 6c raice permixcum exhibere: prefer cur tamen radix.

Lignum tolubrinum III Garcia Park- Col. Lign. 3. Garc. foliis Lzntifci J. B. Chntatitâ Indica foliâ Lzntifcinis candidis maculis aftrjU C. B.

Ramos habet paucos, tenues, quatuor aut quinque digitum longi ordinis, qui nisi alligati sustentare se nequeunt, sed per soluta sele diffundunt. Folia rara, Lenticulorum effigie, oblonga, non viridia sed nigricantia, five nigricantibus ex candido maculis respersa. Radix tenax est, dura, nigra, odorata.

Cum Prorex in Jalanapatan inliila Zzylan contermina efler, dono data est illi hsec radix, quam mirifice adversus vftiena prxdicabant. Similem in Continenti Goac nafci ferunt.

Colubrinum lignum hederaceum foliis Brioni<e> Acofta L J. B. Lign. Col. I. Acofta Park. Chnathis Malabarenfis foliis Vitis^ color Dracunculi C. B-*

Nafcitur in Malabar Hederx modo, colore Dracunculi tnajoris five Serpentariae. *Folia* illi flint Bryonix ferè familia, Integra tamen initio, nervoque prsedita per longum excurrente, Be quinque aut fex venis in latera vergentibus. Succellu tempòis accedunt exigua foramina, qux paulatini cum foliis incrementum fumunt, donee tandem omnino folia fcindant eâque Vitisfoliis familia redant, Confpiciumur etiam interdum in eadem ftirpe folia integra, alia exiguis, nonnulla majoribus foraminibus praedita, omniâque adeò inter se diflimilia; ut ejuftem plants folia minimè effe videantur. Tantam vero^ habet hoc lignum cum colubro fimilitudinem, ut (Acofta trad ente) qui non nfeitaut de die non viderit, (1 a^ Luna: Iplendorem noftu confpicir, vivum colubrum effe exftimet.

Solo hujus ligni odore ferpentes fugari aiimr, idcirco incols maxima ex parte illud circumferre Talent.

Colubrinum lignum Dudafali Canarinis, Acofta II. J. B. Lig. colubr. i, Azofta Park. Clematitâ Malabarenfis altza, radkz serpente C. B.

Plahta admbdumbrevis eff Be tenuis, triaquefolummDdo/o//^ habet mollia^ lxvia, faturatius virentia. *Fin* aut fructus non cDnfpeftus, nee quifquamfe vidiffe aßerit. *Radix* oblonga & c tennis est, minima digito minor, hinc indennonnunquam extuberans & fumma tellure ferpens: cxeaim ejfâ cortex valde tenuis est, & cinereus, nullo dum.guftatur ma:nifefâD fapòre przditus, deinde tainen guftum in ore relinquens fuavem, &: uti Mofchus odoratum. Fiffus est undique^hic cortex, & fponte *ihk* expedit ab alio craffiore flavoque cortice liibtus nafcente qui odorem Trifolii odori rati vulgaris refert, Be faporem Glycyrrhiza dulciorem: pracmanfiis odorc admodum fuavi, necinjucunda moriicatione, momentanea tamen przditus effe deprehenditur: ipfa materia lignofa est, Candida, dura Bcinfipida. Folia napi fapòicm referunt. Germ en producit radix harcfupra terram, circiter quatuor uncias longum in caput extuberans.

Invenitur in Malabar locis humidis, *He* inter arbores^prarfertim verò circa illas quae Angeljns nun- *L0CNjm* cupantur, nee proail à mari.

Ad eadem valet ad qux prxcedentia.

Cudbrini ligni tertiumgenus in Malabar <va(t<t qrboris magnitudint Acofta C B. Colubrinum lignum Clufo Yao dz Cobra d:ftum; forU III. Acofta J.B.

De hac arbore in alio libro (qui tamen nunquam quod fcimus videtur) Is auctorem fcribit Acofta. Pingitur à Clufio notis ad Acoftam fragmentum ligni quod tubercis fere fepatione radiciu fatis in eodem caufa, quod Colubrinis 3. Acofta idem alio fufpicatur. Similis ferè ligni fragmentibus à Jac. Garoto accepitum à Clufio, per modicum fectum longitudinem fectum, coloris erat pallidi; ipfum quidem lignum amarum, fed cortex paulò amarior, cujus fuperficies quodammodo flavescit, ipfe verò ex candido cineracei coloris est.

Harum omnium ftirpium lignum five potius radix, noh modo adversus animalium vims ejaculantium morliis iftujve efficax est, fed etiam ejus pulvis lumbncos necare, papulas, exanthemata & impetigines, tolleie creditur, & cholericam quam vocaht paffionem (incol^ *Mordxi* dicunt) fanare. Similiter utile effe medicamentum ferunt adversus febrium circuitus uncis ponders propinatam, pnus tamen tritum 8c *qua^ maceratum, per vomitus expurgata multabile: Addic Acofta/ Syncopen, ventriculi debilitatem 3c cordis tremorem. Hinc conjeftatur. O. Grev^ vel cogna^ effe hare ligna arbori ex cujus cortice pulvis Patrum fir, vel ejus in Febnbus intermittentibus vilH expcriundi & c inveniendi occaffionem Indis dare potuiffe.

Attendamus experimenta Antonii de Heidein centuna Obferv. 7. quaxad me tranfmiffit-D. Hulfi: Ad febrem quotidianam (e^andum Ligni Colubriini pulverem afnimit Tornator quidam circa vefperam. Subfequentenofte fefe facis benehabuit, fed mane furgere vel corpus movers fatagens fentiebat tremorem in membris : accerfitus exhibui mixturam hypnoticani, &c intra paucas horas tremors liberacur fger. EjuLlem ligni pff. affiunpta à rnuiere cacheftica prater tremorem exci-cavic Be ftupbrem, ita ut fepra nullius rei curam haberet, nefciens (ut mihi retulit) fe effe in miindo, vel vivere. Curatur mixtura hypnDtica.

Retufic mihi illuftris Domina famulum luum ab afflimpto hoc ligno inftar fatui extitiffe. Hxc pncficulans & confer ens cum fymptDmatis anuce vomica in cane excitatis Dbf 50..exaratis [qux nos in Hifloria Nucis vomica: rerulimus'] libenter fublcnbo afferenti nucein vomicam elle fructum Ligni CDlubriini. Hisc mera eft conjeaura.

li. *Lignum Angohnfs Tacufa Indignu diBum* R. S. Muf

Valde folidum eft & ponderolum Ligni Vita: inftar, peftins nigricante.

l%.*Lignum Angolenfe aliud Chicengo diElum* R. S. Muf.

Duriufgulum eft &c' ponderoKim, colore Quercus Hilpanicas: in puJverem redaftum faporis amancantis.

l4.*AgaUochum Officinatum C.B. Lignum AJoys Park. Lignum Alovs Dfficingrum & Agalloch*n> fhrisque futatum* J. B.

ff.fi:

Lignum peregrinum, quod Xylaloert vel Lignum Abes vacant Officinae peftinibus pbrunqne denfis Be reftis eft percextiun, quodque tranfverim feftuni Quernei ligni peftines ^mnfatur, par-rim albicans, durum, grave, pingue, iapore amaricante cum quadam acnmoijia aromatica; pnnis injeftiun bullas agit, tDfuiuque fenfim colliquefcit, iuaviffimum fpirans odorem, tandem vero fi jufflando pergas flanimfci.

Huju5 Ligni frufta rarb magna ad nos advehuntur, ut plurimum enim in fragm^ntisnobis tranf mitcitur, qua; optima cenfentur nigro-purpurea, venis cinerei colons interfeaa, amara^ pondcro&j aquae tamenLipematancia, liquoremH Prunis candentive ferro imponantur exfudantia, iuavem, ac acidulum, fumum fi incendantur prabantia, bullulafque (imul port fe relinquuntia. *Schrod.*

Iphiaabor, teffe Garcia, Olea: fimilis eft, interdum major. Vidit enim ramum ejus cujpfoliis; Fruftum aiKfloreviderenDncontigit, ob difficilem 8c periffblofam hujus arboris diuturnam Dbfervationem, frequenter in illislocis ubicrefcit grai^antibus Tigribus. Feruntautem recens diileftuin Agallocum nulla odoris fragrantia gratum effe^ nee nifi ficcatum odoratum effe,ima eum odorem per univerlam ligni maceriem non diffundi^fed inipfo arboris corde five matrice coacervari. Craffilm enim effe cprtice,, Be ligni maceriem odoris expertem.

Sethi Sc Serapio excifos arboisramos terra obrui,fcibunt, ut putredinis interventu cornimpatur id nuodinodorum penipe cortex & exterior li^m pars, quod nobis minimi vide cur vcrifimile.

Locus.

Legitimum AgaUochum in Malacca Sc Sumatra inliila nafcitur, inque Cambaia Sc Siana.

Gai das unicum genus Indicum novit; alii multa diltinguunt, prxfeiTim Arabes-

Officina:, ex obleivatiDiie Cluffi^ demonftranc duo genera Ligni Aloes, prater lignum Rhodium, quD uli iinc loco Ligni Aloes. 1. Uni diverfi cobres ex venis fibrifve albis aut ex Iuteo pallidis; five ex nigro rufefcentibus fimul mixcis, ma^gish ramis quain trunco. Hoc genus quidam dofti Thua: lignum exiftimant, alii Afpalathmh Diofcoridis. 2. Lignum Aloes aliud ex nigro rufcicit, reiinoJimi, quod uftum gratum ex ft reddit odoreni, ponderoliim, &c aqua: fundum pecens. Hoc quidam putant ipeciem Ebcni Diolfor-

C. Bauhinu5 ex autDnrate Ludov. Romani Sc Jo. Linfhotani triplex genus diftinguit,

1. Primum vocat Agallochum prxtantiffimum, quod *Calampart* vocatur, & folum inter Rege* India: liitribuicur, CUJS fragmentum duarum unciarum manibus cDntreftaLini inenarrabilem cidoris fuavitatem /upra omnia fuiffimenta fpirat. De hocScaliger, Agallochum noftrum quod habet; niusleve eft, odoracumque adeo ut lolà craaatione, fine ullo fiibjefto igni Ipiret admodum valide fed jucundf. Hoc genus, tradente Linfhotano, Calamba vocatur, quod lincerum cum atiro argenteove perlipc deponderatur.

2. Secundum Agallochum DiEcinamm eft, *Palo de Aguilla* Linfhotano, de quo egimus.

3. Tercium Agallochum fylveftre, *AgmlaJbraua*, Ex hoc Jphxmla: precaroris, odoris jucunditate &L pccn nugmtudine commendabiles conficuncur: inagno item in pretio eft, quod ex co Indi iicrapis &: facerdotibus inde rogrum defunfts fruunt, pari honors quo apud nos marmorei fepulchra celebrantur.

Virg.

Ciceram Lignum Aloes calfacit SC ficcat: confortativum eft omnium vifcerum ac pra:cipi^ cordis ac uteri- Spircus vitalesac animales recreac: hinc medetur Jipothyniii; amancudine l^a lumbricDsnecat. Exrerne creber ejus uliis eft in cucuphis Be epichemacibus cordialibus.

Agallochum Diofcoridis conimanducacum, itemque decofto collutum halitum oris coninjen^ dat, ac tDti quoque corpori Jicconi crkumque odons gratia in/pergitur: ad fuffimema depiq^ Thuns inftar adhibetur. Radix vero drachms I- pondere poca ftomachiliperfLios humores imbecillitatem ardor6mque mitigat: Iis quoque quos lateris Be jecinons dolor excruciar, ac Dyiencecricis aut tDrminolii ex aqua bibit^ opiculatur-

A^allochurn AntiquDRLm plerique Boranici idem effe putant aim Xylaloe M * Lig. ^{oo} ^{JDCS} ^{fumle} ^{line} ^{rolwis.} XylalocnauCsin ob amariCULincm diftum volunt. Hermolaus a nonnuua

Ligni Aloes fructum cum gummi adhsrente a nobiliffimo J. Viro D. Rob. Boyle MoTeo Re? Sncieti-
tis donatum meminit D. Grevius. Erat autem istius gummi fapor Lieniuunde evmiavir
color Aloes poffim* ludd* Socotnn* did, fi^ & cm radL. reflet i g S r S C S S f e S
refra<fis; vero, inter oculum Be lucem fuppenfuin Carbuncuh infer fplendebat; ,, puls wre
dactum fulvuni apparebat. Hoc aliudve fimile gummi aromaticum antiquam Hebraorum Al
fuiffbaencpradiuSemditiffimusVir, a cujus fimilitudine vulgaris Aloë nomen accede
Ex relations D Phihberti Vernatti lignum hoc lac manat adeo virulentum ut fi in oculos focid-ir
czatatem caufat, fi in ullam aham corpons partem pufnlas excitec, cutem inflammet: quod idem Z
lignoarbans Mancmelh diftae in India Occidentali traditur. Hoc (inquit D. Grew) neque 3^
hgno inciere neque de alburno. accipiendum eft, fed de cortice folp, fe enim ia niilius arborS
hgno vala la<aea haftenus obfervare meminifle, fed in cortice tantuin.

15. De Appalatho.

Afpalathus Theocriti Scfioiaftididitur, JU ii
a percuffis difficulter avelhtur vel aufeitur.

Afpalathum Veterum Oficinis incognitum effc Matthiolus alifque exiftitant.

Ruellius lignum Rhodium Oficin. Apalathum effe multis probare nititur: cui fs
dusfic Lignum Rhodium Ofic. pro Xylaloe a Honnullis vendkam Apalathum nori eff
& Ruel11 argumenta refuc*. Matthiolus etia.m Ruellium errone arguit, qui tamen i n t n E
lignoRhodio Cordo contrarius eft, cum ei, deneget acrimoniam 6c amaritudinem, quas ei Si
Cordus, tanta inquiens, ei inert amaritudo uc nullius guftum effugere poffit, cui adiunta eft.
cum ahqua adftinguendi vi mamfesta acnmonia qua paulatim incipiat donec prorfus EVCJi-
factas fauces propemodum ut Coccognidium exafferet & fervors dettneat; ut Jemonfrét (§
Lignum Rhodium effc Oleam ^thiopicam. Utri (inquit J. B.) credendum

Matthiolus Ligni Rhodii plantam Oleafrtri in infula Rhodo nafcentis fpeciem dfe dccujii, etam
delcnpationem 6c hiftonam dat a Rhodus fibi commun etatam*. Aneullara etbm ei
tradit a Rhodiensiquadam plmmacopBo fibi miffam. Cenitu am i f URh do
fus, fohisOle.kdDaulommonbus, flore albo odoraflino, \ & tu & a fbro. Repe-
riuntur interdumarbufo quxdam que detracto cortice colons
CP. verier - br Totum hgnum non rubet fed folum i ^ ^ S S S
tur intotamfulaRhDdo lignum ullum ibi nafcens odummn, excepto hoc, ex qua Turcarum
Londnis de Ui Lignum Rhodium Math. & Oficin. ^plunni, pro legitimo Ar
ufurpatum, nil aliud effc affirmat qu dam Cyfiti veri A Marantha defcripti Jignum; qui in infblis Rh
do propinquis 6c Rhodo ipfa Caloieri ontur. Patmi in fphzrularum preec rianmufum convettut

Erravit (inquit) Matthiolus credens lignum ipinoftum effe, BcOlea: fbeciem-
Molubnm M. in & Eravk 6c Aigull ^f Rhfitafiffi S S i & S fuf

J. Bauhinus pro Apalatho obfervavit quodam Officina Lignum quoddam validiffi
diffimum durum, grave, tortuofum, mgn cans partim partim alhir l u
utratfuchupscoto vc, s, alicub. flavins, Lmdc S Z b S ^ j & incardum
nullo, fapore amancante. perancs l e c baf odore

^nfiderandum propomt, an hoc lignum traditum fit iflounid, nomine Ligni Rhodii ^

Lignum Rope odore, dm Lignum Thuris. alii Aftalathus f ft ytr^J^L ±7*
& item <Afpalath<* dbicans torulo cirto quidem.

J.B.

Durum 8c fohdum eft, Guaiacifere textura, pctfinibus utcumOu
ponderofum odore Rolarum: bkolor quismadmo'dum G u . i . C S M
bum, çorner adhuc aUcubi adhxrente fatis craffib, feabro, colons ex fufo cir
acnorenonhilamaricante. Sapor ligno aromaticus primum amaricans, pof t S ? , j s ch
thus faporem quodanmodo accedens. Prunis impofitum flammam celent/r fads concipit Squi-
demise,, fcd nihd relnofi aut pinguis fundit. Fragmentum brachiali craffitudine habent
X. Bauh. Ru. 11, Lignum rofaceum dicitur a novo Orbe delatum, qui & bis illud defcribit V. J. B.

Lignum quod defcripfimus (inquit J.B.) optim^ refpondet Apfalatho 1. AdverF cui fura
congner fi non eadem Apfalathus ?. Lot. C. Bauhinus eas diftinguit 6c diverfas fact iter r
Olealtrum Apfalatho ?. Lob. idem fecit, cum h*c albidia foris, intus fubflava- illud venas
f ROT Fn S P? >>TM, nmlumq; differs a Santalo albo & d J S " £ f e
odor Rote,, in illo mhil tale praedicetur j hac careac manifelta qua Jitate, illud amarum fit Sm
lit defcnptioneseorum apud Cordum & Lobdium conferenti patebit.

Aftalathxtrubem C. B. Apfal. Rhodius ruhens, odoratif. J. B.

Lob.

Hujus apud Nic. Comafcum medicum Venetum Rhodo adveftum tncum m<-
Lob. cortice exutum, rubentem, Taxo concolorem, odore adco fragrantem n
cwnaculum eximio imbueret odore. grantem, ut quam lat patebat

Afpalathi nominz datum lignum grav it zr oUns J. B.

J.B.

A Valerando Dourez Afpalathi nomine naftus eft Jo. Bauhinushoc ligni genus, cujus fragments dura, contorta, nodofa, micis per tranfrerfos peftines apparentibus, ut in Faginø ligitio, colors per medtullium aliquatenus fufco, perreliqua rineraceo exalbido, odore gravihircoio, quem Be per fe, &c prunis impofitum fpirat, fapoi e ingrato. Ex-frufti (inquit) nofiri confideratione facile dijudicainus five truncum five ramum brachialis craffitudinis fuifle.

Afpalathm prima Diofc. Plinii & Galeni, legitima Von J. B. AfyaL cortice cimreo, Ilgno furpurur C-B. Afp. primus Diofcoridzs odoratus Park.*

Von.

Haze fubftantia nph eft tam compafta, ut injefta in aquam prouabi in fundum^ fed fi confertur cum mukis aliis lignisiatis compafta Be gravis dignofcitur: cortex ipfius fuperior eft cobrecineo nigifeante, & quadam acrimonia adfringenteprardims. Hoc cortice exempto offert feffe.msni-brana quadam fibrofa, longe efficaciorfi deguftetur primo cortice^ colors rubro ignem mutans quo dempto ex parteinhacrente lignum in luperficie ad purpuram vergens detegitur, intus pallefcens, pars vero interna ad nigrum vergens. Lignum hoc totuni eft qualitatis valde afringentis cum aliqua acrimonia mixta;. Odoratum eft, validi odoris & qui nares ferit ram cito &c profuidd quam Caftoreum ;iftud eft larmentofum, fpinis quibusdam oppletum.

Miracur Johan. Bauhinus Ponam non adnotare unde ddata fit fie ubi obfervaverit /uam Aipa lathum.

Afpalathus Cretica Alfini vdoris perfuavis J. B.

Frutex eft denfis ramis, fpinis albis, duriSj horridisj cortice caudicis albo, ad trium plus aibitorum altitudinem in akum afflirgenSj floribus multis, parvis, croceis, Spartii fimilibus fed fumme odoraci5. Hujusarbuti radices durs, long^ craffi, colore flavoatque cortice fumme odorato ab Alpino fue^e obrervats.

Prope Frafchyz porcum in quodam colle virentem atque florentem fipe infpexit Autor.

Cum rot difficultatibu5 intricata fie Afpalathi hiftoria tarn in Antiquorum quam in Recentiorum fcriptis, rem dignain induftrio Botanico praftitiffet Alpinusj fi diligentius paulò Afpalathuirt fiam Creticam defcripiffetj ac demonftraffetj folia, florum formam & totius planta: faporem Mirum prarterea hunc fenticem tarn fuavis odorison obfervatum in Crbta per Bekoniutii 6c H^o norium BeJlum. J.B*

Afpalatho adjungit C.B. tria alia Ligni Indici gensra.

16. *Lignum Ammcanum album C-B. CandidiJJimum Lignum Brafilianum J. B-*

In Brafilia fcribit Leriis vidiffè fe lignum candidum ut charta. Thevetus quoque tradit in A^umerica nafci arbores ligno candidiffimo &c tenerrimz, nullius tamen apud Amencos preci-

* Id eft Lignum defidz-w.

An populo fimilis *Tococ-guebic, cui reſina chuns candidior ? y. n. Hanc in India Occidentalⁱ invenin Fragofis refert, Populo fimilem fummi candoris, cujus mareries ob candorem, lsvoreni g^ fplendorem fumme expecebatur ad idola fabricanda. Sub ejus cortice nafcitur gummi feu refina Thuri noftro fimilis, led candidior S: minoribus fragmentis, quo lithic utuntur ut nos Thure-

17. *Lignum Ammcanum. violactum C.B. Vihlactum Brafilianum J. B. An Lignum color* fur* pures Thvttt ?*

14. *Lignum Feix9, quodinfula Vico promit Linfchot: adèv durum ut frrum a^utt^ intrius cocanum undulatum expreffij/inie refsrens.*

19. *Lignum firri duritiem *mulans, nojratihus fjinjri HOC& ditfum. An Lignum de Cochi ed ejufdm cum ferro ponderis ex quo anchoras conficiuntj & d Lufitanh Pao di ferro, toe tfti Lignum frrwm uocatur Q B. ? xpapt. 7. Ind. Or. c. 44.*

Lignum ferreum dicitur ob extremam duritiem cum gravitate conjunaam/ unde ad tddificz minus commodum eft, Be infrumeruorum aciem rotundity ob id operariis 5c archiceftis invifuni.

A Sole be pluvia nihil patitur, unde ad opera externa &c aen expofita convenir, prarcipu^ a« dentes Rotanim molendinarium.

10. *Arbor Yypulo fimilis refinufa C.B. Tocvt Guebit Cluf Not. in Monard%*

Refert Fragofis in India Orientali arbores reperiri, Tocvt guebw, i. e. lignum defidz w seu ex opacam dictam, Populo fimilem, fummi candoris; cujus mareries ob candorem, lsvoreni & fplendorem fummi (petebatur ad idola fabricanda. Sub ejus cortice nafcitur gummi feu refina Thuri noftro fimilis fed candidior 5c minoribus fragmentis quo lithic uruncur ur nos Thure-

21. *Lignum noftrattbus fwftitix IShot) diclum ex India *Occidental* ad nos transfirtur, ronsro-ribtu txpetitum ad cvlvrtartjv Unas flaw color?**

Flores & Folia quadam Exotica.

I. *Mogori flows odore florum Mali aurea* J.B. C.B.

Mali aureae floribus multo odoratiores esse dicuntur, quorum stillatitius liquor eundem apud la* dos ulim obtiner, quem apud Hilpaids flosum Maliaureae aqua.

Plantam hos flores ferentem depictam exhibet Jac. Breynius, Be describit his verbis,

Frutex est quinque cubitorum altitudine, ramosis, foliis binis (partim rotundioribus Br obtusari- ribus, partim longioribus & magis acuminatis) ex adverso fitis, Jafinini Arabici *Cluf.* majorum substantia tenuioribus ac fibrilforibus ac subtilioribus difcurrentibus praeditis: *Florihm* item pluri- mis in ramulorum cymis, perelegantibus, candidis, admodum suaviter olentibus, Violarum, Jalmini flc Malorum Aurantium flores longe superantibus, tubulosis in decem folia divisis, duplici feric difpoficis onuftis; & calycibus in tenuissimas, filo fimiles lacinas didinatis, quasi barbatis, exeun- tibus. Hi flocculi magnitudine paululum excedunt Jafinini Arabici memorati, cum quibus plane conveniunt, cui licet frutex mfi unus idemque ratiane tantum hci variat affinis,

1. *Tianche floccitli Indki* J. B. *Cluf* Exot. *I.z.* v. *l\$.fr.* 16.

Lluf.

Arborific an herbz flores essent Clufium latebat, color etiam in excuatis evanuerat: calyces habebant e quatUdrvelutifquamis compactos, brevibus petiolis praeditis in quibus flores quatuor longioribus & calyces superantibus constabant angustioribusque quam calycum quam decussatim compolitis, protuberante in medib umbonej uc in Malorum Aureorum & Citriorum floribus: Ddor fi quem habuerant evanidus quemadmodum fcapor propter ficcicacem- Ab inco- list am sn [infula: Madagafcar] in aliquo ulum adfervatos fuisse vsniimils est.

5. *Arbor violarum Indka* J. Bw

Arbor est Indica, flores ferens, quibus Pharmacopae Violarum loco utuntur, quorum tamen ufum non admittit Garcias, [quia diversis planis facultatis sunt a nostris violis j mfi in iis medica- mentis que foris applicantur*]

4. *Zhatpaccaflor Bontii.*

Crescit in arboribus non abfimis Perficac Malo, foliis eodem modo oblongis be in cuiusdem pyramidaliter definitibus. Colore flores sunt duplici viridiori & aureo; forma florum Colchici aut Croci Anglici; odore Rosam cum Viola mixtam aemulante. Unde etiam [Eminae Indici iis in nobilifuo unguento Borborii dido utuntur, ut corpus a capite 3d calcem eo inungunt. Nominis convenientia cum Champacam H.M. & florum gratillimus odor hanc ei eandem esse arguunt, ut in Historia Champacam diximus] licet descriptio Bontiana imperfecta & vitiosa videatur.

5. *Benjoino vbvolutum folium maximum* J.B.

J.B.

Arborific an herbz: folium esset incertum: apparuit tamen ex fragmento quod habuit J.B. maxi- mum fuisse, adeoque & Mufe forte folio majus. Erat autem colore rufdeente, costa clata po- steriore foliipartem fecundam longitudinem percurrente, a qua nervi elati Be lpi fipius oppo- liti aliquando inaequali ortu, omnes obliqui prodeunt, inter quos spatium intercedens unciam unam iatum est, interdum tres, subinde palmare, aquenervis bbliquis ultro citroque difcurrunt venulae tranfversas femuncia aut paulo plus inter se distantes, aliquando brevioribus intervallis diffitis: quo nomine a Mufa: quoque foliis distat, que a costa quidem longitudinem percurrente, obdiquis illis nexis uarent, tranfversaque ut diximus, venulis deftituuntur.

6. *NUUPS Indica folium yuibudam* J.B.

Debemus (inquiunt Pen. Be Lobel. J Occiduis Indiis istud concavum folium, cui iimib aut par- titudine aut crassitie nullum liovimus. E Palmx congeneri arbore avullum videtur: quin ipsa cota textura alleiem binis cubitos latum, aut potius tegerem quaternos aut quinos cubitos longum refert, tegular modo fornicatum] He mediam fecundum longitudinem costa femidigitum crassa carinatum; luperna ora quasi praefectum esset, margins tenuiore duriore clauditur. Univerfum fo- lium a fummo ad imum in villos iis quodammodo limiles qui obducunt Nucem Indicanij aut ca- pillitium texendis funibus aptum difcerpitur, quemadmodum cotum est testoriis xdiu & ftDreis ac- CDnimodum.

An Palmsealicyus folium fuerit nefcimus: certe Cocci Indici disti (ut ufpicatur J.B.) folium nulli est.

SECTIO TERTIA.

*Fructus stirpium minus cognitatum è Clusii Exot. J. Bauhini Hfl. T. I. Grevii
Musei Soc. 2 Jg. & alii.*

CAP. I.

Fructus Offivinales.

1. *Cocci Urizntals J. B. Ger. Coccus Indus Park. Coccu Officinarum C. B.*

C^{7-B-} [ceribu[^] paria fiint aut majora, renis fere figura, defcribente J Bauhino, [baccarum Lauri magnitudinf, fed rbturidi Dres] fufco rugofo cortice exteriore[^]interiore craffiore, cinericeo, itidem rugofo, utroc[^]lento[^]nucleum claudente fragilem, obfoleti coloris] Lenticulari apophyfi^{*} Quam geminae ex umbilico corticis partes emittunt, circumjeftum. Coherent autem cocci inter-umbini aut terni, crufculis totidem ha[^]rentes, itf plurimum fingulares. Sufinentur pediculis uncialibus, iinico nodo articulatis, qui fane lignei cum fint arboris fructus effe haud obfcure infinuant. Sapore funt admodum amaro.

Hi fi pe racematim pediculis adhrentes (verba funt C. B.) hsera? corymborum modo ex Alexandria adferuntur. Quidam Solani maniaci, quidam Tithymali alicujus, quidam Clertiatidis fiuftum opinantur. Nobis J. Bauhinifententia verifimilior videtur, Arboris alicujus fmftum effe.

Vires. De baccarum harum loco natali nihil certi traditum invenio. Quod ad vires attinet certum est earum pulverem capiti inpeifum pediculos interimere. Condronchius fqui peculiarem de illis tractatum fcripfit) millies expertum in puerulit trdid pulverem harum baccarum etiam in exigua quantitate cum adipe fnillavel pomo decocto Sc[^] familibus permixtum Be capiri appofitum egregie pfdiculofo in capite ortos interficerej Sc felicius quam Staphideniagram, tutiifque quam hydrargyrum.

I)fu, Verum praeipuum earum ufus est ad pifces capiendos. Compofitio Cardani ad pifces capiendos experta h[^]c est. Baccarum Orientalium quadrans unciae, Cymini 5e aqua; ardentis fingubrum sextans, cafei uncia, farina: unciae tres: Digeruntur contufa in pafillos. Solent alii Coccus Orient^{*} mifcere cum veteri cafeo, melle 5c farina tritici, fiende pilulas formare pifcibus projiciendas. Alii mule^D adhuc plura Cocculis admifcent. Verum non opus est tanto apparatu, nam noftra experientia, fimplex pafca e pulvere baccarum Be farina tritici aqua contemperatis fafta paria effe cacis est ad pifces atronitos reddendos 8c tandem interimendos. Nam quod nonnulli fcribunt pifces ex hujusmodi pilularum efu ad tempus duntaxat vertiginofos Beftupidos reddi; plerofque autem brevi ad fe redire Be quafi revivifcere, nobis non prae[^]t[^]. Exprimi. "nim nuftra pifc[^]tunim apud Condronchium opinioni fuffragatur, nimirum pifces ab ifto medicamento brevi etiam temporis curriculo necari; an vero (ut illi etiam affirmant) nifi quamprimum capiantur facillime purrefcant fie in partes dividantur nobis incomptum. Et fi quis D[^]iciat in fit Condronchii Sj pifces per aquam difcurrere Sevolvari aflumpro pulverej Beidratione ebrietacis aut vertiginis evenire, illis dicam ego, non harum ratione fed dloris quem percipiunt contrano IJ⁰ fie agitan Sevolvari, uturum quodque animal facere & L praefitum homines folent cum dolore aliquo torquentur. Ego pifces primo velut ebrio 5 Be vertiginofos fieri ab ailumptis pilulis concefferim, poftea nililominus deleteria carutidem qualitate interim]. Nam pifces ab acri-Be amara qualitate bjccarum tantum interfici non concefferimj quin potiis baccas fpecifica quadam Be incompta qualitate pifces veicigine afficere K tandem enecare crecliderim. An verb pifcibus fie captis tuto abfque ulla veneni ili Jpicione tips veici poffimus, non facile dixerim, putotamen cum Condronchio fiquum primum capti liintevifcuntur Be coquantur abfque penculo comedipofTe.

Quod vero coccularha: caldae fint, Bemimic ut Matthiolus contendit frigid^{*}, non obtante (oporiferae arundemvi, a fapore acn Be amaro, necnon ab effectis manifeftum est, ut luculencer emonftrat Condronchius.

Baccas harenullo pafco facultate del Eteria vel venenofa prarditas elle, neque hac ratione verum mei ico primarum qualicatum Be fiae amantiae animalia ifta interficere, opinatur idem Condronchius, Verum fententia: tiix minus firmam probationem affert. Mihi ex Amati experimento contrarium patius colligi videdir, Pzdagogus quidam Cubebas polcens ex imprudentia Pharmacopolxfiuf^u accepit, quem pii Latore vulg^D Coccum vacant. CLJUS cum quaruor adfumum grana avidiffiitie comedere, ille in naufeam Be lingulrum Be animi anguftias incidit: mox ei vomitorium exhibit UJHj quo vel intra horaii abeopenculo Be agone liber est factus.

Cocculi Indici aromatit Muf. R. 5.

Rotundi iunt Be aroniati[^]ij nonnulli Piperis nigri grano nDn muo majores iunt, alii Ceiafi nign propemodum magmcutiine, omies Carj'ophyllorum colors.

a. An^{*}.

2. *Anacardium* J.B. C.B. Ger. Park. 3Hnatart>iun1^ o? fl^alacca bentig.

J. B.

Ariacardio fructui nomen dedisse videtur forma aviculae cordis scmula, compressa, unciam bngo, aliquandocum majori, in Dbtuluitiniucronem definenti, expediculo rugoso, totani balm occupante apperit, chloro nigro ant fuchb splendenti. Inter eternum chricein 6c akerum nucleum immediate ambientem clauditur liquor glutinosus, leu mdligonigricans, cm alii vim causticam, Cnrds faporem primum dulcem, mox acrem, deinde vehementissime adstringentem, adetiut fauces in angustorn confringat, adfcbat.

^Garcias Anacardiojnquitfnomsn indideruitrecentiores Grad (nam Veteribus incognitum fuit) acordis [przferciin exficcati C.5.] cum similitudine, tum colore, Arabum vestigia fecuti. Lusitanis *Fava Malaqua* Aicxtuv, quod viridis Be in arbore pendens fimilis fit majori noRrati Fabi. Miramur (inquit J. Bauhinus) neque Garciam, neque Acoftam arborem Anacardiorum descripfisse fi modo arbor fit, de quo valde dubio^ cum in *Hort. Malabar*, nullam ejus inter arbores mentionem inveniam. Ec ramen Acofta magnam refert esse copiam hbmm fructuum in Malabar.

In mulcislndi^ provinces nafci confenciunt Autores. An vero in Sicilia: monte iEtna \ ubi re-locus: ference J. Bauhino, Paludanus fs vindes ex arbore pendulos vidisse testatur, vehementer dubita, quamuniv^fid coj^irment Monachi in Mefuem, Scrapio, 8c Curtiui, qui in Apulia etiam provenire tradit.

Arabes Anacardia calida K ficca esse usque ad quatuorgr. proinde vim causticam habere^ d<lerf Vm\$. verrucas 5c exulcerara cutem 5 quod repugnat experientiz. Eorum etiam melliginem exulcerare, inflammare, fanguinem & humores adurere ftatuun^quod Acofta etiam confirmat, & tota provincia Malabar ejus usum esse caustici vice (cribit. Siquis infituet in putridum Be cavum dentem unt frangitque &c corrumpit fadle. Calce addita ad bDmbycinospansos bbfignandos, 5c alias res quaffibet nbtandas ucuntur. Etenim notam adeD firmamimprimit, ut nulla lotions eximi ^ueac.

Idem Garcias fructum lpfim deleteriam facultatem habere negat, Sc ad experientiam proVocat: fiquidem in Indiis e laftw fero maceratum afthmaticisdariBe adversus lumbricos scribit. Prseterea iis viridibui5 (addic) & fale condiris utimur in cibariis, olivarum conditarum modo. Causticam tamen vim ficcata inefsi concedit. Quineciam Acofta non tantum viridem fructum edulem esse ait, 8c ad excitandum appetitum, non lolum quidem edi, fed coftz Onzx admifceri admødum *Mangos*, Bcc. fed Be in dehecaco medullam incernam edi ad bibendi appetitum irritandum affirmit, rolam melliginem quæ inter duos cortices continetur causticam esse.

McIliesEleft. Anacardinohas vires attribuitj Vcntris totius inferiori5 8c cerebri affectus frigidus cpmpefcit^anguinem reddit puriorem, fie inde fpiritu animali reddito purgatiore Sc tenuiore, fenfius Omnes, apprehenfionem, intdlectum 5c memoriam juvat^ colordmque vividum corpori tribuit.

E contra Cap. Hofman. non admittit Anacardi5 quovis modo prarparatos, imD damnat penitus CDnfefionem Anacardinam, quamvis *fapknium* dicatur: imo, inquit, est *confeffio* (*tultorum*). Habeo etim ab amicis, quosdam ab ejus usu maniacos esse faftos, 5c catenis oppus habuisse; Be a quodam Joh. Helderopreceptore fuo multa exempla prpbpfit eorum quibus male ceflent. Interim tamen Hiftoriam narat oppido mirabilem, de quodam ex ordine sub cui alter preceptor CDnfefionem hanc dedisse ferebatur, Hie enim cam antea fciebant eum omnes afinum fuiffe, a fumpto Eleft. intra paucosmenses eo dofrinse proveftus est^ut J. C. factusad ProfefluramWittebergenfem affirarent. Sed intra paucos annos ita exficcatus est, ut cum perpetua fiti premcretur, quotidie ad ebrietatem usque biberet, itaque 2z fibi Sc fuisiniitilis faftus, tandem mi/er perierit.

Solent interdum Indi nonnulli hinc fructum cupidi cultelli infixum canddsc ardehfi imponere, qui dum uritur mirum quos ftrepitus edat, quaS ignis fcintillas quasi fulmina ejiciat variorum cobrum, caque ratione Impoftores mulierculis 6c rudibribus imponunt, ficc. Vide Acoltani.

2. *Cubebz* J. B. Ger. Park- *Eubzba vulgares, nœ Arabufz Cub?b*3nzc Gakni Carpejium* Matth. C.B. CuMtf.

Cubebz grana (untPiperi familia, interdum paulo majdra, pedicub bngo^ ftili infar donat5j cDrtecefusco, rugolo, interdum erugatb extenfoque, nudo jübjedlo exiguo, rociindo, forisnigricante, intus albo; aliquando caffia reperiuntur, æque efficaci, vd etiam efficaciore fapore praxdita quam nucleata, (iavi, aromaticoacri, fed quiPiperis acrimonia:multum cedat, percinaci tamen.

Arbores earum Pomis noftris haud abfimiles funt, racematim cohcrent grana ficut uva: vitium, nuxque tamen proprio hxrent pedicub. Java: in col a: Cubebz coquunt aritequam divendant, rie Be alibi locorumfementur atque proveniarit. Crefcunt (tradente LinfchDtano) in Java: (ylvis fua fpontead riparriSunds. Fructusautem nequePiperis genus funt, n^que Oxymydrines,neque Carpefium, neque Viticis femem, ut facile effect ostendere.

Cubeba: calcificat Be exficcanr. LanguetiCerti ex pituita ventriculilum vel etiam ex flatu rDborant^ pCftu5alentis crallifquehumanbus expurgant, lienem juvant, flatus difcuciant, 6c fngidis uteri af feftubn5 auxiliantur. DiU cum Maftiche manfe pituitain a capice ttahunt. U cerebrum roborant. *Matth.*

Cubeborum^ in quit Garcias, magnus in vinD maceratamm elt ulus, art excitaidam Venerem^ tum etiam in Java ad exalfaciendum ventriculuni.

Cubebaefioecontineanturdaramvoce facere pronunciantibis perhibentur; quin Sc majorem in cDitu voluptatem inde lentiri: qual vero (inquit J. B.) non lie in ea titillatione mens cominorata, nifi doceamur quemadmodum nos Venus adminiculatior K violentior transveribs auferat.

Cubebz ex aucoricacc Avicenna:; urince vias emundafit, arcnulas excergent, calculos pollunc Renum quam Veil car.

F Si pulverem Nucis vomica; velis ea raduh deterenda eff, nam in pik tundendo ob corneam fubstantiam commixtū Jiequit-

6. *Nux Metd Officinarum oculata* Q B. *Nux peregrina oculata* tomprzja J. B. *Fructus peregrinae* * Cluf. Exot. l. 2- c 30.

§ * *

Major est Nuce Vomica Offic. dicta, qua: hirsuta est, hzc verb circumscriptioe haud ita rotunda, fed per ambirum nonnihil finuata, altera parte in gibbum extuberante., altera compressa. Color cinereus, vel in ruffum declinans: Gibbus per declivia ordine poficos habet ocellos quinque improfos, compressa pars frobiculos habet inculptos, in umbilico quidem unum; unde pediculus vicur prodiit. in marginibus autem multos incerto numero. Ocellis respondent totidem loculi distincti, in quorum unoquoque/Ww unicorn, Pomorum aut Pyrorum feminibus simile, fed babcicus, fubstantia pingui, oleja, fapote Avellanae: circumjeaa omnis fubstantia lapidex est duriciei.

Hic fructus meliis respondere videtur Nuci Vomica: Serapionis quam ejutdem Methsl.

- 7- *Juglandis fertifadfructus* €X9ticHS,fulcatus,tubtrofzjs J_m B.

Magnitudo nucis Juglandis majoris habitiprirque uortice testus non diiro, fed gallarum inftar fungofo, quasi recensputamen carneum fuerit: Totus per longitudinem speciosè filcatus est- fuU cōfque reftos decem in hoc numeravitnus, nee sine eminentiis extraordinariis, inzqualibusj tu^hproiis. Ima parte qua fulci conveniunt frobiculus est, oppofita gibbus. Si acu fubstantiam ejus confudias interiora dura deprehendes.

Huic alium fubjungit fructum J. Bauhinus, quem vocat Nucem Indicam oblongam cortice confectam quem pracedentis speciem videri ait^h finon eadem fit. Hilt lib. 3. cap. 10.5.

8. *Beretinus frubtis* CluT ExtJ.z. cap. IT. *Laurifolia Trenatmfis* GB.

Clufi*

Arbores hos fructus ferentes Foliis Laurinis prxditaE esse dicebantur, craffis, fplenientibusjn ambitu minim Merratis, oblongiufculum fructum, exiguis Iligneis glandibus limil Bm ferentes, nullo tamen calyce (ut affirmabant qui invemebant) iululum, tenui uortice, cineracei coloris, interdum etiam atri testumj nucleumque continentem oblongiufculum, candidum, nullo manifesto fapote (quia pr^h ficcitate induruerat) prsdicucn, &c ut ab incolis Beretina: infulz edocebantur edulera, feu more Isinguminum elixum^h feu in farinam tritum Be pultis inftar inipiflatum 6c coctum.

Indeferta primuminflila, deinde in BBrcioa dicta, & in Moluccis a Fran. Draci comitibus inventus BCrdatus est.

- Glandi Iligna; quvda 7 mnodo. Jimilvri\$ttm, cortice fragili* J. B.

Ipfo fatens Beretino pracedeati fimilis videcur.

- Nucula Indica cortict tsmro, forte Bmtinus frufus* J. B.

Olivae magnitudine, qua adhsic ladufcula, altera parte in acumen definente, fex coftis reftis parvis diitirtus, fonorus. Cortex cedit unguis compressus.

CAP. II.

Frufus rotundi & orhiclares C. B. p. 405.

1. *FruBus magnus tx rotunditatt wmfreflin cartice rugofo fufv* C. B. *Peregrinus fructus craffkt* * Cluf. Exot. l. 2. c. 7. *Feregr. frufus cr. in quo magnus nmlt* J. B.

V Alde craffus erat hic fructus^h nam geminum pugnatum magnitudine aquabac, orbicularipacne figura^h fedlatior five craffior quam longior₃ ut cujus circumferentia esset decem unciarum, longitudo vero a pediculo utrius^h ad fummum taftigium duncaxat novem: craffo rugofoq, cortice, illoc^h fufco, cavum orbem umbilici inftar circa pediculum habente, liiperna auctem parte tuber mils quibusdam obfco: interne magnum contihebat nudeum^h in binas partes festum^h valde rufosum, fufci (quia ficcusj coloris extern^h, ex atro vero rubentis interne^h ad Iringencis initio iaporis, inde fubdulcis. De loco nihil habet.

2. *FruEtus rotundm cortict fungyfo fubpurpurafcent* C. B. *Fr. 1. d Garto* * Cluf. *Fr. planus fubpur-* Exot. l. 2, *pitrws, nuchoimpwje amaro* C. B. c^hp- 1^h

Cluf,

Planus erat, Be circino duftx fere rotunditatis, quem non fingularem, fed plures fimul connexos alio fructu inclufos fuiffe arbitrabatur Clufius: nam alia aliis quasi incubuiffene, veftigia in nonnullis adhuc apparebant. Erat vero craffo quidem led fungofo cortice prxdicus^h fubpurpurafcentis coloris jlevis^h fefcunciam latus, nucleum conciaens planum, candicancem, impense amarum.

NiiUum nee nomen, nee locus adferiptus.

j. *Frufus**

- *Exot. l. 2. c. 13 5. *FruBits orbicularis spadiceus lavis* C.B. *FruBts mifcztanws* 3. * ClutFr. *orbicularis perpolititis mucrone glandis* J. B.

Orbicularis erat forma; unciaspaene tresambitu comprehendens, I^{vis} Be psrpolkiiSj fpadicei colons, fuperna parts exiguo mucrone (veluti glandes) prxditus, inferna veftigio quDdam cuipediculus inhsfiflẽ videbatur, levis & aquos innatans, tãmetn nuclsum aut pulpam continent ut exftrepi-tu deprehendebatCluiius.

- *Exot. l. 2. c. 13 4. *FruElus orbicularis fufcus nucko cineraceo* Q B. *Fr.mifczllaneus* 4. * Cluf. *Fr.fublongus cvrtict duro, fufca tettus epidermide* J. B.

Cluf.

Defcriptio noti valde diflimiUs erat, paulo tarn en minor & oblongior [intsrdum zqualis] Corticem verb habebat duranij psneinftra puraminis nucisPontic[^] fufca ceftum epidermide, internam autem parcẽmcineracei coloris: aqua meriis non libfidebac, fed innatabat, licet nucleum continebac Av ell ana nun miflorsm, cineraceum[^] rugo/um ob vetuftatenij non adeo folidum ut primoincui-tu apparbat, fed'qui cultellofacile fecaretur, fubflava came five libftantiaj qusc manducata fatii ãlfe deprehendebatur.

- *Exot. l. 1. c. 19 Fruetas orbivularis flavu5> macula fubfufed notatus C.B. *Fr. ptregrinus* 6. * CluT *Frutlus peregrinw tanquamtorv elaboratesflavus.*

*Tarn cõctis Non alia in re quã coloris * flavo a frutSu Lobi t[^]A[^] Cluf.fhu Carstti H. M differt. Per eNtremitem qua lobo adnzferac macula fubfufca notatus erat.

quam nucleii
puJpxii

6. *FruBus orbicularis ftdicms nucho duro* C- B. *Ftutfus exoticUs* 4. Cluf *Exot. l. i, c. 19. N[^]i Cjpotz acctdens fruffus, orbic. lavx, [padiceii colons* J.B.

Orbicularispne erat format, quatuor verbunciarum ejus ambitus; cortice five veriũ putartiĩS quidem duro, fed non valdẽ crãflõ csftus, qui fuperna partelvis Be fpadicei colons, infernã rugofus & fufcus, nucis Cypote ferẽ inftra, nucleum concinens durum, foris fufcum, intus album, non ingratĩ fãporis[^] ea parts qua levi putamine tettus fuerat friatum, altera prorfus rugulum. /

7. *Fruttu5 orbiculari* ex ruffonigricans* CB.*Fr.pttrjrinus* ;. Clufi *Exot. l. i. c. 50. Jt. ptregriant orbiculatus cuj pulatus* J. B-

Cluf.

Mediocris Avellanac magnitudinem non exuedebatj pãliB orbiculari erat forma, niĩ inferna pars paulo anguftiorin triangularem quafi mucronem defiffet; color ex ruffb Ill gricans, Be tãmetfi levis nihilominus in aqua fubfidebat. Duro crãflõque putamine conflabat[^] Be nucleum candidum tenui fufcã membranã tettum continebat. Ex Guinea ddatuserat.

8. *Fmtus orbicularis fuliginofus* C.B. *Fr. m iy. a Ja. Gareto* Cluf *Exot. l. z. c. 16.*

Cluf

Orbicularis erat Bcfemuncialis magnitudinis, duro corrice tettus inftra fruftiis Styraçisj duplo ta- Ill en major, colorifque minus illo/plendentis Be quafi fuliginofi, nucleum aiiquem continens, quia agitatus ftrepkum edebat.

- *Exot. l. 2. c. 13 9* *Frvffuj orbicularis atr & acidm* C-B. *Fr; fyrtgrinus acidi fãporis* *CluI *Truni parvi magniW- dim frutlusfmorus audits* J.B.

Orbicularis ferẽ erat form*, unciam viz. longus, tantundem latus, paub tamen planior, utrinque lumens pulvini inftra, ater omnino, h tenui curvõque oblongo petiolopendens, tenui Fragilique CDrice prailitus, quipreflusillo frangebatur, fcpulpam continere deprehsndebatur fungofãm Sc fria; bilem, fubrudentis cDloris, acgue valde acidi iãporis Tamarindoriim pzne inftra, (proptsrea valde CDmmodam nioo judiciD ad fedandam K excinguendam fitim[^] in cuius incditullio femn planumj fufci colons, candicance membrana involutum erat.

De arbors aut loco nihil reficercerepotuit Clufius.

- *Exot. l. c. i\$ 10. *Fruttu5 orbicularis cimriczus ut Chamarrhiphznucleus* D B. *Fr. \. I. navigat. Bat.* Cluf G&* marrhiphts ojficulo nvn diflimilts, fid major orbicularis pane* J. B-

Oibicularispne form* erat, Chanurrrhiphes fauStis officulo non diflimilis, fed major, Lcvis, cineraceo colore pndicus, putaminelatis tenui, quod fungofã quadam materia iuffiiltum, interna, Q^u nucleus includebacur lxye &c fufcum erat: iplẽ etiam nucleus fere orbicularis forma; infima tãJ² pane in mucronem deJinens, qui in binaspates dividiuus erat inftra glands & fimilium. Ej^{^5} tantia dulcis uc Amygdali ferẽ, fubflavi colons.

- *Exot. l. i. civ "• *ArantiifirmJ colons cimractifruclustftrtpitum dim* J.B. *Fruftus orbicular* Arantn firm cimractws* C. B. *Fr. minor i.Paludam* Clut

Chuf.

ProrJus orbicularis erat, parvi Mali aut Aurantii Formã, quatuor uncias ambitu continens, bytfc[^] plons fere cineracei, /blidus Be durus, pulpam auc nucleum jam reficacum concmens, quoniam c^o moms ftrepituni cdebar.

11. *Fruclūs rotundas parvus, putamim fpadkzo fla*vefcnte> nucko fubacido C. B Fr 7 à Jaa* * Exot. 1. 2a
G<rtfa*CluC " " " J " 16,

Cluf.

Lobo inclu(iis fuit) videbatur, aut faltem alio operimento: nam veftigium fupina, parts retine*
W, qua alreri rei Inha-ferat, alloqui firmo putamine przditus erat, licet valde tenui Bepra: polltura
fplendante, coloris ex fpadiceollavefcens, nucleum putamini non adhsrentem continet^ in bi-
nas partes diviiurrij interne candicantem, lubacidp fapore.

12. *Fruilus orbicularis comprejfus cineraceus C-B. Fr. minor I. Taludani* Cluf Fr. rugofus, par-* * Exot. 1. 2a
vis, orbkulat* fa.m figura, <juafi cotpreffie J. Ji. c. 2 u.

Gravis erat, orbiculatae pacne formz, planioris tamen 8c quafi compreffa, rugofuSj cineracei Ferè
DuriSj durus Be folidus, aqua tamen merfiifon fubfidens
Et nomen Be locus Paludano ignotus.

C A P . III

Fruittus orbicularis fukis ncrvipvt dijlintti C.B. p. 405. Nucula Taphzt Here. Saxonia J. B.

^{J. B.}
Magnitudine illa unguem medii digiti squat. Seflilis eft nodice, in gibbum heraiapha-
ricum pacneelata, ita ut per medium feftum globum fere reprzfenter. Curtice munita
eft duro, cinereo, perindeac Nux Vomica- In centro partis plans Foramen umbilicale
impreffum. Subftantia interna nigra eft, duritie cornea, fine fapore notabili. Ad nucem vomica-
m referenda videtur. An granum nucis lequentis ?

- I. *Fruittm orbicularis major fufcus JtriatuS C.B. Ft. orb. pwegrmus 1. CluC Exot. li.c.y.Fr.*
orb. perejr. cum grañs nucis <vomka jmilibus J. B-

Orbicularis 5c fphxicae prorfus forms erat. Dimenfi, five per longitudinem linea dufta, five
per tranfverfium, ambitus erat parrie unciarum novem, nonnihil tamen fnatus erat, circa earri
partem qua pediuulus adhaEerat colons fufci, Isvs Be intus cavus^ aliquid tamen continens, iit ex
ftrepitu quem agitacus cdebac conjsfturam facere licebac. Ex illo p-rtufò edudta liinc multa grana
plana nucis voancae Formam perbellè referentia, nifi minora fuitent, & oras minus craffas habuil-
fent, lapDr&mqe tnnimè ut ilia amarum: ollea tamen eorum durities-

2. *FruBus orbicularis minor cimrawus firiatuS C. B. Fr. orbkm peregrinus i. Cluf Exotm*
lib. i. cap. 9.

J^rorliis orbicularis erat etiam hie fmftus, fed minor, ut cujus ambitus quatuor duntaxat unciã-
rum effet. Pulvinato aliquo integumento inclufus fuiffe videbatur, conjeftura fafta e fibrarum;
quibus putamen (quo inclufum erat) praeditum fuerat veftigiis ipfi impreffis. Cineracei coloris
erat externa ejus pars, interna cava 6c nucleum continens, quia ftrepitum agitatus edebat. SI ha-
buiffet ea foraminum veftigia, qua: funt in magna ilia Nuce Indica, parvum Coccum quifpiam
exiftimare potuiffet.

5. *FruBus orbicularis fubniger & fphndeni^ fulcis diftintfus C.B. Fr. 1. Gnil. Farduyn. * Cluf- * Exot. / \$.*
c. iz,

Orbicularis p^rie erat figurz, una tamen parly Teflilis & C quodammodo planus, altera in orbem
aflurgens, creberrimifque lubni^ra fplendentque qua tegebatur cute fty? membrana, quaquaver-
fum velut fulcis diftintus, verum longè major, nee adeo turbinatus. Qrws erat, coitice Fulco
przditus e&que quern dixi modo fiilcatus: interna pulpa five fibftantia dura candicans^ falii initio
faporis, deinde adftrihgentis. Ex India.

4. *Fruittm ater fphndens, quatuor fulcis diftinttm C.B. Fr. 9. a Jac. Gtrttm * Cluf. Fr. ater\$ tjün- * Exot. J. i.*
tuor fulcis diftinttus J. B. c 16.

Prorfus ater erat, Lcvifque Bè fplendens^ quatuor fulcis fuperne diftinttuSj (tanquam in qua-
tuor partes diviliis effet) quorum bini ad parns adverJk umbilicum ufque dufti, planus alioqui, Be
orbicularis pame forma; unciã paulò minor, fiperina parte aliquantum tumekens Be quail pul-
vinatus, nifi qua parte fulci deprimeb^nt: adverfa pars veftigium r?tinebat fufcum; quo fruftui
five cortici qm tegebat firmiter inhxfiffe videbatur, quale in Caftanea equina conlpicere eft, ve-
rum non adeo amplum/danum tamen Be flidum deprehendebam, adeout etiam limam quodammo-
dore/pueret: eam ob caufam quem nucleum contineat mihi incompertum.

5. *Fruittus orbicularis in furnmo lined trigond difimtilus C. B- Fr. 10. d Jac. Qdreto * Cluf* * Exot. Lz-
Cluf. = 1 E.

Paulb major erat femuncia, orbicularis pxne forms, fufci coloris, qui an officulum duntaxac
all cujus fruftus effefnknc dubius eram; mirabilis enim erat ejus forma; nam fuperina parte in tres
iqiiales partes lineã trigbhã quioAammodo difturfueljatuT, ilia Viz. à fummo in quo foramen
P Q Q P P P P dufta:

diifta: infima autem parte tres illis linear, zqualiter latera fecantesferè ad umbilicum pertingebant, h. e. ad duplicatas alias lineas qua? criangulum conftituebant, in quarum medio erat umbilicus fivs foramen magis amplum quàm in fuperiore parte, non tamen pervium, 8c interftirium illud duplicatas lineas mangulum efficiens occupans paulò candidioris erat coloris quàm reliquus fruius : an verò nucleum-continerei: ighorabat CJufius, quia mutus aut a gi rat us nullum ftrepitum edebat, aqua tamen merfus iubfidebat.

*Exot. l. i. c. 17. 6- *Fruttus orbicularis Arantium ficcum rferens otto venis diftintzts C.B. Fr. i. Jac. Flattau* * Cluf
Fr.Malo Aurantw reficcato fimili, levis, aurti coloris,otfo nervis diflinttus J. B.

Prorfus orbiculariserac Format, quatuor enim uncianim erat ejus ambitus, five à pedicub circumferentiam metireris, five medio CDrpore, corio five cute teftus colons ex aiiro flavefcencis, uc exiguum aureum Malum reiccacum videtur ; ofto tamen nervos lácis craffos à pediculo ad flinnum fruttum omni ex lacere ductos habebat, eoriimque nonnullos geminos, alias quaternos finul JLinaos, alio5 fingulares : valdc auctem levis erat quia reficcatus: breviter omnesnocashabebat Mali Aurantii prxter UJam nervorum diftinttionem.

7. *Fruttus orbicularu fufctrs fenis newis diflinttus ex Guinea C. B- Fr. orbicularis ftegrinus ?.*
Cluf-Ex. L Z.c. 1 D. Fr.perejrr. orbicular is finis nervis diflinttus J. B.

Cluf.

Hie etiam prorfus orbicularis Forma: erat, fed ffnis dun rax at nervis diftinttus, abinfima feds ad excremum uFque per longitudinemrefra line! excurrentibus, fefcunciam longus Be craffiis, fufci CDIDIS, aliqua tamen ex parte Linsrac^i, nucleum vel pulpam i cortice ibjundam Sc liberam cuntinens: levis tamen erat, Be aqua merlus innatabat.

8. *Fruttu orbicular is ffadicetrs novtm vztis diflinttus major C. B. Fr. orbic, fzregr. nrvs diflinttus 1. Cluf Ex. I. 1. c. 1 D. Fr. perejrr. 9 nrvs diflinttus J. B.*

Cluf.

Npn inelegam erat hie Fruttus, forms orbicularis, fex uncias in ambitu craffus, tres Ipngus, ducta à peciolo cui inhzebat ad extremum Fruttum lineã, h.e. in toto illo ambitu fex unciariff longitudinem explens, npvem nervba fummo ad pediculum, femunciam paenc longum, dudisdi' ftinttus; Fufci vel fpadiceiquodampdo colons, levisj prsgnans tamsn, flc nucleum vel pulpam r' flccatam cum leminibus continens, quia agitatus ftrepitum edebat.

9. *Fructus peregrinus orbicularis novtm nrvs diflinttus minor cum officulo angulofo J. B. FruBtu orbicular'u minor, novem vmis, ut fr [zmzn, diflinttus C- B. Fr. orbicularis pzregr. nervis difinttus*
x. Cluf. Ex. I. z. c 10.

Cluf

• Orbiculari5 erat Forms^ novem fimiliter nervis a lummo ad petiolum diftinttus, minoribus tamen he]ueadeò eminsntibus, longc etiam minor: nam trium duntaxat unciarum qua quaverfium ejus ambitus/ nee ftrepitum ullum edebat agitacus, quiamaturitatem forfan nondum adeprusj fie levis ut precedens: hunc apenebac Clufius, Sc in co mulcam pulpam corici adharrentem inveniebac cum officulo valde inxquali, Cc totidem angulisquot Fruttus nervos habebat ad iumnum corricem pertingentibusdifinttus, cui fimile officulum nullum vidiflè meminit: qualem vero nucleum CDntinere ighorabat quia conFringere noluit.

CAP. IV.

Fruit us fipiraolongi wait C. B. pag. 405.

* Exot. L1. r. 19. 1- *Fruttus ovi anfrini magnitudint fufco-eintruj C- B. Fruttus jirtgrini pulpa* * Cluf! *Fruttus pert**
grim nucleus], B.

Cluf.

Anferini ovi magnitudinem zquabat, imò fuperabac, quinque videlicet uncias pame longus, 7^ era ff, ff rucidato ejus ambitu comprhehedebat, valde gravis, nucleum hys pulpa et julpianm fructus verius quàm fructus vanderduy: nam mollis erat, tunc quaedam & rugofa membrana exFuFco cineracei colons tedta, unguibus (fi quis premeret) laceros, coloru fubferv, et vecuftatem Forte, Be ialfi quodammodo faporis, qui an natura ipfius pulpi, an arte acquifitus igno; ro: Fed haud dubie aliquo putamine claufa Fuerat; nam membrana cum cegens veftigia adhuc r&^ nebac imprefla à craffionibus iplnisnucisinternis nevis.

1. *Frattus ovi anfurmi formã C B. Fr. TrbicuL pmgr. j. Cluf Exot.l. g.c. 9.*

Non valde diflimilis erat Fruttui niinori orbic. cineraceo (Iriato C.fi, Fed longior & L craffio^ ovi Anisnm Forma Be magnitudine: adici vabatur in eo Ballamum Peuvianum.

* Hxot I 2. r. 19. 3. *Fruttus ovatis fufcus, nucleu Avallanus fimili C. B. Ja. Sartti* * Cluf. *Fr. toxicus*
coloru J. B.

Cluf.

Duro, denF6que coctice prarditus erat. e6que inxquali & FuFci colons, intern* lervitio & quodammodocineraeD, media ejus parts fibrofa;Be firma:nudcum auctem wnnneoat Avallanus suo
purgantio

Pucamine inclufa: magnitudine^ graven^ durum, rugolum (quia reficcatus) in binas partes divi-
Um, folidum, interiors parte albicantem/in quo niillum manifestum lap or em deprehendere poce-
rat Clufius, quia omnis vis ob vetustatem Fortè evanuerat.

4. *Frutlus ovalis putamim craffo fibrofo* C.B- Fr. 3. Jac. Gareti CluCl. c.

Officulum verius alicujus fructus quam fructum dici poterat, idque valde duro Sc craffb pittamne
praeditum, quod externa parte multis fibris confabat, interna verp nigrum &c quodammodo
jaxeum, nuclum craffum, durum be rugofum cDntinens. Ovaliporro erac illud officulum formā,
fetcunciam longunij unciam craffum.

5. *Fruftuj ovalis fufcus* QB. Fr. MifcèUaneus 1. Cluf Ex. 1.2, c.lf. Fr. Indicusovalisrugofus]3S9

Sefcuncialis erat longitudinis, binas uncias aut amplior ejus ambitus; duro, inſqualij rugosoque
Cortice confans, fufci coloris, gfauidus^h. e. alium fructum vel officulum five pulpam continensj
nam agitatus ftrcpitum edebat. Apertum nucleum continere depreheniit Clufius, craffumj ejuf
dem cLim'ipfD frufru formar, cavumintus fc inanem^ (iibftantiā Camsnufcā conftantem, Be fepors
quafi vetilitac 5c ranCid* Amygdala.

6. *Fruftus ovalis lapidi Judaco fimilis ex fufco nigrkans* C. B. Fr. feregrinus ovatus, fimili^ lapicet
judaico J.B. Fr.z. cap. 30. l. z. Clul. Exot.

Judaico lapidi magnitudine par eratj Sc ejus formam exceptis ftriis pulcherrimè exprimensj ex
rLifonigrantiscolbris eft, utmajoresnorinullægall^ lsvis K aqux impolitus iupcrnatansj duro pu-
raiiiirie confans, ac nucleum continent.

E Guinea delatus eraL

Locust

7. *FruEtus olivdz ojjiculum referens* C- B. Fr. minor J- Taludani Cluf Exot. 1. 1. c. ID, B. r. r. e.
cujufdam pragrands officulum J. B.

Bacci cujufdam pra!grands officulum videbatur, formā Olivac officulum utcunque referens,
longè tamen majus, utpote fetcuncialis longitudinis, uncialis verò latitudinis, rugofum, folidum,
nucleum in iz concinens ut ex agitati ftrspitu Conjfturam facere licebat Ulf.

8. *Fmctius ovalis fpadiceus* C.B- Nnx peregrina i. Cluf Ex. 1.z.c 13. Nux orbicularis peregrina9
glabra, fpadkza J. B.

Cluf

Nux hf^c orbicularis pxne formal erat, paulò tamen longior: nam illias ambitus, fumptā ytrin-
que per longitudinem menfurā ^i uncias conçinebat, vix autem quinque unciarum erat uir-
cumferencia^ inferna parts nonnihilmucronataj luperna verò obtufiorej duro 6c fatis glabro putamina
confdms; fpadicei coloris Be nucleum contitiens, ut ex agitatse ftrepitu conjefturam facere poterat
Clufius: alio' verò involucrd tsftam fuifle cccum eftj quale porro id fuerit, aut quali in arboro
nata inrelligerenequivic Clufius.

9. *Fruffus oblongus fufcus firiafus* C.B, Fr. txohtis 3.- Fetri Vaauw * CluC Frnffus fufcus durus * Exot 1.z.ci
ftrtatus Jtrepitum tdws J. B. 24, " " "

PAUID longior erat uticLa: trium verò unciarum ambitum (qua parte craffior) cominebat, eo,
lore fufco praedicus, durus, ftriatu^ in obtufiim mucronem definens, in quo officulum vef nil-
dens induiij quia agitatus ftrepitum edebat,

10. *FruBus oblongus anuatus fufcus* C. B. Fr. I. \ navigat. Batav. * Cluf. Fr. exot front part* in * Exot I 2'fl
arcum elatus, [upinaplanus, fufcus J.B. *h' " " "

Binas pariuncias latus erat, paulò autem bngior, protia parte in drcum elatus, fupinā planusj
denfb, cralloj dLiroque cortice praditus, fufci CDIDHS & quando immiatus quodammodo Ipadiceij
materiā fpongiosa, hrmā camen CQiftansj nucleum verò cohtinebat uncialem, planunij durumj
fulci colons excerna parte, fibulab entuni iatarna j in binas partes dlijffum, quallam adftiffione initio
prxditum, deinde falivam cientem, tenui fpadicea membrana irivolutum.

Exjava.

Locust

II. *Fruftus oblongus fufcus fohndtns* C.B. Fr. i. cap. 18. li: CluC Exot. COXQQ Cyppte ditfusj
Nux five DfficulumCjrpotc, JimiU Nuci Balfami Peruviam J.B.I

Noft valde abfimilis erat illi, qui Cluiid aliquarido miltusi pro Fruftu ejus arboris, quz liquoetre
niliun Balfami appellatione donatum in infilla Hayti five Hilpaniola profert, fed minor, nec/padi-
eei. ut il^ coloris, fed fufci profus, 8c prx laevore iplendens, centre five inferna parte cineracci
tolons, nonk viut liiperna, fed fcabra. A'io fruftu haud dubie indufus fuerat, nara officulum
dunraxacerataleriusfruftu5: qualis autem fuerat arbor qu^ fructum pertulit, aut qua in provincia
s h a / nihil erat adferiptum. Agitata nullum ftrepitum sdebat, nsc in aqua fubfidebat.

+ Exot. J. z. c. iz. *Fruffuj oblonguj cineracuz nervis craffis* C.B. Fr. 3. *Tarduini* .Cluf. *Cunant nuci prnilis cinzrei coloris* J.B.

Longus erat i uncias, qua parts latiffimus unciam aut paulo amplius latus; forma ei nannihil convexa, dorfum datum & aflurgens, arctius caput, infima pars in mucrone definens, cineraceus color, craffiorss eminentiorelque nervi, a liimmo capita ad infimam partem per dorliim excurrenteSj, tanta arte expreffli ut humana induftria fculptos quis arbitran potuilTet: Alio autem CDittice teitum fui/Te verifimile eft, qui affidua a fluffibus marinis in litore volutatione attrims fuerit: cunftabant verò Illi nervi ex fibrola materi^ quemadmodum infima pars nonnihil atrita Hdem faciebac. Ad nucis porrò *Cunant* formam valde accedebat, execpra ilia ncrvorum eminentia, turn ciam color c, qui in *Cunane* pr orfiis ater erat.

Exot. I i e. l & us oblongus aneraceus acidulus C.B. *Oregioe* Sa tx qM *Cacao fotiom* conficiunt* Cluf.

16. /r. ia* ^ *Fruittuj vblongus vortict flavo-fpadicte* C.B. Fr-13. cap. 16. lib. z. *zxtot*. CluH *Fr. firafilianorum ftrniciofus* J. B-

Uncialis longitudinis erat. non tarn denfoquam lento curtice teftus, fpadicei ex flavo coloris, nudum cuntem5 cineraceo coloris prarditum, 5c tenui nigrissimaque & L fplendenc membranà obvolutunij ipraterquam infima part^ qux aut candicans, auc (dstersâ membranâ) nuda, quantum Clufio obler^are licebat in fructu imperfecto.

Biailianî prnkiolùm zttk dicebant.

I* *Fruffus vblongus lobum refer ens nigr* C.B. Fr. 14. r. 16. /x. *zxtv*. Lluf

Sphndsns prx nigredine erat, uncial cm ferm^ longitudinemj 6c minimi digiti craffitudinetti squans vsi etiam amplior^ parvum quendam lobum formâ rfercnSj mucrone roftdlum avicul quodammodo reprxientants: exalbidam pulpam concinebac, in qua latebant bina aut terna femina fpadicei colons, Malorum vulgarium lëminibus psns familia.

CAP. V.

Fruflus Pjrisgrmcs C.B. p. 40 5.

1. *FruBus pyrifarmis major rugofui niger binis ceUulis dtjhtnfus* QB- Fr. *txothus* I. cap. 14. *dtz*. CluL *exot- Tyrifortnisfruitus rvgofui mgr*, durv corio tefftu J. R

Cluf
Turbinatus erat, Pyricus formam aculebatur, 1/2 uncias longus, 4/5 ambitu, latis tamen rugofus, prurfus niger, ad hunc usque punctum vix dicitur, ut dicitur in culbro huius modis vi adacto aperire possit Clufius. Apertum binas cellas habere deprehendebat, membrana quadam fuscâ 8t fplendenta diftintas, in quarum fin gulls nucleus bifariam divifus, media etiam intercurrente membrana, quemadmodum ferè in Nucce Juglande. Totus nucleus fitum vetu/hte coiitraxerat, Be initioquidem faporenullo manifesto przditus videbatur, diutiusculè taraen in ore retentus quancUm acrimoniam habere, 6c tandem fauces quodammodo urcers compriebar.

2. *Fruttus Fyriform. minor fpadiceo-cinrtus* C.B. Fr. *txot*, x. Cluli l. c. *Tyrifovtnis fruttw Uvij*, *fpadiczi cokris, fragili cvrtict zttus* J. B.

Cluf

Hie etiam ii uncias longus erat, minus tamen craffus; nam apibitus ejus trium duntaxat unciam erat, bevis totus & c fpadicei aim cinereo mixticoloris in longum mucronem definens, fragili rartice conllans^ qui an alio operimento teftus fuerat Clufium latebat: Pulpam autem continebat njgram in qua ofliculum latebat, uncia magis longum, durum, cineracei ex fufco coloris, obtulo mucrone praedicum, \$L liimma parte in uno latere vcluri exculptumj in quo haud dubiè nucleus latet. Jicet nullum agitatus bnitum ederet.

CAP. VI.

Fruilus vrbicularcs & rvtndt & males tulerchlis vhfitt C B. p. 406.

22m. 1. *FruBm orbicularis fufcus tubrculis obfitus* C.B. Fr. x. *Tarduini i Guinea* * Cluf *fruihuorbicular**, *aQuantnlum mucronatum, tuberculis obfitum fufcum* J.B-

Cluf
 f j Ncialis erat bngitudinis, fed ofliculum fruflus^ verius^ quam fruflus, orbicular jvns
 I forma praedicum f niti qua parte fruflus ipfe quo continebatur ^ pediculofe So^ d
 BL exima, quæ aliquantum mucronata) tinnu ferè unciam ambitu, vceptipia in
 rum & perpeuis cubrculis obfitum, in quo camen apparerent veluti triangulans, orna; ^
 utraque exrremirate, fulidum, grave, aqux camen umacani, nee fidens ctiamfi E£ merga u.
 EGunæaJUtustf

- x. *FruElus orbicularh cineraceus tribus foraminibus donatus* C. B. Fr. 8. cap. i 6. l. z. Exot. Cluf
Fr. orbicular is fere cum tribus fulcis & tribus foraminibus J. B.

.tluf.

Formam orbicularem habebat, paulo tamen planior erat fuperna. Be fefili parts, unciam Jams, folidus, nee, ullum ftrcpitum dum agitaretur edens, cineracei colons, tribus canaliculis five fulcis diftinfus, a finmo ufque ad tria foramina quannlateribus obtinebat, tribus aliis minoribus Junima parte prarditus.

3. *FruElus rotundas fiarius tuberculis obfitus lima eminentiore tranpuerfa* C. B. Fr. ~~1112711111~~ A. Cluf
Exot. I. 2. r. \ 0. Fr. peregrinus tuberojus major Clufio J. B.

Cluf. . . »

Huic fpharica fere erat forma, magnitudo p^neuticialis, putamen admodam craffim 5c durum, perpetuis tuberculis undique obficum, flavefcantis coloris, linea eminentiore tranVerfutn fecantc, quam uc in Juglandibuspucaminis conjunflionem K commifluram ^fle arbricrabatur Clufius.

4. *FruJus rotundus fla<vus tubzrculis obfitus* C. B. Fr. *ftreginus* 5, CJuf. J. c.

Cluf.

Spharica: prorfus erat huic forma; magnitudo gtabuli minoris fdopi, putamen cjfdem cum prarcedente colons 8c perpetuis etiam tuberculis, non adeb tamen craflis, obfitumj nullaque" lineat cint5Lim.

- y. *FruElus ovalis ex fufco fubrubens, tuberculis mucronatis obfitus* C. B. Fr. J. c^I. lib. z. Exot
CluC Fr. Exot. Strammn modo tubzrculis obfitus J. B.

Sefcuncialis erat longitudinis, unciam latus; paulb enim planiore erat forma, colore ex fufco Jubrubente, totus tuberculis levirgr mucronatis obfitus, perinde fermc atque Stramoniz fruftus. Nucleum autem continebac fufca quadam membrana teftum, oblongiufculum, larvem, l^adicei coloris, qui albefcentem inedullam concinebat, fed dufam quia ficca 6c quodammodo infipidam.

6. *Fruttus Dliva ojjiculum refer ens, tuberculis obfitus* C- B. Fr. 6. cap. xo. lib. 2. Exot. Cluf Fr,
Dliva cjjiculum refer ens, rugofus cum tribus lineis J. B.

Unciam craflus srat, fefcunciam fere longus, forma etiam Olivs odiculum quodammodo referens, minor taniens, rugoiiis, 6c veluti frequentiffimis tuberculis obfitus tribus nervis /ecundurr^ longitudinem diftiniaus; extrema altera parts obtufa, altera vero mucronata, latis gravis, 6c nucleum ant tab quidpiam continens, ut hex agitations conjiciebam \ in aquam inwftus non mergebatur. Alterius fruftus haud dubie officulum.

7. *FruElus oblongus cineraceus durus tuberculis exasperatus* C- B- Fr. 1. cap. 19. lib. 2. Exot. Cluf
Fr. Exot. cinereus cum lineis dr tuberculis durii J. B.

Binas uncias cum femiffe longus erat, quatuor in arnbitu craffus, cineracei colons, quern aliquo operimento teftum fuifle arbitrabar: in quinq; partesdividi polls venz per longitudinem ducta? indicabant, alioqui eminentibus aliquot tuberculis infar veficularum obfitus erat, quz aperta inanes & in^quales lacunas oftendebant, lpadicei colons dē fplendentis, quafi femen aliquod CDntinuiiffene. Valde durus autsm erat is fruftus 8c adfringente facultate prarditus.

8. *FruElus cordis formam referens, fufcus tuberculis inaqualis* C. B. Fr. minor 2. cap. 20- lib. 2. Cluf.
Exot. Fr. planus forma cordis cum multis tuberculis J. B.

Cluf.

Planus erat, binas uncias longus, totidem latus liimma parte, cordis, ut vulgo pingitur, formam quDdammodo referens, multis tuberculis eminentibus inzqualis, fulci coloris, hvis, aliquantum carioliis, quia immaturus collectus fuifle videbatur. An aliquo putamine inclufus fuericme latet, inquit Clufius: quia nulluin petioli a quo pependiffet veftigium in eo apparebat.

CAP. VII.

FruElus angulis don at i C B. p. 406-

- I. *FruElus orbicularis fufcus trifidus, granis refertus* C. B. Fr. 5. cap. 25. l. 2. CM. Exot.

SefcuncialTi bngus erat, media parte craffior, extremis gracilioribus, qui & multis fibris contextus videbatur, fed adeo firmis, ut fruflra cultello aperire tentaret Clufius, coloris fulci, pelle tamen fpadicea lxvi &c fplendente teftum fuifle reliquz quas adhuc retinebat indiciam faciebant; atqus licet non adeo gravis videretur, aqua tamen merfus fubfidebac.

- z. *Fruſtus rotundas inxqualis cimraceus faxeus* C. B. *Fr.* 6. *ſamiri Indis* Cluf. exot. 1. 2. c. If. *Fr. Juglandis fert magnitudine duriffim₂ Indis* Camiri, *fapore nucis rnofcata* J. B.

Cluf.

Uncialis erat magnitudinis, Nuci Juglandi luo ilb viridi externo c or tice exempts non diffimilis, inarqualis, fiimma parte lanor, infima in obtulliu mucronem propemodum delinens, putamirte fatiſ craſſo faxca: duritieĩ prſdicu₅ nucleumi continence album. Amygdala psne fapore. Alio frutu feu' externo cortice opertus faille videbatur, quia depreffionbus putaminis Jocis cineraceam quandam materiam adhuc inhacrentem retinebat. Uberiorem hujus fruttus delcripcionem vide apud Clufium Exot. Jib. 2. cap. 29. *Fr.* 2. p. 57. aut J. Bauhinum *Hift-* lib. 3. cap- 40.

• Exot. L 2.
c. 11.

5. *FntHus in gibbum zxtuberans cortice reticulatv villofo* C.B. *Teregrims fruBts reticulato corio* * Cluf *Fr. rziculatv cork peregrines* J. B.

Cluf.

Duro corio, & multis fibrij retis in niodum quDdammodo intsr fe intsrtextis Si duris conteftj prxditi₅ erat, *Fons* quidem inarquali &c rudi, intus vero lzvi 8c fplendente, coloréque ad Ipadicum ten dets, 57 uncids longus, binas & amplius latus, lupernè in gibbum extuberans, infernè planus fere, nucleum continens craffum, plenum, fucculentum^ &c qui in navi, quã recens ex Guinea adveftus fuerat, Jim gsrminare inucpCrat.

Alterius ejufdem generis fruttus nucleus folidus erat, quia tamen vetuftus, rugoliis foris. Non eft autem hie fruttus Nux fed Pruni cujufdam Indici ofliuulum : Ad Mangam dec referri.

4. *Frucl¹ angtdofus cimraceus cortice jibrofa* C,B. *Fr. mifczUanzits 2. cap.z\$, lib. 2. Cluf* Exot. *Fr. exot. oblongtiS) anglojuſj cineraews* J. B-

Cluf.

Sefcuncialis erat longirudinis; binas uncias aut aoipior ejus ambitus, nun in rotunditate oblongus, led anguiofus, cortice inarquali Sc valdefibroso, cineracei foris colonis, internè fufci, levis, aquadum ei mergebatur innatans, nucleum continens prorfus rugofum, (quia fortè antè maturitatem lſttus) Sc liibltamLi rufelcemis, atiftringentifque (aporis.

- y. *Fruttus nigr in duos fart zs fe^arabilis acidufhului* C. B. *Fr.* iB. cap. 16. lib. 2. Exot. Clui

Vajdè rugDliis nigrique coloris nucleus erat, in binas partes feeparabilis, exilis, liibftantia, quia rſſicatLi^ dur: acidufcuJi /aporis, an aliquo ofliuulo aift putamine teftus fa erat CJufum lacebat.

6. *FruEtus Avztan* magnitudim^ futaminz vetty in dug partes divifo* C. B.. *Fr. peregrirw 4- c 29. l- 2- Exot. Clul*

Pontica: nucismagnitudine erat, ejufdem colonis, putamine duro, velut in duas p^rtes divifo, nudeum continens, ut ex ftrepitu conjiciebat Clulitis; Nucleus albus, dulcis, quern ad Unguentari^ nucis genus aliquod referendum eflz c>>&L>< i^< Ex Africa delacus eft.

7. *FruBzts fubrotundus cimraceus duplici angulo* C. B. *Fr. txoticus 9. cap, 15. //£.Z. Clut expt.* *Fr. exot. duobus angulis dtfiintlus* J. B-

Unciam longus erat, minus iTncia latus, corricedenfo conftans, cineracei coloris, duobus angulis diffintu₅, Be extimã parte mucronaius, levis. Be in aqua haud fiibfidens, tameth cã mergers, cur, durus ramen Cz. a git at us ftrepkum non edebat.

- B. *Fruttus triangulans fufcus* C. B. *Fr. prtgr. minor 4. cap.io. lib. 2. Cluf exot. Fr. triangH-* *laris fciJJUras ofiendens* J. B.

Triangularis forma: erat, eminentibus tnbns angulis, at fciflũras aftendentibus, ex quibis in cernas parres fteclij dividi poſſe incelligere J ice bar. Levis erat, Be aqix innatans, nee imum pecen⁵ra¹¹ mctli dñ turn D tempore in eã harrens; foris fufci coloñs, an quJcquam inehorc parte concinerec IS' norabac Clufius, arbitrabatur tamen pulpam continere, licet agitatus nulluni ftrepitum ederet.

9. *FT a cl us pentagonus tuberibus inanibus vbfitus* E. B- *Frucltts minor 9- cap. ID. lib. 2. Clui- exo¹.* *Fr. fntagonus wl offizulum* J. JJ. *Hift. lib.z. 16p. 23.*

Pentagonus erat hie, veriùs fruttis officulum dicendus, uncialis longitudinis, quod ex quitoq¹as velut bngis teilcllis CDjnpadum, quibus fiblevatis longus nucleus in fingulis apparebat, led inon¹ Be membranaceus duntaxar, totum officulum tuberibus inanibus erat ubJirum; Illud unicumh¹ abebat, 6e quideni vetullate velut attritum.

10. *Fruclus oblongus fntagonus fufcus* C. B, *Fr. exoticus 2. cap.i). lib.Z. CluC exof.* *Fr. r:3j¹* *ticus Barni^ mftar angulojus* J.B. *Hift. I). c. icB.*

Bill* fere uncias longus eraCj 11nam crafluj; n qu n₁₅ angulos diRinfus, inftar p¹one fruſtus BMUX, flurus, fulco cobre (cui alhedo permixtaj pradirus, Jolidus, h. e. nullum iti¹ quod¹ jgicarerur edew, levis Be m aqua non feblidciu. r:3j¹

II. *Fruktus cristatus fpafcei color is C. B. Fr. n. cap. 15. //£. i. Exot. Cluf*

Cujusdam fructus officulum vid[^]batur, uncialis fere longitudinis, femuncialis crassitudinis, l[^]vi fpadiceique coloris pucamine testum, fupemi quodammodo cristato, Be colonis albi, atque paul[^] infra conum ilium ad latus vestigio apparente quo pediculo suo inhaererat.

Inter Aromata repertum fuerat cum feminibus Tamarindorum.

CAP. VII

Fructus exotici miscellanei c[^] Clufio, Jo. Bauhin & aliis.

I. *Fruktus in orbem convolute fufcus C.B. Fr. minor II. cap. 10. Ztf.z. Exot. Cluf. Nucleus nucis quodammodo convolutus J.B.*

IN orbem quodammodo convolutus erat, nucleus verius quam fructus, qui putamine aut nucis aliqua conclusus fuisse videbatur; folidus tamen, Sc fulci exterioris coloris, internè albus non ingrati quidem faporis, fed acidiusculij quem tamen vermiculialbi, his non diffimiles qui in Poff-tici5 five Avellanis nucibus generantur fed minores valde appetebantj 8c brevi tocum erodebant.

x. *Fruktus b 4 ?nembranaceis foliis compositus, nucho orbiculari C.B. Fr. 17- cap. 15. Ub. 2. Exot. Cluf Admirabilu fruffus Indus J. B. hijt. l. 3. c. 15.*

Admirabilis erat forms; quatuor enim membranaceis foliis ex adver/b inter se oppositis ex eodem tamen pediculo prodeuntibus confatabat, quæ fuperna Be extrema parte vclut coeuntia, officulum infima parte ipsi inha[^]rens Be fragile occultabant, in quo nucleus orbicularis forms, Nucis mofchatae magnitudine continebatur, foris fufca Be fungosa quadam materia obfita, durus, ut qui reficcatus internè albus, Be cornea: duritiei. Membranacea illa folia multis nervis erant distincta, Be rhomboidis forma; atque uncialem longitudinem Be latitudinem habebant. Ex India Orientali.

5. *Fruilus e multis fibris contextus fpadiceus. Fr. 6. cap. i. lib. i. Exot. Cluf*

Cluf
Sefcunciam longus erat, media parte crassior, extremis gracilioribus, qui e multis fibris contextus videbatur, sed adebfirma ut frustra culcells aperire tentaret Clufius, coloris fufci, pelle tamen fpadicea, laevi Be splendente testum fuisse reliquia: quas adhuc retinebat indicium faciebanc: atquæ licet non adebgravis videretur, aqua tamen merlus subfidebat.

4. *Fruktus synzta fignam rzfrms uimracus C.B. Fr. minor 3. cap. iv. lib. i. Exot. Cluf pro Balfami Peruviani fructu mifui. Balfami Peruviani* fruilus met* formd J. Ij.*

In a quam conjec[^]us non mergebatur, licet fatis gravis Be nudsum contineret, ut ex ftrepitii quem agitatus ebat conjedtabatur Clufius: uncialem fuperabat magnitudinem, msta: formam quodammodo referens, h. e. ab ampla bah Isnfim gracilior affurgens, cineracei fere colons. Ad Paludanum mifus est pro fructu Balfami Peruviani Be lane convenire videtur cum fructu Balfamifer[^] arbori5 *Copaiba*; distae apud Pifonem.

c. *Fruflus Javanenfis quadrangulus, corticz retiwlato Jpadiceo C.B. Fr. ptregims tetrazonus J.B. Cluf. Exot. li. r.y.*

Quadrangularis erat forms, nitido Be lzvi cortice testus, feptem uncias a fummo fastigio ad pediculum usque bngus, pedem cum femelle crassus, five iesquipedalis ejus ambitus, finguli enim anguli 4.7 psne uhcias distabant ab invicem. Cortex valde densus, ex multis fibris, retis quodammodo forma contextis confans matenam fungolam intermixtam continebat, corioque ut dixi laevi & splendens, fpadicei coloris exterioris parts testus erat. Tota tamen nux valde levis pro liamagnitudine. Intus officulum oontinebat [minor ejusdem generis quem aperuit Clufius] ab infima feds latiorein metamaffurgens, crassiusculum, molle tamen (quia fructus immaturus) fubrube cute testunij acidi faporii, licet etiam nucleus qui in eo continebatur Candida membranâ testus.

Prxgrandis alicujus Palmæ fructum esse conjedtabatur Clufius.

6. *Nux five uficulum fruiius ex Palmarum genere J. B. Fr. 3. tabzlla 3. cap. 14, lib. x. Cluf exot.*

Cluf

Nux aliqua erat five officulum fructus ex Palmarum generibus, cui yilli qui illam vestiebant adempti fuerantj nam valde terfa Be polita erat, multifque vems nigris a lummo ad imuni distincta, prafertim iis qua; a tibus veluti umbilicis, squali propomodum ipatio ab invicem discrecis, onginem ducebant, Be magnam venustatem nuci adferebant. Alioqui nux binas uncias longa erar, ejus ambitus ; % concinebat; umbilici autem pine unciam ab invicem distabant. Duro cortice nux illa erat prardita, Be nucicum concinere ex mptuftrepuum cisme maniftum erat.

7. *Semen Tamarindi femini fimiU> una extremitate dmtatum* J. B. Fr. ID. 17.16. A 2. -E**f. Cluf. *Tamarindis Jimih fzmen spadkenm.*

Cluf.

Hoc femem (inquit Clufius) cujus fruaus fuerit Ignoro, quod quidem Tamarindi femini non Valdè diffimile erat figurâ, fed magis planum Be oris magis compressis, cortice fpadicei coloris te- &um, iemen continence album, durum 5c ob vetuftatem rancidum. Ipfum femem cum fuD cortice ab una extremitate dentacum.

8. *Semen fruBuſ exotici, forte Cucurbitacei* J.B- Fr -19. cap. 16. lib. x. exot. CluC

Non fructus, fed alicujus fruaus "femeni videbatiir Cluffio, vel Cucurbitacei generis, vel alterius cujufpiam; nam fimilem quodammodo formam habebat, licet aliquantum craffior, nee adeo rrgofus, veriim Izvi, colorifque vel fpadicei vel ex fpadiceo flaveſcentis cortice tege^tur: fed nee hujus generis femina ejufdem erant magnitudinis.

9. *Cucurbitacei generis pregrinus fructus a Franc. Ttinh Cluf. exot. l. 2. c. 12. Fr. Indices Pynfurmis, grantis wtm nigris^ Uucurbitini generis* J. B.

Quinque parne uiiciaruin longitudine crat à pediculo ad fumum mucrDnem : ambitus qua pars Craffior fuitus 9; uncias explebat, a pediculo fatiſ craffio fenfim tumefcens, deinde a medio CDX-pore paulatim in acutum mucronem definens, fuco duróque cortice conftanS, eujus incerna pars valdè levis erac, cineraceique ex fuco colons, conrinens pulpam ſpongioſam nigram molJem, acidiuſcul ſaporis, in globum Compactam, in qua latebant aliquot grana nigra^ parne orbicularia^ com- pcedâ tamen & magis lata quàm longa, in binas partes feſtilia, quemadmodum Cucurbitarum K fimilium femina^ ficut Cucurbitacei generis alicujus plantx fructum eſſe ſibi perſiaderet Cluffius.

10. *Ptegrina mix 1. Cluf exot. l. 2. c. 15. Trufiſſ ſubrotundus rugojus ater* C- B. Fr. fU^m nus, rugofujj niger, femina continens J- B-

Planus erat, duas uncias longus, paulo plus quâAi duas latus, femunciam craffius, totus rugoſiſ & ater, denſo duróque putamine conflans, be femina continenSj ut ex flrepitu quern ^itatus faciebat deprehendere poteram, inquit Clufius. Alio integumento haud dubie teſtus fuerat; nam alrenus iruſtui odicdum livè nucem eſſe apparebat.

11. *FruElus 1. cap. 14. lib. 2. Cluf exot. Nux vrbicularis cineracei coloris* J. B.

Cluf.

Niſtuſhic, feu veriùs nux, orbicularis eratform^, varia: tamen magnitudinis Cplures enim conſpiciebac Clulius) quorum nonnulli ternas, alii binas duntaxat uncias ambitu comprehendebant, omneſ duro fed non craſſb pradiſ cortice, cineracei foris colons, Be qui aljo operimento teſtifiuiſſ viderentur. Interna nucis pars fiiſca & n Ip]—l—. —r—————«— r—. «3TM ^dshesz "11^1el quim uontinebat.ſaftigiumtBgcbat > fungoſa materia plena : nucleus autem inl^enore parte craliior crat^ deinde inmetam quodammodo aflurgebat, & in nutantem mucronem definebar, colons exre- rius ſubpuniceo, ſiibtantia fatiſ mulli, Beiftſriore parte, flaveſcente pracdruſ, injucundi odoris, Sc valde ingrati/apDriſ, uc non mirer cos qui edillent male affectoſ fuiſſe, quemadmodum milii refe- rebant qui obſervaverant.

12. *Fruçius primus.tabella z. cap. 14. lib. 2. Exot. Cluf. Nucis Amygdalina pane cortice fruçius, rugofus, ſubrufi ex fuſcy colvns> und parte planus* J. B-

Cluf

Fruſſis hie five Nux f nam alio operimento teſtus fuiſſe videbatur) à uncias Jongus era^ fecunciam latus aut paulo amplior, Amygdalinâ pane formâ, rugofus, dor/ó aliquantum Juhle- vato, ſupina parre plana, Be inhma latiore quam ca qua ^epediculo pependerat, ſubrufi ex fuſco colons, non valde gravis, licet denſiſſimo corio conftans, ut quòd lcomuncialis fere cſec craſſi niulrffque fibris oblique & L traniverſim feſe fecantibus contextum, Be adeb durum uc apcrH^{encl} ſu^{li}, vric Clufius ad conſpicandum quid commerce, niſi cultro magna vi cum malleo adaſto : genii- numautcm&oblongum nucleum continere deprehendic, nigra membranâ ſeptum, interna ſu^{li}dem pares albicantem, dulciſque uc Amygdala ſapoiſ, nili ranciditatem ob vetuſtatem conſaxillit.

13. *Fruſſus fecundus tabeU* 2. cap. 14. Ub, 2. Exst. Cluf Fr. infra partt.planw fruſſus, ſpadi- cei colons tefcus* J. B-

Cluf

Ejuſdem erat longitudinis, minus tamen craſſus, inferna parte planus, ſuperna in gibbum aſſi- gens, inhma parte qua pediculo adhzferat latior quàm extima, qua: in obtulim mucronem deli- videbaur: membrana autem dura Be Iplendens fpadiceique colons fuſcum corticem tegebat, nemem nucleum five pulpam quandam cineracei ex albo colons, qua: ore aliquantum recent^^{li} fannaceam materiam rcolvebacurj quadam acrimoniâ prardiram.

14. *Fruilus tertius tabeU* 2. cap.iq. I. 2. Exot. CluT*

Mefpilo Setanio non crat vald^ diffimilis, EJufdmque parne magnitudinis, capite tamen non pia- no ut illud, ted in anguſtum comrafto; vetuſtate mgas romraxcrar, fit fans fr.igili coitice conUa-
b.11,

bat, fufco, nullius ferè laporis, qui tamen ore retentus nonnihil adiriftionis cum pauca acrimonia conjuncta poffidere videbatur. Quina introrfum officula Melpili infar continebat, fed majora 8e non rugofa ut ilia, verum valde lsvia Be iplendentia, fpadiceique coloñs, Benudeum continentia.

15. *Fruffui quartus tabella x. cap. 14. lib.*: Exot. Chf. Fr. orbicular is feri form*, fufci coloris J. B.*

Cty-

Prarcedente minor Be fere orbicularis erac figurz, uncialis magnitudinis, lams, fufci coloris, brevi quid em fibnixus.pediculo, fed cortice fatis duro, tameffinon valde crajlb przdicus, qui apertus (nam in binas partes dividi poffe ex ignis apparebat) quatuor gran a nigra concinere rieprehendebatur, femunciam lata Be longa, cordis humani fortam quodammodo referenda, fed magis plana, binis duns merabranis, ut in mice Juglande, ilia feparancibus.

ifi. *Fru&us primus tabella \. cap. 14. lib. z. Exot. CluL Fruttus oijlcula terna mt quaterna finttl jivfrá comment, &c. J. B.*

Hic five fructus, five varietas officulorum fructus (terna enim aut quaterba ficut conjunctim nata fuiffe videbantur alio quodam fructu includi) binarumque longum erat, totidem longum, media parte tumente & fefe attollente planis & comprreffis lacubus, que fides faciebant bona mprimu alia adjunaa fuiffe, cortice nun valde duro prarditum, externa parte rugofum Sc fcaabrum, cineraceius coloris, interna autem LEVB Be candidum, magnum nudeum continens, prorfus implentem corticem, folidum quidem, non tamen durum, cenui membrana teftum: ipfiautem interna materia five pulpa nucis ungunstariae psne odorem habebat, fed acnufculum faporem^ an ob vetuftatem ignorabac CJulius.

17. *Fruttus fecundus tabtH* 3. cap. 14. likl. Exit. Cluf. Fr. orbicularu craffi wrthis.tuhtrihlt nigri colons J. B.*

Orbiculari5 propemodum erat, binas uticias longus, quatuor unciamm ejus a m bi ^ craffoprzdituscorceij inaequali Be multis tuberculis obfitu, nigri extnnefcus coloñs; intrinfecus fubruffi continens nudeum tenui, cineracei coloris membranã teftunij odoris non-infuavis, ied violam quafi referent Be non ingrati fapoiis. Crallo pediculo fubnixum fuiffis vidsbatur, uc ex veftigio mi inRzsrat conjetturamfaciebat Cluffius.

18. *Fru&v* quavtus tabtttx 3. cap. 14. lib. x. Exot. Cluf- 2*. tfrage. mrum orbicular* cum fix mrvs J. B-*

Valde exiguus erat, 8c orbicularis pane Formae, vix Temuncialis bngitudinis, bvi cortice praditus & fex quafi nervis eminentiDribus, a pediculo ad fumum caput zqualer diffante fere fcatio EY' cunentibus diffinfus, fufci colons; quid verò contineret me fugit linquit Cluffius) gui a aetatu, Rr commotusnullunifreptitumedebat.

19. *FruEtu, quarms cap. 15. libi. Cluf. exot. Lobm nVim*ris fufws, fimofn tumult* binoi pbaftolos mgros cmittmu C. B.*

Orbicularis Mat Fruttus five lobus, planus, uncialis magnitudinis, infima parte in noncruentia de fcaente, fpiridufubrubsntibuguetubcraalis undequaue obfitus, ailtlli do, fo non craffior, pediculum ad orbis latus habens. Be totius lobi color fufcus. Omnes autem hujus generis quos conftituebat Cluffius, in medio peroffi erant, ac fuaicula trajecti ad comuodius & facilius, ut arborabatur Cluiius, exhecandum lulpenderentur. iinguli verolobi five fruttus binDs phafeolos continebant feminum Anagyndis torma & magntudine, prorfus mgro, ut conjettaretur Clulius cos lobo, anV quam pertunderentur non adeo pians fuiffe, fed aliquatsnus tumentes. Indi Samparantan appellabant. Quandoquidem autem nlo trajectu alterabatur apud HBS in alio ufu fuiffe feciffe est fed quali intelligere nequie Cluffius.

ao. *Granis Faradifi fiVeMikgeta affinis fruffus C. B. Fr. 14. fivt MeUgutta friria Clui; exoh . 7. 1. p ij.*

Elegantis alicujus plantae hunc fruttum fuiffe rebatur ClufTus, quae fortaffe crecat Canna: Indies vulgo vocataj modo: nam caulis iuprema pars capita five iiliquas fullinens prorfus fimilis mihi videbatur, lenta ut ilhus Be hbrola, multifque foliolis ceu appendicibus fepta. Qua: folia, quern florem proferac nemo Clufio mdicare poterat. Erant porrohze capita binas uncias longa, infima pane cralia, deinde paulacim ad lupremam ufque partem graelefcencia^ quafi triangulari forma praTita obtulus ramen angulis, cartilaginofa, externè fufci ex rufo" cobris, internè veluti in ternas earner * fecundum IDneUudinern membranacea auadarn cartilagine divifa, atque plena nigris fplenden?, d biifque lemimbus, Miho majoribus, denfi fimul congofitis, Be tenui membrana involutes inn ^ He' 8c quadam acrimonia prsditis. Nafcuntur autem ea capita in fummo cauls, quaterna* abV < 4 a wna aut qmMj acque veluti ex eodem ortu prodeunt.

A Cardamomo majore live Melegueta differunt, quod Meleguetz Fruttus manna ex nartr bre vjn Be craffim- fiti hie v=ro graolior 6c oblungior. Melegueta: cortex etiam minus i I S fce' duru, auc fatis fragilis. Minus praeterea grana non tarn numerofa quam in Melegueta, nIT, nIT tamen, fiifca 5c fphiidentia, fingulan candicantwnembraqa involuta. Melgucua; vero gram, licet trifariam

trifariam quadam cattilagine diitinfra sunt, Be fingulafua peculiari mCmbrana involuta videantur, minora tamen fiint, magis rugofa Beduraiftiusfructusgranis j prartsra non ita splendent, Be fubrui fiint coloris acerrimique laponis.

il. *FruBus yuintus cap. i 6. //£. 2. Exqf. CluC Fr.totus niger, binis foraminibus injignitus J. BL C. j.*

Uncia major erat, circiter unciamlatus, tDtus niger Be fatis laevis, anteriore parte binis foraminibus-infignitus, pofterioreveftigium retinens, quo vel petiole inhaererat vel fuo lobo₃ fi aliquolobo inclufus fuerat. An nucleum continent ignDrabat CluiuiSj agitatus enim nulJum ftrepirum edebat, Be in aquam conjedtus non mergebatur.

ax. *Fructus undecimus cap.16- lib.i. Cluf exot. Fr. fyriformis fyfeus, lavijj firiatu^ cam coronula, in quo nucleus J.B-*

Uncialis magnitudinis erat, proriis fufcus, paene orbicularisj ftriatus, levis admodum Si in aqua fupernatan5 ilia merfus, tameth nucleum concinere ex agitations deprehenderetur, anteriore pares vejuti coronulam ftriatam habens, in qua florem fedifle verifimile eft, pofteriore autem in oblongulculum pediculum definens.

ij. *Fructus Juli formam quafi txprinem cineraceus jrana (padicea continent C.B. Fr. 8. c. !? * // 2. Cluf exot.*

Lobi quodammodo formam habebat, & uncial em longitudinenij Juli figuram quafi exprimsns, gracilis, cineracei cobris, aliquot grana [ut ex involucri ruptura apparebat) fatis craffi continens, fpadicea CDloris, lzvia, ab altera parteplana, infpida^ vieta Sc vetuftate cvanida.

24. *Barucz fruBus primus vap.il. Ub.z. Exot. Cluf Baruce fruffus e fluribus nuzihiis axboris Hura J.B.*

Admirabilis erat forraae, Be inCJuyana nafci ferebatur fatis celfa arbore Hura nuncupata. E inultis autem veluti nucibus unci^lis magnitudes, mirabili modo fimul junctis Be connexis conftabat, qux in bina lignofa duraque putamina dehifcebant, Be orbiculaj-em planumque nucleum Continebant, cineracea membana tctum, Eum vero fructum tot nucibus iimul junctis^ be veluC in unum caput coartis interdum crefcBre intdligsbam, ut tanquam prbiculari clavam geminum pugnum craftitudinsarquantem, &C in multos angulos definentem referre videatur. rfufus fructus nuclep in colas uti dicebant ad corpus vomitu 5e alvi dejections purgandum.

25. *Arara fruttus fctmdus cap.il. lib. 2. Exot. CluC Arara fruttus Amzricanm J.B.*

In Kayana crefcitj arborcne an herba non erat defcriptum: Erat vero uncialis longitudinis^ cute rariis quim pucamine confans, fatis dura tamen nigraque^ longiore pediculo 6c ins:quali nitem; ut plures flores inharllffe viderentur. I»—1- .JTM TM*M ** in aqua dixi decacto niafigna dlcera lavant ad ea curandum: aiebanc etiam utibm ad alvum emolliendam, quod de nudso uitdJigsndiim arbicror.

26. *Cunanz fruttus 4. cap. ji. lib. 2. Exot. Cluf Can. frufks arbor is Mvrremor, longus trtl walis) fere niger. J. B.*

Bin.is uncias longus erat, unciam furnmo capite latus, deinde paulatim ad infimum ufque gradior fiebat, dorJb paulo dature, levis, niger Be splendens, tribus foraminibus flftmo capite praeditus, uno fiipern^ binis infernc. Ilium in pumila arboris nafci ferebant, cui nDmen Adorremorj immatunis autem erat₃ fed plcnam maturitatem adeptam duplo majorem afferebant, eumque fupra prunas tDJlum manducariabincolisadversus capitis dolores.

17. *Waricoramori fruffus 5. cap. 21. lib. 2. Cluf! exot. Waricor. rugofa glandi firfili* p^h- flus J. B.*

Secundum fl um en Arriwari crefcere adferiptum erat, ad quam tarn en re m utilis efflet ignoran- E binis quos habebat Cluffus unus binas fere uncia!) longus Brat, alter uncialem longitudinem non fupcrabat: uterque tereti 6e rugo/ac glandi fimilis, adfriftoris facultatis, qui alio eorticcfITC p^ tamine teftus fui/fs vnierctur.

18. *Cropiot rugofus fruttm acerrinim, frmimfimliFipcri *sllbiopico J.B. Fr.6. c.il. J-2- E^{9m} Cluf*

Parvus Be rugofusfructus erat, nonvalde diflimilis fingularibus ejus fructus articulis, quern ^{Piper} ^EthiDpicuni appellant, magni acrimoni^{fr} prardirus, nigriimque femem continens ut Piper ^{fr} picum. Solere aurem incolas eum fructumadmilcere Tabaci foliis adferiptum erac, cum ^{fr} mum haunre vellent ad capins dolorem leniendum. Eranc autem aliquot ejus fructus ^{fr} trajedli, quod incolas feciffe arbitror ad eos commodius rducandun^ veJ ut in prompt ^{fr} quon. J. illis ucndiim.

29. *Fructus*

29. *Tbaftolm orbicularis nigr Americana** C. B. *Parapar Cluf. 1.2. Exot. c. 21.*

Cluf

Phafeoli quoddam genus erat, orbiculare, nigrum, fplendens, quod Idbo inclulum Fuiffle videbatur, ut exhib quo przditus con)efturam Faciebat Clufius. Plures fimiles Fruftus per medium pstrufos Funiculo trajecerant incola: ut ornatus gratia e' CDHIO futpenlos fub finiftrum brachium admirterenc, oblique torqfais inftrar lupra peftus recumbences.

30. *Fruftus 4. cap. 21. h. Exot. Cluf*

Cluf

Exilis erāt, Femunciam magnitudinis non fuperans, exigua: & immaturx nuci *Fauffl* non valde difimiliſj exalbiji colons, calyce prxditus quatuor iguamis conftante, concinens aliquot grana *Fufca*, rotunda inftrar *Piperis nigri.*, fed valde rugofa quia forfitan immatura, intus alba, acris laporis. An *Brafma* apud *Diofuor.* cap. de *Pipers.*

31. *Cardamotni fact* fruētus triangul malignus J.B- FruBus 5. cap. 22. 1.2. Exot. CluC Bacca eft Amymi racemofi C. B. fzu viri Pona?-*

Uluf.

Triangular^ erac form^ iimun-ialis etiam magnitudinis, exalbidi colpris, tenuique membrana teftus, Cardamomj Officinarum fruftum perbellē referens^ continēnque mulca grana rugofa, cint-racci foris colons, Intusalbi, omnia in globum cungefta, iatis validi & gravis jdoris^ Sc acris faporisſj qui breviffimo K vix apparent^ peciolo plants inhzferat^ calyce tribus folijs conftante incluius. Qui mittſbat (ad Clufiutn) Conlulem iux urbis unum ex his fructibus edite feribeat, ex cujus efu murbum contraxifict. Vide *Uluf. cur, m. poft.*

32. *Fruftus 6. tap. 11. lib. 1. Exot. Clut*

Nudiis omnino *Re variz* Forma: erat, quern lobo indufum fuillē arbitrabatur Clufius. Etenim nonnulli plani erant &c quafi quadranguli, alii bblongiores Be altera parte obtufi, ea verò qua *Fc* muro contigerant comprefit^ omnes tamen Foris rugofi, nigricantes & candicantibus quibusdam venis diftinfci, in bin as partes dividui, ut reliqua legumina. Subftantia autem interior *FubFufca-Bc iuli&z.* &c cuſ Fapor eti^m adfringens^ perinds ac *Fruftus Coles.*

33. *Fru&us 1. cap. 23* lib. 2- ExvU Cluf*

Pruni Fere magnitudine *Be* Forma era^ duas psns uncias longus, *Fefunciam* larus, infima pars mucronatus; corrice fiye ipfo corpore iatis craffo, & veluti fungofa materia conftante^ Forh air quantum rugoloj *Be* *fubFulco* color^ intrns^ cavo *Sc* pulpam quandam continente in globum con-volucam^ albicansmj *Fnabilsm*, infipidam, in qua tenella quxdam *Femina.*

34. *Ricmo affinis fruftw C*B. Exotictu fruffm 4. Ub.i. uzp.24. Cluf exot.*

Ricini fruftum valde zmulabaturj nam triangularis erat^ &c in trss cellulas diftinttus; quaruni fingulis femem continebatur rugofum^ uc ante *maCuritatem* leftus *Fuiffc* videretur^ nigrum: exerior cortex *Fufcus* 8C glaber erat, pendeatque inter quinque *Frfia* lunguicula 6c laciuFcula (qua: medium fruftum cegebat) e pediculo femunciali, fctis firmo-

jf. *Datura fem'me fruftus J.B- Fr. minor 8. cap.20. 1. 2. Cluf. exot-*

Orbicularis *Fere* Forms erat, *Be* tenui veluti membranā conftabat, brevi petiolo präclitus, paene cineraesi colons, intus inanis, ni(T quzdam rugofa granula contiuiifletj iis qua? in *Stramonio* concipiciuntur non valde abfimilia : inhxrebat autem larmends quibuldam *Vkis ViniFerz* *Farmenca* referentibus.

36. *Fruftus bzpacticta Indicus J. B.*

J.B.

Kgura hepatis quodammodo rclpondet: Eft enim altera pars gibba five convexa, altera finuata, & concava, ngura oblonga, magnitudo *Caftaneac* majoris, eique conolor, h. e. *Fpadiceus*, fed ad pullum accedens: liiperficie tsnus inxqualb^ rugofus, nihil corticofi habet, eaddrnque *FereFubftantia* interna. An alio cortice *Fueric* com'rehenFus nobis mcertum. *Nobis videtur nucltus ftiiffi tlcujus frufts.* Bivalvis eft, autgeminus potius, *Fufco* tamen *Fatis* infigm in ambitu cohſrentiam defignante, nee multa vi dividuus. Subftantia tota glanduloFa, *Qurnes* glajidis ficcata:, duribr, prxtei levem quandam quam prarbet adfriftionetn, nulf nee gufta, nee odors infigni-
Frufru hoc *Indi* in obfruftionibus. hepatis uti dicuntur, referente *Robino*, quiFruftum ad *J.B.* franfmific-

;7- *Fruftus 5. cap.z^ lib.i. CluLfexot*

Uncias p^no tres ambitu comprehendebat, *Sc* *Iphſricz* Forms erat, putamingeonnans quali *Nux Juglanſj* firmo, *fufci* externa pars colons, interna *Ipadicei*, qui in ties sqaales partes dividebatur, 8c interna, *P4it5*, in tres veluti concamcrationes vel loculos kparabatur, in quibus iingularia grana, *Maly...* in feminibus non valde difimilia^

46. *Nux purgatrix* C.B. *Fruftus* 17. *cap.* 16. *lib.* 2. Clufexot.

Non valde diflimilis erat hie fraftus officulo Baccae Saponaria: etenim orbicularem, ut illud, habebat formam, & eandem magnitudinem. Hujus tamen color non admodum niger fed infusus potius in quo apparebant fubflavescentes quxdam vens. Alio autem fructu correnhenfum fuiffe, & nucleum duntaxat alicujus fructus esse apparebat; nam feftus verficore iibftantiā conftare deprehendebatur, magnis maculis albis filler fubftantia: & fatis molli, (ut qua? cultelb fine difficultate incidipoffet) permixtis.

47. *Avellana Indica major fuhrufa* * Clufii J.B. *Avellanx Indica* \ *genus Manh. Lugd.* C. B. * *Annot. in Mamay fructus officulum D. Gnvh in MuH Soc. Reg.*
J. B. *Chif.*

Tres uncias longus erat, duas fere craffus, inferiore parte Gfiliis, rugoliis fca&rv2, 5c cineracei coloris; fuperna autem Be eminentiore five protuberante parte tavis, fubruffique coions, ut animalculum duro corio teftum videri poffit. Nucleum in fe continet.

Huic dscRIPTIONI addit J. Bauhinus corticem effe fragilem inftra feri teftac ovorum, mlrtus tamen cum fit fpiffior. Continet nucleum magnum, teftum tenui membranā cinerea in qua faporem infignem non animadvertimus: nuchus aucsm magnus, rugoiiiSj firmus Amygdalae mocta, fapore non ingrato.

Mammei fructus officulum eft, 6c erronee pro Nuce accipitur à J. Bauhino 5c Matthiolo. D. *drew**

48. *Balfami Teruvianii fructus* CluE } B. *Fr.* 1. *cap.* 19. *lib.* 2. *Exot.* *CiwL Avdlan** *In diets 5. gznus Matth. Lugd.* C. B.

Ex eodem cum precedents genere eft, [necut nobis videtur fpecis diverfus] fed longè amplior utpote qui ternas uncias longitudine fuperaret, latitudine unanij altitudine pzne duas square alioqui forma U colore eidem planè fimilis: nempg craffo cortice five putamine confans, inFeriore live fupina parte felfilij rugofo fca&ve K cineraceo faperna autem five gibba laevi, fubruff, yel potiùspadiceo ita ut animalculum duro cortice teftum videretur. Nucleum continere deprehendebat Cluiffius binas uncias longum, unamlatunij gemellum, fed extima parte fimul cohre-ntem tenui cineraceaque membrana teftutn, iibftantiā firmā, ut Amygdalae aut Caftaneze recentes, fubfufca, pingui 5c oleaginofo odore fatis jucundo praedita. Be iaporc non ingrato.

Pro fructu Balfami Peruvianii accipit Gluiffius: Vcrum non convenit cum d'fcriptit'ne Balfami apud Monardem aut G. Pifonem.

Aliam adhuc Avellanam Indicam ab Hercule Saxonia miflam pro Balfami *Vttri dz Frias* fructu minore, ejuſque fpeciem aliam minorem defcribit J. Bauhinus, magnitudine digitum fere azquantem, quaeſi competentem haberet craffitiem atque rotunditatem galeam quodammodo reprsentaret. Tefta conftat kvi, fplendida, ex ruffa ad fpadiceum vergente, craffo fatis, fubftantiā offea. Nucleus intus latet Amygdalini fide fedlatio in caeteris proportioni nucamenti reſpondens, fapors rancido, quippe exoleto-

Minor fpecies concolor erat, fed Bguranonnihil evariabat, potiffimum hiliillui veftigium quàm in Fabis noſtris vulgatis nonlatus, nee ut in praedicto eminet. Tefta tenuior multo nucleum quoque parvum, fibique proportionatum continet.

49. *Nux India non biforis Juglandi fimilis* J. B.

Advehitur quidam fructus ex occiduus, adeo Nuci Juglandi fimilis ut nondum introſpeum fipiug putaverimus nucem Juglandem esse: fed ſſraſto caro fuit veica, intus albida, Caſtane fapore, nullis diftinfta nucleis, putamine Be tefta utraque craffiore quam Nucis Juglandis.

50. • *Fruftus bivalvis Indhus niger* J. B.

J. B.

Levitatis praecipuae fructus anonymos bivalvi tegitur cortice, non dura. Be uti videtur fragili, hiantibus jam medio tenus valvis fubfabris figura oblonga, utrinque exacuta, modice compreffaj alioquin ovata relatuta; Latitat intus nefcio quid nuclei.

C1. *Fruftus InMcus, vel nucleus luteus parvus, Avellan** *vblonga facie compreffus* J. B.
J. B.

Unciam fere longus erat, flavus, larvis, lucidus, Ricino majori aliquo modo accedens, uncia femis anguftiorj pxne compieffus, utrinque tamen fere in medio elatior una parte paulo laciore Sc rotundior, parte autem qua haefiffe apparet nortnihilanguftior, K non ita rotundus, aſperior. Cortex facile acicula perforatur, in eo nucleus; qualis medulla nobis nondum conftat. Alius hujus generis fructus, quem apud fratrem C. B. vidit, brevior erat, minus compreffus, multo qua adhsit parte anguftiorj quafi umbilicus aut oculiis, crifta item non ita apparet. Reprſentac Staphylo-dendron-

5x. *Fruftus pregrinus Jtrafy* J. B.

J. B.

Jeraſby diftus fructus e rarioribus quoque effe videtur: Per medium feftus cavus appiret fed binis cellulis intergerino pariete intervenisnte diftinftus, aut fi integer effet quem vidimus f uti non effs conjedtemur) quacsrnis. Extima facie lams, fed fquamatus, albicans, pediculo craffiuſculo.

Rofe nondum expania[^], ac per medietatem feftx figuram nonnihil referret, nifi eilet cavus; ita fuamata eum extrinfecus ambiunt foliDla.

5;. *FruEtus exoticus latus compreffusj colvrx Suberis. J. B. bifi, lib.%. cap. 15a*

J.B.

Duas uncias latus erat ac paulo longior; a[^]quabilis fere ambitu ad orbicularem figuram accedens, praterquam quod parte fuperna [ubi forte adhadit] exiguum quendam finum umbilicali fpecie impreffum habebat. Compreffus erat, medium craffitidine unciam vix aequans, modice incurvus, ut alcera facies concava, altera in gibbum fublata convexa videretur. Cortice conftabat cobre Suberis fere[^] non valde durD, fed vel rndiocri compreffu fragili, nucis A.vellanz craffitidine, fungofo quodammodcij fed interior pars magisfungola erat, fuica, infipida, quia evanida &c magna BX parts ^{aj} unde *be* pro magnitudine admodum levis.

54. *Cordis figuranux flana cineracei colons J. B. FruEtus 5. cap.zG. li. Cluf. exot.*

Cluf

Nux erat plana cineracei colons, formam cordis (ut pingi folet) referens[^] 8c quibufdam locls tumBlcen5j, ad6que lento cortice conftans ut maxima cum difficultate aperiretur. Reperit autem lub eo Cluius alium corticem, nun minus lentum fuperiore iublavi colorisj tegentem nudsum candicantemj falii laporis, involutum rufefcentemembrana.

5j. *FruElus Indkus echinatus fonorus J. B.*

Magnitudine erat circiterNucis mofchatz, colons cinerei, plurimis abundans tuberculis ^{obtusis} Degulflatui videbatur aliquii adftritionh habers. Pediculus craffus ligneus. Sonorus erat.

56. *Fruftus Indicns Juglandi fimilis tuberofus J. B.*

Juglandem pulvinate fuo calyed etiamtium intsftum xquat, perpetuis tuberculis &c longioribus jugis aferatus, ex cinereo ruffelcens, cujus intervenia tenuis replet cortex fufcus. Infima pars umbificum habec fecfilcm, oppofita modice in cpnum faftigiatun Durus eft Be gravis fruftus.

57. *FruEtus multifariam fijius J. B.*

Fer£ orbicularis erat totusj nifi utrapuc parte efler nonnihil compreffus. Finditur cirdter in 1* partesj qua: fungofo hint, faporis manirbflii nuJlius; ineft intrsné oflicdum durum. Cortex ^{luti} fru^{aus} exterior tenuis fufcus 5c cinereus.

58. *Vvni nuclei Maluzanifvz purgatrui J. B. Finus Indica nuzho purgant C. B. fini ^{maluzan} Maluccam Park.*

Acofta.

Alitur in hortis quibufdam Malabar, in quit Acofta, tum etiam in nonnullis fylvis ffonte nafcitur arbor Inagnitudine Pyri, cuiwfclTM iufcrnc ouuco virore przaicaiunc, raperne auiem faturo[^] admodum tenJfla Be molha, quæ guitata valde acria deprehenduntur, &c linguam diu vellicant. Fruttus triangularis Avellans magnitudes, interiusin multa receptacula diflinftus, in quibus femina eft album, folidumij rotundum Pineo nucleo fuo putamine exempto par.

Coniiderandum (inquit J. Bauhinus) An ezdem tint Pines nucule cathartics Monardis, qua^{*} lie defignat, TranfmittitNovaHifpaniaPineorum nucleorum genus quo Indi fe purgabant, quos imitati iint plunmi harum regionum. Nofttris Pineis nude is fimiles fiint nafcentes in itrobilis magnis quales lunt MayziiSpicsmutic[^] moUiore putamine Be nigriore quam noftri rotundij intus albij pingues 6c guftu dulces.

Fig. 7.

Indi, Autore Acofta, binos nucleosmembranisnudatos, terunt, fle dyfteribus admifcentadversus urinae difficultatem & doloremifchiadicum, aut cum gallinz jufculo propinant ad educendps putndoSjlentoSj crasfos figidofque humores Scepculiaricer ad afthmaticos curandos. Ex aqua tritis impstiginesinungunt 8c curant fed admodum urunt : Nuclei pinei cathartici tradenteMonardebitem, p[^]tiut.im Bcaqua5validiflime purgant, Be licet Avellanismitiores tamen vomitum cient. AfHncc.win valenter, nee cum tantis torfionibus purgant. Dantur in diuturnis morbis, Bepeculiari qu^{aciam rati} cultrate crasfos humores expdlunt.

Quibus obtinent nuclei Pinei, five MalucaniAcoflxj five cathartici Monardis, five dire^W jidem fint (inquit J. Bauhinus) non temcre exhibcant xgris, liquid em, referente Acoftajadmckiu^{urunt}, Be quatuorgranainrcrimunr. Monardes etiam validiflimc nee finc'torfionibus purgarej VDmitum ciciefenbit.

59. *Finzoz nucleus d*roj referens frufus C. B. Nucula peregrina alia J. B. Fr. peregr.%. Clut £ l. 1. c. 5 o.*

Pinei cujufdam generis nucis nucleos quifpam actimare poffcr, adeo nofttratis Pinex n^{cj} itrobili nucleus refcrebant, licet magna ex parte nofttris ficlongioies elFent Be craffiores: W milititer puramen Be idem color.

60. *Curcas Avellana* a magnitudine J.B. Curcos Malavarenfm, CarpataCambayenzum Garcia: C.B.

Nascitur in Malava, autem Garcia, fructus quidam magnitudinis Avellanae pro suo putamine; nontamen adeo rotundos est, candidus, gustu quasi sicut Turcae cocca; deperdit: ex ramis cupulidam plants que scribit, nullius, quod sciat, in medicinis usis. Dicitur in Malava *Cambayenzum*, id est exiguum $i > 0^{\wedge}$.

HabalciculSerapionividetur, cujusrequentem ulum ierriinis quidem copjam tacere., Jed chole-ricaiYi quam vacantpaffionem excitarefcrit: quae omnia Malavares huic fructui cribuunt. Fructum hinc ad Ricinum refert C.Bauhinus.

61. *Pepita Feruanus* J.B. *Pepitas del Peru*, Fr.y. cap. $^{\wedge}o$. UL%. CluC exdt. Amjgdalo fimilisfm-ilus Plruanus fufcus <vel Jfradiceuj lined Candida C.B.

In fmftu hoc quaedam est varied natn alter altero major Be amplior est, licet color & forma pro- pemodumeadem. Planuseft & oblongiufculus, altera parte latibr, altera angustior, glaber & la- vis, totusfaci, aut interdum fpadiceit>tari5,nifilin5a quxdam candicans, qua parte fuofniftinad- hxfit (nam alceri incluliisfuifls videturjvarium faccret,pr^gnans est Kfonitum edit.

6x. *Brindoms Indm*,frUtlu5 ruhmUs acidi J.B;

In Goa India [uti refsrt Garcias] est fructus quidam *Brindoms* vocatus. Is foris aliquantuturn rubicat, intusverb fanguinis inftar rubet, guftu admodum acida: invenitur interdum foris nigri- cans [qui color maturitate contrahitur] nec adeo acidus uti lupiriorj qui tamen non minus quam ille incus rubeat. Mutorum palato fapidus est hicfructus, meo vero inquit Garcias minimis ob ni- mium aciditatem. Eo^tinftores ucuntur. Cortex veroadfervatur atque mari alio transvehitur aceti conficiendi gratia, quod a Lufitanis quibafdam etiam in Lufitania factum est.

6^, *Btguill Purchafii*.

Fructus in finu S, Auguftini prope Sjerram Lidnam proveniens, magnitudine Mali, cute aspera & nodofa veftitusj sub quupulpa Fragorum inftar, five colorisj five granorum rationem habuas.

64. *Btninganio* ejufdsm.

Fructus ejufdem loci, Limonii magnitudine, cute rubida, ventriculo gratus.

65- *Rticma Hijpanis Lucma* * DeLdet.

* Jnd. Decid
I. 10. 3.

Fructus est qui forma Be mole ad Aurantia mala accedit: intra medullam officulum Caftanear, am colors corticis, quarq nuclei, qui amarus Be cabb ineptus, albedine valide fimile, aliquamlo dao EORinet. Inter craslos cenfetur cibus: Sapore tamen eftmagis dulci quam aun.

66. *Mungo* J.B- Garç. *Fruftu** nigrz *Coriandro* fimilis C.B. *Mejftiu Meifce Avicenn**.

Eft-feirich (inquit Darjtias) viride, quod per maturitatem fit nigrum^ Coriandri ficci magriitudi- ne- Nafci ferunt in Palaestina. Pabulum est equorum, interdum tamen ab huminibus cditur. Gu- zarate fic Decan incolae in febribus hoc modo utuntur. FebriciCans cibo abftinet per decem, non- nunquam per quindecim dies, post quos hujusfructus decoctum illi propinatur; in quo nonnihii pul- pxremanfit: deinde cortice delibratum Mungo, St inftar Oryzac coctumfebrickantiexhibetur.Pa- ni5 verb tricicus nonnifi pott multos dies adminiftratur.

Mungo autemfrigidus est,quantum ex ejus facultacibus colligere licet.

67. *Sd Serapionis & Avicmn** J. B:

Fructus *Sd*3 quales Rauwolfius vidifle fcrit carent duris putaminibus, plançqienidi funt, mag- nitudine PiftaEiorium, colDTeJuglandibusnoftris non diflimilBs, fapore fatis amaro cum manifesta acrimonia. Dedifle fibi Minontam quendam Hierofolymis, qui dicebat invicinis lpcis provenire j efle aut5mSf/SerapiDnisKAvicenziae,quod virtuiremhabetZingiberis.

6B. *Nux Indicapukhra*, cuiunguis albus J B.

Unciam Be femis longus erat, unciam latus, compressus, niger.fplendens, in fuprema parte veiliti unguis albus. Sonoruseft. Cortex niger, mediointercrasflus; fubeft medulla alba, m lifaporem ma- nifftum non animadvertimus. • Medullas autem albs fubeft forte officulum, est enim f onorus.

69- *Nucula Ina\ Lob.&Pm** J.B.

Lob.
Nuculam Indiwm hnc admodum fructu variam forteque K fylveftreiii efle fuadent nuculae, quai ex finibu5 Troglodyticac Guinea: habemus. Hzc vix magnam acquat Olivam, corticofo nudfo, oh- aginofa ac fapido, illi profus Nuci Indies fimilis, Jed huw Nucule tefta ofTea. Icon integre mag- naoi habbt fimilituAinem cum Chamxrihiphes fructu, inquit J.Bauhinus.

Q^qqqqq i

70. ISMUM

81. *Glans Indies magna* J. B.

J. B.

Juglandem magnitudine aequabat, cortice confans flavescente, uti Glandis Quercis efficitur, Levi, craffiufulco, qui tamen a fortiori digitorum compressione facile frangatur ac diffiliat. Per longitudinem area infignis, inaequalis He scabra fubcinerea excurrit, hili imaginem prae se ferens, quaque parte cortex reliqua firmior est craffior, duriorque eam adhaerens vel alteri corcici externo vel arbori venfimile est. Interna facies cortice contefta est ruffa, tenui acque fungolo, intercurrentibus veluti venulis utin interiori cortice Castaneae immediate callum compleante. In quo equo pulvino immerfus jacet, omnem fere uavitatem adimplens, nucleus figura rotundus, facie Glandis aut Castaneae nucleo perlimalis, geminus at in Glandibus, extrema facie scabra rufa cuticula imstruitur, qua vero committitur laevis, fubstantia dura, & colore glandis nuclei, sapore dulci, grato.

Pro fructu Balfami a Robino ad Placerum missus erat.

81. *Fruftus Amygdaloides nitidus* ptregriens, J. B.

J. B.

Laxis Btubricus est superficie nuclei Amygdalini magnitudine Be forma, nisi quod una parte paucius acutior obcusa Amygdali parte, infraque mucronem alterum lacuna orbicularis infculpta, non tamen effatu dignae altitudinis, forte hinc prodibat germea Color est ex flavo fere cinereus, BC altera quidem parte magis in arcum curvatus, Damaiceni pruni nuclei modo, corcicque tigitur tenui, fragili, nudeum in le concinens.

82. *Fruftus Peruanus Amygdaloides*, sub terra nascens, J. B.

Pulcher admodum alpeftu est grati faporis, qui BC radice caret, nee aliquam plantam profert, aut ab ulla planta producitur, sed solummodo sub terra nascitur quemadmodum tubera. Dimidii digiti magnitudinem sicut; rotundus est Bccntortus Scaffabrè elaboratus, coloris padiceae, nudeum intus continens resstantem dum ficcescit, Amygdalae fimiliter, cortice fusco, incus album, Sc in duaspartes divisum, ut Amygdala, grati faporis, & Avellanam gustu referentem.

Invenitur apud flumen Marannoti, nee ullibi alibi per universionem Indiam. Editur recens & *Locus* efficitur sed torren praestat. Adponitur lecondis mensis bellariorum loco, quoniam ventriculum W^{U5} admodum efficit & roborat. Sed liberalius edatur capitis gravedinem general.

Dan in rerum natura hujusmodi fructum subterraneum mihi fane non videtur veritatem.

Dubitat Clufius, an hic fructus sit Mandobi Lerii, quem ait sub terra Tuberum modo nasci, tenuibus filamentis simul cohaerere, nucleum non esse majorem domstica Avellanae, eju/demque faporis cinerei coloris, cortice non duriore quam Pistium filiquis. An vero folia femine proferat ignorare fefatetur, licet fructum laepius ederit.

J. Bauhino *Mandobi Lerii* miftus arboreus esse videtur, aut forte Trafi genus aliquod: Trafi enim, inquit sunt veluti fructus Be nuclei Avellanarum.

84. *Nucula Indica* Pjiformis & fonora J. B.

Articulo postremo pollicis non major erat, exprimens parvum Pyrum moschatellinurta, folidum durus, rugosus fere cinereus lignosus, fonorus, laporem manifestum non sensimus.

85. *Nucula Indie* ghibofa fonora J. B.

Orbicularis five globosus erat, galffparvae five parvulo globulo fimilis cinerei K maculofcoloris costapzne totus cinctus, fonorus. Cortex non admodum durus.

86. *Nucula ex Guinea* J. B.

Nicis Myristici fere magnitudine & forma, leviss, CDncultu fonum edens, cujus alter finis styli quid fimile habet, ex quatuor parvis lucis five eminentiis procedens; oppositus verb scrobiculunij unde avulsc videtur pediculus, unde radii recti producuntur: cortice mediocriter lzvi, fubruffo testus, quo abralo fubest alius durus qualis in nucem Molchata: huic fubest alius craffior, padiceus, funcoffis, politus. Nucleum ambit immediate quartus, pertinaciter adhaerens, pelliculae tenuis infar rugosus padiceus quoque: ipse vero nucleus amplus, candidus, pinguis, gustu dulci cum fastidio quodam fapor-

87. *Nux Indica* aha J. B.

Minor est Juglandem, latitudine unciali, pauloque longior, colore pullo obsoleto, fuscis maculis onnfero. Delinit in brevissimum acumen qua parte quinquepartita esse videtur. Pars opposita pediculi pars adhaeret, lignea prorsus, firma craffaque unic conjectura arboreum foetui. alioqui fructus lavis fie minimè ponderosus.

88. *Guabam* De Last. Ind. Uccid. I. ID. V. 6.

Fruftus est binos paliw bngus, cinereo cortice, pulpa Candida, durissimis quibusdam nudeis permixta, fuavis 6c refrigerant. Provenit in caedionibus Quiteais praefitur regiombus.

89. *Vomuin Sucu Sinenfium Martin. Atl. Sin.*

Nascitur in mediocri arbore, Be quae vixullā culturā opus habet. Majus est nostratibus, rotundum, puniceum aut rubicundum. Pulpa intra aliquando exos[^] plerumque adfuperficiem acinos, teruncii mole, pianos Be rotundas, verticaliterque ereftos cortice lignofo quinqve vel dicem continet. Caro totarubefcitij mollis fit; it Sorbi infiar matura Be fuaviffimi iaporis est. Siccatum cruftam mellisvel facchari emittit. Est Be cortice viridi quodnon mollefcitij fed cultro vel dentibus detrahicur. *Provnii in Xantunquz, Be extra Sinas nullibi.*

* *bid. Uccid.*
1. 2. C. ID.

90. *Ziccarā Guatimahnfium. Capote * DeLaet-*

Est infiar Pinearum nucum, in quo viginti; aliquando Be triginta Amygdala continentur.

91. *Frattus Indicus granulofus vzl tuberos minor. J. B. Fr. In Jicus 5. c. Jo. 1. 2. Exot. Cluf.*

Prorflisiphrica huic forma erat, magnitudo globuli minoris fclopi: putamen flav[^]centis coloris[^] Be pcrpeuis tuberculis, atnonadeb craffis, obfiturij nulMque lineā cinftum-

J. Bauhinus formam olivirem ei attribuit, lapideam Be inviftam duririemj colorem rufū, fup[^] id em granululis omnigenis alperacamj C&c.

9X- *Fruetus dyfentericus flavus J. B.*

Monard.

Provenit in India, autore Monarde, fruttus Dyfenteriam fanans, datus ex Quito, qui videtur esse vai-bearboris, altera parte LEVIS, flavus, alteraasper, coloratiffimus ac veluti pullus. Csterum qualis effect fruttusj cujulve arboris nunquam perveftigare licuit.

* *ite.*

In pollinem tenuiffimum redaftusj Be cum aqua capitum rularum manē Be ve/peri exhibitusdyfentericiD fliaxu miferē affliftumbrevi lanitati reficuit.

^3- *Nicaragua pomum nuce rotunda J. B.*

In Nicaragua (inquit Benzo) Novi Orbis provincia Pomi quoddam genns peculiars est, nequC Hilpanioli, neque ulli alteri parti Indian conceffum, Piri nostri fpecie ftrm: estj ligno interiofc rotundoj Nucis craffitudine Be dimidio amphus, optimi Kjudundifficni laporis. Arbor procerā, exiguis foliis veftita.

94. *Truno (imilis fruBus subfuscus ex Guinea C. B. Truni facie frufus i Guinea> in quo fufina J. B. Fruttus Exot. i. a Clufio. Chif. Exot. Li. c. 25.*

Pruni ferē magnitudine Be forma era; duas partes vitatas longas, felfunciam latus, infima parte mucronatusj cortice fiveplo corpore fctis craffis. Ar vultu fmoctel matoris comburto, foris aliquantulum rugofo Sc subfufco colorē. Interne est v. & pulpero quoddam comitente, la plubum cuivo-liuamj albi-antem, friabilem innpidamj in qua cenella quaedam femina.

9f. *Trunofimilit (pinofa G. B. Jangomas Trunisimilts J. B.*

Arbor Pruni magnitudine fponde nascitur in agris Be etiam in hortis in *Bafaim, Chaul & Batejtuala*, multi5 fpinis horrens, foliis iridem Pruni, floribus candWISj fructu SorbD fimili, gultu Pruriorum adlringente Be acerbo.

96. *Nux Tontica nuei non *valde ahfmdis, ft> adieu color is J. B. Nil* altzra cap. 26. lib. 2- Cluff E^ot.*

Spadicei crat colorisj Pontica: nuti nonvaldeabfimilisj Unciam longa[^] ejus ambitus unciaj paulomaioj, feffilifivj infima parte atiguitior[^] bxtima[^] craffior, Be velut decufiatim fortinata, dura, rubea, melleo ullo mo do frepitem cdens. Inter aromaca reperta est.

C A P . VIII.

Farvi quidam fru&us d J. Banbino vifiapud IS. Due. Wvrt. & deftripti Lib. ?. cap. Sofilji - & £-*

1. X 7 *frjvrf In Jfca altera, compreffa, cortict duro, colaris finora.* Parvi l?runi quoddammodo »nii^{is} i[^]1 crat, fublongus, compreffus, lucidus, coftisln uno latere confans[^] iucidus.
- 1- *JSTucula In die a tertia Jplendior.* Idem fortē pzedenti. Color id[^]m nifi dilutior Be *fplendidi-* or, magis ciam tonipreffus Be laeior, pocirtimum una parte-
- 5- *FT. Inikzm o* v> par<vi ftre form**. Colons crat quoddammodo Caftanex, dilutions, *fplendidi-* Circulu5 ambic fen: cocum qui non fpbnccc, utrinque toratus.
4. *Nucula fublonga[^] el Dsfruttus alicujui Indici.* Onciam longa, unciam iemis ^{circ[^] ufcu5} i n- tunda, hilci colons, un^a pane latior, lignofa, cava: in ea oudeus cortice tenni teftus, q^u *ins hltus, durus, albus Bcfapor? manificilo defticums.*

C A P . X.

Fruittum exylcorum ojjicula e Mufti Sou. Reg. Londin. defriptimz à D. Grevio edita.

I. **O** *S Pruni Indici fere globulare.* Juglandis mediocris magnitudine est, colore leucophxo obfcuro, undique tuberosum, durissimum, ad bafin Sc verticem aliquantulum prominens.

I. *Vs globulare aliud.* Magnitudine Be figurâ pzeedentis, nisi quòd ad bafin tantillo latior, colore citrino fsuftramineo, duritiè Juglandis, undique inaequale 8c fbabrum, cum fulcis parvis & foraminibus intermixes.

3. *Osglobulare tzrtium,* in quinque tamen valvas feu latera dividuum, primi modo inzquale & tuberculofum undique, xquè durum, ejufdemque leucophæi coloris, verum magnitudine Cerafum medicrem non excedens.

4. *DsFruni oyak,* Magnitudine Be figura est ovi Columbini, aperiufculum feu fcabrum, ferreo colore,substantiâ durâ, non tamen admodum craffa.

5. *Ds aliud ovatum,* Ovi Gallinacei magnitudine & propomodum figurâ, nisi quòd bafis aliquanto obtufior fit, conus feu vertex minor; colors leucophæo, mira duritiè, in quinque latera divifum, rugofum & inaequale, cum plurimis foraminibus 6c profundioribus fulcis. Latera tDtidem fissuris cæcis diftinguuntur, paulò supra bafin incipientibus Scinde versus apicem productis. In hoc quoque continetur ofTeum 5C veluti dentatum corpus unciam longum.

6. *Djjiculum o<vah produt?ius,* Duos digitos longum est, unum latum, Olivæ officuli figura, mbrana quadam ftraminei coloris teftum, lib quafulris undique inaequale est, exterius colore cinsreo obfeunore, intus albicante, duritiè eximia.

7. *Djjiculum ovale oblongum aliud.* Nudum leu nulli membranâ teftum, pcedente multò majus, ut quod Æ uncias longum est 1^ unciam latum. Sulci etiam hujus plures funt St profundioribus.

8. *Djjiculum wait oblongum tzrtium,* pcedenti cognatum verum muko minus. Cornum vulgarè magnitudine parum excedens. Hxc tria cognata inter fe funt, non tamen ejuldem fructus junior¹⁵ Be aduions offiLula, xquè emm dura funt omnia, proinde Beplenam maturitatem adeptâ.

9. *Yrum Djjiculum Juglandi ferk Jimile,* Unciam ii longum, dimidiam unciam latum ad bafe quz paululum excavata media parte uncaam li, verne nonnihil acuminatu fie prominente. Tril¹⁶ rum est fingulis lateribus fulcis plurimis &c profundiusculis inzqualibus.

10. *Ojjiculum figura anemala.* Duabus iinciis longius, duas propomodum latum, 1* craffum, coloris citrini obfeuri, aperiufculum actiarenâ relperfiim effct ab uno Jatereinarqualiterplanujn¹⁷ altero in Jabium duplex intumefcens, valdeaperum, fiffLiraper longitudinem decurrente.

Duo adhuc alia offiqtjjajanomal* fic in/olirs figure defcribit: qua: apud ipfum vide *Muf Reg. S^o c^o* p. 189, 190.

II. *Ojjiculum azuminatum aliud.* Pragrante est Æ digitos longum, ii craffum, duos pxn¹⁸ latum; ab uno latere valde convexum, ab altero propomodum planum, bafi ovali, cacumine in punctum ftatum excavato, colore rubiginoso, prsdurum & rugofum feu alperum, fulcis latiusculis plerifque fecundum Jongitudinem extenfc, è quorum nonnullis ligneæ aliaque fibræ emittuntur. Si Jeci in hoc hique hujus generis pflici» f fibrarum ngnearum ledes Tej vestigia impreffa intelligent iunt. Aliud huic subjungk fimile officulum, multis non tamen valde profundis fulcis undique inzquabj quorum nonnulli a bafi ad verticem fere producti fiint.

12. *Ojjiculum ftuNux ovalis,* magnitudine Be figura :Oliva: mediocris. Uidique laeve est, colon's leucophzi splendentis, veluti Mammei oiliculum, excepta duraxat bafi, qua: fordidiore Be rugofa cum duobus anguftis glabns marginibus labiorum aut oris aperti armulis a cujus angulis crena feu fulcus naturalis Nucem feu o/Ticuluniundiquecingit.

I; . *Nux In die a <vzlut lar'uam ojtndms J. B.*

Niger est, duas uncias fere longus, unciam pine latus, ceu monticulis quibusdam inaequali ovata figura longiore; cui terni fcribiculi fupemè adverfa facie impreffij eo litu ut larvam quandam Simix caudate aliquo modo repræfentenc fine nafp.

14. *Alia pzedenti fimilrs, finon tadem J.B.*

Figura a pcedentis nonnihil evariac Nam Be tres illas fcribiculas habet, fed tribus K^{ne?}Sc^{Ca}ff^{ff} culatis, in medio concurlii tres angulos oppofitos facientibus, interiiinfas. Figura fructus ad triangularem accadir, iccundum felongitudinem canaliculis ftriatus atque /ulcarus, ea part foramina funt litiore, oppohta anguffHorei color ex pullo cinereus. Concuflus nullum prarbet.

Cat & Defcr. Mufti H?g. Soc. p. iui, ioi- Hujus generis Nuces fex fept¹⁹ mve defcribit #D. Grevius Palmacoci nomine. 1. Prima tudine iempedali erar, media parts duos digitos lara, bail nonnihil ovali ic prominente cum ampl fbraminibus ut in Coco, (Il pen lis conic a 6c paululum inflexa. Tribus valvis feu Jaminis cenicur, qui cotiicm angulos concurfu fuo efficiunt, inferne obfeuriores, fupcrius acutiores. vanusprodilhibiiciDnchbrariim lignearum. 1. Secunda mediz magnitudinis, Juglandi ma) iinuam longa, balis diametro unciali. Ad margines foraminum in bafi, hbnlla: nigr in ambicu expanduntur ad modum proceffuum cJianum circa humoi em oculi CiyftalliniM; tia pancer conica led minor, figuri Pyrimolchacellini/Nuci mynfticx parvs raagnicuiin²⁰ lignea, colors Buxi, cum cnbUs, uc in reliquisapertis foraminibus. 4. Quarta, Palmacocus

ditta, Nuci Indict larvatx J. B. jam delcripta: fimilis, Ipecie tamen (ut putat) diverfa, caput caninum in ineptè exprimens. Defcriptionem vide apud aucorem noftrum loco citato. ? Palmacocus ovalis, NudsMvii. 6. Palmacocus latus, in tranfverfum uncialis, abafi ad verticem non ultra i uncis extenfa, tribus in foraminibus propemodum asquidiftantibus.

7. Palmacocus orbicularis, aliquantum tamen compreffis, diametro femunciali, colore fic duritie Buxiyofliculi Perficini in modum Limrulcata- Foramina in lateribus terna aequidiftantia, fibris capillaribus nigris Dbvelatis.

8. NuxrhombDideSjprazcedstibus aflinis, i^unciz longa, funciz lata, femunciam crafla, lateribus paululum compreffis, fibriflignis tenuibus abafi feu pediculo ad faitigium productis undiqus opstus.

15. *Nucidattyls* MuC R. Soc. D. Grevii.

Duospkidigitos lDnga eft, ad pediculum unciam lata, props fummitatem propemodum duas, Pyri infar turbinatus, linea ab uno lacere elatiore fecundum longitudinem decurrente. Pediculus albanugineus in Malo Cydonio teftus. Tunica exterior leucophaea, tenuis, mollis, glabra, ita qua fibillarum operculum non ut in aliis fmaibus fecundum longitudinem produarum, fed crefta j^um admodum vilbruni in yelut D difto, aut fetanum in dorfo porcino, in exteriori tunica exuta, fructus fcopulam fetaceam feu echinum reprsntat. Omnes hx fibellae proximo tegumento circumcirca cpntinuac funt, quod liibftantia conftat lignea, lenta admodum Sc dimidiam unciam crafla. ©perimerrto feu corticis huic proxime fubiacet fubftantia quxdam mollis levifque, in crafla. perimen'o feu corticis huic proxime fubiacet fubftantia quxdam mollis levifque, quae ex Ipano re" liao vacuo kiitio pulpofa admodum 6c fuccubnta pars fuifle apparet. Intra hoc pericarpium latitat ©fficulum magnitudine circiter ovi columbini, non ut in Prunis uoncavum, fed folidum prorus ut in Daftyijis ejufd^mque albicans, denfi 6c corner materia: In fiimmo ofBculo ut in Nuce mofchata cbrmatur cellula quxdam rotunda in qua femem feu nucleus gemunus continetur.

16. *Nux uhofa*, €||C Gutter ^ Ut Ejufdtnr.

Novatn Angliam agnofcit matrem Nux ifta quae ab oleo dulci quod copiofum nucleus fundit cognomen Butyraces meruit. Uncias zi longa eft; media parte unciam ij propemodum lata, utraque extremitate angulosa, & aliquantum p. convexa, ad Cinnamomi parvi figuram accedens. Cute integritate laevior, colore Negro in ficea. Subftantia interior nigricat, quae initio pulpa quxdam erat, feu cortex carnosus; circum digito craflus, lateri Juglandis pulvinato respondens. Os fere orale crati fex feptemve angulis fecundum longitudinem ftnatum, maximis, qui oppofiti funt, in mucronem acutum definentibus. Angulorum interftitia in zqualia lunt, lamellis plurimis 5c tuberculis rugofa, feu exafprata.

Decofto corticis colni Anglipannos line us lancofque Cinnamomi colore tingunt, abfque additione Aluminis, aliufve rei cujufcunq.

17- *Juglaw angulofa*, tjufdm. C&c abgebr 304 Linnt.

Color eft Juglandis vulgaris, unciam fere bnga, tantundem lata, paulo plus fejnuncia crafla. Baf, fed praeipue vertex, aliquantum prominent: Dfto angulis diftinfta eft alternis acucioribus Be obtulioribus. Nucleus in figuram juglandis vulgaris efformatus.

18, <A<vellana: Indie*Ipecies, EjufHem.

Figurae eft triangularis, uno latere majore duobus minoribus lubtenfcF. Bafis femunciam crafla i^ unex longa lata, abafi ad cufpidem tantundem extenditur, coloris cinerei obfeuri, undique rugofa kukabdj ex x diffinitione fibrarum plurimarum Vera duntaxat bafis quae putamini adhxlit g^ bra eft, Be ut Avellanae in medio fifillis.

19. *AvzUana Nova** Angli*i Ejufdem.

Breviore 5 funt 6c latiores hac nuce quam Eoryli vulgaris, apicc depreffiore, bafi productiore, colors fimiles.

to. *Amlana fitrgatrix Novi Utbis. 2&at6atia* |^ Ut, Ben magnum Mtdicorum vulgo Monard.

Hanc fuperius e Monarde 6c Clufio defcriptam dsdimus. Pruni cujufdam (fi Ligono credimus) re-Vera fructus eft non A veil an a: In nuclei medkullij> latitac plantula feminalis fulis binis cum raticula Be gemma conftan5, in qua fola vis cathartica hDipitatur; hac enim exempta rcliqua pulpa innoxia non minus quam alii quzvis Nux edi poteft, teftè *Ligono HiR*. Barbad. p. 6B.

xi. *Nux fitrgatrix Angohnjis* Mu(. R. S.

Longa eft 4 unctej tantundem lata, ab uno latere corivea ab oppofito plana; colore Aurantii, tefta pradura; nuceteo praeedentis fimili. Surfum 6c deorium purgat vchenienter, ut vel una nux daodccies alvum fubducatur.

12. *Hjtianv* figurd fruttm* Mul. R.S. p.107.

Vulgaribus Caftarteis multo minor eft. Cortex exterior fufcus, tenui Sj illicis tamen propemodum duritie auc Lithofpermis vulgaris. Huic fubiacet alius Difficuli Pruni confiftentia Be fpliditac, cui induitur nucleus faporis non injucundi qui tamen afferitatem in fiuwbus aut gutcur ar>t. *3«

11. *Caftanecum Nova Anglia. Muf 5. R.*

Figura est Caftan ex vulgaris, fed tantillo minor.

24. *Fructus Injctus decujatus J. B. Tom. 1. lib. 1. cap. 116. Caftanea purgatrix Milt S.R.*

Ovilli renis formam habet, tanquam ex pluribus partibus coagmentatus, cailanea? magnitud. & Colore, oblongus, craffiusculus parum compreffus, interdum magis orbiculatus^pafillum terra Sigillatae (qualis in Officinis fere oftendi, 6c haberi folet) forma 8c magnitudine adsqans, quetnina quidem parte duo fulci decuffitum in quatuor partes fuis radiis dividunt. Dppofita verò parte figmoidefultus duplex conformem porcam ambiens, artificidse exaratus^ inter cujus comua triplex eminentia germinis fedet,

15. *Eeratiuw Monococcori Indicum J.JJ. Lobus Buglofioides Muf. S- R:*

J.B.

Quinque uncias longus est, duas tenè latus, pediculo brevi, craffo, firmo, non fructu fuperfite tenes interio, fed cortice obductus. Cortex parte craffus, (thaleri craffitudinem fuperans) extima fave fcoriata, rugofa, quaedam fuis partibus pellucente, cum quibusdam verrucosis tuberculis interna, fulca, pulverulenta, digitorum contactum fuiba quadam fulgine^ veluci uutilago (quz c fructus fuperficie J inficiens. Ipfa ci' terum corticis fubftantia veluti ex arenosis quibusdam incis firmiter adeo cDmpaftilis eft; ut fine vi quadam rumpere haud ita fit facile. Quod cavitatem replet intus non faba eft ant Phaeolus, fed phalloides fungofus quidam fructus, internis atqus coavexa: corticis cavitati extenitè respondens magnitudinej ut integer fructus agitatus fbnitum intus edat: pulverulentus quoque eft, teres, modice recurvus ex fungofa quadam materie compactus, cDlorefufcD intusfnirquef iipor fatuus nee olfaftu dignus.

QLII in Mufeo R.S. hujus generis allervatur bbus, [delcribente D. Grevio) triplo major eft jam defcriptDj nimirum decem uncias longus^ 8c in medio 4f latus, utraque extremitate ovalij planus &c icnvis, dimidium digitorum craffitie vix fupersans, ventre xquali^ dorfo convexo, obtufj tuberculis plurimis undique afper^ colore ruffo obfcurD. Tota cavitatis interna unico nucleo repletur, è inira congenere fibrarum albenitum, h^ que fecundum longitudinem Heque fecundum latitudinem fructus extenfarumj fed lccundum craffitiem utrinque veluci dentes in peftine dtplici, cunupulD. Fibrarum interftitia pulvere replentur^ qui initij pulpoiLim fructus parenchyma fuit.

CAP. XL

Fruſus peregrini Wormih

1. **P**rimus est fructus ex cavitate interna, qui in medio dtplici, afflictae coronae in qua spatiosa moco cavam, ut nucleum alium anibitè hupido lit. Parte interiore Be lili foramen habet, quod tamen culcro niajus redditum videtur; tante magnitudinis ut nuceni Avellanam capere poſſit^ per quod intenorem fuperficiem Infrare licet. Cinereus, afper, inarqualis, adrotunditatem accedens, figura faine fepidis Bidntii^ in circumferentia pollices lex cum dinudio obrinens.

x. *StenJus* eft ovalis, cinereus^ alper, ovum parvum gallriaceum^ figura referens^ paululum acuminatum, fed pite cialliDre, pediculi fsvans veftigia. Ab hoc pediculi punfto ad (iimmum apjeem pollices duos cum Jem idz habensih ambitu quatUDr/concuflu fDnitum ab indufi nuclei ataftu edens: fed nullis prominentiis aut cuberculis inarqualis, affinitateni quidndaiti habere viderur cumfructu I. Gareci a ClufiD. i. JExot, c. 15. defcriptD.

3. *Tntius* quDdamDLio figura refert fructum, quern Clufius 1. x. Exot. c. 16. vocat *Coxco-cjpotej* colore fulcoj prx kvDre Jplendens, in utroque apjeem yneream Bcfajcatam quandam habens prominentiam. Nec fructus mihi videtiir, nec alcerius fructus officulum, quia cavus, mollis, Jarriffimus, nullum in Je nucleum Jabet, nec in aqua fubilec. Si xu aut cultullo pupugens faille ad i nora penetraveit: potius Fungi genus quDdam dixerit. Ovum cgluminum majus figurareft.

4. *quartus* elegans eft, altera parte Jeffili/ Nuas mofchatac iTiagnitudine: cortice conftat cunupulD. CULS pars teuia (cabra eft, miqualis, colons Jpadicea^ lapidem Dufqniuni colore Sc lxvoie fei^ referens. Parte Iblili foramen eft, Jjon natuiri; led<:afu proculdubio Impreffum, per quod K corticis tenuita^ &c nuclei ei innatantis, ferme conftitutio videri poteft. Eft autem nucleus cortice paulo minor, unde concuflus JTJuttui aUilJ fonitum excitat: xterum ipfe nucleus exteriis colons eft purpurei led interius albi. Sunt quii Balfami Peruviani fjuftum eſſe putent.

J. *Qumius* ejuſdem fere cum puore ell niagnitudinis^ parte alrer^ lacvis 5c lubricus cum evig^u1 pionnentia in medio, colons luceo^ figura ovali, aliquanculum ad ahgulos obtulus prorubera Parte altera Inxqualis S: fcabra, feptem Juiubus icu foraminibus in medullani pervii? prxditunb IOIJS cinci ni, nuckum nucis Juglandis quodanmodo 1 efeixns, fed lignoius Be durus eiam hac p^u ell. Egu arbicroraffinitatem magnam liabere cum Jexto fructu delcipto a Clufio l.x. E^xD^r c. 1. Qliidani veramnuem Metel die arbicraiuur.

(S. J<r<i Daftylum fernil-figura^ mnulatur, ubfongUJ, compreffLisaliqiantum, duas gitudine Juperans, unam laciudine, utnncq acuminatus, colore purpm CD, Jtriaiis K rugis m aqualibus dotaius. Auc & genCRe Nucura eſſi videtur, aic us majoris alicujus fructuj. Ugyffis namqiiB eft, darus an verb nudeum in fc roiuincac non li^ucc, quia cDncuſBus niinL. m. Ncluo an ad Za,bucayo referridebcac.

7. *Septimus ovalis* est figure Os, ovum gaUinaceum parvum magnitudine aequans, fed ucrinque acuminatum, lignoliinij flavum, nuckum cpntinens, qui moto &c concuffo fructu refbnat. Tefum verD fuiffe videtur pulpa quadam Candida, cUjus reliquiae teriaciter adhuc d adhxrentesconfpiciuntur.

8. *Ottawa** gemellus erat duDrum Prunorum tnajufcolorum, invicem cohaerentium rmgnitudine. Alter vsro illarum f in quit Wormius) appendicem habebat roflratum, Nucis Avellana: minnris magnitudine. Nee genuinum ejus colDrem, »nec pulpam auc nucleum ddineare potuit Worm, quia interiore nucleo aut fiibftantia fpoliatus erat &c exterior facies vernice obfeure flava obdudta; inextremitateappendicis colore nigro (plendente prxditus, ex eo namque rctenta naturali figure pyxidem fecerant Tabaco fternutatorio deftinatam.

C A F. XII-

I. *Vinri conii facie fruffus exoticus* J.B. T. i. P. z, pag. 164.

J.B.

T\Ediculo minimi digiti Fere craffitudinife, rufo, duroatque ligrtfofo[^] folia mutuo incubitu ad[^] mJ rigifcuntur, digitum fere longaj firmij .lubltantia lignosa, triquetra, principio anguftjgi L, M reliqua parte latiora, & faftigio tenus recurva, numerosirque fquamulis, fbliaceis, lucentibus nigrifque veftita. Hsc pars quæ incurvaj modico inflexu feparatur[^] ut frufbim effe fquambfim fufficio fit. Folia quæ in tus delitefcilnt extimis breviora, 5c denfiore di ft Drum foliorum fti-patUDblepta: per quorum longitudinem extimam cofta infignisj angulum faciens[^] extirrit, parte interna carinata. Sapor nonnihl arnaricat, non fine aftriftione nidorulenta[^] ac fi fructus in fumo eilet exficcat. Partes ex comeltione dentiumque attritu hasrent, quod argumento fit fub-tilantiam nonnihl effe vifco/am.

A C. Bauhino fratre hunc fructum habuit. Dignus est inquit qui cum Carduo Madagafcar conferaturj cujus ergo defcriptionem (ubjiciemus, ut Leftor invicem confsrat.

ii *Carduus ex Madagafcar India* J.B. *Infula Madagafcar* C.B. *Cctrdui wjufdam iUgAntijfimi capui*, [ub fructu 15. Cluf Exot. lib. z. cap. 15.

Erät id caput tres uncias cum femiffè longumj inferna parte unciam latum[^] fuperna rhagis, ut quod explicatum ex multis iquamis imbricum modo fibi invicem mcumbentibus confarctj que circa mediam Be liipernarti ipfius capitis partem majores, præ ficcitate reflexae erant fummo fa-ftigiu, Sc quodammodo in lacinias divifaj coloris fpadicei; inter quas exortx erant velut exiguf niembranacsz liguk, plans fie fatis anguftx, cineracei quafi colons, fumma parte latiores 5c foris exalbidar[^] interne autem fpadicei colorisj mplliflmo longoque villo faturx purpurx deganciflimx per oras ornatae, quæ temporis lucceflii in atriim degenerabat. In medio capite denfa erat villoforum ftaminum flavelcentis coloris congeries, inter quæ latebant anguftj 5c pungetites fpin.r, binas uncias -longs, quibus infima parts villoliim femem inhxrebat[^] Nerii femim non dilfimib, fuici ex rufo coloris, fed immaturum.

In magno illo finu infuk Madagafcar a Lufitanis Bayo £ Antvn. GiU nuncupatD leftum erat.

3. *Cacios J- B- Solanum pomiferum folio rotunda tenm* C B-

Arbutti modo nafciturj Sc infigni virore prsdita est, folio rotundo BCtenui. *Fruttum* fert Maid infano[^] fimilem, ahera parte feffilem, altera turbinatum, cinerei colons, grati fapons flc acrimoni^e expertis, minutum admodum femem continens.

Invenitur tantumin Peruvianis montibus.

Magnar est apud Indos xftimatibnis ob infignes facilitates. Nam urinas ciet, calculum è reni- bus pellitj quodque prarftantius eftj illius ufus calculum in vefica commimi ferun[^] Ji mollis ad hue ir[^] ullifqiu medicamsntis ccdat.

SECTION

SECTIO QUARTA.

De Plantarum quarundam fuccis in Medicina ufutatis.

Notts Gummi, H(\$fin<z, <? Sued infpiffati, vide Lib. i. F&ft. nuftr. p. 1 o.

I. *vlibanum, Jive Thai Park. Thus J. B. Arbyr thurifera Ger. C. B. jprailhiliCCIftC 0? &M**
 7-B-

Silicea pinguior est Thuris lauhryma quam Maftiche, ftatimque in luculentam perfina-
 cemqus flam mam sxardet, 'odore multu imbscilliors, fed mhil per incendium ftillar, ut
 Maftiche; dentibus ftatim friatur, verum friatura non cogitur denuo, in Maftichesj nsque
 ut ea libere volutari poteft, cum dentibus eorumque prsepiolis adhaerefcit. Sapors est amaro Be
 modice acri, non ingrato tarn en, Dcfalpino adfringents fubamaro. Colore est ex albo fulve-
 fcents, minufquepellucet quam Maftiche, colors candicante aufubrufFoj, tranflucidK gutc^ alias
 HngulaLeSj alias gemslse tsfticulos aut mammasj prout ea; majurcs minoreive fuerint, lmirantur,
 unde 8c Mammoli Sc Mafculi Thuris cognomens: interdum quaterna: aut quinar, magnitudine
 Ciceris, Avellana?^ SemajoreSj adharrsntes nonnunquam luo cortici unde exfudarunt: friaturaveio
 immundior ex grumorum attritu decuffa Thuris Manna Garcis appellatur.

Quod ex eo [Thure] inquit Plinius rDtundirate, guttaependit *njafculum yocsimus*, cum alias
 non fere mas vocetur ubi non fie f&mina. Mafculum alii putanta Ipecie tsftium diftum. Caf{^
 Hufmannu5 quam ob caulam mafculum vocabant fe nefcire fcribit, nee enim arridere que Plinius
 dick lib. iz. cap. 14. Nobis latifacit Plinius ob formam vel prarfantiam mafculum didum.

Mammofum Thus J. Bod. a Stapel a mafculo diiingui): quod illud oblpngis grumis mammarum
 inftar pendulis compofitum fit; hoc parvis rotundis candicantibus aut flavis, intei^um Unguli5j
 interdum telciculonun inftar gsmellis conftat: Alii hoc ab illo non differre volunt.

De Arbore Thurifera nihil certi traditur. Theophrastus Arborem non magnam ellis traditj
 quinqus fere cubitis atpllij ramofam effej folia habere Pyrofimilia, corticeni lsvsm ut Laurus-
 Alii camen [inquit) fimilem Lentifco eile aiunt, 6c ejufdem fruftus fubrutilo folio- Al» 8C
 corticis 6c folio etiam Lauri. Diodorus Siculus Acacia; /Egyptiacaef formam Arbori thurifera? at-
 tribuic, Salicis folia, Lsntifci autem folia Myrrhs arbori, in quo Diofcoridi & Theophrasto plans
 contrariatur; quomodoharc cDncilianda non video, nifi fit qga^dam tranfpoficio. Garcias quoque
 Thuris arborem humilem effe Be folia habereLencifco familia fcribic.

At Thsvetiis Arborem Thuriferam. Puiua reliiii&eras rdirre traJi^A vaumicooi quam propep-
 nit cum Pinis nulla est fimiitudo; quamvis ie hngat adfrare arbon, aut ei ariltantem pingaL
 Devera ergo forma hujus arboris etiamnum incerci manemu5j quod neque Veterum quiquam^ ne-
 que Recenriorum in raftas illas Arabis folitudinss penetravit qua: Thus dant; uc Ca(p. Hu&
 manni vsrba u/irpem.

Oportet tamen utRsgio thurifera fatis late patsat, Be arboribus etiam abundet^ cum thus tarn
 vili vecat.

De loco Thuris natali tnagna ijs est: nonnulli Arabiam folam Thus gignere fcribnntjnc tamen
 earn omnem, ied Sabzam diftam, *Solis tji Thurea virga Sab<eis*; Vug. Ju&a, aucore Pjnio, negat
 in inlulis nafci prater Arabiam ullis. Thus quoque prxtsr Arabiam nulJis gigni Theophrastus &L
 Plijius tradunt. Dixcre tamen poftca, quod ex relatu acceperant, id etiam nafci in quibufdam
 in lulls. Thevetus etiam mulras infulas &L regiones h u jus fgraces effs fcribit pr^Ler Arabiam, &C
 quibufdam in loçis tam vulgaremeffe quam Aurantia: Malum: Thus tamen quod ex Arabia ds-
 frtur ut olim ita *bi* nunc omnium praftann7imum haberi.

Diofcorides prxcer Arabicum Thus inveniri Be Indicum fcribit. At Garcias per itfiiver/arn In-
 diam Thus non nafci certiffimum esse ait, cum quicquid Thuris ibi confumaturex Arabia deferatnr:
 ce niiratur a quo Diofcorides id acceperic. Potuitforte a Colore nigro quoddam Thuris genus In-

*CcTnment.in dicum appellari, quemadmodum Myrobalani nigiac Indac denominantur. Ac # Bodsus a ^apel-
 Thtyphr. All-Indum Graecos vocaffeithoc genus, non quod in terra ipfa Indix continenre nafcretUJj i^d in
 11*: 9- c-4

infulis Arabiam adjacentibi^ qua: tun temporis erantfiibndorum poteftace, qua: deludeabArabibus
 forte luntrecuperati,, 5c hodie liibeorum funt pncipatu. Duplicem Thuris quotannis mcfciu el^
 tradit Plinius &C confirmat Thevetus. *Mmftmlanno fylebat, mmorz Qccafi9ncvtdm Ai&jam quafM*
*ah tram 'vindimiam ajfert prior at(vut natural is *vindmia cams circa or turn flagrant ijimo afti, i^c& -*
*drntibus qua maximi *vidtatur tjt' fragrans, Xiniuiffimufuz tends cortex. Autumnno legitur in tftl^**
artu. Stcunda 'videmia tji vere, ad earn hy<me curtctbus mcifis, Plin. Quod a;tats coJlJigitur canni-
 "ns, purum, nitiduni, pellucidum est (inquit Thevems) alterum quod vere rubeicens, pon*
 dere, prelio, bonitate, viribus JLipenorū longi: inferius.

Vires.

Quic^t ad vires attinet, Thus calfacit, ficcar &: /ubaftringit. Ufus pneip. intrinfecus eJLud vanos
 capiris ^-pedtons affectus, uc be ad aJvi utenqueprofluvia, ad tuffim (deglucitur vzlp&r^ltmmj
 voniitum, languinis exLixacionem, diarrhuMm, dyLcnrciam mitigan.Jam- Avicenna dcpra^a^5 IUI-
 libu5 & abqlirx memorii Thus opcin prxtfare tradic. Diofcorides Thus in ienuida vaietucine
 hauftum inianiam facers, Be largius cum vuo Juniptum incrchcerc ait. Nos ergo (inque J.o.j

confiiUmus, ut nulli affe(ftui intern oprsfcibatur, nee etiam in. fiiiflimigiis, R vera reriDfit ties de BJUS natura. Sum nobis alia tutiora mediuamenta pro roboranda memoria, & ad vert Vos affedus internos.

Extrinsecus infervit fuffitibus pro capiteroborando, catarrhos difcutit, cava ulcera came renler Sr ad cicatricem perducit: cruenta vulnera, cephalica imprimis glutinat, perniones { cum fuiUo' idiñ autanfeno jianat; ulcera cacoethea turn fedis, turn reliquarum partium demuJcet ftritum cū lafte limmentum: j' Deulorum rubedini ac lippitudini medetur (fbil. aq. Ro(arum multiplici in EX finftioneThims imprsgnata, laftique muliebn potfmbrlum commixta piD collyrio linuido-) verm cas incipientes Be impetigines abigit (cum pice Sc aceto impofitum) Emplaftris, unguentis Balla' mis ad vulnera Be ulcera mundanda 3c earns replenda utiliter adinfcetur. Prxcip.i usUY eft in Cranii Fraftuns.

Olibanum cum alboribus: Qvi tritUm & telapDribus applicarum hemicrama: Sc =ph.116jia prodeft.

Ad aurium dolores, [aures ulcerofas Matth.~\ cum vino dulci .[& calido] infunditur. Cortex thuris vim habet eandem quam thus, efficacior tamen est Sc magis afrtrineit Óuare DO tus tnagis commodat finguinem lpuentibus, Be Hindis affeiftiDnibus appoficus. Hodie' in'ufii fon bft; neefcio an olim importaretur perfe, fed duntaxat qui unâ cum Thure ab arbore 'deradebatur' eique adhaerebat.

Alia res est cortex thuris ninnullis diftus, vel Ihymiana, vel Thus Judzorum quôd Tudii in fuffumigiis frequenter utantur, est corticofum quid ex India allatum. Manna Thuris difta eandem etiam vim habet quam Thus ipfum; nec enim aliud est quam mica: Thuris concuffii elifi ut Plinius fcite.

Fuligo etiâ Thuris olim in ufu fuit ad mitigandas oculorum irflammationes, fitendasfluxianes repurganda "Jcera^ cavaimplenda Bompcfcendaque carcinomata; verum nunc dierum non am plius in ufu est. Modum autem faciendifuliginem vide apud J. B. torn. i. part. i pag. 206.

Czterum Thuris ufus antiquiffimus Be longe uelebernmus erat in facrisj thure enim facrifica bant ohm, eoq; in templis ad fuffitus utebantur. Nee rarior ejus ufus est nunc dierum in templis' Chnrtaij Drum ad iuffumigia. Ejuifdem f inquit Ainatus) etiam ufus est in luftandis mortUDrim cadavenbus, Et nrum diftu ut hie mos per oranes states, inter Diniies fere gentes Be relieiones inolevit.

Thuris limpdi folium Lobi

NDUS cum Parkinfono nihil aliud esse videtur quam Limoniotogeneris plants Cluffio diftar fo lium. An J. Bauhino co nomine defcriptum diverfium fit inquirendum.

Thus, vel Tusut in antiquis codd. abfqueafpiratorielegitur a tundendo dici fcripfit Sofipater ut Tus dicatur quafi tufum, nempe a glebis tufis, five tun (is. Aliis placet thus dici quafi Bw@ *ri n 3>wj quod Voffiomagis placet: nam 3WK Grzcis idem ac ^H*f«« liiffitus, fiveut Recenciore lo nuuntur mcentum. Quetnadmodum »W unde tin, idem interdum ac ^vfufEre VofT

W*m G R Q., qu'em diftum volunt a juvene AfTyrio ejus nominis in hunc fruticem converfo quern Deos Jtudiohffime CDlentem invidi occiderunt. Hinc Diis Thure gratius nihil afferunt Alii nialunt a monte Libano: Ssdin eo, Thuris arborem repenri Veterum nemo prodidit. Venlimilior illorum opinio quia MC. ftilb nomen accepiffe fenbunt. Dfficnar Olibamim vocant a Grscâ

Euripedi vice tota Arabiarum arbor, etc. lachry-

i. De Myrrh*.

> Myrrha Grscis S^r* Be Miffo*. At M#;« pro 2*4r< jEolicum est, & quibus Latini mutuatii funt. Myrrh* nomen [ut Poets fabulantur] accepit a Myrrha Cinars regis Cypriorum filia nuz nefandopatnsamore capta, cum aliquot noftesauxilio nutricis cumillo concubuiſſet tandem dſtato lumineagnita, cum illam pater occidere vellet, noftisbeneficio elapfa in Arabiam confugit, ubi in arborem fui nominis est converfa. Vide fab. Ovid. Metamorph. ID, Vermis Etymon est a pi/^* unguentum. De Myrrha: arbors nihil certi traditur, nec a Vetebus neque a Recentioribus. Theophrastus Myrrham quam Thunferam arborem ficinorem Be humilio^m esse dicit^frucofioremci, caudice duro contorcôque juxta terram, craffioremq; furâ homims. TOium habere Thuris, aculeatum tamen &c non lxve ut illius, Diofcorides Myrrhz arborem fimilem Spins iEgyptiacx esse dicit. At Diodorus Thuriferam arborem Spins iEgyptiacac fimilem facit; Myrrham autem Lentifco cui Diofcondes Thuris arborem CDmparar. Quod de BelJonio i Obi! 8. recenlenc quidam finquic * Cafp. Hofman.) qubd viderit Rams in Palaestina inane est, Hariolatur tantum (uc Scali ger loquitur) ex vicinia cum Acacia iEgyptiaca, cui comparari audiverat a Diofcoride hi. c. 78. cm offirih* Intenim non contemno fpinolaam arbor em Pens Adv. f. 4x8. quod & Acacia fpinas habeat in L^A^c 54. trunco, licet alio modo. At Theveti arborem, quam Hift. Lugdun. etiam dat, rideo-

Myrrham fie defnbuit J. Bauhinus. Glebs Myrrh's alls pugillares ferè, alis Avellans maznitudine & minores, colore fulvD^uffb, aiu ferrugineo, alis pellucids, alismirius^ fiibinde etiam unguibus eximiis albis prsdits: fapere amaro, fubacri: odore nares ferit acnter, ubi adoletur^ nani flammam concipic. Dentibus attrits fnabiliore apparent quam quod pro Bdellio exhiben^c nee aqus immerfs difflvuntur ut gummijed diutius-in ea relifts limi inftar diffluunt Sc flavefcunt' Digitis etia^acilius confringuntur teruncurque. Quibus notis f inquit) facile diltiikues ad admixth adulterato^ummi, Sc fuppoſitiis glebis.

Myrrhain Offiuina-rum lsgicimam non esse fuppicatur Fuchfius, quod nots Myrrhs apud Dio tcondem illi non conveniant. Qlm ipfi Bdellii indicia magis repondere videntur. Cbnuludic autem fiquitem Myrrha fie earn et-s (pccicm qux Caucahis Be Eigafine Diolcoridi cognominatur.

Schrodems extrinfecus prodeffe ait in igne focro, gangrarna, tunonbus, vulneribus inveteratis ac recensibus, praccipue capias, unde in Emplaftris fifticis, ut vocant, ufus ejus creberrimus effe

Myrrha Bceotica Diofcor. quam dicit Arbofis cujusdam in Boeotia hafcentU radicerri effe, & calefaciendV emolliendivim habere, utiliter etiam in fufftus admifceri, hodie prorfus incognita eft.

^ hodie tempore Peftis Myrrham maficare dicuntur.

3. Sagapnum omnium Autorum,

Serapinum *Offic.* a Sagapenocorruptum eft. Sacopenium Plinius a Sagapeio aperte diftinguit

Eft autem Saffipenum Diofcoridi fucus herb* fenilace* in Media nafcentis. Schroderus lachrymam feu gummum arboris cujusdam feruiace* effe fenbit ejufdem nominis ex qua fauciata educitur. Galenus ftirpem ipfam Szgapenum primano vocari ait, fuccum abufive, cum rectius Sagapeni lucus diceretur.

Quemadmodum autem ohm incognita erat parita quae iucurrithunc dabat, ita 8c hodie quoque

defcribit J.B. Guttis confat niagnis vdiit Thuris mammofti aut mafculi (inter J. ^ h ^ febasniagnasdaaum) Oppanacis modo rufefcencibus, intus corneo quodam colore prs-E fuo dente vd etiam digito lentelcentibus, albefcnribusque, mordapi acnq, fapore, odore virofo, tandem admotis flaminam concipientibus. Aflul^ ranus in mafsa inuenta, fubftantia fiingofa, "h" foris purpurafcente, rarius adhuc caulis %fius. poraones; mftae, digitalis craffitudinis, itnarar, fibris longis contextis, quarum fpatia opplet fungofa laxaque fubftantia: femem quoque gemdlutn, Snllce o Par femeneii longius, femenciata &c latum, impunores funt glebs quarum VJX grumos internofci ita rinines funt concrete vduti fufe, colore fordido, fapore & odore JBmih:

Nd < bonitatis Diofcoridi funt pdlucidutn effe, sxtinfecus fulvum effe, intus album, odorem inter Silohii fuccum & Galbanum medium habere, acrem fapdremi Melue colore medium eic inter fubrubiim Be fubalbum, odore Porri in aqua facile refolvi C quod nee Aifr, nee Galbano

SaPquo fenfu C inquit Cafp. Hofmannus) accipere oportet ilia in Galbano, *mi9fSat\$ w'''* <i; tioneffe amplius Galbanum, led tranfire in Sagapenum modo in aqua diffolvi? Hoc^ notam illam facile in aqua diffolvi non effe propriam Sagapeno, fed convenire etiam deteno Galbano, Unde & ab odoris convenierita valde adjuvatur fententia Lob 5c Pen* *Adv. p ?49. J''* h3c gunmata Sagapnum, AJJam^albanum eft cognataru* flantarum ftrulacearvm natahbm differetnum*

"^leapsnum potentiffime aperit, difcutit Sc attenuat, non leviter etiam abftergit. Fad (ait *Fires:* tore Diofcoride quocum 8c Plinius confentit) ad thoracis 8c laterum dolorem, nipta, convuHa, & tumes veteres. Craffa in pulmone haerentia repurgat. Datur 8c comitialibus, opifthotomicis, iplieis, paralyticis perfrigeratis, in febribus per circuitum repentibus in potu. Sed & in unguentis commode adhibetur. Ducit & menfes & foetus corrumpit cum aqua mulla potum. Aux^liatur commorfis a beftiis vensnatis cum vino fumptum. Excitat eas quae ab utero frangulantur fe^um aceto ipfum olfaciarit. Deterit cicatrices oculorum, & quae pupillis tenebras oftundunt, & huffu^.

Inter purgantia validiora habetur. Mefue ait nocere ventriculo 6c hepati. Corrigit atririgenti- bus Be tonum confervantibus, ut Spic, m, ftic, Bcc.

Vires fummatim recenfet SchroderUs. Tanta extrahendi vi pollce dicitur, ut quoque fprcula e liciat. Pureat lentos Be craffbs, imo 8c ferofos humores ex ventriculo, inteftinis, utero, re- erebro nervis, juncturis, peftore. Hinc prodeft in hydrope, tudi inveterata, afthmate, ce- L T T M; fnaftmo coibpfa, paralyfi, tremore artuum, in obftruffione 5c tumore fplenis, febribus m-

on Pleurifi aliifque tumoribus ac dolonbus mitigatione & relolutwne opus habentibus. Fumus ex pilepticos, hordeola ciliorum lariat. Dofe a 5 fl. ad Z V

4. Afa fxtida C. B. Park, nofiras Officinarum J. B.

A fain votem ex Lafere corruptam effe plerique putant. Eft autem Afa (defcribbnte J. Bauhi- & Teita & feauax compaftae fubftantia colore ruffb, glebis fatis magnis coadta; odorem nobis (In Allii fere 'vehementiorem magifque abominandum late fpirans, & nafes waiter ferens j fapor^ rinium amaro, poftmodum mordaci, in Qffidnis fcepiin pura, admota igm flavefcens-

In Offi s R C duplex habetur^ una pura 8c tranducens: altera impuia & turbida, cm Saga- benum (quo ad Siteran Diofcoridescribit) cujus odorem refert, permifemr, unde Germani, D. a- S ftercul, [eolque fecuti noftrates 53 eto¥ tinn0] nominant. Utraque tamen grav. s. odons eft. rñius fuufefle Sebeac ad medicamenta liquida, aqua; aut aceto, aut vino injefta fuper prunas f^flvenda, 8c quod in fundo manet rejciendum; vel per colum, cui adhsrebit, tranlmittendum.

Plerique Botanici Afam fetidam Laferis feu Laferpitii platitae ferulacea: qua: Sixfi* Diofcoridi J. D a ± dicitur, gummii efevolunt, e caule aut radicibus incifis efluens. Hanc fententiam Lt Garcia Alfiht Arabum effe Laferpirium Diolcoridis 6c Phnii fans oftendit Sera^pio lib. 1 qui de Altiht agens ad verbum ea refert quae Galenus 8c Diolcondes de Laferpitio I? ! r. ! ^ r. itiiim autem eft A(am fetidam Arabibus Alibi & d: nam cuicumque AVabi gummii S^lmara ab Indis vocatum, h. e. h A^m femdadh oftendit, f^ftm id Alub^biyvi Anad^ effe pronunciablt. At verb quamvis fortaffe Arabs in ea opimone fuere, non mdē (equitur Ala^m- i- v- edam Antiquoram Lafer eflb. De Cyrenaico id concedi nori poteft, quomam nots cñs Ai* ram-

AD nullo modo CDnveniunt; an Medicum & Syriacum doctiores dubitant. Jo. Bodaeus exprimens, quem adinet. *Net. in Tbtotfr. hijt.* 594. Verum non opus est argumentis ulro cirque alatis deponere: cum Jacobus Bontius jam dudum rem deservit, & con troverfiam dii emit. *Hift. nat. & medic. Indite Un?nt. lib. 4.* qui CDntinet Animadverhdhes in Garciam.

Planta (inquit) e ejus radice Afia exprimitur magna quantitate crefcit in Imperio Perfico, inter Laram Sc Gamaron civitates qua rum prima non Jonge distat a man, Be noftis mercatoribus, & C A'nglis etianij frequentatiir. Estque hxc planta duorum generum. Piima fermentosa fere ut Salix aquatica. Ex ejus foliis & itolonibus incilis Afa fretida per torcular exprimitur, quae ut reliqui fucci, fole indurata in confilientiam eyadit qualis est Aloes. Secunda porro Afli Ipecies longe fec Lindior existit, istque fuccus exprimitur Scradicibus hujus plants, quae crassiffimos Rhapsanos, fplia auceum Tithymali folia referunt. Hujus generis ib aliquot radices domi habuisse ait, qua: quamvis jait e Tenr exfucca, tamen totas ardes foecoi e replerentj qui infuetis vix tolerandus esset. Quid Javani Sc Malaii & caeteri Indiarum incolae negabunt, fe quicquam o'doratus nunquam nanbus percepisse affirmant. D. Mandelflo, qui in Peria peregrinatus est duo etiam Afac ftrida: fucco prargnantium plantarum genera agnoscitj verum ea paulo aliter describit, Alterum fruticosum feu iarmctiDium est, foliis parvum Oryzz limilibus. Alterum Rapi folio, colore viridi folia Ficiis referente. Locis ficcis Sc lapidolis melius proficit, Gummi circa finem sftatis manare incipit, Aut Limno colligitur. Confirmat ciam quae Garcias EN Bontius habere de ejus usu apud Indos in cibis condiendis.

Farr.

Nullum medicamentum simplex per totam India majore est in usu quam Afacetida, tum in nedicamenrisj tum in condiendis cibis, u post Garciam testatur Bontius, ut propter hanc causam una fit cum Opio ex praeceptis nec cibis qua: per Indiam diftrahuntur. Solent Baneanes Btomnes genales provincia: Cambaix, qui a carnium usu abstinent, Afam jusculi & c olenbus fins commiscere, c Diifricato primum ex ea lebetes nec alio condimento utuntur omnibus in cibis. Multa in hanc rem vide apud Garciam.

Umntur ea Medicamenri IDCD ad Appetitum prostratum excitandum, ventriculum roborandumj flatus difcuciendo, venerem lrmendam. Apud nos in Eurupa, praeceptus ejus usus est imernus in fuftebeacione utenna, penpneumonia & vulnibus. Extrinfecus in tumido Liene Be uteri liiffbacione, pancricio (cum alio ovi alb. fufcepto) *Schrod. N. Siquis Epilepsia: obnoxius fenferit Jafia W ex aJJ'a fxtida* Be cornu capno paroxyfmo aftutum corripitur. *Idem.*

5. Ammoniacum C. B. & alhrum. FeruU lacryma Gakno.

* L. 13. c. 23.

Ammoniacum * Plinio ab Hainmonis oraculo nomen habet; juxta quod gignitur arbor quam Mtopion vacant: Ac Diolcondj totus cum radice frutex Agafyllis appellatur, Advehitur nunc in nag" Has glebas CDaftum, grumis magnis confans, unguibus lactei candoris nicentibus, aicrufis, per substantiam colonis obolititi & c fufci permixtisj, odore Galbani virofiorej sapore amicante.

EJige yncerum, ininimi arenoium, purum, majoribus grumisj foris flavis aut croceis, intus candidionbusj quod claram flamniani cum accenditur alit in manibus cum lentore tractatum mollefcitj repentinouque ldtu propter denlitaceni andiDrem, in plurimas splendidas nitentescas micas diffilit Solvicur aqua.

Prrr.

Actenuac B& refolvit, attrahicy U^ JL^ n^ TM, rPK, oi CTm ^ (h. uf w praeceptis cil. in dolonibus arthnciilis, ill refolvend mucilage viicofa, craila ac contumaci pulmDnumj. m denteril^ Be hinc in oblftrutionibus cDntumacibus Liems^ epatis^ uteri, in calculo, excnfcieis in fcirrhis, panis tophifque juncturarunij in feropliulis aliiique tumoribus durioribus refDlvendi Sj Bcc. *Schrod.*

Saccè in (ptifati Exfici, quartifn Hfloriarn tradit Clufius, quern consult. *Exotic. Lib. 4. cap. 7, & 5-*

- Succus splendens Anethi odore C. B.
- Succus Afpalauho fimilis Anethi odore C. B.
- Succus colore albo, flavo Sc rufomixtis, anethi odors C. B.
- Succus cinenciu5 fsmculi odore C. B.
- Succus Afpalathofimilis atcr, micis albis asperfis^ odor C. B.
- Succus AfpaLitho fimilisinodorus C. B.
- SLJCCUS atrotubefcens inodorus C. B.
- Succus flavus albis grams commixtis gravi odore C. B.
- Succus visco Hmilis colore vano C. B.
- Succus Maitichinx refru: non ablimilis C. B.
- Succus fuccinonon abfimilis C. B.
- Succus fanguini Draconis affinis C. B.
- Succus Cainphoram redolens, ex radice Can ell x vulnerati *Garc. G. B.*
- Confule I lift or. Arbor is Ginnamom.
- Succus Aloes facie C. B. MuLc foliis involutus *Cluf*
- Vide *Cluf. EXDC Hiftor. Lib. 4. cap. 7, Be 8.*

6. Bdellium omnium Autorttm.

Bdelli veri non quos (inquit) Baobibus) magnas habet glebas, Taurino glutini, ut habet Diobides, aliquat tunc lumbis, colore ex fulco nigris, sufficente, concretionibus, quae quae hac conditi be cenau, ad gummi magis accedent: lapore lubaniaio elr, multLim tam Ln a i. Myrta relinquitur. OJoi em non infiare m Ipirac flammiani concipit^ ie quidem pertinaceni, us ^/is cras In supCi Hwi: granula exfudans gleba: hinc IUUL: apparent. In glebarum medio nibinij c au ref. c C, lcludit bacilli repetijur p ptofi. Excenit hues glebarum iliqi KUido Myrrham v i i > au ref. c C, coloris fermginSj j lei nun uvu imenfi amaions*

Alia? glebaz pro Bdellio adulterine exhibit[^] nigricantes, micisfi fcindantur pelJucentibus, alioqui VIQS aciem nequaquam admirantes, confitentia Sc fapore gummi, cujus modo tenaciter dentibus h[^]rent; concipiunt tamcn flammam relicto interim craffamento copiofo.

Bdellifera, arbor, defcribente P.Jinio, nigra eft, magnitudine Olea[^] folio Roboris, fructu Caprifici nacuraque. Alii Arbori Myrrhifera eam valde fimilem faciunt. Lobelius & Pena inter alias merces fe mulros hujusligni (iirculos expifcatos tradunt, folidi fubftantia; cortice duro nigricante, fpinis mulcis rigidis Be craffiufculis horrentes, quibus multa copia Bdellii erat aggefita, incus forifque valde quam amari.

Matthiolus Bdellium, fi fuo tempore in Italiam importaretur, adeo rarum efle fcibit, ut ad oftentationem tantum aflervetur veladadulterini Be reprDbatinormam. Lob. Be Pena quod Bdellium putatur, Myrrha? (peciemefle e'xiftimant. Q Bauhinus apud Matchiolum fex Bdellii differentias haber, qAarum defenptiones ibidem requirendas omitto.

Probatu gustu amarum, trahfluicidum cum Frangitur, pingue cum fricatur, odoratunij facile tnulefcensj tincerum (Parthicum nominant.) Reprobatur fordidum,, nigrum, in offas cohvolutum, quod Adrobalon nuncupatur.

Sunt qui gum. Anime verum Antiquorum Bdellium efle putant ob multas notas communes.

Unde autern Bdellii roc differentiae, Indici, Arabici, Mechiifeu Petrzi, Judaic[^] SiculijScythici? Omne Bdellium eft ex India, led prouthuc velilluc mari defertur, inde accipit nomen. 'zafp. Hofmannvs.

Bdellium Galeno vim habet emolliendi, fle eam quidem potentiozem dum recens eft: inTgnit^r v' eJ. etiam difcutitjaperit atque abfterget, fed alia atquealiaetate; fi diluere velis medix xtatis lumen dum eft; fi difcutere Beabftergere tantum quo[^]etuftius eomelius. Uliis prxcip. intern. in tuffi ac pulmonum apoftemate, calculo atterendo, urina cienda, menfibus immodice fluentibusut Be in fluore uterino fiftendo, fetu expellendo. Excrineus difcutit hernias, mollic durities ac neivoruin nodo5, adeoque creberrimi ufus eft in emplaftris fifticis- Contufum folvitur aftufn vino, aqua calida autaceto. *Schrod.*

7. Bdx>nnwn *Officinarnm* C-B. *Benzoin* Park. *Bmjvinumwjus arbor folio Cctri* J.B. 25cnjainin,

Refinaifthaec nobiliffima magnis conftat glebis iiaequalibus, puris, nec ulla ferè forde utplurimum infectis : colore funt ma Ilk: alias rutilante, alias magis ad albedinem vergence, Be crebenim5 ceu unguibus aut Amygdalarum friaturà miftis; verum in rutilis Illis mafijs obfeurius lucent ungu5s, in aliis candidi admodum, fed nun icà pellucidi: lubftantia: omnibus fatis enmpjdta,, fed vel attritu digitoruin ii[^]pulverem friari potis, nec quz fib dentibus lentefcat, faporis fzs expers, verum odor fiiaviffimuj qui accenno vegetior. Eidem interdum adhzrefcens invenitur cortex, qui magna? fati arbons fiipticionein injicit, foris rugofus, ad cinereum inclinans, fubftantia compafta, colore intrinfecus ruffo ceu Canell[^] qui guftanti nihil prster ficcitatem quandam offere videtur-

Arbor Benivifera [inquit Garcias] procerà eft, vafta, pulchra, magnam fpargens umbram ob ramorujn frequentiam, quos pulcherrimo urdine digeftos Be in aere elafos habet. Ejiis folia partim aceto uondita, partim adhuc adhaerentia accepi: Minora funt ea ahquantum Citn five Limanii foliis, non tamen adeo virentia, fed parte adverla candicantia; quæ verb inipfis majoribus ramis nafcuntur ad Salviae folia magis accedere videncur, latiora tamen funt, fed minus longa. Vulnetanturborflsugummi emittant.

Benivi plura funt genera, i. *Amygdahides* h prztantiffimis[^] fie dictum quod ungues feu maculas Candida? admixtas habeat Amygdalarum infar, inSian Sc ejus contermina Mirtaban proveniens- 2., Nigrum in Jaoa SL Sumatra inventum, quod vilioris eft pretii. 5. Nigrum in Sumatra provincia Bayros è novellis arboribus profluens, quod ab odore grato. Benivi dt *Boninas* vocant; fuperiorB decuplo charius. Quia candidum eft elegantius, nigrum verb Be novellum odoratius utrumque perficere folent, ut fragrantix elegantiam concilient.

Benjoinum Veteribus Grxcis Sc Arabibus ignotum tui fle offendit Garcias. At neque Affam dulcem feu Lafer efle, ut multi opinatifunt, cum magns arboris gunvni fit, non herba? lachrymae; ut teftantur fragmenta ramulorum ligneorum admifta, Be Ludovici Romani aliorumque hiftoris.

BenzDinum Myrrham non efle patet quia amantudinis oftgiis expers qjt-

Fieri poteft, inquit Garcias, ut Ruellius [in eo quod *Btmi* Ben Judacum vocat] lapfiis fuerit nominum affinitate, debuitquepotiusnuncupare Benjaoy, id eft, filium de *Jaoa* ubi plurimum nafcitur- At Garciamlapiim efle offendit Scaliger quod Ben filium interpret a tus fit, cum ea vox Arabibus etiam lachrymam fignificet.

Uliis Benzoini internus in medicina rarus autnullus; Schroderus tamen in aftctibus pulmonum ^vv[^] catarrhosis, tuffi, afthmate intnnfecus fomptum przeipue utUem efle fcibit. Extrinfecus in cerebro ^vv[^] perfemutationemexpurgando, inodontalgia- mafticando, in tuberculis ac rubore faciei extergendo, in emplaftris, Teutis, cucuphis, Bee. Obfuavem halitum fcpillinie fufflimigiis admifcetur. Notat' tamen Schroderus, fi fuffitus ex fob Benzoino paretur tuffim excitari.

Prscipuus ejusufuseftadodoraentaBc fuffumigia: Solvitur in oleis Be fpintuvini reftificatiffimo, utBe in aerehumido Ad liquefcendum expofitum-

Habiturejus oleum duplex, 1. Ex recenti in India expreffum quod praftantius. x. Deftillatum, multo i5gavius. Chymicas multas preparationes Benzoini vide apud *Schrodzrum* in *Pharmacop.*

Ad nofctripfic *D.Tancrtidus Robmfon* Arborem refiniferam odoratam foliis cicrini5 przdiftae haud abfimilemtranfmiffamfuiIeeVirgmii[^] *D.Banijtt*, ad illuftriffimum Pracliilem *D.Henr. Com?**; in cujus inftitutiffimo hortD culta eft a *D. Georgio LoWow.* viroadmDdum honefto, fle inreHortenli Deritiffimo Arbor ifta Virginiana Cicai vellirnoniifuliisBenzDinum fundens, in Horto Reys[^] rendjUimi

rendiffimi Epifcopi culta habet folia Citri minorā aliquantulum, non tamen adeo virentia, fed averfi parte candicantia, Be per margines aequalia.

8. *Cancamum* J. B. C. B.

Cancamum Diofcoridi eft lacryma Arabice arboris [folia Myrti habentis AmatD] Myrrham quādamtenus referens, virofi guftuSj quātāquam thymiamate*. e. fuffimento utuntur : Veftes eoadditis Mynha BeStyracelufficiuntur: datur lienofiSj comitialibus Be filpīrofis : menfes cum aquamulfa pellit: oculorum cicatrices confectim emenda^ac vinomadeaftum eorum medetur hebetudinibusJ adversus gingivas humore pragnantesnon aliud,ut Be ad dolores demium, ac per plufculos dies terminū obobrum pondere ex aqua aut aceto mulfobibitum obefos extenuat.

Quid fit hodie ignoratur. Alii Laccam edē volunt, fed perperam, cūm vires non convenient: Uii Benjoinum, nojinulli gummi Anime, ut Amatus Be Garcias.

9. *De Gummi Anime.*

Anime duplex eft,Occidentalis8e Orientalis.

Occidental arborisin Hifpania nova crefcentis lacryma eft feu refina alba, ad Thuris *zolorsM* hDmihil vergens [pellucida, ex albo citrinefcens] verum Copali magis oleaginofa. Defertur gran^{ss} Thuris, fed craffioribus, qua' contraftaluteumcolorem oftendunt inftra refina: : gratiffimi Be luaviffimi odoris eft, 8e prunis impositum facile conlum^r. Differt ab Orientali quōd nee tam candidum, neque tam lucidum fit. Orientaleitem ma^iis frag mentis adfertur tranfparentibus.

Oriente triplex eft. 1. Album. 2. Subnigrdrti, quod Myrrhac quDdammodofimile^odDratumj quod Diofcoride5 inter Myrrhs fpecies tanquam improbam commemorat, fie Minsam^a terra nbi prapcipue nafcitur^ eamappellat: Serapio Aminxam, quam VDccm Lufitani in Anime corruerunt-*Amat.*^ Quod Clufius additpallidum Berefinaceum retorridumque. Anima: omnia genera jucuriduni in fuffumigiis fpirant odorem. In medicina ufus prapcipuus externus in capitis Se nervorum affectibus fngidis, dolorificis, catarrhofisj flatulentis; in affectibus articularum, paralyfi, contrafturZj laxationibus, contufionibus, Sec Mifcetur emplaftris Be cerotis, ad ufus pradiftos.

Gummi Anime quinque fpecies defcribit J. Bauhinus^qus

1. Animes fpecies ad fuccinum luteum accedens,
- a. Anime fimilis refina ex albo ftavefcens.
3. Anime alba perlucida, fapore Vernicis, odore Maftiches.
4. Anime cobre Colophonis.
5. Anime fpecies alba. Copal Indis.

ID. *Refina Copal*, Schrod. *Copal* J.B. C. B. *Gummi Copal* Park.

Monard.

Refina eft admodum Candida Belucida Be tranfparens, magnis fragmenqs Diacitro valde tranfparenti haud diflimilibus, fati5#doratis^ fed non perinde ac Anime. EaIndi in fuis facrificiis fuffimigiū locoutebantur, hincque Dbc aufim^o^o^fuī^ inTempMb frequēti Sn Ufu erat, adeo ut cum Hifpani primū illuc appellerent, hujulmodi fuffitibus nanbus eorum admotisexciperentutv

Ucili5 eft ad fngidos capitis morbos, Be Thuris aut Animz vicem explet.

Ccepit ab annis aliquot (inquit Clufius) ex India Decidentaliquor quidam inferri Olei de *Copal*^^ appellationsj quod an ex Refina jam difta eduftum fitmekret; valde tamen comni^ndan K perutile efle intelligoad vulnera recentia curanda.

Copalliferarum arborum otto fpecies enumerat Be dclcribit *Franc. Hernandes.*

Cxterum Copal vox, monents Gul- Pifone, Indis refinas omnes arborum odoratas 5e gummi denotar.

11. *Tacamabaca* C.B. Park. *Tecomaiaca* Hernand. *Tacamahaca* Vipub fimilu fruttu color* Yaonifi J. B. Arb. *VopuUfirmilis rtfnofa alter a C. B.*

Colliginir vulcrata arbore magna ut Populus, admodum odorata, cujus fructus ruber eft Paçonj^ feminis modo. *Monard.* Fr. HernAdiez folia obrotunda^ mediocria Be ferrata arbori atnrbuit, fructum parvum obiotundum, fulvum rcfertum femine nucleo Perfici hand abfimili a^m morum flagellis. Color eft Galbani fnecc defunt qui idem efle ^utent) unguibus albis uti Amm^111, a aim, odore gravi arque euam fapore *Monard.* J.Bauhinus pleniū defcribit; Colons eft rutilj P^{ar}.^ partim flivi pallidioris, veluti ex unguibus diverfis compaftaj relinx ftrobilim cDncreti^ne, bullatis tamen tuberculis alicubi cava, fiib dente in pulverem difliht primū, mox rurfum recollig^ofu^J J^j tefcfnlque proarbitriD ducitur, fapure amancante, haud ingrato Bcaromarico. Suffita jucundū fpirat Ddorem, Maftiches fere amulum, minus vehement em Be luavioreni j nulloque relitto era^ mento cDnfumitur.

Magni eft apud Indos ufus in quocunque affbtu, praftEtim in omnis generis tumonbus in y^ cunque corporis parte, liquidem minhcē refolvit, maturatSe diffipat: rollit enam omnes dolo iuf^ humuribus fligidis&flatulentis pioventientes. Prunis injeAa nanbiifgue idrnota mulieies uten catione laborames iQico liberat: Umbilico emplaftri modo impohtA uterum fuo loco retinet^ tamilirifTuTio. Delic-mores Ambram Be Molchum addunt. DeJiuxiones quafcunque a Pⁱ fibus^cJ. nuc (linleo execpta & poft aurem alteramvel utramque applicata fiiffitiivc attr.ift.V J^o fat dencihibita ccr.ni modo defluxiones in oculos aut alias facici pai tcs 1 evellir: Dobrcs denn^{um} bus corrupt uJica,

Ex ea, Styracis tertia pars Be A libra momenta fit emplastrum stomacho Jonge immissum finit dem ilium roborat, appetitum aet, concoctionem juvat Be flatus discutit, eodem modo cerebrum fita. MaRnseefficaixij dolonbus coxendicis, Sc omni articularum morbo pRcferrii fiakE* moibus fngidis vel mixtis proveniant. Sda juncturarum aut nervorum vulneribus imDofita P rat; nam statim fuppurat Be spafmum prohibet. Ego (inquit Monardes) teitiam parrem c_e r l a T jicio, uç faci inç implatur. Haec omnia Monard. Emplastrum de Tacamahaca ventu applicatum IT phalalgiam lemre dicitur; efficac etiam est ad tumores lienis, Be duritiss discutendas.

ix. *Carama* C.B.Park. & aliorum. *TlahmUhca guahuil.* i.e. *Arbor infania* Fr.Hsrnand Monard.

Ex compositis partibus interioribus per Carthaginensem & Novam Dea defertur resina coloris Tacamahacae, sed splendidior, liquidior & densior, [foliis involvis solita, nec fructa sibi mutuo adherentibus, est enim valde glutinosa] lingua Indica *Carama* dicitur, quod nomen etiam apud Filipinos reperitur, odore Tacamahacae, sed graviore. Pinguis est & oleaginosa, idcirco tenax hinc multa adglutinationibus & colligationibus.

Ea utuntur Indi in tumoribus & omnis generis dolonibus. Ad eoaem morbos laudatur *anas* Tacamahaca curare solet, Be minore tempore spatio vires suas exerit; sic ut quos Tacamahaca non curat Caranna/anet.

Sed ex eadem Carthaginense allata ad nos est Caranna quaedam purior, & Cryfalli modo limo inferiori multo praestantior, utilior & odoratior.

Præparatur inde Emplastrum antipodagricum Unfigne. Fr. Hernandez fide arborem describit. Arbor est magna, fulvos stipites fundens, kves^dos & odorps: *Folia* oleaginea, in crucis formam compofica, orbiculana. Odera arbor est, gustu viciis Benonnihil atringens.

i.; *Sarcocolla* C.B. Park. *Officinarum* J.B.

Nominis ratio obvia est: ita enim dicitur quod comes agglutinet: vim, inquit Dioscorides habet glutinandi vulnera. Lacryma est arboris in Perfide nafcentis, thuri tenui similis *Dhfc Galm*.

Sarcocolla (inquit J. Bauhinus) grana albicantes sunt, aut ex albo fubruffi, spongiosi micis lucentibus subindemittis; globosarum lacrymarum fragmina Pifi aut parva AVellaL maemtudine; tanta est enim fragilitas ut in pulverem craffiusculum vel conculli levi friatur, faporis amari cum quadam dukedine obicura, ingrata. Sub dente lentescit, Becandek admota primum bullit modum in claram flammam exardet: Admissa repenuntur aliquando folia ex candido flavescunt, Tithymah myrrifitis folia ficca egregie referenda. CGranuja Papavdrmis femihAus non multo maiora est Parkinlbnsaie.]

Eligenda recens, colore ad pallorem vergens (vetustior enim rubescit) faporis amari, fubstantia porofae Bequafi Jpumojs, fadlique in aqua solubilis. *Schrod.*

In *Sarcocolla* notis non conveniunt Plinius & Dioscorides: hiehim subflavium feu flavescens dicit: ille eo meliorem quocandidiorem. Dioscorides laudat gustu amarissimam, *Pjirthe* cum Tenmoma dulcem, in quo ab omnibus deferitur.

Schrod Calp Beficcadstringit, 6bh1bUda glutinat, coquit, toaturat. Ufo prsdpuu vulneribus confidandis, cicatrice obducendis, unde Scnomen adepta est. Mirifice praestat in tocolommi fluxionibus, albuginis, nubeculis (maceratur in lacte Afinino, in luvuluruni matris adhaesores. In hemorrhagiis periculis apponitur.

Sarcocolla multo perferatior scribit, quoniam ea in ulceribus maxime cere calvitium & aha. At quod causticum est glutinabit vulnera? s s i s s s ; fuitam craffam aremotis partibus veluti oculis, cum quibus tantam habet affinitatem, in pui-andi gratia in illis data exulceret. Misera affinitas? quam hostibus optem. Mefue dat in substantia i ad lj. quod ego ne in pilulis quidem audeam, quantumvis bens coi-reft* videantur. Coft^us fiv^ more multa excusat: Ego dCD, *Abeat Sarcocolla cum pi.* (uis in maximum mahn rem Calp Hofm Veteres SarCDColla foris tantum usi sunt: de vi purgatrix nihil dicunt. m.

14. *Gummi Elmi* Park. *G.Elemi Officinarum* C. B. *Ekmi refina* J.B.

J.B.

In mafiâ uylindraccas cogitur quas pollice & C medio digito complectaris, duarum palmarum circiter longitudine. Substantia yerp est fere unifirmi, cerz flavz coldre & confitentia simili facilis flammam concipiens; color alias mtenfior, substantia refinacea: sub dentibus facillime lentescit dealbatürque, lapore non ingrato, nonnihil acri Be fubamaro, odore fere Foeniculi. Obvolvunt autem glebz quæ ad nos impurantur pulchro folio, è cuius nervo medio paralleb: oblique creberrima: in margine feruntur venae, quod Cannae Indicae videtur esse. Funiculis prsterea xylims omnia uonfringuntur.

Multa habet communia cum refina Gummi Molle arboris Paludano misfa *J.B.*

Improprie Gummi dicitur cum Refina fit, ut quæ flammam facile concipiat, Sc oleaginosis diluatur.

Olear yEthiopicz gummi esse multi volunt, siquidem Elemi vox ab Eles corrupta videtur. Aft Elemi Officinarum Dioscoridei notanon habet, nimirum flavum esse Be Scammonio utcunueffimile Bcmocdax. Negat Matthiolus Olear yEthiopicz lacrymam esse. Verum C. Bauhinus Olear K Oleaftros fimilem fere lacrymam fundere ait. Et apud Calp. Hofmannum inventio locum ex Andree Baccii autoris gravissimi lib. J. *dsFm» Aprils* adductum, quern hue tranferibam quia hanc rem illustret valde, Be gummi Elemi originem declarat. Olearumibi [in Apulia] mira vetustas & magnitudo, Quercuum infarpr DcemmaT, Scquod fecunditatis earum argumentum est, (quod in Tiburtino

burūnis non Video, nee in Sabinis oleis) ob affiduoSj ut reor, in Apulia calore^ gummihic Olea; ex Judant optimum, quod Chirugi gum mi Elemi appellant- Gleba est pinguis, ac Myrrhs infar fragranti odore, ut non foliim in unguento probandam existimem, utique applicata simpliciter Ceraū infar, tumores discutiat, emundet fordida ulcera^ ac carnem inducat ad cicatricem: Verum etiam prunis alper/a luffimentum bajfami in cameris edit gratiofum, luperans thuris BcftaftsMjrrhx fragrantiam, quod ReverendiiT Adris Epifcopo Lucz Ant. Refti Barolitano acceptum rerero. Hzcille. Cujus (inquit Caip. Hofman.) graviT. Viri teftimonio tifus Gummi Olearum noftraruni in poffeffiDnem nominisE/ewiimmittD : EtMatenaliftas noftrorjubeo, non ex India alterutra peters fed ex Apulia regni Neapolirani-

De loco ejusnatali nihil adhuc certi accepimus. J.B.

Teftantur plerique qui de eo fcripferunt admirabiles ejus vires esse in vulneribus capitis. Praftici ergo in Calvaris fracturis Sc vulnsribus nunquam id in suis emplaftris ac unguentk omituAt^ mirabilem ejus ufim continuo experimento edofti: qua de caufa ex eoBC unguentum K ceracum aPharmacopoli5 diligentibus concinnatum habetur.

I 5. Liquidambar C. B. Park- Liquidambar Rzina arbor is Ocofolt Jitfa, folik Hedra, odore Styracis huida J.B. Xochiococtz,9 Jguauhuil Jm Arbor Liyuidambar Indici Hernandez.

Refina est^tefte Monarde, effluens incifis arboribus vaftz magnitudinis, pulchris & ramofts, quarum folia Hederaceis familia fuqt, Ocofolt Indi vocantj cortice craffo cinereo. Huic cortex odoris caulā commifcetur comminutus, ut fci. luavids ac diutius fpiret in fuffitibus. Fra. Hernandez arborem Liquidambari XochiococtzA Jguauhuil Mexicē[H] diftam AceriserefoliiseflB ait^ intres culpides duofijue finis divifis, altera parte albicantibus vera verò obfeurioribus lerratifque. Corticem fupitis partim filvum, partim virentem. Addit Jo. Terentius, Fructum rotundum esse, fed infar Polydni rjiukos habere ungulos luteos, fuperficies vero nigras- Ubi nascuntur ejusmodi arbores fragrantiffimus est aerisodor, adeb ut Hifpani primum eo appellentes^ iftic aromata nafci^ atqu^ adeo sas aromatifras esse arbores existimarent. £0 hie utimur in fuffitibus, exloramentisj paffil Styracisliquids loco, cujus odorproximè ad hunc accedit, adeo autem validus est, ut celari iiffEtibus non addicū non poffit, fed totas ejus, li ejus fit copia, atque adeb plateas fio odore repleat.

Fr.

Plurimū in medicina illius uis est, nam calefacit, roborat, refolvit feanodynum est. Cerebrum per se illitum aut alus aromatibus mixtum confortat, omnigeno/que dolores a caufa frigida emplaftri modo impofitum mitigat. Ventriculo adprime utile Stomachicū infar adhibitum nam appetentiam excitat Be concoftionem adjuvat. Cum Styracis, Ambari Be Mofchi momento mixtum emplaftr confiftentia, Bcfcuti forma fuper alutam extenfum ad eadem utile est. Ex eorecens collefto K loco idoneo [in Solz/Fark.] repofito oleum quod deLiquidambar nuncupant deftillat multb perfectiffimum illoque longè fiauius. Sunt qui expreffione etiam eliciant ut majori quantitate colliganc- Nam chirotheci5 imbuendis plurimum abfumitur. Utile est ad plerofque morbos frigid DS> ad tumores reblvendos, ficprivatim ad tumores Be obftruAiones uteri, menl^fque provocandos.

Sunt qui ex arborisramis comminutis Be coftis pinguedinem innatantem colligunt Be vendunt pio legicimo oleo. Atque hie liquor a. fiof^!^ S^ - < K li^ sda pummr in Aromariorum Be Pharmacopcorum officinb vulgb venalis. Fr. Hernandez uleum hoc est, arbors ipfa vel fponte vel incite exftUure ait.

Arboris pampini & fummitates in fasciculos colleAi vsftibus & ftragulis ab Indis infrruntur vdoris gratia, in eumque ufim Hiipanis etiam vendunt.

Fr. Hsrnandez fomni induusndi vim Liquidambaro ejufque oleo attribuit.

A P P E N D I X

AD

H I S T O R I A M

P L A N T A R U M

C O N T I M E N S

A D D E N D A & E M E N D A N D A .

Ad LIBRUM SECUNDO.



^{AD} *finem prim** StBionis p. 66. *adds*

Lithophyren quorundam nondum deffriptorum icones ad Plantas ab Everhardo Rumphio ab insula Amboina milas delineate exhibentur in *Epbzmrz.*

Germ. Ann. n. Dbferv. zi. nimirum,

1. Lithodendri calcarii five Caranar, Calcis Amboiicx.

2. Corallii nigri anguini Ambonici Acarbarum in culls disti.

3. Amaranthi Saxei cum suo faxo annatu.

4. Pseudocorallii rubri fistulofi.

Tag. 6g. lin. J. adv.

Equisetum junceum Africanum fructificans nodis canalicatibus apud D. *Fluckm* videt. Planta est submarina, Equiseto junco nigrinodo Breynii affinis.

Pag. 69. ad finem Settionis secundae, adde

Corallinam mannam Pinifoliam, apud ornatum Viram D. *Gul. Court me* vidimus, quae foliorum bngitudine, figura, se fitu in cauliculi ramulum admodum exacte referebat, ut non immerito *Yinus marina* dici posset. Erant autem folia crusta purpurea Cprallinx reticulate modo obdusa, ligno interiore corneo & lento. Ramus ipsius sesquipedalis longitudinis erat aut major.

Sett. ?. Cap. J. Spec. l.p.70. adde, ad finem.

In vdiculis oblongis extremis hujus folii innascentibus observavit D. *Tamred. Robinftn* corpora, multa, parva, obscura, rotundaj inteneri vesicularum membranz adhaerentia, mucilagineo quodam siquore repleta; cum reliquis vesiculis foliis innatis tum liquoris omnium globulis illis foetidioribus nigricantibus destituerentur: corpuscula isthac plants hujus femina esse conjectabatur, proinde se hanc se reliquas submarinas non minus quam terrestres itirpes festiunibus abundare; Postea liceris Septemb. 7. 1686. ad me datus scripsit idem eruditissimus Vir, feminam praeviditae folliculis contenta adeo manifesta esse, se vel nudo se inermi oculo conspicta, ut primo statim vesicularum extremarum aspectu agnoscerentur Tiesculus de eis superfit dubitandi locus: se enim multis ea viris ingeniosis & curiosis ostendisse qui rei evidentia victi pro feminibus initio nudo oculo coispecta habuerunt, atque etiam postquam micropscopio examina verant: se autem primam horum notitiam se observationem D. 5. *Doody* pharmacopoei Londinensis conjunctiis se suggestionibus debere ingenue profiteri.

Alga quaedam in litore Islandiconas invenitur, e qua calore Soles extrahitur Saccharum quoddam genus, Saccharum communis loco ab insularibus usitatum. *Tho. Barthvhn. Act. Med-An. 1671^ 1671, & 1674.* Eadem lartifilium ovibus pabulum esse dicitur.

Lib' x. pag. 71. lin. 14. post verba itia pro renitio adde,

Algam Hibernicam *ZW:J7J* distam, quam *afE* due in ore habent, pulchre exsiccatam & convolutam, ut moris est, ad memificingeni diff Vir, *D. Hafo Sham:* Earn ab hoc loco descripta specie diffentissimo s^x angustopincipio in insignem latitudinem duarum interdum trium unciarum extenditur, K^m in plures lacinias dividitur, non enim divisione sua dichotomiam observat, quin se segmenta primaria in alia subdividuntur nullo ordine, quae *ibnfim* angustata in acuos muenmes definiunt. Substantia est tenui se membranacea, ad laetucarni marinam accedente, colore purpureo, spirhae longitudinem vix excedens. Odorem non invalidum Viok exspuat. *D. Shane* Hibemos hanc nial Ucarc scubit, non quod vim ullam salutarem aut medicam ei ineffe existiment, led ammi fan[^]

tum causâ & quod more receptum fit. Hanc felle quam describit C. Bauhinus in Prodrôme FLIC membranâ feri ceranoidis tkulo, turn defcripcioj turn nDmen Scoticum *Dils* ad *Dukjh* acceden convincunt.

Tag. 72. tin. 2B. pro decimaquartâ fpeciez adde,

14. *Alga spiralis maritima* Boccprn.

Tenuis est hæc 5c angusta membrana, in modum foiz convoluta, duas aut tres uncias longâ* Cujus extremitatibus in rifa iunt, five fimbriata: implex est, in plures quandoque ramos divisa, tDâqtre fubnigro, fufcove colore nitet. Saxis Breftis innafcitur, lignifque uti Corallina. Liburni, Saccs, & alibi mantimis^flutibus ejetam in litore jxpius collegi.

Pag. eadem Ad hiftoriam foci filliculacei ferrato fyllo C. B. ad calcem paging adds, - Hic fucus *Sargaz, o* Hilpanis dicitur, depingiturque 6? defenbicur à Gul. Pifone pag. 166- Hift. Nat. U Medic- Brafilia.

Lenticula marina finquit) fedimpropiè nadminatur- Est enim non Alga., fed arbulcula bacifera^ palmum Jongaj tenuibus caulibus, grifeis &c perpetuis foliis (erracis, Jaturè rubris in glomos convoluta, qua: circa nifulas Flahdæcas vulgo ditas, incerta quidem origins unde quaque fican adeo magnam maris partem obfidet, ut folium non (alum dices, & remiffiore vestimorum navi- bus haud parvam faciat. Raram hanc plantam pubes nautica Lufitanorum ut fic Batavorum indifcreta quantitate macerant Be coquuncum liquore convenient, e&que non sine felici fuceffii contra difficultates urinandi utuntur. Infipida est pufèr falfuginem à mari contraftam. Nulla Kadix conpicitur, fed fbk rupturs vestigii apparerj

Americam navigantibus magna hujus quantitate nari fluitans occurrit atque hoc figum habent nautz feterrat appropinquare. - Aiunt cum fluentivijè finu Floridz in Oceanium expelli, dti, jus curfus cum impetu Drienrem versùs dirigitur unde fit breviori tempore è Virginia in Angli^{all} quam retro navigetur, navibus ctiam magis unufis. *D. Banifter.*

Tag^ Eu. ad Cap. XL pro ;i (pecie addatur,

3i- *Mufcuj maximus cratoidz maritimus* Triumfetti-

Triumf.

Ex imo maris numerofa ram Drum fobole ufque ad aquarum (uperficiem enititur, qui rami in minores alios iterum aijue iterum fubdividuntur, donec in extremo bifurcati ipias quodammodo arciumr feu curriam pinnas zmulentur: hujusmodi ramulorum craffities plerunquè pDlicerri arquat, quoad extenfionem verò inordinate procedunt, cum nonnulli ramorum jam perfecti ge/pites palmo haud fint longiores^ alii verò iupra cubitum eleventur, adeoque cDpiofuni ramorum numerum hindant/ut etiam non tam levice ponderent. Prarditorum ramulorum matrics latis raris ac flaccida, nullb apparentibus potitur iervis^ propter quod nec (iib aquis refi^{CDn} itiver, ac feni, iunvique taliter vacillat, ut ipis primo itentia implexæ fuerit. cDn¹¹ 2- toffurum falcibus illic à nautis projectus eadem exitum invenit. Horum in fuper color accovirelens est, nullumque prater ab aquis fortitis commotum (quas ubi in fè continet) fape dnt edere in videret. Præterea videtur ramulorum fubfide in fupflacem velut truncum conveniuntj cui pro i a dice inervit lata quardam ac Jubiotunda bans ejuldem cum pJanta Kiffa¹², ac faxis fir mi Him E* adhxrens.

In portu apud centum cellas obfervavit Autor.

Pag. Hi. Ad fimm c apt is de Spongia addt,

Apud illuftrem Virum *D. Guilielmum Zourtint*, Medii Templi Londinenfis rariffimum Spongi* genus vjdij reticulatumj textura: adeo rara: &c maculis magnis^ ut lumen facile tranfmittere^ & UP hbrarum artifice Nature manu contextarum dilcurfus pkuilque clariffimr difcerni pufTinc. EraC ca concava nee valde craffa.

Aliam prarterea fpeciem apud enndem vidi quam Spongiam ramoiam tuberculatam denominavi-

Multa infuper lithophyta ran or a ut v. g. Corallium album punctatum creberrimis punctulli Corallium manum humanam cum pollice Be digitis acieo exafte referens, ut non casu productum fed arte elaboratum videretur. Lapidem fungitem crebriformem. Corallinam cuberolam. tnajorem livem. Corallinam maximam compressam. Corallinam luteo-pallidam. Pori atfenoidis Snaquor aut quinque fpecies. Hippunm iaxeam fulvo-rubram, aliaque qua: curiofius obfervare BC defenbere non vacabat.

Tag. 93. Ad finem cap. zi. adde,

Hare Ipecie5 Tabernzmontano Fungus Capreolinus dicitur. Hujus cliim admirabilis lip^ urinz¹³ rubedo comitatur. Cujus rei veritas illuftratur ab eMemb. An.9. Be ID. Dbleiv. 68. Ephe¹⁴ German.

Tag. tadzm Ad jinewpaging add*,

Fungus Sinznjis Antidotat Lac Tigridis Jiflus.*

Sina ilium irr locis arenofis, inprimis in litore maris gignit, ubi Sinenfium rclatione ex Tigridum lacte clapl b oritur. Tenuem ex tubers rocundo candidoque protrudic pediculum, in quo o^f- biculatus, infra phcacus aibufque pileolus eminer.

Antidotum cuber illud praleniffimum, plurimis refiftens venenis, pchibctunn moibjs mJ⁶ 6 expetKum. *Epbzm. Gzrman.* Ana 4. Be 5. Obferv. Jf;-

Tag.

Fungus typhoidis toccimus Mditensis Boccon. & styntium capitum nunieri mutentir.

Boccon.

P /Umariseft ahitudinis, intridim major, furrum nondum explicate capituli difco planè referens. Pediculus uncialis eft craffitudinis, tres auc quatuor uncias longus, fcaber fungofus; capitulum etiam ipfutu fungofum, pediculo paulb craffius minoris Typhse paluffris clavamaliquatenusreprtffentans, quod dum viret, fi digitis premas veluti fanguineum fiiccumfundit. Per maturitatem granis minimis innumeris exaferatur, undique cocci colore iplendentibus. iEftatis munu5 eft, aliis compeltatibus temcre Be fruflra quififris. Afringit maxime, undeei principalis in cohij^endis fanguinis profluviis^ cujus gratia Melicenfes ex Gaulo infula illius inpulverem foluzi fempulum aut amplius vino vel jufculo dilutum hauriuntj dufta a majoribus hac nunquam fallente msdicina.

Oritur in {copula Melita: infillac adjacente ditto *Scoglio del Generate*; hinc ipfe Fungus *Heritz*, tat *General* vernacula lingua dicitur. Folia tenuiffima primo nafcenti adefle, acque maricimis fluffibus continue irrigafi dicuntur. -

*Pak. 104. voplin.*4" addt,*

Hie Fungus efle videtur quern *D. Plot* in *Hift. Nat. Com. Stafford.* fub titulo *Fungi ramofi *Caj>.6.§.3]* *candidi/infificeranoidis five digitati minini* prop *Dili t* Be defcribit. Differt quod fpic^ nonnulli ieu digiti circumeirca ciifpi funt 6l cornu cervi in modum divifi.

Pag. Io J. I'm. to. post fecundam ftzeizm adjl

2. *Fungus pulverulentus cute membranacea, fubftantij intus fpongiofa> pediculo brzvi vrazjiore in orar* **Hf. Nat. Stafford cap. 5. §. 4.*

Peramplus eft hie fungus, quatuor vel quinque djgitos diametri obtinens, duos propemodum digitos craffius, pediculo brevi craffo, abafifeu principio angufta paulatim fe dilatante ad margines uique Fungi, in met* feu coni inverii figuram, nonnihl fimilem Fungo tuberoib efculto alboj fuico permixto *J. B.* aut Fungo duro arborum fiveigniaio *Park.* Eorum tamen" neuter efle potest hie Fungus, cum mollis fit, cute membranacea lentl teftus, fubftantia interioris fpongiam turn textura, turn colore referente, poris intermedia per maturitatem ejuimodi pulvere lubtili repletis, qui b Fungo *Crzpitus Lupi* ditto compreffo volat. Prope *Fackingtm* a *D. Waltero A/hmon* obtervatus eft, 5cc.

Eadz'm pagm post ^u art am jpeciem pro quinta & fexta ponantur fequentes.

6- *Fungus khulus j'ubccerulzd pulpda^ anllis flaws refertus Boccon.*

Eocc.

Fungumhunc globosa figura, nonnunquatii ovata crefcentem vidit *P. Boccone*, *Nucis Juglandis* magnitudine. Breviore Be craffb pediculo terra coharret, cuttque tegitur mgis quibufdam acque tuberculi5 exaferata, ade&que lenta & tenaci, dura Be crailla, ut corium repraefentet: Pulpa alioquin interiore, inchoatamaturitatefubctErulea, abfolute, aiillis compluribus flavis referta. Hujus coriacei corticis decocto *Meffanenfes muliereulae* pannes lanilve fubpurpurafcente colors inficiunt. Autumni exitu *Sc* menfe *Martio* colligitur elui aptus, ubi & *Catumphili* nomine nDtus,

7. *Fungus Malicorii facie Boccon.*

Eft hie quoque Fungus notatu dignus, *Mepili facie*, laevis, vefics Formá, nigricantis coloris, intermediis fibns terrae cohrens. Pulpa illi ut esterisrara, fed *Cutis* per maturitatem dura, ad infar corticis *Mali Punici*.

Oritur in *iyWisBarga* in *Hetruna*.

Far. 110. post Cap- XV- addz3

Fungus barbatus ^uercinus tztrrimz fteftusBrQytL *Ephemer. German. An.4. & 5. Obfzrv. i ji*

Menfe Augufto in fylva non procul ab acidulis *Schwalbarendibus* in qua dam *Quercu* obfervavit *J. Breynius* Fungum magnitudine pugni minoris, niveum, carnofum, ovali paene figura, fuperius latiore, inferius magis acuminatum, Be undique radiis craffis unciali longitudine deorfum V5jgentibii5 velut pills in modum barba: mferioris cuipidatae e caudicc excrefcentetn. Odorem dum avellere eum ab arbore annicbatur baculo adeo gravem, fftidum ac virofum emittebat, ut eundem miffum facere cogetur.

Pag. II?. Ad finem Capituli I. pro fpecie 41. addz,

II. *MM feus muhifurmiter pyxtatatts apicibm.coccinzis* *D. Plot Hift.nat. Stafford.*

D.Yht.

Coire eft cinereo, pro anni tempore obfeuriore, magnitudine Be interdum etiam figura Caryo^ phylli aromatici, calyce rarius quadrato, plerunque rotundo aut ovali, nunquam valde profundo, niareinibus undique eminentiis coccineis, capitellorum aeicularum magnitudine, perpetuo obftis.

In *Canoci* fylva circa *Wildmorz HoUhs*, *Fair Oak* Be *JVolfelz* parcum a *D. Edwardo Bjreb* *Arniigero* obervatus eft, Be *AUCDH* nojho oftenu.

P-I- 11?. I'm. ^Pft pag. 9i- «.*

Ad tuflim convulfivam leu catarrhum tenntim, K pulVBrBfn mufci * *Qjierno ateri innafcentis* in *...*

in Syrupo Irionis. Affidue utre. E M. 5. D. Page MD. D. E. Hulft_m

Teg- 118-1. 22., adde pro quarta & quinta speciebus.

4. *Lenticula falufiris major* Commelin. *Cat. plant, Holland.*

5. *Lenticula falufiris bifida, fructu tetragono* Magn. *App. ad Botan. Monfp. C. B. Callitriche Plinii* CDL

Hanc Neapoli in Sebtti paluftribus obfervatam depinxit Columna, aquatics Lenticuk: foliis binis in tenuiffimis caulibus, fructu juxta ilia tetragono. Cum Be caulem habebat 6c femina producta, ad hunc locum propriè non pertinet.

Fag. eadem, Ad Cap. VIII. pro tertia [pick adjiciatur

3. *Conferva reticulata* D. Doody.

Puffilla admodum e/ Sc tenella^ è filaments tsnuiffimis in retis formam contextis compofitaj maculi5 fzpep^ntagonis, interdum hexagonis, aut etiam tetragonis: colors viridi j Quantum difccr- nerc lieu it in tubulos non rarò contsxicur.

In foliis propè Weftmonafterium 6c rivulisin ericstoHounflciano obfervavit D. Doody. Herbarum cauJibus, foJiis & aliis quifquiliis adnafcitur.

Addmda LJBRU TERTIO.

Ad fimm Cap. I. pagm 119. pofi I'm. ult. addt,

5- *Frutex cineraccus mufcofus Capitis borne Spei Breyn.*

Breyn.

Frutex arborelcens hie, admodum rarus, be minfics quafi cineribus confpctus. Lignum obti* net album; ramos frequentiffimoSj rigid05, Be variè divaricatos; cortice tomentulu, cinereo penitus drcumteftos, minurifqus tenuibus^ brcvibus, tomentbfis ac cinereis coacervacisj *foliolis mufcofis ornatos*. QLIZ in rami is rariora^ major a, fie ea fere forma^ ut Cannabis lutes ftenli5 Contareni HDIO- num fiimmitatibusj ftellularum in modum; in ramulis verb denfioraj minoraj magiitjus cnipu^i pxne infar Abrotani foemins foliolorum collocata funt.

Tag, ia i. pofi I'm. 21. Capiti II. pro tertia Jpecie addatur

3. *Silago India Orientalis five Phgmaria admirabilis Tjtilanica Breynii.*

Breyn.

Plantã quam defcripfit Autor ^ ^ ^ / — Jol»raj e vcturta: cujurdam Jaca: arboris eajuffice ibidem en at a, tripodalcem obtinebaC lon^itudinism, atque *zaulz* olorinaib fef^ psnnam \ Craffo CDnftabatj rotundo,, friatUj ex vindiflaVD obfoleco^ad Olivarum^conditarum colorsm accedente^ quiparumper ultra fsmipechm à radios, in ramos duospa^ n? dodranrales dividfbaturj arqie hi in tDudcm aliquanto bngior^ quorum quilibet rur^us in binosj vix triunciales tsnues dslinebat. Diftus *taults* ab infima (cni qua^dam adhuc radicum fibra: adhaerebanc) parts ufque ad extrcmum apicem/o/^ craffiulculls cordis figuram inver^am expnmentibus, femunciam in longitudine, & quadrantem tnciar in latitudine vix liiperantibus, exflavo-viridiad Olivarum colorem inclinantibus, rigidiufculis Sc (plendentibus, Tithymali paraliu ricu, velut fquamis denffimic obteftus confpiciebatur. In unoquoque autcm iipremorLim ramorum apice archfciofum pi eg ma, lefquipalmarej canto ftudio, cam curios^ Be late à Natura daboratum, utpotius artificialis quid quamnaturale putandum Tele olrequaret. Hocpediculo perexiguoinnimum, induaSucplurimum parces primum dividebacur: (inguls vero deindeplunmi5 divifac tenerrimis flexibilibus claviculis (autramulis) in diviffione bifidum ordinemfi- e- quentcr obfervantibus^ Be cam accurate tandem terminannbus acfi forfice edent releft^qua: in univerfium crucifbrmi ferie (ut Cupreffii ramurculi) plane corneAr fquamulis feu foliolis rotundisj 5a- namunds ;. *Clufm* foliis ex parte refpondentibus, led longè minoribusj eodem quo planca Integra ejiilque folia colore; quarum (ingularuni in gremio granulum orbiculare, albicans Be pellucidunij Bombycis ovi magmtudine Be facie lateba^ fuperio^re medietate ex fquamula lacpius cmicans, intus inane ex denegata forian maturitate. Reprcritur etiam granulis crigonis. 1 ^

An fpecies *Quam^javaxU* Nardi AntDn. Recchi Rerum medicarum Nova: Hifpaniae lib.6. cap. oi- pag. ijtf? aut genus *llamaco^ui^y papan* cjufdem pag. 414?

Ran dim^t: in *Zeylan* reprcritur: frequentior eft in *Malabar*, nonprocul a *Cochin^* quimvis *ex ibi* perrara a:lhmetur.

Mulci davan fpecies nobis videtur.

Frp- i?o. Isn.ult. Pro Ejuifeti duodezima fpezit adjiciatur,

II. *Ejuifitum junceum mgnhodwn Capitis bona Q>ti, An Arundinis grammes azuleata* *Alpini* *gmuir* Breyn.

Huju5 ramus i D. *Benning* Breynio donatus intra binas Tpithamas fubflicit, C**** *curftans ca-* *adew int Equi-* *ica* Umi frumsntacBi craffitudinc, nodolbj Ixvi, icreci, in alccra tamen parcc piano, non

feti vulgaris flexili ac molli, fed magis lignofo Arundinis inftraj intrinf' ecus ni veo ac concavn ev
 tnnfecus ex obfoleto virore oftaña colons, & quafi punftulis atris infefto [Alius ramulus nufem
 T>. ten Rhine obtinuit, Dbfecunus virelcebat, guttuhs nullis Interftinftus erat, Bcnihil pi-ne ad f. V
 ceum tendebat] Genicula foliDrum vice involucris nigris ftarifque, in acutum dSihcaitibiũ «p»
 cumvnluta hint; ex quibus rami graciles, lenti ac obfequiofij geniculis creberrimis diftinfti contfa
 rio fitu prorumpunt; qui rufus ab miD fuceflivè in frequemia divaricantur vimina, harcque iterum
 in aha minora, ramofa, tandèmqe in parvas furculas paũ cum caulis, raihorum & viminum co
 lore terminantia. Totus illis ramus caudam non malè equinam repiifentabat; unde plantam Equif
 fetum denominare placuit.

Inramo a D. ten Rhyne tranfmiffb Congeries fquamularum quzdam minutiffimarumj in jnD
 dum ferme utncylorum Junci foliacei capfulis rriangulis J. B. fe prxbuit. Qux, nifi abortus ma'
 jprem hujus planta: cum Juncis vel Graminibus quam Equifeto cffe cognationem manifeft'e in
 nicat-

F^aS. J35- T^oft I^m. 4. adde,

In Catalogo Horti Acad. Lugduno-Batavi a D. Hermanno editi Phylk'ridti varietates vs\ fi
 vifpcces fequ Botanicis v. Bannur.

1. Phyllids polyfchides, haniis fungulis cruciatim decuflatis, in fylvis Anglis Z Jacobo
 reperta.

2. Lingua cervina anguftifolia major fualanugine foliorum lacinias involvente. Hart Rer. Par.

3. Lingua Cervina medio folii nervo in aculeum definsntc. Ejufdem Hort. Far.

4. Lingua cervina minima Anglica Bobarij**

f. Lingua cervina feu Phyllitis minima un JB to folio Hort. Reg. Parif. His addenda

I. Tbyllit'u minor Triumphetth

E radice craffiorijubrotunda, nigra, longis exhibtis ac humerofis fibris capillata numerofam folio
 rum fbbolem femipalmari circiter in fenionbus plantis longitudine prarditam, 6c in gyrum velut
 dirpofitam produuit; quorum fubftantia Phyllitide multb craffior, lupernè Ipletidide virefcit' in
 fernè albicat: infuper cDrundem forma triangularis inftr reliquiaum fui generis, geminas tamen
 ad bafin exiguas veluti alas fortitur, uncialis nugnitudinis, verus externum hmbum acuciores at in
 oppofito, qui petiolo propimr, rDtundiores, ubi Edam decuflatac mutuo fuperfternuntur. Ulterius
 eadem folia, uti farpiis propè apicem dentata cernuntur, ita perpetub circa reliquum ambitum
 criipantur, habentque breves petiolos colonis fplendide nigrantis, ac taliter integram foliDium lon
 gitudinem percurrentes, ut fuloata videantur. Dsnique tata planta turn fapare lubaftringenti turn
 fungi odore quem IVianfa reddit perbsllè imitatur vulgarem Phyllitidem.

2. Phyllitis parva faxatilis Virginiana per fummitjtes foliorum prohfèra D. Emitter, a quo de
 fcriptionem & iconem ejus expeftamus.

3. Jaç. Bontius Phyllitidem quandam Indicam caule foliis pluribus donato depingit & defcribit

Tag. 137. Toft I'm. 43. adde₃

Non in-commodum eft fi recipiatur vinum, cui permifceatur fpiritus fulphuris ut acefeat, Huic
 imroiwc radiculam Polypodii per 14 horas; cunc iicca Be utrc pro dentifricio. Firmat mutidac
 & candorem dentibus Inducir. Etmulhrprax. cap. de Denthim vitii. D. E. Hullz

Pag. J 58- fofi lin.-Li. fro yunta Jpecie addy₉

Hewionitis parua Antzgoana folio YI at am fere in modum divifo.

Huju5 folium nobis communicavit peritiff Botanicus D.Doody pharmacopCEUS Londincnfis. Pe
 diculoinnicebatur tenui nigricanti, & Capilli Veneris in modum fpbndentia quacuor digitos longa,
 Folium z\$ uncialislongitudinerLipcrabac; ima parte tantundem propemodum lacum; ad bafin du
 plicem laciniam feu apophyfin habuic vclutHemioniris peregrina Cluffi, utramque tamen ad latera
 dentatam feu laciniatam, Be in acuciorcm mucronem produftani. Medium etiam folii fegmentum
 utrinque laciniatum, in acutum cupidem procurrebac. Semina folii marginibus circurncirca rflexis
 adnafcuncur ucinFilice fEiTiina vulgari aut Filiccperegrinna Ofinundx Facie Bod.k Stapel, non li
 neDlis aut punftis in Averfa folii parte.

Pag. 141. Ad Cap. VI. adde₃

Filiculam hanc magis perfeftam K integram cum omnibus fuis partibus vide apud Clariff Virum
 D.Pliuknz, eanilemque mihi communicavit D.Doody. Plurimis autem tenuibus nigrifilamentofis
 oblique incidencibus radiculis varie implexis &c cum Iniiico cui intermifcencur velut contextis in
 liiperficie Cera! feu petrarurri quibus innafciur fe diffundit ceu velo quodam eas operiens. Fila
 menta obiter foliola emittunt uncialia aut fefcuncialia, e pinnulis compofita hincinde tnbus, qua
 tuor, quinqe aut pluribus, alternatim pofitis, fungulis in tres quatuorvc lacinias longas anguftas
 ad pediculum ufque divifis. Singulas lacinias leu foliola mavis dicere nervus niger per longitudi
 nem medias dividit.

Pag. 146- Po(l frimam fptzmn Cap^{IV}. adde₃ Oftendit nobis D. Pettiver Filicula: fpeciem G
 China delatam, qux plurimum accedere videtur ad Filicem minorem paluftrem, verum extremum
 folium in longiorem mucronem procurrebac, BcLonchitidem divifura iua amulabatur.

Pag. 149. Ad fintn Capitis VIII. de Adianto add?

4. Adiantum folia Coriandn ramofum Chimnfz.

Pediculisnigri5 fplendentibus cum Adianto nigro Coriandri foliis convanit: foliis magis accedit
 ad Alliantum Americanum Cornuti. Sunt autem ea nufquam adverfo fitu difpofita, led ubique
 alterno. Cauliculus feu pediculus ramos ad eundem fere modum emittit quo FJIX fcemina vul-

garis; in ramis feil. adeo divaricaturus verus caulis videatur, non folii compositiferae ramuli pediculus.

Ramulum ficum à China allatum nobis communicavit peritiffimus Botanicus, D. Pzttiw Pharmacopxus Londinensis femipedali longitudine, in ramos divifum, atque etiam fubdivifum: medius fcapus duodeumfoliorum feu pinnarum paria arinexa habuit.

Tag. 153. Ad finem Capitis 8. adde,

5. *Adiantum nigrum* feu *Dryopteris Cbinmfis lanuginofa*.

Hujus folia [totalia] longiora Be anguftiora flint, magnitudinis ratione habita, quam *Dryopteris nigra officina*, in ramulis ex a velle p d u que fat divifa ap n d a in ramulis alternantibus plurimum difpofita fuit; ha autem divifio fit folium *Quercus* quoddammodo imitantur. Pediculi ut in *dryp* rade vulgari ex *spadiceo* nigricant. Verum haec planta insigni nota ab omnibus nobishattens viis Capillañum fpeciebus differt, quod non pediculi Cantum fed pinnulae feu folia ipfa hirtura &c lanugino/a iunc.

Hujus etiam fulium ex China allatum nobis communicavit fuperius laudatus D- *Jacobus Pcttiver*.

6. *Adiantum nigrum Cbinmfz tmuitr d'wifum pinrmis m'mimis ohtufis phrunqnv htfidis*,

Hujus cauliculus feu fcapus folii medius ramulos emittit alternos, in/urculos pariter alternatim pofitus divifo Sj Sc hos demum in pinnulas miii.^.^ ab angulo principio paulatim dilatata Sj ad iummum ufqu^ quod latiusbulum &c plerunquafpim eft. Pinnularum parvitate Be figura ab omnibus nobis cognitis Filicum fpeciebus diffinguitr, addis flc fequenti diviliira.

Hanc quoque a przdifto D. *Yzttt'ver* habuimus.

7. *Adiantum album fioridum Civuta foliis Virginianum D. Plucknet m'horto Jicco*.

Addenda LIBRO QUARTO.

P Ag. I & 9/. 18. *D. Hermantm* in Catalogo Plantarum Horti Med. Lugd. Bat- *Banguen pro A-
ib. # # _ nobu Aht*\ Indica fpecie babtU*
Tag. I f 9. lin. 41. Pro tertia fpecie ad fimm Capitis fzcundi adde;
5. *Htrba dz Bmgala C-B.*

De hac herba C. Bauhinus ex *Linfcot. part-x. Ind. Orient. iB. Kc-* haec habet^
In Bengala ex herbd quam ad colum infar Lini nen^ telam texunr, quz {ubtilitate fericum antecclit: ex foliis lintcamma claboranr, acu pingentes niir^ flofi;ulo Sj nunc hiftorias vario colore, qua: lectulis infernuntur.

Obfervat *Mandiljo m* Indica fua peregrinatione è glo mo laneo fummo cauli plants cujufdam *Herba de Bengala Lu'irani* diftx innafcentij *pi'x* parvx feu fibula: vulgò diftac majori iirr.ih, opri- jnoipannu Sj au Jxa& peii Aioniata fieri.

Hanc her bam fimili omnino fruftificatione gaudere cum *Curcuma*, *Cardamom D*, *Zedoaria*, *U&* nos docet *D. Paul. Hzrmannns Catal. Hort. Lugd Bat. pag. i n .* in hi (tori a *Curcumx*, cui obhceiC aliique /ua obfervau &c inventa plurimas debemus gratias.

Tag. I 6 J. Toft lin. if. adde,

In procidentia uvulx garg.irifetur fuccus *Urtica*:

Ad morbuni equoium ['jTljc & ttnt\CO Anglice diftum.] Ex cineribus *Urticx* cum aq. font- q. f. fianrorbicuh; quibus cempole usiis adde axungix q. li m. E ung. pro ufu. *D. Hulfc* è MS. cu- jufdam *Doftons Tage*.

Tag. I 61. Tcjl lin. 4. fro vBava *Urtica fptcie adde*,

8- *Urtica Ractmofa Canadenfis* Morif. praj. *Dodjir. Mem.*

Hujus folia inultò obfeurius yirent quam *Urtica*: no ft ratis majoris; ad taftum mollia funt, non tamen pungentia, pediculu longis teietibus appenla. E foliorum alis 6c verfus fummutacss Horum vdu t racemuli exonuntur.

Invenio incer plancas meas ficcas ante triginta annos Londini coll eft as hujus *Urtica*: frli^m. r. D. Paul. *Hermannus* in *Appendice ad Cat. Ltjd. Pino Maregrav. & Tijon.* ad *Urticam* [intsW B^{ic} puio racemofam Canadenfem] referr.

Tag. *ibid.* Ad fimw Capitis dt *Spmachia adde*,

Abrahamus *Muntingius* in *Heibano Belgico lib. i. cap. y\ pag. 1 61.* *Plantain* quendam j^m lam defcribici; depingit, quam *Spmachiam* frutefcencem Americanam vocat; qua: ramen a J n locum non videtui i^rrinre: qui linguam Belgicam callent t em ceiuus dt; finire poterunt

Pr^x. 164. Toft- *Un_m 15. pro viarta Mercurialis fvcit addatur*,

4. *Mercurialis Ztylw incoccoj cum Actubuln Knpmzmja Zzylantn fibitt Herman* C^o: L^o J^o.

App.

E radict aimua, albente, moUiuc nDioia luruguntur zaulu nunc uniuis, nun^c plures, ramofis, fundi,

rotandi pedales, friati; ad quorum gsnicula hacrentfolia, ex longis pediculis, Mercurialis effigie, fubrotunda, glabra, leviffimè crenata: Ex horum finibus vero oriuntur tenese femidigitales ak, quos alcerno ordine cingunt parva, hsrbasea acetabula, cum paryis c medio prodeuntibus pulchellisbreviffimischrvt^{1A*} niultis herbaceis villofis & ciirōfis flofculis vefticis, quibus fubfiint rotundi, lappacei globuli, terni fimul junfti, (ingulis continentibus femē parvum, congeneribus

^{suprar.} In Zeylona Be Malabara luxuriat in firhetis. Hinc Kupamenija, hoc est ftercoris aut fimi amans ^{Locus%} appellatur.

^{Cinem / *mzmi fōri fōstfē} ^otfar ia 00/fi* metboio ad hum locum mn prtmtK

Tai ^{ibid.} Adfinem f>agin* profecunda Ambrop* J'petit addatur
xlAmbrofia foliis ArKmi* inodoris tlator Herman. Cat. Lugd. Bat.

Hujnsvirgultistriumquatuorve pedum altitudine affiirgentibus adherent folia* priori ampliora, ^{*ATArofit} Artemifix foiiis proxima, profundius laciniata, lupercin vinclia, interne pallefcencia^ odoris ^{vilgaru} nullius evidentis. Flans in fummis fpicis apparent minores, tons vindantes, mtus nigcantes j quos fingulos excipit femē unicum₃ muricatum, vulgan fimillimum.

Ex feminibus Venetiis tranfiniffis prodiit.

Tar, i6<. Habeturin Horto Hafnicnfi Lappa quacdam minor, aculsata difta Bartbolin.Aff.med*

Qu. quomodo differat a vulgari Xanthis.

Par. 167. I'm. 19. fofī verba Ma, e Syria ~~Mfeidde~~,

Hzc Ricini fpies effe videtur quam * HMKMalab. Auftoresdefenbunt tub titulo Tandi A<ua- * p 2p= 6 o;

^{his vrbis} ^{na/candi} Avanacu, qux fecunda fpies Avanacu, ling. Brani. * VOTO Erando I ^riore fpies, * L^p Erani (quam pro Ridno vulgari habemusj in eo tantum differt, quod alcius affurgat, quodque ftipici-do major.

buſ & rartiis est valde rubris feu miniatis 8c nitentibus: Foliis, floribus &c fructibus paulo majoribus. Seminaquoque eadem fed majora 8c paulo planiora, & inter fpadiceofufcum Be nitentein colorem cinereis undulis rarioribus confperfa.

Rariüs in hifce terris quim Avanayt reperitur.

Ricinus Africans* maximus caule gtniculato rutilante Hort.Reg. Parif. Hort. Lugd Bat. Herman*

Idem totus ruber Indicus Itort. Lugd. Bat. Herman.

Quantum differanc a pracedente norunt qui eos coluerunt.

Ricinus Ammcanus major caul* virefcente Hort. Reg. Paric Hort. Lugd Bat.Herman.

De his, cum nondum eos viderim, nihil amplius dicendum habeo.

Cadtl Avanacu H. M. ad fnem fag.i&i.soft verba ilia, ad Cadel-Avatiacu plantam diftaftt addenda,

Frutex est in arenosis nascens, ftipitibus ac furculis solidis. Folia quæ in pediculis tenuibusji quatuor pollices longis proveniuntj oblongo-rotunda funt, ancerius in cuppidem ftridla, ad perio- kim latiffima, oris rotundis, tenuibus & raris in margine denticulis incifa; fuperficie plana, glabra & texcurx tenuis ac lubtilis: nervis ^ cofta media-iubtus eminente oblique antrorfum exeuntibus, K ja ie invicem arcuatim fubtili traftu incurrentibus, colore viridi-claro, in hac parte. Flores in fmmiis furculis albicantes, plures; quibus iuccedunt Fruttm pedunculis brevibus, rotundis 8c tenui- bus appenfi, forma oblonga&trilatera, tnbus plano-rotundis lateribus confiantes, Be in medio fin- sFnloliumlaterumfuturafjibnliitilongum friati, ad petiolum ftriftiores, in fuperficie puntis lacu- rōfis eftofsi, in vertice cum teneriores funt umbilico tnum rubrorum foliorum, quæ dein decidunt dotatI cortice exteriore viridi diluto, interiore lignofo ac corneo, ad petiolum calyce parvo, qui curpidatorumvindiumfoliorumest, comprehenfi, in terna loculamenta divifi, Interfepimentis ligno- fis, quæ angulis laterum 8c Hyloradio adtridra funt à te motu difjuncta; in quorum fmgulis fmgula occurruntur fennis, focias oblonga in parte interiori, quæ Hylor medio fructus accumbunt, pulicula albicantibus ac in medio. ubi cūto reftituta funt angulo emittente exuberant, fuba- ra avaffriata: fmgqecum fixa parte mtenori planiora, in altera rotundiora & magis extube- raiSa, coloris in totum nigricantis 8c parum nitentis; in vertice nullo umbilico albicante fun^uti qm- dem iemina priorum fpieimm.

Bisjnannoflores&frudlusfert, ferme injanuano & Julio.

Folia crita&cum aqua epota purgativa funt. Pro morfu ferpentis difti Oka CapeUa juvant in pulverem trita vulnere Wantur; eadem cum fohis Panji Avanacu* & floribus Schem-Variu* melli permixta pro capitis puftulis ferviunt fafta unaione. Unum fructus lemē fumptum ufum ^{c^; * Us eff%} purgandi obtinet fi tritum in aqua propinetur.

Hie frutex frtttu trieocco & *i cat hart tea cum Rhino cenvent, in reitqts fat* differt.

Csterum Ricini vires in Hiftoria omKTas placet hie adjicere:

Oleum c nudeis expreflum non folum Lychnis affunditur, led omnibus paffim incolis [Bra- filia: 1 in ufū est quotidiano contra affeftus frigidos tam iriternos, quam externos. Refolvit app- ftemata&matricis ventrifque tormina ac flatus illitum dicitur: prodeft tinnitibus aurium: refti- ruitienofconvuUofquenervos. Tres Vel quatuor guttuk ex conyeniente liquore fubinde per os vel anum exhibits ianant fiigi^os articubium affeftus & imul alvum laxant. Cutem quoque a * ^g, njifc pfora reliquifque viosis vindicat. Umbilico inun¨umbricos pueiorum expugtiat. At * H.Stubs fob. N. 56.

affermac Oleum expreffum, quancumvis nuclei ipfi vehememer purgenr, nullani omnino vim catharticam obtinere, nè quidem fi integri cochlearii menfurā una vies deglutiat, auc nium per anuni injiciatur. Pifonem attendamus.

Semen purgat validè. Sex feptēme nuclei per 05 intro affūmpti humores crudos per fuperiora. & inferiora excurbant cum vehemencia. Convenit ergo in ipiriru vini optima loco correctorii femina nulta macerarc, & tinturam exhibere. *Vifo.*

Folia aquā vel aceto niacerata Herpetis aut hujus generis affeiftibus medcri, praeter Diofcoridem teftem habeo quotidianam experiemiam. Pi/ō. Eadem, ceffe D. *Stubbes*, unicum flint apud Indos Cephalalgix remedmm.

N. Indi ante Europarorum adventum non exprellione oleum eliciebant, nullam enim nfrant, fed coftione; eadem fcil. ratione quam docuic DiofDrntes h.e. contufo iemine, deinde in aqua cofto, pofitremum oleo innatanre cochleanbus excepro: qu^ eliciendorum ojcorum ratio è feminibus &c fniftibus Indis admoduin fanuliaris Be ufitata eftj quDmodo facilius etiam quam exprellione eliciincur,

tiucipzhotl Huaxactnfis fi Ricinus Nova Hijpania Hernandez. Jj|^o an differat a Curcas ?*

Si refte depiausfic ad hoc genus propriè non perfinet, hue tamen ob fimilitudineon foliorum & fi-utius cum RiLIID Americano *Curcas* ditto referri poteft. ^Vrbufcula eft, de/crībence *Hernandez*, j vicuin modoisrpens, finuofis ac cricufpidibus foliis, floribus coccineis, parvis Be aggregatis in comanij unde generantur fruftus Nucis pa?i^|gfcncicz formā ac magnitudins, fed trnD5 indudences Jlicini mar_ candicances nudeos. Tfl|H^nd folia, Horss au fjuftus fert.

Liquor ftillacitius vires elanguefcentes inftaura^reficitqucj ut homines ferè mortuos ferant ex-fufcitare; jdcn\ refii^erat &c impinguat, aucipfi^ arbons folia pi ens vice devorata, nicidūmqe reu-dunt colore. Lachiyma ftillans b perfractis geipinibus inflamniationi DCuloriIm minim in molum confert." "Nuclei quiniij aut Ji inbuftior homo In lepce^ emundati à quodam illos tB-gente membrana vacuanc egregic picimam Be bilem per fupeina He in fern a3 adeo icuro ~~cvenit~~ uc vel levis moment! re ingella_j mellicamenci hujus vis li itaexpedi^t coerceatur.

*P. 4-T. 51.
p. 105.

H. M.

Bzvgi eiri H. M. Ricini Indici species.

Arbor eft mediae Tnagnitudinis, caudice craffo, albicante, cortice obdufto nigricante, ~~multis ramulis cinereis^ intusfungoils, inodoru, fappriqque acris donato.~~

Radix albicans, flavefcenceaclefceme cortice cefta, inodora_ laporis acris Be urentis.

Folia alcernarm brevibus petiolis circa ramulos proveniunrj oblongo-rotunda acuminata, in ambitu feirara, cralla, denfa, glabra, nervis aliqDC e media cofta albicante BC inferne excuberants inlatefa excurreribusj lipor Julcis \$L aAringens.

~~Folia exigui Be pncie in vrbibus furculorum extremis racematim proveniunt, calycique viridj; albicanti & exiguo inhxrent, tribus ftaminulx, luteis apicibus ornatis cpnantss. Ac verò floclculi hi Juh pDCis dicendi Hint, cum ex iis fruftus non enafcantur: led infra Hofculorum analogicè diftrum racemns [cupotiis ip^cas, gemma obfervatur ob] on go-rotunda tri a eimtcens rehexa,albicantia, ftavelcencibu5^ci^/j ornata hlamenca ; quargemma Inodora_ infipidaipfius fruftiis rudimentum elt.~~

FruBus rDCundi, (ex anguillis craffioribus iulcatij fruftibus *Nduamaram* haud ablimilss, viridss craffo cortice cmiti: cui Jubeft putamen feu CDRtextignofusj rufus, bina ternave indudens ~~fructibus~~ albicantia_j dulcis, garique (dpons, Ricini lbii)inum formā smula. Craffus autem qui fructibus Kline ambic cortex, levibus incifiins vulneraruj J^Lhrymam fundic ladtefcencem, acrcm, urenremj nuamobrem ilquis fmitiūs holce dentibus confnngerc conetur, mox inligni acrimonia lingua^ ftuceSj caccera-que oris partes vellicantur, intumBI^usir, inflammantur, qux /ymptomata mors intenipeftiva non rarò excipic.

Ci cficic locis arenolis ge humidis in *Malabar*^ prarfertim circa *Eocbin* : Temper viret; quotannis maturps fert fruftus, menfe viz Dccembri.

Folia comraK pulveriJaca ulcibus infperguntur ad fungoJara luxuriantemque carnem ^{id:le^} dām. Eadem folia cojicifa^ &c cum Dubali Ericibus in nuilub tpn/uta ac calefta convullis <?. fpafnw aiftellis partibus uciliccrimponuntur.

Pag. 18D. Species AcctoIx undecima feu fucata repens copiofe proveoit juxta fcaturigines aquarum in caucibus cliyolis montis *Snowdon* fupra vicum *Llandberit*, necnon ad rivulos in conrrago rupibii5 njoncis *Cadtr Idru* lupra lacmu quendani noftratibus *Lhiny Can* diftum.

Pag. 194. ^{a!} fi^mTM, TMP.± ^{a!}ld* >

Anp ~~ca~~ "maritima MaluiranicafoJiis Polygoni argenteis, /emine amplofufco, vafculis rotun quam apud Y>. *Pluckmt* exliccatany, Vilnius.

P:Z> *9f. ^{a!}d<fē>

Halimus angu/tifolius feminibus (Tngularibus, vafculis Burfx palloria; azmulis bicornibus in D. *Plucknee* in agro *Lineolij* Jenfi invenit.

Pag 19d Ad finim paginje add.

Pcniozem hujus pKinn defaiprionem vide apud D. Hermannum in *Cat. Hurt. Lugd.* *j^ a . titulo *Amaranii Indici* ^inofi /pica herbacei^ *Kathucmpala Zeyloneniibus* h. c. Pala ^{leu}

Pajr. ioi. In horco Reverendiffimi Epifcopi Londinenfis, cūjus frequens in hac APP^ ^^ menuoj Anuranti fpeciem vidimus niaximam, humanam alnrudiim fuperanrenij ^{qan} ream meril) appelles, folns mukb pallidioribus qium purpurei vulgarislpicis ereAis^ ^{qan} iniltò quaniillius gracilioribus, Be brevioribus ft nmdo adules fusrim, colore minus, laci ^{fu b} tiodiore, 3*inu* Clulii in niodum fparfis leu deorlum di;pendemibus. Semen nonaum P^ ^

rat Septembris medio Verum sftas hujus anni fupra modum frigida, Be femtubus exoticis mam
randis minus propitia hnt. uuuu-

Tag. ioi., Tofitin. 64. pro septima Amaranti Jperie addatur,

7. *Amarantus minor Indicus folia Tripolii, flore exaneo colors & argent to variegato* Breyn. prod.

Tag. 208. *Adftcundam fpeciem Afari not.*

Ha:c Afarum Americanum Parkinfoni esse videtur, defcripiiones tamen non in Dmnibus conve
niunt. *D. Raniftr* in Catal. Afarum Amencanum *Park*. Scrpencariam radicem magnam vocat
foliaque ejus maculola esse aflen Cyclarrneorum infar, quibus tamen minorafunt, nee Afari no?
ftratis majora, qmcquid dicac Parkinfonus. Communicavit nobis *D. Pettivtr* folia Be radicem cujuf
dam plantar c PrbVincia America: *Terra Mariana* didici allata quam incola: iftius regionis *Serpenta
riam mgram* vocant. Radices hbrofs erant, nigricances: folia pediculis longis infidebant fieri Be
magnitudinc foliorum ChBlidonii minons, verum circum oras crenata ad modum *Calthz* palu
ftris quibus Be familia nifi quod minora. Eandem plantam ficcam vidimus apud Virum infiJnBm
D. LIOB. Plucknct. Fibrx e radios quodam veluc trunco exhibant. Eandem hanc effeputo cum Afaro
Americano *D. Ranifter*.

Pag. i n . *Kali geniculatum majuj five alia nova fptnes Kaliptrtmis* A D. Sloane *vbfervatum* ^{st ^onl}
infulam Shepey. J r P*

Tag. 217. *Adfirm Cap. XL pro tertia Saxifaga! aure** [peck addatur,

3. *Saxifraga aurea^Kfimisfacie* MoriC Przl.

Satis frequenter, inquit, reperitur in rivulis aqz dulcis a fontibus jugibus manantibus. *Folia* ger
rit oblonga, ferrata, hirta, per terram ftrata; fofculosin alis luteos; quon Sc primo ftatim intuitu a
Saxifraga aurea rhontana rotundifolia difcernitur a foliorum denfa difpoficions Sc forma kinea
cum alterius montanx fine rotunda Sc rariora. *

Sufpicor ilium intelJigers primam noftram fpeciem; vcrum turn male illam iefcribit floribus in
foliorum ahs.

Tag. 219. *poft lin. 40. adde fpeciem fequentem.*

». *Latiuca fativa maxima Aufiriaca capitata, variegata, LaSfuca Cqñophllacta vuh* Herman:
Hort.Lugd. Bat.

Rcfert, inquit, varisgato colors Caryophyllum hortsnfem.

Viribus Laftucz addis fequsntia.

Laftuca: frequens efus Veneri adverfatur ut quod maxim^j unde (periem ejus quandatn Veteres
Eunuchion Be Aftutida vocarunt: cavendus ergo iis imprimis eft qui liberis operam dare vellent
Hanc ejus Facultatem quamvis fuperius leviter atrigimus, quoniam nonlevis momenti res eft, iterum
inculcandam duximus.

Tag. 212. *poft lin. 40. adit,*

Hanc fpeciem *D. Magnol* in *Aff. ad Baton. Mmfp.* accuratius defcribit nomine *Latfuc* fylve
Jfri, angufi, Ucmut, fdn*, Be quzrit An fit Laftuca fylvdrlris altera >nguftior, foUo *Hort, Rer.*

In Catalogo Plantarum in *Horn Reg. Parifi* enutricarum necdum editarum a *D. Tancr. Robing*
ad me tranfmiffib invenb,

Lattmam frattnftrn fdm angufiori & hngfri D. Fagun.

Qus quoniD^o a prxcedenti difBrat inquirsndum.

Tag. iz9. *Ad fimm Capitis tuarti it Chondrilla add?*

Chondrilla Tmgitana floribus lutev Papaveru horUnfu folio D. Hsrmani in Cat, HorL Lugi*
Bat.

Herman.

-*Radius* niticur digitum crafla, pallida, fibrufa, annua, c qua prodcunt/o/w Papavcri hortenf non
nihil familia, duos tranlverfos digitDS lata, palmam longa, glauca, livia, carno/a, albertibus Venis
infignira, per ambitum crenata. Inca hzu afflirgunt cauUs, cubito longioresj in aliquot alas diva
ricati, heves, pallide virentSj folidi, circa cacumina vero fitulofi. Horum fingul^ nodis hzrent fo
lia fine ullis petiolis, auriculata, inferioribus latiora, Be profundiDribus crcnis incill. Apices vero
exornant capitula, Sonchi effigie, fquamata, qua? Augufto menfe expliuant florem, congenenbus af
finem, ex numerosis petalis^planisflavis, ad bafin purpurafcentibus, radiantam ftellam imitantibus
congeftunij fuccedenribui [eminibus oblongis, albis, fungofis, fulcatis, denticulatis, candlidiflino fe
riceo pappo criftatis- Tota planta fbatet lafte amaro, ingrato.

Tag. i)6, *Hieraciurn maximum afferum Chondrilla folio* C. B. d D. NewtDliiw *Cantainvm
turn* eft.

Tag. 2)B. *Hitracium fruticosum fol. fubrotundo* C B. inParco Edinburgenfi, & alkubim *Westmor
landia obftrvavit idem* D. Newton.

Aliam adhuc Hieracii fpeciem Songhi vel Chondrillz foJio hirtuto ad me ficcam tranfmiffit dili
gens Be induftriUS Botanicus *D. Doody*. Caulis erat femipedalis auc paulb altior, untco folio lacinia
co donatus ad modiim Pulmonaris Gallnrum^ flores panter infaftigio geftans non multos nec valdc
diffiifbs, luteos, non grandes, calycibus lanuginofis. Semina parva nigra esse videncur Pulmonanz
diftK^ Folia laciniis flefigura Cichonum^ Dcentem leDnisaaitSonchum imiuntur.

Hsec planta accediu ad Hierachium maximum alperum Chondrilla folio C.B. Flares antequam aperiantur robore quodam diluore exterius findac videntur, ut in Myofotide etiam cernere est.

Fag- 239./W-9. Speciem Hieracii Pulmonarite fextamficdeferzbit D. Hermanns in Cat. Hort. Lugd. Bar.

Ex fibrofis candidis radicibus quotannis fruticant novi iurculi, fetquicubi tales, tenues, in viridi alcentes ladtefences; foliis concoloribus, longis, anguftis, pame iecaceis ab imo ad flimum ufque dense ftipatus; quorum fastigia in complures abeunt ramulos, fiiftinentes è calyce oblongo incano moditè hirturo 3c fquamarcz floras luèses, ex multis petalis planis in gyrum difpofitis conraftos, qui marci di faceffint in femina acro-rubencia, gracili pappo criftata.

Tag. 15 r. lin* 57. Ad fivem Cap. XII. pro decima [tptlma fpzciz adjiciatur,
17. Tragofogon five Scorfonera humilis craffiore folio Magnol. App. ad Botan. Monlp.

Radix ei craffij hrevis, fibro/a, quæ in plura capita dividitur; è quibus multa nafcuntur folia, Innga, anguftaj craffa, glabra: inter quz (urgic caulis palmarj cavus; -flore in fastigio fereni flium, Scorloncrac modo iquamatum, fed minore; Semen etiam minus..

In pratſ ad lxxviam Lacerz vzvius Itagnum Maio mens florst.

Paf. 16t. foft Hn.1%. ad finem cap it is IL pro quart a Jptcit addtwt,

4. Petafites Africanus Zaltba palufinis folio Herman. Car. Hort- Leyd.

Novum (inquit) hoc Petafitidis genus ex paluftribus C. Bon* Spei in hortum tranflatum fow*⁸ est rotundis, rigidib, cienatisj Calthacpaluftris facie, radice flavefcence cralla, cetera vulgari fmile-
Hanc plantam curircaule fructu mo racemofu onufto apud D.S. Dovy vidimus^ unde earn P^{cu} tafiten noil ellè cohftac, fed anomalam quandam ftirpsm Petafitis folio, Bliti fructu.

Fag. 164* Conyzi F6- feu Melicentis foliis retufis Boccon. in hortis Londinenfibz nomine 5e neciojiiis arborefcantis C- Bonx Spei Innotefcir, uc memonuit Tj, Tanvrzdus Robmfm. At D. H^{hu} mannis^ Canyzam Afrkanam Senecionis flore, ioliis retufis à Boccomana abluere fcnbic fkJb- difcofidibus nudis non radiatis Senecionis facie Bimodo in umbellam difpofitûs^ excera cum ca con^u*
nne.

Tag. z^^. Ad finem taptis de Eonjza add.

Conyza Afmana foliis Stxzhadis zitrinx Gallic* Fafic. plant, rar. Breyn.

Suffitex pedahs est vel alciore, Elichryfo II. C. B. finJills, fed rhagis lignofus. Foliis pluribus ScfEchadis citrine Gallica: fed anguftioribus: Flore majors cujus umbo petalis longis be anguft⁸ circumradiatur. Radix lignoft, multis fibris divancata. Semen pappefcens. lu Afuca juxta Promonr. B- Sp. D. 7m Rhyne collegic.

Eadtm Pag. add. Conyzim Africanam Urcicz folio Hort. Awfterodam.

Pag. 170. I'm. 18. pro XT- jiftzT* fpecitinztrponatur,

ii- Afttr I at fvirus Trivoli fiure Dodart. memoir. Tripolium altiffimum Amcr'natum^ cauibus viridantibus Herman. Cat.

Ad inn cm Cap. IV. in eadem pag. addantur fpecics fequentes.

l. After. Africanuj latifilius maximus pumceû caulibus Herman. Cat. Leyd. App.

Altius afliirgit quam Afteres Novae Anglia?, caulibz robuftis, puniteis, in breves, concolores ramns divifis. Foliis Tripolii facie, led rigidionibus, craffioribus, per ambitum nonnihil^ denccatis, in ferioribus palmam a:quantibus, fupcrioribus vero brevionibus fie anguftioribus- Floribus aniplis, VID-laceis, nifedio difed piirpureo flavelcente, & L in albatem pappum fatilcente. Subeft radix fibi^uola, vivax, nunierofa fertilitate fe propagans-

14. Afttr Nirfd Jitlgi* latifiliur, pankulatus, floribus faturate^u/iolaceis Hort. Leyd. Herman*

Elegartti(Iimû5 hie After, humanam altitudinem tangè liiperans, hmihraJtcm albam, lignowP¹* perennirfrem, inBiimens tenliidimis fibris capillaram, ex qua furgunc virguha quamplunna, g^{ia} purpiirffccntia, CaUm tenllitè infirma, circa fastigia in frequences furculos, quali in Ipecicilani p^u niamam collectos (ubdivifa. His Itnttè adhzrenc folia, abique pcnolis, digituulDJiga, du6Jc^u TM^u£ veribs lATA, plana, craliuLilbula, nuicrnata, alcerd pane glabraja:te viridia, alceia ex viridi P^u clice ria, ttunt dIIS eniguis vsnulis E media coffa oriundis inferipra, ad exrimos linbos P^u P^ura, Cj j^u & alijuando Icvillimis, vix confpicuis crenulis exasperata^ qui vero inniedij. ee u radice p^u fupcrKribj5 amphora lbnt; fulca petiolis digitalibus, alatis, ex viridi luffdcentibLis. Juxta k^u rum, fastigia eminent capitula parva, brevib. anguftiflinis foliolis, fquamatum cu/poficis, ve^u bin finKns infidec floj ftellarus, Afteis Amu hcic, inodorus, radiarus, diJcoiJes; radus p^u diko paivu H-ivcicente, abunces mftmma pappofa, tincra, more t^u

2 J. After Nna Btigim latifdim umbellifut, flmbus dilute^u-violactu Herman, iiv^u- Ltf^u

Forma K crefcendi mock* cum fupiore convemr, ferens railicsin Jongè htiqiz^u bam, paum fibrolanij ex qua piudcunt/i//* przcsdeiu haud ablifilia, at piul6

diora, minus glabra, 5c quodammodo finuata. Inter h*c enguntur *cauhs* bicubitales, viridantes, ad radicem rithil aut parum rubentes, ftnati, fuperiDnbus ngidiores, duriores Be robuffiores, circa fumma fastigia in frequentes foliofas alas magis expanfas, umbellam mentieotes, divift; fuftinentesin eapitulisparris^ex longionbus foliolisquammatiTi difpofitis^rw priori paulo majores ex dilutapurpura violaceos, petalis duplicifsrrie fibi invicem incumbentibus, ditcoluteo, fatifcente in *femtnacineria* pappofa, priori fimilhma.

26. *After zstbiofhus, Stxchadxfoliut, flore aureo* Herman. Hort. Leyd.

In montofis aridis ad Cap. Bon. Sp. reperitur. Conftat *radice* parva, lignofa, fibrofa, fufca: *Caule* itidem lignofa, dodrantali, modb fimplici, modo mulplici, candicante, in ramulos divaricato, undiqueo7w(eCaceis, tenuiffimis, incanis^ Stoechadi cicnns xmulis, veftito. Horum fimmitatibus infidet e capitub oblongD^fquamaco *flos luteus*^ ft ell a: inftar, cu jus medium umbon em pallide flavefcentem cingunt foliola^ radiorum inftar, aureo colors fulgentia- His fenefcentibus fucgedunt/pw/w^pappofa, veluc in tongeneribus. Viget & floret per cotum annum, dutnmodo ab aeris frigidioris injuriis vindicettir,

27. *After exoticus Hyofzridis folio minor.*

Siccum nobis oftendit ClarifT. Vir D- Lzon. *Plucknei.*

2B- *After Afrkanus Stwmdajs folio imano* ejufdem.

P. 278. *Ad finem cap. 8. addt,*

ij. *Doronicum maximum Amzrha*um> latiflvmo avjxulofv folio, radice tranfparenti* Herman. Cat. Hort- Leyd-

A Jacobo Boberto habuit. Flores Sc femina nondum viderat.

16. *Doronicum integro & crajfo Hjeracii folio* Magnol App. ad Botan. Monfp. *An Doronicum Hzlvzticumincanum* C-B. prod?

Radix fibrofa eft, c qua oriuntur *folia* pediculisdonata, lngua, latiufula, ftrrata, craffi, fubtlis tomentola, lupra viridia : *Vaults* fequipedalis folia angufta habens finepediculis. *Florem* fext magnum, petalis luteis, in extremitate crcnatis umbonem luteum cingentibus^ qui in pappos abit. Floris calyx irriatus in bail foliis viridibus coronatur.

In herbis locis mentis *Sirram* frequens eft Be Juniomcftf^ floret.

Tag. 180. *Ad fimm Cap. IX. pro 12. Jptm. adjiciatur*M

12. *Virga aurea Lanadznfis folii* Scrophnlaria* Dodart. mem-

Item, 1? - *Virga aurta Amtrkana foliis ftrratis anguftis fubtt ntrvofts* Moril. prclud.

Hujus folia funt fubtus adeoerovofa, & eminenter angufta maximfque ferrata ut notu inde facili5 fit- Quin Be radicem habet odoratiffimam.

Item, 14. *Virga aurea humilis Alpina* Morif praelud.

Haze in omnibus vulgari ace edit, fela parvitate difcrSpans: eft enim Virga aursa vulgari tripb ~~minor.~~

Pag. zddtm/Cipiut X. deHelichrylofeu Srechads citrine addantur fpecies fequentes:

1. *Heliodyfon quorundam foliis Abrotani* J.R *ElicbryJon foliis Abrotani* QB. *Helycbryfon foe Coma aurea* Gcr.

Pedalis, nonnunquam cubitalis eft plantij *uaulibus* reftis, robuftis, fruticofis/ in multas alai fubinde divifis: per quos Be ramos numerofa *falia*^ Abrotono familia, candicantia, ubi primum erumpit, tenuiffimc divifa, brevia, hirtuta, cum gravitate odorata. ^*Floras* ia fummisramis umbellatim congefti, lutei Agerati floribus forma Be odore perfimiles, verum majufculi. *Radix* lignofa, minimi digiti interdum craffitudine, qiiz tamen fingulis annis perit.

La*o folo provenit, Be copiose circa Madrkium itinere Complutcnfi, alilque Hifpanix locis in *Locus*, agris, ubi Septembri Be OftDori florentem videbat Clufius.

Quod dubius effem quo referenda diet hzc planta^ nee ad hunc locum pertinere putarem, commodiDrem quxrendum ratus, tandiu eam Hiftori^ inferere diftuli doneg tandem penitus e memoru excidit Be omiffa eft. Duo funt quz me hafteus dubium Be fulpenfum renent. 1. Quod nefciain an pappoa fit. 2. Quod mihi nondum planc conftat an florem habeat radiatum an vero nudum • quamvis ex defcriptionibus quæ ejus extant nudum habere colligicur. A rcliquis certe Stoechadis cicrins feu Helichryfi fpeciebus foliis mukifidis differt. Qui coluerunt Be obfervarunt nos certioi es de ejus genere facers poflunt.

Hilicryfum Afrkanum ino Jorum gfabrum Magnol A pp. ad Bo tan. Monf. *Elicryfum inodorum glabrUm Cvronopi folio annuurn Magnuli* Herman. Cat. Leyd.

Nobis defcribitur inferius pag. 364. pro Agerati fpecis titulo *Agrati Africani foliis laciniatis inodoris*. Verum fi fcinapappofa obtineat (ut affirmat D. Hermannus, nam in planta quz nobis lucrevit pap-pum nullum fenunibus adhxrentem obfervare potuimus) Elichryfi potius quam Agerati fpecies cen-fenda eft. Nuper cum Londini eflem Botanici Londiaenfes mihi affirmarunt plantain hanc minime pappofam efle, proinde BcHermannum errafle. Quin & iplb (ut video) in Appendice fententiam iuam mutat, à *CiaJfi* certioræ d f t l

Chryfocome African a flore albo anguftifimis foliis Breyn. in Fafcic. -

Breyn.

E radice hujus virgæ exsunt multæ, pedalesj nonnunquam ampliores, lignofej firms, in mukoS ram as tomento albo candicantes diducta; ii ab imo ad fummum foli DIS crebns ac anguftifimifj St[Echadi5 dcrinx Italics Herbariorum dimidio brevioribus dense ftipate. Summos verò rariulos corymbi occupant admoduTi elegantes Gnaphalio Americano *Eluf* n vjldè accedentes quadruploiti-nores, è candidulis, infra aliquando ruffecentibus icà compofici fquamulis, uc umbejnem in medio comprehcnLim duplici *6c* triflici (eric notabiliter circumradient. Semen minus pappofcens, *Chryfo-* comeS vulgaris feminibus part

In herboi5 juxta Promunt. Boiixlpei *D. tm R&jmc* ut Be duas fequentes collegia

Chryfocomz Afrhana flore fbxni avgufUfolia Breyn. fafcic;

Breyn,

Planca alba & penitus tomentDfa eft Chryfocoma: Germanicæ anguftifoliz flore ex aureo roti-lante fimilis, niñ quòd folia anguftiora febieviura^ sorumque ex alls ramulos quamplunmos foln? minoribus veltitos promittat, *FUrts* denfiffimè inglomerulum congefti mukò firm minore^ fqua-mulis sxhioibus minutque iplendentibus ex igndcnte phDeniesJ colons inibri^ati; quorum medium *flamina* quxdam minutiHima in pappos, femine appenfo perquam pufillo, abeumia occupant.

Chryfocome Africanaflore fbxmzto ferratifilia Breyn. Fafcic.

Perraras hujus plantukriw/w etiamcandicant, multòtamen infirmioresfunt^ inque debiliores, K longioresramos diviiti: FoJiis pauciDribu5mult6que brevioribus, latoribus^ ferratis^ nervofis, incanis jpidem, minùs tamen quàm fuperioriSj [Euphraxiz latifolix Italica: COJ quodammodo smulantibus Jepti. Flore Be femine cum precedents convsnit.

Chryfocome fivt Argyrocomt GnaphaloiJu Africanaflore amplijjimo Breyn. Prod.

Chryfocome Africana Ericoides flore albo Breyn. Prod. lumfi. *fulpburco*.

Chryfocome impi; fi<uz Filagg ditta Cap. B. Spm Ten Rhync apud Breyn. in Fafcic. *Dua ff>ccies. Vidimu** apud D. Pluckner.

Elicryfo affinis Africana arborifexns, fioribuspurpuro violactisfoliicSalvia; vdore TLOfmarini *z, a Africana incana arborifems odore Salvia & Rofmarini* uulgp Herman. Cat. Leyd.

Hvrman.

Quanquam hxc arbutcula nomen Chryfocomac nonmerSri videatur, quòd ejus flares aurea luce non rcfufgeant; Attamsn ob florum fquadlaCaiti corymbaceamq, ftruffuram, & feminum pappo^{afT1} ilifpoficiDnem, ceupnmariam plantarum partem, Chryfocoms hand diflimilem, huic adjungendam zfc exiftimavi. Spontenafcentem reperi bcis faxulis K lalebroli5 ad radices moncis cabulaci Capita Bona^fpei, unde in Hortum tranflata lxta fertilitate germinavit. Figic *radiant* longam, obliquam, pallidaniij in brachia divancatam, ex qua virgulca affurgunt complura (nonnunquam ununy fexfepfmve pedum proceritate lignola, ramoia, candidaj incano tomento/o cortice veltita. H^ adftant/o/i^Salvis quadantenus familia, ngida, crafta, perpetua, fupra viridia, infra Candida, infcici^{ia} numerofis obliquis nervis, è cofta media in margines exporreAisjlaporisacriSjanuri^ aromarici, *odo-* ris fragrantiffimi ex Rofmanno & c Salvia mixti. Ad ramorum cacumina pullulant muhi rainuli>ⁿ quibus apparent parvi, fquamati tomentoii *flojculi*, Elichryfi vulgaris effigie/barbulis tanien anguf^{t1,11,11} niispurpuro-violaceiscingentibus orbiculumpallidum, facifcenrem in tenuillima pappo/ccntia/t^{1,1,1,1}

Menfibz Marrio & Aprilifloret inHyemali, inque Prom. B.Sp. lildcm menfibz perficim¹. Vir-tu tibz rpondet Rofmarino. Oleum ex deftillatione prole&tum pra:ftaici(linum efle deoppi^{ativUin} expericntia nos docuil

Elicryfo affinis Ttruana fratefcm Herm. Append.

Sumxit in horto Beveringiano ex feminibus Peruvjæ advectis ad altitudinem sex Septemve pe-dum, viticulis lignolis pallidis, lenis, geniculatis, valdè ramolis; foliis batis, ex oppofito nafcentibus. Formæ & rami admodum ficuti in Peruvia. Scabrofoli-
ipanicæ; ftellatj; habentibus, per marlines tamen crebncis lenaiis, rmbii(que per lDng^{itudinem} ex-currentibus nervis inlcipris: *Fkrim* ad foliorum exorru circa lamorum cacumina cMy^{TMcolb} VJS, ab&ljchylonon multum abludentibus, pendulis, herbaccis, di/Loilibus, niodo ltblv«^{is} n^u tnbz fluacuorve limul junctis. *Stmmibm* exiguis, ut conjicere poruir, pappolis, ad perfcctaⁿ H^{1,1,1} Jiumriucnn fautulijucnndum per due; ikporc fit odorcnullo evidenti.

foliolis circumvallatoflores coeruleos, fistulosos, oris laciniatis, quos excipiunt [mint fufca, barbata more congener urn. Circa Tingidem Africa: collectus erat.

Tag. ;o?. I'm. Jo. adde,

Huicfpedei [n.] valde fimile est si non idem Cirium angustifolium C. B. prW.Folia angustifolia 6C raris aculeis praedita effledicuntur; capitula hispida.

Pug. JIO. poj? lin,%\ pro nona Carduipeeeie adjiciatur,

y.Carduus pycnopolycephalos yfocftris Trivlmfctti.*

Triumpf.

Radice est perenni, Raphani hortensis forma, caestitae pollicari, longitudine palmari, circa extremum ramosa, ramis in crassiusculas fibras divisis, raris quibusdam barbulis, ut Sc radix ipse obfistis: Haec est lignis filamentis fungosa? substantia: mustehni coloris intermixtis compositur, necnon externo mollion cortice ejusdem coloris obtegatur. Folia radice caput multiplicatis caestibus coronantia brevissimo ipsi adhaerent pediculo, palmo plerumque minora, laticudine unciali, folidam fortuntur libitantiam prona parte, qua: densa lanugine obruitur, candidam, fupina vero atrovirentem, fed maculis seu poris lineis quibusdam albis imerruptam, ob hirsutiem turn primanum nervum, turn ipsius propagines occupantem, quae versus laceralem extremitatem bifurcate literam Y egregie asmulantur, & postea in tenuem ac flavescentem aculeum, longum tamen 8c /atis pungentem, cernuntur, imò propè extremum foliorum ambitum ita ordinantur, ut ipsa velut crispatis oris evadant. Caeterum Junto mense fans explicatis jam foliis unus vel plures juxta caestium numerum eorumque robur oriuntur caules, qui Augusto deinde mense duorum fere cubitorum altitudinem adepti, anguloli, alati, aculeisque muniti cernuntur, colore ecianij quasi cinereo ob modicam lanuginem praediti substantia exeriore lignis hbris constante, medulla spingiosa intus repleti, foliis multis imis fimbriatis, fed minoribus ornati, 8c ad modica intervalla nullo pediculo cauli adnexis, raro in ramos, & turn paucifimos, divisos ac breves, unde in ipsius fastigio, quatuor seu plura nocantur /W, cum 8c conferrim fimiilque colleita, ac brevissimis innixa peciolis, magnitudine plus minus nucis aculeis, & c priusquam florem expandant rotunda, viridia, est mulcis squamulis in luteum ac pungentem aculeum definitibus composita; Flos ex plurimis flocculis atro-rubentibus, 8c ex ipsorum centra album ftamen preferentibus dense percipit junctis, nec ut in aliis Carduis dilatatis donec ficcati decidant constar. Semen densa ac alba involutum lanugine forma, colore ac magnitudine (nisi quod 5drotundius existat) perquam fimile est feminibus Cardui Leucoii folio. Tota planta reliquorum Carduorum odorem obinec, sapore est initio dulci, post amarorem relinquitur.

In umbrosis fylvis ultra Tufculanos agros extensis qua praefertim itur Lavicano Anagniam, Scareperit descriptionis autor Jo. Baptistas Trumfetti.

Accedit ad Carduum polyacanthum fecundum Ger. emac. quern nos pro Carduo acanthoide J. B. habuimus.

Pag. ? 14. Toft fecundam Jficiem adde,

Carduis Bat km jpinofij JimKS cchitio aculeis rigid is armato.

Exficcatum vidimus apud eruditissimum Virum I?. viuckny*

Tag. 117. 14. Tro fecunda specie Cardui stellati, ftu pro prim* varietate ponatar

1. Carduis JteUatns foliis integris ferratis Magnol. App. ad Botan. Monfp.

Difficil t praeipue a praecedente foliorum forma qua: in hoc integra sunt, cum in aliis Jofint valde distincta Invenit D. Tourmfirt juxta rivulum diditum Vtfirt inter Cndiac & L Vauvrt.

Tag. 311. Toft ficindam Cyanifyec'wn pro tertia interferatur

\$. Cyanus Centaurwidts fruticefcens Lavandula folio cap. B.Sp. Breyn. Faffic.

Breyn.

Frutex mihi videtur lignosus quantum ex ramis miffis augurari licuit. Hi quadrati, Jignofi, necnon incani sunt, binis alternatim ramis. Foiwla Lavendulx hand diffimilia fed breviora cregionententibus praediti: quorum fummitatibus capitula etiam ex adverfo bina innata, haud crassaj pollicem tranverfium longa, lacis incanarum squamularum 8c membranacearum squamulis, Caryophylli ipiaci Aldini calyculorum de more, imbnataj ftaminulis referta Serratuls familibus quorum color me later. Semen magnum, oblongum, pills molliuscilis argenreo colore flendentibus hirsutis, lojiffimis que in modum Stobes Rolmarini foliis Pona:, Ted ad phoeniceuin cendentibus

Tag. Ibid' Pro tertia Cyani specie intrpatur

4. Cyanus major Alpiwsfoliis meisis TriurnfettK

Triumpf.

E radice carnosa, cinerea, palmum circiter longa, infra digitum caestitiam, in minores barbulis praeditas divisa, guftu [ubadfringence, manlu mucofa. Mardo mense plura exeunt /a, denfblictrc brevi roinento ipsa cooperiente Candida, primò exeuntia ad Cyani majoris vulg formam accedenna, nunc acutiora, digitum circiter longa, vix unciam lata; succedentia, tantum praeditis (ut plerumque solent) majora, verum etiam tibus, quinque vel inciluns dilhntla. E medio foliorum caestice circa Aprilis incia tenuis feel lignolus accollitur palmarem circiter longitudinem obinens, quandoque ramofis, externis ftriarus, at angultioribus iniugnicus, quae nullo pediculo caulem ainplexantes, alatum quodanum lint, prxlertini qua: Horibus (unt viciniore, quibus etiam lacinix defunc In apenuncur inagnitudine, forma 6ccolore Cyani majoris vulgaris, uti est Kjemem

tabeaftis fubfequens. Radice Bcfoliis perennat, non tamen ferpit more Cyani viiJgaris. Humore nimio CDrumpitur-

Sapore eft amaro, & odpremveluti Cinara inter manducandumreddit. Folia acie cujtelli fcarificata vulneribus etiam majoribus applicita intra dici fpatium eadem ad cicatricem perduCunt-

In altiffimo afperrimoque illo Aprutii monte, (quern vulgus Hortum Centami nominat) ab Auftore primitus reperta eft haze planta.

Far. 323. Toft lin. feptimam interfrantur

7. *Cyanix Orhntalis altzr ftu Conftantinoplytanus flvrt fiflulofo candicante* Hoit. Reg. Parif Herman.

Hort. Leyd.

Idmfiftulofo purpurto flore coruhdem.

Idem flore luteo jiftulofo* Dodait. Mem. Herman. Cat. Lugd. Bat. *Hujm fttcimm ad me miji*

D. Doody-

Tag. 519. *Adfimm Cap. XIII- pro 31. jptdz Jacex addatur*

%I. *facva luua Crztkafvliis Uinzrari** Declare. Mem.

Tag. 525. lin. 16* *add. Htknium Indizwn flore & famine maximis ferentt* Herm. Cat.

~Pag. 3? 6. *adfimm Cap. I. pro quintafpzcie addatur,*

5. *Admium Indieum flore & femm maximis prenz* Herman. Hart. Leyd.

5. *Admium Indieum flore & femm maximis prenz* Herman. Hart. Leyd.

18. *Calendula minor arwnfis & quarta Calendula fpeciebus addantur*

g. *Calendula minor arwnfis Hispanica* Hermali. Cat. Hort. Lugd. Bat.

Minore arvenfi gracilior Bchumilior eft; quotannis ritu congenerum ex femine deciduo propululans.

4. *Calendula humilis Africana flore intus albo foris violaceofimplici* Herman. Cat. Hort. Leyd.

Htrm.

Sequentes pDius florum & feminum difpoficionemj quam foliorum cacterarumque partium affinica-tem Cabndulis inferendam cenfuimus hanc plantam. Mittit ab albente radice caulmdos multos ramofDS, dodrantem raro fupcrantes, nunc erectos^ nunc redinatios; Folia pingua, craffiulhila, glabra, aliquot launiis incila, Erucac maritimsc non adeo dilparia. Flores in ramulorum fummitate petahs fimplicibiiSj Calendula vulgari longioribusj intus lafteis; extusviolaceis, ad folem radiatsc ftella; in modum expans^ crteroquei clausis, ad fe collectisj Be in gyrum revolutis, medLim occupantc orbiculo crocsDj aliquot purpuru-nigricancibus granulis^ in tenuiffimos villos fatifuentibus inTperlb. *Seminan*Az; in parvis capitulis difpofita^ ritu Calendula duplicis fpeciei; alia orbiculata^ inenibranceaj compreffa inllar Oreofelini Cluf. coloris dilute caftanei; alia quae his eleganti ordine interjacent teretia, fpadiceo-fufca, ftiperficie granulaca. Utraque Focundicatem probantfuopartUj quem vel Autumnodeciduaj vel Vere ftudio fata feliciter excludunc.

Alumna eft aridorum collium ad Promont. B. fpei, culturae liib noftro climate patientiflitna. Ejus faporpercipitur fatuus, aliquando fubamaricans; odor medii difci crocinus debilis.

HLIUS plants fpecimen ad memilit D. Vzttivzr Pharmacopoeus Londinenfis ReiBotanics appri-tnb gnarus.

Eadein pag. Fro Urtia Cbryfanthemij fpecie addatur

3. *Chryfanthzum Afleris facie, foliis ad florem rigidis>florz minore clatu/s* Herm. App.

4. *Idem flore minimv humilius* Ejufdem.

Herm.

Prius erigit caules pedales, aliquando altiores, rigidoSj duros, ramufos^ tenui tomento obfcoSj q^i bushirentfolia, Aferi (tipino Clufii paria, rigida, deorliim iiflexa, medio nervo inbrevem aculeum abuncnte- Flores fert Bellidis minores, luteos, radiates, difcoides, denis foliis fupradidtis fimilibus, nuinqe majoribus, totid^mqe minoribus circumvallatos. Difco niarcefcente denuunt *famina*, exi- fua, iifcaj folidaj ex quibus planta renovatur. Huic fimile eft polterius, aft humilius Be omnibus partibus minus.

j>afm 2iq. L 66. Pro Urtia Cbryfanthzmi \$ trie intzrfrratur

%I. *Cbryfanthemum Canadenfe Rapunculi radice, ftumofum vulgl* Herman. Cat. Leyd.

Herm.

Multis firmatur radicebus, albis^ carnofis, fufiformibus, Rapunculo aut Afphodelohaud difparibus, qux vaults attollunt qyamplures, novem decemve pedum altitudine, rocundos, alperos, nonmhil hir- fudS Be ftriacosj in nuinerosos ramos fubdivifos. Hos fine ordine cingunt folia palmam longa, pol- licem Be amplius lataj in acumen definentia, afpera, atroviridia, per ambitum leviter crenata. Ra- morum cacumina occupant?orw lucei colymboli, Chryianthemo Canadenli humiliori (imillini, nifi nuod petala dduitiis flavescant, in mucronem bifidum terminantur^ Be foliola flon fubfrata longius -roducantur. His fatifcentibus fuccedunt/^w/w^ angubfa ritu affinium. Radices fubamarum, aro- maticum, non ingratum habentes iaporem à Canadeniibus parantur in fercula, velut ab Europxis

Rapuncu i j Rapuncu i L. 7.

Tag. 40 ^ I' -ddee

pH§ adhucaifiseChryfanchemirceetumfpeBiff a C.B. ptoyonuntur, nimirrtn.

I. *Bittis lutea foliis profundè incis minor* C. B. *Lhryfanthemum minus* Cam. ep.

Hanc J. Bauhinus ad Chryfan themum fuum maj us folio valde laciniato, florecroceo refert,

i. *Bettis lutea foliis subrotundis* C. B.

Quam D. Hermannus eandem facit cum Chryfan the/no folio minus feito glauco J. R. quod nobis non probatur. Ex fynonymis enim Sc ex defcriptione patet, Chryf folio minus feito, &c. eandem effe plantam cum Chryfanthemum fegetum nostrate, hoc feft, cum Bellide lutea fol. profundè incis majors C. B. quamvis non fim nefcius compilatores Hift. Ebrodunenfis Bdlidem illam aliò referre.

De hisnobis nondum fatiffatum, eft. D. Hermannus in Catalogo Horti Lugd. Bat. tres recentef Be diftinguit fpecies Chryfanthemum folio glauco a Crericis Chryfanthemis diftintas.

Fag. 341. Chryfan themum noftruin oftavum feu Alpinum fecundum Cluffi ex obfervations D. Leonardi Plucknzt M. D. Londinenfis femina producit pappofa, ideoque ad Afteres transferendūm eft.

Fag. 541- Adfinem Cap. IV. de Chryfanthemis add.

I;. *Chryfanthemum Peruvianum flare albo* Catal. Lipfienfis Amman.

14. *Chryfanthemum Virginianum Platani folio* Hort. Oxon. *Utrumque vidimus apud eundem periti.* J. f. W. But ante um & mfignem medivum D- Plucknet.

If. *Chryfanthemum Americanum Scrophularidifolio* Ejufdem.

Pag, 544. Ad fimm pajrime addatur,

Tarmica Alpina Matricaria foliv' Triumphetti.

Hanc plantam *Carymbifera Roxburghii Uefoliumbtttd, folio alato & laciniato eandem esse mihi persuadere*, quamvis nee figura ejus, nee defcriptio in Dmnibus conveniunt plantis noftrac: namq; foliorum lacinia: obtufiores iunt, deinde caulis interne medullofus, *turnfolia* in nodis, e quibus alter erumpit ficulus communiter majora funt reliquis inferiorum nodorum e quibus ramuli alter exeunt: tandem flores quamvis integri naribus admoti nullum fenfibilem odorem exhalent, triti ramum Agratum redolent aut potius fnaviorem odorem florum Ptarmicæ prioris *Matth.* emittunt. Quæ in noftra non obfervantur: in reliquis convenire videntur.

ND5 etiam pmoafpefti Ptarmicam folio alato plantam noftram denominavimus: yerum portus animadvertentes eam odore & sapore carere foliaque profere alata U laciniata Matricariæ fere in fructu differentiam mutavimus.

Pag. 346. //».ii. *pafi vtrb'aiUa* Hort. Blac adds BDtan. Monfp. *MtUf odoratum minus album* Monfpdenfium DodaiT. Mem. ubi plenejus defcriptionem vide.

Paf. 346. //».ii. pafi vtrb'aiUa Hort. Blac adds BDtan. Monfp. *MtUf odoratum minus album* Monfpdenfium DodaiT. Mem. ubi plenejus defcriptionem vide.

Frutex corymbiferus Afrkanm Chryfanthemuli Ericoidis facie, fioribus Globularite Breyii. f. f. f.

Breyii.

Frutex eft Jignofus, ramis compkiribus, cortice ex obfletopurpurafcente fufci colons testis: quorum juniDres Chryfanthemuli Ericoidis defcripti adeò fimiles, iidemque ftipatifoliis utnon faciù ab UD diftingui pollint. Flores ramulorum extremitates lutei occupant Tanaceti infarflorunq; quahijiumbdlam dilix)fiti, orbiculares oninino Globulanx feu AphyllanridisHerbariorum perbell referentes, minores quidem & L ex tubulis minutifGmis quinquepartitis dense admodum conflata fed em fuamniinutillimDinfndLi fixam tenentibus: quern propter immaturitatem exilitat, fortu a examinare mihi non cncceffij an vuluti Cupi elto-pinuli feminum pericarpia concavus BcfmefinfertL aut an ipfe Scm an illud. Quicquid vero fir, five fructus five *icmsn*, certo certius illud cõtem pxnequo Abfinthii femem mocbc nciæ involutum lanugini obfervatur.

Pag. 3fo. Ad fimm Cap. I. de Bellide minor e adde,

Bellid minima annua Triumphetti.

Triumpf.

Februano labente in confpeftum (e prodens iemiunciali circiter *radict* nititij cortice albo te indutaj fe ex paucis fibris tenuiora aliquot capillamenta mittentibus coagmentata, qua: *fforx* fiipern in emlem ac breviflimum veluci truncum albi colons definentes ba⁹ effbrmantibus pluibibus/WA dilute virentibus, acfimul nicidis, luccofis, nervum oftibus jovali formã, extreme l orundioribus, levitã crenacis magnitudine unguis minimi digiti dineciruircrfemiiJituliinclufpediculD, pjllidioris colons, breviflimis acariDnbuspilis ter Folia ad parvi iligiii alcitiidincm alTurgit *caulnulus* eredes, fragilis, licet capillaribus nervulis fubftanna apparentur Larriiagina compofirus, nee vulgar! fib crafljor, ino interne a r terriãveib tcnuidimã ac rubra qikxlammi d'ij circumleptus membrana; ab eodem ver infra di era tum quaruoraiirplura inordinare *exeunt folia*, abinfimis quoad folam paivitarem di que in ejuklem lummitate nonnihil Intiore intra calycem ex duodecim viridancibus cri fitrudLim unicus?Diapent L bic totius plantar latiDnevaldLinfignis, difcum ufteiuans am inginra anguftirriualbilque pulvis circumdatum, qua: ad differentiam Bellidis min lion in duplicem, ac unicum diJixinuntiu Ryrum, neciion longiora exiftunt quam in flori iinxcdens nimiiDum, cincrei colony ublogiuuii furma: at; Ikllklis prardirti nun. vulg. «

Inlocis Romzvicinis prafertim aridis Beincultis Sc arvis reftibilibus .mira fecunditate
Februario Sc Martio rbrens, brevique ex toto deperditur.

BeUis montana graminisfoliis Magnol. App.

Radix vivax eft, fibrpfa c qua plurima prodeunt *folia*, longa, angufta Be graminea; leviter versus
extremum crenata, ngidmcula. *Zaules* font fefquipedales, in quibus *folia* line ordine aliis aneuff
ora villaş quoidam pro denticulis habent. *Flos* in quolibet cauls unicus cum umbone luteo plurtimis
petahs albis cinfto. Ontur in planitie montis *Serane* 6c Maio floret

Tag. % \$ l. lin. 18. adde;

BtUif Alpina major rigido folio brevior & latiore Herman. Cat. Lcyd.

Pracsdente humilior eft 8c tenerior, foliis latioribus, brevioribu^magisreflexis: Floribus minori-
bus. Floret in hybernaculo tota hyeme.

Bella montana major foliis Chryfanthemi Cretici angufiioribus Magn. App.

Magn.

Radix fibrolie perennes plurimps *caules* producunt, cubitales, friatos, in ramulos divifos *Folia*
fecundum ramulos in profundas laciniis divilk funt, 8c variè diflefa. Extremis ramulis *flos* ma^Bh^Us
infidet, cujuspars inferior ex plurimis foliolisviridibus fquamatim difpofitis componitur. Ambfinc
umbonem luteum plufquam triginta petala alba, in extremitate leviter ferrata *Semen* habet alia
rum more. Florencem invenic Julio menfe in depreffis BcFerèinacceffislocis montis Calcaris in 1^
co difto *Barroc* juxta. fluvium delcnpionis autor *F. Magnol.* *ow.

Bella Americana fruticefcens ramsfa.

Hanc exficcatam vidimus apud *D.Plucknet*. Ejufdemqueramulum.ad nos mifit *D.Boody*. Caula
firmo Be ngido effe videtur, fumma parte ramofo, crebris foliis anguftis, oblongis utraque^ extremitate
acutis, denticulisranoribus ad margines obiter incifis veftito. Ramulum unumquem, uc Be uau-
lem medium cerminat flos albus umbone luteo.

Triumpf.

Buſththalmum Alpinum flore candido Triumpfetti.

Radix hgnoa multis ae gracilibus barbulis capillata, talam etiam fcabritiem po/lidet, ut nodulk
undequaquereferta videatur, f^adicei coloris, inodora acferè infipida ex feipfa emittit quandam di-
gitalis trunci . fut italoquar) portionem, in cujus fummodenfi germinant o/iorww celpites auorum d
quandoque aliqui terram attigerint facile produftis radicularum fibris cidem implantantur: hDCDafio
plancam quodammodo repentem, ipfiq, quandam perennitatem reddentes. *Folia* ipfa forma colore
odDreacraporeiisBiiphthalmivulg. *Matth.* omninofamilia verum triph majora. Adventante Tunio
c finguis fere celpit.bus praediftis refti, ramofi ac fragiles aflurgunt *caules*, confirmQibus veftiti foHis
Jed proportionahter minonbus: in caulium acramufculorum faftigio *capitulum* fquamofum protube-
rat, coloreprscer obfeurum fquamularum limbum ex toto viridi; quo *ib* aperients/^ emuat difcum
ex lutcis ftamimbus gompoftum habensj Sc fxpius i± albis Details rirTm A M L n d L u » curu
ns: fbminis panter forma cum illo convenit, at magnitudo minor Sc magis Candidas color

In Alpibus Caftilionenfibus Autumno obfervavic Auftor nofter caulibus vix palmo altioribus fe
minime ramolis: verum in monte *Cavi* prope Albanum xftivis menfibz caulibus cubito altiorib^{Locus}
Be in quamplunmo5 ramulos divifis.

Tag. ;57- *Im.iz. Inter varietates Matrkari* recenftnda* whit *Matrkaria fylveftre* flore
qua: in Hort. Lugd. Bat. a *D. Htrwanno* colitur. In fyljijs caduis reperijeribit Tab.

Pag. ^u. *Adfinem* Cap.I. it *Abrotanofoemina* adde *Jpecks feyuzntes.*

Abrotanum foemina foliis Crichmi D.Fagon. *Hort. Rzgm Parif.*

Abrotanum fcemina foliis Roris marini tocis viridibus D.Fagon *ejufdem.* An *Abrot.foem.* ó. Clufi?

Abrotanum fcemina degeiier ex *Abrotani feminz viridis femine* Wore pallido *ejufdew.*

Habm cCatalogo M.S. piantamm Horti praediftinondum editaium a *D. Tamred. Rubinfon & a*
D.Hanf. Sloan communicate.

Abrotanum faemina canefcens foliis Stochadis citrinx *Brey. Trod.*

Pag. 361. lin. 34. *WSfimm* Cap. II. dt *Eupatorio Cannabino* addt,

4. *Eupatorium aquaticum Americanum* Park. *Chryfanthenium Qannabinum Amzrhanutn Wloni.* prxl.

Anoftrate difcretu facile eft: *quippzcaules* editquadripedalesjffubrubsntes, firmiores6creftiores.
Flofculos ex mulcis ftaminulis luteis conflatos habet, Bc/ewiw^bidentia vulgaiis *Chrylanthemi canna-*
bini feminibus multb majora, veftibus pariter adha^rentJa. Addit *ParJunfbus* caulem ab jmo ftatim
ramulos longos crebros emittere. *Folia* ima quinquepartita eIts, fupei^iora in cauls iriparcita- Cau-
lemad quinque aiu fex pedum ahitudinem aflurgere.

f. *Lbryfantbemum aquaticum foliis multifidis Cicuta nonnihil fimilibus* Herman. Cat. Holt-Lugd. Bar.

Herm.

Fibris radicatorum numcrofis, pallidis: *Caules* tolht tripedales, aliquando akiore5, ramofos, glabroSj quadrangulos, geniculacos, fubmde ex vindi rubentes. *Folia* ad nngulos nodos promit bina ex adverb, miikifidci, Cicuta? nonnihilfamilia, aft minora & C robuftiDra. Fl ores infi dent ramorum faftigiis, diTcoides, vix radiati, Chryfanthemo Cannabino Americano duplo minores, parte extima mulcis viridantibus foliolis fquamarum inftar obvallati, media vero orbe ex minutis aurejs fitfulofis tubulis, apicibus fufcos exferentibus compafti: *femina* fuccedunt oblonga^ deprefla alpera, in duns apices dejincncia more hujus generis reliquorum.

7. *Eufatorium cannabinum Jazobaa foliis Virginianum.* Item 8. *Eup. Americanum, caule incam> floreareoj umbom wzrrimo. Utriusque ffitctm Jiccum apud D. Plucknet 'vidimus.*

Fajr. ^*(yim Ad fimm Zap. IV. De Bellidz flore lutzto nudo* ~~addit~~
Btlts Africana capitulo afhylo luteo, foliis & caulidias juncta trettis Herman. Cat- Leyd.

* *Ubryfantje-* > *jata* eft ex feminibus *Borne fpei,* priori fimilis eft foliis & cauliculis tenuioribus ereftis ~~et~~ ~~addit~~
mum CapB. ~~cbjs:~~ *Sapore* ^ odore veluci praeueilens fatuo.

Sp. rep ens
flvrc aphylo
*Breyn. **g-* 5 04-

<J?art* *Agzrati fpeciei bac fynonyma ad a ant ur.*
Hzhchryfum Afrkanum modurum glabrum Magnol App. *Elkhryfum inodorum glahrum* ~~Carney~~
folio annuum Magnoli Herman. Hort. Leyd. *Vbryfanthemum corymbiferum Africanu* ~~Trium-~~
fetti, a cujus defcriptione nofiram fupplr.

Radix circiter felnpalmaris^ intorta, gracilis, plurimifqus tortuofis capillata fibrillis, fibtanfia ~~cap~~
~~rosa~~ *Bi alba* ~~3~~ *ftiperque ejufdem radicis indivifiim capuc* ~~cedi~~ ~~fi~~ ~~in~~ ~~breves~~ ~~quandoque~~ ~~ac~~ ~~tere~~ ~~len~~ ~~p~~
cruneos multiplicetur. Foliorum ~~idngkudo~~ *maxima vix unriam squat nee laticudo illam patvi &*
gici lupcrat eciam qua laciffima tuat versus apices. [Magnitude pro loco aut folo variat.]

Tag. 569. l. 29. pro duodtama fpecie Abfinthii intrfvratur
Abjinthium Santovkum Gallic urn C. B. Magnol. App-

In noftro litore [inquit D. M.ignol] frequens eft, cum Seriphio Gallico permixtum ; ~~a~~ ~~quo~~ ~~quod~~
cile diftinguicur ex eo quod folia longiora*, latiora & c minus diflefta habfar.

Tag. 571. pofi tertiam [ptcizm add.
Abrotanum mas ex Surinam molli birfutiz camfcens, ex borto Fagdiano D. PluckneL
F. 372. 5- Abrutanum campztri fimileM Tingitantm Herman- Cat. Hort. Leyd.

Forma Sc crefcendi modo Abrotano campeftri vulgari fimile eft, odoris Be faporis aromaticin^J?
omnino expers, ubi vero adoleverit acquirir virguha magis lignofa Be fruticofa. SummKates w"
co/i lunr. Folja tenuiora, hilari virore nirenria, inferiora utpluimum trilobata, fuperiorainceigt³
Scmina ^xigua cinereo-lpadicea, more congenemm. Londini in hortis colitur. *Ramuli* florifei¹¹¹
irequentiDi es /urculos dividuntur quam in vulgari Abi ocano campeftri-

F. 57], Ad fimm Capitis de Artemifia aAde, Moxam tarn celebrem in curatione poctagrtf P^{er}
uftioncni nihil aliud effe quam Molluginem Artemifix offendimr in Ephem. German. Ann. "
Ob/. 6. Recipiancur folia Arremilii. Exllccata probe Et cauJeluo decrpta conteranturmanibus co³
nJq, donee excuifo pulvillo viridi lanuginolx inciores fibrxveliit Jutegnurn lubftrarxremanean[^]
Sin ma defiant odore mantis repetendum opus eft ad ddiJ^iataJii tenerirudinein. Joan- H²maiiv⁶
Kornmann. Vide obfervationcm.

Tag. 378. fro IJ. Scabiofe fpzcie intrpgnatur
l j. Scabiofa fteUata annua prolifera Dodart. mem.

¹⁸ ~~18-~~ *Scabiofa altiffima annua folttis Agrimonix nvnnil filimibus* Hfennan. Cat- Hort.Leyd-

SupiM viri altitudinem affiirgit *cauhbfts* rotundis, tavis, genioilaris, pilofis., ramofis quibus a ~~h~~ ~~11~~
gula ~~genicLila~~ *harrcjit folia* bina ex adveifo, pinnata, crenata initar foMfcum A grim on¹ ~~3~~ ~~is~~
liihil liirliita. Summis ramis inhdent capicula ex ~~n~~ ~~v~~ ~~is~~ *fiofculis* pentapetaloJBD- compo^{11W*} ~~»~~ ~~J~~ ~~n~~ ~~ab-~~
iubjiciuntur /w^i oblonga, parva, infummo umbilicata feu ftellata ntu congenerum- ~~Ra~~ ~~m~~
eft albi, Jignoli, fibrofa, annua.

Tag. 5 Bo. pro iz & 25. Scabiofa fpecie intrfzrantur
11. Sufcifa Alp ina Globulanx fyltis Triumfetti.

Triumf

Singulis hujus generis ~~plantae in fucondiffimus foliorum~~ ~~luis~~ ~~perinde,~~ ~~quoniam~~ ~~circiter~~ ~~longis,~~ ~~in-~~
ftiLidoiLim propagaiiur ~~cauhbfts,~~ ~~Et~~ ~~folia~~ ~~quidem~~ ~~magnitudine~~ ~~ac~~ ~~forma~~ ~~folijs~~ ~~Globulariae~~ ~~ten~~ ~~Bul-~~
lidis ccerulea; omnino ~~correfpondent,~~ ~~verum~~ ~~erat~~ ~~Bura~~ ~~exiftunt,~~ ~~multifque~~ ~~arantur~~ ~~lucis~~ ~~aut~~ ~~comple-~~
cais ~~venis,~~ ~~li~~ ~~illam~~ ~~per~~ ~~radicem~~ ~~ipforum~~ ~~longitudinem~~ ~~excurrentem~~ ~~excipiat,~~ ~~colore~~ ~~viridi~~ ~~plene-~~
denis, ~~lapore~~ ~~clarato.~~ ~~Non~~ ~~radice~~ ~~tabium~~ ~~percrenat~~ ~~haec~~ ~~planta,~~ ~~fed~~ ~~erat~~ ~~per~~ ~~hyemem~~ ~~folia~~ ~~re-~~
ciner/

tinet, quamvis ifta vario tempore variant inter fe: nam Vere alia habentur dentata, alia etiam laciniata, aft recurrente Autumno his omnibus parita fe exuens nova omnino integra induit. Miiio menfe e fingulis cerpitibus gorminant unus, interdum plures *cauliculi*, ima parte ratnofij herbacci, tene* neri, laeves, longitudine drdter digitali, uno, vel ad funnum diiplici nodo diftindtij quibus utring. ad latus bina folia nullo ediculo hasrentj a (uperius expofitis longe diverfaj utpote profundè laciniata inftrar foliorum Scabiolae calidartum regionum. Singulis cauliculorum ac rariulorum apicibus flog infidet, vulgaris Succifac flore amplior, formà tamen nullateris difcrepans, colore aljquantuluny dariore donatus: quibus delapfis hiipida emergunt *capitula*, *femz*n valde exiguum continencia, oblongum, angulotum, hirtutum, dnerei colons, quini, in (iimmo apicibus veluti coronatum : *Radix* fufci eft coloris, craffioris lubftantiae, ac in multas fibras dilcindkur (c brevi ac ferè ncdofb trunco provenientes) & fui extremo indudta veluti carie contabelcens.

In falebrofis ni^difque celebrem Centauri hortum drcumvallantibus jugis ab Autore defcriptiDnis reperta eft.

Tag. eadem* Ad finem pagina adde,

Climpidium Virginianum anguifolium flore luteo Herman- Hort. Leyd.

Herm.

Caulibus exit humilioribus K gradlioribus: Foliis anguftioribus, pallidioribusj contadtu niollioribus & odoratoribus: Floribus in caulis faftigio paucionibus, tenerioribus^ flavefcentibus. Cxteris partibus Canadenfi fimillimis.

a3. *Succifa anguifolia faluftrv* Triumphetti.

Triumpf.

E radice nonnihil corrofa aliquot parum craffis product veluti truncos virides, herbaceo mutiitos cortice, nonnullifque albis carnofis fibris barbatoSj qui reipla aliud non fiintquam infimae caulium partes, qua: dum ip(i magis protenduntur, deperAtis foliis novas radicum barbuas lupur humum effundunt, haud difpari ritu ac in Millefoliis, Ageratis & familibus. Ab his vero infimis caulium partibus Veris tempore plura exeunt velut in gyrum expanfa/o/w fuis innixa pediculis, longitudins (inckifis etiam pediculis^) fequipalmarij at laticudine drciter femundali. *Flora* quam in vulgari Succifa dimidio minores obfervantur: In reliquis cum ea plane convenit, uti turn defcriptiOj rum figura oftendit.

C^terum arefcentibus floribus hiipida fuccedunt *capitula*, *femen* valde exiguum, ovale, aeruginè coloris; ac glabra continentia, nsutiquam illi ablilmilequod in tertia Scabiola Cludi conpicitur.

Tota planta perenniter durat, uliginofa loca ac umoras expetit.

Tag. 381. *Scabiola [peuzibus adde, Scabiofam foliis Diplaci.*

Icem, Sucdlam angudifoliam Alpinam. Qusnomina in Catalogis plantarum ad me tranfmiffis Invenio-

Tag. 585. *Fro fzxta Eryngii fpecie inUrp matur*

6. *Eryngium Amerikanum fetidum, Itubu Surinamenfibis* Herman. Hort. Leyd.

Herman.

tedis altitudinem nonnunquam Itiperat Eryngio montatio pumilo C. B_m J_m B. non multum diftiiiile. Nititur raduculis tenuibus, fibrofis, paliidè flavefcentibus; *caulibus* ternis quaternilve, viridantibus, redtis, firmis, ftriatis, in frequences rarios divaricatis: quibus infident capicula oblonga, echinata, herbacea, Pyllicraffitie, fubtLts aliquot rigidis aculeatis foliis drcumvallata. Intra echinos capitulorum abfconduntur *flosculi* exigui, pallidij vix confpicui, fktifcentes in *femina* parva^ (us fortis paria. Folia circa radicem humi procumbuntj in orbem digefta, digiti longitudinem Sc^litudinem aliquando excedentia, molliora^ obtufa, in ambitu crenata, fingulis creni^ ill mdlleculas fpinas definentibus. Aft quacaulium geniculis per intervalla adnafcuntur iunt rigidiora, mucronata 8c laciniata, marginibus profundius lerratis 8c robuftioribus acubis armatis. Tota planta eft ingrati fragrantis odorisj ad Coriandri recentioris folia accedentis j guftus verò acris Be fubdulds.

Surinamenfibis audic *Itubu*, id eft, fuga ferpentum, eo quod Eryngii hujus auram ferpentes fugiant, nee eo loci quo geryn^nat unquam reperiantur. Ob falem volatilem quern obtinet reponitur ab Americanis inter Alexipharmaca praftantiffima. In uteri vitiis tantx efficaciae eft, ut folus odor naribus exceptus hyfterica pa(Tions correptas relictusre valeat.

J>ag. 590. pro quart a Valerian* fpecie interponatur

11. *Vahriana Cacalix folio Alpin** D. Fagon. Hort. Reg. Paris inter nvdum edit as.

P*g- 299- Line* 19 & j^D- deleantur: Revoco enim quac ibi difta funt, & (ententiam muto, nsc genere rantum cig^ Admirabili Perfiviana plantam hanc convenire, fed Be fpecie quoque cum D. Hermanno exiftiW): Nee obftat foliorum hirtucies, nam ut obfervavit perfpicaciffimus * F. * N_m in Columna, id evenire poteft loci varietate : Nam Cichoreum dulce (inquit) a nobis propofitum in montano naicali loco & frigido hirtutum eft admodum, tranflatum Be cultum Neapoli omnem hirtutem depofiiit. Sic etiam in Sanguiforba 6c aliis obfervatur, Be in maritima Braffica oleracea. PoC lime etiam flores tubi longitudine variare.

-p_g% AOI. l. 6- pro nona Eupatorii fpecie adde,

9. *Eupatorium Indicum flore albo* Bartholin. Aft. Meet.¹

Pag. 401. pro quint a TimpinelU fpecie interferatur

7. *Ptimpnella Afrhana maxima fatida* Hermanni. *Siccami nobis exhibuit* D. Plucknet.

Pag. 44 add. *Szfelivyrznaicum Thaffix folio* D. Plucknet post *Sefeli Majffilimfe**
Vg. 421. Ad firmn Cap. XIII. de *Ferula addantur species fequentes.*

Ferula lucido & crispo folio D. Lock Holt. Reg. Paris
Ferula folio latiffimo D. Fagon ejufdem.

E Catalogo Plantarum Hort. Reg. Paris. nondum editarum ad me tranfmiffo a D. Tancnd. Ro*
binjon.

Pag. 417. Ad firmn Cap. II. de *Laferpitio addantur ha species.*

Laferpitium umbella contrafta 6c D. FagDn Hort. Reg. Paris.
Laferpitium foetidum folio ffagili Be angulofo D. Fagon ejufdem.
Laferpitium anguftifolium non finuatum ejufdem.

Habui è Catalogo proximo difto.

Laferpitio Lobelii fimilis anguftifolia J. B.

In horto Rnbini Lutetian vidic J. B. Robinus autem fibimiflam affirtabat nomine Dauci mon-
tani.

Pag. 419. Ad firmn paging & Cap. IV. de *dzutaria adde,*
4. *Cicutaria LaJJubica ThyJJ'dini folio* Breyn. Prod.

Breyn.

Planta eft cubitalis, caule refto, ftnato: foliis Thyffiblini, fed minoribus minutiusque differs:
Umbella alba & denfa, feminefriato *Cicutaria: fatuac Lob.* fimili.

Locus.

In *Caftubi* montibus atque dumetis lylvarumque marginibus ubique ferè nascitur.

Pajr. 451. Specierum Myrrhidis quarta Sc quinta: pleniores defenptiones habentur in *Morifi**.
TJmbellif p. 66, 67. Ubi pofteriDres hujus gñas tradit varietates, Altcrum foliis hirlutioribus, femini-
bus lungionibus; Altcrum foliis hirtutiflimis, Femibus longis fubli/bis.

f^p-4^5- Ad firmn *Capita dt Mzo adde* Meum lacifolium adulcerinum longiori folio D. Twr-
nefortii.

Tag. 4^6. lin. 11. Add. *Angelica Acadienfis flore luteo* Dodart. mem.

Radix ei nigra efl & denfabris confertis, plures emitcens caules, ftriaros, angulorD5, altitudinefc''
quipalmarcSj mfenus vestrims pediculis quibusdam, origine lua membranaceis, progreflii tnguanu^
excremo in tres pediculos lubdivifis, quorum medius quinque fuffinet folia denticulata, reliqui duo
tna tantum. Caulium nonnulli ramulos ex alis foliorum emittunt. Singuli autem caules K ra-
muli faftigio /uo ge/lant umbelJam pluribus fafculis flofculorum minimorum, hueorum pentape-
tal >n compoifitam. Petala autem pericarpio viridi acicula: capitelli magnitudine Innakuntur. S^d''
f97/Wintu5 duo vel Cria viridin. apices lutos fuffinent. Flore prsterito perficiuntur *strnina*, per nil''
turitatem brunnea, ftnat^ Can feminibus iatis familia.

Tota planta aens eft, amara 6c aromatica, odore ab *Angelicac communis* multum diffrente. Vi-
vax eft, non ccllat fzntn producere quemadinodum *Angelica vulgaris*, *Afi Angelica vulgaris* f^r''
ojuam fermlfemen per fe feczrit radizitus intent. Allata eft ad nos (inquir) à D. Richer, à Rege niu-
lb in *Acadiam* Bè' *Cayennam*.

Fag. 44^-. *Planta* iw agro *Cmbrabright*. à obrervatifj quAm pro> fimpllielTa, "Saxifraga media j.B.
habuimu5, cadem videcur Apio. petrso five monuano albo J.B. p.465. delcripto, ut ex planta e
Iemine orca Sc in horto cuha didicimus. Caulis etiam altitudo defenptioni J. Bauhini reipondet.

Pag. 446. lin. 26. Ad firmn *capitis de Pimpinella Saxifraga adde,*

Hrc'planta a D. *Magnol* III Append. ad Bbtan. Monlpcl- fub titulo *Pirpimlla Saxifraga* ~~maxi-~~
nine Amzricana: fie dL'fcuibkurj

*Radice*m habet craflam, in plurima capita divi/am; *folia* *Pimpinella:*, lobata, led latbra, a^d Pa-
Itinaçam lylvcfticm Utifuliam accedentia, ferrata, /upra glauca, fubtus leviter pilola- *Caule*m crf-
gic bicubitalem Sc tricubitalem, quafi Junceum, in multus ram05 divifum j ad quorum articul^ ori''
cur *folium* parvum, longum. Vmbztt* conpluciantur plurimxj parvaE pro planrx magnitudine, qui
componunc capitula lutea cum *ftaminibus* albis. Succedunt *Jtmina*, bina fimul ut in *Pimpinella* Sa-
xifraga, led imjora.

Ex infula *Tabaco* naftus eft-

Pag. 44B. Pro *tertia Apri fpeciez interpmatur*^

; *Apium faluftre minus zauluulv frocumbentibus ad alas floridum* Herman. Cat. Hort. Leyd.
Herman.

Hoc piceilenti eftconforme; aft omnibus partibus minus & gracilius, *cauliculis* humi ~~procopit~~
centibui, alis quamplurimis donatis: ad quarum hiius oriatur parvx *HoiHfl*, albicantium ~~ambroz~~
quos excipiunc *femina* exigua, ftriata.

Luxunac Ji)cis unJnlii S£ aquoiis Bdgix: nee dubito quin K Anglix etiam, quamvis a no^^{is} ~~not~~
mis cuiofe /pc4ftantibu5 nondum fuerit animadverla.

4. *Apium paluftre fruticefcens flore am^hjffimo* Darthol Aft. Hofnian-

P-K-4?o- Add. 1. *Anifum Afruanum fruiizefzmi* D. PliiLkner.

P*g- 451. Im_m ^j. addt, Dcnnoxix Cicurx [erreltm viJi: longam cpiftolam' in Epnein' ~~Gzom.~~

An. 1 ^ . Dblerv. vi^.

Pf. 4J1. Ad firmn *paging aJJc*, Sclcli *Pyrcnaicu*in *Thapfix folio* D. Fagon. In ~~Catalogo non~~
duin eiiitaiujn huni Reg. Parili i D. Tancr. *Rvbinfm* aJ me tranfnullo.

Tag. 464. ad finem Cap. XVIII- add. Daucus Pyrenaicus Dctare Citri &. Fagon. ex eodem Catalogo.

Fag. 4.6^ / . x4- *M- Caulalis elegantiffima Pyrenaica D. Fagon. ex eodra Catalogo.

Tag. 476. fi». IX- «dde,

Taftinata Oenanthes folio Bocconi.

Bocç.

Folia huic Pimpinellae Saxifragx five Oenanthes non abfamilia. Cauks pedales, refti, ramofi: Umbellz magna aliarqm Paftinacarum tenuifoliarum more. Flores albi, quibus fucedum femina exigua, afpera feu potius villofa five hispida.

Suprà mures Leocætae urbis in Si: ill a invenit D. Boccone: neque enim in pratis aut fecus viarum margines cum ipontanea fylveftri feu tenuifolia nafcitur.

SufpicDr hanc eandem efle cum *Dauco fecundo Siculo Sophia folia* Zanoni fiiperiore capite defcripto, cujus femina à D. Boccone tranfmiffum.

Tag. 478. Ad finem. pagin*, & capitv I. aJJ*,

6- *Kubia quadrifolia aforrima lucida peregrina* Herman. Cat. Hort. Lugd. Bat.

Folia ex nigro virore lucent: flores aibicant, quos fingulos excipiunt baccx gsfm^lls nigrsc, cetera non differunt à vulgari.

7. *Aparim minima vel Rubia [axatilis minima* Magnol App.

Magn.

Planta eft pedalis, radices habens parvas, liibrubentes, quae plurimos ramuhs profert, quadratos, (iibrubentSSj afperos, ad quorum articulus folia fex vel feptem angufta^ brevia Sc acuminata^ radiatim difponuntur: pedicellis infident *flofcu*li herbacei, quibus fucedunt bina femina fimul unæta, nigricantia, oblonga, ex una parte concava. iEllice floret in atpens circa *la Vah*te Be *la Colombiere*. S^tis accedit ad Rubeolam faxatilem C. B. in prod, fed noftra non eft incana. Figura prima Rubia: angulofae afperse J. B. iftam optimè reprafentat.

Caapo tiragua Brafilianis Marcgr. *Rubia Brajilunfis fioribm vmicillatis albi's, maritima.*

Marcgr.

E radiee longaj intoita, lenta, exterius fufca, intus Candida multi enafcuntur caules, quadratij duorum aut trium digitorum intervallo, geniculati, oftodecim^viginti, 6c interdum plures digit, longij qui parcam cærac incumbunt, partim fe iurrigunt. Ad fingulos autem nodos adnafcuntur duo, cres, vel quatuor folia, figura 8c magnitudine Hyffopi, in as quails tamen magnitudinis. Quidam etiam caules hinc inde ramulos protrudunt ad nodos, eodem modo foliis veftitos. Caulis autem ramuli 6c fplia {lint pilofa, vindia, incana- In fummitate caulis &: fequidigitum fub ilia, 8c tali intervallo rurfus verfus inferiora verticillatim enafcuntur *flofcu*li, globuli luloni magnitudine, plurimi, albi, tetrapetali; Be prope quemhbet verticillum flofculorum bina foliola Hyffopi aemula. Pofl flofculos *cap-fu*U rotundx ftriats fequuntur, magnitudine Myrtillorum, in quibus femina. Planta hzc falii eft la-
purisj Be proinde Kali geniculatuin feu vitraria poteft appellari.

Frequens eft in locis arnofis maritimis, in mediterraneis autem nequaquam reperitur.

Reperitur Sc aliaejufdem fpecies, caule lignofbj foliis Rofmarini-

Ad Rubiam in nonnullis accedic^ non eft raraen vera & genuina R u b i a p u r i s i a .

Tag. 487. Ad fimm partis prima lib. decimi pro fecunda Specie Nafturtii Indici aJdafur

a- *Viola In die a fcandvns Nafturtii fapare maxima odorata* Herman. Cat. Hort. Leycl

Herman.

Sinquam amoenioris Florae tultonbus turn vanetate, turn infigni florum elegancia fepe commendavit planta, hsec profecto Nafturtii Indici nova fpecies eft. Multb feracior, 8c omnibus fuis partibus amplior eft Nafturtio Indico vulgari. Etenim e craffa, palhdaj repente, fibrofa radice admirabili fertilitate luxuriant, viticuli longiffimi, herbacei, fucculenti, glabri, qui vel fob incumbunt vel vicinos ftipites bacillofve complexibus fuis involvunt. Horum gnicula emittunt tortiles, fequidodrantales pediculos, fuftinentes folia orbiculata, peltata, hedera: infar angulofa, vulgari Nafturtio duplo ampliora, medio pallence umbone, cui pediculus inferitur, in aliquot coneolores radios ad ambitum ulque didufto. Ad finculas foliorum alas prodit alter peciolus brevior &: gracilior, qui terminatur in *fiorem* ampliffimum odoratum extu^ croceo, intus nunc cinnabarinD, nunc coccineo, nunc fimul ex utroque colore pulcherrime variegatD fiiperbientem, quem fi Solis radiis illuftratam mfpereris^racili hololericapube aurato pulvcre^ perfufa diceres interpolatum. Flos quinque contexitur jPblis, lefquipollce latioribus, quorum duo fuperiora furrefta c bafi angufta, coccineis fulgentibus vsrgulis ftinata (enlim in rotundam latitudinem expanduntur: tria inferiora fulciuntur anguftiffimo qraffiufculo. crocaco cervice Be ubi in latum orbeni fe diffindere incipiunt concoloribus ^ margines barbulis capillantur, unguibus holoiencia macula, modococcineaj modo intentius miniata infcriptis. Medium occupant aliquot brevia, rigida, recurva, miniata *flamina*, oblonEis ftina^5 concoloribus apiculis ornata. Flori vero lubjicitur flavefcens calyx, parte antica qua Boris petala ampleftitur. in quinque mucronatas crenas, poftica vero in longiffimum calcar, purpurafcentibus perlongitudinem ftriis infignitum produftus; quo, una cum florę delapfb lequuncur *vafcula* fubrotunda, 8c rugofa verrucofa, ut plurimum-cerna, rarius bina, preffius invicem junfta^ quibus fingulo involvitur (mm oblongo-rotundum, Fulcum, craffum, fohduirt, rugofum, ftriatum icu angulofum, nonnihil mcuivatam-

Quamvis radix hyeme perire folet (circuli tamen decem Be in terram depacti, radices agunt, & a frigore muniti hyeme tota vernant, & iuccedente Vere flares St femina numero fertilitate largiuntur.

Fag. 497. ad fimm pajr, adde

In Catal. Hort. Leyd. Herman, pro diffinita Anchulac ipece politam invenio Anchufam primam Matthioli C. B. MattL

Tag. 5 DO. Ad fimm fagin & dr capitis de Ecbio addatur,

Lycopjis Diofc. qmbufdam J. B. Esbium latijfimy folio Lycopjis diffum, fiore dilute purpurafcent Herman. Hort. Leyd.

Lycopfi Diofcor. apprime fimilis planta radice nititur rubra, & qua vaults furgit reftus, cubitalij ex cujus parte ima plurima prodeunt folia, rugofa, rigidaque Bugloffij fylveftris, nullo Dfdinis in ambitu extenfa, qux fumma verfus minor a femina evadunt in cacumen ufque. In viginti aut pluris dividuntur ramus quibus minora rufis 2. dhsrenc folia ut in Echio; ex quorum iinu flofculi emergunt tenelli, purpurei, inferiori parte incegrj in ambicu verb in quinquangufta-foliola Caryophyllorum fylveftrium infar dfflta.

Ecbium Lycopjis fade Africanum ptrrmz Herman. Cat. Hort. Leyd.

Producit cauliculos bipedales, afpofros, nonnihil pilofos ramofos exruffo viridantes- Folia pingua craffifcula, Lycopfis vulgans anguftiura, breviora, afpera hirta quasique verrucofa Be obtufa. Flofti in coeruleo purpurafcentes: Szmina triangula, nigricantia. Caetera fupenon fimillima.

Fag. jox./iw. 2. adde₃

Pro Synonymo Jacua acang* Heliotropium Americanum cccruleum folijs Hormini Ddort. nwn.

Fag. Soy. Fro prima fpecie Salvi* ponatur,

1. Saliva maxima folijs & floribus amplijfymis Herman. Cat. H, L. major ptrtrgrina floribus Breyn. Prod.

Fag. 519. Ad fimm capiti de Satureia adde₃

Thymbra Africana folijs spinofis, flore purpurw Bartholin. Aft. Med.

Satureia floribits in fummitate difpofitis Herman. Cat. Hort. Leycl. Fukgium nofirum eff.

Satureia hirta purpurea Libani Dod. mem.

Fag. 5x6. Ad fimm capi de Polio adde,

Folio affinis Guacatane C. B. Guacatane Scrophularia Indica Park.

Ex Hifpania Nova miffa eft. Ad hxmDrrhoide ejus decafta ex vino offi calorabfit) dioquin ex aqua hxmorrhoides abluuncur, deinde bland £ ficcantur, pDfmDdum ejufdem plantx pulvere id iperguncur.

Dolores ex frigore Sc flatibus ortos in quacunq; urporis parte fedat, ii locus refina prius inuntus tenuidimo hujus pulvere inpergaturj fic Jintem iupcrimponaturj Bcc. Vide.

Fag. J27. Ad fmem capiti de Ttucro adde,

Teucnum regium purpurtum M on fun. Pixlud.

Mulco altior eft luec Tpeccis Chamidrye vulgari; humilior Teucro C. B. Flofculos gerit ampfosj rubros, galeatos: quibus pereuntibus fubveniunt femina itidem magna. Folia (lint lucia DDJCU- r^que virena.

Niliil video in hac defcripcone quod non conveniat Chamzdryi majorL

Teurium Americanum procumbtm Veronica aquatic* joins fubrotundts Herman. Hofl. Lugd. Bat.

Radice firmatur ceni fibro/a pallida, fpargente coliculus fpithamizos, quadrangulD5, hum* J. tos qiiD5 per intervalla ambiunt folia bina fibi adver/a, fubrotunda, glabra, pingua, leviffime denticular Veronica: apponita; roudiffidiana nonnihil fimilia. Ad hoc nunc extorretur P. X flares, ulrinque unus, parvi, pallidi, labiaci, vix galeati, labio irifido, galMkiimplici, Lon/paia. Singulis lubect urculus quinquedufy liiftinens femina fibrdc^aj fuica^ quacumq;

^X-S 1¹ - k* 45. ^M^>

In choJera cciam raoibo ton v eh it Mentha ceu egregium ipefficum, ftomachum nempe do pacihcans.

F* g. tadim, Mentham anguftifolLim Jpicatam C. B. invenit D. DaU Bo ckinga: in J. J. ripas fluvii duobus tribuivc locis copiolam. Odor tamen vehementior fle ingracion huic eit H Menthi Roman a: in horcis cult*.

- ^ - 5 ? V Mentha undcuinia ab coilem ibidem inventa eft ad fluvium propMolcndm Jomcum.

F. 5. S54 Ad Jptuem aJdz, Planrahic liocanicis Limdincnlibus Sacurcu VirRimana ilonb. in lummitate nijiupatur. Siquidem Hoi es in liimmis duniacac rainulis CDifctDS geftac vduun

Pag. 536. Pro sexta Verbena specie adde,

6. Verbena Americana Urtica foliis htgioribus, florz coeruleo Herman. Append.

Adfinem pagina adde,

8. Verbena Africana minor flort lutw Bartholin. Aft. Med.

9. Verbena Indica lanugvnofa flore rubente ejufcbrn.

Tag. 540. Ad finemcapitis de Origano & Major ana adde,

Origano Congener Zatarendi C.B. Zatarendi herba J. B. Zatarhendi Origanum Indium Veiling; Obfbry.

Vejling.

Magnitudine pedali adolefcit, caulibus reftis fatifque firmis: cujus folia Atnaraci habitudine, tenella, mDlique veluti lanugihe alperfa taau blandmntur. Rotunda quidem ilia funt, in conum tamen leviter coarftata Be excurrentibus in lojigitudinem fibris cum viro/e pallidula. Flofculos producit quatnpluriniDS, niveo candore laftefc^nces, qui per extrema caulium inter numerosa foliorum capitula prominuli, Dnicidis Origani ufubellam glomerato ambitupropernodum exprimunt: linguam guftantium aromatica necingrataacrimoniaperilnngens Creticum Origanum odorisvehementia fuperat.

In (onticis capitis affectibusj cum fenfuum motiifque voluntari nobiles Functiones improba mucedine vel imminuuntur, vel penicus obruuntur, eximiè opitulatur. Stomachi vigorem excitat, folutifqus tstro veneno vitx prxiidiis gratura 5c efficax remedium adfett.

Pag. 541. //> io- adde,

In Catalogo Horci Auadem. LugdunoBatavi à clariffViro D. Paulo Hermanno edito, Ocimum ffigyptium Alpini Ribau ditlum pro fpecie ab Ocimo Caryophyllato niajore C_mB_m dUtinfta pofitum invenio.

In eodem Catabgo Odmi varistates feu fpecies habentur fequentes;

Ocimum foliis ex nigro virefcntibus flore alh Cat. Hart. Reg-PariC

Ocimum violaceo Jlore ejuldem horti.

• Ocimum nigrum majus acuto Ruta odore.

Ocimum medium crifpum conglomeratd breui^m fpicd Cat. H. R. Paris.

Jdtm bullatis foliis ejufdem.

Ocimum tricolor ejufdem.

Ocimum anguftifolium foliis [erratic.

Tag. 247- Adfinem capitis de Hormino adde,

Hormnum Fyrenaicum AnguriJfolio vifcofum D. Fagm Hurt. Reg. Parif. inter nondum editas.

ICAN,

Horminum Verbena lazinus anguftifolium Triumfetti.,

Triumf.

Radix lignofa, alba, vix ultra digitum longa, rarius in alias divifaj Temper tamen numerosis fibris reFerta, ac rugofo obfeuro cortice induta uberrimam Foliorum fobolem multiplicis fanè Formzfiiper homum eFfundit : horum enim aliqua altius c^ucroque laterc incifa Verbcnsc vulg. frondibus plurimum affimilantur, praeterquam quod in apice magisubrotundaexiftant; alia vero non tantum incifa, fed emm dentata fpeiftantur ; dum ex adverfb nonnulla crenis lolummodo per margines diftinguuntur. Variant prarterea penes utramque longitudinis ac latitudinis dimeniionenij quamvia nulla latitudine, unciam, binasvero longitudine fuperent, petiolus autem cui innituntur oblongus atque compreffus, extentioncrvo in adverfa FoU parte cminente, ac in minores fibdivifo totam iplorum longitudinem pcicurrit. Hujufmodi porro Foliorutu fubftantia haud craffa, attamenglabra, imo^ ii ope microfcopii examinetur talem crilpitudinem oftentat qualem in Brafficis, color obfcure virefgensj odor nullus^ diu manfa nefcio quid dulcis faporis guftatui exhibent. E fbliorum centro attolluntur bini vel plures cauliculi, refti, lignofi, quadrangulares, quorum rarioribus licet nodis bina folia adnafcuntui^petiolis przdita (exceptis tamen (upremis) interdum latiora^ fimulque breviora iis que ad radicem, interdum vero iis longiora fed anguftiora: prope radicem glabri, verfus faltigium pilis exiguis denfis donati, przfertim ubi flores erumpunt, qui calyculo, quo prius inclufi erant, hiante, vindemque colorem obfcuris lineis diftinftum detegente, fe produnt ampli, galeati, in reftam oblongam fpicam verticillatim difpofiti, colons faturate caerulei: quibus deinds lpadiceum fucced«jfcpw, minutius reliquis hujufce generis.

Nor. Caulium fobftitatts una cum Bonbus eorumque calycibus fragratitem fzrh Pukgii odor em cxhalanc.

I. Planta toto anno, tarn hyeme quain ^flate, floret in aridioribus acfabulofis Romanorum arborum traftibus.

pagm J^I. Ad finem capitis de Betonica adde,

Jjetonica purpurea fpica longiorz moUiore & ferius flonntz V* TolirneFort. Inter nvndum editat Hort. Reg. Parif.

Yag. 5 \$2., Adfinem capitis de Prunella adde,

Prumlla Alfina folw^ angnfio integro D. TourflsFuit. Intvc ngndum zditas Hort. Reg. Parif.

Item, *Brumllam Lufuanicam flore & fpkamajore* Dodart. Mem. / & *Scrophhtlari** Herman. Cat. Leyi

Tag. ff J. *Capiti de Stachy adde,*

Stachys Tyrznaica D. Fagon. *Inter nondum editas* Hort. Reg. Paris

*Stachys Alpina folio Betonic** Dodart. Mem.

Stachys Bztonica: folio fubinc am Herman. Cat. Leyd. j

Herm.

In altitudinem bicubitalem adolefcitj *radice* pallidaj digit urn craffa, carnoJa, mulcis fibris capillata, *caulibus* cribus quatuorve, ramofis, reftis, folidis, quadrangulis, rigidis, in fpicam definentibus palmarem; quam undique cingebant deniffimā verticillataque *trie* flores dilute purpurafcentes, galea biidā erefta, labio promiffb amplo fcutellam exprimente, *be* ad collum anguftius utrinque aunculato : *ringulis* vero lubjiciebantur utncuh longi quinquefidij nullis vel brcviHimis petiolis fulti, continentes *fmina* quaterna, fufca. Infceper caulibus ac ramis adnata crane *folia* rugoft, ferrataj pallidē virentia, Betonicz faciej bina adverfc cruciatōque fitu difpofita, faporis iibacriSj odoris debiliSj aromatici quidpiam redolentis.

Semina exlalia allata fiinr.

Fa[^]. eadeWj Ad finzm capitis dz *Stachy addt*3

StachysIndica proceriorBetonica; folio D-Plucknet.

Fag. y6o. tin, 34- pro [zptima Lamu] fpecie adde,

7. *Lantum paludojum Belgkum MdtJJ'a foliis* Herman. Cat. Holt Leyd-

Herw.

Exilem, albicantemj fibroQm gerit *radictm: cauliculum* palmar^m, aliquando idngiorem, qust dranguJum[^] geniculatum, fiibhirfucum, in ramos divifum, quorum geniculis aditanc *folia* sxlongioribus pefiolis, bina ex adverfo, Melifli foliis paria, fed graciliDra. Summitates ambiuntverticillara fene *fiojculi* exigui, pallidē purpurafcentes, galea anguftiore[^] minors Be integra, labello majorcj latiore Be cnlobatD. Hos excipiunt *It&ina* fufca quaterna in utriculis foliaceisquinquefidi[^] Spontefualuxunac in paludofis Belgian fetido & gravi odore ad congeneres fpecies accedens.

Tag. 563. lin. 3. ~~addt.~~

An Sidzritis African fiore aurzo oblmgo* Tho. Bartholin. Aft. Medjc.

Pefi tin. 20. pro fpecie *Sideritidis tertia add?*

3. *Cardiaca Americana annua*3 *NepeXx folio* j *floribm bwwibm fbcenicw ifillofis* [^] *Ltwurus* ~~addt.~~
Armizanm vulgo Herman. Cat. Leyd.

Her?n.

EauU adolefcittriticubitali & C altiōn, herbaceo, candicante, quadranguJo, ftriato, folido, albā medullvi farfto; quam per remotiora intervalla verticillato ambitu dtnpleftuntur utriculi dena numero faque congerie invicem incumbentSj tubulof[^] quinquangulr, ftriati j * fiipere longiores,, ex l^s-vibuspedunculis deorfium flexi, Sc quadatenus falcati, oriticijp amplion, feptem molliculis aculeis, lex brevioribus, uno in fummo longiore Be robuTtore arniata. Ex his exeunt nores galeatlj vix labiarijprxcedsnrE; Africana criplu bi eviores *SL* graciliores[^] villoli, phsnicei coloiSj fuccedenbus qūacernis *fzminibus* oblongisj angulofisj fpadiceis, luperiore itidem brevioribussk anguftiori[^] bus. Ad lingula genicula ab imo caulead/ummun[^] ifqus nafcuntur/[^] bina ex oppofito alternatjm[^] Nepetx haud multum ablimilia[^] amphora tarn en, riDiimihil mcana, mollia,&: inartibitu magii crenara. *Radix lubcii* lignola, albicans, fibrola, pro plants rations lac parva. Nata eft femine ex Sunnama advefto.

Tag. 568. Terua nobis Molucca: fpecies *Meliffa fruticofa* Sicula, &c. difta non videtur differre a planta quam hac iftate in horcis circa Londinum Lamii arborei Zaroni, fit *Teucrii Tingitani* HDniinibus cultam vidimus.

Pro tertia *Marrubii nigri fpecie Capiti 14. addc*3

Marrubium nigrum Creticum Alpin. Exot.

Alpm.

Kradicibus multis PrimuJs fiinilibus *folia* complura profert, oblonga, extremis acuta, parvisiu[^] pediculis (urium in orbem afta[^] nigra fie nigra lanugine obiita, *Marrubii albi* foliis major a, J[^] giora & latioraj magmtudinc &c figura ad Apiaftn fere folia accedentia. E quibus fane. duos. pjuif5 *caulu* producir, longos, reitos, quadrangulos, nigros, per intervalJa ceniculatoSj in Q^uib^{us} c fingulis gemculis exeunt circum ipfbs ex oppofico *folia* coniplura[^] numero[^] H ieptena, ac p^{er} etiam, nblonga, prionbus fimilia, fed longi: minora, mulrum nigricantia qu[^] Wrca ramum ⁱⁿ orbem aguiuur. In caulium fummitaubus/orej utrinque virgas ambiunt, non diflimiles ^{rubii} floribus, itidem nigricantes. Tota planca colore nigricac, ut deinduftriaab aliquo ^{videtur} eo colore obilufta. Saporis Be odoris experts eft.

H<c planca, h ab Alpinoreftē defenpua fit, plunbus femper ad fingula genicula ^{foliis} ^{addt.} Videcur.

[fig. fi]- Addatur Sjnonymn II. *Speciei*3

Ranmtlm Ahptcmoidcj Ajuga foliis P. Bvecom ; *tjuim tenfuh* p. 28. & 29.

Far 5 B4. Fro Ranunculi nemorofi fpecie tertia interponatur >

¶. Ranunculus nemorosus Vtrgmianus parvo flori, mo Uiori folio Herman- Cat. Hort. Leyd.

A fuperiore hand abhorret, fed floeulis &c feminibus valde exiguis eft, ceterifque partibus omnibus utriusque & grauioribus.

4. Ranunculus Uajfubicus folio Thora Breyn. Prod.

Apud J. B. (inquit) cum Ranunculo auricommo Lot. confunditur, à quo tamen manifeftè differt, altiùs namque excreirit, & in omnibus maior eft. In (ylvofis Caflubiz Diitur. .

Malva altra reptans Betonica folio Zanonì,

Cauls Be foliis Mai vac Betonica: folio Bocconi fimilis eft, fed minor, Be naturà rfpatrix. Flos palicer fimilis; verum petalis maioribus.

In piano GrofTeda: eundo admontem PefcahsinEtruna, &c locis vicinis ontur.

Far. 600- Pojt fxtam Mal<v>* fpevhm. adde,

7. Maliam Tingitanam flore cosruho D. Plucknet.

Far. 60x-' Althxx vulgaris dusc varietates habentur in Car. Hort. Edinburg. & Hort. Lugd^Bat. Herman. Alcera folio rotundiori five minus acuminato : altera folio angulofion,

jid vires AUhtca adde,

Pulvis radicum Althaea: ad 3j. omni mane in lafte epotus in Gonorrhoea eif remertium praEitan-
ftiflimum. E MS. Doftoiiis Fage medici, Suffolcienfis.

Far. 601. pro fecunda facie Malva: frutkefcantis interferatur,

1. Maha Hiffanica foliis mollibus imdulatis in margine, fuperius micis fulphuris ad Sohfa
fphndentibus donatis Moril Hift.


Folia producioe mollia undulata in margine, fuperius micis fulphureis ad Solem fplendentibus donata. Cauhs edit bipedales auc cripedales. Flores & femina aharum Malvarum hirodo. ^ Perennis eft planta, quin &c perpetuafronde viret, ut Althxa Dibiae. Provenit in Hifpania, aliifque M-
ndionalibus locis.

Fag. 6D6- Adfintm cap. 10. addt,

1 D. Alcea Zeylanka folio latiori cordiformi Herman. Cat. Leyd.

Huju5 folia fummis marginibus cordis figuram referunt. Caules rubent: Radix pereinat. Cx:
tera cum penultima conveniunt.

II. Alcea Zzylanica foliis fafciculatirn congests ejufdem-

Sunthuic flores admodum exigui fafciculatim feu in racemosdenfilims difpofiti.  parces ukima: fpeciei omnino fimiles.

Far. 609- lin-i' Ad finem capitis de Caryophyllata adde,

Hic eadtm videtur Carjophyllata Virgimana albo flare minore, radice inodora. Herman. Cat.
Leyd.

Yiuxfolta longiufcula funt, attaftu afpera, crenata, inferiora palmam ampla, laciniata, fup-
rioraancufta, ranus laciniata, leviter mucronata. Cauhs ad duo cubita elevati, nonnihil vUldi
& abferi in multiples furculos divifi. Flores Caryophyllata: vulgaris effigie, petalis palhdis, an-
fxufiffimis mzuis frawnibus herbaceis cum apiculu pallide flavefcantibus Semina rara fuperio-
rum nuda in wptitulum congefta, brevionibus Be minus ngidis filamencis caudata. Radix fubeft al-

Wratabin difti in Corait. Montis Gomend Walla.

Taz. 61; Ad Gang capiti He Anemone adde,

Ammom afEnM^t/jionã, fibrofa radice flore Afierh, Tanaciti foliis fubincanls Herman. Cat.
Leyd. Cbryfantbtmum Stxbes foliu latioribus Breyn. Proi After Jacob** foliu latiori-

HS Eaijmfaw anguftioribus. Zhryfantbemum Afrkamm Stxbes fdm anguftioribts Breyn.

PI-DIL

Herman.

Prior fpargit per terram folia digitolongiora, forma inter Taraxacum & Stoeben media, prona
nallule virentia, fopernã" incan* 6c fubhiifuta., in aliquot lacinias, fitu modu oppofito, tno-
d. ifenD, intercedencibii5 bngioribus intervallh, diffefta. Inter hxc prodeunt cauhcu term',
DhirtivE dodrantes, molleculi, lucco aquofpleni, anguloli, vindantes, atio-piimecis, latiufulis
perlonpicudinemexcuricntibusftriismcripti, quæ caules ea potiflimum parte qua humi procum-
bunt penicus videntur obliterare, ita ut nihil auc parum vinditatis in us apparear. E media caulis
eriguntur

Ghandiroba vel Nbandiroba Brafdimfibm Marcgr. Granadill Jpecies 'videtur.*

Hederarfcandentiſ ſpccies, more Murucuae feu Granadill* afcendit, farmentis pauljò teneriori- bus. Folia habec dilpolicamore Hedsrx, fub/otunda & qu^ii in tres angulos dc/inentia, quatuordiz longa -&c totidem lata, viridia, glabra, fplendenria. *Floſculos* fertparvos, ex pallido lutscentes tē urapetabs. *FruBm* fcquicur rocundus, viridis, fplendens, inftar Murucui*, Pomi majoris magnitudi- ne, fuperius circulum Inlculptum quaſi contmens, 6c in centTM ejus tres lineas, unaextrcmkâte ad angubs obcuſos fe contingent. Fruſtus fecundùm bngitudinem difteſtus intus apparet cavus- cortcxque Illius Murucuae cortici craſſitie eſt xqualis, duplici ſubſtantiâ compoſitus, exceriòs mini- mâ, cr.ificieJignDfa, reliquâ interiùs(pongioſâ, heculentâ, albâ: Cavitaſfructus in medio per in- terſtkia more Jijglandis in cres difpccitur concanierationes, continētque in qualibet quatuor, [in- tocum duodecim J ordine difpoſica corpora ſubrotunda, clypeata, fatis craſſa, magnitudine pataci, in excremate ambitus tenuiora, folida verſus medium. ^ Quodlibet corpus pelliculâ primum obdulum eſtvea, punſtulis feu ruberculis nigricantibus, qua detriſtâ, cortex ligneus fulcus apparet, inſtar teſtac ovi fragilis, in ambitu dentatus: corcice fraiſto intus albus apparet, .continetque oleaginoluin nucleum ex aibo flaveſcemern, pelliculâ inclufum.

Ex hoc nucleo oleum paranc Braſilienſes; quo in lucsrnis utunturjclariffimum, Be optimum, tardē enim conJimitur; in cibo non poceſt uſurpari, quia amarum eſt, quemadmodum *BL* totus fruſtus.

In horrum Regium ex America nuper inveſta eſt Granadilla: quzdam ſpecies diſta FJosPiflionis folio pynformi, flore candidiffimo q. An Murucua velicaria lanuginolâ odoris gravis *Marcgr.* à *D. Tancrzo Robinſon.*

Tag. 660- I'm. 26. Ad fntm Capitis dt Bryonia alba adde>

Bryonia Zzylanica foliis profunde lacmiatu Herman. Cat. Hort. Leyd.

Herman.

Ingenium catharticum congeneribus hand dillimile probat hsEcBryonia, tumguſtu *iuu*, acri, amaro &c naufeufp, turn etiam uſu, Zeylanenſibus in hydrope frequenti, penes quos in parietinis mde- ribu5, aliifque inculris fordidis ſua ſponte luxuriac. Spargit à radice albicante, fibrola, in modicum ventrem extumefcente flagella tenera, flexibilia, longo variòque reptatu cincinnatis fuis clavicuſs vicina quſvis apprehendentia. *Folia* atro-viridia, aſperiuſcula, quinque vel ſex profundis laciniis diviſa; *Flore*: ad foliorum finus folitarios, aliquando binos ternolve, parvubs ex quinque petalis reflexis pallidè flaveſcentibus *St* fubhir/ucis compolitoſj *Baccas* Cerafi magnitudine, oblongo-rotundas, primùm virides, poſtmodum rubellas, aliquot lacteis ftriis pſrbslle inferiptas, continences in pallido lentòque ſiſpco acinos fuſcos, duros, aſperos^ Jubrotundos, cingulo medio quaſi ſacia in obcuſum ap- cem protuberante. Radix ad multos annos perennat in *Zeykn*^ ſub noſtro verbò duriori climacc facilè perit.

Tag. tadzm, fro quinta ſpciz Lauri Alexandrine addz3

5. HippogloJum falits anguſſifimij, baccis ex oblongis ptiolis in extreme ramuhrum dependentibas Brey. Prod.

Tag. 667. pojt lin. 55. adds,

Ad Bchymoffin [fugillationem] nobiliſſimum Cataplaſma. R Radicum Sigill. Solom, Ireos Florent. pulvenfat. ana partes ſquales. Aq. vine uoch. unum- Ol. RoIT q. f. M.F. Cacaplaſma ap- plicetur loco affeſto.

Tag. 669. Ad finem paging add. Qjartam hanc ſpcciem ſie deſcribit D. Herman, in *Append* Multis fruticat virgibz cuoiralibus, flexibihbus, obſequioſis, ramofiſ, qux ornanc *folia* hilari virore lu- cida, mucronata, ad Myrtina accedentia. Sept. menſe exeunt è ramorum cymis *capitula* parvajFD- tundaj herbacea, ad bafinſlo. monopetaloj in viridi palle/centefex exiguis crenis diviſo veſtitaj quo marceſcente tranſeunt capitula in *fruttus* globofos, pulchrè rubentes, baccis Aſparagi fimileſj in- cludences /ub pellicula tenui K parca pulpanudeum unicum rotundunij pallidum, durum. Subſunt *radices* fibroſe, albae, muhzj longa, facie Alparagi, ex uno capitulo promiſlâr.

Pag. 671. pvyt. li > ;? . ^ ^ 1*

WeAphalij quibus ScDrbutus valdè familiaris eſt, decoſto Glyc^picri cutn radice prtî potuquoti- diano utuntur cum ſicceſſu inhocmorbo.

Tag. 674. lin. 34. poſt verba ilia hicſubjiciam ad finem ſpechinon adde^*

Cùm in CatabgoHorti Academici Lugduno-Batavi à ClarifT Vïro D. Paulo Hermanno edici inveniam SolanD Ppmifero Indico ſpinofo, Boraginis flore fruſtu meceo pro ſynonymis adjunſta Solanum ipinofumHuſtii rotunda C. B. Be Pomum de Hiericho Mebngenſis congener *J. B-* pritnam ſententiam mihi relumendam video: ſiquidem D- Hermannò non potdt non effeprobè perlpeſta hxc planta, ut qui earn Cùm in loco natali creſcentem vident, turn in horto aliquandiu coluent.

Plures ejus /pecies diſtinguit idem eruditifT Botanicus, nimirum,

1. Earn cuju5 Synonyma dedimuſj quam *Lhunda* ſimpliciter diſts Hort. Malab. eandemfacit.

x. Eandsm ſpinis violacpis,

f. Eandem ſpinis ex albo virentibus.

4. Solanum, Bcc. candicans maximè tomentofum: i. e. Sol. ſpinoſum maxime tDmsntofum P. *Boëcone*, cujuſ deſcriptionem dedimus. Hanc ſpcciem pro Anachunda *Hort. Malab.* habet, cujuſ fru- ſtus pilis denſis bngis, iurreſtis ac nonnihil hirſucis ex albicanda flaviuſculis imdique en cundati Sc iubaiperi funt: integram deicriptionem ſi placet vide.

5. Solanum,

§. Solanum, 3ec. Americanum floribus ex lae&o Be cteruleo mixtis. Hanc fpeciem pro *Jurepiba* femina Pifonis habet. At D. Commelinus praecedentem.

6. Solcinum pbmiFerum frutescens Africanum, (pinofum, nigricans, Boraginis flore.

Huic (inquit) SoUnoLuppingtonum TW/X alba, lignosa, perennis, longo Beobliquareptatudi perfa. Ex hoc fructu C^//J lignofus, fequicubitalis, raniDfus, in viridi nigricans, aculeis mordacibus undique armatus. i^/^promitatro-viridi^ oblonga profunde laciniata, coftis ab utraque parte fijpanibus fpinis obfeffis. Flores ad ram Drum cacumin* pentapetaloides, Boraginis facie, ex cLErukopalentes. Baccas Pomi amoris amplitudine 5e forma, primum virides, deinde flavas &c ex maturitate in nigrum degenerantes colorem, *Fovzntzs femina* compreffa, orbiculata, fufca, in pulpa flavefcente, vifcida, acri^ amara, naufeofa Be virofa.

Ad foliarum margines locifque alijs incuhis PromontDrii bonse fpei Iponte provenit. In hortis tarn per femina, quam ramorum circumpoficionem vel fiiberfionem commodiffime propagatur.

Hujus radicem, quam a crem Be arnaram deprehendi, exemplo Hottentotoruni ad Hydropicoriam aquas per urinam educendas ex decocto prarfcripi magno Temper argrotantium levamine: pul-pam vero baccarum virulencam reperi, inducentem capitis gravedines, corpores, dolores^ furorem denique, ipsamque necem.

Hujus aliam fpeciem vidimus in Horto reverendiff. Epifcopi Londin. foliis minus profunde laciniatis, fpinis crebriDnbus craffioribus Be longionibus de qua alibi diximus.

His adde,

7. *Cheru-Chunda* H-M. *Jurepiba mas Pifon. ex fmentia D. Co mm dim. Solanum Indicum* &^*~
fumfructu minirno₂ miniatu^ glabro.

H. M.

Reliquis minor est, altitudine fequi aut duorum pedum, ramis in latum iparfis, ejus *caulis* non rubescunt: *Radix* fibrosa Be albicans: Stipes cum lurculis tenuiffimis pilis obfitus Se viridis^ medulla intus mpili. *Folia* multo minora ca^teris, pilola ac aspera nonnihl, paucioribusque Be minus culpi^^u tis laciniis i^nuata. *Flores* omnium minimi, ftellati, quinque vel sex cuppidum, cobris effirubo-dj-luti Be fubpurpurafcentijs in fingulis cuppidibus in medio venula albicante ac nitente Be ad umbilic- cum calycis viridescente friati, e calyce in quinque cui^pides partito. Corculum^ quod in medi^o flavum feu croceum ellj confat furreftis Be craffis ftaminibus, qua: fuperiora 6c inferiora versus cjuftedeil fe're craffitiei funt. *Fructus* ex omnibus fpeciebus minimi fimi^ rotundi, glabri fine pilis ac nitescentes, a fuis calycibus arfte infenus comprehend, colore dum immaturi funt viridi, dum ^u maturi flavo, deinde corallino rubro. *Sentina* praecedentium fimilia.

Radix decoctum confert in tebre calida; idem cum melle prodest catarrhis Be gravedini, ite^u franguria;- cum momento Cardamomi flatibus Be intestinorum torminibus conducit. Radix aut foliorum ficcus decoctus & epotus concoctionem promovet; idem aim faccharo datusuti, Kej^u decoctLim cum melle fervit pro phlegmatjcis juvatque in peftons asperitate. Foliorum Se fructuum decoctum additD pauxillo Sacchari Be calcis pro pruritu cDrporis fervit in unftio^e partis affectar.

Pleraque hap vires nobis fiifpe&z funt.

An planta fpinofiffima Virginiana nobis ante 30 annos apud Tradefcantium viva, cujulque folia & flores etiamnum recinemus, fit praecedentium ahqua, an fpecies ab omnibus diffinfta, nni non CDnftare fateor: funt autem folia, quantum in ficca difcernere licet, la^ia Be pifis ommno deJticutaj utrinque non per mediam tantum coitam fed Be per nervos laterales fpinis acutis flavicantibus obfita. In fiirculo florifero quinque aut.fex flores funt. Spinula: tenues^ oblonga: Be propemodum reft* funt fecus quam in Hort. Malab. pinguntur.

Fag. 679. Capiti 15. adde, Solanum peregrinum Beta: folio. FoJia habet grandia, craffi, fteculentaj ad Betae formam accedentia; nee Hores nee femina vidimus. Sufpicamur ifthoc congener eile Solano Americano racemofb: in IIDrto Chelifeiano ut Be Fiilhamenfi colitur.

Fag. 681- Ad fecundam Solam veicarii fpeciem nota. D. Hermannus in Catalogo fipi⁵ laudato Solanum veicarij Indicum a Sol. Vefic. Americano fpecie diffiniftum facit, Be hujus Synonyma ponit *Tomal* feu *Planta acinDfa Hzrnand.* p. 195. Camuru *Fifonis^* nee nos repugnamuSj cum illi [ut qui utramque coluerit] plantar ha: nDn poliunt non effenotiores quam nobis, qui neutram haftenus virentem vidimus: unde Be Hahcacabum Virginianum *Park,* ab Indico diverlum cftc abfque ulla tergiverfation^ agnoicinus. Deleatur ergo illud Quarrendum, *An fecit difftrat a yr&z edntt.*

Solanum fpinofium D. *Fagon* in Catal. nondum iditarum *Hurt. Reg. Farif.* ad me tranfmiffo quomodo in prxcedennbus differt inquirendum.

Solanum Caianense hirtutum, cattle & pzdulu fcitwjis Dodart. Mem.

Pag. SBi. Qjarti Solani Halicacabi fpeciei, e. Halicacabi five Alkekengi Tndici Bontii Pj^{eni} rem *He* accuratiorem defenprionem tradit Paul. Hermannus in Catalogo Horti Acadcm- L^{UB} Bat.

Radice nititur tenui, alba, fibrofa: Coliculis dodrantalibus, tenuibus, rotundis^ glabris, crebros 111^4 nios diduftis, media lui parte hunu procumbennbus: Foliis Solano vulgari limilibiis, fed^u j^ j¹⁰. noribLi5, atro-viridibus, acuminatis, in margins aliquando leviter crenatis, feplus integns. A rum finus prodcunt iubinde in calyculis quinquifidis *flora* parvi, pallidit; flavefcentes, nio/iDpt, in quinque angulos acutos difledi, Be ad fundum fulcis maculis inlnpti. Hos excipiunt v^u hcrbaccas; angulol?) Solanoprarditto duplo mmDies, quibus induduur bacca conCDJor, I c^{ed} iib^{JS} depreffis pallidis, in pulpa virenn, acri ficamara.

In inculti5, iordidb aridis Malabarx Be Zcyioni collegit D. Hermannus. Ex ^u guDranni5 fe iciovat. Faee ad Solanum 7- B. accedic, parcbibus cam en omnibus ^u

Solatum pomiferum Amtrkanum non finofum latfeo flore. h>a ' Brafilievfibus Marcgravr. Ivabeba Pifnn.

Frutex est^{Pris. M. Ev.} odemmodo crefcens quo *Jurtpeba*, fimilique ligno, fed folet altius aflurgere. *Caudex* finofus ac Jeni hirtutie piiditus. *Folia* diverfa: figure, inordinate pofica, pallidè viridia, oblonga, non ita laciniata uc *Juriftb*** levi hirtutie feu lanugine infefta.

Flore fitidem fert ut *Jurepeba*, lafteos, pentapetalos in Jaritella: expands, in medio autem *fiawivula* lutea funt erefta.

Fruftwn fert *magnitudine tnajoris Pomi vulgans, rotundum, mitio laturate vindem, acbrunna lanueine teftum, per matuntatern cicrini coloris ac fplendenterrt. Cortex fruftus inftar tefta; ovi *ftar pomi Pifo*, fraçili5, intus continetpulpam fucculentam, flavefcem., admodum dulcem Bcgratam formicis, ca> *de magnitudine* terum non-edulenvqz: *copiokfemina*, Lentium magnitudine, figura & colors continet.

Radix plantarum est amara & tenuium partium, atque inter remedia deobfruentia in pretio habita, *Vires** practrtim in renum vifcofiratibus abftergendis. *Qlia* radix quibuldam nimis amara videtur, decofta exinde parata temperantur cum *Liquintia Americana*.

Far. 67 J. Fro decima quart a Solanijpecieinterferatur,

Pomum amoris majits fruttu rubro Park. parad.

-Hsecplanfa omnibus liisparribus caule, folio, flore, fructu, multo major est ea quam defcripimus hrt hiftori? aliasfimilis. *Fruituspomi* mediocris magnitudinem arquat, cftque ftriatus feu fulcatus plerimque maTVali^ rhicillicprotuberan^ cumillmsaTqualh *БСГОМУДЫСТ*; magis infuper planus ficdepreflus^onglobofus utillius; ejufdem rubn colons, quamvis habentur etiam hujus generis colore per matuntatem luteo, aureo, albo.

Parkinfonus/expenemiafua, iterata per aliquot annos in hortis noltnsiatjone fruaum multo minorem evadere aflent.

Hoc genus in Horto ReverendifT Epifcopi Londinenhs Fulhamiae, prope Londnum vidimus hoc autumno cum fructu maturo, 6c fpecie diftinctum puramus a vulgan nobis defunpto.

Fag. 684. Adfinem capita de A Jparago addt>

6. *Afparagus acuhatM, maximMs> farmentofvs zeylanicus* Herman. Cat. Hort. Leyd.

Herman,

Huicfubfunt *radices* longas, fufiformes, pluresex uno capite propendentes, albicantes, carnolir, pollicem craflz, fapore fubdulci, graro, ad Scorzoneram noftam accedente. Ex hac pullulant aliquot *Jarmmxa* Ingingiffima, in mulcas alas divifa, brevibus pungentibus aculeis, modo fiiifum, modo dcorLim fpecftancibus, -armata, vicinas arbores fcandentia, eafque ampleftentia. His adherent folia reliquis hujus familiar fpeciebus omnibus latiora, longiora & robuftiora. Ad quorum iinus prodeunt c calyculis exiguis *flores* parvi, pallidi, hexapetali, fulciti breyibus tenuiffimis pediculis. HDS excipiuntbaccarrubentes, in quibus continctur utplurimum terni angulofi, nigricantes acini, velut in ipecisjbus cDnfimilibus.

Sponte nafcitur in fylvis infulac Zeylonz, indigenis *Hattawwiiia*, Europxis vero ibidem degentibus *Loan** Scorzonera difta. Radices vel cum lafte aut brodio carniun, vel fale aceto Be pipere conditae, ab incDlis habentur in deliciis.

7. *A Jparajtus a cult at us Africanus* ejufdem-

Норнаф.

A *Corruda* vulgari nihil difcrepat, nifi radicibus craffioribus, rotundioribus bulbi florum inftar, ex uno cefpite dependentibus, fapore cum Afparago Zeylanicoconiunili. Ad rivulorum margines circa Promont. Bon. fpsi luxuat.

8 *A Jparagm acukatus Siculza.*

Cauliculos feuflagella multa edit, tenuia^ angulofahumi fufajramuloshinc inde crebros ad femuncialia interdum intervalla emitcentia. Ramuli panter crebris foliis fecuncialibus aut longionbus rii *aculeis* angulofis, qufque fpinac verius funt quam folia, alterno fitu veftiuntur. *Flores* circa foliorum feu fpinularum bafes exeunt herbacei colons, Afparagi flonbus fimiles: *Fruftus* nonobfer-

prope Tauromenium in Sicilia invenimus circa finem Maii florentem. An vera & genuina Afparagi fpecies fie neibimus cum fructum non viderimus.

Sfnftian Mentzef. flrugilla rariorum plant, duplex genus diftinguit, Alteram vocat *Vaem Idaam* fabfiremfoliv mapbus *tiuts*; Alteram ^tf. *Uptfolns parvuacutts Szrpdlunflar.*

Eadempag. Ad finem Lib. I; . in iapitefeorjlmaddatur,

CAP. XXVIII.

Semfervivurh marinum hacciferum Brafilianum Marcgr.

IN rclauSedalem aut majorem altitudinem aflurgunt mulci cWf/, digitum craffi, lignofi, fragiles, teretes foliis circumdnfti eo *tnoio* quo *Portulaca*; quzlunc egrcgic vindia, crafla, fucculenta, fteura *Portulacs* folns fimilwj *verim* longp majora, Be magnam Acetofam iquancia. Inter folia m fmEularibusDBdculisprodeunt/oW/* quinque folus confantcs, uno lucre in ambitu ferratis, albi co-

Uuuuuuu

lo>>>j

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

antis ufile epiplafma. Putantur folia cum radice manducata calculosconfringere & urinam movers.
 Diofcoridi Cotyledon *W T*S UitAw x&*: fucco ejus cum vino circumlito infittillarove. Inflammationibas.facris ignibus, ftrumis, pernionibus illitu auxiliatur, ftomachi ardorem reFrigerat Hv''
 dropicis Folia ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria, " * 'y''

Eadern pag. Ad finem Capitis tztii de Sedis ft dlat is adde

Sedum Afrkanum umbellatum album Herman. Cat.

Herm.

Exilerpj fibrofam, albam habet *radictm*: caules complures, ramofbs, fuccofofs, fpithama altiotes:
Folia viridia, angufta, acuminata, caulem abimo ad fumum ufque cruciato pofituvelut in Genti-
 ana ambientia: *Flares* albos, pentapetalos, in mucario leu umbella difpofitos: [emina exigua in fiJi-
 ciilis quinis invicem junftis.

Eadempag Sedum minu* drupe S.Vincentii Catalog, noftr. plant. Ang. S.Vincent's* ~~Herbarium~~.
Hoc ad fedawwlthapfularia prtinet. Folia denfe ftifantur.

Tag. 69 ;. Ad finem Captis quarti adde>

Plamas hafceeruditifl^ Paul. Hermannusjn Catalogo Horti Academici Lugduno-Batavi adFicus
 Indices Opuntias didlas refert, 5c Ficoides leu JFicus aizoides appellat. Etenim (inquit) harum om-
 nium floribus fubjicitur fructus ad modum Ficus Indict quicuqufcunque <t magnitudinis acfi^urs
 includit pulpam fuccolam dulcem Ficiu Indies fimilem, quanquam licitate in Fungofam aridam
 membranaceau fubftanciam degenerantem^ & varios feminum loculos defenbentem.

Mihi necdum conpeili ftint harum plantarum fructus, ad Aizoa tamen potiis quam ad Ficus
 Ind. referenda videntur; aut re&ius novum plants genus conftituunt. Di(pe(cunrurautemaD.Her-
 manno in qUinquecapfulares, quarum dua: (unt fructu pyriformi majore^ quinque Fruaiipyriformi
 minori; tresverofruftuorbiculato: Scmulticapfulares, quarum alteraeftfructu majorijalteianiinori.
 Prima inferbicur

Fkts AiXioid. Afric. maj. procumh triang. fol.fruf. maxim, tiulu

Fructum maximum edulem Ficiu fimillimum proferens, fpargit ab *radice* crassa, fibrofa, repente
 multiFucefibratacapillamentis *caliculos* multo Sj humi ftratos, digitum crassbs, duos tresve, cubitum
 & amplius longos, liiccofos, exviridi pallefcentes/ penes radicem aliquando rubentes, ad quorum ge-
 nicula exeunt *folia* bina ex adverfo, digiti longitudine & crassitie, triangulata, vindi_{aj} fucculenta,
 cum tocidem ex oppoito ramulis,, 6c ex his aliis atque aliis, fiiftinentibus in cacuminibus fructuum
 rudimenraj pyriformia, quinquangula, quinque trigonis Foliolis inFerioribus multo minoribus circum-
 vallata, intra qua: emicat Flos ftella? vel Solis effigie radiatus, afteris flore amplior, ex molleculis
 tenuibus numcrofis petalis quasi rartis ad Solem aureo Fulgore micantibLis conftrudhis, cingentibus
 multa concolona (*tamina*, Fannaceis fkefcenfib. apiculis donata, quorum medium occupant septem
 oftove corncula, ex luteo vindantia, in orbem diffiife. His marcefcenfib maturatur *fnStus* ad-
 acquans nonnunquam Ficum vulgarem, viridis, pulpofus granis minutiffimis, faporis dulcis, aquofi
 haud ingrati, fummo umbilico quinque ftellatis deufflatis radiis infcripto, pulpa vel cito putrefcente'
 vel intentione Solis aftu infongofarnfubftanciam tranfeunte, qux difpescitur in quinque loculos in
 cludentes *zmina* cxigua, angulola, faifa.

Luxunatum. c^tensfubjequentibus huiusrorrislocisn.arit.aridisfabulofisadPrioniont. Bonr Soei
 ubi Fructus tarn a Belgisibidem hofpitantibus quam ab indigenis Hottemotris efitantur. Hi T n_{pop} ^{Comu}
 gatio fit vei per avulFosramulos terra: commiflos, vel per radices quas caulium genicula
 ma demittunt. Toro anno in Belgia viget & virec, aft prfervanda est a Byma: injuriis. ^{Consp}
 citur tnplfici florum colore, albo, purpureo fie flavo-

Kadem folio triangulari enformi.

Priori omnibus notis refpondeo, exceptis Foliis nonnihil brevioribus enfem Falcatum laciori dorfb
 imitantibus.

a. *Ficus aizoides Africana minor ereSta, folio triangulari glaK^flo. luUo. An Cbryfanthemum Aizoi-
 des Africanum triangulari folio, flore luteo Breyn?*

Parcium exilitate, neutiquam difpofitione Sc Form^ ab ante allatis differr. Frutefcit cauliculis cu-
 biti altkudine, redliSj tenuibusj lignofis, albetibus: *Fgliis* dupld brevionbus, digiti minimi crassiri-
 cm vixadzquantibus, ^lucis, triangulis: *Floribus* intra quinque Foliola luteis, ad Solem expanfis, Fu-
 periore minoribus. Hisfiibjiciuntur/r<^j AvelJana: nuclei magnitudine, pyriformes, quinquan-
 guli j fucculenti, dulces, vetuftateFungofijtenaces quasiquecoriacei, in fummo plani, quinis ftellatim
 decuffatis radiis notaci, cludentes in totidem oblongb loculis *fem'ma* pallide flavefcenctaj angulofa
 dura, exigua. Indiget eademqua fuperior cultura- Foliorum lapor oblervatur nunc ialfus, nun
 aquilifit ^{us J P^{out} ^^{ert} ^} genium foli in quo nafcitur.

*Eadtm triangulari folio <virid, flora zntm aureo, foris purpureo. An Cbryfanthemum Afri-
 fore cameo Breyn?*

Tota zftate floret cum proximè defcripta, cujus fitum Sc figuram omnino imitatur fed ridetur
 paulo minor S& gracibor. Foha edit yindia; flores intus aureos, extus purpurafcentes errfinus colo-
 rem quodammodo incarnatum mentientes.

Uuuuuu %

Eadema

Eadem folio treti prowbens flore purpureo. Cbryfantb. aizoides Afrkanum triangulari folio, flort purpureo Breyn.

Cauliculis est infirmis, herbaceis, relupinis, dodrantalibus. Foliis viridibus, teretibus, angustis, gracilibus digito bngioribus; Floribus purpureis: ceteris antecedenti paribus.

Eadem flore coccineo.

Haec a modb didta differt foliis nonnihil longioribus 3c floribus elegantissimo coccineo cobre comantibus.

3. *Fkus aizoides Afrkana major, flore flavo, folio piano latiori. Cbryfantbemuns aizoid. African. primum feu, latifolium Breyn. Cent. 1.*

Hujus flan subjicitur fructus orbicularis, fucculentus, dulcis, ex vetustate fungofus, candidus, ima parte convexus, lumma planus, medio umbiheobarbato; ex quo quinque ftellatim decufflarz lines ad excremum ambitum ducuntur, dmidentes fructum in quatuor cellulas feminibus duris pallidis retertatas. Crtera lupenus vide,

Eadem folio angustiori.

Omnibus partibus minor Sc gracilior confpicitur.

Eadem minor multkaulis flore intusrubente, extm tmarnato.

Spargit *caulkulos* numerpfos, fucculentos, geniculatos, reJupinos, ab radice paUida &c buxea. *Folia* bina ex adverTo; fupenoribus multo minora, Portulaci inter & Halimi folia media, incana bullatacj, alperineperrula: *Flora* denfisin ambitu barbulis radiatos, intus grate rubentes, extus incarnates, fero & mane cangenerum ntu claufos, medio verb die fole illuftratos expansos, afpedu lugundiffimo. *Stum** palhda, exigua, in fructu ftipiere minore.

4. *Fkus aizoides Afrkana, triangulari folio longijfimojruciximultkapfulari, flore luteo major. ChrJ-Jantbimum anoides Afrnanum fecundum five teretifolium Breyn.*

Hanc, eandem effe existimat quam Jac. Breynius in *Prodr.* nomine Chryfanthemum fimilis Aizoidis Arneanz ma/ons, triangulanfolia; floreluteD majorc dsfc-ipfit. Etenim pro ratione TDU Kxtatis, modo amplior Sc robuftior, modb minor & gracilior obfeivatur. *FruEtus* amplitudine nunc Ceralum, nunc Nucemjuglandem a:qua, fucculentus, fubdulcis, infungofam membranaceam 6^ itantiam tranhens, commumter 17, pluribus velp.iucionibus membranaceis loculis, favis apum fimiJibus partitus: ex cujus fummo ambitu eriguntur rotidem radii fungnfi, fufci, acuminati, duas trévs uncias longi, effigiem coronulx exprimentes. *Radix* perennat, colitirque velut fpecies liipiores.

Eadem minor, cbryfantbemum «iz,oides Afrkanum tertium, five triangulari folio, flore aureo Breyn. Cent.

Hare aftecedente minor, profert*fruStus* Cerafi magnitudinem vix excedentes, if aut i6membranaceisbuli^totidemqueradiis brevioribus, (vclutileminaMalva:) in orbem junais,acinmucronatum capitulum terminantibus conftruftDS, quibus includuntur/<miM exigua dura, angubla, rufelcentia. Reliquam delcnpionem qua: Breynii est, videfiupra.

Pag. 699. *Adfinem paging adde*

Abutilo Indico Camerarnfinde finm idem, Beloert H.M. P. 6. T. ^p.-i-i. D.HermannusBtloere Abut ill India inrepedefynommuifacit.

H.M.

Alntudinis duorum triumvepedum est, ramorum è fpadiceo fufcorumjenioribus pilis hir[u]o[u]m KWycejusfibroia. i^/wVeiba/ci mollitiem reddentia, renuia equidem, elato acuminata, q'«V inulura: funt crebnores, longis pilonTqucadhsrentia pedunculis, ternashabentcoftas, fiequentius ? bdr, jg v^n iu p^iore ^taxat cminentes parte Sapor fubacris, odor haud plane ingratus. Lutex /orw, inflexirquie fupernc petiolis inhftences, qui *Catu-urev* poffent vjden m paululum majoresefler, quina habent pctala, e Jongo kuora, venis reftis ftriata; exfurgenti e *mediojtlo*, multa funt ^mtr nula renuu, flava, ex umbilicoautem germinis fructusvirides erumpemes. HirceTuccedunt capio lemalialia, quinque vjrentibns circumfepa folus, vercice plana, in frequences, qux duo triiveplan* continent /«»/«*, caplulas Teminales, pilmum rubentes, deinnigncamu, lintci collaris more comp« cara feu cannata, puirque oblita.

Vtret.

Arctnarum amans est, Temper frondens Be florifera. In *Ange-Caimal, mi* & in hortis repenjur-Fohorum puivis inteftinis alienus est, hypercatharfin enim excicat facillimc. *Radix*, qua: ok* «K vjt. alias conco<ai3ni, fi earundem facultatum ei addas herbaSj kprx prodeft; contiitum Sc &¹¹ aJlumpcum lbmen citat aJvum.

Karim-Bu3tr« H. M P. 6. T. 46. f. 79. Abutton Indikum quince adfmguloiflorei thecu.

Moxdefc:ipta=B_eWftipitBframiSjradiçe ppximacft. •Fwim dsnfaj molli^in-quinquiB•**£ culp«d», per ambirum icrrata, pctioUs bngioribus 6c pibiis inhirenr. Cofla, giw ^ P^{ICI}P^{UL} f_{Bt}

bet brachia, vix nova fpargit. Viror in fupina parte obfcurus, in prona clarior eft. Odor iis ac fa-
por nullus. *Flora* pediculis innicentes, quints conftant petalis, è longo rotundis, qua: è viridi diluto
nonnihil flavent, duo in latero leviter fimbriatis, vntus in parte inferiore circumfcriptis leonculum longitu-
dine in ftriatis, & cingit omnibus calypas; horum ex umbilico affurgens ftylus crasfior & longior, co-
loris purpurei fimbriis ducundatur rubris, quæ gemmas habent, & in vertice bifariato dividitur
in filamenta, colore purpuram, lenifudinis fericum referenda. *Calix* vero quinque foliorum juxta
pedunculum feptem, offco, fepiflims novem foliolis anguftis fuccingitur. Floribus dsciduis è perian-
thii medio enafcuntur *capfula* feminales, numero quins, plans, pilofe, nigricantes, in vertice emi-
nentes: hs propriis loculentis *femina* trilatera, quorum duo plana, tertium corivexum, colons è
rubro nigricantisincludunt.

Arenofa latatur fblo: neque flores, neque frondes unquam ei deficiunt: in *Angecaimal* fre-
quens eft.

- Radixolei buyrique infervit confedtionis: item ex ea conficiuntur globuli fonticulis non inutiliter *Vfus* \$
immittendi: e folus chirurgi (ut iplbrum utar voce) lavamentum parant ulcenbus ac eryfipelati con- P^ow^e
venienciflimiim.

P^o. 701. Cap. XL add. *Hujm pajoremjtu fteciem feu varietatem obfervavit D. Plucknet, nobifquz*
ficcam ofimdit.

Tag. 7x3- \$!« ^n *Mtvhoacanna alba dnifrrhante feu Gialappa aliter Jifferat qudmnt Radix Jecorti-*
cata ab eadem Integra feu eortice vefluta, yuomodo Piper album d nigro differt non aliter differre
conjeBurafeu fufpicio efi D. Tancredi Robinfon. Et fane non efi dijJimiU vtri Mercatores com-
fendii caufd viam inveniff'e unam radcem,pro duabus obtrudendi.

Tag. 72.7. tin. 40. pro Decima feptima *Convolvuli jffick inUrponatur*
j7. *Convolvulus Indkus villofus Hedtra folio tripartito, flore cxruleo Herman. Cat. Hoit. Leyd.*
Herman.

Gaudet radice exili, pallida, modicè fibrifaj Viticulis longis tenuibus, pilofis, infirmis, quæ vel vi-
cinis ftopimbu5 implicantur, vel terra inoumbunt, & exviticulorum nodis novas radículas deHunt:
Folius paüter pilofisjupernè vindibus, liibtus pallidioribus, in tres lobos Nil Arabum inftar divifis, aft
anguftionibus: *Floribus* monopetalis, campaniformibus, peranguftis, pallidè caeruleis, fugacibus, ad So-
lem expands, exteroqui clauis, tribus quatuorve in hiriutum capitulum congeitis, fingulis infidenti-
bus calyculis villofis quinquefoliaris. His includuntur vafcula rotundaj plana, cruftacea, in quibus
quaterna *femina* triangular fu(ca, hirtuta. Madet tenui lafte, fubacri, ingrato, iilpedto virtiuis
purgantis.

Locis aridis incultis India: uberrimè provenit.

Tag. 718. *Descriptioni Battata Hijpanica addz GnL Pifonem ajferzre earn Flows femicictrnl dilute <uiri{*
des; interne canddos^figura Campanula,

Tag. 750. Toft iin.16. adde pro 29. *Convolvuli /pecie*
a9. *Convolvulum Americanum villofum pentafbyllum& heptaphyllum majorem Herman. Cat.Hort,*
Leyd.

Herman.
A radice non adeò magna, albente fubrotunda emittit iarmenta hirtutaj herbacea, infirma, in ra-
mulos quamplure5divaricata, fexautplurium ulnarurnlongitudine, vicinis quibusvis adminicu, jis multi-
vario amplexu fe involventia. *Folia* palmam ampla, hidiita, digitata, quinque vel feptem profun-
dislacinisincifa, altera parte viridia, altera fubincana, longis pilofis petiolis adhaerent. Ad horum
exortum prodeunt hirtuta *capitula*: in quibus font flores pallidè flavefcetes", fie poft flomm exanther
fin *femina* precedenti omnino familia. La&e quoque dilutiore turget, fobacri ingrato.

Ex America tranfmiffis eft: non muUum differt à Convolvulo iEgyptio Vellingii.

*IdemZeylanicus minor Ejuodem. P« Tigrim Jifius * Diwipahuru Zeylanfium Convolvulus Indi- « ^jr^olii*
cm heptaphyUus viUofus Breyn. Prod. fimilitudinA

Przedenti fimillimus eft, aft minor Be hirtutior. Foliorum incifuræ funt laciores & obtaJiores,
pedem Tigridis eiprimentes. *Flores* candidi quinaut fepteni prodeunt alterriatim è capitulw hirtu-
tis. Scminum medulla inaquam tepidarn injefta peramoeno fpeiftaculo refolvitur in tenuiffima can-
dida folia, plants foliis exafte repondentia.

Tag, 7^1- *Adfinem Capitis ejuarti addefequentes Convolvulijpecie,*

*Convolvulw maritime Zeylanicus folio crajjo, cordifbrmi, Bintamburu Zejlansenfibus, * Fes Capra Lti- y, . .*
fitanis Herman. Catal. Hoit. Leyd. *Silber*

Herm.
Huju5 radix, Salfaparilknonab(imiri5,inobl;iquumlongclat6que prorepat, fufcQcrasfloque cortice
tefta, & latae tenui, inrelinam roncrelçente referta. Ex qua fparguntur farmenta, herbacea, glabra,
infitmaj humi ftrata, trium quatuorve ulnarum longitudine. His alternatim adherent *folia*
iibrotunda, carnola, lucida, glabra, expanfa aut coniplicata quafique bifida, imitantia figurain
cordis. *Flores* prodeunt ex parvis quinquefoliaceis calyculis, monopetali, ampli, pentanguli, campa-
niformes, rofeo vivaci colore, umbone medio atropurpurafcente. *Semma* lequuntur quaterna, an-
gulofa, hirtuta, locata in vafculis fubrotundis, in parvum dehnentibus mucronem:

Fera.

Confimili purgativo fale ac alii con gene res pradii fuit huncquoqtie convolvulum gaudere colligit D. Herttian non tancum exla&e acri linguam &: fauces pungente, fed & experimenris multijuga* experienna comprokjtis. Refina enim radios drachma; ponderc cum vicello ovij Ufe coccinetJ, aliave convenient! ennilfione data hydmpicomm aquas bisnde fubduxit. Idem oiScium pra:ilitic radios e'tr:scum cum fpiritu Vini parati;m. Hinc faifam &imagnartameileexiffimat opinioneril quam habent Lufitani & nonnulli lndt de vi ejus diaphoretic.!, inde forte du&a quod facie extern a Sadrpsrillam referat. Licec in cenfum purgantium reponatur radix, tamen ejus folia cedunt in pabulum cu mail is, cervis, damis, caprfs tam domeftids quim fylveftribus,

Lttm,

Luxuriae locis maritimis Malabarar, Zeylan, abarumque regionum (kinfularurnOrientaiuim. Plants huicini: nilis e China allata folia nobis commumcavit eximius Botanicus D. Jac. Yti ver.

*Convolvulus inHkm alatus maximus, foliis Ibifco nsmihil fmilthas angulofts. Ttrrbib Ošana Herman. Cat. Turfithum refwj foliis Altbaa, vel Inikum C. B **

tlertfart.

Vaio longoquerepr.ar.uad tria quatuorve cubita descendit *radix*, poljicem &liuscraf?a, ligno-U, in aliquot ramos divifo, craflo fucoque cortice te<ftaj qui ruptus fillat luicum k&eum glunno-fum in pallide flavefcentem refinam illico concrefcentem, guMs primum fubductis, pofmodurii pungttivi, vomitum minamis. Ex hac prodeunt (armenta ramofa, quatuor alis donata, varios in gyros iefe con torque ntia, prope radicem lignofa, digiti craffitie, rufefcentia, in progreflu vero viridia, fo: iept6nve ulnarum longitudinem aliquando fuperantia, quorum noniuilU humi procumbiint, alw vicinas arbores fruticdqe fcandunt iifq, multiplici plexu le involvunt. His adfiant ex cannatis alatifque pedunculis *folia* Althara: nonnihil paria, molliaj incana rarique l.mugine obfita, angulofa, in ambitu crenata, leviter mucronata : Ad quorum finis circa ramortlm fiimtnitates exeunt petioli, (upenoribus longiorcs, robuftioreSj alis & carina omnino deftituti, fufinentes terna aut quaterna *ctptufa* objonga, mucronat.i, quinque viridantibus in rubrofcliohsconflataj qus /ngula excludunt *fi>rtm* monopitaluiTi, Convolvuli vulgaris magnitudine & forma, canditium, intus quinque i *pallecentibus* apiculatis ftaminuliscum fexto inteinicidio fubjeclx (eminali capfulr impacto refertura *Flora* excullo *ceptuls*. oexpanduntur, in quorum centro conlbiciuntur quaterna, rotundo-angulofa *inri-* cantta iemina, Pteris magnitudine, inclufa vafcub tenui, membranaceo, fuhrotundo, deprefc quadripanito. Confimilia iemiiiAjrlorum ieminumque invokera memini, inquit, meobiervAire iTM Mehococanna, cujus eKpanimn inrolncram una cumcaptiila Itiminaii fjJso pro flore piopoiiiiic M^o nardes & ex co Dulechatnoios, J. Bauhinus aliique.

Turbith frequens ofkndilocus opacis, humidisj ad^oflarummargincs, retro hortorum lipcs alii(% locis fylveftribus amari longs diffitis in Zeylan & Malabara.

Colligitur in ufum inekicuni non caules, ut perhibetGarcias, fed radices craffiores, turgenteJ la<Se & re'ina copioiiore. Qua: ad nos transferunturfodluntur in Guzaratta, ubi proventus luxunofus. Ha:c omnia Hermantws.

Convolvulus Bona nox Ji3m, flure candJograndi J.B. Smilax a/pra Indies Occidmtalu C. B. Bar not nocbts Htfbsnis Park. Vmim J. cap. 18. IA. a. Exot. CuC Cluf.

Primo ortu bina prorert *fidu* DmpanuU. In Ji- p m i » ^Ii «at- felii. fimili-, fed mfffficla 6f cr. illiora, em CCIAIH limilia edit foia recens natus Mechoacanus. Muln porro ab hujus plant* radice prodeunt *c. iuUs*, qui pedamenta affixa vel vicinas plantas multiplici ambhnt fpira, Smilaci* a fperie inJLir, cui etiam familia habet foji3j majora tamen & mollioi a. In caulibus etiam aliquot hanni. uas contine: fpinulas, quaies & Smilax afbcraj fed niiores 6: minus horndas. In planta ex fcr* *ae* nara Sarmenu tenelios vdutilpinarum aculeos, prarfertimcirca aiticulosgencrabant, qu* Clu niKil aliudeiantqu. im radicum rudimenra, ut m plerique plantis, pit:\ Mayzio, Harundtne, &c contingre videmus. Cujus ctiam fememia nobis arridet, iiquidem in milla Convolvu Ji (f*^{me} lar- nuntAlbinulis obfita ha<ftenus videre contigit. *Flam* autempandit candidos *Be* grandes, *mediocri* dilco pares, <hui niatutinottimporedehiicentes, noitu illico fiaccefcunt, umte nomen acccpife videtur. Calyx norem continens, [in planta ad Cluiium mifia] quinque foliis unciam feie long* & !*• m invicem ampleilemibus conltabat, ut in Cappare, quibus includebatur caput trigonum niL-nu^{lil} iaceum, tria grana inflar magnorum Pi(6rum continens, toioi is ex tufco cineracci & C p^{nc} rLiig¹¹* A: tres £Uteni/kn. rex longis pediculis dependentei craffiufculo ramo jnbaffTe apparebant.

Hxc planta cum genuina Convolvuli (pecics lit a Smilacc apera genere diveiia dt.

Convolvulus folit Sagittarix Wheeleri.

Exficcuuni vidimus apud D. T Uchitt.

Convolvulus ferpeni mariUiHus fffttfohm, Triumphetti.

Triumpf.

Cecipites aliquot plurium credorum foijonum (upna humum fundit, mcommlbes immedlate ra[^] al;os lignoik, perbreuibuf tamen, ac ekilibus vellutiituncoissimixofj qmorum majora un.i Clinh p³j^m 1>.UL:ill excakbant minimi digtti longitudinemy formaq, familia erant us CanubricJf vulgaris, m tamenangulliora; imoabexcurrentenervo mediamploiuni longitudinem (aliquot m. vn L¹¹^A^, aiiuh ordine hinc inde ad Litera demittentej fipernc eleganter (ulcau reddebantur, interne ro torola. Porro hujumodi foiorum color cincrous /miulque (j)lendens obfervabatur, exciraa t. / & m • « « « ' : : : : : « deala lanugine eadem folia occupaote; i ubftamia (biida ac i'''f^N'' feri tamen fenlibilis fapons aut odoris. Subtus toliorutn celpites pro radicibus craffiafca'''m''T' .- jif rci iiii extenoootta timx, ttaetxm, ac rudatr annuloli, adewiue fimul oaoaew«^{uc} llus ftJtM

fubjeftas crahenti reliquis etiam aliis remotioribus cepitibus infervientes eadem opera, Jm forci cdntinuatio difrumperetur) fuccederent. Harum fibftantia nervofa, cortice craflb fubfpadiceoTetta, infipida planè acifiodora/nee tenuioribus capillamentis omnino deftituta, imperfectis pribrum more annulis voluminofa acinflexa.

Flos breviffimo ac gracilihseixc petiolo plerunque nudo, interclum binis valde exiguis foliis folio/ris appendicibus ex adverf o ficis donato circa Apnlisfinem fe explicans, formâ ut in reliquisuig^ neris^fed parvitate Convolvuli SieuliBocconiani xmuluSyHon tamen coeruleus {id in candidocarneus, Qc in media quardam ftamina minimis apicibus praedita, nbrcurioris colons continens, calyci infidens" herbaceo,aliquoc incifuris diftinfto. Flore vsrD,cicò arefence parva, globola luccrefcic *capfula*, in-cerdum quacuor velquinque, parumper angulofc^j nigri coloris femimbus przgnans, fingula tamen intus Candida ac tenui membranâ invicem difcreta.

Tota planca maxime vivax eft Be folia medias etiam inter hyemes confervans.

Juxta oram i^iaricimam quâ è Centumcellis Romam itur in eminentiore quodam loco lateralem *Locust* vluti limitem fei^a publicac prxfignante a *D.Trioxfetti* inventa eft.

Pag. 741. *Campanula glabris* ~~addaturj~~

Campanula minor Americana foliar igidis, flore czruleo patyJoKzrtmM. Cat. Tracbtliitm Ammcanum minus flore cxruko patuh Dodart.Mem.

t^od. Mem.

iadicem habet fibrolam & velut capillatam, è cujus capiteinitio fundit/o//^ Rofae inflar in^orbem pofita, pollicem & L dimidium longa^ Bctres circicer lin^as \lignes/ lata, leviter erenata, firma/glabra, 4jefuper obfeurius viridia. Emedio foliorum exit *caulis*, paullum friatus, dimidium circiterpedem ahus, foliis circumcirca obfitus, figura inferioribus fimilibus, fed minoribus magifque acuminalisi Circa rpediam partem plures emitnt ramos, foliis etiam veftitos, eis qui in cauta fimilibus, verum idhiic minoribus Bcautiioribus, quorum unufquifque fastigio fuo *florem* geftat, calyce quinque-partito cinftLim, c ccEruleo in violaceum colorem tendentem, Campanx nmilem, quinque-parcium: è cujus medio exit *Jtilus* flavo-viridis, fumma parte trifidus vel quadrifidus: imum ftilum circumflanc quinque filamenta tenuia, lutea apices fiiftinentia, triplo ipfis longiores. Flore prasterito craffeicit calyx Sc quandam quafi ftellam efformac, in cujus medio fe elevat pericarpium, in tres cellulas divi, fum, /e^ewcontinensparvurn, ruffum, Rapuncalorumfimilem. *Radix* ebceribus propaginefeiiiit-tic, qui germina novafque plantas edunt. Folia faporefunt hviter adfringente. Planta vivax eft Be umbra, gaudec. Ex America adnos allata eft.

Tag. 743. *Ad cjuintam fpeciemfcuErinon Col. adde,*

FI ant am ab bac divrfam depingit & deferibit Abrah. Muntingius in Hiftoria plant arum Belgica^ quam vocat Erinum Diofaridis, ad quern Lefforem remitto. Lib. 5. Cap. iGj.

Eadem pag. pro (fiecie [exta poft Erinum F. Column* addaturj

6. *Campanula minima Africana, Erini faciej flvrt wolaceo^caulicul^procumbentibusHzymzn. Cat. Herm.*

Erino F. Columnar accedens plantula in pafcuis aliifque irriguis locis circa Promont. Bonac Sp; i feperitur, cujus feminahucadveia^ lactè progerminarunt. *Nitituv radicz* exigua, palliLLi^emittence *cauliculos* tennes, hurai procuinbentes, in aliquot ramulps divifos, quibus adltant foliola Erino Co-lumnz bagiDra, anguftiora, pinguia, craffiufula., hilari virore nitentia, (inuata, per margines levi-ter crenata. Ad horum alas prodit tenuiffimus pedicellus, fuftinsns ex calyculo exiguo^ hirfjto quinque-partito^/cw/wTwparyum, oblongum, niDnpetalum, campanula turn, quinque profundiori-bus crenis diffedtum, colons in purpura violacei. Hoc defluxo fiicedie more congenerum v?fculum oblongum, exiguum, trigonum, tricapiulare, tribus foraminibus, vix confpicuis pertufum^ contiriens *femina* minuciffima rubiginea. Tota planta^ laifte tenui aquofo lubdulci turgec. Floret ab Augufto in mediam hyemem ufque feminibus deciduis ih propagans;

7. Eadem cauliculis erettisj

Antediftzadebfimilis eft, uCantequarn adolefcet vix ab illa dilcerni queat. Cauliculos acquirit robuftiores, refta aff^gentes, dodranrales: *Folia* longiora & anguftiora: *Flofculos* nunores inpedunculis longioribu5. Cftera cDnveniunr. Offendit cum fupenore locis hurh^ntibus ad Promont. Bo-iis Spei.

P^I- fi». ?4 D. *Hermannus Hummatu H- M. idem facit Solano Jfrinofu fruciù rot undo ^ longoflort C B. Eg0 ttiam mutata [entzntid a Stramorifa majort albo d^werfum puto.*

P*K- 7?o. Ad finzm Lib. 14. add.

CAP. VII.

Anonyms Brajliliana flore tnonopetalofpeciofo.

Marcgr.

IN fequipedalem altitudinem aflurgit, *caule* rotundo, leniter hirfuto, geniculato: ad genicul^ autem hina folia fibi invicem oppoTita, leniter etiam hirfuta, oblonga, vndia, Sc in extremica-tibus ramulorum multa foliola fibiadjunfta, acque inter illa)orej ex longo calyce prod^untes, ex laftclcente dilute purpurei cobris, unica quidem parte conftantes, fed iuperius in quinque laci-jlias divili, nullo in centra ftamine. Pofit florem fequiritur folliuuli magnitudine grani CannabiSj quibus ~~caulis~~ compreflunij fufcum.

**Prz. 758^m Yro 16. *Linaria fptcz interferdtur,*
16- *Linaria annua angustifolia flocults albis Imgin c and at is Triumphetti.***

E radice binas circiter unciaslonga, eaque lignofa, tenui, albocortice induta, in contortas fibra.5 diflefa, ac barbularum fatellitio ftipata germinant duovel tres *caulkuli* initio recumbentes, tenuiffimi, ilibvirides Bi fucofi, quos radiatim per intervalla cingunt fuliula ut plurimum quaterna fimul. Integra, Dblongo-angufta, craffiufcula tam en acfaturatiuſ virentia. Horum cauliculorum unus vel alter ad fummum, plantã magis adoleſcente crigitur ad palmarem vel fequipalmarem akirudinem f paulatim interea eontabefcentibus csterisy, tun cquehujuf modi gaulis reiftus, rotundus, lignofus & C craffior fpeftaii in dpi t, interne quidem alba medullã repletus, externe vero involutus membrana, firmum hilvã, deinde pallefecnte, qui infupcr in aliquot pauciores ramubs fepe dividitur e finu foliorum erumpentes. Folia autem fupenora ordine longidra fiint SL anguftiora inflrionibus^ K un- cjalia tandem evadunt^ fiiprema fingulatim dependent Be ferẽ capillacea redduntur. Ex fimmo caulicubrum adventante Junio prodeunt flofi: iili rari ac exigui, brevibus pediculis fuffulti, e calyce quinquefolio reliquorum congenerum fimiles, fed perexigui^ calcari longiflimo, colors penitus albo. *Capful^ oblonp^, turgid^ circa medium patenti rima diftinc!)*^ tenui candidoq̃ue diaphragmate in geminas cellulas difcret^ utramque copiofo ac minutiorẽ femine, maturitate nigerrimo, ex rotundo in oblongum declinant^ repletus, altera extreniitate latiprcj cujus panter iapor, uti ctsrarum parrium, flibamaru5.

Semine completo Planta penitus exficofitur.

Roniae prope Farnedanos colles, non *lungẽ* ab eo fitu quo meridiem refpiriuntj lipius ubf^vavic Joan. Baptifta Triumphetti.

Pag. 716. Pro ig. *Linaria fpecie ponatur*

Linaria Americana maxima purpureo flare Herman. Cat. Hort. Leyd.

Herman.

Eaults huic rotundi, Lxves Be ramoſi, humana altitudine quandoque fuperiores. *Folia* quina, qua- ternaj ternãve ex adveifo^ abfque petiolis ordinatim difpolica, uonlimili ferẽ facie Gentians concavac, ex bafi^laca in acutum mucronem tendentiaj fupernẽ glabra, lztẽ viridia, infernẽ pallida^ ali- quo: per longitudinem excurrentibus nervis inferipta. Summas virgas occupant *flores* monDpeCal^ in fundo inLegn, purpurei, reliquis omnibus Linanz fpeciebus ampliores, anteriũ riftum, pofterius calcar habentes. His defluxis /uccedunt yafcula rotunda, liirium verſus bifariam dehijcencia, * & qnibus *femina* nigra, orbioilataj compreIa^ foliacea, qux globulo rugofo pallido, tanquam fep^? mtermedio imbncatD ordine circumftant. *Radix* lubeft, alba, tenuis, fbrofaj vario reptatu longis laceq̃ue feſe diffundens 8c iungulis annis nova germina protrudens.

Pag. 761. Ad finem Cap. dz Antirrhino add.

In Hort. Reg. Parif. & Hort. Acad. Lugd. Bat. habetur

Ajtirrhinum longifolium majm Italkum flore amplo, ni^to^ laffefcentc.

Pag. 763- Ad finem hijaria: Pijhlocbia Critic* add. Medici & Pharmacopcei Londinenſes Polyrrhizon yirginianam diftam k Piftolochia Cretica diverſani ellẽ contendunt: Et fane ipicimina licca ucriufque planta: qua: apud dlarifll virum Be Botnmcqn K=rr^ pp^miffirnum ~D. Leonard. P. Juck- nec, MD. vidi^ plantas diverſas eſle arguunt- Rem curioſis diligentius examinandam propono. Ca- terum omitti non debuit Herbam hanc certiflimum eſſe Sc prarlentaneum remedium adverliis lethi- feros mor/us Serpenſisilliuſj tjc fiattfcfnalte poſtratibus difti.

Viret.

Herbx comman/i iuccum deglutiant, ftatim a mor/u, Be contufam vulnere imponunt. Radicis Si herbs pulvis in vino aliõve convenienti liquore fumptus morfiim canis rabidi fanat, 6c ab hydro- phobia defendic.

Pag. 764- Ad finem Capita de Ariflvlochi* addatur

Anjhlocbia longa Mzxicana, Tomabuafli copatli Hernand.' / . 1. c. 24.

Herba eſt volubiliſj *folm* cordiformibus, Cacaliſftla copaulis fimilibus led majoribus K *rotunAiorj-* bus, *caulibns* tenuibus, plexis, gemculatis Bc purpureis, purpureifqucfonbus radice Jonga, craſſa K P^ J^ lida; fructum fert craſſiLifcũlum, Curcubitis Itnatis ac pent agon is quadantenus limiõm, J^ r^ j^ n femine. Nalcitur in montods Be calidislocis; qualis ell Tlackmalacnliõ- Be Huaxtepcen/i5. K^ Li^ eſt nonmhil amara^ guflu adltngentej Be refmofa.

Pag. 767. Ad jinem capitã dt Scrophularia add?;

*Scrophularia pertgrina fruteſceni foliis Tucruí crajjuſculſs Brcyn. P10J. Hort- LugJ. B^ *1*
man. An Scrophularia Tilepbu folus ?

Htrm

Hare ob elegantiam U perpetur) virenrcrh comam omnes Scrophularii fpecies antecellit. ^{11 • p adict} pallida in contort-is fibnllas abeunce *caules* crigic rc4*os, firmos, fnitejccates, alcirudinis lelq̃ip^ ^ quadrangulos, virides, Ihãtoſj geniculatos, frequences in ranios diviſos, quns ad Hnguhi. K^ n^ iirre ^{gum folia,} crairiulcula, Jiibrotumla, grenac^ uigLien vix CXLCLICICLI, vulgaris Tucruí racie, ^{inferiore bina adverſa,} fupenore vero folitaria. *Floſculi* infident exiguis quiquihilis calyci. ^{phuljnx Ruw caninj diftr limiõimi,} niDnocLnh, fubromndi, in quinqc Liunias, qua^ ^{peraladiflectti,} per, ilo lupcnori purpurafecnte, bihdo, galca: inUr, binis lucralibus ^{dis,} imo laburo, exiguo, purpuralcnc; profluemibus L- medio^ IIAII *fiamimbut* candid^ V^ ^{purakennbus donacis-} Florçs excipit *uafculnm* JiibrDCumhiin, arismiiarLiini, bic. ipluw^ ^{dchi/Lens,} contincn5/r^n« exigua^ tuka. Piopagacur feliciusramulis quii

C. Bauhinus Tripoliurn Ang. 8c Leucoium maritimum aliud (*lam*, Leucoii marini latifolii Gzr. fynonyma facit. Parkinonem iconem Camerarii afflunit pro Leucoio fiomarino maximo, quod nihil aliud est, nostra fententia, quam Leu coium maritimum nollras, ut diximus; maritimum autem nostras cum maritimo majore *Uttf* idem videtur. Quorirca ni inveniflem in Catalogo hort. med. Lugd. Bit. Leucoiurn mark, finuato folio G.B. & Leucoium mark. Camerarii J.B. à D. Hermano, cui notiora esse debsnc quam nobis, utpote qui utrumque coluerit Sc ob DCUIDS habuerit, prodiverfis Iperiebus propohta in lententia perfittiflem, eandem plantam esse Leucoium marit. *Uam*. Be mariniim majus *Cluf*. quamvis Tnpolium Anguillar* longè alia res fit & refitiùs à CBauhino ad Leucoium maritimum latifolium referatur.

Tag. 781. Ad finem Cap. h de Levcoio aJJe,
Leucoium Afrkanum cosruko flore latifolium hirtutum Herman. Cat.

Herman,

Ex radiada tenui, albente, fibrola exoriuntur caules Hngulares vel jramofi, bipajmares, graciles, hirtuti, atro-vircntes; quibus ad ramorum finus adtant/ > // ^ nonnihil finuofa., pilofk, craffiufcula, Integra, raro laciniis incifa, digkum longa, unguem lata, nunc latiora, nunc an^uftiora, nervis venite nullis inferipta. Flores brevibus infident petiolis^ forma & uolore Lini fativi iJoibns zmiJij aft quatuor tan turn petalis conftrufti, totid6mque fubtus vindantibus parvis foil oils muni ti. Hos excipiunt y?//^ < ^, digitum langx, anguflacj compreflac, bivalves & L bicapfulares, quarum feptu in terms dioutraque parre *adhxrznt femina* exigua, rufbfeentia, oblonga, parum comprefla. Seminum ftpor deprehenditur lubacris: Odor florum nullus.

Incola est Fromontorii Boiia 5pei, amans faxola incuha Sole illuftrata.

Leucoium Afrkanum coerultv fkrz Caronopi. angufio folio minus Herman. Cat.

Ab antecedente differt partium omnium exilitate.

Tag. 785. Adpnem pag. adde,
Muntingins in HiH'or-ia plantarum Bdgka Dentaria quandam fpeciem dzpingit, quam vocat montanat^ radice non dzntata> rar & infolent is forma, quam apud ipfum vidz lib. 5. cap. 18 f.*

Tag. 790. Add. *Taronychia Buglojz* folio D. Banifter, apud D. Plucknet <vifa_m*

Tag. Rv"j. Ad finem paging, pro feptima *Eruca fpzeic add**,
7. *Eruca ecbioides Afrkana fiort coerultQ Breyn. Prod.*

Tag, 814, Ad finem Caf. iy. pro 17. *Eryfimi Jpzcitaddatur*
Eryfimium filiquis quaji impltztis Tyrmakum D, Fagon.

E Catalogs nondum cdkarum Hort. Reg. Parif a^ D. HanJ, Slav** ad me tranfhiiffo.

Tag. 816. Ad hiftvriam *Nafturtit aquatki vulgaris addatur*
Nafturtium aquaticurn maximum D. Fagon.

Item *Nafturtium aqunricum minus*, quod hac zftate [An. 1687] obfervavit D. Dak. Foia triplu minora funt quum Siymbni vulgarisj flores & filiqux conveniunt. Florendi tempore menftruo ipatio jllud antecedit. Iifdem in IDCIS cr^fcit.

Tag. 819. Ad finem Capitis de *Rbapbano fylwftri add**,
Nafturtium impatizns lutzum filiquis curtu, fortis Rhapham aquatki fpecie Banifter. Caf. Pleafc Virgin.*

Ramu'um hujus ficcum vidimus in horto ficco D. Leon. Plucknet M. D. Londineniis.

Tag. B1}. *Toft I'm. 30. addz3*
Cochlearia major Batavka zrttta folk oblongo Herman. Cat. HorL Leyd.

Hzrm.

A vulgari majors *Cochlearia* differt tantum cauliculis refca aflurgentibus, dodrantalibus, aliquando cubiralibus, Sc foil is oblongis. Rcperi in u dull 5 area Carwick.

Tag. 827. Add. *Nafturtium Virginianum filiqud cvmpreffjd.*

Tag. B 3 7- Ad cakzm pagirue adde,
Tblafpi Halimi folk fimpzr 'virtm Herman. Car.

izTJTK

Forma 5c magnitudine à Thlafpi fruticolo fpinofD non mulcnm abludit: verum cauliculis est herbaceisj Ipims omnino deftirutis, pallidis, glabns, incumbenubus humi, B& in aliquas alas divaricatis: *Folits* brevioribusincanisj (plencentibus Halimi de more: *Flonbus* nunc in Jpica, nunc in uo- billa difpofit^ candidis^terrapecalisj quos excipiuntj/ziri/^r orbicular, depreflij fepro inte- per cranverfium, hoc est anrrorum Sc retrorium, eas in binos loculos dividente; quibus inclL. Liitur/er>CTi uniLLim, orbiculatum, deprefliimj ruffiim, acre . . . amjta- /V. 8; o- /111.1. Not. p. Hermainusin *Cat. Hirt. Leyd.* cum Morifono *Eruca marjma* ^^ licam ab Anglica diverfam facit. Ecrevera fi ahera monofpermos iir, aJtera ^P** *V an folio lacore & craffioic, alccra angulhorej non pner ratioacm id facit. Nobis wrnenn^ S rals

tius contemplantibus Eruca maritima nostras cum Eruca maritima Narbonensi & Italica eadem specie planta Vila est. Ac Hermannus potius fidendum, qui utramque colit, Be ut credi par est differentias Deservavit. At illi non libenter concedimus Eruca maritima Anglicam folio die k> tbe & crassiore quam Italiam.

Eadem pag, Raphanistrum Mempernum capsula capitata & aculeata ad instar rostri aviculas Morifon. Myagrimum ex Sumatra capsula spinosa Zanon* Rota* Hienconthea: fylvestris species.

Eadem pag. Ad finem pagina adde

Rafhamfirum monoipermum maximum Ehalepnse, fiore hteo, capfuU rotundifriatd Mori/on hift Morifon.

Folia prima edit Sinapeos more: Caules producit bipedales Be tripedales secundum folium cui committitur, nuic^umilioreSj, nunc altiores^ ramofos admmodum, in quorum rahiufculis exeunt flores tetrapeali, JuiBl; cum muhis ftaminulitidem luteis, quibus fingulis succedunt/Z/W^ lingulis, rotunda^ friacarjufutz, definentes in apicem acucum^ramis brachiatis prxdiftis iniffences dense fati dilpofit.Tr ad^sdalem&fefquipedalem aliquando longitudinem.

Floret iib nmem a;ftacis, &c femina macura edit ineunte Autumno. In fingulis filiculis fineula continentur femina.

Fag. 84?. Ad finem Cafitis de Ifatide adde

Ificis fylvestris minor Lufitanica Herman. App. Folia profert Myagro quodammodo paria^/ed pau^ 16 ampliora; caulculos fpichainaros, ramofDSj graciles; Flofculoi luteos, tetrapetalos, exiguos: sining las gompreflk5, fungolas, avis lnguam refei entes, in quorum media Semen unicum, flavunj/oblongum, acre, more congenerum.

Fag. 84?. Veronicam fpicatam latifoliam C.B. invenit D. Lloyd ad latera mbitis eujfdam Craig Wrtidbin diiftin Comit. Montis GomenciWallia:.

P^gf). Ad-vires Opii add. R OpJi 9j. Sal.nitri, Camphora anagr.iiij. Olei Carvophill.gutvi M.f. piluls parvzindens in cavitatem dentis dolentis 3c permittite falivam ex ore effloere. SZDS tollit dplorem dentium in momento. D.E.Hulfe.

Fag. 857. Foft Fapavtr comic, violaceum adde, Papaver corniculatum Hormini folio D.FlucknetJ

Fag. 858. Ad vires Chelidonii majoris addc, Uium Chelidonice majoris PeftemaPhn n r.^: cekbrat bbrandus DiemerbroDk lib. dt Fcgle.

Fag. 8 J9. Ad finem Cap. II-profpcie Chelidonii majoris adjiciatur

Chdidonium maximum *Mvhw tanadmft Cornuti. Park. Item Ranunculus Virgimemfis alhtj eufdem.

Morifon.

Eregia hxf planta perpaucis confat foliis, longis pediculis e radice originem trahefitibus, amplis-rotundis^laucevirentibus, BcVitiumfohorum modo laciniatis. Radkzm habet carnofam ut Be folia fucoflavo aut auroo virus quoddam olente turgida; fi qu^libet ejus pars rumpatur illico pradiftui juCUS emanat. E radice immediate ontur pediculus brevis, tenuis, fubub {ifl^ -4 al- bum, txplurimis petahs conflacum veluti Cyclamims flos/pknt^ d S S f S. r. i. f c. ^ ^ al- bivalvis, craffiorfeupiffiDr, fine fepto medio, wmtinens multa/WPWIM, majora feminibusTnoff- raCis Chelidonii majoris.

Planta est Americana, in Virginia vel Canada proveniunt. Anoipalis filiquofis pociu^ p uam Chslidoniisannumeranda nobis videtur.

Fag. Bfp. Ad finem capitistertiadd.

4. Smapijtrum Indicum triphyUum flore carneo minus non frindum. Herman. Cat.

Htrmav.

E radzelmly albente, parva caulculum erigit cubitalem^ in paucos divifum raniDS, ad t u u r glutinofum, cui adneftuntur folia terpa^ petiolo modo Jongiore, modo breviffimo ramis cauliculog, preffius junfto, fuffulta. Flares modo albicant, modo ex flavo pallefcunt. Cscera Sinapifro Indl^ copentaphyllo omnino paria.

Locis aridis ficcis, cultis Bf incultis utriufque Indiac mirabili fecunditate luxuriat.

Harum plantarum femina fapore & virtute Sinapi non tantum imulantur ejuoque loco fubftituunturj verumetiam a Lufitanis in India degentibus Mustardo demato,hat: est, Sinapi fylvestre appellancur.

Fag. 864. Froseptima Tthymali Ipeciz iriterponatur

7. TixhymalHs Lithofermi majoris folio Magnol. Append.

PlurimDS producit caules cubitales, in quibus folia fequunciamlonga, Lithofermi majoris fed aii-uftiora, confertim maffantur, qua videntur glabra, quamvis breviffimis pills donata lint. *Flarts St fcmina lunt ut in allis fpeciebus.

Fro oBavo & nona,

8. Tithymalm Amygdaloid?* five Cbaracias arborefcens fiorihm purpureis major.

9. Idtm florihsflavejcentibmmimr* Herman. Gat. Hut. Lugd. Bat.

H05 nequs depirgitj neque defcribit;

1 ?.

i o. Tnhymaitis Hibernian Mackenboy dlfiti.

Hunc rrentem mihi notidum videre licuit: in ficco folia latiufcula & okufa kint, non crenata, nee admodum ciebra in caulc, <Jn (atls craiTus efr, dodranralis aut pgdalis faftigio in ramulos at-juocdiradiato, Scfoliorum ydlm corolla dncto, ut in aliis Titliymalis.

Seminal non obfemvimiis.

J*fl<f 870. (w^? mtam ^uartatn a<hle,

Charralycen alteram Virginiatumj foliis crenatis& macula fufca eleganter notatis, quam exficcatam aputi D. PUclna vidimus.

Tag. tadem, SfcekM Tithynmlt ~J>- P. Htrmtmus in Calalogo flamanm Horti Atadtmicl Lugduno-Bittavi, •

TihjmdmH Rirgufinam flore luteo fntafttalo vucar, & fie defcribit.

E Radite lignofii, tenuij pallidij caulkuhs promit dodrantaicsj ramofos, quafi friticofos, gracilej tainci, giabros, fubrubentcsj ahquundo exiguisfermjmcis pundis & tuberculis aferper^s. Hisad-(L:nt fotiarzra., lin^ria: p,\WA, ied wiplo breviora, infigni per longicudinem nerva iniinpto. Raniorum cynns in(idcnt/tr«, qumqut;oibicil!atis flavetcentibus petalis, rotidmqueconcolonbus fit-m^mulis; iingulis duobusapiubusdonatts conftru&i.: c quomra niedio prominec <vafculum, prsvuiu, trigonujii, trkap&larc, ecu arem-Jamm minutiflimamm congcau, aut vemicarum inftarafpe<-Ujftlj tnbus t (ufrirto eKOUAibus ibnimutis bihdis. In fingulis capfillis concmettir femem rocundura, ftitcum. Etaftswa pollutat culmranij inprimis hyemej tujus ngidiorts injurias minime fiift" net. In nofrate ccelo foioqiw fomina raro perficienij per rasanulos fe propagari patkur. Anomala efl planr.i, nee genuina Tithymali fpecies.

Pag. 871. Tthymaius ferrucofus J B. a D. Dale aliaibi in Eflexia aut Suffoicia inventus eft & in ho: turn tranflatus: locuni non niemniir.

Pag. 871. hn. 9. add:)

Tichynialus Ranunculi radice D. Fagon. In Cat. Hort.Rcg. PariC nondum editarum-

? "£'%Tl- fro ttrrt* fpteU Euphoria aide,

3. Crtm alut Ipms crtbrigtbm borridin D. Watfo in bwto Chljiant) cultits, anruloftor & fpmoftef Jr

Hermann.

4. EJa-Cafc H.M. F.i. F.4.;, f^%.

• Frutex eft duuim hominum altkudinem fuperans, nafccns in arenofis. Radw crafla, (e ...a) in ttram demirrens, ac tibras hinc inde emictens, intus lignofa, cortice extenus fufco, intus candidf & Iadeo. Stipesqui ex radice unus afiurgit, rotundus, acambku amplexum unius brachii implemSj Ut ^ rami, quos hinc redos, hinc toi tuolbs emittit, cortice vaMc lacteo, ac in (iiperficisc Jpinis, binis&bsnis, tranfverfis, durisSt aculcitis, ac in fpiralibus tra&ibus ordine litis in tomm muniti, cum tenenoies iinnt coitice viridi-fuicOj ac intus pulpa criam alfaicante ladea, vetufiores iignoii cortice minus viridi feuancreo, & intus Jignofi. Folia tranfrerfim, vel etiam furredini produnt, pctiolis, rigid is, trailis, brevibus, kcici>. tmmi<> fef «< ff •••» ftuywt TMi ramis corqmcim'circint-iLc.i, iuntqus oblonga, lingu^Formna craiB, denfa, anterius totunda, feu ctiam rotundo-culpiditaj nullis venis feu nervis ad rtlurii conjpicuis pertefta, in exteriori parte unam cotfam cmniantem in niedio hsbefaa , in interiori ejus tradu iirilco ftnata, nullis ,ilus ncrvis ad vifum confjacuis psitexra, intus valdc la&eit, u;perlicieplajia &glabra, colore cumtenenoraumt viridi-flilcdf ami vaultiora vmdi-ctaro, acdein mvefcenti.i decidunt. Folia temper el iummiiare ratnorutn ac furculorum increcentiutij qui virides futit, emmpunt, inienoribus dcciktni=, nocalque albicantes & extuberantet relinquemibus.

FURts linutss floribus pra;cedentis, ac fupra ex nodis prommpentes. Florlbiis erumpsntibiis Co-iiia maginex paito doeiduntj ac maxime in luperiori parts: caulium vlfuiKur. FiLidus cam primis ipeioi iiceni, cumquaScuiffa floret.'

Radice COJ tex intus & epotus in aqua in qua Oryza coda & lota eft, fervit pro hydrope, eliquo medicanientum valde * lene: ejus Jac cum butyro in quo decodum eft datum blandc e lenner puegat. Folia ad igwrn calefaiSa urinam provocant; eomndem decxxiii Hamad(ai vapoi excepus doloibus corpoiif feu niembroruni mitigandis ac depeliendis contoi t. Succus ex foliis calcr<ttis Jcu paruni toftis expieilus & aairibus inditts eorum dolores fedat • td^mque octtilis infitillatus eonun nu-iKCuiis toliendis confen; qnin Sc in lotionc corpons prodefit pro pudendis tumefiit.

Nor. DL; Euphorbii plant.t dilii; mi re video eximios Botanicos Pad. Hennannum & Joan. Com-mehnum. \k tljkrts vrbis negat figuram Dodonii effeveri Euphorbii; illepro CupJiOf!)i^o^f^o icerwn proponit, U<xlon*i & Lohcin Euphorbium. Uterrcdius? AflStapclmm hlium pntocw" affirmana Ccieiin Spinoliim G(r. non aikur differe ab Euphotbio IW.quam ut adiltani plao^atn a |uveae.

Eitpborbi* cognate vel EfuU Indicx Bonti <nnc plan: * &eyn. Proii.

^•878. fro emnta Ruta Jpecie addatur,

J. Ruta Cbzknfn tamifilm flsmn ptalts vMs featntihui Moriiion. hift.

M. rif-

H*c cum pfxa & cati in omnibus fere quadrat, min (quod dicitur) qu. ttuorp" ^-I rodor -P) numerosis vilhs leu pilis luteis icatwnt. Capmat femuiffi" FF" "I tragoto, mmo, -tpdtlis pncesdaotM pita, atque in finRiilis locuanicntis (qua. lun^J^d* mifludorafcijiin*, anguloli q i M r a p d L a l } l u i i y r t

* Uittfljoc
similiter acc
& caustic
planta sur-
gou.

fa.

Habetur

Habetur in Horto Acad. Lugd. Bat. hujus generis foliis latis. In Catalogo quodam ad me misso in-
Venio Rutzspeciem arboream latifoliam ditam.

Fag!Ej^ pollnonamVlantaginu^ fpeciem adde,

ID. Fjantago Myofotis five trincrvia birfuta Carol'miana. ^dillie ta^ lantaili ftoill Carolina.

T,x reminibiis c Carolina America: Septentrionalis provincia delatis induftrio HortulanoD. Derby
Hogfdeniae propè Londinum enata eft. Radix fibrola reliquarum Plantaginum fimilis. Folia tres
plus minus uncias bnga, unam lata ex angufto principio fenfim dilata aliarum more, hirtuta, tri-
bus tantum nervis [in plants ad nos tranlmiflk folio] per longitudinem decurrentibus. Spies bre-
vibusBe tenuibus pediculis vix unciam excedentibus hirtucis, ipfz pariter tenues brevèfque, adultz
fortè aliquanto longiores funr, tune tamen proculdubio tenues 5e psrexigus. Communicavit D, Doodym

Tag. B79. pro wdf*Plantaginis fpecie adde,

ix. Vlantago Indica Q B. Payco herba Monard. Cluf Exot.

Monard.

Herba ex Pei'ivia miffa, incolis Payco ditam, cujus folia Plantaginis foliis forma 6c colors funt
fimillima^ reficcatà valde tenuia, 6c guftata impensè acria calidaquedeprehenduntur.

Eju5 pulverem ex vino fimpptum nephriticum dolorem à flacibus aut fngida caulà prov'eni-
tem tollereaiunc; ipfam verò plancam co&am Be emplaftri modo dolenti loco impositam, eundem
effectum praeberè: quodveriflimum eflb fe experientia didicifTs affirmat Monardes.

Pag. B80. Un. II. adde/

D.Edv. HulJe in Manufcripto quodam D. Page, M. D. Suffolcienfis hujus herbae pulverem ad-
versus morfurn canis rabidi commendatum feinveniflbcritib; Rf, inquit, Coronopi (Herbam*Scel-#
lam tiDnnulli vacant) quantum velis^ mundatam Be in clibano vel aliter lenj calore exficcatam DT^dr^fj^per
in pulverem liibçiliflimum comminuas, ejufque quantum folido noftra: monstx incumbatj plus errorem sfa-
minufvepfo ae^roti ztate, inconventionaliquoliquore ceuvehiculo propines. mnd?s Salam.

quam in ^Stiffblcia Stellam tmxvocat^fro Coronopo quam hzrbarii nonnulli Herbam StclJam vgcant habuerit :Jifuidem Sejamrides^d-
ludadvznus morfumsanis rabidi valdi celebratur. mazzmm Chac

Pag. 887. pro xi. Pbafeoli fptciz interfiratur,

X4. Pbaftolus Africanm birfutus^ bituminofm^ jitiqius bullatis, flare flav Herman. Cat. Hort.Leyd.

Hujus femina (inquit) ex dehvibus irriguis montis menklisfeu Tabulati PromontDrii Bon. Sp.
hue advexi- Proferebant plan ram drmençofam circiter trium ulnarum longitudine, more Pha-
feolihortenfis emitrentem ex radice lignola, alba, fibrofa farmenta tenuiaj terna quaternavc, valde
ramofa, folia fuhrDtunda, obtuse muuronata, fiibhirtuta, glutinola, bitumen quadantenusredolentia.
Flores Papilionaceos flavos^ aliquando lineolispurpleis inferiptos: Semina rotunda, nigra, parva,
hilo albo exiguo, in filiquis parvis^ tumidis, vilbhs. Diligenter cuftodita viget tota hysmc, mul-
tofque annos durat.

Pag. 889. pofi Un. xi, adde,

Pbafeolus Brafilianus Mucuna Guacu diftm Pifon.

Pifo.

In tanta PHonim Fabariimque apud Brafflienfes varietate hzc fpecies ca-teris facilè antecellit,
turn magnitudine turn pulchritudinc. Crefcit ex arbore qux ejufdem eft nominis. Faba hxc ILLI-
gra pelb, lapidis fere duriticj pilis flavis, molliter eft veftita, nianum longa. Be tres digitos latV
Vi effrafta pulcherrimi globuli, inter ft ltiis divifi exinde prodeunt tres quatuorve punicei Be rubri
coloris, rocundi, laeves, magnohib, qui (i in aqua macentur, yim noxiam ex parte deponunt,
&L cum Tipioca de Mandtboca praeparati Barbaris edules finnt. Ita utvenenata carum qualitasnon
ufque adeb akè pofita à natura videatur quinretundi patiatur à correaorio convenient Quippa
cum interior fabsE fiibftantia acris (it & mordicans, vifcera vellicet &c ulque eò turbet corpus, uc
vomitus violencus 8c alvus mDveatur, refrigerans Be demulcens alimentui^i hoc medicamsntofum
ex Tipioca factum ceteris Antidotispraeferri lolet.

Pbafeolus Armrkanm fpimfus folio parv^> Rhomboid* D. Plucknst.

Fhafeolus pzrennis fruticefctns Afrkana filiquid trianguU eretfd Tho. Bartholin. Aft.Med.]

Pbafeolus alatus Indicus fruilu fufco, orbiculato maxinto, hbis Utiffimii & hngiffimis, PHZ,U/*I Zey-
lommfimb Herman. Cat. Hort.Leyd.

Pbafeolus alatus arboreus, frufu orbiculato comprejfb coccinw Mandhatbija [tu Mara Ztylonenf
Ejufdem ibidem.

De Phafzolis Brafilianis Cumanda ditis.

I. ZumandaguauH, i. e. Faba magna Pifbn,

Pollici5 funt craffitiCj Be ficut prsfanc Europacis magnitudine, ità etiam lapore Sc falubritate. In-
ftar fullis ad arborum cacumina enituntur, eafquçHsdera modo compbduntur,

Fabae correfafts Be contufa:, cumque ovo exhibits, contra fluxus ventris in u(u funt. Coft* vero
ad cataplafmat5 modum 8e ventri impofitae colicis doloribus medentur, ad rsvfenda quoque apo-
ftemata parti affifta: applicantur.

X X X X x x x

Planum

Plantam hanc cum neque describat, neque depingat Pjfo, an fit ex defaipsis, an nova indicia nefcimus.

4. *Cumanda guira* Marcgr. *Vifa*.

Mg

Frutex est elegans, toto anno florens & fhullifera: cortice virkli ligno frajjili; in ramis aitem multos habet ramuloSj furredos, iefquidigitLiin longos, direcle fibi oppofitos, led paria alcernam pofita; 5n quorum uno tria funt *felia* oblonga, actiminata, foliis Salvia', -iaira; familia, interne ?ibicantia, fuperne viridiora, & ad taAuni inftr Senci Lcvia, conlpicuis venis pradira; in altero floras fex, lepteni, aut oculo, hitei, Piforum noftratum magnitudine, fohis duobus furfum veriis aim fur involucre*, & uno deorfum, quod maximum, inferius rubris vcnulis per totum JniTgnicum. [f*/«*fc dlfenbit flora, vel mun fitus m bac fpecit mwitur, [tan eutem fraatUubit) tetraftali & fdpiliauKM] Floribus fuccedunt *fbftm* comprefl^ & quafi contorts; quarum quelibec contmet quatuor grana Pliakoli, alba, noftris Pi/is pau!6 minora, qua; co&a iwne fapiunt, & alvum la? ant; ideoque Bt Iknfibis atque etiam Lufitanis in frequenti fiint uo.

Fioient ac fiudus fijrunt toto anno.

], *CumanJa* iNtripliciter diije non videnrur diffen-e a PhafeoJls ralgaribns.

4. *CcrnAtidorviin*, L c. Fabi parvse, iunt Piiia Enropsis magnitiidiiie paria, ied'oblpnga & noil rotunda, aibi quoque 8t leucophsi coloris. An Phaieolus tumidus minimus niveus J. B. ?

5. Phafcolus elegans, *GtumJu* didus, Turcitorum modo fcanck, iifiimque e(t tbtis 8c floribui fed multo minonbus. Jucunde lemper viret, perpetuifque copulatis liliquis parvis decoratur: ic ut ob ornatum *xqui* ac u(m fativa fada fit planes.

Hoc genus Phafeoli adeo expetiti lunt prac exterbj ut non minus *gris iguam finis conducant.

6. *Gartmbee* dktar Turads Phaleolis aliquanto funt itiajores, colons nigei rinii *Si. opom* (hon fid minus frequences precedentibus.

In Horto Reverenaiffimi Domini Epifcopi Londinenfis **Phtfoli ipeckm vidimusfeP** inollibus lantiginofis & ferf j'neanis, brevjonbus & pomndioritxti qu&ra cujus aliis Phafeoiji hactenus vlt, aliqus pliois, femine nigro plendent. Eandem hanc putamus Phafeolo Africano hirtato bitaminolo, hliquis bullata flore flavo D. Hermann superius defcripto. Folia utique cum fo tnaquamodorcad Tnfol. Phafcolus Hord Francofurteifis folio iibracuntlo a pud D. Pluckert vifus nelcio an idem fuerit prisedcnniim alicui.

Aham etiam Ipeciem habemus ex eodem horto a D. T>oo4y tranfmiffiri foliis piagnisglai**if longos mud ones produ&iSj an decriptum nefcimus, nee enim flores, nec fructuni vidimus.

Vhaftdm InJicui cohlftsto fiore Triumfetti. Amricannts premu fiore cochkato idorxtc, fennu hits fufiu ttkulMH, Cmacalla Aiclus Hermann. Cat. Lcyd Piiafwl. calyce c D. T.Robinfbn.

Intutitur *reitti* infigniter craiTij & i ad palmi circiter longitudineni tulicrofa^ qua; praetenjua quod in alias minores adnatai miHtiplicetur, fenfim etiam imminuitur, lioc pado mukumJini radici balani myrepiica; *Aldmi*, omnetque tandem in fibras nonomnino reftas abferuntur. hujufmodi radicum iibftantia carnofa & albicans est, odorom oleraceum refrens, extsnuiq^ obducitur tunui rufejeente niembrana, nee fibril's proDaaiiibus. in ilw?"»» pn«i«tJtn ubi «W erumpicj derticnitur. *Cmlu ve.ro* larmencolus utique ac lent us digits lcm iere crafficim^pocilumium (enionbuSjacquirk, infirmuSjfaturatepurgureus. Circumvolvendofe fcanfensad %o ufque cubicoru^ akfudntcm una xJiite, in minores alios (miilicer fcanfentes divifus & fubdivifus, lumrnatitibui iah^ dibusSi herbaeds. *Felta* vulgarium Phaleolorum foliisadani;iiiiii repondcnjini quod minus *dunoa* tamenexiftant, vici*kpore, odorenul|o,peccicijiiifi;mipairaaribusraoimervallo CJ inordinate inh^ren,tia. Equoium finubus incltiunre a:fbte prodeunt palniar<> cauiiculij fra<au contumaa; nitide yuctuq;. recli furfum ^e<Santes, ac argenteis glab;ilts velut ng coptOse onuftij qm magts intumelcentes. area Autmni mitia fie in fpirakm formani aliquaten targidam clonganutr, IU cochieara (uo putaniinc exutani cgregio l ipja.>(cmcnt, colort: prius mo candjdo janthino, fuavique pwpura, pra?d(we circa ipiraitim centra perfufo. Hsc autem noniml ruiimenta. *FUt* ipfe ex argenteo calyce (quern fiiftinec nicide nrens petioius) cyti^1" ^ Punicu quoad formam refiKinte, bicyriore tamen, pandit extenus quoddam petalutrij^noau Jaw^ dine, at bngitudine mapn in trcs fpir.is circumvolutum, intus ac foris diluioie aTiigmeo^o^g intectunij qua umen cafyei infentur aliquvd (plendentis piupura: adniixtoni habens. t^nl inra Ipiras exeunt bina brviora & anguttiora petala, ibiqui fimul veluci eoent, extenus m^ /ifJmcjintusdilutL-viokecca, ptope cen(i;mn unop fiilva rwiuuentepouioie. IBW^sec<tto P tertium breviffimum (nccprimointuitu fatis apertens) excipkur clypcifornic, colons aloi J 1^ nonsj quod iinextrcino m cutulutn ardarur aj-genteuin, m ercbros annutosciranatum, " iudim; extendatur petaijs duplo long) mem: deniqtic in hujuice pofter i 01 is petalii inn qu area o c c ^ *membnavilpodia* qiuni petalum, brevior, .iigentea, ovalis, angLilfilflima, jn fibram p.iirerP^bm -w priod ineluUmdegeneratis. Subhisoniibospecalispaiv, ! tbvetur/ifw*, in fibram P^2,1^wof iuicns, ac lui extrtOBUte villofa. Mai-cej'cejitjibui pewfis fih^un aliquantuJum curva^offi ai ^nciis elongatur, inedioenter unK» eraili tfC rotuuiti, coWo vindi, in qua psrfe&um /^ ^ojja. Lentb niagmtudnerii paulo niajorem accedtt, minus tamen fphxricum, at redi in lumci tum lined colons ad rufum terjdentis.

Haaufiwiwren,^ c Lufitania in Italiam invcfla. E qua Indorum regions 1JJI«" comparavwint_n« U«t H« otioratus est, at **tw** hoc **CC& b**«U admodum uicort^1" **Boa rd** & pro **maxinu** parta **SMMQ** po/t ic **Boa rd**

Tag. 911. *Ad fintm Cap. IV. deGljcyrrizaaddatur,
Ibiracemfive Ltqintm Jyl-vtfrtit Piion.*

Famiiariiflmu (incjuio ilia radix, qua? Brafilianis *Ibiratm* (quod dLjIcedinem exprimr, *Lufitans* *Akeest* dicitur, eadem plane habemr qua: Liquiritia: nonicn a Lacinis accepit. Majons frutids cL altkudinej cauk lignofb, foliis Pyri fimilibus. P'ocis andionbus crdcic in iylvis Parnambud Glycyrhiza:, non axjue camen dtiitis fi m.ifticetur radix.

Pag. 91 a. N.Pifb/ei-<rtJ/*Mjhabet Paiomiriobr fpaciem, qua; a pr.cedenti fettprima Ipsci^ di/fert foliorum figuraovali, ftmintquerocondo., nigro minuco 8c multo. Una; Sens fpsdssiuncnon Oro-bi, ideoque nine ad Senam eransferend#.

Pag. 91 f. *Sptc'icbut Orebi adds,
Onbum Armritanam ItHum; filiquif inean'uBreyn. Prod.*

Frfj. 917. *Adjimm Capri II de Orco fykntm adjiciatstr, vdfi m&vu frofecunda hmbi fade intrr-
pmatu,*
A, *Orohm Jylvatkiu nojlrat Cat, A.ng.*

Rttikt nititur craffaj lignofa, perpetiUjiindewH/wexoriiintur numeroft, pedales ant cubbies, terram verses reclinatij hirtuti, irriati, ramoJi. *Folia* Vicia; vulgaris minora, conjugatum .id eandem coftam adnexaj ad (eptem auc o&o paria, nullo in extrema cofta neque impari folio, nequeclavi-cula. *Flores* fex aur feptem in eodem lurculo itu communi psdiculo, e fotiorum finu egreieb, co^o-ferti, ut in Lathyro iutco dumetorum, purpurei. *Silifug* breves, latar, glabrar, duo vel tria, & *' & piura *fanms* continentes.

Adfpc&inpauciscirca *BiggUify* Cumberlandia; vicum, itinere *kHex&am aA Perch* oppidum ob(urv.ivinius copiofam. Tho.Willikll infra moneym *Brecknock* eundo ad *Cutrdiff* Wailue [iibe'f' Ikin iii Comicstu Merionethenti non procu! a 54/* oppido props vicum quendam in defccnlii m^{on} tis Djnbigenfis. D.Sutherlandj in Scotia invenit,

P<f. 9J7. Fo/ Caf. L. de Nil fu Indito mterfonatm pro Cap. JI,

?ol)g*ta hdica minor filiq, <u rrvvis D.Syen ».<. Coliml H.M.

E r^iice intusalbicante lienofa, cortice albicante aut ruffb *K&s*, amar.i & fubaai, inodora *tm* ciigit bipedalem ant pedalem, quatuordigitos crailunij ramos cranverlos fundentem, ligiio lu coiticciLibcinereacm|tiviridi, amaro 3c mordaci. *Folia* alata feupinnata, pinnulis cofe angulofej tenui, vinilipetioliiparvishtncindearinexis parvis oblongo rotund is, a petiolo ieiiiiin dilatata &cxcrcinis iibrorundij, lupemu viridia, fiibus hyalina feu ex viridi lubcemlea, faporis Jubacris & Jiibamari, ac hneuciI ardoris diuriis;maftic.ita. f&n/parn, papilionacei, imo peralo ung boreperfulis, (iiponore lito Sc Floribus delaplis fiiceduntplyta, anguftr, ten lies, phn* & ad tinatri partemnonnihi] *milexx*, duostre(Ve polliceslongacglabracj primum virides, demderubro *Rfcdcentcs. Semina* (en Fabs qua; incus font ;i fe muruo per ipfam caniem filiqua: fejunft^ o^ longo-roEunda:, pUnx, cum (iu longitudine jacemesmlongitQdineiliquarunijCumumbilicoycnrfiiiicarum affix^, primum VH-IICS, dcin nigricantes. Bis uianno fert^aw & />^/cf, ranp*8 pluvioib & a-fhfo. Prxter (lifquas trudus nothi vundes tcmnrer piloii ac durioJi fitrculis Crpe n^el'fi conlpiciuittur, qui in vertice iunt toranune pertuui & intus cavi. *Hi mhill alivdfum qudm tm/weiv excTfcmmtx abmfctis pim^eit!buxentat#, at beffitium frdtmentvm torum fattihm fuppeJamt-*

Succus I planta extradus addito momenro niellis fcrvic pro oris pufrulis, ore co perunclo- *Rid**/trita & decoda in lacte *Coqut Mini* condcit in niorbo faao, fada perunaione.

Tag. <N>. *Trfquttitam Ajjtragali JfiecUm intrrferatur
Aftregalus Cunadnfti fiore viridi ftavftetitt Dodart. Meni.*

Dodart.

Radict eft alba, minimi djgici craflimline, in piurcs radiculari ilivila, laporc inirio dulci, fubacrij Scad Kaphani laporem ceiderje. *Cludes* emictic 4 v;1 5, bipeds I« & incerditm alcioresj t& ri's, Icviter frtacos, neKloibs, inferiu! rubentes tir & tircanodos, Quorum unulquilquG d^untiam producic alam foliofam fptunbus foliofbia conjugation!bus compofitam. Ex alarum *dod* gntint ramuh novloii pariter & rbliofi ad moduni ciults. Summos caults & ramulos occupig' }jLi:ibus,^sr;J./legumino(is 6viridirlaviumcibus com,X){ica:, aliorum Afrragabnim liiTiilib' nbus pr;ct<ritbdfortnantur *filqu** pfures, dimidmm cii-circ pollicern lonKi, gtabra:, brunnea-
quaque *SH* iictmdim longkiidinem tenui mernbrana in duas celluUs divifa eftj f&''' j{.]jo
P^rvijj xeraiiijioliniSj *phtw*, glabiis, reniformibiw, aliorum Afrragaloi-um limiltbus rclpt3-)
Hora, Hyemc pent Fngons minus paens eft.

Pag. 945. *Im. z ^ Bannum a iDD\$U**e ad me rranmifam pro Glauce nijpanic* Jufu cam effe*
mitoqoarn P.Hermannuj ia C*. *Um. LugJ. Bat.* ddtmbit &dcpingit pro AffragaJu^ ^ ^ ^
liltqua EplgloBidi ficnili Bon porpureo majori Tournioiiii: quaff rerun Cluin ^{Gi}^Sⁿⁱ... <^^{oi}c^z
rw non »ulim, uti nee negart; iioruiulla umen font gox divwiani arguunt, ut quw norum v.18

in hac specie non extremis cauliculis fastigiis innascuntur, fedefoliorum finibus exeunt, quod- que pinnatibus componuntur floribus. Qui ergo recepts fententiz adh*ret, 8c plantam preceden- tam pro Glaucis Hispanice Liliis habet, me volente id faciat.

li P fia&amori Tournafortii Herman. Cat. Hart. Ugd. Bat. Harumdefcnptiones vide 1. c.

QA8 TrifolbLagopusdiaotertiofeuEbenaCretica: Alpini, addantur Synonymafequentia, incanus Crocus effi. Cytifi genus miflum nomine Eb.ni fecundi floribus purpurea j. fi. W i w i ^ S o . feu Ebenus Cretica Belli Be Ponz Park.

Tar d « rM&cinamMthlotiJpecieminterferatur, MellitusQitanicarotundo amatofolio procumbens, corniculinflex h n , * , exedem cntro ortisHer- matfKVpp-

F i ^ t 5 ^ 5 2 S s h S S * 2 % E - Herman Cat Ho<Uyi

Exilitate partium à superiore differt.

Prfr.qSg Tro jiptima Anonidis fecie interponatur, Antonitvonfuinof* pro ^mUm Lujitanicaflore furf. fecato Breyn.Prodr.

Prfr. qSg. Pijf p m Anonitvonfuinof* Anonitvonfuinof* ubello in hift Plant- Belgic. AbMuntmg., , ^ » . epicta & defcripta accedere videtur ad precedentes Cuwfyheftropwenne d.^tam, forte eadem est, folia

V S ^ i E i S i b u s fubneaantur PlantsCretalarix diff^quod in India Qepitaculorum ufum miftrDribenteorurnramulifiliquismatunisonufti. Harum quinque fpecies in Horco Lugduno- Batavo enutritas defcnbit infignis Botanicus D.Paulus Hermannus in Catalogo plantarum Horn Academici Lugduno-Batavi.

I Crotalaria Afiatica frutefce^trifolia, floribus lut^amplis Herman. Laburnum Zeylanicumflm- bmtx Can &ribo variegatx, filiquK buUatu Breyn. Prod. Cytifus Zejlancus fohu Laburn Amman.

In cauhm frutefcit bipedale, glaucum, crassitie digiti, varios ad latera fpargentem ramos. Folia concoloria glabra, ternaab uno digital! petiolo, in obtufum mucronem gracilekuni; Anagyndi noKtma Caulmmficornantur/?on^ luteis papilionaceis, Anagyndi panter hnnlibus, fingulis ex calycquinquedantifolobisgacilibus pctifis dependentibus. Hos flpM excipunt bival- ves tereteX rmcbraxiacca, rigid*, glabra, ex bafiangulhorem amphorem quafiampdam, cum giore proteno hlamento pures, que indunt/iwiv' par^, coropalliz, flava, renata, breviffimis tripartitis petiolis affixa, cie Be faporeGeniffae acmula. r r X n t Salis purgantis, quod ftatim ac ex infuso aqua: calids fumpta funt vomitiim minen-

%% Crotalaria Afiatica trifolia [ubhurfuta Herman. Append.

T> pA-nri lion raultamdiffimilis est, afttotafubhir&ta, & quoad omnes partes minor & teneri- Praccdenp non mm Qm^ flores 8c fiUy* ftriams ambiunt, facie Crotabnc fe-

S n a d ^ & i r ^ ^ Append. pro quinta fpecie Crotalariae proposit: Huzonatum.

3. Crotalaria Afiatica, folio Jingulari, verrucofo, floribus cerwtr< ejufdem.

H''*!*: ii enofa, rari, fibris confperfa, annuatim pereunte cauhm tollit herbace- f S f f i ^ ^ a t u S " al Lem ^ odorum, angulofum, in progrefsu quadrangulum, Scpropc SumahSrtequentibus ramis orbemUpohk ornatum, quibus per unc.al.aintervalUbre- /Sffis^SS adhSait/ifi-, lemidigitum longa, duosungues lata, in fummo okufa, partefuperna dktTvu-X; inferna ex vnicli candicante, nervola, modo pro iok & dimittit ingemo glatura mo- Kfrucofd madgms ginduladula Ramorum apicis affigunturi in fpicam, quam ambiunt, flore, l^ ionacei fupenoi multo minores, coloris cerulei, vel in cetruleo pallefcens, numero quinquc p i p i ^ . m non raroeciamngintaumfpica: adhxrentes, quiesparisquinquefolus in tenuiffimis aut app^ . i ^ . m p t f a t r dependent. His d i t h o x i s m e c c e d u n t f i u f * p r a - d e n t i c o n f i m i l e s , a f t tremulis peuii. ranoribus pills obfite cum hlatnento ad extremumbreviDri.claudcates 2 f S in pnofe, cum quo 8c nfdem natalibus perfienntur. Foliorum iapor est oleraccus, fimi- Cm vS fubaais & ingratus, quidpiam cachartici portpendens.

4. *Crotalaria Afriatica floribsts luteis, folio (ingulari cordiformi) ejufdem.*

Herman.

Pares cum fuperioribus agnofcit natales, faciem, crefcendi modum & vires. Aft foliis omnino glabris ex bafi angufta fenfimin latiore, obtulam Be cordiformem aciem definientibus, Bt fex feptemve per tranfverfum nervis inferiptis; floribus flavis, &c ieminibus in filiquis glabris ritu congenerum.

5. *Crotalaria Americana hirtuta minor', herbacea, cauU ad fumum fagittato ejufdem.*

E radice pallida fibrofa cauliculinm emit tit gracilem, nunc fimplicem, nunc multiplicem, ramo-film, fpichamizum, hirtutum, ad radicem rotundum, in progreflu vero propè fingulomm foliorutn exortus alatum quafique fimbratum, alis faciem fagitta', ut in Chaniargenifta peregrina Cluffi, expnmentibus. Fo/i* c^terisfpiciebusminDra, unguem lata, leviter mucronata, j4^ta, craffiufcula, pallidè virentia, cauli fine pediculo preffius adherent. Flores ex fpica propend.iffit, papilionacei, dilutè flavefcetes fiibhir/iiti, Cytifi floribus haud majores, quos fequuntur jtmia rtmformia, infili-quis bullatis, parvis hirtutis.

Tag. 967. Tro Synon. terti* fpeczei addatur. An Lotus tetragonolobus mdritimus flore luteo Dankm> propz Cruciforam nafcens Bartholin?

Tag. 971. Adfinem Capita de Loto adde,
Lotus incana procumbem tjuaternis filiquis zruciatim difpofitis.

Item,

LoUtspar'va hirtuta foliis acutis flore luteo. An Trifolium argent at um flore luteo ?

uas apud D. Plucknet txficcatas vidimus, ut & Lotum afperiozem fruticosam Africanam,foliis incanis; floribus binis amplis coccineis. -

Loto Affinis Coryli folio Icon. Robert. Dodart.

?a£- 975- <dd fimm Cap. de Cytifo addatur,
Cytijus flore primum incarnato> poftmodtm rubella Herman. Cat.

Herman.

PedaJi, nonnunquam cubitali, aflurgit altitudine, virgis gracilibus, lignofis, foliis glabris, ternis in brevi pedicuID, /or^in ipica coacervatis, papilionaceis, ab exortu candidis, poft incarnatis, gratè rubellis, fiJiquis Be feminibus ut in Cytilo glabro nigricante C. Bm

Tag. 974; Toft Fumaria primam fpecizm add*pro ftenda,

Fumaria amplexicaulis vejicaria Bartholin. Aft. Med.

Tag. 977. I'm. 9- add. Fumaria Canadenfis radice tubtrofa fan am at a Dodart. Mem.

Tag. 9 Bo- Tofi quint am fpxiem *s£.frhynomenes interferatur pro fexta,

6, Htrba vafia Amrri**' f-Y* >' -wftw? fpm^trs xxaffzrnv&ypttvLU* Jlcacia; laticribus & brevivrblts Breyn. Prod.

N. Folia Herbarvivz in pulverem redafta, & exigua quantitate aliquidties exhibita clam exitium hominibusinferunt, pecoribus alimentalia exiftunt, idque prxfertim de prima Ipecie diftumvult Cul.Tifo.

Radices ejus non minus tutum prztant Antidotum quam folia, perniciofo turgent veneno, li multum Bilacein ulumadhibcantur. Providi aucem eft medici in hoc 8c fimili caiii prater fpecifica ad generalia quoque confugere Alexipharmaca, live exotica, live domeftica. Nobis fufpefta funt yua habit turn da hthifera foliorum vi, turn de falutari radicis. Nee enim videtur verifimile pizoribusalimentialia eij'e (ju* hominibus txtiofafunt \ ant radicem tjits plant* alexipharmacum eift pojfe cujus folia ic-nenata. J3>uin & ipfe Ftfo radici foli nanfidendum monct, fed adgtmraha zoufugiendumm

Tag, 98), Adfinem Tagina: adde,

Herba vivafolih & floribus hngis fzdiculis, tint^thyrfo infidentibus Ambonica Rumphii, Epheni.Gerrn. An. II. Obf. 52. Herba fenilens & pudica Bontii). 110. Figura utrobijue eadem. Bontii der fcriptio nihil valet: Iconautem long? dwerfam flantam ofindit ab omnibus aMarcgravio, Brey-nio, Zanonio difcriptis.

Item.

AsEfchynommt foliis minimis A D. Plucknet nobis vftenfa in borto fuo ficco.

FaS- 9?f- Lychnis major newtflora Dubrenfis difta proximè accedit ad Lychnidem vifcofani quincam noftram, id eft momanam vilcolam albam lacifoliam C. B. uteandem luppicer. D.N*w~ton quiutramque CDntulic inter fe^ diverfam affirmat.

Notandum etiam D.Dais Lychnidem prxcedentem noftifloramin Anglia ipontaneaminvenills.

P^99^ - On. ID. Botanici Londinenfes affirmant Lychnidem fijo. albam reflexa /picà Magnoli in Botan. Monpela candem plantam e(fe cum frequenti leu Lychnide flore albo minima noftrate. ^*Jc* men millaminlpkanDftratis reflexionem haftenusvidimus: at neque florum petala profunde, hpm-da /line in noltrate, im« vix omnino fifla; adeoque parva, uc eorum incurvatio vix IK pbervabUis. Oportec ergo it locus in hac planca mtignem vanecacem dfidac five eadem hi live minus, Lycfr ni5 cenè flcrJ aibo minima nobis difta Anglia; indigena eft, à D. Dent in agro Cancabngienli dudum

obfervata, & ad nos tranfmiffa^quam * Lychnidem fylv\ annuam anguftifoliam flare pLirp;irafcente * *In Casp*^{larum} denominavimus, Sc per errpreem pro Lychnide fylveftri annuaeflore minors cameo MoriJbm habui^{larum} Angl^{larum}. Nuper eciam in vicinia noftra inter fegetes eandeminvenit *D.Dais*.

Ha:C planta adeofimiliseft decima: nonfpecieifeu *Lychnidi hirtut** flore elegant er<variegato> ut floribus exceptis vix poffint internofci. Ec quod ad Lychnidem illam decimam nonam atcinec, vix pnfum mihi perfiadere eam fpecie convenirc cum Lychnide hirta minima fexra Cluffij & floris duntaxat colore variare; fi quidenmon colors tantum fed eciam formã florum diffbrunt; cum Lychnidis hirtac 6. C/«!petala incifis marginibus pingantur, hujus autem Integra &c fubrotunda funt. Ex femine deciuo fe renovansin hortulo noftro nondiim produxit plantas vel floris figurã vel colore k matre diverfas.

Fag. 998. Hiftoritf. hychnidis maritime repentis adde,

Hanc planyj R^{ti} D- Sam. Dak in Horto cukam fiipcriore aeftate diligentius Dbfervavi & C cum Lychnid; Behen al^tollatam fpecie diverfam effe deprehendi.

Eadempaglin. 11. Addz Alias adhuc feu fpecies feu varietates Lychnidis lylv. feu Ben albi vide in Caralogo Hort- Lugd. Bac. a *D. Htrmannv* edito.

Tag. 999. //W.14. ScribirD. Hermannus in Cat.Hort. Leyd.fe in PrDmontorio Bonx fpei coUagifTe Lychnidem fegetum Nigellastrum minus glabrum diftam, &c ejuftque femina ad D.Mori&num cranfmiffiUb.

Pa<r. 1000. Toft Lychnidem plumoriam [ylveftrem Jimplicem adde

Lychnidem Caryophylleum Virginianunij Gentianse foliis glabris, quatuor ex fingulis geniculis caulemplexantibus flore amplo hmbnato, quam inter ficcas *D. Pluckmt* vidimus.

*Tag. ioDi. Adfpecie nonafeu Lychmdis 'vijcofa flore mujcofo hiftoriam adde*₃

Hscherba vulgo Suffolcienli *Stella terra* dicitur, clique in magna exiftimatione ad morfum Canisrabidi. Grayus in libro fuo de Equomm cura & medicina [Hippiatrice] cap. ^ . Seft. 9. -adverfus malum prxdidum eam (ic przfcribit. Herbam integram unã cum radicibus diligenter mundatam, elotanj & probẽ contufam in lafte, cerevifia^ alaj aut vino albo Equo a cane rabido CDmmorfb exhibe₃ tribus matutinisfuceflivis, prima vice treshebas integras cum radicibus fcilicet & tota fuperficie pra:bendo, [ecunda quinque^ terria fepcem, videndo femper uc Equus omnes partes f umac 5c deglutiat. Quac fi obferves^ Equus haud dubie fanabitur, & ab umni Hydrophobia: pericuJo Jibera bicur. Ac ncequo5 folium, fed Be omnia alia animalia Be hominem eciam ipfum curat hoc medicamentum. Generofi cujufdam (inquit Grayus) mihi familiaris filius a cane rabido infelicicer demorfus, licet equifquevis morbiprogrefta eflec; uc capiteaffetto delirareincipretj hujusmedicamenti ufu perfefte fanatus eft Sc etiamnum poll multos annos fanus pfrfiftit. Habui ab amici/limo vjpu eod^mque ingenio &c cruditione prxfanti *D.Ed-wardo Httljt*. Potest etiam herba cum butyro recenci concufa &c in pilulas efformata exhiberi pari effeftu.

In his numerorum obfervationibus aliquidruperftitiofi inefle mihi videtur, ut & in integrac plar.rx nullã parte omiffa fumptione. De medicamenti autem efficacia minimẽ dubico- Vide plura in Phibfoph. Tranlaft. N. 187-

Fag. 1 DQy. Fofi Lzdi Alpini fecundam fpeciem addatur pro tertia

Viftns Indlcus Ledi Alpini foliis & flortbrs amplis Herman. Cat. Chamxrboclodcmlron zxtvicurn amfljijitnis flvrtbus Liliaceis Breyn. Prod.

Herm.

Fruticat duorum cubitorum altitudine, truncopDlicem craffo^ cortice fcabrO/iiixquali, exfufco cinsreo; Ligno duro, folido^ pallefcente, Ramis brevibus, comortis, inordinatis, circa fa/tigi_a foliis Balsamo Alpind non difpanbus^ fed rigidionbus Be villolis denfiffima ferie perpetuoque virorc refercis. Incrahxc producant^r^jj quodammodoLiliacei, monopecali^ quinqueparciti^ ftruffura Balfiini Alpini, amplitudine Narciffi Gareti, colore fulgencis dilutions Cocci. Julio verb 5c Augufto tanrã ubertate luxuriant, ut luperiorcm fruticis parcem quali eleganciffima coccinea vefte videantur coDperire. His nifi orlor deefltj diceresnaturamnihil amabilius, nihilqueadmirabilius unquam produxifle. Attamen odoris defiderium rependere videtur florum congeries numeroza, amffiniffimia Liliacea ftruffura, K vivacitas exquisitiffimi colons. Carcerum ex fingulis floribus fele exferunc quaccrna apitiihuftamma, Incurvaca, pallide coccinea, unico intermedio longiori infidentẽ fuuigi fruftis iudimenco. His una cum flore defluxis perficiuntur in parvis^ oblongis, villofis, quinquifcidis uericulis conceptacula villola yelutiin Ledo Alpino, quinque intus caimulashabencia, in quibus femina exigua flavefcentia. Q10 contumacius eft Balsamum Alpinum locis mitionibus, in quibus vivere refragatur, tanco fequacioreft hicCiftus, qui hortenfem culturam admiccic, FaculcaCsadcongeneres Ciftos accedg#e pucamus^ ex adftingente guftu qucm turn illis habec communem.

Tag. ioi?, //w.4. D.Magnol in Appendice ad Botan.' Monfp. quæ de identitate utriufque TuberariiMy^P^habet revocat, m^jorẽmq, a minore diverlam effe agnofcit; feque majorem inveniffe Maio menle florentem in incultis locis circa Vauwrt pagum refert. Radix ucique vivax plura capitula cum foliis hirtutis producit, qua: caule glabra funt.

Tag. idf. k 1 j., Adde, Chama:ciuni quendam montanuni qucm PDIU folio vocac invenit D. P^{inc}Etut in momibus Brtni-Dvwm diais, in Somcrfetsnfi Com.

Tag.

Tag. 1016. *Pro duodecima Htlianthemis specie addatur,*

12. *Ciftus humilis Ai&oidej maritimus Africanus flore rubdlo Herman. Cat. Hort. Leyd.*

Herman.

Radios nititur parva, ex ruffb ajbe^cente; *Caule* concolori, dodnintali, rotundo, nuncbifidojnunc quadrifido; *Foliis* teretibus glabris, Sedo minori luteo acutifolio seniuhS, fed craffiDnbus Be quadruple longiDribus, Inter hac erigitur pediculus gracilis, tenuis, nudus, fubrubens, femipalmaris, circa fattigium in aliquot ramulos tenuiffimos divaricatus, iiftinentes *fiorem* psntapetalum, paivuluni^rubellum, fugacem, quiadSolem Meridianum expanditur, hoc verò recedente dauditur, vel omnino triarcefcit, relinquens conceptaculum rotundum, trigonum, in terna foliola carinata diillieiiSj fundénfq, *femina* exiguj compreffa, nigra. Frequens occurrit maritimis locis ad *Vronont. Bona Spei*, inter fpccies FicU5 aizoidiS, Be proindeeandem culcuram requirit. Solum amat arenolum, ficcum, aeris rigidjoris injurias sgrè ferens, progerminans non mijiùs ieminibus quàm ramulis r^ftis K in tenam dfti s j virens djo anno. Sapor percipitur aqueiiSj odor nullus- v ^

*Cbamaciftus Frificm foliis Nardi Celtic** C. B. *Cbamaciftus Frijicus* Park. *HirQu* s qui *Chamaciñi* gzm Cluf cur- poft.

Cluf.

Plantula hzc Celticac Nardo ferè fimilis Foliis Scradicc, ejufdémque propemodum magnitudinis; Caiilicub tamen di/par eft, qui gracilis, fefe attollens, quims aut fenis Honbus onuftus conlpicicur, Ipeciofij Ranunculi florum armujis, fex Foliis Hmplici ferie difpoficis conftantibus, flavi colorisj parvis tamen maculi5alterius colons duphci ferie circa umbilicum Dibìculatim diffinftis: Iis fuccedunt capita feu vafcula mucrone bifido prxdita, paleaceo /emine refena. Tota planta aliquantumgravitr wlet-

LXXX

Nafcitur in paluftribus ficcioribus locis permixta Gramini Parnaflì vulgb difto propè amceniffimum quendam pagum in ComiatuDrentia;. A Dortmanno habuit Cluhus.

Planra eft anomala, magis tamen accedit ad Sedumquàm ad Chamxciftum.

Tag. 1019. *lin. 3.* Plantam hanc^a Joan. Baptifta Triumfetti in Dbfervationibusde Oituaevegetatione plantarum defenptam invenio. Liber autem ifte non ante ad iranus noftras pervenit quam Hiftoria noftra de Herbis penitus abfoluta & impreffa elfet.

Tag. 1034, *Spergul* fpechbus adde,*

Alfimm Spzrgula faciz minimam Commelin. Cat a].

Tag. 1036. *Ad finem Cap. XII. qua: eft dt Aljim adde,*

Alfine procumbent Gallii facie Africana Herman. Cat.

Herman.

Spar git per terram ex tenui capillari radice *zaukuhs* graciles, rotund^ glabros, geniculatos, ranfofosj *Folia* ad genicula fex feptemve ftellatim, Gallii modo expanft. Intra hac exeunt aliquot pedicelli tenuiffimi, iiftinentes *flores* nudos, ftellatos, exiguos, pentapetalos, foris virefcetes, incus pallidos, fubfequentibus/^/w/&«.r fulvis in capfulis Alfine proximis. Annuæ eft, ex Affica advefta, florens Augufto, propullulans gu^annis ex femimbiis dec^ui^ . S^por -ppamit muncacus Be ingratus.

Alfine litoralis graminea Magnol. Append.

Plantula e/l triuncialis^ cauliculo^ habens plurimos, partim reftos, partim fupinos. *Folia* ad articuldS bina, parva angufta; inter quæ oritur pediculus fere uncialis, unicum producens *florz*m Alines mediz floremulto minorem, cui fuccedit *capitulurn* cum involucro, minucilTimo *femine* plenum. In herbidiS maritimis cundo ad moatjm Cetium, ubi ftagaum trajicirur, Maio niefte cDpiose reperitur.

Tag. 104X- *Ad fintm pagina* adde,*

Sedi niinoris flore albo quadnfoho fpcciem in rupibus circa Voltagium in territorio Genueni obfervavimus, nifi error fit in notisnoftiis.

Tag. 104f. *Tro Synonymo prima Cotj/ledonis Ipeciei adde,*

Sanicula Ai^otdes foliis longijjimis fzrratis candicantibus Herman. Cat. Hort. Leyd.

Tag. 1046. *Pro (ynonymo [zxt<z Cotyledonis fpzeizi adde,*

An Sanicula Alpina rofea ohlongo-rotundo Jirrato folio, umbdico vubntt ? Herman. Cat. An^{pariùs} *Sonic til a mntar. a crnata umbdico rubro* Cat. Hort. Reg. Parif?

Tag. 1047. Djunimii quartam Cotyledonis ipcciem five Saniculam montanam rofeam flore guttato *Hort. Rtg. Parif.* eandem erti plantam puto cum fpccie fexta, feu'Ssdo ferrato latiM'^ nioncanogutcatoflors *Park.* Ejus ergo vice lubftituatur.

14. *Szdam [zrraium flore albo multiflortm* Dodart. mem. & *pro 15. fpccie addatur*

15. *Sedum Africanum annuum, Cent auru minor is facie, flore awreo* Herman. Cat.

Altitudinem palmar vix attingit hæc planca, figens *radtcularn* tenucm, fibrofem, albanij ex qua a^f furgit *camliculus* limplex, rotundus, pallide virefcens, ad luinmuitem ramolus, cui per ^fiflCerVaJl^A

ftant *folia* emffiufulca, fucculenta, bina ex adverfo, Centaurio minori nonnihil fimilia. Raniorum fummitates fuftinent periamhium quinquefoliur, quod dehicens excludit /[^]wpentapetalum flclse inftar expanfum, foris purpuraicentem, intus aureum, *fiaminulis* in medio apiculatis flavefcen- tibus, fingulifque petalis ad fundum macula cordiformi Janguinea infcriptis.

Pag. lo[^]. DuabusilJis plamis, -i. Gratiola anguftifolia Ger. emac. 2. Ageratiim purpu- reum Dalechampii J- B. duo capita aflignandalunt; quod genere fint diftincta turn a praceden- tibus, turn a fe mutuo.

Pag. 1056- Pro quinta fpecit Geranii Altha* folio addatur

Geranium Africanum arborefcens, Ibifci folio rotundo, Uarl'ma odors Hort. Lugd. Bat. D. m Her- manni.

Herman.

Ad radic[^]sjaontis Tabulati Promontorii Bon* fpti frutefcit hoc Geranium, *radice* lignofa, al- bente, craffi^lwy⁰ ^ caule r[^]unita, hirtuto, tres Be amplius pedes alto, aliquando ftatim a radice in complices *Wtnos* divifo, quibus ex Jongis[^] pilofis, cra/sifquepetiolis circumftant *folia* in ambitu rotunda, lew-r crenata, modo plana, modo finuata, craffiufcula, molliaj hix/uta, lbifci inftar, di- lute virentia^T odoris fragrantis, Carlinam smulantis. Circa faftigia prodeunt palmares ramuli quibus ex obngis, quihquifidis, fubhir/utis calyculis infident *flores*, ex incarnato rubentes amph[^] psntapetali, duobus fiipenoribus petalis amplionibus, galea: inftar ereftis, binifque languineis in baff[^] ftriiis infignitis, tnbus Inferionibus minoribus, quali labiatis[^] prominentibus e medio aliquot *stami- mbus* cum *[tylo* longiori, in quinque ianguineas JingiJas divaricato. His defluxis fuccedunt more congenerum quinq, *capful** membranacea; ardle fibi invicem annexe, Be in longum acutum inucro- nem terminantes: ex fUibuspraematuritate dehifcentib[^]Lis profiliunt *toiⁱ&zmifina*, oblongajfpadicea, rofrataj contorta, incana lanugine pubefcentia, cum ftilo intermedio, e cuje apice femina hxrent!

Tota planta, imprimis folia, fubacrem Be aromaticum prabent faporem, cum levi vifciditate! Hinc reponi meretur inter carminantia Be emollientia. Folia leviter efficcata non infelici fuccellii adje- ci clyftenbus contra ventris tormina, paffionem Colicam, lliacam, Nephriticam, prarfertim ^{Prm} CalcLikum, czteirifque urinae difficultates.

In Belgio de facili propagatur feminibus, ramulis *ic* viviradicibus.

Pag. Eadem. po[^tfsptimam fpeciem.

Geranium Africamtm Coriandri folio, floribus incarnatis minus Hort. Lugd. Bat. D. Hermann.

Htrm.

Hujus Be pracedentis [Geranii /Ethiopici Myrrhidis folio tertii flore magno ftriatu *Breyn.cent.iJ]* *folia* prim a /eminaka *Hint* flbrocunda, brevia, modice laciniara, in progreflu vero elongantLir'Be fre- ijuentiorib[^]Li5 /egmenris di/Tecanturjqua: in hac minori /pecie apparent tenuipra, anguftiora, haudqua- quam hirtuta. *Flores* prodcunc paulo minores: *Semina* ceteraque omnia pr[^]difti Geranii finulia*

Geranium Africanum Betonic folio laciniato & maculato, floribm incarnatis* Hort. Lugd. Bat. D. Hzmanni,

Htrm.

Pnonbus accedit Be hacc fpecies, cujus folia inFerion, radici proxima referunt effigiem foliorum Bconicz. qua: vero in progredi cauli adftant, majora lunt, profundioribus laciniis incifa, Be medio iinu ex fufco rubsnte macula[^] inhgnita, ahquando omnino viridia, *Caulicuks* fpargit Ipichamam longos, gemculatDs ex yindi nonniha rubentes, refupinos, fuftinentS *flores* pntapetalos incarnatos Geranio Africano Conandn folio perquam fimih; quos excipiunt *femina* quina, roftcllis contortis lanuginoi5.

Geranium Africanum AkbimilU hirtuto folio, floribus albidis Hort. Lugd. Bat. D. Hermann*.

Htrm.

Cauliculos emittit bicubitales, ex viridi rubentes, pilofos, geniculatos, procumbentes, 8c ex fingulis nodis novas radicales demittentes: quibus ex longis pediculis adftant/p/w rotunda, Alchimillx fo- liis paria fer[^] pilol'a, in viridi candicantia, media lui parte interdum maculata, in ambitu crenata Be laciniata. *Flores* edit multos, fimul junto[^] luperioribus Ipeciebus minores, albidos, Be pro in- geniolbli Be climati5 in pallido vel flavefcntes vel incarnatDs, fubfequentibus *feminibus* quinis, d'it policionc Be facie congenerum.

Pa^gm 10J7. *Synonymis lo.fpeciei adde*, Geranium Cicuts folio mofchaturn C. B. & pro un- decima fpecie, aut octave varitate potius adde,

Geranium mofchatum folio ad Myrrhidem acctdente minus J. B.

Hare enim fpecies alia5 odorata eft, alia5inodora.

Pag. idfB. Geranii e/uarti titulo adde,

Geranium Africanum noti olens tuberofam & nodofwn, Aquilegiafoliis* Hort. Lugd. Bat. D. Htr- inanni>e quo & dejeriptionem fupple.

Htrm.

Conflat *radice* longa, tuberosa, craffa, nonnihil lignosa, ex viridi pallefcnte, lubinde aliquot fibris capillata: *Caulibus* (urrefctis, bipedalibus, cmeraccis, glabns, lignofis, ad genicula craffefcentibus. Foltis ucrinque appofitis Aquilegb facie, craffiufculis, iegmencis tamen paucionibus Be amplionibus difft[^]ais. Floribus pentapctalis in umbellam congeftis nuncTurfum, nunc deorfim fpe<antibus, col- lons buxci, nonnunquam obblecc purpuralcentis[^] i velpera ad Auroram ulqus juuundiffimum Ipiran- tibus

tibus odoretn: Seminibus antecedentium ritu quinis rofratis, Candida, fencea, modica lanugine pubescentibus.

Propagator feminibus, & tuberibus seu geniculis.

Tag. 1v6l. *Gtranzs Mal'vie foliis addafur*

Geranium Africannm frutescens Mal'ua folio, I acini at o vdorato HDrt. Lugd. Bat. D. Hermann.

Ger. *Malua folio odoratum, flere purpurafeentz* C. Bona fpzi Breyn. Prod.

Herm.

Fundit radicem crassam, candicantem, fibrosam : cauliculis cubitales, geniculatoSj nodatoSj refu-
pinos: folia digitalibus petiolis, Malvs paria, (ubrotundo angulo(a, crenat&j undulata, nonnunquam
laciniata, odoris grati & aroma ti ci • Flora facie antecedent^ aft paula minores, fex feptfmvphiT
res vel pauciores quasi in capitulofcu umbella fimul junctos; cui subjiciuntur quinquusj in Drbem ra-
diata, hirsuta, fibrotunda toliola, ambitu rubente & in exiguum molleculum m u c ^ m abeunte :
Sequuncur femina lupcriore, tenuiora.

¶Tota planta pilosa hirsutaque facie est, gaudens iisdem natalibus cum prarcedente, ^ademqum cul-
tura 6c virtutej led remiffiore.

Tag. ID6J. *Ad finem capias de Gtranio,*

Geranium Africannm Uv crisp* foliis^ cauliwlis procumbzntibus> floribus txiguus rubeUjs* HDIT.
Lugd. Bat. D. Herman.

tiern*

Germinavic (inquit) nobis ex fejninibus Afficishscupifilla Geranii/pecie^ radicz tenui, fibrosa;
frauliculu plurimis, ramulis gracilibusj gniculatis, humi jaucicibusj prona parte rubicundis^fupina vi-
ridantibus. Singulisgeniculis adftanc/o/^^ incerdumbina e regione, glabra^ litè viridia, Uvac enfP^
foliis ITmiliaj fed quadruplo minora K frequencius incifa. Penes horum exorcum exit tenuis pedun-
culus, circiter longicudine digki, liiftinens flofculos, iinum, ties, quatuorve, exiguos, pentapetalos,
j-ubcllos: quibbs hngulis subjicitur pediculus tenuis cum calyculo quinquepartico, includente vafcu-
lum pentacoccum rDfratum, in quo quina femina exigua more congenerum.

Fag. ID6?. *Tofi l/». quartam adde* Hujus arboris in Hort. Lugd. Bat. duplex habeturipeciej feu
varictas, AJtera flore purpureo; altera flore flavo. Lin_m a6. add*, Quxrendum an fru&us a Jo-Bau-
hino defcriptus pro fthidtu Xyli Brafiliani non fie potius diverii Jpeciei quam illius quam Marcgra-
vius defenbit j fiquidem in illo Iemina dupci oraine in loculamencis fita fujit^ cum in defcriptione
Marcgraviana Xyli Brafiliani fsu *Ammiju* hujufmodi feminum ficusnulla mentio; alia etiam lunt
qua? non conveniunt. Oculati/limus Botanicus Jac. ZanonusBonomenfis duas dari Xyli Brafiliani
fpecies diverias existimat. Nam primo quæ a Marcgravio defcribitur pentapetalos esse dicitur, cū
i fe culta Be defcripra (referente Fratre Stephano Capucino Ravennate^ qui 14 annos continet
Fernambuci commoratus est) florem flavum campanularum producat, quod & ex Lerio cojitir-
matur, qui eam Flores ferre luteos Campanulis fimiles inftar Cucurbitarum vel Citrullorum tradi-
dit. 1. Marcgravius Xyli fui folia in tres lacinias fefta efli fcribit^ cum planta: ejus quam e fs-
mine naram coluic Zanonus folia variar admodum forma: effent^ prima integra 8c /ubrotunda, Jr
cunda acutiura, fcquentia laciniata una, duabus, tibus, quatuor Sc plunbus lacinus pro planta; a>
tate magnitudine fie ftacura, uc luprema in rarms ail iepEul UTqæ lacinias incifa elfent. ^ . l'auod
fructum feræ uvacum, Be tandem femem Piftacei magnitudine; cum in fuq feptemfemina conjun-
fta, ut plerunque iuntj non mdltum fuperent molem nucis Piftacei. Verum his argumentis facile
poteft responderi. Nam primo mihi verifimilius videtur florem Xyli Brafiliani quinque petalis
CDmpofitum esse quam monopetalum, quum rliqua: onines Xyli ipecics pentapetalo flore fint,
magilque fidendum est curiolis ipeftatoribLis Piioni BtMarcgravio, qui planta ob DCUIQS pofita flo-
rem delcripfenint, quam vel Lerio, vel Stephana Capucino; qui minus curiosè eum Ipeftant K
examinarunt, SL ut verifimile est, e memoria defenpferunc Dcnique Marcgravius folia in tres
guidem lacinias fefta esse fciibit, non camen lemper &c omnia: hoc est, pleraque hoc modo fefta
ettz, aut feftionem hanc affequare. Denit^ non dicit Marcgravius iemina lingua feorfim Piftaceis
zqualia esse, fed in quolibet flocco continet feptem nigrosniftus magnitudinifimul PiftaceDrUm :
quod quidem obfcure distum esse fateor, utLaetius etiam id de fingulis fructibus acceperit. Lerii
autem autoritas apud me minoiis monenti est, qui fructum etiam quadripartitum esse Icribic pra:ter
normam alianim omnium Xyli Jpecierum qua^ fructu funt vd tripartite vel quinquepartito. No-
men autem commune *Ammiu* eum eandemplantam intelligerc argbi^quam deftribunt Pilo K Marc-
gravius.

jXUliavthns African;*/- *Timpinella Jpkata maxima Africana* Bartholin. AH. Hafn. An. 16fj. Vol.
x. p 58. Hcrm. Lat. Horc. Lugd. Bat.

Herm.

Mdlifera hare planta radice nititur vivaci, lignofa, crassa, pallida, biachiata, longo profunrtquoq
reptatu hinc indè diffufa; Scapo multiplici (upra Viri alcitudinem aflurgem environs &i vigDiis pep-
pecui, pollicem crallo, 1 otundo, ftriaco, /cabro, genicuJato, ad radicem Jigno/o, /olido, in progrelw
ex ruffo virente, &c ubi in florifei am fpicam fattigiamr punicante, facile ex geniculis in terram demil-
fis fe propagant. Fnliu pinnatJ5, facie Pimpinella:, aft fextuplo, amplionbus, ngentibus, nervoli^
per ambitum profunrius lerrans, colore in glauo virenrej Cnila^ media ad iunimmm ulque, cui
^oha ex advcrio ftiidliis adlnrent, alata &L crenara, parte vcio ima & prona cwtetfa folio, dJ^B^
mm longo, concoloii, integro, lata fua carinatafiUC bnfi, qia ad fiapi geniLula pioiurpic in mUCroii
nem porreffoJ 6c cofta: inliar ligula: incuinbenc, Oioire fntido narLerico gravJ, iaF^{dic} herbaC#o
panim ariftiugercjcc *Flnibvi* in fiimiro nimerciis nudis; ex IIIED F^{u^iteis^} in fy\W*ⁱⁿ ccnReltis,
JXTENCBU

hzrentibus ex petiolis longulis, puniceis, tenui raraque lanugine pubescentibus: quibus iungulis subjicitur folium, nunc puniceum, nunc expuniceovirefcens, ungiemadquans, & in deltoideum cfligiem gracilefcens. *Flos* utplurimum quinque conftruitur petalis ex floris fundo amplion, cui arte junguntur, in longum protenfis, duobus fipernis latioribus & Jongionibus, binis lateralibus brevibus Be angustioribus, unico inferno brevillimo carinato. Hoc in flore conftanter deprehenditur, reliquorum vero numerus Be amplkudo variant. Ex his profluunt decem *flamma*, punicea iaturati colons, quinque longiora *BL* tenuiora, apicibus flavefcntibus parvis, totidemque breviora, apicibus robuftionibus, leviffima concullione deciduis. Inferiori petalo includitur receptaculum cartilagineuri cariniforme, refertum liquore melleo, diluto puniceo, faporis vinofi jucundiffimi. HuncaBelgia ad Prom. B. Sp. degentibus non inepto nomine Melianthum five Florem mellis appellat. Mellea verb h.c. fubftantia neutiquam videtur produftum roris feu aeris in flore collecti fed co ipfo quo flo5 perficitur incipit ex porulis & villulis internis floris bafcos inftar iubililimi vaporis emanar & L in tiancem -bane carinulam deponi. Sivs enim plan ram mox Hurss paricuram aeri liberiori expoffierisj iim^conclavi diligenter cuftodiveris^quam mellis proportionem Dbfervabis, tanca utrobique ubertal#*it in fubjecta folia ftillatim defluat. Melle florq; exarefcnte fequitur *vasculum* ventriorun||Siembraneum, facie 6c magnitudine Nigellx fruftum adquans, tetragonumj quaternis diflepfentis diftinfum, quafi ex totidem vafculis effe compactumj fingula continent femina ovale, nigmm^lucidumj femini Pxonis fuppar.

Sponts iiii luxuriat locis udis Be paludofis adPfam. B. Sp. Tranfpofita in hortos minim in modum multiplicatur. Brumam rigidmfculam quamvis patienrer ferat, tamen culodienda eft in commode hybernaculo, ne floreSj quDS media faepe hyeme fuppeditare foler, vitium capianK Bt preant. Eo adeo dclefantur *Hottentottij* & nunc quidque Belg^ ut Melianthum nunquam prxtreant quin melleam ejus dulcedinem avidè reforbeant. Haftenus Hermannus. Plantam in horto ReveidifT. EpifcopiLondinenfis cultam vidimus.

Pag. 106?. Ad finem Capita VIII. Je Goffipiv,

. j. Moul Elavou fivz Arbor lanigera fpinofa H. M. P. 3- T. fi, p. Si. &ojjipj*m arborum caule ffinojo C. B.

H.M.

Arbor eft procera Be admiranda, altitudinc Jo, crallitie 18 pedum menfuram haud rarb fupranSj antequam ullos diffandac ramos. *Lignum* molle, fragile, lubrufum, cortice craflb, molli, cinereo, intus rubicundo ac fcabro cinftum, qui fquamis numerosis, rigidis^ atris^ glabris ac nitemibus fpinis infuper dotatisundique ornatur: *hx* autem *ipinx* acutac circa caudicis exortum demum deciduntj manent tamen in ramis fuperioribusj quos umni ex parte obducunt; atque hzc ratio eft quod Simix nunquam hafce fcandant arbores.

Radix crafla^ Hbrara, albicansj cortice Jubrulo^ flavefcens ac nodofo obdufta: iapor acerbusj odornullus.

Folia infipida, inodora, manibus confrifta unDtuofaj *Panja* foliis hand ablimilia, longis itidenij rotundis, glabns, necnon viridiftriatis, ac in exortu nodolis pctiolis plura fimiil juntla, Be in orbem expanfa inhsrent.

Flores fiiaveolentes, ac magnitudine palmum aequanteSj pluresfimul junfti ramulorum extremis inherent, atque b calyce craflb, denfo^ intus fubvindi, extusflavefcnte prodemit, quinque oblongis, craffis, denliSj undique colore purpureo nitentibus, witus laniiginolis Be reflexis foliis confantes, numerois in medio craffis^ denfis, longis, ac rubicundis *fiamimbus*^ atris falcatis *apidbus* dotatis, duplici ordine mediam floris cavitatem fie iimbilicum occupantibus: inter quæ *ftylus* prodit fililis, qui ipilliSfruftL]Sriidimentum eft. Inluperin floris umbilicu fiibcucrucus ac pelJucidus obfervatur humor, qui dulciffimi gratiffimique faporis eft.

Fruftu5 cum P^w/^fruCibus in omnibus conveniunt^ exrepto quod femina in loculamentu nun triplici uc in ilia, (ed duplici ordine locataffinc.

Crefcit ubique in Malabar, feminibus fata Anno circiter i 6 fruftus fere, quos dein fingulis an- LocUJ r* ni5, viz. Februario 6c Martio menibus maturos exhibet, atque ad annum IDO & C ultra Frugifera Tempu_m

manet

Lanugo lcttulis Be pulvinaribus farciendis infervit. Arboris cortex pulverifatus, Be cum liicco vfiu EJ Limonum in linimenti formam redaftus, inflammations quafcunq; compctic, B£ odium fradtu- Vi*e*- ras confolidat: cum adufto verb e nuce Indica vino fi permifceatur pro linimento ad herpetem ufirpatur. E radice verò cortice c^regium fit vomitorium. Humor ille dulcis, qui in floris finu colligitur, cum Tamarindi foliis exhibitus quofcunque aquofos humores per alvum fle velicam pocenter educit.

6- *Goffipivm Indicum Salicis folio, fruElu yuinejntcapfulari* * *Panja Tafijala* H. M. *Arbor lanigera* * P. 3- T 4^ ni^zra five *GoJ]ampinus Plinii Bontio. Goffipium Javamnfe Salicis folio* C. B. *Lanifera* 5°, 5^f-f 5?- arbor ptegrina J. B. CluC *GoJ]ipmm^rboriumDrUntaltfQliisSalmsdigitatistatiQribus* Herman. Cat.

H.M.

Arbor eft procera, 40 aut50 pedes alta, ramis decuffatim in alios minores divilis in orbembrachiac^; ita ill velut ala: expanli videantur, ac (uti in Abiete Be Pino obfervare eft) firfum verfus magis magifque gracilefcanc frondes. *Lignum* albicansj molle, cortice gUbru, atro-viridi variegatè, inodoro atque inlipido obduftum.

Radix albicans, cinereo Scglabro cortice tefta, fibris fuisonlate per terram diffunditur, fed profundius ei inhsrec: fapor vifcidus Be unftuofus, odor nullus.

Folia longis, rotundis, glabris, necnon rubicundis petiolis plura fimul juntta, ac in orbem expanfa inhzrent, oblongo-terecia, glabra, dcnfa, longitudinc fpuhaafiarn, Utitudinc duos circirer polliccs aquantia, virore nicentj.

Fkm

Fhres inodori ac infipidi, plures fimul iinjti, rufis, rotundis ac hirtutis pcciolis, ramis lignoli* inherent, atque è calyce craflo, viridi, in quinque lacinias fefto prodeunt, quinque fubrotundis, denfis, intus lanuginofis, extus glabris, nitentibus Be albicantibus foliis confiantes, quinque in medio teretibus, craflifj albicantibus *fiaminibus*, flavefcentibus^ Jilcatis ac divifis *apicibm* eleganter ornatis, mediam floris cavkatem &c umbilicum occupantibus; incer qua: *stylusprodit*, flavicicente globulo docarus.

FruBns oblongo-rotundi liintj quinque angulis levioibus lūcati, corclce primū viridi, glabro ac niteme,, dein rufo, fcabro acduro, obdufti, intus in quinque lolulamenta, alba ac nitenre lanuginfj feu gollypio refertij divili. Inca quam lanuginem, dehifcente demum Fruftu, numeroſa obfervantur *femina* rotunda, glabra, nigricantia. Hujus verb aibons fructibus macuris pletsque ejus decidunt frondeſj quo tempore fbis fructibus ornata eft arbor.

Lews.

Provenit ubique in *Malabar*. Semel in anno^ Viz. januario Be Februario menſibus fructum ferf. Martioautem S^ Apnli denub frondeſcit Be floret^ atque fata feminibus 40 ann^ non rarb frugifra maner.

Vul

Froftuum horum lanugofeu gollypiuifl colligicur, ex eoqueleftuli Be pulvinaria fiuk^ quae/umnam ob moirkicm pluris zftimantur. BDrums lanuginem hanc propter brevitatem carmiRan non poſſe ait, ideoque nee lintea inde texuntur : facilJimeflammam concipic. Flores fruftufquetenerioresin cataplaſtiatis formam contufij ac capiti impoſitici cephalalgiam Be vertiginem Collum.

Hujus arboris frūclum eJJ'z quern defcribit & deffhgat Clujias Exot.L I. cay. 14. *minimi dubito. Folia tamn arhoris à Franc. Rodrigues nimis avguſta defcribuntur. Et Szbaldus dt Wen apud Zlufium loco citatfrarbores t^uas obfervavit Jimihm frutum gerentes in Guinea maritmis ampliora babere folia affirmabat. Forte Jaisamſis foliorum anguſtid d Guineenfi differ** ; inl utraque diverſitat babetur in Hvrt. *Academ. Lugd: Bat. Herman. Cat-*

Pag. ic66. *adde*3 Bammia ex Surinam Urtics foliis D. *Plucknet.*

Tag, ID67. *I'm, 1. D. Hermannus Quingombo I. feu Alceam muſchatam Piſonis, quſ Alceae hirlutz flore flavo K femine moſcharo Margra'v. eadem eft, ad Ipeciem noſtram tſreiam fæ Alceam ALgyptiam villoſam C.B. refert: Sc cerce ci fimillima eft^ fi non plane eadem- De Eripta- nes per Dmnia non conveniunt^ ut conferenci patebit.*

Pag. 1069. *pro Synonymo tirt^ & Speciei add?*

Akha: a arborea Indica Populi folio, flare ephemera *Herman. Cat. Hart. Lngd. Bat.*

Pag. lojo. *Pro Synon. decimxepiart* Sptcici \adde,*

Alchxa arbor Indica Tiljs folio, flore ephemera *Herman. App. ad HOTi. Lugd. Bat.*

Ad finem Capitis lo.de Alt baa Indica addantur Species fequentes.

Alt baa Indica floſculis par vis, folliculatim ra?nulu affixn D. Herman. Breyn. Proi Item,

Altbaa Orizntaltſ Pernambucenſis foliis latioribm & rvtundiortbus D. Plucknet.J

Item,

Alt baa Indica Bryonia folio ejufdem.

Alcea Indica fruticofa fiore evecineo petalis criſpis.

*'Am Tar it i H- M. P- 6. T. 45. f. 73- **** Ttyp* Bairvtm~Tndtvc* tnodvra, feu Malva fruticeſcem Boncii ?*

Fiutexteſt-B*7tf-P<in>; plane fimilis, 8c nonniilarte aut culcurain arborem adoleſcit- *Floſ* tamen ilinplex, coccinei, inrenſe rutilantis *colons*, in eo differ^ qubd quinque conſtat petalis latipribus, rotundis ic cri(biſj circa unguiculos rubenti macula conſperſis. In quinque puſilU, villoſa^ filamenca, quz capitulis è fulco gaudenc purpurcis dilpeticur fubpurpureus *ſtyhu*, qui in funimitate mulciſ *fiaminults*> femilunatis *apuibus* exornacis circumtegicur, infra verb, fi nos planus fiſri^ peulis intenoribiiſ.

Ob flornm gratiam per totam Indiam in hortis colitur: 6ftque longzva, Be ubi ofto vel decem annorum complevic itarem floſ cfimplici evadit plenus, quo Echnici ucunturin raremoniis.

Virec.

Concna folia acque ex aqua exhibiu ſs qui ex variolis febricitanc, eorum copiolam inhibent eruptionem^ pra:cDrdiorum temperant zftum, cum butyro nimiuni menſtruorum fluxum; Ex oleo cum foliis *Curumulli* coſta unguentum przftanc vulnenbus apcum. Ex florum gemmis decoctum raulieres reddic fteriles: ipfi aiuem oculis illici ophthalmiam coliant. Ac flores apern, I ecen6lque exbucyro criſi aphthis medſri incolis dicuntur.

Hanc/peciem D. Commelinus proRofa Batavico Indica inodora feu Malva frutelcente Bontij lib. 6. cap. 4. habec qui à nobis lib. ix. cap- 9. dubiranrer ad Alchzas referiur.

BDntiusmfibribuſ continuis le aqua^ ex hujus floribus deſtillata ad foinum conciliandum pro fruntaJi ufuni eſſe f cubic.

Alt baa Indica Gojppii folio, Acetof fapore Czt. Lugi Bat. Herman. Alcea acetofa trifido fib* India Untntalis Breyn. Prod. I.*

Radium habet fibroſam, albicantem, fingulis annis pereuntem : Caulem tripedalem, vinderj glabrum, ahquando anguloſiim, ramofum, in fila duſtilem : Folia tnlobara, late viridia, f of a l niagnicudinead Goflipii folia accedentia, longis iniuxa petiolis. Ad horum finus produnc *flora*, ex brevjTimis pediculis ampli, rofei, incarnati, ex quinque petalis in bafi arftejunctis, ſcint *flora* dio piillilo racemolo concolore exluſti. His ſubjicicur calyculus quinqueohatus; ex quo po* florum exanthelein piodu *compfm*^ niembranacea, DblongD-romnda, peiuagona, quiniſincus Jocula^ mencis donatJj in iuibub *Jtmm* coinpreſſij ex ruſolpadicca congciicrum more.

Folia

Folia fubacidum & levicsr vifcofum pra:bsnc faporem. Ciulesnon minus quam apud nos Canabini in fila ducunrur, &c ad funes texendos ufupamur. Hinc in agris & Harris Indonim quocannis femur. In Horto Reverendiffimi Epifcopi Londinenfis cultam vidimus.

HUIUS & alia dattir/pecies, a *Garcia ah Horto* Bangu ditfa.

Althaa Indica Vitis folio, flore amplo flavo pendente Herman. Hort. Leyd. *Albāa Indica* non pinofa flore amplo, psndulo, flav Breyn. Prod. i.

Ex raiict alba lignofa protrudit cauks modouilicum, modo plures, bicubitales, lignofos, redtos, glabros, aliquando fibhirfiUoSj inia parte rubentes, iimmiviiidantes, in mulms ramos brachiatos. Cum his fimul exurgunt folia longisinfidentia petiolis, crius quinifve (egmentis divj/a, foliisViris haud abfimilia, fetfrigidiora, craffiora, aliquot venis ac infignibus nervis donata. Ad alarum fummicates pg^g^Sp breves,, tenuiffimii pedicelli, quibus nolarum infar appendene flores, ampli, Ro/ar ininpri5 magycidine, ad Solem aperti, citej Dqui clauj^ quinque pecalis flavefDennbus, unguibus viplabeis hfbfejceis, in fundo junftjs conflati, prominente e medio piftillo, copiofis apiculis puniccis^ef^ganter paniculatD. Floris balm tegie calyculus parvus/ in quinque profundas, acuminacas, viridantes crenas, quafi totidem fpliola difleftus. Huic vero incumbunt quina auc feptena anguftiffima feracea foliola ftellanm decuffita. Floribus emarcidis fuccedunt vafcuU membranacea, duriulcula, fibhirluta, ex quinque fulcis yp^ alls &c cotidem lobulamenus confancia, in quibus continencur femina compreffa, fuica; reniformia, congensrum more.

Ex leminibus in infula Z^ylona collectis germinavir.

lil'dem in locis ubi hrc; provenic invenitur 8c alia fpecies foliis apheris profunde laciniatis, foliD-^/ffm. 3ff- rum Cannabis infar, laporis acidi; caulibus aduncis hamis undique armatis, cacteris ver5 parcbus^{ct9S} ~ fuperiDri fimillimis.

BDnrius 1. 6. p. 11 ?- hanc alteram fpeciem videtur defcripiffis Acetofe Indies nomine.

Acetofa Indi-

Folii fi malticentur, acecofam plane fapiunt nih quod guftui pinguius quiddam St glutino- zaBontii. fins repraEfenenr. Quod addit femer ejus infar feminis Cardui Benedifti Ipinofum' effe non ca- pio, ni(i feminis nomine vafculum feminale intelligat.

Qualitate eft b frigida vergente ad ficcam. Malaii Be Bengalcnfes Be ceteri Mauri earn in eduliis Vires E? pro olere reponunc. Herba hacc quoque in frequenti ufu' eft pro topico medicamenco. Conte-^*~

runt quippe folia fnpErlapidem marmoreLirti cum feob^ ligni Santalini^ ic intinfros pannos capiti imprjnunc niixco oleo Nucis Indies flc aceco in doloribus capicisbiliofis. In febnus ardencibus eciam &c phrenitide admodum frequen! in ufu eft.

Alcea Indica fpinofa magng flore tx albido flavefcente D. Com din. *Narinam Voulli* H-M-F. c.r. 44.^7 y.

Rubi more luxuriat frutex ifte, cauliculis rubefcenribus, fpinis ejufdem coloris licet interalbi- cent, perquam acuis obfcis. Folia craffa, oblonga, in rres cupidatas laciniasj quarum media protending divifi^ villofaj apera, in oris Terrata funt: horum terns fenticofa; , h viridi rubences cofulae in parte fupina, ubi quoque protuberant, [pinis carentes, in prona magis eminent. No- vella hacc teneiaque folia noninciduntur, aftin cupidem exeunt, quse quò vetuftiora eò profundius inlécantur. Flures ex albido flavefcentes, petiolis qui juxta foliaceorum furculoruili exortum prodeunr, adhirrenc criuncialibus: quinis confantes petalis, levicer criipatis, venis pi-ominentibus ibiatiSj niaculis aurem grandifculis e rubicundo Dblcuris, qua: circum oras exterius apparent, in- terflinftis. Exfurgens fpiffis rubicundufque ftilus, Hn ambitu ftaminulis rubris, qua: majufcula 6 croceo rubra h. ibent capitula circumdatur, fie in fummitate quinqies dividitur. Florem involvens perianchium quinquelaciniatum, pilis candidis, oblongis, ngidis apherum eft, hocque decem, elongi. angulh, pjloli, cubitah modo inflexi unguiculi coarftant. Odor ipfis nullus. Floribus deciduis ^p/i//^ lucrelcunc fzminalu, conies, pills candidis villofz, perianthii foliolis obtedfce, qui fil'cehuentes in quinque conceptacula fejunguntur, quorum in fingulo femina intsrfeimento meliaftino inherent. Foliis ac flonbus nunquam denudatur.

Per univerium Malabar regnum in locis arenofis plurimus eft.

Folium hujus fruticis oculorum pcerygio imfopicum, fubniDvet. At ex foliis hifce adjsftis Pi-^{Lociu} Viral pere, Zinzibere, Laftc, Nucifque Indica: iucco expreffis liquor re/iftit fluxionibus. Plants pedis dtus balneo extradice paraco facile difcutitur.

Alt baa Ricini folio Virginiana Herman. Cat. Leyd.

Herma.

Enara eft feminibus ex Virginia delatis Planta humanam ahitudinem mulcum eicedens, ex cu- jus radice Ibilco (imili, pallicia, longé lat^que repente, perenni, guftus vifcofi aflirgunt colicuU glabn, viiidantes, Eequencibus alls lubinde divifi. His adftant/0/w longis fuffiilta petiolis, Ricini azmula, terms quinifve, mucronacis ac circa marginem crenatis lobis diflefta. Ad horum exDitus ab imo caulis ad (ummum ulijue prodeunt fimul pediculi longiores Kgraciliores, in aliquot pedi- culis tejuiffimiiD5 divaricaci, quorum finguli fuftinent ex caliculo vindanti quinquefariam crenato fipai'Vuni, candidiini; quinque carinatis petalis in bafjunftis conftruffum, medium occupans illa racemofa, innumeris violaceis apiculis exprnata. Flare dilbuilo fequitur capituUm, exigilis membranaceis, angulofis, arfte invicem conjunftis Be in acuminatum apicem thecisefformatum; quibus fingulisincluditur:ww unicum, parvum, fpadiceum, reni- tur.

II. *Apocynum hurfiih abides filiquis erebis Africanum Herman. Hort. Leyd FritiUar-a craTa Promont. bonx Ipei Stapel. not. in Thzopbraffi pifi. p. 3: j. riuuana craja*

Herman.

LDCIS months, (axofis prsruptisadProm.B. fp. luxuriant è r«fin exili, alba, fibrofi cmOjadi modohumiprofrati, modo oblique alcendentes, /pithamam Be amplius longi, valde ramofi, dimr. craffi, aphyll. lce vindantes, ingructe verb tempeffate ngidiori ex livide ad purpureum vS^h res, properpDdijm tngoni, denticulati &c circumquaue brevibus, craffis, obtufis quafi aculeis (Sn pofitiohich. Ad denoum fenus prodit pediculus digito brevior, tenax, pallift virifceus, vel ex livido purpurafceus, communiter in tres, raro in quatuor foliaculis cuspides abiens iLiltinens^orewamplumJHavum.monopetalum^raffiim, quinque acuminatis laciniis expanfuna fi ns glabrum, virtantem, quinque purpurafcentibus per longitudinem ftrii incriptum, intustena^ m i y CDriacem^ugofum, flaveicentem^punicantibus maculis eleganter confperfum, odons fetidi vipenni: Ex WFprotuberat umbilicus orbiculans, ejuodem cum flore confftenti* &c colons OCCU* pansfermtmediam floris partem^2 cujus centrum concavum tegit stelk,Quinque radus CDmpreffis puniceis in extreme bhdhis lividilique conlrufta : huic Infidet breviffima craffiufcula columella emittens in imo radios quinque, teretes, rigidos, pallide punicantes, infummo totidein alios, brevic* fimos, concolores. Florern deciduum Uquxmiw filiqua gem ells, ereftz, virides, fpithamam lo n ^ digiti craffitie, includentes Apocynorum more femina orbiculata, comprefa, tenuia, marpini^h^ craffiufculis, caftanei colons, lmbncatim invicem incumbentia, quibus fingulis infident flocci feij candidi, ad folem aureis micis fulgentes.

Culturam exigitquam Opuntia fpinofa. Solem auramque calidiorem amat, Septentrionalem vero & C hyemale Irigus in tintum reformidat, ut Illico livefcit, areicat flcpercat. Propagatur tarn femine quam avullis ramulis in terram depaftis.

Virtutempoffidsre cum Apocymy communem indicant acris, amarus, naufeolus fapor, & virolus odor.

ii. *Apocynum Americanum arbore/cens filiqua maxima Herman. App.*

Herman.

Foliz palmumamp^mucrDnatis^regioneoppDfitis, longispediculis appenfis feminibus tSurinama miffis prodiit. Semina erant membranacea, comprcfia, fufca, cum alba lanuginofa cifane.

Tag. 109D. *Ad Caput de A[chpiadz add.*

Afdtfiadi affinis, Jiliquiu foliactis pappo dtfitutis D.PJucfnet.

Tag. 1098. *Adfintm Capitts dt Blattaria addtnd.*

Blattariam Ztylanicam flvrt amplo mini at 9 Herman. Cat. HorL Leyd.

ftadtmpag. Oxys five Trifolii avztofiJpecitbzts adds,

Tnftilium acttofum cormculatvm luttum majus retfum Indicum feu Virginianum Morif hift.

Hujus cauliculi reftitunt, feureaa afcendunt ad pedalem altitudinem: Folia, flores Be cornicula feu iiliquas pentagonas, Oxyos lutes minons repentis quoad omnes fuas partes multo majora alias familia fert.

Tag. 110Q. *Adfinem Cap. 5IV. Jtt NummuZaria addatur*

Nummularia rara Norvegica flore purpureoBanholin. Aft. Med.»

Tag. 11 oi. *Ad Cap. XVII. nota.* Nonnulli Violz aquaticac duplex genus diftinguunt, Alterum folio latiore, quod jam defcripimus; Alterum folio anguftiore, Millefolium aquaticum equifeti folio, caule nudo C Bauhino duStum; cujus hoc in loco mentionam non feciflem, fi non mveniflem iii Cac. Hort. Lugd. Bat. à P. Hermanno edito.

Tag. 1101. *addm*

C A P . XXIII.

A# *Cufcuta Park- major C.B. Cufcutafive Caffutba Ger. CaJJutbafiveCufcuta J.B. jDpbber* Anomalu accenferipotest, velmonopetalis flore ictrapetaloide.*

J.B.

A Li ens quadra affecla nun quam non parafitatur Caflitha, ingrata hofpes^ quippe quac herbas frutic6fque quosfemel arnpuit longiflimis ftamineis daviculis rubenribus. tarn arfto nexu romplectitur, ut eorum genium defraudet, fubduftoque alimentD eos penirus enecet^nullis poitquam in ahum confesndit mxa raduibus, quibus tamen pnmulum erumpens haudquaquam defticQitur. Folia ci omnino nulla. Flares adintervallaglomerati, caules non ambiunc verticillatim, fed ad unam duntaxat eorum partem vergunt; (ingulis autem * quatuor foliolis acutis crallis Be (uccu. • H*C calyx's lentis conftant; intus ftamina totidem medium-florem occupanc. Adlingulos florum glomerulosap-Zo^^ feuf^m. ponitur fohoUim minutummembranceurti, quinetiam eiignisillis, ubifloresnalbuntur caules rainos fun dum t.

Caterum vlanta bac'prolixa & verbufa dejenptione non indiget, cum ab alijs quibuscun^ abunde diftingua- m eo tijildfohis caret, & poftquam fuurwmt etiam radicejongijfimis tamum filament is confans, quibus, contiguu ft artumvol'vit & adhareftit, aliment um mdi exugtns. Semina rotunda, Papaverinis

I. *Efithymum five Cufatta minor* C B. *Cajfutba minor* Dod. *Cufcuta* Park, qui duos specizs notat.

An hae species diffibrat à precedente merito ambigitur: nobis nondum constat. Certè quae in Officinis habetur *Cufcuta* filamentis constat multo tenuioribus, quam quae apud nos passim sponte provenit; & tamen Parkinsonus affirmat eam quae Viciae innascitur frequenter in ista esse circa Lucidionem, indeque Pharmacopoeia nostrae potè suppleri. Et fons robustus apparet exsiccatiori debetur; potest etiam plerumque ipsa pro sterilitate soli, aut plantarum quibus adhaeret nasci, vel *Dry* minor evadere.

Cufcuta è femine in terram deriduo fœtuotannis renovat: Cum tamen adoleverit radix penitus marcescere dicitur, plantaque ipsa ex stirpibus quibus adnascitur totum lium a Jimentum exfugere. Verùm ex accuratioribus observatione *D.Sam.Dah*, Radices, quae longae sunt 6c fœci colonis, nonica stam intereunt, imò (ut ei videtur) nun intereunt omnino; fed plan tam ipsam yr pagane: quamvis venim fie ex Parkinsoni & nostra observatione li femine in fidili fratur emergat, se quidem plantulam, fed brevioradicis peringit nonfinito propinquo stirpes quibus irrepat, unde proculdubio aliquam fœkem alimentu fuipacern ille exugic. Ex eisdem periculis Britannici observatione Flores *Cufcutis* nonopetali fiunt in quacupr (rariusquinque) fegmenta brevialacuta diviii, colorcalbo calyce viridi fœculenti in quatuorparity fegmsnta divilb excepti: quibus succedunt vascula feminalia rotunda fingula quatuorfeminaoblongo-rotunda [Parkinsoni Papaverinis diplomajora] continentia.

3. *Cufcuta Americana*, super arbores [z diffimdsns \ Cufctricbodes lendiginofa arhorihisinnafctns terra Mariana D. Plucknet.

Hæc super arbores latè se extendit veli infar, tenuibus filamentis, ramosis Variè impfexi de depend nubiK. De flore AUC ibimine nihil novimus. Gratum bobus Sc vagcis pabulum effs ferunt. Vidimus primò apud D.Gwl. Courtine, delude apud D. Leon. Flucknet.

Cufcuta Linum & Legumina in quibus copiosissime sepe nascitur apud nos provenit, vel strangulat panitus & corrumpit, vel certe humi debetur & alimentum fraudat, unde non immeritò à nonnullis Orobasche dicitur. Hinc in Suffexia & alibi rustici & agricola eam excruciant, utiolo nominibus Iacit & id inferru hsrha, se5Debilè gut id est, intestina Diaboli cam appellants Plantarum quibus innasdrur temperamentum participare aliquatenus creditur. Sic humidior eff qua! Lin Dim plica tur, qua: Genitum superat urinaspotentiusmovetj adfringendi facultatem admixtam habet quacribiac inTdet. In otadentalibus Anglic quæ in urtica nata est urinis potencer eliuendis efficacem experimento suo conhrmant inolac; adnotante LobdiD & post eum Parkinsono. *Cufcuta* humorem melancholicum blandè purgat. Utilis est in scabi iftero nigro, obstru(aionibus hepatis Scienis. In fomentis; daffionibus Bçalneis iudatoriis ad quafvismelancholic affcti>nes Regiumque morbum inveteracum pra:ftanciffima habetur.

Tag. 1106. Add* *Lilium Terficum minus* Dodart. Mem.

Tag. 1109. Cap. 4. *Adi Liliurn Amerizanum Acadienfs florz ruhro fuintato* D-M-

Tag. 1110. Im. 8. Add.

AICDDI Antherarum Liliorum alborum in diuturnaurinxsuppreffiDneunicè olim profuifferecordamur. Hagendorn. Cynosbatol. pag.48.

Ad dolores postpartum, iV Ol' iLiljrum. V. Lan' fticid* eo imbutè calidè ventriculo supponantur. Eft fingulare remediim inquit Matth. Lhefntau. Habui à D.Hulfc.

Lin. 19. Yofffecundam Lili. Jp. ecii p' pvttria adde,

Lilium latu cauls muhiflorum *Cet-Hort. Reg. Tarif* *Lilium* album Syriacum *Rauwolfii J. B. D. Herqiaiiijus* diverfum fctk a IuK^; 8Jbo Eonftatitopolitano *Sultan Zambach* ditto *Cluf*. Nobis varietas tancum effevidetur.

Lilium Canadenfe imperffctis floribus Be irregularibus multis albis *Morif. bif.* anomala 6c monstrofa planta effe videtur.

Tag. 1117. Im. \ Incipientem cancerum A' Epa fub cSnenbi> cofta &c applicata aliquoties fanaffe perhibetur.

i Contra cplicum dolorstj remediuruiniigne.] Re. Cep. incif Krad. Raphani fylv. p. Zirfpb. Nucis mofchata: ana 3 (i. Coque in vini albi. fcjfl ad fc.j. Cape fiifj. ineunte paroxyfino, & deinde quando opus fuerit. Habui à D. Ed. Hulft.

Tag. H^7- Addatur,

Nar: JJ'us Zeylanhm flort albo bfxagom odor at o, Lunala Zeylanenfibis Herman. App.

Huic subternitur bulbis oblonD-rotunda pallidus ilib carticibus luis lanuginolusj folia promens NarrifliUj alt breviora. Ad hurum latera affuic thyrlus levis, uraffitudine calami procerirare dodrantali, in aijus apice turget vagina membranacea, excludens flortm unlcujn hexagonum^ monoperalum, vandidum, odoratum, iij lex fuiaceis, depliu flexis, circacitque lacinis difli^nm. Mellium occupat calyx ix per oras venis incilis; ex quo prpfcitur ftylus cum fex fufallib; falcatif taminibus in luteos apices delinentibus. Sequuntur rinvw Afuica angulofa iii valculo tricaplulari, morecDngenerum. Minor hujus Naruiffi species à majori differt partium tminium parvirate, aliquando etiam florum Ucinis minus contortis, & per or^s pallidè caerukà lineà virgatis.

Tag*

Tag. 1143. Ad finem CapAIL aide,

Lilium Africanum hurrnle longijjimis foliis polyanthos, fattrato colore pur pur asc ems Hermaa Cat.
Append. *Lilium idem dUuto colore purpurascens sjufdem.*

Bulbus huic rotundus, magnitudine Bcorrtla⁴ Lilium Spharricum adiquans, cujusduris membrana-
5⁵ ceis cDrcticibu5,exquibu5 totus componi videtur, lanofa pallida filamerita intertexta fimt. Foliis vi-
get totaaEftatefphacricDparibu5j fid provencu prolixiori humi jacentibus. Sspntembri menfc erigitur
fcapusprope palmaris, in viridi puniceus, e cujus bifida iriembrartacea Vagina funduntur deni, ali-
quarido viceniflores, in orbem diradiaci, hexapetali, forma &c colors NarciffoLiliaceo Ferrarii pires,
jmagniradineverDinferiors, odore Hyacimhum racemofum *Mufcari ihuDipcadi* diffum zmulante*
AlrBrLis flore pulpura faturatiore, Alterius vero dilutiore gracillimE rubente. A floris incentu ajn
parent vafcuja o^onga, trigona, tricapfillaria ferta feminibus.

LiUqm^eylanict4numUUiftrurn& bulbiftrum/TuXzhhZzylanenfibzts Herman. Cat. App.
iitrm.

Ex hujus *bulho*, pblongo, albido, knuginofa aflurgunc *folia* Narciflina, lata, glabra, plana, cari-
hata Bcflexuofa; inter qu^ attollitur thyrfus nudus, rotundus, bipalmis, cujus fumum capuitcorD-
natur *floribus* fenis npvenifvs pro setate plantae aut foli ubertat^ modò paucioribus modb pluribus
in umbellam congeftis, omnibus fimul e vagina membranacea bifida prorumpentibus : Singyli ve-
rò fex candidis anguftis longulis petalis uomfruuntur; in quorum medio prominet *ffilus* cum fex al-
fcidis ftaminibus in verfatiles flavefcetes farinaceos apices defincntibus. His defluxis liicedunt in
Conceptaculis trigonifj cricapfillaribus/cwiw^ fufca angubfa, qua: in bulbos grandefcunt; concepta-
cula dirumpunc 3c gsrmina protrudunt. Eadem femina bulbacea obfervantur in Liliis fphxcnis,
Si/rhynchn\$nonnullis5, aliifque hexapetalis bulboisIndicis Africifque.

Fig. 1151. *lin.G.* SuccuminfpilTatum bulborum Tuliparumferunt inficere nigerrimo colore, qui
jiulla arce elui pDeft. An ergo cum in Oriens Tulipa; ffonte nafcanrur in mafjilas planas mor-
f d b m e u m e u m redaftum ita temporarenorunt Chinenfe^ ut iis atramenti fcriptoriivel rubrics fa-
brilis loco madefciftus infeniayt, aut eodem mappaf Gofflipinas colorent^ aut illius beneficio alia
pigmenta ita przparare doftiliint, ut elui nequean^ aut apricationi expohts telx Gofflipinz minimi
decolorentur. S.Paulli quadr. Bot. Cl. 2. p. 135.

Tulipa [trotina ramofa maxima, flort Jimplici, fimbriato^flanfo-vario Hcrm. Cat. Hort. Leyi
Het7n.

Hujus *bulbus* emittit *caules* pedes alijores, roboratos, incano madore pubefcentem, & in tres;
quatuor^ *pluribus* ramis dividit. Singulis infidet *ffer* amplius, in viridi rubro aureoque elegantz
& moljpicibus petalis modò planis, modò fimbriatis. *Rofe* vel *Panniz* in modum *Avf*
politit refertus. Huic xftate ferventiori luccedit aliquando *capitulum* oblongum trigonum, cfteris
Tulipismajus Krobuftius, quod dehircens in tribus loculisTex feminum feriefoflenditmore cong-
nerum. Caulivero ac ramis adftant folia lata, firma, ereftiora; qualia frst Tulipa frotina *ffer*
Uyf. cum qua hxc planu folis exceptis floribus omnino convenit.

Tag. 11 yx. Pro DrnithogaloJpicato octavo interfratur

Ornithogalum Indicum (picatum flare latfeo tna^nQ^folhCep^fifiulofQ D.Plucknet.

Tag. 115?- dd finem Capitis dz Urnithogalo add.

Ornithogalum Africanum luteum udoratum^oliit Cepactv, radice tuberofo. Herm. Cat. Hart Leyd.
Htrm.

Hiucfubeft *radix* ampla, tuberofo^ nonnihl depreflajfeffiliSjpugnimagnitudine, colons flavefcen-
risj F^ ^promenslonga^ftulola, cepacea; *Florts* in fpicarn congeftos, hexapetalos, luteos, odora-
rcis, aquibusprofluunt^w^concoloria^anuginoro tomento oblita. Sequuntur/ew^ rnorBcon-
generuin in vafculis tricapfularibus-

In udis petrofis Promontiirii Bons ipei provenit

[L. 1151]

Tag. 1164. Ad finem £ aphs de Hyacintho add.

Hyacinthm Africanm tuberofo flore cceruleg umbeUato Brcyn. Prod.

Brcyn.

*Radiz*m habet tuberofam, firefte memini, albam vel cinreamj fibris craffis Sc longis imã bad
diffufam. *Folia* virencia, oblonga^Hyacinthi Drientalis Be Lilio-narcifli Indici Ferrariani inediatn
faciem obtinentia. C^ < /pwrotundum,nudum, fbfquipedalcem Be altiorecm haud craffum, in cujus api-
ceio, 11, nuncplures nunc pauciores *flvrzs* Hyacinchi Indici tubcrofi 6c effigiã, Be magnitudins
nafcuntur, umbdlatim autem difpofici fie ccerulei pulchri coloris. Fruftus forma me latet.

Pag.1 170- *Gladiolus *sEthiopicvs flore miniato Hort. Reg. Parif 3. an dpracedenti diverfus ? Adi,*

Gladiolus max. Africans Bartbolm. Aft. Med. Hafn,

Tag. 117X- Ad finem pagina adde,

Coleb\$cum biflorum feu vere & autumnò florens an d Cohbicv verno Camer. difiwat confidrandum
propimit J.Baubinus.

Tag. H77- *Adfinzm fagina addatur*

22. *Crocus *vernus angujifolius [erotinus farvo argmteo verficohre flare Helm Cat- Hort. Lugd. Bat.*

13. *Crocus vernus jvncifolixs ferotinus caulefenci; fiorihus violaceid, ad SoUm aureis mkis futgentibus Ejuodem.*

Hie (inquit) adeo fimilis est Croco terno angustifolio Clifii Rar.]. 2. 207. ut psene idem videatur. Sed dubium movet cauliculus fsmjpalmarisj i cujus apice prodeunt tres quatuorve/orej violacei ad 5oi?pi expanfi, aureifque micis nitentes.

Tag. 11914. l. 2D. adde₃

Ephemtrurn AfrkahutiãHnũum flore Mpztah Herman. Cat.LeydT;

A Marcgravo in Hift. Brafil. pag. 8. depi^gitur Be defcribitur fine nomine, Scã riobis, quã tunc plantam ipfam nun vidpratjus, lib. 23. p. 13 ji. inter anomalas difponitur fufa titulo Dipetalse Brafilianz folijs. Gentians aijf Plantaginis. Aft jam Pseudophalangii Ipedem effe percipimus. Hermannus à Z#jioniano Ephemera ramofoj &c. diftingui tantum radice annua 5c Horibus m in on bus duobus peCafis conftruftis altsrit. Verum fi ego verba Zanoni recte intelligo, in florum fituinfignis est differentiã: nam in Phalangio Virginiano Z[^]noni flares feminalibus vafculis non funt contieuij quemadmpduiTi in hoc, nec per confequens tres uno calice in dull fed unus tantum tripetalos tribus vafculis ferrjnalibus poftea fe exferentibus communis, cum in hoc nullus hujufmodiflos fit, fed tribus vafculis fern, ex eodem calyce exeuntibus terni infident flores dipetali[^] hoc eftj fingulis vafculis finguli.

Loau. Luxuriat in tefquis Sc ad margins rivulorum circa Promohtor. Bon. 5p. Seminibus dedduis in horto fe propagat.

Similern Ipcienij aft muhõ minorem, obfervaylt Hermannus in Zzylan 5Z Malabar, quassinlocis uliginofisj aliifque hejbidia[^] abundabat. A medids reponebatur inter aquea SC refrigerantia me di camen ta-

Tag. 1 iDo. *Ad flnetn Zap. de Aloe adde₃*

Aloe Amirkanafobolifera Herman. Cat. Leyd.

Herm.

Ex craffa, fibrofij pallefcente radice prodeunt folia facie vulgaris Aloes Americans juniorisj cat[^]nola[^] fucculentaj mo do pl[^]na U humi procumbentia, modb canaliculata &c arcuatim furfumvergentia[^] lxtf viridia[^] in mucrpnem minus pungentem abeuntia, &c in ambitu crebrioribus exiguisj Fufcisj rigidijfuulis ipinulh arm at a. Ex hprum medio autfexto a /atione anno aflurgit caulⁱ*i fex (cprprnve pedum altitudine[^] ftriatuSj compreflus, fulidus, durus[^] h&rbaceusj rañs aliquot f>lizs, infericribus longe angujioribus Be tenuioribus caulem firmiter ambaentibus velticus, ip[^]rgen5 circa faftigium fbx feptemve₃ plures vel paudores ramosj palmaresj fuftinentes ex brevibus craffi5 petiolis capitula oblong* ftnaca., tnguna, capfularum feminahum rudimenta- E qupruip cymis eriguntur flores oblongi₃ lex iutco-viridantikis or<[Ssj oUka[^]c pet[^]lis conftrufti, prciniunt flyU flavefcentc, cum ibx brevioribus cDncoloribus ftaminibusj longis[^] tranfverfis apicibus donatis. His emarcidis perficiuntur, lubjefts capjiila:, includentes femina parva, angubfa[^] rulca, duplid lerie in tribusloculamentisdi/poita. Ad fingularum capfularum exDrus[^] aliquando etiam ad ramorum fie foliorum in caule iinus progerminant nova: fobohsj qux avulla: &c in terrain depaftis nullonegocio excrefcunt.

D- Hermannus Iridcm uariam Cap. B. Sp. *Bod. A Stapel* Abes ipedem facit, VDcatque Aloen Africanam folio longiflimoj Be anguftilErnoJ floibus luteis fuecidis-

Tag. Hoi. Canna: Indies plures (pedes diftingimnt Herbarii, nimirum,

1. *Cannam Indkam latifoliam maximum Herman. Cat. Artmd. Jndk. hiffimo folio, flortrutilo* Hurt. Reg. Parif.*

1. *Arundo Indica 1 at if oh a flore luteo funtlato C. B.*

3. *Canna Americana flore fulgenti cocco splendntte Herman. Cat.*

Herm.

Hiius femina ex Surinama tranfniilTa funt. Stipites edit vulgari Canna Indica paulo humiliores; Fforej hilari cocco intentilimẽ rubentes; Semina mioora[^] in ipadiceo nigricantia i cetera paxia,

4. *Canna Indica angufifolia flore flavo. Albara Pifon. l. 5. 21- Herman. Cat.*

J. *Canna Afrkana minor flore fuave-rubente Barcholin. A ft. Med.*

Tag. 1104. *Curcuma fynonymU addc*, Curcuma five Terra merita DiEdnarum radice crocea J- B. Qui verum Indium Cyperum Antiquorum hunc esse ftatuic. Plant* iphus defcriptionem accuratani debemus obfervacioni Sc induftria: Claffimi Viri 6c eximii Botanid D. Vault Htrmanni, cuius frequens in hac Appendice mencio, qui non hanc tantum plantam defcripfit, fed & nDVum una jtirpium genus in lucem produxit: Nofque docuit, quod ancea nefcivimus, Simili omnino rrufticalioie gaudere Bengalam Indorum, CafdamDinuin majui Be minus, Coltum Arabuinj Galangam u-

tramque, Zedoariam, Zerumbeth Garciz Be Zingiber. Plurimum certe vel hoc TDID riomine,ei debet Republica Medica & Botanica, quod tenebras illas quibus involute eflent, simplicia lthxc medicamenta paffim ufitata difpulerit, omnefqae de illis difputationes Be litigia deteminavent Be futulerit.

Conftac f inquitj Curcuma radice tuberofa, tereti, in tranfirerfum afta, Zingiberis facie, craffitie digiti, exmultis propagihibus cum circularibus in fuperficie zonis geniculatim conflaca, aliquot craffifculas fibras e geniculis demittente, ponderosa, foris pallida SemodicE: fcabra, intus crocea ac temporis decurfii in puniceum inclinanc, folida quafi ex condenfato croceo lucco preffilis compafta guftiis acris, aromatici, pinguis, odoris fragrantis. Hujij iingulageniculaprocriiunt folia lxtē viridiaj plana, fpichamam longa, unam duafvs palmas Xtik, in modicum acumen definentia, foliis Canna: Indies junioris adeb limiliaj uc a rudionbus nori facile ab ipvicsm difcerni queant. Hoc errors duftum video Bontiuinj qui *Hift.Nat. & Mzd. Ind. Orient.* l.7. c. 30- loco Curcuma delineavit Cannarn IndiVam in India frequentem, & hortis noftrisfamiliarem- Cxterum e novellis & robuftioribus radidj tuberibus erigitur fcapus dodrantalis, teres, fuccubntus, fcriptorii calami craffitudinc e vindi pafscens, inferiori parte nudus, amedio vero ad cacumenufque in craffam rotundam fpicam faftigiatus ^ quam Formant foliola ab exortu pallide viridia.poftmodum ex flavo rubentia, vel ex pallido flava ^ duos ungues lataj fenfim in recurvum mucronem abeuntia, fquamatim difpofita ^ intra quorum commifluras delitefcit tenax Be vifcolius humoc colleiftus ex nofturno decido rore Insuper ex lingulis fquamis iuceffive prodeunt flares oblongi, Cannae Indies facie, aft triplo minores quatior utplurimLm pallide flavefcntibus aut purpurafcentibus petalis conftituti, uno fuperio ^ e ob ^ lique lurfim vergentCj binis inferioribus refta protenfisj intermedio vsro quadantenus intorto 6c fimbriato. Quibus excuffijs fuccedunt vafcula parva, membranacea tricapulariaj que continent [tmina rotunda, fufca, feminibus Gannz Indica: minura.

Indis adeb familiaris eft Curcuma, ut vix hortum in Oriens reperire liceat, in quonoꝝ colatur. Maturefcit foditurque radix poltquam florts exaruerunt. Propagatur tarn feminibus, quam nodulisfeu germimbus a radice rcefaeis. Donatur falc olcofo volatili, parribus blandis vifcoiis immerfo. Haftenus HermannU5.

Methonica Malabarorum Herman, hic inierwida. Vide defcriptionem inter anomalas in-

Tag. IXD7- Cydamini multae fpecies nobis omiffae habentur in Catal. Hort. Rejr. Parif. Be Horti Asadz. m- Lurd. m Bat. a. P. Hermanno editi, quas hic recensere non pigebit

- i. Cyclamen Autumnale orbiculato, circumrofo folio, fubcus rubente, odoratiflimo flore : Coryrarum Hort. Reg. Parif. Hern*. Cat.
- a. Cyclam- Autumnal?, folio fubrotundo lucido molliore K crenato, fuave-rubente flore, Syria cum ejufdem.
3. Cyd- hyemale orbiculatis foliis, inferius rubentibus, purpurafcente flore, Coum Herbariorum tjufdem.
4. Cycl hyeme Be vere florens, folio angulofo, amplo florcalbo, bafi purpurea, Perficum diftutn tjufdem.
- Idem cameo flare, bafi purpurea ejufdem.
5. Cycl latifolium auriculatum flore fuave-rubente ejufdem.
6. Cyclamen folio longiore angulofo fie linguam Serpentis mentiente, Rcgium ejufdem.
7. Cycl folio paulo longiore, vixdum maculato, flore dilute purpurafceme, Romanum recentiorum tjufdem.

'Pag. Ii lo. fofi hiftoriam Ari *sEgyptiaci Cohcafia ditfi adds,

Arum maximum cauliculu nigricantibus Zeylanitym Herman. Cat. Leyd.

Item, Arum Album jEthiopicum flore albo odorato, tnofchum redolente ejufdem.

Item, Dracunculum Indicum cauls viridi non maculato Dvdart. Mim.

Fofi hijtoriam Dracunculi aquatici adde,

Arifarum Potamogeti folh Bocc

Boc.

Radice Be cauhs maculato cum aliis Arifari fceciebus convenit. At Folia unciam lata, duas Jonga, fubtus paululum nervofa & per terrain fparfa quadantenus Potamogeti rorundifolii iunt familia. Flos brevior Be radii textoris inftar apertus, exili piftillo pilofo praegnans, extremomucronato Se hami inftar adunco. Natales illiSaccz 8e Panormi in fylvula S. Maria: a Jefu, Beg.

Tag. 1111. Adfimm Capity de Aro adde,

Arifarum anguftijohum minimum P. Boccon. f. Bo.

Bocc.

Humilis pft hzcplanta, Be palmarem altitudinm vixfuperat, Caule, involucro, piftiUo, necnon r- Jice globofa eaque Candida Arifaro anguftifolio vulgari perfimilis, fola omnium pradiaarum partium exilitate, atque Fohis anguftis Be longis a vulgari difcrepans. Ad Saccam ^ mediis in faxis atqus in faxorum fifluns mihi obvium faaum eft, in loco La Pirrera diao.

Pag. 121B. Orchis anthropophorafemina Col. kd.Dalc inventa ell in Eflexia juxta DaUngtun vicum ^ props Sudburiam in veteri Sabuleto.

Tag. 1 no. Orchis Scarabsumr&fcrens Breyn, Cent.i.p.tf. ejufdeni Orch. my odes fufca Luilitanica eft-

Tag. 1140. lin. 30. Ad dolores oculorum vehementes J ft Cruflumpanisfecundarii, torreatur K Itatim quam maxim: cabns aqus immsrgatur, 6e extrafta mox oculb applicetur per noftem relinquendo.

quend'o. Excellens est remedium, inquit Liber arcanorum. *Cbejnau*. Tranſiulit *D. Hulfe*.

Ai fidorem provDCandum in febribus] fit micarum Panis communisq. f. Cabfiac in *MB*. 8c irriteretur vino Hilpanico Be aqua Theriacali., deinde applicetur lunſ pedum &c puit haras feptem re-riDveatur. *Idem*.

Tag. 114J. Ad ſimm paging adde;

Pulp! Pomomm aflatorum comminute &c mixta cum aqua funtana, atit Cereviffa terui non lupulata, deilide iynipd violarum edulcorata Be pota ad fit ran gun am Valet.

Ad tonum riervi aut tendinis larfiim, St dolorem in quavis parts] fit" duas. quartas Cereviffa: optima.; veteriſj ad Olei auc extrafti CDnſitentiam decoque^ eoque parcem affeftam frequenter inunge.

*Tag. 1146. Ad Jimm cap'uis de Hordeo~*dde,* In Hiftoria nelcio qiornodaumiffum eft Hordcum nudumLi Gymnocirrhon *J B*. quod fie d^fcribic. HujusIpicHordeaceam imitaturliDrridoariftatum barbicio, at verò graha rufefcentia, iitnq.-acutdj una facie lulcata, ex adver/a: partis mucrone germen longiufculum oftenrantia_A gluma ſimplici obvoluta Jevi etiam digicorum aCPrū factiulius quàm Tncicea exiliunt, Siquis aurem ver/uunl ordo obſervan poſſit quaterni ii videripo'flin^porro folium latum, multuſſi calamus ampleſtitur.

In Catalogo Horti Edinburgici Sutherlandii; & *Hort. Acad. Lugd. Bat.* habetur Hordeutn nuduuii Quoiiiodo hoc differt à GymnDciitho five Hordeo nudo *J.B?* Zeopyro feuTririco-ipelto *C. B?*

Tag. 11^I. poſt tertiam Milii ſpeciem adde;

Milium Indicum Arundinaceo vault₂ grants flaveſcentibus Herman. Cat. Hort. Leyd. *Frumzntum*. *Id i~~caum~~ juod Milium Indicum vocant C. B- Theat.*

In feptenum pedum altitLidinem aſſiirgit culmo Arundineo, digitum craſſib^ quem à geniculo aJ geniculum involvunt folia frumento Indico anguſtiora Sc longiura, lineá albá per mediam longitu* dinem nutara. In iummirate engitur juba dodrantaliſj pugni eraſſitudin^, multis paniculiſ; Itriftiũs invicem junctis coacervata, *flora* lanugineos pendulos Milii inftar flavelcences proferens; quibus defluencibus (uccedunc grana copioſa₃ rocunda^ nitida, dura^ pallida, farinaceaj magnitudine Of obi; ſingula infident calyculi^ bifidis, parvis, riigris, ſplendebus.

Milium Indicum Arundinaceo caulz₇ grants nigris ejuſdem ibid.

Htrm.

Hoc cum priore convenit creſcendi modo Be forma, ita tamen ut grana ferat nigra, lucida, iſi ſummo nonnihjl tomento/a.

Utnimque MiJium quanquam in utraqueIndia omnium frugum ferriliſſimum fit, fa turn tamſn in hoitis nuſſns difficulter ad frugem perducitur.

Tag. iifi. Capiti de Milio Arutodinaceo adde,

i. *Milium maximum Indicum. Litboſpzmum Arundinazium aliud, ToZuHitlapil xocbitl Hirnandez, p. 1B2. Milium Soils Bontii, p. 1 fi.*

Htrmand.

Folia fert Arundinacea, fruſtum initio candidum 8c gemmantemj undem nigrum, Be nitidum 8e precariis vocacis globulis perfimilem. Quamvis caldis maxima ex pares locis na/catur, frigkU camen Bercepeica non refugit, cranllauirn jamdudum in Hllpanlam. TumOTcs prxcer nacuram repellit. Valet etiam adverſus renem Be veficz affedus.

Tag. iz6j. Graminis Lohacei hac zftate /peciem in prat is obſervavimus Ipicis parti ali bus to- tahm componentibusanguſtioribus terctioribus nee ita CDnpr^dis, longioribus etiam, quam in vulgan, inferioribu3 non feſſilibus Jn ala feu finu cujuſdam fuliuli, fed longjs pediculis infidencibuſj alif adhuc differſntix obſrvari polTent.

Tag. 1166. Ad finzm Capita VIII. aJJe,

Gramzn Aloptcuroidzs Indicum maximum.

Culmis aſſbrgit bicubualibus aut triGubitaJibus, Spica tres uncias longaj tsreſj Graminis typhini ſriliſj led major, non c Jquamis compaſtilis quemadmodum illiuſj fed ex ibminibus confercis fin- gulis pjlorum [Cnuium conge'rie velut penicillo quodam ad bafin cinſtis.

Ex ieminibuſIndiciſ in hortp Reverendiff Epilcopi Londinenſis liiccreyit,

Tag. 1171. I'm. 9. addz,

Uramzn birfutum rzptm [vjed /implici, moUi J.B.

J.B.

Impure una luxuries eft radicum albertium^ nitidarum, geniculatarum. Japore fubdulti, quibus in immenſum Is propagat. *Folia* longa, hirluca^ mollia, vagini longiſſimi culmum nodoiũm tenuem cubitalem obvolvunt. Panicula mollis concraftiorj palmum cirutſr bnga ex vñdi purpu- rafcens.

L. v. 17.

Abundat in vineis Muntbelgardi florens Junio 6c Julio.

Tag. 1171. Ad finzm pag. & Zapitis dz Granime Dafijlo addz,

iiram Dablym maximum Amzncanum Hort-Reg. Pañ Dattjhn Indiũm zſculzntum Jpti ^ »:* *culata* Ambroii. *PhyL Szfamum przmz Indnum Zanon.*

** Bunsalpo- ſum.*

Semine ex India delato cnata eft, nihilominus hyemis fecura, in horto Jacob. Zanoniad nium ulnarum alcitudinem excrevk, *rodw* liniplici alt^ defcendcmc, £ capice multa germina emittemc

Be fibras fpargente. E majoribus radice germinibus exeunt *culmi*, penna scriptoria majores ad medietatem usque crebris foliis cincti, reliqua parte hudi, ex rorunditate plani seu compressi fuperne virides, inferius lucidi, foris Arundinum fimillimi, intus spongiosa medulla Sorghi infar pleni: nodispra:grandibus raris intercept imayiz. parte phis quatuor digiris a fe invicem distantibus, & fuperius mulco adhuc plus, ut fuprema internodia aliquociens ulnam longitudine excedant: inflexi rumpuntur Scontritit fuccum reddunt aqueum. *Folia* ad radicem ulnam aut etiani duas ulnas interdum Jonga; quae in caule ordine breviora, fragilia, per longum ftriata Be velut plicatiba, foris viridia, intus albicantia, ad margines a(pera, abfque ulla tamen [eratura, pilofa. Singuli culmi fingulasj binas, ternafve, interdum etiam quaternas aut quinas geftant *ffkas* fpichamani longas, triangulares, fquafniofasj inter iquamas [fingulas] menfe Junio exeunt iBftgulazduElanuginDf^coloreLacc^ *dlVzr-zc'mo*, Be poft has eodem menfe, atque etiam fequente, pcrunamquamquefpica: divifionem enaftunt flores ilaflinei apicibus obfeure flavis ut in aliis hujus generis, quorum particularem defcriptionem apud aurorejñ noftrum vide. Floribus fuccedunt *fzmina* tegumento pyramidali, duro, foris CDbre paleaceo, lhtus argenteo contenra^ cque tribus lateribus glumis coloris paleacei cinfta; Teguminibus hifec^exutis *jzmen* membrana ex albo fublutea teftum apparet; qua detrafta nudum pyramidalem retinet figuram, dum recens. eft Pfiftauji mundi colore, exficcatum ad albedinem inclinans, valde Dleolim. Spic2E fcapus medius ex articulis invicem commidis componitur, quorum unu/quiique dentis lins radice formam habet. Reliquam defcriptionem vide apud Zanonium.

Tag. 1x75. I'm. 6. adde,

Cramen Filiceum faniculis inUgris Bocconi.

Bocc.

Radix ell fibrati, *culmo* tenui Be geniculato, foliis paucis vctito, cujus faftigium obtinent pulchrae paniculEj vulgari Gramini Filiceo^ares, ni fimul effent conjunft^ Be palmam manus extenlis junctifque digiti5 imicarentur.

In litore S. *Erajimi* loco li *Stax&wni* ditto nobis apparuit.

Pr. 1177. *pyft decimam* Arundinis fpeciem addz.*

Atundv Indica vanegatafm Laconics Corniti 5f. *Laconic* d Fctro MulUrio* Stapel 440. *Herman. Cat.*

Cornut.

Hujus radix vulgans more natura^ vivai Be geniculata: Singulis annis calamos Se folia verc novat, quae duo fimul apud nofhyeme intercidunt- Calamus hominis proceritatem implet ac fuperar, vix nudus oailis pacet. *Folia* enim, quae in *fio* exortu tubulo fafto, pediculi vicem prxtant, complexu tenues, per ambitum inducunt tunicas atqua ita flibinde nafcentia ab imo ad (ummum ufque calamum operiunt. Inter haec folia quaedam cubitum longitudine fuperant, latitudine unciam *ajteram explent: inuana liint omnia, varie tamen colorantur, excurrentibus lineis latis, quarum ali^ fibflax ftnt, alii virides, ali^ fubruba^j quanquam is rubor non omnibus fDhis communis fit, fci tan turn ad radicem natis. Ejus paniculam videre non licuit.

Fag. IIBo. Cap. 4. pofi tertiam fpeciem Zraminis Arundinacti ivtwferatur,
Gramen Arundmaeumajuaticum paniculd Avenactd.

Hoc genus a D. *Sam. Doody* Pharmacopco Londinenfi, Rei Herbariae peritiffimo Be nuxiiHè indutrio ad rip^s Thamefis fluvii inter Lundinum Sc Chelfciam ob/crvacum ad nos ficcum crahfniifftm eft. Ad tricubitalem altitudinem aTurzit *culmo* grandi/Aruridineo, geniculatp, longis internodiis, in cacumine longam^ non multum fparlam, (ubinde purpurafcentem, e Ipicis fquamofis muticis compDlitam paniculam gefans. *Folia* anguftiora quam pro magnitudine plants, longiffima.

Pr. 1x89- *Pofi feptimam Gram. Avenacei fpeciem interponatur,*

Fzftuca Avcnacea fpicis frigofoitbm e glumis glabris ~~frigofoitbm~~.

Ad pedatam aut cubitalem altitudinem affurgit, *culmo* tenui, tribusaut quatuor articulis inter^Qpto, foliis anguftis, oblongis, utrinque hirtutis cinfto. *Paniculam* in faftigio explicat longiarem Be anguftiorem feu minus fparfam, Be paucibribus fpicis compofitam quam praecsdens. Sunt etiam fpic* tingulares glabrz Be frigofores quam illius, ahas limiles.

In pratris humidis pfDVenit. *D. Dah* obfervavit Be attulit.

*Gramen Awnacwm glabrum patiucla e fpicis raris frigo/is mmpofua> ariftis teriuijimis**

Culmo eft cubitali aut etiam longiori, tenutquatuor aut quinque genicuhinterc^pto; ad quorum fingula *Folia* fingulariaj ut in omnibus ferè Graminibus, aliquDufque eum obvolvunt, modice lata, viridia, ftriata, glabra. Faftigium occupat *panicula*, laxa, c fpicis frigojis, paucionbus fie ranus fiti compofita. Spicarum fqtmas fingulas ariftac terminant longiufcuk, capillacei ferè, tenuicatis. *Radices* fibrofe. Fulhamiz prDp^ Londinum, in aggere inter locum exfeenfionis c cymbis Be Epifcopale palatiumj a D. *Doody* obfervatum oftentum Be ad npx> .tranlmilTu^ cfl.\

Gramm Avcnaceum panicula purpuro-argenta fflendznte D.^Doody.

Radix quantum exficca ^fcerner licuit, pauds Be brevibus fibris conftat, plantani tahiea p>rennem effe dDnjctatur D. *Doody*. *Culmi* cubicales Be alcior'es, tenues/duobus' tcibufve arcicuU donati, totid&mau5 foliis vctiti, paniculam in iummo geftantes, nan muhumrpaflaiij piirpuro argenteam

tean? Be iplendentem, non e ipicis fquamofis compolitam ad modum praxedentium, fed ex locuftis Avenacearum <emulis, quarum unaquxque tria plerunque grana glum is obvoluta Ce ariftata continet, ariftis ppartenuibus/ nonnihil incurvis, purpurafcentibus. *Folia* ad radicem Be in caub ima hir/ita, in fuperioribus hiriuties non apparet in ficca, Dmnia, brevia 3e angufta potius quanti

LQCM.

In pafcuis circa xdes Gumitis Cardiganix ad *Twitnam* Middlefexix vicum.

Fair. 1296. pro *sexta Graminis Cyperoidz Tolyttacii fpecie adde,*

Gramm Cyperoides foliis moUibus tznwbus, fpicis brei'ibus coacer/atis tribus quatu'v'Vi in fummitatz caulis.

Hxc fpecies ambigere Vffetur inter 4PTBe fequens genus: nam fpica in fummu paleacea caifa ad .hoc pertinere eam arguit : at fpicx ex fe minibus com pa ffiles, breviflimx, & gloDulrmm xmulx^ in fummo caule coacervata:, non exeuntes e foliorum finibus, nee pediculis infidentes, fed cauli immediate adnatar., ad fequens. *Folia* ei angufta, oblongaj e radice verebra, Be Grani-neorum ihftar mollia. *Caules* pedales, tenues^ nudi, triquetri^ enodes. Radfcibus Be modo k prppagandi non videtur ab abis Cyperoidibus differre.

Locus.

IncrictD Hampftedienfi propc Londinuni invenit D.S. Doodj,

Tag.tzzy.lin. 4. f¹^

Gramzn Cyperoides fpica jimplici cofflprejfa difiicba.

Caulis femipedalis aliquoufque fupra fpicam producitur, ut fpica £ finu caulis egredi videatur gumadmodum in Juncis. Eft autem Ipica fimplsx, mollis^, non ad mod um yompadta compreffa^ difticha^ colore Caltaneoj Jucido. *Folia*, forma S£ crcltendimodo rdiquis Cycroidibus refpondent. Hoc genus a *D. Newton* mihi primò ollenfum eft, a fe colleclum in aquofis propc *Urton* Weft-murJandia? vicum, necnon circa *Zbijjburft*. Habui cciam k *D.Dvody* Be exhecatur vidi apud *D. Plucknetj* qui primus illud oblervalTe dicitur.

Tag. i)ix. Sparganium lecundum feu nonramufum apud nos nafcens fuperiori zftats Dblen^atum defenfifimus his verbis,

Fibiis multris, pr^longis, fimplicibus, crartiufculis, e luteo albertibus, profunde in limum demiffis *radicatur*. E radius capice plunna exeunt *fulia* pedalia aut cubitalia, etiam longiora, vix femunciali laticudine, lama, raullidj neque cannaca, neque friata uc in ma)ore fpecie^ incus cunc^v.i, in acurum terminata: Inter quz aflurgit *caulis* ter^s, geniculatus, folidus, infirmus^ cubitab jDngirudine, vel major min&rve pro altitudine a quarum in quibus oritur, ad fingula genicula finguli5foJiis veftitus, qua: ima parte eum vagina: infar cingunt, fenfim breviora ad fummu ulque. In finimo caule florum Be feminum globuli quatuor vel quinqus habentur, quorum infimus pediculo Jongiuculo e folii finu egreffo infidet, Hiperiores in alls foliorum feffiles non tamen caulein undique ambiunt, quo a planta J. Bauhino defcripta differc. Summi globuli meris ftaminulis floreis quibu5 nullum fuccedit femem cunftant, inferiores pilule fsmiferx llint.

Tag. 1313. *Add,*

1. *Uapicagtinga, aliis Jacarecatmga Acori fpecies Pifoxi.*

Europaro Tioflo externa figure five radicem, five folia fpeftes^ excepta mflgnitudinSj multum fimilis. Sed quantum mole inferior, tantum efficacia^ fuperior exiftit^ inprimis radix, qux ciliid* Be ficca eftj grato amarore Be aromaticofapDre linguam vellicans. Ea iola, vel aliis mixta nun tantum ad incidendos fngidos humores peccantEs fchciter adhibetur, fed Be contra venena affumpra inprimis ufurpatur, ab advepns arqic ac indigenis. Nonfemper uliginofis lucis ficut Iris, fed etiam promifcuc aliis terris gaudet depreffisj glebofis.

j. *Acorus Afaticus radice Unuioz Herman. Cat. Calamus aromaticm Garciz Aroin. hiil lib. I. cap. 31. Q^an & quid diffzrat a praczdtnfc.*

Acorus hie omnibus partibus ronvenit cum Europio, excepta fok radicej qua: tenuior eftfle CompafidJ", fuperficie crebnus geniculata, odore Se fapore gratiori.

Low.

SpOnte fua luxunat in Malabar Be mfiila *Zilan*. Incolis Vazubu He Vazumbp audit.

Tag. 15 18- Ad plantam *Jyftca* Pilonii diftam Be pro Graminis (pecie propolitam nota, *D. Banifl* in Catalogo Virginienfium pro Gladioli fpecie habere titulo Gladioli lucei trip stall Honbus plurib us minim is ex uno capiculo fquamolo erumpntibus.

Nardis Indica Gzr. Indica vulgarx].B. Indiuia fiv? Spica Nardi/Pzik. IndicaM qua Spica^ Spies Nardi, & Spica Indua Offic C. B.

Nardu^ Diofc. 1.1- forte a Naardo, urbe Syriaca Euphrati conteyiinaj aliis N^Ji^li/r. Genera nuilca recenfet Dioicondes cap. 6. qua: varietates potius Joco natah folium differences, quam ^P^j^5 i^ltinfte^videnrur. Nardi Indies nomen \ inquit J. Bauhinus) pairicula duntaxat pJanrx nodis obtinet, qUz & Spu. Db figuram dici merair. Eft autem nihil aliud quam coniatum radice capur, exmarcidorum foliorum nervolis filamentis convolutjs congeftum, colore rufefcenre, faporc amar- r1>JA^C J^qUC ^ aromarico, odore Spicx Celtica:, validiori. AdImct luc coma radici digitalis cramtLdinjs, lacuratius ruffx, folidi, led fragili: eft ubi folia quoque nondum in nervos divuJli, ilbicanna inveniuntur: Cauliculi eciam concavj, ftnaci, plurffque c* eadtm radice capiJlati Ipi- ix marxj lubinde confpuuncur.

Miror autem quenquam hTic phntxcaulej potiuffb negare, cum eornm partes itiRmx h f m n n s nervofis DbvolutE, fe cuivis examinanti facile confpicendas praebeant.

Quicquid autem repugnet Anguillara aliique, ego cuin J.B. Garcia aliiTque peririoribus Bocin- cis exiftimo noftram Spicam Nardi OfEcinarum veram efle Be genuinam Antiquorum Narduni In d i a m .

Porrõnon efle diverfa Nardi genera, 'fad unicum duntaxat fibi no turn teftatur Garcias, idlè. quad in monte quodam juxta Gangem fluvium pmvenit, qui alt era quidem parte Drientern fpe- ftat, altera Decidentem; ad quern Occidentem fka eft Syria, multisregionibLis ab India difcreta: nequeuna prxtantiorefl altera, fpicamve habetalia alcera mult6 JongiDrem. Nee eft quid quis exingenti pretio quo antiqmtus teffe Plinio 1. ix. c. 12. cmebatur, inferre ftudeat noltram Nar- dum non effb bgitimam. Nam India: nunc magis aprta: &c cognirx funt quàm tempore Plinii fuerunt, &*p4 aromata majon-copia,- minufque adukerata quàm Plinii tempore ad nos adferun- rufj pioinde Btviliori pretio emuntur, ex quoin Indias circum Ahicam navigari coeptLin eft.

Magna eft ijiter eruditos quxflio/qux pars Nardi U-x>s fit- Quidani radicem efle affirmant, quidanincRanfPrioribusluffi-agaturGalenus,!. Antid. 1^4 'D'AnTg/^xB- 'IrAidai vi^v JUAAW ^±KHV^

Polleriorijs Dioibondis autoritatem opponunt, dicentis, Plures babt>t Jpicos ab eaJem radice, turn co- mQfas-tUfn\fbtin-viccm com/alutas. Dicendum, Tpicas dici cauliculos multis capiUaceis Foliis obli- tos, qui quamvis radices videantur, revera non funt, fubfunt enim radícula: feu fibra: quibus ali- mentum atrahir planra; atque has vocat radices DiDfcondcs &c à caulibus diftinguit. Interim ta- men hanc plantam caulks emicere fumma parte ipicis, aut paniculis onuftos, ad moduin Grami- num autisaffinium pkntaiim, miniinè dubium eft.

Nardi Diolcoridi vim habent calefaciendi, exficcandi y urinafque ciendi. Qpamobrem Be al- vum epotas fifterc, &c appolitas ex urero fluxiones faniejTique cDiiiepcere, Ex frigida verò potas naufex & ftmachi rnfionibus auxiliari: it^mqc iis qui à flatibus exagacentur, hepancis, iftencis atque nephriticis; cpftas verò in aqua & pro fomento infeflibus adhibiras vulv^ inflammationibus adhiberi. Facers & ad fuperfluo humors redundantes oculorum palpebras, dum lpa cilia atrin- gunt& condenfant: Quin Be ficcas ad fummovendam gravcolenciam humentibus corporibus uc- hter inlpeigi: Milberi eriam antidotis. Porro ad ocularia quoque medicamentaufque ad lummum lzvneiii ntas Be cum vino in paftillos compDrmatas vale novo non picatorccondi.

Nardi folium Plinio principale eft in unguencis, Variè autem praparabatur Nardinum unguen- tum ab AnciqiU5. V. Diofcoridem. Vis autem ejus, attenuans eft, acris, exteribria &L rareFadtoia humorum, & calefaftoria.

Nardus Gav^itts fpuria Narbomnfis Park. Spuria Narbomnfis C B. Narbomnjis Gcr.

In mDntis amcEiiffimi Be celfi, herbarum leftiorum feraci/limi, cui idcirco nomen *Horti Dei* imp oil turn, feptem plus minus mill, à *Gang** urbecula diftiti clivo qua ad meridiem maj ève Medi- terraneum vergit, hsec uben proventu erumpit, mu/cidis Be udis traftibus; infima *radix* puilla, exlibiis fibris duris Be raris, nuc fubfunt fpicatis comosisque torulis, minimum digitem craffis^ co- lore pallecencibus exfulco, Fercpalmum altis, non valdt mucronatis, led quadantenus per extre- ma recifis. *Folio* eft viridi, rigido, junceo, vix pedern aho, nunierolo, quo 1 ab ima radice oi- tuTi trans fpiceam Comam inum caulem ambientem fefe exfent: muhscque plants quali uno celbi- tisambituamplexuuiius effigiem prscfe ferunt. Tota inodora eft prxterquam capillamenta Ipi- cca, qux multb craffiora quàm Indica: iunt, odoie mu/ci Querni ve]. cerreftris, cui femimer/a humo inferuntur comofa capillamenta : è quibus grarilis ac nifidus junceus culmus *Elpb** vojata: non diflimilis, cubitum altus exit, a medio cujus ad lummum ahernarim fune admodum exiles her- bacea: filiqua-j apiculis c calyculis aliquantum Schernantlii flori, auc deflorefcenti Geranio auc Co- ryledonis humilibus.

Adverlariorum autoribus Nardo Gangitidi DioFcDridis profum quadrare videtur.

F. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. *Synnymo Cgtyledonis repent is Brafilinjis addc, Azaricvba Tifms p.i\$y. ex^uo & defcriptiom m [upplc.*

Flortshnz inde ex diverfis cauhbus ex luteo albefcentes fert. *Radix*, qua: longa &L (armento- fa nmlt eft contrira odore eftradicis Penolelim, gultatu perquam jucunda Be aromarica, tenuium & talidarum partium, utinter radices apenentes haud poilremum locum mereacur. IncoLr re- centein foliorum luccum inter decantaca habent antidota, vomitumque ficut noftrates foliis Afai i co kulbitant. *D Batmifier* in Catabgo Virgmienlium fe nullam pDtuifle obfervare differentiam fcii* bir inter hanc Be CotyMoncm P ^ ^ ^ 1 . ^ f ^ . ..

Pag. , , 2 j . Ad fin™ CapUts XII. it Gladtolo lacufirt adde, .*

NDS pknram hanc cum primo earn invenimus quam pocuimus accurate dercripfimus his verbis : Subaniferercit, pUirimis/tritf majulculis albis in arenas demiffis, fapore nullo pixditis. *Folia* adradieum pkira/duas circiter unciaslonga, angulta, extremitatibus reflexis, duplici intus fecun^ dum longitudinem tubo excavata. *Vaults* ab una radice aflurgit umcus, pedahs Be altior, teres, in- tiis CDncavus, purpuralccns, foliis per intervalla longiora velticus: propc iummitatemT&rej gefans iCLiis biJfcus, tenuibus, è fohorum finibus exeuntibus Infidentes, ofto aut decem, plures, EuriorcIveWrius dilpoluos, pallide purpureos ccreolve, e tubo fimplici III quinque fegiionra S anlbs nuirum duo Kiperiora.inguftiora Be lurlium reriexa, infciora tna lanora & concava- SURCCdic^ valculum leminale majucilium, *ftimma* intus continens plunna, perexigua, purpura- fcentia *Stylus* in medio Hore, Be Uamina purpurantibus apiculis donata. Calyx floris quinque- parting. *Repic* lwc planta flagcllis emiffis Urganax modo.

* m

Lapparn

Capparis Pectulaca folio C.B. *fabaginea*, five *Ptilias Luetimtrum* J. B. *TeUplism Dioscoridis & Phtii* CoL*Capparh Jabago* Gr. *fabaga*, *Jive Igtm'mofa* Park.

Col.

Radicem *Tmbet* *cratam*, perennem, longim, aequalem, candjarn, reuicorticeobdu(fa:n, tene-tam, fed vetu(ate lignofiore, capite extuberante ob gcrmmum vecuforcmi amiflkmein, & novorum quotanms cruptionem. Plures quidem exeunt ab i-adice *rami*, tinin, teretes, hnes, virentes, geniculati, ipontanea: Pomsloae iimiles; iinguiifque gemculis *folia* utiinque adherent unua-libus petioiis vel minoribus, craflls, fekjtis, Aurantiorum petiolis quibus folia infidenr iimilibus, minoribus, atque angaJlionbaHfta ab eodem ortu prodeuntia, carnofa, crafla, laevia, effigte Portulacs, lenta, iuccofl^jpa coeruleum quodammodo vergentia, ob candidam affersinem, qua dealbari videntur ex viridi, circa radicem laria & ina><>ra, ut lat.i fine uncias duas, 6c lougitudine ij fuperent; ciica ramos ctecicfcentia Portula cirparia, & in fimmu minora. E foliorum ortu & caulis geniculs breves bini productintir' petioli, circa fummupi c medio ramulorum, in quibus pnmfim virides *crymbi*, rotundi, paKim oblongi infident, arciii., qui dehifcentes alba folia interna exferunt parum, numero quinaj licuti& exta-IU ilia continentta calycis vice, coi-ymbum efficient^, pluribus croceis, obiongis, intemediis., tetiibus *jamtmnm* capstans prodnais, ex eorum centro tanmdem excedentibus. Stamina quidem ilia pnmum crailo capice, brevi filamentu funt, ciim flos parLim hiat 8c cavts confpicitur; at pev-fe&iorc fiord prodoamtur admodum ftamina, capirejla feu apices minuuntur; atque intenia foiola flojis Candida croceum unguem, dimidium folioli occupancem oftendunt. Floribus marcefemi-busfltque deciditibus petioli remanent, *filtquat* habentes, elaus, psrvas ftarinnibus adimc retna-nentibus: At peificicntc fe filiqua, R.iphani Gliquam armulante, *ftamina* pereunr, pctioiis intor-quetur 6c Jiliqua deorlunt nuUF, vireicens, lavis, nitidaj ctra extremum crafla, atque pilum ha-bensj a quo veluti Imorquinqueperlongum deducuntur, qmbus filiqua jam jnatuntaioin 6c fic-citateni adepta dividitur luans, ieminaque dcmittens oblonga, plurima. fe

Junio & Julio floiet, & filiqua! profert, Augufto & Septembri menic perficimr.

Sapor planta;amaruv pariim acnmoniar offerens guftui, non multum a Capparis vulgaris fapors alienus, unde & Capparis nomen ei inditum, Quia fojjs alatis Fabx folia imitari videietur, alii Fabaginem dixi unt.

Radius (apor acrbus, parum acris, ad amarum melmans. Folia vero magis amara. Ob amaro-rem ad venues necandos apud Syrps in u(u cftTtradunt.

In Italia locis rudetatis ffonte nafii perhibecui. At nos nullibi in Italja ffontaneam obfervavi-mui, nee ab alio quoquam fide digno ooiervatam audivimus.

Pag. 1*2.6. Ad *fintm Cafiti* de *Acamho* addt,

Acanthus exottem Breyn. Prod.

Pag.e&tUnii *AJCap.de Ltcntcptitale* adde,

Leomoperalon capitatum Americanum Munnngio in Hift. Plant, Belg- defenptum & depiAumi Ub. ; pag. ;61.

*JL- H 8. Ad *fimm paging* addt,

HJCC plants umbdilifera Cbtenenfi* foliis Sefeltoa ^thtopio, radice Pafinaca: *Nfti icuGetftg dVtA D. Tunertdn Rlitnfyv* ini^iibimr. C^ii ex acturjta plants itone t China ad Kcftam Societi-tem fnillaj foliis longis, anguftis, acuminatis, alternatim difpofkis eam eife i en bit, rioubus a I bis, pentapetalis, umbeliatis.

P. Hso. *Zidomix Itmgabiftoria* adde,

Celeberrimis Vir D.Paulus Hamanmu in *Cat. Hort, Ltyd.* bane plantain Zingiberfs latifolii Syheftns ZerumbetGaraacnommi.; plend Si accurate defenbn his verbis.

S[Mntanco proreiKii bioriat in Sylvis locilque aliis unibioits infilila *Ztylsn*, MalaWar, cttara-riimque Ooient.dium regionimi, Malabaris *Kna*, Zcylaneniibus *fVattHgbtr**, hoc cft> Sylveftre Zingiber diifhujj tujiw *radix* pncJonga, brachiuin crafiaj inaequalis, nonnihl depreffa, ex crebris prominribta tubcribitt ceu apophylibus per genicula junetis compaAa, alba, nonnunquam fla-vifxta, camofa, lucculentt, tenacibus craffionbus hlamentis intertexta, modo in foil fuperficie *harem*, rnodokmsdaiifla, paudfijue albetibus fibriscapillata, guftiis aciis amancantis, aromatici, ad Zingib< jccedcutis, fed niagisterreftns & minus grati, odoris fragrantis. Ex hujus tuberculis eriguomr *C-IMUI* (ciqutcubaies, craffimidine digitali, herbacei, deprefs, viridante medulla pleni, qLiosalernoordineabinoiadiiimmulqueveftiunt/c/M (pithamam longa, tres, quatuorve tranf-verioj digitoi lata, in mocronem abcuntia, glabra, pohta, altera parte vinctia j altera in Viirdi paflemia, hiicita [K-djtulo craifo breviflinio, qui lato ac foliofo fuo pnnctpio Arundi-cum Grarninumre riro cuuem inolre, & in nervum per folii longitudinem excurrentem termina-tur. Ilijn CiKilibus/orwrtulliconpiciimtui, fed ex pcculiaribusradicum tuberculis, velutinCur-cu_ma t *atitique* hujus iurtaioinatibus, Jingularis engitur icapus, prj;longis aliquot foliaceis fqua-»ii5, fbptun ftnShfiime ambientibus contectus, apiee in oblongo-rotundi.m, fquamatum mfefcens capnt, ex njultis obtulis fotioiit tiibricum modo harrentibtis confitmdum, faftigi.ito; ccujusqua-^ manim uutrftidis prolSit *fin* oblong¹, s, utplurimum pentapetalos, Curcuma: aut Zimtiben funiliSt p²..⁰ *luidio*, j;:i!ji- uillar credo duobis ijirerionbui confermtbus inftrar iatm urotcnhsintwmeaio ri.iveictntu, fimtara, ad mirgineni fimbnato, ex angulb curvuMMiroitiin*¹¹ lanoidinem drffca. Huic detnum ligub inftrar incumbit petalum uafum albiduMreliquis an-gufts, craffittnjaw, fensboftioj, ddi¹»ens inparvum, kviter inflexum muaonemT His omni-bus marojiceiuibus imx&lit rafiaulum pa-iiL tngoown, commons in tribus locuLmientis *anvt*»TM mntia, fulca, Cannx In.liui; pu&nunonL cweroqui vallic imiuii. Culturam poicit candem *Curcuma*.

Salevolatili oleofo aromatico abun dare hujus radicem inter alia probat defillatio. Trah/mittit enimper Alembicum aquam fragrantem cum fufficienti oleo, cui, (1 recens fuerit defüllaca innat Sal volatilis paucus, formã nivis aut Camphora: ^ Hie in Ipiritu vini folutus, condicis, eleduanis, aliifre debite remixtus, acidis ventriculi cruditatibus & ex ii(3em obortis fl^tibus ac dolonbus mirabiliter cotiducit. Idem fed cum blandaalvi dejedlione praefat fuccusex radicerecenti expreffis. Conficciffa, ficcataStin farinam trita plurimam acredinem amittit, qua ratione Conficiuntur ex ca panes, quibus annonã dnriore vefcuntur Indi. Mucilago fquamati capitis Interfittis inlrens aromatis hujus virtutem nonnihl redolet, 8c propterea^ dolorofo & debilitaco vetriculo csnfetiir utiliffima. *Hac omnia Hermanns.*

Juncus Floridit^^^KE. B. Prod.

C. B.

Radice efi?«^ndida, geniculata, fibris plurimis adhaerentibus; *caule* palmari; *foliis* term's, junceis, oblongisj acutiSj, duobus caulem fuperantibus; cujus fummp fingulis pediculis, qui quini fiimr, al-[smaciLi fibi fuccedentes, flores (quos non vidit C.B.) inlident^ quos fruftus gemini rorundi Orobi Cretici magnitLdipe fbqauntur.

In paluftiibus Helvetia: circa cenobium Eremitanorunj Scin monte Frafto ad lacum Pilati Lucernatum.

Quo pertineat hxc planta ob delcnpriõnis Imperredionem nelcimus.

Far. 12 44. *Hiftori** Piperis fubjvngatur,

Betre five Bttelle J. B. *Betre Jive Tembul* C.B. *Betre, Btttl, Betele five Befble* Park.

Planta eft anadendras, arboribus fe implicans Be eircumvolvens, eafque Icandens Hedcrx modo. Folium, defcribente Garcia, iimile reiẽ Mali medic* folio, oblongius tamen & per exercmurh ardtius, venafive coftas per longitudinem exurrences habens, amarum. Fab. Columna, notis in res medicas Novae Hiipan-Piperis & Beclae foliorum differentiam oftendit, Horum folui, inqum, quamquam incer fe magnitudine vix dffierant, fimilique modo farmentis arbores fcandentibus hcreant^ effigie atque aliis non parum difjungi videntur. Pipens enim folia, qua: non tribus cantum fed quinque nervis per longum folii ferẽ Plantagineis diftinguuntur, carnofiora & foUdiora fune foliis Betle, magilque ad ovalem figuram accedenria, & indc in acutum definentia. *Betle* varo iifdem nervis tenuioribus molliora & : delicatiora funt admodum, 6c circa petiolum latiora, atquein fiimrno finuofa, ut ipfius conipotiũ quam ullam Ovi effigiem exprimere vidcantur.

Folia *gnx* pro *Bttle* foliis defcribit J. Bauhinus, circumfcriptione *S>c* magnitudine cum Tiliacdis poffenc confen-i, rorunda, nifi in mucronem non fenfim fed mox definerent. glabrajacrovirencia, tenuia, Poramogironis modo, nervis quinque aut (eptem, partim reftis, parcm finatis, ad mugronem ujqs exuurreniibus, pediculo unciaJi appenfa, fapore aromatico^ tenui; manlii nefcio quid arenoi fub dentibus eße videcur. *Confiderandum annm pro Bttela foliis Piperis folia Jefcribat: nam quod ad figuram eorum> turn defcriptioni. accurate Columna, turn figura Clujiam cvntrarim eß.*

Folium optimum cenfetur bene maturum colore fulvefcete. Corruptitur fi recens a planta colleAum diutius manibus trafetur.

Fsrt *Betre* in Maluccis infulis fruAutn quendam contortum, Lacertae caudae fimilem, qucm ifthic edunt quod bene illis fapiat. Bontius fruilum ferre (cribic Piperi albo & obbngo fimilem feu mavis caudam Gliris referentem, quern Malaii *Sirii boa* vocant, eßque propter raritatem, in longẽ majori exiitimatione quãiiiplum folium *Settle*. Sentur vitis modo, addunturque ftipites 8c pedamenca, per qux repens (e fiitineat : Quidam majoris quiftus gratiã Arcex arboibus id maritant, atque icã pulcherna unjbracula conficiunc. In omnibus Indiz provinciis cre/cir, led Jocis maritimis, non mediterraneis& a man procul remotis, nilicxillis in hare transferatur humana indußria.

Vctuffiores Botanici plerique *Betle* cum Malabathro (eu Folio Indo confundunt, qu^ tamen plantas funt diverfflimz i unaenim arbor eß (urreda, teße Garcia, ahera fcandens & adminiculis cgens. Matuño tempore, pomeridiano, vespertino, imo etiam nodurno Betelam manducanc, eamque continuo manibus geftant Indi.- Sed nec fimpliciter Betela utuntur: nam maficata amaradepiellenditur. Ergo ad mitigandã hanc ejus amantudinem Arcam admifcent & calcis momentum, f Arcam 5c calcem Betek folio involventes] ficque praparatum ftaviffimi cfe (aporis affirmant. Alii Betela: Lycium admifcent, ditiores & potentiores Caphuram de Borneo: Alii lignum Aloes, Mofchum & Ambarum cinericeum. Sic autem paratum adeo iuavis eß fapors, orifque halitum adeo commendat fuã fragrantia, ut perpetuo fere illud maficenc opulentiores, turn etiam alii pro faculratum ratione, tameffi non delint qui Arcam cum Cinnamomo aut Caryophyllis maficent. Hxc Garcias; verum alii qui in Indiam peregrinati funt & irineraria conferipferunt, Indos tam opulentiores quam pauperiores Arcam tolam confractam cum tantillo calcis Betek folio involutam in 05 injicientes perpetuo manducare fcibunt. quod adeofuavem halitum expirat ut totum conclave odore f uo replat. Priorẽm ilium fuccum expuentes (quod tamen nonnulli nonfaciunt) qui cruentus videtur [color ille Arcae debetur non Becek] deinde alia atque alia folia fimili modo prxparata (iibsequenter lumunt. "Hocnifaccrẽt Indi eorum ons halitus male olcret At Bontius affent, quodfiquis fine modo (quod Ja:pfit) his utatur, corrodunt dentes, imo eos excidere faciãnc: novi ego hie juvenes qui 15. annum nondum exceßere tamen plane edentuli erant ab ufu hujus folii frequentiori.

Solent aliquem dimiffuri, aut ipfi ab adftantibus difcedentes his foliis praparatis plena burfulã fericeã abicimtem honorare. Nemo autem difcedere iuftinetj donec *Betre* fit dunatus. Illud enim dimiffionis indicium eß.

C2ten^im opulentiores aliquos aditum *hot Betre* maficare pro more nabent, ut odOre onsanimani coinmendent. Siquidcm^ apud eos luminx incivilicatis elt odoratum nori habere anhelitum, iti ^itfi tenuioris fortunx aliquem cum potentiiori iermones conferre neceße fit, manu ori appofiti loquatur, ne teter aliquisodor altenusnares feßiat. Sic etiam mulieres cum viris congregfturaT, *Btttt* mandunt amequam colloquanturj exiftimantque ad lafciviam (iinimani eße iHecebram. Inde in

Z z z z z z z z

Vificacionibus

vitiationibus & mutuis iulationibus Betella ipfis in manu est, Sc lumina benevolent significarione, ubique ea offertur cum cake Sc Areca in carino ligneo quem ad eum fervant ufum. Postprandium pracipue mandunt ad avertendum ciborum fastidiuip.

Abstinere autem folent ab ejus ulu interdum in finire fanguine junctorum, Be in quibusdam jejuniu deftinatis diebus, See.

Præ. Gingivas cgnfirmat, cor Sc ventriculum roborat, flatus difcutit, cerebrum & ftomachum purgat cum Cardamomo mane. a jejunis praananfuiti, orifque halitum (ut diximus) emendate dentesta men denigrat, imoj tetteBontio corrodit Be decidere facit.

Lufitanorum mulieres Indos imitatsfflmiem Betellae mandendz niorem habent, cum fine ea vitam vix fibi confars potte arbitr^nt J

*Arbifcula Brafilienfis Piperis facie jutftra. Bztis Marcgr. Beth *vd Betre Piip.^, Pipsr Imguv* Brafilienfe.*

Marcgr. Pifo.

Arbifcula est quatuor aut quinque tantum pedes alta, uauJfce refto, nodofo, digitum craflb, pallide viridi, Sc per totum pundlulis albis maculato. Superius ad aliquot nodos ramulos adipiicitur, itidemDdDfos^ 6c ejufdem CUJII caudice colons; & c in his,folia, ad gumlibst noduoi unum, quinque aucfex digitos longum^ linguae figura, pallide viride feu flavescens, fuperius splendens, Laurinifolii craflitie; Julum item unum ad quemlibec nodum, unum aut duos digitos longim, pennanrOlornam rirciter craflum, femtn fcrens oblongum^ fafclimj odoris valde fortis intar Zinziberis, f Piperis longi forma, fed inlipidum 6c nullius usis. Denique Pipens ftirpi ftrmentis, caule & facie exrerma fimillima est hxc arbifcula; differt quod folio St fruftu lit paulo grahdiore. P//o.] Lignum caudicis intus est fpongiofum. Radix aromaticum quid ipirat, & Zinziberis prztanciam iapore, colore atque odore aemulatur, prscipue fi recens fit, tune enim dignitate illi vix cedir.

Virtu Foliorum Sc radicum decoctum colicum dolorem fedat, dolores membroruji mitigat, ventrem flatibus turgidum cumponit, pedumqus tumores ex frigore natos amolitur. Idem prxtant balnea Sc fomenta inde confecta.

Locus. Frequens est turn in iylvis, turn in ruderibusurbis Diuubf.

Prater hanc Betyn alae adhuc, inter quas est Bztys foeminaj in fahibus reperiuntur, julisgracilibus Sc exiguis botromm modo congeftis.

Pag. IJ44- pofi Un. 12. add,*

Jaborandi IV. Pifonis. Pipzris hngi fpmcies.

Frutex est arborefcens caudice duroBe nodofo, fature viridiLauri majore, czerum non diffimili. Fruttus five Juli potius Piperis longiflimi non qualirates fed tantum formam armulantnr, 6c caudici adnafcuntur, fohis magnis lingua figura, acuminatiSj nunc alternatis, mine fibi Be Julis oppoftris. Radice est avarumjaborandi Ipecierum efficacâ fimili. Folia pro balneis Bcfomentis contra affectus frigidDS in ulu exiftunt.

Jaborandi III. Pifonis Atriplicis fruticefcantis species ejfe vidztur.

Pag. eadztu, jid hiftoriam Linnæi cng mctis Cluf. mla.

Ex Catalogo Virginienfium D. Joan. Banifter.

Corpus illud quod pro flore va/culo feminali infidente habet Parkinfonus^ nihil aliud est quam operculum arcuatum umbellz aut Conopzi fomrl, quod va/culo ab injunis aens f csh defendendo infervit. Vafculumfem. quinquecapfulare (quod extrinfecus asperum est) ftaminulibrevibus numerofis apices flavos geftantibus cingitur. Hie unâ cum petalis quinque faturatè purpureis Hololerici S. veluti inftar^ qu inter fingulos Operculi angulos exfirgunt 6c inflexi illud bperunc (unde refultat hgura Ephippii muliebris Sedi fimilis) brevi decidunt^ remanentibus quinque calyuis feu floris inv^olucris foliis; unde corpus refiduum, 1. e. operculuqi cum calyce & vafcuta figura: Parkinfoniana: nonnihil fimil^ apparet.

In Frigidis udis Be paluftribus fpongiofis inter Dxcoccos oritur.

Pag. 1345. Ad finem pag. & Lapitis feptimi aide,

Hanc plantam Jac. Breynius in Prodr. Alceam India: Orientalis fruftu lappaceo foliis Ribis vocat^ 3c^a fe in Cent, prima male fub nomine Trifolio affinis India: Orientalis defcriptam fenbit.

Pag. 1^46. C^IX.

Hujushsibx Cajacixnomine pleniorem defcriptionem videapud Gul.Pifoneml. 4- P--4J. qui Be vires ejus adversiis venena celebrat.

Ad finem Herbarum anomalarum pag. 1348. addatur?

Planta fcandens Hedtraztis foliis Ztylanic Breyn. Eph. German. An, 4. & 5- Obferv, 1^m, m*

Hxc in Zeyhn inRila fentibus Be fruticibus fe circumvolvens planta flori paffionis Hederxfolio feu Clematiti Paffiflorx flore Juteo Muntingii (qua folia^ cnpreolos Be caules) perquam re/pondet: quanquam viticulis capreolilq, multo tenuioribus^ atque foliis minus dunSj qua: etiam acutiora Sc quodanimododent^jlara apparent. FJores oblongos, tubulosos, anguftos in quinque folioja exeuntis, ^yamocUt^ florum aniuolos fed niveos, & c ob lacinias tenues in fibras plurimas, iibciliores, crilpas, divi-(bs, qualiradiates afpectu digniffim^ ferre aiunt-

*Eadem pajr. Adfinem Anomalarum addantur Kali isegyptiacum foliis valde hngis hirfutis QB. Kali S. Alpini. * Kali zsfegyptiacum 3. Alpino J. B. *sfegyptiacum Park.*

Alpin.

Foliis confat paucis, Ajugs foliis proximis, fed valde longioribus, caule uno, non omnino reftOj aquotre5 quati;orve cauliculi exoriuntur, qui refta furfum feruntur; quilibetque iplbrum in cacumine fcapum quinque auc pluribus foliis Champityos proximis, ac deorfum in arcumrecurvatisin-dinantibus, conflatum habet; falfo atqueacrifapore. ^^

Dubitat C- Bauhinus annon hare planta eadem *dt^^K^yUio minors*, a fe in Prodromo defcriptOj cujus idcirco defcriptionem, quia in fuperioribus a no^^^Ba eft, fubjiciemus,

Radix eft tenuis, oblonga, fubalbida, fibris p^acis capuHHT *Ramuh* f'emipalmates, rotundi, tenuesj rufefcentes, iftceram rechnati, in fummoimminores divifi: *foliis* brevibus, anguftis, bims fibiexop-pofito repondenti^us, qux alis fubjiciuntur, aliquando ternis, nonnunquam quinis fimul junftis. Ramulorum faftiis capitula fquamata infident, quibus utnnque foliolum unum,. (aliquando plura Kimpan longitudine) pai-vum, recurvura, &L per matuncatem rigidum fubjicitur. *Flofculos* habet pufillo5, albos, pedicellis inhxrentes, quibus *femen* longc vulgari minus, fiibnigrum, relucens inccedit. Augufto florens in horto collegit C. B. Sc *femen* Patavio accepit *Gvttne* rubri &C albi nomine, Hsydelbega *Botrii* rubri appellatione.

Planta lattaria Africana Pini fruEluum facie Breyn. Prod.

Planta hzc rara atque peregrina forria prD caule magnum facit tuber, cinereum, valdc turhidum^ rotundum vel turbinatum, Piniformp, magnitudinis pigni Sc amplioris, quantumque exajpeftuexterno colligere licuit carnofum, multis fibris fulcis ab ima fede anguftiore prodeuntibus nrmatum. Ramos pra:ferfim fiipernc. procrudic copiofflimos, dense in orbem comacos, uncias tres, vel ad fimum quatuor longos, digiculis fbrme crafluudinis, fatureque viridis coloris, qui juxta fummitates nazis craflefcunt, atqutubercillis angulofis velutirquamulis per totum a natura ita formatifunt, ut nonalicer appareant quamfiPinifruaus. eflent immiaturi: in illorum fummitatibus foliolaquodaiii aneufia, digitum tranfverf. impxnelonga, draTajrigida, in fuperiore parte canaliculata* atro virorc piffajTithymaliaphylli ab Imperato defcripti, fimillima conpiciunturjlaftefcentia, ficut etiam tota planta laftea ubertim alimonia diffimt. Ethoc, inquit Br. quantum ex Planta (quz an adulta vel primum germinans me later) atque figura [uis depidta colonbus obfervare potui, namque plura non licuit.

Methonica Malabar orum, Nienghala Zejlomnfium^ Lilium Zeylanicum fupvrbum vulgb Herman. Cat. App-

Suftinetur hac planta *radice* oblonga, ex rotunda nonnihil compreffa, forma anconemfeu litsratn T> ex duobus quasi brachiis cohrentem, referente; foris fufca, intus alba, carnofa, guftiis amarinau- iefoi, e cujus medio fuperioriangulo prodeunt farmentahsbacea, rotunda, nodofa, ramofa^kitudine trium quatuorve pedum, qua: vel humi incumbunt, vel vicinasarbores fcandunt, varioque flexu il- las comprehendunt. Cuilibet nodo adhxret folium glabmrij planurij politum, latitudine duorum triumve digitorum, longitudine verb propè dodrantali in longuni, recurvum capreolatum mucronem definentia. Ex fummis ramis, aliquando etiam foliorum alls oritur pEdiculus, fuftinqps *florem* nudum, odore quidem vacuum, fed fructurx ran rate & colons pulchricudins flores omnes quos Zey- lona^lc Malabara fuppetunt long^fuperantem. Confat verb fex anguftis femidigicum longis, ele- Eantiffims fimbriatis petaliSj totidem apiculatis *Jlaminibus*, *Scfylo* intermedio triculpidato. Primis ab exortu diebus in viridi flavefcit, Si FritillariE ricu propendet, dehinc expanditur, ejuoque petala, fta- mina&fitylus furfum retroque vertuntur, Bcfenfm inaureuni, tandemque exquisiciffimum coccine- um colorem facitunt. His omnibus defluxis perficitur *feminarium*, amplitudine Nucis JuglandiSj fub- itnundum, trigonum, tricapfularc, quod in tres coriaceas tcnaces mepibranas dehifcic, refertum *Ctmnibus* parvis angulofis rubris duplici ferie difpofiris.

In Hortis Beverningiano K Fageliano luxunat. Herbis bulbDhsamibus annumeranda elt.

Hippophaes AnguiUara: & Dodonaifive Spina purgatrix J.B. *Hippophaes quibuflam* *to*»9* VAMA**MI> u e. *Spina purgatrix* Anguill. C- B. htm *Rhamms cathartkm Ole# folio* ejuldem.

Hippophaes (inquit Anguillara epift. 8.) fabulofis Pebponnefi maritimis, quæ nunc *Moret* rt^rnr nnnir ruin? radix ob vchememem vim purgandi quibuflam ipxnx purgancis nominatur- Suffrutex eft fpims duriffimis, fpargit le in comam rotundam, albam: *folia* Dlea: longiora, angulh- ora Be cnenora: ne^orem, nec fructum vidi. *Radices* palmo longiores Jadleum fuccum frangend3 fundunt amarillimum, odore gravi: Similem plantam in Italia non reperi.

Parkinfonus Glaftindam Hon. Belli pro Hippophae Diofcoridishabec.

Hippopliarftum quorundam Dalechampio ex planta licca e M lita infula delineata^ quancam fitirps fn nefcimus. Echinopus Plucarchi quibuflam J.B. force Echinopoda Crctica Belli fuenc.

Par. U77- A»-?B- D.Jo. Banifier Nucem Regiam Virginianam primam C. B. qui forma SC li- porcIiarumab Anghcis differt &c, eandem facit cum Nuce Juglandi Virginienfi alba *Park*, a ligni colorelic difta. Harum varia: liint Tpecies forma ic putamims duritie diffcreitss quemadmodum Europa-i. Hie mix eft quam tl)e I^icherp feu fDiech I^icherp I^U1 vacant. Ex hisnucibuslac confidunt Indi quod vo^nt Ijkkfcrp fIH?il6, non ex majonbusillis, ut vulc QBauhinus. Ex fimi- litudine mum habet cum luo lafteJuglandium Indi lac noftrum ^icHerp vocant-

Z Z i L L Z Z X

Alltr*

Auclir defcriptionis Carolina Indigenas ex nucleis hifce decoquendo oleum falubre elicere icribit, quod Se Anglis ad ufus culina: frequenter-infervit. Praeftans habetur remedium ad tormina intdtinorum. Sapore eft jucimdo, verum pofffemefre fpatium rancefcit K corrumpitur.

Idem DJJanifterNucem Juglandem feu Regiam majorem cortice fcaebro Be duro, nucho mag no Be dulci C.B. eandem elle vult cum nigra Virginienfi Park, à ligni colors fie didta. Verum Parkin-fonus hanc Nucem nucleum intus minimum claudere fcribit.

Fagii7y.Iin.iy. Addc,

Hand generofius contra colicam reperij^hmediurn quàm Juglandium membranula lutea amara pulverif Be cum vino data Sim.Paul. Qc^hBotan. p.99. Be p.66f.

Tag. IJBB. I'm. 22. Add. Quercus Virginiana Caftanez folio D.Tluckmt.

Tag. I 3 85. Jm. 11. Add.

Ad menfc5 albosfeu fluxum uteri album] R'. Scubem Quercusin tenuidimurn pulverem redaftum, propina inlaftè. Vel 1^h. DecDiff. foliorum- Qpercus ^v. coag. Leporis 3j. ofto dierum (patio laepius utentibus curavit veteres fluxus. Idem efficiunt Confolids ma juris radices in ladle coftx Be cutndtx. D.Hulft.

Equi Jcutellati fibalbidu (tlfpplc^grap) fi verno^hemppre unum vel alterum pugillum aut manipuluv oculorum aut gemmarum Qiercus arboris recentium in m odium A vena: conjeceris, illiquis aliquandiu his pafcantur rugncan, ubi pilos veteres [adunt₃ vel nigriore^h albidorum loco renalcuntur. Hocadlenbendum Vitriolo Quercus. • Sim.Paul. Qquadnparc. Jkrtan. p. 340.

Tag. 1 ^h96. Adfimm f>aginaadd.

Abizsfoliis pralongis Vinumfimumans.

Hujus ramulum ad me? mifit D. Doody Pharmacopoeus Londinenfis, Bofanices apprimè gnarus. Folia Abiegnismultblongiora ut Pinus videri poffint, non tamen binafimul ex eadsm checa exeunt, led lingulae ramis enaicuntur AbietinDrum in modum, creberrima, angufta, in mucioes acutos & L pungentes exeuntia: quern florem Fruftumve ferat nobis incomperuin. Scribit Cantum D. Dovdy in Horto Edwardi Morgani Weftmonafterii pridem enutrKamPinaltn nomine.

Tag. 140^h. Sabina vulgaris nec/lerilis eft, nsquebaccifera^h fed ex obfervatione D. Samuelis Dak Medici Be Pharmacopcei Brantriensj vicini & amici noftrij in plantis indagandis Be obfervandis indiiifju admodum Be curiofi, verè conifera. OHendit illis nobis conos virgis adnafcentes plimmus, Pifis multo minureSj fquamufos, Be fub lingulis fquamis ut in aliis hujus generis bina femina occultantes.

Tag. 1408. Arborem vite verè conifcram effè hac zftate obfervavi. Fruftus enim fquamofos producit, fie fib lingulis fquamis bina vel iingula lemna membranis alata occultantes. De florej an fruftui contiguus ht^hanab eodem fejunftus, nobis nondum conftat.

Tag. 1414- Cedni5 à Goâ malcollocatur inter Juniperos, eft enim cunifera, Sc Sabina? Ipccics cujus odorem gravem fpirau.

P^h 4^h / 17. Notandum u/am tantiimSaljcis/peciem corticem abjicerej verum dnasànobis obfervatas nimirum prxter hoc loco defcriptamSalicemnoIram quartam, five folio auriculato fplendence flexilem: quin SeSalicem à ThoWjllifello Darkingz in Surreia obfervatam cum Julio denhiflimo tomento ecu cotone conferfto abhis duabus diverfam diè fulpicor.

Tag. 1418. Adfintm fagina add.

Utrum Uleas fufculis fructu rancefcit Lappulo fimili.

Tag. 142;. //0.41. adde, Potus eximius in colica plumbaris expstitus, IV. Caricarum pinguium 14, Aq. font. lb.xij. coq. ad medias pro potu communi. D. Hulfc è M S. D. Fifhzr.

Tag. 14? 8. HiflGri&arbQrvpertzgrin&frutumficuififnikmgtrztis CluC Exot. /-I. r-11. adde,

Fruftuihuic idem effè videtur fruftus Lance diftusBoncio 1. 6. c. 25. lacvis, cortice-flavo, ficcum bft^huni, acrem Tithymali inftar ^hvulnere inflifto fundens: à quo (in quit) externa tan turn facie Sc nomine diffat alter qui Ramp eft an VDCatur, quod fruftum crinitum denotat, quia Hlamenti quafi ca pi Hs externe fit munitus. Nuclei utriufque intus conditi cum carne fua eundem faporem acidum Be vinufam obtinent. Otemmai bores vafta: Be magnz funr, full is LauriAiSj è quibus hi fruftus racematim magjia quantitate pendent fie pulcheirimo afpcdu utriufque fruftus ardoribus febrilibus rehnguendis exinue conducunt.

•1446. Ad vires Pomi addej Potus antinephriticus, Rr. Pom. dulc. aflat, n. ij. Vim albi Aq. font. ana lb p. Syrup, de Althxa 5J M. Dibat omni manè lepidè. Idem.

Ad dolores accrbill Ophchalmi-r, IV. Pomi dulcis fub cineribus co<fti pulpam ad ⁿij. Canipn^D rxii Croci3|i. Aii.Kolarujn Stlaftbituicbns. q.s. Fiai Cataplafua. Bruel Cbfnta*. H^hui a< oodem D. Hulfw.

Pag. 14J9. lin. y. Pro quarta & quinta Mepili (pinofa /pecie addantur

4. Mzjpilus Ipinofaftw Uxyacantha maxima Virginiana Herman. Cat. Leyd.

5. Mepitlus Ipinofa five Dxyacantha Virginian* nigra ejuftm quarum in fluent z cap. mntlofafta eft.

Ibidem pro tertia fpecie Sorbi foliis integris interponatur,

3. Sorbus Aumparia Virginiana foliis Arbuti Breyn. Prod. Herman. Cat. Leyd.
Breyn.

Arbulcula eft Chamzmepilo J. B. non valet diffi^l ^ ^ duprnf aut trium cubitorum altitudine aliquando akior, uno plenique ftipite, pollicem c r l ^ ^ B in aliquot ramos ex fufio vel fpadiceo cinereos divMditur, Be hunalios minores^ Terraris f o i m P d frequentibus eos ve/tiennibus onutios Ai' buchHimil^{OTS} jpiDna au tern part e albi can tibus & lanuginofis. Fhrzi in lummis ramulis pentape² rail, candidi, Sor² Aucupana: fimiJlimi, fed minus conferti, in umbellam difpofiti, quos excipiunt iupervenientes bacc[^] coJore Sc formã etiamSorbi Aucupari[^] frmaibusphuic convenientesj fed mi- nores[^] in quibus femina quoque minor a continentur. Septembri floruit.

Pag. 146D. Pro tertiaIpecieSorbo affiniujn foliis integris addatur,

totonsafttr J. B. Utonafttr Gefneri Park. Cotonafttr folio rotunda non ferrato C. B. ~~stms C~~
jpilus Cordi ejuftem. Chamanzpilus Ger. Epimdis Lugd. j D ~~ist~~ ~~medior~~.

Frutex eft ramofus, cultiUamenarbarefcens, cm folia Mali Cydonio:, aver/a parte candicantia Be lanuginofa, adverfa vero nervofa Be virentia, minimi per ambitum ferrata finiatã[^] pedicujobrevi appenfa. Flores cDncavi, herbacei, pluresjunfti cohserent, quibus fuccedunt/r>ffr^{*r} in extremis ram II- IJS, velutinOxyacantha Matthioli five Spma alba, bini, terni, vel plures, parvi, compressi[^] v ro- tundo oblong[^] in unibilico quinquepartis feftiunculis infigniti, cortice ubi maturefcunt pnm&ru- befcente, cui tamen obdufta eft lanugo cineracea: Sapor lis acerbus. Officula intus conrinsntur terna auc quaterna, obJonga, hinc angubia, illinc plana, duriulcula, qua: tamen dentibus facile con- reruncur, medullam claudentes albam. Fructum Clufius dicit colore fons initio fubflavelçerite de- indembro, carne intus pallid a, fungofa, Dxyacantha fere fapore, quina officula five femina con- tin ente.

Nos in montibus Rheno imminentibus, inque Saleva Be Jura obfervavimus. Frequens oritur in Alpibus, Apenmno aliifq, montibus, utvidere elt apud Clufium Be J. Bauhinum.

Gefnerus, eumq, fecuti C. Bauhinus, Parkinfonus, Lugdunenfis hiftorii[^] auctor 5e alii, ex hac plantaduas faciunt, ut J. Bauhino quern fequimur videtur. Verum C. Bauhinus ncin fidencer affir- mat diverfas esse, ut vulc Gefnerus[^] fed forte eandem[^] Cotonastrum Ge/neri & ejuiaemGhamcnie- ipilum, quamvis ilia foliis fit majoribus, nee baccis adebrotundis. Quid Geihero errandi ocuafio- nem dedifle putet J. Bauhinus apud ipfum vide.

Hortis facile affuefcit hie frutex, quamvis monticola fit*

Pag. 1[^]66. Adfextam fptzhm Opunti* feu Fhus Indie* adde.

HancIpeciem elfeputo quam in Horto Chelfeiano a D. Watfio cultatn vidimus, ab infula Barhd- dos acceptam, toliis longiffimis, tnangulanbus, profunde canahculacis, Be ad angulos folum fpinis stel- latim difpoficis armacis. In Horto D. Darby pnmum culta fuit.

Pag. 1467. Adfimm capitã adde,

Ecbmomelocattos lanuginofm tubzrwlis JP'noJis undiqut obfitus.fruSfu } I at en bus fparfim egreditmt.

Hancraram & nondum defurptam fpeciem in Horto maximc Reverendif Epifcopi Londinenfis vidimus. Figur eft globofx, nullis fulcis exaratus ad modum pr[^]cedentis, neque direftis neque tranfverfis; plurimis tuberculis acuminatis e quorum limmitanbus fpin[^] egrediuntur, unciam circa longis undique obfitus. Tubercula ilthzc denla hie illic lanugo intercedit, Fructus e latenbus sbar- iin exit, Mali granatac flori nondum expanfo non diffimilis[^] pallidius duntaxat rubens, quern fpinse undique muniunt, ut impune eum contingere non liceat. Singulis 24 horis novas fructus promit. Flos Monopetalos funmitari fructus infidet. N. EjuHem omnino figura: Be colons eftEchinome^{''} locafti vulgaris fulcati fructus. Hzc D. Tancredus Robinfvn, e cujus notis defenptionem noftram con- cinnavimus.

Pag. 1485. Adfintm pagifia pro Loti fecunda (pecie add,

1. Lotus arbor Virginiana fruEtu rubro,

Quam olim Jo. Tradefcantius in Angliam e Virginia intulit. Hujus florem bafi fruaiti coharren- tem in ramulo a D. Doody in hortoreverendidimi Dm Cri/pin collefto, Sead nos tranfmiffo obfervavt mils: Summo aucem fructui ftylus geminus cornuum fpecie hue illuc reflexus infidst j unds nos in di- fpofitione arboris Loti erraflelufpicamur.

Vai. 1485- Adfintm cdpitis dt Groffularia addatur,

Uva cripta Amzncana Pifon. p. 141.

Pifo.
Mentibus potiffimum pluvii (quibus magna pars fructuum hic [in Brasilia] vigere foler) fructi- fera eft hzc planta, quæ ex radice alba, longa, filamentofa, caulis e viridi albicanibus ad ordina- ni fructis altitudinem affurgit, fpinis undequaque armata. Cui hinc in de altera ferie omo longiffi- mus pediculis adhaerentur filia diverfa hauræ & magnitudinis, ferepæe tollis fimilia, dilute virida, zzzzzzz ; ad

Plantá rupta aut contufa ejulmodi odor em foetidum exhalat, unde Be ejufdem quali^{תחת} particeps effe videtur.

Perennis eft planta, frigoris tamen minus patiens quam fuperior.

Oleander Críticus fruticofa majur fxtidzts Zanolii.

Zan.

E radice perenni, farmentofá, fibrpfa, (átis craflá, tortuofa, repente, *cauliculos* fupra terram funditmultos, undatim flexos reflexoque, fpithamam circiter longos, tenues, teretes, ligno/bs \$c nodolbs, inferne cinericeos, nonnihil lucidos, paulò fuM^^ flavicantes, fummis ramulis viridibus, in gyrum circa radice caput terram latè occupantes,^^^Btotè eam contigennt radices agentes/ad fingulos nodos duos trefve ramulos emittentes, qu^{ur}WH^mox minores lubdividuntur, unde plantá ipfa foliis (^j^amulis crebris valde denfá apparet. *Folia* ad nodes brevibus pediculis adnexa, plura etiam fimul minora, ex eodem oculo ad nodum, qui craflitie ipliim caulem fupsrat, exeunt, lupernè obfeurius viridis¹, fiibus¹pallefcentia, crafla Be denfe, in medio fulcata, Be lineis tenuibus velut fcripta, oblonga, medio latiora, versus utramque extremitatem acutiora, Anthylhdís maritime Alinefoliac C. B. familia. Prope fummos caides folio rum ce/pes exit, in quorum medio gemma: aliquot viridante⁵ exoriuntur, quarum unaquæque multas oblongas fiftulas emktit, qu^u aperca: flofculos rubentes oftendunt, fumma parte in quatuor laciniis feu petala divifos, deDíTum reflexa, forma, Sc CDlore Nerii vulgaris florum, fed multis futpareft) numSris minors, vulgaris Gelfemini flonbus valdè fimiles, fed minores, ut iidem planè ut viderentur, ni color differentiam oftenderet, ut Be língulx qufcdam in medio rubentes cum quatuor ftaminibus albis, apices rubros geftantibus, utveluti tptidem iagittae feu fpicula fanguine tinfta appareant. Mediam fiftulam ftylus permeac, cijus ba^{h5} recepcaculum fru^{stus} obtegit, quimenfe Augufto ad maturitatem tendit. *Szmen* in quibiifdam pa^{vis} fruftibus occultatur, colore viridante, forma pyri, cujus apici infidet tenuis qufcdam cauda retorta; fruftus maturefcentes, obfeurè purpurei Be lucculenti evadunt velut Myrtibaccar, Be tandem cum perficiunturnigri- *Semen* oblongum femini Qtiamoclit fimile, fed minus. *Radix* triplici coiticeintegitur, exterior[^], quæ faciliè dehbratur, nigricante, media¹ tenera¹ Be flavá, tertiá rubrá ve-^{Jut} Erythrodani, cum medulla in medio lignofa flavicante.

Odor totíLis planta: fetidus Be ingratus velut floris Dracontii vulgaris, unde Be capitis dolorem inducit, Be oculis nocet non aliter quam Nenum vulgare. Sapor ingrattiffimus Be amarus: in manu geitata reffpirationi officí[^] 6c Naturam totam perturbat, ut non fine ratione veneno^{fe} qualitatis particeps cenfeatur.

Hanc plantam effe exiftimo quam propè Scajeam in Regno Neapolitano inveni, Be poftca ficcam apud infignem Botanicum jam fatis jumftum *Joan, Mariam Ferro* Pharmacopceum Venetuiii vidi, Periclymeni fupihí pumili appellatione, Floris e^{ffdem} forma¹ ad Periulymenum accedit, flos etiam fummo fruftui infidet ut in Periclymeno; qui fructis qualis fuerit in ficca difcernere non licet, pyriformis tamen videtur Be umbilicatus. Folia in ficca craflá videntur glabra, non utraque extremitate acutiora, Be in latiora ut in planta Zanoniana, fed 6 lata ball in mucronein fenfim anguftata *jit* Serpylli foliorum armula in longiora effent.

Urucatu Brajilienfibis Marcgr:

Marcgr.

Planta eft quæ fuper arbore *Urucari-iba* nafcitur fine raice, verum quatuor aut quinque *folia* infenjis lata, bulbum faciunt ovalcm, circiter quatuor digitos longum, qui intus conanet medullain quandam unguenci fafticii confiftentia Be a^peftu, pingusm, ad tadtum fingidam, *Wklbo* vn efcen-tem, multa adhzc hlamenta iubcilia albida in ie difperfa habentem. Supra bulbumVoJia a fe invicem difcedunt, fi^tque ibi an^ufta, fed in pedalem aut majorem altitudinem excrefcentia, fbp^{er}iu⁵ latiora, lingua: ngura, Be hmilia Squillar, viridia. Qiiqd^hbet autem folium fecundum longitudinem habet ties nervos. Nee florem fert, nee fruftum; inodora eft planta, unguentum quoque illius inodornm. Hoc denique frigidum Be ad^{dolores} leniendos judicatur aptuillimum atque efficacif fimum: foporem quoqueinducere experientia probatum eft.

Pag. I 647. *Ad finem paging add**, Carandas Bontii alia ab hac arbor effe videtur quamvis illis [Bontius] candem velit, Be quidem Tamarindus Americanus noftratium aut ei fimillima arbor. Tamarindi enim illius filiquac quas apud illuftrem Virum D. *Gul. Courtme* vidimus, breves compreffie fie monofpermæ erant.

Pag. 168 f. *Ad Cap. dt Staphylo dendro adde*, Abrahamus Muntingius duas Staphylo dendri trifoliati Virgimani (pecies depingit, majorem Be minorem.

Tag* 1707. Platanus Occidentals feu Virginiana] Arborum vetuftiorum, docente nos *D. Jo^m Bamfier* in Catalogo plantarum Virginienfium, non tantum trunci fed Be rami cortices fuos fca- bro⁵ exuunt indèque Be glabri evadunt Be nivis fere inftar candidi. Arborea etiam juniores cortices abjiciunt, virides tamen non albi apparent.

Fag. 1711. *Ad finem Cap. de Barba Jovis adde*, Abraham. Muntingius in Herbar. Belgic lib. *i^m* cap.41- plantam quandam depingit Barbx Jovis Antiquorum appellatione, qua[?] quo pertineat nefci- mus, certè hujus lopi non eft. Icon folia oblonga reprarfentat extremitatibus fubrotundis, crebra adèbin lürculus ut sos undique occultent.

Pag. 17xz. *Speciebus Anagjridit [w Lahurm adde*, ^Laburnum fpinodim Americanum flore ru- bro ab Abraham Muntingio in Herbario fuo Bdgico ciefcricum Be depiftum-

Pa^f.1718. *Ad finem Capitis de Sp&rtio non fpinodh adde*, Genifta: quædam fpecies abAbr.Mun-¹ uogio¹ 1 • Herbario Eelgico depingitur Be ddcrimir, quam latibliam flore luteo parvo vocat. Pjg. 135;

Emendanda.

Pag. T44. P. Hermannus Filicem mollem feu glabrum vulgari mari noil ramoff acCeden-tem J. B. &c Filicem marem non ramolam pinnulis angustis raris profundti dentatis Ger. emac. pro eadem planta habet; nee nos repugnamus.

Pag. 15[^] l. 18. D. Hermannus in (^aj^o Hoifi Academic! Lugduno-Batavi pi(5. Banguen Alcc^e, live, in ille VDeat, Althaea Indi c^ ^ ^ Hb effe nos docuitj hinc ergo ad congeneres Lib. 19. Snft.2. cap. 9. p. 106.;. transferenda cft^ ^ ^ ^ p

Pag. Eadem l. 47. Caput de Urtica a^W^entem prima: Sefitionis partem remnVeatur. Dbfer-vavi enim in Urtica Romana pilulas lentiniferas Be fiudtus racemofos in eadem planta f quod 3c aliis Vctix fpeciebu5 commune elfc puto.

Ptff.io^ /- antepenult. AmarantU5 Siculus fpicatus radice perenni P. SOCCOTL non reftE collocitur inter AmarantosSericeos, fi inudu genuinus Amararitus lit, quod non puto: Amaranto potius affi-nis aut familis-videtur.

Vag.ix^ Kali floridum repetis aizoides Neapolitanum Col. ad Chry/anthemii aizoidis Lib. 14. cap. 4. defcripei genus percinec, ideoque hinc illuc transfrenqundum eft-

r^ j i44- '46- f^ft vtrba ill* primum Claffi aJJe, Imo non accedre tamum, fed eandem plane plantain elfe exiftimo^ fiquidem inhorcum tranllatus Sc cidtus a D. Sam. Dale unum vel alterumramulum-emiffit, 8c in omnibus ddenprjoni Hieracii PannDnid I-Cluf. re-fpondere deprehenliia ell, ideo hit: expungendum, 8c cum fpecie (eptinia Cipitis VII. conjungendum eft.

PagiG-\$. I. 40. Species nona, nimirum Conyza wulibus rubentibus, flore luteo nudo hoc in loco expungatur, nam repetitur p. ^9}. ad quern locum in noftra mthodo, non obtantc gravi Con^s odore pertinet.

Pag. 172,- Afttiquam jam fententiam reliimo, ipeciem quartam feu Jarobcram montanam non laciniatam noftratem eandem plantam elfe cum fecundaleuicicnboxa Pannr^nica folio non laciniato J*B. ut ex planta inhorto D.Dale culra cum deltvptione Cluffi CDllitaapanut.

^ ^ . . ?9? " Q1^ de ArzogatI leu Mtabih Mexicana Hernandez nimis fdtJnanter /cripfi revocoy C£ poll iecundas cogitationes earn 5c genere Be lpecie cum, arimirabili Pcruviana convenirc ag-nofco.

Pag. 417. P. Hermannus Laferpitium foliis anguftioribus, dilute virentibusj conjugatim difpoli-tis Mortfoni pro eadem planta habet cunyJLaierpitio Gallico J. B.

Pag. 540. Origanum montis Sipyli gsj'Jna Diftamni fpfcies nobis videtur.

Pag. 619- Hiftorii Sagittariz addc, Idem etiam obfervavit diligentiffimus Botanicus D.DooJy, qui in omnibus Sagittaria: plant is bulbum feu tuber qualis a Bauhino depingitur infra Lnum in iplam Tenum lolidam deixum inveniriad me fcripfit. Notandum tamen non in hoc tan turn planta folia hoc modo variant fed in aliis etiamaquaticis, utv. g. PotamogitDnelatifolio, cui paiter folia aquis Immerfa graminea funt^ at qux aquas luperant lata 5t fubrotunda, ut in ejus descriptions pften-diuus.

T*^£- IM- Rapunculus Creticus Pctromarula diftus hinc rcmovendus, Sc ad Rapunculosgaleatos transfer end us eft.

Pag. 780^ C. Hermannus Leucois aftinem Tripolmm Anguillar^ & Leiiconirn mantimum Ca-wtr. pro ipedvdilhnifia a noftj o LJULUIO maritimu laticolio ponit.

PagiW* itapiftrum floreLeucoii marinnij nelcio quo cafu in eadem pagina repetitur.

Pag. B18. DefcriptitJ qua: lubjicitur ritulo Rapbam a^uatki Ger.Park, &c. ^1 aherius plant^j nimirum RadicuLr lylveftns five palufns J. B. Rapiftri aquatici Tab. Raphani aquatici Rapiltri folio C.B. Ideoque deleantur verba illa. Promde Rapbanw aquaticui Tab: & tujdem Rapiftrum aqxa-tuum nan different fpecie.

Pngm B59. l. 30. Species illa Thlafpi verum primum Diofcoridis Zanonio difla ad fcquens capuC tranferatur, fiquidem in cjs vafculo membrana filiquas liifterminans ad laticudinem filiqua: tranf-ver(i eft. Eadem auteni videtur Thlafpi Alexandrine Corculi J, Bm p. 834. dslcriptc?, ideoqux cum illo conjungenda-

Pag. 866- fpec 17- Tiihymalum marinnum feu ERilam raram £ Lio Venetorum infula, flore albo Cat. Horf. Rrg. Parif. Paul. Hermannus Apocym Ipeciem fdcit, vocatque Apocynum manci-nium creftuni Venenim flare albo: Ec ceite nobis olim ex ramulis ficcis [nam plantam virentem nondum videre concigit) fpecies Tithymali non c(Ib videbatur, Itxl plants longc diver/i.

Pag. 89 J. Chamzbalani kguminolx vires nefcio quo cafu ad p. 899. tranflatiLathyro Vicis-formi liibneduntur, ide&qucilhnc hue removenda: liint.

Pag. 912. PaiomiriobasduasPifonisSennxl^ecies elfe non Orobi iD. Hermanno didici. Hac , zftate utraque mihi fuccrevit ex femmibus ab ornatiffimo Viro D. Spragge acceptis.

Pag. 911 Abfu5 etiam eodem docencei Sennz fpeciem elfe agnovi. Adde Synon. Abflis foliis Trifolii J. B.

PaX. 996- Species duodecima feu Lychnis fylvellris alba /pica^ reflexa^ Botan, Monfp. eadem eft proximò icquenci, i e. Lychnidi flore albo minima noltrati. Vide addicamcna. D. Dale Lychni-dem aivenlem ninoem An.^licani Part, in arvis propc Colcelhrum uiventim pro eadem liabet, nec nos repugnaniuir. Vide qus defcriptionem p. 1004.

Pag. loyi. JmicarurSalm.iniiccnlis dcfunpcio repetitur. Habecur fuperius Lib.4. cap- 17- P- i n . A:S) cf jrri d^bcac nobis nnndum conflar: hiè ramen ã placet delcatur.

Pag. 1^7- Spccicmr^tyledonisjidecimam, feu Sanicuhm Alpiiam crenatam umbiJicopal-lido eandem elfe puto cum icxca, ideoque rranflita illuc ruulo dcfenpcio hie delcarur.

Pag. jof f.

Tag. 105 J. Gratiola Hyflbpoides Be Agratum purpureum Dalechampii male adjiciuntur capiti de Refeda \ lumque fingula proprium caput constitutere debent.

: jw_{ID77}. Linum tertium Be quartum Morifono defcripta non differreputamus à derima fpecie ieu Lino fylveftri cEruleo perenni HDfrate; nam &: hujus eciam haca^face duas fpecies obfervavimus alteram caulibus ereftis, foliis laciioribus capitulis majoribus, aheram caulibus terram versus re-
^in^foliisanRuftiDrib^cap^ minoribus.

Pfig. in\$- ^ Mteptnuk. Allium montanum majus Anglicum Newtoni, id elt, Allium Holmetife, ad hunc locum non percinet, non enim bulbum habet ex mulcis nucleis compolitunij utnos umiffa inter transfer en dum particula [Non] faho opinaii fumus^ fed fimplicem turricatum : cflq, ex Dbfervatione D. Sam. Dale, qui in Hortoillud colui^Jiihil aliud quam * Scorodopraftum pn-
* p.M21 de
cum Cluffi: ideoque hie expungatur, & cum IIIO conjurigatur. Nptandum aucsm Porrum Syria-
frifram.
cum Tab. i. c. fylveftre folio latiffimo C.B. plantam effe longc divsriama S^oradoprailo primo Cluf.
nonutfupicakamn j eandem.

Fag- II^I. Yucca Brafiliana K Americana Muntingii ftellatae folio mucronato Be obtufo ad hunc locum non pertinent, led Mandiocz ex qua panis Caflavi fit, fpecies funt.

Fag. 1445. Ad finem Zapfjs VII- addc_M Ananam fylveftrem Acollac eundem fruticem effe cum Kaida Horti Malabarici à peritiffimo Botanico D. Jacobo Breynio illud in Prodromo innuente, didici • ideoque hiftoria ejus inter Anomalas tradita in Capite de Anana p. 133 j. hue transferable

Fag. 1663. Pequea five Pekia x. Pifonis bis ponitur.

Cohnil Hort. Malab. bis ponitur p. 17;4. Be in Appendice p. 1891.

Fruolu5 Samparantan diftus bis ponitur p. 1744J 6c p. 1 BI 5-

In delcriptionefolii L_{Quintuin}^ p. 1797. lin. 38. acutiif ponitur pro obtufius.

Libet hlc adHiftoriam condmmandani Stirpium nonnullarum Indicarum, Mexicanarumj Perficarum, Africanarum K Virginienfium nomina à me omiflk ex Hernandez 8c Reeche, Indicibus Zanonii Fafciuulo rariorum Jacobi Breynii, Be Catalogo Joannis Baniftr excerpta adjicere.

EX INDIGIBUS

JACDBI 2A NTETJ II BONONIENSIS.

A

J4 Givan.
 1\ Akafa.
 •A. JLAKled, Specks Croci Indici.
 Akafonum five Arkafvnum, Manga fylvzfr is. Hujus
 figura & descriptio in aliquibus conueniunt cum
 Odallam H. M- in aliis^ ut feminum par wit ate,
 dijferunt.
 Ala, fzu Zingiber Chinznsz.
 jiladar Uroci Specizs.
 Ala dial.
 Albu, Jptcies qua Alou H. M.
 Allium Indicum.
 AUo.
 Amarkand.
 Ambari fagi.
 Am bet i.
 Ampururi.
 Angle arbor.
 Anicigan.
 Anna Varstcha^ i. e. Arna Vifci Indicij ftu Plant*
 parajitha fpecitt.
 Antacca.
 Arbor 5. Gtorgii.
 Arbor jilt a ex qua A*ves nidos Juos fuspendunt.
 Arbor Indica max. falfo Idolorum cultui dicata *vr
 detur eJJ'e Atti-meer-Alou H. M. qu<£ Ficus est
 fptcits ffgomniHTn Arborum Indicurum maxima.
 Arvor ferdSmblia argentea.
 Archam arbw₃ cujus radix Mater Dei dicitur. Fo*
 Jia babet tripartita, folida ut Mjrtus; Florem al-
 bum; e cujus mzdio oritur fruilus fquamatus fi-
 guram pifcis babens.
 Arxi five Ada arbor.
 Arita feu Rita.
 Arumha Mjrobalani fpecitj.
 Aruja.
 Atta.

B

Bablia.
 Baccbion.
 Badam arbor.
 Babila arbor.
 Bahinda.
 Bar Zambul.
 Bafilicum Indicum J)h.
 BzbU.
 Bendi.
 Bajba arbor.
 Bil.
 Bingbz.
 Birli JpecizM Pal_{mXw}
 Bnogra.
 Brimm {I've Blitum Bengal*
 Britum Ambvr*
 Buzfipda.

Bulilla, an Bdilla H. M
 Bnin, Bmkhni.

C

Caggiu feu Cbaggik Arbor,
 Earda arbor.
 Card ilid arbor.
 Carangia.
 Cafunda fzu Cafcunda frutex*
 Cata, Tartanz.
 Cetorz, on frutzx.
 Curafani fzu Jjfozft. Curafen.
 Ci& thara.
 Chiadkzn.
 Liamba pua.
 Ciarati.
 Ciaruans feu Herba Trinit,
 Cickna.
 Cirti Cucumzr'u fpzeizs.
 Ciurata feu Rota aut Canna Indica.
 Cerundi.
 Criata herb*.
 Cruni.
 Crulli mufla.

D

Danti five Stipfdanti.
 Dudbaliw
 Durli.
 Fangbzla.
 Fxmculum marinum Syria.
 Flos Vavonis*
 Flos Pzrfidis.

G

Catgbzrt.
 Garar NtUu
 Gbarfalli.
 Gbondi arbor_m
 Giambua.
 Giafon, arbor parva,
 Ginthz gintha.
 Guburlt.
 Gulfi.
 Gmg.

H

Hzrenda dux fpeciej.
 Hortnlana.

I

Ignis cali Herba.
 Ijrlt arbor.

K

Kadi Tumba.
 Kaggiun fpzazi P*Im*D*3jhfr<t-
 Kagfrii, arbor, Laggm cadern videtur: <y. m U
 KagniUm.
 tJ& matam_x

Kalii kardor radix.

Kalumba.

Kampedi Fudeli.

Kanadi.

Kembtri.

Kantefen <ve> Kara Syriaca radix.

Kannu.

Karante arbor.

Karute arbor procera.

Kata pineka.

Khevan.

Khink.

Kiriata.

Kokus infularum.

Kodria.

Koni vulg^o Ralla.

Krididi.

Kudi, Anneko.

Kucli arbor parva.

Kuper kuti Herba refens.

Kumba.

Kurulu*

k#rut arbor parva.

Kufeta.

Kura kufa.

L

Lamba vulg^o Giacca de Bufeio.

Laun.

Lai

Lr

cits Bintamburu vote tjuadm fig^o ^{vubuli fje} ^{ifstaj Zy}
 hnmfibus ditto, Herman. Cat. Lcyd

Licchia.

Limber* dux fpccits.

Linda arbor.

Linbra, arbor.

LondaL

Luceragg?

M

Mako.

Macongoi

Makorna.

Malkangoni fruBus.

Aland* Jabo. Her.

Mandara.

Mamtkdi.

Mdrbetb Herba.

MajJUra.

Meluk.

Morns Indica ^{vulgi Calf}

Munda

Muri kuL

N

Nai.

Nagdon.

Nagli feu Naccem.

Harandi.

"Narnbtidi,

Narwa feu Naraf.

Nilica ^{et Nilica} ^{H. M. p. 1017} ^{dicar}

foliis^

Nsd.

Nimbera.

O

Ddelbinga*

Oghfi.

Oiid Mogre.

Oxalis ^{Perfic}

VaberabuL

Tacali arbor parva.

Pagnas.

Ffiguiera arbor_m

Faire arbor.

Tanna feu Bethel.

Tanna tali,

FMstohcfeu Giancoma, an Jangomai Garcia ?

P

FanriKaJli.

FaperambtL

Taragb fm Pharangh.

Paravgi.

ParcoL

Panngha.

ParmL

Par mi kanti arbor.

Pateki fmVripilk

Pangiota*.

Phutia.

Pis

Pimbul arbor

PinpaL

Pinkeui Pinxeni.

Ptti phanda.

Putakeri.

Puna.

R

Radix Pzlua & Peluz.

Rad. Ran Varuua feu Dantora.

Rad. Nai.

Rad. Kua.

Raifink.

Rambe Arbor.

Rambulon.

Ranabil radix.

Rangandual.

Ranguri_m

Rarondera.

Ratdegal₃ Arbor.

Rinda.

Ringhini.

Rodali herb a.

Roftrage, Arbor.

Rodibula.

Rumbera, Rambora.

S

Sab on.

Sabranta Herba.

Sabfin & Samb₂ Savan ittm> Anteka.

SaifcuSairain.

Sakat.

Samba arbor

Sanderfar & Sander Pal. arbor.

Sanderlak •frutex.

Sapuri.

Satura.

Sa'vargbi.

Sciruli.

Scivan & Saivan arborprocera.

Siabon,

Supbucaia arbor.

Suran, Surandi arbor\

Surna.

T

Tamberi Pagi.

Tan.

Tankda.

Tapberi, nidtt I ramo fufptrifus.

Tarara.

Tota

Tota Vari,
Tittttmes.
Teti kani.
Topfi, arbor.
Tittfigur.
Tj, arbor farvz,

V.

Vaar feu fora.
Vartti.
Vxar Vanti.
Varua chart) arbor farva.
Vafnagha,
Vmdftu Jflu, Herba.

Vtfub Mogri.
Ulba, Heria.
Umbra, arbor magna,
Undari.
Vpalfcri.

Z.

ZalanJa, Htrh.
Zsmbal, Frutix.
Zi>mbul, arbor,
Zambulon,
Zaffar, bulbm, An Crocus ?
Zafuan ml Cbisfu.
Zuui,

*Index efl Plantarum quorum Icones & Descriptiones ex India mifo
Frater Matthaus S. Iosephi Carmelitanm difcalceatus ex urbe
Kegio in Lombardia.*

S^ononnullarum ex his Figure # Descriptionis habentur in Hifloria
BotanicafacobiZanmii. Vt v.g.

*

1. Li Liadul live Asdalbul Herbs Indica; quarn ita defenbic praicufus frater Matthaus.
i-\ Feka habet lat.i & oblonga; f lores albos, unico ramo infidentes, in qua funt aliqua fo-
JL &. liufcula cordis hgur^, inter çvÿc natcunrur flofculi, qui habent odorem quafi fimilem
porno maturo, & induduntur linulis foliolorum, in quibus apparet caput vacca; cum inis cornibus;
unde Gentiles qui vaccas adorant pulmentum tali capitciaciunt*
- i. Allihj nomenAIoufeuFicusIndica:fpociemdenotat.
Arbor eft grandis, habet foha magnaj lat.i, plans & mollia, odore fylveftri. Flares produ-
cit colon's purpurej. Fiufusfert quafi ut ficus, fed defuper acutus, colore rubro, faporcacido:
Semen incufum eft valdi amaruni, Frudus vim habet corroborandi refrigerandique, FOIJK
utimtur Indi ad inflammationes, &c-
3. Archam arbor.
Hujts radix Mater Dai dicitur. Folia liabet tripartita, ibbda ut Myrtus: Flos eft albus, e en-
jus medio oritur frudua fquamatus figuram pilcis habens, qui in puivcrem redadus 8c cum aqua
bibirm eft optimum renediim pro Fcribus.
4. Butu.1, S- Brutia. Hujus icon kabctur abique defcriptionc.
5. Bucbe
Cni foUifcngulari.i; fiors intiis flavi, in bafi rubicundiflumi, qti.ifi quinas cicatrices continen-
tes, unde^Wcicatncum dicitur. Radix trita pro renum dolore adhibetur, flos vuro fanguinis
profliviumliftit.
6. Bulilia eft Bulbus l(quamofcs fimilis Ltjio, e cujus medio oritur ca*In, qui erigirur ad fex palmios
aculeis circumdatus, in vertice emittens pyramidem Aro noftro fimilem rotundis fruciibus CLim-
pofitam, qui colore & forma videntur Corall, inter quos exeunt aliqua angufta Sc undo/a folia
Lonchici apera: fimiita, colors roiacco ieptenumque numcruni non excedentia. FniAus du-
riflimi (lint, virtutem habent (iftendi ianguinem, ibio carnk tarSu ubi funt venar, applicanturque
in pujverc ad Huxum finguinis fedaadum, & conrei imc lilis qui non poflunt retmere cibum pro
ftomachi imbedllirate.
Cannam viv.iin Ipinofam venenofam St mordferam pro figmento habea Dattirumcn canna
quaA-dam capita fquamato in Brafilia Pae&oiatmgt difta.
- T- Carda arbor Indica, cut Limones cujus folia fricata dant odorem ficut folia Cedri, e
ftillantur ad fluxum fedandum, Ipirantque ambo odorem fuaviffimum. Fructus eft vardo major
Limone. Boves fimiles Cedri. Cortex fructus eft durus inftar Granatorum. Pulpa induia iecun-
do toittice duriflimo & crallb eft vifcofa ac fapore infipida; Semen inclufum at Jicut LimoniSj
kd non tain durum nec amamtq, Hoc fiudlu utuntur Gentiles antequam maturefcant ad ap-
peritum excitantini.
- % Oirtii'i.i arbor Indicj
Folu habet icnkj plana, cordis figura. Radicis decoato febrim toilit. Folia trita &dho folio
mvoiuta & in cinere calido feptitta pro omnibus animalibus funt protkua.
9. igH arbor pagi Ends dwfi in infulaSolor, nulla hujus deicripao habetur fed ic<l tantum.
10. ILinaJiku KonadciidKroOrlenwlUhciba,
Rut** eft (ubeiof*, yaldc craila & icabroftj qua; plurimas radicuLiscniittlr; in verti-
miila tote, pam quiden, led loughin, inter qua; aliquot affinpup virguLr, Juncorum inftar
at. alitudineiB qniqqc, (isv_e palmui-um, quorum in mote flos eminet luccus, fimplicis Roiz
non abfitnii»: e oij in medio trU lUmina ^o(Ieunt) apiccs, m fimmitt
« (Sura cordi -- I alcu veru lu BOMS /pirant odorem ut longe tentjia tut.

II. Lamba, arbor est valde alta, nasciturque in Jocis Tylvefribus, *cujus folia fum parva, Parietaria noRrs /Jmifa: Ramos habet longos, arquali proportion diihmes; FruOas fmulss nuci, /adure Ceraforiim, colons aurei: ideoque inuheres eos colligunt ad ringendos capilJos, fed dam mehu fupplicii: nam idprohibitufj quia islervantuiprD Avibns.*

E Fascicub rariorum plant arum jacobi Breynt.

A.

A Bfinchio Seriphio finilis Cap. B. Sp.
Alcaea minor Africana, Alchxx facie, flore purpureo varvo.
Arbor rofea prima, feu Arbuti folio, flore flavo. Secunda, five Scyracis folio, *Tm Rhym.*
Arbor lucensHalicacabi fructu. An Arbor lucens Jamaycenfis noftras?
Alphodelus major ramofus Cap. B.Sp-

B.

Bellis Emci folin incana, C. B. Sp.
Bugloflum Africanum Echii folio.

C.

Camphorat* fimilis, longius radicata.
AUera, niagis hir/uta.
Chamapgenifta C-B.Sp.
Chcnopodz fimilis planfa mirabilis Africana, Echini *Alpini* facie, fed minime spinofe.
Chryninthemum Africanuiji pumilum^ foliis Abfinthii Alpini umbelliferi minoris.
Corruda spinis horrida, foliis Afparagi Sylveflris Africana.
Corruda Affienna Hippuris faciff.
Cynogloflirti Africanum myrtifoliumTi.
Cynofbrchis Cap.B.Sp.

E.

Elichryfhn minus Africanum, floreaureo.
Erica Coris folio /Ethiopica, flore purpurco tetrapetalo.
Erica Serpylli folio jEthiopica, flore purpureo pulchro.
Eupatono affinis Suffrutex Encoides capitatus, Cons feujunipcri folio Cap. B. Sp.

F.

~~Fructu~~ /Ethiopicus fBliis Alaterni-
Myrniformis *D. Tm. Rhym.*
Yi^{r:c xA**} i. Cluffi folia
Africanus foliis Buxi.
Africanus, fruticisternbilis Narbonenfium foliis, capituhoblongisquamofis.
Frucexononymus, foliis Lauri tini minons.
foliis Chamsgcnifts Cretica: . . .
Ickuminofus Myrtifohus, fihqua hirfuta, Anonicfis montana: praecocis purpures himbecenns *Mvri fon.* facie-
Fucus carnoiiis coralloide5 C.B.Sp.

G.

Geranium Malva: folio odoratum, flore purpureo Cap. B. Sp. *D. Ten Rbynt.*
Myrrhidisfol. /Echiopicum parvum. . . .
noftu olens iEchiopicum, foliis Myrrhidis anzuftioribii5 minus hirliiris.
noftu olens Echiopicum lanuginoJum,

foliis Myrrhidis Jatoribus minufque Jaciniatij*fir)rc rubro vel purpureo pereleganti.
Geniftac Afpalachoides polyanchos major Cap. B. Sp.
Geni/la affinis Africana flore crrrullo, alatis 6c punftati5 foliis afperiufulis.
Gladiolus, flore pendulo.
major ramofis, flo. cceruleo amplo.
medius, flo. majors*
minor gramineus, flo. parvo cteruleo.
min. gram. flo. parvo pulchro vanegato.
Gramen triglochm bulbofum Monomotapcnfe.

H;

Hyacinthi 8c Cotyledonis faciem mediam obtinens Planta Africana, floribus luteis longifEmis atque ftriatis, GladiolusImperialis *Tm Rbyne.*

M.

Mai rubiuin album minus Africano, calyculis amplis.
Monorchis C- B. Sp.

O.

Olii5 atrum Africanum-
Ornithogalum urnbellatum maximum Cap. B.Sp.

P.

Perfoliato anguftifolio montano *Col.* fimilisPlanra umbellifera nova, fructu criplici membrana-cco C. B. Sp-
Pimpinella maxima Africana flore purpureo.
Planta Corios folio Africana.
Planta fruticelcens Africana perrara, foliis Peucedani, flonbus conglomeracis¹, Herba: caftae Americans nunnihil fimilibus.
Planra foliis Ru/i minoribus C.

S.

Sanamunda Africana i. five foliis angulifidm candicantibus.
1- Sive foliis Serpylli minoribus afperiufulculis, capitulis Thymi.
*- * - ; Sive foliis Serpylli majoribus incanu.
4- Sive foliis glabris acutis.
5- Sive sricoides major.
^ 5- Sive ericoide5 minor, ramulis admodum lanuginofis.
Solanumfpinofim arborefcens C.B. Sp.
StEchadiArabicsHmilu C.B. Sp.

T.

Thymclxa yEthiopica foliis Pufflerin^ mioor C.B. Sp.

V.

Virgaaurca Africana foliisEricac bacciferr, foliis Linarix minoribus.

E Catalogo huc rarissimè Anno 1680. quem composuit eruditissimus Vir & consummatissimus Botanicus D. Johannes Bamfter Plantarum a seipso in Virginia observatarum.

A.

- A**liine Spergula latifolia reptans.
 Althaa iucea Pimpinell majoris folio, florihns parvis, feminibus rofratk Folia hujus plants pediculis inluknt.
 Althaea magna Aceris folio, cortice Cannabino, floribus pan-is femtna rotatim in fummitate cauium, fingua fingidis cuticulis rofratris co-operta ferens.
 Akni'a magna quinquecapfularis, cortice Cannabino, roliis integris fubtus albicantibus, floribqsmagnis exfundofaturatrubroalbis.
 Alth. magna quinquecapfularisj cortice CannabiO toJiis Mal7arun) modo divjliisj fubtus viridibus.
 Ambrosia inotlora foliis non divifis.
 gigantea inotbra foliis asperis trifidis, ,
 Anchufa lutea minor, quam Indi Paccoon vocant feipfos ea pingentes.
 Anemone boiofia fylveftris alba.
 Apocynum eie<2um non ramofiim folio fubrundo, umbellis florum rubris.
 Apoc- ered. non ramoſ larioie folio, umbellis flomm aibicanribus.
 Apoc. ere&, minus, umbella florum Candida.
 Apoc. ereft. non ram. Aiclepiadis folio, umbellis florum rubenbus.
 Apoc minus non baefcens, caule & foliis hirfittii, floribus faturat; luteis.
 Apocercd. non ram. RorifinarimToliisurnbellis riorum candkiii.
 Apoc. petræmn ramofiim Salicis rLfo.
 Apoc. Jcandens, capfiijis bre?ibus Jpinis asperU.
 Apoc. Jcand. capfulis alatis.
 Apoc. Jcand. capfulis planis.
 Hæc omnia filiquas ferunt tuinsntei.
 Apoc. erect. ramofiim njcauje mbente, foiiis oblongis parvis J iJiquis [ex flofculis aibis] tenuiffimis, biu.Kini ad extremitates conjunftis.
 Acifarum tripiylluii, pene viridi.
 Arif tripk miniiijpenatro-i-ubeiKe.
 Ant Dracontii foliis pnelongoacuminato.
 Arum aqiiatiamij foiiis in acumen declinentibus, finduviri d.
 Arumlluitaru, pens nudo.

C

- Car^LuiiJ^a^iMjesLjrp. foliis fubms incanis, capita vilooio.
 CiryophylliM 8orefcraperalbo.
 Calt.; nca pumili rscemolo fr^ftu parvo, in lingulis capfulis echiiutisunico, Cftc €!)t!fjUiijsni. Autoi- deienptions Carolina: ex hac mac.; Chocolaum fieii refertnoji multoinferiorem ci q ax ex Cacao fit.
 Ccnuurium nunos caule quadrato alato, fJox carneo amplo, umbilico lax.
 Cnemidion latum Alcyrodes.
 Clematis purpurea repens pnabs ilorum coriacek
 Clem. erecta, humilis n>n ijmofa. foliis iibrod.
 d. H
 Codilearu tlate majori In loo* ui^aiatffis piocui «moca.

- Conyza comilea acris Americana,
 Cucumis/rudu minimo viridi, ad maturitatem perdu<ao nigricante. Frudus Bri'onis aJb<< bacca non muJto major est, cu'us primoaf pecla fpeci<m efle putaveram.

D.

- Dens cantijus fiore luteo.
 Digitalis flora pallido tranfparenti, foliis & cauk molii hiribtie imbutis.
 Digit: rubra minor, labiis riorum pattilis, foljis parvis anguftis.
 Digit, lutea elabor Jace.i: nigra foliis.
 luteaaltera, foiiis tenuiis difleftis thecis florum fbiaceis.
 parva comis coccineis.

E

- Eryngium campeftre Yucca; foliis, fpinis tenellis nine inde marginibLisappofitis.
 Euonymus capfiijis eleganter butiatis.

F.

- Filix mas foliis integns auriculatis.
 mas rachi leu, nervo medioalara.
 fbemina foliis pee margines pulverulentii, feminibus fimbriatis.
 Fumaria filiquo_a lutea.
 Siliquofa altcm grumoG radice, floribus gemellis ad labia conjundis,
 Fungus (exftercorc equino)capillaceus capittilo j-ondoJ nigro punctilio in fummitate notato.
 Ex recenti fimo tio&si exoritur cauliculis ere-dii, vix digitum longis, capillorum inirar tenuibus nee minus ctenfls feu confems- Singuli Cauliculi parviiio globufo zqaco CORonantur, qui in film ma fiii parte ma cub parva nigra LImacis oculo fimili iniigtur.

G.

- Gentian* affinis foliis glabris (erratb, fioribus Rann referentibus.
 Gladiolus cxruleus hexapetalos, cauls ctiam gla* diato.
 Grarioh foliis latioribus ferratis.

H.

- Hedera trifolia Canadenfis foliis finuatis.
 Helleborine flore rotundo ktco, purpureis venis friato. <Zi/t fl^ocbtifinc ffetcer.
 Helxine late icandens feminibus majoribus.
 Helxine frutefcens Bryonia: nigra; foliis, capfulij triquetns amplis Pergamenis.
 Hieracium fruocofuro latifolium toliis punAuw & venis languineis notatts.
 Hyacinthus Occidentalis flore pallij camulo.
 Hypericum paa'um caule guadiato feu Alcyron minimum.
 Hyper, pumium femper virens caule compreffo lignco; ad bina iatera alato, fbre lut<ot<<< petalo, feu Crux S Andrex.
 Hyper, frutfcens luteum Philiyrrhe* folia.

I.
 Tacea non ramosa tuberosa radice, foliis plumis
 rigidis perangustis, flores ferens multos parvos
 ruwes acaules in spica ad caulem sessiles.
 lac nan ram. tub. rad. foliis latioribus Mores le-
 r'ens pauciores, majores, fquamis hiantibus ar-
 matos Bepeditulis ciiriis in lid Bnces.
 Jacobara lanata folus brevibus iubrocundis, lanata
 altera foliis longis angustis.
 lafmin UTi-avboreum fains amplis, oblongis, Ju-
 perne virentibus, fubtus leni canitie pubescen-
 tibus, flores albos in quatuor Dr lacinias longas an-
 gustas ad umbilicum ufque partitos raemati-
 ierens.
 Iris aculeata oaedfera arborea minus ferax.
 Iris coerulea latifolia Be angustifolia.
 Chamz-Iris verna odoratissima, hnfblia coerulea
 repens.

I.
 pseudo-Lathyrus luteus glaber/iliquis tumebus,
 auolicem (emmum fenem continencibus,
 pfAido-Lath: luchirucus filiq. tumenc. CDntinenti-
 bus duplicem frjem feminum-
 Laurus Tinus floribus albidis c k g n w bul at.s.
 Ftenondum ap.rtus pyxidi S M. Magdahna:
 Cae nonnunquam piftam vidi) limihs elt.
 Lilio-nardus humilis albus.
 Lilium S.Martagon, flonbus reflexe exluteo ru-
 bentibus, purpureis maculis deganter notatis.
 Lilium S.Martagon pufillum florib. minuuflimis
 herbaceis. Caulem habet vix dodrancialem. ver-
 nicillo foliorum unico cinftum, cujus limmitas
 quatuor floribus reflexis Sdlanibgn Dh-floribus
 magnitudine haud aqualibus, pediculis parvis
 infidenibus coronamur.
 Lilium Squilk folns, denticellis parvis ad mai-
 gim.5 Latis. Cable est alto, nudo, ad cu,us
 Jniimitacem prodeunc flores in spica sessiles,
 peralis ync ad imum (ut lbqui amanc te-
 aals) quasi erasis; ftaminibus. fex (fi non
 male memini) purpuro-coeruleis, mole lua a-
 Kquannilum depreffis. Flos quamvis, afectu
 non admodum pulcher fit; pergratum, habet q-
 d drem. Uadicem habet imbecam in Jar Litu,
 folia crassa ad quodum ex denticellis, vix
 Sempervivi speciem est.

Lonicitris maxima foliis planis i.e. non denticis,
 nec plicatulis, ovaculis notatis unoin ce f>>
 nec plicatulis, ovaculis notatis unoin ce f>>
 foliorum uniuerso protrudens: in au-
 gustioribus, pulverem ten fit mta-
 brantulis quasi in capulis fereantibus compo-
 tum.
 Lonicitris major Polypodi facie. Hinc est
 aut vulgaris hinc nudo florula est. atque
 Lychnis plumaria alba, foliis ad genic
 cruciatim pofitis, thecis florum mra-nt, bui.
 Lythraea hirta minor, folus de floribus purpa-
 reo punctatis
 Lythraea hirta minor, folus de floribus purpa-
 reo punctatis

M.
 Melissa elatior foliis magnis dentatis glabris, ad
 geniculum bosis: Hinc odoratos hinc parvos
 flantia hinc quasi cuncta protrudens in
 humilitate capillam racematam ferens.
 Mentha tricornis hinc naphu-oditica, f. ad folio-
 rum juncturas ex foliis cristatis julithora simul
 ac fructum ferens.
 Mentha tricornis hinc naphu-oditica, f. ad folio-
 rum juncturas ex foliis cristatis julithora simul
 ac fructum ferens.
 Mentha tricornis hinc naphu-oditica, f. ad folio-
 rum juncturas ex foliis cristatis julithora simul
 ac fructum ferens.
 Mentha tricornis hinc naphu-oditica, f. ad folio-
 rum juncturas ex foliis cristatis julithora simul
 ac fructum ferens.

Myrrhis minor procumbens, feu potius Ceréfoli-
 um.

N.
 Nuxveficaria Virginiana Park.

O.

Orchis palmata elegans lutea cum bngis calcari-
 bus luteis, palmacalutea minor nullis calcari-
 bus. Hermaphroditica, flore minors, calcars
 longiore.

Origanum floribus ampliluteis Sj purpurCo macu-
 latis, cujus caulis sub quovis verticillo decem
 vel duodecimofoliis est circumcinctus.

Ong. cujus ramorum iummitates floribus dilutis
 rubris in verticillos congestis coronantur.

Orig. foliis ad fummkatem caulium canis, floribus
 multis pallide coeruleis in cymis ram Drum
 dense Itipatis.

Ornithogalum luteum parvum foliis gramineis
 hirsutis.

Drobinche radice dentata caule Be flore albo.
 Flos ejus quern unicum in uno caulis Goodyeri
 Orobanuchs5 fimilis est fed major. Concepta a cu-
 ll feminahs venter feu pars protuberans non
 rotunda est fed canaliculara.

P.

Pepo frudlu parvo compreilo.
 Phalangium ramofum flohbus dMs, aifundum
 viridibus.

Phalangium album non ramofum floribus albis
 ad caulem spica dm fetilibus.

Phyllitis parva faxatilis per fummitates folii proli-
 fsra.

Pifum fpontaneum purpureum.
 Plantago aquaticaliore folio.

Polygala feu Flos ambarvalis floribus luteis in ca-
 pac oblongum CDngestis.

Polyg. rubra spica parva compacta.
 Polygala spicata rubra major foliis ic caulibus
 circulefcentibus.

Pol. quadrifolia S. crudata floribus ex viridi ru-
 bencibus, in globum CDmpactis,

Pol. quadnf. minor spica parva rubMHL
 Polygonatum ramofum caplula pflBratica, va-
 mumum perfbliatum flore ochroleucocapflua
 trigona.

Polypodium parvum foliis minutim ferratii.
 Polypodium minus alcerum Scolopendrise f>>>
 PocamogitDn Virginianum.

Quercus variac specie Sj i .Pumila. i. Alba. 3. Ru-
 bra. 4- Hilpanic*. 5. Castaneac folio. 6. j>>>
 auc Salicis foliis. 7. Fruticofa. Harum primam
 in Hiitoria, quintam in Appendice mbmini-
 mus.

R.

Ranunculus Thaliftri folio, radice grumofa; A-
 nemonefylv.
 Rapuntum minimum glabrum. In uliginosis mi-
 nus glabrum flore pallidiore.
 Rhamnus PruniFolius fructu nigro, ofUculo com-
 precito. CtjebLACHi^ato.

Rhus ramis ex stipite pullulantibus glabris. Hu-
 jus truncus carpi crassitiem nunquam superat,
 pollicis raro excedit. Baccæ sapore fune sub-
 lalfb cum pungenti illo acore qui in Tamarin-
 dis fecitur nncxo-

Rubia parva foliolis ad geniculum unumquodque
 binisj {lore cteiuco firtulolo.

Rubia parva foliolis ad geniculum unumquodque
 binisj {lore cteiuco firtulolo.

Rubia parva foliolis ad geniculum unumquodque
 binisj {lore cteiuco firtulolo.

Rubia parva foliolis ad geniculum unumquodque
 binisj {lore cteiuco firtulolo.

Rubia parva foliolis ad geniculum unumquodque
 binisj {lore cteiuco firtulolo.

Rub. parvā lacifolia foliis ad genic binis, flors
rubente-

S.

Saniculafeu Auricula urfi Cydamini flore.
SaMifraga petrara Aliincfolia.
Sedumlaxatib parvum, caiile gracili aphylo, flo-
ribus rubentibus.
Solanum verticillatum latifolium molle, floribus
obfoletē rubris, bacci5 luteis.
Sol. verticill. angustiorc fobo, flore ochroleuco.
Sol. triphyllum flo- tripetalo, atro-purpurco, in
fuliurum finu abfque pediculo feffili.
Staphis agria fol. dilutē viridibus.
Scramonium fundofloris cccruleD^ pomis longiu-
ribus Ipinis armatis.

T-

Tiichomane5 major foliis longis auriculatis.

U.

Valeriana Garca feu Valeriana csruha minor.
Veronica pratenlis Scrpillifolia.
Viola tricolor nudo caul^ foliis t^nuis difleffis.
Viola alaba(Irit^5pentaphylisa, Cochhani fapo-
rc, Nafturtii /pecies.
Urtica urens major feminibusrotundisj compref-
fis loculamentii viridibus inclufis Be in caulis
fummitais racematim di/pofitu.

Inter femina ad me ē Virginia tranfinifla, Armv
16B7. ab codem D. Banifter, rionnulla invenio
quorum nomina in hoc Cablogonon habentun
v. g.

Erigeron (frutex marie) Halimi folio : Senedo
arborefcens Atripheis folio.

Eryngiunl Plinii Portulacs foliis aD. Spragge ac-
csprum.

Euonymu5 (nimalē memini) Pyracanthac foliis.

Lyimachia lutea cormiculata niantima.

Cynogloflum csruleum BugloTi foliis:)

Senx ipuriz tres fpecies quarum Una filiquis eft
hurfutis a D. Spraggz acceptar. Dus a me fatx
germinarunt Be plantas produxerunc, quac dua:
ipecifit Paiominobg a Pifone defcriptt eflē vi-
debantur.

Piftacia nigra Cor^li folio D. Spragge.

Ulmus fructu Lupulino.

Ricinus parvus Urtica: folio.

Convolvulus bicaplularis feminibus pappo ahff.

Phalangium ipicatum flofculo Arbuteo bullato
aurfo.

Lithuipermum floribus r ultra tis.

Ricinus frutefcens Fici foliis,

Gram en marinum echinatum. Hujus fenina effi-
am a D. Spragfyt accept quarhaexftats inhor-
to Jata germinarunt^ led nondum ad frugem
pervenierunt.

COMPENDIUM
 Hiftoriae Pjantarutn Mexicanarum
 F-RANCISCI HERNANDEZ

PRIMUS LIBER

Ajit dz Tlantis in gemn, nimirum de earum nominibus, conVmientiis t? differētilis; de gmeratmbus trmutatimibus, f>artibw,faporibus,&c. iz quibtis not Libraprimy Hiftoriae kujus diximus quantum fufficere arbitramur.

LIBER SECUNDUS. CAP. L

Coapatli S. Tlamacaz^uipan Hernatii Corymbifzra Mzxkana Perflcifolia, flore parvo ochrohmi> radke odorata.

RAdixflatum difcutit, ofla CDnfolidat, urinam evocat. Jus decofti dicitur evacuando cunre dyfenterias. Cortex radicis ^ P- ponderc pernovem dies continuos devoratus doJor^ ejue Venerfa ortu5 bnirs pshibetur. Idem ffbres quartanas fug at.

Cap* x. Coapatli IL S. Teoitztlae: Corymbiftra Mexkana Lirnmifolio> flore luteo> radkz odorata,

TsmpramentD Si viribus cum precedents CDiivenit.

Coapatli III. S. DeTepequaquiluo: PappofaMzxicana trifhyttos, flort albo^radkz tubzrofd.

His ob convenientiam in. nomine B£ viribus fubneftemus,

Coapatli IV. S Quayhnacenftm CAP. XII. dferiptam fyliv oblong after* in cauh per interval! tern** flõribm nudis, fallidis, filofis\radke odor ata.

Vide duas alias plantas Coapatli nomine, frigida temperie, infra lib. 8. cap. §§.& yG. Ac quia JAnnDCatJo: eff Column*) in prima Coapatli Synonymum eff Tlamaca-ztjuipan, quod nomen invenimus in alia plantis, quarum unguines de nomina tantum in exemplaribus exant fol. 414. in alia parũo variante figura, fub nomine Tlamacaquiy Pappo vel Coapatli, quæ figura tertio defcripca Coapatli) quodammodo affinis videtur; an Pifturis varia fõrs, vel Manca: varietas fit proponitur expendenda.

Cap. \ Texaxapotla Hern. 5. Ptarmica Indica Linifolia repensflore pallido, mali Medici odore.

Naiibus admoca fternutamenta movet, unde confert gravedini.

Cap. 4. Xochinacauli 5.Flos Auriculæ Oregioella * Cluf Drejuelai Hughes, quæ Hifpanica vox eff «E eodem Auricula: fignificatu. Hujus Boris mencionem fecimus in Capite de Cacao Lij. p. 167 r. at / x/Ti plantar defcriptionem omiffimus, quæ hujusmodi eff, Arbor longis Be anguftis eff/oi/ir, viroreexaturato rinftis, 6c epediculo veluc marcidDpropendentibusin inferiora. Flora incus purpurafcunt, extern'e herbacei, auricularum fcnb forma, jucundo odore. FruBm eff filiqua, longitudine /ex unciaruni, crafficie verõ uniu^digifi: Stmm^V\$N* exmurua compreffione fiunr angulofa, liintque colon's iknguinci. Clufiusfloris hujufce folium pro corcice fruftus alicujus habuic. Nihil hoc flore frequenrius in Indorum emporiis venditur.

Huicflorivald^iTmilis flos Toloxochitl cap. 10. defcripti, nili quõd plenus fit, & colore ntfnnihil variet; Chocolati etiampariter potioni admilcEtur.

Cap. 5. Xococoxochitl feu Piper Tavafei: in hiftoria noftra defcribitur fub nomine Amomi odors Caryophylli pag. 1507:

Cap. 6. Acocotli, feu Corymbifera Mexican. rubero/ir, foliis Nardi., flore plJJide rubente.

Viribus & ceniperamenro non mu/tuni dfferra Coapatli.

Cap. 7. ^w/g^S- DcixnbitL Folijs An, caulibusffEiiculaceis geniculatis. Nee floras, nee fruftus dercribic, undc ad quod genus pertineatnoslatet. Caules duncaxat condiri fcribit, fed Sc crudes edu- Ic5 effe, fapore Sc odore graco. tarundem pine virium eff cum pracedente.

Cap. 9. *Atepocapatli*. Flore eftradiato coccineo: *Foliis* Amygdalinis, ex advero binis; *radicibus* tuberosis,

Sterilitati à frigida intemperie medericitur. Be febres fugare.

Cap. 10. Eft de Calyophyllo aromarico; dequo nosin Hiitnoltrae Lifi.p. i.jog. abundè egimms.

Cap. ii. De Cinnamomo; dequoſie nosprolixè Hift. P.1559.&C

Cap. v. De *Coopath* IV. quartinos cDgnominibusplantis in initio librifubjunximus.

Cap. 15. *CumlZitti* S. Afarum Mechuanicuri; Re<5tius cum Terentib Cacaliam Michuacanicani foliis vitigineisferratis, floribus luteis dixerim. *Radkibus* eft fibroſis, odoraris. *Folia* exfementia Columnar ad Comifam Mattholiacedunt.

Temperamento Beviribus cum pracedentibus ferè conveniunt radices, qux folx in ufti funt. Be ab incolis magni Runt ob odorem jucundiffimum, Mofchi xmuluni.

Cap. 14. *Hoitziloxitl*, Arbor Anethinarefinifera, Liquidambaris plants par eft, *ſtipitt* refto, kvi, extra exaturato virore tinfto, intus candicante; *foliis* oblongisacuminatis ierratis, [icon pinnata re-prjefenrar, ex pluribus conjugationibus cum impari in extremo compofira] *floribus* pallidis; guftu K odore quavii fui par te mirè refert Anethunij ejuſque effeftus. Be efficaciusprxftat.

Fruftum ligniubicunque infddiatur ftatim radices agit.

Cap. 1 J. *Tilxochitl* feu *Vaynillas*, de hoc egimus *Hifi*. 1. x; . c. IJ, p. 1; 3 D.

Cap. 16. *Axixtlacotlj* 5. Virga diureticaab effeftu urinas educendi difta, *Foliis* eft Anchufe, minoribus ferratis, hirlicis, per longum venofis, *radice* Hellebori albi, fibrata, pdora; *floribus* parvis, et albo palleſcentibus, veluc coacei vatis, odoratis, acrifque laporis.

Cap. 17. *Hoitzxochitl*, S. Arbor Lonchifolia, *Foliis* eft Myrtinis longè majoribus [quinqueuncias longis, dua5 laci5] rigido Be mfefto mucrohe; *floribus* coccineis, quos nlo tranſfixes Indi in emporiis fiis venchint, qui &c utenni funt fle cardiaci, inque condimentis &c dapibus Croci vicem praftantj [Ffutii5 Porno limilis, colore Amygdala; cui florem infediffle videtur]

Cap. 18. *Chictepatli*, S. Chamxdrys Mexicana, folus aiperis, floribus luteis, *Flores* circa pbftremo5 caules coacervatj Be calycibus oblongis GontsAi: *Mia* odorara, amara; if^jcfurculDlajpariter odorata, at amanrudinis ferè expers, acris, Appetentiam excitat. Duac aliz cognomines. at diverſi generis- Vid. p. ^64, ^6y.

Cap. 19. *Hucuuiro*, Salvifolia Mexicana, floribus promifcufe cyaneis atque coccineis, *Folialonzis* Fediculis appenfa, adextortum latiora, fubalbicanfia; *Radix* tenui5, longaj Odor & fapor Lavenxi-
t. Extenus appoſita medecur dolori ventriculi.

Cap. ID. *Toloxochitl Arifiothyea* Arbor eft magna, foliis Mali Medic*, duplo lofigioribus qux abcedentia veftigia in caule relinquunt. FJosodoratus, polypetalos, externa parts media vireſcent*, circum oras ex cinereolute/cens, quatuor digitorum diametropetalis interna partecavis Bc purpurorubciKibu5, in extremo luteſcentibus, pinguibus Be glutirioſis, fingulis pollicem zquantibus, umbons medio virente. *Flora* effigies nDn parum fimili5 HDII *Xvcbinacault* cap.4. deſcripci, 8e eundem ufum prjeftant, paritèrquasadmifcetur pDtioni Chocolata:- Cardiacus eft Beuterinus, ſterilicatis remedium.

Cap.a 1. *Tztaſllacocotic* S. Herba Lonchifolia, Dodrantss quatuor aha eft, *foliū* oblongis aſperis; *floribus* caiidencibus, calycibus parvis teſlis; *radice* liirculoio, fuſco cortice, odorata Bere(ino/a, dolores icdance, tuſa St cievorata.

C.ip.i3. *fyifaltcTlacopati*, 5 Convolvulus Cinnamomeus, à radice fapore refinofa & odoratoj Volubi5 eft herba, *foliis* cordiformibus fed longionibus Be magis acuminati5j venolis, ^lutinoi5 Be Jalivo5, cichns; *Radict* lucea, Rhaphano5Tiiuli, digitum minimum craſſa, faporis rednoſiK odorati. Nafcitur in calidis. Diuretica eft Be febrifuga, hydropicismedetur^ Be CDnvulionem emxs curat.

Cap. i j. *Toz,owtoHiM* S.JuncU5 capiratus, *Radices* fundit capilluas; *caules* terercs, Jacves, cavos, & in cacuniine *capitula* lutea oblonga: *Radices* dulces, odoratar. Bechica clt, cephalica, diuretica, cardiaca, urerina, aftiingens, undefluxusomnescurat.

Cap.a4- *Tomabisaftla cypath* S. ArHlolochia Mexicana: Hujus deſcriptiDncm vide in Appendice.

Cap. if. Caninga arbor, Lignum Aromaricum Monardjs. vid. Hift.p 180I-

Cap.x : *Tztle-Huayopath*, 5. *Radix* Caryophyllea, *FoUm* Mab Limom^ lubtus candicanribus SC hūdati5j iupernè nigancibus. *FUribm* candicancibus modicis, *frmBu* parvo orbiculari : *Radice* candidis, acnbi5, odoraris Caryophyllorum, quorum vicſni (iuplcre poſſintin cibo & C Hicdic:mentis. In calidis *Tdarnx* collibus nalbitur.

LIBER TERTIUS. CAP. I.

Copal Qyahuitl S. Arbor *CopaQifra* I. *Cepalcaimtl Ggmar* *; <</Cluf Exot. *fgr, i^m*

Cap. Opn/InJis (ucalibi moNUMLis) quodhbet gummi genus ſignificat, icd quod ab hac Arbore
I ^i ^0'' ^m'^^ Jcarifwt.i flit ?&f^xm ira diciur, nobis inHiftbria e Monarde deſcrip
C. T ^t^b^r pproceia, foliis queinorum ho mi SL magnitudine [pinnulis foliorum inrcJugc, to-
ha cum pnnata pinguntur e pluribus hujulmodi pinnarum coniuganonibus compoſita; media ea-
am loſta tjuibus pinnar aLnl<rtunir membranar uciiaa, foliaceis auſta eft uc in Lentilcu] Fruftu ot-
rorundo &: purpuralceatc Liummi Annrc.

Cap.

- Perlebore; S. Arbor Copallifera II. (cu lanifolia. Mediocri est magnitudine)*
 hoc obscuriorum perquam semibibus tu forma t magnitudans, tumeri
 am colore fuallemi. Gummi ftillar non abfirme prcedenTM, fed PargTM S magnitudans, tumeri
- Cap. 3. Oprf %*qubxiotl, S. CDpallifera III. Leprofa difta, quod Ici. membranam e r ^ r n
 exuat; /Mfc ft parvis oblongs [fain numeronffimas pinnatim ad uiam coftam annTM pTM pTM
 tat, adqumdecmiu(queCDniuTMat.oncs) fructu acinofo, fingulatim dependent. tummiDTM ^TM ^TM
 m Cap.4. C^Totopecenfe, Copallifera IV. Mai. Medics foliis LuratTM viridibT Trbör di
 agni.
- Cap. 5. r.« ^ & «*/, S. Copallifera V. montana, Arbor eft medians, uncdónisfolio fhii
 jaset. fTM folia icon piypata reprsfentat] fructu Glandibusfirnili, quend.m vduti StrobilinumTM con
 tTM qTM W r n i m lucida 6ertfinpfa opadam (ahvi, atqueincludentem intra fe nudenm candidumTM
 ad m&A nNem. Thus Indicum djicur. TMTM uTM m.
- Cap. 6. CutfTM Copalli, Copallifera VI. leprofa II. Arbor =ft mediocris, foliis obrotundis parvis
 iLinirqueracematimdependemibus. pxyacanthTM firnilibus, vTMld& odoratis, glutinosi/quc. Folia adTM
 nocanteTerentio, hcu Be ngrna limihafunt folns iliqua: arboris. * "««,*u
- Cap. 7. Tecopal JTMuabaitl Pitz.ab»ac S. CopallifeFaVII. Ieptiphylla Fo/i>»Jt ninniric: vTM
 nimeferratis; fructu panro, rotundo, Piped figuri non ablSndi, fed B c M t o / n S E i J iTM :
 per Incervalla ramis appenfis. oinuvS acinis
- Cap. 8. Xocbi copallii aliiS Xarapixjia, an Xolochcopalli Gomara: apud Clufium Exot D « - ?
 Copdlifera VIII. menthsfDhis profundiuTM ferratis Arbor eft mediocris; ftipiribus i i » » ^ vdoisTM
 liquor Exfillans fulrus eft, Limonum odorem valdc referens, ThurisIndici generibu/annumeranTM
 dus. F./w adnocante Columna, ^ polhces longa, duos lata, obfeurevirentia. Flares ex bneis cT
 lydbus dilute virentibus, denfis ftaminibus IUCBIS compafti. An Balfamum Uiticx folio Indis xJa
 diftumMonard. cap.9? de quo Hiftor. p. 1758.
- Cap. 9. Maquixocbi copatti, S. Copallifera IX. foliis Mali Medics, floribus coccineis. Arbor efi
 magna, ftipice candicanubus punftis diftincto. Hujus gummi Animi nDnnullis vocatur
- Czp. 10. Hofyuabuitl tea Çb,lli arbor. Arbur Mexicana cortice amaro, fniftu in orbiculis ftellatis
 ftipiti adnafcentibus. Duum eft generum, Alterum Jtipit, rnagno, levi, fulvo, Be lencarefero me-
 duJla; Flonbm candicantibus/i/ ^ maximis. Frn8us Ponticis nucibus par eft, candeni luteaque ob-
 duftus ræmbrana, Sc aman lapons. Altemm foliis Mali Medici fed majoribus. De huius eummi
 quodincifo cortice cmanat, HMdifto Chocolate imerdum admiferifolitononnuUa èPifbnilman-
 tiffa Aromatica petita vide Hift. noft. 1671. Plura de ejus viribus vide hoc in loco.
- Cap. 11. Arbor Balfamifera I. Hern. Hoitz,iloxitl. De hac vide Hiftor. p. 1758.
- Cap. 11. Huacemx, Balfamifera II. baccifera. Arbor eft medioens aJitudinis 6c craffitiei, materie
 firma, incorruptibili, odqra; foliis luceis denarii amplitudine; fiore parvo candicante, baccis Lauri E
 cortice, confracto, aqua maccrato, demum infolato 6c expreffo liquor balfamicus extorquetur,
 Excratur etiam, exrolus ftillatitius liquor ad mulra utilis. Surculi ad dentifcalpia commendantur,
- Cap. 12. Ballamiferall. MaripendatH difta. De qua eginius Hiftor. p. 17?g.
- Cap. 14. Balfamifera IV. De Tolu difta, defcripraHift.noft. p. 1758.
- Cap. 1J. MoUe arbor, Lentilcus Peruana, Defcribitur Hiftor. noftrx p. 15 Bz.
- Cap. 16. Tecomabaea. De qua vide Hift or. noft. p. 1846.
- Cap. 17. Tlabvehloca J3>uabuitl, 5. Caragna, Defcript. vid.HiftDr. p. 1B47.
- Cap. 18. Xochbhecto guahuil, S. Liquidambari arbor. Hift. p. 1B48.
- Cap. 19. Txsac JZuaubxiotl, S. Galiofifera, Arbor eft mediocriS, /o/ia obrotundis, ftipitibus BCD>.
 diculis rubentibus. Gummi ftillat canTM idum acris faporis, ad dyfenterias urile, quod anuam in qua
 infutidicurlafteo tingit colore Ballami Antiquorum infar.
- Cap. 10. Copaltic, S. Arbor Copallifera cuticulam exuens, Ocymi foliis, fructu Oxyacamh ^
 Gummi in filtendis dy/entriis celebratur. Hoc etiam aqua: infillatur in lac folvitur.
- Cap. 11. Tz,ina Zancuilaquahuil, S. Arbor Laccifera.Folia Acaciaj ^gyptiaca; ei attribuc ftipitTM
 pnpureo5. De Laccavid. Hift.noft. p. 155;.
- Cap. xi. Ez.<juabuitl S. Draco arbor, de qua vide Hift. p. ij ^ S.
- Cap. 13. Ezquabuitl fscan&iguabnabuacemts, Foliis eft magis Drbiculatis, hirtutls Bcafferis, crat
 fo cortice, radice furculofa, juxta aquas nafcens, ad eadem uculis qua; pracedens.
- Cap. 14. Mt&quilt S.Siliqua Acacia; de Acacia vid. Hiftor. noft. p. 976, 977.
- Cap. zj. Mtz.<juilt Michuacanenfis, Acacia No. Hifpania: II. Foliis eft exiliDrib. Mizquid vulga-
 gari, fie fpinis caret.
- Cap. iS. Hucipocboil Huaxacenfis, SRicinus No. Hiipan. inrcritur Hift.noft.trae Append, p.185 ^
- Cap. 17. SsJJafrat arbor, de qua nos Hift. p. 1 5 68.
- Cap. iB. Tocpatli, Arbufcula Mexic. Rhaphani fykeftris foliis, fiWibus candicantibus. Radix fur-
 culofa, acris, odura, Liu venerea: medetur.
- Cap. 19. Hoaxacan S. Lignum Santhim, vid. Hift. noft. p. 168y. Guayacum.
- Cap. 30. Tlobalxxbitl, Arbor noftiflora 5ambuci fblis 6c umbellis. At Folia (errata nonfunt;
 fifcuU orbiculares Scpallentes; tfwiracematim dependentes, per maturitatem purpurei.* Turnores
 difcucic aut maturar, pulvis inperliis medetur ulceribus inlanab. fcabiei, leprar, 8cc.
- Cap. 5'. Cayolix, an S. Tepozan, Arbor falvifolia, Thus red)lens, Medioch eft magnitudine, /s/;
 it Salvia maJDribus fupernè virennbus, fubtusfubalbidis, pmguibus, Verbafei modo hirtucis; Florc in
 extremis ramis medico ac luteo & in Corymborum formam vclit cDmpofitD. Diureticurri eft uteri-
 nis conuenic affeftibus. Extnnleus impofita radices, cortices auc folia tumores (olvunt, Be ulceribus
 medentur.
- Cap.;i. Na*abuaquab*itl, S.Morbi Gallici arbor, magna eft & excelfa, foliis Olez, odoratis 5C
 r. m. l. n. i. s. Fructus è tronco enacus rateniDs longos componic, cujus pediculus rubet, baccz verbiuntvi-
 ndes. Nanabvaquahjuitl p. 389. depifta huic cadcm eft.

Cap. % %. *Sastubtkparfi* S. Arbor ignea, Nerion five Rhododendron Mexicaniim. A noftj ate Ke-Ho, adnocante Columna, rnagnituoine differt, foliis longirudinis pedalis 8c latitudinis pollicium ;£, & quod nervuli foiorum circa folii oras conjungantur. Eodem obiervante, Nerium eriam noftre cosloj non lac, led copiofum hteutn fuccum Apocyno fimilem habet, in radke tam en copiofum album lac enntit. Idem obfei vavit in Periplocis & vulgari Afclepiade. iid. Ajinot. in Recch. p.865J.

Cap. J4. *Jfyauhjjac*, Arbor fetida Mali Medico foliis actuninatis. Cortex atrin git, & fluxum.iki coeret. Succus naribus.-mraausfternutarnenta excitat.

Cap. ;?. *Xikxocbtll*, Arbor pentaphyllos Mexicatia fioribus capiliaceis coccineis & albis. Flercs ante foiorum exonuin profere. Turn Defcriptio, turn figura, notante Columna, Goffipio Indico Poiw: Ital. fatisapteconvenlunt, ni folia ineodem pediculo feptena haberet.

Cap. 36. *Caefolm*, Baccifera Ceratifolia, floribus cojruleis,, acims purpuio-nigricantibu/ -] Folia a ftri ngu nr, u nd e diar rri ceas com pe feunt, &c. . v;

Cap. 57. *Tkquixotbitl*, Arbor Mexicana Mali Medics *foliis*, Cynorrhodi hWj K&i'i'odore. To-toannofloret. Floscodionemjuvat&coiimendanditalitijscausiChocolataiadi.iifccmr.

Cap. ;8. *TiaUmatl*, S. Aibor vomitoriajTiifcJiaeft/o&jtfSalvix pinguionbus &c molHonbus, fioribus fpicatis, parv-is, coccineis, ex quibus acini producuntur. Si Aii&or (mqic Columna) proaciniis iiliquas pofnillet *facile* ad Atiag^rin referri poflenticon 8c vires; fi quidem vim ei c.tharticam M-tribuit. E]ufciem nominifcft alia planta longe divcrfa p. 410. Sed p. 451, adeft iconfimilis fubSynonyinio vocabulo *Tztae tlatamatl*.

Cap. ;9. *Cbatalhuk*, S. Caffiafylvdrris, Vid.Hift, noft. p. 1747. Inreliquifcmm Caffia fift. Brafiliana *atifiGBfttaak*, floris colore luteo ab eadem differt.

Cap. 40. eft dePalma coccifera, dequa nos proluxe p. 1^6. & fequentibus.

Cap. 4f. *Achioil*, Medicina ringendo apta, ie. Urucu. Via Hifhp.1771.

Cap. 41. *Bubti Cojolti*, Palmar ippecies, Areca S. Fautd dicta nobis videtur.

Cap. 4^ . *Yicoi* S. P-uma raontana, Arbor eft fniticans, duos frivc ab radice ftipites edensj/^4 onga^anguitaj crafla, Iridis terc familia, led longe majoraj acervatim ab extremis ftipitibus orientia ; *pro* hexapetaloSj albos, odoros, racematim dependentes; ex quibus generantur *fritilm* firoh)lis{sinUcs. E foliifeofere modoquoCannabisparatis filafiuntlinteriftoiretquetexendis perquam idonea, fiimiora iis quaexMctl.

ILx decriptione luc Arbor Draconis dida: fpecies cfie videtur. Icon *Tecotlqux* liabccur p. 44j. non convenit Draconi arbori, at nee huic defcriponi. Vidcnotas Terendi.

Cap. 44. *Nofili* S. Tinai um genus, de quibusvid. Hift. 0.1464.

Cap. 4? - *Nochtz,rx>pa'ti* S. Coccus Lidicus, *Cecbinelt*, Hi/V p. 14^5.

Cap. 46. *Cacava^mbuill* S. ArborCacavifera, vid. Hift. p.1670.

Cap. 47. *Anaemic* S. Papyrus lutea, S. *Tiptematl*, Sycomoi Saxatiiis. Dua; fnt fpecies, Pina arbor eft magna foliis Hedera; amplifj pinguibus,, obrotLindis cordatis, altera parte ex viridi pal-lentibijSj altera fulvis. In ipfis ftipittbus, qui Fiailnei funt & lenes in modum Sycomoi i, *frvBxs* Ficus parvis fimilifj Jemine minuto ac fulvo refotus. Adha:ret ftxis non mediocriter fpcAando iniraculo. Radices nondum excufib lafte cathartics: funt. Secunda fpecies codem nomine & temperamento prardita, virgamm reciarann leviumque ufum Untum pra:fat,

Op.4ti. *Cepalxtxbctl* S, Pniformis gummofa, foliis eft obrotundis Pruni; fmi&u Medicis MaUt fimili, prxdulci, Talde adftringente, 6i (alivarn Jhll.inte impencsc glutinolam, qu« diarrbais & djffenterus medctn. Materios Opei ibus iateftinis aptiffima eft.

Cap. 49. *Cepjlxteitl* altera, S. Pi-«niftjrm3 Rtim mala 11. toll is »ft mnjoriblls alias K mil lbU5: FfU-Bu minis aut Nucibus Juglaootbus fimili forma & magnitudine; pra:cedenci viribus & forma conganer, nimifum aftringens Si glutinans, fa pore dula.

Cap. jo. Tanurindusj Lte quo vide Hift. p. 1743.

Cap. 51. *Xalxochtl* S»Pomumarenof.un i.e. GoyavefeuQuayavaHift. p. 1455^.

Cap. 51. Planta *Cacbo* vocata. Vide Hift. p. 1859. Exahomm retamdefcribir.

Cap. 5;. *Hrtzmomaxaili* S. Arbor Cornigera, Foliis eft Tamarindijfloribusluteis, filiquis cfailentis. Cornua Taurims vaidefimiliainripitc & ramis prodeunr. FoJra infpidaj venenis tamcri adter'fa i dicuntur. Gene; amor intra conjjcula Formice morlii nodvjc. Q An Cornua *hxc fnt* excre-Iccntix a Koimicisilliscxciatx^ anc* aculeorum leu /pinarum gcncre& natura?

Cap. 4^ - *Quaahitybuetli*^ Avellani^ cathartica: De hifeginuis Hiflor.p.1181. Huic tribiit^fi-fuwjnagnunij fulvumfic contorcum; *folm* Rhododendnangufta&longa. Vide etiamHift.noftrs p. 1837.

Cap. j ^ . *Quaubajuhujth* 1. S. Caffia fiftula^Ue qua nos Hift. p. 1746.

Cap. 56. *Qttmkytcbiutli* \ Aibor Cucurbitifera nudeis pmeiformnbus cathartics. vid. Hift.p.18;°» Tribiic '!i;x>n ioii,(magna, Ijppa; iimilia,angiiIoJ,i; f ruciuni Nud jug land i Jimilem, (robilos terrios, toruicm fecrecoi civicatifaus, n&fratibib, Pmeis nucibus form.i, inagmtudine, cruft:iBcnuacij pares.

Cap. 57. *guwhUItzhi*, Arbor flu Au orbicular!, friato,crepitante; Foliis eft Mori, majoribus, ferratis, vert>ii5.1-mctL;per niatait.itcm (ecunduni ftr«s deliifcens magno cum nnpetu & fbnituvcloo trnmenn bellici 'rumpitur, d;otiecim cuciter iindemconnens, exquibus bwnmenbrananu-
* *Flis Arnicis*
pode trtpet. I- dati btarnt-pur^nc. V
ht turn mpi-
ta optim.

Cap. {«. Ah.. *no gnab ml*, Arbor Quecificornis iruftu butyraceo. Folia Mali Medic* mapm, I sriora: Pn, *no gnab ml*, pr-r-tociuin forma & magnitudme, came butyracca, nudeo *tolida* *lu*
*^
*^
E nucleii per cxprewoocoeJidtui oleum Ainygdalinoiiiiuift

Cap. 59. *Cochinapal*, Arbor prunifera trifolia, frudu Cotonw forma, offis nucleo dactylio. Hupa fuctus idem eft cum Peris- x nuci (imih fuctu, nudeo venenato Moirudis, cuju*
neuvide Hiftor. p. 117. *Poni ingeft* *fonium cveilliant* *

Cap. 62. *Quartzap* » S.AjTOiia, Anon Ovisdi cflc videtur Hift. nwft. p.1651.

Cap. 61. *gyauhxilot*, Arbor cu curbinFera triFolia, fructu mofbhat. Flares cymbalorum habent Fornam; Fruttus dulcis est & edulis; folia Fpinofa, in nonnullis tamen fpinis carent.

Cap. 61. *Uoacamacballis*, d foliorum Forma Colubn maxilla: fimili difta, Arbor filiquofa femine LencifDrmf folio *CoamppiUi*. Fruttiis 1 pi can flint. Arbor eft magna.

Cap. 63. *Tlapakz,patli*, Arbor Mexicana «*7r©, Ocymi folio, flore candidD racemofb. Jus fr. cofti comcum urinam evocat, fanguinem per colem fluentem cohiber.

Cap. 64. *Chichipalcz, cjUAbuitl*, Arbor Sangaiflua Mexicana, flore fruftuquecarens. Folia Jonga, obtufa, K versus pediculum fenfim attenuaca : Lac prim o can dens Be tandem mbefcens effundir. Cortex afringit Be fanguinem fifit.

Cap. 65. *dhuapatliTilacenfisj* Arbor Indica foliis Illicis, flore luteo paiVDj fructu nigricante, Stipitis (fju^paliidu5 intus) ramentoruin decoctum iftericis Kbiholis opiuulatur.

Cap. 66. *Abies Mexicana*. Vid. Hift. p. 1397.

Cap. 67. *Ek.i&zsfj*, Arbutula tiifolia Philippinenfis, radice alexipharmac*.

Cap. (S8 *Tz,opilotz,onte wmatl*, S. Caput Aura. Foliis eft longis angpftis, fructu magno oblongo nucleos quofdam pianos indudente, fapore Be viribus Amygdalarum amararum.

Cap. 69. *Quamocbil*, Arbor Punica: foliis, filiquis rubenribus femine nigntfante. CapitulainpofitremisviticulisEpichymoimilia producit. Semen comeftum odore infuavi halitum inficil Cortex afringit, &c fluxus cohibet.

Cap. 70. *Cacaloxocbil*, Arbor fillquplaj Fois Mali Medicis majoribus, flore pulchro odorato. Florum apud Indos permultus eft ulus in manipulis, torquibus Be corollis. Arbor lafte manac.

Cap. 71. *C^P^k^* S. Cerafus dulcis Indica 15 S o- Hift. noft.

Cap. 71. *Calamaio*, Arbutula Philippinenfis Laurifolia, radice emplastica. Hzmorrhoidas curanc.

Cap. 75. *Coco Quaubixli* Arbor cactiaca foliis Leguminisjficco rubefcente. Flokuli exiles ad foliorum exortum.

Cap. 74. *Coconam*, Arbor Foliis Sens, flohbus albis umbellatis. Tinea: Be lichenibus medentif Folia.

Cap. 7J. *Enguamba*. Hiftor. P-179¹.

Cap. 76. *TpeyZtqtiixocbil*, S.Tz, <juixocbil montaru Foliis majoribuSj floribus candidis in mufcaria compofirisjinodoris. Cortex ad gingivas tumentes K laxos dentesfirmandos utils eft.

Cap. YJ. *Tbuixocbil*, Arbor flore pennas avium referentc. Folia *Pinabuiuli* 5. Arbori verecundac familia ei attribuit, quina perintervallaprodeuntia; vires etiarn eafdem amorem conciliandi, Bcc. quo mirer florem pennas avium referentem ei aferiberc, Bcnonpotius folia-

Cap. 78. *TtXApirt<ua>* LaurusMichuacanenfis, foliis odoracioribus. Semen Coriandro fimile fed paulo majus, nigrum quando maturum,

Cap. 79. *Ttlatiam^* S. Arbor urens^quam *MancbmzUo* difta: eandem efle iuipicabamur. Vid. Hift. p. 1547.

Cap. Bo. *Tlatz, van*, S. Cupreffilis fu(a. Arbor vita: Hift. p. 1407.

Cap. 81. *Xumatl*, S. Sambucus noftras.

Cap. Si. *Vapaya*, Pepo arborecicens. Hift. p. i?7a.

Cap. 8;. *Azapaxli* Arbutula foliis Rhaphani ferratis, flore albo,, fructu deftituta. Folia tufa Be impofita lienem abfumere dicuntur.

LIBER Q.UARTUS.

Cap. >• *T^tpatli*, Frutex Mexicanus radice tuberofo, floribus oblotigis caliculatis albis, foliis AmvzJal,lni5. Flores in fimmis ramulis in capicula feu potius (picas congfti. Ad aquas nafcidiidreca eft Be carmiriativa, dolores colicos Be a lue Vencrea ortos fedat decofta 5c pota, icon

Cap. *CbOlapatli*, Frutex foliis Rofeisj flofculis coccineis, binis una c foliorum alis exsuntibus. Thoracica eft, 8£ ventns dolorem fedat.

Cap. 2. *Copalxihmtl*, Frutex odoratus *CopaBi* refcrens, foliis Ocimi ferratis, baccis rubentibus. Thy-

Cap. 4. *Huitzilxocbil*, Origanina, floribus galeatis, coccineis. Calore fuo flatus difcutit,

Cap. 5. *Barlataf* A. L. foliis fiffidfa m è n t o f i s coccineis.

Cap. 6. *Barlataf* A. L. foliis fiffidfa m è n t o f i s coccineis. Siliquæ nodofe funt feminibus extubeiantibus, lutes. Sicca eft 5cadftngens. Aqua in qua flores tufi macerati funt in aqua calida p. 4z6.

Cap. 7. *Tztlacoti^Scabioh*, fruticofa Mexicana, flore luteo. Ut facie fie viribus cumScabiofa con-

Cap. 7. *Xm^uilpatli*, Frutex Mexicanus foliis Sail as angulhs, flohulis caliculatis pallentibus. Afringit K CDmmanJus guttur urit. Folia externe omnibus pa:nemorbis a ingida caula ortis meden

Cap. 8. *Tztlacoti^Scabioh*, fruticofa Mexicana, flore luteo. Ut facie fie viribus cumScabiofa con-

Cap. 9. *Tztacpatli*, *Tptxictnp teu Heximo*, Fohis pennas avium rcFercentibus, flanbus luteis. Cor-

C. i. i. *io. Acuikti*, S. Vohbihs aquatica, Rofi Mofchar* flonbus, potius Jifmiru Arabia feu Sara-bac'i ij>vptii *AI fin*, monence Columna. Di;>lexeft, alrera. fohis minonbuSj floribuscsndentibLisi aitera foliis majonbus, flonbus palhdis. FJora odoi a mentis & cor. ollis inleiviunc Folia flatus di-fcutiunt intus (umpta, foris admota cumores reblvuor, & contra<fta membra laxant.

CJJ>. *si. II:ii:z-tvmssz,m*, Spinaclna frutsfcens Americana *Muntitifrii* c(Tc videtur. Flore eft pur-
 >> >eo, ftaminulstJuteis, frwftu candidis Cerafis finuJi. Videtur eile cSolani potius genere ut *xeSth*
 iUdiciscortexpiirgat.

Cap. p. v. *XiuhjtuttiilPttzaboac*, eft Ami S. Indigodefcnp.Hirr. noft. p 91S.

Cap. 11.; *Xuthjtuttiil Pttz&acaitera*, floribus cap:llaceis, candenribuSj foliis Piperis longi majoribujj neri-oik Eut<m videtur fcaindai (pecid *M*rcer*. Icon pra:ccdsnrri appofita hujuseft.

Cap. r4- agitde ArtindinibusSjcccharifis& deSaccharo,dequibus nos fuse p.1178, 1*179

Cap. 1J.- *Aixipaili Texaxabuacensis*, S. Volubilis quinquelateja folij *viagin&*. Sue :*Jk&"uretiaB eft, & tS*ricisadriiodijrg confci t.

Cap. i. f. *Ecafatli*, S-pinfASanibucus. Siliquofa, flonbus expanTs Jureis in fijnimis ran;u!i, fili-quls tereribus cenoibus. GranulaLcjuibus iinuliaj ied minora. Folia (hoc eV pinna: foioruni) A-rjiyjgilipj. Calitla ii&ique dt & nonnihl aftnngens.

Cap. 17. *Huixiquii*, Folia ct longjfferrata, magnitudine Mali Medica; floribus fpkatis. SL car & afiringit, unde fluxionibusquibulamque opitulatu^ & tumoresdiicutir.

Cap. 18. *N^azeul* §.Tiitt>aiz>#f, Datura aitera Mexicans. SoJamtm pomiferunij pornofpinoforo-bj feminepallido. Fructumfpinasdeiiium exiire icribit; FoLa mcJJa *ScUtma*.

Cap. 19. *TIIIM capatii*, S. Syring.t lutca, flonbus pentapetalis fdlatis. Foliis eft Pyri, flonbus /picatV, ieniithe nigro exili, ilipitibus & ramis *avis*. Folia caiefaciufj iiccanc & aftringunt.

Cap. 10. *Tcci&iui*h*, CJianiidryfoJia, gravicer otJorata, flonbus oblongli coaccrvatb luccis. Calef Sc efficar., extemiappla vcatriculo utennis affitibus convenic Jus foliorum modenir djien-
 torm.

Op. 3<- *TixtkfatU*, Pem.tphylJos febrifuga, florepavocandentCj frufturonindo. Radixcsafla, Jongaj cencra& iuccLiktaj mipense refrigerac & adversus fcbj-es magno in pretio Jiabetur.

Cap. jz. *Ail.* S, Aquo/ahabaappenfi *Althzi* Indica, aberofa radice, *fol'us* cirigi-neisj nonbus rubns, capnuJis *Ktaa*, triangulis. FraAss Corailomm inftrarubent, cfculenti *ihnz*, &fcnune nigro plcjij. R^dk himiida&i falivofa dtnaturaj unde convenk niorbts qutbueunqce *
 talida cauia ortis.

Cap. 22. *Cocozamalli* ; luf&atentati, Unnaria mirabilis, Nosin Hift. p. 717. ad Convolvulum hede iceum ttfoliium reulknus & tolia quid em fim ilia rime, veruni cetera non *ben* e respondent. K idiV crallaj tfores candidi motiicj acini Ceralisbaud abiimiies urinam mue evocat. Confute Her-Dand, lioc III Joco,

Cap. 14. *rz.tac-CoatienepiSi*, Convolvulus foliis cordatis, floribus ex albo palleftenribus, S. Vojubi-IIS diisreticj. **Radix urinam** provocat. V. CoanccpillifeuContrayerva.

Cap. 15. *CcatU*, & **Aqueus Serpeos**, V. Lignum ncpkritiaim Hift. 1804.

;.:6. *Ce^applot' xocbit* Pi;riclymenunifiore coccineo pendente. Frjgida&fiumida cenfetur tern pc rie con 11 a qim V< 1: i t Iy 111 c 11 n no frati .1.

Cap..17. *Cbitpirt S.Citiirapit;*, aquam rubeocolore cingens feu Arcanum Venerei noj-bi. Radicc eft craffi iong^j in;cm<; ex alba & luteo purpura(cencc; foliis Mali Medic*, majonbus; floribusluta-ft-llitjs. Sapore Scodore inJigni caret. In Luc Vencrea profligandii pj.mrjs iclitjuas Afefiu^M-w/A fadlc (upcrat, . m UUH.K.1.

I;vS. Car., unonmi. Frutex eilt fpu .foils candidifqtic infitens ious, iinde prorert fljpites exert Hilvc/cntesj ac intrarubcos, contortos,ruk;rr6f(tie toliiscordis t'civ dgurij fedyftiucrpnc appcnibnnbjjs, vems rrcquentibus i inedio nervo ad ktera piocclentibus. Tingant ejus ligno hla coccineo coloie. Nafcttur in frigidii Mechuacancnlibts caiupcftribui ac monmlis locis. Longc diveila plaiiu eft a Brafilia arbore in Ilift. tfufenpta p. 1 ; 6.

Cap.iJjs, *QuxHbTryaili*, Ocinnfoba ferrata floriuvs efateo iibcentibus, in (umom ramufe coacer-vatis. Siccat & adftnngit, undedunhqrasaliifquefluxioncsiiiftr.

Cap,%n. *QtHmhTUfMliU*. S. VohibiisLiinonTl-olia florecandentijradjee fulvi Eruptioneselue Vencrea ortasaJiiique cutis infeiiioiiJi extent & c fauit.

Cap. v 5 r. *Xutb-Ciicdm* S. Mint* contortiv.i. foliis raris, um'ca ab lino latcre kcinia., Pliafroii flonb. Cortex radios poti>j adftj ingit *fk*. vomitum fifitit.

Cap.; i. *PiHabuibitzli*, S. Herbs verecunda. Ca.ieo feu Herb* viv.t terda fpecics *Mar%gr*. nobts viJctiirj deftripe Hift. p.979.

Op. 23- *MexecbitIS.Om<xtcbitl*, PeHiafoha fioribus fecundum caules parvii, filiquisCapJitilu-ree. FJoreses luteo rubefcunr. Odor pLuir.c gravis. Forte Apocyni fpeciiis. Vi poflet onetica.

Cap. 3^ *Atimam*, S. Frutex juxra acjus proveniens, Foliis Salignis, fltiribus candentibus, *uwes* cralla.caltanejs invetei-jtaii-elipiente. Folu otlorata iunt & vi catharQCd poMent

&p.;f. *IzMtiKpatli* S.vulnerumiiiedian.1. i.lula Ocynufblia non (ciata. Lac c germinibus m-tifis cm>ua m rectn tes plagas glutin at & ad cicatrice in perducit.

Cap. 56. *Bupbuj0i* \\\cx lyngutn Phtlippincnc. Hoc in hi/lona ad PijKr longum OcadeiiMi-retuimus; vcrunj ex ufij quem a assignar, &rre feu SJctlf pexiib sntciligert; u^
 uidentn.

Cap. 17. *Talancuyt*, i Piper Jongunij **Hujta** priter *Bybuyefuperioreopiic* deferiptum qi>to<^r
 fpecies proponit, quas quoniam ex alio id i i i b c i 3, omittit.

Cap. 28. *Expiti Quababacem*, Sangmnis medidutj roliis Verbafei onanioribus, hifitit, odoro
 £^1^ Sarcacha. Sana iuccm Hguineum rranat, ui de nomen. Coitex/ictat & aftringit. De-coftiim wdicu me&tur dyfeBtertij, iuccu* linguineu veteribus plagi.

Cap. 39. *Cwalchichiltiu*, Vitis Sylvestris feuLabrufca, cujus plures species in Nova Hi (pan. foonte proveniunt, quae BeformaBe viribus cum noftratibus convenmnc.

Cap.40. *Hapabualizpatli*, S-Convulfionis medicina, Humana est altitudine, ftipitibus ac ramis fcabris, magna ex parte foliisnudis, (quae longiufulca Seangufta /Lint) floribus exilibu<r,pallidis< caJy-ciforniibus. Decoftum totius plants propinatur.admotum ainiflum reftituendum.

Cap. 41- *Yttamatlantli*, S.Dentes vetular, Foliis vitigineis, flore pallido, faiftLi acinoIb/rAcematim dependente. A fpinarum cum dentibus fimilitudine nonien habuit. Folia virigineis hirtutiora 8e mi-nora, Acini maturi lutei, multis nucleis parvis candidis referti. Folia alvuim leniter fubducunt. Ad-moventur capitibus puerorum refrigerii caufa.

Cajy-41. *Tamancapatli*, S. Medicina temperata foliis Portulaca: Quavis parte incilufundit Jiqiio-rem rei^nolum, faporeSc odoreThuris. Radice est craffa, longa, fibrara^ cujus puJvis ulcera cacoe-the etiai^,p>i!^fa ^^titt dicitur. Liqueur firmac dences &: gingivarum dolori mederur.

Cap.43. *Xi&pririf* S. Leprx Medicina, foliisMon majonbus. Suffitux est quaternos altus cubitos^ ftipicibus multis. Tufa folia lepram Sc lichenas curant.

Cap. 44. *Ttnamaz, Nanqvaloa*, Frutex trifolius, floribus leguminofis, frudlu f filiqua Ponticx nu-cisforma. Radix magnajurculofa, foliaSalvix forma; Flores in corymbos conipoliti ex candido purpurafcentes. Frj^tusracematim dilpo/ci. Succus medetur oculis inflammatis & tumoribus pra-ter naturam.

Cap. 4J. *Tlacote^uiliz>J>atli*, S. Medicina incife fidis^ ftipitesmulcos ligno/bs fundit: Folia Ori^a-ni ferrata; flores modici candentas. Acns est Be glutinulus^ odoriiSj Coriandrum aiiquantulumt_ fipic- Thoracicu; est fle flatus difcutit.

Cap-4S. *Xalquahmtl*, ftipite pundtato: odora, foliis Piperis longi, eique plane^CDngener, &c earun-dem vinum. « n r 1 . . / - o 1 1

Cap. 47- *Mintzintx,in*, ftipitibus est fulvis, foliisPerficr, flonbus albis. Amara estplanta Be odpra, guftu nonnihl acris, calidaqus Bclicca. Folia tulaacque illica ventrj inceptina aviciatis emundant humoribu5-

HdRtnu5 in Arbwibu fa. t? Frutkibu* ordinem Librorum & Capitem Hiftori<z*
HERNANDEZ firvavimut; figumts ftirpes, qu<z umnes Herb& funt, **A b d r i c a**
fcriz difyvnzmus.

A.

A Bfinthium Mexicanum, *T&tacchyatl*. Et forma Be viribus Abfinthio Europxo repondet. Repetiturlub litera Y.

Acacoyotl, S. Arundo vulpina: ex defcriptione eadejn videtur Cannae Induac anguftifolia; ve-rum flores non conveniujir.

jicatx,an Aycxilt, Equifetum fuliis brevibus, S. Polygonum foemina Mxcic.

* *Acaxaxa*, Julifera Gentians; foliis.

Acaxaxan, Potamogetito affinis Mexicana florife-ra. Planta paluftris Be lenta^ qux ftatim comprimentibus cedat digitis.

* *Acaxochitl*, Limonio fimilis vel Euhio. Caulis ITibet/ folia longa Biftoi ca: figur^ flores rubeij calycis foliolalonga; Flos barbam habet Ion-gam trium foliorum-

*Acuitz** buariacua*, Scorzonera Mechuacanenfis Rumicisfolioj floribus ex candido rubencibus, orbiculri5.

Acxoyatic, S.Herba Nunmi, foliis Abiegms, flo-ribus fpicatjs, radice cathartica.

Aguts Haycinorum est Chilli 5. Piper Indicum filiquolum.

Aboatvn, S. Quercus parva, folus Illicis, flofculis coccinei5, acini5 nigns. Radix adftringic fie ex-ficcata.

Abuapatli, S.ChamaEdrys Mexicana, floribus lute-is parvis.

Abuattpatliy Urticz-folia cum Julis Piperi lojigo limilibus, radici appenfis.

Alabuacapatli, S. Lubnuciu 8e cennuolium medi-camencum. Folia Lini mino^ flores canden-r^ radix alba, pdlucida.

* *Arnacpatli*, Corallium digitatim punftatum.

Amamaxtla, Expurgans S. Rhabarbarum Mona-chorum: Diftrt a noftrate ejus nominis La-pathoj ut nobis videtur.

Amara herba i. e. *Cafachicbit*.

* *AmaKauhtli*, Bulbitera quzdam foliis Tulipa:, *Amutz,auhtli*

* *Amaz>quiltl*; BacciFera foliis Phillyrea:, latifolif.

Amvlli herba, Convolvulus Mexicanus foliis cor-daris^ floribus albis.

* *ArnoKotl*, Baccifera,fdJiis Crirhmi ipino/7 bacci* in uvam congeftis.

* Anonym* Mechuacanenfisprima. Folia figura Be fitu cum Chryfbgoni foliis conveniunt.

* Anonyma; alae novem depinguntur diverforum generum, p. ;ji^yi. *Hern*.

* *Acoxochitlj Font* Anagallidis, feu Veronica; a-quaticx species.

* *Apanxaloe*, An Lychnidis species? Flores iimiles Plumbagini *Torrent*.

Apathfeuatlmam, Campanula hir/utaSalvifolia flore pallide rubente, femine fulvo. At folli-culum ovatum ei attribuit^ qualisin Campanu-lifon cernitur, fed triquetrus.

Aparajua, Herba Mexicana anadendras, radice ruberola, flore candiioj i<p^@''<

*Apatz,iVuntz*umtri*>* Herba Ocyimifolia, Chama>meli flore^ Anifi famine.

Alia species Fuliis AmygdaliniSj floribus luteis pap-pohs, radice Coriandrum olente, *Mufida odo-rata* didta.

Apitz>alpatl, Herba adftriftoria feu dyfenterica, ad Veibenam accedens.

Hocnomen etiam Baccara: purgativztribuicur.

*Apitz,alfathTz, Qntofol9tlii\A*s fubrotundis, Chry-
/t h i p o r i b u s .

AJ:z

Aqua gutta, id est *Achyrocline*. Herba parvula foliis Solani aut Piperis.

* *Achyrocline*, Planta volubilis foliis Clematidis.

Achyrocline caulem ei i Ahuatepatli. Nomen significat *Herba nasum* < juxta rivum. Alia combatur p. 354. fo: i: *Umex*, verum rAjace rotunda varietas. Idem etisni nomen crih dicitur *Tamox*. xQCtyettu}, qtw: ramen Ipede dj crih videtur.

* *Achyrocline*, Icon representat Herbam trifoliam foliis serratis pediculis longis infidentibus, a radice crebris, Fragariae fere species. At nec caules, nec flores rAjace fractuspingiuntur.

* *Achyrocline*, Fiuccx marinus < f^{AA}©, fcsiCollina species.

Achyrocline, S Herba ajuolis locis proveniens, caulibus prostratis, foliis (aligiis, iis oblongis.

Achyrocline cin.uj if. *Achyrocline*.

* *Achyrocline*, it. Aqua: gutta.

* *Achyrocline*, *kkasLth*, Herba foliis Urtic* alcermatim dicitur.

* *Axihuitlapapa tlaUli*, foliis binis adverfo ferrans.

*Axixcxf** *Huiliz-parii*, Leguminosa Glycyrrhizites, ilonbus luttis (pici^{is} iiiiis parvis Ciccmm. AcHoreSj monencu Columnaj iikguinoinok alieni iint, nintirum quinqtupartiti cum muiris in roedio ftaminibus nigns.

*Axixcxf** *axixcxfatli*, S. Mediana urina: lute.ij foliis Hylaeae, fide: & lutea.

*Axixcxf** *axixcxfatli*, S. Mediana urina: lute.ij foliis Hylaeae, fide: & lutea.

*Axixcxf** *axixcxfatli*, S. Mediana urina: lute.ij foliis Hylaeae, fide: & lutea.

*Axixcxf** *axixcxfatli*, S. Mediana urina: lute.ij foliis Hylaeae, fide: & lutea.

Alia species *Axochiatl* it *Colon* dicta foliis descriptioni respotidet; Florummdimenta in (Itmmij caulibiii h virilfti patient: radix fibroia estj non Kaphanofini: in.

Axw- *axw-* *axw-*, S. Narciflorion Mexicanum, flos magno. Radix tumores discunt, & dyenteriam albidam fluxus coarctat.

* *Axochiatl*, de jingitur p. 50. verum icon imperfecta est hWe frutuque vitiu *Yoi*.i coraata sunt, admarginem *linuar*.ij pinnatini difpo/ita.

* *sfyactib* *yitabvii*, Depingitur tantum. Folia Gollipitiaut Fitui familia, lublutca, in rununo multa congefiti.

Ayaca: / (S. Gobcynthis Indica cuberofi. Radix oibiaiaris, (eptem aut pluribus minoribuscineta; Ramis & foliis est Cucurbits ho«en&, Jed iinnoribus. Radix urinam evocac & per japeriora ac jnferiora purg.tt. Pornum nortra Colocynchidis frutui nugniodinc, forma, atqus fatultate refpondet, fed hac aliquanto minori.

Ayotte, Herbs famillis testudini, Graniinifolia radice ovbiculata, fructu tricocco. Radix candida est & lacto manatj purgsc per inferiora, ievi ecian; *occafioni*: vomitum ciet.

* *Auaxvcbid*, Infoliaeftj foliis Uicicx familibus, Hore Anemones: Folia o&wxz Ijnca: rubi-a: preceptant.

B

* *Banizal* L Icon folia repra-fentat alata & bicom,of;u Crifta; Pavonina; diets; Inmodum. Wee flos, nei; fruftas appiugkur.

Banizal f Indorum i.e. Tuibitl., da quo vanas iencenoai v. apwd Carciam & Heriwndea.

Jo. Terrentius concludit Turbich Indicum inter Controlrali species numerari debere, quod extra debitum ponit D.Hermannus. Vid. Hist. natl. Append. p. 1882.

C

* *Caa-*, Radix longa fibroia; caulis filian Co.,; rAjace inflat, sine pediculis: in fummo boer

h d. Color tauoewn dicitur vinty.

* *Cacamil*, *Khil*^ Huic radix granulata Thore inflat; foliis in c*uie hnt, cypofad-erona i-mi3ia; flos cocaneus in . . . luteis, Rosa h' l.

Cacamil, S Herba *amara* flore subrotundo pappoio, foliis minimo hollita. Secta exp i i h eba purgato omni humore.

Cafslie, Coaptb Mexicanumj floribiw co Aftringic, & durlice^n) inflarnnutiones rep<

Cacamoric *tUnaqinknt*, S. K) Hlft-fioft. p. "

Cafiu > *at4j* Pappola, folus oblongb fitTatis, i ianuginoia, Flos extrinicus i i pulfio albw, intnfnecui robet. Radix acris est & *itmnj* admulta ucis.

Ouaatl kiitrf *Chuiltdmfi* St S. AmgaiJis Mexicana: nofrati periimiliseft.

* *Cacapatli*, folia iabet Fragariar.

* *Cacapatli*, folia iabet Fragariar. tcon impwf&ita, Folia^bfonga prxfetiti.

Cacapatli, S. Medicina areni. Aphodely affinis Mexicana, flos luteis, catydbus gon-

Cacavjtzfati, S. Medicitu pabuli fpinoli, ciuli- culis *eiY m* ftelia formam pfr terrain fparfis, ac refertis foliis lililibus in Jphjcmias agg ecaci;; longiufaila h.tbet & candteanm juxta unibilicum filamentaj radicem pjrvani, i-bratam.

Cac < *itx*, in, foliis est Mali Panic*,. nfnitu prbic>|>- n calice excepto, Colore magno. Cortex pul- verizatus alvum leniter fibulocit.

* *Cachraspa*, Ad Campanulas pertinere videtur, calix floris luteis; . . . ipfe ruber.

* *CabH4KJitx*. *Kjui*, Radix long. i rubec inft. ir Rf<a- barbari Flores oblongi, cubuloiJ, carnei in fummis caulibus fpcatent quafi digefti.

* *Camatotencitfiiili*, Caului nigris velut annulJscin- tins, folia cpniata, oervoia^ longicudtns qui- tior unc. latitikiine fere pan. *Ttr*.

* *CansolxubsU*, Arbor leguminofaj folia in das componk. Flos Caflix JunilSj ex rtibro ftiviis in odo partes divifiis: SiJiqua i'uib famillis *Tcr*. Haje in itone non apparent.

* *Cgmoptlic*, JJores in (ammo miilti iimu! con- jundi.

Caijuwli, Ocymjfoia verticiliata, foliis non (er- racis, floribus q'aneis.

Cayslpnth, S. Mufcarum medicina, Ligviflioifn Mexican urn, flore Ferular, fblismenthxternb quini fvc, femiae Piperis mgri Jifuli,

Cayelpatli, Vaxatenfis inufcarum Medic ma, Plan- nida per terram rjwms, candidts & ftc-^{aris} fufcatis Decoc- tum catharticum est.

* *Cutcpatlil*. Cofti hortomm fohifj , -adiceR.ha- phani fibris cinda.

* *Cicecpatlil* alceraj Ly/iniachia; luces fo^{lls}> calice tubcroia FilipenduLc.

Cicecpatlil AcadanenFB, Gycjirfc* *sfvnlh* << dice dulmicd purgat rice.

* *Ciliqatli*,

*Cefcr/vr/i, foliis Urticx & ex airerio binit
Campalacchi 'e, Pappofa Ochorou fou< fynofa,
radice Raphani, qiiKJniaieft fir sens.

*Ceitunom dt ^mbuntb & K, Baccvfera Nerii folfis,
baecis in isvam < ongetia

CmmM>Tzeeifu/is. Foliis, flow & fiuctu ad
Pciiplocam Gntcaui angufufoham accedit.
7.7WB.

Cnit<* TiKAaqmenfu, fe< Mater fpicx Ni
PaWliVr^afSnb w^Apocyno, Vcibala foins
linu^6n(jlo£^is in miicariis.

*D>n WMI IT i. rniit> n n. rinnrrf t.rlitttrnjir i.
tadix ton^dacuM fibritpnrfonj*

*Chachaiacamitti, Artw: baoCJfera, Pjrnfel», OJC-
cis in racrnulis Rtbuim annulb.

Cborittiti, Urtrta; folia ferraca; f&<<> longi .m-
Xi, ex albo rubefceiiKs; ratlix fibrata. Vi-
trdis A£uri flonbus (uccedunt, in qribus
Setbimcurat Ratli) pot.i.

*w(/, Raflic ItKHKii, orafia. fibrofa • Foli-
um Biftot:r bnguffl Jiiixletim, ltmn Juosili-
git. Timnf. iuin nee cttdcm ncc HOT em aut
fructum j rtpnrftnot

S. Pboca in humoreinnimefcenj. Foli-
is eft Ieictera; lionbus tandid. cxilibus in
valcuits oblortgk toiKiiitw, in qñibus lemcn
generatur canidens, lentiforme. Ula epaveft
turn in mMicin*, twuincibs ad p.iranda bel-
Liria & pottones icfrigeranto.

-CU*iiifail. S. Pennicæ (peacs flore htsa
At fo'u (errata non unt.

GfcaA*, f*, Papaver Jpinoffim hifr. noft p. <;6.
Cubunvnt-c CttiUm •, & China sdthtngen
Jm eft (:• mce, floz in piirpureit China: (irml-
bu:, radiubus e*p<ltati*; adflr ingeni eft &
fluNiii omnes cobibrt.

Chkbk wlttl, FoB i bin*, ad quorum exommi
taules in nodos iwonjbran^ Hos oblongo tu-
boflaviis.

Colojyncifimdicimbrofa *. AyoreAli.
Cbicbi mtatf*E, S Ctaaiirotcg gciittmotlicinn;
Apoa Mexican* tubul<t(^i anguftis in cano
freljrim ad irrcivjii MI

*Cbicb)c frimprontc JrOtifuUy., is pj-
ronyi.hi.1.:filiu* bmtstenellH; adAltincj poffit
referH.

'Cbkbkrv^Mitbafit, Plants eft trifotu, icil Ingu-
hrn Si (lit generis.

•CbicbibwxKbitl, Fofia Chonopooio atit Stramo-
nioimilia; Frucius oblongi, alii vindes, alii
Iticei; Flo* albus Stramonio limilis. Flos (urn-
Csoptb TonruitSmicnJi), Ramule crebns foliu
mRIS, anguiiis, hirhim, infern^ fubalbida, rfori-
bus liitcts, rldice longa cenid. Vesperudi potio-
rtiboj & ierpentum irtibus medetur.

*Cbkbstv.cTif<Uubx<>tnbl, Bulbofa raiiiceeft^fo-
liis lam TuliaT, Hore pulchernmo in uno «u-
licufo fohivtũuo unico. Flons dc(cnption<m
vide tn fwts Terrentii p. ;6S.

*Cbicbitn patli VrtxAin anguiofns efc vidcrer
««ridraqn&nmends»

*Cbibihica buapatit, kon imperfefta: t<ia Ca-
fumhac aut Alyli Bbfeoridu nwntam G/,
cauliculus ferdt
bicbteboiHttli, Atriplitis fpecies amara.

*Cbicbitn :?, luliola in caulibus & 1 amufe difpo-
nurur co owdo quo pinntiljt in viciarom fb-
jijj
feii^? mow?*, Foliis eft Caftanca; fcrati*,
f i o r c o b l o n g o i-a k' ilisiinsiii. Ans:on proflore
fiiicqas Pappici finite reprdentai rubras & in
ewfwna patte leuas undique claufss; r:iticc
longas & «lut nodofas,Cortex evacuanlo cor^
pupTebres cut K.

*Cbicbitn :?, luliola in caulibus & 1 amufe difpo-
nurur co owdo quo pinntiljt in viciarom fb-
jijj
feii^? mow?*, Foliis eft Caftanca; fcrati*,
f i o r c o b l o n g o i-a k' ilisiinsiii. Ans:on proflore
fiiicqas Pappici finite reprdentai rubras & in
ewfwna patte leuas undique claufss; r:iticc
longas & «lut nodofas,Cortex evacuanlo cor^
pupTebres cut K.

*Cbicbitn :?, luliola in caulibus & 1 amufe difpo-
nurur co owdo quo pinntiljt in viciarom fb-
jijj
feii^? mow?*, Foliis eft Caftanca; fcrati*,
f i o r c o b l o n g o i-a k' ilisiinsiii. Ans:on proflore
fiiicqas Pappici finite reprdentai rubras & in
ewfwna patte leuas undique claufss; r:iticc
longas & «lut nodofas,Cortex evacuanlo cor^
pupTebres cut K.

*Cbicbitn :?, luliola in caulibus & 1 amufe difpo-
nurur co owdo quo pinntiljt in viciarom fb-
jijj
feii^? mow?*, Foliis eft Caftanca; fcrati*,
f i o r c o b l o n g o i-a k' ilisiinsiii. Ans:on proflore
fiiicqas Pappici finite reprdentai rubras & in
ewfwna patte leuas undique claufss; r:iticc
longas & «lut nodofas,Cortex evacuanlo cor^
pupTebres cut K.

*Cbicbitn :?, luliola in caulibus & 1 amufe difpo-
nurur co owdo quo pinntiljt in viciarom fb-
jijj
feii^? mow?*, Foliis eft Caftanca; fcrati*,
f i o r c o b l o n g o i-a k' ilisiinsiii. Ans:on proflore
fiiicqas Pappici finite reprdentai rubras & in
ewfwna patte leuas undique claufss; r:iticc
longas & «lut nodofas,Cortex evacuanlo cor^
pupTebres cut K.

' * } * . ' f * ? * » . Ff)lii bi™ opptKra Cfemati.
I. iimlu,caules volubiles; ratii-
cisl HmtM, h*ncidCieroitirisgenus
pertmerearj>iont iftiwfe Ten %*An
animota velut per miraculum tk-nrtum dolo

Cbitlfn, Facie & vinbus adDignakem accafic
Col, Ac (tares proutpingL:nmr&: del ^biiim'
ctlictini figura non rdpondenr.

CbitlfnCustSi, S Signum ftercoHi, Ik'fcila eft
toli is Si I ignis, f>-inLi 1'ingisjubeji^Ltirr.iev-
rrema p.ificlentijus. Raiiix aens & adurens
fopra intr.iqije purgir.

Cbil^itfxtbitl, S. Signi inll.iv pentisii?, Mortuo-
rum medidna. PM<t eft Saficii, anguftiorimB,
in CJ:JII' (.rebus eitbit.ili, in cujiti ii.iunupArte
flore cornet rubi ivc^ ctlicubrum forma. Ra-
dix parva, fibnta amara, & tamen tngidx na-
K. Ept'cpticii opm:lai i Aidtir, unde feciin-
diim 11 omen.

Cbitlfn, Corymbifura Oqriirolia flbi-ioufiure-
is, aunij Pipens nigri *rriulis. Aeris eft &
il ca, purR.it vdwmeter: lat vermCb ex-
ed. Terrentiai ad Thyin.iluui rtfctf •

Cbitlfn, Mcican.i v. CfsLeimttat!
ptqitj S. Herb.i Hrirta, ciullkiscenui&nis I
Lu,j,t?n;iliai lutsis 3d folioiumex.ortus.

Citimit, Ptwtfflus flonbtis racemoJu purpuri*,
Oiqubiams, Flos abpjftas Coiwohrai p>-
rius v)detur. Nitin-a icon rcfpomJet ii.
Cioni.

Ctmtil, Azgvntn mfoliuni foliis Pliafcoli corJi-
tis flatus albt)d)5, icpens, tadace fciuggic.i,
Crv*:*UTm(bafiatltxfi>i S. Corifza Mexicans,
fiiiis S,ifvt< ghinnthj /Jortbia purpurafectiu-
bu*.

Crvfeth Hemiamtiea S, Hsrba urertna, foliis Flc-
jinoniudis mtjltificlz fita iktijitiri, rtonbas al-
b< umbellatk Utrina eff & thoracica, par-
rum promovet, iinnam ac menfa ciet. Cony-
z r d l i d t t i r Terrenero.

Crvyait major, S. Fcemin.irum
Ocimi, floribus rufis lpicatis, radicibus upil-
licois.

*f<b*xj)Hili, S. Pentium rtwdicina, cauliculi
pctrcrram fprih, fnits rentnffinns penjatiit,
hoicm canidus.

Coccyz p, Auricula- nifi fpecia cfe videtur,
fioribus i viridi ,iibencibus: ALifina Columnar.
Calk v. CohibnoJw.

Ca<w>atf*JS,S.Contrayerva. Vid. Hift.noft.p6ji.
Csoptb TonruitSmicnJi), Ramule crebns foliu
mRIS, anguiiis, hirhim, infern^ fubalbida, rfori-
bus liitcts, rldice longa cenid. Vesperudi potio-
rtiboj & ierpentum irtibus medetur.

CvapjrfiAjfheJtma, Radidbui eft Aiphodefiiii
mSa prefixB, Porracets paribus [m iconc Po-
lygon.wi dmiliora, nervolaj Horibui lnfummus
caulibus vciut iptcaets Scotch i

*nymtecox&h-tl, S'lofi Lyrtceus. Ra^ice eft
Iquamofa, foliis longis btioicujfer, fluribus Lihi
autTulipi-jfubrBpuncbis intediIndis Candida
& pslleixntibus.

axiburtl, S. HeibaColubrina; folnfcfHiyjps-
na niinoribui, non pertulis, Honbus pm-puris
cilycum figur,!, & fingulis fohorum alis^ugu-
lis. Campanula turn figKra turn iiribut

I A rft. At fvitfmp p / n j .
Coca Pmma, Hippogiofli ptoculdubio (pecics eft
7fr- V. Hill, noft

Cxehsa Vmsetfu Volubili? PercficUolia rafdkc or-
biculari, Hore & fitifith vidua. Radix dmieti-
Bbbbbbbb o/

- cf, lichenotriptica, emmenagoga, & alexipharmaca.
- Cucocaquilitl*, 5. Olus aquaticum. Folia in iconc Caryophyllatam referuntj flos Caryophylleus coccineus & calyce squamob. Planta trium cubitorum altitudinem assequitur. Sapore est acri Nasturtii & pro olereufurpatur.
- Covoxohmtl expurgatoria*, An Convolvuli species? foliis cordatis, floribus parvisluteis, vasculis tricoccis. Humores omnes supra infraque purgat.
- Cocoxihuitl Tzucalcztincetifis*, Menthz foliis est, fructu in fummis caulibus capitulorum forma. Impensè calida est, & gustatalinguam adurit.
- Ceootemecat*, S. Funis volubilis acer, Clematidis Ipecies. Mirum tamen quod dicit folia dyfenc ends me den.
- Zocoxihuitl*, S. Herba acris, A flū r git interdum in altitudinem arboris, foliis Polypodiiaut Acanthi, venis rubentibus, flonbus Ipicatis pallidis, iftēin Iracemolojparvoj utnque acuminato, fapore acri & L amaro. Stipites fuco luteo mannan r. A lapDre acri & c urenti, Capfici quāmfimillimonomen accepit.
- Cocoz, xo chip'at It 5*. Medicina lutei Doris, Buphthalmum luteum, foliis Bugloffi, radicibus Pxoniz. Radix glutino/a est & L fluxus listit.
- Cofoyatic*, S. Herba Palmac fimilis. Radice est Porri cap. foliis Palms humilis, floribus oblongis purpureis Calyculorum formā. Radix contnta 5c naribus admota pi u tin us ft emu tamen cum mDVet, undeMedici Indi Tttici&itx, ea velut certiffimo indicio periditantur num argri oblati morturi fine necpe. Alia est herba vkam& mortempraznuncians apud Monardem. Concifā & inmultum conjesta mufcas omnes perimit quotquot dulcedine ill' (S1a: mul/um deguftaverinc.
- Coert S Zomtic*, Phafeolus exoticus radicibus tubevuifj foliis laciniatis, illiquis nodofisj femine lentiformi, efulento.
- Eohayelli*, S. *Chi chic a hoaz, ton*, Eryngium vel (ut reftēTerrentius) potius Dip/acus American us. Galore Stacredine fua ad affeſhis frigidos valer,
- Cdtotli* Leguminofa Securidāczfoliisj floribus in capirula cDngestis^ pallide purpurafcentibus. Glycyrrhix ut odore Sc /apure ica vinbusacceo it.
- Colubriohx, ZoaI^uilitic*, Paftinaca aquatica Mexicana; ut facie lie vinbus cum Europxa conveniens.
- Copalli Dei, Tbtub C&palli*, Caule est cavo, geniculato Ferulx, fructu in fummo comanre mufcarii in modum, floribus lanuginoiis. Radix ad luem Vneream facit.
- Coyolxochttl* S. Martagon volubile Mexicanum. Foliis est nervois Plantagineis auc Arundinaeis; caule volubiii. Circulus foliorum liimum caulem ambit, ubipediculi egrediuntur floresluftantantes undiquaque diffu/bs, Liliaceos, c rubro viridantes punctatos, quorum ufus ad fervias fit corollas.
- Coyotomatl*, 5. *Tymal Coyotli*, Hift. noft. p. 681.
- CoZamalo xthuitl*, S. Herba Iris: Cur itā dicitur sic cum Autor folia rutacea ei tnbuat non video. Radix cenus fie longiuacula, floi es albi^ forma H^"cz>i>>\ Acacia.
- C P ^ / ^ W / ^ S C U I arum funis; China ^, Mexicana Medicina imrabilis: Volubilis, radice erat ia rubra, hbrata, caulibus capreolatis; foliis iubromndis tnnerviisj fiuftu Myrti fmine referto. Duplex esse dicitur, fertilis & flerilis. Celebratur ut panacea quadam & Dniniim ferè morborum medicina. Autorem, si placet^ confule.
- Coptic mecapalli Ttlancenfo*, S. Cnfta galli Mexicana^ flore purpureo.
- CoTLticpatli Azatlamrifis*, S. Thaliftrum Mexicanum. Folia [partialia]p^ne Adianri; Fj6ics pilofiparvi; radix dulcis Be amanriidineiil participant. Diuretica est, & adfringens. Jemen f. fructusFilipendula: P?^us vi^letur. Adfflumina. Alia pingitur ipecies^ dkiM^^iris, ex quibus multEfibra^ depend^ritt^
- Coptic xibuitlj Linifulia* (emine in fummis ramulis orbiculari. Radix cathartica est.
- Łoz, tomatl*, Solanum veficarium; flore, Juteo, radice crassaj viribus cum vulgari convenit. Vefica viridis est, fulci oblcure rubent. Hill. 6Si.
- CicHitlapilli*, S. Glandulania, a jadicum neura difta, foliis ferratis, feminibus Coriandri hgu-ra & c magnitudine, binis una tenticulorum in modum nifcentibus. Hanc ex figura tocius plants & vnibus ad Mercurialem reftereferc Jo. Terrentius.
- Cuitlafotl Tepecuaquilcenfoj* S. Napiformis, foliis pinguibus cordacis, caule volubili. Radix Napum olet iapitque; bilem evacuat. Ad Convolvulos referenda est.
- Cuiztapafollin*, Phafeolus Mexic. foliis Mori, flonbus parvis rubeis, radice dulci. DeccMftumradicum hydropicis confert. Nidus lacertarum nefcid qua ratione dicatur.
- Cu>garijejt4a3LzguminDili* caule volubili, foliislongis^ angustis^ nervois, floribus purpureis, filiquis tereribus, tenuibus^ prarlongis^ femine orbiculari albo; radicecrassa, candentejonga, capillata. Legiiminis genus iingulare est; necdum enirn prxterPhafeolos legumen ullum caulibus icandensnovimus. Alia pingitur caulibus niagis creftis, filiquis nodofis.
- Crrungar^ita*, Foliis est longis, angustis, Pentaphylli in modum ferratis, floribus Campanula cyaneis, vasculis orbicularibus icminibus merns. Radix Thoracica est: pulvis fIDrumrumptusvilum acuit.
- CHUnqm, S. Matlacaſa*, Bulbofa radice cepx, foliisVecronicx alnlis, floribus luteis, filiqua oblonga, femine trigono. Radices edules iunt K VI
- E-
- Eloyuilitic*, S. Herba geniculata, foliis Bliti, caulibus farm en tofis, nodis iniignibus divifis; Hore femi^q, rubro atque minutD in conDnij modum velut ex Blito dependentibus. Humida est & L frigida, Pleuritidi 6c tuffi opirulatur; alvumquelenit.
- Erahmm*, Foliis est Origani, flonbus oblongij, angustis, cyaneis, radice contorta. Conanclrum olet, fed acrius quidpiam fapic Calida elt Be ficcaundeurinam evocat, flatus difcucit, Kc.
- H-
- Hoaul^mlnl*, S. Atriplicis plures species: Vidp. 169. altera rubra, altera vindis utrsque elculentx, tertia amara nee edulis. Norn in 1^ai. cumfigmficat, Olus feminis in enftamooompo-fici. Columna hanchabet pro Am^licc baccifera, & C reffe ad Bici genus potius quam art Atriplicesreferendam cenfef- — Convolvula succuicis, radicebus
- mm.....^, — K
foliis cordatis, flonbus oblongis

dicubustuberofis. Radix editur elixa, febrilem calorem compefcit, olet fapitque aquam deftilatam florum Mali Medicae.

Hochlicpatli, S. Suavis medicina, Herba leguminofa floribus cDecineis, filiquis tenuibus teretibus. Glucinoia est Be adftringens.

ijuemberequa, Trifolia folns undulatis, caulibus Yuolixis, fructu parvo racemolo ab exbrtu foliorum prodeunre. Frigida est Be adftringens.

M.

M. cervi; Pappofa foliis Laftucs ferratis floribus luteis, femine tenui ful-VD. Urinam Be menfs evocat, flatum difcutit, 6e alia puzft at caloris effe ft a. m

MatlalylZsic Tetz,ocana, S. Triorchis Mexicana. Folia craflaferrata Plantaginis, Be adradicem Arundinacea; caulibus est geniculatis digitum craflis: Flores cyanei calicum forma: radices Triorchidisparv^ Be multx. Radix ad ea vale t; quibus refrigeratione opus eft.

Mtçapatli S. Zarzaparilla. Vid. Hift. noft. 656. Quartam Ipeciem defcribit Be d spin git Muntingius pro Sarfaparilla vera.

Mecapatli Mecatlinmfist Convolvulus Mexicanus flare purpureo; videtur effe Convolvulus purpureus folio fubrotundo C B_m

Mecaxochitl, Vid. Hift. noft.

^diahoapatli 5. Medicina ipicar Mayzii; Alfins affinis arborum truncisinnafcens, flosculus candidis. Acris eft, odorata Se calida.

Michuacanica diuretica Vid. *Tlalantlacuaye ctiitlappli*.

JMzctti Tlaxcolli Vid. *Tlaxcoll*

Milto-matl Vi&Tomatl.

JMotmenfis Herba expurgans, foliis parvis cdrdatis, volubilibus, floribus rubris calycibus fimilibus valculis iubrotundiis, femins cathartico.

N.

Nanacace, Jacea Mexicana radice tuberofa, foliis lubrdtundis. Aiunt radicem decoctam alvum fiftete, crudam purgare.

Nanahuapatli, S. Morbi Gallici Medicina, foliis Pilofbills, flore in fimmu caule Chamsmeli, femiheacri. Ulcenbus putridis medetur.

ifaviyeputz, quadrilatera. Chryfanthemum caule alato, folio haftis cuppidi fimili. Alia eft yarietas flore è luteo purpuralcente, quz frigida est Be humida; cum prior calida fit Be acris: Item tertia radicebus Hellebori, calida Be acris.

Neicotlalpatli Totopzzzifis vomitoria, Apocyni fpecies effe videtur (urrefte Terrentius) a foliis in caule binis ex adverfo, odore virofo, Be viemetica. Foliis est Scammonea; caule volutili, flonbus candentibus, furculofis radicebus.

Nextabe, Chamslar^ congener, fohis Ohx inordinatè pofitis, caulibus lignofis, fructu Cigenbusfimili, radice acn Beguttur urente, cathartica.

NxtTacotU Tacapichtlenfts Limpniphylla floribus pallidis in calicibus Iquamofis. Cabda eJt ficfica.

O.

O. AS. Herbaktificans. fDliis Lim quater-nis quinifve per intervalla in caule, flosculus purpureis fubrotundis.

OcopiazTU, 5:Scorpii fpina, Eryngii auc Dipfaci fpecies- Radw Eryngii odore, iapore & vin-

OcoS S. Planta refinam ftillans; Folia bnga angulta finuola K crcnacaj floipsiotundi K

coccinei, radices A/phodeli fucco refinam Diente. Foliis odor, fapor Be vires Raphani.

Oiiliuqui, S. Planta orbicularium foliorum. Con* vplyLilifpecies, foliis cordatis, floribus aibis Ion- giufculis, femine Coriandro fimili. Sapore est acri, comefta varia in Cerebro phantainata excitat.

UmimeXitli, S. Ds iernoris. Foliis Ocimi HULMst caule volubili, floribus in fimmis ramulis parvis pallidis; rafculus liibrotundis, radice craffa, longa, tenera, Candida, glutinofa, infipida 6c inodora. Dlla frafta conblidat; viribus cum Symphyto majors cDnvenièns.

DmixQchitl S. Fjos oleus. Lilium Mexicanum foliis porraceis. Flos ex oblongo tuboinftellam expanditur; viribus cum Lilio convenit.

P.

Taradifea herba Hernandez, difta quod folia habeat Manucodiatz plumis limilia. RadILLj-iibroix; caules filiyi hi/pidi. Amariffima est, unds lumbricos necat, flatum difcutit, peftorL msdetur.

Pep, Foliis est ferratis oblongis, finuatis Lapathi pulchri Bononisnfis infar: floribus rubentibus in brevibus pediculis è radice exeuntibus." Radix fubacris feamara, xhoracica Be cardiaca.

Pbacei. China Michuacaneniiis.

Vina huihuiZttlij S. Herba verecunda *Hijior. nofe* p- 979.

*Poz,tecpatli*Huaxacenfis Gemmata, Foliis è puilllis, convolutis, arborum gmmis primò erumpentibus fimilibus, Nafturtii fapore. Nervis replutiis fiiccurrit ac mo turn amiffum reftituit

VoZtecpatli Mecatlanica, S. Fracturarum medicina, foliis Mali Perfic^, binis per caules adverfis, geniculatos teretes digitum craflis j floribus pentapetalis rubentibus. Tum^res arcest hsrba, fraftis Be luxatis oflibus medetur.

O;

Quelars^ S. Ireati hominis medicina. Foliis falignis, caulibus contortis tenuibus. Pacifcam Jierbamappdlat CùJumna, quia velut Ammo medetur.

Jguamiavatlj S. Spica arboris. Hernandez ad Thymalum paralium refers fed malè. Icon Selaginem ^- Thalii referre videtur, Be locus etiam convenit: quamvisicon *Tlamacazypapan* cum floribus vixrdpondet. Quinetiam vis cathartica Sdaginem arguit.

SZuaquahut&ontkj S. Truncus Seftus. Apocynum Pyri foliis, fructu Capfici ipintffo Be lanugi'nofb, radice orbicular] miti.

^uauhxcotil ChillAle?ffij, S. Oxymalva, foliis Ferratis tufdisaut quinqu-fidis^ radice Napi fuccDla. Sapore Oxalidem referunt folia, fructus orbicularis acinoftis. Radix leniterpurgat. Adhanc accedit Alcea Indica Guilipii folio, Acetolk fapore *Herman*, nifi quod radice fitfibrofa. Alia etiam Alcey Indica: fpecies foliis funt Ace- tofae fapore, ut qua *Acetefa Indica* Bontio dicitur.

£zul AmoUi, S. Herba Amolli, Convolvulus foliis cordatis, floribus candidis przlongis, Cymbali f ornia. Herba est frigida 6e emolliens, unde ihflammationibus medetur.

T.

Tatacanaltic, S. Chamsebalanus Mexicana. Folia Saligna; floras modici purpurei &nt;a: l^jux Bbbbbbbb I onl £.

- longa, & per intervalla in rubercula orbiculana intumescens, dulcis.
- Tefonpatli*, Apocyno affinis, radice Pyriformi foliis longis pinguibus. Fructus Siliquaeftri, femine refer tus piano, orbiculari, pediculis appenfb. Foliolafte acri manant. Radix amara eft & odoiis gravis. Datur alia fpecies, foliis latioribus mDlioribus St minus nervofis varians.
- TeicTLwincafali* S. iftiis ouulimedicina. Folsn eft Jongis & anguftis, (emine gemino luteo, rotundo, parvo.
- Temecatli* expurgans, Convolvulus foliis hederaceis, flonbus luteis orbicularibus e foliorum ajis.
- TmtcatlTauhtepzcemis* S. Bryonoides. Foliafubrotunda, undulata, niollia, odoris gravis: capreolacis caulibus, fructu acinofa racematim dependence; radice magna amara.
- Teoquilm* S. Saxeiverme5. Cauhbus [feu radicum trun&^efi geniculatis, & circulis quibufdam pracindlis, fibris terra attafta itatim emiflis capillaribus; foliis cordatis; cauliculis feu mavis fhiftibus Piperi longo perfimilibus. Odor a eft & acris/traumatica, diuretica, carminativa.
- Ttfarj* S. Crafa plantaj foliis haftatis ferratis pungentiUtica^ Janugjne ubftitis; caulibus cavis geniculatis. Inifpida eft Be inudora^ temperiefrigida.
- Tepeboila Capitz, xouhitl*, Saxivolvula, Foliis eft Hedenc urticarve, (erratis (axis fe convolvens, radice luco manante. DaturaIiud genus/foliis fcutoruni undulatorum forma. Refrigerat Be humectat.
- Teftla xibmil* S. Herba montana, foliis Amygdali, floribus ad extremes caules fubrotundis, vafculis cDnteftis virentibus. Odorata eft & calida.
- Tepetla chkhix xihuilit*, S. Herba amara in montibus proveniens; foliis Chamardryos odoratis floribus pallidis^ piluJis ftellatis; fructu parvo oblongo. Radix odora & amara eft: Decodtum herba: per fupsrna Bi inferna purgat.
- Tpeyautli* S. *TTantli* Muntanaj foliis eft Salignis longionbusnec ferratis, caule tricubiraJi; fjjribus Dblongis calyculorum forma, cocdneis^ radicebus fibrofis. Acris eft & odorata.
- Tepezjtntli* S. Spicz Mayzii montani. Apocynum radicebus contortisglandulofis.
- Tepitz,ic xihuilit* S. Herba firma. Foliis eft parvis obrDtundisj ferratis Adianti ni^ri; flore oblongo pallidc rubente, vafculo rolaceo panic fimih. Unnam elicit quacunqus de caufa reten ram.
- Titz,milTonall<e* S. Sedum Myfticar. Foliis eft longis, anguftis, rans, juxta excrema lacioribus, floribus orbicularibus candidis. Succus emeticus eik
- Titz,quixochitl* S. Tz^quixochitl ikxea^ Bellis minor MexiDana, folns Lini, flore Chaniarmeli^ radicebus fuixulofis. Radix frigida eft Sc aitringens.
- TvibquilitHc* S. Herba principis, Foliis Mali Punicæ ad Ungula genicula terniSj flonbus in cojTmbisj coccineis, filiquis paiyis cum feminibij5 maturisnigris. Radix tenuis^ proluxa, lutca trigefadc, fi_{ca} Be afringit.
- Teuxochnl* s. Flos Herois, foliis Dcymoidis floribus purpuris parvis, ante arftatem emicandibus. Radix totaplanta duplolongior, cenera & lafte manans fngcFaut Be humectat.
- Teopath zgi*. Duphthalmi S. Bellidis ippecies videtur^ UTj flore dilcoide radiato, difco lutcQj radiis purpurafencibus; foliis aferis finuofis; radice crafa Paftrinacx fapore^ cujus fuccus tuffi confer^ & dyfenteria^ miram prseftat Dpemj ex eadem paratur vifcum.
- Tezompotomc* S- Capilli foetidi, foliis ferratis Salignis; flonbus candidjs, comantibus, odoris. Naficicur in humidis. Radix odorata Sc ~~anara~~ calf ficc. Sc adfringit.
- Thtuh CopaHi* Vid. Copalli Dei.
- Tlaaqa Vamecaxochitl* S. Flos funis p~~ulicere~~ tris. Foliis eft Salignis., floribus ~~Saly~~ ~~Fibrofibus~~ exilibus, tranA^erfa radice. J^f^ifem amiflam reftituit.
- TlachichinoaFatlahoac*; 5. Herba ufta; HeliDtropium majus Mxicanum, Tres figure trium diver/arum plantarum eflevidencur. Situsflorum tertis Ipecies in furculis floriferis idem eft cum Jflu florum inBuglo/Io EchioidelIndicoBrey-nii.
- TlakirnatlgiLTlalamatl*, S. Morbi Galliici dolores fedans & c Herba S. Joannis infantis. Trifolium purpureum fpicatum foliis Nuramularix. Adftingens eft Be vulneraria. Monardes Herbac SJoannis infantis folia Oxalidis villoJa tnbuit: intelligit fortè Trifolium acetofium.
- Tlachochichk DcaptlayucZj* Salvifolia floribus candidis pappois. Succus pituitam purgat §, ponderis.
- Tlacolcoatl* 5. Coatli humilis. Foliis eft Erica? ; floribus candidis longiufculis Sc velut c flocco Loncinnati5 j radicebus fibrofis- Radix diuretics eft.
- Tlacopatli MalinaUmJis* S- Ariftolochia MexicanaIII. Folia cordata ; caules volubilesj Fructus oblongi5 Avellanae magnitudine; Radices fibrat^ Morbis frigidis pa?ne omnibus auxilio funt.
- Tlaxochitl* S. Jafminiflora., foliis Salignis fubalbidis, ad nodos terms; flofculis ex albo rubentibus longiufculis Sc compoJitis in comain-Lafitudinem pota tollers dicitur, & radice pulvis vetuftis plagis mederi.
- TlaeuilaxQcoUi* S. Vifcera terra?. Foliis Drigani Jongioribus & anguftioribus, fructu rotundo ^ foliorum alis j radicebus albis, tenuibus, longis. Succus naribus artraiftus pituitam elicit Be cephalalgiam tollit. Cathartica 6c emEtica eft- Caus5 nudo/i pinguntur ita ut inernodium quodvis ip/i nodo infertum vidcatur.
- Tladpatli TonallaS.Mzdirina* dyfentericoruiji, foliis Lini, floribus in corymbis feu fpicas compofitis.
- Tlaelpatl* 5. Medicina dyfentericomm alia, foJis Veronica: fubrotundis ferratis, fructu Piperi longo fimili [aut fpicx Plantaginis] Radix Jonga, digitum crafa.
- Tlaelpatl* Acatlanenfis Alfinefolia II. caulibus fpithamiffis, femine in fpicis foliaceis feu fquamods. Radix ut reliquarum cognominum dyfenteriz medetur.
- Tlaiapaltic* S. Cocos,tic. S. Tlalauhyuichioyantie S. *Zhaantc rubta*^ Herba pallida, foliis Dblongis ferratis, radicebus fibrofis pallidis Helkbori; floribus oblongis candidis, fructu glandibus oblongis fimili. Bibituradvcrfusfebres j iremVa: riolas.
- Tlalatochifll* S. Humile Pulegium. Foliis OrJgani ferratis ex adverfo binis, e quorum nubus fingulis finguli flores exeunt ex albo purpurafesntes, Linguiiii quamprimum calefacitj paulo poft veluc Atochiftl/pecies reddic mten^ 5e gehdam.

- Tlalacahuatl** Chimalhuacanichalcensis S. Filipendula 4. Mexicana. Foliis est Ocimi oblongis, craffiufulcis, nervosis, ferratis, binis per intervalla in caulibus apheris tenuibus, floribus cyaneis in fpcis Stschadis Radicum glandulis Avellanarum magnitudine, qua? ardore febri-
 III temperant, Be alvum fistunt.
- Tlaliacaual** 5. Yz,tacixpatli₃ Filipendula trifolia, radicem glandulis interdum oblongis^floculis cocjineis. J^adix frigefacit Be humefat. Icon flor & ga^ta^v^ftbiatos repnefentat, fpcas fquamatas.
- Tlalcapolin** S. Charriscerafus Atlapulcensis, foliis ferracis, obngis, in caulibus per intervalla quaternis quinifve una, floribus in iummis ramulis parvis coccineis; fructu Cerafi, minors. Pulvis radicis dyfenterias curat.
- Tlahhtnolxochitl** S. Venerea medicina II- foliis oblongis, anguftis, crebris; floribus parvis, oblongis ex albo purpurafcenribus mult is capillamentis luteis. Folia afringunt. Radix ad 3ij. devorata vomitum ciet.
- TlalchiplinHozxotZtincen/**is^Foliis Origani nonnihilerratis, floribus candidis, femine in vafculis candido rotundD,radicibu5 fibrofis, Catharticis. Alia pinguur Ipecies valculis in foliorum alls in tres carinas dehifcentibus.
- Tlalcocoltx, in** S. Parva herba & C contDrta, Tithymaki5 heliofcdpius Mexican us fuliis quam no-
 intras magis acuminatis.
- Tlallantlazua cuilapilli** 5. Cauda parvi Tlacuat-
 zin; Michuacana diuretica. Duplex estj
 mas Sfoemina. Mas foliafert Solani mucro-
 nata₃ Sc juxta cupidem contorta, caules volu-
 biles^ radicem cenem, longam^ fibratam, can-
 dentemque. Fcsm'ma caule est cinereo genicu-
 lato; foliis cordatimajoribus, flore per hye-
 mem candenti Be niagno, fractuque oblngo
 Sc amphore^ reFertDj femine luteo obdufto can-
 dida lanugine. Hxc proculdubiD Apocynilpe-
 cies est.
- Tlallantleaca cuilapilli**, S. Trifolium tetraphyllumij
 floribu5 rubeis fellatis in (pidsquamofis. Ra-
 dix craffa. Thoracica est dolorcique Si lafitu-
 dinem fed at.
- TUUayotli** S. humilis Cucurbita. Folia CDrdara a-
 cuminacabinaadverla; Caules volubiles geni-
 culatij cucurbitube pollicaris craffitudinis Sc
 longitudini5, maculis viridibus Be cinereis inter-
 itinfra; edules, ac refertz lanuginofo femine,
 Radix longa fibrata per fuperiora & i inferiora
 purgare dicitur. Inter Apocj'num Be cucurbi-
 tam ambigere videtur aut de utrpque participa-
 re. Ad Cucurbitam tamen magis accedit.
- Ualrnatzalin Hoxotcinfen** 5. Amygdaloides fer-
 rata floribus parvis purpureis in iummis cauli-
 bus. radiceNapifrigidaK ficca, corpus tamen
 purgare dicitur cum *Cacahoatl*, Bc-
- TiaIqi4t<jMt**, al S. Penna terrs, Millefolium Mexi-
 canum, Europseo acrius & c amarius.
- tlaltuhcayotli** S. Tzilocayoth humilis, iiliqua-
 ftrum Mexicanum. Sarva fymptomata, qua:
 dicitur inferre hoc medicamencum, fufpicio-
 nem injiciunt hanc herbam inter Apocyni Ipe-
 cies nutnerari debere, quam augenc herba re-
 pcns^flosalbus, iiliqua viridis, qua: omnia in
 filiquaftri5 nunquam fimul invenies. Ter.
- Tlalxotmio** S. Yztomio humilis, Folus est Portu-
 lac^ aliquanto maJDribus, caulibus teretibus
 purpureis, flonbus in fimmo purpurcis j radi-
 cibus craffis, furcubfis, amans vi cathartica
 prsdicis. Folia Urna> CraJInU fimilia saulibiH
- fine pediculo adherent: flos pentapetaloj ruber :
 inde inter Craffitlie feu Sempervivi fpecies rep-
 nendavidetitr. Ter.*
- TlanouiloniHuaxasen** 5. Herba Mexicana Pilo-
 fellae fhjis binis oppolicis^ fpica PJantagineaj
 [Stoechadis Col.) Radix acris Be cathartica
 est.
- Tlanoynilonipatli Yancuitlanenfir**, Linifolia hirtuta,
 floculis luteis fpcatis, radice longaj acrij guc-
 tur urente^amara Be cathartica.
- Tlapatl** i. e. Stramonium.
- TlaquMuhtili&patli** S. Venerea medicina, Foliis
 lofjiis anguftis Salignis majoribus, floribus ful-
 vis, radicibus longis, fapore Glycyrrhizae. Di-
 arrhoeas puerorum curat.
- Tlaltaciz, patli** S. Fluxionum medicina. Folia Ori-
 gani aut Teucree, caules tenues breves; flocu-
 li candidi [lutei icpwj Abfinthii fimiles.
- TlaltauhcapatU**, Alfinefolia, floFculis albisjradice
 furculofa. Radix acris nonnihil fl^flnl.qs ftj
 ophthalmica Be Thoracica mirabilis^ diuretics
 etiam Be tumores maturans.
- Tlatlaub CqPatli** 5. Dxygeranium Mexicanum, cu-
 jus dux ipecies, altera radice candidiore, alte-
 rarubente: icones etiam diverfitatem often-
 dunt in foliis Be floribus: in akera enim bini
 flores pinguntur in uno pediculo^ in altera fin-
 guli: alcerius folia altiis incifa funt, ad mo-
 dum ferePentaphylli Tormentillae facie; alte-
 riuslevius. A noftratibus Gcraniis acido fapu-
 re differunt.
- Tlatlayotic** S. Nummularia Indicaanoftratege-
 nere diverfa videtur; est enim radice craffa,
 Jafte/csnre; fructu Gucurbicino eduli. Radix
 glu tin ofa est Be a dfringsns.
- TvciZttjuih** S. Mayzium torridum Be calidum, Fo-
 II5 Chamardryos ferratis hirtutis, odore gravi ;
 floribu5 oblongis luteis, pluribus congeftis. U-
 terinis affeftibus Be dyenteria: medetur.
- Toma** S. Urtica arborefcens fplis finuofisj ftipi-
 tibus kvibusj candidis litfeifque floribus. In
 icom inferior caul is pars fpinofa pingitur.
- Tomat** S. Planta acinofa yel Solanum. Hujus
 duo genera proponit^ Alterius fructus minoies
 orbictdares (unc^ membranā include ifque vel
 nucibus Pontius majore5, minores Juglandibu^
 qui eviridi pallefcunt; vel pradiftis nucibus
 xqualeSj eodem colore, *Miltomama* dftar: Al-
 terius ma)ores *Xitomama*, qui Poma amoris di-
 cifulita nobis videntur; hi etiam vel majores
 iterumfunt, eademnobisin Appendicc defen-
 ptas; velminores, utrique coloredifFerunt, lu-
 teojjubro, aureo.
- Tonalxochitl** S. Solis nunciusj Foliis est Ocymj
 longioribus minime ferratis [icon profunde
 ierrata repraefentat] caule volubili, floribus
 magnis^ longis^ incus luteis circa labra, qua:
 fifla (iint, purpureis, Cappares olentibus. Hu-
 mida est Be glutinofa nauura.
- Totoyxitl** S. Pes pallennus, Convolvuli fpecies
 videtur, radicePyriiformi ladefcente, foliis in
 Quinque aut fcptem lacinias prbhinde divifis
 Ore Malvae minori [icon integium , Campa-
 niformem exhibet.] Radix grato est fapore, Be
 tamen (quod mirum) leniterpurgat.
- Toz>ancuit laxcotti**, S. Inteftina Tuccae Talpve
 Indies, aradicibus illorum inftar conglobatis
 forma rara: Foliis Origani aperi0libus, flori-
 bus in fummis caulibus coccineis, calicilorum
 forma. Radix reFrigerat Bcadfringit.
- Trtgoriganum Quauhmacenfv**, Figura, Uefcriptio 5C
 Yirc5Tragorigano conveniuntj in icone tanjen
 quatUvir

- quatuor vfil quinque folia ad genicula fingula fulMndeappinguntur, forte piftoris incuria.
- Jurbith* Indicum Convolvuli /pecies est foliis I-bificij flonbus candidis, interdum ex albo rub'ntibusj Malvaceis. Vid. Hiftoris floftrac Ap-pendicein.
- TuZtpalt*, Polypodinm Mexidanum tuberofa ra-dice fibris cyaneis, folio brevi- Impetigines, panes, furunculos, Juem Veneream, aliofque tlimores difcutit.
- TsAguangueni* IFI, S.Hacmorrhoidalis Mexicana. Fofus est bngis anguftis, plerunque quinis, Abfinthii India; floribus cDCcineis; rafiteibus fi-bratis. Amuletum est appenfum brachio ad hxmorrhoidas.
- Tz>ahuangueni, T*>atfwane*, S. FilipendulaMichua-tanica foliis trihdis ferratis, floribus in ambitu coccineis, medio luteis cum alba quadam iride. CalfacirSc efficit.
- Tz,ahutngumi* S. Filipendula Mexicana altera: FJoKfeua^ft circa mddium luteis, in ambitu Surpurafcentibus quoad Afteres pertinere o-nditur. Folia habet Umbellatarum in mo-dum diyia; radices tuberoias Oenantes. Con-vent viribu5 cum pracedente-
- Tzautli*, S. Gluten, Gladiolus Indicus Alphodeli radice, floilbus e luteo purpurafcentibus. Ex radice iccata fit gluten prscftantiflimum ad ufum piftorum. Ea dyfenteriarn, aliofque flu-xus curat.
- Tz,icatz, on Tzcomatl*, S. Caput formica. Folia Lini ftellatim per intervalla caules ambiunt, juxta qua? florum vice qufdam velut verticilia pro-fleunt lutea. Radix dulcis est Be glutinans: Folia frigida Sc glutinnfa.
- Tzocuilpatli*, Pappiflora foliis Dcimi crenatis Sc nonnihii fpinofis. Odorata eft., calefacit 8c efficit.
- TzsQQuilpatli* altera foliis majoribus profiindius ier-ratifubcus candentibus. Flores orbiculares Sc pilofi, caules hirtuti Sc iubalidi. Decotaum ejus mDtum ami/lm refituit, naribus attra-Sum hemicrania: medetur*.
- Tiowpp/icX/ir^Neftearea*. Foliis Ocimi in caule binis. Fbs candid.s parvis oblongifque Ipon-dylisfimilis, in pediculislongiufculis. [Florum unitoium figura fpicam vel julum Typhx re-fert colore ex luteo in rubeum cend^ncc] Fo-lia Mel iplum Be Saccharum dukedine bng e fuperant.
- Tz, onpotoni*, S. Helichryfum Mexicanum, flori-bus pallidifj umbili CD rubro.
- MicuiTlaxcoUi*, S. Pifcium inteftinaa^radicis for-ma difta. Foliis longis anguftis, flofculis parvis candentibus in fummis caulibus tenuibus. Ra-dix medefurulc5ribu5etiam canciofis celerrir-ne, tulã &c pota lftericis medetur, &c unnam cvocat. Fructus apertus pingitur in tres partes divifis, Sc in earum unaquaque duo femina lucea.
- Xararo*, Heliduyfo fimilis, foliis Salignis ferratis i'ibitus albertibus. Flores rubel^ntesquarrosif calyculis conteguntur : radices fibris fimiles ni- &*. RaJ a niara eft, odorata, calida Be ficca.
- Xc' rtm?>* Phaeolus Mexicanus radice orbiculata toliis per medium velut orbiculariter feftis. Ra-diceserculentarlunt &c menlas fecundas inftru-linr: Corpus refrigerant Sc huifleitarn, iitimq, extinguunc.
- XiubTvtonyui*, S. Herba calidaTotopecenfis. Fo-lus eft alperis, lerratis Limonis fed majoribus floribus purpureis; radice furculo/a, Hellebo-ro fimili, lanuginëqueaut efcaobdufta, ~~Caca-nacar~~ tDa fimilis eft ejuoque fpecies. ~~Deuozum~~ Jumbricosinterimit.
- XQchipalli*, Artemiffolia^ floribus Floris Africa-ni led parvis ex luteo rubentibus. Floris tantum ufus eft, ad affectus urerinos K ad ulcera v prae-cipuus verò ad tingeidas lanas luteo co^orSj & ad pingendum, cujus gratia in aqua coquitur adjefto niuro, Befuccusexprimitur. *
- Xoxonacatic*, S. Hyacinthoj^ cagjSb^ flujrs C2P-pe, flofculis longis Jutels ^^jicy?fs" exilibus,, b radice ftatim exeuntibus radice orbiculari A-vallanz magnitudine, capillamentis nigris o-perta. Purgat blande K leniter omneshUmole5.

Y. . .

- Tauhtli*, S. Nubibfa herba, Umbellifera floribus lubis, foliis integris Salighis ferratis, odore 8c fapore Anifi. Thoracica eft, Bcuterinaj diure-tica, lithontripticajomniãque fere prarftat qua; calida Btiicca.
- Tcbcacalotl*, S. Vas Gofflipinum- Foliis eft orbicu-lanbus, undulatis, fenis, fubalbidis prxter alia qua^dam minora Sc albididra; cauliculos te-nues 8c breves, 6c in fumma parte exiles flof-culbs profert, radices verò capillis (imiles qui-busfaxis adhsret. Edulis eft. Hernandez Li' chenis fpeciem effe vult.
- Ychatlepalli*, Foliis eft cordatis, inferne hirtutisK albidis, fiiper^ viridibus; flores profert virentes in Corymbisj fructus fubrotundos; K capillos quofdam juxta foliorum exortus. Odor Cydo-niorum. Cortex radicum hydropi medetur. A ens eft 5c calida.
- Texochül*, S. Flos Tefl, Radice eft craffa, tubsrolij aliis ei £ funiculis demiffis appendentibus radi-cibiis porcinis renibus fimilibus fed majoribus; caulibus quaternis canaliculis ftriatisj rblis Bliti, floribus oblongis luteis, fumum olentibus. Radix dulcis eft Sc edulis, ficcatarpulvisinper-lus ulcera oris curat.
- Yolmini Euliz, patli*, Folia angufta longiulcula ; caules prolrixij florespallidi, radices tenues, a- ~~h3ra, 2, 2, 2~~, calidac, pituitam Sc bilem evacu-ant.
- Yolofalli irina* a figura foliorum difta, dua^pecies iunt, Prior foliis Iridis anguftis, flore Omixo-chitl, S. Lili Mexicani; radice pyftformi. Ra-dix cardiaca eft infign. &c vulnerar. Altera caule, flore 8c fructu carens, foliis Plantagineis anguftionbus, (ingulis binifre ab eadem ra-dice.
- Ttktuimpathifeu* Canis interfeft:Dr.S. Hordeolumj /i. *. Hordeum caufticum, S. Cevadilla Mv-nardis. AnreveraFrumentacea herbatit, turn figura, turn de/eripto, rum vires mihi dubium faciunt. Caulis iriinum digitum craffus. Delcriptionem Beiconem vide apud Hernan-dez p. ^07. Du5 aliac /pecies I-Radicecaepa-cea, eifdem viribus- I*. Radice orbiculari, foliis anguftioribu5, lap or 2 nullo, ibidem habentur.
- Xiyaboal Cbapafrepecenfisj* S. Nepeta Mexicana foliis niioribus &c breviDnbus cordatis^ floribus candidis.
- Xtmexif*, S. Oculi cinerei, Foliis Limonis fer-ratis Iubalbidis, floribus. Chryfanthemii, radice craffa furculofa, aniaa acri Scurenti, Pãnos, lepra5 Sc Jichenas extergit Sc curat, Inluper Tz,atz,ayanalitz, li morbum in qua univerlilm corpus dehifbir, illita relina, inlperlDquic de-fiiper hujus pulvere Be gallinarum pennis.

Txtomiwn Xihuitl^ S. Lanuginosa herba. Folia Anchufi, caulesbucubirales; flares candidi, calyculis contend, in pappos abeunres. Radices emetics font.-

Tz,cuku\$13 5. Oculus depiftus, Caules exiles geniculaci, flpres candidi parvi ad foliorum exortus, qse bina in caule: Radix Pa?onia: fimilis, -Primo gullatu dulcis, mox guttur urens, eva-Cuat pituitam.

Tz,patli, S- Apios Mexicana foliis tenuibus oblongis. Virik^s cum aliis Tithymalis convenit, Raiiix - m>r^vAJ^dft^ Avellanae magnitudinc.

Zjafafalic, S. H^rba glutinosa Be candens, a radidis quahtate di6ta. Foliis est Alliariz, ieviter ferratis, fructu racemoso uvx acerba: forma Be imgnitudine; capreolisfandens. Radix anodyna est, humenti Be gluciposa natura, frigidaque.

Tz,tac ahuatlj S. Faemina Candida, Dens leonis Mexicanus. Galida est Be amara, convulsi6ni 6e corminibus medetur.

Tz,tacchjatl, S. Sal amarum, Abfinthium Mexicanum, Europxo fimils forma Beviribus.

Tz,tac ololt&in Chullulenfis^S. Scammonium Mexicanum^ Radice foliis, floribus cum Scammonia Syriaca convenit; duntaxat foliorum auricula

magis falcate : flares ex albo-rubefaint. j Radix dulcem faporem prarferre videtur, & famen deVorata bilem ac pituitam evocat.

YZitacpatHYaqjrmilanenfis, Lychnis Mexicanaanguittifolia, flore parvoj coccineo. Radix acris est Be glurinofo.

Yzfiacpatli Ygualapcnjis, Papposa Mexicana, Vir-g& aures flonbiis, foliis Ocimi lohgonibus. Radix acris est, amara Be calida.

YXttacpatlis Ototonilci, Linifoha argfritea, floribus candidisj radice purgarrice.

Y&tacpatli Tepuz,caUula, S Liniana argentea Mexicaaa. Floribus est oblongis, ex luteo candidicXtibus, in pappos abeuntibus. Calyx floris Senecioni fimilis. Herba est papposa ad Elichryfum accedens, non Linariam.

Yztacxibuitl, S. Baftum monil^ Volubilis ippecies calida Be glutinosa naturâ, ophthalmica Be diu^retica. Flos inferiors parte depiftus est colors luteo, fuperiore coloreEchii. Ter.

Ycd AcocotlthuUulmjisj S.RofmarinuV^ferulaceus-Umbellifera est foliis Faeniculi craffionibus 6c latoribus, lemne candido, rotundo, angulofb Serefinaceo, quod in mandendo linguam exurit; radice craffa longa Thus olente. Oni*mbu5 notis Rofmanni ferulacei re/pondet.

Mirumfortafe alicui -vidtri poffit tot novas ahifrut indMas herbarum *Species in hoc optrt repenri. V^urn*
dfinet miranfimzLum perprudent, Herbas medicmales ptr No-uai

nemfuan aut odor* fragranttam, > prr^, fm : W fmdtus,
ittmunt.

Species in hoc optrt repenri. V^urn
dfinet miranfimzLum perprudent, Herbas medicmales ptr No-uai

Cum adHiftonam plantarum Franc. Hernandez, illuftrandam me parum lucis adferre pofTe vide-rcixi, nccob brevitatem 6c imperfeationem defcriptionum (pecies plerafque ibidem Cradkas adfuas daiTeş reducere valerem, eas duntaxac inde bxcerpere & Hiftonat noftrs inferere decreveram qu^ ab alns etiam ddenptar effent. Verum ab Amico quodam, cui plurimum tribuo, monitus, nonnullDs Hiftoriam utimperfktarn cminaturos fi toe effpecies deefTent quot ab Hernandez nova: prodits fuit, Epitomen hanc qualemcunque, fuma feftinatione ut edicionem morarer compoficam - adieci Siperckium licuiffetplantafingulas cum Amencanis aPifone, Marcgravio, alhfque traditis dilJen-ter CDnferre, longc ptrrftecn, Mm r.dd.r. potuiffleoi, multafqu,force, q^Ls jam prp novis fc non dum editis habeo, ab alns defenptas inveniffim.

Species fequmtzs ad cahem Catahgi Zanoniani, p. \yi?. fubjkimdcu, fed Typo-
tktarwn incuria omiffa, hincupfkat Lzttw *nefolms.*

12. *Umbra ku Baccam* frutex Orientalis folia habet oblonga, aliquantum inclinata, dentata & xqualiter dufta. Flores producic raceiyatim, ut Be fructus rotundas. Utuntur illa ad conftruendum unguentum pro vulnibus: folia cDfta funt pro uftione, praecipue pulveristormentorum.

15. Palma; Indies-S/r/i diftz icon exhibetur abfque deicriptione.

14. *Tared Arbor* (ykeftris habet lignum alpsrumjfructus producitparvulos figura BCguftu no/lro Hypomelidi fimiles, fed parum trigonales Be dulciores. Flores emittit pulcherrimos, quatuor folii compofitDS, e quorum medio exeunt yirg* oblongz fanguinez.

1 y- *Finxwi* est Arbor qui habet folia magna, quali rotunda, aliquantuliii aculeata, plana, non tamen lenia fed parim afpera. *Flofculos*^ producitparvos: Fruiftusin racemis funt Utra:, ex quorum feminibus extrahitur oleum quod est opimum pro intemperie frigida.

16. *Ramba Arbor* est procerâ folia habens oblonga, nervoia, eoloris viridis: Fructus vero fimiles Coriandro, fed in racemis ficuti Uvx, Be liinc multum faJutiferi infirmis: Folia codta cum fale Be fulphure in aqua omnesplagas fariat breyi tempore: Succus vel pulvis de fructibus est valde admirabilis pro plagis, gangranis Be frifturis offiuni.

iy_m Rambora est Arbor lylveftris, a Luiitanis *PerodtMatto* difta ; hacc habet folia fatis magna, afpra Be dura magis quam noftrx Ficiis, mulcum nervofa, przfertim in parte inferiorc. Fructificac mulcum non in ramis, led in tninco, ubi ex omni parte onuntur, in quibus nafcuntur fructus, ut PDmumparvulum,lanuginDfum, habentcs ftellam irt media cum quatuor corniculis. Condiuntur in Aceto live Aqua falfa pro cibario^

18. *Rategal* Arbor producit folia oblonga Be ovata, colons viridis- Flores pulcherrimos habet, multum racematos; c trunco enim prodeunt multz virgulx, in quarum fimmmitate iint quaedam foliola viridia, bipartita ut in nostra Viola, prima infenus claula, cetera totaliter aperta, e quorum medio falciculus virgularum fanguinei colons exit, Be una foliola parvula cum caul tango, tota crisp2 & pulcherrima, pulcherrimo ordine difpofita Be in eodem racemo flores nascuntur, interdum aliqui flavi, aliqui rubri, alii partim flavo, partim rubro col ore variegati, quos fiintinent receptaculafuperi> usrubrainferius veroviridia. Seminadant ut *Fifeli* (quid fibivelithsc vox non capio) odorel^afturtii noftri. Uruntur fruttu ad folvendum corpus, Befemina cOfta cum aquafalfafunt optima pnjulceribus malignis. Pulvis fimilker idem efficit.

19. *Stiffdanti* Arbor Indica folia habet aculeata, aspera Be crada, valde viridia, flans producens parvulos, ^lbs fie in cacumine radiantes. Fructus est criangularis, rotunduSj njgricag^: *Radix magna*, fed valde purgativa, d cum aqua bibatur urilis est ad hydropicos. Ex f^I^f^inartt Oriental55 medicamentum purans; fed vaide pericul^jni est ob nimiam caliditatem; apdNffidhas 6c est medicament um mortaTe.

23. *Toppi* herba marina Indica *folia* habet magna ut Laurus, lucida in fuperiore parte viridia, fed fubtus parumlutea cum acuminibus minutis, colore nigro. Est planta valde longa Benafcitur in man, duplicis fpeciei, quæ in Foliis font familia, quz nullum habent nervum nisi unum in medioj funtque tattu multum mala, quæ tote franguntur & in diverfas partes dividuntur; fblum diftingunturinfrutibus; quorum unus est utPirus, etiamin odorefimilis cum quinque auriculis foliace-15 retroflevis, quæ adherent fuftibus, in quo inferta est Jonga fistula, quæ dum fructus^naturefcit caditj^ eff^lena lanugine veluto magis delicata. Aliusverò fructus habet parvLim calycem inftrar poculi, qui poftea dilacatur & dividitur infeptem radios, in medio quorum est parvusfructus Rapsc noltrac fimilis. Estur fale condirus vel aqiiâfallâ : valet ad reprimendum fanguinem, ac etiampro contulionibus Se aliis fimilibus affectibus utuntur fupradifta lanugine. Cortex plants: partim est ruber, parcm luteus quo utuntur ad tin gen d urn Colo ran rubrum obfeunffimum.

ai- *Toffimdadvz Cafunda* frutex est circiter quinque cubitorum altitudine. Flores producit flavos, pentaperalos inftrar Violæ: folia vulgari Parietariz familia func. Pofit flores liliquas profert Phafeo- Ji5limile5 in cacumine tamen curvatos, in quibus funt circiter ofto femina dura, oblonga Belenia. Folioruni decoctio partum accelerat, foliaque trica cumSinapi ventris doloribusmedentur.

B" X2. *Zambul* arbor Indica live Cornus mias Theophrasti ex fentenria Jac. Za^pni. Arbor hscfâ- tis magna habet folia, oblonga, plena, dura, neryofa, frpftus producens ad inftrar Corni noftratis, colons inter rubrum vel fanguineum Be nigrum, funtque faporis acidi; ofla VSYD olivarum inftrar. Cortex contLifus Be ex eo deccewaio fatta alvuni fitir. Hzc arbor eadem eile videtui' cum *Noelatali* feuBerberi Indica Aurantiz folio H Af. p. 1606- Hiftoria: noftrz defcript*.

23. *Zambal* utraque Ipecies Solani Indici fpinofifpecies eflbvidstur.

Inter *EmtndznJa* nefcio quo cafii omiffam invenio hanc notam, Planta illaj quam T^S.Vah srroneepro Gramme bulboloaquaticoâ C. Bauhino in Prodrômo defcripcam & depiftam fuiffeobfervavic nafque commonefecit, non erarSparganii ra'dix cum foliis primò erumpentibus Si aqua im- mcilis, ucnos memoria lapfi icripfimus, led Sagictarix aquatica;; quod Lcflorsm 11091 ec opDitt : nê Dbfervatori injuni limus, noftrumqueilli enorem impingamus.

INDEX

A	<i>Adyfruilof</i>	1356	<i>J.B. 152. Braftlianum</i> Marcgr-	14J*
	<i>klma? e. Baobab Alpini</i>	1372,	<i>thcum</i> Thai. 141. Chinenfe	1854.
	<i>Abdehvi Melo *s4LgypUus Alpini</i>	645	<i>it urn aureum</i>	113
	<i>AbeUicea Vona, i. e. Ffeudofantalum</i>	180?	<i>Adonis ejuſque ſpecies</i>	596
	<i>Abelmoluch, Ricini ſpecies</i>	168	<i>AdrachneTheopbraſii.J.^R.</i>	1577.
	<i>Abelmoſc Ton* & Veſſing.</i>	1066	<i>zsEgilops ejuſque ſpecies lifty.'v. Amnā 12 \$4. Niir-</i>	
	<i>Abhel Guiland. Cupreſſi ſpecies</i>	1408	<i>bonenſis</i>	1290
	<i>Abies foſmina \ly^masTheophr. 1. Picea</i>	1396.	<i>isEgilops Afpris Theophr. i. J^uercus ſpec.</i>	1187
	<i>Mexkana Htrnand. 1397,1916. Marina</i>	76	<i>zsEſchynomenes varia Jpecies 979^980,9^1,1894</i>	
	<i>Abrotanoides faxea Cluf</i>	64	<i>^dLtbiopts ejuſque Jpecies 54^</i>	54?
	<i>Abrotanum ejuſque ſpecies 371*372, &c.</i>	1866.	<i>^ffC Cretenſium^ i. Carduus latfeus Syriaztis Qam.^ 12r</i>	
	<i>fiemina ejuſque ſpecies 3^8,359, 18</i>	6 f	<i>AgaUochum S.Lignum Aloes</i>	180S
	<i>^rar* ^/>>*«*</i>	889	<i>Agaricus</i>	107
	<i>Abfinthium ejuſque ſpecies 366, t^ff. ad 376.,</i>	1866	<i>Agaricus Crttcnſium Bell.</i>	314
	<i>«————Santonicum</i>	368	<i>^E*ty Qalega affinis H. M.</i>	1734
	<i>»————iSeriphium</i>	370	<i>Agem-Lilac Perfarum Gorn.v. Syrninga</i>	1703
	<i>————Alpinum UmbeUifetum</i>	347	<i>Ageratum ejuſque ſpecies iſi^ferulaceum Dal. 186.</i>	
	<i>^E y «f ^/>> / <. Tl. i''?»»»^</i>	922	<i>purpureum Dal.</i>	105f
	<i>Abutilon ejuſque ſpecies 6.99. Indicum</i>	18 80	<i>Agiahahid Ah.mi. v_m Lyciuni</i>	1629
	<i>Acacabis Cam. i. Kifmifen. S.Kefm.</i>	1718	<i>Agnacat Scatigeri</i>	179
	<i>Acacia ejuſque ſpecies</i>	976, 977	<i>Agave ca / * / . ^ f x</i>	1696
	<i>————Malabarica Intfia dicla H. Mi</i>	1739	<i>Agrifolium 5. Aquifolium</i>	1617
	<i>————Americana Robin i eſ' Park.</i>	1719	<i>^griocinara Gretcnſium J. B-</i>	30i
	<i>————Germanica l. Trunus Syl<u_m</i>	1527	<i>Agriofari Belli, l. Triticum Sylv. Qretkuni</i>	1243
	<i>————foliis frutex MeſopotamicHs</i>	1719	<i>Agrimonia ejuſque ſpecies</i>	400
	<i>Acacia trifolia Q B. i>. Cytifus</i>	17B3	<i>Agrimonoides Col.</i>	ib>
	<i>./&*0 Pif on. ^</i>	5 S	<i>Aguape Brajl. i. Nymphaa</i>	
	<i>Acajaiba arbor cujm fruB&s</i>		<i>Aguara-quiya Marcgr. i. S. 5p.</i>	67X
	<i>Acajou Pif on. u Anacardii ſpec.</i>	1649	<i>————ponda Marcgr.</i>	1237
	<i>Ac ant h mm ejuſque ſpecies</i>	31^	<i>Aguarima PiE</i>	134?
	<i>————illyrkum J. B.</i>	ibid.	<i>Aguti-guepo-obi Marcgr.</i>	1231
	<i>Acanthus ejuſque ſpecies</i>	191*	<i>Aguti-Treva</i>	1794
	<i>————Qermanſem^ i. e. SpbondyHujn</i>	408	<i>^w* e ^ Panucbo Hernani</i>	1653
	<i>Acanus Theophraſti</i>	31^	<i><AboTjai Theveti ></i>	166
	<i>Acaricvba Pifon.</i>	13^3	<i>Ajuba-tipita</i>	1791
	<i>Acarna ejuſque ſpecies 31 4J 3</i>	f	<i>Ajuga, i. Qhamapitys</i>	571
	<i>Acarna fimilis flore purpureo J. B.</i>	189	<i>Aixjoon *v. Sedum 687. paluſtre 2 i. Stratiotes</i>	13 24
	<i>^fcer ejuſque ſpecies</i>	1700	<i>Airi^i.Hayri</i>	1?
	<i>Acetofaejuſque ſpecies 177, ^c. */ 1 81,1856. w-</i>		<i>Alabaſtrites Lob. u Dent aria</i>	1229
	<i>ficaria Americana 179. rotundifoL hortens</i>	180	<i>Alaternus ejuſque ſpecies</i>	16a8
	<i>'Acetofella, i. Trifolium acetofum</i>	1098	<i>Albdra Canna Indica ſpecies PiE</i>	
	<i>Achanaca Thev. l. Braſſic*-folia peregrina C. B.</i>		<i>Alcanna j v.Yhittyrea</i>	1585
	<i>Acbdlea, i. Millefolium</i>	345, 346	<i>Album olus Dod.z. LaBuca agnina</i>	392,
	<i>Acbvite</i>	16ji	<i>rf/*jufjut fades 604, 60 J, 1873. Indica</i>	
	<i>Achlades, Bellon. l. P^'^^ »5//^- Cretica> a noſtris di-</i>		<i>uob</i>	
	<i>uerfa</i>		<i>tnofcb *</i>	1066
	<i>'Acboavan Alpin. 1. Matricaria inodora</i>	357	<i>Alcbimelech Alpini_ u MelilotHs</i>	zsEgyptia 955
	<i>Acins ejuſque ſpecies</i>	553	<i>AlcbimiUa</i>	208, 209
	<i>Aconitum ejuſque ſpecies</i>	7°1j 7^1	<i>Alcpiium ejuſque ſpecies</i>	81, 8x
	<i>————Hymale Park.</i>	700	<i>Aletlorolopbos i. Crifia galli</i>	769, 770,77r
	<i>————racemofum i. Cbrijtopbor.</i>	661	<i>Alf * marina ji^Zjd^c. 1849. t'mttoria 73-</i>	bomby-
	<i>————Salutiſerum S, Ant bora</i>	70f	<i>cina 71. fontals tricbodes</i>	1 [g.
	<i>————humile bifolium^ &c. Mentzl</i>	671	<i>Albagi J.B. v. Genifia</i>	1730
	<i>————? J 19^w Afaticrts radict tenuiore adul-</i>		<i>^/7^ Cord. ;. O^ ^ j E/oftf ! 2 3 x</i>	
	<i>tmnus C. B. l. Irar pr^f^ lutea</i>	1186	<i>————Match, e^ aliorum, uDoronkumTlantaginis</i>	
	<i>^?^<» Tlinii C. B. i. Chriſtophoriana</i>	661	<i>folio C. B. ^/i/5>^ Thai. iMtBc fain*</i>	
	<i>Acua pods gems in China ex Oriz,a</i>		<i>Alifma Col. l. Auricula Urſi</i>	Xo8x
	<i>Acultoſa Gaz,a Ad. Cardui genus</i>	%oy	<i>Alkekengi vulg.</i>	o 81.
	<i>Aw moſebata Oxil Col. l. Geranium moſchatnm.</i>		<i>Alleluia_ i. Trifolium acetofum</i>	1098
	<i>Adiantum ejuſque ſpecies 147, 148. nigrum Of-</i>		<i>Allicia</i>	792,
	<i>ficin.' 147. Amtrkarmm 148. */iw> />/w</i>		<i>All turn faiivum H2f: Syto. foliis fiftulojis</i>	1117
			<i>Sylv. planifolium \^*)*montannm latifol u Vi^*</i>	
			[a] Ron aii:	

INDEX.

<p><i>Borialis</i> 1121. <i>Vrfmum</i></p> <p><i>Almts ejufqite fpeuies</i> 1409. <i>nigra baccifera</i>, u <i>Frangula</i> 1604.</p> <p><i>A let ejufqz Jpecies</i> 1197, 1196; &c* 19° &- <i>faluftris</i></p> <p><i>Alpam</i> H. M. ^76J</p> <p><i>Myofotis</i> ! 029. <i>Spergula ditia</i> 1034, 1896. <i>Corniculata</i> GluT 1029. <i>Hzdtrula folio i. e. Veronica</i> [pecks 848-1011* <i>Veronica</i> ib. /o/i» 7</p> <p><i>Htf/frfphyllos wruUa%</i>. [<i>candzm baccijmtfo</i>]</p> <p><i>Solanum</i> 682- <i>Alpina glabra</i> C. B. <i>U. Lychnis</i> 1033. <i>nc-dyfa</i> Dal. 8DJ. <i>cruciala marina</i> Ger. 1024</p> <p><i>Theophr. flo. luteo</i>, u e. <i>Abutilon</i> 699.</p> <p>Indica Hzrman. 190: ^1901</p> <p><i>Laferpitium</i> <i>Vetrum</i> 425</p> <p><i>Galicum</i> <i>Scribm. im</i> <i>Symphytum</i> 504</p> <p><i>Alufivz Alou</i> H. M. i. F/C^J /W/c^z 14H</p> <p><i>Alyjjon Diofcoridis</i> i. <i>LunaAa Graca</i> 788</p> <p>— <i>Galem v. Marrubium</i> 557</p> <p><i>Alypum Monjfdienfe mvntis Ceti</i> 1445</p> <p><i>Amaracm ejufque fpuies</i> ^i. <i>Major ana</i> 511</p> <p><i>Amara duhis</i> *v. <i>Solanum lignojum</i> 672</p> <p><i>Amarantus ejufyue fpecies</i> 101, 1856. <i>Sericez/s</i> IDI. <i>tricolor</i> 205. <i>Siculns</i> [pwatuspirmnis <i>Boccon.</i> 20 j</p> <p><i>Amatz. cjuil</i> 1789</p> <p><i>Pifon.</i> 155°</p> <p>137?</p> <p>ibid.</p> <p>Ambalam 155!</p> <p><i>Ambapaia</i> H. M. 37°</p> <p><i>Ambart Alan</i> ^g: <i>affinis</i> 1760</p> <p><i>AmbarvaUfivz</i>, u <i>Uffigala</i> 1535</p> <p><i>Ambela</i>, i. <i>Zbaramzi Acoft.</i> 1760</p> <p><i>Ambrefia ejufcjui fpecies</i> 164, 1855. 84;</p> <p><i>ihlafpi fw</i> <i>Nafturt. verrucufum</i></p> <p><i>Ambugavrnb</i> 174</p> <p><i>AmbuUn</i> <i>Seal.</i> 1793</p> <p><i>Amelancbhr</i> <i>Lob.</i> 1461</p> <p><i>Amepodi</i> H. M. 1787- <i>BeltUa-Amelpodiib.</i> 1611</p> <p><i>Amelpodiibo.</i> <i>Karetti</i> <i>Amelpodi</i> 1611</p> <p><i>Anil S. Indigo.</i> 1611</p> <p><i>Virgilii eft Ualtba palu/tris</i>, aliis <i>Caryophyll.</i></p> <p><i>aut Aferis montani fpecies.</i></p> <p><i>GoJlipium</i> - 451</p> <p><i>Jpecies</i> 144</p> <p><i>qitorvndam oJore Caryophyll.</i> 1597. <i>Germanictm</i>, i. <i>Sifon Cordi</i> 44;</p> <p>— <i>Flinri vulg.</i>, i. <i>Solarium</i>, &c. 673</p> <p>— <i>Virgin. Lormjam. faciz</i> 799</p> <p><i>Amonjz</i> /ZvA 16^7</p> <p><i>Amozaba gramm</i> 1318</p> <p><i>Ampna</i> H. M. 1^66</p> <p><i>Ampeloprajinn</i> lilG</p> <p><i>Amvetu</i> H. M. 171X</p> <p><i>Amygdala* ejufaua fpezieis</i> 1519J I^1B. <i>Granatenfis</i> 1791</p> <p><i>Amugclalo perficum</i> 1516</p> <p><i>Amylum</i> 124D</p> <p><i>AnabafuXsvm</i> i. <i>Polygonum baccif fcandens</i> I 6; 8</p> <p><i>Anacampfcroz</i>, % <i>TUphium</i> 689</p> <p><i>Anacardium Occidental*</i> <i>Cajons ditum</i> I 649</p> <p><i>Anacardium fimpUciter ditum</i> I B 13</p> <p><i>Anacock</i> <i>Pbafcolt (pecies</i> Ha0</p> <p><i>Anagallis terreft. ejufque fpecies</i> 1024</p> <p><i>Anogalb</i> a^uat, <i>rotwdifolitu non</i> ^</p> <p><i>cremAa</i> 110i</p>	<p><i>Anagyris zjufijue fpeuies</i> 1722</p> <p><i>Ananas LinfcL & Acoft a</i> 1311</p> <p><i>Anavinga</i> H. M. 1604</p> <p><i>Anblatum Cordi</i> /I've <i>Aphyllon</i> J. B. 1719</p> <p><i>Anchoas</i> S. <i>Zingiber majculum</i> <i>Hern.</i> I? 14</p> <p><i>Anchufn zjufcfuf: fpecies</i> 49S, 497J 1-</p> <p><i>^Wz Pifbn. d^ Marcgr-</i> 1^77</p> <p><i>^Wz Pifbn.</i> 1^87</p> <p><i>Andrachne</i> <i>Theophr. i. Adrachge</i> 1 J77</p> <p><i>Androface</i> <i>Matth. l. F//^ lapit&gfpecies</i> 66. <i>W</i> 1056</p> <p>Marrh.</p> <p><i>Androfamum ejufque fpezieis v. Hypericon</i> ID 17, 1 D 2 1114</p> <p><i>Anemone ejufate fpecies</i> 626, 635, 187;</p> <p><i>Anemone nemorum</i> 624. <i>Bononienfium</i> 700</p> <p><i>Anzthum hortenf</i> 41 (S. ^ / v. / 419</p> <p><i>Angdicaejufque fpecies</i> 4.34. <i>Acadienfis</i> 1852</p> <p><i>Angelica arborefcens fpinaja</i> 179^</p> <p><i>Angdicabaccifera</i> <i>Uanadenjis</i> 66 L</p> <p><i>Angzlina arbor</i> 1, 84</p> <p><i>Angzlyn</i>, i. <i>Andira Fifon.</i> 1687</p> <p>Angolam 1497</p> <p><i>Anguria</i> ^i. <i>Citrullus</i> 643</p> <p><i>Anbuiba arbor</i>, u <i>Sajfafras*</i></p> <p><i>Anil five Anir</i> 926. <i>Anil alia fpec.</i> 178?</p> <p><i>Anime gummi</i> 1846</p> <p><i>Aninga Pifon.</i> 1654. <i>Aninga-iba</i> 1613</p> <p><i>Aninga-peri</i> <i>Pi/pn. Flanta eft fruticefcens</i>, <i>Jim in denfis fylvis najcitur, fore exiguo abt-cante o cut pauv* uvuU i ceruleo nigncantes, Sambuci baccis fimiles fuccedunt. Foliis decoratur lanugmofis, ovalis figura, tnfte viridibm widem, fed afpectu pulcherrimis, ad tafum iq-fiarUrticxmortu*, mollibitS &<velut lanuginofis% i>xqui: nrviz mult is & craftlis dtfinguuntur. Folia recentia contfa yd w pulverzm rzdatt* medentur pnma inUntione uUzribus recentibu* , dr inveterate. . .</i></p> <p><i>Anifum ejufque fpecies</i> 449J 166B</p> <p>— <i>Indicum</i> S. <i>Zmgi</i> 1835</p> <p>165L</p> <p><i>Anona mar am</i> H. M. 1650</p> <p><i>Anomis ejufque fpecies</i> 357, 95^959, 9*0 189J</p> <p><i>Anonymos Rxbzfii foliis icon</i>, <i>Roberti</i> 1700</p> <p>— <i>flwre Zolutea: Clul-</i> 1733</p> <p>— <i>Garcia; i. Herba viva Acoft*e</i> 982</p> <p>— <i>Brafilianus frutzx flore Keiri</i> 1785</p> <p>— <i>Brafilian. flore monopetalo fpeciofo</i> 188?</p> <p><i>Anferina</i> <i>Trag. i. Argentina.</i></p> <p><i>Ansjeli</i> H. M. i. <i>Angelina</i> 1384</p> <p><i>Anthedon</i> <i>Theophr. uMefpilns Aronia</i> 14J<</p> <p><i>Aithemis; i. Ehamanzlum</i> 355</p> <p><i>Ant bora</i> S. <i>Antithora</i> 7^5</p> <p><i>Anthrifeus; i. VeilenVeneris</i> 42K</p> <p><i>Anthyllis</i> <i>Alpin. ex 215, nivet, i. Tyg</i> J K 2.</p> <p><i>Yalomanac</i> C. B. J. <i>munitt Affines foliis</i> C B-</p> <p>1026. <i>lentilia Feplios effji mar.</i> 1024 <i>legumi-</i></p> <p><i>nofa</i> » 1</p> <p><i>Antipatfres</i>, i. <i>UoraUium nigrtrm</i></p> <p><i>Antirrhinum ejuf^ue fpecies</i> 7 60, 7 61. <i>arvenfe mi-nMV. Linaria</i> ^j605 <i>minuiflb. Linaki*</i> <i>fatw</i> 10 d-</p> <p>Ger. App-</p> <p><i>Antipatfres v. Caryophyllus aromatz;</i> 1508</p> <p><i>A par aqua</i> <i>Hern.</i> 661</p> <p><i>Aparim ejufque fpeveis</i> 484</p> <p><i>Apeiba</i> <i>Marcgr.</i> 164;</p> <p><i>Apbaca</i> 89?</p> <p><i>ApbyUant</i> %s <i>Anguillara</i> 351</p> <p><i>Apbyllantes</i> <i>Monjpd.</i> v. <i>CaryophyUtts</i> ^</p> <p><i>Apiaftrwn</i> u <i>Antirrh</i> 554</p>
--	---

I N D E X .

	pag.	
Apios J.B. Tithymali spec. 870, 871. Americana Cornut. i. Afragali spec.	937	Arundo ejufque species 1275, &c r? I.J. Donax lb. najiosfeu fartla 1276. Indica izT.J. Saccharifera 1278. Scriptoria 111&J*9°9
Apium hortenfe, vulgo Petrofelinum 4 ÷ 8. palufire feu Pakdapium 457, 1868. Mactdmicum 46?. fertgrin. foliis tubrotundis C.B. 462. petraum five rnotavum album 463. montanum Tsigrum J.B. 413. montan. folio tenuiore C. B. 461. Ciqttdi folio 414. palufire latleo fucco S. ThyjJelint^Ag^mkum S. maritimum /±vj	1402	Aruno Indica latfdia v. Canna Indie* 170z
Apocynum ejufque species 1087, 1088, &c. humile aiz>oides Africahum, i. Fritillana craffa 190;	1402	Afaxtida 184;
Aquifolinm, i. Agrifolium 1622	1622	Afarina Matthl. 2u8
Aquilegia ejufque species 7°5170^J707	821	Afarum 107/1857
Arabis, i. Draba 821	821	Afcalonitis U17
Aracynappil, Malum aureum 1660	1660	JStfckpias ejufque species 1090, 190?
Araca-miri 1456	1456	Arum ejufque (pecies *v. Hyptykm* 1019
Araca-guacu Pifon. 918	918	Arctostaphylos ejufque species 17*9°*7?o
Arachis five Arachus vulgo v.Ficiaqoi.fabaceus S. Faba Kayrina], B. 90 ^ 904. 'Csaiyu@- 919	919	Arctostaphylos m arbor H. M. 1756
Aralda Gefh. l. Digitalis 767, 768	767, 768	Afparagm ejufque species 683, 1877
Arantia vulgo, <v. Malm Arantia 1651, 1653	1651, 1653	Afperula ejufque species 43
—marina 1826	1826	Afyhodehts ejufque Species 1191
Arara fruBus 1646	1646	Afplenium 139
Aratku varia species 16^1, 1652. pana 1794	1794	Aftru Theo>hr. <v>Egilops Qiterchs spec, 1587
Arbor Braziliana Juglandi fimilis 1779	1779	Affitra i. Mandaru 17 51
—febnfuga Peruviana 1779	1779	Afier ejufque species 265, 266, &c. item 1858. Cqnyx,oides Gefii. 2,64
—finium regundorum Seal: i. Urucu 1798	1798	Aftragalus taticm Cluil 920. matinus Lufitankm Boel. 935. Sylvaticns Thai 914- Ajffricam/s hu odoratm 956. incan&s filiquid incurva 938. Afo>ffeffulanuf). B- ;E. Romanes J.B. *. Hedyfarum clyp. 929. CanadenJ.fio. viridi fiavefcenU 1852
—Fraxini folio, cortice fpnoJoVirg. 1546	1546	A fir ant ia nigra 47 4J 475
• Fraxini folio C. B* h Az,edarach 1798	1798	Ata-maram H. M. 16 5P
~Exotica Fraxini fok Negundo credit a "Judo: <vulgo 1717	1717	Athanasia u Tanacetum 36J
—Janigera Bontii, v. Goffipium, 1795	1795	Athara 174
—Lavendula folio. Chuf. 1595	1595	Athara Pabae 1369
*racemofa3raJll.fol. Apocyni Br.1 1800	1800	At^ i. Mayz>ii farina 1391
• conifera odorata fit. Saltcis, &c. 1800	1800	Atragene Thcophr. ^, Viorna vulgi 620
—; pntaphyllos Viriniana, &c 1800	1800	Atrattylis 304
•Spinofa, Hercults clava diffa tinBoria l'j^tinBoria Virgin. 1751	1751	*A>p/<c e/w/^ / ^wi« 191,1913 cH morifru&H 197. maritima Halimus diuia 194,1857
—S,Thomas, i. Mandaru H.M. 1799	1799	Atzoyatl Hern. v. MTVIÉ. Peruvian* 399
—trifoliaveneftata Virginiana 1437	1437	A'vacari facie Myrti 1781
trifilis 1698. de Rayx* u I*tens Indica 1798	1798	Avanacu H. M. i. Ricinus 166^, 1855
•Tulpifera triplex 1407, 1916	1407, 1916	ibid. Avaram9 temo 1763
—*vit* 265	265	AvzUana ejufque species <v. Corylns 1379. 1751
—Tjvifera Tabacensis 1799	1799	fm: 1381
Arbufcula coralhides dtpingitur Pifoni 4i^	4i^	Avena ejufque species 1%SS. pilofa J.B. v.Fejtuca 1289
Arbutus 1°578. folio non ferrato u Adracbne 1210	1210	Avenqua Lufitanis Marcgr. l'. Adiantum Brazil. 14^
Anhfinglica 165	165	Avevll Hern. i- ^ / C J Mexicana 397
Ardabar 1097	1097	Avicularia Sylvii i. Speculum Veneris 74X
ArBium u Lappa major ; ; 2. item minor 1133	1133	Aurantia Mains <v. Mains 1658
ArBurus Belli 1033	1033	^ar£#w^ / l. Cidonia 1452
Areca i.Faufel 1033	1033	Auricula leoris k Bupkurum 47.Jj,474
Arenaria J. B. 85 f	85 f	Auricula Jtdtf i* Fungus Sambucins 106
Argemone ejufque species <v. Papaver 617	617	Auricula marina 77
Argentina 1111, 1907	1111, 1907	Auricula muris ejufque fpecies y.Pilofella 242. 311. 242
Arifarum ejufque species 761, 762, 1884. polyrbiztos 763 J 1884	761, 762, 1884. 763 J 1884	ri Alpma glabra j, B.1003. ww^ C 92X
Aristolochia ejufque species 761, 762, 1884. polyrbiztos 763 J 1884	761, 762, 1884. 763 J 1884	Auricula urfi ejufque species 1082a 1083, 1901-
Armeniaca Malm I J13, &c. 991.	I J13, &c. 991.	Auz,uba Oviedi 1643
Armma ejufque species, *v_m Caryophyllvs 990^ 991. fratenfis u Lychnis 1000	990^ 991. 1000	Axochiolt Hern. 261
Jrmoracia u Rapbanm rufiicanus % 18	% 18	Axsarolut u Mefpilus Aronia 1458
Arnabo nomullisus Zedoaria 1582	1582	Akedarach arbor 1 j46
Aroeira i. moUe arbor 372, 373, 1866. tenuifolia five leptofhyllus i. Abrotanum campefirc 371	372, 373, 1866. 371	B
Anhanita i. Cyclamen 1005	1005	Badukka u Capparis arborefcens 1610
Arthritka i_m Primula veris & Paralyfis 1080	1080	Baccharis Monfpelienfium 1373
Arim ejufaut species 1108, 1209, &d 1907	1108, 1209, &d 1907	Bala H. M. l. Afo/i ^rW 1771
		BahelScbulli H.M. 1364
		Balam-pulli u Tamarinds 1743
		Balanus myrepfica Ger. 1738
		Balaufium 146;
		Balaufia i. Marrubium nigrum 27t
		talfamuni

I N D E X.

	Pag.		Pag.
<i>Balfamina mas five Cucumerina</i>	647,1874	<i>Betuluj i. Carpinus & Ofirjs</i>	
•————— <i>fijsmia PerficifoL</i>		<i>Bibineld Cxi. i. Coronopm</i>	879
<i>Balfamita mas 35j. femina</i>	364	<i>Bifoltum ejufque species</i>	
<i>Balfamum vjufyue species 17\$J-</i>	Peruvianum	<i>Bilimbi H. M.</i>	144?
1757. Tolutanum	1758	<i>Bintambaru</i>	188 I
<i>Baly infula fruElus</i>	1613	<i>Biferwas Cam.</i>	J44
<i>Bambu Arundo arborea</i>	1311	<i>Bijl'ngud i. Hippoirtioifum</i>	66?
<i>Bamia v. Alcea Indica</i>	1066, 1900	<i>Bifmalva i. Alt ha a</i>	601
<i>Bananiera Pifon. u Fictn Ind.</i>	"377	<i>Biftorta ejufyue species</i>	186, 187
<i>Bandura Cingalenfium</i>	21	<i>Bid H. M.</i>	1733
<i>Bangui</i>	159, 2054	<i>Bixa Oviedi i. Urucu</i>	
<i>Baobab Alpini</i>	1271	<i>Blafo H. M.</i>	1721
<i>Baptifecula i. Cyanus fgttum</i>	321	<i>Blattaria ejtifque species 1096, lofyf, c.</i>	1903
<i>Barba capra i. Ulmaria</i>	623, 709	<i>Blam H.M.i." Toluwe fflis,</i>	
<i>Barbareg Erucx species 809. muralis J. B.</i>	799	<i>Blitum hortenfe 200. Americanuw</i>	1479
<i>Bardana S. Lappa major 331. minor</i>	16j	<i>Blitum dicJum ib. Blit. Botrys diHum 196. El.</i>	
<i>Baruce fruilus</i>	1810	<i>Atripx fylvefiris ditum 197. Amzricanum</i>	
<i>Bafaal arbdr</i>	1510	<i>fpmofum 199. BLKaliditfum</i>	ibid.
<i>Bafihcum vitlgy tjufyue species i. Dcimunt</i>	940	<i>Blitum hortenfe 200. Americanuw</i>	1731
<i>Battata Hifpanica 71B. Tajaoba</i>	1134	<i>Boa Tpnkring Bontii i. Coral arb.</i>	909, 9*
<i>Baxana</i>	"794	<i>Bona major DDCL i. Fab a</i>	707
<i>Batu & Batimla i. Crithmum</i>		<i>Bolbonach S. Viola Umaris.</i>	1064, 1204
<i>Batrabion i. Ranunculus e 81</i>	58, 1, &c.	<i>Boletus Antifuorum</i>	1631
	1844	<i>Bombax u Goffipium</i>	
<i>Btcabunga i. AnagaUis aquatica</i>	81, 853	<i>Bon <vel Ban Alpini Coffee frutex</i>	
<i>Bccbion i. Tujifigo</i>	249	<i>Bon feu Calaf Alpmu</i>	
<i>Bedeguar Otfig. i. Spngia Rofa camp*</i>	1471	<i>Bonduck Indorum 1743. Silitaua non fpinosd</i>	1800
<i>Beefha Arundo</i>	1316	<i>Bonus Hmricus</i>	195
<i>Beenel</i>	1557	<i>BoragQ ejufyue species 49*. femper' sirens</i>	444
<i>BtguiU Turchafil</i>	18; 1	<i>minima Herbariorum</i>	196-
<i>Beidelfar Alpini v. Apocynum</i>	1088	<i>Botrys Ambrofioides</i>	1315
<i>Bella Donna i. Solanum UibaU</i>		<i>Branca urfina i. Acanthus</i>	408
<i>Bella Donna i. Solanum UibaU</i>		<i>Germanica i. Sphondylium</i>	1718
<i>B*Ua Modagam H. M.</i>	1481	<i>Braffica ejufque species 7943 79jj &c capitata</i>	
<i>B*Ua v. i. Scarparia</i>		794. florida 79J. caulo-rapa ib. arborea,&c.	
<i>Billis major ejufque species 351,1865. ramofa</i>	1665	796. Epiphyllitis thyrfoides 797. fpinofa ibid.	
<i>umbillifzra Cornut. 270. Tanacti folio i. Ta-</i>	1493	marina monofpermos %i\$.perfoliatajili<juofa 797	
<i>vacetum inodorum</i>	352	<i>Brafma im Fiper abortivum</i>	134Z
<i>Billis minor ejufyue species J49J iBSj, 1866</i>		<i>Britannic a Antiquorum *vera Muntingii i- Hydrotat-</i>	172
<i>Bellis lutea, &c. C. B- xr. Chryfantbemum</i>	1066	<i>Brindones Garc. Erntjus tip...</i>	1831
<i>Belmufctfs vEgypt. Belli</i>	1880	<i>Briz,a</i>	1242
<i>Beherc H. M. u Abutilon Indicium</i>	1845	<i>Bromos im Avena 1715. Avenacc-</i>	1289
<i>Bzloinum</i>	1660	<i>BruneUa ejuffine. fptcies</i>	551, 552
<i>Belutta Tijampacam i.CaJtanea Rofea Indica</i>	1856	<i>Brufathaer Arbor Ch'mmfis</i>	
<i>Bengieiri H.KI-</i>	1878	<i>Brufcus S. Rufei</i>	664
<i>Ana-Bepou H. M. i. Nimbou If43- Kari-bepou</i>	1738	<i>Bruξανelli</i>	1497
	1787	<i>Bryon i. Mufaa</i>	113
<i>Ben-Kalefiam</i>	163J	<i>Bryonia alba 659. <?gna D. . .> xvchoacana</i>	187J
<i>Ben Nux</i>	1851	<i>Bugloffum ejufque species 493. ^</^e ex j^/v/tf</i>	
<i>Ben Moenja</i>	1535	<i>Lancafina JOD.fylveft.cauUculisprccwmbentibus</i>	
<i>Ben Tbek a H- M</i>	1605	<i>C.B. 502. hit turn Ger. ^. Hieraeium echioi-</i>	
<i>Btninganio Park.</i>	1815	<i>des,&c.</i>	23?
<i>Ber & Bor Acyfia</i>	1605	<i>Bugula S. Confolida media</i>	575
<i>Berben's ejufyue species</i>	1815	<i>Bulapathum Plinii Munting.</i>	17?
<i>Berben's fruilus</i>	1815	<i>Bulbocafianum</i>	440
<i>Berben's Takh. i. AnagaUis aquat. o j u*,P. 0Rf,</i>	1815	<i>Bulbocodium ejufijuz species u Pfeudonareiffus</i>	11 jo
	1815	<i>Bulbonach u Viola Lunaris</i>	787
<i>Betonica ejufre fptc<.</i>	1815	<i>*ulbus eriophorus 11 58. liliaceus vomitorius C.B.</i>	
	1815	<i>Sp. 1111. monophyllum J.B. 1154. j5^ - Fuch.</i>	
<i>Betonica aquatica u Scryphularia</i>	1815	<i>l. Ornubogalum lut.</i>	111?
	1815	<i>Bami jr^or l. Co^p 1691. Bunnu eacfcem*</i>	30x
	1815	<i>Bunias i. Napus</i>	30x
	1815	<i>Buphtbalmum vulgare Ger. 341. CotuU folio ib.</i>	
	1815	<i>Dodonai l. ^rfo>lj w^/or 597- peregrinum Al-</i>	
	1815	<i>pini ibid. Alpinum flv. candido</i>	1865
	1815	<i>Bupleuron ejufyue fptciu</i>	47? p 474
	1815	<i>£w/i wwnj^* Cscf</i>	83

I N D E X .

	Pag.		Pag.
<i>Bur fa pastoris ejufyue fpecizs</i> 8 } 8, <i>pajtoris minor</i> l.		<i>bine inde₃ certis intervailis fex, quino₃ue, tria₂</i>	
<i>Najlurium fetraum</i> 82.7. <i>major loculo oblong</i>		<i>duo, *vel etiam unum folium[^] Rosmarini a-</i>	
<i>C. B. 790. minor locuh oblongo i. Faronychia</i>		<i>mulum, inodorum adfiftit : Eadem i/detur</i>	
<i>vulg.</i>	789	Cf. Mart.	
<i>Eufelinum Flin. i. Fetrofelinum Creticum</i> Q B.		<i>Zamara Marcgr. Lychnidis fpecies</i>	99?
<i>Butomos i. Sparganium, at Clufio Acorns adulteri-</i>		<i>Camara-vuba Marcgr.</i>	247
<i>nus feu Iris paluflris lute a</i>	1186	<i>Camara-mira</i>	1547
<i>Buxtis ejufqiwijiteas</i>	1695, 1694	<i>Camara-tinga</i> 16f\$. <i>Fericlymeni fpecies.</i>	
<i>Buyo Euyo InjTbbAJfeffx. Hsm.</i>	1343	<i>Camarinhaja, Marcgr Lyfimachia fpecies</i>	462
		<i>Camarinhas Pifbn.</i>	1518
C		<i>Cajfyru Marcgr. i. Solanum balicac.</i>	681
<i>Caa-apia Marcgr.</i>	33°	<i>Carhbui i. Myrtt* Americana fylir.</i>	1504
<i>Caa-opia Marcgr.</i>	1631	<i>Camelina Dod. II. Myagrurb</i>	811
<i>Caa-ataya Marcgr.</i>	1	<i>Camiri fruttus</i>	1973
<i>Caacia Marcgr. *. Cajacia Pifon. Herb a colu-</i>		<i>Camotes i. Bat tat a v. Convolvulus</i>	/*722
<i>brina Lufitanis</i>	1345	<i>Catfos Thzophrafti, FI ant a spinofa Sicnla, nonnuU</i>	
<i>Caachira 2. Pifon.</i>	1753	<i>ITS cinara.</i>	
<i>Caetimay</i>	1861	<i>Campanula ejufque fpecies Jil,&c. Ad Iaf. item</i>	
<i>Caao Marcgr, u Flanta mimofa*</i>	97?	<i>1883. birfuta five Trachelmm 731, 73[^]-</i>	
<i>Caaghiyuyo</i>	103	<i>glabra Rapuncuhts ditta 757, &c Perficifoli*</i>	
<i>Caagua-cuba</i>	1634	<i>718 Cyprianadillil ib. C. Cynoblatia feflilis</i>	741
<i>Caapeba</i>	1	<i>Camphorifera arbor</i>	1
<i>Caaponga Marcgr. 1039. 7. Pifon. 1331. II. Pi-</i>		<i>Camphora</i>	ibid.
<i>ion.</i>	1337	<i>Carmpborata</i>	11D
<i>Caapomonga</i>	1334	<i>Canacorus Lob; i. Atundo In die a florida</i>	1232
<i>Caapo-tiragua Marcgr.</i>	1889	<i>Cancamum</i>	1848
<i>Caaroba Pifoil</i>	1761	<i>Candou Furdajii</i>	
<i>Cabureiba i. Balfamif Peruviana</i>	1757	<i>Canella i. Cinnamomum & CaJJa</i>	1559 > ^ -
<i>Cacalia ejufque fpectzs 291. Americana</i>	191	<i>Canella ex arbore E. B- I Bui. alba</i>	1802
<i>Cacacotic Tlanauquiloni Herru</i>	7x8	<i>Caniram H. M.</i>	766
<i>Cucau; C activate</i>	1572, 1671	<i>Canna Indica florida</i>	1202, 1906
<i>Cachi arbor quid.</i>		<i>Cannabina aquatic* C B.</i>	46^
<i>Cachos Monard.</i>	1833	<i>Cannabis fativa & Jylv. 158. ff>uria u Laniii</i>	
<i>Cacbrys im Libanotis Cachryophoros</i>	4	<i>Jpecies</i>	561
<i>Ca cub alum Plin. u Alfine baccifera</i>	68x	<i>Cantabrica Angiullarse v. Campanula</i>	740
<i>Caiahaba S. Mippi</i>	1795	<i>Canfcbena-pou, Mandaru fptcits</i>	
<i>Cajan arbor</i>	1722	<i>Caopoiba Marcgr.</i>	164s
<i>Cajacia Pifon.</i>	1345, 1914	<i>Caova potus i, Coffee</i>	
<i>Cajous</i>	1649	<i>Caoup</i>	1793
<i>Cakile Serafionis i. Eruca marina</i>	840	<i>Capillus Veneris II. Adiantum</i>	147
<i>Calaf Alpm, Saffaf. Rawwolfii</i>	1424	<i>Capicatinga Pifon. Acori fpeciu</i>	
<i>Calafnagrofiiis, S. Gram. Arundinacea</i>	1281, 1282	<i>Capnos I. Fumaria</i>	404 > 40 J
<i>Calamintha ejufquz-fptcies</i>	568, 569	<i>Capollin</i>	1550
<i>arvsnjis verticiUata</i>		<i>Capotes fruttuf v. Cydonia exot, C. B.</i>	1655
<i>Calamus aromat. Officin. i. Acorus</i>	1	<i>Capparis 1629. Fortulacx fylh</i>	1911
<i>Cakatrippa i, Confolida regal*</i>	707, 708	<i>Capreolata Bryonia folio</i>	1245
<i>Calceolus Maria u Hditorinc</i>	1232	<i>Caprificus</i>	1433
<i>Calcitraba u Carduus futiatus</i>	317	<i>Caprtfolium perfoliatum & non ferfol</i>	149°
<i>Cahbaffier Rochefort</i>	1667	<i>Lapjicum ejufque fpecies</i>	675, 677, .
<i>Cahfiam H. M.</i>	1197	<i>Capuueba</i>	1316
<i>Calendula ejufyue fpecies</i>	117, 1833	<i>Uapat gallinaceum^e u. Dnobjfchis</i>	914
<i>Calochierni Critica Carduifpcier</i>	304	<i>Car a u Inbame Marcgr.</i>	7*9
<i>Caltha ejitfque Jptcies i. Calendula ft7. palu-</i>		<i>Uaraguata I. Aloe</i>	1199
<i>Jtris</i>	7°°	<i>Caramolas Ac oil.</i>	1449
<i>Camarajapo Piton. Mtntajlri ftec. Affurgituulz</i>		<i>Caranna</i>	1847
<i>unico, procero, tereti, birfuto & rup₃-m bipeda-</i>		<i>Carambu Lyjimacbi* fpecies</i>	1510
<i>hm alitudinem-y folns leviter fzratts; hirfutis></i>		<i>Carandas & arci<e 1647. Bontii</i>	1749^ 1309
<i>inferius quafiincanis, bmts fbi oppojta cum par-</i>		<i>Carandji H. Ml i. Negundo</i>	1371
<i>vulis adjuncts. In fuptrioribus ramulis caulis</i>		<i>Caranaiba Pif Falm<z fpecies</i>	1 8
<i>mult I-florss umbeUatim pojiti Mo anno Tana-</i>		<i>Cara-Scbulli H. M.</i>	17 ft
<i>ceti fere rnndo proveniunt, cum Jtaminibus di-</i>		<i>Cararu Blii Jpccits*</i>	201
<i>lute wruUi cohri\ quorum odor₃ ut & totius</i>		<i>Carcapuli</i>	r66r
<i>plant* ejt Mwtaftri amula, faporis amarican-</i>		<i>Carchivec Turcantm im Primula 'veris</i>	HDI
<i>ttis & aromati. Ssmine nigrv , exih longo,</i>		<i>Cardamine ejufque fpecies 814, SiJ; pufilla faxa\</i>	
<i>ffuodmaturum pappis evolat. Radics ejt Und-</i>		<i>tilis AweiJti* Col.</i>	gxS
<i>la₃ fibris rmltis prxdtta.</i>		<i>Cardamomum</i>	1204
<i>Camanbaya Brafil. Marcgr. Herba fdamntofa,</i>		<i>Cardiaca j71, 572. Americana annua</i>	1872
<i>ab altiffimis arboribm dependent, tta ut tntegros</i>		<i>Carduncellus montis Lupi</i>	316
<i>vbducat, gryfti colon* & l«fi lawginofaam</i>		<i>Carduus ejufque Jpecies 308, 309, 31 ^ ^ . itefn</i>	
		<i>1862. beneditw 303. Cbryfantbemw ztf. Bra-</i>	
		<i>filwnw fil: Afot-s i; Ananas' 133*- lanctatus</i>	110.

INDEX

<p><i>Cbondrijla ejufque species</i> 227, I 857. vim'weati[^]. <i>purpwafems fxtida</i> Park. i. <i>Hieracium florz car-</i> <i>weo</i> 271. <i>altera Diofcoridis Rauwolf</i>. Cklf. 243. <i>bulbofa</i> 247. <i>ccerulea Cyani capit.ults</i> 257. <i>vifcofa</i> <i>humilis</i>; i. <i>Latuca</i> Sylv. (<i>pecies</i> i11. <i>Verruca-</i> <i>riai</i>[^] m. <i>lutea</i> J. B- 122. <i>fol. laciniat. ferrat.</i> &c_m C. B. I. <i>Crupina Belga</i> 31.</p> <p><i>Cbondrts</i> 1240 <i>Choyne</i> 172 <i>Cbriffopboriana</i> 661 <i>Cbryfanthemum ejufauae /pecies</i> 336, &c ad 342, I B63- <i>AlpinumfoL'Abr&tani multifidis</i> C. B. 286. <i>Vakntinum Cluf.</i> 63. <i>Canadenfe bidens</i> Mor. 337. <i>Aiz*oidis Afriuanum ejufjuepecies</i> 692 <i>Cbryfocome</i> 281, i860 <i>Chryfogonum Pen*</i> 171G <i>Cibage Pini forma</i> 16 f 4 <i>Cicer ejufque species</i> 917- <i>Sylvefire</i> Matth. 935. <i>arbor turn Indicum perenne</i> v. <i>Anon is</i> 939. Sylv. <i>latifolium triphyUon</i> C.B. ibid. <i>Cicercula</i> 981 <i>Cicboreum ejufque species</i> 2f j. <i>bulbofum</i> J.B. 247. <i>fpinofum</i> 2ff. <i>Verrucanum</i> ibid. ^vtf. //ff. <i>Afr-</i> <i>utie afperum</i> C.B. ^. <i>Hieracium</i> ill <i>Cicla Officin.</i> I. Ito* «fi[^] 2D4 <i>Cicuta.</i> 4fj <i>CicUtarite varine fpeeks</i> 451 j 1868. <i>odor at a</i> 419 <i>Cidrafeu Pomaczum</i> 1448 <i>Cinara tjufyue* species</i> 279, 300 <i>Cineraria, i. Jacobaa maritima</i> 286 <i>Qinnamomum</i> y j 9 <i>Ciporema AUii Brafiliani species aphyllus</i> V. Pifon. 236 <i>Circ/ea Lutetian a</i> 401 <i>Circimn ejufque species</i> 30 ^ 306, C^r. <i>Cl?/R ejufque species</i> 1006, 1007^ d^r. w^f 1007. f 1012- <i>Ladanifera</i> S. <i>Ledon</i> I 1012, I 1012, I 1012. <i>myrtifolia</i> I oil. <i>vapfulis tri-</i> <i>gonis major</i> 1 DI 1. <i>Wica* L^i Alpinifoliis</i> 1 89y. <i>humilu aizvides, &c.</i> 1896. <i>Cl?ar humllis</i> v. <i>Chamaciftus</i> 1 o 15 <i>Citrage, /.</i> A f f ^ i . 1311, 1312 <i>Citra</i> 1806 <i>CitruUtts, i. Anguria</i> 643 <i>Citr^f ejufque species</i> 1644 <i>C^T^ Siliginu</i> V- <i>Secale</i> 1241 <i>Clematis Dapbnoides</i> 1 uyl.flore rofto clavaty 1 874 <i>Clematis ejufque species</i> 620^ 621. <i>tetraphyUa</i> Ame- rican[^] 1319 <i>Clinopodium jj8. quorundam Mafichina GaUorum</i> J.B.520.arenofa <i>Ocimifacie</i> 5 5 3-<i>Creticum</i> Alp. J 54 <i>Clitonus flos Breyn.</i> C>*Ora» <i>Matthioli -u.Thymelaa</i> 1589. <i>albumfoL</i> <i>Olea argenteo molli</i> 73f <i>Omar fativus, S. Uartbamm</i> 302, 1861. Sylv. <i>hir-</i> <i>futior</i>S. <i>Car duns Btndittus</i> 3^3 <i>Cobban arb.</i> 151 <i>Coc* Indorum</i> 1788 <i>Cocconilea^v. Coccygria</i> <i>Coccula Offic. S. Codcuhs Indus</i> 1812 <i>Coccygria</i> 1696 <i>Coccus baphica</i> I 392. <i>radicum</i> 186, 4^1 COCCJY -W/C* 1356. <le <i>Maldiva</i> 14^f <i>Cochinilla</i> ^ 822, 823, 1886 <i>Cocblearia tjvtfyue species</i> <i>Codda-panna H.M.'</i> <i>Coddam-Pulli H. M. i. Carcapuli</i> 1 661 <i>Codaga-pala</i> 17 J 4 <i>Coda-pilava</i> 1443 <i>Cod... ..</i> 17 J o <i>Coffee ...</i> 1621 <i>Libanotis</i></p>	<p><i>Colchicum ejufque species</i> 1170, 1171, 1305 <i>luteum</i> 1143 <i>Colchic o narciffus</i> n 4 ? <i>Coles Pbaftolus & ei fimiles fructus</i> 1774 <i>Colmil H. M.</i> 1734 ^ 892 <i>Cdocaffia, i. Arum zsEgyptiacum</i> 1209 <i>Colochierni Belli, i. ^itraBylidt & Cnico</i> Sylv.fimi- y y 1209 /*c.B. y 104L</p> <p>C V W ^ 2 <i>Colas fontz</i> J-7 <i>CV<*,* 5COR?iw^ ejftue fpecies</i> 91?j 9 J 4</p> <p><i>Xmttattra</i> 1611 <i>Comaaurea, i. Chryfocome</i> 28x <i>CowaOT^wriP!^ ^ Adiantum Brafilianum</i> 14? <i>Conferva j 9. PZmti, ^ rcticulata</i> , r g ^ <i>Conna H.M.i. CaJJiaftiftula</i> 174,5 <i>Ctmjotida major, v. Symphytum</i> 50j <i>media, i. Bugula</i> j y f <i>media vitlnerariorum</i> Lob. 5JT <i>minw, i. Bellis minor</i> 349 <i>g^fo</i>, 707,708,7^9 *«rc^, /, <i>Heliantbemum vulgar*</i> 1 o 1 e <i>Conrayerva</i> j 44a <i>Convulvulus ejufque fpecies</i> 722, £.*< / 731, 1881, <i>IBtiz.marztimus -ibIndicus Battatasdiilus</i> 728. <i>Sjriacusj S. Scammonaa</i> 721. <i>pennatus Qiamoclit</i> <i>dijlus -Jo.niger</i> 18r <i>ejufque fpecies zfi, 262, 3&c. i;ff»</i> 1858 <i>Hslemits</i> 263; <i>awv*</i> J.B, 164. <i>major vulgar is</i> 292. <i>car idea acris</i> 27°, 271 <i>Copalrefina</i> 1446 <i>Copaiba Balfamifera arbor</i> 1759 <i>Copalxocotl Tepeacenfis</i> Hern. 1343 <i>Copau</i> 1794 <i>Copavich Ouaffuu</i> 1789 <i>Copeya arbor Papyrif</i> 1795 <i>Copiiba Marcgr.</i> 1577 <i>Gr^ a f o r</i> 1775 <i>Corallina marina Piniformis</i> 1849 <i>Gorallina marina</i> 65. <i>reticulate</i> 67 <i>Corattoides arbufcula</i> 67. <i>tr/w</i> 1847 <i>CoraUium ejufyue species</i> 6r, 1849, 1850 <i>Corchorus Plmii</i> Lob.*. <i>Mdocbia Alct>q> Indica</i> fc- r,cl^ 1 o 6 S,, <i>Lorchorus Plinn^ z. Anagallis</i> 102* <i>Coriandrum</i> 430 <i>Cor.Indum, i. Pifum cor datum</i> 4J57 <i>Cor/j ca^r/^ maritima</i> 882. <i>Monfpejfulana lutea, im</i> <i>Euphrati* species</i> 773. <i>AF^.</i> C.B. i. <i>H?perici</i> <i>Jpecies</i> x o 1 g <i>Lor>>c cervinum, *t>. Plant ago</i> 87,9 <i>Cornus fativa</i> 153. <i>fxmina</i> 1571 <i>Corni vel Sorbi species Bontio</i> 1623 <i>Corona fratrum Car dims</i> 111 <i>Corona Imperialis</i> 1135 <i>Coronilla ejufque species</i> 914 <i>Coronopus</i> 879. <i>Ruellii, u Nafturtium Vzrruc.</i> 84? <i>Corruda, im Afparagui Sylveft^</i> <i>Coru arbor</i> 1781 <i>Cortex eriophorus</i> lEoz.avtirbeumaticits ibid, <i>arboris</i> <i>Ig*ad ndvigia</i> ibid. <i>Pin&J^ Nova Scotia</i> 1b1i <i>Winuranus^eo\ Lajvang arboris</i> 1803. P^< <- <i>vianus febrifug.</i> 1225</p> <p>Cay* x ^ 4 <i>Cwy/rj fativa & Sylv.</i> 1379. <i>Byzantina</i> 1580. <i>max. f oho latiff</i> <i>Virgin.</i> 1709 <i>C0/WI347. horunfu</i> 363. ^w<7^ <i>Libanotidis fpe-</i> 1111 427 COJMMJ</p>
--	---

INDEX

	PAG.		PAG.
<i>Catinus i. Coccygia</i>	1 696	<i>Cynocrambe 1^3. legitima</i> Diojcoridis C- B.	206
<i>Cotonea malus</i> 14	5	<i>CyogioJJum ejt^ue species</i>	489, 490, efr
<i>Cotoneafter i. Mefpilus</i>	1460, 19^7	<i>Cynorrhodos i_m Roja can in a</i> V- J^	44- J^
<i>Cotula i. Cham<zelum fuetidum</i>	355	<i>Cynosbatos</i>	ibid.
<i>Cotyledon S. Umbilicus Vemris</i>	1\$!%	<i>Cynoforchis <u. Dra&ar</i>	IXII, 1x13, d^^
<i>Cotyledonis varia species</i>	1245, 1045	<i>Cyperus ejufque Jpecies</i> 1299. longus inodorusPe-	
<i>Cotyledon paluftris</i>	1323, 1911	rwvianus^ny. rotundus inodorusex Florida ibin.	
<i>Scherunam-Cottam H. M-</i>	1513		
<i>Co'valam H- M.</i>	1365	<i>Cyprus, i. IAgufhum</i>	1623
<i>Courondi H.M.</i>	1554	<i>Cyr/Jj ejufque species</i> 976, 4^v^d^ 973. n^m	1894
<i>Courou-moelii H. M-</i>	1 634		
<i>Couton arbor</i>	J794	D-	
<i>Crifia pa<vonis Breyn.</i>	9^1	<i>Dabw>i CluU D^m^a</i>	1771
<i>Cracca i.Vicix species</i>	9^03	<i>Dailylus vulgo l. Palma</i> 13	f 2J 17^
<i>Cratagonon Jv_m Euphrajia 77X. iV^w Melam pyrum</i>	774	<i>Damafonium l. HeUeborine</i>	1230, 1241
<i>Craterus Theopbrafi</i>	14J7	<i>Datura i/vlgo i. Stramonium</i>	74^*
<i>Craffjula i. Telephium</i>	689,690	<i>Daphnoides i. Laureola</i>	I J87
<i>Crfl/j Dalecb. *?. Trinciarella</i>	2x7	<i>D^*7W Officin. v. Pafinaca tenuifolia</i> 464. -^J-	
<i>Crzpitus lupi</i>	104	<i>/ifw C.B.414. Ireticus femine birfuto</i> 463.	
<i>Cr/?* Pa'vonis Breyn.</i>	981	<i>yf// lo/w C. B.449- rnantanus Apii fol albican</i>	
<i>O/l?* JJW/* j. Pedicular is</i>	7^9	<i>C. B- 43 B. ri<w lo/^, C^c 460. montanus</i>	
<i>Critbnum ejufyue Jpecies</i> 456. <i>Spinofum S.Pafti-</i>		Chf. yfaw r^, ^, J. B. 454- 3-^D % TM	
<i>va ca marina</i> 469. <i>cbryfantb emum x 6 B. quartum</i>	454	<i>Cul+tlJteUatus Creticui</i> 46^ <i>pratenjisMiUefolit</i>	
<i>Match.</i>	454	<i>paluftris folio</i> (E. B. -v. <i>Oenanthe</i> 459- <i>rnontanui</i>	
<i>Crocus ejufque species</i> 1173, &c.ad I 177J	J 906	<i>Apii folio. major</i> C B.	783
<i>Crocus Indicus, Arabibus Curcuma</i>	IX04	<i>Delphinium u Confolida regalis</i>	784
<i>Crotalaria</i>	1893J 1894	<i>Dende Ricini species</i>	4-^
<i>Cropiot frutfus</i>	iBxfr	<i>Efto-r ttfW/J ejufyue species</i>	1 V
<i>Cruciata</i>	479	<i>ECTJ /OWJ eN//y<e ^w/w</i>	*44J ^45>^ 69
<i>Crupina Belgarum</i>	331	<i>Dentaria apbyUos</i>	^H*
<i>Cuambu Brafil. Gnapbaliun Marcgravio, Caryo-</i>		<i>Dentaria ejufque Jpecies</i>	J.^5
<i>phyUata Pijoni</i>	1613		
<i>Cucupora Jfjz</i>	1 613	<i>Dentaria Buguhides</i> MentzeL	774
<i>Cuciopbora Talma</i>	1 613	<i>Dintellaria Rondeletii</i>	394
<i>Cucumis ejufyuz species</i> {>tf.*sEgyptiufi. Cbatz	646.	<i>Diapenja, i. Samé id a mas</i>	47*
<i>afimnus</i> 647, 1874. <i>puniceus</i>	'874	<i>Dittamnus Creticus</i>	537
<i>Cucurbt a ejufaeue Jpecie*</i> 6383 ^c. <i>clypeiformis five</i>		<i>«0<f Offic. i. FraximUa</i>	648
<i>Sic di an a</i>	648	<i>Digitalis ejufque Jpec.</i>	1*7* 116
<i>Cucurbt if era arbor</i> Tab.	1 613	<i>Dipcadi u. Hyacintbus r. Gentiana, Pseudopbalangii</i>	
<i>_____ /b//0 Laurinv</i>	1 113	<i>IZL _____ f</i>	13?^
<i>k_____ Americana foliu</i>	1 113	<i>Diofpyros</i>	1461
<i>C</?/rr Maregr.</i>	1 113	<i>Dipfacus ejufque Jpecies</i>	382
<i>Cumandata Pifoli. v. LfWfJ.</i>		<i>Dvwapaburu</i>	1 1
<i>Cudu-Pariti H. M i- Goffipium</i>	1 06f	<i>Dora Rauii/olf. J. B. v. Milium Ind.</i>	1253
<i>Cuipeuna Pifon.</i>	J 78i	<i>Doria J. B.</i>	279
<i>Cumana arbor</i>	f 79^	<i>Doronicum ejufque Jpecies</i> 274^ 277. 1859	
<i>Cumanda Fab*</i> l s s 9» f s	9^	<i>Dorycnium Monfpelienjium</i> 969. Imperati J. B. 73^	
Cumaf. H. M.:	1 624	<i>Dorycnio congener Cluf</i>	9^?
<i>Culcaf. ColucaJJia</i>	" 09	<i>Dr<^ B21. luteaftli^uis ftriftijfimis%\\ alba fili-</i>	
<i>Cuminum</i> 433. ^/-v. <i>capitulis globojis</i> 401. <i>fratenft</i>		<i>quofa repsns</i>	786
<i>i. Carvi Omcin-</i>	447	<i>Draca arbor</i>	1 195
<i>Cunane frutlus</i>	1 826	<i>_____ herba</i>	37*
<i>C<w7* ^<^<^, l. Origanum Syh.</i>	539	<i>_____</i>	1211
<i>Cuprzffus</i> 1405. <i>manna</i>	77	<i>Draawculus bortenjisj Tarchon</i>	37?
<i>Cuprejopinului Cap. B.Sp. Breyn.</i>	*444	<i>_____ pratenjis, Ptarmka</i>	344
<i>CurcaS;,- Ricinus Americanus</i> 166. <i>Avillan* magni-</i>		<i>_____ paluftris^ Arum</i>	1210
<i>tudim Malavarenfium</i>	1831	<i>_____ polyphyllousj Dracontium</i>	1311
<i>Curcuma</i>	1104J x9^6	<i>Drakena radix</i>	1339
<i>Curuba Cticumis Brafilianus</i>	634	<i>Dry opt éns Trag- If l. Lob. 146. o/^ r.</i>	152
<i>Carim Ctrini & Bern. Curini</i>	7^0?	<i>Z>J7>/J Cardui Jpecies, de qua nihil certi</i>	
<i>Curutiit-pala</i> 17	J	<i>Dudaim Gen. 30. tf" Cant.J.i. Mandragtrfi</i>	669
<i>Cururu ape</i>	1347	<i>Dudafali, Ligni Colubrinifpecis Acoftx</i>	1507
<i>Cufcuta ejufque Jpecies</i> 19 0 3 ,	1904	<i>Dulcamara i. Solanum Ugnofum</i>	67*
<i>Cyamos leguminoja, i. Fab a</i>	909, 910	<i>Dulejh S_m Dih Algxfctes</i>	184?
<i>C^w<j <7<^<e/ ^ ^ j</i>	311j jxx, 1 B6x7I B63	<i>Duriones Acoft<e</i>	1551
<i>Cyclamen ejufaeue Jpec</i>	11D5> 1106, 1 907	<i>Dyabibah Cmgaknfium</i>	983
<i>Cjdonia Malm, i_m Cvtyma</i>	14f		
<i>Cydonia exotica</i> C,B.	It65		
<i>Cymbalaria</i>	^ ya		
<i>Cymvnm</i>	43j		

I N D E X .

E.	Pag.	F.	Pag.
<i>Ebenm</i>	iBbf	<i>Faba ejufque species</i> 90 ^ 910. <i>purgatrix</i> <i>latijima</i> :	916
_____ <i>Cretica</i>	948	1776. <i>arborifera</i> 1777^ <i>Sylv.fru'durotundo atro</i>	163
<i>Ebuhx, i. Sambucus hufnilis</i>	1611	90;. e^f>^wij2z. <i>ptrgctrix</i> <i>S.Rkinus Anie.</i>	163
<i>Ecapatli dtera</i> <i>Hern. v.Sena</i>	1742, 174?	<i>Fabagy</i>	1911
<i>Echinomelocatos</i>	1467, 19*7	<i>Fagara Cubebis affinis</i>	I Hi 5
<i>Echinopoda^retica</i>	1710	<i>Fagt/sinfi. Sepiftw, i.Carpinus</i>	1245, 1245
<i>Echinopw w ^ CjS? . wnor</i>	3 & 5	<i>Farfara, i. TiiJilago</i>	259
<i>Echium ejufque species</i> 498, 497, 1870. <i>pullo fiore</i>	104		159
495. <i>Scrrpioides</i>	1445	<i>Fegopyrum</i> <i>Dod. ? . Fruntmt. Saracen.</i>	181
<i>Ela-calliH.M.</i>	1707	<i>Ferrum equitnum ejufyue species</i> 933. <i>Gallicum</i> <i>(Mr</i>	915
<i>El^agnus Cordi</i>	409*	_____ <i>quis in fummitatz</i> <i>C. B.</i>	410, 1855
<i>Elaphobofcum, i. Vajlinctca Syl<v. latif</i>	759	<i>Ferula</i> <i>v. jfy</i> <i>refpecies</i>	ibid.
<i>Eiatine ejufque species</i>	1347	<i>Ferula</i> <i>v. jfy</i>	1289
<i>Elemi gtsmmi</i>	447	<i>Fefruca ejufque species</i>	1431, \$'c. <i>Indica arcuata</i> 1437.
<i>Eleofeiiniim, Apiitum palupre</i>	1364	1916. <i>Indica Dpuntia diita</i>	14^? J'19' : 7
<i>Elengi prtinifera</i> <i>H- M.</i>	776	<i>Ficoides Herman. i>. Cbryanthemum Aiz,oides</i> 69X,	1879, 1880
<i>Elephas, Col. I Melampyri species'</i>	1859	<i>Fit^f Sinenjis florida</i> 178 8- <i>z^gyptia</i> . 13 21	13 21
<i>Elichryfon</i> <i>iA* 281, 281.</i>	1230	<i>Rear infernalis</i> <i>Italorum, i. Papwver Spinofum</i> <i>B 5 6</i>	283^ 284, d^c<
<i>Elleborine, v. Hdtborine</i>	1375	<i>Filagy</i> <i>Dod. T. Gnaphalium</i>	283^ 284, d^c<
<i>Eloxochül</i>	254; 255	<i>Filipmdula</i> 62?. <i>aquatica</i> 441. <i>montana flote Fedi-</i>	771
<i>Endi<via vitlgaris, i. Intybm</i>	1345	_____ <i>cularite</i> <i>C. B.</i>	771
<i>Embyaembo</i>	97	<i>F7/ff florida</i> <i>iff. mas'vuhqris</i> <i>IJ.2., foemina</i> <i>*vulig.</i>	149* <i>Indica OJmunde facie</i> <i>i^Jcandens exoti-</i>
<i>Enguambo</i> 179*. <i>Herriarid.</i>	698	_____ <i>ca anomalai^.</i> <i>baccifera</i> 145. <i>Saxatilisramofa</i>	151
<i>Enneaphyllutn, u Helleborafitr</i>	273	<i>Filicula</i>	140
<i>Enula campana</i>	196	<i>Fiftularia, i. Pedicular is</i>	769
<i>Epawil Hernand. L Botrys Mtxic</i>	1638	<i>Flammulajwis, i.Clematitit</i>	621
<i>Ephedra, u Uva marina</i>	1550	_____ <i>v. ^ - ^ Ranunculus flammexz</i>	£22
<i>Ephemerum Virgimanum, u Phalangtum Tradejanti</i>	1550	<i>i^/ ^ Africanus' ejufyue species</i>	342
_____ <i>Lyfimachia</i>	1550	_____ <i>Mexican^ J. B. i. Mirabilis Peruv. %9-J</i>	1FXK
<i>Kpimedmm</i>	ibid.	_____ <i>Ambarvalis. u Poty^ala</i>	1FXK
<i>Epimelis, *v. Mzfplu</i>	--	_____ <i>Cardinal!*) i. Rapuncultit galeat.</i>	746
<i>Epithymum, v. Cujcuta</i>	--	_____ <i>Luculi, i. Lychnis</i> 1000. <i>Cardamine</i>	814
<i>Eyuifeium ejufyue species</i> 117, 12,8,129, <i>IB p</i>	59°	_____ <i>Conjtantinopolitanus, if. Lychnis</i>	992
<i>Eranthemum, v. Adonis</i>	16^	_____ <i>PaJ Jiontt; i. GranadiUa</i>	649
<i>Era-way CluC Risini jpzcies</i>	16^	_____ <i>oojfr</i>	314
<i>Eric* ejufque species</i> 1713. <i>maritima Anglica</i> <i>/k-</i>	cc	_____ <i>Nobilitat V Bolyu, UKS c&r.</i>	797
_____ <i>Tiria</i>	cc	_____ <i>Indicia e^ violaceoftifcus, c^c.</i>	090
<i>Ericu H. M. i. Apocynum</i>	103>	<i>Fiet guebit Populi species exot.</i>	1207
<i>Erigeron, V. Senecio</i> 290. <i>Zeylanibum</i>	1494	<i>Fockii Solani species Bant.</i>	675
<i>Erinos</i> <i>Col. v. Campanula</i> 729 J 74?, 1274	1274	<i>Fceniculum ejufque species</i> 457. <i>tortuofum</i> 460. <i>ww-</i>	416
<i>Erithronium bifolimn, &c J. B. ^- i> <> J af^w</i> 1313	1313	_____ <i>ritimum' Crithmum</i>	416
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Famum Gracum ejufque species</i> 9^4, 9Jy, 1895	961
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Fosnum Bfurgundiacum, 'V. Medica</i>	961
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Folium Indicum, i. Malabathrum</i>	199, c^c.
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>FontaUs, i. Potamogiton</i>	199, c^c.
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Fragarin 'ejufque species</i> 609. <i>Sierilit</i>	610
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Frav^uldji* Alriu! nigra baccifera</i>	1604
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Fraxtnella</i>	628
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Fraxinus</i> 1702. <i>bubula</i> > <i>i. S or bus Attcuparia</i>	14 J 7
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>FriUaria tftifque species</i> . 11 o 6,	1107
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>cra^i P?ow. B.Sp.i. Apocynum</i>	1800
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>FruEtus i aftanets forma utnngtte acumin.</i>	1800
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>tetrapyrenus putamine ligneo^ &c_m</i>	1839
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>exotici plurimi a pag. 1812= ad</i>	1839
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Frumzntum Indicum</i> <i>Mayz, ditlum</i>	1249
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>Saracenicum, i. Fegopyrm</i>	181, 182
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	<i>Fruetx *s^Ethiop, baccifer fol Myrtitti</i>	1636
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>cineraceus mujcofus</i> <i>Breyn.</i>	185a
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>Indicus baccifer</i> <i>Vitis Idx&i* Chffii filit</i>	ibid.
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>Breyn.</i>	ibid.
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	_____ <i>Mufctformit InL</i>	119
_____ <i>de c^ntaqa Jufit.</i>	16.	[6]	104

INDEX

	Pag.		Pag.
<i>Gttmni • varia species</i>	1846, 1647	<i>Pulmonaria durum</i> ij.8.	Fruticofi -vari*
<i>Gutta Gamba S. Jsmott</i>	873	<i>species -158, 2, 3, 9, j</i>	<i>i^o. falcatum & ficUatum</i>
H.			
<i>Hacub Cardui species</i>	310'	ijS. <i>Hyoftris dictnm</i>	lip
<i>Halicacabum Solanum</i>	68r	<i>Hhrobotam, L Herb a Sacra</i>	535
<i>Halimus latf^m & #</i>	194, 191	<i>Higuero' Ovze Ji</i>	I?7^j 1667
<i>tlaliphaos *</i>	1-387	<i>HippogloJJkm, u. Laurus AUxani,</i>	665, 1875
<i>Hafhtla regia, i. Aphodelus</i>	1191	<i>Hippion Gwtiamlla species</i>	1718
<i>Harmala, u. Ruta Syriaca</i>	874	<i>HippoIapathum, Rbabarbartim Monachorum & Pfeu-</i>	171
<i>Hayri Palm* Jpeck's</i>	1363	<i>do-rhabarbarum</i>	459
<i>Hedera ejufue species</i>	1505	<i>Hippomarathrum Spharocephalum</i>	191 J
— <i>quinquefolia Canadcnfis Corfl.</i>	1 37	<i>Hippophaes Angtiittara j</i>	&
— <i>trifol. Canada ejufdem</i>	ibid.	<i>Hippofslinum, <v_m Smyrnum</i>	43
— <i>terreftris</i>	566, 5-67-	<i>Hippuris Saxea</i>	68
<i>Hedynnois MonfpejJulana J.B-</i>	128	<i>Hippuris ejuffue Jpec.</i>	127, d^c
<i>Hedynnois, u Dens Leonis</i>	244, 1 j	<i>Hirculus 591. Frificus</i>	1896
<i>Hedysarum clypeatum ^triphyfon Canadenfe</i>	91 j	<i>Hirundinaria^mulgoj <v. Afckpiar</i>	1190
nut.	c -i	<i>Hoaxacan Hern, u Guaiacum</i>	\ 6ff 5
<i>Hedysarum majus_m & minus, <v. Secundaca</i>	ibid.	<i>Hoitziloxitl Hernand. 17 f 8. Hi?i>J -War.</i>	1535
<i>ti e i e n i u m nntgm >75- & * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jf</i>	50/^ pyramidalis ? 4. Jwfovw maxm^*m, 1, Mj	<i>Hwourah Pram species.</i>	
	ibid.	<i>Holli</i>	I&T2,
<i>Uellinthemum ejufque species ^ Chamxciftus ioi j,</i>	10, 14, 10, 15, 10, 15	<i>Holofieum</i>	8 E o
<i>Halicacabum ejufque species, vMithryf</i>	10, 14, 10, 15, 10, 15	<i>Holofieo affinis cauda muris</i>	1 ? ? x
<i>Halicacabum 501. tricoccon</i>	16?	<i>Hordeum ejuffm species Yi^ murinum 1158, 1908</i>	
<i>Helleborafter ^</i>	6, 8	<i>Htrminum ejufque stecies 541, 543J ^^^ 1871-</i>	
<i>HeUeborine ejufqut fpaftz</i>	1230	<i>Hucipochotl Hern.</i>	185 S
<i>Hettebvrus albus</i>	T68	<i>Hummatu H- M- i. Stramonium</i>	749^ 1885
— <i>zngt</i>	697, 698, 699	<i>Hoxocoquamoclit Cam.</i>	9 11
— <i>zngt Sanicula fido</i>	43 f	<i>Hjacmthm ejufque species 11 55, cH. Stellaris I 5 j6,</i>	
— <i>nigrtttuifol.</i>	397	<i>15 f7, 1 558, eriophorus I ^fiore oblong* Orient-</i>	
<i>HHxim femine triangulo</i>	187	<i>tahs 11 f9. /o. 0E/OT£. Anglictz ibfi. raternojus</i>	
— <i>cijjampdos, v. Convolvulus,</i>	1112	<i>11 Si. cumofns ibid. Indtats tuber&Jus 1164..</i>	
<i>UemerocaUis Chalcedynka</i>	1187	<i>botryodes; im racemofm</i>	116j 19^?
<i>Hexasia Quera fpecies</i>	1187	<i>Hydrolapathum</i>	17 J
<i>Hexasia if. multifida.</i>	1187	<i>Hydropiper > i. P^rjcaria urens</i>	1 & 2,
<i>Hexasia nobiliseUf^c fp.de, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</i>	43 f		
<i>Hexasia</i>	121	<i>Hydrofhyllon, *! Dentaria affinis Ecbii for. &c</i>	M47
<i>Hexasia, v. Libett</i>	0	<i>Hyofcyamus ejufque species</i>	711, 7ix
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hyoferis? v.. Hieracium</i>	112
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hypecoon</i>	1328
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hypericum ejupjue species</i>	I DI71 1018, 1019
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	— <i>frutfezns Amzruanum fore albo</i>	1782
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hyphear</i>	1595
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hypocharis, PorcMa Hieracii fpec*</i>	2,29
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hypofphyllo I. Cifus</i>	1128
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hypoglofifum S. Hippogloifum</i>	68
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Hypjopus ejufque species</i>	5 [6, 5] 7
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>HyJJopifolia S. HyJJboides</i>	10 J >
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417		I.
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jaaroba MarCgr. P^/cofi /fw>J</i>	859
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jabatapita Marcgr.</i>	1512
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jaborandi</i>	1345, 1914
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jabuticab*</i>	1348
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jaza</i>	1440
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jacape gramen</i>	13^7
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jacapucaia Marcgr.</i>	1677
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jacaranda</i>	1648
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>7^r& Brafilienfi. Melo arjaaticus</i>	643
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jaceaejufue species</i>	318, 319, 320, ;2i
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	— <i>capital* fpinofis</i>	318, 319, 320, ;2i
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jacacitica . . . Juvier</i>	M*
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>j-azvbaa Afer nobis ditia</i>	271, 171
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>*—maxitima</i>	3,8£
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>—vulgar is alia! species</i>	284, 285, 286, 1861
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jacuaa-canga Hcliotropii species</i>	5 j 1,
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>J4ra</i>	1, S8
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jaiatpa, i. Ananas</i>	7^4
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jalapium</i>	1465, 1466
<i>Hexasia, v. Exparatim</i>	417	<i>Jamacaru</i>	1465, 1466

INDEX

	Pag-		Pag-
<i>Jdtobvloim</i>		<i>Iva umbu Bra-fil</i>	1530
<i>Jambos</i>	1478	<i>Jucata arbor</i>	1792
<i>Jangomds</i>	1814	<i>Juglans</i>	J 377, 1975
<i>J amp aba</i>	1666	<i>Jujuba</i>	1533
<i>^faparandib*</i>	1645	<i>Juncaria 111. Salmantiifis</i>	1933
<i>Jaracatia Vil.</i>	1569	<i>Juncifs ejufquefpecies</i>	1304, 1304, 1304
<i>Jarumd</i>	1739	<i>^funczts bombycinus, <v. Gramtn foment.</i>	1305
<i>Jafminum ejufquefpecies</i>	M99J 100, 100	<i>Juncus floridus major 701. minor</i>	1913
<i>— -- Piffia*.m> i. Syringe</i>	176	<i>Juncm odor at us, i. Sebznanthus</i>	1666
<i>jbacur apart Marigr.</i>	1505	<i>Junipappz cyma</i>	1411
<i>Iba-curupari Marcgr.</i>	1677	<i>Juniprtts zjufauz fptvies</i>	1313
<i>Iba paranga</i>	* 2 f°	<i>Jupicai</i>	817
<i>Ibiraba</i>	1777	<i>Juruma Marcgr.i.Pepo Brafih 641. Jurumu</i>	6 j 7
<i>Ibi-pitanga.</i>	2 J4°	<i>Jupicanga, i. Radix Ubina</i>	674
<i>Ibira-piterunx</i>	1715	<i>Jucfueri, v. Herba viva</i>	1781
<i>IbirareTno AUiarix Brafiliana Jptcies Vifoni, fitu</i>	1676	<i>Jarepeba Marcgr. i. Solanum fpinofunf</i>	1794
<i>eo fiant. & frttitikus rvtundist Ugnv add durQ *t cifi* tx</i>	1673	<i>Juwb Amaz*onwn Cluf.</i>	1493
<i>Ibixuntz</i>	i 89X	<i>Kakals /ptvies</i>	144*
<i>Ibracem, i. Liqitiritia</i>	159?	<i>Kakata H. M. / . ^w^<^f 5//v. ^co/^</i>	1612
<i>Iyira feu Vindaiba</i>	1715	<i>Kaka-ToddaHH.M.</i>	174?
<i>Ibira-piterunx</i>	1715	<i>Kat-a-Moullou H.M.</i>	157*
<i>Ibira-piterunx</i>	1715	<i>Kaka-Niara H.M.</i>	195
<i>IbirareTno AUiarix Brafiliana Jptcies Vifoni, fitu</i>	1676	<i>Kali geniculatum 111, 18 J 7 - minus album</i>	* 99
<i>eo fiant. & frttitikus rvtundist Ugnv add durQ *t cifi* tx</i>	601	<i>—fruticofum 5, Vermicular is frut.</i>	ib-
<i>Ibifcus, i. Ah ha a</i>	i 54^	<i>—^Spinofum xix. »w/#f /PWW? cochhato</i>	Cold
<i>Ibixuma^ i. Arbor Sapqnaria</i>	1GG1	<i>id/i floridum repens aiz,oides Ntapolitanuv*</i>	1915
<i>Icicariba Pifon.</i>	1480	<i>21 j. ^gyptiacum</i>	1741
<i>Icipo Marcgr.</i>	1785	<i>Kal-todda -vaddi H. M.</i>	769, 770
<i>Iou-MwUt H. M. Prumjpecies</i>	179?	<i>X^w^/ H. M. wari fpecies</i>	1506
<i>Jeaiiba Marcgr.</i>	1960	<i>Kandtn-Kara</i>	154*
<i>Jtqui tinguacu Arbor fapvmfira</i>	I 829	<i>?trin-Kara</i>	1499
<i>Jetaiba, imLccufta arbor</i>	711	<i>Kanndh <vari* fpecies</i>	1649
<i>Jtrafoj fr_m</i>	1791	<i>Kapa-mava,i. Cajous</i>	1483
<i>Jtqca Bottata herhd.</i>	1792	<i>Kara-Angolam H. M.</i>	1768
<i>Jtqca i. Marboranma</i>	1645	<i>Karabaka</i>	1498
<i>Igbucami</i>	1391	<i>KareKandil</i>	1664
<i>Igcica fir Igtaigcica</i>	1796	<i>Kara H. M.</i>	1668
<i>Jad. l b</i>	1796	<i>Kara-kara H. M.</i>	1796
<i>lkx ejufyueJpecies</i>	1391	<i>Karin-niotti H.M.</i>	1718
<i>IIuctbra minvr</i>	426	<i>Karin-tagera H- N4</i>	1596
<i>Impatims htrba, i.CardamitK</i>	447	<i>Katmer-BahoHr Turcarum Cora i. Cydamm</i>	1595
<i>Impratoria ejufaut ftecies</i>	916	<i>Kasjavo-maram H. M.</i>	1740
<i>Imperator* affinis umbtUiftra ntarit. Scot*</i>	1762	<i>Katou Conne</i>	1764
<i>Inaia guacaiba, i. Cocos arbor</i>	719	<i>Katou-Indd H.M. * Palome fpecies</i>	1643
<i>Indigo, f. Induum Offic <v. Anil & Nil</i>	J743	<i>Katou-Kakfiam</i>	1415
<i>Ing* Vari* fpecies</i>	1739	<i>Katou-Naregam</i>	1772
<i>Inhamz Lujitanorum & Ignant</i>	114	<i>Katou-Patsjotti</i>	1765
<i>Immboy Marcgr.</i>	* 791	<i>Katou-Pukolli</i>	1432
<i>Intfia H. M- i. Acasia M*lab.</i>	841	<i>Katou-Tbzka</i>	1441
<i>Intybus S. Endivia</i>	ibid.	<i>Katou-Tfjaka</i>	1781
<i>Jobualxochitl</i>	810	<i>Kauki arbor</i>	1731
<i>JonthlaffH Col-</i>	1675	<i>Kawaga H. M.</i>	782, 787
<i>Ipeca-caatinga Marcgr-</i>	1701	<i>Kawaga i. Lemnata latensis</i>	1372
<i>J^ec^ coanba Marcgr.</i>	111	<i>Kzmes granWm</i>	1055
<i>biq, i. Eryfimium</i>	12D8	<i>Ketmia Syrorum Alcea fpecies</i>	156
<i>InpaW M."</i>	1789	<i>Kikajon,im Ricinus</i>	1713
<i>Iraiba Pbn. Palm* fpecits</i>	705	<i>Kifmefin</i>	af 3
<i>J^r e;Vll^e ^wiw Ii &o, d'c</i>	742, 1187	<i>Knawd Gtrmanorum</i>	238
<i>Jru bulfofa</i>	1769	<i>Lablab Alp'mi</i>	82
<i>Jru wyaria prom. B.Sp. Stapd</i>	1789	<i>Labrum Vtncris, i. Dipfacus</i>	1721, 1919. Zrylanimz,
<i>Ifopyrm Diofcoridis Col.</i>	1789	<i>Laburnum, u Anagy* v, Crotalaria</i>	115
<i>Jfatts</i>	705	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	**53
<i>Ifara murra H. M.</i>	1789	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	1957- J/
<i>Ifcbamon, u Graven daElylon</i>	1789	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	1957- J/
<i>Iva arbritica, i. Zbamapityi 574. mofcbata Menf-</i>	1789	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	1957- J/
<i>pelttyfium ibid. MuftbataRbat, i. MtUifolium</i>	1789	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	1957- J/
<i>lvabzba Pifon.</i>	1789	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	1957- J/
<i>Iva-f>zcavga, i. Sarfaparilla</i>	1789	<i>Lacryma Jobi S. Miliun Arundmac,</i>	1957- J/

I N B E X

	Pag-		pas-
<i>phyllus</i> i5 Jo. luUa V'wginiana 8&2. lutea 'vulgaris ejufque species I oar galericulata J72, f73-fur pure a fpicata lv^S. cxrnUci fpicata^ v. Veronica	84	5	1777
M.			1698
<i>Macandm Bontii</i>	1442		ins
<i>Mafarandiba</i>	I ^1		1703
<i>Macer vuterum</i>	1779		77
<i>Macoxacotifera arbor</i>	179?		1565
<i>Matock Virginianum Pepo, is species</i>	641		649
<i>Afabejuszr</i>	I 6^9		i5^4
<i>Macvuna</i>	BUB		1670
<i>Magtiti</i>	J 199, lioo, JIDI		1414
<i>Mahaleb</i>	I -j4^		1784
<i>Anfchi H.M. Rhamni Malabarici species</i>	1474		1749
<i>MailEdou - *</i>	1557		571
<i>Katou-Mail-Elou->></i>	1557		1114
<i>Mail, Ornbi</i>	I 00		327
<i>Major ana ejufque species 517, 538, 539. Syriaca</i>	5x6, 327		1323
<i>*vel Cretica^*v_m Marum_2</i>	167		18DX
<i>Adala-Elengi</i>	jj 65		1581
<i>Malabathrum</i>	157		177?
<i>Mala-Poeva H.M.</i>	1597		37*
<i>MaUam-Toddah H. M.</i>	1597		Abrotani G-B-
<i>Mallamothe fzu Pa<vatz</i>	157		ibd.
<i>Al^Kv* fylveft+ei annu* 597, T%T% Syl've!/:perennes J99. bortenfeji feu Rofete 600- arborea maritime 6 p 1. Vzmta few boraria></i>	ID 67		4^5
<i>iWtftf zstibiopica 67 3. infana</i>	ibid.		1*49
<i>Afe/*f fylvefirus 1448. domefiica feu fativa</i>	144J		1671:
<i>Artemisia</i>	1513		723, 1881
<i>Arantia</i>	1658		fdecbinum Zinz, iberi affinz
<i>Aurea^ i_m Cydnyia</i>	1452, 1453		544
<i>Citria</i>	1654		Medic* cochleata: spinofa & nm spinofa van* species 961, &c.ady66. feuteUata 961. deliata* 962, 963. ciliaris 965. mar'n'tma ibid, orbicular* 961. lunata
<i>Cydonia</i>	1452, 1453		961
<i>Limonia</i>	1656		961
<i>Medica</i>	1654		71*
<i>Perjica</i>	1516		Medica faiwa
<i>Punica S. granata</i>	146131451		Medium five Campanula Mariana
<i>Indica porno angulofo (Catambolas) 1449</i>	1449		Mzeru, u Vanna Indica
<i>>Indica frufu pentagono (Eilimbi) ibid.</i>	ibid.		RtlantpyrUfn-ejufque species ' 774/775
<i>Mamanga frutex Pifon.J. 183. Frutex eft in Erafilia arborefcens^tbiofue vb'viztsj^nfitanorum vulgo Lavapraras ^?c?<j. Flores fert multos, penduhs & luteoij&pofti bosfiliquas plurlmasjjblongas, copulatas> frimitm quidem uirides^ fed mox nigras & futri; 4<*> & frejuens femem in iUis contentum. Folia habet Citrus baudijimilia^ paullv^ tamen longiord & mottiora^ vulneribu5 ataye ulcetihzt* medendis Lhirurgis expetita. Succctts ztiat oleofm ^e Stlijuis .'' txprefftu/ admaturanda apoftemata refervatur.</i>	1665		623, 779
<i>Mamay arb.</i>	I 665		1344
<i>Mambn Arundo</i>	I 315		1108
<i>Mamoera^ i. Pepo arborefczns</i>	1370		1654
<i>Manaca Marcgr.</i>	I 612		1654
<i>Mancinello</i>	1646		1516
<i>Maxdthoca MajidiibtL</i>	I 683		146131451
<i>Mandragora ejufque species</i>	668, 669		1449
<i>Mandsjadill.M.</i>	1752		ibid.
<i>Mandobi, 1833.1/. Mnndubi</i>	- 9 19		ibid.
<i>i^W*r<*>. H.M.</i>	7 J1		ibid.
<i>Mangaiba Marcgr.</i>	1^44		ibid.
<i>Mangier bianco</i>	I 6 CI		ibid
<i>Mangaratia^ i_m Zingibzr</i>	177X		1467
<i>Mapgyfiam</i>	1652		647
<i>Mangue S. Mangle</i>			179*
<i>Manjapumeram H. M.</i>			Melocorcopali Scalig.
<i>Manna, <v_m Fraxinus</i>			Melongena 673, 674, i. Attitf iw/i>*
<i>Mantts marina</i>			Melo-pepof <v. Pepo
<i>Many I-Kara, i. Frunus Chinenfis</i>			Melochia]. B. v- Corchorus
<i>MaracQckfeu Maracot, i. Flos pajfionis</i>			Melocotena
<i>Maragofa Lufitanorum^ i. Cucumis</i>			Mmiba Corymbiftra, -V. Cofius bogorum
<i>Maranda Zeylani. Myrti species</i>			Mentba ejufque species 530, 551,
<i>Marotti H.M.</i>			Mentbafrum tju^ue species 549, 5 f^.
<i>Marmzhs, Marmelada</i>			-tuberofo radict
<i>Maratatabiba Marcgr.</i>			Mentba cattaria^ctifque species 374
<i>Maripendam</i>			Mercurialis ejufque species 163.
<i>Marrubium aquaticum 535. nigrum ti. Ballote 571</i>			Zeilonica
<i>album 555, 556, 557- AlyJJon dittum ihnigrum</i>			Ilx. Vtr&mana 1458. ImrnOu C...
<i>* Cteticum Alp.</i>			Cmttfttr J. B.
<i>Mart agon S. Lilium ffontanum flore reflexo, 1112, . 1113, ^ Canadenfe H09. Chymifiarum 1110.</i>			Mg
<i>Pompom</i>			
<i>MarumvulgaYefio. Cortujz</i>			
<i>Mafarandiba Pilbn.</i>			
<i>Majfoy cortex</i>			
<i>Maftiche gummi Lntifcin.</i>			
<i>Mates fruitus</i>			
<i>Mater bzrbarum, i. Artemijia</i>			
<i>Matricaria ejufque species 357'. Abrotani G-B-</i>			
<i>348. Alpin. fol. Charnxmdi</i>			
<i>Matz^atli Hsrnand.</i>			
<i>Matrifylva</i>			
<i>Mayx, Frion m turn Inch cum</i>			
<i>Kiecaxocbil</i>			
<i>Mzcapatli</i>			
<i>Mecboachenoa</i>			
<i>fdecbinum Zinz, iberi affinz</i>			
<i>Meconium^ u. Opium</i>			
<i>Medic* cochleata: spinofa & nm spinofa van* species 961, &c.ady66. feuteUata 961. deliata* 962, 963. ciliaris 965. mar'n'tma ibid, orbicular* 961. lunata</i>			
<i>Medica faiwa</i>			
<i>Medium five Campanula Mariana</i>			
<i>Mzeru, u Vanna Indica</i>			
<i>RtlantpyrUfn-ejufque species ' 774/775</i>			
<i>Mdandryon Plinii, i. Barba capr*</i>			
<i>Melanthiumj. Nigella 1070. odor at wn</i>			
<i>M^hagrisi. FrittUarid</i>			
<i>MeUnken</i>			
<i>Meliantbits Africanus</i>			
<i>Melegueta 120 5- Spuria</i>			
<i>Melica^ i. Sorghum</i>			
<i>Mdilotus ejufquz fptcies gfip, 951, 1893 quin*</i>			
<i>Tragi J. B.</i>			
<i>'4fa* #*Cv tfofruticofa Sicula acetabnh*</i>			
<i>Molucca 508. Molticcana.</i>			
<i>Mdocattus</i>			
<i>Melo ejufque species 644, aquaticus</i>			
<i>Melocorcopali Scalig.</i>			
<i>Melongena 673, 674, i. Attitf iw/i>*</i>			
<i>Melo-pepof <v. Pepo</i>			
<i>Melochia]. B. v- Corchorus</i>			
<i>Melocotena</i>			
<i>Mmiba Corymbiftra, -V. Cofius bogorum</i>			
<i>Mentba ejufque species 530, 551,</i>			
<i>Mentbafrum tju^ue species 549, 5 f^.</i>			
<i>-tuberofo radict</i>			
<i>Mentba cattaria^ctifque species 374</i>			
<i>Mercurialis ejufque species 163.</i>			
<i>Zeilonica</i>			
<i>Ilx. Vtr&mana 1458. ImrnOu C...</i>			
<i>Cmttfttr J. B.</i>			

	Pag.		Pag.
<i>Metl Hernandez, S. Aloe Americana</i>	1201	<i>cay terrestri famili* 1ix. Filicinzt* ib. pyxioides Y14.</i>	
<i>Met el nux tjuorundam^ i. Stramonium 747. Officina-</i>	I 81 5	<i>arborezts, U/nea Officin., C. B. 114. arboreus</i>	
<i>rum</i>		<i>cum orbiculis ibid, pulmonarhps</i>	11 6
<i>Mmm ejufyue Jbecies 43 r. Alpmum umbeUa purpu-</i>	453	<i>MutteflinaJ.K</i>	4 ^ 4
<i>rafctnte C. B!</i>		<i>Myagram fat'vum 820. monofpermon 838. Sihejua</i>	
<i>Mez,ereon Germanicim, i. Laureola</i>	J 5 87	<i>longa S. Camelma 811. rslP/cr.</i>	I g87
<i>Micambe Angolenfium</i>	'3 ^ 9	<i>Myofotis, i_m Auricula muris</i>	2,42^ 245
<i>Milium ejufiue species 1150,1251. Arundinaceum</i>		<i>Myofotis Scorpoidvs</i>	• 6 5 6
<i>Sorgo norhinatum 1152. Arundinac. Lachryma</i>		<i>Myofuros</i>	13 ? 2 r
<i>J'obi di&un±\</i>	1253,1908	<i>Myrica vulgo, u Tamarifcus</i>	17 04
<i>Milium.Solts, i. Litofpermum</i>	5 ^{D2} M J ° 3	<i>Myrobalanus ejufiue species</i>	153 ^ 15; ^
<i>Militaris, Ai&oides, i. Stratiotes</i>	13 24	<i>Myriophyllon pelagicum Zortufi Cluf</i>	" ^ 69
<i>MiUefolium terrzfire gjujfiue species 344, E^c. *^<f-</i>		<i>Myriofhytton, i, MiUefolium/</i>	344
<i>ri#7# umbzlatum 459. aquat. minus 1321. aquat_m</i>		<i>^ ^ r ^</i>	^ 4!
<i>dictum Viola aquat. iioi. palufire galericula-</i>		<i>Myrrbis ejufyut species 43o; 431.,,fylvefiris feminib.</i>	
<i>tum 1322. aquat. pennatum fpicatum 191. tf^ ^ r.</i>		<i>asperu</i>	4 ? x
<i>cornrttum ibid, rf^ tf. Ranunculi flore & capita</i>	586	<i>Myrtogmifia Cap. B. Spei Breyn.</i>	1731
<i>Nillegrana major 214. minima, Alfines species 1026</i>		<i>Myrtus ejufyue species 15 o I • Brabant lea</i>	1707
<i>Mimofa ejufque species, i. is£fcbynomene 979. -K*/-</i>		<i>Myrtidanum</i>	1 y" p2
<i>Todda-vaddi ditta H- M-</i>	174°	<i>Myrtillus, i. Vitis Jdxa</i>	1,480
<i>JVf/WiH.M.</i>	173?	<i>A/ ^ i. Sebeften</i>	1555
<i>A % ;</i>	1795		
<i>Mirabilis Ferwviana</i>	397J 39^	N.	
<i>Miracaiba Pifon.</i>	I. ? 6z	<i>Nagam H. M:</i>	1753 ^r
<i>M/r/i Pifon. Palm* species</i>	ibi d.	<i>^ IL M.</i>	1635
<i>Miztquitl, Hern. I. Acacia</i>		<i>Nanar, i. Ananas</i>	1332
<i>Modagam H. M.</i>	I 544	<i>2VW* Eruatam</i>	1785
<i>Modera-canni</i>	*47°	<i>Napeca S. Nabca, i. Denoplia</i>	1534
<i>Mogoriflores</i>	1811	<i>Napellts ejufiue species, i. Aconitum</i>	701
<i>Molagomaram</i>	1J4?	<i>NapobraJjica</i>	797
<i>Mo ^ ^ r^or</i>	15 ^ 2	<i>Napus</i>	801
<i>t/loUugo montant</i>	481	<i>Narciffus ejufoue species 1 T 3 o, 1131, E^c * </114°-</i>	
<i>Molon Phnii, i. Filipendula</i>	61 3	<i>r^<^q longiffitnv S_m Bulbocodium &- PfeudozNar-</i>	
<i>fAoluca</i>	568	<i>ciffus 1130. media longitudinis 1131. £rex/i c<-</i>	
<i>Kerb a Molucana Acoftie</i>	352	<i>//ce Monantbes 1133- frgyi c^/ice Volyantbes</i>	
<i>Moly ejufiue species III9, IIIOj 1121,1122,1123</i>		<i>1133. juncifolius 1037- Japonicus 1142. J><f-</i>	
<i>•-----Mojchatum</i>	1119	<i>c^f S.Lilionarciffus 1141, 1142- maritimus, i_m</i>	
<i>Momordica, i. Balsamina mas</i>	647	<i>Pancreatium 1140. Indicus bifolius, serpentarius</i>	
<i>Aow ophyllum</i>	668	<i>Column. 1126. Autumnal is</i>	1143'
<i>Monorcbis</i>	1117	<i>Narcijjo- colchicum^ i/u Colchicum 114 3</i>	
<i>JWor^ r>£; *</i>	1639	<i>Nardusagreffits^ i. Afarum 207. Ce/tiM 391- Iw-</i>	
<i>Mor'mga.</i>	J74J	<i>^/c^ / ^ > y^ jcll</i>	191 o
<i>Morfus Diaboli, -i. Succipz</i>	383	<i>Naregam</i>	1656
<i>_____ gallints major, La miu species</i>	f 80	<i>JSTarrbecium Tbeopbr. i_m Ferula</i>	4x0
<i>_____wwwor Veronica species</i>	848	<i>Narumpantl H. M.</i>	163S
<i>_____ran*, u Nymphaa min.</i>	1310	<i>Nafiurtium ejufyuz species B25, 1B86. affuaticum</i>	
<i>Morus ejufque fpzesh</i>	1429	<i>814. aquatic 1 & Alpinu *vari<B species 814, 816,</i>	
<i>Mofchatellina</i>	684	<i>817. petraum^z_m, Bur/a pafitoris min. 827. Vahn-</i>	
<i>Moul-Ila S.Elavo H. M.</i>	1658	<i>tinum Cluf £ B2b. verrucofum.i. Uoronopus RueSii</i>	
<i>^i^ot E^vum S. arbor famgrz fpi^oz^ H. M. 1B9B</i>		<i>843. bybernum</i>	B09
<i>Myullava</i>	175z	<i>NafhurtiumIndicum</i>	487, 1B69
<i>Mourowve</i>	1540	<i>NatrixPlinii</i>	955
<i>Mmuüaiba & Mocitaiha Marcgr.</i>	1712	<i>Jfo/w* Jfffort H. M.</i>	1503
<i>Mucuna guavu Pif.</i>	1889	<i>Negundo</i>	157J
<i>Mugo Pini species</i>	1373, 1400	<i>Neiemelfalib Gramen</i>	127 2
<i>Mundubi Marcgr. i. Aracm ^oz^z^</i>	919	<i>Nela-poutli</i>	45 *
<i>^oz^oz^ Pif. Rm^oz^ ^oz^oz^.</i>	166	<i>ISfyw S.Scorpis, i. Genifla [pinofa</i>	1729
<i>^oz^ H. M- i. Jafmimm</i>	1500, 1601, t^r.	<i>Nenuphar S.Nymphaa</i>	1, j^
<i>^oz^oz^ Br</i>	1548, 1501	<i>Nepeta ejufyuv species</i>	548, 549
<i>^oz^oz^, Col.</i>	955, 1031	<i>Nerhn S. Rhododendron</i>	
<i>MureciPi(on</i>	1533	<i>—> ^-i Alpinum S. Lt dum Alp*</i>	17 67
<i>Murucugifera arbor</i>	1789	<i>Nbambi Marcgr.</i>	1346
<i>Murucua, u Flos FaJjicnis</i>	649, 1874	<i>Nhandu Marcgr. i. P^er longum</i>	J 343
<i>Mufa arbor</i>	H7?	<i>Nicotiana ejufiue species</i>	712
<i>Mufcari Hyacinthi species</i>	1161	<i>JVJf* Brafil.</i>	1 y j o
<i>Mfctpula Lob. 1 oQ*.nmfn[o flore</i>	1001	<i>JV/V^i 01/J, i. Urobanche</i>	1228
<i>^oz^j</i>	114, 1851.	<i>Nigella ejufyue species</i>	
<i>^oz^oz^ 55, ^oz^oz^ 78,79. ^oz^oz^oz^ 113. ^oz^oz^</i>		<i>Ni£eUaJlrum, *v. Lychnis fegetum</i>	99 8
<i>^oz^oz^ 114. Jf^<^> US. ^oz^oz^oz^ 120. ^oz^oz^oz^</i>		<i>JV7 ^oz^oz^ i. ^oz^oz^</i>	92 i
<i>^oz^oz^oz^ ill- ternjtr* vulgar^ 112. ^oz^oz^oz^</i>		<i>Arabum</i>	

I N D E X .

		pag-
—Artihffl; i. Convolvulus	'IZ'L	
Nilka maram H. M.	IJ5^	
Nür-Pougeikn H. M. 1764. Nür-Notsjil	157;	
Nimbo Garcia & Acofite	1 ?4?	
Nmzin radix Zhinznf. I 3 3 8^	19ft	
—H. M.	1 644	
—H. M.	1655	
—W r; H. M.	J 55*	
Nochez, nnpalli Hern. i. Fiats Opuntia	145	
NWw/* Hern.	ibid.	
Noela-Jaii i. Berberii Indie a	16p6	
Nolfy^e tanger c> i. Balfateina, drc.	I 328	
'Nola-Ily, i. Bambu Armihhis spec.	I 316	
Zara-Nofi & Bm-Noji H.M.	1 57 J	
Nuciperfica * ^	1516	
Nurtottilaria ejufijaepecks	ID 99J x 9^ 3	
tfox Avtllanq, *v_m Corylus	I 279	
—f	I 254	
—ejufijae ff>ecks	I 277, I 213	
—Jujrlai* Virginiana mgra-	ibid. I 279	
—mojc hat a'cl'/'<'*? jje ties *	I 221	
—veflecaria, i. Siafhylodndron	1691	
—Vom'ica Officin.	1814	
Nucula terrestris; i. E^lbocafianum	440	
Ny4 /' H. xM.	J 606	
Ny4 H. M.	1499	
Ny4aa ejufiyue species	I; 19, I 213	
O		
—tichras S. Er*vilia DDCL 899		
Ocfmajrup Vahriantbus Lob. i_m Valerian* ruhra		
3H9. Verriicarium Gefn. / . tirc^ -;oi. ^/ew-		
r/w<w CluT i. Marrubii (pecies		
Uejmtoi Jes ejufyuz species '954, 995- Lychnitis Cq1.		
Ocohxochhl thrn.	id; i	
—ejufiyue (pecies '540, 541, 1^71- Cereal?, i.	lh\$	
—gij		
UdaRam H- M. l. Manga, venciata	I 252	
Ddontis qühif Jam J. B. 1/ Lychnis	1000	
Odontitis hitta VaUrاند J. 15.	472	
Oenambe aquatic* 440, 44-1- Afyco^i, i.	1000	
—	536	
—	1 25	
—H. M.	1566	
—		
Dhafatma 154^ 1^4^ M4^ Sylmfir.	IJ44-	
—Bohanka \	157^	
—oleander ejufijue /pecies, i. Nritim	17'67J	
—Ulibanum S. Thus	1840	
—Ojra	124?	
—Hippofslinum	428	
—HifpajiMm, i. Spinach la	161	
—Judaiëum I D 6 3		
Vnohrychidis *varia Jpecies 9; 6, 937. Semim cly-		
peatoafpero 919. ftrnim dypeato l^vi C. B. 917.		
incanafoL lovgionb. C-B. yi^ineana fvl. fub-		
rotund. C. B. ibid. Dzltf gallinaceum faftum	914.	
—arvenfis, i. SptculumVemris	742	
—Lyfimachia Jilijuofa	861	
—	1792	
—	957, 958, 959	
—Cardui /pecies	213	
—Ger.	153	
—	126	
Ophiofcorodun yuibufdam	1220	
Ophis bifutiM *j*f_w fa	1232	
Opium	854	
ppoponax	410	
Opulus Itah	1721	
Opuntia ejufiyue /pecks, i. Ficus Ind. 146; . marina		11
Orchis ejufiyue /species Ii12j 1113^ t^c. 1907- f ^ "		
—c//^;^ 121 x, &c_m palmata 1x23. abortivaj. M-		
—*&J ^ ^ 1228. Anthropophora 121 %Melittias &		
—Sphegodes 1220. Myodes 1219. foetida feu Trtf-		
—gorcbzs 1212. Arachnitis 1222. Batrachites ibid.		
—Omithophora \111.hermaphroditka . , ibldi		
—Oreofelintm	4\$	
—Oregkella Cluf	1^7^	
—Origanum ejufiyue species 539., ?4^1 fjtulofurn Ca-		
—nadmfe	772	
—Origano congener Zatarhendi	1871	
—OrleanaS, brellana, i. Urucu	177E	
—Ornithogalum ejufiyue fpzcks	1150, 1905	
—Ornithopodium ejufquz /species	? ? ' 9 ?^	
—Ornithopodio affinis Stella Uguminofa	93.8	
—Omzfs, i. Fraxinus Jylveft.	173*	
—Orvbrtn ch z ejufque fp ecies	12 2 6	
—mafe dent at a	1224	
—Or obits fativas 91 f. fylwft. filiqiti* ere Bis	3122	
—913.^/X'. Jili^uisprovpndntibus gl6, 917j	1542	
—Orvala Dod. 1. Sclaraa	54?	
—Oruçoria fruttus	177&	
—Oryz^n 1246. Germanka	1243	
—DfniUndaregalis, i. Filix florida	151	
—Ofireain arboribus	1772	
—Ofrya, JIlmo fiwili^ *v_m Carpintres	1^25	
—Ofyris frutefcens bacdfera m	1489	
—Gr*ecorum	210	
—Otites Tab. 1. Sejamoides Salarrmntkam mag.	1002	
—Oxalis ejufiyue species, 1/ Acetofa 17 8j 1 7 9		
—Ovij crvva	1793	
—OtyaGracorum i. Fagus	13 81	
—Oxyacantha 145B. Virginiana	1797	
—Dxyacantfius Galeni, i. Berberis	1501	
—Oxycednts	141?	
—bxyccocos, i. Vaccinia pqluftria		
—Oxylapathum 17%_tuberof. American* Munt.	149	
—Oxymyrfine> i. Ruscus	66	
—Oxys S. Trifotium acetofum	1-7-	
F.		
—Paco caatinga Marcgr. Canna Ind. Sp.		1801
—Paco-caatinga ejufdem		1202
—Paco-feroca Canna Ind. /species		1542
—Pacourii		1205
—Pacoeira, i. Mtfa		179*
—Padn H. M.		1374
—Padm Theophr, i. Ctrafus avinm		175°
—Paenoe		14?
—Paianelli H. M.		14B2
—Palega-Paiamlli		17-11
—Pai Paroaa		ibid.
—Ftemria ejufijue /phies		16x4
—Faioimirioba Sena /species	693j 121, 1	
—Pala		517
—Paliurus folio Jujubino		174?
—Palma S. Mamts marina		1708
—Christi, i. Rkinus 166. Orchis palmata		177
—* datfyifera	15 J, 1153, 1734, 1734	
—prunifera Japonka, Todda Panna		123
—coccifera, Tenga		1360
—humills S.Chamarrhiphes		1356
—Palmarum -vari* /specki		1359
—Pdmapinm Lob.	13 53, ^5, 45	
—Paltifera arbor		1362
—Paludapium S. Apium pahjtre		1367
—		1364
—		447
—		1372
—		1373
—		1374
—		1375
—		1376
—		1377
—		1378
—		1379
—		1380
—		1381
—		1382
—		1383
—		1384
—		1385
—		1386
—		1387
—		1388
—		1389
—		1390
—		1391
—		1392
—		1393
—		1394
—		1395
—		1396
—		1397
—		1398
—		1399
—		1400

I N D E X .

	pag.	
<i>Fragaria palustris</i>	1077	
<i>Fiat</i> My Orientals 1705L Occident. 1707, 19*9- J>		
<i>dicw duplex</i>	1791	
<i>FUgmsria murabds Breyn. i^Sdago</i>	18 J x	
<i>Plumbago PUnii Ger.</i>	3?4	
<i>Plumbago G&aiana palust.</i>	73 9	
<i>Plumbago</i>	1711	
<i>Plumbago H. M. Saponaria</i>	If 48	
<i>Fdcwtmum pelrawm Gefneri J. B.</i>	^- Lychoss vif	
<i>F&lsmtaium, i. Tnfolium frrticani flare luteo</i>		
<i>Fidium mQüX&uun ejuffc^ fpecus 5x4. Gnaphdivdes</i>		
<i>Alp&ttm</i>	195	
<i>Fafydcantbas Cafabo** Jm B.</i>	515	
<i>FplygaU vulgaris</i>	*335	
<i>Palygala Vaknitna Cluf 9x4- Folygalx major</i>		
<i>Majfdiotica C.B. 925., dumetorum fie. vario,</i>		
<i>fli* articulatis C. B. 9x5- Indica minor, Co-</i>		
<i>lin4 H&A 1734 jg* G&Bulffia C&P&P</i>		
<i>£ m&scuum 3^8. Cartufiy B-</i>	925	
<i>FUygnatum. ejufq^ Ifzcies</i>	664, 665, 675	
<i>FMygnum ejuffive species 184, ^t- i^«w xix^ XI ;,</i>		
<i>bacciferum i6^%. f*mina E)od. <v_mEq*ifetum 1x9-</i>		
<i>nivzum 18^%. cocciferum Yolonicum 186. h&Z&t</i>		
<i>*verjvic* lato SerpyBi folie Lob. XI4. Knawel di-</i>		
<i>illum</i>		
<i>Fcljfodiwm ejtifijuc fpecks 136, 137- Brafilianum</i>		
<i>Marcgr- 14X. Z&^/^-wwBrcyn.</i>	13^136	
<i>Pdjrrbtzs* Ariftmloch'ui</i>	- 765, 1884	
<i>Fdpatric m& m&um ejJfauc ffcies,</i>	1x£	
<i>F&mm& Alamit *v_m Malus Ltmowd</i>	16 6v	
<i>F&mm& m&um</i>	.675. if* < 1877	
<i>F&ng& H. M.</i>	144^	
<i>F&ng& m&um</i>	47??	
<i>F&ng& m&um H. M.</i>	1717	
<i>F&ng& m&um</i>	1495	
<i>Tsj&vu-P&magam</i>	1611	
<i>Fm&ma</i>	1517	
<i>Tj& m&um</i>	1517	
<i>Pofid& ejufyve fpectis</i>	1417, 1418	
<i>PtriCeraOio affiues</i>	63	
<i>Farrwo ej. f& m&um 13.6. S&f& m&um</i>	2.47	
<i>Fortulaca aquatic* Ger.</i>	2035	
<i>Fvrudaca ejufau& species</i>	A B3 7	
<i>Potanugitim, ejufqu& species</i>		
<i>PtXcrio affints Pimpimlla foinoja</i>	1492	
<i>Paterion Difcaridtt, i. Tragicantb*</i>	957, 914	
<i>F&ant & r. Arg&nt&ia,</i>	617	
<i>Foualetsj *H.M.</i>	1634	
<i>Prajfivm, i. Marrubium album</i>	555	
<i>Priapeia Gefn. i- Hicotiana Anglica</i>	715	
<i>Primula veris ejufyuc species m 1080, 1081, e&v.</i>		
<i>Prunella ejufyue species 5JI> Jf XJ I Syr</i>		
<i>Pnaues ejufyue species I fx6, ^r, [ylwfr. 15x7. iw-</i>		
<i>f&va</i>	1	
<i>Fran& f&focfri affinis Cahadenjis C- B. , 17 8 x</i>		
<i>Piuido-afpbodtluf paluftris</i>	1194, 11 9 J	
<i>Pf&udo-bunidSy u Barbarea</i>	309	
<i>Pf&udvcapficum Dod- i- Sulani species</i>	673	
<i>F m& p&t m& m&um Afmny;nus flo. Cvlutea. C&u.</i>	1772	
<i>Ff&udo-ajf&er flo. Itit. J. B.-l. P&ss&x H&rc&f. 409, 410</i>		
<i>Ff&udo-ajf&er Lob.</i>		
<i>Ff&udo-ajf&er</i>	557	
<i>Ff&udo-ajf&er</i>	11 b 5	
<i>Ff&udo-dig&it&e P&rticx foliu' BoCC.</i>		
<i>Ff&udo-n&rt&e&ium, i_m Lych&nis figetum</i>		
<i>Ff&udo-ajf&er</i>	Ixx6	
<i>Ff&udo-ajf&er S_mN(*ciJf<s tub* f&ng& m&um</i>	Bulbo-	
<i>ca&um J. B.</i>	1.37	
<i>Ff&udo-ajf&er, i. L&rt&e&ia</i>	551, 482	
<i>Ff&udo-ajf&er fpecie' 344- Auftriaca xS7- Alpine</i>	foL Matricarnc 18 64	
<i>Ftarmica foliis profundius f*rratis, l&t viridibx& eU-</i>		
<i>ttor Herman. Cat. App.</i>		
<i>Ftarmica Alpina incanis ferrat&s foliis c&ii^em ibid.</i>		
<i>Ptarmica Rbaphani aquatici folio ample</i>		
<i>D.^&ejufdemibid.</i>		
<i>Puchaminifera Virginuma,</i>	17?*	
<i>Pulegium ejtifqu& species</i>	173	
<i>Fulmynaria arborum, i. Mufci species</i>	116	
<i>----- " " 0, i. Hieracium</i>	249	
<i>----- maculofd> S- Symphytum</i>	488, 4S	
<i>----- Gallorunt</i>	13:8	
<i>fuls</i>	1x49	
<i>Pulfatilla ejufau& species</i>	673, 63& 2	
<i>tyeno&vros</i>	315	
<i>Pyracantha</i>	1457	
<i>Pyramidalis? *u. Campanula</i>	737	
<i>Fyretbrum Bellidis port</i>	355	
<i>----- UmbeJliferum</i>	46%	
<i>Pyrsla ejufage species</i>	1x33	
<i>----- Alfin&e fiore Europ&e</i>	110J	
<i>Yyrus fativa ejufyue fpecie</i>	145>	
<i>-----</i>	1451	
<i>Pyri (ylvzft. facie frut ex Brafil.</i>	17<f	
<i>Pytahaia</i>	1798	
<i>Pjcielt Hern. L. Nicotiana</i>	751	
<i>^u&hyy&a</i>	1795	
<i>Quadrifolium bortenfe album, <v. Tnfolium</i>		
<i>^u&drifolium Ferfiatm Zanoni</i>	11 0?	
<i>Quamoclit, i. Convolvulus</i>	73^	
<i>^uera-iba Brafil. Marcgr-</i>	17^U	
<i>^2&ercvs ejufau& species 13 8 f 7 I j t ^</i>		
<i>----- marina, i. Alga</i>	J>^	
<i>Qu&ff m&um ejufqu& fpecie 6lo, 6ll> 612, 62&</i>		
<i>-----</i>	1068, 1727	
<i>Qumgamb*</i>	1736	
<i>Qumquina, i. Arbor f^rifug*</i>	- *08	
<i>\$u*mua Cluf Amaranti species</i>		
<i>guity Brafilienfibus</i>		
<i>4 f& m&um 5. Cepficum</i>		
<i>Radkula'DoA.</i>	804	
<i>Radix S. Helen*</i>	1337	
<i>----- car&e</i>	976	
<i>----- c^i/^ minima Gsr.</i>	684	
<i>----- f& m&um, i. U& m&um</i>	148?	
<i>----- Rbodia</i>	614	
<i>----- Urjina, i. Meum</i>	477	
<i>Rancena-poumaram H.M.</i>	1577	
<i>Ranunculus ejufqu& fpecie' ^i^&c.ium l&Jia</i>		
<i>iS^&pratef& arvenfir ibid, m&morofus dulc&</i>		
<i>584. e&bmatus jBf. f^/i^rir ibid. & fti-fla**'</i>		
<i>metis q^%-l_m&gramineus ibid, montanus 588, fBj></i>		
<i>f 90. grumofa rod ice ^91. Afiatkm grum&ja ra-</i>		
<i>ch& f& m&um, f& m&um, f& m&um</i>	5H>>	
<i>Ranunculus nemoroj&us, v. Anemone nemorum</i>		
<i>----- rut aceo folio</i>	5?6	
<i>----- fl&areghbojo</i>	70*	
<i>Rbapbanus z&ju&que species</i>	804, 805	
<i>----- rufiicanus</i>	816	
<i>----- aquaticus</i>	ibid.	
<i>Rapbaniftrum</i>	18B7	
<i>Rapiftrum flore luteo, I. <f& m&um</i>	803, 804	
<i>r----- A m&um, S& m&um</i>	804	

INDEX

	Pag.		Pg.
<i>Scolymus tjaftjw fptciet, i. Cinara</i>	299	<i>Sigillum B. Maria</i>	80
— <i>Cbryj'anthemus</i>	258, 213	— <i>Solomona, v. Polygonatum 664^ 66j / ^</i>	^
<i>Scoparia, i. Belvedere</i>	X10	<i>Silacus Plinii</i>	4J?
<i>Scorodista</i>	775	<i>Silene montanum 439. Creticum folio Ccuta</i>	464
<i>Scordium</i>	1014	<i>Siligo, z. flos farina</i>	1240
<i>Scorodonia</i>	ibid.	<i>Silym ^ or ejufque species 171 B- . Sylvestris Jpi-</i>	17
<i>Scorodopraj'um *</i>	1121	<i>nofa Arbor Indica> u Coral arbor</i>	17 2 6
<i>Scorodithlafpi Aldrovandi J. B-</i>	834	<i>Siliquastrum, ^u. Capficum</i>	271
<i>Scorpioides Bup leuri folio</i>	930, 931	<i>Slip hi en S. Laferpitium</i>	413
<i>Scorpioides leguminofa 931- Portulaca folio C- B-</i>	957	<i>Silybum, i. Carjuus leucognipbis</i>	172
<i>Scorpius ejufque species</i>	17*9	<i>J/><pi ejufae fpeties Soi,%oim</i>	793
<i>Scorz>onera ejufque species</i>	24^ J 2,49J & Cm	<i>Alpin. Bxot.</i>	182 J
<i>Scrophularia ejufque species</i>	764,765,1884	<i>Stnapifirum Ind.</i>	5
— <i>minor J. B. l. Cbelidonium min.</i>	579	<i>5^ ejufae species 443, 444- Eruca folio</i>	C.U. 450
<i>ScuteUaria</i>	572	<i>Sjouanna-Amelpodi</i>	1507
<i>Sebesten</i>	1555	<i>Sifarum</i>	442
<i>Stcaacul Arabum Lngd. u Vafinaca Syriac.</i>	443	<i>Sifon 443. Alpini ^ExDC.</i>	461
— <i>AV 3. i. Crithmum fpinofum</i>	469	<i>Sifymbrium, i. Nafurtium aquat.</i>	1
<i>Secale</i>	1241	— <i>i. Mentha aquatica</i>	1 6 &
<i>Secamonei. Apocyncrti</i>	10^7	<i>Sifyrrhynchium ejufque species</i>	1 6 &
<i>Securidaca lutea major QB. 921. Pennai</i>	928.	<i>Stum Matth. & Italorum 814. wi>> impatiens</i>	K14
<i>Sicula filiquis foliaceis 935. l<??* minor filiquis</i>	936- filiquis planis utrinque dentatis 93^.	<i>W * * *#*r* ejufque species 655. / ^ w, 1. C<</i>	1
<i>dumetor, major, fio. varh filiq.articulatis C. B-</i>	92?	<i>volvulus major. & min. ^ii.hortenfis, u ^e J^0'</i>	1
<i>Sedum arborefcens Bontii 15B5. arborefcens Stapelii</i>	1878. ;<*/>// arborefcens J. B. 687. T>^/ ^ J vulgare	<i>lus</i>	1 4
<i>aliaqtie Sedi majoris Jpecies 687, 688, 1878</i>	1040, 1041, 1042, 1043? 10 44	<i>Smyrnum ejufque species</i>	436, 437
<i>SWi minor is vafculo bicorni species varia</i>	1041, 1042, 1043? 10 44	<i>Solanifolia Circa diBa3 v. Circa*</i>	1
<i>Sedum minus fteUatum feu echinatum 691, 692, 1B79</i>	1041, 1042, 1043? 10 44	<i>Solanum ejufque species 671, C^ . hgnofum</i>	1
<i>Sedum ferratum 1045, 1^96- Alpinum quartum</i>	1041, 1042, 1043? 10 44	<i>fruticofum bacciferum 673. pomiferum ibid.</i>	1
<i>Cluf! 1085. tridatylites 1043. tridat. teitorum</i>	1041, 1042, 1043? 10 44	<i>7J5. h^7> 1876, 1877. fpinofum Indicum 674.</i>	1
<i>ibid, minns fruticofum C. B. i. Kali frut.</i>	199	<i>ftu* 1B75, J876. tuberojum 67S* veficanum</i>	1
<i>Sel Serapicnis</i>	1B31	<i>681, 1876- Sommftrum verticillatum ibid. l*o</i>	1
<i>SeUgo India Orient. Breyn.</i>	^ 52	<i>/Atf< 679. racemofum Americanum 661. ?<w</i>	1
<i>Sempervivum ejufque species, v. Sedum 687- mar-</i>	1877	<i>7; / ^ J. Srrrfw^w 747, 748- Mexiocanum</i>	1
<i>rinum bacciferum</i>	1877	<i>flo. magno, &c. 399. tetraphyhn & tnpfyUon> u</i>	1
<i>Semcio. ejufque species 29a, 1B61- arborefcens Vir-</i>	1799	<i>Soljanella ejufque species</i>	726
<i>gmian. At rip Lie ts folio ...</i>	1799	<i>Solea equima j. B. f. /Vrr<w equinum</i>	930
<i>Stnna Alexandria 1742. Occidental* Yaivmirtoba</i>	1743	<i>Solidago Saracenicu ejufque species *79</i>	1
<i>dicta 91.2. Orientalis bexaphylla</i>	1743	<i>5 > ^ 9^fw / ^ # < 224,225. / o < / * D ^ / ^ W-</i>	1
<i>Seriphium l. Abfinthium</i>	37^	<i>Sandari H. M.</i>	1624
— <i>Germanicm, i. Sophia Cbirurg.</i>	812	<i>Soph era Alpini</i>	811
<i>Serpent aria tnpfyUa, v. Arum</i>	110S, 1209	<i>Sophia Cbirurgorum</i>	1937
— <i>Virgiman J. PolyrrbiMs</i>	763	<i>Sorghum</i>	1252
— <i>item Pulegii species</i>	544J ^ I *	<i>Sparganium ejufqtte species</i>	1311 91 10
<i>Serpent an a major & minor Lugd. l. Dracontium</i>	186, 187	<i>Spartium ejufque species</i>	1726, 1919
<i>III I- fxmna Filch. l. Biftorta</i>	186, 187	<i>Spartum</i>	1259, 1260
<i>Serpyllum ejufque species</i>	511, 511, 33^	<i>Spatula fxtida Iridis species, Xyris</i>	1190
<i>Serratula</i>	33^	<i>Speculum Veneris</i>	741
<i>Sefamoides parvum Matth. V. Cichoriumiff. Sa-</i>	186, 187	<i>Spelta S.Zea</i>	124^
<i>lamanticum magnum? i. Lychnis</i>	186, 187	<i>Spergula ejufque species</i>	1034
<i>Scfamum verum 1327- perenne Indicum Zanoni</i>	186, 187	<i>Sphacelus Tbeophr. C- B. l. S*/-w*</i>	509
<i>Grammis Ifchami species</i>	186, 187	<i>Spondylium ejufque species</i>	408, 409
<i>Sesban Alpini v. Galega</i>	927	<i>Spica Celtica 391. Indica</i>	512
<i>SV/cfi isEthiopicum frut. 476. pratensft 453. wo>></i>	927	<i>Spica> i. LavenduU minor</i>	1326
<i>tanum Cicuta folio glabrum 452. palufire laiTe-</i>	927	— <i>trifolia Alp. exof.</i>	1326
<i>fwns i. Thyjfidinum 413. mentanurn Fxniculi fo-</i>	927	<i>Spiraea alba tomefofa, u Carduus</i>	1326
<i>#0439. Maffilienfe Ger. 414. Offidnarurn CB.</i>	927	— <i>alba, i. Dxyacantha</i>	1326
<i>43&- Crsticum majus & minus i. Tordylium^i r,</i>	927	— <i>appendix</i>	1326
<i>4^7- Ptloponnenft Match, v. Cicutana 451.</i>	927	— <i>cervina, i. Rbamnus catbart.</i>	1326
<i>2 wovr. Pannon.</i>	927	— <i>Solfitialis> i. Jacea</i>	1326
<i>5/^ TP caW/0 Gcln. l. Ferrum equinum</i>	930	— <i>Burgi Monfpelienfi. Alaternm</i>	161
<i>Stylma J.B. i. Androfamum vulgare</i>	1020	<i>Spinachia ejufque species</i>	1527
<i>Sida-pou H-M.</i>	1788	<i>Spinus Virgilii</i>	1639
<i>HjJ/opifoli</i>	1788	<i>Spir&a Theophrasti</i>	974
	1788	<i>Split xl. Fumaria</i>	1850
	1788	<i>Spongia ejufque species</i>	1310
	1788	<i>Sqmnantbum, l. S^bxnanthurn</i>	1310
	1788		Statbys

INDEX.

	pag.		Pag.
<i>Stachys ejuſyue ftecies</i> ff 4, 5 j [^] 1872; <i>paluftrisfoe-</i>			
<i>tida</i> , i. <i>Panax coltmi</i> Gen	56;		37?
<i>Staphylinm Veterum</i>	465		859
<i>Staphylo dendron</i>	168 [^] 1919		912
<i>Staphis agria</i>	j D 7		1588
<i>Statice Dalech.</i> i o j	7		1619
<i>Stellqf guminofa</i>	938		424
<i>Stellar iq aquatic a</i>	122,3		748
<i>Sja^y ejujque ftecies</i> 32 [^] 324. <i>fruticofa</i> <i>Cretica</i>			977
3 ifo. <i>capitata</i> 'Rofixarini folio	323		1416
<i>Sttxcli[^] Arabic a</i>	\$13, 514		1768
<i>Citrina ejuſyue ſpecies</i>	280,2 81, 282		
<i>Stramonia ejuſyue ſpecies</i>	747, 748, 749		
<i>Stratiotes millefolia</i> 3 4 y, 3 46			
<i>Stratiotes</i>	\ 514		
<i>Strychnodendron</i> > i. <i>Amomum Plinii</i>	673		
<i>Struthium S. Lanaria Imper.</i>	1000		
<i>Styrax arbor</i> 1680. liyuida <i>Aceris folio</i> 16 [^] l. arbor			
Virginian* <i>Acer is folio</i> 1799- r [^] r [^] Officin.	1681		
Sty	1393		
<i>SHC</i> « <i>Stenifium</i>	1854		
<i>Stf[^]i/i Scabio fa ſpecies</i>	380,1866		
<i>Sumach S. Kb as</i>	14 [^] 0		
<i>Su-pim</i> Boym.	16 [^] 5		
<i>Swci exotici</i>	1844		
<i>SultanZambach</i> u <i>Lilim album feregr.</i>	n.10		
* <i>Stra</i> //<y<or	1? S 8		
<i>Syalita</i> H. M-	1707		
<i>Sycomortss</i>	14? 9		
<i>Symhyhtum majm S.Confolida ma.</i> [^] 04, 505. w*- culofum <i>S. Pulmonaria maculoſa</i> 489. <i>Pr</i> Bc- raginis facie 494. <i>petr&um</i> , i _m <i>Prunella</i> 5? r			
<i>Symphonia Dal cch. l. Am ar ant us tricolor</i>	20;		
<i>Syringa ejuſyue ſpecies</i> 176 [^] 1764. <i>Malabarica</i> latſecem, &c.	1785		
<i>Syfirhynchium S. Sifyrhynchium</i>	1166, &c.		
T.			
<i>Tabacum zj&fyuz ſpecies</i>	7 j		
<i>Tabaxir</i>	1? 1?		
<i>Tacamahaca</i>	186		
<i>Tacomaree</i> , i. <i>Arundo Saccb.</i>			
<i>Tacori Draconis arbor is folium fimik</i>			
<i>Tacuſa Lignum Angolenſe</i>	1808		
7W*	1399		
7% [^] H. M. 174?- 2%. [^] #i*	1746		
<i>Tagetes</i>	341		
<i>Tajaoba</i> Pilbn. <i>Braffice</i> * Sp:			
<i>Talagas Cingalenſium</i> 13 6 8			
<i>Tahir-kara</i>	1787		
<i>Tamaratonga</i> H. M- i. <i>Carambolas</i>	1449		
<i>Tamarindm</i>	174 [^]		
Occidentals	1800		
<i>Tamarix S.Tamarifcus</i> • 17 04			
<i>Tamoatarana Cannna Indica ſpec.</i> , 120 5			
7i w [^] P/i>i	660		
<i>Tanacetum tjufyue ſpecies</i> 365: <i>inodorum</i> 352. w- »r (? [^] re <i>Camphor</i> * C.B. w. <i>MiUefolium</i> 34.6. A- frictum, L <i>Flos African</i> ** 342			
<i>Tangaraca</i> Marcgr. i638. Pifon.	1794		
<i>Tawi</i>	1547		
<i>Tawif</i> <i>Brajilienf</i> Pilbn.	1662		
<i>Tawif</i> <i>ſpec.</i> , 5 [^] c/6/ <i>Uvisſpec.</i> Pifon.p. 182. caule »»» rii [^] altitudinem \ foliis oblongis an- trujtis dentati5> lanngmofis \ floſculis «A» [^] r/»j furnnum caulem, in pappos fatifcentibus. <i>Vulne-</i> <i>rariaefi</i> tnſignis			
<i>Tapyra coaynana</i> , i. <i>Caffiaſifiuh</i> <i>Brajilian.</i> 1747			
<i>Tapfm brfam</i> Gtr.	1094		
<i>Tarchon J. B. f. Dracu[^]cutu</i>			Pag.
<i>Tarzriaya</i> <i>Brajil.</i> Mar egr.			37?
<i>Tareroqui</i> Marcgr.			859
<i>Tareroqui</i> Marcgr.			912
<i>Tataiba</i> Marcgr.			1588
<i>Tataria</i> <i>Ungarica</i>			424
<i>Tatura</i> , <i>S. Datura</i> , u <i>Stramonik</i>			748
<i>Taxocoquamoclit</i> > i. <i>Sesban z[^]z</i>			977
<i>Taxus</i>			1416
<i>Tecomaxochitl</i> m			1768
<i>Telephium ejuſyue ſpecies</i> [^] Qy. <i>legitimum Imperati</i> , i. <i>Chamacifto affinis</i> +1016. <i>Dioſcomdir S. Scor-</i> <i>pioides</i>			9j6
<i>Tenga</i> H. M. l. <i>Palm a coccifera</i> . I 3 f 6			*4°3
<i>Terebinthina rejina dittd</i>			* £77
<i>Terebinthits</i>			14? 5
<i>Teregam</i>			225
<i>Terracrepol</i> ~ ^			1204
<i>Terra merita</i> Officin. <i>J. Curcuma</i> y*			572
<i>Tertianaria</i> J. B. -^^^*			895
<i>Terra glandes</i> , z, <i>Chamabaianus legumin.</i>			1C47
<i>Tellatiam</i> <i>Nieremberg. Hernand.</i>			1C47
<i>Tety-pote-iba</i> S. <i>Vitis arbuſtiva</i> Pi(on. p. 2fo. Ex <i>ſtercore Avium</i> <i>Tecyns w[^]a dkitur ad arbores</i> <i>Aurantiorum</i> , <i>quas maritat</i> , & <i>pr^e nimia luxu-</i> <i>rif tandem cooptrit & enecat. Folio eſt Myrti</i> <i>majcris fimili. Ex hijtis radicebz & ramulis</i> <i>contufis, dr oleo commum frixis emanat inſigne</i> <i>medicamentum ad vzntris & pedum inſtaiones e</i> <i>frigore ortas.</i>			1870
<i>Titragoma</i> <i>Theophraſti</i> i. <i>Euonymtts</i>			8; 9
<i>Teucriurn ejuſyue ſpecits</i> ?26,			608
<i>Teucrit S. Chamadryos fauria varia ſpec.</i>			179 [^]
<i>Teucrium Alpinum Cifti</i> <i>fiore</i>			4a;
<i>Texoillifera</i> <i>Mexicana</i>			1620
<i>TbaliHrum ejuſyue ſpecies</i>			1565
<i>Thgnia ejuſyue ſpecies</i> 4 i 8, 419, d [^] c.			1094
71 « <i>Chinenſium</i> , <i>Tſchia</i> <i>faponenſiufn</i>			1870
7% & H. M. l. Xwfi £. <i>Quercus</i> <i>Indie a Itontii</i>			8; 9
<i>Thapfm S. Tapfus barb at us</i>			608
<i>Thlajpi ejujite ſpecies</i> 809 [^] 1885. <i>Alyſon dictum</i> <i>ibid.. Vace aria folio</i> 830. <i>Drab<e folio</i> 831. <i>b<e-</i> <i>foliatHm</i> 832. <i>Saxatile</i> 853. <i>umbzllatum</i> 8 [^] 5. £- <i>ſcutatum</i> 8?6j 837. <i>fattiurn</i> , i. <i>Burfa pafi.</i> 8; 8. <i>Alexandrinum</i> <i>Conttſi</i> <i>l. verkm Dioſcoridis Zano-</i> <i>ni</i> 83 [^] . <i>Alpinum minus</i> 821. w/»/lj Ger. 825. <i>clypeatwn SerpyHi folio</i> 841. <i>montanum Glaſti</i> <i>folio ibid, anguſtifolium</i> , i. <i>Naſtrntium minus</i> 82 J. ito/i <i>Hierichontea dictum</i> 1711			1711
7#0J [^] Or<or <i>thurifera</i>			1840
7ft<p <i>Theophraſti</i> \$. <i>Arbor Vitte</i>			1408
<i>Thymbra</i> <i>Gracorum</i> , i. <i>Satureia</i> 518, 1873			1873
<i>Thymelaa ejuſyue ſpecies</i> I f 89, 1918			1918
<i>Thymus ejuſyue ſpecies</i> 519, 520, 521. <i>capitatus</i> <i>Cre-</i> <i>ticus</i>			519
<i>Thyſſelinum</i>			413
<i>Tibead</i> , i. <i>Hyacinthus botryodts</i>			I i6t
<i>Tigridis</i> <i>floſ</i>			1165
7M [^] * <i>ejuſyue ſpecies</i>			1694, 1695
<i>Timbo</i>			13 3 o
<i>TmBorius</i> <i>fios</i> , i. <i>Geniſta tinbtoria.</i>			172 y
TWJZ /wn/0 H. M.			156y
7/0/ij 5. <i>Laurus ſylveſtris</i>			
<i>Tiſioca</i>			1684
7//>i, <i>Attiani</i> * <i>Brajil ſpecies frutic. flo. albkanthy</i> <i>fruitu nigro rotundo</i> <i>Prunorum inſtar</i> Pi£ 276			1710
<i>Tira-caUi</i> H. M. <i>Tithymali ſpecies</i>			1807
<i>Tithymalus ejuſyue ſpecies</i> 063, 864, [^] - 1807. <i>Char arias</i> 863. <i>dendr aides</i> 864. <i>paralius</i> 8 of. <i>myrtifolitu</i> <i>ibid, cyanijias</i> 867.			867.

I N D E X.

	Pag-	pag-
<i>pineus ibid, belivocopus</i> 869. <i>verrucosus</i> ^m <i>i. tuberous</i> 5. [^] <i>itf?</i> B70. <i>Hibernicum</i> <i>iBBB</i> . £*£<-y?»j	1343	1155
<i>Tlatlancuay Hern.</i>	1343	
<i>Tlaollij i. Frumentum</i> <i>Indicum</i>	1249	
<i>Tlalpalcofatl Hern' i. F/OJ Africanus</i>	1 342	I 8S2
<i>Tlixocbil Hern. i. Vay mil as</i>	133a	418
<i>Tandi-Teregam</i>	17^7	799
<i>7R/fo P<<WM H. M</i>	13 60	1105
<i>Tocot-guebit</i>	18 To	-59
<i>Tomabuaili Hern.</i>	I B 84	1 1 1 1
<i>Topiaria Cynogloija J. B-</i>	5 ^ 2	791
<i>Tordylum spurium</i> 411 - <i>genuinum</i>	412	
<i>TormzntiUa ejufque species</i> 617- <i>Alpina folio fericeo</i> , * <i>v_m AlbimiUa</i>	209	
<i>Tototifera arbor</i> De Laet.	I 678	
<i>Trachdii species van*</i> 73*J7»J734J735	735	
<i>Tragacantha</i> 9 3 3 J 9 3 4	J 9 3 4	
<i>Tragiujf</i> v. <i>Hjpericurh alterum Diofcoridis, &c. J.B.</i>	1 1 1	
<i>Tragopogon tjufqut Jpefte</i> ^ 2J1, 2Jx, 253, 1 1 1	1 1 1	
<i>Tragopyrum Ger,</i>	182	
<i>Tragonganum</i> •	\$^23, 527	
<i>Tragzis</i>	1240	
<i>Tragus jpinfus Matth. i. K*/i /pinofum</i>	212	
<i>Tr^ j i. Cyptrtzs efcuhntus</i>	1 3 0 2	
<i>Trtmatz Marcgr.</i>	1 7 8 3	
<i>Tnbulum terreftzsz</i>	1 344	
— <i>aquatic us major</i> 1 321. <i>wwwor e?</i>		
— <i>Totamogiton minus</i>	1 B9	
<i>T i. S. S. Polythc</i> am	7 4 3	
<i>Tfolium tjufiue fptchz</i> 940, C^c. ^ 9 5 0. <i>acztofum</i> S Oxys 1098, 1903- <i>bituminofum</i> 943. <i>Afpalation</i> Col. 9J5. <i>Alpinum Rhaticum Ajtragaloidz</i> 95 6. <i>fellaturn</i> 945. <i>fragiftrum yfJupulinum</i> 949. <i>Lagopodoids</i> 94^ jRyi. <i>pain fire</i> 1099. <i>Hepaticum tjufiue species, l. Hepatica nqbilis</i> j8o. <i>Amerkanum /pizatum</i> 92B. <i>fpinofum Lre-ticum</i> C. B. Io?7. <i>Lufitanium corniculatum</i> Park.		
<i>Trifolium coebhatum</i> [pinsfum & lave, v. <i>Medica</i> ,		
<i>Trifilio affinis India Orientates</i> 13 45, 1914		
<i>Trifolium hxmorrhoidah, i. Lotus LyL</i>	968	
<i>Trmciatella Cordl, Cbundnll* fpeciej</i>	227	
<i>Tripollium ejufque species</i>	270	
<i>Trivrchts</i>	" 17	
<i>Triuzum tjufiue species</i> 1236. <i>Indicum, S. Mayz</i> , 1249. <i>accinum, i. Melampyrum</i> ⁱ <i>temulenta</i> ⁱ <i>m</i> <i>Lolium</i>	1162	
<i>Trixago, S. Triffago, i- Cbamzdrys</i> 527. <i>Apula un-caulis</i> Col. i. O*?2* ^tfff	771	
<i>Trolluts flos, u Ranunculus globofus</i>	700	
<i>Tsjakda H- M- FTKJ /pm></i>	14? f	
<i>TijapangamH. 'M..</i>	1737	
<i>Tijaka-Maram H. M-</i>	1 640	
<i>Coppa-Tijambou</i> 1479. <i>Malla-katou-Tsjarnbou</i> 1480	1 4 7 9	
<i>Tijane H. M. FN</i> [^] ^{y>}	1 5 5 6	
<i>Tsjeroekara H. M. 1497."</i> <i>Tsjerot-Katou</i>	1547.	
<i>Tsjeroe- Poem</i>	157^	
<i>TsjeriamCottam</i>	I 596	
<i>Tsbinka-Papoua Ind. Pifon.</i> I f	09	
<i>Tsjocatti</i>	1573	
<i>Tifbera terra</i>	11D, 11 f	
<i>Tyberaria Myconi, v. Ciftui</i>	1 o 12	
<i>7<^Mi <<^ Afthma</i>	1 3 17	
<i>Tucum Pfonis Palma: species</i>	13 61	
<i>Tucum Pfonis Palma: species</i>	173 6	
<i>Tucum Pfonis Palma: species</i>	114 ^ ^ - 19 0 5	
<i>Tucum Pfonis Palma: species</i>	1463	
<i>Tupa-ipi Mai egr.</i>		
<i>Tupi-e-wa, S. Scoparia</i>		
<i>Turbith Officin. al. Convolvulus</i>	I 8S2	
— <i>Garganicum</i>	418	
<i>Turritis ejufue species</i>	799	
<i>Tufai, i. Corona Imperials</i>	1105	
<i>Tujfilago ejufque fprzits</i>	-59	
<i>Typha paiuflris</i>	1 1 1 1	
<i>Typha w Hem.</i>	791	
V.		
<i>Vaccaria Lychnidis species</i>	999	
<i>Vaccinia, i. Vitis Id*a</i> 14B7. <i>wfe</i> 65? ^/»yifw.	1867	
<i>Valeriana ejufque species</i> 388, C^c. ^ ^ 39^	1867	
— <i>Gr^c* 1102. Mexicana</i>	1 9 2	
<i>VaierianeUa ejufiue species</i>	1 4 4	
<i>r ^ H.M. 17?4-</i> <i>Paxoni</i> <i>ibid.</i> <i>Teryam</i>	153^	
<i>Vaynillas Hijpanorum</i>	133^	
<i>VmcuSinenfis</i>	1 893	
<i>Veratrum nigrum</i>	^97J ^9^	
<i>Verbafulum ejufiue species</i> 1 oBo, I o B £		
<i>Vkrbazum ejufauz species</i> 1094, I09?. <i>Sal'vifolium</i> 511." <i>Sal'vifolium exoticum folio rotundiore</i> 10D7.		
<i>Lychnites Syriacum, &c.</i>	993	
<i>F*r W rj>/iio />< /<< 5 3 \$ j £ B71 • & ^ < I * MZ^m</i> <i>L</i>		
<i>Stapeln</i>	1 3 0 6	
<i>Verbena fazie plant a BraflianaMzycgv.</i>	ibid.	
<i>Vcrbefina Gefn. j. Cannabma aquat.</i>	36 ^ 3^x	
<i>Vtrmiculans frutex</i> 199. £er£*	1^4*	
<i>Vzrnimbvck lignum</i>	1737	
<i>Veronica ejufque species</i> 845, ^, <i>ad 353, 1 3 9 7</i>	8 4	
<i>Vejtcaria marina</i> J. B.	1 5 7 7	
<i>Vittadegou H- M.</i>	1 7 1 7	
<i>Vitro pali</i>	1794	
<i>Ubebeba/oH Theveti</i>	159^	
<i>Viburnum</i>	159^	
<i>Vicia ejufiue f i>» ^ 9^0> 9^0^, ^ c. r f</i> <i>na 1 0 7 1</i> <i>La</i>		
<i>Vicia fufiue famacea jipmls CuL</i>	1122	
<i>Vi&arialii mas5. longa</i>	1? 62	
<i>Vidua</i> <i>II. M.</i>	109D	
<i>Vincitoxicum, i. Afdepiat</i>	109I	
<i>r/wc< pervinca, i. Clematis Dafhnoides</i>		
<i>raj</i> <i>agm</i> <i>101. 1 4 3. Lumaris S. Bmfo-</i>		
<i>nazb"i%7. Mariana</i> 732. <i>Matronalu</i> 790	7 1 9	
<i>i. £r<c< Calathiana GentianeU</i> [pee.	1144	
<i>Viola bulboja, <v. Leucoium bulbofum</i>	1869	
— <i>iW/c* Nafturtii Saporz</i>	0 2 3	
<i>Viorna vulgi</i>		
<i>Viperaria Ger. Sic</^ Zanoni</i>	1879	
<i>Virga aurea ejufau* species</i> I>7*J&^	3 3 1	
<i>Virga pafitoris, l. Dipfacuf</i>	1 5 7 1	
<i>Virga Janguinea> u Cornus fxmna</i>	1 5 1 8	
<i>Vifcum</i>	M" 1 5 7 1	
<i>Vifqueiro Lufitan. Marcgr.</i>	4 * 6	
<i>Vijnaga. i. Gingidium</i>		
<i>Vitis Idaa ejufquefpeciei</i> 1487. <i>1 1 2 7. 1 4 2 3. Clu</i>		
<i>l. Diofpyros</i> 14&£. <i>Id<ea pai>K></i>	1 4 1	
<i>^rjj ^i> rtf r/ii/af 7><i< 1 613p/rfw 4p></i> I 2 1 4		
<i>Cftrtiir^M</i>	1 5 7 1	
<i>Fi>j bederacea Indiza SCapfl. v. Heder</i>	1699	
<i>Vimaria S. Barba capr*</i>	5 2 4, 7 0 7	
<i>Ulmus ejufque species</i>	1 4 2 5	
<i>Umari</i>	1 5 7 1	
<i>Umbilicus Venms S. Cvythdm n>artt>u>, t. Andi^</i>		
<i>fac 11</i>		
<i>Vtnbr*</i>		

I N D E X

	P ^{g.}		P ^{g.}
<i>TJmbuVifonis</i>	15	<i>Xagua Martyris Arbor Jfapjirife?</i>	1796
<i>Ungumtaria Lutetiamrum Abrotanwn foemina</i>	358	<i>Xerantbemum</i>	287
line Jo Flin. i. <i>Arbutus</i>		<i>Xocoxochitl Hern.</i>	1507
<i>JJngula cabaUina</i>	2J	<i>Xipbium J. B. v. Gladiolus</i>	1169
<i>Unni Chiltmfkmt</i>	179 ¹	<i>Xochi9cotz, o £zuubmitl Hern.</i>	
<i>Unifolium S.Monopbyllum</i>	668	<i>Xylahts</i>	1808
<i>Volubifis, i. Convolvulus</i>		<i>Xylobalfamum</i>	757
<i>Urtica ejufque fpecies ity.fatua'v. Larmum</i>	449,	<i>Xylocajjia Lob.</i>	
<i>Urtica ^- rac^mofa Canadenfis</i>		<i>Xylon S.GoJJipium</i>	1064
<i>Urtica fyL Tupa-ipi</i>	1771	<i>Xylofleum, i. Vencllywenum</i>	1491
<i>Uructtri-vaPifon. P^w^r fpecies</i>	1302	<i>Xyrv, i. Spatula feztida</i>	1190
<i>Uru-pariba</i>	178;	Y.	
<i>Ururumbeba, i. Jamacarum S. Tuna VLfpec. Pifon.</i>	134	<i>YzeccL j. Talma-pinus</i>	1674
<i>Urtica Dfficinarum C. B.</i>	1347	<i>Team Peru</i>	729
<i>XJtricarua C. B. S. i</i>	1739	<i>Yga,</i>	
<i>UtyBrafilienJium Acacia fptcizs</i>	1793	<i>TiUamol</i>	1789
<i>Urtica marina</i>	1484	<i>Tucca S.Mandiboca</i>	68;
<i>Urtica urfi</i>	1487	<i>-----felis Aloes</i>	1201
<i>Vulmraria rufica Gefn.</i>		<i>Tzatzec caltacotl</i>	252
<i>Vulvaria, i. Atriplex olid*</i>	198	Z.	
<i>Uvularia, u Trachelium</i>	73*, 73?	<i>Zatarhendi Alpin.</i>	187
<i>Uz>ejr Alpini</i>	168	<i>Zacyvtha J.B.; Ckhorewn verrucarittm</i>	255
<i>Waga H.M.</i>	1766	<i>Zea ejufque fpecies</i>	1742
<i>Waricoratnari fr.</i>	18x6	<i>Zedoaria</i>	1337, 1911
<i>Watta-tali</i>	1595	<i>Ztrumbet'</i>	1340
<i>Wamcabte Ds Laet.</i>	1791	<i>Zingi five Anifum Indicum</i>	1835
<i>WzUia Tagra</i>	1746	<i>Ziccara Guatimalenfium</i>	1534
<i>Wifanck S.Vimetoxicum Indicum Ger.</i>	1088	<i>Zingiber</i>	1314
X.		<i>Zizyphus ejufsjue fpecies</i>	
<i>Xantbium ejufque fpecies</i>	165	<i>^-----^ Cappadvica, Olea Bobemica</i>	57b
		<i>Zopal-Nochez/h Hernand. v. Ficut</i>	1462
		<i>Zitccba, i. Cucurbita S. Pepo</i>	
		<i>Zygis Clufio, i. Serfyllum</i>	123
		<i>Zufiniare, i. Mart agon Conftantinopolitanum</i>	K 1 3

INDEX

I N D E X, etc.

C.
Zahulus, v. Lithontripctica.
Cancer, V. Ulcera; -] Ditergntia, ^nodyna, & Sk-
cantia. Eryfimium, Solanum, Carduus bene-
ditus.
Cardiaca. -] Rad. Biitortae, Ca^linz, CaryophyH-
ts, Helenii, Petafitidis. Fd. Acetofells, Agri-
& X&ixi Calaminths montanae, Cardiacs,
fimf MSlz rangufioi; ar. F/o. Cordiales 4 difti,
fc. B^aginis, Bugloffii, Rofarum, Violarum,
LeucoiMutei, Lillii convallium, Ulmaris: Sc
przter hzc Alempharma pleraque.
Cardialgia.] Cardiaca.
Catarrhmerinus, v. 7<# convulliva.
Catarrhus.] Anodyna, Be Adfiringntia. Eryfimium,
Fragaria.
Hvorcyamiis, Papaver, NiCotiana.
Caulfica. -\ Ranunculi plerique, Ros SDIIS, Tithy-
mali omnes, Sinapi.
Laureola, MezereDn, Ahovai, Anacardium, Eu-
phoibium, Apocynum, Manchinello, Hor-
deum cauliticum.
Zepbalgia. ^ Peucedanum. SBryllum, SoJanum
vulgare excern adlubitum: Fravotitts ad Ce-
phalalgiam quamcunq; commendac iuccum
Verbena: deputatum.
cedera; terrefr. fuc. Be Hjfnotica, Coffee.
Cep^ic< >.] Liliium Convall. Pionia, Salvi^ Ro-
rirmarin. Opobalfamum, Betonica, Majorana,
Verbena, Thee, Coffee, Tiha, Lavendula, Me-
liffa, Origanum, Pulegium, Ruta, Satureia,
Serpyllum, Primula veris, Adianthum verum,
Fumaria Split difta, Caryophyllus, Cyperus,
Ninzin, Cerafa nigia.
Cio/sw Afer <J.] Atwdyna, Adfinngntia, Hyfnotica.*
Vaccinia.
Ligna Colubririi.
Cs//<: «W^r,] ^ ^ ^ ^ - , & Uyfnumza Agnfoln
baccs, folia, aculei: Csrefohum, Chatnzme-
lum, Daucus, Erics flores, Eilipendula, Gera-
nium, Pimpinella Saxifraga, Veronica.
Buxus, Hedera cerreftr. Eryhmum.
Convulfiivi motu,] Cefthalh. H7r>^ & A^*
fpafmodica. Chamxmelum, C^rala nigra, He-
bellium.] Liliium convallium, PhyUms.
Cia^] FlorumFabsScFragansaqua deft 11
RacUx Polygonaci, Pnmuk flores, Solanum le-
Yiriim, Sdkmom, Betula, Sabina, Ulmus,
Amygdalus, Ag. LiniDnum, C^phora

.D

Dioscorides v. Galienus] Buxi ligni decoct Sc
Dioscorides & Sidorifera.] Buxi ligni decoct Sc
excraft Ch.] Buxi ligni decoct Sc
Cbelidion.] Buxi ligni decoct Sc
Crocus & cius Extr. Ebulus, Fraxim - k << fc
lignum IV-f^ip, Famaia, Junipen ligm dj-
coct & Excraft. IV^wri^ Laureolx decoft,
Lupuli radios decoftum tdtm, Miln
videm, ft. X, Petafitidis nid. Pimpindk .qua
videm, ridaem, Sapora
ria! Tormaidlb rai Veronica, Ul-
aria.
An^cli Card, bensi China, Conb-ayenra,
sSlaSrilla, Zrfoaria, Snrdiumi. S.orzonm,
Calendula, Guaucum, bafaftras, Camphora,
Alexipharmaca fere omnia.

Diarrhoea] Berberis. Farina FabAum, Lens. Mu-
cus, Dxylapathi fem. l^hyllitis/PJantagb, Poly-
gonuni, Sorbus, Virga aurea, i/Jmaria, 5c re-
liquafere idfringentia.
TDrmentilla., Nil, Pimpinella' fpinola, Coffe,
Macer^ Papaver.
Digerentia.] Ocymum, Majorana, Ruta murar.
Chamzmd. Crocus, Liliium Libum, B^rdana,
Scrophulana, N^puš, Bdeljtim, Tacamahac,
Aiiioniacum, Elcmi, Onbponax, Pix.
DifcHtimia.] Rad. Alth^f Curcuma, Iridis,
Scyllac. FoL ChamaEtnel. MelilDt. Verbafc. Flor.
Sambuci^ Croti. 5e7^fCumin. FcenugrarcLini,
Lupin. Gummi Ammoniac. Copal. Opoponax,
Sagapenum, Tacamahaca, Galbanum, Myr-
rha, Bdelium.
Diuretica.] Abfinthium, Acorus, Adianthum/
*Agrifolii fummicates, Anonis, Apium, Aqi**
legia. Asparagus, Barbarea, Betonica, Iryonia
nigra, Calamintha, Cardui gpiunquc, ^erc-
folium, ChamxcG^Ckriizcmeli flores, Ci-
chorium, CnicLis, Daucus, Eryngii cujufcunq;
radix, Erylimum, Eupatorium Avicennx, Aqua
florum Fabs, Filipendula, Freniculx rad. Be
fem. Fraxini lignum Be fem. Genifta: flores,
Baccz Juniperi, Linaria, Semen Lithofermi,
Hedera terellri^ Hypericum, Kali, Lupulus,
MeumjNafturciLimaquat. PercepierjPericlymE-
num, Perficaria filiquofk, Peucedanum, Pule-
gium, Plantaginis ILICCUS, Rhaphanus ruftica-
nus, Rubia, Rufcus, Sal via agreftis, Saxifraga
alba & i pratensis, Sifon, Sium, Solani imlicaci-
bi bacca; Tilisc cortex & folia, Valeriana, Ur-
cicf fem. & racemuli.
Dyfwteria.] Berberis, Clematis daphnoideSj Cy-
nogloflum, LamiLim rubrum, Lens, Un-
gentum cb Lunaria, Mufcus, Pilofclla, Plaii-
tago, Polygonum, Sophia chirurgorum,, Tiliac
baccamm pulvis, Verbena^ Virga aurea, fc
pleraque, adtringentia.
Papaver, Filipendula, Ciftus, Nymphsea, Faba
iEgyptiaca, Uva quercina.
Dyfuria. -\ Daucus, Cinercs ipongiolaro fe ca^
nina;,, Syrupus morurum Rubi vulgaris,
Malva, Hordcum.

E

Emtica.] Afarum, Acrylicis radix Be fern. Beto-
nics rad. Digitalis flores, Ebuli radices, Geony-
rni bacca; Eupatoni cannab. radices, Genift^
fem. Hedersc baccar, Juli Be cortex interior Ju-
glandis^ Laureola, Narciffi bulbus, Polygonari
baccx, Sambuci aquac. bacc^ aucore Pra^voth.
Sedi minimi fuccus, Senecionis herba^ Spr-
gulz femem.
Nicotiaria, Gutta Gemou, Hellebor. alb. Ciuta
aquae SeyIU, Cacaputia, Cyclamen, Ricinus^
Nux vomica, Afarum, Anagryris frerida, Glans
unguentana.
Emmenagoga, v. Mtnfes movzntia.
Emollintia^ Alcea, Alchsa, Atriplex, Beta, Cha-
mimelum, Lapathum, Malvsj, Mercurialis,
Parietana, Violana.
Allium, Liliium album, Melilotus, Verbafeumj
Gummi Be lacrymz vana; Bdelium.
EftUffia.] Cerafa dulcia, Digitalis, Filipenduhj
*Liliium convallium, Pzunia: rad. 6C fem. Sina**
pi, Succifa, Aqua florum Tiliu, Valerians ra-
dices, V ileus.
Mufcus clavatus BC vmma Cephalica, Bryonia alba,
Hellebor. Paftinaca lylv. Bugloflum, Hormi-
hura, Rura, Galsga, Ninain,
[d] Eryngium.]

I N D E X

Eryfipelas.] Lens[^]paluftrjs, Mali fylv. fuccus, Maiva, prsrpicue[^] or renfis, Sblanum vulgarej TuffiUgo, Umbilicus Veneris.
Scdum maj. Por>um Amoris, Malva rDfea, Secale, Stramon urn, Pavate, SambuciiSj Camphora.

R

Febbris & ftbrilis ardor.] Acetofa, Argentina externe, Cerafa arjda, Cichoretim, Densleonis, Geranium, Licht.], Lujula, Papaver Rhoetas, Portulaca, Rofa: caniha: fruiitus, Mora Rubi Idari, Vaccinia, ViDlaia.

Tertiana.] Alfine in Epirhem. Caryophyllata, - Centaurium minus, Hypericum, Pentaphyllum, Sinapi jn Epirhem. ad carpos, Verbena.

guntana.] Cicura, Hypericum, Linaria vulg. Oxyacanthini vilci pulvis vino albo infufus, Peftaphyllum, Rapum, Sambuci bacca:, Sedi nijnoris iudcus.

SZUotidiana.] Lupk;au; in Epichem.

Fcbrescomma.*] Endivia, Laftub, Berberis, Cynoglolla, Nymphxa, Tamarindus, Aurancia, LimoncS, Myrcilli, Ribes, Sorbus, Sempcrvium, CitriaMala.

Ftbres mtrmitunUs.] Myxa pyriformis, Ligna Colubrina, Fraxinus, Contrayervaj Serpenaria Virginian. Piper, Cortex Peruvianus, Chanimellim, Chamardrys, Gcntiana, SinapiSj Adianrhum verum, Bardan. maj. Abhncium, Imperatona, FernicLilum, Prunella.

Flatus.] Can iemen, Mei lemeii[^] Fcniculi fern. Radices Ari iiccat[^] Tanacetum.

Aurantia, CardamDmum, Caryophylli, Cubeb. Macis, Nux Mofchat. Acorus, Galanga, Zinziber, Anethum, Chamzmel. Curqinum, Carum, Zedoaria, Anilum, Piper JamaycenJb, Bac. Laun.

Fluor albusmulierum.] Filipcndula, FloresLamii albi, Paronyehia folus rutacsis, Rofa canina, Sal via, Quercus.

Fonticuli feu Fontancll.*] Hedercij Saponaria.

Fratturas offitum cvrtfolidcmtia.] Coniijlida: rnajoris Sc Pplygonatiradjes[^] Rulus.

Gummi varii, &L vulnzraria.

G.

Gargaria Abfynth. Alliaria, Camphora:

Gargarijmu idonea.] Folia Aquilegiar, Pericyleni, Aqua Fragorum.

Gonorrhoea.] Cicioreum, CynogJO/ILIm[^] Dens leonis, Lichen, Millefoiiuin vulg. Nymphia, PJancago, PoJygonLim.

Relinz, Gummiij Sc omnia confolidantia. Aparine, Buria Paftons[^] Abies[^] OpobaJ/amunij 5anrala.

H.

H?n2optj/is.-* Argentina, AfpJenium, Bardana major, Pes can, Plantaginis iuccus, Urticac fuccus & eorujidem aqua ilJJ. Vinca pervinca.

Hecbrybajis.] Biftorca, Clemans daphnoides, Gallium luccum, Geranium ftinguineum, Gkr- itum, Pnaphahum, Millefolium, Pcnraphyllum vulg. R_{DS} (bli_{ij}) Salix, Pulvis baccarum Ti- . liz^J ^ I^C * J 5c in genere omniaadftnngemia.

HawoptyfiSi Hxmorrhagia.] Dnrnia zmfult⁻⁻⁻ Umca, f impinellavulg. Salvia, Bmnella, BuiTa

H?n2optj/is.-* ? d⁰ . ? y o r i yamus[^] ^ Pav^{erj} Nigdlaftrum, Linum.

Hecbrybajis.] Chamedrys, Chclidonium mi-

nus, Cynoglofla, Fungus Betula:, Fuiiguspul- verulstus, Galeop/is fiuccus, Filipendula, Li- naria, Scrophulais rad. SmaruJa, Sidefins, Verbafeum, Vinca pervinca. Genifta. His m- bus malls & rdiqua ferē *Adfringvtia* conve- niunc. Becabunga, Anonis, Cacao. "

Hepatica.] AblTnthium, AcerofelJa, Agr[^]rnonia, AfperuJa, Betonica, Ceutaurii nijnoris flores, CichDrium, Fragaria[^]Fumaria, Lichen, An- thia.

Hernia.] Alehimilla: exiccatxpulvis, 0on/blida major, Cruciat, Dentaria, Filix p[^]acipueflo- nda, Geranium columbinuTn, Herniaia, Lens paluftriS, Lunaria, Nummularia, Pei foliata, Polygonatumj ScrracuLi, Telephnum, Valeriana major.

Anonis, 6c omnia *Adfringvtia*, Adianrhum al- bum.

Hesperes.] Chelidonium majus, Gummi Cerafi Sc Pruni fylv. Erica[^] PiJofella.

Hydrovj.] Abfinthium, Almisnigra[^] Ebulus, G> ni/ts i'em. & fummirates, Kali, Linaria, Poly- podium, Pulegium, Ranunculus hederaceus, Khamnus catharticus[^] Solanum lignolum, Sol- danelJa.

Biyonia alba, Rufcus, Nafturtium, SambucuSj Guaiacum, Semen Fraxini, Afclepias, Trifol. paluftr. Ins, Betula, Cynosbarps.

Hypnotiva.] Narcotica omnia, Unguentum P>>> poleum, Primula: maj. flores 5c conferva eo- rundem.

Hypocondriaci affetfaj.] Orobanche[^] HcHcbor. Poly- pod. Agrimon. Gencaur. min. Cort. Auran- tiar. Ammoniac. Galban. Cerafa acida, Core Mali Cirri.

Hysierici affeffus.] A triplex olida, Daucus, Meum, Parthenium, Paftinaca litiva tenuifolia[^] Peu- cedanum, Phyllitis, Sphondylgim, Xyridisrad. Crocus, Afla feccida, Galbanum, Brj[^]onia alba, *Matricaria*, Ballore, Cardiaca, Rura.

I.

Iferus>] Apium, Aquilegia, Afparagi rad. AP perula, Berberis cortex interior, Cenraurium minus, Chamxdrys, Chelidonium maj. & min. Crocus, Cyani flores, Eryngium, Euparorium Avicennz, Fragana, Fraxini Jem en, Fuma* na, Geniftx fern. Hedera terreft. Hypericum, Lens paluftris, Lichen, Linaria, Marrubium album, Mercurialis fern. Origanum, Oxyla- pathi rad. PuJegium, Rufci radices, SoJani vs- icarii baccx, Solam lignoli feu Dulcamara lign. Be foia, ThaliiitruTi, Verbena, *Ulrica*.

Rad. Curcumx, Rubia: Sem. Cannabm. Nil, Muf- cus QLiercinuSj Aquijegia.

Incr. JJanw] Laftuca, Symphytum maj. Cyno- glofla, Papaver, Planrago, Solanum, Nym- phxa, Viola, Gummi Arabicum, Sarcocolla, Tragacantha.

Ifchiadicus dolor.] Artemilla, Afparagi rad. Cen- raunum min. Confolida maj. Heleniumj JJCDB- bxa, Populus alba, Thalapí, Ulmi correx K quscunque parci ea Arthritidi conducunr.

Rad, Bryon. alb. Foenum Grxcum, Ol. Lau\^ num.

L.

Lac ab[umenUa[^] Reptllenria& Jdjtring»tia.* Plan* ragoaquaria.

Lac ceaguhvtia.] Flores Acanrhvulg. Gallium luccum. Acirla omnia.

*Litbarg**)*

Lethargm.] Sternutatoria, & Cephalica, Sinapi, Nalturtium hortenf.

JanUriaA Farina Fabarum. SS4^ \ * < * . Acole F^r. Acon,

Cardui fulbnuni, Caryophyllat*: {ylv. Tr*v«. Eryngii' PrM Hdenii, Fihpendul* vulgans, Filicis Peucedani, Pimpodlae Saxifrage, Rha-

JSili'ruft. Rubi, Rife Tragopogi' Unicr. * Adu ^, ut & radix & fem. Anonidis,

Apotheca aqua deffill. Argentina* Afganigus, Aveleao' (ylv. cortex Prayot. Becabung*, Be-

toniua. Breffice. Cardui ftdlati, Cerefoln, Chamayce, Chamepicyos, Naftnrtn aquat.

Paristaria, Parthenii, Percepier, Perficariar, Pilofella, Pulegii, Quercus, Salieis, Saxifrage

*Vir & L pratensis, Sifymbni, Smm aqua Tana- ceti Thaliftti, Veronia, Virgs mil. Virg^

ceti, ina. Capana herb*. F/or< Chamxmeli, autec. Capanae tis, Ericae, Geniftae ut 6c fimm-

Conchiluz Sem. Bardanae maj. & indon: mruat. Praver Dauci, Ironis, Junperi, Licholper-

int, Chycancki, Peucedani, Rofe fylv. So- lani halsicaba, S L U J S S

Giammi Curati, Lx odon caforum, & Granulid radices. Sam. Saphiz Chirungurua, Relioa Terebinth.

Nil PhJariB, Lacryma Jobi, Arena, Gratuen caninum, Grains Cruc.s, Pafiam ffliquo-

fi, Anana, Pinns, Betda, Mdpih officula. Nuclei Armeniaci, Thee, Limon, Baltama

Indica, Lignum Nephriticum, Cubebae. Lachrima woum, ita. 3 j&rr' r' : * Cmfoh,

Intia, 8C An ^ * * Fihpenduk radices. Lau Veneta.] Lignum Buix, Saponana, Scor-

G ^ a Tu ^ St, Sfa,anlla, Santala ^ itax aspera, Bardina mai, Saffafras, Taman cus.

Luliciintepnorum. \ Abhnthium, A Uum, Cannabis fem. auc fohorum fuccus Frxyot.

Centaurium min. Coral Una, Fihcis fim. radix, Granosa cania, Helkborafter maj. Hype-

ricum, Juniperi A na, Malobuuar Parthenium, Sabinu Ka hoc genere A

Seuentionis fupcus aut decoct. Scordium. nactuim, Vifcus. Hic addit e Praxois Enula

recondis fuccum, Petafoidis radicum, Rutaria caprariam.

Agrozina vulg. Cypn, Aloe, Re itu A venaca & Flor. Mali Perfic. Cort. App-

bantLjgnaColuhmw, -- u

M.

Mofia & Melancholia.] florum Hy- pencil. Fununa, MeUila, Anagallis Mas,

Agriocnia, Hellebor. Idou-Moul. Adomatium obrotis nower.] Emulcentia am-

nia. Althea, Cer iant, Dulcamara, Meltra, Mentalium, Far Fabarum, Seruacio, Smon

aquar. Solanum vulgare & lechnle Adomatium (feu pm generantia.) Ali

Lilium alba Meltra, Chamamel. i- Liliu, Foenugracum, Hordeum, Dnum, Tri-

cum, Coloponia, Eleani, Ladanum, Liqui- datum, Melitiche, Pix, Syriax, Taxacoaba-

ca, Thus, Terchinthas. Melancholia.] Funnaria, Pimpinella

Mofia mroptig.] Abhnthium, Acetofa radix,

Acorus, Alliarial^ Agiuitij Aquilegia, Artemi- (ia, Arum, Afarunv Afpar^gi rad. Betonica^

Becabun^a^ Bryonis rad. Qilamincha, Car- diaca, Cacpa, Centauriimin.yrad. GhamaEdr^s,

Chamxmqlum, Chamarpity, Conyza, Cro- cus, Daucus, Eryngii rad. Eupatorium Avi-

cennac, Hedera terreft. Flips rad. Graminis rad. Heleniirad. Hypericuiij Leucoii lutei fld*

res, Matricaria, Melifla, ^entafrum, Mer- curialis, Meum, NafturOlim, Phyllitis, Pim-

pinella, Periclymenun)/ Polytrichum, Praf^ fiurn, Pulegium, Ru f ^ Rubia, Salvia agre-

ftis, Saponaria, Sespyllum^ Tanacetum, I7r- ticac fem. Prae aliis omnibus Sabina: quin 8c

diuretica pleraque funt etiam emmenagoga. Garyophyllata, Ariftolochia, Curcuma, Carda-

momum, Cyperus officinar. Schenanthus, Acorus, Vaynilla, Coitus, Sabina, Myrrha,

Sagapenum. ... Mznes Jiftentia. -] Mentaftrum, Pi;ftpiriella, Plan-

tago> Papave^ Riuisb; P^lygonum, Rofxca- ninz florey Vinca pervinca & reliqua fere

Adfringentia. - N y m p h s Millefolium, Hyofcyamus, Papaver, Acacia^ Cinnamomum.

Mifus involuntarius. - \ Confolidantia onmia, & Ad- firingwtia: Agrimonie exiccat* pulvis, Plan-

tago. Morfus vtmatus. -] Ligna Colubrinaj Lychnis fylv. flore mufcofo, Opoballamum, Scrpenta-*

ria Virginiana, RutaiAlliumj Alexipharmaca Rad, Granadilk, feu flor. Paffion. PhyJJ, pn

Marificum, Scorzonera, PimpineJla vulg. Calamintha, Ballote, Pullatilla, Anagallis MaSi

Malum Citrium, Caniram, Laurus, Platanus, Rofa.

N.

Narcotica.] Croci flores, Cynogloflum, Hyof- cyamus, Laftuca fyk. Lolium, Papaver, Napellus, & alia Aconita : Stramonium, Nuces

Mofchat. recent. Odallanii Couculus Indus, Nux Vomica.

Odontalgia.] Argentina, Chelidonium minus, Clematis daphnaides, Lepidii radices, Primula

veris, Ptarmica. Anodjna&Narcotica: Nico- tiana, Quercus, Morus.

Opfbalmica. - \ Caryophyllata, Chelidonium maj. Cichorei K Cyani flores, Dipfaci aqua, Enuli

campana, Erica, Euphrafa, Fumaria, Foeni- culum, Hormmum, Holofteum, Linaria; Ly-

fimachia fpicata, Pomorum agreftium luccus, Salicis lachryma, Valeriana, Verbena.

Acacia, Anagallis mas, Ulmus, Camphora, Arbor triftis, Ebenum, Sarcocolla.

Oris & Gingivarum Viti*.] Areca feu Faufel, Cochleana, Maftiche, Herba Britannica, Fa-

gus, Hondir-Alou, Mefpilus, Balaufia, Gar- ryophyll. Ind. Nux Mofchata, Malabathrum,

Rhus, Agallochum.

P.

Tardlyfil] Cephalica onrnia. Cerafa dulcia, Err- ca: flores, Leucoium luteum, Liliu^n conval-

hum, Primula veris, Sinapi, Vifcus. Varmychia.) Paronychia vulg. Telephium..

Fartus diffialis. -] Diffamaus, Caltba; Crocus, Galbanum, Myrrha.

Affectuum & Remediorum-j.

- varia, Brasil.rubrutnjUPBtoDOtl^Ufticftj Can-
del, Orellana.
- Tormina.*] *Anodyna*Be*Narcotica*: Meum, Serpyllum, Tanacetum, Trifolii prac. purp. flares, Verbena:
- Tumora be Inflammationes*^] *Anodyna*, *Emollientia*, *Difcutientia*, *Reptillntia*, vel *Maturantiaprorz* yiftca: Cerefolium, Oleum Chamaemelinum, Cate^Cynogloffa, Fagi folia, Galeopfis fuc-
lamium, Ol^um Lini, Malva, Orchi-
du. rad. Parietaria, Rapum, Selinum Sii^fo-
lis, Sphondylii rad. Urtica.
- Tj#f>v.R<rtiiv<Btr#.] *Enula campana*, *Eryfi-*
mum, *Daucus*, *Glycyrrhiza*, *Bacca*: *Juniperi*,
Linum, *Marrubium album*, *Parietaria*, *Peri-*
clymnum, *Pecafites*, *Peucedanum*, *Scabiofa*,
Tragopogi radix, *Tuflilago*, *Verbena*, *Viola-*
ria, *Urticae radix* &c *femen*, *Caftanearum fa-*
rina.
- D ECoftum ^peftorale, *Papaver*, *Rapum*, *Mufa*,
Avellana, *Amygdalus*, *Siliqua edul*^Bdiliun,
Benzoin-
- TMJ *cotulfiva* five *Catarrbus fennus*. J *af*^
(*pafrnodica omnia*: *Mufcus pyxidacus*, *Succus*
Pulegii, *Origanum*.
- Muib5 Qtiernus, *Agalbuchum*, *Cubeba*^ *Opo-*
balfamum, *Balfam.Peru*.
- V.
- Variola* 8c *Morbtili*. 3 ^ *fracavtnJum*, v. yfflw-
pharmaca, *ad expellendum* *Aquilegia*, *Crocus*,
Rapi femer.
- Venmm ftimulavtia*7] *Afparagus*, *Avellanar*, *Ca-*
ftanex, *Crocus*, *Eringium*, *Eruca*, *Daucilem*.
Freniculum virens, *Cannabis*, *Fabs*, *Orchi-*
des omnes, *Opiava quxunque*, *Paftinaca la-*
tifolia, *HDrminum*, *Mentha virens*, *Naftur-*
lium, *Ononis*, *Perfonatse rad*. *Rapi fern*. *Sina-*
pi, *Apium dulce*, *quod Stkri* dicitur.
- Ventriculum roboravtia* leu *Stomachica*.] *Aromatica*,
Amara: *Abfinthium*, *Acorns/Acetofa*, *Agre-*
fta, *Berberis*, *Caryophyllata Pravot*. *Cerafa*
acida, *Fraga*, *A^pnrafrunij Calamintha*^ *Pru-*
na fylveftria *Sc eorum-fuccus*, *Pulegium*, *Pru-*
nella, *Sorba*, *Ranunculus*.
- Zingiber*, *Galanga*, *Crfrntrayerva*, *Cinnamomum*,
Safaftras, *The*, *Curt Mali Citrii*, *K Auranni*^
Zectoaria, *Piper*, *XochoxDchirl*, *Caryophyll*.
Aromat. *Nux Morchat*.
- Verruca*] *Mercunalis*, *lucrus in foraminibus* *Po-*
puli collectus, *Lac Tkhyrnalorunij pra:cjpué*
HEliofcppii, *Dipfacus*, *Galeopfis fuceus*.
Sedum maj.Heliotropiuni maj. *Braffica*.
Vertigo.] *Cepkalicaomnia*: *Pri^iula veris*, *Aqua*
florum Tiliis, *Vilciis*:
ChaerDphyllum, *Sinapis*.
Ulcera.] *Caprifolium*, *Negfndo*, *Liguftruim*,
Lycium, *Mandihoca*, *DpoHillamum*, *Myrrha*.
Ulcera cancrofa. J *Dztergentia/Anodyna*, *Siccantia* :
Elatinc, *Gallium*, *Lavjol** *pulvis*.
Hdiotropium, *SDlanum*, *yimphyrum maj*. *Lada-*
num, *Schcnanthu*^
Vomitoria^ v. *Emetica*.
Vomitum pftentia.~] *Hypnotica*^ *Sal Abfinthii*,
Menthac aqua ftillac *PbJygonum*, *Rubus Idsus*,
Vaccinia.
Urina ardor vel ammonia^] *Sem*. ^*frigula*^ *EmuL*
fionej, *Anodyna*, *Emollientia*, *3f Incraffantia* j
Caftanearum emulftio, *Malv?*, *Glycyrrhiza*,
Portulaca, *quacMcis* ^d *acrimisniam* *urinz* *mit-*
tigandam *njkil* *CDnducibilis fa*: *quam Lac rf-*
cens copio^c *ingeftum*, *auc Laftis defefto* *Ser-*
rum *vel Cerevilia cenus*, *nihil enim aliud re-*
quiri videtur, *quam ut Sanguis fero sxhaufus*
lenialiquo liquore affacim diluarur.
Urina cruenta, v. *Adjiringent*^ & *Confolidant*.
Uteri procidentia.] *Adfringentia* & *Vulneraria*.
Vulmriaria> feu *Uvnfolidantia*.] *Agritnonia*, *Al-*
chimilla, *Anagallis*, *Androfzmum*, *Argen-*
tina, *Artemiffa*, *Bellis major* *Si minor*, *Beto-*
nica, *Bonus Henricus*, *Bugula*, *CencaLirium*,
Cecerach, *Chamidrys*, *Cicuca*., *Confolidamaj*.
Cruciata, *CynogJorfum*, *Equifecum*, *Eupato-*
rium Avicenna?, *Foeniculum*, *Geranium*, *Gla-*
ftum, *Hedera terreft*. *Herniaria*, *Hypericum*,
Jacobxa, *Lamium*, *Lilium convallium*, *Luna-*
ria minor, *Melilotus*, *Millefolium*, *Nummu-*
laria, *OphiDgbflum*, *Panax coloni*, *Parieta-*
ria, *Pencaphyllum*, *Perfoliata*, *Perficaria*, *Peu-*
cedanum, *Pilofella*, *Pimpinella*, *Pinguicula*,
Plantago, *Polygonacum*, *Polygonum*, *Pru*^
nella, *Rubia*, *Salvia agrellis*, *Sanicula*, *ScDr-*
dium, *Serratulaj Sophia Chirurgorum*, *Succiftj*
Tanacecum, *Telcphium*, *TorrnentilJa*, *Vale-*
rjana, *Verbena*, *Virga aurea*, *Veronica utraq*;
Balfamina mas, *Delphinium*, *Ulmaria*, *Nux*
myriftica, *Refina*: *Sc Lacryma: variac*, *Clema-*
tis Daphnoides, *Pyrola*, *Qtiercus*, *Pix*, *Al-*
nus vulg. *CadaPilava*, *Oi. Olivarum*, *Opo-*
ball'amum, & *L Balfama Americana*, *Sarcocoli*,
Elni.

NOMENCLATOR BOXANICUS.

Cuts-tatl, or *Reed-Mace*, Typha.
The Cedar ^treC, Cedrus.
 Cefall&inc, Chelirtanium.

Clifdbefe, or *WildMustard*. Rapistrum.
 The *£\$nfctct*, Agnus castus, Vkex.
 r ^ f j c t t p tree, Cerafus.
 ^ **ChclTp**, Salanurnhalicacabiirn, A ^{kekengi}.
 Chaerophyllum, Cerefolium.
 The **Chnut** ^treC, Castanea.
Chn ^treC, Ceb, AUine.
Chind ^treC, China radix.
Chur ^treC, or *Chich-peafe*. Cicer fatimm.
Chr ^treC, UocOptjer, Chriftophoriana, Acbnirum
 racemofum.
Chif ^treC, PaUurus.
Chitp, or *weefjühervil*. Mynhis.
Ch ^treC, Cinnamomum.
 Cniquefoil, Pentaphyllum, Qiijnqueplimli.
 The Citromttec, Mains medica ^ Citia.
Ch ^treC, Schaenopraffon.
Ch ^treC, Horminum.
Ch ^treC, Mgi ^treC fpecies.
Ch ^treC, Chamalir.oiU5.
Ch ^treC, Trifbliim purpureum majus pra-

 ClobejEl, Caiyophyllus Aromaticus.
 Cockle, P(eudom)Blanihiuni, Lychni5 fegetum.
 COFFA, COLLi, or U^f/e. Pedicularis, Crifta galli.
 T& COCO, or *Coktr-Nut-trez*. Palma cotxifbra, feu
 Tenga- ^in.-
 <ttoffe, Caova^ Coffee Fr<f^ fe% Bon v^ Ban
 Arbor.
 CokbOJt, Braffica.
 £Mpf, ToiDer, Braffica florida.
 Coltj-fvot, Tuffilago.
 5rr^w^ ColtsS^Ot, Cacialia.
 (tfoilinifiine^ Aquihgia.
 Comfrep, SymphyLim, Confolida major.
 Saracens ConCblltb, Solliago Saracsnica^ Virgs
 aureae fpecies.
 £O2al, Corallium.
 Co^allin^ Corallina.
 The *folfett*, Subcr.
 (JTOHan&cr, Coriandrutn.
 <^Im flaf, Gladiolus.
 T& COJItel-ttec, or *Cornelian Cherry*. Cornus tnas-
 ^Auce, ^treC Coftus hortorum, Balfa-
 mita mas.
 The Cotton ttec, Goffipium, Xybn.
 Couftage, vulgo *Cowücb*. Phafeolus Zurratenhs
 filiqua hirtuta.
 Coto-flips?, .Verbafeulum, Paralyfis.
 Ctnne?-Lull, Geranium.
 The bearded CteCpCt, Crupina.

 Crof^llio^t, or *Mugweed*. Cruciaa.
 CroIBfcac, or *Butter-Cups*. Ranunculus.
 CrotoIt ^Imperial, Corona Imperial*.
 CretD fiUL, or / ^ ^ Rivtr-wed. Conferva Plinn.

C
C ^treC, pillt, vr *Wake-robin*. Arum.
C ^treC, Cucumis.
 Cil&UCCb, Gnaphalium.
 Cumin, Cunnum.
 The Curran bulb, Ribss.
C ^treC (Jv2 Corinthiaca.
 The *Cur* & 3 Wc, Araciu fpecies.
C ^treC, Latine etiam Cypreffis.
 The *Cup* ^treC, Cupreffis.

D.

Daffobil, Nareiffus.
Daffic, belSj, Confolida minor.
Dambellian, Dens leonis.
Dorchil, Lolium. ^
D ^treC/Palma daftyliFera-
D ^treC, Succila^ Mbrfi^s Djaboli.
D ^treC, Anechum.
D ^treC, or *Fepper*, wi</ Ltpickum^ Piperites,
D ^treC, DiftamnusJ/
D ^treC, or *traxincl*. Fraxincrlla.
D ^treC, Lopathum-^
D ^treC, Col ^treC.
D ^treC, Apocynum.
D ^treC, or *Gatter-trtem*. Cornus fiemina.
D ^treC, Cynoforchis.
D ^treC, Dracontium.
 The *Dragon* ^treC, Draco arbor.
D ^treC, Fil^endulä, Denanthe.
D ^treC, a ^ LtiitTeula paluftris.
D ^treC, o^amonii feu Dacuras Indict fpecies.

E.

Eaxty\$Vlt, or *Keppfr.Nut*. Bulbocoftamim,
 Nucula terrefttris.
Eaxty\$Vlt, Chaguzalana.
Ebenp / Ebenus.
E ^treC, or *Sweet-briar-buffj*. Egläntia,
 Roia foljis odorara.
E ^treC, Sambucus.
E ^treC, Helenium, Enula campana-
 The (CIm-lrce, UJmus.
E ^treC, Efidivia.
E ^treC, or *Sea-Holly*. * Eryngiutti.
 (Qttfalottttf, or *Scallions*, Cepa Afcalonica.
 £upfjO^fium, Schadida- Galli^Tithymali fpecies.
 CpC^?igl)t, Euphrafia.

F.

f ^treC, Foeniculum-
f ^treC, flotur, Nigella.
F ^treC, FeruU.
f ^treC, Sulphur-wort, or *Hareftromg** Peuce-
 da num.
f ^treC, Thapfia.
f ^treC, Fcenum Gracum.
f ^treC, or *Brakes*. Filix.
f ^treC, Matricaria^ Parthenium-
f ^treC, Ficus.
f ^treC, or *Broom-ivort*, Scrophularia-
f ^treC, Nux avellana, Corylus fativa.
f ^treC, Abjes.
f ^treC, or *Viftacho*. Piftacia.
 The *weet f^netling* ^treC, AcoruSj Calamus Aro-
 maticus.
f ^treC, Linum-
f ^treC, Conyza.
f ^treC, Pfyllium.
f ^treC, Sophia Chirurgorum,, Nafturtii fpc-
 cies.
f ^treC, Iris,
f ^treC, Amaranthus.
f ^treC, or *Speedwell*. Elatine.
f ^treC, Digitalis.
f ^treC, Alopecuros, Gramen
f ^treC, Thus, Olibanum.
f ^treC, Libanotis.
f ^treC, Anfarum.
f ^treC, Fntillaria, M
f ^treC,

NOMENCLATOR

f UmitO?p, Fumaria.
 3Flir\$C, Whins or Gorfe. Gdniftápinofa.
 5 tr i ck to or, Lignum Americanum flavum.

G.

Gaelick, Allimm.
Gentian, or Felwort, Gemiana.
 t&erman&cr, chapizdrys.
 Trzv&zxwawibzij ^reucrium.
 Water- Ocnngqnbet, exordium.
 ©illflcr, Zinziber. ^r/.
 4\$lat(t)Dpn, Xyris, SpatC^afcetida, Iridis fpecies.
 ^ I f i febojt, or Saltwort, Kali, Salicornia.
Goutz-haab, Tragopogon.
Goutz-ruC, Galega.
 7Lr 43oabo*tree, Guayava, Pela.
 ©djDcn*rob, Virga aurea.
 £5flitToE \$ka\Ntr, Myagram.
 The ©Orfe fictrp*6ul^, Groffularia.
 450pfc^grafjBf, or Cleavers, Aparine.
 <00Urt), Cucurbita.
 11i^ P r r M f ©2aitl, Sefamum.
Gials, Gramcn.
Green-Uthj vr Woodwaxen, Geniftella tin-
 ftoria.
 <&2uYli, or Gromivel, Lithofpermum.
 4B2OU&?pine, Chamspirys.
 ©:Olindfcl, Scencio, Erigsrum.
Gum, Gummi.

H.

Hartf:Ar, Buplsurunij Auricula Leporis.
Hartf:frot, LagDpus.
Harts-toJlgUt, Lingua Bervina, Phylhds.
Hartwort, Sfdj-
 ilairhtoctb, Hiscracium.
 The (haitl^t)oni, or Whitethorn, Dxyacantha.
 The ©a5cf nut^tree, Corylus fylvcftri5-
Heath, Erica.
Hedgc:SpogAM^dica e thin at a.
Hellebor:C, Helleborus.
Hemlock, Cicuca.
Hemp, Cannabis.
Hemlock, Hyofcyainus.
Herc, Mor/us Gallinx.
Herr, terriBic, Alypum mentis Ceti,
Hollpljoch^, Malva hortenfis.
Hollp Agnfolium, five Aquifolium.
Hortep fuchlc, Caprifolium, Periclymenum.
Horn p l, Cerinchs.
Horn Lupalus.
Horn Marrubium.
Horn ntl, Scachys. »
 The **Hornbeam** tree, Carpinus, B5ttilus, Offrys.
Hort: taxi, Equifetura, Hippuns,
Hort: tongue, Hippogloflum, Biflingua.
Hort tongue, Cynogloflum.
 J^oufe Jerhj Sediim.
 The I^uinbk plant, Hsrba mimofaj feu humilis
Hort difta,
Hort^, or Harebells, Hyacinthus.
Hort, Hyflbps.

L

The **Jack-tree**, Jaca.
Jinch by tje ijcdgc, **Janch** alone, Alliaria.
Jalnjp, Jalapium.
Janchginn, Jafininum, Gelfeminum.
 ^ **Janch**trtt, Arbor Peruviana, five febr-
Janch Qj^nquina.
Janchcar, Aiinccila JutUe, five Fungus5ambu-

Janch, Anil, five Nil.
Janch:trcrs, Lachryma JobL
 5. 5Joln s IUO?r, Hypericon.
Janchtrcrs & Sidsntis.
Janch:trcr, Arbor Judx.
 The **Janch**cr, Ziziphus, f i v s j u j u b a .
Janchflower, or Carnation, Caryophyllus.
Janch Juniperus-
Janch, Heciera corymbifeia.
 Ground^it, Gill go by the Ground ~~Alt-krj~~
 Tunboof, Hedera teneftrii.

K.

Kidney or French-Beans, Phafsolus.
Knapweed, Jacea.
Knotgrass, Polygonum, **Continua**:

L.

Labica:Sebitaly, or Rennet-wvrt, Gallium
 Juteum.
Labica:Spolter Clematis fpecies.
Labica:fl^antie, Akhimilla.
Labica:flipper, Calceolus Mari ^ Hsllcbo-
 rics (pecies.
Labica: i SmoCft, or Cmkow - flower > Carda-
 minc.
Labica:EettUce, or Zom-Salht, Laftuca agni-
 na^ Valerianella.
 7Lr Jlarel^tree, Larix.
Lacpur, Delphinium, Conflida regalis.
Lactwort, Lafspritium.
 2atocnDc\$ Lavendula.
 SttabenDcr^CpttOH, Chamzcypariflufj Abrota-
 num frmifta.
 i^E- Eatienber, Limonium.
 3ISe ilaurel^tree, or Cherry-Bay, Lauroccralus.
 EeabfDP?^ Dentdlaria, Plumbago PliniL
LJttm, Porrum.
 The Enncm-tree, Malus Limonia.
 Eentxi^, Lens.
 Eeoparti^, bane, Duronicum.
 Eettuce, Laduca.
 7Lr JLilly, Liliium.
 7Lr Kime: or Linden-tree, Tilia.
Liquorice Glyq^rrhiza.
 3llbertO2t, Lichen, Hepatica.
 The **LJCC** tree, Jctaiiba, feu Lobus cx Win-
 gahdecaow.
LofUriFe, or Willow-herb, Lyfimachu.
Lot-trefoil, Lotus Herba.
 Hlobage, Leviftium.
Sung **not** Pulmonaria.
Lup, Lupinus.

M.

Marr, Ma cis.
 The **Marr**atD^tree, Umc^Bixa, Drellana^ AchiotJ.
Marr, Rubia rinfortum, Erythrodanum-
Marr2t, Alyflum.
Marr:tjoir, Adiantum nigrum, Capillus Vc-
 nens.
English flr?0iben^air, Trichomanes.
Marr, or Indtan-Wheat, Frumentum Indicum.
Marr Malya.
Marr Althara, Ibifcus.
Marr Akea.
 The **Marr** tree, Araticu f
Marr Mandragora.
Marr tree, Mangas.
Marr^anato^jettCt, Mangle.
 7Lr fl^oplctRr, Acer,
 ^origplH, Calendula, Caliha.

BOTANICUS.

Corn-Plantain, *Chryfanhemuin*.
Majorana, Majorana.
Marble of Peru, *Mirabilis Peruviana*.
Imperatoria, *Imperatoria*, *Alfrantia*.
Herb Safflower, or *Majtick-Tbjmt*, Marum.
The Safflower-tree, *Lentifcus*.
Safflower, *Grameniparceuin*.
Safflower, or *Maudlin-Tanfie* *Ageratum*, Bal-
anitra-foemina.
Safflower, *Cocula*.
Safflower, *Colchicium*.
Safflower, *Ulmaria*, *ReginaPrati*.
2C?cDiffe or *Snatf-trefoil*, *Medica*.
The fl^cfcIXptree, *Mefpilus*.
Safflower, *Mdilotus*.
SBprdn, *MBID*.
Safflower, *Echinomelocactos*.
Safflower, *Mercurialis*.
Safflower, or *Tarrow*, *Millefolium*.
Safflower, *Polygala*.
Safflower, or *Grouty Milium*.
Safflower, *Mentha*.
Safflower, *Mentafrum*.
Safflower, *Vifcus*.
Safflower, *Moly*, *Allii Genus*.
Safflower, *Nummulana*.
Safflower, *Nap^llus*.
Safflower, *Lunatia*.
Safflower, *Mufcus*.
Safflower, *Cardiaca*;
illBOthinuUctn, *Bactaria*.
Safflower, *Klofella*, *Auricula muris*.
Safflower, *MyofirDSj* *Cauda Muris*.
Safflower, *Artertiifia*.
The Safflower, *Morus*.
Safflower, *Hernionics*.
Safflower, or *High-taper*, *Verbafeufin*.
Safflower, or *Toadfoolj* *Fungus*.
Safflower, *Sinapi-*
Arabica, *Draba*.
Safflower, *Turritis*.
Safflower, *Myrobalanus*.
Safflower, *Myrrha*.
Safflower.

N.

Nardus, or *If all-ferny-wort* *M Cotyledoijj*
Umbilicus Veneris:
Napus.
The Nardus, *Nuciperlica*.
fettle, *Urtica*.
The Safflower, *Lotus arbor*.
Safflower, *Solanum*.
Safflower, *Lampfana*.
Safflower, *Nux*.
Safflower, *Nux mofchata*.

O.

The Oak-tree, *Quercus*.
The Oak-tree, *Hex*.
73^ Jc^r/^^afe, *Hex*.
«Pat^ Avena.
Thz iMlbc-treCj *Oliva*.
Oliva.
Oliva, *Monophyllon*.
Oliva, *Cepa*.
77^ Ojange-tree, *Maliis Aurantia*.
<O?elk *Orchis*, feu *Satyrione*.
O?wR or *Lwe-long*, *Telephium*, *Craffula*.
The Ofier, *Salix aquatica*.
C?Cpc, *Bupthalthmm*.

Palma Chnfti, *Ricinus*.
Palma, *Paltna*.
Palma, *Panicum*.
The Paper-tree, *Papaia*, *Maitiocra*.
The Paper-tree, *Papyrus Nilocica*.
Herb Paltna, *True-hve^r Ont-berry*, *Hfirba P>ris*.
Palma, *Apium hortense*, *P^troiclinum*.
Palma, *Caucalis*.
Palma, *Percepies*.
Palma, *Paffinaca lati^/ia*, *Scaphylinus*, *EJa-*
phobofcurn.
Palma, *Sphoilylum*.
Palma, *Paltna*.
#a(TioJl^ffulDer, or *Afer^oib*, *Granadilla*, *Pa-*
Paffionis.
7^ ^ Seatt-tree, *Malus Perfica*.
The ^cnrttCj *Pyrus*.
7^p Prtt^ftear-ttetj *Opuntia*, feu *Fic. Dada*.
Paltna, *Pifum*.
Paltna, *Pyrethrum*.
Paltna, *Parietaria*.
Paltna, *Pulegium*.
Paltna, *Piper*.
Paltna, *Capficum*.
Paltna, or *All-fpice* *CaryophyUus fru-*
dtu rotundo.
Paltna, *Clematis Daph-*
noidea.
S^cter^hJO^t, *Afcyrum*.
Tve ^l)prife-llUt, *Ricini fpccies Americana-*
Spamfj J)ct tOPTfl, *Vifiaga*, *Gingidium*.
Safflower, *Anagallis*.
The Pine-tree, *Pinus*.
The Pine-tree, *Anana*.
The Pine-tree, *Chamzpitys*.
Safflower, or *Carnations*, *Caryophyllus*.
The Safflower, or *Lilacht* *Syringa*.
The ^)itc(j tCEj *Picca*,; t. *Abies mas*.
Jiff ^lane-tree, *Platanus*.
plantain, *Plantago*.
The Olatitaitt^tkc, *Mufa arbor*.
The Safflower, *Polium*.
olep mountain, *Polium*.
^olpottip, *Polypodium*.
The i^gimgranatc-tree, *Malus Punica*,
^DitH-tDeetl, *Potamogitan*.
The ^oplar-ttce, *Populus*.
^Oppp, *Papaver*.
Rough headed Baftard-*^Opp^* *Argcmofte*.
potato^, *Battatas*.
The 3^icEtip Sz&ttzz, *DpuntiJ*, feu *Ficus*
Indica.
Paltna, *Primula veris*, *Verbafeulum*.
The Paltna, *Lyfimachia Virginiana*.
Paltna, or *Frimprint*, *Liguftrum*.
Paltna, *Phillyrea*.
Paltna, *Alaternus*.
Paltna, *Legumen*.
Paltna, *Pepo*.
Paltna, *Portulaca*.

Q.

Q *Uinee-tree*, *Malus Cydonia*

R.

HJabirt, *Raphanus*.
Horfe-ftaciffj, *Raphanus rufticanig*, *Armoracia*.
Kagtoon, *SeggruinorS*. *Jamesv/on.fawbx*.
Rapunculus, *Rapunculus*.

B O T A N I C U &

~~Curculio~~, or *Heliotrope*. Heliod'opium.
 The CurpiltitC-trHT, Tercebinthus*
 CltffflH, Androfcemum.
~~Chou~~-WadC, Ophris bifolia.

V-

~~Daleriani~~, Valenana.
~~Wanilla~~ BaniJJas.
~~Spinus~~-roune, or *Shepherds-needle*. PeftenVene-
~~Demis~~-Joknu-~~alaf~~, Speculum Vencris, Dno-
 bryquis arvenfis, Campanula arvenfis erefta.
~~Verbena~~ Verbena.
~~Vicia~~ Vicia.
~~Onobrychis~~ Onobrychis.
~~Horseshoe~~-&Zit% Ferrum equinum.
~~Viola~~ e, Vitis Vinifera.
~~Viola~~ r, or *Scorzonera*. Scorzonera.

W.

35aftC'Hobili, or *Cuckou/Fint*. Arum.
 7&e i^alnu^trK, Nux Juglans.
 3@aII flotocr, Leucoium luteum, Keiri-
 3Dart-iUO?t, or *Sun-Spurge*. Tichymalus Helio-
 fcopuis.
 J@ap-faring-t«C, Viburnum, Lantana.
~~Triticum~~ Triticum.
~~Fagopyrum~~ it, Fagopyrum, Fagotricum.
~~Melampyrum~~ t, Melampyrum.

The JBJitC-ficflin-tree, AriaThcophra^i Sorbi
 fpecies.
 i^itlolU-preif^, Paronychia.
 The H^O?fc-&Cttp, or *Bilberry*. Vitis IdM.
 Vaccinium.
 aDI&olU-toffil, Chamdsea triccocos,
 Sweet WiMiam0₃ or *Prxlt of London*. Arnierii
 The aDillototCflr, Sail*. ^m-lJa.
 Spiked WiVLotO.of Theupbraftw, Spirara Theo-
 phrafti.
 3@inter^-6arfe, Cortege^/mteranus.
 HSillter-grKll, Pyrola.
 Woab₇ Graftum, Uktis.
 fMd-MBaab, *Dim Weed*. Luteola
 IDolftr^-bdnr, Aconitum.
 3@O)b-raif, Afferula.
 3@uib-&ili&, or *Boneyfuckle*. Periclvm^num^ feU
 Mater fyka:
 3@P?intDO)ll, Abfinthium.
 a@O?m-fHrb, Abfinchium Santonicum.
 3@?acft, or *Sea-weed*. Alga, Fucus.

Y.

l a m, Rapum Brafihanum.
 ^arroiu, or *Milfoil*. Millefolium.
 TbefittotZB, Taxus.
 Ulltta, *Caffava*, or *Indian bread*, Yucca.

Z,

Stboatp, Zsdoaria.

F I N I S .

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

