


Indian Botanic Garden library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO. 581.9(545)
BOOK NO. RHE-h. v. 11
ACC. NO. 02405



HORT. BOT. REG
CALCUTTA.

maube Camp's Malabar Garden,
Calcutta
H O R T I
MALABARIGI
PARS UNDECIMA.

D E
H E R B I S
ET DIVE'RSIS ILLARUM
S P E C I E B U S

LMs, MMrkis. AM. Brachmannm charaBeribus nomine express.*

Adieaa Florum, Frutom, Seminumque nativs magnitudinis vera delineatione.
AdjettaHorum, colorumviriumqii eaccuratadefcriptione,

ADORNATA

<Per KobilijJimum ac Generoffimum %>.>.

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,

*Tonarcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem supremi Confessus apud
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, nunc vero Equestris Ordinis nomine Illustribus
ac Præpotentibus Provincia Ultrajectinæ Proceribus adscriptum,*

In ordinem reiegit @ latinitate donavit

A B R A H A M S A P O O T M. D.

Notts adauxit, ^Commentar'tisilludravH

J O A N N E S C O M M E L I N U S J

Republicæ Amstelodanensis Senator, ac Horti Medici præfatus.



241764

BOONIC


B2405

M S T E L E D A M I.
Sumptibus Vidu* JO I N N I S van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,
Anno do 1703 sen.



Pineapple

1781



Brachyotum

J. P. - K. J. K.

Bot. n. 713



HORTI MALABARICI PARS UNDECIMA.

D E

HERBIS ET DIVERSIS ILLARUM SPECIEBUS.

KATA-TSJAKKA.

TABULA I. II.



(Ratmnes & Lufitanf *nInanas* dicuntj
duum, triumve pedum planta, arenosa &
aquosa amans loca, *fydix* crassiuscula >
undiquaque longas * capillatas > nonnihil
nodulatas albicantes Ipargitfibras; media
pars obtortx radios fibrinam obtinet. Primae

radici-formes scaturigines exteriori trunci lamellas infe-
runtur > foliaque inferiora perforant > & quidem illic locf,
ubi folia decidua aliquantulum putrefad:a> maxime con-
fpicux; foliis vero vegeco virore expands, evanescunt.
Laterales radículas trifariam nobis ostendunt phasin, pri-
ma subfusca est & filamentosa •> altera lignea, albicans,
muscosa, tertia five medullaris nervea, pradura, admo-
dum i5rma. *Caulis* e radice exfurgit unicus? rotundus,
redus, sine stolonibus; ex hoc *caudex* tripedalis? fructuiu

P» XL

A

nem.

nempeii. annumeres₅ crassiolus ? pollicis ferine latitudinis viridi, nitente, glabro cortice obductus, qui femiannulatis geniculis interfingitur; interiori parte spongiosus, fistulosus₃ medulla alba kante, succulenta, fibrosa infructus; humor illius aqueus est & subdulcissimus. *Folia QX* femiannulatis erumpunt geniculis ? alternate ordine, illorum bina totam trunci peripheriam arctissimis. complexuntur vinculis, inferiori parte confertim, superiori laxius truncum adnascuntur, • oblonga sunt, supra fructus in fastigium excrecentia₅ finuosa, sensim in cuspidem aculeatum trifloram interiori parte concava? fibris in utraque superficie laxioribus & fungosis pertexta > quas regulari nexu procedunt₅ quarum interiores ceteris majores, crassiores ac valde duras*; ubi radicles ejaculantur oblique, fucus recto ductu procedentes₅ candicantes: Interior finis subviridescit -> illius latera, ad unius circiter digiti crassitiam, fusco virore nitent; in laciniis? jam describendi aculei, congruo 6c quasi artefacto ordine, infiguntur; unumquodque *folium* induas dispecitur laminas cujus convexa, pars rarioris, concava autem densioris structure est; folium ordine sextum ? per universum hunc truncum₅ aliud, recta diametro oppositum, habet? adeo ut totus truncus hexagonusj ob circularem & cochleatam foliorum compagem? dici queat; femilunares foliorum ungues concinna infertione truncum firmiter adhaerescunt, superiori vero membranula₅ reliqua j foliorum substantias, viridescentibus fibrillis agglutinantur. In oris folia hanc muniuntur spiculisj ceu aculeis densis, rigidis? acutis ac incidentibus, versus cuspidem parum incurvis₅ non tamen aduncis; inferior pars circa caulem ad duos tresve pollices sine aculeis est; contextura illorum rigida, crassa, densa, spissa, venulis parallelis₃ ex unguiculis ad cuspidem₅ qui magis durus & rigidus₅ striata; quae ad inferiorem caulis partem prodeunt, oblongiora sunt, in vetustiore planta ex viridi subflavescent₅ ad ora sex flavorum effeunt, ut & in spiculis aculeatis₃ in parte superiori extra oras rubescunt₃ colore futuro rosaceo, in parte nempe ima ac interiori, in

exteriori incarnatè rubescunt > in superiori flavescunt, circa latera farinaceo ac albicante rore ianisque floccis conspersa: superiora unà cum inferioribus ejusdem sunt figure, circa caulis cacumen interius in una parte sanguineofaturo ac vivido nitente rubore suffusa, albicantibus conspersa, rosam, tulipamve marmoream diceres? versus cupidem fusco & nitente virore, vel etiam sanguineo si teneriora sunt, in exteriori latere colore vivido incarnato, superne viridescencia vel ejusdem incarnati coloris, farinacea quoque nive, qua color incarnatus ceu viror in foliis obfulcatur, conspersa? illa remota ipse foliorum color plenius sese conspectui offert; singulorum foliorum apices praeduris aculeis mucronantur: unumquodque folium gemmam continet, quae licet per exigua, integram tamen plantam perfectissime in se comprehendit, pediculo trunci circuitui, exteriori nempe ejus lamellae, insertam.

FruBusi in quo flores proveniunt? in caule excrevit unicus, cacumini ejus infidens veluti nodus, superioribus foliis inferne succinditus > trobiliformis *Tint Italici* iruclum referens in totum *Cinara* inllar, foliis futurorum florum operculis, eleganti specie constructis, atque in modum cochleae (sunt nempe aeva versus dextram foliorum ordines inaequales, alias rectius exfurgunt) ipsum fructum obsepientibus, ita ut iextum in ordine, iemper dianietro aliud oppositum habeat, ubi bina ad latera paria cumstant. Foliis hi sunt rhomboideis > cupidatis? furcibus, rigidis, adverticem sensim minoribus? etiam in pris 5 cupidibus ceu aculeis parvis ac rigidis munitis, venis in longum, versus cupidem triatis, anterius sanguinei nitentis coloris, ut & exterius, ubi albicante farina Wufcatur 5 in unguiculis viridescens. E vertice floriforme, oblongum capitulum, pulchramve potius rotta foliaceam emittit; in germinationis exordio, perinde ut cetera fructus folia, rubram, atque in sui accretione viridescens, led ubi lanuginosa tunica obvelatur, purpuream; in sui principio arete, congruo tamen ordine

compactam j ienurncjt-; magia V-A^Jfam, in apice splen-
 didevirentem. Integer fructus pyramidalibus conflatur
 capfulis, abinteriorecaule ad extimum corcicem decur-
 rcntibus. Foliaceus *apex*, nonnunquamfiraplex, aliasj
 multifidusj quifructui infidet₃ radicum₅ facile hie fe-[^]
 parabilium? ac lateralium furculorum primor*dia in fe|
 continet > adeo ut ipse vertex eafdem > quse in tota planta j
 funt? partes includat, idem ctiam₅ fi obtutum acuas,
 in lateralibus furculis videre est. *flores* in fruit us verticej
 ex foliaceis tuberculis prodeunt, ex vertice oculorum
 ceugemrnularum exfilientes? qu[^] per totum, cortice,
 execpto, ad verticem fructus, ubifoliis denfionibus ve-
 fhtur j ad ipforum fohorum unguiculos extuberant;
 funtque florum conceptacula, quarutn peduncuh fio-
 rorum calices, in fundo rotundi, primitus clauui, pofter
 transgreflutn fioribus concedentes, deciduifque floribus
 femet conftringentes concrefcenctfque, evadunt; gem-
 mulaedecactero follicofas funt & nonnihil ad latera com-
 prefix, conformataeex tribus rotundiolis, craffis, rigi-
 diufculis ac affce convolutis foliolis₅ quae adfeinvicem
 funt conftricla, colons exterius fanguinei & nitentis,
 albicante farina, quas ruborem obfufcat, confperfae, in-
 tus virides 5c. aquese. Flores ex hifce gemmulis follicofi
 exilientes tripetalifuntj oblongi, ad verticem rotund
 cufpidati, fuperioriparteftricli; inferioriconvoluti,ub
 arfto orificio, a gemma follicofa, cujus fundo funt in-
 ferti, tanquam a fuo calice, arripiuntur. Colon's ad
 verticem,cacruleofaturi, infernealbicantis, petalimar-
 cefcentibus ex rubro fufcefcunt. *Stamina* in Hlis fex₅
 flavis, furredtis&oblongis dotata *apicibus*_y quorum tria
 fo•liorum interftitiis, reliqua fupra incifis elateribusin
 figuntur foliis, ac fundo gemmae follicatcc fe inferunt.
Stylus in illis etninet unicus candidus, fuperne bifidus,
 trifido apiculo, cujusquodlibetinterftitium bifecatur&
 crifpatur? inftar Lili. *Flora* exgemmis cufpide acuto,
 purpurcoprominent, quorum qui in inferioribus gem-
 mulis funt concepti citiores exfiliant₅ qui in fuperioribus


tardiores, etiam in ipso vigore angustis oculis hiantes. *Fructus* maturus, oblongo rotundus, grandis, cortice flavo & rubefcente? foliis nascentibus & contrariis vellobfitus, velnudatus? oculis ceu gemulis latioribus caivis j inanibus & magis complanatis in cortice extuberans. *Caro* ex albicante flavecit, succulenta, saporis, > ceteris fructibus, gratissimi, acido-dulcis & vinosi; in medio *stylar* ceu corculum est oblongum, rotundum, duriusculum, ex albo flavescens > carne subdura, quae lignoGs intusest per texta fibris, ex fistulosis oculi transversim incisum humorera exsudans. In fructu etiam transversim incisum oblongis & radios videntur striae, ex corculo seu stylo medio, tanquam medulla fru&us ^redientes & ad corticem excurrentes, quarum caro majoris succulenta & flavescens. Immaturus si gustetur carne iua linguam lancinat ac vellicat. E regione staminum, quae non ipsis floribus, sed riorum interstitiis inferuntur, impulsa jacent *Semina*, in quovis nodulato tuberculo, floris retinaculo, ternis, singularibus cancellis, triangulari forma, quae trigona quoque infarcitur ac distinguitur niembranula, fedusa, ubi affabre factis, nerveisque catenulis rotundiusculis colligantur corollis, quarum fimbriis eleganti rotundarum gemmularum cingulo obvestiuntur, binos inter colliculos, ficuti pinealis glandula inter cerebri nates, recumbantibus. Quoad femina ipsa, parvasunt, plana, pyriformia, ubi prae cocia albicant, maturefcentia apicibus fuscis dotantur, plusquam **matu?** **fructus** > castaneas fuscas emulantur, atque in valvulis seu cavernulis, quae intracarnem, proxime ad corticem, seu gemmulis floriferas confitas sunt, reperiuntur, rarus in una capsula bina; ipsae valvulae oblongae sunt, in longitudine versus medium stylum fructus ceu corculum directae, atque in illa parte quae magis ad stylum accedit, striatioribus, ac velut membrana nitente candida obductas, & plures, ad singulas gemmas follicatas, exstantes. Porro observandum, quod in novellis plantis hujus partibus profunde in orificio oculus emergere videatur candidus, constans

cx foliis supra se mutuo₅ tunicarum inftar₅ convolute
 uti in bulbis apparent, funtque illa folia > quae plaota
 caulem in geniculis inveſtiunt* cujus primordium in inia
 parte oculi interius fitum eli *Folia* in aqua *Orj^a* coffe
 & pulveri "*Baliari* mixta, in potum affumta₃ hydropico-
 rum ventres purgant. *FruBus* immaturi cum *Aceto* pro-
 pinati > foetum ex utero ^ellunt. Idem cotneftabdomi-
 nis ex flatibus intumefcentiam corrigunt.

T A B U L A I. 2.

Prolixior hujus plants *Ananàs* deſcriptio, ſub
 nomine *Kapa. T\$jaka* u\teriori explication! non
 diget₅ omnes enim & fingulae ejus partes ab Au*
 thore quam accuratiſſime funt obſervatae & anno-
 mx. Unicum hoc addendum 5 plantam hanc ex
 America in Indiana Orientalem eſſe translacam,
 ubi majores fruſtus, quam in nativo profert ſolo,
 aq_{ue} etiam ibi aliquantulum mutatae ſt_f folia
 enim in India anguſtiora quam in America. A
 quinquennio ſingulis annis in Horco medico Am-
 itelodamenſi arte excuka, ſat magnos & raatu-
 ros proculic fruſtus. A *Caff. Baub. in Pinac.* vo-
 catur *Car duns Braſilianmfolih Alöes. A MarkguV®*
Nana Braſiltensibus -? & ab *Bernando Matz.aH*, ſeu
Finea indica: pertinet inter plantas pomiferas, an-
 tiquioribus *Botanographis* plane incognita.





K. R. Khan
Mirza Asaf-ud-Daula

پندرہ روزہ
میرزا آساف الدولہ

K A D A N A K V vel C A T E F A L A ,


T A B U L A III.




PLanta est arenoso & petroso gaudens /bio. "*Radix* penniformis, fibris ex albo flavescen-
tibus oblongis vestita, carnosa, aquea, fi-
lamentis lignosis, raris pertexta, faporis
aquei, linguam nonnihil vellicantis. *Caulis*
ex ilia prodit unicus, brevis, rotundus, fur-
red:us> intus carnosus, aqueus. *Folia* bina, decussato
ordine, ex caule emergunt, quorum principia caulem
amplenduntur, in latum extensa, ad longitudinem cubiti
& amplius excrefcentia, sensim in cuspidem fridla, valde
crassa, superiori parte plana, inferiori, qua radici obver-
tuntur, convexa, glabra, in oris spinis viridibus, rigidiuf-
culis munita, de c^tero pulpa aquea, clara ac viscida in-
fructucla, in qua fibras rara, virides in longum sparfe vi-
funtur, faporis aquei & subdulcis. *Flores* in caulibus
rotundis, qui ex radice oriuntur, ac foliosis involucris
nive indevestiti & intus fistulosi, humidi, plures congre-
ati proveniunt, oblongi, monopetali, superne in sex
partes divisi, in cuspidem definentes, exteriora versus non-
nihil inflexi, filii, in collo flavii, crocei, ftriis aurancei
coloris perfusi. *Stamina* in illis sex viridi-albicantia, api-
culis oblongis, furre & is, ruffis, dotata j stylur in medio
albicat. Apud Medicos extra usum.

T A B U L A 3*


C / A K ^{oë Yu} *caft* ^{*aMn, mVinac} . *plan ta hxc* ^{†spei, prater haec binas adhuc species Aloe at-}
detefla ^{annu (Juot annis J. uam p]u m se hu Jusunc} *botefcentis* ^{inveni > fumx altitudinis & crassitie ij}
Ab abam ^{conf Ppecies} *ut* ^{ut} *prolixius* ^{videre efl-apud} *lqaarum* ^{trunci incisi, egregium Aloes succutri}
Mexican. ^{UI MUntin & mAloldario i & Hmandum Hi p.} *fundunt, qui Malabaribus ignotus, in aliis tamen*
quorum ^{H rma} *TM* ^{n in Pridrotno Paradif Mtav.} *India: & Europce regionibus familiaris & maeni*
Dom. *Leftorem remittimus. In Itinerario* ^{ufus est.}
Swtonis vanderstel gubernatoris Capitisbo-



H



Handwritten notes:
L. ...
...
...



I

^

Handwritten notes:
P. 272
...



山
椒
木

山
椒
木
L.

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fig. 1.

MALABARICUS . 9
 EL E T T A k I.

T A B U L A IV. V. VI



DEclivia montium; valles, umbrosa ac c& nefaamatloca, folis impatiens, duodecim circiter pedes alta, in quern finem *Tab. I flirp. A.* hominis appositam yides imaginem. 2^/* oblonga crascescit, geniculata, albicaais, m* a tortuosa, fursum virens, e lateribus innu-
 DOa' libro fas ernittunt radl*culas > quibus, veluti pedibus, P^{cr} mde ac radix *Zin^tberis*, proferpit. *Caules* qui e ra-
 d¹ cee mergun^ rotundi) glabri> virentes> latum ferme
 poll' aruTM iuo emetluntur diametro* flipite simplici; instar
 Var^{TT} CUJUS texturam ^ mulantur, furgentes, albicante
 tran^{ua} que medulla> Kgnofis filamentisj quorum extrema,
 cor^{*ns}verfim difleda, eriguntur> infrudla ; ex quorum
 ednr^{fub}llia » a^ueaj tefearanearum instar, candicantia
 cum Clpo quntflia; foliorum ^{ba}fi> qua; fuperioribus radt
 fu⁸eni cullis inniti tur (Tab² - litt.B.; theciformibus
 ftunt. *Distraeh**, manibusve triti aroma ipirarit. *Folia*
 illis ^{ith}^m Ju - K^m non ab familia funt, quatuor circiter
 fp⁻Manias longa, lata (videtab. 1. litt.B.) viridia, para-
 lellis ^{oX}libus q uc venis^s ftnata, odore ac sapore fbrti * fuk>
 Jici ⁱⁿ^ar ornatico. Cofta media in adverfa parte *viridi dilute*,
 tij?e ^verfavindlon *Flores* (videtab.2.litt.E.; unifruc-
 ^rporacemo, vel radicali furculo^ plures; plej^m que
 litt[^]atuorve, ejufdem oblongis folioJis (vide tab. z.
 hoc^{Ve*}uti capfulisimpliciti; nullusenim infoliaceo
 ad^{Involucro} confpicitur hiatus. Tegmine hoc autem
^{terto} tetrapetalus *visui fete* o % t flos ^ vide tab x
 % pp^{CO}nVⁿⁱUnt) quorum tria (vide ibid, litt G.) magnitudine
 Sof^{eni}Unt> oblongoangufta, viridialbicantia, membra-
 va^{J'} 3^{Uar}> tum (vide ibid. litt. H) quod prioribus ex ad-
 Jitt. £^{Jacet}> tenui ftylo (ibid. litt. I) lingulaque f ibid.

T>1. donatur, paulo latius ac minus oblongum est,

interius fitum ac viride; Lingualitt. K denotata, oblongo-angusta *ell*, crassiuscula, in interiori facie, quæ intirno foliolo ex adverso opponitur accumbitve, fulco ftriata, in supremo apice bifida, dilute rubescens, fuoque fulco exilem, candicantem ftyluuj litt. I, qui in tenue planumque definit capitulum, recipit. *Ftoris* vigore cessante complicantur petala, fructuum apicibus perpetim infidentia, *calyxque* in fructum intumescit, (vide litt. M) qui ubi adoleverit in orbem distenditur, convolutis floris folse etiamnum comatus, (videlitt. N) qui deficcatus talem ut *litt. O* formam refert. *FruUus* radicalibus frudlipromisque racemis appendent, qui uvis & forma 6c sapore haud perperam affimulantur, orbiculati enim sunt & grate subacidi, viridi, crassiusculo, carnofo, aqueoque *coxtic*[^] obducli, ftriis admodum tenuibus juxta longitudinelO pertexti, intresdistindos dividuntur loculos cancellatin[^] distinctos₃ ita ut quodlibet interspimentum, in sui medio* membranaceafibrilla (videtab.2. litt. B) etiamnum, fed levi ingressu bifecetur, ficque feminum conceptacub efficiunt: adeo ut sex ordinibus, combinata, triangularia? preffis planisque lateribus fruauis, copiose infideant grana aromatica (vide litt. L) qu[^] medio ftylo trigono? (vide tab.z.litt.C) cui, mediante membranaceafepa, affiguntur fructibus suis adhserefcunt. In aprico frudlus hi exficantur folo, ubi cortex, qui primocrassus viridisque, *eX* tenuatur & ex ruffo albescit; suntque ipsissimum *Cari** momum*; non feruntur neque plantantur, fed post fylvarum combu[^]ia, subomnigenarumarborum plantarumque cineribus progerminant. Porro observandum quod ex radicum geniculis subterra, plurimse prodeant *gemma* cutpidatas, viridescentes > quæ infurculos Cvidetab.2.1 litt.n) fessiquifitham longos excrefcunt, suntque illi fuccincli* geniculati, in articulis foliaceis vel membranaceis gaudentes tegumentis₅ qu[^] ficca ex albp ruffescunt, & è *com*; missuris laterales, simplicesque pedunculos erudant, qui? subfoliofis, capiformibusque tegumentis (quibus ar#e vesliuntur.) florum, fruduumque germina recludunt.

MALABARICUS . u

res hujus *Elettari* five *Qardamomi* sunt cognitae species, quarum prima quas hic descripta est & delineata plane rotundas ac albicantes profert fructus, cuius natale solum in pra (ochim & Calicut in locis montanis, triginta circiter a mari miliaribus, pretioque, obpraevalentiores vires) huius praevalet. Secunda species oblongior est, sed vilior; tertia ylifitna & plane acuminata; quas posteriores juxta ^{Walt} aliaque Indiarum inveniuntur loca. De viribus nihil addendum duxi > fat enim superque sunt cognitae.

T A B . 4. 5. 6,

^{Elett} ^{Scadv} ⁴ⁱ ^{ua: illic ab} ^{Aua:} oretam fufe descripta data opera usum illius in Medicina praeteriit; ^{est delineata} ta, est ipsissimum *Carda-* omnibus enim ram in India, quatuor in Europa ^{duQ} ipso primum plenissime in lucem de- fatis est cognitus. Specierum diversitatem ^{am Lector} ^{Bo} ^{ius mcm} se priorem putat. Sed lege, *Cardamomi* etiam annocavit, indicans quatenam sit ^{dica} ^{et} ^{us} ^{Pfis} ^{niagis} ^{notx} ^{erant}. Noiter Auctor ^{unius} ^{qued} ^{des} ^{criptionem}, ^{6c} ^{ipse} ^{ju} ^{dicat} ^{ut} ⁱⁿ ^{pos} ^{terum} ^{fraudes} ^{dolique} ^{pre} ^{veniri} ^{possint}.





D. N. P.
K. P.
1850
1851

Jan 11 1851

K V A

TABULA VII.



Va, Bramannibus/c«^j proprium & commune omnium plantarum nomen est, quæ ad [*pecks* Zinziberis referri debent, funtque numero odio. *Ku*&, *Tsjana Kjua* > ^ *Ual an Kua*, *SM anga Kua*, *Of Mangella Kua*, *Int Jyi-KjM*, *I^atou*Int/yi K^un*. *zff\dala-Intjyi-Kua*. Prima species omne amat folium, præfertim arerio-
 ^ 3 in quo sua sponte provenit & progerminat. *TRadix*
 ? Unapartetransversim excurrit, alba₅ crassa? tuberosa,
 inde teriuioribus & fibrosis radiculis inftru&a,
 densa, multisque capillis albicantibus pertexta > cortice
 glabro; in longitudinem^ fe per tuberosos dispergit, ad
 crassitudinem duorum circiter digitorum, & {pithamse lon-
 ^ ^ Jnem, in ramos divisa, aqua limpida referta. Sa-
 ror acris est, linguam vellicans₅ amaricans₅ aromati-
 cus. Odor fortis, iest & gratus, perinde ac si multa
 aromata inter se essent permixta. *Folia* oriuntur ex
 radicum extremitatibus ad longitudinem! cubiti₃ & lati-
 tudinem in medio duarum spithamarum; antè ac-
 minata, circa pedem angusta > *costa* eminerite inftruftra J
 illa multas emittit laterales > transversim antè excur-
 rentes, sequalidistantia, in extremis oris disparent, ubi
 subtilioribus venulis marginem folii ample&untur; inte-
 rior pars folii aliquo modo complicata est & reflexa, futuris
 notata. Color in parte interiore fuscus est * in exteriori
 dilutior. De castero folia glabra sunt₅ nitentia > aquea.
 V*/« fesquipedales sunt, viridante medulla pleni, sed nulli
 ^ "lis conspiciuntur furculi; sedè radicibus, fcapuserigitur
 rAUA jar is₅ prselongis aliquot foliaceis squamis j fcapum
 arctissime ambientibus obtectus; quas folia digiti longitu-
 dinem* fuperant? antè in latum extensa, & exiguo
 cuspide ad se invicem contraita, extremitates à capite re-
 flectunt, glabra sunt? in longitudine tenuioribus venulis
 P. XI. D in.

influa, quas, nisi frangantur, nequaquam videri possunt; inferiora viridia sunt, media flava, superiora rubra, purpurea, dilute caerulea, summa pene candidantia, asperius jucunda, odoris grati, sapor ut ille radicis. *Flores* ex squamarum interstitiis, duo vel tres simul proveniunt campanulas referentes, inferiori parte & intus sub albi, tenui, transparente membrana conclusi, hexapetali, petalo superiori oblongo pellucido, calyx inferius, erectus, flavi sunt & albi, complicati, & vix videntur nisi totus flos à caule divellatur & a se invicem separetur, ubi unum illorum reflexum deprehenditur ad marginem fimbriatum; in medio *filamentum* seorsum prodeit cuspidatum, draconis quasi caput & aviculam alatum erecta cauda referens. Odor gratus est, è calice seorsum extracti, & intra digitos contusis foliorum simulatur odorem -> saporis subamari. *Capitula* feminales rotundiolae sunt, & depresso, grana continent cineritia, ut illa *Tsjanafya*, sed raro inveniuntur. *Stemata* diu superstitia sunt, folia decidunt, mense Julio & Augusto denuo progerminat. *Stemata* radices, aliquoties lotas pollinem reliquunt, ab indigenis multum estimatum > qui pulcem ex illo conficiunt. *Tydyx* contusa & fucus recens epotus, omnem intestinorum ardorem sistit, renes purgat, fluxum album inhibet, gonorrhoeam sanat & sanguinem purgat. *Foliorum* fucus hydropicis propinatur > intumescitiam abdominis aufert, modice laxat > viscidatum intestinorum pituitam expurgat.

T A B. 7.

Kua fecundum sententiam Cl. Vir. *Tauli Her-* } *Cingalensis* *Walinghuru*, id est, *Zinziber* *syvestris*
ntanni est *Zerumbeth Garzii* ab *Horto*, cujus descri- } appellatur, *tyalabms* dicunt *Kua*. Illa *U*
ptio, ut & illa *Auburn* admodum obscura, & } cum Auctoris nomine ut plurimum conveni



Hibiscus
Linn.
Hort. Clav.
p. 21.
1758.

TSJANAKUA.

TABULA VIII.



Ramannes dicunt *Tonvo*, fecunda species omne folum amat, prascipue umbrosum. *Ifydx* alba, in multos tuberes divisa & prorepens, fungosa, aquea, fibris quamj^u*rimis pertexta, aquea, tenella adhuc viridis est & albiscapillis obfusa; *Cortex* deminon potest; vetustior facta & fracta, multae fibrillas exinde in longu^un³ extrahuntur telas aranearum instar. *Sapor* aqueus est[^] dulcis ut ille *Cummeris*, leniter Zinziber spirat. *Sur**cul^f aiverfis in locis radicibus progerminant, ad altitudinem trium quatuorve pedum, digitumque craffi evadunt, rotundi, fanguineo rubri, glabri, nitentes, arundinacei, genic[^]ati, simplices, fineramis > intus virides & aquei. *Sapor* 3 cum odore, ut ille radicis. *Folia* oblongo angusta, duas st[^]thamas longa, anterieus acuminata, in medio lata, prope circa furculum annexa, ubi pedes furculum obvolvunt ac obtegunt, in parte adverfa *Cofla* eminent, in obverfa[^] fe[^]antur, laterales costae transversim marginem folii pe^jun*⁵ ubi oblitterantur; multoties introrsum sunt convoluta, mollia, nitentia, viridia, admodum aquea. E cac[^]Umin[^] furculorum capitulum. l^eu tuberculum exortur, instar *mali punici*, pyriforme, ex multis corallo-rubris gemmulis conflatum, quae fingul[^]e lata basi, medio stylo annectuntur. E gemmis prodeunt *flores* trifariam divisi tetrape* alij ephemeri, candidi, campanula formes, in ver[^]uce aliquantulum aperti; quartum petalorum maxi[^] est & reflexum, in cujus cavitate quintum reperitur, lin[^]mo[^]UIGQ re fl^eXum & ⁿ quartum recumbens, e regione cje[^]U¹⁴ re Per[^]itur in pede floris radicata, apice flavo, de f^jq[^] alba; ipsi flores admodum aquei sunt & in j[^]e[^]ll[^]ue fiunt, e calice suavem admodum ispirantes odore[^] non autem ex ipsa substantia, quas odoris & saporis est[^] Pers. *Calix* e tribus constat foliis rigidis, lignosis,

rofaceorubris, intus cseruleis, quæ ficcata fufca evadunt; trigono ac rotundiolo infiftunt globulo feminali, interle- pimento in tres partes divifo, ubi *femina* feriatim, & ^{1^e*} cundum fe invicem difpofita, membrana media anneflun- tur, triangularia, ut ilia *C^{ar}Λ^{momt}* > primo casrulea? dein fufca, quando cap fufca feminales etiam trifariam aperiun- tur; contufa Zinziber fpirant, faporis admodum exigui? > intus alba. Diu admodum fuperftes h#c planta eft, radix enim proferpit & hinc inde novos furculos emittit, prf fertim menfe Aprili & Mayo. Cum Zkmbere mixta in colica paffione adhibetur. *Sums* dolores > ulcera, & aurium tinnitum aufert, auditum juvat, omnem flu^{xum} cerebri tollit & vertiginem.

T A B U L A 8.

Secundum meam fententiam *Tsjana Kua* ilia defcriptione noftri Authoris quam in ^{xime} *venit*; eft enim faporis yappidi, fubftantia: ^{fibrofa} & capi Uatx. Sæpius illam inter Radices ^{1^o} *riie officinarum* inveni. Germani illam pro ^{vero} *Cofo Mrth91. Theriacdi* adhibent. Radix quæ in officinis proftat & divenditur, cum





Handwritten text in Arabic script and Latin, including the name *Vanilla* and the name *Linnaeus*.

CMALAN-KJJA.

TABULA IX.




dlankna, quasi dicefes *Ky.a sSfdontana* • > tertia species est Zinziberis, fecundum Bramannes *BenTsjapo*, elato, pingui & limofogaudet folo. %*tdix* bulbofa est, extus cineritia, coriacea membrana obdufla 5 intus alba,

fella, denfa, aquea, undiquaque multis fibris ob-
 capillata, digitum crafla₃ cui quamplurimi oblon-
 rotundi bulbi, bini & bini, trina lupra fe annefluntur
 ne₃ glabri₅ hinc inde minutiffimis capillis in intrudi,
 h₃ perinde ac "*Bulbocafiana*^ quos nomine *I(our{a* infi-
 5 intus^m^ues 6cmudlaginori 5 *Zin^beris* odorem
 ,%orem fpirant₅ linguam minus vellicames. E fum-
 Y^uta^u *Co* radice^u *flores* *in* *cl* *id* *bus* *&* *qu* *ate* *br* *na* *na* *cu* *is* *in* *fer*
 u^undo calicis longis petiolis prodeuntes ? tripetali vel etiam
 h^u tapetali, quorum triaj digitum longa, ftramenlata,
 reli^uqua petala, f five ipfum florem obtegunt, flore jam
 a^uPERTO, fupine recut fibentia; duo ex reliquis longa font
 & an^u gufta₅ in acutum definentia, tertium millis ex ad verfo
 cf^u bifariam divium, ita ut *ipfedos* retrapetalus videatur,
 ^Xti colon's est, ex casruleo albo, purpureo, rubro^ flavo;
 j^u reli^ua maxima parte alba funt > ita tamen ut *diili* co-
 ?^{re}s etiamnum > fed obfeuri videantur; ex eodem cali-
 Cls^u fundo fimplex progreditur *filamentum* purpureum,
 S^uo d cornuta & flava eminet lingua; gratiffimi hi flores
 lu^untodoris, *Violas* & *-tilia* longe fuperantes, * ante folia
 e^u terra erumpentes, quibus deciduis *calix* intumefcit >
 Ca^u *pfu!* *as* *fiminales* efficiens. *Folia* cum illis *Kua* intotum
 co^unveniunt, excepto quod caules & fuixuli non feifeita
 ^J^us^ant, cubiti altitudinem non excedant, fapor ut ille
 "ftn^berisj odor idem. Semel quotannis floret haec planta
 te^umpore pluviofo, diu fuperstes est, in proprio nempe folo,
 Si^uja bulbi femper de novo progerminant. In Malabaria
 P: Xl. F E ad

ad decem gradus altitudinis versus Borealem partem *Lineæ* ^jEquinoctialis ₅ pleno videbatur flore, qui mense **Junio** ejuldem anni Batavias, ad sex gradus *Lineas* *J\$L* *Quinoctialis* versus Auftrum exsiccabatur, ubi mense Decembri de novo florebat, turn enim illic loci pluviae decidunt. Cum ex Indiis Europam peterem, septimesimo tempore? ter florebat, ac toties folia permutabat, donec mense Augusto tota consumpta deprehenderetur. Ratio, quia tam brevi tempore toties folia exposita, terra non tantum poterat subministrare alimenti, quantum quidem ad ulteriorem conservationem indigeret; quod & in eodem itinere in diversis aliis plantis accidit & observatum est, quam pl^{urimum} enim fit? ut sub linea aequinoctiali, aer nubibus obtegatur, unde pluviae? quas regiones sub Zona torrida frugiferas faciunt, sine illis enim omnia comburerentur & deficerentur. Tota planta in formam unguenti redacta mirum in modum vulnera recenter infligunt; incisa sanguinem in corpore coagulatum, & omnem purulentam materiam consumit; est & unguentum oculare. *Succus* radicis omnem pituitosam & quasi hydropicam materiam è manibus, pedibus, atque ipsis etiam articulis? quamvis quasi emortui, & extra omnem naturalem motum videantur abigit.

T A B U L A O.

MaUn Kiu à Cingalenfibus *Maba Kalutra* vocatur, *Hermannus in prodrom. i*arad. hatav. dicit* *Cohbicum CeyUnuum flore VioU₅ odore & calore epbemeroy* 6c hoc ob similitudinem florum. In offic. *Ztdotrid rotundij* quoad saporem ScSodorem, in cinis duplex (pecies *Radice Zedoari** invenitur, una nomine *Zedoari & radice longa* alia *Zedoaria radice rotunda*, vel Belgice *BU-k. Zedoar.* Meo Iltet fententia, longam & rotundam *Zedoariam*, *radices unius & ejuldem esse plantis; sed i_g nof-* *judicio doct. Dom. Jacobus Brejrinu in sua Pra-* *diomo feiund: non male judicavit hanc MaUnKua* *centumviro, nunquam enim in his vires videt*





درخت چغندر

شماره ۱۱۱

Dr. M. L. ...
M. L. ...

M A N J E L L A K U A ,

T A B U L A X I .



Anjella Kut quinta species , Bramannes dicunt *Jlady*, vera *Cucuma* est, omneamans solum. *Hadix* ut ilia *Zinziberis* bulbofa est, duos digitos crassa, extus eleganti flavo colore tin³a, intus rubeo aqueo, qui etiam flavescit, densa, carnofa, nullis circulis interstitiis, sed ejusdem ubique colonis, multis minoribus Wadiculis, quibus capillatis fibrillis obducuntur, mstru^a, P^ende ac ilia **Manja K^ua*, gratissimi odoris & saporis, afffortioris. *Folia* proveniunt ut ilia *Kjta*, sed illorum ^{les}feup'edes, postquam a stipite recesserunt, longiores ^{iu}nt. *Costu*U qua^a ex medio folii utrimque transversim ^a anteriora excurrunt, propius junctae & subtiliores sunt. *Folium* ipsum majus est & dilutius. *Homini* vertice junctorum oriuntur foliorum, forma ut illi *of Manja K^ua* ⁵ etiam *femina*, ita ut inter hanc plantam & **Manja K^ua* ⁵ exiguum intercedat discrimen, excepta magnitudine, ^a ptttdantiori virtute, odore & sapore. Non tantum ^{III} desertis reperitur, sed etiam in agris excolitur, ^{3c} hoc ^{Iu} cricausa⁵ nulla enim familia est quin *illis* inter edulia vitur. *Europaei* illic decedentes, *Croci* loco est. Etiam ^m angendis linteis adhibetur. *Succus* cum *radice* contusus ^{ve} l levigatus orificium reficit , halitum gratum facit, ^e larat, melancholiam pellit, sanguinem purgat, ^{ve} flerem excitat, ventriculum & cerebrum confortat, ^a ^{ff} frustiones renum, vesicae tollit, menstrua provocat, ⁱ ^l iter alvum laxat, hydropis curat. Brevi, omnium ^{Con} sensu planta praecellens est & excellentissimis ^P ^a ditis virtutibus.

T A B U L A II .

¹² ^{ec} ab Authore nostro descripta, vera ^{ad} ^{ma} ^c » («*ma*. Ab aliquot annis in Hor^o/* ^{um} ^H ^{el} * ill ^{at} nexcolui, & fateor ad amissim ⁱ ^K ^u ^a ^{er} ^{ri} ^{pt}ione hac convenire. Distinguitur ^{uo} ^{ti} ^r ^{en} ^{ills} > quod foliorum caulis fit dilutior. ^x ^{Su} ^{re} ^{ati} ^o ⁿⁱ ^H : ⁱ valet, figuramenim *Canna* ^P ^{fo} ilia ponit. Delineatio *D*. *Utrum*

etiam deficit, & cum ilia nostri Authoris minime conveniens, praesertim in *pogteffu floris*, qui multo melius ab Authore nostro est observatus. Radix hxc quas apud Indos in nugno est uiv, *Eotri-Boni* ab illis vocatur, reliqua cognomina videri possunt apud *Bauhinum* in *PIMM*.



Page 55
L
1797
C. W. Smith
1797

Bot. Tab.

INSCHI «/ INSCHI KUA

T A B U L A XII.



Extā species ; Bramannes dicunt *Alè*,
 ipfiffima planta est 3 quam nos *Zinzjb&r*
 vocamus, quae iterum in tres dividitur
 species. *Infchi*, *Ratou Infchi* & *Mala Infchi*
K^ua. *Infchi* tantum dicit ac fervidum,
 calidum? urens, quare reliquas *Kjm* species

linguam non ita pungant nee *vGllicent* Planta est
 excrescens ad aitudinem duorura triumve pedum.
Radix bulbosa est, multis tenuibus, curvis ligneis,
 P^Uatis fibrillis *Me* terra affigens; intus ex flava albescens,
 ^ • > multis filamentis & nervulis in longitudinem
 p^uxta? ftepius tres pollices lata, in medio crassa,
 spi[^]arnam & quod supereft longa, fed turn facile frangitur,
 qua¹ causa est 5 quare exficcata 3 rariffime tam magna
 vide[^]tur. Sapor dulcanarius est, fervidus, omnibus pene
 notus. *Surculi* multis in locis è radice progerminant?
 digitum crassi, arudinacei 3 geniculati, intus virides 3
 corculo humido inustru^{ic}li 5 rotundi, glabri, nitentes,
 simpl^{ic}esj nondivifij ubique pedecalici fermifoliorum
 i[^]ob^v>luti > ut caulis in totum ab illis obtegatur, quas folia
 in solo Venice prodientia 3 in proceitu furculi subsistunt,
 illic loci ubi furculo inferuntur, arundinaceos circulos
 relinquunt. Saporis Sc odoris sunt aquei, fortis, grati.
Folia spithamam longa, duos digitos lata, pedetentim
 in acut^usi definentia, in adversa pane *cofia* eminente
 instr^uta > quae in recta ftriā relinquit, fusco viridia,
 glabr¹i nitentia; fortiffimi & grati Timi sunt odoris,
 saporis dulcamari 3 linguam non ita vellicantia quam
 quide^{na} ipfa radix. *Floret* ut illi *Tsjana l{ua* in vertice
 furculi proveniunt, fed in illodifferunt, quod extubere
 florif[^]ronon ex gemmulis, fed ex cochleato cavis content
 soliolis. ^{^ta ^c} fi^{rtlu} l^{atc} l^{uea} ^{^a} ereafficiuntur 5 illic loci
 p^{im}^{^o} sunt viridia, deinde corallorubra, aft ubi se ipfa
 ob-

obtegunt) flavescencia, quæ tandem etiam rubescunt
 squammatim optima serie disposita, glabra?, nitentia
 Flores infra cochleata tuberis proveniunt foliisque meo
 tibus affixi, cui etiam folia annexiuntur, monopetalæ
 difformis, quadririviti, viridi flavi, in principio alba
 membranula inclusi. Unum petalorum longissimum ei
 & erectum, cavum, introrsum inflexum, duo reliqua
 angusta iunt & minora, extrorsum reflexa, quartum
 brevius est, bifidum, cum margine rubro. Nervis
 punctis aspersum. In medio ex pede calicis tenui, albu
 prodeit filamentum, cuius lingua oblonga, flava. Ad
 admodum exiguum est, sed contuli cum illo foliorum
 convenit. Ultra diem aut biduum non supervivunt, citoque
 pereunt. Stamina sequuntur flores, tenui, alba, inter
 membranula inclusa, ubi inordinata serie minutissimi
 fibrillis stylo annexa, & cochleato cava foliola
 elevat, oblonga, depresso rotunda, ab una parte
 convexa, in longitudine parallelis striis exarata,
 nigra, nitentia intus alba, oleosa, pingui medulla.
 9. & fapor ut ille foliorum. E radice, per simpli
 distillationem, sepius oleum colligi, ab omni parte
 faporem & odorem, cum radice conveniens, sed non
 fervens nee ardens de castro valde limpidum
 rubrum, aquas innatans. Mense Aprilij in terra bene
 exculta, feritur hæc planta, e terra eximitur, replantatur
 atque ita excolitur; annua e terra eximitur
 quatuordecim dies in sole exsiccat, cineribus ex
 vel etiam calce aspergitur, atque sic conservatur
 tine; & corruption! admodum est obnoxia? turn
 exsiccata vel saccharo condita ubique locorum transmitti
 tur. Arenosum & non bene excultum respuit
 & plusquam annua ligneis filamentis adimpletur. Etiam
 in fylvis & desertis reperitur, diuque sua natura
 ceteris epibus & pluries folia renovat, quæ ut
 mense Januario & Februario exarescunt. Præcipuus
 in radice est, quæ præterquam quod in edulis adhibeat
 etiam intus fumta asthmatibus, pituita evulsiva

Ventriculo male di/pofito conducit, exterius applicata
 artuum dolores, chiragram & podogram tollit. Cum
 aqua contufa & oculis infufa, vertiginem fanat, illam
 nempe, quae poft partum mulieribus non bene per men-
 ftra purgatis, accidit? quae nifi in tempore curetur, epi-
 lepfias > paralyfes, manias, imo ipfam mortem, in illis
 regibus fepeffime producit.

T A B U L A 12.

Inferius per *ditam* tam accurate & Perfec^e ab auctore noftro eft defcriptus & delincatus, ut
 alteri *Lim*-? *ditam* daddere fupervacaneum duxerim.



P. XI.

G

KA-



Handwritten text, likely a botanical description or name, written in cursive script.

KATOV I ^C SCSI K U A.

T A B U L A X I I I




Ramannes dicunt *Kjlinyane* septima speciesj
quasi diceret Zinziber fylvestris. In totu m
cum praecedenti convenit plantar fed odor-
neque fapor tarn fortis nee aromaticusj
omnes etiam partes multo majores sunt;
folia \\ \s c^ManjaKjia perquamfamiliafunt.

^{t^} vires pene easdemfunt ut ille *Injcbil^ua*, fed non
^{ta n t l} valoris neque praestantise. Indigene, lucri causa
^{at ^} cum praecedente commifcent. Sed notandum quod
^{na c ne} q^u e ex femine producat neque excolatur, atque
^{u ue o} merito pro fylveitri habenda*

T A B. 13.

^{Zit ^ bere} ft fylvestris. A *tifine* in *Mantiffi Atomat.* > Cap. % . defcribitur & ab eo *ZmubtrUas*
^{vocat} > ab *Hernando Anchoa*.





M. pinguicula L.
 2100 300 ml.
 2100 300 ml.
 2100 300 ml.

I«V

MALAINSCHI KUA

TABULA XIV.



Octava *K*** species & tertia *Zinziberis*; Bramannes dicunt (*firi Kstijane*), quasi *Zinziber montanus*, altitudine omnes priores antecedens. *%tdix* cum illa *Infeby* convenit, led duplo crassior, aquosa, vappida, *Zinziberis* aliquo modo odorem & saporem gratis. *Surculi*, ortus, *Folia*, ut *K** Infeby*, *kd h<c* [^]ulto longiora & latiora, sapor & odor cum illo radicis ^{co}nvenit. *Caulis florum* quae; medulla est plants, ad ^{blt} altitudinem sese erigit e vertice foliorum, rotundus & ^{H^{no}}uaque multitudine florum obiectus., brevibus ^{pe-} ^{tl}lis brevibusque ramulis, quaterni vel quini, cauli affixi, ^{ui} glaber, viridis & nitens; grati & jucundi odors ^{^ru}But ex pede florum proveniunt» oblongo rotundi, ^{^atn} references feminarboris *K'valam*, sed paulo ^{o''}giores, primo virentes & glabres, deinde ruhi & ^{cen}tes, cortice crasso, membranaceo, uvarum mstar, ^{tUs} densa carne vel medulla, quae rufa est, intra quam ^{con}cluduntur *pmina*; duove tria numero, alba, tenui ^{r^{lei}} membrana inclusa, oblongo rotunda, ab una parte rotunda, ^{dllr} a, nigra, nitentia* intus alba, oleosa & unguentosa, ^{•%}«u am Rdalum refert; saporis aman, odor ut ille *Zinziberis*. Provenit *K#*hfibj*, non excolitur neque ^{ln} edulis adhibetur. *Suceiu* e radice recentis expressus, ^{''}Jtos & extus Podagricis datur; coda radix dolorem ^{ca-} ^{Pta} aufert, in vino macerata omnes artuum cruciatus ^{%>} reostollit, in pulverem redacta, cum fucco ^{%a-} ^{hani} permixta, scapota, calculos dinnuit, arenulas ^{re} nibus deterget, mulierum colicatum sistit, menstrua Provocat; fucus <nam vinocoflus lochias promovet, fan- ^{Stin} em purgat; & efficacissime fecunditas expurgat.

XAJSLA 14


Inter,!

,,,,,,., confccmnsram, quaroim » » » * ! eicolui? in

, majus & elatius.

H

PA.



Strobil.

بجانبه قبا الينجور

1870

P. W. L.
Herb. - Kew

PARUA-KELCANGA

TABULA XV.



Lantula est altitudine duarum spithamarum, nascens in aquis minus profundis. *Ifydx* glandulosa est, intus albicans & aquea, plurimas radices fibrosas? quas prius albicant, dein flavescunt, ejiciens, faporis expers. *Caules* tcnues, simplices, fistulofi, alii triangulati, alii rotundi 5 virides? inferius albicantes. *Folia* ^ fummitate cauliculorum triangulatorum reſla pro-
^{eu}nt, ex fingulis unum, ligonem referunt, oblongo
^{guſta} ^ iherius latiora, circa petiolum rotundis oris
^{anterior} in cuſpidem contra6la5 ſuperficie plana5 con-
^{textura} lenia5 mollia; mediocris craſſitie. *Coſta* in
^{adverſa} eminet, ut & venul«tenues, utrinque duſe; qui-
^{bus} in longum ſtriantur; *caules*, triangulati e quibus folia
 Proveniunt, in iriteriori foliorum parte? planiores.
^{Fl} ^ congregatim ac velut ſpicatim > in fummitate pro-
^{priorum}, rotundorum, viridium cauliculorum videntur,
^{albicantes} ſubpurpurei; conflati ex *ſtaminulir* aliis crat
^{ſior}ibus, aliis tenuibus, qu« *apicibus* purpureo rubris do-
^{tan}tu r, quorum petala rotundiola, parva, primum ſcu-
^{at} timpoſita ac ſtamina obtegentiaj ſed cauliculi, quern
ⁱⁿ gunt, fummitate excreſcente* a ſe mutuo diſſita;
^t in poſis progreſſu tam petala quam ſtaminula virideſcunt,
^c poſteriora in *gemma** mutantur rotundas, virides,
^{ae} paulo niunitas, in quibus *femina* parva, oblongo rotun-
^{da} primum viridia, deinnigricantia. Addendum in ſu-
^{de} p. quod plantula h^c e (ua radice glanduloſa a latere,
^{ae} jlettiradicem producat, quapropagatur. In Medicina
 lumobtinetur ſum.


TABULA 15.

^A
^{ub} ^p ⁱ ⁿ ^{ec} ^{Um} ^{deſcripta} ^{fithi} ^{Ec} ^{planta}, meo iudicio vocaridebet *TUntagmiap* ^{li-ka} > floribus
^{pure} «, radice glanduloſa.

NIR-



Die-lymbu
Groot m.
Teggen m.



Die-lymbu
Groot m.
Teggen m.

N I R - T S J E N B U .

T A B U L A X V I .



PLanta aquatilis es fl. *Radix* aquosa, carnosaj albicans, plurimis fibris albicantibus se fundo aqua: affigens, *Folia* caulibus, qui ex radice exoriuntur, ac vindi albicantes, tnoles, & intus fungosi sunt, furresta infident, superioriparteviridia, inferior!, ubimultis <ninentibus obducitur *collis* rubrocsruleicentia. hafti formia, craffiola. *Floret* caulibus, qui ex radice onun-
 ^r, infident in propriis suis ac viridibus involucris, sunt.
 ^eligute oblongs, rotund*, albicantes. carnosae, quas
 Nunculo ftriaiore, ex crastib, rotundo, rubrae ac bulbulis
 ^c abroso nodo, emicant. Nullius usus in Medicina.

X A B U L A 16.

Arifatum mihi haec planta est *Indicum Aquaticum cum pistillo rubro, pediculo globulo adhaerente.*

N E L E N S C H E N A M I N O R .

T A B U L A X V I I .



PLantula humilis, nascens in arenosis & petrose.
 %*adix* fibris, oblongis, albicantibus vestita B ^
 in petiolis versus interiora incurvatis, candidis,
 ^ a q S e i s , theciformis cavitatis, fupenon versus
 ^idibus, proveniunt; oblonga sunt, angusta, obtuso
 ^t f p i d e , f i n u o f a , u t r i n q u e n o n n i h i l i n t e n t i a . *Colla* craffa,
 t ^ i c a n s , c u m f u s v e n u l i s , i n a d v e r s a p a r t e e m m e t , *Fhrm*
 lo co, in oblongo, folioso, theciformi, vindi diluto in-
 y?lucro, cujus collum inferius inflatum est & rubescit, &
 hl « u e v e r t i c e v e r s u s i n f e r i o r a , s e m a g i s m a g i s q u e a p e r r t ,
 re conditusest W oblongus, rubescens, fupenon parte
 ^ / o E inferior! in colli folia ce i parte gemmulis
 ob longis X o r u f f i s o b f i t u s , p a u l o i n f r a c a p m i l u m n o d o

34


H O R T U S

theciformi, qui oblongus & gemmulis quasi granulatus, incarnatus & sub purpureus est, circumdatus. Potio ex foliis preparata colicos mitigat dolores.

T A B U L A 17*

Ego dicrem Atiftum indkum peiraum |wmiL> udtct fbrtf*, pjltilo mho adbtrente, iunutt ^{i purpa-}
7ajienilius.





1793
1794
1795

St. L.
1793
1794
1795

From the ...

S C H E N A .

T A B U L A XVIII.




Uatuor hujusplantaefuntspecies. \$ china,
 J(jlenfchena> Cattu-Schena, *?Mulen-Scbena.
 PrimaBramannibusdicitur Surno, afenofis
 gaudens, altitudine trium quatuorve pedum.
 tydix prsegrandis, plana, rotunda, ipitha*
 mam ferme longa, crafla, cubitum pene lata,
 lu Priori parte, circacaules, fibrisalbicantibus, in orbem
 & ^{rc} data, intus denfa, iucculenta, unduofa & exal*
 icante fubflava carne, faporis aquei & nonnihil pungen-
 tic, n eduhis eft & in foris dividitur. *Caulis* e radice,
 ubi candidus eft., exfurgit unicus, iuperne in tres ramulos>
 au hinc inde furculos minores emittunt > & in duos magis
 I^{aff} ffiores aliquando divaricantur 5 divifus; funtque & cau*
 P&ramuli tenerij molles, glabri^virididilutijalbican-
 >> "ndulis vindi fufcis variegafi, intus humidi, pulpa
 albica nte, fungofa, humorem ex fiftulis exftillantes cla-
 tum, fubrubeicentem> qui in manum incidens, earn
 ^^{rc} **hil** pungit, & in aere infpiffatur. *Folia*, qu^ ramos
 ulofquecaulis, in quosdivifus eft, inveftiunt, oblon-
 ^^o tunda funt, anguita, fuperius cufpidata, *viridi* clara^
 yn^f ferioriparte caulis prodeuntia, caulem angufta laci-
 \ velutalatum reddentia, linguam acriter punguntac
 a^c ant Nervuli e` *cofta* media denfi, obliquo ac pa*
 ra^{ell} f^{ell} oduau, exeunt, quiamargine reflexi, limbulum
 lic^c loci relinquunt, una cum *cofta* in adverfa emi*
 I^{****} & redhm partem itriantes. *Flotes* filii funt ante
 trer^> proveniuntque in capitulo oblongo, quod cum
 folio^o >> craffo, albicante, intufquefubrubeifcenteinvo-
 ucr^o e radice exfurgit, funtque *gemma* flavefcetes
 capitulo circumpofira, quaruminferioresmajores, fupe-
 riore^o rainores: illis deciduis caulis, foliis veftitus, prodit.
 em^o Pore pluviofo tantum reperitur, aestivo cum inferiori
 parte

parteradicisemoritur, cujusfuperiorpars, fibriscircom-
 data est & remanet, & denuo in crassam excrefcit radicOT-
 < *Bulbus* inpartesdificiffus, in fole exGccatus & pulverna-
 tus cum la&e vaccino atrabilariis propinatur.

T A B U L A 18.

Ex Ceylanepflantam hanc confecutus fum, quam etiam in Horto Medico excohu, in i J^s Cat^{id}
 logoamevocatur *ArumVoljbjllum*, *Dracunculus* 5c *Setpentatia* diftum, *Ce}Lwcum*, t^{ie} & ^{br}
dilute, *maculis albtantibus nttato*, *tnajus* & *elatus*.





M. ...
...
موتو الجوز
...

CMULENSCHENA


TABULA XIX.



Pecies *Schena*; lingua Bramannum *CakrU Sumo*, casteris elatior > ad altitudinem ferme quinque pedum affurgens, maxima ex parte cum *Schena* conveniens; fed *radix* grandior est > *cadis* craffior, pene in plures ramos bivaricatuS) numerofioribus foliis veftitus; in cortice, qui exterius viridi dilutus > albicans, undulis³ viridifufcis perfufus, pulchrè variegatus, denfis afperifque & extuberantibus gemmis obfitus, incifus uberiozem aqua[^] Warn exftillans; linguam acerrime pungens & lancinans. ^{R^vix} contrita & cum caprse lacle affumpta, vires corroborat.

TAB. 19.

^{II}h: go Hm. Med. An. elod. àmevocatur Troirom. Parad. Batav. Arum VolypbyUum, Dr4cu»tium
 Polyphyllum > Dracunculus & Serpentaria dittum, & Serpentaria dittum, folio ramofo, Paoni* injiat, caul*
 Ceylanicum, cau^{ac} JP^{ero} > MACHHS vir' tdlfufcets, & viridi-
 aipero, Ceylanicum.
 «tibHs pulchre not at0. Ab Hermanno in



Polypodium majus L.
Palmstamm auf
Polypodium majus L.
L.

NELENSCHENA MAJOR.


TABULA XX.



Secunda species *Schena*; Brartiannes dicunt *Cayeri-Surno*, nascitur in arenosis > iidon^{TM*} ximegaudens folio, altitudine pedis. *T[^]dtx* alba[^] pugnum crassa* densa, aquea, plurimas albicantes & barbatae fibras, quae potius cum flavescunt & in annulos corrugantur, kittens, linguam acerrime urens, ad propagationem sui Nilis plants, novellos ex (e oculos edens. *Cauliculi* plures ex radice proveniunt, teneri, rotundioli, interius viridi, virides, ad radicem albicantes & folliculosi, quibus folliculis se mutuo involvunt, spithamam plus minus longi. *Folia* e fummitate caulium protenduntur, oblonga, Sonem oblongum ac rotundo cuspidatum, referenda? undis oris in cuspidem contracta⁵ tenuia, plana, viridifera, in parte adversa maxime nitentia. *Costa* media cum transversis in adversa parte nonnihil eminent. *Flores* in priuscauliculis, qui inter foliorum caules ex radice exurgunt, videntur, rotundi, virides, venulis in longum iati, intra folliculum caudatum *stylum* oblongum recedentes, cujus pedi circumponuntur; illorum petala bicant, anterius bifida, interiora verius inflexa, Quorum ora rubrum referunt colorem. *Semina* in inferiori parte distyli, qui plurimis nodulis concinne ad se invicem p^octis est circumdatus, e nodulis erumpunt, oblongo rotunda, primo viridia, ea parte qua extra nodulosemicontra[^] > contractiora & albicantia. Non nisi tempore plureso h[^]c planta reperitur. *Julius* in pulverem redactus, & butyro & faccharo fumtus alvum adstringit.

TABULA 20.

Species est, ^{mn} minus & forsan minus *ajUmtm* safari* folio, *Bama. Intern. V*d% »*<**



Quercus
suberosa L.

فانجوس

553

Quercus suberosa

K A T U - S C H E N A ,



T A B U L A X X I



Iertia species *Schema* Bramannum lingua
Cajuro-Surno, nascitur in arenosis ad altitudi-
 nemduum pedum. *fydix* duriola, ruffa,
 fibroia, unicum emittens caulem, & duum
 ferme digitorum transverforum intervallo
 inferioraverfus? brevem demittens pedem,
 nova radix adnascitur, quæ priori emortua, ad pro-
 tionem novas remanet plants. *Caulis* simplex est,
 didi] utu Sj fl_ratus, aqueus, in nullos cauliculos di-
 ainferiusj intervallotriumquatuorvetransverbrum
 &torum albicans & extuberans, supra extuberantiam
 Quior; triaexilliusfummitateprodeunt)/^, quorum
 lateralialia induasimjores lacinias, ad quas minores ad-
 p. ciniseappendunt, divisa sunt? rotundiolis oris, in
 P^em contrafta, tenuia, mollia, in utraque parte
 Adutz, linguam urentia. *Co/la* media cum laterali-
 U. Viridi diluta Scalbicans? in adverfa parte eminecredam
 t Floribusdeftituitur. "*Bulbus* contritus&indecodo
 oko datusfluxumfiftithaemorroidum; cum /A a-
 ffumptusappetitum excitat.

T A B U L A 21.

»*/£,*'***«
 quafidiceres *Scbtina Sylvefius* ame vocatur *ArumUalabaucumminusfoljrh;ttim, udke*



Handwritten botanical notes in cursive script, including the word 'Stem' and other illegible characters.

Large handwritten text, possibly a name or classification, including 'D. B. L. F.' and other illegible characters.

W E L L I L A .

T A B U L A XXII .



Lanta est aquatica. Radix crassa³ fibris densis⁵ longis, ruffisq; capillatis, in orbem vestita, hinc inde à latere fibras oblongiores, crassiores⁵ geniculatos, ad novas plantae productionem, emittens, intus carne albicante, densa, fucosa. Caules è radice exeunt plures?

~ ~ ~
 a^vliⁱ a^{ce} flos^g gerunt, omnes fungosi * cubulosi, molles, intus albicantes j aquei^g in^g f^g li^g liquorem non nisi^g ifcofum exfundantes; illi in quibus folia videntur, ab parte crassiores sunt, maxime ad radicem, ubi candidi^g ant colon's, versus folium sensim extenuati, superius ca^g fasti^g j^g llm^g r^g otundi⁵ paulo inferius ab una parte late ac^g profunde^g excavat^g intra^g cavitatem > tanquam thecam, florigeros recipientes, qui rotundi³ non nihil plani^g ten^g uiores, sequali ferme crassitie, non tam aki⁵ membranof^o 9 tenui⁵ albicante & transparente in volucro > quod^g ex^g teri^g us duobus limbis obfitum est, circumdati. Folia oblonga sunt & pro se grandia, anteriora verius sensim in^g cus^g pide^g in contrah^g à postica parte > versus quam late^g exporr^g unt j utrinque in cuspidem protensa, finu seu^g J^g J^g J^g inter duos cuspides? ceu pedes folii⁵ profunde^g f^g k^g in oris limbis circumdata, densa & subtilis text^g i^g mollia, superficie valde^g quali^g piano, viroris in^g j^g ? parte vividi, pleni, sub caeruleis in adversa magis^g la^g 5^g .%^g ns adurentis > fed codta in edulis. Cola cum^g cur^g T^g us in adversa parte quam maxime eminent. In car^g Ine^g propriorum caulium, in theca seu in volucro flavo^g -scent^g te > ceucroceo, ipithamam fernie Jongo, involutum^g ac^g reconditum est caphulum oblongum, crassiusculum, ^uri^o Ium j globulis, seu gemmulis condensc, flavo^g rubescentibus ceu croceis > in oris dentatis? obfitum;

in collo capituli ? quod brevius est 6c crassius > acthecavi-
ridi extuberante reconditum, *gemmuU* planse majores a^c
irregularis formas, infra globulos flocculosos? ^{cōn} ^{denlo}
ordine refident, illae fructus sunt primordia j, & cum ti^d.
culis simul proveniunt; suntque has *gemma* in collo p^{rk}.
mum in totum Candidas, dein, cum magis extuberant ^t
virides, quo colore in uria parte tinguntur > vertice & ^{huc}
albicante? quaedam citiores, alia stardiores, a de o tu ^g [^].
mulis candidis hinc inde virides interpositas confpiciantur -
ubi maturare complanatse fuit, in medio vertice ut n^{bi}.
lico parvo notatse, coloris ex flavo intensius rubefcentis ^{ac}.
aurancei, molles, succulentas, suntque tunc saporis lū^b.
dulcis, 6c in edulis adhibentur. *Capitulum* medium [^].
stylus, uti & fructuum *gemma* immaturas, saporis a-
rentis; gemmis hinc maturefcentibus 5 capitulum a ^{co} ^{llo}
decidit. *Semina* in singulis gemmis ceu fructibus nove^m.
decem, plus minus recondita sunt 5 rotundo *oblonga* [^].
cupidata? ex albicante subrufa, parum nitentia. ^{I'} ^{*}.
trita > affata, noduloque implicita, solum exhibent > ^{Pa}
tibus > ex nervorum compressione > solum affectus J [<] [~] ^o.
ducens ; Rafura *fructibus*, rubrarum *formicarum* ^o ^V ¹ ^s ^P ^{I'}.
mixta, idem presertat. **Bulbus* radicis sanguifluxine ^{detur}
gonorrhxas.

T A B U L A 22.



فخار بنوعه

Karnal
Karnal

1844

KARINTOLA.

TABULA XXIII.



St & hxc planta aquatica; cujus radix oblonga 5 crassa * carne albicante & aquea > fibris oblongis 5 rotundis » albicantibus crassis instructa. CWw quibus folia infident, omnes ex radice exoriuntur, interius non nihil plani, maxime circa pedem, superiori parte

^{stri}chores, *costam* foliorum constituentes ? viridi *Luki*,
^{dilu}terubescens, intus fungosi & aquei, viroris in rec^{ta}
^{par}te laturi & nitentis ? in adveria dilution's. *Folia* oblon-
^{go}gunda sunt incuipidem de jGnentia₃ in oris non nihil
^{crip}ta, mollia₃ lenia, superficie plana & glabra, venis >
^{ex} *criff** media oblique adicendentibus₃ ftriata₃ ilia crassa
^{est}, altum in recla parte eminens. *Floret* in propriis cau-
^{libus} s qui & ex radice oriuntur > ac virides, fungoli, aquei,
^{non} nihil plani sunt > superne collo crassiole turgentes,
^{ac} rubescens proveniunt, ampli, cochleatim quasi
^{turbi} • Qati₃ cuspidate intorto, carnosij exterius scabri,
^{purpu} reo rubri, interius rugosi, rubrofanguinei. Infe-
^{rius} e x globulo rubeo centeglo mulato, infundo collifito,
^{ex} ^{Ur} *8** *t stylus* candidus j *caphulo* flavo ? oblongo, granu-
^{latu} odulatus j per theculam capitatam, fungo/am, ru-
^{besce} ntem & rugis obfitam > in medio hiantem, fetrans-
^{mit} *glohulw* qui > floribus deciduis j infundocolli
^{apparet}, rubescit j spiris instructus, juxta spirarum trac-
^{tum} granulis eminentibus, superne planis ac rufescenti-
^{bus}, obduclus. In hoc *femina* in numerosis includuntur
^{cave} nulis carnosis, viridibus ? proxime ad corticem re-
^{condita}, in singulis cavernulis unum, oblongum ? pri-
^{mu} albicans > inferius rubescens, dein in totum rubef-
^{ce} ns > transversim globulo in longitudine fitum, *Qylo*
^{carne} o albicante circumpositum. Balneum ex hac planta
^{prae} *Alia* *um* omnem corporis aestum reficit.

TABULA 23.

P. A. I. ^{species Ari.}

M

POX.



Handwritten text in Arabic script, likely identifying the plant or its medicinal properties.

P O N G A T I


T A B U L A X X I V .



; Lanta aquatica , cui *radix* valde fibrosa, albicans. *Caulis* e radice exfurgens aqueus, fungofus, viridi dilutus , novos caules à latere emittens, intus larga cavitate, corculo viridi fufco, ex quo verfus corticem membranacea excurrunt interfe pimenta. *Folia* pedunculis viridi dilutis interius planis, cauli appendent, oblongo angufta, incuspide m ftri&a, languida, mollia, tenuia, lenia, viroris in reda parte faturi, in adverfâ clari, ubi numerosis eminentibus nervis, ex *cofia* media, ftriantur > fiporis ingrati. *Flores* in cacumine caulium plures aggregati videntur, in capitulo oblongo, gemmas funt secundæ, quas aperte pentapetalae funt & candidæ. Uli fuccedunt *globuli* lœminales rotundi, virides, aliquo modo cuspidati, intra florum petala, ferme inclufi. *Semina* in illis arenacea, numeroia, conferta congene, inftar pitillii Oiieminis, in fuperficie viridis globuli, qui interfe pimentis Qto medio bifidus, confita. Inferiores florum gemmæ B h P pus aperiunt, superiores tardius. De vinbus altum est filentiũ.

T A B U L A 24,

p
 tjo^u aliis plantis aquaticis nemimam quidem habet convenientiam, ita ut plura (Jciiladi cere
 qc^Q n f u h u m d u x e n m -



Skutka L.

اسکوتکا

Skutka

اسکوتکا

اسکوتکا

K U R K A.

T A B U L A XXV.



Nascitur in arenosis. *%adix* rotunda > bul-
 bofa, valde fibroia, capillata, in fibris bulbis
 novellis infru&a > intus denfa, aquea. *Can-*
liculi quadrangulati & viridiclar. *Folia* ex
 lateribus cauliculorum, geminata& ordine
 decufatOj proveniunt in petiolis longis,
 pnis, craffiolis, interiusfulcatisj acnonnihillanugino-
 ^ oblonga, rotundiola? exigue ferrata > in margine
 W°fi, pilis minutiffimis & hirsutis obfita? craffiufcula,
 ^°Uia, viridia. Ex *Cola* media costulas laterales, obli-
 ge anteriora verfusj excurrunt> venulis, quse folium
 ^cellatimpertexunt? comjtatasj re&am partem ftrian-
 ^es» in adverfa eminentes. De viribus nihil confat.

T A B U L A 25.

^{Pl}
^{appe} ^ tamhancex Ceylone confecutus fum Tub nomine *JufaU*, nullos fert flores, propagatur per
 -cutesj tuberes, pcrindcac *GlansTmeffris*, atque etiam eodem modo comeduntur.



Callitriche
Linn. Sp. Pl. 1031
Linn. Bot. Linn. Soc. 1753
Linn. Bot. Linn. Soc. 1753

A > M B E L.

TABULA XXVI.



<£Mbel variae sunt species, *Areca-Ambel*.[^]
Cit-Awbd, 2\(*edd-Ambel*, *Ottet-Ambd*, sunt
 que omnes plantas aquatics. Prior lingua
 Bramannum *Saluca* dicitur. %idix albi-
 catj fibris filulaceis albicantibus, sapore
 aqueisj vestita, ad propagationem novas
 plantæ radicem, quam *Kjtlangtt*, vocant, proferens, iJJa
 palmami longa evadit, crafliufcula? exterius nigricans,
 intus albicaos> faporis aquei&fubastringentis, in eduliis
 adhibetur. *Caules* rotundi, fistuloiï, simplices»fine nodis,
 viridi diluti. *Folia & flares* in propriisproveniuntcauli-
 bus, ac iJlurum fummitatibus infident. Ilia superficiei
 aquæ incumbunt, oblongo rotunda, rotunda anterius ora»
 teneriora autem, rotundo obtuso cuspidem, postica parte,
 qu^a ex caule longe excurrunt, redra incisione usque ad
 ca^l^mferme disciifa> in margine rotundis denticulisar-
 cuat^lm excisa, in interiori superficie plana, glabra, in
 rec[^] parte viridis vividi & nitentis, inadversa colons ru-
 bri ^ujecorini; in exteriori *colam* habentintermediam,
 crassatrn, altum eminentem, ramulos transversos hinc
 inde etnittentem, quæ se iterum in numerosa dividunt
 bra^{ch}ia, & in dentium apices ramulos immittunt, utrin-
 que: quinque. *Flores* qui aperti extra aquas emicant j ve-
 lu** ros® sunt, multipetali, petals oblongo rotundis,
 an[^] Suffis, anterius in cuspidem leniter contra6b"s, colon's
 pⁿidi & rosaceodiluti, in exteriori *fcrie* petalamajora
 lⁿtScoblongiora, colorerofaceo, interius diluto & al-
 bi^{ca}nte, interius pleniori. Denso numeroform longio-
 ru[^] *fiamimm* ornanturpenicillo, qu[^]latiuculajplana,
 fla^{va}> *fly to* medio brevi, lato, rotundo, in superiori parte
 latiori, piano, in orbem circumposita & versus illum
 inflexa, quorum ilia in exteriori ferie pros ceteris eminentj

magis furreſta & minus inflexa; interiora & ſtylo p^{r*} ma₃ nontam longa, verſus ſtylum magis excurvata; ſuperius in ſua baſi roſa inſignitur, conſtanſex ita mio flavis» brevioribus 5 maxime inflexis * ac verſus centrum contra & is; exteriora folia, quas flores in gemmis dunt, forma quoque oblonga ſunt? florum petalis ſi exterius coloris viridis & venis rubefcentibus in longiſſima ſtriata₃ quorum ora etiam rubent₃ interior pars eſt & albicat. (/em rnx rotundas ſunt & cupidatſe. in ſtylo conſitaiunt numeroſa? inter ſepimentis naceis ac plicis a ſe invicem, in propriis cellulis parva, rotundiola > primum albicantia ſed matura *Nasturtii*, aſt fuſciora.


A R E C A A M 2 B L.



Eſt *Scalia* ſpecies a *Areca Imfal* di<5h, rum petala paulo majora ſunt > coloris roſacei, magis Candida; etiam ſtylus, cui flava circumpolita ſunt > in baſi ſi roſa plana 5 conformatate iſto ſtylo ſi lavis, quas ex medio, qui in centro baſis eſt, ad rotundam ejus orbit excurrunt, Pnoris ut & hujus bulbosa radix in deco pro *dyſaria* propinatur. *Semina* ardorem offium refici cum ſacharo nempe condita & comeſta; folia cum *Ottel-Ambel* ſimul trita & cum *butyro* co&a errhinum bent pro oculorum dolohbus.

T A B . 26.

Omnes hx plantae ſpccics ſunt *Nymph*** > prior h*c appellari poſſec J? *ymphaa Indica* * *P^l candida* *otto in dmbittittato.*



Ranunculus
acris L.
Scrophulariaceae
Herbarium

G I T-Ai M B E L.

TABULA XXVII.




*It Ambel, quasi diceret Ambelminor; secundum Bramannes Caluri Camalla cum priori convenit, estque tantum minor species, caulibus tenerioribus, foliis minoribus ut & rminibus. Est & alia species ejusdem nominis in eo solum differens quod florum petala
 v<l< srulea, vel rubra, vel alteriu
 se in decollo pro dyfuria adhibentur, cum ueebm
 ft<< Jti vomitum fistunt, tuffim mitigant; fmuu cum
 "hro ufurpata conveniens pro diabete lunt medica-
 tum.*

TABULA 27:

Malabarica minor, folio serrato.





Utricularia
Linn.
1753

NET)EL AMBEL.

TABULA XXVIII.



Tertia species < * *Jmbel*, lingua Bramannum *Commodu.* % *adix*, quae & ad propagationem minorem edit, rotundis) fistulosis, & albicantibus est vestita fibris. *Cavies* e radicibus lexfurgentes rotundi sunt & fistulosi, in vertice folia gerentes, quas superficiei aquas intibunt₃ alii illorum simplices sunt₅ enodi, alii in superpartibus, non nihil infra folium quod in vertice videtur nodulo interstinguuntur, ex quo plures transversos culiculos emittunt quosdam crassiores & longiores, quorum summitatibus folium₅ quosdam tenuiores & minus longos₃ quorum summitatibus flores infident. *Folia* ipsa minora sunt quam illa *Citambel*, rotundiori forma feu ipsa oblonga? ad petiolum rotundis oris₃ non vero rectis, ut *oJwibel*, incisâ, *cojlulis* minus crassis ex petiolo striata, insequabili ora > non autem denticulis arcuatim instructa. *Flores* extra aquas aperti emicant, in tertium candidi, pentapetali, petalis oblongo rotundis, cuspidatis, tenuibusj fcelliformiter expansis₃ interiori parte ab uno latere, alio petalo, quod medio, lacini^e instar, protrucitur, obtusa, interius filamentis densis, candidis > longiusculis in totum obfita. *Stamina* in illis decem, parva, tuberculata, apicibus flavis & striatis dotata, illorum quinque superiora₃ tera eminent, & cum illis *capitulum* in medio virides cuspidatum* *capfulam feminalem* efficiens, infummitate nodulo parvo quatuor gemmularum ornatum. *Calyx* foliosus est, quas parva, oblongo angustia, cuspidata, viridi clarissima. *Florum gemma* rotunda; sunt *Sccuspidatae* • Postflores capitula feu *gemmae feminales* seprodunt₅ cuspidatae sunt, numerosa in le continentibus *fimina* rotunda, quae primum albicant, sed matura colorem ut

femina *fh(aflurtii referunt, perinde ac illa ImbeL* **Inte**
gra planta trita & cum butyro coda & intus fumta, **anti**
do turn est contra morfum ferpentis C^o ^r Capella dicti.

T A B U L A 28.


Heec *Nj/mpb&aminorisaffimsIndict, florealfo, pilofo.*



Syconia - citimbel
Booncha m.

Camellia

Chenopodium




T S FEROCIA CITIMBEL.

TABULA XXIX.

Mior species est *Amel*; folia & caules & radix, omni ex parte cum illis *Cit Amel* conveniunt. *Floris* parvi sunt ac simplices, pentapetali, oblongo rotundi, stelliformes, interius in singulorum petalorum medio, foliola lacina secundum longitudinem alati, in orificio capillis flavis obfisti. *Staminis* in illis quinque brevina, quae inter petalorum interstitia exsurgunt, *apicibus* utrectis ac albicantibus dotata, *filamentis* quinque brevioribus interpositis, cum quibus ex medio orificio *globosius* viridis, cuspidatus, stylis infus, se prodit. *Calyx* penneolius est, quae folia florum petalis decussatim interponantur. Ex *bulbo* radice in aqua, *visio adhibe* butyroque cocto, limimentum preparatur antihemorroidale. Ex eodem cum *cantharis* terrestribus in oleo trixo *asservat* conficitur medicamentum, contra molestum capitis dolorem, temporibus nempe illinitum. Ex eodem cum *Utroque* *Amel* & *Inde* fit portio ad corporis aeternum restitendum.

T A B. 29.

Amel *Inde* *asservat* *portio*



Lotus
Nymphaea
Nymphaeaceae
Linn.
1753

T A M A R A .

T A B U L A X X X .



Res hujus plantas sunt species, *Tamara*[^]
BernTamara, (*ulyTamara*; prior Bramanni-
 bus *Tada* <*i5MaStu* dicitur> planta aquatica.
 %*adix* profunde demissa, crassiola, nonnihil
 dura, fistulosa, fistulis latis pervia, albicans,
 inferius nodosa, è nodulis tenues fibras in or-
 bem emittens > subtus radices) è quibus, tanquam pri-
 mariaradice, novi prodeunt *C^{au}^^{es}* > simplices hi sunt,
 rotundi, fistulosi, virides? punctis aspersi. Fo/w singula
 fu^ iofident cauli, prsegrandia, rotundiola > versus interiora
 in^ ttxa, crassiuscula, mollia, *Velutl* inftarlenissima, in
 r^ çaparte viridi fusca₃ alt oblique aspersa hialij ceuex
 v!^|dicaeruleicolois, inadversa viridi diluta. *C^{ofl}^^a* ^as
 ^ndiclarfle&nitentes, ex caulis fummitate, veluti radii
 ec entro, exeunt? quaspotquam adcertaintervalla, fin-
 §^{ur}tae in duos ramos bis terve sunt divaricatae, proxime ad
 ^r^s in se invicem arcuatim & formicatum deferuntur; in-
 er has, inadversa parte tantum eminentes 5 venas trans-
 ve rse mutuo inoculatae conspiciuntur. *Flores* qui cauli-
 b^s propriis infident > prsegrandes sunt, petalis constantes
 jknfertis, coloris rosacei albicantis, odoris grati *Anyfum*
 -pirantis; *petala* ipsa, oblongorotunda sunt? rotundis
 oris in cuspidem contracta > venulis, ex unguiculis, in
 longum striata, coloris rosacei, in superiori parte magis
 fatu^ exteriora majora sunt a clatiora interioribus; haec
 ft duos, tres, pluresve inciduntur cuspides, & *staminulis*
 or nantur flavis, quae cum *apikibus* ceu nodulis candidis,
 ex angulis incisionis emicant. In medio florum densus est
 P^{ent}**cillitis* longorum, planorum, croceorum *flaminum*,
 in fummitate oblongis & candidis nodulis ornatonim, in-
 te rioripartefutura Candida, ex qua nodulus, itidem can-
 -l^^us, prodncitur > triatorum; ille circumpositus est *flylo*

rotundo, luteo, in fummitate plana & lata fuperficij? > inferioraverfuscontradtior? intus f ungo fus 5 ad bafitt[^] perio rem in fuis cavernulis feu cellulis *femina* reconteff^s > quas oculis ex flavo nitentibus, gemmularum inftar pl^{D^} rotundarum, extra illam emicant; ipfa femina primofc.¹¹ albicantia, fubflava > formsecylindriacas, deinde adelirpticam formam accedentia > & cellulas fuas dilatantia.? & *' gis magifque ex bafi fuperiori ftyli extuberantia, o[^] furda. %dix trita & faccharo mixta in formam con& exhibitur pro hasmorroidibus. *Succus* e floribus extract¹⁹ & cum Oleo *Zirgelim* affumptus, in modicum mento¹⁰⁰ fiftit fluxum.

T A B U L A 30.

lamera hxc a nemine unquam eſt deſcripta. Mihi eric *Njn* > fb *Maſlinis Malabar'ua, flo Te Ai* > r¹² roſa¹¹ albiante colore.





P
Cam - Linnæus

1810

و ظهیر

Page 23

B E M T A M A R A.

T A B U L A XXXI.



PLanta itidemaquatica, ineotantuma` *Ta**
mara differens, quod *flores* fint paulo am-
 pliores, illorum petala Candida , odoris non-
 nihil vegetioris. Post accurationem obser-
 vationem fequentia addenda duximus; fcili*
 cet quod folia *Tamara* & **Bem Tamara* duoru m
 i^o diametro fint pedum; caules fistulofi, proxime ad radi-
 um aquei, in partibus fuperioribus intus la&ei ,
 Amenta ex illis albicantia , tenuiffima , numerofa,
 Ve^lut araneorum tel« , ex la&eo ifto fucco nendo
 Sjtocantur & in longum protrahantur > fatis firmæ.
 ^caulibusfoliofistantum quatuor, tubulis majoribus,
 pervii fint, numerofis minoribus tubulis ad latera in-
 ftructi; Caules hi proxime ad umbilicum ceu centrum
 decifi; coftse fingute, quse ex umbilico viginti & una nu-
 merantur₃ & tubulis cauliumlateralibusrefpondent, tu-
 bou^lacea cavitate pervii funt; fed in medio umbilici diffecti,
 Stiles nempe, crux carnoiã apparet? cujus una parsfu-
 Perior verfus partem folii contra&or eft. Prseterea feptem
 ?^ulesfloriferoS) etiam latistubulis eflè pervios, 6cinil-
 for^oum medio *ftykm*, ex quo tubulorum interfepimenta
 exfurgunt, atque & ille unico tubulo in medio pervius eft.
Bulbus cum *butyro* inunguentum redacSus omnia oculo-
 rum vitia corrigit; Idem cum *Zingibere* & *Coriandro* in
butyro contritus > pro bæmorrhoidibus applicatur.

T A B U L A 31.

A in^evocatur *tymbta'* affims' *MaUbarica*, folio & jlort ample > colore *candida*.

Handwritten text in Arabic script, likely a title or description of the plant. The text includes the name of the plant and possibly the artist or publisher's name.



K O T > 2) O\$ T c4 I L.

T A B U L A XXXII.



Lantula aquatilis & natatilis, transversis, aqueis & albicantibus repens caulibus, qui oblongas, albicantes, capillatas, in densa fascia, emittunt fibras. *Folia* plura congregata ad radicularum fascias exfurgunt* oblonga, ad latera re&is oris, in vertice
^{Ora} rotunda, crispata, una cum caulibus admoduni
^{fra} gilia; viroris hiali, inferius albicantia, anterius, ner-
 Mis oblongis ramofis friata, exterius plicis eminentibus
 ^longum crispata, tenuitervillofa, inferius ad radicem
 fr'ofalanuginevestita, carnofa, craffiola, tubulisparvis,
^{rot} undis, intus pertexta. *Flores*, odoris expertes, ex
 ^ediis prodeunt foliis, quorum petala tenera, crispata;
^{Un} utn illorum oblongum est & albicans, interius cochlea-
 l° cavum, anterius ftri&ius, in medio superioris partis
 kflum, utrinque in oris ad latus plica annulari, interius
^{ei} ^inentecrispatum, excujus medio, supra plicaturam,
^P rvus&erebtusexfurgit *ftilutus*, qui superne in orbem,
 ^albicantibus est dotatus *gemmuks*, ad exortum yirl-
 ^fculo foliolo rotundo, quod inferius duabus laciniis
 ^utiauriculis, est inftrucl:um, quaficollari fuccindus.
^{Co} W florum oblongum est, pilis oblongis albicantibus
 ^pillatum; exejus orificio *gemma* emicat cuspidata, al-
^v ^ans, viridi diluta, *nodulo* aqueo albicante dotata, in
 ^ femina vivuntur. (*feñma feminales* oblongo rotundas
^{eVa} dunt, incortice, vitri instar pellucas, petiolis trans-
^{Ver} fim infidentes; uno latere, quo caslo obverse, marcef-
 > ti, florum petalo transversim adhasrentes, intus aqueo
 ^Jmore replete. *Semina* in illis sex oblonga, viridiufcula,
^{fo} ^rtl, cigetm^, circa illam partem, qua petalo adherent,
 > ^nte nus infidentia. *Folia* cum *Oryfy* in ladteo *Wjtm*
^{ndic} « fuccotevisata medicamentum praefiant antidyfen.

tericum. Cum aqua *rofacea* & *faccharo* data, tuffim
 graviolem & purulenta phlegmata corrigunt > hamopfiam
 inhibent. %tdix cum *cumino* in /[^]Sfe vaccino trita &
 epotaalvum promo vet > tenefmum lenit, lumborum &
 hypogaftrii dolores emollit. Idem prasftat fi cum *Calamo*
Aromatico gc aqm calida aflumatur.

T A B U L A 32.

Planta hecc aqux innatat perinde ac *Stratiotts* J milari poffit. Vocaripoffet *Sedum Indicum paluftr.*
 feu *Alois Paluftr. Bauh. in Pinac.* a nemine unquam! joins *latifimis, crispis* > floribtis *albicanribas* pi
 eft defcripta neque confpecim habet cui affimi-1 lofis.





بیتا و بیضا و بیضا

Hibiscus

Hibiscus sikkimensis L.
Linn. Sp. Pl. 1000
Zell.

1830

PANOVER TSJERAVA.


T A B U L A X X X I I I .



Lanta estaquatica. *C^{attlex}* geniculati, super fundum repentis, aquei, viridi albicantes, ex geniculis radículas feu fibras duas pluresve emittentes, filamentis viridibus condense vetitas. *Folia* in caulibus petiolis oblongis, aqueo albicantibus, superius ventre piano turgescuntibus ac pilosis, proveniunt lata, cuspidata, ad oras acutis, profundis crenis incisa, posteriori parte ad petiolum recta & sequali ora, crassa, spissa, in anteriori superficie valde plana, admodum glabra, in exteriori costula, viridi albicantibus, ramosis, & *Colla* media exeuntibus, & in venarum cuspidibus incurvantibus obsita, coloris sanguinei, nullius saporis. Vetusior facta planta, ex vertice caulium in communi pede, folia numerosa ac ampliora, dense in unam quasi fasciam, referentes formam, congregata proveniunt, pluribus radicibus infra dictam fasciam interius dimissis. Extra usum in Medicina est.

T A B . 33.

Com... lenarie tec planta fit descripta, de flore enim & feminibus nulla ratio, nisi ut cmi
 hic non r
 »poni poteat, nisi quod pro Hedttt^P" possit haberi.



Handwritten text in Arabic script, likely a title or description of the plant. The text is written in a cursive style and includes the words "بصل" (Basil) and "قرفة" (Cinnamon).

Handwritten text in Latin script, likely a scientific name or classification. The text includes "Cinnamomum" and "Zingiberaceae".

NARUKILA.

TABULA XXXIV.



Lanta nascens in aquosis. *Jfy Jix nigricans** fibris vestita. *Caules* rotundi; aliquantulum complanati, glabri > virides, interiori superficie cavi, intra cavitatem teneres excipientes caules/uperiori parte unico nodulo interstitio > fungosa intus > albicante, aquea

Medulla. *Folia* verticibus caulium infidentia in singulis, [^]Quam ampla & oblongo rotunda & cuspidata» venis subtilissimis parallelis > ex *cojla* media > quas in recta parte eminet & ad oras striata & viridis fatur & nitentis & in adversa? [^]ut, furdi > foliis *Kattu bala* quam maxime similia sunt, ^edrinora. *Flores* in caulibus propriis suis petiolis pro- [^]niunt, in illorum vertice quasi fascia infidentes, ex [^]latu aperto caulis? qui circa geniculum videtur superio- ^{re}ni, & intra quem prius inclusi fuerant, tanquam vagi- [^]me theculam infra folia emittentes, prodeuntes ex ^{c?}lycibus oblongis, grandiusculis, viridibus ac rubescentibus. Ignoti usus.

TABULA 34.

† hęc descriptio imperfecta est, ita ut ex illa nihil concludi possit, atque ideo libens accuratum iudicium aliis relinquere cogodierem. *Cann* & seu *Arundinis* indiu affinit, flore globofo.



Th. Th. and

1811

W. B. Smith

B E L A T O L A

T A B U L A X X X V .



PLanta itidem aquatica. *%adix* bulbosa, (bulbi rotundi sunt, primum albicantes, ex inde virides, intus carnosus, carne succulenta & nonnihil viscida, albicante, viridi; ipsi bulbi se mutuo propagantes, ita ut tres quatuorve simul juncti conspiciantur) fibras oblongas > Cr3ffiufculas 5 plurimis filamentis tenuioribus vettitas, primum albicantes, dein rufescentes emittens *Caules* ex radice Wurgentes rotundi, simplices > foliis vestiti interius albicantes & succulenti & viscida. *Folia* quae caules investiunt, ac supra pedibus cavis circumvoluta, oblongo angusta in culpidem ftricta? cubitum longa, quatuor transversos digitos, sed in medio plures, lata» venis subtilioribus in gum ftriata, lateribus versus inferiora parum clausis, viridis in utraque parte faturi. *Cola* in adversa parte emittit crassifolia > viridi albicans, à lateribus tresve minores conspiciuntur, restam partem quasi fulcis ffrientes, odore pvi ffpore nonnihil porraceo; exteriora folia quas caulis circa radicem investiunt, minora sunt & albicant; *Flores* infummitate caulium fasciati proveniunt, pedunculis viridibus > nitentibus, furredibus ffrictis crassis, in superiori parte magis exturgescentibus, ac leviter incurvatis oblongo, angustoj viridi folio, inferius succulentis; petali sunt, illorum quinque oblongo angusta, unum in totum Candida; sed tria exteriora magis angustiora nitentia* minus Candida; sextum latius est & altius cavum* oblongum? ad ventrem pctioli fitum > exteriori medio, quod ex dorso prodit, oppositum, exterius in totum candidum? anteriori ora albicans, infra oram in medio, duabus oblongis, latis, flaviusculis ffrictis signatum 5 ad ftrias rosaceo rubescens inferius ex medio venis, tenuiter rubescentibusj oblique versus os am ffrictum. Ex inferiori orificio *UnguU* exfurgit, oblique ffricta,

re&a, Candida, cr[^]Iiola, aliquantumcufpidatai ^{cujus}
 p]anapars> petalo cochleato cavo est obveria, ^{^n(r}ra ^{cuspi-}
 dem *gemma* crassa, flaviufcula dotata. *Flores* in ^{totum}
 maleolent, ~~facilis~~ ^{^emma} ^{notum} ^{cavi} ^{edio} ^{cortice} ^{fabacei} ^{re} ^{puiver} [^] [^]
 virides, dein albescentes, ad partem petali cochleato
 alte exturgentes. *FruBus* oblongi? trigoni, in ^{^edio}
 laterum crassa ac altum eraincte costa obdu³i, ^{cortice}
 crassa, aqueo, viridi fatur[^] nitente, fapons ^{fabacei}
 sylvestris ac viscidis, in medio* farinaceo, ruffo ^{puiver} [^] [^]
 plati; animadvertendum porro quod florum petala
 germinaacprimordiafintfructuum; qui illis ^{c5Wf} ^{abara} ^{1:ni}
 admodum fimiles sunt. *Bulbus* cum aqua *OryW* ⁱⁿ ^o ^{es}
 mentum prseparatur aduersus phlegmonodes * tumor
 abcessus.

T A B U L A 35.

Mihi hæc planta est *GUiddis Ind'uusfalustris latifolius, sine albicante.*





Handwritten text:
C. G. ...
...
...
...

E L c A T O L c A.


T A B U L A XXXVI.



nascitur in arenosis. "Radix bulbosa* infe-
 rius fibris candidis vestita, intus carne densa,
 humida, viscida, durioribus carnofis fibris
 pertexta, odore gravi. Folia plura ex radice
 pedibus oblongis, rotundis, theciformibus,
 in quibus alia teneriora includuntur, ex-
 forgant oblonga, in cuspidem stricta, nitentia, intus
 venis subtilibus in longum striata, in adversa parte quinque
 nervis lignosis eminentibus instructa, quarum media
 transversa, omnes glabra sunt, redam partem frangentes,
 odoris gravis. Flores in caulibus proveniunt simplicibus
 rotundis, glabris, viridibus, geniculatis, ex radice exfurgenti-
 bus petiolis, foliis oblongoangustis, cuspidatis, circa genicu-
 los vestitis, intus carnofis, fibris densis, lignosis, intra carnem
 humidam pertextis; flores ipsi superiori parte caulium illic
 loci ubi minus lignosi, infident > ad exortum foliolo parvo,
 oblongo angusto, cuspidato, viridi, inferius fusciflori,
 oblongi, cyathiflori campaniformes, exterius tubus emi-
 nentibus futuris in longitudine perdudli; interius ab ori-
 ificio ad medium usque cserulescentes, exterius albicantes.
 Stylus in medio eminent nigricans, extra orificium nodulo
 flavo dotatus. Fructus qui cacumini caulium omni ex parte
 infident, oblongi, triangulati, quorum latera, plana, (supra
 & infra striatiora, viridifusci, glabri, in medio laterum
 futura crassa, rotunda, viridi, alee extuberante obducti, in
 vertice umbilico eminente ruffo instructi; membrana qua ru-
 ducuntur carnofa est & crassa, interior! parte viridi flava;
 nullis feminibus, sed intus glomulis lanuginosis, albicantibus,
 inde indurascunt, maxime ad angulos repleti; etiam
 florum petala in fructus excrefcunt. Ex foetida, radice &
 aere Curcuma linimentum preparatur temporibus pro
 cephalæa applicandum.

T A B U L A 36.

Specialis hæc planta est, externa facies cum Gladiolo conteri possit, sed flos aliquam cum illo
 Digitalis videtur habere convenientiam; ego dicerem Gladioli affinis latifolia, flore campanulato.



اسم النبات
اسم النبات

Dr. J. M. ...
...

B E L A M C A N D A S C H V ^ L A R M A N I .

T A B U L A XXXVII.



Ramannes dicunt *zJry*, planta est ad alti-
 tudinem hominis affurgens, arenofogaudens
 solo. *%tdix* glandulosa, crassa, albicans >
 intus densa, (ubflava? fubatnara? longas al-
 bicantes & tenuiter capillatas ejiciens fibras,
 tresquatuorve oculos ex se promens. *Caulis*
^e radice affurgit unicus, pollicem crassus, nodulatus, intus
 gleans & fungosus, foliis ad nodulos circumvestitus.
^{pQ} *H<** oblongo angusta, tres pedes longa, pollicem, ali-
 andodus, Jata? acinacea, venis in Jongum *ilrkta*, ex
^{ll} parte onej quas inferius est profundior, hiantia, cau-
^{leib} excipientia, & labnsardiffime circumplectentia > vi-
^{JAs} exterioris communis & nitentis, interiori parte, ubi
^{la} ant, membrana albicante obdusa. *Flores* in fastigio
^j Pius caulis, vel cauliculi transverberum, qui ex
^{ul} nodis hinc inde exfurgunt, petiolis teneris, viridi-
^{vescentibus}, pandis, ex uno eodemque nodulo plures?
^{(I} atur, quinque congregati merumpunt, hexapetali,
^o Wongo rotundi? ad petiolum *ttriGti*, anteriora versus,
^{rot} unda ora in cuspidem contra bli, inter flavum eolorem
^o tis intense rubris interioribus variegati; tria petala; quae
^{bre} viora & minus lata, tota superficie interioribus sunt varic-
^{gata}; reliqua tria, quae paulo longiora & latiora, & prio-
^{ribus} singulis interposita, ex unguiculis ad medium usque
^{varie} gantur, anterioribus colore rubro dilutione; in adversa
^{parte} petala flavescunt ad oras tantum rubris notis trans-
^{parentibus}, ac *costa* eminente in medio striata, nullius
^{odoris}. - *Stamina* in illis rubicunda & iure reddi conspiciuntur
^{tria}, *Hngulis* flavis, fureddis dotata; *flylus* crassior est,
^{rot} Undus, triangulatus; calyce destituuntur. *Tetioli* %
^p o xime ad flores, crassiores sunt & extuberantes, tribus
^{lat} cribus planis, in medio striatis, circumscripti, *feminum*
^{apsulas} efficientes, quae floribus deciduis ampliantur, &
 P. XI. T ex

ex viridi subflavo viridiores evadunt & in tria feifl. ^lÓa lia
 locularrienta mediis diftinguuntur iriterfepimentis. ^bia l
 Integra codta & pro lotione corporis adhibita antidot ^{um}
 eft contra omne venenum. 2[^]/x trita & applicata ^{or}
 fui ferpentis Cobra Capella didli₅ medetur. *Folia* ^{um}
Oleo Schirgelim ab indigenis adhibetur ad vaccas & ^{pen}
 eduliis venenofis infedla, vel animalibus venenatis. ^{la}
 tumintusj tumforas? fumpta & applicata, curanda-

T A B U L A 37.

Flores hujus plantae cum Cnt variegati perinde
 ut *Flos Tigris Dodon.* alterius autem frudurre,
 fed quoad formam externam aliquo modo conveni-
 entes, & à nemine autem quod fiat anie hsec

fic defcripta planta; meo iudicio ^{vocari potest}
Gladioli affuit MaUbaktt & ^{er(flavo, maculis rubris}
interfero.





Pellaea polypodioides

Handwritten text in Arabic script, likely a name or description of the plant.

Small handwritten text at the bottom right corner, possibly a date or reference number.

BELUTTATOLA TALI.

TABULA XXXVIII.


A Quatica est planta quas circa fluviorum ripas invenitur. *Itydix* castrifolia, bulbosa, carnosa, aquea, ex tunicis quasi super se injectis formata, corculo flavo, fibras castrifolias oblongas ex inferiori parte emittens > illae primum albicant, dein flavescunt, fa-
 saquei. *Folia* ex radice prodeunt, oblonga > gladio-
 in instar, in cuspidem definita, inferiori parte mil-
 totheciformiter convoluta, interiori parte cava, cra-
 sca, fungosa, venis in longum striata, viridifusca >
 radicem albicantia. *Caulis* e radice exurgens piano ro-
 ndus, virididilutus, a radice candens, fungosus & c
 Meus, in cortice, si a carne deglubatur, interius instar
 colerici. *Flores*, odoris expertes, octo vel decem simul
 ex col' Ab oblongo, vitidi diluto, quo > exteriora versus >
 non nihil reflexuntur, in fastigio caulium proventunt,
 inferiorius ad exortum crasso pede extuberantes; illorum
 sex vel octo ordine exteriores sunt, duo interiores confiti,
 phientis candidis inferiorius interspersi, liliacei, pentape-
 5 angusti, cuspidati, candidissimi, in medio & exterioribus te-
 Uiter extuberantes, venis in longum striati, exteriora
 5er' tis in totum reflexi. *Stamina* in illis quinque, oblon-
 7° rotunda, apicibus oblongis, nutantibus, transversis,
 crocco colore adspersis, subrore nigricantibus dotata, de cas-
 tera rubropurpurea, nitentia, inferiori parte Candida,
 superiori coUiorificio, ad petalorum unguiculos inforta.
 Stylus lurrudus, oblongus, rubro purpureus & nitens,
 e medio florum emicat, inferiorius candidus, expedecolli.
 Filo-
 n' rum *gemma* oblonge, striatas, conicx, primum ex
 ^Y° albicantes, dein magis albescentes, exterioribus in medio,
 -^ extuberant, non nihil rubescentes. Porro notandum
 Quod flores, simul congregati primum folioso involucro,
 quod

quod in duo fefinditcuspidata folia, fint inclufi, *com*¹,
 tuentescapitulum oblongum, crafliolurn; fedruptop:
 volucro, prodeunt, duobus foliis > quas exteriusviridia*
 interius Candida, ad planum caulium latus fnferius fuc-
 cindi. *Prućtus* illis *Tola Tali* fimiles funt, codemque
 modocxpede colli florum excrefcunt; *Jemina* continent
 candida₅ carnofa, fucculenta. Ex planta concifa & toft*
 bini fiunt noduli, qui utrique maxillas appofiti, fpafoiutn
 curantCynicum*

T A B. 38.

Hæc Illio *Narciffus* confpccies eft *ToUbo Cey-* | ipiffima, hoc folumexcepto difcrimine, ^{ad}
lanenfibus, feu *JMi CeyUuui umbelliferi & bulbiferi*. | cem bulus paulo minorcm clè delineatani₅ H
 Vide *Hewi. Cat. Hart. Ac ad. Lugd. Batav. vel forian* | quidemreipfafit.





وَعَلَا كَمَقْلِيحٍ
مِنْ

711
L. 111
T. 111

Sf O V A N N A T ° L J TALL

TABULA XXXIX.

Species est *Tali*, Bramannes dicunt *Gola* *fyndo*, plantatriumpeduni altitudine, arenosa amans loca, etiam ripas aquarum. *%adtx* bulbosa est & albicans, subtus plunmasjalbas, fungofas, humidase mittens fibras, iaporis aquei & subamari. *Folia* gladiolorum, feu *forum Lili* inftar, ex fe invicem prodeunt, ad radicem *in*ata, lata, craffa, in marginem acutam extenuata, micraris cuspidibus in oris minuta, vei *Ms* in longitriata, plurimfe magnis fistulis feu tubulis (quattplacior dine ac ferie adle invicem funt conutx, ac membranaceis parietibus ordinate interchips;) intus *ang*itudine pervia. E medio foliorum *vaults* vinds, is, comprellus, intus albicans, fungofus. fistulofusi *3*ice exfurgit, - in cujus fummitate *fires* plures *G*mul, lue velfex congregatim, finguhpropnis, rotundiolis, flavis petiolis, qui ex nodulo iupenon caulis erunt *a*proveniunt, monopetali, oblongo anguti, coicandidi, quatuor aut quinque ferme pollices longi, *mlati*, in longum triati, oris non nihil interiora verclauli, odoris debilis sed grati. *Siamku* in illis fex, *ai*ufcula, maxima parte petalis inferta, purpureo runitentia, inferiora verfus albicantia, *aptatom*tirulis, lunulatis, nutantibus, flavo rore confperfis, *ca; flylus* cum hifce conipicitur tenuis, intotumpur<oruber, qui per petiolum transmittitur, & ibi ex tealbicat. Deciduis floribus majorem petioli contract virorem, & in fenori parte, qu\$ circa nodulum est *r*ador, in *capfuksfemimles* extuberant & turgescunt, *o* ut plures fernales capful* congregatim nodulo aufm fideant; funtque te, ad petioli figuram, *w*imum *ll*ago rotunda:; crassitie tantum arliqua petioli parte *e* U, deinde, cum ad justam pervenerint magnitudi-

dinem, caule fuperiori deciduo, rotunda: vel rotundo-
 pknse, cortice viridi diluto flavefcnte, venulifque in loⁿ.
 gum itriato, cujus caro intus albicat & fungofa eft > tenui-
 ter obdudte. *Semina* pro ratione magnitudinis in iU^{lSj}
 tria, quinque, feptem continentur, totam capacitate[^]
 fub cortice replentia, filamentis quibufdam fungofis? a^{*}
 bicantibus, hincinde, tenuiter interfepta, variasfig^{ur3?}
 unolatero, quascorticiproximum, rotundo, aliisplani[&]
 colon's albicantis & fubviridis; illorum caro albicat & a-
 quea eft, etiam fapor aqueus eft. Semel quotannis floret,
 tempore nempe pluviofo. 7(a£x bulbofa trita & toita
 hasmorroidibus apponitur, conducitque apofternati^{^5}
 aperiendis & maturandis; eadem toita & cani data, de^{rtus}
 illius excidere facit: *filia* toita *carbunculis* applicata? do-
 lorem ex illis obortum mitigant, ungues excarnafic^{2toS}
 fanant.

T A B. 39.

Inter omnes *Ufa mtifit* hxc omnium maximaeft, a nemine, quod fciam, antehac unquam
 defcnpu.





Handwritten text in a cursive script, likely Latin or a European language, located in the lower right corner of the right page. The text includes the name of the plant and possibly a reference to a botanical work.

C A T U D L I T O L A .

T A B U L A X L ,



P Lanta sesquipedis altitudine, nascens in arenosis. Radix bulbosa est & Candida subtus tenues & albicantes ejiciens fibras. Folia quae ex radice oriuntur instar Lili funtieu gladioli oblongi, in cuspidem definentia, venulis in longum ftriata? in medio crassib tergo Kuberaotia, parum interius clausa. Inter folia, extra (Ce) unicus exurgit caulis compressus, viridis, spitham* ti longus, in apice nodulatus. Flores propriis cauliculis, in summitate caulis, plures congregati videntur» era vel octo? ex uno eodemque caulis nodulo iimul Urgentes; in totum candidi sunt > odore debih ied grauptime conformati 3 duplici petalorum ordine constantes!; in exteriori sex petala sunt oblonga, angustaj furresta, in ^pidem definentia > venulis in longum ftriata, costula, in ferfa parte parum eminente, in fruda, stellam dices teufpidalem; in interior! ordine stella est versus umbilicp5 campaniformis* duodecim in oris cuspidibus emmens, ci^ folia exteriora cum in parte adstringuntur. Stamina in Msfex Candida, campaniformem ex umbilico stellam in ^rius ftriantia; singulaque in intermedios cu/pidum anguios eo ordine incurrunt, ut duos inter se reJinquant cuspidites, sed superiori parte ex angulis eminent > flavis & u^umbentibus apicibus ornata. Florum gemma oblongo Sundae, ex viridi magis magisque albescens, ftriis numero sex, quae in vertice coeunt > ftriatae. PruBus eodem mo^o ut llll 'Pola Tali proveniunt. Etiam fimina albicant, quorum caro albescat & aqua est, lapor etiam aqueus. S^riel quotannis floret 5 tempore nempe pluvioso. fydi x in •^le exficcata & in pulverem redacta cum faccharo nigro exhibetur pro ha^morrhoidibus; ejus decoctum cum aqua idem prasstat, pro lotionem nempe adhibita. Tofta & de in^nt a postertibus apricendis & maturandis super imponi^r; addito oLo podagricum illo perunguntur: folia unquibus circumdata 5 illorum dolores sedant.

T A B U L A 40.

*'''\$« est C₆Lni«U, flora albo hexagono odorato Hermannii in Catalog. Hort. Academ. Lugd. Batav.

Katsjula - Kelengu - ...
KATSJULA KELENGU


كاجنولا كالج

Capura - catari

كاجنولا كالج

B

f




KATSJULA KELENGU

TABULA XL I.

B Ramannes dicunt *Ofmt* Catari* planta pas-
cens io arenofij. %'Mix arnofi, albicans,
tibrasemittencfc&novcltistepTOjMgina ocu-
lis> odorisiragrantis& aromatic!, ntaxime
cum iica_T Linzjt>trit in for, atbicmtc
Gcca came* cortice rufib* njgol'o. Duo
ex radice fold, pedunculis furro&is, htis & caviscliir-
gunt, in tran. TUOJ cjrtenfa t es advcrJy IUJ » aimph, ro-
tundiola, infcriusiinulocavo, angullo exrifc, cr^its>or-
nosa, glabr a,vcniailibdlibusaDnufaribu^tqiKcroluuram-
tus oblicuroi rrjctu fubcunti ex medtn wna iirbw, virori*
na superiori parte faturi & iuia, in inferiori i <nc radfd ob-
verfa, viridi clar ft inorisJimbuJoTubcf<:crtTC ruitrncta, o-
loris gra riaroniiiitict. *Flttm* ox rtdite inter folia mtdiaJur-
titixfiimmt, obiongoperioloccu colJo, Eripetali, duo
mm o n^o rotunda & caadida j tam interim tjnam
us: tiunltiiccoppolitumi a^L rii« inmedio, in
duo al i a q i. pcta Li est div ihi m, in rcr f iulidum i in mt*
die * 4k imo parte ad pedem purpurco n^m, cxtcriuscaa-
ium> inpede infcnardiluti, hvell^its & vindc(ceas>
Uque in totum rrfbus oblot jngurti* andidw i'oliotos
Uuriculis fuccindtl EKfif rui medio /?> /< cxiteglt
catus, foliaceus, candidus, ad pedem pi:tiJiliurf>ur<flf*TCr-
centem accumben:, iipcmcin duas u [Ogulastiifliij quoti
P«bb purpureo iunt rdlexs. In nu Oavue dt, intus an*
diu tnciEbroti avirate, perquaiii Jius? fc transmittit
randidus, tenuiflimus, ptmfh nodulutus: floresin
totum illis Tjfffigrli*iKi'KdntEn non diflimiles lunc. Jn
super obi"crvtvimU5» quod loco floris cmarcidi ac decidui,
n» oacflas novelluscum pctiolo ferine pollicari c rad*cc
exilic x* ocyus ergo iwfcuntur. ^«fc<*** i o tratMVcrfas
incidi Lur lamdlas^ & divenditur. W«A« cum rccctm
io nulluJas redaciufi i dlhmaticis datur

X J I B O L A 4).



٥٥

فانقوس

(N)

KATU KAPEL feu CJDES^JCO.


T A B U L A XLII.



Afcitur in arenofis. *I^dix* fibrofa, carne intus albicante, filatnentis lignofis pertexta, corticeruffo, faporis aquei. *Folia* ex radice oblong ad duos exfurgunt cubitos, inferius foliis minoribus inveftita, exterius convexa, interiuscava, viridia, rigida, veniflanugifis in lonfum friata, valde craffa & carnofa, carne intus ^{de}nf_a, albicante, aquea. *Flores* in propriis proveniunt ^clibus, qui ex radice oriuntur rotundis ac petalis mleftiuntur oblongis, tenuibus, extus aqueo rubefcentibus, intus aqueo viridibus, illorum fupenon parte undique in Renteſ, bini vel terni fimul in uno communi pedunculo, i?xtapetali, oblongo rotundi, anguſti, nitentes, in me*o vena friati? collum oblongiufculura eſt & candidum. *^mina* in illis fex, oblonga, Candida, oblongis, flavis, *^tantibus apicibus* dotata. *Stylus* etiam oblongus eſt 6c ^{Ca}ndidus, ex *globulo* prodiens albicante, inferius in collo ?to. *FruBm* rotundi funt, fimlices, vel etiam bini i^un<ai, viridi diluti, quorum duo latera globofa; mqui[^]sunum aut duo reconduntur *femina*, quae tenera, faP^ris fabacei. *Folia* trita & in formam boli reda&a, «verfus ophthalmiam & oculorum fuſſuſionem aſlumun[^]r: cum radice addito tAUio ac <*Juripigrnento in oleo *^rgelim* decoſta, gonorrh[^]am fanant, fi nempe caput *^m* oleo illo illinatur; *Vulbus* cum *fandalo* citrino & ^{hti}*yro bubulino tritus linimentum exhibet, m nervorum ^{co}ntraaionibus & ardoribus adhibendum. Tota denique *Wanta* oleo butyroque incodla omnium oculorum vitia ^{C^r}end at.

TAB. 42.

[^]ppellari poſſet hæc planta, *Aſphodeli* I* [^] floribus, h « t t p « . l i . , fpicatis.



Vanilla

R. vanilloides

في الحقل ووعصا

من الحقل

Vanilla

K A T U B Z A L A,

T A B U L A X L I I I




Ramannes dicunt *Ifyna Queri*, planta est ad altitudinem ftaturas exfurgens humane > arenoso & udo gaudens (bio. %qdix oblonga •> rotunda, corticifaus investita* pilisinorbem circumdata? cculata, exquibus denuo propagatur. *Caulis* simplid pede ex radice exorfens, rotundus est, viridis, geniculatus, ad geniculos foliis arde vestitus & obvelatus, ex inferioribus geniculis ad radicem > supra foliorum ^ortum, novos caules emittens. *Folia* quibus caules ⁿftiuntur, tenera adhuc, in totum in se invicem ⁿt convoluta > oblongo rotunda? lata > mollia, plax lenia, glabra > venis parälcllis ex *eofia* media crat ^ori, quse in adverfa parte altum eminent, ftriata, in totum foliis "*Bala* vel "*Pigueira* familia, qua de causa i Lusitanis *Figueira de* <> *5Mato* vocatur; viroris in refla part ^o fufcioris & nitentis > in adverfa dilutionis, ex fe 1^vieem prodeuntia, ac parte fuperiori, qua caulem ^eferunt 5 patente orificio convoluta > quas in fummitate funt caulem ar&ius ampledtuntur & nonnihil rufcunt. *Flores* fimul proveniunt cum *fruBubus* in cacumine caulium, ubi in tres acutos ftringuntur angulos, fufce rubefcentes, vertici fruftus infidentes, illi viridi dilutis, femiuncialibus 5 angulatis & duriolis petiolis, ex caulium angulis, bini & bini, alternato ordine erumpunt, ac finguli folio follicofa, quo pri ⁿ cum mo flore obteguntur, ad exortum petio ^o m fuccinguntur. Ipsi flores o&petali ffunt, ^o ngi, difformes, colonis coccini vel venuste mi ⁿ iati 5 inferius ad unguiculos flavi, petalorum unum

majus, oblongius, latius ac le ^{nu.} est, infra
Veluti; duo latifolia sunt; unum notis; subris in sil-
 vo colore variegatum; unum in ora ol. ungo, rusto
 emmens apice seu flammula; omnia contracta sunt
 & non expansa; & hoc, ob arctum calycis oris
 cum quo excipiuntur. *Calyx* 6 tribus constat
 oblongis, cuspidatis, rigidiusculis; confertis; sur-
 rectis, quæ rubro fusciora sunt & magis nitentia, in-
 tus venulis, versus cuspidem, striata. In florum me-
 dio *Stylus* videtur plantus, latus, subflavus, nitens;
 superiori parte parum rubicundus. *Gemmae* florum ob-
 longo rotundae, in cuspidem desinentes. *Calyx*, quo
 flores includuntur, rubro fuscus. *Fruktus* ipsi capitu-
 la sunt oblongorotundiola, futuris interlincta, gen-
 tibus spiculiformibus, rigidiusculis, transparentibus;
 undequaque ballam exasperata, in totum viridia,
 in cuspidibus gemmarum rubescentia, cum sicca sur-
 nigricantia; spiculo, ubi flores decidere minima. *Som-
 na* intra singula fructuum latera, in totidem distinctis
 capsulis, sita sunt, quæ interiori membrana à se mutuo
 intersinguntur, in singulis capsulis tria vel quatuor
 nullis unguiculis adherentia, sed crassiola albicante le-
 nagine involuta, formâ exacte rotunda, *pisi* magni-
 tudinis, primum albicantia, deinde rufa seu subrubra;
 punctis nigricantibus interspersa, saporis parum adstrin-
 gentis. E *Fruktibus* parum tostis succus elicetur; qui
 auribus immixtus dolores illarum mitigat. Ex illidem
 & *Saccharo* massa componitur, & umbilicali regio-
 ni applicatur contra *diabete*; ex calidis febribus in-
 tam. *Succi radices* Mercurii sublimari vo ^{sicu} in-
 fringit.

TAB.

TAB. 43.

Peregrina haec vegeta medicata est ab ip-
 samentu subhorum sine, & hoc, pro jubi-
 co, quæ sitis tollit, cum haec aliquant lu-
 berè distillantur. Haec *Calx* sed, vocantur
 mali, sicuti *Sala* dicitur, & est, apud India
 Calca, hanc, in hanc, dicitur non omne Cans
 India dicit, vel Engas, sicut, in Thesaur. Di-
 citur haec species in hanc Etalibus exco-
 lunt, ut hanc.



TAB.



Laccaria-golla L.
by Darwin - m.
Laccaria-golla L.

GARIMGOLA.

TABULA XLIV.



P Lanta est aquatica ad altitudinetn exfurgens; cubiti. *Radices* fistulose, albicantes & rubescentes, fibris vestitas, illas primum albas, dein croceas, pluribus capillis flavis in circum quasi implexse. *Caules* piures uniti & combinati exfurgunt, rotundi, circa interiorem partem nonnihil pknii, fungosi, valde fistulosi, hinc inde in folliculos, k quibus novi prodeunt caules j extenuati. *Folia* quas singula, unum numero, in fummitate caulium proveniunt, forma sunt cordis oblongi, inferius latiora & superiora yersus, oris Jtn rotundis, in cuspidem acutum definentia, superficie lcnia₃ textura condensa? crassa, mollia, venis, quas omnes in petiolo excurrunt & in cuspidem intrant, ftriata, *nervulo* in adversa parte parum ente infruda, viridis in una parte fusci, in alia tnis, saporis subastringentis. *Flores* ex caulium riori folliculo, infra folia, cum cauliculo fistuloso •punct₃ cauliculi petiolis congregatim infidentes, ius plane odoris; hexapetali sunt, petala ipsa Jongo rotunda, frecta, tenuia, membranacea, coloris in totum caerulei₅ corusci & scintillantis, papillarum alarum instar₉ maxime siinbleconspiciantur; in exteriori *costa* viridi per medium ftriantur: tria ex rtiora sunt, tria angustiora₅ inter singula latiora infita. Sex in illis videntur *lamina* c^{er}ulea, *apiribus* fctis, ftriatis, acflavis, dotata; illorum unum aeruleo pallidius & latius est, *lingularum* habens ^{er}uleo viridius, • quas caeteris est longior, latior ac emflctior, sublingua laciniam folioli instar angusti. Inter illa e *globulo* viridi vel subflavo, qui in orificio florum hasret, prodeit c^{er}uleo albicans) staminibus crassior, in vertice
 P: XL Z gem-

gemma albicante ornatus. Florum (*lemma* oblong[^]₁
 quinque vel sex costulis eminentibus striatis > nonnisi
 intortse₅ vel, si mavis, crispatis; illarum folia primum¹
 pellucida sunt, ac clara, veluti a papilionum, ^{nu^oC^}
 ruleo colore tincta; tractus in illis videntur subtiles ven-
 larum, quae in plures se spargunt ramulos, & hinc JP^{de}
 ex *costa* media oriuntur, fedilte, infoliosc[^]ruleis & i^{Cin}
 tillantibus, visum fugiunt. *Capfida* feminales t^{latw}
 oblongo rotunditate, tribus in longum striis radiate,^a
 foliis, turn costulis valde crispis & extuberantibus, ac p^{rae}
 ficitate contradiis & rufofuscis, inftrudis, in totum^m
 comprehense. Numerosa in illis continentur *femina**, in
 tres series disposita, per membranam internam tenuem^m
 quae ex medio fructus, ad intervalla, inter strias i^{trawofme}
 dia excurrit, ac corticis exterioris striis arctius adstricta
 est, distincta, forma rotundiola, parum oblonga & al-
 bicantia, matura colorem feminis referunt *K.^{ur^}
 Totaplanta contrita & in ladle data, febrim edetur co-
 ricas. Oculorum affedus tolluntur, si caput cum i^{ius}
 decocto unguatur & oho. *Rgdix* codlacum *faccharo* aliu^m
 ta > vitia hepatis corrigit > flatus distendit; tritain *butyro* &
oko sic epota inflammationem seu rubedinem oculorum
 tollit. *Cortex* radicis in pulverem redactum *Zaccharo*
 fumtus antiasthmaticum est; idem masticatus & in or^c
 detentus odontalgiam fedat & abigit.

T A B . 44.

Secundum descriptionem criffimi nostri Au- lineator florem tantum depixit *pentapetalum*,
 thoris pertinet hanc planta inter illas quae sunt *fl-* cum tamen secundum descriptionem ^{Cin} *hexapeta-*
*it hexapeulo, trcaffulares, ndite fbtos**. Sed de- lusfit.



Callitriche
L.
Callitriche
L.
سنة في الحديقة
L.

IX3 L I t A M A R A.

TABULA XLV.




Lertia species *Taward*. *Indices* quibus fundo adhaeret, fibrae sunt capillatae, in unam quasi fasciam conjunctas, albicantes; adultiores tunica flava obductas, annularibus fere striis corrugantes. *Caules* crassi > fistulosi, admodum leves, ad radicem crassiores, superiora versus in angustum contracti, angulati, intus aliquo modo laevi. *Folia* singula ex summitate caulium protenduntur, ex caule, versus posticam partem, duabus aciniis tanquam alis (quasi singulae in cuspidem fere striant) longe excurrunt, ac versus anteriora, rotundioris, in obtusum fere contrahunt cuspidem; lata sunt, interiora versus se nonnihil adhaerentia, ejusdem in utraque parte viridis, spinis minutis obfusa, maxime in reversa parte, ubi etiam aspera, fractu facilia. *Cosia* ex utroque tredecim plus minus excurrunt, quarum aliae versus posticam partem, in laciniarum seu alarum deferuntur cuspidem; aliae, cum *cosia* intermedia crassiori, versus obtusum folii cuspidem, hinc inde nervulos emittentes transversos; omnes in utraque parte eminent, maxime in adversa, nervulis transversis exceptis, illi enim in adversa tantum eminent, in recta conspicui. *Flora* in propriis geniculatis proveniunt caulibus (illi minutissimis sunt oblongis ac valde asperis; ex inferiori geniculo, ubi tribus foliis cinguntur parvis, oblongis, cuspidatis, & ut folia *zaminum* in longum striatis, tres aut quatuor emittunt cauliculos geniculatos) prorumpuntque ex singulis caulium geniculis, plures simul, tenuibus, rigidiusculis ac nonnihil furrectis petiolis; parvi sunt, tripetali, illa atorotunda sunt, interiora versus cochleata, candida, parum scintillantia, a se mutuo nonnihil distantia; unguiculis suis tenuioribus, *nodulo* seu *xapttuh* vindi, gemmu-

mulis interfructo j è petiolo extuberantij circuitp^{0/1*} ta ; e' quo lamina egrediuntur plura, birevia > tenuia, > albicantia? oblique furrecta? ex inferiori parte flex flavis apkibus dotata; ipsa florum petala tribus viridibus succifl' guntur foliolis. Capitulum ingemmas extuberantiajores > rotundas? valdenitentes & transparentes j asperas, acuta prominente futura 5 in medio striatas; in hisce, quæ aqueæ sunt, intersepimentum est viride 6c crasum > utrinque ad latera cavernulam relinquens > in qua duo albicantia reconduntur femina. Ignoti usus est hæc planta apud Indos.

T A B U L A 45.

Quamvis Auctor noster dicat hanc tertiam Tab. 1 tibi/wm B. P. hanc enita ex omnibus a Ppar et cir-
ntara esse speciem, quarum duæ priores Tab. 501 cumstantiisj atque ideo à me vocatur ibi. ^
6c y descriptaj, & conspecies sint fymbdai I mdica major, folio obtuso, floribus nfinonbus ^
nihilominus tantum referri debet ad Sagittam & > tibus.





Phlox *subuliflora* L.
nos. 1000 m. l.
J. G. S. J. G. S.
317003 m. l.

O T T E L A M B E L,

T A B U L A XLVI.



Uarta species *aJmbel*; Bramannes dicunt *Odeca-aloèn* a prioribus quam maximè differens. "*Radix* rotundi instar nodi est, cujus *cortex* flavus, plurimas tenues flavasque emittens fibras, ctiam ad ulteriorem propagationem? novam proferens radicem. *Caules* *erzdice exeuntes*, *Gmplkes font*, *ieneri*, *Mulofi*, *fed* *Q* *raffiores* & angulati, viridi diJuti > albican tes. *Folia*, ut [^] priorum species, caulibus non infident, sed singula ^e X *fluore* < a protenduntur caule 5 de que etiam aquis innata [^] t vel incumbunt, sed oris, inferiora yersus, convolutis [^] ad f_e invicem contractis, turn sub aquis, turn extra aquas ^{en} 3 *icant*; tffaxime in latitudinem extensa, rotundis ad ^{Ca} *ulem* oris, antierius in cuspidem ftridlis, valde rigida, [^] ftu facilia, in lacinulas hinc inde infinuata, glabra. Cum [^] o intermedio venutemajoresjexipfo caule, utrinque *tres* quatuorve passim, obliquo 6c arcuato exeunt ductu * *quo*, a marginedefledentes, in cuspidem deferuntur; in *adver*sa eminentes, rebl:am ftriantes. *Flores* caulibus infident propriis quadrangulatis, in singulis unus numero; *qui* caules 5 parte superiori *i* proxime ad flores alati sunt, *R* *ristin*empequinquealismaioribus, latis, *rigidis*, folio [^] *m* instar, ac minoribus intermediis. Ipsi flores candidi < intj difformes, tripetali, lenes, crispati, venulis in ^o *ngum* ftriati. *Stamina* flava sunt; inter ilia *casttulum* kfe prodit cuspidatum; inferius tribus fuccinguntur *foliis* viridibus, angustis, furredtis, cuspidatis, quasubi* *que* viridi fuscis sunt obducta nervis. *Capfu* U feminales ^{*} *o* *tund* # j oblongs -> cuspidatas; *femina* in illis reperiuntur ^{nt} **merofa*, rotunda? minufcula, colon's > ubi matura sunt > [^] *befcentis*. H[^] *c* ut & ilia reliquarum species in eduliis Whibentur.

TAB.

46.

*Cæteræ plantæ cognomen Ambel gerentes, priores enim omnes confpecies font Nymph**mi. K* *uloante Tab. a 6, x 7, z 8 6 ci 9 de Arup, CUI* *noris, ut suo loco notatum. Ha:c mihi est Sagittuafi.*
ne minimani quidem habent convenientiaro; *nis MaU&tcrifu Jatijfito folio, floribus ex albo trifoliatis.*

P. XI.

A a

TSfEM



Arabis cymulifera

رَبِيعٌ وَرَبِيعٌ

mal.


Arabis cymulifera, L.

T S J E M C U M I J L V .

T A B U L A X L V I I .



Renoso has plantagaudet folo, longe ex-
 currens. ^Walbicans est & fibrosa. *fattier*
 è radice plures exfurgunt simplices > rot un-
 it di, rigidi ufculi? lignofi, aquei, ex albo fla-
 * vescentes, venis tribus ftriati. *Foliir* desti-
 tuitur. *Flores*, difformes 5 cacumini cau-
 %m", qui fuper nepaulocraffiores, ad unam partem non-
 °ihil inflexi, infident transverfi, bipetali; unum illorum
 r ubro fanguineum 6c purpurafcens, interius in orificio,
 u nauofo liquore delibutum; alterum, (exterius nempe)
 Wpidatum est, incurvo dorfo, lateribus claufis, coralli-
 ^ rubefcens, inferius ex ventre emicantem proferens
 C3mpanam; ilia ventre non nihil est piano 3 ftridto dorfo,
 ^opetalicufpidatidorfum respicit. In illius orificio *fiylur*
 Sfpicitur cras Eolus 7 alborubefcens) CU Jus *capitulum* ^ albo-
 [Wefcens, planum, rotundum,, pilis minutis albicanti-
 ^sobfitum; cuni ftylo *flaminm* duo reperiuntur paria,
 ru befcencia, *apcibus* albicantibus, latis, fibi mutuo an-
 ne xis dotata; ad latus campanas florum inferta. In fuper
 ^tandum quod *firf* ** ex globulo exfurgat grandiufculo,
 ro tundo, in bafi *calycir* fito; est que hie globulus albo fla-
 >e fcens, tunica membranacearubefcente, qu^ facile de-
 ftill*, obductus; transversim diffe&us ex carnofis hu-
 midis plicis conformatus esse videtur. *Folia* cum *th(uce*
 Mosclbm *Zaccharoque* gingivis applicata, dentium putre-
 dinem arcent, eorumque vermes enecant. Ex foliorum
 simul & ligni *fucco* ellychni aparantur, qu^ *oleo* foliorum
 d'Emjirno intindla accenfaque, leves relinquunt cineres,
 S^ui palpebrarum aliorumque partium suffocant vermicu-
 los; *Bulks* radicis idem prsestat, cum *Sandalo* pone aures
 & ~jn fronte applicitus; pulverifatus nempe 8c toftus.



V A E M B V.

T A B U L A XLV. III.



Lingia Bramannum *'Bembi*, planta aquatica est. *Radix* suavissimi odoris, faporis peracris, numerosas, flavescens, capillatas, ab una parte versus inferiora, emittens fibras, in longum proserpens, ficca, molli & albicante cuticula, corculum habet, finatura flava annulari, ab interiori carne interstinaum, Per novos oculos qui radice protuberant propagatur. *Folia* ex nodis radicis transverse proveniunt, lato oblonga, vel oblongo angusta, tres quatuorve pedes asquantia, ad unam partem clausa, atque ibi tunica albicante obvelata, venis subtilioribus striata, radicem, pedibus flavescens. Wacmutuo convolutis, inestitia; faporis ac odoris *cris. *Folia* cum *Zinbere* ficco trita artuum lancements & arthricos dolores ex pituita falsa & acri, mitigant. *tydix* in carbonem exusta & in pulverem redacta dentifricium est, quo si gingivas, superpota *Orizye* aqua perfricenturj Cynicus curatur spasmus. Idem pulvis? cum convenienti liquore assumtus, cholera medetur; imò pnt racolicos & ventrem lancinantes, affumitur dolores. Comestus prostratum appetitum tam efficaciter excitat, pt etiam salivam moveat. In aqua tevigatus & propinatus itno pro balneo adhibitus epilepticos fanat infantes.

T A B U L A 48.

Acorus hxc est verus *AfMumradicetenuior*, vel *Calamus Aromaticus Garzi* ab Horto. Ab omni parte convenit cum *Acoro* vero officinarum, sed folia parum angustiora sunt quam *Ami* nostri, quia magna copia ad ripas aquarum dulciora invenitur, & multo citius quotannis suos profert julos.



۱۵۵

۱۵۵
۱۵۵
۱۵۵
۱۵۵

T A L M O 2) E G C A

T A B U L A X L I X .



Ecunda species. *eZMoc/ecca*; Bramannes dicunt *Cuvali*, convolvulus est nascens in arboribus. *'Radix* crassa, tuberosa, cubum longa, intus albicans, laeva, mollis, minus lignosa, exterius nigricans, fibras tenues hinc inde emittens, odore & sapore glandes humilans terrestres. *Caula* tenues, lactei, vetustiores citius, sub exteriori crusta virides, parum lignosi, tenues virides, ex una parte valde rubefcentes, glabri, nitentes, humidi *Folia* hinc inde, in petiolis, interius fructuatis & subescentibus proveniunt, singula septem laciniis interfracta & divisa, in recta parte viridi fusca, non nihil nitentia, in adversa viridi clara, niollia, lactea. *Obliqua* in Java parte etiam eminens ibi rubescit, ad singulas transiens lacinias, in adversa viridi clara est. *Flores* in petiolo communi, piano, nonnihil incurvo, rubefcente, spithamam vix, ex origine foliorum exoriens, brevibus suis pediculis plures congregati proveniunt, campanulas sunt purpureo rubrae, ex collo, stella quinque oblongorum cuspidum, qui proxime ad oram excurrunt, & venulis in longum franguntur, signatae; ipsi cuspides in collo intense purpurei, in extremitatibus purpureo rubro diluti; exterius ex purpureo albicantes, in stella nitentes, nullius odoris. *Stamina* in illis emicant quinque purpureo albicantibus, apicibus oblongis, furrectis, albicantibus & fannaceis *Wax* filii tendis est & albicat, rotundum, crassum & farinaceum in vertice gerens *nodulum*, qui ex rudimento fructus, in calyce fito, exoritur. *Max* pentafolius est, coUum campana? artissime complectens; singula folia, rotundioke vesicaj instar, inflata sunt, rubro fusca, ad Persicum colorem vergentia; deciduis floribus se araflime claudunt, fructumque, etiam cum maturus est, maximam

mam partem comprehendunt, sed turn viridia ^{funt.}
FruBus baccasuntrotundiolas, calycisfoliismaxiniaptf
 te ardè obtefbe, fuperiori parte rufi, interiori virides [>]
 quatuorfubtilioribusvenulis in longum ftriata[^] *eluti
 in tot loculamenta divife, quorum duo à duobus ^{^}H^.} ^{f.}
 membranatenuiintermedia, Jeparantur. *Semma* in u^{n.}
 gulis unum, ad partem corticis argenteis filamentis ov^{q.}
 turn, irregularis figuras, duorum triumve laterunij p^{ulf.} ^{f.}
 interior ex flavoalbicat. %adix in fole ficcata, trita? ^{ll}
 pulverem redada > cum *xaccharo* & *butyro* decocta.[^]
 affumta, macilentosferturreddere & obefos; fed & ^{Jm.}
 modicum menfium fiftit fluxum? & in febris o^{ffum.}
 confert.

T A B . 49.

Ad caeteras *Modecca* fpecies, de quibus *fart*,
t&av. etiam & hsec pertinet} ubi Sc una eodetn
 nomine *Pal Modecca*, id est, *Modecca alter a.* def-
 cribitur : in eo differens quod *hujm flos* ex onani
 parte, omnium fit maximus. Ad prcedentes
 nullas dedimus annotationes; nee mirutn, apud
 omnes enim *Botanographos*, maximum de illis
 est filentium. Aft cum poftea vidiffem *Clanft.*
 D°. *Brejnium prodrom. z. pag. 48.* omnibus notnen

dediffet, *Floris paponis purii Malabartct* ^{es enias,}
 pro fpuriis haber fpeciebus,) *hxc app* ^{offeC}
Flos f, l fwws fpurias Malabarhns, fl ^{offeC}
tinore. Obfervandum est quod folia ^{offeC}
 fpecierum *Modecca*, & uniuscujufque ^{offeC}
 quam maxime inter fe inviceni differant ^{offeC}
 enim eodemque caule invenies, qu^{norh}
 ter, quater, quinquiesve funt divi^{ita} ^{offeC}
 lum difcrimen fit in *fioribts Ufru Elubus.*



Handwritten text in Arabic script, likely a title or description of the plant.

Handwritten text in Arabic script, possibly a date or author's name.



MU NT) A V d L L I


T A B U L A L .



on volvulus, arenosa amans, arboribus sese affigens. *Caules* rotundi, virides, non geniculati. *Folia* in petiolis oblongis, crassis, interius triatis, viridibus, proveniunt, novellis furculis hinc inde comitata > formam referunt cordis, anterius cuspidata, ad pediculum finem excisa, mollia, lenia, viroris in refluente fufci y in adverfa diluti, trita odoris gravis, nullius faporis. *Coſta* medialata est, plana, viridialbicans, unacum lateralibus in utraque parte eminens, maxime in adverfa. *Flores* ad exortum foliorum duo vel tres juncti proveniunt in petiolis oblongis, crassis, virididilutis, tortuosis, monopetali, praegraves ferentes catpanas, oblongo-angusto, viridi diluto collo è calyce exilientes > lato & amplo orificio, stella quinque oblongorum cuspidum, qui exterius extuberant, triati, ex superiori colli parte, ubi rugulis leviter crispantur, contextura tenui & transparen-^{*}te, valde lenes & molles, coloris nivei nitentis, visu jucundiffirai; stella exterius viridis est; odor ut *Lilia* nostratutn. *Stamina* ex illis emicant quinque, Candida, nitentia, quae ex inferiori colli parte, cui interius quasi affluta sunt, *apicibus* decumbentibus albis, alba farina aspersis, dotata. *Stylus* ex calyce exurgit liber, candidus, crassus, super stamina, cum fuorotundo, albo ac farinaceo eminens *capitulo*. *Calyx* quinque folius est, illa oblonga sunt, tri-^{<aa&}:cuspidata, coloris viridi nigricantis, florum collum arde excipiens. *Florum gemma* oblonga, conies, viridi dilute. *FruBus* ad exortum foliorum brevibus infident petiolis, oblongo rotundi, cuspidati; teneri virides, r[^]ne intus viridi, succulenta, intus cavitate angusta, a^ãrati odoris, cor tice crassiusculo obdufti. Ufus in Medicina nullus vel saltem ignotus.

T A B U L A 50.

Pminet inter pedes Convolvuli. Ego dicere m *Convolvulus Malabaricus flore amplo viridi diluto colore.*



Katun - Kelengk' l...
 ۱۸۱۳
 فیاطو نجیر لهنجا
 ۱۸۱۳

۱۸۱۳

۱۸۱۳

RATTU KELENGU.

TABULA LI.




C011 volvulus arenoso gaudens folo. *Caules* rotundi, virides, pilosi, parum lignosi & languidi. *Folia* in petiolis oblongis, rotundis > pilosis, viridibus, ex parte spadiceis, ac fusce rubescentibus, caule crassioribus proveniunt, forma cordis, antequam brevi cuspidata, ad petiolum excisa, parum pilosa, ob pilorum hirsutiem in recta parte aspera. *Costa* media cum lateralibus in adversa eminenti parte. *Flores* in petiolis rotundis, pilosis, supra exitum foliorum prodeuntes, cyathiformes sunt, stella quinque cuspidata, ex albo viridi diluta > ex orificio in orbem signati, alboflavescentes, in orificio colli fusce rubro purpurei, lenes; in tractu cuspidum stellae exterius pilosi, nullius coloris > infra calycem in geniculis petiolis, duobus angustis foliolis fuscis. *Stamina* ex fundo colli exurgunt quinque candida, oblongis 5 albo flavis, fuscis *apicibus* dotata. *Stylus* candidus est, superius duobus rotundiolis, candidis nodulatus gemmulis. *Basia* cuius laminam infident, quinque rotundiolis fenestrata est cancellulis. *Calyx* pentafolius est, folia ipsa cuspidata sunt, furrecta; illorum tria ampla sunt & lata, duo interiora angusta. Floribus deciduis succedunt *globuli* rotundi, qui ficci, coloris cinereo fusci, quatuor continentes *femina* intersepiuntur mediis à se mutuo separata; trigona sunt, uno rotundo, duobus interioribus planis, eisdem cum globulis coloris. *Folia* cum *Codiavanacu* & recenti *butyro* trita abcessus maturant & aperiant. *Radix* cum *aqua Oryx* levigata eripere resistit.

TAB. 51.

Parte septima* huius operis pag. 71. alia, eju-
 ut. ra nominis describitur planta, quas cum hac
 nostrane minimam quidem habet convenientiam;
 illa enim pertinet inter species *Batatas Sylvensis*;
 ••• si uoloco ostendimus hanc species *Convolvuli*
 i. Quidamvis autem nota Chara & ritica Coo-
 lyu'orum fit quod Capful* feminales sese in tres
 partes apertant, sed illae huius plantae in quatuor
 dispersantur; nihilominus tamen proxime ad
 illos accedit, & licet claviculis, quas habere o-
 porteret, destituatur, secundum descriptionem
 DD. RapHiJl. BUM. Tom. 1. lib. i. y. cap. 4. tamen
 illi nomen dedi, *Convolvuli / finis MaUhrici* ,
 f. ut usq. à sl. f. Megatis.

1000



P. M. L.
George & M.
The Smith
J. J. & C.

B d L L E L.

TABULA LII.




Billel; Bramannes dicunt *Tafyfi* < *valli*, con*
 volvuseft* cauliculis fuper aquam repens?
 acexillarum Cymiscapillatas, viridifubal-
 bicantes emittens *radices*; illae₅ pedunculos
 caulium obfidentes, ex pluribus confiant fi-
 bris capillatis, candidis* laporis aquei. *Caules*
 tenues, tenerij aquei, virides, cymisinflexi, excy-
 marum convexa parte, unde & radículas prodeunt > folia ac
 flores emittentes. *Folia*, quae longis rotundis ac viridi-
 bus petiolis proveniuntj haftiformia funt, poftica parte
 in pedunculos laterales exporrecSta > ad eorum oras nonni-
 hil finuata, textura craffiufcula, viroris in redta parte fufci,
 in adverfa diluti. *C^{ft}* media cum lateralibus in redta maxi*
 meetninet parte ₃ minus in adverfa. *Flores* monopetali
 funt, ftella quinque cufpidali notati, inftellaejufquecuf-
 pidibuscandidi, interius purpureo rubefcentes, exterius
 purpureodiluterubefcentes. *Stylus* ex orificio calycis
 emergens candidus eft, in *apice gemmula* albicante fa-
 rinacea nodulatus; cum illo quinque emicant *lami-*
na, oblongis, albicantibus > farinaceis dotata *apicibus*,
 lateri inferiori colli inferta, in ima parte ₅ ubi craffiora >
 rubefcentia₅ pilisque albicantibus barbata. (*emma* florum
 oblongocufpidat[^]Bj viridifubflavas. *FruBus* rotundioli,
[^]tribus veluti rotundis lateribus extuberantes, incufpi-
 difem brevem & anguftum ftriati; teneri adhuc oblon-
 gwres funt & magiscufpidati; maturi magis ad latera ex-
 tuberant, coloris viridi albicantis? quinque foliis viridi-
 bus & acuminatis *calycis*, maxima parte, praeſcipue autem
 ad extuberantias, excepti. *Semina*, in illis continentur
 tria ₉ interſepimentis candidis à fe mutuo diftin&a, trigona
 funt, uno exteriori latere rotundo ₃ duobus interioribus
 planis obtuſe concurrentibus; faba in fe continent viri-

dem, anteriori parte in duos lobulos unguatim, perintersepi-
mentum medium, in medio fissam; in convexa parte umbilico feu oculo viridi, qui versus planam partem inflexus velut in finem sese recipit, dotatam; faba hac resoluta, ex oculo viridi, tanquam communi pedunculo > duoplaniconspiciuntur foliosi lobuli, qui finguli in duo foliis, crispata relaxantur linteola. *P*Unta cum ebutyrato lacte oleoque simul cocta lumborum abscessus sanat, dolorem mitigat.

T A B U L A 52.

Convolvulus mihicst aquaticus folio Ungiore, floribus candidis.





Ipomoea
Ipomoea
Ipomoea

T I R V T A L L

T A B U L A L I I L



Convolvulus finuosis ramis arboribus se affigens, arenoso & terreogaudens foloc % adix tenuic, ^^rofa, longe excurrens, cortice albicante, cujus fapor subdulcis. *Cauliculi* rotundi, tenues, virides, rubescentes, raris pilis obfiti. *Folia* hincinde, ex diversis cauliculi partibus, petiolis crassioribus, longiusculis, teneris, viridiclaris, interius ftriatis, nonnihil rubescentibus, proveniunt, figura instar cordis, postica parte ad petiolum rotundis oris profunde incisa, in cuspidem angustum contrada, tenuia, mollia, superficielenissima, in margine subrubro limbulo circumdata, in recta parte vindex usca. *Coxla* media cum lateralibus in marginem progressa in brachia divaricantur, in adversa parte maxime eminent, ubi viridifusiores sunt & nitentes. *Flores* in longis, tortuosis, virididilutis petiolis, qui cauliculis, ex quibus oriuntur, crassiores sunt, ex origine foliorum prodeunt, septem, octo, plus minus congregati, monopetali, albicantes & purpurascens; illorum collum oblongo angustum est, in illo purpureo rubrifunt; extra ilium purpureo albicantes & nitentes; ex inferiori colli officio stella rnfati, cuius cuspides ad oras deferuntur & ibi pereunt, nullius odoris. *Stamina* in illis quinque Candida, tenuia, collo inferta, *apicibus* flavis & furre « 3 is dotata. *Stylus* an didusest & tenuis, duabus *gemmais* in vertice nodulatus, ortum habens ex globulo viridi, fructus rudimento, in fundo *calych* fito; ille, collum florum arte arripens, viridis est, pentafolius, rotundo cuspidatus. *Florum* nmmx virides & cuspidats. *Fru3us* baccas sunt rotunda, f linuo modo planx, primb virides, exinde flav « feu rufe, nuatuor venulis vel lineis ftriatae, in quibus *cortex*, qui duriolusest & tenuis, in quatuor ferelaxat partes. *Semina*

no


H O R T U S

in illis quatuor ? tenuibus à se mutuo interfundta membranarum, de caetero trigona sunt > uno rotundo > duobus planis lateribus 5 coloris castaneo fusci, ex oculo in vertice, fila ejiciunt Candida -> tenuia. *Succus* exreflus pro lotionem adhibetur* ad purificationem corporis.

TAB. 53.

Convolvulus MtUbariatsflmbtis ex albofurfurascenibus.





Ex. *Mimulus*, *hirsutus*

Benth. *Fl.*
Small Botany
1843
رفیق طبرقہ خانی

B E N « T I R U - T A L I .

T A B U L A L I V .



Convolutus nascens in arenosis. *Caules* tenues, rotundi, virides, glabri. *Folia* oblongo rotunda, crassiuscula, mollia & lenia, odoris debilis & grati > faporis subacris. *Cosia* media in utraque parte eminent, laterales in 3a extuberant, in adversa tribus suis conspicuas. *pores* monopetali, campaniformes > stellati quinque cuspidales, oblongo collo, candidi. *Stamina* in illis quinque furrecta, candida? *apicibus* incumbentibus secundis nodulata, inferius pilis candidis barbata? collo acuta. *Stylus* oblongior *gemma* albicante instructus; ex *globulo* viridi flavescente, in *calyce* fito emergens; ille quinque foliusest, tria illorum ampla & oblongo rotunda, duo angusta & cuspidata sunt. *FruBus* oblongi, filamentum oblongum, viridi dilutum in vertice gerentes; inter quatuor furrecta, scabra > rigida, & viridia folia, calycis locum adimplentes, confiti, illorum cortex crassiusculus & viridi dilucis, intus valde glaber & albicans; in medio mollissima, flocculosa, albicans continetur lanugo. Ex *fucco* plants infusus preparatur, adversus morbum endemium, *Titao* didum: idem cum *fruBu* ac *cortice Cadel-avanacu* haustus, alvum laxat.

T A B U L A 54.

Convolutus Malabaricus, foliis longi, flore candidi.



مذبة غلال سنجق

Cal. - 3000
Mimulus L.

St. - 112



T A L A - N E L I

T A B U L A LV.

Bframannes dicunt *Cali-Falli* vel *Rain. Ma-*
moradj convolvulus est arboribus se affigens³
 vel super terram repens. *%adix* lignosa,
 fibrosa 5 cortice viridif usco. (*autes* tenuif-
 fimij angulati, virides, ad corticem interi-
 us membrana albicante, densa, subtilifli-
 mis pilis pertexta, veititi. *Folia* oblongoangusta? cuspidata,
 ad petiolum utrinque pedunculo laciniata, tenuia, *moU*
liaj lenia; *Cofia* inadverfaparte eminente infruda, viro-
 ris communis, nullius faporis. *Flores* monopetali sunt,
 ftellain medio ornati* cujus cuspides in ora non nihil emi-
 nent; albicantes > subflavescentes, in collo notarofaceo-
 iatura in orbem suffusi. *Stamina* in illis quinque tenuia,
 Candida? albicantibus? furredlis *aficibus* infru&a. *Stylus*
 tenuis est; illius *capitulum* virididilutum, in duas veluti
 pennas bifidus. (*alyx* quinque folius est & cuspidatus,
 florem arde arripiens. *FmBus* globuli sunt planorotundi,
 exalbicante virididiluti, ftriati, exfuturis, permembra-
 nas intermedias, in quatuor loculos feminales distindli,
calyce quinque oblongorum & cupidatorum foliorum
 profunde excepti > coloris ruffi & spadiceiac non nihil ru-
 bescentis. *Semina* in iis reperiuntur quatuor, in fingulis
 loculis unum, triangularia? uno latere rotundo duobus
 planis 5 primum albicantia > exinde spadicea. Decorum
 hujus plantse, *Sam/travari* 5 (*flycirrbify* & *oleo Sergelim*
 permixta linimentum praestat j quo caput illinitur adver-
 fus cephalasam & comas fluxilitatem.

T A B U L A 55.

Miratudignum, quod omnes *Convolvuli* spe-
 cies, huc usque descripta; & qua: imposterutn
 sequuntur, cUviculis destituamur, 6c pier urn-
 quicquaviorvel plures habeant loculos incapu-
 lis feminalibus. Ex genere *Convolvulorum* ta-
 men miuimè sunt excluderidic, sed necesseario
 inter illos recensend^, cum illis enim quam
 maxime conveniunt. Hxc ciibi est *Convolvulus*
Malabarhus, angujlofolio, flore variegatf.



A T > A M B O E.

T A B U L A L V I.




Res illius sunt species > [^]Adamboe, Schovanna Adamboe 5c 2?el Adamboe; prior lingua Brannum dicitur *Tougia-Falli*, convolvulus est, cujus radix fibrosa > albicans. Caules rotundi, tenues? minutis pilis obfiti; super terram repentes, radículas, quibus se affigunt? emittentes. *Folia*, quorum petioli ftriati & pilosi, cor referunt? textura tenuia > mollia, superficie lenia. *Co/la* mediacumilateralibus inadverla parte eminet. *Flores* in uno petiolo plures congregati proveniunt 5 monopetali * in quinque partes incisi, corrugati* ftellati, in collo purpureo rubri 8c futuri 3 exteriora versus ex purpureo albescentes > sine odore. *Stamina* in illis cjuinque albicantia, *apicibus* oblongis, furred:is > albicantibus & farinaceis dotata; in inferiori colli orificio, cui inferta sunt ? crassiora, albis & lanuginosis pilis obdu&a. *Stylus* inter ilia apparet tenuis & albicans, crassa & farinacea *gemma* in vertice notatus₅ ex *capitulo* flavo[^] fructus primordio, erumpens. *Calyx* pentafolius est. *FruBus* non nihil planorotundi, foliis calycis arctii Eme inclusi, in vertice caudula eminentes₃ tribus seu quatuor lateribus rotundiolisj ac in latum non nihil extuberantibus, cortice primum viridi, in superiori parte, ubi calyce non obteguntur rubefcentes, odoris ubi aperiuntur? fortis₃ ilium *Tiperis* & *Zin[^]beris* viridis aemulans. *Semina* in illis tria vel quatuor, fru<3:um x[^]plentia, trilaterialia 5 inter sepimentis tenuibus* membranaceisj albicantibus? quae in oris rubescunt, a se invicem sejundaj coloris argentei; in oris lateris convexi, pilis argenteis obfita; pulpa viridis est & nullius faporis. Contrita cum lacte aflumpta, antidotum est ad verus morsum serpentis *Cobra Capella* dist: i; *fruBus* triti & cum aqua aflumti, idem praestant.

T A B . 56.

Parte quarta hujus Operis Tab. 2o.2.i.&22. | nomine insignitae, nullam tamen inter se convolvularum species eodem nomine Adamboe describuntur, quae multum inter se differunt, quamvis | nientiam habentes., uti antea demonstravimus: Hxc mihi est Convolvulus Malabaricus flore maximo omnes sint species Malvarborum, & sic plures in | furpurascete.

898/8



Shorea striata L.
Cassipourea M.

شوریا ستریا
کاسپوریا

SGHOVAUNA tAT > zAMBOE.

TABULA LVIL




Ingua Bramannum *TSangada-Valli* convolvulus est priori pene similis, excepto quod folia sunt bifida, *fores* paulo minores, ut *6c fruBus: femina* pilis in totum villosa vel lanuginosa; ubi maturare in pilis spadiceo fusca, lenitie instar *Feluti*, sub pilis duro, offeoque cortice obdita. In aqua decodta fomentum exhibet quod dolores arthritici mitigantur. *Folia* cum *laBecoprarum* in potionem parataj pro *iasmorrhoidibus* propinantur.

TAB , 57.

A°. 1690. Convolvulum hunc in *Horto Medico* | *Cat. Hort. tugd. Bat. Ceylanenfibus Bstnhurn* |
 ex femine produxi & est *Convolvulus Maritimus* | *Lufitanis Fes Cap* dicTrus.*
Cejflamcus folio irafio, bijido, seu cordiformi. Herman.





B. J. ...
P. ...
...
...
...

BEL-AT)AMBOE.

T A B U L A LVIII.



Convolvulus nascens in petrosis ; radicularia albicantibus terras fesc affigens. [^]adix ruffa* intus nonnihil lignosa albicans, in longum excurrens, tortuosa, fibris vestita ; illius cortex saporis est subdulcis & subacris; odoris terrei. £*«/*/ rotundioli, virides, flexiles, frarum lignosi, albicante medulla. *Folia*, quorum petiolifulco ftriantur, ad exortum proveniunt radicularum, forma lati&obtusi cordis, circa petiolum angulato finu excifa* crassifolia, mollia, lenia₃ viroris in recla parte furdi, inadverfadilutions, *cojlis* crassisinftrucT:a₅nullius odoris vel saporis. *Flores* campaniformes sunt & 1 tellati; floribus *Adamboe* per quam fimiles j fed in totum candidi. *Stamina* in illis quinque furrecla > *apicibus* oblongis, candidis, furrecT:isdotata. *Stylus gemma* nodulatur Candida, rotunda & granulata. *Calyx* pentafolius est, tria illorum oblongiora sunt & virididiluta, duo minora & viridifufca. (*jrlobuli* in calyce confpiciuntur feminales > quorum vertex filamentocoronaturoblongo, tenui, ubi c[^]ruleo *iuiciy* ad calycem albicantes. *Semina* in illis tria vel quatuor triangulata, oblonga, superiori parte in cuspidem ftri&a* colons cinereofufci, intra pulpam unicum > parvum & rotundiolum recondentia nucleum, odoris 6c saporis fabacei. *Succus* cum oleo <£M.aro & *Zingibere* decodus[^] linimenturii pr[^]ftat, capiti inungendum₃ quo morfus rabidi canis irritus redditur.

T A B U L A 58.

Convolvulus MaUdrkusfolio rottmdiore ; crsffo , jioreundtde.



Pellaea L.

بزرگ چمنی نخل

Handwritten text in Urdu script.


T U L L b S C H O V A ' D ' l

T A B U L A L I X .



Ramannes dicunt *Arty-i* convolvulus super terram repens vel etiam arbores scandens. *Ifydx* brevis, rotunda, tenuis, aquosa, virididiluta, fibras numerosas barbatae à latere emittens. *Caules*, palmitum more super terra currentes, nullasque claviculas eji-
 ciente Si teneri sunt, duri, flexiles, pilosi, asperi, sub pilis virididiluti; pili ipsi longiusculi & subflavi, colo-
 nis *Xerampelini*. *Folia* etiam pilosa sunt, in sex, septem, vel etiam plura folia rotundo cuspidata incisa, omnia *Cola* media & lateralibus instructa, crassa, virididiluta, saporis & odoris sylvestris. *Flores* quorum petioli longiusculi, virididiluti pilosi & asperi, circa originem foliorum proveniunt, ex crassis, foliosis, virididilutis, & cyathiformibus *calycibus*, campaniformes, angusto collo, colonis candidi & nitentis, versus superiora crispati & corrugati, venis subtilioribus in longum striati, pilis rarissimis obfiti. *Stamina* in illis videntur quinque tenuia, recta, Candida, albis & furellis dotata *apicibus*. *Stylus* candidus est & longiusculus, in vertice *gemma* alba ornatus. *Calycis* folia angusta, hirsuta, viridia, inferius albicantia. *Semina* in gemmis continentur quatuor, quae gemmae tenuibus nervis in quatuor se dividunt latera; ipsa femina oblonga sunt, trigona, parum pilosa, primo albicantia, exinde fusca. *folia* cum *Tipere* trita & parti affectae imposita, omnem virulentiam, à morfu canis rabidi contrahentem, amovent; cum *butyro* trita apostemata resolvunt.

T A B U L A 59.



Typha - caelestis L.
typha - caelestis L.
سجورنا كراطلية

TSJURIA-CRANTI.

TABULA LI



Onyolvulus cujus *radix* albicans fibrosa & capillata. *Caules* tenues, intorti, virididiluti, nitentes, aquei, cymis inflexi, ex cymarum adverfa parte, caules ejicientes tenues, foliofos, virides; etiam & ipfifoliosi funt, una parte nonnihil fulcati, certo ab exortu intervallo, foliis veftiti, in mediofulcafce partis velut nervulo obfiti. *Folia* anguftiffima, oblonga, graminiformia > craffiola, in reda parte viridifufca, nervulotenuieminenteinftrudta, in adverfa viridi dilution & nitentia. *Flores* prodeunt in cauliculis oblongis, tortuofis, viridibus, qui cum cauliculis foliofis > ex cymis cauliumemicant, & fuperiori parte nodulis extuberant, ac fapius in nodulis in binos divaricantur pedunculos, & ad florum confinia nodulo craffiori turgefunt. Ipsi flores ftellamreferunt quinque cufpidalem, oblongo, angufto collo, in totum purpureo rubri, intus in foliis colon's purpurei fcarlatini venuftiffimi, odoris expertes. *Stamina* in illis quinque rubra, nitentia, rubris & oblique decumbentibus *apicibus*, candido, farinaceo rore afperfis, ornata, colli inferiori parti infer ta. *Stylus* albicans, in ferius viridis eft & craffiufculus, Candida & farinacea *gemma* inftrudta *Capfu* *Ufeminales* oblongorotundse, anterius in cufpidem obtufum ftrictum, tribus quatuorve futuris *ftriatis*, primum virididilutis, exinde rufis, *cufpidem* invertegerentes oblongum, primo viridem, poftea durum & rufum; membranaceis interfepimentis in tres quatuorve valvulas diftincte. *Semina* in principio albicant, ficca nigricant, oblonga, nonnihilangulata. *Thiltri* effluvia huic plants tribuunt incote. *Succus* ex foliis expreflus errhynum eft cephalalgiam fugans.

TABULA 60.

Tsjuria-Cranti Malabarienfis eft *Cuamocrito* five *rifon* in *HiJl.Oxohieif.* re & vocatur *Convolvulus tx-Jasmitum Americatum*. *Cltif.Car.Vofib.* fed pro *Jas-* *oticus atmtwjotiis Mytiofylli* feu *Uillefolii Aquatici*, *mini* fpecie haberi non poteft s atque ideo a *Mo-* *flone fanguinto*.

P. XI.

H h

SA-



1816

Handwritten botanical notes in cursive script, including the name 'Sida acuta'.

1816

SAMUDRA-STJOGAM.


TABULA LXI.



Convolvulus nascens in arenosis. Caulis rotundi, villosi, cinereoalbicantes, subvirides, tenues, sub villosa tunica viridifluri, intus lignosi & medulla infructi. Folia in petiolis ^{W J lde ? tur v a i d f} oblongis, rotundis, ^{ik- .-k Cra ^ \ , ! n t e u s f u l c o f t r i a d s ,} villosis, cinereoalbicantibus, subvulvulosis, Interque amp? a, Dblongâ, ncu sp, dem W a, formacordis, adpetiolum inu excisa, crassiuscula, valde mollia, intus glabra, viroris atun; madverfaparte, densa, cinereoargentea, tomentosa, pannum dices lanugmosum torculari compressum, tenera; cum latenbus mterioribus arte clausa & unita. Cofif madverfaparte em, nent, rebt_{am} ftriantes. Flora petiolorum vertia plures congregati & fastati infident, monopetali; campamformes, Uellati, interius fusce rubropurpura, mtentes, ad oras dilute rubescentes, extermsmeollout&calyce lanugine albicante, tomentosa vefhn, inferiusacalycetn oblongis, cuspidatis, candidis lanug.nofisrucc.ndb&obteaifolik *Stala* in iUisquinque oblonga, Candida, *afkibus* grandiusculis, oblongis, candidis, iulcatis dotara. Stylus duabus exornatur junctis 6cgranulatis *gemmaulis*. Calyx arctusest, cuius folia cuspidata & convoluta. Florum *Gemma* oblongaj, cuspidi^{^*} FruStus subrotundifunt, alifduobus, alii[^]fe | t u £ rantes latenbus, *cuspidem* in vertice gerentes; iramaturi *comcem* habent v[^]idifuscum, qui incisus copiosum & ardens exfudat lac; maturi aurancei colonis ad flavum vergentis, intus medulla carnofa, dulci, molli, ^{mi_ni_{me}} ladleainfruai. *Semtm* millistria in diitinfis loculis separata, triangulata, vindi flava, carne albicante & dura. Ufum non norunt Media.

TABULA 61.

Convolvulus nutxhnm Mahbtrievifis, folio villofo, floribus purpurascemibus.



Pimenta - willd L.

21505 500 ml

عشبة وريحان والي


CATTJ-FALLI

TABULA LXII



Convolvulus arbores scandens. *Caules* ro-
 tundij virides, lignosi, vetustiores cinerei.
Folia formam lati & obtusi cordis referunt >
 spissâ, viroris in redta parte faturi & nitentis^
 inadversa viridi diluti & cinerei, *costis* tana
 media quam lateralibus infruda ; ilia quas
 propius ad caulium confident fummitatem > inferioribus
 iensim minora & contra&iora evadunt. Flore & frudcu
 caret. Ex *foliis* balneum praparaturadverfusbtilyum
 6c malaciam. Ex *radice* cum *Curcuma* & *JerolaBis* trita
 linimentum conficitur, artuum dolores mitigans.





Mimus pudic L.
Passerina sp.
کله بنسویله کله

M A R E T c s f - I N z s f L I.

T A B U L A L X I I I .



Convolvulus arboribus se affigens. *Caules* rotundi, lignosi, geniculati, cinerei, languish. *Folia* plura congregata in oblongis proveniunt cauliculis, oblongo rotunda & angusta, antea cuspidata, valde crassa ac carnosae, plurimis filamentis pertexta, rigida, dura, in oris rugulis se crispantia, superficie plana & glabra, virens in reda parte fuscior ac fusca, in ad-versa clari, intus carne viridior & fuscior. *Colla* in ad-versa parte alte extuberat, in cuius tractu folia interiora in fulco sunt inserta, saporis amari. *Floribus* destituitur. *FruBus* in geniculis caulium proveniunt oblongo rotundi,* nodos referentes lignosos, rugosi, asperi. *Succus* cholera medetur.

T A B. 62. 63.

Descriptio harum plantarum imperfecta est, ita ut de illis nihil certi posse affirmare.





Mimulus

میمولس

PISTNU-CLANTl.

T A B U L A L X I V .



DUx hujusplant* funtſpecies, *Fiftnu-Clandi* & *Sendera-Clandi*. Prior planta humilis ell cumcauliculiſtransverſim ſuper terram diffuſa. *ſydix* tenuis eſt & re&a, in terram ſedemittens, fibris tenuibusveſlita, *cortice* mterius albicante, ſaporis ſubdulcis. Exillaperplures, valde tenues, rotundi, piloſi, lanuginofi ac vindes exeunt eaulieuli, eubitum plus minus longi, non *in* altum ſed in latum diffuſi. *Folia* valde prvaſunt&oblongo rotunda, craffiola, mollia, lenia, in utraqueparte lanuginofa, longis ac denſispilisobfita, jwroriscommunis, ſaporis iubdulcis. *CoſHula* in adverſa parte nonnibil emineñt. *Flores*, quorum petioli tenues lanuginofi, piloſi, vindes, longi, qui digitali à floribus intervallo, minutis & cuſpidatis funt veſtiti foliolis, ſupra)X. ongme foliorum proveniunt, monopetali, ſtella juinquecuſpidem ſignati, colonis in exteriori ſuperficie inter ſtell* cu/pides c^ruleo diluti, ad umbilicum in ſtella purpureorubicundi, in umbilico albicantes, exterius in iteſſae cuſpidibus ex purpureo albicantes. *Stamina* in *iUis* quinque *apicibus* breyibusdotata, cum quibus etiam quatuor vel quinque albicantia erumpunt filamenta. *?ahx* viridis, piloſus, in quinque foliola diviſus. *Gemma* in verticepilis albicantibus funt infrudte. *Flores* ipſi ſub veſperam ardiſſime clauduntur, adeo ut viſum pene fugeant; ^ſtivo tempore etiam ſecunda à meridie hora clauſos in venies. *Capſula feminales* parv# & rotund^ primo vindidilutas, dein flavefcentes. *Semina* pro numero angulorumquatuor, tria, vel etiam duo in veniuntur, nullis interſepimentis à ſe mutuo ſecluſa, trilateral, uno rotundo, duobusplains, depreJTa, flavayelruffa, maturarubroſufca. Tota h^cplantavegeti&haud injucundiefiodoris

prsecipue aquis impofita; tempore pluviolo maxim& reperitur? feftivo non nifi in locis umbrofis. Antifebrile eft cum *Cumino* deco&a; etiam pro extenuatione corporis & morbis chronicis exhibetur. Cum *laBe* aflumpta etiam calidas curat febres. *Oleo* in codla & capiti illita capillos promovet.

T A B U L A 64.

Minus genus eft *convolvulh*, a me vocatur *Convolvulus ind'uus minor*, *Alfwc folio*, *florcrubhundorfurfurcQ*





Thymus-herm. L.

1830 m.

جانبی کلاسیک

1830



SENT > ERd-CLANT > l

T A B U L A L X V .



¹ *Ecunda Clndi* species. *Radix* tenuis, fibrosa ? cortice rufo > albicante. *Caulicui* quinque angulati, glabri, non pilosi, viridi fuscescentes. *Folia* in utraque parte glabra sunt, oblongoangusta ? illis primae speciei longiora ? superiora versus lateribus magis deductis > semilunataj vel etiam duabus femilunulis tricornis excisa, ad petiolum duobus pedunculis, bicuspidalibus vel tricuspidalibus eminentia. *Flora* odoris expertes majores sunt illis primae speciei? monopetali, illam referentes quinque cuspidalesj alboflavescentes, ad umbilicum purpureo rubri. *Stamina* in illis quinque* furetaj albicantia, apicibus dotata. *Ctyfal** *Jeminales* cuspidatse, foliis *calycis* maxima parte comprehensas, ex vertice filamentum ejicientes tenue & albicans. *Semina* in illis passim reperiuntur quatuor, trigona? duobus planis* uno rotundo? costula? in medio extuberante, triantur; colorem referunt feminis *3(a)lurii*. Tempore pluvioso etiam quam maxime invenitur, *xtivo* non nisi in locis umbrosis. In decodio affumta antifebrile is. Cum *Zaccharo* ardorem jecoris reflexit. In pulverem redacta Sc cum aqua capiti illita, omnes fedat dolores. Trita & cum *Faccæ urina* epota omnes arthriticos dolores > praeimpedibusj mitigat.

T A B U L A 65.

Convolvulus Indkus minor, folis angulato, fite ex albo flavescente.

F I N I S ,

I N D E X.

*Trior numerus tabulam, pofteriorpagimm defigmt**

<p style="text-align: center;">A.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1;"> <p>Damboe. 56. 115</p> <p>Ambel. 26. 51</p> <p>Arega Ambel. 52</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">B.</p> <p>BalleL 52. 107</p> <p>Lei Adamboe. 58. 119</p> <p>Beiam CandaScliularmani. 37. 73</p> <p>DdaPola. 35. 69</p> <p>BelutcaPolaTali. 38. 75</p> <p>Bem Tamara. 31. 61</p> <p>Ben TiruTali. 54. 111</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">C.</p> <p>Cadenaco, feu, Katu Kapel. 41. 8j</p> <p>CarimGola.</p> <p>Cata Valli vcl Kadanaca. 3. 7</p> <p>Catulli Pola. 40. 79</p> <p>Catru Valli. <Sx. 127</p> <p>Cit Ambel. 47. n</p> <p>Cult Tamara. 4;. U</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">E.</p> <p>ElaPoJa. 36. 71</p> <p>ElettarL 45.6. 9</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">I.</p> <p>liifchi vd Infchi Kua. 12. 23</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">K.</p> <p>. adanacu vet Catavalla. 3. 7</p> <p>KapaTsjaka, 1.2. 1</p> <p>KarinPola. 23. 45</p> <p>KatouInfchiKua. 13. 2</p> <p>KatsjoulaKclengu. 41. si</p> <p>Katiu Kelengu, 51. lof</p> <p>Ka:u Llala. 43. 85</p> <p>Katu Kapel feu Cadenaco. 42.</p> <p>Katu Schena. 21. 41</p> <p>KoddaPail. 3*. 63</p> <p>Kua. 7. 13</p> <p>Korfca. 25. 49</p>	<p style="text-align: center;">M.</p> <p>Mala Infchi Kua. 14. 29</p> <p>MalanKua. 8. 17</p> <p>ManjaKua. 10. 19</p> <p>Manjt.lla Kua. 11. 21</p> <p>Marea Inali. 63. 129</p> <p>Mundi Valli. 50. 103</p> <p>Mulen Schena. 19. 37</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">N.</p> <p>NatuKih. 34. 65</p> <p>Nedtl Ambel. 28. 57</p> <p>Nelenfchena major, 20. 39</p> <p style="padding-left: 20px;">minor. 17. 33</p> <p>NirTjembu. 16. 33</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">O.</p> <p>Ottel Ambel. 46. 59</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">P.</p> <p>Pal Modeca. 49. 101</p> <p>PanaveraTjeraua. 33. 56</p> <p>Parua Kclengx 15. 31</p> <p>Pongati. 24. 47</p> <p>Pult Schovadi. 59. 121</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">S.</p> <p>Samudra Sjopam. 61. 125</p> <p>Schena. 18. 37</p> <p>Scliiovanna Adamboe. 57. 115</p> <p>SenderaKlinJi. 65. 133</p> <p>SjovannaPoUTali. 39. 77</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">T.</p> <p>TaU N:li. 55. 113</p> <p>Tamara. 30. 59</p> <p>Tjem Cumutu, 47. 97</p> <p>Tiru Tali. 53. 109</p> <p>Tsjana Kua. 8. 15</p> <p>Tsjeroea Cic Ambel. 29. 57</p> <p>Tsjuria Cranti. 60. 123</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">V.</p> <p>Va Embu. 48. 99</p> <p>Viflnu clandi. 64. 131</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">W.</p> <p>Well I la. 22. 43</p>
--	--

INDIAN BOTANIC GARDEN.
LIBRARY.

PROCESSED

ACQUISITION

CATALOGUING

CLASSIFICATION

DATE .. 18-8-64 .. DMK

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

531'iff? 5)

Call No. . . . mir7±Acc. N6.3M9.ff.·

Author..... *Rhede, H. Van.*.....

Title..... *Horti Indici matavarici*
Vol. II.

Name of Borrower/Code No,	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA