



Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA
CLASS NO.....
BOOK NO. FRI-4
ACC. NO. B-8697



4.267.
I-106



ICONES SELECTS
H Y M K N O M Y G E T U M
NONDUM DELINEATORUM.

SUB AUSPICIIS

REGIME ACADEMIC SCIENTIARUM
H O L M I E N S I S

EDITJE


AB

ELIA FRIES.

I.

HOLMJE,
P. A. NORSTEDT fc FILII.
MDCCLXVII.

7/18/81
11/11/81





Hymenomyces/ nobilissima Fungorum familia, frequentius adumbrati quam cujusque familiae stirpes, quum plurimi et praecipue carpsu ita conservari ntiqueant, ut accuratori pxamini inserviant. Icones igitur ad fidam determinationem necessariae, at dolendum harum editor es sine discrimine quas-cumque sibi obvias species et hinc in, gBnere vulgatissimas MIDIO et triviales iterum iterumque ad nauseam depinxisse. Restat vero longe melior pars specierum nobilissimarum, quaru nullsB exstant icDies; permultse harum sistunt typos uinnino peculiare, quibus nil simile, nee affine cognitu sit. Harum icones ad plenioreiii fungDrum cognitionem eo magis necessarias duco, quum multse in silvarum primsevarum pénétralibus lateant, quae non omnibus licet adire.

Per ultima decennia omnes mihi obviae Hymenomycetum species, sumtu Reg. AcademiaB Scientiarum Holmiensis, artificiose depicts, ut in Musaeo ejusdem jam servantur ultra 15D0 tabula3 in folio imperiali, Integrain hanc collectionem Ldere temerariuin crit periculum. Jam vero editi sunt *Fungi txculenti et venenati Sueciae* (Sverigesatliga och gifti^ Svampar t. 1—93), inter quos plures novi nondum depicti exstant v. c. ex Hydni3 *H. Icevigatum, fragilef politum, corrugatum,*

HYDNORUM genus, inaxiine insigne, a riliquis Hymenomyutibns facillime dignoscitur hymenio infero aculeato, aculeis liberis, a?qualibus, subulatis, terrain spectaiitibus. Sporophora tetraspora, sporis simplicibus, subglobDSD-ovalibus. Quum hae haud palpabiles offerant differentias, ad singulam speciem repetere haud necessarium duximus. — [JiiDad aculeorum form am oinnino congruunt *Mucronice* (typo *Hydno calvo* Alb. et Schw.), sed in his receptaculum nullum et aculei, ceterum definite terrain spiiictantes, sporophoris monosporis instructi sunt.

Species Hydnorum reliquorum generum centralium (Agaricorum, Polyporum etc.) numero longe inferiores sunt, sed

dive7sidens, et melior data figura *Hydn. cirrhati*. Hoc opere absolute, insigne crederem MyroldgisB incrementum, si mihi concessum erit sine nimio dispendio edere species selectas, nondum vel male delineatas — et tainquam specimen pra?beo hunc fasciculum reliqua Hydna insigniora adumbrantem, quem *Botanicorum* et in specie *Myvologorum, Bibliothecariorum* et *McBcenatum* favori commendo. Hoc Dpus sistit supplementum ad omnes hactenus editas Iconographias Fungorum.

Omnes nDstrac icones ad specimina vegeta, jove udo CDIlecta, delineata? sunt. Specimina jove si ceo obvia, pra^cipue hygrophanorum, ita mutantur, ut vix recognoscantur, quales plurimse editae Oortinariorum inones. Singuli fasciculi continebunt ID tabulas et in eadem, ubi spatium superest, plures species, ita vero ut species affines juxta se invicem collocentur omnesque ejusdem generis vel tribus in eodem fasciculo.

Usus Hymenomycetum in cibariis maximi momenti et per ultima lustra in Suecia admodum increbuit. Alimentum prtebent sapidum, salubre et eximie nutriens. E variis speciebus coquitur panis, jusculum deliciosum et variae saginn¹. Db has rationes speramus fore ut hoc tempore vulgo neglectuin Hymenoinycetuuin sturlium brevi reviviscat.

lungius inter se distant. Varia3 species diversissimas induunt formas et substantia variat carnosae, fibrosolenta, spongiosa, suberDsa, coriacea — immo gelatinosa, nisi species gelatinosas (*Tremellodon* 1. cDrrectius *Palmellodon*) genere movers inalle.s. Plures species, eaeque nobilissima?, admodum rari et sporadice sunt; Suecia vero nobilissimarum specierum numero excellit. Ex his hac vice offero species quasdain selectas; reliquorum generum Hydnceorum, quae siccatae facile congeriantilr, pro tempore seponens. Deteruin in opere nostro: *Sveriges diliga deli giftiga Svampar* plures valde insignes species jam delineate exstant.

I. HYDNUM VEKÆIPELLK

(*Mesopus.*)

Vet. Akad. Förhändl. 1861 p. 31. Monogr. Hymen. II. p. 274.

Diagn. Darnosuiiii; pileo inaequali, vupando, laevi, glabro 1. in fibrillas squamulosas adpressas lacerato, rufo-ferrugineo, stipiti3 carncque pallidioribus; aculeis aequalibus, fusco-ferrugineis.

In pinetis UplanditE pluries lectum. Esculentum.

Species maxime mutabilis tam quoad staturam, quam pilei cuticulara. Dptime explicatum caespitose-connatum vel ramdsurn more PolypDi cristati, sed occurrunt simul individua simplicia et magis regularia. Stipites firmi, haud admodum crassi, inaequales, glabri, pileo pallidiores. Pilei carnosissimi, cDnvexi, margine inflexD, ceterum inaequales, repandi, 2—3 uric, lati, primo laevigati et glabri, at vulgo in fibrillas squamulosas secidententes. Exstat vero forma simplex, magis regularis, et cuticula ssepe integra persistit. Color ferruginus, immo rufescens, passim simul fuscescens. Caro concolor, at pal-

lidior, firma; ob stipites concrecentes intus passim lacunosa. Aculei in stipitem decurrentes, breves, subulati, inaequales, pileo concolores at primo pallidiores, demum fuscD-ferruginei.

Affinitate naturali proxime accedit ad *H. subsquamosum* BATSCH EL f. 43, Pers. Mj^c. Eur. t. 21 nee nDn icon nostra in Mus. Acad. Holm., sed color rufescens, pileo primitus glabro, dein fibrilloso-secedente etc. facile distinctum. In *H. subsquamoso* DjSimplici et magis regulari, color lutescens, carnis albo-lutescens et squarnie pilei superficiales secedentes. Ex eorum fuerere quoque sunt *H. Ivegatum* SWAKTZ, FRIES Sveriq. dtliga Svartipar t. 81 et *H. fragile* FRIES l. C. t. 89, at variis notis abunde diversa.

Tab. I sistit formam op time explicatam stipite ramoso, pileo fibrilloso-lacerato. FormoB simplices et pileo levigate simul cleptic exstant in Mus. Acad. Sc. Holmiensis, ijuas vero h. l. negligere co^imur, nu tabulnrum nimilL-rus multiplicetur.

II. HYDNUM MDLLE.

(*Mesopus.*)

Vet. Akad. Förhändl. 1851 p. 53. llymmom. Suec. II. p. 274.

Diagn. Simplex; pileo carnosissimo, inolli, unvuxo, umbilicatD, tomentDSo, albo-canescens, stipite curto, firmD, glabrD aculeisque in stipitem deurrentibus subulatis tequalibus albidis.

In pinetis U plan dire hinc inde at semper solitarie nallis. Idem in Vestrogotia Observavit def. LINDGREN.

Ab omnibus numerosis Hydni stipitatis in Svecia obviis reedit pileo tactu niDlissiino Db tomentum densum intertextum, quo pileus obductus. Stipes uniriim longus et EEque fere crassus, oequalis, glaber, albus. Pileus formam habet potissimum Paxilli, junior convexus, disco profunde umbilicato, demum vero explanatus, ssepe repandus, 3 unc. circiter latus, tomento denso intertextD contiguo ^nullo inodo squamoso) obductus, pallescenti-albus. Aculei pileo coucolores, subulati, haud decolorantes.

Quoad affinitatem naturalem proxime accedit ad *Hydnum scabrosurn* FK. indumentD pilei dense et longe tomentoso; in *H. scabroso* autem pili non intricati, sed stricti et fasci-

culati, unde pileus covqjriectus, squamosus. Hujus quoque icon in Mus. Ac. Sc. Holm, servatur, sed hoc loco recipere snperfluum duxi, cum *H. striatum* Schaeff. hujus habitum et uha-cteres bene exhibeat, licet suberosuui dicatur et nomen absurdum. Hoc loco observare liceat fungDS Schaefferi ad icones descriptos, unde fungi squamDsi et fibrillosi striati dicuntur v. c. *Agar. striatus*, *Hydn. striatum*. E synonymi^8 porro falsis *Polyp arum confluent em* (Boletum aurantiacum Schaeff.) dixit induratum et arboreum. Hoc intellectD perspeximus, contra textum, Schaefferi tab. 225 sistere statum incample turn *Ag. corticati*, licet desit velum et stati terrestris dicta.

Hydni mollis oppositum est nobDilissiiniun *H. politum* FRIES Sverig. atliga Svampar t. 90 pileo firmo glaberrimo nitido fulvo-ferrugineo, aculeis circa stipitem circulum nuduin relinquentibus.

Tab. 2. figura 1. siatit fuii^um uu^m], naturali.

III. HYDNUM TORITLDSUM.

[*Mesopus.*]

K. Vet. Ak. Förhandl. 1851 p. 53. Monogr. Hym. Suec. II. p. 275.

Diagn. Tenax, pileo carnoso-fibroso, convexo, umbilicato, radiato-rugoso, glabro stipiteque elongato toruloso rigido glabro griseis, aculeis curtis albis.

In pinetis circa Upsaliam, eertis annis, plurics lectuni.

Hydnum torulosum ad longe alium typum quam praecipue illic spectat; contextu carnosissimo-fibrilloso, lento. Stipites 3 unc. et ultra longi, 1 unc. crassi, aequales, sed torulosi, quasi e pluribus coaliti vel ad ramificationem tendentes, valde tenaces et extus polito, dilute cinerici. Pileus semper parvus, unciali vix excedens, non villosus, sed jugis e centro radiatibus inaequalibus, griseus. Aculei parum decurrentes, tenues

et breves. Variat stipite polycephalo, sine dubio e pluribus conascantibus.

Proxime accedit ad *H. fusipes* Pers. Myc. Eur. t. 2D f. 4, 6 (cujus novae optima icon deposita in Mus. Holm.)₃ sed statura, colore etc. abunde diversum. Hec duo unicum // *infundibulo* Sw. peculiarem sistunt tribus pileo carnosissimo-fibroso, lento tenacique. *Hydnum gradle* FR. concolor recedit carne fibrosa, aculeis ex albo rubellis et statura.

Tab. 2. figura inferior sistit speciem diffinitivam typicam.

IV. HYDNUM FULIGINEO-ALBUM.

[*Mesopus.*]

SCHMIDT Jfyc. Jfyt. T. j>. Hft. VIULS *Sy*t. Myc. I. p. 400 Epivr. p. 500.

Diagn. Gregarium, pileo carnosissimo, subrepando, rubello-fuscescente, disco subsquamuloso, carne alba, fracta carnea, stipite firmo squamuloso cinereo-fuligineo, aculeis ex albo rubellis.

In pinetis Saxoniarum primus detexit def. SCHMIDT; dein per plures annos legitur ad Kungshamn prope Upsaliam, ubi vero nuperius frustra quaesivi. In Nassovia legit D. FÜCKEL, qui typum icone cominunicavit.

Eximia species *H. repando* proxime affinis, et ad ejus typum variabilis; nunc repandum, difforme (ex SCHMIDT etiam lobatum), nunc satis regulare, rarissime concretescens. Stipes

firinus, 2 unc. circiter longus, e squamulis scaber, e cinerico fuligineus. Pileus pro ratione tenuis, 2—3 unc. latus, disco tunc plurimum squamulosus. Dolor ex SCHMIDT albus, versus marginem in roseum l. fuscescentem vergens et junior verrucis rubellis secedentibus in disco adpersus. Equidem verum legitur undique fuscescente-rubellum, disco squamulosum. Caro alba, fracta rubella characterem essentialem praebet. Aculei subulati, breves, aequales, in stipitem leviter decurrentes.

Tab. 3. fig. super, formam magis regularem sistit.

V. HYDNUM MIRABILE.

(Mesons.)

FRIES Monogv. p. 341.

Diagn. Pileus obconicus, hirtus, alutaccus, inferne una cum stipite suberDSo-lignosuini, superne vero tectus strato crassiori heterDgeneo e fibris erectis stipatis, aculeis tenuibus, requalims₇ ex albo flavidis.

In pinetis locis sabulosis OstrogDtirc detexit fungorum oculatissimus observator H. VON POST.

Inter multa mirabilia, quae Suecia? silvre primtevse ex Hydnum grege offerunt, hoc principem facile tenet locum. Statura et forma quid em *Fl. Dan. t. 1374* (H. coeruleuin), sed pileus constat e duobus stratis, quorum inferius cum stipite contiguum et similars, lignDSo-suberosuini; superius vero et crassius, distincte ab inferiori liinitatum, formatur e fibris strigosis, erectis dcnssissime stipatis, e quorum apicibus emergentibus superficies hi.spida. Analogam slructuram tanturn vidi

in tropicis *Polyporis fitnalibits*, at in his minus compacta, et in Suecico *Polyp or o circinato*, in quo vero stratum superius B tomento intertexto inolli. Stipes lignosus, curtus, vix micialis, ilrorsum attenuatus, cum pileo obconicus et superne dilatatus in stratum inferius pilei, extus intiisqus flavidum, pallescens, qualis color in nullo Hydno suberoso visus. Pileus superne CDiivexo-planus, hirtus, sericeo-nitens, 2 uric, circitei latus, alutaceus, subtus late obconicus et tectus aculeis tunibus, lequalibus, brevioribus, ex albo flavidis, demum fuseescentibus. " Stratum superius JDve udo spongioso-bibuluin, et compressum fundit liquorem aqueum flavidum, ut *H. ferru-fineum sanguiniuin*.

Tab. 3. f. 2. si-tit funguin magnitudine nnturni.

VI. HYDNUM FERRUG-INEUM.

(Mesopus.)

FRIES. 0*. My. I. p. 133. Sys. My.p. 403 IBM1. ^ EUn*. T.13L Epicr. p. 30*. W«a*. Bo». p. 355.
H. cnrbunculus. Secret. If eh. JTL v. 9.

Diagn. SpongiDSo-suberosuini; pileo molli, primo tomento albido in scrobibus guttas sanguineas sudante oblecto, dein lajviori suberD^o ferrugineo, intus concolori azono; stipite ina.¹ quali aculeisque fusco-ferrugineis.

In pinetis Europse me disc et borcalis hand raro; frequens in Suecia, porro in Russia, Germania, Helvetia et forsan Gallia.

Gregarium at non confluens. Stipes firmus, li—3 unc. longus, inroqualis, fuseo-ferruginBUS, intus CDncolor. Pileus obconicus l. adultior explanatus, immo depressus, 1—4 unc. latus, compactus, sed junior spongibsD-mollis, liquors sanguineo scatens, ut compressus aquam sanguineam fundat et in optimo vigore guttis sanguincis variegetur; adultior vero suberosus, exsuccus, extus intusque ferrugineus; junior sc<lepe tomento albido involutus. Aculei subulati, sequalea,

fiisco-ferruinei. Ex obs. \Jahlenbergii subinde stratose reviviscit.

Proxime affinis *H. aurantiaco* ALB. et SCHWEIN., sed nb omnibus Mesopodibus differt substantia junioris spongiosoniDlli, liquore sanguineo referta. Hujus speciei dedimus icoilein₇ licet hue spectare videantur *Bull. t. 409* et *Krombh. t. 50 j. 10, 11*, cum neutra characteristica sit. *R_m stviatwn* SCILEFF., quod prsesens sat refert, vix dubie ad *H. scabroisum* referen-
(luin, licet suberosum didtum, ut jam supra indicavii«U5.

Hydni compacti, valet? polymorphi, varias dabimus formas in supplement!), cum nullrf adsit bona et characteristica *ivou*.

mb. 4. sistit funguin lptiine vigentem.

VII. HYDNUM SCRDBIGULATUM.

(Afesopus.)

Fries Obs. Myc. L. pag. 143. Epicr. p. 503. Weinm. Ross. p. 356. Seer. Illev. III. n. 17.
H. cyathiforme. Bull. — FT. Syst. I. p. 405 vnr. minor. — nou AUDIUIH.

Diagn. Ferragineuni, suberoso-coriaceum, pileo B clavato plano-infundibuliformi pubescente, disco scrobiculato-squamoso, intus subzonato, stipite brevissimD, nudo, aculeis brevissimis.

In pinetis ut videtur Europae totius, at minus frequens.

Gregarium, srce concrescens, undique ferrugineuin. Stipes rigidus, i unc. 1. parum ultra kngus, 3—4 lin. rrsus, squalis (nee basi incrassatus), glaber, strpe radicans. Pileus suberosD-eoriaceus, tenax, plano-infuidibuliformis, 1—2 unc. latus et ultra, subrepandus, non 1. obsolete zonatus, rufo-ferrugineus, siccitate stcpe expallens, intus cDiicolor, obsolete zonatus. Aculei leviter decurrentes, tenues, fragiles, pileD concolorcs et demum fuscetentes.

Exstat *varietas* minor, pileo cyathiformi vix unciali, primu clavato. Hanc exhibet Bulliardii iigura, quare novam forma¹ typicae et bene explicate dare necesse duximus. Nomen *H. cyathiformis* omnino ineptum, primitus et meliori jure ad *H. tomentosum* aliasque species relatum, ut varietati tantum servari pDSsit.

Summa adest affinitas cum *H. zonato*, cujus bDir.iiiL iiguram dedit BATSCH (EL f. 224; inutuata in NEES Syst. f. 242); hoc vero recedit pileo tenuiori, magis aequali, distincte zonato, glabro, margine subtus sterili nee non IOCD natali in silvi* frondosis.

Tab. 5. f. 1. «istij optime explicatam fDnum. Yar. *cyathiformem* Aitlens apul BULL. I. c.

VIII. HYDNUM NIGRUM.

(Jfesojnis.)

Fries Obs. Myc. f. p. 134. Syst. Myc. I p. 404. Epicr. p. 509. Weinm. Boss. p. 350. Seer. Ilriv. III. n. 15.
• f* H. rinertjum. Pers. Myc. Eur. II. p. 168.

Diagn. SuberDso-rigidum, concrescens; pileD inaequali, tDincntoso/ azono, cceruleo-nigro, intus stipiteque valido atris, margine nculeisque albis.

In silvis acerosis, prswcipic abiegnis, Europa? ut videtur tdtius; in Suecia haud raruin.

Dyespitosuini, raro sparsum, varie concrescgns, in gen ere uulla forma constans, sed colore interno atro azono ab omnibus diversum. Stipes rigidus, unc. longus, sed basi vulgo incrassata producta saepe radicans, inaequalis, niger, basi tomentosus, intus concolor. Pilejis suberosus, junior clavseformis, dein turbiniitus, demum explanatus, plano-depressns, e variis eon-

crescentibus difforinis, tuberculosus, tomentDSUs, ciEruleo-niger, azonus, sed in optime vigore margins albo. Aculei subulati, tenues, breviores, albi, demum cinerascetes. *Inodoruw.*

Jove siccissimo pileus einerascit et hunc recedentem statum, quem plurimi specie distinguunt, sistit *Hydnum suberosum cinereum* BATSCH. Def. SWARTZ cum *H. suaveolente* sul nomine *H. pulli* jungebat. PERSDON *H. cinereum* dixit, at longe diversum ab *H. cineveo* BULL.

Tab. 5. f. 2 Funguin mangitinline naturuli et cDbribus typicis status vegeti exhibet.

IX. HYDNUM GRAVEULENS.

(*Mesopus.*)

Deltist.! in litt. — *Fries Epicr. p. 503. BtrkL Brit. p. 25H.*

Hydn. leptopus y. *Pers. Myc. Eur. J. p. 171.*

II. fusnum, fottLuis. *Seer. Hdv. III. n. 14.*

Ulagm. Ilraveolens, pileu curiaceD tenui molli, azono, rugciso, glabro, nigro-fusco, intus fusco; stipite gracili, oequali, glabro, fusco-nigro, aculeis decurrentibus brevibus cineruscen-tibus.

In silvis, praecipue frondosis, rarius. Lectum circa Upsa-liam in Suecia, prope Dhristianiam Norvegiae, in Valeria An-ajlite, prope Viennam in (fallia, nee non in Helvetia.

Colore ad *H. nigrum*, sed vegetatione et pileo tenui ad *H. mdaleucutn* accedit, sed praster alias notas in vivo odore forti Meliloti, vel c *Delastre* Apii, a reliquis inodoris mox dignoscitur. — Raro sparsum, vulgo dense gregarium vel caespitosum, at pilei non vicinDrum more concreseciites. Sti-pes tenax, admoduin gracilis, uncialis l. parum ultra, vix line-

am crassus, ^qualis, glaber, irmmo politus, fusco-ater. Pileus fere papyraceus, infundibuliformis, insBijualis, uncialis et ultra, glaber, unicDlor vel margins albo. Daro concolor, sed pallidior. Aculei decurrentes, tenues, breves, cinerasiientes.

In speciminibus a me vivis observatis, e quibus icon data, pileus unicolor, qualis hoc loco delineatus (etiam PersDon unicolorem describit), sec. alios vero margo albus. In nostro insuper aculei primo albi. Hse vero differentiae videntur minoris momenti et forsitan ex a3tate pendeant. — Affinis *H. melaleuci* icon optima exstat in *SCUJREF. t. 272.*

Tab. S. fig. super, furmiuu circa Upsilium Luctam uxhibet.

X. HYDNUM MULTIPLEX.

(*Pleuropus.*)

Fries in Vet. Alad. Fortlandl. 1852 p. 54. Monoyv. Hymenom. II. p. 277.

JJiatjn. Pleuropus, pileis coriaceis, nuincrusissiiii.s, iinbri-riito-coiicrescentibus, velutinis, fusciscentibus, stipite laterali, jiculeis confertis subtilibus plumbeis.

Ad truncos vetustos arboruin in silva Nosten hand procul lib Upsalia cDpiose lectum.

Nulla exstat species descripta, cum qua coinparetur. Pilei coriacei, tenaces, numerDsissimi, spathulatD-cuneati, lj unc. longi, vix lineain crassi, dense imbricati et in pileum compositum, flabelliformein connati, postice in stipitein com-munein horizontalem fusiformem, A unc. et ultra producti, radiato-striati, velutini, azoni, fusciscentes, subspadicei. Caro eoriacea, tenuis, flexilis, fusciscens. Integer caespes 3 unc. Intus, rcniformis. Margo acutus, primo albicans, dein CDIIcolor.

Aculei subtiles, brevis, CDnfertissinii, primo albido-cinerei, liiox spadicei.

A reliquis Pleuropodis stipite horizontali longe distat et vegetandi modo propius ad *H. apoda* accedit, inter quas tarn en nulla rite cognita affinis species. Apud Micheliuin vero delineantur plures species apodae, coriaceaj, quas a recen-tioribus iterum haud lectas doleo. Harum inv estimation em mycologis Italicis maxime commendo. Hydnum apodoruni sectiD Dmnino artificialis est et character artificialis co^it species a se invicem longe distantes.

Tab. li. figg. inferiores sistunt caespites JJydn. imdt;2>Uci*.

XI. HYDNOCM DAPUT URSI.

(Merisma.)

Fried Alunoyr. Hymen. tSuec. II. p. 278.

Diagn. Darnosum, tuberculifonne, iiiiinarginatuni, pendulum, in ambitu undique solutum in ramos rainulosos, in aculeos deflexos, subulatos abeuntes.

In truncis vctustis ad Tvetaberg Suderinaiiinae legit def- DL. TAMM.

Portentum mirabile, inter *H. Coralloides* et *H. Cajmt Medusa* quasi medium, sed ab omnibus aculeis rauiDsis diversum. Tuberculuin sistit pendulum, hinc basi angustatum, capitis magnitudine, colore intus forisque albo. Intus carnDsuin, soliduin, simile, nee intus cancelkitum. Pars htec solida, *H. ErinacBum* in memoriain revocans, spithamam fere lon pa, 3 unc. et ultra crassa, maximam part em fungi sistit; in ambitu vero soluta est in rainos ramulosDS, ultimis *H. corolloidis* haud absimiles, sed breves unciales deflexos in aculeos omnes terrain spectantes, *H. Ej-inacei* multo breviores nee simplifies ut in *H. coralloidi*. Pagina superior in hoc non

sterilescit, instar *H. Erinacei*. Dontextus floccosus, mollis, elasticus, sed tenax et aridus, ut fungum vix esculentum fingerem.

Dubin in illud, utpote recentius iterum haud repertum, *H. Ramaria* cum hoc videtur prDxime affine, vix tamen crediderim prioris sistere formam depauperatam. In utroque tamen ramuli ipsi in aculeos abeunt. In *Hydno Ramaria* deest corpus carnosum, ut, nisi aculei constanter terrain spectar ent, ad *Clavarias* pertineret.

Hydnum Erinaceus maxime pDlymorphum (Cfr. *S. Myc.*) ab utroque maxime differt. Speciosissima hujus forina r^Drdi-formis, pendula in truncis adhuc stantibus nascitur. Ad truiicosverD prostrates format tubercula minora, hemispha3rica; aculei verD semper terrain spectant.

Tab. 7. sistit specimen ilisscctum n Interc visum. In MnsajD HDliniensi siinul sprvatiiir icon tuberculi integ-ri »ai\ farc», ijunin VBFD, ne tabu lie multiplicentur, exclusimus.

Tab. XII. HYDNUM GEOGENIUM.

(Apus.)

Fries in *Vet AkacL Förh* 1852 p. 131. *Monogr. Hymenom.* p. 279, 349.

Hydnum sulfureum. *Kalkbrenner!*

Hydn. terrestre, sessile, luteum, villosuin, aculeis brevibus. *Fil Syst. Myz. L p. 415* inter inquir.

Diagn. Imbricato-multiplex, CDiicrescens, c sulfureD-fuscens; pileis carnosD-fibrosis, leritis, inseijuabilibus, villosis, nuculeis brevissimis acutis inte^ris.

Prima vice legi in par. Fryeled Smolandice (181S), at, tain p am in evolutuin, ut paucis tantum, supra citatis verbis in *Syst. Myc.* ut intjuirendum notaveriin, dein copiose margines fossarum glareosos late incrustans, pileis reflexis, Upsaliae lectum. Nuperius quoque ad Rej-myra DstrogDtite optime explicatum dctestit felicissimus fungorui indagator VDN POST. In Fennia ad Mustiala Dr. KAHSTEN. Tandemque in Carpathis legit amic. KALKBRENNER.

Species maxime insignis et prtecipue forma adeo varia-Djilis, ut diversa specimina ad Pleuropoda vel, plurimis pileis in c[espitum] integrum concrenentibus, ad Mesopoda fiuvile referres. In statu typico tamen ad Apoda p[er]tinet et nffusu-rRfiexiini Thelephoram terrestrem et laciniatam in memoriain revoiiit. M^celiim floccosum luete sulfureuin, terrain

perreptans. Pilei numerosissimi, reflexi, multifariam et prtecipue longitudinaliter CDiicrescentes, unde pagina superior colliculosa et inferior profunde lacunoso-sulcata, valde ineequabilis; superne villosi. Ceespites format amorphos, varia^ amplitudinis, pileolis imbricatis, subinde stipitato-porrectis, imino stipite centrali instructis, ut in figura a v. Post pi eta. Dolor fungi junioris laete sulfureus, adulti verD et exsiccati fuscenscit, Contextus fibrosus, sat crassus (3^4 lin.) sulfureus, in siccis virescit. Aculei conferti, tenucs, aciculares, brevissimi, integri, marginales papilla^forines. Pilei margo obtusiusculus, numquam inflexus. Non edule!

Neque affinis nee secunda species hactenus innotuit. Michelius SDIUS notat speciem terrestrem, colors obscurD et aculeis longis recedentem. E textura tamen juxta *H. scptentriDiiale* collocandum, nee ad Mesopoda vel Pleuropoda ex speciminibus pseudo-stipitatis. Inter Hydna Apoda plures species etiam substipitatac occurrunt v. c. *Hydnum gdatinosum* (ad terrain in silvis circa Upsaliain IIDC ssrpe eximie pleuropodum) et *H. diversidms* Sv. iVil. Svainp. t. S3 B.

Tab. 8. Fungum mgnitiLinE natumli nxlitbet.

XIII. HYDNUM SEPTENTRIONALE.

(Apus.)

Syst. MFC. I. p. 414. Schlecht. Linn. V. p. 231. Epicr. p. 513.
Vir. Aortense. ff. cōvintum ft y. JFh'ran. Eoss. p. 3f)2.

Uagn. Ljarnoso-fibrosū, lentū, pallescens; pileis innumeris, dimidiatis, planis, scalaribus, villaso-inaequabilibus, posticB in corpus crassum, subcarnosum coalitis, raarginibus strictis, acutis, integris; aculeis confertissimis, gracilibus, requilibus, albidis.

Grigantea hæc species, maxima generis, prinid in Suecia media a p. d. SWARTZ lecta et me cum sine nomine communicata; dein a me ipso ad truncos stantes in fagetis Sinolandæ lecta, porro in Ulmis adhuc vivis horti botanici Upsaliensis, ibidemque in truncis cavis var. *hortensis*, eademque in horto Pawlowskiensi def. WEINMANN.

Portentum mirabile, rite explicatuū capitū magnitudine, seil pilei in pricente plures imbricati quam in ullo aliofungD, Daespites densissimi, 1—3-pedales, pileis scalaribus in corpus crassum solidum, basi plana truncis adnatum vel cuneata intrans, coalitis. Pileus singulus 2—B unc. latus, utrinque planus, unciā hand crassus, sup. erne azonus, imi3quabilis, subnudus, sed exsiccano fit villosulus. Daro camDSD-coriacea, fibrosa, lehta, aquosa tainen, indurescens, alba, zonis concentricis concolDribus. Color albus l. pallescenti-albus, exsicca-

tione lutescens, exoletus fuscus, villo obductus. Margo strictus, rlcutus, integer, tactus sicpe nigrescit ut in Polyporo adusto. Aculei cDnfertissimi, graciles, maxime aequales, 3—5 lin. longi, marginales vero papillscformes. Ex cochīn mycelio per plures annDs reviviscit.

Varietas *hortensis* multo minus explicata, effuso-reflexa, pileis paucis tenuioribus, ut e forma diversam speciein facile fing-eres, sed contextu, colore reliquisque characteribus cum typo convenit.

Nulla adest species, cui rite affinis; ab omnibus Ajfodis hactenus cognitis differt came subcoriaceo-fibrosa. At vegetationis modo imbricato-concrescente satis refert hand minus mirabile *H. cvrrugatum*, cujus itionem dediinus in *Sveriges iitliga Svampar t. 16* (Fungis esculentis Sueciaj), sed hoc cariDSD-floccosum, friabile (nee lentum), iinmarginatuū, esculentum, cum *H. septentrionale* ob contextum subcoriaceum rmanducari nequeat.

Tub. 9 intugi-un sistit crespitum mngitudiūB natuvali, t. ID. ii^ura superior pileum solitariū lit pngimim inferiorein univ cum aculī?is.

XIV. HYDNUM FULGENS.

(Apus.)

Fries Vet. Ak. Forh. 1852 p. 130. Monogr. Hymen. 11. p. 278.

Diagn. AurantiD-fulvum, pileD dimidiato sessili, spongiosocarnbso, mollissimo, flabelliformi-expanso, undulato lobatoque librilloso-hispido, aculeis confertis compressis acutissimis incisis.

Nobilissimus hie fungus lectus ad truncDs vetustos in monte Dmberg Ostrogotioe, unde specimina recentia attulit C. A. HOLMGREN.

Colore splendido et carne spongioso-fibrosa, in siccis fidinodum fragili, maxime insigne. Pileus dimidiato-sessilis, sed postice porrectus, angustatus, pendulus, sursum dilatatus, undulatus lobatusque, vulgo e pileis 2—4 imbricatis connatisque compositus, 2 unc. longus, sup.erne undique fibrillis versus ambitum atpressis, mollibus, tenuissimis hispidulus; inargine tenui incurvo integro, nee instar *H. cirrhati* fiinbriato. Uaro adradum tenuis, spongioso-uda, sicca fragilis. Aculei admōdum conferti, graciles, 2 lin. longi, omnino discreti,

cDmpressi, apiceque in dentes acutissimos incisi concolores, sed pallidiores et in statu juniori forsan albid.

Etiā hoc species nulli alii hactenus dBscriptoe rite affinis. Quoad substantiam cum *Polyporo hispido* L potius *P. cuticulari* in statu juniori potissimum comparanda. Inter Hydna praebet analogiam quandem cum *H. cirrhato* (cujus optimam figuram exhibet *Sv. iitl. Svampar t. 63*), quod vero carnosum, esculentum, fibris pilei compositis, margine fiinbriato longe recedit. // *fulgens* haud esculentum. Multo magis convenit cum speciebus Americanis, nempe *H. pulcherrimo* BERKL. et CURTIS et praecipue *H. friabili* FRIES NOV. Synb. Slyc. p. 70, at plurimis notis abunde diversum. Praecipue in sione est aculeDrum forma, quibus ad genera Sistotrema et Trpiceni quodammodo accedit, sed aculei semper discreti nnlb scamno conjuncti.

Tub. 10. figiū inferior intDgrum fungum inngitmiūB natuvali L-xlibit.

ATLANTICUS.

Yastissimum regni vegetabilis genus, at siinul speciebus
 •ute limitatis insigne. Ab hoc genere hactenus tantum se-
 pavare licuit greges quasdam naturales, primo obtutu facile
 discernendas v. c. Doprinos, Lactarios, Russulas, Lentinos
 s. p. [L]OB sub Agarico restant species in subgenera
 vere naturalia dispositae sunt. Characterem primi ordinis
 •offerunt sporse ut inter Algas, inter quas non genera modo,
 seil families distinguunt. Secundi tantum ordinis characters
 praebet velum saepe vero obsoletum et praximas species se-
 ^rfr*Jhis. Veli variae formae sunt: velum volvaceum, annu-
 latum, araneosum (*Cortina*), squamosum, fibrosum (pileo ad-
 natum ut in *Inocybis*), pulverulentum, viscosum.

AMANITA.

Hoc subgenus inter Agaricos Leucosporos principem te-
 net locum. Facile dignoscitur VBID duplici: universal! \volv(tj
 a pilei cuticula discreta et partiali [*annulo*) vulgo supero.
 In speciebus volva circumscissa hęc basi vulgo oblitteratui¹
 et pars superior in verrucas supra pileum irriditur. Sed in
 ultima sectione volva tam tenuis et floccosa, ut in fungo
 evoluta plane dispareat, quare hujus species ad *Lepiota* olim
 relata?, a quibus tamen recedunt pileo a velp universali hauri
 incrustato. Hujus exemplum praebet *Ag. lenticularis*.

Amanitae ob staturam speciosam ex maxima parte jam
 delineatae; *Ag. virosus* inter Fuhg. escul. et venen. Suec. t.
 84. Quamvis fere omnes indigenas in Mus. Acad. Holm. dc-
 pictas deposuerim, hoc loco paucas pro Diio. Quaedam vern
 veteres icones tam incompletae, iinino incertae, ut novas darri
 necesse duent.

XV. AOARICUS STRANGULATUS.

Fries Epicr. p. 6. Monographi. Hymen, p. 3.

Diagn. Amanitii pileo carnoso, e campanulato expanso,
 a volva disrupta squamis confertis variegato, margine sulcato;
 stipite farcto, basi a volva circumscissa arcte vaginato; la-
 mellis liberis candidis.

In silvis inixtis, raro. Olini semel in Smolandia legi,
 Upsalise vero in silva Nosten copiose, Septembri. In Hollan-
 dit OUDEMAN8.

Fungus, admodum spectabilis, elatus sed fragilis. Stipes
 junior omnino farctus, senescens modo cavus, sursum atte-
 nuatus, spithameus, e volva circumscissa basi arete vagina-
 •tus, albus. Annulus inferus, unciam circiter a basi remo-
 •iis angustus, interdum duplicatus. Pileus magis carnosus,
 quā in *Ag.-vaginati*, minus vero quam ceterorum, junior coin-
 {mulatus, -adultus vero planus, obtusus, 3—4 vine, latus, vi-
 -ciulus/ glaber, spadiceo-lividus, at. pro more expallens, squa-
 niis (veil fraginentis) vulgo litis, confertis, planis variegatus

et subinde plane obtectus. Margo junioris striatus, adulti
 sulcatus, fere pectinatiis. Lainellae liberae, nec dente striati-
 decurrentes, confertae, ventricosse, candidae.

Ag. vaginato manifeste proximus, ut annulo exserto (in
Ag. vaginato annulus in volva inclusus); pileo squamoso-ver-
 rucoso etc. eximie distinctus. Etiam ad *A. jjantherinum*
 accedit, in quo annulus passim a pileo remotus, subinferus:
 cfr. *FL Dan. t. 1311 / . 2.*

Ulterius inquirendum an *A. Cecilicy* BERKL. specie differat;
 recedit veid statura graciliori, defectu annuli. Habitus idem.

Qualitates *A. strangulati* cum *Ag. vaginati* absque dubio
 cōngruunt. Hunc Dlusius fungus perniciosus aduūnerat, iit
 Vittadini esculentum testatur.

Tub. 11. *Ag. sti-augulatum* in statura uaturali adolescentem ut aulul-
 tuin sistit.

XVI. AGARIDUS NITIDUS.

Fr. Epicr. p. 8. Monogr. Hymen, p. 12.

Diagn. Amanita pileo carnoso, e convexo piano; verrucis crassis angulatis fuscis obsesso, marginibus larvi, carac alba immutabili, stipite solido, conico-attenuato, squamulosis, rhizo, annulo supero, lamellis attingentibus carididis.

In silvis praecipue frondosis Sueciae meridionalis minus frequens, sed pluries (Femsjö, Kinnekulle etc.) lectus. In Sudermannia semel a def. Dl. TAMM quoque observatus.

Color totius fungi (verrucarum pilei excepto) vulgo albus, nee nisi rarius in hit escen t em l. virescentem vergit pilei. Stipes solidus, firmus, 3 unc. longus, unciam crassus, conico-attenuatus, bulbiformis, squamulosus, albus. Annulus superus, tenuis hinc saepe lacerus, striatulus, albus, subtus villosus, demum disparsus. Pileus carnosus, subcompactus, obvolutus volva (irassa floccoso-crustata, dein in verrucas crassas, angulatas, induratas, fuscas diffracta; explanatus 4 unc. latus, siccus, nitidus, absque pellicula viscosa, margine semper laevi-

tarn ell so liber aë, confertae, perlatae \\ unc. usque), ventricosav Candida; Daro compacta alba, prorsus immutabilis-

Est e stirpe *A. rubescentis* et *A. spisso* (cujus bonu icon exstat in *Krombh. Schw. t. 29, f. 1—5*) proxime affinis. Ille carne rubente, hic pileo fuliginoso l. cinereo aliisque notis dignoscuntur. Icon *FL Dan. t. 2147* ud hanc speciem forsimspectat, sed omnino erronea est; stipes cavus etc.—E contrario *FL Dan. t. 2140* sat bene refert *A. validum*, quam nostram viduam, in Mus. Ac. Holm, depositam exhibere perfluum duximus.

Qualitates hujus speciei ignotae; e carne composita,apore miti, edulein facile fingeres; suht tamen onines Amanita indigene suspects.

Tnl). 1/2 lgr. sup. sistit finguin aultum manit. nutur.

XVII. AGARICUS ARIDUS.

Fries Epicr. p. 10. Monogr. Hymen, p. 14.

LL; bulbosus ut rave, *Paul. Champ, p. 308* ex descript.; icon nunc vidimus.

Diagn. Amanita volva fugaci, pileo carnoso, tenui, nudo, margine sulcato, stipite e farcto apice cavo, attenuato, subglabro, annulo supero, lamellis attenuato-adnatis, albis.

In betuletis siccis, sterilibus, estate sicca et calida, in Smolandia et Vestrogotia a LINDGREN lectus!

Stipes e farcto apice cavus, 3 unc. longus, 1 unc. crassus, sursuim leviter attenuatus, hirsutus, ferme glaber, ad basin ebulliosam leviter modo floccosus, tunc albus. Annulus superus, sed unciam fere a pileo distans, reflexus, persistens. Pileus a stipite discretus, carnosus at reliquis tenuior, explanatus 2 1/2 unc. latus, glaber, siccus nudus, albido-griseus, margines striatus, fere sulcatus. Daro mollis, alba, immutabilis. Lamellae adnatae, postice attenuatae, tenues, confertae, albae. Odor et sapor debilis, non ingratus.

lie et sequens ob volvam fugacissimam, nee ad stipitis basin persistentem em, neque in pileo adulto verrucosam facile

pro Lepiotae specie habentur; at in individuis juvenilibus velum saepe conspicitur floccosum et a cuticula pilei discretum. *A. aridus* ceterum a proximis differt lamellis attenuato-adnatis. Affinitate naturali proximae accedit ad *A. pantherinum*, sed defectu volvae ad basin stipitis lanuginis proximae distinctus.

Ulterius inquirendum an species citata Paulctii ud Aridum spectet. Descriptio bene cum nostra convenit, at iconem comparare non licuit. Hinc nostram exhibere necessarium duximus.

Qualitates ignotae; ceterum tum rarus et tenuis, ut nullius sint momenti.

Tab. 12. % infer, fungum magnitudine naturali exhibet.

XVIII. AGARICUS LENTICULARIS.

Lasch in Linn. III. (1828) p. 157. Fr. Epicr. p. 10. Monogr. Hymen, p. 1f).
Ag. L. spürt n, guttatus. Pers. syn. p. 265 IIIDII SDELEFFER.

Diagn. Amnnta volva fugacissima, pileo e globose convexo-plario7 molli, glabro, margine levi, stipite farcto squamuloso, annulo superD amplo, lamellis liberis pallescentibus.

Locis humidis silvarum passim, at nullibi copiose. Hac tenus lectus variis Germanise, locis; in Uplandia et Sudermannia Suecize mediae (in pineto-montanis Smolandisc numquam vidi) nuperque in Britannia. BERKELEY.

Cum priori convenit volva fugacissima, vix in statu juvenili conspicua, at ceterum lpngge distans. Stipes farctus, seel spDngioso-mollis, 4—G unc. longus, basi leviter bulbosus l. omnino sequalis, plus minus squamulosus, intBrdum fers glaber, albus. Annulus superus, amplus, laevis3, at supra annulum jove rorido obsrvantur "guttse maJDres, aqusse7 quas siccatac vul^o maculas relinquunt. Pileus nariDSUS, junior globosus, dein [lampanulato-cDnvexus, demum planus, 3—4 unc. latus, lacvis/ glaber, udus, alutaeD-carneus. Daro mollis,

spongiosa, alba, odore mucido. LamellaB omnino lib era, approximate, ventricosa?, antice latiores, admodum conferta, albidsc.

Locis similibus legitur varietas *vapida* stipite medio cavo, pilco fuscscBnte reticulato--scrobiculato, cuticula marginem versus fibrilloso-lacerata. Odor gratus, fere fitEni. — Ad hujus formas quoque pertinere videtur *Le grand parasol*. PAUL. CHAMP, p. 308.

Uriica species, cum qua *A. leiticularis* couiparari potest, est *Ag. Persoonii* Fn. II. cc.2 sed hie omnibus partibus major et robustior; pileus e convexo planus albus, in centro cinereus; stipes solidus, rigidus squamulosus. Hie modo in figetis Susciae australis obvius.

Tab. 13. fungum juvenilm et ailultum exhibet.

LEPIDTA.

Hoc subgenus Amanitis itiaxime affine exstantque species inedhe; hinc *Ag. Vittadini* et *echinocephalus*, illinc *A. aridus* et *lenticularis*, facile vco dignoscitur velo universali incru-

stato nee a pilei cuticula discreto ut in Amanitis. In ultima sectione vcluni universale viscosum. Lamella? omnino liberae excGptis quibusdam *A. granulosi* subspeciebus.

XIX. " AGARICUS HISPIDU6.

Lasch in Linn. IV (1823) p. 518. Fr. Epivr. p. 14. • Moiwgv. Ihjmn. p. 24.

Jiagn. Lepiota pileo carnosio tenui, uinbonato, primo tomentosD, dein in papillas vel squamas secedente, stipite farcto "attenuate annuloque superD floccoso-squamosis, lamellis approximatis ventricosisi simplicibus, albis.

In M arid a primus legit oculatissimus LASCH; dein ipse in fagetis umbrosis ad FemsjØ Smolandiae, demumque in Britannia, BERKELEY.

Stipes tubulosus, sed intns fibrilloso-firctus, 3 unc. usque longus, 3—5 lin. crajssus, sursum attenuatus, a velo universali stipitem usque ad annulum ^upcrurn, membranaceum, rflexuin vestiente dense lanaTO-squamosus, fuscus. Pileus carnosus, mollis, ex hemisphoBrico • expansus, plus minus evi-

denter uinbonatus, e velo universali jam prfmitus tomentDsus (nee Isevigatus et continuus ut in sequentibus), tomento dein in papillas squamasque ut in *A. acutesquamoso* secedente, 2—3 unc. latus, umbrinD-fuscus. Caro tenuis; alba, imhiuabilis. Lamellae liberse, approximatae, ventricosas, simplices albas. Odor subraphanoideus.

Medium tenet locum inter *Ag. acutesquamosum* et *elypeolariuin*; statufa hujus, indumentum" VPVD pilei illius. Colore obscurD simul notabilis.

Tab. 14. fig. super, typicam speciei formain exhibet.

XX. AGARICUS CLYPEDLARIUS. BULL.

Fr. Syst. Myc. 1. p. 21. Monogr. Hymen, p. 24. A. c. Dubrius, Pers. syn. p. 258. r. xl. var. y, d.
Relipa copiosa synonyma videns in Syst. Myc. et Epicr. v. 1.

Diagn. Lepiota pileo carnosu, molli, umbonato, primo incrustato lsevi, dein in squamas floceosas, adpressas laceratD, stipite fistulosu tenui subscqsili annuloijie fugaci floccoso-squamosis, lamellis approximatis albis.

In silvis tarn frondosis quam acerosis Kuri>ptu facile totinls haud r-ari).

Vulgate et polymorphic hujus speciei nuerosa^ exstant furiiiiu; praBSoitBin "tenseo typicam. Stipes medulla iliscreta, floccDso-araneosa farctus, in ox cavus, 3 unc. circiter longus, tuqualis ;1. basi leviter incras^atus, 2—3 lin. crassus, raollis, admodum fragilis, primo a velo areolatim disrupto, lutescente contigue squamoso-squaiTDsus, squamis facile secedentibus, iquo stipes villosus 1. fibrillosus, pallidus, supra annulum striatus. BHeus leviter carnosus, primo glandiformis, laevis, sipice fulvescens, omnino contiguus, licet sericeo-mo'llis, levicr naucosus, tomento crassD mafinali, dein in annulum superum stipiti adherentem secedente; dein campanulatus

explanatusque umbone fulvo, ceterum toUis in squamas floccosas solutus, 2—3 unc. latus, pulchre alutaceus et admodum mollis. Daro floccosa, 2 lin. crassa, alba, uda aijuosa. Lamellaj liberae, 3 lin. lataj, molles, confert^, Candida) 1- 1^{ut} scentes. Odor debilis.

Singulas varietates hoc loco notare haud licet. Cf. Monogr. Hymen. Variat nempe stipite lanato, pilei coloris o. s. p. Praecipue elegans forma pileo albo, squainis concentricis fuscis variegata. Huicaffinis *A. felinus* P., qui tam constans ut pro peculiari specie facile sumendus.

Plurima) exstant vulgatai hujus speciei icDies, sed oines incomplete, stipite deterso e, s. p. quare novam necessariam duxi. Proxime affinis *Ag. cristatus*, semper minor, plurimis notis diversus, stipite subnudo, annulo medio, pilis squamis glabris, lamellis deinum remotis.

Tab. 14. fig. inf. optimum speciei frinatii sistit.

XXI. AGARICUS PARVANNULATUS.

Lath in Linn. HI (1828) p. 160. Epicr. p. 18. Monogr. Hymen, p. 29.

JJitgn. Lepiota alba, pileo carnosulo, ex ovato campanulato explanatoque, umbonato, laevi (haud squainoso) sericco, stipite fistuloso, gracili, infra annulum inferum fibrillitso. lamellis liberis confertis.

In campis graininosis inter muscos, Markise, Scania?, jove ;)ludio, coelp sereno cito marcescens.

Minima Lepiotarum species. Stipes fistulosus, iuqualis, iiii^cialis circiter, soepe flexuosus, lineam haud crassus, infra annulum fibrillosus, supra annulum mulus, glaber. Annulus inferus, distans, integer, patulus, sat persistens. Pilcus disco harnosulus, campanulato-convexus, umbonatus 1. gibbus, 3—6 lin. latus, villo adpresso subsericeus 1. subpriinat. Paro

alba. Lamelite libera^lato, ventricosae, nullo collario a stipite segregate, crassiusculo, confertae. Color totius fungi albus. siccitate lutesceij?. Quoad staturam admodum variat.

Medium tenet locum inter Clypeolarios et Mesomorpios: ob annulum inferum ad hos potissimum referendus. Unica species, cum qua potest confundi, est *Ag. ermineus* concolor et locis similibus obvius. Hic vero, multo major, differt unumlo lacro haud infero, pileo glabro, odore raphanoideo etc. Hujus iconem dedimus in Sv. Jot. t. 595 f. 1. [*Ag. ermineus* etiam circa Upsaliam in [m] lectus).

Tab. 16. fig. 3 iuuiv vulgarem hujus speciei formam referent.

XXII. AGARICUS SISTRATUS.

[V. iSift. Myr. L. j>. '24. Afuqfirjr. Hyinvii. p. 'JO.

Diagn. Lepiota pileo carnosulo, e campanula! o convexo, obtuse umbonato, pruinoso, stipite fistuloso aequali veloque infero fibrillosis, lamellis liberis adscendentibus albis.

Locis nemorosis, graminosis, in hortis plurimis locis l'gta, at rarior species.

Species tenuis, delicata, fragilis, priori gracilior. Stipes listulosus, intus fibrillis araneosis' laxis vix farctus, 2 unc. circiter longus, lin eam crassus, aequalis, sericeD-fibrillosus piMiinatusve, albus. Annulus lacrus, fibrillosus, circa marginem pilei appendiculatus, fugax. Pileus leviter carnosus, canipanulatus, dein expansus, obtuse umbonatus, atpmis pruinatus, explanatus unciam et ultra latus, albidus, disctr srpe >bsciioi% in flavidum l. carneum colorein transiens. Caro

tenuis, mollis, fragilis, albida. Lamellae liberae quidein, sed stipitem attingentes, confert^e, 2 lin, latae, alb.Te.

Ab A- sistrato specie haud differre censeo *Ag. seminudum* LAS en, *Ag. ocellatum* Montagne, *Ag. linton* Seer. n. 42, Statura quidem inter se nDimihil diffBrunt, at desunt oinnes characteres essentialia.

[Juoad affinitatem naturalem *Ag. mesomorpha* BULL, sine dubio proximus; hic vero pilso stipiteque laevibus glabris, annulo integro, erecto abunde differt. Annulus tamen Ann cuticula pilei contiguus est ut in *Ag. granuloso*.

Tab. 15. fig. 3. form am *Laschii*, etiam mihi obviam sistit. *Ay. ocrtlai* figuram dedit Montagne in *Annal. Scienc. Natur.*

XXIII. AGARICUS GLIDDERMUS.

*Fr. in Vet. Ak. F*6rh. lci52, p. 43. Monogr. Hymen, p. 31.*

Diagn. Lepiota pileo carnosulo, tenui, molli, e campanulato convexo, laevi/ viscoso, stipite cavo arancoso-farcto, floccEDSO-squaniDso, supra annulum lacruin lti^yi, lamellis liberis ventricosis candidis.

In pinetis deisis, udis Suecicr (in Alsike-skogen prope Upsaliam haud rarus)7 Germaniac et Britannia?. BERKELEY.

Species pulchella, cum *Ag. dypeolario* plurimis nDtis analogi, at pileo la^vi, glabro, yiscDSo distinctissirua. Stipes araneosD-farctus7 3 unc. circiter longus, 2—3 lin. crassus, aetjualis, «iccus, mollis, albidus, usque ad annulum incompletum, lacrum floccDsb-squainosus, superne vero nudus7 albidus l. rufescens. Pileus carnosus, tenuis, campanulato-convexus, obtusus l. late gibbus, li unc. l. pairuñ ultra latus, bevis, glaber, iilutine tenui oblinitus, rufo-vaccinus, minus discretus quam

in plurimis Lepiotis. Caro mollis, alba. Lamellae liberae, approximatae, latae, ventricosae, cDnfertae, candidae, haud maculate.

Novam incipit seriem specieruin nobilissimarum pileo viscDso a praecedentibus distinctam. Ex his haec et duae sequentes distinguuntur stipite sicco, squamoso; *A. illinitus* et *pinguis* stipite glabro, a velo viscDso.

Hac -specie detecta orta est suspicio *Ag. mesomorphum* /?. Alb. et Schw. potius ad *Ag. gliodermum*, quam *Ag. delhatum* esse referendum, licet *A. gliodermus* minime, *A. delicatus* facile cum *A. mesomorpha* comparandus. E descriptione sisteret sequentem, e loco vnro nntuli pra3sentcm.

Tab. 15. fig. 1. superior sistit *Ag. gliodermi* typicam formam.

XXIV. AGAPJCUS DELICATUS.

Fr. Syst. Alyc. I. p. 2>j. Epiur. p. III. Mvnoqr. Hymen, p. 31.

Diagn. Lepiota pusilla, pileo carnosulo, convexo-plano; limbo, glabro, viscido, stipite fistuloso annuloque infero dense floccosis, lamellis liberis confertis albis.

Hanc speciem olim in Smolandiae nemoribus legi, 1835 semel Upsalire; nupcrius vero per plures annos in ollis horti botanici Upsaliensis.

Ut prior *A. clypeolarium* refert, hic *A. mesomorphum*, pileo viscido stipiteque vestito clare distinctus. Stipes fistulosus, unciali longus, lineam crassus, tequalis, siccus, albidus, indumento floccoso tomento obductus. Annulus vulgo integer, membranaceus, siccus. Pileus leviter carnosus, e limbo planus, subumbonatus, 1 unc. latus, laevis, glaber, viscidus; neququam granulatus, rufescens 1. flavescens. Lamellae liberae, confertae, tenues candidae?

Species a praecedenti certe diversa, licet, characteres parum promineant. Differt tamen statura triplo minore, pileo campanulato, stipite floccoso nee squamoso. In var. *vaporaria* annulus magis distinctus et passim incompletus.

Singularis est ratio Lepiotarum plures species offere varietatein vaporariam. Sic *A. rachodes*, *acutisquamosus*, *clypeolarium*, *cristatus*, *Mreagris*, *delicatus*. In Europa *A. Molybdates* et *cepcectipes* in hac statione tantum lecti sunt, ceterum in statione naturali Americae obviis. Nulli dubitamus hos cum plantis ex Americis in Europa esse introductos, forsitan etiam *A. Mdeagris*. Confer dissertationem in Astram de Fungis tropicis in vaporariis obviis.

Tab. 15. fig. 3. sistit varietatein vaporariam.

XXV. AGAPJCUS MEDULLATUS.

Fr. Epitcr. p. 11). Monoyr. Hymen, p. 12.
Agellinitus Secret. IMv. n. BO IIDII Fr.

Diagn. Lepiota alba, pileo carnosulo, convexo-plano, umbonato, glabro viscido, margine a velo appendiculato stipite fistuloso discreto, fistulosum recoivente velum inferum, obsoletum squamuloso, sicco, lamellis liberis confertis ventricosis.

Hanc speciem in Helvetia primus detexit def. Secretan; ipse locis upricis, muscosis Smolandiae.

Odor Raphani, Stipes cavus, cortice exteriori crasso parabili a tubulo interiore discreto, firmo, denm fistuloso, 3 unc. circiter longus, 3 lin. crassus, aequalis, fragilis, siccus, infra velum sericeus squamulosusque, apicestriatus. Annulus incompletus, laceratus, vulgo in margine pilei appendiculatus, vix in stipite prominens. Pileus leviter car-

nosus, convexo-planus, umbonatus, 1—1.5 unc. latus, laevis glaber, viscosus, albus, disco griseo variant. Caro mollis, aquosa, fere *A. clypeolarium*. Lamellae prorsus liberae, ventricosae, antice latiores, confertae et, ut totus fungus, candidae.

Fragmenta veli in margine pilei appendiculata non semper tam regularia et distincta ac in icone, interdum annulus distinctus ut in *A. subcavo* Fl. Dan. t. 1843. Hanc figuram sine hesitatione ad *A. medullatum* ducere, nisi Iaraella adnotat, subdecurrentes, an errore pictoris?

Ab *A. illinito* concolori mox distinguitur stipitis sicci indole, velo distincto; a praecedentibus colore.

Tab. 16. fig. sup. typum speciei tunani sistit.

XXVI. AGARICUS ILLINITUS.

Fr. Obs. Myc. II. p. 8. Syst. Alys. I p. 23 cum syn. Monogr. Hymen. I. p. 32. Hoffm. Icon. analyt. Fung. t. 13. f. 2. var. alutacen, A^{aricus}. Linn. Fl. Suec. n. 1108 sine nomine, tit. descr. Dptima.

Diagn. Lepiota alba, pileo subcarnoso, molli, ex ovato campanulato expansoque, subumbonato stipiteque e farcto fistuloso, tenui, ruquali glutinosis, annulo obsoleto, lamellis liberis, confertis, denium remotis.

In silvis campisque graminosis per omnem Sueciam a Smolandia in Lappóniam usque, Jove pluvio, exeunte autumn o, haud tutus. Apud exteros in Germania tantum lectus a Del. HOFFMANN.

Species nobilis, peculiaris typi. Totus fungus adolescentulo univrsali glutinoso collinitus, quod pileo expanso annulum incompletum viscosum in stipite reliquit; velum proprium partiale desideratur. — Stipes junior farctus; maxime cavus, 2—3 unc. longus, 2—3 lin. crassus, aequalis, fragilis, nullo modo fistulosus. Squamosus, sed glutinosus, lubricus, lit supra annulum siccus. Pileus leviter carnosus, 1—3 unc.

latus, glaber, viscosus, inollis, deinum fragilis, umbone fusciscentente, margines striatulus. Lamella liberae, demum a stipite remota?, confertae, molles, saepe venoso-connexae. Totus fungus vulgo candidus, sed occurrit varietas pileo argillaceo s. alutaceo, margines laevi, fimbriato.

Ut reliquis partibus valde insignis etiam structure ut glutinis fabrica maxime singularis, ut amicus HOFFMANN l. c. plene exposuit.

Adhuc restat valde nobilis species annulo viscoso-tumido, licet stipes siccus, solidus, pileus carnosus e. s. p. a precedentibus longe distans = *A. pinguis* Fr. Epicr. p. 33. Hic ad ligna putrida nascitur. Hujus nobis deesse figuram dolemus.

Tab. 15. fig. 2. varietatem primariam candidam exhibet.

ARMILLARIA.

HDC subgenus artificiale colligit species a Tricholomatibus et Clitocybis ob velum partiale annulatum (in *A. aurantio*

obsolutum) remotas. A Lepiotis differunt stipite in carnis pilei ditto et veli universalis defectu.

XXVII. AGARICUS CONSTRICTUS.

Fr. Gysi. Jyv. I. p. 28. Epicr. p. 22. Monogr. p. 41. Berk. Brit. Outl. p. 06.

Diagn. Armillaria alba, pileo carnosus, piano obtusus, siccus, incore sericeo-nitente, stipite solido oequali, annulo apicali angusto deciduo, lamellis inarginatis confertis.

In campis apricis graminosis (principue locis, ubi graminum iburina aquina adustum) primo in Scania frequentet legimus, dein sporadicum per plures provincias usque ad Upsalam. In Anglia legit BERKELEY.

Totus fungus albus; exoletus pallens, humilis, sediternus, odore farinae recentis. Stipes solidus, carnosus-fibrosus, 2 unc. longus l. infra, 4 lin. circiter crassus, aequalis l. basi incrassatus, fibrillosus l. squamulosus. Annulus prope apicem stipitis insertus, angustus, demum obliquus l. deciduus. Pileus carnosus, e convexo planus, 2 unc. latus, obtusus, siccus, per se glaber, sed in statu juniore obductus velo tenui sericello secedente, at numquam squamato-laceratus. Margos

fungi junioris quoque villosus, involutus. Caro haud crassa, sed compacta, quo a Lepiotis recedit. Laminulae sinuatae (emarginatae) l. rotundatae, nunc adnexae, mine demum liberae, admodum confertae et angustae.

Pertinet nobilis haec species ad Armillarias Tricholomoides et *A. ramentaceo* BULL., proxime affinis, at colore et pileo numquam squamoso facillime distinctus. Magis recedit *A. cingulatus*, cujus iconem edimus in LINN. 183D. t. 10. Externa facie ad *Ag. lejocephalum* KRDMBII. t. B2 (non Bull.) proxime accedit, qui vero annuli defectu, stipite cartilagineo etc. distinctus. — *Batt. t. 7 f. B*, cum *A. constricto* bene convmit, sed ad speciem absolute determinandam haud sufficit.

Tab. 18. fig., super, varias speciei formas sistit.

XXVIII. AGARICUS LAQUEATUS.

Fr. Epicr. p. 24. Monogr. p. 45.
Ag. mucylus, GpigiMis. Secret, n. 38. Bait. t. 10. V.

Diagn. Annularia alba, pileo carnosio, hemisphaerico, obtuso, laevi, udo viscidulo, stipite solido infra annulum (cortinamve) squamato-fibrillose, lamellis adfixis, demum sefiMENTIBUS confertis candidis.

HECC species proprie est Europa? australis, at sequens fungus^{us} differt, excepto vel cortinato, quare varietatem Lensemus. In Bahusia S. LINDGREN, ipse in Scania scmel legi.

Totus fungus albus. Stipes solidus, 2—3 unc. longus, 3—4 lin. crassus, ffigualis 1. basi subincrassatus, infra velum typice annulatum, sed in nostro vulgo cortinatum, squamulosus 1. fibrillosus, basi fuscescens. Pileus carnosus, tenuis, hemisphaericus (explanatum non vidimus) obtusissimus, laevis, glaber, udo viscidulus, siccus nitens, 2 unc. latus, albus L

discD lutescens, niargine primo inflexo, dein deflexo laevi. Caro alba, firmula. Lamella? primo obtuse adnata, demum vero secedentes, haud admodum perfectae, 2—3 lin. lativ-marginem versus attenuatae.

Affinitas hujus speciei haud liquet; tunc u Tricholomideis quain Clitocyboides longe distat. Juxta Ag. mucidum hinc colligavi, nec tamen huic rite affinis. Ag. mucidum sporis amplis, lamellis mucosis. aliisque notis non omnibus tantum differt, ut similes KALKBRENNER haud immerito pro novD generis typo censeat.

Tab. 18. figg. inf. formam cortinatam exhibet.

XXIX. AGARICUS IMPERIALIS.

Fries in Lund. Holm. p. 5. Monogr. Hym. -p. 42.

Diagn. Armillaria ampla, compacta, pileo valde carnosio, i convexo explanato, squamoso, subbrunneo, stipite solido crasso aequali, annulo infero duplicato, lamellis longe decurrentibus, confertis, angustis, ex albo lutescentibus.

In pinetis rupestribus; primus in silva Radaas Vestrogotiae legit S. LINDGREN, cujus iconem hoc loco exhibemus. Dein cum dsf. Lund prope Holmiam legi formam non nihil recedentem et hanc in Monogr. Hym. descripsimus.

Fungus nobilissimus, giganteus, valde durus et compactus, inodorus, sapore grato. Stipes solidus, intus similis, 1-5 unc. longus, 1—2 unc. crassus, aequalis 1. basi attenuatis, usque ad medium a velo vestitus, pileo dilutior. Annulus medius, duplicatus, patulus, persistens; exterior videtur velum universale. Pileus crasse carnosus, e convexo expla-

natus, obtusus, 4—11 unc. latus, saepe repandus, sic BUS, fusco-brunneus 1. rufescens, squamis adpersus. Lamella? longe r\ sequaliter decurrentes in conum obversum (minus in Vestrogotico), confertae, pro ratione angustae, albae deinde flaventes. In forma Vestrogotica stipes infra annulum lamis lutescens, pileus disco squamosus; in Holmiensi stipes liliifolius annulum squamosus, pileus squamis adpressis obscurioribus floccosis versus marginem laevem fibrillosum maculatus.

Affinitate naturali ad A. robustum et A. colossum proximum accedit, sed ab utroque differt lamellis decurrentibus, annulo duplicato. Agaricus colossus velo prorsus destitutus.

Tab. 17. liliifolium Vestrogoticum sistit.

XXX. AGARICUS LASCHII.

Fr. Epicr. p. 22. Mono jr. Hymen, p. 43.

Diagn. Armillaria pileo camDSD, c convexo piano tē—
pressove, laevi glabro, stipite valido curto fibrilloso-striato,
annulo contexto, lamellis decurrentibus angustis albis.

In pinetis Markiaj detexit def. LASCH; nos in silva ad
Alsike props Upsaliam legiinus.

Stipes solidus, curtus, firmus, 2 iim\ ist parum ultra
longus, basi unciam usque crassus, fere glaber, annulo infer D
parum prominent^ medio cinctus, carne subspungiosa. Pileus
carnosus; primo convexus, obtusus, margine involuto; dein
explanatus vel depressus, 3—4 unc. latus, siccus, lacvis, gla-
ber, sordide argillacED-pallBScens, margine tenui et leevi per-
sistentc- Daro subcompacta, alba, cum stipite omninD con-
tigua. Lamella) utrinque attenuatse et acuminate, vere et
longe decurrentes, confertsc, angusto, albo-pallescentes, nu^dat,
net- A. mellei instar albo-farinosce.

Demto annulo htcc species ad Clitocybas pertineret me-
dium ten ens locum inter *A. nebularem* et *geotropedem*. In
individuis pileD depresso pi-leus saepe gibbus ut in *A. gep-
tropede*. Eodein modo *A. melleus* ad *A. ectypum* accedit.

Dicavi hanc speciem insignem def. LASCH, diligentissimo
ct acuti^siino HymenomycRtunn inrlu.pf.itri, nui Ipluros rlebe-
mus novas species et numcTDSas l^loru) Gerinanitu; novitias,
"fideliter determinatas.

Species edulis videtur, at tain rara et parciT obvia, ut
nulla commendations digna.

Tub. 19. figg. sup;r. fuiij^uin ma;n. nut. nitft rnilns pnnit.

XXXI. A&ARICUS PLEURDROIDES.

Fr. Monogr. Hymen. II. p. 206.

Diagn. Armillaria pileo camoSD, e convexo piano, in-
njqiuili, glabro; stipite soli do, deorsum attenuato, subexcen-
trico; annulo infero an gust D patulo, lamellis subdecurrentibus
fconfortia albis.

Ad truncos Pyri Mali Ostrogotia; in societate Agar.
Pometi, detexit saepe laudatus H. VON POST.

Species nobilissima, cum nulla alia cDmpjiranda. Ob
fstipitem saepB excentricum sLUO jure ad Pleurotos referatur.
Gregarius, vix ctespitosus. Stipes solidus, 1L—2 unc. longus,
4—5 liri- crassus; deorsum attenuatus, laevia (numquam stjna-
mosus vel reticulatus), albidus, in colorein incarnatum obso-
letB vergens. Annulus inferus, paulo infra lamellas abruptus,
patulus, irrngulariter dentatus. Pileus carnosus, mine cen-
tralis, mine valde excentricus, e convexo planus, inaequalis,
obsolete gibbus, sed• variat etiam depressus, laevis, glaber,

li—2i unc. latus, siccus, incarnato-albidus, pallescens. Caro
alba, cum stipite contigua. Lainellc adnatoe, subdecurrentes,
CDnfertae, haud ventricosa37 albidae.

Ambigit haec species inter Armillarias et Pleurotos, siil
a Pleurotis annulatis longe distat, potius comparetur cum
Ag. lignatili. Eodem modo supra videre licet species exceptb
annulo cum TricholDinatibus et Dlitocybis proxime affines.
E contrario omncs Lepiotoe annulate intirne inter se .con-
junctoe et a reliquis distinctissimse.

Ob carnein lentam nee hunc nee *A. vidteum* edulcs
censeo. Hie lentus, pertenuis, sapore acerbo, qunm m^ruu
fungis Qsculentis adnumerari.

Tab. Id. figg. infErior. varius *A. Plmvotoidis* sistmit fovms.

XXXII. AGARICUS DENIGRATUS.

Fries Vet. Ah. Fdrk. 1861. Monogr. Ihjmm. II. p. 285.

Diagn. Arinillaria pileo carnosD, e convexo piano, udo viscidulD, verrucis innatis guttato-punctato, margins lcevi; stipite SDlido, fibres o-striato, fuse op alii do, annulo apicali, sececlente, lamellis decurrentibus, subdistantibus, pallide bruimeis.

In humo upibrDsa ad basin truncorum Horti botanici Upsaliensis per plures annos legi.

Gregarius, obscurus. Stipes solidus, firmus, 2 unc. longus et infra, mine sequalis, \ unc. crassus, nunc basi napi-forini-incrassatus (h. e. inferne tumidus, basi vero attenuata), fibres o-striatus, fusees centi-pallidus, intus sordidus et basin versus fuscus. Annulus prope apicem affixus, angustus, integer, at facile scedens, albidus. Pilous carnosus, haud coinctus nee flaccidus, e convexo planus, obtiLSus, uuius viseidulus, verrucis elevatis guttato-punctatus nee fibrillosus, 1—2 unc. et ultra latus, brunneofuscus, margine semper lcevi.

Lamellte decurrentes, leviter distantes, ahgustji*, primitus pallide brunneac, dein obsDiiriurDS, vix farinose.

Affinitate naturali *A. melleo* proximus, at pluriinis nutis cgregie distinctus. Ad truncos arborum siinul vidi forinani cccspitD&am tenuiorein, {[uan] hue referendum eenseo *A. denigratum* PERS., speciem dubiam, nemini cognitam. Fungi terrestres enim in truncis nati vulgo cajspitosi et tenuiorig-

in fungi typiei societate ridieulum legimus spectaculinn- In variis Agaricis, Russulis etc. in pagina superiori VIII M' r licet pileum resupinatmn, innatosessilem, lamellis in centra concurrentibus; at in simili hujus lusu e eentro enasciiiu' stipes verticalis, primario antipodus, annuloque lam ell as t- gente instructus.

Tali. 2i) siatit typieam fm-iniini: ii^, iu^nn.v^ HIUIIM.U.^I.II, „ntiiiiuu:l...

TRICHDLOMA.

Dignoscitur hoc subgenus pileo carnosD, stipite exannu- lato carnosD 1. fibroso, lamellis postiee sinuatis (rotundatis

1. emarginatis). Species inimfcrosaB, nobilissima.

XXXIII. A&AJIUUS COLOSSUS.

AV. Kprr. />. -M. Muiuv/r. ITymen* p. 47.

Diagn. Maximus, durissimus, pileD. compaeto, crassissimo, hemisphrericD-expanso, glabro, ilcmum diffracto-sLjiianDSD, inargine ex arete involuto infraetoque nudo; stipite solidissimo, primo tuberoso apice constricto glabro infurnb earne[j]ue testaceis; lamellis rotundatis confertis tenuibus albis, dein latissimis pallide lateritiis.

Portentum mirabile inter folia Pini silvestris dense coalitva-ta (1829—1834) unieo IOCD legiinus ad Femsji) Smokndia)- Haud procul ab eodem 1861 legit Fil. HUBERT et pingi jussit.

Maximus et durissimus inter omnes Agaricos hacteiins ilBtectos, uuii Ay. *robusto* et *imperiali* tantnm cDinpa-randus-, utrojuc longe speeiisior. Stipes solidus, came ubiieue similari et maxiinc compacta, 3—4 unc. longus, basisquB ovato-bulbosa, ixi'ue crassa, apiec vero valde constrictus, 2 uni. tiintum crassus, definite bicolor: pars bulbosa per se glabra, sed fibroso-lacera, testaceo-fulya; pars cpiistricta et primitus pileo arete involuto inclusa^ floccosa, Candida; primitus nut em sistit tuber cliff Di'ine, 8—4 unc. la turn rlepres-

sum, pileum oblique gerens. A^elum nullum, nisi flocco> in apice stipitis pro veli rudimento surnere velis. Pilous junior quoque tuberifDrinis^ Corhinariorum Scanr-oruin m>n' bulbo applicatus, e terra emergens glebis et foliis obtectu-. margin e arctissiine infracto-involuto, stipitis part em constritarn amplectente; ilein heinisphuricus, xuargine arete inflexo albedo, lawis et glaber — demuinque evolutus, planD-CDnvexus depressusque, semper obtusissimus, repandus, "spithameus v\ ultra; diffractD-sqiamosus, JDve udo circa marginem viscidii-lus, testaceus. Caro sicca, fibrosa, 2 uric, usque crassa, fractu ubique in colorem incarnato-latcritium transit. Lamella rotundato-libBra, sed stipite pbliquo extrorsum emarginato-decurrentes, primo confertro, august^ alb*, rlein lat-ibres, magis distantBs, integril, demuin vero \ unc. to, lu'era pallide lateritiac. Inodorus.

Tub. -A. . II. fntmm ininorem sistimt.

XXXIV. AGARICUS SEJUNCTUS. Sow.

Fries Syst. I, p. 47. Epicr. p.-26. Monogr. p. 52.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, B convexo expanso, laevi, viscido (flavo), fibrillis innatis fusco-nigricantibus virgato, stipite SDHJD, sursum attenuate, albo, apice subsquamuloso, lamellis emarginatis latis subdistantibus albis.

In silvis, praecipue pinetis, solo glareoso, haud frequens. Lectus in Suecia, Germania, Anglia. Specimina depicta lecta ad Flottsund prope Upsaliam.

Fungus validus, speciosus, odore farinae et rancidae. Stipes carnosus, solidus, ventricosus, dein elongatus, 3 unc. circiter longus, unciam vulgo crassus, laevis, glaber, candidus, apice subtiliter squamulosus. Pileus disco carnosus, marginem versus tenuis, et convexo explanatus, primo gibbus, at umbone evanescente, 3 unc. circiter latus, JDVB udo viscidus, flavus, fibrillis fusco-nigricantibus virgatus. Caro pro ratione tenuis, alba l. funereo-maculata. Lamellae emarginatae, junior es rotundatae, latae, subdistantes, immutabiles.

Forma a Sowerby picta (t. 12 B) a meo tantum differt, ut novam iconem dare necesse duxerim. Persoon hanc iconem dubitans duxit ad suum *Agaricum Uucoxanthum*, qui cum nostro bene convenit. Quoad affinitatem naturalem hic non ad sequentes, sed *A. foimiji* Schaeff. t. 69 accedit, at pileus viscidus, virgatus, nec in fibrillas l. squamulas secedens.

Inter *A. sejunctum* et *A. equestrem* medium locum tenet maxime spectabilis *Ag. coryphaeus* Fr. Epicr. p. 28, utroque vulgo major, torosior, carne tamen molliori. Ab utroque differt lamellis albis sed acie citrinis, pileo flavo squamulis l. verrucis nigricantibus variegato. Nascitur hic in fagetis Sueciae meridionalis, quare pingere non licuit. *Krombh. t. 68, l. 18—21* non fucata hujus staturam refert, sed fucata *A. equestrem* praebet.

Tub. 23. sistit varias *A. sejuncti* formas.

XXXV. AOARIDUS PORTENTOSUS. FR.

Fries Syst. I, p. 39. Epicr. p. 26. Monogr. p. 52.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, et convexo explanato, inaequali, viscido (fuligineo), lineolis nigris virgato, margine tenui, stipite solido, firmo, subaequali, glabro, striato, albo lamellis rotundatis perlatis, demum distantibus pallidis,

In pinetis Europae saltem borealis vulgata species, praecipue autumno seriori in societate *Ag. equestris* vigens.

Splitarius l. gregarius immo rarius amplius densos caespites formans, inodorus, saporis miti, quibus notis jam a praecedente longe distat. Stipes solidus, validus, totus eximie carnosus-fibrosus, vulgo 3 unc. longus, unciam crassus, subaequalis, nudus, sed fibrilloso-striatus, albus. Pileus carnosus, at ratione stipitis validi tenuis, primo convexus, dein planus, subumbonatus, inaequalis repandusque, 3—5 unc. latus, viscidus, et fibrillis innatis nigro-virgatus, at ceterum laevis, glaber, vulgo fuliginosus, at variat violascens, lividus et senio-

expaliens; margo semper nudus, tenuis. Duro alba, obsolete lutescens, fragilis. Lamellae rotundatae, fere liberae, 3—4 lin. usque ad unciam latae, distantes, primo albae, dein lutescentes vel griseo-pallescentes.

Vulgatam et valde distinctam hanc speciem a praeis Auctoribus haud descriptam valde miror. Sine dubio *Agarico lurido* adscriptus, ab Hartzero (t. 73) longe diversus *Ag. fumoso*. Praeter lusum caespitosum, giganteum aliam legimus forinam minime pumilam stipite subbulboso ad terrain nudam.

Reliquae species pileo virgato facile dignoscuntur, *A. flavobrunneus* et *albobrunneus* lamellis rufescenti-maculatis, *Ag. virgatus* pileo absolute sicco, lamellis canis.

Tab. 24 figg. superius typicam *A. portentosi* formam exhibent.

XXXVI AGARICUS FUDATUS. FR.

Fries Syst. 1, p. 40. Epicr. p. 27. Monogr. p. 54.

A. [quinquepartitus. Lund Holm. p. 7.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, e convexo piano, subrepando, viscido (lurido o-lutescente), tigrino-variegato, disco obscuriori, stipite farcto, molli, squamuloso fibrillosoque, lamellis emarginatis, latis, subconfertis, albidis.

In silvis, praecipue pinetis, rarior species, circa Holmiam, Upsaliam et passim obvius. Indicatur quoque in Germania, Anglia.

Stipes farctus, mollis, saepe ascendens, 2—3 unc. longus, 4—6 lin. crassus, subaequalis, primo minute et dense squamulosus, dein eximie fibrillosus, fibrillis demum nigricantibus variegatus, pallescenti-albus, apice albus et albopruinosus, demum fragilis. Pileus leviter carnosus, convexo-planus, obtusus, saepe irregularis, 2—3 unc. latus, raro ultra, viscidus, sed facile siccus et opacus, laevis, glaber, nec fibrillis nigris virgatus, sed tigrino-lituratus, lurido-lutescente

cinereo-ovato-flavo, disco obscuriori. Caro tenuis, pallida, durum fragilis. Margo tenuis, nudus. Lamellae profunde emarginatae, 3—5 lin. latae, ventricosae, subconfertae, fragiles, albae, trama hyalina cum carne pilei concolor. Inodorus.

Insignis haec species cum praecedentis formis saepe commutata, sed ex iconibus hoc loco datis facile discernuntur. Observandum modo stipitem A. fucati non semper tam manifeste squamulosum ac in icone, ad specimina optime evoluti factum exstat quoque hujus forma curta, subbulbosa, ab analogis prioris caute distinguenda.

Agaricus unguentatus, ob pileum viscosum juxta *A. fucatum* in Epicr. collocatus, ob pileum simul villosum nihil ad stirpem *A. terrei* referendus.

Tab. 24 figg. inferiores typicam A. fucati. foras adumbrant.

XXXVII. AGARICUS QUINQUEPARTITUS.

Linn. Suec. p. 1222? Fr. Epicr. p. 27. Monogr. p. 54.

Diagn. Tricholoma pileo leviter carnosio, e convexo explanato, repando, laevi, glabro, viscido (flavo), stipite solido, striato, glabro lamellis emarginatis, latis, albis.

In pinetis campestribus admodum rarus, Legi in silva Dannemarkensi juxta praedium Linnaeiium Hammarby.

Stipes carnosus, solidus, 3—4 unc. longus, a basi ad apicem vulgo attenuatus, 2 unc. et ultra crassus, striatus, glaber, albus, Pileus carnosus, versus marginem tenuis, e convexo explanatus, repandus, laevis, glaber, flavus, nullo modo virgatus l. lituratus ut praecedentes. Caro, disci excepta, tenuis, fragilis, alba, subhygrophanus. Lamellae emarginatae, minus confertae, 2^{unc} - latae, albae. Odor nullus. Sapor mitis.

Praecedentibus manifeste affinis, sed pileo nullo modo virgato vel liturato mox distinctus. Ab *Ag. fucato*, cui proximus, colore et stipite glabro.

Descriptio Linnaeana *Agar. quinquepartiti* omnino paradoxo et in nullam speciem typicam quadrat. Sine dubio monstrositas et, ut meam praefiscini dicam opinionem, *Hygrophorum conicum* spectat. At quum Pollich et, ni fallor, Paulet ad hunc retulerint, hoc loco admisi nomen parum aptum quia vidi specimina adeo repanda, ut lobata facile dicam, et insuper juxta villam Linnaeanam nascitur.

Agaricus dentatus, quem quidam ad *Hygrophorum* referre maluerunt, manifeste pertinet ad *Ag. rutilantem* Schaefferi. Descriptio Linnaeana optima et, quod praecipue notandum, hujus characterem essentialem, aciem lamellarum incrassatam villosam, notat. Schaefferi nomen aptius ubique receptum tamen servandum censeo.

Tab. 25. Agarici quinquepartiti statui naturalem exhibet.

XXXVIII. AGARICUS BULBI&ER. A. S.

Alb. i't Si'itc(u/i. p. 151. Fr. iSyst. 1. p. 27. Monogr. 1. p. 35. Klotzsch in Dietr. Fl. Bor. t 373. Weimm. Boss. p. 13.
A. malleipes. Lasch in Linn. IV, p. 27.

Diagn. Armillaria pileo carnosio, convexo-plano, obtuso, laevi (gilvD-testacep), margine stipiteque farcto cyliudrico, *marginato-bulboso*, pallido fibrillosis, annulo obliquo fugaci, lamellis emarginatis, pallidis.

Locis muscosis in pinetis Europae praecipue orientalis. Circa Upsaliara hand rarus, at in Suecia meridionali et occidentali haud legimus. "

Fungus valde singularis, *Cortinarios Scauros* s. marginato-bulbosos statura referens, at nullD inodo affinis, maxim e vero Tricholomatibus limacinis. Odor et sapor nullus. Stipis farctus, raro cavus, 2—3 unc. longus, $\frac{1}{2}$ unc. fere crassus, aequalis usque ad bulbuin globosum, marginatum; cuticula exterior pallens, separabilis, demum lohgitudinalitBr fibrosa; sed intus medulla molliori farctus, extus intusque pallescenti-albus. Velum est cortina annulata, laxe adhaerens, obliqua, fugax, alba. Pileus carnosus, haud compactus, e convexo explanatus, 3—4 unc. latus, udus, gilvo-te-

staceus, margine pallidiori, per se glaber, sed passim et praecipue circa marginem e veli fragmentis squamuloso-fibrillosus. Caro alba, mollis. Lamellae late emarginatae, subconfertae, demum parum distantes, latae, albo-pallescens, demum pileo fere concolores.

Hunc et sequentem, e characteribus Armillarias, hoc loco juxta vere affines CDinparationis gratia inserere **utile** duxi. Exstat quidem jam hujus icon a *Klotzsch* 1. c. data, at cum hoc opus vix in manibus Mycologorum veniat[^] nostram haud superfluum duximus.

Proxime affines sunt *A. focalis* (cujus icon a me in Musaeo **Holm**, deposita tain praelongum sistit specimen ut charta hujus Dperis non caperet), *A. robustus et luteovirens*, quorum icDnes exstant apud Kroinbh., ut etiam nostrae in Musaeo Holmiensi.

Tab. 2B iigurae inferiDres sistunt formam typicam, UpsaliiB luctam.

XXXIX. A&ARICUS AURANTIUS. SCHAEFF.

tichaeft. 37. Fr. Syst. p. 39. Monuyru h. p. 31K Alb. et Schwsin. p. 159. Secret. p. 712.

Diagn. Armillaria pileo carnosio, e convexo piano, obtuso, viscidioso, innato-squamuloso (aurantio), stipite solido, aequali, aurantio-squamuloso subannulato, lamellis siiiato-adnexis, candidis, demum maculatis.

In pinetis montosis humidiusculis hinc inde, at nullibi rlopiose. In Suecia media haud rarus, at in regionibus australibus desideratur.

Est e pucherrimis, odore farinae recentis, sapore ex Alb. et Schw. aimiro. Stipes solidus (nisi a larvis pertusus), aequalis 1. sursum attenuatus, 3 unc. circiter longus, $\frac{1}{2}$ —1 unc. crassus, pallesceris, sed usque ad zonam annularem dense obsitus squamis confertis, subconcentricis, verruscosis potius quam squarrosis, aurantio-fulvis. Annuius nullus adegt distinctus, sed squamae stipitis definite et concentric[^] desinentes zonam praebent annularem, 2—3 lin. ab apice stipitis distantem, supra quem stipes laevis candidus et jove udo guttulis aqueis irroratus. Caro firmula, pallescens, in parte inferior! stipitis in fulvellum transiens. Pileus carnosus, mar-

ginem versus attenuatus, e convexo planus, obtusus, obsolete innatD-squamulosus (cuticula non lacerata), interdum fere laevis, viscidus, 2—3 unc. latus, pulchre et saturate aurantius, disco saepe obscuriori. Lamellae emarginato-adnexae, confertae, 2 lin. latae, primo candidae, dein fulventes l. rufescentes.

Legimus insuper varietatem caespitosam, minus regularem, sed itidem pulcherrimam. Stipes saepe curvatus et ascendens, dense Dbtectus granulis punctiformibus aurantiis, demum rufescentibus. Pileus primo laevis, dein riyuloso-granulosus, aurantio-fulvus.

Hujus inter Armillarias et Tricholoiijata ambiguae speciei novam hoc loco inserere icDnem riece[^]ssariuin duxi, ne cum vicinis v. c. *A. flavobrunneo* CDnfundatur, et quum Schaefferi icon haud parum a forma mihi obvia reeedat.

Tab. 25 fig. superiorBs specimiiiFi Upsaliae lecta adumbrant.

XL. AGARICUS FLAVOBRUNNEUS. FR.

Fries Obs. 23 p. 119. Epicris. p. 28. Monogr. p. 56. Pers. Myc. Eur. 3, p. 177. Berk. Dutl. p. 98.

Ag. trichopus. Alb. et Schw. p. 163.

A. fulvua. Fries Syst. 1, p. 37, nun Retzii st alior.

Diagn. Tricholoma pileo carnoso, e conico convexo explanatoque, discoideo, subumbonato, virgato-squamuloso, stipite cavo, fibrilloso, *primitus viscoso, intus luteo*, lamellis sinuat-decurrentibus, confertis, e flavo rufescenti-maculatis.

In dumetis subhumidis frondosis, praecipue betuletis, per maximam Europae partem vulgaris; vulgo catervatim nascens et saepe caespitosus.

Species distinctissima, plurimis notis privis ab omnibus diversa. Odor farinae recentis fortis, rancidus. Stipes cavus 3—5 unc. longus, 1/2 unc. crassus, rufescens L fuscescens, vulgo ventricosus (utrinque attenuatus) minorum tamen aequalis, rufofibrillosus, *primitus viscidus* apiceque nullus. Pileus carnosus, e conico-convexo explanato, late gibbus 3—5 unc. latus, viscosus, fibrilloso-virgatus vel innato-squamulosus, haud laceratus, rufofulvus, disco obscuriori vel totus vacinus (brunneo-rufus). Car. sat compacta, alba, sed stipitis vel tota vel in ambitu saltim lutea. Lamellae emarginatae sinulque dente eximie decurrentes, con-

fertae, flavae, tactae et senio rufescenti-maculatae. Exstat varietas minor, tenuior, pallidior.

Hujus vulgatae et a plurimis lictae speciei nulla exstat icon fida. Ag. *incertus* Schaeff. t. 62 ita ambiguus, ut ab aliis ad Ag. *melleum* ducatur. Ag. *compactus* Sowerb. t. 416, olim hue a Berkeley relatus, IDCD supra citato rectius ad Ag. *albobrunneum* ducitur. Cum hoc passim confunditur, et A. *albobrunneus dubius* Pers. Myc. Eur. 3, p. 178 sistit hujus formam. Verus Ag. *albobrunneus* Pers. eximie differt stipite solido sicco, apice albo-farinaceo, carne Candida, pileo laevigato sed fibrillis innatis virgato, lamellis dente haud decurrentibus e candido pallescentibus. Hujus boiam iconem praebet Schaeff. t. 38 [A. *striatus*, nomen ineptum].

Ex altera parte accedit & Ag. *nictitans*, at hic inodorus, pileus non virgatus, stipes farctus squamulosus, h-mellae absque dente decurrente e. s. p. Hujus icones praebet Bull. t. 574, f. 1, Hus^Jl t 46.

Tab. 27 figg. aipriorBs genuinum A. flavobrunneum sistunt.

XLL. AGARICUS USTALIS. FR.

- Fries Obs. 2, p. 122. 3. Myc. 1, p. 57. Monogr. 1, p. 57. Winn. Ross. p. 20.

A. leucodphyllus, Alb. et Schw. p. 163.

Diagn. Tricholoma pileo carnoso, e convexo piano, obtusD, laevi, glabro, viscosD, stipite aequali sicco rufofibrilloso, apice nudo sericeo-laevigato, lamellis emarginatis, confertis, candidis, demum rubello-maculatis.

Duplex exstat hujus forma, altera major, firmior in pinetis, altera minor tenuior in fagetis, praecedente minus frequens, ut lectus in Suecia meridionali, Rossia, Germania.

Ddore nullo pileoque laevi, haud virgato, mox a vicinis distinctus. Stipes farctus, dein cavus (in minori jam primitus), 2—3 unc. longus, 7/2 unc. circiter crassus, aequalis, siccus fibrillosus, rufescens, apice albidior, at non farinosus. Pileus carnosus, haud compactus, hemisphaerico-expansus, laevis, glaber, non virgatus nee squamulosus, at in var. minori disco ruguloso-punctatus, basi rufus, in var. tenuiori pallidior, disco obscuriori. Car. alba, fracta passim rubescens. Lamellae emarginatae, denticulo decurrente, confertae, latiusculae, candidae, dein rubello-maculatae.

Forma major et minor videntur constanter diversae, inter tot affines novas species aegre admittendas censent. Cum nulla vicinarum specierum forma primaria confundi potest, sed varietas minor vix diversa est ab A. *fulvello*, quae auctoritate tantum Bulliardii fretus ut subspeciem dubiam Ag. *nictitanti* subjunxit. Forsan A. *ustalis minor* cum A. *fulvello* speciem tam ab A. *nictitante*, quam A. *ustali* distinctam sistit.

Cum A. *ustali* quoad staturam bene convenit A. *frumentaceum* Bull. Hujus icon a me in Musaeo Holiniensi deposita cum Bulliardiana optime congruit et acedente odore frumentaceo de identitate dubitare non licet. A Berkeleyo ad Hyporhodium ducitur, et v. Post in schedulis monet hunc prius obtutum pro Hyporhodium non posse non haberi, sed esse p alii das.

Tab. 27 figurni; iulm)ri)s frjnnin mürjrmü Anj. nstalis sistunt.

XLII. AGARIDUS PESSUNDATUS. FR.

FT. Syst. 1, p. 38. Epicr. p. 23. Mono jr. p. 55. Weinm. Ross. p. 20.

Diagn. Tricholoma pileo compacto carnosissimo, convexo, obtusissimo, repando, granulato guttatoque maculato, stipite solido obeso, primitus ovato-bulboso squamulis albis undique villosis, lamellis e libero emarginatis, confertis, albis.

Ab hac definitione formae primariae *silvaticae* admodum recedunt duae sequentes, quae forsitan distinctam speciem, *A. starts* dicendam, sistant. Haec forma *silvatica* odore forti farinae recentis, statura curta instar *Ag. equestris*, pileo granulato 1. maculato a sequentibus facile dignoscitur. Haec tantum in pinetis Smolandiae lecta, quare iconem dare non possumus nee sequentes in vivo comparare licuit, ut de specifica differentia absolute statuere non possumus. Descr. pi en-am videas in *Monogr. L c.*

* *Ag. stans* pileo carnosissimo et convexo explanato viscido laevi (nee granulato, nee guttato-maculato), rufescente carne sub cuticula rubella, stipite solido subaequali squamulosis, lamellis rotundatis, confertis, albis, rubro-maculatis.

Duae exstant hujus formae sat notabiles, at certe ejus-

dsm speciei, altera *campestris*, in nemoribus frondosis, ambulacris etc. obvia; altera *montana* in silvis montanis, utraque circa Upsaliam haud rara. Fr. *Monogr. 1, p. 59.*

Haec duae formae habitu inter se haud parum differunt. Forma *campestris* stipitem habet obesum, rubellum, squamulosum, at non villosum, pileum latius magis applanatum, brunneorufum, obsolete squamuloso-virgatum?; forma *montana* habet stipitem ad 3 unc. elongatum, omnino aequalem, album, apice tantum albo-squamulosum, pileum minus, magis convexum et omnino laevem.

Utrum *Ag. starts* varietas an distincta species dijudicare non audeo. Numquam in eadem regione legere contigit, in qua genuinus *Ag. pessundatus* luxuriat. Dolendum me haud annotasse odorem *Ag. stantis*; si inodorus sit sine dubio vera species.

Tab. 28 sistit *A. pessundatum* * *stantem*; fig. superiores ejusdera formam *campestris*; inferiores *montanam*.

XLIII. AGARIDUS RESPLENDENS. FR.

Fries *Monogr. 1, p. 55.*

Diagn. Tricholoma candidum, pileo campanulato, e convexo expanso, laevi, glabro, viscoso, sicco nitido, stipite solido, subbulboso, glabro, sicco, lamellis emarginatis subconfertis.

In nemoribus, praecipue sub *Corylis* eximiam hanc speciem in Smolandia exeunte Septembri legimus. Iconem quoque misit def. *Lasch.* In *Darpathis* legit *Kalchbrenner.*

Gregarius, totus candidus, odore grato, sapore miti. Stipites solidissimi, totus carnosus et validus, 2—3 unc. longus, $\frac{x}{2}$ unc. crassus, mine bulbosus, nunc aequalis, laevis, glaber 1. apice inodorus leviter fioccosus, siccus, semper curvatus. Pileus aequaliter carnosus, at non compactus, primo convexus, dein explanatus, obtusus, 2—3 unc. latus, recens prorsus laevis et viscosus, siccus pulchre argenteo-splendens, saepe cum maculis hyalinis, discus lutescens et superficies adpressi sericea apparet, licet glabra sit. Lamellae juniores fere liberae, dein eximie emarginatae, subconfertae, tenues, integerrimae, 3—4 lin. latae, antice aequaliter attenuatae.

Habitus hujus speciei exactus *Hydrophori eburnei*, et primo ad *Hygrophoros Limacinos retuli*, sed stipite glabro, lamellis subliberis, tenuibus inter Agaricos manebit. Fungum esse esculentum vix dubitem.

Hic et *Ag. spermaticus*, in Anglia quoque lectus ex Berkeley, a reliquis Tricholomatibus albis differunt pileo viscoso. A se invicem quoque abunde differunt. *Ag. spermaticus*, cujus iconem em sat bonam dedit Paul. t. 45, f. 1—3, stipes subcavus tortus, pileus irregularis, margine primo infracto, at praecipue dignoscitur odore viroso, ut Paulet vel eriatum nens eat.

Singulari naturae lusu iconem hoc loco data etiam *Ag. albellum* juniorem bene refert; hic tamen non affinis est et ad aliam Tricholomatium tribum pertinet.

Tab. 29 figg. superiores *A. resplendens* referunt.

XLIV. AGARIDUS CDLUMBETTA. FR.

Fries Syst. Myc. 1, p. 44. Epicr. p. 32. Monogr. 1, p. 63. Weinm. Ross. p. 25. Berkl. Outl. p. 94.
A. albus. Pers., Alb. et Syhw. non Svhaeff. et Alior.

Diagn. Tricholoma, albus, pileo carnosus, e convexo explanato, obtuso, rigido, subflexuoso, sicco, primo glabro, deinde subsquamuloso fibrilloso, stipite solido, valido, subradicato glabro, lamellis emarginatis, confertis, immutatis.

In silvis frondosis Sueciae meridionalis et passim per Europam.

Species maxime mutabilis, ut duas species facile distinguere, hinc formas primarias seorsum describere necesse est. In omnibus color candidus, stipes firmus, pileus demum squamulosus 1. fibrillosus, odor nullus, sapor mitis, quo ab *A. albo* Schaeff. mox distinctus.

A. In betuleis ericctosis inter inuscos. Stipes obesus, unciam usque crassus, inaequalis, turpidus. Pileus semper fere repandus, immo lobatus primo glaber, kevis, demum rimose squamosus, margine junioris inflexo, tomentoso. Haec est forma primaria in Syst. Myc. descripta, *typica*, saepe rubello-maculata.

B. *Media* in dumetis. Stipes longior, aequalis, basi subattenuatus. Pileus subflexuosus, sericeo-fibrillosus, demum squamulosus, interdum fusescenti-maculatus. Margo vix villosus.

C. *Speciosior* in fagetis umbrosis. Stipes aequalis, cylindricus, 4 unc. usque longus, fibrilloso-striatus. Pileus regularis, explanatus, 4 unc. latus, evidenter fibrillosus, marginato nudo. Caro tenuis, scissilis, subinde coeruleo-maculata.

Formae A. et C. adeo diversae apparent, ut quisque pro speciebus distinctis haberet, nisi adesset forma illa *Wiedia*, quae aequo jure ad utramque trahi possit. A reliquis Tricholomatibus albis abunde differt, unice cum *A. unicolor* comparandus.

Tab. 29 fig. 1-3 inferiores sistunt *Agarici Columbetae* formam *mediam*. Pileum siccum fibrillosum clare exprimere pictori haud successit.

XLV. AGARICUS IMBRICATUS. FR.

Fries Obs. 1, p. 27. Syst. Myc. 1, p. 42. Monogr. p. 64. Weinm. Ross. p. 22. Berkl. Outl. p. 99.
Agar. rufus. Pers. Myc. Eur. 3, p. 175 non p. 61.

Diagn. Tricholoma pileo carnosus, compacto, e convexo explanato, obtuso, sicco innato squamuloso (umbrino-rufus), margine primo inflexo, pubescente, stipite siccato, vido, apice albo-pulverulento [bando cortinato), lamellis sinuato-adnatis sub confertis albis, dein rufescentibus.

Est e vulgatissimis in pinetis, regionum tarn raontsariim, quam carapestrium Europae saltim borealis et mediae.

Stipes solidus, firinus (tantum a larvis perfossus), mine curtus, conicus, 1/2—2 unc. longus, unciam usque crassus; mine protractus, 3 unc. longus, subaequalis, adpresso fibrillosus, apice albus, squamulis albo-pulverulentus. Pileus carnosus, compactus, e late convexo explanatus, obtusus, siccissimus, umbrinus 1. umbrino-rufus valde opacus, 3 unc. et ultra latus, disco contiguo, ceterum squamuloso-laceratus et versus marginem fibrillosus. Margo tenuis, primo leviter in-

flexus, pubescens, dein prorsus nudus. Caro firma, crassa, alba. Lamellae leviter emarginatae, fere adnatae, confertae, 3 lin. latae, juniores omnino albae, dein rufae.

Ag. vaccinus Pers. syn. (nee Schaeff.) cujus boia icon exstat in Pers. ic. et descr. t. 4, f. 4 sub nomine *A. rufi* cuius quo *A. imbricatus* confusus fuit, singulis partibus ab utroque differt stipite cavo, eximie cortinato, apice nudo, pileo campanulato expanso unbonato margine tomentoso e. s. l. — *Ag. vaccinus* SCHAEFF. ad suum honorarium perpetuum duxit PERSDDN, potius sisteret *A. imbricatum*; equidem videri potius Dortinarium censere. Mirum sane iconem hujus vulgatae hujus speciei desiderari.

Tab. 30 normalis *A. imbricatus* sistit formam.

XLVI. AGARICUS UNGUENTATUS FB.

Fr. Epicr. p. 27. Mtrnogr. Hymen. 1, p. 53.

Diagn. Tricholoma pileo leviter carnosus, e campanulato expansus, uninboriato, squamoso-floccoso viscido; stipite solidus, valido, laxe fibviloso lamellisq̄ emarginatis, confertis, per-latis, sordide albidis.

In pinetis raro. Leutus in Smolandia et Dstrogotia.

Species valde singularis, pileo squamato-floccoso et nihilo tamen minus primitus viscido, quo ab omnibus reliquis Tricholomatibus differt. Stipes solidus, validus, sed intus demum mollis, 3 unc. longus, 1 unc. crassus, aequalis, fibrillosus, et non striatus, griseus, intus albus. Pileus carnosus, sed raro tenuis, scissilis, e campanulato expansus, valde umbonatus, 2—4 unc. latus, totus cinereus, fimbriato-squamosus, squamis innatis floccosis viscidis, quasi unguento similis, Margo primo inflexus, villosus; dein patens, nudus. Lamellae eximie marginatae, 1 unc. lateae, confertae albidae. Inodorus.

E pileo viscido ad Tricholoma Linnaea referendus, at major adest affinitas cum Tr. Fimbrillata et in specie Ag.

terrev. Nulla enim adest perhula irrigata viscida ut in Trich. Limacinis.

Ad stirpem *A. terrei* insuper pertinent:

* *Stipite annulato*: 1. Agaricus ramentaceus BULL. — 2. Ag. cingulatus. FK. icon data in Linnaea 183D.

** *Stipite cortinato*: 3. Ag. gausapatus FR. — 4. *A. tristis* (SCDP.) FK.

*** *Stipite absque velo manifesto*: 5. *A. sculpturatus* Fu. — 6. *A. argyraceus* BULL. — 7. *A. terreus* (SCHAEFF.) Sowerb. Omnium horum novae deposuimus icones in Mus. Holm, quas vero h. 1. omitto, citari ex affinitate et descriptionibus facile dignoscantur.

Omnes species e stirpe *A. terrei* incolunt regiones campestris; in Smolandia occidentalis montoso-silvaticis nullae haurum observatae.

Tab. 31 figg. superiores hanc speciem sistunt magnitudine naturali:

XLVII. AGARICUS ATRODINEREUS PEBS.

Pers. syn. p. 348. Fr. Epitr. p. 37. Afonogr. 1, p. 72.
Ag. cuneifolius P., Fr. Syst. 1, p. 116.

Diagn. Tricholoma, rigido-fragilis, pileo carnosus, convexo-plano, sicco, glabro, demum rimose incisus, discus prominens et obscuriore, stipite farcto, oequali, glabro lamellisq̄ arcuatis adnatis ventricosis albidis.

Locis graminosis in campis et silvis haud raro. Legitimus in Scania ad Lund, prope Upsaliam ad Vårdsftra. Etiam in Germania, Rossia etc. lectus.

Fragilis, odore farinas recentis. Stipes farctus, intus inollis et nudus hyalinus, 2—3 unc. longus, 4 lin. crassus, aequalis, cylindricus, albidus, glaber, at e fibrillis longitudinaliter adpressis striatulus et apice nudus. Pileus carnosus, convexo-planus, 1 1/2 unc. latus, siccus, glaber, opacus cinereus, disco prominente obscuriore, primo laevis et integer, demum marginem revolutus et rimose incisus, at non squamuloso-diffractus. Dorsum pilei in fungo udo hyalina, hygrophana. Lamellae nunc liberae, nunc dente decurrentes s. arcuato-adnexae, plus minus ventricosae, tenues, confertae, hyalino-alboe.

Agaricy cuneifolio fragilitate insigni et odore farina recentis manifeste affinis, at major et plurimis notis distinctus. In *A. cuneifolio* stipes cavus, unciam 1. parum ultra crassus, deorsum attenuatus, apice pruinatus; pileus tenuior, subcarnosus inodo, dilutior, demumque in squamas diffractus; lamellae obovato-cuneiformes et apice oblique truncate. Hujus formam majorem sistit BATSCH t. 206 (mire ad diversissimum Hygrophorum pratense ducta) et minor e BULL t. 580 f A, B, quare nostram in Mus. Holm. depictam omittimus.

Nomen Persoonii *A. atrocinerei* forsitan dubium est hac specie neque iconem, nee plena descriptione fixa. Post Persoonium Synopsin haud incommemorata licet diversissimae ad hoc nomen tamquam varietates relatae. Definitiones vero haud obstanti-pretendenti hoc nomen tribuere optimum visum est.

Tab. 31 figg. inferiores varias *A. atrocinerei* exponunt formas.

XLVIII. *Agaricus sapidus* Fii.

Fr. Obs. 2, p. 101. *Linn.* 1830, p. 101. *Monogr.* 1, p. 69. *Weinm. Boss.* p. 23. *Berkl. Brit. Outl.* p. 101.

Diagn. Dlidus, firmus, pileo subcompacto, e convexo explanato difformi obtuso, sicco glabro, demum riniDse squamoso punctatove, margins primitus nudo; stipite solido, inaequali, subradicante; lamellis uncinato-emarginatis distantibus tenuibus integerrimis albo-pallescentibus (obsolete virentibus).

In silvis tarn frondosis quam aceris admodum vulgaris, saltim per omnem Europam borealem.

Odore pnnino peculiari, potius saponaceo, quam nitroso (ab *Ag. alcalini*, *Hygrophori murinacei* etc. prorsus diverso) semper tute dignoscitur, nee non substantia compacta, baud fragili, lamellis distantibus, pilei cuticula sicca, glabra, demum in squamulas *rimosa, ut etiam in aculis srepe rubellis tam carnis, quam stipitis laesorum. Stipes s Dlidus, 2^3 unc. longus, i unc. crassus et ultra/saepe inaequalis v. c. incurvatus, basi attenuata radicans, pallidus, nunc glaber, nunc praecox in silvis frondosis squamulosus, nunc autumnò seriori fibrillis nigris eleganter reticulatus. Pileus carnosus, e convexo planus, obtusus, 2—4 unc. latus, omnino glaber, JDVB pluvio udus quidem, at numquam viscosus, lasvis dein siccitate plus minus rimoso-rivulosus, punctatus l. in squamas diffractus, nDrmaliter fusco-lividus, sed variat albidus, cinereus, Dlivaceo-virens, nigrescens; margins tenui, glaberrimo, primD. ipflexo. Caro albidà, dissecta plus minus rubescens. Lamella3 uncinato-

imarginata3, distantes, tenues, integriiiiix!, albo-pallescentes; in varietate insigni luteo.

Species mire polymorpha, ut gregem potius facile fingas, hinc sub diversiq nominibus confusa, in Linnsea l. c. primo rite limitata. Inter hujus varietates prticipue eminent *altera*, inagis compacta et regularis, stipite subbulboso squamoso. Hue etiam *A. atrovirens* PERS., tenuior, obscurius virens, squamulis pilci CDnfertioribus. Hie in fagetis umbrDsissimis autumnò seriori lectus.

Synonymia vulgatae hujus speciei maximB intricata et ambigua. *Agaricus graveolms* Sow. t. 281 ad *Ag. gambosum* pertinet. *Ag. argyrospermus* BULL. t. 502 vix alibi citandus, at icon non characteristica. *Ag. fusiformis* SCHUM. Fl. Dan. t. 1729 habitu melius congruit, at describitur sericeus. Apud plurimos auctores ad diversissimDS relatus v. c. *Ag. luridunij jnyvmycetem, murinacvum* e. s. p. Species e stirpe NitrDSDrum apud Seer, hujus loci videntur. *Ag. cognatus* et *affinis* WEINM. in Syll. Fl. Ratisb, 1, p. 71; 11, p. B ab ipso Auctore hue reducuntur, at hujus descriptio melius in sequentem quadrat.

Tab. 32 figg. super, hujus udumbrant fDimam pileo fusco-virentB; iiA^B* riorcs variDtatBm alt warn lamellis luteis. Singulos lusus CDIDH^S pilei i¹Da licuit pingeiB.

XLIX. *Agaricus uutilagineus* BULL.

Bull. t. 589, f. 2 insufficieis! *Fr. Epicr.* p. 36. *Monogr.* p. 27. *Berkl. Outl.* p. 101. *A. unibrinus.* *Pers. Myc. Eur.* 214.

Diagn. Tricholoma pileo canmso, rigido, subfragili, e convexD expanso, gibbo, untlulatD, glabro, e cuticula rimulosa subtiliter atro-punLtatD, stipite subcavo brevi glabrD candido, lamellis emarginatis confertis albis.

Loco graminosD, humidiusculo in silva abiegna unico loco props Upsaliam copiosissime lppi. In flallia, Britannia et Rossia sinul lectus est.

Odor ex BERKELEY faring recentis, at in meD baud notibilis. Stipes subcavus, curtus - et firmus, at fragilis, 1—2 unc. longus, unciam fere crassus, candidus/ superficie polita, laevi et glabra. Pileus carnosus, haud compactus, rigidus, subfragilis, junior convexus obtusus, margine involuto pubescente, dein expansus, 2—3 unc. latus et ultra, undulato-repandus (siccitate rimoso-incisus), margine deflexo et incurvo persistente, semper siccissimus, minute et densissime gramilatus, sed granula omniid innata, a cuticula disrupta orta, primitus fideo contigua, ut pileus ater appareat; in adulta vero granula per rimulas ita distincta, ut fundus albus inter horum

myriades transluceat, quare pileus densissime nigro-piinctatus upparet. Daro alba. Lamella; emarginato-sinuatEe, confert^r sed tenues, 2 lin. latiti, alba*, dein griseo-pallescentes, ft* color purus.

No vain dedinius Inaxiini insignis speuei icDicin, cm¹¹ Bulliardi nullo modo characteristica sit, Junior niodo cartilagineus dici meretur, adnltiis enim mollis et fragilis. *M' hordus*, rigidofragilis, ab hoc abunde differt pileo haud punctato, sed in squamas demum squarrosas rupto lamellis^{que} subdistantibus. Hujus icon desideratur. Habitum refert *Sow.* t. 105, at noster inodorus. Apud nos in Scania tantum lectus.

Inter *A. mponaceum* et *cartilagineum* medium locum tenet rarissimus *A. miculatus* FR. *Monogr.* p. 70. Hie differt pileo compacto livido, disco modo rimuloso-granulato, lamellis distantibus.

Tal 33 figg. super, fungum statu naturali exhibent.

L. AGARIDUS ELYTROIDES (SCOP.) FR.

tiuop. Fl. Carn p. 424? Fr. Epicr. p. 3D. Monvgr. 1, p. 73.
A. lemniscus Trog! et forte Pers. Mi/c. Ear.

Diagn. TricholDina pileo carnosus, e convexo piano, obtuse, B granulis confertis, minutis prominulis scabro; disco floccosD-leprDSo; stipite farcto, molli, B fibrillis densis, sursum directis reticulato; lamellis emarginatis, perlatis cinereis.

In Europa australi haec species videtur passim obvia, licet nondum clare exposita sit; equiidBm per pliires annos leg'i cum p'ecedente mixtum.

Odor farinae recentis, at debilis. Stipes solidus, firmus sit mollis, 2—3 unc. longus, j—1 unc. fere crassus, deorsum plerumque attenuatus, e fibrillis densis, sursuin directis et adpressis, undique quasi imbricatis niaxime priva ratione reticulatus, extus cinerascens/intus sordide albus. Pileus disco excepto leviter carnosus, e convexo planus, obtusus, 2—3 unc. latus, fragilis, siccissimus, colore peculiari atrofusco l. inurino, sed adultior ex indumento floccoso-leproso canescens. Superficies enim pilei adeo peculiaris, ut simile vix viderim7 undique granulis confertis, minutis, prominulis scabra,

in disco verD floccDSo-leprosa et in areolas minutas rimosa. Caro alba, interdum rubens. Margo patens, interdum remote plicatus. Lamellae latissimae et p'ofunde emarginatae, fragiles, cinerese, demum pruinosae.

Species admodum peculiaris, quasi media inter *A. cartilagineum* et *terreum*, ab utroque tamen abunde diversa indumento peculiari tarn pilei quam stipitis-

Nomen Scopoli hue retuli baud obstante brevi descriptione; concedendum tamen plura veterum synonyma tantum privisorie esse determinata, donec in locis natalibus determinatio confirmetur. Eadem est ratio iconis *Batarrw (t. 17 D.)*, ex qua *A. lemniscus* Pers. Myc. Haec vero icon haud male refert nostrum fungum, quem quoque def. *Trog* sub hoc nomine misit.

Tab. 33 fig#. inferDi-es normal em *A. elytriditi* sistuut formam.

LI. AGARICUS VIRG-ATUS FK.

Fries' Sijst. 1, p. 48 Epiur. p. 39. Afonogr. 1, p. 75. Weinm. floss, p. 26.
Ag. niDcinereus v. niEtlus. *Alb. et Schw. Consp. p. 1751.*

Diagn. Rigidus, pileo carnDso, e convexo piano suburnbDnato, siccissimo, *lineolis innatis nigris virgato*, inargine primitus nudo; stipite solido valido, striato, glabrD, albo; lamellis emarginatis, confertis, canesceitibus.

In pinetis siccioribus Europa?, saltim mei'ia3 et borcalis vulgaris species, at vulgo solitarie nascens. In silvis fronsis, v. c. betuletis rarijr et in fagetis varietas insignis.

Ut omnes vicinae species nobilissima, pileo *virgato* ab omnibus haud viscosus mox distincta. Sapor junioris felleus, adulti mitior. Stipes solidus firmus, 3 unc. et ultra longus, \ unc. et ultra crassus, aequalis l. ipsa basi tuberosus, striatus, vulgo glaber, interdum squamulosus, albidus, intus albus. Pileus carnosus, at haud crassus, rigidus, e convexo explanatus, subumbonatus, etiam jove pluvio sic^us, laevigatus, glaber, sed fibrillis innatis atris virgatus, griseD-cinereus, umbone ssepe obscuriori; vetustus variat squamulosD-diffra-

ctus. Margo rectus et primitus nudus. Caro tenuis, cinereo-alba. Lamellae late emarginatae, 3—5 lin. htae, conferta3, canescentes.

In fagetis exstat varietas major, pileo nigrD-squamuloso, squamis secedentibus, bis terve modo lecta.

PileD nigrovirgato *Ag. portentosum* et affines in mentem revocat, at defectu pellicula3 viscosae pilei longe distat. Nee alii evidenter affinis; nisi forsitan *A. tumido* PERS., cujus bona icon data a KRDMBH. *t 72 f. 1—J*, quare nostram omittimus. Hie elatior pileo primo infractD, bullato, haud virgato, lamellis subdistantibus, saepe rufescentibus facile distinctus. Coloribus omnino similis *A. opico*, hie vero minor, pileo haud virgato, lamellis crassiusculis, minus confertis facile distinctus.

Tab. 34 Jig. sup mores Ag. virgantum julumb-rant.

LII. AGARICUS SUDUS Fit.

Fr. Epicr. p. 38. Monogr. 1, p. 73.

Diagn. Firmus pileo carnosus, e convexo applanato, sicco, glabrD, cin ere o-rufes cent e, ssepe disco rimoso-squamuloso; stipite solido cDinpacto, fibrilloso-striatD, squamuloso; lamellis profunde einarginatis, subconfertis, ex albino cinereis subrufescentibus.

In silvis IDcis graminosis montanis. Hactenus tantmn circa Upsaliam lectus.

Rara hajc species ust adinodum firina, inodora. Stipes solidus, compattus, 3 unc. usque longus, A unc. et ultra crassus, sequalis 1. sursum leviter attenuatus, fibrilloso-striatus 1. squamulosus, albidus cum levi tinctura rufescente. Pileus carnosus, c convexo-planus demumque depressus, iramo reflexus, obtusus, 2—3 unc. latus, siccus, hinc vetustus sjEpe rimose squamulosus instar *A. sajjonacei*, rufescens 1. fusconlfescens. Daro firma, alba. Lamellae profunde emaro-inatte cum dente decurrente, 3 lin. latee, cDnfertae, albidse, dein cinereo-rufescentes, at non maculatse.

Speciina hoc loco delineata a'prius lectis nonnihl recedunt, quamvis de identitate nulluin dubium. Stipès i) prius lectis squamulosus, nee fibrillosus, lamellte albte, acie tantum rufescente.

Primo obtutu *Ag. arcuatum* BULL, refert, at ab eodem longe diversus came coinpacta, quo ad aliam stirpem, nemp *Ag. saponacei*, pertinet. Ab mDC tute distinguitur omnium partium cobre, odore nullo, lamellis magis confertis etc. Exstat tamen forma [*Ag. sudus* B. Monogr. Hyrn. 1, p. 73) niter utrumque media, ulterius observanda. Minor est, stipe* vulgo tenuior, levis sordide rufescens. Caro in ^ilvum traissit^ Lamella minus confertae, exsiccate rufescentes.

Ag. sudus primo detectus 1835; dein per triginta anno frustra qua?si, donee ultimis annis priscis locis emersit.

Tab. 34 fig "g-infer. ai specimiiii 18G3 lecta depictw sunt.

LIII. A&ARICUS COMPACTUS.FK.

Monogr. Hymnm. II. p. 286.

Diagn. Tmholoma pileo spDngioso-compacto, e convexo piano, lasvi, sicco, glabro (cinerso-livido); stipite solich, glabro albo, lamellis rotundatis subdistantibus luteis.

Hactenus tantum lectus in lucis amtEnissimis in promontorio Vreta Udde ad lacum Mslaren.

Species insignis, obesa, robusta, inodora, statura Russularum. Stipes solidus, U—2 unc. longus, unciam et ultra crassus, aequalis 1. sursum attenuatus, lsevis, glaber, politus, albus. Pileus admodum carnosus, sed margin em versu tenuis, e convexo applanatus, obtusus, lsevis, glaber, 3 unc. latus, semper siccus, numquam rimose squamosus, cinereo-lividus. Daro crassa, spongioso-compacta, at stipitis mollior. Lamellte postice rotundatse, horizontales, leviter distantes, pro rations angusttp, (2 lin. circiter) opace lutetE, numquam maculatse.

Umiiiiu medium tenet, locum inter Tricholomata Rigid' et Spongiosa. Cum illis convenit pileo firmo compactf'»* pileus numquam rimosus, 1. squamosus. Hi_{nt} ad Spong. Ua potissimum referendus, licet nulla adsit inter hajc vere affinis. Agarici personati forma cinerea statura quidem similis, at non affinis.

Deterum hoc loco observare liceat cutem specieruo carne solid^a gaudentiuin siccitate facile ruiosam et squamo^s evadere; vix umquam autem specierum carne spou^s S^{losa} J "olli.

Quoad qualitates haec species convenire videtur cum *Ag. jwrsonato*, qui edulis est at minus sapidus. Huius fori^a typica [Sowerb. t. 209] pileo gaudet cinereo, at variat pile⁰ albl> fl18C0 et in var. *munda* [Fung, escul. Suec. t. 57] li^o lacino.

Tab. 6a hss. supBri01-BS *Ag. compactum* rrfurunt.

LIY⁷. AGARICUS LORICATUS FR.

FT. Epicr. p. 37. Monogr. Hymen. I. p. 71.

Diagn. Dartilagineus, tenax pileo campanulatD-convexo subundulato, udo (viscidulo) subpapilloso tenui, *cuticula crassa cornea discreta hricato*; stipite subcavD, aequali, rarlicato, striato-fibrilloso; lamellis attenuato-liberis, confertis pallidis.

In DDryletis Smolandia¹ olim legi, nuperius quoque in Uplandia lectus et delineatus.

Species pmtea, sed ab omnibus diversa came scissili; cute superiori 1 lin. crassa, subcornea, fusca Dmino discreta a medulla stipitis in centro intrusa inter cutein et hymenophoruin cum stipite contiguum. Ddor fortis, non gratus. Stipes carnosio-fibrosus, admodum tenax, subcavus, vulgo tortus et irregularis, 2—3 unc, longus, 2—3 lin. crassus, aequalis 1. deorsum attenuatus, testaceo-fuscus, nudo oculo glaber, sub lente fibrilloso-striatulus. Pileus leviter carnosus, e cainpanulato convexus, saepe undulatus et sinuatus, uvidus, 1—2 unc. latus, glaber⁷ sub lente punctato-rugulosus, nunc umbrino-, nunc livido-fuscus, circa marginem dilutior. Lamellae prorsus libera? et a pileo facile separabiles, admodum conferta?, ventri-

CSDB, integerrimse, aquose pallescentes 1. stramineD-albidse. Daro e tribus stratis a se invicem discretis constat: cute crassa, strato intermediD et hymenoph[>ro] cuti stipitis contiguo.

Est forsan *Ag. saponacei* personata forma, at tot eximias praebet notas, ut seorsim proponere cogamur. Odor non saporiceus, sed potius lixivise. Specimina circa Upsaliam lecta magis regularia sunt.

Agaricus Meleagris Sowerb. t. 171, juxta hunc secundum iconem citatam cDllocatus, ex observationibus Berkeleyi⁷ in statu perfecto annulum gerit et hinc ad Lepiptas referendus.

Plures, quam ceterum in animo erat, dedimus Tricholomatium icones, cum species etiam distinctissimae ex solis definitionibus aegre plend, certitudine determinentur. Dolemus nunc non licuisse addere icones *A. hordi* et *A. opici* e Rigidorum serie.

Tab. 35 fig. inferiores ad *Agaricum loricatum* Upsaliensi a typo recentem pErtinent.

L\'. AGARICUS AMIDUS FR.

Monogr. Hymen. I. p. 88.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, e convexo expanso, laevi, glabro, fusco; stipite solido tenaci subbulboso albo, lamellis subliberis latis distantibus candidis. "

In pinetis locis mi^scosis subirriguis v. c. Kongsparken prope Upsaliam pluries legimus.

Solitarius, nee unquam csespitosus, quare exiinie regularis et BUinorpus. Ddor nullus. Stipes solidus extus tenax et iibrosus, intus spongiosus, a basi ad apicem attenuatus et vulgo bulbosus et villosus, striatulus, albus. Pileus carnosus, at non compactus, priina setate subcampanulatus, mox e conAexo expansus et srepius gibbus, 3 unc. usque latus, semper regularis, laevis, glaber⁷ jove pluviD udus quidem, at siccatus non expallens nee senio decolorans, fuscus. Lamellae postice Totundata³, fere liberal, absque dente in stipitem decurrente, distantes, 3—4 lin. latte et ultra, haud venosae, Candida?.

Nullus ad est, cum quo comparetur, prater *Ag. Maluvivum*, Europae australis incolam, cujus bonam iconem dedit KRUMBH. t. 13 f. 1—4. Inter omnes vicinos *A. amicus* lamellis fere liberis et distantibus praecipue insignis.

Stipitis structura fere Dlitocybarum. Externa facie accedit ad *Ag. pullum* PERS., testibus Alb. et Schwein. Hie vero differt pileo compactis, semper Dbtuso, margine lamellas excedente, lamellis emarginatis confertis. Apud nos in fae-etis niodo lectus.

Fungos CDlore nitido, rubro luteove, apud Auctores sa3pius pictas vidimus; vulgo autein praeterviste species colore cinereo et fuscD, quare plurimae sine iconibus tegre determinantur.

Tab. 33 fig. super, ad *A. amiewn* spectant.

LVI. AGARICUS PANAEOLUS FK.

Fr. Epicr. p. 49. Monogr. p. 87.

Diagn. Tricholoraa pileo spongiDSo-compacto, convexo-plano, niaculis griseo-pruinosis variegato saepeque guttato, marline inflexo-repando, stipite solido brevi, fibroso-striatD, lamellis arcuato-adnatis subconfertis griseis l. sordiiie rufescentibus.

In pinetis campestribus locis graminosis prope Upsaliam, suis loçis quotannis obvius. Singularis hujus var. *calceolus* in Coryleto lecta.

Ddor nullus. Stipes solidus, tenax, extus fibrosus, intus spongiosus, unciam longus l. parum ultra, i unc. urassus, glaber, nudus sed impolitus, fibroso-striatus, albido-griseus. Pileus carnDsus, haud crassus sed firmus, e conveXD applanatus vel passim depressus, semper obtusus, S unc. latus, passim repandus et excentricus, laevis cinereD-fuligineus, pruina quasi innata griseus et variegatus. DarD tain pilei, quam stipitis spongiosa, bibula? sicca alba, sed pileus nullo mo do hygrophanus. Lamellae emarginatae l. rotundatae, demum pileo depresso subdecurrentes, valde confertae, integerrimae, hori-

zontales, plus minus arcuatae, 2 lin. latae, ex albo griseae L rufescentes,

Var. *Calceolus*, pileo magis carnoso, excentrico, lateraliter producto, maculis farinosis griseis variegato, stipite brevissimo fusiformi. Hunc exacte referunt *Sterb. t. Gf. E—G.*

Hie ab omnibus praecedentibus et *A. patulo* longe distat et *Ag. arcuato* proximus, qui verD differt pileo crasso, nudD, umbrino-nigrescente l. rufofuscD eximie decolorante et expallente, carne demum alutacea, stipite basi incrassatD, lamellis candidis. *Ag. arcuatus* BULL, sistit typum peculiaris stirpis, ad quam pertinent *A. panceolus*, *A. melaleucus* PERS., *A. brevipes* BULL., *A. humilis* P., *A. subpulverulentus* P. Etiam *A. grammopodius* BULL, et *A. excisus* FR. his accedunt, licet magis a typo distent. Horum novas icones iepDSuimus in Mus. Ac. Holm.

Tab. 36 figg. inferiores *A. panceolum* magnituiline naturali representant.

LVII. A&ARICUS PATULUS FK.

Fr. Epicr. p. 47. Mqnoqr. L p. 87.

Diagn. Tricholoma pileD carnoso, e convexo pjano, subrepando, la&vi, glabro; stipite solido, firmo, elastico, aequali, glabro lamellisque emarginatis, confertis, reticulatD-conjunctis, albis.

In nemoribus frondosis Suecire, Rossiae etc. hinc inde; copiose in betuletis ad Fredrikslund Uplandiae.

Solitarius l. catervatim nascens, inodorus. Stipes carnosus-fibrosus elasticus, solidus, firmus, 2—4 unc. longus, i—1 lin. crassus, aequalis, glaber, albus. Pileus carnosus, firmus, convexo-planus, obtusus, s^pius repandus, 2\—4 unc. latus, lajvis, glaber, pallide cinereus. Caro sat tenuis, alba. Lamellae constanter et a3qualiter emarginatae (npr rotundat, "ti *A. amici*), fere liberae, confertae, pro ratione angustae (2 lin.), plante, ad latera subvenosae, albiae.

Cum nullo prsecedentium Tricholomatum comparandus, potius cum Dlitocybis difformibus pra3cipue in statu ctespitosD. Ab his vero bene distinctus lamellis eximie emarginatis et fere liberis. Adest quoque quoad cobres similitudo cum *A. platyphyllo*, at hie nullo mDdo affinis pileo tenuiori, virgato lamellisque latissimis mox distinctus.

A. patulus est inter fungos meteoricos, qui aliis pluvi[>]sis annis maxime luxuriant, aliis vero siccissimis desiderantur. Hie annis siccioribus solitarius, pluviosis vero maxime c^espi-tosus.

De qualitatibus hujus et prrccedentium nil novimus; sapor miti, sed vix edules.

Tab. 37 figg. auperiDres *A. patuli* prtebent imaginen.

LVIII. AGARICUS CAELATUS FR.

Fries Epicr. p. 42. Monogr. I. p. 82.

Diagn. Tricholoma pileo carnosulo, convexo, *umbilicato*, flocculoso-laevigato, dein rimuloso-rugoso expallente; stipite flocculoso-farctD, tequali, glabro, fuscD; lamellis sinuato-adnatis, confertis, sordide albidis.

In collibus silvaticis olim adustis inter Polytricha olim quotannis legi in Smolandia et nuperius iisdem locis filius Osc. ROBERT, qui iconem direxit. Circa Upsaliam nDn vidi.

Pusillus, inodorus. Stipes tenax, elasticus, at non cartilagineus, minorum farctus, majorum cavus, parietibus internis villosis, uncialis modD 1. infra, 1—1\ lin. crassus, sequalin 1. apice leviter incrassatus, fuscus, obsolete pruinDSus. Pileus carnosulus, convexus, sed centro depressus, unciam vix superans, exstrius, recens glaber fuscus; sed exsiccatus griseo-pallens, non tamen hydrDphanus. Lamellae sinuato-adnexe, cum denticulo decurrente, confertae/ leviter arcuatae, sordide albidte 1. griseae.

Species admodum peculiaris, toto habitu insignis et cum nulla alia Tricholomatum specie comparanda. Potius primo obtutu OmphalitE speciem finges *oh* pileum constanter umbilicatum. At stipes nullo modo cartilagineus et lamellae pDstice manifeste sinuatae. *Agar. Trich. putidus* statura et coloribus quidem praesentem refert, sed hujus pileus umbonatus, odor fortis farinae recentis, ut alias differentias taceam.

Vere affines tantum inter Clitocybas invenimus, nempe *Ag. hirneolum* et *Ag. parilem*, cum quibus statura, colore et sporis SDRdide albis congruit, at hi lamellis decurrentibus plurimisque notis ceterum longe recedunt.

Quodad locum hujus speciei systematicum attinet, in praesente optime collocatur inter *Tricholomata Sericella*, inter hos peculiaris stirpis typum indicans—

Tab. 37 figg. inf. hanc speciem depingunt.

LIX. AGARICUS LASCIVUS FR.

Syst. Alyc. I. n. 110. Epicr. p. 40. Monogr. I. p. 77. Weinm-Ross. p. 62.
Seer. Helv. p. 853. Berk. Dull. p. 102.

Diagn. Graveolens, pileo camDSD, CDnvexo-plimo, obtusD subdepresso, e sericeo glabratD, laevi, alutaceo, stipite solido, tequali, rigido, basi radicatD lamellis arcuato-adnaxis *confertis* albis.

In silvis frondosis inixtis et quercetis vulgaris per plerasque Europe regiones, at in Suecia tantum in regione Fagi legimus.

Odor fortis, quodammodo Philadelphi, faetens. Stipes solidus, rigidus, totus fibrosus, 2 unc. et ultra longus, aequalis, fibrillosus, albidus, basi radicatus et tomentosus, apice albo-pruinatus. Pileus carnosus, e convexo planus, obtusus demum depressus, 2 unc. et ultra latus, subtiliter sericellus, inargine priniD involuto. Caro alba (in *A. sulfureo* lutea). Lamellae arcuato-adnexae, demum subdecurrentes, conspicue tenuiores et confertiores quam *A. sulfurei*, albs.

Incipit novam Tricholomatum seriem pileo siccd primo sericellD, in qua *A. sulfureus* BULL. — *FL Dan. t 1910 f 1* et *A. bufonius* PERS.—" BULL. t. 545 f. 2. 0, peculiarem stirpem sistunt, quibus ad do *A. lascivum* et *inamaenum* nondum delineatos. *A. lascivus* medium omnino tenet locum inter *A. sulfureum* et *inamaenum*. Dmnesodore peculiari foetido dignoscuntur et *A. lascivus* ab omnibus vicinis lamellis confertis. Hunc insuper semper legi in silvis frondosis, sequentem tantum in pinetis.

Ad *A. lascivum* porrD accedit *Ag. stiparophyllus* Lund. Holm. p. 10 cujus differentia specifica mihi nondum satis clara. Hujus habitus omnino *A. acerbi*, sed pileus margine numquam sulcatus. Ab *A. lascivo* differt stipite subbulboso, carne pilei compacta. Odor ut in reliquis e stirpe *A. sulfurei*.

Tab. 38 figg. superiores *A. lascivum* ante DCUIDS ponunt.

LX. AGARIDUS INAMDENUS FR.

Fr. Syst. 7. p. 111. *ffpivr.* p. 40. *Monogr.* 1. p. 78. *Weinm., Seer., Berkeley II.* cr.

Diagn. Foetens pileo carnosD, convexo-plano, subuinbonato, e sericello glabrato, lcevi (albido); stipite solido, tequali, radicato lamellis que arcuato-adfixis decurrentibusve distantissimis candidis.

In pinetis montosis Sueciae totius per totam aestatem et autumnum frequens, sed in regionibus cainpestribus rarescit et in silvis frondosis numquam lectus. Etiam in exteris terris videtiir vulgaris et ab omnibus recentioribus Mycologis indicatus.

Odor *A. sulfurei*, sed fortior, mihi gravissimus. Stipes solidus, firmus, 3 unc. longus et ultra, 3—6 lin. crassus, s^qualis, glabriusculus, albus; inter muscos basi radicata, villosa auctus. Pileus carnosus, sat tenuis at firmus, e convexo explanatus, subumbonatus, 1—2 unc. latus (prioris minor), siccissimus, e seripello glabratus, la^vis, pallescens, sor-

dide albus s. dilute alutaceb-albus; interdum discD lutescens-Lamellse varie adfixaB, normaliter emarginatre cum dente decurrente, sed interdum vere decurrentes, planse, crassiusculiV maxime distantes, distinctse, candidae.

Cum prtecedente odore aliisque nbtis convenit, at lainell¹⁸ valde distantibus candidis ab omnibus vicinis dignoscitur-Singularis in hac specie varia lamellarum insertio, at cum frequentius emarginatse, cDnfirmaote affiriitate sine dubio vera Tricholomatis species. Inter Clitocybas nulla exstat affinis species.

Ut odor, sic etiam sapor harum specierum admodum in' gratus, virosus et huic stirpi omnino peculiaris ut inter fun^os venenatos sint numerandi. Analysi chemica digni sunt-

Tab. 38 fi^ inferiores adumbrant formam pilei iliauo lutescentis.

LXL A&ARICUS CERINUS PERS.

Pers. syn. p. 321. Syst. Myc. I. p. 89. Epicr. p. 41. Weinm. Ross. p. 10.

Diagn. Tricholoina pileo carnosO, convexo-plano, obtuso depressove glabrato, lsevi; stipite farcto, fibrilloso-striato, basi glabro, lamellis adnexo-secedentibus CDnfertis luteis.

In pinetis siccioribus inter muscos minus frequens, at legi in Smolandia, Uplandia, Nericia. In Germania defexit PERS DON, in Rossia WEINMANN.

Minor, puinilus, inodorus, stipitis fabriuti ad Clitocybas accedens, sed lamellse in rite evoluto sinuatae. Stipes farctus, unciam longus, 2—3 lin. crassus, tequalis, nudus, fibrillosD-striatus, luteus; interdum basi fuscus. • Pileus camDSUs, e convexo explanatus demumque depressus, 1—li unc. latus, siccissimus, lrovis, glabratus, colore sordide cerino l. fusoescente. Caro tenuis, at firma, alba. Lamellae sinuato-adnexae, seepdentes, horizontales", plante, admodum tenues et confertse,

lineain latae, obscure luteac l. *. cerinaB, sed sporsc &innin° albae sunt.

Species distihetissima, at plerisque Mycologis ignota it in speciebus alienis v. c. Flammulis quaesita, icon nulla hact'-nus data. Quamvis colores longe recedant, statura et fabric* *A. jonidi* videtur proxiine accedere. Quoad colores *Ag. Gift-vernico* stiam sat similis; ille vero lamellis decurrentibus• et sub distantibus flavis bene distinctus. *Ag. chrysenterus* **BULL.** t. 55G dignoscitur carne lutea et stipitis basi radicante villosa. Hunc semel ligriD putrido innascentem legi.

Odor nullus notabilis. Saporem non annotavi. Hie vero et sequentes tain exigui sunt, ut de eorum usu in cibariis non sit sermo.

Tab. 39 fttg. super, varios status *Ag. cerini* ante DCUIDS ponunt.

LXII. AGARICUS ONYCHINUS FR.

Fr. Epivr. p. 41. Monogr. I. p. 79.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, convexo-plano subumbonato, glabrescente, *marginem versus purpureo-sericeo*; stipite solido, aequali, fibrilloso-sericeo, apice floccoso rubello; lamellis mox liberis, linearibus, confertis, luteis.

In pinetis inter muscos in Smolandia rarissime. In Dstrogotia legit amicus v. POST formam majorem, stipite fuscescente.

Fungus admodum elegans, regularis, firmulus. Stipes solidus, 1—1½ unc. longus, 2 lin. circiter crassus, laevigatus, at accuratius inspectus subtiliter fibrilloso-sericeus, pallidus, apice leviter purpurascens. Pileus carnosulus, eurorophus, junior convexo-planus cum umbone (nee uti prior demum depressus), dein planus umbone evanescente, 1—1½ unc. latus, siccissimus, opacus, badip-rubens 1. obscure purpureus, versus marginem eximie regularem et pallidiorem velamine sericeo. et purpureo obductus. Caro tenuis, sed firma, lutescenti-alba. Lamellae per omnes setates horizontales et plante,

postice rotundatse primo attingentes, dein liberae, admodum confertse, 1—2 lin. latae, valde inaequales, obscure lutese.

Affinitas hujus cum *A. cerino* manifesta; at coloribus, pileo umbonato, numquam depressus, versus, marginem purpureo-sericeo, stipite solido apice rubello-sericeo, lamellis mox liberis facile distinctus. Indumentum pilei junioris purpurascens *A. rutilantem* in memoriam revocat, sed in *A. onychino* superficial, licet arete adpressum, in *A. rutilante* autem a cuticula pilei lacerata originem ducit.

Descriptio supra data ad specimina optima, ad Yaberg prope Fensjö lecta, facta est. Cum vero hujus nulla adsit icon, formae elatioris, stipite fuscescente ad Reymyra ab amico v. PDST lectae, inserere coactus fui. Haec sistit formam senilem margine striato.

Tab. 39 figg. infer. *A. onychinum* in statu senili representant.

LXIII. AGARICUS JONIDES BULL.

Var. *persicolor*. Fr. Monogr. p. 80.

A. perainvis. Lasch nee Fries.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, convexo-plano, obtuso, glabro, persicino expallente, stipite tenaci subcavo laevi pallidioris, lamellis sinuatis, tenuibus, confertis, candidis.

Ad terrain graminis per plerasque EuropaB regiones. Varietas hoc loco oblata lecta est ad latera yiarum prope Upsaliam.

Stipes primus farctus, dein cavus, tenax, longitudinaliter fissilis, 1—2 unc. longus, 2—3 lin. crassus, aequalis, pileo, subconcolor 1. sordide pallescens, apice albo-maculosus. Pileus carnosus, convexus, dein explanatus, in praesente forma semper obtusus et interdum depressus, 1—3 unc. latus, laevis, glaber, jove pluvio udus, e persicino incarnato-pallescens. Caro sat crassa, aquosa, fragilis. Lamellae leviter sinuatae, admodum confertae, tenues, 1—2 lin. latae 1. parum ventricosae, candidas. Odor nullus.

Agaricus jonides plures complectitur inter se adeo recedentes formas, ut ulterius in vivo comparatae tamquam di-

stincta? species forsan sint separandae. Hinc necesse duximus hoc loco exhibere formam vulgatiorem et constantem, quam defunctus Lasch *A. persicinum* dixit, a meo vero *A. persicino* diversam. *Ag. fallax* Lasch idem videtur ac *A. purpureus* PERS. et *Ag. purpureus* BOLT, forsan jungendus cum *Ag. pravo* LASCH. Horum examen futuris observatoribus commendo. Formam violaceam in Suecia nondum legi.

Quoad affinitatem naturalem *A. jonides* e statura, lamellis etc. ad stirpem Tricholomatum sericellorum referendus, licet pileus sit glaber. Si vero variae hujus formae separentur, sit peculiaris stirpis typus, cui etiam sequentes adscribendae.

Ag. persicinus noster ab *A. jonide* toto habitu longe recedit et ad stirpem Hygrophanorum referendus.

Tab. 40 figg. superiores *A. jonidem* v. *persicolorem* praesentant.

LXIV. AGARICUS DARNEUS v. PAEDNIUS.

A. carneus. Bull. t. 133. Fr. Syst. 1. p. 130. Berkl. Outl. p. 101.

A. paeonius. Fr. Epicr. p. 42.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, convexo-plano, obtuso, laevi, e sericello glabrato, margine flocculosD stipiteque cavo, molli, fragili persist enter rubris, lamellis rotundato-liberis ventricosis candidis.

In campis apricis graminosis post largas pluvias aestivales raro, at jam variis locis lectus, ut in Smolandia, Ostrogotia, Uplandia.

Species pusilla, elegantula, inodora. Stipes fibroso-mollis et fragilis, nee tenax ut in vicinis (quare optima Tricholomatis species), ceterum cavus, uncialis, 2—3 lin. crassus, flocculosus, carneo-ruber. Pileus e convexo planus, obtusissimus, \ unc. latus, lsevis, siccus, e sericello glabratus colore persistenter rubro, fere Paeoniae, nee prioris instar expallens. Margo inflexus, flocculosus. Dario pro ratione magnitudinis pilei crassiuscula, mollis, alba. Lamellae rotundato-liberae, confertae, candidae.

Medium tenere ID cum videtur inter *A. jonidem* et *carwleum*, cum quo passim confusus, at ab utroque plurimis gravissimis notis distinctus, ut stipite molli, flocculoso, pileo primo sericello, margine flocculoso nee non colore persistente. Loco vacuo nunciam hujus damus iconem comparationis gratia cum frequente.

Quoad staturam cum nostro congruit *Ag. Gussoni* I^m zengae Fung. Sicul. t. 1 f. 2, sed lamellae hujus saturate rosae et nitidae, et tamen Leucosporus dicitur. Quoad colores et habitum multa habet communia cum *Clitoc. incili*, sed hic multo major, pileo demum infundibuliformi lamellisque decurrentibus longe distat. Caveas insuper ne confundas cum *Ag. delicato* annulo deciduo.

Tab. 4D fig-g. mediae *Aj. carnei* v. *paeonium* exhibent.

LXV. AGARICUS CARNEOLUS FR.

A. carneus. Epicr. p. 42. Monogr. Hym. 1. p. 81.

Diagn. Tricholoma pileo carnosulo, ex hemisphaerico convexo-plano depresso, obtuso, laevi, glabrello, expallente stipiteque subfarcto, brevi, rigido, sursum pruinato e carneo albicantibus; lamellis postice latissimis, rotundatis, confertissimis candidis.

Ad terram locis graminosis Suecici rarior. Specimina hoc loco picta ad Halmbyoda Uplandia lecta.

Species pusilla, tenax, inodora. Stipes tenaciter fibrosus, fere cartilagineus, rigidus, primo farctus, dein cavus, uncialis et infra (interdum brevissimus), lineam crassus, deorsum attenuatus, ex incarnato albicans, apice subpruinosis. Pileus tenuis, leviter carnosus, primitus hemisphaericus, dein convexus et regularis, obtusus, demumque explanatus it reflexus, saepe cum umbone, vulgo repandus, immo excentricus, unciam latus, lsevis, glaber, siccus, nequaquam hygrophanus, sed color e rubro-carneo expallens. Caro tenuis, nivea.

Lamellae rotundatae, subliberae, horizontales, confertae, postice latiores, 1—1¹ lin. late, candidae. • • • ;

Species inter Tricholomata et Dollybias intermedia (stipite fibroso-cartilagineus, nee mollis prioris); De similitudine cum precedentibus hoc ID inserendus. In statu exsiccato aridus et *Marasmius scorodonii* haud absimilis. Quibus notis a precedentibus differt a descriptionibus datis facile elucet.

Hanc speciem cum praecedente commutavi, quare hujus nomen ad hunc nobiliorem incaute relatum.

Hoc ID observare liceat species per retatem expallente maxime differre ab *hygrophanis*, quae jove sicco colorem nativum in statu humido mutant.

Tab. 4D f. 3. *Agaric. carneolum* sistit sub nomine *A. carnei*.

LXII. AGARICUS ONYCHINUS FR.

Fr. Epicr. p. 41. Mmogr. I. p. 79.

Diagn. Tricholoma pileo carnosD, convexo-plano subumhonato, glabrescente, *marginem versus purpureo-sericeo*; stipite solido, aequali, fibrilloso-sericeo, apice floccoso rubello;-lamellis mox liberis, linearibus, confertis, luteis.

In pinetis inter muscDS in Smolandia rarissime. In)strogotia legit amicus v. POST form am majorem, stipite fuscescente.

Fungus admodum elegans, regularis, firmulus. Stipes solidus, 1—U unc. longus, 2 lin. circiter crassus, lsevigatus, it accuratius inspectus subtiliter fibrilloso-sericeus, pallidus, apice leviter purpurascens. Pileus carnosulus, eumorphus, junior convexo-planus cum umbone (nee uti prior demum depressus)7 dein planus umbone evanescente, 1—li unc. latus, -ieccissimus, opacus7 badio-rubens l. obscure purpureus, versus marginem eximie-regular em et pallidiorem velamine sericeo et purpureo obductus. Caro tenuis, sed firma, lutescenti-alba. Lamellae per omnes setates horizontales et planar,

postice rDtundatae primD attingentes, dein libera)7 admodum confertai, 1—2 lin. latae, valde inaequales, obscure lutea?.

Affinitas hujus cum *A. cerino* manifesta; at coloribus, pileD umbonato, numquam depresso, versus marginem purpur eo-sericBD, stipite solido apice rubello-sericeo, lamellis mox liberis facile distinctus. Indumentum pilei junioris piirpurascensns *A. rutilantem* in memoriam rsvocat, sed in *A. onychino* superficial, licet arete adpressum, in *A. rutilante* autern a cuticula pilei lacerata originem ducit.

Descriptio supra data ad specimina optima, ad Yaberg prope Femsjö lecta, facta est. Cum vero hujus nulla adsit icon, form^ elatioris, stipite fuscescente ad Reymyra ab amico v. POST lectse insersre coactus fui. Haec sistit formam senilem margine striato.

Tab. 39 figg. infer. *A. onychinum* in statu sBnili repreesctant.

LXIII. A&ARIDUS JDNIDES BULL.

Var. persiuolor. Fr. Mvnoqr. p. 8C.
A. piirsicinus. Ladch. nee Fries.

Diagn. Tricholoma pileo carnosu, convexo-plano, Dbtuso lBVI, glabro, persicino expallente, stipite tenaci subcavo lacvi D]allidiore, lamellis sinuatis, tenuibus, confertis, candidis.

Ad terram graminosam per plerasque Europa? regiones. Varietas hoc IDCD oblata lecta est ad latera viarum prope Upsaliam.

Stipes primo farctus, dein cavus, tenax, longitudinaliter fissilis, 1A—2 unc. longus, 2—3 lin. crassus, sequalis, pileo subcDncolor l. sordide pallescens, apice albo-maculosus. Pileus carnosus, convexus, dein explanatus, in prtesente forma semper obtusus et interdum depressus, 1—3 unc. latus, laevis, glaber, jove pluvio udus, e persicino incarnato-pallescens. Caro sat crassa, aqiiosa, fragilis. Lamellae leviter sinuatge, admodum cDnfertae, tenues, 1—2 lin. lata^ 1. parum ventricosiE, Candida?. Odor nullus.

Agaricus jonides plures complectitur inter se adeD recedentes formas, ut jiliterius in vivo comparatae tamquam di-

stinctae species forsan sint separandae. Hinc necesse duximus hoc IDDD exhibere formarn vulgatiorem et constantem, quam defunctus Lasch *A. persicinum* dixit, a meo vero *A. persicino* diversain. *Ag. fallax* Lasch idem videtur ac *A. purpureus* PERS. et *Ag. purpureus* BDLT. forsan jungendus cuin *Ag. pravo* LASCH. Horum examen futuris observatoribus commendo. Formam violaceam in Suecia nondum legi.

Quoad affinitatem naturalem *A. jonides* e statura, lamellis etc. ad stirpem Tricholomaturn sericellorum referendus, licet pileus sit glaber. Si vero variae hujus formae separentur, sit peculiaris stirpis typus, cui etiain sequentes adscribendrc.

Ag. persicinus noster ab *A. jonide* toto habitu longe recedit et ad stirpem Hygrophanorum referendus. *

Tab. 40 figg. supBriDrea *A. jonidem* v. *persicolvrem* prebent.

LXIV. AGARIDUS PAEONIUS FR.

Epici: p. 42. Monuyi: Hymen. I. p. Sl.

Diagn. *Tricholoma pileo carnosio, convexo-plano, obtuso, laevi, e sericello glabrato, margine flocculoso stipiteque cavo, raolli, fragili persistenter rubris, lamellis rotundato-liberis ventricosis uandidis.*

In campis apricis graminosis post largas pluvias aestivales raro, at jam variis locis lectus, ut in Smolandia, Dstrogotia, Uplandia.

Species pusilla, elegantula, inodora. Stipes fibroso-mollis et fragilis, nee tenax ut in vicinis (quare optima *Tricholomatis* species), ceteruin cavus, uncialis, 2—3 lin. crassus, flocculosus, carneo-ruber. Pileus e convexo planus, obtusissimus, A unc. latus, lsevis, siccus, e sericello glabratus colore persistenter rubro, fere Paeonise, nee prioris instar expallens. Margo inflexus, flocculosus. Caro pro ratione magnitudinis pilei crassiuscula, mollis, alba. Lamellae rotundato-liberae, confert^B, can d i da³.

Medium tenure locum videtur inter *A. jonidem* et *carneum*, cum quo passim confusus, at ab utroque plurimis gn^v-vissimis notis distinctus, ut stipite molli, flocculoso, piko primo sericello, margine flocculoso nee non colore persistent^A

Quoad staturam cum nostro congruit *Ag. Gussonflyzengae* Fung. Sicul. t. 1 f. 2, sed lamella hujus saturate roset^B et mtidae, et tarn en *Leucosporus* dicitur. Quoad colonis et habitum multa habet communia cum *Clitoc. incili*, sed hie multo major, pileo demum infundibuliformi lamellisque decurrentibus longe distat. Caveas insuper ne confundas cum *Ag. delicato* annulo decidup.

Tab. 40 figg. mediae *Ag. pxonijm* exhibit.

LXV. ABARIDUS CARNEUS. BULL.

Bull. t. 333 J. l. Prkv. p. 42. AhmwjV. Ibfni. l. p. HL Secret, n. 739. Berk. Outl. p. 101.

Diagn. *Tricholoma pileo carnosulo, ex hemisph^Arico convexo-plano depressove, obtusD, l^tDvi, glabrello, expallente stipiteque subfarcto, brevi, rigido, sursum pruinato e carneD albicantibus; lamellis postice latissimis, rotundatis, confertissiniis candidis.*

Ad terrain locis graminusLs rurior, sed per plerasque Europe regiones lectus. Speoimina hoc loco picta ad Halmbyboda Uplandia lecta.

Species pusilla, tenax, inodora. Stipes tenaciter fibrosus, fere cartilagineus, rigidus, primo farctus, dein cavus, uncialis et infra (interdum l^trevissimus), lineam crassus, deorsum attenuatus, ex incarnato albicans, apice subpruinDsus. Pileus tenuis, leviter carnosus primitua hemisphaericus, dein convexus et regularis, obtusus, demumque explanatus et reflexus, sa³p^B cum umbone, vulgo repandus, immo excentricus, unciam latus, kevis, glaber, siccus, neutiquam hygrophanus, sed cplor

e rubro-carneo expallens. Caro tenuis, nivea. Lamellae rotundata^B, subliberai, horizontals, confertre, postice la³or. 1—U lin. lata^B, Candidas.

Species inter *Tricholomata* et *Collybias* intermedia (atip^vnbroso-cartilagineus, nee mollis prioris); ob similitudinem cum pracedentibus hoc loco inserendus. In statu x^ssiccato aridus et *Marasmio scorodonio* haud absimilis. Omibus notis a pracedentibus differ^t a descriptionibus datis facile elucet.

Loco in tabula vacuo hanc speciem addo, cum Bulliar^{ji} ngura sistat formam a mea, recedentem - et iⁿsuper comp^anationis gratia cum prjecedente.

Hoc loco observare liceat species, pe^r etatem expallent^s maxime differre ab *hyqronham?* n, i[^] • w[^]nanis, qua? jove sicco cobrem n^a-tivum in statu humido mutant.

Tab. 40 f. 3 memorabil^{em} A. carnei formam aiumbat.

LXVI. AGARICUS BDREALIS FR.

Fries Epicr. p. 44. Monogr. Hymen. I. p. 84.

Diagn. Tricholoma pileo carnosò, irregulari, subumbonato, glabro, sicco, rivuloso, ex incarnato albicante, margine nudo levi; stipite solido, elastico, glabro, inaequali, basi attenuate; lamellis einaerdnatis, tenuibus, CDiifertis, albis.

Loeis graminosis in silvis frondosis Sueciae medite Upsalise in horto Botanico) circa solstitiuni rarus quidem, sed ubi adest, magna vulgo copia.

Descr. Valde jregarius, subcsespitosus, odore farina recentis et sapore gratis, quare sine dubio esculentus et cum proxime affini *Ag. gamboso* comparandus. Stipes solidus, elasticus, 2—3 uric, longus, digitis crassitie, deorsum attenuatus, ssepe tDrtus et incurvus, glaber, apice tantum obsolete pruinosis, semper ulbus. Pileus carnosus, forma varius, vulgD urnbonato-convexus, ina^qualis, s*pe flexuosus, immaculatus, glaber, siccus riinulosus, 2 unc. circiter latus, primo incarnatus, sed senio expallens, alutaceo-albidus, margins tenui nudD invotutD. Caro mollis, alba, a larvis mox infestata. Lainellae emarginatne, dents decurrentes, tenues, conferta, albidae, colorem haud mutant.

Inter Tricholoraata Guttata, inter se maxime affinia et praecocia, quorum typus *Ag. gambosus* FR. (Sverig. iltliga Svampar t. 9), *Ag. borealis* insignis pileo immaculate et incarnato. PrDximus sine dubio *Ag. albello.sv* & hie prtEco-cior, colore plurimisque notis diversus. *Ag. albdli* plures exstant icDiies, at nostrum minus bene representant; habitum melius sistit icon nostra *Ag. resplendentis* supra t. 29.

A^aricus monstrosus Sow. t. 283, quem tamquam hujus monstrositatem sub *Ag. boreali* dubius citavi, ex Rev. BERKLEY species distincta. Cum *Ag. albello, boreali, pede Cai^rce* caespites format stipatissiinos (Dfr. SCH^EFF. t 14, SDW. t 122), at occurrunt simul individua solitaria et magis regularia. His rationibus nee non odore farinac recentis facile fingerem *Ag. conglobatum* VITTAD. etiam ai Tricholomata Gruttata essB referendum. At SDID pingui, ut hortorum, plures fungi typice siinplices, ca^spites densissimos formant, v. c. *Ag. decastes, humvsus, inversus, dryophilus* etc.

Tab. 41. figg. supBriores sistunt statum nDmalem *Ag. borealis*.

LXVII. A&ARICUS TIGRINUS SCH.EFF.

Schceff. t. 88. Syst. Myc. I. p. 53. Epicr. p. 45 varictas.

A^ fuitillurius Batsr.Ji. ai iconem SCH^EFFERI.

Diagn. Tricholoma pileo carnosD^ compacto, CDiivexd, repando, glabro, *obscure maculato*, margine involute; stipite SDlido, tumido, pruinoso; lamellis rotundatis, confertis, angustis, albis.

In silvis acerosis admodum rarus. Upsalise sevnel legiraus. In Europa australi indicatur vernalis, nostrum vero legimus primo autumn D.

Fungus admodum nobilis, obesus, absque notabili odore farinse recentis. Stipes unciam longus et crassus, admodum cDmpactus, solidus, pruinatus, albus. Pileus cDinpacte carnosns, in meD e convexo expansus, obtusus, repandus, 2 unc. latus, pallide brunncus, maculis confertis et obscurioribus variegatus. Caro crassa, firma, alba, immutabilis, at ad marginem involutum tenuis. Lamellae postice rotundatae, demum dente decurrentes, confertae, angustaB, albae, demum obscuriores.

Novam dedimus iconem, cum specimina a me lecta ethoc IOCD .depicta ab icon Schaefferi ita recedant, ut novam facile fingeres speciem. Schajfferi fungus differt stipite longiori,

pileD B conico expanso, albo-caiescente, lamellis demum distantibus, at tarn multa habent eommunia (staturam Dbesam, stipitem pruinosis, pileum obscure inaculatum), ut satius duxeriinus conjungere. Sic lamelhc magis distantes in fungo Schaefferi ex ustate facile pendent; specimina a me lecta enim juvenilia.

Affinitate naturali ad *Ag. graveolentem* PEIIS. manifeste accedit, at hie pileD immaculato, stipite fibrilloso, lamellis demum fuligineis facile distinctus. Observandum colorem pilei hujus variare albidum et fuligineum, ex quo facile fingimus coloris differentiam inter Schaefferi et meum fungum haud esse essentialem. *Ag. graveohntis* plures exstant icones, optima *Krombh. t 53, f. 1—6*.

Ag. tigrinus BULL, est species longe distans" et ^entini species.

Tab. 41. figg\ inferiores *Ag. tigrinum*, qualem TIDS h^imua, adumbrant.

LXVIII. AGAPICUS DIVILIS FR.

Ag. militaris Fries Monogr. Hymen. I. p. 90, nee Lasch et Fr. Epicr.

Diagn. Tricholoma pileo spongiDSD-camDSo, niolli, e convexD piano, lsevi, glabro, subviscido, gilvD; stipite solido, molli, fibrillDSD, pallidD; lamellis profunde emarginatis, ventricDsis, subconfertis, ex albo pallescentibus.

In pinetis- montDsis admodum rarus. Specimina hoc loco descripta sero autumnD ad Lurbo prope Upsaliam lecta ab amiCD LINDBLAD.

Descr. Stipes solidus, intus mollis, fragilis, a basi in crassata sursum attenuatus, 2 unc. et ultra longus, fibrillosus l. squamulosus, albidus. Pileus vere carnosus, admodum mollis et fragilis, e convexD planus, obtusus, 3 unc. latus, laevis, glaberrimus, udus fere viscidus, gilvD-pallescens, baud decolorans, nunquam virgatus, disco obscuriori, pellicula secernibili. Caro spongiosa, albida. Lamellae profunde sinuate, fere liberae, confertse, 3 lin. latae, admodum mDiles, ex albo pallescentes l. sublutescentes. Indorus.

- Hunc fungum in MonDgr. Hymen. l. c. cum reservation^ retuli ad *Ag. militarem* LASCH, speciem in Suecia non lectam, sed tam gravibus notis recedentem, nt nostrum nunc distinguere non dubitemus. *Ag. militaris* differt odore forti, pilw margine primo involuto pruinoso, lamellis rufescentibus maculatisijue. Forsan hie *Ag. pessundato* proximus.

Inter Tritiholomata mihi cognita nulla exstat species huic rite affinis. Cobre et pilei pellicula secernibili ad Trichol. Limacina accedere videtur, pileD stipiteque spongiosis pileiqu^ pellicula lubrica quidem, nee vere viscosa, abunde diffirt. Structura autem omninD est *Ag. Amanita lenticularis*, ut hnjus primo obtutu censebam formam exannulatam. *Ag. lw icularis* differt statura majore, velo tam universali lil^et fugaci), quam partijli, stipitis apice ssepe guttatD, lamellis prorsus liberis, hymenDphoro discreto.

Tab. 42. figg. superiores *Ag. civiern* represBiitait.

LXIX. AGARICUS PERSICINUS Fu.

Fries Syst. I. p. 52. Epicr. p. 2. Monogr. I. p. M.

Diagn. Tricholoma pileo carnosp, e convexo explanato, obtuso, lsevi, glabro, incarnato7 (*hygrophano*) stipite farcto, tenaci, sequali, glabro; lamellis sinuatis7 confertis, linearibus, albis.

In pineto-montanis, locis graminosis vel muscDsis, etiam ericetis, passim obvius per plerasque Suecia prDvincias. Etiam in Rossia et Germania lectus-

Descr. Stipes farctus, tenax, totus fibrosus [hinc non elasticus), aequalis, glaber, apice modo obsolete pruinosis, albidus nee pileo concolor. Pileus leviter carnosus, e CDH-vexo planus, obtusus, 1-2A unc. et ultra latus, lrcyis, glaber, hydrDphanus, udus carneus, siccus albidus, margine lsevi glabro. Lamellae nunc profunde enarginats, nunc rotundatae, fere liberae, arcuatae, confertBe, tenues, lineares, integerrim^B, albae. Inodorus.

Ab *Agarico jonidv* typico hie facile dignoscitur, at e colore et externa facie facillime confunditur cum illius forma *persicofore* structura longe alia, in illo stipes elasticus, facile

fissilis, pileo con color, pileus nnn hygrophanus, marline lamellas excedente, lamellie leviter sinuatae.

Inter reliqua Tricholoinata Hj^grophana nulla species adest, cum qua facile comparetur, nee cum prffii^edente confundi potest; hie enim mollis, fragilis, spongiosus, stipite fibrillosD, pileo pelliculoso etc. Ad species rite discernend^s nun modD icones necessari^, sed etiam complete descriptit)^nes, nara structuram, odorem aliasque qualitates icones DN^primere nequeunt.

Exstat *Agarici perskini* varietas major, stipite solido, pileo latiore subrepando, lamellis leviter ventricosis. Haec vero rarissima, e solo pinguiori orta.

Ut reliquae species hygrophaDK in cibariis rejiciendu^s. Sapor tamen mitis, nee ingratus.

Tab. 42. figg. inferiores *Ag. persitini* imaginem prebent. Dolor vulg^o diluitor quam in exemplaribus depictis.

LXX. *ATRAETDUS ALIUTR* SCHÆFF.

Schæff. t. 250 (insufficiens, forma tenuis). *Fries Syst. I. p. 53. Mvogr. I. p. 91. Weinm. Ross. p. 30. Berkl. Brit. p. 105.*
Ag. leucocephalus Bull. t. 539 var. pileo lutescBnte.

Diagn. Totus albus, pileo carnosio, B convexo explariato, obtuso, *siccissimo*, laevi; stipite solido, elastico, sursum attenuate, subnudo; lamellis emarginatis, subconfertis.

In silvis frondosis et mixtis admodum frequens et polymDrphus, ut forsitan plures complectatur species.

Descr. Distinguuntur omnes hujus formse habitu Clitocybes, stipite elastico, pileo ne jove quidem pluvio udD, quo \i\ omnibus Tricholomatibus spongiosis rscedit nee non CDIDTC albo, nullo HIDHD hygrophano. Variat quidem tenuis, at normaliter robustus, firmus, regularis. Stipes solidus, sursum attenuatus (vidi quoque bulbosum), extus tibrosus, elasticus, 3 unc. longus, j unc. et ultra crassus, nudus, sub IBntemodo apice. obsolete pruinosis. Pileus carnosus, at non compactus, tenax, e convexo explanatus deprefesusque (baud umbonatus), 3—4 unD_ latus7 apparenter glaber; siccitate variat disco 1. totus lutescens. Lamellse plus minus emarginatse, subconfertae, adulta? 4 lin. latte, immutabiles. Ddor nullus, sed sapor acris, ingratus.

Cum nulla exstet icon formae typicse, nostram offerB duxiinus necssarium, praecipue cum facils commutetur cum variis concoloribus esculntis; hujus vero sapor ingratus, acris et forsitan venenatus.

Iiiter numerosas hujus speciei formas summopere memorabilis est subspecies **ccBsariata* FRIKS II. cc, Db habitum cDnsimilBm priori subjuncta, at pileo stipiteque tenuioribus pileoque priinitus SBricBo-fibrillDso diversa. Hac nota proxime accedere videtur ad *Ag. impolitum* LASCH, speciem mihi hand rite cognitam, indumentD vero stipitis et pilei facile distinctam.

Locus systematicus hujus speciei ambiguus est; ob pileum numquam udum et epelliculosum forsitan melius inter Tricholomata Sericella collocandus.

Tal). 43. figg. superiores ail *Ag. album* rDbustiorBm spectant.

LXXI. *AGARICUS LEUCOCEPHALUS* (KBOMBH.) FBIKS.

Krombh. t. 62, at noil Bull. — Fries Epicr. p. 47. Monogr. I. p. 92.

Diagn. Totus candidus, pileo carnosio tenui, convexo-plaiio, ltevi, *udo*, mi core sericeo secedente giabro, mar gin e patente nudo; stipite cavo, cartilagineo-tenaci, radicatD, lrevi, glabro; lamellis rotundato-liberis, confertis.

In terra nemorum raro., Civca Upsaliam lectus ad Vard-s Vtr fi.

Descr. Ut prior stipitis indole ad Diitocybas accedit, hie stipite subcartilagineo ad Collybias: Totus albus absque tinctura lutescente. Stipes cavus, fibrosus, sed extus politus, subcartilagineus, basi solida attenuata radicans, laevis, glaber, 2 unc. et infra longus, 3 lin. crassus. Pileus cariiDsus, tenuis, tenax, convexo-planus, obtusus 1. obtuse umbonatus, jove pluvio udus, per se glaber, sed junior villo sericeo adpresso candicante, demuni secedente, tectus, margine acuto patente glabro. Caro tenuis, at compacta, jove udo aqliosa. LainelltE rotundato-liberBe, confertae, tenues, integerrimse, candidse. Ddore forti farinae recentis insuper insignis est.

Krombholzii nomen, err ore licet ortum, (nain *Ag. leucocephalus* BULL, est prior) servavi, cum Bulliardi nomen cedat

Schtfferi antiquiori. Improbo morcm rejiciendi nomina ob homonyma non servanda.

Hie et prior nee non *Ag. Columbeta* frequenter commutantur, quare omnium dare icones necessarium duxi. Hujus causa fvut icon Schafferi minus bona. PERADON in Synopsi sub *Ag. albo* intelligit *Ag. Columbettam*, sed in Mycol. Europaea *Ag. album*. Meliorein *Ag. albi* (at varietatis lutescentis) iconem dedit BULLIARD, sed KROMBHDLTZ hoc nomen transtulit ad praesentem. Interea hae tres species vix affines dicendte, jam qualitativis exiinie differunt. *Ag. Columbeta* est mitis et edulis; *Ag. albus* amarus et forte venenatus; *Ag. leucocephalva* noster odore forti farinae recentis pollet.

Quoad affinitatem naturalem *Ag. leucocephalum* nostrum proxime accedere ad *Ag. (Armill) constrictum* censemus. At praeter veli defectum, multis aliis notis differunt, ut distinctas esse species non dubitemus. Probat vero h*c species, ut multae aliae, Armillarias a Tricholomatibus haud essentialiter diffErre.

Tab. 43. figg. inferiores *Ag. leucocephalum* sensu noatro referunt.

LXXII. AGAPJDUS MELALEUDUS PERS.

Pers. syn. p. 355. Syst. Myc. I. p. H4. Monogr. p. 93. Weinm. Ross. p. 661. Berkl. Outl. p. 106. Secret. n. 644.
Ag. blandus Berkl Engl. Fl. ex ipso inv. Ag. leucophaeus Pers. Mycol. Europ. 3. p. 291.

Diagn. Tricholoma pileo carnosio, tenui, e convexo piano, obsolete umbonato, glabrD, hygrophano; stipite farcto, tenui, rigid o-fragili, albido, striis fibrillosis infumato; lamellis emarginato-adnatis, ventricosis, confertis, albis.

Est e vulgatissimis in pratis, hortis, ad margines viarum etc., Jove pluviD,

Descr. Stipes farctus, dein etiam cavus, junior-elasticus, sed adultus rigido-fragilis, 2—3 unc. longus, 2—3 lin. crassus (sed exstant formae firmiores), basi subincrassatus, nudus (non pulverulentus), sed fibrilloso-striatus, albidus, striis obscurioribus. Pileus carnosus, e convexo explanatus, obsolete umbonatus, 1—3 unc. latus, laevis, glaber, i^{us} vulgo nigrescenti-fuliginosus, dein fusco-lividus et siccus expallens. Daro mollis, alba nee hygrophana. Lamellae emarginato-adnexae, confertae, horizontales, latisc, plus minus ventricosae, integerrimae, albae.

Ut plurimae vulgatae species maxime proteus et vrsicolor, ijuare plures auctorum species colligit, et ipse est fere sta-

tus tenuior *Ag. arcuati*. Inter nuerosas varietates a forma typica, supra descripta, recedentes praecipue notandae:

**Ag. adstringens* PERS. syn. 35D, pileo explanato rigente, exsiccato piceD subnitente, stipite nudo, lamellis demum obsolete incarnatis.

**Ag. pylioleucus* S. Myc. p. 114, pileo obtuse umbonato e livido griseo, stipite subaequali, apice albopruinosD, lamellis albidis.

**Ag. porphyroleucus* 1. c. firmior, pileo carnosiore, umbonato obsolete, stipite solido fibrilloso, lamellis albis.

Vulgatissime hujus speciei nulla exstat icon typica, seJ varite figura3 *Ag. arcuati* apud BULL, ad hujus subspecies referenda? v. c. figurae nigrae t. 443 ad *Ag. adstringentem*, figurafescentes 1. c. ad *Ag. porphyroleucum*.

Multa cum hac specie communia habere videtur *Ag. turritus* Epicr. p. 51, at hie alius stirpis est nee ex *Ag. arcuati*. Pileus primitus campanulatus, lamellae serratae

Tab. 44. fig^a- superiores lixiib;it faciem *Ag. mdaleuci* typici.

LXXIII. AGARICUS EXSCISSUS FR.

Fries Sget. I. p. 114. Epier. p. 52. Monogr. I. p. 95.
Ag. myocleuDUs stilbopus Pen. Myo. Ear. 3. p. 219.

Diagn. Tricholoma pileo carnosulo, e campanulato ex^a pansD deinuraque umbonatoD, kevi, fusco-cinereo expallente (cano); stipite e farcto demum cavo, polito nitente; lamellis emarginatis, CDnfertis, linearibus, candidis.

Locis graminDsis, pinguibus ad pagos raro, sed suis locis quotannis redux. Filius meus O. R. FRIES legit ad Femsj^o eisdem locis ac equidem ante triginta annos.

Parva, at pulchella species. Stipes junior solidus, adultus cavus, tenuis, leevis, glaber, nitens, 1—2 unc. longus, 1—2 lin. crassus, omnino requalis, candidus. Pileus carnosulus, junior complanatus, mox explanatus, umbone prominente, demumque etiam undulatus, lacvis, glaber, junior murinus 1. fusco-cinereus, deraum canus, at siccus non decobrans, sed nitens. Caro tenuis, alba. Lamella einarginato-adnaxae, confertae, 1—2 lin. latse, candidae.

Etiam h^{ec} species, una cum specioso *Ag. grammopodio*, est e stirpe *Ag. arcuati*, at a reliquis longius distans. Stipite

politio glaberrimD candido, pileo primitus campanulato decolorante quidem, at siccitate non expullente, sed nitente, lⁱⁿ mellis linearibus a reliquis abunde differt. Nebulam pulverulentam albidam pilsis, ut in variis affinis et *Aq. nebula* juvenilibus, etiam in IIDC interdum vidimus.

Agaricus brevipes BULL, et *humilis* PERS. etiam sunt stirpe *Ag. arcuati*, at stipite brevissimo, illius extus intusque fusco, hujus undique pulverulento facile dignoscuntur. PAULETTI t. 44. f. 1, 2 *Ag. brevipedem* melius sistit quam BULL. t. 521. f. 2. (juvenilis). Uterque in Suecia haud rarus, novasque Mus. Holm, deposuimus icones.

Species, quae sequuntur, ad stirpem omnino diversam pertinent.

Tab. 44. figg. inferioris in *Ag. mac in* tun purLim* ut.

LXXIV. AGARICUS SORDIDUS FR.

Fries Syst. Myc. I. p. 51. Epicr. p. 53. Monogr. L p. 96. Weinm. Boss. p. 2.9.
Ag?, mnlus var. praticola. Alb. et Schwein.

Diagn. Tricholoma pileo subcarnoso, tenaci, e convexo piano depressove, subumbonato, glabro, hygrophano, margin e dcinum striatulo; stipite farcto fibrillasD-striata, basi incrassatDj lamellis^rotundatis, subconfertis, e violaceo albidis fuligineisve, demum sinuato-decurrentibus.

In sterquilinis, hortis, pratis fertilibus Europae medise et borealis minim e rarus. Præamat terrain excultam gregarius, in terra valde humosa caespitosus.

Descr. Gregarius, subcaespitosus, tenax, inDdorus. Stipes factus, lentus, 2 unc. circiter longus, 3 lin. s̄ ultra crassus, subincurvus, fibrilloso-striatus, pileo concolor, basi vulgo incrassatus. Pileus subcarnosus, e campanulato convexo planus depressusve, subumbonatus, glaber, 1—3 unc. latus, junior lilivino-lividus, fusco-1. carneo-virescens, vetustus vero decolorans, ut totus fungus squalidus, fuscescens, siccus expallens. Margo in adultis striatulus, in vetustis sæpe undulatus. Lamellæ primo rotundatæ, dein sinuato-decurrentes, subcon-

fertse, demum vero subdistantes, e violaceo pallescentes l fuligineae.

Affinis Ag. *nudo*, at longe minor, tenuior, admodum tenax, hygrophanus. Dolor ita mutabilis ut specimina juniora et vetusta primo obtutu eandem sibi specieem æque fingas. Talis status decoloratos sistunt Ag. *mutabilis* et *sordidus* SCHUM. — nec non FL Dan. t. 1843. f. 2.

Agaricus urbus FR. Syst. Myc. I. p. 48, juxta Ag. *sordidum* ob lamellas coerulescentes collocatus, eidem vix affinis est. Hic nimis fragilis, stipite bulboso st lamellis admodum confertis bene distinctus. Hujus icon sistat in FL Dan. t. 1844. f. 1. — Cum Ag. *sordido* similitudinem quædam habet *Cortinarius myrtilinus*, sed hic ob velum aranbosum et sporas ochraceas nullo modo affinis.

Tab. 45. figg. superiores Ag. *sordidi* typicam formam sistunt. Varietas hinc magis videtur, illinc fuliginosa.

LXXV. AGARICUS LIXIVIUS FR.

Fries Epicr. 54. Monogr. I. p. 57.

Ag*. Dimp-Bssus. Swartz Vet. Akad. handl. 1808. (Sowerb. t. 66. tam, exactis refert liujus formam majorem, ut melior fieri exhiberi necesse est.)

Diagn. Tricholoma pileo subcarnoso, fragili, e convexo piano, glabro, udo hygrophano, umbone evanido, margins explicato membranaceo; stipite e farcto cavo compresso, albo-floccoso-pruinoso; lamellis rotundato-adnexis, ventricosis/ mollibus, subdistantibus, griseis.

Loris graminosis campis circa Upsaliam, Holmiam etc. autumno sibi, socio Ag. *cyathiformi*.

Descr. Stipes e farcto demura cavus, 2 unc. et ultra longus, 3—4 lin. crassus, et comprimendo adhuc latior, sseps flexuosus, fragilis, fuscescens, sed pruina floccosa obductus. Pileus leviter carnosus, e convexo planus, junior umbonatus, numquam depressus/2—3 unc. latus, lacvis, glaber, udu cinereo-fuscus 1. umbrinus, margins membranaceo demum striatulo, interdum sinuato. Caro tenuis, aquosa. Lamellæ rotundato-adnexæ, primo obtutu liberae, subdistantes, molles, 3 lin. latae, interdum crispæ, griseæ,

Nomen Ag. *compressi* ineptura est, quia stipes typice teres et tantum senio compressus ut in plerisque Clitocybis Orbiformibus. Nomen tamen non mutassem, nisi aenic. BERKLEY synonymon SOWERBYI exclusisset et Ag. *compressi* figuram olim ad Ag. *butyraceum* et nuperius ad *Hygrophorum vinum* retulisset, cum quibus nostra species ne remotissimam quidem habet affinitatem. Noster structura proxime accedit ad *Clitocybas Orbiformes* et e colore forsitan pro Ag. *cyathiformis* forma sumtus.

Inter Tricholomata nondum delineata nobilissimus est *Agaricus rasilis* Epicr. p. 54. Hujus stipes fibrillosus, admodum mollis et facile rasilis, pileus e campanulato expansus, fibrilloso-virgatus, umbrino-fuliginosus; lamellæ scedentes, acie floccosa, alba. Sparse omnino albae.

Tab. 45. flg. inferior altera am Ag. *litivii* formam sistunt; alteram SOWERBYI t. 66. Has species mihi difficile persuasum est.

LXXVI. AGARICUS PAEDIDITS FR.

Fries Epicr. p. 53. Monogr. I. p. 96.

Diagn. Tricholoma pileo subcarnoso, tenaci, B convexo explanato, circa umbonBia conicum depresso, *Jibrilloso-loBvigato*, udo, margine involuto nudo; stipite farcto, curto, substriato lamellisq̄ sinuato-decurrentibus, coq̄fertis, augustis, ex albo griseis.

In campis sabulosis, collibus apricis props Upsaliam olim (1836) rarissime lectus, dein per plures annos latuit, sed annis IB52, IB53 admodum frequens.

Descr. Statura pumila, substantia tenui et tenaci et coloribus sordidis, numquam vero in violaceum vergentibus, *Ag. sordido* affinis. Stipes farctus, extus subcartilagineus, intus fibrDSiis, unciam longus, 2 lin. crassus, substriatus, nvidus, griseo-sordidus. Pileus leviter carnDsus, flaccidus, B carapanulato-convexD explanatus, umbonatus, demum circa umbonem conico-prDininulum depresso, *jibrillis innatis radiantibus virgatus*, lsEvigatus tainen, murinD-fuligineus, opacus, margins nudo. Caro tenuissima, tenacissima, albescens. Lamellae sub-

sinuatse, rleniculo decurrente, confertae, angustse, ex albidD griseae.

Quamvis hujus affinitas cum *Agarico sordido* manifesta, cDloribus et plurimis gravissimis characteribus, ut c descriptionibus comparatis elucet, abunde diversus. P^IBD ftbrillDSU-radiato, sub lente cunspicuD, convenit cum *Ag. glauconitente* (A, nitente BATSCH.), qui vero ceterum eximie differt et ob lamellas distantes Hygrophoris videtur affinis. Hujus bonam icDiiem videre licet apud BATSCH. / . 192.

Alia cum *Ag. pcedido* cDm̄paranda species est- *Ag. favillaris* Epicr. p. 54, in quo etiam pileus circa umbonein depresso, sed hujus habitus *Ag. metachroi*, color albk'ans, pileus numquam virgatus, lamellaB confertissimse, lineares, postice attenuato-adnexse. Est e rarissimis, letitus In pratis montanis muscosis.

Tab. 45 fgg. superiores A. pmlidwn reprcsBiiint.

LXVII. AGARICUS PUTIDUS FR.

Fries Epicr. p. 54. Monogr. I. p. 78.

Diagn. Tricholoma *graveolens*, pileo carnosulo, hemispherico, subumbonato, lyevi, molli, hygrophano; stipite cavo, fragili, subcompresso, pruinoso lamellisq̄ adnexis, ventricosis confertis, cinereis.

Inter folia acerosa Pini silvestris haud raro. Pluribus Smolandise locis, ad Holmiarn, Upsaliam legimus. In Fennia, *Karsten*.

Descr. Odor fortis, farina recentia rancidus. Stipes, cavus, 14 unc. longus, 2 lin. circiter crassus, eequalis, vetustus ssepe compressus, mollis, subfragilis, obsolete striatus, griseus, pruina tenui alba detersili tectus. Pileus carnosulus, hemisphaericus, junior umbonatus, uncialis et infra, mollis, laevis etiam in margine recto, sed hinc inde alboirroratus, subolivaceo-griseus, siccus canus. Lamellae liberas apparent, sed in fundo adnexae, confertse, ventricosae, 2—3 lin. latae, distincta, ex albedo cinerea.

Pusilla, at eximia species. Habitu et odore cum *Collybiis rancidis* convenit, at stipite molli, tibroso omnibusque

notis ad Tricholomata pertinet, inter quosc nulla tamen exsta* speciss affinis.

Tab. 4B iigg. inferiores *Ag. putidum* sistunt.

In Musa3o Holmiensi insuper deposui novas icones sequentium Tricholoinatum: *Ag. equestris*, *Ag. nictitantis*, *Ag. frumentacei*, *Ag. rutilantis*, *Ag. variegati*, *Ag. sculpturati*, *Ag. argyracd*, *Ag. wstuantis spurii*, *Ag. luridi*, *Ag. vaccini*, *Aff-furvi*, *A. terrei*, *Ag. xuneifolii*, *Ag. tumidi*, *Ag. sulfurvi*, *Ag. gambosi* (Atl. Svamp. t. 9.), *Ag. albelli*, *Ag. graveolentis*, *Ag. guttati ancijritis*, *Ag. arcuati*, *Ag. cinerascentis*, *personati*, *Ag. nudi*, *Cnistce*, *Ag. grammopodii*, *Ag. breripedis*, *Ag. humilis*. Cum horuni exstant icones sat bonae, novas omittendas censeo; ineptum enim videtur species bene cognitae iterum iterumque delineatas publicare. Et omnino vituperandum jam publicatas icones mutuae, ut in Neesii systemate.

DLITDDYBE.

Lamellis postice attenuates, adnatis, vulgo decurrenibus a proximis TrichIDmatibus differunt. Stipite hand' cartilagineo, at intus spongiDSD plurimi simul a Collybiis recedunt.

I. UISCIFORMES, pileD subaequaliter carnosus, e convexo piano regnlari, lamellis aeijualiter decurrentibus. Color non hygrnphaniis. Ag. *nebularis* et *odorus* inter Fungos escul. Suec. picti sunt.

LXXVIII. AGARIDUS CLAVIPES PERS.

Pers. Syn. p. 353. Fries S. M. I. p. H6. Monogr. p. 100. Sommerf. Lapp. — Weinm. Ross. — Secret. Hdvct.

Diagn. Dlitocybe pileo carnosus, molli, e convexo appla-
natD, nudo; stipite farcto, spongiDSD-molli, elastico, obverse
clavato, subfibrilloso; lamellis longe decurrentibus, descenden-
tibus, subdistantibus, albis.

Vulgatisshnus in silvis Europae facile tDtius in Lapponiam
usque, Ag. *nebulari* vulgatior et pr^ecocior, at semper fere
solitarius nascitur.

Descr. Substantia totius fungi mollis, elastica. Stipes
solidus, intus spongiosus, obverse clavatus, basi { unc. et
ultra crassus, subfibrillosus, fuligineo-lividus. Pileus carnosus,
leyiter convexus, inox planus, deinum fere obconicus, 1^—2
unc. latus et ultra, laevis, glaber, siccus, mine unicolor fuscus,
fViligineus, uinereo-lividus, nunc circa marginem albicans, ra-
rissime totus albus. Daro laxa, alba. Lamellae longe decur-

rentes, linea recta descendentes, subdistantes, flaccidec, inteo-er-
rimae, Dinnino et persistenter albae, at sernel vidi luteas.

Species distinctissima, sequente excepto cum nulla alia
comparanda. Maxime miramur vulgatte hujus speciei nullam
existere iconem sufficientem. Ag. *mollis* BOLT. t. 4D absque
omni dubitatione hue pertinet, sed tam personata ut a My-
cologis Anglic haud recognita sit. Interea nullum" dubium
est nobilem hanc speciem etiam in Britannia nasci.

Odor mitis, sapor non ingratus, sed ob substantiam spon-
giosam non edulis est ut Ag. *nebularis*. Ab hoc reliquisque
abunde insuper differt lamellis longius decurrentibus, quam
in ulla alia Disciformium specie.

Tab. 17 fig. superiDres Agarkum riavipedem referunt.

LXXIX. AOARICUS CDMITIALIS PERS.

Pers. Syn. p. 352. Fr. Syst. Myu. I. p. &6. Epicr. p. 56. Monogr. I. p. 101.

Diagh. Dlitocybe pileo carnosD, convexo-plano, obtuso,
glabro, udo; stipite farcto, spongioso-elfistico, glabro, a basi
tiMi[qualitDr attenuato, fuligineo; lamellis subdecurrentibus, planis,
CDnfertis, niveis.

In pinetis montanis, subuliginosis, adinoduin rarus. PER-
SODN oliin in Germania detexit, dein vero ibidem a nemine
lectus videtur. Nos in Suecia paucis locis legimus.

Descr. Pitocedenti affRnis, sed compactior, minor, in-
odorus. Stipes farctus, elasticus, 2—3 unc. longus, sursum
attenuatus, 3—4 lin. crassus, glaber, fuligineus. Pileus car-
nosus, junior convexus, dein planus, haud depressus, uncialis,
laevis, glaber, jove pluvio udus at non hygrophanus, unicolor,
umbrino-fuligineus, fere nigrescens. Caro firmior, alba. La-
mellae adnato-decurrentes, *horizontalis* et plantE, quo habitus
a priori omnino diversus, confertae, tenues, candidae.

E dsscriptione data facile elucet differentia ab Ag. *clavi-
pule*; lamellte utriusque singulis rationibus differunt. In

neutro observatur nebula pruinosa, qua pileus junior An.
nebularis conspersus.

Obiter inspectus *Cantharello umbonato* admodum similis,
qua; forsán fuit causa cur vulgD sit praetervisus. Lamella
vero prrcbent differentias tam manifestas, ut confundi nequeat.

Oloribus cum praeedente convenit Ag. *Auricula* FR.
Epicr. p. 57. Monogr. I. p. 1D1. Hujus iconem onntto, cuin
dubius sim an sit homonymus *Dub. OrL* et *Dec. Fr.* licet
hujus descriptio omninD conveniat. Affinitate vero et spo-
rarum colore non indicatis, alius forte gregis sit v. c. *Ag.
Prunulus* vel e Tricholomatibus guttatis. Ag. *Auricula* nostër
in pinetis rarus; Decandollei vero in graminosis circa Orleans
frequens et in cibariis laudatus sub nomine *Oreilette*. Hin-
c maxime optandum ut Mycologi Gallitt hunc fungo-um plenius
exponant.

Tab. 47 fi^ inferior's ail fomms Ag. *comitalis* pertinent.

LXXX. AGARIDUS POLIUS FB.

Fries Dbs. I. p. 13. Epicr. p. 57. Monogr. II. p. 344.

Diagn. Clitocybe pileo carnosus, convexo-plano, glabro, griseo (nee hygrophano), stipite solido, aequali, glabro lamellis-que aqualiter decurrentibus, confertissimis, albis.

In silvis frondosis rarè. Hanc speciem jam anno pluviosissimo 1813 legi in Sinolandise fagetis, dein frustra quæsivi, quare *Ag. fumoso* subjunxi, donec novani et magis typicam formam ex Dstroo:Dtia communicavit amic. H. VDN POST.

Descr. Fungus caespitDSUs, quo a reliquis Disciformibus jam differt, individuis vero nunc paucis junctis, nunc numerosissimis, basi connatis. Prior forma est typica, magis regularis, stipite solido, subcarriDSO (nee cartilagineo), squall, vel basi leviter incrassato, recto, glabro, laevi, 2—3 imp. longo, albo. Pileus carnosus, orbicularis, B convexo explanatus, uncialis et ultra, laevis, glaber, dilute cinereus, opacus, nee hygrophanus. Caro alba. Lamellae aequalitpr decurrentes, admodum confertae, perangustae, integerrimBe, albse. — Altera forma luxurians cespites format amplos, "stipitibus numerosissimis, basi connatis, tenuioribus et stepe flexuDisis, pileis* tenuioribus, mutua pressions difformibus.

Externa facie et analogae formarum serie multa habet cum *Ag. fumoso* communi-a, at accuratius comparati plurimis gravissimis notis differunt, ut vix affines dicendi, immD tribu movendi, cuin *Ag. fumosus*, ad Clitocybas Difformes referendus. Structura horum longe alia; *Ag. polius* est carnosus, *Ag. fumosus* subcartilagineus. *Ag. furnosi* stipes apice pruinatus; pileus primo fuliginBiis, dein lividus, subhygrophanus-Daro hyalina, siccitate albicans. Lamellae irregulariter dscurrentes, griseo-albae.

Historia Rujus speciei docet quam necessariae sunt icones ad novas species figendas. Species enim per plures annos Observatas facile fingimus alius fuisse formam personataiu vel ad dubias rejicimus. At ad fidam determinationem specimina sicca non sufficiunt, nisi plena descriptions sufful^{ta} vel melius iconibus.

Tab. 48 f. 1 *Agaricum polium* representat.

LXXXI. AGARICUS NIMBATUS BATSCII.

Batsch f. 55. Seer. n. 689. Fries Epicr. p. 57. Mynoxjr. p. 288.

Diagn. Clitocybe pileo earnest), & campanulato convexo, obtuso, glabro, (cinereo), margine involuto pruinoso; stipite solido, firmo, apice squamuloso lamellis-que decurrentibus, arcuatis, cDiifertis, albis.

In campis apricis, graminosis passim, at ob habitum ignobilem vulgo praetervisus vel cum *Ag. pulvrvulmto* P. confusus.

Descr. Sregarius, firmus, odore farinae recentis, medium tenens locum inter priores majores et sequentes tenuiores. Stipes solidus, 17—2 unc. longus, 3 lin. crassus, basi subincrassatus, apice (vel undique?) squamulosus, albus, Squamulas stipitis equidem semper vidi albas, ex Secretan vero senio nigrescunt. Pileus carnosus, e cainpanulato convexus, obtusus, ltEvis, glaber, 1—li unc. latus, cinereus, margine tenui inflexo pulverulento l. pubescente. Lamellae decurrentes, confertae, arcuatae, perangustae, albas. Caro compacta recens hyalina, sicca alba, sub cuticula saepe grisea.

Figura *Batschii* a mea tantum differt, ut diversam si^{tere} speciem facile fingerem, nisi omnes riDtae essentielles defuissE^{nt}; hinc nDvam iconem dare necesse duximus. *Batschii* /- ⁴² hujus censetur varietas alba, qualem vero non legiinus.

Quoad affinitatem praecedenti omnino proximns, sed st&" tura ininori, stipite squamuloso, lamellis longius decurrentibi^{11*} et postice vulgo obtusis arcuatisque videtur bene distinct³¹

Ex altera parte accedit ad *Ag. luscinum* Epicr. p. 57 qui vero differt stipite pulverulento et pileo tenuibus, lamella planis subdecurrentibus. Hujus iconem dedit PEKSODN [^] nomine *A. trvchcei* Myc. Eur. t. 23 f. 3, quare nostram, ^{^ll} Mus. Holm. depDsitam, Dmittimus.

Tab. 48 fig. 4. *Agaricum nimbatum*, quali3in in Suecia legi, sistit.

LXXXII. AGARICUS DOTHIOPHORUS FR.

Fries in Vet. Akad. Ffirhandl. 1851, p. 44. Monograph. I. p. 102.

Diagn. Clitocybe pileo carnosio, tenui, tuberculo mammi-formi elato gibboso, glabro, canescente; stipite solido, curto, excentricD, glabro, deorsum attenuate; lamellis decurrentibus, confertis, albidis.

Locis graminosis silvarum circa Upsaliam sa?pius lectus.

Fungus maxime abnormis, at forma definita et CDnstant, licet nullus adsit, cum quo comparetur. Stipes camDSD-fibrosus, $\frac{1}{2}$ unc. 1. parum ultra longus, basi 1, apicē 2 lin. crassus, obliquus, rectus vel ascendens, albidus. Pileus tenuis, leviter convexus, laevis, glaber, prsecipue vero insignis gibbo-aitate inaxime prominsnte excentrica, albido-canus. Lamellae dente aeutō decnrrentes, angustae, vix lineam latte, confertae, pileo pallidiores. Gribbositas pilei stipiti excentrico oppDsa est. Odor nullus.

Singularem hunc fungum pro mDiistrosa prDgenie habere, nisi plures centurias legissem oranino conformes.

Varie species centrales locis verticalibus excentrici Bvadunt,

hie verD nascitur locis planis horizontalibus, in societate *Ag. stannei* etc.

Ob stipitem constanter excentricum ad Pleuropodes referri posset, sed affinitas major cum *Clitocybis* et statio terrestri *Clitocybarum* speciem suadet. Facile fingerem inveniēda exemplaria stipite centrali et turn gibbositate etiam centrali.

Umbo pilei in omnibus Agaricinis a protuberantia stipitis pendet. Hac de caussa rarissime observatur in pileis valde carnosis et compactis, frequenter in pileis tenuioribus, Ubi verD stipes non protruditur, sed stipes in hymenophorum expanditur pileus vulgo umbilicatus et lamellae decurrentes ut in Dmphaliis. In Polyporeis, Hydneis et Auricularinis nuinquam observatur umbo. Inter hos affinitas longis major quam cum Agaricinis.

Tab. 4B figg. 2. *Agaricum dothiophorum* statu liDmnlī sistit.

LXXXIII. AGARICUS CURTIPES Fu.

Fr. Epicr. p. 58. Munojr. I. p. 103, 473.

Diagn. Clitocybe pileo CiamosulD, e convexo piano, obtuso, glabro, dilute umbrino, expallente; *stipite* solido, a3quali, *extus intusque fusco*; lamellis subdecurrentibus confertis, albidis.

Locis graminosis et in silvis Scaniae, Smolandise, Uplandiae, sed parce obvius.

Descr. Stipes solidus, 1—2 unc. longus, 1—2 lin. crassus, aequalis 1. sursum leviter incrassatus et subpruinosis, tenax, rigidus sed fibrosus, extus intusque obscure fuscus. Pileus carnosulus, e convexD planus, junior passim umbonatus, sed vetustus etiam depressus, uncialis, laevis, glaber, udus, sed non hygrophanus, primo fuscus, dein livido-pallescens. Daro uda fusca, sicca alba. Lamellae adnatse, leviter decurrentes, plana3, lineam latse, albae, adultae minus conferta).

Species sat variabilis, sed semper stipite extus intusque fusco facile distincta. Hac nota convenit cum *Ag. brevipedē*, cui tarn en. haud affinis. Major est affinitas cum *Ag. atrato*

et *striwpilo*, sed horum stipes nartilagineus, fistulosus, aliter coloratus et hnjus pileus striatus. In *Ag. curtipedē* inargo in senili tantum obsolete striatulus.

Exstat hujus varietas minor, stipite $\frac{1}{2}$ unc. modo longD, subcartilagineo, qui statura et structura *Ag. carneum* in memDriam mox revocat. Haec in Scania tantum lecta est.

In variis minoribus Tricholomatibus (v. c. *Ag. cameo*) et Clitocybis (v. c. *Ag. curtipedē*) stipes tenax subcartilagineus ut in Dollybiis apparet, sed intus fibrosus, vulgo solidus, cum in Collybiis tubulosus et vulgo fistulosus. In Collybiis insuper lamellE numquam decurrentes. Dmphalia? non modo stipite cartilagineo, tubuloso, licet passim farcto, sed pileo etiam primitus umbilicato facillime dignoscuntur.

Tab. 4S f. 5 iiii *Ag. curtipedem* pertinet.

LXXXIV. AGARICUS HIRNEOLUS FB.

*Fries Syst. Myc. I. p. 269. Epicr. p. 58. Mvnoyr. I. p. 103. Weinm. Ross. p. 223. Pers. Myc. Eur. p. 84.
Ag. phacellus I. c. p. 112.*

Diagn. Clitocybe pileo carnosulo, convexo-plano, laevi, glabro, cano, sericello-nitente, disco deraum depresso; stipite farcto, tenaci, gracili, apice albo-pulverulento; lamellis decurrentibus, confertis, canescentibus.

Inter gramina et iduscds in pinetis, campis, juxta vias in Europa media et boreali baud raro. In plerisque Sueciae provinciis lecta, sed ob minutiem facile praetervisa species.

Parvus, gregarius, tenax, inodorus. Stipes giacilis, non tamen cartilagineus, sed elasticus, intus flocculoso-farctus, 2 unu, usque longus, sed vix lineam crassus, aequalis, saepe flexuosus, glaber, griseus, apice albo-pruinosis. Pileo carnosulus, plano-convexus, centro demum depressus, \ unc. latus, la3vissimus nitidulus, udus quasi viscidulus, canus; cuticula quasi sericello-CDnglutinata. Margo involutus, teniissimus. Laraellse decurrentes, confertae, tenues, albido-grisese. Sporee concolores.

Decurrit simul varietas major, pileo dilatato (unciali usque) infundibuliformi, untulatD, subzonato, eandicante. Ad hanc

referendus mihi videtur *Ag. undulatus* BULL. t. 535 f. 2, olini CDnfusus cum *Ag. undato*, qui expallens canescit, sed vegetus fuliginosus et sporis rufescentibus bnge distat,

Sporis albido-cinerascentibus convenit cum *Ag. ccelato* et *parili*, etiam statura, at tot gravibus notis ceterum differunt, ut vix rite affines diriantur. Color *Ag. hirneoli* numquam fuliginosus et lioet per ffitatem expalloscat neutiquam hydrDphanus.

Unica species, cum qua confundi posset, est *Ag. gallinaceusj* sed hie totus albus (etiam sporae), stipite primitud flocculoso-pruinato, pileo pruinato-irrorato opaco et habitu] longe alieno. Hujus iconem sistit *Huss. t. 39*.

Tab. 48 f. 3. prsebet imnginem *Ag. hirneoli*.

In eadem tabula f. 5 depictus est *Ag. parilis*, ijui infra inter *Vlitoc. Infundibuliformes* describetur.

LXXXV. AOARICUS OPIPARUS FJI.

Fries Epicr. p. 59. • Monoyr. p. 104.

Diagn. Clitocybe pileo carnosulo, compacto, e convexo piano, obtusD, hevi, glabro, nitido; stipite solido, carnosulo, valido, glabro lamellisque adnato-decurrentibus, confertis, albis.

Locis muscosis in pratis silvaticis Smolandiae raro; etiam in Suecig, media semel lectus.

Descr. Stipes solidus, carnosus, firmus, baud elasticus, 2—3 unc. et ultra longus, {—1 unc. crassus, tequalis 1. a basi leviter attenuatus, glaber, albus. Pileus carnosus, e conVBXD explanatus, obtusus, 2—4 unc. latus, laevis, prhno flocculis superiicialibus adpersus, at mox glaberrimus, nitidus, absque pcclicula secernibili, expallens at non hygroplianus, colorii rDseo-incarnato, gilvo et e cameo alutaceo varians. Daro CDmpacta alba, iminutabilis. Laniclla postice aujualiter attenuate, acutee, adnatae 1- adnato-decurrentes, confertae, venis transversalibus vulgo connexae, 3—4 lin. latae, albae. Odor baud notabilis, sed sapor gratus *Ag. nebularis*, cum quo ob eam em compactam edulem censeo.

Duplicem legimus formam/alteram major em, alteiim minorem vulgatiorem, quem icon *Ag. amari* haud male repn¹ sentat, sed hie ceterum longe alius indolis, ut vix affinL¹ dicain.

Flocci in pileo juvenili, ut etiam tenuis pruina in *Ag. mbulavi* et multis *Tricholomatibus* spongiosis, est veli universalis, fugacis species.

Utrum *Agaricus rosms* SCHAEFF. t. 75 pertineat ad hunc, an *Russulam* sensu Auctoris non plene liquet. Prtesenters haud male refert.

Dolemvis nobis haud licre addere icuneui pulelicriini *Ag. tyrianthini* Epicr. p. 58. Hie tantum in fagetis Sueciff meridionalis lectus est et colore carneo-purpureo nee nou mycelio lanoso crocato-rubiginoso facillime dignoscitur-

Tab. 49 figure superiores formam mijorem *Ag. opipari* representant.

LXXXVI. AGARIDUS SDCIALIS FR.

Diagn. Dlitocybe pileo carnosD, e conveXD expanse, urabonato, laevi, glabrD, gilvo; stipite solido, adscendente, glabro, rubello, basi radicato hirtio; lamellis plano-decurrentibus, vix confertis, lutescentibus.

Supra acus Abietis coacervatos loco umbrosissimo in horto Botanico Upsaliensi una cum *Ag. venustissimo* per plures annos observatus.

Descr. Species admoduin pulchella, dense gregaria, inodora. Stipes solidus, fibrosus, vulgo adscendens, uncialis, lineain 1. parurn ultra crassus, basi incrassata inter folia demersa radicans et more *Marasmii peronati* hirta: Pileus carnosus, B convexo expansus, junior praecipue acute umbonatus, unciam circiter latus, ljuvis, glaber, siceus, rubellus 1. potius gilvus. Can) sat tenuis, alba. Lamellae planD-decurrentes, baud cDnfertae, lutescentes.

Habitus hujus speciei omnino *Ag. irrufati*, ut primo mihi in inente fuerit cum hoc conjugere; nimis tamen ille recedit vegetatione csespitosa, stipite cavo fibrillosD, pileD e convexo depresso, primo sericello, semper DMUSD, lamellisque confertissimis et lunge decurrentibus, pileo CDncoloribus. Major adest affinitas cum *Ag. vernicoso*, cujus forte varietas; differt tamen *Ag. vernicosus* stipite farctD luteo, pileo numquam umbonato, at vulgo depresso, nitido, lamellis magis distantibus, laete flavis. A socio *Ag. venustissimo* certissime distinctus. Ab his omnibus receditpraesensbasiincrassata, radicante et hirta.

Agaricus irrufatus lamellis longe decurrentibus et confertissimis alius stirpis est nempe Agaricorum infundibuliformium et *Ag. inverso* proximus.

Tab. 49 figure inferiores *Ag. socialem* sistunt.

L3XXVII. A&ARICUS VERNICDSUS FR.

Fr. Epicr. p. 60. Monvgr. I. p. 105.

Agaricus csrinus ft splendens. Alb. et jSchwein. p. 87.

Ag. flavidus. Pers. Myc. Eur. pr. p.

Diagn. Clitocybe pileD carnosus, e conveXD piano, subdepresso, glabro, nitide gilvo; stipite farcto, firmo, glabro lamellisque adnato-decurrentibus, subdistantibus, luteis,

In silvis abiegnis admodum rarus et sporadicus; lectus tamen in Suecia, Rossia, Grerraania etc.

Descr. Stipes farctus*; firmus, tenax, uncialis, 3 lin. circiter crassus, a^qualis, laevls, glaber, luteus. Pileus carnosus, e convexo explanatus, regularis, obtusus et vetustus passim centro depressus, 2—3 unc. latus, laevis, glaber, nitide gilvus, margine involutus. Caro firma, albida. Lamella adnato-decurrentes, postice sequaliter attenuatse, subdistantes, lutesc. TriDdorus.

Colore et statura convenit cum *Agarico cerino* at ab hoc, prteinonentibus jam *Albertini* et *Schioeinitz*, manifeste differt pileo nitido, stipite glabro et prsecipue lamellis decurrentibus,

subdistantibus. Exstat vero fungus inter utrumque intermedius (*Ag. subceraceus* Fr. in Mus. Holm.) priori vulgo minor, et lamellis confertis *Ag. cerini*.

Ag. flavidus *Sowerb. t. 366* nastro major est, lamellis ob pileum profunde depressum longe deurrentibus, ut ad Infundibuliformes facile referatur; ad *Ag. vernicosum* tamen referendum esse non dubitamus.

Ag. vernicosus videtur stirpem naturalem una cum *Ag. odorv, subalutaceo* et sequente sistere. In his omnibus lamellae leviter distantes; priores duo odore suavi pollent, reliqui inodori. Colores horum maxime quidem differunt, at character e situ lamellarum est majoris momenti.

Tab. 5^ figg. supeviDi-es ad *Agaricum vernicosum* pertinent.

LXXXVIII. AGARICUS VENUSTISSIMUS FR.

Fries Monogr. II p. 289.

Diagn. Clitocybe pileo subcarnoso, e convexo planD, obtuso, laevi, aurantio-rutilante expallente; stipite e farcto cavo, sequali, glabro, rutilo; lamellis decurrentibus, subdistantibus, aureo-rutilantibus.

Ad terrain supra folia coacervata abietina in horto Botanico Upsaliensi, loco maxim B umbroso, in quem nullus umquam solis radius intrat, per plures annos, nee alibi lectus.

Gregarius, inodorus, praecedentibus tenuior. Stipes junior farctus, demum cavus, U unc. longus, 2—3 lin. crassus, aequalis, glaber, rutilus, basi albo-tomentosus. Pileus leviter carnosus, e convexo explanatus, regularis, obtusus vel vetustus subumbilicatus, 1—2 unc. latus, sericello-laevigatus, splendide aurantiD-rutilans; sed expallens, margins nunc laevi, nunc in majoribus crenato l. crispato-dentatD. Caro cDn color. Lamellae vere decurrentes, leviter distantes, aureo-rutilantea.

Species elegantissimaa. Colores fungi tam spendidi et intensi, inter rutilum Bt aurantiacura vibrantes, ut hanc harmDgen

ars victoria vix exprimere possit; in fungo vero vetusto vel exsiccato pallescit et in flavidum transit.

Oh cDlorem lsetum primD obtutu Ag. Vzrsiformibus (v. c. Ag. bdlo) affinem crederes, at vix dubie pnedenti proximus, a quo vero plurimis notig differt. Pilei superficiss glabra est, licet facies sericello-laevigata. Structura potissimum convenit cum Ag. subalutaceo Batsch. f. 194 (inelior nostra in Mus. Holm.), qui omnium parti um col ore differt et simul 1^m viter odoros.

Tab. 5D figg. inferiores Ag. venustissimum depingunt.

Dolemus nos hoc loco omittere icones Ag. amari et rivulosi CDactos esse, cum color hujus in tabula originali ita mutatusj ut aegre dignoscatur. Est Ag. rivulosus inter species vulgatissimas, licet a nemine Exterorum, quantum novi, post **Personium** sit recognitus.

LXXXIX. AGARICUS TOKNATUS Fn.

Fries Syst. Myc. I. p. 91. Epicr. p. 62. Monogr. I. p. 110. Wimm. Boss. p. 60.

Diagn. Albus, pilei) carnosus, tenui, utrinque applanato demum rimosD-rivulosD, subnitido; stipite farcto, tenaci, aequali, glabro, striatulo; lamellis adnatis, horizontalibus, confertis.

In silvis tam frondosis, quam acerosis, minus frequens. Lectus in Smolandia, Uplandia, Rossia etc.

Descr. Statura minori, regulari, pileo circinato inter vicinos facile dignoscitur. Odor nullus. Color totius albus. Stipes fibrosus, farctus, aequalis, li unc. longus, li—2 lin. crassus, glaber, sed impolitus. Pileus disco carnosus, ceterum tenuis, e convexo-applanatus, 1—2 unc. latus, demum circa discum gibbum depressus, apparenter glaber, sed propius inspectus rore peculiari Ag. rivulosi tectus et in vetustis minute et dense rimoso-rivulosus, absolute siccus, subnitens, nee hygrophanus. Caro alba. Lamellae adnatae, denticulo decurrente, plantae, admodum confertae, lineam et ultra late. Proxime affinis Ag. rivuloso, a quo differt tenuitate, forma regulari, colore pure albo et immutabili, lamellis magis con-

fertis. Cum reliquis Clitocybis albis vix comparari potest. Ag. sapidus PEES, videtur varietas major, pileo glabrD, lamellis minus confertis. In silva abiegn olim hri

Agaricus tomato shnul subjunxi Ag. opalum, habitu LT totura similem, cum senel modo in silva abie^na p^rce lectus at. Differt tamen conspicue ab omnibus Clitocybis pileo jove pluvio vicoBo et ab Ag. tomato in supBr stipi J ten l ri, sub fistulo T SC O PIDS IUS ^ ^ ^ i dbi o sistet speciem distincte In.

Defunctus Secretan (n. 674) Ag. tornatum describit lamellas virescentibus, quales nunquam in meo observavi. Facile fingerem illius specimina spectare illam Ag. viridis formam ambiguum, quam sub B. in Monograph-Hymen I. p. IDS notavi

Tab. 5^{lf}. 1. Ag. tornati praebet imaginem.

XC. AGARICUS CANDICANS PERS.

Pers. syn. p. 456. Fr. Syst. Myc. 1, p. 91. Monogr. Hymen. 1, p. 111. Berkl. Dutl. p. 109. Weinm. Eoss. Secr. Helv.

Diagn. *Albus, pileo* carnosulo, e convexo piano depresso, laevi, e micore sericeo, tenui, candicans nitente; stipite subfistuloso, laevi, ceraceo, nitido; lamellis adnatis, confertis, tenuibus, dein decurrentibus.

Locis humilibus silvarum supra folia putrescentia totius Europae, ut videtur, vulgaris. Praemat alneta et betuleta.

Descr. Minor, tenacellus, inodorus; totus albus, stipitis indole ad Omphalias nonnihil accedens. Stipes cartilagineo-ceraceus, politus, nitens, levis, glaber, adultus fistulosus; basi vulgo incurvus, radicans, villosus. Pileus leviter carinatus, e convexo piano depressusque umbilicatus, unciam latus, mine regularis, nunc excentricus subrepandusque, brevis, velamine adpresso sericeo nitens, udus albus, siccus candicans. Lamellae prius adnatae, dein decurrentes, confertae, admodum tennes, angustae, fere lineares.

In silvis abiegnis legimus varietatem sat notabilem stipite tenuiori, flexuoso, pileo piano nee umbilicato, nudo, lamellis haud decurrentibus.

Ab affinis facile dignoscitur stipitis indole. Proximo accedit *A. olorinus*, qui vero differt statura majori, stipite villososquamuloso, pileo haud depresso, lamellis arcuatis.

Pervulgatus hujus speciei icon nulla exstat, sed inter formas *Ag. cyathiformis* BULLIARDI Tab. 575 f. E₇ ad hunc pertinere videtur, at cum *Ag. cyathiformi* nulla adest affinitas.

Reliquae Clitocybes disciformes albse pictae exstant. *Ag. uerussatus* in Fl. Dan. t. 179 B, *Agaricus phyllophilus* Ibid. t. 1841, *Ag. dealbatus* apud SDWERB. t. 123, *Ag. gallinaceus* apud Huss. t. 39 teste BERKL. *Ag. gallinaceum* nuper legimus pileo quoque depresso.

Tab. 51 f. 2, binas *A. candicans* formas sistit.

II. DIFFERENTES, pileo haesqualiter carnosulo, (disco scilicet compacto, margine tenui) subumbonato et saepe irregulari; lamellis inaequaliter decurrentibus, hinc longe, illinc breve, immo subliberis. Vulgo caespitosis, admodum difformes.

XCI. AGARICUS DECASTES FR.

Syst. Myc. 1, p. 49. Epicr. p. 65. Monogr. 1, p. 116. Weinm. Boss. p. 27.

Diagn. *Amplius, caespitosus, pileo* (disco excepto) submembranaceo, e convexo piano, undulato, laevi, glabro; stipitibus solidis, glabris, albis; lamellis decurrentibus rotundatisque, confertis, subundulatis, albis.

Olim legi in fagetis, quercu mixtis, in Sinolandia caespites minores (10 pedibus circiter junctis); Upsalia deinde in terra nuda hortorum vel graminosa juxta Bibliothecam Academicam vere luxuriant em.

Stipites numerosissimi, in caespitem amplum juncti, solidi, extus intusque toti fibrosi, vulgo attenuati et curvati ascendentes, saepe compressi, glabri, nudi l. apice obsolete pruinosi; singulus 3—4 unc. longus, unciam circiter crassus, omnino albus. Pileus disco carnosus, ceterum admodum tenuis, fere membranaceus, fragilis, explanatus palmam latus, junior saepe gibbus, dein planus, levis, glaber (net virgatus), udus murinus l. lividus, siccus fere alutaceus. Margo omnino membranaceus, primitus breve incurvus, dein expansus,

quo major pileus eo magis undulatus lobatusque. Caro e membranis duabus, facile scissilibus compaginata, fragilis, alba; disci modo ex apice stipitis compactior. Lamellae adnato-decurrentes vel altero latere rotundatae ut in Tricholomatibus, 3—4 lin. late, marginem versus attenuatae, nunc confertae, nunc leviter distantes, vulgo undulatae et acie crenulatae. Sporae ovales, albae, more *Ag. mellei* caespites farinosos recedentes.

Species valde insignis, proxima *Ag. aggregato* SCHAEFF. t. 3D5, 3DB, qui tam en stipite fibrilloso, pileo saepe excentrico, lamellis e carneo-flavescentibus bene distinctus. Potius confundi potest cum forma caespitosa *Ag. palulii*, qui vero pileo carnosulo, haud scissili, lamellis angustioribus, confertis, venosis longius distat.

Tab. 52 speciem luxurians *Ag. decastis* exhibet.

XDn. AGARICUS AMPLUS PERS.

Pers. Syn. p. 359. Syst. Myc. 1, p. 95. Epicr. p. 64. Monogr. 1, p. 113 (Seer. n. 819?)

Diagn. Subcaespitosus, pileo carnosus, e convexo piano, subrepando, laevigatD, disco compacto; margine tenui nudo; stipite solido, yalidD, subcartilagineo, nudo, albo, apice subvillosus; lamellis inaequaliter decurrentibus, subconfertis, latis, t fuligineo sordide albis.

In silvis acerosis, montanis in Smolandia legirrus; formam minorem hoc IDDD adumbratam in OstrDgotia H. VON POST. In Germania Dlim detexit PERSODN.

Descr. Subcaespitosus, amplus, sei 'statura admodum varius. Stipes solidus, S unc. usque longus, uriciam crasaus, sub'equalis, sed ssepe tortus, nudus, albus, apice villosus, Interna structura carnDso-fibrDsa, sed superficies polita, subcartilaginea. Pileus carnosus, junior fere cartilagineo-tenax, eonvexo-plaiius, subgibbu's, inaequalis, repandus; vetustus vero laxus, fragilis, 3-4 unc. latus, iimD pedalis, laevis, glaber (raro virgatus), uvidus primo fuligineus, dein lividus, siccus

canus facie sericea. Daro disci compacta, marginis tenuis, non vero meinbranacea scissilis prioris. Lamell» altero latere rotundato, altero decurrentes, juniores s*pe crisps quasi serrulat-ae, primo fuligineo-cineree, dein albicantes. Ddir haud notabilis.

Multiplex hujus cum prsceibnte analogia, at pluriinis notis distinctna; major affinitas cum sequente. Duobus pm" cedentibus proxime accedere videtur *A. molybdinus* s. *molybdodocephalus* BULL. t. 523. Haec species in Suecia non certa est, sed ex icone differt pileo primo campanulas liffivi, margine recto, stipite sursum farinaceo-squamuloso, lamellis carneo-pallescentibus.

Odor nullus, sapor rnitis, ut edulem facile ihTM.

Tab. 53, minorera Ag. ampli formam i-B_{prmsb}lat.

XCIII A&ARICUS COFFEATUS Fit.

Syst. Myc. 1, p. 85. Epicr. p. 65. Monogr. 1, p. 114. Seer. n. 822.

Diagn. Subcaespitosus, pileo conico-hemisphaerico, laevi, virgato-subtigrino, disco compacto nigro-punctato, margine tenui, involute; stipite farcto, elastico, glabrD, albo; lamellis inaequaliter decurrentibus, confertis, angustis, integerrimis, sordide albis.

In pinetis, rarius in quercetis, passim. Nos legimus in Smolandia, H. VDN POST in Dstrogotia. In Helvetia *Secretan*.

Descr. DaeptiDSUS plerumque, sed ca3spites linojres (2 — 4) nee raro solitarius. Stipes crassus, primo farctus, dein cavus; carne fibrosD-spongiosa, elastica, alba; nunc curfus, nunc clongatus; in aliis sursum, in aliis deorsum et in elongatis utrinque attenuatus, fusiformis, interdum regularis, bulbosus, raro sequalis rectus; sscpius vero difformis, compressus, tortus, politus, glaber, albidus. Pileus junior CDinpactus, conico-hemispha3ricus; sat regularis; dein vero explicatus planus 1. depressus, saepe excentricus, lobatus, 2—4 unc. latus, udus fuligineus, siccus cervinus, nitens, vetustus livido-expallens, glaber, sed accuratius inspectus (sub lente) fibrilloso-virgatus et disco nigrDpunctatus joveque sicco stepe diffracto-squamulo-

sus. Caro in disco compacta, in.»mbitu.ciissilis. Lamella nunc longe nunc leviter decurrentes (in eodem individuo) subconfertae, pnmc Mguste, dein latiores, e sordido albo. Fungus m maxime versiformis sed color et reliquae notae constantes ab a Inibu^ pileo lineolis nigris virgato mox castantes ab a Inibu^ pileo lineolis nigris SOWERB. t. 176, qui vero pileo umbonato, lamellis aistantibus, venoso-convexis recedit. Synonymia ceterum variis difficultatibus premitur. Ex Secretan huc referenda *Pauletii* t. 115. f. 1, 2, quam iconem non vidi, quare nostrulu jullicum suspendo. *Ag. terreus* SCHAEFF. t. 64, vulgo ad *Ag. Trick. terreum* Sow. relatus, aequo l. majori jure ad hunc ducitur, praecipue ob vegetationem caespitosam, ab *Ag. terreus* Sow. prorsus alienam. Cfr. insuper *Ag. fumosum* cum huc saepe confusum.

Tab 5
nigrae pui I. f. 1. f. omam VulgataTM Ag. coffeati adumbrnt. Puut-ta et lineolTM
saepe minus conspicuae et lentis op. bl.
I. e o servavit.

XCIV. AGARICUS FUMOSUS PERS.

Pers. Syn. p. 348. *Albert, et Schwein!* p. 175. *Fr. Syst. 1.* p. 88. *Epiur.* p. 56. *Monogr. 1.* 115, ubi lapsu calami diutius *A. ncbularis*, — *Weinm.*, etc.

Diagn. Subcartilagineus, rigidus, pileo carnosD, convexo-plano, obtuso, laevi, nudo, *escpallente*, pellicula adnata; stipite farcto, apice subpruinoso, lamellisquv adnatis, subconfertis *lividis* 1. sordide albidis.

In silvis tarn frond osis, quam acerosis Europae totius, ut npparet, vulgata species.

Descr. Grregarius, subcespitosus, subcartilagineus, tenax. Stipes solidus 1. farctus, librDSD-carnDsus, 2^3 unc. longus, in pinetis 2—3, in nemDribus humosis 5 lin. et ultra crassus, suba3ijualis, sed saepe tortus 1. curvatus, glaber, sordide albus, apice plus minus albo-farinaceus. Pileus plus minus L:amosus, e cDnvexo planus, Dbtusus 1. junior tantum gibbus, mine circinatus regularis, nunc flexuoso-undulatus, lsevis, glaber, expallens, subhygrophanus, 1—3 unc. latus, fuligineo-fuscescens, mox lividus, et siccus griseus. Daro uda hyalina, ^icca albicat. Lamellae in regularibus adnata, in irregularibus hinc decurrentes, iUinc rotundatac, confertae, distincta37 jam primitus griseo-albidae. Ddor nullus.

Formse hujus majores et regulares statura admodum. Dlitocybis discifonnibus accedunt, sed indole cartilaginea, pileo subhygrophanD et prsecipue formis caespitosis et irre^ularibus Ag. difformibus propius accedunt. Ab *A. coffeato* tute distinguitur pileD numquain nigro-punctato virgatoque; a sub-simili *A. inornate** Sow. t. 342 pellicula pilei baud secernibili.

Ag. fumosus P. 1. c. e descriptione optimorumque Auctorum consensu ad hanc speciem pertinet. Sed in *Pers. Ic. pict.* sub hoc nomine alia pingitur species. In *Mycol. Eur.* confunditur cum diversissimo *Ag. virgato*. Tandem def. HARTZER quaesivit in *Ag. portentoso*.

Cum hujus formis caespitDsis conjunctus fuit *Ag. poiñts* supra descriptus.

Tab. 54₃ f. 2 formam maJDicin regularem expalhntem *A. fumosi* ante DCUIDS ponit.

III. INFUNDIBULIFOKAIES pileo umbilicato, dein subinfundibulifbrmi, non hygrophano, lamellis longe et aequaliter decurrentibus.

XDV. AGAPJCUS SINDPICUS FR. varietas.

Syst. Myc. 1. p. 83: *Elench. p. 64. Monogr. 1.* p. 121.
Ag. squamulDsus ft. rufDcinn am omens. Alb. et Schw. p. 217!

Diagn. *Grrectveolens*, pileo camDSo, tenui, plano-depresso, uinbilitato, sicco, rubro, *dymum expallente flocculoso*; stipite farcto, aequali, fibrilloso; lamellis decurrentibus, confertissimis, e candido lutescentibus,

In Smolandia ad Femsjb verno tempore, praecipue locis iidustis, haud rarus. Locis ruderatis graminosis in Lusatia leijerunt ALBERTINI et SCHWEINITZJ Formam autumnalem ad FeinsjØ legit LINDBLAD.

Forma typica hujus speciei, cujus definitionem supra ijedimus, est fungus nobilis, stricte *vernalis*, odore forti farinae recentia. Dolemus hujus non adesse iconem, tantum fungi *autumnalis*, sub auspiciis ainici Lindblad picti, qui differt statura minori, pileo glabro? et lamellis leviter decurrentibus. Utrum hie varietas an distincta species, fungo vivo non observatD, dijudicare non audemus. Inquirendum an pilei cuticula glabra vel tibrilloso-laivigata.

Forma *Ag. sinojñei* typica, cujus plena descriptio in *MonDgr. Hymenom.*, proxime accedit ad *A. incilem*, stipite cavo, pilei margine incurvD subcrenato, lamellis leviter decurrentibus distantibus venoso-conve^is, distinctum. *Ag. squamuloso* *Pers.* neuter affinis.

Forma *autumnalis*, quoad habituin iconis, magis refert *Ag. paropsin* *Epicr. p. 72*, sed hie dignoscitur pileo polito glaberrimo, stipite semper albo.

Fere omnes fungi ab ALBERTINI et SCWEINITZ in agro Niskiensi lecti etiam in Suecia mihi obvii, quorum magna pars a nemine dein in Germania observata v, c. *Sphveria Tubulina, lutea, operculata* etc.

Tab. 55 figg. inferiores *Ag. sinopicum? autumnalem* ante DCUIDS ponunt.

XCVL AGARICUS PAEILIS FK.

Sijst. Myc. 1. p. 168. *Epicr.* p. 69. *Monogr.* p. 122. *Pers. Mj/c.* Eur. p. 81.

A. cimicarius. *Pers.* I. c. t. 26, f. 7.

A. obliquus. *Pers. ic. pict.*

Diagn. Pusillus, pileo carnosulo, convexo-plano, atomato-*Jlocculps*o, e fusco griseo, disco depresso, margine deflexo; *stipite* farcto fibroso tenaci nudo *fuligineo*, lamellis longe decurrentibus confertis angustis griseo-albicantibus.

Locis silvaticis ad terrain sterilem Europae mediae et borealis. In Smolandia et Holmiae legi, H. VDN POST in Dstrogotia.

Descr. Pusilla, at benB distincta species, inodora. Stipes farctus, fibroso-carnosus, tenax, uncialis, 1 lin. crassus, aBqualis, laevis, glaber nudus, griseo-fuscus. Pileus carnosulus, planus, disco depressus, J unc. latus, atomatus 1. disco flocculosus, exstrius, e fusco griseo-albicans, at non hygrophanus. Lamella? longe decurrelites, admodura confertae, angustae; albido-griseee.

Statura et fere colores *A. ccelati* et dilutiDres *A. hirneoli*, qui tamen evidentissimis notis a se invicem distincti. Habitus *A. parilis* est Dmphaliae, at stipes nullo modo cartilagineus. Duae exstant hujus icones Persoonianae, sed loco in tabula vacuo nDStram addidi comparationis gratia cum *A. ccelato* et *hirneolo*, pileo glabrD simul notabili.

Ag. obliquus est forma abnormis orta e statione declivi ut ad latera viarum, ex ^UD stipes adscendens et pileus excentricus, obliquus.

Duplex est Dlitocybarum series, altera pilei cuticula innato-sericea l. flocculosa, altera eadem glabra, polita et jove pluyio' uda. Utriusque exstant species analogae, at certissime distinctae.

Tab. 48 fr^ S Ag. parilem spBct.it.

XCVIL AGARICUS SPLENDENS PERS.

Pers. sij. p. 452. *Fr. Epicr.* p. 70 sub *A. gilvo*.

Diagn. Solitarius, pileo subcarnoso plano-infundibuliformi, *glabro*, *nitido*, gilvo-lutescente; stipite solido, glabrD, concolori; *lamellis* longe decurrentibus, confertis, simplicibus, *albis*.

In silvis tam frondosis, quain acerosis passim. Upsalise vulgaris.

Descr. Stipes solidus, 1½—2 unc. longus, 4—5 lin. crassus, nunc a?qualis rectus, nunc a basi attenuatus, adscendens, laevis, glaber, pileo concolor. Pileus leviter carnosus, praecipue circa marginem breve reflexum tenuis, plano-depressus, demum infundibuliformis, 3 unc. latus; laevis, glaber, nitidus, e gilvD lutescens. Variat pileD exantrico et jn individuis majoribus margine repando. Lamella longe decurrentes, tenues, confertae (minus tamen quain in *A. gilvo*) simplices, albaB, sed vetustoe flavescetas.

Medius inter *A. gilvum* et *A. flaccidum*. *A. gilvus* typicus diversus pileo compacto, saepius guttatD-inaculato, carne lamellisque confertissimis, subramosis e pallido ochraceis, ut

pnmo obtutu non potest non bene diversus videri. At exstat forma in e.d.a, cujus icon in Mua. H. Olmi^{ens}i deposita, utruinque jungens, quare finxi *A. splndmtem* ad *A. gilvum* acceriere, ut *A. membranaceus* ad *A. infundibuliformem*. Pilei vero tenuitate ad *A. Jiaccidum* magis accBderē videtur, nam hie modo recedit v_{eg}BtationB c^spitosa, pileo latius reflex. fBrrug^{ine}o, stipite e farcto caVD in^ali, lamellis arcuatis flavescantibus.

Exstant in hac rBgi^{one} plures ambiguae formae, quibus numB r W Spe CIGS Justinxerunt SCHUMACHER st SECRETAN, quas vero non stricte imitandaS CensB0_ Dedita «« P^hri *A. splendentis* cone m ut illiv.s affinitas ulterius explicetur. Probe vero tenendum genuinum *Ag. gilvum* FL D^ t ml tan tum i n mDn tam8 . o Wi am Venire P o " o attendendum J species p...i cuticulafl OCCulOSO-lavi gata et g a, jove p .la J uda, numquam esse confundsndas.

Tab. 44. figg. superiores *Ag. splendentis* pnet imaginem.

XCVIII. AGARIDUS SENILIS FR.

N. sp.

Diagn. Dlitocybe *pileo* leviter carnosD, infunlibuliformi, glabrD, *concentrice cicatricoso*, sordide *alutaceo*, margine patiente; stipite solido, aequali, glabro, albido; lamellis decurrentibus, linearibus, confertis, albidis, demum pileo concoloribus.

In pinetis Smolandia³ raram hanc speciem tempore autumnali (Septembri) legit D. R. FRIES.

Descr. Gregarius, inodorus. Stipes solidus, aequalis, \— 2 unc. longus, 2—3 lin. crassus, sequalis, saepe ascendens, glaber, albidus, basi nudus. Pileus carnoso-membranaceus, flaccidus, junior disco depresso, rorax infundibuliformis, 2 unc. et ultra. latus, concentrice cicatricosus, margine haud reflexo. Color aegre describendus, sordide alutaceus. Lamella? longe et linea recta decurrentes, lineares, angustae, confertissimae, primum albae, dein pileo concolores.

Ab *Agarico Cacabo*, cum quo olim junctus, abunde differt. A *Cacabi* stipes enim e farcto cavus, sursum eximie

attenuatus, basi incrassata tomentosa, *pileus laevis unicum lamellis fuligineo-cinereus*, margine reflexo. Magis accedit ad *Ag. Jilacidum*, a quo coloribus distat. *Ag. Cacabus* ad *Ag. infundibuliformem* accedit, ut *Ag. senilis* ad *Ag. Jilacidum*. Cum *Ag. lentiginoso*, specie mihi haud obvia, *Ag. senilis*, quoque videtur comparandus, descriptio vero tantum recedit, ut cum hoc jungere non liceat.

A reliquis infundibulif. orribus longius distant *Ag. Paropsis* et *vermicularis*. Illius stipes elasticus, medulla molli farctus; pileus planus-depressus, (nee umbilicatus neque infundibuliformis) rufus, lamellae semper candidae. *Ag. vermicularis* stipes cavus, max. compressus, nitidus, pileus e cameo alutaceus, habitu *Ag. diatreti*.

Tab. 55, fig. 1. *Ag. senilem* depingit.

XCIX. AGARICUS DATINUS FR.

Epor. p. 72. Monogr. I. p. 126.

Diagn. Albus, *decolorans*, *pileo* carnosD, plano-infundibuliforrai, sicco, *glabro*; *stipite solido* elastico, sursum *subattenuato*; lamellis decurrentibus, confertis, albis,

In silvis, praecipue inter folia Fagi, haud frequens. Ob synonymiam dubiam de distributione extra Sueciam incertus sum.

Descr. Stipes farctus, intus spongiosus, elasticus, tenax, 3 unc. longus, 4 unc. crassus, in nostra forma basi incrassatus et tomentosus. Pileus carnosus, sat tenuis, e piano infundibulif. orribis, semper obtusus, laevis, glaber, 2 unc. latus, primo albus, dein vero sub pluviis in colorem dilute carneum, jove sicco vero in alutaceum abit. Stipes tenuis, flaccida, alba. Lamellae decurrentes, linea recta descendentes, vicinorum latiores, minus confertae, persistenter albae.

Affinis *Ag. infundibuliformi* ejusque odore grato, sed debili, pollens, at diversus colore albo, pileo numquam gibbo,

glabro, sed in juniore fibeculis superficialibus mox evanescentibus adpersus etc. Facilius comparetur cum *Ag. phyllophilo*, qui verum facile dignoscitur pileo numquam infundibulif. orribis, stipite tenui, lamellis adnatis nee non odore nullo.

Synonymia hujus speciei admodum difficilis est. Descriptio *Ag. suavis* Pers. a nostris fungis haud recedit. Etiam *At. neapolitanus* Pers. Myc. Eur. e descriptione, excepto stipite aequali, aegre dignoscitur, sed ex iconibus Cel. *Briganti* t. 23—25 (*Agarici Coffeus*, qui *Ag. neapolitani* synonymon) potius ad *Ag. cerussati* formas locis pinguibus luxuriantes pertinere videtur. Utrumque sit hujus staticae in faece Coffese vix primitiva et naturalis esse potest. — Cum *Ag. Catino* insuper conferendi *Ag. flarxidus helvolus* Seer. n. 993, (pileo umbonato diversus) et *Bull.* t. 286.

Tab. 51, f. 3. *Ag. Datini* iconem exhibet.

C. AGARICUS TUBA FR.

Ejncr. 72. Monogr. Hymenom. I. p. 127.

Diagn. Albus, pileo carnosus, tenui, convexo-plano, umbilicato, albo, sicco *sericello candicans* Uj margine laevi; *stipite cequali*, mox *cavo* compressoque, sursum nudo; lamellis longe decurrentibus, latis, confertissimis, albis pallescentibus.

Inter folia pirii autumnis serotino haud rarus.

Descr. Gregarius, albus, inodorus. Stipes e farcto cavus, i unc. longus, 2—3 lin. crassus, aequalis, demum conpressus, valde tenax, sursum nudus, nee pulverulentus. Pileus carnosus, tennis, convexo-planus, umbilicatus, dtum infundibuliformis, 2—3 unc. latus, laevis, etiam margine exstrius, udua albus, siccus candicans, per se glaber, sed primitus velamine tenuissimo sericello obductus Lamellae longe et tuqualiter decurrentes, horizontales, valde confertse, 3 lin. latae, albid'03.

A prsedentibus bene distinctus et pileo subhygrophano Cyathiformibus affinis. Proximus sine dubio *A. pithyophilo*,

eisdem locis obvio, sed pilei forma et lamellis lunge et utteno- decurrentibus facile, distinctus. In null^ alia greg^ species tarn affines ac Clitocybarum infundibuliforraium.

Synonyma nulla certa adsunt, sed *Paul. t. 63, f. 2—6* nostrum haud male refert, excepta stipitis basi glabra. H#^ differentia non sufficit ad species distinguendas; eadem species inter folia coacervata nata basin habet villosam, quam 1^0^15 nudis, et apricis amittit.

Ab utroque praecedentium longe distat *A. ericetorii* Bull. t. 551, f. 1. quam iconem primo obtutu ad *Hygrophorum eburneum** potius referret. Est vero ab hoc diversissima structura spongioso-elastica, fere *A. infundibuliformis** ~" *A. ericetorum* Pers. est longe alia species, in Ic. et descr. *A. rusticus*, in Syn. *A. umbelliferus*.

Tab. 51, f. 4 prebet Ag. Tubae iconem.

IV. DYATHIFORBES, pileo carnosus-membranaceus, B depresso cyathiformi, scissili, hygrophano, Lamellae decurrentes, dBscendentes nee ut Orbiformium horizontales. A *cyathiformis* BULL.

CL AGARICUS EXPALLENS (P.)

(Pers. syn. p. 461). Syst. My., I. p. 172. Monogr. Hymenom. I. p. 129.

Diagn. Hygrophanus, inodorus, pileo carnosus-membranaceo, plano-infundibuliformi, laevi, glabro, fusciscente, sicco argillaceo-albicante, margine mox expanso; *stipite* e farcto cavo, acquali; *lamellis* decurrentibus, leviter distantibus, *albidis*.

In campis apricis et silvaticis raris hinc inde. Forma trivialis sat frequens, nobilior raro.

Duplex sub hoc nomine obviam venit forma, altera *trivialis*, cujus iconem sat bene sistit *Bull. t. 575, f. 1. G.*, rariam plurimam ante oculos habuerunt et nonentibus PERSONID ipso, ALBERTINI et SHWEINITZ forsitan potius est *A. cyathiformis* varietas, a quo tamen differt stipite mox cavo, haud fibroso-reticulato, sed apice albo-sericeo, pilei margine mox expanso et demum striatulo, lamellisque confertioribus albidis. Cum hac plurimis notis congruit altera *nobilior*, ab *A. cyathiformi* manifeste distincta, cujus descriptionem infra dabimus.

Descr. Ag. cyathiformi minor, pallidior, inodorus. Stipes e farcto cavus, uncialis 1. parum ultra, lin eam 1. parum ultra crassus, nunc aequalis, nunc sursum attenuatus, laevis, glaber, pileo concolor 1, pallidior. Pileus disco vulgo obscuriori

carnosulus, versus marginem submembranaceus, B BONVU" plano-depressus, 1-2 unc. latus, vis, gkber (in f. trivi^ Pz. t. 575, f. 1. G.) colore fusciscente, laevi, glabro, fusciscente, sicco argillaceo-albicante, margine mox expanso, acquali; lamellis decurrentibus, leviter distantibus, 1—2 lin. latae, albidaj.

Plur. Auctores, qui *A. expallentis* mentionem fecerunt, formam rivalem ante oculos habuisse videntur. Quam respicit *Burb. Cent. IV. f. 1* e rudi icone haud li. Forsan malles has for

majoris momenti nehus visum Mt affines conjunctim tractare, *Agaricus s. m. d. f. Statu u. A. d. colors A. ex. pallenti similis. Icon Fl. 1912, f. 1, ceterum bona, ad statu ud- l. m. d. est, pilei CBatro obscuriori. Odore grato, aniseo ceterum manifestis distinctus.*

Tab. 56, f. 2. Ag. expallentis adumbrat *A. expallentem* P. formam nobilioris sistit. Tab. 61, 16. ^idetur. noona, qui mihi Dtius varietas *A. cyathiformis*

CII. AGAËICUS OBBATUS FR.

Epicr. p. 74. Monogr. Hymenom. I. p. 129.

Diagn. Hygrophanus, pileo submembranaceo, ex umbilicato infundibuliformi, glabro, fusco-nigricante, margine demum striatD; stipite cavo, tenaci, glabro, fusco-cinereo; lamellis lecurrentibus, distantibus, obscure ccesio-cinereis, demum albidolruinosis.

In pinetis campestribus circa Upsaliam minus frequens. E synonymis ambiguis etiam in vicinis terris obuius.

Descr. Totus valde aquosus, tenax, flexilis, inodorus. Stipes cavus, 2 unc. et ultra longus, 1—2 lin. crassus, aequalis l. sursum attenuatus, ssepe ascendens et flexuosus, glaber, nudus (apice haud pulverulentus) laevis vel striis interruptis albis notatus, fusco-cinereus. Pileus carnosD-membranaceus, in centre) tantum scissilis, primo convex o-planus, late umbilicatus, dein infundibuliformis, uncialis, glaber, margine striatus, fuseo-nigricans, siccitate expallens, cinereus. Lamellae decurrentes, distantes^ latae, caesio-cinereae, e sporis demum albolpolverulentnB.

Est ex insignioribus hujus gregis statura gracili, pileo striatD, lamellis distantibus, demum more *Ag. mellei* l. *laccati* albopulverulentis facile distinctus.

Apud neinim Auctorum hanc speciem clare propositam inveni, sed ex iconibus l. descriptionibus varii huic accedere videntur v. c. Buxbaumii rudis figiira Cent. IV. t. 3, f. 1. at ut haud fucata levioris momenti, Melius habitum exprimit Bull. t. 248, f. 1, sed ob stipitem album hue pertinere nequit. Incompleta descriptio *A. tardi cinerei* Pers. Myc. Eur. p. 81 non obstat, sed ab *A. tardo* P. (= cyathiformi) tantum distat, ut vix cum hoc CDnjunxisset. Melior est descriptio Secretani n. 1D44. Agariconim species strictius quidem definitae quam aliorum fungDrum, sed ad descriptiones incompletas, deficientibus icDnibus, plane impossibile est synonyma absolute deterrnare. Ditavimus ad species, a quibus descriptiones nbn distant.

Tab. 57, f. 1. Agaricum obbatum sistit.

DHL A&ARICUS PRUINOSUS LASDII.

Lasch sec. icDiem et description em missas. Epicr. p. 75.

Diagn. Hygrophanus, pileo carnosomembranaceo, ex vumbilicato infundibulifDrmi, la^viusculo, brunneo, primitus pruinoso; stipite subfarcto, oequali, fibrilloso, pileo concolori, lamellis ex adnato decurrentibus, confertis, angustis, albidis.

In pinetis muscosis serotinus. In Markia props Driesen rletexit LASCH. NDS circa Upsaliam pluries legimus.

Descr. Tenuis, rigidulus, inodorus. Stipes farctus l. obsolete iistulosus, U nnc. longus, H lin. crassus, aequalis, siepe ascendens l. curvatus, junior fibrillosus, pileo concolor, sed seepe dilutior. Pileus carnosomembranaceus, junior umbilicatus pruinosis, adultus late infundibuliformis et glaber, brunneus, exsiccatus cinerascens, interdum squamulosus. Daro tenuis, cinerascens. Lamellae decurrentes, confertae, angust«, juniores leviter arcuatse, adults falcatae, ex albo sordid^.

A vicinis habitu et coloribus facile distinctus. Fungus a me lectus et hoc loco depictus a LASCHII nonnihl recedit, at differentiae minoris momenti et ex tetate facile pendunt. Laschii minor, (1—2 unc. latus) magis regularis, pruina plumbea conspersus, stipite pallidiore. Noster major, (2—3 unc. latus), pileo repando, nudo, stipite pileo concolori. His notis ad *Agaricum fritillifvrmem* Lasch in litteris accedit. Hie vero stipite cavD, tomentoso, sursum incrassato et odore forti ingrato abunde distinctus. Insuper memorabilis est colore; qui non more sueto siccitate pallescit, sed obscurior fit.

Quoad affinitatem sequenti videtur proximus et *Bull. t. 568, f. 1*, ob pileum squamulosum ad *A. pruinosis* relata, sine dubio sequentem spectat.

Tab. 57, f. 3 formam vegetiDrem A^ pruinosis proponit.

CIV. AGARICUS CONCAVUS SCOP.

Scop. Fl. Carn. p. 449, optime congnit. Fr. Epicr. I p. 75. Monogr. I. p. 130.

A. fumigatus Pers. Myc. Eur. p. 75 nDn obstat.

Diagn. Hygrophanus, pileo submembranaceo, late et profunde umbilicato subpervio, limbo convexo-plano undulato; stipite farcto, aequali, glabro, griseo; lamellis decurrentibus, confertis, angustis, fuligineis.

In silvis regionum campestrium; prope Upsaliam lectus in silvis densis, abisgnis, udis.

Descr. Species distinctissima, gregaria, inodora, tota subfuliginea. Stipes farctus, tenax, sed totus fibres o-mollis, vulgo curtus, uncialis 1. parum ultra, 1—2 lin. crassus, aequalis, nudus, glaber, cinereus. Pileus admodum tenuis, flaccidus, primo plano-convexus at late et profunde umbilicatus, Jeraum totus concavus (non infundibuliformis), 1—2 unc. latus, udus fuligineus, siccus cinereus 1. argillaceo-canus, maraine laevi. Caro tenax, pallida. LamellDB decurrentes, arcuatse, admq̄dum confertse, 1—2 lin. latse, obscure fuliginesse.

Primo obtutu facile fingeres Dmphaliae speciem et habitu cDnvenit cum A. mauro, sed stipes totus fibrosD-mollis.

Lamellae A. mauri insuper candidae sunt. A reliquis Cyathiformibus facile dignoscitur pileo jam primitus profunde umbilicatD, fere pervio et lamellis fuligineis. SCDPDLII descripti¹ tam adsequata ut hoc nomen servandum. Etiain A. fumigatus PERS. e descriptione data nulla nota palpabili distinguendus. Tandem icon Bulliardii t. 368. f. 1. potius ad hunc quam p̄cedentem referenda; differt modo pileD squamuloso, quo ad p̄cedentem accedit.

J5 variis a BULLIARDD datis figuris elucet acutissimui¹¹ virum fere omnes Cyathiformium species sub suo A. cycdh¹¹ formi conjungere. Quicumque vero, cui concessum sit omne[^] a nobis allatas vivas comparare, de earum absoluta differentia facile persuasus sit. Restant adhuc plures apud SCHUMACHEB-SECRETAN, qui ulterius observandi.

Tab. 57, f. 2 est imago A. concavi. Hanc speciem minus quam [^]statura variabilem vidimus.

CV. AOARICUS QUELETII FR.

N. sp.

Diagn. Clitocybe pileo subcarnoso, cpnvexo, umbilicatD, squamoso-punctoto; stipite cavo, aequali, pcculoso, albido; lamellis longe decurrentibus, arcuatis, subdistantibus, albidis.

Locis silvaticis in collinis JUIJB legit sollertissimus fungorum investigator L. QCELET exeunte Novembri.

Descr. Species minor, pulchella, a reliquis Clitocybis Cyathiformibus diversa odore farina; recentis. Stipes fibrosus, inox cavus, unciam 1. parum ultra longus, 2 lin. crassus, sequalis, flocculosus, griseus, basi et apice albus. Pileus carnosomBmbranaceus, primo convexus umbilicatusque, demum infundibuliformis, unciam circiter latus, fuscus, siccus vero albicans, squamis minutis, aequalibus, fuscis eleganter punctatus. Caro pallide cinerea, sicca alba. Lamellte longius, quam in plerisque Dyathiformibus decurrentes, haud confertje, lineam latae, arcuatse, griseo-albidae, dein obscuriores.

Tnter Dlitocybas Cyathiformes cum Ag. brumali tantum comparari potest; licet vero inodorus, pileo stipiteque glabris

mox distinctus. Cfr. Bull, t., 278 A, B. — Agarkus suave^{pr} lens simul olidus est, sed hujus odor gratus, aniseus. [^]st vero insignis analogia cum A. lentiginoso, at hic inodorus, et omnium partium colore immutabili baud affinis et alius stirpi^s;

Hoc opus fungis Suecanis praecipue dicatum, cum v^{*o} hunc licuit loco ceterum vacuo inserere non dubitavi ex^{*1n} cum fungum addere. Cel. Queletio plures nobiles fungos cir^{Esd} HerimonçDurt detegere contigit v. c. Queletiam mirabilem, W vum insigne Lycoperdaceorum genus (forsan Lycoperdon hef^o culeum Pallasii), rarissimum Potyporum Montagnei, A. V^oo^o nillum, Dudoniam Queletii*) e. s. p.

Tab. 57, fig. 4 ante oculos ponit Ag. Queletii. IcDII collimuuu:ata-%\$ Dr. Quelet.

*) CUDONIA QUELETHI, mitra carnosu-caracea, ex alba fuliginea, subng gra^{os} p^o SIZI nta W⁶ Udō Blatōo sukato^m ex albo fuligineo, SP^o or magnis, navicularibus, bdcularibus. In (inercetis Jm-a vere Bt autumno.

CVI. AGARICUS VIBECINUS. FR.

Fr. Obs. 2, p. 209. Epicr. p. 75. Mo?iogr. Hymnum. I. p. 130.

A. aggregatus. Pers. Myu. Eur. p. SO non Dstat.

Diagn. Hygrophanus, pileo submembranaceo, e planD infundibuliformi, glabro, livido albicante, margine mox patente striato; stipite cavo, aequali, molli, glabro lamellisq̄ue primo adnatis, dein decurrentibus, subconfertis, griseo-albidis.

Inter muscos altiores, praecipue locis humidis in pinetis vulgo catervatim, sed occurrit etiam solitarius, vulgo major.

De.scr. Forma primaria inter Polytricha, praecipue ad inargiries paludum gregarie 1. seriatim nascitur. Stipes cavus, elasticus, 2—3 unc. circiter longus, 2—3 lin. crassus, uequalis, laevis, nudus, glaber, mollis nee subcartilagineus, albido-griseus, basi villosus. Pileus disco leviter carnosus, ceterum submembranaceus, junior planus, margine involutus, dein plariD-umbilicatus, demum infundibuliformis, margine piano, patente, striato (pileo udo), 1—2 unc. latus, glaber, griseo-lividus, siccus albidus. Lamellae adnatae, dein decurrentes, subconfertae, 1 lin. latae, griseo-albidae. Altera forma

solitaria, locis graminosis nascens, paulo major, stipitis basis nuda.

Ag. brumalis, cujus bonam iconem praebet Bull. t. 278, ab *Ag. vibecini* t̄gre dignoscitur stipite subcartilagineo, nee molli elasticD, pileo flaccido, in ambitu reflexo et semper laevi, lamellis lividis, substantia magis aquosa, vegetatione serotina.

Ex altera parte magnam habet similitudinem cum *Ag. metachroo* vetusto et siccitate albicante, hic vero facile dignoscitur stipite sursum pulveraceo-pruinoso, pileo piano persistente et lamellis numquam decurrentibus.

Bulliardii tabula 575 f. H. L. quoad staturam cum formis *Ag. vibecini* convenit, at colore plane recedit.

Tab. 5B, f. 1 sistit *Ag. vibecini* formam SDlitariam. Formae ~~gregariae~~ *concoloris* ataturam refert t. 55, f. 3, ceterum diversa.

•V. OiiiiiMES, pileo subcarnoso, B convexo applanatD (non infundibuliformi), extus intusque hydrDphaiiD, polito, rie-D squamuloso 1. farinoso, lamellis adnatis (nee decurrentibus), planis, tenuibus, confertis.

CVII. AGARICUS PAUSIACUS. FR.

Fr. Epicr. p. 77. Mycnogr. p. 133.

Diagn. Hygrophanus, olivaceus, pileo subcarnoso, e convexo piano, laevi, glabrato, obscuro; stipite cavo, aequali, striato, apice albo-pruinoso concolori; lamellis obtuse adnatis^s ventricosis, confertis, umbrino-olivaceis.

In pinetis montanis Smolandiae rarD; nuperius vero etiam UpsaliaB legi-

Descr. Odor debilis, sed manifeste frumentaceus. Stipes subcavus, tenax, 2—3 unc. longus, 2 lin. crassus; aequalis, striatus et in superficie saepe undulatus, apice albo-pruinatus, pileo concolor. Pileus carnosus, tenuis, primo convexus, subumbonatus, dein planus depressusque, unciam latus, laevis, glaber, at primitus rore sericeo cano fugaci obductus, colore varius, at semper obscurus, in Smolandico subolivaceus, in Uplandico umbrinus, siccus subochraceus. Lamellae postice

latissimae, obtuse adnatae, segmentum circuli referentes, valde confertae, in omni aetate obscure olivaceae 1. umbrinae. Sporae albae.

Rara haec species a vicinis eximie differt omnium partium colore et lamellis valde ventricosis, ut primo obtutu facile fingeres lamellas esse sinuatas. Praximus *Ag. ditopus*, odore forti farinaceo insignis, differt pileo tenaci demum inverso infundibuliformi et saepe repando, stipite omnino nudo, lamellis tenuioribus, obscure cinereis. Color lamellarum earumque forma praecipuas et in hac tribu optimas praesent differentias. His accedit odor, qui plerisque nullus notabilis, at in aliis vel aniseus gratus vel frumentaceus s. farina recentis.

Tab. 5B, f. 2. *Ag. pausiacum* adumbrat.

CVIII. AGARICUS NUBILUS. FR.

Epicr. p. 77. Monogr. Hymenum. I. p. 133.

Diagn. Hygrophanus, inodorus, pileo subcarnoso, B CDII-vexo planD, glabro; stipite farcto, sequali, apice pruinato; lamellis adnatis, planis, subdistantibus, argillacvis.

In pinetis campestribus, ut Upsalise, variis locis lectus.

Inodorus. Stipes farctus, elasticus, 2—3 unc. longus, 1—2 lin. et ultra crassus, aequalis, teres nee ut plurimae affines adultior CDmpressus, striatus, glaber, pallescens l. albus, apice pruinatus. Pileus subcarnosus, e convexo planus, 1—2 unc. latus, laevis, glaber, siccus alutaceus. Daro pileo concolor. Lamellae adnatae, denticulo dBCurrente, subdistantes, horizontales, planse, alternis modo dimidiatis in forma minori, fuscescenti-argillaceae. Variat excentricus.

Duplex hujus occurrit forma, altera *major* hoc IDCO picta pileo primitus umbonato fusco-brunneo, lamellis fere linearibus, at in junioribus segmentoideis — altera *minor*, pileo obtuso, dein depresso, udo livido, at utriusque sicco alutaceo, lamellis **ventricosis**.

Hic et A *pausicus* ad typum vulgati et bene cogniti A. *jnetachroi* pertinent, cum quo stipite apice albo-farinoso l-pruinoso congruunt, sed coloribus et plurimis notis differunt Ad A. *metachroi* typum quoque pertinent, licet horum stipes nudus et glaber, A. *ditopus* lamellis obscure cinereis et odori forti farina? recentis bene distinctus — et A. *diatretus* inodorus, pileo incarnato ab omnibus distinctus.

Pruina farinosa in apice stipitis multorum Agaricorum um singulari attentione digna est. Nescimus ejus functione's; pro conidiis vix haberi potest.

Ad species e stirpe A. *metachroi* non numerandus A-*obolus* Epicr. p. 78. Hujus stipes fistulosus, anbcartilagineu* politus, nitidus, omnino nudus, sed striatus et structural **pilei** longe alia, quod vero nee icone neque descriptionibus facile adumbratur. Pro Collybia facile haberes nisi lamelke ulnate dente decurrente.

Tab. 58, f. 3 ad formam maDrem Ag. nubili pertinet.

CIX. AGARICUS ANGUSTISSIMUS. LASCII.

Lasch! in Linn. 1829, n. 523. Fr. Epicr. p. 78. Monogr. p. 136.

Diagn. Hygrophanus, inodorus, pileo subcarnoso, tenui, o convexo *piano* depresso, lsevi, glabrD, *albido*; stipite e farcto fistulosD, tenui, nudo, flexuoso; lamellis adnatis, angustissimis, albis.

In dumetis et nemoribus inter folia et muscos haud rarus. Lasch in Markia primus distinxit, nos variis locis in Suecia legimus.

Descr. Stipes farctus, senio fistulosus, 3 unc. usque longus, gracilis et sequalis, vix ultra lineam crassus, saepius curvatus l. flexuosus, glaber, apice nudus. Vulgo albus est, sed occurrit etiam stipite fulvente. Pileus carnbsulus quidem, sed admodum tenuis, plano-depressus, at non umbilicatus, 2 unc. circiter latus, la^vis, glaber, aquose albus, siccus candidans, raargine patente, in adultis striatulo. Caro licet admodum tenuis, formula, tehax. Lamellae adnatae, denticulo decurrente, angustae, confertissimse, tenues, alba?. Minus quam reliqui aquosus. Ddor nullus.

Est quidem e stirpe A. *fragantis* et *ob.soleti*, tamen Iongius distans stipite gracili, pileo tenui utrinque applanat^ lamellis perangustis confertissimis, odore nullo. A *frat/antiK* (*Hoffm. xc, anal t. 3*) et *obsrieti* jam plures exstant icones.

Ag. *angustissimus* adeo manifeste hydrDphanus, ut a Dlitoc; Orbiformibus excludi nequeat. **Reliqui** vero albi siccitate candidantes, vegeti licet aquosi, nempe A. *pithyphilus* et *Tub** juxta affines citantur inter *D^iformes* et *IhdibtiformeSr*; cum quibus A. *angustissimus* confundi nequit.

Defunctus Lasch principem tenet locum, i Agaricis respiciamus, inter recentiores Mycologos German^ Gaude mihi concessum esse plures illius novas species iconibus illustrare. Hymenoinycetum studium nunc videtur in Germania vxhpendi, cum in Anglia BgrBgie floreat

TA. 59, f. 2 sistit Agaricum angustissimum.

DX. AGARICUS MORTUOSUS. FR.

Epicr. p. 79. Mycogr. Hymen. I. p. 137.

Diagn. Pusillus, inodorus, *pileo* subcarnoso, molli, *plano-depressus*, levi, glabro, *spadiceo*, hygrophano; stipite farcto, aequali, glabro, concolori; *lamellis* adnatis, cernitissimis, sordide et albis.

Locis graminosis nemorum rarius; In Smolandia et Upsalite vero pluries lectus.

Descriptio. Species parva, pulchella absque odore notabili. Stipite farctus, rigido-tenax, unciam 1. parum ultra longum lineam crassus, aequalis 1. sursum leviter attenuatus, senio vulgo compressus, glaber, apice nudus, pileo cernicolor. Pileus carnosulus, plano-depressus, 1 unc. latus, laevis, glaber, decolorans et simul hygrophanus, at semper obscurus, junior

umbrinus, dein spadiceus, siccus alutaceus, immo fulvellus. Lamellae adnatae, dente decurrentes, admodum cernite, angustae, sordide albae. — In Monogr. 1. c. describitur stipes albidus exclusis verbis: *spadiceus, basi (albidus)*.

Dum neutro praecedentium facile comparandus, habitus potius *Collybiae*, sed stipes farctus, totus fibrosus et lamellae sub decurrentes. Habitu potius accedit ad *Leptonias*, sed sporae omnino albae.

Cum plurimas *A. Cyathiformium* species a Bulliardo pictas vidimus, nullam invenimus ex *Drbiformibus*.

Tab. 59, f. 3. *A. mortuosus* nitide pin git.

VI. DIFFERENTES, pileo tenui, hygrophano, squamuloso vel furfuraceo, versiformi (at non vere umbilicato) lamellis adnatis, latis, crassiusculis, distantibus, excipit *A. decori* *A. nitidulus* ad *Collybias* relatus est.

CXI. AGARICUS ECTYPUS. FR.

Syst. Myc. I. p. 108. Epicr. p. 80. Monogr. Hymen. I. p. 140.

Diagn. Oligus, pileo subcarnoso, e convexo piano depressus, melleo *Jibrillis innatis*, fuliginosis, e centro radiantibus subtiliter virgato, margine striato, stipite subaequo, elastico, librillosus; lamellis adnatis, subdecurrentibus, distantibus, pallidiusculis, demum rufo-maculatis, albo-farinosis.

In pratis paludosis per omnes facile Sueciae provincias ubivus, baud rarus. Extra Sueciam hactenus tantum in Scotia lectus, teste BERKLEY.

Odor primo gratus, aniseus, demum fetens. Stipes cavus, elasticus, 2—4 unc. longus, 3—5 liri. crassus, sequalis 1. leviter attenuatus, fibrillosus, sordide flavescens, dein fusco-rufescens demumque olivaceus, basi nigrescens. Pileus subaequam depressus, e convexo planus depressusque, 2—3 unc. latus, glaber, sed fibrillis innatis fuliginosis a centro radiantibus virgatus, fuligine quasi conspersus, sordide seu melleo-flavescens, dein rufescens et in putrescentibus fere brunneus. Margo membranaceus, striatus. Lamellae adnatae, demum decurrentes, latae, distantes, venoso-connexae et interdum

ramosa, pileo pallidiores, lutescentes, demum rufo-maculatae, e sporis copiosis albo-farinaceae.

Species nobilis et distinctissima, *Ag. bello* affinis eoque mediante ad tribum *Ag. laccati* referendus. At omnium partium colore, pilei subcarnosi margine membranaceo striato, lamellis distantibus, sporas copiosas spargentibus mire refert *Ag. melleum*, e qua similitudine facillime dignoscitur. Color et varius et ex aetate mutabilis, semper vero ad typum *Ag. mellei*, a quo vero abunde differt omnino veli defectu, pileo numquam squamoso-piloso, stipite cavo. Dolor saepe dilutior, magis flavescens, quam in icone nostra.

Nobilissimarum specierum hujus tribus (*Ag. belli, incomiti et difformis*) nullas adesse icones maxime doleamus. Cui hi obviam veniunt, eum rogatum volo velit icones parare. Praecipue *Ag. incomitus* pileo virgato et squamuloso simulque viscosus ab omnibus tantum distat, ut cum nullo comparandus.

Tab. 59, f. 1. sistit *Ag. ectypi* formam *obscuratam*; de *CDIDHS* varietate cernitas descripti in.

CXII. AGARICUS DECORUS. FR.

SysL Myc. I. p. 108. Epicr. p. 130. Monogr. I. p. 144.

Ag. galb_{nu}3 Lasch in Linn. 1829, n. 526, ex quo recepi in Epicr. p. 41.

DiWL Luteus, j * . . . "TM r > y % ZZZ ? * Z
obuse, squamulis ^ ' j l Z m Z e Z ^ X l l ^ <<
 farcto dBinum cavo fibriloso, lamens oo . . . unco s Pini
 Pulcherrima et nobilissima hsec species aa . . .
 in silvis Sueciffi montanis fre, uens est; ebam in Kon^gspapRen
 Upsalia, rarius.. In Markia legit L₁₈C_H. In Carpat^s k_g, t
 KALCHBENNEE.

Descr. Solitarius vel gregarius, inodorus, undique BIB-
 ganter et persistenter luteus. Stipes e farcto cavus, 2—3 unc.
 tongus, 2—5 lin. crassus, aequalis, squamulosus l. fibrillosus,
 raro glaber. Pileus carnosus, tsnuis, subfragilis, e convexo
 explanatus, l₁ leviter depressus, non umbilicatus, sepe irre-
 gularis et excentricus, squamulis minutis, confertis, nigricanti-
 bus punctatus. Caro tenuis, lutea. Lamellae obtuse adnatse,
 nee decurrentes; sed senio ssepe secedentes, confertae, planar,
 2 lin. lata^, aures, immaculatse. flocculosis,

Legimus simul varietatem pileo olivaceo-luteo aliamque
 in trabibus inudatis majorem pileo fuligineo-flavida, lamellis
 stipiteque albidis.

Locus systematicus huius speciei ambiguus est. LASCB
 <* lamella* passi- secedens inter Tricholoniata collocavit.
 <* ve^tajne epixyla, lamellis typice totis adn₃tis M. >"
 ^ ^ ^ ^ Ws IBmi) Vetur. Jn Epicrisi inter Pleorotos citavi ul'
 ileunsa^e in^tezm et excentricum, s_{BD} hoc e situ obUi!">
 End et quarBapt¹usv¹8an¹, utinSptemateMycologk», adClit-
 f^ ^ ^ J ^ hu tam5n r^ edit lameL^B postice obtusi-
 nel, attenuatis et a Versiformibus typicis lamellis confertis
 A. trichaius PERS., a nemine dein lectus, hujus variety
 ^ opinionB LASCIII; at nimis recedit descriptio, pileus ile-
 scribitur umbilicatus et alutaceus, lamellae iecurrelites, ijuale^r
 num(luara in Ag. decoro. Poius nngerem hunc ad A. ch^u-
 sup^{ry}Uum acced^{er}B) se(i receⁿtioribus vix innotuit.

Ad A. decorum proximo accedit A. ornatus Fr. Epicr. I^r
 JyOilocissimilibus, at longe rarius obviis, diversus stipi^t
 ^ ^ ^ apice farinolento; pileo umbonato, squamulis ininuti-
 fuscoferrugineis exasperato, lamellis distantibu^
 {jujus \oc\ vid^tur A. cestuans Letell. t. 599.

Tab. BO f^uurse superiores sistunt Ag. [lecDruin.

OXIII. A&ARICUS PACHYPHYLLUS. FR.

Fr. Obs. Myc. I. p. 76. Epicr. p. 80. Monogr. p. 142.

A. absinthiatu. Lasuh. Linn. I. c. n. 120 var.

Diagn. Pumilus, pileo sub eam DSO, e convexo piano, udo
 laevi ochreo-brunneo, sicco furfuraceo-squamuloso demumque
 rimoso; stipite e farcto cavo, fibrDSO- cartilagineo, pileo con-
 color, lamellis adnatis, subdecurrentibus, crassis, distantibus
 canis v. lutescentibus.

Locis graminosis pinetorum raro, sed in silva Kongspar-
 ken juxta Upsaliain ssepe post pluvias aestivales catervatim.
 In Markia legit LASCII.

Deter. Species ex habitii ignobilis et ob staturte et co-
 loris varietatem aegre definienda, sed sine dubio distinctissima.
 Stipes saepius farctus, sed majorum cavus, fibrosocartilagineus
 instar A. laccati, nncialis l. parum ultra, 2 lin. crassus, nunc
 aequalis, nunc deorsum attenuatus, subinde adscendens et
 flexuosus, lacvis, glaber (ex Lasch fibrillosus), pileo concolor,
 apice obsolete pruinosis. Pileus carnosulus, e convexo ex-
 pansus, umbonatus obtususve, i—1 unc. latus, saepe diffor-
 mis et altero latere incisus, fuscus, fusco-luteus, sed typice
 ochreo-brunneus, hygrophanus, udus lsevis, exstrius; siccus
 squamuloso-floccosus. Lamellae adnatae, praecipue, junioris
 decurrentes, distantes, typice canae, sed variant, fusco-lutescen-
 tes. Odor mihi obsoletus, ex Lasch amarus.

Specimina recentius lecta docuerunt varietates ^ ^ ^
 Laschii non fliffere et cDlorsm canum lamellarum esse typi^{inli}
 Affinitas cum A. laccato manifesta, at forsian major
 A. grumato, lamellis albis distincto.

Tab. 5D. iigg. inferiores adumbrant Ag. pachyphyllum.

In Musaeo Academic Holmiensis insuper servantur *"
 quentes Dlitocybarum species depicts:
 A. nebularis, A. auricula Fr. an Dec? A. lusdnus, odor^o . . .
 subalutaceus, A. amarus, A. rivulosus, A. cerussatus, A- l^r
 thyophilus?, dealbatus, A. gallijaceus, A. elixus, A. <iig⁽¹⁾r^e
 teu-s, A. maximus, A. infundibuliformis et membranaceus, -
 squamulosus, A. incilis forma tennis, A. gilvus, A. fjeoir^r
 pus, A. inversus, A. flavcidus, A. ericetvrium, A. cyathip^r
 mis, tres varietates, A. Calathus, A. suavvolens, A. brumtil[^]
 A. applanatus, A. metachrous, A. diatretui, A. fragrans, J^r
 obsoletus, A. gyrans, A. laccatus, A. ametystinus, A. grumit[^]
 tus, A. demusus, A. ornatus, qui vel jam pictae exstant
 vel facile discernuntur ex affinitate et chsfracteribus.

DOLLYBIA.

Stipes cartilagineus, vulgo radicans. Pileus plus minus carnosus, e "convexo planus, margine primo involutus. Lamella?, liberae, adnexae v. adnatse, numquam decurrunt elites. Velum nullum.

UXIV. AGARICUS PLATYPHYLLUS v. REPENS FR.

(Pers.) Fr. *Syft. Myc. T. p. 117* (ubi syn.). *Mon'ogr. I. p. 147*. *Weinm. Ross. p. 66*. *Berkl. Outl. Brit.*

Ag. *grammiDcephalus*. *Bull. t. 594*. var.

Diagn. Collybia pileo carnosissimo-membranaceo, explanato, obtuso, fibrilloso-virgato; stipite brevifido cavo, molli, aequali, striato, pallido; lamellis trimaculato-adnexis, perlatiis, distantibus albis.

•Ad ligna cariota mucida Fagi etc., forma *repens* usque explicata sub libro Betule, ut etiam ad terram juxta truncos per maximam Europam partem.

Descr. Mycelium, si bene involutum, insignius quam in ullo alio fungo, eoque radice- et loriformi, longissime repente, immixto, anastomosantibus, villosis, albo, (quod *Hizomorpha xylostroma* ACH.) optime distinctum. Stipes mollis, cute membranacea, qua ad Tricholomata revergit, at manifesta Collybias species, 3—4 unc. longus, 1 unc. crassus, equalis, fibrilloso-striatus, castreum glabrum, nudus. obsolete apice pruinatus, albidus, basi breviter et praemorsivum radicans. Pileus

carnosissimo-membranaceus, tenuis, udus aquosus, fragilis, mox explanatus, 3—4 unc. latus, obtusus, fibrilloso-virgatus, e fusco cineribus albicans. Lamellae oblique postice truncate, leviter adnexae, 1 unc. et ultra late, distantes, molles, albae. Dolor haud notabilis.

Species sumptuose memorabilia, cum ulla alia vix comparanda; forma repens ut optime explicata pro typica censenda. Formam magis trivialis, sine mycelio depinxit *Bull. t. 534*.

Ex hujus mycelio eductus sum *Hiantias*, *Fibrillarias*, *Xylostromata*, plurima *Itacodia*, *Athelias* et plura genera recentius distincta Dordeana v. c. *Vephalocladia* Sacc. *Veg. Scand. p. 493, 494* esse mycelia.

Icon nostrum Tab. 51 speciosam *Ag. platyphylli repentis* formam exhibet.

UXV. AGARICUS SEMITALIS FR.

Fr. *Syst. Myc. I. p. 117*. *Epicr. p. 82*. *Monogr. I. p. 146*.

Diagn. Collybia pileo subcarnoso, e convexo piano, obtuso, glabro; stipite fibroso-farcto, fibrilloso-striato, praemorso, cute cartilagineo-membranacea; lamellis obtusis annulato-adfixis, distantibus, albis, demum et tactu nigricantibus maculatis.

Ad terrain grammosam juxta vias annis pluviosis saepe frequens circa Upsalam, ceterum admodum rarus, serotinus. Vivit solitarius et caespitosus.

Descr. Est inter fungos maxime versatiles, totus subcartilagineus, saepe tenuis, statura maxima varians, nunc elatior, nunc pusillus, inodorus, lamellis facile imbricatis. Stipes primo farctus, demum subcavus, elasticus, a basi subbulbosa vel praemorso-radicans attenuatus, 2—4 unc. longus, 1/4 lineae crassus, fibrilloso-striatus, fuscis cineris-albus, apice nudus. Pileus leviter carnosus, e convexo planus, ob-

tusus, 1—4 unc. latus, laevis, glaber; recens udus, piceus, fuliginosus. immixtus, hygrophanus, siccus nunc pallide hitescens. isabellinus, nunc griseus; marginem primo inflexo, dein patente, perspicue striatulo. Caro tenuis, scissilis, vobgeti udae, sicca alba. Lamellae perspicue obtusae (attenuatae rotundatae), annulato-adfixae cum demum in stipitem decurrentibus, subdistantes, distinctae, albse, dein cinerascens, tactu nigro-maculatae tandemque nigrescentes. Omnes modificationes notare non licet.

Multa hanc speciem cum priore habet communia, at eadem vix affinis. Locus systematicus difficilis est, cum cutis stipitis baud cartilaginea, sed uti *A. platyphylli* at *A. pulli* in membranacea, mollis, quare Collybiae atypicae, non tamen cum Tricholomatibus jungenda.

Tab. 52 fig. 1. Formam demum *Agarici semitalis* adumbrat.

CXXVI. AGARICUS STRIDULUS Fr.

Fr. Epicr. p. 85. Monogr. I. p. 152.

Diagn. Collybia pileo carnosus, molli, e convexo explanato, levi, hygrophanus, carne aquosa inferne corneo-grisea; stipite fistulosus, rigidus, fragilis, fibrillosus-striatus, livido-fusco, basi incrassatus; lamellis sinuatis adnatis, latis, confertis, candidis.

Ad terrain graminosam locis apricis in pineto-montanis passim. Lectus in Smolandia, circa Upsaliam etc.

Descr. Solitarius l. gregarius, inodorus. Stipes in oxfistulosus, corneus, gracilis, strictus, 3 unc. longus, 1—2 lin. crassus, tares, aequalis, basi modice leviter incrassatus, subradicans, fibrilloso-striatus, primo atrofuscus, dein fuscolividus; apiculus nudus. Pileus carnosus, butyraceo-mollis, convexo explanatus, subumbonatus, unciam 1. parum ultra latus, udus subviscidus, nigricanti-fuliginosus, dein fuliginolividus. Caro sat crassa, sed innoxiosa, B fuscus albicans. La-

mellae adnexae, postice horizontaliter et late emarginatae, confertae, laticae, candidae.

Quoad affinitatem ambigit inter *A. (Tricholoma) nielaleucum* et *Agaricos butyraceos* (praecipue *A. asemum*). Ab illo differt stipite gracili, composito; ab hoc lamellis latis, adnatis. In speciebus *Ag. butyraceo* affinis stipes cartilagineo-corticatus et a basi attenuatus.

Agaricus pullus Epicr. p. 85 nonnullas notas cum praecipue habet communes, at speciem sistit distinctissimam, nobilissimam; praeter alias differentias distinguitur cute stipitis membranacea, lamellis transverse pellucido-striatis. Ceterum truncigenus Bt vulgo caespitosus.

Tub. 62 fig. 2. *Agar. stridulum* representat.

COLLYBIAE BENUINAE.

A praecedentibus Tricholomoidis differunt stipite gracili, *quali, radicato, levi; a Teplnophanis laetiore, lamellis numquam cinereis vel fuliginosis.

DXVII. AGARICUS DISTORTUS Fr.

Epicr. JJ. 84. Monogr. I. p. 150.

Diagn. Collybia pileo carnosus, y convexo expanso, laxo, umbonatus, levis, glaber, expallens; stipite subcavo, a basi ventricosa, tomentosa attenuato, subtorto, pallido; lamellis leviter adnatis, confertissimis, albis, dein rubiginosomaculatis.

Ad truncos Pini in provinciis Sueciae in montanis passim. Upsaliese rarus. In Anglia legit Broome.

Descr. Gregarius. Stipes fragilis, extus cartilagineus, intus spongiosus, mox cavus, 3 unc. longus, vix 1 unc. crassus et e basi tomentosa totus sursum attenuatus, contortus, sulcatus, pallidus. Pileus carnosus, tenuis, convexo-expansus, obtuse umbonatus, 3 unc. fere latus, admodum laxus, 3 unc. fere latus, laevis, glaber, badius, expallens, at non hygrophanus. Lamellae leviter adnatae, confertae, lineares, vix serrulatae, albae, demum rubiginoso-maculatae.

Species nobilis, media inter *Ag. fusipedem* et *Ag. butyraceum* at ab utroque abunde distinctus.

tpicr. p. 83; huiusvero stipes tortuosus, mollis, frugibus, obtusis, lamellis admodum latis, haud maculatis. Craterum valde circumscriptum, in arboribus frondosis tantum obvius, 47- maculatis quibusdam characteribus, v. c. lamellis multiginosis-maculatis *A. distorto* accedit, sed praeter compositum longius distat pileo comparatum, hinc ut dicitur, semio rubente, stipite valido, praemixto, non expallente, neminem sistit. *Agaricus distortus* t. 24 fig. 1. Huiusmodi nostrum irrimis insidiosa speciosam omisit. *Agaricus distortus* Bull., in Europa, australi et media ratur et in provinciis montanis, mediis et borealibus desidatur ab *A. distorto* substitutus.

Tab. S3 ii. 1. *Ag. distortum* depingit.

CXVIII AGARICUS XYLOPHILUS FR.

" Fr. Monoffr. II. p. 289. Vet. Akad. Fork. 1861.

Diagn. Collybia pileo subcarnoso, campanulato, laxo, dein expanso, late gibbo, glabr; stipite cavo, aequali, subflexuoso, fibrilloso-striato, albido; lamellis adnatis, perangustis, confertissimis, albis.

In Ulmis vetustis, cariosis in hortu Botitniuu Upsaliensi late viguit sero Novembri.

Descr. Species admodum nobilis, vulgu dense caespitosa. Stipites cavi, 2—3 unc. longi, 3 lin. crassi, aequales at saepe flexuosi, fibrilloso-striati, albidi, intus fusciscentes. Pilei leviter carnosus, ampli, campanulati, prolixi, 3 unc. usque lati (explanati usque 4 unc), vulgè obtusi, interdum vero umbone minuto praediti, et magis expansi late gibbi, glabri, albidi 1, medio fusciscenti-alutacei. Magis expansi marginem versus rimose fissi. Caro ubique tenuissima, fragilis, fusciscenti-aquosa. Lamellae adnatae, reticulatae saepe decurrente,

Agaricus strumosus, albus, pileo tenui convexo irregulari glabro, margine primo inflexo villosus; stipite cavè aequali flexuosè crispato-undulato, Lamellis secedentibus ron-

angustissimè, linenni tantum latae, confertissimae, acie integra.

Agaricus romosus Bull. t. 102 eadem statione gaudens, admodum distinctus pileo e convexè explanato, demum depresso, stipite farcto, lamellis leviter adnexis. Major adesse videtur affinitas cum *Ag. confluente* ob lamellas angustissimas et confertissimas, ut vix comparari possint. Deterum haec species e margine vix inflexo Mycenis accedit.

Agaricus xylophilus Weinm. in Linn., cujus unicum simplex specimen semel in trunco abiegnò lectum, est species dubia et secedenda. Descriptio incompleta (v. c. lamellarum) et contradictoria (v. c. pileus in diagnosi firmus et in descriptione fragilis dictus), sed specimen mecum communicatum habitu nostro ita accedit, ut distinguere non ausus sim.

Tab. 63 fig. 2. *Ay. xylophilum* optimum sistit.

fertis integerrimis Fr. Epicr. p. 86, in pinetis muscosis nascens, hujus loci, at deest icon speciei distinctissimae.

DXIX. AGARICUS INKATUS SUM.

Schum. Saell. II. p. 304. Syst. Myc. T. p. 123. Monogr. I. p. 156. Berh. Dull. p. 116.

Diagn. Collybia pileo subcarnoso, globoso campanulato, dein convexo, umbonato, levi, stipite fistuloso, torto, subcompressè, albopulverulento deorsum umbrino; lamellis liberis, linearibus, confertis, pallidis.

Locis humidiusculis silvarum rarior species. In Selandia detexit SCHUMACHER, cujus iconem exhibemus. In Anglia legit BERKLEY. Typus legit ad Femsjø formam tertiam parte minorum.

Descr. Caespitosus, tenax, odore mucido. Stipites earlaginei, fistulosi, 2—3 unc. longi, 2—3 lin. crassi vel dimidiatim latiores, tortiles 1. flexuosi, fusciscentes, demum umbrini, superne 1. undique albofarinacei; intus ad latera villosi. Pileus leviter carnosus, lentus, e globoso campanulatus expansus, umbonatus, 14 unc. latus, 1^{us} vis, glaber,

colore sordido alutaceo-fusco. Lamellae liberae, sed approximate, valde confertae et angustae, integerrimae, pallidae.

In forma minore stipes 14 unc. longus, lineam modo crassus, undique pulverulentus, extus intusque pileo concolor, non rufescens. Pileus e convexo planus, uncialis.

Affinitas hujus speciei manifesta cum *Ag. confluente*, licet habitus sit sat diversus. Dignoscitur insuper stipitis fusciscentis, torti indumento haud floccoso, pileo alutaceo-fusco, lamellis angustis quidem at leviter ventricosis nec a stipite remotis. *Ag. confluentis* icon sat bona in PERS. ic. pict. t. 5, f. 2.

Tab. 64 fig. 1. Sistit *Agar. ingrati* formam majorem.

DXX. AGARIDUS ACERVATUS Fit.

Syst. Myc. 1. p. 122. Epicr. p. 92. Monogr. 1. p. 150. Berkl. Outl. p. 119.
Agar. cry thro pus y. Alb. et Schwein. p. 184.

Diagn. Crespitus pileo carnosulo, e convexo piano, glwbro, hygrophano, margine striatulo; stipite fistuloso, aequali, glabro, rufo, basi radicato tomentoso; lamellis liberis, linearibus, confertissimis, albedo-incarnatis.

Ad basin truncorum Pini silvestris per plurimas Europae regiones, multis locis copiose.

Descr. Drespitoso-fasciculatus, stipitibus numerosissimis, stipatis, basi coalitis et albo-tomentosis. Singuli stipites eximie fistulosi, rigido-fragiles, 2—4 unc. longi, 1—2 lin. crassi, sursum leviter attenuati, raro compressi, basi excepta glaberrimi, laves, rufi, interdum brunnei. Pilei leviter cariiosi, convexi, dein explanati, obtusi 1. demum gibbi, 2—3 unc. lati, udi incarnati, sicci albidii, margine primo involuto, demum explanato, striatulo. Lamella primo in nexa mox

liberal, confertissimii, perangustse, linearis, ex incarnato bidse.

Ab omnibus e stirpe *Ag. confluentis* distinctus vocatione inaxime caespitosa, stipitibus numerosis basi connatis et basi tomentosa, excepta *glabris*, lamellis semper approximatis. *Ag. confluens* stricte non est caespitosus, licet per individua Mycelio expanso juncta, stipitibus ibique floriculis pulverulentis, lamellis demum remotis.

Primo obtutu *Marasmiu erythropvdi* similis, cuius ALBERTINI et SCHWEIN. conjunxit, hic vero iiridus ilamellis latis laxis mox distinctus.

Tab. 64 fig. 2. *Agarici acervati* formam minoram representant.

CXXI. AGARICUS NITELLINUS FR.

Epicr. p. 80. Monogr. 1. p. 142.

Diagn. Collybia pileo submembranaceo, e convexo explanato, laevi, nitido, hygrophano; stipite subtiliter fistuloso, aequali, rigido, glabro, fulvo; lamellis adnatis, tenuibus, subconfertis, albopallentibus.

Ad margines graminosas viarum in pinetis. Quotannis frequena in silva Hongsparken prope Upsaliam.

Descr. Solitarius 1. gregarius, inodorus. Stipes e farcto listulosus 2—3 unc. longus, 1/2 lin. crassius, aequalis at saepe flexuosus, glaber, striatulus, ferrugineo-fulvus, siccus luteus, basi saepe villosa radicans; rarius apice pruinosis. Pileus submembranaceus, convexo-planus, obtusus, 1—1/2 unc. latus, glaber, accuratius laevigatus subrugulosus, udus fulvus 1. testaceo-fulvus, pellucido-striatus, siccus subalutaceus. Caro tenuis, concolor. Lamellae adnatae, postice obtusissimae et

antice aequaliter attenuatae, haud admodum confertae angustae, integerrimae, nitidae.

Species haec pulchella, distinctissima a praecedentibus longe distat. Habitu *Ag. laccati* et stipite intus fibroso fere Clitocybas accedit, quibus olim adscriptus, at stipite pollentissimo nitido melius ad Collybias referendus, confirmante sequenti unica vere affini.

Exstat quoque varietas minor stipite vix unciali, pileo 1/2 unc. lato, pileo umbonato. Neutra in extra Sueciam lecta novi — nee *Marasmiu chordalem*. Utraque species tamen in his ut huius furile praevidetur si huius venisset.

Tab. 65 fig. 1. *Ajhimbrat Agar. nitellini* formam majorem; fig. 2 minoram.

Agaricus nummularius LAMACK, Bull. t. 56, Epicr. p. 91 nis. S'culo inquirendum an varietas dubie subjunctae species est species mihi illic nee obvia. In fallor praecedenti affinis distinctae.

DXXII. AGARICUS SUCCINEUS F.JJ.

Epicr. p. 51. Monogr. I p. 162.

Diagn. Ullubia pileo sub eam uso, i* convuxo expanse deinumque subdepresso, laevi stipiteque listuloso, uequali, rufb glaberrimis; lamellis obtuse adnatis, latis, crassiusculis subdistantibus, serrulatis, albidis.

Locis graminosis in silvis. Ad Feinsji Sinolandiae legi in fagetis, in Suecia media vero in pinetis, at rarior species.

Descr. Solitarius, inodorus. Stipes fistulosus, tenax, 1—2 unc. longus, 1—2 lin. crassus, tequalis l. basi attenuatus et arrhizus, laevis, undique glaber, politus, rufobriinneus l. rufescenti-pallescens. Pileus tenuis, subcarnosus, e convexo explanatus, obtusus, demum depressus et insqualis, siccus saepe rimose fissus, unciam latus, laevis, glaber, rufus l. brunneo-fuscus, expallens. Lamellae adnatae, postice obtusae, minus confertae, valde latae, crassiusculae, pallescenti-albae, acies serrulatae.

Unica species attinis est *Ag. nitellinus*, at clare distinctus i3 descriptionibus supra datis. E Gennaiia missus sub nomine *Ag. dryophili*, a quo vero lamellis latis, crassiusculis, minus confertis facillime dignoscitur, *Ag. xanthopus* differt statura, pileo e campanulato expanso laxo, lamellis fere liberis, integerrimis.

Ag. melleus SCHAEFF. t. 40 inter hunt; et *Ag. aquosum* ambigit, sed dicitur lignatilis, at terrestriis pictus. Variis vero locis Schaefferum vidimus e memoria loca natalia erroneo indicasse; sic *Polyporum confluentem* dixit truncigenum, e contrario *Ag. corticatum* (SCHAEFF. t. 225) terrestrem.

Tab. 55 fig. 3. *Ag. succineum* typicum spectat.

CXXIII. AGARICUS MACILENTUS Fit.

Sy3t. Myc. I. p. 131. Epicr. p. 93. Monogr. I. p. 166. Weinrn. lioss. t. 77.

Diagn. Dollybia pileo carnosulo, planiusculo, obtuso, laevi, rj-labro; stipite subtiliter fistuloso, tenaci, nudo, radicato lamellisque secedenti-liberis, cdiifertis, linearibus, luteis.

In pinetis montosis supra acus perraro legimus in Smolandia et Uplandia. In Rossia legit WEINMAN.

Descr. Species pumila, ariia, inodora. Stipes obsolete fistulosus, cartilagineus, tenax, 1—1¹/₂ unc. longus, lineam vix crassus, aequalis, filiformis, passim flexuosus, glaber, haud pulverulentus, late flavus, basi leviter radicans. Pileus arnosulus, orbicularis, e convexo applanatus absque umbone tumbilico, unciam vix latus, siccus, obscure luteus. Caro lenta, tenuis, lutea. Lamellae secedentimiberae, confertissimae, linnae, valde inaequales, eleganter et pure lutie-

Statura unniid *Ag. myosuri*, sed color *Ag. verity*, quare cum hujus formis pumilis facile commutatur. Hic vero differt stipite farcto, tdo fibroso nee cartilagineo extusque fibrilloso-striato, pileo demum depresso, sordide luteo, carne alba, lamellis latioribus et in formis minutis adnatis.

In omnibus Collybiis stipes norinaliter fistulosus (licet in nonnullis priiid farctus), at duplici diversa et stricte definita ratione. In aliis tubulus sat amplus, sine medulla; in aliis in stipite medulla farcto subtissimus ut primo obtutu non facile observetur. Hic character maximi momenti et in aliis Agaricorum subgeneribus raro observatus.

Tab. 55 fig. 1. *Ag. macilentum* spectat.

CXXIV. AGARICUS AQUOSUS BULL?

Bull. t. 12? Fr. Epicr. p. 93. Monogr. I. p. 163. Sommerf. Lapp. p. 284. Seer. Hslv. n. 737.

Diagn. Collybia nilou carnosula membranacea, mixta piano, obtusa, margine striatulo, supracostata, farrina, seuali, fflabro melleis; lamellis adnexis, mox liberis, confertissimis, linearibus, albidis.

Locis humidis, muscosis silvarum, rarior species, sed in variis regionibus lecta. Formam optimam legi in silva ad Sunnerstad prope Upsaliam.

Descr. Fungus annuosus, melleus, siccitate admodum expallens, inodorus. Stipes farctus, 14-21 unc. longus, lineam latus, aquosus, flexuosus. 1. leviter undulatus,

ceterum politus, glaber nee apice pulverulentus. Pileus tenuis, tenax, mox planus, obtusus, orbicularis, melleus, margine dense striatulo. Lamella? ut supra, integerrima?

Aliam in Smolandia legi formam magis habitu, quam characteribus diversam et Ag. dryophilo accedentem, a forma typica haud parum recedit. Differt stipite fistuloso, basi flocculoso, siccitate fulvello. Hanc formam sistit Bulliardi icon, quare novam dedimus formae typicae.

Tab. S6 fig. 2 depingit Ag. mellei formam typicam.

CXXV. AGARICUS EXSCULPTUS FR.

Epicr. p. 93. Monogr. I. p. 162. Cooke Brit. Fung. p. 59.

Diagn. Collybia pileo carnosulo, tenaci, e convexo expanso, umbilicato immutabili stipiteque fistuloso, tenui, in-panso, umbrino, subliberis, arcuatis, confertissimis, curvo glabris; Umbrino ano-ustis sultureis.

Ad ligna vetusta, indurata duercus raro. Legimus in Smolandia? in Britannia BEDOME. Tab. SB fig. 3.

Descr. Proteo Ag. dryophilo affinis, sei stipite minus fistulosus, brevis, uncialis, vulgo incurvus, rete sulfureo; pileus convexus, vere umbilicatus, 1-2 unc. latus, fulvobrunneus nee expallens; lamella confertissima, lineares, sulturese. Tenacitate praecipue insignis.

Ag. exsculptum d. Tr.

CXXVI. AGARICUS EXTUBERANS FR.

Epicr. p. 53. Monogr. I. p. 164.

Bull. t. 28. f. 1. bona! at n. D. n. Fucata.

Diagn. Collybia pileo carnosulo, campanulato expanso, umbone lato protuberante; stipite tenui, fistuloso, radice lato-labro, pallido; lamellis attenuato-adnexis, confertis, albis.

Ad terrain, iuxta truncos et ad ligna putrida hinc inde et sporadice obvius.

Descr. Solitarius, tenax, inodorus. Stipes fistulosus, in firmioribus etiam farctus, radicans, 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, tequalis, strictus. 1. leviter flexuosus, lavis, glaber, haud pulverulentus, albidus. Pileus e campanulato expansus, umbone lato protuberante, orbicularis, 1-1 1/2 unc. latus, glaber, lasevis non hygrophanus, rufo-fuscus, basi 1.

umbrinus, circa marginem primo incurvum pallidior-alba. Lamellae attenuato-adnatae, secedentes libere apparente, confertae, 1-2 lin. latae, albidae.

Affinitas hujus speciei acgre indicatur; quoad staturam cum Ag. protracto comparanda, sed ab omnibus recedit ut tuberculiformi. Ag. melleus Seer, cum nos convenit, sed Ag. melleus Schgefferi longe distare videtur. Melius convenit Ag. ocior PERS. et optime figura Batta supra citatis.

Tab. 6? fig. 1 et minor Ag. extuberantis ant. oculi.

CXXVII. AGARICUS MYDSURUS FR.

tiyst. Myc. I. p. 132. Monogr. p. 158. WaMenb. Suec. n. 1.904. Seer. n. 653.

Diagn. Dollybia pileo carnosulo, orbiculari, planiusculo, obtuso, glabro, lsevi, rufo; stipite subtiliter fistuloso, radicato, aequali, rufescente, apice albo-pnlviTiilerito; Inmrii His liberis, linearibus, confertissimis, albis.

Frequens ad terrain in pinetis SueciaB Lapponiam usque. Utiam in Rossia, Germania, Helvetia lectus.

Descr. Stipes cartilagineus, tenax, subtiliter fistulosus, filifonnis. imcialis, sed radice. aequae longa, vulgo *glabra* auc-

tus, apice albo-pulverulentus, ceterum glaber. Pileus leviter carnosus, tenax, primo cDnvexus, at mox applanatus, orbicularis, \ unc. et ultra latus, obtusus, laevis, glaber, si ecus, plus minus rufus. Lamellae liberal, admodum confertte, planEE, quaternatse, alba?. Exstat var. pileo rufolivido, pileD subumbonato, Ag. *comigeno* accedens.

Tab. 155 fig. 4. im agin em A. *myosuri* priebet.

CXXVIII. AGAEICUS CONIGENUS PKRS.

Pers. syn. p. 388. Syst. Myc. I. p. 152. Monogr. I. p. 158. Berkl., Weinm., Seer. etc. — Buxh. I. t. 67 fig. 2.

Diagn. Dollybia pileD carnosulo, planiusculo, inaequali, subumbonato, glabro, expallente; stipite subtiliter fistuloso, tc3naci, pulverulento, pallescente, radice strigoso-fibrillosa; lamellis liberis, CDnfertissimis, pallescentibus.

In pinetis ad conos Pini et prascipue Abietis Europe totius vulgaris; plerumque gregarius.

Descr. Stipes cartilagineus, subtiliter fistulosus, tenax, nunc uncialis, nunc ad 2—3 unc. elongatus, totus filiformis, pileo concDlor, unidique primitus pulverulentus, demum vero subnudus, basi cauda strigosa radicans. Pileus leviter carnosus, firmulus, e convexD planus, subumbonatus, versifor-

mis, ssepe angulatus etiam depressus, i—1 unc. latus, glaber, colore admodum varius, e testaceo-gilvD lividus, immD gri-seus et albicans, udus margine strintulus- LamellaB prioris, at pallescentes.

Ag. *myosuro* maxims affinis, ut lingers varietatem c loco personatam. Interea habitu et pluribus differunt notis. Vulgatae speciei deest icon excepta rudi haud fucata *Euxbaumii*.

Tab. 57 fig. 3. Ag. *conigenum* proponil.

DXXIX. AGARIDUS CIRRHATUS PEKS.—SCHUM.

Schum. Saell. n. 17.93. Epicr. p. 89. Monogr. I. p. 159 et plurr. Auct. recent.

Ag. *tuberosus* v. *cirrhatus*. *Pers. syn. p. 374.*

Diagn. Collybia pileo carnQsulo, piano, sericello, demum umbilicato, stipite subfistuloso, aequali, pulverulento, radice torta fibrillosa; lamellis adnatis, confertis, angustis, albis.

Ubique inter muscos, quisquillas et in fungis putridis catervatim nascens.

Descr. Quoad magnitudinem et staturam maxime varius, at semper pusillus, tenax, albidus saspeqt) rufescens. Stipes subtiliter fistulosus, ut tubus centralis saepe a3gre conspiciatur, 1—2 unc. longus, filifonnis, saepe flexuosus, pallidus, albo-pulverulentus, cauda torta, fibrillosa radicans. Pileus leviter carnosus, e conico-convexo planus; medio demum umbilicatD-depressus, rufescens saepe cum mammilla

centrali; a magnitudine aciculae expanditur in 5—5 linearum latitudinem, *sericrilus*, demum subtilissime et saepe concentrice rivulosus, albus, opacus. Lamella adnatae, quo hie a duobus praecedentibus clare difert, confertte, lineares, peran^u- stse, valde inaequales, alba3.

Dum duDbus prrcedentibiis, Ag. *tuberoso* et *racemoso* stirpem sistit distinctissirnam, a sequentibus stipite pulverulento etc. facillirne distinctam. Praicipue cavendum ne Ag. *ocdlatus* cum Ag. *eirrhato* confundatur.

Tab. BB fig. 1 sistit Ag. *cirrhatum*.

CXXX. AGARICUS MICHELIANUS Fit.

Fr. Obs. 11. p. 146. Epicr. p. 14. Monogr. I. p. 168. Seer. p. 747 a. Mich. gen. t. 73. f. 3.

Diagn. Collybia Candida, pileo submembranaceo, convexo-plano, obtuso, glabro, margin e striatuli); stipite farcto, firmo, stricto, nudo, basi subincrassato; lamellis adnexis, confertis, angustis.

In radicibus graminum seriatim, at rarior species.

Parvus, gregarius l. potius seriatim nascens, totus tandidus. Stipes obsolete iustulosus, uncialis, lineam fere crassus, firmulus, strictus, aequalis, nudus (numquam pulverulentus), glaber, excepta basi villosa. PILEUS carnosulus, sed

admodum tennix, tenax, e convexo planus, obtusus, A^{luc} latus, glaber, udus margine striatulus. Lamellae adnatae, confertae, angustae, integerrimae, constanter albce.

^ c u m duobus seijuentibus, *Ag. florida* pulcherrima^u ocellato peculiarem sistunt stirpem stipite nudo aliisque u^u a pvoecedentibus distinctam.

Tab. B8 fig. 2. *Ag. Michelianum* repraesentat.

CXXXI. AGARICUS MUSCIBENUS SCHUM.

Schum. Saell. 2. p. 307. Fr. Sjst I. p. 145. Monogr. T. p. 168. Ft. Dan. t. 2023. f. 1. Weinm. Seer. Mich. t. 73. l. 4.

Diagn. Collybia Candida, pileo submembranaceo, convexo-plano, obtuso, leevi, glabro; stipite farcto, seta ceo, flaccido, nudo; lamellis adnatis, subconfertis, linearibus.

Inter muscos, praecipue ad basin truncorum.

Descr. Stipes ob tenuitatem farctus apparet, uncialis et ultra, capillaris, flaccidus, saepe flexuosus, glaber et nudus, basi subradicans. Pileus submembranaceus, e globoso hemisphaericus explematusque, obtusus, 2—3 lin. latus, pellucidus,

laevis, glaber, maruescens, inargine integro persistenti, numquam revoluto. Lamella adnatae, subconfertae, lineares, alternae breviores, acie integerrima.

Unica species cum qua confundi posset est *Ag. inycens* capillaris, diversa lamellis latioribus, distantibus. Spatulo tuo novam dedi iconem comparationis gratia cum proximis

Tab. G8 fig. 3. *Ag. mmtigum* nunciat.

CXXXII. AGARICUS LUDIUS FK.

Fr. Kpicr. p. 44. Monogr. I. p. 168.

Diagn. Collybia Candida, pileo inembranaceo, tenacello, e convexo piano, subumbonato, dein revoluto undulato-diformi, lobatoque; stipite fistuloso, capillari, nudo, radice repente fibrillosa; lamellis adnexis, liniaribus, subdistantibus.

Inter ramenta lignea, serragineri in horto olim legi. Nuperius inter muscos in pinetis.

Descr. Valde gregarius et fasciculatus, rhyzidio fibrilloso albo intra matricem late repente, totus lacteus. Stipes angustissime fistulosus, (tubulo non nisi lente conspicuo); un-

cialis et ultra, capillaris l. cumplimitus lineam latus, glaber, tenax, flaccidus; saepe ascendens et tortus. Pileus membranaceus, primitus convexus inargine involute, obtusus, dein expansus et revoluto, maxime undulato-diformis, subumbonatus, laevis, glaber, non hygrophanus. Lamella attenuata-adnexa, subdistantes, tenellae, immixtis paucis dimidiatis. Exstat varietas major, pileo camoaulo, umbonato.

Tab. r88 fig. 1. *Ag. Ludii* pertinet.

DOLLYBIAE TEPHMPHANAЕ.

colore obscuro, lamellis griseis 1. fuligineis distinctai.

* *Graveolentes.*

CXXXIII. AGARICUS RANDIDUS Fu.

Syst. Myc. I. p. 141. Epicr. p. flō. Mono jr. I. p. 170. iVeim. Boss. p. 104. Secret n. 656.

Diagn. Collybia graveolens, pileo carnosulo, "e convexo piano, umbonato, lsevi, tenaci, indumentD sericello albedo irrorato; stipite fistuloso, stricto, rigido, radicato, glabro lamellis liberis, confertis, angustis, cinereis.

In pinetis ad terrain per plurimas Sueciae provincias haud rarus; in Scania quoque lectus in silvis frondosis ad truncos. Deterum in Rossia, Germania (Wirtgen), Helvetia lectus.

Descr. Ddor farina recentis fprtis, subrancidus. Stipes tistulosus, rigidus, strictus, 3—5 unc. longus, 2 lin. crassus, ajqualis, laevis, glaber, lividus; radice longa, fusiformi, villosa. Pileus cartilagineo-carnosus, tenax, e convexo planus, late et obtuse umbonatus, la3vis, glaber, diu irrigatus viscidulus, 1—2 unc. et ultra latus, plumbeo-niger, fuliginus, expallens at non hygrophanus, primitus rore sericello-pruinoso velatus.

Lamellee liberae, confertse, august^ sit v^ntriiDsvi^, obscure cinereae, subpruinose.

Singularis hujus varietas *bnllata*, stipite 2 unc. longo, radice brevi, pileo bullato, repando, 2i unc. lato, circa umbonem depresso et extra hunc jugo elevato cincto, nitido, ferme nigro; lamellis linearibus, venasis et venis connexis, fuligineis, albopruinosus inter typicum passim occurrit. Cum sequente non commutandus.

Nobilis h^c species sistit typum peculiaris stirpis odore facile recognoscendse. Ad hanc stirpem etiam pertinet *A.g. putidus*, sed stipite nullo modo cartilagineo-corticato, sed iibroso-molli, quare optima TricholDinatis species. Ddor *Ag. inolmtis* minus fortis, ssepe obsoletus, at sine dubio ad Rancidorum stirpem referendus.

Tab. 69 tig. 1. *Ag. rancidi* icon.

DXXXIV. AGARICUS CORADINUS FR.

Epiur. p. 95. Mvnoqr. I. p. 170.

Diagn. Collybia graveolens, pileo carnosulo, convexo expanso, nudo, hygrophano; stipite cavo, rigido, arrhizo, sursum albo-farinoso, subsquamuloso; lamellis adnexis, secedentibus, vix confertis, lafiusculis, albido-griseis.

Locis grainiosis silvarum prsecedente rarior; pluries iurca Upsaliarn lectus. In Britannia, BERKL.

Descr. Odor farina; recentis forris. Stipes csivus, eximie cartilaginous, junior rigidus et tenax, deuin fragilis, ut plurimum cDmpressus, difformis (etiam lacunosus obvius) U unc. longus, 2 lin. latus et comprimendo latior, sursum subattenuatus et arrhizus, fuseescens, apice squamulis albis farinosus. Pileus subearnoso-cartilaginous, e convexo expansus, nunc umbonatus, nunc depressus, stepe difformis et undulatus, 1A unc. et ultra latus, laevis vel circa marginem

rugosus, glaber, vegetus fuscus et nitens, exoletus et siccus griseus. et opacus. Lamella obtuse adnatae, secedentes, ut saepe liberae appareant, late, vix confertse, priniD distinctse, dein #prsecipue in individuis difformibus* venoso-connexis, albido-grisea3.

Singulis partibus a priore differt ut u detinitionibus datis apparet. Ab utroque clare differt *Ag. Ozes* Epicr. 1. c, etiam graveolens, pileo glabrD hygrophano, udo griseo-fusco, sicco argillaceD-fuscescente; stipite laxo arrhizo, fragili, apice pruinoso; lamellis abatis, subventricosis, *fuligineo-olivaceis*. Dolemus nobis haud adesse iconem. Lectus est in pinastretis Smolandiae ad Femsij, sero Octobri.

Tab. B9 fig. 2 nil *Ay. coracinum* per tin tit.

CXXXV. AGARICUS INOLENS FR.

Epiur. p. 96. Monogr. I. p. 171. Cooke Brit. Fung. p. 51.
Ag. Zephirus var. Weinm. Ross. n. 183.

Diaan. Collybia subolens, pileo carnosulo, e campanulato-clexo expanso, umbonato, glabro, hygrophano, marginB striatulo; rtipit* e farcto fistuloso ngid», undulato, basi albostrigoso, apice albosquamuloso; lam.lhs adnsxis, seuedentibus, confertis, albido-gnseis-
I^J partem, at minus frequens; Upsali* vero co-
mam v. c. ad pedes montium Gottsundfjnsium.
piose v. c. • V^{rio}-du[^] subtiUter fistulosuSj demum vero
Descr. Stipes 9[^]3 unc. longo-us, 1—H lin. crassus et
mo^{llior} r^{utior} qualis/in supei-ficie undulatus, lividus,
CDmPr T2s cēnf basi albostrigoso, apioequB albo-squamulo-
ai^{cus} p^{alesc} bas[^] carJagin^d eus ut priorum, e
suis. Pileus campanulato convexus planusque, ut plurimum obtuse et
late-umbonatus, 1—2 unc. latus, glaberrimus, hygrophanus,
udus lividus, siccus albo-pallescentis facie sericella at opacus,

margins primo inflexo, dein expanso striato, rarius si^{uit}
undulato. Lamellae adfixaj, secedentes, 1—2 lin. lato, sub-
imbricatae, albido-griseae.

Inter Gollybias rancidas restat Ag\ *mephiticus*, apetitⁿ
nobilissima, statura a reliquis prorsus recBdens. Stipes ob-
fistulosus, filiformis, flaccidus, cinereus, undique -
albis psuinato-velutinus. Pibus carnosulus, **convexo-planus**.
^—f unc. latus, adpresse et lsevigato-sericeus, cano-albescent[^].
Lamella primo adfix*, dein subliberre, confertae, albidie. D^{ap}.
farinas recentis, admodum fortis. Nascitur supra ramulos
folia Abietis, una vice, at oopiosissime lectus.

Singularem Ag. *inolerUis* varietatem paulo majomn pil[«]
umbonato BX Ostrogothia misit v. POST. Desunt not. suffix
entes ai hanc specie distinguendam. Dfr. t. B9. f. 4.

Tab. B9 fig. 3. Ag. *inohntem* S^{ist}.t.

** Inodorce.

CXXXVI. AGARIDUS PRDTRADTUS FR.

Epiur. p. 97. Monogr. I. p. 173. Uvokc Brit. Fung. p. 62.

Diagn. Dollybia pileo submembranaceo, e convexo piano nitido; disco carnosulo, depresso, siibpapillato, obscuriore, margine striato; stipite fistulosD, laevi, glabro, griseo radice longa fibrilloso-strigosa; lamellis adnexis, ventricosis, latissimis, griseis, subtiliter albo-pruinosis.

Ad terram in pinetis circa Upsaliam rarius. Etiani in Britannia, teste BERKLEY, lectus.

Descr. Inodorus. Stipes subtiliter fistulosus, eximie cartilagineus, sed demum mollis, supra terrain 3 unc. longus, 1 lin. crassus, strictus, laevis, glaber (haud pulverulentus) livido-grisBUS, infra terram productus in radicem deorsum attenuatam, fibroso-strigbsam. Pileus submembranaceus, e convexo planus, disco carnosTilo, depresso ssepe cum umbonia centralis rudimento, vix unciam latus, griseo-fuscus, ni-

tens, margine dilutiore inanifeste striato. Lamellae adneX^{tl}-maxima ventricosae, postice quasi truncatse, 3 lin. et ult^m
lat*, subdistantes, grise33, subtiliter albo-pruinose.

Species insignis, aimodum distincta vix cum alia coin-
paranda praster Ag. *protuberantem*. Remotior adest affluit^s
cum Ag. *plexipede*, sei liujus stipBs brevior, firmior, e fibril[^]
implexis, arete adpressis sericeo-fibrosus, quo ab oinnib[^]
diffiirt. Pileus insuper cdmpanulutus, fere Mycente; la-meUn^{ll}
liberai. Ha3c species nascitur in fagetis circa truncos; etim^{ll}
in Britannia lecta, teste COOK, Br. Fung. p. 61. Dolendu[»]
hujus nullam existere bonam iconem; Fbrce Dan. t. 2023, f-^d
nullo modo eharacteristica.

Tab. B7 fig. 2. Ay. *protractwn* illustrat.

CXXXVII. AGARIDUS TESQUORUM Fii.

Monogr. II. p. 2,90. Vet. Akad. Förhandl. 1867.

Diagn. Collybia pileo carioso-membracra Liu, convexo, obtuso, levi, fuscD-nigro expallente, stipite fistuloso tenui fusCD, apice pruinoso; lamellis liberis, ventricosis, subdistantibus, cinereo-fuscis.

In campis et collibus graminosis apricis circa Upsaliam, v. i\ ad arc em regiam, pluries lectus.

Descr. Stipes fistulosus, sesquiuncialis, lineam baud attingens, subfiliformis aequalis, flexuDSUs, glaber, fuscus, apice farinosus. Pileus carnDSo-membranaceus, firmulus, convexus, obtusissimus, glaber, exstrius, 3—5 lin. latus, fusconiger. expallens. Lamellae omninD liberae, valde ventricosse, 2 lin. latse, subdistantes, cinereofuscse. Odor nullus.

∴ Lamellis liberis, latis hie e proximis facile dignoscitur. Variis notis accedit ad *Ag. murinum*, qui vero multiplo major, stipite iibrillosD nee pruhidso, pileo impolitD, lamellis

adnexis facile dignoscitur. Hoc loco add ere liceat description em nova; subsimilis speciei:

Ag. (Collybia) glacialis. Dense caespitDSUs, subaquosus, fragilis. Stipes fistulosus, a basi attenuatus, \—2 unc. longus, 1—2 lin. crassus, glaber, haud pruiiiDSUS, aquose griseus. Pileus leviter carnosus, ex hemispherico convexus, obtusus, I—li. uric, latus, Ia3vis, glaber, hygrophanus, vegetus obscure fuscus, siccus sordide canus. Lamellae liberse, confertae, vix ventricosse, grisege. Lectus est in terra congelata ad Bergsbrunna exeunte Aprili et ad Knifsta 5 Maji 1858 •). Externa caespitis individua frigore congelata, in meio nuper enata vegeta. Fragilitate ab omnibus vicinis differt. Icon desideratur.

Tab. 70 fig. 1. *Ag. Usquorum* spectat.

* E terra congelata ceterum *A^jaricum humosum* et *Ag. esculentum* enata tantum vidimus.

CXXXVIII. A&ARICUS MISER FR.

Fr. Vet. Akad. Förhandl 1861.- Monogr. Hymmom. II. p. 290.

Diagn. Collybia pileo carioso-membranaceo, e convexo piano, subumbonato, glabro, margihe striatD; stipite fistulosD, sequali, fusco, apice farinaceo, lamellis adnatis, confertix, cinereis.

Species iuu prscstervisa, per ultimos annos copiosissime IBcta multis locis in Uplandia, Ostrogotia etc. Optime viget Octobri.

Descr. Gregarius, tenax, inodorus. Stipes eximie cartilagineus, admodum fistulosus, 2 unc. 1. paulo ultra bngus, lineam crassus, ssepe leviter flexuDsus, laevis, fuscus, apice albo-farinosus. Pileus tenuiter carnosus, e convexo planus, numquam depressus, at saepe umbonatus, unciam vix latus, glaber, udus cinereus, margine striato, siccus vero canus et

laevis. Caro tenuissima, concolor. Lamellae adnatse, lineam 1. paruin ultra latae, confertae, vix ventricDsae, cinerese.

Species clare distincta, haud ignobilis, ut e nomine facile fingas. Inter Dollybias potissimum comparandus cum *Ag. erosv*, qui vero totus mollis, valde hygrophanus, pileo lenti-formi-globooso umbilicito, lamellis eximic emarginatis abunde distinctus.

Potius confundi posset cum *Ag. mortuoso*, at hie manifeste Clitocybes species stipite haud cartilagineo, toto fibroso, apice nudo; pileo plan Dd epr ess o, umbrinD, siccD alutaceo 1. rarius fulvello, lamellis angustis, albis.

Tab. 70 fig. 2. *Ag. miswem* depingit.

CXXXIX. AGARIDUS ATKATUS FR.

Syst. Myc. I. p. 168. Epicr. p. 98. Monogr. I. p. 175. Weimn. Ross. p. 87. Berkl. Outl. p. 120

Diagn. Collybia pileo carnosulo, plano-depresso, umbilicato, lamī, glabro, nitente, margine convex*; stipite farcto, tenaci, curto, glabros extus intusque fusco; lamellis adnatis, latiusculis, griseo-albidis.

Ad terram apertam, nudam in vañ. bue** pr.vm.ñs stepe lectus, ut etiam in ternis adjacentibus. Seratinus.

Descr. Species pumila, sed firma, inodora. Stipes farctus, demum fistulosus, eximie cartilagineus, tenax, curtus, vix uncialis, 1-2 lin. crassus, Basalia 1. sursum inerassatus, levis, glaber, extus intusque fuscus. Pileus leviter carnosus, tenax, disco plano-depressus, numquam papillatus, marginem versus convexus, ljevissimus, orbicularis, unciam et ultra latus, diutius irrigatus viscidus, udus piceo-ater et nitens, siccus fuscus. Lamellae adnatae, vix decurrentes, primo arcuate, dein planse, subdistantes, ex albedo griseti, sordidse.

Species inter Collybias et Omphalium; hi accedit pileo depresso, sed Wilmsh. Linn. Affim. vero species non inter Collybias, sed Omphalias augend. v. c. in A. Mauro, facile distincto pileo profunde umbilicato, udo striato, sicco sericeo-nitente; lamellis decurrentibus, confertissimis, candidis.

Agaricus atratus locis ad terram non stricte adscriptus ut in A. thardlus carbonarius, quoque occurrunt An. specierum accurate indixime sublevat. specierum determination em ma-

Tab. 71 f. 1. Agar. atrati praebet imaginem.

DXL. AGARICUS AMBUSTUS FR.

Syst. Myc. p. 157. Epicr. p. 97. Monogr. I. p. 175

Diagn. Collybia pileo submembranaceo, convexo-plano, papillato, striatulo, hygrophano, stipite subfarcto, tenaci, brevi, livido, lamellis adnatis, confertis, lanceolatis, albo-fuscescentibus.

Ad terrain deustam, carbones in Smolandia frequens. Etiam in Germania. LASCH.

Descr. Pusillus, tenax, saepe gregarius, inodorus, totus fuliginosus. Stipes farctus, demum fistulosus, vere cartilagineus, strictus, unciam longus, raro ultra, lineam, haud crassus, livido-fuscus, junior pruinosis, adultus nudus. Pileus submembranaceus (prioris multo tenuior), e convexo planus, demum depressus, papilla minuta umbo-natus, uncialis, glaber, primo fuscus et laevis, dein striatulus fusco-lividus, margine primitus involute certa CollybiEe species. Lamella adnatae, decurrente, conferte, planse, angustae, fuscescentes.

Stations cum priore saepe convenit, sed, ut e notis datis elucet, certe distincta. Ut prior ad Omphalias hrec ad My-

cenis accedit. descriptione et lamellae Ag. a. t. LASCH Linn. IV. JI. 0. hunc referendus, P. «dbntem spectare videritur.

Tab. 71 f. 4. Agar. ambustum depingit.

In Musaeo Acad. Scientiarum Hohniensis sequenti Collybia; insuper de Agar. radicans, I. c. exstant: cems, asemus, veluti, papillatus, wafw, maculatus, butj, mosus, xanthopus, fo. yophilus, cauticalis, tuberosus, davits, ocellatus [Bull. t. 59. f. 1. H. P.] murinus, tylicolor. Cum h. censeo superfluum jam exatent iconibus sat bonis novis

DMPHALIA.

Stipes car til agin eus. Pileus umbilicatus. Lamellae vere decurr Bnte.5. Omnes inodorge sunt.

I. DOLLYBARI: pileo demum infundibuliformi, margine primitus involuto.

* *Hydrogrammi*: lamellis angustis, confertissimis.

CXLI. AGARIDUS HYDROGRAMMUS FK.

Syst. Mycol. I. p. 16i). Epicr. p. 120. Monogr. I. p. 179. Que'let jur. p. 218.

Ap. streptopus et orthopus Pers. Myc. Eur. p. 107.

Diagn. Omphalia pileo submembranaceo, umbilicato, demum infun dibulif ormi, flaccido, glabro, hygrophano, marline striato; stipite fistulosD, laevi, glabro, subcompresso, basi radicato, hirtD lamellis que decurrentibus, confertissimis, livido-albis.

Locis humidis inter folia coacervata et putrescentia (Fagi praecipue) in Suecia meridionali et Europa media.

Descr. Subcespitosus, unicolor, udus lividus 1. albido-lividus, si ecus albescens, in [JUD statu cum *Ag. phyllophilo* confusus. Stipes eximie cartilagineus, cavo-fistulosus, 3 unc. longus, 2—3 lin. crassus, glaber, sed basi radicans et albo-barbatus, praecipue in varietate *streptopoda*; mine brevior teres rectus, nunc elongatus, saepe decuinbens et compressus, undulatus, apice nudus. Pileus submembranaceus, flaccidus,

profunde umbilicatus, 2 unc. et ultra latus, eximie h'grophanus, limbo mox patente, subundulato, striato. Lamellae longe decurrentes, confertissimae, perangustae, arcuatae, valde inaequales, integerrimae.

Hydrogrammus hie Agaricus est dictus e pileo valde hygrophano et in statu udo striatD. In statu si ceo albescit, ijuare haud dubito quin hujus loci sit *A. hydrogrammus* Bull. t. 5S4 f. A. Reliquae figurae ad species valde diversas referenda.

Species *A. hydrogrammo* proximo sunt *A. chrysoleucus* et *ventosus* coloribus facile distincte. Dolorem aqueose albidum 1. lividum hygrophanum ars pictoria aegre redd ere pot est, quare obscurior apparet, quam in statu udo est.

Tab. 71 *A. *lydrogrammum* dspingit.

CXLII. A&ARICUS DUMOSUS FR.

N. sp.

Diagn. Omphalia pileo submembranaceo, e convexo planD, leviter umbilicato, testaceo-rufo versus marginem striatD; stipite fistuloso, glabro, concolori, lamellis leviter decurrBiiitibus, confertis, pallidis.

In silvis dumetosis circa Upsaliam rarius.

Descr. Solitarius, statura et magnitudine varians. Stipes cavo-fistulosus, a basi leviter attenuatus, 2—3 unc. longus, 2 lin. crassus, lsevis, glaber, testaceD-rufus, basin versus obscurior, brunneus. Pileus submembranaceus, e convexo upplanatus, regularis st parum tantum umbilicatus (quo a proximis nlox dignoscitur), 1—2i. unc. latus, e magna parte pellucido-striatus, glaber, testaceo-rufus. Lamellae multo minus decurrentes et confertae quam in proximis, plan®, albidae.

Coloribus proxime accedit ad *A. ventosum*, cum quo jungere in mente fuit, at statura longe alia, ut potius cum *A. umbilicato* comparetur. Etiam quaedam figure *A. hydrogrammi* Bull, ad hunc pertinere videntur. *Ag. hydrogrammus* Bull, est species maxime collectiva. Fig. C. D. 0. ad nullam mihi obviam speciem referre licet. Fig. G; H ad *Ag. Dyathi* formes pertinere videntur.

Ag. ventosus, cum quo praesens confusus fuit, pileo profunde umbilicato, demum infun dibulif ormi, lamellis longe decurrentibus et colore carneo facile distinctus. Est quasi forma gigantea *Ag. pyxidati*. Hunc tantum in fagetis Sueciae meridionalis legimus.

Tab. 72 f. 1 *Agaricum dumosum* vefert.

CXLIII. AGARIDUS DETRUSUS FR.

FT. Monogr. II. p. 291.

Diagn. Dmphalia pileo subcarnoso, B convsXD umbilicato stipitsque firmD, mox cavo, glabro obscure cinBrBis; lamellis dente decurrentibus, tenuibus, confertis, albidis.

In silvis circa Rsymyra DstrDgotiae legit H. VDN POST, ilui specimina et icon Bin communicavit.

Descr. Habitus hujus spsciei est Clitocybis, at stipitB cartilagiiiBD facile distinguitur. Stipss junior farctus, dsin cavus, firmulus, 1—1A unc. longus, 2 lin. crassus, sursum attenuatus, laevis, glaber, obscure cinereus, fere nigrescens, basi vero albicans. Pileus leviter carnosus, primo cDnexus,

dein umbilicatus, 1—2 unc. latus, lasvis, glabrs l>x icont subzonatus), obscure cinereus. CarD alba. Lamella subhorizontalss, levitBr st dente modo decurrentes, lineam circitLi-lataB, tenues, admodum confertiB, albid^.

Agarims. umbilicatus SCH^FF. t. 2D7 nostro proxinius differt colore livido, sicci albicante, stipite apice sBricei), pileo primitus umbilicato. Statura ^UO^UB convsnit cum *A-dumoso* supra descripto, at e descriptionibus collatis differentia patet.

Tab. 73. f. 1 *Ag. detrusum* exhibet.

CXLIV. A&ARIDUS MAURUS Fit.

Syst. Myc. I. p. 168. Epicr. p. 121. Monogr. I. p. 181.

Diagn. Omphalia pileo submembranaceo, convexD, umbilicato, glabro, striato, hygrophano, sicco ltevi sericeo-nitente; stipite subfistuloso, tenui, rigido, strictD, nigricante; liimellis decurrentibus, confartissimis, candidis.

Locis paludosis deustis hanc elegant em speciem sub duplici forma pluries legi. In Fennia KAUSTEN.

Descr. Stipes eximie cartilagineus, subcorneus, rigidus, fragilis, primo flocculoso-farctus, dein fistulosus, 1—2 unc. longus, lineam vix crassus, glaber, fuligineo-nigricans. Pileus submembranaceus, typice hemisphaericus, at late et profunde

umbilicatus, circa margin em late ruffexus, unciam 1. parui ultra latus, glaber, hygrophanus, udus striatus fuligineus, siccus IEEvis, sericeo-nitens, lividus. Lamella? utrinque attenuate, acute et longe decurrentes, confertissims, candidte.

Formam supra descriptam typicam non adesse pictani dolemus, sed ad hanc speciem sine dubio spectat var. *planiuscula* pileo firniores, vix striato, piano, lamellis leviter decurrentibus.. HEEC forma cum *Ag. atrato* facile confunditur, a quo lamellis conf ertissimis^angustis, candidis bene distinctus.

Tab. 73. f. 2 sistit *A. mauri* var. *planiuscula*.

CXLV. AGARICUS LITUUS FB.

Epicr. p.-121. Monogr. I. p. 180.

Diagn. Dmphalia pileo submembranaceo, piano, profunde umbilicato, "demum infundibuliformi, laevi, hygrophano; stipite fistuloso, gracili, striatD lamellis que vere decurrentibus, confertis, angustis cinereis.

In pinetis ad terrain locis gramiiiosis dispersus nascitur raro, at circa Upsaliam pluries lectus.

Descr. Stipes primo flocculoso-farctus, mox fistulosus, ad 3 unc. elongatus, a basi subincrassata hirta attenuatus (at variat basi attenuata radicans), saspe flexuosus, teres, longitudinaliter *striatus*, cinereus. Pileus leviter carnosulus,

primo planus, profunde umbilicatus, infundibuliformis, unciam 1. parum ultra latus, udu nitens, cinereo-spliel, siccus vero sordide alutal>eus, Lamella, vere decurrentes demum rectae, confertae, angustae, integerrimae, obscure tle.

Ab omnibus vicinis dignoscitur stipite elongato striatoque. Basis strigosa insignis ut in exemplaribus pictis, obscure cinereis, semper tam

TM. 72. f. 2 *A^rivi Litui* u onem antB oculos point.

CXLVI. AGAMCUS DFFUDIATUS FR.

Epicr. p. 121. Monogr. I. p. 181.

Diagn. Omphalia pileo carnosulo, e convexo plano-depresso, laevi, glabro, hygrophano; stipite fistuloso, tenaci, glabro, rubello; lamellis decurrentibus, tenuibus, confertis, rubellis.

Duas hujus legimus formas, alteram in aj or em in fagetis Smolandia, alteram minorem in pinetis circa Upsaliai.

Descr. Stipes eximie cartilagineus, fistulosus, 1—2 unc. longus, 1—2 lin. crassus, aequalis, junior teres, dein cDm-pressus, glaber, rubellus, apice saepe sed obsolete pruinosis. Pileus carnDSulus, e convexo plano-depressus (nee ita pro-

funde umbilicatus ut in praecedentibus), uncialis, lsevis, glaber, hygrophanus, carneus, senilis et siccus expallens, fere albicans. Lamella? minus decurrentes, primo arcuataB, dein rsctae, cDiifertae, pileo concolores.

Hsec species a praecedentibus longius distat pileo vix uiniblicato et modo depresso. Major forma ad Ag. *dryophilum*, minor ad A. *carneolum* accedit; lamellis vero decurrentibus ab utroque facile dignoscitur.

Tab. 72. f. 3 adumbrat A. 'ofuciati formam minorem.

DXLVII. A&AHICUS SDYPHOIDES Fa.

Syst. Myc. I. p. 163. Epicr. p. 122. Monogr. p. 181. W?inn. Ross. p. B4. Que'let jur. p. 64.

Ag. inconspicuus Lasch n. 215. — Kg. buccinalis. Seer. n. 1021.

Diagn. Omphalia Candida, pileo submembranaceo, ex umbilicato. infundibuliformi, inaequali, laevi, sericeo; stipite farcto, brevi, subvillosus; lamellis decurrentibus, cohfertis, angustis.

Ad terrain locis mucosis in campis apricis post intensas pluvias per plerasque regiones, etiam Americae.

Descr. Col ore can dido nee hygrophano ab omnibus hujus sectionis diversus, sed admodum multiforinis. Stipes tartus, curtus, A unc. circiter longus, lineam crassus, sequa-lis7 subvillosus, flexilis nee rigidus. Pileus submembranaceus, pnmo umbilicatus, dein infundibuliformis, bene explicatus

unciam latus, inaequalis, limbo patente, at vulgD pusillus, 4 lin. modo latus, excentricus et flexuosus, e fibrillis subtilibus longitudinaliter adpressis sericeus et laevigatus. Lamellae vere decurrentes, tenues, confertae, angustissimtE, lineares.

Inter Dmphalias nulla exstat affinis species, nam A. *scyphiformis* concolor omnibus partibus differt. Major adest affinitas cum Ag. *Pleuroto mutilo*, qui vero differt pileo carnosiori, subdimidiato, reniformi 1. spatulato, stipite sublateralis glabro, lamellis crassiusculis minus confertis.

Tab. 75. f. 2 Ag. *scyphoidem* spectat.

** *Epidiysii*: lamellis leviter distantibus, linearibus.

DXLVIII. AGAKIDUS CHRYSOPHYLLUS FR.

Syst. Myc. I. p. 167. Epicr. p. 122. Monogr. I. p. 181.

Ag. Epichysium ij. Alb. et Schw.?

Ad ligna putrida Pini in Suecitate silvis montanis frequens, raro in campestribus. Dopiosissimum legi in acervis serraginis ad molas ligneas. In Carolina CURTIS.

Descr. Stipes tenax, mox fistulosus, 1—2 unc. longus, 2 lin. crassus, aequalis, e situ subincurvus, laevis, glaberrius, basi villosa subradicatus, aureo-vitellinus. Pileus submembranaceus, flaccidus, jam primitus profunde umbilicatus, limbo patente subreflexo, 1—2 unc. et ultra latus, flocculosus et saepe squainosus, valde hygrophanus, udus luteofuscus, siccus iilutaceo-ninus 1. ennu-albidus. Lamella) vere

decurrentes, leviter distantes, distincttE, persistenter aureo vitellinae.

Elegantissima Omphaliae species e stirpe A. *Epichysii*, cum quo Albertini et Schweiniz conjunxisse videntur, a quo tarn en longe distat. Nee alia exstat species, qua cum confundi potest.—Ag. *trichwus* P., in eadem statione lectus, omnibus hodiernis mycologis ignotus, recedit pileo carnosio, piloso, lamellis dente modo icurrentibus. Inter A. *chrysophyllum* et *decorum* inediis.

Tab. 74. f. 1 *Agaricum chrysophyllum* adumbrat.

CXLI. AGARICUS PDSTIJ FR.

Fr. Monogr. II. p. 291.

Diagn. Omphalia pileo membranaceo, umbilicatus, glabratus, aurantiacus, margine striato; stipite fistulosus, levis, glabro, flavus; lamellis longe decurrentibus, linearibus, subdistantibus, albidis.

Locis paludosis in Dstrogotia lectus ab H. VON POST.

Descr. Ad definitionem supra datam paucamodo addendum licet. Stipes 3 unc. longus, lineam et ultra crassus, eximie

aequalis, strictus, pallide flavus. Pileus non aquosus nec siccitate flocculosus, primitus umbilicatus, dein depressus, marginem versus convexus. Lamellae lineam latere, arcuatae. Dolore laeto pilei aurantiaci facile dignoscitur.

Quoad colores *A. Postii* similis est *A. (Nolanea) cetratus*, qui sporis roseis abunde est distinctus.

Tab. 74. f. 2 *A. Postii* in oculos ponit.

CL. AGARICUS LEUCOPHYLLUS FR.

Fr. in Vet. Akad. Förh. 1851 p. 45. Monogr. I. p. 183.

Ag. Epichysium v. leucophylla Alb. et Schwein.

Diagn. Omphalia pileo submembranaceo, infundibuliformi, laevigato, glabro stipite farcto fistuloso, rigido, glabrato cinereis; lamellis decurrentibus, subdistantibus, candidis.

Locis humidis in pinetis. Legi prope Upsaliam in Alsike et Sunnersta skog. In Britannia: BERKLEY.

Descr. Ab Ag. *Epichysio*, pro cuius varietate proposuerunt ALBERTINI et SCHWEINIZ, omnibusque hujus gregis speciebus dignoscitur lamellis candidis. Ag. *Epichysio* insuper major, firmior, haud aquosus. Stipes e farcto fistulosus, rigidus,

U unc. et ultra longus, lineam crassus, aequalis, vis, peris, concolor dilutior. Pileus submembranaceus, infundibuliformis, ultra unciam latus, laevigatus nec floccosus, obscure cinereus, margine reflexo involuto. Lamellae decurrentes, leviter distantes, distinctae, arcuatae, candidae.

Analogus cum Ag. *mauro*, sed statura et lamellis substantius r. lare distinctus.

Tab. 73. f. 4 delineatur Ag. *leucophyllus*.

CLI. AGARICUS PHILONOTIS LASCH.

Lasch! in Linn. III n. 226. Fr. Epicr. p. 123. Monogr. I. p. 184. Quælet jur. p. 21d.

Diagn. Omphalia pileo membranaceo, infundibuliformi, subfloccoso, cinereo-fuligineo, hygrophano, margine demum erecto; stipite subfistuloso, elongato, sursum attenuato, concolori; lamellis longe decurrentibus, subdistantibus, linearibus, albido-fuligineis.

In paludibus sphagnosis, verno tempore, aliquot Suecise locis legi, at rarior species. LASCH in Germania legit, HASZLINSZKY in Hungaria.

Descr. Fragilis, totus fuligineo-cinereus. Stipes e farcto fistulosus, 14 — 3 unc. longus, crassitie lineam vix attingens, glaber, basi floccosus. Pileus membranaceus, totus profunde

infundibuliformis, margine demum erecto, strius, hygrophanus, siccus, **nooculosus**. Lamellae longe decurrentes, adscendentes, recto-porrectae, subdistantes, angustae, pileo pallidiores.

Proxime affinis Ag. *Epichysio*, qui minusculo, margine deflexo, lamellis pro-decurrentibus. Vulgus quoque ad ligna mucida legitur nec nisi raro in paludosis (var. *icmadophila* P.). Hujus bonam videre licet in Pers. ic. pict. t. 13. f. 1. Ag. *sphagnicola* Berk. a nostro (Jiff. t. lamel. sordide ochraceis.

Tab. 76. f. i A a arid *Philonotidis* imaginem præbet.

CLII. AGARICUS STRLEPILEUS FR.

Fr. Vet. Akacl. Forh. 1861. p. 22. Monogr. II. p. 291.

Diagn. Dmphalia pileo membranaceo, e convexo explanato, umbilicato, glabro, undique striato, livido-fusco, hygrophano; stipite fistuloso, glabro, tenaci, fuscescente; lamellis subdecurrentibus, minus confertis, albidis.

Locis graminosis silvarum circa Upsaliam lectus.

Descr. Stipes fistulosus, firmulus, tenax, ad 2 unc. longus, lineam crassus, aequalis, saepe flexuosus, brevis, glaber, fuscescens. Pileus membranaceus, e convexo planus, umbilicatus, numquam infundibuliformis, uncialis 1. parum ultra, totus eleganter striatus, glaber, livido-fuscus, sed ut hygrophanus

siccus levis, albopallescens nee flocculosus. Lamellae leviter decurrentes, subconfertae, 1—1½ lin. latae, albae nee cinerascens.

E characteribus datis referatur ad stirpem *Ag. Epichysii*, tui vero haud admodum affinis. Habitu potius accedit ad *Ag. Clitocybm curtipedem*; hujus vero stipes totus rasilis, pileus nee umbilicatus nee hygrophanus, lamellae dente modo decurrentes.

Tab. 73. f. 3 *A. striclepileum* sistit.

CLIII. AGARICUS AFFRIDATUS FR.

Fr. Syst. Myc. I. p. 169. Obs. Myc. 2. p. 213. Epicr. p. 123. Oooke Brit. I. p. 79.

Ag. tigrinus Alb. et Schw. Oonsp.

Diagn. Dmphalia pileo submembranaceo, planiusculo, dein infundibuliformi, exstriato, albido, squamulis pilosis obscurioribus variegato; stipite subfistuloso, glabro; lamellis decurrentibus, subdistantibus, medio latioribus, albidocinereis.

Locis paludosis inter Sphagna et praecipue adustis multos locis copiose lectus verno et aestivali tempore in Suecia, Jannania, Anglia.

Stipes fistulosus, unciam longus, lin. crassus, sursum leviter incrassatus, laevis, glaber, cinereus. Pileus carnosomembranaceus, convexus, profunde umbilicatus demumque infundibuliformis, 1—1½ unc. latus, albidus, squamulis pilosis cinereis undique variegatus, margins deflexo, haud striato. Lamellae longe decurrentes, subdistantes, medio latiores, griseae.

Quoad color et vestitum pilei *Lzntiv tigrino* similis quidem, sed ceterum nulla adest affinitas. Lamellis medio latioribus et statura inaequalis inter *Ag. Epichysios* et *umbelliferos*, sed ob lamellas leviter modo distantes hoc loco collocavi.

Tab. 75. f. I *Ag. affricatum* adumbrat. Stipes in icone erronee albus.

CLIV. AGARICUS ONISCUS FR.

•Syst. Afyc. I. p. 172. Epicr. p. 123. Monogr. I. p. 185. Weinm. Ross. p. 86.

Diagn. Dmphalia pileo submembranaceo, e piano infundibuliformi, undulato, flaccido, obscure cinereo, hygrophano, margine striato; stipite subfistuloso, firmo, undulato, griseo; lamellis decurrentibus, subdistantibus, cinereis.

Locis mucosis turfosisque rarioribus, at Upsaliese sat frequentibus in Slottsbacken, plateis arenosis horti botanici, autumnis seriori. In Hungaria: KALCHBRENNER.

Descr. Species protea, sed bene distincta. Stipes efarctus fistulosus, firmulus, sat tenax, mine teres, curvatus, nunc inaequalis, subcompressus, undulatus, griseus. Pileus submembranaceus 1. carnosulus, flaccidus, exoletus fragilis, convexo umbilicatus 1. infundibuliformis, saepe irregularis, undulato-textuosus, immo lobatus, vix uncialis, glaber, obscure cine-

reus, siccitate expallens, laevis, cano-griseus. Lamellae decurrentes, subdistantes, cinerae, siccitate obscuriores.

A praecedentibus admodum diversus, *Ag. pyxidato* proximus, sed color diversissimus. Dolore et pileo irregulari prolixime accedit ad *Ag. Pleurotum tremulum*. *Ag. vespitosus* BOLT, sistit formam majorem expallentem, locis humidis obviam et valde recedentem, quare novam iconem formae typicae dedimus.

Agaricus rusticus Epicr. p. 124 — *Ag. ericetorum* Pers. Dbs. I. t. 4. f. 12 (optima), sed ab *Ag. ericetorum* Pers. Syn. diversus, multo minor et tenuior est, pileo striato, sicco sericello e. s. p.

Tab. 72. f. 3 ad *Ag. oniscum* pistinet.

DLV. AGARIDUS SCYPHIFORMIS Fu.

Fr. Obz. 2. p. 221. Epicr. p. 124. Monogr. I. p. 185. Qušet Jitr. p. -219.

Diagn. Dmphia alba, pileo membranaceo, e convexo infundibuliformi, glabro, margine striatulo, sicco lsevi; stipite subfistulosD, tenui, glabro; lamellis decurrentibus, tenuibus, haud confertis.

Ad terrain nudam brevipes, inter muscos longipes. Lectus in Suecia, Germania, Hungaria, Gallia etc.

Descr. Stipes mox fistulosus, tenax, nunc uncialis, nunc inter inuscos ad 3 unc. elongatus, lin. vix crassus, sequalis vel apicem versus leviter incrassatus. Pileus ut supra, h₂ unc. latus, passim obliquus. Lamella? normaliter tenues, sed occur-

rit simul varietas 1. pDtius monstrositas, lamellis crassiorib^{us} dichDtomis, quae pro *Cantharello* (*libido* a pluribus est **sumta**).

Ut Ag. *scyphoides* inter Hydrogrammos, hie inter Epichysios abnonnis est et statura longe alia, pileo stipiteque glabris, lamellis minus confertis valde distinctus. Major similitudo adest cum Ag. *Collybia muscigeno*, qui vero dig¹¹¹ scitur stipite capillari, flaccido, pileo globosD-hemisph¹er¹o, numquam umbilicato, margine l^{evi}, lamellis numquani decurrentibus.

Tab. 75. f. 3 Ag. *scyjihiformem* ants oculos ponit.*** *Umbriliferi*: lamellis latis, valde distantibus. Vulgo pumili.

CLVL A&ARICUS RETOSTUS FR.

Fr. Epicr. p. 125. Monogr. I. p_m 187.

Diagn. Dmphia pileo carnosulo, plano-depresso, laevi, umbrino, margine convexo, integro; stipite fistuloso, brevi lamellisque leviter decurrentibus, latis, segmentoideis, distantibus, pileo pallidioribus.

In silvis frondosis supra folia coacervata, priino circa Peptopolin a Weimnanno lectus, niiperius a me Holmitc, UpsaliaB.

Descr. Pumilus, firmulus, totus umbrinus. Stipes e farcto fistulosus, tenax, vix uncialis, lineain et ultra crassus, atjualis, laevis, pileo pallidior. Pileus tenuis sed carnosior quam affinium, statura Ag. *umbeliferi*, i unc et ultra latus, udus laevis, siccus politus, glaber, quo ab Ag. *umbellifero* dignoscitur. Daro concolor. Lamellae leviter decurrentes,

medio latiores, utrinque attenuate, SBgmentum circuli referent ea, distantes, pileo pallidiores.

Dolore ad Ag. *oniscum* accedit, sed Ag. *nmbdlifero* magi* affims W11_{1s} admodum distantibus; nDn tamen «Int portice latiores, triangularBS in Ag. *retosto*.

Hui_c subjunxi tamtam subsp_{eci}Bni Ag. * *arenicola**, lods ar^nosis cira Upsaliam semel lectum, diversum pilBO floeculoso-vBwacMo, lamellis confer*dribus, angustioribus; meh_{us} obs^rvatus, vix dubie distingUend_{us}.

Tab. 75. f. 2 d_uc_e infimae gBnuinu_m sistunt A f_oBS subspeciem *arenicolam*.

DLVII. A&ARIDUS SDHIZDXYLON FR.

Fr. Monogr. II. p. 292.

Diagn. Oinphalia pileD submembraiaceo, planiusculo, umbilicato, glabro, cinereo; stipite fistuloso, inaequali, rufofusco; lamellis decurrentibus, distantibus, linearibus, pileD pallidioribus.

In scintillis ligni quercini, e rimis erumpens. Magnam hujus copiam Upsaliae legi.

Descr. Dense gregarius, CEespitosus, iirmus, irregularis. Stipes fistulDsus, unciam longus, 1—2 lin. crassus, basi attenuatus et radicans, vulgo curvatus et stepe compressus, laevis, rufofuscus. Pileus quam prioris tenuior, e convexo

planus, A unc. latus, subrepan_{du}s, immo excentricus, haud InanifBste striatus, cinereus. Lamellae minus quam in vicinis lares, nec segmentoideae.

Cum nulla Tut obvia specie comparandu varia veru^o communia habet Tut Ag. ^{cam Pt^o Phll^o} Berkl. Dutl. p. 133; hie vero diff_{er}at^p 2e lon_giori, pu escant, pileo profund& striato etc.

Tab. 76. f. 4 Ag. *Schizoxylon* refert.

II. MTCENARII: Tenuiores, pileo primitus campanulato, margins recto stipiti adpresso.

DLVIII. AGARICUS L[^]STADII Fu.

Vet. Akad. Förhandl. 186 L p. 22. Monogr. II. p. 292.

Diagn. Omphalia pileo carnosulo, hemispherico, umbilicato, lrevis, badio-fulvo, nitido; stipite fistuloso, rigido, lradio-rufo; lamellis decurrentibus, confertis, distinctis, luteis.

Eximiam et pulchellam hanc speciem ad terrain in IUCD unoenissiino Wreta udde ad lacum Mälaren legit C. P. L[^]E-TADIUS.

Descr. Coloribus ad *Ag. Camjianellam* et *Ag. Fibulam* accedit, sed ab utroque optime distinctus, solitarius 1. 2, 3 individua juncta. Stipes eximie cartilagineus, 2—3 unc. l[^]ngus, lineam crassus, a basi leviter attenuatus, snbflexu-

sus, laevis, glaber, badio-rufus. Pileus carnosulo-membranaceus, firmulus, h[^]Binisphaericus, umbilicatus, 2—3 lin. latus, lssvis, glaber, nitidus, badio-fulvus. Caro tenuis, concolor. Lamellae vere decurrentes, tenues, confertae, lineam vix latse, *numquam venis conneoca!*, integerrimae, saturate luteae.

Ag. Varapanella diifert stipite badio, basi fulvo-strigoso, pileo membranaceo striato, hygrophano et pr[^]cipue lamellis venDso-connexis, Cum *Ag. Fibula* vix comparandus,

Tab. 74. f. 3 *Ag. Lcestadii* spectat.

DLIX. A&ARICUS PICTUS FR.

Syst. Myc. I. p. 166. Epicr. p. 126. Monogr. L p. 189. Weinm. Ross. p. 89.

Diagn. Oinphalia pileo membranaceo, cucullato, uinbilicato, striato, fusciscente, umbilico vulgo ochracBD; stipite tarcto, corneo, spadiceo, basi membranula lutea floccoso-radiante; lamellis sub decurrentibus, latissimis; distantibus, pallidis.

Ad ligna mucida in fagetis et ad varias quisquillas v. c. folia Vaccinii Myrtilli, Abietis etc. putrescentia, raro et vulgo uniuin modo specimen unoquoque loco.

Descr. Species valde singularis, ab omnibus diversa lamellifi latioribus quam longioribus, sub triplici occurrit forma:

A. *Typica.* Stipes corneus, rigidua, furctus, glaber, spadiceus, basi meinbranulaB floccosa? radiosae fulvae insertus, apice leviter incrassatus, pallidipr. Pileus ineinbranaceus, campanulato-cucullatus, fere Dvalis, diam. 2—3 lin. circiter, sed altior, quain latior, fuscus, disco umbilicatD vulgo flavD, lateritus perpendicularibus, obscure striatis, margine integro pallidiore. Lamella? adnatae, sub decurrentes, ob singular em pilei formam latissititaj, latiores quam longiores, distincte

(haud venoso-CDnnexoe), distantes, subconvexte, albid[^] flaventes.

B. Priori statura et colore similis, sed jileus papillatus. Ejusmodi lusus papillati nee umbilicati prsebent *Ag. Campanella*, *griseus* et *Fibula*, qualis est *Ag. amcenus* LASCH.

C. *Concolor.* Magis a typo recedit: prioribus minor, absque membranula ad basin, pilei discus concolor sine umbilico et umbone, stipes tenuior, minus rigidus. Haec forma legitur inter folia putrescentia Abietis.

Ag. Phiala Schum. Sa3ll. 2. p. 297 plurimis notis cum nostro CDnvenit. " Cfr. *FL Dan. t. 1730.f. 1.* At hie quadruple saltim major et stipes pallidior, ut distinctam censeam speciem. *Atj. pictum*, ssepe lectum, numquam magnitudine variant em vidi.

Vegetationis rationibus *Ag. pictus* ad *Ag. Bellies* Berk. Outl. p. 134 accedit, sed pilei forma pr[^]Drusus opposita, in *Ag. Bellies* tota inversa, cyathoidea.

Tab. 77. f. 4 *Agarici picti* praebet iconem.

DLX. AGARIDUS DYANOPHYLLUS FR.

Fr. Monogr. II. p. 293. Vet. Akad. Förh. 1861. p. 23. Kalchbr. Hymen. Hung. t. 7. f. 2.

Diagn. Omphalia pileo membranaceo, campanulato, umbilicato, striato, e livido lutescente; stipite fistuloso, aequali, glabro; lamellis decurrentibus, subdistantibus, *Iceste cyaneis*.

Ad truncos putridos Abietis prope Upsaliam detexit D. J. FRIES. In Darpathis legit Rev. KALCHBRENNER et e Jura indicavit QUÉLET (sed icon ab eodem in Fung. Juranis data, ipso monente, imperfecte colorata).

Descr. Gregarius, subfasciculatus, inodorus. Stipes sessuuncialis, lineam vix crassus, laevis, jove udo lubricus, luteus l. livido-fuscus; reliqua ut supra. Pileus e Campanu-

lat- demum convexus, distincte umbilicatus, manifeste striatus, glaber, lividus (rarius «cyanescens») demum expallens cum colore lutescente incuso. Lamellae longe decurrentes, leviter distantes, arcuatae, laete cyanete, demum expallentes.

Est e pulcherrimis Omphaliis. Affinitate naturali proximè accedit ad Ag. *redinem*, at janis coloribus facile distinctus. Cum Ag. *laccato amethystino* nulla adest affinitas.

Tab. 77. f. 1 Agarici cyanophylli formam cyanim adumbant.

CLXI. AGARICUS REDLINIS Fit.

Epicr. p. 127. Monogr. I. p. 190. Quélet Jur. p. 220. Kalchbr. Hung. t. 7. f. 3.

Diagn. Omphalia pileo submembranaceo, obtuse campanulato, mox expanso, umbilicato l. toto infundibuliformi, livido, hygrophano, margine renexato; stipite fistuloso, glabro, tenaci lamellisque decurrentibus, confertis, crassis, albis griseisve.

In pinetis locis humidis, tamen Sibiria, quam Upkandin; copiose legi in acubua et ramulis Abietis ad terrain

Descr. Gregarius, tenax, subcartilagineus, inodorus. Stipes fistulosus, 1—2 unc. longus, lineam crassus, aequalis, interdum flexuosus, laevis, glaber, lividus, basi fuscescens l. in ramulis nascens albifloccosus. Pileus submembranaceus,

admodum rigidus et versiformis, primo obtuse campanulato mox umbilicatus et sensim, versus cyathiformis, marginem denexato, striato, 1—2 imp. latus, glaber, udo lividus, siccus albidus l. isabellinus. Lamellae longe decurrentes, arcuatae, subconfertissimae l. albæ l. griseae.

Proximus videtur *Cantharello repho*, tamen habitu et coloribus omnino congruit, licet characteres preheant *Cantharellum Junxissem* cum Ag. *redini* nisi stamine valde diversa gauderet.

Tab. 77. f. 2 *redinem* pertinet.

CLXII. AGARICUS UMBRATILIS Fit.

Syst. Myc. I. p. 157. Epicr. p. 127. Monogr. I. p. 190. Wmhm. Boss. p. 88.

Diagn. Omphalia pileo submembranaceo, e campanulato convexo, dein umbilicato, laevi, glabro, umbrino-fusco, margine striatulo; stipite farcto, tenaci, glabro, lamellisque decurrentibus, latis, confertis fuseescentibus.

Ad margines fossarum Scania olim serotinam legi hujus formam majorem pileo magis campanulato. Nuperius minorem copiose legimus ad littora lacuum Smolandiae, ut Bolmen, Haknas etc. jam estate. In Hunaria: HALCHBRENNER.

Descr. Gregarius, tenax, hygrophanus. Stipes tubulosus: sed intus flocosus-farctus, 1—2 uncialis, lineam crassus,

aequalis, laevis, glaber, fusco-ater, dein submembranaceo obtuse campanulatus, dein convexus, umbilicatus, uncialis glaber, nigro-fuscus, siccus. Lamellae adnato-decurrentes leviter distantes majoribus arcuatae, confertissimae l. indivisae. Coloribus et exterioribus aliisque confertis aliisque confundi, potest tamen characteribus *Collybium ambusto et atrato*, tamen characteribus *Collybium ambusto et atrato*, tamen characteribus *Collybium ambusto et atrato*.

Tab. 77. f. 3 formam minorem Ag. *umbratilis* refert.

CLXIII. AGARIDUS GRISEUS FR.

Syst. Myc. I. p. 158. Epicr. p. 127. Monogr. I. p. 191. Cooke Brit. p. 51.

Diagn. Omphalia pileo membranaceo, e campanulato convexo, glabro, hygrophano (e griseo albedo); stipite fistuloso, tenaci, glabro lamellisq̄ue leviter decurrentibus, arcuatis, crassiusculis, subdistantibus, albedo-griseis.

Locis graminosis in pinetis apud nos rarior species, sed in plerisque adjacentibus terris simul lectus.

Descr. Stipes vere cartilagineus, mox fistulosus, 2—3 unc. longus, lineam crassus, apice leviter incrassatus, teres, strictus, laevis, glaber, albedo-cinereus, arrhizus. Pileus submembranaceus, e campanulato convexus, subpapillatus de-

mumquibus umbilicatus, non verum expansus, in unc. latus, striatus, hygrophanus, e livido-griseo canus. Lamella leviter decurrentes, distantes, distinctae, latse, crassiusculse, sed acie acutae, griseo-albidse.

Ainbigit species inter Mycenas et Omphalias, sed adest quoad staturam analogia cum *Ag. Campanella*; uterque variat pileo umbilicato et papillato. De lamellis vere, licet leviter, decurrentes, ad Omphalias referatur.

Tab. 78. f. 1 *Ag. griseum* proponit.

CLXIV. AGARICUS SPEIREUS FR.

Syst. Myc. I. p. 159. Epicr. p. 113. Monogr. I. p. 191. Berkl. Outl. p. 126. Sear. n. 946. Quélet Jur. p. 220.

Diagn. Omphalia pileo membranaceo, e conico-convexo piano, striato, pallido, disco papillato obscuriori demum depresso; stipite filiformi, tenaci, nitido, fibrilloso-radicato; lamellis adnatis, dein decurrentibus, distantibus, candidis.

Dense disseminatus supra truncos muscosos Quercus, autumnis seriori. Tamen in Suecia, quam apud exteros sat vulgaris.

Descr. Stipes subtiliter fistulosus, admodum tenax, filiformis, 2 unc. circiter longus, aequalis, glaber, nitidus, albus, basi fuscescens, radice fibrillosa caudatus. Pileus membranaceus, junior conico-convexus, dein planus, centro depres-

sus, umbone obscuriore fusco, ceterum pallidus albidusve, striis fuscis variegatus, 2—4 lin. latus, glaber, interdum pruinosis. Lamellse primo adnate, dein pileo depresso longe decurrentes, distantes, alternae breviores, candidse.

Mycenis filopedibus magis affinis quam Omphaliis vicinis; ob lamellas vero demum longe decurrentes inter Omphalias inserendus. Locis similibus legitur *Ag. supinus*, at hic stipite incurvo et lamellis liberis optime est distinctus.

Tab. 78. f. 2 *Ag. speireum* astitit.

CLXV. AGARICUS SETIPES FR.

Syst. Myc. I. p. 159. Epicr. p. 127. Monogr. I. p. 192. Weinm. Ross. p. 119.

Diagn. Omphalia pileo membranaceo, e conico convexo, striato, fusco-griseo; stipite filiformi, stricto, basi pubescente lamellisq̄ue longe decurrentibus, subdistantibus, venoso-connatis, albedo-griseis.

In dumetis roridis, v. c. *Rubi idcei*, inter muscos etc. baud admodum rarus. In Carolina: CURTIS.

Descr. Stipes filo tenuior, quam obsolete fistulosus, 2 unc. et inter muscos roridos altior, fere setaceus, tenax, strictus, typice glaber, griseo-albidus. Pileus omnino membranaceus, e conico convexus, saepe papillatus, demum umbilicatus, 3—4 lin. latus, fusco-cinereus et striis obscuriori-

bus variegatus, normaliter glaber. Lamellae longe decurrentes, distantes, tenues, demum venoso-connatae, albse l. griseae.

Haec species tamen inulta habet cum *Ag. Fibula* communia, ut pro illius subspecie haberem, nisi colores constanter differerent. Uterque variat pileo papillato, Bt— quod singulare— sub lente pube tenuissima obducti passim appaerent. Utrisque habet varietatem stipite superne caeruleo, qualis *Ag. Fibulce* sistit *Ag. Swartzii* et *Ag. setipedis* hoc loco proponitur.

Formam typicam *Ag. setipedis* optime sistit *Ag. tentatu* Bull. t. 560. f. 3; iconem aequalis lusus stipite superne caeruleo in tab. 75., l. 5 damus.

CLXVI. AGARICUS GRADILLIMUS WEINM.

Weinm. Ross. p. 121. Fr. Epicr. p. 128. Monogr. l. p. 133. (Jooke Brit. Fung. p. 82. Quélet Jur. t. 4. l. 2.

Diagn. Omphalia nivea, pileo membranaceo, hemisphaerico, subflocculoso, ad latera sulcato; stipite subaequali, basi flocculoso; lamellis decurrentibus, subdistantibus, tenuibus.

Locis paludosis ad stipulam de Betas; primo circa Petropolin lecta, dein variis locis Sueciae, Angliae, Galliae.

Descr. Species tenella, marcescens, Candida et junior subflocculosa. Stipes subtiliter fistulosus, filo tenuior, fere setaceus, mollis, 3—6 lin. longus, basi flocculosa insititius. Pileus membranaceus, hemisphaericus, nunc umbilicatus, nunc

papillatus, at numquam inversus, 2—3 lin. latus, B. flocculoso; glabrescens, udus manifeste striatus. Lamellae decurrentes, tenues, subdistantes, alternas dimidiatae.

Plurimis notis congruit cum *Ag. stellato*, sed tenuior et primo flocculosa forma lamellisque tenuibus certe distinctus.

Tab. 75. f. 4 *Ag. grauellimi* sistit iconem.

DLXVII. AGARICUS INTEGRELLUS PERS.

Pers. ic. et descr. t. 13. f. 5. Fr. Syst. l. p. 161. Epicr. p. 128. Berkl. Engl. Fl. V. p. 64.

Diagn. Omphalia tenella, versiformis, tota alba; pileo membranaceo, ex hemisphaerico expanso, psilucido-striato; stipite brevi, tenuissimo, deorsum pubescente; lamellis decurrentibus, distantibus, subramosis, acie acutis.

Ad terrain humidam, folia putrescentia et ligna putrida passim per pluriimas Europae regiones; Btiam Americae.

Descr. Parvus, versiformis, totus albus. Stipes subtiliter fistulosus, tenuis, sed firmulus, uncialis usque, ad ligna incurvus, "deorsum pilosus et basi saepe bulbillo villosulo adnatus. Pileus membranaceus, junior conicus, 2—3 lin. latus, mox hemisphaericus, saepius difformis, explanatus, \ unc. latum > cr disco depressus, margine striato. Lamellae, decurrentes, angustae, pliciformes, distantes, ante marginem vulgo evanescentes, aequales vel ramosae ut in Dantharellis, sed acies a cut a.

Ag. integrillus una cum *Ag. microscopica* mihi ignota et *Ag. polyadelpho* peculiariter em sistit sectionem, a praecedentibus

longius distantem. *Ag. integrilli* bonam iconem I. c. dedit. PERSONI, sea loco vacuo addidi novam, sistentem formam *Ag. polyadelphum* accedentem.

Tab. 75. f. B ad *Ag. integrillum* pertinet.

In Museo Holmiensi insuper depicti servantur: *Ag. umbilicatus*, *Ag. pyxidatus*, *Ag. hepaticus*, *Ag. P-hysiuxn*, *Ag. xnrualis*, *Ag. rusticus*, *L. umbelliferus*, *Ag. rison-pallidus*, *Ag. stellatus*, *Ag. anella*, *Ag. Fibula*. Horum omnium jam exstant Donae icones.

Ag. telvelloides Bull. a me ad *Cantharellus* relatus est *Ag. cupularum*. *Ag. rufulum* Berkl. ad *Ag. demissum* habitum *Ag. laccati* juxta hunc in *p. 8D* collatUS, sed e characteribus est *Omphalia*

MYDENA.

Stipes cartilagineus, fistulosus. Pileus campanulatus, subumbonatus, margins recto stipiti primitus adpresso. Lamellae liberae vel adnatae, non decurrentes.

I. CALDDNTES: lamellarum acie discolori, saepe denticulata.

DLXVIII. AGARICUS ATRDMARGINATUS LASCH.

Lasch in Linn. III. n. 181. Fr. Epicr. p. 101. Monogr. I. p. 198.

Diagn. Mycena pileo membranaceo, conico-expanse, sulcato, viscidulo; stipite procero, striato, glabro; lamellis itttenuato-adnexis; angustis, albidis, *acie nigra*.

In pinetis circa Upsaliam ad terrain solitarius quotannis obvius, autumnD tantum seriori. LASCHII fungus truncigenus, caespitosus, firmior et praecocior.

Descr. Species nobilissima, vulgo elata, demum fragilliuia. Stipes fistulosus, strictus, fragilis, 3—4 unc. longus, lineam et ultra crassus, tEijualis L sursum leviter attenuatus; interdum tortus, sulcatus, glaber, ciriereD-fuscus l. in ianthinum vergens, apice dilutior, basi radicans, obsolete filonulosus. Pileus exiinie membranaceus, conicus, dein conico-campanulatus, latus, profunde sulcatus, glaber, udus obsolete viscidulus, li unc. altus et latus, fuscus, circa marginem

dilutior. Lamellae postice attenuatae, leviter adnexae, ceterum fere lineares, 1—1[^] lin. latae, haud confertaB, nunc distinctae, nunc venis connexae, pulchre canae, ad latera in carneum obsolete vergentes, acie tenui constanter nigra.

Intercurrit varietas insignis stipite striato, fusco-purpureD, disco pilei obscuriori, laevi, margine striato, lamellis cDnfertis albis. Hie ad *Ag. ianthinum* accedit. Deterum cum nulla alia specie comparandus.

Laschii fungus statione et vegetationis rationibus a nostro satis differre videtur, quare hoc synonymon dubium. Cum vero notaB characteristicae ceterum sint communes, nolui novum nomen proponere.

Tab. 78. f. 3 ad *Ag. atromarginatum* pertinet.

CLXTX. AGARIHUS RUBRDMARGINATUS FR.

Syst. Myc. I. p. 150. Epicr. p. 101. Monogr. I. p. HW. Seer. n. 911. Berkl. Outl. p. 122. Lasch in Linn. IV. n. 544 (var. fuscopurpurea).

Diagn. Mycena pileD submembranaceD, campanulatD, obtuso, striatD, hygrophano; stipite levi, rigido, exsuccD, l i i-~~v~~ipallid; lamellis adnatis, distantibus, albidis, *acie purpureo-fusca*.

Locis humidis ad ligna putrida, stipulas etc. haud rarus et in plurimis regionibus obvius, at sporadicus, etiam aestate.

Descr. Minor, fragilis, inodorus, exsuccus, non caespitD^{su}s- Stipes fistulDSUs, 1—2 unc. longus, lineam haud exced^{ans}, aequalis, saepe curvato-ascendens, laevis, glaber, livido^{pallens}. Pileus membranaceus, campanulatus, obtusus, uncialis, striatlis, glaber, B hydrDptinus, griseus, livid r>-rilbtillus

vel fusco-purpurascens, siccitate expallens (color ceterum variabilis). Lamellae adnatae, denticulo decurrentes, distantes, distinctae, haud, ventricosae, ex albido griseo, acie fuscD-purpurea, haud manifeste dentata.

Statura et stipite exsucco differt ab *Ag. sanguinolento*. *Ag. metatux*, cui videtur proximus, differt statione terrestri, pileo siccoD atomato-sericeo, lamellarum acie haud discolori.

Bonae icones *Ag. aurantio-marginati*, *elegantis*, *coccinzlli* et *rosfli* exstant in *Flora danica*.

Tab. 78. f. 4 *Ag. rubromarginatum* refert.

II. ADONIDEJE: color e purD, lamellis albis immutabilibus.

CLXX. AGARICUS ZEPHYRUS FK.

Syst. Mycol. I. p. 147. Epicr. p. 102. Monogr. I. p. 202.

Ag. galericulatus v. rubellus Alb. et Schwein.

Diagn. Mycena pileo carnosulo, campanulato-convexD, obtuso, margine striato; stipite striatulo, squamuloso, lilacino-Tufescente, basi sublanatD; lamellis attenuatD-adnatis, late linearibus, vage venoso-connexis, albis.

Ad terrain et inter ramenta tarn in silvis frondosis quani acerosis vulgaris, saltim in Smolandia.

D. descr. Gregarius, rigidus, fragilis, mihi inodorus. Stipes fistulosus, 1—2 unc. longus, 1—2 liri. crassus, ietjualis l. le- viter sursum attenuatus^ striatulus, jprimo albo-squamulosus, demum nudus, rufescens, basi incurvus₇ saepe lanatus (hoc

in icone omissum). Pileus submembranaceus, discD fere cu⁷ nosulus₇ e campanulato convexus, obtusus, uncialis, ad n^{ur} dium striatus, non hygrophanus, livido-rubellus l. albo-inc¹ natus, disco subinde fusciscente. Lamellae adnatae, denticu¹⁰ decurrentes, late, sed non ventricosse, deirium sedente⁷ vage venosD-connexse, albae, interdum rubello-maculate.

Doloribus Ag. puro accedit, sed vix rite affinis. Etiam ab Ag. galericulato fragilitate, coloribus, stipitehaud radicato e. s. p. bene distinctus.

Tab. 78. f. B est Ag. Zephyri imRgo.

CLXXI. A&ARICUS LINEATUS BULL. VAR. EXPALLENS FR.

Syst. Mycol. I. p. 152. Epicr. p. 103. Monogr. I. p. 204. Weinm. Boss. p. 114.

Diagn. Mycena pileo membranaceo, campanulato, obtuso, lineato-striato (pallide flavente); stipite tenui, lavi, pallido, basi albo-villosD; lamellis adnatis, linearibus, albis.

Ad terrain inter muscos, locis vulgo humidis minus frequens.

Descr. Species tenuis, mollis, coloribus (ut videtur) mutabilis. Stipes fistulosus, filiformis, 2 unc. longus, aequalis, levis, glaber, pallidus, ssepe flavescens, ad basin albavillosus. Pileus eximie membranaceus, campanulatus, demum expansus, obtusus₇ i unc. l. parum ultra latus, totus lineato-striatus, glaber, in nostro vulgo flavescens, pallidus. Lamellae

adnatae, lineares, perangustae, subdistantes, distincta?, all¹ acie concolori, integerrima.

Agaricus lineatus Bull. t. 522. f. 3 au meo haud pal¹¹ recedit, praecipue pileo fusciscente. Specie tamen haud fi¹¹ diversum, cum praese¹itis legerim varietatem pileD f¹¹ scente, ceterum ab utroque praecedentium diversam sti¹¹ rigidulo, flexuoso, nitente flavo, pileo exacte canpanul¹¹ lamellis crassis. Pileus lineato-striatus omnibus formis d¹¹ munis.

Tab. 78. f. 5 variGtBtem Bxpallentem Ag. Insatii Bull. propoiit.

CLXXII. A&ARICUS BENZONII FR.

Elmch. I. p. 20. Epicr. p. 104.

Diagn. Hiatala alba, pileo tenerrimo campanulato, subumbilicato, striatulo, secus lamellas hiascente; stipite fistuloso, requali, glabro; lamellis liberis, approximatis, persistentibus.

Species Americae calidioris, nunc in Europam introducta, Upsalae [juotannis in corbibus Orchidearum tropicaruni horti botanici crescens. Similibus locis lecta in Hollandia (OUDEMANS), Germania (RABENHORST).

Species delicata, marcescens, pileo tenerrimo, more Doprinorum Veliformium hiascente, quo ab omnibus Mycenis

Eur (HIATALA), cujuspiureg exstant spec¹ g¹ i¹ n¹ t¹ e¹ n¹ s¹ t¹ r¹ picas Bt subtropms. Dfr. Fries Nov. Symbol* Mycol. H¹ VBro¹ lo¹ CD sub Mycenis servavi, quum vix considerari possit ut Flora Suecica, dvis. Proximus B. discretus Fr. L. C. abunde differt pileo umbonato et lamellis f¹ t¹ s¹ i¹ t¹ e¹ remu¹ Omnibus; Hiatalis sporae albae et ¹ allae pers entes, ¹ bus notis a Doprinis abunde distinct*.

T¹. 80. f. 2 Ag. fiwcnfliTit.

CLXXIII. AGARICUS FARREUS FR.

Epicr. p. 103. Monogr. II. p. 293.

Diagn. Mycena pileo membranaceo, campanulato-expansus, subumbonatus, atomis nitidis, furfuraceo, margins crenulato; stipite subradicatus, sericeo-striatulus; lamellis adnatis, tenuibus, venoso-connexis, subfimbriatis.

Ad terrain inter gramina et muscos. Primus legit deturictus LASCH, qui sine nomine misit. Nuperius in Suecia lectus ad Tvetaberg Sudermanniue. Etiam *Seer. Helv. n. 919* hue spectare videtur.

Descr. Stipes fistulosus, 2—3 unc. longus, lineam erases, aequalis, subsericeus et striatulus, albus. Pileus mem-

branaceus, e campanulato expansus, unciain haud attingens, obsolete umbonatus, atomato-furfuraceus, nitidus, quo ab omnibus Mycenis differt. Margo striatus, crenulatus. Dolor pilei albus, mine in incarnatum, nunc flaviseentem vergit. Lamellae adnatae, subconfertae, venoso-connexae, acie saepe fimbriatae.

Cum nulli alia specie confundi potest. *Ag. lacteus* differt statura et pileo glabrato.

Tab. 79. f. 4 *Agaricus farreus* refert.

CLXXIV. AGARICUS FLAVDALBUS FR.

Fr. Epicr. p. 103. Monogr. I. p. 205.

Ag. pumilus Bull. t. 260 var.

Diagn. Mycena pilgo submembranaceo, e campanulato convexo, glabro, laeviusculo, dein expanso umbonatus; stipite rigidulo, arrhizo, albo-pellucido, apice pruinoso; lamellis sedente-libris, planis demum ventricosis, albis.

Ad terrain apicam nudam l. gramine tenui tectam per plerasque Europos regiones. Catervatim nascitur.

Descr. Stipes fistulosus, rigidulus, strictus, vix ultra unciam longus, lenticiam crassus, aequalis, arrhizius basi glaber, sed apice pruinatus, pellucide albus. Pileus submembrana-

ceus, fere carnosulus, e campanulato convexus, demum explanatus, umbonatus, Y et ultra latus, laevis, glaber, siccitate saepe rimoso-fissus, flavo-albus l. omnino albus. Lamellae adnexae mox sedente-libere, demum planas, ventricosae distantes. albae.

Species olim cum *Ag. lacteo* P. conjuncta, a quo multo plurimis notis differt. Inter muscos vero occurrit varietris stipite longiore, filiformi, quibus *Ag. hypnophilus* PERS.

Tab. 13. f. 5 *Ag. flavoalbum* arumbrat.

CLXXV. AGARICUS LACTEUS PERS.

Pers. syn. p. 394. Epicr. p. 103. Monogr. p. 205 et Auctorum.

Ag. nanus Bull. t. 563. l. N. 0.

Diagn. Mycena alba, pileo membranaceo, campanulato, subumbonatus, udo striato, sicco levi; stipite fistuloso, filiformi, subtenaci, flexili, glabro; lamellis adnatis, postice attenuatis, confertis, angustis, linearibus, lacteis.

Ad terrain in pinetis vulgo gregaria, numquam caespitosa nee lignicola ut affinis *Ag. gypseus*.

Species quoad staturam admodum variabilis. Forma rursus muscos nascens 3 unc. usque alta, stipite aequali, basi fibrilloso-radicato, pileo 1 unc. lato. Alia forma supra

folia pinea nascens unciam l. parum ultra alta, stipite flaccido. Tertia etiam ad folia pinea lorige minor, pileo demum planiusculato, stipite tenui, basi bulbilloso-villoso.

His bene cognitissimis formis addo novam *pulchellam*, inter *Ag. lacteum* et *gypseum* ambiguum; hie verum differt vegetationis rationibus, pileo longe tenuiore, umbone prominente, et praecipue lamellis basi latioribus, subdistantibus. Hie insuper typice caespitosus, lignatilis.

Tab. 79. f. 3 *Ag. lactei var. pulchellam* sistit.

DLXXVI. AGARICUS GALEROPSIS FR.

N. sp.

Diagn. Mycena pileo membranaceo, campanulato, obtusD, lsevi, ferruginzo expallente; stipite elongato, strictD, glabro, infpjne ferrugineo; lamellis liberis, ventricosis, subconfertis, pallescenti-albis.

In terra humosa Horti Upsaliensis post pluvias sestivales.

Descr. Primo obtutu *Galerae teneri* adeo siinilis, ut eandem farilfc credas. Propius vero examinata differt lamellis liberis, ventricosis sporisque albis. Stipes fistulosus, 4 unc. circiter longus7 a basi ad apicem manifests attenuatus, apice 1 lin. crassus, strictus, fragilis, la3vis, glaber, inferne ferru-

ginascens7 apicem versus alb op all esc ens; basi haud radicato 5 Pilous submembranaceus, cDiiico-campanulatus absque i^{un}. bone, unciam 1. parum ultra latus, lasvis, glaber, juu^L ferrugineus, mox expallens ochraceD-pallescens. Lamella ut supra.

Species paradoxa, ut c ens Bam ulterius inquirendum in sit forma personata *Ag. teneris*, licet notis gravissimis rat. Inter Mycenas nuila exstat affinis.

Tab. 79. f. 1 *Agaricum galeropside* ante DCUIDS ponit.

III. RmiDiPEDES. Stipes firmus, tenax, rigidus, exsuccus, siccus, basi radicans. Pileus haud decolorans.

CLXXVII. A&ARIDUS COH^RENS P.?

Fr. Epicr. p. 195. Mon.gr. I. p. 207.- Ag. rigidus Lank in Linn. - Ag. cmtopu. Pers. My., Eur. p. 214.

Diagn. Mycena pileo carnosulo, e campanulato expanso, vduto-mollij fulvD-cinnamomeo expallente; stipite corneo, rigido, glabro, nitidD, badio, basi villo heterDgeneD vestito; lamellis liberis, distantibus, subvenoso-connexis, pallescentibus.

Ad truncos vel adtegram inter folia putrida in Kongsparken props Upsalam quDtannis legi. Etiam in exteris terris, licet rarius lectus.

Descr. Stipites subcaespitosi, fistulosi, rigidissimi, cornei, 4—5 unc. alti, 2 lin. crassi, aequales, laeves, glabri, nitidi, sursum badii ipsoque apice albidii, inferne spadicei basique villo albedo, quasi heterogeneo, conglutinati. Pileus leviter camDSUS, campanulatus, obtusus, uncialis, laevis, glaber, sed

tautu mDilis et aspectu subvelutinus, licet non pubescens cinnamDmeus 1. umbrino-fulvus, expallens, marffinD recto stipiti adpresso. Lamella pDst.ice rotndato, röblicherw, Tlstands, vulgo veno^o-conntm, perlate, ex albo pallesceht^

HIB et sequens vulgo confunduntur, licet vix affinu, ^rB synonymia difficile. Hunc equidem et (ut videtur) to*** et S *Cohen e Pers. habui, us, se d A PEL... hunc suu novo nomine descriP-rit, prius ncm en du bium factum. Uteumque* sit species nobilissima nom.n servit!

Tab. 80. f. 1 *Ajaribum cohurentem flEpi...*

CLXXVII. AGARJDUS GALERIDULATUS V. CALOPUS FR.

Ag. cDherens Auctt. pr. p.

Pulcherrima haec speciei notissimae varietas a typo differt coloribus et stipitibus in longam caudam basi coalitis. Ab *Ag. cohcerente* differt stipitibus cartilagineis, in caudam radicanter coalitis, absque villo prioris caracteristico

reliquisque *Aq. galericulati* f... Sn L Bgl ad truncDS p' i prope Upsalam.

Tab. 8D .r. 2. «... A Wlriculatum v. calopodem.

CLXXIX. AGARIDUS REBORHIZUS LASCH.

Lusch in Linn. IV. p. 577.

Diagn. Mycena tenax, pileo ex acute campanulato expanso, sicco, glabro, striato, subfulvo; stipite radicato, lasvi, "noccoso-pruinoso"; lamellis subliberis, leviter distantibus, albo-pallentibus.

Ad terrain juxta trim cos. In Germania variis locis lectus; in Ostrogothia Suecica detexit acutissimus fungorum in agator VON POST.

Diagnosi jam allatae pauca addere licet. Subcespitosus, siccus, inodorus. Stipes 2 Line. circiter longus, gracilis, in

speciminibus a me visis glaber, sed, pruina in variis facile disparente, auctoris definitionem sequi debui.

Ex elegante colore potius forsitan ad Adonideos referres, sed affinitas cum A. galericulato tanta, ut PERSONA pro illius varietate habuerit. Huic enim optime respondet A. galericulatus * epigaeus Pers. Syn. p. 177, Alb. et Schw. p. 191. Equidem primo pro varietate A. chelidonii habui, a quo tamen distinctus stipite exsucco, pileo acute conico etc.

Tab. 83. f. 4 Agaricum reborhisum depingit.

CLXXX. AGARICUS PARABOLICUS FR.

Epicr. p. 107. Monogr. I. p. 211. Ag. utroque Albert, et Schwein. p. 191, HDI BDH.

Diagn. Mycena tenax, pileo submembranaceo, ex ovali parabolico, obtuso, ad medium striato, disco nigricante, margine integro albicante; stipite laevi, rigido, glabro, concolorato, basi strigoso, praetermo-radicante; lamellis simpliciter adnatis, adscendentibus, subdistantibus, albicantibus.

Ad truncos Pini praecipue autumnum seriore, in hiemem persistens, gregarius l. caespitosus.

Descr. Stipes fistulosus, strictus l. in situ verticali curvatus, adscendens, quam Ag. galericulati minus rigidus, 2—3 unc. longus, lineari crassus, e basi hirsuto-barbata leviter attenuatus, cinerascens, apicem versus laevissimus, glaber, saepius viola-

scens, junior albofarinosus. Pileus submembranaceus, ex ovali campanulatus, demum parabolicus, siccus subnitens, disco nigrescens, lacvis, marginem versus striatus, expallens, violascens. Lamellae simpliciter adnatae, lineares, adscendentes, subdistantes, raro venis connexae, integerrimae, albae.

Mycenarum more admodum variat. Forma hoc loco delineata a typo recedit stipite curvato-adscendente, fere concolore pileoque magis conico.

Tab. 80. f. 3 Ag. parabolivum adumbrat.

CLXXXI. AGARICUS TINTINABULUM FR.

Epicr. p. 107. Monogr. p. 211. — Ag. galericulatus v. hiemalis Lasch in Linn. IV. p. 536.

Diagn. Mycena tenax, pileo submembranaceo, campanulato-convexo, subobtusum, laevigatum, unicolore (sed maxime variatum) udo viscido stipite rigido, laevi, glabro, pallido, strigoso-radicato; lamellis dente decurrentibus, confertis, planis, tenuibus, albidis.

Ad truncos prostratos variarum arborum, praecipue Fagi, per omnem facile Europam sed ad A. galericulatum vulgo rejectus.

Descr. Typicam censeo formam seditariam, stipite curto, sed ex LASCH variat caespitosus, stipite interdum ad 3 unc. elongato. Deterum omnibus gravioris momenti notis cum nostrum convenit, ut de identitate specifica non dubitem. Color pilei quam maxime varius. Cfr. Lasch.

Tab. 80. f. 4 sistit Agaricum tintinabulum brevipedem.

CLXXXII. AGAKICUS EXCISUS LASDH.

Lasch in TAnn. IV. p. 538. Fries Epicr. p. 105. Mono jr. I. p. 207.

Diagn. Mycena firma, pileo campamilato-cDnveXD, disco litimosulo (spadiceo, fusco-nigricante); stipite rigido, tenaci, radicato, lsevi, fuseescente; lamellis crassis, subdistantibus, canis, postice exciso-angustatis, subliberis.

Ex Laschio in truncis Pini caespitosus; ipse vero tantum ad terrain solitarium vel gregarium legi.

Descr. Pro more Mycenarum statura et colore varians. Laschii descriptio a nostra tantum recedit, ut speciem distinctam facile fingeres, sed omnes characteres essentialia con-

gruunt. Ipse duas legi forinas terrestres, alteram **Smolandica**^{an} in MonDgr. descriptam, alteram Upsaliensem, quam ict)n nostr¹ adumbrat. Haec recedit stipite longiore (2 unc. et ultra), subflexuoso, pileo fustD-nigricante, lamellis tenuioribus. C^{kl} raciteres essentialia offerunt rigiditas et tenacitas. totius iuni^h pileus stipesque obscure fusci (numquam in einereum v^h gentes), lamella? postice excisai.

Tab. 81. f. 1 *Ayarimm excisum delineat.*

IV. FRAGILPEDES. Stipes fragilis, siubus, exsuccus, arrhizus. Pileus fragilis, in plerisque hygrophanu*-Lain slice decolorantevS.

CLXXXIII. ABARICDS DISSILIENS Fu.

Epicr. p. 108. Monuyr. p. 213.

Diagn. Mycena fragilis, pileD submembranaceo, e UD-nico campanulato, obtuso, ad medium lineato-plicato, obscuro, fusco; stipite subincurvo, striatulo, cinereD-obscuro, basi striQ-DSD; lamellis rotundatis, secedenti-liberis, latis, mollibus, albidis.

Ad terrain garpinosam baud frequens, nuperius Upsalioe LDpiose lectus. Dlim inter quisquillas lectus, qiiàlis in Monogr. descriptus.

Descriptionem dabo novam ad specimina Upsaliae lecta. Stipes 2 unc. longus, 1—2 lin- crassus, glaber l. pruinatus,

exsuccus, sub lente atriatus, dilute tinereus, compressus l- flexus in lacinias revolutas dissiliens. Pileus e **andiformi** conico-campanulatus, non explanatus, ad medium sulcatu- sicus obscure fusuus, margine concolore l. albicante. La- jnellre postitie rotundata?, fere liberal, antice latiores, molles, albidite. — A. pseudoclypeatus Bolt f. 154 csespitous, trau- cigenus ad A. dissilentem accedit, ut A. excisus Lasch ad nostrum.

Tab. 81. f. 2 est Ag. *dissilentu* imago.

CLXXXIV. AGARICUS ALCALINUS FR.

SysL Myc. I. p. 142. Epicr. p. IUIK Monvjr. I. p. 214.

Diagn. Mycena graveolens, rigido-fragilis, pileo submei- branaceo, campanulato, obtuso, nudo, udo profunde striato, sicco nitido; stipite glabro, sublubrico, basi villosus; lamellis adnatis, subdistantibus, ex albido glaucescentibus l. obscure cinereis.

Ad truncos vetustos per totuin fere annum multis locis vulgatissima Mycena.

DiagnDSi datai vix addenda plenior descriptio. Est colore inter maxime variantes, ut pluribus opus sit iconibu^h Schatfferi t. 31, 32 hujus form am stipite luteo t b rt- ferunt, sed dubium, a l. fo" » a An Wt-ygii; odor rW indicatur. Hoc loco datur^h TM-TM=^ta, lamellis stipit.qu' obscure cinereis.

Tab. 81. f. 3 est fDma **Agarici alcalini**.

CLXXXV. AGARIDUS Plicatus FB.

Syst. Myc. I. p. 145. Epicr. p. 110. Monogr. I. p. 216. — Ag. Dligophyllus Lasch Linn. IV. n. 542.

Diagn. Mycena fragilis, pileo membranaceo, campanulato-expanso, plicato-sulcato, sicco opaco, umbone carnosulo, obtuse; stipite polito, lasevi, glabro; lamellis adnatis, distantibus, crassis, venoso-complexis, griseis.

In terra humosa Suecise, Germaniae, Helvetiae. Olini quoque legi in horto oleraceo ad Femsji), nuperius in vaporario horti botanici Upsaliensis.

Descr. Stipes rigidiulus (non mollis ut A. metati), fragilis tamen, strictus, tequalis, lasevis, glaber, uncialis, griseus l. fuscescens, basi prismatus, arrhizus, albo-villosus. Pileus membranaceus, e campanulato expansus, umbone carnosulo,

lasevi, ceterum profunde lineato-sulcatus, sulcis distantibus fere plicatus, saepe quoque fissus, uncialis, fuscus-cinereus, siccus opacus. Lamella adnatae absque dente decurrente, crassae, distantes, venoso-connexae, griseae demumque albido-pruinosae. A. metato videtur proximus, sed hic mollis, stipite laxo, pileo laevigato. — A. *oligophyllus* Laschii quoad staturam cum meo exacte convenit, sed recedit statione circa truncos et lamellis albidis.

Tab. 81. f. 4 ad *Agaricum plicatum* perthiae L.

CLXXXVI. AGARICUS Aetites FK.

Fr. Epicr. p. 110.

Var. rufescens pileo explanato, subrepando stipiteque rufescentibus.

In collibus sterilibus, ericetosis (Lassby backar) propinquissimis.

Insignis haec varietas (et forsane speciei typica forma) a *Panus* descripta colore pilei et stipitis recedit, ut primo obtutu pro nova specie facile habeatur. Reliqua tamen omnia *Panus*

gruunt et color inter Mycenas maxime varius, ut species non distinguat, quare in diagnosis raro citetur. Ag. umbelliferus *Schveff. t. 309* utramque formam manifeste conjungit.

Tab. 81. f. 5 *Agaricum Aetitem rufescentem* representat.

CLXXXVII. AGARICUS STANNEUS FR.

Epicr. p. 111. Monogr. p. 214.

Diagn. Mycena firma, pileo membranaceo, campanulato-expanso, glabro, obsolete striato, hygrophano, sicco lasevi, stanneo, sericeo-splendente; stipite rigidulo, laevi, glabro, *pallenscentis*; lamellis denticulo decurrente adnatis, venose-connexis, albidis.

Ad terrain graminosam in silvis, vulgo gregarius.

Descriptio formae firmioris datur in *Epicr. I. c. HEBC* habitu ad *A. galericulatum* accedit, sed arrhiza, fragilis, in-

dora. In hoc locu proposita sistit formam *gigilantam*, speciem *Filopedum* referentem. Ceterum omnibus partibus congruunt et varietatis nomine vix dignae. Plures Mycenae analogae offerunt formas, statura maxime varias v. c. A, galericulatus.

Tab. 82. f. 2 *Agaricum stanneum* spectat

CLXXXVIII. AGARICUS VITREUS *Fr.**Epicr. p. 111. Monogr. p. 218.*

Diagn. Mycena fragillima, pileo membranaceo, campanulato, ubique lineato-striato, umbone discove carnosulo nullo; stipite striatulo, splendente, basi fibrilloso; lamellis adnatis, distinctis, linearibus, albidis.

Locis humidis pinetorum, nobis haud rarus.

Observatio. Hujus et praecedentis forma) saepe similes, sed certe distinctae; notam hujus speciei essentialem sistunt

lamellae angustae, lineares. A. stannei stipes rigidus et cervice pilei sicci color stanneus, sericeo-splendens.

A. tenuis *Bolt. L 37* prioribus quoque similis, sed distinctus stipitis tubulo membranaceo, pileo margine appendiculis dentiformibus albis cincto. Boltonii icon bona, appendiculi marginis neglecti,

Tab. 82. f. 1 referenda ad *Agaricum vitreum*.

V. FILIPEDF:S- Stipes filiformis, flaccidus, subtenax, exsuccus. Lamellae decolorantes. Graeillimi, *terrestre*

CLXXXIX. AGARICUS AMICTUS *Fr.**Epicr. p. 112. Monogr. L p. 2W.*

Diagn. Mytiena pileo membranaceo, conico-panulato, ad medium striato, sicco, glabro; stipite filiformi, aequali, tenaci, villosa-pulverulenta, radice torta, glabra; lamellis liberis, confertis, linearibus, griseis, acie pallescentibus.

Nobilis haec species pluribus locis in Suecia lecta inter muscos silvarum et camp Drum, sed apud externos haud indicata.

Observatio. Est inter tenuiores, stipite tenui, tenaci, pulverulento facile distincta. Pilei color varians, sed plerum-

que elegans.— Amicus v. POST ad Upsaliam detexit species [A. *plumbum*) tam pileo quam stipite albo-pruinosis distinctam; quae differt insuper pileo appanato cinereo-piloso, stipite basi striato etc.

Tab. 82. f. 3 A. *amicti* praebet imaginem.

DXU. AGARICUS DEBILIS *Fr.**Epicr. p. 112 cum syn. Monogr. p. 222.*

Forma hujus typica, inter muscos et folia obvia, pluribus locis ~~descripta et picta~~, ut hujus iconem novam super-
tutuara censeam; sed SADIO nudo, arido occurrit forma *fallax* stipite brevior (1. unc. longo 1. parum ultra), firmiore et pileo pallescente, cujus iconem dare utile duxi, licet vix

vere varietatis nomine digna, quum unice e statione pentica et in typicam directe transeat.

Tab. 82. f. 4 sistit A. *debilis* *hmm* /allacem.

UXCI. AGARICUS COLLARIATUS FR.

Fr. Obs. 2. p. 164. Epicr. p. 114. Monogr. I. p. 222. -

Diagn. Mycena pileo membranaceo, campanulato-convexo, subumbonato, striato, expallente, glabro; stipite filiformi tenaci, glabro, nitido; lamellis collariato-adnatis, tenuibus, confertis, distinctis, albidis.

Locis gramineis silvarum baud frequens.

Descr. Affinis Ag. *stanneo* ejusque more varians stipite

tirmiore. Dollariuni non adest discretam ut in *Marasmiotrotula*; lamellae modo ad stipitem cohaerentes et conjunctae secedentes.

Tab. 82. f. 5 imitatur Ag. *collariati* formam tenuiorem.

CXCII. AGARICUS ACIDULA SCHIFF.

Schiff. Fung. t. 222. Fr. Epicr. p. 114, ubi synonymum. Monogr. T. p. 223.

Diagn. Mycena subtilis, pileo membranaceo, campanulato-convexo, glabro, miniato-aurantio, marginibus striato; stipite radicato, setaceo, tenaci, luteo, nitido; lamellis rotundato-adnexis, ventricosis, distantibus, luteis, acie albicantibus.

Inter ramenta, folia dejecta, etiam ad ligna, haud raro.

Descr. Tenerrima, seel tenax, persistens. Stipes subtiliter fistulosus, radicans, l. unc. circiter longus, setaceus, glaberrimus (exiepta basi radicante), nitidus, intense luteus.

Pileus membranaceus, campanulato convexus, umbone minimo carnoso, 1—2 lin. tantum latus, striatus, glaber, nitidus, miniato-aurantius. Lamellae rotundato-adnexae, fere liberae, rationibus latse, ventricosae, subovatae, distantes, alternate breviores, luteae, acie albicantes l. omnino albae.

Vulgo jungitur cum *A. stipulari*, tjuare utriusque dedimus nomen.

Tab. 85. f. 3 prebet Ag. *Aciculain*.

VI. LACTIPEDES. Lamellae et stipes radicans siccus fracti lactescentes.

CXCIII. AGARICUS HJSMATOPUS PERS.

Pers. Syn. p. 311). Syst. Myc. I. p. 141). Monogr. I. p. 224.

Diagn. Mycena ctespitosa, pileo carnosulo, campanulato, obtusulo, marginibus denticulato; stipite rigido, albopulverulento, succo atrosanguineo scatente; lamellis adnatis, unicoloribus, albidis.

Ad truncos diversarum arborum ut Fagi, Abietis, saspe copiose, sed in quibusdam regionibus deesse videtur.

Specie] nobilis et vulgatse icon desideratur, quare dole-

mus nobis non licuisse adumbrare formam typicam *pileo albincarnato*: sed adest sub auspiciis amici LINDBLAD picta icon *pileo obscure fusco*, ceterum nullo modo diversa. Hanc magni momenti, ulterius prebens testimonium, quam levis momenti inter Mycenas sit pilei color,

Tab. 83. f. 1 *Agaricvm hjsmatopodem*, pileo umbrino-fusco, refert.

CXCIV. A&ARIDUS CRUENTUS FH.

Syst. Myc. p. 148. Afonogr. l. p. 225.

Diagn. Mycena pileo submembranaceo, conico-campanulato, striato, margine integerrimo; stipite stricto, glabro, basi villosa-radicato, succum obscure rubrum stillante; lamellis sirlnata, unicoloribus, albidis. *

In pinetis Suecic, Rossis, Anglic ad terrain, locis humidis, solitarius.

Descr. Inter praececedentia et sequentem medium tenet locum. Stipes fistulosus, 2—3 unc longus, lineam baud crassus, sed firmulus, strictus, ltevis, glaber, nunquam villosus-

pulverulentus, pileo pallidior, basi villosa-radicatus, fractiij lac obscure rubrum stillans. Pileus subinmembranaceus, eonico campanulatus, obtusus, striatus, glaber, 3—5 lin. I**0! badius 1. fusco-ruber, expallens, margine integerrimo. ^A melle totte adnate, confertiE, lineares, albid», & acie integer] concolore.

Tab. 83. f. 2 at AgaHcum emmtum spectat.

OXD.V. A|>ARIDUS SANGUINOLENTUS, ALB. et SDHW.

Albert, et Schwein. Uonsp. y. 196. Syst. Myu. I. p. 141). Mmogr. I. n. 9-J.J.

Diagn. Mycuua pileo membranaceo, campanulato-con-VGXO, striato; stipiteB iebili, flaccido, glabro, laticem dilute rubellum stillante; lamellis udnatis, subdistai;tibus, pallidioribus, acie atropurpurei*.

Inter folia dejecta IDCIS nudis silvarum frequens.

Descr. Praecedentibus multiD ten.; v • WA- nile^ rubello 1. fuscecente. R_Bliqua ut su -D. e. v. 22.1.1. r. J. Z^ GONNERMANN et RABENH-p. J. s. e. A. ^T* r. -cônem -e. B. paratam baud superfluam duCO. noStram VTM^S pro opB^.

Tab. 88. f. 3 A_gaHCUm, «^ ^ entMm sistit

VII. GLUTINIPEDES. Stipes exsuccus, glutinoso-viscosus.

CXCVI. A&ARICUS CLAVIDULARIS Fr.

Syst. Myc. I. p. 158. Epicr. p. 114. Monogr. l. p. 228.

Diagn. Mycena tenax, pileo submembranaceo, convexo-expanse, striato, sicco, epelliculoso, disco demum depresso; stipite tenaci, glabro, viscido, albido, basi fibrilloso; lamellis adnatis, albidis.

Locis irriguis in pinetis. Speciein in Smolandia detexi; Upsalia^ forma tenuior lecta.

Observativ. Pileus pr albidus, flavidus, fuscisceo " ^ ^ CBnarum colore, vari», hoc IDCO picta p_rD ->PICa habe ^ ^ . Et lam statura variat. FoT^.

Tab. 84. f. i. A, d**TM^ris sistit imairiijPM.

CXC VII. AOARICUS PLICATO-CRENATUS FR.

Fr. Monogr. II. j>. 294.

Magn. Mycena pileo tenuissimo, conico, subumbonato, sulcato-plicato crenatoque, alb. o flavescens; stipite filiformi, glabro, viscido, pallide rubello; lamellis attenuato-adnatis, ads. dentibus, dente decurrentibus, distantibus, albis.

Inter miscos in silvis abiegnis Upsalae lectus.

Descr. Stipes obsolete fistulosus, intus flavescens. Pileus epelliculosus, color forsitan varius, seel hactenus semel tantum isctus. Reliqua ut supra,

Tab. 84. f. 2 ad *Agaricum plicato-crenatum* pertinet.

DXC VIII. AGARICUS DITRINELLUS PERS.

Pers. Sijn. p. 184. Fr. Syst. Myc. I. p. 155.

Diagn. Mycena pileo membranaceo, ex hemisphaerico explanato, umbonato, striato stipiteque tenello, viscido, basi ejusque iconem dedit PERS DON in *1c. et descr. t. II. f. 3. Ab villosa* citrinis; lamellis uncinatis, distantibus, albis.

Forma primaria PersDonii ad terrain in pinetis baud rara; addimus novam formam in trunnis vetustis Pini lectam. Tab. 84. f. 4 sistit *Agaricum citrinellum* trim nig. enim.

Descriptio forma primaria exhibetur in *Monogr. I. p. 229-230. Ab hac vix recedit nDstra nisi loco natali et statura minore.*

VIII, BASIPEDES. Stipes siccus, arrhizus, basi nuda in orbem dilatata vel bulbilosa strigosa.

CXCIX. AGARICUS DILATATUS Fn.

Epicr. p. 117.

Diagn. Mycena alba, pileo membranaceo, convexo-piano, obtuso, laevi, glabro, margine striatulo; stipite filiformi, stricto, basi orbiculari, convexa, laevi, glabra; lamellis collario conflexis liberisque, sublinearibus.

Species nobilis, rarissima, bis modo lecta, 1818 in Smolandia, 1851 in Uplandia.

Diagnosi modo addendum, staturam cum *Ag. stylobate* convenire, sed pileum esse latiore. Nomen respiciens *Ag. stylobatem parum* aptum est, praecipue si hue pertineat *Bull. t. 563. l. R. S. 7* in praesente *Ag. dilatato* subjuncta, sed forte species distincta, statura plane alia.

Tab. 84. f. H *Agaricum dilatatum* depingit.

CO. AGARICUS ECHINIPES LASDH.

Lastfi Linn. III. n. 193. Epicr. p. 117. ruin. syn.

Diagn. Mycena pusilla, alba, pileo tenui, campanulato-convexo, subgibbo, glabro, striato; stipite crassiusculo, glabro, basi bulbillo hirto inserto; lamellis attingentibus, crassis, distantibus.

Ad terrain humosam, umbrosam sub Filicibus locisque similibus passim, rariss ad folia delapsa.

Observatio. A vicinis facile distincta, sed inquirendum, nuni *Ag. lacteus* * *pithyus* alia sit hujus forma, in foliis Pini obvia. Nostra specimina *Ag. echinipedis* cum Laschii exacte congruunt.

Tab. 84. f. 5 *Agaricum echinipedem* proponit.

CDI. AUARICUS PTERI GENUS FR.

Fr. Obs. I. p. 43. Syst. Myc. T. p. 180. Epicr. p. 118 cum syn. — Pers. Myo. Eur. 3. t. 28. f. 6.

Biagi Mycena tenella, rosea, pileo campanulato, obtuso, lseviusculo stipiteque flexuoso, capillari glabris, basi bulbiliosa, strigoso-radiata; lamellis latis, adnatis, distantibus, integris.

Ad stipites Filicum exsiccate, rarius ad folia, per omnem Europam a Neapoli (*Brig. t. 35. f. 6*) ad Lapponiam.

Observatio. Species pulchella, plurimis locis jam pi¹ sed collatis iconibus nostram non omnino superflua vid⁶ Lamellae variant tequales et alternse.

Tab. 85. f. 4 sistit *Agariti pterigmi formam gracilentam, paksBil*

TX. INSITILK. Stipes tenuissimus, insititius, sine radice vel tuberculo radicali

UUIL A&ARIDUS DORTIUOLA (PEKS.) SCHUAI.

Pers. Syn. p. 394 incluso seiju. *Schum. Scull. n. IGHD. Epicr. p. 118*, ubi syn. — A. corticalis *Bull. t. \$19 pr. p.*

Diagn. Mycena pumila, pileo tenui, hemisphaerico, demum obsolete umbilicatD, sulcato-striato; stipite tenui, brevi, incurvo, furfurellD; lamellis late adnatis uncinatisque, latis, subovatis, pallidioribus.

Ad truncos arborum stantium inter muscos vulgaris.

Observatio. Quum htec et sequens species a plurimis tomnisceantur, utriusque dare icones necesse duximus. Acu-

tissiraus LASCH hunc primus distinxit. Cautē quouue distil guendus ab *Ag. supino*, locis similibus obviō eiusdenni^{III} staturae, sed hie tenax est nee marcescen[^], 1^s libi^{^s} ventricosis.

Tab. 85. f. 2 aistit *Agaricum corticolam*.

CDIII. A&ARICUS HIEMALLS DSBECK.

Osbeck in Ectz. Suppl. 2. FL Scand. Epicr. p. 1PJ. — A. adscendens *Lasch' m Linn. IV. n. 645* (f¹ *Duna alba*) — A. corticola et corticalis Auctt. pr. parte.

Diagn. Mycena tenuis, pileo membranacep, campanulato, obsolete umbonato, margine striato; stipite tenui, adscendente, sum nniinRriin- lamellis adnatis uncinatisque, angustis, linearibus, albidis.

Locis pr[^]cedentis similibus minus frequens.

Observatio. Prsecedenti maxime affinis 1 character¹5
dati videntur constantes. * ^ ^ ***

Tab. 85. f. i *Agarhum hiemallm rbpnes,ntat*.

CCIV. AGARICUS CAPILLARIS SCHUM.

Schum. Sml. p. 2b'S. FL Dan. t. 2142. f. 1. Epicr. p. 119 cum synonymis.

Diagn. Mycena tenerrima, alba, pileo campanulato, demum umbilicato, glabro; stipite insititio, capillari, glabro; lamellis adnatis, adscendentibus, albis. baud ingratum

Ad folia dejecta et coacervata, praeicipue Fagi, in sero autumno persistens, frequens.

Observation Loco in tabula vacuo comparationis gratia inserui hanc speciem, licet pluries pictam. Lectoribus omnes nostras Mycenas insititias uno loco delineatas habere.

Tab. 84. f. 5 Agaricum capillarem spectat.

VVV. AGARICUS STIPULARIS Fu.

Syst. Myc. I. p. 160. Epicr. p. Hi).

Diagn. Mycena tenerrima, pileo convexo, subumbilicato, lamellis paucis, latis, distantibus roseis; stipite insititio, capillari, (sub lente) puberulo, flavido.

In nemoribus humidis ad varias stipulas in Suecia, & Germania [Lasch n. 206) Helvetia (Trog Suppl. 2. n. 114 a), Pallia (QuéL p. 76).

Observatio. Adraodura delicatus. Lamellae vulgo sex, sequales. Reliqua ut supra,

Tab. 85. f. 5 proponit Agaricum stipularem.

CCVL AGARICUS JUNCICOLA FR.

Syst. Myc. I. p. 160. Epicr. p. 119. Berkl. Outl. p. 130.

Diagn. Mycena tenerrima, pileo conico convexo, striato, glabro, rufescente; stipite insititio, capillari, fusco; lamellis paucis, adnatis, distantibus, sequalibus, albis.

Ad culmos putrescentes Juncorum a Suecia (Stehag) ad Italiam rarior.

Observatio. Proxime affinis, sed coloribus distinctus. Tenuior quoque est et saepe fasciculatus ut in Bull. t. 248 l. D., quam addimus vegetationis modum Dptime Hionstranteni. Hanc figuram sine nomine alienis immixtam necesse fuit segregare.

Tab. 85. f. 6 Agaricum juncicolam [epinpit.

Mycena major pars statura et pilei colore magis variat quam ceteri plurimi Agarici. Difficillimum igitur omnes forinas communi diagnosi limitare, Variarum igitur specierum dedi novas icones, a prius datis recedentes, quod lectoribus baud ingratum spero.

In Museo Academiæ Hohniensis insuper depictae servantur:

Agaricus aurantio-marginatus, elegans, rosdlus, purus (bis), *Adonis, luteo-albus, lacteus, gypseus, rugosus, galericulatus* c. variet., *polygrammus, Icevigatus, atroalbus, ammoniacus, metatusy tmuis, Jilopes, vitilis, cimmerius, gnlopus, epipterygius, vulgaris, stylobates.*

IX. PLEUROTUS. Stipes excentricus, lateralis 1. nullus.

CCVII. AGARICUS ORNATUS FR.

Epicr. p. 130. Monogr. F. j). 144.

Diagn. Pleurotus pileo carnosD, convexo-plano, subumbonato, luteo, squainulis floccosis fulvo-fuscescentibus consperso, adulto nudo; atipite spongioso-farctD, molli, excentrico, sequali, glabro lamellisque obtuse adnatis, latis, subdistantibus luteis.

In truncis putridis, ad terram prostratis, in pinetis; in regione Upsaliensi admodum rarus.

Descr. Stipes carnosus, intus spongiosus et demum cavus, 1—2J unc. lDngus, 3—5 lin. crassus, laevis, glaber, luteus, apice subfarinolentus. Pileus carnosus, disco subumbonato excepto tenuis, 2—5 unc. latus, squamulis minutis, fiocculosis, fusco-ferrugineis, demum secedentibus exasperatus.

Caro mollis, albolutea. Lamellae obtuse adnatse, lutea? ^{III} majors forma lata* et distantes.

Dua? distingui possunt formse, inter [juas tamen n^u^ limites. Altera firmior stipite excenterico, pileo irregular¹ umbonato, lobato-repando, primitus distincte squaTnulo[^] altera denudata, magis regularis, pileo obsoleteaumbonato ^{ct} squainuloso-punctato, lamellis angustioribus minus distantibus. Pileus interduin in rubellum ver[^]it, nt habitus P^l A. *variegati* Scop,

Tab. BB. f. i romam denudatam Agaric*^omati sistit.

CCVIII. AGARICUS CRASPEDIUS FR.

Fr. Monogr. I. p. 241.

EHagn/ Pleurotus pileo carnosus, plus minus excentrico, crenato lobatoque, laevi, glabro, subtestaceo; stipite spongioso, solido, elashico, glabro, pallido; lamellis adnatis, confertis, aiigustis, candidis.

Ad trim cos in pinetis Upsalia? sat frequens. Etia in terris exteris lectus; varietas robustior in Britannia: SAUXDERS et WORTH. SMITH.

Descr. Ctespitosus. Stipes solidus, firmus, elasticus, intus spongiosus, nunc basi incrassatus, nunc a3quañs, in aliis uncialis,* in aliis 3 unc. usque longus et turn tortns vel compressus, i—1 unc. crassus, pallidus, vulgo glaber 1. basi leviter villosus. Pileus plus minus excentricus, interdum sublateralis, sed postice semper marginatus, tenuis demumque in inargine explicato fere raernbranaceus, flaccidus, pla-

nus, in maxime excentricis postice d^opressus testaceus 1. pluviis autumnalibus alutaceo-pallescens, inter^oum canarⁱ scens, 3—5 unc. usqu^o. latus, lams, Di h M^o involutus, dein eleganter cirenato-bbatus. Daro[^]Ifba [^]>* mella3 totse adnatse, tenues, confertBe, angust^o, demum lace^o rattp, albo.

Huic nobili et clarae speciei affioe r^o y l o l IDC no m^o Hypophyllo plicato Paul, t. 44. f. j, ^o primitus datum. x^ol^o omnibus nDñs cum nastro convenit, co^ore except^oriseo 1. cinereo, ut nesciam an distino-uatur su^o nomi^o ^o A^o Intermedia est nostra species inter A briatum, sed ab utroque longe distanf l pU monariU7n et ^

Tab. 8B. f. 2 Agaricum eras^o p^oitium representat.

CCIX. AGARICUS OIRCINATUS FR.

Fr. *Epicw* p. 132. *Monogr. I.* p. 244.

Diagn. Pleurotus uJbus, pileo carnosio, cDnveo-plano, obtuso, orbiculari, pruina sericella candicante; stipite farcto, elastico, acquali, glabro, subexcentrico, radicato; lamellis adnatis, subdecurrentibus, confertis.

Ad ligmi et ramos dejectos hand frequens.

Desur. Solitarius, totus albus nee hygrophanus. Stipes farctus, elasticus, 1—2 unc. Inmgus, 2—4 lin. crassus, aequalis, centralis l. leviter excentricus, rectus, glaber, praemorsu-
ladicatus. Pileus carnosus, orbicularis, horizontalis, tenax, e convexo plano-disciformis, obtusus, 2—3 unc. latns, brevis

sed micDre stricellD candicante obductus. Lamella; adnatse, leviter decurrentes,* conferta*, 3 lin. usque lata», ulbre. Odor flebilis gratus.

Species egregiti distincta, verosimiliter primarius *Ag. lignatilis* PERSDDN, quum hie illius sensu facile pro *Gym-iiDpudis* specie sumatur, ininime vero noster *Ag. lignatilis*. Huic vero hoc nDinen re dubia omnium consensu tribuitur-Persoon utrumque facile conjunxit.

Tab. 88. F. 1 A. *circinatum* a dumb rat.

UCX. AGARICUS SPODOLEUI^US FR.

Syst. Myc. I. p. 1H2. *Epicr.* p. 133. *Monogr. I.* p. 247, excl. var. alba.

Diagn. Pleurotus pileo carnosio, planiusculD, orbiculari, subhorizontali, lyevi, glabro, cinereo l. brunneo; stipite solido, subverticali, glabro, pileo dilutiore; lamellis decurrentibus, siniplicibus, confertis, albidis, postice discretis.

Ad truncos arborum frondDsarum. In Suecia ineridiD-Uali legi" pileo cinereD-fuscescente; specimina picta, pileo l>riinneD, ad Ultuna prope Upsaliam.

Descr. Ut plurimum solitarius. Stipes distinctus, erectiis 1- adscendens, solidus, 2—> unc. Inngus, pollicis crassitie

1. infra, glaber, pileo concolor, sed dilutior. Pileus carnDsus, planiusculus, subhorizontalis, 3 unc. circiter latus, hcvis, glaber, dilute brunneus. CarD alba l. cinerascens. Lamella* decurrentes, conferta*, albidae, postice simplices.

Species vix cum alia confundenda, [fxclu^o *Ag. pantoleuco*. Huic verD admodum similis est *Ag. coriipellis*; statura et habitus cDnvenit, exiinie vero differt pellicula pilei crassa, subgelatinosa, separabili lamellisque haud decurrentibus.

Tab. 87. f. 1 pertiibt ad *Agaricwn spodoleucum*.

VVXI. AGARICUS PANTOLEUDUS FR.

A. *spodoleucus* v. alba Fr. *Monogr. I.* p. 246.

Diagn. Pleurotus tutus albus, pileo caniDso, excentrico, dimidiato, spatulaeformi, laevi, glabro, pDstice depresso inar-
ginato, margine tcquali, integro; stipite brevi, arrhizo, adscendente, glabro; laincllis decurrentibus, confertis, simplicibus, basi discretis.

Ad truncos Bptula*. Specimen pictum ex Elfkarleby, UplandiaB reportavit Prof. C. J. SUNDEW ALL.

Descr. Solitarius, firmus, albus. Stipes solidus, adscendens, valde excentricus, unciarn 1- paruin ultra longus, \ unu.

et ultra crassils, uequalis l. deorsum attenuatus, la*vis, glaber. Pileus carnosus, adscendens, oblique horizontalis, spatulaeformis et leviter convexus, 3 unc. usque longus, 2 unc. circiter latus, lievi's, glaber, disco ssepe opaco, margine umnirvo integrD. Lamella? decurrentes, subconfertae, minus tamen quam *Ag. porneti*, albas.

Ad hanc specie[m] quoque referenda forma minor, pileo inagis regulari, subumbilicato.

Tab. 88. f. 2 redilit iua^inera *Agavici pantoleuci*.

VXXU. AUARICUS EOMETI FR.

Epicr. p. 132. Monogr. I. p. 247. — Hypophyllum pometi Paul. t. 21. f. 1.

Diagn. Pleurotus albus, pileo carnosD, convexo, laevi, glabro, disco depresso; stipite excentrico, solido, tenaci, elastico, adscendente, villosa-radicato; lamellis rlecurrentibus, valde confertis, postice distinctis.

Ad truncos Pyri Mali languescens. Descripsi ad specimina Upsalia? lecta; iconem cDinmunicavit VON POST speciarum quam nostra tenuiorum in Ostrogothia lectorum.

" *Descr.* videas in *Monogr. L c.* Specimina nuptrius I^B minora, tenuiora, stipite breviora. Prsecedenti videtur I^B inodum affinis, sed structura alia, mollis, flaccida, stipes V^V loso-radicatus, pileus irregularis, margine involutus.

Tab. 89. f. 1 sistit *Agaricum pometi*:-

CCXIII. AGARICUS MUTIUS FR.

SysL Myc. I. p. 111. Epicr. p. 132. Monogr. I. p. 247.

Diagn. Pleurotus albus, pileo carnosulo, versiformi, glabro, sicco sericeo; stipite excentrico lateralique, brevi, treti, glabro, basi villosa; lamellis decurrentibus, subconfertis, angustis, erassiusculis, simplicibus.

Ad terrain gKaminosam tam in Suecia quam exteris terris minus frequens.

Descr. Species minor, pumila, a pra?eedentibus longe distans. *Ay. scyphoidi* (t. 73. f. 8) vero tain similis, ut varie-

tat em facile finger em. Nuiquam tainen'noiniscue nascant vidi nee ullos transitus directos. De differentiis sub *A scyphoide* jam disserui. *Aq. mutius glabrescens*, nunquam regularis nee infundibuliformis. In **Europa australi major** iirmior legitur.

Tab. 88. f. 4 *A. mutilum* spectat.

DOXIV. AGARIOUS PULMONARIUS FR.

* JIJISLANDIS *Monogr. I. p. 248.*

Diagn. Pleurotus sessilis, exacte lateralis (nee postice marginatus), pileo carnosulo, obDvato, in basin stipitiforem brevissimam attenuate, flaccido, glabro, fusco-cinereo; lamellis decurrentibus, comoloribus 1. pallidioribus.

Ad truncum languescentem Juglandis Holmise lectus.

Descriptio format primaritn data in *Syst. Myc. I. p. 187* et *Monogr. I. p. 248.* Ab hac cliffert subspecies 1. varietas

hoc loco oblata vegetatione c* f. u[^] attenuato sed non vere stipit *3P l. Sa, pileo SBSsili> baS1, | differentiae non magni mom V, e; tenjm multo minor, | speciem distinctam f[^]acile ^derein[^] ha blt[^]H tRm fliveTSU f[^]

Tab. 87 f 2 i u ; . . . P1*bet A9ari» Pnonarii subspeciem **Juglandis**.

CXCXV. AGARICUS ALMÉNI FR.

-Diagn. Pleurotus pileo carnosb, tenui, exacte laterali, reniformi, posticé in stipitem brevissimum productD, glabro, fuscescenti-fulvo; lamellis determinate decurrentibus, divergentibus, subconfertis, pileo pallidioribus.

Novam hanc speciem legit Prof. A. ALMÉN in Abiete ~~emortua~~ decorticata in regione Upsaliensi. Erumpit e foraminibus, ~~quæ~~ pici excavarunt.

Diagnosi supra datse pauca modo addenda. Stipes 1—2 lin. longus. Pileus forma varius, 1—3 unc. latus, majornm. margins undulatus.

Tab. 87. f. 3 *Agarimm Alme'ni* sistit.

CCXVI. AGARIDUS LIMPIDUS FR.

Epicr. p. 135. Monogr. I. p. 250.

Diagn. Pleurotus pileo carnosulo, obovato reniformive, ~~laevi~~, glabro, albo, hygrophano, postice stipitifurmi-attenuato; ~~lamellis~~ linearibus, confertis, ad basin decurrentibus, albis.

Ad truncos arborum frondosarum pluribus Sueciae locis lectus, sed apud externos non indicatum vidi, nisi hujus loci

*It *Ag. lacteus* SCOP.

Observatio. Cum nullo alio confundi potest, tantum cum *Ag. miti* comparari. Stipitis rudimentum nee squamulosum nee villosum. Pileus circiter uncialis, sed pro more magnitudine varius.

Tab. 88. f. 3 *Agarimm limpidum* depingit.

RCXVII. AOARIDUS RENIFORMIS FR.

Fr. in Vet. Akad. Förh. 1873. p. 5.

Diagn. Pleurotus pileo carnosulo, horizontal[^] reniformi, piano, cinereo, postice emarginato cum brevissimo stipitis rudimento villofeo; lamellis e tuberculo stipitiformi excurrentibus et divergentibus, tenuibus, linearibus, griseis.

Ad ramos exsiccatos Pruni Padi in DstrDgothia detexit

H, vox POST.

Descr. Stipes in tuberculum villosum[^] album reductus. Pileus leviter carnosus, exacte lateralis, semicircularis, horizontalis, planus, laevis, *villosus*, cinereus, 4—5 lin. latus. CarD admodura tenuis, subgelatinosa, diaphana.

Tab. 89. f. 3 *A. reniformem* apectat.

CCXVIII. AGARICUS ACEROSUS Fit.

Forma C. *Monogr. l. p. 251.*

Diagn. Pleurotus pileo membranaceo, reniformi, piano, striato, griseo l. fusco, sicco albo-sericeo (in forma fusca cano-sericeo); stipite brevissimo obsolete; lamellis determinatis, confertis, simplicibus, griseis l. fuscis.

Ad terram, muscos, ligna putrida vulgaris et maximè e polymorpha species.

Diagnosis data cDinplures hujus speciei formas complectitur. Plurimarum in *Monogr. l. c.* seorsim dedi descriptiones, quas hoc loco repetere nimis longe deduceret. Quae

hoc loco picta est forma D. l. c, uujus pileus ^{subsessilis} membranaceus, flaccidus, reniformis, in argine striatulus, 1^o stice vulgo depressus, passim strigosus, udu fuscus, siccu? canus. Lamellae decurrentes vix lineam latw, fusc-t. H³⁰ legitur ad acus-Pini, muscos, viaru latera. Aflinitate j^{lit} gitur cum *Cantharello lobato*

Tab. 89. f. 2 sistit varietatem fuscam *Agarim' averosi*.

CCXIX. AGARICUS NIDULANS PERS.

Pers. Ic. et descr. t. b\ f. 4 (expallens). Syst. Myc. l. p. 18B. Monogr. l. p. 255.

Diagn. Pleurotus pileo carneo, primo resupinato, dein expanso, sessili, subreniformi, tomentosD, luteo; lamellis concurrentibus, latis, subdistantibus, aurantio-fulvis.

Ad ligna cariosa Fagi in Smolandia, Pini Upsaliae legitur.

Descr. Gregarius, passim imbricatus, junior sistens, cupulam excentricam, dorso adnatam, dein magis reflexus subdistantibus, reniformis, 1—2 unc. latus, tomento per s&tatem squamuloso, luteo, sed variat expallens. CarD. in hac grege

sat crassa, firmula, lutescens. Lainell* primo concurrent¹¹ pileo vero reflexo adnate apparent, l³, subdistantes, aur[<] fulviE.

Icon nostra sistit formam lsetius coloratam, quain adtl¹ ut comparetur cum *Ag\ Jonquilla* Leveill. *Comm. in P*^ t. 20. f. 4.*

Tab. 66. f. 3 *Agaricum nidulanUm* adumbrat.

DCXX. AGARICUS UNGUIDULARIS FH.

FT. Elench. l. p. M- Monogr. l. p. 256.

Diagn. Pleurotus pusillus, pileo carnosulo, primo resupinatD; stipite incurvo, dein adscendente, pellicula viscosa tecto; lamellis determinatis, distantibus, albis.

In rimis corticis truncorum arborum frondosaruin lan-guescentium, proecipue hieme.

Descriptivnm videas in *Elenchu*. Stipite primo incurvo, dein adscendente cum *Ag. septico* et *byssisedo* convenit, sed

pileus modo 1—4 lⁿ. l^{atu}s^j p^r() rati^one carnosul^{us}. Stip^{us} lineam vix longus, in rimis corticis delitescens. Dup^l legi formam, alteram pileo aterrimo in Sorbo, alteram pileo griseo in Quercu.

Tab. 89. f. 4 *Agaricum unguidularis* in p^g tit.

CCXXI. AGARICUS STRIATULUS PERS.

Pers. St/n. p. 485: Syst. Myc. I. p. 193. Epicr. p. 137.

Diagn. Piturotus lineatus, pileo tenuissimo, subcupulari, sessili, striato, glabro; lamellis latis, distantibus.

Ad ligna, ramulos variasque quisquilias humi prostratas inligatus, tñ situ variabilis.

Descriptio praecipuarum varietatum data in *Monogr. I. Pl. 195*. Hoc loco offerimus formam typicam nondum descriptam, nam *Ag. striato-pellucidus* in *Pers. Obs. Myc. II. t. 11m* & §, ab auctore ad *Ag. striatulum* relatus, species manifeste diversa. In *Myc. Eur. 3. t. 25. f. 3* delineatur forma valde a typo recedens, pileo irregulari, demum deflexo, di-

midato, cespitoso, qualem in ramis exsiccatis Doryli legitimus.

Tab. 89. f. 5 praebet *A. striatidi* typicam formam.

In Museo Academiae Scientiarum Holmiensis depositae insuper sunt icones sequentium: *Agaricus corticatus*, *A. dryinus*, *A. ulmarius*, *A. lignatilis* cum var. *tephrocephala*, *A. glandulosus*, *A. ostreatus*, *A. salignus*, *A. petaloides*, *A. serotinus*, *A. mitis*, *A. tremulus*, *A. dictyorrhizus*, *A. porrigens*, *A. septicus*, *A. atrocceruleus*, *A. algidus*, *A. applicatus*.

X. VOLVARIA. Harum omnium bona? exstant icones, ut novas dare superfluum. Omnium in Suecia lectarum specierum exstant novae icones in Museo Holmiensi.

XL PLUTEUS. Rhodospiza. Hymenophyllum a stipite discretum. Lamellae rotundato-liberae. Velum nullum.

CCXXII. AGARICUS ROBERTI FR.

A. semibulbosus Fr. Monogr. II. p. 295 pr. parte.

Diagn. Pluteus pileo disco carnosulo, ceterum membranaceo e convexo piano, obtuso, hirtulo, exsulcato, albofuscescente; stipite apice cavo, glabro inferne solido, leviter incrassato; lamellis perlatiis, ex albo carneis.

In fagetis Sinolandiae legit R. FRIES.

Descr. Ab *A. semibulbosus*, cum quo hactenus conjunctus, tamen gravibus characteribus differt, ut non possit non distincti. In *A. semibulbosus*, qui *A. hispidulo* magis affinis, stipes

tenuis, sed basi inflato-bulbosus, subtiliter iustulosus, rectus, pubescens; pileus sequaliter carnosulus, sed admodum tenuis sulcatus, atomat mollis nee hispidulus, in unc. modo latus; lamellae angustiores. Stipes *A. Roberti* incurvus e situ forte pendet. Pileus uncialis et ultra.

Tab. 90. f. 1 sistit *A. Roberti* imaginem.

GCXXIII. AGARICUS HISPIDULUS FR.

Obs. Myc. ? p. 97. Syst. Myc. I. p. 201. Epiz. p. 141. Monogr. I. p. 264. Lasch n. 292.

Diagn. Pluteus pileo carnosulo, e convexo piano, sub-
 ltevi, piloso sericeove, griseo; stipite fistuloso, glabro, laevi,
 argenteo; lamellis ex alb 3 earn BIS.

In truncis vetustis Fagi, in quibus omnes fere Plutei
 speciBS leguntur. In G.rmania legit LASCH.

CM AT i
 Descriptio locis citatis adest, prima in Ubs. Myc. L c.
 Est inter valde affines Pluteos minima et distinctissima spe-
 cies, A. Semibillboso et A. salicino affinis, sed ab A. Roberti

longius distans, A. salicinus differt stipite farcto, fibrill^{osi}-
 caprulescente vel virente.

In Musaeo Holmiensi pictae servantur A. pellitus, A.^{ca}
 vinus, A. ephebeus, A. hispidus v. vaporarius, A. petasatus,
 roseo-albus, A. leoninm, A. chrysophceus, A. nmus cum v^u
 lutescente, phlebophorus.

Tab. 90. f. 2 Agaricum hispidulum repraesentat.

XII. ENTOLOMA. Khodospori. Hymeiophorum cum stipitB contiguum. Pilei margD primo involutus.
 Velum nullum.

CCXXIV. A&ARICUS LIVIDUS BULL.

Bull. t. 382. Epicr. p. 143. Que'let Jur. p. 83.

Diagn. EntolDina pileo uarnosD, e convexo planD, sicco,
 laevi, glabro, pellicula vero longitudinaliter fibrillDSD-cDn-
 texta, alutaceo l. livido; stipite subcavo, valido, glabro, apite
 pruinato, candido; lamellis rotundatis, subliberis, e pallido
 carneis.

In silvaticis ad terram rarD, sed ad Holmiam copiose
 lectus.

Descr. Stipes cavus l. medulla spongiosa farctus, vali-
 dus, 3 unc- longus, unciam et ultra crassus, sequalis, baud
 iibrillosus, sed striatulus, apice pruinatus, extus rigidus, can-
 didus. Pileus ca'nDSUs, disco compactus, e convexo planus,
 subgibbus, 4 unc. et ultra latus, regularis nee repandus, siccus,

lams, glabar' sed cuticula longitudinaliter quasi fibriH⁹,
 cobre inter hvadumetalutaceumvario^all^Lte. L^{am}
 rotundato, subliber*, vix conferts, 3-5 lin lat*
 attenuate ex albido earn,,. Od.r'fanpaeus" , antie

Fung. speciDsi novam damus icon

ein, quum Bulliardi mi-
 Quum fungi

 vensus equies vulgo censeantur, hic maxime car-
 vendus; secundum Cel. QUELETO experientiam periculosam
 valde vBnenatas.

Tab. 90. *. 3 sistit Agarici livid, iinaginem.

DDXXV. AGARIDUS PRUNULDIDES Fr.

Syst. Myc. I. p. 198. Monogr. I. p. 269. Epicr. zd. 2. p. 189.

Diagn. Entoloma pileo carnosus, e campanulato expanso, umbonato, laevi, glabro, subviscosus, pallescente; stipite solido, glabro, albo; lamellis emarginato-liberis, ventricosis, ex albo carneis.

In terra sicciore, clivis apricis, inter gramina frequens, sed solitarius. Lectus in Suecia, Anglia, Batavia, Gallia.

Descr. Odor fortis faring recentis. Stipes carnosus-fibrosus, solidus, 2—3 unc. longus, 3—4 lin. crassus, brevis l. striatulus, nudus nee farinosus, albus. Pileus carnosus, e campanulato convexus, demum explanatus, laevis, glaber, viscidus, demum

longitudinaliter rimosus, margine demum striato. Color pilei varians, albidus, lutescens, lividus, cinerascens. Lamellae primitus leviter adnexae, emarginatae, demum subliberae, 3—4 lin. latae, confertae, ventricosae, albae, sporis carnea.

Species admodum distincta, odore quam Ag. Prunuli fortiore, sed habitu Pluteis accedens. Cum in hunc ignoto Agarico repandv Bull, multa habet communia.

Tab. 91. f. 1 Agaricum Prunuloideum aiumbrat. Color pilei in iconis solito obscurior.

ODXXVL A&ARIDUS PDRPHYRDPHJ^US Fr.

Monogr. I. p. 473. Epicr. ed. 2. p. 190.

Diagn. Entoloma pileo leviter carnosus, e campanulato explanato, repando, umbonato, laevi, fusco-fuligineo, expallente; stipite solido, e basi incrassata attenuate, nudo, purpurascens-fuligineo; lamellis postice truncatis, fere liberis, ventricosis, griseo-rubellis.

In pratis graminosis juxta Upsaliam, autumnus.

Descr. Major, mollis, sed rigido-fragilis. Stipes solidus, totus fibrosus et in fibras facile rasilis, 3 unc. circiter longus, a basi incrassata (4—5 lin. crass.) aequaliter attenuatus, nudus seti impolitus, opacus, purpurascens-fuligineus, fion hygropha-

nus, licet siccus murinus, in utroque statu valde expallens, glabriusculus (accuratius vero lustratus fibrilloso-contextus), ambitu repandus et saepe inciso-lobatus. Duro color, sed sicca alba. Lamellae postice truncatae, fere liberae, subdistantes, 2—3 lin. latae, distinctae, primo griseo-albidae, demum sporis griseo-rubellae.

Odor nullus/

Tab. 93. f. 1 Agaricum porphyrophmum sistit.

DCXXVII. A&ARIDUS ARDDISIAUUS Bull.

Bull. t. 348 (alia forma). Fr. Monogr. II. p. 295. Epicr. ed. 2. p. 191.

Diagn. Entoloma pileo carnosulo, e campanulato convexo, obtuso, laevi, udo, chalybaeo-fuscus, demum cinerascens; stipite cavo, sursum attenuato, glabro, chalybaeo, basi albo; lamellis liberis, confertis, ventricosis, ex albo l. griseo incarnatis.

In Suecia hic lectus est locis humidis in pinctis. Bulliardus lectus in pratis Galliae, cujus iconem a meo deo recedit, ut tibi iconem addere necesse duxerim, praecipue cōmparationis gratia cum Ag. madido.

Descr. Statura admodum varius, semper inodorus. Stipes fistulosus cavusve, 2—3 unc. longus, 2—3 lin. crassus,

sursum leviter attenuatus, glaber, sed facile in fibras rasilis, eximie chalybaeus, sed basi albus. Pileus carnosulus, e campanulato convexus, obtusus (in meis specimenibus haud debressus), 2—3 unc. latus, laevis, glaber, udu, chalybaeo-fuscus, junior nigrescens, vetustus cinerascens, sed non hygrophanus. Lamellae liberae, valde ventricosae, postice attenuatae, confertae, ex albo l. griseo incarnatae.

Tab. 94. f. 4 Agaricum aridum ardosiaci formam praebet.

DDXXVIII. AGAKIDUS VIEIDANS Fr.

Monogr. II. p. 345. Epicr. ed. 2. p. 192.

Diagn. Entoloma olivaceo-virens, pileo leviter carnosus, e cillime dignoscitur haec species. Odor nullus. Stipes cavus, 2 unc. conico expansus, acute umbonato, laevi, viscosus; stipite cavo longus, 2—3 lin. crassus, glaber, tenax. Pileus H unc. la^{us} sequali, glabro; lamellis leviter adnexis, confertis, incarnatis. Lamella admodum latis; secedendo fere liberae. Reliqua ut

In silvaticis ad Reymyra Dstrogthise legit H. YDN POST, supra.

qui icon em CDmuni cavil

Descr. Dolore pulchre olivaceo-viridi, etiam carnis, fa-

Tab. 93. f. 3 iconem Agarid vihdantis praebet.

DDXXIX. AGARIDUS MADIDUS Fr.

Epicr. ed. I. p. 144. Monogr. I. p. 271.

Diagn. Entoloma graveolens, pileo carnosus, e campanulato expanso, obtuso, laevi, viscido, violaceo, vetusto fuligineo; stipite subcavo, fibrilloso, violaceo, basi albo; lamellis subliberis, ventricosis, albido-griseis. jove pluvio madidus, subviscosus, siccus nitens, violaceus, non hygrophanus, margine tenui, inflexo, striatulo. Lamella h^{iter} adnexa, fere libera, aquose molles, ex albido grisere.

/ Inter musDS, folia coacervata in Suecia variis locis lectus. Etiam in Helvetia.

Descr. Stipes carnosus-fibrosus, subcavus, 2—3 unc. longus, 3—4 lin. crassus, deorsum vulgo clavato-incrassatus, fibrillosus, apice nudus, basi alba excepta violascens. Pileus leviter carnosus, e campanulato convexus, 1—2 unc. latus, laevis, glaber,

Ddore gravissimus, pungente, fere Bmsulce foetentis ab omnibus Hyporhodiis differt. Agarkus ardosiacus inodorus lamellis liberis et stipite glabro distinctus. ICDII Fl Danic t. 2148. f. I. sistit formam haud rite evolutam.

Tab. 91. f. 3 Agaricum madidum iepingit.

DDXXX. AGAKIDUS JUBATUS Fr.

Syst. Myc. I. p. 196. Monogr. I. p. 272. Epicr. ed. I. p. 145.

Diagn. Entoloma pileo subcarnoso, e campanulato expanso, umbonato, villososquamoso fibrilloso, murino; stipite cavo, juali, fusciscenti-fibrilloso; lamellis leviter adnexis, secedentibus, confertis, fuligineis.

In pratis tarn siccis, quam humidis. In Suecia haud rarus. In Anglia ex BERKELEY et BDDME

Descr. Inodorus. Stipes carnosus-fibrosus, rigido-fragilis, primo farctus, adultus cavus, 2 unc. et ultra longus, lineam

et ultra crassus, aequalis, fusciscentis, fibrillis fuligineis vestitus. Pileus leviter carnosus, e campanulato demum explanatus, umbonato, 1-2 unc. et ultra latus, in cute floccoso-squamoso 1. fibrillosus, murinus, non hygrophanus. Daro tenuis, scissilis, concolor. Lamella secedentes ventricos, p^{im} o bscure fuligineis, dein sporis eleganter fuligineo-purpurascens.

Tab. 92. f. 1 A. jubatus adumbrat.

DDXXXL AEJAEIDUS RESUTUS Fr.*Epicr. ed. I. p. 145. Monogr. I. p. 273.*

Diagn. Entoloma pileo sub earn DSD, convexo, obtuse, ad-
 presse squamuloso fibrillosove, fusciscente; stipite tequali, molli,
 glabro lamellis que leviter adnexis, ventricosis, crassiusculis gri-
 seis, sporis rubellis.

In silvis ad terrain, inter muscos etc. variis Sueciae locis
 lectus.

Dzscr. Inodorus. Stipes totus fibrosus, primo farctus, dein
 cavus, 2 unc. circiter longus, lineam et ultra crassus, aequalis,
 extus politus, glaber, striatulus, subgriseus. Pileus carnosus,
 seil admodum tenuis, convexus, subobtusus, numquam umbili-

catus (licet discus ut in Leptoniis obscurior), unciam et ultra
 latus, totus nunc dense floccoSD-squaniDSUs, stjuamis adpressis
 obscurioribus, nunc laevigatus, longitudinaliter fibrillosus. La-
 melke fere liberal, ventricosae, subconfertse, griseae, sporis ru-
 bellae (numtjuam purpurascetes).

Multis notis cum praecedente et seijunte convenit, sed
 species admodum diversa.

Tab. 92. f. 2 *Agaricum resutum* sistit. Figura minor sistit typicam fpmam,
 reliqua varietatem stipits fistubso, ebn^ato.

DDXXXII. ARAKIDUS GRISEDCYANEUS Fr.*Syst. Myc. I. p. 202. Monogr. I. p. 274.*

Diagn. Entoloma pileo subcarnoso, convexo, obtusD, floc-
 coso-sq[uan]iDSD, griseo, in lilacinum vergente; stipite cavo, floc-
 coso-fibrillosD, e pallido cteruleo; lamellis adnexis, secedentibus,
 ex albido carneis.

In pascuis, collibus apricis post pluvias aestivales frequens
 tam in SuecJa? ^uam Bxteris terris.

Descr. Stipes totus fibrillosus, mollis, cavus, li unc. longus,
 ^—3 lin. crassus, floceDSo-fibrillosus, e pallido caeruleus, in-
 terdum totus albus. Pileus leviter carnosus, e campanulato

convexus, obtusus, numtjuam depressus, unciam latus, totus
 floccoso-squamDSus, griseus, ut plurimum lilacino-tinctus, non
 hygrophanus, sed valde decolorans. Lamellse ventricoss. Reli-
 qua ut supra.

Habitu et coloribus ad Leptonias accedit et in harum socie-
 tate nascitur, sed totus mollis et stipite totD fibroso abunde
 distinctus.

Tab. 94, f. 1 *Agaricum griseocyaneum* refert.

DDXXXIII. AGARIDUS DIDHEDUS (Pers.?) Fr.*Pers. Syn. p. 343? Fr. Monogr. I. p. 273. Epicr. ed. 2. p. 194.*

Diagn. Entoloma pileo subcarnoso, e campanulato expanso,
 Uttibonato, squamuloso-fibrilloso, e violaceo livido-murino; sti-
 pite farcto, fibrilloso-farinoso, caeruleo; lamellis sinuato-adnexis,
 confertis, sporis rubello-fuscescentibus.

Ad terram in silvis prope Holmiam tantuin a me lectus.

Dzscr. Habitus *Agarici terrei*, sed coloribus prticipue spD-
 aruiii nullo pactD affink. Stipes totus fibrosus, farctus, li unc.
 longus, 1—3 lin. crassus, sursum attenuatus, fibrillis tenuibus
 farinaceus, sublacunosus, caeruleus. Pileus leviter carnosus,

junior campanulatus, adultus convexus planusque, umbonatus,
 numquam depressus, 1—2 unc. latus, siccus, squamuloso-fibril-
 losus, e violaceo demum livido-murinus. Lamellae ut supra.

Sporarum colore rubello-fuscescente ab omnibus reliquis
 Hyporhodiis distinctissimus. *Ag. dichrous* Pers. nonnullis notis
 recedit, sed ad aliam speciem ducere non potui.

Tab. 92. f. 3 ad *Agaricum dichrvum* spectat.

DDXXXIV. AGARIDUS SERICELLUS var. LUTESCENS Fr.

Epicr. ed. 2. p. 194.

Obs. Vulgate et bene cognita hujus speciei varietatis addimus iconem stipite fistuloso, subnudo, pileo magis regulari, convexo, losvi, lutescente; lamellis fere adnatis. Licet habitu diversa ad *Ag. sericettum* certe pertinet. Nascitur locis apricis sole infestatis, quum typica forma silvatica.

Etiam magis recedit *Ag. sericellus* Pers. *Ic. et descr. t. f. 2* (non Bull.) magnitudine, pileo campanulato squamoso, stipite bulboso. Videtur species distincta.

T. ^ f a v . . . , , . . .

GDXXXV. AGARIDUS PLUTEOIDES Fr.

Monogr. II. p. 345. Epicr. ed. 2. p. 195.

Diagn. Entoloma pileo leviter carnosoj scissili, e diivexo explanato, obtuso, glabrescente, hygrophano; stipite fistuloso, rigido, cuticula fibrillosa tecto, albo; lamellis adnexis, confertis, ex albo carneis.

Ad ligna putrida Abietis raro. Primus detexit H. VDN POST in DstrpDthia.

Descr. Stipes, fistulosus, rigidus, 2 unc. circiter longus, 1—2 lin. crassus, aequalis, nunc rectus, nunc curvat o-adscendens, albus, tactus lutescens, cuticula fibrillosa vel ex inventore subtomentosa; basis ipcfassata, villosa, vulgo oblique et breviter

radicans. Pileus tenuissime carnosus, scissilis, iunior convexus, adultus planus, obtusus, 1—3 unc. latus, primò leviter fibellus, udus albido-griseus, margine fere pellucidus siccus sordide lutescens. Lamellae apicem versus attenuate!

Unica Entolomatum species epixyla et habitus Pluteoidum, a quibus tamen abunde differt stipitis structura pileo tenui scissili, lamellis emarginatis.

Tab. 91. f. 2 Agaricum Pluteoidem refert

DDXXXVI. AGARIDUS ELAPHINUS Pr.

Monogr. II. p. 296. Epicr. ed. 2. p. 195.

Diagn. Entoloma pileo earnDSUIO, convexo, obtuso, glabro, hygrophano, margine striato; stipite e farcto cavo, firmulo, nudo, livido; lamellis postice subtruncatis, latissimis, e pallido carneis.

In pratis muscosis, silvaticis ad terram. In Smolandia detectus a RDB. FRIES.

Descr. Odor nullus. Stipes fibrosus, e farcto leviter cavus, firmulus, Hunc. longus, 2—3 lin. crassus, aequalis. leviter attenuatus, nudus sed obsolete fibrilloso-striatus, lividus, fuscescens. Pileus carnosulus, sed admodum tenuis, eximie

convexus, obtusissimus 1—9 lin. i, UHL. latus, laevis, flaber U^{AMS} obscure cervinus l. umbrinus, siccus pallidus fuscus. Lamellae 3—4 lin. latae, fere triangulares l. ovatae. Ceterum ut supra.

Dharacteribus ad *A. szriceum* accedit " CUI YATO VIX A dicendus, jam odore nullo distinctus.

Tab. 95. f. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. A^{micum} daphinum i^{pin}git.

DDXXXVII. AGARIDUS TURBIDUS Fr.

Syst. Myc. I. p. 205. Monogr. I. p. 276. Epicr. ed. 2. p. 195.

Diagn. Entoloma pileo sub eam DSD, B campanulato convexo, umbonato, hygrophano, marginB primo recto, adpresso, dein fissD striatoque; stipite cavo, inflato-clavato, glabro, argent eo-splendente; lamellis emarginatD-liberis, albo-griseis.

In silvis sub variis formis; in Suecia passim et ii^a pluribus vicinis terris lectus.

Descr. Proximis major, inodorus. Stipes carnosus, fissilis, cavus, deorsum inflato-clavatus, sursum attenuatus, 2—4 unc. longus, 3—5 lin. crassus, saepe tortus, undulatus, glaber, siccus argenteo-lividus. Pileus leviter tarnosus, e campanulato

expansus, obtuse umbonatus, 2—3 unc. latus, glaber, demum rimosB incisus, B fusco lividus, margins meinbranaceo, striato. Lamellte primum adnexae, dein emarginato-liberise, lat^e, confertse, ventricosre, eroste, subundulatte, grisege, juniores pallidiores, non pulverulBntaj-

Species admodum distincta, pilei ma-r-gine primitus recto a typicis Entolomatibus recedens.

Tat. 93. f. 2 al *Agaricm turbidwm* pertinet.

DDXXXVIII. ARARIDUS NIDDEDSUS Fr.

Epicr. ed. 2. p. 196. Monogr. I. p. 278.

Diagn. Entoloma pileo carnosomembranaceo, e convexo expanse, subdepresso, glabrD, hygrophanD, sicco sericeo-nitente; stipite farcto, aijuali, glabrD, albo-pallescens, apice albopruinoso; lamellis emarginato-liberis, latis, subdistantibus, pallido-incarnatis.

In nemoribus frondosis circa Upsaliam pluries lectus; etiam in Anglia, Gallia,

Descr. Odor fortis alcalinus, interdum vero obsoletus. Stipes fere solidus, 2—3 unc. longus; 1—2 lin. crassus, om-

nino a3ijualis, lrcvis, glaber, albopallescens, apice albopruinosus. Pileus submembranaceus, e laminis duabus tenuibus compaginatus, scissilis, e convexo planus demumque saepe concavus et difformis, 3 unc. usque latus, rimosus, fragillimus, omnino glaber, udus cervino-cinereus, siccus lividus, sericeo-nitens. Lamin ellsc 3 lin. et ultra latse, fragiles, interdum undulato-flexuosae.

Tab. 94. f. 3 sistit *Agarici nidrosi* formam.

CCXXXIX. ARARIDUS SPECULUM Fr.

Epicr. ed. I. p. 145. Monogr. I. p. 278.

Diagn. Entoloma e pallido candicans, pileo carnosomembranaceo, e convexo expanso, glaberrimD, hygrophano, sicco splendente, margine infractD, striato; stipite fistuloso, ^equali, fragillimDj striato; lamellis emarginatis, ventricosis, distantibus, ^albo-carneis.

Inter gramina pinguia; etiam locis ramentis ligneis sterco-rata.

Descr. Species variabilis, sed colore sicci cundicante splen-dente mox distincta, inodora, stepe caispitosa. Stipes fistulosus, 2—3 unc. longus, 2 Jin. circiter crassus, glaber, junior teres, demum saepe compressus, nitens. Pileus fere membranaceus, e niembranis duabus scissilibus compaginatus, primo convexus,

mox planus et demum depressus, 1—2 unc. latus, cliscD saepe obtuse umbonatD, glaberrimus, udus aquose l. stramineo-albus, siccus argenteus absque facie sericea. MargD tenuis, infractus, ssepe flexuosus, pellucido-striatus. Lamelhe leviter adnexae, emarginatae, 2—4 lin. lata?, breviores angustiores.

Duplicem legimus formam. Primaria subcaespitosa, tenuior, pileo repando, obtuso, quam *Batt. t. 20. f. 1). E. bene refert*; altera solitaria, iirmior, pileo regulari, circa umbonein obtusum depresso. Hanc sistit icon nostra.

Tab. 95. f. 2 *Agarici Speculi* formam major em aliumbrat.

In musED Holmiensi insuper servantur icones *Agarici Placmve, dodis, Bat-suhiani, clypzati, rhodopolii.*

XIII. DLITDPILUS! LamBllaB decuiTentBS, reliqua EntDlomatum.

DDXL. AGAKICUS PSEUDO-OEDELLA Fr.

Munogr. II. p. 296. Epicr. ed. 2. p. 198.

Diagn. Dlitopilus pileoD carnosD, e convexD explanato depressove, laevi, fuscescente, sed sericeo-canescente; stipite solido, curto, tequali, extus intusque fusco-cinereo; lamellis decurrentibus, latis, distantibus, albidis.

In collibus apricis, sterilibus autumno seriore lectus ad Upsaliam.

Descr. Odor vix notabilis. Stipes carnosus, solidus, firmus, 1—1 unc. longus, 2—3 lin. crassus, aequalis, extus intusque pallide fusco-cinerascens. Pileus carnosus, e convexo

explanatus, demum subdepressus, 1[^]—2 unc. latus, firmus, interdum leviter repandus, laevis, fuscescens, sed micDre seriⁿ cello obducto canescens. Lamella vere decurrentes, distanteS, tenues, cinerascenti-albae. Daro firma, sordide alba.

* Medius inter A. *Orcellam* et *popinalem*, sed odore obsDls^{sh} pileo micore canescente, lamellis distantibus facile distinct!!*

Tab. 96. f. 2 ai *Agari_{cum} Psmdo-vrcdlam* citania,

DOXLI. AGAKIDUS PDPINALIS * FIRMATUS Fr.

Diagn. Dlitopilus pileo carnosus, compacto, inaequali, subrepando, glabro, extus intusque umbrino; stipite solido, aequali, nudo, concolore; lamellis longe decurrentibus, confertis, obscure

Forma typica A. *popmahs* in Scamte pratīs vulgans; ab hac insigniter differt subspecies *firmata*, hoc loco oblata, nuperius circa Upsaliam lecta.

Descr. Odor fortis, gratus farinse recentis. Totus fungus extus intusque umbrino-fuscus. Stipes solidus, 1—2 unc. longus, 2—4 lin. crassus, a^{ua}Us, interdum curvato-adscendens,

glaber, pileo concolor 1. pallidior. Pileus compacte carnosus, firmus, convexus, saepe laevis, glaber, opacus, passim guttato-maculatus, non hygrophanus. Lamellae lanceolatae tenues, vereDB^{ertM}, aris²²

Agancus popirriis typicus a subspecie *firmata* differt tenui, subcarnosD, flaccido, stipite farcto et colore cinereo; speciem iistinctam facile censes, sed odor et omnes qualitates communes nee desunt formae mediae.

Tab. 96. f. 1 sistit *Agarid_{popinalis}*, sub^{apci}Bm *firmatam*.

DDXLII. ARARIDUS UNDATUS Fr.

^N Epicr. sd. I. p. 149. Monogr. I. p. 281. Berkl. et Brom. n. 1000.

A. him solus Sscr. n. 606.

Diagn. Clitopilus pileo subcamDSD, profunds umbilicatD, undulato, fuligineo-cinereo, expallente, sicco sericello, opaco; stipite e farcto cavo, brevi, concolore; lamellis longe decurrentibus, tenuibus, obscure cinereis, sporis rubiginosis.

In clivis graminosis, ad viaruin latera baud infrequijins, jam restate.

Descr. Praecedentibus longe minor et tenuior, inodorus. Stipes totus fibrosus nee cartilagineus, vix uncialis, saepe brevissimus, 1. raro 2 lin. crassus, fragilis, inaequalis, passim com-

pressus, basi subattenuatus, albo-villosus. Pileus profunde umbilicatus, interdum undulatus, 1[^] unc. circiter latus, grophanus) et siccitate sericellus, mellaebaud confertse, distinctae, 2 lin. latae, integerrimae.

Species distinctissima, sporis rubiginosis a reliquis Clitopilis ad *Claudopodes* recedens.

Tab. 95. f. 4 *Agarivum dn* ^{un...tum} proponit.

DDXLIII. AGARIDUS DANORINUS Fr.

Epicr. ed. I. p. 150. Monogr. I. p. 281.

Diagn. Clitopilus pileo submembranaceo, convexo, umbilicato, demum expanse, ltevi, flocculoso, dilute incarnato-albo, expallente subalutaceo; stipite e farcto fistuloso, tenaci, curto, glabro, albo; lamellis decurrentibus, distantibus, ex albo incarnatis.

Locis graminosis, pinguibus et ad latera viarum; lectus in Suecia, Anglia, Gallia.

Descr. Parva, pulchella, inodora species. Stipes junior farctus, adultus fistulosus, uncialis, 1—2 lin. crassus, seijualis 1. minorum sursuni incrassatus nunc rectus, nunc adscendens,

interdum coinpressus, albus, basi villo albo terrain conglobante. Pileus uncialis, tenuis, submembranaceus, primo convexus, margine involuto, dein planiusculus, umbilicatus, difformis demumque rimoso-diffractus, exstrius, flocculoso-ltevigatus, e dilute incarnato-albo expallens alutaceo-albus, non hygrophanus. Daro haud scissilis, alba, ad lamellas hyalina. Lamellae decurrentes, distantes, distinctae, crassiusculae, postice latiores, 1[^] lin. late, juniores arcuatae, in pileo explanato rectae.

Tal. 95. f. 4 *Agaricum canwinum* illustrat.

ODXLIV. AGARIDUS ANHUSTUS Pers.

Pers. Syn. p. 345. Syst. Myc. I. p. 195. Monogr. I. p. 282.

Diagn. Clitopilus pileo subcarnoso, convexo-plano, subumbonato, glabro, caesio-cinereo, hygrophano, sicco sericeo-nitente; stipite e farcto cavp, glabrD, albp, basi incurvo villosus; lamellis adnatD-decurrentibus, confertis, ex albo incarnatis.

Ad terrain, inter folia dejecta putrescentia raro. Lectus in Suecia, Sermania, Helvetia.

Descr. Inodorus. Stipes junior farctus, senilis cavus, 2—3 unc. longus, 3 lin. crassus, aequalis 1. sursum leviter attenuatus, ^{caevis} glaber, albus, basi incurva villosa 1. hirta. Pileus tenuis,

e convexo planus, umbone minuto evanescente, 1—2 unc. latus, hygrophanus, udus caesio- 1. livido-cinereus, siccus expallens, sericeo-nitens. Lamellae leviter decurrentes, 1 lin. 1. parum ultra latee, confertae, priurn albae, dein incarnatae.

Vegetandi mo do et coloribus accedit ad *A. hydrogrammum* et *rIbodopolium*, sed notis datis clare distinctus.

Tat. 9B. f. 3 ad *Agaricum angustum* referenda.

In Musteo HDlmiensi insuper servantur icones *Agarici Prunuli, Orcdlte, vilis.*

XIV. LEPTDNIA. Ehodospori, Stipes cartilagineus. Pilei margo incurvus. Lamellae adnexae.

DDXLV. A&AEIDUS PLADIDUS Fr.

Epicr. ed. 2 p. 201.

Diagn. Leptonia pileo campsulD, e campanulato convexo, exstrio, fibrilloso-sijumoso, typice griseo caerulescents, disco villosus obscuriore; stipite farcto, glabrD, atro-cyaneo, apice albo-pruinoso et (sub lente) nigro-punctato; lamellis adnaxis, latis, albidis.

Ad et juxta truncos Fagi; in Suecia media lectus in Betula pileo contigue villosus, ca^ruleo.

Dzscr. Stipes cartilagineus, farctus, demum sursum subcavus, 2—3 unc. longus, lineam crassus, sequalis, admodum

rigidus, glaber, sed apice albo-pruinosis et sub lente nigro-punctatus, obscure caeruleus. Pileus carnDSo-inembranaceus, uncialis 1. parum ultra; reliqua ut supra. Dolor pilei variabilis, normaliter griseus, in violaceum vergens vel albidus, squamis obscurioribus. Lamellae postice latissimae, sed tantum adnexae, confertae, planae, albiae, acie concolore.

Tab. 97. f. 1 ad *Agaricum placidum* pertinet, sed CDID^l pilei haud sDlitus. Cf. descriptiDnem.

CDXLVI. ARARIDUS LAPPULA Fr.

Epicr. ed. 2. p. 202. Monogr. I. p. 285.

Diagn. Leptonia pileo carnosulo, e convexo piano, umbilicato, exstrio, griseo; fibrillis brvibus erectis in umbilico obscuriore stipatis muricato-punctato; stipite fistuloso, striatulo, lilacino-fusco, apice nigropunctato; lamellis adnatis, latis, confertis, ex albido rosellis.

Inter folia decidua in fagetis serotinus, haud frequens. Lectus in Suecia, Anglia, Erallia.

Descr. Inodorus. Stipes admodum fistulosus, 1[^]—2 unc. longus, 1—2 lin. crassus, aequalis, sat tenax, sub lente striatus et superne nigrD-punctatus, fusco-lilacinus 1. obscure purpureus,

basi albo-villosus. Pileus leviter carnosus, hemisphaeticus, dein planiusculus, \ — \ unc. latus, primitus flocculoso-mollis/adultus fibrillis erectis umbilicum versus stipatis, nigrescentibus muricellatus, quare discus obscurior pileusque griseus, nigrD-punctatus apparet. Lamella primum adnatai cum denticulo de currente, adultas affinium more secedentes, plante, latissimae (fere ovatae), confertae, distinctae, albogriseae.

Tab. 97. f. 2 Agariri Lappula* pukhram formam iepin[^]t.

DDXLVII. A&ARIDUS IETHIDPS (Scop.) Fr.

Epicr. ed. I. p. 152. Monogr. I. p. 286.

Diagn. Leptonia pileo carnosulo, plano-depresso, exstrio, nitido, e nigro fuligineo, glabro vel innato-fibrilloso-virgato; stipite subfarcto fistuloso, tenui, glabro, fusco-nigricante, sursum nigro-punctato; lamellis adnatis, albidis, acie concoloribus.

Locis graminosis apricis, stepe in societate A. serrilati, frequens sed parcius obvius.

Descr. Stipes medulla farctus, dein fistulosus, li—2 unc. longus, vix lin. eam crassus, gracilis, glaber, fusco-nigricans, sursum punctis nigris scaber. Pileus leviter carnosus, plano-depressus sed non umbilicatus, \—1 unc. latus, fibrillDSD-virgatus,

glaber tamen, B nigro fuligineus, junior exsiccatus nitenti-nig* non hygrophanus. Lamella adnatae, sed secedentes, nunc [^] arBS, nunc vprtricow. Proximus Ag. serrulato, sed differt umbilici defectu, Wills numquam cyanescentibus, aciB con[^]loribus.

Synonyma dubia. A. Mops Scop. Ann. Hist. Nat. I[^] p. H7 plunims notis convenit. A. Nigrdla Pers. hue ducerB* nisi lamdIB d.currentes. HaC nota fretus ad A. atridem du # WEINMANN.

Tab. 97. f. 3 Agarici xthiopis fBm^{am} Tenn. rem sistit.

DDXLVIII. A&ARIDUS AQUILUS Fr.

Byst. Myc. I. p. 209. Epicr. ed. I. p. 154. Mvnoqr. I. p. 288.

Diagn. Leptonia pileo submembranaceo, convexo-piano, umbilicatD, striatulo, subvirgato, spadiceo; stipite farcto, brevi, subfibrilloso, epunctato, fusco, sursum incrassato; lamellis sihuato-adnexis, latissimis, subdistantibus, ex umbrino purpurascenscentibus.

Locis udis ad lacuum litora plurimis locis nuperius lectus in Suecia.

Descr. Species admodum a reliquis recedens. Stipes farctus, interdum apice cavus, uncialis, deorsum leviter attenuatus, lineam crassus, obsolete fibrillosus, fuscescens, absque punctis ni-

gnis. Pileus t^M, B convexo planus, profunde m U I i [^], - 1 unc. latus, nunc glab^{Br} virgatus) nunc adpresse suant[^] losus, stnatulus spadiceus 1. fusco-umbrinus. Lamelli [^] funde sinuato-adnexEe, ob lati+nrl[^] distantes, distmetae, quatern[^] latitudmem insignem convexte, sub^h seentes, acie cDncolore inf[^] gerrima. Lamelle ob sinum pr[^] fundum saepe subcordat[^] ix wiiuu huj[^] societate legitur f m nor Ag. [^] JaCUS. Bolmen in [^] formae i

Tab. 98. f. 3 est Agaricus aquilus.

DDIL. AGARICUS FDEMDSUS Fr.

Syst. Myc. I. p. 208. Epicr. ed. I. p. 154. Monogr. I. p. 289. Seer. n. 616. A. suavis Lasch n. 2 85.

Diagn. Leptonia pileo submembranaceo, convexo-plano, subumbilicato, striatulo, luteo-cerinD, fibrillis adpressis, squamulosis, fuseescentibus adperso; stipite e farcto fistuloso, glabro, nitido, luteo; lamellis adnatis, subdistantibus, flavo-pallidis.

In silvis, praecipue pinetis, inter muscos rarus, sed lectus in Suecia, Germania, Helvetia.

Descr. Stipes cartilagineus, subfistulosus, sed floccis mollibus, albis primo farctus, 2 unc. longus, lineam vix crassus, **aequalis**, glaber, luteus. Pileus tenuis, tenacellus, e convexD

planus, leviter umbilicatus, unciam latus, striatns₇ luteo-cerinus₇ stjuamulis fibrillisve* fusees centibus 1. fuligine quasi adpersus. Lamellae adnatae, dente decurrentes, subdistantes₇ flavD-pallidse, dein sporis incarnatae, acie integerrima concolore.

Species elegans, sequentibus admodum affinis₇ sed colore laeto facile distinctus. Variat tamen stipes, licet rarius, fuscescens et casrulescens.

Tab. 98. f. 1 *Agaricium formumum* refert.

DCL. AGARIDUS CHLOROPDLIUS Fr.

Monogr. II. p. 297. Epicr. ed. 2. p. 205.

Diagn. Leptonia pileo membranaceo, e convexo explanato, striato, livido, centro nigro-squamuloso; stipite fistulosD, gracili, l^{vi}, glabro, caesio-virente; lamellis adnatis, lineariblisj pallidis.

Locis graminosis silvarum; in Uplandia Suepise hactenus lectus.

Obs. ColDribus *A. exili* similis, cui hinc in Epicr. ed. I. subjunctus, sed notis gravioribus differt, nempe statura et forma *Ag. formosi*, a q^{LD} colore dignoscitur. -Stipes firmulus, rigi-

us, 2—3 unc. longus, lineam crassus. Pileus uncialis, disco excepto glaber, margine primo incurvo. Lamellse 2 lin. late, acie concolore. Relitjua ut supra.

Plurimis rationibus convenit cum *Ag. asprello*, ut ejus varietatein censerem, nisi habitus insigniter differret nee ullos viderim transitus, licet utrumijue copiose legerim.

Tab. 98. f. 2 *Agaricum chloropDlium* aiunbrat.

DDL. AGARIDUS SDABROSUS Fr.

Epicr. ed. I. p. 154. Monogr. I. p. 299.

Diagn. Leptonia pileo submembranaceo, e convexo explanato, primitus umbilicato, exstrio, squamuloso, fuligineD-fuscus, hygrophano; stipite farcto, apice nigro-punctato et albo-farinoso-, lamellis adnatis, ventricosis, subdistantibus, griseis.

Locis graminosis in silvis circa Holmuim et Upsaliam pluries lectus.

Descr. Prsecedentibus firmior omnibusque partibus exitlie distinctus. Stipes cartilagineus, farctus, demuin fistulosus, firmulis, 2—3 unc. longus, ultra lineam crassus, ojjacus, fuligineo-nigrescens 1. chalybseus, aprice punctisnigris scaber simulque

albo-farinaceus, ceterum lsevis, glaber. Pileus cum priorum comparatus leviter carnosulus, primitus convexo-umbilicatus et squainulosus, 1—2 unc. latus, udus fuligineo-fuscus, baud striatus, siccus expallens, fuligineo-griseus. Lamellae adnatae, planae, segmentum circuli referentes, subdistantes, distinctse, grisee, acie concolore.

Tab. 97. f. 4 ad *Agaricum scabrosum* pertinBt.
In Musaeo Academic SciBntiamm insuper servantur icones *Agarid lampropodis, serrulati, lazulini, incani, asprdli.*

XV. Noi ANEA. Rhoci Dspori. Stipes cartilagineus. Pilei campanulati margo rectus.

DDLIL AGARIDUS VERSATILIS Fr.

Monogr. II. p. 297. Epicr. ed. 2. p. 206.

Diagn. Nolanea pileo submembranaceo, e convexo explanato, glabro, laevi, nitido, aërugineo-livido, "siccò fuscéscente; stipite fistuloso, glabro, griseo-albo, siccb argenteD nitido; lamellis leviter adnexis, ventricosis, distantibus, gri&eis.

Locis nemorosis in terra nuda. Legi in horto botanico Upsaliensi. "

Descr. Dolore tarn udi, quam sicci intense metallico insignis. Stipes fistulosus, rigidus, strictus, H—2 Unc. IDngUS,

lineam et ultra crassus, aequalis, laevis, glaber, nudus, griseo albidus, siccus argenteus, splendens. Pileus submembranaceus e convexo explanatus, obtusus 1. obsolete umbonatus, 1^o glaber, i—1 unc. latus, udus serugineo (?)-lividus (color P⁸ culjaris, asgre indicandus), siccus fuscéscentis, nitidus. Lamellis leviter adnexae, firmae, valde ventricosae, distantes, griseae, s^o 1^{ete} rubentes.

Tab. 98. f. 5 A. *vertilis* prabet inagiii Biii.

DCLIL AEJAEIDUS NISRIPES Tidg.

Trog in Flora 1834. p. 527. Fr. Monogr. I. p. 295. Epicr. ed. 2. p. 207.

Diagn. Nolanea pileo submembranaceo, campanulato, obtuso, exstrio, primitus floccis fugacibus tecto, dein nudo, fusco; stipite fistuloso, torto, glabro, nigro; lamellis subliberibus, ventricosis, luteo-incarnatis.

Locis paludosis Helvetiae, Sueciae (Vestrogothiae) Norvegiae (Dhristiania).

Descr. Craveolens. Stipes fistulosus, 3—5 unc. ustjue longus, 1—2 lin. crassus, aequalis, rigidus, tortus, subflexuosus, glaber, niger. Pileus submembranaceus, sat tenax, e conico campanulatus, obtusus, luteus, glaber, sed junior flocculis lute-

scentibus fugacibus conspersus 1/1 unc. latus. Lamellae ex adnexo liberae, ascendentes, tenues, subconfertae, late, e luteo incarnatae.

Ddore forti, foetido, fere piscis putridi facile dignus et ad Ag. *pistiodorum* Desat. et A. *picum* Kalchbr. proxime accedit. Illis praeter alias notas differt colore fulvo-cinnamomeo; hie statura curta, pileo papillato, stipite pruinoso, lamellis emarginatis cum dente decurrente, roseis.

Tab. 99. f. 1 sistit fungum aMum, p^{ico} denudato

DDLIV. A&AEIDUS JUNDEUS Fr.

Epicr. ed. 2. p. 207. Bsrkl. et Broom, n. 1116.

Diagn. Nolanea pileo membranaceo, e conico expanso, radiato-striato, papillato, subcuspidato (in forma typica subumbilicato), umbrino-fuligineo; stipite fistuloso, elongato, gracili, fusco; lamellis adnexo-secedentibus, obovatis, subdistantibus, e griseo-roseis.

Locis paludosis inter Sphagna, Lectus in Suecia, Anglia.

Descr. fragilis, inodorus. Stipes cartilagineus, instulosus, gracilis, 3 unc. longus, lineam vix crassus, aequalis, laevis, glaber, fuscus 1. niger, demum livido-fuscus. Pileus omnino membranaceus, e conico campanulatus, cuspidatus, haud unci-

alis, striatus, hygrophanus, sole arripit. Lamellae ascendentes, adnatae, secedentes, subsistentes, e griseo-roseae.

Singularis duplici pilei forma, habet, idata, hie ra umbrilicatae quae tamen pro dimiscuib nascuntur. Similia offerunt A. *campandla*, *fibula* Vw+ + r. *ijxstat* ijuoque tertia forina mellis e cinereo-iusco purpurascens.

Tab. 99. f. 2 prabet formam cuspidatam Agarici juncei.

DDLV. A&ARIDUS MAMMDSUS (L.?) Fr.

Monogr. I. p. 293. Epicr. ed. 2. p. 207.

Diagn. Nolanea pileo submembranaceo, conico-campanulato, papillato, striato, glabro, fusco, sicco isabellino, sericeo; stipite fistuloso, rigido, polito, glabro; lamellis adfixis, sessilibus, e griseo roseis.

Locis apricis, siccis haud raro. Forma tenuis hoc loco depicta lecta Upsaliae.

Obs. Forma typica major bene cognita et inter formas *Agarici S&ricei* Bull. t. 52 5 picta. HDC IOCD offero formam

triplo minorem et tenuiorem, quae statura ita recedit, ut facile pro distincta haberes, sed ceterum nullo caractere recedit, nisi stipite apice obsolete pruinoso.

Agaricus mammosus Linn, est anceps species. Ad hunc retuli, quum characteres non obstant.

Tab. 98. f. 4 sistit *Agaricus mammosus* formam tenuiorem.

DDLVI. AEJARICUS VINADEUS Fr.

Monogr. I. p. 295. Epicr. ed. 2. p. 208 nee obstat Scop. Cam. II. p. 444.

Diagn. Nolanea pileo membranaceo, campanulato-convexo, obtuso, striatulo, nitidulo, rufescente; stipite fistuloso, laevi, glabro, flavido; lamellis adnatis emarginatisve, distantibus, tenuibus, albo-incarnatis.

Inter muscos in silvis locis humidiusculis rarior.

Descr. Stipes fistulosus, subtenax, 2 unc. et ultra longus, lineam crassus, aequalis, laevis, glaber, flavidus. Pileus mem-

branaceus, fragilis, campanulato-convexus, obtusus, 1—2 unc. et ultra latus, striatulus, nitidulus, obscure rufescens, in nostro glaber siccus forte furfuraceus). Lamellae ut supra.

Descriptio Scopoli cum nostro fungo bene convenit excepto pileo furfuraceo.

Tab. 99. f. 3 ad *Agaricus vinactum* pertinet.

• DDLVIL ARARIDUS IDTERINUS Fr.

Syst. Myz. I. p. 207. Monogr. I. p. 296. Epicr. ed. 2. p. 209.

Diagn. Nolanea pileo submembranaceo campanulato-convexo, striatulo, subpapillato, flavo l. virescente, hygrophano; stipite subfarcto, brevi, rigido, flocculoso, farinaceo; lamellis adfixis liberisve, distantibus, ventricosis, pallidis.

Ad terram tarn in silvis frondosis quam areis hortorum Suebiae freijuens; in Anglia legit WORTH. SMITH.

Descr. Species distinctissima, licet admodum versiformis colore varians. Stipes farctus, rigidus, 1—2 unc. longus, lineam crassus (interdum vero compressus latior), nunc totus, nunc apice albo-farinaceus; pileo concolor, rarius fuscus. Pileus submembranaceus, firmulus, e campanulato-convexo, im-

mo totus reflexus, sed numquam umbilicatus, typice papillatus, 1—1 unc. latus et ultra, pellucido-striatus, glaber, hygrophanus; luxurians in humo hortorum undulatus et versiformis. Lamellae adnexae, secedentes, ventricosae, distantes, pallidae, in fungo putrescente saepe crocae; ceterum in solo culto nunc liberae, nunc monstrose decurrentes, distinctae et venis connexae, immo crispatae et anastomosantes.

Color quoque admodum varius, typicus est flavo-melleus, sed saepius flavovirens; stipitis et papillae pilei saepe fuscus.

Tab. 99. f. 4 *Agaricus icterinus* refert.

DDLVIII. AGAKICUS INFULA Fr.

Epicr. ed. I. p. 158. Monogr. I. p. 297.

Diagn. Nolanea tenacissima, pileo membranaceo, e conico expanso, papillato, levi, nitido, hygrophano; stipite subfistuloso, rigido, glabro, fusco; lamellis tenuibus, angustis, confertissimis, e can dido roseis.

In silvaticis ad terrain locis graminDsis vel adustis, suis locis quotannis redux.

Descr. Iridorus, nunc pusillus, stipite filiformi, unciali, nunc major et firmior, 3 unc. usque altus. Stipes semper eximie cartilagineus, tenacissimus, politus, nudus, glaber, pileo concolor; variat levis et striatulus. Pileus niembranaceus, lentus, e conico campanulatus, majorum ssepe difformis, centro demum

depressus, i — U unc. latus, exstrius, glaber, humidus ^ vino-fuscus 1. fuliginus, siccus isabellino-lividus, in utroq^{lie} statu nitidus. Lamellae ut supra, ob pilei formam inserti^{ie} variae, typice adnexae et secedenti-liber*. Exstat var. *versify mis* pileo e convexo depresso, immo infundibuliformi sed p^{bl} sistenter papillato, densissime striatulo, sicco sericeo-nitente-

Statura et magnitudine admodum varius, sed tenacitate-
facie p^{lie} nitida et lamellarum candore a vicinis optime^{dl} stinctus. *A. mdm*, cujus affinitas dubia, cum *A. Infula* p^{dl} simum coiff^{arandus}.

Tab. 100. f 1. **prabet** figuram *Agarici Infule*.

D DLIX. A&ARI DUB VEREOUNDUS Fr.

Epicr. ed. I. p. 158. Monogr. I. p. 298.

Diagn. Nolanea pileo submembranaceo, campanulato-con-
vexD, disco carnosulo, subumbonatD, aijuose rubello, margin em
versus striatulo, flocculoso; stipite fistulosD, firmulo, pallescente,
apice farinaceo; lamellis adnatis, distantibus, ventricosis, albidis.

In clivis graminosis ad terrain catervatim nascens in Sue-
cia, Anglia.

Descr. Stipes fistulosus, cartilagineus, rigidulus/sed mace-
ratus in fibrillas fissilis, li — 2 unc. longus, 1—2 lin. crassus.
Pileus submembranaceus, disco carnosulo, -priniD subumbonatus,
dein obtusiusculus, numquam depressus, humidus ad medium

obsolete pellucido-striatus, primo obtutu glaber, sed accurate
inspectus marginem floccubsum versus obsolete sericeus, aiju^{*8}
rubellus, sed admodum pallidus nee siccitate colore mutatu^{*}.
Lamella secedentes, crassiuscul[^], distinct*, segmentoide*, 2 lin[^]
et ultra late, aijscendenti-plan*, aquos^{^e}.

Species distinctissima, cum nulla alia hujus gregis ^
paranda. Analogiam pr[^]bet cum *Ag. (Uollybia)' fbridulo*, **d
sporis laete roseis abunde distincta.

Tab. 99. f. 5 eat ima^o *Agarici verwundi*.

DDLX. A&ARIDUS UOELESTINUS Fr.

Epicr. ed. I. p. 158. Monogr. I. p. 298.

Diagn. Nolanea pileD membranaceo, campanulato, obtuso,
striatulo, glabro, c[^]eruleo, centro obscuriore, scabello; stipite
fistuloso, laevi, glabro, atro-cyaneo, apice pruinato; lamellis ad-
natis, latiesiinis, subconfertis, albidis.

In Smolandia legi ad truncDS vetustos Quercus, Upsaliaj
in silva abiegna. In Anglia: BERKELEY!

Descr. Solitarius, inodoris. Stipes mox fistulosus, H unc.
longus, lineam vix crassus, sursum attenuatus, apice albo-pru-
inosus, ceterum laevis, glaber, atrocgeruleus. Pileus tennis, cam-

panulatus, demum convexus, obtusus, virgatus, disco scabrido
nigricante, obscure -ruleus, non hygrophanus. Lamella ^
nat*, ventncDw, latissim., caBo-alb., acie concolore. Spor* **
lute rose*. Forma in silva abiegna ^ ^ ^ ^ ^

A rdiquis solan^{eis} distinctissima est, sed colors M****
ad Leptomas aecedit; cum nulla vero ex his conjung[^] p[^]
et statura omnino Nolanete.

la 3. 10D. f. 2 *Agaric codzstinum* (f^{Bramm} ab^{istinam}) alumbrat.

XVI. ECDELIA Rhodospori. Stipess cartilagineiis. Pileus submembranaceus, primitus imbilidatus, infundibuliformis, margins primum incurvo. Lamellae vere decurrentes.

DDLXI. A&ARIDUS PDLITUS Pers.

Pvrs. Syn. p. 465. Syst. Myc. I. p. 209. Monogr. I. p. 299.

Diagn. Eccilia pileo submembranaceo, umbilicato, glabro, livido, hygrophano, sicca nitente, margine striato; stipite fistuloso, sequali, polito, apice subpruinoso; lamellis decurrentibus, confertis, ex albido incarnatis.

Forma typica in paludosis sat frequens inodora, locis siccioribus in fagetis odora, stipite brevior.

Descr. Gregarius, fragilis, coloribus et structura ad *A. rliodopolmm* accedens. Stipes cartilagineus, fistulosus, 2—3 unc. longus, locis siccioribus brevior, 2 lin. crassus, sequalis, teres, politus, glaber, lividus, saepe apice albo-pruinosis. Pileus sub-

membranaceus, e convexo expansus, jprofunde umbilicatus demum tunc subinde infundibuliformis, absque umbone, 1—1¹ unc. latus, glaber, hygrophanus, humidus obscure lividus, margine striatus, siccus laevis, expallens, nunc in sole nitens, nunc opacus. Lamella decurrentes, confertae, medio ultra 2 lin. latte, ex albido incarnatae.

Proximus *A. apiculahis* minor, tenax, umbone persistente distinctus.

Tab. 100. f. 3 *Agaricum politum* spectat.

DDLXII. AGARIDUS &EISED-RUBELLUS Lasch.

Lasch in Linn. V. n. 566. Fr. Monogr. II. p. 298. Epicr. ed. 2. p. 212.

Diagn. Eccilia pileo membranaceo, profunde umbilicato, demum piano, striato, hygrophano, ex umbrino cano; stipite fistuloso, glabro, pallidior; lamellis leviter decurrentibus, subdistantibus, e pallido carneis.

In pinetis ad terrain in Germania et nuperius variis Suecici locis copiose lectus.

Descr. Gregarius, inodorus. Stipes fistulosus, 2 unc. longus, lineam crassus, aequalis, levis, glaber, subnudus, pileo concolor 1. paullo dilutior. Pileus membranaceus, profunde

umbilicatus, ambitu primo convexus, dein planus, uncialis 1. parum ultra, striatus, hygrophanus, udus umbrinus 1. fuscus, si eus griseus. Lamellae ut supra.

Specimina in Dstrogothia lecta paullo minora et dilutiora, stipite unciali et tenuiore, lamellis ex albo incarnatis.

Dubia forma in *Monogr. I. p. 301* descripta ad hanc speciem vix pertinet et dubia manet.

Tab. 100. f. 4 sistit *Agarici griseorubelli* formam typicam.

DDLXIII. ARAEIDUS PARHENSIS Fr.

Fr. Monogr. I. p. 301. Epicr. ed. 2. p. 211.

Diagn. Eccilia minor, pileo membranaceo, e convexo piano, profunde umbilicatus, glabro, fuscus, ad medium striatulo; stipite fistuloso, brevi, glabro, concolore; lamellis decurrentibus, confertis, linearibus, ex albido carneis.

In silvis locis graminosis, ad vias primario lectus Upsaliae, dein in Anglia et Fennia.

Descr. Species pumila. Stipes cartilagineus, fistulosus, vix uncialis nee lineam crassus, deorsum attenuatus, glaber, epunc-

tatus, fuscus. Pileus membranaceus, piano-convexus, profunde umbilicatus, glaberrimus, vix uncialis, ad medium striatus, udus fuscus, siccus nigricans et nullo inodo hygrophanus. Lamellae lineam fere latae; ceterum ut supra.

Cum nulla alia specie facile comparandus. Pileo siccitate non expallente a vicinis mox distinguitur.

Tab. 100. f. 5 *Agarici parkmsis* signa.

DDLXIV. AGARICUS RHODOUYLIX Lasch.

Lasch in Linn. V. n. 567. Fr. Munogr. I. p. 301. Epicr. ed. 2. p. 213.

Diagn. Eccilia pumila, pilso membranaceo, umbilicato-infundibuliformi, udo remote striato, subfuscD, sicco flocculoso, griseo; stipite farcto, sursum incrassato, tenaci, glabro, cinerso; lamellis longe decurrentibus, valde distantibus, BX albido carneis.

Ad truncos varios, JmEcipuB alneos, in Germania, Suecia, Anglia.

Descr. Species eximia, distmctissima. stipes cartilagmBUS, tenax, msdulla molliore farctus, unciam Bt infra longus, \ lin.

crassus, sursum incrassatus, glabBr, cinereus. Pileus lneimbrnaceus, profunds umbilicatus VBI potius infundibuliformis, liiaTgins rBflsxo, \ unc. modo latus, hygrophanus, uduo reimoestriatus, subfuscus, si ecus floe culosus, grisBUS 1. albescens. ^mellae latae. P^UCEE, alternataB breviores; reliqua ut supra.

Insignem analogiam cum Ag. uinbdlifero offsr, sed sp»^rosBis mox distinctus.

Tab. IDD> f. 5 ima&0 Agarici rhodacyUclBm

POSTSCRIPTUM.

DeciniD IIDC fasciculo volumen primum Iconum Hymenomycetum absDlutum. Num ulterius hoc opus continuetur, B publici favores pendet. Maxime necessarias censeo icones nobilium Dortinariorum, quorum perpauca rite delineati exstant. Icones et descriptiones parat^ sunt, ut etxam me mDrtuo opus possit absDlv.

icones iare nDnnullarum sPECIBrum antea d_Bbnca-arum, ^uarum ICONES date incomplets et a meis recedentes. Distinctarum specierum hac-tenus c o n W u m u t r a m , u e d . l i n e . r e n E C B S s e e r a t .

Corrieencla

Pag. 77 lin. ultima loco t. 72. f. 3 l e g e t . 7 9 . f . 2 .

AiaBnia.

Pag. 53. Agaricus ingratusF?. Ban. t.22Mf 1 (^ j n s t e r v i a)

Pag. ID2. ENTOLDMA. Lamella postice sinuate.

Pag. ID7 omissum:

CCXXXVII bis. A&ABIDUS MAJALIS Fr.

Syst. Myc. I. p. 205. Berk. et Br. n. 998.

Diagn. Entoloma pileD camDSo-membranacBo, campanulato-convexo, umbonatD, lasvi, glabro, hygrophano, margine Bxplanato rspando; stipits fistuloso, torto, striatD, basi albotomentoso; lamellis subliberis, crenatis, e pallido roseis.

In silvis abiBgnis, vulgo caespitDSUs et vsrnalis.

Obs. Major, gracilis, pileo cinnamoinBD, sicco ochracBo distinctus.

Tab. 94. f. 2 Agarici majalis icon.

INDEX.

AGARIDUS

A	aprosus _____ pag. 1DD tab. B9 fig. 2.	clavipes _____ P ^a &- ^3 tsh. 47 fig. 1.	flavD-brunneus _____ P ^a g- 24 tab. 25 fig. 1.
acervatus _____ »	34 » 64)) 2.	clypeolarius _____ » 14 » 14)) 2.	fDmDSUs _____)) 1 1 1)) 98 » 1.
aricula _____ »	91 » B5 » 3.	caelestinus _____ » 114 » 100 » 2.	fucatus _____ » 22 » 24 » 2.
lethiops _____ »	11D » 97 » 3.	coft'Batus _____ » 50 » 54)) 1.	fumosus _____ » 51 » 54 » 2.
setites _____ »	89 » 81 » 5.	cohaerBns _____)) 85 » BD » 1.	
atfricatus _____ »	77 » 75 » 1.	DDllariatus _____)) 91)) 82 » 5.	^alericulatus _____ y> 86 » 80 » 2.
albus _____ »	39 » 43 » 1.	Colossus _____ » 2D » 21,22	galBrospis _____)) B6 » 79 » 1.
alcalinus _____ »	53 » 81 » 3.	CDlumbetta _____ » 25 » 29 » 2.	glacialis _____)) 71
Alméni _____ »	99 » 87 » 3.	CDmpactus _____ » 3D » 35 » 1.	gliodermus _____ » 15 » 15 » 1.
ambustus _____ »	72 » 70)) 2.	DDmitialis _____)) 43 » 47 » 2.	gracillimus _____)) 82 » 75 » 5.
amictus _____ »	90 » 82 » 3.	CDncavus _____)) 55 » 57)) 2.	grisBDcyaneus _____)) 1D5 » 94 » 1.
amicus _____ »	31 » 36 » 1.	cDnignsnus _____ » 67 » 67 » 3.	griseorubllus _____ » 115 » 100 » 4.
amplus _____ »	50 » 53	cDnstrictus _____ » 17 » IB » 1.	griseus _____ » 81 y> 7B » 1.
angustissimus _____ »	5B » 59 » 2.	coracinus _____ » 59 » 59)) 2.	
angustus _____ »	109 » 913 » 3.	corticola _____ » 94)) 85)) 2.	Hffimatopus _____ » 91 » 83 y> 1.
a^uilus _____))	no » 98 » 3.	craspedius _____ » 95 » B6)) 2.	hiemalis _____ » 94 » B5)) 1.
aquDsus _____ »	gg » BS » 2.	crusntus _____ » 92 » 83 » 2.	hirsolus _____ » 45 » 48 » 3.
ardosiacus _____ »	103 » 94 » 4.	curtipss _____ » 45 » 4B y> 5.	hispidulus _____ » 102 » 90 y> 2.
arenicola _____ »	78 » 7S » 2.	cyanophyllus _____ » BD » 77 » 1.	hispidus _____ » 13 » 14)) 1.
aridus _____ »	i2 » 12 » 2.		hydrDgranimus _____ » 73 » 71
atratus _____ »	72)) 70 » 1.	Isbilis _____)) 9D » 82 » 4.	
atrooinereus _____ »	27)) 31 » 2.	dBeastss _____ i D 49 » 52	lctBrinus _____ » 113 » 99 » 4.
atomarginatus _____ »	83)) 78 » 3.	decorus _____ » 50 » 50 » 1.	illinitus _____ » 17 » 16 » 1.
aurantius _____ »	23 » 27 » 1.	delicatus _____ y> 16 » 15)) 2.	imbricatus _____)) 25 » 3D
		denigratus _____)) 20 y> 2 0	impsrialis _____)) IB D 17
-Denzonii _____ »	84 » 79 » 2.	dstrous _____ » 74 » 73 y> 1.	inamDenus _____ » 34 » 38 » 2.
Wealis _____ »	37 » 41 » 1.	dichrous _____ » 1D5 » 92)) 3.	Infula _____ » 114)) 1DD » 1.
bulbiger _____ »	23 » 27 » 2.	dilatatus _____)) 93 » 84 » 3.	ingratus _____ » 63 » 64 » 1.
		dissilins _____ » 8B » 81 » 2.	inolsns _____)) 7D D 69 » 3,4.
C	caelatus _____ » 33 » 37 » 2.	distortus _____)) 62 » 63 » 1.	integrellus _____)) 82 » 75 J 5.
cancrinus _____ »	109 » 95 » 4.	dothioporus _____ » 45 » 4B y> 2.	ionides _____)) 35 » 40 » 1.
caniicans _____ »	49 » 51 » 3.	dumosus _____)) 73 » 72 » 1.	
capillaris _____ »	95 » 84 » 3.	Bchinipss _____)) 93 » 84 » 5.	Jubatus _____ B 104 B 92 » 1.
carneolus _____ »	35 » 40 » 3.	Bctypus _____ » 59 » 59 » 1.	junceus _____)) 112 » 99 » 2.
Darueus _____ »	36 » 40 » 2.	slaphinus _____ D IDS » 95 » 1.	jiincicola _____)) 95 » 85 » 6.
cartilagineus _____ »	28 » 33 » 1.	Blytroides _____ » 29 » 33 » 2.	
catinus _____ »	53 » 51 » 4.	Bxcilus _____ D • 88 » 81 » 1.	lacteus _____ » 85 5 79 » 3.
cerinus _____ »	34 » 39 » 1.	Bxpallens _____ » 54 » 55 » 2,3.	LiEstadii _____ » 79 » 74 » 3.
chrysophyllus _____ »	75 » 74 » 1.	excisus _____)) 4D » 44 » 2.	Lappula _____ 11D x> 97 » 2.
chloropDlius _____ »	111 » 98 » 2.	Bxsculptus _____ » 55 » 66 » 3.	laijusatus _____)) IB » 18 » 2.
circinatus _____ »	97 » 88 » 1.	extuberans _____ » 55)) 57 » 1.	Laschii _____ » 19 D 19 » 1.
cirrhatus _____ »	S7 » 68 D 1.		lascivus _____ y> 33 J 38 p 1.
citrinelhis _____ »	93 » 84 » 4.		lsnticularis _____ j> 13 » 13
ci^vilis _____ »	38 » 42 » 1.	Iarrsus _____ » 85 » 79 >) 4.	IBUcocBphalus _____ D 39 y> 43 » 2.
clavicularis _____ y>	92 J> 84 » 1.	flavo-albus _____ » 85 » 79 » 5.	leucophyllus _____ D 75 » 73 » 4.

limpidus_____pag.	99	tab.	89	fig.	3.	persicinus_____pag.	38	tab.	42	fig.	2.	senilis_____pag.	53	tab.	56	fig.	
lineatus_____»	84	»	78	»	5.	pessundatus_____»	25	»	28			sericellus_____»	106)	95	»	
lituus_____»	74	»	72	»	2.	philonotis_____»	76	»	76	»	1.	setipes_____»	81	»	75	»	
lividus_____»	102	»	90	»	3.	pictus_____»	79	»	77	»	4.	sinopicus_____»	51)	55	»	
lixivius_____»	41	»	45	»	2.	placidus_____»	109	»	97	»	1.	sistratus_____»	15	»	15	»	
loricatus_____»	31	»	35	»	2.	platyphyllus_____»	61	»	61			socialis_____»	47	»	49	»	
ludius_____»	68	»	68	»	4.	pleurotoidL's_____»	19	»	19	»	2.	sordidus_____»	41	»	45	»	
						plicatocrenatus_____»	93	»	84	»	2.	Speculum_____»	107	»	95	»	
IHacilentus_____»	65	»	66	»	1.	plicosus_____»	89	y>	81	»	4.	speireus_____»	81	»	78	»	
madidus_____»	104	»	91	»	3.	pluteoides_____»	106	y>	91	»	2.	splendens_____»	52	»	55	»	
iiiajalis_____»	110	»	94	»	2.	politus_____»	115	»	100	»	3.	spodoleucus_____»	97	»	87	»	
inammosus_____»	113)	98	»	4.	polius_____»	44	»	48	»	1.	stanneus_____»	89	»	82	»	
maurus_____»	74	J>	73	»	2.	pometi_____»	98	»	89)	1.	stans_____»	25	»	28	»	
medullatus_____»	15	»	16	»	2.	popinalis_____»	108	»	96	»	1.	stipularis_____»	95	»	35	»	
melBUcus_____»	40	»	44	»	1.	porphyrophaeus_____»	103	»	93	»	1.	strangulatus_____»	11	»	11	»	
Michelianus_____»	68	»	68	»	2.	portentosus_____»	21	»	24	5>	1.	strisepileus_____»	77	»	73	»	
miser_____»	71	»	70	»	4.	Postii_____y>	76	»	74	»	2.	striatulus_____»	101	»	89	»	
mortuDsus_____»	59	»	59	»	3.	protractus_____?»	70	»	67	y>	2.	stridulus_____»	62	»	62	»	
muscigenus_____»	68	»	63	»	3.	pruinosis_____»	55	»	57	»	3.	succineus_____»	65	»	65	»	
mutilus_____»	98	»	88	»	4.	prunuloides_____»	103	»	91	»	1.	sudus_____»	30	»	34	»	
myosurus_____»	67	»	65	»	4.	pseudo-orcella_____»	108	»	96	»	2.						
						pterigenus_____»	94	»	85	»	4.	Lesquorum_____^	71	D	70	»	
iXidorosus_____»	107	»	94	»	3.	pulmonarius_____»	08	»	87	»	2.	tigrinus_____»	37	»	41	»	
nidulans_____»	100	»	86	»	3.	putidus_____»	42	»	46	»	2.	Tintinabulum_____y,	37	y>	80	»	
nigripes_____»	112	»	99	»	1.							tornatus_____»	48	»	51	»	
nimbatus_____»	44	»	48	»	4.	fjuetii _____»	56	»	57	>>	4.	T^A_____»	54	»	51	»	
nitellinus_____»	64	»	65	»	1,2.	quinquepartitus_____»	22	»	25	»		turbidus_____»	107	»	93	»	
nitidus_____»	12	»	12	»	1.												
uubilus_____»	58	»	58	»	3.	rseborhiziis_____»	87	»	83	»	4.	Umbratilis_____»	80	»	77	»	
						rancidus_____»	69	»	69	»	1.	undatus_____»	108	»	96	»	
Obbatus_____»	55	»	57	»	1.	reclinis_____»	80	»	77	»	2.	unguent atus_____»	27	»	31	»	
offuciatu_____»	75	»	72	»	3.	reniformis_____»	99	»	89	»	3.	unguicularia_____^	100	>	89	>	
oniscus_____»	77	»	76	y>	3.	resplendens_____»	25	»	29	»	1.	ustalis_____»	24	»	26	>	
onychinus_____»	35	»	39	»	2.	resutus_____»	105	»	92	»	2.						
opiparus_____»	46	»	49	»	1.	retostus_____»	78	»	76	»	2.	V enustissimus_____^	48	»	50	»	
ornatus_____»	96	y>	86	»	1.	rbodocylix_____»	H>	»	100	»	6.	verecundus_____^	114	»	99	»	
						Robert!_____»	101	»	90)	1.	vernicosus_____»	47	»	50	»	
pachyphyllus_____»	60	»	60	»	2.	rubromarginatus_____»	83)	78	»	4.	versatilis_____»	112	»	98	»	
psedidus_____»	42	x>	46	»	1.							vibecinus_____»	57	»	53	»	
panseolus_____»	32	»	36	»	2.	Sanguinolentus_____»	92	»	83	»	3.	vinaceus_____»	113	»	99	»	
pantoleucus_____»	97	»	88	»	2.	saponaceus_____»	2S)	32	»		virgatus_____^	29	»	34	»	
parabolicus_____»	87	»	80	»	3.	scabrosus_____»	HI	»	97	»	4.	viridans_____»	104	»	93	»	
parilis_____»	52	»	48	»	6.	schizoxylou_____»	78	»	76	»	4.	vitreus_____»	90	»	82	»	
parkensis_____J> 1 1 5	»	100	»	5.	scyphiformis_____»	78	»	75	»	3.							
parvannulatus_____»	14	»	16	»	3.	scyphoides_____»	75)	75	»	2.	V					
patulus_____»	32	»	37	»	1.	sejunctus_____»	21	»	23	»		-A-ylophilus_____D	63	»	63	»	
pausiacus_____»	57	»	58	»	2.	semitalis_____»	31	»	62	»	1.	Zephyrus_____»	84	»	78	»	

HYDNUM

Caput Ursi_____pag.	9	tab.	7	graveoleus_____pag.	8	tab.	6	fig.	1.	scrobiculatum_____pag.	7	tab.	5	fig.	1.		
fulgens_____»	10	»	10	mirabile_____»	4	»	2	»	1.	septentrionale_____»	10	»	9,1	»	1.		
fuligineo-album_____»	5	»	3	fig.	1.	molle_____»	8	»	6	»	2.	torulosum_____»	5	»	2	»	
ferrugineum_____»	6	»	4	multiplex_____»	7	»	5	»	2.	Teripelle_____»	4	B	1	»			
geogeniuni_____»	9	»	8	nigrum_____»													





HYENUM | MESOPUS | MOLLE. FR.



HYENUM TORULOSUM. FR.

Edinb. 1841.

Edinb. 1841.

Edinb. 1841.



HYDNUM FULIGINEO-ALBUM SCHMIDT.


F. A. Schmidt del.



HYDNUM MIRABILE FR. N. SP.

F. A. Schmidt del.


L. G. Hefner & Co.



HYDNUM FERRUGINEUM. FR.

E. Fries, dux

E. Fries, dux



HYDNUM (MESOPUS) SCROBICULATUM. FR.

E. Fries del.

P. Åkerlund del.




HYDNUM NIGRUM. FR.

E. Fries del.

P. Åkerlund del.



1, HYDNUM SEROTINUM, FR.



2, HYDNUM (PLEUROPUS) MULTIPLIX, FR.

Fig. 100

Fig. 101

1884-1885 New York: Van Nostrand & Co.





HYDNUM GEOGENIUM FR.

Paris, chez M. Moitte

Paris, chez M. Moitte

Paris, chez M. Moitte



HYDNUM SEPTENTRIONALE. FR.

E. P. D. 1836.

E. P. D. 1836.

Lib. & L. Mackenzie & Co.



HYDNUM SEPTENTRIONALE, FR.




HYDNUM FOLIOSEUM, N. GR.



AGARICUS (AMANITA) STRANGULATUS. FR.

H. Pries drew.

H. Pries del.



AGARICUS (AMARITA) NITIDUS. FR.

AGARICUS (AMARITA) ANIBUS. FR.

E. Fries del.

L. Schaeffer sculp.

E. Fries del.







LESTIPUS (AMARANTIA) RETICULARIS: LASCH.

Fries Icon. Hymenoz.



AGARICUS (LEPIOTA) HISPIDIUS, LASCH.



AGARICUS (LEPIOTA) CLYPEOLARIUS, BULL.

Fries Icon.

Icon. Hymenoz.



1. AGARICUS (LEPIOTA) GLOMERATUS.

E. Fries del.



2. AGARICUS (LEPIOTA) DELICATUS.

3. AGARICUS (LEPIOTA) CISTACEUS.

E. Fries del.

E. Fries del.

Inh. (L.) Abrahamson del.



AGARICUS (LEPIOTA) ILLINITUS. FR.



AGARICUS (LEPIOTA) MEDULLATUS. FR.

AGARICUS (LEPIOTA) PARVANNULATUS. LASCH.

1

A

1

m

r

J

Tt



AMANITA MUSCARIUM IMPERIALIS

LEWIS & CLARK



AGARICUS (ARMIUAR) CONSTRICTUS. FR.



AGARICUS (ARMILLARIA) LAQUEATIS. FR.

Fries, lichen. hymenoz.



AGARICUS (ARMILLARIA) LASCHII. FR.

E. Pettersson del.



AGARICUS (ARMILLARIA) PLEUROTOIDES. R. SP.

W. P. A. del.

Fries, d. 1872



AGARICUS (AMANITARIA) DENIGRATUS. FR.



AGARICUS (TRICHOLEMA) COLOSSEUS. FRIES.

H. Fries del.


L. de Meijere sculp.

Agaricus





AMANITUS (TRICHOLOMA) SEJKOVIAE. SOW



AGARICUS (TRICHOLOMA) PORTENTOSUS. FR.



AGARICUS (TRICHOLOMA) FUCATUS. FR.



I
V

ACARICUS (TRICHOLOMA) QUINQUEPARTITUS.



AGARICUS (TRICHOLOMA) FLAVOBRUNNEUS, FR.



AGARICUS (TRICHOLOMA) USTALIS, FR.



AGARICUS (ARMILLARIA) AURANTIUS. SCHAEFF.

E. Feltgen del.



AGARICUS (ARMILLARIA) BULBIGER. ALB. & SCHW.

Edwards & Feltgen del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) PESSONDATUS, FE.


London: J. Taylor & Francis, 1854.



AGARICUS (TRICHOLOMA) RESPLENDENS. FR.

E. Fries det.

E TV-arsen del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) COLUMBETTA. FR.

E. Fries det.

Lith. a. de las Akr. Lundquist & Co

P. Åkerblad del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) IMBRICATUS. FR.

F. Hyes del.

Lith. a. tr. A. H. L. Goussier & C^o

E. J. P. Goussier del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) UNGUENICOLA, FR.

E. Fries del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) ATROLINEUS, FR.


E. Fries del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) SAPONACEUS: FR.

E. Pons del.

Lith. et Imp. Lemoyne & Co.





AGARICUS (TRICHOLOMA) VIRGATUS, FR.

E. Petrusson del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) SUBUS, FR.

E. Petrusson del.




AGARICUS (TRICHOLOMA) COMPACTUS, FR.

L. Jussieu del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) LORICATUS, FR.

L. Jussieu del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) ARVICOLA. FR.



AGARICUS (TRICHOLOMA) PANAEOLUS. FR.



AGARICUS (TRICHOLOMA) PAPILLIFERUS FR.




AGARICUS (TRICHOLOMA) CAESATIUS FR.

E. J. G. G. G. G.

F. Akerlund del.

Lith. & M. G. G. G. G.





AGARICUS (TRICHOLOMA) CERINUS, PERS.

E. Tenison del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) ONYCHINUS, FR.

E. Tenison del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) TORRIDES. VAR. PERSICOLOR. FR. BULL.

H. Pettersen del.

i



AGARICUS (TRICHOLOMA) PAEONIUS.

AGARICUS (TRICHOLOMA) CARNEUS.

E. Fries del.

L. & C. G. S. London & Co.

v. Post & P. Leptand. del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) BOREALIS, FR.

E. Feltgen del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) TIGRINUS, SCHEFF.

E. Feltgen del.

Edw. G. Evanson



AGARICUS (TRICHOLOMA) CIVILIS, FR.

E. G. Evanson del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) PERSICARIA, FR.

E. G. Evanson

E. G. Evanson del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) ALBUS. SCHAEFF.

E Pettersson del.




AGARICUS (TRICHOLOMA) LEUCOCEPHALUS. KROMB.

Fries Aitex


Lehmann & Abraham Lundquist & Co

P. Åkerlund del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) MELALEUCUS. PERS.

E. Petterazzi del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) EXSCISSUS. FR.

H. Petterazzi & P. Ambrosi del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) SORDIDUS. FR.

E Pettersson del.



AGARICUS (TRICHOLOMA) LIXIVIUS. FR.

E Pettersson del.

E. Fries direx.



Litho: rch. Abrah. Lundquist & C^o



AGARICUS (TRICHOLOMA) PEDIBUS. FR.



AGARICUS (TRICHOLOMA) PUTIBUS. FR.



AGARICUS (CLITOCYBE) CLAVIPES. PERS.



AGARICUS (CLITOCYBE) COMITALIS. PERS.

E. Fries del.

E. Yvermann del.

L. Koenig sculp.



T




I

4



*



*



1. AGAR: (CLITOCYBE) POLIUS. FR.

4. AGAR: (CLITOCYBE) HIRIBATUS. BAYSCH.

2. AGAR: (CLITOCYBE) BOYHIOPHORUS. FR.

5. AGAR: (CLITOCYBE) CURTIPES. FR.

3. AGAR: (CLITOCYBE) MINREOLUS. FR.

6. AGAR: (CLITOCYBE) PABILIS. FR.



AGARICUS (CLITOCYBE) PAPILLATUS, FR. VAR. MAJOR.



AGARICUS (CLITOCYBE) SOCIALIS, FR.



AGARICUS (CLITOCYBE) VENUSCOSUS. FR.



AGARICUS (CLITOCYBE) VENUSTISSIMUS. FR.





w




Si w2

I



1 AGARICUS (CLITOCYBE) TORRATUS. FR. 2 AGARICUS (CLITOCYBE) TUBA. FR.
 3 AGARICUS (CLITOCYBE) CARDICANS (PER.)
 4 AGARICUS (CLITOCYBE) CATINUS FR.




AGARICUS (CLITOCYBE) DECASTES, FR.

E. Fries del.

E. Fries del.

Lithog. et. Sculp. G. S. G. S. G. S. G. S.



AGARICUS (CLITOCYBE) AMPLUS P.

E. Fries delin.

H. v. Post et Alstedt scul.

Litho v. Schlichter & Zedlitz, Stockh.



AGARICUS (CLITOCYBE) COFFEATUS. FR.

W.A. Dallwitz del.

F. Henschel col.



AGARICUS (CLITOCYBE) FUMOSUS. PERS.

E. Pries del.

E. Tattersall col.



AGARICUS (CLITOCYBE) SPLENDENS. P.

E. Fournier del.




AGARICUS (CLITOCYBE) SINOPICUS. FR. VAR. AUTUMNALIS.

E. Fournier del.

P. Albertus sc.




1. *ASARICUS (CANTHARELLUS) FAMILIUS*. FR. 2. *ASARICUS (CANTHARELLUS) EXPALLENS*. FR. 3. *ASARICUS (CANTHARELLUS) EXPALLENS*. FR.



lfc




AMANITA (L.) VAUGHAN. 1822. FR. 7. YARACICUS (L.) CONCAVUS (ZOO) FR
 2888887 (L.) VAUGHAN. 1822. FR. 7. YARACICUS (L.) CONCAVUS (ZOO) FR



1. ARABICUS (CISTACEAE) VIRESCENS. FR.
 2. ARABICUS (CISTACEAE) PASTINACUS. FR.
 3. ARABICUS (CISTACEAE) RUBRUS. FR.

AE.



AGARICUS (CLITOCYBE) ECYTHUS, FR. AGARICUS (CLITOCYBE) ANISOSTERISIMUS, LARCE.



AGARICUS (CLITOCYBE) MONTUCOSUS, FR.

E. Fries del.

E. Fries del.

La. 1875



AGARICUS (CLITOCYBE) DECORUS. FR.



AGARICUS (CLITOCYBE) PACHYPHYLLUS. FR.

1848



AGARICUS (COLLYBIA) PLATYPHYLLUS VAR. HEPENS. FR.

E. F. Vasey del.



AGARICUS (COLLYBIA) SEMITALIS. FR.




AGARICUS (COLLYBIA) STRIDULUS. FR.

L. Fries del.

P. Akerblad del.



AGARICUS (COLLYBIA) DISTORTUS. FR.




AGARICUS (COLLYBIA) XYLOPHILUS. FR.




AGARICUS (COLLYBIA) INOBRATUS. SCHW. & C.



AGARICUS (COLLYBIA) ACERVATUS. FR.



1 AGARICUS (COLLYBIA) NITELLINUS. FR. 2 EJUSDEM VAR. NIMON. FR.
 3 AGARICUS (COLLYBIA) SUCCINEUS. FR. 4 AGARICUS (COLLYBIA) NYOSUREUS. FR.




TT



T
V



1 AGARICUS (COLLYBIA) MACILENTUS. FR. 2 AGARICUS (COLLYBIA) AETHIOPS. FR.
 3 AGARICUS (COLLYBIA) ENSCULPTUS. FR.




1. *AGARICUS (COLLYBIA) EXTUBERANS. FR.* 2. *AGARICUS (COLLYBIA) PROTRACTUS. FR.*
 3. *AGARICUS (COLLYBIA) CONIGERUS. FR.*

L. Fries del.

J. Nees sculp.

Leipzig, in Commissione apud G. Neumann, Neudamm.



M

1. *AGARICUS (COLLYBIA) CINNAMATUS*. FR. 2. *AGARICUS (COLLYBIA) MICHELIANUS*. FR.
 3. *AGARICUS (COLLYBIA) MUSCIGENUS*. SCHEIDT. 4. *AGARICUS (COLLYBIA) LOBUS*. FR.

W. Peck del.

Lith. by A. Schaefer & Gendron, New York

W. Peck del.




1. AGARICUS (COLLYBIA) RANCIDUS. FR. 2. AGARICUS (COLLYBIA) CORACINUS. FR.
 3. INOLENS VAR. UMBONATA. 4. AGARICUS (COLLYBIA) INOLENS. FR.

Thunberg.

F. Feltgen & P. Aderland del.

Lith. v. H. Schlichter & Penderff, Bonn.



T T

i

2

1



IT

Tf

3

4

1. AGARICUS (COLLYBIA) ATRATUS. FR. 2. AGARICUS (COLLYBIA) AMPUSTUS. FR.
 3. AGARICUS (COLLYBIA) TESQUORUM. FR. 4. AGARICUS (COLLYBIA) WISER. FR.

2. 1851. Icon. Mycologica.

3. Peltanus & P. J. J. J. J. J.

Lith. sculp. Schlichter & Seebert, Sackh.



AGARICUS (OMPHALIA) HYDROGRAMMUS FR.




1. AGARICUS (OMPHALIA) DUMOSUS FR. 2. AGARICUS (OMPHALIA) LITUUS FR.
 3. AGARICUS (OMPHALIA) OFFICINATUS. FR.

P. Alaricus & S. Pennington del.



1. AGARICUS (OMPHALIA) DETRUSUS FR. 2. AGARICUS (OMPHALIA) RUFUS FR. FR.
 3. AGARICUS (OMPHALIA) STRIPILEUS FR. 4. AGARICUS (OMPHALIA) LEUCOPHYLLUS FR.




i.

1. AGARICUS (OMPHALIA) CHRYSOPEYILUS FR. 2. AGARICUS (OMPHALIA) POSTII FR.
 3. AGARICUS (OMPHALIA) LAESTADII FR.



1. AGARICUS (OMPHALIA) AFFRICATUS FR. 2. AGARICUS (OMPHALIA) SCYPHOIDES FR.
 3. AGARICUS (OMPHALIA) SCYPHIFORMIS FR. 4. AGARICUS (OMPHALIA) SETIPES VAR. FR.
 5. AGARICUS (OMPHALIA) GRACILLIMUS WEINN. 6. AGARICUS (OMPHALIA) INTEGRELLUS. PERS.

Printed & Published by E. P. Peterson




1. AGARICUS (OMPHALIA) PHILONOTIS LASCH.
 3. AGARICUS (OMPHALIA) ONISCUS FR.


2. AGARICUS (OMPHALIA) RETOSTUS FR.
 4. AGARICUS (OMPHALIA) SCHIZOXYLON.

P. Albrecht & E. Petzmann del.

Lith. a. tr. h. Schläpfer & Sendorff. StiKiHi




1.



2.



4.



3.

1. AGARICUS (OMPHALIA) CYANOPHYLLUS. FR. J. SP. 2. AGARICUS (OMPHALIA) RECLINIS. FR.
3. AGARICUS (OMPHALIA) UNGUATILIS. FR. VAR. MINOR. 4. AGARICUS (OMPHALIA) PICTUS. FR.

L. Penzance & F. A. Leitch del.

L. Penzance del.

Imp. & J. K. Schläpfer & Co. Genéve, Suisse




1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. AGARICUS (OPHALIA) GRISEUS. FR. 2. AGARICUS (MYCENA) SPEIRAEUS. FR.
 3. AGARICUS (MYCENA) ATROMARGINATUS. FR. 4. AGARICUS (MYCENA) RUBROMARGINATUS. FR.
 5. AGARICUS (MYCENA) LINEATUS. FR. 6. AGARICUS (MYCENA) ZEPHYRUS. FR.



1. AGARICUS (MYCENA) CALEROPSIS FR. 2. AGARICUS (MYCENA) BENZONI FR.
 3. AGARICUS (MYCENA) LACTEUS FR. 4. AGARICUS (MYCENA) FARREUS FR.
 5. AGARICUS (MYCENA) FLAVO-ALBUS FR.




1. AGARICUS (MYCENA) LUTAEERENS FR. 2. AGARICUS (MYCENA) GALERICULATUS v. CALOPUS FR.
 3. AGARICUS (MYCENA) PAKAABBUCUI FR. 4. AGARICUS (MYCENA) TINTINABULUM FR.



1. AGARICUS (NYCERA) EXCISUS LASCH. 2. AGARICUS (NYCERA) DISSILIENS FR.
 3. AGARICUS (NYCERA) ALCALINUS FR. 4. AGARICUS (NYCERA) PUCIOSUS FR.
 5. AGARICUS (NYCERA) AETITES FR.

t





1. *AGARICUS (MYCENA) VIREUS* FR. 2. *AGARICUS (MYCENA) STANNIENS* FR.
 3. *AGARICUS (MYCENA) AMISTUS* FR. 4. *AGARICUS (MYCENA) DEBILIS* FR.
 5. *AGARICUS (MYCENA) COLLARIATUS* FR.

E. Fries del.

E. Fries del. & A. Saccardi sculp.

1832. G. B. Schimper & G. W. G. Beck.




1. AGARICUS (MYCENA) HEMMATAPUS PERE.

2. AGARICUS (MYCENA) EVIDENTUS FR.






3. AGARICUS (MYCENA) SANGUINOLENTES ALP. SCH.

4. AGARICUS (MYCENA) GAEBOHNIUS LASER.



A

1. *AGARICUS (MYCENA) CLAVICULARIS* FR. 2. *AGARICUS (MYCENA) Plicato-crematas* FR.
 3. *AGARICUS (MYCENA) DILATATUS* FR. 4. *AGARICUS (MYCENA) CITRINELLUS* P.
 5. *AGARICUS (MYCENA) ECHINIPES* LASCH. 6. *AGARICUS (MYCENA) CAPILLARIS* SCHUM.




1. AGARICUS (MYCENA) NIGRALIS FR. 2. AGARICUS (MYCENA) CORTICOLA FR.

3. AGARICUS (MYCENA) ACICULA SCHRATT. 4. AGARICUS (MYCENA) PYRIFICERUS FR.

5. AGARICUS (MYCENA) STIPITARIUS FR. 6. AGARICUS (MYCENA) JUNCICOLA FR.



1.




2.



3.

1. AMANITA (PLEURISTIA) MUSCARIA, FR. · 2. AMANITA (PLEURISTIA) MUSCARIA, FR.
 3. AMANITA (PLEURISTIA) MUSCARIA, FR.



1. *Agaricus (Pleurotus) subaureus* (Fr.) T. & G. 2. *Agaricus (Pleurotus) palmarius* (Fr.) J. & L. 3. *Agaricus (Pleurotus) alberti* (Fr.) J. & L.




1. AGARICUS (PLEUROTUS) CIRCINATUS FR.
 3. AGARICUS (PLEUROTUS) LIMPIDUS FR.

2. AGARICUS (PLEUROTUS) FANTOLETICUS FR.
 4. AGARICUS (PLEUROTUS) MUTILUS FR.



1.



3.



4.



5.

1. AGARICUS (PLEUROTUS) POMETI FR. 2. AGARICUS (PLEUROTUS) AGEROSUS FR.
 3. AGARICUS (PLEUROTUS) HEXIFORMIS FR. 4. AGARICUS (PLEUROTUS) UNGICULARIS FR.
 5. AGARICUS (PLEUROTUS) STRIATULUS FR.



1. AGARICUS (PLUTEUS) ROBERTI FR.

2. AGARICUS (PLUTEUS) MURPHYI FR.

3. AGARICUS (HYGROMA) LYONS VULL.



1. AGARICUS (ENTOLOMA) PINNULOIDES FR. 2. AGARICUS (ENTOLOMA) PLUTEOIDES FR.
 3. AGARICUS (ENTOLOMA) RADIATUS FR.

F. Petruschke del. et F. Petruschke sculp.



1. AGARICUS (ENTOLOMA) JUBATUS FR. 2. AGARICUS (ENTOLOMA) RESUTUS FR.
 3. AGARICUS (ENTOLOMA) DICHRUS P.

J. H. M. ...

Central Type-setting, ...



1. AGARICUS (ENTOLOMA) PORPHYROPHANES FR. 2. AGARICUS (ENTOLOMA) TURBIDUS FR.
 3. AGARICUS (ENTOLOMA) VIRIDANS FR.



1. ABARICUS (ENTOLOMA) CRISPER (CYANEUS) FR. 2. ABARICUS (ENTOLOMA) MAJALIS FR.
 3. ABARICUS (ENTOLOMA) NIGROSCUS FR. 4. BEATICUS (ENTOLOMA) AROESIACUS FR.



1. AGARICUS (EUROTOMA) CLAVATINUS. FR.
 3. AGARICUS (EUROTOMA) SEMICELLUS. FR.

2. AGARICUS (EUROTOMA) REECHII. FR.
 4. AGARICUS (EUROTOMA) CAPUTINUS. FR.





1. AGARICUS (LEPTONIA) PLACIDUS FR. 2. AGARICUS (LEPTONIA) LAPPULA FR.
 3. AGARICUS (LEPTONIA) AETHIOPS FR. 4. AGARICUS (LEPTONIA) SCABIDOSUS FR.




1. AGARICUS (LEPTONIA) FOMOSUS FR. 2. AGARICUS (LEPTONIA) CALONOPOLIUS FR.
 3. AGARICUS (LEPTONIA) AGULUS FR. 4. AGARICUS (NOLANEA) NARCISSUS FR.
 5. AGARICUS (NOLANEA) VENTATILIS FR.

1



1. AGARICUS (NOLANEA) NIGRIPES. TROC. 2. AGARICUS (NOLANEA) JUNCUS & CUSPIDATA.
 3. AGARICUS (NOLANEA) VINACEUS. SCOP. 4. AGARICUS (NOLANEA) ICTERTIUS. FR.
 5. AGARICUS (NOLANEA) VERGUNDUS. FR.



1. AGARICUS (MOLANEA) INFULA. FR. 2. AGARICUS (MOLANEA) COELESTIBUS. FR.
 3. AGARICUS (ECCLIA) POLIUS. PERS. 4. AGARICUS (ECCLIA) CRISTO-KUMELIUS. LASC.
 5. AGARICUS (ECCLIA) PANNICUS. FR. 6. AGARICUS (ECCLIA) ENDOCALIX. LASC.

f T

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No.j..... Ace. No.®-.2637...

FKI -i
Author.....Fries, E.

Title...Jjt0Mk..AUld*JL...hymenomy
cetum nondum delineatarum

Name Of Borrower/Code No.	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

