


Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO.....
BOOK NO... **CLV-**.....
ACC. NO. **8-8611**.....





1717

PLANTARUM QUAE IN HIS PARTIBUS DEVS INDIDIT, ATQVE
FRAGMENTA ESSE VIDEANTUR, QUAE LIBET FERVA DOCEAT.

CAROLI CLVSI ATREBATIS,
IMPP. CAESS. AVGG.
MAXIMILIANMI.
KVDOLPHI. II.
Aulae quondam familiaris,
RARIORVM PLANTAKVM
HISTORIA.

Quae accesserint, proxima pagina docebit.

ANTVERPLA
E. officina. Plantinae
\ / -Apud Ioannem Aiorctinn
CIO. I3CI. 1607

• I VIRTUTE ET GEJIO

ELAVIHOZIT

EMRHOZIT

Список книг, принадлежащих библиотеке, Ur. xvloTrlvjy £, и
иных, от прот. абис. Соловьева.



RARIORUM Plantarum Historia sex libris descripta a
Carolo Clusio,

Ejusdem Commentariolum de Fungis.

Addita? doctissimi viri Honorij Belli Medici percelebris
aliquot ad Car. Clusium Epistole de variis stirpibus
agentes.

Alia item eruditissimi viri Thobias? Roelfij Medici, de
certis quibusdam plantis, Epistola.

His praeterea ad accuratae Montis Baldi agro Veronen-
si descriptae, auctore Ioanne Pona, pharmacopaeo
urbis Veronenfis diligentissimo.



PRIVILEGIUM CÆSAREVM.



RODOLPHVS .TECVNDVS diuina fanente dementia
 eleBus Romanorum Imperatorfemper oAugu^us 3ac
 GermanU, Hungari&3 Bohemia, DalmatU 3 CroSti&x
 StlauriiA f\$C.Rex*Archidux Avtfin&3Dux Burgun-
 dia, Stiri&3Carinthu3CarnioL {\$ WirtembergA^c,
 Comes Tirolis ejrc Agnofcimus3 ac vigoreprxfentium notumfacimus
 vniuerfis: Quod cum Dottusnofter &/acri Impertj fidelis dilectus
 Carolus Clu^ius humilltmènobis exponendum cur otter it ,pr&manibu\$
 fe habere fcripta qu&dam 3qu& in publicam vtilitate medere flatuerit^
 vereriautemne cum magnos fumtus in Pitfores & Sculptores fece
 rit3 lucri can]a alij, quod fieri folet 3 fibi infraudem eadem imprimant->,
 aut imitentur 3 {iccij Uboris ipfeatque induftn& Ju&pr&mi ofraudeturac
 de iitua4ur j nos confiderantes ^quampr&claram iam antè operam in
 quibusdam lucubrationibus 3 qua iam antefuerunt edit#j pofuerit 9 (£
 quam nobis exquisita ipfiusac varia eruditio 9 prmpue^ verò etiam in
 indaganda jlijcpium & herbarum natura fedulitas Mq\ in dufiria com-
 mendentur _, quod multn peregrinis ac remetis in lock didicerit f\$ obfer-
 uauerit 3 mulmfecum attulent 3 qua rara & luce dignafint j quodafi*
 dui adhuc ftuditi in hoc incnmbat3 vt qua in antiquis auffonibus abdim
 0* obfcura fitnt, eruat atque i Uuftrefi vtrp&claram nominis fuimemo"
 riampofteritati relinquat3 benigne ipfi quod rogat, Priuilegio noBro
 aduerfus omnem fraudem confulere cupientes3 pr&fentmm vigorefcien-
 ter animoq-y bene deliberato^ pro autoritate noftra Csfareafeno decreue-
 rimus^ edixerimusacfiatuerimus3 quemadmodumpr&fentium vigor-cJ
 decernimus3 edicimus acfia4uimus3 ne quifquam Typographorum, Bi*
 bliopolarum aut aliorum 3 quifque imprimendu Jiue vendendis hbris
 • aliave quacunq; ratione negotiationem exercent Ubrariam3 intra vi-
 ginti annos3 à prima editionis die numerandos, Caroli Clupj opera duo-
 • bustomū exprejja3 quorum prior Stirpium & abisloriam continet 3 al'
 tero plerique Ubelli3 & *c. ab ipfb Latinifatti comprehenduntur3 f\$ qu&-
 cunque pr&terea idem Clufrfs edct opera 3 ipfo incio aut inuito typisfeu •
 quocunque olio modo aut charatl:ere3 flue integra 3 fme aliquam eorum
 partetn imitetur3 exprimat <vel in publicum ed&t^ neve ab aliis edit a vet
 exprejja vel aliunde allot a intra Sacri R&mani Imperijfirt'es vendat3
 ac difirahat aperte vel occulte Si quU autempr&fens ediftumnoflmm
 tranjgredi aut violare£\$pr&ditki opera recudere 0* infraudempr&no-
 minati Caroli Clufijedere aut venderèaufmfuent3 eumnonfolsmj
 eiufinodi libriexemplaribus3 tanquam qua in commiffum cecideriwL>3
 mworato Car ok Clufio eiufq-, hkredibus, 3 vel mandatum ab iis habcn-
 tibus3 opeQ^idagifiratHSeiusloci, vbi defrehenfafuefint3 vendicandii
 priuari, ven; mcttam muUfn dccem Marcharumauripuri fi/co noftro

Imperiali' audum vindki, aaparti Ufi ex & quofoluenda acpendenda
 funirivolumus₃ eatamen lege₉ nequidea opera Orthodox* Catholic*
 Religioni contrarium habeant₃ & < vt triacu^wfcunque operisaut J[^]bri
 txemplaria₉ ubi excufafuerint₉ ad Imperialem nofiram Cancellariam
 :trAnfmittatur. ^lupdfi neg Ugaturjoacnofira gratia ac Priuilegio ipfe,
 • ipfiufqueh&redes excidiffecenfeantw-Mandamus proinde vmuerfis &
 fingulU no Uris & Sacri Romani Imperijfubditis & fidelibus ddeftis,
 iam Ecclefiarum, quorum & secularium cuiuscunque status gradus, U
 nis & Conditionis extiterint, praefertim vero ita qui in a^M a^otraW
 xonfiitutifunt₃ ac velfuo velfuperiorumfuorum loco ac nomine Juris vd
 JuftitUadminifirationem exercent₃ nequemquam hoc PriuilegiumfeH
 interdifiunnoBrum impune violarejpemere aut negligere patiantur.
 Sedfi quoscontumaces compereriftt, prdfcripmpa?naplecfi, & ' quibuf-
 cunq-^reftefierifoteftmodu₃coercericurent. Qitatenus&ipfigrauiifi-
 mamindignationem nqfiraeuimre voluerint*Jdquod tejlaturpr&fen*
 tibmUterismanupropriafubfcriptu^Cafareifigmnofiriimprepone
 muniti5.I>atuminArcenofiraRegiaPragA₃diedecimaquimmenfis
 February yinno Domini miUefimo₃ quingentefimo nonagefimoter*
 tio: Regnorum noftorum Romani decimo of fauo₉ Hunganci vigefimo
 primOiCrTSobemici it idem decimo ottuuo.

RVDO. LPHVS.

Iacobus Curtius a Senffteiiaw. *Mmandatum S.C&fare<t<jMt<frot>rium.*
 Io. Baruitius.

TIB i Ioannes Morete, qui haud exiguos fumptus pincrendis & fculpen-
 dis Plantis mecum pariter im_Rendifti, tibi inquamp_Rmitto Vt hanc
 meamRanoruiPIantarumHifloriam, & adjundos huic libellos wpistuis
 excudas ac evulges: nee alibi alius quifp_Riam intra vi[^]nd annos, cupio five v^X
 beo, fub poemis & muldis, quar S.CcefarcieMajeftacis licterismihi concei_T
 continentur.

Carolus Clujtta A*

SVMMA PRIVILEGII PRINCIPVM BELGARVM,
ALBERTI, & ISABELLA Infanti[^] Hifpania?, Archiducum
 Auftra₃, Ducum Brabantia[^] & c. priuilegio cautumeft,
 nequis Caroli Clujt Imp_P. Cf. Augg. sMaximiliani II. Rudvl-
 philL AuUquondamfandiaris. Rariorum PlantaramHi/loriam,
 pr[^]tervoluntatemloannisMoreti, TypographiAncuerpien-
 fis[^] ntraduodecim annos villo modo imprimatur aiibi terra-
 rum imprefiam, in has mfenoris Germaniediriones imporret,
 venalemvc habeat. Qui fecus faxit, confiscatione librorum,
 & aha grauiopoenamuiaabitur. -vtilatiuspatetinlitterisdatis
 JDruvell[^] in. Martij M. DCI.

Signat. I. de Bufdier*

CARD-

CAROLVS CLVSIVS ATREBAS'

BENEVOLO LECTORI.



MAGNAM voluptatem mihi femperattulit, in variis ^quas peragravi regionibus^Plan tarum o^ervatio. Nam quum nulla fitProvin- cia quarpeculiares quafdam, & quodammo* do (ibi proprias non alat, infignis vanetas ubiquemeis oculis fefeingerebat,qua? non potuit non effe deleftabilis, viro à primâpropè aetate ad Plan- tarum obfervationem propenfb, pradertim quumaliqua^oo currerenc à veteribus Au&oribus neglebr, vel ab ipfis qui- dem defcripta?, nondum tamen à quopiam Neotericorum fa- tis cognita:: turn etiam alia?, qua? ad planearum à veteribus proditarum claffem referri poffe viderentur. Non minus enim gaudioafficiebar, quàm fi ingentem Theiaurum reperiifem.

CETERVM quum indecorum, & kberaliingeniominimè dignum arbitrarer, voluptatem quam ex ea obfervatione per- cepifTem, mihi dumtaxat fervare, & apud me quad premere velle, quin potius aliis fimili ftudio fefe oble&atibus effe com- municandam cenfcrem : facere non potui, quin quâpotue- rim fide & (edulitate, primùm illarum, quas in Hifpanicâ meâ peregrinatione obfervaveram, Hiftoriam, publici juris face- rem: deinde, earum, qua2 partim in Auftriâ, Stiriâ, 6c Pannoniâ, partim vicinis Provinces poftea fefe obtulerunt.

E A s porrb Obfervationes, cum Hifpanicas, turn Pannoni- cas, quum animadverterem plerifque gratas *fuiſſe*, imò ilia- rum exempla adeò avidè experifca, ut nulla amplius fibi fiiper- effe Typographus conqueretur xonfultum fore exiftimavi, fi eas recognofcerem, atque aliarum plantarum, quas ab illis evulgatis obfertavi, hi^Driam adderem, omnes veluti in unum corpus contrahens, fingulas tamen in fuageneral fpecies, commodâquadam ferie (quantum quidem fieri potuit) diftri* buens. Mihi etenim perfiiadeo ^ non minus gratum futurum cum laborem, quàm priores.

PLANTARVM autem Hiftoriam in fex Libros divifi, ut commodius in fuas claffes diftribuipoffent. Quum verb Plan- tarum hiftoriam dico, nominem exiftimare velim, univerfam Plantarum hiftoriam me intelligere : *fed* earum dumtaxat, quâ: à mife primùm obfclrvatae, aut ab aliis nondum fueranc

prodit, antequam eas publicarem: exiguae enim laudis esse
 arbitratus sum earum historiam repetere, quae ab aliis esse
 prodita. Non negaverim tamen, quin interdum nonnullas
 inferam, quarum alij meminere, eas autem historiam
 non fuisse plenè conscriptas mihi videntur. Quarundam praeter
 cetera mentionem facere me proficiat quae ab aliis fuerunt de-
 scriptas, atque etiam illarum icones in meo libro inter-
 dum intuli (Te, quia adferi mearum, quas describo, fervan-
 dam, commoda: videbantur.

B O N I igitur consulatur, quern (studiose juventuti gratifi-
 candi studio) in hac fere & multis morbis obnoxia sumpsi, **la-**
bor, Scilicet iuniores ad familia, vel etiam majora tentanda ex-
 citet: libenter enim alteri hanc lampadem trado, ut qui an-
 num sextum & septuagesimum jam agam. Si qua tamen fu-
 pererit vita mediocri valetudine confans, eam omnem ad pu-
 blicam utilitatem impendendam profiteor. Kal. Feb. cb. bci.



A D C A R O L V M C L V S I V I f

A T R E B A T E M #

D I G N v M est opella, nee pretio caret
 Famâ iestimando, quas juvenis vigil
 Gnavusq; ucuibrationes
 Extuderit? mē n labore
 In lucem apertam ^fasciculo fenex
 lam comprehendas ar&ius unicò,
 Vt cuncta reprxfentet unum
 DifpofM ferie volumen.
 Postrema certè cūraque Ifmaque
 Sudore tanto, totq; moleftiis
 Vix hercle credo, culte CLVSI;
 Conftiterit, velut hate & ilia
 Prior: tametfi *fxpe* animis ratum
 Nifu voluptas in medio folet •
 Praeberedelectamen ultro,
 Nedum opere ingenij fupremo.
 Nam gaudet in fe mens generofior,
 Cum laude fi quid magnificum inchoat,
 Frudluq; fink; extimofq;
 Haud patitur temerè umbilicos,
 Defiderantes fortè manum ultimam,
 Vel impolitos vel nimium rudes
 Manere: quamvis ceteroqui
 Parvulum opus quoq; terminatum
 Induftriorum iudicio virum
 Ametprobari. Nos male confita
 Spineta castramus maligne,
 Quafdam etiam bene collocatas
 Runcamus herbas cum loliogravi,
 Triftique avenâ. Tu tua digeris
 Feliciori, prout decorum est,
 Ordine feminia herbularum,
 Stirpesque raros, quidquid 4§bxtera
 Et noftra gignitpcrfpecies humus
 Difindliores. Singulorum
 Cernere jam yideor redadlos
 Quincunce iuftd^o reticulata per
 Dimenfa fines alveolataque,
 Id est, ad unguem recliorem.
 En, quiderk, quod oporteatte
 Transferre ? Planum est omne, fibiqu? opus
 Aptum est favorem fcilicet omnium.
 AientnepotcSjte fuiſſe
 Mirificè, puto, diligentem.

Paulus fMeliffu* Franc. Comes Pal.
 et Fig. cūis hom.

IN PLANTARVM HISTORIAM

CAROLI CLVSJL.

Vos «radices, Vos ð cum Floribns, Herb*,
Fulcraqueramis Arbores,
fiunc agite, ambrosijfucciexbalatefipresi
Nuncpandite altiuscomas,;,^:
tynguine nttnc calices difiendite, ne&a\ ts attxit
GhtodparU quint A Amor fid.
fcftra etemm^rms baud ulli bene cogmta, *virtus,
Fama qmdrigis aflra obit.
Tarsqite aded vefirum, cacd bafienuf obruta nofte,
In rvef?e lucet aurej.
AJJertori igituridi pro munere quifnam
Grates habebius piast
FaSor ? an omnt genus morbi ilicet, Agmine faUo^
Trudetis ad Ditis lacw?
Eidab'ttisyfummosquiguftaverit ore,
Semelve naribts bauferit:
Sic Clufi nomen virtutesque imbibat imts
Animispotenter, ut mbil,
SOuam Clufi laudesmeditetur, £?* omnibus oris
DtCAt bona in turn plurttva?
Annuite. una Deum namfiGlaucttmfacitherfa,
Jjhtidnon Jimulpraflabitis
Vos *oRadiceSiVo\$ocumFlonbttJyHer^x,
Vttkrtque ramis Arbores ?

IanusGruterus,

CL v s i, delities ambrque oJVI
Maximi jEmiliahi, Opimitate
Quo nil, nil Sapientia, orbe toto
Aut est, aut fuit, aut erit fecundum:
Quam re<Se tua nomina omineijnplcs&
Quam rede, puto, Clufius vocaris?
Non quod sacra oculis mk, Apollo
Aonum(5ue Machaonumque cludat;
Kon quod fint tibi Hygacac operta templa,
In queis & Venus & colit Iuvcntas^
Non quod Pallados arcearis aris,
Quas Prudentia menfque redafervac.
Sane, Sacra oculis tuis Apollo
Aonumque, Machaonumque nudat.
Sane, funt tibi Hygawe aperta templa,
In queis & Venus & cotit Iuventas.
Sane, Paliados aggregaris aris,
Quas Prudentia Menfquerettafervat.
Sic di&us potius; quod unus ipfe es
Cuius corde arumoque continen/er
Se Phabus, Medicina, Athena cludant.

idem Gruterm.

Mοίμε εἰς βλασάν ἀσπιδεμένην γὰρ ἀνήκω
ἰατρικῶν, τῶν ἀέλιον ἀφραίνοντες μέγ' ἔπος τῆ ἀνδρῶν
Tavru \$ WILT* τὴν ἀφραίνοντες, καὶ ἀσπιδεμένην
Κλαύδιος ἀσπιδεμένην

Νικαίος ὁ Ἑλλησπόντιος

Iii C. Clufij Claiiflimi & amiciflurii viri
opus Botanicum,

Dontc cruntHerb<e% donee ftorenimStrt^^
Clufiadis nutuet floridafama Libri.

Francifcus Velmlnianus Med. D.Pidavienils;

Qvam longumfyarfi fores flufonpulchra Vinid
Germine Clufiaco, &JlrpeVirente virenti
lampatet &» Clufl nomtn>tamfkmareclufo
Calofjtارفi cluens jflori virente nitet.

PafchalisleCoq. MecL D. Pi&avienfiss

In Caroli Clufij Plantirum Hiüoriain;

Pafi^{a raves} quondam fuerat Medicinadolores^
Etfere opus me diets ypro dolor I ipfa habmt s
jQuidfaceret Ipofterratas vaga>pervaga terrai
Clufij in zAtrebatu duett ur boffittum.
Clufius <egrotam> mord nfilla, potentibus herbii
Adjuvat^hinc medicasfert Medtema mantis.
Him etiam extremos fe Clujafamaper Indos .
Didtderat > Volitans dotlaper or a Virumi
illetuas Europa> tuas America plant as,
Africa five tuas ,five tuas Afia
TJouit, Z5r him toto late notifimts orbt est
ClufittSy Atrebatum Cluftus ilWhculus.
Ergo animofus abiLiktr, *?< fiforte`jqwis atiElor^%
(jhtxreris) hoc fat ent^Kere, Clufius efi:
Hocjat erit, mora nulla, manuque^oculoqtie^ animo fa
Lefitorisjeltxafriptere Liber.

Pctrus Plateau I. F. Toriiae&ifis,

IN. PLANTARVM HISTORIAM

CAROLI CLVSII.

TVLERVNT vafios priora feck
Scriptores, neque defuer[^]noftro,
Linguis, iudicio, eruditione
"Qui clari ftudium omne in hoc lb[^]arunt
{Sui ut quemque animi impetus ferebac
Atque ardens amor ardui laboris)
Spartam quaii fibi fingili colendam
Sumfiflent, numeris ittodif[^]ue cundts
Perfedamque darenc & abfolutam.
[^]Quod cum fit propè difciplina in omni
Summa non Cmc laude fadtitatum:
Turn vel præcipuè hoc vidcre in ilia eft
<U[^]E vires docet & figuram, & cipfos
Natales quoque, differentiafque
Herbarum(ftudium utile atque duke)
Et frugifit, fruticum, arborum, omniu[^]mq[^]vie
Vitaqueishdmini falufque conftat,
Et finu loctplete terra fundit
Casio femlibus xigata ftillis.
Summa hanc barbarie obfita[^]Ti actnebris
Plus quam Cimmeriis (pudet fateri)
Primus feftirait fuo nitoti
Noftrom setate patrum Leonicens:
t[^]uem Rueflius, hunc quemoxfequuti
Complures afij haud auidem labore,
Sedquos ingenio jCelebritate,
Dodrinaque adeo pares fuffle
Conftat, auri merito prbbanturomnes,
Dotequifque fua: (ncgata namque
"Cundfcauni, iua finguli tulere)
Vt negem facile effle judicare
Cuinam laurea jure del[^]Matur:
Nemo fi taihen abneg[^]rit vitiquai[^]
Plus ilium meruiffle laudis atq[^]ji[^]
Pracmi, qui falebrofa & invia inter
Primus compita figere eft pedem auil*[^]
Venturifquenepotibus prseivit,
(Tua ha[^]c dd&e LeoniteneIaus eft:)
t[^]uis, Clufi, precor, alteri fecundum
Audebit dare te, tuos labbres
Qui norit, tua quique fcripta Vidit,
Vidit fcripta, fatis probanda nunquam>
Sint verò eximiam referredigni
Qui laudem fuerint(libens fatebori)
At certè fuit ante qui pra:iret
Et viam darct explicatio[^]cm,
Scripto[^]A confilio, aut opinione:

Cui, quod non minimum tulit laboris,
 Pars laudis quoque magnae cedat aequum nec est,
 Verum, dux tibi quis fuit, comaeve,
 Quando quas animosa gens Iberum
 Terras folet et calentes optas,
 Mensium spatium oculosque laeta
 Herbas mille manu legens avari;
 Laus qui sibi vendicare partem
 Tua: vel minimam queat vel aufit?
 Discendis tibi quis fuit magister
 Herbis, Pannonicos, iuga alta, montes
 Quas novas dare, te iugent, scimus,
 Nostris te quoque dante habemus horcis?
 Ignoraret opes suas Iberus,
 Ignoraret opes suasque Pannon,
 Ignoraret opes orbis ipse
 Arborum, nisi te docente nossemus
 Nostris delicias alunt quod horti
 Quae: vel visu oculos juvant foventque,
 Pulvinos hilarint veritate,
 Acceptum ferimus tibi illud uni,
 Et grato tua scita scripta, Clusi,
 Cum plaufu modo leditamus omnes,
 Ventarique auidem legent nepotes
 Dum constabit honos decorque Phabon
 Et Flora: fuus: efferentque Chusit,
 Quae qua Sol oritur caditque, nomen,
Mitma super allra clara fama.

Ut nescias Hogbtlmde.



IN CAROLI CLVSII A.
EFFIGIEM.

Os Clnstjronntm^ oculos^, &> c&ter#~~unius~~
Pifloris txfrefat honi mania hem.
Ingenij hmdptuit <vim: at Ckjius tyft
Extjrefiit illtts hoc in opre qmm of timè.
Longa dies ^t otyu fitfark ddettt, tyjum
Et Clttfititn: ofut hot nulla dekbit dies.
Erjjo_y ilium in cineres ubi lonjja refolyerit~~us~~,
Adhuc o]>ere in hocfibifupreritCltifius.

Ioannes ab Hoghelandc.

CAROLI CLVS I RARIORVM PLANTARVM HISTORIC

. LIBER PRIMVS .

PLANTARVM, qu<ts in writspercgrinAtiombtu meis rar tores
ohfavavifaft'or'iam fcriptmw, abarboribta earn aufiicabor,
fie enim ordopoftularevidetur; deindeadfruticcs Juffrutices
& 'virgulmprogrediar•, qttibttt aliquot swavhoxautovs fubtf-
CU??L> . Hue autenL*omntapriorz^iibro compltffianimus eft : reltquas
fiirpes infequentes Itbros dtftnbitamj.

DRACO.

CAP. I.



APAVCIS prodita est hums Arboris hi-
(luna.caqueaclmodum mutila.Libuc
itaaucearahic fubncce, &C ab illanoftrax
Obfervjtioncs aufpicari, quandoquidctn
valde rmcft.tn noftra prarfctim Europa,&!
H;rb<inis dum hos Commentarios icribe-
bam (m fallor) incognita.

EST veroDracofapciuscnimnomenon
in uento)proccra arbor, PJnu procul inrucn-
tibus refcrens, adcdicqualesjfcmpcrque vi-
reuces fiinr rami.Huius cruncus craftus,0<2o
aur novem cubitales ramos xqualiter na-
fircntes S>C nados fu(ltncr,qui in fum mo fi/U,
inalioftrnosvcl quitenios ramos cubita-
lcs, aut pauloainpliores, brachisliqucraf-
(itudiins ddinunt, nudos item &: fine foliis,
in furamogeflanrcs capita plenacubitaJium
foliorum.unciali **FaticudiDC**, fenfim in mii-
cronemdcfinentiLim, mediacoftadenfiore
5c eminentiore, utinIndisfoliis, tenuiurn
fk. rubenemm in latcnbus: mucronem plae
repararfentant ea folia, femperquevirent,
&: Aloe's vcl Iridis niodo, invicem ample-
xando natcunrur.Truncusperquarn icaber,
mulets rimis dehifcic, humoremque fundit
pjrCaniculjacftus,tui in rubra Jacrymam
denfacus, ^nguis Draconis appelljturj ob
quamianecaufam.hancarborcDnconcQi
nuncupavi. Materia truncifirmactf, fer-

rumquedifficulteradmimt, qu6d veluct hbriscranveriim & obliqueexcurremibuscon-
fctet:atramicummulwfticcopragnanrcsfint,fatisfaci!ccsdipoflunt.

EA w arboremOlyfiponeprimum vidi annorparata:ralutis[iumanit,quingcnrcfimo
fcx-iccffimoqLia^Tt.i(uprainillclimuni,poftraonafteriumDivjeVirginiracriiin, cuinomen
a Gucia.ottopalmorumcrairiudincjincer aliquot Olcas in conenafcentra,naonacliisig-
notam & negleftaro,qnani neque florem, neque fnidum ferreafierent: rem tamen ali-
ter fc habere pollca^cprchendi, ramubex ilia ipfa arbore anno fequente rcvullo donatus
abamEc.EriafticnJioranufufucinsumaliquotfoliis^grucdquefa^ment&llacryma
meismanibusextmta mulcoccmpore adTervatuuii, aC«rarc Maximiliano cvocatus, in
Belgicacum multisaliisciusugciersreli^ui) peda-jarnpliorevclongicudiUi^p, *uiinlixrent
ahj ramuli uiulco fmi2u racraacira coopaiSoofHfti • Frudui color flaWccm, (jrorali-

quptulumacidus.magnitudoexiguiCrafi.Euminrummiscapmbusnafciuerifimilceft, ut in palma dadyli nafcuntur: fpadia tan>en un illos in chdi nou intdlexi. Hums porro arbonsrccntiacapicateneflafunc, Sdhumilium Palmarum five Charnxriphes njodo.cums cerebrum indlciciispif,edi polTent.nili amamudo prohiberer.

A p v D veceres ncarincm Mus arbors me[ioncm racereirtvencio,nifi forttea fit.quam Strabo ex Pofidonio Gadtbus nafci tradir.kbro Geograph. rrcio, his vci bis.

Galeni arbor Pofidonius

D E AjrboreGad.bus exiftenrc (cripris prodiditPoftdonius, quaramos hiimum ufque jneurvates habcac.frondesfxpiffime mucronis fpVciemgefbnKs,quarumIon&tudocubitalifeft.latrudod]gicorum quaiuor. Huic &illudiiinammefle creditur, ucunof'rattoramo lac effHuat^radiceaWcinaminij humor exfuder,

V E R v M nequcnoftra Ivec arborramos incurvatos.fedcrctflos^cqucfoliaramiata hacc₃illmsraraisefttradislaccx(udac,at humoraqoeus dunraxat. Deladicc quod adfcrit, noftrxfM«quadrare videtur, equafecundum radices tcrebrata.kcrymamllatisauni; mponbuscmticreaiunrubram,utpo(leadicemus.

C £ r E K v M Uludhietetiamobicer indtcatum volo,quiain Gadium mentionem incimm, me, cameifidiligenterroiam n falamperluftrarim, nullamarboremconrpexilfe Pofldonmsfcrit: fed nequeullam aliam, prxter aliquot falices, & imam am al«n.^hceetf^abincolis vimfided.gaiincepijcircaurbemGadc^rccnuadhuc ii«[,.,mavir, dar,afu, nnr,omn.frufl.fcrarumatborumgecreex,ult, ffi_ma,quo* . . . clhgiaqoidcmnuncapparem, faburraarenacea, qoamnaveseoanpd 'me exonerarum.omniacomplente&cxutence. Ex recenioribus'b'nr- i TM i Δ i S - - - borem defenbere memmi.fcduccinaeadmodiim

Alqui Draconis

A L o i n vs CadamuftuslibroNaviganonumcap.4. eiusinhxc *verba meminit.* rro fau* IN inrulaPorcusfanaifeCananisuna.eft.SaneisDniconis larTM, odahc- nis decoctum & defecatum, fanguis effi- riturquem Draconis appellant. Eiusarborfruauni producit Cerafi inflar menfe Martio, g^o . . . iltueximumjColorisventi

P o s t hunc Thevetus Singul^{is} briumFiancia: amaraicrcap. vin. defcribith.s verbis eGallico reddiis.

Cinnabari Dignitate

E s t in Canaris infulis arbori genm.certoanni. temporegu_{mm}i fundens, qu< i San- guinem Draconis vocant, perfora ca aibore propc radicem fans laco & profu ivlo h.a. fructus luteus est, magnitudine Cera- ca
bre aut ardoribus valde vtilis . Non est diffimile hoc gummi Cinnabari Diofcondis. Hoc Thevetus.

E t sane id gummi quod apud diligentiores quosdam plantis scopulis invenitur, Sanguinis draconis in lacrymis nomine in- g nitum m gna ex parte ex Madera & Canaris ut- fulis in Europam inuehi- mnmncnamcx Ap- barim fubminiftrabat itica, que Diofcondis tempore Cinn-

A n hac porro arbor alicuius mometi fit in medico ufu, neminem feribere memini: fru- tus tamen aciditas argumento est, utiliter in febribus (vt cenfet Thevetus) praberit polle- Eius lacryma adftinguendi vi pollet, illiusque ufus non infelix ad multitudine . . . cas fluxiones, croentas excreationes, firmat^{do} scommorosdntcs, & roborai] dai < in < iv 3 S. Quae facultates eis admodum funt fimiles . . . quas Diofcondes rinnhnr; ^: ! . . . "fui uiuic Hæmatite lapillo efficaciorcm facit. Hanc ob caufam, non abs re exillu- jaMtl1 Q^uæ A Medici, exquisitum illum fanguinem Draconis, legitimum Diofcondis Cinnabari præferim cum eius tempore a nonnullis etiam fanguis Draconis appellacaCi.

PERSEA.

CAP. II.

V . DE rarenciam est S S t S S U ^ ^ m ^ < * <<<, fb Valeriu? utbeventia lap.de, e America, ut ferebatur, ed delatam.

Persea hifpania

r Pyro fimilis est, in latum diffusa perpetuoque virente coma, ramu- bus. Folia illi lauri latifolia, fuperna parte viren v emere o- loris, firma, nervi aliquot per obliquum difcurrentibus, odore & fapore qu^o commen- data, cum adftictione tamen linguam mordicantia. Flos Lauri fere co^o poli^o nc^o ematum compactus, pallidus, fex foliolis confians. Fructus per initia tempom pyri in modum oblongus, nigro colore, iucundoq; pe conuocc, gultu caftaneæ aut dulci amygdali v hauri abfi. V . l . Vre florenitmconfpxi, Aummno maturam fructum ferre intellexi à c. v. d. Ioanne Plaça Medico & Profeflore Valentino, qui mihi illam quo nunc dixi loco commo^o mcolilque t^M4w*, dtciaf- ferabat: tamenli qui nobis Americam defcripferunt Hupa^o illi, aliam ab hac diverfam arbor- rem hoc nomine infigniant. Sed multis poftantus, ab eruditiffimo viro Simone de Tovar Medico Hifpalenfi, qui fimilem arborem in cultiffimo fuo horto, cum aliis exoticis ftri- pibus alit, non Ma^o bay, fed Agucate vocat, edocuit lum. An vero hæc arbor Veterum Perfea fit, nec ne, di piciendum eft.



THEOPHRASTVS Ubro mi. Hiftoria: Plan-
tarumcap.n.Perfeam irtliuncr^odumdefcri-
bit. Eitetiam in ^Egypto aha arborPerfea-di-
<St>afpc&u magna &pukhra, fcd maxim/fimi-
1 ispyro&c folus, \$cfloribus, &c ramis, & toca fi-
gura, prxterquam quodhaec perpetup eft folio,
ilia dcciduo. Fruttura aurem fert piulcum,
eutnqc omniceraporc matunimcdit, novo
(empr verexcm occupanre. Mi :cm
fub Erctiarum flacum; rcliquum c
ferunt&:rcfdndunc.E(tniJgn!tu<:
intus: .mtiDcns queDoadaiodura pru-
num, Brdmulcominorc&molliorcfla: car-
nem «B6 valddulceinjfuavem, conco^uque
facilem: ruhil cnimtw? qui inn
tentar. Exc: ha huc arbor radicum tum lom
tudinc.tu Knc, cum cnam multicu
ne: marc nhabccrobjlUm , alpcfla
pulcliram,atn klotus, cxquafiraulacra, Ic-
ctulos, mclulacra pcalia huufmexli conhciut.

S [AI i L i modo^pJcmque fere verbis iplam
Pliniusdcfcnbiclib.xin.cap.ix.lubPerikxar-
borisnominc,vocciplasc(3milccis,quastamc
lib.xv.cxi

Perfc. Tiinquit, aiboresfero&enm difficulratc cranficre, ucqua: in Rhodoniliil feranr,
quod primum ab /Egypto carum fuerac hofpitiun. Falfuin euvenenmacum cruciatu in
Per(isf>ignj, ScpcEnari ncaufaaRcgibuftanflauain^Egyptiim.Sc terramitigata. Idcniin
dc Perfea di! ifentiorcs n-adtuir, qu^ in cocum alia eftjmyxis rubefcentibus fin)ilis, nec extra
Orientemalci voluic. Eamquoqucerudiriore negaverunt exPerfideproptcrfupplia
trantlatam, (cd i PerfcoMemphi facam, &: ob id Alexandrum illacoronari vidores ibi jnfti.
tu)(Te, iihonorem acavi fui. Semper autem folia habec&poma/ubnafcentibus aliis.

Qui fine locuj eorum fencnciam aprciflime refellit, qui Perfeam arborem cum Per-
ca ina!o eandem efle jCerebrofufaslerere volunc: uutaceam urriu (que arboris hifloriam
fdififilmam

PERSEA item meminic Strabo Geograp vlcimo, perpetuam illicomamtribuens, & p, fl>
fructumpyrum magnitudie figura oblongi amygdala motu puciminciuftum & cono
S E D & Galen, hb. 11. dc Alimct. fe Perica Alexandria; vidifical Tent: meminit & aliis locis.

IN eoomnesconveniunt. ut Perfexperpetuam cornartribuanti Oblongum fructirnj
inclu film amygdala: putamine&corio. Hacc quam exhibco arbor perpcriaaquidemefcc
nu, folioaucm & Bore laurum magis refertquam pyrum fructu etjam oblongo eft, fed qui
myxis fqualemilli Plinus locoiacnadduiaombuit Jaut obtongis prunis fimilioritt, Quara
atnygdalL5. &: colorc(iicPlafareferebarJ nigro. non hcrbido.

l'raQjf.E, vcverumfatcar.; an]C[fi nonnullifcum Perfea Theopli raflo defcriptanotis,
hicnoftraconvniac; mihitamenaptidsquadrare vidcturei. quam Plinius libro iam me-
morato dcribit: auc quam Plutarchus in -ifgyptona(citefatur Ifidigratiffimam, quod
fructum feraefiguracordisxmulum^olium verdlingii T. Sed aliorum idrdinquo iudicio ;
nobis fenrentiamnoftram in medium prodilil Te fatifeft. Non poffum tamennon mirarij
quofdam Perfexhiftoriam ncligcntius pcrpendentes. nonefle veritosad hanc noftratn
frufus Cucu fuo pulvinonudati «oncm inuis Commentariis pro Per(earfru6Vuadiicere,
fructuscerceplane offctqui nobis aliquando pro Bdellij frudu obrufus fuic: nill Forte pyri
vel cordis forma quam utcumque exprimit, cos utid faccrenc impulerit. Verum Cucu intc- > *
ger fructus, etiam per multos annos adfervatus, & plane reficcatus, pugno maior eft, ma-
gnumque perficum malum potius xmubiur, quam prunum autpv'n'im. Eius hiftoriam
Theophr. lib. iiii. Hift. cap. 11. Plinius lib. xni. cap. ix. tradunrpaulopoft Perfesdefcrip-
tionem. Neuccriamcn Perfea; frufum pyro fimilem facit, fed magnitudine illi xqualera.

Hvius quam exhibeo arboris neminem haflenus experimentum feciffe, quod
fciam, puto.

A T Perfea: fra^iim cibo idone tim, & ftomacho utilem Diofcorides facu: aridavei6 fo-
lia in farinarnrcdafta, illicufanguinis cruptiones filere tradit,

GETERVW Afa^abHiipanis Hiftoricisdcfricp cum jarborcft formofajfimilini odovi-
rens^ciuglans laiacoma, fed celfa, &: qua: in Pyramidcmaliquantulum deiinat inftarcu-
• pccTi: foliis lo. igiijpdo major quam lautudoj^ naccric ligni fungofa, frudus rotundus fii
magnus. carn mafim cotoneum refcjrKjfd tapocperfici mail "uracini cui inlunt terna
vclquatetnaof Tajflrduinplurajvaltjc amara. /-
Matt 11 T-
T T M ? * * *
r S i J d u .
* * * * * l t u

LAUROCERASVS
Laurocerasi flos.

CAP. lit.
Laurocrak cum fructu



JEc huius arboris hiftommbuloprodiram .imcJneherbariis quidem noftn x zatis cogtiiramaibinor. Cum autem ex earum fit gencie, quae perpetuatomavucnt ,c\le-gaiKiffimaque fir alpeftu, locum inter prinus, in noftnslilccCommcn ranis, mrcicdiJb* vciidtarevidetur.

Laurocerasi flos

Est vero Laurocerasus [Gecnim appellaretibct, Scnominiscaufam poftca explicabo) jti ftx magnitudinis airborjcaudice recto ,mu[tis ramis doimojq uicarticc auovicncc obdu- £lifunc, [iovel!i5tamc[iomninovirenttubui. Foltaaltenutimramosambiunt, nondccidii aj Laun laufoliajlive poriiis Cm \x mali fohoruni xmula, pcr am bitum nonniht) dt'tata, ncr vis aliquot ex mediacofta m Utra excuiitmbustfupcinc (plcndtia, infcinc ncuquaqu3tiⁱⁱ color in vetuftis ex aere vircfcens. tn novcllis ex vindi pallelcens: faporamarus, niiclorum mail perfica, aut amygdalarum amararum armulus. Flos initio milii non confpedtus, nam quam alebam arbufcuia, fine flote, iinc fruftu periiic; quam veto D- Aichoitzio dederam, anno adogefto tertio fupra nulkium & quingentcfimuen, tcnfc Maio cgrcgic fl^o rutt. Paucis portannis floruit cciam D, Joaclimo Camcrario V.C quatinpifdonaram »** ille Noriberga Vitnam ad me (criplic. Oblongas porro in lummis vetuftis ramis inter fu- periorisaTim folia fen baft« Us ,digttalis Iongitudinis, craffiufculaSj in quibus brexiipedicu- loimicrofi, & racemimmodum confcrici, nancuntur li>rcs, candidi. quinq; foliolis con- ftantes, niulcis in umbilici ambiru Itaminulisprediri, Cerafiavium vulgonuncupati Soribus non arimudumdirrimilesjodoristamcncxpertcs^uinullum frudus rudiment Limpf^o buerum, (ed caducL adtrLodumfucrunt. Supra hos deinde rami germinant & novc Uaiⁱ protrudunt. Fructus, quem in arbore nafcentem non vidi, fed qui Conftantinopoli miff^o fun anno (eptuagtilmo quarto & oftogcfiinofcxto fupra milleumurn ficquingentciiiun) ovali forma rok. cxigiii prmn niagnitudinc, Scbctcnfruftui proximus^bris mgerjrugofuSj pulpaprarditus dulci&: eduli ,cera(iortim vcl Bmncnfium in Moraviaprunorum pulp* modc>.) (H uium cominens tffili parte orbicularem, dcinde fenfim in oblongam renuciiHp cuffidcm ddinentē, uttcfccfcicpofTunt amici Bclgs, quibuseum fruftum ninccomuni- cavicum GaUccatibus live Peranisprunco UsjalbiSj Oblongmfculis^acidis. Vtunic iuc fru- £tum licet diligenter terra: com mifcncm, ct; am in fiQilibus, ut commodiii-curarem, tuncgerminavit. AtcniifodeirnominaTceptuscft Byzantio ,anno .fr. D. I. :^{cxxi. hcc} iimili ft^ma, colmc U fapore praedmis, bViaaur tema habuitfub pnfranullo piuinine incluf4feminaplan^(ipadiceicoloris, pluri'->iumaccodc[iaadLoiiapnrii?inx, vu IgdGoaia* canacniincupai<,"mina.

Laurocerasi fructus

Laurocerasi fructus

Citria

Limonca



Limonca 4. generum. CITRIA ferè similis est, quam ipsi Limonera appellat, cuius fructus minoribus Citriis pares, oblongi, fatisdentacarne, & multo tuc acidopradici, nullis aut per paucis iptus

acini: folia Citrus breviora, flos purpuralocns fons spin* minorcs Bd brtviorez quarnm Limera: huius generis rcpnuntorctiamdulccs, minorestamen& oblongis Limisfmincs. Audio die usgenas prxgnans reperiri, ab Mm fiuclum minoicm inlecontincns, incol* t"ualmtrnai, i/w*if/f«S*Jwvocat: veiumidffctms noncUmihiconfpectuni. Dodifs, vie S.deTovatecx Fortunaitis infuUsdelatum fenbebacin Indicc fuihoni quem ad me inictebaranno M. D. XCV. & attud genus(calcrctotum ferecarneum quodvanajfigurarepreclentat, eamobcauf Tamab Hifpanis Lmexts di• fyurai appellari. Quaru aurnci genii* > omnium maximum coufpiciebam HagxComictis apud Batavosarino M. D. XCII ri. III¹*. Heroins PniKipide Chimayja Dofitiffimoviro Bernardo Palud^no Medico naiffum^id enim Citri) mail grand ions magnitudincm xquabit, coiticem veiomuiusdenfun-^ & auri itffat falgenccmhabcbar, grumosctiam intcnotes minus acidos, quamrliquagcncu.

Q V A M ipfi Limeram ntincupanr, ragnocaudiceainjrgii, r3mofquchabct "tt-n"io^{ics} longo Sfirmu, lungisjvirentibijsf pints armatos, folia perarnbtiumnonnihil serrata, florum candidum, frui sum pauio tninorem Limonera, oblongLulcuum, ubi matu ruit flavefcenrem, corticecenui, vtnilnifl (uccum ferè continuoatj Cumquf acidiffi mum .Semper flore & fruclu onurtaconfpiciwr. Aliud potremscII gennspet omnia ferefimile, nififpimsciret, vel eas perquam exigua, haberet, & illius fructus rotundus eflct, fumma parte quali corona autcnbilico mfignirus. Um ufque acini feu grana oblongalunt.

A V R E A malus rciiquas huius generis ma^ntudinc fuperat, Malo vulgari non infe- lior fertilifolo, tametfi humilis interdum rperiat: firmosliabct ramos, fpinajpauca&: breves, foliavindu, annimcper ambttumkraca, floreicandtosodorati Cfiraos, fructum, N4TATI) & Hifpanivocarr, matuhtaicaurti coioxis, fuccopraditum auc dulci, aut vinolb, aut acido, tn quo gvatia frrequentia, rocimdiovaquam in Limonibus. Habct etiam hie arbor fuigtncris pum^ioncmjquunnfitioncvelinoculatione prorjagatur: libcratio refthxC fcrendis floribus & iTtalisciam infngidi^ regionibus, modonrc curetur.

E x co genere quod dulci e(t fucco, Hifp. ili apud Ciarrufianos (Ht(pani/« Cntti*fno- minatit) transB«im8umen, binas arborrscnfpej; i quarfructum fertbant carnemulto nTmotepreditUTft Attneniscorum fere rnpdOjlicetfimilitercanierulisidifliriftijm& fuc- culcturnvtteliquotu^, cuiuscoTtc"svn\ a^utTifaTne& (uccofa tubfti-nti-a fnatidcbatut, cbrticiscoltir in[ignfcr; auTeuseft. Hirp. ini. »V(if4«jjQ«/ voca. m, Aliudid fupergenuicuius fuccus acidusiiniciTiTi granumcomincb^.

Milum aursum.

Poma.Adami,



QVAE vulgo Poma Adami dicuntur, ca Galli *Pancire*, *Baccici*, *Terenjari*, *Lusitani*, *Zambos*, *Toronjari*, *Zambos* appellunt. Arbor ipfainrerdiimiliumtlor.e[t,Cirria: perquam fimilis, magnatamcnex parte celfiorcm Malum aurea squat: breves habet fpinas, folia Limoncrx, florem candidum, odoratum, fructum rotundum. triplomaioem aurea malo, macurtute Hauescntem, corticc iniqualiijdenfo, craffa & fungofaearne, qua: a nonnulliscmn cortice fi mu! cditur, fucobrevibtis follicolis nt3iinali aurcx comprchenfo (inreliquiscnim generibus foiliculi iivcvecifulsefuccurn continentcs ablongiufcula; funtj granis fubiocundis. Nonnulli Afyrium malum vocatit.

CETERVM, prater Aurantium malum cdulicortice, decem maltMedici genera apud Hirpalenfts invniri, cxaltero Indicc, quc manno M. D. XCVI. cruditiffimus vir D. Simon dc Tovar mittebat jintclligebam : accipicbam cnim ab illo femina illius quod Hifpani *Zambia* appellat, deinde *Ltmonts dt c&rne*, *Ltm<nts dt figuras*, *Ltmenes prc Sades*, *Ltmenes pencitt*, *Limonts ttttits*, *Ltmot>tsdukes*, *Lima daicefjimai agriai*, *Limena afe TWfe*, *Vcl Lmat dtl Emjw<iJ*r*, quoniar a, inquit, ablnpratore Carolo V. cx Vngaria in Hifpaniam prim6 delaca hsc plata fertur, cuius quidem opiniort]sfidc maugere videtur, quod ultraceteramati Medici ffenera, haec frigris patientii Timaxi fiat, Eft autc meius fru Ausedulis multo fuaviore gottâ prxditus quim Auratia exaxel, fuccus vcr6 eius maximcad acidum dulcem accedens, weo quocumqum rtiali Medici^enem macidorum fuavii Timum.

Omnium porro folia pcrpetuo viridia funt, multifquc veluti foraminibus. fi Soli obiciantur, r, pertui3, infarfoiorum Hypnci, iunaudquadampediculo mhitencia: fola mali aurcx folia fecundiim iunfluram tamquam appendices liabent.

CASTANEA EC^VINA.

CAP. V.

Qvi NAM Cattancam CL.v. Matthiolus commenrariis in i. lib. Diofcoridis defcri-tjphc: quoniam umen nondum apud noftro Sjauccen cranffime confpe&aest, & mihi gregic adolevit^llius hiftoriam adicere libuit.

VASTAM cflcliancarborc intclligo, quam fane Vicnna difcedens anno M. D. txxxviti, i Ricrcliqiu, intradiodccimum annum, inhumane coxa; cranfncudnicm, duarumq3 Orgyiaturn aut amplius altitudmem adoleverat, lacamqtie comam fparfcrat. Frigris patitiffi mamcf Te. umbraqlc & aquaut Platanum dele<?ari deprchendi. Autiwno autem, cum folia abiecit, protinu F'gcr ita mntaccum quiddaii extremis rami ili Sjj^ tutgidum. quafi partutu C]ping oih quato lenthom f& Bofif Bcnfuri jiqi qocci ilices & hntit fo di drcadh xrcnt, totaque hic me ita pci>durac, tloncc 'ncance verfa przmacure admodu^i, f, tmm* in folia

Castanea squina his feria.

Malum aureim.

Poma. Adami,



Qy AE vtilgdPoma Adami dicu[r,ea Galli/^<<</Bxtici,7'tfr#HJ*r,Lufirani ZamLoai Toronja
 appeffant. Arbor ipfamterdum humilior est Citria: perquam finiilis, magnar. anienex parte
 Zamboa.

CETERVM, prarter Aurantiam malum ducit corticem, de cmmali Medici genera apud
 Hippalencs inveniunt, ex altero Lidice quomanno M. D. XCVI. cruduiflimus vir D. Simon
 de Tovar mittit bat iitelligebami accipiebam enim ab illo femina illius quod Hispani Ztm-
 ^appellat, deinde Limontsdtxmt^Ltwntsdifguras, LtmDaesfrna4os, Lirtients fom'ttSy
 Limentst(uties, Limo%tsduhts, Limaidu Ues Jimat sizriai, Limamtdt YuluycX Limasdtler»-
 ^ (r^r, quoniaoi, in quic, ablnprator Caro Io V. ex Vngaria in Hispaniam primddclaca
 hxc placafertur. cuius quidem opinionis fide maugrevidcuir, quod ultra cetera malt Me-
 dici genera, haec ftigoris patientiflima cxiftat. Eft autem eius frudus dulcis mukofuaviore
 guftu pricditusquam Auracix caxel, fuccus ver6 eius ni axime ad acidum dulce Diacedens,
 ideoque omnium mali Medicie ierum acidorum diaviffimum.

Omnium porro folia perpecuo virtudifunt, mukifque vtuci foraminibus. fi Soli obii-
 ciantur. pertufa, infar foliorum Hyperici, tunduric quadam pediculo mhxrentu: fola mali
 aurex folia fecundiim iun&uram tamquam appendices habent.

CASTANEA ECLYVA.

Cap. v.

" p Q vi N A M Caftancam CL, v. Matthiolus cemm rariis in 1. lib. Diofcoridis defcri-
 TL pfr: quoniam ramen nondum apud noftros, aucterte ranflime confpe<3a eft, & mihi
 regie adolevit, illius htftoriam adiciere libuit.

V A S T A M cflclian carbore intelligo, qnam fine Vicnna difcedens anno M. D. LXXXVIII.
 iftoreliqui jintaduodecimum annum, inhumana; coxa; crafficudinem, duarumq; orgyia-
 rum auramplius artinidinc madolcvepat. latamq; Liccomam parferat. Frigoris patientif
 Tinnam eflit, umbra q. &: aqua ut Platanum dcle<?; an deprehendi. Acu^no aucrn^um fo-
 lia abicit, protinur* gentamentaccum quiddaii extremis ramulis^ ifeturgidum, quafi par-
 tunat jpinguic & rJento humore confj> crfum, ii' iquoculices & huifeiiodi infesta lia rent,
 toaquichic mcitaplidura Cjdonee' neuntevcp; jfeprz mature admodurtj^ cmmx in folia

Castanea equina.

Castanea equina: fm&usechinato fuocaliceie&us.



Castanea Pernanx fruclis.



ftfecphccQc.quapalmatafunr, & plerumaue fi-nr^
inh*reriria, tunc Lunic & diluio re virid S Mr S^{n * n 2 mc / o uni} idem^ucp ediculo
tefinaprc fenfimiitatum exerefencia & Mr^{Menofa^u gofa} longa^ab
vircmu, infcrnecand, cania, amariuftulo faSore
Temper anjualli liei uoppo fi
to tamen, alternatum ramis amplectuntur: in ve ramu v tent,
uti sunt, sub quo later alius succulentu s, viridis lignum ambiens,
lanfolio, cu huius arboru materies peffim, lsrft P^{Cl; ailttime lufdem} excaquamunicam
con f a f i i n ram ->ituaiieni vtdi ! m U^{i Hos & recens frue ^ n ondum m. h i}
fc Inc que fr p ius pctitos ab amicis oui Conf^^{a Cr Cr veri: > utr Per art: flor} «daturara:

<: tandem cum foocbiirc c o m i n u l e i ^
tt vcrAvu! garicaibn «*qua]is, inte d ^ yzantma reduce anno M. D.LXXXVII-
hfidplanior & orbiculari quodamtoodofo Sf^{ma 10 rin o n} mucroncmdefinensucil-
nente, quod fenfimgracilckens. ad nronV^^{itubercul} oqu)t)damfupene re parte emi-
rivest, sed infima, ua lre calyci adheret, exalbidu s, f) flTMP'opc i. od Un. ii «aiii
impressam habc, q, m, l i s i n v f i c a r e r e p e n t u s f e u p e r e g r i m e a m i n e c o n f p i c i t u r , s e d l o n g e
maio rem, nec na cand: un: tingularis est hic cortex, nec aliam tr i
tra se occulit, quemadmodu
vulgarw nonadco grati raporistamen S^{TM a & 1 oltda} ^nfec^ne, Candida M

cem o n f e n d e p f i I f e r i i n f i m a p a r c , n | p o r m u u u j u s p i n e r e p n a e i d i h i f e n s n u

A&a&aali.

Torci „ue P M i P vel < J f a 3 m p u * l l u c a r ^ o n c o n v q a f r e d e p r c l i e n d a t u r
froflum devoratum, n n l i ; ! X . ^ l d = f t , ^ \" a e a f t a n e a : n o m i n P i ^ T M - , n .
Gallis dicit potest Castagne de cheual, Germanis Noffo hfiat, Itali Castagna di cavallo.
Hic no' possum no' adicere elegas Castanea genus mihi a doCastimo viro

Castanea de
casalla.
Castanea de
casalla.

graphoclariffimoAbrahamoOrteliOjVeterearicodonatumanno M. D. xci.quodille
PeruaiuproLjiiciadclacii,accleberimoV. BcnediftoAriaMotano'pauloanreacceper:...

Spliaencx con 6 pxne figurxcft hxc Caftanea, nifi htera babcret paulo deprefliora, pr&- c*Jf.
fctim vbi pediculo inh^fit.corticcfadlfcafrOjfragilitatnen,Sc velimfungofoobdufta, /o-
Ions ex fu (co aLicjuantuliiia flavelcciqfchuic (ubfimt innumerat tenues quidem fed f\$ax
i'pinx, pu quod nuclcum influait, renaater inhaerenres :ipfumpuramen fw:um
dt,ru)ndc:i:•• i,fcd lcntum& fractd contumax, interioreparte Izvc&fplendiduiii, quo
continecar nucleus amygdala (pammeruolibcnc) raagniwaine \$C colore, forma autem
leporinorcnifimiliSjincusalbuSjaporedLlcisfere ucamygdalaaicuafancavulgans.

Ems iconcin, in (tudioforuin graciain,(nb Caltanea: equinx fru&u, 1 uo echinaco calice
psditOeadcm rabclli expjpK curavimusa pcrico Si diJigente artifice.

PLATANYS, AfH, SORBVS, &c.

CAP. VI,

Placanus.



TA M E T s I Pktanus in iis ⁱⁱ_{lib}mm.
regionibus quas adij Ipo-
tc non nascatur, quia Iramen
cum Caftnea equina Con-
ftancinopoliaJlata, ad aliquot
orgyas mihi Viennx Aultrisc
adulevit, iJlius menrionem
hie obiter facere volui; Hi-
ftoria apud alios videre hcci.

A c i a r s etiam, quod fo-
liorum fimilindincproxime
ad Platanum accedit. Eiusin
Viennenfi faltu, & aliisvici-
nisfyluisobfcryantiirduoilla
genera, a plcri%; ii defcripta.

Latifolium oblongiore
rum uva, candidiore&:hxio
quod abimpentis
line donatu est:
vocat, Vnga-

Ab... inore<blio,firmio-
re... fa. c riWiore. core i est,
ab imperitis in Gillia Syco-
mons nuctipathin, id Gallis
E r t i U, Vng,iru I bar fa did-
tur. Vrrmq; genus Germa-
ni fatHVnb j)(«f6t)ltti Itali
acere, Hispani et acre appellat.

SORBVS item corniinatiss*^{tbmft}.
Plinio dift,i&: Herbarionmi

ijlgo,quam Anguilara &do(5tiflimiquicCratargumTheoph.lib.ili.Hi(t.pLm:cap.xv
deicriptum cflcccrifent,Viennenfi faltui,& plenfque aliis Aufrix & Pannoniac fyluis rami-
liariseft. Eius frulus Odobri-Vknam in forum venajis adfertur, atenuioris ibrtuni
hominibus SCpucris admodum expetitus:Gallit_x*//cfw.GermanicWaftcv/VngariBar.
koczca vocant.

FREQ^ENS eft&iifdemloci^prciertimvcroitcrfaxa&rupes, idSoibigenus,quod
nonnulli AriamTheoph.eflccenfem/oliocoryliautalni fere,fedpr
canofruttumferens superiori proximum fed colorcdiffercntem,qui ti]00c(\:mmimi
cdulcm,&:anul'oanimumantium,pra?terquamabavibusexpctiruin.Eiusinillunivulgarcno-
rrienoviprxter Aunciacum;quod Mclperpauraeft.

A VCVPARIA ctiam cognominata Sorbus a baccarum ufu, quod iis hictnc aucupes
turdis & mcrulis infidiari folcant, fohislegicima: Sorbi,vel Fraxini. Earn Dalechampiuscur stTb!
cornnalcm cenfeat,nullam caufam video,ciimcius rubnsbaccis ncmovcfaturjAa
folisturdisaliifq; fylvicoUsavibus.gallinagintr prxfertimexpetatur: deinde.ubi Platanil*-
lia, que Plinius Sorbo torminali tribuit &c. im: Va-
\$fl.mjdrdsberkinje <\$c^Xix.

A T I e>tima5or#usplcrifqnc regionibusqu^adtjfativulgarisel.foliisfuprioripro-
xima,mollioribusraVncn,&:noaibilpubpr&ncibuS,fruillum fereplcfWc^acexpeticum.prz-
fercim multerculis apucris,&£ mrcrd um lccund\j'rrienfis maturus addict. Vngari Btrkinjt,
Auftriaci

Acer latifol.

Sorbustormir. aiiis Plinij.



Sorbus legitima.



Englandis gnomis altitudo.

Coryli. var. ruginosa.

Austriaci *A. sibirica* vocant: reliqui Germani arbore ^ptUbarmfi Spntofctum/ fru&u Spntofcti Galli arb. C#Mwr, fm&. Cotwr. Itali arb. *Sordale*, fruct. *Sorbi*. Hispani arb. *Sorbal*, fruct. *Sorbal*.

Hic autem polfit non meminisse genemillmi luglandis baud tulgam, mihi cefti proxinitsaniih demum obicrvjri, & na, tinucc iurcum aliis vulganbtu fecundismen/isaJpu* fta nconvivio <Licidim adqmjd cram evecdrus^ ipfiusporronucis teo^Hcii(Jo, & ktnqiorqw vulgavsi fotma, mcin«iwbar, jtbiriDi(i. ponoe, ratus dr. etiam vulgan cam esse arborem, que cuimodi nucez ferret. Hugelando amico nucez mitrebam, qua? in p. doci in n junt, sed foliactiamprotiiJrorjViiJgnsqiticJ fogtafld^s foJiis forma fiiniJia, hoc est alau, mtiar (bTtorum Fraxini, idlggc magis tencll. iptque mambiCU ktuu-. quorum odor ctiaangravisutin vuJgari.

AVELLANA BIZANTIUM.

CAP. vii.

CORYLI. v sduorum vulgo est generum, sylvestris (pome nascens passim obvia, & domestica. qz in hor. l. co. itur. Ea etiam duorum est generum: nam **Pe**l obJoiig ukulum *Fw&uta* fert eumque duplicem, uniuscnim nucleusrtl«bn (qui pratfantiior iudicacw) slerius alba pel* licilliinte^tuevelbreviorroi & crafliu feuluni* qualis in Italia, Hif^{vni}» recciitur, & ftondmi milii conrpeftuj cfv, & L Francotum ad.

r .^T^{fc} qualis in Italia, Hif^{vni}» recciitur, & ftondmi milii conrpeftuj cfv, & L Francotum ad.

VERVM alnjd?f«nUiPcrgmu & rrarifif(vadnjoduhif propono, qu'ji3 anno M. O.

LXXXII, rnuma

Corylus.

AueJknapumilaByzantina.



Avellanx Eyzancirue ramus cum fructu minorc.



primum .dcindequadrenniopfl: lrcrumal-
latum cfi; Conftaiuinopoli ciim varij gen-
risbulbaceis flirpibus curante Mag^{co}acGc-
nerotb D. Dauioe Vngnad Barone in Zon-
eckGfilij bLtit AftiPfidji &
Turcarum linperatorijCiufq;Proccnbusin
deliciisfcTe mihiaffirmatiac,

Eiuspon-6 frutex,eodlcrenre,Tupractabi-
talem alnitudinem raro cxcicfcit,(cdpumilus^B
temper perniana:craiTos admodum magnof-^h
qtie ferciuin tenuibus pediculis calyeescal-
lofos<Wolcy.,modo (ingu)ares, mocio plures
limul ineociem pctliculocoliirentes jUivul-
gariSjCxtrema parte in multas cnflalongafq;
laciniasdivifos, tcedeiamnulcis limbriatis
appendicibusobfita: funtvcro ijcalycesforis
valdeduraafpera^IaiHigiiwhtrliitijincrciorc
fiate 1*v«, connemcs fra&tim Auellans
lylvcflri Sc fponce nafcenttfercfifnifem , vel
aliquantuliim brevioyc, iltiroq;puraminc, uc
ill3c,confantcm,<Jui nucleum fimilctnconti-
net; quern initio obreTvarenon potui ,qu6d
unicum dumtaxar fruSum,t)ualem rum in
Pannonicarum ftrpium hifloriaexpertj,im.
petrare potucrim: poftca tamen cum plurei
na&uselTerj&raliquorab iptbacccepiffem fuii
caicybus inlufos&exemptos,non modo dt-
guftarcvoluij fed cciam telluri comifi in fi&i-
iibus,non cum fuocalyc^utante milii fuerat
fig,nificatu, fed nudos:jirq; illiquidmaltero
dY x a t a r a c i o n e a n n o S f i & i f i I
rauvirgula cxcrev<ifat pcdalcm,quam fine
ordine

01 line obl(>ngiorapaulo qua m in vulgariambiebantfolia,pertnde tamenmgofa: Eius uni-
on lfruticem humana alcimdinem ruperantem.adhucafebam.ciim FranLofurtodikcdi
M.i-xcin.fedquiullms fru&usfpccimennondiidccderafcimoneq; etiam annoM.D.x.v.

ALNVS.

Alnus vulgaris*

CAP. VII r.

Alnus altera.



Cornus.



A² DE b vulgariseftnotiri* Alnus.vtaim 4
T² **Petridian**
... scriptoribus eius in-
... vacancum esse videatur
... uotquet illas
... edcninc unicum eius e
... xprium me factum ex
... hanc stirpem observabo,

VULGARIS illa, omnibus provinciis (quas
quidem adh) admodum familiaris est, & Gallis
Aulæ, Germanis Echnam, Italis Alne, Hispanis
Alisa, Vngaris Esze fa dicitur, Grecis αλνδρα.
At aliud genus alunt Austræ & Styriæ monta-
na, circa flumina & rudis locis, etiã in Danubij in-
sulis circa Viennã frequens est alteri cõmixtum:
quod perinde affurgit ut primum: huius cortex
candidior est, folia quidem similia & penn-
de rugosa, minora tamen ³¹¹juancum (superius
non splendentia ut in primo genere, sed internè
candicantia: tuli etiam & strobili minores quanti
in vulgari, tenellique rami & novella folia tullo
lento humore aspersa ut in priorè. Vtriusq; dif-
ferentia rusticis illarum prouinciarum etiam be-
ne nota: nam primũ genus Schwarzal; hoc est
Alnum nigram: hoc Wasse al; id est, albam Al-
num appellant. Huius cortex magis refrigeran-
tem & adstringentem cum iccitate facultatem
obtinere videtur quam vulgaria.

F(JLib.RV\ru^tl.in] arEmKttfteitUt de Cornpauquid subijctam. Nam prater vulg-
tain, qu* a cercris qui Phntaru Hifloriam defeHpferun,efl propofita, aliud genus obferu-
batnO&tfbns interm M. D,ax:in.cdmPrancQftmoCoioniam dcfceijdrem , Andernaciu
Rchniid , in horcojusdiverforij cui tymbolum S. Spiritus, monemc honeflo viro
ru ny mo Sc holier.

Cornu mar-
tiani
genus.

Noa ininore porrd aliquidine affurgebat illa arbor, quam vulgaris mas, ejuſque
fimili corticceratobduiflus^crtim rauulijillmsramulislongcfragilion.'Sjfbhacx vderfo
eosam^pletn^ncujbreviixrdiculojinftarfoliorum vulgarisj niteo[ia,ncc iilisminusnervofa,
inambitti nnn (irrr.ua, (cd vulgnrisfo!ijsbtiora,ex quorum alts cutaccsthecremergebant
ctuim anrc brumam,inquibus Horum rubfcqitencenovovercexplicandoriirngcinn3x:flo-
rcicnimcum vnt^ari ,ejuſque fluſtuscuin ille inatiirefcic ,iaturat!iis tamen (ucihtclligc-
hi^njitibiatercranjoraetiati.n.brc^ioraqueofficuaiahabet.

V v LC A R i s autem Cornus,ledfyluſli:rior&magispumila, frcquensnafcturinultis
Auftrixnferiorisfyluis,

Cornu mar-
tiani
fmmha.

E A p EM foliorumEnicaf.icic,utqua;circaVlmiiriicC!arnobrcrvabarrijdiimSaiman-
tira: in Hifpaniaagcbimjiic adijciam: nempc Vlmormiijuxci TJiormim amnem nafcen-
tium quafdam radices in frequencia tenuifTimaqueitaminadelincrc .atquecum
guaquic!imianimalca!alocuitiilisfvexigLiisrqi!illu]isperquamfiniilia,qua:Salmaticcn-
itſpiltratoresdiligencrccolliguiinefcam ncpiiciidispitcibiisidoneam. Qji^vcropifcato-
rurnoculoſcfHigiuntjildiLitiuwlisradiculisimplicaraperfiſtanr, adoleſcunt, &extradicu-
liſcmergciiti:] avolantinlartcrrcftrium Iocuftraruni:polteaccixottfpore tn aquasrcmeanr,
adconfervandum faum genus;

Longa
radix
flos radi-
cis.

SILIQTA STLVEETRIS.

CAP. IX.

Arbor Iudae.



H V i c arboriSiliqux fylvcdm nomen in-
didi, nonquodfiliquxvereribus deſcriptae
familisikjldquononhullis Hiipatiia;locisvul-
gari no m ſue ik appellhrf

i. C R E S C I T incerdupinarboremjtrfSTna-
gniludiniSjlocisculciirfcudcgleiSaSdfj
icens,plermque in frutice potius, quam ar-
bores ccn(endac;fi.R,iiiors^f<^raB
rim ex larchbus nafcenrc'S.corcicc ex
nigricateta*s, qui primo Vercaitefol
primiim gerrJlinarc nic^pictibus, *
KrnnsA]\$quMzinc><. Bores finuil
genilljrautpiJoi:m forij^i,colorcpurj-
ginci:fi)JHclc:indeel?mtervaUis prodc
rerc,minus tamen earnofa, circinatce prof
dum roj^Kdkacis,nervofa adiftodum uiiAr&m-
lociiiarum,& dura,ſupcriore parte viridu ,mrc-
riore vero nonijiIAcandicaotiit floribusfucc-
dunc niembralaciarpurpuraiJKMCs liltquaf,&
quodatn inodo ftan rpareateft^SLprcdy; d^Bt-
I its longitudinis & Jati|J8lnis, m quibus Icmcn
lentis planum,dLirun]i

Siliqua
genus.

i. Almdgenus inveniturpcronmiaferefimile, A
pra:ter florem,qui in hoc candiorfdm in ſupe-
riore purpureus (ic,& corciciiJnrguksrua] qui
candiratpotiisquam purpurareit.y

Arbor Iuda-
e.

Spontenafcturprimumeenus'GraQ^I
gnOj&quibuldamaliisHiipaniſatqueNatbo-
neniis Gallia: locis inter (epes. Alitur etiam in
hortisnon modoin Germaoia & Be!gica,fd
eiamin vcteriHirpanire Caſtella ob venuſtatem. Secundiini genus flore candido ſpon-
te nafcenſnon vidi, ſed femine dumtaxat natum qutbufdam Belgicisliortis.

V v L G vs HctbtrioTOTS Arborem ludsappJar.-qmdam.Tj]jqHanimiivcJoborumge-
nerntioneFabjginem:Granatefes vulgari fermionc Akaronobco, hoc eſt Siliquam faruam
fiveſitveſtrem : M^uritani illius regionis incolx Dtt: CaRellatii propterclegantiam &:vc-
nuſtatem: Arabes d' auor; Galli Guainier,quafi vaginalcm,quia, ut opinor, ejuſſiliquae cultro-
rum vaginae ſrnnjl*ir<r.

Arbor
genus.

C^yu nomine h::c arbor veteribus fir diſta.non facile dixerijiiKonnuIliad Cercin
Theopli.rcfermic.Scd canihil aliudcſt qifam populitrciumgenuj^ldgamrcdrcrcriptum,^^
quod

quod Plinius Lybiam appellat, Gaza ve
brum usurpavit lib. i. Theophrastus
lib. a. Carca
mentum Siliqua
est ex unica illa
loci iudicare.

Citium
Thiopkr.

D. M. Mompely de
Colte un Theophrastus
bam, peritiores rei herbaria studiofi Arborem ludz restrebantid
iptam lib. H. ft. plant. iii. cap. xvii. qux licliabcr

Quzeyefcvca Hamprovcnit Colytea appc Jlara. alrcrrius generiscit fi
multisahs concava, non admodum rara, foJio Jaunno ktifolia; Lauri fed
phorcqueui vet ulmco 6milc apparear oblongius tamen . colorc parte alec
goatitem uba b, donervof oque, ncrv ul, sprxtenu, bus fibnfquicintereaspropaemcsauze
mediocallo hacam in modum excurriunt: &c. Etcap. x n n r i i i f H m h b r i l l e c c c r i i i
buit leguminum modo. Qjia: fane noc prafercia. fi u

Cstut*
Tbtthfr,

contrahatur, Arborei ludz
PORDC
gic i Theophr
notitiz. Eam
nascentem in quibusdam Austriae montanis inveni, egre-
i. describitur ante Colyteam. & est satis vulgans ubique
appellant.

Capula.

CETERVM Siliqua Graecis *Kapula* dicta, Valentino regno frequentissima est, ubi eius
fructus in iumentorum pabulum cedit. Conspicitur & alio Hispaniae locis magna altitudi-
nis, lateque ramos spargens: caudex illius crassus, longi firmique rami, folia alata ut Terebin-
thi: aut Pistaciae, majora, Nouembri & Decembri solum instar luglandis fere, in flores ex ru-
bro purpurascens se se aperientem. siliquas deinde digitali longitudine, crassas, edules, quae
grana continent Cassiae siliquosae quam solutivam cognominant, grana non dissimilia. Gal-
li arborem *Carouzer*, fructum *Carouzes*: Germani fructum (nam arbor illis incognita) *Sant*
Tobana item Itali *Carobe* & *Carobale*: Hispani arb. *Algarano* & *Garon*, fruct. *Grouar*. Vng. ti,
Germanos imitati, fructum *Szentlancs kenyere*, id est. D. Ioannis panem
appellat.

Lentici li-
storia.

LENTISCVS.

CAN X



MAGNA solum ex parte fruticat Lentis-
cus, multis ab una radice stolonibus & vir-
gultis assurgens, lentis, & viminis instar obse-
quiosis, cinereo cortice obdusis: interdum vero
quando non caeditur, sed negligitur aut pleris-
que locis ad Anap flumen, quod Hispani *Car-*
obale appellant, observavi in arbore, nullae ma-
gnitudinis excrevit: folia Glycyrrhizae, firmio-
ra & duriora, atra viriditate splendens, alata,
hoc est in longo pediculo utriusque sili-
culae semper contrariis pinnis, ut in
Terebinthi, Juglandis, Fraxini, Sorbo
aliis, nullo tamen ex-
tremo impari
merum (ut in illis) faciente, suavi cum qua-
dam gravitate odoris, sapore acidulesculo, & ad-
stringente: ut interdum adnascuntur vesiculae
aut folliculi, ciliisibus esquis pleni ut in Tere-
binthi: flos in alatum cavis circa oblongum
pediculum racematim cohaerent, muscosus, co-
lore ex heroido pallescente, nonnihil purpura-
scens: fructus deinde initio viridis, mox ex pur-
pureo rubes, per maturitatem niger & oleagino-
sus, ervi magnitudine, nucleo duro, nigro, candi-
dam medullam continente.

Estalec.

PROVENIT copiose per Lusitaniam, Bre-
tanicam, regnum Valentinum, & toto illorradu
ad mare mediterraneum obverso, a tunc, n Gal-
lia Narbonensi: a
Novembri, n
Observat. cap. viii. refert in
nummanifcit.

fLH' * ?c?V["?P"n"TM sInfiilariumop«& «, „ / „ „ U " ? » p i o f l n ; m u m e f l e L e n t i f c i p r o -

venit Idem mihi retulerunt qui Constantiopo-
nonnihil tamen differre arbulculis ab ijs qua-
cia Lentifcos iftic excoli. quam
i ? T n Narbonenff Gallia & Itali
erunt.

Nemina

DICITVR Graecis *Kapula*, Latinis *Lentisco*,
que, Italica *Lentisco*, Hispanica *Mm**

gS3nl

nis
nonnuf-

nonnullis r-fnufr-sLufitanis (WWfrd.Ejusefina Gracispmm %cir'nm, Larinis Reli-
tia Lentificina, 5℥ Mastichc, OffiunisMafitx, Gall is iMape, Garmanis STCaffW H^anis
AlmaftigSjlzaXis Maflicr. oleum ex lentifici baccisexprclliim Gall is IW*¹ dtmajiu, Htffpanis
acite de maza.

T M B V I T Diofcorides Lencifco, Acacia: 3c Hypociftidis vires! Maflichen /aSguinis H^{ultra}
rejectionibus, &: vcurituffl ucilem eflēdicit: oleum quod e femine fit, ciim qt^ adftnu-
gendumeft.

CdminHarbonenfiGalliaderetn, oleum ex Lctitici baccis exprimebaturmagmad
vana ufus, quod in peregrines regioncsaſportabatur. Etdentifcalpiacxpurgandisdentibus
idonea. non minusquainolim. exLentitcilignoconficiebantur ut eciam inpleritqualijs
rc^ionibus, qnc Lencifcum alunt. Hifpini umen majore ex parte feftucis c Gingidij five
Bifnagxumbelladetradtis, dentes actbopurgareblnt, tamctGapudeoscopicscnaſcacut
Lenofcus: Fed unica Bifnags umbellaplumadentifcalpia ex tempore fubmiuifrac.

TIREBINTHVS

C A P. XI.



T E R E B I N T H V M in duo genera, hoc est
marem & tēminam diſtinguic Theophrast.
lib. Hiſt. PJant. lit. cap. xv: Marem fteril'cm faci-
ent, in ſanf ut frad, qua fup ex t, una
fruſtum protinus ruſſum promens lentis magni-
tudine, qui concoqui ticquic: alia, viridem edi-
tum, potlmodum ruſſum FLim tingens, poſtremoni-
grum facinisinagnicudinifabae, &c.

Ego illas ditferenrias non obſervavi, tametſi
diligenter inqumiuicrim: niſi differencia: lintap-
pclUnJe, cum frurrciincet feomninofimiles
FruClum ſcunr, alterinnem & ruſum, alicrin-
terdum ad mat:uritat: n perdtium 5 nonnum-
quanicuſm frucjxnunadukus, auc nicniſum-
broſb SC iniquo Joco provcnicns, nullijm fere.

M A X I M A porro ex parte Terebinthius fructu-
ca, ramis longis, ranS) Cif]etcocorriceicttis: fo-
lia III Lauri. aut Piltacii pocius (quas plurimo-
nim conſeiiſii Terebinthus indicaeſi, cujus
Theophrast. lib 1111. cap. v. meminit) cuſdem
cum illandons, circa unLiin pediculm nconjuga-
tim vcin Sorbona (centia, uno, quod excremo-
pediculu inhercc, im{iar, &: hie ajie quantum vide-
licet milii obſervdrilian] decidua. VTL, ciim
novella folia, profuſer erubcuria exrcmisra-
mis germinare incipim

tuberculis, capioſu
prpuralcens, velp
tens, qui temporis
Lentificinofere iūnile
giorem, intti & viridem, circa vindemtas, dum maturit ex rulec
& refinofum jnanurq dura colligicor inficienreni, mcdunan Mlicoi
frLiticcſcum rubt: fcerei icipjentem] antematuritatem, inanem^] jici] nt, L; arpo bal-
o quod in officinis venale prnponitur, plane ſimilem. Fcrtcciam vmdemiaru intern pore
concavo? quofdam folliculos (2u veficulas folijs & ramulis inhxrences, qna Jcf fere in Vmi
folr is natburitur, fed pallid o aut purpuraſcente colore: inrcrdum etiam extremis ram is ob-
longa & cartilaginea cornicula, variafo Tmae Xcre (centia, concava, quar (ut etiam follrculi
aperra, i_{cn}] orem-quendam continete deprehendunt uicui permixta cinrcra & fulginofa
excrementv que exiguam animacula alau.

Srroi te provenit plunmts Lufiwnia Cj Hi^ania, & Gal!ia: Narbonenſis Loci Sj ubi inter-
du; ii in arboris formam aſturgt: fed in axiina ex parte ſblum modofruccat. Nufquain quod
fciam j commemorat ſis locis retina ex Terebinthio licicur: Bellonias in Syria & Ciliciaco-
piorari inveniri. qux venal is Damafcutn inferatur, Sc in Mefopocamia. i Turcis Afamia vo-
cata. qux in Cairo venditur, refert.

G R f c 1 rtpſicn & fo > Larini Terebinthnurri, Galli 7V «fM^, Hifpani nonnuiii,) cornicu-
lis. titafbirror. Ctf/w/f^". Friia mejus Avicenna Granum vir. devocat. Reina Grxcsi H-
^ • M T . j) M n ' - % ' S , B i : i) i s P t P r , e c n : g
quaſn Terebiq d i i i x n o m i n e d o r i a n t . A b i c g n a e ſ t .

H v i w s s c o r r i c i e f f o l i i ſ c a f t e n i v i t e t n b u i t D i b f e d r i d e s q u e d e f i n o . l i e m e n] ; e f l e
illorri W & patandii S l u i n d i d a c t o n e m * . P r a i c e r a f r u a u n f e m . f l j e u o i j r c , f e d f t o m a d h o
adverſari,

Terebinth.
man & fimo-
na.

Terebinth
hiforia.

rutiln-

Sumina.

Facultati.

advrrari.excalfacer^unnam movcre,vencrem cxicaic, corra phalaneoium morfusron
vender in vino bibi. Ejus refina reliquas anteccllic, ceste Diofcoiide: Galenusramcn
noniffarumriculcatmnratioie.Maftichenpraterendamccnret,

BALLO N i y s lib.n. Obfcrvationumcap. xvi.referr, cum in'ciliciacfler, in Arabem
CarodumTerebinthi, fruftuouiftum agrret bamafum,

irtZL

%*

v^L, TM

r^w.

unff,im rnt,rn_m nr,H,r,q,ui Camelum Terebinthifruaouiftumaccret bamafcum

ffifgldT lib_aP LX T; & lib - "P - * Thraci* & Macedonia:ru^cos menfc

oscfeon'collige&dis'nucibus UifaUtl'kHLHuSicrebinthiramulis,

w—, cumpnimeftorniaaegalliani magnitudmefunr, antequam inanmii

tormaniautcorniculaexrcicanc,&tUasmagnovendereinPrufaBithvn

cnim earum ufus ad fericea lamina vanjs colonbus imbuenda-

pliisquamfexmilliapondofingnlisannisinrumi.

C. V. Leonardus Rauwolfius Hodceponcilib.ii.eap. vin.ait Terebinthi

minus. VETixTrb*(A vocanc.pra;tervijlgaremduogner:

Bonquibir.

non longior.

magnitudinetn,pi(o majorizqualcmeffcinrotundum nonnihil

eim Indicum five Dra : ucruhue frm^nm nr^> ~f-r-inis juuoni

obcaufam inquilinos abunde ijs vefci, perinde ut noi pncis nucleis & avellanis.

dora &: TM^ con(pi) tua habet folia, differunt. Po ffS

phraftihb.nn.cap.v. Indicam Terebinthumreferr.

Ri-i-. qucmad^odum minus ad ecrunderm w ? TM «

Terebinth
Indica Ther
brafl.
Pali.
Bel.

COGGYCRIA.

CA P. XII.



Coggycria
lyfana.

Natalis.

Blevar libus con-

tttt Higis, dw.tal.s enflitudinis, nigrican-

tib inos divi-

fit, —————, omantma,denfa,nervofa, tere-

binthinis folijs ferme paria, latiora tamen, &

orbicularo fere mucrone, oblongis, fubruber-

ribus pediculis nucia tenuiores ramulos am-

biunt, odore quodammodo lemifcino, guftu-

que adfringente, non injucund o tamen: ea

subaftatis finem rubefcunt, elegantiffimoque

nitore oculos oblectant: emicat e fummis ram-

ulis quidam veluti racemus multorum flos-

culorum ex herbido pallide ————, uijCXilsbuS,

« pumcantis colons pedicellis inh-

rentium. palmatum deinde fele explicant illi

pedicelli in latam longamque ————

fartem. *, (* ————, j-TTumaccamce-

Jongemmorafuftineni:radix illidura lignoii,

tans fibm donatMtTerebintho Uli,Doa,

Ocfcit fponte in monte Badenfibus ther-

mis qHa: a Vienna < quatuor miliaribus abfunt,

vicinisque quibusdam montanis

locis, vbi interdum adeo pumilam erui, ut uix

cubitalē altitudinem attingeret. Olim etiam

legere memini, dum Avenione per Araufor-

um agrum & Boulline ad Montclimar profi-

cifceret, Valentian Allobrogum L. ————

Nemina.

Vulgus Herbarioru mappellat hunc fruticem Cotinum, & aPlimoitavocancxiimar,

Cotini certe breviter meminit Plinius lib. xvi.cap.xvi] h. s. verbis: r it & in Apemino frutex

qui vocatur Cotinus, ad lineamenta, conchyli) colore insignis. Ex quibus sane nemo facile

colligat, an ei fuppi quae apud Herbanos tale nomen obtinuit, Cotini appellatio recte tribu-

ta fit: fed ab illis hoc nomen potius inditum fufpicor, à foliorum tabefcentium rubro colo-

re, quo Cotinum inficere fcribit Plinius.

Cotinus Plin.



Idem

Iicm Fliniuslib.xin.cap.xxiii.Coggygriamdcrcetibitin htlnc tnodum :Similis[^]<:Coggygria foliofunedonividcli^{cet}JrBagnirudinc minor. Proprietacem habec fru&iyh amitendi 1 anuginc(pappurn vocant) quod rmlli atij aibocum gertcrievenit. Ea fanefrluriniastoras habec nofraehuicftirpi conveniences.

Pliniusautcm colocoad vrbum fereexprimicTheophrastioxw/jMtiXfaylib. rfi. Hiflor. plint.cap.xvi.dcfirriptom *poQ.tivJ*Mym>.8fMiaiJ' i?} TuroifTO \$</AAOP^ TC >»*jtju«fa^ri ciiP^h.
^wofbsjucvulgataliabiiccxernplaria : at xoWK/f/asJegiflvidecur., non »«uwwPW» quara Gaza prunumncrpretatuseft , ciim tamenammadvertere poruiflteundcmTheophrasflum aliam *xoxvttffjuj*[^]ty, hoccit,pru«uin abhacplanedivcriamlibro nji.Hiftor.planc. cap.ni.defcnberc.

IraquelibenteraiTcnrior docliffimo Rucllio, qui *nonst*[^]n?^^ vocem priore lococormpcam c/Te cenfet,&xok)wTMAe/a? legendum eTc fufpicacur: *mAtiacmm* apud Theophrastum eciatn VncdoncmiignificaCjCijusfolijs/ruticisquCmdefetibic/oliacomparac. Apriiisigiturmeojudicio hanc firpem Cocconcleiancum RueJlio, autCoggygnain (fi quisforre TheophrastumficcripfirecumPlimocenfecJappellabimuSjqumCocimiin: cumxorvt-o; &:TJicopirafto&;Diofcoi"idi oleafterlk.

Hoc fmiricad parandacoruucontuiCoriarij, non miniisquam rhoç, cdm alibi, turn circa Yicnna Auftriarjubi criam rhois vulgatc noracn *Sumach* indiderunc.

Rhusoblniorura & Corianorutn.



^MP" ^ B^^B* d
• ^ P ^ J ft ^ L .
^ ^ a ^ ^ ^ I
— ^ ^ . ^ ^ ggSga^i' WPV
- C ^ ^ ^ ^ ^ ^ § ^ ? - ^ rfr ^
fpm

CETERVM quia in Rhois, quocoriaperfi-*Rbui curt**.ficiuntur, menrioncm incidimus, ab intlituto non critalienum de eo hie nonnihilage, pra[^]termifsicjushjtorja,qua:luculncradmoduni a Theophrasto primum,lib. in. cap. xvi 11. Hiftoriacplantamm, deindea'PJiniolib.xiii.cap. vi.5ilib.xxiiii.cap.xi.po(lremoaneotcriscisplrisque descripta eit,ne actum agere videamur.

InHifpamcavero mea peregrinatione, magnum ejusproventumSalmanticcnu* agro efle, iflicquequirftijsgracia diligenrccoli, obfervabam. Mulci emmagri eo conferuntur ,nec minorecuracolumrquam vinew,alioquineccam liteafTurgir, aut fi culcura abiit,degnerat &: fyU vefcit: *Nhh* non defunt qui vitibus imerferantculcurxcompendium quarrentes, utcadem opera cum viribusfodiantur. Cxdunrurfingiiilisaniscnati (urculicubitalesad radicem ulque auc fummam celluremjdeindedeficcantur, in pollincmrediguntur,& in ufum convert uncur,adparandacona.

Officina: hunc fruticem *Sumach* nominant Arabics appellations,Hifpani *fumaque*, Ga:U nonnulli *Rhus*.

Pliniuseodemlibroxxrin.cap. xi, meminit alrerius Rhus.diverfi a fuperiore. Ncc Rhus,in- *R!*, *UShub** quit,Lacinumnomenhabec, cuminufumplu. ribusmodisveniat. Nam&herbaeftlilucuVis, uticulis brevibus, quxvncna&:

tineas pellic: &frutex coriariusappcllatur, fubrutilus.&c.Harcherba Rhus.quantum conijcerelicetjca efie vidctur quam Brabanci & Batavi Sd5c(appcllant,nonnulli Galli P*»w«>),magni inter eos ufusad confervandasatincisw-ftcs,&Belgetiamidroburt)Screvi(ia;addenduin: illi cnim incoqttere folent, utmagis capu: tncet,& temulencos potorcsefficiac.

E(l&aliusfrutexfolijs Oxymyrfines, floralboinHifpania&GalltaNarboncnfi frequens.quod a nonnullis Rhus pljni nuncupatur. Veriim ciim isnullius alceriusRhus mcmincritprajterquamilliusquamlicrbamcognominaCj&CoriarijfruticiSjCujusfemenmedicamcmis&cuHnxnecefianurriiatbitrantutpcriiorespouiiisadDrvODlioniPlinnhiftonamacederertaliscnimeftlib.xxvii.cap. ix.ejusdefcnptio. Dryophononfimilisherba cft,ctuliculiueftuib«s,cubita!ibus,circuinda;isytritiiquefolijs,poll,cariarnplitudmc,quajuoxymyrfiucs,fcdcandLdioribusmollioribuijuc,floreca[ididofambuci,&c.

ROBYA, QUERCVS. CERVIS,
Robut 112.

CAP. XIII.
Robut 111.



Robut 112
Robut 111

RO i o % i quina genera i nonn_o Hisaffigruri, ab alijs (blrim qnaterna. Theophrasti, lib. Hi. HA plant. cap. ix. & x. fcnbitmonnullacamenomine difcrepare Vtv «6Idzidi v. dercon (acvcmnr, hH: gencta fane, w. q u a m nonnull, Robur, Gaza nunc pliadam" nunc quercum vertu, <n/Aw4.auxCemis: wA «*t. AAoc, qaa! Gazs Latifol t. Jijt^

Quercus: φηγε, quæ Esculus: αλφειος ή φυλειος, quæ uamam uca, auja, etrussemina: omnia fructifera: dulcissimam autem glandem esse φηγε, sive Esculo, deinde φηγε, tertiam φηγε, quartam αλφειος, postremam & amarissimam αλφειος, sive Cerro. Macedones autem quatuor genera faciunt, φηγε, quæ Gaze Veriquercus, φηγε, quæ dulcem, φηγε, quæ amaram, φηγε, sive Gaze Cerum. qu?rotundam glandem ferrhancnonnulli sterilem omnino, alij viciosum fructum ferre aiunt, quem nullum atiimantum guitet præter suem.

- Qui pluradeh. svokcccon Oi lat Thecopliraftam quod diximus l. bro A Plinij Naturalis H^A ftor Klib. xvi. a*v & vi. Nos v_{cr} 6_e asarbor « { iicd_c fcnb_c musqua: p_{cr} Hi S_s & m Aqu Ka_{il}, a Can_{ab}nsf inmmavalg^^dedaao_a Roborcno_{mi}ncn_U^Pn" S tur ual-

Quercu non vulgana. v*vi_{mus} mmpcr Lerrum, & nonnulla dc

Robut 112
Robut 111

caudice magis co- cifa quàm quercu, uti in vitibus, ita averia parte molli canaque lani

Frequens est in celsis Castellæ veteris montibus, atque in Aquitania supra Burdegalam, ubi Roble dicitur: tameti idem nomen Hispani etiam tribuant vulgari Quercu, quæ in Hispaniâ frequens est, & montibus Calpi fretisq; Herculeo vicinis semper viret. Quercum etiam proptie Quexigo Hispanis dici, & Encina de bellitas gruiſſa à quibusdam vocari, mihi relatum est.

fimprvini.
Jttur 11.

ALTERA, Quercus ferè magnitudine in Austria, Sty Pannonia crescens, strigo- fior est Quercu, luno duriore, folio minutis amplo, altera ? Ite I K, ? h l incano, ex guam glandem tert: i ncoti a nutritie Statmarchet appellant, Vngari emens cher

in. TE R. TI A, hunailiorU & interdum humanam altitu J_{cf}nnon" cedens altoqui prio- ri facie, foliorum forma, canicieque omnino similis. Ut Uliu8 pumilum g^effc v deacur: fert hæc prægrandem gallam, exigui mali magnitu, aded copiosam, ut aliquando ramu- lum, vix palmum superatèm, novem aut pluribus, onustum colligere meminerim: hærebant ex gallæ ipsi ramo contiguz fere, sed sine ullo ordine, rotunda quidem & veluti fphxrica

sphaerica figura conplicus, tedaliquottuberculisrefper/ac: rubentardunareccnrcs.jpnefertim ea parts quafolem (pedant. Invcniuntur& in liujus folijs inteidumpifulxijs&niJcs <Jux Quercus nofratis folijs innafcutur.


M u Ins Carte! lx veteris montibus frequens est, Sc pleni m q ue ntimerofis abeadem jladice ftolonibus fruticat". Omnes etiam montes Vicnrx Auftria: vicini hoc roboris gencr*'abW dattj quod fim iltcn fc rt gallatn; fed norv adco copiofam. 1

Huj us ramis contortis.deinde fillis & exflccatis, Thedaloco ruftici utumur aliquot Ca- fteJlas veteris locis,praicrrini circa S.Martinum *Del CafianaL*

QVARTA, inarboremexcrefcitpufillamiejusircmfoliaminorafunc, duriora, angu- ftiora,non adc6profundeincifa&:firmata,fed veluti aculeatisdenticulistantuni ferrata,in- feniequidctn candicantia/ed nulla moUi lanugine afperfa. Frequentem etiatt Htaalit gat- lam fupenon fimilem, & acuris tubcicniis ornatam,pallidjore tameocolore.

Robur v:

Robur v 11.



Ov 1 NT A, huic fercfamilis est; fed (olonibus brevioribus & magiscontortis.rugofiorc- aueoßrticc ?alljc item extremis ramulis natcuntur, alijsrniiores, la:ves&fine tuberculis, colorcxrujffonigricanK,ijjsqa*inofficinisvcnalcsrepcrriUWw,perquatnfmilic«.

Nafciturutrumquehocgenusin Lufitaniifolitudinibus ltinerc VlyfTiponenfi nonpro- culEborra,&abincolisCrf^rf//<inuncupatur.

SEXTA Uumiliseft, nechumanamaltitudinemexcedir, ttuticispotms, quamarbons no,mi[iedonanda:tcnuibus&:lcr-*:isran3is,folijsfecunda:ferefimilibus,fedminoribus, nec adco finuofisjtninorum gallarum, quarplcrumqvc binar, terns, autpiuresfimul nafcuntur, admodum ferax:

Nafciturin Auftria & Pannonia:nullmntamenejusnoraenvulgare intellexi, fed ruftici cum feeiinda confundunt.

'IN VENI T v R.& fcptimuraquoddam Roboris genus (nifi quis ad Quercum referre ma- *,*,. nt. lu) niter Rio frio, & AldeaGaleganonproculVlyiTipone.arcnofofolofrequentiflimurn, Jjwf! ade6huiT)!e,oi:rar6pedemakicudinc(upcret,nufauam alibi mihiobrevatur.Nejusramuli tenucsac flex'ibiles.vulgaris Quercus ramulisfimillimi: folia ad qumtum genus accedunr, aliqiuntulum tamen majora & molliora.Hocfertg!andem quemac vulgari liaud minorem, tQtidm etiam cra(fiorcm,caliceplaniorc,admodm amaram. In rciiquisgencribus^prx- terquaminfecupdo.nullamgtandemobfervavi

O M M E S nofro adftmgendi vim habent,tcftc Diolconde, prxlctrim interior fcfubic- cTuscorcici liber, qm ligno membranceuscohrrct: quincnamunica putaminiglandts fubie<2a. Decoauincxijsdaturdyfentcricis.carliacis, fangumem exfereantibus. Tritain peffo.ferainis rluxione vulva laborantifius/ubdiwr.

CERRYS.

Cerrisifera.



aliquid.

Uliatyla.

CERRVM Q^ercus genus non modo in Vicennfi faku, (cd plerifque ctiam Pannonix fylvis frequens est, eadem altitudine qua vulgans Quercus, atque etiam cclliore affurgens, caudjccrcftiore, corriccraffiore & magis fcabro: folia frequentionbus inciftns, fed minus altis divifa habet, quim Quercus, ^Jongioribustenuioribusqucpedicuhs mhaerentu: ramulos breviores, frequenioribus nodis obfitos, gemmas immores, & aliquot craalibus foliojis ecu ftaraimbusautvilhs^ptas; floresraceroatim compactosucQuercus, eqmbus, utmecinqueracanafcuntur calculi, fed ij brevi crafloque ped.culo annotijiis ramuljs adhrrent, oon intoliorumahs, omninohipidi, & molliter cchinan, m quibus glans est n_uer_na pauio brevior, & obmaorc mucronbrardita, qu« Aucumnoniatuntatemadipir; j_fur: adlixrnt interdum inrer folia, mulns vcluti fquamis confancia capita.

Ruftici & marcris chores optime- cam i Quercuvu«ridiftingiieMnorun_{EL}illiusnia. tericm cand_diorcm_j laxiore'mquc, & ad op_craminiisaptamcenfenrcs.

TMEOPHASTO Hiftplantarumbro III. cap. ix. a ^ ^ Plinio Natural. Hiftori* libro xvi. cap. v. Cerrus dicitur: Germanis Cerrisifera/ Vngaris Cher fa.

Hvvs C_{erri} craffioru_m atquectiam icnuiorum ramorum_libralia interim auc m-

jora fragmenta in lapides commutata, ipfaque adeo matrice in nigrum lilicem converfa (fuperficie tamen candida & friabili reman_ut) naturales ipfius ligni venas, orbes, & liquimqu_e e_oT_amctiara_{num} ^_n ^_{ll}l_s S_u Jhafarisdc Batthyan (cujus in hac Hiftoria mentio farpe fit) munere L leg. anno M. u. Lxxx. m montis E y f e u b l immihendskecli^quaad vallem Pinkthal ab ejuodem fluvij eam perluentis nomine nuncupatam. d f r f t arque ad Auftrium & vltimum

w < / . -

Cih f_{ir} MX. Mi fir MX.

Obtus is monsolim tuit (quemadmodum ad lmcvicim) Ouerc, <^r- u ^_v s: nunc verc vmet, s gencto iiflr₁ mivini fcrac₁ b_{us}, nuibu₁ J_o ^_c T_s ^_^ ^_^ ^_^ ziorum u g_uer_u p_{er}tantulimiorum maximorumque perficorum malorum arbores. Eit autem hic mons cum vicinis aliquot pagis jam memorati Ill. Dn. de Batthyan, p. m.

t'fua ixs-

fluaflindufccramviddiqUmexercSuZli^f"^^^ modo obfitz, fed quz reliccata, gallarum modo dura & firma erat, quarum etiam vicem expleat ta & fcabra, id vitium illi peculiare fuerit. g u] is annis arborem infestet, me later, ut qui semel dumtaxat peream faltiispartem itetfecerim. f'Otuffct-An

VftumautT. Vn

CETERVM iifli Quercus per multas Pannonix fylvas ffi ^- a Cft: id cfTccxiftmianies. p, id est arboreum unonem vocant: ipsam ver_o oarborera THy)* lliccm

Quercus ma- PUM 11.

B_a v₁ potio genus plerisque Oceani littoribus observabam, quod, an ad Quercus marinx hiftoniam referri possit, facile judicare non possum: licet cum ea quoz Theophrasto lib. Hiftoriae Plantarum III. cap. vii. describitur, nullam affinitatem habeat. Nascitur autem haec planta in scopulis qui mari alluuntur, aut marina aqua operiuntur, sine ramis, sed oblongis latisque folijs, adeo mollibus, ut cum aestus recessit, nullo modo sustinere se queant, sed in faxis ltrata atque diffusa conspiciantur: multifida vero sunt haec folia, & secundum alarum exortus e_uue cavitates, bullas quasdam aqua plenas eminentes habent, eorum vero celuti rodimentum f_lg_uli <=<umci-isdcfini. nr, fub. a ma_nis >>nd, scj_eaa: ficcataa p_{er}ditasunt quamo_o nter igrescunt, & glutinis instar splendent. Nullis radici- s, aut Osticorum testis inhaerent.

Qjicrc us marina.



MEMINI & aliud genus in Flancfyia: & 2elandiimaricimiscoltigerc,folijslattyribus, tenerioribus, finuofc, confertim nafc^ntibus, pedali interdum longitudine, SC a(s folia ex media coftaproferetibus.ut in ChaiTiargenifta, eadumaquisoperta funt virfcunr,ejecl:averd & rdiccata ,candicantrfragiliaque funt.irhoc genere nullas veficulas oblervavi, fed extrema folioium plcrumque in latura cpanfa: faxis inharrenc,aut trabibus in aquamimmiffis ad infringendum artus maris vehementiam.

Quercus ma-
rina 11.

CWERCVS vero marina Theoprafti loco ; jammemoraredefcripta,fbliumhabetcarno-
fum,tenuc.& Myrica: fimile.colorcad purpu-
ramaccedens: formaflcxuoia,atqueinjatu-
dinemdiffufa, ramos breves, contortos, (pif-
fbs: magnitudoarboristotajcubitalisjaurpau-
16altior.V*tilismulieribus adlanasinficindas.

Quercus ma-
rina Theop.

Iftam aliquandocolligere meminiadmare
mediccrancum , tempeftacibus in Items eje-
& Am cum Alga,& alijs mat is purgametis, dum
Mompelij agerem i poftceacciamcircaCalpen
& C ValenEiam,dum Hifpaniam peragraremje-
rumcubitominoreni.dunflunoligno.Ejusra-
mialbafalfugine ad6confperfieranr, utfac-
charotecli viderentur, in modum foliorum
pTamancis ant Erica: vulgaris formati,federal
;fiores: interdum eciam omninopurpurafcen-
~tes fuerunt, nonnunquam partim albis partim
=purpurafcentibtisramulis conftantes. Nullas
radices habebantarbufculsc, fedinfima parte

plana:erant,&plcmmqucaut!apidibusautoftreorumcefftsadliasrebant.

Mnlasciim !uiju(nodiabufcuUscubitalts&hores,numerofisramulispr?dtras
nim omninoalbas, tumprorfusrubefcenres, cumpturimis alijs Natur<miracu!ismagna
dtli^ncia conquificis adicrvabat Imp, Maximilianus 11. felicifs. memorise, infua arce
Esp.1077 fecundo ab uibe Vienna miliari.

S V B E K.

CAP. XIII.

S V B E R i s duo genera Clarils. KTatthiolusobfervaint: ego uniciim rantiim, nifi forre
quod in extrema AquiwniaPyrenxisproxima nafcitur, abcoquddper Hifpaniasfre-
quenscftjdiverfumfit.Nam Aquitanicum ('quodquidemconfpexi) folia non retinet, fed
hicmeabijcit:ut, cum mense ApriliinHi/paniasproficifcererobfervavi, folijsenimpror-
fusviduatxcranequotSuberis arborescirca Bayonam confpexi. QuareTheophra-
stuslib.ni.cap.xvi.Plancarumhifc.nonimracritotribuitSuberideciduumfoliunijCumdi-
cattarborem effe Pyrehnae flimiliarem,

Suberis A-
quitanici fo-
lia decidua.

QVOD vero in Hifpanijs nafcitur, perpetuoviretutllex, cuiadedfimilecft, utprimo
afpectu plerumquc fallat.nifl cc.-'cxraflus, & difrumpi folituserrorcm detcgerec. Majus
c(illiceplerumque,&caudice(ubiadolevit) longe craffiore, cortice item den Co, carnofo,
fcabro,5£ rimofb,qui nifi fuotcmporedetrahaiur.debifcir., atidquc fabnafcencexpellitur:
co detracto,qui fubeft novcllu'; ita rubet ,ut procul afpicientibus arboresubrbrca au t mb
piftxvideancur.Subcristami llignisfirmiores funt,foliamajora,longiora, mojliora, &fu-
pernemacisvircentia,interdumnonnihildentata,aliquandominime,utinllice. Glansma-
gna,ubi nTaturuitt!gncans,nigalongior&obtu(iorecufpide,caliceeciam majore ,magis
nifpido, &perorismollicercchinaio: glansadmodumadfringentis& exficcantis^uftus,
Ilignamulroingracior: magna ex parte conjunclimna(citur)utponncanux, fed cralib bre-
viqucpetiolo.&firmiorequamlligna. Ramulis nonnunquam adnafcuntur dura & ligno-
faqua:daincincirecoloristubercula, ade6 firmicrinhsrentia, uz nifi frafto ramo cximi
non poffint.

Suittitijp*.
ndimUlljr-
trumprp.
virens.

Nafcitur plcrTque Caftella: novaf.BrcticasqjlociSjprxfertim circitPuertede Mirdet,ubi
ingenrefejufuntlylva:,&:totaa<:Jeol_ufitan;:i.

Nafcit.

Sed Match'oli Suberalccrum oblongisanguftifquefolijs quod Pifanoagronafci tradir,
aaihi nunquam confpeflmn, qucmadnlodutn nec illiuj CtrrtfugjreSenenti agro frequem,
quod

Suber latifolium.



quod Theophrasti Arcadum fitoocfyvrefse ccn~
 k-crlcaliamcnim numquam vidi. Lpqt c^p^ofc-
 flio^era^cmarim, fien<: lconfcncfi^IPafliju:n3-
 v ijbis ad alpcufque progrefsi led riegotia per-
 petuo me rcvocaruct. Ideoque in poffrum ODI-
 nem adcundi Italiaui cogitanonem flepofiti,

H i e pomiarbor Gra: ciiif
 ber dicitur. Hifpaniarborem
 communi cum iitgna uumi
 bor/j^jMjGernianis Pa^iffio
 arborem&co Ricem (qatili.i
 nicuscftj Lttgt. Miror autemp
 nium lib. n. Obfirrv-ttioiuni
 cdulem Mar. arcyloJimilcin ti
 Lttzt vocabulo diverfsm aSu
 telligar, prarter omniun Gaionirf
 morem. Mihi certe nullum alium
 vidcre
 defcriptam.

bus Province mfarpsit, tripUc?n, Subcri corri-
 cctn tn bait, wlpribripiini audiiqMMtm qu*
 dam in ejus hiftoria tradit, ab alijs, antum ob-
 ferva:

Subcm, i to
 era proven^ faiprie, glac
 Kno^tninco, ngr1u.. Hunc
 Jd e-
 vellunt cortices
 in in cadonib & om-

crep.das mQnit&hibcroumcalceawtS Ex te<< o *1 hrT
 pacrar.cquibusquidqu.dhea.c.spropinacur macnan!
 Wquovctuftior. DetrahendiscorucibusliJcSr*
 cumfemdauradligrwrarnijfquemate

explananturaqua, fedigm, necdcuntur nifiwrrin,
 toifura Urgi itnbres intervnciint^tbor in t e n S
 &iicca,&t<nporumobfervationeraidftllcnrr H A
 Ctrahicurtu
 X anno
 d d fi
 Kadl miniiru

VE * v M inH.fpanijsprimumiJlumpraxiaflbmrn? *Q-H<l<<<ani,s.
 quononmodoadcadorumobturamenta alvAri-
 kd eciatn aduiguriorum, parietum, & mUror, m
 quam Lire mad u ram vocanc, ubi inidummh.
 bncimi locotcaasconfpicre liccr. Idem TM, Paf
 crepidis & h.berne calocatoiidoneus: itaque
 ru m fentennam ex praxraflbiHoexwmdie
 noradnullamrcmutilis.
 v, ucco
 riticcbinosfca(Te: nam fcabritia illacxe-

ILEX MAIOR.

CAP. XV.

I L I C I S duo genera recenset Plinius Hist. naturalis lib. xvi. cap. vi. Vnum folio non
 multum ab oleis distante, quod *emula* Arcadum esse videtur, Theophrasto descripta
 lib. vii. cap. xvi. Hist. plantarum. *emula* Plinius
 profundior^uc.
 <nt, toio non aculeatO, (cd molliorfc
 jho<n)im ^* v jt autemmihicoenira arkrt, -aV i n •

aculeata sunt: certe in tenellis arboribus ante quam glandem ferre inci-
 piant omnia folia aculeata observabam. Multos in extremis ramulis ferre oblongos violos,
 qui in flavos & muscosos flosculos polline & tenui pulvere perfusus explicantur. Glandes e
 floribus non oriuntur (nam sunt inutiles) verum ex alijs quibusdam separatis pediculis: ex
 autem quernis glandibus sunt similes, nunc majores longioreque, modo minores & bre-
 viores, quae nonnunquam ante maturitatem nigrescunt, & gummi quoddam reddunt pulsi
 calidm,

Ilex major.

Ilicum majoris ramus floridm.



calicium aponstamennonigrati. Maturararacortex fiveputamennigri carnucleus can:
Udus firmus & dulcis est, prsferim majorum: utnque camen a nonnullis maxime expe-
tuntur. Uisq ue non nltusavidcvefcun: uracnoscaftaneis autavel Janis; liancobcaufara in
foro Salmalmcenii, alijfque Hispaniadocis, venales menfibus Odobri Sc Novembri pro
ponuncurrucnonirnmeritodixent Pliniu^ pcr Hispanias glandem/ ecundismenfinferi

Hacvixminorem Londinianno w. d. LXXXI. in/uburbanoquodamhortoad dextram
amafis nram, supra pontem qui ueramque urbem conjungit, in u Iris & frequen-
tis sprxditam admodum fragilibus, in quibus confuso ordine Sc sparfini nascuntur folia
Hirpanicarolijs dmilia. Florc batfixb/ incin Maij pau Idfeni Jsquasin Hirpan Ms. & clandes
in en urn emergentes habebat, \xxx an maturatem confeqtianrur, me fueit: nani fca

Ilex
tmfisfrUT.

Alceraporroeriam vaftemagnirudinis narcis regitfad Westmonafteriim horto a leba
tur fed magntudine cupenorenon conferenda. Iicctad cocraffbei Teccaudice utne
mnampleffipofler, Haccafupriorcnonnihildifrcrrcmilliivifacri: naraminorasi maeis
orbicuiata habebat folu, buxeis interdum non amphora, nullis aculeisiorrentia aliooui
rubcusincana & ftiperne virentiaj Utprioris folia: nullo^ inifta flores obfervavi & anel-
andem ferret nemo indicarcpocuic. An vtro Ilex mas fit. quam^ Jinio tctfc-riandcai ferrcnc
gant, nihi HcatuerepOMtim.

Ilex UnU.
mji alira.

Quatrjdoaijrimus Ma« hio Iusexhibet, mihividere non concigit, ad id forte genus refe-
endactquod Plmms in Icalia nasciruditfoiionon mulcum Olca Ediffimili, nam ob Jon-
gum & angulum cii: & c Mactfuolus Hetrunameafcatcreaflerit.

Ilex Mith.

V i sc v M. aurhyphcarinnullallice obfervarc mmini, fcdaiiquando eranum exnuni!
ceonig Ticansi niisar bonbuiqu Errequentcs nafcebancurfj vaillapcme OT nobium & TO
mom vulgo diflum. Mompelliano agrc & interdum. m Bartica prz (crrim, rniictn ficainlH
Mumfucumanerej colons cramis dpendenwm. qualcm in likisramofuariandffniT
ftoadpungccuravi : qui verbflorc m habet, expriore Londioenficxprelliicfr namnu«
cx Hirpainaatciilcramamos. fiorcmominocorruptum & atritumiubebant'

Copitnc nascitur per univerfam Hi/paniajnlocis pfcrrim campeftribus & rnlh.
ro in montibus, Luliwnia: no admodum familiaris, ubi Soberfiequenti (fi_{mb} M k* KfMtl
ncnfis Gallia 3cP» vnciali. «dam abundan^ ed miiore glande quam Hif Dani r'i
Nomcn Gra; cum cft* pry?, Lacrimm Ilex. Hispaniam^ cwa. Italicum r), r n

*MftJtL Ckfm Ami, Germanis Sc Vngaris igiio caeft. Fru<aum Thieophrastus™ ul
wto* vocat Hispanoi Bdeu^ at Abitteta.. wpiatusex Ho mero Ntim*.

QVINUS i AM C^tvllsyttaibJaJsIlicisramic^diinturcubUaUit^...
&ac^rvosco[iwcriimurA'l«tuopenLin[LTr,ddnde(ubjcaoigiicin«rboiicsufti;l;mtl]r.qui
Salnaunciam Si alia locs ^eportamui. Ai borimi trunci, ad mokrum fabricasfc alia opna
fma...ui;dUiiimatenahni)a&:iii]rubiHs.

ILEX COCCIGERA.

C A P. x v i.

Ilexcocci-
gera bulleto.

Marais.

Remota.



N V N Q V A M altaflurgiEhaec Ilex^cd mul-
tis ab eadem radice prodeLnutbiis raniis
fruticat, duorum aut trium (quando plurimum)
digitorum crassitudine, sexnumero uSustan-
nim, autetiam virgultistcnuioribus, ramolis:
folia illifuperiore (lice minora, aliqantulum
imuota. niagisvircntn. necavcr laparteadtdin-
canaj ngcnribusaculeis armata, quar vctpfate
interdum rubcfunt: pufilUm & valde aniaraoi
.ferrglaiidem^calice fpinofe & cchinatov

CRESCIT multisHifponir locis, in Nar-
boncnfictiamGallia& Provincial no dobiuui,
quin& plurimisalijs, led nonubK]uccocum
gent. Nanaijsfbliim region i bus qurMediter-
raeano mariviciiw (unt , '& magno Solu ardore
eorrcmur, naticianimadverrcbam. Sedncque
Iticperpetuo fert: ciimcnim frutex adco ado-
nt, at gJandon alerc incipiaCjCoccum non gi-
gnirTKieotp lolciu mcobeqiadiieonesiwaduU
ioresfnmccs urcre, ut proximo anno novelli
re^ganc. qoidcincdfinguUwnnisaliquidTfub-
A r a m u l i s i n h i p c m e m i n i u r
exiguormn p^orum colons cmeRei gi snunt.
Huncpucn& molierculit colhgere loicnt K
mercatoribusvendunc, quimagtiacjus cop-a

Ir
m Coccus.nfeftona Pjnioaquifi, l, aiJ«.Hi-
f l s M J O r q u e x S u i n g a d r e f e / l
qui ver. coccum g. GratUm
latix rubes granum, aut circa Emeritam Lusitanie in maxima laude est. ab xvi. cap. vi i .
Omnes tamen has ejus dotes Ilex solo provocat coeco. Granum hoc, primoque ceu
fruticis parvæ aquifolæ ilicis, cusculinum vocant pensionem alteram tributi pauperibus Hi-
spanie donat. Arabibus cherimes, Hispanis grana de tiniveres, Gallis vermillon & graine, vel
Fustrali: P O R R O coccum vim adstringendi habere, vulneribusque & præcis nervis convenien-
ter ex aceto illini, testis est Dioscorides. Meo tempore in Mompelio mulieribus in d difficili
tam memini. prxbcnfpl¹

ipsum Dioscoridi etiam aduocæ Satrach, Plinio coccum & cusculinum, hoc hispani summa
estisjudepravata voce simplisse videntur: ait enim lib. ix. cap. xl: Hist. ur. Coccum Ga-
latæ dicitur, quædam in Hispania dicitur, quædam in Gallia dicitur, quædam in Italia dicitur.
Gratum hoc, primoque ceu
fruticis parvæ aquifolæ ilicis, cusculinum vocant pensionem alteram tributi pauperibus Hi-
spanie donat. Arabibus cherimes, Hispanis grana de tiniveres, Gallis vermillon & graine, vel
Fustrali: P O R R O coccum vim adstringendi habere, vulneribusque & præcis nervis convenien-
ter ex aceto illini, testis est Dioscorides. Meo tempore in Mompelio mulieribus in d difficili
tam memini.

Ceterum Cocci etiam meminit Pausanias
fruticis ordines, quem Iones & reliqui Greci cocco
ina voce Hys nominant. Crescit eadem magnitudine qua
liore quam Lentiscus, in reliquis Lentisco similis: ejus fr
magnitudine: gigitur in cocci fructu pusillum animal. id si mat
tit, statim vola c r e l l e i s u m u
fructu m legunt: est ctiam animalcul.
autem co d e b a h i s v i r o I a c o b o S u s s o , g r æ c e & l a t i n e l i n g u æ p e r m i s s i m o a d m o n i t u s
conculitur. sanguis tingendis lanis urils. HatcPausinias. VetereJ
sum, non habet q u o e n e c q u o , s e d t r o p i c e & t r a p i n o , h o c e s t i l e x & i l i c i p r o l e n t i s c o & l e n t i s c o ;
quæ sane lectio legitima est nam quæ similitudo cocci insectoræ cum Lentisco? facilis au-
tem est lapsus a p o e i n q u o e .
A n H y s a u t e m G a l a t a r u m d e d u c t a v i d e t u r H y s i n i v o x a p u d P l i n i u m l i b . i x . C , M - , -

Hy^inum

in Pbocæicis. Perpcui inter vices ejus
q a i f i i p c , P l , r y g i a m f u n t , f « P
Wiamniw.folionigriore&niol-
Sotamfruauifinilis^rvi
urofrustu inaercm exilic-
iaturanialculuin,coed
HatePausinias. VetereJ
sum, non habet q u o e n e c q u o , s e d t r o p i c e & t r a p i n o , h o c e s t i l e x & i l i c i p r o l e n t i s c o & l e n t i s c o ;
quæ sane lectio legitima est nam quæ similitudo cocci insectoræ cum Lentisco? facilis au-
tem est lapsus a p o e i n q u o e .
A n H y s a u t e m G a l a t a r u m d e d u c t a v i d e t u r H y s i n i v o x a p u d P l i n i u m l i b . i x . C , M - , -
Quin & terrena miscere, coccoctinctum
cum, vciu comcutl^
Vituuiusciamlib. VII. cap. xiiii. hygini meminit.
C CKCV- M. quo modo gignatur, & ejus tolligendi rationem Quiquetanus libro
suprà

fiipra memorato multis verbis declarat, quae hie fubiunximus.

Ilicis duo genera: akerumarborefcns, alterumfrutexexiguu'sfefquipedaliproca^itare
Iacctflimevirc,folijsl2vorepr<fulgidis, fpinarum vaUoambicisnumerofbjftoIonca^Furgit
in moduna Ro(anj:a noftris fagi appellationem fortiturjqum vis nullam fagi tmagirm re-
pnefentec. Provcnitlocisplamsquidem, (cdinaltinldineveveclis, cxilibus&ficentibus
collibus,ft:d infccundiis. Vre raedio rorari imbribusfrutices ,coccum hoc modoordiun-
tur. Vbi imusfcirpus fc in duo brachia parcitur.in horum medioprimum omnium iricrefcit
rotundum quiddam, magnitudine&coIorePili, hoc Matrem vocant, quod ex eo cetera
grana prodacuntur. MatresportohabeeutplurimumquincjuequiEibctcefticumfamilia,
q ~~z incunozitate,zitu^ ue minutijlimorum yrmiculorum catervam rofundunt ,fatif-~~
cuntqciafumtncate. In animaliaproprepit nova fobolcscolore Candida, pro fcquifqueirt
fublime. At ubicunque vermiculi vel geminantis i urculi axellis occurrerincjdcfidenc, &c in-
cremensaufiti, milij magnitudinc fiunt. IndeliberiusadolcJccncibuSjalbuicolorindne-
nciuna cranficjimquenon animal ^cdPifumrurfus apparent. Tiincqueeagrana maturita-
rcmadepcacolligunturjamcoloratisvermiculcsfoetajdimquearportantur mercatoribus,
ambiens pellicula prartenentaterumpitur. Vermiculorum quidem qui citra vaginulam ha-
benrurpreciuminlibramquamlibct, aureusiblacus, ingranorum veroqusadhuceorum
pactmrcinenc.hujusquadrans. Torpentinterim vermiculi, acimmobilesjacent; ccte-
rumtCiimpriraumceropcftivitasadefijinlinceaprsecipitatijibliexponiuntur . Turn libato
caloceftitim prorepunCjatqueeffugetenititur: (edacufr.ode,quicontinuusairidei:, con-
cuffulitei in medium eovfquereijciuntur, donecemoriantur. Tantaquidem dumhxc
fiuntjtotoquemoxtriduOjOdorisfuavitateatquegrati^utnonCibetar, nonMolcho, non
Ambrai.tedncCitriorum quidem flonbusfacileconcefTerit. Siqzverdgranalcgentisef-
fugcrint fedulitatem , eamox alaeorumanimalium numerofumexercium in auras effun-
dune.Obfervatumcftunoannoexcampolapideo,Arelatenfiagro,huncproventuniundc-
cimaureorum millibusftimatum. HaftenusQjuiqueranus.

Cocci baphi-
ca histeria ca
Quiqueranus.

SIMILEM Cocciparandirationem in GalliaNarbonenfi, atque in Hifpania, dum Cictip^{arom}
ifticdegerem,ob(erarerDemini.Areasenimfubdiohabcbantadcamrcmdefinatasc,emi-
nente^{culumn}ar^gne^ut^ulineopanno in (traciscote^{ome} ad^{ft}di^{bs}
(ummoferuoreSolisperccuoalTidentibus.&xtremajinteibacilloconcutienribuSjVtver-
miculoseffi'gcre properantes, in interiorcm linteiparrem repellcrenc; iftam tamcn fum-
mam odoris fuavitatem non fenfi, licet (atis acres & fagaces habeam nares.

VERVM PerrusBeUoniusObfervationum, quas nuper admodum latio donavi^ lib.i,
cap.xvu.aham praparandi coca rationem tradit: ejus verba referatn.

Cocci baphica^cenfusingens est in Creta: fedcjuscolleclioni ctimpotentiorcs operafiti
impendere nolint,pa(tonbus & pucris iftam provinciata relinquunt. Invcnitur menfelu-
nioinexiguoquodam frutice,cxllicisgcnerglandemferentis, finepediculoinhsrensili-
lius frudcis (tipiti,coloreex cinereo albicantc.Sccl quia iltius fruticis folia ipinis horrent,uti
Aquifol³^ palloresfurtulamfinifrageftarjt, quaramulosdeprimunt&inclinant, dextfa P³
duteputatoriainfalccm,qua illosdcractunt,& rotundas veficulascxiguiipifimagnitudi-
neaufcrun^quapartelignoadhxferuntapertas&hianteSjpulillisrubrisanimalcuLslende
minoribus plenas,qui per hiatum ilium effugiunt, & inanem veficulam relinquuot. Pueri
jamcolleclamcoccumadQusftoremdeferunt,quixdimenfbabillisredimit, Isanimal-
culaavfciculiscritofegregatjdeindefummidigicislenitereaprehendendOjinpiJaseffor-
matgallinace'iovimagnitudine: natnfi nimiumcomprimerct, tota in fuccum re/olve-
lentur, &Ccolorpcriet. Itaque duo infe&ionisgenera t iinum pulpar, alterum veficula-
rum: quoniam autcm pulpaadinficiendutn commodiorcfi, cjusprcciuu quadruple ma-
jus, quam veficularum.

Cocci baphi-
ca histeria ca
Quiqueranus.

OLEA' SATIVA*

CAP. xvii.

OLEJG perHifpaniasvariafuncgcncra. Namnuncrrjagnam&carnofaEnfertolivam,
mod6exiguam&gracilem,interdumctiamalbam.

H A B ET veroOleafoliumSaligneoferefimilejdenfius.firmtus^revipediculoramulis
exadvcrfoutplurimdminhKrens.fupcrnemagisicanmnaminferne, amatigufus,flo-
remcopiofuro.inramulis racematimcompactum, cxhefbidocandicanccm,quatcrnisfo-
Itolisconftantem.&fructusrudimentumampleclntemrfrulusejusovaUeitngurajofleo
intus nuclo. permatuntaccm nigrefcens.prarter olivam quam albam vocant.

Lu(ifanic2Olcas,minoresolivasproducunt, fedmultumoIeiejufquepr3:ftanti(Iimpr^oMan^t
bentes: ficetiamnonnulIxquisinNarbonenfiGallia&Bajrica nafcunturolex minorem ft³um!
fructumferuntexquoplusoleicxpnmiturjakcri, quodemajotibusolivilicetur, longc/
prarfcrendum.

Circa Hifpalim , U craffior olivanafekur, atqueetiam minor, nonnumquam & alba:
qijam&circaVlyfliponcmjufcicJarifliinuscquesDamunusdcGocvdcmqucvirdoair-

immus pte incunozitate, zitu^ ue minutijlimorum yrmiculorum catervam rofundunt ,fatif-

Olca Saciva.

Olea lig-
na repens.

Vitum bar-
on purpur.

Semina.

Silvestris Olea.

Fastidum.

Oleobris-
ana.

KiltUl.



Irjnmaturasplerumquecondiunt I
nias& Galliam Narboncnfom; incerdii etiam
Granatenfi regio primum Februanoioiligi-
iurotiva,plen[qucvcr6Hilpaniqlocis.L]eecin-
bii.ut&mGalliaNarboncnli-hiquidempcr-
ticisdecuriunr, illiauteranflimc.iid potuiad-
motis fcalismanuicguut.nc requccianrnfpm
dcuffisgerminibuspr^npucivhcmctrcnoi
laboranEolczpercuT;e;& detriment ticapiunt.

NON procul Hifpali ,vifctiin m olejiropioii)
nafccnsobfervabam mtiife I an usnOj oil veto-
rum dominos magnodamno afficiensintegros
enimolearumramoi.crcbroetiaimnaxiniam
earii partem caderecoguntur, nc lacius vitium
ferpat,alioquiocasarDoresoccupatmUj&:flc-
nlcs rddicuum Habetveriidviftum baa as
non albas,quaies in alijs arboiibus nacitro, ifd
ex rubro purpura(ccnr.cs, cujufhiodi mifquam
alibi vidcre memini. Has cum in Belgium uci-
di)(Tcm,&:coluti)bis,&:ali]savibusdevorandas^
dabam, ut experircrannaafcivcJlencarboTibus
impositoaviuillaruni fimo: vcrum operalufi.

Belloniuslib. ti. Obfervacionucap.iAxxnr.
fimile vifcum in oleis Hierofolymirauo agro
crefcere fcrcbit. Olex,inquit, iftic pcculiatu no-
taareliquisdi(cernuntur:narnvi/cUTiiquodeis
innarcicur,rubrisbaccisc(r.pracdituni.

Itahs&: Hiiipanis, *OlvtrrGMxs*, DtJNomGer-
manis. *O / V oi* : dicitur: du usctia *Dals*
GracciSjOlivaLacinisS; *ha\ls, *z, tytu»j* Hifbanis
(oleum enim olivarum *aztytt* vocant} Gallis
Latinos Tequoc is *time*, GermanisoflbtD/ Vnga-
tiso j

SAT i v/E olcifoHomm viscadcmftquac
MvclriSjinquit Diolcoitdes, fed aliquanro in-
fenot:unde oculaubus medicamtntis, ob mi-
tiorcmvimconvcnicnriorcft. Sudorlignovi-
rentcaccnfomananSjillitufanaclichencs^ur-
furfSj&fcabiem.&c,

S I L V E S T R I S O L E A .
CAP. XVIII.

OLEASTER iifhrOlcara dolcfcitjillique
peromniaferefimiliseft, cortice tatnett
ore, ranoribus ram is, minus frequencibus
& brevioribusangudioribus^uc folijsliccteo-
dem modo circa ramos difpoitis; flos ut in olca
fativaraccmarimcohxrens/rudijscxiguisoli-
visfimilis,paucatamncarnepr^ditus,raucro-
nercurvo,elongisptiolisracemacimdcpen-
dens^nmum vindis.dcir.de purpureus,po(tre-
mo ubi maturuicniger, fucco prignans purpu-
lecquigufatusnonnihillinguamveilicat.To-
ta arbor infigniteramara eft.

Nafciturquibufdamcollibus juxtaTagum,
ic mulcis Luiuiniatrdcfctis conrragofisquc lo-
cisjiiueringencia faxa,pra:fenim non proculi
cbrba.poftrema Lufiwni? (uc ijunc circumfcri-
pucft)uicb,duobus fupraAnam flumen milia-
nbus, ad radices fercCaftuloncnfisGttus,qucmnunc *Sittra mertna*, hoc cftMontem ni-
grum vocant^Lijus pars fuperandacft ijsqui Vlyflippnc Hifpalim ptoficiicatur, ubimagnx
cjus

cjus funtilvr. inqmbuslanuariomenlefru&umcolligebam anno WDLXV. Maturus fit ejus fruauscum01ca:ied magnaexparte incoltsnegligicur,&infifrnorumalianiinq;^vium efcam tancim cedic.

G. n. n. c. i. d. p. n. d. a. l. a. r. e. s. d. b. r. v. s. Latini Oleastrum & Oleam silvestrem, Hispani *acebuche*, Nemea fed frequennus <*(/«:Galti *Olivier faHva^e* appellant.

EASOEMCUHI Olea vires obtinet,ied vehcmctiores & plures. Quas veto Diofcorides F* *inlata*. Olcaftrotribuic.eafdem Plinius Oleseadfcribiu.

Plura veto deOlearugenenbus₃culru.&:a!ijse6pctinentibusvidere licet apud M. Ca-
An. r. \A ViTru*rr) r j u m s l U m I T t r ; s . . D . n . J X i I u a d e f c r i p t e s f r .

OENOPLIA feu NAPECA Bellonij, CONNARVS Alexandrinorum
forcè, apudArhensum. CAP. XIX.



NON incommodè forficari Silvestri Oleae subjeiam Oenoplia:, fiveNapeaf, cujus Bellomus meminir, hiftoriam: cjuam Vnetijs adaieannoM.D.xcin.miccebatc.v.Hononus Bell us Vicentious, Cydonis CretxMedicinatn hciens, una cum ratni *ihis* (ionbus onulb lcone^pfius manu dehncaca.

ARBOR aurcm c/t.ipfb reference, Piri medicns.ilcicudine,cujuscaudiccm&:ramostegitcortexxalbidus, adcineraccum tendens: ej us folia Paliun Theopfarasti ,five Ziziphi rutilxto lorumfunt^mula, bmasuncias longa, unam lata, tibus nervis apenolo fecundum longitudmcm excurrentibus ptstdita, *fupcwJi* parce fatura vindicate nitentia, inferna ad cinctaceum aliquantulum tendentia^uf lamosalterms inordinataambiuc.-adquoruoieortum niulnnafeimcurHofculialbi.HofculorumOlcc. mftar peculiaribus longis peciolis finguli nitcores:ftuausfuccedit parvo malo valde fimilis, magnirudine, vt plurimum, cerall, interdum ^{13mc} in cefnii glandenictiamiq; lanteftua-
lucenijjiglandenictiamiq; lanteftua-
visguftus, officyluminfe continensolivinx-
ftar-Biferaauteaieft.nam&novoVere&Aut-
tumno Gngulisaanisfrudutn profm: vernalis tamcnpleriimquead fugem non pervemr,ob
im+r,Ufnco pi2m, fedivL-niiibuscarumpitur.

DVORUS gener: n: fpinoiim imuro,afccrum nscar^p.SpinoffumjabAdiaBj^ bicur, qui Connaruo i Achenxi {*teicile* } nfe,
he «iconipfius a borannonrccl' carumat.
ij nactur & in Cretan

Spimscarens in ^gyproSyriaqueprovenit: nactur & m Cr«a, in urbe Rhec.mo "cSvria allaci3m,quod nonnoverac Alpinus.quemadmodunictioecgoiptnofum • quaMti ur eafcnrenna, ut non Connarus Achenxi elcc hxc arbor, <cPpotiusiVlybi| LotusLvi tea ab ipfo Athensoeodcm libropaulopolldetripta: prafeH.mcdmvidcrLn, arborcmiinscarere, hancque mearj fencnt.alpino igniHcavi, a quo Ocoopl* ainu m (pODium acccepi.qai.dcmptis fpiniSjidemeratcum Napecaimedcfenpra. 7-dML

Vrnufaucarbons hifloria apudSetapionem sub *uorkinc fjJ*. Diofcaquavaldedifibrjconfundii: Bclbnuslifc.QbfervaucniiSBKiK.x. Nade caminterarboresperptcmftondcvirentescnumcracquodinjt verutn efie,ann Crecam tranflata.omuino faliiim docetexperietSB

H A c arbor in M^ypzo & c Syria, Nerfeu i V^ydi Smr: ai: iif Cjn» P^rior «m«necaret Nemea,

QVAM porro Democitius apod Ashenzum lib.Trm. Dan ^{mmofoph} ab Alexandrinis Connarus huimlw, crebns ram.^nonn.h,! fpinoils,p«long!_kral|i* fbl.o, tencro, nat bisquotannis «ritve & Ariadl cem, magnitudine olea phaulie, carne & officulo, ei, quam diximus olea fimilibus, eximia faporis jucunditate, Rexent estur: at cum exsiccatu fuerit, molitur in farinam, quam pedibus calcant non manibus purifunt, aut aqua rigant, quoniam respuit ejus natura, sed cogunt in officina. ego non (atis.Tcquor Democerra mentem, qui Connanim ravam cin^m ^f? «« men.autVlmo (quaemagniarbores)nonlum]lorcmrerc,bar H am r j , m o m _

PRosPfiRauceraAlpiimlib.dcPhnds^gypticap.v.Arborjnq^in/? pypto,quam c i = ill.

HActjilfi-
ni.

illi *Nabea* dicunt, Loti magnitudine spectatur, instar *Acaciae* spinosa, folia fe
xima, vcruntamencliora: flores Iujubar floribus quoc
quibus exeunt pomula rotunda, odotata, dulcia, gustuque valde suavia, ceri rum
majurum Marofticentium appelhromm xmula, que apud primates *Aegyptio*, *Yi* *A* *remk*
funt in magno pretio. Arbor bis in anno floret, Vercici licet & A. f. m. *Yi* *A* *remk*
est, fed vern[^]rausnonperfeacmaturanw, \ per[^]fer[^]qu[^] *efn?* *JaZ* *^* *^* *T* *^*

immoderate pforum efuiiidulgeatur. Eam fine dubiocffe
liaram olim ab Alcxandrinis appdlatum. Athcnari Icri
videantur *Nabea* fructu & olli
duir. liafac[^]nonoblongum instar oliv*
bus farum mferiapudcosanimadverti.
diuro pro abo. cisenim veici. pcmd

Em facul-
Matr.

Sed & in med cum usi m • J L »
run, frequenseftufusadiWch, alviq
prosumpio. autclyfteribus inieao: ex
infusio, familiarissima est ad omnes pestiferas febres: aiunt enim hos fruct
suis venenosas qualitates & putredinem efficaciam habere, corque strenu
item perfecte maturorum, optimus est ad purgandam halem
rum ductibus. In omnibus etiam putridis febribus
dandum calorem utantur, &c.

Ceterum *Oenophloeiconem* spinis carentem, qualem ipse *Honorius* ad me mitchat, ex
priui curavi, ut huic capiti adderetur. Ipius quide
compegerat cum aliquot stirpibus siccis, & sem in
Pinelli opera, curarentur: verum navis, que illa ferebat, sevis tempestatibus acta, in *Siciliam*
ejecta est, & corrupta, ut fasciculus ille cum magno meo dolore perierit. Exemplum tamen
Eouilole quam fasciculo addiderat, lanuario mese insequens anni M. D. XCI. II. accipiebam
Maij sub exitum, Lugduni apud Batavos: que quoniam earum stirpium quas mittebat, am
plam mentionem facit, existimavi me operapreium facturum, si illam ad calcem
Observationum adderem: refertim cum plerasque contineat, de
tionibus ago. Eam ob causam Lectorem rogatum velim, illam ep
postea ad me mittere, legere ne pigeat: nam & erudita sunt, & de multis stirpibus agunt, que a
Veteribus quidem scripte sunt, sed pteraque vulgo *Herbariorum* nondum satis cognite.

ZIZIPHVS RUTILA.

CAP. XX.

Ziziphi ru-
tila hystoria.



Natalis.

Tubero.

PY a i magnitudine interdum assurgit Zizi-
plus rutila, plerumque minor, contorto cau-
dice. scabro cortice: laves sunt rami ex nigro ru-
fescentes, ad singula internodia binis spinis fir-
missejusdem colons armati, altera recta, altera
hami modo incurva, ut in *Rhamno* tertio. Ab
istis ramorum internodijs bini, terni, pluresve
tenues ramoli exeunt lenti & flexibiles, coloris
palescentis, spithamez longitudinis, in quibus
alternatim & impari ordine folia nascuntur
Rhamni tertij, sive *Palsii* *Theophrasti* folijs si-
milia, tribus nervis distincta, per ambitum cre-
nata, dilutiore rami viriditate pradita, & ma-
jora quam in *Rhamno*, ad quorum exortus ali-
quot flores exigui pallidi, quinque foliolis con-
stantes, quales in *Rhamno* tertio nascuntur, de-
inde fructus ovali figura, olive magnitudine, pri-
mum viridis, ubi maturavit, rutilis, dulcis saporis.
Alitur in plerisque Hispani Gallie Nar-
bonensis hortis: spote nascit^{cn}numquavidi.

MEMIHIT Ziziphi Plinius xv. cap. xiiii.
H utalis in hac verba. Aque peregrina
fo ha & Tuberes, que & ipsa no pndem
venercin Italiam: hae ex A
xtus Papinius, quem *Abu H noviffim*
utraque attulit, Divi
ribus, in castrorum a 8 Cribus fad, baccis simili
lora quam malis, 1 a 8 Cribus fad, baccis simili
S agg Cnblls p p ue deco-
ra, quoniam & in t

benuq

berum duo genera, candidum, & acalore fericum dictum. Er lib. xv. cap. x, Et Zizipha in-
-iuit, grauolercuncur tncnfc April. Tubcresmeliis inferuntur in pruno fvlveftn, 6f malo
cotonco, &: in Calab nce: eaelt fpa fylvcfris.

COLVMELLA lib. tx. cap. i. li. ubide Apumpaftione agirj Zm phum duorum generum
facit. Arboresjai^probatil Timr. ricilaat quca Lba Ziziplus. Tuberumeriamnieminit Jib. xi.
cap. ii. & rintcarborc Sjqux primaiflorent. recenlet. Poiruntjfc ribitjhis diebiis [pridicvid-
licot KL. Iiinuariasj Ccraij. Tubere Sj& Armeniac Kiatque Amygdate, cetersque arboresque
ptimse florent, in(eri commode.

Plinius xeo fump(i(Tevidemrqu Klib. xvi. cap. xxv. fcribir: Florct prima omnium Amy-
gdala. menfe Ianuano: abcapproximclorent Armeniaca:, dein Tuberes 6c Prscocoes illx
peregrin^ iiscoafcs.

PORR6 non defunt qui vterbus etiam Gratis bane aiborc mcognitamef Teput: enr. S£
ad Lotam quara Th; ophraftus lib. nii. cap. iv. Hift. Plantarum in PharLdeinru] aLocopna-^7iijia
gommnafei tradit, re fcrendam. OpC] me (anc con venire videtur arboriquam Athena-usli-
broxim. Deipiiolbph. fubfinem, Loti nominedefcribic ex Polybij Megalopolitanilibro
duodecimo lultoriarum, li is vcrbis:

Eft autem Locus, arboiminime procera, arper3, non tamen aculeata [alij fpino falegur] Locus Ail*.
folio Rliatni, pauld latiorej & aa/Iiore; frufu per iniria colorc & i magnitudine dm ill per-
rettis baccis Myrti, dum auge {cit, coloris pboentcei, olcaE magnitudinc, totui] do, nuclco ad-
niodumpufillo. Maturus iscol]igicur &: cum aJicatufus, ad fervorj mramulorum nqj cibum
mvafa conculacur, acftipatumingenuorum autem edulij sidetra& onudco. codcm modo
reponitur jacprociboefr, giiftucancis &: palmulis nondt (fimili, odorera mcti fuaviori. FitS:
cxcovinmn, inaquamacerato, &: trito, fapor] Sgrati, &: jucuiidi] ualisc [topcimum Ul: me-
rum id & c fine aqua bibunt, led ultradecim m diem non perdurat: quainobieniadufum
cam brevis remporis conrici Linr. Ficctiamacectim exco.

Eundemetiamulum Loto rribuit Plinius cx Cornelio Nepotc Jib. xm. cap. xv. & eo
pafctosexrcirus ultro ciclo quocommean. es per Afncanifcribir.

GALENO c-np. x. dici plerifque placet. Verim recentioribus Grxcis ^(/«p«& Z^Cuqa. i
cITcj OfTicinifwJM^ certum eft. Arbor HiCpanisacefeifo, Gallis It] ufoer, Narboneniibus
GniJ< wltcr: fra£kus ijfdem dfofeif & sc afttfufawubts & twdekUs; Ifplisgiu^ieit, Gernianis
autem Not-Baqi-terlin.

SANGVINIS acrimoniamedomarc credunturejubaccx, & tuftim fpirandi q; difficulta-
tem leuirc illarum dccodum; pec^ori, renibus, ye Cicz prodefle. Galenus Sericaparvi fucci
c{Icaic, neconcoflioninecftomachofacilia, infolentibus & c cfrenatis pucris 6f mulierib-
b»s cibi gratia tantum expe: i, exiguum que prxbere alitnentum.

ZIZIPHVS ALBA.

CAP, xx I.



AD fupcrioris ahimdtncm incerdum aflur-
agithx carbor, fed pleruque in lantudinem *(!, *:
(efe pandiccaudice eft (acis craltb, cortice icvi & C
candicante: rami qui interdum fpinoil funt, ple-
rafque virgulas habent tenucs (pinis carenres, uc
(uperior, folijs alternatim & fine ordinccriam
narcenribus, (alignis fimilibus, inollt bui, bmm-
noincanisexornatas, ad quoram exoctum ob-
longi nafcuntur flofculi, colons ex argenteo pal-
leicentis. gra vera, non ramen injucundum odo-
rcm late fpargentes Sc capu r ferietcs, q u i bus Cue-
ccdunr oblongmfculxbaccx, exiguisolivis aut
Ziziplns fimiles, alba:, fungora fed dulci came fi-
ve pulpa przdita:, ofTeo intus nuclco canicularo
Creleictponte infcpibus cum Rhamno & Vi^l
ice juxta urbem Guadix icigno Granatefi: & i^Q w atalec.
omnibus fere viridarijs aliturno Q modo per Hi-
fpanias, fed eciam per Galliam & Germaniam "

refert: fed raro
fructifera eft.

regionibus

BELLONIVS libro Obfervat. ii. cap. exi. exilti-
raatei Te Ziziphum afbam Col umella, & fcribit
apud Heraclcam agrorum fe ex hujusmodi
fruticibus confarc, earutr. pes
bus venalem propon^ a GWdsvcrnaculo SA
mone Zizipha vocan.

Item alio libello quem icurandi Ziziphus al-
fylveftres arbores edidit quohquectla^h nupcr la Colomilla.
V 3 Udmo-

admodum latiodonabam, a Plinio Ziziphum Cappadociam appellatur cuius in hxc vrbamemine. dcoronisagenslib. xxi. cap. ix. Natur. Hiftorix. Duoearum genera quando alii Bore confaDt, aluE folio. Florem dixenm cTe gemftas, namqUC 6C Ms decrcptui luctus, itca rhododendron, item ziziphaquar & Cappadociavocancur: hisodoracus familif- qucolearumdocibus.

Ziziphus Cappadocia Plin.

Terre herba Plinij.

Tbuzhr.

Salis latifolia.

Elagium Raurivif.

Nomina.

NON dcluniquilovislbarbaraarboem. operetopiarioififilein. & inroranditatcin fpi- am. foltoatgentcogulusPliiuslib. xvixap. xviii. Natural. Hift. mcmnit, el& AnguilUiariamenlibL- llodcftirpibm, quanaopiniane, binas alias proponitananKisomni- notolijs magisutvidetur ad dekrip: ioncm accedentes.

ET 'An ^ S niimnu "cu P rilllcho" n ^ - EA « ^ t 3 mcn Thcophrafl i quarlibi mt. cap. xi. Hift. Planwumdefenp » cft Aidecur Salicis gcnus cffe: & aliquando illud effe xifi- m / v l f « undum n a u n s n n s s r s s a s n i p t r e a n d i d i a q u a h a b e t f o l i a q u i m e c c r e t a l c e s ,

ad mah folium non nihil accedentiated Jongiora. fiorem mel illum mo]]cm, wllJoJuro, can! d. e ^ emamcqua, nrefC expandatpopulialb a e i u ! ofimilcr U) h g l n i m r e l . q u s r a h C i b u s I c n -

nimidiomaKcofcripto. ammadvc mipfumahamarboemobfcerva & apudfialepfi JJ/K. / abincolis appellatam q i ^ a d ^ h i f f a r i a m m a g i s a c c e d r e v i d e t u r . o d o r a t o L r e p l x -

exquorg « l B « h c . t u j r l . q u o r a d r o b o r a n d u m c o r p e r u t i l . s . E a m v e r o e f f e « n l c t q u »

ibus « r » r i & * * n * b » m y , Scrapioni zurumbnh appellatur H A v c a u t e m z i f p o n t e c r e f c e r e , & a b l a t . & l e g i t i m u m e f f e . C a n t a n i a m & C a n a t e n t e s A r b o r p a r a y f o , h o c e f t , A r b o r e m p a r a - d y f i : G a l l i , t e f t e B e l l o n i o , I n d i e r b l a n c & O l i v a f t r e . M a t t h i o l u s c o m m e n t a r i j s i n D i o f c o r - d e m O l e a m B o h e m i c a m a p p e l l a t & i l a i n z i t a T h e o p h r a f t i e f f e c e n f e t .

AZADARAC Herbariorum.

CAP. XXII.

Azadara hiftoria.



Metale.

Arbor fan- ta.

^ * * "

jfmiiw.

SVPE R i o R i hanc arborem fubiicienda pu- tavi. quoniam a nonnullis eodem cu m ilia no- mine imuncunr li><rtn.: eZ- ter eas dif- ferentia!

Es r ver6vafta8cpiDcera, nonminUsaliquan- doquam Locn^cautiicc craflb, corticc in noucl- lis Levied ficus corticcm fere accedente, in adul- noribui feabro & rimofb: illi us fo]ia adfraxini fol< ahquantulum acceduc, fed pltir. mae ramo- to & obloogo pediculo dependence Ckucgaol

rd. aadrndu ^mgricantia^fabhrciacmcum li) mi b l i f a u t t v i n g ^ c t b - liorum exortu, multis longruicu o- ribus purpurafcentibus, odoratis imque cohaereotibus exornati: quibus luccedit fructus imino viridis. uritate autem candicans

SI ua-

Is fere m nonnullis M a b l i c o f p i c i t u r . o t a h i e m e p e r d u r a t u d u s i n a r b o r e , n u l l i s d e g u f t a n t i b u s a v i b u s

Nulquam h i n c a r b o r e m f p o n t i n a t e q u o d v i d i f e d i n m u l t i s B e t a m e c u n a m r e g i a s v i a s a l i t u r : n u m o r d u c m m a j o r m i h i c o n f p e c t a , q u a m H i f p a l i i n R e g i o p a l t i o . I t a l i z p l e r i f q u e l o c i s f r e q u e n t e m e f f e i n t e l l i g o . M e m i n i & i n M o m p e l i o o l i m v i d e r e .

I s t i c m e o t e m p o r e A r b o r f a n d a d i c e b a t u r : m p e l i e f i E p i f c o p o L o t u s a l b a e x i -

hu Cretmerenia? ni g o m i n i s v i r o s n a m u b , o l e a : f l o s S e c t e r a : a p p a d o c i z t r i b u n t : n a m u b , o l e a : f l o s S e c t e r a : i m p e r i t e q u a m H e r b a r i j G a l l i a l i s H e r b a r i j s S y c o m o r u m f t e n d a m A c ^ i i f p e c i e m

Doctissimo & celeberrimo viro Gulielmo Baeticis vulga tur: Ualis Pert) mukis mpo]ita

Baeticis vulga tur: Ualis Pert) mukis mpo]ita vna: urblspj ateis, ad umbram praebendam,

Arbol parayfo, quemadmodum Castellanis Ziz plus alba dici- anis Zenzfacht, teste Bauwolfio, q u i e a m i b i d e m n a f e n t e m a t q u e a l i j s l o c i i n i u a p e i c g r i - n a t i o n e


natione obfervavit jfructum retincentem, donee fequente anno novagerminapnr bear,
 Pleriquc came flepur. ani. 3. quam A victim all b. 11 cap. xv. Azedara et liappcllat. Arbor in- *tutmmk*
 quir., notahabens frud: uni limilcm Nabach [ideft loto] Sinominante amin Recharbo-
 rern Myrobalanorum, & cft ex magtiis arboribus,
 Flor Hi Azadaracth calidum in cercio, ficcum in fine primū, Avicenna lof o memoraco *facilitate*
 rchbltj & cccre brioblruftioncs apri reaireric: ftilla unum veroejus liquorempediculosin-
 terficere, & comamalcre, lio vino permi (lo caput abluatur.. Fruftum autc jnpedorino-
 xium, & valdc permciofum efTc. Rau wolfius addit canes intenmere, fi cum obo obijeiacur:
 cx quibus quidem faculcacibus. Ziziphainefli; non puflc, conijccre licet.

PINASTER IT ALIA RESINIFERA.

CAP. XXII r.

Pinafter n. Auftriacus.

Pinafter m. Auftriacus.



PINASTRUM appc llo Pinura filueftrem^equurus Plinium^qui Nacur. Hiftor. lib. xvr.
 l cap. x. Pinafter m. hialiu dcf Tequam Pinuro filveftrem fcribit, & qux TI wophraftus
 Hitlor. Plant. lib. 11 i. czp. x. dcntru K'id'^i CLirid [t, ^d? in\imfi Wt fi (cmt T2n (iuh. 'E) as in meis
 peregrinationibus varia obfervavi genera: cerna in Hi (panijs, quaccrna m Auftriacis Panno-
 nictsque montibus & filvis.

MAIOR. Hifpanicus, in Piri a Italicudinem excrefcit. inter dum etiam fuperac^mediora- *Pinafter n. Hifpania.*
 mofus: folia ha bet Pm^oblonga. bina fcmper limul jundta, in viriditate nigricantia, acumi-
 nita fepungenciarftrobis pautomino re quam Pini^Iato inter rcjuarhas, quibus compaft us
 eft, nudco, molli & nullo putamine inclulb, (cd tenui cortice duntaxat ce£lo. Caudcx it-
 flus, cortex leviar & minus (catier quam Pini. Plurimam Refinam fundit.

Crefcit id genus in Aquitania, in Pyrenasis frequentiflime, & c plerifq, alijs Hifpani^ locis.

AVSTRIACVS major, duorum efl gcncrum. adeo inter lilmifimn^rpauci. nifirj^c'. *Pinafter n. tip nut. dunt gen.*
 rii c^fores^ifcernere queant: alrerum camen genus Iftiore & erediore fct caudice, Uvio-
 recortice, majore cono, Auftriacis SO direff Kiit diaum: alterum craffiore plcrumque fct

caudicc/cabriorcc Drttcc folijs pauldrafior Lbus. minor conoec Owdrfj jcfmiit appellat Lim

Tenuia porro & oblonga habet uemque genus folia. pungenajbina femper con junftim *Pinafter n. Auftriacus.*
 ceodem cubuhprodunna, & cccircamosiuorbem quafinaicntia, Maionice feincxi
 tremismii quafi bocrofive uvas quaf Ham ferttenuibus Itjuamis obfitas, qui Iponccapc-
 ricntibus fe fq^aamismoftendunt vircfcentcs aucpallefcence Sjp lcnosrcnuipollincl Lico
 five farina, qua: levis aurar a Hacu difper. gitur. Ex medijs deinde botrts nova germina **codem**
 nienfeprodcunc fuis novcllis folijs tcnuiquadarii vduumcbranain Tfurison^ii qu^cx-

trema parre, anre quam folia fuccrefcant & explicentur, fructus dimcnnim danr grandio-
re jam fimmicer qjadgerminum bDilimilitate fupioris Autini immature fru& iij viridi,
ramorum alas fpcSante & reflcm Vrrumque lioc genus Vngari vddftny'6, 8c kdzfel'j'o no-
minanc. & exeopafnminraontanis Auitriacis & PaDnonicis conficiuntur afrercs, rorara b
aqua vcrfatx opera fefii: exalboetiam, quod parum ab Hifpanico majore, & folisforrc na-
talibus difFerre videtur, fcanduts, & vincarum pali.

Pinaster 11.
Auitriacus
aler.
Pinaster 11.
Auitriacus.

Nigrivero genus interdum invenitur triflor carborej contortocaudicc. & in latum fpar-
fis ramis, minore adhuc quam prxcedens cono.

C U E sc IT & ad nonnullorum Aulriat montium radices in fcopulis ^fupra Badcqcfe-
thermasquamorfupra Viennammilianbus, in montium crepidinetenuigramine obfira,
aliudquoddam genus concertoadmodum caudiccdivaricatis ramis, quorum furculimul-
tograclhores tentiore fque funtquam in fuperioribus duobus genibus: folia item habec
illis longetenuiora & breviora, tamen bina Temper coniundim ex eodem tubulo in virga-
rum ambitu nafcem: extremis virgis botrus five uvaexiguorum iulorum vel unucamen-
ro tenuiorum fquamarum inclu fa adnafcitur, qm non virefcunt aut fiavent uc in ante dift(S,
fed purpurafcunt ^ftMie ujn uiflimurn putverem abetinc, fuccrefcnc ex eorum raedio
no voger m en ^j jflMP* mcmbra navelveficulainclu fionufto: huius conusctiain
minor dt> & Qbcii^^^UHW mucrone.

Pinaster 11. Hifpanicus.

Pinaster 11. Auftriacus*.



Pinaster 11.
Hifpanicus.

Pinaster 111.
Auftriacus.

M I N O R Hifpanicus duorum hominum altitudinem rar Afij^* rca
ctudice, ut plurimum ab imo ramoso: folia illi majori fimilia, fed breviora, & diutius viren-
tia: conetiam minores, oblongi tamen, turbinati, & candicantes, multa plerumque refina
infecti, non admodum ijs diflimiles qui Auftriaci, albo cognominato, innafcuntur: nuclei
quales in majore, nigra membrana contecti. Murciano & Valentino regno frequens.

P I N A S T E R pumilio Auftriacus humanam non fupcrat altitudinem: fed ftatim à radi-
co in lentos & oblequentes, tamen crallos, rugofoque & denfo cortice tectos, ramos divi-
ditur, atque in latitudinem diffunditur: hos per fingulas squamas bina femper ex eodem tu-
bulo fimul prodeuntia & juncta folia ambiunt, que madmodum in Pinu & vulgari Pinastro,
magis tamen carnofa funt, craliora, breviora, & obtufiore mucrone pradita, colore que fa-
turatius virente: ftrobili unciales squamatim compacti lariceis conis haud majores, fed ma-
gis turbinati, rectique, pediculo retrorfum non inflexo ut in predictis generibus, nucleus
alaris ut reliquorum, & inter compactiles squamas latens: radix cralfa, lignofa, in di-
verfa teffens.

Nafcitur

Nascitur in turinensi monte in Au (Iri* & Scyris) alpium supercilijs, inter fasa & scopulos ut pium
mii ji, ubi nullaxilix arbores provemunt.

Pinafternj-Hispanicus.

PiccapumiU.



ALTER P^{^^^}J^{^^f}T^{^X}o Secomctcfti, nqkeitainlanrudi-
ramos divifus ut ^{no...} rramen ^{cis foli} diffimilita, non adeo tamen
ncm dUfci:virg^{*etiani} j f ^{^^} S S g S S S S " pMdW fiipenomm folia: ftrob.li
us etiam pusillus & nigricans, alatus ut reliquorum. Solo Murciano
tegnogenQshocid[^]acranffimecoiilpexi' . [^] onnlii^{se}fl;cputatur.qaemadnjodum ^{Hemina.}

minor H ^{infu} i P i U o H J g S g S S S i voomt P < - «*f. Nuctim P, na-
lonio lib. iii. Observat. cap. xli. Pinon. ^{ocabulum Picea Pinus}
stri fructus Plinius Pitydis appellat. Dioscorides tamen w ^{& aliquantum exalsa-}
que fructui indifferenter tribuit: quem vim adstrictonam ^{t.}
cientem, tussi pectorisque vitij auxiliari, per se, aut ex melle sumpt
E Pnastr^{ma} jris Austriaci inferiore parte, radicibus vicinote, ^{^^ GermaDJept0.}
ad. gnernarandendua. & lumen prae bendum donec, ma^{ri}: per ^{^^}
Vindas usus, ftranp M enim humor ad radices dVficndens ? & «bores, fie utinTcdam x.J*
Tercantur. exqua affbl*. Est vero Tede vocabulum ^{& mterdumaiborem} ^{gn}
catquam ^{ius ^ ^ cap. x. Natur. Hist. sextum re}
temexP. n ^{no d il...} as colligere non observavi, quifⁿⁱ fcrarum genus face. Refinam au.
tabros, & alijs Hispaniae locis, ubi arbores vulner ^{cjus rei causa} singulis annis novum
vulnus supra annotinum infligentes, donec ad ^{3 f i i aut} djwitalm P^{Js} altrud. non
ac deinde alia aperitur.

Qv^{ae} vero Theophr ^{fit, ex Gazz versione & vul-} ^{hu} Thep.
gatis graecis codicibus, difficult admodum judicari possirnciftuno. quandoquidem ejus
materiam openbus in ptam e ^{fft&icudmepinoniiiorcm. mm} ulq. erectam assurge-
re scribit. At ut ex melioris notae codice colli ^{mnsum doctiorum judicio ea est ar-}
bor quam Plinius appellat Piccam, & apud re «miores rei herbaria: Scriprores codem so- fto
mine donatur: arbor procer a, & in mete modum crefcens, folijs brevibus, rigidis, & pungent-
tibus, undc quiri q u e r a m o s g g ^{for T. tcr8 f d c c u (ra, n, n, a, t b o r e \}
nascuntur qoadi o d caufam Vngari ^{fcffefl^S.} ** < ? f ^{cri l ci ^ m ^ b l ^ t n l} nuncupavit.
Fen wcr6ca Maio menfc in extremis ramis fingulares mlos pallcfccc fani W p c i n i A. demde
tuobilo\$

flexibiles siue conos mollibus squamis imbricatis compositis constantes, purpurascentes dum novelli sunt & primè nati, deinde paulatim in longitudinem excrescentes, quæ in maturis septem aut octo interdum unciarum est, sub quibus exiguum alatum semen, Pina-

Picea pini.

Picea pini.

Picea pini.

Picea pini.

SE D & multas habet notas
to idcirco a pice esse, hoc est, ab
Germani (schott) aliqui rot thamm, Meminit etiam Plinius lib. xv. cap. x. Piceæ fativæ quæ fa-

^ S ^ & ^ & S s ? ^

memora-
tam Piceæ fativæ,
pinam nucem ferat.

Illius autem genus reperitur, quod numquam valdè asurgit, sed pumilum maneijfert que quedam nucamenta natis pontice magnitudine, e squamul^{is} nbncatim compoli Eis, icdio & veluti cellulas ostenduit, a fummis & pungei
ribus & allidiqribus foli^{is} uam superior prædita est. In hac neque florem, neq LiefrLidtiim obfervati: & hand fcio an iiJrat. Videtur eam C.V. Dalechampius non ignorat, fcd Pinura Tubulum, siue Tubulum vocare. Plinio tamen Tubulus Pinaster est gracilis, succinctor, eno-

ABIES CVM SVIS IVLIS.

y bin.



Stria.

ABIES autem Plinij *Abies Sædita*, abies femina Theophr. lib. iii. cap. x. est arbor cellissima & formosissima, cortice lævi, & candidiore quàm in Picea, ramiscrudceuf larim cid<cn- bus, & in latera, velut ait, expansis, quos ambhnt folia plana in junioribus & bifido iiiu- ctione conspicu- iJuperncvindia; averta parte cineracea, & utri- que in ramulis veluti pecti- natim disposita. ra. t. a ut totus ramus complanatus, & compressus videatur: in vetustis autem a. b. oribus folia...um ordinem (nisi in tenellis ramis

obcufo mucræne, lic« puncliui, reddumur. Adulte arbores circa majorum ramorum extremos quasi furculos, in singulorum folio- ram aliis prona parte exigua quedam nucamenti- terdum ferunt, è quibus singulares bre- vefq; uli- plicantur. f. Canllranccanu «menia in a ic < uiii nonumq... rallores habet quàm Picea conos, obtusa cuspide, latioribusq; squa- mis præditis, Cedrinorum fere modo, inter quas prominent veluti membranacea foliola: non propendent ut Picearum cono, sed firmi & quoda... is ta- mi- scnea arbons cacumen foUlmodo naf- cunt- rent- Aut... in autno, & multam resinam fundunt. Sub Autumni finem & hiemis initium matu- ritatem consequi feruntur.

In hac porro arbore vis (cfi) quod nus ex Theophrasto appellat obfervavi mn ge majore deinde copia anno 'M D L<lv !' ^ V TMhum ANZ M. D. LXXXIII. sed lon- Hybeck à Waldstain Pro- uibe (i cuius arcem incolebat) albis, penin- de atque vulgare viscum, bacis præditum. Tenuiores hujus arboris ramos solent Vienneses, venali vino ante suas axes laspenlos proponere, ut aliarum rCgIONum i incole hederam. Itali *Abeto*, Hispani *Abon*, Galli *Sap* & Sdplf?, Germani *Weißer Eichenbaum*, Austriaci simpliciter *Chamm* nominant, Ungari *senjè*.

Nemica.

Larix.

iti Theophr.

SE D cellissima etiam est Larix, à Theophrasto minimè descripta ut asbitror nam Gazx Larix nihil aliud quàm *Abies* est, quam prioribus libris perpetuo Piceam interpretatus est. CETERVM Plinius de Larice agens, omnia illi adscribit quæ Theophrastus tribuit, ut ex multis locis inter se collatis videre licet, quorum aliquot in medium profereamus. Theophrastus Plantarum Hist. lib. iii. cap. iii. *Abies di... Plinius Hist. Natural. lib. 9.*

libro: ^xvi. cap. x /iii. Montes amant cedrus, larix, reda, & ceterae quibus relina, ite maquifo-
 Ha. ^{ll}xiis, ilex, & x. Rur fuscodem capite Theophr. *dittpv Zht/uhcwt Fi vutivien a %\$ Trp'o-
 ^piNi^B-», ^tv^x, >; TriTv; d^U; 7ru^, dy^xyv». Vjm^iicm('dcm lib. cap. XXI. Silveftriuro ge-
 neris folia non de. <sup>idur abietis, larici, pinastro, juniperi, cedri, terebintho, buxo, ilici, aquito-
 no, &c. Theop. praeterea ejusde lib. cap. x. <sup>δ' ἀπορίων δ' ἴσται πέντες καὶ ἄλλων πέντες τὸν πέντακον. ἀει-
 κων μὲν γὰρ ἐπιπλουθεῖ ὡς τῶν ἐλάων οὐκ ἀναβλασάντων. τῆς πέντης δ' ἐφασι τῆς ἀναβλασάντων ὁ ἀεικὼν</sup> ^{ullis}</sup>*

radicibus non repullulat, picea repullulat, uc in Lcsbo accidit, incenso nemore pyrria: o.

Hinc faiiuaie flearbitror, uteodem capice perpetuam comam Laricitn buat: nam Gc
 scribit, Omniae aperpetuovirent, ncc facilediiccrnuntur in fronce, ctiam apcritis: tara
 natalium mixtura est, fed picea minusahaquam Larix, &c. Jpfacamenxprienriaa Siud
 aoidocccrflbfacnfm, quxvicena, fi^pluranonnumquanifimulabcodemcxartife ruber-
 culisrainDsconfuroordincambientibus exeunt pnt Cillimodo. ienuiaj molliaj viridia, Ijs
 ferifitaik quarin Corrua certii Hispanica a me descripta nafcmuur, perennia no fuit, fed
 incunee *hicmedccidanr, 5Enovo vctcalizex ijCdctn* tuberculis renafointuf: rarr: longi fuit
 Ar^racile Sjdcorrumpendente Sjn quibus unciales conidmollibusquamisimbcatim
 fibiinvicem incumbentibus compoficijexrjbropulceri'imcpnrpuraft'entes. dum novelli Sc
 iccnces funr, *ex ijfdem* tuberculis c cjinibus folta prodeunt, brevi & craflbfii moqj petiolo,
 furfam, hoc est d brachiorum ahsredcxo^ nirentc Sj Ut mucrone carlum fpecfent, qui alata
 parvula ftmina conrinent.

Graxis dicitur *Xa. ^%*, Lacinis Larix, Icalis *Larice*, Hi (panis *^ilers*), ut aflcrunt nonnulli,
 nam nullam in Hilpanijs nafcentem videre meraini: Ga Uis *jMr Uz. l*, Germams *Htuhtn Hmt*
 Vngatis *vor'osftnp kibil tmbintina lez. '6»*.

I Udauremanimadvrtendum, Vngaros omnibus arbotibus coniferis jaramemoratis
 / ^ (' qomen^quod proprie apud eos Iumpcrum fignificatjadfcncbre, quia folium fpinar (i-
 niile Squafijuniperin Lmliabent.

* MAXIMA porrocopirt, harumarbotumplefarcieueiefcuntin Vienncfifjliu, turn alijs
 monctbus Alpbibus vicini Sjarquectiam in ipfis *Alptbus*, *exceptiscartjm* rutrnisjugis & : fu-
 percilijsubinull^ . prxcrpui rilionc mpinafrum prior clodcfenptom^ crfifitrcpotlunr.
 Crfcfunt & plerq ucalijs Germania: & Bohemia: locis^ rarius wrnen Larix.

Abies marina Belgica.



Vinerorum pedamenta Si pali Vicnncfi agro
 exabre6wnr, arc] < } eeri; tm ex Pinafro, quern
 album ipficognomioanc: circa Neapolim vcr6,
 & fupra Badenfes Tlicrmas, rotoque ilia tradtu
 ex)a; ice (n. ini ea abudandr) vt qvx corruption!
 minus fit obnoxia.

Fiuntitem ifticex laricc longiflimicanales,
 tcllis fupponendi & aptandL^ ad pluviam & : im-
 bresexijsdecidentcscxcipiendum, funtetm
 commodi (Tmii: namcumfirma&: (olidamat-
 ricconfent, dtutiflimclolisardoribiis, & alijs
 aerisinjurijsrcfifitrcpoflunc, nccfindufur, aut
 vitiumconcrahunr, caque de caufa non picis,
 non alterius rei induflione cgent. Honim ma-
 gna copia Vicnnam atvchitur quinquaginu
 pedum auc majorelongitudinc.

Q_v^i plura de Coniferis arboribus cogno-
 fcerc voJctjPctri Bestoni} hbdlum cuititulutn
 fecit de Coniferis arboribus & c pcrpecua fron-
 devirentibus, cum ijs qua: MatrhioIus in pri-
 mum librum Diofcoridis cap. de Pinu & Picea
 commentarus est, atque cum alijs qui postea
 feriferunc conferat.

ABJETRM vero *marinam* quato Theophr.
 runt. ninor. iiD. nu. cap. vu. deienbit, videm
 non memiiii, & mihi ignotam fatcor; Qucrcus
 enim & Abietis hiftoriam confudiflb videtur
 multa (q; notas quercui tribuiffe exifHmo, qux
 Abien, auctjus genens arbori marina: iijclius /
 rorcafe confonment.

Mcmini: vutem P^0ftmcumcxH1fp, a n i s r << .
 aitum obfervare annis r exagchrno r xto^ & r f x a g e f i m o f c p t i m o f u p r a m i l c f i m u m & q u i i n
 g^ite Smam m Fkndxati mmtiink Y3i: m irbufcuhmm formas Ofitcarum LC?M & Myl

raro palmi altitudinem excedentes, extenuibus vducifquamisconcextar, nonnullxomni-
no planie, in orbem prominentibus ramulis alie.

Cupressus
Maritima Del-
ptm.

Alie Cupressos ita emulabantur, ut satis mirari nequirem Providentiz divinze opus & ar-
tificium, ramulis frequentibus in orbem, sed nullo ordine nascentibus, & sursum spectanti-
bus cupressinarum foliorum modo efformatis. Harum tamen aliquot annis inter chartas
stervatarum & compressarum rami, si in vitrum aut aliud vasa vitreum injiciantur, fla-
torum vulgus satis obsecrum illis nomen indidit.

Plures adhuc collegeram, sed cum plerisque alijs Naturz miraculis in cista repositas a
Divo Maximiliano in Viennam evocatus, in Belgica reliqui, nec ad manum habui cum hzc
describerem, nec etiam ab eo tempore conspexi, ideoque earum historiam dare nequeo.

HARVM autem marinarum plantarum, uti & reliquarum stirpium, atque omnium Na-
turz miraculorum diligentissimus observator erat Illustris vir Carolus a S. Audomaro m.
Dn. de Dranoutre, Moerkerck: & f. Dynasta.

Myrica ma-
ritima Batavi-
ca.

SEd & anno M. D. XCV. in Trejeaamentarepctas, raaris littorearenofosaggersnon
procul Lugduno Batavorum i>s, quaEuorautquinqueplantulasconspicicBamcon-
chis Tollinarum adnatas, gr- icilesvalde. digiralisautmajonslongUudinis, in breves & fal-
sugine obductos ramulos divi- ias, quus Myncx vel Ericacramulos mirum in modu referrenr.

AUBOR VITAE. CAP. XXIII.

Ativt'u vitt
ktlJtria.



Nantes.

ADMODVM elegans est ca arbor, cujusra-
mum hie expreflumdamus, perpetuovirer,
caudiceftcao^liquotorgyiasaito.nodofopaii-
latimfuccrefcente.corricecxrubromencanceli-
gnoduro, frequenteshabct ntnos in alarum for-
mamcxpan(os quinaliosratnulos planosalter-
naamelKrcfucaefcctBdivifi.deiTuoiiiiulta
oblongafolia,nmnerofisfolioli_s, quaternisfia.ul

Cupresso, pusilli, flavescetes, quorum nonnulli
deinde in exiguum fructum pini nuciei magnitu-
dine efformantur, conimodo e sex squamulis te-
bellis compactu, initio viridem, dein flavescen-

juatana pletumquEfemin, pascacc K T o [Th
«iculi faporis) paulu-
C r e cont n l c n ^ - Tota arbor gravi-
ter odorata d r d t l j » as « » y n e r c s l o n g e p c n s
odore, quem... quis folium nonnihil duntaxat dig-
itis conficaverit, facile eluere non possit. Hunc
autem non modo viridis ex se exhalat, sed etiam
multis jam annis excisa & resecata retinet.

Primum mihi conspecta est hzc arbor in horto
Regio Fontaine belleau, non procul Aurelia Gallo-
rum, ed ex A r Septentrionali ora. Canadai

diffi. d. det, GallDrum In. perium obtinente Francisco^iUfnn
omnium fummo Marcenat Qaccanre. utxi l'timo EuronJ
miim virura Nicolaum Rastum Regis elieirurcum ectebe g n i U. De n < i capud doctifi-
Naturacmiracjloruni ftudi ftudiofiffimum & p e i f l] " U T h u m > e i n t h i c e i n A u e o m n i u m
commiyicavitubi nuncadcofrequeiiscft, ut nu u s t t e ariz studiosus, qui eam in
fuo horto non alar: inde portu in plerofque Ger a r hortos transijt: facile enim rami de-
pacti radices g i n t q d u m f x p c T m ^ tus, presertim loco umbro(b&fer tili
pinguis solo. Nascisurctiamfemine: fedcncellrnl ante ante quam inramosdividncur:&
explicentur, Oxycedum. Iuniperumj forem primu m en t a s a (i m o d u m a f m u l : i n t u r
Frigoris patientissima est: hinc tamen fuscum & fuliginosum eolorem contrahentibusfo-
lijs, qux novo Vere pnullum n i r o t e m d & viriditatem reci

AD quam arborem vetenbusdeferi
iThcfr., Pluimi^aKnuamTheopraftuslib. ini ^ onfacilequisconijeiat.
I. cinqucalRCiitibusprorcranna(t5tradie < f i 9 c a p , i n i o n t < i m c a c u i n i b u s ,
hac vel ba: Thyum ab alijs Thya appellatum, nascitur apud Ammanus fanura, & Cytrenesi
agro, forma Cupressi similis, ramis, folijs, caudice, & fructu: vel potius ceu Cupressus silve-
stris. Multa etiam ubi nunc urbs est: & tradunt contignationes basilicarum adhuc existere,
nulli

Inuolucris impuretrediniobnoxium die hoc lignum. CrifpuTimaveroejus radix, exquaprzcipua ope ra hunt.

Anguillara porro Thcophrafti Thyam tiihil ali ud eſſe cenſet,quam Sabinam primam,,(i-vevujgarem. Scd licet Sabin^ genus inveniaturbacciferum: cjuſtUmetifruſtusJuniperi vulganuruct.il nou major, valdeabiimiliſeſtupreflno, cuiTliyxfuclum Theophraitus "uikrm fjeſt.tlTcnadinod um SitoraniThyaTplantamcuprefTo.Et facile in dodtiffilmi GuilaiiLiimfentL'ntiatnproblematisix.&x. defcnUonconceflcnm,plurimiim adThya:liiftotajpiiXheophi-afioprodiiam acccderearboremfui generisCupreflb limilimam in Syria, Hablielfructus.



jEgypco,&Arabiana(ccntcm,cujusfruſtusj4i6f/totoOriente notillmu? ,pilularum Cupreffiniagnitudine, colorerufu in nigruindcclivt. Talem ver6/faiiWnomineiniignuura, fubanni M.D. ixxx. iniriiumcumalijsplerifcjuexotichmihidabatdo-(fciffimusvirBernardusPaludanusFnrius.nuncEnchufianuſpo. iiacros,& omnium rerumnaturalium(qmbusamplin*iniurn milixum refertum habet J pcrifflinius,cpcrcgrinat]onefuaSynaca &c jEgyptiaca rcdux: quadecaujaiilius uoncm leftorisoculis hicfubsjeiendumduxi.

PliniiſectiamNaruraiisHillonxlib.xiii.cap.xvi.Thyaimcminitj&plcraquccxTheo- plirafii loco jam di&odefumpnr.

Nondefiintquidarborcm Bnitam (dequaidem Pliniuilib. xit.cap.xvni referant. Petuſit,i]i]iquitiinHilima;osnrbum Brutam.Cupreflbfularfimilem, exalbidiramis, odonsaccacafatu , &6 cum miraculo hiftorijs Claudij Cxfaris prardcatain . Foliain- fpecieſpaciouſibus ^arhoſtradit.odorem cfleproximum Cedro, fumuniqueejascontra li.ilignaremedio. Nafciair ultra P:i(itigrinin nibusoppidiSitacx, monteZagro.

H .t.c quidL-tin arbprad Cuprefiiim nomiiliilacccdit: verum ramosfirfium non attollit q«emadmodum]i,ifcdin]iini<isvclutial.iscxpanfos,utdixi,tlatinidincdifTundit. Hujus item folia tamctfiex fbioltsfquamatum compaila,omninoplanafint.nonrotundautiCu- preflb, lunipero tnajori, Sabina: nee rotunditatem ante contrabunc, quam in tamos excreſcant.

GaXliartre dtvie, hoc eſt, arboremvincnuncu pant, nefcio qua rationed u&i, nifi forte obimmortalemjuſcomamj quam ramen cum multialijscommnncm habet, aucodoru cjuſvehemenciam.quamlalubremclTecxiftimentjhocnomcnindidcrinr. VulgusHctbariorum &Thuiam& Arborem vitarappellat.NonnullipluraThuia:generaconſtituunc,& hancatbotero terrium genus eſſe voluni.

N O N dubium eil.quin ad plcraque fit utilis: nemo veto illius facultates noſtroarvo prodidic.quodfciam.Cumtamcnmagnamhabeatpartiumtenuitatcmj Siamanufculafi^verifi mile eſt digcrendi&abftergendifacultatcpraditain.

H A we porr6defcnbrevidcturOvieduſlib.ix.cap,xii.li.hisverbis.Siintpiactcreanonnu Hi al«,qiias inter arborcsccen(co,crafnr.udine&longitudincpraaltiPini,cuj us foli.i Hifpaniram filiccm plane rcfcrunc,tamctfilongemajora:cjLi(clemtamen forms ,ut viJlicctfiingulafoliacniukisfolijsiimuIconneXLSConfent. Habentigiturifti n.rhorcsfolia vcraBFilicimninoſimiUa, fuiſviridia: &magnaexparteincorrcnciumtipisS<;convaIIibus hum idis (pontc nafcuntur.

IVNIPERVS.

CAP. XXV.

IVNIPERI duo genera vetercs conſtituuc, majus&mtnus. DioſcoridesuniuſfriKaum nucisjuglandis magnitudine interdūaugeri,a!teriuſnucē ponricamsquare air:ciim tamen reliqui lunipemfruttum nonmajoremquammyrtotribuant: Ccd nee ipfecap.deCedro.

VERVM deluniperocujusdeſcriptio a Dioſcoridis intrprece tanquatin notha rcjeda eſt,pri mum agemus,deindcdealteracuirpinapto folio eſt.

Iuniperus,quam majorem appello ,frutexefthumanam altitudinem rar6fupcrans, caudicecontorco,nonreflo,muUisramispra;dito,(cabrocortice:folia habetcarnofa,&ex continuaquaternorumfoliotum mutuoconnexorumferie compofita, qucmadmudtn Qy. preiFus: flores lunipero vulgari & Oxycdro fimiles, flavos, fed extremis folijs infidentcs ut mCu[>reflb&Thuia:quibusfucceditfruaſbaccatummyrtimaginitudinejrotundus,pn- nuuin viridis.deindcadphcnicumcolorem tendes,qm matiiritatenonnihilmolleſcit ſp- pore & odore luniperibaccis (imili.qui triaaut quaterna, vel etiam pluragrarfa obtona& ftrialubcc,mcdulhii(ialbam5£relinamolentemcontinentia. Vereflotct, fruſtunicue diu retinet arite quam matureſcat.uti Iuniperus. Primum femine narns hie frutex,& adliuc tenet,folia habet omninodiffioiilia,utpote qua; alceriuſjuniperi folia a: tnulentii^niibrevioraſEjull6 molliorac(Tenc :ctim ver6 jam certiumaucquartitm annuwattigt', rotunda, &cuprefſca folia efformare incipit: ut inferioresramipungentibus&acmiſfbfiis, lummi >>l6 obtuſis 3c rotundis onuſti incerdum conſpiciantur. Quam metamorphofim'nifi quis diligenterobſervaverit.facilincrroreminducipoffir.utcredatadolefcntcmiamadulta divcrdin plancara eſſe.

Sabina bac- tifer.

Abel.

Abel.

Bruta Pini.

Sabina.

Arbor Filicis fima.

Juniperi ma- joris hiftoria.

Juniperus major Diofc.

Juniperus Alpina



Scalae.

N^a SCITV R aainyrrnenumaare: naimnterCaipen&MalaMni-, Bxiicx itemK
uasNarboneniisoramaritimaoblciavam.

OPTIME convenithicfrutexcuin lunipromajorc, quietamquamrpuriac Diofcori-
discodicabinterpterercjaacft.utdixi.Fjusvcrohweftdcfcriprio

Juniperus
major Diofc.

IVNI? t R v s major,quam aliqui filvelhem Cu^{prc}ffum appellant^, Mnefitlicum.alij
Acaferatn^omam lunipmim.VIlgocognita^{ct}.Cupreiofimil.s : afpcrismariiimiiA 16-
cis pleruroq^{ue}charicicuvardem ^{idm} lupradit

Cldw n*
nitiamms

N I si totOadCcdrammoremaUcram, iatn 1 heophrastus& Pluiius phocniciairt
f l b d d f e ^oratumem

Juniperi ma-
jori de Sabi-
na hactis dif-
ferentia.

Ex Neotericiis nonnulli Sabinae
baccifera, plurimum differat odore & forma
etiam odorator: Sabinae extremi rami

J T 1 ^ T ^ r ««:«inaturitate Bigrefcdn^miMrefm f a n t q u a m h u m s O I K H «

qui Thuia primum genus faciant. Ex
tutibus praeditam esse cu^{id} valgarUunSo^{d,0d0re&fap0rCCOIJ,gCreIICCCfimiIbuSVir*}

Juniperus
vulg. vulgaris
(Sabinifolia).

E A porro Juniperus cui spina pro folio est, vix tota Lusit^{ania} reperitur, Castella verono-
va admodum frequens est: sed ea praesertim qua^{re} celsior & ar^{torekens} (upra Segoviam, qua

inde Madritium itur, ut istae trabes & aedium contignationes incolae sibi fabricent: nec iur-
inertis Plⁱ

Sed & in I
gnitudine

A L I Aii aurcraelegantem Iumpcrumpun
bufdam jugis mi hi pnmiim obfervatam hi? S^{ungam}.

Juniperi
alfin*

Cubitalcm altitudinem ea non
ffiub&b

verum latiora, breviora, crassiora, nec minus quam illa pungentia, colore interius ex caru-
leo candicant

Scalae.

magis, ante quam plenam maturi-
e jussidemque cum illo saporis.

P uurren ««ein & Eifchcri, quibuiduntj«Mlocis invenicbam Aug<ft°
menfc

menepauculaistirpesfrit&u maturoSi immature* onuftas,Gu(tusauteiij mdicabatjfacuU tatesa vulgari non abfirniles poflidcre.

VVLGAIUS porro Itjoiperus Graxis itpiuu&es, Germanis RtwmtarnnobctTBatl)fy>lutbwm/ 8, GallisGi»etire, Italis Gtneprc, Hilpanis Enebre, Vngaris Ttvifktsftnfi. Ejusbaccxgrxcis *pxtuM\$'L<;g3[YisgraiiitdeGettitr€) iiaXiiGrMtUediGi/tepre, hifpanis NtHtmot, germanis Kctoittbta.

OXYCE DB.VS.

CAP. XXVI.



IVNF> ER o fere familiseftOxycedrm, mi- gnacx parce contorto ut ilia caudle, mcerdumeciaminarbufculamexcrefcens,tcnui& rufefcctecortice: folia habetluni pen vji nsraodopungentia, aljquantulumumckjn- giorafifrariora, ternafemper circa umulosti- mulnafcentiautin Iuntpeio: frachim inacid viridcin.deindeflavelcenccti], poitrcmo, ctim niatuuirpimiccicolaris,IunipcirrVufhimul- to majorenijUtinterdum avellanam magnitu- dinea^uet, & nberealisquibufdam, veluct fquamamm rudimenrisobfiturn,nudcos tres autquatuorinxqualcscontinencem, majores quam infupriote, medulla intusalba. FJorce lunipcri modo, SCcodem tempore urriufque fruftusmaturitatem adipificur.

PR o v R N i r plexirque Hifpania: &: Nar- bonenfisGaUixarperislocisr nufquamautem majorem vidcre memnn, qiam supra Segobiam KGuadarramaj irinL're Madririano,iibi arborum rnagnitudincm&altitudincm interdumiequat, rruncohumani corporiscraffitudinem asqiiante, exquo,veluti ex trunco lunip- eri, q u i f i i u ul cum ifto eadem alciudinc cre- fcit, sedium trabes &C contignaciones incola: faciunc.

Ulicporro inejusramismcnfeOctobri en.l- cim plantulam obfcvabam digiri longitudi- ne,infarvilci ramofam,geniculatam,viridem, interdum vilavefcntem, ramulis mirice rccen- ter natis, live ej us plantx quam nonnu Hi Sali- Scrapervium vocant,(cdpaulo minotibusconLiiKem,

corniam, Mompelliani marinum quorum extremis aliquando inhzret veluti fructus Musci, qui in arboribus aut faxis nascitur, fructus per similes. Acido & valde adstringente gustu est tota hzc plantula, Oxycedro, velucivilcutnmalijsarbonbus.innafcens.

X H E O P H R A S T V S hunc fruncem * « 4 » » 1 » ^ Auxiw appellat Hiftor.Plant. lib.ii. cap.xii. Phoenis, cum fequutus, Natural.Hift.lib.xm.cap.v. Cedrum minorem Lyciam & Oxycedrum, Nam quam alij pro Lycia ex... donec Taai aricisfive Cuorefli folia contraxenc, hec non define, qui quarwm Tliuiac ««rx ea facre nonvercancur.Minorem autem Phtemciam voco,ad majorU Comferx ••drelatePlinioelt, in Syria, Phoenicia&alijflocisrefCL*ntis,diferenriam.Hifpa. Ovxcedrum a lunipcro non difecrnunt, fed eodem nomine Embre utramque vo- boiicnfcsGalliC-iAappellani,acoleum«coconfcaum,A««fc<&e<dlr,c.npitisma. bici ciuxi!Hs A^dicitur, pccorumqucfcabiei& ulccribus, qmbusa tonfuranofl. namqaatp Infeftancur, adprime utile. Idem oleum , quod cedrtie fimile est, Hifpani eUart.

M V R I C A .


CAP. XXXII.

D V o Myrica; genera Vetres nobis prodtdenint, filvctrc unam, aliudfativumfive domefticum.

M Y R I C A filveltris magnaexparte cantummodo truticat mterdum in vafam arboreni'W* a aduleric:fcabrocaudiciscortice,raraorum verdpumicante: folia habccCupreffii.autEricsc iuimilivulgaris, colons ex viridiadcincrcumcndentrs; HoresextremisramiinoWon«is pediculisconfertos&racmanmcompaaos, exiguos, fons purpurafcentes, ciimcxpanfi (UIK .Candidas, quinquefoliolisconfances: qmdeincincxiguuinfrmen tomaltoiimi- liHum

Myricafilycfrts r.

Mynca filveftris 11,



utunciiibriianrur, xigui veluti valvulis inclusum, quibus maturitate dehiscit ut buse se
 recennbusflonbusibmen lo & similibus Ter plerumque in anno floret, vere, aestate, autumnos
 recenfer quz nullum fructum, imo ne se jam evanescens semper subsequenteribus. Hanc Plinius inter cas
 li fructum tribuat compage n, ufto W^{mCn} ^ , ^ p^{rof}emitt: cii » 'amen DiokoticJes il-

Natali:

Nascitur plerumque juxta flumina, aliquando fatis etiam procul ab illis: Obrervabam S &
 in Narbonensi Gallia stagno Volcarum vicinam nu(t)uamtamcnampliorcmvideremcnii
 ni, quam supra Madritium Re um Hispaniz Re giam, planiciemihishui « rmodiarbonbuj
 conit a, noK procd ab amTM!, Xarama & H enares confluentibus, sub Compluto. Hispa
 n, s ^kMU de Henares nuncupato, quod fluvius Henares eam urbem alluat: ~~quod tamen~~
 iftearbores, quashominis ulna amplecti vix potuiffet, diverfum florem non tciuntab CO
 qui in fruticannbd umtaxat amari: eibus proveni c Frequenscriaaihsc est Belgicishortis.
 NF juam eam neque in Hispania, neque in Gallie, pcrpetuacomavircn: cmvidi: fcdno-
 vo vero singularis annis nova foliorum germina profertentem.

xyf 1
•Ultra 11.

A l r v d hujus silvestris genus in Pannonia nascitur foli mmodo fruticans, nec unquam,
 veluti superius arborefcens: brumam etiam fert, .acnEuisutgallicoiachi rpanicumgau-
 det: crassiores huic sunt virgze, folia crassiora * faciora: fingjlis annis novos furculos produ-
 cit cubitales, virides, ut plucimum desinente in quanaamfpicampalmarisautfemipcdalif
 longitudinis, e floribus ex albo purpurascenuous, majonbusciuum in fuperiore, quinquc
 etiam foliolis constantibus confertam: his succedunt oblongi & mucronaci caliculi, qui de-
 hiscentes, semina nanna salicis, volutum ostendunt: cx niajufcolorum foliorum, fut-
 cul ramuli exigui wfioiionuflif.

Natali:

opioscadflumcn Drafen, ante D Hippolyti urbem, vulgo e
 i Vienna Auftriar .nfenons urb e militariibus distantem, crefcit: a nane etiam
 oppidum de 311 uenSjbini supra Neapolim Auftriaz militariibus, p^{ra}sertim arenolis illis
 locis quz hieme ab ijs annibus inundantur.

Ttiffm.

Floret Maio & Junio, ac deinceps tota serē aestate flores & seme roferre non desinit.
 Huic similem, quibusdam Germaniz ^ RhniUra fl^ul.^nTvrotcnfi comitatu
 i nafciintelligo: frequentem etiam vidi ante paucos annos Londini TnSiobantum in ali-

Myrica
11.

SATIVAM, quam Dioscorides mitiorem vocat, & in Agypto Syriaque nasci scribit, fructu
 Gallz proximo, gustu adstringente, cujus etiam P^{hni}Uⁿⁱeminjt, numquam conspexi.
 Belle huius observationum lib. 11. cap. xxv. & xxviii. gypto se vidisse ait magnas arbo-

res Myricæ gallam ferentes, ab Arabibus hujusmodi appellatam, magniolum in medicis dicitur: fructus vero arboris est lenis, fed ex crematibus potius saluberrimis. Verbis. Tamarices in Ægypto locis humidis Scæcis ficci que indifferenter nascuntur, illarum enim flos perinde sicut in arboribus locis repenuitur, atque in hinc dislittonbui. Ex acem exercere quam gallam naminimus, adeo anuftarui K. uc parum abfitquin ramini mionpondererumpantur.

Vocatur autem a Græcis juw Plinio Myricæ, Tamanx & brya filvefns, oificinis Tamarificus, Hispanis T^{ny}, Gallis Tamanfyve, halts Tamtw, G^{inaais} <niwi Mn

Folio 1 v M Taraaricis decodum ex vino & aceto, lien i indurato prodefle, testes sunt veterum medicorum. & tunc nam expent La: atque in eundem ufum potioris calicis ex jus ligatur naric quibus bibant lienofirmo multalij sinru permtt fbi unfcmt-fle Tamaficemimajoris gallamru Lncis extercation-bus, Sicali acis in pndari, ac contraproflu Viafcminaru [n. regium morbiim, & pliabngioruin mor] us: illiriitumores in liibec: corte! cineowcm ufus adhi L-K-rur. D^{coftum} foliorum cum vino potum Ji^{nem} abfumiti mulus prarierca alias facultes liuicfrudum buir Diofcorides. & Plmi us.

Mcmi cci^m Frantofortum ad Mcenum ad^{ri} folita doliola e Tamancis ad Khe- nuitnafcens l.gnoconannata, ad fextarium dimidiuai forticapaaa, nonnullactiam paulo inajora, qm bus conrencus liquor lienofus profit.

ERICA Coris folio 1.

CAP. XXVIIt.



ERICAM Diofcorides lib. i. Myricæ fimul km facie, longè tamen minorcm: hbro vero III. Coriu filio Erica: pinguiore ac minore. Plinius N. J. ur Hilfor. lib. xxun. Gap. ix. fructu cirofenbicnon multiini a Myncatdifforcivcm, calnrc Rorifmarini & penè folio. Ex quorum lencntijs colligi pofls videtur, plura cflc Erica; genera, uccertefunc: quemadmodum ex iconibus & carum defcriptionibus fubje&is videlicet.

PK 1 M v M itaque genus Ericæ, Gmilc est Myricæ, & Sepcncntionalibus regionibus maxime familiarc, locis mculus, raro (upra cubid altitudinenaflurgens, plerumqueminus, tenuibus romis. duns lignofii. fruticosum olorc ex nigro rubefecnte: frequenta habec folia, c foliolis quatenio ordinedirpofitis confanna, uu CuprefTus, tainatix, & Innils, vindia admodum, quxtemporis fucccfllu! nramuloseffi. irmantur: floresfcundiim ramulosa medioad fummutn vfque propendetit bullaci quodammodo, quaternis foliolis coiffantes. clcgantidimopurpurje dilutions colore, mterdumctum, /edrard, al bo. Bis quidem florec: fed majorc ex pane AutumDO tantunijlicet nonnutnquam ctiam vere. Rariis provenit in calid tonbus regionibus.

Isti per omnia fi milcm plantam. fed pau!6 clatjorem, folijstomentoiis & incanis, paul6 etiam diluioce flore mvenicbam incultis, fupra Windeforam Regum Anglia: Regiamjocis.

ALTERVM Erica-genus divcrfo aftiperio-Zrics Cm, teeft folio: «enim VTyricat folionon refpondet, fed Cotin, foliorum forma&fitu adrrfo- f^ol^u» dum xmutur. Itms aucem generis mult* funt fpccics, magnitudine, foliorum & florum fonna, coloreque, niter led ilferentes.

PR 1 M A, omnium quas vnquam confexi maxima, humanam altitudinem interdum t. fupcratjfnitico faa Jmo Jum. ligaodur Oyexrubronigricaceifo Iijsexilibus & rbrcvibu Sjquaternoordine raniosobidentibus. gultu admodum adfringence, florccopiofb, racematim penetiof ramulosoc Lipante. ui interdum majoresatni pedali longiruefinconufticonfpiciantur: eft autem is Hofconcauus, veluti exiguum cymba Jum, oblongus, odoratus, pulcher, albus.

Nafcitur in Ludcaniarfoliudinibus inter VlyfTiponcm ^Conimbricam cclcbrem eiu^{*} Regni Academiam; inveniebatnetumcitra Tagum decinio ab yiffiponemiliari, indc Hilpalimprofeclaras. Fljrct Novcmbr> J Dcccmbr, & Ianuario, hifeaimmenfibus & obfcrvavit Sikgi.

Erica Coris folio II.

Erica Coris folio in



Erica Coris folio III.

II.

III.



III

ALTER A, cjuodem fere altitudinis cum prima, cuam fruncora, cauion bus ramistamen, ciu (acm "imi upenore colons. exilijus fi roilitr folijs quaternis ramulos fi mu| ample flentibus, quorum excream oblongmfculi floras infident fupetionbus ^miles. cotore purpurarcentres. Touctiam adtrichonis parti ceps.

- Provenit i idem quibus primalocis, illactiam irquentior ^ codem tempore florens.

2. Non mulcutn illidiflimilis. quse Narbonenfi agro frequens, longior paulo fccop ^ fiore est foio, flore purpureo, minore, & extremis ramulis contertim ftrparo, cujus iconem exhibere videcue Llanls. M atthioius:

TE RTI A illis per Gmilis, pa, 16 tamen humilior aliquantulum majora & latiuscula, ngrior, qd habec folia, quaternis ord, ni bus circum ramulos na (eentia, p liirixios flores per interwllafccundiim nimuloni longinidincm nafcentes, (upenoribus formafimi Kherbnceiprimum coloris. dc ind ex albo pnrpuralcc Dtes. Toca ctiam adftndona feedatcpridira.

S^{upra VI} I ponem f_{reque}s inter r_{uperio}fes, r_{un}bus ramoc_{ts} occurrit, utetiam citra Tagum. Floret Decembri & ranuario.

V^{arta} etiam fronsalis est, duonim ramulorurn attitudinc nonnumquam in p_{io} ^ fracililima fere, viridibus, que in delicatis jionni hiram s

etiam & herbacei coloris. Extremis ramulis capitula e multis folijs compacta nonnigignit, b' nō multum ab similia, que in vulgari & duriore Thymo aliquando eōip

Vulgaris

Erica Coris folio v. Erica Coris folio vi.



Erica Coris folio vii.



Vulgaris admodum hic est toti Hispaniae[^] Lusitaniae & Aquitaniae: nam spatiosius illis foris in cultis inter Burdigalam & Bayonam locis, quae vulgo *Landes de Bordeaux* nuncupantur, nullum feracius in virgilio conspicitur. Nota est etiam Naibonenfis Gallicae, conficiendis scopis maxime idonea. Verano tempore & sub hieme florer.

QUINTA minor est superioribus, cubitalis V. vide. Jiccut plurimum altitudinis jamis gracilibus fruticosa, quos terni per intervalla ramuli ambiunt, crassis folijs admodum exilibus circa illos dispositis quodam ordine & ceteris nascentibus: flores plurimos habet superioribus paulo majores coloris purpurei oblectioris, confertim circa ramulos longis pediculis insertos.

In cunctis Lusitaniae locis supra Vlyflponem frequens. Florbat inter Decembri.

SEXTA admodum firmior est quinaria, tamen humilior, nec fruticosa, sed omnes fere virgas seu tenues ramosa radice profertens iungulares, cinerico cortice obductos, quos frigida quadam ambiunt ratnolorum rudimenta, seu germinaculis confertim nascentibus constantia, nigrioris quam alterius coloris: flores concavi, quinque floribus formae simplices, & ceteris purpureis, longiusculis pedicellis verticillato ambitu, per intervalla, & e fummis ramis dependent.

Nascentem hanc vidi in Hispania veteri Hispaniae, supra Lutetiam Galliae, & in Anglia supra Norwicam: Septembri florentem.


spania, supra Lutetiam Galliae, & in Anglia supra Norwicam: Septembri florentem.

Tii. SEPTIMA mulrosterets humique procumbenresramoshabet, pedajes, intctdum
 eriamcubiwlcs, exatropurpuraIcencs. HospLLrimagraciliaambijuntfljoia fertixfolijs
 penclmha, paulotamentlongiora, quafernisplerumque, nterdumqu.nisverfibusordinc
 d. Iponita. aditngcme gustu: fofculi in fummis ramulis oblong^ concavi, purp<rei d ut o!
 ris coloris, ex quatuor foliois ejusdem ferè coloris prodeunt[^] u mar & re ficca ri n, eri
 cans & minutum semen continent: radix dura, lignosa, in diversa tendens: en pro
 cumbentes rami, humiq;e diffusi, tenues capillaresq;e

Copiose admodum crevit supra Erbof in ascensu heremitarum magno militari germanico
 fupmGanungam: inveniebam etiam mter faxa & (topulos, n i plis Durastm Encaltes atque
 aliarum Sty riacarum & Austriacarum alpium prez: us jugis, ubi Junio & etiam serus floret.
 Inter Pragm & Noribergam etiam Junio florentem colligebam anno M. D. LXXIX.

Erica Coris folio vi n.

Erica Coris folio lx.




viii. MINOR est octava, & pedalem altitudinem rard superat, magna ex parte humi pro
 cumbens, quaternis folijs, ramulos, contrario exortu, semper ambientibus: flores secundum
 ramulorum summam longitudinem inter folia de pendent, cavi, pusilli, in quatuor angulos
 desinentes, herbaceo colore raditi, in quibus deinde semen: radix dura & lignosa.
 ascensu montis illius qui superandos est ijs qui Gaminga ad
 rentem Augusto men unt, quo loco & florentem & foliacea capitula profes
 detur pumilum. nusquam alibi mihi inspectam. Quartæ genus esse vi

ix. NONA, æquali cum illa excrevit altitudine, tenuibusque virgulis prædita est
 fusis, ex purpura nigricantibus, quæ summa parte in multo i p<erutn^e ramulosdividi Ib
 lent: folia in ordines & versus digesta, ut in reliquis, tenuia aumodum. Erica sextæ in Hispa
 nia & Gallia nascentis folijs similia, terna semper
 virgulas ambiunt: f u m m l ramuli onusti sunt ce
 inquatuor angulo, feal, color is cum quatuor illis foliois S^5 flofcu1^ <<< ma j P.<<<
 ftaminulismgncantibus, filo e purpurascente e foliois J^und e enafcuntur, carnci: oaoiis
 vanintaie gcang, exi^um Lbct: radicem alijs ^o flofculo TM<<gentibi>> fcmem
 cum liujusetuo ramu ff, vindia C3 pitula, è latioribus Foliolis coropaaa, cap.tulorum

Invenitur hæc apud arcem Salsolan in silva illi imminente qua ad Salsolan ex arce iter est,
 alia item ad sinistram oppidi Nantrebe silva, & nonnullis montanis Pannoniæ silvis. Floret ut
 plurimum, Aprilis & Maio, quo tempore aspectu vetustissima est.

Erica Coris folio x.

Erica Coris folio xi.



...ctMA fruticofaest, cubualibus aflurgensramulis, fragilibus, nignorequamrrli-
quxcort.ce:folia fuperioribusfimiliahabcc, fednigriora&craftiota, mnoordinecircum
?amulosdirpofia^afidiufculicumquadamadfriaioncg«Itiis. Seprembri&Oaobrifru-
fiumarcliquisditferentem fummisramulisinha:rentemgerir,pulcherrimum candidum,
trnrfparauei^obfcimores & iniquales unioncs formâ & colorc rcfrentem, fucculctum,
acidiraporistriaeranuladurapleramquecontinemem.quiNovcmbrteiGccatu^&fpon-
fedecidit An floreat ignoro,incols ncgabanc, &c BuQum paulanm intumelcerc grandiuP

colu i ^ £ S S S S ^ S f t n ! K w ^ » procuj VlymponciterRiofino &Aldea
ealera.ubi qui Ta^um trajcere volunr.naves conlcnduntA enam fupra Vlyffiponem fo-
foadmodum arenofb, copiofo fuofruflualboonuftumitmitio manargrana ift frunciin-
hirentiacxiftimarem^deoprocularpicicmiimpofueruntrjamenimpnmumexonebatur
Sol&friBdiufcula«ataura,utpotcNoverabris inido.

H V M I difFufaestVndecima^latasocHpacarcas.multisramislignoiis, fixihbustam-
menconlbnsexatorufelcencercorticteais, quiirerd«m6brasagunt,ut latioisfcrpere,
acufficiensalimctumcliis attrahere qucant: anursncsramulosDumcrofambiunt
foliola ternis.incerdumquateinisverfibusbifpoita.crafni&carnofa/uejion fere familia,
fapore prim^{ra} linguam cxficcante, dcindi acri & linguam vellicancc: pufilli ad foliorum
exo«U5floculi,tbnusfoliolisocritantcs,coIorisexherbaccofubalbicanis,pMrpurafcnti-
bus ftaminuhsinterneprarditi: his fuccdunt rotunda: baccarjuniperinishaudminores.ini-
tio virides.macuritacc nigrae, & purpureo fuccojUti mora,pkB*,iQquibnsmulta inxquaiia
Bcvducitriangulagrana: radix figorafii dura est.

Hanc florentem,&c viridibus baccisonultam,mulrak]ucadnuc lupcnonsanni macuras
rtinentem inueniebarninpracccltmonris, vulgoSPccfjrclippellari, (copuiis, quinto fupra
Neapolim Aufrix urbem mithari, menfc lunio. polteactiam Augufto, immacuro & ma-
turojruru tu nt,namin@n<t><ff&@^{MIW} celfinimarum Auftriar&StyriKalpiumjugis. 11-
lius etiam arenofis Hollandia: tumulis crutx ramum iuis baccis maturis & uumaruris
onuftum ad me mifit N. V.Ioanncs ab Hogchnde anno M D. XC.

Certumcftcimipanicflc, quamManhiolus inmontibusquiBocmiam aSilefudii"
juno-unt inventam.bacciframcognominat, acdefcnbit, wmctiifubvtrcfccnrem pulpau
fua; fruftui cnbauu.quarni meanigricat,& purpuico lucco manusinficit:(cd immanis for-
cacc baccispraditn obfervavir. Mulcemp auicm difterc ab Oxycocco Coidi, five Vaccmjs

p;luftnbus

palustribus Dodon SL Hj; ntenimfolliacr afa, rarnofa, & acriufcularum illi us autem la- uufcula, pronapartecana, rcfrigeran[...]

Enca XII.

XII.



XIII.

DVODECIMA cubitali pame est altitudi- ruucofa. tenuibusvtrgulisprsditajquster- f^{era} per circum maiores ex mtervallis na- icuntur: folia Hmilicer tcaia ramulis inna- lcuntur. exiguaquidcm/cdlatioraquaminfu- penoribus. mfaiorefc terrain (pedanteparte nonrh. l cadicantia, hirfi1<<. gufl^{usa}dftringeii- us: lunimi ramul, ad fol. orum exortus vcincil- Janmexornanturperintervallattrnispcrptuo- flonbusarcjuali inter Icfpationafcenci bus, & in unam p^{arre}rr, conveys, major, bus quam in re- sgenenbus. concavis[^]entreni[^]. irurm- colonsexmbtopurpurarcemis. numero fex, cm[^]uodecimquindecin[^]at pluribus.

Indem cum Decima, & alijs Luiltanis are- nois locis crefcit ut plurimum. Floret O[^]O- bri mense, & subinde fermen exiguum, nigri- cans, quale reliqua (praxer bacciferas j p^f eit.

DECIMATERTIA, folioriJm formanon multum ab hac di- flerens, plcrifque Brabania: & Geldria locis etc. item Castel- la veteris, p^{re}fcrtim circa collem la p^{na} de fran- cia vulgò appellatum, in quo monafteriu D. Vir- gini facram, pedibus folummodo fruticans virgis, tenuibus, ex rubro nigricantibus, fre- quentibus eas cingentibus folijs, quaterno or- dine difpofitis, fupcriore ordine anguftioribus, & Thymi vulgaris minoribus, hirtutis tamen & pilofis: fummis ramulis pl^{er}«mqc dependent uniaut feni flores fimul ju[^] L 1) i) conval- Smfl h fimiles, paulò tan n oblongi orcs m ex rubro dilutius purpurafcen-

Erica. Tamarix.

us: mterdum ctiam albi. Floret Vere & AutumnS
^ » J " Gra (ri3 Erica 8 cEni Li i A bi bus Tetralix, etc. P^{rimo} Theophrastus quicem Tetralicem nominat inter plantas quæ ætate germilanc, fcdqualifidri- bit) Galli Brayere, Itali Erica.

Primum vero genus, quod folio Tamaricis est, Hispani Quiribola, Lusitani Quairo ap- pellant, Germani Berba Vagari, apud quos non minus abunde nascitur quam in multarum aliarum Provinciarum solitudinibus, æli zōid est huc male viride.

Acacais m&rinhas,

Alterius generis primam Lusitani storta vocant: quartam ura & urget. >*. Hispani breca: septimam montani pastores aliqui unnd: decimam Lusitani camaribetra to ce- Diofcorideta commentarijs A nCha ^ exifti-

f;/^

Fo L i o r v M Erica: fuccus oculomm imbecillitatem sanat, si oc- « « sinfill « ur: flos & coma Terpentium morfibussillitu mcdetur. Memini, dum Mompe « « ffutif^{umc} flcolco ex Ericis floribus confedo, ad collendos herpetes fctidos & jam inveteratos totam faciem

Septembri & Octobri v ? aliS VI > " W invenitur, ft. brientibus exuibent, ad fitimqia premuntor restingue n am: avide etiam idem fructus à putris & mulierculis ex petitur. Si Acacalis est, aqum i us fructus, ad col- lyria quæ ad excitandam loculorucnaciem conveniunt, puc. Jiofcondes.

PRVVS MYROBAL AKVS. CAP. XXIX.

1,1tmii alt.

FACILE adolefcit hæc arbor, & in vastam excrefcit am ramifubinde in alios divifi. orac am admodum præbent umbram: caudex mulS la: vio- lina prantorum genera: tcnuiorsrami foha quodammodo « « inferP.uruun & Unft-d, tenella, per arnbiri] inferrarafl)m. flor candidus, tenuior quam in vulgari: fructus,

Prunus Myrobalanus.



Arbutus.



fructus, cujus alternis annis feracissimusest, nuncundus/iblongotenuiqupectioluinterfQ-
li.ipendens, aspectu jucundus, per mictavi-
rect cum maturd cere incipit rubescit natu-
tate madae purpura nigro commixta niter,
carnem succulentam & palato grata m, nu-
cleum non admodum magnum habet.

Floret cum alijs ejus generis novo Vre:
sub (ulij finem & Augusto fructus matu-
tatem adipifatur.

NONDYM vulgaris erat, cujus descri-
berem; sed qui habebant, ex Csiarei Palatii
horrona stierant, ubi omnium primas con-
fexi ejus arbore stesingentes, unde primus
e delatjs, incertum: nonnulli cConstanti-
nopolitani Galtia genus duxit carbitaban-
tur. Certe ea arbor quae Bicurigibus Gallo-
rum Myrobalanorum Chepulorum nomine
uften dicitur. huic pertimilis esse videtur, uex
ejus folio in Jctelclaro mihi que donato a Cl.
V.D. Ioanne PofHiin, tuic Pala[inalis] left.
Archiatro, a; ltimae licce.

2. Nunc in eodem Cxfateo Lorto illius ge-
nu<idnitrefijpnt>ris nuclei naturam, quod
minore tunc tunc u d orppj pat t t t t t t t t
nihilafup

Cv Rntu Vgenen Pruni, Myrobilani fit
nppclhtiodjca, mel. ut t: mm. cfrudus li-
mills c(l, nequocof Tu'ijlj, t; ux re liquid Pruni
gicneri Lius iimilia habet. licet p. irva. cuni legi-
timorum Myrobiljanorum oilculis live nu-
cleis quae cari U & u d i f t i q d quam
commune liabeni.

ARB VTVS.

CAP. XXX.

A R t n v M Theopimfli A Diofcoridea
heri: ei Tiii ius n. ilur bic An «L-
hra cenfec. Cujus fane (L-n Lnriarun poilinn
non tuberculis: cum A b l m i h & enis
obfervati^m Cocuiua nwio fihil Omiluu-
dimsru'.

Ei T i ero pomila ar' > or, 4 flt Bg (idsfn itex, Arnti hi-
frquenn. ., ijuor
b. f. u. u. A oqui trunco & majoribus ramis
fatis fcabr Qcottice teclis: folia nulli ordine &
temeris centiamulos an: sunt. Laminis
familia, cjuflcm interdum amp
ambitum ferrata, (emprw|P
splendens: flores extrer
appendicracemacim cohere

ie Soliobverfifane, ne nihil parpaflentes,
concavi, Lilij convalhum tionbus **peclij***
mies: trucus trago nius, orbicularis, mul-
to major, & rotundis prunis interdum magni-
tudine par, initio viridis, deinde flavescent,
postremo, cujus plenera acurus, mbv colore
clgantiffiaio conipicius, **interiore** camtri
carnepallefcence, cdnlis, Siattrnjisfdreunx
homimbus valde expetitus, **ideoque** Vlffip-
ponc, Sialijiquibuldam locis veulibus a mill-
canismuliculis in foro proponitur- (emen
m.lio non inajus, tenui membra Da obdu-
lum in meditulo continet.

Btfric* & Lu/iHn; V»]cu?n^r Myrtum, Cistum, & alios frutes provenit, semperque fere aut flares^aucfru&i onufta confpicitur. imd interdum urroque abundam: foJcteniro deciduo flor. novum germen exremisnmis piofenejn / poqf^ynalterius floris. In Narboncnfi Gallia rufcenrem enam obfervabam . Crevitctum apud . •• E^e gas Tcmine & i nonnullis fi&Uibus excepcus, cum alijs prpctua fronde virentibus kciflime adfervafolcbat.

Bellonius lib. i. Obfervationum cap. XLiii. refert in v. anibus monti Adio' veteribus ad eum wAcbraio^icina Arbutos nafavatbc m agnitudinis. cum alibi du nuxat fhitec nt -ut m inus mirum videri debcat, aiuba (K^mePliia. o Namr. Hiftor. bb. xv. cap. xxim j quinquagenum cubitorum in Arabia eascfceautor est.

Dicitur T. I. po^ Grxcis^ po^ Latims Arbutus. Xklii^ Hirpanis^ r. * L. n. Gtans, addiraa (piratione). * rr. «A^ fioaUS GraKUiU, w^M, Lathis vicidS JifpS niAdr/So t^ . illis arboufti.

Plinij vs Nat-Hift. lib. xxni. cap. vn l. ai: uncondonis fruflura efledif Ericinco aioni Sctomachoinudkm: lib. ver6 xv. cap. xxiin. pomwne men ex argumento lk, unom cancum edendi. Achenxus lib. 11. t

& tpf multoscd, i Amarum Luitanu>cx Arbunfolijs & floribus aquammrcis orefl. fcrvari umquam lactauffimam ad verfus pefterti^ venena antidotum T

ADRACHHE THEOPHRASTI.

CAP. XXXI.

TSTI v. etiam iconem brevitatem hiftoriam. ciim Ocnoplia fupra defcripta, mittebaudem Honprms Bd. Theophrasti, frequenb provenit in Octa, in catibus Leucis & alibi.

arbors modo: perpetua fronde vSr, foliaq^ habet lannmsadeb fim, la, s ut folio odore dignoscantur: nam Adiacnes folium odor cet ret: caudicis & ramorum omnium cortex ad e l* V, s, Rubem & fp| endem est, ut corallij tami efle vidcanrur: xitaterum tunc cortex, & in tenuiffimas bractcas decidit, quo tempore neque rubens neque splendens cernitur, fed medium quendam uiter pallidnm & cinis accumulorem ad quod KII. florem & fructum bar. Arbutus, profert, & quidem adeo magis alteru ab altero modo dignoscere potest. Differt tamen a m hanc ab Arbuto tantum proventu in ramis, neque folium ferratum habet, neque corticem medicum (carbum lignum materiam duntaxat est, fragilis tamen, quia flecti non potest). Ipsi g uirticendo lavi, & ad verticillata ex h wsmulicrum fuis appendenda. Theophrasti hanc arborem inter eas quae virent, & perpetua fronde virent, & perpetua fronde in cacumine hinc virent, a me obfervatum est. Ipsi ad te mitto.

Vocatur haec arbor in Creta Sitotafere Grgcia, αδραχη. Hae Bellus.

Nos autem ex Theophrasti de Historia Plantarum libris I. III. IIII. V. v. v. v. v. (sic enim herba est αδραχη) historiam quam paucissimis verbis edidit, q

v>teTM. in quic p ipr Mu6cx filve tribus prsr Terir, ad dincnc qu, dem acque unedo, inferior ic RaSS^ S^ a? Arbutus & c An-je<unt, rummi aucem rami (>ni-fo lib et Andrachne, nia- tofimi. Andwchne & Apharcaprimuir TP' w p^ d' W. tu in fruau Arbu- rem. cum floret. - bisenim iftar fruct. fer xhi, ^ m matn «nt, bum uvadu Lefcit: posterior detraao. omrws arbows fere. nccari rtd-Sf, lleUnrc v) dcutur. Conicfl autrm in orberri camem vcl m mte Tptel nil germanaque futur. An< J<f hnc qi artamen & ipfa fi q'i* lowv Hit, mori «uia itaque vci iis, fert^ excepto

Petalae sine alijsqz floribus.

Nomen vulgare.

Adrachne historica ex Theophr.



eaupcofubc<rdixerim:]ioceniinacjuvaripotiiiicorriced<raao affirmanr, videlicet rim extcmo.quam carni proximo,fku return Andraclmcm. Aadnchaes vcrd lignum muJienbusadcllas,fiveopusrexroriurnexpaii:ur.

Pliiusauuemcap.xxiiJib.x.ii.NaiunlisH.ftAdrachncnapppllaLAdraclincn.inqui^ omncsfereGr^iportulac^omtneinterpretatur.cum.llafidictba.&andrachncvocoqur,^ imiuslitter*direritUaw. Cerenim adrachnceftfilveftmarbor, nequeinplanis nafcens familisuedoni/oHotantumminore&nutiquamdecidemcxotnccnonfcabroquidcm.Icd

HANcarboremulc.seriamloc.s.mluaperegrinatioiicobrervavitPmiisBenonms, atquelib iiObrcrvationumcap.ciiii.fcribir,iterfaennHalcpoAnnochiaiii,intumutis narenwm fibiconfpechm , cujos ramos fuofruftu o>uftos, qmlibet eorumquiconiitabantur.abftulcric, utin itinreedrcet: maturafeniraerac.clegantiqucruocolore.fingulos addendum invitabac.Racematimaucemcol^rcbacmagnim dine&coloretruaus Kubus idzi.qucm GnlliFMiw^/appellant.aiollisqncratucArbutiftuau.

Noscjus iconcm,qualem ab ip[bHonorioBelloaccpinius,Lcftonsoculis(ubi)cerevolnimus, turnqualis eft fuofruauonufta, tumhicmefuofruaupnvata, utramquccadem tabcllacxprefTam.

TINVS, fcuLaurusfilvefris.

CAP. XXXII.

INTER LauriecneraPliniusNatHift.libxv.cap.xia.TinimciiiK^iu]liforteMteruin Utinotum prlterca cognitx,mf, M.Caco lib.de re Rufticacap. jr. i .cam Laun filvan* nom.ne inrellieac. Eius tnagenera nonnilnl inter fc dircremia oblervabam.

PRiorfrut<ma<u<itudmeCornumfeminam* qiiat, virMsq, hab<to<longas,quadran. culos.ranofas- folia ordindiftinaa, pevpetuo gemma limut inter fc adverta, magna, lata, Cornusfcmi,xfolijspxlfim, [a,adfaurnata<me nacedcn,ia,pcrccuaho<ceft,mmorta.

adfrictione: summis ramis florum quinque folijs constantium umbellas profert candidorum & odoratorum: deinde fructus succedit Myrti baccis paulo longior, planior, angulosus, ex-nilei coloris elegantissimi

NafciturprsrruptisScl raliisfruticesjflain fcpibus circaoppida LufitaniE Montemerbo nev^St amar, ubi cum suo flore & fmoii cdhgebam menJeNovembri, lamctfi alias Julio ^>gu(ro floreat, fudusOaobrimatonsfit, j^^^<!



AtTE-R, cadcmquafuperioraltitudmeaflurgit^requeioribus&firmioribusTamis, corticex rubro virefceme cectis: ci rca quos folia fupcrioris,aliquantuiimt anguftiora & ob-

£ longiora,

longiora, pluribus venulis distinda, fibi invicem opposita, ut in priore: flares extrorsum
umbeila Timctiamnaicuntur^olo Tenonihilfoiispurpuracnie, minus odorantquam {ii-
periorisifruftustiam minor clVplcnior^nigrior.

YnodunitaxatlocoinLuGtaniaquodam monasterio PeraLe» <raA^Eko, loc'tsinciiikifu-
praVlyffiponem recens exmi<So, obfervavi fecundiim pifcinas, & Scinde Bxticx manf im is.

Tim it t.

TERTIVS in Belgicis horiis nihiprimumeonfc&us, fcmmeextaliadelatomrusapud
nobttctn&:clari(s. virum loanoema Boifoc, penciirimum & diligenti flim<m ceihetbitriaE
cultorem^rbufculx magnitudinc, qucingulis annis florem feffruflum ferchar. Aiunt mine
Kplcivqcalij rei heibanxfudiofi, nobilesqi vin & matronx, ramis excaqu^m dixi aibu-
fculadecraftis&terrKcommiffisenatosfniciccs. Minore ver6 eft folioquam fopiores,
Laminotamen laciore. tevi. nigricant Cjperpccuo, ramos ordines quodampt-rintei vallaam-
bience, ut infuperioribus generibus: umbellar florijmnonmhi Ubrispurpiira (centium (um)
mos ramos coronant, dei <de frudus ex cxruleo nigricans, a! vis, minor quaa in alijs. fiis plc>
ramque floret Vere & (ab hic mem.

Vign. 221.
Silvestris
laurea.

THEOPHRASTO Hb. i. cap. xv. interperpemo vLrentese filveftribus, dicitur <fa'(p(i''')>?f<^1?^
Plinio Tinu^& filvefcis Lautus. Lufeani priorem Vu*dfrr\$ {eft amcnftaliaplantadit
Cmilis hoc nomine donaw) Altrum/o^^a foliorum utar bicror freq^ntia, Bartici duril.
idea Ucam Anguillara/d#<yiiwfi<vulgarinomine & kHcnbit, & kBrui) sMelc(ft; Bello-
oious itnugmt nuncupat.

ALATERNVS.

CAI, XXXVI.

HV i v s fructis perpewo vitcttis duo gncrl> in mcapetegtatioiic Hirpanica obfei-
varem emini.

Alaternus l.

Alacmus a.



Alaternus l. VNUM arborefcens inter alium, loc

tente (ubeo mcmbra^tdam SSSSSS^{TMccand} I<> virefcncce ^E^n^la-
ordine d tpfoca folia, media inter Olea: /tn-ITt f^{Um anibt: n n ^}veftiunt ncondiro
fzx atnbitam feriatafet viridinigratia S ? i S ? . "agniw dincetafliiifcuala^cyitet
J^1SCXherb1dopallcfccntis, raccm_a im Sn?^frU^TJ exortus, flotes olea fimiles
-triam media h.cmc. Nilum in hoc ft^JL ,M^{gllpedIC<} illis dependent vere, interdura

purpuralcente coloribus simul permixtis infecto: foli> illi luperiore miliora M circinat?
ribus, cortice qui eos ambit, ex albo, viridi, &
retundica-

rotuadicatis, inambitaeriam (errata: exfoliorumalis flores elongiufculispediculis dependent utin fupenorCjillis tamenmajores, &ccolons tnagisherbacei: quibusfuccdirfructus racenutim cohzens. Lenrifcini magnitudinc, imcio viridis. demdenonnju] rubcfcenSjqui tfibus nucleisconfarc videcur. plcniorcm, & nigri colorisjnacuriut fieri arbitroi^nam imriturofrulucolligebam Apnli, & floribusonufturnFcbruano & Martij initio. t< Primum genus Vly (fiponeliagro, locisjvicinisin Lufitania obfervabam. Alrerumetiani ijfdem Jocis, pra:terca mulcis Bxticx, cutn Granatenfiregno & Valentino.

PL i HI vs lib. xvi. cap. xxvf. Alaterni mcroinir, cui folia inter Ihcem & Olcam tributt. HjecadebcaufafuLturhuicfrucki ALucrmnomendederim^onCelaibu quern Thcopli, ttiaminterprpecuo vircntesrcenfct, Sitardefruitum maturarait, Necrefert QuodPli-^TniusAlacernumnegetfrudumfcrrc, crenim inarborcnon valdc fibinoraballucinanpo-TMtuicqueraadmodum incctrisquascodem loco com memorat. FruflumjinquiCjarborum lolznullum fcrunt, hoc eft, nc (emen quidem, tamanx fcopis tantim nafcens, populus, al-TMnus, ulmusa«mia, a! arcnus, cui folia inrer Ihcem & Olcam. Nemo enim reiherbaria; nted tgnaruseft, quialno sexfemine, quodinglobu! isadulnoicsferunc, nafci non Iciac, ciim & ipfaruft: cisidii: notiiim: tamarix [aneexleminerKmfemclmiiiinataeftrpoulos. falJcesfe-TMminibus pappofalanuginivolutis proveiiLre. ulruos item actinias ex famans (feruntenini femem fed minds quam btifolia) plcrutnque vidi.

CETERVM Alaternumeandcmcum Theophrasti Philraefle. Bellnnius lib I. Obfervar. cap. xLu cenfet. Ncmoe frinmonte Atho, ii]quir, cuiarbor Piiiiio AlaternusdLcla (veteri lcgitimominc, quoip(cTheophrallusi llam donavir, Philyca?, !gnot3fir: Corcyrensvcr-TMr6 & Creten (esiA«ayfOt appc llanc, tlu: aejus folium inter Hicem & Oleam medium est, te-TMfle Plinio. Theophrastus quidein vanjs Iocisinrua Plantaruii] Hiftoria Ti^tu^THCXn-TM /«Vpoomrtiinic, (ed formatnnondefcribic: utramquctantdm maruregrniiinare, & fei6 frudum redderCjPliilycxhoiio reminalendopccijrejfcmpcrnimfronde abundarc^ inaxi-TM mcflexibile meffe, candorcjue Cclaftri.

LuQcanis priorf-f/fiapp? llatur, quibufdam fHipttr & te. [a^utmio: Gallis, Belloniotcfe, XialadrifiLftinguinbUnr. Lucenfibus llitre. Anguillara Aiaternum vocan tradic vulgari appellatione t^laterna & Ltntria.

NuHumilliusurum medicum novi. SedLuficaniafTerebantemcorticeinaquadecoao pifcatoresluarctiafubrutilo colore inficcre; Stiiidoresefiagmemomni Jignij quod pallet, decodtionejnigtfcntem ccxrulco coloi cm conciliarc.

PHILLYREA.

CAP. XXXIIII.



PH i ITR, AM, dcqua Theophrastus, iPhilly-TM rca Diofcoridi de/cripra diverfam cffe, nemo, ut opinor, jam ignorat. Nos de Philyrea hie agemus, cujus aliquot genera in Hispanijs & Nirbonenti Gallia obfervabam, omnia folijs concinnoordine difpolkis, &c contrario interfe petiolorum exortij nafcent [bus, utin Olca, Myr-

PRIOR, alius afTurgitquam Kexcoccige-TM ta, rimofqoe habet pollicarisjel etiam amplioris craffitudims, corrice virjdi, fed candicantibus maculsa fptrfo, te&os: foha Ihcis coccigerx, rrjajora, viridiora) Craffior3, in anibitu nonni-TM hifonofa adgn entis quidem gustus, fed non ingrati. Hujusflos non est mihi confpectus, fed fru(ftus UIKI(cin0^u alis, et aliorum alis dependen-TM s) matuncate niger, officulum continens.

ALTER. A pnorem magnitudine fuperat, multisramiscandicantecorticeob^tcis pradiu: folijs Alaterno priori psnefim ill bus, firmioribus taracn, & miniisnigricantibus, faporis quidem aliquanculum acris, fed inquo amaritudo fentia-TM tur. Nequeiftius floreracn rpxi, ipfurn autem fruAum ncematim inter folia propendenrem magnitudinc granorum piperis. aut fruftus Myr-TM ii, ro[undum, nigrum, calid i? uflus, oircum & du- lum nucleum candido & fragili corrice obdu-TM am concmentem, Dece mbris initio legebam

T £ R T i A ftipenohbus minoreft ucl plurim-TM um: .1 liuinmen arbufcuhm videre memini duorum hominum altitudincm aequatitcm, Si ab Ularamulum r_{ms} fioribusonufium avcl-

Phillyrea 11.

Phmyrca ni.



Phillyrea mr.



Phillyrea 11.

Phillyrea 11.

Phillyrea 11.



lobam, è quo subiecta icon delineata est, & cum plerisque alijs stirpibus in meâ peregrinatione collectis adseruatur. Ejus autem rami exalbido cortice teguntur, ut in alterâ, aliquantulum rugoso: folia habet superioribus angustiora, nullis cretis serrata, ejusdem ut in precedente coloris, adstringentis gustus: flores oleæ similes pusillos, ex herbaceo candicantes, confertim inter foliorum exortus nascentes: fructum deinde rotundum, superiori similem.

QUARTA humanam altitudinem æquat, ramos tamen minores & frequentiores habet quàm superiores, nigriore cortice tectos: folia Oleastrî, angustiora, viridiora, amaritudinis non expertia: flores etiam exiguos, albicantes, oleæ similes, simul congestos, & inter foliorum alas circa ramulos nascentes: quibus succedit fructus, maturitate niger, baccarum Myrti magnitudine, ossiculo duro præditus.

QUINTA, jam descriptæ forma, magnitudine similis, in hoc differens quòd ejus rami tenuiores, rariore minusque conferti: frequentiores etiam habet virgas à radice erminantes, fracto satis contumaces: disposita, paulò longiora & angustiora. Quarta, oleastrî moribus, viridiora, faturatiis virentia, subactis lapidis. Hanc floribus fructu carere incolæ mihi antea viderunt: utriusque superiori similem proferre non dubitò.

Prior frequens est in Lusitaniz incultis circa Eboram. Altera varijs Lusitaniz locis, in septentrionalibus, sed usquata copiosior quàm circa Tomari insignem pagum, in Belgium detuli. Tertia desertis Bætica locis: ejus etiam unicam arbuticulam in Natbonensi

fenti Gallia confpiciebam ad ingreſſum pagi PeratU. in inj. Volcani. in agro, iccundol Mompeliomiliari. Quarta abunde in CaltclUnovaHiſpaniac, Jociſincultisnonprocula Tagge flu mine difficis invenicut, & frequenter Mompclianoagro in ſepibus. Quintamrf- quim alibi vidi quain in incukis Caltcltx veterisSi Barrier.

Omnes autem, prater fecundam, cujus fruſtus 3micisa mco reditu cornunicatus, & 1 plerifitLiererrazcredirusnoneſtnatLis, nonmodo incultiflimis hortis Uluftnum virorutn Dn. Caroli a DivoAudomavo, Doraini in Dranoucre, Moerkerke, & c. Dn. Ioannis de Bran- noil, fo ci-Jm in eigsniftimtis Nobilium viromm Dn. Joannis Dijs, losnnis Boi/bt, Ge- nexoCx Dn. Marix de Erimcur Magnifici viri Conradi Schcti iixoris, Raphaelis de Coxia piſtoris Rcgij, Gcorgij van Rye mercatoris Machtinienſis, ^aliorum quoruodam rei her- barii: fludio ſc oble^bLiriamjConfpctxaliquandofucmnt. Ec porterioraquidem cria gene- ra alias fpccicspccriflcvidentur: namquedumbreviore&Iatiore folio, alit longioreſc anguftiore. quxdactiam ferratoaliquaurulmfolio nata^funt^matrcnonihildegenerates.

OrfAAfcSaGneſidi&a, Latinuranonnonhabet: fcdgracca vocePhillyreadicenda. Prioraquibuſdam vcnia.culoHiſpmorumfcrnoneazefodickur, iUiuſfcmcnOxya£2rjzhq rioinincad BelgasmiiTum. AUcraLufiranisadcrac. Tercia^quanaTj&quintKindifFren- ter nomina dabant inco!ac, mod6piadcrac, modo Uditrtta, nunc (entifle, nonnulli eciamtr- •viſco(quod ThyThelea: proprium & pcculiar c)t) nunc ſpances • Tertium genus PraPank i ftagni Volcarumaccolis, ubeiemcmini, 4^(frdicebatur. Quartnm veromeotempore Mompcliana; acadcmia: ftudiofi, nunc Oleaſtrum, interdum etiam Halimumappellabanc.

DIOSCORIDES Pliillyrefoltacommanducata, adoriſulceracommendat, veleo- nitnckcoiSocoHuioſuber: pocavcro unnamacmncrcſcierdicic.

HALIMVS.

CAP. XXX 7.



V NVM- Halimigenus Dioſcorides tradit. Plinius Naruralis Hiſtorixhb. XXII. cap. xxu. duogenerarecenſct, & tertiumcx Cra- tvaaddir.

HALIMVS ergo Dioſcoridis, quera & majorem& latifolium appdlarc licet, frutex eftomnino candidus, Khamnofimilis, jpfoc etiam candidior, cadcmq; alricudine aflurgens, multisramis ex u naradicep rode unn bus, crat fiSjgnolis, & frag[libus, nullisrigensfpinis: fo- Jiaoea:, feuporius Rhamnij brevioratamen&: laciore, incedura rhomboide figura, albai car- noſa, quodammo fplendentia, (aporisacidi, circa ramos, nulloſervato ordine temerena- ſcuntur: floſ oleæ pæne, muſcoſus, purpurafcês, racematim in famous ramis coharret: deinde femcn latum Atriplicis, aut porrulaca: quam marinam vufgdappeUant, coptoCiim: radix du- ra c(Ijligno/aj& in multos ramos ſparſa. Floret aftatc, femcn Aurumno matureſcit: invcm etiam Decembriflorcntem&: maturo femcno ſuftum.

PIVRIMVS ſponte provenic Vlyſponc vicinifquolocisadTagum, autejuſoftia, 8c atftuariamariproxiniaian ^pihuſmixn'm cum Rhanino, atirfolus: Hiſpah iremin Icipibus. Natusciam nobis femine quod Vlyſliponc ar- tuleram, quem etianmura apud quofdam rei herbariaftudioſoſalixiftimo: vcriimmus albuſeratquam n.itali loco^&ltoranadus folia, Atriplicisfilveſtns feremagnitudine £c

forma. catnoia tamcn, &: falſedinis nonnihl rccinentia.

Fruilraliunc, verbis Amati Luficani tnductus, Salmanticsadardem D. Virginis cut Cognomen de l> frig*, fluvio Tliormi Vietnam, fepe requifivi; fed Rhamnum'iltic frequencem. qucmadmodum tota ilia fuburbiorum parce inveni: niſi Atriplicem ſiU veſtrem, illicut plerifque alijs locis (atis abunde naſcentem, pro Halimi frutice fortaſ* fis (umpterit.)

H * L i M i genus aliud, ſi pracubicalem. aucfcfquicubicalem non affumira Jriri KJiicm flagellis potiu*, quhm ramis, ad c6 infirmis, tit pkrumque procumbant & humi Fundanrur' candidLquidem illis, fcd minus ſuperiorisramisr hujusfolia oblonga, anguſta ninpuia & camoſa. cinrci Sialbicaiuiſcolons: feſfumrais fligc Uiraccmatim cortrens mnaſcim T

Halimus II.



Halimus II.

Halimus

Halimifolia

herbacet potius quam purpurafcentiscolornsj deindeJbmenfupriori pine fimile, paulo tamcminus. Floret quo fuperioreropore.

la maritime regm Valentini nafcitur; videre & Jegercetiammemiminaggeribu5)lliusInfule, quam duo Riiodani cornua taciint,inter Fanum, D. ^Egidij & C Arelatcn, cum Mompello AreUcen& inde MaffihamproficifcL-rci'. Alituretiam a noftracibus in hottis. Alcbat enam Vicnna in fuohortoculciflimoCI VirDoilor loannesAichottzius inijgnis Medicus, &: diim vixit amicus cariflimus.adco prolifco (einir.c, ut plurima: ill! plantulxfingulhannisfpontenafccreniur.

A D Halimi ctiam genera referri potest alii plantanonmodoinniarifimisMediterranci mans, led ctiam ad Oceanumfitis, lit in aggenbus Hlandtiz, Zelandix, &: Hollandiac nafcens, pedibusramtSj humiprocumbentibus, excinetco colorcpurpuraftrentibus, folijs priori fiiinhbus, pinguiotibus&magtsainoils, nunustamenincanis,5iexviridipoi)uscanelcciuibus:flosetiam extremes ramulosambit racematim, ex tierbaeco purpurjIccnSjdeinde femem fecundo fimile.

CL. Vir iacobus Dalechampius (ipfum enim raagnxiUiusPlanrarumHiftoriae, quarproximis his annis Lugduni apitd Rovilium cxpreffa tft auftoremfljudico) verum DiolcondisHaliinumTholofxin hortis coli aft: fed ciim fruttum, Ribesvulgari (imilemeiadpingat,dubia mihi cft ejus fides. Dtolcorides enim nullius fructus in

ejusHiftoriamcmunit: nee ipfeeriamPlinius Ego veroprimum quern dcfcripli.legitimum Diofcoridis<^*jMocvircenfc,& minus gen us Plinij: Lufitam Sahutdwas a lalfiigine, Hifpalenfeswartfina, qaodmantimifcrefcit, appellanc. Alter(IIVcflrcgenusPlintj vidctur, cuircnuiorafohatribuit: illius vulgarc nomen til" ignotum. TertiusvuiqoPoiculaca irurinadicitur.

Omiiesautc mperpetuaruntfronde,&aliquid3dfinecumArriplicefiIvefIri (cujusvaria inveniunturgeneratoliorumamplitudine Scxxilitatcintericdifferentia) habcrevidciur, Si forteiatn facultatesnon diffimiles.

H A L I M I folia Diofcoridi& Plinio.cibi gratia decoquuntur: radix drachma? pondere]'naquamLtl]apota,torminadikiuif,ruptaquc&:convuIfamitig3t. PJiniusdcindcutruraquegenusprodclcdylcnericisetiamcxulccratiscum panc,ftomacho verorxaccto. Vlcnbus vetulsiilinicrutum, &recntium vulnerum impetuslenire, &luxatorum pcdum ac veficidolorcs-.led in eifdem remedijs,crK;fus majores (ilvefris dlcj& in (ananda hominum ac pecorum fcabic: femine lingua: (ubdico (itim non fentiri &c.

Lufitanicrtctencllasprioris,atquectiam Rliamnicimas in cibosccipiit. Clarifs.eques D-mianusdeGocs.idemquevir dofliflmus Halimi inajorisfoliacum furfuribusdcofia, &podat,risqua:acaliikcaufaproveiuii>t,malagmatismod6calidaimpo(i[a,doloreslen]rc mih lathrmabat.ciyn VlyffiponecTem.

Tertij generisturiones& folia F;andri(Oceaniacolx,falecondirefolentj&:in\fumftrvarc,non fecusacTyrrheni mans maritimis vicinijfamculum marinum.

FRUTEX CORONARIUS.

C A P. XXXVI.

Frutex coronarius

VALDE eleganscthicfrutex, multisabradicclongisvirgispriditus, reflis, cinereo corticetcllis,digitalisautmajorisraftitudinis(quaE'tandombrachialisinrerdumevadii) nodofis&quodammodogeniculatis, multam medullaminrecoiitinennbus: lixdemum in multostencnosviridcsramosfpargutur,quoscxLntervallisbinafeniper folia contunopctlicolorumcxoftunafcentiaxornatir,]autuismajora,obl6ga,perexircmunimucronataTUPnraV mdiain ambitu cunaUami fligni dlitibusfpid c-itiJcaensiHoresextrcraisramulisinfidentjternt^uini.fcpteni.nonnumcjuampiufcs.biiH kmper mter feoppoGtijCXtrcmoimparc JconJbntijquatuorfolijsinucionatis, albis, numerolisfibnspallidismcdiamfloricaviutem&umbilicum occupantibus, odor jutunde gravis.qualisinaufcorummaloriim&reitnoiuniflonbus: hisfuccedumcapitulacmulus

quae tunc macturpna, impetuectua, piummvardia, deinde maturitate nigricantia, quibus

quibus dehilcetitibus, oblongiufculum & tenue femen excidit, quod pleromque novellas
 in hunc se quentibus, procreant, nascuntur etiam avulsiōne, & Itolombus radices spargenti-
 bus in e propagat. Floret Junio, semen Augusto maturum est.
 b Ni. ifqu. im I
 Cotifjetlflus. nfcioiHicdcUtusipoucainHifpanijsunusautalterjBelgiohaudciLbicinif-
 fus. Nuncpaucifuntj inGecmania, alyfquevicinisrcgionibushorti, mquibusobodoris
 fuavitacein 6& elegant iam uonaUcur.

Frutex coronarius.

ἄσπυς Theophrasti.



A v veteribus fufricognitushie frutex, nondum ftatuerc poffum : pafim vero ab Her-
 barijs Fruc coronartus, qu6dcjus Hosodoratus in coronas interdum addatur, & Syngaa
 virgarum rci Sjrmlongitudine & fungorx interiorismedu llxcopiajappell. mir. Auftnae
 iMacron^p p i f c i c p e r e d o t i c a l i c a m i p o e r a g i n a m f a m b i i c u m a f l o r u m o d o r
 e v o c a n t.
 Sunt qui (fg-pwrTlicophralb effecenfeanr. Sed cum illius Sr^, qutm a nonnullis-ft*
 appellan dicit. adeo luculemerlitabipfodcscripta Hift. Phmt. lib. 111 .cap x. non video qui-
 busrationibus fuam opinionem ftabilircpoflint. Nemocnimin re herbaria velmediocri-
 ter verfaruseft, quj non agnofcat Oftryn dvc Oftryam, illacn cfTcarboretn qux in omnibus
 pent Gcrmania, G Pannonix, & mulurumaharum Europx Provindarum f i l v i s o b
 via est. r i e a s i v e f a g o , n o n f i x h o t u P u l i i n i u l , q u b . x i i i . c a p . x x i . N i h i f t e a m
 defcnbic. corpore & corrtce fimilis, folijs fgi fed minoribus, durioribus, perambicum ferra-
 te, non fpk'ndentibus fuperncut ilia, antchiememtamen, priufquam defluant, fimiliter
 fl. wefcen. ibu?, cxtremis ram Lili <irpicainalatarumhgularum, in quibus crocnhordeofimile
 later, propendentemferens. Her Wijsquibuldam Fagus dicitur, nefcio quoauc j ore. r v f i
 fnrtcifigifimihtudine nonanisocafionem lumpfennt. Gcrmani JE > < " « " h i u l ^ a p p e l l a n t ,
 Galli chtrmt, Acre bates mcipopulares ad grxcam vocem alludentes tffj?rr, ecujus craffio-
 ribusvirgiscratcstexuntur.

Corotarius porr6 frutex ativllumin medicina aurum obtineat, nondomintellcxi: fcdno-
 biles apud nos matrons: floribtis fyndone mundacxcepns, & in conclavi ab acre perflato (u-
 prame^fam ffratis, finguiifqiiedicbus marcidoruni & pridianorum loco rcentibus suppo-
 fif ischirothecas fuavi odore irnbuere folebant.

Es r alius quidam frutex anoftrisetia Syringa vocatus fupc'. oridi' nrnilis. Natnquam-
 Vis ab eadem (*Jice multas proferat virgas rechs 8c nodofas. magis ramen fraxini, quam Sv-
 ring* [bprioris, enella \$virgas rcferrvidicia:; niultisecijinfuncattamis, circa quosad
 fmg os nodos binafolia concurio fitu rta^untur, latiora quam in pratcedntc, fi& longiore
 •! r i n g a -
 r h l < t f * n .

Syriagactuloo Sore.

Lilac Mar-
thici.Cauda vul-
pina.

Evonymus i. iivc latifol

Evonymus i.
latifolius.

nixa petiolOjCraltUicua, dura,mgricantta,; cad
populinigrzfivchdeise foliorum formam ac-
cedentia: fum mis ram is oblocgos veuti rac-
mosfert,cquibus multiflores fupericrc nrjiores,
obfletions caculci colons dependent, odoran
quidem, minustarnenquam prioris Syringe ijs
luceditlongiufculusfrudus, duabuwelunnic-
branaceis valvulicon ftans, q uo b ina o bl on ga Qc
comprefTa /emina concinctur, colons ex atro
rufelcentis. Facile pangitur.

Hunc etiā nālunt no fratium horti. acque pic-
ric Germanise, & aliam iiii Prouinciarum: ilo-
xct cum fupiore, interdum macurius.

LILAC hunc vocat Dodifs. "Matthiolus, &
ex p dura q Conditino p l i f u i t i j l a t a t u m
ratnulis fiore &: frudu refrcisab Antonio Cor-
cufofibimidis, quicx Aphricaaccep rat; (cdin
cofa UiturquodfrLclura piftacijs finicm ilhm-
buat, nuclointus conferto & admodujn pingui
ex quo oleum exprimaturj quod de Ben appel-
lant: nam hujus frudus mulrum a Piftaci > dif-
fer, uc ex cjus hiftoria liquer.

Belloniushujus meminifle videtiū Obfer-
vanti Di lib. ii i. cap. L. Nam pofiquam dixit Tur-
cos nullis parceret fumptibus, Bc Kummam adhi-
bent diligentiam jinconquirendis exoticis arbo-
ribus, quxclegantibus floribus iint prarditx, ad-
dit; Alunc fruticem hedera: folijs perpeuuvi-
rentem, viotacets floribus, oblongumpedicu-
luraanibientibus, & vulpine cauds crafficudi-
ne m^a quantibus, qua dcau (a iplliua lingua vuU
pinatn caudara appellant.

Vertim noftra Syringaca: rulcapcrpetuam non
habet coraam, ucille Caudam vulpinam habe-
re afcric fcd deciduo est folio, ut **fuperior**.

EVONYMVS. CAP. XXXVII.

NON minus familiariseft uniuersae Tan-
XN noniar Evonymus vulgodiflu Sjtuam ic-
liquis provincijs quas quidmadij: ahctaiucn
etiam quxdam alia fjugenera nucfciuni ali-
bimihiobfervata.

Vi RG AS habuit primum genus, cum id
reperi, cubi talcs dumaxat, lctas & fraflu con-
tumaccs. quas ambiebant bina folia ex adver-
fo Icmpernakentiajeviterin anibitu (errata,
Evonymi vulgaris folijs non abfiniilia₃ quod
ad formam atcinet, fed longc majora, Citiix
ma Jifolij amplitud Jnenonccdentiaj Vndia,
guftm ingrati & amati: radicem digitalis cu-
fikudimsfumma tellure in cubitalcm longi-
ludincm excurtentm, mulnlqj flaveltentu-
bus fibrisonatam, Nulloftum **Borctob&t***
vabam: Tcd postcaquam in cultiffimohorto
C. V. Dodoris Ioannis Aicholt^aij, **Vienoca***
Us Medici, vctre amicitia mihi cojundi, cui
biriastirpfsquascrucratn, adoleverunt; ad-
liumana vcl ampliore multitudine post pau-
cos annos excreverunt, ampliora folianactx
funt, flores & fcmen **tulennt**. Maio emm
1 menfc oblongitenuc/qiincrin fitnafoliapc-
dteculinatifunt, tquibus aliqu-it dependebat
florculi, quatuor. ill > n. - itibush > li < ilj s & : adcar-
q

neum quod apamodocolore in accdentibus prxditi, forma pcrfimiles Evonyrai vulgaris
flonbas:

floribus: quibus fucco flirruaus, urin vulgari, quadrangulus, in rerdum ctiam quincuran-
 guis cojiltan vnajor [amcn. & quaii alatus, mar. uritac de hifcens, &: albagrana aurca pulpa
 inclu a luuinuii quam Augulto/cd pociflmium Septembri menfc continens. Sub Autum-
 Difiiicin, fo^<i abijcitur ieliquis arboribus qui bus perperuanoncft coma & extrremara-
 mu iormn culpide oblongam gemmam jf pem proximx novo vere germination is, producit.

Vno dmn raxac loco hunc rucicm obletvabara anno reparatz falutis humans M. D,
 IXXIX. Maiomenfe in (ilvaille aqu Ecx Grtkim 111' 'Dn. Ealtlulansdc Bactliyanarccdfcen-
 Liscit vcrfus Waiaf LJinuni. ca Pannonix pit Cj quje olim Inrcramnis appcl) abatur, ntrnc au-
 tem ilavouta: iionich obtinet, Germani SCin Wtton & vocant, ulcra Dravum flumen: & i inde
 binos ilioi frutices Vicnam adrcrcbato.

Evonymus ir.



BICVBITALTBVs ramisal Turgicalr. cnitTi, aut etiam majoribus, digirali, interdum polli-
 caricraftitudine jciuii & obfequiofis. dcfb cor-
 tice obd u£lts, viridi primium, dcinde multis ni-
 grtcandbus maculis afpero, qui in fummo 3i-
 viduntur in plures ranaulo Sj Ordine & ferie qua-
 dam interfe oppofitos, quos exornant folia fi-
 niiliter cxadveifo fita, latifolia Myrtifolij spa-
 ria. reneriora, Icvittrque in ambitu crnara,
 guttu priniim exficcantc, dcinde amanulculo
 & calido: e quorum finu, in oblongis gracili-
 bus, ne p dantulis unus ibini aut ad summum
 term flocculi splendentcs & c purpurafcentes de-
 pendcn, quatuor foliolis con{tantes jumbi]ico
 quadrai; o. & luccis laminulis quatuor angulos
 occupantibus, Coggygrix flon non multiim
 abfimils, majorc stanien; fruflus fuccedit in
 quadrangulis filiquis vulgaris Evonymi famili-
 bu Sj fpongiofus. auricoloris, ijs de hifcentibus
 tenui filo ppendens, in quo grana cxtima pare
 nigra Sifplifndencia, Fraxinellz granorum
 inflar, binatnterdum & ternacodem loculo & c
 pulpa comprchenfa.

Copiosenafcitur in fylvofis utriufque Pan-
 noniae montibus: fed qui Alps attingunt, id
 aleredc finunt. Invcnitur & in Moravia: nuf-
 quam ver6 abndantiiis, quam in filva arc
 Greyczenftcin 111. Comitit Nicolaide Salmis
 vicina, fccundoa Vienna Auftrismiliarjad Ie-
 vam Danubij ripam. Floret Maio: fru&us Au-
 guftoplcrumque maturefcit. maturius quam vulgaris, &: priraum genus hk defcriptum.

Vumvfut Gr^corum, Evonymus Latinorimcnlcturponoridoaorum virorum parti is
 fi-ucexqui apud Herbariorum vulgustalc nomen obtinuit, tamctfi quidam alirer (entiant,
 & Tnpxy^Uv (Ga7. quadracoria m verti Ocuju solum nomen apud Theophrastum lib. ru.
 Hift. Plant. cap. vi. inter fem germinantes invcnitur, c (rcvolunt: ejus autcn Wi/ci"i^ox, aliam
 quandam ftirpem, quam infra fuo loco defcribam.

POKRA vulgarem Evo(iymum ac 3 prts maxime apperf, dre; <j folysavit/efinenoxavi? -
 fci, dum in Pannonia c Tem didici, eam que obcauram, ab Vngaris f^rd^/idcft^ca.
 prisrofaarbordicjuir; hec id Theophrasti opinionioni tepngner, qui Evonymiifolia, capris
 prjrcipue mortificracfle fcrcbit. Germanis aucem epi6tlt<um Jicitur, Gallis #uf* i*, & btu i
 fairt Urdtirts.

PEIKLTMOV M;

CAP. XXXV M.

VVLGARi s Periclymeni, duo genera funrcognita, utrumque vicinis fruticibus plc-
 rumque fecircumvo) vit: fcd illu 3 quod n Septentnon jhbus Region! bus na (cttur, ex-
 'rcmis ramismulcos flores odoratos admodum, id rubrum fructu in unurn canut coa^lum
 profert; alterum in calidioribus regionibus ve! uti Italia, Hifpania, Narbonefi Galliacrefcjt,
 latioribus fblijs & binis aut ternis ac tabulis excremos rmmulos anibientibus, in quorum
 fingull s (en] plerumque floresxonunturpr; Ecociorci & minus odorari quam in priore. qui-
 bus fuccedunt baeoi tere pumcc^ Vtrumque genus Belgicis & Germanicis liorcis valdcfa-
 miliare. pergulas interdum vcftit. Neutrum fpon te nafcitur, quod (ciam (Crc tcnon obferva-
 Vi jiii Vngaria/, uftria, B^hcmia: Matron 3i: Aufl: nacx^i>f<nw<^j f<icf! (> appellat.

ALIVD porro genus c(t, q<od nulloadminiculocgens per feconfitit. ffitius pluragenc-
 ta obfcrvabim. I* Jamprzter primum, cujus aim luculentad cicripuo ex ce: Pcnntadcin,
 lib, in.

Natali
 Evonymus
 11.
 Natali
 Evonymus
 vulgaris.
 Evonymus
 vulgaris.
 Scandi ge-
 nera.
 Periclym, 1.
 lib, in.

ib.in.cap.xxrin.Hiftorizftirpium Clarifs. Viri Rembeixi Dodonari GefareiMedici,hie rcpetendara effe non duxi:Leaorem tamen admonitum volu^nafqualcs baccanon ferre, qucraadtnodmnnonnulliexiftiman:, fcdgminasfemper, eafque perpetud fere xqu alts magnirudinis.ciimin Pannonia, A uftria, Moravia,Bohemia, ubiplurimum, cumin Allo- brogum,Hclvetiorumquca!pibus,&alijsloctioquibusfponteaeffcic. InBdgicis autem horcisculcum ,vix unquam xuales ad matumatcm perducere deprchenfum cftj at cum aU teraexcrefat&turgidafiat.unafcmpercxilis.plenatamcnrcmanctjltagcnulam^cgeRa- toriam^auccucurbituainfefcrrcquodammodovidccur.

Periclymnumreflum n.

Peticlymnumreflum in.



Lin. 177*
Timilia. 11

ALTE RvM humiliserjtmanamqucaltitudincmrariffimeatringic: multdgracilio- res Sc rariores lubet ramos albicanec coroce re&os: folia priorcteneriorajongiorajin ambi- tunonnihilJerracajfiiperncvirentiitii.inferne minus incanaquam primi: tenelTisgerminibus enafcuntunnterfoliagraciles pediculi; unuminrerdu, fcdbinosutplurimumfloresdi- finentes,fupriore miporcs&rtencnores, non pallcfcentes ut illis, fed purpurafcentes, qui- bus {uccedunt gemelli fructus arque magni ac in priore.ctiam aruales,mgri camcnj non ru- bnjfucculenti^iiftiifracceRadixduraeft&lignofa.

Hujusunumtrucicem in l'yrenarismontibus, binosautrcnosapud Allobrogcs, dcinde frquenciores vanjs montibui Auitria; &: Stiris, inueniebam.

Tacit. gen.
Periclym. 11

TERJIVAC d f c u a c i d i n f c t i f c u t e ipite,multos in ramos diuifo, nigricanrcorciceobdu6los,qui(cabercft, &:pterumqi]cmultislocishiat:interdumftatim atadiccidniulcosramosfcredividir:tcnclliramulipurpurafcunr,&incanalanugincpube- fcunt; foliacontrariofitu inrcrfedifpofita, utinreliquisPericlymenigeneribus, illiqudd rubras bfficas fert non difTimiliajCxlicanns & amariufculi guftus:flos non fuerat milii con- fpeaufcadinliujusliiftoriamprirnumevulgarem, quandoquidem fub finem Iulij foluni- modoobftrvatusfriitexfuo maturefruftuonuftus: ataliquotdcindcanniselapfis, femine natx ftirpesjctioi Tatu anno,flores etcnelloTum ramorum Altspediculo inh*ventes, pro- tuleruncgeminus.nidimencofrudus.utccrorumjinnixos^ufitloj.pallcfcentes, cavorSC Inquinquclaciniadivifos, ucrliquonim Pt-riclymni furectigenerumflores, equorum utnbihecoproduntquinque Raminulaflavaappendice infigmra, frudiusfingularibiis bac- ccs .utrimqucintcitoliabrevjpedculoitcpjriicntibus .contbt, Chai^izmrfpilo Gcfnc- nmagnitudineaqualibus.fcdlongionhiispaLilti^olorisxrulci^uxvinofo&acidiiifL-ulo fuccoplcnas.manusrubrocolorcinficiunrj&niultapianagranaconcinct'. Radixlignora luce diftunditur, & multis fibris pr«dita cft.

Ocfcit (pome ad radices cujuftam montis par:o Malirz vocato contigui,ad Cniftram,vii

quæ ad Taururam, superioris Sciriae: Saltzpurgenfem Ditionem wringenrispntcelfurn montem, ducit: tunc autem femine natum quibusdam horns almir. Incoljctuaum dUigenttrcolligunt, & in emporium uiam reponuac.

Periclymeni in. U u. flores.

pciidyheimhream im. cum fruau.



Quæ ARTVM genus humiliseft. rard cubica lem fupcrans amplitudinem, ramis fecundocrâfloribus candidioribus^entis & fra<2u contumacibus: folia illi omnia maxima JLau- / <<' * * * * *
 i in non minora. pcr extremum mucrona aj ruperne virentia, inferne candidiora, nullata
 in longo trallitaculoq; petiolo gemelli, fecundo forma fimiles, nunc ex purpura candican-
 ter; d6 purpnci: fruâs plerumque cunicus, rar6 geminus, t3 metfigemir) ofioririiccdar,
 omnium rariffimus. exigt ticerâf magni j d i n e j ruber^ ucculentus, tranfparens, duplici in
 lummo jubi flores inhaferunt, ftigraate noratus, fed unicum granum concinctis.

Frequens eft in montibus Pyremis & Allobrogicis, fed omnium abundantiſſimum in Pannonicis, Auftriacis, & Sriciacis j prarferam fupramonafterium Neuberg, vbij 8c in reliquis vicinis Alpiſus plunmi ftirpes elegantiſſime proveniunt.

Fiornt omnia furre & Periclymeni genera Apnli & £ Maio. fruâs julio & Ausufto pierumque perficitur.

Primum genus ~~ante~~ fit ftjt & 3ri < 6 (Itia quibusdam appellatur vulgo, quidam Xyloſtei
 nomin Cj pofremam Gertnamicam vocem exprimentes donarunc Auftriacarum & Stiriaca-
 nim Alpium incolitriapriora genera J?unt > a brevocant. Q^iafcinuulum vulgare nomendi-
 dici. Verum mihi non probatur corum fententia, qui hoc genus Plinianam Chamxcerafum
 cfexiffilâncijus fuf frâs uſi l i a j p o i s g r i a c a m m i n i d e c i j m u l l a m q u e l i a t i c a c
 tota ftirps cum Ceiafoaffiatem. Sed magis veritmilis judico, ipſius Chamxcerafum nan
 cflcdi vcrfam ab ea quæ plurimis Pannonia:, fevicinarum quarundam Provmciarum illo eft
 • ponteprovenitx-ujushiftoriapaubpoftfcquetuniicc miln fatifaciuncqui Ficum Idwnj,
 cuius Theophr. lib. il f. PlanchtRorcap. xv. meminit. effe voluit: nam liac planta nul-
 lam^neapintonenotam habet cum iplius. nec cum Plinianaficu Idaraconveniem.

AD Periclymenicci generaproculdubiorcfcrndactf hccclcgaspldnta. cujus iconccum ck*m*u
 ^•(criptione libera! iter promotua (Juxincef]ioſer. icanii]iriac6municabac C. V. Thomas
 i ennzus Londmeryſis medicus, cum alijs aliquot elegaci/Titis flirpibus, dcquibus fuoloco.
 CAVLICVLIS vrododranulibus cfl, quibus quatuor, fox, rariuſo Soadhrrenefolia
 "adverfb n*r interval! a fica, Phi Uy res Narbonenfis/ivc medix/ojijſ familia. red pau!6 ma-
 J^ra, ni. igirque nervofa. in mucronem dci Kiciitiaquinquecoftis ab ip(b pediculo ad mucro-
 netn excurrentibus. Eſupremorum foliorum caviduo vcluti ramuli exeunt bimis folijs de-
 dem

Aiyrti, aurpotiisSpinxappendids, fivevulgatxoxyacanthir, colorcforisinitiofubflaveC-
cente^dndcrubrojcarne incus pailida, fungo/i, oxyacandianamdi&arfeiefapore, quina
officula five femina continence. Augufto maturusft.

G E S » E it o ClumiK. TncfpilLinlappcllareplacuic:quernalijrecentioresfcquocifunt. In
Epiftohsfatisapertedoceta Coconallo ipllus(ncquiseandem ftirpemexiftimec) differre",
cui majora fbin, biccasonadc6rubnis, nee adeo rotundas r.iibuit. Suiuqui Diofcoridis
hrtffLnAt&tt, & Tliiophnft mepilum aV-SwcW^veilccenlenc. Epimclis fane Diofcondis,
quam tean&iwappcllari ait, vulgarisnoltramcfpilusert. Anthcnoidesvcr6Tlicophr.ifti
{quitn GazaGalliczappellacioncxprefTitJqualiiftjnon facile judicari poficarbitror. Mi-
hi porro videtur hie frutex plarimas notas habere communes cum xouapw (i vc arbucio Dio-
ftoriJis, qua;aThcoplualh ArbucodifFerc.utcap.deArbutoadnotavi. Anguillararautcm
videtur Diofcoridisito^poceffi; Andraclinc,quamTheophraitusPlant.HiUor.lib. ui. cap.
Xvi.Aibuco fub)ungic,ii)iqiicimilcmfactt folio &:frui3:u.

Viridula
Arbutus

Viridula
DitiC.
Anthrathl
Jbuehr.

VITIS IDJSA.

CAP. XL.



ID &#. Virisnomeni'veriis (firpibustfibi riliu idan.
video a Rei Herbaria: pericis: ied maxima nx
pars Myrcillum gcrmanicarū officinarum, hac
appellactoneTheophrastim intelligere, vulr.
Suntqui alium fruticem ab co delcnbi arbi-
trancur Nosurriulq; generisfirpeshoc capi-
ta defcn be mus.j priori: inictum faciēces, quod
plunum opinione idnomen fibi vndicarcde-
b<<:cujufque species (practer vulgarem nigris
baccis, slum buxeis ncc deciduis rolijs, bacai-
qucrubris, & cerciampaluriribusnafcentem)
duas ab alijs minLniedefcnptasobfervafle puto.

PRIOR flcxilibus est ramis & liumi dif- r;/i r
fusis, gractlibuq;e, multis germimbus vixē
inu(co(quOramioccul[antur) prominentibus,
inquibusulloordincdrgethluntfolia, priot-
itis Lcdialpini folijspcneiimiha, paulo ramen
longiorajanguftiorajteneriora.minulqucrat
fa,admodum venola, fupcrmc virentia, inferne
diluciora, lcvicrperorasrenata, Sitnoliibuj
quibufdam villishiifura, longopediculoinhf-
fencia.guftus valdeadfringccis: infummisger-
jmmbusprxcdcnusannijbaccasfeit (florera
non obfervavijrntundas,cera(ij nonnumc<uam
magnitudinc,t>b[c5gis& tenuibus nediculisdc-
pendentes, colon'sintci viridis, dcindcrubri,
poltrem6nij;ri,iUttiiJtas, nonitigratifaporis,
nullaoffictilacntinences, fed planadumaxae
fennna,alba,numeroutplunmuniuina: radix
lignofjiuibufdam fibiisdona;affl.&: ramipet
rerram fparfi fimiles fibrasnonnumqua agunt,

Maturis & immatum baccis onuftum hunc fruticem, juxta Ericam bacciferam alteram
nafcentem, inuiiusan(afen jugi fupra^iifcfrjfcopulismenfe Auguftoenicbam.

V i c i N i o R est vulgwi Alcera,quaramosetiamliabecliumi intrrdum diffQfos,rerctes, n\$KUm n.
Kntos, nonnumquani veto firmos&crecos, corticc mod6ctnereo, modorubefcemctc-
ctos,inniukasalasdivifo<;Si in his folia, illiquxnibroctrtfrufti] forma iiii ilia, fed cenerio-
ravcnofa,fubtusxalbida,guflusadhingcns&nonnihilacidi:tlosvu!g3rilimilis,ej!can-
dido purpurafcns.concavus l.ibrisinquinq;uecrenasdivills, &: excruiis reflexis, fiiisintus
ttaminiiisifrLiirusvulgarifimilis.matunrarenigr^aponrquegTatianonrninusquaravur-
pns officinarum iiiiymlluscoinmiciHUIvlis.plurimagranula in fecontinens: radix est durav
ttgnora^multisfibnscapill.ua.-farmcttjivcramiprocumbentcsjfbubinderadicesagunr.

Invcnirur inOJorialbnijugo duobusfupraCTItuktit germanicis miliaribus: postca etiam
ObcryabamLndefccnlu/<xr;cnj]b.:t(C'p_m:a:i:(ljLifniilro frmouuftam, atque in EtfcbetO
AudriarmontefiipuGamiugam. Annodcinc M. D. LXXIX- rcpcnmfilvaNoribergenfi
Urbiproxima,ad Lacomia.s,iibi& vulgarcsmgrn fcruhrsbaccis maxima copianafcutnt
fub Pinastris, Piceis& Abietibus,ducc & comite C. V. loachimo L.F. Camerario. In Silefia-
cis ver6 montibus criam provenirc audio.

FOR_M A & 5mplirudinlij-cafupenonbusdirFert;ctcnininiulti^flolonibiiisftatimara << idan.
cerno, qii3C, quinosjinterdurncubieoſahis, cra(Tis, valderan: o {is; n: eri-
cc obduitis nugiaax pane: primo vrc folia cxgemrrus m taaiulorum larcnbus



nafcntLbuspromitfLibnisomninoincana, & multoromentoobfita, fuperneaurcovi-
 dia, c quorum media **velati** corymbacca fiorum qmnis folioliscandidis contancium coma
 emergiCjllncodore^foliadcindepaulatimrfecfexplicanctomentofjmqueillamJanugincai
 a b j i c c u o n t r e i r n p i n b c i t i u n e n r a r u i f d u H i i b f d d f g i e r u m -
 bilicoqtuncjuealisauthcinijsfepo, Ipin*appendicishuilu n-ajor, fucculcntus, fubduL-i
 mcllocoq fapon-,qualt fere Ceratia feu Sihqtic.continens dena sue plura grana obionsiuf-
 cula, plana, fubnigra. to t,

ArniidannJTimnafciturmontibusVicnnaAufrixviciniSjVeluti adBrunnam, Mcde-
 ling.Cnmpoftkirche,BadL-n,Fiicha,atquecnam ad radices Siyiiacarumalpium.Florcr.ut
 dixrmcuntcVcrefrugona&Trusc(!).

Hemina

A v pnozem reacinhancclafcnfi remlcrim.alijsjudicandum relinquo: neccnim mthi
 ipfiinilliusnomendarurafkifacio.Lcdialpinigenoribusadcribipoflcnifibadequi s
 prardim est:& alu quardam nora: reiragareiuur, Vulgare nomen non incclexi. Simferu vc-
 roadCommentartjde Alpiuscacem ejus **inctninjflevidetDr.** (&ari?^Mtnappcl!are:
 namparumiRofafmontanxfruricediffereafrerir.HuJHsfanefoliafatifaJillaniaccedunt

Altraab Auftnacarum &Snriacarumalpium Vonatoribus^cgerb-Tnunciipatur, libn-
 Krcnitnejubaccisvittitant,urip(im)Jiireculcrunt:Lind(-nomen indirum. In Sildia voca-
 tur **OciitW** quemadmodum Sc ca qua- **nibro** tru&u prxdita est, &c paludris: limilem ecia in
 apud illosurumobcmnr.qualcm Lcdonalpinum Intcaoiibiisalpinisprxftar.

Ternam lcati Vtcm IdotamTheophrasti.cuius meminit **lib.li** i. cap.xvi i. Hift. Plantar.
 efle cenfcnc. Auftnaci rufici montani JHegtiibn vocant, **vei** quod niufxcius frudlum ob
 atlecdincm appcMnr.aut qma negJcflaab.ivibusmulasque in pabulum cedunc. Pena&
 LobeiiUSjrfw(i(af/;rnomme(Jcfc_r,bcrevidencur in **doOiffiaisAdverfarijs.** **lofias** vero
stmclnisJiitb!fiiit/hocert,pyrumpetr<ni>,ocoloprariiemorato {nitailor.appellar. Gefie-
 rus in hiftolisvaria ;(i modo hanc intelligic)rnt-mcnomina, Myrcomalidu, Petrnmcldii,
 I ynccfviriar.Pyraftriidirx.DjlfcriampiusEpimclli'k'n] ala-ram vocat, 6i riibrum **rradhna**
 rr.buic U>coraftumGc(nen effcccnfcns i deindealioloco AmaIanchicnlli_a>>»_{nA}J_i feu

tjrw ft
 fro.
 Myitmmiu.
 Juttmiit.
 Tyrujlir Ur*
 J,nneluAt-
 uTM

Quoniam
 Catinaller.
 Cyanaga.
 Dyofiron.

COTOVASTRUM potto, quem Gesnerus Cydonaginem, Dyofiron & Mithridatum in Epi-
 stolis appellat a superiore omnino distinguere videtur, cum illius baccas rufas esse ait, he-
 cec carne & succo nullas, feminibus intus quaternis triangulari.

Cocotuftei fortè Gcfncrt.



Vva Vvii.



Eum fruticem legi Tb arbitror in Sncalbirijugis Iuniofiorentem & fruetusrudimentum effrmanterri, cublr. alibiisrami5, lcnth) **nigro** corcicc r<3is & midis, quorum **fummicatas** deliiK-bjiu inbreviagcnnnm incana, qu.ms autfcnis fblijsprxdiumaluiimilibus (**opcr**ne virentibus interne nonniinl **candi** amibus, inambitufcrratis, gu(tusaaiancain:,: niter qux veluti umbdla tiofcuJorum occulta baturqmii quefo: ijsconftanuiim, colorispurpurafecntis, quorum dcinde (ctlesinexigua malacxrubcrabac. Ilium ipfum quemlegcbamusr. imumiicadpingiciir. ivimu5. An vero **Aggiomclca** Hcllonij, quain lib. 1. cap. xv 11. in Ctecx montibus **in?cnifle** Jeribit, exiguum malorum pyrisformalimilimn **feracemi fca** lane *Oi*o?**>tWi Atlienii quiodammodo j convenirevidetur: & ipfe Beilonius codem loco, Allobrogum Amaiancier, iive Crctenfium CodomalOj ab Agnnielcadillingmc.

VVA VRS I.

CA P. XL I.

TRUTIC AT pedjlibusferrramulis, fljv X^ bilibus&lcnos, **buoif d' Tu Js**, rubelixjvc corcictcdis, uctncrri«res Arbutiramuli: **folia** illifrequciKia, nullo ordine **rjinKadh**xrentia, Arbuti folijs minoi x>ca. rnat'a, Cha. mxlex Italice foliorum plane xruula, minime tamen hir(itta, cum adilrictione amancati); extremis ramulisfloresprofertcxcandjdo purpurafcenr. cs, fivccandidos, quibusk'mterpurpurafcescoloradmixtuslijCavos, Atbuci floribuslimilL's, Scuvarinodo llmul congefros: fruftum (quemnon vidij incoJxrubentem, rotundumjCxi guiccraftiinEhr^rdumreferebant; radixparva fed lignofa. Perpetuafronde virec

Vnicolocomftentem confpxi arido foVo fijaprico^iargia, in colic iiiiiiiitticui(J Jin viculo *Venia el babul* vocato, inter Guadix & Baca, regnoGranatenn, **itum** florcenteni Mar no anni M D. LXV. (**eritistamenpleramque** florere, fruftum xltate maturfecere, & in plamaad hie memufque perdurare ipli medlaxflirmabanc.

PERITIORES quidani Hifpaniquibuseam oftendebam, ChamidapfmeneiTccxiftimabant, craftitudinefoliorum procolHubio decepti. Miliivcroad amufflniquadrarevidiurap>Tor<?/Aw quam Gilcnus lib. yn. cap. (•••) II n. De Compofit. Medic. X<T< f07rou; his^{ms} verbisdefenbir.

Vva Vviiin Pontonafcicur, plantahumifis & frutico(a, folioMcmxcyli, rruclumfcrei^ ru brutn ,roiu od u (tjgu ftu a ti (lerum.

Nam quod nonnulli Vvam urfi Galcni a ^{Vv*} Theophralli Vite idia differre nu putanr. fal- ^{^/y'''} Iunturillt meojudicio : quandoquidem Vitis tदारानिलालिud cflc vidcacur quam ea pianra c'ljus fupriorecapicc aliquot gciiuia **oefcri** pfi. Et h*c a Vitis Idea: illo^ciiercpumilo quodbuxcis folijs Temper viict& rubris bac cis prqdituin ctljUiulus notis differtjlitet noti-

nultiquiluuusiconcmaraciiiHi'panicisobfervatioiibLjsaiiK cxliibiram ab tilius iconc dirccrneienonnovcrunc, iufcnfilievidcatmir. Magisadhuc falluniurqui liancmeam cum AlpigciuSi Chamirrhododendro Lobelij confundunt: nam C vtriuofqueIittoriario Si, iconemdiligcatercontulifrentjplufimiiin inter fedifcpcpareanimadvcrufleuc.

Nondd'jncqui Vvam url] Faciane fpinam illani perpcuo virentem Oxy. icatuliaevulga- ri flonbus Sdfu&u perfimlem,qua; in Belgicis hortis Pytacatit ha: nomine ali (olebat. Eam An"iilar3,&refle quidem mco iudicio,Oxyacnrham legicimatn effcenfet; nam Theo- plirj(tuslib.i.Hillor.Pl.int. cap.xv.&lib.m.cap.im, perpctuum comam Oxyacantlixtri- buic.L?iofcondesPyraftiifol^{10c^nc^teura4ue} nlupci baccasabc&tcnyn, plenas,rubras, fragiles.&c.apciiTimc Oxyaeanthano rferremihi videcur,

CHA MAECENAS VS.

CAP. XL I I.

Parti... rff.uli. tji Cha- macra

Chamaeraf- illaria.



S V p R A dixi, corum fententiam mihi non sprobari, qui quartun Periclymni furro di genus Piiniana Chamaceraium cfie «i- (htunr,&: meas raciones iftic attuli, PUnius quidem Nat.Hift.lib. xv.cap.xxv.enumcra- usaliquotCeraigeneribus, addit: Sunc& Maccdonicaparv^atboris, laroqctriacu- bita excedentis: & minorcetiamnum fruti- ccCiiamrcrafi. Neurram autem harum, fruticem ilium qui interPriclyincni genera detentus est, diet pofTccnfeo: fedcosquos nuocdefciibam.

V A R I A E altitudinis inveniturChamx- terafrifru«X:nam interdum mcubiulem.bi- cubiraletn, aut ampiiorecm rmgmcudinem attollitur, umbrofis viddicet iocis&tenui folo:fiicioribusautemlocisj fejufta femitaj plerumtjue fupri pedalem altitudmcmnoa aflurgit. Tcnucs autem &c Jcnrus liabetra- mulosfeuvirgas nigricante ex cinereo cor- ticeobdudas,qua:ex iniervallisquxdam tu- bercula, & veluti gemmai proferont, unde tanquam excachrye, aliquocxtgua foliola, Myrci Tarctinar folijsa:qua)ia prodcunc,fi- mulque (tores bim, terni, quatenii aut plures fefecxp]icanr,carididi, quinquefoJioliscon- ftanteSj multisin medio ftaminulisprsdtei, Ceraivulgatis floribus prfltnilcSj minores camcirtra lios flores, atque ctiam inextre- niisvirgis, exali]stuberculisexeimcfcncfi- oribusfolia rupenoribusmajora, Cerafi vul- gaiis accibo frutlu fotioium ibtmam imi-

tantia,& in ambitufimi!iKrcrenata,Iongctamcnminora,&atra vindicate fpledentia,rub- amari guflus: floribuj l'ucceditexiguusfradiuSjrotundus^arnoMJs, niacuritatc ruber.exfic-

ncisminuIquegraiiaporis,quamfintacida«rafa,o(rcointusiiucLeo:radixcrafla,Jonga, dura,paucisifibi&pt!cd«a,profutidumpeKrs,&c)ua:difficult«eriii poffit.

Crefcit palm in Pannonia, Auftra inferiore& Moravia, editoribus(tccifquelocis,ad vincrorum ctiam incoltibusfitorum margines, &C juxtapublicasvins. In Bohemia videre non memini-Horet Aprili cum primum foliagerminareincipiunt: fruclu lunio, incedura lulio duntaxat matutus est.

Græcis ~~~~~oc dicitur, Latinis Chamæcerasus, Germanis Auftriacis Erbe wein/Vi-

Cerafum auftroim&tu nigto) Gallis, apud quos Iponte tionnakitui,Cfr:/«r »«» nuncu- paripocrit.

S C E T E H V M MaccdonicaCrafosperPannonasZAuftriam.inagrorum&Tvinciorum marginibusfrequentiiTimacr.raroatlriumcubitorum aUicudinem accedens.nihil in reti- quis 3. vulgaT\qwxaccibum\$£rubmm fete ftuctumdiffctens*. nam floics,ftu&tuaj foliafi- milia habet.

Iwv^Yt%"nTVR ponbiTk^viftria&Vinnonia^i) ftvnic«qui cum Ciafo aliquant, affinitatem lubent^&anonnullisimcr c]usgeneraicferunmr: Quetnadmodumquiap^{ci} ritque: Mahaleb vocatui .odorato flore,¹¹ leopulis & saxosis Pannonia locis nalcens, & col- lum urbi Viennensis vicinorum radicibus, à nullis Auftriacis tam ob caufam Sui vocari hoc

Mahaleb

27

hoc est petrofa Cerafus appellatus. Hunc etiam plerique Narbonensis Provincia: & AU-
brogMm locis non praecula Rhodanofitis obferuare mmini. Siqui Vaccinium Plinij, &
LacStlu, cdjus nudum notenapudThcopliraftum Plane. Hift.lib. [U.cap.iii. & vn. ex-^{^/C}
tatjeflbccnfenc. Pliniustamen Nat.Hift.lib.xvi.cap.xvm. Vacciniaquofis lolummodo^{^/1*}
fiatci cradit, cmgendicaui adfervitorum vctes: in quem sane ufum neminem hunc niri-
cenaiaue jus baccasururpare intelteji; atpaluftris! la Vitisidafa, ciimcaqu^{^/Dignsfi} & rubris
oacciSjCft in fhira> apr.a, quemadmodum paulo ante annotabam.

Cciafusirem avium, aurCrafusracemofavulguhcrbariorim nuncupata, in filvis fre-
quens, Germanismoftic^{^/Imndiainr}, **Vnga,rZeinhfta**. Belgica officinal, ante quim res
Jierbaria adcoexcu UaefTctjpro Vice habuer Linc. Sunrqui PadumThcoplirafto lib. Hid.
Plaot.iii.cap.i. effecenrent-SedciimTlicopliraduseoloco Padumduntaxatrcculentinter
arbores umorofio gaudentes, nulla addica defcripcione: qui ratione suam opinionem (tabi-
t a n e i d co.

MYRTVS.

CAP. lint.'

CATO rria Myrtigenera rradir, nigram, albam, & conjiigulam. Plimus lib. xv. cap. xxix.
Nacuratis Hilt, fimo tempore alter diuina fuisse Myrt genera refert, videlicet in fati
vara acque lilveftrem, & in utroque genere hieifoliam in veruri. Sacivarum generatopiar-
dciidefacre, Tarcntinamfoliomi JiutOjRornanampatulo, Exoricamdcnljfljmo, **fenis** b-
liorum veriibusream *verb* noneTc in u(ii:ramofam utramque altam. Conjugulan] iecxilti-
niarc^{^/qixruorc}mporcRoiiiananunctiparctur,

EgoveroinHifpanicamcaperegnationcj& alijsqu KadLJlocis, multo pluragcnetab-
feruare: memini : nec dubito quin ex fatione major aJhuc vatictas orin polfit.

Myrtus Bactica latifolia, domestica.



VNTH, dtiscraflisramis, folijsduplkircnc.
rarius difpolit] Sjmag[iis, u: intetduiii ad Laiiri :-
liuifoliauc Atbutifoliorum amplitudine mferc
accedanc. diluciiis paulo virciuisco! oris, odora: is
rariislioc floret auc fruftumfct, quiatexendis
fepibus, c]uas codere folent, eo plerique utantur,
Nuffiiam id genus vidijiii/ijnmonafterioquod
datn Hi(pali, & in latiffimis Maunranorum Gra-
natEviridarijSj in quibus, pirdnas & lacus clau-
debanr fepes IIIO Myrti genere eonfbntes, 6c
cxjlioquodam non mulciimhuic diflimili, mi-
nonbus taniens, & paulo denfioribus folijs, **cujus**
nos bit **pifturam** damus

SECVNDVM genus altiiis fiuricatj & aradice **Uyitut**:
pludnosdeolbs, craflbs, firmos queros pro-
nnt:tblia fuperioris fecund^{^/Ipeciei} limilia liaber,
fedadeo confertim nafccncia. utpene mucuo fclb
contingent petioli. dupliciinteriJum (**cric, fepiu**
tphci, valdecoJorara: Hosc) usca! ittidu4q unique
folijs confat, cetaflorum floribus fere fimilis, al-
bis villis plenus, odoracus: **cui fuccedit** paulo ob-
longiorruftus quitn in Tarentina, inci6 viridis,
dcjtii|ccdra maturefecre **incipit**, pLirpurafeni,
tandem plenam nutuntaccai adeptus, nigr, vi-
nofus, graiifapons, Candida IntuLva^{^/uc}granaia
(**ccoatioens**).

Hoc genus in Complurenfis atcis **horto pa-**
mum radii confpeftum, tmultis **cjus** frutjcbiu
feriequadam & ordine difpoficis, c'cgancillinio
(pedaculo, **cum** Temper viceat : deinde CordubiV
in quibusdam hortis.

TEHTII generis unicatn arborem vidifTe memini in Htronymicarum monafterio,
primo ab vrbc Cordubainilian, **eadem** foliorum denfitate & (crieqwa (ecundum genus.
verum minorcfolio 8i[aturationis] virentc: fruduciam **magiore & magis orbiculato. quireii-**
CUorura Myrti gentium fm&usinltar, alba & intlexa grana habet, minorutamenciijjiii
fuperioris,

QUARTVM; genusaonadebdenseftucicar, ncqLiemuttuman'urc; it, trnuibiis & frat'ili-
bus ramis, folijs c]ujus... circa

Myrtus Baccica angustifolia.

Myrtus Baccica filvastris.



circa ram6sna/cenribus, nigncarmbuj,6<Ioraris: flosajjifamiliseft: fru!uirbliin<lii5,obl longispediculis ex fuliorum alisprodeuntibus inhxrens, copioJiis, initio viridis, dcinde candvcins, nmuricate niger, vinofus,giaii admodum cum quadam adftTidioneapoiis:

Statua.

Spontfl prouenitpIcri(oueagris:&:co!libiisEscrcmadurx (qusBjeticxparseft^d AnatB fluncnikaj& Lulitaniarijli concrcminaf,adcopiosc,u!; per aliquot mi'iafia,nulli fercalij fitticsconfpicuntur. Odobnintcidum florntem, fed maxima ex panefmflu onutlam tune Myrtum colligebam,cum Madritio Vlyffipponcm profictfeerer, locisincultis & proctil i m u i. procul .i H .uninibiisdiditis, nunc Ixtioribus, viridionbusq; &: ainplionbusfoJijs; nancplini exfuccis, &frc rigencibus pallefcntibusq; pro locorum natura & Gtu:nana in ccmvallibus nata,nm!ti lj?cior&: viridior temper erat.

Myrtus la- mbaica fm- filvastris.

I. Q V I N T ? M genusfacialtcfaticattenellorum&rubentiumramorumfrequenna dcnium/olijsonnium miniruis,anguftioribus, Sc niagis mucranatisquam in ullaMyrto, (acuratius virentibus,fragrantisodons:flai pac retiquisjtum etiam fiti&uSjqui inicio quidem. viret, marurtaccautem nonntgrefcic utrc]iquorutn,fcdcxalbidus maner.

i. Hujusgeneris invcnituraliafpccies ejufilemcum fupenorsforma:, led peromnurncnrior,cxiliore &: angufborc folio.

Piimtim ntillii utraque hac Myrrusconfpe^aest in hortulo illuftris viri Dn. FcrtJinand* CotinhoLuQcant, p:reginarum&; exoticarum rcrum ftudiofilimi, & multis longiaqms petcgrituttonibus ctari; cumfioiwlifepesexhoc Mytti genere contlabant. Ilic MufatnnczCccntcm, & aliquot alias pccgrinas (Hpes vidi. Eftvcr6is!iortusin cditione urbis parre extra mania, apu j quctn veccresaliquoc inferiptioncs inarmonbus inJculptas ^d l i t

, - ConfpiciimruroniniaiftaMyrtigcnra fpr«cr primifpeciem priorcm) apudC.V.Da. koannein BoirotdocliiTiinum &Li herbaria: ftudtoffimum^qui omnium primus ex feini- nibuiacnccommuriicatisaluc: dcindeapudpleiofquealtosquibuscommunicavit: latai cniai interratn pacliradicesagunt, fedquintum gemisomnin] f-icJimccomprchndjc.

Myrtus fil- vastris

Nvuc yev^apudcundem, &apud vllufticsviroslloannemde Brandon, fc lomncra Diffum ipiumagnatum, nob l fuM atronas, Mariam de Brimaur Conradi Scheri, Mar- garetam de Clermes Praefidis Namurcenfis, uxores, aliofque quamplurimos in Belgio rei herbaria ftudio feie oblectantes,alebantur & alia Myrti genera ab his quz defcripti diverfa: quorum nunnulla latiore erant folio, quaedam medioen, alia minore.

fyttas domciicA fru3u albo.



i. L^ATIFOLIAE qu[^]dain amplo est folio, *rim 1 ji-
quodtatnenprima?clamsLarifolia: primar ma-
gnitudinemnona;quat,vindi,ranor(;ord]ncj3f
eoduplici circa ramosdifofiro.

x. Altapaulo minor est, interdum vegetior*
viridioreq; folio, quandoque palhdioe, &
triftiore.

Tertra denfiore est folio, & magis tncrona-
to, codemquenunc vegcciOEc&laetLorc, nunc
ctiam pallidiore

E meJioeffolio, non multumabfimi- airuuwA,
]iscitquartogncriamg in (iipriorc dalTc dc- &«
fcripto, fed miniis nigcannbus 6i quodam-
modopaUcfccniibus virgultiSj longiore ctiara
frudu.

MIKORE quateftfolio, omniumfrcquen-
tiflinia in Septentrionalium rcgionum liortis
fuit, ante qa[^]m minorillaprioris CblTj[^]nora
effec. Ejuscum ramulifaciliisradicesagant, fi
piiiguifulopartganrur, quamhujus, cciam latis
vulgarisfjiaeftmultisGermanix liorcis. Ha-
bec ver> minor hsc conferca admodum folia,
duobusuc plurimumvclibus iuanmlisdifpo-
iica, nonnumquamternis: qucmadmodum in
alitsgncri bus aliquandoetiam accidie.

FlorcntplcrumqueiicAututnno. fruftusra-
riflime ad maruriuccpvenit, Ccd in ipfa planta
tota hicmc barens, ctim rufus Tub Vcrisfineoi
acriexpontur. inanis&immacurusdecidit.

Dic iTVR autem Graccishicfrutexju[^]p/ix,
Latinis Myrtus, G3. Wi% JMjrtii. UHTurte, Hi-

Pts *^frahav, la\Ni Myrte & AfOf/f^ Germanis **Copie torn,**
P^mnm, fecundum, ad: tertium genus in prima cfaftedcfcriptum Hifpani Kjinyhtn me-
J'ce, lioreft Myrtum Mauntanicimvocant. LarinifporeritelfcExoncaj ljectternij, ad
JLiinum, foiorunivciiibusdillindbmvidcrim, ciim PI mi us fenosverfusua: exotica: trt-
verdm quirieneit adco denie ftpacaimerdum i. a. ci in fecundo Si. tertio genrefolia,
ut plu rui h r b f t i d

Quarcum genus Hifpani Iimpticitarar4[^]« timjftd vocant: eam filveftrem judico,
*|uoni3tnfpontclocisincult] <; provenic. Sedo[^]t/utjp!7/v>iab hac plane Icgrogandactijfui gene-
*nintertilveftrespropria. Pliniustamenlib. xv. cap. vii. inquodcfaaitjsoleisagic, lilv-
lrcmmyrrumminotefemincacjuibu(dam otymyrCncra vocari (cnbit, ab alijtchamz-
myrTmcm, abal. j! acaron; i (lmilnudine.

^JuintT m genus Candida my rt[^]apcliari potent a baccarum exalbidarum colore, Ec
•OincsHta: inyrti [prseter quartan[^] hortcn[^]es & donieftiat

i-acifolutnquxin Belgicis liortisalitiir, Konianamdici pofTeexiflimo, quam Plinius
eandemcutnConjujiula'Catoniseflcputac: eam ex Iulia & Ilomain Belgicam illa: am
certum elt, nam in Hifpania vidcrenon mcimni. Horcnijs Belgica ininutiore&dcnliore
lolio[^]d Tarentinam mco judicio referenda est. Niff quis pocius ita cenfeae, cand tdam mi-
nun/Timoomnium folio in prLmaclaiTcrepnlkani]TarcnnamefrtvocanJam. Nam cum
^acoranruni nfgnT. albat&conjugulafmeminerir jam verdconjugulaPlmio fit Romana,
isgn ex tuCoi utisno^{ta}: rcfaz canciida, qu[^]adnullum Plinindcfcriprum genus referri
poffic. quamTareiuinam. Sic Horcncfis ilia in Belgicis hortis abtsiirio culEa. minutiore fo-
«^oiTonincommodeiEgyptiamTheophrastodeCauftPlantar. lifa. vi. cap. XXVII. defcri-
ptam rcftrctquam dc an^{gu}rt^a fronde. mgroque fruQu eftc, & alias odore prxccllere atTerit.

I OR RO Myrti foliivirMia&ficca. iplxquebaccae. cumforisiroprofit[^]tum intracoⁱ
pusiumpta. reftnngendivimlubenc. MulwpwccraMyrtifaculiatc apudDiuic. lib. 1.
Kp-nuntur.

Belloniyslib. i. Ob. rrvationum cap. Lri. rfercllyricosmyrtifolijscorb pcrficere[^]ucm-
tuKLim MaccdoneRhoc, ^ijyptos Acaciaefuiqui, Alii minoris iucolas dandiua

MYRTO.

MITITO-CISTVSPENNAII.

CAP. XLIII ?*



Cist. Penna

Cist. Penna

EL EG k N s est hxc plants, cujus iconem C.V. Thomas Penna-us Londinensis Medicus anno M. DLXXX admemirtebar, & iubequente anno Londini in Anglia iicain often Jcbar, ijuam ille ex B. i. carium infu Urum majorc, vulgd Majorica nimcupau crutam ^u/pro-x < Voi' appellavit; cujiiscic3ufail]mshi* ftoriam inter Myrtutu §c Ciftuiti reponcta hbuit. .

FRVIE x est inrcrdum tricubiralis, fca* broadmodum cortice, & vcluri quibustiam tubL-reulisob(ico, qui in vctuftisrauii. JJS facile atMcedit & c rpomedccidit: foliAiumpend Myrii {qimrucndorfiiimnonminus(cabrum dlquanripfi ramulij (Upernclx'ia, conjUgacim ut in Cifti & Myrci g^ncribuj circa ramulosrufccncia^flnres fummis virgisiniidentju-Eei, qutnqc oblnqns foil js cofhnces, & rnutisiumediculliu longiufulis flaminulisprx-diti: his succedit oblongum & pentagonum capitulum icminc plenum.

Totadirps oJoracft, & Ientorem, five pingucmqcndamfiiccum, qualiCiftiLcdi genera madcoc, erTundtre videncor.

CISTVS MAS.

CAP. XLV.

C b7uiuoprinia (utPliaianisutarverbii) genera Dioforidesfacie, marc & ftminam.-deinde tertium addit LcdondiSum.

Ego, illius vclnrgjs infiflens, cna trtam fumina genera conltituam : dcinde *hygula*

ui cas species quas obfervavi, dvi *dam*, initium a *Mare factures*.
Ciftus mas i.eum Hypociflide.



Cist. mas

Cist. mas

Sk nirt.

MAREM porr6 Ci/rumappello, qui flort qinJem, utreliquaCiftigenera filvdrcm ro(amjcimiljtur.fed coiorein rubrum nunc/atu* rariorecn mcdodiJutiorem habet: cujusquio-qnc (pecics foliorum forma aut coloic inter ft diircrcnu'sob/ervabani.

PIUMVS Ciftu;aias, cuiiishlciconemcuiii faa hypociftide cxliibco, huirana altirudin* plcrumquefruticar, lignolatisfragili, & candi-canrc corticc te^o: frequentibus ramis altcinarim femper ex adverio rcfpondenubus i candem ciiam ferieni ft.rvani)busfolijs, qL)^omri-no funt incana, moJliora & lun^iota in DOVHc plantis, inadu!usvei6, corLtrailiora, duriota, 5f afpera.fulujrum falvixmodn, rnucronata, ad{Iringentis giifius: HofjusCyiorliodi autdl^ vclbnsrofxmagniiime, quinque folijs corl» (Ians, dilutiorisrubri colonsicu, utvocant, incarnari, rrmkisftjminibuscroceisniedium fiocm, utinRofafimplici, occupantibus: Hori fwcccduntcapitulaqustdam pentagons, dura, hirtura, incana, mucronara, in qmbusrxiguiini cftlcmrnexrutb nigric^ns, fennnisHyoreyami aur P-ipau'ris magnitudine.

Adhtiju' tadtces, qua fummijeeftpitibuscfffundnntur & : cohxrcit, copio'c nalt'iturr!reantiflima omnium quns umquam videnm, Hypnciftis, nono Vctc, cum Ciftusjan ad rxplicandosflerfsfeparac; nain quandoprnuifri cternemtrgit, purpureum fivecciuifinum (enemi*

fericum eleg. (Te dice res: dcinde paulatim a(furgens, & (f fc ex phi ans, mu]tum dc priftini colons uicia remimt, & cytinusiuosprofertcandicanrcSjCurgidos & Jento iuccop!eno5:cjui a pcris pharmacopois dcnlatur & in ufum adtervatur.

Frequens est hic Ciftus, ciim in Hi(pania, prsler[im ea parcc quar Bxcica appelhcur, rum 'n Luficiana & c Gallu Narbonenfijuaxime iictio monte.

Ciftus mas ii.

Gftusmasv.



SECVSDVS eadema Hiciidincqua fupcriora flurgit, interdum cii amnjore, nonmi- **afi*tm***
 trutff U cre Jn qium frequ t qn inustamncandicatfolia habec n
 modniedi (pofita, molliorata m L-n, longiora, anguftiora, & magismucronata: floscjus
 iupenort **Gftilis^camei** colons: capiculisciam & (cmincpaium diffct.

Nascitur & in Htrpanid, & diutius reliouis **maris** genenbus florer: illius irem ratnuli tenc-
 nores. roruleiit uinciuidptanipinguc & ouorum lub Autuiim comraluinc.

Dubium nun est, quin Hypocillis sub hoc **gcerc** eciam crefcat: nullam tamen, quemad-
 modum nec lub cribs fublequentibus **blbrtfavi**.

TER TIVS fupenuribus breuioren: iion mini scamen fruticofijs: tenciores lubecra **cifi*>***
 m o fol) an fpe h o d d l r e c v n d i r e c p d i r e p n a g i a m g o f r e g o i s p i l g e a d i o r a c a: m n
 flore m alijs fimilcm jtilutius **rubentem**, & c aliquantulum odoratum, quam notam in reli-
 Rois Cifti Mans generibus nondepfehendi: h j l r r i i b as pau l i i f t m t
 fit fil H d i u l u c r i M, q i i T H () r u n i c a l i c c s f u n t) d i u t i d s o c c u l c a n c u, m e n n p q u a l e.

Hunc duncaxac iti Luficantafpontenafcentem, Tupra Olyl Tipponcm itinre Conimbri-
 cenfi, atque **ctiam** in **maritimis** oblervabam.

Omnium humana aetate plerumque attollitur, ut reliqui fruticosus, & ramulis ali-
 quantulum incanis: ejus folia reliquis majora & quali orbiculata, nonnihil hirsuta & rugo-
 ft: flos fupcrioribus forma ilmili. s. paulo major, & colore saturatius rubente: hirsuta, durg,
 pencagonacapitula, fuperioribus majara, in quibus femerufuni, niajus quam altotui v
 coi nnetur.

Inventur Regno Valentino ic Arrogonum, audio ctiam in Italia frequentetn effc: natus
 "Bdgictspolice **Iwrtis**, **femia** ex III L Sprovtnaijs miifo.

Q^AVINTVS liimiliseft. & lipinus ut plurioum, mulrispedalibus aut pau!6 arapliori-
 bus ram is ex **eadem** rad ice **prodeuntibus**: folia crispa (unt & quodam modo (inuofa, candi-
 cantia iahi Tfuca, guflus acerbi & adfrin^entis iflores ramulorum Limnutibus arqualial-
 tudine & cqua(umbiciktim naicuncur/rupcriuribus paulo minore Sjfedelegantis ex rubro
 purpurafcent^ colons & iii: cnfions quim in quarto : capitnlar liqui i minor a, (ms in volu-
 ens plerumque conrci Sa, femcn continent reliquidmilc fed t n agis attum.

Huiicmfolia Lufitanianafcutemvidcbamfolo admodum venofo: nec uTquam fre-
 qtientiore m

quenticocraquatnapud monaiterium Ptralcp^didum, qumco iupra Vlyiipponem milia- p (cminc imtiironiiiUnn.floie in nonrmlisplantiscnam Novcmbri nulli con fp(a_o. Semen in Belgium reverfus,utocterorum G&gncruin aliquotamicisconiroumcabam: fed nemimnacusdthic^rutex, pneterquam unil^ctroCoudcbergoPlumiap:ro dochflimo ^rciherbariscftadibiffimo, qiemicamenaiu confervare non poruit, namfubfequent hicmsiatirigidaabftulit.

Reliqua gmera qux hiemem fitpcrarunc, omnibus rei herbaria: fludiofis qui in Belgio vi- vunE,fatisnora,cdmcaautiafuishoitisaliUJt,ai«aliqttandoalucrincl.

Florem vcru omaesiitiCifti Apnli^liquandoetiam n)atunus,nonnutnquam ferius, pro rcgionm&:locorumnatura&: ccmpramcnto: (emcnAugufto, Scpiembri & Oftobri lnacuttfcit."

Qv A T V O R prioraMarisgncracomrauni vocabulo dicuntur Hifpanis tpP«\ quiu- turn genus peculiarity Lutitanis nfiSt vocatur.

CISTVS FEMINA,

CAP. XLVI.

Cistivina
Cistivina
Cistivina
Cistivina



CISTVM feminam etiam in fuas fpecies distribuam. Namautelatioreft, &redis virisruricans, iicutMas: autiipinus&humi ipir[us,ut Encavulgaris Myricac folio. Detrude ucrumquegenus colorem in flore variat, qui maxima ex pane candidusefl, quandoquelu- teus, feu Othra? colore.

EM igiturCiflufeminafriuexranoious,cu- bicum interdmnalniSjDönumqijarn hunnflri- tus,gracilibus,nigric3iuibusq; ram is, folio noft minorcquam in marisquarcogcnere^ircin.ux t^cicrotmiditacis, rudiajatpero, viridiranaen, fapons fidfringenris &: acerbi: florem habcr paulominoreuiquaro mas,quinct generis flori pneiimilem, album, nonnumquainetiani fla- vum, luteisnbris, utin rofafilvenri, medium florem occupaitibus:capitulaminorafunnria- nis capitulis,nigriora, non mucronata, sed non- nihilcomprefla fupcriore parte, femcn pauld nigriis & fans magnum coatinemia.

Rccti & fupini qui album florem gerit magna eltinHifpania,Lufiraina,GallraNarboncnJi& Aquiraniaabundarftia. Quiverd lutcmnpro- fere, nomiullisduncaxacHLfpaniarlocis, &:cxt- tr^inaAquicaniicantabrii hnitimaj ciitaBi- yonntn vidiile meoijn,

Hilpani Ciftum feminam vulgd xAr*-efifp4 vocanr,noniinc ex Marisfc Lcdi appellatione

cotnpofito. Narbonenfis Gallixincolaf,qmccirca Momptlmmvicimifquclocishabitant, nieo temporemeu^a vernacitla lingua dicbanr.

C i ^ T v s aucem uccrque, mas &c remina, Græcè dicitur κέκος Dioscoridi, quem & κίθα- ρύβ & rJtxs-apov a qu ibu fdam voca ri icn b it.

Po RR 6, quitm muliisannis habui opinionen^hic diftlmuiarc nō poflum. Ea efijTlico- phraftigraaruin excmpLirruUltisjam (jccilismendoitni foiffc, &: Hillorfs Plane, lib. vi. cap.u.initio, *(srwpfox/03-oo^cgciiuuintflc:,ciiorealibrarijs facieadnniVo, obvocumaf- finicatem.

NanicimTlicoplifraftusdcarboribusagcnshb.iii.Hift.Plant.cap.ultiinOjadcodiltgeii- ter Hederacn in Tumma genera, humi rpenccm & in altum fcattoUcnrcm, lianc denuo in- tra :clicra,c:ilididatn,nigranlj& qur Helix appellatiu: terti6, fingulagencrain mulraslpc- c^:sdiftribuerit.Curlib.vi.cjuldcMHiltcap. n. quafiiuioblrus* inter(ufruciccsHedcr* ^ m u i i t u r , c j q g q ^ r o f l e f i l v e t r i s t r i b u e n t c u j u s o b r e c r o q o x n . i n i e f t t i m i l i u i d o c u m H e t l e r i f l o r e o m n i b u s n o t i l i m o ;

CenificgocxitlimOjmcndofum TheoDhraftiCTcmplatincau&ftiiCfe^r

Plinius qui Nat.Hist. p c p i d b d i c i p . x x x m hiftoriam exejuftdem lib. 11 t.perfequutiisfic.

Sic enim J b T I h U ^ n:ra pnmt, mas & femina, major traditur mas corpore, & folio.

folioduriorecciajti apcinguiore, & florca. l purpuram accedence. Vtriufcjjieautem floifi-
 m lisdlrote lilveitii, mil **quod** carcatodre

Itemlib. xxi cap ix decoronisagtns. VcuiirurcferuliSj & corymbisj & hederæ flore pur-
 J Ureo. Ell & m aiiogencrcearum filvefribus roils fimih. Et in ijsquoqucolor tancuni de-
 c «ac, odorauctni Dcft.

SiniilicrcumdcLadanfiagitlib. xi F. cap. xv Li. Hcdcræ pro Ciftoponit. Verumautem
 Ladanum {inquit) Cypriufular, teedeodipi m hircorum barbigenibut que viioiis in hsr-
 ienijted hederrfloredcrofo pafibus matutinis. tmn efrorulenta Cypros, & c. Quod facis
 indicant fubfrqncncia vrba. Suncqui herbam in Cypro, ex qua id fiac, Ledam appcller, & c.
 Nam Ledon Cifttgenufe Te. nemine in ignorjrearburor, & pail6 poftdemonfrabimii.

Sedlib. x Xrtii. cap. x. x «(rifa Ciftodi (tinguit Nam pofVeaquamdc Hcderæ faciiltanbus
 ^git, (ubjungir, Grzci vicinovocabulociltoi appcllan fruticm majorem Tliymo. folijs
 ocymi. Duo ejus genera. Flosirafculoro (accus. femina. 'albijs. Amboprotunrdvfnterici
 ci Si & c. Ecp. mlop6: f, Subhismaximcoafcttat Hypociftis, quam inter Hedcras diximus.

C E T E R v M Cilb folia, & parvagcnuina trita. adeo dehecant & adttringuni, ut ulcera
 glucioarc valcant: Flores autecnefficaciore s funt, iicur cum vino poti dyfentcrias, ventris
 imbcccillitares, flux» st|UL- & : liiniidit. i [esperranc] : nomaspcc (cilliticohibent, vetuft
 cenbus, & igm anibullis cum ceraco medencur.

H Y P O C I B T I s vcio. iiii ar Gra' cist. VoK ^ dicitur, anonn Li! lisp6 n3-pof J xnvposcogno-
 niinaturtclK- Diofcondi. -I' l • niii s fribicorobathiona quibufda indici. arefaflaminumbra, ^ , , J"
 filtere alvum ex vino auftero nigroque, ficcare & (pidjrc, 3; rufam flomachi rlicumatilinosore («Ww.
 emendate: potam tribus obolis, Janguinis excreationes, cum amylo dyfentcrias potam & in-
 ful , vetera quoque ulcera purgare.


CIBTI FEMIMAE CLASSIS AETERA.

CAT. XLVII.

A L I Q V O R • prarcrcæ Cifti <rcncri Ln Hifpania & Lufitania obfervabam, quxad Trcni-a/ij
 - fl nam vcluciad **primatiurngcnus, meo iudicio**, potiis referenda, quam ad Marcem, aut
 Ledoi]. **quandoquidem** nullo pingui lencoque liquore funcoblica, necroicum five purpu-
Kum flore habenc

Cistus folio Halimi I.

Cistus folio Halimi II.



Puro R cubiralc ^ ant ampliores profertramos, graciles, fatis fruticjros, in quibus folu, ff « Aii >
 "ortulacarmariiiii in ln. k' dnmnoincaiuut Halimi (aquocognom (: nindidi) obtufio- H « i' pw' •
 re mucroncfubacidi & : i (irrm ^ cntis gu (tus: (utnmis ramis multi uiharrent flores, quinque
 tolijs conilant C5, fiAv» coloris, mirjores quam infupcnoribus, illi Ciftigncncri quod nnnhulli

HcLaniic



Cistus folio Thymi.



Hypocistis
Jura.

Cistus folio
Halimi 11.

Cistus folio
Lavendula.

Cistus folio
Sampfuci.

Hic anthemon vocantur Cistus. f. uas fibras in r' C' dio continent: his uocantur longiuacula SC tmnpula capitula, exiguum fubrufuiu femca continent ia.

Ad hujus radices Hypocistin nascentem onit' inolutcam, fwc ot hiK Coloic, ipius ptantst florem colore referentem, lanuano menfe anno M D. LXV, reperiebam. Hanc pueros & paflores nuducare intclixi.

A L T E R protcioreft priorc, firmioribus «- mis & iucanis in pnoii foliactiam habet Halimi, pau' oramen longiora, anguft: ora, magi^ nmcro* nara, 5c dorf > clatiore, incana tamtn rora & fio ca. fuba^ idi ctiaai & adftnngentis Uporis. Iltiu* neque floricii, iieque /emen vidi.

Vterque frequens est in Lufirania arcnofo folo & auranurim afflato, inter Ericas, non procul Olyillpponc nulquamalsbi miliicon' pccius.

f E K T I V S plerumque cubitali aflurgicahitudinc. plufimis ramis, ij (que bre vibus pra:ditus, circa quos confertim nalcuntur folia angufta, m-cana, Lavenduli folijs proxima, adftnngenti* guflus flores fupercruins flortbiisiou multum ab* (imiles jparvi. taiididiifcm non obferuavi.

Hic frutex ad 6 Lavendii] a: (iii) iliscft, ut cl- ce pro odore & lapore. prot' a fumi po(Tic. & terro qias plantasinittocoiil' pxi m' gligt-bam. Laven- aubm' flccxi fiman' ., Icd flonbus dc inde confpflis in aliquot alus plantis, diligenti' obler* vati s. Cifti genus tflccpcr he ndi.

Solo Valentino rrgio hoc Cilti genus inveni- nifbam andis & perofis loriuquarro a Valentia mjliari, Aprilis initifi.

QVAMVS feuttx est multo j gracilis ramulos frcw, in qmbus folia ^ a m, t' uificir ci- data,

nwi, incana, Samprico (imili. i. paul6 minor, & dorfoenninenc3 con: rarijs inter fcepeicu-
 tis, iinaceticns Cifligentibus, nafcuntur, & addtionem h r t b q d ad d i t a c c
 & (nlledineconjuncthm : flas LLi {ummir. imiscopiofusquiriisalbisfo} j] scon [ht , quorum.
 medicullium macula ex purpuranigriscansmficir, villis&ftamim bus tfavis medium Horcu
 occupantibus: capicula dcinde lini ferecxigua, crigona, in quibus lemen miiiucuni Hyofa .i.
 mi. cx mgro candicans five cinereum cont inecur: totus vtro oblongus ille ratnulus qm flo-
 rem Sc capi[ulafuftinuit, reminc mataro arefcir. ut in fingulis Cilli generibus.

Primiira hunc inveni in Htspani? Castellavcteri, (upra oppidutjicui nomen D Martini
 tltt CaffaSal: dciiidecopioliim cncACarake)», &ctozoBa: t} Cu agro inter Tagum SiAnam
 flumina.

Hifpani Jfuiraelaauz quiriucU appellant, com muni ferme cum Ericar minoris vulgatio-
 tis vocabulo, quia fortaffis inter Ericas numcrant.


QVINTVS pedalifrucicatalcitudLne^ amuiiscxpurpuranigriscantibuSjdunSjlignofiSj qui
 HianaaexparceiinncfolijsconrpiciLincur, praeterquamcircaeoruni (ummitarcs, in quibus
 confocitinnauicunrarcxiliaadmodum, viridia, ThyraifohorumaErauU, aflfringentisgu-
 ftus: florem fummiraraisfercfuperiorifinulem^ inorem^ nullisinacuLisinfcc^um; fe-
 mennonobfervavi.

Hcc mihi /bliim confpedus eft extrema Hxticx parte, qua Caflcllara Sc LuCtaaiara fpe-
 at: fieri tamen potcft ut etiam alijslocisna(catur.

CISTI FEUINAE TERTIA CLASSIS. CAP. XLVIII.

SVPERIORIBVS proculdubioconjungcndd: funtplantK, hoccapiccfubijcieiKI^j
 Sd forma refpondeac, ncc difimile fit tcoipctamcma.

ChauxciRus r. Chamxciftus n>



OMNIBVS nocactptanup!uribusregionibusvutgaris, aiiamGermani, qu6cHocisincitI-
 tis inter Eneasnafcatur, & folijsHyObpum vul^ arc m r muk' tur^ f^ n^? appdlanr^ ori-
 s, atupallidis, fed maxima ex partcaurcis quidccaufaHerbariorumtn Gct-
 us Confolidamaurcanimmciipat. Suntqui PlinijHelianthenefle volunc, alii
 :hcir4>^uinpiofc. cuifolium amiTacofi' niic. floremaurcum^ adiccparvam
 nee altc dcmiflam tribute. Ego ad Cifti femiax tertiati claficm reducend. itn ecnfeo:
 que' nadmodu. n& aliagcnrafubfc nucutiainmeispercgnationibusobfervnta.

M v LTQS promicClumxci (lusaltcscxcadmradicramulos, tenucs, obK)nPos rum-
 ., 94 ccllurc rpatlos. lubrubentes. in quibus exigua folia, ordine quoda & duplici ferie, V
 . qucm-
 admo um.

Cf/Imftitit
 ym.

CHIftmiut
 Ctijpsllt.

ChauxciRus
 Chamxciftus
 jT" B/t
 rt».
 Chamxciftus
 11.

admocJuminrelicjBiaCiftigncribus, dtfpoftita, Scrpitlofereiiimilia, nigricantia & hirtuta, craflaque: Ibb flormti aurem partum. in novcllisrjrrm. longtora & candidiora. • flores in extremis ijfdero noveliisramulis term aur. quaterni, oblungis~5i hirtutis pedicellis inhajruntes, qujnif6 lijs, utfupcnonsflores, confhnrcs, iUifqucinagnirudinc pares, fed aurci plane colons & odorati: fciien obfervarc non ticntt: radix mukiiida, aliquot fibris lace iparfis cjpillata.

Nufquamnifiiniummis Auftrix & Scynx Alpibus inveniebam, idque feme!, menfc Auguftoflorcncin: in hortumvcroiranflaca. ubUHam aliquot aanisalui, Naaioir. iliiifloutc: fed florefcumfuispedicellis nimium caduci^ omnem obicrvaidtlemij ocaioaec, plane ademcrunt.

Chamxocytus in.



Clumxocytus mi.



ch m**ia* t* Do DRANTA ti Bvs cfl Tertiusramulis. liumi' (imiliterdirFufis^uos bina Temper c#n-
Uu trario interfctiturcpiuncfolia, MvrtirareninxfolijsJcqualiaautan^uiltora /upcncscin-
rea quadam lanugine obducta, interne vcrdomnino incanaj guftu adfringente ik nnnnihil
amaroprxdica: pedicellos poiteacxentduas auttresuncias fongos/^uibus *wildcat* quiiii
tucfeni flores fuptrion fere forma fimiles, quospidor male cxprt flit, Arfcultorcorrupt,
lutci coloris hii fuccedunt trigona parva capirula, femine inarqual^miniitOjrLiitroplena: ra-
dix lignofa, diira, vivax: in hoc etiam ramuli flores fuffincntes, tuaturo & deciduo femine,
cx fii: cari & confngiplcrumqucfolent.

Maxima abundantia nafcitur in omnibus illismontibusqui a ^ (fmkrjDanu bjoimmi-
nenti, ad Alpes Auftriacasconcinaquadam Jbncprocurrunt, turn criam inHaroburgenfl
Pannooia: moxite, alijlque ejufdem Provincix locis fublimioribus pnfertim, *Gccii que,*
florct Maio. fcincn maiurum eft lunio.

Chumxi KJ , Q_V_ART v s exiguaeftplania^cnuibus. lijrnois, humique Iparfiviigulisprzdita: folijs
Uu ^rimogncrri, quod Heliantlicn putant. fimihbus, mtonbugramen. omnino radicantibus,
guftuadfringencibus; flores extremis ram is in fide nt, quinque folijs conftantiei colons in-
terdma atbi, nt pljrimiiin pallidijtiiminibus medium florem occupantibus. -lctnctriangU'
liscapituiisLinopanbuSincftexiguum. rufum. Radixlignofa & fibrofa.

Chumxi f. diff. i Qj i NTVS abhocnondifFertmagnitudine & ramLilonim tenuitate: floresitemfimi-
jcs, fc: tr)inaSmilia: fed folia angufta omnino ^rcnuia^ifto folijsThjnii (qui quintuscn ia
fccunda Ciftifeminrclaffe' rcrporiderttia, incanacmm & Cjufdcmiemprranctui. Radix
perindedura & fibrofaacqieiiiprioris. Floresaperic urcrque Maio.

Frequenseftweraque plancula Salmaiuiceii fiagm, ubi *ftd^Htr**. abincolisappcllatur,
q uia perdict circa cam frequenter ic voluunt, ^ put vctant

Chamaeciflus v.

Chamaeciflus vi.



Chamaeciflus vii.



SEXTVS dodranra/cs atitmajoresfiumi^j ^{Chamaeciflus}
 fufosramuloslubet.muttisobl longisaiigudis- n.
 que foli js,nulloccrio, led cotuloutplunmum
 ordinc dilpo(ins,r^ptos, prztrvulgare in om-
 nibus Cilh genenbus foliowmfitum, faporis
 i/ijtio **relurgummofi**, decide *amaricanris*: ex*
 tremosramulosbaii aut terni occupant fiWs
 quinqucfblioliscontantes, lutci, cum iimin
tnedioftiroinulis, coforis quibus fiiccedtinc
 trigonacapicub (**ads** magna, majufcutum & l
 inirqualeicmcnojitinencia: radix lignoft,du-
 ra, vivax, rorisn]grocorciccobuutta,oi in ali-
 quot ramosparfa.

Ririorcfi, nu'quam cnim nifi in monre Bx-
 dcnfibus therm is immiucnti, quarto a Vienna
 Auftrif miliari,acqucinHaniburgenfidoibus
 i Pofonio Vngariz urbc milianbus, paucilas
 planras invenicbam flnTentcimcfc Iunio, quo
 tempore, aucpaulo *palljenieneciam pct&at*.

OBLONG is, quandoque dodrantalibus ^{Chamaeciflus}
 tantdmfcrcpitSeptimus ramis, luinii diftutj^
 nigricantibus, in multos alios breves ranui ips ^{Vu,}
 diviis: folia frequentia & confcrufunr, bn\
 Temper inrer fcoppofiw, exigua, 5t-rpj]lo mi-
 nora, Thy mi dunoi is fol ijs liaud majora, craff-
 fa,fupaioicpan:e vindia, infancandicantia,
 amaricati^l. faporis: extremis ramulis innarcun-
 turbiniauccuarerni flofculi fimul jun£H,pcr-
 pufiUi,quinqucfolioliscopim, c^nci quaff
 colons: lufuccedunrcapitula, maturitatcin
 quinqucrenas lefc ancricncia, & icmen cxd<

afimoaumwtenrfentiarr.idixdunijignofa aliquotnbrttaona.Hcft: quincum ramilubm-
 dc tenucs fibras a ^unt.Exliccaca plawa non injucundo fpirat odore.

Chamaecitrus VIII.



Chamaecitrus VIII.



Nascitur tenui folo inter fax*, in fimmis en(drt(s/©it<lttn/&alijs Aufnacaum Sryriacarumqmc Alpium iupercilijs. Floret lunio interdum eriam pauld macunus, pio icmpons quoiix, quzjugaillegit, mature aut Icio (olvitLir,ratione.

Ciim Pannomcarumftirpium hifkmm prf mumevulgavi, nondum tnihi conflabacqud lflam planmlam referre debenn, quod rocdiam quandam nacuram interChamreiftura tc Cncoirum Maahioh obcinere videcetur: camobcaufam inter utriufque capita locavcram, Sc axJtuua *reliquiam, liberutncinquc faciens quo potiitimum nomine appellate librcct. Seddiligiemi. .poftcaoblcrvaiaim,imer Chamrcrli genera rponcre placuit, impcllc n: ibu s me, uc ica raccim .aliquot cau lis.

OCTAVVS pal mans eff aut pauld am plior, fuprioribusqt firmior, mulcis l gnois,rec>ij tc ngricancibui ramulis przdttu\$, quos numcrofa tt a leo cc ii for ca ambiut folia, ut quaternis vcr tibus digelta videatur, Myrti minoris folijs non dif Timjlia, minoratamen & hifuta, licet atra viriditateiii perncrplendcant. quoruguiiusad fin&ionisparticepsefvfaj unicus interdum SC alter extremis ramulis cXic, fatis craffo pedtculofubnixus, jiaico quidem coaftransfolio, fed quinque prorundicreniitijlotq^clucr cimci. sdiio, utquinque folia haberevideamr, cjuftem cum pnmogenercpene magnnudi nii. coloris ex aibopurpurafccnrif. fc quail caracidtluriori SjdeccmflamtnibusexircmaMTco nigris^dyloobtongoptirpuralccDCcmciuini florem occup.xniibus: Honnu excuffis apparent penugona capititla obtuse mucronata, que mat uritaf e perts emfn condine e cprendunturcxile adtnodum, flavi colon's.

Raridiinum huncfruticem duntaxatin Sn(# <foi jugifcopulis n,ircntcm obfervabam ,untie Sorentem Tub metis Iunij finem erui; fcminever6pragnante inTfpt^lkn fumrtioftiper*ilio, diiohus (upra ^ft^ff milianbui. Semel •tqac iteruex ijsjugiscurn fioccfpirc dotum ptum in mcii horculum uiftuli cu aljs cleganibus alpinis ftirpibus: fed mitefcerc nolucrut.

NVLLVM noiiKn vulgare has plants* obtmC' re incellrx i prarter Priniam quar, ut dixi, JbO'tc* pfffpGLrra. ini^dicinir; Trrtiarn quzab AuftriacisJ^tptaH" TPeltf<<< vocatur, a prsrflanri videlicet curandorum vutneru f JCiilrate (quo ctiam nomine ipfosdanarcaudio Priorem) SC ^iartim arqucquintaabHifpaius ftrdtgMtr* *f pel!atas. Su nc autem onines perpetoo vitenti & lua folia per hicmtrrt in cures: fed cotum flores admodii caduciA'tttimfenefcetr.

CISTVS AUNVVI. CAP. XUX.

VJ Supetiorwplant*rnultoiduracanno*! ucquashocfapicdc(tribam, Ch. inixcifto, mea opinione cogenetes, annuz sunt dunt << *^i Vtxmooittt mno pchte loV at

1. IKIOR, inviiictoiuiiapu^ Sat: nantienfes marginibus, & Granatenis Regno mibi obfervata, longiusculis hirsuta, rectis, & raris est raris, magisque viridibus, satm-

gulis, folijs autem amplioribus quam in Chamacito primo, magisque viridibus, satm-

genn'sgLflus.flitsChamarciptrimiHori u~mili5,pal]idusaur.albkanse[,{cmenriinut.urn rubjfcensin trigoniscapiculis.duploquim Clumxcift-iprimimajonbuscontincmr.

CastelUi ^{q a i t i a j b l a c l a b u j J c r j q i i S T A T U s} dicun- surjCrelc.iii^Granatencfc^cr'h dt quadrille. An Hydiiophyllon ierba, quam Pamphilus in i jlo/Tis, tdte Atiicnaolib. n.Dcipnoibph nadir iupeinaicntemculjenbus, ciiuiiudicio⁰⁰ u bcfc t u bera cognofiru nt ?

. Ejusaliafpeciestnvcnicurlongioribusaliqmntulomvirgi'ijnontamenminusliirrutis, angulHoribuscciamfolijSjCujusflosintnor.palliDuSjValdecDiikLi^Liipicul.iSciemt llmiha.

ALTEHAM. Madricianutlva inuenicbam, fecundoab urbe Lutctia militari, pccuali alntu- dine i Te i c i c l g l s f e n t i s n e c a J r h o ' d u m r a m o l i s c a u l i c u h i : o b l o n j t M i s , a n g u l i s . h u j i t i s p l u t a s r i d i a t e p a d i G l i ^ C a p n o g u l a i f t q s p i n o dam &c lento Immorc lunc obiica: flos p<<fillLtsctf,quinque fblijs confans, punicante macu- Jainfignicis,pallidiahoquicolorisLicLipnoi:cc.'nellaadmoduii]&:icLqucnacapnulapLfil- lum &cioereum femcn continent.

Hujusnullum vulgajfenofienintelJexi.Sedurri.iquc Maromenfc floret.

Priorifcfcmen,tmaximecomraend3riad nephricosdolores, atqucadaliosufusutilccf^ ic,tqc monebat Do&iis.vir SioiomfcTovarHirpalcnfis Medicus.

CISTVS LE DON C. A P. L.

CYPEREST ucterciumCiftigenunnCuaspeciescriamdiftrLbuamus, qua: non minus va- ^{Oriz lunc quam in Cisto femina. Inguam autem abs omnium vulgarissimo, & purgatifimo} pcrHi/paniansafcentcfjicimus.

Cistus Ladon. angulitolium.



l. PRIMVM igiturLcdonfruttcatad liominis altitudjiciUjqumcciam intcidunt luprac, misfrequqpttbuSjlignofis, duru, nigps: rofia, quemadmodum flirjni, ex aducrfo jftafinc, oblonga« franfverfutn digitum quandoquc

lata, nonnumquam etiam lactiois, superne ex vi- ndmjficantia, infernejjiidicantia, qu:t*cum tenellisramulispingui quodam txioitio, cali- di),&tiMii(parntel<juoreadc6cdpiolbafpctfa (uiu , m procul cuam ex splctrdore confpici tc agnofci polfit, odor autem octava mliarikget- nianiLi panenanjusperupt: HorcelLinter ICII- quaCiftigeneral: pulcernmo (U am^lirtimo, magn* Ro(Jcinftar,linipliciquincue roliorua) ccxcura,omninoL)trrduma!bo, iedcujuuiin- ::ub folia circa unguem ex purpura nigricante macula rhoniboitcunncrai.jore, inodo mino- rcSianguftiorucplurimitm infdadjnCjHuns T &? umbilicorntiltscroceisfibnspleno, utin IJIS Ciftigenenbus: capitulainlongiSpdciculis.fo- -lijrcjiciiiisdenudacts,omniLin iiiaxin)a,rotun- da reic &c plana, non mucronaca, & facpenu n c- rodecagona,dura, interiusflavfcfcntiaj'qu'bus dehilcentibas,(emendccidiicopioruni,iubru- fum.omnium minutilTimum.

TocapLi!]ta,diun reliccatatit,quendimcan- dore in contra hit, pinguem tauicn ilium i bum lencorem &fuavem odorem non amiicic, fed cum recinctad multos cciam annos.

Crefcithoc genusmultisHifpanii k L.lir- raniiJocisfrequentilTime, piftonbus ai,

ciendasforsces.&ucnuori^fortunxhominibusfrucndoLgnifervicni. Nulquam tafTK\ abandonriu^quAniincnUibuseorumquedeclivibusinterT^gum irAnam Rutnina, &to. to fere m ontc Sit'TAMtrtn* nuncupato, ut mihi aliquando coucigencad viginti tere nulla- naperhujufinodifruticesitcrfaccre.

X, SupcrataCalpe, littoremorino, qua Mi !aca miter eft, laciorenafcitur folio, qmfiad Lti<,»\ Uti- LauriangudifoltJtffbliorumformamScamplitudincmaccdcntc: non minus utnen pin-/'''''''''''^{Guilento^uc illo hu more abundat,quam jam defcriptum.}

Hifpam utruaique-vd^uiiranipnorecm Ipeciem iflep*appellant. ALTERVM genus,ubi (po[Kcna(cicui;brcviuise[i]&: hicubicalibusdiinraxatafTurcit fto- U>oibus,ramofis:ramifmit fragilcs,*bli>o[i]nium,inter Cifti genera qu;ob(ctvabam m*x- t.fel mpm.

Led on luti folium n.m.ijus>

Lcd<n ii.latifolium minus.



Ledon 1114.



ma, superne viridia, inferne nonnihil candican-
tia, Hedera foliorum formam interdum. & Popu-
Jinigrarplcrumauearmulanria, facis rudiaSc
carnosa luemc rubedinem noonuJhm contra-
ntia^ubactdi & t adrtringcmis faporis flos can-
didus^iftifcmincfioriparcapicuiapentaena.
mucronata, exili & mricamc femme refcitt
funt.

Tcticlplanwrneqacpingucs, ncqucodora-
raiunt, lcdannotifucduntKat, & vccu{loirei,
AutumnojraTfettim.qnorem pore omncs Cifti
pmguesfitnr, abundantiore lucco.
crassiore falecm de magis tenaci pregnantcs esse
mihivifz sunt.

a. Hujus generis alia specics etiam invenitur,
Peromaufrtrfimilii, fedhumjlior, nequecu-
ae, guftuconvcniunr.

Vcrumquegenusnafcitnr incamontis Maria-
n.fvulgo Sierra morcnad.ai) parcc, qo x fupe-
«d est y, qui VlyUpponc rfifpalim iter fa-
ciunt. Inve- us Gra-
nate vicinis

Primam fpeciem incolz xara-xi ra, & x-
riva voca ant: Granatenles xara, codem
quo Cal. ellani Cittum feminam no^nc. Alre-
ra fpecies incolis xaxarpcacitur.

RT ! V M in Hispaniis non observavi, fed
femine millo Cyprij Led nomine no-
bis & plerisque alijs Belgis rei Herbariz studio



Ledon 1115. latifolium minus.

Ledon 1115. Cytisum.

sefe oblectantibus natum est, cubitali, interdum majore altitudine,
bus ramis, carnosis folijs, & piz latiora viridit

genet**

generis folia magitiidimSjbreuoribustamciij&rlomboidjsquodaniHindoficnrar^vecum Uovcilisramis lento &trofcidohumoreobfita funt, non ad c6ramejiabiircijnti&:dcnl'o,tic- que etia adcoodorato.ucin primo gencrcrfios ^Ibus c(t,fcundo geueri fin:iljs, (emenctiati exile nigricansmrocundiscaputulis

f. Q£*KTVM S^{enus} mulcisramisfrucicat.cubicolongjoribusjentis&flexibiljbu^liir- luti,albicanibu?: folia reliquis Ledi gencribas molliorajad Cifii femiue foliaaccdunr, VcmmpautoIongioraa;Tigufliora;jiirfucanigrjara^knupjngutdinefl n o - oovemotempore, fedctiam percot.ima: {la«inconfpiciuncur: flosalbustdCiflifcmina: nore non tnior,ncc ciabi:i:nilis:capitula exigua mem branaccis quibuldam & Jaxis involu- cr'isccta/emcn continent omnium inter Ctiti genera niaximni,nrgrum,

InrolaCaficllavcteri hoc genus obfervabam (vicinispagoS. Martini del CaffantNo.1\$ uoi abincolis*4r&vify nuncupaturjadcofrequenSjU: vulgarefie ifticproverbum,

3j*it» dmentvay wd* notuidt-iAlomnes ardvu)t(6Et. hoc est,

Quicumquemontemacceditpotiisquam inanisredcat, vclArdivicja (plantamviliffi- ma) collide, Apud noftros Belgas (atum felkitcrprovenir.

Ledon v.

Lcdon vt.



Q-viNTVMcademquaproximede fcnpmmaflurgiealtitudine, vcriimramisduris, li- Bnofts.nipncaiinbusioblorigisok-aEfolijs.anguftiorjbm.fii fcis.pinguibus.&lcnwhuiTiore coniperlB, qucmadtnodumScnovelliramuli: flosalbusoinimmfcremiDimgs: loncafif «ngp!ofcapiituaajbr e i nca ex tufo n igricans,exiguum.

Adhujusadiccs genas UIud J^a WfiveC Gij monj, Hlypocinisnuncjpatum,adn3> tumuivenieba™, m.jlUvcluCi tIuaniis, utquodinahorum'Ciilig=ncrum radiabusert:» cic,cornpaitum pAllelcntiscoIoris, quibufdamtam^ n liiiL-ispurpurafcemibusafni ^uc&glucmofoiuc

co totum prag N jil ifto Ledi g-nere vulgstius toro Valetitno regno, & Narbonenfi Gailia ubi Lcdum non oblervabam • (ed m plerifque ajjs Hiipania &c Luficanu.-]^ ^iac

Se XTVM pene QH into fimil cett, brevm^aulA, minonbiisanguftioribu que folijs, lento humore algeri is, quemadniodum iliiusofu: flos majorcft,albusiwm & quaque folijs confu^ netianonpoccti «m#

SBPTIMVM cabitdceft,raukis&f roquentibus ramis fruticans, cineraceo colore pra- * quoi p un: equa nna tolia Romamini coronari: foliorum zmulu, omnino cabiteen.

Lcdonvn.

Lcdoavm.



Lcdon ix.



Lcdonviii.

Lcdonvii.

Lcdonvi.

eaner<rmia&: iifpida, nec minus pinguia, Sc
lento fucco perfofa cum **Chs ceneilis** rauulis,
qujnifuincum genus: flos fummis ram is copio-
fus, Candidas, lupriorifiinilis, necfcmenilif
filii c.

ValcDtino ctiam Regno hxc duo poftretna
mihtduntaxac obferv.ualum, circa Xativa, & l
ab it b is naxarpo dicuntur.

OCTAVVM cadem qua ftiprius magnitu-
dinecrfcir,rimitamen magis expand funr, foli-
acenuiorajlupcrnapartcxfufcovindia.infer-
luerocaiiilicauiu, ut Rotifniamiicoronarix
folia vidcantur. guflut.inienadftnngentia, licet
lento quoJam Sipingui liitmorefiu cum renli-
iisramis nblua: numcroii flores Iccundiim ra-
morumiongitudincni nafcunmr quinqueclijs
confances, cxigui, pollremo tamendcferipcis
paresjurcicolons: icineninpufillsscapitellux
cin-reonigricar.s.

Invcintur hoc frequensinculcis illis lociscitr
Tagum, fupraOlydipponcm, CHID Ciflofohjs
Halirai, & ionnullis Bxticac, ubi ab incolis
jwf^idcftjRosmarinusappellatur.

NONTM rainuseftTupriorc,foliapauloma^
jora, nequefubcusincanaunnpiaxedentf, (cd
rariora&magisg!ucinolafunc:ramulos,quibus
flosmbarfit.tcnues, exfuccos, **plancque** rccon-
dos, aliquot inania capitula &omnmohiantia
jam excullo femine, fultinete d'prehendebam.

DECIMVM pedah duntaxat eft altitudine,
ramuliicxilibusJtgiolis.facistamenfragilibus^vgrLcantibus.piiigibus, &qitc
humore uiidentibus: folij longc minonbus quain in Nono, **non** tjuttum a Tin mi inlut
difljdcnu*

Led on x.



diffidentibus: flores non confervavi, quicquid in ro- dum nee in superiore: sed in oblongis lamulis quafi umbellatim produciuntur apicula exte- guntur & inferius parte aperta nana jam & cum hinc rami- bus sanda.

Nalcuntur verohsceduopoftrama, in extre- ma Bxtica: parte qua Cattellam nova (pedit ab incolis xagutrfo nuncupata: tametsi postea nonnulli etiam lumerutU appellant, quod Tub ca forte t«bca, vcl poniis, ut exiftimo, Hypociftis, qua: illi tuheris fortai Te loco ubi servata til, na- fcentur: lubracnim Hi) pani turiruti, utant ddi- jci, vocant.

Non minus perpetud virence nec decidente funcfolio iftj Oftigcnera, quam Mas & Fcmina.

GR. *C is porro hic frutex ASr/o^ Latinis Le- dondicitur: Plinius etiam LaJanappcliat. Pin- gut vero illud quod ex cocolligitu r A»^toP, La- tinis Ladanum jofficinis Laudanum.

£ i v 5 colligendi rationem Diofcorides lib. i. Pltms Niturihs Hiltonar lib. xii. cap. xvii. de- fcripferc. Quam vet6 inter reccctores Bellomus lib. i. cap. vi i. Obfervationum in Crcta obfervaf- fe ait ad (en here hie liber, cum ab alio neimnc lit adhuc prodita.

Grci colligendo LaJano peculiars in Oru- tafali- mentum parant, vetnaculo (crnioncilis Ergafti- ridii Uum. Eft verdidin Urumentm ranro dei- tium ex percifimile: huic affix «(unt niulcx ligu- Ix five zonz e corio rudi nec praparaco came-

leniter ad rivas nuda Janiferis fruticibus, ut in haerent liquit Jus illi tium orcircaf > li coactctus, quide inde alip; ulis perfummos St> tis ardore scilicet scitabr ad ciclus. Irai iue La- danum colligendi fummus, imd intolerabilis est labor, cum tocos diet ardei. tifiimo canicu- * <ftu in montibus harrere necesse fit: neque faole quilquam altus ad id colligendum <pc- ^ j Dfumir p rfter Calohic ros li octft, monachos Grxcos. Nufquaro aurem < majurcc > ia Per totam infulam cog, tur, quim ad montis Idx radice < 8, pagp Ogalwus nuncupato A' apud Milopotamo. Hactenus Bellonius.

Siquis ratncnin Hilpanijshuic colligendo oopram navare vcllet. multum in orcutm. iij * idetur, negof: iomag nam < jus I.) ncpurii Timi, rc(iiii) i, & odoraticopiam coUigrc police, cifmiticcg rxnli quando. urdixij filvfin veniantur omnium pinguiffimillmi Led; quod pno locode fcripfi: nequillocx Aphricain vctlo, rn. ignaex parte impuro. opusc-flec-

* CETUVM Ladanum pmo excolu calidum ell, adhuc lufstantia tenm princ'a * mollicns, & moderate digerens. atque etiam concoquens: itaque mirandum non est, ii pec- uiliaritCTaJ uteri vitiac onvniat: lii mlitradllnaiomspaulnU) mliabcc, quocirca et jai Tnle- fineness capillos rnticrnam quidquid pravi humoris ad radices eorum reI «Jit, idoi ai B < brumi ^ tuc natca quib fixtu D ^ coacrahic

LSDVM ALVIHTM

CAK tu

I. T «DO non incptd fiibi unecruo doritushlcat que icgans frutex. multiscubita Hbus. tdi^w Llignofis dur, i, i lumii UC P^ i i r i i numh d L r T u i l s , ancreo ^ accdrticctcaisram. sprxdici: s: * < * Snorum extremi ramuli confcnsircentibus folijs func obliteri, Chamsalex Itali « tutiot um femuhs duris, fupen viridibus i jifplendentibus, inftrncdiliitiorccotore conlptcttis, mu- • crtiacit Kcrdum rocundiore & obtiiliore, inarabitvllol! sliirrutifqucut ("i « * i i o vager < n » u, ad fringemis laporis: germinum extremis infidctcoma florum dcorlum in R. xo- rum & propridei tiund. ca Qipanulx modo concavorum. quifumma Ubrjqum quedi viiu- • • sreclalubL-nces, fortsintcnfiis rubent, & * rgnceis velurigunis (cui ipfiu inde deph. dent ptiolis confperrifuii VLitiorcvcrd panedilutius rnbii, aliquotltamini MSintrala- tenibus, fuaviufculiodoris: ij-i (ucceduntexigi Jacjpitulaqi in quicollul) sconftan: ia, in quibus femm fulvum, mnucll Tnum feobis tnlar: virdia captulatnta, fuo odore capiti * gravedmem quodaon modo inducunt: radix dura; lignora. oblonga: led & rami per ccrnam iparfi inccrdum fioras agunc.

.../ Soces bca / Mchite / Durcstia aliarum que vicinarum Alpium Jugis inter laxa, ad de veta plerum que latea. Obfervavi etiam supra Gaminam, Chamulka- norum

Ledum Alpinum.

Ledi alpini
genus alpinum.



Ledum alpinum
nomen.

Chamaeris
dentata alpina.

Chamaeris
dentata
filia.
Sed nomen
atque.

Evonymus
quercifolius.

norum cecobiuro , in montis ascensu lapidibus ihato, qui subcundus est tj<, qui ad fff">(7& vicinas A)pcspofici(cuntur.

2. Aliudcujus genus invenitur inOn<ribo>fu-
praO'<t>crj/ ranoribusfolijs, necitaconferrij,
majoribus, durioribus, admi>ilum venosis, lon-
gioris mucrone pceditis, mu<limcinambitu liir-
iuris^proiiaplcrumqueparteflaucfccnibus,
aut ferrearubigine nigricannibus: flortsfiabet
(uperiori Smiles, fed paulodilucinres, capitula
& lemenlimilia. Hujusfolijs&ramis adnata
aliquando rperiuntur tubercula nunc micij
ponticx, modo pit'i magnitudine. ini-qualia/o-
risrutilanteaurpallefcenre nonnumquam co-
lore, intusfungofaj &alb.ipu]papiciu, adUri-
tionis paiticipc, quatgallarum vicemprartla-
re poflunt.

Florctutumque genus lunio & Iulio: fc-
ntu sub Augudi finem, auc pauld fcruis tna-
tuiefcit.

NtRtON alpinum nobilis idemqute dodif-
fimus Vlyl&s Atdrovandtis luinc fruticem jp-
pellat, tefteC. V. ConradoGefnero intiefcri-
ptione MontisfraiSi. Alpiat piftores3(pw>)(nfc
CBtjefit norninanr, uc ipfe eodem loco & in
Epiftolis, Si Simlcrusad calceni Commeiuanj
de Alpbis cefcrunt, quidam^flinith^iy non-
nulli ^inwriatb vocant. Primumgenusomnino
intelligi exiftimarem a Clanfs. Viris Pcna &C
Lobelio tii'Advcl/irijs, fub AlpinarChnmarro-
dodendri odorx noininc, niit bacculas apparagi
vel <xi pares illi tnbucrent, quas in noftio non

rperias, ffcJpC'iwgonatantiJmcapirLila. tttexejusdcrcripcione fatifliqiift. Altrump luri-
mumconvnircumcorummontanaChamxleaTfolia^vcLentificfoliaChiamcrodotlren-
dro minus odora. In Obferuationibusprioif iconem exhibet Lobelius Kalfami alpinom-
mine: pi<ftor tamen Horesfidcliter non expreffir. quos in quinque crenas. noninquatuor, di-
vi {ofcflceompenflet, firamos (tiis floribus onullos, aiucaii© M. D. nextin. amicis Mach-
liniammifibs [equibusillam iconem exprefTic) diligentiiisconCdraflet: licet non negctn
in wrdum hri pofc, utquacuortanrunicrenis dividantur, (iconnunquam ludente indo-
ribus natura: at omnes in eodem ramo tales natos esse redibile non est.

Hic est fruce quae in nonnullis Evonymum dicitur, ante meminit, nescio qua ratione* du-
flis. Namin hoc ubi fVw£luilcfamoproisim quo actus in quaternos verfus dde/hn,
qualem Theophrastus fiv granum quadrangulum anguraj quod Plinius. illi iribuunt? tx mo-
tl Odefiripralatieiiftoria fhtisliquet ne minimam quidem noram ad Evonymum referri
poirt'. Itaq; Liccum Gernem locofupramemoraro. & in Epiftolii. Lcdipotiiiefclir^uam Ne-
nonaut Evonymutnarbitror. muicum mctmpclJentCjUriraceileam. hujus ftirpis odorciC
tenipfraento. Ruffict&: Pallorfeorum montiutn m quibus ob/crvau, uirumque genuf
Oimifa appellat QC, coque Tindores qui vicina loca inhabitant, ut ututad l i n Lu-
gro colore inficicoduta. Nullum prattercautui apud cos obuacre imcllexi.

LEDUM SHEZUCVM,

CAP. LII.

Is Ti Ledi genrtbus adnumerandum ctiam efle htinc non minusekgantem & ra-
Crum f non e f t d u b u m i j s e n i m o d o n s f r a g r n t f t

CVDITALIBVS auteni interdum cft virgis, firmis jgnois, corticccinereo obdua <>>
quaramextre main plures alias renuiores 5£ quodaminodo purputalcntes, ealqueti*¹
nul<i>ivKiun:ur:ill3Cviafliminaliosodraitalessramiilns, viT<iccisquidem, Jediomcto
quodamrub>ginci coloris obitioj^uosnulk(ericdigefta(cdeonUifa ambium(ulia, Lit**
noiiihscoroiunarfolijsfercliniilia, fedlongiora, (upinaparrc vuitia, adeoqucinprona*¹
pnrcinrerlcsa Siconvoluta. iitc jusunihilconrpicipofTltpartrncrvumlcundumloItjJon-
grtudinc mxcutrentem, fimilitomenio, CBmpetiolociiiinhaEtet, jmbeicentem, gratiK
fiiavisodoris^criulculi tatnen faporis: funimis ifufraniis inlidcnr capita¹ irx multis brcvibu*
quail fquamis ferrugineis cornp. ida, e qmbu^dnndc (cfc rpxplicic coryrubacca q<*>dan>
multorum florum coma, oblong'• Tcncltu, uqac TmsifatK, iioniuhlun)cnlaiiugiooffi.

Ledi alpi-
norum.

pedicella

Ledum Silcifiacum.



pedicellis inhzrencium, gratoodore harsfen-
narium.quinisfolialisalbisconfhintiun^nor
fublucconim (uttemerc qmdam qui lkeu;n
cum HoreramnduLit.ixatconfpexit,aflecre
noncltverirusjdccenicandidisftaniinuliscum
ftylo medium florem occipatibus: hisdemum
fuccduntoblongUifculacapitula,peniagona,
officulisfruducorni, aliquandomagnitudin
non ccendencia, qua: du m adhuc viridia funt,
argentspuntlisdiftiaftaefle videntur, fed ma-
tantarem adepta, rubiginiri funt coloris, fe-
menque continent oblongum, flavcfces,adco-
que exile, utfeobis, elignoi vermibusero/b
fponc decidentis, infar fit. Verutn pcculiafe
cihmltis capiculis, utmatura, deorfum tnfle-
dancur, cerratn^ncmucj-oncfcpendent, magna
Naturx providentia, ne femem remerc cfBuat:
namprarterliquorumconfictudincm, apc-
diculojtion ab extrema cufpide,apcrriri &: deli-
fcerc folenr: macurofemincj terniautquater-
ni alij raniuli rubiginco tomenco obdudi cum
fuisfohjs in comae lateribus nafcuntur, fpc-
m flutum in (cquentem annum pollicentes: radix
lignofact,& brevibusfibrisonata.

Tocapianta,pri(crtim Honbusonufta,odo-
rataeft&aroinaticumquidpiam fpirat: tjuarc
mirumnoncft.ijjCcfteMathtolo^cftjbusinij-
ciaturad easacincij prarfervandus,

Nificitur plerifque Silcila: locis, undc nan
m odol iq uoc fti rpes crutas, quar in m c a ra hor-
rulm tranflutarperbienniumduntaxatereve-
runt, fed etiam recncsramosclegantilfiiiiis

floribus&: faofmchi onuftos, ad nos mittcbat anno M. D. LXXVIII. Cl.V.D. Achilles
Cromertis NifTentis, tunc R^o ac Ill^{mo} Epifcupo VratiHaviciiii a fecreris, nunc veroBrun-
nencfisin Moravia'woA/<TOD(:qLiinosecl'am pronofraamicitiapcramanteradmoncbat, ad
montiit in radices aliquot Ce planras invenifle.qux flores fex folijs con fiances, duodenifque
ihinmibus prxdtofcprzferrenc. Inrupcradcbjr,qui jJli dux viz.futlTec, Ven&corcm adfir-
nure, fimiicplantaminriimmismontiunijugisconrpxinc, jamfuisflonbusornaram,
tjuxdigitalcm longitudincmnonexccdec: nominritamaudemabco^nb^ff(&bin[r(T<t/h6c
eft.peregriii.iinipian.ini,quia videlicet apes ejusflortbusdcicflaiULir.

Floret fitb fincin Iunij Si Iulio , femem Augufto & Septembri maturum tft: iniiz-
tentque uucrdu in fcquencem ufque annum capicula , fie ut recenti flore , & frufla
fupciioris anni vacuo , nonaumquam Sc tercij anni tirtus pedicellis, onufti rami
conTpici polTnr.

ROSMARIVVM filveftre vocaturhic frutex M.itthiolo: fed, ut dixi, ad Ledige-
neupcxiii'irferendusvidetur, inquafcentiacd dodiflimusnofterLobelius- ideoquej
l-cdumSilcljacumnuncupavi. SiquisBoemicum (quodin Boemia tette M-itthiolo na-
fcatur) autfblijsRorifmarinicognoniinare malic, a fohorum cum illo (imifinidinc, per
me licet. Cordo hsd ignotunifuihle arbicror,& Planarum Hiftonatlib.i. Chamarpuccn
abcoappell.iri.

Moo dubiumcft, quin^ fiquispericuliimfacrcce.adplcraquemagni ufus futurus fit
liicfrutex. Acquicetifilcicij, tcf(iCromcro,adverrLisart(CutorumconrraLiioncsuti)etri
feliciITi'no expenmenco compererunt,torius planrs dcco&o in folium infufOjCui argri infi-
d^anD)COQUeicmc dio(iibinderi.'peci:o. Idem mliujusotcoftill.iticio Fabiani Ilges Nif'
fem turn l'Inrmacop.ti opera &c diligencia vitrcis organisextra&o, menfe O^olbri anni
M o. LXXXI i. donabac: Annoaicemfubfcquenc, iffenier Fjbianus Ducu Brigeniis
nuncPliirmacopoeus, oleum quod d fummejus fruticisramisflorcntibusexceprarad
me mifit; qu-> 1 oim aJmodum frogrstos iit^flirpis florumque nativum odorem icntcat,
cifdempro.uliubiofacult.itescti4mob]incbir.Nondumtamenqucniapiamperciiulnfc-
cilleintellexi.

I ISDE M. porrAtoctsquibmidLedumcercic.nonnurnquam inventurfrutexquidam
p-alsalctu iini ji^Ki-n^T, tcaulimrububentibusvirgispra-dijus,quandocintc-
Rujorescan .Iu,i irfr(qucr.imulosdivit!uncir,angulis!onpi(qi-icfolijsten)cn:&:confuoor-
zcosvcHciXibusMtilos, fupcrnc vftenzibus, inf<flevcr6 canelcemibus, StS-tlicis
gumiba:

scatili
Ajariepa
tjijiaa.

Rufmarinw
L.M. " "
ckimi
Ctii

Cilicifacit
gumiba:

Rofrminus filveftris



ufm'ig fli.

Spicii «Tlicophr.forti



Spicii «Tlicophr.forti

pumilx anguftifoli x q uz p zulo p ... [ur.valdc umthbusfolijs, tiulhusgr3tio3(ins, fed pctidftcingentis (aporis: fummis ectgm tamis uifidentcapiculacx multis brevibus (quamiscompa&acachryosmodo, c cjuibus Jcic exphcanc aliquot flolculi tenuibus obtonj quepediccliisinbacrencci, quunjufoliolii,ut lvipenons.prxditi, feddiverli colons, rutui; imirum dilucioris live qnodammodo c.imci, quibusxcultis pentagoiia con(pic:uutur cipcuhbrevia, omuio muctone, txili, pilk* l'cenie feminc plena.

EoJcm CLIO iuprior tempore florcr, &: maturum femcn profcrt.

HVNC fub anm M. D. LXXVII. Autum* tium, cSilcfiaa^mc miticbatO- V.Fnderi- TMisScb;zius Dlicis BrigenflS MedicttSjliacinfirripcione, Ros martmu filtf/Irji cZtrxfxoi;, Similem vero ancc mulcos annos Machlinix aluimusinhono; fiifloicntm, nonpiocul Loon arce,inter ra Bantub aCpani xenceueru[uui,accepiuuiJ.

SFEIR, € A THEOPHR, formè. CAP. ill. I.

BR I G A Silcfix ctiam mihi Vietnam miltit clegaatem hunc fruticem idem Sibitius, ipib Verc.anno M. D.LXXXVI. ^uiinmco hortu!orcpt>fitiis, egegeprovenir (tnsbrotolenirit lococullncaram ur faciliLison^rhenctlect) Si fequèc anno fiorcj be temc prolulr.

DVORVM auccm cubttoriim litditf a ngit, cnoibei ramis leuui gp utileo cortice obduchu per qios fine ulioortiinelparfa funcfrequiKu, longiufcula&angufti^ia., falignisproxima , perarubitum (errata, fupcrncdilutioievtnditate przdita, uicracvriutt srugine alperfh, exficcatif (urn quadsBte arra^uu<]!!ecot)un^:tg]f^:^^ Exrcen iraimili.digitilisfeve L>ngitu3mis, (atiscraflaoi fpn * fenint cxiguorum fiorum , uva. i; mqtiduni congefturnqiiiiiiiis(t!lijst6(hruturri; equorum umbilicomuliaftaminulaprodeunt, colons cum t'uo Horc a)bo rubcfccntis five carnci, niillupccijlia!ioiurpr:rdirorum, nifi quilt*fercmf wentcolca\\ illifcvjncfccnt^bus facCedunc ptirtilla p uugona capitula, quxad plenam matuntatcn] pL-rvenicmia tenuiflimm K pnlvcieum quodammodo fenien flavtfechset}undunt.Menft fulio (lorcr, fiib Atiguffi fiiK'in femcn marurefur..

Qui a \ me mitteb.tr "icbizius, pccorjxba ruranadSyimgam refcrru pofFer,ptGprer pentagon J capituJa rorlnnn cjn? Sytinga: albo Horc capiolis hatiti abfamilia, nunora tamen, po'linem po-itis, quam (nien effiinJenria.

Sed ego ad ... cap.xxtii.Hiit.Plant.inrcrri'riiticescjuu ipicam p.uiunt ractnintj commode rrfcn-i pc flf iudico: Sictnlmatt,

Viburnum M r l l i, quod nonnulli arispas clfevolunt.

SALIX ANCVSTIFOLIA PANNONIC*

CAP. LIII.

T)RJETE R. vulgariaSalicisgencrajquorumfupriorPannonianonminiisfcraeftquara A leliqjSqiusadij Pro^i^ix,pecuharsquafJam faiccsincaobfervabjiii.qLiasaiibi vidre nonfrictinSii.

C R. E »c iT ergo pecnliarfflnoddam genu.sjuxtatorrentcs&udislocisjera{roC3iidice,& rain is in mulca BJnuioresfre^Untioresqucramulosdivifispre dicum,quain vulgariseafalix qijianguilisalioquifolijtpnaparte incaniscft: liujusinfperfoljanon dfodofubtusca- nefcunc,fdclictiupersc:*indii'4juadam [amen alba lanugi r4 pO be icuncjT! guff iora [bur, mlongiorcmmtteroncmddjnunc.fTcquentioraquein ramulisnatuuurflorcsalijsgcne- iibusiiimifcs,paindi, /cmcn*]ueminutiilimum,nigriim , candid,! mollii'iuclanugineexce- ptum,levlsaura:arbitno hue IHC Fertur.Solet ctiarkhaxSklix alia i(uadam pccutiari noi4a ceceris ditingui: nan pk'rumque lubrufcncibus^nbil(Li.i[Tt ifibercvms , Laphico cocco fc- tefiinilibus, onerata liable folijconfpjitur . VietoJconens, (lib flibp Vienna in Danu- biumiiflucns.camaximrabundat.

Salix angu- stifolia Panno- nica.

I N infulapohHjDanvibijqii^crfgioncPofonVlt, alriiTimas&ciffnrtlmas falicescon- r,fa m fe- fpicicbam maxiirfVprjgrandium Vt(c> fruttcum copiaonefias. Audio ctiam circa illam ID- "i* m- ftoirurbem6iinCathncisarboribns,&:Coryli.,ro(aiamquefrutiwCRs, vifcum»afci, mini id afHrmanteorn.iri(fimo viro Andrea HL*indIejus urbis Pharmacopseo.

Vngarifaliccinl-itifoliatnaquaticam, quamegoaliquando ElcagnumTlicoplirafticfle On- fuppicatus (urn, Anguillara Silcr l'linij eTc credidit, Dalcchampus platyphyflon leuco- J** phfasoo cognominar,appeltant^ij^r/d, vulgarem lutcarn five pallidam Saarfiz, rubram /,^ Kiz.fiz. fd , amerinamcxquacorbesfiunt, kdgtfx, Gcrtnaniomnescommuiu vocalic, D* ttot/fcifJttflfQOmiaantjGaili SauUeti Sadtu, Irali Saint, Hifpani SA

Widenerbaum/W

SALIX PVMILA.

CAP. t v.

MONTIVM herbofa&apertajugapumias aluntj quattribus gencribus fparferti.01 quasobfervarepotuij dUcrtiuntur.

Salicisputnilxlacifol.gcnus i.&CU,



PRIMVM enfmvirgashabec minimi di- s»Uxp*mi- giricraffitudinc, humitulas, pedales.jnter- 1*14u^8 luti. dumctiam majores,frccqic tibuspt^ditasra- mulis,ciiiL Turfum attolluncur.&l nicer gramin- <icmrgontiinciaSibusferc (ohjsobuti, fu- pernc viridibus & fplendentibus, Ufcmc fub- cinertis&quodamcnodocancici'ntibus, ntm multumabJimilibus Vinsidax it.foliis. Fert eain tencllisramulis flofculonim moucsfi- cas,quibus fucccdum capitub m in niajoic U. larifoliafilice,quarma[uraaprcritiu[ur Augu- flo,mollcinc]; lanuginem fundunt, in qua pu- fillanigragrana latent' radix a^modum crafla est,ro pntz tenuitate crallisque & oblique fparflsnbmfirmjcyj.

Salix pumila lacifolia.

A L T E R V M it miles fund it virgas,Viumi ctiam jaccntcs ,nonnumqium paulo longio- res, nugts (cabro cortice tc&as, &c in ftaquen- tioresramulos d; f; h; i; u; i; a; p; i; e; riorc fotiaambiunr, niagis mucronau, (iipcr- neviridu, liiflrc[pliriidentia,licetu-nui lanugincpubefcanr. Hujusfluruni (pica, live luluscaflialculuseft, illi pxncfamilis quini btfoliafalicnafcicur; radix cum (upen<,rj convenit,ui)6cra(norquodamniO(io vidcu r, now minus quiiin illjdt(perla,virgisi.'tiam,k , cundum radioscaput, interdum fibrasagnt- tibtis,

Salix pumila lacifolia.

TERTIO Ejcncrigracilioresfuntvirga,ut piunmiimpafjles .noiinum quaanlodfai.ta- l d e t * k ' n c j (t H e i t c e r e Qx:unaa\ ll folia, (ativi lini foliorummodo

anifita fupinaparteviwlia.pwtvivciticinercaj&cumnovclladlmc futu.oaitiiiiiocana: invuleanlUvcfcens, exigua, bmvi, moUiqucfpicaancefolianafcitu:, at m o mdi-

H dam dc-



damdeinde hnginemrefolyitur: radix digital is craflitudinis, obtain, nicra, Sc COHM- bus fibris donata est- Crefcit etiatn hoc genus in udis exdvs tilvis infra Frinca ^{torum} ad Merum.

ttixfiimi } * IWVENTVR porr6 in Pannonii Sc Auitriarquibufdajdc«flisc3cJaisfi[<s^ uigi-
 •**"*/"•"•
 nofispacis, Quartumqnoddamgenus, gracilibusSi chftalibus ijterdum virijs uir- gem, non minusqujm m (upciore k*nus, qu&amcdio^Girnrt)uaar:iniuJurum, um!:i* teiuntcxiguasBorusn fpicas,molcsSdincanas,mitmitatc^npappim tehmgincroabcun- tes: foliujpcriotebreviora,anguftiora, fiiperncviiiidu^nfctnceaiiilanuginepubfctinc &fplndeQt: radix fa periore non minus era fla est, &c cnuibus Jtn's prztUta: fL'd&vir- cultafccundumfummuinradicisc*put, quatelluticoktrenc, furr~de tenues & capillatas fibras agunt.

Nec huic diflimilis, paulo tamen latioribus folijs praedita, quae paffim in fabulofis Hollan- diae aggeribus Oceano objectis inter gramina & fpartum, belm aliis noncuparum poffitur.

CHAMIA.

CAP. LVII.

ChmAn I. **S**VH.CVLOSVS ftuccxe(tChamel.r.i,ramispa!maribus, intenduflaminibus, praefec-
hiistnL
 Stitndalidisregionibui:bfolisperpetu6viridibus, Olf i milibus, mimbibus tamen nec incanis, ledviridibus,guftusinitioamari, detndelinguaTcllicamis. flores habet exiguos, pillidulos auc ftavos.tnbus foliolisconll.nres,ex foliorum alisprodcumes .fruSr
 cumtithymali raodo.pclliculi primdm viridi, dcindcper maiuritate mrubr3^wiari&fer- vdi guftusjobdufturn,durum,& ubicxlccatusfucnt,iufcura. Floret <^iJ^ ftuculus Au- juflomaturcicic.

Wald. Nafcitur Valentino SiAragoniim regnotoraque Ciralonia:vrilm multo btev^Wfcfcndidiorquarri inGalliiNarbnneni.CctccMompelianoagrocirca Miravaux,a((fcuni il- li collem, viaque ad Frontignanum urbem, Setio monti, quod vulgo *Cap de Sete* dicitur, pro- ximam, freauencit, ubimuUovcgctior&vittdtorquaminHilpanijs. NuncctiamJici herbatise ftudiofifiii G crmann Si Belgio alimr.

Nomina. Xanthoxa Græcit
 dicicur: apudLatmos GarcumnomenretinciClumctx*. Quidam Hispani
 olivæ* vocanc.Narbonciifis Provincia Garşutt.

Tacitum. DIOSCORIDES auctor est pituitam Stbilcad«Tahcre,inc«apoti]ifmnpum, itaut
 doz

Chamelza tricoctos.



dur Abfihij panes ad imam Chameleimi-
ficcantur, ScHydrotnclieccceptaeincatapo-
tiacogantur: in ventrv; tamen non licjucfiri,
fed quotquor affumpta (iint regcri, Hujus
icemfolijscum melle mtis /ordida ulcra Sc
cruftofa repurgaff. EafiJem pine faculr;uei
IN bint il'i Plimuslib.xxim cap. xv. Nat, Hi-
ftorix; fed iib.x i ti.rap.xxi.Chamel^am cum
Thymelza confundit.

ALIVD porro Chamelarxgenus nobis ex *chymelza*
Italiadefcturabhacplanediverfum. Idrc- "
dortolonefruticat, ramofque iibetadmo-
dumflexibils, tenactcortice, &quidifficil
difruin pipotdl, obdudlos, folia ad mod um
conferca.carnofa, Daphnoidis foliorum foi-
mamimitantia, multotamenminora, &in-
cana lanugine, inferne prarfctim, pubefec-
oa: *Rotes* limul congeltosi quacuor foliolis
confbntes, dilutidimcpurpura/cntes,cxia-
nuginofc eolorifque aigentci calyculis r^ro-
deunccs-. fruclum non ti icocunijUt fuperior,
fedunicum, oblongiufculum, tenui miniara
membranatclum/ucculentacarne.&fcv-
dum nuclum in fecontmenrepxditum.

Eum fruticemdumaxatapndnosvidebain
inhertiset]lcum,birque incerdumcodem an-
no florencem. Vienna:Aullnxaiiquotiesil-
liuslcmcterrr credidj, K natasphniulasdi-
ligenterrummaqueucia conlcrvarevoluijcd
iubfequens hicms (empet corrupic.

THYMELAEA.



CAP. LVII.

FRVTE x cfl Thymelara pollicaris inter- TJ^{ymelaea}
du craflitudinis, cub.talts veroalmudinis*^{ymelaea}
autampSioi, &.inm>lw^iTgasdi(uscubi-
Calcs,pukbras,tenuer-cla5:qaai lepiunt per-
petudvitenciafolia Lini frre Jed nia|orajla-
tiora, nonob:u(acu/f>idcut Chamtla-x, ne-
qucadcofrs-ilia fedniiTcionata, lenta, &C
gummo(uii'tjii'd(iam, iidentihusatterantur
prxbentiaiflorciftTt in extremis virgis copio-
ibs, quut«orfi)iiolisi."on(l.intcs, Olrarfcreeii'
mils,candidov,raccman ^{in timprop} feden-
tes: ^{didde fidum} baccarum myrti intr-
dummagnitudinc, paulo ldngiorecm, ntitio
viridcm.poftcaacor.illii modorubrnoi, c.irne
fucct plenaCraforuro inftar, lub quihtec
tintcumfemen, nigra frat;il]quepc]!Cula,a]-
bam&fervidi faporis mcdullam obvolvcs:
radixlignofact&dura, in tnetlis planm ra-
phani modocfFormata, mflbcorticc tclla,
(ed, tjucmadmodumtotaplanta^cntoaiart-
mocium tenaci.

Nafciturpertotam Hifpamam loci? afpc-j?«4^.
riSj&plcrifqui NarbontlisGallix.F]oret au-
tem Iulio, actotononnumquam Autumno,
femen^ue Titbindc profert.

GRAECI 5xiftuA*af vocinr,nonni]]lietianj
ymelaea, tclla Diofcoride, *ymelaea*, <iytti, *M*
ymelaea, t, xti&por (wmctficodemcapite folia
peculiariter *ymelaea* appellari dicat) Eubtren-
tes *ymelaea*, alij *ymelaea*. Latini Thymelaza appel-
Viuoncm i cunc nt • H tftianv I tjt v t fc s t
Hi vs

is mense Octobri & Novi; m bri avicu li i plerum e] j us fructus Græcis miltare
jMww^Latinis Granutcnidtl Impecutrnrvocetiiciir. Hallucinancureuim, inquit Dio-
icordes dicitur Scaifumt o Cmel e l ianf a l exi mant.

Yaculant.

FOLIA permeflts colligidebentji Siiit.-catajnumbraretondi. auflorepi'orcondc: & ii
dareUcibir, anteati. mJi&: uc[vicximi. Purgantau'cni^acjuotaduciinc/iacetabulimen-
(uravirtodilutomaccenturj moderatiusauton, addiialenrecofla, aurcontntisolenbus.
Seminw medulla, [> tlem, pituitam, & aquas per jnfrnadctrahit/ivigintigtationinipa] fin-
terna bib;itur: vcrtim faucesaduuit. itaque cum finna aucpolenta. aut in **urxactoo** dan dg-
bet, aut melle co a b d ^voqiri ucrcuaccitadapf lio b videre l

SANAMUNDA HISPAWICA.

CAP. LVJII.

SUPERIORIS MONTIS itdc<5jungi poflccxiftimoduofuffruticum genera, qua* S. mamiuic
per Hilpaniisobkrvabaro. (jmbusaddiporell6i tern uinillbijutk.
Sanamunda i. Satiarouada \



Camelaria
L.

PRiMvs Suffrurcxmullriscubiralibusrarnisabeadmradicefi-uticat.ob/cquiofis^exi-
bilibus, corticccxtertorenigricecncce obduais, alium interiorem Itntum & intenmariJa ft
dividentem com pte^oljs Camelar. rjuiramenbruv Lotibii Sj Carno'
iisqucad Tithymalum paralumni. aut Mymim proximdaccdentibus, **fed aliquaruluro hir-**
futis. urcaranmlosconfemm Sekne quadam **diftributis, euma) Ofii ii mordcantur,** amanS
ittitiOdcinde acribus & **adurenribusi Bora inter** folia naltuntur Olcae Umils, oblungi, in
c | i u t o l a p e r c x l : r e m m d i v i a l u t e i : { r u a u s , u t c x r e l a ; u a c c c i) T I I ^ f t
fed nigrcanus cotovis'. radix r i f l a ^ l i ^ n o f a .

• **Frcqucmctignis Granattfni & Valeotij, JO,** in dpricis & Solc illuftratislocis: Verno
tcMipore fluret. licn-' ert, Martio & April t.

1 s T i c ab Herba fi > , hoc cft, ijsqui Stirpium norriamfc habcreprefkentur, Sanatnun*
da vocatur, a mficis VLO ei > erd4-ir*z., obp'irgat). di videlicet taculutem, cujuscauiaruftifi*
illwscigioi. Uniajjiio in ufa est.

Sanamunda
m.

ALTER cubi Ciliscitiamalticudinisftut<cft.ramisIenti!, fltxibi [ibui, carnofo & : denro
corticeintcais, qui (fubl]racxteriorccure) pertotani plantam. rrxitruin circa iadicen>, U-
uiaucCannabismodDinfiiadiuicipoKft: (upcuwesumultulideofdkUD), confcrtomO>i
lanuginolorum. & vclutitomentoquodamobjitorutnfoliorumcoiiiiimnaiium **fupenofi**
mmoniin. & mucroii Korumjjiinomihihlgu Qusicddcindens & lJlrhC
coma havelicentum Botcalorum Qicx l i u l u t a v u n c r w a t o b o l e : r a d i x c r a f f a & l i g n o f a
fupenofi famlis est.

Irtiusfrudumobfeivarectum nonponii.qttandoquidem F(bruarioflornrctnirvenic-
bam petrofo Si fulcrofo loco, maritiniisBartie*, interCalpcn 6c Eiltpona, montibusque
Graniwproximis.

GKAMATLNSIBVS MauritanisSjnamundavocatur, apudquojpurgandorumcorporutn
gririifreqLicnrvfiirpacur. Drachmxnim ponderccumdeco&o Cicerum (umpra , nvri-
ficcpurgarpennfenora. CircaCalpen, ubivulgo^wr/M/^appellaiur, nullusilliusiui,
prxtcnjiura al exaltac iendas tornaccs.

Sanamunda in.



T U T I V S duos fupriorismagnitudi-^{^m}
nccxcedit, candidionbusidmultotentioribus m.
virgis, quatuin cortex fjpra moJuni Icius
eft \$c frangt contumax: extremi ramuli fre-
quences & ferè omnino tomeniofi , procum-
bciHenicomamhabent.&fiequenubusfblio-
liobfici func. carnohis,parvis, Sempervivo mi-
noriDjofcorJdjs, quod nonnullh, IJcL'brani
vocant, valdefitnilibas, urentiscttamfaculta-
tis; floresfuperioribusfimilesinrcrdum liciba-
cci funt, aliquando pallentes. Sed nequt iftius
fmSum obiervare ucuit; floret Aicem cum
fuprioribus.

Invenitur hoc genus roto tlo tnflu marici-
no Mcridicibj<fdo, qui ab Hciculcofrer.ojad
PyrenjosufLjuccurrir.

Qvo pormnominevulgari appcllctur, ig-
noro. SimLlemauccmfruttccmicium adnos
aliquando miferunt C- V. Alfonfus Pantius
Medictis Sc Profeflbr Ferraticnfis piarmenio-
rijr,fl(rampli(IJmusIacobusAnti>niusCoriu{us
Paiavimis patricius, lic quidem Ecicar ALxan-
drina: nomine.ille vero Cncari.

Vcriim Cnewu-nc.an alio nomine, Veto-
rib us defcripte fine hx ftirpes, alijs ludican-
dum relinquo. Cercum tamen <(t,Thymc-
Ixx congenres cfle, Sc ijlicm idu du bar
pollere.

CRENAVUM MATTHIOLI.

C A P. L I X.

ILL is fubijciendumexiftimavielegancemhuncfufFruti<m,cui inulti funt rami gracil.
Ics, flexibiles.lenti, furculooi, ab jpfaprotinuscllureemergancs&Jiunudifflii:"fo[iaⁱ-*
nulloordLnedirpofiaiamulosambiunt, viridia, cu[anea, ThyiiJc]xafvera-proxima,ii]grati
primumjdciiidcamar! fapo'is,nullaautpcrextgua(quantumquidcmguflantidrprelxnt:c-
relicuitucrimotiiaprarilira: Hm.i in fummisfurail^fex^eptLn^autplurts,conferrri,qua-
tuorfoliohscoti(lantes,exrubropurpurafecmes.Cenrauri iiiLKerisflormnpenczmuli ,in-
grati ctiam&amarifaporis.arpcfllu tamen pul<.licrnni, itque odoraci,capiit ffi Juuiiusr.a-
ribusadinoveantur;centantes: Jjsfucceditruclusexiguu'.jThymcliarfruluiliauddiflimi-
lis.nonrubcrquidem. fcdcandidus, oblongmfculus, femcncontinensincertamcmbrailia
teftum,rotundum,Thymc!xa: grano pat: radnt longa,minimi dtgiti ut plumnum craffitu-
dine, inccrdumnigricans, majore vcr6cxparte flavelcens, knta. fupcmaitnonnum-
^uamgraciliorjUiiocramiflexibiles&hunndifperfierncrguiH, Si'fubiide, /ccundiimaU-
tum c jva,(atis craffas fibra<i flavtflxntes agunt.

Provenit in mulis montibus Vienni vtcinis tanta abundantia, ut rufficac mulierfjddum
floribusabundat, multosejus manipulos in forum venals adferant, cumalijsvarjgc-ncri^
floribus.cxomandonim tncliniorumgratia. Nafciiurectiam in Pannomarfilvisediiorc lo.
colitis ultra flumenRabum five Arabonem.Fccquensctiamcreffitquibufdam ficcioribus
pratisFrancofortoad Mcrnum vicinis, prrfertiniivilvaquadaniquerrubusconfita.circtter
miliareinfra eamurbem,ad fimftiam fluminis, intertricas,ubiitfan)candidisctiaiflo-
nbus vanantem confpiciebam, cujus cciam manipulos rufficx mulieres inforovtnales
proponunt.

Apud plerumquC fletrcrc folct, nonnumquam ctiam Maio • fruttus maturus eft lunio.
A'leoautru fcrf^nduscdhLcfurTrutcx.ut farpnumcrdtercodemanno florcat.novis Ho-
iibusfemcnferTiperconfeqtiientibus.quod probe maiurum.biscodem anno dcum cade m-
que planta colligere memiai Vienni AulHix.

Cnestum Matthioli.

Cnestum Matthioli.



Cnestum Matthioli.

Hippoglossum Valentinum,

Hippoglossum Valentinum.



Hippoglossum Valentinum.

WATHIOLVS Comenarijs in Diofe
 cap. de Cmamonio hunc [tffruticem pro
 Cncwro alboTheoptuasti propomc.Ciim v>>
 lo.qualciitThcoplir.Cncarum.cojoslib.vi.
 cap. i].Hift.Plant.duogcnera facie, album iC
 nigrum, difficulrerjudiciri peilic, cur Imic
 ftirpi Cneairi nornci accomniolarevolucrit,
 muki mirantut. Pofrema autemditionc
 cap.de Tji ymclxa lib. 1 > 11 .aliud nobisThco-
 phr. Cne&ron adfert, nullis, utipfiUsverbft
 urar.dcficicncibui notis.Scd ciim nudam tan-
 tiim imagine addtio Cnewri nomine noftrii
 ocuiis fubijciai.iHmtquehiftonam plane fub-
 icit,fpud iG fiffidohab uen-
 mus,nt:ino,ucopinor,vit]o veiter. Diofe&C
 Gal, XZnevron, adThymclxam &; Chamc-
 learj referendum tflcenfentdochflimiqui-
 que.Petitilimu'iAnguillaraopinicinumliD.i.
 cap.de Caffia, Cncwrum utrumque Theoph,
 arbitrarefle noftLJin Roremmarinum co-
 lorurium & L.ivendulam.&Gazam nnendo-
 /uni exemplar (ecucum,o Ji/ufA<?ooff^o, pio
 fXa'De legiffc, propccreanigri;m odoiccare-
 reiiiterpretacum cire.CujusrcicautTanimfi-
 ce ilium exagitac Matthiolus. One mcus
 Tiicopiu.i(h Gricuscodcx qui Venetijs an-
 no M. u.Lii.Aldinis rypiscuiuscft,dift«clii-
 bet o o i ^uA<c tveffAos.

Cteriiin mfi in Iucpl<int3,acrimonia,clux
 tjuidem fenfu pctcipi poffic, abcfct, adThy-
 raelxx gencra^ut ipfi cogencres ftirpcs (qua-
 les mulctis inveniri paulo ante monuimuj)
 liunc ruffruticem nferendum eflc ceticfrem.
 Vulgaremautem appellatsoncm curapudru-
 {hcasmultetculasnuUam invencrit, (insini-
 rari nequco, quandoquidem Illius flores ipfis
 adco familiares tint, & in delicijs. Nonnulli
 tamen ruflici *St(n wctf) hoc efl, pccrxait
 rufuhrn vocanc.

Quibus veio ficulnatibus ptxdita fit hzc
 plan ta, Qhilli adliuc incomperium.

HIPPOCLASSVM VAHEHTIKVM.

CAT. LX.

SV T J I V T E X hicpotius,quJm herba,
 cubttili aut ampliote altitudine afiurgit,
 multis ramis lignofis,duris, fragilibus tamen,
 & nigricantibus ^qritu q itca^nos x tuber-
 culis interdHm multaconfertiro &: fiuiul yaa-
 cla folia nafcunturj in tencrionbus vcrora-
 mulis, qui plerumq; rubefcunt, rarioia, Myr-
 ttfere, longiufcula, ex cirulco nigricantu,
 carnora,nigricante pedicu(o,icuco mucrone,
 excrema:atnancudinis: (uramisramulisfin-
 gularcsinhacrenc calices fiuamatim compa-
 cii.interiorisorbisfloruiicabiofxjaicMcjr-
 fiisDiaboli raagmrudinc, quiflorem conti-
 nent villofum Sd lanugmouim, ex c*rukQ
 candicantem in meditrlliOjat in ambiru ora-
 ninocariulcum: (emen ifrioro,nam floren-
 tem dantaxat con(piticb.ini: radix dura efl
 fiilignofa.

"EcbMMio mtate floubus onuttum hunc fufrutic m invenitb im in Bxi'vc* roVnudmi'

bu cir.

i bus circa AnrequeramjMarriourcm, inter VeIez&rubio&Lorca,quarEliociota vetcribusdicicuriMurcianiregai urbirSjtocoque Valentino regno.

BAETici, Ceroni/ade{rd*tej,hocel\,coron\la.mt'ntun\five monachorum.quaficorum orbicularcmtonfuramflu rercferentem ,&zjttmpri t*x*ta, quiatemperai'ida&exfucca videtur,appelianian.Murciainver6S<: Valenttni vulgarioce/>*/vWj.

NonnuJli Valentinz academic ProferTbres Htpogloffum efTecenfcbant; fed nihil curn HippogloiToDiaiWididelcnppto commune habet, nifi quis forte ob foiorumejuscum R.u(cirolijsafKnitar.emei hoc iomendonandumpiKet,qu:etamen in hocfrucircircapediculum oblangiora 3c anguftiora funt:pra;trca dilliniile utriufque faculrates.

Alij Alypumnominaremalunt: fedciim planeandafit &fucciexpcrs, «on video<juaratione Tuam fententiara ftabilicc pofiint.

CETERVM circunforanci Batcicarmedicicjusdccofluin proptnaredicunturijsquiGalUCA fcabie five Vencicalue laboranc,non fine niagno (ut aiuncj luccd'u.

CASIA Q^VOKVHDAM.

CAP. IXr.



CVBTALis est hare planta, frucicofa, cenes virgasfrens.virelcentes,lentas,interdum ctiam nigricantes,prariernm dum novellx fiint: & in his folia Lini rariis per ranios fparfa, amari (aporis: flores aliquot ex luteovirelcntes &palliduli,muieoti, corniflorumxnfcli, adflrilunxfacultatis, ineodem pediculocongcfli inafcuiKiir:fru&tusdcjndcquahsMyrti,i[iitiovt-ridis, ubi maturuiciuber, Coratlijaut A(par.r:i maturo t'ruQui ijmilis, fubdulcis, lentusquc,tandemnonnihilacrimonixcfes^fcojiuusnucleo,qui medullam cdtiactalbam^dulccio. Radice nititur dura & ligno/a.Florft a;ftaEC,frudus O&tobri,velctiam ;ince macurlecir.

VarijsHifpanix lucis crddt iciundiim viai: frecquentidimeautem GraiuEfiili &L. Valentino rcgno. Mompcliauo eijam agro nhm obfervarc menmii, ad Ingreffuoi Pcaul, psgiad flagnum Volcarum fiti, dcinde (ilvulaEgrcmonc Lo.nobio proxinia, in qua muljr elcgai ires (Virps.

Eo quofitn: verlabartempore.a ftudiolispro Oliindc lubeb^cur: fubfcquentibui annit Cafeam appcllaremalucrunt, quodjion:rnetia[n nonnullisHifpani-elocis obciuct. DoftilJuiiuS Pla^a Medic us & Pioflflbr Valenunus Plintj Polygonum cflc cxiftimabat: veriim ad quod Polygoni ab iplb JctLripn genus rcfert poflk, non video. Hilpanorum vulgus Badtysz, &: victna loca Beticæ, qua Lufitanix conjungitur, incolenz, quardaleo vernacula liguappdlar.

Si quis cum Ofynde Pliniodercripcaconferer, aliquotnotajcommuneshabcredeprchendtt: mhilcamen ftatucre volo. Certe wia/pos Thcopiua fh. qucm CaihrnabHyginovorari Pliniusradit,cujufqucipfclib, xxr. cap. ix-Nat. HiiVcxThcophrafto duo genera conftitui:,cflc non potcfl. Sedncqucciam Virgil'i Caha, planta odorata,cujus in Bucolicis & Georgicis meminit,

VVA WARINA VVLCARIS.

CAP. LXXI.

H V i v s cfuogenerapcr Hifpanusrai hifuntobfervata, foladuntaxacmagnitudine in-terfc differentia.

PMMVM humanainterdumalcitiidincfrucicat, Spartij,quodHirpani>#faw,|vocant, ttiado, brachialisrafklLidinisaliquandoftipitc.oblongisramis, nigricantibus,<]tiidcndc multas virgulas fcruntpedales,tentics, multis ititernodijsdifiinfrs, ucEquifccum ferc, propndentis.lincfolijs.adirjtuni iidtriiigentisfapotis: florem (ccundum mternoJia confer- tiiiii.mimitum.&inlcofini.cornrloribusnoiiablililem.pallidumidcincdfiictumexi- guis mons Jimilem (pc mini quidem rctulcrunt incolar, mm florencein duntax«Tidcbam) rubentemfiicculcon ad uf r c f i m n i a i i / ut uris nigra, ut- tusalbairadixduujgnolaqucft.

ALTEHV M liumilccderacilibut/armctofis&frcqientibusramulisfruticoruni.qui ut,humi fparfa & profusa coma, sine folijs, ut Primum, Pliq' mact, nec

Polygonum n n. Plinij majui.

Polygonum iiji. Plinij minor.



nec minus adstringens: flores sunt muscosi palliduli coram floribus...

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw minor: long*

Notata:

ubi plurima nascitur, nuf

Alteram frequen

ferè Hispaniæ med itullio

antea nulqun

& ipsum mar

Notata:

Topon.

Androsac

Brizog

Crotoc

geil.

HISPANI

de mar, hoc est, uiam marinam appellant.

Cum istuc vivebam, peritiores pumilium genus ad

notæ non inepte huic plantæ quadrant.

Postea nonnulli ad Androsacem retulerunt, Bello-

niium sequenti, qui Observation. lib. III. cap. XII. de Androsac

Periculosis Anguillara, Crototis, cujus Nicandri inter

hanc, ni fallor, describit opinione duodecima. Crescit, inquit, ad flumen Sebenicum in Dal-

matia humilis frutex, Pino valde similis, frequen-

tius) Equiseto minori similia sunt, ejus flos rufesce

inde in fructum extuberat rotundum Ceraso m

inorem, mifuum

contrahentem, qui etiam edi possit. Nascitur locis asperis, montosis & saxosis, &c.

MVLXIS verò notis, hujus primum gen

dtate mihi videtur, quod his verbis describit

pellitur, pene arboris modo frutex, radice

num palmorum, nigris geniculorum ternis quaternisve articulis. Huic quoque spissandi na-

tura, sapor mali cotonei.

Deinde quas Dioscorides Polygono tribuit facultates, adhuc hodie apud ejus regionis,

tibi hic frutex nascitur, incolas, in usu sunt: illius enim decoctum penis & vesicæ ulceribus

conferre astringit.

Possit tamen

in hæc verba memi

aut alterum granum mi

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

aut alterum granum mi

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

Epibra

Canon

Anabasi

ad Epibranfi) rfitan<iaaj<fcri

ad Epibranfi) rfitan<iaaj<fcri

ad Epibranfi) rfitan<iaaj<fcri

ad Epibranfi) rfitan<iaaj<fcri

ad Epibranfi) rfitan<iaaj<fcri

ad Epibranfi) rfitan<iaaj<fcri

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

«»<» brequfcipens Abii. denova sprctiubir d s Sw

junei ^cniculaci, radicc pallida. Dat.ir ex vino ntgro auflero trita ad ruflnn, fuffina, tormina, &c.

• Haac Bell'oiiiislib.i.& in.Obfervationurriatboresconrcnderedit,.cujus&fructlmm AnrtroiaccsfimilctrijTubrum cdiflb rcferr.

Ego vero hancpLim-am (blam feicnafcentem, &fefe mftinentem, ncc ulloadrtiiiiiculo cgcmm temper uiuicniebarn. j

ANAGYRIS

CAP. LXIII.



TAMETS I nonnulli plura Anagyris gene- ra (cvidifTe referent: ego umcum legiti- mum, quale videlicet a VctLnbusdetricipcum cljtantum oblrv.iOc ingenue profiteor.

ARBVSCVLA aucem est hutnanam alti- tudinem non multum (uperans,calidionbus prx(rrimrcgionibus(nam alibi duorumctiam. liominum mugniaidincm xqoancem conlpe- 3ti) multis riinisfruticora,coiticeexviridini- gricante obfucto, e quibus ramuli profiunt. Duffi folijs trifolij hti mxnianthis,hoc cfi, tei- nis (imui jtindis, ll'd (uperne dtluoM virfcen- tibus, a versa aucem pane inc.tnis, nt viucus fo- lia ,odor is, ur (patuljc fixcidx vulgaris, (quam nonnulli Xynn clfcvoluntj adco grav & te- tri,m tranicuntibus fuo factarc caputoffendat. Ex foliorum fedibus Sc alis, binijternijaut qiu- [crniadfumum rloresiimul pro<icutoblon- gi ,quinquefolijs con(fcinc.«,geni/r;c fereauC CyniiflorummodOjfedauorum fupremum, quodqacrcliqoa integit, Dreviuseft,S&mnii- me.ut in illiSjrcrlcxum, colons iitcnfiusaurci, reliqms p.illcfccncibus: filiqua: dcinde fucc- dunt digital is longicudinis,pollicaris vero laci- cudinis.carnljgmcK jtnquibusrernaautqua- ternafemina, oonnurnquam plura, (atisma- gna.txfgiisplufiolisTqualiajrcnis forma, qua iniEiociiicancdcindcpurpuraicntemcolo- reni contrabunr, tandem, cunipJcnemarjra, excxruK-ojiigncant: ucaptiinmcDiofcoruit-s TidMiAd dixent: nam aicodem ftudlu non ex-

acniaturorrcsdin^renrescoloresrubindeconfbiciunrur.

Primiin omnium limicfruticemnarccnctn invenicbam primoab Archcllapide.Cxo- quodaucollc3quidi(.iturD.Antonij nioncntcCV.codcmqucprimarioMumpelianx cademiseprofcllbrc D GuilclmoRondclccio. Deindcfrequentcm circa HifppJimtotius LTK-a-Emporiuincicberrimum^umctiamadMundain, Mahcam&Vak'ntiam.

Floret !flicl,tnjano& Fcbruario^ftatcfemenma^refcit. Hujusponoligni matrix five or,nonn!gricat,(ci,!nonnihipotiuspallefcit.

AWjf/w^ajairajtfo;, a nonniillis etiamaJtciErosGrscappellatur, ccfte DiofcorideS; Plinio, L-inmsAtugyrifj H;rbanoiufl!vulg6Fabiinvcrfa. VulgarenomenHiii^iiii*-"n> noninteU xi.

TENEKA foliatriira Dtorcortdsrefcrtillicutumoresreprimerej&fipan:usli*rcat,& fteunda:mcii[csqi^c niorentiir,iJracl)mapondrcbibiinpaio:fic&:lulpiriorisdan,&CO11- tracapitisdolorfsi[ivirio:difHculrpanentibusadaJligari,iuurapanuftatimauferantur. Plinms addit, in vino veterc ad plialangiorum morfus dan.Radios ttn tex, ucricuc, cong- queDdisdilcur.ictidiqjadhtbetur:&:icmnn]anduca[um, .omitioncivchenicmrcier.

CYTISVS.

CAP. . HI MI.

f \ tanraopinionumvan'etatedcCyEifo.Iicetjudicare difficile Tic, qmslegitinmsCytirus Cytifm -Ivcccnbusdcriptus .peritioresexi(timantcumc(requeraC. V. BartliolomasusMaran- ^tpp onit. CCjjij i^f^i b o, i h c r c a p o i t c quicb ofruti- ccs,,id Cytiii genera ft Jam referri cat.

PRTOR in^rtir,i]u[Hifcul.rmagiiitudn]ccxercir,diroftipicc,cwjum3ctriarl,ivrcit, f&dcor fivep.ns interior nigrcit; isantenicumniajonbiis ramis& virgultis cindiL.uite corticcobducitur;tencllira^Hi]i toci vijlov)b(iti:fi)lu!iumcro(aiaiiosambmnt, ternauni p-diculo inlwrcnria Medici mwdMilutoris viridicatis/apois vindium Icgumtiitn.anjt-

Cycifus L

Cyitfus it



Cyitfus m.



ri tamen: aliquot flores extrcen is ram **ulis qnifi** (p f it , fa G i i r { : i o f j m l e s i m n o - ics, l u t c i , n o n n i l i L l o d o r a c i : d e i n d l o b i G e n i - f t x p a r e s , o b l o n g i , a l p e n t a m e n & J u r f u t i , i n q u o b i g u o m f e m e n , t o m i u d u f o , l u g i - c a n s , G e m f l a m i n u s : r a d i x l i g n o f a j & i n d i u c r - f a t e n d e n s .

ALTER, duorum cubicorum duntaxa: altitu- de s, frucicoftis, virg. is proferr Candidas oniro- cenus Jramofas, tohaiupunoriiimiliajter- na fcmpr ex imopcdiculo **natccacu**, minora, profufincana, numquam expanla, (cd (coipr quali complicara, prominentc dorfo, **impctei** amara: flores, nt in altero, extretnisramisinri- dent ftiojrioribus forma fimilcs, (cd inteniior &: plancaireus color: filiquexciam longiu fcu- lx, arpera:, expurpuranigrccfcntes, mucronc deorfum inflcxo: (emen paulomsjuseftj & fub- ni^rius al[cro, radix fitniis.

Vcerq necrcfcit S;ilm. incicnfiagro, & alij uciufq; Caftelli Jocis (ecundiini publicasvias- Flortni lunio/cmen proferunt Julio & c Augu- flo Seminibus indL; ad amices in Belgium mif- lis nonmilli in fuifhortis alucrunr, ubitongd **majotes** adoleverunt: fed lubicquutis polle* Ecigicismocibiis, ciinnccglifjercitur, & inter- mkrccrctUL-ncccfiariif cura, prxfertini hicmali tempore, uttunc mense d' r m l o c c i t .

TER: TVS hum an am aritodinem atmgif, **vitgas6ae** liabct lont: is, **non admodum frutU** cDfa?. Deque knM^nijrrrcntecortictobduftai; **foliairifolijautmediae**, tcma fiinul uni ioloinhwenria, (upmapartcvindia, pronaverofubrufaLimginc hifuta, legumimim aman licuUiaponsjHorcicxaJaruniinurclKHiiis m3JO!ts, cuniGeniftxmajoribiis floiibn* comparand),

Cyitfus m.

Cyitfus m.

Cyitfus m.

Cycifos mi.

Cy« fus v,



ampanndi, anreoco lorefu! gents. Hnius retncnobfervare non licuir, c:um folummodd
*im<: tium radiccscircaC>ipcn&: Barticimantirnis Februarin florentem invenerim.

Di'orum fuperioru unriu ULJiii vulgarcnomcnimellefci, ift verd ab incolis *Efidbon* & *
Kin . . .

QVARTY, cubitales & rmi. iores liabervirg. islenbs. vimincas. in muttas alajdivifa?, qti«
ii ii Si fine ordin cambiunt remaperpctuo foliacidempediculo inhzria^ india, emt-
tiorerjmb. ini Amifculo [apore prxdw: luminac virgac in oblongjm fpicam florum,
quatuor foliolo constantium delinunt, qui pili florum formam xmulatur, longe tamen mi-
fl" res fiiiit. l'ireicolom, fiiav'sqin: odoris & nic! cum^ui. Wam Ipirarms ill quardcindefuc-
ednnt] irucplam cx'>uuin Hjvcfcnsfcmcncontintntes, radix dura, Jgnof^longajra-
ionbus fibris lonar. a til.

O)pioscnafe-curnon mod6 in omnibus (ilvis Viennenf; sagfi, & fecundufnvias, fed pie-
fifque Partnonia; li) cii, & in ea Aufn* irift' rioris partc quje vereri circumfcriptione Paniio-
fii-en Qncnrt' inctiir. Cre£ it & iii Hercyniar lilva-p. trtcqux Boeniiadi uiidr qucingit, vbi
florcncincipit fibrii flunij^ Augullo pler Ljniqi KCclT. reit. lt: acin Aultria & Panuo-
^iamacuniis.

CVBITALK? nonnumquam funt Quintovirg*, ref5IT, tettites, vimincar8ir lenrat: qu3tab *Cfiif*
•nfirmoad fuininuni ufijuce xornanc foliaternatti. ini um ped culo Lnhatencia, proximo
^rcfipro rrecliiu liaj fed. inguftjorj. omrinio incana. amjrtgufius, qar tncapinguc flvi-
dentur: ex il m t c r J fotionim finuhmramuli prodcunr, fimilibuifolijs, Icdmino-
ribus obtiti ferentes in fummo qui r f l l i o i d r e k l e i p t j t o n (i s h e r b ?) (q u a m a p i g f a n
didus filiquis nonnulli filiquofam cognominant) floribmpirtimils, aurcitolorrs, odoris
non experies: dcn' lecxfolliculis filiquas obloii giufculas^ Iiius. liirluta^ omninoyar quejii
his labruflau i ll'men pl.inum, nonnLimqujmtumiii* ufculuni Arroiuridiufculucn, durum,
quod maturi- tit J(; [ii (LL-ncibuirili (juiscxcidi C: uidx durac (l & lig. olariigr Lcans **fumma**
klute/parft

Frr. jii -mest com Vicnn^ fl. igro. prarfcm supra Plnflinorum fjbriacirt, Si mulctis ails *Satin*.
Un /ufHxfuperiorti Sfi affriaris» cana Moravix & Pannonix Iocnandis' proprcvias.

Floret lulio. S; riibiii J' i) i A' iriimimm ntqaei C- men Tub Augufttincm, j C i c p t m b r i n i i -
refciftedyrcmicyfii ludcroientbmcftvaldeobDOxiuin

Fastispeneronujul rucis inpc's rugaxi cui cuu, quam plerique legitimain
tXoCcorid Anii ofaccii c Cfjextlli raant, obiiqi(*urcnL*



Cytifus
quasi alba.

Cytifus vii.

Natalis.

Cytifus vii.



^ VT > z. Ejus alitid genus est mulrd majus, CTiffio-
ribas virgis ad— odumUirfucis.re<2tis,fuljsdu-
plo amplioribus, fiiiqliisfeulobis tntjonbus:
iplj etiam florescolorc magis aureo rutiht.

luxraiepejin PannoniaSi Auftria natitur,
fi;dr-iriiiisc(t,& miniisobvium fupcnorellii
criam icinen vermiculis obnoxium.

S E x T v s pedalibus, raro cubitalibusaffor-
git ramulis, tenuibus, omnino incanis: quoc t x-

ornanternaftmperfolia, brevi pediculo in-
pfffl:O Jixrentia, quorum medium duflotongtusft

I A _ jeliqiiLSjcincrci& canfcenriscoloris, adfrin-
genris vco & lugium c'ficancis faporis; ra-

U ^ inufeLili tVic jbi;noadrummumper fingulo-
riiiiiifoliorurri txortus, flonbus aurco colore
fufilgpribus, jucundis odoris, anallu tuar, bim

uiternisimulnafcentibuscxmolJit puadam,
&candida lamigmc hittuta va^inula, fimilis
rum iuperionbus forma:, (cdminotibus. Sc-

niennonubiirvavi,
Invctiuur varijs Hifpanix locis, pntfertif¹¹

Baf id fednufquamabiindaatiorem vidcba¹¹
cjuhm Valentino regno,ubi pluriniuscjusul¹¹J
eft: nam illiar ramis nudis & a suis folijs liberis
fu ra tegetes, ab his qui bombyces alunt, spar-

p fatum mori foli - bombyces, serices sua
fisjam
ftimtnahis raroist dvolvuntjCiic dcindr i w¹¹
licrculis&r pucris/xplicantur. Valci;t>ni^S^

Ai 1 q_voT Jiabet .S-rtimus ramos huWJ
fu prfc.renucsJenios.fradiuconej

cts^ quinnllisautcertrariJlimisfolijsItattobJiti, multosautcmexlarenbusramitloi
ictu D^tencUoSjhiifutoSj in quibuifolia longii pediculis mxa, Kraoicmpernuni

pro-
icio, bre-
viora

inQuincogenere, clacodorfo, fupemcviandia, infcncanalanugtnc pube- fcenna.amariulcuti fapons,& hcrbacci odor is: ex alarum in extremis ramulis, & per cotoi interdum ranmlosparfarum nnu prodeunterniaurquaterni fn?uljun&i .naniiumquam l'ingi ilares floresj Quintt Hori forma fim ileslutei colons, qui tamen dum marcefcereinci- nunt,auieumco lorc made6^turumconrrahunr,utpurpurafcercvidcantur: folliculi,un- oenorcsemrgijik,paHcnr&!anuginepubefcunt;uiiqua: plans SihirfutxTubfu /cum exi- guum (rmen continent: radix durajlignola, juxcaqaatn rainiper terrain fparii fubinde fit bras agunt.

Sponteprovenitfilvulaqmdamad Lachn pagumprimoab urbe Viennamiliari, & ple- 224104 rifquealijlociurbivicinis :rcleirciriarainutriufque Pannonixfilvis, &in Interamm ul- tra Dravmfl flumen. Matuniis floret fuprioribusPannonicis, Waiovidelicet,nonnum- quamctiam Apnli.fcnovosinccidum ex ramulis Bores per toratndeindcactatcmprofctr. a. S E D & liujus generis alia fpecics invenitur pedalibus virgiSjtenuibus.vindibus/upinis &humit'Liis,quasainbiuncfitniliafolia; floresetiam paresxtreuiisvirgisquini, feni, aut pturcs dm ul congefti innafcuntur,nulli aucem per virgas fpari ut in fuperiore. fihqus& fe- minanon dLffcrunt: viigarum^oliorumqiparsinferior&iiliquac molli hiriutiapubefcunt, Hunv in folis Pannontxfilvis Maio menlc florenteminvenicbam.

Sc 10 &aliosaliquotfrutices Cytidnomineproponii quia verodiligentcrabalijsdc- fcripn func, lic fubijeidos non xfitnavi, fed cos tannim quosa nemic antcobfervatos, & Cyrii nomine compredicndi po/Tcputavi. C^uarti camen hifioriam nofterLobehi^p adVLfarijs prOilidiflc videtur.

PURRO CytififQliarefrigerarc,rumoresinrerinitiadifcutereiGcumpaiierirailinan- uridccoilumpotuurmamcKjrc.DiofconJescribir.Columellalib.v, cap.ulcimo, Plinius lib XIII cap.xiu u.attduniex Ariftoniacho Atlicicnii.nutricibusindefci^u liclisaridurn &vi aquadccoctum,potui cum vino dari: firmiores, celloresqne infantes neri: &aliaple- taque ad Cytifi culturam,& pecorum ex eopabulum.peruncia.

COLVTEA SCORPIOEIDES.

CAP. LXV.

CYT I s o cognara:fbnt ex ftirpesquas hoc & proximc (equentecapire dcfcibiianijidco* queponcCyuiigjncracullocandascITecxiUiinavi.

Colutea fcorpoidesLelacior

Colutea fcorpoidesl.hmnilior.



M v L T A s Prior exunaradice fert bicubitalcs.interdum & tricubitales virgas, gratic% OlmMfl*: (atisumen firman in frequenter? raroos drifts: foliaatjtareptem auc novem unic(fla:in- />»*) i*** h Jff fauno i M p a t e c x t t e m a m a l a r n o c c u p a n t l f o l i a ' > ' -

•Colutea scorpioides altera.



fimilia, fed tninora, faturarevirentia, ingrai admodum&amanfaporisicfingtilisramulo rumalisprodeunceiuiicspediciiJi fiiftinentcf picrumqucbinoSjncinnuinquamccrnosflores Golutcarfim;Jes (brmi&coiore, fcd minores & nomhil odoracos: fihqz rercetes, oblongx, quibufdam veliui arriculi< diltindiar,oblong3, la:via , fubfiifcicoloris&ingrat! Capons femina,finj;u!afiLi gulisarticulisitHlu(jhabcnt: radix Itgiiiof.icft,k>ng<:latcque difperfa.

% EST &:altera huniiiiiorJujiiiiLqjdLfRjffjnc- que folioruni nu mcro,au Elitu.au ctbrm a, ne- queflorumformalcolore,a fupcriorc differ- rens.ic'd luijz virgf palm ares aut pedales dun- taKat, hieme inrcidura marcefcere folenr, \$C novo vcr denude radicc nov^ germ inarc: fi- liqu^&fcminapaiiiradixlimiitcrdura&li- f l r f i & f i b i h d f t

Spontenaldit 11 rad £*if iit^s vicinifq; Vien- ni nioncibusabuiitlt, cum etiam in nomiulln Pannoni?montanislocis.PrioreecianiiiiBcl- gicss fiords jim dm antcconfpexeram: fecjus Pena& Looeliuiin Adverfarijs meminerunr, inValcna Wompelliani agri filva na(cia aflc- rentes. rnliorciscuhalongcmajorc vadit.Po- fctrioremnunquamartcaoblervavcram.Scii &ca in hortifculcapaul6 major fic,&p!crmn- que virgasliicmrcctinci. Florent Maio.

A IT t K A niticurradicccra(ia,iSf lignosa, lent&camen, Siflavcfecne corttec obdufti, multisqucfibnspra:dita:cxquapluresiingulis anniicimte vcre novas ptoaudit virgas pc- dales, noniiumquam cti.uu tubicales, Iemas. viniincas,la:vcs,VLrtdes, Si in his remerc iporfi alata f(i;ij,qui(ii, (cptena, ant novena um co- (l.<inlia:rcntia,ex(ii-cantispr)inumgii flus.de- indenonnihilacrimonia: Ill fummisl.ibrurc- lmquentis: floresinfolLorurooblongisvirgu- li\$ in hatrent copioii, leg 'i m J nacci. 1 n orbit u la- rem coronam difpofiti,HJVI nullo graio odo- rccommndati* quibusfuccedut arculacira diftmif filiquf (iipenoribus breviores,femen iniingulisaiticuliscontincDtcSjPolygalicva- lentina: modo.

Ca-icit in montium, quii Danubio&fo* tcterg ilh imminenti ad Alpes extenduncur, radicibus, inter vepresSd advinccorumnur- fmes. Florcc lunio, nnuninqt-iam ctiaiu f^laio: (ubfequens hicmsvirgascorrunic.

POLYGAIA VALENTINA.
CAP. LXV I.

TjRvncos A eft hie planti,binos palmos al- i ca, multas ferensvtrj;utas lentas, (parti aut junciinfar; folia finguliscultisinhzrcncim- pariplcrumquenuiTiero, quina, fcpcna.auc plurj.Lcmicu)^ (imilu,niagisi2men carnofa, & ad rutxcolorem [cccdentia, adfringencis & ingrati guftus: Ht'csmclilorofiniilesJuccJ, corona: m modum.fifTr.fjsviugulis (qu«ma- gnacx partcnuda: (UIK.& i.,,iruro femine cX3- rekrcrelblemjinfident: iticurvx, dcinc, lon- gsc&rercetesrucccduntfiliqu*, tribusautquatuqrinternodijsddlindar, qua (emen conti- Hcmilurmn,oblongiulculupigiuni,ingratiapoiis:i3du[loiiga,duraJcfIM, crafjjiifcula eft.

Perpetu & virens floreque Aprili. Maio. & Iuni Ojtemcnvco Iulio maturum. Inveniebameci in Septembri florenti Dt & rca Jidioribiis locis mature a Jmo 4tJ, videlicet Ffbiuario, Salnioticenfi agto frequens est secundum vias: Granatenfi, Murciano, & Valentino r-Bnii Jloc Jiaccnois coUi utadeclivibus obfervabam. Apescxejus floreplunnumme Uol- l i: g d untur.

Vvlt O S.ilmanticenfibz Ccrafiiffa Je Rej > diciur, quasi femila regia, & iflic efbcir.x Meliloeis iccucitncur. Granaccnfcs & Murcianiif/!; ^*^, id est, Lenticulaui, Valctini Polygil am a ppl lanr.

IN collibus fit vofis Valentie Hifpaniicvicinis invenit & alia huic admodum fimilis, fed m-ioribus virgis, firm ion bu Sj & urcumque rubenribus: m-ioribuscciam, viridioribus, frequentionbu! & carno (isfol!; s; majoribus & dilutions colons floribus: iiliquisnam paulocnil Tioribus: femtnc verd omnino Gmili.

EIVSDEM urbisicmtianrinlis Tertia, oblongis, lenti£/ungofisfcumedulloCs, & om- Jlino virencibus vtrgis prjc Jiu, quas rara obfeipiunt folia, fupcrionbus adliucciaflora & mollioraiflos Sccondx parrfemen obfervare non potui.

Virt cciam perpetud ucracque: fed in collibus natadhitiffime florec, Vere U Autumno. Prima & Secmda, ante mcam ad Cxf. Maximilunum n. profclioncm, in Belgicishortis alcauatuc.

P o K R 6 Polygila Diofcoridi & Plinio guftuct adftricta, quæ pota lactis abundan- tiam facit.


ANANIS NOV SPINOSA, fivCMITIOR.

CAP. txvii.

ALVNT Silellacaprata Anamidisquoddam genus avulgaridivcrfunij quod ab alijs mi- nime obfervatum exifti mo.

Aaomsmitor i.

Fraxinella.



MVLTOS annuacim ex radicedtua. lignosi, U perenni fert cubitales, nonnumquatn ion- Anmilw. Boresfurculos, rotundos. Jntos, firmos Mmcn, ramo (os, nioltilaiiugincobduttos: miittaib- / << .: <<. Tia alternanincaulcmlat4bafiamp]eacniia, plcrumque icrna ex codcm pediculo produn- ? • << » # " * • tia jncerdum fineularia. iiolliora & tmpliora quam vulgaris fumnix virgc & ramidcfinunc in obl<in<im fpi&am flojJm vulgari qmdem (imihuiDj]cdcolons magis langumei: fertdc- iniicfiliq uasvulg. iria^imilcs. Scipfumctiamrcmcn. T o " planta lento quodam huiore graviter Sc hircir, ifii virus olente obfta est, Fraxinellz ferc odons infUr; n» [0 autcm acu- Jcorum vallomunitact.

Esrfealiud cerium huicaded (imile (prrfertimfiutriiinqi in liortucolacur) utanrc quam jbmkit. • flores expiceKur, mfi diligenter intd ft conferantur, vix diicrni queant: paulo tame'i pin- > ""' • < " »

gulus iJeprebanditur, nee aJco graviter odoramm: praeterca ubi (ponce nascitur candidius elti ejusitem rlores, qui liuei (unc, breviorcfbicaialcunur.

Tri/ffittls
Joviana

Priors femes e SiTelia no bis mi (Tutu ed Trifblu majoris &fceti(Ji nomine, plant* etiam ex co nare. Alceruin frequens nateiturciim in Narboncnfi Gallii, ubi primiim obfcruabam, mm in Hnjf)inia&: Lufitania. Floret Htrumque genus Iunio &: iulio.

Nativus Plinij

Cv M cota quail facie Anwnidem vulgarcm, exceptisfpinis rferanthatplantz, licebiE CØ nominare An«niJcs non Ipinofas five mitiores. Pofcnorem nonnulli Hifpani Cteris filrdrtris genus effc aummabsnx: Pena 6c LobcHusPlini) NSaticcm cfie cenfent j tujuslib. XXVLI Nat.Hlft.cap.X11 Bwmioic: (cdejus Natncisradixduncaxathircivirusolctrecens cmu, non cocapbnta. Cumque nullam pleniorem dctrcriptioueoi addat, difficilecllccxi-ftiinc>, qu*! Uin ilia Naenx fit ju Jicare.

frximS*

Paria

OLET etiam hircutn vulgo Fraxinellaappeilata.cjj jus radix Di3ami a I bi nomine in offinnis notacil .SiuTurpatur. lltmfpaffim inPannonicisilvis, Vicnnenfique(alcu, duo generainveniunror: Vimm elatius, obngiorcflorumipica, faturationbufqucfloribus& oigrtoribusfblijss Aiterumlumiliu^jbreviorefbica, dilutoribusflonbus&folijs: Vngari litBumm & zjrua*fin vocattc, Crcfat5£uiFraiKofordiano(al[u, inquoaliquotj piante reptexmvco flora prarJiti.

DORYCHHIVU HISPANICVM.

C*» . ixvnr.

Dorycnio congener planra.



Dorycnium
Hispanicum

T;R VT 1 c o s A & tamoraliaec estplanta.pedcm airampliusaka.rcnuesproducemvitgM, rincanaSiflexibiics: toliaolesalbicantia, ii]inora&: breviora, tcrnafimul, iiterduinctiam pluriab codera exortu prodenmia, in novellis ramis, qui nondum florem protuleruntadmoJumfrequentia&confertimnafcentia. adfringentifguftusjflofcopiofus, parvus. trifo- JiipratcnfissEmulus, albus, vclutimcapitolinncongctusrummisvirgisinfidct: quodecidente, <iuaterna:, quinx, aiitp!ures interdum fucceduntfimul junftx valvulx. crvi magnitudine, rufefcenres, in quarum fingufis, urpjurimunifiiiigulafcmtnacontinenturverficol»- na^uatiaptnc TicliymaiiparalLj. ejufdemptiucformx. coloris&magnitudmU.ndixduraW Jignoianigncat. Percuniscft. ncc luafojiaabijcit. nifinovjrecep is.

Maralt.

Q uoq; etiam Salmantica rei herbariaftudrofi, Dorycnium vocabant, co quo iftie vctibaz tempore, quoctiara nomine apud MoLipcliaiw, aiuc muius wnutdotiatu fuit

igaillaraciiiniliaTcicntciciani ampledi vidjtur,Opiniomimlibroxiui. Ejusfemena
AUrovan iroaUquando mifTiimfiucTriiblijalbiappcllationc; Sicxilloplan- *Trifin,*
aLx&i.linxn.ucenCtvBlgismift4ttg<f9Qca& * << .
Cetenim, [tectcam Dorycaio Dioft:ori.i[dcrcrtptononnullasnotascommuncslubar,
cju;ta;nen liiftntixper omniarcfpondercDon viderar.

Hvic ferctiinittsplaiiM V.il-jncinore^[iy&;qLi]burJam Bxtic^locisnafcLCur,cubiraii
busk vinainfsmCfdofcatisvirgis, fuperioregraciliorjbus, *breviortbui&c htionbvsvfoWjs,* *l'mm^l**
brevi^ ic p.-Jiculo ccniisauc quinis fimul juiictjs.ramulos.iniplcctenribus, falii & nonniliil
•crim >ni*obtinentsgaftas: obngiramiifculijternoSjquiternos, aucquinesfloresfufti-
Hem,Kfedica tnajorc; viridis coloris: aiiogui toraplantacandidior cftfopriori^indiota in-
inatCjus neque (LMJH, nequeadicemobfrvabain : *fed* «mi)lumquaicn)cquifaado ab-

um pccococ^ exrimj u^ p ic p ofui

V E T E R E s pjno Dorvcai«oa fonnifermn effe fc ribonc.&copiofidi haufum mortem
rcrre Aoverdplanta, **hocdapatcdefaipta**, (oporiftrafic, neminempericulutnfcitilli
arbutor.

GENISTA TINCTOMA*

CAP. LxIx.

Genifta tiufloria Hifpan.

Genifo ttndoria vtIgaris.



D duorumcubitorumaltitudincmcrefcitinerredum hicfrurex.nudo *ftipitt,cnof)i,rc-*
u ido.digitalicranicudincj candicantccorticcteo^quiiii m ulcipl ices breves^ ucr.iir.os, *r,cbin» tik.*
tencLlos&fragilesruninupartedividiur: hosornaitfolia Lini autThymclxz,frcqLientia, *Btm* Us-*
fupcrne vircna,internc verb incana & argeniei plane lplendoris,guftus niino CNIIUanus 6c *Danica.*

h i d f t i i d d f b a m a r i : f l o K S f u m m i s r a m u J i s n a / c u n t u r / p ' « ' » c o n g « -
fti Genift.r cinftona: Germanicxtimiles.lutct.Tota planca clegaiistfafpcau.

Quo tempore floret, (iibcacEclcit Ha:modcriquodd*m genuiclegaiis^pc dalisalntudi-
nisftacliialisinterdumcraflitudinis, multisflonbusamedio fcapoadlummunmlquccx-
oniacum magnisoblongis.luteis.cxtreniapartchiauubus&mquinquepanes divifis: to-
tumhumidumcit.pingrjolcagmoliquematcnarugcc.

Nvio v A M hime^ticetnconlpiciebam, quam Murcianoregno(ccutl{)umv i a s n a .
fecntem &c MartiajapVle flotenrcni.Incolxftirpc m iplam/?V-appc]labantJHarniodctum
autcm Cub can alec's, *jtmtwd*, quiaforiuti,U vaccxcofefwiitur, ad venciem excinne
taummappccuiir.

CETEKVU raaruticBmiUuraquiatingcpdiufii.florisTinftorij.vclGcniftxrinflonac

numen invenit, in Hispanijs videre non meruini: at in Auftria: Sc Pannonix Chofis Joels 8fi • ad moicinorum pratorum margines frequentiflimum confpexi. Vngans Ftfi* i imp d'ci- tur. Freqnentiflinius teiam m omnibus pratiiuibuspoximoiiiv#, cum Francolordia- no atjrojuin plcrifqcalijs Gccmamx Jocis.

SPARTVM GILJECORVM.

CAP. tix.

Genifia Pl- 97

OMKIBVS nooffinutn, Spartum.fiveSpjrtimaDfofcoridis, cflil-PliniiGenJRam¹ livcHilpanicamficAtricanam odoratoflore.vitgulis plane juncns&frach, contuma- cibus,qmbusraraquadam,durafloret,inhaxencfoliabrevidccidiw.,j utLocadcindc planta uncfolijsconfpiciatur. w^mui*

Sparcium DiofcoriduGccfih Plin.

{parrium 11. Hifpan.



Illius hiftoriam, cum à plerifque diligenter & accuratè fit perfcipita, hic proponen- dam non duxi: fed fi alia quædam ejus genera, quæ in Hifpanijs observabam, tan- quam nova, & à nullo adhuc exhibitæ, oculis fubijcerem, operæpretium me factu- rum exiftimavi.

Spartium 11. Hifpan.

EST verò unum cubitali plerumque fupite, pollicem craffo, feabro & ftriato corti- ceo tefto, qui in plures cubitales virefcetes & ftriatos ramos dividitur, & ^{* deil {deil1} f-} ^{* ? ? ? otCon R*} ^{novellæ adhuc & primùm germinantes, a quo- rum} ^{capit deciduis, ut totum in rami} ^{pediculi è quibus dependent ad quot exigu} ^{floribus pæne fimiles, lotes, inodori: fucec-} ^{bx que in jumentorum pabulum cedit, per-} ^{maxima ex parte femien (rarò bina) contine-} ^{tur, durum, nigrum, exiguo teni fimile, quod in lobis agitans aut concuffis crepitat, & fan-} ^{tum edit: radix dura eft & lignofa.} ^{ciatur: è virgularum bte.ibusprodunt longi} ^{flotes, glycyrrhizæ vulgi Wil i j} ^{dunt cartilaginei, rotundiufculi lobi} ^{fioniles, ex flavo rufefcentes, in quib} ^{novellæ adhuc & primùm germinantes, a quo-} ^{capit deciduis, ut totum in rami} ^{pediculi è quibus dependent ad quot exigu} ^{floribus pæne fimiles, lotes, inodori: fucec-} ^{bx que in jumentorum pabulum cedit, per-} ^{maxima ex parte femien (rarò bina) contine-} ^{tur, durum, nigrum, exiguo teni fimile, quod in lobis agitans aut concuffis crepitat, & fan-} ^{tum edit: radix dura eft & lignofa.}

Spartium 11. Hifpan.

ALIVD longè majus, & hominis altitudinem fuperans invenitur virgulis prio- re tencrioribus, lentioribus, & magis obfequentibus, flore ejufdem cum fupenore formæ, fed paulò majore, & omnino albo: lobi etiam conveniunt: minores tamen funt & minus femien continent.

Natalis

Primum varietate Castellæ utrifque locis crefcit arenolo folo, & Maio floret. femien ma- mihi con- fpedium

tu,u,udtIaUo.A]c_tumCiad_b_USdun_m_ati&:loc_1svicin_jau_amannc_1flac_1s)

Spartim in Hispan.



Chamgenista 1.



locis colligere memini.

^CLCim c(tarcnof<> &c sterili fblo, fuis floribixs otuillum Febrnario.Lobosoblcrvarcnnonpotui in ipfa pUnt;i: (cd tnihi dcinde abamicq miffi fuit ex Hii pj m)s.

V T R v M Q V t genus Hifpani rffw Ver- naculo **fermone** appellant: Geniftam verb odoracam hinujU &c. ynte/la: vulgarem &:Sc- ptentnonahbus regionibusptularcm, tjuz rtctam p **pveqflo**, **Csquciqrfi** **6d** illa. qucmadmoduiTi noltrates,fcoparum,qm. bus allies purg^nc & everrunc, loco ucancur.

CE T t R v M iuncplaiKamaJSpartmn, quod DiofLondcsaira(OT/ovvocat,rcft-rcndam oniiiiiocxilhiim.Aii vem ijfdcm tacukatibus pndicaic,noji intellexi

DeSpartoautcii H1 (panicojuncifolio, de cufusni'uPliasuslilyxix, cap. u.Natuf.Hiflo- h f t l i b

C H A M j t G E N I S T A .

C A P . L X X I .

GEWISTAE illius,qua;pcruuiiverfimfe- re German ram Gall i am, Angiiamatqci Belgicam vulgtifillma est, cuiufqj flores nou- dumcxpanlosliL-'gxniuriacondiunt,& cap- parum loco **cdunz**, (ponte nalcentis nulla vc- fl^ia **obfervar** pocui in Panjonia& Bohe- niia,ncc]uctoti Auftna&MoraviJ. Sfdduo Charnxgenirtx genera p l c n f e j u c i l i b tuk-iunt.

P M M V M multfs palmaribus, interdum criapedalibusaucmajonbus virgulis humi distundicur, teretibus, lcntis, ftnatis, vircna- bus,&cin aliquot ramulos divifis per quos con- fufoordine, &quaiitenu reiparfafunt folio- la, bina,ccrnaauicjuaccTi]a, abcodemexorc & Eubcreulo **prodcunria**, **Geniftx** vulgaris **GermanicaE folijs** linnJu ,cnuncioreodorio, **fcquaficomplicata**, /upernevuidia, inferne iionuihincana, amariu^cultguflus: cxillo- ruinaliiiiiiiuliiicbini tfures In'ti, qimtuor foliolis cun(lames, Gentflz gcnujnicx flor- umxinulijfed mmores, nullointerdum,ant cccrc pccxiguo odore prardm, DOnnuUislocis fatisorati,na(LLmcur :quibusdcinde fucc- dunt planar ilijix", lurfuta:, cxiguii Hjvtfcciis femcnCytiligcncriviimilictmtiicntts.Ta- dix est dura lignofa, aliquot fibrifonata: icd & virgulaciccundumradicem, qua terra intc- guncur,plcrumquefibrasagunr.

Nt(citurmulus Pannoma- locisadvtarum &rikarummargins, cdins, iccis, atquede- fercisnonnumquamagris. In cuicis &: inter vepresaliquandomagisluxuriat, & inniaio- renialtiudjnemexreit:ir.FtorctMai<.>t]iun- doquetiam Apnli.

A L T E R i v s, qua: piano coque altero ex ci. »/jf altero nalcente est folio, quod dcinde in cauli- culutnconvercitur, liiltoriatn, ciim abal.jifit prodita,htc rctexciidam non *ftimavi.

Haiicplanculamohinapud **Helvetia** cdm jftaciicrfaccrcm, & qmbufdain Gerqiaox



silvâ Nemethwywar III^{de} Dn. Balchafaris de Bathysan urbi & arci munitissimæ proxima, atque supra Sopronium urbem vulgo Sebomus dictam, Austracis: sed omnium affluentissimè inter Sakerunya III^{mo} Comitis de Zrinio minutissimam arcem, & Fridaw Magnifici Dn. Michaelis de Zek arcem in collibus: & nunc proximè in silva quadam militari circiter infra Francofortum, ad sinistram Mœni fluminis, ubi etiam frequens Primum genus, & plerz- que aliz stirpes.

TERTIUM porro elegans quoddam genus, secundo quodammodo affine, folis Valenti- ni regni locis incultis & alperis observabam, quod prætermitti non debuit.

Vix palmari magnitudine assurgebat hæc Chamaegenisa, admodum tamen fruticosa, proximis brevioribus simi-

Chamaegenisa

sinuosis edum in

tuc.ac:mramuhimconvenitur.ficcdm.cocaplantaSftfir & »J -r*Ff latim in- re videtur.fittandem admodum fruticofi : in SSSSSfa iSfe TS? foliis consta-

fore: aut plures

dixi loco, mense Marcio. Po

teram GAWm m r., / id est terdrem Gen £ ^ . 3 / -1 1 ap ^ ant. Al- Tectiz nullum

CETERVM >nPannonia«iam vulgatiffimacftca Geniftefnpri,.r- • .

rcw.qmmnonniilliGcniftellamfpinuiamnomina™ Vnwn/ / L'Pⁱⁿ«&<uJeishor- Gennani eicitni»pfri«wicn. Frequenscft&ciicaFrancofortlma i -ho f ^ A c " " " " crmaniz ac.

ANONYMOS COIVTIE FLOHB,

CAP. LXXII.

FLOREM similitudo & aliz quædam note faciunt, ut hanc a quibus quidem, sed ele- gantem & in ad huc, ut arbitror (præterquam à me in Pannonicis) descriptam plantam fuprioriboifub

TELA autem habet longè lateque summa tellure serpente, signosam, lentam ta- subinde capillares fibras agentem, ex qua procedunt multi lenti & obsequentes ra- mali,

Colonia

Au&ny moi flore coluccr.



n>uji, dodrantals^Sr circa excrmm, qua terri inreguntur, fibras plerumqucagentes: folia in his buxiffmuja fere, canioia,vtndia,pau!oca- rnenmagis mucroara, confufo urplurimum ordincdilofoifa,guftantibus ingratarpinu-n, dcinde aniaara 5i acria: in extremis ramulisprodcunr inter folia florestcrai autquaterni ,ob- longi.majorc ex pane odoris experces,nonnuL l is an re m locis iiiavemfij narciffinam quaiidam fragranciatn refercnr.es, tnbus folijscoiiftates, quorum duo.tlba funtj&alarum modo furfum expan{a,cxalbidagaIcolaiLlorumexortumiii- tegence,tertium in longiufculum vcluticubu- lum convdlutum j furfam per longitudinem a^ pertumcftjOtrcmicateconcava&incurvaJu- tucicoloris,&:pervetuflatemomniiointerdum purpurnfcenTisautrubckcnm.fioribusfacce- duntlatat&comprefTxfiliqu^Thlarpilacifolij thecis paulo minores,virides,qu^ bin.i plerum- que (nonnumquam uniaimtaniim) ebnei- rient grana,cxtgui crvi magnitudinc, nigrican- tisex cinraceocoloris.hirluca, & Velun quod- dam animatculumcmctiw, Polyg.ili vulga- ris majorisrubro; (dequapoftca) Icirinihaud a b (i l a o a j q 2 C i t i b u i (l a t e r a l o c u l i s / p o n t e d e c i d u n t .

i. Interdumcciam pro loci natura floris co- i l o r e m v a r i a r c d e p r e l i e n d i t u n n a m b i i i a i l a f o - h i a l a r u m i n f a r l i i r f u m e x p a n f a , g a l e o l a q n c c o r u m e x o r r u m t e g e n s . a l b a n o n t u n e , l e d p u l - c e r r i m e x p u r p u r a r u b c n c , t e r t i u m a u t e m v e -

luriintubuUimconvolututnflavefcir, ejuqueextremaparsaiircicft. Frcquens est Prior non moJ6 in monci bus Calenberg, Medeling, & BadenHbus thermis immtncntibus.fed&inaliisad Auftriacas&Stinacas Alpesexcunentibus, (jmomni Refi- nif.T3ruoiarborumgeiieereiiitcgurur,tnter(axa:p]orimisctiaii Pannonia: locis est obvia, Velud apad Polbnium.Soprophium,S: Zolonock.Atterra muidrrior inventu. Floret vcrd Utraque Aplni &C Maio,femenpriors(nam alterm non obfcrvavijlunto pcrficicur.

N V L L V M nomenhuicuffruticiimpofui, cumdubitcmansvercnbusfLiericobfcrvat- tus:pr9tercaut[tudiufi(anfampr<fbeamdiligentiusvctresAu(9oresexciticndi,&:apt]djl- losapr.im aliquamappcllacionem inveniendi,ne perptuidvuvupiai; mancar. A ruflicis ne» gligirur. properca nullo illam nominedignancur: quidamEamen, a perptua vindicate, SBP appc! Ian dixcrunt.

SPINOSI SVFFRVTICES ET E'nAAAOKATAOI.

N V N C fereprtClaArborumfratlcum tr Stffrntkumitfrifithne^ppre- aummefaRuruxextflwvi, ft fp'nojos Frt4ttcex &Jujfruttces, eajjueSttrpes qux aditc*perfe constflert rie.jutHrtt^ fed iluritm ad'mwculo egmt (I beapbra/iitt h w - ;,, ?u*au\otj<;vili-naytei-txxuk^&pptll&t, GAZS implcxkdtU\$ vcttit) ttdjtngrcrm. Imtium * AMtmfdcum ah ilUt'Sujfrutuibus, fu% Gtmfl* flore funtprtditi.

AsPA*THVS ALTER. CAP. LXXIII.

TAM ETS I rciamhungfruticemnnnefle Icgitimum Afpalir.humalrcrum : qniavcrd tale nomen a plenqile obtinuit, im mutaiidum non putavi, pflBferti va ciini ad quera fnticcm veteribusdefenptBBJ referndebeat, adhuc ignorem, nififorte Scorpij genenbus adfenbendumcflquisirencar.

TOT A PLAN TA en? tumnonexcedit.fruticofaadmodum&ramola.rtmlltjhorrens fpinisdrnfl^nmisacutisinaiiibuscnjlcunriirpufillafolialentisinagmtudinc indu,fjuali.ipercipUqdcpenora} fertn novcllisrimulis, i n a t i a c u

* I floresfnloni(rnbusAfrigidionibus/pidis,benii)usterniaatplyrcsfi!Juliaa(cumur,Gc. &ift< fitmlcs,tniQores,coloni nunc lutci.ijunc palleltcas; femca in paivis lihqvus exiguum.

A t h y u

Afpalathus alter 111.

Afpalathus alter 111.

Afpalathus alter 111.

Scorpius

Scorpius


Scorpius i.

Scorpius i.

Scorpius

Scorpius

Scorpius



AL iv D ejusgenusrobustius, &altiquantum firmius nonnummum alcixexcretceiiSj cujus flos perperuo pallidior est, aiiiqui non multum priori diffimile.

TERTIVM genus ad cubitum nonnumquam magnitudinem accedit p Jerum q uctam cnm J nus c flj Sipedalis tanium alcitudinis, cocum etiam tenerius: ramuli in mukoplures spinas divijijlx denuo ID alias. fic ut (ingulf spitis totidem Abroronimultifida folia vidcantur, nifi aculei obfiftent, qui, ancgligentius conidcantibus Sj Vix animadvrtitunt Verccx lamulorum lateribus exigualij prodcunt ramufculi cani 6c hir/bti, quibus adnata sunt molis & incana leiitis folia, majora quam in primo genere: in (umms illis ramufculis floris priori fimiles paulo majorcs jutci nafcuntur.

Crefcit Primuru^umin Cantabris ruperato Pyrengo faltUjum varijs alijs Hifpanix locis. Si ^tarboacnii Galta. Scconduni ia Cattellaveteri tanmmmodo obfrvabam. Tertium in Camabris duntaxattCTtio i Viftotia uibemiliari, ad radices Pyrenaroruin, quSHifpania ia {pedant.

PRIMVM genus ab Herbarix rei ftudio fil Salmanticx & Mompclij Afpalathus akervocabatur, vulgo Salmannccndum, & aliorum, a quod nos nalcitur, Hispanorum, talia fecundum CafcJJanis anaga: tertium Cantabris ballada.

FLORIBVS prioris cum faccharo fermentati Sj Salmanticcnefi ad finnandas & cftaurandas collapfas vires utuntur.

SCORPIVS.

CAP- LXXIII.

DVO plamarum genra. qnat plorimum ad Scorpij. cuem Gaza Neptin Inrcpretatus est. hiftoriam accedere videntur, inmcis peregrinationibus obfervabatn.

PRIMVM cubitali aur ampliore akitudineaf Turgit. mulcis virinis ex atro virctibus, friatis, dcnilfimo Jpinarum vallo obfifit fruticium, quxdcindelpinara] ijtntn thoribus funcircumkpta;: folia nulJa. mfi primo vcrCj apparcr, btevidecidua. Flores Gcnifti mirsoies pallidi, interdum verbadeorafefccntes, ut turxrevidcantui. prarfcit imfub AmimnuiTi: filiquxdc inde (iiccdunt breves, cylindracear, magna ex parte inancs, aliquando tamen fcentes exiguum icmen pallidum aiiitfubijrciini, ut Gcnifta vulga» is Septentrionalium: radix fnigularis in aliafterjucs fe fpargens, Sditiicidiiailate (c propagans.

Floret: Mato & Iisnio, U quandoque toti ae lat<: circa Autumnum vero, denuoflonbu* onufta confpicitur, co^uctempore faturatio- & f magtsiutili funt, u: plurimdm, flores.

ALTER. v M ped'K. altitu Jiocm taro fupcrat, totam dentitlimw {^}s liottens, cui noo confufo ordine unrt CupciiWe nslairnut, fed

inter fe exorta binz nafcuntur, vifcmcs bi

dem, sed languidius quam superioris, neque alix ex abis: fummis ramulis inherent

Scorpius 11.



term flores fuperiori fimilesjutci coloris,mcnie Martiorquo romporccxi goas brevesque fili- quaj, velporiisfcminacrvmagnitudine, m- clufamcmbranaquadam mulra mcanaquela- ruginehirfuta,deprchendcbamdciifilTitnisip- fuis pliant fpin is occukau, ut ex fuperciorc ar(la- te deciderant: aded vcrö canefcebant, ut lintio arancarumcelaseflecxiftimarem: radix fingul- aris/ed in pluresdcindepropagines fparfa, du- ra ^ lignolacit.

Primum varijs Belgica:, Germanic, Galliatj K*t*in. Hifpaniz, Anglisc locisconfpexi, nufquam ta- menfrequentiuSjquminculcisillislocisfupra Burdegalam, Bayonenfi itinre, KapudCan- tabros PyrenKorumjugorumaccolas, ubiranta magmtudinaflurgit.utduorum liominum altitudincm arquarc nonnumquam vide rim, craflicudinc vcrö brachium humanum. Akc- rum collibus Granatarvicinis itinre Cordu- benfi dumaxat, nccu/quam alibi mihi confpe- Aum. Anporr6Echinopoda,cujusdofli(Timus vir Hononus Bcllus in altera ad me cpitloli meminit.'plurimumcertcadUlamiilliacc- dere videcur.

GALLI p primum genus Itxmirijs (quki- ta)*ge, Bcige Caffi/bom appella: iitulum VLilgarcononichifpanicum inccclxxi. Alrc- rum genus G ran atcnfi'SiWu/wdVocant.

Q V A s ftulcares Scorpius pbnta babcat, nemocradit, SolusPlimusaducrfului aovki- iiii animal valerc auftor eft.

EKIHACEA.

CAP. txxv.

\ *2» T) LAWE X \^OTifiTOcS9B/



nova, & rota elcgatis eft hsecplan- ra,dodramalts, inorbcmprfblumditfufi, multisfpims vircentibus, five aculeis horrida: floresGcniftjexcerulcopurpuralentes, mf- nores,calyculisiiiduGlii(pidis,villo2s,ornnino fercincanis, bini aut terni (imulfcmpcon- jundb:fotiolainterddum.dum Horet, producit, fedrarOjeaqucpcrpauca.Lenticul^fimili.i.quac ciimbrevi marcc/canc&dccidanc, totapianta maxima ex pane fine folijs fpeftacur, & mulci* plicifpin.ilum vallo Erinaceum fnicconvolu- tum reprxfemat radix lignoia& tuagna eft pro plants ptoportione.

Nafcitm rcgnoValentino, affluentervero circaSicte aguasoppidulum, (cptiinoaburbc Valentia miliari.Madritiann itiiHTC.afpcnslo- cis&fccusvias, Apnli florentcm obfervabara &crucham iter iftac faciensanno M- D. LXV. femcnobfcrvarc non potu vntrufc fequente in Belgicam reacr(us).

INCOLA, («-avocant,hocftEritiaceum,quoniam erinaceum animal terreftre.dum K«w»* inorbvmlccontrahit.autmarinum, aculcorum& fpinaramvalloplanianmulatur: qua: =>d6 caula ruic ut illi Erinacc^nomen irtdercm.donee coniodiis aliquod ex vccenbus Scri- ptonbiis dare poffimUS. Ar.vero'incolx ad medicualiquem ufum adhibcant, non ituccllexi.


TRAGACANTHA ALTERA.

CAP. txxvi

• wti STH, t nuimaKquandoMaffiKzflorentem, fidfvuftti prxditamobfer- "rrt Y vllc memmifimimifitwcpaata fturicoraadmoduin mukos Mdalschabefiju- *I*ll. flexLbiks.btctitumquaqucfcdiffundentes, candicantes, &, dumadliuc til clli '11 Dt,

TragacanthaalterajPoterium forte.

X<AXS*OT Anguil. PoteriumDalcchampij.



ftnr lanug.tiofos.mulmlongiscanefcentibusTpinishorrent<rfoliorumplurimeGmiil jufr
 asal^LenacuUaucTragacanthxproxim^cxigurCdid l i f r i
 per inervallaexeunt, dulcis fapons; foUji hieme **deciderjribus**, ncrvnlh mcdii q uibuifclia
 inhrcbant inngidas & acutas(pinasevadunt,ucco rcmpore totapUntafinefolnsconibi-
 ciacur contraquam inTragacantha. Qua-hicmecciamfohahietinct, i.eccaabiitidoneff
 novarcquenteanno adqmficrKituinderoumdfciduisvctuIbsf^olm^ncrvnliincediiciani
 in/pinasabunt.

Iftam neque florentem.neque ferncnferentem vidi: fed fubea pFunmos fbliculos bom-
 bycinis Cmi Haut Alcer OUus, quam Matthiolus Hypccoum appdlac,folll«:ujis feic parci,
 man<inveni,qiiojab illacxidiffcfc florem ex fimilibus prod.rcalbam ,non magnum S
 col* refetcban: defa>><QiM cert, mtlj.gerc potui,rad.x lenta, longa,in mulfommos
 J.vila.nigrocomcefonsobduaamatneintuscajididaJiingosa.duta^DienorparsRuiii-
 lame; lubdincrcferr.

Hatali.

Nascitur plurima circa Gu
inurili folo:nec alio loco cont

la Venia el peral, Granatenſi regno, in collibus, arido &

Tragacantha

VVLCA % Ei nomcniioiuucllexi. Sedctim adedfleTtagacandw: fimilis, facile mihi
 rlujd/remenc]cginnum70TY<,,quod blonibusK,f<J<vo<nDio(*:gridcsait
 fruticare f l u s i o , f e i r r e r c , Q L T e r a i m i l i s l o n g , s m o ! l , b u * , l c m < , K n u i b u s . f
 canthæ proximis, in collibus & aquosis r a f c l & r a d i c e c m f i J
 gummi fimilem reddere tradit; cuius q. P. s. u. lib. xxvii. Nat. Hist. cap. xii. meminit, il-
 ramaiamaqui bu'dam ph nionvocanfcribens.

Thelyria.

BELLONIUS lib. i. Observat. cap. xvi. duo Tragacanthæ ger
tentium montium verticibus earum forte altera huic fimilis est
suz Perovinianus cap. xii. scribit tria Tragacanthæ nomina

observasse refert in Cre
CcitcRauwolfius l. b. 11
L f f

Rauwolfius
de Tragacantha
et alia

*-<

quorum dngulnnorbiCLilanbiisaavlcennbiufolliCulisinduduntur.racmatimnuafni
 long'uKu^svirgulisnafcaricurirerciuincjHldcinpen^alntudinispluribusvirKisfirmiori
 Dupurpuralcentibus aflLir^cns.incanalanueincPoteriLr.iniruJ.iuu^..n^n^bys s,____,n-i
 floribus f c.

Cla.V.DjlccjiampJus.opcimcdclitticiariaremrritus, Poterium w AllobroEibusprope
 11^0^k"r G[ati:ino p o l l v l c l l l u n i « f l l v o i i s **convalbbiis** rep^riri ait . Sat i.eato
 intelli JS p S - nfque Porer, i nom ille ^onatur, vercor> ut (uam •T'nionon Ic S l l i -
 mitraionbu « ueri poter, quippe cum ea pata penitus à Tragacantha differat & folia p m
 pincliz vulga
 nsfluam Germani Suigmtorbamvocant, viicutuibpcnc,paululumcandt-
 cantia

cintianfernchabeac, minora&tencrora, fpinasmolleshincindeperufuprettrCstfirculos
tnnvcifimtSiobliqueiparfaf{cij'usrcicau(aanDnnunisPimpincIIalpinbtaappellatur) £c
udiccmtnuem, duram, exfuccam. Poterium verd teſte Dtoſcoride &c Phniufururxxdt
loagos Inbens ramos,rpinis horridos lanugine fpifla teſlos,Tragacan:liar proximos, radii cs
longas admodum nervofas & firmas ut proxime terram recitadant fuccum unguifimi-
lem. PimpincIIam ilbm (pinofamahquonesfanc mihi femincnaram^iligenterin liotto.fi
Hctilibusconfcrvare voluiffcd Temperhiemsfubiequensabftulit. nonnumquamctiam mi-
hi miſſum ejus(emen ScosbesTheophra(tinominc:&:,vu!go adhuc iplam plantam in Cre-
tavocafiaV*£^<tjitriprum. DcillaconfuleHonorijaLteramcpiftotam,quxadcalcem ha-
lutn Obſervacionum adjeſta.

Ang^u'tlarzoptnionutn Jib. viri. videtor Pimpincttam ilhm fpinofim id X«Ax«l»ſive
Tipam Theophrasti refcre- Doſlt(s.aurem Rauwoliuus, qm earn in Libano muive cciam
Tent,fcnbit Ubro 3icap.jam memoracis,ab incolis BtBan vocari.

ſjeA BO ſcnbit circa no vam Carchaginem plantam quandam eſlc.de cujuscorticte-
IJ: pukerrya:conficiantur:an hxc mca (iIjgnoro, nullam cnitn qualcm ille defcnbit.dum
i(bti;erfacerm,obſervabam,aucifticna(ciab incolis i iirelligebam.

CETIKVM Dioſcorides Potcri) radices tuſas, prxciiſnervis 5; vulncribusglutinandis Ptm
illmi, dcdumejusncrvorumarK-cliiibusprpdclle, reſtiſeſt. Eaſdem facultates tribute illi
tttactn Pitruus,&:addir,invinopotum,rubetai urn veneno auxiliari.

R H A M H V S.

CAK LXXVII.

Dvo RhamnignetaThcophraftusltb-nr.cap.xvn.Hiftor.Plant, facit, albuai&rii-
grum, utrumque aculeigeſum, & j ſpecietu s.

Rhamnus 1.

Khamni i.alieta ſpeciet.



Dioſcoridesſria genera deſi:ribit,nifi mcndofam ſcxemphr, utpcririJSmus Angt]i]ar,a
ſurpicatur,qui teruum adſciticium cſleputat. Et fanē, ciim Diofrondeseafdcra facultes
ſno Paltur'o [ribu.it,quasTheophfaltusPaliurolibroafcap.rLipradi^iſdcicripto: vcſcriſoile
cſtccrti) Kh,imnidrcnptionemqua:apudDioſcondcmexrar,adPaIiinejus luſtoriamrc-
voc.iiHUm,p]Lr.ifquccmmnotaſhabetcumThcophraltiPaliuro communes.

HST ircro [Hiimnuf-f]Li^{lexpac} icndiſcpibusidonciJS,re(lisvirgis, in mulroſramosdivi-
fi^canlidis,qux.icvalidiſacfirmiſaculeiſlio.Tent.' foliaplerumqucquatcrnaautquina
s>'ifingulanirmpinariimexorc5narci!iirir,Qblonga,fubFinguta,fubablida,olcxumitia,[cd
tenera&iacculcna^ Au«imno,noviſucrc(ctnubiis,inrcrdunidecidua;fiore Aut-imno
J>i^ ulculi.candicaticeijcxtrcoijſonsjaquinquccrenasdivifi:qujbuidccidetibus/ci unis

quoddam rudimentum utin latino, relhquitur: numquam tam cncius fruauum vidtra iniluconrgit: craflaniulcip]icijicradicc(nnatur.

%j& *1 ?lus n nlsalluniobi «vΛ an1 Rh amn unip arnc Cn1 Uf mj fedhi. mil1 ore m) f «q ucu- (1J r *1 oribus rainis fruiicanreiii, m]iKjribus folys, magiscarnofij, falfieuftus Jupcnorccand idio- rcDi: Honbuscjuidcm cum illo f6mi*» l«d purpurci plane colons

Rhamnus n.

Rhamm m. forctniger Theeph.



ALTE R. flexibilibus est virgis & ramis, spinarum etiam valk» horrent) bus, angntiftri- bus folijs, neque adeo carnosis, perpetuis tamen ut in prioribus olca "Cibnruscircaranoi fe maturitate flavescent & toca hieme in fructo perma- urn's. Totmautem fructxpulvcre resperfus videtur.

TERTIUM h i d d u i c o l a m c bus ramis, Spini in sepibus nascentis & pruna silv. caferenci^anicudmr. corr^n^ dis, & longis spinis armatis: folia ex quibus- ntur, longa & angusta, carnosia, viridia, ad- nque referentis, p T f * **V<ii<<M Confertim juxta folia nascent. & mate nigrum fructum stundum acerbum.

Prior Rl]m[iusn)uttiiH'fMnia- Lusitaniz, Narbonensis locis nascitur: Illius al- te ram speciem uno taatu" kfco^ xime Floruelam urbem VWnhtts Orccl1 mrf^am ad Hamen Sc<bin, nuncr appellatum, Valentini regni extremis l? It Ueohf «vabam. Alternon modo in Belgicis ruitant, sed etiam in quorundam montium vallibus, secun- dum amnes crescit. Tertium incultas Granatenfis & Murciam e g i d d ^ equentem in- ter alios fructices inveniebam.

NO M E N Græcum παύρος, Latinum etiam Rhamnus Hispani priorem fram rones appel- lant, alteram ejus speciem spino: tertium spina nigra, qui ad Theophrasti Rhamnum « um forsitan referri possit. An verò is sit quem Bellonius in avventi ut nigro fructo, igne T quo hanc plantæ. ne tribus efficaciter illinuntur.

Siccitiao, Plinio. Salmantice & alijs quibusdam Cælocis prioris folia cum turio- nibus, ex oleo, & sale eduntur primis mensis, habent enim acrimoniã us im eum aciditate conjunctam, quæ saporis gratiam conati. T cito; fup d us decocto, relaxata & dillo: utra membra, polagex etiam dolores utiliter fovet incolæ referunt.

SME*aiORiBvs adijcicndus videtUThicrptnofusruceX, mulcasabraHieevirgaspt-o
 feien5.cubicalcs vcleciam ampltorcs,rc*Sas, tenues, mbentes, multis ramulis praeditas,
 quib i a i n g e l e r u m u t d e f i n i t e r a m e n t i a l i o s a c c i e o s t u e i n d e f a p o r h a b e a n t
 breves interdum SdinnrmoSjiormumquam vtro firmos,& multisfuliis i/bficos utin Rh.im-
 nopriorc: folianuiloordinedigclliluntjpinifohorum at,nuh,led muldrbrt-viora, Myrci
 TaceBn i r f u x l j j u n d a m a q i m g i t i u u j c o m a u j a c i d a t e i o r
 canus. Necfloreml,nefru&uni videreconngic: nam Novembri, & novovcro Juncaxat
 huncfruticeni invenicbam ahquaexpjrtefuis foh|svidiucum.

Apud Complucum uibeoi,qu.im Hilpani ^{^ikaUdt Hr»»rts,} qudd proptercam labatur
 aotitshenares, alijfoucnova:Ciflcll^locis, &Bitica»partc, quatQ vul^O txtivin.idnrani
 co^nominanr,circaHucnu,&declivibusloL-is, hieineexundancibusiuittcnreoblrvabam.

Qvo NAM referendus cfl thicfriitcx^iu dubit.ivi,&etiainnumdubito Sunrnonnulli
 qui ad Lycium rcferridcbre pu[ant.C.ifti:]l.ini,qu[bi]i(boparuin uluni prxbctj& in falces
 col]ig.ituscjlracindispiHorumclibanis(crvic./j(n<]£pr.fivc/dm*f*<j vocaat,

CETERVM, VOX *tamt'ixt,* miln m memoriatn revocatquendam fuffrucicem in incul-
 tisnaft:cntcm,queni *vico\xtamtxt* appellat. AlFurgitispedjialcitudmcfrequent:biisr.i-
 nuilcuhiprxditus.quiadcoexigiis^cofctisfbliolisonufti lunt.utramuiculorum lignum
 Vixconfpicipoflitteaxcincvacfoviventulnrr.Scexrremaamariiu .inns.

Fucritneautem vc[enbu]:cognitushicfruttx,& quo nomine abi Hs vocacus,ignnro.

Legicimum porro Lycintn , in lua Percgrntattonc obfervavil Dodils Leoairdus R.ia-
 Wolfius, ciimin Ltban^ monrc ubiabtncolis eww vocariaic . tuiii Hicrololyttmluppen
 proficiscens.cujusficclim Arabibus / / jpp^ Jode a g l i c b m f l f b , 8 i i i i s
 'concin lib. HU. inter plcratque aliascxlubec.

SPINA INFECTORIA PVMLA.

CAP. LXXIX.



INFEKTOK.IA Spina, cujusbaccarum fic-
 leo, viridemcolorcmncnciliantpiiftims, &i-
 bns, qu-equeRliimnusfolutivusa Rt-cairinn-
 bu'nuncDp itur, multis Pjnnoniaf locis vulga.
 tiflimjed, ubi interdum atboream amplitudi-
 n -niadipiicitur. Dccanobis>nt'ftlcrmo-
 led de abis duobus fruticibus, qui illi admodum affi-
 nescife vidtJitur.

PRIOR bicubiE,ilibusaflurgitramis,in mul-
 tataldmdfus coicicelxvi, Spuixintcclonsccc
 lirc&(ubllantiafinnlccisSis qui membrana/u-
 penore dctracta,cx vindi palleicit, & amanu fcu-
 li (aponscl: ramuli paucis fpinis horrent, fed ip-
 (iinip HAS plcrumquctlcintre (olent: r'oluilli
 vul^an fL-relimilta.minora.angulhora, adpruni
 (ilvt-ftis live Tpini fovu phinmUin accedenna,
 gufluliFiguamcxcticcantc: florem ut in vufgari
 congihuni cjLfdcmcoloris&formx,liocftcx
 pal lIJo licl bjtcu m,quatuor foliohsconfancm,
 niinorem ramcnhabet, tadiccmutinalystruci-
 cibuslignofam.

CVBITA LES habet Alter ramos, minimi
 interdumdigiticraftitudine magnacJpartemi-
 noics, nigrorugofoquecorciccobduitos, (up-
 noreparte mramulosdivifos, qui tenmorels-
 viorequecorcicctcfti,plcrumqucinaci]tam|pi-
 namdcfinuiit: *fah** Myrti, autPruni filvctfis
 pottiis, brL^vioratamen&nunora, vindiajper
 ambitum noiiniinl *fertaiA,* adilrtngentis pri-
 rmrn. (kindenonniliilanwicanusguftusT no-
 res inter folia herbaccos, quaiuorfolijsconfan-

tes fruftiim deinde^nxifcctori* vulgan non abfimilem hinis, nonnufT:quan^en.im *
 cornis vL-Hjcom(iv-Vnrisdiltiuidluni,ininovirulcrii,iK-iiidcpMraatumatcniriigrum: radi-
 «Cincraflani,lienorim^aram,r.trasfibrlinIarcrafpargentem.

Exit Pnorftcqcocas in Leytenbergfcviquismonwnufilvis^ Alter abundanKr in monte

Spin* iafe&oria pumila ir. 0



Smilax aspera
var. pumila
Mm.

Badcnfibusthermis imminent, & vicinis jugisloco pefofo & falebrofo. Vecnjuoflo. et MaiO)&: Iuliofructum perficic.

S p IN A M mfeftonam pumilam hosfructics appellavi, quia magium nftinitatcm cim vulgarinabent, licet nunores lint. Si quis ramcn LyeIJgenuspotiiscflVcenfer, ejus arbitrio permitto in quam refrac claficm vdir: Neucrus vulgarem apptllationL-ai iieceJlxi. Et baud (cio, an aliquin in ul'u finr apud coruni locoiu m, m qmbus nafcuntur, acco!as,

SMILAX ASPERA.
CAP. I. XXX.

A StEKJB. Smilacis duo inveniuntur ge> nra: unum trequentibus ipinUhorn- dum, rutilofrudu: alccrum paucionbusacu- lcisarmamm, fcd folia nuJlis, nigrofrufu.

VR i M A SHilax, longis, frequentibus, val- dc implicatis rarmenti\$, imnc in hanc, mod6 in alreram partem, cerra quadam fenc fcrvata, inflexis, lentis, & multis p inu horrentibus na- fcitLir: ex iingularum alarum fiou cagrcobs proHucens, quibuiproximosquoft]iictVutiLCS & 21 bores ampleftenJo, abiaais ad fumrna re- pit: tclia ad fingulos inflexus, heden, non an- gulofalcdapediculolatorajclciidclaiiimin raucroieQidci]ncnria, imncampla&: viridi, i, modo anguftiora Sc albis macufis confperfa, fpmosacate, utinquitPlmius, jioceltncrvo illomediocminenciore&foltoruurisaculca' tis &rpmofis: florcsxigui, fetlaci, (ex foliolis conllincesjmiici^d (ingutosextremorum la- mutoruminfli;xus(t)uimLiiciplicesfunrJcon- junfti iitxcoiicmcuberculo, (ivc (ucTlico- plir.iflusa'C) ttTroivbsmiiwexunakodem vefi}O excunt, cadidr, cidorati, racemi in n o- dum propendun[es: fruitus dcinde **eugtits** uvis Labtufex rautis confans, macunurc **rutitus.oucleos crcs, binoi, unicum, pro jemo- rom** ii: igmet!dincconci!itn. scluro>, oiresve- lcr Afp. iragi, forUnigros radix longlatecque fl'ipjnresfui) icrra floras habet, tenuts, tajidi- dr», & **germinifbmiDirelliircfpatgitminimi** in err ium Jigiticullitudine, nudofa fcauaici- cuhra. albican ta.

ALTERA finnlibuscupriorc Tirmentisi; claviculcs proxima quurque ampledennbus nafcitur, nnn eft tameii adc6 fpinishorrida: flbluctiampjulobn'viora, acriora, molliora, nullis. autccrrcranilimisaculcisobfitalMbet: flos alrert oixinin6 formi fimilis, kd colore difFerens: nainxaJboquaficarneuseft, ftu- fufque rudirnenrum, quod ex medio florc **eunquam** utnbo pranunct, rublcit, plenu* aurem Si niacutus fructus non eft rutihis ut in priore, (cdominonigcr, &r(uccul<;cior, quan- Lum tjiidcm mihi viticmr:o!Viculan*)vcniuiit.

Sciiis florent, irod^iututnno t-ciamipfo* cum fun fruttu **Oflobri** ii- KovcmIm florcnc- tesrepticbam :at **frigtdistegiontbiuculta** & fiftUibusadfcrvaca, Autumno duntaxa Horet, nunquam

SmiUxaspera rutilo fructu.



Smilax aspera
var. rutila
to

Timfm

Smilax aspera nigr© fruSu.



RofactntifolU Bauvica.



mox Alabandicam, viliosam albicansibus folijs, viliosam vero plurimis sed minutissimis

numquam femcn perficir. Milii magna parte akcro duntaxar a fatu anno germinate cepit, nonnumqufam Bciertto. Perpetuo folia recmcc.

Crefcir. prior varijs Hifpanix locis, & in NarbonenUGallia aspero & aridiffit & in alijs calidioribus regiombus: raram in Luficania confpiciebam. Alteram autctn plenque illius Provincix locis circa fepes, & collium convexa, & c extrema Bxucx parte, qua Lufitania: conterminat fl.

Σαίδα ἔτραγη: Dioscoridi appellatur, σιλῆ. ἄγ/impliciter Theophrastro. Gaza Hederam Ciliciam interpretatur, quia Plinius lb. xvi. cap. xxxv. (cribir Smilacem Hedencliirnlem, primim e Cilicia profc Sam. H ifpani priorem f-tre j parti/a, hoc ell Rubiviticulam appeilanc: Secundam excrema: B^tica: incol? *va M Ptr- < id est, uvam caulinam, Lulltaniconrcrmi- ui rcam*, Oly(ipp^nenics afftga taen,

CETE k v M Diocorkles ait folia U acinos, ance & port eporos, vencnorum Jiuidora eflc: & acinorum (ucce>, inquit Plinius, inf. m- tibus rxpius iiii fillat Ojnullavcriei iapolrcano- cirufa. Mihi in Hifpanijs relatum cil, tjusradice ufos, Amrricanx Zarza: paril]x loco, nan fine fucccfu: & i Tiukoruno opinio cil Zarzani panllam Smilacem clle novi oi bis.

ROSA. CAP. LXXXr."

NON minus varia Rofarum genera con- ipiciuntur in Aufri^ hortis. quam in alijs plerifque Provincijs. Aliquot tamen ifticalun- curquae ante vidcre non meinini. Suiic & Syl- veftrcs prius mihi rozconipe SU, de quibus omnibus (Uaardine. Scdancequam Uarucn Inftoriam dtferibere ad^rcdiar, quardam de Centifolra ro/a. cujus Theophrastus. deinde cum (cquoci Plinims & Athtnxii'i, meminc- runt .parmitrcnt facte exitlttnavi : & de qui- bufdam alijs rofis. quz poftca admcam noci- tiam pervenerunt, dicctidum.

Theophr. ergo Planr. Hift. lib. vr. cap. vr. fie air. Twf cf 1 PoSuv (& Qha.) £) a, Sopixi & (ft(AA<T, i[stf hhiyiTiT), ^ rpaynr, καὶ λαοται, καὶ κροισὶ κισσῶν, καὶ πλείων κισσῶν, καὶ ἄλλῃ, τὰ δὲ τὰ ἀσκαφυλλῶν, καὶ κισσῶν φύλλα, τὰ δὲ ἐπὶ πολλῶν ἀλλοτρίωνται τοῖς τῶν. ἕκαστα γὰρ ἕκαστα ἑκάστη καλοῦσιν ἕκαστα φύλλα πλείων δὲ τῶν τὰ ἑστὶν ἐπὶ Φιλιππῶν, αὐτὴ γὰρ λαοβα- κιστικὴ ἐστὶν τοῦ Παγγαίου, αὐτὴ ἕστὶν, ἕκαστα γὰρ με- τὰ πλείων, σμικρὰ δὲ ὅσα ἐστὶν τὰ ἑστὶν ἠγὰρ ἕκαστα αὐτῶν ὅπως, ἀστὶν ἕκαστα μὲν ὅπως, τὰ μὲν ὅπως, αὐτὸ ὅπως δὲ, αὐτὸ δὲ μὲν ἕκαστα μὲν ἕκαστα ffu: Cf e H τὰ μὲν ἕκαστα μὲν ἕκαστα δὲ τῶν Tj XLTC.

Plinius autem lib. xxx. c. ip. irn. Nar. Hift. dc Rofaa^nsi je (cribit. Genera ejus nolln feccre celc berrima, Pramcltinam & Campa- na'm. Addidit calii Milcrum, cu) Us (itardenti Umuscolos, non excedenr duo dt- nafolia. Proximara ci Trachiniam minus rubrctem,

Lincolam. Diff. riant enim multitudine foliorum, asperitate, leuote, colore, odore. PauciP Jim a quina folia, ac dande numcroiiora ctin (it genus ejus, quam CcmifoJiam vocint. qi est in Campania Icalia CiGricctatv croarea PliihppO3:(i?i4ib*ti6(lia: terraprovcnru. Paiigurus Rions in vicino rert, nuiTjerofistblijsac parvis: unde accole tr.nistL-rcntesconfenirt, tplaque piantarione proficiunt. Non autem talis odora: iilima est, nec cui hriffimum maxim unique fahomrbrevirerfae indicium cft odoris. fcabritia cotticis.

Ac icnarus verolib. xv. Dcipnofoph. (cj us verba iatine expreflj add am, nam grxcum exemplar p nraanibits non habeo) R<f arum multacffc genera, Thcopliraltushb. vi. inquir, 8; liorum plurimis in flore quinquifolia, quibusdam duodecim, alys viginci, nonnullis circa Phi: lippos [Maccdonizoppidum] cmm, quas plant. inccx Pangeo] Tai] flatas, ubicripio- fiptoveniunt Haruinpuillia valdefunrteriora folLa: iicc-nuiiill. iprodeunt, utin Eii] (ccui alia iint, extrin {ecusa! ia, f<; d nec ampl*. nec odoris jucundi, Suavmsolent quibus folia qm- nn. dtaber est cortex intccior. Prastantiffimus odor Cyrcnisquam obrem nobiliffimura est iltic ro(aCL- iim unguentu Li.

Cjmaitm
"f*"

Odorat iiTiuiani etiaoi apud Cyrcnas nafci, audores fum locis fupri citatis Tlicophraflui & Pinius.

Lfaeoff- Herodotus autem in *Prsnia*, five lib. vin. roras in Midx Gordio geniti hottis fua fonte mfcireferc (exagenum foliorum, fragrantore odor quam ceteras.

*Ceanfili**

AM porr^ quarapud Banvos Centifoliari nomenclatur Rofa, cafi^ cujus prxdicL Auflores mentionem faciunt. hqrc. Nam illi Centifoliani in odorarii eiej & pui illahalH' fco- ha^ LTLbunc Oj-ixacernapud Batavos alitur, non niodor cft Tentc N. V. Ioanncab Hoglic- lande (quibus iijus planca suba iiii M. D. xxix- in icmmnii huntlu, quasci mprarvaluif- (cpuc. irem, corrup (ascircdprthendi, pra: tcrunius radiculx fragr) c; ni: un) Prxncfiints ma- jores. & penndc fere odoratas intellect: fedcriam Francofurti ad Marnmapud Bakhafa- rcn & Caro: um Hoyke Belgas fratref que germanos illo ipfo anno conipxi: fequenrev- ro, cx ncgle & o illo, & i veluti abjedofngmento nata nuln est ftirps, qua: altero annonempe xci. circiter quaii ragenos florestulit, nunomnes tamenciufdem amplirudinis, fed in non- nullis numeraviccncenaviceia foia. eminefcus majorajintrinccusplifdla, ftaminum lo- cum cxplentia, & in iplum calitem reflexa, odore maucm deprelicndi pratneftina', adal- bam nonni hi l accedence m, colo re m prameft narnondiirimilem.

*Cenif. B**
"f*"

Iftius etiam ftirpem unam, que album florem rcraij habere fc ait idem Hogliclandiis, me- di* inter illam & proximam fcquenrem magnitudinis, quam albam rurojore m provincialcm appellari ait, ut ruperiorcm, majorcm Prancftinam.

*tumif. B**
"f*"

Sed & rarus aliud Cencifoh^ geoas apud co/dem Batavos inveniri, nuperad me fcipfic ille ipli; Hoghcbndus, priore aliquantominu- s, lio cft, medix inter illam & vtllgarem prx- nctfim magnitudinis, alioqui, color, odor, forma, convemunc: quod vc rume^ ccxcjus planraab illo M, D. xcn. mifla, (equente anno deprelicnii.

Praxifina
"f*"

Prioris generis aliquot parvas itirpcspoltea acccpiabornatoviro, codemque dodo & di- ligence pii. irmacopo: oDc! pnciifi, Thcodonco Clucio, quatum paucxquxdarn bellegr- m Miarunr, ut permanfuras (percm: fcquente anno una florem tuh r.

titfavrtft-
"f*"

Nopdefunt, q<i Pixnettinamaibicoloris inveniri affcrarit; miiu CCC nondum videre conrigit. niii forte afit quam honefcus vir Wilhdms Oftcrat Francofurtenfis civis uni- cam inculrofuoliorcoalit. Illius rlos mult6 dilucior Praencftina, & : f^c il bicans, perindet* - men tuagnus \$C plenus, in quo nonnullactiam folia obfcrvavi media ex pane candicantia, alrenpurpurarcncia. vellimilis coloris vcnisafperfa. Annoctiam M. D. xcm. florem miln protulicquamad me Hogliclandus mircrat, planta.

Titavrtft-
"f*"

Illi congener cffc videt ur elegms ilia rofa, dc qua honeftus vir Ioannes Rcttau, civis Co- lon iei iis, i: ipriori biis Autumnal] bus nundinis apuci roc vccba fecitife videlicet Colonic in fuo hortualere rofam Prxneftinx fimilem forma & magnitudinc, qua: ut plurvniim dimi* da ex parte Candida folia liabrcct^ ciiquarubrajuccrtiaduntaxac ex parte alba, vclnunc integra alba, modaintegra rubfaintcrfccommixta confpiciantur. Ejus prolc m fequente Odobriadcmittcbarjq uicprK valuit quidem/cdnondum fore muilunidederat, quooi Francofurco exccHi.

PR^NESTIW^

Accipio etiam flavas rofas inukiplicifoliorum feric prsditas extare: nupercnim Vienn* Ao&iaead mcfcribebat nobilis Matrons, ejus ipfi faaamclTelpem, & ah] fc iimilesexpe- clarerc culcrunt. Memimcertcaliquandoviiere, Con(hntinopoliallatos chartaccost] uof- dam hortulos varij generis ftirpibus ornacos, qua; ex cliarta tenuiflime incisa iam atfabri cimfttuac, & l)ngu!* ii" scolonus ad c6dcganwrdepiaxcrant, ut magnam adniiratio- nem & voluptarem ipedoribus adferrent: inter cis crant & fiavx rofx plcn*, kalisrplc- ra-que ftirpes rax & : elf ga rites.

CETERV U adeas qux prxter vulgare iam cobfcrvata cfunc. rcd carous, HUrurauterri varia cfuntpccics.

PR^NESTIW^, quarnvu Igus Provincialcm vocai, valdc fimilisei Prior, nec illim- nus altea (riirgit: info lofiorcdi (crimncft, quicirciter quadragenisa» tptunbus folijs, paul6 ai<p lionbiis, & ftituratus non nihil [ubentibus copftac, mulcis (hmiuibus fiavis umbilicutn occupantibus, alabaltroque: multo crafiore & breviorc, ^uam obc4ul*m £> lff twft vulgo

appellatur

appellatur: odor minus luavjs, & albxfercipiximu\$. Hujus genus album florem ferctis apud Batavos iicr Çnrto jiaua JKHidq^t icupdel o rã.

Valdcfrquenscli: **Vienneafibiwnonas**, & **cotaAultna**, **uollius** nmenapudiJosufus, quaaiaacndaro fitlaciamatju JUL. Francofurci ad Mocnura quседaro ejus Ilirpes Prince-itiais mltzaluncur.Florcccutnceceris luaio,mterdum ctiam Alaio.

Rosa sine spinis.

Hofa Ciuamomcaplno flor.



M v LT i s (titim a radicaTurgit Altera virgis,huminam altitudiieim inrcrdum arquan- R*11 A* tibusfifctililblo&umbroflocupjngacur: urplurunuin ver6longcinfia cam iniigiittu- /-•"— dinem,&: cubicaiibus di.nicaxac,vcl (c/quicubuahbus,lo.¹vibLis&: fineipinis, viridibus, in variosramosdiduE:is folLihib^raljcajlioteftcciiiisaiitquinisunicofx (quxfubafpccrctj in]rcntibus,binistemperinuTfcoppoiltis.cxtrenio impanlakisamplo jConstaiHiajfljca vitiditacc dipernenirfiKia.infeniccanclenti.Textremisramisinlidcnrflores.oblongisbirfutif^ucpediculisiiiliXTciircVjmultiplicifblorumnuincrocoiidanteSjPr^icftinisinajores, medijque inter illas&rubrascolons^ucundiodorisifruflusbrevisjCrafrus.pcnorbicularis, margaritate rubensjinx qalc f jmen & utocete Phe h raltusnotit xz c 54 ut omnia Ro- firumgnerajtanuginemvolutumconi:inec:radixdiirajlignt)rap!crumqic,a liarum inftar, sub rerra propagines in Utcibus fpargit.

Hujuscognitionem acceptam fero C V. D. [oann i Sclirotcro feniori.Tenens Academię *QThuringuPnmaci,&:IU"«)u"1 DucumSaxonix, LandgraviorumThijringiaf, SdPnncipUmCoburgenfium&WimaricntfurHtum Medico, quafia 111^m Principcl'incipum Wi^iricnfitim niatrecamnacluSjiiberaliKrViennam ufqucenihi mifitannoM.D.Lxxvi.Flor^ autem lunio.Vidictiammultosoftannos inquorundam Patriotum horns FrancofoniadMocnum.Necdefunrquiaorealbofconfpexifreaffirmenc.

>- Altutiejugenu5 invcinnunonvaldedi(rimiltbusvirgis, ViennxMtr** cctiam ante *t/fi u qj. ^ u m in cam urbem ad ventum, in quibusim lioris cultum, quod, minores & rajiorefo- •" " * * * ^ onientexcur.icon(tan[csfloresprofert,colorepcncfcuinvinirubri.


PAKI propcTertutltniagnttudine : raroeniinduorumcubitorumaltitudinem fupc- Re^Cr re. *ntem Vitnaobravavi,t>L-qucncibus&: brevibuuaiflis donatam.purpuralcentibus, qui **m)» zina ^K&brevibusfiini'annacHunLfolLorunx-illiiiiiiicsquxinRori.vulgo Candlarcug-^" 'lotncia a*it.p«, lu>i, hoc eft, exquimsaut(cptenUfoli}ss:4^{u:il,mj:cr} fe^atiodiftntibw ^nituu.utiolliinc.alceroiide.geniculacimcoijugatinKjucicmperadlixcente, unoqucin ° * c mnl re: r)u p 4 r u e v d ! e ; i i c i d i e a p i s : g l e r m * a l i c i o °>:* roXliniiteSj led nujorcSjSimulcipltcipuiilorunQfoliorumglomcrationeconftantes, quena

quemadmodum alba & Pr^K-ftina:odorfero^ioalis in Alba vulgan'plena fruftrum nondum videlicicuitj TainctimukisaniusilacrLiims-. «>« radix late admotiumLrpii, Stvivaxftt, novas virgas fubimk producents.

Ennarali
saly,

Vndepriimitn Viennam allaraGt,plcriquedubitant: nonnulli ramen exTyroleni Comitatuori nemduceret:xi(timant: ahj eG-illia Molchat^plcnorubroflorenuine raiffm. • Tune inomntbus Cxiareis hoTiis,qiitondamqi Ptincipum viroimn , & Nobihoium matronarum.&altorumqiM herbaria?reiftudiooblefantur,alcbatur;muli6vcrofrctjUL'miorem polleaapud Mag^{Cl}ac Generofos Dominos Adolplmm Hermannum 8c Geortgum 9liebt(tlittEpUa^>Ati)lpattic^e\$, Haflis Marelchalcoshcredicarios: fed omnium frequentifO-mam Cafeellis in amccnifTinio cuUiffimoqc horto Ill^mPrincipis"Wi)hcltni Landgravij Hailla: Sic aliusmult6,8ilup^ahumanamalncudincmfe(e attullentem , ititcrdunicnam Autumnorurrusflorentem, qu-ctamen Harem minus plenum fupctiore, qux Viennxcft, hibece mihi VI(J,& (olonsacque ramosmimisrubeatcs.

Rofa campeftris oforato fiore. Rofa campeftris cum fuo fruftru.



QUARTA humiliteft & fruticofa, folijs illi euz album florem fert, perfimilis: fed eius flo-
sj,liccralbi,longemuiors, nequeunquam plane fcf explicates, cjuftem cum alba vuU
gaioJoris&colons.qoi tamcnp'uscarneiadmiftum habet. Paulo (cmis alia floret.

7"
i.
»m

Hiiicprimumbfervabaroincultifs D.lnan Aicholtzjhnrtto, undeillamadquifiviflet
"rtru; deinde FraiKoforu a 1 Mccnutn m qtiorundam Patncinrum horns. Plurimtim
mcojudirioaccedere »ideiurad Gr*cu.latin Plin qnani lib.xxi cap.xxx defcnbir.

QvINTA cubira!ibu?attquoc,aurad (i)mmum,fcd ranffime bicubitjhbussaffurgic virgiS
firmSjdLKis.tigtwti^rubcfcentibu^jdenfifTimolp^n»rum villannuvi»s, exqmbusfrfquco-
tcsconfufoorJine nnu'imr fptnofi ramuli.virides.finjvuli fuum florem fuftineites^lbum,
odoratum,quin que folijs conflantem,lutez aut Canelle roze vulgari Culm;capiffa cels
q U a m f t a n i i i l b u s t p o l b s medium floris umbilicum occupamib"
frufiusrotunJi.is.bri.'vis.tnitiovtidis,lcincle.plcnaTn ma tunc a g e m a t . I f f a r t
u o a . c a n i a u r a l e m q a c o n t i n e t u q i n t e r e a m q u e l u t e o s i m p l i c e s f e r t f l o r e s . &
illamqurabag^ribusioquibusrponrcprovcmt.fiveap^pinellxfnliorumlimilirudinc
nomenapud Bel<risaccpic (tmnvt rofin &pcnprni(Htroofncnim apptiHaht) fere media, p<<
ambitum f?rrau Sc nulhu^ fplendoris.raJix dura, lignofi,in diverla rendir.

Invcnuur muliu circa Viennam locis, prxfertim editionhis* montofi^ Floret Ma
quo tempore vul ceru b eres p i m o s e t u s a k s o b b o r i g d a m y h a l e s i n o r u m
deferunt.Fructus Augufto maturefcit.

SEXTA pedales, atque aliquando cubitales, etiam ex eadem radice profert virgas virides, lentas, et...
Liliiepaucis, [iif cine mulcisfpinisrifciKCS.folioru alas rubrarjiiujlunas.qiiinque
jitem tol vs lupeme vmdibus interne candicantibusco iltanr.es; fummisvirgis &ra-
mulisLnfKiKLiKLiL{atism.tgiicahces(ivcatdbafn,liir[ibarbaciuc, quaicis in rofis lubris <
simplici foliorum ordine conitantibus, ex quibus deinde selexplicantmagnar, nononini-
no odoris expertes rose, quinque folijs proutz, immo rubra, deinde paulat.m remittetite &f
quasi evanescente rubedine, carnei tere coloris, multis luteis staminibJ<, florisumbilicum,
qucmidiiiodun]i(ia!.jsrois,ocupantibus:fructus ruber, rotundus, omnium maximuslc
pyri inmodum turbuiarus,fulvc(ceitcpulpa, inxqualiaalbaeminacontincr.

Naditui passim in ceduis iilvis, aliarumfilvatum maiginibus, rublimioribus&defertis
agnspi r Aultnaminfciorecm&utiLveifam Pan no mam." Floret Iunio, fru<Susmaturefcit:
Aui;allo,5i plerumque tota hieme if fi ftirpiinliatret.

Non incpcc meo qmdem jud... **ecturhoc Rosargenus, Latine Ro-**
fa pumi !a. Autlnac i -erbtorn wrt **V ngran veto PARagi rofa appellant.**

RVBVS IDAVS PLACAE.

CAP. LXXXII.



IDAEI rubigenusmihiaftendcbacC.V.Ioan-
ncs Flap Medicus& Profcfibr Valcnnus.co-
dem conbio, quo Perfca fuperiusdefcripnm,
primo ab utbc Valcmia niilian ,(Inc fpinis, folijs
rubi inollioribus, longis farrnciuis per rerra fpar-
fis, cujusfrufum tticcbacRubovulgari mino-
ICTn>aliis illi admodum (imilcni.

1 Anfm forteparbuit Plafx ut hanc plantam
rubum Id^umccnietjDiofcoridis Latiniisco-
dex,quicapitcdeRuboitla:o,qui)d dim quarto
11 bro,hxc verba] *quanqutwi & pat fyinii wve*»U-
;<r3aiidicaJijbctjpra;ccr Gr.reicodicis ridem.

CETEHVM in Auftriacis STplcrifque Ger-
mania: fil vis fponte proven it Rubus ille baccis
live moris rubris, no modo (af oris ,fed ctia odo-
rirraria comraendaris: EumGermani^iibr/
G/M fm>&otfcr, frudlum framhotti appellant:
peritidrcsldxumefleccnfent, dcquolii ofc.ut
dhrij lib.mi. Plmiuslib.xvi. cap.xxvn. Nat.
H ll.&Iib.xxtiii.capxiii.mlicvetbalcnbit.

IdxusrubusappellacuscU.quoniinlda.noD
ah.is, nalcitur. EftautcmtcnoracmiDor^i-
nonbuscalaniLsinnoenrioribu'que, fubarbo-
tJm umbranafcens- Htjiisfloscum mclicepr-
pliorisillinitur, &ignibu'facris, ftomaticifque
exaquabibendusJacur, ubiftomacliiciilcgen-
dumcum Diolconde: natitlib.xvi.cap.xxvit.
contra ftomachi viciabibiferbic.

Rubus porro idariu hicinliortiscoliturduo-
rum generum, rubro videlicet Si albo fi ucta.

RVBVS SAXATIItS, five PETRAEVS.

CAP. t xx x u I.

PEDALEM nr>nsuperacaltitudinem,tercibus, fubrubentibus, & hirsutis viticulis, in
quibusbnaa utternafolia.Rubo [da>aplcncfcjocnuncupatopcniGmilia,hoceft
firnul<codempcdicalonafcncia,nigofa, noahirfuutamcn, Qulli'gae fpin< horrcDtia,
valde exiccantis & adhr...
cu m n] s Rorcestjuidefcrt({cdcujsforma:autcolons,igrjoro, vcnfimile est Rubo idaro
•ut hum ill pares j deindefrudumrubovuigariautldiominorem, hoc est miiiorcacino-
f u n micro co iftantcoa:eteaimbmojtancim,ternos^uasernos,aiicadfuinmQmqainos
^Qoilla bct] IongetatnclntndjrcsqiUtiniduliodihibv gnt r f, on a, & d d
ticciplenos,utquodarnniodorxanrparcine^K:idt8palatieratiffigiiftporis: continent fin-
^uliiifacmifingulagranajaiba rugofa&iiucqjialia.adftnricnnsnguftus: radix lojiyclatt^j
*rpit,5clongasin6:r3urflviticulas huxnifpaigir,quaffubindradiccsagunt.

Abunde provenitafwofiscoHibusNeubergnionaBtmtrtinineQtibus, fub^eHldimo
jflcmno-ninismaite, cujmfummuaiJBgunapcrp<niaflivcobfituiB.CrcfcitA&malis
puli<;quLcircacclitlimorummonriumpHucsluntjiionmiplisniontiumjugis. Augu-
mcntccolligcbau i maturo (uofiuttuomiltum.

RVBVM

Rubus Qxatilis alpinus.

Herba

Quercus

Rubus



CHAMAEMORVS.

RVBVM faxaitem five petmim appelli-
 vi, qui lulu f'ixolis &: pctruliilocis inVenf,
 aimi cnim nomen magi- propniim mihi non
 fuccurrebar. Rull!CimoianH?Kf>trjio> til
 pecraus biCCJS vocint, ^aMa*6aT0!;T!K0| lira-
 fti non inepte mco judmo ccum dto potfLt:
 G 224 IVJ Dtrabum incerprecaeus est Quan-
 quam proxi e u l CKimA'b.min cuam .i,cc-
 dat humilis ill: rubus^>Icnlaue Belgiixlilvo-
 fislocus & agrorum ma-gmihus intercum na-
 feens, bactis ii, e moris lacculeDCH pjucis fiC
 exigitisacimsconflaacu , modnigris, mod-
 dexrulcis,paljroatlmodum^r,ttis. OrcupdC
 ctiam ille multos Auftnf 5i Pannoma agros,
 Vngarij [zr~ff>y diciturj vulgans vtro rubus
 cbpkrfti&Lfely %iir,idefcterreflfn morus.

Notusamem Gtfafe mhaviddwMe fu t hu-
 milisht rubus.cuincieintjfer^ptioiit- n.on-
 cisfracti Iriarumapptlui. Rubus nl*us mquit,
 frJlbf ru, abfque ullislpmis, hnnnlis
 planta g nol, radifj b j b u .vel f i y, i c i-
 nisbi ns.cernis.auciinguliiii unofudu aci-
 elolaporc. m Cixo. Mcminir & in Fpillolis.
 Si.iilerusctiai] Commicnrariodc A'ptbus.

Sunilem plane mco (uS haccis onudum,
 eodemque nomine apud moncano! pafloies
 iiiJigintum, ex Stlcfiacoiontinisfcopoliscru-
 tum , ad me mitrebat D Achill s Cmmerus
 anno M. D. i xxx quemcopio'cad nieta.li-
 cas Ebdkui zuertnamtt iuici puitca lenbebat.

CAP. LXXXU I [.

Chamaemori

Rubus

Rubus



INTE R mita Rubos ctiam cenfeiidj efl
 hicclogansphnta, cujustcoemft! hi hfa
 riainobiscoinuniabat C. V.TIom*sPen-
 11*115. Levidinclis Diedicus, lupranicmora-
 tui.Clumxmori jppL-lla[iuncindiu

DODRANTALIUV^ aotCOL prxdica c(l viti-
 culis **inquibusaltracraatiiDma,qu2tuor,rarnJs**
 quinquCj folia Icabra, malvz, vel pouiis mori
 [ntViffVtdiltett & J>nrhUiriBJ4,r/ utiu. lattitlt
 cumRiffvivrartifot/ftcp>ftrre]t~oi] <. mm »al-
 dediflirmllLa, iuuinuicq prcipuas panes di-
 vi(a, jjipcrambitum lerrata, lunguptdiciilu
inmxi, qu ex binis alts five apopnyfibis cau-
 liculumampleOlfiticibuscxflHit.iummucau-
 lcm exornarflosunicusqumq. fnliohs ex Dt-
 gro puTparafccattbuscoolbns. Frufusmori
 tpiam[r>tiv]j£*rBVirtm] fimilimus (uudc
 nomenj ledpaulominor.pTimum.ilb<r.ii^K
 ti-erbus,po!learuber, ezacerbpdulcis: radix
 jreunque nodof a, ex Sugobi nodis patios fi-
 brn(pirg. Jns,mircckpr<ipagtns,&q«am long-
 >(Ti me ferpem, adcoutbrrvitetDpureiBfl'i*
 mum (pariuniuccupcc. Flora lun.o& lulij
 tnicioifruchis Auguftnroatiiniied

NivDla .V jpcrra loca amar, (umnHMij]C
 tnoius, S i i m d i m g e r i c a s p r o v e n t
 Dnoe Englfcuow cotius Anglix celliflino,
d k d d I b i L ancathra.

A^ ;LI kwbrtrrn appellant hoc est, nodu-
 famha cam, afroSanodi^fimili. G ulsu ad-
 ft mgit,exlicca,& refrigerat.

CHAMAEMORVS.

> H. **V. FMOR** Imperion valde affencm in Norwigia & finitiimr gionibusnaqicex
 publicumialjfcvp Hoicn Medici, ad prxflatitium Wrum D. l' Ltrum Pau*. rj. n
 CJU^U*JhlfvioPl pud Bitavos AcademiaPiofL'fform epifuLi iurelligeha: qm &
 mq orcimci-clurtularscpolicas.

mq tcima^ digitalis longitudints, fufdcoloris corriccobduftx,
 qWibusin. i l t b l i R b j l p d H l
 .iliqaomciniastdivila, cnbufqucnmncnoribuscenssavef
 snuulta; vciizaJ circuinfl-rentiam (pirguniut, in am bitu dent.ua: a
 ^loii^iorciteinioreclqiicpctilrlfilacmcjlicul
 tWBrftjsem
 pnribusmu p: b HonTrufus fuccedir, fra^i
 imgnitudinc, p^ cu jus interior putpa molhs, Immida, mucilaginofo, ext-
 liumacinulor rftla, gulfii non inu. ivis.

Paludofis & hmbi j l o ^ j n ^ r c , ex Hoieh fpifh>]. ididici, &: *maturir. item aiiquheTc*, v. /A/<.
 fructum, menfibos lupio. Qum liSextiti: abincoJisver6'3J(H(trt<iiipll

CETARVM q uzconq' andi j us fructus ratio q nam ad j rabies e jus facirates, cum
 exipfiusHoicitepiftoli, mniexijsquxipfcannofcxro&rnonigfiajottjpra milldimum
 5iqui»^en: eli[nuniprxfcnsniilii Lugduiiicon(irmabar, fLibijcert. li'

Ex ipIbfritiitoinq^utrijEtcdiurium) rudiminerviconficiuiirquorannif Norwsgij. atque
 Pilimarlij, in liunc ternif aiolutn. BCCJS in fiftili aut abend per fe atfmedincrcmcouli
 ftentiam coqu unyiuillo alio addico liquorciciim enim fucci plti? ilut &: moJl<, al: eno lui-
 morcirngin noncxpetnt. Qianquam indeiicationbusfuricnonmilli. qiji nicl|^B i o-
 ncnfisiquofummc delecbrmutSeptentrion. ilcs ifliJaliquidarTundanr. Hanc confeS^Bem
 idonci? vaiisexcpram, &: nccorumpicurarabarnbientcacr, bucyrodiflolutoobdudjm,
 ului ftaJioftmrcrtvint: noble lane, &: probatilimum llis advcifus fcorbutum reme-
 dium. Etcnim non facile ercdas, qiixmiracutailhgens, tol, ihac m^dici. i faciatqtotidici
 ucomninoarendumllt, nihilad hancfTc vel cocJilcariam illamcotAicoiinjslia^cnust. c.
 lebrat. im, vel bccabungi. im, vel lify mbnum cardaminem, 5i id genus atia, qmbus Germam
 fe fffLr. Et memo admirandaingularrs Dei benignitas, quod Noidlandiarlorgiused
 Septentrionem remotu, & jfocuiiffinHJinorbisobcshloliq^incltfmciinam roifcrabiliterlca-
 tenti. g j p r o r p i c c r e volucnE: cnnvcr6morbormncrudorun], putr!(Jorum,
 nicljnchoicorum. niira liic ubique feget. Idorco **ICCL-ITICIS** miftros rufticahrs varij auxilia
 d e u l t a r n i e v (g r v i b p l u s l u r q i d h a c c n m m e t e r n l m e -
 den reiac. Icano[inu]lifcorbuticos, qia[H vis r]dicule, camen bene arque utiliterl. Line III rro-
 dumcurant. ILivtcinamaltquam infulammorisabundafitemcxponunc, ibull-niq; Joins re-
 Jiilo.donni nolitranscruiu, priufqujm (initatifine icfhrtuti. TLiniciinillj. quJiaboir;-
 QihuaauatccxcluG. yitetamen (quodredibtlec-Itjcupidijinonsiltsvdaengiinitjr, li-
 ve ucfxcinoremed 10 prumifTun fanitarem recupeisietencient; l;veitlicin] qu3 nt
 miin rKrxtanfDumqihocadfatittarcmaamt lincdubLoimrdpauc
 oppidocoiwalcfunt. Hicme veto cjuando sd non licet, **lectuario** fuonon minusrdiciu r
 utuiuur, line cercidoli, **aucufflodia**. AJiqui cococuracionii cenipore, nulluaimaiimeuco
 ucuntur, Hactenus Hoic rus.

S K D feilleipfealrcriusaijufdam Bacciferx. fimilibuspinc fupcrion folijs, a fein Nor-
 •Wc^iaobfctvatxhifunolammihianoM. p. xcvi. conimunicabat.

PROXIMAM [i/i<>-/o^i/Jf;/f<]inquit, hudenirnerctur, fruricbiaqu^damlrirps, c[t]? c'w ma-
 Ribedurn foliolis & rfruLu. proruapropoftioncaJefixmijtatur. ut n6dtibiccmteiti. ini KL £
 bclij fpectcinappcllitarc. Dodrantalisen. corticcpettoloruninigrif'anrCjfblij'. bcis. diflcllis'
 virish]iioruin modo: baccac iicujtifqucpediculiaptccquatnplurimcccirijuiicl-ctiimq' am
 inunibclLi. non. utinvutgariRibefio. enHiltisoblongiuccraulispfiideiKCS. rubeiHjacidu-
 l' (apir svalde graci. IncolisCctirtttKniiuncupantur.

C v M in Ribes vulgWU mentionem incidrimus figpificanJifnocxtfttmavi Auftriacas Sc
 Sttn. icasalpescjusquoddamgenusalcre, Dihil, velqua [nn] JiimumavuI gandtrtTcn5, t>u- M
ftuiamen non acidified duJci. J**8*

Eflprxtetea Scrundum genus amplioribus foijis & majore fru^u. Irccr acidi fapomur >. (.n.).
 ^ulgansitujuscnim flos van. it, quiaqui in vulganherbaccicolorisdt, in hocceleganteriu- JJ*
 bct&puniccuseft. An huic iimilisqu. nn N. V, IoanntaB'>i (otin horto Brmellisalebat? ^o'''

Mittcbat etiam anno M. DXXCI x. aliud Ri bes genus ex Anglia accpuru i n ad me N. V. Cz-
 TOLusdeTallis vcredjrtoruin AntucrpLtrpxfectus, quod uvi' Crirpxrubrofiuflii, ipp(;lla-
 iWteinfcripnimcrat. Pofteacafncnelaobi Garetipiftola Londinoad me nn(s, itrudiani
 ferjciitellijjebaaitnicuscniinifriccxflarssquidcintulit, deinJccorruptuscltj vitruan li-

uilem,



Ribes pil-
losum.
Grossularia
fruticosa
sive purpu-
rascentis.

mitem, paullo majorem
rem ut in uvâ crispa.
i, confertim ttraen in codcm pediculo non nascentem/cd fingiife*

CERTS RIND;
ribusq; folijs, spinas ad singulo-
nullas, breves & vulgari multo
mis cortice ex fusco purpurascens
ris iostar virentem, qui matras
Inremconrahicprindcacnonnullapruna.

quod paullo in
g
pg

j^). <<' <<* . Vn¹ g^{ari5} taracn g< iusctiarainvcnirurubcriusnarcei << , 1 I M . U r t * .
e* . ! busbaccispr^ditura. "cnusnaiccns, aropronbufcjuccfolijs&njajori-

i' > r*
obscuro
dam, teste C. V. Iacobo Dalechamptio, hunc fruticem & Grossulariam sive uvam crispam
ine: an verò Grossulariz hzc appella-
phrastus nullas spinas (quem Gara
adeo insignem & singularem diligentissimus

AcquumterVcMraeffterb^
&acc<<rar,ffim^us(Sorhr<<Wub1?^^^
in

Ribes legi-
timu. Drab.
Walsl.
Berberis vul-
gar.

De Ribes autem legitimo libenter ac quieto sententia C. V. L. Rauwolphij, qui nascentem
ejus plantam in monte Libano observavit, ut ipse lib. xi. cap. xii. suę per ea loca Peregrina-
tionis scribit. Legitimum, inquit, Ribes Arabum illic inventi Septembri mense, tanquam
primū, & præter anni tēpus erumpens, sine flore & semine, duobus duntaxat folijs prædi-
tū, hirsutis orbicularibus, Petalis foliorū vulgo crediti amplitudine, quæ brevibus, sed cras-
sis & nō minus succulentis, quam ipsi caules, pediculis inheiebāt: e quibus caulibus fit (quem
admodum in Halepo conspexi) legitimum Rob Ribes Serapionis. Gaudet humidis locis, cras-
saria habet radicē ex nigro purpurascens, longiusculā, rugosā, incurvā &
tis ingrati saporis: caules, ut præcedēte capite adnotat, pene cubitaliter hirsuti
virides, inferne (ut etiam Serapio prodidit) purpurascens. Ant
loco observabat Petrus Bellonius, ut apparet ex libro, in quo de
CETERVM per Vngariam, Austriam & vicinas Provincias, sic quentissimus etiam est spi-
nosus



CL'iuacisdjplirjoidislatifolia,



A D contm aute m claflem non dubium est qiiin referenda (it vulgaris i! a omnibus, quas Jii provinces, pbnta. vicinis arboribis & fcpibus fefe implicans, crafilis, rugofis, tit, folijs **quinis** ex uno nervoprodtutibus, guftu acribus, floribus aJbiSj luiiita ihT-

nofusillefrutex, quiinofficinisBerberisappel- *Kmu*
c. Vngaris ir'om bar bard, Sefaiiffakai hoc
cft, vinum batbarum, & arborcaacer. ora, nuncu •
para. Hadrianus lunius vircruditi llimus, & alij
do<3t, Spinam appendicem Plimjefleccnfnr.
Ego. tamctfi illorura fententix facile (ubfcricbic
p
retinent me tamé dubium & uzdam no-
tx peculiars &: manifebe in Crefpino, fi vc Ber-
bcri officinaru m, qua: i n Spina: appendicis h ifto-
rianonfuiflentprxtermiflx, ficamintellexiffcE
Plinius, nempeflavura lignum, & magisftavara-
dtx, cciam ad cinjendum apca, deinde trium illa-
tum fpinaru ad fingulos nodos perpctua ferics.
Sicverdcgoxitolimo, Spina: appendicis *defcti-tyW*
ptioni non minus belle quad rare camSpinam, *xstun;*
quspassim conijJ5, prj/crcim apud diJigentes & C
airiofbslororum in Belgio cultores, macerte
implexajxcimas lio^torum orasambit, rubenti-
bus baccis focundas, quam Gcrnani *b<St?nl*
Galli *Akbt e[pine]*, Vngari *GaUgnja fa* appellant:
vulgus Herbariorum Oxyacanrham nominar.

PK /ETER verd multipliccs facultates Berbcis
Vulgans^uaro officinis notajfLint & a C, V. Mat-
thialodelcripw, hoc fecretu ab amico accipie-
bam: vinum album tame, in quo medianusille
cortex qui inter cxtimum & lignoadliarcentem
eft, lincopanniculo involutus, per trium hora-
rum fpatium maceratus fuerit, rairificc, fi bi-
batur, purgar.

Iftiusporro Berberis genUSj Afcharenburfjiad
Mocnum quinis fupra Fiancofurtumilianbus, B(fi< rji
inveniri, cujus bacca: five acini grams interiori-
bus careant, ad condiedum proculdu bio apiifl.
mi, non modo intelli^cbam, fed magnii cjus ft ut-
ticm inculto horto ioannis MCilerdi Jigcciffimi
Phamacopaci & civis Francofurtifcoipicibâ.

CLEMATIS. CAP. LXXXVI.

CLEMATiDis duo genera facie Diofcorides,
& diverfii loos dderiblt. Prior ^k
cogoominata, VLi]go Vincapervinc3, quonomin-
ctiam abipfo Plinin vocatur, qui lib. xxi III.
Nat. Hifi cap. xv ^Egyptiam quoquc cognomi-
nare yiderur. Fjusaurcm binKfuntfpccics: Vna.
vulgatiorj CxruIcOjiitplunmiin, ftore, fedqua
cum ctiani vanat, ut nûc abu<;, nunc fubpurpu-
rafccns, qualem apud Allobroges Tpontenarcn-
teffi inter vepres obfervare memint, prarenim
circa Laufannam, cumq; inrcrdum aliuflo-
n medmrn compleflentem: Alteralongcamplo-
rahabet folia, craffiores viticulos, majorcf^jflo-
res colorc caruleos: ca ffonte nafcitur cum mul-
ns Hifpanir locis, turn in Narbonenfi Gallu,
magnaprarfertim copia circa Mompelium.

Alrcra Clematis a Diofc. lib. tin. Plin. lib. xx-
iiii. cap. xv. def(. Tibitur: ficu Iratescnim ab utro-
que Auaorc trad itx conveniut. Hujusvariag-
nera inBe^g^ci% horcisa) untur prcgrc acceptis,
quoru m ta n dem coloniam in Auftriacos hercoi
ctiam traducebam.

Clematis altera.

Acragne Throph.



ciinaxumbilico product nbus, ocloram, quibu\$ruccc(iurit rotunda capita remii is finul
congectij&capillacra coma ooafti.

Afayu
Tbitfb.

Vitis filiflora
321109.

H A NC rcinerbarizpcriidflimuj Anguillaraa Tfrt^ii-w.cujus Theoph, Plane. Hift ltb. T.
trap.x.mcm]nit,cfl(;ceiifer,cuilubens.i(fcntior,inuiper pliniolib.xvr.cap.iln. Nacur.Hift.
Vitisfilvcftvisnommcnotam fu:ffca{rcro,utetiamcu)liber,utriufq;Scriptori5 verbs ron-
ferenti,facilcapparcbit.Nam Theophrastus in hare verlu fenhm&vpotJi faff/^o/s/rev^ ^*

>nawroxOCI^II?. Plinius vcro. Teriurerpo lignum ligno, igncmquconcepitattriru, uv
piciiEcniaaridifornicis/ungijVelfoliormnfactlimeconceptuen. Sednthilcuciapr^
llantiusquaitcratirjlauroqiaaEtrat.Probatur&vitisfilvcftns^liaquam Labrufca, &ip^
ederxmodoarborem feandens. RuelliusaGa!lisr«r«diciftribit. Germani^F^Bto3ppV^m
lant. Ulius farmemaego in Pannoniaconfpicibam brachialicraflrudmc, nodiscarenti^a
ercfla, rimolotontcvitisinilariefVa.haHjeinterdumlQngitudincfubvafteisaboribuS, K
btramosfpargentibu<, quibus(eimplicaverant, crercenna.

Zamia.

Vitis filiflora
321109.

Vitis filiflora
321109.

Diosc.
Zamia
Clematis
321109.

P 1 1 N i v s Lib.xxi ii.cap.i Nat. Hift.aliam adhuc Vitcmfilvcftrem pruferta Labrt?^*
dirH.Tentm]gnicul.itafn,rimo(bcorticC) baccis rubentibm,quam li quis diligenter confc-
reicum VitC^lvctiiDioicoiidis.onamcantleniqueftirpcmaDCisdcfcvibicoDipenctEK^11
auremPJiniuscJrecredit,quamvulgusTaminiam uvam vocar.

CLEMATIDIS porr6altctiusrcmentritum, pituitambilemqucdctraherc, inaqu3authj^
dromclite, foliacjiuillicalepras purgare, Diotcoridciauflorc. p]inius,ucduimus **
qucin racoioi wtnus Libto, ptot fui fia^ile5facuUa.tes ci criubit.

CLEMATIS ALTERA BJETICA.

CAP. LJCXXVII.

Clematis
321109.

T J E K E C R I N V M eft hoc Clematidii genu5,&r a ncm ine,quod fciam,ante quam cjui D-
l ftoriamcvulgarem,obfervamm. Longaautemhabccfarmenta.lenta&ranofa, bin*
pcincervalbcapreoloscontrarijs /etnper inter (ipc)culis nalcentes profcrentia, qsbu
vjeinasarborea&fruticesfcandit: foliapynfcrc^moratamcnjdura, vitidia, in ambitu^0n
cifafive lemta, aens & fervidi gudas^ngulana in lingulis pedtcehs. (ed plurima iimuK
Ciu live Uraa, acnSOCIDVITU^UHU^LU^UUI^ in ler^UUV JCCummu. S^*
clavicuhrumal]sprodcunna:interciuar,extroque (ami tutor um laterc pctiiculi
caliculum Tichymali cavcolis feu labdlr* fimilem luftinenics,ex cujus medio cxili. - , &
jum ex tnulris(eminibus nnlio arq;tlibus coofiatun), quibus iniident oblongi cmcinni,
-, lbx quod am n:odo villofar plum uk<

Hw^c

Gemaeisaltciu Bxtica.



Clematis ezru Ica Pannomea



Hanc ftrpca primum inveniebam anno quinto & texageimio Ripra milidimum & quingentdlm urn, inter Afuidum (vulgo iit dt). t f/&t)« appellatum & Calpcn, (ecun diiniflusnta, viciusaibufcitlas openencem & Uio pondre depiimtncem : dcimic alijs Bxticx locis, Ianuano jam fuos cincinnos explicancem.

Now dtibiumcflquinad «Ae^Tj(Ta, cucus Diofcorid. lib. mi, mcminit, referenda fit, ciim & formal ternpetamenco Gcilh valde limilis.

CLEMATIS CERVLEA PANMONTCA.

CAP. LXXXVIII.

TAMETSI hic fructu cibum fecerit non implet, ut (uperiores, fed fatifirma lit, nec adminiculiscgar, Clcmaidistamcn nomen impofaj quiacjufdc mertnfmpramcni, & floremplirpure^ClematidLcferimile haber,

Q^ATEHNJS mircm velqumis a(Tun;itfarmentis cubicalibiis, rcf. LS, duris, lignoiis, fulvefecntibus, quadrangulis, ftrutis, quibus multainnafcunturfolia, aklepiadispi-ncfolijs refpondentia, binafempennterfcoppofica, qux imtio it(c invicem aniplcc^Lntia, fulli^cull, auc tumentis veliculje formam exprimunt. dcindcc expanduntur Jataj Vcnofa, nan valddura, fervidigitlus, quemadrr-odum Flammuli Mactbioli foliirextremi Sfarnientis £c laictalibus ramulis qisibus divifa funt, fingulares propendent flores magni, quatuor folijs crucisin formam dccuffatis conlhntes, dcorlum nutaiucs Clemacidis. alterius purpurearflorum modo, mucronibitsumcxtcriUs DOXmhi) reflexis, eleganti exrulco LOLORcfons (aturatiore, incus diluciore prsditi, non nihil odoraci, mcdiru Jliuni occupaatibpi multis flaminibus villuui ex Havo purpurafcentibus: qtiibus fuccedit'cnien PulfatillB femintfcrcfimile, in rotunda capitula, & velut pilulas Atragens glomerato fructui iini Icscongctam, Songa villo^i, rclrcxaqiccbmaexornacum, nulhusiterin'ioiii. T particeps: radix i. uiscrafsa/armentitia, inultas obliquas ficfulvefcenrcs fibras fpargit, pcimJe atqnl Clematij altera purpurco flore. Caulcs live farmenia iingulis annis ad raiJicni u(que marccfluntji incuntc ven novella, tre^ucndoraquccx ip/i repti Jlu Jinc.

Invenitur Iponte Qtfcens in praxis circa Stampfen duobus ultra Pofomum Vn&iri.^ miliarf>us, & al(js flf Panabijrijiffifir (ypra Polonium, medio fisi Airinere jnterearji urbco & Tuben, ubietiatn legcunamrubiam fpotuc crcicncem legebam. Floret Maio 6i Junio. fcmen maturum est Augufto

C v M primdm Viennam Aullria: aprlle rcmannovidelicct M.D. Lxxiu, illiusitmcn mihico in municibat doctil Timus v'u Joannes AicholuiusejuJ ut & S Mcdtcus & Profeflbr publicus, Clymrn! nmmine, qiiottiam ego

(pbntl ftaiidum confpciJU) ad amicos in^Bc fgcamiui Kcbam^x co progiucitplar. tr "

Flammula Matthioli.

Flammula Matthioli
var. gener.



Apocynum t. latifolium.

Apocynum t. latifolium.

Apocynum t. latifolium.



Apocynum t. latifolium.

lem appellationem iftic retinucrunt, licet anno
fcqunte cum Maionice, quibusdixilociiflo-
rentedprehcJiiTcin, (eduloamicos moncrem,
Clymenion fimfc le men quod mileram, (ed
alterms plantar, quxati Clniatidis alteriusgc*
nils aliquo j verius refern deberet.

CETERVM Clematisilbal:cra, five Flammula
Maectholi. cujus moifo memini, ad6brcqu«
in Auftna infertorefc Pjnonnia, ot nullz tint
cedu^ (itvXjpTifenim cini"afvsviotum in Dmu-
bmm delabentium npas tUs tu m ciacobos in-
undari (blitasjquse ei aon abundant. Duoru vc-
rognerum. abijsquidiligentiii sobrervant^fle
dcprch^ndicur. Viueiimi (irmcntatubefccti*
habte, quemadmodu & foliorum nctvos & pe-
dirulos, pricoctortieft, & odoratiifertflorem.
Alccrius auttm ^armenta cum foliorum pedicu-
lis vircr<;unt,&: florem fctius proferunt. Homa-
nam verdalcitudinem urriufqucfarmftautplu-
im u m p c r a E i r l , S f i n g u l s a , e q j f r e -
quencioiaineunce vtre (inarcidis & corruptiis
prionbus) renafcuntiiir.

Huic protiuslimilem mihi natatn mcitlini, (c-
mincabamicomihimiffo Cciwatidis flore al-
bu pleno appellatione . An vtro calis reperiatur,
me lacee; mihi certenuiquam videre eontigit.

APOCYMVM. CAP. LXXXIX.

STIRPIVM quoad Apocyni hiftoriario a Vrte-
nbus traditam plminmm accedcrevidemur,
triaobfervabam genera: quibus&quarrAitnad-
di potent.

PtuM! rtipcpollicaricflcrafficodine, brevis,
cincocco comix rc&us, m piurcs alas u'vf ra-
niosdivifusjuui licet Itci fine Sc vimina, raro ta-
men vicinis fruticibus icfc advoivunt aut imp-
cant, fed nullo admniculo cgentes, per Cc fubfi-
ftunt: fbliaperpeiLidgemiiuinerfcoppofita, ad
fin^ubs rjmorinn imdos ad»afcumur hede va-
i f a f o n g l i o r a g i l a n j v l a t i ? c a n k o j , < j u i -
busvullisaut fradis, exatbo pallefcens lucctu
cmanac^cupufilhiijatbus, AfcJepiaJi non di-
tuili'i, ex alarum iinuquaii umbella[m] prodic.
Frudum nanobfervaba, led Afdcpiadisfrtyiui
pancfimilem imt-lljgcbafemencertquod hoc
nominealiquunndoaJ memifTumfuir, Atlepiad-
coparcrar. planum. in medio aliquaiuuju nru-
mc(cns, nigrum, alba inrciore pulpa , quod terr*
comiffum. non dtnaturn. Pbnrani aurcm ipfam
lur icrfia d i e p i g f i d e o & g f l i g r
accipiebaaCV. AIpliufo PancioScremfis. Fer-
ranac Ducis Medico , 6c Acaiemct Profcffoic.
Vidcbam deinde Caffcllis apud IHufirifs. Principem
H.ilti?&:Cattoriim ^illiciniumjSc Clarift.
viros Camcraruim & Aicholiiium, ltd & ego
Vjcnjc Aufuta; albam. hicmc quide folia aHj-
cicntjJilliusaucem mclcmctmifacilefercntcm

AL r f R VM atuplexieju Ic eft, victms pedamenti
Wfleconvolvensrnuliislengifltmislarmeniis.
quibusetiamprxalcarumaiborufli vrcinasnan-
ci(catur) cacuminafupprac^univcrftcafafniaadur.iji^imf.ilctita.fraflii invifla.rutilant
ttJexfufocolorii.multisiiioJis.ilvegenicuiisidiltinAarcquibuibiria/cniperfoliafxadver-

fo nafcentia prodeunt, dura, fuperioris folijs nigriora, multo longiora, mucronata, plurimu[m] q[ui]
vt-Distraiverfim ex medioncivooncentibuurifiEnKa, qucmidmudu Ncnj fdia^tm tamen
adc6

Apocynum 11.nngutifolium.



Apocynum i u. tecifolium.



adcd ^ ^ _ neq . dunUa# eofucc0plena Fro,
res extremis rarnulis lareralibusirtfidetquarcni,
quini, autplures, Aiclcpiadisnignerlonbusfbr-
ma Irrules, mii]t6 tame majores, colons nigri ad
^ purpurcutendentis. cuniyiiiilvindiratisadmU
XEm fit, qual is fere color in Anftolocbi ^ rotun*
da: pnoris & Polyrhizi flore nigro, confpicitun
Hisrfemde fiiccedimtblongx & torofxfiliqu
Rliododecdn (ihquis pame (i miles, gem ina; uc
Iplunnum, Sjcxiryrfumaliquiaituluminflcx,
7five divaricate, deinde mucrone rurfum coac-
fectes (quod Plinmshisvocibusdivifbacutoui-
telligersvidetur) quibusdchiicntibus, femca
apparetpriori majus, & plcnius, mulcalanugine,
ut Afic p g eme, involutum: radix lon a, far-
mento(a, late fe fpargens, & fubinde germ mans.

Ejusaliapeciesper omniafrefimilisinveni-
curbed tenuioitbus ratnis, multoque anguftiorib-
us folijs, no minustamenvindibus & c nervofis.
Vraque Seciidi generis fpecies/cminccx Ita-
lia acceptomiht nacaest, ciim in Belgio. tQVie-
neAuJlri ^ percnmlqjcI ^ decidimtamenlueme
folijs, fcarius Hores produccnSjquam ut fru&us ad
maturitatem (qucmadmodum & Rhododcn-
dri) pervenirepoflit.

TERTIVM, longis. tenuibus & frequetibus far-
meiuisproximiqjxqucfecndit, multiplicicir-
cunivoluuone & ardoncxuillaatnpleflcs, vin-
dibiiStgeniculatis. fbijshedcnctnollibLts, lubci-
nacci colons, la&eo lucco, ucctiam Tarmcra,
idfo torgtdiSfVt vel IevifRmo vulnrc ^ no minus
copiose quani ex quovis Tirhymali genere proii-
liat. Floresex alarum (iiiumulti umbcl!a: frcirt
moreprodunc. candidi, parvi, qumqjfolijsper-
iftdi ac Af Icpiadis floresconfntesjliliquJep[^]
tercafitites, nmUotomento & lanugineplcnx,
quafcmnoccultarum. pl.inLim. cxciticraccofu-
li.-uai, Ardepadco fcraini par. Molcftii Timzrunc
IHUS mdices. quac larmenofst & fibrofz adrao-
dum, eadefert cra/ficudJnc Jongi/Imc hacNc
icrpuii, & latevicinacirculo caocc Upanr, candi-
da sltoqui & f ragi]cs, adcd tame vivaces, ut, ii vel
minima fibrafitb terralatenoculosillicrucntis
crTugcrit, projimovcregrminarc, & vicinaloca
occuparconfpiciatur. Icaque. non minusexofa
hxc planta rei licrbaria ftudiofis, quam Ariflo-
chixclematidisilludgenuSj cui vulgusSarracc*
nicf cognomen impoluit. Huj us cauliculi & far-
menta Kiemcexarcunt, Sc pccunt, fed novo
vcre alia flifrequentiora gertuinant.

Iftius liiiqtias fcmincjplenas, paucos annos pofl
naeumcx Hifpanijs in Belgiamrcditu. cum ali-
quot alijs fcmmbibus & plantis. Piaciavfquemihl
Initcbatoptimusvirloantics de loigny Fabri-
carum iftic Prife < aus, hifpanicainfcriptioicad-
diu, ^ «f t rcpdperlesarlett, hoc eft, pcrarbore
rcpitopolrcaradicib' adcomulplicatacft. ut ne-
mo ciTft in univerfo Belgio rei herbaria: ftudio-
fujj quieaexfuoj wrtopcwtnsenirinocnpeMCi

CETEKTM mrcgni Valentiin & Narboneniis
Gallix maritime jp rclertim licroreilloquod in-
CLT Vokai um ftagnun] & marc mediterraneu eft,

Convolvuli genus herbis locis observata, proxime de fto Apocyni d m f tu r
mle c imrarmencofisramulis, tumfolijsqu ^ r » ai; is < 1 III ^ orbicuUca, in mucn, nt, cam
cdcdn-ntM cincraLvicol.iri?.Ti)C3ctiaplanta laaco fucco p < s ^ ans, & vicin.irumflnpiim
«> uUcuUsikcimplicans, cujnsftmciat h inonconfi > cauin. E jnsauremkoacm. qualisifti*

Apocynum
11. nngutifolium

Apocynum
i u. tecifolium

Apocynum
i u. tecifolium

Apocy n. n 11.1 itif.Sca m monca Valenc.

florens & fine radiec a me lefla, ftudiofbrum oculiifubijceiclibiuc

S E D etum ad Apocvni daficm referendara center. FabiusCoiutu V.C&acerrimi, in examnaniis fiirpium notis, iudicij,plantani ilium, quam quoiquot de re herbaria commeiuanos hade mi s fcripferunc,proA(clepiadc,ntgro flore, exhibuerunt. ConfulaLeQorejuslibrumcui «tulus*TTOBA2ANOC, cap,dc Apocy no.

AD veterum porro ApocynujcVonfro^quod Diolcorides eciam a nonnullis wroxp «/u&" appcl' Iariait (dtrlcrcntcm tamcnCynoaambc, dc quapccultah capite poftcaagic) refcrendx ha: planixvidentur; fedprimaomnium maxircc. Sunt qui 7tp/7rAox«<fa\$nomine omnibus Amplexicauium generibuscommuni, appellctit. Quartum genus Valentinis & MompellianiS Scammoneadicebacur, plurimutn camenalginmaScammoncadilUns.

PLI NIVS Apocy ni («minccx iqua dato.plcureticos&omneslaterisdolores fanari tradic lib. xxi m.Nat.Hift. cap.xi perniciofura aueem ef feiiunc frucicem cambus, & omnibus quadrupedibus, incibodawtn,&ipfc, &Diofcorid« fcriptumreliquere.

, PRIOR 1 s fanc,cluod hoc cap.defcripfiijApocynipericulum fear in cambus III^{mu}*C>[torura

py
co&oni,quodvulgoNapellitim vocant, &: Nc-ri^fedniiulummagispr^tntancapernicicBiadferredprelienrum est.hoc Apocy no.Id autefa-Quva est abipfbPrincipe anno M.D.xxc.pr^fctntibuscjusMedicis Mauncio Thaurer & Laurentio Hyper JOJ Cim experiri vcller,an Siicfiaca terra,qux apud Scregam cruta,cas facu hates acvcr/us venena obcincrcu, qu ales,qui vrnalc proponcbatjhabercafirmabat.Quotquotaurecanibus,propinato vcnenOjtancunde reit^ in pom datuel,poft aliquot fymptomata reiticuti lunt: quibusverderranoneftcxhibitajpericruntjac qui Apocynum hau(crat,omniutn cinflimc.

AD hujus Jibii porro calcem adij ciend a puravi,qui,dumSalmantic*viveremjdcLupuIifi-vcLupi fliftarij {fiirpis ctiam amplexi caulis) facultatibus intc!jigcDam,non adlcripta tamen cjus htftotii, qui a plerifque tradita elt.

Vulgus creoit vctulac Salmanriccnfo, fepnumcro medicinam empiricafaftitare fblit?,a(i curandam alopeciam ivencra luc natam, hac ratione lupulo utebantur. Ejusradices pondrc libra: uniu s probe loras&ilordibus rc-purgatas, pernoftcm in aqux librisodo maccrabant: potbritic in ilia ipfa iqua,lento igne & fumi experte,adtertijt partis confumptioncm coquebant, vclctiam ad mediam partctn, fi vehemcnscfTct alopecia. Decco&ioncra Icivabanc in ufum: cjul unciai o3o mane iegrisjejunis propinabanc, dc inde fcagulis injedis fudorem provocabac. Addebantncrdum apij (ivc Iciini liortcnfis, dual actOtS, & gramimsaliquot radices, nornun* quamctiam paffas uyas agigartismundatas.

Apocyni
grifera.
Apocyni
Karyophylli.
Apocyni
Mephitici.
Apocyni
Valentini &
Mompelliani.
Apocyni
falsi.



Lupulus.



Lupuli
falsi.

CAROLI CLVSI
RARIORVM PLANTARVM
HISTORIC

LIBER SECVNDVS.



ARBORVM, Fruticum, & Suffrutkurru abfokta btftoria,
quam prioress libro complexifumut: hocfecundo, dcjflir-
ptbftft qua bulbacéaaat tuberōsa confiawLtradicc-j, agemus,
quorum magna pars florum elegantiatfvarietate omnium
oculosadft ailicit, & mirummodum recreate neepoBremumlocum
inter coronarias obtinere debet. A liliacei verb generis plant is, ~~ahx~~
magnitudimm ^florum pulchrltudinemjmttumfaciemus.

TVSAI, five LILIVM PERSICVM.

CAP. I.



BICVBITALI mt etiam amplioreaflbrgir Tu- r<jj *Q-
/i/interdumcaule.firmo, craftb incus fun- **•
gofa, v irid l ,rotu ndo q uidem, fed ad cubiti a I ci-
cudtnemftriato, multifque liliaccis fere folijs
nunczquali, modò confufo ordinccufnam-
bicntibus,cxornato,clcgantisviridisrplenden-
tilque coloris, fcd fectidt odoris, & quafi hiicini,
nates etiam procul fenctis: idem ille dcinde
caulispedali, nonnunquam etiam cubitali, fu-
firafolucmic.it longitudinc, nudus& iinefo-
lijs,ncque rtriatus &: vindis, ^cd larvis & purpu-
iaicentiscoloris, qui tamen in fummototidcni
pameinanguJosdciiiir, quot Rorcs fuihnebiit^
nempe binos,ccrnos, quaternos, quinos, fenos,
aut plureSjOmnes vcr6 qiafi xqualiwr.fed con-
trano fitu nafcentes, fingulofque inter bina fo-
lia, inferionbus longe- minora & anguftiora,
xquali fermclongitudincpropcndctes elegan-
tiffimo (peebculo: fuprjnorcscaulisdenuoat-
tollirutdodranti plcrumquCjaut imjoream-
plirudine, folijs cxilibus &c anguftis onuftus:
nonnunquafiipraflores nuiliiscauliculuscmit-
net, fed conferta duntaxat anguftorū foliorum
coma: interdum etiam mihinatifuntfupra flo-
res rton unicus cauliculus five ramulus/cd bini,
ternijaut plures iuis etiam foijs finguli ornati.

Crevit porr6 Vienna; Aufrix in meo hortu-
lo anno MD xxcatque etiamalijs, pljnta undc-
nts, pluribusve autpaucioris floribus prardica,
cujus caulis fupra fcptenoi zqualiter propeden-
tes den no nudus, quafi dodranrali longitudine

a(rurgens, teliquosfloresfingulos inter folia nafcentes protulit, longa, densa, ficmultifida
alia frthorum comā fupra cofufa. Sed & inclligebam ab his qui aliquot a mn is Conftanti-
nopoli hxferanc, caulcm nonnunquam, fupra priorcm tllam florum *qualiterpropcnden-
lium {cricm.dodrantiilongitudineaatolli, aliarnque florum fcricgeftare.aliquandoctiara
tertiam»accumdcmunfioliormncomamfupcrem]nctem i easverdfirpesunicumriorum,
ordincmfubfcquentibusannisplerumqucferrcobfervavi, utpcculiarccgenusnonfitcen-
fendum, fed Naturrluxiirriancisquidam duntaxat lu(us,liccmihialccrocciam annodupli-
cem florum fcricm geftarc limilem plantain memiaenm.

"V4111

Tulsi plant
Luzitum
et dicitur.

Habaic

Tufai five Liliium Perficum. n.

Tu&i cum feriine.



Tufai Habuit autem Vicinnenlis quaedam patricia. cujuscauiisrupraterramplanuspedaliiongi-
tudmextab.it, deinde in binos rimos findebatur squall loughirudinscxercfcntes, lingu-
losmnieis flonbusonuftos, magnacriam fitsalupracosfoliorui^coifa : liabuerunr&an),
&c^oannononJgf(iniorupr.innlleilnium &: quingcruefiim in abmiles plantas in binos
caulescubitalipacntiiprau-tramalttturfinedivifaj.qaorunal ter octo aut plures, quibus qui-
nos aus fence flores tulit: mta vtro plants hocciatu pi culiare liliis, quos quoniam coma
multa fa foent.

Tufai Aiqu;e ViciHiifumeohortutoobfervatieftT'a/ifi'plantadur amara, & s'li Anglia
perc^ciiurcr.rcli^ivjiqiuspoftcaoblervaverui tturusiygg^ quinquage-
nisoutplunbiu Honbusonuftifuit Et IlliiltntffinioCatroruni I quop' Helmo, & man-
num proxime pncedente tfocute planwquadngcrns flonbt. ex liliis, quos elafu Garc-
ms civisLondirK'nlisSi Aromatarmsanno M.D. XXCII, n. e. mtebat, quos habuiffe. ut
bitios&: (cptu.igL-nos flores protultnt. Habocrun: &: aliji q' d'us comu, in quibus splures-
fiioresnati, viccninempc, tnceni, autquadrageni: quoi quot autem fac numeroso Hores
tuletuntjplanos, latoft^uc, & vjldeftnacoshaburnccaulesnimj vtri, quos proximo infe-
quciitcatinoad mgemum rcdijfr, hocct, caulcmrotundunj ternis, quibus septenis, auc
odlofiisfloribuspraditum habuiffe. Vtporroadhujiis itirpifbn quibus reverentibus cu mflo-
res primiitn crunipoilt, intr folia latent, caudictntesque funti vnde paulatim incremen-
turn fumunr, ur!actiani fuccrffefntctacaulu^iatiilosiuftini^Puda p'artc:floium vero pe-
diculniULig^{ment0} dcoifum inflecfnmur, &ipli flem-spjlleicrcincipMint, vionstianien
purpurcis (ecuiidum fuliorum(qurffnafunt, l:it3&pcrcxrremutn mucronatajlongitini
nctn&hteracturiceniibosunguacutem lingulurum fbliorum nonnihil foriscnuncrc
&cxnigropurpuraficntc. Floswm abfolutus&matorus expanditur, hntinnabtili modo
propendens.aureimaji fivccitnjcolorc^fdpailidmrc.venisillipurpurcis (umn.am \cnu-
lbtcmadfcrcntil" Lis: (ingulaflarisfolia internapartctn ipl]^ unguibus, finffolanbu^ tuber-
culiscandidispwdita'unt, quar mcdunocctiam lolc linipidiffimam dulccmqc aquari).
exfillanilachrifiarun mmrircm, utuniones propendntL's vnk-anrur, led abundant^
pluviorempor^cadcindtuberculamarcfcfcncibus flonbus in albas Licunas abfitnt:.*
incdioflorc (exCandida (bniiia cinn pallcfcrmtbus apicibus•prominent, breviorerrifidp
filo inter ca latitante. Fiori fuccedunt magna trigona, interdum etiam tetragona, capiti, ut
mLiIiopunico.an.jnnoltisMartJgonappellato, qUdninjngolianguliDtrinquepinnat
funt & alati: excuffo autem florc, itatito lilium eriguntur que tccunda futura font capia,
magna Da omnium rtumcoudironspiovidcutL^Qc^cbilccnubus illis, lemma ai itc
ruriam

turicateni' Cxci danc: funt ver6 captan. i. liliacea, paiillo obiongiora, catti I. iginofa/ubrufa, du. pliciferie, in, lingulisangu!isdigefta, que[nadmodum in Lili]gcneribus, Tulipis, congencn- bufque plancis. Radix bulbofacti, crafTa, ex magnis, craffis, & iicculentis Iquainis compa&a (mcininibinas fii amplius iibraspenden reseruere^ color interdum albo, nonnunquam etiam purpurafcente, plcrumque autem pallidofcetidoadinodum odorc, hircumque, uti folia, otente.

Cetenim Aliud genus est, neccaule, nccfolijs, nee riorum forma a fupiore differens: T*/<***ij# nam&illosinextrcmalajvis&nuiJicauIspartexqualiccr fere in ambitunafccn[es, fi]»gu- loicque inter bina angufta folia fufinct, uti fuperius, fed color variat, nee u t in prcedente flavus, vel verius pallcfens, Ccdrubc^autfandaracajfandicifqjcolorcmrefert, inftaraftaci elixi chelarum fere:fexetiam laris Si mucronatis folijs conftat. unguibufq; ex purpura nigri- cancibus, cum fuis inceriore parce candidi tuberculis ioipidum rorcm fillannbus, & fexna- minibus, ftiloque acquatilongicudine propcndentt bu Si Hocgenus iuperiore magis venu- tum mihi videtur.

Variat item in nonnullis planis florum color: est enim vel medius inter utrumque genus, Tufatvntit- tad pnnris, fecu idive colorem quam proxime accedit. tat IIIa

Secd&Quarcam quandam dirrentiam obfervabam, licet cjus florum color pro Ximcad Secundum genus accedat: anguftiora enim folia habebat jilla que & radicem nullotctio Tu/ai vari- *tll1 - odore^antum quidem naribus manifefta percipi pot Tet, pra:dita.

Floret pprrohseplanca Aprilij inter dumeriam Martio, fiaeristemperies paulo calidior Tempus fuerit, undc uniprj; cocibus Tulipis, ac que etiam maturius: femer lunio matrum.

Nufquam vero sponce nafcentem hanc plantam confpexi: fcd Conftantinopoli delaram, co^upad Maximianura Cxfarem hujus nominis ll. Viename vocatus fum. anno primus Bi- lgicj: hortis coinmunicavi; fid in Viennendbus repofita feliciter provenit. Ante meum tarienex Belgiodifccit Tum, cjus iconem (qualem C. V. Rembrcus Dodonxus in Purgantium Jiiftonr Appendicce exhibuit) III, V. Ioannide Brancion miferat C. V. Alphonfus Panciui Scr^ Ducis Ferrariar Medicus^ triquenoftrum amicum Mimis.

HACRENVS nullam plantam obfervarem cminiqjux Hemerocaltidcm Diofcorididcfcri- ptam ex alijs (mcoquidem iudicio) referat, quam hanc. Alij confcrant, & iudicent. Aliave- r6 est Hemerocallis, cujus Athenus lib. xv. Deipnofoph. meminithis verbis. Floris Heme- rocallis qui noilu flaccfcit, ad exortum fohs mox revivifcens, Cratinus in Effeminau lie ct*ti>t. memimc. Hemerocal- lu Dufc. Hemerocalia

Anemonarum vernis calicibus acinthis

Elichniframti^anAuth^tro^mhtbttxerecft.

Pancius verdilli Li Sjdcquanobis fcrmo, iconem mittebat Ctf«>^w^fr</> nomine infigti- tarn, quam appellationem apud He (bariorum vutgus ad huc retinet: bulbivero a C<farci j Oratoribus Conftantinoboli miffi, aut delati. nunc Tuxyfbiaih^ modb Tufai, llvc Teufai. & cnim u. pronuntiant dum Germanico m6rc, & eicvatione vocis in ultimai, nomine: Tufibf accuin [ut ab ijs intelli gebam qui Conftantinopo Itvixerant) Lilium regium fignificat. Interdum etiam bulbi miffi Turfam & Turfandt appellari bne; fed poftrcmx liar voces a Tur- Tur<ni cis duntaxat nominibus ad ijciblentjadreit Cui adnex t int. ni agnitudine m c xprimenda ai: j " 1 1 " exempli gim3, Cavalala/eturfa > 7i J4, id est, Cavalaflos Tulipam itirellige) magnus & amplus; qualcm (erotinx plcrumque Tulipa: babe re fbent: fi vcr6 Turfum aut Turftwda, nullo ad- jefto alio vocabulo {cribunt, dc magnis & amplis intefligendum.

Ex Perfia vero Con/tantinopolim ddacos itius bulbos omnino mihi perfuadeo. quoniam Natalis. cum eos primum accipiebam, inter reliquas hac fuit infcriptio. Twal. Ier Ptrfiano roff' obd' f- colorito, com / a 74 ^ 4 ^ ^ d r e f i u a T of er, cis du Pauc p color, duralitica te.

CETERVM, anapuaocos medicum aliquem ufum obtineat, non intcllexi: arbitror tamen renuftatis & ornatus potius causa hanc plantam infuishorris illosalere, quam obulasejus facukates. Nam Turcx omnium elegantium riorum, cnam nuliodore pnditorum, funt ftudiofi (TImi: nccullis funitibus parcent, utcos undiquaque conquirant. Turca fufi amatores.

DIOSCORIDFS autcm fuz Hemctocallidili facukare ftiradix potaj autci- immel- T* cniitu. Jc&Iana in peflbappofita^ quam cducit & fanguinem: foliatritamammaram inflamma- tionca partu contraitas, oculorumque Colleftiones mitigan: radix Sc folia igniambultis Otiliffini eillinunrur.

LILIVIRFSVSIANVM.


CAP. 11.

T O D E M cum fupriore nomine, im6 inter ipfius bulbos Conftantinopoli miffa fuit hu- Xl jusphtxbulbolaradix, alcropoftm cum in Viennamadvcncum anno: cum tamen Ceteris cfTct candidior, 8 criultovirulentoodore prxdita, fcor {im tcrro committebam. diver- ftai a Tufii cTo rarui: ncc mea opinione falus turn. Nam novo fubfequente vcre mature Lili j Sufiani bnferta. admodiim 2CT minarec CEpit, tandcm que caulcm protulit cub Ltalcm, rotunduni, rnulii scir- *uinlep: um fobjsdigulis longitudinis & latitudinis, longe quam Tufai modo defenpti fo- lia an^ultioribus. illis fere fimilibus qua: in fummo ipfius capitc nafcuntur, vircfcctis ex ci- ncraccoloru, five quodain modo xrugino G, qualis in Tulipa: fylijs confpicitur: contor- quentur

Lilij Sudani

fios.

Lilij Sufiani kapus ciimtadte;



qucniurver6illa,buxeiqucfuntodoris. Florero mihi non protuJir, fed paulatim plantacon»
 tabuit: atquiGencrofoviro VlnchodeKhunigfpergannp. M.D. XXCIM. floruit, prxced-
 dentcannocumplenfqualijslegantibus fti pibusConftantinopoli allaca, florejhauic
 fexfotij? contaiteSjmagispaculosijquam in pifturacjpreifijfonspuipur^valdcobfqltx co-
 lore prxditos, interne paullo,dilutiores, inodoros, quorum angues,ubvinecebant, (ex umbi-
 licofexinarquiliaftaminiib. prodienmcpurpurcisapjlfibuipnmuraconfpicua, quiobvetii,
 BAVopollinconfperfiapparebant: triadeindclongioraftaminulacoibant, aihimq'ic me-
 dium florem occupantem.TrnuUbantur! fubfcq'uitadeindcfcxanf»ulacaptt.i,fivt:triai)gu-
 h,quoium ilngultangulibinifaliscrautpracditi, Tufaicapitibuifcrcfimiha, icti miiinraSf.
 breviora/emincTLiiaictiamimili,paulluitjrnramcnbicviore.plcna-radixniagiaefljTii-,
 fjiradidpxncarqualis, cp.uicisfedinagnis (quamiconcextra , caminiioribustanicH&ali-
 qiantulum longioribus,nulloque(utiam dixi) tctroautgravidore narcis fericute prsrdirx*

Floret Apnli, lemon illius nianirumcninTurajrcmineaucpaullopoft.Nulluniamctmfc-
 mentulit,quam tnlii idem Dn.dc Khunigfpcrg ex fuanatadcdicp!anta:terni tamciaculc*
 annoM.D.xxcv.cxillipro^nati, finguliHoribus, hicvicenis, illeccricenis, tectmspluribus
 onufti, bubbos cum felecfiffimis quibusque alijs, fequentis anni rigida & afpera hiems corru-
 p)ir.Anno vtro M.D.XCII li, quospotlcindquifv cum bulbos, nonmodoHores, fed abunde
 f emen maturum proculcrunt Lugduni Baravorum.

Trapa

Nomen

K*:*,*».

MI^SI aliquociusliujusfirpispactbulbiTufaibutbijspmixci,cuminfcriptioneT"*/"*
 for Ptrfi<1>0ifidom4wl<i PenAthteFcrjnto; tadem poflremiAacceptuscjus bulbils Sufim-viilit
 appcilatione, quod e Sufis pnum Confbutir.opolim allacus lit: Iiacque adcode caufa Lit
 liimSufianumnuncupavi. -gt

P.iullo autem ante mtum e Be! gica d i fee flu m, nmn ere M-ig¹¹ Viri Iacobi Confarcni pap
 tncijVfnc'i,m!(cratconfngu]ncoruoll.IoannidcBrancien,Gciicrofiislaci)bu5(icCou-
 denhovcex Italia firoiicm bulbun Pmtthh Per(iano iinrjuinc,qui^odcfiinirio^dGen. Io-
 annen vanderDiift,paricogQ^onisvii^teipfijunaum^3tfcgatt>,coramultisahj
 limisplantis pervcuit. Uanno M.D.LXXVI. bt cubitalentaM^mpiiorem tulitcanicm, quis-
 quagenisfloribusonufliim,nnljumaueiiii(ctnen:inonc<renn!ii,ivicqiiLdcmlubreq
 anno,utiplemet Vander Dufc ad me Viennam perferebat. Illius iconem, dum florebat,
 Ims coionbuscxprimebjt Rapliacl de Coxia Regius pictor, Sc exemplar mihi aiittebai ,c*
 quo hie icon imicata.

Illius etiam iconem habeo, fed non magno artificio depictam, eamque sine bulbo, cum
 LilijnibnfvemintatiByianrini (ilequoproximocapiic) muacaredo^ifrimiviri fuitmi^
 LUC omnium Naturx inuaculorum icrucacorii& adimrauris, Nicolai Radij Rr^isC
 cheiturgi,

chicungui qui Hyacinthi majoris nomine appellabatur cum apud ilium anno M. D. LXXI. LUCETIXEFLEM.

De hac etiam planta ad nos in Belgicam scripsit A. J. Phonus Pancijs quando Tufaiiconem mittebat, his verbis *Ptinchio Ptfuneepunt* *bifliffivta, & *i fruitu Giglio* «Manage», *drvrfo dtlU Coren* *Imferuit: hoc est Penachio Perfianoclegantifliniacflplanuc Lilij aut Martagonis generibus, different a Corona Imperiali.

LILIVM KVBKVM five MiHiAivMByzanunum.

CAP. -tn.



"TTENVSTA admodum est & dumcushi. Vt foriam describam, latis raraha: cplanta, cujus folia Lilij albi foijis familia, breviora nine n brio raque, & c in lacribus fub hirtuta, confufbordine caulicm ample duntur. quicubitalis aut major eltj Cxviriaipu rpura (ccns, digitalis crassitudinis: Hores funina of afl: igioproffer languido collo dcorfum propenderes, iex folijs convolutis & reflexi Sj Utia Lihomonia, five Martagone Matcluoli. confantianes Iegantiflimo minij, autccrarubarrecentis colote: 6 medio More exeunt fex cand icanti a stamina. croceis apicibus infignita, fhto inter ilia prominence. Floribus succedunt capita ijsquj in Lilio filveitn live montano nascuntur plurimum repondentia, atque (imile paleaccura fufcirt qucfmen continentia. Radix interdum valde magna non est, nec Lilij Cdvcrus radicem mulcura (upcrar, illi que (recens crutaj colore valde iimilis est, diuniis aurem extra terram adfervata, ai quando exalbfirit, nonnumquam fquam vel totx purpurafcunc, vel quibusdam notis facurace rubrtibus afperguntur augefcit verblartiore folo conflta, & fubifide in plures bulbos dividitur: omnes auteni hujus plantar caulcs infima parte paullo fupri quidam, notis ut in Lilio filveitn, iust gonati.

Floret Junio cum Lilij 5, aut paullo fcrnjis; fcmen ciam froadrfiodum, videlicet fub Augufti fine, au: demu in Sepcembri matutu est.

Constantinopoli Vietnam delaca fuerat, antea in eam urbem adventum, h^cplanta, & aliquot nobilibus Maironis communicata. Vnicum poftcabulum inter al] Os J' < / ; * fl ^ m ^ , t f 6 noruinc mifl bsa Gencro (b & Mag ^ » Viro Davide Vngnad. cum apud Turcarum Imperatore Carfareus Orator cflet. accipicbam, qui prius jannisunicum florem temper mihi protulit: fed anno M. D. Lxxix. quaternos. altero curru infecquentes, fenos, cofque omiicsex fummo extirno quifcaulcfioml prodcunces, quemadmodum & caplantaqua: Gencro C) Viro Wolfgang ^ o Chriftophoro ab Entzeftorf * nno M. D. xxc111 florait, tredecim flores extimo caule, eo que unciam lato fuffinens (atarte rubentes, cum prxcedente anno quinque Juntaxat extimo cum fed lotundo caule, ut incus. tulii Tec.

Sed & Patricia quaedam Viennensis aliquot plantas habuit, inter quas una extimo caule duas uncias lato tres & viginti flores tulit, in reliquis plantis que vel in ipfius, vel aliarum nobilium Marroniarum, vel Entzeftorfii, qui instructiffimum habuit, vel meo horto alebantur, picrum quocunium, interdum alterum & tertium in fingulis caulibus florem natum confpicibam. Gen. porro Ioan, vander Diffplantam habuit femine natam, quacp" moquos norcs proffer cocoptanno, oftonos, proximo autem infecquente, qui fait (cptuageltmoo ° A * vus fupra milicifimum icquingentefium. quadragencis protulit an verdplanus fuffeccaulif, & illias ex nmo fastigionat flores. non significabac. Sed piiiuraillaa Radio miludo * tt, cuius [uperior capiceniemini, vicinos aut plures flores ab extimo caule pianopro pndenteshabebat-

Anno prxterca fecundo AT nonagfimo Tupra oilief Tmum & quingentitnam bmas habuifatur Jtiores flores jwrentis plant M. quarumpnor quateciiiios, alKufcp: ciiios Bores tule. r ^ nt, omnes rummocaulis faft' ^ o * q ^ u: il > cerflinalcenc «. non remcre percaulciif (wriogj, queni admodum Lilium album aut filveiticfare Olau 1 (ingularaucm hoc peculiwc l> i bueru, n t u tunus niedius inter rdiquos furret b pediculo Dafceretur ^ ct nalter ^ quidcin , llc ^ ttodcnilfolijstonl Uns K ^ uodamoilogracllu Sj Uu D U; cunda [ub]etta itonc vidachct.



Zufinim

CETERVM duorum genera meffevideturhare plant*; unavidelicerdilimoribusfloribUJ
 prxdita.alcerafaturatoribus. Ego (anlongaexpcricnriadidici, easplantasquxdilutiorei
 feruntHorcs, caulem&rbliaviridiorahabercijsquibusfarararioresIWflores: postremii
 cnim caulcsSi folia plcrumque ex purpuranigranc. Dcindmihiconfpc(3:x font radices
 Confancinopoi alUtx, quibus color purpuralcens fuit^dilutiorecsprotuiffc flores:ali? con-
 tra faturanores. Eflorum vertinuniero, ancrtaaliquadifferentia (uciniciocxiftimabaro)
 vonftitui poflic, plurimumambigo, cumcasfirpesquraumcrofosmlcruntflores, fubfs*
 quentc mcerdum anno.paucovurunicum duntaxat habuiflcobfcvaverini: atlsrto &pifli-
 gui fob depositos bulbos, plures ucplurimum profctrc ftores animadverfum.

Hanc

HANC planum Clans Matthiolus #<«««*_&, & alcerius nomine appellarc videtur, K
 in lapidizmonnbus crmflcait:red illius descriptionem valde mucilain proponit. Erutipor-
 it) annis reptu agefimo nono fupra quingentis annis & millidimum atque cum lubrcquen-
 tibus bulbi in hortis Uiprafinum in Cornu Byzantino vulgariter Pcranuncupato fins. alla"
 funrplc Eifque nobilibus yiris & matronis Zufiniart appdlatione, cum a Gencrofo viro Vn-
 cliode Khu Qigfperg^uabalijsqmprox Ltiii sfiibrcquentibus annis Conaantinopolimbo-
 norarij conducendi gratia in iTi.mdc redierunt: tametfi in Ichedis interdum cflct additunij*
 nonnu Uis C«ron*dt/Ee appdlari,

Me mini &: Zufintirt nomine inferiptum fcmen, qual^ante defcripfi acctperc ciimp"*
 matn Vtena amappu liflc m.lcdrctr3rc Qmmiffum nonptodijt, nimis vccuftum ruiflcputo*
 Quxtamcn poftca ex rncis planiis collegifc mina. commodotemporerata fclicitcr prove-
 nerunt. pianaque folio Iaim node crunt. qualiafcrc Turaiprima fol^, ahcrodc inde-nn°
 Utiora. tcnio cau hculum aliquot folijs onuftum^uintodem iim & fxc oflorem.

C LILIVM hoc minium novoverc cum Martagpne pr. muni etnereere foW
 T / 6 Zimb q_a^o q T ^fc<1"Cl:tc "P^tc» «iam ante htemem cum LiJioalbo.,
 ihiauwm relanime^confpcaascfle Lilij hujus Bvzitim plantas. quz florem non m<-
 i-niatuniferrcm, fed prorfus niveum. inccensakcri parcm. In chartaccis lane Uis Adonid*
 hort_{l_squogum in i<_o fa mcm in^nullar Zufinurt ftjrpcsalbo florcerant, fed omn« vcl & f}
 TM_{r_ub_o} > v_et_um i_n i_n f' ucat quecuam bavo colorc padiupl iiiiucjaja fingula.es, modd
 terniaut quaterni Kqualiternarccn.es.

Zufinim
 miniatore
 fava flore

LILIVU RVBRVU przcox.

CAP. irir.



HABENAT p^oro amplis vir Ioannes Mar-
 HorffPatricius Francofuttensis & Sena-
 tonj ordinis, postremis annis qui bus HI ea vr-
 bchabicavij aliud genus /-ifjirubn.exSt'ut-
 gardenfi Ill^mi Ducis Wirrem&ergtci liortoac-
 ceptumj quodunofre menfo maruniis By-
 zantine riores proferebar, nempc Tubfincm
 Maij, aut initium Irniiij, ut mihi rcf_Lcbant
 qut viJcMnt, & ipfcanno terno & aandgcfi-
 inofupri millelinium& quingentcfirou vid-
 dersavcbam.riLli infortunni luxatifcmoria
 dextriacco p^ole q an roodd tune Itclo
 adfixumdccinbar, fed pn[tea dextri cturis
 u/umprorfus:uJv:mir,.Erataurem florid color
 (illorumtcfimonio) minusTituv^t longedt-
 lutioreo, quiinH^o b^o p^o -ccdetc' apuedc-
 feriptisapparec. caulisfinc. iircxplJri,qL!am
 umcamalc bac, quamqucmilu F^pcorurto
 ditccdcnci Itbcralfrerdunabjt, dcprclicrdcre
 lieu it, jfracilior&bjevioletac Byzintinnad-
 ulcis.cubitalen^o videlicet: titudinc nonmuf-
 tum excedL-iis, foliaijur mxhrebant an^u-
 fitoraiimagiifatu^o :tarepr.Td!ta;b"u[-
 bt i'qtiamx {nam lquatnamn iiJkcm lubec
 perindcacByjanrinuni) longecrnm brevio*
 res cr.it: rulcr.ic veto ilio anno tres Hores fj
 ni-
 mocaulisfaft<gio squaliccriniidertes, mifai
 autctn LugdumapuJ Batavos,fcquentcpLo-
 Ximaanno u:ictim (ram Jong.icntm in Jzane-
 re norata dival ed f f l d fit jus, quem
 supra dixi, coloris, proxime autem

Lil. 21. p. 100.
f. 21.

infecume
 binesduntaxau: anno verd M.D. .
bulbus
 nihi furtp/ablatns cum feclfli/Timisqiiibufque quas in horto alt-bam bulbaccis &: tubcro-
 Clftirpibus. Liccraut macurius aUcrvlorcs profcrct,!]Jt>Tanicn{it, usgenmnarc loh-b.-it,
 CETEKVM fubisiicumanniquirnSinonagefimi fupra roilleGmtrn & quingenu-
 tnuu, monebarmedofti(fimus vir Thobias Roeltius, Mittefburgenfi'. in v-
 j: Saneem op Pra: crtsquriJcnmr bisfiiurns s!; p^
 ganccr ftirpL-sattuliflvFiccrquas binacflent Lilia mimatofcu rubroHore, roatunm Bv7
 linoflore5profcrenna, quonjm .llrcrumanguilioraFojia habcret>]Joquod Cocftamino
 alhtum:alrcriusvr6ft)!iamulcobrevioraelTL'nr,acpaulolaiiora. Horumiconx
 fibusxpreifas, fed radicemunijs, cum aliquot uumfque piantxfbltjsSequence luc
 nie mi ttebic.

Quod latio'ecflfl>lio, non videt tabfiinilciili, quod raodddescripfii Pacricio France
 funenf) acccpium.

Valdcaurcmdivcrfiimeft AngufVifolium. nnnquiJcmfloris forma [nam qi
 JtacircamvoJura&reflexa) (cd colote, qui Litiocruento mijon n Ill bu !(>.:• ii
 tumKii, foliorumquepcrcaii!em[parrunimdilTi[ninc'idmc: multacn.i
 fleiit iL nti A a l n i o d i j m i i n p i l l . t
 pene foliorum Tragopog: caulitcm falgium Oorejprofi. frnprn codem l •
 tmo. rcdir summi caulitatis, inter angullifima.
 radix By24nt: iuiradicctiiraiuli. tur, nicriigt: oamneutrius pfantam viden
 ?Scd&tricnniopofticoiicin (uiscolotibusexpretTuniad memitteb.it idem
 qualeni illedepinpreutavera: ad normamejuspUntx qunpru-oiJLUiaiiii'
 S'nra flores pmeutar.

LtLii po'r^fitvctris, five Martagonis Mattliioli Cciuus^roxipjoc^p'tav
 fecinimohatfinitatem. quimeuui LihnBv'i. iiiiioriibroii. iber) dinur: n: ai, qu
 kmjii ob'erv. ireliCLHtiiiL" iHCottitoo de forlitan hie filb
 <.. VavM zmemgausrmioTCcxercicualvW u; Sfauplio« nigrion^uc h
 tnultoactam pliiL'sri'ires(&n: Liratepurpuralcc>tes, qui fi
 bus miscalis aliquando raris diflunchi fut, acque, priusquam expandantur, multa lanogine
 spu^fterconicipiuntur.
 V. iiaconnuuquauilioecgenusi nan non piocal Miurpicn Aulirue, cniere mci mini,



eju* c*ulij viridis, caput non inflexum, Ted furre^um, mutti nihilominus lanugine ctiatn hirututn. florcidilutpurpufafircnres. necullismiculisaipcrli.

11. A LTE 11 VM humiliuscft. cjuifoludilutcvirent. ranoresflorwptodLiclr. cofquedjUuio- res. ac raulcis nitfricannbui maculis notatos: pr<jcocior ell reliqui *. eju (q uc flores. ante quani expItcetiturglabnfunc&: piirpurarcnKs: caijIiscti2mpurpurjdr.

Variet.

Iftius generis alteram fpccicincum hirailemeracbam ultra Dravum flumen ad Gre- b^nio Pannoniatnteramm, qia eiamcnfenus retiquts florbat, ettara inhorrulo Vienn* piosinereliqiuiliujas generis ihrpcjncpofiri: illius flores valdcobfoleti, nigfquepunitis

Tertiactiam Immiiscft Tpric^apuci Maurpachcum majorcpromifene tafceiM, cujtis caulislcvitcrpurpurjfcirjronj inflexavft. Horesglabri fbris. erplicatitert, dilutLflimcpur- puralcentcs. & quaficamcicolorii. necullismaculisafperfi.

Notat.

PalTim utrumque hoc genus provenit in filvis & umbrosis pratis Lcyrenberg, eorumcjuo moncmtn quia Caln nbctg Auftrir. ad Alps ufque prornrrunt: Nalcitur Se inplenlue SrinZM Vngirnfilvis. atque montibtilisfifvoffis, quinonprocul Francoturtoinhi Wocai luo. ad Septentriotwtji abfun: Minusaitemolim ob/crvare tncminiin multii Ger- man>x lilvis, non modbeditiorcloco liris. fedctram in piano.

in.

TE RTi v M pondquoddam genus filvofisillismontihusmnd^mcmoratis ad Franco- furti Sptenmoncm in vntum, !ii]tjiilc, Socundopncrrproximum: florcm tamcn colore varimn: namancequamcxplicncur, foriscarnctquod. ininiodocolorisfunt, explicativcrd, incusalbt, K DOtixjutbufdamparpureisinGgniti. Similetn ftirpem lubuimuncrcN. V. loannis Boiloivecensamici. qua: randema^olcverac penndeacprimigeneris planer: (c& cju< radioxofirx colore minusnn£J: a, qiam fuperiouim. Sed Francoftircnfisquidam civi* un. imKibchar, cujus flores intriorc partcomninovci, necn! isnotisd! ainal

til. fl. nirt*
fere.

111.

Es Tedun qaarcumquoddam genus, cujmflows Pnmonondilfimilcs, (cdfcriusfcfc explicarc (bliti jltiqc non infuavi odorepraditi.

Notat.

Omnium flores terrainfpec Unt. & penntervallain fummocaulc nalcuntur. fotia^i- ieatl pediculum reflexalubcnc: ftnnenctiam mrrigontscapitibos duplici line in lingulu an^d- liscontinetur, fn(cum, pKinum, cartilapinofum. radix lurco oclincioircinfecliclt, quam obcauimi Gernui<ctMvurtj/ideftauearadijU tur.

SILTAM ZAMBACH.

CAP. V.



QVoytAM Tcrtio huj us libricapitcfff/
 tav Ztmbachmem inimus; non abs re crit,
 fi quxnam fit planta,hic declaravcn mus.

Naaliquotics hoc nomine allarat funr Cc/i-
 ikntinopoliradices Liliofinales, quarum,ex-
 tremxfquamxcum flavefcrcnt, Martagbnis
 alicujus.coiifimilis Lilio tertio precedcnc de-
 fcriptOjgenusexiftimabam: ideoq; quibufdam,
 amicis in Eclgica mifTar pro MartagoneCon-
 ftaminopolitano. Sed port quam terra: com-
 miffaJ folia Liliovulgari profus familia pro-
 ducereanitnadverti: negligentius illafcolui,
 vulgaris Lilij effe exiftimans, prefertim cum in
 Indice adferiptum cotnpenScm,Sultan Z<>m-
 taihfa fierigr«ndt bitnchi, id eft, Sultana: Lili
 magnos albos flores habet; & in altcro,o odrt
 ^i Ci^ifl, Lilij odorem tiabct. Indefaflum,ut
 apudBelgas,mod6iulranZambachappella-
 tione, modoMartagonisContiantinopolita-
 niflorealbodonatadtea phnta, ciim tamen
 unicaeademquefit, nondusdiverfir. Atque
 fieri pofTearbitror,utqui Venccijsinhortiflu-
 deca: Marcagon Conftancinopolitan. alboflo-
 re vidtTe afftrunt ,&il li qui cam ftirpcin habc-
 regloriacur,fallatur,5; hoc Zambich viderinc
 aut habeant, non Liliutn illud tertio capite dc-
 fcriptum albo flore: inficias tamen no co, quia
 inveniri poffic. quisenim- in intenorem Natu-
 rae finum penerravit.in quo plurimaadhucoc-
 culta latent? Conftantinopoh tamen tgnocutn
 cfTeaiTcro, alioqui Viennamfuiflctperlatum,
 cum Turcx nihil fingulare habeant, quod pc-

Siltam Zam-
 bach.

Martagon
 Conftant al-
 bo flore.

cupniafcujusfuntvaldeavidi) rediminonpoffit.

Biennio autempoffl quam fuperiusdiitas radices terricredid iu^em.cumomnes quas fer-
 vavcram,florcsprofferrent,certi(fimccompri,nihilaIiudcficqLtam Lihialbigenus,vulga-
 n prox!num.Ha)i]Sumencauks,licetvu!garinon breviores, adiligentius obfervanqbus
 graciliores,nrioribusquc&:minoribusfbrijsfcptidepchehJuntur, ipflusqucflorespauilo
 minores, *qne tamen ac vulgaris floresodoraci. Nonnullx vero radices in tantam molera
 excreveraiifjUt vix utraque manu comprehendendi poffent: unacriam illaruro plu res quam fe-
 xagenos Hurcs in piano trefqueferc uncias lacoccaule ptotulerit: (ubfequentcautcm anno,
 rurfuspaucosintertt^utrcliquXjCaule.

Lit *!&• 7j
 i^mli:*

La *lt- */
 ^ViT*'

Meminciiim anno M.D.LXim.VlyftiponecfremXil'aceamradircinforoemerejquam
 PerroCoud.jlicrgopharmacopoeo dotiffimo Ancucrpiani cuDraconisarborisramOjCo-
 locafia,V3r]l[qt]L".il!|srarillimisi(ticobIcrvarisp]antismili.Eaipfarloreshuicprorfufu]i]iles
 (nifimeinoriafallit) poffcatulit: fedquiaplerumqucinextimocauleconfertimnafceban-
 tur,&:iii^erduainifonnescrant,vkiumquccontraheb.intjipfeLiliumfatuuracognomina-
 re fblebat.

Lilium fa-
 tuum.

Z A MB ACH porro voccm,rc(lis eft Amarus Lu{itarlus,Com mentarijs in Diofcoridem ca-
 pitedchfminounguentOjidem Arabibuslignificare,quodnobislafminum, topiarijsope-
 ribus nobile & accomtnodum, cujus florum odor fuaviffimusquidem eft, fed caputcriam
 ferit, Ver]fiini!caiHemcft,TurcashaJncArabicamvocem,omnibusptautisqLiaruodorpac-
 n^ lafmini florum fquosetiam in Afuticis liorrisultraBofphorum rubricolons inveniri in-
 iclligoJCuj^eolennacfamilifeft.tribucrc: funcnemTurcxvaldenegligcnrcs&impcritiitii
 rebusproprienuncupandis Sicilli,ftf/rZ^OT^6appctlanr,Narci(rimantbulbi,quiMom-
 pelliams Pancratium flore Lilij, Valentinis Hemcrocallisdicitur. quod ejus flos non modo

Z *» kach
 v^i)

ty* inll re-
 h*fi re-

an Zam-
 blfh

Lilij nodammo do qmnam,ted etiam odorem referat,que vocem G^ p^ uis Kolam li ni-
 fic.it, omnibusflortbusofarutnarmulisacommodanc, addicoc^itmtr vocabulo, fipleni
 fine, uiG^tcatamcr, illisclt&Rofa plena, & Anemone flore multiplicifoliouiiintexturi
 conftanre,8(: Pjpaver.K Mil va Horcenfis Sc fimiles pleao flore prxdix, omnes emm hx, fi-
 mill nomine nobis fucre iniflic.

Gel catenit
 w&mpen

L 1/1A c E JE quardam alia: (Kipes.


CAP. T(.

LIHI Pum'cei, five, ut appellant, cruenti, multifunt genera: nam Vnum nullos bulbos infummalis ferti Alrer Lim verdijseft praiditum,
 NON Bulbifc binx fundir Fercnr Kt omnibus notr. Vnaemmlongo & prajaltoaf Turcaule;, valdedihiros ferrfljrscs, (crotinga qe ft, cum Liltoal boduntaxat florens: mqua
 iitbift- icxi-gcnosaliquando flores unocaui inhxrentes, obfcvarem emini. Alteralonghumi-
 liorpr-^Dcior^ue Pnore, puniceo & quall rubentes proftrt flores, nonnunquam vicnos
 3utplurcs: mcoiini & plcnos vtd L-re, duodecim, vrginria ut plurium r briorum textutacou-
 ihnrscs: lingulare etiam habec fapec planta, quod ex raajore buibo oblique & in latera propa-
 ginei fub terra graminis modofpargar.

£Mfmm, B v L B I F E R i autem tres dirfl-rcntise apudeos qui rem herbariam excolunt, obferuan-
 tur jred non ab omnibus. quas opera-pretiuni duxi Jlgillacim hic exprimere.

Martagon bulbiferum 1.

Mattagon bulbiferum 1.



PRIMUM igicur bulbiferum Lilium, bicubitali intCTdutfna f Turgitcaule, ffrmo, craflb,
 folijs /epcoliliai CLS jfub atris. itiuufnm 15 alis crartiores bulbos gcftans, & amplos flores rubn«,
 Lilio punii." eominnrinonbulbifro concotores. Tencriore shu; usplanrac antequam flores.
 ferrcincipia MjbulV 15(ecundumcau'cmkmcifolianatis non nususdona Tacum , quamre-
 Ji^na: duilpccics: (edquandovetulii»rcs(unt, florelque aliquot annis prorulcrunt, vi^ nifi
 iniummocaule jubiinalas dividitur, & fcundum fl«rcs, majores bulbina (ci olenr.

ALTE RVM, ^{VIX} cubitalem excedit alctudinem. caulectiam est firmo, (Iriato. cx viridi ni-
 grtcantibus flijs praEdtco, quxramencum rummocaule in canilan«gincpubc(cunt: ejuS
 flores ignco rubore non rutiljnc. ut in fupcriore/ed ma?i<; pallefcit, & ad Lilij punieet non
 bulbiferi majons colore plunnum acccdunt. E jus aduiciorts caules. paucos etiati n bulbos,
 cofqc (bpcrtorc minores, nifi in fummis alis gcftare (blent.

in. TtRTivM , iicrduo fupcrioramedixplci unique est magnitudinis, licet nonnunqustn
 prtoris akitud Lncmactingat: caules riabt'graciliores & infirmiores, arque ipficum folijs di*
 lurius virent: flores Secundo generi perfimiles. Hoc femrer focunda Diilborum inter folia
 nafceit iun) (obolconuftume (l. c. jufqueradi X) Pr]ori 5 radice minor, clart-nbus propagme'
 plerumque fpargere fblet, qua: ad fingulagenicuhincandidos bulbos excrefcntes, iuhm-
 dc novas in 3mbitup]ant. is producunt, Lil]ipunicci non bulbiferi minoris in (tar: f]iis bilbi
 innlisnati, fecuii (iifpccieiparcs, priori in agr) itudiii cinfenores: oi Trict]iic, tcrx cornn] ifli»
 fujgentris planum protreatiit, 6c (Lcundo anni. icaukin bulbillis onuftum excrefcunc.

Jemat



FeruntcamcnomniahxcLiliain trianguJis capitibusldtum, cartilaginofum, fubfufcum
ftmcn, ^ucmadmodumlitiumvulgarcquod(lerilcn6efl, fedruij; encrisplantascctampro-
fert verum qua: exbulbilhsin atis natiscrefcunt p[lanca;], mui tocelcriu? adolefcunt.

Florentomncshzplantxlunio, aliaraltjspaulomaturius, [cmcnqucp<.*rfic; imr Auguflo:
bulbaliinalis Uzrerc Colcnc, donee venco autcomadluexcunantur, *itnotticcedtun* p[antx
adhuc inharrentes, fibras dcorfum fpeflantesagere folem, tamquam ad comruuncm ma-
trcm teiram affirantc Sji: ilia fc condi eupjenres.

Prior nullibifpontenafcnsa me obfervacact, (*ed eam* primuni Lirxcoafpexi in *cultif-
fimo* horto Gencrofx matrons Maria: de Brimcur Mag" viri Conradi Schcci uxoris, *que
dc inde* bulbis in terram dc pa< Sis, reliquis Belgic U liortis brevi tempore to mmunij facia est,
atquecci. im nunc Vicnnenfibusacahjsvicitiis, mca opera: namipfa ad me aliquot majores
bulbose Bcfcgica mKccbac. Rcliquz dua: inmoncants Auftrix *Si*. Styri; c ptans fponti; cre-
fcunt: fecunda autem rarior inventu.

iolencverocum har. tum alicduxnonbutbifer^ciim primum florum gnimasoflencfc-
rc incipiunt, aformicisadmodum inefctari, fietuco temporenumquam immuncs ab ipfis
*confpicere Ucc2t: non fecus ac Pxoaix (loresanrc qu^m explicenrur, qui minim in wotiuta
etiaoi d fbnnicis appccuiuur. prarlctim qui plenus cil, 6<: ille etiam explicacus atque apicus.*

PORR. 6 Liliafphodclufillepuniccorlorc, quem CV-Dodonxus HcmcrocafidcmcfTc
centr<, valiic luxuriac in omnibus Auftrix, plunni[qj Germania: tiortis: ac qut luteu tn odo-
ratiim^; nei; icacaducuni Jubctflorem, Aufiririnc 2nicusracancn KumiftLica Jverua]r
ilium aucm maxima copia fponte nalcentem in tnalcis uliginofis prau s, non procul ab op-
*pido 3C munitilifna NcmctliwywzrHi hctois Balchafhris Jc Bairhyan p.m arecqua Occi-
dentcmfjic^atjannis M.D.Lxxix. & Lxxx. deinde invenifirdincolisncglciaani, uhifloren-
tem labwem menfis M3j), Sc Iunij initio crucham, Batthyamnadm o. uisad coclegintcin
& odoia[nm ftaremin ipiiis fundonafci. niukasilico illius plantascuni (uiscc Cpinbusciui
juffic, & corbibii 5infuiimhorcuin inferri. Vngan Ztodti homappellant; Croatx autem,
apudquoseciani alboflorc invenirinuhi aflercbant, (Syan zv/ct.*

TULIPA, CVC TILIONARCISSVS.

CA P. VII.

L I L I A C E A S ftirpesubfequideber peregrins Hit, ScobinCt^ncmin florccolorum va-
ricutcin omnibus rci herbaria: (Iudiofisincnw grattiTima plunta, quam vulgus Tuli-

pan, doctores Liliafphodcius in p[ro]prietate

M 3

illius * * *

Iilitisautcmduoha^enusprimariagencraobfervabam, prarcoxvnum, (crotinumaltc-
rum;tiractfi invcniantut quaedam vclutidubiar.quz medio inter utrumque genus tempore
florerc folcanr.pottus tamen inter ferocinas habendx ,quam inter prcoccs;Dc mroqueg-
nere peculiar! capire agemus,atquehoc vn.praccoci tribucmus.

Tulipa
caulifera.

PRACOCIO * Tulipaunicum fert ea jlcm, pedalem maxima ex p3T«imcnJurti amplio-
:m, rptundum, virentem , &:brevis quadam incanaq;lanugirica(perlunj, ronconcavum,
fed fir!na medullapiamm:hui]cplcrum(Juercrriiaamplcftuntu! foli.t, noniiumquamqua-
terna fl^qmna, inferiora lataadmodum, ut criam pijlmarem latitudinem explere viderim,
& illiaccaflongiora tamen &c craffiora^arinata^iipra terram fefe paodentia & conrorquen-
tia,superiora autē minorā & anguliora, eaq; vel propēdentia & nutantia, aut interdum fur-
rtfflijOmnia autem colore ex caruleo virente aut rru. inco, & veluti arinaafperfo.SiJmEno
cauli^iifidctmagnusfloSjuriicus (geniifiofetiamahquoticsvLJ
^tim nalcentesjvel bifido tnha;rentes) furliim fpedits, (ex fan
mccfi&ftptenis&oftonisconlpwcrimJcjuftlcminitiocOmj
terram fefcinflectm,iUvc; tnaimbcsjUtcolubnamrcipenti
ementjatur,dcincle paulacim fefe fublevars^A: eolorem
cans, accalachicyailnvcinfstatinfundopandens^cxquofcna,
i d t d .H d l l i d d d i j
i in modum vanancibus.Excufibfiore,
gularc capafansmagntra,oblongiufculam,vel bicvius,vcnu<
tKs partes a fummo aehifccte.confpicLunrur fex ordines fctni
ceifcre, &:circina:a:propemodum rotunditatisincerdum, alt
centrum & iinteriorapctiingic,oblongiufculiuf plurimuni.p.illidij
fiimbresfreqncndoresccidcnnr.cciam fufci. Radix bulbaccsiiti •rdutn^brvior est, non-
n um uamoblon ut,gralla gfenoreledcn jnnihil rompente, vti Colq; illi radix fete fi-
brisaliquottenuibusdonata, Sfforisvelfulverccte, fed magnacxparteiiigranrcmcai-
bran b d a, faxit tempa ic afic ^ a e f ca tanc i umfortis n ar, a l i i d o au-
tem adeo denfo tomenco plena.uc moliffime recubec bulbus.qui (olid j5cft,finnus,&: vclut
albumen ovi cotSuui canaiduSjguftaicique dulciSjfalicm lion ingratus.

Tulipaprarcoxflava.

T. Praxia
fucina
vicia.



T. Praxia.

T. Praxia.

T. Praxia.

T. Praxia.

S v M M A autem in Prarcoe (el coloris va-
fietas: nec inajorf in ullo alio flore videre
memini, nififoruein Papaverc. Etenim aut
omnino luteus est aut ruber, aut albus, aut pur-
purcus: iiicrdum ctiam bmidplurcjcnc his
cotonbus in eodem flore permixti confpictun-
tur. Nonticlmn quicxtuki omnino coloris
Icvidifle afTcram, iinhilaKe hatknusvtderc
non conti

Lucca Tulipa vel adauri fulgoremaccedir,
autpaller,foliorum aurem unguis pkrumque
attei (uut, licet ctiam habueim vcluci tu!igi-
nt a(pero5:odor quail ccrat recncis.ii ve tiara
croci, interdum nullus, vel admoduoi im-
bcciltus.

Ruhrar color nunc (aturitiorcd, modo di-
Illiot & i. gratifTrai afpccclus, interdum ctiam
inelcgans, &:obfolctus: foliorum unguisvel
lutciomriino, auttanquatn Icviquadamfuii-
gmc in lutfoafperfi, in quibusdam nigrama-
cula medium unguem Uttcum tantunimodo
mficir, inali]storumfefeitaoccupat, otnih"
nirilutcaquardam lincanigrum **ungUCa** «»"
biensconlpiLiatur: iicerciumadcotnagni funt
iftiungues, **Utdimidiam folij** pirti-m occu-
pent.Hujusvero odoralusgr.ituscJtirifter ma-
tiauid, mignavcro ex parcc valdeobfcunis,
vel papavens virus quodammodo refrens.

Albiotnairiocandiduscftj mfitriacxterio-
ra foliadorfocineracci vtl interdom ctiam cq-
rulttt quid pi am color is adm iftum habere **vide-**
rentui; unguis lutei, normumquani vcluti fu-
Kabui.quibusmiBucsprorfusalbicflent.apii.-cs

ligine afperfi., apic« & (laminapallent.
muncantes.
Purpurca alijs saturatior est, & violaceum, five amethystinum colorem habet, alias Pro-
nax flo-

Tulipa prczdx rubra.

Tulipa ptzcox alba.



Tulipaparcoxpurpurca.



nistrflorisatmula, nonnumquam dilutior, & Dalmacenam five Provmcialcm (qum erudiciores Prxnctinana vocant]rofam colorerreferens, iicrdum vcrdade odiluta, utalbecere vidcatur, aliquando ex purpura nigricac & £, obfoletior est: omnium mccm unguescum apicibus aut pallenc^auc lucei funtcoloris, tamctfi nigros cciara apices habeanconnullx, & pcdieulos eafuftinentes quadani velucifuligincinfestos. Invenitur & odora, Sc in odora.

Faccrevrnonpo(rum, quin hic ad ijciani, qux circa simplices has, & : unius colons Tulipas obferuavi. Habui enim anno. M. D. xxv. aialiquot lubl-
 quentibus jcu jus flos, cum T? cedetibus annis elc-
 gans ruber fui rer, poftcavariccomiiiixtuscxrob-
 fiiflavo inter/cconfu Gcoloribus. modorlavo medium quad folium occupantc, modd robro vel utroqueradiatimperoras difcurrerterucrit. Similicerflavam quacflavum & rubrum : & purpurcam qux album & : purpurcu colores varic inter ie coramixtos. & radiarun folia fecanccs habucrincc. Ac illud etiam obferualiann, quotquotfic nacivum CDlorcramutarunc. fiibindccorruptifblitas. voluiflrc camenancc, haccolotum varietace herijiiioculos oblcitarc, tarnquaai ipfictrenmni valcdi&urat,

T«lhti»
 ^t' tu'L

Variadco multiplex cfl, ut difficile fit omnes T- /> «r«i, cjuditi' centias verbis exprimere. Nam ciim tu- jufcum quocandc mprxcocis Tulipicim Lnacxuf- U. & tdlurc fcpulra germincc, non omnia retinent nauum maensciorcj fed in|atk» colore tranf-


*

format)

t

fortnantflore sprstferum Alba^cujus (cmincprognarasplamasinfjgricm colorum vaficra-
 tonjprsreliqmsnancifcijCxperienria&diligentiobfervationcdidiei. Scniiracniminco-
 dcMGapicennaamencitpiocoilefla^odemquefcictnoiiiinfoterrXauciinnOCpirmiA
 fa(quorcmporc,non verno,fercndanjnromnium bulbacearum &tbberofarum lcmdina,ut
 l'elicirerprovcniantjVelenammatunuscum lponredctiutjplantiilas proximo fubiequen-
 tevei^producrun^quxpoftquinrumjfcxcumjlerjrnrnum, imoctiam (utaliyajijsfacilius
 adolftcunc) o&avunij notium &decimuno annum floresproruleruntj eoqueautomnmo
 albos U matrem references, atque al bos varios, vcl lutos & lutos varios, aur ru bros atque
 rubrosvanoSjVclpurpleosacpurpleos varios, quorum videlicet purpleafoliaalboris
 ornatafufre. QjnnEumad FlavasaucRubrasarriner, plenque proles marnscolorem rcti-
 oent; iipeetiam inahum commurant.Omnscpouci hascolorum dirJercmias jquiini apii^
 fimepoccrimus vetbisxpnmerconabinjur.

Tulipa prxcox F-V.




Lurcar-varizigiturros (ut randemfcriem
 fcquamurquainprimis coloribui dofenben-
 disteuimusj explicatuji nonnumquampri-
 misdiebustotusluccusapparcc. quaitudcinc,
 autquinrodem um diejllius folia rubrisvirgu-
 lis extnnictis leviterpcr eras diihnguuntur,
 interiorpartcomninolurca rt-m.nriLiic.pra:*

fertim triaesteina, &: unguem nonnmrquam
 habencveluti fuligine tindum, apices inert-
 dum lureos,& ridiculosrosfuttiiictesfufros.
 Inrcrdum extema floris folia circa medi rani
 rubrisradijsinfignira funt, interioraau'frc-
 quenttonbus, &ad extremum ufquefolium
 feté excurrentibus *

5. modo foperant. Aliorum exreriora tria folia mucronaca Si lotea (unt, prateroras qtiarpur-
 purarubifcenteradiatiinrttercurfantcinfigniuntur, deindeextre [III] orx lutea; liinc,inter-
 nj parccirciter medium folium,frequences rubri colons radios liabec: interiora foliaorbi-
 culacornucroncprxditaabinfinioaafummumoblngisrubrislinciidiftinguuntur.pjrter
 extremas oras qux lute* funt, interior pars m inus rad iara quam exterior, imguis magni, lu-
 tci,quernadmodum flaminicum fuisapicibus [jiodorati. Eft&cujusfoliaextremamcu-
 rndemorbulacam habi;k,forisomiiinoaurca,lu[Cisoris: intusai!tfmomninoluc<.a,au-
 rcifivepoctiisrubri colonsflavo permixti linea racii.uim medium folium, rnntvrliniqu
 fecante : pediculilutci funt, apicescineracei: aliquaiitulumodoratustii. Cujusum folia
 orbiculitoprorfusunt mucronedoTfbinxtenoribusatli'xrtcmum ufquemucronem lu-
 teo onslatis, exaureorubtis, unguibuslutcisdiimidium foliumoccupantibus, ftaminibus
 Siapicibusluieisonnihiltiimodorus. Aliifimiliterhuicpares,(dddutioiceoloteptas-
 diei.ftaminibus&apicibusdunraxatvariantibusjfednclliodortcatenr.

6. Rubr-e-varia: flosexteriorafoliamagnax parre mucronatalubct, interiorsorbtcnla-
 ta. Aliquandoautem utraquemagnisonaurifulgoreplcndentibusfuntprxdira, magni*
 7. g e s s . a p i c i b u s g p p
 8. bus plerumque vclut fuligine infectis: hujus flos fans odoratiss est. 1 nrreru m exterior
 luraiaorasfori^liabencinccrius aurcmdiliitiis rubenr, &tjua() radiarim in lurcasor
 lansnrbctlodefinic: inrcnora verd fimiliter ruhtiir, led Ignoresor.is hahfiit, rubfo
 raduttmutinextersonbusdciincnr, ungiiesluicos,lb[nin.icincni.-ci colons: &i(i
 1. nonnihiliraws. NennmqiUEndilutioremmijcolorcrubencuMaqucfolia,racJiocref
 otif

VI.
 7. 1. v.
 1.
 2.
 3.



oras habencia/oris minij colore interiora folia fere tota occupance, virgatim tamen in oras
Wensdefincnie, magnis unguibus flavts, apicibus cincraccis, pediculis ca fuftincnnbus lu-
tcis:flos etiam utcumque odoratus. AJiorum cxtertora foia, nicdio dorfb luceo fangmneis
VirgulisdileinCtafunCjrcliciLiaparterubra.onstamenlaccis: interioraomninoferen.ibra,fcd
iu bro colore rjdiaci m in aureas oras defincnie, intcnore pane tota propemodum lutca,nifi
circi medium foltrir) rubns radijciiftingaercentur, *tingtiescum* pedjculislurc;apices nigri.
Qjionmdam fbluoniniamucronaca, cxterne dorfo lutci colons, reliqua parte fanguinei,
pidtcorascj ut: i urea: funtjnternclaneuincisradijstotarefpcrfa, extremis tamcori^lureis:
fuenura foris latguinis modo omnino rubent, lutea: feu flavz orz sunt, coloribus tamen te-
fe invicetncomniiftciKi bus, inerna parte omninoflavafunc, nifi circa medium crebriori-
cus (inguijicis rad ijs inftar orbisquodam modo inlignita cftent: unguis, fiamina & apices
turn (upenoregi-nerconvenunt. Suntaliorumettamomnia foliamucronaca, orisaucis
refiqua parte ruDris.practcicxte riorum fo]iorumdor(a,c]U(jaiircisquibuf 3am virgulisaffer-
Ja(unr.,otnniLimuiiguesUiteir3dutiminrubrocommixti,pediculUmei,apiccsnigri^on-
nullioruincxtenufoliamucronata,internaorbiculata, tntarubia, cxccept]sons,qux aurei
colons feintradurim in rubra dc(inentrs:cxanoravcra folia facuranora funtjOinnraramen
intcijure parre magisaurca(urit,ungucs,(hmina,pediculi,cum pricedcte conveniunt: em-
nium tfturumfloresfatisodorati. Inveniturctbmcujiisibluparva5orasaurcasabeni,e]e-
g.inzihmoniuTo colore relit]uaoccupanrc, unguis *HIVOS, iinvna* vcJiJt]Ajj^{linc^111}u^*
apices obfolete purpurcos.

Alba vari^utnmiiiifoliacxrremaparte mucronatahjbet.autriaduntaxatcxteriora,
fca interiora orbicuhta. Innoniullis extfrna folia ad extremum ufijue niucroncm otrmi-
noferc.iibaiunt.cxcceptisorisquarclegantis&dilutcadmodumpurpurilficnti'.dvecarnei
ucitadu'aincolonslUitiiiiterioiavcro'iiugispurpurarcunt ungueslutci]dcindexalbidi,
ftaminJCLimluisjpicibLisrlavj. Inquibu(damcxtcnora foluuxalbido lunr. dorfo purpu-
Ipisvirgulisafferfi»roli IUapartepurpurafLcnteaut incarnata: inccnoraftjJiaoninino pur-
J>arca(uncungucsftclJatiaa Havi dcinJcalbi,apic('sluiei,pediculosfu(tinctesvelutifuli-
ginvalpctii Aliorum cxtcrnafoliaaUioetiainiun:dorfo, p!unbuspurpurcispin(3isdiffrin-
cto,interiore parte dilatiate purpurata nitet: cta interiora folia fatutatoris sunt purpurz qudm
in fupciore,ungucs flavi rjdiati Itlto:inilir,npc;s mgri/ufci pediculi. Incerdiim externa
folia **magnas** orjs ornco colore prrditus h i bent.rhqua parte albaiintcriota ver6 quafi cat-
nei sunt coloris. Nonnunquam externa folia **paUefcncrc** funt dorfo, alias onininoJba, pr-
oras quz foris brevibus & raris purpuraficibus raji]jsexornatur:Lncrioutoualbalunt,

*

orat

orascamenlongi9ribus8ifrequentioribuspurpiircislincisinfignirasforishabent,irii etiore
 S. parre omnino ferè alba Punt. Quoitidam exeriora foliadorfoScexrremo mucrone palliT,
 alioqu i Candida oinii no, orx i n tcriore partc paucis purpu rat cennbus rad ijs d ifi rvguuru r-l n -
 7. teriorafoliaamediofercadextremasoraspurpurafcntrbiis radijsforis a/perfa funt, incus
 yerdamnthoalba.praccroras qua: rarioribusvirgulisdiftincli funt. AliquitdoexEcnutria
 foliaprorrusalbafunt:inrcrioraaau:emorasnunpaucis, mwddmulcispurpurafchcibusfi-
 8. ve/carni,tcoIorisvirgulisdi(l:in£iLu]iabent:otnniumungucsfl,ivi]ont,apices&pediculipa-
 lent Invcniturcciamcujusomniafoliacoloribusquinetnalbo&carneopcrmixttspraidi-
 tafuiiC)(td<jmncincraccumcarncoco!oritcmrcperfuuurn referanc.vel fimilis plane colons
 cum tenuiore tilo fericeo panno carnei colons, cujus (ubtcmen albumcftb, Germani
 Siit<fa(t/ hocest,argentcutncloremvocat; hujusunguescaibtdi, apitcsobiolcrepur-
 f urafcen tested iculi albi funt.

Tulipapnrcoxt-v,

VIII.
Tulipa
officina

I.



Purpufear-varixflos magniex parccomnia
 folia tn uctonataliabctjntetdtim tamen cxrer-
 na dun tax at rmicronatafunr, intcnoraautem
 orbiculato & obtulb mucrone pwdita: «it
 cciatn cujus Qcnnia folia otbicular um habent
 mucronem, utex Ungulurum defenptione vi-
 derelicebit. Nonntuquamieituromnia folia
 rriucronataPionix poiypfino& plcno flure
 purpureum colorem imitantur ,oraiqj habent
 ex albopurpurafecntes, unguescxlucoviri-
 di^ue culoribus fimul quodammodo permi-
 xtis(ubob(curos, exalbido orbc radiatim cos
 ambience, pediculos flavos fed vcluti fuligino
 infelos, apices nigros:iUiusfioresmagni(unt
 &admodu patuli. Mucrnatactiam(ingula
 folUjforisutplunniumpurpurcafunt.intenus
 media pane tarni colons, or is CX albopalle-
 fcntibus, ungmibus, ftamintibus, &apicibuS
 flavisliveluccis. Interdu omniafolia mucro-
 nata, foris & intuspurpurca funtomnino, ex-
 trem afqueoras albas habent.ungues lutcos al-
 boorbccircundatos, apices obibietepurpura-
 feencesinitio ,deindcubiobvcri< Tunc (folciit
 cnim omnes bulbacci generis florum apices
 explicantefcfrflorepapenre&invenere) flavo
 poilnic afperfb, flavospediculos. Aliorufin-
 guli folia ccianimucronata,8ffaturatiore put-
 purcocoloieprxdita, omnium ora exalbid*
 ungnsalbi.in imo camen flavi.apices fcftami-
 napallida. In quibufilaomniafamiliter folia
 mucronara, fed color purpurcus dilutiornna-
 • gifqjieflofiduSjOrafcxalbid*, unties ex viridi

6. 7. 8. 9. 19.
 palkntcs.pediculi ntgricancs,apIces pallidi: odoratuseftplerumque iftarum Tulipatu llos,
 reliquarucQ inodorus.utctiam genereotnniafolia mucro-
 naia,obfcuriorispurpQrx&: quad amcthiftna:colorepra:dita(unt,niagn is autemorisalbis,
 unguibus,ftaminibus&apicibusflavis. Quumndam contra floruflingulafoliaorbicufau*
 funt otisjjsqucmagnis&albisjdiqua pane laturaci ore mtentcque purpu reo color epredi-
 ta,flawosungucsarubitalbusorbiSjCincraceiapices,rlavi pediculi. >Jonrmlorum intcriora
 folia aliquantulum orbiculau.dilutiore purpureo colore rplendcnnn jcriore parcc totafcd
 alba funCjOmn>uorzra3gTUc,albx,iiriguts,ftan]ina& apices fl.ivi colons. Rrcriturctiano
 cujus externafol'2 mu^ronata &c reflexa, cxreriore parte ob(curiorispurpurxcoloreprxdia^
 liintjnterioraveroorbiculaca&diluriuspurpurelcentia, utraqueautcm in magnas albas
 orasDL-Gnctiaj&iiKcriorepaircveIutipurpurcumorj'em,totuETiflorempraicdiUiTiam-
 bicntemhabentLa,lureosvel flavos unguosalboorbcc inclufos,apicfs obfolctc purpuralccn-
 tcS, flavos pediculos. Eft prsttrea cujus omnia folia mucronata,&criaextern.i foris purpu-
 rea,omniaautcmraagnisorisalbispr*dica,intenorc6;partcomninoalba,nifi mccliainco-
 tum parrem vcluci purpu reus oibis (ccarct &c varium faccret,ejus ungues flavos ambit al bus
 c«culus,(litninacum apicibus pallent.

SE Dantequamfinemhuiccapitiimponam, adijeindaputau, quxcircaTulipasferni-
 nc Conflantnopolis mirtb natas obfervabam.
 Magnumfeminis illarum cumulum acceperratIlluftrisvir^tigenus dc Busbequeciim
 pleri^ucbuibaccisairpibmo VicDnMayc^lutarmoinGalliaceri
 proficite.

ptoficiicretor, nihi rdkuiir:cavcr6deniumannisfcptu:if('firnoquinto& fiquente lupia
 n>ilieGmum,&qingenccfimUmconfertim(qu&d?era]ftacflent,&vteta, vixqac nalcitura,
 CXiftifharc] rrr.eni.indavi.ExiisrjrneningcnsTulipariim numcrusprognatusefr ,qua
 rutnnonrtulkcqrtrtojexto ,jcquecn.ini fcquentibusanfifslorestulcruntinlknicolorum
 varietac:: commendjbilc;. Nam flavor omnino,riibros,albt)s,&:purpurcos, vcl ex hiscolo
 ribusi.Kcrrccoin:ntxcisdttin£los hoccli.F-VjR-VpA-v.p-v.nadbustiimprxcoccs: Scd inter
 illosciamfiicrurtt.quidLii^entiusobfervanti, potiisad Dubiarum veiScrotiurumTuli
 parum clitSem retrendi vi.ictur.quam Prjtcocmm: nam licet rqualt cum Pra;cocibus ma
 apiitudineoounuHlfdancaxataffurgaot, eodem tameiicum DubijsiivcSctotinistempore
 florCR-aniina'.lvern:dcj<:aiiceni Dtoximiscapitibus.

H x. n igitur (iintqnx de Pr:rcociumTulipamm varictare nunc commenrari libuicmon
 nieftigit catnL'n,qiinp!uresdiffrentLrrradipocui(renc, ft-dcjufniodi .quasadjamenunic
 racas,tamtJuaniprimjrns rduciaatquefubilliscmprchenJipoflcxillimo. Nuncmcect
 ad Scrocinafum defcripioncm tranieatnus.

TVLIP* SEROTINA,


CAP. VIM.

СЕРОТНА Tulipa,majoreftamplitudine .cubitalctnctiim&tripcdalenu'nterdomha-
 ^bercaulcm,firmiorcm,cram'orcni,rorimdum,funpohrnarerieplenij, &brvictiamin
 canit^ veliui Unuginc , fivecrHorefcentia quadam aperfum : hunc alrcrnanm amplcftun
 turquacerna plcrumque t'ol:a,nonnumquam qmna & lcnajCarinara, firminra quam in Prz
 coccjurplunnumcrfta, nonnut4ntiaaut ad terrain inflexa,arq;orisinrcrdumadtd refle
 xi^,utfinuoiaavidcanrur,aliquanHoomntaxqual!a.Summocauli,quiprdalivcl majore pie
 rum que.i mo cubi tali ctLamnonnuqnam long] tiidincnudiKfu pra folia cminet,urricus] ni
 dct (ios magnus& oblotigus,cyathi tnodeconcavus, fex folijsconltans, extrcroapicccm
 nini auicronato velorbiculato ,au:rnbusxtmoribusdunta)cacti)ucronatis, interroibui
 orbtcularisutin Prxcocc.&ccontra: capnrut in ilia triangularc,mcmbranaccum,cr.iffius
 ut plurimiim.&prominutoventrequoafummodclufcncce, lex ordines ic minis plani, car
 cilaginoii.rulvijautrubelccnris.najonfqjquam in prascocc confbtciuntur: radixpricocifi
 milis, longiore umen tnajorctijbulboconftat plcrumque, inrcliquifcum illaconvemens.

T. serotina hi J

Tulipa serot. πολύκλωνος μικρά.

Tulipa ferot T FoZ. vxtc S' iimajor.



Tameta.iutcmliicTunpanonrmmtacpntcoxunicourpIurimumconfrcrauIcrum
 Umen inrerdura »oAoxA*kr& ramofum habct mam na« tmhiunrubro floreacq.emm
 fiavoprzdix, qmbuscxiofimidfolijaUalwrnudus&pcdalis ramus, sracilionamcn.&ad
 fumini

T. serotina minor wald. clava.


i ummt folij exortum tercius, crai TirLidinc primarium caulcm propcmmodum trquans eadtm- qualatutudmenuduscxcrcfcensadnafcerctur, finguli etiain fuum riorum luftincinc.: in- urdum quatecni, quini', & plures (nam anno xci. habui (ex ram is totidem flonbus conflan- tctn) flores finguli (uo graciliori ramo ex alls nafcenic mGdenres provencrunt, (cd ahj alij s majores, nonnulli eiam vitiati. ficqueniidsver6acciditumnicoramodonetur, qiilin bum autplunbus.

I 4- hacporritam infjgnem colorum varictareai nondeprchendi, fed ffavasduntaxar, vci aJauri eolorem tnclinanics, &: rubras unguibus plciumquc uigi 15,0lbe aurco ci»iilii, cai- que velodorato vel itioiloro tiore.

Tulipa serotina flava.

T. f. flava.

T. f. tuh*.



FLAVA ejufdem fcic coloris eft cum pix- coce, hoc eft, dilucioris & quodammodo flavj, vel pallcficiHis, vchiucnlioris & quali ouri modo rucilantis, vidi etiamcujus foliorum or; (inguincisgucnsafpcifzeflcnt: foliorum un- gues plerumque cere recentis coloren refc- runt, inrcrdum nigricanobui qiiibuldani ve- nis diftmfti coiifpicujncur, vel nigra macula notatiapicescumpedictilis vclflavifuntcolo- riSj autcmeracci, vclfuliginccjuadam infefli, auiomnonigri.

RVDRAE color plerumque faturatier eft, & c|tiatlnigricat, mterdum diluciorA: perele- gans: tolLoruinungucs autotiininofiavi (tint, qualesirsquibtiMainprxcocibuSj automnino nign, qui Sole illuHran carruleum quidpiam permixrum habere videntnr, vel macula m- granunc mmore, modo majorc (caquenteni orbcanrcoinclula, utoculumquodamntodo expnmcrevidcatur, quade caufa anonnullis Oibmdt Se'.t, hoc eft, Solis oculus cognomiiu- tur) flavuminficienc, nonnumquam ctiam totLtm fere occupante: apices cumped:culi (velomninoflivi lunr, vflnieij, inrcuium api- cescincrcicolorisj&petiicuh flavi.

CcKriim liarum Scrotmarum Tuliparura. qu* vcl flavi, vcl rubrt coloris fiore prxditx funt, nular liaflenus varictare in laione mihi ppercrunt, ntl quodintcvilutii exmbar femi- ne, fljva:, coatraxHavarfcinmc, rubrac nai* ftjUnguibu* (xpenumcro varuntibus. •

Tulipa dubia defaria.

T V 11 P J « medio interparcocera & fffrotinam tempore florctiKS, videlicet qua: mar- ccfcenreprTcocium florediose xplicanc, & {rorinnflorercincipicncLbus, jara (enc* fcuntjimoiuerdtiracum illtscrumflorcnt, Dubixquodammodoappellan podunt, cum utrialque generis nacuramrefranc Suncvcro nicer cas nonnulla:, quorum flores & spf> piantai"rotinirumm.ignicudiam3cqLtant:a!ixquxprarcoceMioii(ufcrjnc DCCilliforml runt abfimiles, & ill5cquidem vclarapli HimisflonbLisprirditx, vcl prxtoccJion majonbus: funtetiam i x i m p r o c h u s u m S e s . l i n g u a r u m a u t e m : J e n a s q u a d u d i c t i . p o r e t i m u s h i c e x p l i c a b u m u s , e a r u m v i d e l i c e t q u a e n o b i s f u n t c o n f p e c t a : J : n a m q u i s r e l i q u a - t u m i n f i n t r a m v a r i c t a t e m v e r b i s e x p r i m e r e q n e a r . "

T. dubia major: 1.

2.

3.


4.

5.

D V B 1 A E I g'turmajores, Horcmnonmiinisamflnmhabent, utdiximiis, aujmfcroti- nat.IllLimautca] vclpallidum admodnm, vclH.ivuui.omnibus t* lijs mucronatis, & unj; 01, busflavisiniatcerxrecentis. Invenuur etiamcujosomniafolia (.mninorbva, cxtren-1*5 orasotbiculataslubenEad prxmaturi auiamalicolorem aL.(cdence?:ft;nntnacum apici- huiflavaruntilliusflosociorarus. Aha item cujus color omm no aurci's, exrcrna dcinde f* liaiavorofbprzdia orasdilutorijcinnabariscoloreradiatinidiftii .Sas 2Icjuiruni: interi- oris vert folia cinnabans etiam colorem.irque toluper binos lutos netvos (rcundtim fon* gitudinem, & flavos radios in latera excurrentes: unguetupus magni, flavi, altitudinem Iupcraniapicut)i.(lui nigri fontjPfdicoIiflavi, ftdfuhgincinfedi. NonnumquaDc omnia foltaorbicoIatoniuctoncpTiditarlivi coloris lvnc,nibm veins lccunilum tout m longitu- dinem excurrDtibnr.huncicnMibtJS, modderaffionbus, an iKicuiniti. urn. dm idji-aof** lium interdutu intlcicaubus, Suiiquibui florts ditto us tubeni, & cinnab- in colorem quodam-

Tulipa Julia i. major.

Tulipa dubia i. majoriaUcra.



quodammodo referunt, omnium foliorum extremis mucronatis, vel faturarios funt, & quodammodo nigricant, ex cetero tistio! ijs mucronatis, interioribus orbiculatis: unguibus flavis, magnis v. parvis nonnutquam veluti fuligine asperis, vel in omnibus folijs, vel in nccerioribus duntaxat apices modo flavi scilicet leviter nigrificantes, l'oddo f'nnino nigr, flavitiam pediculi media ex parte nigricantes. Aliarum Boreas sunt colons albicollecci, qui

«» pp Anō? id quæ: nam folia ex l'opaliēnc corum quædorū in flavo cōtiora fofia orbiculata, unguis & apices palent. Nonnulla funt flores omnia folia habent extre-
Oomucrone OT biculata dilucifl mipurpurcoloris^ quodammodo carni. maximos Hn-
gucsalbos. quacipici adhxrene tiavfcncncscū fitnimbus & apicibus. Quarundatn pau-
Fofaturaciiis purpurafcut. & alinarum prxdulcium prxcociorumque rubfcfcntium uvi-
rum, quas Germani Cermiim/Aufmaci C7?ur<(f((«appellan, colorē referunt, in recriura fo-
ia orbiculata. unguis cum apicibus flavescunt. Reperuntur item quarum flores lacurr ad-
mo Jum funt purpuræ & nigrorum aridorum cerariorum fuccum pxne referunt. Auftriaci
a Crfdft vocant. haruuii gucs vcl fubc Krulcifunti Vel ex carrulconigrificantes. rtarairjafu-
&afuot

€.
7.
9.
9.

DVBIARVM mcdixqu*amp!\(iim florum habent, paucifunt arnob (crvat. Earum
Unavaldepallidicolons, coctutnfulphurferereferenris, propterea Auftriacr nobiles ma-
trons &cti&(lfinrt/idc(l, fulphureico Joriscognomenil Jimdiderant: omnLacus foliamu-
cronacajiingucsfuliginē infciii, Ejus unicum bulbum Byzantio allacura habuit Gencrola
Dn.dcHcylcnftaiijtiuxil iusprolem communicavir: floruit qmdem ilia anno M.D.Xxcvt.
& bonum femē dedit, red Cubfcqucns naidahicmicum matrē corruptit: (emen annofc-
Sucnre terræ commiffum. Vienna: in mco Tiortulorli Sum. Altera flavielcgantiscoloris
noem habet. cujus omnia folia mucronata, nigri unguis, nigri apices, fuhpnc infc^ ipedi-
culi. Hic anno M.D.xxvDt. florē nimihirulitfedccimfolijs conflantem. cjus vcr<iproles tre-
dcccimjatfcquente aiino. mater duntaxatoao. prolcs rex. Tertiā flosf-v.cft, hoc est ex fla-
o Sifubro coloribus permixtus, magnis fex mucronjtis flivifque folijs confans, qu ab
Ungucomnino nigro, rubras venas per foliorum long] curlinem radiaum excurrentes & in
Urcrafparfa-iliabe^ nuncraras admodum jmodddcnhs & confertas.

11. Dalia
I.
2.
3.

Dubiarum mcdijaiuni, quarum flores PrxcocibLsfunt xquales, & caules intrailarum
magiiitudinē nonnuraquam conliftunt, ut plunnum autem Dubiarum majorum alti-
tudineti quanc, multiplex est genus, cujus difR-rēnridifficilius diftin^uipofluntquam
Prarcociuni^ bvariatiuolrirutn rnixcionem per tocos flores interdum dirtu (am, utlunga Sf
dilige Q<obt;rvai Lone<liJici; ahquasulencxhittiux vcln Hliiflorucruuc, vdiapodalioi

111. Dalia
media 11.

TuKpadubiaiLmedia r.

Tuhpadubia in.mediaiL



Tu) ipa dubia 111. media i j. vcificolor.



creville significatum est, quâ porcro perfpicucato, pro ingenij mei tenuitate deftituam. Sunc igitur quaedam) Flavar dilutiores vel palufcentes, quarum extenu folia quodimmado forisvirefcunt: aliarquarum toliaorbiculata Tunt, unguesautcm fubvirefcunt: quarum irem folnflavicolonstlcganm, interioratriafuperneorbiculata, SC quib,rd3mfangmncisgutnsafpci(a:n6nulfomnia folia flavahabent.ungucscrti colons, quaksahoquifrocinarhabcm. alia: quarumunguesnigra & fplendente roaculi (unt mfigoitijvel ex fufco & viridi colonbus commixcisprufi. NotmllarF-v.funt.nam licet omnia foluinitioflava Cnr, tern»t* menvclquatco die poll quaoicxplicatifuot Sores, fingula folia tenui limbo rubro exor-TM confpicimi[ur, Qonnumquamctiaini»
 prolibusinamfatisfafiftit] *
 rcr, velaltertsduncaxatanniiconlpKitur:
 quauVim fbva rolia lubent, orasautcmcin-
 nabans fere colore infctjs i aluru folia paL-
 lidioratunt, & nibriivenis orn.it as hi bent
 oras: quorum irem folia Ctiam p.illent, id
 perruistft null aurci pratmwun colpr,pr*r
 lectum circa orau iuvenureti.im verliculof
 cle^atifTima.cijus colores flavusfiiru-
 Dcritacommixn iunc, nc c friceo panno
 " i vuo j fentbu rumef, conllat
 fitesv idcancur,illumnguesnigrifiicijJ v,
 <rotmaf. niitic tnihi haicnaca, clega" 'i'
 ^ u m f l l u it auzo M. D. XXXV III. Ali
 rum Ro-

rum flores aihiquicm liinc/cd in Havumdrgaicrantis colonsquo^{poAfi/xK}quails itiDubia
 majore kti-npfUidl, hanim folia vel oraiiiaiiicronara, velintenoranibicuhtomu-
 crone con[t]jac.iingui.*Sjfbniina,apiccspallefic:natactiimihic(teF-v.(erounc(cmincqaod
 Ioan.BoifoccommHiiiJcavirjftilpliuifeiqu^{damtolorii^ualisjllaHt-'yfcnfteiniafercJeii} mi-
 nus ampli fluris. Qu.mmdam *Norcsa*>ypoM'*Jx.actum* h'mt colorisfed alm', coloratljunflus:
 naiiicajiifJamominatblianiucroiara^{cxcremumillutnnuicroticiTirLibro} colorecin&um
 habciir alia paaidiora (lint& ora<. rubris veins diltiuitas habent: iii nonnullisfoliorium brae
 ve purpuraedatki i i c i c o t o n k o m i n i d o i j n d , a t t i c e i a m i n f c d b a f m a o c c u p a r .
 Vnamiabui A-v.ferotin.t (emiiicnatamqitxannoM.D xxxix.(lorcmprorufalbum protu-
 IJEjlicctintiovir/censcolor perfulusqiiodanimodoconfpiccrtur, fliminum apicesfalci
 tuerunc. Nomiullanimfiores A-v.funto<3ava;A-v.praccocifcfcfimiles,ijqie,veld!lutiorec,
 uiccrionbuitblijsquodaniinodoorbicLilatjs, ungLiibusnunexalbidiiCircafummumpur-
 purafechte macula iiifignicisjltaminibusxalbidis.eorum apici bus ni?.ncamibus,modbuti-
 ^uibus&:lbfniibuscaidic.icibus,vt;IunguibLiscxalbidisfubccri]jeo'orbcinchifis,albisfa-
 minibus.nigricaiitibus .ipicibus;aut Taturationibits fbijjspra-ferum exeriorc parcc ,cxterio-
 nbus m l l crotiatis.omilium oriscaticanribus, unguibis exalbidisfubcarrul^a macula inii-
 gnitis,3lbis (ynunibuSj^picibus cotum nigricantibus: quarundam folia mucronatadiiutio-
 rif ^ u e i i n t e c o r i s a u t i a t i i i a t o r i s i n v e n i u n c u r e t i . - i m q u a i u m H o r e s p l u r i m i t n a d A - v . p r e -
 cocissecunda ^ c t r t i x c o l o r e n i a c c e d u n t r & a j a f c m i n c a B o i f b t m f r o n t a i g a s t i e g u i u s
 flore purjnrcarvcnxperto iufblium difperfa¹ func.fionutliaec primiiannoM.D.xc. Ptit-
 purcarum fiorescolorisnuncnjzicdil'jttoris&magii'floricii, foliacjiincerioraorbiCLilatalia-
 beni^exalbidosungucs^urpurafcentiaftaminajCotii apicesnigricanrcs: moddqafifmiiles
 Purputex dilution dubi^iwajorijCindicatibusorijUngui bus vel ex alboflivc(centibus,vcl
 •fljvisomnino, autvclutifulgincinfccclis^utcxciul^Oj Havo, Sifubviretccncecoloribus
 toinaiixtis: mo Jo (arurationis coloris, cui albicanies tamcii qixdam venx permixta: funt,
 ungutbusautextiavouigificantibusJaucflavisoojninojautcx vfridiiiigr!caritibus,auc(ub-
 Csiukis.iivcxeiTLilcoriavetcntibusSjautcsruleisomiino, nifflavcfctisorbisambirt:
 'tinctiaaiqitarum florasddutepurpurci ilium Fere coloremrcferunt qtiinCaryophyllcis
 r t i r b r i t i s f u l f d e i f i a p u m e a t s c o n c u r , V i n e m f S i S i a f f i n a
 tronx Democantys^{ff}*, quaiiaurci malicolorcmittiistnbimnt, (juadiliirusrubuiticolorfla-
 vusquodamtuodoperfufusvidetur, horum colorvcldilutiqr, prxfertiminKriorcparR&:
 p^roraSjVtlfacuratio, interdum interncdilutiflimus, foristacuratio, unguetsvclflavi, vel
 iUvumcolorem fuliginofus ambitorbis, vcl ex viridi nigrtanc, vcl fufci funt: vidietiam
 quarum flosad poltremam ilirTcremiam Sccondigeneris valdeaccdercc, tubioramcn co-
 lore alium fupraittc:quxdanipluiimut;iacceduH[ad cam cju? inter DubiasraajoresocJa-
 Vo loco repotica eft.verura humilior,foiijis inter ioribus orbiculaco mucrone pr^ditiSjUngui-
 busvclomninoalbiSj vclcandieamibus&fiipriorcparte adcarrolcumcolofeilirfendenti-
 biK>(liDiinibusexalbidis,apicibusadfufcumVcrgentibus, vclungibusbtrulcis, autexca:-
 ruleovnlc'centilHivclnigricntibus^lixDuburummajorumnonogeneriimicisfcrc,!!-
 ct'tiiniinorL's,qiiautiunguesvclfiilcirunr, vclcxarrulconigricanc, vclflavinigreatbfla-
 YutncoloTCinambicntc. P-V.florum folii vcl dilutioreccolorepurpurcofuniprsditaji'cl
 'acuratioe.ormmimonmucronata",vclinteriorumorbiculaticxalbidafunt, unguetsauc
 albi,aut (ubcasulct.aut albi cjuidem , fed tjuos later orbis cam.ci colons ambit, (lamina pi*-
 nimnigricantia. Inter reliquas Kubrxmih natx quarum folia fbris ad purpuiatcen-
 teincoloicmacedebantjntcDusautcmcoccineifercccoloriscranrjUngues^ftaniauia.apices
 flavi:iicm quarum floresrubri, folijs tamen exterioribus fcundiim lougitudinemflavus
 color afpa-fus:& quarum color non Tplend-ns, (edobfcurus&ad btericiumaccedens,un-
 gueifljvivotlnigri.-praitrcajquarumfioresR.rerotinaTfiinilcs^uaEabmigiiibusnigrisflavo
 orbccinclisOculusSoliscogtioniinatacft. Aliaircmcjus iiosnonduni milii confpeflus
 dum ha-c lcnbrem , verum piclyra a nobiii viro Ioanne de Hogclande Lugduno Batavo-
 rum miirianoM.D.xc.deindecilliusunic^quamliabebat.bulbus.ejuldemanniaLUumio,
 cujus flos omniafolia niucronatahabctjCaque, utipfcHoglielandiusadnicfcripfit, mirio
 ^uidemoniiiiiviridiajdcindeorisvclutipalleccntibusjqua:tandem in rubrumcolorem
 mucanturradiatimfclealtericotoricommilcentem .color etianiillevindisfcicfcntefiore
 •••langufcit, prxfertiminriorefoliorumparte : &fanefubfcquemibusannis, bulbusilic
 florem mihi dcdit,qualem dc(crip(crar,nuium tamen femcn nancfici porui. Sed & aliafc
 ^incmiliuuita.fimilemflorcnprouxitLugduniBacavorunianrioquinco&Inonagfcuiio
 ftipraniuilleiimuin&quingcnredmum. Suntancniomnestixdubiarrncdixlecundacclal-
 *»{pr*trpoftrcmum genm) mihi nata; fcmine.vc] Byzantio allato,vcl -i N. V. Ioanne Boi-
 lotcommunicate, vel eoquod mihiferotinarncadedcrunt, vcl (quodmagismirandum)
 aliquotetiampneocts. Nam anno M.U.XXCVI. ex purpurcaprKCOcmsflorcncchabui p. Te-
 cotinam c cedebant, qocm conpici dixi in quibuftam purpurcisfccunda; clavisDubiarumnicdia-
 rum,qux M i A M n a c i s T s o t t M i i t j f a i & c o t t n o m b i t
 cxtertonbus folijs .mgricantibusritcm firwwAiwMw.c P-V. auicm praccoc,p. ferotinam ad ru-
 brmquodammodotendciKCiu.SCP-v.ILVotinamdilutiorecmclcganteni. AnRofequmc,
 M a turfus

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ex fractu-
businterdum
f. m m b

iLirfuscP.pra: Rub.fcroc.clegaiucmr.dcjrneumcoloreni accedentem,]oguibus ex caro-
 l'vo nigricatibus.M.D.XXCVIII. autem anno e P.pra. a 2. d. d. a. d. f. e. r. o. n. n. a. R. l. e. r. o. r. u. n. g. u. i. >u<&
 itaminibus flavis, P. levor. nigricatibus. ung. & s. v. lei. ot. in. m. i. e. x. a. p. r. e. c. Flaveni. semit. & s. v.
 ferotuiani. Contracx A-V" i. TOTma, nata: liinipracoccs Alba, Flava/Ru bra ung. flavis, Ru-
 bra *Orbis di Sals & P. dilution.*

*Ex fructibus
 alij
 p. r. u. n. g.*

*Ctbramlu
 ruitpufum-*

CujLIK^ampor^El!-v.qll. ca^OM.D,oxvll. primum Bruxellatfioremprouilit, femine,
 naclusefljam diLlusBoilot, &quxdam nobiles Matrons: do bias et; amTuiip.is niirico'o-
 ri]ll variccate luJentes. ut ad me perfcscriptum cftretcnro &flava\$, & pallentes, exalboinem
 pallecentesSjlive&p'psAit'Xoi/Cjpiirpiiralcentes, inteniuisantdiutmsrubenres, latentij colo-
 ris, acqaealiasalijsc)onbusmfignira<, habuerunr: qiiibusctiamimilcs, & aliz elegantiflj-
 miscoloribusvariemixtiipoftsamili(i emincnatXj& fingulisannisadhuenafunctir, qui-
 bus pares nunquam ancc eonfpedx: ita Dcus iniftis floribusadmitabiemfianipotcih-
 tem oilendit.

*Tfim-mi-
 iuimftei
 fiiimimin
 ftmjmt*

CETERVM anno M.o.xcirt. mitcobaIacobusPlarcayTulipa*, qua;titiferninenatacr.u,
 monlirofequidera j fednoninclegantiSjiconem , coloreateltquiditTercnieitt; ejusnim
 ^os^ , pfo retreccc, prorfuj viridis, interne (ex parvacraflaque alia folia cciam viridiacum-
 pi^eenSiCa^{putambieitia}, utinitio parvabracifficafloridafive Cvpriaviderctu% Primoquo
 florem tuJicannOjjiicglcxiiirc/cribebat.viEiuni aut Naturxludumefletxifrimans: fed cum
 subfcquentibusquatiioranniisfloremnon variareammadverreict, nuDuniatcmaprobum
 lemen parbtre.cjus rci pccrsfvs.bulbum alrci donavic.

ir.fm4.fm-

**»#»Wf*iiit-*

4U, & AIH,

SE D & mthi btenntopoft, ex femine natisferonnamilii florem dedit fex folijs, ut reitiqu?,
 »#»Wf*iiit-confantem, prorJusvirentibus, exceptisorisquacpallidKerant, &: ungn»bus, qaieKviridi
 palJefcebant.HoruitctiimihiannoM.D.xcvi. AliaviridiscitjusoraEaibajfiierunr. Breviter,
 fingulianainobisproferutnovumaljqquodTuliparumgenuSjnccaiKecuipiaconlpctlum.

Tulipadubiapumilio.

*Tulipa de
 lina pumilio.*



*Tulipa
 mil* tliir*.*

HVMILIOR port6Tulipapt'dalcmalcitiidi-
 nem non fupcrat, inid ut plunmuin infra cam
 confittit, folijs & florc ad Precocem proximd
 aaredens: florjsaurem folia omniamicronata,
 fed exteriora multo tongiora, tons obfeure ni-
 bra, exr. remis tamenonsvireniibus, intcnora
 omniafoliaintenscrubcii!: & fplcudcnt: un-
 guesflaviradiari, fed quosnigervima macula
 iicinficitjUtoibisaureus&raiJiaruscanidun-
 taxat ambito videatur & oculum uodammo-
 docmenciatur; GarDtnacutnfoisapicibusni-
 gricant: hujus radix bulbatcaimcrdumcrio-
 phoraest, nam exterior ilia nicmbranabtiibi
 subftanriam ampleflens & tegens, plurimo
 denfo, candido, molliquesuoircnioadtofuf-
 futued, utmolliffime liulbum rccubaienc-
 ccfle fit.

INVENTVR ctiam alterum pomil onis
 Tulipxgenus, quodnnliiquidcmconfpcccluni
 non est: fed iconem fuis colotibuscxpreffam
 accipicbam anno milicGmo quingenrcfimo
 fexto Si. nonagciimo, ab erudito viro loanc de
 longhe, EcclclufteMiddelburgcnfi inMat-
 tiacis.addita hac defcriptione:

MittoadtcTulipa: cujufdara iconem, ad
 filfljdlrt imi ti inenexre am, kcc
 cadrmquaTiilipainagniiudinc, panbuscau-
 lc.florcfblijs (que pa ulTo longiora &: an gu ft: 0-
 ra liabere debet)&: bulbo quem erui. u / pi&or
 com modi us exprimeret. Tribus jam annis
 concinuisin liono liabui florem profaciirerj).
 fed uncum , nec (lorein liabuic quamdiu fin-

gulari folio prardttafuit, aliarum Tuliparum modo: nam fupcrinre aono hibui florc fbo o-
 (iu(Um, & afianiunicum folium produccntem, qux mine quaccrna folia nafla, prinn]mfio'
 remdcimimtulcalcriprodiisfirailemjUtceitLimfiridgenusmajoremapiuidinemiuii

mo major non cU, quatuoT ptomens folia angulti, canniti, TuhFa: MompeUtata tolas fi-
 ntilia. inrcrczcauliculusprodire. uncial is aut paullo longior, nudus(pr*[cr atiarum Tulip^a*
 rum morem)«virLdipurpurafceiis, l^{ltilimo} ^ 1 ^ 1 S⁰ n⁰ Circm g^{circns} fexfolijjconfantetn»fo-
 nsnonahilpurpuratcentibus, imuscandidis, mabilkamocoipuKeobloDgocapisulo fe*

Bava

Tulip a pumilio alters.



flavisftaminulis fepto^uod^ⁿ (emeu protul- ritjigno: fiVrcin aurem tulifleApnli inde conijcio, quoniam Tub Mai] initium pidurarn mitcebat, cufusbu'busexiguus, bulbitamen alurum Tuliparum form am refi rens, exfpadico ntgricantc corcicc te&us. Iconeaccepta, Croci verno tempore florentis genus imtio exiftiroabam.

CETERVM nonomnesfloresdiuinfiacoloris elcgantiã &c venufbate perdurant, veiiim notinullirum magis caduci, brvvi marcefunt, alarum firmiores linn & colons gratum diu. tiusretineit.prxfertim frotini&dubia:. oranescertenubilocxlo (cfc contra hunt, &pluviofacilecorrumpuncur,etiam antequim expandi polliiu inrerddum, li concinui cadanttm-Dresrconca,rcmpcracofoleillu[lrati,explicati-> tur & diurius confervancur : &i vehemente ctiam ejus irdorc nimum excofli, 6c i'uo humore cxhausti, facile defluunr Ncqueomnes vericoreSjtjm pncoccs, qulm ierotinx,fin-^{Tulpa alba} ^_B ^TM* gulis annis eandem coloris gratiam perpecuo t, cr, fl, f, retinent, fedalternis variarclirpuiisobfervavi, ^W»*
exempli gratia r v.A-v.unointerdumannoni* tidiffimxfiur, fcqicntevs alms color, quara flavus vci albus in cis confpicitur, lie K-V. Sc P-V nonnumquam magnishabent ^d ^{oras avas}
Ic albas, fequ cntc valde exiguas.

CETERVA tametifeminibu; rerse manda-^{Tulif} tis Autumnofinucihsenim bulbaccarum Situ-^T [%] [^] [£] ^{at} beiofarum maximã ex parte verna est fatio)

feujus plantr gentfs confervanTolcat:interdum tamen&nucleismaioribulboadnatispropagatur, fednullainrcrprecoccsTi[ip:uferrilliorrubra,&alba, omnium autcm maxin.e* fero[inarubra, quar.idcdfarcundacft,utciarn femincnata, & vixbima alias proles generet bienmoaurnennioancequirnflorerciicipiac, quod etiamfaciuntplcwquedubixr Solent enimomnesTulipsnondumadul(z.&antequamtiioresproferrcincipianr, utplurimumfi/jgu)((anntjrcicã&:qua(iadperpefidiculumin tiodrantaKm & paimarem aUttudtncm profundius de(cendcre[Apennmeas excipio.Sr quafdam alias, q nx non in altum, fed in larus&obliquum,ante qulra flont'erxlint, proleselongisvenisdpendenresfpargunr, ucproximocapitcdclarabimus) fcorinr aurem illx Sidubiijam drJxjetiaminveiens bulbi exuvioaliquidlubflantiserclinquitrc, quarin almm bulbum effiurriata, limiliccr in exuvio/ubdanrisequidpiamrelinquitquKinalium bulbum omnfic, utfi quis cum dexteritateqaadam & indufna trimos 8£quadrimoscruat,exuviorum vcihgia (equendu, nõnumquamvclutcatenam aliquot bulborumcohaircentium , 8c cxptimo exuvioortumduccntium inveniari; licet interdum accidat ut R.ferotina jam grandior,nondum tamen plane adtllra,tn(lar Tulip* Apenninat five Bononicnfis proles in larus (pargat ui in meo hortulo, in quo varij generis bulDofasfirpcflorumclecanriã&: vanetate comaieiidabiles akbam t£ <xcolcbam,dum Vienna; a^ercm.non femel obftrvavi.

Mcmint &bulbosininhmaala,quafifummatclturenatos, mferodnarum feAjbiarum T«I»^{at} generibusprxfertim (liccetiam in A-v,p-v,&quarundatnaliaium prsrcociumaltsbulbi*'/ra. milii nati mu } qui telluri commifTi, qufdem coloris cum matreflorem fubfequente anno produxerint:eundem cciam eolurem retment bulbi matri adnati.Ex fcin imbus veto qua; fit propa^icio^planefuedLxijincertacft.iiiprarcocibasnimirum&dubLjs.'f amfefonnatmagna ex parte faum genus confervarevidentur, qucmidmodum fuperiore capirediciumeft:auc fialiq uam mtitationcm adquirunc.exieua ea eft,& plerumque in unguium & (htmnum. varietate,aut colons intenfiõne vel remimone conCftit.

Soleteaulismediobulboocrumpere : fed ipfo cum fit)lijs jam marcido,& ficcato.C bulbum cruas.adlatus Illuscnatum confpicicsqjjad criamevenitti) Indebulbo(a,Colthico, & congenerebus alijs) novo bulbo pauatim fuccrefcente, & totius plantz fuccum ad fe recipiente.quo temporecoramodiffiincruL potcft.crutus bulbudiu extra ccrnam adfervtri,5c in alialocaetiamproculdiffitafincnoxatramfeni.

Qinnesiurcm cuijifcumque generis TulipaE(ut^{ia} iio breviter <notemjq Lemad- rooJum longaxpccititudicj. quaiiJiu floremnon ^tunt,o, %avXotplane funt,& unj.

Tulips bulbitera.

embryoni-
fides.



cum folium fingulis annis proferre folent: at fi, dumemerlic, (efccxplicarciuciapiens, fecund um etiam eoiikliifum appareat.illo if fo anno florem prolaturum fpescfl, iifi pruina, autaliudab injectorum eroiione iiuomnjodum caai inrcrcipiar.

Qjr.o nomine vcceribiisdi&a fie Iiarplan-ia,multi dubirmr. Stint caoa^pnciiores nonnulli, quiadSatyriufn Djofcoridfe, quibiifdim rpifuPJ^oi cognominBtonj, tefori ndiam cenfcant;ad cujus laacedfcnfptionim mulcii notis accedit. An vci6 ljfdem taculratibus cum Sary no pr jrdica fir, nemij;cm p^ ntulura feciffe incccllexi.

Meminiancep!uresannoVieniifn(iph,ir-macopaco ad rubn cancri iymbold JUS^LE.TUI cc ice.iusSsroEinebutbO'iqijadiimo' dcullV, ui (aCLharo conJircr.radi; uin (ffchidis i uitat, &inaliquo, quiad hujurnodiremediacon-fugercc, pnclicaictur verilmil]oncgligert-tiaqviadamronclircobUtci,pLncrunt. At uti-noM.D.xCit. loannL-sWulrpliarcfiaLfiifiS muUos condijt, rsdicum Orcbidis inft<,qui-bus cccre longi fuaviors.V }ihrogTiit:trc< dt'prchenJcbjiti: anven rnr,i.juod faevfiotriiliu!tur,nontiiui:-tnrccllexi.

Potuiifcc auceru ancc criginta jnno^ Ant-urrpianusqudam mercarof cc ti quii dceate ttacucr. henimcum linrum hulb'J-rum none*i^uum Domerumabamico CUBI byllinispannis Conftantinopoli i;hi ir-ifTum acccpifcc, cpascfTexirtimans, ex.:ivali- quocfubprunisaf]jniuflit, fcyulganmrnsi'

par um modo, exoleo & accro in cocnam fibi parari: reliquos in liotco, i uter brallicn & i alia oIcradcfodic,ubinf]gletli,omnesbrevrpencerunt,priccrf>aiJL-ost;uosGroggiusR>emcrea-for KlidilimenSijcl AcriauJrperquam lludiofus.id (c rceptit-cujus fini dJigentur, & m-duflnar accept um refcre debemus ,quod eorum poflca Horcs, gratiflimi V3ricuce dckQl-tioncm&voluptatemoculisaJferentcSjVidcrenobishucrit.

Maria.

HactenusauKmTuliparumbulbinobisByzannomiffifunriAjtcoetsquitlen] Cafe Idle, (cioivxvtr6 Ci*A>iltti :1 loci;nHDtrumndcfnmumCuiiffi^iopohniillatirunr,ap-pellationeindi[a: Cafja urbicli inpen<niu'aff*cjr/<dii5a, quxinferProp<iutdcm4: Eu-Xinumpoiuumiitacth Cj**i* vco in Macedon'.aurbsmar;iima. Sunt^iTulipam,prx-letim purpurea,Cosmofand,16 eiTcvline avctcribus mter cotururus hcibas numcracuov

TULIPA BYZANTINA ALTIRA.

C A P. X.

Q VIA novumTulip*genujiocticcdefcribemus.operxpretiummefafurufnL,if- ftiniavijfipaucaquacda inde Apenninca, Narbonica, fi^Hitpanica, quibus nolhahzc aliisquot rtbtasiimvlshabec^priuidiflcreremus.

Tulipa d. fmmmm.

APIWKIHA igituriulipapedalem vel etiam cubitalem fertcauleni, inbinosauC teniosmos interdumdivifui, quibus iingulares iiiJldentflitrcsfirnisucplunmiiinfohj* nonnutnouam Ji odoniconftantes.fbns lubvirclencibus.imus flavis, protuberance med- ditollicapitctrigonooblongiufculo,mulnsflavisfjniinibnscinfcto:valdcodorarusiflos,

leporij flavi (navcolentiam referens, fuperioribus Tulipis plerumque magis expanditur, & ic'caiucriclidubvc(pcramtiLi]irixai; toliaalijsTutipisanjtultiora, ctiaoi carinatantit:ni- jii13(ubcineraceicumtaulccolons,terna.quarerna: fcincnpalcaccumurimtliauisTuli* pis,lcdlongeminus. radixbu[bofarpadiccocor[icetefta,inbinaiautpl]tres(bbol<iingu- lisannisdividitur, proximo anno fl ores daturas, quuiK alias lubinde oblque & in later* ip.irj;it(praE'lcniraqxnund]m Horemtulitjnoninaltum rclh merg:t. Floretum (croii- nis,aut paulo etiam ternis. Nafcitur plurima in Apennino, unde erant in romini Bononia adnojante multosannos mittereC. V. VJyflm Aldiovandum , BononieoicniProfclfi> rem,& omnium Naturae miraculorum Scriptores iolertiffimum: cujus lucubrationes avi- dcodhuc expectatuut,

Tulipa Apennina.

Tulipa Narbonensis.



Tulipa Byantina genus atteracn.



Hv ic fimitispine est Narbonensis e Ceben-^{Ty}nis montibus, a C. V. Matthij de **Lobel ptimifaa** ^{****/} etuta, feaniicisin Belgicam nifTa: minor tamen cfl in omnibus, Bore Torismagis virencs, mrus *fjvi, dcliz: iusqunltlam fpinn: TadicxiamCK* nuibusncrvism lacciafbboles & bubillosfpargit.

TERTIA Inmonccquodani Aranioesvicinuna- ^{TKII} » tti- ta, in Belgicam a Francifco de Hollchctjue Regio 5 horcuUno miffj. Narbiinci paullu minor **efi** que floreni *non vuli*, Jed Narbojicjifi iirriJem c7c intellexi, qui foliaumen habcat foris nonomaino viridia.vcnim piirpurafccnrecti.im colore perfu- (a.IIiusbulbosaiiquaiidoalui, qui umcodiinta- \ax folio (ernper germinafunt.adco^; inanes p.m- htaifadtifunt,uctandemp^{er}icnot Mieratprx- tercaidem Frantifcus&alios aliquot bulbos { uc HifpaniabuJbaccaruni, &. vananim aliarujii t^t- gatuium firpium maxime frax est; quorum ma- ximampartemin Hil'panica mci peregnatione non obiervaram, qui tandem belgicum acrem te- fpucntcSjCOntabucrunr.

BYZAHTIM* autcmfolioproditlilico,ufiico, ^U fi florem non fret, reIiqurum Tulipjrni nmrc, ^{**} at Horc ptohiura pedalc m ptomit caulem, viri- ^{***} dem.rottidum, qucin •mpk' <Sunturbu, 1|cri)ro- ^{****} que folialiliacca, diluciiisvirentia, &Lih(Perici [—] foltorum *modofplendenth*, florem (umnii parte ^{ipp} futincntem Apennina:Tuhp^flortfotma& am- plitud'ne parcm, <cx mucroruminjjsuftantemi quorirm exteriora p»ulo angulhora *ium.imcnotl* vero laiora, exalbido forts cum purpur.i(cntc &:

virij mixrocolorc, intern^iiremccniitcriibcfccnicfiveiithiocdnico, unj;uibus& flami- nibus flivis in^ric Aitcapicciiligniasionihiil odoracum: caput trigonum Apcuninx

fmile, quod ad frugem non pervenit: radix bulbacea Apenninexplane (similis, aliquotibus donau, quam etiam bulbos in Ucus spargere observavi.


Floruit mihi hinc anno M.D.XXCVIII. Aprilis mensis & aliter in fupercrannaala quemadmodum ex hac icone, quae ex illa floribus ipse mecum exprimebam, videri licet) habuit florem: Genes arxauwm Donuna: Vngnadin, quae Epri; cedci He Novembre Byzantio illic anicurn nultisatijs bulbaceis stirpibus accepit binxctiam florucrun junabrios, velut itnea, gestans flores, altera unipum. An postea aliquoties floruerint, ignoro; illo ipso tamen anno Vienne direcc/Li: carumduarum certe, quae illadonantefolium recinucram, quod ammd Jocontemncns. quod Apenninas (ad eum miles crane bulbi) exstimavit Gm, nuliadeincrps floruir, led prolem generante Si Unicum folium produxerunt. Mihi flutem fimo hac inferiptio* ne *Lili dt dnei fictifK*. quae coniungere licet ut plurimum binos proferre ^{ATM*}

SED quandoquidem in Apennines Tulipa: mcnionem incidimus Sicuti opremendum non duxialiud Tulip* genus quod habuit Jione flus vit Thecodoncus Coo in liard Amsterodamenfi civis.

TR EST a cucumilla. caule. folijs (quae ita mcpna Hllo viridiora) flons forftna, Apenninfx non valde di (fimili!) D^{ccctiam} Cutnii hirclatum radice, quae ut iiqui un, 8 lliusi Hftar, oblique propagines spargit; floris autem color ruber est fatirator fex folijs mucionatis constans, jjouoflii odoratu Sj quorutn iingues lone inigri^ avocolorecos ambicte jinternis folijs interioribus in ternos radios mucrinatos definentibus. in reliquis crinis. orbiculato mucrone, illis externis parte omnino flavescens, his vtro paululum flavi circa infimum unguem Jiabentibus Sj trigono oblongo capitulo Apennines infar medium florem occupante, rubescit: Icilfc CD milni non confp^eum. Floret Apnli.

FRITULAAIA.

CAP. xt.

Fritularia
bulbosa.

VEHVSTISSIMA lites plantae pedali, mterdum etiam major, est caule, rotundo, tenui, foris ex viridi purpurascente, floscoloris, intus vefo, ut Tuliparuna, fungofo: quinaplemni quae habet folia, interduccianv plura, in codito ordine percaucini (paxafapj; <fta, enrinata, digitalis longicudinis vel majoris, fuperioribus exceptis, quae breviora^unt, caule viridiora, ic Narbonenfis vel HifpanM* TulipK folijs foimacolor^uc proxima: flos ita futn mocaulc rpi f Timcunicus j^ncid Lim bini, rard tenu. ottnes autem codc Dn ceniporc k apericntes) non nnnic uanngcmc]lus, in odoruj, dcorfum ipcftans & propendenstintinnabulimodo, fex folijs conflans ut plurimu, (habui etiam o^onis & duodenis quae ircolis quibus danunc quadra us nunc oblongiufculij partim candidi, partim purpuri, five iat Qiatkmt, ut ita dicam, carni colons, elegantiflimo ordine in Cj pulcherri ona quae feic di Rinda fun^quadris tamen ad late ra minoribus: folia in cetera parte funt vegetiore & elegantiore colore prxdia, eandem tefque, quae parre capici in harrone, ut Rofarum folia, unguis hifacnt, a quorum infimâ i c Je virefcens quz d j n, & herbidi coloris linca. ad medm nufque folium du&avidetur: (examina medium florem occupant. quorum apices primum pallidj, deinde, ubi obverit funt flavi, & quafi pulycr quod am con ipfifi (quali font omnium fere Boruin apices) quz ftillum fuleum, ucuip]en(t)ucali} s floribus, ambiunt: triangulare deinde iuccedie capuc, unciam plerumqu<

langura, fuper na parte crao ius & Cne cororu, alioqui Narboncnns Tulipa: cap! rifin) i c, in quo craen planujam difit se Tulipar femequa firefcens, membranaceo margine latiore, in quo nullum, contraquam in Tulipu. permixtum confpicitur: radix bulbosa. candida, flida. nutln tunici) fepta, fed veluci m biius caque ut plurimum rquales parces fo Sti, CCUJ nicio proru berat quafi pulvini quidani j Undc ca i lisc mergi^ rfrilipattc muttistibns dorm A.

fuutu.

Ttmfm,

Hujus flos interdum variat: nimirum plurimu in latuutigs purpurescentes quae Jras luber, mrcrdum ditiores. Vnam liabco (emine m u m dilutif Timam. Floret cum prxcocion I <u J Tulapii, mtcidm nctum Martio, in horns.

Spot

Spoil te quibusdam pratisad Ligenni Hurnennon procul Aurdiit urbe Gallix ccicbri nat-
 t J d i f l r i M I l l i i & B e l g i e c c o i n u n i c a i a a n n o M D D c x n
 fnafti ctiam in Nortmannia & Britannia minore intelligo) Dcuide Vienna: Aullria:, ali-
 quot bulbos accept tncnnigpoftmunerc III. V. Ioannisde Vulcop, Regis GalliarapudCx-
 (arctn Maximiliatum Il.eumLegari.Mifitctiainad me aliquot poitannos JH.V.Augenu^
 deBousbcqucSerenifs RcginxEli/abctlizCaroli ix.GallianimKcgisvidux,fumnius Au-
 laTPrj^ckjsaiCifari a Confiliis.Luteciarailtosbulbos, ucnobilium Aufbriacarum Ma-
 tronaruifluxillnisfloris crant'ftudiofiflimar.votisIatiffacrcm.Anno vco M. D.LXXIX. in
 quibusdanipratisquatriduano itinerc infra BudamPaiiiw»ni^,abijsquiCunftantinopoli re-
 didanr, mefe Martio.florcr-s obfervataeft. Sed & poftcapicrxquc Icmine mTlii n-ia: funr,
 quxfceptimo&oaavodcmutnanno, vderiaiiifcriusfiofucrunt:quarufflalixbinos,qu»-
 dam ternosjnunnularvel gminos.vcl duodceim folijscgntfantesHoiesculcrunt.

Fitillaria dilution

Fitillaria Aquitanica.



N. V. Ioannes Boifot, veterete amicitia mihi conjunctus, aliud genus habebat magis feroti-
 num, quod toto bimestri post primum floruisse ad me scribebat, bis ornatum floribus par-
 te interiori ex flavo virentibus, sine ulla colorum distinctione: foris nervus extuberans &
 eminentior ex obscuro virebat, foliorum orae nonnihil reflexae verruculosae erant, ex flavo,
 virente, & purpureo. Ex Aquitania originem ducere asseribat.

Is uem mihi Autumnio communicabat anno MDCXCIII. Maji subsequens
 tismmo foim, ancrut fex folijs uti precociore consi Untcm, quorum extreme orae non-
 tum arentia virentibus, sine ulla colorum distinctione: foris nervus extuberans &
 eminentior ex obscuro virebat, foliorum orae nonnihil reflexae verruculosae erant, ex flavo,
 virente, & purpureo. Ex Aquitania originem ducere asseribat.

flumfit- fexftaminaexumbilicoprodiabanc palhdisapicibu* obfui, aliaal^ lon g ora.
 Nullu^fcrncn tul.t, proximoannoimmuet.sbulbusHorcmntionded.r, landcmlubfc

quens rigida hucms omi
 Ceterav. Fitillaria
 memini, v
 instructum
 X t nuod florcm anno nonagelimo sept.mo Juprainllciimiwi & quingentc-
 sinum prodoxit, fex quidem folijs constantem & nutantem, ut fupcriora genera: led quo-
 tum folia sunt flavi coloris rubris maculis distincti, illorum medio nervo prominulo & vi-
 tescentis coloris.
 Q u e ad me primum genus mittebat pharmacopæus Aurelianensis, Noël Capperon vo-
 catus,

catus, ac paullo post to fchyrica ilia communique lanicna per univcifani Clalliana graflanre Jyblatus, f¹ < < / / i ' d < < 1 < < nomen indiderat, qu< > de jesarcolarvei (icolorcs, f nlllura qacdatnroo- do xmulntur: vulgo Liltim varic^atum antedieebatur. Dodonscus Mcleagndcm appcl- larcm allic, quoniam eius foluvarmcp, p^] ^ j vls^Tus Gallinam five Perdkcm batbaricam aucGuinea: vocarcfola, divctiis tamen. fie- cuiulaauctm (peciescomhiode McLeagrisautFritillam appcllari ncqftit, quandoquidcin colorumiiicavarictastimili modononclcdsftin^ijUtmpr-ore: tamcti & carft^m JII- quantultmi tencrior, fi^folijs, qua: in liac paullo 311311^10" magilquc licibadpf8^{lons} vi- dentutjSiradicc^tquectiamfiorisforiniiannthillainxmulctur.

AN apuJ Rcf. cntioresmedjcuuii in ufum vniatlix plantamefugit. Obflorum tamen elegantia & tffttxpeti^ediligentcrjnhortifcolipociiisexiftmio

NARCISSVS PRÆCOX SIMPLICI FLORE.

CAP. XII.



Narcissus latifolius

Bulbus

Narcissus simplex
Tiwfnl

SIMPLICEM Narcⁱ flojicm appello, qui simplici lex fohorumi cura confac, licet medium calix occupet. tijus autem (liprs, auratiore habet folia, aur anguftiora & tenuia. Vrrulque generis flores coloreertam jnter fe differunt, omnium porrodifFerentias qua pocemus perfpicuitate hoc capite trademus.

PRIOR, ergo latifolius Narciflustria aut quaternahabecfolia, virentia, oblonga, porri folijsfcretinulia. caulem cocavurnjtntntuid, nuJum & C fine folijs, pedcm ahum, interdum alciorem, incujnsiumnio, il-x autOLloplure fve nafcuntur floics, inangulispedicuJiL miidentes, & c icnui racmbnmacco mvoKicio crunipctes, mediocr)ieramplos, cum gravitate quadam utloracoj, (cx folijs conftan. es albis, tmerda < iama' j^ a^ t[< < (, quorum medium flavusomninocaiixocciapatj fex brevia iUm ma cum (im apicibus pallidis cononct: flonbusliiccdum triangulariacapita, in quibus (etsenm^rum, angulti (Lim. Radix illilatisanipla, bulbo { a, nigricantibus aliquot tunictsfepa fibrifquc mulciscapilbtajintusonininoalba, & fiprxctdatur, lenrumquendam

fuccum, ut reliqui bulbi, exhillans.

Nafcitur plenfque Hi(pania), qua* Mediterrancomantibjct^atft, locis, & romi)ibin ferccirca Mompcliumpratis. Menunt non jirocul villa novioppitulo Magalomvicino, bulbumerttre, cujiisftimmuscaulis deem

& fex flores fuffinetet, ut metuo & alius de capite Uti. C. m. V. G. Helmi Ron- dclcti, apud quem vivebam, horto, tern coramifi.

Floret incilidioribus regionibus menfc Fcbruan Ojerueremini ctiam quafdam plan- as Ianuario in pratts Boutoncto (uburb. ino vicinn (utintertini intercjuifdem generis ftir- rwtaiiaalnsniatunuseerininat" l AniiH Ri> < r: icvr> r: ann milnf. . . . ^ mi. . . i.

Invcniturealiushuicfreimilis. fed paullo prxcocior. btbnbiisquicfolijs. i^nipioiibiii flonbus. cmplcrumquenifucnu. quaterni. autad linmnuni lem Jupreniocali inlldct. Ad- ^ . " • fertut Conftantinopolicum plerifeuealijs, & in fictilibus uc plurtmum colmir, ubi floret Apriti, interdum ctiam Martio, livcnstempcrics paullocaltdior fucric: maiorodonsira- tr; intia in lioc nars fertre videcur. quira in (iipriote.

K^ifUti- HLLJugcncnsati quotbulbos, JVdr<^M₁₁ominc, mittcbatad mcanno M.D.XC. fil* M wim- Hcras Ioannes Vincentius Pmellus. quus plenos Hurts probtuos Irerabnnv fed bulbcque* " " " " " -K verr. moa tpe fruftratam dtfpchendi. Namclcgatesquidem floreshabui, (cd fimplicife*

foboTOMfcrttconfanics, fupcnortamploies, omniionivcos pnrter medium calicemf¹ m. odoc> sftananaflimi, tepwios & plurcs fumroocankfimulnafcentcs: folia catioaw. necmtna> latthabuic, quamqui plenun> ftrtfiorcni, ftradicemcraftlion: m. Monitusau- Mm, quosmrfe< < bdbos fimplicem torem t0 liffe, altj jmeiroperti tmini> craftlis, quortia aorcs, pknirueront, pauUo tamen minores Primo^equentccamtedc fcripta

xtdltM- ALTU pnonformanondilimil<, folia habcttcmamquiterna viridiora piotlofu-

CCcoocavus. cuunfidencfcm/cpteni^mcrdumden, fio^priSysamiteW bulgio¹¹ paullo,

Narcissus latif. simplici fl. p. dr. fus. albo i.

Narcissus latif. prof. fus. albo n.



paulloj&omninonivcijquorumvidelicetcalixillcmcdius (quinpriorcflavuj) etiarflal.
 buscft,odorprioriimilsSjlitnilisccLam radix. HJiusncccagicneque'fcineobfervarcorui:
 nam tanuano cxtcrcao, nafcentcm pingui folo nonnullis LuHtanix *8c Bxzicx loch, Si*, uli-
 gmolis multaq; ad hue aqua lhgmann bus & florentcm obfervaba anno M. U. LX v. tum chant
 r'cbruani micioin rummaCa]pccrucbaradunta\.n.: Ejus aliquidbulbiin Belgicam mifli
 nondum flares ttltcrant,dum ociennio poit t C^fircViciinam acccricrer.Hxc porrci planta,
 exiildrumeftnumero.quasmagnKilljus&gcneralisStirpium Hiftonar.amcpaucosannos
 Lngduni cxprcti Au£tor Dodonaro tribuc^&abco mcliiinplrlil' (cribit. Egovcr6noi»
 rooddhanc, fed plunmasalias <iuarmndcfcncpcionem inH*(panicis oblcrv.ui»^o)ritbuscdi,
 Dodonxum a me lubuiffc aflcro, & omniaqur in Hiffunicj inea percgrmarioiic obferva*
 Vcram liberalitct communicatTe dico, quemadmodum ante feccram cjux c N'.irbonen(i
 ^j.illiadccciinioantcinlporcisactuleram. Sed quiqu3cfbf. Tiberc pocuifll-t Dudonru^ dc
 ftirpibus Hilp.intalLitGalhanafccntibus.niuakerius marudutcntc,aim ante annum
 HDLXXitn. quoad Crfarcm Mixitnilwnim ti.cvocacusert.tiuiquam Bctcicacscocffcrit!
 Harcautcon ncninexcirtiniarcvclimicdditajramquam cum laiuiluctariiiutd'eh'un-
 ^ j. Panabusiof tate. i. n. m. m. i. cum chum v. v. n. m. i. f. uerit. i. m. i. c. u. s. d. e. r. a. m. ^ f. i. o. n. e.
 m-j. nmcoloj icdutmca,hoceft, mcolaborcddi^cntjqcobfcrvanoncparrainihi vincti-
 Ccm.Mcinuniquamf'aicpudoriSjUCmutuumabaiiqaoquidpialurapfcrimjqii'ningcnud
 frmpcrproff iTusdm a quo habucrim : an ahj iiniili gratitudincrya mcu(iint,bcncvolis
 lccloribusarfimandumrccliiquo. nccn Appcndicad Purgantium lufloriam Dodomus
 fegac, quini!lius&:aliquotaliaru[rriiconcsamcaccpcnt,utanimadvctrcrcpotueriintqui
 ipfius Dodonati vcrbacxpendrcnialucrunt, qoam nudaru pictLrarum intuitupafccrcocLi-
 los.Scd dc his fati,ad Narcidi hiftoriam rcdcamus.

Htius^cnerisaliuscft^fupciore minor, firmioribosmagifq;candicantibusfolijs, quilia *tnnijflm*>
 fere funtmNarcLiromnno^ju i. iNarboncndbusScilla five Pancratium, dtim Mompclij/!^
 yivrcm, diccb. uur. V atc n! ni Hi (pani Hcmcro pallidcin appcbant,«»!».....

Ccmus,ciulebrviorc,&:bi[ios,a^f"osaiJtqua[CrnosLi[raxj]florcspriori Tcii[f.

ExHifpjtiiaopfnicLim rcditumtniflus.rcliquis NaruilliicnusJioccr Maio, *Bruxellæ*

inqiibuwamhorci^oruif'
 TE^nvb item ByzintioallatusM.D.xxvii. quifcqiient;cano foludcdirprimogenti r
 f... cauk'tn interfoliacincrgenteni,pol;ilcm,quiccnios&quatcrnosflorfdsdcitcjur.
 dem cum superiore m ii Tnicudini?,nivciprorrLiscoloris, idcft,ca[icccunivco
 gebant fena itamina, rerna alijs longiora, nava.
 vix quif

ijt>

Tntqui(pia!ndircrnerepocuiQct,nifidiffèrentiim fcciflentfloresillominores.&frequenttoresinfumnjocaulcnafrcntes^dorein&fragrantiam Iafminireferentes:hujus{ciienin trigoniicapitibuscoricliifum, nigrum inirquale: utriufque radixminoj^ullopriorc&nigns tunicis (cpt3,swfi>c4da utamtr bianco nomine miffa fui^ut^Uu^u^S p io ancc: Floruit Maio menfe.

Narcifs Utifol.flo.p^prfiis fliVO.

N. latifol.
favaflor.
fiorit...

N. f. alba
f. mtdn
entru. 99
v.



QVARTVS IBfoliiserum B. initioalla-
cus fuit, ceterum ad h. In rtrtrsr. no minc, folia
tlli proxime dc(croto) Jmili... Hosinillova-
mt,narn vel totu... havis est... olomnino pal-
let, prztercalicem... in hoc plane autcus
cft;lèmen iniigoni... capitibusnarcifTinum,
inrquale,nigrum :... icisfpadicci-
loris tefla.

QviNIVM IOU... bit isNareiflui,
quem cum alijs aliquo... elegantibils ftirpi-
bus, KaUnij anno... xvi.adracHifpa-
limiiccb.it cruditiflira... virDo&or Simon
deTovar Hifpalenfis Medicus, ego verdex-
tremo inlquencceSceptmbri demumacci-
picbam.abipfiLisobicu: nampaullopoftin-
telligcbam Augufto extinttum fuiflc, ma-
enocuni mco dolore, nec medmeri totiu
Bocanici ftudij detrimcto: dodlidimus enim
fediligenci d muserac, cgrcgieqiin l u c p
l;r(tri vcr(atus,qui & Jiutius vixilfct, multa-
rum exoticarum Itirpium cognitionem po-
fctri adquirere haud dubie pnemifent.

Hujusautem NarciiTi bulbusfatiscaffus
erac, cxtrno corde /padicci colonsptxdi-
tus,qui lanuano {cquente,quucraa protulic
folia, fata, & q uofam modo cann a ta, U c pr
ccdentium aliquot, v\ndia, cubitalislongt-
Cudinis.ipterquzciLilisprodijccubicatisauc
altior,dcndc duorum cub no mm altituJi-
ncm (iiperans (quatnin rcliquis Narciflo*
rum cneribus obfervare non nicminij>iri-
dii,li[iatiis,[ntuscavus, fummoTiftigiofu*

Oinensnicmbranaccumquodd3minvolucrum,cquricxibancfuispc[iolisinnirente5florcJi
qutaijfrni.fcpteni.avjt plurc?, fenis folijs, inftar aliorum NarcifTorum limplici foliorum te-
xturaconfamium pratditi.coloris fl.ivi,nonnihi 1 quidem nallefcntis, fioridi tamen^ quo-
rum medius caix aurcus.fuavis ualdcodons. An pond pro! ificum (emen daturus (it, adliuc
ignarus fura , quandoquidem eo florenre cjus htlloriam conctnnabam Marrij inirio, ur i*
annui vatdc prarcox fuit,nulli aut perquam cxigui przedente hicmc^S^ demum extremO
Martio valdcaspera fuit,& muJcasftirpscscorrupti.

Nontnultumdi[Umihscrat,quianno M.D.xxvi.mibi floruit, aloancBoifotprceden-
te Autumnoacceptus.quem FerraniaJlacum feribebat. Mifir&alium cujusHorcm expaJ-
lidovireli;creaicbat,calicemqucanguftunaflavurahabre:(cduttumqucbulbmncorrupti*
hie ms ilia rigida fubfequens.

Narciflati-
folia...
ma.

NASCVNTVR &alijNarct(fiquibus larioarafunt folia&florefimplici foliorum textur*
confiances.inBclgicis&pleri(c)ueGermania:horcis:dequibusc6fulcnda:CI. virorumDo-
don.n Pemptades& Lobelij Obfervationcs.Illud autem dicciidum r>utavi,Majorein ilium
amphs folij5.SC in eodem Ciule biiios UL plurimum ,interdum tetnos &quaternos flores mJ-
gnjsfultinenECO] (cxflbtjsalbisconfanres, fcpallidumciJicemcingences.odoratos (vidi
<iamquj&: tluodcnisfolijscon(larcent)in Angltafpontenalciavirisfidcdienisintcllexine-
Alccrum verd ex hisqui uuicum tlorem ferunt (raro binos) album, cuj us cihx parvus, pall*
dus, oris fimbriatis purpurafcentibus, nafcentem obfervabam in qmbuliUm Narbonenti*
Galliepratiijatquectiam femperConltancniopoli miffum,cum alijsbulbaccis & tuberosis
ftitpvbus, Dvt Mini, live hint, id eft, colU velc... ptis cameli, nomine, quia floriscollum
longiusquatin ccteri NarciiD.procenfum habet.

Narciflati-
folia...

ILL I ionJifllnii leniSextiimobfervabjm.cuiqu.iccrnaautquinaMartioincnferruni*
punftfolu,oblonga,angu(b,intercadein'dccaulisnudus,r(itondus,innisfim^o]iis, iticuj^s
iunlmo,ccenui membraiuprodit,unicus, nunnumquatin &.alter, flos lex nivcis folijsfte**
mododcciiirjncQntLin^p.irvumcalicemr».il!idtimcinjicnc!bus,cii]uux rubella fimbria
cxornatz/cxincoiRxqualibuiftjminulnflavcicentibuj: flyriluavitciodorawfuccdunt

cafritaU

capitu! atciangula, crafnufcula, in quibusnigruii in xqualcfaicn: ra(iixutccretisbulbarca, mupiscad icari) us tum ef conb ns, xrim b quz se iquas amj e, a ca, e cujus fessili parte pi u rir. iae subfu fex fibrx dependent.

Provenictiagno mitian supraGamingam Charcufianorum tnonafterium, D. Virginiae *Kmti** Thronum nuncupatx^acrum, prarisquibudamakiffimolacui vicinis, ad praedium * & f dichirn, in quo, curannbus Carthufemoderatoribus, perliununiter & luculenrerexccprt tamper htinirjs, dt! m in fumniaHcrrcn-alben *Si DurrenUain jugatendcremu^ autex ijsju-gisGamingarBredircmus.* Quoiftictemporeflorcat, miliinonconfta.: necfciviffcm iftic nalci, niiaMacum proficfcens aliquot bu! bos rotarum orbitisrecens erutosofTenditfcm: biduo enim aut criduo inre ruflici foziium cvcxerant. Sed il/e Viennam perht*, Maio men-fcinmeo hortulo floruerunt: venftmilc autcrueft naraliloco feriiisHorere. Memini & illi fereitnilesmEugaQcisijioncibustnventos, altudioiisex Italia reductbusyicnhamadme perlacos.

f SEPTIMO generi Iatiorareliquisfolia, irugtneifercpallefcntiscolons, intertjuxfarisla-tusproditcau! is, nudusutreliquisNarciflis, pauloinfirQiior, foislb: iatus, intusconcauus, ^mml futnni» partefuftincsmagnuti] laxum, membranaccum folliculuiji, tjuodehifcenre, rxic utiicus. ut plunnum, flosmagnus, odoratus, fex albisfulijs medium ciuiccm pallidum cing-titibusconftansjCujusfitnbnaxpallidopurpurafcitiflorifuccediariscraQumtftiangii-larecapiir, nigrtim femcncontinensrradixcrainorfiipciore, JS'ctim majorcillo, quemin Angliafpontc [ncidixijCompjrandajCtiarn foboles. rdiquarmnNarcLffinarum inllar, fatis fcliciter piocrcans.

P ES: ynaalhrura, Gerterori Dn. de Hcu(enftaindiccbat: ft'riuseti am reliquisflorc^ncm- pc Miio menle. Id gcnusdeinde facisfrcoqus obfervabam Francofortianis in horns.

ELEGANTIS porro Narcifli (qui intercosquatlatorahabentfolia vm. enr) Hoscum ali- quot fblijsmihim itcbacuradofitfl mo viro Bernardo Paludano Medico celebno, quilndi-cum cognom ina bat: ego cjus hiftoriam pro oico modulo ita concinnabacn.

Naicifs, b: ifol. Indie us rubro flor.



SENA vel plura habet is Narciflus folia, Narcifli vulgatis foliorum inftar lōga, ad quo- rum latus emergebat caulis levis & enodis, ini: asconcauus, (Uraino fiittgio in nodum definerts. Acmbnanaccum quod dam involu- crjm purpurilcentis colons fulhntem, i quoumcus floslfec^erbat fex lōgis & an- guftis roli|scooftans, qual'ia ftrc in Narcifli Aunum'ialis mmoris (dequocap. JCVI. hnjus li bn) flore con(piciuntur, non flavi tamen, m: ilia, veriin rubn (atari & fplendcinis colons, inllar ftoris Arundinis Indict vulgo appella- tr. cui non valdcablmhseft, c quorum nie- dio prodibanc fex ftamiria cjufdctn pine col- lons, oblonga (aaibus inGdcbantapicesfufci coloris quia foruue exactr. it ucurrupri) & mc- dius ftilus, sub quo rudimentum triangular is capi: is, quod hiud dubie femcn dedifTci, fcr- te en. iiii maturum, nifi ipfc florem pizaidif- Tci, ut miliicontpicendumpracbercc: radi- cem, Paludano referenre, (ubet buibaccam, czpis vulgaribus rubetibus profusftmilcm.

Vn team au rem cj us plantam habebat, ipfi mifTim ab emditilmio viro D. Simone de Tovar Hifpalenfi Medico. quar florem dabat lunio M. o. xciiii. alccrum aurcmexpeflabac fequenc me fequoniati n prarf dente anno, cadeni planra bis ill) florem protubfctj men- * fibus lunio 8f Qui ntili.

AT anno itifcquenre, ex Indie chorti To- Tarici, & cpiftohsquasipfc Tovar ad medc- indefnbdiat. cognofcebam NarcifTum In- dicum Iacobarum ab jpfio nuncupatum.

NARCISSVS Indicus, Iacobus mihi indigetatus, ut scribit meptora Cal. Junij M. D. xcvj, ad medatā, ex Occidētalī Indiā (ubi Acaal. Yacht), quod est, Bulbus flore rubro, voca- *Ur, nobis deutus. ni! mrci nero anxienpion na«cnus, jjuuuu«(i, uuius, cujus radix bul- tofa, cep* rotmidarmiihin-i. «riiin) upcrnatunicapulla, folia pnmiimc mittit crafla. ob- * On g-i, NarcLflī raannt. tibi Heracrocallis Valewina dlfti^cmula; fcudumfoUa y«6, atque*

adeocxlaterc,pcdalisSclongiorctiamcmicatcaulis,p]erumqucurius,aliquandova6&;ai-
 rc^nonnumquamparirertquanquarnhocraro) inccrduna fuccffive,dilute rubem, mtun-
 dus.comprefiotamcnflilo^avuSj&interiusfubnibitlus, qm'in mcmbraneamdclinicvat;!
 nulam ftjuraccrubcnremj&adextremumacuniinatam fiffatniljuCj equaflofiinicuserum-
 pitjOblongus, pediculonixusvindipre, qu id corf tim in flex u s &; vc lu ti procumbens (ut in
 LcncoiobulbofovcLLtliorubro,tamccfi noiixquenutasdcorfumq; procumbem)fex mu-
 niturfolijsclegantiminijcoIorerubent!buSiCribus(upetioribus,rocideminfcnoftu5: quo-
 rum quod cfuperioribus medium est,fure&ius emmet: reliqua Juo ad Iatcraamcdiorcflc-
 ftunturiiDfcnoraaitcmdeorfumcurvanturjCunvSisitacociniiatLs, iiteniisetiamruLiri,qui
 abordinisSan&ilacobiequitibusinvctc gcfbtur, formarnvaldc referat, unde Jacob.n
 cognomen ipi a mcindituri. Sum porro in hoccelegantiflimo flore ftamina icpiem finiili-
 ter rubrarquorum mcduia) aliquanto longiis in tagtllarc m apicem cicfinit, ceterafcxapi-
 cesna(ifvcrfifitiunt,intcnusfuici,(L]pcrficieve[olutcopulvifculoobduai: cunclaautcm,
 ad metliarnftrc eorum longitudinem, medium ex infeuoribusfolium ambit: idcmctiam
 arliquisduobusinferioribuscornplcx«m:atqi:cubiha:cdeorfum Be&uatur,ftaminaipft
 furfumcleuantur.

Iltoiplporro arto floris cum fuo caule&folj'orum iconemad me mittebat 111^o Co-
 mes Arena be rgius.quam adVivumdcpingicuraveratexplantaqu.Tillifloremprotiilcrat, i
 D. Tovarccodeniannoaccp'd: Jeindeicquente Februanobulbi (iis cotoribuscxprciti
 iconcm,quicraiTuscfttuaicaexteriorcfu(critcdus,fibri5qucinfim.ifcde,nonnihilpromi-
 nen:c,fr<juencibu5,crallijplcrifque Si in alias ccuioresdiviils^Sj alijs minoribus, prardicus.

H J C funtqua:dcNarciffisJati*rcfoIio& floribus fimplici foliorum textura prarditis
 dicendacenfui; mincadeos,quifimplicu;uiikm florcenam conitant, fed anguUahabcnc
 folia,pergamus, corumque differencias percurrauius.

Narcifi.juncifol.i. amplocalicc.

Narcissus
 qui dicitur
 Juncifol.



NOHO igiturNarcifTo (quiprimus inceff
 cosquinngullioribustbliisiuncpradicij bi-
 na, aucternafuncfolia, pedalisautmajori*
 longitudinis, craira&fucculenta, infari<<-
 lioruai Narcifli priced entis tercij minoris,
 verumangnftiora, & quodammodo media
 inter ilia, &fcquentis I uncifolijuiajons fo-
 lia, carinataramen&viridi colore pixJm,
 proxime ad luocifolij Narcifli foliorni *
 ridadatemaccedente: prodit inter folia cau-
 lisgracilis, infbrejds qui fubfc^uirurj, fir-
 uius.pcdalis longiciidinis, qui <sup>inmo talis-
 gio cx membranaceo follici"</sup> binos aut
 rernos flores prom ic<al* e' ^{ante majores}
 & laxiorci quatr t e l w ^{Narciflorum}
 juncifolio, fexpradiqj ^{olavivis, quo-}
 rum medium ocenpate ^{rior quam in}
 uilo NarciiTurum genci^ inncian) na»*
 queiongus,&;perorasdHTi]nuofus,paol-
 lofaturanorislutci colons,concincnsbrtrvJ*
 fan ftainaflavaapicibus aureis prxdiu, K
 ftilumfljvumcxumapartccra(Iiorcm:oda-
 ratuscfl isflos.pcrindeatqueNarcifTijunci-
 folijflores: radicem Inbci Narcifli fcquen-
 cisbulbozqaalem.

Mihidemum confpctuseft hie Narciffiu
 annononagclimo quincofupraniillcfimo*¹¹
 &quingentclimum, Aprihracnfcfuiirlon-
 bas onuftuj apud Tiicodontum Clutium,
 Acidmiciliom Prxfectum,Lugduni B>t*
 vorum, quo anno bulbimibicommunicai*
 aim ab illo,tum a Cornelio van Hille Eccl*
 fiafteRotcrodamcnii.

DEC i MO eiam NarcifTo, qui anguftiore folio fecund us, bmaauerna funtoblona
 C*T51" fo^a.angulofa,carnofi,8<p2^ncrotiinda,jiincisviridioribiis&:medullo(is,^vorci.oloifque
 vnmiftmii. quodamraodo familia.ncc minus flexibilia, inter qua: mediujexititcaulis, rotundus,cavUJ,

ni, quaterni, aut quini prodeunt oblongi (gemelli interidum) forma Narciffinis fimiles, odo-
 ratiore eo qui medio purpureus est, flavo omnino, hoc est tam interiore calice quam am-
 bientibus

Narcissus juncifolius n.

Narcissus juncifolius

minor.



blentibuscumfolijs,qua:vel mucrotiata, vei tncrone nonnihilorbicukro confpiciunrur; nisuccedutiitriangulacapscaobcufisangulisutrduorum Narci (Forum .njgro&angu lo- l o f e r n i n e l n i n o r c t q u i d N i r u m r d t i a m m i n o r , c a n d 5 i g n i c a n t i b u s m e m b r a n i s)

Iftius genus invenitur minus, gracilioribus, rotundioribus, frequenrioribustjuc folijs, Kmjq«» Cauliculismedioprodeuntibuspuffillis, unicum plerumqucautatterum Horem duntaxat "/*.*"•"• luftinentibus, flavum & odoratumut alrcrrius, (cd folijsconlbntcinfirmionbuiiSimagis orbiculatis.

Prior (bonce nafcitur in raonianisprarisnonproculTolcto, &cfrcaGuaJaLupe. PortefioremuliginofisinterHirpalim &: Cades lociscum ipfolflore crucbaniLiarionenf;acjn Bdgicishottis neuter nil) AprilirlorctjVtlerianiMaiOjlicccimcrdumdcuopaulJoance <rumam,ii minor fir acrisconfiutio,

InrcJlexi ab *Hifpanis* Narcifltquoddam genusin Hifpania inveniri quoj *omnino jancis* tfrifj?.;«. c^iani GcfolijSj fed Horem candidutnproducat, cam^ucobcau&m lunquilti bUnconbui- tifri.aitt tolis appellati: fed cum illtim iitimqitam confpexcrim ,plnra lik adferre non licet. Anno tamen D.xcvi. aberuditiilimoviroD.SimoncdeTovar paucosbulbuseonomineinfigmtos accipicbamifedadeocxilcs.utpotlmultosdunraxatannosillorum Bores lint fpcranJj.

NARCISSVS PR^COX PLENO PLORE.

CAP. x II T.

T J ^ ' L ^ C A T A pTEcaciumNarcinbriim quifimplici funtflorchiftoria,cosqui plenum •CiivcTroAtfipyMar tllum Imht'nr&coJorcejuidern rariancetD defcribanags.

PRIOR. Utionbuscltfolijsquampriinusiimpkx.&quidamiTiodocarinatisternisaut; l'iarernis,c.iulisfriatus,nudu'i,intusconcavus,utin/upcnonbLis,pcda!taIcirLjdinea(rurgit,« SuiembranaccofolllLculormnmocaulLinfiJccc.ernoSjquateriio^ aut piulCs [mm mc taini in liorculo meo Vien nz Horerc qui feptenos habucrit) Bores proroitjents albis ampl if. ^icfolji; ur priori-, (iimplicisiertuim genus confiantes, quibu<i pro *chccidlbz* alia folia ruiK,minora camcn,&: flavi calcis fragmentis fie mterteda &: disjun&ta, ur. nulla calicis for- *naappir<r ar.fcd vcluti apoplylis *Savaad* lingua interiora folia adnara vidcatur: odoratiffi- •Uusefille Hi>s,&p-avedincquadamcaputtentans:nulluin lemen in liocgenrcobferva- V:radix interdum crassillima,multis spadicis tunicis septa,& frequentibus ubus donata.

ALIEN folia,bulbara, caulcm, prioriadcdfamiliajuba, utncuttrabaltcrodlcerni n ^uear,folifloresdiferimcofaci«nt, ^uiewuaeV4ginulafummocanliinfidcntc,einereurjt»**» tcmiaut quawrni, priorioiagmtudinexijualcs, (cnisquc tblijsalbisconltantesan>pluin

NarcifTus pleno flor« i.

Narciffus

pleno

ficre

II.



NarcifTus pleno Bore 111



NarcifTus pleno
111



aurei coloris calicem cingentes, aded multipliciter miruniquie in niojum implicatum, uc leucioiflvi pt)lyjtuyllLini florci (jcuatioitm q.io !j Diuo.lu.niulctur; uJurperuide**fuaviJ** acmpnorc.

TE RT I vs fulu&rreliquaomniafuptri-
ribiisfeic(imilulubct,(cdpauillomint«ra;flo-
rescciam in hoc minnres, icx albis fulijscoa-
ftances, medium taliccm fljvum & plnum
habet, emic3ntibus c medio oblon^iufcui.*
anguftis **fblioli** (**tctlacim** quafidecuiTans ,albi
quiUctn colons^L'ti cui & vindi¹- forii, & palli-
din mtenore pjtte pctmixn fint: odor firrf
quslisin pnorc, ted ncicio quid magisaroma*
ticu in ipirans, nicdius inter narci (Il Sc ruufcari
oJorem.

(>mncs Byzancioallati: primusquidem fr-
piffime, nam fingulis annis, cum alijs bulbocets
tt^pibus Vicnnim nutirbantur. altCTum dun-
taxat confpexi in hortu Generofe Dn. Vngna-
dmerino M.D.XKCVII, L praricdciite Aururnn*
illi cum alijs & **Cmplici** ntveoiJorc miffum:
ternumhabm muncrc Plnlibercio: Bruxellis
Cet'arici dapteti cum plerique alijs bulbis sub
anni M D.IXXV. imtium.codemquidcmanr-
fiilcquentibus folia pruduxit, at null um flo*
icm.tucoanno M.D **utxiz.** **toair,** peti¹¹¹¹¹
exifhmavcnm, anno[ivblequente 1 Martio de-
nuLipnuliir^V Aptihtfinosrltwes, t,uales mo-
*li Jell **npui iulic:culic Sf** proximo luc lequente
amiopluidum in Anj.¹lupcrfj;riiucir,rffc"

rentibiisdomcaicis Flortmc-tianifiipcnDresAprili Atluncaiitt:hu-ii.emt* I acn.crprtc
non loies, te I non ovete duntaxat, eo videlicet anno quo florem dabit. Nam si ante hec
illi pro-

illi pmdeunt(rari(Tiroc id fit) proximo anno non florebit. Sarpe ctiatti in reliquis preccocibus Narciflis qui Conftancinopoli mitnintur velplenoflore vel albompdioluteo, accicftj tit fctrititacis indicium fe Ji folia anclnemememercinr.

AN WI porroM.D.xxviii. Auguttomcnfe Byzantio miitfuitmaenimuncrisloco tres w. ^{arrif flia.} crafli NirciTi bulbi III. V. Davidi Vngnad Baroni in Zonneg 8c PTeiberg atqoe bellici con(il>j Praddt, quiFeza Aphricacurbereccnsallatij magnumflorcem multiplicifoliorum i ^{UI?} nuicuro conftantem omntno Havum ferrdicebantur: ille Vienna difcedenti unum dona- vit quemjCtIm propter iaritatenimihicarusc^{*ct},liorcoprhicmem committercno!ui, fcd in fid'i fuitimacuraalLii:omnistamen meafcdiilitasinutihsfuit, namcorruptuseft. Ean- demtbcanamexpem funtquosuxorircicrvaratjUtexpifiuslitterisposteamtellexi.

Narcitfiisplenoflore v,

Narciflusplenoflore vu



Q V INTVS cpncrcNarcifTi mediopurpurcinfolijSextiquicxhxomcmbrana ceofo!Itclocxic,prodicquctiuvQvrecu[nillo,fb]ijsaltjsi.iucrfbusonininofitnilis,(b)um diitrimcii in.nVcell,qui lexquidem majureculisfolijslaccxpanficonftat,ut ille.fedinca- licc illo rubra finibria **otnato^llia** fex folia paulo miuora continct, (**ingula peculiareol** fim- bria:umcalicium **habcnuu**,**^quoraro** medio aliquot alia **minufcuiafoliaftamiaibuspeb** niixcapro^cunc:fuavLsadmodumcftodons,ad Mufcan quodammodoaccdens. Singula- resutplurimum fufinctcaulisflores,interduini:tiam biaoSjUtquilimpliti foliorum textu- la conflanccin florem **feif**,

Floruit miliiMjiomcnfcanni MDxc.pr^ccdentcautumnoi lo BoiforoBruxcllismifTus. EoJem tenjporc pro plcuncti j NarcifTu acct-piabhondto virp loinne Nfernianno Col- lon:A iHilbuin.quiqmdcmlequc[Hevercprodi]j&inummocaulcvj^!nilainrulit:(edilla cxar^lcci^fferistpcmprarcidicAtannuJ xci.plancfimiletn fuperioncfTcdclaravit, Quo ctiam **annomihi communicatfit** N. V. Phthppus dc Sivry; Przfcdtus urbi Monnbus Han- nonix,**N4fcifl5** bulbum,qm (cquente anno florem rulicillislmslem,fed vignicj& plinbus i(iIijs,nnlhiHemjincrcurlantcinti.Tillafimbnatocaln.eucinjamdi(ao. **AtquiIU»»Co-** tniulc **Aicnbe^florukannOM**. D. xxcix. qaatuor &fcxagena folia habmIII-icribcbat ad me idem **Boifot,ac** uuici bulbi, qucm abeodem Cornice impctwverat, prole **fuperiote** Au- Rult teuiiili)S.-il,qu(trari?biilbaccis(tirpibusadmcmittcbac:verumtabL'htio,cuinxyi- dula.qtuuidtilia.uu, traJiracratColomamfcrcndaj inprxdoncsincidence, cumilhad- junttisperijsmagooeodploie.

SEXTVS paulo-igituravideturhabercfolia, alioquinondiflimilia: bisflorispeci- men **Vienn** m i **hi dedit,fcd** vuinm FL-cit.Francorotti toto bicnno **Folia duntnat** iiovoverc d.d. aniJic.idatpropterta^Cunditaccni, prolescnimfinguhsanniilitisliberaliter/ub- ^{Narcif flia.} ^{vi. n. n. n. n.}

...noroiarqui bulbum cum haciconemittebarhoncfrusviridrmquereierherba-
i !. Kifliirms&dilige:isobrcrvator,IacobusPlateaii,civisTomacerifis, milu figntfica-
bat unicum fumaro caule ferre florem sub Maij mensis finem,totum nivoum,&mutoplici
fwlio iunitcitturicoiiltjntemdiujus radix minor est quarto gencrc.

Vndeprunuroin iklgieam illataitir. quatum& quintumgenus ignoro: quod autcm
Mermannus communicabat,ex Regis Galliae horro delumptum fuisse intelligebam.

Narcissus

CdEK-VM fetfle. es Narcissos à Grecis, Narcissi à Latinis appellantur, Galli peculiare no-
men noil hibent, Ndrctflts tame iiotniiiarcpoiJent, German 15 37MEIV' roTindicitur. I ro-
n simplici flore LtneUna ab Hifpanjs nomen impofitum: alteri LtnobiancoicCeho'inj*
tjuibuldamtiam NaraffedtSeutl/a^deW, NarciflbsHifpalenfis, vcltjuodcircaMifpaliin
plunmusnafcatur, vclquoda me priimim,deirk)caEialij5excaurbciuint{rLJS. Ejusalra
(pceics/*»7«&j&j»f«"2ppellaM riiKjiamcr.fi prefer rlonsforroam iihilarime habeatcum
Nardflbjuncifblo. Tercijfii Quaiti luftoriarTurcicumnomrnadfcncpum. Od.ivumSC
Nunuma limilitudincquamej us folia cumjuncishabciUjHilpani lunqmlhs vnranc. uos
NarcifHimjuncifolium noreHavovc!tcnuifoliumdLcercmis,add!tFrcntiatii QuartijCiii
flavusctiam flo5,fedJatLorarbliia.Dodon«usBtilbumvumi[0]:imii tilecontendic: cjuoau-
tem argumenroipfc &:reliquiquiejusvcftigia(equunmr,id probate potfiDt, hbeptciuatel*
ligeiefD: ccite Narcilbrum cujutcumquegenensiadixvomitem prsemanfaciet, uidcm-
tpepdicemus.

Onnem porti Narciflum, prztcreum quem peculiars nomine Dtvflohhi dicluin dixi,
Turc* propneappellantStnnatti, hoc est, Regiumtalicem, quodflavumilludinnipdio
flotCjCalicis formani quodammodo refcrat: qm vero mktucejus buibos iratio corruptioque
neminCjUt plium in(cribfic^3Utic ZtrmtAd*, modo Kerfnrj!r,interdueiaai ir.cprio-
re Z*rtmc *tta ad diuvocciw««vc 1^4^k, dim co lore m album vclfl.ivum ddi^n.ue volur.
At quipleno est flor, p]cwtncfucZrrtMCjdjeatJwfr appellaruntj jWdcis iiecem vocibus
bianco&:^«i?fl,procoloiisflorumquosmittere fepitabait,vantitc. tamccfi iirpftimcno-
bis iinposiruai depiehcJcnmusinam inulos simplici flore lioc nomenclacperimus contra
nonnumcjuuai plenoflore prxditos, lucsimplici Ztrimc«Unicriptione- Interduuetiani
tam plcmiSjCjiaLU qui ampfo limplici ctt flore,pnefestilB cra(To prxditi bulbo, Pe»achit 110-
niincmifli,vcl (ituUatamtr: 'jte (qua fttpellacione& Ancmoncm plenoflore , &£ alias quafc
damftirpesaccepimusjqus voces Roizplcnarfloremlignificant. SxpilTimcctiamemScm
gencrjsbulbis divcriarjocniia ad/cruptafuifTccopenmus' ut (chcdisaHdirnnnnimefiJcn-
diini fit.fcd cui us color is Horcm fnt lubiyiri NarciiTi bulbi, ipfa OUTO^M nos docere & ccr-
tosredderedebat.

T*th>ttt.

NARCISSI cujuicunque generis radicemprzmanfamvomiticrcjamdmnous, quem -
admodum fxpenumcrocxpertusfun): quifaculureprarditaaicfle, ipfcctiamDiofcondes
tellis est,apud quem reliquas Narciffi facukates rcjuiiri-reftudiosnc pigcac.

NARCISSVS. SEROTINVS.

CAP. x III r.

Narcissus
serotinus

Narcissus

Narcissus

Narcissus
serotinus



V N1 c v M cauliculmn, digitalislongitudi-
nis,gracikrn,TacuuinlubVt hie Narciffus,
incu]Lis(unimoflt)feNarci(fiiiiiii odoratu, fiS
foliolisalbistoti(t.uitcm , Sc in medioextguuin
calicemflavunicoii:inciucm;r]orifucccd]texi-
lc trigonum taput,cxi^uu nigrum angulofum^J
femen connncas: radix NarcilFo Iuncifulio val-
dc Cm ilis, minor camen, multis candidis tunicis,
lentoqLtcfuccoprapiuntibLisonltans.fcd nigra
quadammeiubran.itctta.Tou planta amaract,
utiupcnoresNarci(li.vcreqjdixitPlinius,odora-
to lkporem raro ulli non aaaram.

NaficicurplurniusadAn.imflumeninTurda-
lis, ubi fiorentcm , Scfuiscipitulisjamaturc-
fccreincipictibuscrucbain lub O^brifinc",
nulhscbulbo nans folijs, ncculb comm vdht-
gt.iob(ervans,quod fane mtln admirationifuir.

Jncol« r... appellabit, nos serotinum nup-
cupavimus, possemus & Autumnalem minorem
vd mtaimomdtctc: EUD NarcifUim vix ouoo*
rem inveniri posse puto.

NARCISSVS TERSICVJ.

CAP. XV.

A K ATA 02 plane est hxc planta, & floris
duntax.it pediciloprxdua,vc"uti Crocum,
Colchicumqu-icxilitctgotnicu branacco cu-
callo,

Narcissus Perficus.



cullo, tamquam ex vaseculo aur rhcca. flos obloeu¹;
Croc. uit Col- Incifions xmul. is/cxfuhjicoftans
ex flavo pallcfcentibus. quorum cria interiors pan-
lojnguriorafiiDt, externaliora, & fuminoiB<-
cronc nonnihil incurva, five & rificion quardam ha-
bentja, quainrcriorum mucronemamnleduntur
oc comprcndunt, ingrati oootis, & paravctis quat
virus redolentisJUMinafrx medium florem occu-
pant, mfbhorum ungbusnata, fedinternonim
rbliunreliquis lon^aiora, exiUcerncdto oblorf-
gior rtilus gmcdiSjS; IIIIC capite. Folia iili iuntHe-
merocalhdi Valencini, dequa paullo pwft, non
multum abftinilia, lata, plana, ejuidcmq; cu illis co-
loris, liocft, adxriigincum rndctis. quusut piuri-
niiimconvolvunturjaucfcfcircuniagunt: radix
crafti. bulbolLi. :! ball (qua: multis fibnsdonara efl)
ftacimextubcraii, iatus Candida, forts palhdiuf
quidcm, fed aliquanrutn ctiam Dizricans.

Stmcl dimtaxat CSflantinopoli allamm cfl hoc
bulbigcnus, mihn'Jiconimunicituin aPhiliberto
dcBroxclh., cujusanrc nicmini. aii/ii M n. LXXV.
initio, quem poftca varijsatnicisciiim inBelgca
ciirninGermaniadUtribui. IniiiioNarciurum Au-
rumnalctn maiorctn fequnte capite delcnben-
dum. exbulbi forma efTcccmicibam, in quaopi-
nionevjldcme confirmvic flosubfincicpccm-
briscmrgens. Sedpoftqumfolia Qonfiibfcqui
snimadveni, & ineuotc ^cmiim vt-reprodircob-
icrvavi. caqueabilliti. i folijscolorcdificrccia; turn
exaiSiiiscollari inter fcutraque plaiuajditparesC-
(coianifcftcdeprtlicndi; arfhte breve inter folia

caput. pontccmcratTijm, brevi pediculoitha. Tens, & fumm. ite! lurc viiccmcr^{ans} jferreali-
qurtrie* obfer^{avij} quodciirn inanecflcr/cmifiisconfpiciendi fpesomnisubUta.

•i No MEN (chedxilliaddita: Jnfciprumcrat^j^»3f4d1j«ry?j»(i, idcflNarcin^{iis}Perficus. *Nympha*
Multum vcroconvenire videcurcum Narciflovel LirioalceroTiicophralb, cujismemi- *fiTM U.*
nith((totix plantarum lib. lexto, oap. vi floreni amptum illi cnbutns. colorcmque (uteru-
diriores volur.c) mclmum. nojinigrum, figtmobloneuiD, Jcjocinumqucadmodum, po(t
Arflumm 3fcircaxquinoctiunilcrcoiten^{enti}; m, vci, ut (bL) ucnte capite ait. aii tumnoprj-
nitsimbibus, quemquelibra vu. hiibriatcap. xu. taulenitancuaiHbriliabtrciin. x.: ut
croUED. cam omnibus aliisaffurqar.

NARCISSVS AVTVMNALI";.

CAP. XVI.

PER s I c o NarcifTo valde afBnis est hie Narcifl uvamctfi ntuter flnr Narcifluna in m-
Icturj fedrolisfolijSj&radice. Q^ania. iutcin aucfenalubctfolia .oblonga, pollicem I*
ta, nrviridititeferⁿⁱ. ricantia. rqlcndencia. hupl pleiymoucfaif. i, inrt'rona: brevisxcix
cauliculusviridii, rotundus, vixfiipnTenantIaccollens, cuiinudetSo< iup
milis^a brevior. Saviomninotoloris ex membran. iccoralliculociiic'rfjaiSjCuj us exteno-
ratriafi"»I]ainterio[ibLism. j]oraIunt, cat'jucvcluc ample&mcur, omou autem mucronc
funtiiMgisorbiculato, quii Perfiij folia: fcxllaminafui^{apicil} nisornaia, & ftilus c MMS
uibiliL-ocroergiintradixerafricftnJtimdaintuscjiiidtdafofiSiitNarciil' Lisnig
Hajusatiafpccieainveniturangullionbusfolijj. inrcliouijcumilloconfcniens.

SubAugitrtiriiienij&Septembngermiturincipit. & pIcrumqueHorcr. Gjudcnnoni. i.
nisquibullunHirjunixpratisrcnam in Italia fpointcnakiaudio. ExTfaraciaanrepaucos
annoscriamadferncepit, cujus butbos quidficiccate nonnihilpalicice«ntinittoPerfici
NarciUcfTt; puubani: fed emergenciamllico, *pail* quam tellu ri f ucrunt comm i (fi bulbi, tb-
lia, oinnccindiibicaiidii) L't. ili MK-III adetneronL .

ALTEK. Oclobrinic: ili. 't]ucmadmodti! iipcr(icus, nuuim c vagitiula membranacca v
profenflorcin fcxoblongis&antrufliifolijscn(bntern, noii-rqualibu; , namextenora
paullo loneiOU&I. Kioraiunc, oivinia autem mucron. ua fbnsufcencu& (picodpnsia,
rifldjoriseolorciBnapJ acccdenna, flava (lamina medium rlutent occu-
pant odoratuscfHiicrit^a, ft'l^a^HicpcdiculoinnHcns, (Lipratcramiionat[o]litur: lluiV); in
narciJo cmwjpacinterdumincipiuntfbUa, utrfunnumautcmiaeuantevcredunuxat,
VIvird! aA¥^t, iclftiillitirtoll(>ruilim: iJ (Jris((; J^o, 'Eⁱ all
1732



Pseudo narcissus minor Hoffmannianus,



Huncverd, colore in interdum murarrolv
 fervavi, liocfl, caliceni ilium medium non
 minus palhdumhaber^quarnfiiit lex ilia ex-
 terna folii ip/u mam bicmia.

Nime ciiapud Belg. in hortis alit ut altud
 genus proclui li f r i i b / . l b b , b e f r i q
 rebus, fed diverfo Bore, quividelicccmedio.
 illocalicccarcit, &rjus]oco, plurimafblia
 externis illisomnino limilia Stpallida liabcat.

AT aliud genus nonnullis vctcmCaftcllx
 pratis,&liuundismuunislocis, Anglicoquid
 dem fimilc.lcd folijs longc majonbus, magif-
 ducvirentibusjonjjiorccaulepaulloniinorc
 norejCoqiptorfusrlavo Sjquaflaureo.videli-
 cct cam externis fol'js quam calicc: radix liu-
 jus cralHurcft quam in fupcrioribu;.

Esr ctiamali!, qui novoverrernauc
 pUiraproTeirfljlia, majon forma coloreque
 6 milia, (ld longc minora &r anguftiora, no-
 rcn puiiHum,majoriramciiHilpanicoBifor-
 ma&riavocolorcperfimilcm, uifidetemdi-
 gitali.tenui, viridi cauliculo inter folia em-
 gentirrlon (uccedit inti^nurn> obtuiistamen
 angulis, &fcii rotundum capiccllum, in quo
 (cinc inxquale nigrum, fitis magnum pro
 pUntxproportioncrradixbulbofa,cxiguj,ti>-
 risniRncans. MifTu^mihihicfuitprimum a
 lo. Nloutono, NarcitTt minimi motirani lati-
 folj nommcidcindaGenfrofo Dn.dc Lon-
 gatrc, pro Pseudonarciffo minunoHifpam-
 loflavo.

^{1s}TV';-trv\ «rdqttibttfdwi Lufican^Bccufiiqucollibus, Pseudo.Narcifligenus
 *W ".-mfolanoaUuucfiifcrioabiu, fed valdc angutli, Iirepouusjuaceai cauls lenun,
 nudus,


nudus, palmnaitus, cju sextemirati infidet flos vaginuta emergens, qut fexfolij!- herbirio palldecentibus & xpantis confat, quorum medium catix flavus, caiattu inltar oblongus, orisprrditus nonfirmofis&: fimbriarisut lupriorum, fedxqualibus:radixexiguo Marciflbfamilis,incuscandida,foiisnigricans.

Florcbat Ianuario,cum Vlyinpone Hirpalim proficifccrer:& Incola; CmftniSi ,hcctt, CiiTipdiulam vocabant.

S t D & xprelsa rod Sttrpiutn quas in Hifpania obfervabam Hiftona, m fit d me IoannesMoutonus Torniccnlispliarmacopa:u5diligenn(rinius&:litlelifriiDUS,idt"- qucrf. hrrbarix pentiiHuiuSjClegatcslMcudo narciftijurtcfolij iconcs,qi)ascpbnris, irfimedio Martio .mm M.D.LXXVI. florenttbusdelineari juflerat: easporro aliquot ante annis a quotlamc Galtitiarc duntcin Cantabrorumjugiserutas acccpifleJcribebat.

Harumpnor,jillipertimiliscfl,qucmproxLnic(iclt:rtpli; imdjllam ipranicfleccrtusfun), Nam anno M. D. LXXXI I I. mum lurum ftirpium lingulares bulhos ad IDC mifit, qui omnu lequicue anno non modocgregiccreverunc, led cciam flores protulciuni ipfb Fcbruaiio, quuforteIQ ficitilircpoitofidiligentjusadlervaveram.

FfcudonarcifTus juDcifol.ii.fl.a.vo flor. Ffcudo-n3ietfs.juncifoLm.albo flor



*Pinianar-
cipieman
fepu.ii.*

*Pinianar-
cipieman
fepu.ii.*

*Pinianar-
cipieman
fepu.ii.*

Alter tenuior aptullo. licet farrea. habuit folia. florem flavum, hoc est calicem per or« leviter&tenmterfimbriatum^^XjlIjfolioUcaliccmambiencta.exherbidopaHcfcentiai incapitulo florifuccedcntenigtumrotundiufculum fcmncium tulit: radix pufflla foi* nigricans, bulbacea, tenuibiKfibrise/cdceproduntibusfirmara.

Tertius quaternaa utquinj folia lubuicccinnmm^&capularia, viridia humi procumbenua&fparla.interquKCiuiculusciiu-nkinfirmus.paJmanj, KnubSi n^us unicumiO fmnia odorem membranaceo folliculo prodcuntcm fuftincns. teneltum can'didumoninino&calicisorisfimbriatis:hujus(emcnnonoblervavi;radixfupcrion(iinihs OrnesverohasclegantciplantulasmihabiulitafpcrrimailJaannincvi hiems

VlLfcKEM porro Dodonus armcllat Narcium filvedrcm Muntqui rutent Theophr. «.vi.Hi(l.cap.vi.^oA^W)J'«fc(re,ciJ!us[o]juimrcoronarios floics aruui maturecruinpuntjmemiijicfivcPljnijJib.xxi.Hiit.Nac.cap.xi.Codtaminon.quod'bLsHorrcair.vcre*! aiuumno.Geimanisctt^Mnwiiisblumtiif Auftnaex matron* ftoH(tall id est, HavumcalicU; Jum.&srftgBtiybltinni/lioccljflavamvtolamniartiam, Bcltiz actttrrtbM GilJinonnull' Cmttenratsfih) j>#rw», a porracis videlicet tohis appcllanc

HiweroCallis VALENTINA.

CAP, XVIII."



Hic plant*, que in cr. N. irttfigencrarc-
ferenda, quina aut (cna funr folia, oblon-
ga. la^Narciflinis familia. fcdplianiora^rnio-
ra^ue, (ubcincracciqt) odammodocolons: C3u-
lisinterca aflurgit cubitali inrerdum alcitudi-
ne, & Lcucoij bulboii quarti (etc quo paullo in-
ff3) cra (ficudincfiriniorjnudus & imcfcl) js, qui
cacumiitcpromit membranaecu involucium,
& eodcbi (ccnrcquinojautfcno3, inter } uplii-
res flores, Pfeudu-narciflbvulganfimiies, lilij
odoremlpirantes. albosomnino: pmrcxter-
norurn (cx foliorumncrvum, & extremos Enu-
croncs, qui vindicolore nonnihila pcrficon-
picmntur. cmcdio oblongo proruberantca-
lice pcr oras /aci^niato exeunt Candida fcxob-
lon^aftannaluisapicibus flavisornata & mc-
diolongiore ftrlo. ticlilioalbofere: marcidis Sc
defluentibus flan bus fublunt tngularia capi-
ta, iicrai Titudinem ficccflu : cmporisextab-
rantia, quibiisremcnconrinctunii<; rum, ma-
gnum, conlpreffun] , fungofum: radix bulbacea,
inagna. alba^blongior. fenco humorc plena. ni-
pnicarite cortice obdufla, qux interdum adnatis
Nartidbrum modo fc prop. igar. Cauliscttam
& folfaoncifa aut contrat; lalcnfum humorem
cxfillant,

Hemerocalli-
da valentina
Lutetia.

Inmaricimis Circj Valentia in Hifpanix fre-
qtens. & r toto illo maritimo traclu infra Mom-
pelium, ubi Maiomcnfc florenrcm, Iuliotjuc
Sc Auguftofemen maturum ferennem magtia
difficulraceanre mukos annos crucebam, t. im
altc arena maris fludibus ag^cfla, racrfacrac.

Italia

Alatactiamctl Vicnna aliquotics, dumitticvivebam, Conftantinopt)li, Narciflisvarij
generis permixu, Ce» z*mb<xtk nomindzddica infcriptione. a! bos ac odoratos flores proferr c
medio inter Anguftum & Scpcmbrem tern pore • & ccrte bis autumo florni dedcrunt TC-
fensallatibulbi Gencrofo viro Uolfgango ChriftophoroablMii/jftojfAiiitnaco; fcdilla:
'pfeplanta-niiUnrnpofliCjfloKmampliis tulcrunt-, quemadiuoJutn nec caromnes
Hrpf.iiiia&: Irali.iixpiis in Belgium det. ius, vcl feminecharas aniquotannis salui-
mus. Itaque li. anepljiu. ini. ut & alias quafdam, in Hunimclaflem rfb
nunquam, autranllit Horcreblenc, ciim videlicet concepto
orcc; iuunrur. & tranfeniuntur. Aliquoteria hijhos. i
aipcrant<; q; jofcuinalijs plerqnc leunUKC III Viro Io
* " ni accipiebam ex eaurbe di/cdTurus Hi b finem
a» ni lucms omnibus liorcis valde nom. fuftulir.

Eo poriotL-mporcijioMompclifapiidC.V.GijlicImiimRdl^f^fvivebam, Sal- MS*
lavocabatur, acquecx catrochiftOsquiTheriacarH in^rediumur^Bicopii parabant:
pofteaPjncratium flnr LiIijvocarie<pit. Qu* in Valentinolittortwfckiiir. D. Ioanni Plac-
ceMedico&Profrflui jllmturbi? cclcbcrnmoHcnicrocallis nuncupabarur, quicalilia-
teorquidem flores ferrcafHrmabat. fcd fiavefcntis aut paliidicolons. HiCpanorura vulgus
Amarumini vocat. Itali quidam Giglio marino, apud quos rubro aut purpureo non invenit-
f>pra: fer: imOtlien { iportu, railnaJiquandorclacunicit

Paratians

LiLroNARCiS!vs HEMEROCALLIDIS Valenrinzfacif. CAP. XIX.

i-\ V A WHVAM cum Hemerocallide Valentina magnam affinitatem habeat, eodem
V^tairicncapitenoncnmpIcaendJm^cdpcculiarcciputillitritJiicndumopcrxprcttun
ximusinotascniiTiquaWainliabetabHcmcTOcallidcahenas.
• Snnineauccinfx [oiiamiflbiUQiefl harcplaoa loanni Bidaor Canonico In (ulano, ret
herbarie (ut intelligo) ftadiofiflimo, qui Inniuconem N.V. IoaimiBoifot mniebac, isvr6
fnc, anno M.D. xcm.
uc (ibusctia in Pl. ucau, cii jufree] ucns in meii Obfervationibus mccio, codcmannorcri-
bat fimilera plantain ipfi Dawm iemine Ijlorentia nurtb Martagonis raril Umi appellatio-
q Jfdnd d r p p c l l a r e m a l m i r e t S c q i e n t c a n n o n) c
rogati

Lilio-narciiTus Hcmerocallidis facie.

Lilio-narcii
histeria.



logaruejusimagine mmific, & iitccrisadme
exarati; defcriptioncm addidit, quaSj quoniam
galticcloquebaturjatinasficfaciebam:
Mitto,un petieraSj iconē cjus Nardlli, quera
fanone adqvi fivi, & eorum, qua: circa cam
plantain obiervavi .deicriptiuncm.

Eivs bulbusMufcaricraftitudinarquar,
veletiam fuperar, pauJoiijlongiorclr, multis
tunicis iivolutusjqvanim excima fu(ca eft,
fcquenslūbrufa, rercia candid ion cjus radices;
feu fibrz, graciliores & ficquentiores, quant
in Mufcan:fubAprilisdcmumfincm (nul-
losbulbos memini adcō tardē emergentcj)
fenaautpljraproductit folia.duplorercbtio-
raqumMufcari.fcdillisbreuiora.& fubcx-
tremum Auguflum marcctcentia, diilimili
plan^rationequamtuaHemcrocallisValen-
tina,cujusfylliaAuguftocnKrgunt,dtindcro*
ta hime viridia permanent. Ex eodem bul-
bubini interdum prodcunc caules, ft rentes
finguli,circiterLi niurn men (cm/olliculo in-
clufbs fex aut oilo flores parvo lilio non d H-
mijcs,mediumoccupantcparvocaliccalbo,
in tnuclaslaciniasper orastedto, odorato, in
quofexalbaftamina Havis apicibus pradita,
& mcdiusftilusaibus:(ciik'iuhet;ii[iigrum,
minus & magis rotundum Hctnerocallidis
femine.Ego Lilio-narcilTum Oncntalc m ap-
pelbrem: (cd tuo iudicio pcrnitto.

Ill i us porrbeiconem,exca,quamipfc Pla-
teau mittcbat, expreffam hie iubiccinus.

LBYCOIVM BVIBOSTM.

CAP. XX.

Lycium
bulbif. prae-
mense.



TR i A Lcucoij bulbofaradice apud Pan-
noneso bferuabam genera: quorum diii^{ff}*
prxcociafuntj tertium (erotinum. **Preci-
ous** addo aliud peregrē Vicnnam altacum,dc-
inde minimum genus in Hiipanica pcregi-t-
nationecrucum.


PRIMVM, Narciffi autumnal is majoris
folijsfiinilimalubct folia, ad mod um viridis
& nitida,nō camen adcō atra vi rid i tare fplcn-
di'ntia: caulemcmcdio illorum excuntem,
fefqiiipalmarcmjniidum.ftriatunij infirmum,
concauum,mcmbanaccumfollicultim, five
yaginulam in Tum mo fcrenrem, equan.nus.
interdum alter, raro tertiuscrumpit flos> fi-
* folijsxqualibusconfems, candidis, fedexti-
mā & anguftiore parte vcluti macuJi i viridi
flavefcnte **infe6hs,** nutans Ji dcorfum ipe-
flans, cxiguicymbalimodo, medium occu*
panribusfexrlavijflanQinibuscumcandican-
tcttilo,rlon(q;Spiii2appendicis, **fiveOxy***
cintharvulgocreditz odorem refrens, "cc
ingratus: flori fucccdunt menibranacea capi-
tula, pyri modo turbtinata, fem en ex candido
fiave(ccnscontinentia, oblongmli:ulum, dti-
rum:radix bulbofaeft, multiscandidisrtini;
cis (exnmiramenfufcaj conlUns, & densa
candcantium fibrarum comā firman.

Lycium
bulbif. prae-
mense.

ALTERi vs folianonmultdmāruperionsrolii? forma dilcrepant, veriim anguftiora
funt & firmiora, ad Pseudo-Narciffi vul- inofum &
quodammodo cineraceu ai raagUaccedentia; **caoltenli** graciliur?, paitnaics.nudi & con-

Leueoium buibof. pixiox min vs.

heucoiaw bidbof prxcoc Byzant.



cavie'vaginulailli in{idcntc,unicumrert)pcrflorem(pUiresobfervarcnomeniini)promunt
 fupriorcminorc, nutantemctiam &pendulutn,acqucfexfo[ijsprzditum .quorum tna
 c' terp Uomni d n i s l e j l i u i n o n h g r a t o r a t u e i n d i b e h) b u s i q l l h a t a a u t
 fudo czlo ,aUrum modo fc explicjnt,ti **iaimeroa** breviora (urn, & cordis, ui vulgo ab impe-
 peritispLiigicur/orrnam.fivefigirexrenarn rcfcrunt.binisviridibusmaculisircacrenam
 Tons nocata,interne (ex viridibus rad ijs ab umbilico ad extremas oras infignita medium **fit**-
 fem Icxctiarnftaminulacrocea, (tiliik]QccxiJis,candidus,occupanc,odornullus, aucper*
 fluimqxiguus: limiliafupcrionbusfcrcapitafuctdunt, mtiioratamen, &n|ivatvircriet*
 formam penccxprimencia, mquibus femnalccrocandiiiius: radix fupciore ininor,mulcis
 etiam cumcis albis coiiH.ins, excernanonntul mgricantc, &: (clFili parcc mulus cnuibus fi-
 p d

Proditutrumquematurcadmodutn.frarimque inter binafoliafloremofrenditvixliqu-
ftiib, quasfecundumgenusnonniquamctiauiptnetrat: Maio menfe itnic
 f h l e u n c

TUTIVM genus (cc undofere fimife eft, fneuntcque Martiobma fofiapromitiltifi
 milia.fed iatiora^rugincicciam colons^onsgeinmam ut ini]oconipletrent.a:cralliuiuc- f
 luscauhs tandem (uccrefcens, unimmflaicm vaginulainclufumfuUinct, formalupciion
 ^ifinim duplofetcmajorem tnbuscxternisfolijsalarum modo expands,prorfusniveiSj in-
 icrtoribns vciobrevibus.biulcis ut in iiperiore, fimul coc'untibus, & vclun tuhulu quem-
 P'am ctf. irnuiitibus/oris pk-rumque circa unguis; virelcncibus^eliqua parte albis, oias can-
 nicnrcundumcrenaivindesinaculzinficiunt, interius *verb* aut niagna <x partevindia
3ant, au:odoradiisabini!5unguibiis (ccundum longitudinemdudlis prardica: prionsfra-
 grantiam utcumquea;mula[urhic fios, &: fuaviusquidpiani fpirare mihi videtur; radix fe-
 cundo major.

Primum, in III viquadam non procul ZolonockIH.Dn.de Bathyanoppido udislocisfo-
 htnaniOfjyobfrvrbam.-creicKeriam *pknfque* GermanixJonsjAlrcrum *no* modoin *V'tcn*-
 "cnfi&: **Leytaoralnibus**, fed etiam plcnfquePannonixpratis: umbra tamcrimags dcle-
ftarividewr.Tertiam Bv/JntioViennaminferriexpit,Narcifcibulbispermixcum,poftan.
 «, **B. sxcu.** Sed&iiiuitepcinmittebatDodifs. Imperatus.cummultiialijsbulbis,
 pli./nl) Aitumnumanrii xcn.cnionrcVir^incocrutum,

ARIO **quinquciuif**« fute foliaNarciiCms (imilia&i virentia: cquorummedio
 dldfr^ n i l i q t i J n e t j l i t m l p a n u s , & b n i s a c u t i o n -
 i,viridis,caifbranacea vaginutiquinosaut fcenosfloresfummorartuno
 basangulisprzditu

Leueoium
nulla gra-
ta Byzant.


Natalis

Cauroi bul-
lis
*J***

proficienii

Leucojum bulbofferotiu.mjjuj.i.

LeucoiuaibulboCa.acatana3eteauif*



proferem.uncinnibuli modo pendulofjflexarquilibus&rniveisfolijscoftantes. auorumrt*
timanipirtem vindes rnaclux inficium.fenisirirus ftamimbusHavjs, medioque Jafcollilo*
i p g nito oribusluccedantma na g g ; p p y rin mo
dura fere curbmau, nigrum fenien orobaccum, Liliafphodeli davo flore (cmini non abfi*
mileconuneiua; radixcratTafcljulbjccamulcuruccuicntiituincisconllac, &TplunmisB'.
bmdonaractf.

W. a. d. a.

Seriisfuprioribusplcrumqucgermiiurefblet.atcjueMaiodemumcnfclorcjproftTrer
Vnoduntixatiiiiccrjrumspjnnoriir loco hoc genus oblervabsm uliginofix praxis fupr*
%aradinutnant)M.D.Lxxix.Memini&:illi{imilepUnc,duodc:origintapriiis anniscrucr*
in Pratis Laccrx vicims aim Mompelij viverem.

Scd&cjusgenusquibufdam pracuad Danubiumfitis infra Viennam Aufrii nafcitur^
cujusfoliaqmdemfiailia.lcdpallidiora.noacd mucronauj&velutibifidoraiicronprz-
dita: flores item maculij ex vindi magu pallentibus infcSi. Alicur hoc etiam in Germain"*
&Belgicishoitis.

Leucoj bul-
bofferotiu.
mjjuj.i.

QVINTVM cau5icuoctpalnrmmaUo,gracili, unicum, interdum aherum 5c tertiumfi>
rciisiorcaioinninolaftcum, pendulum, (cx<.li)sconfanrem, &tintinnabuiimodoform-
matuniiiinodorunijingratiqcuftuSjinqupallidallaaia: flore)am aperto, demum pro-
deuntquaternaautquinacapillariavitidiaqucfoha: radixbulbofa, facis crafHtpropUnt'
exilitatCjCmuUuglucinolistumcijcompafta&amara^uecandicintmcbranaintepiti'1-

Extrema Bxtica qua Lufitaniz contermina eft, non procul Badajoz, quam nonnulli
ceni Auguft*^m clTccxiftimant,ad flutnen Anam fitam, nafcitur,ubi fub'finemO&obn's^
Novembrii initio.cum fuo flore crucbamVy(Tiponem proficifcens.unde in Belgicam cud
parvo illo fcormo Narciflb amicis mittebam: qu i diu in penfilibus fuis horns ucrucaluc*
runt,nu[[umtai]cn,tjuodCum,floremvidcrepo[ucrunt,&:atitultciusbulbosconlava-

W. a. d. a.

tint, ig not oi
PM MVM genus i rhizotomis mulicrculis 3J?>fi>ri/quari dicas paluftrem violam,nomin*
rur:in Germania vero ubi plenq; locis nafcuur, b>fir^)<Nuiif< blamth/ id c(t, candid us rC'
bruarij flos, addifterencumPfeud<narciflivulgans,qucmBril>J'J<nw'S<b[ut]">appellaridi J
Alterum ab ijfdem mulicrcuhswrtff* fcp/ & Cnctrefcn/ hoc eft, tlba viola & mvex guttx,***
in ligni videlicet etndure appellatur. Serotini majons nullum vulgate nuraen lutelle*^{I*}
auemadmodum nequeQuinri, quodLeucoium amuniualedicipotent, ciimauto⁰⁰
duQuxat.ut puto,flotcat.

SCILLA

SCILLA HIS* ANICA.

CAP. XXI.

SciUjchifpanicar flos A: fcmcn,



? C 1 1 1 M hi&omm pler'iqveiiScnim-.kiiqiiianenio haectnaskghnam ejus iconeta
 *^ exhibit, **ftcetc aba** potui qum mcis obfervationibus infererem, ciim cam & primum
 emergentem, & fl >rciucm, ieminc & onulli, plerifque Hi(paniae & : Lufitania illociscrucnm.
 E s T vero Salt*"caillipleruniquccubitafisau major^ctus^ucius^b/quefolijs, pluri- MI
 nuscaiididis 8f (**ellans** rlvjnbusornarus, Aiphodcli minoribiu, ornirhngalo majori | quod ««
 qmdam Scillam Epimenidi3mpuc.irLc)valdefiniilibus, qu!abiniis (uuvenflimc Tlicoplira-
 ftusHilt lib.vii.cip.xiL-ftribitiCuplicariincipiunt, qucmadtBoduni Aphodtli&quariMi-
 dam aJi.inimbulb.ic<;arui) ftjrpiam **Borts:his** (hccc&ani ttiangufaatpituhconipTeflhan-
 gulis&vclutin.ini.ijHiqubustJiricn nigrum, planum, palceum (**emCD:** quinque, fcauc
 ^radcmumctnergutmliahhacea, Uta, viridtaadmoauoi, deafafivccarao6, huiDiexpan-
 a.nonnihtcarinacarfadtxcrairief, m<lesrooicu<li?ulentoquodanali<mofeplenispia>
 dita, mulEifqucraffiufcul>fibri\$capilb(feL

CopiosnafarurfupraOtyiipponcm, 5(:plcrifquealijs Lvilicani*StHifpaniaclocis.Floret W*
 Augno & : S'ptembn. fcmcn Odobri & Novembri marure/cit: folia niacurojam feminc,
 &cxaiitict<3ijJc,einemiit) **NoVembn&** Decembn.

C i R A c i s c7*ix^a.Laciniseciam Salladicitur, cuju5Plmiustriagenerafacir, mafculum
 tobjaalbus, feminam nigris, & tertium eius gratum epimenium, quoc angustiore est totio, kaiHISjt.
 & minus afpcry, v(1, utThropliM(hisJiabcr, Jarviore.HiJpani **Ctbeffa tktmsj** appeUanr.

*Cum porto Epimenia: cul. re **igpiin, JOjedalisfijHenjcrocallidemvalcnanain**, illatn
 esse non posse, certissimo argumet [oclttxemplumdcdubuspilcatonbus, qiiod incerdum hilla epim.
C V. Rondeletus retere folia: :idaudem cftc|u(modi. Iikiriim pteacorom alrerctilonij
 Hemerocallidis, co conc ifx, IUCLO incinflum, ludali, (f^ucm odcratj cibum iumpuroadpo-
 ^it-i!!:h(jinrii.ici, ncciiii'idusmeruc[is, carncsprophr. 'isiccat) nfquevclicur, **abftinente**
 *Iio, qm fe tame premi tic-abac portpaucosdeindcdics **mifci** iltc, qm carriesdcprac^iiblam.

PANCRATIUM.

CAP. XXII.

HEPATI ofjmplicudomajorefrjCxtimztunicxiubent/oliaqucampIioraJonTiora Paneratiom.
 * **magiscannata&rqquadammodofurrcib.**
 Abunde crefcit in: Hifpan" medicerrancjs. adeorufticis exorum, ntmecjobju]bo?crucn- v-
 admoncTentnc. Agrostem, puzientaneum enim cne vscuuum, Agerminat cum Scilla:
 florentem a item, aufemenffentem iiumquani lunepiatuam cmipcx, Fabiano

Pancratium.



Bulbus Eriophoius.



Svif T crgd Bulbocriophoromulcaoblunga Hia, Hyauntlutii lerclimilia, r-n Nat-

Fabianoaurera Ilges, utadmefcribcbatan-
noM.D.xcn.in peniit bus boms non uiodocau-
lcm proiulit, fed ctiam piuriinosflores *fpicxin-*
farinconafccnres, ftxfblijs con (lances, Icillx
(quantum ex pi&ura, quaoi epiftokeconjunxe*
rat, colltgcrc licebat) floru m im u ios.

Uetyxparm «PX/AA*Grscis, Pancratium La-
tinisdicitur, Hifpani eodem quo lupcriorem
nomine dQnAnt, Cd0#a4lfarr<in4.

DIOSCOMDE tctc Sullx vires &pre. paratio-
ncmliabet, eodemquepoiidercin morbisffi-
cacitcraftatnicur: cuitamen mitior,t]uam Scil-
Ja:,faculcasinell. PliniuscaltJcmtaculcates, at-
quct'tianipluresillicn buir. Hiipniruilheis, li-
cet exofa, aliquotamen innludt: namaqua,
dumillaaflacur, cxIbll.nHclcabicmutilicrilU-
m,& curan mib iaffurbait.

BVLBVS ERIOTHORVS,

CAP. XXIJI.

Hlc est ille bulbus cu us florem tanto tem-
pore Uelgica vidacdclidt;ravir. Nam cum
primum n.icti tnuncrc ampliflimi \in Iacubi
AntoiiijCortufipatricijPiuviij. pluriimsjnins
{umniadihgentiaifticcxcoluimus, atqueadlu-
biti omoi cur.i, ut aJ Horum generacionem pcr-
duccremus]lubindctiain mutatis terrygtnai-
bus, fed opram luftinus: in maxima tam en
amplitudein excrevt, Kfcniirum mniouaJ-
mra fbbolc propagavit. Ei poliquam acclGc
Itlullrium quorundam Vencorum qui ad n8s
lctiplcrunccc(timoniim,c]ujflort*[Catnctiip]us
decenmo bulbu m in (LI is hottis alu iSsat) nura-
quam con(pcx(Tc: Gifluin'cft, utftcnlemdTc
nmtaco natali fylo, neque Horem proferreabi-
traremur, prifertitn cum id viium mimerola
nuclicorum prokabuulconiptiforce. Veruni
aticctrem fc baberc, anno M. D. LXXV. mcule
Maio Jcprchendi.

Namctimprscdentecciim annum bmm2 ali-
cjuot ill ins bill bos Ma/fdnmajoris nomine cum

l i u f t l i n L C onstantinop-
lire diens arabifci Philibertus de Bruxella cu-

jusante memini. Sc ex illis nonnulli [TO nofiii
amicma miliulaliflec.parcin iple ten^concic-
didi, parct; inpeiH)lihor(oC.V.loiiijK^AicboI-
uius MedicusScProfdTor Vicnntiu: mibiooJ-
ne5pericruc, illevcioduoscon{crvavir, quoruni
altercciam floruit non fineingenti mL-a Ja.nru,
quam omnibusrci licbaria: ftudiofis, iflius bul-
n/uisflonbusoQuftideliicattooeadvivufneX'

Srcfsa a peritiflitno artifice Martina RoraS-C
Sf** fculptorc.atquedcfcriptionc in Appendix
ad Hi/panicai Qbrcrvationfs, illoiplbantiote-
ftatamcflvolui. Eam cum deoud in Pannoni-
cis ob(crvationibuscvuli; iflem, Ugmficavit rin-
hiGencrorusDn.deLoiijgtretpii ctiam u lo
ant M.D.XV. f l d l & M h i 6, ab eo

temporequo iconcm dhocari curabam, **illius**
florem Dumqaan vidcrecontigit, licev
annispoUcabulbuinalucfiti) iui!jLri.uiiiij[acc
pturioas (bbolcs pi ocreamcm.

cissinis, minus carnosâ & succulenta, duriora etiam, viridia, mucronata, ingrati saporis, quibus miuutiffime etiam confra&isj tenuiaquedâ (lamina infiar telxarancarum diduci posunt. Ex liorū m e Jio cauli s ex it cubitalis, aut amp! ior, re&tus, Scinltni cau lis xm ul us, xv is, nudus, virefcens, supremâ parte ad czruleum colorē tendens, oblongamq; ac densam veluti (picam, in denos vel piures verlus, ance quam explicctur, distinclam, prinium vindem, (ec* pan latuiffdumlere explicat in Horesjerruleumcolorcmcontrahentem: flores fenisfoUoliftellatim expanfisconstant, trianguloilmbonc in m cdioproto berate, Hyacinth iau turnnalis tiunbus valde fimiles, inodori, ca: rulei cum fuis, quibus infident, pediculis, & internis (t. miiitbjs . quorum apices initiopurpurei. ubifetexpandenini. palldcntquadam velutifanna ilperli funt. Incipitflorere ab imo, ut Scilla, & reliquæ magnæ parte bulbacex stirpes, flutes raceraî aut spicE mrtarconferros habentes. flēt. Semcn obiervare volumus, sed rtorcsadmoJum caduct, flatim marcescere ceperunt, & reli^js tantim incaulcpediculis decidcrunt. Radix craira & bulbora cfl. plurimistimicis albisonccxajto mentofa^ veluti arancarum telisobfca, mulcos ut plurimum bulbos ad latera adnatos habetis, & crassls oblongifque hbris nitens.

Etiophorus Peruanus.



Aliyd p^efegtotiffriiimlEriopteti • *Hyacinth*
genus aberuditilimo viro Doflore Simo-
oe de Tovar Medico Hi spalenfe ecle berri-
md, anno M.D. xvi. accipiebam, nunquam
ante mini confpe&um, quodjam defcripto
adjungendum putavi,

MVLTA id ex radice promit folia/urrcdla
initio. deinde in terrâ (cfc inclinancia, dē(a,
carinata. inflarfoliOtumHyacinthijViridia,
(plcdent!iq., qu5 minutim cofra&ia, tenuif-
nmafiiiunaprebchaudfccusacPrimum
genus: inter luc folia fc/qui pedalis nafcitur
taulis. tres interdii irgracilis, firm us tamē,
nudus, virefcens, qui lummofo Migio pluri-
mos fundit flores, initio quafi in (picacoag-
gertos. dcinde ab infimofefcexplicare inci-
pientes & in latitudine expandentes. fcxfo-
lioliftellati indccuflaciscōdarc deprchcn-
duntur. colonspurpurei. circa umbilicū to-
tccarulci. ut & prominens umbOjatq^fena
quxiltuambiuntflaminulara, ravisfeu
pallidis apicibus prxdita, Ursula floru folia
perlongitudinē iccantcvna ex atro pur-
purcijodor valde tenuis & exilis: oblongis
verogucitibiifq; innitur florci pediculis
ex vindi pitrapuferibus, quoru fmguli ex
appendicuUru candidarum 5c mctnbrana-
ccarum fnti prodct; floribus fuccflerunt
trigona mucronataq; capitula, (cmcncon-
tincruiarotudu in, mgrum femini Hyacin-
thii Anglici feu Belgici par. bulbusejus cras-
fus. longiulculus & quodammodo pyrami-

dalis ex albo fl. ivercensfcujusqtiamat, pcnndcacinpiorc, mollilanuginccpleuxi infiroa
fcdcmulris crasfcufculis fibns prxdit Uifloruitcx HemoMaioinicquente.

Ceterum. cum diligenrer hanc stirpem confidero, & cum Hyacinthi ftellati Peruanico
ne confcro. plurimis notis convenite comperio, & ilia tpa iconclianc ftrpcm, aut illi pa-
re it. cxpref Tun cflc. pame mihi pcrfu. idco: illud foldm increft. quodicomfolianon canna-
ia, fcdmedioncrovoprotuberaiuc&: (ublevato ad piai lnt, tiim radix nimis obtufo mucro-
ne. Hinc ncauflam Lcftort optioncna re! inquo, urquo loco volet, iconem adaptet.

Ep<Sop>, Limferi nomen huic bulbo indium. ob tomentocopiara, quod lanx modo in x>mm.
ftaminadiditci pored.

Tlicoihraftus inter vttcfes. lib. vt i. PlantHift. cap xi i r. enophon memmit bulbi. illunj
in littonbuinafci, laniraq; fub pnmistunicis haberecx quaioge & alixvcftescoficiantm:
dem 1c quod internuin est in co bulbo. mand iioaiw in hoc nullum penculum fecimus.

Eju^etiammciuiiitt'linius lib. tix. Nacural. Hifl. cap. il. Theophrasti tefrimonium ad-
fe<ns: & Atheius lib Deipnofoph. il.

SeU fitis mirari m: quico, quof (im feribcre non rfc writ*, Dodonaum wdiffe in III. V.
Ioannis Brancionis hortocriophorura ilium bulbum, cujus iconem exhibet in appendice
ad Purgantium liifto[iam, ciim uracndilerw faibat/: nophonim quidem vidiffe (pnmum
videlicet

Videlicetquem hoccapitnosdcfribimusjatlloremnuuiiqunrn. Iconer*, autē quamistic
addidit, accptam fert illi. qai, me uigenre, cam milerat. Ec certe Dodonxum ali quozies
admonuisse memini, ne vulgaret, quod mihi admodum suspecta esset illa icon.


HYACINTHVS ORIENTALIS.

CAP. XXIII.

DE Hyacincho orientali quidquam scribere non erat animus, q«ia a plerisque prodica
etiejus hifton. i: ciim veto de isto Horequxdamobfirrvavcnmab illis vel nonam-
m dvcrrajvelncglcfta. pixteiinlbiutumt'adurusiionvideoijicahick 10.

Hyacintus orientalis.

Hyacinthusor. *tr. A. 169. 9. 10.*



*Hyacinth.
orientalis.*

*Hyacinth.
orientalis.*

*Hyacinth.
orientalis.*

PRAETER iHum ergo qui omnibus jam fatis notuseft, cujus quociens in Wmcolonsintenfi-
one admoJiim vamaTccicpiehendi (nan) totu. sqiaticxrulcus, vel fubeincra-
ccus, vel dil-
ltius purpualcctis & lilialis. ai Lt faturmt purpiircus & ad viols nigr. T Jti V' colo-
i- in accedens inveniitir) i» nichortu! oa! cban], cujus bulbi jrcliqiiorunini; igimiidincm
non admodu in luperabar: (ed folia firmioracrant, cauliseeia inter illa prodiens major. cral-
lor^ vic cnor; aut plures flores proferens, alijs quidem fimiles, kd ex ci & eaceo quodft UtmO*
do purpuraicenes, omndque in unum latus propendemes, reliquis non niimiodoracos:
(ciicn in cria Qguliscapicibos minus akoro,

Muj us (cminctiatanni est planta? ro>j>'xA^!o?, cujuscauliscubitalis, crau' us, firm us anno
M. D. XXCV, deeam & c fepteni flores habuit, non cjuldcm cum macrecolons, led purpurcos
floridiores, 6 (:r Libi Uisbinosrainulos, qior Qmfin^ ulLc) utnisrtoribus crantonu[h: (cquciH<;
ramenanno nudum tulitcaulem paucior(q. flores, ciini longcplurescxpccclaf' cin , quan-
do quidcm pnmofocmwnruiflc] fertilis.

VERVM diligentifl mus & eruditionis non contnenda: Iacobus Plarea iinihi fcripfit)
Hyacinthum aleic ft valc amp Usfbi) £, magno, craffi>_1 fiimoq; caule, moili* Honbus pv.t-
Bjtd Mik*. dit Oj Colorem non addidic. led iconem milk Hyacinthj polyantlu majoris nomine miigni-
tam ciualem hie expnmi curavimus.

Habco quidem unam firpctn valJelaco folio Scfaturatiusvirefcctc prxditam , CUW
cauliseicianicuf UK ifirmiirquftfc dinferendisrloribus patior^ t potc qui plures denis non
dct. eof qiiin ad latu^ unum Ipeclites Sc covctibs, fed omni Jjrcrcxquahter quali (arloi,
faturatius purpurafcctes: capiia c] iam fa] uracius VLrentia, qualip Lirpurx mlpcrlbc» (porc.

httvh. tr. CETERVxi, quod filentioni inimL' p'rcmendum duxi, Gnerolo Woifea OgO Chrt (toph°
am fmp: rQa b Entzctorf. fcmtnc imecommudicato mcuseft Hyaintlii bulbus, qut Apr 11 men fc

Hy aciurima orient. TJOAMO'H alter. Hyacintlms orient, nive us.



anniMD.xxert.florcccrcpic, STfcquentibusannisiimilcsprimisfloresprofencnódefijt. Ejus folia alijsdmiliafiincpaulotamendiluttusvirentiajiiKerquicauliscmergttfatis fir- nHis.fcnos.fcpcnoscmeplures (habuicnim duodcnos&quatuordecim) jncrdumflores profrcnsrainufl-ulos.nicenureparteomninoniveosforisctiamalbos.fcd quorum extcr- nacria folia ad «^poAsi/Koc colorcraqucdammodoaccidunt, nan minus tamen odoratos quimfupenoresHyacinthos : ijsfucccdunctrii;ona.capitadi]utius virentia, fementiam nigrumcontinentia: radix (ariscraila,candicans,mul[is fibrndonata.

ANNoporru M.D.xxv. By^antioaccepitGenerofa Dn.Vmmadinmagni muneris!<> <<< orUnt.

~~... & pro i hyacintu niveo ... quatuor ex quibus bulbo: a reliquis d' frecto: quod unum~~
candica[icccsrant, alij iiiiurL' piirpurci&co!on':3di]ioduin riondt: Lrtriu(qtJc generis unum mihidedit: pLirpucumLJtnqij::fubfc- qucnshicrHScorrLipit, tamctfimcimagnamcurarn habuerm, alterpaucosdcdictloresecS/quconjnnonivosj alterominores, utctiamtota plan ta muled teneriorfiiiDfirmJor est.

>> Diverfiiuorem nb uiroque.qin proalbo Hyacintho hadenuseft habitus,cujufque uni- nye.#, & cam ftirpem a C. V. AlphonfoPantio mirtamalcbat in pcnfilibus tiortis 111,Joan.de Bran- cion.cinnViennanievoctruiufumexBelgtci: (JUUJUSpoflcapluresbulbosViennailli mifi, Dam iftic (Jtis frequens crar.ciim valdc fit hburalis in fbbolc generaia. Sunt vero Olios flo- << ante quam expl icenmr,albi,lcd aperu oras rantim albas Gabct, reliqua parcc quafi car- dicolons.cii'ti rarncnfcnefl-rcncipiunricrc codniveifiunc

Tv RC/E omnesHyaciiHliDslitctiiausceptosZowWappcllationemifcruntjadditaNMwiM.
v-----s cum [indicum, vcl aliiijuapiam, cum locum untie accpcnnt, unhcarevolunc.
Flotentomaci Apnli.

CeTEa.vM huiccapiti anncftendam cenrui raram quandam plantam,nccantcanum **-t>.xciii. mihicon(p©2ao»i ciunsfancprimamcognitionein acceptamfeioBernardo 1'4lud.ino,McHico,viruJofti[limo,mihiqiamicilJiiiK>.&fliquisalius)naturaliara return Pritalimlatrc catim f u cti f munt quim h b t I (en i p senim

""iicoicavmii.c.'iiiiJ.-m.iiuciii tjmen per interval!! ambiebanc o&o.aucnovcm folia in- """"
?nduoordinc dil ipfufj fncdil«ptrcampleflerii,ucni>donimquandain(pe.
c'cii]]>i% (,erentiCI' u , :i;ii:ilo;i:i.>ra,^:Iaiiij!J,*iip:fu.tpartL*breviora,omiii.iraint;car]-
^tt,<iiliKiusvi::-lirii,finiJur.i.^:iK-]iisvt-liMniinmi3partescconfnngerct,velutitenuir-
^Ulbnuju^nitu i;u]j[uiiiEnoplionvulga[isdjvuliuuniolicndcti3.iumraujc*itlisd-
Goebac

finebat in duodfnosaucplurcsflores (quorum unicusducaxacapertus, reliquiadlmc clau-
fijconfertira & in fpiczquotiammCKiofoirnamnaicntes.iiriciairi longos.lummapancin
fexIaciniasaliquancuJ.umrflexasdivifos.HorumHj'acinthiAliariciaaftar.ftdlongecrar-
fiores & magisluculentos,nonrainusforfan,quam malicitrij n"ores,fexfaroinibuscmc-
^ioprodcurttibus (quorum apices pallidil&illis breuioreftilorodoratusnefit,anodoriscx-
pers,melater,quialarisaffli&umvcauni,& media ex parteconfradum accipicbam: qua-
lcm autcmtadjcemliaberec,noDcraradlcripturu.

Mamm.

Miss A porr6fuemtPaiudanohaecplanta,cuminfrcriptione,i«/i«f/W/f«fy7o«»j/5*w
frostfrins Htrti Hyxiatbiorttniditxmufam: ego, proptei cenuiflimailh, utdixi,infartelsc
ataaeatum ftamina,q.u^cauhinhaacniia folia, vclminutim confrasla reddebant .Eriopho-
lignusaliquodarbiirabar.cainetG&wulisfulijsornacuSj&florumfotinarcfragaKiJtur,
hec radix mihiconfpcaacflet.

Ex epiftolaracnert.quaai biennio postabruditiflimo viro D.SimoncdcTovar(qui Pa-
ludanop]antamconiniunicarera)accipicbam,curaaliquocccjusplantx,cuberibusvcrius,
qaam bulbis, ferupulus aihititjc<ftuscK, an ad Enophon genus com mode refcmpoiTer;
eicnim in hunc modum Icn bebat.

Hvacmthus Indicus tuberosa radice.

Hyac. Ori-
entalis Indici.



PLANTÆ Indicæ, mihi Hyacinthi Ori-
entalis Indici indigciatx buibus, plunbusad-
natis tuberibus (e propagat, c quibus muka
prodeunc folia humi fparfa.oblonga.angu-
fta, mucronata,al!ij foliorum a:mul3,atque
incorunrc medio cõplurcscaulesafliirgunt
rotun Ji, logi, bicubitalcs, & non ram altiu-
res,acferetricubir.ales,duriufculi,]^vcs,mi-
mtni digiti ciailitudincm nunquã (upcran-
tes,midc, ob nimiarn illam lungitudincm
actenuitatem infirmn .obliquequotepore
flores femntj fe contorquenc, & humi ple-
itimque procumbuc, mû bacillisautadnu-
niculisfuflineamur: hosantem caules,pcr
incervalla, finguiatu folia alicrnacim htl
bafi ambitucbfviora multo,fed magisacii-
minata,quamcircularadic: atqucineorum
fummo permulci fpicattm coherentes inti-
dent Sores.candidijHyacinthii onculis flor-
ibusfimiles: hancverbplantam Enophori
bulbi genus eflc, non faLile affli'itiar. Hrc
Tovar,ad lpfum cnim (enpfera, cxijs, quas
infolijscauli inhacrtubus deprehendcrani,
notisEriophori genus mini viden.

Ercerrc quz mittebat, quxque ab III"
Comite Arcniberco poft accipiebani tub-
era jinfequentt Scxtih folia produxerunc
longa.humi (parfajCannau infar foliorum
Eriophori/cd anguftiora Sc iogiora, in mu-
cronem longutn defiaentia, fcTeUi invicem
amploSentia,qucniadmodumIridislatifo-

lix, caulis expertis, folia, quryulfa&confrasta, non fecus in lamina diducebancurquam
brvioraillacauliannexa: radix tuberosa eft, Ari ^tgyptij, fire Colocafii infar, fed longe
minor.adnatisfcprapagans.nortnulUrquefibtispTTdita, utexfub)efiaiconc vidcrelicci.
Itaque fi Hyacinthusnuacupandacrit hxeplanta,HyacinLhu[n Indicum wberofa tadice,
ipfelUrhccebir.

Hyac. Indi-
ca tuberosa
radice.

HtACIJirHVS HIJFAWICTS.

CAP. XXV.

Hyac. Hifpa-
nicæ.

DODOMJE I Hyacintho non fcripiovatdeabfimilis non eft hie Hyac.Jnthui: folia ta-
menprofertnonadcofplendencia, nechumiftrata, fedpotiislurre&a, breuiorem
caulibus,notes amatis purpurascetes, & mscumini colorem quodaniduo tepore
quorum odorctiam magisoblcurus: fcracn»radtx,ferc conveniunt.

Floret eodem tempore cum Dodonact non fcripto.iicmpe (ub Aprilis finem & Maio.

HUQC in Hifpania mcl peregrinator:c non obfetvavi, icA paucos ante annos fccclgi^
miflum accepia Generofo Dn.de LongatrejHyacinthiHifpanici inodon nomine. Vndc
parrd akhabuent,mihi iacomperwm.

Hyacinthus Hispanicus.



Hyacinthus obfoliatus coloris Hispanici.



CETERVM nonscriptum Dodonxi, non modo circa Machliniam & BiuxdLis non potremas Belgica; urbes in pratis quibusdam silvulis nascentem conspexit: sed in Galliarum parce, Belgicas vicinas, vulgo Picardi adfata*, in silvis eruidum Lutetiam proficiscer: nusquam tamen abundantius, quam in pratis herbis quocumque Ludovicis, & etiam longius ab urbe distans, ubi crece memini quicubiuliconfarentcaule, & tricenoshabere flores. Sicut Oidodii tenius purpurascens, modo dilutius, aliquando etiam omnino nivosos (quales etiam apud Bruxellenses Iblebant) vel media ex parte purpureos, aliter candidantes: sed carni coloris etiam inventi, non modo ad me conscripti Uonefuit, & diligens pharmacoparut Jacobus Garccus junior Belgae, etiam binos ejus bulbos postea misit, quorum alter corruptus, aliter eleganter coloris flosculum M.D.xci. demum mirum in modum in proli bus audus est,

HYACINTHVS OSSOLETIOR. HISP.

CAP. XXVI.

QVINA autem fena habet hic Hyacinthus folia, oblonga, cirinarum succiplena, coloris circincovirecens, Mulcari foliorum armulacere, angustiora tamen, flexibilia, orbiculatofermum mucronem candidil vena interiore parte per longitudinem in ea excurrere, ingrati saporis: prodecaulis nictiofoliorum, pedalis longitudo in eis, vel etiam amplior, gracillissimus tamen, nudus, densus, duodenos junctum etiam vicinosorum per intervallo ferens decorum spectantibus, Hyacinthi Andico non multum ab illis, feruntur comitantes, quorum terna extensora validiora hexa sunt, ineriora non aded, sed vel tunc rubalium quendam imitancia: color in illis valit-obflectus, ut qui ex purpureo, alioque varietate permixtus videtur. Odor tunc effusus fert in triangulis capitulis, planum, nigrum, tartilago (um, circinat z ferocitudo ita Li, Cdttxicimnipaxi pariradix globosa & rotunda junilciscandiantibus infestis & numero illic flosculi parte praedita est.

Spontaneatur quibusdam Hispaniarum locis, unquam in Belgicam delatus, nonnullis amicis floruit, aquibus (enim in coin) uniceo, natum mihi fuit planta; Vienna: quae aliquo anno nullum fraentulerunt anno 1707. D. xxcii. & frequentibus abunde, quoniam femina M. D. xxxc. naca. atque unum ac maruifrent circam acm fau, illo ipso tempore gemmarum septembris & quodam tempore illi in xx bienno potius flutes dedrunt, dei & capitula fuum femine concinunt.

Scrogemiat, & folia in Aemimnum feruntur in lunio autem in Liliis Horec, flutes etiam, femine ex code m capite excepunt arum tritium nuii (ulceris obicervabam, ucalijalijis. Wolctiores conspiciantur.

Hyacinthus
Hisp. juncus

Varietas.

Hyacinth! obfolet.Hi (pan.fcroLicmen.

Stylus.

X. varij ad
in a fidi-
genijis



M. f. m. d. s.
f. m. d. s.

Wufcariobfulctiore flor«.

Cyloa ferli
v. m. d. s.



CVM in Bdgicam amicis primū mitreret hunc bulbū Francicus HolJebcque, Iligis Hi-pania: Simplicita& hortulanus in Arai joez, no- men adlcptum erat Hjracinttu flore colorisci- ncracci & terrei. Et line dubio inter Hyacuuih gencrareccnfendus est.

Addideratprxterca feqticntes butbos, vnum quatuor aut qmque flores gci Unccm albicam panulx modo eformatos : Ahum campanulx etiam flore fans magno ad terram **ioclinato**, Havi incuscolons, foris purpurei: **tertium flavoflora** fupcnore parceapcico; alium flavohumili flore, **CJ** fcmcn limilc **Ameresmtes**: Narciiurum junci- folum al ho flore: Narai Tumcxrulco Horc: Picu- do-narciffi genus adtnodum exile : alium monca- numignotum Croco lilvcftn fimilctn: Hyacin- thum orientakm Hifpaliicuū: fle Tulipam Hi- fpanicam, **cujoiantetnemioi**. Equibus nulluni fuperefle putn, prxcer l'cuJonarcifTun Sc Hyac- intlvum Hifpanicum, quorum defcnpcionem fmsjain locisiuicrui-

MVSCA M.

CAP. xxvii.

Evicini s Conftaiuinopoli hntis, ultra I7o- fphorum in AilaUcis, **primum** iiaftrx-iuropx cominunicacaclt lixe **plasta** qus.ob luavitlUnuia odorem **filcotiopntmcndaaiinicuic**.

H A B E T sacemquina am (**cnaoblona** **afb-** lia humi diffiati, & oblique inticxa **caniculara**, fa- treralla & fucculenta, Hyacinthi comōi majoris, five prum MattKiuli, folijs perquatin limilia, &-, tenmaftaniinajfirunipadtur, cnam often Jenna, non adto tamen abundt, ut **Eriophori** iulia. q cum primum germinjiit, vcl **purpuraicur**, **autai'** **befcuotj** inncrdiunpulcliriii]orul. iiotulorcni- tent. Ex hoium tūL-Jio cauhs verno tempore crump;t latiscralius **fidus** & **nudus**, **d J**um infirmus protLtacraditudnc: hunc **a** medto ad funnium fere raccmiiim coharentes ambiunt flore SjUrccoItspropemodutnfimilcijiniuoanti-r- dumpurpurafa-titcvuicvindes. dciudccxpurpu- ri viraices. aut cii vindicate albicanr.es, iionnuni- quam fubcxrulci. aliquandonigncantesiincio fi- ve IJCLiratt'purpurali-enti'Sj Hcmde **palJidi vd** **Ha-** v f e d e b v l l i n i o j t f l i l l o r o m o u b i r a b l e c c r c i n n p i u n t , n a n c a n t e s a u t p u l l i , i ; q u e m u c r o n e q u a m i n a l i j s L r a l l i o r e & : **o b t** **r e i n i c r d u m . q n i m a i c d c t e i n c i p i e n c e s , g r a t i i l** **m u m m o f t l i i t e r e**, a u c a r o m a c u m o . j u i u r c n i r o c t - r u n r , l i c c i q u i f l a v o c o l o r e c f t , p r a v m & n a r c i i n n u m q u o d a m m o r i o f p i r e t : i n t e l l i g o & n i v o o n m u i o f l o r e , a t q u e e c i a m e g r f p i c r u b e n W i n v e n L r i , q u i) s (a n c m i h i v i d r e c i i ' a n d o m c o n t r a c s

lisanniimarefcctibin&perruntbus.urHvacintliorutu, **Narcifforam**, **Tallparum**, L* li o r u r o & m u k l b l b i t f i u b r a , Abimoflorescxplitare" r

Muscari flavo flore.

Muscicau IU suis filiquis onustus.



ut ctenbulbaccr fpicatum vel bonyodem'florem ferenres.' Obfervavi interdum hanc, Kremer
 tirpem.cailcm inbinosra[nosdividcre,quorumfingDli mulrisfloribusonuflicurint.
 AD Hyacnuhigenraluncplantamlinecontrovciareftridcbcre. nemo est in /Sprm*
 iitcftudio tnediocnter verfatus^ qui nonagnofcac. Ejus veto primam notitum amplifliaio
 iro Iacobo Antonio Cortu/baccepcam referim05,qui illam Ul- Ioan, de Bracion (urnmo
 eoamico, feramquam fraci cliarifllmo, ancc mulcosannosin Belgicam u^uc mittcbat
 faddinomlnc. C. V. Matliiolus ejus iconem addiiv dL-fcrptionc. Conflmtinopolivcrd
 (undepnmumco perlata fucntadhuc ignoramus) fempct mi(Ta fuic vel -^Mufuri, vel
 ^fchortt/tiautcJJ/#A«r/w;appdlatione,ob infignem oduris fuaviratenij qui ad eorum pa-
 illorum fragrantiam,quoJcxbenjuinalif^uc odoracisparaic (blent, quodaoioiodoacce»
 icrc vi Jetur: candem ob caulam nonnulli ciam Mufthi* grectvocwt.


HYACINTHVS COMOSVS BY2ANTINVS.

CAP. XXV II.

QVATE n. NA, quina.autfcnaintsr dumhabitfolia.IHimi utplurimum fufaficexpan- jyt tm,
exlentini
kilia.
 (ajnonnuiniutmprod tmbcncripdureaxagi ObjonyjHyacinthi pimi Matthioli folij
 valdefimiha, lanorc tamcn mucroncprardica, fcinlatenbus vclutitcnu i hngincobdra,
 P*ft:rtiminfiiniaparc,L"ircacoruncxorciin,inKracigufus&nau(cam facile excitaturi: ex
 J)°rum incdio.pcdalii.nonnumquam major,nafciturcaulis, ceres&rotundus,nudus, incus
 i, fons viridis livifque, quern a media ad fumum fexigenti plemque aut plures
 H b o l i o' f u l i i' i' r' M a i n i o l d i v i f f ^ f p l i i' i' u i c s n t u s
 nodorijinitLO candicantes.dcinde ciim marcefcere incipiunc, fufci Sc in elegantij colo-
 *is: pedicuh qmbasfloresnituncur, initio brevilTimi funt, dcindcpaulaim marcefcntibus
 *o nbuexcrefcntes,quatCioruncurumaut; ampliorcm longirudinemadquirunt,(icutto-
 ^caulisuisfloribusicacxpanfionuftus, afpergillum non minusrefcre videatur, qi^m
 y'Ppartsquoddamgenuj: caulis fupreniapars cum Hornmpediculis purpurafcit: inripir
 "oicicabimis: [ngonadcindecapitulafert.cxigua, proplancz amplidinc.inquibtispau-
 ^mfeminjnrcrdumin fingulis capiculisunicunidiintaxat.rotundum.nigrum.Hyafmthi
 piifi majoris icnnnc minuscontinceir, interdumnuHum, nam ut plurimumcapitula
 f'ntia l l i n t i c c a r b i c h o r u c t u a i n p l u r a c o l l a p i f r t e x u n i c i q u a m h a b e b a u i p l a m a r e r
 bus, aut (quantjoplurimaj quimisautfc'isjr adixrorunda, bulbafa, multis candicanti-
 oUs tuois ton[Uc,exwrioic fubfuka.fic bait mukis fibw albis fulci

Hyacinthus comofus Byiant

Hyacinthus comofus alboblores,



Historia.

Tempus.

Nomina.

Circiter annum M.D.LXXviii. primii in flammis Armeniæ confecti in rolicum alij varij generis bulbis, Mag^o V. Paulo Trauon Cxfarca: aula: Manfcalco Sc a Iccrciore Confitto Tin ctijus (uburbano paucos bulbos videbam Maij incio florentes anno M. o. xxc. Ex eodem tempore nullos misos memini prater tmui aulcerum, duntaxat fcmtl acque iterum: quia rbricaco nan expert rur, ciim nulls floris deganna lit prjrditus.

Q v o nominca Turcis mGgniacur. mc Utec: nara Mulcari bulbts fem per permixtus foil: ego, woprcr cumi & fluruin ^uandam cum comofe majorc Hyacimho iimihtudincm, '» moium Byzaiitum togtiominavi.

*9"£**" CETERVM Iluiconadmodum diffimilem & in Belgic. i. & Vienn^alutms ntilB au P*W"- perpufillaco> aprxditutn, cujus aorc sobfblction colons jlbicantis, Byzantini flunbusf- tis acceduac, pediculi tamen rlorcs (uflinccs in longitudmcm non exccrcfcur, lemen* radix fansconveniunt. Vulgarcejus non ficn. Hyacinthus comuf" uiaibi rtore.

Nfu. amf. Hyacinthiporro tliuspnmi Matdiolt, five comoii rruprisaqoibafdatn cognomina^{ci}» quin multis orbis Cliriftianiprovincijs pnter tur, duoui Pannomis g8ncrao^{w*tf*} bun. Alterum prxcox, htiorc folio, craffiorc coma, incleganti «mcn, nujoirquc^{lba} Alccrum magis lerotinura anguftioic folio. Knuior conia Jxior verb & fleg. inriort; hujus Hores coma Tpraximi, exxrulcopurpura (...unt, cju (dcii Hiuv cum fomaiun] colons, quannu m pnored didcratur: bulbustiam minor. Pncoi. Mato: hoc lunio floret.

SEMIME aurcmcxH-fpauis anno M.D.Lxxv Hyacincfatorie ouiishifpanicinomine mif- fo[cu]us meadaoefle genera (hrimdeprdiendi^ttmmagnkudodiiparcnc) Vientix Au- ftriab Lilbacci-pIantermliinatar (unt, (Jin. -tamtLⁱ in duo Hyacinthi comofimajo^{ene} a pe- pererunt a vulganibus nec florum coma, nec folijs differentia, nisi quod alterius folia latiora & rigere solebat, alterius angustiora lon- gioraque. cnamanclicicmen Kniiimri Qsfcmcn Hyacir Knimeranius MuL-ariremiiiiperquamlimikviuxadcocaulariit. ut li-pjratin. I r. rx-ni Hind autem pcculurc ID iiounulhs, ut pizmuuii bucxsexuiffi .nigram five fulioiioI^{urn} poll mem (parent uftilagini fere limile-m.

Nomina.

Pulm fi'i

Vvifttu[»] >... / <TM... \ ... t-... . « ^ p... nam cepan. tiAuX Brabanti, d... hinc est, Aspergillum, ppter comam ifpergi lit inftarexpanfam • Hispani... de... h. e allium ciconiarum. Non defunt qui PencaTpumbulbuin Pin... Nat HitUxv. cap. x. cmccicnibroalri-ram. alM gro papaven similem: sed ex tam mutila descriptione, quis leuicnam comoda fere...

ELLVD surem veri- twere pi>(Tum, nullumtmquam bulbumguftaffe (n.im quotquoc
flupes inve nio ;r:lu pjtuni cogni.t>,vcl ance non con(pcfas,gu(tarc folco.u:dc tUarbm &
;occcoi ntnajfdjudctiicnfcitTepoflJcn) qiugrajorefn vomciidiappcrenoatn mitnfeccrit
iftuHyactntSiomaj^recco^otb: cadccaulii, illorumlcntntntiamprobarencqucoj quaa
-Eicalcmordnibdlboriini claffe pununt.

Hyacinthus
botryodes

HvACiNTHVS BOTRYIDES.


CA?. XXIX.

SPOWTE plcriftiuc Pann^nis locis & copiosenafcitur HyacinthusilleHirpanijs&Gal-
IteNarboncnG vulgans &c pMTuu obvius in aj>ron.im marginibus &c (ecundiim vias,
quemcgoJt tionbuiracemi in nio'ium extremo caylccfgcftis/SoTpf/ihfi co^nominoj nopl
nulliconioiumminoremappellarctiialur.c: ncedcfiitir'qui Bulbtmem Plini] cite putem
Genn.mi J:n;^i fuMduWid eit,caninuni ailiuiri, Bdgi a racemi inftarcongcyUfloruinrpici
£#>f me appellant.

Hyacinthus

Hyacinttus botryodes i.

Hyacinthusbotryodespurp. m.



Et v: duo inveniuntur genera: u
racemoloi
Illorum duorum generum k JS«Urionbu*,finaioribuf4uetoli)i,ou*huoiid.f. i..
EST ww^tcitmmgcnusbrcvonbus,^Du^^^: usflorCii),ctfupenon. >>>

ttt*fermSfi^«Jong4Bmcnar^h^»«^ utvicinisloctsfponcnoaiufcKur,
l.uinctiidentScolorepMditifunt. Ids; nus V icnax, r-
H«TyroIcnficomic«ad^tirmc^^^rf^gM^Iw^dfc^KH yA-
Similes porro omnino plantis non ino-
Ointhe bo yodus lacteo atque e niveo purpurafcente flore (hic enim us inveniuntur diffe-
rentis) nate sunt: & inter illas etiam quæ tamofam tulerunt florum vTMn,, hoc est. q w uv*
in modum plates congellos habuerunt racemulos, alios alij minores 8 grac U i i bus
similes plantas femine albi à me communicari natus habuit plates quam quadragenas III.
Balthazar de Bathyan in Zolonock sub Martij finem florentes anno m. d. xxxv.
V E R V M Hyacinthus botryodes lacteo flore, à superioribus florum forma non differt,
funt enim concavi & tumentes, nullatamen, vel perquam exigua odoris g r a c i i c o n t u c t i - ^ * *
biles: Is etiam in duas species distingui potest.
Vna enim lacteam omnino florem habet, caulem exalbidum, foliaq dilutius virentia, &c
; . si palefcentia: tota etiam planta tenerior, nec nisi primo vero, folia protrudit.
Alicuius

Hyacinthus betryodet albo floic.

vi.



Budo.

Hyacinth. variegata.

Hyacindiui ftellatus Peruanuf,

Hyac. stellatus Peruanus.



Hyac. stellatus Peruanus.

Alten'us fiosniveoquidem colorsprddtus est, fed cuiperfula videaturtenuUquzdum & dilatirtmiapurpura. quahsin rofisaibisncndum plane expanfis, ptaeferana circa unguis, hareveiuftarc & marcelcente flure intendor reddKur:cauliseviridipurpura(cir,foliaviridiora luni,&; in fini parcc cjuodainmodo p u tpuuicnua.

Omniium firmina intfianQults qmbufdam vafculisconctncutur, rotunda, nigra, exigua: omaiuQ} ctiam iafl plurimos cxiguosuU' clcosinambicu generate (ulcc, uulli tamen abundantiiisquam duorum piiorum, Florent utplurimum Afrilijnrerdum ctiam Maio.li vernumtempusob prxceddiuishicmis alcentatcm fenusincipiat.

Latci prior (pecks ohm nobis comimicicataa C. V. Alplionfo Pantio, intnuni&ia Baldo monte cruum a itudiolis q b q Jam ex lulia redudbus Viennamadferr: Altera ab ampliffimo V. Costulo Dupedi albi nomine in Belgicam italla.

HYACINTHUS STELLATO FLORE. Cap. XXX.

MULTA sunt H¹ycinthis stellato flore genera, <jut>rtH n latoram hoc capite de fenbendam luxi:; utrujus calcau nonnulla ctiam deHyaCuul:is vulgari stellato flore dicCBUS.


PRIMTM atltetum locum merito sibi vindicabit elegans & rariffimus ite, quem, ex Peruano urbedelatum, in fuo hort'flalebac Everardus Mumclioven (trui lixe fluida cordi' ficiorentem fuiscoloribLicxprimiciia* bat:cju5 deludecxemp]3iexarchvty[>oEverardi imitstfljMonsAñainidcil, aa mcmic tbatNobilis virCiroIus deTa'fis, RegiuS Antuerpw Curlnrum Pr*frflus, menft Augulloa.mi xen. (up;a miile&num&quiO' gentcfimum,

LATA, crassa, mulra^ue (utcxicorcani madvrrere ltcuit j lubu't folia, Hyjcyntht orientalii, iteu potius Enophori bulbi folijsfmilita, humi, magna ex parte, sparsa, & viridia, inter q ux p rod; t nodus caulis viscens, sum: nof<ftugio milieu rl'inbus, (p.ex hi modum lim>Icongectis, onuftus, qmabimofcfcpf' niumcxplicarcincipiutir.irlbrScjllar, Ottiithogalt & fimilium: pediculi oblongi, ex arro viref<ntes, ex gracitium & txi£ uorum fbtIP" rumalnorti flures ftjfbnent, lex foiijsfcll* inftarexpanfisconftaiuei.rurpureiforiscoloris,intnsexpurpuiai:jcfulci,umboncf quemj dmodunnn vulgari, floriiiimbilicum c^{uta} (exflairnribuMliiifn ambicntibus, occupaⁿⁿ te. Fuit ite odore aliquo reditus is os, anc

in frmenabicricnndum incrllexi: radix b b r a f i u e l n t a H a d i h i i i t a t a l i s f u f c i c o l o r c p r a d i r a t o n s , B e T r o l n s * - r n * f i u f c u l i s f i b r i s a b i m a k d e p i o d c u n t i b u s f i r * m a t a .

ALTH. etumcle_KainJa«aiibicuinfuofiorc_idun)hzcfcritbtbain, conspectus: cu: * iculm

Hyacinth-ftdljtus Uly foUum flora. %adnrUWJ«usLiiij foUum fcm.



leoneem cum sequente descriptione Viennam ad me mittebat Tomaco, Ioannes Moutonus, tneaPannouiamim ilirpmm biftori.i jam cvulgata,

' ATrvLiT, inqnt. qui Pfeuda mrciflos juncifbfios communicat[atjcxij(3cm jugiserutum bulbumjL^ctofitisfimilem, ledoblongtorem, flavcfcentiscoloris, luMamgoinsoaoronda<n fi.T LHij lilveftris&mont.-mipurpurciradix: fenaautertivelptirafert folia, Liliij "albi (antequm in cauicmabar^ foUjsQmiha, cquorummc dioeauliscj>litpcdcbrcvior, multosrlorcsinfummo (uflincns, Hyacinthiftella^vulgouuncitari fl^ibus, on*inopares, sex fol j conftantes intense caruleis, five violaceis, emitt

fi umbo^cujaseausiHyaciadsQoa (Iellacum Ajp ... appellavi: ubi i fucflA v^man-
• p U p i l l l n M e t b t n a m l k ... m. v. x. c. r. i. e. u. s. b. u. l. b. u. s. e. x. a. l. i. s. f. t.
pallefcntibus squamis mbricatim difpofiris confbn ... Sed in toto corpore ubi
haefit, atque omni inoflaccidus adrneprvcnif Tctjten? communis alioque ... In mscor-
tupir. Alterum dicitur bulbium jboaccipicbam, &a)iq ... faco-
boPlartMii: fedoiniu' smiliicortupti. Hjusporry iconcma ... ira acceptis m, in
appiidtccad fuam Scirpium hillorum, exhibet Lobclius noftci ... M. D. JCV. CJS
bulbum a NV. Io. mne Boflbexccipwbaai, qaiinleqtteaceanao ... tcsdedit.


TEHTio ^uaccma aut quiiu func folia humi fula, longi, carinata, dilu ... vircenti. i. Hvacin-
thinis a c n l N?, in requ. i m n t J r e n J C o p e, H j a » i u n u j < : c r c d e r e ^ h c
emerfiti^esliiterclongirudmis, fracih8£intirmiuc:ujjiculi:s, pnurcamiotctnosfalli-
pensfioreMterro Qijaccrnosnucquij]os, iexfolijscoiin.inCi.s, di!uticrulcicoioris, int)doros,
qiiiS!!inu(tMtiiinhrHHaciathiftel]ativiilTnhsf:l*explicariinc&:cxaibi
ca fex (liniuiula olt'-tidcrum. quarum apices purpurci, ihlo in medio eonim aflurgece: Cue.
cell~ igub cap'n'iU, quadia in vujari, (cd fnao(3, ut femcn obrvarencqujve-
dix bulbola est, non magna, nigro corice recta & fibris subius praedita.

hJaiiQ bulbutn Hyzinno acccpnim cum aisjsftirpibus Fraticofurtum ad me mrccebaran-
no Mbx. Gcnerofa Domina VDgiudininomineadicri&toj»/W»«ilf,qt!iar
tio Lilitim Sufianum infignr tom, dcinde, Iris ilia bulbofa pr.rcox. quam
Hermola2vlo Coftantinopolitano exhibuit, Dodonaeus pro inde tuberosa. Flores mliu
|> fot: ulic Aprilil: iim. ili] 5 Hyxintlik

Q V A R I v u M i t t e t b u i W - i a W a l a c h n J Z c f a f i d f x i r t f i i ^, a l c b a t j o i c f t i / 7 [n u J a c j, - | r e r I V
Cidmus vir Wilhelmus lafpa Tduyn, cjurcoi urbis Plnrnacop^us. & proll- an no M. D. XCIII.
• cointmmcab.u ; iconeo mi coin ejus parvo bulbo fqui pnijt] mioch«
Tholbin Roe) Qus ilJiuiurbiJ Medicus. Doctus. vii

Q:

Is autem



Hyacinth. fe. Uatus albo no re



Hyac. fe. Uatus cineracci colorific.

duis Imperator. Qui albo est flore, sponte n...
autumnos qui bulbos Franco...
Stephani Strangem Pharmacop...
cineracci sub:bulbove flore predictum, Lugduno Batavoei in flum a N. V. Ioanne ab Ho-
gelo

Is autem mulca habet folia humijea, in-
ftra foiorum Hyacinthi Aigltci \c\ Bdgiciferce
inter q uo prodi c ad huculus pal raari s, v iceno J. m-
ccnos ,aucplmesmrerduoj flores, fncarvel avx
ini Urcongestos. fcrens/cx folijs conliantes, mc-
djum occupante umbone five capitclio, & feK
itamimbus, non fecus ac in Hyacmtho, am ftU
laci cognomen vulgo obtmuit l'ced longedl
rtscoloris & du Ci Cxc^rulcocineraccr Honbus
IncraduntjapiEula tngona **fcmcn** comincmia:
radix bulbolacd. candida, inftradicis Hyacin-
thi **Belgici**.

Flon-c cum vulgari, hocert, Tub excremun*
Martium. vclctiam Aprili,

CETERVM in proximis Viennae filvis^t qucin
Pannon.a (upra Nemethwywar, qua iter ad
jrczium cft^nncipuai itirix Rt-giam ,ad vil-
Vdy « vulgifti Hd bi

decussatis ... "f*iuu>, ot in lull* lurin*"
•^" T'o^iomciapiidrc cilierbari*
lludiolos invenit, is viddict qui tarrulco cil flo-
re: in quo vjnccatem ctiam ob!avaba. ahjs flori-
bmma: i Tis {atuii' &: adviol. tccum quafirerdti-
iibus, **alijsadcameuid coloren proxime acce-**
ha, vel, ut platumum, buna, ut et d' illi bulbi **quos**
Neapoli Fran: ofortu ad me mittebat : **duiaa-**

ifcenrem ... dcremii. ... i-no*
docillimi & ornatiissimi vni Philippi
Berger: alium deinde exalbido & veluti
N. V. Ioanne ab Ho-

Superioribus autem generibus maturis florere, & in triangulis vasculis fecundari, non ut cetera genera, sed fuscum & tamquam fuligine infectum; cum non valde diffimile criamcftiilius fetnen. quia l'bos profen flores.

Viennenfes porro Macroneum quod r'ulcum habet florere, ^5f<w&<Jlt'rtmi appellant, quae w, ficjriilectnii!iumco!ivalliim:nam cenanthen, vulgo Lilium convalhum dictam, ipse o< narily, 35a[Oniin nuncupant; Belgavftellato flore j«5tmtf m vocant.

SE D & Hyacinthum (l'cllatum vulgaria!ioqtiiformafimi!cnirepcrir; audio, quorum HjM.(Mt. alter flores profert fuavit' rubentes Siqaaficameos, alter fhvos: Illos autem vidercuon- ff''''''''>^t dum mihicantigit.

H Y A C I N T H V S A V T V M N A I S .

C A P . XXXI .

HYACINTHI autumnalis duo observabam genera, non forrhaqu^cmdif Terentiaj fedatnplitudinc: disticti unis ergy caufa, in oiajorem & l' minorem **dividemus,**

Hyacinth, autumnalis major.

Hyacinth, autumnalis minor.



M A J O R quina aut fena habet latiuscula & flexuosa folia, vitidia aliquantulum carina. tacokhicimontanihifpan]ci,p.inlopfld=fcribendi,infbr,interquxproditunujnonnun quam bini, terni, aut pl'ircscauliculp-ilmomajores, rariitinoi .multisiofLuhSjrexfoJijs ftclUinfUrexpansiis constantibus 5c dilute purpuralcentibusftipati, in qusbusquxdaoa (b-niiniilanigriscaatibusapicibiiipridita: marcelcentibusrioiculisillicoluccedum tenuiaadmodum&tri^onacapitula, qujtbrevi mamiefceoMfiChianria, pulillum rjigrumfemen oftendunt,qui)d terra; gremio (brim excepruraluigencnsplaculasgencrar.quxmihinterdum tertioanno flores dederunt^idixcriTijjfculi.candicanSjinfimaredemultisfibris donata. Hoc genus raihi interdum caillicu[osdedicramolds,quormu fingult ramuh fuiirlo- culis onulti.

M I N O R I plura&cxiliorafuntrnlajiumirparfa.interquxexitunusautaltercauli. culus doHranults,nudus,gracilis, circa cu[U5 fiim mum njfeuntufrijdiatirtoltulipnorc minoreSj&foliolismiius mucronatis con (lames ,Cjufdem cum puore coiohs: fetneD in thsp> nis vasculis Gmile, rid ix candicms, minor,

Primum in lioituloduntaxatalui, ffontenatum non vidi, maturiusmitiorcfiorentem, incedum vel [ub [ulij hiiem, vel Augufti initio. Alterum atue quadragintaannos in vicinis MompeliocolliculisnaK'iucmfibmitLtniSL-ptcnibnscmbarnidcinc MadntianiI'atifi- orumfilva,earipteqii.i-idBoioiioiii:[i(enri)obiiinvergit_ arcnofo(bloS;Ialcbro!

AVTVMNALEM ILUHCH/aciutiuiiappelljibimLis,quianoanifuutumnoflore-


U i bat.

bat.QjLiidam Bulbinem PlmijciccxifhmbanrfedBulbinsnpudtpfurn lib. xx.Nar.fiift. tap. ix! dcfcriptiophinercfragaturjCuiporracca folia Arrubicmiduru bulbum cribtm. Alij ThcophrafrT/^njje(Tcaritima)j,qLiiod lib vn.hjft.cap.xn.inter eas qua:ante foliotum & caulu exortum florc incipiunc, rcpooit. Vemm quidem cit, hanc plantam florere mcipercance qujm foliacmrgant: led alio loco Tiphyi mtei aiftivos florc metniaic: ique noca huicnon convemr.

OmUTHOCAIVU ARABICVM.

CAP. XXXII.

O "Tt... arabicif.



OBLOVGA habec folia, viridia, carinata^yacmtlnonentalisfolijsadedtimilij, ucabiji vixdilconiat qmlpum, mii in hoc itudio benc-exercitacus,prv(ercini inplancaiuo caLile&rlunbusviduata.minimeauteraNarcifli foliorum am ula: inter qirfcubitalis cm crg itcaijxy n uou g a cles viricentj quam aliquounfummonaicnteslofufoordincambiuncramuli fiveiongipediccliifloresinagnos fuitincacs, Natciflinis magnitudinc pares, fed Ornkhogali forma pr^ditosjiliorumque modo fub vefperam fe claudentes,fcx folijs proriusalbis conflantes, medtcatiadoiis&: piKman/um coriandrumfercreferentis, cnangularicapimlo nigro.lplcndente, medium florc occupante, tjuodambiunt (exalbahmim flavoapice coronata: femina numquam adhucobfervarc mihiiicuit, licet fingulis annis Byzuuiocon; alijsftirpibuscjusbulbi Vicnamjiuflifucrin", quorum nonnulli florc dedertnt: capitulaumen incrementum capienciafcncfcnteflorc, &cx nigro viridem colorem contrahentia, ut lemen dacura viderentur, paulatiin conrabe fcre coeprut: radjx buibofa, Hyacinthi iraula, candcans plcrumque, c mukis tumcis conflata, lataadmodumfede, &inambitufibras fpargente. FlorerMaio.

Belgisprimiincotnunicara hie plantafuit, ni tills ex IcaliacjustadicibusJU. loam dc Brancion, aC. V, AlplionfoPancio, Srampli/Timo

Iac.Anr.Cortufo,dc!ndeeriamConltanrinopoJicumalijsraniftirpibusaccp:a,S<n)clifciic florentem vidi: Vicnniautcmprfxpe,

Ornith. Ar*-
Hinc in Arabi-
sara.

MLraaiicemcfthujusbuihnaturamamplcrumquccxperti fumusvixullaforiapromere, niilingulisanntscxcmpusaliquauto tempore adkrvccurj deinde autumno terra;denu* concredat,turncninidemumgerminareibictetiam ante brumam: nullusautcmflorcrc miliiconfpctuiuselUnifuccensConftantiniopoliallatus. Namcx illorumcrtnumero, qui, niliifticcrurijamconccprumin utero florc hnbent, in frigidiores provincias tranflati, nullu m dent.Prarterca ciim frigoris valdcnnpaticns fir.ncque in Belgica,ncque Vicnna h*- mem m horco fer re potu it; led m fictilibusrcponendus, ubi bulbiscirca^matrem adnatis fc* licfter (c propagare folec.

Narcissa.

Ex Italiapoc6miiTnsfuitLi!J Al<tandrininominc;Con{lant]nopolivet6fempcrZ*J>- fnt^rf&quodHyacinthumarabicumiignifkAr Vicnncnlcsmaitlf<'^(mWhefr, candidum Hvaeinrum appellaiunt, donec Jegitimus aibusHyaamhusillis innorcfc<<< cocpiti,rujiccnim,Turcicuin nonic iaiiiatar^TaMftw^flrtnibcvocarunt. Sedquiaad Orn- niftifgili genera potiisrcfrendusvuJctur.quam ad Hyacinthios.OrnithogaliAtabicinoriK-n indidi,ii,Halii[bir]ituirum/pontcrefcitloco:liettM2thiolusNarcifiis,ciimquibusnLi^ lam ailinicatcm liaber, adnumcret.

ORNITHOGALVM ALIVD.

CAP. XXXIII.

VARIA aliaruntOrnithogsligncrajrjiioninuionnullabalijtraditafjnt.pIcTiqw^ vcro a me pritnuraobfervara: dc omnibus igiturordinedifferemus, initium a major-

Ornithogali
maxi.

OMMivM amemmaximum,porracea!nbctfoltafcnaautpltira,caulcin inccrcacmrgencerncubKalcmautarnplinrcm^echiii^iidui'n^irnnim^naunamriominfpicami tem,qncxp/ca-ifcnijfolijsconfarconfpiciuntutxalbovirc(LXiitibus,Kfonsh(rr ba,cci* otmniio:

Ornithogalum majus.

Ornithogalum majus Byzant.



Ornithogalum Pannon. albo flore.



deinde capita, nigrum rotundum semen con-

omnino: ijsfucccdunt trigon a capita nigrum
n) agnumq; fcmeiico[inciitta:radix(atiscrafra,
bulbofa, muhistiiniciscaiidicaHtibiis coflans.

ALTERV^, non minore alcicudinc afTurgen-
tcm habetcaulem, fupciori fimilem, led viri-
diorcm, qucm a mediofcrc ad fiimum fatti-
gium mulco plures exornant Horcs, pnorL m.i-
jorcs, fonsprxtcoras, qu. if aLL>xfont, omnino
viridcs. incciusvcioiium cpxlicati funtj b t la
omnocauidoris: fenicntriaguliscapitibus
altcriliinilc. lcdpauJlomajus&oblongms: ra-
dix candidioi, &Inngiorintcr(lumitiamp)am
magnitudmccxtubcracrfoiailli longtora, nu-
gisvirklu, &cxcrcmoinucroneacuminato.

HnicfercifiinilcTcrtium, /cd paullohumi-
liuSjciilurtorc ctiamcaulc& foliji, quod cocpit
Bvianuo dcicrti alijs bulbis pctnuxtuin, nullo
addico nomine.

QUARTO quincjucaut fcx, anrt hicmem,
ArabijfcH prxtcr rliquuru confuctudincm,
gcrminant f: il, lmi expan/... fgu a d gra-
lislongitudinis, cx vi

lcoriimfimum alnliuni folijs
vftldcrc(pondctia. aliquantnii]mhirluta, hcr-
bicciguft«s&:tifipidi: (ublequeBte Apuli/o-
liis Hiccc/ccrc incipiciuibus, inter illa cxilit
dodranti]iscauliculus fertos aut plmcs (bica-
iitiicohrrcntcsfulincns flores, quicfcoisfo-

li**libopattMaibmeD&in t e**-
riore partnon mintislaftcicandorisqirani in
fcundogencrc/orisncrvovirkii illoi 11;11 dor-
|iocctipanrc, utinlfCLido&vi]]g. irutian» illa
mentu: t a d i x a i b c t t b u l b (t d l a
lento

Ornithogalum majus II.

Ornithogalum majus Byzant.

Ornithogalum Pannon. albo flore.

Inroliumoreplena,giifl-osprimuminfipidt, dandacris, fori^cmcsarcaremiioes->bfapl obducta,&:/cmIipar[cirultiscandicantibustlbriscapiUau,i.iilLLdfictiili.iic^p habethic | ... cajUtnaialiloco,ubifpontenafciitir,magnacxpaiEc,(.uirir3oiibu..oDuibi.lf.itm folijj ... {piciacur.at.icfalrcmjart)fereevanidis&:3accidLS. Ac in liuniscu1r.aHiuiuis>lc!litu,Mii: loiii retmrelolce^inaiajorcmainplitudincinexercijit, fpicam vicciuniiiui jluinjrr, tit-rum nonnu.iiquam profciens.

Ornith. vult
prr


QyiNrvvt est vulg.ircilluJ, omnibus ccrcequas peragravcritn rtgionibus (bvium in agris,OriithogalumUC.V.DodonxoBi]lilicufaiulicminoniincdckii]Jiiiiiii.

Ornith. aliad

Aliud luyussTenusalcbat Viennr inaikiflimofuohortOjGencTofa ©.dcHeufmftainla-
rioribusfolijs,crafliorecaulc,ampjioribusflonbLis,paitltomajt)rC"bii!tofx"l yolcli Con.i-
tatualiatum: alioquicum Quinrogenereconveniensi: qualeciatD Ntajxjli ad me mite-
batdo^ciflimusvir Ferdinand us Imperacus.

OrnithogalurpHifpanic. minus.

Ornithogal.palSiJoflcie,



Ornith. III
Sax. minui.

E x parvo orbiculanalbicantebulbofena autceptena novo vcreprofirtScxr um Toff J' (^Qtthogalo'vuJgariferc^ilia^&dpaulojuigatHor^nulkvcnacindicaMt per longitude ocinfcib^ quotum «cdioproductingidariscaultcolus.interdudn &alcer,paJmans,tcTes,iu-
finrcru fcnos.fcptcoos.awplnresfloiculcBjalEcrauinjqn^nmfscotcs, fed quali umbel-
lam quJdatnefFarmantes, idcoa:qLiali Jbnt alcifuJinc ,non fecusatque in vu:^ni L\ ji.ihico.
renis fo5iolistxaibo(ubL'iro!eiscoiiftames,ioti<lcinqi]ccandirfisft.m fi nlis\^n.ttiio
capitufubcxruleo umbilicum occu^anitbus:nuHa aJhuccapituUvL-] fcmcnobllrvBIO
potiii,tora coma brevi a floribu* marcclceinc. Floret hphn.

Ornithog.
Palmarum.

S t p T i M v M non vaHc abiiin ik est Btrlbo Olivefi i Fuchfij & Tragi s majorc tatren fo-
lio conil.it, cuik-que crailiore, liccr mfirno: bmicuc aut term quos (uftinci flores majorts,
minus flavi ,{cd ex herbacco quoUammodo palhdi. '

Zaluz L.
Vmkfy

O C I A W M locnm dabimus BulboilvcitnFuclifij.cujusc dmabalijficproditalnfl*->-
tii,cam hie rtpctrcnontft nteffc.

Ornithog.
Fit. Ahmu-
rum.

Auvoprxcrc<ftOfnitIiop4lum,nihinonconrpcaum,redM.V.Ioin. ab Hoghelan
(icdc<men) (num) } niSiiui)UXaxidp^ccl] mefi' qtrj^aqiift.s. longis,Hyacim)irH<fi^
disvu!garisdexulcoflorcfolusvaWefimUibus:cauLculoinifrilUproduncuin(i^<ntfloic<'

P<H.IMU
fitt-

flavi,duplom.iiores, llamtnib<5 m niediorubeticibus:cuis bull-ola radix adTOvu'girwiun^'-
aofiiiiLlts^tfimitccancuruanti-fructubhiditotc nonpp
, Vmco Dccimumproditiatfolto. duasauresunciastonEO angufto otill
lam Si actL pjft«qti»cjuo<J tennis uncia]* c .»UKUUI, unu m aiit alicruir ioliolu m 1 ^ *
nnu,tquorumntediohimauttenciix.lititfiofculi flellaii ITKUISflivi fonn viri
raiccccf,fc»radiolii& toddem ftwHnibBtinttu pnedioi ijttuccduat pufill^riangf

picula,

p...ula, f...mine...ffo...eq...&...inp...uall...lenare-
dixalba, rotunda, cineraccopucirmcol...du-
&a, exiguipifimagnir. Lk1inc. Sed & hoc cultu-
raaliquanculum niajusevadi

Prim um fatSfircqunsobfcrvabam irre: ...
gccc agris NemetnwyflMr 111. Bachumvici-
nis. Alcerumeciaminrer(egctes Mompel...ano
agro&ptrHi/panias: Viciinxn.im miluna-
tumfeminCaRaflioLutctianiiflb, Mojyap-
pelktionc.Vtruniquc Maiofloret. Quartum
fargilfime provenic aperto illo& latcpatnre
campofccudiim filvul.inw...ago Lac... unmi-
nentcmj&inficcionbuspTatisrccondmn Dan-
ubiumjinmonicBadeiifibusthermisiinmi.
nen:c,tocag; ilia mormum fric,imic ufque ad
Calcnbergcxcurrn[c,&Hjmbiirgen(circ)ii-
teapertis&gramincislocis. Qiiintum j.im di-
xi nufquam non cffc mihiocpctlum. St-xcum
mihicommunicabac GencrolusDn.de Lon-
gatrCjHyadnthi ftellaris /trotini alboHorc in-
Jcriptionc.&cx Hifpanii tniflim diccbat Se-
pnmumobferval am in Sdnscaru & Auftra-
carumalpiumpirati.ubi livA- dfinere fblcnr.
Oftavum non modo utHqacadagruru &c ill-
varumcardoarum margines in Germania br-
quens, Ccdctiani apud Vngaros circalcpesflC
agrorum marginesnam vidi. Nonuni circa
Alcmariam Hollandueurberepctum efl.Dc-
clum eode quo Qiartu nafcitur loco apud
filvulatn illani pago Laclni Vietnam : (cj apri-
comagisdclctan vtdctur, abLindantiisL-nim
crefcii in apcrn illius agn margine Meridici
oppoico. Ob!crvab.i enam in Gccioribus agris
inter Ncmthwywar&Zolonoclioppida IX-
Siiis memofjea. Hoc cum quarto genere in
Belgicatr a nie miflum Brancioni & alijs ami-
cis alcero pnft quatr Vicnnam appuliflem
(nam R.ui buna ftcundo Danubio navi ve-
flusfurojanno.

PIUMVM ponoappellit Dudorus Apho-
del um bulbofum Galeni.cdm aihil Alphode-
JJ prarter floru formani habcat- Oit.ivim Vn-
cans Tik urj, quidaio irtfjhuaei Perdicium
Theophrastieflt.-cefent, quiaforfitailib.H)ft,
l.cap mi. (cnbitpluresilli radicesefliquira
i:adljdtamcnraflasbabre radices, qua
Cue nota Huic non convenic.

VICTORIALIS LONGA.
CAP. XXXI III.

NVNc .id bulbaceos illas ftirpesprogre dia-
mur,qiixlt llatisquidem utparcedentes
fuotflonbus,vcnimminoribus,SaDuniin]ca-
pur,atplurimum cong...ftiid...que,graviore
refer id*.

I-iv-, autcmqmm hncapitcdcfcribcmus.fi^TM/i,
C«iUs,dig«aliscftcraflitudinis,fui...
mipaHcpurpurai...
tus,iDulK>sin(uinniofcii nsfli [culoSjol



Victorialis longa.

mi. -^f^iu^A—nM<. femi candidisfeliolisellaBSConflatnes, cepanim fl<...
f... (t.intjprxditosjdcindcirigonacapirubJnqu bas(emenro...
obio. I^... ^cn^onsfolijspcnciim,l.a:radixoblu.ig.11cx,rcnu...
multaque

multisque validis & perertnibus fibrison « ita, mtilriplici cortice varijs fibril zyt fingoe-
UDtibus confatante, fco uo d am i i i odor c c i c u l a ^ o , i n v o i u t a , q u a r f i n g u l i s a n n i s f d i d j s
bulbis circa ipfam adnatis fe propagar. fibris adco implicaris, at difficile fit, bulbos con-
f h a t u s 3 c h x a f i t e s , c j u n g e r e .

XttMltt & Copiosna feirurin Durrcntlein, duobus supra Gamingam milliaribus, & mocanis paflo-
ribus ^ n ! ^ ; c N i c i t u r , q i ! i b u s n i a g n o e f t i n u f u a d v e r f u s c o r r u p c i a e r i s & n e b u l a r u m e x h a l a -
tione. Ii venitur & in ciontibus qui Bohemian] a Silefiadifh. Tiniane, ubi a Germanis
esfcjniury appellatur, quia qui errbdiendis mcrallis operam dant, magnas ccrasque illi us vi-
res (c expenri pr^dican[ad (cfc mupiendurri ad verfus impurorū (pintuum inultus. iquibus
frequentilBnic impccuntur: iiii. lctiam Viftori3lis nomcnabiTi: 3uintiicim contendunt.
Manhiolus Alliuinaii guinum vocavit. Iofii Simlcrus Allium alpinum nuncupat, Stijn^nrcl
& : S i b (i t f ; (i m f o ; n / . i b i n v o I u i ; j q m C J u a m r) m o l t i t u d i n e .
Vulgus Herbariorum Vidoriaais longxaucmajoriscognomndcdit, ut a Gladiolo difcer-
nait, cujus ridicm, ob corticis quo iiii [cgitur, cuii fuperiorci iiii htudinc [n, Vicloris lcm.
roundim Si parvam appellant.

HUM
Ltitrmm-
na Gm. Ec
Cvranca.

C v M Vidoralis porralongx folijstnagnam fimilicut Jincmhabet All!) urfinifolia. licet
nio llia & rencia. Frcq Liennffim maucmideit omnibui Pannoiil & Auftrivili'is,
conjuncti mperura quena lccnscura Lilioconvallium Jive Oenanthe, Auftriaca, utanrc
dixi. wdiT^fciffcfiw^Nngaris ZeMtgfZrgrversgajEiacdl, S. Gorgij lbs, dicla, & c Gjtcv/Kg] Wf-
rjc a nonnullis, quod significat u nio nis floret n.

Xyftmm
mual.

'X v F H t v M autciri live Gladiolus mi nor, cujus ctiam meminimus, multis Pannoni*
& Aulttisc pwis, ac noanumcjuai ad fil< arundeclivilocoflearum iiii argines frqucnscitj
illi (Imilquodin H [spanij? & Narboneo G Gallia inter fegctes nafeicunubio eleganciflo-
re. Scd & vicinis Pragi, Boliemiz Metropolis, locis crefcit.


SCORODOFRASVM.

CAP. xxxv.

S CORODO p HA si duogencracvidentibus notis inter fe difcreta, ciim Vicnxxvive*
rcnijobiervibani.

Scorodoprafm i.

Scorodopa-
fmmi.



Scorodopa-
Jun 11.

VR i M v M oblonga & lara profert folia, por-
rarcismajorajcarinata, caulcmfcquicubitalcm,
nonnumquani bicubitalcm, dtgiralis craflcludi-
nis, fiipenouiparre uudum, fercacem in liimmo
caput membranecoinvolucro tecium, ucccpa,
quqdexplicatur, multos fiofcuculos (imulconge-
ftosccpaceisfimileSjfcxatbidtsfbliolisconfaa-
tes often Jit: quibus fueccduatngona capicula,
inqu. busnigrumrcmen, cpsElccnripat: udix
fubctcraffa, parvxcepualis, multis albistu-
nicisconlbns, quasfcffili parte plurimiscandidis
flbrisprxdifacl^ & vcttiibtccinaliosmajoresbii!
bos fefedividic, atqucaSios niinorefad larcnad-
junflos habcc, gravis, mcdijq, interalliura & por*
rumodoris. Iunio & Julio floret.


B ic VB iT ALB M liabet Alterum c. mlem,
inulrt; at infima parte ad medium ulque porra-
ceis folijs, priore angofrioribus, circumJaium,
medio inter porum & alium odorerrcliquam
parccm nudam. viridcm, ia: vcm . fuTflmofaftigio
fufitiiientem capticc multis butbis, ut n\ Moly lo-
dicoongc/rum. & candicantcm membranecoin-
volucro curpide longa, viridi, pradito tcaom,
quod deinde bulbis excrefcncibiustumpicurjnu-
doKiucbulbos iiii tiopurpuratccntes. potlca xal-
biiiosdctc^it. inccrqLiosrlolL-uliquid. imnafcu-

Mc cum (uo capirc enn volve folet, ut ferpcns
obrorcocollo limilitidmcm quodammo^orefe-
rit., deinde fenfioi pautatimque life explicate in-
cipit, donee randomcaputctigat: radix mulci*

nuclcshmpliciautduplicitenuimcmbranataiscoriflat, 8cnumctolis' exalbidishbitilcf-
fill patcedonan ell.

Imiunii^(uuncaputcontorqi, ct, luliovert\erigit, eodcm Aucmenfebulbos admatu-
ntatcm pcrducit, qui [err* crediti, fui gcuens pUntasproccant.

Scorodoprasum n.



Moly Theophrasti.



Scorod.

Primi generis pauci bulbi ornirhogali Arabici bulbis permixti Byzantio deffiuu alkti func paullu post quam Vicnam venUSAo, quorum unum auc alrerum Ill. Juan, de Brandon mLcebam, cum akenusgenerisaliquoc bulbulis. Vuicusquemlerviveraminirum in mpdumlc propagivic, ui fuceffu cempons mulct elargiri pocucnm- turn autcm apuj TurcasclTcinclelLcij^, miliialiquiundore&rebarlll.AugTiusde Bousbcquc.

5 W T qui fccUnduni genusfyiojxopofotip- pellent, qaiacaputcum fuprcmataulispirte frp cntis mftar (e concorquat*

M otr. CAP, XXXVI.

V A n. I A flint Mbly genera, quorum bina kVeecribus dcfncptaliabcnius: Home- ticom, cujusTlicoplir. l'ant. Htftor lib. it. cip.xv.& port cum PJin. NacHiftor. lib.xxv. cap. in i.memincre:& Diofcondcnm. Dc liis iftucapiteageraus^cquectiamtertiumquod. daingcnusaddemus, nupcraioioduiuturo- px(ut amnt)familiarc fadum.

PRIMVM, folijscfr. Scilk tribusaurqua- tuor, longiojibus, invicemampleMiHibus, cu- bitili aut amp!tore caute, tt-aflo, concavo, to- tu!ido, folioruracxperre, tnuhosHoresdeHa- tos, canHiiios, fumniofartiofufiiiicnsloigt pcdicellisinrixrcires, nigtointnangujiscapit- ttilisfeminc.ccpauiti feniinifercfinuli: radix cra(Ti.alba, rotunda, nigrcoticcte<3a, quam negit Theophrastosdjfriculrercffodi, IE H>- mcruirradidir. Iuxracaulcmintffr folia, alms pkrtimqucexiccauliculusplanus&foliacuj, (eu veniis folium , in fiimnio vcluriaHijnu- cleuni gerens,;nitioandicQnteni, dcuide pal- lefcntcm, qui, tffra fxcceptus, gcrnunajj c cjuldcm generis p'antam profert.

Quod verd in Italia natefcnbitcapitcfu- pra memoratOjCujus videlicet radicem trjguita pedesLongam, ac ncfiequidrm lohdanijled tbruptatUjSLaliquotdicbusc-rTofram inter dif- ficulcates (jxcas, Campania libi allacam, m ih pror.(ufcflincognituni, nccqL]cmquamaudi- re. vclfenbercmemini, qui IcvniiJcdicret.

MOLT alterumgenus^hdicumcofinom- natum fquodnonnullis Caeaeft/tbAtbauino. mncdicitut) quiax Indiaprimtim in Hilpa- nias perlatu effe ferunt, & inde ad Italoscranfl* vi(Te('abilli5Cerre Belgataccpcprunt) fuperiq* rifulij&rcliqujformafiinile.mrnquatn (lo- res apudme, ncqucapud m rot' l'ios protu- lit.-fcdcorum loco, cauli<ipk, fese planus, tdc6infinnui, ur, nifialiquofulci atur admi- nicolo. airolli non pofite, (umma faftig io con- gloBietattimcaputfert, multisvclutiatlj (pj* cismcfpii vul^ariswgnituditic cunning mi- tioviridibus, dcindcp4llelcentibus SjUetiam intercrranonrcpoliur, genrinarjfte!luri"taii)(.ii corbmiflje, inraajorcibulbosadolcleunr fo» liaque &: caules (non tamen fingulis annn, quepuimoiumnce ipfa etiaospatesjpfodu-

"oT f h k

Moly Indic.

Moly Indic.

Moly Indicum.

Moly Ditfoiidife



Molyminut,



Moly Ditfoiidife



Moly Indicum

c*nt: radix, utatteriu5,ccpac«a, rotunda, alba. mikiscLiiicisjinL.Cli^uarumcxcernifufca.vc-tuftucfcfc fcpuratis, & in alios bulbos pangens.

Coe^ic hoc ctiam Conffontinopoli Viennani •dferrt, dumiftic vivebam, Zumbut*ribt bulbi* permixtum; Sciudcforfidti, cciaminlcalunii * dofti/Tiinocameo viro Ferditiando Imperaco ir-telliechanijMeapolitanorcigno fponce n^fci-

BIWA antccnagrimitaccoru[iiprncinfi]r folia habccTertmm.mollta,ad terrain mflcxa,ex-teriore pane aliqtianculum lanuginofa, inter q>* caulisxilitdodrantalisjl^vus.rotundus.cavui, funniapjrtcmembranaccuruquodJaminvoli- crum fuftinens.e quo mulci emergunr flofcu^1 candidi, lex foliolis confiiiites: radix bulbofa. avclbn? nuets magnitu<jilic.inru?alba,fu<ulcfla,aliquintulum acris, fubmgratt odoris, foris n^ gricancibus membranis invol uca.

Nafccns hoc Moly ,&initioFebruirijfi<r< profcrens, GalJibus,ca vcccciiurbispartequ*10 marc protenditur, erucham , non procul a laccl- lo locum occupance, in quo Herculis tempi^10 fuiflecrant

PLVRIKIVM ad M « \ D iofcorid is accede r< m In vidctnr, prscfertinifi pro *ανζυμν τυζα παρ λεγανι r i *αζυμν τυζα atm.**

Hvic valde limik eft Moly illud.quod I Moer- icor Flandrorum in cultriTimO fuo liortoalct*31 Ill'-HerosCarnlusiDivoAudomaro^oi^101 ^cDranoutrc.MoerkerkenAf-CaulisCjus pal- ft ipc- vmdis,denos aut plures fuftinens flores, Texnivcii fohulu, non muoonaw, ut ftot>^

floribus, sed orbiculatis & majoribus confiantes / cnisii] medio flaminulis .inter bma porracea
quodammodo sed angustiora
magnitudine, albicantibus fibris praedita. vnde habuisset ignorabat, sed femine peregre ac-
cepto sibi natam eam plantam augurabatur.

AL117M five MOI» MOMTANVM.

Q A r . XXXVII.

V J VLTA ttiamfeVngari*, Auftfe, Stiri*; Woravi^uctnontibosMoly five AUU
J.VI luncKnera.folijs.floibu^velcapiibusinterthdifcrepancta:quorummaximampar-
quorummaximampar-

Allium fen Moly monaaJatifoL i.

A U ; u m fi ve Mely monranum ii,



PR. t MVM, ciulemliabctdiiorumcubitorum altitudinc ejccrfccnrem,qiicm,admcc-«./roi
di iri uk(i?^mbiuntfo Ud,mukdqu^m in Allijfrencribushtiora,lonjr.i,pon3cctsp tox(m2: **<***
fa nno cauli,qm Ix/iiSijuncceusell, infidccopJE t multisbulbise xatropurpurciilimul
cong .Itis, farisque crafTh conflicum, interquos inoblon^is pctiolis nafcttnrur flores dilute
purpurafceates, qaibusfuccedunrtrifjOTavafcula, inquibusfemen: radix bulbofa, crjfla,
exmultisnuclcisconflans, numeroilralbis fibrisprxditaest: Ccd & bu!bi ratundi radiciin-
licrent ir* fere pares qui in c.ipitcfiiiifk;iintur,qii'que,cerTaexcepti,plancasfui generis produ-
cuncTotilbtpi AHijgravijo lor inert, Iunio&Iuliofiores&bulbosftrr.

C VBITA L t alFurgit Alrcrumcaulcjlivtjrotundo^iridijinquotcrnaplenimqueftilla, Mx
fupcrlionsfjlioai>guftiora, &velucigraminca: fimmus cauliscaputdiflniet duabus Luis'***
nKrmbranaccistuaicislongiorcmicronepriditisobvolumjqubusfcfcapcncitibuSjnujl-
ticxigui bulbi (I nulcongcib apparent, inter quos flares, fx purpurafirennbus tolkiliscon-
ftaites,&obtortgispediculisirilirrentcs, dcp;ndcnt:rotmidain, aibain, long]s,can(iicauti.
bu^que (jbriscjpillacam radicem babet

EA DE M eXCidbitTerdaa alcitudinc,to: idcmquetllifunejun<.ifolia, viridia, c.iulis uA
ftpra folia Irtfis.rotuiidus.TiridiSjintercrbinasmembranacciacnarn tunicas/ongicaudainiU
gnatas,caput fulinec L-muhisexigiisbulbis, punicantiseviridicoloris &inln g
he rbaccamcurpidc plccmpleriJiTic[iicddiienubus, conf(;rcim, iucnj(ccntibiisxoi)ri.i]u
quz dependent ia oblongu gracdibiu^j pediculu Korcs fupcrlion floribus fortiw & m asni
tuditieuinilescolo olorisexalbi Ji.quoram mediaft>liol,i.k'ciinJii:ii!nn^itU(iincm,&ucr4(ouc
orat,vena oblo Icrepurpurtrecnsiuficiadi xctUtnrocuntlAclt.cand icans,longis
tibusque fibris prxdita.

AUiumfivcMoIymoman.iii.

Alltm'onfanimiJpecSefi



Alii] montani 11 ii.fpecics w



H ABET & QilJrcum terna junrea folia,C3ii-
IcmcubLtaleni, rotundum, cui infidcc caput
duahus menihunJCCLs rumcis caudatis con-
clufom c
catut Hormn ex logis pedtcuUsdpendentium,
coma.qtti Iexp.illui: folujjisconlbnr.totidem
eciam ftaminul.icuni (lilo Ill mediohtioenr,
quicum luocauje refefit.&in cubiculum illa-
ti, fuaviflimi odoiis (qual.j m prxcocioru Cy-
clatmm Hutibuspercipicut) Ccdfogacisadmo-
dan^cffcdeprehenduruunijsfuccedunrigo-
nacapituU.tiiquibusfen-ennigrum ,planuni,
Ciryopliyllforirni flurutn (cminmoninultuin
abfimilc radixglobo&ed Superior)ficoillis,S
eodem ffndnc.»piHa.u.,EiuckosmKrdutn inla-
renbusdeponens.

Alia in f... V... p... ferè altitudi-
ne excolcens, fimilibusque prope folijs prædita,
cujus coma inter laxas, membranaceas, &
Ionium maaooem lialu-mcsturncas Utc (e<<
expTctflr, Honhus culoniv4dcobfijleti plena:
radix (upcnurifimilis, iiuLltuicnaminlatcri-
busprotic

Tnum iltorum poOrcrao defcriptorom ra-
dix alltuna lui • auietn hcibatcuquen-
d

Alterom &... g... pp...
U mnnnum fricij cjm a StruCU Au(triaci<<que
Aip'biiv I Duuibium fupta Virnnam excat-
ntnt/fporuc.fuleuntur. (.)iurti ver6 prior fpc-
ciescucal... M t f o

Moly mon-

Junnt.
mitil.

27/10/25

Allium feu Moly monranutn v.



Allium five Moly Narcissi finis fol. I.

lira ad fimfram Danubij Ccana, in quo Vngancacormria fieri (blent, & locis Nicla Spurg in Moravia vicinis, omnium autem abundantilimc fupra Baden (csrhennas, crefot,

PAR i alcirudincfliirgicQuincLiir^caule nudo, viridi, paucis folijs) ridibusoblito, cujus fastigioin Gdetcaputoibiculare initio, c mulcis floribus brevi petiolo praeditiscongeffim, qui fex foliola, nunquam fceprorfuscxplicantia, habent, IcxinmedioiUmintbus & ltilo, elegmpurpuricoloris: radix bulbofa, alba, nucleos inccrdum tenui membfan. i teeU^& rproximccaulemlateribusadnatos, tubens, 8<: Ccf fili parte multas albicantes Hbras. Ejus odor, Ailijinf taroaputfent.

Moly monranutn v.

In Vngariacirca Po(bniutuduntaxacobfcvavcram, quum Pannonicarum ftirpium hiftoriam publici jurifaciendam, ad vincomm in collibus Danubio imminentibus (itomm margincs, Maio & Iutii oflonbusonuftii. Po(t quam ver6 Vienna difceff!, & Francofurrum ad Merum pervent, aliquot ftirpcs inter fegeccs agris illi urbi vicinis in veras, in meffu hortulum tranftulipropter Horum elegantiam. anno M.D.XXCIX. Tcttio autem poft anno, binos ejus bulbos Neapoli accipiebam J Ferditiando Imperato, qui flores duncaxarprotulci LHLugduni apud Bacavos, ubi demum qualc gniii Moly montani c(reca^iiovi: paullocameri pizcocius florere tnihi viumcftillo, quod in Vngaria, quod Francofurtio bfcvabam: nara & illud Lugduum adfcbam.

Narcissus

MOLY NARCISSI FOLIIS.

CAP. XXXVII.



ALL 11 odor facie, utbinx hx rubrofit ftirpcs. ad Moly claf Tem. non incptt, mco judicio (nam & ahxaccdunc notac) referri poflinc.

PRIOR, quina aut fenq ex radice promit oblonga folia, plana .fuccul c ca, N arc i ifi Qu i nti fimplici flore, k. c. Narciffialccnus nivco (lore folijs familia. vjridia admodum & fplcndenria, inter quxcubitalis plerumquccxitcaulis, nudus, firmus, viridis, friatus, ferens in ("mmo multos flores/expurpurafccitibus folioli Sjtoidem qucinterius (Uminulis prxditos, fimul congcitos, & veluti globofum capuc coftitucn(CSjqum admodum inccpa, quibus fuccl-duc irigona capitula, qnx, maturitate dehfcentia, rotundum nigrum (emcconcinere deprelicnduncur: radix nodofa eft, antcrius progrediens polygon ati modo, cxtiml parteg!obo!a, candt. da, mulristunicis circumvoluu. Hurimis albis fibris przdita, & adnatts feliciteric propagans.

Moly Narciff. Foliis.

Aliudcius genuicflnova Ucabfiniile, molliotibus & magis cineraceis folijs, dilatio ribus ctiam floribus. Floret urrumque (ub exttctum lunium & Iulio.

Moly Narciff. Foliis alia.

H A D E T & Secunda quina auc Tcra folia, ita, ftirpioris folijs non minus laca, fed breviora, aliquantulum fctorquciua, viridia, flifplcndentia^aulcrapcdalc, fupcrioregtacilioiem,

AlliumfiveMolyNarciilliisfol. II.



Asphodelus i.



Asphodeli.

fed non minus firmum, friatum, quifimmo fastigio t¹ membranacea tunica mulcos floculosproniit, inorbienlare caputiimukogeftos, priorisflonbusfimticsJfstelegancicjrepurpui.i nitctes: capitulis& ft: mine cum Peiorc repondeiiGmilucr & radice, qu:r nodol j est, &: aJnatifinanibitu, lionmfclitiusillii, fc { cpropagai.

Illiuseriam genus tvenicur lon[^]ionbus Sc angulort ub : f, ncluc d col:ovi ur x,caulicolic pulli infirmionibus, floribusve multo diluioiribus. in rel njus fjtis convemunc.

Vtcaque lixe (peciw fcrius ptiorc genere floret, ncmpclulio&: Augurto. la omnium rat! i-ci ub d l pcl u d e l u c (a m d e b n f d e i) quxEam. vcttigiacaulis, ptxcedentibusannis narij imprc/ntiubentes, Polygoiuti radicia infra, non adco tamen hxx.

Nafcfirumncsin LcytenbergfupraManderflorff[ubi [cpidx (unt aqua:c)uaru ufumulli v jlc cud incmcu rant, pr[^](eitim calculoobno»j] Sialijtmuntibusurbi Vienna: VK in is.

SECUNDO genciifimilespUntemihinatse funt Vienna: Aufhii, ferninc Lutctii inilToi doctifTimovtro, rtnimtj; natural moo pentiflimo Nicolao R.iltio, Cftcirurgo Rec[^]io, Bulbi vomitorij nomine, quafoali: vomitucictejus n iix prxmanfa. Eoaiem cn:im nominealuit m ampliTimo.cndeniciiLijlEillinio (no hortnCatfelUs IU>ftriifirausCactonim PrincepsvilhelIBUS Non liclunttanu-n. qui Aluni, qimd Plin. N.uur.Hift.lib.xxix.cap vi. tnarvislpontinafci fcribit.cfTe vdinc: fed ciim ille t'onnam non defenbac.&Allijgernuicllejdutaxaedicat.terti quidpiatn ftatucrc dilficilecft: niiaabco, qui forcepericulum tceeric, anaves, codovorato tanquira lo/ntx, raarm capi pofline.

ASPHODELVS. CAP. XXXIX.

ASHODELVM ciim plcriquidefcriplerint, Aliic (ubijeerc nac-r.tt operatpctum.Quia aucemaliqm. r ejus gene ra ncmudhutiiliincau, uiiii n l' fuparicaram flirpiumoblcrationcfevn l' gaham, i. me obf rratient[^]leAonbpfrumrr.[^]i.jturunipuubaro, (icoruqualem-cunquc hntiam p[^] pontrcmrquam denuo hie r fpro, i, i., Jqticdanipoftcaobfcrv. i. ventu adeai n l' rpen pcninctr.

PitiMVi mulutubeto blōga folia, angufta, rriangnLa, 8c<c!mi canna, turgida & lenta, niucri[^]ata caul. mrotundi mtravens, bicubicak-ni intt r dū in ramulos fupcrne filum queat i medio fere faifam rerpendo exoriant multi Qcellatifi r foliorum flores colora intus albi, for rjfvcrd cicnro purpti' rcente fupgula folia CULLril: m l' optu d ium quā d i f f i g u r a t . u c Otnit! : . r g a l i f l o s v i n c e n t e l i n e a d i l i n d a . S f t J t o t e d e m q u o t f o l i o l a f t a m i n i b u s m e d i u m : O C c u p a n t i b u s f e m : n d u r u (n , l i g n o l u m r u g o l o m , a r r u m , & l i g n a t r i q u e t r a , c a p i t o l o c a r u . i J a r i f e r e , k i n m a e m i t t e n t i o n i b u s c o l l a p r e d i t o . S e x \ m i l i p a r a l e n t e c o m m e n t a m o d i l l o p e r m a t u n t ; n e m d e h i l e n t e , c a d i t : f l o r e t p e r f a t t s a t v a i d k i t T h e o p l u a g u s , & m e i p r a b i m i s .

imis. Radices ab uno capite numeroſa exeunt, oblongæ, exiguis natis ſimiles, ſed inferiore ſede craſſiores atque in fibras deſinentes, ſucci plenz, candicantes, ingrati & ætis guttas.

Iſtus radices videre memini, dum Olyſſipone Hiſpaliſi proficiſceret, aratro erutas, que ducentos aut plures ab eodem capite pendentes, eoſq; craſſos admodum natos haberent quinquaginta aut amplius libras totam plantam pendente putem. Itaque niſi mirum, ſi Plinius octoginta ſimul acervatis ſæpe bulbis referat.

jfrhMi

Aphodelus II.

Aphodelus minor.



ALTER. huicominofimiJis, exccptiscaule,quiunicuseftncqucfurculofas, & flore, *Aphodelus*
 qu omnino albus: illius etiam radix non adco numeroſa.

*Sponveluz nafenoruterquccditioiibus faxofcqucLi}fn.inix, Hiſpanix, GaUixquoque x*i*lti.*
 Aquitaiiica: & Narboncnſis locis. Apud Belgas non niſi (atus provenit, ut nctjuc in Gctma-
 Oia. Floretucerquc illic Martioſi Apuli: m horns Mattfj&cturn Junio,

TIHTIVS, ucfDlij^jtilc&floribusfatisfimidſcfrupenoribuSi itaradicibusomnino,*Aphodelus*
 <Jiffer,qua:nonglaiiJu[o(ir,fcd fibroxcrafnetjucSC nimmrolxexunocapitc nafcuniur:fo- >minor.
 ia Aphodeli, minora, mult6angiittLora, Icnhora, dilutionlijuc (unccoloris, e quorum nic-
 dio (ex aur plures ex eadem radicatTurgiitcaules cubiules ,ramofi,quos fine ordine nafcen-
 tes ftipanrhorcs^upcrionbusfiriuilcs./cJ aiaaorcs, medtum folium purpura&cntc vena per
 longitudincmfccance: flonbusfuccdu»triangulacapitula,inLtit>viridiajcmccxaibida,
 in tju fba? icsnen wgofum,ingu}oftim,2kcto minus.

Toto Valeniinoregno millus ſcrieſt alias AlbhodeliſinaſciturS: Gadtbuſad ipſum pon- *Sautu.*
 temdeſuaſocognominatuin,quoinfulacontinenticonjungitur, &plenſqucGranatenſis
 *^gnilocis:olim etiam campo illo Upido(b lupn Arclatem, Maſlium proficifeens(ecus (c-
 tnit.ſcolligercmcmmini. Seminc, exHiſpantjsamedelato, amicisnacusciltnBelgicaj ſed
 cum ſngorw fit impatiens,periba[hicmc,cam ob cau(am aniiuuii ccnfcbit/Jonec me
 nitoreſqui magtiasiltiusplanuſhiemc virnceſinHiſpanijsvidcram) III. Ioannes de Bran-
 ctO(mnamextjsquxpoſreareminenarar,ri;liliindicamcoſcryarct,quxaliqtiotdcdncdfub-
 fcquentibusamiisflorensmacurum (emenprarbit.quod etiam terrxcreditum provenit.

Giutcis «V^o»T(A»c, L.innisHsftularegia. PljnuscauleracHniflohbusAlbucumnonii
 »u,qucinGra:cis»5(p'^vocarilcribit. Idem A(pliodclum aJiqtiibtisHcroion appellari *Hercia.*
 badit,& Dionyſio marcm Scfeminam cTcHiſpani pnorem *Gtmenes* vocant, altaum radi-
 CcfibrofaValencini CT^wwwf^-fjidcft,paruin Afpiiodclum, Granarcnfes *Ctboti*df(ultkra*
 hoccft,cepimcolii bnamappellanc.PataviiinfclioUA(phoJclumrifulofum,qu6dconca-
 V>ft)j.i.habeat,forljtan. Nilvl cum Philangiocommune li^bct.

*Af hodeli facula e ex Dioſcoride, Plinio, Galeno petenda: an verò tertius alicujus in ro-
 tic^tn. 4 lit ufus, 4 ne mine hitteut UUCHXL*

Pseudo-aphodeltu £

Heudo-aphodclus 11J



Pseudo-aphodeltu

Heudo-

XIII.

Pseudo-aphodeltu

ASFHODELVK porro ilium flavo flore palustrem ,cujus Dodonarus & Lobelius in fiii* fcnptismcminctur^vclpotiLis Pfcudo-alphoJelijm(iiam niln) Afpliodclofi mile habec pra- ter rtor«Uec Dodormiscautem ciiaen umitem factor .c]iicatncunori est t^udus, fedtnln4 foliolis five vaginulij jUum ample&entibus donatus) Xyphij folijs aur renuifolijc Jridis, ali- quando cruebamin paluftn fausilliscnectis MaldeK'icmovicinisrL'cundoi Briigarumuib* FlanJrircelcbernmi, iniliari, M JIO menfi: cum 111. Viro C. irolo a DiIvo AudomarOj Dn, dcDranoutre, Mochkerckc,&Cc. cmru vxt." iusrt'Uxandianiniigrafia,aJccroameoex Hi- panijs reditu anno.

ALTERVM autem PfcLjdo-A/pliode!igenus,folijs illi valde fimile.fcd peromnianiinus,in Snealbcn,Ncuberg,Etfi:[ieri,atqucali)spratismoun!S,&;graminciscollibus,Junioflojrcnf S: Iulio icmcnprotciens oblvabam.quod fupcrioti conjungendum putavi.

NVMEROS A fantillifolta,fcfe muruo ampk-ftencia uc in(upcnore,&: Iridc, anguffra, brc* via,viridia,dura,a[nanu(L"ulij& c.ilidifaporis:cquorutnmediocauliculusgraci!iscurditur pedalis interdum,aut major,aliquot nonnumquam foliolis inlixEcntibus, fpcam sofculo- furafrensfcxfoliolisconfantium, alrenusinJar, fedminorum, pallclecctis ex herbacco colorii,&odoriscxpertium:qLiibus(tuce(lunctrigonacapitlla,inrcrdum tetragons & pen- Oigona,aiinariffimani ruffum (cmcncominentia: radix vixcorpus habcCjfaUenuibus ali- quot hbris dunraxat confat.

PSEVDO-ASPHODELI minorisfivepumiHonisFoiioIridisnomenindidi, adprioriidiffc* rnuam 4111 P/eudo-aphodclui majorappellan polTcc.

COLCKICVM.

CAP. XL.

PLVR. A ctiamprztervulgarcillidquodomnibusGermaniz&Vngariafpratis obuium (eft) amc<bic;varafuncCoichitigeneia, foliorum,florum, &:radios amplitudine, vcl edan) flormncotorCjinter fc diSercatitL

Colckic Pan
LMtijbr
< 170016


MVLTVRM riorum est Primum genus, quod in quibusdam pratis Vienna: Auftrixvici- nis, necproculaDai)ubiof]ti5, intervulgansplantarufccns, ante muhosannosobferv*^ bam&crucbAm,ut Ill hortulum rransferrem, dcindcm prarisarci Starcnberg Mag" Dn.de Hcufulihinvicinis,magnacopiainventunict. icFtenoscino, denos, autduodenos, vcl etiam pluresimerdmn pronot Hotcs laSci candorK ,clegarm ipc&atulo: hujus ctiani folia* vu]gariscolcli:afolijsiqualia, feddiluciu]virertia, inci-ntcduntaxatvrecxeunt copio- fuin fcit (cine (Lbruium ui laxu ttian^iiJis fapitibus: udix^vul^aris bulbo,major,ad Secun- di caroen

Colchicuni Pannon.jroAi/aF&alb.flore.

Colchic.Paniiomc.a]b. ffor.f«Bea



Colch.Byzanr.Urifflores. Colch.verfic flor.



difamen five infcquenrisamplitudincm non acccdens. Iflic&: pauci bulbi reperi, quorū floreslegatiter mcbanc.

Huicafinedtquod C. V. Lobcliusprope cetebk.A*. BriitoliumSiagro Somcrferi in Anglia nafci t^r observabac, cujuicaliquotbulbos, iplc& Morg^r iius, tjuum anno mille(iiiH)tjuil^r antefimo feptua^r; limo prinio.ipud cos cTm, mihidonjuic: lii i nico reditu crrarcredidi Mjchlinir jriorjinprociikriinc, infcquencc vrc.folu Iquacvuleirisfolijsan^utboramihivdiun; Jdeind -meJiTajix vul viripir.

Novo vrecgrmmjc AltTii: i^r na^ue, autjuarciTuproduct; fol a ampliffima, Ellebonjlbifoli|incctbriii.i, nccmagnitudnc raid* abtimilu, nee illu miflui nerrofj , migtrjmcn vinJia, i: (cfeinucuQ amplientia: Autumnocun> vul^art mnucroios ferr flures, ui viccnos a^r vjre memmen m c\ tes.vul^arisquidemflonbuifurma.keulore propc (1 m ilcs.kd amplorc*, craffioreque pc d i f b f J l t n i S H u l e itaratis impurificnces,& nquam venuquibuffa per folia fparm, i^r ii aut n vul^inifaticopiorum (cmen Tert inrcrJum in triangulii laxis bre. talisive f l u i l a p o r t u ; vulgari; radix cralliTi>na,pugTium xquans, vcl ctiao amplior.

Constantinopoli li %uhrcscjusbuibi bjs fuot



Colchic. Hispan.

fantallatum Vicnarvibam: Gencro/xDti, dcHeuren (!ain, aquaproIcfnacpti' cbara' & Generofa: Dn. Vngnadin anno M.D.XXCV i 11 quum ilbnc Francofui turn difcederem.

Cv M illms flore quandamaffinicate mlubere videtur floscius Colchici, quod Tlicodoricus Clunus Lufitana accepit: nam lex ctiam folij^ confrat purpuri cum albonn^ ti colons, (tvclutite flcilaiim (utin Fhtillarizlloic) di (poi iii, floridionstamen: imibthcuni etum occupant fex alba (lamina, flavisapxibus prrdjta, & mediiii Irtlus in llatniii. i. divisus, purpurascens in fuprema parte coloris: odor aut nullus, aut valde obfcurus. Floret cum reliqui Colchic: s.

Colchic. europ.

TB RT I VM Eenushabcomuncre Gen-Dn. dcHcufcnftjin. quzinculcij Timofuolior^ co Tuburbano ad Vttnam urbem^ inos autternosalbarjqno SjUnJcadqutlivillet, ignozate fciffirmabai. Non minus crastoeft id bulbo, quam Prinum Acletiam crastiuurc: **Octobri,** paullo ferius **an breviores,** & brevipediculo mmxos, uc vix fupr* tellurem acroilancur, quorum imenoracna folia ex purpura quodamiodorubent, au [Hifpanicin] ontani Honbus concolorialutit, utplun- nrm jCterio fl autcm ttia vcl omnino Jadc candoris lunt. vcl interne media ex pane pur- purca, aut crastionbus purpurcis venis radiaum diHi ncla. vcl purpurcis macu tis asperla, on** nia verb mucrone tnagis oibiculaco to. obtufq quatn in vutgai i: liujus folia ioeuoae vcie gc** minantti, ex vitidipurpuracune, dc inde xphcaudtuuciu jviticuc vulgars stoliji. ScmC* duptaxat; u^ femcnlccrc merrini, prioris lcinemi! us,

Colchic. Uli-


Qv^ RTVM genus alioifoto accipicbam anno M. DZXC. crifTnctianibutbo, quod crri* commiffuin non modd non floruit jcd prorfuipctijt, Sc tibebii auteoa ejos fkucm piupurt^ coloris flc. qui proculaspicantibui vulgaripa apparercc, ardiligcitiis obkrvambus, co- lore sex albo & purpurcodiftinb vidcbantur, latiad Fiitill. i. ia-a) tore Dia». ccdcc Hcj: folia item hibere ampla, ad (crnminclin. ua. Pofteaumcti, con (pcilo CokLtc\ Byvant Lti. cuju* bulbum ad iplum inittcbani, flore, dlvcrfutn a mco latifolio, iuum Cokfaicuni cflc roone- bac. ForJtan verd idem genus crifT Cum Lufitanico Clucij.

Colchic. msa-

Qy .mo te vna ui quaternadintfoliadigicali ilongicudinis. carii Mti, fiima hiimifamea ^jar (a, faturatus vuentia & li' > Jend-nna. Vix (tmifHi. in] laca, acidigu) Uis, ranlcedteC. co- lorem contrahenti adum tablcerc iitipiuiit: tio. siinc folijs prioidmexilic Septeinbn, ai- quarvdoctsam Augvifto, rTc lonm^, aiii; u^ i & c^ purpurarubt Dtibiiit ulij^, tuixlem is 81** diol am in bafct th. unc llatini (tactcr ai iuuui Coli-ljtcigti Kiuoiuiuitnu foliafb fequuntur,

Colchici monwni Hifpan.femen.

Coldiicum mont.mm.verfcolorc flor.



sequitur, & niumradix u TT d e m d c h i e m e m P «durant, ufque in menfem Maium, vel etiam I*
 lida, & c. hione dulcis, longiuſcula ſede, quali in ceteris generibus, & adia-
 tis in la propagans.

Colli bus Sal nuricx vicinis, folo valde lapidofo primiim cruebam cum fuo cauledodran-
 la .hniKK&trianguUricapire.in quo fetncnextrubromgrctensfivefufcu,larve,cxiguum
 lbromndum Maio uienl^dnnoM.D.LX• 11, Apud Bdgas, apud quos, **feminc quodnata**
 ^ocongeram^aciimellniinu mdffc d d i f l i l l g . Vicnae autem Auftria
 ujuoricixmeisfirpibus!cmncollgi,c.il,;iciNclufiiaivixccir. iH Hcrdumemcreeinc
interfoJia lam languidalatnce, aliquandadigitali & palmari cauliculo innicente utl
 iJmFrjiicoturriadMajnum&LugdunBatavorum.

Hvic **nonmuleumabfimilcft,qaod facobus** ri.iceauinfuohortoTornacia!creadrac
 ru)fb.it,tum folijs,tuin bulbo: floresaLtcindtfFerrequoriimomjiaquideni folia loniza & T* T&
 ^^betianicflciH,i_nrciori verdcoaalba,ex[riar3 media exparcanrLjiaaUdcarnet

PAV c os porrdCoIchici bulbos,vulgaris biilbisvalde fimilcs NeapoliFrancofurcum ad c---^
 'mittbatK-rdiiiaid**uslnipcratus, quini.lu Lugduni B-mvouundemmn** flutesdedc-
 ri"nt,vulgusHofibusnonifimiles, fipccftvdianc, vdfacurparpuKos.

&c datiu Colclnci **genujvulgari** minus, Salraaincenfi agio oblervabam in **akioribuj** f'
 P^at«diluciorfli)rc.atqucinnonnullisplantis, laciomninoMiidoris, uoite cre folia
 "tincaxatprotrens

autmillid,ycl Alexandrinum.Inonnullisrhibitum .niliilaliudeffe vide.
 ^q lipxgenusquale Apennicumforte. cui pittor nimisorbitUIJU folia tribuc-
 r«&tpli vein pbntarnimislata&brevia.

^RANCOFVRTI **ctiainetlaliaaccipicbamftraenj vulgaficokhicifemiflipar**, cum fuo
 ^capitdo.HerrodaayliSyriaciappellationejquodterrxcreditnai.necdumgenniQa
 <^**quumindedifcederemScd&Iij^UlrAflih**(
 ERVM ha.i.p!aiiuDio(i;oridiwAvijfirdicirur,nonrHillis,ip

* «' « QuiThecoplirafti locum **Hift.Plait.lib.vi** op vi.mccgrum **efleocn5t** eius Narcif-
 />» , five Liniun **nieroflore**effearbtrantOT **Hiftani g*it*merte»ili/, & Fifferitgumcl**
 C: {jcriiunii^ii6Mfran& ftrtfeh/GalliDonnuOi Mtrtsathna. Priinum aurem eJ{,ui

io^ ..cum byzaiuinumlitifoliummulflorum,"nonincommodedici poft videtur
 Ten sum,

Colchicum plcno flore

Colchicum
plcno flore



<***>

Colchicum biflomm.¹



Colchicum
biflomm.

Tertium, *καλχικόν πικρόδασθον*, verficolor.
Quintum vero, *καλχικόν*, t, renuifolinn^&c
monranum HifpJ nicum. Salman *ikt-t'cs* hoc
genus *mtrtaAtrji* vocabant.

ALIVD porrfilecgans Colchicigenusapi
Belg2sinvenitur, cuj Lisquideincogninoneni
acceptam fero 111^{ma} Comiti Arcbbergi OjOr-
dinis Vclcris equiti dignifimo, qui prarrer
exoticarum flrpmm cukuram, cui max i me
indulget. magLisctiam fumpubus qualcunq;
adipitci poccli, vivis coloTibusdeptngi ciutt.
Is Autumno M.D.xcv. butbum ad me mittc-
batj UtflorcconipicreporTcm: (cdciimnuU
lum protulifT: intciligeret, infequente No-
vembnicofiegrcificexpreflamaddidit-Flos
vulgari colorc perilmilis eft, fed plunbus fo-
lijs confans, nempe vicnis aut plunbus, val-
de cofcrtis, quorum fex execrna reliquis ma-
jora, vulgahs came folijs anguftiora, inter<Jtuc
ftamina ut in vulgari, flavis ipicibus prardfta.
Ex alimenti copw plenum florem tulille cxi-
ftimabam inirio, qucmaJmodum naturiinter-
Jum ludcre (blet io alijs floribus, qui dciiidc
aJingenimn redede: *led ipfc Comcsaffir-
tnabac, wmciiim M.V. loinncsBoifot, iift-
gulis anni plectios flores id Colchici genus
profccre, cofqj pi a res, majores, &c tnajoM fo-
lio rum numero coftaiues, quo bulbus major
Scvecuftjoreft. Originccx Germaniaducc-
rcaiunc. & primum in Belgium alljtu a Rhi-
2otortiOj Cujus no men N; colaus, q in frequen-
ter e Belgio in Germania a Nobilibus qui-
buftkni macronis ablesarcrur. Sed bulbus
anno infequenre cum ftlecliflimij ulijs flirpi-
bus furto I ubhtus.*

CoiCHICYM aiFtORVM.

CAP. XLI.

NO vv M & rarum hoc Colchici j>cn<*>
mihi fane, ancc annum nonageiunii tc-
tium fupra milicfimium & quingentcfimuⁿ
nunquam confprelum, cujus cognitionc to
cceptam fero do^ifficno viro Moyfi Qu^{^1*}
to, qui Autumno precedencc nicinoncbffr>
vernnotempore flores (ibiobfervaiiinmon-
tano quodam prato, non procul Heydelber-
ga, ubitumdomiciliumhabebjc: cdoclitm
tamen ante, fimilcm invcmri platam, cx Epi-
tome dc Plantis C. V. Ioaciiimi Camcram iⁿ
clytar Rcip. Noribergc. primarij medici. Ioaf-
nes Mulleru^ plnr macoparus Francofurti^{1m}
fis ctii aftt rcbAc, (ibi adolcfctiti conlp<ctum
in pratis *Halx* Suevorutn vicinis novo^{vero}
florens.

PERINDE atittrmeralTo id cofitTat bulbo,
acvulgare Colchicum, ex cuji! finfimip^{rtC}
coliscmrgicquaruorunciaslugus. exnicni-
brarjaceoinvolucioHorcm promens obli^{1*}
go pediculo nirentcm, rolgaris Don forn¹
z q ualem fex fol; scollantem fed minorem,
quorum term extcrnatnajufculj, internaaii
*ccriaanguftiora & breviora, f i n a i Qis,
lopurpuralccncia cflc videbantur:

nec semen fiquod tulkjobfervatenjiliilicuitpermcirbuni; xxv cmm Apniisejnfcdmam
 ni, cxcafu luxatiimmihidl femur dextrum cum fumma coiulione, cujusrcicauutoto
 trifictndecumbemliiin tnthifuic, male admin iltratatuui.idieirurg'is, quituxa lOncc
 glthijCjuam norfzgnofccates (quum ramen ibbmdccosmonrcrm, tnclux.ittonem rctin-
 re)vef ni.iljgnediffimulaiires^dfoliuscontufioni^curamanimiiimintendcrunr. Veram au-
 tem fui]cluxationcm,eEiam nuncnrm magno lucoiJulorc Si damno experior:dam & mi-
 ni dextrum cruscontratum,neepedem promovcre poflTm,ni(i gcminn lciipmnc Kibnxtliis
 fultuSjatquequidL-mnonfinecrucucu.CererumadColthichirtoriamredcamus aquaju-
 ftusanimi doior me avertit. Bini ijitur majores bulbi ex ijs quiquaterni Heydetberga ad me
 mircebincurjrtDremdedrutfubfincin Augufti,pautloante mcum Francorurtodifceffum:
 nercioanerrorcommiflLililcgencibus,quum bulboscrcrraerucrunt. Majorem purr6bi!l-
 bumaMoyfcaccipiebam ,cuireccnsflo\$adliucinlia:r;;bat, (bbexrrcmun) Marnum, reli-
 cjuosinfequente Apnli. AtquciftarationejColchicumbiflorumpoedsauncupandura LC
 (er,quam Vcrnum.

- I L L o ip(oautem anno feribebat Iacobus Plateau, ColclVicu m le habit &, quod vemo &fcto «r».
 tempore flavum florem protuhTcc: fed bulbutn cdmeruiflcc, vcejusprdlcni ad me i mutic-
 ret,utramque corruptum repriflc.


CROCVM VERNTM.

CAP. XL 11.

MULTI PLEX etiam estCrocumvernotemporefloresproferrns.folijsqic&florisco-
 lore valdevariacNosautem duo qusprimaria genera confitucmus: vaum_xUciore Cr
 folio &: legitmi croci aucumno florentis foliorum .T mulo,liccr breviorc: AStcrum.tenuiurc
 i;prorfLsjuncco:finguladcinc]n/uasrpcciesdUI;ribucmus.

Crocum vern.lacifol.alb.flo.

Cioc.vern. latifol.purpurco flo.



LATIFOLIUS ergo Prima sp...ies, terna&quaternaintcrdumhabct folia lat.ufcula &bre-<>« »
 ...umioogitadinemfubtusMcarritibuspm diw^ntcrqujpro-i;
 r.v.pcd.culonitens fexfolijsconfansalb.s, imapartecumpedjculo
 candida r— "— l«.«fnidafibrisqicandicantibusInfin)ifedepradiia-^Null: Dctieli
 quas Croci verni species, hac magis recanda in edenda sobole. Eius vero floris internum, U. l'itillu.
 oha, nonnunquam purpurascntibus venis sunt alperia, inter-
 purpurascunt, aliquando etiam purpureus radius omnia folia
 fecunddm lonritudinemmed» a cca^
 en angustioribus, inter ^ promens ^ mernbraiu· Crw
 i florem brevi pediculo immitentem, sex folijs constan
 ICHWU'

tem *viohcexzi* carrutum cendenris prnrpurzcolore, unijmSus ic fummo pediculo fotura. tiorpcpurpurilnitennbus: radixakeniimilis, &inc<Jend.ifobuk-facjs torcundainterduln. Noiiiiunquam, led valdc raro, fenutraqueliarc, rotundunitxalbidiiimeannangulo capitulo. TM....."ufiun.

dd/nnmsvirFerdinandusImperatus, cumalij^alKiutiiftirpibusFraicofutiuta annoM.D xcn. Ejus veroianimarcLdi&dudum terrieruribulbumuniciiaccipicbara ,qui ftquciucverc folia qmdein protulir, fed nullumflorm, Lugduniporro hiatavoium, cum alijsCrucivcrnilatifblLjfpcciebusHiireuidditjillis forma (imiletn, hoc eft, fexfolijscon. ibntern,quorum externjiria paulolongior.i,intcntria breviora 3irjplcdlun:ur,n)ultoumnanpIoraquaminfccundafpcciCjlliceicilliscolorenc valdcdir?anancinuLidid

Croc.vern.lanf, a! bo vcificol,flo.i.

Croe.vern.latif.albovcificol flo.n.



Cole. v. r. r.
hab. f. a. l.
v. s. f. l. l. r.
f. r. r. r.

Quartze folia, Croci fativi & legitimi folia fatis referant, nisi breviora essent: inter quae, hinc aut terna prodeunt flores, Prima & Secunda (speciei floris constantibus inaequales, tertiae inaequales, quorum terna exteriora (quae pallidula sunt) albae, interiora vero purpurea, in medio habent crura, in medio habent crura, in medio habent crura. semina praebet in triangulo, semina praebet in triangulo, semina praebet in triangulo. cas: radix superioribus similis, foris membranâ fusca, intus alba.

Crite vit*.
U'fil mlf.

fir» . 1.

Xmtm (^
Ktatwu.


illi similem, fed per omnia minorem, ante multos annosin Bdgkam nobismitte Ue C. V. Alphonsus Pantius Ducis Ferrariae Medicus, quibus horum in icrdumo (aonii & denis folijs praeditum habui, iacobus Plateau etiam duodenis, illiulquiciconmadmcinittibat, anno simplicem fxfolioruniflorenitilir. minit iofras Simlerus in Helvetia: deferipno-

re, candido, & utroque in mixto: fmiciff vulgari (octjamnascuntur) fofrai: ad hoc radice in supremo jugo Baldo monte agri Veronenfis provenit. Nascuntur & alijs locis; nam anno m. d. xc. Ferraria ad me scribebat doctissimus & diligentissimus stirpium indagator Joachimus Jangermannus C. V. Joachimi Camerarij ex foite nepot, mihiq; ob morum probitatem doctrinam, ingenij elegantiam, & alias animi dotes valde charis, quem etiam non dubito futurum fuisse praclarum lumen Germaniae, si diutius Sereni Ducis Florentini Simplificata, vt vocant, ad Turcheni maris littora instituerat, tres Croci verni differentias invenisse. Exijs elegantiore, vel albicantes, vel purpurascentes flores proferre, quorum exteriora terna folia crassiores quasdam venas purpureas saturas in fcdas habebent, quae mitum flori decorem adderent. Reliquas duas majores esse, Croco fativo non inferiores, & utriusque florem purpureum; sed in una Colchuci floris tulla dilutum, in altera Croci

Crite: val
v. r. r.



Croc. vern. latifol. Havo flora



Croc. legitimi floTeparom cjit'crfum. Adrfe-
bat, lofephum admonuifle, Ilmdeleganrifli-
inumgenus nafciinjdfefiraciscircaLibiirni
portum, quod florem proferret faturaciflimi
putpurhnuentem, nucm, utptcmagis tbtot-
inum^onfptcereiltinonliLuiflcr.

Qj jinraeft, quam Alphonfus Pantius pau-
loanc mortem mittebar, florem jam marci-
dum adhuc recincmcmj 8i (emen in rrianju-
locapireoiarurun?, f.x quo *toih* nata'pbrr,
quac certio anno flores proferre care nit: funt
vero ij fuperioribus ampliores, ad Tertia fpe-
cici florum ma^nitudine ptoxime accden-
tes/excciam folijs prxdit!, qu'>ru externa trin
fonsex Candida qitodammudo purpura/cfir,
& fatuiatifllma^quafiqueacr^ f iirpura: mbus
velctiam quinquelineisabindma parre fur-
fumatecndetibusinfi^nitafunt .nitcnif pur-
punfeunt, interiors verotrM, veldJuttoris,
vd ^turartoris purpurt *i'anccoloiissna im-*
guesramcn, finiiltbu;, urexterior. i, nd: |sini-
jnita: fcmcntri. i. guJiscapitibiisInbfulcim;
folia fupcionbu'; fpcCirbus lotigiora fcia
ra, TertiajrolijsnonvaWcabfamilia, duabus
ctiam albi liacis fubtusdiftin^a: radix paulo
ampliorluijusHorcmctiani oftonisi
terdumluxuriantfniJiabLii. quatuor videlicet
inrcnis, cotidem extenm.

Cut
Uif
vna

Sexur. quatuenaucprurafoliarant, ad QuintxTpccci **folia**valdeacccdenna, longiora
^JCii. &reircacxorum lat(ora, 6inifcanrftdis venitfcu/irfutn *medum* ncrvaa per longi-
^incmexcurrentibuSjtitinrcIiquisCrocirpccicibusqu^em^fSffeificipientia. florer., !!.
Paululam orbiculatis, flavi coloris, uncinque adortum, tria logiufcula lamufculaq; flamma
dilatius

dilurium flavescentia in rasco tuinenrem , & longiorem ftilu m futnmo fastigio in tria f...
divifum, (iuivicroL Itiminibuspxnc concolorem: cui fuccedir, uc in fbpriore Croci verni
rpicie, membranaccureitrianguure capitulum, rocutidorufoclj {cmine plenum: radix cum
iipcnocL radice conuicir. vclctiam majorcft, {o]ida, aliquot candicannbus fibris, fcfni
partc donata, & aliquot tunicis obvoluta. -binos plcrumque, ternos, atit quarcnos, vcl ctia plu
res profert Horcs rmlacnim Croci verni fpecics hacliberalior in producendis Horibus.

Cm, -vt'tt,
liifm. au-
vok

Fjusatiac Hpecie SjCU Jusfoliapauilobreviorajnfriorcramparrelariora, illiusquini
veumrcrtfloremfolijspznc^qualia, flosmagis apertus, fextiam folijscon (btalterobrev
vionbus, fercorbiculatomucronccolorisprorfusauci, rria (lamina umbilicum occupan
tiabrevioralatiaraque, filinsalccriimilis, fummaparreinterduinquatuor ftaminuladivi
ruSjalrcj-jnsljJoconcolorrflorcbatmihiannoM.D, xxcuii, *Stfequentibusduobvs*, paullo
maturiustlavOj&inulosctiamdabac Horcs.


Ctei. jtra.
Ut, f, t. fd.
ii. Jjct.

Sed 8ircrti.iej us fpecies folia nonminiis lata habet, floresque fex folijs magis mucronatu
confintcs, colorisomninopallidit, viridibusvcnulis exteriorurafoliorum unguccsohsdi
finguencibus: cetera: nora: conveniunc.

Omnscsha'ifljvidiffrcnsmihicorriimpibat rigida iili hicms anni odogefimi fexti,
fup rami Udiinum 8equingcnciiimunifepures (juam I c x a g n o s b u I b o s u i o f c
iiiiucnaro Sjpcxtertresaitqiuuorqu Lilav! genus coniervarunr.

Croc. vern. latifol. F-v. florc.

Crocvm. latifol. F-v. florcduplici.



Croc. vern.
latifol. f. v.
v. v. v. v.

Septima. quinquaufcx habet folia jtcnubinfarfrolcgitimicroci. infimartccxpBr
puranigncantia. cquoru medio unum aualcerum Horem promit autei fercrcoloris. lcginnii
croci odorem nonmlulferentem, fex Kum folijscoftancm ut reliqua crocigenera. quor
umexreriorarriapaulloangulfiora, & magismucronau, tribuscraitiufculisradijsxatro
purpurafcentibus abimoadjummu. fccuniumfolijlongitudincxcurreiibus, & multa*
interdumvcn. isinlater. ifpargctibus, infignita, ternaii]tcnoralatiota (unr, & unguccsliabcnf
forisctiam ex auo purpurafcentes, pediculum quiflorem fufiner, rofidim purpurci coloris
faturiradijs notatum, quot fune in flore **folia**: umbilicutn occupant tna flava ftamina, inter
quxIti]uscmtneccxtremapartctriKdus, auricolons: fionbiisluccduntciaffurctilacngo
nacapica, adc6 (aturopurpurccolorint" ccti, utatraidcantur&lplendcncia, quxmaturi>

Cm vtn.
i. nf. l. jl*

ccautin tuperioribus. fcd prxcnllorurr. morem muhiphici rcciculatoquccortice -bulcfa,
SC multis tenuibus fibm (cllili pane, per retkulati corncismaculas (cexcrendbus, pr*dna>
raroadnatosbntbosproferens. *

lltiusaliacft fpecies, qu* jncc radice, nec fo^ticque Horc dirFert^xceptistadijs. qui
luc

latz DfesparguntjUt prxicrorasjrotumcxEeniminjtrlumfbliorum dor/um infit injr.p<-di-
calus e; ;t r, florem ruftincns,rocuscxpurparanigricanterplendcat.V^aqucfpccicsaJ[quo-
iinmihj florem deditduodccimfolijsconltantem , fexincernisaureitoloris, (ex ex terms,
Purpurcisra'lijs inljgniciSjdeindeSexdgonacapirulaiinrcrdumetumgcmcllosumpediculo
irih3fri. ntes,qi)ibusctianigcmL*lh capita, utraquefemine plena.

Florentomneshxdifrl-rcntia;incunce Vere,alia:alijsmAtunu!;,Martio,& Aprilisinitio:
nullaaiucmdiuusfobntimerum riorum fubindcnalcemium J caquarflavunjen florem,
quaromnumctiam liberal](Tme femem pntber.

Quituoarpriorum locum natalenijamdix^&ornnesinhortostrannici.domcfticcfaclx
fuar, Q q n a r a m d i x i) & l 3 i n x a l i c (c q i e n t e s Q j
Germanise mnotuic po(t annum M. D. LXXIX. StephanivanHaufffnNoribergenCsdilign-
tn,q<ic)us aiini imrioConftaruinapolirediens in comiucu Gncrofi V Vtrichia KuhigH-
perg (quipricdeineannolionorariuTieotuleratjinServia^ivc Mo:fiapuperiore,fubBel-
gradofiorencraic Marcio nit'nfc,&pauIlop6ft,fubBuda,Fric:llariam, cujusupram-
minijflorecemobfervavit. Crocumpotlca<Sia'ij,antea mcadcioniii,vidcruat,tftincVt^(ti-
n.iru redcuncs,inThracia,nonmoac>flavoflorc,fcdenaniaibo,& inbcirulcotadtoastern
ncglrgencsfnerint, utnocrucrint, caurampntextentesqucidillisnotilicijiflcc .qaiaprb-
perantibus,&itcr3darbitrmmTurcatutn (quiduccsirinerisadInbici) inltituantibusLci;a-
tis.non fie tutum ex rheda, five cifio dclccndere illtsio locis^ob Plagiariorttm Si larronil me-
tum,FJavsautemvarixpaucibulbiallatiannoM.DXXCvii. Odobrimenfcjijjadfomar-
cidi &cxfucci, vtvernoceporceiutosapparcrcctaMon& flnres 5ifoliaadhuc rcrcincbant,
emptiqjficant in foroConftancinopoli, Vnusau'raltereorum quos redemcram, Siterse
coiTimifram^rodicruntfequentcVcre.unicumdLintaxat folium proferenres: & anno de-
mum M.D.xc.&fcquentibLis,floresquosdcfcip(i iniliirulcruntFrancofurtiad Ma^nuin,&
Lugduni apud Bacavos.

Crocvemanguftifol. i.

Croc.vcni.anguftifol.il.



Angustifolii potto spe-
Crocinijs longe angustiora gracilioraque, rotunda & capillaria fere, interque, vniu-
autternicauliculi. unciales ut plurimum^ngulofi. rullincntes ores: c
rel, quaf nec. cs, imapar, flav, centibus, uusunml, canta
ctideneibas, five violacdr (inveniuncat & toocand<ii> "gJ^J"} cont, incntia: radixcati-
guz avellanz magnitudine, duro fpadiceoq; cortice five put
TtSre & toatter Mcmtice OH< tntfno<< in Bctnn*coll. bus Ufita-
rtucram, roujstojw"-
n^x. fiaitunisobier vabam, " - xa] bopurpur: ifcetuc, vixqi. iceicr Tapromt-
ner te atque unum bulbam eruebam flore m liabcccin c toliois octocompoitum, qua[iior
ext ernis paullo majoribus: radix erat gen iiii u candida, unafupcraUcraimUideris, quaram
fuperior firma, dulcis & edulis erat, inferior ftracida.

Croc. vern. angu(lifol. viulacco Bor.

Croc. vern. angu(lifol. viulacco Bor.

Ktsltt,

Crtt veruum
*»gmlhf,l.
1111.



Vberioribus & craffioribu* dft
Tercia folijs, ijsq; ititerdum furc-
i.hy. flosduarum pixcedentii flo-
ie longc minor, totusq; czruicus,
tribusccrioribusfolijsexccpris,
quac forisvirefccte colorc nonni-
Jiil afferfafunt: Jiuusradix priori
fornufimilis, paulo tame major
eft, (enien ciam craffjuiculum.

FrcqucsinvctuturGadib¹¹ Prior,
atque inter Afindum (vulgo AfcJi-
na fidena) &Ca]pcn₃ locis/aJc-
benfis & apricis. Tertiam dunra-
xat G.idihu; juxta priorem mvc-
nie)am F*:bruari3initio; Secun-
dam Ianuario,

CeterumannoM.D.xcAutum*
no ad me mittcbat diligetiflimuJ
vii Iofepbus de cafa bora Sei^{m*}

Etruriar Ducis Simplicita, aliquot Croci vern anguftfolij bulbulos, quorum nonmilli &-
quencibusannisvernnotcmportoreRom tulcrunc. trancvetoillisternnamquiucnu juncca
folia, PrioriangulttfolioHitpanicomodocripcofitnilia, interquzuncialisrenmscauli-
culus prodibac, membranaccumfoliiculum iuftinens, exquo floiculus eincrfit fex foliolii
constans pp is, quibusungLicsa]bisvnisdistinK, &:ItiluLcxumbilicopro-
diens: fugaxadraodum fuit hiefflDS.utpotequimicoduntaxardicaper tusnianefit: radiX
Hifpanieiangultfolijradtci par, multistiiniciis ffvccoficibus Juris rca.

Primumgenus, Crocum vernum, ob florum 8c floriscum Iegitimo Croco
familiaritatem, v o a t Grzcct5*oi,KtjM<o; dLcipoflcc alijCocOmotitaciunphare
maIuntfahudtanienmonunum Crocum proximocapircdabimus) TwcxZaftian vocanc
Oocura, & voces addunt^, <<"/>*", quiitna!bum, violaccuni, flavunicoloicmexpiimerc
volunc. AltrumctiarHgenusjCrociverni nomenobtinuit, afloriscumalioforma, tamct-
fi Ooci folia nonhabcat, (celttnuta, S& plane capillacea. Nomen vulgarcLufitaniCiaieci;
vicini5, apudquosc, ciam nafci quidam illiusregionis incolxaflercbant, Nezffafptqutriiuj*
eft. Avclianxp. irvz. Secund3fpccicsincolisf(f*///j)j, hocct, parvacpa(licitur, quofere
nomine Hi(pani minoresomnesbulbosnuncuparfolent. Prior fpeciej Anguillararobler-
vaxfuifL* videcur, &: Crocum filvltreangufffoliurrt abeo vocan,

Tlieoplraltus Hift. Plant, lib.vi.cap, vu.Lcucoium intercasftirpesqux vernorempore
florentjrepuninfrequenteverdjibrOjbuIboraradiceconfbreuitjiUiqueadjungitBolfciani,
Opirionem, & Cy iccm: quid Cpoftremarum liarum dua:um altauui nomen, Croco verno
tenuifoliotribitur?

Off''-

fVM'.titt.

Po K ^ 6 lanfolij generisraiiicquidam forisuten^umcenfenr,tUitatnquepubi, urinas
erebras atque craffas elicere, tumores hydropicorum discutere, & fpicula evellere. Angufti-
fblinuHas facultates cuiquam exploratascitext.

CE TERVM fxpius mi raws futn, ncc in Auftriacis, nec in Stiriacis, neq; otetiam in P*"
n onicis t p tibus, u g m Croc n ernoten i ore florum r emu; veni : tamcti diligenet
perlufrariw: quum Helvetic* AlpcSjillistciamfri^idiorej. aliquotc jus genra/pontealjnf*

CHOCVM MONTANVM,

CAP. XLiii.

TR r A Croci montani genera mil) ifuntcognita urtum, in Lufitartiaobrervarum-aff*"
rain, Bruxellis acceptuij] : ier(iuni, in ThraciJtiatum, ai Conftan[ir, opo]iallatuii)-
PHIMVM, florecftiatiiviCroci.fcd dilunorc & minorc. rnbuintuJerticeuftjminit¹^
& Silo lutco (ummi pane in aliquot Ibminula divifo: folia illi quaterna Crocinis Gnulia*
bteviotatamcrij interiorparcc, lincainquandamcandicantemCccuudiam lungitudinern»
exterKjrevcro. btnastanquamcanaliculofscfulcoJucinquefccundunincrvumcxcurren-
tes habentia: radix minor quam in Gtavo, candida, olens & veluti interpedis distincta, quia
(quod omnibus alijs Croci generibui. glaiiolijs & fifynnchioetiam accidit) pl. inraflorc ite,
fupcnoi radios pan auge(cit, inferior iuttm flaccfcitaiminuitLir, inraquetamendfi^
quodafnconiccemuttisvJlisconicextoiiiivoluta5i:tc<i:l:j,tenu]fHjlquecfibrispcrcorict.n]f^
caeientibus, (cfti i parcc donata: i ubdulcu porto ilia clt tntio, dcinde ingrati Japoru


Croc. mont.

Croc. mont.
1111.

ALTERVM, illitaciimilc.rloremiic full is prom irSceptcmbn. untullaLitolr-pioreF*"
diculoinriitciem, (jtisudoratum, (exa:quatibustbj; sorbiculatomucr<ir, cpra: dins, &f¹¹¹¹,
rationspurpureicolons parneque violacci, ci;n(ranrem, tnbusex umhilico proc'tiim^^{11*}
flavislbmtuibus, ScftiloxHeinuin muapitemmukiridum. cnfliuletiUimouchai^ntei
nullum

Crocum montanum i.

Crocum niomanurfluii.



nullum adhuc fecerunt mihi observare licuit. nec quibus mirtebar ullam ejusnerionem in epistola faciebat. radix Prioris radici valde similis. comestibilem sicut contexto involuta. oblongos inter dum nucleos fati procul amare pargens.

TERTIUM Hosinodoruseuameft, veltenuis admodum & evam diodons. fenis, utreque croci genera, folijs, quorum interiora cerna paulo breviora (unr, omnia autem o bicuratomucrone, albicanrisinitiocoloris, rcd in quodeinde, tcmponsluceflu, dilutus quidam czrulcum perfum videtur: ftamina ex umbilico produnc terna, flava, & in medio ftilus five penicillus in tria vel plura (laminu) dividitur, flavicem colons: fliccefcenic vel ummarcidoflof C. quina. fena. rart pluracmcr Bontina i ubi Kufoliacxrenuiine i i brjalqtias florem in iuo obvoltrat. Croci vern. latifolij folijs pame familia. hweft. paillolat. ora q (Am facivi alba lineafineula foliaprlongitudinem {upinaparttdittinguent A' pranabinis tom

fibris sub ei nascenbus prxdita. qu.: florum fat is scax cft: nam fie ternos, & quaternoi, interdum etia
 Nascitur l
 absunt, ubi Novembri observabam, & cum fuo florcerucbam, anno f exagesimo quarto supra millesimum & quingentesimum, & amicus in Belgium mittebam. Istic etiam Septembri floruit, Viennae Austriac & Francofurti ad Moenum, Octobri interitum maturus: Maio tunc lit crassa, angulosa capita, semine plena,
 & fflv3EL
 Alterum Cococifilvestns
 Missum est Tertiu B
 bni mense, Zafra m.
 rulo non esse flore,
 flores profencepfit.

IRIS BVIBOSA.

CAP. XLIIII.

LA LIOVOT Plantas in Hirpanictineapregnatimic. ... «vauam .qnrncr HorcTn- Adis Syndjs cirLVU, erucas; amcn, bLlbnccaradicL-ftTcdre hcn, k-k1n^qu*, a1. Mllc movrt. utpnwcs Iridis bulbo Cenuiainri^uarcn. Dcillnnjitur, sc aliji eaiumfc
 * J pfl

pollcanacis.inquaramflormagnacolorum varietasconfpicitur.Iioca¹!reagemis: alio
ailtra proxime lequent^cdc ijs qui Herein Xyridi ma[^]is iimilem habiic.

Iris bulbofal.uifol.iive i.

Iiis bulbo/a vicUcflo. Gvc a



Iris bulbosa

PATIA, fena, ut plurimum, habet folia longiuscula & latiuscula, Hemerocallidibus Dodonæi, sive Labi-alphiodoli foliis fere similia, breviora tamen, aliam natam invicem amplectentia, mollia, in terram prona, superne ex viridi pallentia, inferne vero incarnæ e quorum medio flus exilit, e membranaceo involacro, unicus, odoratus, cæruleus (interdum lactei candoris) novem foliis constans, Indis figura, quo marcescente, utrinque alij singulares, i. e. Cille Nulius est illi caulis, sed flus longo duntaxat pediculo, ut in loco: radix bulbosa, a v c l lance instar dulcis (nam degustabam) det, ut in loco: radix bulbosa, a v c l dum florer) aliquot, præter fibras, crassæ, longæ radice subascuntur, ut in Hyacinthi radicibus interdum fieri solet.

Marab.

Invenitur in Lusitanæ Bæticæque collium radicibus, non procul ab Anâ flumine sita, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. In Lusitania porro Januariis, in Bætica autem Febuario florentem observabam & eruebam: apud Belgas delata (Corduba enim ad amicos Belgas aliquot bulbos mittebam) nondum flores dederat, quum ostentio post inde discessi, ad Cæsarem Maximilianum II fecimus, ideoque nullum semen observare potui: in illis stirpibus, infimam partem pediculi, qui primum flore inter folia reconditam, in rudimentum longi triangularis capituli desinere, multa candida granula continentis: quo argumento adæuor, semen Aprilis aut Maio maturum illic esse posse.

f*|j*£
d¹e

CMSSIOKE cltAkrafolio, ac veluti cepaceo, viridiorè, parte inferiore carinato sive fitt(Bot,naIrisjucquailbulbisargr
quii)afoliaainpleauncur:bi»ost-x\
te[^],inrerdu **omcum** duncaxac, novc'b> fo
^R,interdunnjt|j]tioris,inodorumtami
ronaunn vulgsn Irid[^].-ScbbrorLiminllarpropendcmia"
»Mainiciisinajmbunc,ufuucadlutMmm-.r.,i.»
peti gentia, ma alia turrocla, supremaque parte latiuscula, infima verò valde angusta: floribus succedunt trigona laxaque capita, quibus semen rugosum, fulvelcens, crvi magnitudine, quod maturum, in capitibus crepitat, si moveantur: radix magna, plurimis in tenacibus, nigricantibus circumvolata, intus alba, & tessili parte fibris prædita, quæ annis nucleos circa latera deponit. Hujus folia non Vere demum germinant.

QuiJ

Quia G. V. Mathiasde Lobe) medicus. de re licrbartaoptmcmcrituSjli^ncIridim primu Jclgiscommunicaverat, mifTiscx AnglualiquencaJ amico. bu!bis,fpontcifticna(cicxi!tLinaL>i,&in Aii glumprofefi]saii'ioScpruagdHnoprmiio(upraMilldimum&: quingcnrii.num.fruflUin agns Sccolhbsuquirecbam,doneeBiifboiumquum veniflbn^bi Lnb-liunicrxwenicoam , abcomtclhgercm , iftJcprimiiniillimrkmiL/ro.cxhortis.inquibuscol-b.imr/rLiiam.uinie Lorulirnjamicisiniliflec.Vcnfimilcell.Hifpanicisnavibusqup! pkrumquclinltoliumcomini;abant.priiiniiiiHlluccxHi {paniaautLuiicaniitdclai;am. ~

lfhi>ulbo'a iiJ. five vcrfico!or.



TERTI/E, quinqne aut fexruntfoliaangufla SCTciiLiia,cubicaiislongLti]dinis infernipartcftriaca&fandtcaatia.cxturnaautcm rugok, vtndiscufncineraccocomniixti coioris, caulcm amplexanciabuiulem, interdnmet.iam majorem , nodofum , unicum plcrummiic florcm.rarobinos^nitmbranaceisv.iginuiisprofercincm, Indisang^{ulbfolia} floribus forma (Irrnlem , cujus tria lactoia \$c ad Terrain inficxi foli t.extimapartcampliorarudc.&rcandicantia.lurcaqiiicinaciihini]gnira.ca videlicet parte.qua folia his iticum bencia, & ligulam occtilencu, bifidaque,&: inp.irvasal.isrcHexa, dclinunt, tllaquciubcirukicxc,indidocoloris:rcInjua cna cre<5Li funt, oblong.i, & dilntius ex cjerulej purpurafecnti J: rorui Hos jurundo Ipiracojorc ,prarmanficorianJri(>bJucti (accluro,(iwcpra:parati infiar. Florjfuccediolongum triagulumcaput,altcrograciIius,ncquc]Li^nim, Ce mL-iiiaigulofuiUjfbubrufiim^onnniis. Radix bu]bo(a,canti]jjj ,{Ubulci!; }fpadiccisahquoc mcbianis involuta, minor /Lipenons radicc, &llaliber.»Iiusnudeosproduccn5jquibusfacilimferi potcft.

Eftvero i;a:c vc! breviorcUciorequeflorc, &t tlo dilutiore ,aut faturaciore, macula etiam illi in proppndentibus Librorum inlhr folijs breuiare.vcl anguftiore & longiore:ac labris ilhsfirnilirerdilutionbusaiitfatuntioribusilli* que interitum adeo latius ut violacei appateat,

jpiiilque in illiialbiconlpiciator, fed cxnjJensduntaxw color aonbienj Bavamillam macp* lam nux in hoc genere longic* ut plui imum c(Tc fulcr. Rurfus qua: latiore est florcm,plcrLrmque libe: alior est angufti]l"ain binn Horibus producendis.breviorcm^uclliquaro^lvciriqum caput & aequalis ubiqijecrafTitiniin)li.ib<:aHgu]t]florsaatnoloiigiorcft, & infina parte g: calior filiqua. l. ;in litiHorj; raJix,brevior&: craTitr cft:alterius, longior &c graj' autcm vanetacem.'anoicconciliatani cfk,non dubium est.

"pTric*ilc,queviii]o •" i/i^i.s/nuncnpatur.Hifpaiiiffur'.icjpninumdatanihi fuitlifcplan- s*ttUi. tal^nl^oiBnyTriroopriino&humanMranojnaDoneGallo&tffieArcbitcflo. quihorrajurti pereennisftirpihusUiiisinfataum pone «deshabcbar4 quo, nonnullis Caftcl} collibusfpnntc nalci incfligfbjm. Floret m horns luimu umGladiolo;aucpaulu macurius:le- zae extremam lulum & Angufto maturum est.

Q v t r > porm in tac More 3C q uib aldam al jwniii!cont;gcritaiinoNoni£;c(iinofccundo a i d & f i r e r m m hoc loco adfen'benai exillimasi. Is enim, ut propter

gpaln humiditarcinarrecqucnabws'irobribus.fcTM fuitptofercndisamplionbus fohp caul" * / u MIOII ranioio utplurimuDi eSe U>^cni:,irc?<ijx.]ti>roi]i reddidit, Nam habtnTuiipamraolant, quxvelunico,velbm<s cernis,quatercnis,criamqoinisramis(fidJgalisTuun, fltifemlii'thaaHibu^ntcapiKdcTulipadiximus^aiikmpi^icunicijleruiUJmultasXyfluij

flitac, qux unco, aliquot qux binis quatuor vel quinqne floribus ornatis: plurimas Iridis bulbora; qux biniivelternis, binasqua quaternitflonbusfiieruntonuftac. Summocninj caula falfigno innati binis ex iisdem vaginis emergentes, quemadmodum in Secundo genere alrerakert luccedentes, in nonnulhsetiam (emus: A!iar,prar(t ftim verticolorej Liti-ftot>hturariorcs.p<ttrgeminosiHos flows in (uoOTOcaolenaB^cxingulanvagipainfra illosfia sjalte-r.ilcqiicnrc n.^ul.irtsfToduxaintramulos.teracs-licmcalatos.fuftiiicntes binv vag nas cqivbus<ncrHeronfingulatesflores(utin (uhjcdaiennc viderelicet] p;i- crinde odo'ati. Habui etiam anno xcvii. multas Iridis bul- bu' ; .atua, quz fluateioosfloies tuleruat

Iris bulbosa
111. Jov
verjuilior.

verjuilior.

Annui it D
* * * * *

i-hMi vn-
fido uoi-
l>unt*

Iris bulbof. verticQlor vcAu'xAaic;

Irii bulbofi flavo flo.fivc f.



Tulipa bul-
bosa.
Iris bulbof.
Iris. fiva
luna.

Multos etiam dedit is annus Tuliparum bulbosininfia * (quod fucci & homcri. abundantia tribuo) nascentes.

QVARTA, jam dicta Tertiz per omnia ferè similis, brevior tamen est caule, gracilioribus- que & ex viridi pallefcuntibus folijs: flori- busque, latioribus, latiores tamen, ex vaginulis summo cauli inherentibus, pro- fertur. Irii mediz inter secundum & tertium genus magnitudinis, que madmodum & filii in quo semen superiori simile continetur, radix tertij ge- secus ac illa, propagatur.

Favio.

Sed hinc in fine uandam etiam differentia licet ex g n 3 m mventiurlatiow

aNquanfulum/atuMtioceqf mag s run H, t n n 3 m mventiurlatiow
fiol.mcmbnacca wawia,llaTM k n V und K r i f o s r e s " n k r 6 V l Q r s . & c r a f t

illii«^udituiiorecftflavo>lorc-namTMhTrc?diS dcfi nent f m ^ ^ c f i u i m
ungmncohoccolorecuret. V r i m e m g e r m i n a r e f o l e n t .

Natalis.

Nascentur p... & petriolis collibus ad Tagum fitis supra Olyfipp 3ncm, ubiea«utf-
m Decembri anno M.D.LXIII, cum aliq
Belgium mittebam. Floree paullo ma-
por tamen se mutuo consequuntur interdum simul fl...

Iris bulbofa
v. p...
m...

... A mihi primum conspexa f...
quingentesimum, nonagesimo quarto. Nihil vero ea
Iris bulbofa, cujus flores verticcolores, folijs floris co
folijs constat, quorum terna inflexa & terram spectan
saturatoribus a medio folio in latera excurrentibus d
maculam flavam satis latam, medium folium per l
benria & gibbosa ejusdem etiam sunt coloris, pau
gis satuta, odor pene florum Taliz: binos autem, ternosve in eodem caule fert flores, qui te
liquarum Iridum bulbofarum floribus magis sunt ferotini, ijsque marcidis demum aperian
tur f... nitium Julij. Flantibus succedunt triangula oblonga capita, ut in verticcolore Iris
bulbofa

Natalis

E Lusitania porro hoc Iridis bulbofe genus, paucos ante annos, primum in Belgiam de-
latum fertur.

Sequente autem anno, a tribus bulbis ab amico acceptis, unus florem longe elegantiore m
jam descripto tulit, amplioribus labris nempe cohstantem, tribusq; folijs surrectis latioribus,
gibbis

Irid. bulbosx v. feracn.



gibbis etiam amplioribus, fotumq Læ adco Ro- remmulco faturatiore purpurâ nitctem, & ma- gis expanfum , idem camenqui inaltero odor: caulispra:terea circum nodos quibus folia in- hrcbantjex purputi nigricabac.

PRIORI, a c i f o l i e i ^ d c o l g u m *M. m. s.* przreliquis, amplitudinc, &cxrulcxfivepur- purear.afloriscolorc: Hifpani,vcl LirieGmpii. citer, yc\Lirictff>*d*>id, Coidubcnfes, Ltrws i>c</f,3ppc]]atu,liocctf, Lirium,Lirium enfi- forracm^LiriunicaTutcum. AltcramjViola- ccamcognoininavi, Lobcliuscum PcnaHya- cinchum PoëUram clfecenct, vulgarc hujus nomenniillumfcio. Tertiamangurtifolia ver- ficolaremfivevariamnominavi; Hifpamiir/* i^wffappellabani:. QiiarcxaHoriscolorc.Fh- vz, five Lucca: cognomen indidi: Lufitani, Rey/abutj\ocib'M. Quiiux,quum mihifpon- te nafecsnon lit obfervata, null urn nomen vul- j;arcinrellcx: fed quihortorum calturadele- danturBacavijLulicanicxcognoniendcdciandr.

De jllarum acem viribus 3c facultibus,nihilcompenum habco, auc ab alijs tradicum acccpi.

Omnium porr6iflarum flon'bus,illiuiprx- fertim quxvano est flore fquia, ut opinor rofci- dumquendatn fuccum in lacenbus exfudant) formic* mirum in modum funt iniefis. Prar- terca omnium iftarum, tarn illarum quarum mentionemfecimus,quam fubfequenrium flores niarccfcere jam incipientesj hanc pcculia-

tem notam liabent, quid milvinorumunguiuminfarcomtahantut: quodctiamaliorura Iridis genemm floribusvenir.

C* T E R V M funt & alia: Iridij bulbosx fpecies^on ex quidcm aiiunde inveds, fed fe- *S'itu ürHej'** *vrjirtr.* *Wjft i I .* **taiitt** apud Belgasnatx.quarum hi(tonapra:termiueandanon videtur,cam ob caufam, fupc- rionbusadijciendascfTccxiftimavi.

PRIM A igiturVcriicoIomquoddam genuseft.afuprioribusdiverfum.nonfolijs^aule, I. *titradicc,hii cnim cum Tertio auc Quarto g?nerconvcnit,(cd flonsco!orc:quia tna**jus** folia ad terrai inchnata.Ii v labra.flava (iint,& Quart i generis folrjspropendcnubus labio- Tumin{larfcrcfifni]ia, magna cimenaurea macula in prominentc&T reflexoJabro infigni- W.adquamabinfimofolrjutigueincrinfecuscxcurrentr aliquot venxquodammodo purpii- **talceotesjtria** autem gibba & illis incu mbentia.dorfo \$c alis pallent,lacen bus **candicanti tria** Vcr6 furfum crefla,ex albofubcarrulea funt,hoc**eftjalbicanti**siunicoloris, quem (ubca;u- Itacfaajratioresvcl dilutioresvcnxdiflinguunc.

ALTERIVS rernatiiflexafoliapallent.&labrum liabent fljva macula inftgnitum, a qua II. *d unguem ufqucanguftiora funr,ut in ccccri? genctibus,& interne qmbufdam **venulispur*** Puralcentibtis diftinda funt; tria gibba folia ligulanuegentiaiiJ^poXfLr'xoi/runtcoloris.vflat- Dicant,fiimmo tamen gibbo pallefcnte; terna furredta exalbida funr,nervus ramen **perlon-** g^Cudinm excurrē *Hivckii*. Vtnufqvc HorcsodoratijTertij generis fupradfcncpti florum "ifhrTadixetiamnoa minus quam in illofocundaproduccndisnuclis.

Ulas habui tnuncrc Ioanms BoifbtannoM. D **XXCVI** quadrienniy verdpoft, tresalias commumcabat,qua:iafequenteanno hosfloresprotulcrunt.

PaioR. quacentilliusTerciumgenusabipfbaccpcum, l.itiore, breviorcquefuit flore, III. Ciijuscernainflexafolia.laro&propndentcfuntlabro, mediaaurea macula (quamalbus orbisambit) infignito, perorascripfo,cxrulcicoloris,i macula aurem ufqucad unguem fo- ^i.cxtai^diturnervuscxtniirecusvirefcenSjinrinfccuspaniduSjmultispurpureis vcinsinla- teraexcurrentibus, tria gibbaalataque foliapurpurarcntis funt colons.gibbus albicans,al5 c^r t i t e j t i f i i / c c t a f o l i a ^ p x b r j f u n L

ALTE R A, fivecjusQ^arta, florem habuic.cujus ternafoliatcrtram fpec>ania,flavi funt *mi.* coloris,aurei macula labrum occupante.a qua ad infimos ungues.inrciore parte lparfe fun c SuatdimvcnidilutiuspurpurafcncSifoli.ijsmcijnmbentiacxalbidafuncprxtcrnicdiurn nervum ad extremum folium excurrentem & gibbu m,qu i pallidi funt colon Sifurrefla terna

f^ a i p i m a p a r t e p x c x q u o p u r p u r a f c n t i b u s v z a i s f u n t d a n a n p e r n i c a n d i

Timtx,

r. TERTIA &, five Boi foci Qmna: flon ^crnaincurvafive in tic xa folia, prorfis la&ci can-
 on s faerunt, pra:r,erwacula!Tiill;inimcdio labro Lmprefm ,cjuaraurei colons cracgibbs
 prarterca folia illis incumbencia,albfauerunt,ut Sc ternacrefa,excepta ilia infimaparcecir-
 ca imguis.qux re nue qu idpam l ii be^rulen m habere v i fa eft. Odorati c ciam.h t flores cranr.
 Ex cujus generis (emfoenaue lint hi vanecaEes,nilil ad rac percriptumjiwcforlitan quit
 piamtamexalcobfcvavit: odortamenqualisin V cfi colors il la j iriTertiogcnerC fupr*
 dcicnpr^mcinitjfpicionciiiaadducitjCxilloongincmfumplUrc.

IrisbjlbofaF-vfi.e. i.chffisterci.T.

III.



II.

Qv A s vcroPrim* iltiu Flavari-Variar
 Duuiriiprintim iTihimiflx,fcroiiieco na-
 ctus/um,&: annodemumM Dxc. duobus-
 que ilium icquencibus, flores protulcrunt*
 ubtdam.

YXA, quim F-V,hocctfF!avam-Variam
 majoremj&orintLineielegantifliniam mcri-
 : 'a;>pcljrc poiLLim, caulcmnonminusal-
 tum uabct,quam Teruutn illud genus vcrl-
 colorcliorca me certio locotlcfenprmn ,vi-
 deli. JCCLibitalcm aLitamp]ioren],fulial.itio*
 i i:breviora, media fere interillms&Se-
 tu;itli generis folia, fl'jrcmmajufculum,cu-
 jus terna folia iniljx.i 5; terrain fpefLnria lu-
 teifuiucoloiis.&aurcanucuIAinracdiola-
 broiiiiigniun[ur,orisquo.lanimodopurpu-
 rafccQtiDus,angafjorc folioram partcqr
 gibbnintegitur, intrinfc'mukislubpurpu-
 rcisvciiisintarcacxciiiirentibusnorataigib-
 bi&iacatDbeuciafolia,diIuio purpurco co-
 lore funt prardicaitriacreflaralde (aturapur-
 pura iicciiCj" c quafi vtoheca fant, prxfertim
 mediusper longtucudincmxcnfcusnervus.

ALTERS ecrimF-V,&taciflora,(ciipaii-
 lo humihor, terna a.l ccrnam inflexa folia fl-i-
 vi colons bibec aurei inaculi inignita, &
 qua,ad iufi num folijunguem,multas purpu-
 rafccnribi? vni-inucnreparceruncdifftn-
 &.i:giblu folia quo i.inmioilo pttpririfctin^
 ncrvjtn tamen CuhHavum habentjtriafoli*
 ereda purpurei funtcolons,

nr. TERTIA F-V.florisfiittMeadcm.&ierna ilia foliainSexaflari colons, aorcimaco
 infignita, & vno argenteo ibi, m s i l d o l j s f i b u i c r e p i i r f u r a t
 centibusdifftmela lunt: furrecta terna folia ex cacruleopurputafcunr,mediiwaatemperloi>
 pitudinem excurransnctvu^Havefcencis eft colons: &trialijs incumbentia,oblofcti,cui
 fljvi quidpiampermfllumclt.

mi. F-V.Quarta.ctiamlacifluUjteinainflexa folia pallidahabL-r.iurea macula in(ignira,q"
 auiemparcccMncrato folio integunruipurpuratccnbus veins (ttrndillinc.U:gibba fo!
 eriamp<purafaiQC;triaverdcreaiorafolia,c<<IciimIubentcoloreiD,

v. Q_y i 9 T A F-V,qua:anguft[Roracit, triaadccramfpecjhmriafolia,flavafoot,aurei
 ctiam tnaculi medio labrolo{ianica;Sf incuoibentia illis Folia candicant, ncrvus amen
 eminentior,quoJ amho J. & l a n f e t t i m i a l i g n i t a . a c x a l b i d a f u n t , i n a p a r t e f u b
 caculeis quibusdam veins leviter difftincta.

n. SEXTA F-V,(tiam angustiflora, & humilior, non valde abfimilem matri, hoc est, Prima
 a Boifbr. miflir. hibut: florem: fed quibafdam not:s fecundx ab ipfo accept i elpondentem,
 uc media qiixdamfpecics inter urramquecn fen poffic.

vii. LATIFLORA cft^claciorSeptimaF-V,cojusinflntafoliahabentlatioraUbra,fl'?)
 coloris, aurea macula inignita, qui vero parte gibbis fol- untur ad taguem usque in-
 terius. m e coloris, gibbo
 exceruleopujuMftopcgibba&alata folia ctiam purpurafrenis f
 tamendi!mi,)rc:i(irrc-ta folia Lt iu(lu!a(unt,& illts nu^ispurpuialcu ut, caculeique quid-

viii. HVMILIOR, lanfloracamen, eftOaavaF-V,eni tcmatcmtn fpectantia folia flava
 funt,aurea macula maju feula DOCUa, intern* i pane qm cameratts bifidM^c folijs regior,
 pnrpirafcentibus radijsiolatera excurrnbnui difftinaatgibbacrifataqoe folia . purpurei
 carruleo commixtiluntcolonvpio gibboexpurpuraPuvctcnciccicaioratbha , caculei
 purpunpermixti funt coloris.

AMavsTiFLonA/edlmmiliorenam,cllNonaP-V.cujstriurrioflorurtucrramrpeaan-
tium labra longuata sunt & pallida, orisque aliquantulum purpura centibus, macula aurea
longiore
vum qui
tes gibb
inligaii ardi quapart biridis fo Kis reaa. iriterncpurpurafcentelpritermediuncr.
act;idUuton.s,fn[is,-xvirid,paJ(ffccit!s^ihbacumfu)saliscn(tatisfolia, purpu-
[ispaulodilnrioriluireccla teniafalia, purpurafaturatiort: nitent.

IX.

Deci-
-A, cjiimemrorcaltitudiisdcum fupCTiore/julqucteriufoliaadtcrtram proiia,
pallefcite
pae foris vitel
Anax colorcm tendenti
i, :;ibbtispa!lc(ccns:terna folia qua: furfumactolluntur, albatunr,
medio ncivocircaungum pallefcencc.

X.

Vndecim
q p
bafun:,9ava«naen macula infigaica:gibba his incumbentta,™ rpurafunt: tria furfirai «e-
clapurpurci/eiiviolacafmicwlom: brcviter non muknm abluniliscft Anguftiublwwcr-
fi^olonfaturrin l'imacli(re.

XI.

MEDIA quodammodo inter Latifloram & Anguftifloram eft Duodecima, ea^jchrior,
Ubristriunitulioiam terrain fpectuitiumexalbo purputa-'centibus.aurcamaculanotatis,
quxincdiuin etiani folium perlongitudinem fecans, ad mfimum ufque unguem angullior
prore)ld)tur,c/usbrijrj)j)rnju5/ji:ijrjnorf6u(vents purpuras dilltn&a: folia cufatsSC bid-
diillivmcumbenna, d lucipurpurei, & quad ad rubedinem tendentisunt colons, gibbo
pju!o tngislaturoulliinlispiaacolons font (urrccb folu, eorum ramen unguccsaliquaucu-
lum (jturatiorec.

XII.

Ittrjra porroomnium flareso JoratifunCj&Tcnijgeneris floribiisverficoloribus, odo-
risguaiarelpndent.

Ex hae quidem fummae funt differentiae Idem bulbosa radice praedictarum, quae mihi fe-
OiineF-V.pnin.tUuiion nax:alirt,i[iicn tti.itn iijt.-e. ledquaruincoloresproximead ifla-
rum colorcm accderenrpropterea.mmimc hueinferendas pucavi. Nam in tanta varicta-
te,qiiisiiii»ularuui di/trimiriJ conynodc vrbisexprimerquear? In fl.iva: autcm & Purpi-
tex vigkccjc femne nans plantis, nuliam liaitenu vancrarcm obfervavi, fed omnes roaier-
Hum Colorcm retinuerunE, & ilium qimjcm intcnfiorem vel remiffiorem.

Summa va-
Titli m lni.
initjiftmi-
MIHUU.

IUvii practercini ftaruin in ium plantis femine nitisob(crvabam, plurimarum vaginani
illam iniiiio emergentem, c qua. ui in priiuo Jcscriptisexeunt folia, rutn five langinei coto-
As radijt ctle infida^non fetus ac Quartigenerisprimz fpecici in prinia ClafTe vaginulam.

SED & Decimum cercium genus (emioe mihinatum, quod florem demium tulit anno fu-
pramillciimum & c quingentefiann nonagclnnoquarto, quadriennio videlicet poftquam
iemcnccUuricrdicum. Cubitali vcrorafurgitcaule^iodoio&geniculaioinllaraluruin li-
dum liujus generis. quem ambuiuloga & afigufta folia. cannanurinfij prioribusrciiquis:
fmnmuscaulisuffinet florem reliauibn. iliinitcm&: novcmfolijsco(iftjntcm, fcdcolo-
fediverrum; n. incerna majora LibropTOPendciitcprofufcxriilcatunt, tumentmaciill
aurcoloris amedioLbrojdinfutum flbj unguem diferttajns incurribentia. fornicataq;
fealatafolia, [acunpurpuncotorefunr, ligLilam^uetegunr, terna(urrect.i, oblor)ga, an-
gufta, farutapurpu'l (cui rubedolevisal imej) in tent: odor tenuis, nec ad casque, verfico-
lorefuntfl >c (uavnacemaccffJcs-capini Utrigonalongaqjinllarcapiniiawcificolorisj^ua
tamcnnullumlc menciileruicradixbulbofautreliquarum Indtim bulborarunijp!urcit.iuc
nuclcos ad iatca generani.

XIII.

Floruit primo annu circiter quindccim dies antecillasqua ECiruleo Stflavorunt florc: al-
tero cum ij(Hcm, luno videlicet.

Huicprorflisfuiukm H'CoaliaccipicbamannOM D.XCVI abcruditiflimoviroD.Simo-
OtdcTovarHirpaIenl5Meaico, utexcjus Hurt: quern infcqucnrisanniMaiodedit, obfer-
v»reporui anverofcinincipitiutacirer. autaiundeaiiffjiihiladicribcbat. •

SUPER.IOB.IBVS annis. utaiice-diciumert, "" FIJVZ Indisbulbofxcinincnatitplantistml-
^rnvancratcmobfervjvcravi: ataiiio M.D. JCCVM cum in hac, iumalijs infigne vanctatem
babui. NamaKnononagcfirnotertiofupramillefimump& quingentefimum feorfimindi-
vci fa pulmnis Flavar, AtbyjFverlicolons (eniina tcrxcommifi Tub finem Novr mbris, na-
fJCcxijiplanri nee loco mutar, cjuarto p6(t anno flaresproculcrunt ;tx Flavaquide, autna-
*O!prorfus, aut flavos *jimni furrecb folia au^ pall c bant aut ex ilbidacrant, vel c^ruleaerant,
vclfiiliginci! ifectacuni fornicatisfo]i)s, ex F veriicolorcauterrijfiavos. flavos item quorum
ft rrciafoha alba erant, vcl initiolabrababentes flavaaurca macula inllgriitadeincfcflavut
Hccolormaculaon amhiens cxruleuoiccoloremproduscontraxit, folararnic-ita&rfmrc-
^afatura pLjrpuraninierunt, vcl etiam alios illis perlimilcf, quorum tamen Havalabraoras


Quandone-
va vancrat
in lradibus
i*ti*fu ft-
mint Hutu
Hjrvacur.

W Alba vcid palltdos. furrca folia alba aut exalbidahabentes. autxc Truleopirrpurea, aut
matn pro pemodum limtle*. Quam vanciatcmprodacnt reliqui plantacjllis lemmibus
nate, indicabit dies.

TRIDE s bulbofoproxime.fineconroverfia, fubfcqiii debet planta quzdam flore Ky. & orbilulara, ut Xyphium^ujus duo genera ID Hifpanica pce- griDauoncaincoWervara.

Sisyriuchium majus.

Sis(-)rinchiura minuj,



Sisyriuchium majus.

VNUM oblongis angustisq; folijs, mollioribus quàm Iridis bulbofr folia, & ad Allij aut Hyacinthi botryoidis folia proxime accedentibus, striatis, viridibus, & humi plerumque fu- sis, rotundo, dodrantali, striato firmoq; caule, qui ex multis involucri tanquã vaginulis flo- res promit quatuor aut quinque, alternatim prodeuntes, hoc est, ut primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps, Xyridis potius florem referentes, quàm Iridis, ex no- va compositos, quorum tria, ut in jam descriptis Iridibus bulbosis, deorsum infle- ta verò reliqua, quæ in alijs ligulam tegere solent, surrecta, summâ parte divisa & bifida. Est vero totus flos pulcher aspectu, coloris caerulei, præter maculas illas, & odore quidem prædi- tum membrana constantes, ut semen rotundum, parvum subrotundum, quod in illis continetur do, superior plena, candida, dulcis, edulis, & pueris expetita, inferior flaccida (totam nimirum substantiam ad se trahente superiore, ut in Croco, Xyphio) & tandem evanescens cum inha- rentibus fibris: multiplex verò cortice reticulato, crasso, nigro integitur. Y. hujus radices instar, & adnatis sese propagat: nam quinas interdum, etiam senas, aut pures plantas, quarum sin- guli bulbi suo retiformi tegmine involuti erant, alio villoso capacioreque tegumento simul comprehensas evadere memini, in collium supra urbem Olystipponem acclivitatis, apud suburbanum Magnifici & Generosi viri Ferdinandi Cortado, equitis Lusitani, multis per- grinationibus in exteris regiones factis, clari atque etiam Gadibus, non procul à ponte, q- eam insulam continenti nunc conjungit: unde ejus bulbos in Belgium ad amicos mittebam N. & C. V. Caroli Tiliac, concilij Belgici tunc in Hispania Præsidis, operâ: qui successorem deinde habuit C. V. Joachimum Hopperum.

Sis(-)rinchiura minuj.

Sis(-)rinchiura minuj.

Sis(-)rinchiura minuj.

ALTERUM genus superiori simile est, minus tamen gracilioribusq; folijs: flores è vagi- nulis prodeuntes, colore superiora floribus si- culi minore & exiliore semine pleni radice reticulato cortice tecta, & gemina.

Crescit Valentino Hispaniæ regno, sed Murciano frequentissimum observabam, atque

cruebam, praefertim in ribus lucis superacjus regni metropolim, *Murria* uel *ga* appellaran), quae Vetenbus *Murgu* dicebatur, in cre Granatenfi.

Floribus acutis, quae genus Martio, nautiolo: / cadapud Belgas, Maioduntaxar, interdum etiam lunij in Ojtdcjuvald raro. uopotcnoijalteniisucplunmum. annis durjtaxatprodre folcat, Jmo paulatim pk'rumque conrabefcens, profus candem sepem iitero percat.

PAIMVM genus Lufiuni *V**^ff (quasi nuculas aucparvas nucis dicces) appellant, quopticfidiccejusbulboperindcatLjueavellanis, vefcuntur, eutnque in dclitjs lubenc. Alterum i(jcolis, £»7<?, nomui) l's *Macaco* *diatur. Porro rucplanta&d cum bulbopluritiu majC^cdrevidetur. qucm Theop'hralt lib. vii. Hiftor. > Ian car. cap. xin. *acvpt-yyjovap.* pclUc, . Styibitenim pccularc Siiryricliiocnb, ucunaradixprinioaugeaturhujmt-Mum incunte Veri; quodi i tniocx creverit, conralucur, fupremumq; crc/ca, quod manditur, Plinius verocum fequucus. tib. Natural. Hifton^cap. v. Gtfncra, mquic. Gtschaccfecce, Bulbiact* . Setanorij Pythion, Acrocoion, Agilopa, Si(yrinchtum: in hoc mirum, tmas cj us radices crecrehemic; verno autera ciim appamcrio viobj mitiui & contrabi, rum deinde burburn piaguefecre.

SEG V a D v M genus, ad ventristorminautile flercrcrcbancincolx: fed devorataradicillo corpus faltacione effe excrcndum.

Qv. o pociflimum refurrem hunc elegancem florc m, dfu fuidubius, fed & adhuc xrc O: nani ex mutila iconc, concinnandam illi fuit illtus hiftoriflj neccerri quidpiam ftatuere licuit. Ne tamen locum non haberet, proprecognitionem, quam emu Sifyrii chiobabere, iieaopipiaic, vidt: rurj Sifyrinchtj capiui addendum pucavi. Si qms vero aliopertinere cenlbit, perrncq; iidem (brnperlicbit: peruinaciter enim meam opimonccuri. non est animus.

Es r cr, 4 > hu) us (lirpts flos (cujus fupremam caulispertem cum flore Cuis coloribmduntaxac ocpreirir, anno noiu geflmoq; iiarcorupramillcfimum &: quingencefinium, Praga accipicbjm' ab Elaialc Gillon, mex (ororis filij) pulcherrimus, lummo cauli Litis graciliffi Vircheatiianitens, Kcxmcmbrmaccomvolucro, infat fbHiclonim, quillidn m flores atnbuifi Cjmcrgons. Ertbustantiim folijs *ffi* piflur^ fides ell adlnbenda, confans m ucronacis. binis uncias lon^is. minimum digitum lacis, dor(oclatiore, c=cmlcicolons adeodegacis, utcum Genciancll. ccirulcis floribus contendere podit: inrcma parceramofaquxdamilaraina in rtiuluscenucs fibras ftaconnere vidciurruficoloris. apici bus vcrdalbis; infra illum ai Jira cr jr. alcerius floris gemma luo membranaceo Folliculo etiaro in volura.

Expre/ia autem fuerath. 'Ec'icftn ConftantJnopoly a piftore induftrio. dcalcera, quam piflor quida Perlicus c Perfia attulerat. ub! nafci, *ScUle* vocari affcrebac. ConftanEinopoly vcrd cftc jguofaru lunceplantam. Z^porr6, Turcis florc m lignifc arc, anccdicrcmcmmini.

IRIS. LATIFOLIA MAIOR.

CAP. X i v I,



IRIS oceanum flirpium est numero, inq; iitbtij rummam varietatem obfervabam. Innullam enim provinciam peregrinatione inftitui, quicjus aliquod genus antes mihinonconlbcftum invenit, uccxmeis Hifpatiaruni & Pannonicariimftirpiitmhiflonjsqu^ feorfimruntedir^ vidercliaic, & cti3 mex hac apparebic. Omnes aurem m Latifolia^ & Anguftifolias dividemus a Lanfolijs initium fad; uri, quas induo capiradifl' tribuimus, priore quidem majores, altero minores & Ipumilas comprclifuri. Anguftiblij dcinde foam pccularccipurdabimus.

PRIMUM veto [ocumimcrmajores Latifolias ob floris amplitudinem & vcnufhitcm merito fibi vendicare videtur, qua; (cm aut o) Jona habet folia Iridis LufitJiic^ biflur^ folijs nyn abiimilia, muruo (cic ut in alijs [ridum genenbus ampleflencia: c quorum mediocaulis exit cubical is aut amplior, rotundu<;, g. nicutatus. digi Ealiscraf ltu dms, florem fufitir K-momnium quos unquam in Indibus coit pexerim maximum, novem^ iit rcli-uorum, fohjs confhnrem, colore ta. men ab illis differentem: namrn. i. id terram inclinata folia crafrant. tnrriorc parconinon nigrajnftque! damven Tex purpuracandicantes intercurfarcnr ab infima bail ad medium ufq; nctngns villis larnbfita. macula nigra. fcriccivi Winigripanni inftir, medium folium occupante, foris multo dtli-tiorarunt. tcrnailianimoracis incumbenriaqu*

Trinomialis
fol. i. flos
latifolia

i piam

ligulas

liguiastegunt/cTnicara&biGda funt, fecjufciem ftrcco)oris, paullo ramcn dilutions, licet adobffurampurpuram 3cedei>[is:mafiJn'c&r.a.palmarisiunr. amplicudinu, &rmembrana-cxpxnctcnuitans.pliiniiriislfncisabinfiTiabaliadextremum ul^uc folium excuncubits, paitim nigricannbus, pamm excincraceocandicannhus , ut Amciicani pavonisexpp.nfam cjud.im fere imiternuijintcnc area uriguemnonnilulhifuu. Nullum odorem m hot flo-redepvchendi , fed lola LOIOHS varietate.K ramate commendabiliseft. Ilh fuirecdunt, (cd rar-d adiiit>dum,capitatrigona cralTa.uncias tres.quatuor, & quinque ititcidurr. Jen t,a, nurnc-rorum/cmcnrugol'urn/ulcumjpfifcreinfstarinagnum^ontincnria.

Natalo.

Couftairinopohprimum Vtenni dclatafujt hare Inisipfabruma III. V. Augcriodc Bouf- becquep.m.Csfinsolini.adTiircarLmlmpcTacorc^cgacimunerleptcnnifundo.po- (tea autcm Set¹* Elizabethi A u (trial is Gallic Kegmx vidua: felicifs. m. Tum mo Aulx Vxx- feftc&CajfariaConfilijs.annoM.D. lxxiii. ciimreccnscoadveniflbm, qui unaradicemc donabit,aliasinBelgicamamtcismitrcbat. Sublcquetcannofiniilemattutit Mag¹V.Ca* rolus Rym Dn. dc Ecukbecke Csefarus cliam Legatusad Turc. Imp. Conftantmupoli rc- dienscumalHucPhilibenode Bruxella DcincdquotquotautLegati.velHonorarijfcrcndi gracia Confbruinopolim mifli,Viennam redcurcs ,cum alijs exotieu ftrpibus eriani auo- Jerunt. HieroisinjuriasdifficilLusfercinhortorcpofira, reliquis Iridjsgencibus, utego& plenqucalijnofrodannoexpccifumus. Ranuscmrnctctisflorcr, &unicun^ utpJun- mucn,flciretn pcofK,MaLo:(emcn macucum lulij initio.

Ins AiLuicacsrulealjvelacifbl.m.ti.

Ititmmrl*-
17/4.11.1700
M. 100000-
ni.



S N A 3 fcptena,03onaqueha'berAlre- rafolja, omnium Indum aniplifliniaS: in laturi]expanra,vuidiscuixrugo permixca vidcacur,coloris, nuituo Ic amplicfrentiajC quorum medto caulem promit /cfquicu- biiacm ,interdum etiam bicubiuiem vel amphorem, fumuni,cra{Jiorem fupenoir, lxvem, genicLilaruni, niulcis^aliscooca- vum.cqiiibiiscipiofi (nullam enimfra- cwrcmconfpexijvaginuli/queinclulipro- dcum flores, nvagni.novem (olijstontan- tes, quorum remainflexa dilutepurpur*- fcennsacque adcznilcom tendentis funt colons, multispurpurafcentibus venisab infima parte & ftamina tiubrii flava in Jongitudinem Sc lateracxcurrentibus:bifi' da foliaxalbcfcunt,gibbo ramcn iHorurt dtlutepurpurafcentc: ma qua: frfcattol- lumfolia, anguftioic ic ima partequibuf- da purpureis brevibus venis diftinfla funt, ubiver6(ein lacum expandunt /ubcarru- leum habent colorem , dtlurioremadhuC a.& florum Sambuciodorem, quam inflex- graviozem tamen, quodammodo zinu' an- cur.-ijsfucccduntrarioiesilicjuXjffivecapi- ta^raflajmagn.vtriangularia, &obcuo mli- crone pr^dira,qia:mati]nta. & dehifcentia, feracnconrincedpche'dumur crallum, angulofum.durum.flavfccns.rupMiori fe- re par: radix era(raeft,magna,nodoft, mtu-

tis longis craffisque fibnsdonara.IateribuSjUtreliquiz/c propagans.4.: fi rc purg.ira<i i" C- tur.odurata.

Conftancinopolt mihi mifTafuitab III. V. Davide Vngnad, Cxfareo turn apud Turc.Imp- Lc^ato.nunc bellici Coufili] Przlidc. Floret etiam Maio.

I>*)«! It
tifr. l. U. fi.
in Ddmit.

H vi c non valde ablimilisefl.quam ante multosannos, in Belgicam ufqueadnosm^iz Ooais. Alp h.Pantius.nifi quod florCs.iMiconcolores.fummocaiilisfanigiomagisconfri; toshabctevidetur, jucundiffino ipeciaculo; icmentiamin bicviorctapite minus, palli- dum,angutofum,rugofum.

I'kndjrls-
tifrl ill i. fi.
ve Damje.

N E c illidifparL-ftfolijs&radicquam N. V. IoannesabHoghclande Lugdono Bata- vorumadmeficannoM.D.XcDamalcenarnominc.iprilemincnatani. Cubitalcaut^ bie-nniopoftautpaulloa|orcmprotulinlac3u]fni, mquo multiut in Aliaticarfrufca flores.trtridem quot eafaliisncc minusampliscanftinKs.ejuldctn^fiznccalonst rena ta- meninflcxapaullo dilutiuspurpuralcerc&adcirulcumcolorniiendcvidenrur, atque magiscomplicari.ternabifida&gibbavillof*limbrta:incumbentu,anguliflora&cinfc i quodammodo colon* :Krnavei6Jurre<aa dilutions extulci funt coloris, & latis interdum candican-

candican-

eandicantibus vetisextmapartconiperfafunt:odor Afiatricafimilis, Hoc aureminejus aliquot flunbmbfervabam, unumcxilhsfblijsexurfurnatrelhfolent, fubrus, pcrinde atqueinflexaalbefcere, ctiarnaliquantulum inrlettij tinnliscolorisefTe, & fimbnam illam multisvillisconftantciH Inbrc. An porrd fingulis annis fimiles profcrat Hores, tenipjs nosdocebit.

Irislatifol.majorv.



QVINTA habet folia Scunds familia, *tmwijtrU-* paulo (amen breviora.&angustiora.inter qu? ^{u^v} P***_l ^{A_i^d>i} **P^*_

cxiccauliscubitalis^otundus,digitaliscrafii- tudinis,in aliquot ramosdivi(us,quiptomunt è tncbranaccis thecis flores fupciore minore<.,nonnihilodoratos,quoruniJabra, five folia ad terram inHcxa, facurationsfunt purpura:& infra circaanguem,quavidelicth!] fuc il la & pallcfccns funbria excurrit, vanjs venisdiftin6la:hisincumbunteriaalialatmfcula bifidafolia, quxcanJicantesligulas tegut: dcindc clacenus (urgootrcrna etum folia, deganti purpurco coloreprxdita, Hon Lufitanica: btflor? fere fim ilia,lacioiacamett! luceduairriangulaiesfiiqa^obtofomaGfOBC, inqoibus fcracn insequalc: radix tubeiofa, Secutidarfimilis.

Mirtaenam h?cConfl:ant;Hopof[iabni.V. «*"* Davide Vngnad. Fiorccquc Maio.

ILLI congener fuit, qua ad me Viennam >""*)* niifir lo. Boifbt anno M. D. xxcnr. Similsa '•>'• enimfoliahabuit, caulcrapaullo majorem Horesfimiles^liquantulunimajores.inodoros,quoruDicma(urreclafo liaa[quidrubeditushabcrevidebanturji-adiCLsamljtudinc conueniebant.

IK 1 D 1 s m^jorisduoaliagenra in Fran- fir* w}«* cofurcenfibushortisobfervabam. Vnum.cui ^{U"J-111,} llynca: cognomen dedcruntjonga lataq; folia habentcm.Di!mania: majonpxncpana, caulem non mimis grandcm.ncc ranores minorelvcfloresprofctentem^ novem, ticreli.

qui,folijsconfntantes, quorum tcmainflexa&!^: terrain fpcflatia, planepurpurci five violacci, dilutorista*)enfunccoloris,nullis,niiicirca infimam partcm, venisdilhncia, nmbna medium folij ncrvum occupante, albisftaminibus flavoapicc prxdirisdonari, trij furreftafoliaejufdemfere, fed magisdiluticoloris, acJSCteroabifidaligukmtcgentia, &iiiabrixincumbrentia:oJurfjcisfuavis.

VVLGATIUR. Altera.fimiliahabetfolia, abexortu an tem circa radicem purpurafccmia, *iri*, *>*U- caulemcubicalcm.iutampliorem.miiltoicvaginulis.purpurafcentibusradijsinfigntispro- "M^»«- fcrencin flotes, novem folijs confntes, quorum terna l ncurva mulris cratis venis purp- ICIS funt nocacj ,fim bria ad labrum inflextiprotensa, capillar^bus ftam inulis Hivo apicepriditisonatairernaereclioraplcrumqucbih.lafiantjColorcmqueliabentobfolctum , in quo purpurcumquidpiam magi? v-A minus faturumelucet, alata angufta folia fim brixincurnoenciaejufdem cum fiirrectis funtcoloris,prxcer mediumnervum in longitudincm excur. ientcm,quixca:rulcopurpura(cit:odorflorumSarabuci. Breviterlridiobfoleexbelgica: valdc fimJiscft.

NON AGE si MO porrofLipramill^finium&quingctefimumannOj milliimifTafuntBruxcellisa N.V. loinneBoifot aliquot alia Indismajoris genera, qnorumnonnullaMaiolc- quente flores dedcrunt.

VNUM brevioraquamfiiperiorliabrtfolia, alioqu'tnondifTimilia, nee minus circa radi- *irhm^tr.1** cem.quainviccmamplcft'jntuijpurpurafceiKLa : caucmcubicalcm&horem, inaljs ^{ifil un} divifum,mqu 1 bus in ulciflures.tatidcmquotprxcdenrcsfolijsprediti,quorum terna deorfuminflexaperorasfiibc3:rulca,circaungucscxflavocandicant,deindemulnscrafTiulculii fiairarpurpuxvcnisabimoinlongicudinetcnxcLrrentibus funt pracdita, ftamiimmfimbriaefuperckmfimilueft : terna ercfla folia candicancis ex cxmlco funt coloris, eonim ori quodammodo flavcfunt.unguestenuionbusvenisdiftinguantur^bifida&alatafolufim- bnanitcgemiaferecx flavocandicant: odorprarcidentifimilis.

PA VLO humilius AI md eft.ncc ejus folia circa radicem purpurafcnnt:canliscraciiorin ^{1*•*•»} alasfinditur, fioresgeflancesfupcriurifotmaquidcindmils, divcrfitatnen colons: nam ^{J**"/}



terna inflexa folia, licet illius folijs non sint disparia, oras ad flavum obsoletas paulo
 habent, venasq; paulo dilutiore. *tertia* non abnata, paulo
 rana, angusta alataque folia simili colore praedita, praeter medium nervum qui magis purpu-
 rascit: odor etiam florum Sambuci amulius.

^=sssesssks^S^?sssss^*i^s

Iris latifol.
major IX.

PRIMA parva Tertium habet folia, interque cubitalis fere & superiori aequalis affurgit cau-
 lis, ternos aut quaternos e vaginis viridibus, oras purpureascentes habentibus, ferens flores,
 quorum tria inflexa folia Decimae quartae non valde abnata, longius tamen protectam ha-
 bent fimbriam illam villis constantem, quam ut a bifidis & gibbosis folijs tota tegi possit,
 quorum color obscurior & saturatior, quemadmodum & sese accollentium, quibus non un-
 quam in parte luride maculae. Odor idem cum superiore. Paulo tamen teritis haec floret.

Iris major
latifol. X.

QUARTA (quod mihi perijt) huic coloris respondere scribebar, & peculiariter id habe-
 re, ut inflexa folia duobus diversis coloribus secundum longitudinem sunt discreta, altera
 videlicet parte reliquorum foliorum coloribus secundum longitudinem sunt discreta, altera
 cruce accepisse, qui semine natum sibi assereret cum alijs Indibus, quatum nonnulla unicum
 duntaxat folium variegatum habebant, quardam versicolore tantum nervum medium fo-
 lium secantem, cumq; vel ampliore & latiore, vel angustiore, ut mirum dictu sit quo
 modo Natura in his floribus iudat.

Iris major
latifol. XI.

ALIA praeterea genus eidem civi semine natum
 rum conspicuum, non adeo tamen elegans, sed coloris... ut vaiko-
 lor carulea dilutor dici queat ea Iris.

Iris major
latifol. XII.

ALIA sunt XIII folia, & lanora longioraq; quam in precedentibus, viridia admodum,
 rugosa, aliquantulum crispata, mucrone nutante, e quorum medio emergit cubitalis aut ma-
 jor caulis, levis rotundus, viridis, in aliquot ramulos divisus, qui e venticulis vaginulis latis
 amplos promunt flores, nonnihil odoratos, & ad vulgarem Oxycantha floris odorem accen-
 dentes, quorum tria reflexa folia pallida multis crassis purpureis venis a folij interiori a sede & a
 fimbria, ad extremas oras sparsis praedita sunt, labris etiam saturae purpureae n. tentibus: tria il-
 lis incurvata, sub quibus occultantur ligulae, coloris pallidi tamquam fuligine perusti, ut
 etiam sunt tria erecta, sed magis luride nullum mihi haecenus semen tulit, tamen multos
 annos illam jam aluerim. Matutius paulo floret secunda, & color floris aliquando latita-
 rior, interdum dilutior.

HancnactusfumaC.V.IoachimoJonch RCamcrarioReip. Nonb.Medicoprmano, «
& amico carifs-unde veto ille habucrit, ignoro.

Iris latifol.major xv.



Rygosafunteciam iffi folia, minustamen
lata.longa, &viridiaquam tnxuui. fi:cunjiim
radiccmomnino iitcrdum purpurafcentia, c
quorum mediacaulem proniicubicaleni, v-
vcm, viridem, aliquotramtlisdonatum, qui-
bus infident Hores c vaginulis emergtntes, uia-
gni, velpror(usinodon, vel Oxyacantlu; vulg.
Horum mftarodoraci, coloris vanccate cfimen-
dibilesmam cria folia qua; furfani (pcftat & at-
to]uncur,rar6fcmucuoample<5untur,aucca-
cumincnudr, fcdplcriimque (nifi marefcere
inci
nil tamen convexa, angu(liora,liitei colons,
quemadmodum J f i b ^
conteyunc: tria ad terrain inflaca , circa bafini
&cxorcum pailenc, reliqua parte candicant,
mukiscamcpurpurcisiadiisabipfafedcadex-
tremas u (que folij fquod pJerumque faruratus
purpurafcitincarum (tirpium floribus,qufCir-
ca:adiccm ntiIapurpu]aiuuftLirTul.'t) palhd.is
oras,clcgaiuipitluradccurretihus: villofifim-
bna,qua parte inccgirur, lure.i eft, extrema ve-
rocxalbida, pallcutefliguji, magnatriangula
SiobcufoatiqiatLiluin inucraiu-cjpira, faraea
orobi magnitudnif /iffrum, rugofum cotinen-
tia:radixno<JofajVul^nns Iridis^infar, fcnsHa-
vefcens, muicis ptrinque n.i kc mi bus fibris fir-
mata, quirepurgara&cxficcatajodora:ill]rn.i
eft, fecum Illyrtca, quarin offidnis habecur,
odorisgrauacontendcrepa(Tv'cxiftimo,

In montanis lupra arccm DiviGeorgijher-
bidofoto,&collibusS[ampricnimrnini:nnbiis

inVngaria tranfdanubiana, aliquotmiliaribusfupraPolonium, prinniniobfcruabanig-
nusiJudcujuftijlupurpurafiTntc colorccirca raicem no'i furuperfuii: deindefcrcquen-
rinsutrumqucgciiusin Leytenbergmoccfupra Mjndcrftorf, fe/iccionbtispransiopronio
vianis. Crefcicctiam tncollibusnonproculabHrHzdtorfini-langc-Elul, Magnif. Dn. dc
Entzcftrorf Floret Maio.fub lumi fiiicm fenicnmaturam.

Hvic valdefinnlis, & ilhasquidem (cminenacum puto, quarmilnctiamcontarvaraeltj^
c\ ["upenortmquas BoifociiniJtnumcro:folia ramen illi breviora,&; (quod rarum) inagna i*
ex parxeduobui coloribus dijhnd»albo & C viridi.fk quidem, utalblK pcrloij;tudinenei
cxturrat, nohnumquamdimidiatum folium occupans,iuuerdum ferecoEum ,aliquandoejuj
duntaxatpancniijfdemcciamcolori bus interdumdiftintlx vagi naf fibres includenres:qui
tertia ad terraminflexa folia fuperioririmitalubcritrc,ih!niilL-ar,)]jietifimbriatot.iflava
cft,bifida folia illam tegentia fl jva.cujus emm colons Itnu ceina ilia ((e atiollemia, SC rota
" frefufrop ut in prxcedente, infimaauctn) & atguftiorc parte,purpurisvclut maculis in-
ternic.ifppr(i funt: odorqualis inprxcedente, nonnumquam adcoimbeciltisuc vixdepte*
hencclatur. Floret Maiocum fupenore.

EIVSDEM Boifotaliapodalem habuitcauler«rotiindum, geniculatmrjibinosautternos
CKmcbVjnc^isvagnispromcnsfl»rc."i,q^{innu} i term terrain Ipcclancia palletcis exal-
bofjntcolons,multisptirpijrcisvcnis.it¹ infinafoliorum bafi, quacauguftiorell, inJ.iterj,
tiimartiiibna,qu.rljvat(r,adexcimasfol!oruniora<;procurrentibus,qLiibin lingularcs, in-
terdum bin« purpur~:x macular funt afperlz: bifidafolia fimbriam tegentia tiyj^Miyjn funt
coloris,cujusetiam terna furrecij (exceptaeorum angurti ball, quje Havcfccmj niult'is put-
purcisyenisinlatraprocurrentibusRariuta.

B U A N T I O cnammilTumaliud Indis genus folijsQuincogeneri ndndilTimilibas.fcd
breuiorealiquantumcaule.inaliquotr.-imosdivifo, quWiiftincntllorcsc-vagmuhsnier.
gentes iam diftis paullo nainotes, quorum color mediul nucl fecondi &i quin'ti gt-ncris Ho-
ffs. ratfixquintoger.criifinnlis.

PluriCqupiconvenifcvidebaturcutn D.ilnutica illaminorc,quamaPaiuio miflam Bcl-
gicihortialcbant antemcu in Auftri.>di(ccfrum,floribuspurpiixdilimoricolorc pradius.

ILH.magnitudinpar,anguftioribustamcnfolijs,quarniBoifotaccipiebam,caulgru.
cili.pectorB&i(tmifTcminterdumctiaicubnumalto^namulosdivifo,quibusiniidenc flo-
rcsoin-



irigiAjr
Urif.tif

KS omnibus pradi&is minores>u i bus folijsad terrain inclinacss,di!utè purpureis, tnb^{us}verd^o
creftisobfolcupurpureicolons^ualisinulgansquod^nigcnetccoiiipicijur. ladixnoma*
gna.aodolà E)isflosmjh)pnQiuraconlpc<>usannoM o.xc.ccterisflorenribus.

ALIA cxearunnumcroquacantioxe. ab codcm BoifotmifTz, bienniopoftduntaxat
floremlucie. A proximcaurem dcfcriptancepracilitatecaujis, quiri ramoscttani diuifus,
nccanguitiafijlorumjoccradicedifferr^arcjiiniiliterinagnicudinc pares habct.frd diver
ficolonsmam teniaadterram uifiuxa.dilutij&rquidera obbletipurpureifunccolorii, mul
tisflamatoris purpuræ venis à fimbria ad oras fe fpargētibus: fimbria flavis flaminibus con
ftat: bifida folia illam tēgentia obfolere flavefcit: rornafu i La infe g au uffa fl. vzetiam
fedpmpurcisvcnisdiftin&a latiorcauteniparrcpalidct-ntiscolons, quodammodotamen
fftufileviflimaj&quxvixapparer.purpura: SarnbucinLiodurcrt'ert,icdpaulograviorem.

Iris major
Lut.ii.11.

NON mmusaoiplahabetfoliahjc Iris.quiim (iiperior, jnterquarLjulLsa/TurgitpctJalif,
t<rr<,genicufatus, vindis, *tulioem*membramccasihccajviri(fes,pcrcrascivirc purpurj
centes, equib^{us} m g L t b i n i f u l o r ; jamde&tiptz paullo minores, novcai flijs
confiantes, quorum terna tēram fpectantia ab imo anguftiora, candidantia intētus, fatuæ
purpuræ venis elegāter diftin&a funt, latiore verd^o parte omniao purpuræ: villola fimbria in
fernaparrectavercrt/upcrnapitr'purafcitbtfidafofiolafubquibuslater, floridi purpurciluct
culons, Literna folia fiirredaifioftenuiterodoracus.

Iris major
Lut.ii.11.

Hxc wihi naci est Ff ancofurr ad Mecnum,(cmine fponredeciduo, Si floferu dedit mmo
M. D. xcn. Maipnitio.

BIFLOAJt Lulitamer folia vulgatibteviorea&anguftiota.alioqui non valdediflimilii'f'
fummo pedal) c.uilefos c putputa(<ntibvis v.iginulisprominct nuvem ut aliamtn Indum
flfbftillitninoftitriSi acc o n , e i u r a o n a p u r p u r e o o r a s , q u i i f f i d i i & p r o
pendentibus folijs interflus inter, villola illa fimbria qua donata funt, profus candida. Vni
cum autem fingulares caules plerum que florem ferunt intē dūm u d r a r d , alter rariflime
tertium, fingulari quemque vagmulainclufum Jueundillimiodons, & rnanthein hiliom
convallium coprominatam emulati: (on 9 f i s i q u a n f a l i n d u r o f u c i e n a f o l i j s
conftans, hoc ell

Ratlo.

in
temscuani mceiSjUt interduoi Naiuia in Boribus luxinat.Stmrnangulolvun.rupoijji m
ir i a n ^ u i a n c a i t f f T o , ^ r i r i i v i e r : r a d i x i l l i l b f t n o d l b o h a u f o l i a p t i l l i
cansenflitudin^{is} a i b h a a r o s c h i d a , i n r a t i a , o r s i n i t i o , & p a u l l o p o ſ t , f e r v i o ſ ſ i m i g a ſ t u s ,
g p
ujulcisfibu luiDmArclluic bxtSsfil (ubinife in plaprppaEineic
Nafcimr mulcu Luiiuni* locis (upra Tagum vel pingailolg Si marvis, ot nrta Comm
bri&iDi

bricam, ceiberrimam Lufitania urbem, ubi illam florentem mense Novembnerudbarn; veifalebrofis & lapidofislocis, uccircaCaxcaysmarinam urbemfif portLtm, under ddatam Olyiipnnera^idamicosdcmdcin Bdgicam mifi, Scintercliartasrepoiit am cum alijs plantisiple detuli: nam licetinregro anno iftic iatui/Tec, terracaniei commiflj in hotto HL V. Caroti Audomari, (cquacacVcre Homit, potteacciam Aucumno, cufusreicaulabiiloramcognomnavi.

NON multumabcadirTerrevidetiirquamaliquandoVcnetijiaccepitCV. lo. AicholzriusIridisIllyncxappdUcione, incujujculn/fimo hortotforenrem Maio confpiciebani. C^maenimaucicnaexImgulisradiciscapjtibuspromitfoJia. iiiiisfdijstimilimaic. -iuIern, taroampliorem, qui in lumnoc vaginulispurpurafocnnbus florem piomcbacLufitanicx forma perilmilcm, paulloiamemajoretn Siccnriorem. necadcdfuavisodonsjicetideum fatisaccedret: imllum lcnem oblvabamiradiKnodofa & geniculata ut flipenof is jOloris, ctimvircnseltjngacijCxiiicacavL^faiisgrati; Siuifipidiuutioguftus, potcatamen fervidi/aucscque urntis.

ILL i fere par qur Viennam antcaliquot annos mihi miffa a Ioan. Boifor, Romani maio M. D. xxv. floremctiamparem, exceptistribushirretrisfolijsquarad cxruleurncoiorem magis tendebant, finibi i. ique inferiorum magis fiavefcnte, & odor vulgari Oxyacanthix, qui itiprcccdntc ad bifloiam Lulitanicam nngisaccedit.

ALIAM incultillmo Aicholtzij hortopaulloamatunusjamdercripiisflorem, rubAprilis Videlicetrincmob (crvi) b. i. midcautemillam] iaftus, ip! cinctignoraba[:. Eavcr6! atana bcbatiolia, rugoia, pcdahs rtrrt-longiLudinis, circa radicem nonnthjlpurpurafcentiaicaiuem non prodcntem c mcadio tbliorum. ut alia:, fed (corfim fine folijs, pedalem, in quo resuat quatuorflores c purpur-ifcctibus vaginulis excunres, magnj, purpura laturatioicnitenres, inodon, quorum ma folia ad terrani mclinata, abipfoexortu, u{ qucadfimbrix, quxtota candida est, extremum, albis radijs insignita funt: his succedunt triangulares filioz, magne, obtufbmucronc. magnumfcmcnconcinentcs aliaruni Iridummodo: ladixcrafla, geniculata, in[usc. mdida, forisfurvicolonscortic tecb, (icisodoia, ad PliuCive Valerian* doinctiCKodorem accede ns.

Pcculiarem autem habec ha:c. prxtcr ceteraj Iridcs. notam, m nulla folia per hiemem retincat. fed omnia Hacccleant & cxiiicccnur. nudatij conlpiciantur; deinde ineuntc verc nova germina proferat: Simi! cm. ii noeandem, pofiea conipicieba Francofuiti, in horro Mullen.

Dvu IVM non est quin ex cjus fcmicjqdum cum alurum Iridum (emimbus, & mulcarum radicibus ante aliquot annos in Belgicam ad amicos Vienna mittebam, prognata iic elegans ilia Insquam ex Angliaredicnsanno M. D. xxci. florentem confpiciscbam Auguftoininltruftiffinioliorconobiiiis V. IoannisdcHoboke, archigrammatcitur Antuerpiani: nam per omnia illueljxjndcbar, nihi t^uod folia circa radicem (aturaciuspurpuralccre mihi vifafunt: an portó Uicine folia amitut, me Uigic.

LAT*. pedaltsjifere longitudinisfoliahabetelcgasaliud Iridisgenus, Iridis Aiclioltzianxmododcferipcarfolijsprorllisfiniitja^adicemctiam&caulem^uipcnnde atqtieinilla ad foliorum latus ex r. idicc nafciturpedalis, tenuis, in quo iingMlars aur gemini flores c vaginulisexpallidovirell'ciitibusprodcuntjfurma Aicholczian^Jimiles, fed colore variances, mm ternafoalioprcndentiacandicant, purpurx exolta: venis abwfiiueorumfcdcper JareraexcurrentibusJqueadxtimarafimbtiambubcarrulcisvilliscoiiftanrem: triaautcm incumbciina&tigulara fiveftaminaccgcentiajalbafunt, earum tamen gibbo fiibczrulco: terna (Urredactiam candid J, & ab infima fede muUis purpurcis venw diibncla, donec tn latitudinem expandi incipiant: floniuccei Tietriangulumcaputbinaspncuncias Ionium, craffiufulutnque, quod maturicatcdchifcens fulio^femenoflendic rugofUtn, fubfii[quin, crvi magntudme; radix h lemc folia non retinuit

FlonjirAiclioltzioprimum Majj iniEto, Anno M. D. XxciiiLunicaquain habuitptanta, cademaceoUinquaviccffimaquinta AicliokziMna repofitacrac, & qua;criam oppoiitam arolam pecupabat. Icaque non dubico quin cjus femindeciduo nata fic. tamctfi hujus flos odons gratia commendabilis non fuerit, qui tamen in akeradeprehedebatur. Mirum enim in modum variant quar ex femincafcuntutlndcSjnoH (ecus acprxcoccs&dubix Tulipis atqnc PapdverajUf longa fpxprientj. i didici.

MVLTa foliahxcccxxviii. liabetinvicemamplecVcntia. ccterarumIriduttiinfar^iiciam laca. iLa'rciuzpedalisgcnicuUtus, tres viridiiexiltcaulis, (ummoaftigiofuttincni binas incmbraiiaceasvagiuiiisexviridipallefcntcs. equibuscmcrgitflosreliquisIriduingctieribus forma fimilis, colore autem diverfus, nam ex albo pallcfcit live ω γ δ ϵ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ \omicron π ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω ell. & terna cpanda/bliabimoadxtimasorasflavefcntibusvenisfuntdiflinch, fimbrialbicance, fed quitenus a bifidisfolijsstquxlimilicoloreftint przdita. gibbo camejidorflounihil purpuracntcJJmcgitur, flavefcntcc: furrecla foliaabimograbilia, internaparcemultisin Utera(birfisvcn]sobfo]L-[c]nurrpurarcentibiis(untdifunc>a, ubiver6re{1: Inlacutiicxpandcruik] •^f> Ww(iintcolons. Nulli in hoc (lore odorem deprehendi: fed ems Itirpcm Maio florencni wfervabam francofuruin Mylcr pharmacopaci horro.

E i (iinilcm neullafefeinrediferentcmctiam alebar,foliflorcsdi[crimenfaciebanr, quipaullocandiowsvidebantur.

NOH dubiameftmukbplurainvcnirimajonsIndisgcnra.bedqti^inijhamamicishoc digni s, f, a p L, a c boni proponere volin., qui bonicofulcnr, ur fpero, hos noftiosconatus.

lr'uUtiftt.
magn.
vulgaria
ebjstci*.

AV*.

Herbar.

H i c porroadijeiendum etiamcenfui, vulgarem illatn feomnium tritifljmam Iridenyn omnibus quasadijProvincijsobferuaffe^clhoKisjVcltnuivs, am ciiaminteitluniteftis innafcenim: alteratn obfoletioris crium furreftorum fblioruin colons odons floru m Sambuci, quiqueinBelgicisliortisrariorelTcfolcbat, vuJganffimam inAuftrix& Vngaria;liortis conf p xillc. Albara autcm tltic ranorem & mca cantum opcii illiscognitam, acccpcis c Belgipcjusvaiiicibus.

ALUHV M PriorConfbiitinopolimifliclz<s4Uj<tSvf<txi&Z Al*t* .Tw/imn nomine, cum Incaddk\onc, f!0rik/tiPt>t<tii,ct)'4nHet>Her)<> tfts<,h.e.clcgaterpi^i Horcs boni odoris: atque, fmfierbtonto Cr/HgMjfacftjflorc mfertexalbo&nigrovarium .clcgatem (ancflorctucofliprimiiis.ftd nullu m gmum odorem dcp relicndimus. Ego, quia cx Su(i, Sufia)æ Provinciz bA etropoli, primu m in horcos Conftancinopoli vicinos ulcra Bofphorum ficos illacam puto (ramidnomenindicatevidetur) Sufianamnuncupo, Sccondutnautcin.A/iacicamcxruleam:hxc cum Quinca a Mag" D.Dauidc VngnadConftantinopoli mihi aiifla \tla)t Su* yi*iappellaiionc, eun)Pnorcmrntitivolui(rcm.Tertia, Dalmanciemajoris nomercnneat: Quarta, Daniarcnna: Qjjinra, Afjat"!c«purpurcar. Reliquis, procuju/quearbitrionomiiu iii3"ipotcrunt. ego, breuitariconrulcrevolciiSjnumcrosadjcci. Namquisintancavarictate, & coioru m fi m ilicudinc, (ingu l is pec ul iarc nomen dare qu eat ?

Cctcriimlridisflores lupos nominari, qtioldupiriiSuilabrisquefimilcsfior, Philinum fcribere, rtfifcft AtVicriatusDcipnofoph.libroxv. Grxcisautcm/pedicitur: Lariois, tris> GalliJjr/n/w^.-Germanis^ilsnifto ScJjwnc^Belgis^lctf: Xxdwfitfm Hifpanis, I>^w. Vlgarem HifpaniLinec*rd^toey, iziliGJgliotcleft, GermanicfawCitsstn/iinfijjimcl^tjit mll ippellant.

CHAMJf. IRISUTIFOLU.

CAP. XLVII.

AL i v D Jndisgenushumiiiiism Luikami (axofis&c tnauna auri affati^ locis fupra Oiyflipponcm obfervaba, cujus fuliacjufdein fere cum Lufiranica bitlora crane latituditus, fedbrev!ora:radixi!lifimalis,geniculau&obliqua. Flos mihi nonconfpedtus, menfiscnim crac November, ted filiquas five capita jcutiinata ininia in humih 6i vix lupra terram aflurginecauliculo reprecibam, tnangu!aria, magna.pro plants proportionc.

SIM I us veto plants femenad III. V.Ioan.dc Brancion miflum cit ii doftidinio Lobelio e Mompelio: cxquonata;plantxAipcnoriferce fimileSjquxiSorcmdderuntvclcairulcumd]lutiorcmfiCquail rarleftem, ternis labrisdcoriuminHexis paullo (aturanoribus, aut cand' cantemomnino.autpallentcm.cumqueniodd dilutions colons &quaficxalbidi, oiodofatutatioTijSiaciflavum proximi, aut purpureum fiveviolacctim,&:tllum ('.riamdifferctcm:nani uniuscolorplancnitfrxviolx.altcriusfronai^ terram certiafolia, a6ipsa bafi fiJcxortu, ipft'p fimbriiflava.albas Stfatislatas venasduflasb* bchanc, & variegatum limacis dorfum fere refercbantrefcien in trian::ulis magniscapitibus, crobi magnitudine, pallidum, rugofum, ovalis formæ. Omnium vero flos inodorus Apelli plerumtueapenturcum (equennbus.

Nvwc d d e i b b n d x r t t a r C h a m z i n d e s l o n f o l t a ; p r o j l u 5 o x a t / A t < l i v e e x a u l c s , q u a r u v d e l f e l o r e s n u l l o c a u l e f u f t i n e n t u r , f e d f u c c u l e n t i s & i n f i r m i s d u n t a x a t p e d i c u l i s i n p e d u r , n r C r u c i , C o l c h e i , & f i m i l i u m . I f t a r u m e t i a m d o x d i f f e r e n t i z : V n a e n i m m a j o r i b u s l a t i o r i b u f q u i c e (K o l l j s , I n d i f t n a j o n s f o l i j s I a t i t u d t n c v i x c c d e n t i b u s - A l t e r a p a u l l o u n o r i b u s & j n g u t h u n b u s . i a m c c G A n g u f i f o h * I r i d n , q u a r r . J e i n d e d e f t n b e m u t ^ o l i j s l a r i o n l i i K .



Chamae. latifolia p. 1.

CbtmihiA. hufcl ilHH tliinm.



HAHV M igiturmajvjt brevibus cft folijs jnter duntamcnc tiam pedalibus, Iridis vulga- *chanthii*
raodo latis, & (ecundu m rjdicem magna ex parte purpurascennbus: inter qua- multi Ho-
cs c vaginulis prodcunt fingulari pedicuto dodran calique futti, vulgari paullo minorcs, Lu-
ebifl Drjtx mu li. ti Hnm. i ^ mtudjn Cjrum colorc, quifarurationsn Kjr xvio Jxcft, praf-
rtinitnafoliiterra in Ipcilancia, qusvilloftm fimbriam, ufqucad bihuatlla, qoxligulas
tcgunt. folia. cxcxultoptjrpurafcentem liabcnc. iublighs vcrö, five flam iniljus ltnca*»:
omnia autem floru iiii folia ^ aniquicfi i r lurn attolli intur j quam qucrepandau' rram fpedanr,
mf: riorc & li: ffilipartir, alb: squibufdain radijs variarafunr. Sinc autem ejus flores vcl ali-
qu. wrulu' modor. Ki. vcl inodiiri: triaugula capita magna, mucron-ira, in qmbus femenorobi
iirudine palle (cens, fjuod exlkcatum rugas contrahit & riilvefcic; radix nodn fadl. ut

LL i v\$ (croinc nata cft fioilbto Bruxclia: Chamii ridis latifolix m. i joris genus, matri *Tmkm.*
per omnia flm ilc, prxter fi, > rem, qui non purpurcusjed carrulem cle^ans fuir.

Hirpanica: aut G4llicat, de quibus initio **hajuscapiris:** filhrcspaullo minora, capita
triangula & iimcronar. icri. im mii]ora, lmcn minus, Inrlo Tibus funi inavaricu'i: licetfer<;
omnc fimbri. r vil/o. T. li (praf. tmrna, cxcrcilcjs frabcinr, mfra *vcm* urt fi inojodiela. Iaccoj.
Ex iiii sver6p. nR-. wdiint. ix. uadnotavimii: namoinncs, val<ic difficile.

Vnafaturatorisarpunecolorenicentem habct florein, inrerdumctiam dihtio Tcm, il-
lunq; odoratum. hunc minime: tenui folijs quæ attolluntur & inflexa quodam modo su-
pernc femruocnntingunt, inut Tacjuc, modo orbiculatis, mod61ongioribus & bifidis,
Alrcra odra coctrloic. cuius iiii frionalabranonnihL! putpuufcunt, rurrect Saver^ ciru- *ch»n, r I*.*
lei fi intcnloris.

Tertia: flose juod ammotjorubet, interduro diluriore & ftia viquadam rubcdincve]mm, *a-*m, i*
nieocolorcpr-3C htu^ dhprafertini fblLis Urfum creflis: viilotarfimhriarfuprior pars albi-
car. interior inreacft: est jccmodoracus, autt Dodoius. Horamoniatnftaininacrzulca *c: >*
In Quarta flos color jllfcensiomiumquam exalbidus: folia fin Jum (peilantia, ibip- *****)*
foliatum exorta in uerolj gner purpurafcentibus quihutdain liiteis decoratur dcorlurn *rrll*
trn inflexa, in **palle/cencc exalbida func.** ^- auternvind, celorepcrfufa: p2ljc rc<rnfr
tur: alteriusct: Hno (ioris.
flavrc. c & rlupenora folia pitrpurarcn- *<*m+M*

! itinrarfilofloris colorca Quaru differtis enim
k<svtrgul is five iatlijsexoriantur, p
medio infecta sunt Jodatushii jusetiam cft flos. SMinjnaporrölnij Lii & qujtjja' jtu' fi' u' t'
Omnium

Chamxiris htifl.niin.or n 11.



Katata.

Chamxiris
Leuifolia
1771.

Omnium vcr6 feliola ftamina & firbrix magnam partemrcgntta,bifidafunt,bn afcjuc pinnas furreibs, ut eaquse in Indibus bulbofii, habcnt. Purpurezpra.r.cra,alb:e,5iverikoloris folia fecundum radicc m plcium.que pur* purafcunc,

Nafcuntur omnes in nudts & apertis colli- bus Pannoniz & Auftriar: purpurca quidem major,rubraq'uedilutior,inPre)lenbergH3m- burgenfi irontivicino: purpurea minor cum iflic, tucollibus Medclmg, Gompoflkirchen, & Baden immineibus, in quibus etiam iu- bra&cxrleainvniuntur: alba in Harnbur- genfi nionte: verficolem certe no nifi in collei- eumonte Badenfibus rhernis imminenci, qua partOjfoMTo? fpedjt obfervabam. Cecc- riim tim ioGgKCni vanecatcm ex femine dect- duo ffontc gigni noncftdubium. Nam vcrfi- coionsfemuaame in horculo ccrca; commifla (illiusenim obfloris elegantiã periculum fa- cere volui) &pallidas, &calbas&:vcr(icolores matrifmilesprotukrunt, & alias praccraad cam quidem accedentes, (cd levibus qujbur- dam notisinter fodi(erctas,quaks»ci bisexpri- meredifficillinium, vcrequedeijsillud Poc'tx dici poflcxxiftimem:

fac its hsn emnihm mns,

Nox d) verfa ttmtB, qualim dtttt efft fortTUM,

ALIA porrdhic fubijeiendaeft.nona meobfervata, fed aStcpluno von Haufen (enjus fupramemini, cuiqueaccepamferoCrociflaviMarfiaci primam cognitionem) infra Bu- daminPannoQuMa:fiifinicimaDecembnainiM.D.xxcii(.eruta,dumCon[tan]t[in]>poli Viennamredirt.ailanuanolcquentemihabiptbdonau.EamproptrKncntatcmfiitili credidi,&adc6diligenterfovi,utMaij fequentisinitiofioremdeaoñr.

Alaufolijsauteruinoribusjatndcfcritisrjccradiced:rrL'rt, necfolijs, qu* circa radi- ccm nonpurpura fcunt:ncccjusflos illarumfloribusclifTi'in iliscIl,p!urimumenimadQu>¹¹* turn genusaccdit: kbra camen propendia obfblcmiv, colorero pallido permixtum b^a bent, Si abcorumimã partc ufque ad cxtremifimb;iamijux pal lidafft, pfiirpurarcxcur- runc venx; prnnaraternafoliaquaxalbaftammatcgunc, expalbdalbefGunt; (urfuro veri creclapillidafunr.circaimumtamcnobioletcpurpuralcentibi.sr.idijsafperfj . Illoquideoi anno axayAocfuit.Sequence camen brevemadmodumcaulem, vixternosdi-'itus f>pratW* rameniincncm habuitjCunnfcderuntbiniflores.

E AM cumreliquisfereIridumgcncribus, & Iclediifimisquibufqualijsftirpibuson¹¹ pcnituscorrupitauniM.D xxvñr aipcnimahieim.

CETERVM apudBcIgasmultopluraChamxindishtifoli^genfrnaliintelligOjfetrji ne na- ta, prxfertim Bruxellis. Intrecceros auteni doi3iifimtisvir [oanntsMcircns, illius urbu inedicus.diligcticulturafumminiltaftirpcvaiictaccinatJquiii vifrepcrhibetur. Al quot carumgneracomraunicabatmihi W,D. xc.annoN. V. loãnes Boifot:.. d cum quardam pericrinCjancumfupcriiisdscfcritisillaiumaliquarcnivncianciiliilaffirmiarepufluin¹¹⁴ rum umenquasconlvi vavi> & bienno port florem dedcrunt, quanindain ctum alt. arum, quar in meo hortofponte narx,eodem annoHorueruncJiiftoriam adiciam.

Chtmutis
nirvii,

PR; OR illarum, quas doñot an me mnt:bat, elegantiã ma em radice quocem neque folijs un different, neque etiam floris formã: fed color diversus, & aded varie pictus, ut diffi- cile fit, cum exatle verbis exprimere: nam tria folia deorsum inflexa, varijs radijs expallido p>irpura(ccnbusabimo(urfum&itilatera spariis funtdiftir.tta, pcorascriam renuiqu^o dam cxrulcocoloreafperfa: fimbna medium folium ad ioflaionetn nfcjuc occupanJ rouJ- tisvilliiconnat.qua bifidofolio intcguntur, flavis, reliquapartcdiluteexrulcis: foJjagih¹* illatn&Iigulam tegciitia.c<ilonsfuiucxcarrutcocandic.intis . qm incoftj&orispaullo (a- turatiorenjternafcfactGllentiafoliacxcafrulcofl.jvffcunt.atumoan.gufla, iiiiuInspur- purcis venii in lateracxcurrentibusprzdita.quãvero in latum ex^l.induncur.purpurafcen¹¹ bus maculisalperfa funt.Flon fuccedebat lorgiufculum cnangulare raput,quod pluvic cor- luperunr. FluvtnicualijsCHamarindibus Aprilidedicni!!.ii>dt)nsgrariac6tiicndibile¹¹¹

At i ox A M affinaatem haberccum illavjdptor/nurdccidua ferine miliifporjtcnata. Franc<ifnrflorircicumali>sdcditAprilim D. XCH. Kovcm iurem utreliguarfoliahbt* quorum tria dcoifum inflexAfii terrain fpcctSancu, longa, ic prxter rdiqiwrum Jndum in"-

Chamanrislatifol. minor vn.



rcmadcd incurv.i ftr, uemremo mucro-
nc flonspcdiculum averfa parte amplcdtan-
tur:colorcm verohabccinfimaparc Have-
icenccm.dcindc dilute purpu raft ctci,fatu>.
rationbustamen vcnisdiftindumabinfinii
bafi&viliosafimbnaacandicaiKe.fi.ivcftci-
tibusapicibusdonara.quam incegr btfiduni
foliolumexalbidipallcicetisexdiiijrecjr-
rulcocolors, cjualictiam furre&acnafuiK
folia :odor fere noru Sambuci aut Tlialiectn.

ALTRA.quamilacoboPlaccuaccppif-
fcfcncbebatBoiforus.radicc/olijs.floris for-
ma,cetcri\$Cliama;indibitscratfimilis. Ejus
triafolia terram (peflancia a^paXtdxts cram
coloris, ab imo ad cxtretna u (que Jmbriam
purpurarcntibusradijsafpciih fubfimbnd
verd,quaefoliumfefemagispandit,purpurc3.
macula cranr notaca radiacim in latra lc
fpargence.or^autem cranrexalbid?: fimbria
abimoaJfoJjj mHcxioncmHavis vUHscoa-
ftabat, ubi vcropurpurcam maculam atting-
gcbat, atbis: bihda foliacam tegentijaiba
tranr,quemadmodum&: terna folia (eicat-
tollticia, fed ncrvus medius in utnfc
^ ut t, in m par r n k f n l m i, orum ob-
foletar purpura: radijs difnfl.i, fuprcma ve-
ro, internepaucisnotislevirerpurpurafcen-
tibus infe£b:e:cpcrs autc licet odons,coloris
tarn en gratia non carebat.

Illinon diffimihsmihi fponre nara Fran-
cofurti.qua: codctn anno flores dcdit.

ALIA pr.rterca mihiifticnatanon in cle-
gas,quae (emipcdalcm cauliculum profc-
-

rebat,tererem,geniculatum, fummojfKgiogcftantem membranaccum folhculuin pur-
purafircntesoras habentcm,equmcmrgcbant bini flores non magni, novem ctiam fulijs
confantes quorum tnarpanda ball trantangufta.farispurpurarcie.interncautcm
candicantc&fiitur^purpurEvenisdiHindldufqucadfolijnficxioncm.Jabravcropropede-
tiaadc6(acuri violacci coloris,ut quodammodo nigrclccrc vidcrctur i fimbria viliola Ha-
vcfcbbjtinimaparc^eltquapurpurcacrc: terna cam inregenriapurpurei cranr coloris,
Vcluti3d tcnu furrccilafolia: nullaaucim odons fuavitatccommendabilis.

NATA &alianoiiLncl(-gans,qHxifubcrosaradicedodrantcmautpcdcmlongaprodu-
ccbatfolia.inrtareorumilLibusalix-Chamafindcsfbntprxditr, latavidelicet&mucro-
nata: interquxa!!urgebjtcauliculusdi):waiitrcsunciaslortgus,luftirjcnsummo6ftigio
vcluti tbbliculum binis tmembranaceisfolijs confantcm, ccjuo prodibac flos novcm fblijs
praditus,cjurdcum formfcutn aliarum Cliamxiridum flore, quorum terna vcrfusreram
iiifixa,latoracandLcancifquecoloriscrant,abinrimafcdc(C]U2anguftior}mulnsvcniseji
fiavopuipur.ifcentibiistntaccTaexpanrisdiftincli.ufqueadextimamfimbriamiivcfupcr-
cilmm,nfquc deinde a fupercilto ad cxtremas oras.qux albcfccebant,cratTioribus, Si coloris
purpurei mridioris: terna vro furre&a.qux inter ilia nafccbantur,inriml parte valdc cran t
angu(la,veniftiuc quibuidam furvi &luridi colorisdi(tin3a,poftca in latum fc pandebanr,
rcncrnmiquccrant, & exalbidicoloris: terna rehqua, qua: brc viora & in fomtcm con-
vcxa, bi('ulciqu.c,eranc, aliquamulLimrL'fclxLsrurfumallLS, ligulampallciccncmctgc-
bant.&fimbncfive fuprciliumpropcndciHum&terram (pcaanuiumfoliorum ina-
mincbant, cofonfquecranralbi, cui fubcxrulus color nonnihiladniius, przfertim m
ipfo gibbo: odo r null us aut valdc exiguus.

IRIS TRI POLITANA.

CAP. XLVI r.

PROXIMIS hisanms Tripoliadferebatur Tridisgenus.mihiantcnonconrpcQu. quod
annodemum M.D. xcix. florcmprotulitornatidimo&iperhumano viroThcodoro
Coornhart, Aruldrdamcnficivt.qui eju>. ciulcm cum Horc S£ filiqua ad me tntitbeat lu-
ni&menfc, utcmniodiusdcrcbrcpofTcm; ipfamctnimplantarn bicnmoantcmtilii
°oai[nuiicavcu],[i]uxquidcin«uranuui v.gct, fcd Horcm uoodumtulit.Illiujaurcm hi-

Aotun

Chamanris
latifol.
11.

Σ***
foli
JHMF

Chamanris
latifol.
x.

floriam, quia poftraditum Typographom cum cxeinplar, plantnm narKH'celinrnApf endicem rejeceram; fed quadoquidem pro preramiflimciexemphris aliquot tapiMjSfCundi Planrarum hiftorix libri procufionem, typographies: ope rx fib I oh cre j; on j-orrmum: hue revocare libuit, & pecoliare caput illi tribuere inter Ir<ics lacifoiiasSW anguibfolia*

Iris Tripoli-
Folia

EST vero hac Iris celfiorum aut altius aflurgentium gnerc. folia habens reliquis cuas conpexerim multo longiora, dichotoma viliuice, uicilia, huc facionem & anguliofolia latitudinis, unciam videlicet lata, reliquarum Iridum folijs magis viridia, non tamen splen- doreis ut Viridite eandem habeat inter folia prodeuntem. omnique pedes longum. vel etiam lonciorem, rotundam, firmum, licec non valde ctaflunijiodof Litn, & aliquot Inrtvionbus folijs pr^ditum, incuius fummo bini & terni Hores vagnis prodeutcs, novem folijs Sjinambit Liquodaro inodo imuofoj Conftarites, Irttlis bilbo & flavo fiore floribu^ founi non diflimiles, aurei colons, quorum tria majora verfus terram valderefjtsyi, & if, incumbencia tria alia mtnora alara ligulam flavain ccgencia, tria reliqua c fatcobiis m^rjorum prodeuncia i affiirgebaii Einftarillorum quiiilridibus bulbo Gsciitilpicii Jnuir, bHJ utique mucro ienibabcbitic, floribus Liccc Ercruntrigonacapiu, ia Gqgu Us Ja Ccribag emina cofta *fiuencr* vofecundum longitudinc mcmine, iion diflimilia capiti bus Iridis anguftifolii majoris fimilibuseriani feminibus Splena^ adix digitalwerni Ti Eudjtis j ftigricans & uo- dofau l a l rad ch a t g f I r j a r o m .

IRIS ANCVSTI FOLIA.

CAP. XLIX.

RESTA « T nobiscaj Irides perre qucd x qui angulior cfi in r folio j q i i jr um tam et fitria genera in Pannoma S: Auftria ob rrvavcnm: vn(cunnamentl, nHliialiis in reliquis, quas a Jijj Provincas non confpc&um.

Iris angustifoliar.

PRIMA autem^ ux & r Mtjorjm multaptofer folia longa, rigida, angulioia & pignora quam Tripohcana, qua: compeffa vel confrat, a, ingratu< terriim quocodoreni (pirant, ("f pmodiim ur Spatuh r forcidsrvulgo appellarf rolia, minus tam engravcolentem: inter qua: caulestretcs. oblongi & cubitales, in ciduni etiam longiores exuigunt, quaternos aut qn inos flore sexvaginulis lacralibus promt*nn.J) Indisbulbola; vcrficoloris Honbusfoni^ iioii admodum diffiniles, colore prulco faruratione pratdnos, quibus fijcccdunc oblonga capita trigona, liibruf. i. muko firmtora. niagifqi cartilagmofj. qu. ini latifoluru iridum, i jspa^{fa} qurirj Tn politar. a, ai ngulis etiam emittitibus, & quodammodo qumis uz delitcent Sjicmnduplici (ertedigcfhim, aliquantulum compreffum & angulofum, offeaque duntier, tubrefcente membrana refto: offendunt vrj< n. csobtiqix,]ongx, nodo (i gracilliores quam in latifolia, Tn politar. a radice sua afaultj foris nigncantes jnniscandict fcs*¹¹* palldeccfires. iipoicacn & fervido. rmilrafto¹¹, galque fibras fpargentes.

Iris angustifol. major
fig. 1.




Batn.

Eam primuniconfricibamin Be-It'iclsjor riscuttam. dcindcanno M.D. LXIII. plonman> fpontenafecteminampltdimo qnodam P^m, ro. flumim Rlicovicino, viaqux Mog^{untl}7 Openhcimum ducit, obictvabam; aliq^{nod} dcindc poflainos, Iicrbofis qmbufdam^{loc} f juxra was, & ad quorundam pratonim^ nargines nortprocu! a Manderftorf. quintoi Viena Auari^ nllluri, aiq<cccia n aapi! d^ . ilte^r, r i s

ft » «ottt: po(lremum anno M. D. txxix. in pratis quibufdam Hungnxapud Luidvva III[»] r i s
vinD Batnyarccm.

It rrv j geniisirtvrnirurJamdcrc Tiptopromniafamilc, Drxtcrquam quodincjosfo' liJ sconfraaijnu Husgravisodor percip^ur
f floret utrumque genus MOJO, interdum duntaxat Iumo, fi aterior kicms praecesserit

mca matam in Auguſto
M>*V>fi- AtrERA, qiwpereicgaiKe ft>nu||ibimihifllitCOLir. fl aut cu ^ ir] Auftnaoiprofi' cilcerct



cilicere: Jube'tq-, cubitalia. interdum eciam (ongtora. folia^dmodum a^fguſta, mini di-
 gitii fivcfeniuncizlatitudinemnonexcedntiajVindia^titamcnſplilndetia.fumtſiapar-
 cernucronacajinfi[naver6,qudfub terra latenr,purpur.i(cfntia,nu]loingratoodore,up)lc-
 pquealiaruaianguihroliarucnyprxdie^r-
 aules habet ſeſquicubitalis, nonnunquam bicu-
 bitales aut ampliores, reſtos, teretes, firmos licet intrus cavos, geniculatos, virides, ſummo
 jgoin binos aut renios rarnulos-diviſbs. quibus infidentibus aut terni flores, In diſ bul-
 bolx. verlicoloris latifolix flonbus forma (itniles, odorat. quorum terpaſolia drosium
 j^flexa^nfim a parcel quatenus biridoalacoj folio liguli. occaſte reſurgit, ſarvo co-
 lore funr, reliqua vcrparte (quarinnonnu Mis brevior & lai or eſt, in alijs oblongior & an-
 K'iftior) none candicance, mojo purpurco, feuvio lacco collat. vena ſtatim purpura
 n'cencibus perfolij longitudinem & latitudinem & extirrentibus, de rambullivca ſubercilio
 carentes: ricia ſorſum execta anguſtiora ſunt, & cum bifidis illiſ exaltibus ligulas rccantibus,
 purpncei (itun (ive violacci (anccoloris; breves dc inde face eadent ſignat. ſive cap. rian-
 S^Uj breviora quam irtpncedent Ctnccquadeo mucronaca. n" que gemma ſola emittente
 P^*Jtt4, qurpcrraacurit. ii: cm nigricanrcm colore m contrahunt. & de
 *1 uic, an^aloiim, noniilii] comprcirum &: durum concinentiſt laſl/aiLL, tentA, dun,
 n»dola, inlbr fupenons, fibril dons & rnuibus prxdita.

I^r inuim illam /ponre provenientem, nō procul Vicnll AuHric in prati's ſupra Himer
 gim, Eberſiprr'adpilDdes, irqucaltjs Auſtn^pr'atenllbus Locis reſcriebam. Mittcbat poll-
 ad me Ulam (iccam, in Sudertim montibus ſcrutam, do<n: tſ Timus vir Ludovicus Camera-
 flus, loactiimi lenioris F. cx S. Annx monte. Anno vero Sepcuageſimo nono ſupra milleſi-
 ftii in Sec^uingciſt mutn/rcquentillimam circa Sackturniam III. CouinſdcZrinioar-
 cm> alijſ qucprati iilignoli! inter Muram & Dravum Hungariarcſdanubiatiarflumina,
 icmadinodtim criam in Comitatu SaUdienſi inter Lindwa &: Muram Huviuni obſtrva-
 bz. J^r Florct & remen proſerccydem. quofuperior, tempore,

" f c commodc Paanonica anguſtifolia verlicolor dicit poterit, honaurcm Byzantina M<bi
 utquidam appellant; peraniceno quidcni eſt flore, atcamcn Conſtantinopoli non adveſta,
 na Nobilibqsviri Woannide Brancion. & loannivander Dilft. atqucalijsamicis priftitjs
 Belgimn mittebim Vicnns Adflnx: qui averdexcaurbcrarasquafdjTn plantas Con-
 ifittipotim capccuniarc dcmptasijldemamicis Libinde communicabam, conrigtut
 nnulli illam etiam Byteintio allat amputa^nt, proptercalridcm filvcſtſcm Byzanfiam

appellari, addita Voce pcramoenati, propter florum elegantiam : apud Naules vrrd marrona Sjridis Clufij Cuiainiemirj Cognonienadquiiivcri, iii'prietxteris, qua: a melubermundis genc. ribits, grata fuerit, qij nardncidi) ni ctianmuncd.

Dra Clufij.
Iris anguilli.
fol. 111.

TERTIA, ex radice nodola mulraproducta folia, hrma, longiora quam precedes, & Priora. Talis affTurgn caulis, firmus, aliquot flores profcrens Secunda; & lroibus longiores, & Prtii-x floribus pnelimik Sjfed longefacuraciore purpura & quafinigrapra: ditos: qu] bus' uccce- 6 unr, capita prima: capitibus itmilis, feminecna in fimili plena- iadix, ui iiii' fium clijnoilofa, dura/orts nigra, minimi digitigraditudine, intern.! parte ex alborlavfcens, anror(i)m & inlatrapro^rdicns^alsarum angullifoliarum Iridnminllar, & £. tandem veluti niurbeni fcf (pagsns (quod omnibus Intlbuseft conimime) multifibris dona] agracilibtis, duris, ficci Sjlentis tamcn, & f radu contumacibus. quarum anteriores & novellxcraftjores ^rnoiliores. & candidae.

Iris an. illi.
fit. 1111.

QvAK.TA, nec foliorum nec florum foima, nec capitibus, fetninc'veaurcaule & L radici diffitt a Tertia: humilior eft duntaxat, ejusctiam floris paulo Tiinores, & angustiores, mca quicmopinione, atquecciam diluiores Primartainen floribus saturatiors.

X't tin.

Naditur utrumque hoc gci Hisquibuldam Hifpaoia: & Galliae Natboiicnlis locis matitimi Sj veluti non procul Valencia, & Monte Setio; unde in Belgium delatx, fuavancucc hottosiftic exortiarunc, non) inusquam Auitfiacos, mca operaituccfiel goacccr fitxi n^m utroque illo genere carebanc Aufnaci.

K. mint.

ILLI S porro Indumminnarum majoris & minoris nominarunt impofita, quoniam nonnifi locis maritimis sponte proveniunt,

Iris mtg.
fit fill.

CJvjNrA, nec foliorum forma, nec radicibus miiltum diffleri majore marina: pifi quod folia haberenon videatur tam atra viriditate pndi: a. florisctiaplunnum difterunt: nam tria folia furreflapurpurci (unt & violaccoloris, iria veto reflexa & terva fpc^ antiapail- lolorafunt jSC multis Jafteis purpureilque venis alrcmatimpcrniixtis abipfo folijungue exorictibus, atque fecundum longirudincm & in lacra fe Ipargennbus, grati^ imam vanet. ucm effinur, Floret cum marina. rcrius prmiailunio videlicet iuen^ fcm^ nmacuficatmadquitit Septembns initio.

Iftam fponre nafccncem non vidi, fed in Belgicis duntaxat chorcul tam ob. fcrvaban). In anguftifolia vi.

Iris «».*
lijal VI.



SEXTA J omnium, ijuaj< utti^ i. jn. tiiii<, iii.. "r muicapromit c radice folia, liipenonbus adhuc angustiora, nec ad ead dura, fed nMflia ctUtutjufqiii vircntia, Cujuseriam duas diJ4rtmias deprehcn debam, nam Vna pedalem interduum ad quatuordecim, teretcm, bir><lc(Oc3u Cfemos ineoplcruni' que gefl. it flores, quartipi Licformiifimilos, & * diuitioris colons, dcinde capita oblongiulcitla^ turgida, valde cminentibus costis pcediu: Altcn" s caulis vix dodrantalc fupcr ai altiuu linem, & uti- cum. niagnacxparie Horcm profert, i lternus flori fimile, armeniaci mali. autpruhtmatun i doctum quodammodorefirrentc, Vtrmlijuc radix [cn<i^oc & C graciliore frupenorur radfee, non minustan- nicnodola, nigroiiiniliter coricctecti; & an- rrorfum atque in iatenbot(erpens, uc I ncvitcm- pore magnum ccfpiKiii occupct, & cum i i ficul- tareeruiqueac.

Provenir uttaque paflim in pratis Viennar M- ftria: vicims ad radices mou um fit is., ut apu' i M^* debug, Gu(iipo Hkirch, BadMi(ium tbermaun', i ptefctum quoz in altiorem caulem affurgit pince- que flores proferunc i liffir< putof minorcin l. >- rernjabcaqium C.V. Dodou Kus CLuiixi Tid^ 1111 fiuiplicicr. Lobdus autern, Iridem pcPtiliil>>

fiivefretu ingu fit folntn appellan t, Belgicis hortis j amdudu tn fa mi lurfm.

Aconvirf.

CAP L


AN no reptuagefimo quarto fupra millefimum & qimigemftimuin, milii primilni confpe^a eft Vienna: Autna: legitimi Acori planti VJK. quoz deinde in hottulo alui. munere Ulufnum viromm Augerij d< Bousbcque Scremiiint f i i abetia: Auftrialis Francar Regi nKiau x (dumvivcbat) fumini Pwfedi, Dv. de Cognac Liberi Baroni in Sonneck, nuac belJia CoQiUij apud Cxiuem Rudolj^um 11 Prandis, atque Magnifici viii

viri Caroli Ry:nGaod.ivenfh, qwomiies Legatomm officio apudTurcarum rmpelaco-
rem,Crrarisnooiaedefunaitucrafit.Hancporid,quaip<TigonspaicQriffina4iieioisio-
temperieai noa reformtdet, led per belle cam fcrar, arque adnatis miru in mudum fc prop-
pagrt, quaiTiplunraiscomaiunicabAin , adeo utnirncapudomnesrciheibaiiKcultores
vul<*iriTim.ifach (it.

Ejus **hiftoiam** in Appendicc ad Hirpanicarum Planraruobfervaciones, olim dabamus
aJdicaqbideai icoiic,(cJcui (quuninond-jm tunuctuponsfloreciprotuliflccj nucamen-
tumnonfuita.iJituinjicque in cjushiftoriaBunsmentiofacia. AtquamioM.D. LXXVH
& aliquot icqucatibusHorencem vidcrim,opra:precium meiaflurum exrltimavi, fnllius
niltonam^qialem in pjnnonicarum plantaruniobfervatLonibusevolgabam.cum fiorea-
tii iconcquain **accuf ad Sen** potuic,ad vivum exprefs^hoc capite denuo rponerem.

Acortun legiimutn.

Acorum cum (uo iulo,



ill. 117

A c o n o i o-iturfunt folia TridistenuifoltE majoris ferc/ed multd longiora, &gratifli-
nrviridiuceprarJira, medionervoleu coltaaliquatitulum **utrimqutprominerte, utin**
Xyphijfoliis.tiuorumformamfatisxmulaitur.BiilloriJiiiutpakiltrisilliusplanricfiavo
ur<,[id, is Horum xmulos, proferentis, quam nonnulli Indeni palufit-m, pctitiores ve-
•ut'fiutoinon appellat, infat ,aliacxalijsprodeunr, medium autem folium plerutne
re'liq«islofigiuiisc(l:il!;ia'ucem licet fubam.iri fine ftporis, nontamcningraijj tnaqucju-
«un.io 3c aron.inco fpirant odore,quem etiam reficcata & cxliicca, vel poft mul ros annos
'cci'WQc: (ub hTcinis initi^m marcefcunt **Ufficitur,incuuK** autem vcre nova germinanc,
Hci';Indcanj;urtifolia: porrdcalem inter folia nonproducit uc [**fides, fed ex** larcrcxcic
folium venJ**Squa** uciulis,cjuldcmcupirettquis**folijs**longitudinis, videlicetbicubitalis
•irduaj,quodArocJioaJlummumufquc^anumcft.&reliquisfimile.infio-.avcropar-
tccufT • ufA>,Si vclutiirunangularccaulemformatu.VbtjamexrenuanArcoiij-
Planirrn • inucaniencum(al!quando, fedrari(rimc,gcminuin)alarerepromic,
ylilulol .icio^i-dpromines&furcaumjlincifqucobliquis&cranfver/im
fefeiccanbasdi lin.liim,flo'l'culis,(l'umf:;<:itp^leatlpallidls,nill:;o^A) mo'loris,cjliatuorfo-
Lojn cooftintibui plenum ,quoJ **paolatio** deinde incrementum fumic,donee hiimam fc-
ilmeinculTitudiricnQqiadquirat/rcquetibiistuberculisviridibustamcle-
Banaferiedi/pofitiscxornaruaijacrccentcnpinaftacoDamzmalarivideacur. Radix ilU
i'XteniApjrtccandic.Tis.qiunifub terra !atct,fupra terram excam.vircicns, inter-
l i i H T i ' h i l i i S l i b s d l i i a f i r d o r a t a t u b a m a
ris, **inumensinfernaparteadna«8fibriscraffis&albicaOdbu\$,eri«inodo-**
tau, doant • i'zTptt a'utciu 3i fummi **teluirc ftfc** dift'utidit, c lateribus, & Gngulis fcrL- arcu-
culii

eulssfeugmculispropaginesalcernacim in obliquum fpargēs,ut brevi tempore magnum locum occupet.

Matth. Ingemiquodam lacuadradicespraccelfimonm juxtaPrufam Birhyni* urbctn ffonte nafcuntelligebam.&fanchumidislociseaudrc.&fecbndumfluciKaJongcfelicusprovenire.quim Liccis,expenear,Scd & C.V.BernarduiPaludaniiiiMedicuiEnchufa!ius,ac (Jnguarismcusamicus,quumanno M.D.LXXVII. exPoloniaItaliā petens,ViennarAufn me conveniret,copioseadmodū supra Vilnam urbem in paludibusj exircmaLithuania Moskoviam fbedanteinvenirircferebat, SC abincolis Tartar siy appellari afflirbar, quod,Tartaristlliusuruspnmumipfiscfretcmoftratus. Circumfcreeniniillos jpleruinque hanc radicē,& aquatn non biberē,quin priis Acori radix in eaferuēt roaccrata. Simile Juuipiidehujus plants nomine ctianuradit MOtiliasii MichowSarmati^lib.u.cap.xn.

Tatunky.

Recentes vcroradices luo corticedelibratas Scdilrgenter rcpuratas codire (bJent Constantinopoli,atqieinufiimadferuare:manccninijcuniplcrumquemanducarefolcnr,adVerru5Corruptiaer]Sconragja,ut[nihircferebatN.V.Pi)ilibertusdeBruxella,quiC6ftantinopoliredicns,vafculoijsconditispLenoBiedonabat, CondiuntcciamnuncinGerma* ma Nobiles aliquot matrons in domcticumufumj&plcrique pharmacop<xi,quonj nonnulbs (aded n unc vulgarisiflc est plan is.) fingulisannisadcentenashbrascondircintelligo &nonconteninendumcxeaquafum facere.

fultmn.

QVVM autem Acori vires ac facultates, Diofcorides, Gaknus&alij fatisprolixidefcip(crinc,Lciliori; ad cos ablegamus. Prarcermittere verb nequco,quin hie lubijcia,quod tnihi olim accidit Vienna:cu magns auSoriraiis Medico.Rccens cvulgata niead Plantis Pannonicis liiftoria,excfnplar dono mittcbam,qasnomenindicate r.oneft neceffc. Ille, lcdonico libro, magnopere Tc mirari (cribebat, mcin Atori hiftona non adfcnpiflc.cju* radicusufm^ftrilitaccm mulicribustnducere:cgorcprondcbam me magisadhuc mirari, quod hxc lcriberet,quum non ignorarc ,neminaa Vetcnbushoc Acoto tnbuere. Scd bonus vitadhuc in vulgarimukormn opinioncvcriabatur,<juie xiftiinabatBuiomoD,cu* jusradicenonnulli nugno errore pro Acoro utuntur, leguimutn Acuruin cllt'j quoni Wmctiproffus diilimiki line netiulque facultates.


RANUNCVVS PRICOX.

CAP. 11.

TR i A RaancuV prxcocius florcnisreperiunturgenera: nuorum duo prioia inPannoniaobfervabanirpontenalccnTia,terciuminBcTgio,ncgleclumqu](lcin ,cujufque mentionem non feciflem, nifiornatiffimusvirlacobut Plateau ijsicwntm miffiet, Batrabij Apulciappellauonc.

Ranunculus prate ox i.rutz folio.

RANUNCVVS PRICOX FOLIO.



Kttlu.

timfm.

PRIMVS , aliquot a radice plWucit folia DD*
tiffida, tutadolijsuonvaldeailfimiia, molln-t
tamen & magis virtua; flaresautcm hbetat>
plos,ante ipfa folia emcigentesjfonnfecus.di"¹¹
jntioemtrpunr, ad iuaveiubcmeni coloiectn-
dentes, inreincandidor,duodcnisautplunbut
folijsconstantes, umbilnumcccufanrtcapit⁰
lo vindi,ut in rehejuis ranunculis, cmclo niuln'
albicannbusfarmulisqijicflavoiaipicnsnaM'
fine odore : hos Justinct caulieulus tercs& »ⁿ¹¹⁰
purpurafccns, dcindecx viiidipallefcfns,q^{11C1J}
ambit unicum plcrumcuclolium, (pl"^{1 3}
cxjgms;sdabctn i jls d [V i i u m
bancauliculum amplefcens: flontus dccidi)*
fucrcfcit illud capitulum^infcmnacrafl¹¹¹*
culacvadit, TKoraValdcnfium, fitre»m»^{nC1?fl}
grumofa radice certij,paulo poft dclcnbendi, K"
nunipxncfamilia.

Nafci[urininfoioribusSncbergjugis,&^{V)Cl]}
nistnonnbus, fingulaii radiccrtLffiuftup*^{8A}
ditus, ccujuscapite aliquot crafTioics fibr*^{8A}
pendent: in hortosautcm tranflauis, tnolns³
natis planta lcfc piopagat.mult^que frequen¹¹¹¹
resfibrasfpargtt, utfecundoaut rertroqu^{Pi}
anno,unica plata pluresdarc plit. Eam au¹
ut loco nativo recentcrura.cxprimi^{CUT3}/[^]
Floret vcr6,in honostrandatus.plcruqu^{^^}
li; nativoauwm loco,videlicetfrigidiore.ic"¹¹¹
fed brevi poft lolutam oive^u^ugaiUin^

Ununcprxcox 11. ThalicwifbL

Ranunculus Apuld quibufdam.



Id. imetjrnplancimfpontenafciinraonrcBaldOjagro Veronenfijpofteaaiicelligcbairij
quiainquasinontisdefenptione. quamornari/Imus, &perdo#us phitmacopacus Veronenfis
Ioannes Pom fcctc. illani fub appellatione Ranunculi conandri folio exhiber. Eam
porr6defcriptionem, ad calcero meZ Plantarum liiftoria: Lector reperiet.

ALTE n. caulem nabccpedaliakitudincafturgenrem, "racilem cx vindirubcfccnrem,
inquoquater na aut quinaroliaj maioris Thali et nrl oreafbofolijs, color &: forma valde
fimilia. lcdmora&tenciora. amarofapore: fJofculi in lingulis alarum iinubus fingula-
res. candidi, qutnque foliolis confhnu*s, ibis pctiolis jnnircnr.es: quibus dccidentibus fuc-
cedunt bina aut ccna cornicula/cm en rocundum. fubruffu ai. acconiti liieinalis vulgo ap-
pellari. "eraini fcreparjoceailcmradicc^rxrcraulem^rodiunt bina aut terna foliarupra
descriptis {imilia, lIngulanbLisdodranra libu(q; pediculis, cjufdem cumcau!ecobris, inni-
xi-tadiximpciscamara, mulcisalhs fibns donaiact, ex quarum capiccalia exit nodo/a
Mdicula^ubindcad fingula interuodianovasiibrasagcns^tque hac ratione fepropjgans,
idcoque perennis.

Abundc nalcebarur in faku Lcytenberg. Mandcrftorfvicino, ulcra Lcytam flum^quin-
toab urbc Viennâ Aufnaca milliari, ubi primum ilium ob/crvabam, deinde quibuidatn
alijs umbrofis fitvis Vici Hicnijgro. Invcnicbam etiam apud ZollonocklJL Herots Balclia-
'iris de Batthyan in Vngaria oppidum, in rervepres. Florcbat Aprili, /cuicn interdum
Maio. plermnque Iunto ad maturicacem perveniebat.

TeR. Tio. ccapitrcaultis fibrisonato. oriuntur aliquot folia, fupcrioris folijs minus la-
c^{en})iata, in ambitu tamcncin cifa, uncialibus aut longionbus pediculis prardica, & Clatabafi
cauliculis do Jrantals binos aut ternos inter illa excurrns amplecicncia: cauliculis pro-
curnbentibus & quodammodo fupinis, adnafcuntur terna aut quacerna Hmilia folia, e
quorum linuunciales prodcunt pediculi, qui Hofculosex flavo pallefcenres, & qutnque
foliolis conf tamcs fuffinenr. quibus dcciduis, apparent quinaucfena cornicuh mucrona-
* quibusdam itubrculis oblita. fcmcn fupcnotifrc refimilcc continentia.

SE D quoniam in Thalictri mentionem incidimus. obrcrvabam in Auftriz inferioris fi-
v^{en} infra Anifm rtumen iua. &: Pannonix pratis, filvis &: momams, varia cjugenera om
niavidelicet caqijj; in Belgicishortisahconfpexcrarn. prarccr Hifpantum, quod illis Pro
^ncijs etiam mcaopcia vulgarcfacrum ell. Ejusiuncm folia, licct aliorum ^i<-^nerum
dodivili Bcincifif, Aquilegiz five Aquilinar folijs adcorefpondent, ut ab impcritis planu
« xdi {ccmiqua, Q.c. am: cq* uiru in c3uIcsair Lrganc &: flors producaii, qm iuhoc "enerc

- 1. n)urcoG,utrelif[uormii,fedcoIorisflavirun[. TriagencKimonna, folijsinterfectnve-
mutinied unumafciuscxrcdiujuam reliquado , Horquecandido, coqucvaldcgravi;
odoris,ctjalcerum paullohumilius.florcciamalbo, minus tame 11 ingranodoris: aquo
terciumdiffITfolonoriscotorcquipurpurireit. I^faccniUduolonyjioribuSi&magisatris
- J. 6. flint folijs,& quodjtnuiodo fpkiidenribus: alterum pallido floriscotore^clatius alcerum,
candicanrc, iii^uchumtlms. SepcimituiiOininuin minimum, folijs minonbus,ciiicracei
coloris.pallidoflunscIore.OrnniumradiccsilivazIutic&icrpuHt, fubnielcnovagermina
• 7- producentcs: fed omnium maxime Septimi.


RANVNCVLVS MONTANVS.

CAP. L II.

IN urraqucPaDnotJia&Noriciparte,vari.i Ranunculi genera fponce n3fciobfervabam,
Itjui pailim tn alijs etiara Provinces creciainc SedaliquotaliainearumProvinciarum
akiillNisjugisconfpicicbam , C]uaearelicjuisHerb;iriireiScriporibus vix obiervatadfc
anunadvertcban; icaquomnibusarEis MedicarludiofisgiatuniQit; fadurumcxiftii
bam^ieorum In lion am illisctiamtominunicarern.

Ranunculi montani i.fpecies i.

Ranunculi montani i.fpecies alcra.



Ranunculi
montani L.

M v L T A parva, rotunda fequafi circino circumduila babe bat Prior folia^liquot crf-
nis divifa,&inambicu ferrata,airiviriditate/pl<ndemcquc lupcrnc{jisc dita.laticraflili-
ve camofa.&fcvridiulmofi^rc; interquipediculus onturtcnuii, tinpulans, brevisdo-
drante'qucminor.floremaJbunijquincufofijiconftantcmlaltint's.iiiiKioruiii.cojasurn-
bilocuracroccaftamina occupant idcciduoflotcapparcttapiLulum inniacurofra^ormn-
le,qumadmCKlum in alijs ranunculuses ex minuto fenanicfimulccwigcftocontiattra-
dixmultisalbicantibusfibnsprxditaest.

Ranunculi
montani, f. f. v.
sive alius.

Ejusalterafpeciescrac, cujus Folia in treslacinia?divtfa, & ilk'denuo aliquot incifuris
donatx^auliculusabalccronondiflrercns.icdampliotctn florem ^erens, cuoRj.iiitcrdun»
duplicibtiomm iL-neconIUnteni:alioqui&colorc {upcnonpjrcni,codemqLic tempore
fcfcexplicantem: radixctiamqucmadmoduminlilo, lupernipaite iionuilln t*tubcrat,
&fibrisonatacil.

Habitat

Nafcituruterqucin fummis Sncberg& vicinarum Alpiuna jugis.coufragofu!o.&:ps-
neiaipfspctrarumfi(Turis:Junioe;intcTdum]fticflorcbat,.iliqLiado(enus,utvidtflie<iiix
matunusautferiusfokiturMnhoriosautcmtrannatijmaturcadnodunij&antcaliosra-
nunculos,Apriiicilicetnoicsprofcmnt.

ALTER, quinaaut fena promebatxradiccfolUj magnajViridia.dura, Ranunculi illuis gloiieratolivygloboiofloa'jqumnonnulliTroiliuinuppellaiir/oJijshaudabllinilta^on¹ nihilhirfita.cnbuslciflunsad pediculum ufqucpertingctibus.&alijspraCTerca minus profuitds **divifi.faporc** initiodulejppoltea aliquantum amaro,pediculis craffis, firm ts, & pedem longis... retm, firmum, aliquatolam bifurcum, intos cavum, qui in lurnmofaltigiocrinahabcb^tfolia coi]Ligua,protmuic laaniaca,pa:nc inftar Aneinonidum.fupra qu¹ deinceps caulis divi- debaturin quacuorautquinque oblogos\$e cercespediculos, quouum iinguli luftincbant unicum florem quinisfolijslacis magnis&albiscouitantemjtiicdjocritciodoratum.multisflavisilaminibu5,capirulu[n occupans umbilicum.cingentibus, quodxcuirufloreap- patcbatmagnoplauoqucfeminconuftum: radix crac velati prxmorla^&Cniultisnigrican- ubusfibnspridica.


Ranunculus mont. II.

FrequensnafccbitirinSneberg, Snealben&aliarum vit:inarutnpratis[ublimioribus, floreatque Iunio,[cnicnautcm niaturiratmadipifccbatur Augufto.

Ranunc.

Ranunc montani ii.fpecicsalr.cra.

Ranunculusmontanus in.



IN cdffioribustamenearon demAlpjamjtigis,mulcohnmilior&:mapshirfbtaeCce- bat hxc pbnta.pedakm aticadmeoa oon exccdens^flore paulo maiore(&: qu i Narciffi flo- rera a'lbm.mediuin calicem flavum bibciuemsquareportetjeoquectiani nugisodora- coquamproris: cjustciainfohamajorcamariEudine&acrimoniaerantpdita.tametli pritnogulluquandani dulcedmcm habere vidrenrur. Serins Horcbarpnorc : namcara dumtaxat flotentem reperiebam, quum in inferiorejugo, alteram jam femm fcinimatu- rumnabentcmobfervaflem.

Ranunculus mont. II. Juncus alba- ra.

ILL v M proxime (equi dbeE puknern mus ille Ranunculus alpmus, quem non obser- vavi, fed cujtis iconem &:dc(cr!ptionema Doeliffimo viroThomaPennaiiLondinciifi Medico Iabui.

Quatuor aucem .quinque vel fex a radice protcrebat ille folia, inqmnque vel plures in- terdum prxcipuaspacies Ranunculi mododivifa,partepronaferccilia, fupina vcroexni- grovindhia-c quorum medioutvicusciViUsab radice orvcbatuT.logitudincpedcmxquans, iiklus,folj»_m fuinmofercmittensoblunga, maximacxparteintreslaciniaspercxerc- mumdivi(a,6quorum mediopediculitres,quaaior,vclintcidumpluresoriunturduosdi- gitos trafverlbs **lortgi.unico ra** duobui foliis fubiode omari,quorum finguli florem (af- tiiciitpLilchrum.cxqmnqucfoliJsorbtcularibusconfantcm.quarinfenuspurpurafcunt, rupcriusinlatenbuscxalboburpureaufuntj^liquapaiteaJbiflimajmulcisluccislaminibus medium

Ranunculus mont. II.

medium occupantibus, calyceque ex quinq; folijs herbacei coloris conflante: *femina* st in tanunculis, compadl:a, ex nigK>purpurea & mucronaca, parum comprcfia, pauloquam in alijs ranunculis majora: radix in fummo lecofj. multipliciter divifa, (a:pius Ci uciatsmo-dj incifa, 3℥ in nmlcas fibras divancau. Tora vero planta pilola est

*Ranunc.
Tempus.*

Crefcit copiose in inonce Itir^regio ac urbis Genevenfis. Floret Iunio, l emina **Augu*** llo macura.

Ranunculus rooncanus 1111. Ranunculus pleno flore albo.



*Ranuncul.
mont. 1111.*

QVAuro, magnacrantfolia, in quinque lacinias (cSajViridiafcinambituftrrata: infernediliitiora & fplndentia. dura. ncrvola^uf pra;man(anullam maiiifcflaacrimoniani, fcJamantudincm pociiisliabcredepreicndebancui': cailliscubitahsauianiplior^itnuij licccenuis Jivis^odisaurgeniculispraTdituSjinmulcasalamedioadCufiiiiium expan-fus. in quibus flores facis amplij Secundi tamen fioribus minores, quinis folijs conftanres, tcnelli^orilaftei. altquantulum odorati .ftaminibujpallentibus umbilicum occup; incibus, & capicQhrudimentum cin^entibus, quodcx fcmLnibustimulcongelhi^ucmadmoduni Ill reliquis ranuncuhs, conflabat: radix primorla videbatur^ inftra radjcis Secundi, mulwf- que longas & candicjntes fibras liabebat.

titts'. ti.

AbuiidantLT pro venire confptciebam inacclivjniomis^cchfel, Sncberg, & ralioroht montium lilvolislocis. perquradcos montes parcbacafenfus. Florcbati Hiccodenitcin-porc quo Sccondus, fed Ill cultis Maio: lemen maturum erat Iunio.

*Ranuncul.
num. ItII.
mittIII.
n*

1ST i vs generis invenitur, qui florem habet plenum Sdmultiplici foliorum fericcon-fantem: alias caule, folljs & reliquis nous profusert fimtlis Qiiarto jam defenpto.

P o R R 6 ijfdem tocis quibus Quarcum. repericbam ctiam Xanunculum ilium albofl^{0*} rcqucm C. V. Rembertus Dodonzus cap. iii. lib. ini. Pernpradistertiar quartum interex-ternos dderibit •(cda Quartomododefcripto differcnrem. Nam humilior d lillo. folia' que liabet livtorajSL paulo magis acra. tamctf iltmiliter incifj. flores rariorcs & iajinoics. inobli-liquLitn nafccncibus pediculis inhrrctes: Si przcocius acro fiorcb.it.

*Ranunculu
nil'. lilt.
*nft
fult.*

H v i c aucm conpenem florccplenontvco, utale bacura N. V. Ioanne vartder Du^c amicofingulan, qui illiustconc vivis tolonbus expretlam miln Viennam ufqucmirtcbat* quamqucrupcrionbus lioccapitcadjungerc libuit, n< rquaminillis]u^is oblcrvare poiuj.

Arbirror ilium ad quiflviflcx iij planris. qti. t. panloantquam aCa:lirc Maximihano 11. Viennam acccr(Jtus, cBelgiodilcederm. JII. Viroloaimdc BrancionCjUscun(anguinco, cBufgundicis motibus miratfucrant. Siniiles dc milc plantas. & Nonberpcapud C. V. wa-chim UDa Catnctaiium. & i Francofortiad Mcenurufrequentes conlbicibaiii. **Vulgare**

in nrtic est u r r umque genus in omnibus lionis Belgicis, habetque poflrcmum illud hij-
nlmsgiinusflores & Canipiorcs Sc frequentiorefoltorum fericprardiros,quam id quodal-
tusaffiirgit.

QyiNTvs, omnium, quosumquam confpexrim, maximus, multa ardiee producbat
ilia valde amphSē carnofo (i vedcnfa Sc fucculenra. ficulneis haud minora, quinq; pro-
jndis incifuris dmfa. mambitii non nihil ferrataj Coloredilutius virente (plendctina. non
ihil villofa^criaadmodum&iLnguauivellicatiatcubitalcscaule Sjdigtaliscraffitutlinis,
rmos. hirfutos/uprcraaparte in aliquot ram os divifoj, quimulros Mores Cuftinebacquin-
<juefolij conftan res, reliquorum ranuncolorum inflar, & lutco auricolorc fulgenr.es: fe-
Wea vulgarian rjnuncolorum iemiu par in capitula congeftum: pro radice multas can-
dicimes fibras habebat.

Crefcebat in nemoribus & nmbrofis declivibus que omni Autriacarum, atque Stiri-
acarum Alpium loctjuxcanvulo clique (centeniveprofuentes. In nonutlispr^rereau m-
fcrioispratisadfaltuai Viennenren^Scultra Dravum^bfcrvabam. In hortis & pratis Maio
fiorebac: in Alpiis vero Junio aut ferius.

Ios i* Simlro Priorcognicu'ifuirte VLdetur₃& illius mcmminifle Commentariode Al-
piis. ab Helveticarum Alpium accolis^fgatwut/ hoc est, Vcnatorum licrbam, appellari
firnbens. Montani Aufriacarum Alpiuni opiliones & vcnarores fitt^crfraut vocabanr, & ad
pellendas fcbres {umic nomenj folijs cms contufis Sc carpo admoris utcbantur. Secundo 8C
Quarto ijdem venatores^Y^6ctff/& CuijfcUb&rold e(1, Pr2: morfx, &: Diaboli morfus nomen
in3ebant. Qjinti nullam pecuharem appellationem intelligebam: non incommodta-
cn, mciopinione, ^A*ru<pe/A^oc {tuTpeJyw, * foliorum amplitudine cognociinati puflic.
VNCAHI Ranuncium generc Sefojiu vocanc.

Ranunculus glomerate flor.



RAN vtfri VLi fi Orroilliu Sjqum Gcfncrus n#amtgk-
in Defcriptione montis fra&i Trollium florern ^ / ^ ^ ^
vulgo dtci fcibir, qm'que a Dodonxo Kanuncu-
lusg! obofo Horeappeflatur, & Qumtus est inter
c«ernotabipfo Penipt. idistercixlib. n n. cap.
111. flore in globum colledo, defcriptos, duo in
Aulnararura Stiriacariimque alpium praisob-
frvabam genera: Mamsunum. ampliorc flore,
Arqualiaurco: Alterum, humilium, flore paulo
minore, & colore, ut pluriinum, ex viridi palli-
lcence: alias .fcliorum forma, capir.ulis, fcmine
mgro, &c radice inter fc convemebanc. Ilium
ctiam incerprimulas vens rubro flore pradctas,
CX fceptentrionaiibus Angliz moncibus crucum
recenter Lon lini a:ino octuagefimo primo lu-
praraii climu & qui Dgen Eefi Liiumco/picicbain.

RAMVWCVLI CRVMOSA RADICE.
CAP. tiii.


NVHC de ijs Ranunculis agendum ol yoi^CB-
Sxf dvp^to^«W4, qai vcluri grumoi am, fi-
ve ingrunaosquoldam longos & breves conge-
ftain habent ra Jicero, Chdidonij nunoris fere
infar. H»rum duo genera mi hiconfpefta, quz
i n d u o d i lliivifb capita dividenda cfie exifii ma vi.
Hoc autem Priorcadurusdc tjs quxnaraliloco
(prater fecundum) flores profcrentia obferva-
bam. Sequence vcrd, quialiundc invciia, vcl

habui. aut alij fe habuifTc/irelconfoexilTe mihirtulcrunt.

E o Rv M crso Ranuncolorum grumosa radice quos nativo loco obfervabam. Primus,
quin iue fexant plurahabebat folia. circinatpxnc rotunditatis. in ambicu ferrata, per ter-
Mm ocpnr* fplenicnria, & vctutitumencia bullataque fupernc, nervofa, &: lanuginofa in-
fend^wraii'initio ripons, (cd poftca fervermflimi: interfoluex. hebantaliquot pedtculi
veriusqui, caulicolido- Jranwlesfcrc, vcl brevioresaiam, villo Cfclanugiiitqaadamob.
fit" fin»ufiruftinentcf florem luteum, odoram, qmnii, rcnis, oftonisinterdum, aut pluri-
ois foliaco. nft intern quibus VLm:«o «xcuffi«vct fponte defluencibus, capicula, aliorum ra-
nuncolorum capitellis aut frag- mdinictoinii! ia apparebant, pallida: railixcmultiscraf-
fis longiafcalfiq. grumis five tuberculis conftabat Chclidony minoris logioribus radicibus

Ranuncul. grumosa radice 1.

Ranuncul. gnimoiaidi. fpecicsn.



nondiltiinilibus, quibus plurimæ tenues fibræ erant intermixtæ: temporis autem successu
 fuccreſcence planra, ex aduacis It-parari & £ in plures plantas fangi poſſe cõp facxpriemia de-
 monſtravir.

Natalis. Frequens erat circa Olyſſiponem inter oliveta, & plerifque Brricarlocis, ubi florentem
 Novembri & Ianuanocollipcbam. atque amicis in Belgium mtrcbam japud quos etiam
 Oclobri & Novembri flotes protulit, & totahic meſi arctinuit in Maium mijue roſſe
 ſem: aliis novis, paulo antequam fiorere incipiat, repullulantibus.

Xomi—. EKANT iii Lutfenna qui *Monun* nominarentt quitamcnappcllatione ferulac Mqi Be-
 damp lapaapiid coſctum tñtgnitur) & ex lafle propinarent, ad provocanda menſtrua.
 Sedin Brcuri Aa Jiam pl. tantam pro A/tf/j/4» proponunt, cam ¶ idelicet, quani odorata radi-
 ce, plaii Mginifque cre folijs, nicer Dorenicigen crajib, in I. cap. v m. hujus Plantarutn
 hiftorix. repono quia forlitan in montanis nafcitur.

Ranunc. gra-
maſtrada
111.
Tiora Pal
111.
111.
111.
111.
111.
 ALTER, quina ſua ſena promebat à radice folia, impenſe viridia, lata admodum, ur initio
 TAAtj^Wo» Pajinonicumci Tcccnfcreai, forma cnim. illius folijs non cran valdc difliff^{1*}
 IM, & P! aranifolioium formam plurimum imitabantur. multis vciis prxdita: in crq^{1*}
 cauliscxi Stcbarpalalis, lans firmius, aliquot folijs minonbus & valdc incilis prardiculi^e
 quorum finu pro dibam ramuli minonbus adhuc folijs obfici, in cr quar nafcebantur n»^{1*}
 res longiur culopediculo innixi ^ i in quoc foli ^ lit cis ratis amiljs conhanies. quorum uni-
 bilicuni occupaban multa ftamina aurcicolonsapicibus pn-iita, fccapitulum mediu⁰¹
 cijgenria: numero farimabarur radice muhis oblonjris crat Tiulculifque grumiscornp^{1*}
 ica. in liaridicis Tripotitani ranunculi, quxtongionbus gruniis conttai, colore ex alt^{o*}
 IUTCO mixto crnii (ſeu < prxditis.

Haec pUntaiTi ſponte provenicnem non oblervabam, fed ab Liocicſſiſ Tima-viro Viv^{**}
 nio *Pardun* Medioburgeni civc, primum accipicbam, deinde iconem colonbuſa H^{v1}
 vniexprei Tatiitplanci Creticoreniinc, **utftnbebat. fibinata, mittcbat diligentiſſi**^{**}
hcobuj Plateau. Wam auctem, folia ance **btemem** [quoa] pei belle crecj pr omere, & adli^{...}

Ranunc. gra-
maſtrada
111.
Tiora Pal
111.
111.
111.
111.
111.
 ſe pro p ge. nita. e. b. an.
 N O N valJe dii Tiruli radice crat ea plantj, quam inter Ranunculi genera ^{enim}
 referendam **ceofebam**, **ſccai Tcrtimn tocutu intern** qm ^ rumola raoice fonft^{intf}
 dabam, quzqite apud rci Herbaria: Undi Ofos Thorz VaWenfium nomen ohtinu^{1^}
 3 **Claniffimo** auctin viio Coiitido Gclncr Oj Conuulwco, Aconitum tuum P^{(Oit t)*}

Ranunculus Creticus Uuifolius.

Ranunculus

grumofaradicem.



Pthora Valdenfium, raontis BaldL



tidis eflb pnratur: dequo peculiarisar TerriD
pod jpiiu^Epiflolas, opera CafpansM'olfij
cditas, inleita eft, ubj Cychmmum tcrtt&m
Plmij Lib. xxv. cap. ix. NaturalisHiftonx,
5c Limeum cjuldcm Lib. xxvu. cap. xi. Lm
deli p f al bonde it.

Ilium ranunculum ego in Etfcheri Tum-
mi jugi prxctpitijs & rupibustenuicerrile-
viter coopej-cis, atque ad incndiem obver-
fis, men{e Augufto inveniebam, dcjnde fre-
quenriorcm; vegcciorcm, majorct|ucco-
ptd in Sticberg, arduo illo rcdoque ad lccun-
dumjuguni afccnlu, Si alio. ipii vicino. Ejjij
tam en folia breviora., rnpnactiamparre-
laciara&magisincificredcprchcndcbam,
quam fine Thora: ValdenGum, auc illius,
quarn c moncc Bildo apud Veronanveru-
ram confpximtisjbiia. Htiusprvtres Bos
quinisfohj5conf;ibat, qnum illonimqua-
ternis dumtaxac folijs expnmatur: ceter<
nora: faciscouvnicbanc.

SED & Qua Ttnm. qi. iiconiniqu Gsrpoi-
te provenientes obferyabarn Tertius, Maio
florentem crucbarn in Hamburgeniimwri-

HunEjari* milliaribus, qua Occafum (ptd:at,pra:lerrim in co-
M n n a m b i t u . q p p p
nieiintcvrequatcrnaautquinacxibantlongopfdiculoinnixa,
;idididinsaquc htnugineobfta* cauiis gracilis, pedem altus, intc
&) Iqu6rpr|t(]ubuiflore!n(JK
^ , cxqutnqLti;ip
il'pirtfeibiufcabcriuUsflvegrainisconftabaf, p c l i d n m h m i -
ffia:feriufcsfibMiate<ttiMte Multasproles ea radix g^ncurelolet, vdnacri
aduacien-

Ranunculuigriunofaradiceiii.


Ranunc. II. gric.

X.

ti iimf
ad h. n. gen
majorib. 2.



Ranunculus Afiaticus grumonradice



adnafcenres. ut in Tnpolitano, fequentica
pitc defci ibendo. vel (ubinde tenui fibrx jn
lixrentes procul a fe fparfas.

Similem C. V. Alplionfus Parmus Ferraricntis Medicus, i« Belgium ad nos mictibat Ranunculi Illynciipptllauonc.

Alium prxtrea Iacobus Plateau, multti majoribus folijs, caulc, & flonbus, magifque incanum, tumctiam magis numero Uitadicibns, ut commodé Illyncus major dici poffit. Is nunc in omnibus honis plus *fuis* famtliaris. qina laic per tenucs HbriSj fubinde novas plantas generantes, fe fpargit, & magna locibrevi occupac

RANUNCYLTS ASIATere
grumofaradice. CAP. LUII.

T>EREOR.E invc&ommRanunculo fum
* quigrumofam radicem habent. Pnniui, aliquot a radice producit foia, unciam lara, dunbus parvis lacinijs divifa. peroras l jrrau, longispedicul Snitentiaj Cra Hiufcula & fuculcnra, glabra, vel quant Jevi Himchirfuia, venis, ex viridj alleicentibus rzdita, tub-
q p p
acidi & ingrati tmtto (aporis, qui brevi in a-
crem Si linguam mordicantenn converttur
p j

r-liquis, & in creslacinia & diviliim, qurum I] iigula: cetera folia x quant, 8d t replicitr r in cifa. fimul qucin ambitu I erraca. Medius inter haccaflurgi E Cauli Sj teres, viridis, conlxvi!, fed quadani lanugine oblJcuSj quem per intervajla amliiunt biuu autterna folia, tninora, magifquctaciniata iljoquurd nnocauli adharcc, (ummofa fligio aniplum futjncf florem, Panonici) five II Tyrici florem magnitudmefuperaruem, licet fjtfdem quodammodo formij & prortbs in odorum. qi inque, aw (ex inrer dum folijs conf tamem, nonnquam ctiam (nam {epe virtolus fie) terms auC quacctnisdumiax M, qui rbnnfccus plicni* cei funt colorij. internc vco miniat iclegart* tis & fptncdciitis, medium florem occupan-
i b p l i b & b i f t

quorum apices cra/ fiu fcutt. iniciopulli. deinde in traceicolons, extuberante intermedia ftamina capitello, purpun nigr r viUi* oblito. quod in uencialcm aut ampliore von- gitudincoi tandem encrefcens, frequitts fc- minis rud Lmci Hoqmdem ubtitum tft, && profus plaru Si inanis. miln «rte numquam fertile fint: multU haber radiculasc o¹⁰ capite dependentc T, breves & cra (fiufi: ulas, perinde ac que Pannonicus five Illinois, *c' etiam Luficanicus^ quorum grumofis rad*-
cibus non multum difcrevit. Sunt enim alijs longiores) extrema tamc parte non obtu-
fa, fed linguia in teone fibrarum paulatim de-
fioeoc, folda, tufci, extetius criorii!

ai Di. ingrati in itio liporis. Qcinucaftis^
Paiinonicoporro grumofaradice ranuncuw,
numulusca» fatur, qui oblique per rad. cunr mtern. t. aieporngcns. iuynupi:

niud tere commune habet, quo <i fub caule inter mrdim rjdicis wumqs. craii
numulusca» fatur, qui oblique per rad. cunr mtern. t. aieporngcns. iuynupi:

subtre^e" quo mult* radices paullo fupcrioribus minores dpender,e quorum medioaa-
liscxi'it,(lib quo dcinde ahus ram ulusfimsliterprodii^nlatuSjUnfupci lor, per radicu fpa-
tia lē (pargcnj&i no vam radcum congeriem generans: quin & matn , five primariz radici
aJna(cuncurcontigui Siquafiipiinfidentes tetni autquaterni fimilium, & quafin;atri
zqaltum gru maruru globi: qua fanē ratione fatifcliciter fē propagat: ha bet prxtercaal-
basquardaiufibraspercraffiorum radicu m fpatia fefc explicant.es & fpargenicis.

Ranun. Afiat. *ῥαυνός κλωνός*, five grum. rad. 11. Ranunc. peregrinus grumofa radice 1.



A LTE R,abUIovixdiffertveIgrumosa radice, Vclfo!ij,florumvefornia&colore: inro-
locualccftdiferentia^ui.utplunnum, paullo craffior&finnior eft, atqueeam7ro* i<-
tAxJn^cxfoliorum.quxilliadoalcuntur.alisuauraaualcerumproferensramulum, (jui
floretn pnmario paulo minorem fufinct: iitvidrelicuinfubjecUico^Lealfabrcexpreka.

*£•"
fmm
fit
"***
Tm f

Floret uterque (ub Maij finem.auc Iuni] ini[io.

An mo oagcfimofupramillefimn&quingencefimurn, Conftantinopoli allatrfunt
Mag^ viro Violgongo ab Enzcctorf, aliquot Pnorisradices T*ioi><>lo\$ tatamtr Lie nomine
iit*. quod Tripolitanum plenum florcniignificat: licet etiam hac appetlacione qui-
dm amici ex eodem loco poftca femē accepernt, quod mihi comraunicatum & crrx
omnijnrum, non Ranunculi pl3ntam, ut fperabaoi/cd legitimam urcicam, vulganter Ro-
nanamdi<3.im, produxit.

Km*

Subfequentibus deinde aliquo Mmiis, Altcnusradices inferticaeperunt Priorisradici*
bus commixtae.

SCRJBBAT porrò ad me Iacobus Plateau anno M. D. xcv. fccaxftatelnfulisFlamtria;
"be, conrpxilTetnpeiiGlibushortisIoannisBridoul, cjururbis Medici, Ranuncul^uo
flora genen, ipfi antea non viva.femine nata.acceprocx Italia prxcedente anno: atqac ab
^loucriuTqac iconcm impetraTe, quam ad me mittcret: ex qua brevem hancdercriptio-
rtctnconcinnabatn , Siliuiccapitiinferebam, nondubicans, quinrei herbarix IludioCs
fiMtum facerem.

Ranunc. pa-
" * J/K*
m, s f

Ex rjdicemultisgrumisconfbntc.qualiseft Afiatici,oriunturPrimogenerifoliapli.
" Aflarici folijs non valdedifTimilia, & inter ilia caulis pedalisattitudinis, in binusgraci-
e sramosdivihis, fummoaftigio fufinentcs fingularcsflores, quinque tolijsconsta-
ntci
"bis,qLiibiis(maxinic circa orasjfuaverubenscolorpermixtuscitct, nicdtum fiorem ob-
iacbintmuitaflava (lamina oblongiufculumcapituliirn cingemia; caulmaucctn. anre
tjuam

quaminalasdividcretur, atuplclebaiiruralia folia, imernns aut pluresprofundajlad-juasfcfta.

II.

ALTERVMgenus₃exfamiliradicplaniorafufcrionbuspromcbarfoliarinrcrqtia:gracilis airurgcb;ucaulis,cujus)nfiniampartemambicbat folia mtresprofundaslacini, cas- que in ambitu crenatas divisa: mediani autem illius parte m. alia singulari, caque nec laci- iiaM.ncccrfKatairummocauliin hacrcbaiflosququcfclijSjUtprecedenSjpraeditus. Cin- Jifqueum iltocolons, {ed «c tima pane magisotbiculatiSj&Jeviterrcrcn^tis; medium flo- rem Occup2b.li breve capiculum Jtaminibusinclum.

QIK> tempore flores protuliflcnc, uon adferipferat: fed iimilja genera ctiam ft habere existimabatjemine Cretico natajquorum floiem nondum confpexiffer.

III.

VNAramenplancarlorem proriisniveumilli pctcatuht, in jelicuij Tnrclitsri fio» omninofimi]e.ip(].)stamc[iplant^ folia nonnih]ldifFercbant,qi)Japai))uluaj]bcfc(bant.

Wins iconem cum altera, cujus flos radiam mixtns tub)o & flavo colonbus, hoc **dfb** vcnisHavismagnavenuftatcrubrumcolorem recarnibus,snnow.D.xcvi.ad **mrntittetar**, feduobusinfecuritibiisannisjcjusquiflore album habc^radicfSjqua^tcir.cn buyj pefca prierunctamctfidiligentem oprainadhibereiti,uicasconfcfvarcpofl(m Scribtbahn- fupcrahud Ranunculi genus ipliatum IcmncctiameCrcraactc ptp, quod Autumnala crfttncedumtanietiflDrcttnuUftctAHipteponcafloiemcjiJSConffcxcrit^elatctquja licet ad me pluresab co tempore dederii epiftofas, in cis nullam ejui Ranunculi **mentio- Beta** fecit.

ET lixquidcmdeRanunculo gnJmosjradicCjquiflorem fimplici foliorum /ericcon- {rantemf(Tunt,fcricbndaeM^:exiftiniabam.Scquciitcautnic3pirc, iliumquiflorecnple- num, St mukipticifoliorum (enepscedum habent,dcfcibenius.

RANVMCVLVS ASIATICVS GRVMOSA RADICE plenoflor.

CAP. IV.

X.ir.ttrr A-

tes.tit (.



P E D A L E M habetPrimus caulem,interqui- terna autquinafoliiadilura viriditatenteti* cmergentcrD,mcciiiiformxinrcrpaluflns&*I- terius ranunculi **cchinato** (coinc prardii fo^{na}: qi « percaule **spatfa**, minora & laanwra: funi- inocanliinfidet magnus fios multipJicifoli^o ruai glomeratione con flans, **ut qtrifereinR***^{**} niiciivilo vulgan polyphylo flore tubcro(iq^{uc} radccpridito, non aurei tamcn.utille, colon[?]* fed epecinei valdc rubentis, &i quail **6ngUtnJ**? ex foli... nifi inilemfioreni/cdminortmimulexhuic radices IimulcogcnorXulJtaiiiiLi ranunculi gr^{'''} mofis radicibus perfimilei, aphodeliforffle< pallefcntes.

Hanc defer: pcionem concinnabam.cu tnHi- fpanicarum flirpium Hifloriam publican) f^{ce*} rein, non ex viva planta (nondum cnim vidci* turn cotigrat) (cd ex iconcviviscolonbuscx- cprciii.a.quam Generofiiis Carol us Rym.p^{l'''} d'ctun of unquedna CefarL egati Wn- muncre, apud Selimum Turcarum Imperato- rem,Conuari[i!]opoli tediens mihi communi- caverac

Iftatu porr6 **iOBJ** tametfi ego & a!iquoti"> ipfisCefarcisLcgatisfublcquentibuiannis^{l'''} fcrimus.ut plantana quam ea piftura refcreb^ ad no! perfcrcndam curarenc: nuoquamco^l- feqvii pocuimiiis.ScdAncmoricmlaritoliiip^{l'''} **focintadum** miferant, negantes eom ran^{l'''}* culura auc unqua libi **coefpedaoa**, «ut... no-

tumcircXcrtnmramcncratexpIatitaqiiarmrcrumraturacIt.advtvuniexprefiamf^ ie.quod naili trtati funt,& ipfcCarolus Rvm.&cjiK piiiflor Latnbertusdc Vos, q ui illa- dciincirat/itque DoilifTimusvir Arnoldus Manlius Rymij tune [iiedicus,nuncin **inciyra** Cob]ucnliacadcrcnnKlcd[Cinxprof(cror,quiAiicn)oncsgcnusciTccntcbac,&ipli^{CL}*^{na} ex perienna polka de«:uic.

NAM cum anno M.D.XCLiUC Hiftoriam Francofurti recognofccrem,ntcaflig^{afior}f^ auflorinpubiicumprodiret, YwnnaminfcriccpiflcinoimusiLim i GcnrolaDn> «^c

Heulentiam,

Heufenftau. qna: precedence anno florentem plantam k habuifle fcribebat. Ulius florlm ipficaiamabeaimpctrav^nedubitarem iuuciuri, cciam icqueucc Autunoatiiistam cru moiam radicem. quJicerMiiis&exliicLa, Maiy pincn menfc M. D. xcn. floretaiiht, quajemcamfiialhtpcnunc dcfcibemui. SC iconcmad v_{IV}um expretam adyecmt hildtoforuuigraEiauV.

Ranuuc. Aaat. gmm. rad. plcno flo. ii.

Rananc. ACtt. grum. rad. plen Ho. m.



TERNA anrcm velquatrnahabcti r. iJicprodcutitu folia, Afatici, five Tripolitani RanancBlitbli}jfitnilia, fl&filloran] mfb. v inciljmmiioraram Ciincerquxcmergit canliculus ^drantcrapediialtu Sjgractiorquii D Tripolita Bt. cuiinha Erentbinafolia, finrcrd O&tertium puiliuin) quorum Infimra terms profindts lacinijs per oras ferrarisdivifum dt^lte- ram, quod f u m & p ulas, ur ue h c m i s y ue q i me d u m n e r v u m i n c i s i s, u a t o m f i n g u l c u n i c a m c i n i i m h a t x r n c. n o n u m q u. i m h m a s, a u t p l u r e s, c 5 S t L i i a v e r o b i n a s t a n t u m i u m m o c a n h i u s d e t c a l i c u l u s q u i n q u e f i p d i f f m a p i e f m e e n s, q u i e x p l i c i t u s. m u l t i p l i c i f o l l o r u m f e n u o n l t a r c o n f p i C i t u r (e t t u m e n i m & t n g m u h a b u i t) f o n s f u b p l i c n i c e i i n i r i o c o l o r i s, d c i n d e m i n i a t i, i n c c r i u s e l e g a i u i s r u b r i n v i n i a n a d c o c c i c u m r e n d e n t i s, q u o r u m a l i a b t i u (c u l a, a l i a a n g u f t i o r a, m n b i l i c u m f l o r i s o c c u p a n t c f u l i a C c o q u o J a i n c a p i r u l o m i r u n i n i m a c o: r a d i x A f a t i c o l i m p l i c i (i m i l i s, a h q u o t g n u u i s m i n o r ^ u s c o i i [b n s, & : ! ! i U s i n l l, i r p r o p a i T i n c s a d l a c r a (f e d r a r 6) f p a r g e n s.

H A H v I T &: e o d n i a n n o x C !. C i c n r o f a D n. V n g n a d i n , R a n u n c u l i p l e n i B y z a n c i o n c - C p t i r a d i c e s. q u a n m i u n a d i v e r f u m a f u p e n o r e f l o r e m d e d i c D i m i d i a t i c a i j l i s i l J i u s c u i u o f l o r e i c o n c m l u i s c o l o n b u s e x p r f n a i n c j i i f i l e n i a n n i A u t u m i i o c u m a l e n u s f i m U i s (u t a d f r i b e b a t) r a d i c e, a d m e m i r t e b a t: r L i ! i t i l i a q u i d c m v e r c (e q u e n t c c e r n a a u t q u a t e r n a f { > 1 } 3, f e d c j u x f r e q u e n u b t i s i m b n b u s f u c r e c o r r u p t a, d c i n d e e t i a m r a d i x. Q u ? t a m e n d e d i t f o l i a, ^ o n v a l d e d t l l m i l i a r u p e r i o r i s f o l i j ^ f e d m i n o r a & p l t i r t b u s t e i H i o r i b u f q u e l a c i n i i s d W i (i. R i d i c e m, { i m u } j t q; a c c e p i f l e m, e x p r e f f i q u a ! i s i n f u b j o 3 a t a b d i a, f o l i a a u t e n i v e r c, a n c ^ u a m r o a r c e (c e r e i i E: r e l i q u a m l l i r p i s i c o t i e m x i c o: i c m i l F a i n n e a t u s.

R a d i c u L t p o n o q u i n c - i u a L i t l c X j f u p r e m a p a r t e c r a f f i u f c u l s. e x u n o c a p i t e d p e d c b a n r, f u p e r i o r i b u s p a u l d l o n g i o r e s. c c j u a r u m c a p t t e p r o d i c r u n c q u i - d i x i f o l i a: c a u t i c r e t i, u t e x i c o n e m i f s d a p p a r e c, i n h z r c b a n i b m a f o l i a, q u o r u m i n f i m u m i n c r e s m a i o r e s l a c i n i a s d i - f u m. S i i l L r d c n i i o m r e r i i a ^ . m e d t a v e r o i n q u i n a n m i n o r e s: f i i p e n i u m t b l m m i n t e p t e m p T o f i n d i o r e s l a c i n t a s d i l T c c t L i m. i i n g u l a s d e i r j d c i n t e r n a s m i n o r e s: f u m m o c a u l i i n h e r e b a c f r e q u e n t i b u s f l e i n u l c i p l i c i r e i j c d i f p o l i t ^ f o l i j s c o n f l a n s, q u o r u m a l i a a l i j s p a u l o l a t i o - i C o l o n s, u t E u e l u r a Q (l: c h d e b a t k u e m n e f c i o a n p i d o r f i d e l i t e r i m i t a t m f i r i t h i n, . . . ^

tlioflorefrofilicbatpdcicellusuneiam akus.fuhtinensalium florem minorem, plenum ta-
men fcejufHem colons , nonfecusac videreftt interduo iiiiRanunculoillotuberofa&:
magnaradice.cujusfiosflavusmulcipJicifo]iorum feneconfans, qui fsepenon modole-
cundum florem ex primo, fed & rercium ex fecundo nonnumquam producit: ex fopeno-
nsautcmfoliifinunatuseratraiinilusduobuscnuibosfoliolisprajdituSjCujusfastigiojn-
lidebatflofculusctiam plenui lecondofrc arqualss.

Nimis. Qvp nomine *miffxfuerincha*:radices Byzaniio,neurramilijndicarrpor.uir.fed abilJis
accepiaddicaGermanicaappcllacioe Cuf56ifcftt«(n)«Sd)m«ltibltmtlf hoc est Tuicici
pieni ru bn Ranunculi.


ANEMONE SILVISTRIS.

CAP. Lvr.

RANVtfcvLOS proximefequidebet Anemone, propterform^& facultatumquandarrr
cognationcm.ExierasvcropiartedcTedebeTttiWcfresconiemanuueft. Illarum duas
fpecicsjicecabaltjsobtervata^,pauloramendiligentiiisdcfcnbereanimuseftjquia in Au-
ftra,Sciriaj& Pannonia Ipontnafcentesi me f^pius crutac,S& carum fcminacollecli.

Anemone filvcfrisi.

ifmm.Jit. I.



Radix.

\\ J C I B & V M ' N \\ » -

Tentis.

furtoid Mflfimtpratisrefcentemobfervabam. FluictifticMaio,inhonisculra,"^
Aprih;quin«ijmrurlusAucumnoincerdm. Semen Iuliofacilinieventocxcutitur,ni»
tjais mature coHjgatjK fxpe ncligentiusobfervantem frustratur.

Habuitporro loannesMulleruspharmacoparus FranLofurcenfisannoM. D.xc.n. inter
iHastjuasanreprariscurasinhortum cranftulcrat,binas, quirurn lurlutumcapitulu
visapicibuscin<ium,multisrenuioribusfoli)sparcimalb)s,parrim»urpura(tentil)wo
turn fuit.ut quis flore pleno cfic fufpican pofTec

Anem. fil.
u.

A L T E R A, ex fummo villofoqueradioscipiremulta profert folia, qucmadmodiinj
Anemonesilvcfrisigenus,quod vulgus PuKatillam appellac, illiuJ prarfertimquoddil"
tiore praxociorecque est flore, folijs fimilu, lanota tamen , duviora, & in tres *foh*
rum alas divifa, f_Up₁₀3 paRtc viridia, pronl paullocandidioraA: villo/a, ingrati &
dcacrisfaporis: iru« qmcaulis emcipvi palmans, firm us, hirtuius, Quemciica («(""
mum terna r ut in Ancmombus , conjun&im ampleclunmr folia, Jac'niata, U "iU1"
tisd(vi(iui<:refcta: flos fummo cauliinfidensfcxfoti} scoDftat, intenoreparte I^CIS, C X
teriQrenonnihilpurpurafcentibusinterdmn.&yillofis, minorquaroPulfiij "TM. 191"
paucioii»*

paucioii»*

Anemone Glvefrisii,



paucioribus luti's ftaminibuj praditus , qu* tandem implumau Jemims congericm , quem admodum m pulJ jullj^ .tranfcuiir: radix oblonga^ ninimidiginairairudinCj paucis fibnsdonata, nigro funs cortice re&a.

Ocfcit h^c in cellionbus Eifchcr & Deurnftcin St ini jugis.mter (I opuloi cfnuj & Jevi rerrarc£los: plerumque verdimpfis (copulorutn filluns & com milluns adfo alee ladicesagir, ut (iuimadilHcultalC &r vix unquann ,ni(i avulfis ferro inftrumento fcopulomni tra^mencis, in. tegras rJfibi cruerelicuc-nc. Floret au tem iftic luio,interdum etiam dumraxat Augudo,pro *ftaiismaturiusaurfcusincip.cncjiiattira Inlutis videlicet mvibusi nam e pnmis Honbus c(l. Semen plerumque matunrjtem adqmnr. fub extremum Auguftum . Difhcultcr ameni vel cicurari vel mitiorcm acrem ferre fiotcil, quemadmodumctiam plera^iue alia;elegantes plants in fummis illamm AJpiuin jugisnat^, quasaliquotiescumfuocclpire m horrumimujimus^i;otrino J^o convnienteqLiccarutnna- tunloco repofitas, confi-rvare (tuduimus: led fruftr.ionnccurani&diligeccianiaddibuimus.

TERTIVM quoJJam He elegansgenus,nec hactenus de (c r p t u m n o n c g o b (b (d I). Thobias Kocliius medicus Medioburgentis apnd Mactiaeos, diim anno M. D. X C. tx Italia Biffileam profitifceretur.

Ab radice auteni (quixnonnmquam mini- »idieltic«ffitttdlnema;goatl villofocjpite,ut ille m fhi fig.n.fitarhar.fniiltagerinii,abanc folia vu|.irisPullatiIla;hi!ijspxnclimilw,laciniata.& multiidivifurii ftaa,mui:ia.parte fup.navindiipronaautcinpaulluIumc;ndicaniia^Vvaychirliita.inrerquxcailliicDier- cnudus rotundus,ljnugineobfitus,circarammam(uninci«foliok,cquibusprodj- •ule-inpulfatdlxfimilispediului,cuimH Icbatumcuifl,>stmior,utplunn.um ,pi.I- f«ill*vu!«riifiorej«fi)lij«onlhnsquzintenorep3itejad(;fljaeran,cnorea u tem,oblanuginem,d«Iutiora&i«Uffmia:iohujusmedit, llioarbiculatuincaputerrine- ba luteu th um buscin£him , cui v>l(ofacarfaria luccedere vidcbator, qujiuuAugnfto menfemKuritatemconleauiaibitrabacur. Florebac Ionio.

la Alpium plantis nati alle reb it, nulquam vero a u b d antius obfervalle,quam circa pe- Natalis

in montis S. B. p n o a M cslub.re v.decur Mtfctnolni Anemone^ K«i« Wm me, licrtpi^dr iconemnegligentiuscxpreffirrit Alrenus .conem pjv.it LobehimnObftrvwionibM, <<<***. foll,addSLpcllat.on/Pair«.U* dta] qo*!c«Polf«.lla.vul«ncongcncr fit, ab.lla fiirnendirlL-riflorisforma, quinoUraodooortcftpendulus, utPulfatil& neqiiectiatn m.icrone rerlexo. Non nlgavcrim ramen Pulfarillam alpnam ma flore nuncupari Poffc, fcincerAncmuncsilil^cftrcs. aticPcACTfhm. cflercferendam. VinmieauKin Belgicoriim liorrorum „cob faftacftmei opera, miflisViamxAuilrixad Nobikivioj Brancionem&DJfumplanm&lcmmbus.

S E v N D A mcinifTeViJeir GefncrusinDfferptione Montisfrafli, Lbellnde Lunuifherbis in hunc mod urn. Anemone quadam Alpnu ,r:dicenipra , rap tulo (c. - •hioishirfuto BcUnueincinftrviti>iilvenriscauHi«rcterro, Pullarillzquam lul. vo- <ant,cognata.Paftores aliqui ^ (rjtr.irtj appeUant.quod.cataplalmatisjalUr.vciienatii u.or- fibusirnpolira.pcorifalutinsJic.

T E R T I « utdixi, hfftona.l nulloIiaflenusScnproreprodira: atquequ'cognitio- nemiubensacceptamfero no^ifTiiao Kuclioo, quiejusplantamikcamad me mictcbat, Hthirtonam concnnarepoflem.

C E T E H V M P.jlfatillTvu!g.imluogenerapafllm in AufinxSi vicinarumrrginnum %>CKeditionbiK*& ventoperrIU'Sinveiiunturunum • prxcociuscraffiore tolio, ampl.o tacdilutiore fi>ire,quodab Vngitis/#*-v.:iww«Ai»,idcft. equikcwkcwuhm fiveeqot. »a Pulfatilla: alterum, non adco prcxox, fol jo tenuis inc 1(0, floreqe minore. & purpu- re i colons aJco Cuuri^tOtgCI viJc«ur, ynguttltMievvieyvnbin, hoc eft.virginis kc w- * I Jccwrchiri

PulfaciJa vulgaris dlliciore Ho.

Pulfatilla vulgaris /aturatiore flo.



ketwchin, sive virginea pulfatilla appellata. Invenitur autem u rumque genus interdum lacteo flore, mixtum inter alias ejus generis plantas nascens, & simul >neuncc vere flore*

Pulfatilla
plum flore.

Inveni etiam mihi significatum fuit P. flantem ferat, atque ex ejus teamine nata pl... ut speraveram, sed simplici sex foliorum le...

Silvarum
Ranunculi.

VULGARES etiam sunt in Pannonia & Austria silvis illa stirpes quae toti Germaniae, & multis alijs Provincijs communes, a n... nes tenuitolar ceruleo flore pæne sol...

Anemone
silvestris
Tropaeum

Solent autem illa novo Vere florem proferre, cum q; aut lactei profus candoris, aut purpurascens, aut cui in candore leviter aspersa sit diluitor purpura, sive carneus (licet mihi hoc vocabulo uti) color. Est etiam quae flavum habeat: sed folijs nonnihil differt, ple-

Gingivero
silvestris.

& purpureum (cujus folia duriora) Neapolitano agro sponte crescunt, referente de Of: mo viro Ferdinando Imperato, atque ob radicem acrimoniam, Gingivero silvestris, vulgo appellantur.

Autem
silvestris
prima 1.

CETERVM, praeter enumerata Ranunculi nemorosi genera quae simplici flore conrta^{nr} bina alia observabam non sponte nata, sed in horis... flore est, infra describendo accipicbam. * : qu t j r u i n " numcumco qui r^{k>}no

Id ex radice longa, te... lorum, folia reliquis sim... Silvarum ranuncu-

Autem
silvestris
prima 1.

drantalibus, teres, ex viridi purpurascens, summo fastigio gell... purpurascens in mentia, quae in tres lacinijs dividit an... nentem, inter quae crescebat truncialis pediculus... nens octo aut novem brevibus mucronatisq; folijs con... externa parte nonnihil suave-rubentis purpure... cupante capitulo viridi, fragi rudimentum referent... ba & tenuia, apicibus flavis praedita: adnaesabantur... media ex parte alba, altera viridia. Florebat cum a... Alterum in hor... illi quod candidum... ;oornac1(J)a1v1r,aKin..in, Porrc[;:Q11odn_c1ucndicc,nrq,ff^A^ tpurpurafcccmfloremp.oferc^inim.lccutJongicnin.Krfaat



tt dice, czulkalos ctiim ex vhidī purpura fcentes habebat, in quorum fastigto, non terna?
 fed (cpcna plcumque nafccbantar folia admodum virentia, in alia ccna {eiq. laciniata)
 diuiraucjadpediculumilU[u(linencem, quipLirpi)rafccbat:interqu?aliujpediculusa(-
 fargebat binisunciaslongU5,licrbacci colons, (u (lincsflorenno&o aueno vcm fctijs con-
 f art... quoru oi qaacuorextcFnairibuslacInijscxrimaparcedi vifaforis circa ungue pur-
 Putafceban, alia incrna mint me, fed omniaherbaccicratit colons, Scumbilicumhabe-
 bant incrciore partex viridi albelccntem, qucmoccupab.ircapfrellum immaiario frago
 fimile, viride, illud cingentibus multis exalbidis itaminibus, flavis apertibus praeditis. Flore-
 bac Aprili cum fuperiore.

Ex ruperiorumporrovulgatiumgcric, nonitapndcmobfervacKfunEduznovxfpc -A
 cics.qux plenum florem habent,anullo(quancamquidcmintellexi)afdlmcdc(ccipta::ccr. ?
 tedemum milliiconfpefb funccarum flores Ibbexcremil Apnlemanno M.D.xcm.quum
 bicnioantemiflje fuiflnt a N.V.loaiine Boifoc,monentccirca illarum culturani id cfe
 obrervandum.amba-i in horto velati cancellis quibusfiam colnberi.autcoticiudi fidihbus
 "iebere, utplenumRotemprofennt, a.1 toquinifliiaJuxui-ja degenerate, cifqucfimpli-
 ^mdumtaxadarc.

DODRANTALI Priorafllirgitcaule, tcreti&rotundo, quem circa medium xquali fitu A
 mbimiterm. maguaex parEcfohorumali, intcrnasplerumqucprofiindaslaciniastivi- f
 fz itque illx rufus in crenas aliquot feftje, perinde fere ut in co qu i fini plici flore albo cfl, m
 Silvarumranunculo :fune verdeafolia npernevircnciajinfernepaululumincana.atbrevi
 lanugiticpubctcentiarfummuscaolisdefinit in terna, quaterna, aucinierdum plura folia -
 :n Jii5hs minot3, iemis zamen criam profundis hcinijs di vi(k, & in atnbitu /ccrata, tn quo-
 m tnediooritur flos multiplici foliorum icitic tonltans, ut iirerdum tricenisqumis, qua.
 rjgenis,aurpluribusfolLo!ispratditiJskonfpicianjr, quorum excciora&linra, in ter-
 dumquam laciniast feaa funr Sc verficoloria, hoc eft, coluris ex albo &c dilute vire-
 t;nte mixn.Kitcrnavcro, minors &angu(liora, intrinfccusniveicoloris, forisctiamqui-
 d:malbi, fedcuifuavcrubenspermixcusvidcatur. odorrtorumSpiniappendiciszmulus:
 uicidium florum occupatcapitulum multis (laminulispi^ili[uii, qualc in vulgari Silvaruni
 IP criicu to.

ALrERA pauI6breuiore(i,cauliculi tamen fimiles, terctcs& ratundi, quosciam cir- A
 caLnecdiimambiuucternT, quiceni. c, Siplt]i-cstioniHniiquamfolioruinalx, in cernaspro" f>
 tun... i, & ufque ad pediculutn pertingencesj laciniastmix, &c illx linuliicr in alias lacinus fM
 tun...

Ranunc. fi]v>t. pleno flore purpuratc.



Ttmftt.

Paria. 22
MI. ill.

Anemone hortensis lat. f. firoplo flivo flo.

minorcs fitx, eaq*ue ferratre: ipfa folia fupt-
raparte (atuievirentia, pronapaullocansi-
diora, utrimqurtamcbrcvilariDginepubc-
kentiaiiun.niocaullinnaftuirturteirja^qia-
rcrna^&plurcsiniereiumfoltoruniaZtCri-
fariam diuife ufque zd pediculum, atque illz
inarobirucei... t, molliguc Janoginc , non
fccuspubci...
pctieii faturc...
exomurf...
nbus folr...
trora, quxdam etiam facipata, in ferna vero,
minora. omnia autem raturepurpurakenti'
busir.fimisunguibus (quibus admixttmnc
cxriilciqiiidpiam) prardira, deinde albican-
lia, tandem diluteeielgtanrer purpurafcen-
tia, mediumctiam octupantevillofocjpi*
iulo,ucin fiipenor: idem ttiamqui iniilo
oJor Vtnu[quc radix feiimilisjoi ga,tfrcs,
nodofa & ramofa, piopagincs fundcms & all-
quorribris donata; orniquc JilveUns radi-
cem pci oint.ia refcrens.

l'aulio (eriui Silv«(tn fioret.r.; n minus ra-
tnen acii aajut- urctitc qualitatc pudita,
tjuam ilta.

Ante aliquot annoscafu repcrtarrlgan-
tesi(lr&: vtnuit^plant?apud mmsBt.-jga»
quz purpureo quidem est flore in filva, Mo-
na: horu mtocnbo Flor:ala pf illato, ad-
vcr(a,bitiisaLovaniDmillianbus:t]Ufautcni
album ilium iMbccintilvjWWditifr;
ne illm Ducis Arichotentis.

ANEMONE HORTENSIS simplici flore.
CAP. LV 11.

DVo Anemones genera Dioscorides &
Pliniusfaciut; unuoi (ilv...
incLjIusralcns. Cicuris autim tres esse spe-
cies colore flohs differences • aut cruth phoe-
niccuii] cfic. auicjudicantcra. five lacteam,
aut purpureu. Gal. lib. 11. xara' rorras luteum
ctim invcnin trjdit.

Eco, prz[criilvc(irei,dcquibusru...
recapitccgimus, Exurit4r*in, cluxin iorttS
aluntur, duopnmana genera oblf rvabam'
Ynmscimflorcsfiniphcifbliorukr...
Habanc: Aiccnusaurem...
Vtriiniquc porro genusbifanamdividip
rcanimadvrcrcbani; nam vet lafiorccran
folio. vcl tenuiore Sc mulcifido. Cccefiirr! ce
ilk cujiis(lores funphci foliorutn ferie^{6^}
ftant.hoccapiteagemuSjinitiumfaocfeJ^
cjus fpecicibus quz I Jtmra habene folir.pt'
xinion-oAi^t/AAar^wdefcnbemus.

LATIFOLURVM crgAPrimaJarifatnP
h...
bitu ferrata, dura, firma, longoc; petiolo fol-
ra. iapinipincinccliarevinaiwcc^
pron. iplcrumt]ucpurpurafccna. utCfci "
minis propemudumfofia, fe^{rvidIT, nil, P-}
ns. inter nuxpalmanscxitcaJlls. tcrccs. iu^{b,}
hurfutus, fumma parre ferenscenu Uciniat



r-sir* fri-

ttmtntt

U* j Ulf. I.

qiii fiorcirtiruftinctdeccmautpliiribusfolijscoDftancmjCXternapartejflavis: interna. aureis. umbilicum occupant capitulum mulris auris ftaminulis fcepto: radix ruberota est oblongiu[cula, Tormcnri Na* vulgans fere armula (ralem certcruca bac J aliquot ribnspr'ardi-
fa, foris rigricans, in rusa lba, lbld2, Ingratiadiiodum faporis, qua: que gultancrr), cxcia[at2
nadfea. quodammodo frangi ilct. deindcfuiacrimonial Liiguamati quuntulum vel hcec.

Lapidolisqusbudam LuiitanL-colltbusiuxca Tagum, atque narn inter veprscruc-
Dam Decembanno M.D.LXIII. flf infequēte fanuario ualis videlicet iiii Hilpanicarum
Stirpium Hiftoria xprcf Lieftr nullumenim florem turn remporis obfervare trcuerau. Sed
multos deinde port annos, feminee Lufitama dclato, (iui km apud Hollaiidosiaram me
moneba: Ioanucs Mouronm, pliarmacopxus docti^mus & L djligenclimus, iicciim quc
cum caule Sc-folij florcm c Bacavia acceptutn, communcabac, qualcm (ubjeda tabclii
exprimic uravicius.

Ancm liortcnflacifduplo flore flavo. Ancmjiortcnf latif.fjmpl.flore ii 1.



ALIA Mlatifoliam Ancmoncm adm^ anno M.D.xxvni. mittebat^ J.V. Ioannes Hog-
bndius. gof pri ma folia promebat jam difl.v fere proximaj purpuracentis ex viridi colons,
deindcaliquo calianormihil Uciniara, inter qui palmaris unus aut altercaulis prodibar,
fuf tinens folium tmgnis & profundis lactnijs divifum, cquo atfurgebat pedalis mterdur:
pedicutus. cui in fide bit finguarum fiodup Jici fo Jjorum ferte confans, quorum cxterna fer
aut fceptem^ orbiculatocrant mucrone, nonnulla etiam denrato, foris pallida & tenuibus
(jiii burk J. impurpura (centibus vcnulis quodammodo afperla, interna autcm deccm, duode-
Cim, aucpli rapauloaiigufliora, foris ciiampa! le banc, omnia vco internl parte flavacr:
cxillon orofb fiocauli liimmo imminete plemmque naleebatur alter ramus dodrantcm
P^dis altus, quem medium ambicataliud folium minujj minotibufq; lacinijs ptardicum,
Kerenscttam in fummo flore miimilem: medium florem occupabaccapiulu mukislutis
ftirniaibus cinfhim. quodi Tiatuncate infcmcn planum lanuginofinn abibatj & levisaurx
flicu difcutic battin radix infrs minimi digiti craflitudinem, binas uncias lon^a, in profun-
duta rendcb«, non in tacum (c fpargebat, unaraq, aut alteram, interdum etum plure fter-
retci appendices larcnbus promcbac, & aliquot infup cifibris prardiraerat. Scriusalijjs
Anemone's g^ncribus \$£ germinrtbat & florebat. temen lunio maturjm.

TERTI* foliacjufdc m funt amplitu Jinicum faprioru folijj, fed Saniculaifoliorum
p^rtedivifura initio. S: pron^ parte non nihil purpurafecntia, mox multifida & tenuis in-
ti; dcinde emerge caulis nudus. lanuginofus, dodr jntalis, nonnumquam etiam pedalis,
tr' ! i K l i i n f t i m involucro flprenocludens intcio, ut La fupriore. tandcm
excrelcens, flore fultinet, in duo J i d f l i d i i f f i f f i cinctacis co-
loris &

Ann. lxx.
Itzf. lxxij.
II.

Jitm. hert.
Uif-t in.
fupl. fitr.

kms & hifuta, intcriusmifta rubedmepurpura nitenria, gr.iuffimo nfrSu, mediucapur yilloliiDi nigrisda.ninuliscirciimeptuin," quod excufib Hose, veluriprmiumemcrgeiuis afparagiiliyiTulusnuuinefaE,& ex piano villofoq; live laniiginolb (tmine ennflatum , pec maturitare'm icvi(limoaitrefljtudecLi[jitur,&c:jusarbttriofertt}r,pcrindeaclitveftnsAne- mones Prim * f«nen •• radix novcllam plantarum fuminenaurura , cxiguseohvarn'millis dt,vctuiHorau[cm,nodu(a&articulata,fonsnigr.i,intusalba, fibnsaliquoc, perquasdli- nientum [rahiu,prardira,qija:fi"urtulatIm fr.iftapangi &fcnpotcft.

Natalis.

Eara quibufiam Germ anil tocisfecundum Rhenu, inier Mogunciam&Andcrnacura, iucervcprcsmapricofiorciucm Manioconfpicitbani.Poftannum etiam w D XXC. (mm antcmiirjin non mcmminOConflanEinopolicxpitadrferriiHi valdefiniitis.ii non'cadcm.In bortistiltajinccliienicm pleriiq; folia pmditic, vcrno autra tcmporctiorctjinctidutn ctiam Autumno ftmen \1mo ni,iturum,quod ilatim leripr.T(bc,uc(i-pecxpcnu?(oin.Si- milicni enam in lca!una'ci arbitcor: quiapaucoi antciinnosadofli/limoviru Fcrdmando Imperaro Ncapoli accipiebam,

Nemica.

HKKBARIORVM vulgusapud Bellas Ancmonem Ocllatam fivefeltigtram niiccogno- minat.Mirorautcin **aprmuJlosadeAtcmerarijeflc** judicij, ut hanc pro Gramoprimore- ponercnonfiMrvt'nri.quindoquidemlc^KirHuni Geraniumpumunijtubcrosaradicc,**tic** iaris vul^3n5.Roritix.

lettfsi, tut. Jimfuciftrt.

AL i vDgenusiri>. ^nitureitlvaldcfti«ile,& forte cju?reminatum,cujus radix fupert'o- bustacinijsdivifavidcnnr&dilurius virenti.ijaiflonsfonnaxdoiL-tamcndiITimilijforis cnim fbliatx.ilbidioblcltiunrcoloris.intuiepurprnadiiutorcalbicanticapitulumfuis ftaminibusfcnim medium florcmoctupaCjquodmacuntatcinpappunijCUicraenivc- lucum.abir. Paullotriusprioretiorct.

Ancm.hort.latifol.fimplici **floreVI.**

Ancm. hort. latifol. v. fimplici fl.



Ancm. hort. latifol. v. fimplici fl.

ilncn hort. latifol. vti. fimplici fl.

ETIAM antchietncui fuaprofen foliaQjjiiturn genus, TL-rcixfolijsparncfimiliajincci qn * cauii^ucin rcliqm'SjCxonturpalnuns.nLduslanugincpubcrcens^ribusfolijs, vclquanilvviin- mCjVelnonjinLfis, floirtn (quoJ HI Antmoncs genchbusvulgarccf^occukantibus, **infumtn?** prxdirus, qui camen ad bmas uncias live binOS pollices, vcl **etiam** altius cxrcfcens fupra 1ll.1 ft> iiola.inoftona pk'rumque,rar6plura,folia,dilu- norc rubro ,& adcarcum quau ccndJrc colore intenus nitencia,albtcanribus unguibus/ons aO- temobfolccc rubentia & lanuyme pubefcencia explicatur,multisin umbihco vioJaccisninnin- bus hifutum capkulum ambicntibus: radix tu- berofa&nodofaest cenuibus aliquot Hbns do- natajfcrisnigricanSjincerncvci 6 Candida.

ALIVD Aneaioncslanfolia-fimplicicarnco florc genus fiabuit Gcnerofa Domins tic Heu- (cnflainBy2antioallatum;quodApnli&:M¹.¹⁰ anniM.D.xxciiu.ipfiprinium rtorcsproniiic⁰ liorum forma, colorc, radicc, \l fupenorc piiij⁰¹ ditFcicns: rtorcsctiamfiojpiccs, (cddccc 2"^t duodecim latulculorum folioiu numcro con- ftab.ic, purpurci fcre cobris, & ad Tcrna: riorinTM co ln re m valdeaccidentisjnnoncanici.ting"¹¹⁵ albicantibus,mul[ji]qucmgricantibusflarnm^U- liscingentibusmt:dium **hifutucapkulum.tT***** criammaturit.-ncin totnetotim lanugincm P^{1**} num (cincn continental!,rcfolvcbatur.

QVINTO no valde abfimile Septimum genit.

quantum ad foliaartinet.rdmeoxrcConfannnoroli anno M. D. XX-VII, **cmtum.q** qucnniopo(tdcmmHorcmtul:t Francofuniad Mocnuni, cum **wliqois gencribos** •• **Maijimd**am. Habuitauccmpl.inta,quxmihunicalhujLisgencriscr.it, radic«niu^{RO*} fam,fomnigr.tin, cqua prodibantduoaurts (ui isannusnonigcfimuslccuTiduiLiF* nHlIdimumSiquLijJt'itclimium fine adniodum fcraxin Ancnionum &;multarum alta- rum bulbacearum Ilirpium fionbus profcrcndislauliculi r-t dalcs.icrct«cx vindi p^{ur}P^{u*} rafcrtccs, &tcnui quadamlaiugme, uccctcrarum.obdudi, qooscircalumoium^{cl}?^{c*} bantccnulaan)at.ihilu,q^uoruuumm«orzpluribuscrcmscrantd]Vil.T,quampr*«drn- nLim₁cxquibuscmergebaticuiicuksautainpi₁oicspcuoltpurputafccmcs,iul^{illtnC^}

res.simplici oftofoliorumferiecoftantesjtenuitcrodoratos, quotum colorforisfaturactus ex purpureo rubcbat.intenus vero ufquead ungues, fatmā purpurā (cui admixta rubedo quxdam)nitch.iticquad kermciinaerar, foljomruorxtuodammodococcinea:, inqnas Umenfpargebantur purpurafcentesradij.&vidercrurpeculiarisqtiidamcolorcxurrifque conilacuSjperqiatnclegausfanejUfiguesfoliorum magni,albi:medium Horem occupabat ViloXum capirellum ntgrum,muhis ftaminulis fanguinei colons ciii£him, quorum apices excxrulco nigricarireSjqLiod matumate in lanugtnem refolutunij&UJi implicatū nigrum lemen habens, ut in alijs latifolia: Anemones genenbus, teviilimo auiKAatudiiperflim fui(Tjr,nili colligcndi teaipusdiligncncr obftrvaflēm.

*• H v i c periimiHsvidcbitur (modōeademonfit) quamanno M. DC. apud N. V. A.vander Duynincultiffimoejushorroconfpiciebam.EafancmealongēvegctioreratiSC niulco plurescaules futs ftoribus onuflos profercbat.

3. N E C i vaUeablilimiliscracquxleminenata, honeniū*IraoviroChriftiaiiioPorreto, aanoedem M.DC.florem tulit,paulloamēn(utmihiquidcm viclebatur)dilutiorem,cu- jusetiatnftaminulavillofLuticapitcllumatnbiēntia, violacciquodammodocrantcoloris, & apices nigrcriia ilia fimiliter folia rummumcaulem am plectēciaerantmucronara,uni- co dumtaxat in tres lacinias divifb. Florebat dumtaxat Maij imno, quia valdc ferioinus fu r annus.

CSTERVM femine AncmonidumterrECommiiTo,ve]fpontedeciduo,multopluratam latifoliarum,quāearum qui folia inultifida& tenuiterincifa habenr,genracōfpiciun- turin eorum,qui rei herbaria: ftudio £e oble£bnt ,hortis,quā ea, quorum hftoriam ante aliquot annosevulgavi: Siquoctidienovanafcuntur.

Ecenim inter latifoliasquxpurpureumfloremhabent, mittebatadmc N. V. Ioannes Eoifotanno M.D.XCVIM.genusquoddamipfi feminenarum,cujusflosipl'orefcrente cle- ans cflct,fed miUidumtaxat bicnniopoftnōrem dedit.

ILLVD autemexradicenodosatuberofaqe&forisnigra.qualisfuperioris&omnium *Antm.h»tu* Suslaco fun: folio (prater earn qua: flaviimrloiefert)multa promebat folia, illisquarpur- *J?''^''*J'''* purcum.Sccoccineuin.atquecarnei colorisproferunt florem valdcfamilia, adcōut, non *-im, ''/''*•* eonfpcclo flor,planca; diftingui nequircne: atque inter illacaules aliquot teretes ,pedalis iiterdum [oagitudinis, virides,tcnuī quadam l.;nugine ob(kos,quibus mfidebanterna fo- tianmronata,unciamlonga,cquorum medioexiliebatpediculusgracilis.tresunciaslon- gus,tcnuifln)]li:erlanugineoblittus,ru(t.inens florem elegantiflimum oftofotijsconfan- cirtjcoloris purpurei faturijexterius fplendentis^ntenusminime, quorum ungues magni, albiqj^ infl'iii verōparce,quā peiculo alhx fcbwt, purpurei ,eminente in mediohwc -ipitellovillo(b&.nigrctanic, plurimisfubca:ruleisfiaminulis,quorum apices C5rulci,cin- ^o^odorHorumfpiuxappendicis.

Floreb.iccum alijs Anemonum gencribus extremo April! & Maio.

NONVM genus eciam communicabat idem Boifbt, ipfi iimihtcr feminenatutn aflerens, *^««« *''*•* ^iftic,ad4liarumdiff;renitam, violaceo Bore appellarifcribens. Habebatautem folia *'' / ^ ^ fion* fap-Tiorija-KUrifolixTertixnoi mulcutndilfamilia.quina, fcptcna, autplura, interqus Pro Iibjn:li'igulares,bini,aucc2rnicauliculi, tcretes, firmi, cxvindipurpurafcentes, tcnuī *P* quafam lamtjjine pu be fee n.res, pedal is longicudinis,quos circa faftigium an;bicbant terna folia,ut in prscdentibus, initio florem occultantia, ex quorum deinde medioprofilicbat *f''*^''^* pediculus,binas auc ternas,interdum etiam plures uncias, longus,fu(hnens Horem odo. vel *-itj. x. jim-* etiam pluriJUS inrerdum,folijs couftantein, ex terna partcrubpurpureis.&fpldentibus, *plac fura.* nrcriuvcr6,expurpura viobecis,quorum ungues rLib^frentesalbicanteotbeerantcinfli, ^pintappcndicisflorum odoremquodammodoreferentem: umbilicum occupabatcapit- ulum nigristaminuliscinfutum, quorum apices ex ca^ruleo mgrefcebant: radix aliarum *Anem. hore.* latifo- *u''f'f'm-* liarmn radiceinflar tuberofa,fonsnigra,&:qua; frag mentis, ut ceterarum, pangi po- *lucifia:'* teft. Florebatctim alijs Aprili,

D;ci vvm quo Id^ra genus obfervabam , quod licet tota quodammodo facie Nonofi- *f''*^''^* mile cfTet, *-itj. x. jim-* Hi. Horis folia coloriscfTentetiam violacci: in terna tamēpjrtcnotisquibufdam *plac fura.* critu difcrea.nam albis maculis crane infignita. Et cercē initio.plantam illam vitium ali- quod contraxifTc exiftimabam cufuscaufa maculxilla: in flore apparerent.Sed quum radi- *Anem. hore.* cē, *u''f'f'm-* nincorruptamorFendi(rem, &fcqucunteannofloresfimilibusmaculisnoraticonrpic- *lucifia:'* centur,dj,cr(iim genus eflccenfui,

ALIVU prxtrea genushab^bamcujusfloresei TentviolaceipauHofaturatoriscoloris, *Anem. hore.* ticc(incele<^atiDāei quod a Boifotoaccipicbam,& quorum ungues majorescmagifque *u''f'f'm-* CM*Mierant, propiusquodammodoaccedentesadOctavigenisflores. IHudConftan- *lucifia:'* tinopoli allatmmilii communicabat IllullrisViriDavidisVngnaduxoraniioantcquiiia V•crinaxcederc.-n,ur Francofurtum meconferrem.

H vie Ancmomdi non valde d i/l m 11 is cratcaqux fem incnaaPorretOj prim urn florem *^ ^* ^ytannofexcentfimofupramillefimium.ctiamelegas,nccfolijs.cauliculis.atqucetiam *•''/• 13M*''* *^''''J^1*1* *externa* *partc* *partc*

parte dilute purpurascens & splendens valde magis interna autem violaceis, quorum uncie

fenlibih prsditus f cujus umbilicum occupabat villosa nigricans capitulum, multis staminibus cinctum, quorum apices nigri. Florebat Maii initio.

CETERVM eidem Porreto semine nata est alia Anemone latifolia, quæ etiam primum protulit anno M. D. C.

Anem. hort. latifol. xxii. simplici flore. Ea autem ex rubrosa & nigrâ radice, qualis superiorum, multa producebat folia, superiorum similia, inter quæ prodrabat singularis caulis crassior & firmior, ex viridi purpurascens, & brevi lanugine septus, in cuius summo fastigio nascebatur tria folia, superiorum folijs paullo ampliora & longiora, omniaque laciniata, e quorum medio assurgebat pediculus crassior quàm in superioribus, ex viridi purpurascens, & brevi lanugine obsitus, veluti etiam terna superna illa folia, sustinens ampliorè florem quàm superiorum, duodenis item folijs constantem, foris ex purpureo albescens & splendidibus, internè ex violaceo purpureis & etiam splendidibus, quorum unguis albi quidem, verum non adeò ampli ut in præcedente, umbilicum floris occupante villosa capitello nigro, quod ambiabant subfusca staminula, subcartuleis apicibus prædita. Florebat Maio.

Anem. hort. latifol. xiv. simplici flore. Ista adijciemus eas latifolias quæ flores quidem purpureo colore præditos habent, sed multo dilutiore & veluti carneo. Omnes autem, radicis & foliorum formâ non sunt dissimiles superioribus, præsertim Tertiaz, caules etiam habet teretes & brevi lanugine obsitos, atque ex viridi purpurascens, ut illius, ad quorum fastigium nascuntur uncialis longitudinis folia, quorum unum, ut plurimum, paucis lacinijs sedum, inter quæ exilit triuncialis pediculus, ex viridi etiâ purpurascens, sustinens florem octo plerumque folijs constantem, quorum externa pars nonnihil purpurascit, interna coloris est ferè carnei, ejusque vel saturatioris vel dilutionis, unguibus item vel amplioribus, vel minoribus, omnium tamen albis, & capitellum medium obtinentibus nigrum & villosum, quod ambiunt multa albicantia stamina apicibus cartuleis prædita. Flores autem sunt vel majores vel minores pro terræ ratione & ubertate.

Anem. hort. latifol. xv. simplici flore. Florent omnes eodem tempore quo superiores, aut interdum paullo serius, pro loci, in quo repositæ, situ. Quædam florem habent nonnihil odoratum, aliz minimè.

EST & altera Anemone latifolia, quam habui munere N. V. Joannis Boisor, cuique Decimum quintum locum dabimus. Ea autem habet radicem nodosam & tuberosam instar radicis præcedentium atque foris nigram, è quâ prodeunt multa folia, ut in præcedentibus, sed majora & crassiora atque in majores lacinias divisa, inter quæ singulares aut plures exoriuntur caules satis firmi, virides, vel ex viridi purpurascens, brevique lanugine obsitus, ut quæ binas uncias superent, & quadam lanugine pubescentia, è quorum umbilico prodrat pediculus tres aut quatuor uncias longus, ex viridi purpureus, sustinens florem octo-

etiam novem folijs constantem, coloris externè carnei, & unguibus, internè verò carnei valde diluti, illum, qui incarnati hinc prorsus referentis, & à nonnullis orangeus dicitur, suave rubens iore vel pallido suffusus esse videtur: medium florem occupat capitulum villosum ad violaceum colorem tendens, cinctum staminibus eisdem coloris, quorum apices saturè purpurei & quasi nigri, maturitate in pappum diffluit illud capitulum, cui implicatum planum semen nigrum, in præcedentibus.

2. Aliud ejus genus etiam mittebat, jam descripto per omnia minus, cum folijs tum caulis & flore, cujus color licet ferè idem, in præcedentibus, sed paulo utilior videtur, in quoque nulla odoris gratia.


Anem. hort. latifol. xvi. simplici flore. Tempus. Floret utrumque genus cum superioribus: & pro soli, in quo repositæ, ubertate, ampliores vel minores flores proferunt. No du b l u m p a t a Marum semine hæc, et interdum variant, & flores proferant. saturationis, vel dilutionis coloris.

SIMILEM quidem habebat Anemone Decima sexta cum Latifolia pleno flore (de qua sequente capite) radicem, sed ejus folia, quæ etiam multa ex illa oriuntur, non erant adeò ampla & crassa ut illius, neque adeò dilute virebant, sed ferè erant ijs similia quæ in latifolia purpureo flore, sive Tertiaz (quæ omnium prima Belgio cognita) nascuntur, inter quæ assurgebat caulis dodrantalibus vel etiam pedalis, satis gracilis, viridis, in cuius fastigio nascebantur terna folia uncialis longitudinis, quorum unum paullo latius extimas oras laciniatas habebat, alia duo mucronata erant, interdum etiam alterum illorum nonnihil crenatum: inter quæ assurgebat triuncialis aut amplior pediculus, teres, viridis, aliquando summâ parte ex viridi purpurascens, brevi lanugine obsitus, cui insidebat flos octo plerumque folijs constans uncialis longitudinis, interdum brevioribus, nonnumquam longioribus, ut ejus, cui Pavonis majoris nomen dederunt, florem simplicifoliorum serie constantem æquare possit, pro soli in quo planta alitur, videlicet ratione: floris color idem qui in plenæ latifoliz flore, hoc est, elegantissimo coccineo intertâ t a p t a t e n s i m i l e s e t a r u m unguis pallefcente orbe illos ambiente c n p a p e . pubescens medium

) externa autem, ^uadani lanugiiv medium

Anem. hortens. latifol. simpl. flore xvii.

Anem. hort. latifol. simpl. flore xvii.



medium florem occupabat capitellum villosum cinctum staminulis purpurascensibus, quorum apices nigricant.

DECIMUM septimum Anemones simplici flore latioreque folio genus habuit Constanti... Anem. hort. latifol. simpl. flore xvii.

SanaginosistfUinacapitulo mciDgenna... tamentofam rcfolvebatur. cui im P'^a' "L.;narc foUft tadix craifa, nodota, ton;

obfervaMapudN.V.A.vanderDuyn^j^ am locum dabimus. Habebacid ' ; - { / - ^ quas numeravimus, equapro. p f a f i e n .

ur ue 3a umb.l.cumca luftinentem... ««nislSiofculls fobji -n fefcgio pwJ^M ^ r f a longuspurpura/ccniccolor, 8s ^ omaf i p acai 3 « ut in d d q i i s l a i f f o l i a n , i

occupante medium florem ca... initio nigri 5c(plendentes, dc inde ex... Ucfrotinus fuit, propccr ptxccdcncem asper-

Florcbat umtaxat Maio, quia is annus va... rimim

Anctn.hcrt.latif.Cmpl. ilorexvm.

Summa cal-
tn vamtu
*n Ammti
d* fiwtiu Ht
ts/mim.



Aacm. hort<n£ tenuif. fimpl. fiore i.

ttmmftt. i.
ep. sifera.



Ratais,

Ferrazie Ducis Medici
de communicavit.

J- L T, . h. 1 (J^{ftl}mim) «bAlphonro Pantio, Sercnifliin:
)eJuradicibuilluft[i Viro Ioannide Braucion, qmreliquisdc'''

rimam hiemem, qualis totis trigintaqL in-
queannisio hisregiombus non iieratcc-
p

HABEBAT ctiam aliasfeminenaras,qua-
rum folia crane latifbliz Tertia; foliji roo
valdediflimilia/edquxfloreshabcrentq-
UIdamnocis, abijscquarum femineDatz
crafc,difcretos:utNatura non minuspne
Iudacinoloribusflorumhujusplatx,quam
Jti Tulipis, & Jndibus. Id quod ctiam obser-
vabam in tilis quas nobiles vjri Carolus d&
Bentynck^IoannesHogclanduSjatqueor-
natifUmus virChristianus Porrectus femire
adqutivcrant: nam nonnulli floreihabuc
runtcoloremvelfaturatioa'vddjlutioreni,
<juidam ctiam fere albicanrem, alij/angu-
ncunij variantibusetiam miruminmoduin
forum unguibus. Im6ip(eHogcl.indusinrct
»nuttierasplantas turn latifoJia: turn angu-
"iroli^quasfemincadquifivichabuitlatifo-
jiasquat hoc anno fexcentefimo fopraniiii-
Iefinn]m,primum florem tulerur,in quaruni
flonbus pluTquam triginta color is aut <n-
guiumditcnminaobfervavir, turn ctiam in
*oliorumnumcro:quajdiffercnuasipfcferi-
ptotradidit.

ABSOLVTA latifoliaram Ancmona^{uliffi*}
piici Horcprarditarum lufbna, utad Ango-
{tirolias tranfeat fermo contentaneum est-
tarum ctu vana: funt lbccicsA iltequidem
rolijs & radice inter fe diftrentes: major Or-
men m florum colore &c corum uncuibus
confpicitur difTerenti. l.


PRIOR, multahabctfolia.novovercquo
pio eda p i n r d i d e x e e
viridipallentia, multanda, Coriandri, vel Li-
mani
epotiusAncmonidijfolijsilmilia.tri
geminaplcrumqucfimul pediculu conca,
nir utaq; m terramueDiofcondre<2ear,
<ncl.nantia:interqu,caulisexi]iinudusqu"
acm, (l-dquem terna fohoh, tnfanani pro-
fundiusmcifa, media parte ampleauntuf,
qua aliquamdm florem occulrat, donee 5o-
iiscalorcex iji fcfexplicans, & cmrgens,
expandamr in quattuordccim aur<pndec-
cim roltoJa mucronata. mmora quam^{in la.}
t i f o l p u a B u c m g c n r b l l c i t k
ir. Das,co[oris vd <ru>
albi, vel u troque mixri, hoc eft, exicrna MT-
tcubcarrulci wmcernaalbi, ftamjnulisalbis,
Suorumapices pallidi, medium florenioc-
cupat.bus: dccuiTo flore, apparct cap.teDum
Pine Kanimculi, conHatii ex (cm inibos eju*
temimetiam fimiJibm, nonromctofuo iuf
in Latifolu Ancmonide: radix digital is ple-
rumquelongitudinis&crafllicudims. in^{*1-}
^uorramosd.vifa^cubrcrculisobfita.fibra*
quaWam hac iliac (pargens, forij nigr.-i.intu*
alba qua: fi_{mi}lter fragmentis fen & pang^l
poreft.

Hancp^{murnex} JralialiabucnirBetei"
(J^{ftl}mim) «bAlphonro Pantio, Sercnifliin:
)eJuradicibuilluft[i Viro Ioannide Braucion, qmreliquisdc'''

floret

Floret novo vcrccum Anemomdislatifulixgncnribus: cjus Icincnctiam cum illoma-
toreicii, aut paullo ferius.

Anem.hort.tenuifol.iimpl More II.



ALTERivsfoliaantehicmem prodcuntqui-
naaucfena, multo mincnbus & crebrionbijs
inc)liirisdivila,qLiim PrionsAnguftifolia.;Bul-
bocafhni,five Ocnamhes primefblijs non val-
dediJfimilta,magts camen carnofa,&: denfiora,
dilutiufquevircatia • caulisiiircreapedalisaut
major^nicusucplurimum.nudus^ioceft.nu]'
lis (bli)sfceptus, quadam lanuginepubefcēstn-
lUrcauliilaufolurum , qucm circa faftigium
ambiiictent.i minora&mulrifidaf(jlia,ad rem-
pusflorc moccularancia, quibusexpl)caris appa-
retflosrummociuli Infidens, quicaloribus a-
perrus, majorequa fupcnoramplitudincpr-
sdirusconfpicitur.Sifexdumraxarfolijsconlh-
rejicecinterdum Icptenaauto^totiaadquirar,
purpurciS<:qu3liviolaceico!ons,c>;tern.iparte
liinuginofii, cuiusumbiliciumnccupantibmi-
nanigricantibusapicibus prsdita, capitellum
vtllofumnigrumqueambicntiajqnodniillum
umquamfemcnproferreanimadvertijiccrot-
ts triginc.iannis vclctiacn pluhbus in liorto a-
luerim: radix nodofaest, multosinobliquum
quaquaverrura fpargens tcnuesfragilcfque ra-
ni os.foris iigranrcs.inrus albos.

Anem. hort.
tenuifol. iimpl
More II.

H*c ettsni in Belgicaprimum mifTaaPan-
tio:poftcaaliouociesalktaeflConfranrinopoi
ViennatnAuftriE. FloretAprili,&interdum
denuo Autuinno, radice minim in modupro-
pagatur : nam veltenui/llma ejus fragmenta
facilecomprehenduntStrepullulat, etiamab-
jcrta &: nulli rerri t<fra

Natalis

2. Hvic non diffimilis nec folijs,nec radice nec BorisformiCfiftantlnopoli cum ea qux
violaccocftflore,aivcilajiiifloriscoIordumtaxateftdilFrcntia,quinoncftviolaccuE,icJ
cxpurputirubens.

IN HiTpanicarum flirpitimliiftoriadii3um est, ex ItaliamifTam fuiTe III. V. Ioanni de
Erancion Ancmonem.liniilctii radice&folijsSccandarienaifoli3C, qoarjo carrulumflo-
rem multiplicifoliorum tcturacondanremferrediccbjiH.quemconfpicere mihinon k-
cuiffrt. Dcince in PlaiitirumperPannoniamBivtinasProvjncrasobkrvataruniHifto-
ria,Constantinopoli Viennam esse allatas Gen.Dn. de Heulentain solidas & recentet mi-
nimcqucnigoljsAncmonidis radicescjsrenuifolixqua: multorumfoliorum /inguineo
est Bore wdicibuspctfioiiles.quss.quimiccebat Bimxaat vocan,&:ctoulcani plenum flo-
rciuell.ircftnbeoat: qua: licet BuJbocafanifolijsfirniKafoliaproduxiffent, fioremta-
mndtdifVcntn6plenum,necca:ru!ciim,(i.-diimpliccm&a!tenuscoloris.Hocctiamno-
minc,vcl j?/*/5^,omnium autem frequentiflimcJ«/5^f appelJanoneConstantinopoli
poftca miflx funt &: illi &: Gencrota: Dn. Vngoadin.atque aiijs, Anemooiidis radices, que
tamefti mulcifidahabnetint folia,tnftar foliorum Bulbocafjni, Hons tamen colore varia-
runcSingulasporroordincedfcricemus.

PKI M A igi cur hoc nom ine mi(Ta, Tertia autem in claflecarum aua: Eenuiore folio funt
& mukifido, foliorumquidcmformaumSecunda:folijsrefpondebat, commode tamen
tenutfoliadic non poecat, fingulorum enim foliorum alar, licet terna; numero ut in ilia,
mitiusfrequentibus.latoribufqjjacinijsdivifrerant^anunculoruquorundamfolijsqua-
danrenus reftpondentes: qua: tamen poftremogcrminabant folia, Utiori bus Anemonarce-
nuifolisPolyphyUoflore folijsvaldediflira ilia non eranct inter qua prodibantlingul arcs
caules (urnmo faftigio terna ut in aiijs folia fuftinccs, Utionbus tamē lacinijs divifaqujui
in cctris Binizade (pecibus, c quorum medio proilicns pediculus biuas unciaslongus
(iilbnbacaoremfimplicifexfoliorum tcturaconfantem.ek-ganuffimi&floridicocci-
aci colorisjquoru unguis fatis mfgni ,cx pallido.fufco & albo colonbus m i x tus tinti crant,
paucis Itaminibuscapitellurncingentibus&florisumbiliciumoccupannbus.


Anna. herr.
tenuifol. iimpl
More II.

Idgeniisinihi&aliiscornmunicariim.prziiawrcanceliicmcmgcmmasprotrudercro-
leSa^quasproximcfuWcquensgelucorrumpebatiacegrecgiccuinal^fioresdcditanno
M.o.xxvi.Vcnim Si luc Ancmonidcu], & rduiarum maximum partem notwscorrum-
pebat

pcbat aspenimx fublqumis hicmisinclemenua,t]M2 maximam tahmitatcm omnibus
prope German iæ hortisadferbat.

Ancm.hort.ccnui fol.fimpl.flore Jin.

Ancm.hotc.tcnui fol.iimpl.flore vu



f^lTh^M* ALTERA,qu<tenuifoliarum Qiiarta,fimilimajam di^habcbatfolia,inrerquraflur-
/<nmj><y<<I gcbatfirmuscaulis, reniafoliahciniaia luflincns.undepiofilicbat ielcuncialispedicuiuSi
hrmus.florc (uftinensamplum,oi51:onts(pr^eteriftius^eneris Anemonidunnnorem)fo*
Iijsconstantnijcolorisincenorcpartcoccineielcg.irflimi.unguibusalbis.ctenoi'cqui-
dcinctiarn coccineis, fed tcnui lanugnr pubefcentibts& Tplendctntbus: umbiltctinioc-
ciipaiice villof bnigricatecapLte,mul:isftamiibuscinto ,quorum apices ex nigropurpu-
ra(cebam:rcmciiofcrvarc nan porui.uam florem qucm imicum liabebat.carpcbam ,u*
iLidLmincrvadelniearem&derebberemifcdii quoddediflcè, ^Ana,quod ubiequentes An-
lntinidesprotulcrunt.parcfTeputo.

AMi>.hri. TERTM^urTenutfoliarum Quinaefl^iulcaantehicmcmpromcbatfolta, tenuifo-
T*X<P- ^HyphvUofangtmieofloTc fo^ nonditTuuiSia ,paulvoiamenfatui.uiora&hanllo
miiusindfa:interquxcaiilescibanrrefniautquaternijinterdunijUtin ^{na, quod ubiequentes pc-}
dcinloii^^firm^purpirafcenteSj&hnuginepubefcentes.tribusfolijsvaldcdiflcftiS^11^{ul}
ciniJtis.tiorecm inicio oculcibus, Anemonidistenuifolia: plcnx&: ccrerarum more pi*"
dieijquidcincadcrumunciammahirudincaumajorc. fii jpraillacxrelccnteSjUn "¹¹
cum (insul[rufincbantfloctn.magnum^lliquivtolaccuseft, p.xncinKrduma;qualeTj>
Ijmpli lex rblioram fericconftaatcm,quxcleganufrimococcuicocolore intusmtebanr,
forislauiaginepubcfccbarr,quorum unguicalbi,&umbilicus,amultispurpuroviplacci*
Jlimmibus medium capurenigencibiis,occupatus: radix tubcrola& nodota ut (uperion*
aut Tenuifoli.r pleno HorcHsc unaex illis Anemondibus Binizadc appetlacioneinii*¹¹
tifeft,quc*rulcuai plenum florem peflaredebear.


Attm hrt,
unmf. v i.
fimpluirt.

QyARITA... Sexta folijsa... Tertianihil differcbat... longi-
tudiniscaulcm Jiabeba[,circafaugiun tnafoliafu(rincntcm,alialiirminftar,l.uioribiJ51¹¹
cmijsdivifa.dcindcfupra ilia palmari longinulinc a(Tur^cntcm, &: florem fufntctmam;
plum admodum, reliqms eius generis majorc, (impliciiiiuliterfexfulioruni textuw
conftantctn.nonorbiculato mucrone,utfuperinri3,led incMfpidcm feredeficntc, colons
^nguincleganridimt.unguibusalbisma^iis.villoiicapitcutnbiliciumflorisoccupance,
&mii]ris finguinisftaminulisobfto, quibuiinfidcbant apices ex c^rulo purpurafccn-
tes:radix fupciorifm.ILS.

Jfntm hnt-
tmft.ru.
JtmfUujit.

B i x t z A D e C^uifitar.fivtfTentiifoliarSeptimiFolia antehicmem prodibant.humjqi
r g c b a u t r u r u u t, i f a b a d a j o i b u U d n t d i b v a n r u : i n r q u a
Maru

Anem. hort. tc Duif. fimpl. flore vn. AQcm. horc renuif. fimpl. flare is.



Martio exibat caul is dodrantalis, tenuis, teres, pufpurafcens & brevi lanugine pubefccns; adcujsaftigium nafcebaruurpeiindeac inslijs genenbusriaminoralaciniataqucfolia, Horcmregnua, minus camenincifaquam in Terna Binizad, ex quorum medioprodibat pediculus binasaurresuntiaslongus, fubpurpurafcens, cuiniidebactiosminoralijs, & foccineoquidem colore prxditus^cd nonmliitad fangtiincuo) tendente fplendens. qualis in quarundam Tutiparum floribus con Cpiciur, (ex. uc plurimum, nonnunquam quinque dumcaxat li;d interdum ctiam (epeem tolijsconibris corura unguibus magnis, exalbidis, qui purpercisvcmsdilndicianc; umbilicum fluris occupabathiriucum capicdlu, tenuibus purpura(ccnnbiifqucftaminibuscin<Sum, qoorum apices nigricantes: idmaturitateiri tomencum rcfolvcbacurcui implicacum planum, utinceceris, femer.

i. Hujus flos interdum variat: nam licet fex folijs conftet Scoccincus ffr, adcofbi ramen hteris colore mace edit, nee fploidens eft. Vinufque aucciu radix Tenuifolix plenoflore radicem non niinus fcfrcrcquam praedifra;

NoNcratdifTimilis fupenon cum radice turn folijs, qua: Sexca Binizad nomine mifla, five Tenuifolia Oaava. frequentcfqi Cxradiccpromiccaulespc demaltos. vindes, fumino ^{Amem. b*rt.} affugio ex viridipurpurafcentes. & tnaetiam folia minoratcnuiterinci [afu (tinent<< intet ^{>>>> / m m m m} quarexurgit palmans pediculuseic viridi purpuraifccns, & brevi lanugine pubefccns. cui infidecflosmaj-irfupcriare, fexfolijs con flans cexternaparte lanugine quadam obdo<ais&: calonsfangueifacuracioris&iplendeniis, internd aurcm fangumeicoccincopermixti, quorum onguesejufdem ferè funtcoloris. fed fplendentis aliquantum, t|uaquepediculo adlixrentquodammodopallentis, umbilicum flons occupanc nigricante capicello purpurafccntibusftaminibuscinao, quorum apicesxciruleofufci. abittandem illudcapitelluminalbicanstomentum, cut implicacum (cmen planumucinprxcdcnrc. Floret Aprilijji Kcrdum denuofubextremum Autumnum.

TF. NVLFOL/B Septimxfimi hscracradices: folijs Seprima Binizade appdlationcmifla, five Tenuifoha Nona. Ejus autcinrl^s L-nisfoliis noncotjlbbat. utrdimiaruni maxima ^{Amem. lrt} pars. led quatuordccim U plunbii Sj ijstert familibus, qux inriore parte flons Tenuifolue ^{<< m / o . * * >>} plenrcoiitpiciuntur, dilutitamen admodumpurpurei colons, & quail caraei, nullisunguiutn vctfigijs: medium autcm capicula ambicbanc mukapurpurcaftamin^quormn apices czrulci, ^{f m f m g n}

Maio flor^b. icapud Gen. Dn^{3m} Vniradin anno M.D.XXCVI n. Autumno prcedente ipfi ^{Tenno} Cttnalij splerifque fngularibus Byzanoaallaia. Anferai (cmen. milmncompertum rnam ^{quum unicam ejus p} iiciiniuberc Cj Camquc uituini axat flore prarditaintilluniucprx, ^{* *} fcindcrem

fincrcmpcrmittebatjql'ocomoJius dcfcribrc & delineate potTcm. An porro iii
teannotimikm floreiulcric&laieiidcdcrit, ignoro:nauj uiuipJoatuio ViennadilccUi.
Anem.Iiort.tcmiif.GiDpI.florex.S.:xi.

Aiwn. hart.
Wmf-l X.
Jim/litfia.



An'tu hurl.
tmnif.it. II.
Jimfitctfi/rt-

RADICE atque fblis Tenuifolia; Quintarpro-
xima ferecrat BimzadeOftava, veITenuikilia
Dccima, licet tba paullo craffiora & magis fuc-
culnta hahere videretur, atque prona parts
fplenderent: inter qu.Tnaiccbaturcaulispedem
longus,firmus, viridi lanugi ne oblitus, terna fo-
liafuffinciis,nunadcofrequentibusJ-icinrijdji-
/aquam fuperiorum, quibusflos inicioobvolve-
batiir: e quorum umbilicocrefcbar pediculus
trescircrunciaslongus. amplugeflan. srlorem,
eoqLiiviolaclcoloriscfta'qualt, lex folijscon-
ftatitem.utcetrorum maxima pars, cxalbidivi-
refcentis prim um colons, demdc nonihil ad car-
ncum tendentis & cnca unguet vircfcentis cx-
terna parte,intcrua veroalbi.plonmis in umbili-
corenuibusftaminibus carnei colons, quorum
apices nigrijhrliituni canciqeparnc colonscJ-
pitulumcifignbus. Ilbctiani mifiafueraicGcTj.
l)n* dc Hculcnrain pio ea qut Horem caru-
lucum plenum ferret.

FOLI 1 i, c;iu!ibui,radice, jam di£br refpondb-
it.Nona Bi'izacit: ant Tfnuifolia Vndccima
Anemone: aijmrlospedicu!oir:lidrb.iti;tribus
lacintatis folijsemrgenti, ljtis maijnus, breviof
tamen (npenote,fcx ut plunnum folijs prxdirus
(1 nttrdumctiam odonisautilpluribus) colons cx-
terni parte carnei albo mixti, interna vt-ro pror-
J u s r c i c a l b i g b V b l J l u m
virefcntibu
s: medium florum ctiamoccupabac
hurfutum capirulum albis ihminibus cintum,
quorum apices(ubcirnlci. Matnra utriufqtie ra-
pita m tom^ntotjmbnugincmpljnurnfemenconrinetucmrelolvcbantur^alcvtllima

VtuniqueluncAnemonidcm tenuifoliatn cxalbido flore Dccimam videlicet Si Vn-
ten! n«"s c^nveniam X p n m l C u r a b a m a l c t : n i l S t a m f o d u m t a x a t f i o r e m , q u i u c c -

Et hae quidem omnes Anemoni [^] <P>*Bini2ric appcllatioe mifTr. Ccrcnim
iftam varietatem fatiore fieti credibile eft: n3m in al^hJs quibusJam etiam pianris idem
contingere obfervabamus.

Ceterum aliam Ancinonidcm tenuifoliam albo flore confpicit bam arud NV. Ioan-
nem Hogelandum,quam alterutrius iftarum femine ^{n a t a d b i}

ffntm ut9tt.
anmif. s. s. s.
jampici fls.

Multa autem promebat ex radice folia/nultifida infl. irahartim Ancmonarum tenui^
liarum, viridia non lplendcntia; inter qucxixibanr biniautplurescaulcidockantaicsvel
etiam pedem lo
divifa, ut in reliquis Anemonibus multifido folio praeditis, e quorum media fide exibat pe-
diculus, binas, ternas, aut plures uncias longus, gracilis, purpurafcentis ex viridi coloris, fu-
retinens amplum florem, lex folijs proifus candidis constantem, exceptis foliorum ungoibus,
qui externa parte nonnihil virefcba't: medium florem occupabat capituluoi nigrum, plu-
rimis ftaminibus albis cintum, quorum apices nigri magnam venustatcm candido flori
addebant: radix erat tuberosa ^{cr.iffn} u f cni. i. inftradicisfiipciiorum, autijhusAncmonidiS
tenuifoliz, quae plenum Un^uincum florum prnferr

^l^?^6M?X^CV^9 Onftammo r o l l i m i a A novovcreaccppi Gencrofvir, Davf-

Anm. hart.
confe. s. s. s.
jampici fls.

di. magi cauccas Anemoniarum radices, quae statim telluri creditz, fubfequente Maio &
Junij initio flores protu unt non unius generis Nam licet omnes multifida inflar Bulbo-
callani haberent folia r &rcfcendi forma at e qlice tenuipolary ol p byllo flore tu-
bro five
riorum
capitulum h
cibus ex obfcurz pu-
nus. Singularum radices imi exerat & nodofz. Omnes autem mille Galipo i a e nomi-
ne, & fubfequentis hiemis inclementia corruptz.

CETERVM inrcquenreannoaccipicbamByzatitioaliquot Anemonidis radices, Uchin
irorc demptasmeoirc,cumquibuldamaJijspregriniipl:<tcui.quarur>, tres inter casque,
enuiore fueruic folio,rlorciri habuerum aj;tm dcicripis colorc nonnrhil vanantem.

Anem.hort.tenuifol.fimpl.florc.xn11.



Vn A proclitmulrifida&renuiccr incite folia, j_{nm}.^A r_{ri}.
reliquarum Ancmonaru Bulbocastanifoijsprx- m*iti
dirarum modo:interquaedodracalesam amplio- JW J*
rescaules,nudi,firni,(ubhiriuti vclbrevj quada
lanuginc pubefccte5,rcna mitiora foliaaliquoc
lacimjs divifacircafummum faftigiumhabctrs,
deinde lu m mo failigio, quod f u pra terna ilia rb
lia ad aliquot unciascxrcdcebat, florē fuftincn-
tcifexfoliorumftricconllanrcm ,exccna pane
carneicoloMsprorfus, priKralbicantcsorai,)!-
tenucroexaibidi, vents camen carnccoloni
abimoungucuique ad medium foliurw Iparlis,
umbilicum occupantevilio(b capicrillo, mulns
leviter purpurafircntibus (laminibus nigcanc
apic prxdin's obilto: hujus vco radix a Uipcrio-
riiradicc valdedtffercbat, ScTeaafotizScun-
dx,qux violact-u fert Horcm .radici proxinia crac:
nam medium qindcmradictscjput, equo folia
&caulis emeigebat, extuberabat & craflius crat,
utin ilta,deinde tcnucsfragile'sq,ramosfonsni-
grefceces,intusalbo5,illiusuiftarquaquavcr(um
inlaterafp.irgcbat. Haecinfcquenre Vrc Mores
dedir.

ALTERI , Gugulisquidem annis folia emerge- jt<*m,
bantPnori no li dill! in ilia: (ed quadrienniopoft
dunuax.itr.jusflore milliiconfpicccficmu,qui
iingularicaulitercri innitcbatur cernas autqua-
rernasunciasfupraminorailla folia tenuibusla-
cinijsdivifaau'urgenri, /ex(imiliterfolijspr.Tdi-
tus,&: pxne pnoris Hori fimiliSjCandidior c.imcn,
ncc valdea Dccimxtertixflore diverfus,multis

ftaminibus albtis Tiiberruleo apicpracditis,&hifutum cJpitulumcingentibus.cjus umbi-
licumoccupaiuibu^HuuiisradixaPriorisradiccfongediveHa.namullosnigricantesra-
mos in IaKrafbarwbatiUuiiDftar,vcrdminiBbrc6tradb,TenoifblJatquae plenum flo-
rcm fett,rfdiccm,fo«na,magnitudine & colore valde referebar, vcl cciam magis albefce-
bat: brL-vLcnon valdedirtinnlisxtii.

TERTIA ncqucfoliis.ncqLIC radiceabhaedirTcrebat.norisetiarmorm-nunits^cxnim A*** heft,
foliKconfatabiampliortamcn.&foliorum magisorbicuiatomucronccrat, colorctiam W''*'-
divcllus nempe mber leu potids (angumcusadcoiaturaius &:elegans, uc cum tlllo,qui in
fericcop'annovillofi>rubrofatur,5cadnigredincmquodaminodoteridciKe,cIuc<T,con-
tendercpolTcviderccturuin^ucsadliucmagisfarun^Ibicancibustanienquihufdafn venis
dlftinai: umbilicumOccupab.It hicfutum fufcumcapiculum, quodambibantmultafta-
minacxpurpuarubentianigricantibusapicbapradira.

Florem etiam hxc dedit quarto demum anno pott quam illam accpiflem.

Now minus eJcg.ins.nccctiam eivatdefimiliserat.quam LugduniBacavorumobferva-
bam.F^crenimexradiccfimilirertuberosa&crafsiucfijperiorimjmiilraproducebatfo-^/!*'-
Jtamncfici>> inrtarprecdencium.&interilJacauIescrnosautplurcspcdalislougirurtis,
interdum mi]ores, quorumfaftigioinfide-banctenufpliaminoramultiplicitennula, &
fupra ill i afiticebac cralfior pediculus.quacernas imcias logus, ex. vtndi purpuratens, &
(-tincns florem valde amplum, nonccdenccm magnitudine floriScundxTenuifohse^ (ex
foliiscODftantem, colons lkngui.neiexatrorubentis&quafi (enccipanni villofi kermcli-
ditta:mu!i, quorum infimaparscircaungiicsfplendebat, florisverdumbili-
cum -> cc.1 Uatc apU e ULM! n lgr d m BU! flum, x b i b (s f t a r) f n b q o ^ p ^
ne coloris:p4uUoKunendilution5fcptum1^ramawc<nigri. I-IorebatApril.

ALIAMprxtercavaldecleEanccmconfpteiebain UluftriftimeDucisArfchotenfishor-
toflInrenwm Lugdun.ap«d Batavos.quam amaccepfred.ccbat.

Hibclumcclmilla, multa&tcnuitermcilafoUKumi fpapiamtaraliarumTenuifo- A* m
^.(jniratorcta.nenluimihiquidem v.dccatarvindicatpfa(talpcd<:iil,scxvirjdi f
p^wurafcntibusinmx^interquxprodibantb^tanbautplurcsc^qjctfiurpw^
tcaai brevi^j Unugine obditfi, arin prxcdcniibusgeiicnbus.tummo faftigio f f t i i
terna

ternafolia, inftar corum quise iualijs Aneconibus tcttuifolijsriulciruia&ajqualicerna-
i<amia,<i quorum mediocxibaEptdicuIusrjufdemcii in cauk colons, unciatn unamajt
altcuni longus,aut ^aullo major ,cui inlidebat flos (ex folijs conllans,brevi renuique lanu-
gtoeeuertorc parcepufcemibuSjColorisu^lutcrubcfcentis, incenoreverococcinci val-
dc Jilun,quorum unguesampli crant & albi, umbilicura obildebat fufcom capituhl mul-
tu (assuinei coloris (tamuiulis cinstum ,quorum apices nigri: radix fere ei limil is qua-
ntmtbJixplenofiore. Cumalijs gencribusApnlifloreni.quiodQnscxpcrs^rafcrcbat.

uij in
fuit

EODEM fimilitr tempore Altam obfervabam florentenijCju^cx tubcrofa crassa radice
infartufupcionSjfnulcaproductebat folia mulci/ida,cjustenuijblixqu^plenum florem lia-
bet folijsfamilia,iLHerqua;ctiam exoriebamur bini am temijintrdnri pluics, pro planue
inagniiudine,caulcs,pcdalislongiciid[nis, virides,brcvilanugincpube/ccccs,fcrcntesrum-
mo t^aftigioternaminorafolia, led valdeciam diftcla, inter qu* exiliebacpediculus<cs
autquatorunciaslongus, cxvindipurpurarcnSj&brcvitcnuiquelanugincobfituSjflLi-
tines florem fex unculibus folijs confanicm elegantis coloris > veluci ex fanguineo & coc-
ci tieo medij,nonfacuri(amen leddiluci, ci^uc profus familisquem vulgus cochiuil!cunt
appellatjCxtLmaparteorbiculaciSjnonaucem mucronaris.qitorum unguis magni, albi, 8c
quafi argcccijUtubilico flons occupaco a nigro villofo capitello, quod am bibant tnulta te-
nuiaftaminulacmfdcmcun] florecolorisj&nigrisapicibusprardita.

um. lort.
I. 3; <U. XXm
j.mfLJbrt.

CVM caconvnicbac Alttra.tam radiscquam foliorum forma: caulis tamcn& Folia in
hac taagil dilute virefcere videbantur, qucmadmodum 8c terna ilia qui in furamo caule
nafcuntur,rum pediculuscui fiosinfidcbat,quictiam craffiores & firmiores crant quam in
fupriorc:flosirem majorjltccc/enisduxta3tf<ljjs,uti!c,confansj/anguincotamen co-
lore quodammodo prsditiSjVcl inter coccineum & cochimllcum mcdin,atbicantibusun-
gmbusij(q:minonbusquaminfLjpenorc;c3pitelloin Boris umbilicoGto, ftammulifque
illudambicnabuscumflnsapicibusjnliprofusdiftrebacafiiipenorc.

Hvte funcquf de Anemonidetenuifolia florera iimplici foliorum fericgerentraob-
(ervabam:nondubitoautem t^mnpura genera repcriatur,& mukoadhucplura quotti-
dic exorirura cofidimuSjVcl foliorum nutnero,vel colore, vel alijs notis rJoresdifcrctoilia-
bicura.in ijsplantisquzfijperiorum fcminevel nacarfuntjvel nafcentur.

AntmenUti.
m flurimu.
jw'.t. JIlgH-
I. 3; <U. XXm
j.mfLJbrt.

CtrERVM.OmniaAnemonidumgcnera^inguiarecaulcSfintefdumduoSjauttreSjVel
etia m pi tires, prout t in agna: 8i aropls vel vecuftx funt radi ccs, prof crtt (olt-nt, & n ul lis ra-
nispra:diros: iioncandidcigiruragunt, quieas nntkifido&arnofocaulcCKpreflasnobis
proponunt.Nonramcninficiasco, quininterdum Naturarluxunantuluiu cbingerepof-
iit,uc unus ramulus,inrcrdum &alter,inter fuperna ilia folia fummum caulem ample&cn-
liaena&atur, utmihiacciditmTenuifoliahorccnfiiimplicifex foliorum coccinoflorc
anno M. D. xxxcix. tc latifolia hortenfii (implici floreTertia, anno M.D XCH. atque
etiam alijs Temiifojix gencribiis anno M. D. xcimi. & Hogclando in ea Tenuifolia
albofiote,quam rcminea.dqmfcitat: venitn idranffime,&ptitcripiiusplant*naturatn;
nififorti-LatifolixSecudiquisppculiarecflccnfcatjUt caule in binasalasdivifumgrac.

Anguillara.

REFERT diligentiflimus Anguillara, (cinaltismontbusobfervatTe Anctnorndisgen"*
multifacio &c lanuqino'o foho, cnj us flosquatuordu m m a t folijsconfartct Papavens flo-
lum inlbr,qin vel rubri colons effc.aulalbi ,aut exrulci: & in Apulia genus illud in vcnin>
quod GalcrumlutcoefTccolorc Icnbit: quodquum non facie, fedfolo colorca reliqui*
gencri bus differre allbratj plunnum dubito, an latifolir genus illud fit, quod fecundo lo-
co defcripii.

Semina.

DicirvR autem CrxcisaViM&^PlinioAncniona&Phenion.Gazafremiumtnifi men-
do(us fce juscj ca : P. rion Ruc) mo criplent nova & inuitara voce vertit nullum
l'uJg.ircnomenovi.RucUiwsramcn CequitUmrds,CocIcs,& ps(frillarr) Gallia appella-
ri affert. Scia postrema duo nomina Papaveri erratico nonnulla Galliz locis tribui: vox
Cequeburdet Pulfacillac forte convenire po(Iit,qua; filvtttns Ancmons genus cfl. Non de-
fanc camen ,qui fimihappcUatione Picudonirciflu m pallido flore donent.

Coronanam autem plantam apud Vcteres fuiffe, ex Athenxi Dciprofoph. Hift-^{ll}*
bro xv.apparet.

Nicantleronimlib. n, Gcorgicoruraf3orcscoronarios apud cum rcccnrensAnemoni-

Et AnemomitsfdemUs ipfa, antes quam contrnEientur,

EcCracinUSinEffcininatiSjapudcundem,

Chiffi&Tutlitomnignit omtur mihi Caput

Aitemomrutti "Vtrnu calicibmJcrptUo^croci) hyacwtboj&.i.-

OMissis pondNeocccricorumvaniide Ancmonidcfententijs, cjuivisacriJest/^
proxime ad Ranunculi ficul.es accedere videtur.

SED longcomnium elegantiflora Lint duo illa Auemonid lsgen Era. qus Polypliv Ilurn, 'w>f&»
 fivemultiplici feneconlrantem lubentiflorem: quarum hiftonain Appedicaci Plan- \$•'''*'''&''
 tarumin Hilpaiijs obfervatarum defenptionem dataeft, & in Pannonicis Plantarum ob- w*
 fervationibus aucciiorreddita: mine verd quia circa illarum altcram, latifolia videlicet,
 quaf dardnotas diligencius obfervare mihi Jicuc, cjus hifloriam de imegrorctexerepla-
 cuic. Eju veto plures obfervabam fpecies.

Aem. liorlatif. plcnoflo. verlic radix.



ILLARVM enim Priof, multahabebatfb-
 lia, Ijta inicio, & latifolia iimplici flore Primis ^{Aatm hort.} ^{Utifti.} ^{plena}
 folijs pine familia, dcinde Samculx aut Tercia: f^{ori}*.
 latifoha: fotiorum SEMlaj majora tamen, ma-
 gis ura nervofaque, & in tres lacinias altius di-
 vifa, infuper in ambitu (errata, fupina parte vi-
 ridia admodum & quaf nigricatitia. pronacand-
 didiora, fervidiffimi faporis & illicolingua
 Urcntis, anrchiemcm etiam germinantia. No-
 vo jam Vere, unus aut alter caulis inter folia
 prodibat dodrantalis, interdum ctiam pedas
 longitudinis craftiufculus, nudus, brevi larm-
 gine feptus, circa faftigium tria exigua folia,
 auc nullis, aut rariffimis lacinijs divifa abeo-
 dem ferc exortu prodeuntia &: Cmultand etn
 caulcm ample clertciaproferens, deinde binis
 uncijis fupra jam diila folia emcrgens, magnum
 ac late expanfum florem fuftinebat, numero fis
 folijs conftant etn, quorum externa & majora
 dena auc duodena, colore viridi, ucp iurimutij
 pr[^]diraerant. eorum mucronibus coccinco-
 colore leviter & virgacim infctsis, interna vero
 minora, & an p^uriora dilutiora ccrubropur-
 puranitebant, & qu* medium florem occupa-
 bant cjufdem etiam coloris, ad umbilicum re-
 flexa, & vcluti glomerata crant.

H A B v I T. borro Gnerofa Dn. dc Hcufen-
 ftaio anno octogc Gmo quarto fupra millclli-
 mum & quingentcfimum cx hujus fragmen-
 to, quod aliquot ante annis pfi coromunica-
 veram, florem modd defcripco fimi Jcm, qui ex

aiiofimplici oclo latorum fotiorum partim viridium, p. irtim coccineorum flore jtnuncia-
 lic. iule (uprarernaminorafoliainnicentccm cmergcbat, qucm fu (linebat uncialis pediculus
 purpurafcens, elegante fane (pcfcuculo.


T ALTERAM (pcciem liabuit illo i pfo anno eadem Gdricrofa Dn. qux ampliffimum gc-
 ftabac florem, infidentempediculo duarum auteriumunciarum (upra terna ilia minora
 folia emcrgenti, initio quidem virentem, dcindc coccinum colore paulatim contraheti-
 tern, o&onis tamen aut plunbus folijs ktioribus & externis rehqua amplcctentibus, ali-
 quam vindttatcm retinentibus, interior! verd coccinei profus crant colons, eorumque
 unguis (uperiore partcc pallido flavcfcebanr, infima, quacapiti in hirebant, coccinca-
 diatim in pallido definentes crane celoris: flons autem umbilicum non occupabant glo-
 merata & L reflexa folia ut in prxcedente, fed villofum capitellum nigrcans, mulcjs nigris
 ftaratnulis ciin[^]um, quorum apices initio ex viridipalle (ccbanc, dcinde, ubi obverfi, ad
 fuberruleum colorem rendebant. Ejuftloris diameter crantibus untijs Romanis, Cvc
 quadranteliomatiipedis amplior.

S I M I I E M nunc alunt omnes rei herban* cukores Belgici in Luis Jortis; in qua taraea
 duplex difcrimen animadvettebam.

V N A cmmcaules inter folia producebat dodranrcmaut pddem lndngoscrafnufculos
 Sifirmos, virides, ruftinccntes lummo faftigio quaternaplcruoque. nonnunquam etiam
 quina imailis longicudinis folia, quorum unum latiusculum & exrima parte in lacinias du-
 villim. rliquam mucronata[^]iridn. interdum tamer, uno aitalccro, rubro colore conPper-
 fo: ped. culus dcindc inter ilia afTurgebat. tres quatuor. aut plures nonnunquam untijs lon-
 giK, cra(ru[^]firmus, viridis, pubcfccns, cui infidc bat rlosunicus, viccnis, triccnis aur pl^uribus
 tblnsconlUns uncialis vel ctiam amplioris longitudinis, elcgjintifaturiore fplendentc-
 quococcinco colore prxdms, quorum unguis fanguineo ambibat magis orhis pallidus,
 quima-

Anera.hort.lacifol.plen.flor.verficoli.

Aneni.hort.hEif.pleno flor.cocciico.



qui magnum decoret Hori addebar : Horn umbilicum occupante capitello villoso nigro ftaminulis fanguini cuba frufeos apices liabentibus inflo.

Anem. hort. lacifol. pleno majori.

A ut R A flores minus plenos profen , & in rerdum limplicio & o , novem aittdeceni foliorum duntaxat Icnc conilantem; ahoqiii, ace folijs nec Boris amplitudine, nec colore ab alijs differt.

Singularocn radix era (Fa, & in aliquot capita excuberansj Latifoliae Tertia? (implici flore radictsm^r. fori Jntgra & fcabra j Tntut - alba, (b) Jida. ingrati/aporis & tria ucescoaidjni, !""l' tisquctnuibus fibns pr-rdica.

Tmfm.

Aprili velpaulloctiam fetius florem iftac expandunt. Sed Prioris fins rarif Timcin Cet-maoia ad frugciupervenit. frequentiffime enim , antequam **fcfcxpliccCjViriuin conti*** Jit. CLTciject multijainiisaliiL Tim. ulr'aicnos aut quaternoscjusriorestxplicatos videC nonmemini. OQclis autem iicuItiflimo Uorco Ittilinffimi Pncipis W illidroil *11m gravij **Haffiaaa.mawmura&amoeniflimmproraleratanno M. D. *xci, qaemvivo*** loribus iplius jufliicxpref Tum , duinfequicue Uclobreipius Ccllitudinaica convenircni* **naihi** confpiciendum praecebat.

Nimin.*

PRIOR. iftarum Conftaminopo lifemprallitu fuic *Gtul* vd *Galfj/d* <<r.ippcll3C^{lonf} qua (ut antedtximus) ruJcospxncomntsrlores & niultipliti foliorum lenconrt: invt^{sdo} nant. **Vulgaucem** Herbanorum apud **Bctgasfic Chalcbedonicam** , & quia ctus Hi) ^{Ple} rumque vitioluseft , & incaput mulctis viridibmfolijs confans degenerat* vintit" Anc^{^o} nidis cognomen illi tributt, **Altram atitem quz** perfeclum **coccinctum** Horcm **ccite*** <¹² vonem inajorera appellanr. **qudd** ejus flns, orbem illum, qm in extremis cauda pavono^m piurnis conrpicietur, quod atn modo imitetur, tamct (idivciiis colonbus prxditiis

Harum radices. penndca Latifoliarum (implici flore, prxfertim **quz** *cralle & globoze* f^{ll}t , cemporis diutumtatc plcrumquccariolariiint, Sdvitiodc indt- ac *extremis nodos* ferpente , tandem pcutscorruptuntur, nitaltcttus adniinium annis, in fragmenta di vullx, ccllimque comni iHc panganr.

Anem. hort. lacifol. pleno fura.

CETERVM Alterius, quz plenoflore est, folia .numero quina, fena, aut plura ID* mujtftda. Bulbocastani. aut Tenuifoliz. ccundi. rimplicifexfijlit Hiimicric flore mgi^^{de} tis folijs similia, paullo tamen dilatius virentia, seu verius usquz reliquz tenuifoliz. Km coccinum simplicifexfohoruiicccouIUincm gelbiitescrai Tiorc qucradice pj*^{di}.

Ancm.hort.tcimifol.plcno9orc.



dix.habent:c.mlisetiam illarumcauli familij, quern circa fummuTiina minora ccnuitcr inci- fafolia am btunt, ftorem, anrequamaperiarur, occultantia, qui fummo cauli ad binas, ternas, aut plurs uncias fupra minora ilia folia fuccre- fecnti infidens, in dena, aut plura externa parce pubcfcentia, longaque&latiulcuiaatqucetiaim majufculafoliacxplicatur cocci modorubecia, internavertiparte coccineo iaturatiore nitentia, quxnumcrofa tenuiaq; foliola fanguineo colorepDcditaamplechintur. Hujus radix nodofe quidem eft, fed paullo longior altera, & licccforis nigricans^itidior ramen, & pallefcen- te colorequafi perfufa, brevitercarum radici fi- milis. quarum flores fanguineo coccincoq, co- lore funt prxdix, ifitusaTba .ejufdemquecum aliarumradicclaporis, &:tcnuibusfibns, utini; donaca, &: fragmentis pangi poteft.

Hxc porro multo liberalioreffe foletin pro- feredisfloribusquamreliq. rarilTitncvitmm ^facin5:iaid, fimitiQrflcatristcperies, Autuin- ^F^nofloresdcnuogeftans/edmagsdilutosj&m- ternisfolijs { calonsdcfedru) aliquaviriditatein retinentibus. Atinijsqui Apriliaperiuntur, ego fic alij aliquado camamplitudinem habuimus, ut Germanici ralleri orbemxquarer, &iritnn aucquatuor fimul cojunclorumcraditudinem fuperaret, hoc eft, ut duas uncias lati cflent, & unam denii. Hoc ctiam ego & aiiij expert! f u- mus, in integnsradicibus&earuin fragmentis, ur charta dumtaxat involutx, &c fine terra iicco

loco p_{cr} rotum Animum totimque hictnem refctvacx, deinde ineuntc Vcre terrxcre- ^t*. Maio menfefolia protulenncSiinfequentc lunio flores. IJcm periculum in aliarum Ancnonidtim radicibusfccimus, & fuccffit xpenencia , veriim innullafdcicusquam ia Tenmfoiia polyphylo flore.

M i H i primumejus radicescommunicarunt Conftantinopoli miflas vel allatasllu- <ris Vir David Vngnad, & Gen. Carolus Rym. ejuoque affinis Philibertus de BruxelU: qux <dcinde mea opera Belgicishortis communesfacix, miflas Vienna Auftrix ad amicos ca- <ucundemradicibus. Illimaurempaucisannisaricequam adCxfarem Maximilianumevo- <catitc. ViMnn^m BU. Cx-r- L* GirtTirrin. xil... ^* Urim. IJITITIAN. III. VIT. II. TITIA. H. B. M. TI. <us, Vicinnm praficfecer, Byzancio ctiam delatam acccprat III. Vir Iuanncs de Bran- <cion, amicus fratris loco a me femper habitus. conlanguinei ipfiusopera Iacobo dcCodcn* <floven, qui binasejus radices Vicnnx redemcrat cum paucisaliquot Tulipis rccensaCur- <forcquodam Conftantinopoli allatis. Poftcavero dum Vit-nnx vixij&bx&ftiperiorNo- <bilibus vtris & matronis, quibus pcregrinx plantx Sc elegantes Hares in dehcijs erant, By- <2ancio Viennamfmitallacx: 13tifoliaquidem C*/M/a**r, uidixi, appellacione: hxc vcr6

z_{tumq} C^uod fiautem Anemonidifaliquod genus. ad Adomdisflore, Ovidio Libro Decimo f'*** Metamorpli. dcfcryptum, referendumeft, nullumhacl: cnusco[irpicren)eniini, quodejus <cfcriptioni propiuscedat. quim hoc: etenim (anguini concolorem iubet florem. Licet <ctiaaiqupncCecic'r. c capitedefcriptx ('m« florem hmplici foliorum fericconftantem ha- <bentes coccinei aut fanguinei coloris, pro eo fuini polTint.

CETERV Kide Anemonide qux mifta fuit proeaqux cxruleum plenum florem habere <del... am ante diximus. Simtle certc florem nondum vidcre mihi contigit, qucmad- <^odum nee jllara, quam albo plcno flore inveniri aiant.

CYCLAMINVS.

CAP. LIX.

C Y c L A M i N i fub /Eftacis finem aut Autumni initium fuos flores producentis, dcin- <dc folu. qux poftquam tota hie me perfiterunt. fub Aprilis finem, auc Maio amittcn- <differentias in Pannomi Sc Aulrij obfervaba^ <VNA <enimcxglobulanradicc. tenuibusnigricantibusqucfibrisprxdica. multacircina- <nodum roncundatis profcrt folia, Alari folijsfercrefpondentia, non adeocamen- <nerne virentia, ini: "cnc purpura centia. liumi cspanla, flores in longis pediculis nu- <folio led in quinque profundas l'icinasdivifo, Gc ut plura vidcancur, conlian-

Cyclami, vi
dicitur...

prop...
crassa, fu...
tantes, unico

CydaminusodoMtopaipurco flore.



Cydam ad-
tate flore.

Cydam ad-
tate flore.

Nomina.

Cydam ad-
tate flore.

Cydamia.
Rycausa.

Cydamia.
Rycausa.

tes, quirefcexplicjrcircipieriresurfum re-
fleftuncur, coloris vcl dilutius velfaturatio
purp lira fee nets , odoris (tiaviflimi : ij marce-
(ce ntesintegndecidu nt, cap_! cul umque Cubic-
cjuimr, cum pediculocuiintidet in multas fpi-
rui icconvolvens, donee terram attigrit. cui
incumbens paulatini augetcit , donee violae
mania: feminariim vafculum magnitudinc
_axjuet. quod macuritate ab extremo mucrone
aperitur, feme'nque ofletidit inxquale, ex fu-
fcfulve(cens, quod terra: commiflum, in ger-
nicnnonabii, fed in t. tuberculum autraduii-
lam conuertitur. prircrreliquoium ft m in u in
UCU ram , undepo(leafoliola prom ir.

A I. T E R A illi plane dm ilis c(t: pauciora ta-
m en temper folia profcrreconfpicitur , eaque
non purpurakentis fubtus coloris, ltd albi-
cantisquodammodOjautpallefcentiSjCuiviti-
dismiftus, utin ACuiauvtlrisfbj^.

Nulli (untillaiu Provinciarum filvofimontes,
nullifaints, autinrcrdumin nonducnac-
cliviranbus uda prata, qui ijs non abundent,
ubi varix magnitudinis radices cniuntur, tan-
tarinrcrdum. urmanumimplercqucant. qu*
pier unique magis fcabro fvm corticc, quam
juniores aut mediocres, &: habent interdum va*
rios quafi cauliculos undc folia & flores fin-
gulis aiiniscmergunt, qui etiam confr. i^i^
terra rconditi, in globul. uem radicc mtfbr-
matuur & tranfeiint, iingutis cciam annis fo*
lia &: Hores pro Jucentes. In faxofisaute mon-

ribuSjautrupibusqux Pinanrorum (11 vafalunt, nu finedifficiltatcmierc memini. quardi*
gita! cmcramtudinemnon (iipcrarciK, ledincubicaleni nonnumquamlongitudincmex*
crevifll-nc. fubindctnodos (ubifcilicccpaulo laxiorcspetraruni hflUras na^ct cram) ex-
tuberantes.

Rhizatomarrnutierculx. qu* multas Cy c lam ini radices cum varijs alijs plan t'is Viennam
inforumvnalesadrerrcfolent^owfrMtappeilic. Uocelt. porcinum pane m, quidam etiam
ruffici Ltkt <Ff^id cH, terra: malum , Vngan auteni Dtzjre rtpM, porcinum fapui.

CETERVMduas alias Cyclatini fpccies (c Inbere aJ mcfenbeb. it Nobilis vit Ioannes
abHoghclande, abipfiusfratreTlicobaldo in munttbu^qiiibtildamertitasdumtx Italia
tedircc. Illjs vtro non Au: umni initio rtocspromerfe, led iplb Sollbrio xftivo floren
pcrc, p r leveraret jucadauriirinaleLirque/Etjuinoclium: ejusitCtn femine natas plafta
idcmottustmtempus obfcrvare camobcaulaiiia-flivumCyclaminumporiusdicendi
quam autumnalem. Pnocm habere foliaalbisnuculisubfcuicnofara, auernap:
bentia, aliquantulum angulofa, SotesaturatmsporpufiilccnrM: Altram folia pf
aversaparce virenttjadvcrsimaculisdlbtSjtjsq; vatdeconfpit uisaftrrfi, roturdiora
riotibtiSj& norejdilutiarcSj urrofque autem fuavifTimiodoris, nates etiam proculr.
lis. Vtnque hoc pcculiare. quod vetera folia rennear. donec novanafeantur.


A^s ipono M.D.xxci. aQtunano^ niflz fufft Conftanrinopoli Geji. Dn. t.
cum van) generisbtlibis. aliquotCyclamim r. idites. orbicularcs. quas caftjt tit * in-p
ncmion luperaire & valdeterritmxpolitumqj corticcinhabuiflcaicbar. qux RatiH
hicmcmfoliaproduxifTL-nc, Cyclan) iniincuntcv; rcpnn]unicn]ergentis&: floruit
fere liinilia, pron. i partepulcherrinicpurpurafcentia, &: (opina candicantibui maco
cnitj. paucionbus camen angulis przdium. Mania ft-qut-nte Hurcs tulit, quos (ubleq
lucurrupt: i[amic vernunieffcomninoputabam. Aipoflquam fubfeqiiientibus annis
antcllicmcm (empcrproferre animadvert], atqueno: innmquain, mitio' cprarfctim
etiam flores plirrimuni K' li^ anautiimnali Cyclami. iOjan vernaliatcnbiifrem. dun"

Qui venales h j bebat Turci, ci qui illJS emit, libenter obtrufit pro Viola marti
runrojtametfi Cyclatn micf Teagnofcct.

Bims (ubli; quennbus anni^ muUo nriorcs & pbni omnino bulbi CytlaminuHi
Bv7intio Bu) mrrmtit (Mi, &: flA* > i appellations. Quadricnio vcr6 poflmaj; iitimj & P
ns Untudinis ruhcnndc accipiebiin nullo nomine infignitu , CHUS folia genus i.
Belgiciliioitiit4iHiliarccile (olcLu [liciiLij. (cot(jliu, ptorluirtrunc, led fubtus tubem
id anni

Cychmius iuodoro purpuiafcftotc.

Cyclaminus verno tempore florens.



id anno XL. supra millefimum & quingenfimum, plurcs vigmti flores tuht, ljs qui in Belgiconarccbantucnondiffimilcs, etiarainodoros. "XCI. autem, plurcsquinuagCQis:ftqucutc biseenr.cnis-

Bi=LGicvMillud genus in quadamfilva non procul urbc Tornaco primus obfervaverat loanncs Mouconus, cuju5 hbralcs radices dum Machliniae vivcrim, & magno rapo aqualcs.ab ip(o nobis miflas mcmint: Illiusfolia utpturimum fubrus virfcfbant, flosdilute rubcicens.carnei cut coloris, & inr.erdii[i] albicabat, inodorus. Cujusfetninc naras aliquando habui pl'antasfimilcs planfi Mores profrcntcs.folia otiam hcdcracca: fcd cjueaur. matrisfoliaoinnorferebant JioccfrrJubtusvindimiltocolorcpaJlcfcbbancaurpurpurafcbant Byzanni Cyclisnini foliorjm in[br,c.iq-, (upcrncalbisfrct]ucntibusmaculis afperfaerat, etiani nonnltla ad itmbilicum alba macula infignita, alia minimc. Tarn hoc verdjqum By^ancinum magistrcrotinum [upraeiuracrans, &:Oclobruiatplurimamduntaxat florere incipieiisinNovembrcinufquc. ByzantinUl:mcndutaxatfctnelobfcrv.ircpotiii,lic« aliquot cipitula diu rctincrc quaca-i frugem perventura vidcnrur, hicms tamen temper cortumpebac; illLjdaudemcratduplomajuseoqtiodBelgicusprofcrebar. Belgicoaucmhcdcracco folio finiilisc Britannia Gallixpoftca inferri carpi:

HABVICTIAM aliquando Cyclammi vcrno tern pore florens paucasplantas, femine ex *cycUm*, Belgica mihi mifib natas, qnaeter«o a fatu anno flores profrcrcxprunti Odoratil Timos fa-w». nc, & va ls; arifaturatorcs, paL]l6qucgraciliorcs: folia alijsminora, inambimfcrcrifpa, 8c foliorLimhcderxfbl: maniitiiiranria, rcncnorar. amcn, lupinapartecandicantibusmaculis afprfa aneulonim etiam mucronibusalbicanubus. prondommno purpurafectia. Primus inter Belgiccam plantam habuit Ioan. de Brancion muncrc Alphonfi Pantij. cujusdeinde frmie n_atxp laritxinaliorumpoicftatemvnerut. Sed N V. Ioan. Boifotaliudgenusalcrre iblcbat obloH<Tioe folio. ut mihi ,cdra ante aliquot annos illiui femem mitceter, per literas figmficaba Usctiam M. ft. XCI. anno aliquot bulbos verm mifit i qui fequntc Aprili flores tulerunt.

AT quem noftcr Lobclius apud infubrcs lutco flore obfervafle fcnbbit. vidcre nondii mi-_{r>(/>}. to hiconcig.c. Quemadmodum nee cum de quo mihi rclatum eft parvaradicc avellanx ma-_{'>/>}«.' gnitudinczfate Horera vulgari roajorcm profrcntc. & indclivicate ntonisafecntem, CK* - * «. ^uaicrfaciendum eftijsqui Roma Florentiam pipficifcuntur. ulcrapontem Milvium ft. «, cundnt nvm 4? «r» uw/rdichim: qui forte Hoglielandij altercfTepofct.

TERTIANOVcbri» anm M. D. XC. fcrcbeba i adnKc; Candia Crctxinrulacurbedi i o gemifs. lolephus dc Cafabuna ielga & SerTM Thufcise Ducis Horti Medici prscfc Qui, in cam in-fulam

Cyclamini
flos.


iulam obfervandarum ftirpiu gratiã a fuo Principe ablcgatus, fc interrliguas plantasqu
Novembri florenres ifiic invcnifict, Cyclaminum albo flore obfcrvatC.licxenio ver6pc
adfcrcbatGallusquidamrhizotomusGalJiamjcaliam, Germaniampragrarefolitus,
Bataviam, rarioresquaflam ftirpes, mtrcquasCyclaraimradices,qucmaifloreprate
turn cflc refcrebar.

DENTALL

CAP. tx.

Dens caninus furputaf centc flore.

bens caninus albo flore.



fCmtJli" valdc acc^^?iC^ailll.aCCISrro)Uma,brcvioia"n^c& kt.ora, ad All,, urfina forma*

bus asperfa, bafi angullã, paulatimq; in latum extenã, deinde in mucronein delinea: ex
plicatis folijs, confpiciendum fe fe præbet flos, dodrantali pediculo enodi & vacuo purpura
lcentiq; innitens, lex oblongiufculus folijs confians deorfum inflexus & fpectans, qui ætis
(Solis radius excalefacti) tepore fe fe explicat, foliaq; furlum refleclit Cyclamini inftar, cle
gantis & dilutioris purpurei coloris, fenis intus flaminibus purpureis, & candido trifulco li
pulum, cõnoens aliquot femina Leucoy bulboli præcoeis alterius feminibus fere refpon
dentiã, fed longiora graciliorãque, flavelcẽtis coloris: radix lor
tisq; candidis fibris ftrpata, & plana quadam appendice, unica
luti radicum fuperioris anni & præcedentium aliquot veftigi
paulatim gracilefcens, unde caulis emergit, fummiã tellure bina folia proterens. Quamou
nullum florem dat hæc planta, unico duntaxat exit folio.

Copiofe nafcitur ad quorundã montium rad.ccs hcrbjdo & udo folo, n5 procul Gra<i°
Striz provinciz metropoli, & Serⁿⁱ Auftriz Caroli regiã. Similis plane coloris
in Allobrogum montibus erutam & mBcl «. J Brand o Donrcz nohis aliquand D.*
fam memini: Sed & circa Baionam na(c,r iCinis Camaborum monc.bus, mili trb*1
C.V. idẽmque Medicus Regius loa
turius, in hortis præfertim culta.
Floret Aprilis, interdum etiam ma

Dimrtiti*
MM *ff<
fms.

Aliud vetõ genus crefcit in Apennino & Euganeis montibus, cujus folia longiora, ma
culas albas diutius tenentia, initio dum exuunt, florem etiam amplectentia, qui fuperioro
major plerumque eft, vel lactei omnino candoris, vel milis purpurafcente albõque colori
bus con

Orchis Pannonica n. l.

Orchis

T.



JS stain

Orchis v.

Kaulu,

Onbu v. l.

Natalis

Tempus

& inq<atuorbarbu! asdivifo, albo, purpureispunaisdiftiri 3o, parvoen! caTiJter(; oprer ni-
 nente, tcm] isodoris, (ubquo, utinreliquis Orchidibustoro (utn&'conton0cflc3pitulur
 exiguutufmencobisinfbreoniincns: gem inas radices habetu ft iculorumodocffoiffi a
 ta5, unamplcnam, a] [cram marculam, lupraqusexidiocaulcortxfibrxexpandiitit.

Nafeiturad montis Glefenteld imminctis radices, bmis lupra Ncapohm AuRna: m^{ia}
 ribus, abundantius camen in momium tenui graminc tefloruni dcdivitanhus, fup
 daun, Mcdeling, Baden, & p er lqufa f e ltuod ubfic bonJ us i vS iennæ vicinis.

Illilluilemcrucliam m ontibus Greben proximis, fed longe ampliozem, craffioreque &
 lonfjiore /pica prardium.

C^vrxi Aquatuorautplurahabctfolia, fummatcllure jacentia, Belgrezorcliidi⁵² l^{ua}
 pafTim in pratis mature purpurcum florem ferr, **fimilia**, (cd uullis tnaculisafperfa: caul^{L,fn}
 patmarem, a) iquotminonbusfo!ijs[eptum, cujus (uainium, multiflorcs. cx; Guaga! cad^{ljo} n

busfoliolisconfante^ribufqialijsfoliolisgaleam ambiftiribus, tatiore bartaptopciiuco'
 tcA dbtul Torccalcariprxdti, (pi catimq; nafccnresexornain, colons autpurpuru d dura-
 toris, autdilu[ions] » ftferecarnci, atquecri. iomn! noa] bi, baTbatamepl; rumque
 guis. vcl jnajpribpsmaculis faturd purpurafcnbsafçetsJ in tcdLmctpprorfu
 pra: fert] [Di: iladcisriocibus: femenuitireliquiscon[orttsval(t)] istont[nctijr: gciiiifa^{sf*}
 diccs^nanifupenorisaniffacciديوicin^Ueramreccmioicui. futculcniani. tcgiini⁰¹¹¹ l.

cn d i d f l l r l o H t

Inveniumurpaffim in pratis Viennxvicinis. Similemctiamobrervaba. TnnoM.
 in pratis urbi Londmicfi in Anglu proxitis: ubi & atiam crucham grandiotc
 purpurcorum fpica, tetirrimi ftroris.

let Ioan. Hogbelaii < Jius, cu) usiconcm & bt nos bulbos ad me mificamcbienniu,
 taliafl'urgiccaulc, queni ternauc quaternaacnbiunt angtifta folia: fummuscauhs
 breviorcm fpicam florum elegantis interius rubri colorinJintt ti, f vci 6 paulodiluti
 fidolabropropendiciKC

Rara mventu crefcit in marinis aggeribus, interdum ctism rccpirturcirca Hafan^l
 tandiar. Inhoriosautcmiranlhca, Utiuscxiicat fluiuiiuomam, inmctxqualifo^{rnlinj}
 definentem.

Omnes autem Maio mense florere folent, prater primum genus quod paulo ferius fo-
 resptoum.

Orchis Batavicavr.

Orchis Pannonicavm.



TRIA plcrumquchabet^cptimum genusanguflafolia, alioquircliquis Orchidibusfi-
 milia, viridia. *czuhculum pahauem*, (*picaflorculomm ex herbaccop^llidi colons*, tribus
 apiculisconlUntiun^&rnofcliiodorcmmreferentiu^exornatumiunicamradicem. rocun-
 datnpidmagnicudmt;, fiipi-aquaailongarpropagincscxpomgunrur, quae novas fubiude
 plantasgnerant.

Exircopioscincolle motiafterioNeubergvjcio, Sfliinio floret.

Ec hrtequidcmdeOrchidibusorbicularasradiceshabentibus Quarvrofequunturjge¹-
 nrirjlice radicebus tint pr;edir.'c, inorbem cornatxonfunt, lcd in aliquot appendices de-
 finunt. Sf qujii patinas imitaorar.

Li LI i primum enafcnci3 folia tria autquatuorhabccOflaffa, dilurioris&quafi pal-
 ientis viridnatis, nulliqc macu forum a/pergmcoratJ.?, iijgMti Capons; palm&rctn catrem
 am plctSuntur aliquot (•otioU, incujus (um mo fastjgiofloresfpicatomdigeftinaicuncur ex-
 albidid&quanpallelcntiscoloris, nullis pun^risoiltmdli, anccius motionumfnantibus
 cucullis finiiles, utrinqueauriti, Btlatiufculopallidolabropropendctc, poftciorevcre
 parte corniculum habet*ntcs, ut confotida regalis, aut Liiiana, fed Utius &: obcuiim, gravi-
 terodorati, florum (ambuciodoremrefcncresiad horum exortum fingula folioianafun-
 tiKpallenria, &: fioribuscolorcrfpondentia i radices gemma:, veluri palmat, inbinoj,
 ternos, autplures digicosdiftributxfunc, quarum vetuftior fungofa, nigrior, Siflacci-
 dior cft. altera cand ida, vegetioi¹ ac fblida. paucis fupra carum exonuin nalcntibus fibns.

Aliudgenuse(tforma, m3gnitu<iinc, ccKntqacnoth Hit par-.foh variezasm Aonbm, qui
 inhocpurpurci flinttfoliolafub Boribus nafcnciacuam purpurafcunt.

Invenitur ucrumquegenas non modoin Lcyrano falcu fupra Manderftor^alijfq^uc Au-
 friKinfcnoris iitvis: fed eriam edition bus quibufdam praris Vienncnfi (alciu proximis.
 FlorctautcmAprilinonnumquamcciamMaio, pro muiore videlicet autrigidiore verna-
 lisacrisconficurioc.

CETERVM nonincommodcforfitanPfcudorchis appellari po{litelegansplantula, quani
 «cItaliatcdiesobrcrvabacarinoM.D.xrnt. erudiuisvirGu! iclmuscMera, BatavusMe-
 u s . & m i l u F v a n c p j n i .

HABETVcroilLiunicumfoliuiiin^xmcbranaceoquodaminvolucroprodicnS. fcmun-
 cialislaticudints. duanim unciarum auc amporis 16^itudims, multis vctns lccuodiiim lon-
 gitudinem excur[cimbus, & medio nervo prxditunij valdcque tenuc, dum reficcuum est:

^) ex codem

cxcodeminvolucroprodit&cauiscullis /emipcdalisautmiiior.gracilis^medioadJum-
 mum fafligmmjfiocLisqqibufdam onuftus, quorum forma mi hi ignora, quia icca plan-
 tain duntaxat vidcre contigir.in qua mhxrebat adhuc flofculorum pecioli, & bina aut tct-
 nacapitella,infl.ircapitulorumOrchidiS:raiiixbulbof3eft,a|iquotmembran3ectiijvolu-
 crisredajprasterOrchidumnacuram.fubquanmltrtenucsfibixcxcunt^utiij Allijgenc-
 ribus.cumquibusaffiriisatcmquantlamhabcrevidctuijadiicisiationcjCm^tiuniqucad-
 hue Inliajrcc (bpenonsTannijaru exfucca,&cauliculumretinens.Ciitn porre^icdia quan-
 dam nacuram liabcac hare planta, 6℥ pcculiarccapuc non vidcrctur rCquirrc^Oichidibus
 fubijciendamcflbexiftitaavi.Pernjc tamen temper hebcic alijSj quo vclint-loco reponcre,
 &C noracii imponere.


LEIM ODORON.

CAP. t x II.

ORCHIDIBVS quodammodocognatum A ff i, p pp Theo hrasti, vel / 12-
 Gazyz Diolcondis, & Cynom non PlinijCUjusvaria genera invcniurti^rmukisPro-
 vincijs communia.

Pseudo-Icimodwron

Orobanche



ff. U-

Ar congffncrcm illi planam. quippecur fuperna parfc ipfuro smulctur, in motanis fu-
 pra Oi:lcncres rhemasobfervabam. qux nufquam antea, quod memincnm, mihi futtcoc-
 Ipeiita. Pcdaiiaflurgicillacaiile frequentibuJccundumradiccmfoliolis, tamqua v.iginu-
 lis^nvluco/picamgeftans riorum qi)atnorfolijsc6ftantium, ruperiore in corniculuni dC'
 fincnc, & promufcide quadam inter media folia prominente, cui adnara; fu utd u tenus
 barbul^flonbuftriara&longarubfuntcapitulajfcmncexili&orchidufimiL plena: fub-
 rotundamradicem non habet. qualem fuohaimodorotnbuitTlicop lih. vni. Hift. planC
 cap. vni. fedcralTas. longai. & obliquashbraslMbct. qucm. idmodumeaplancaquivulg^o
 Hclleborinesnomcnobtinuit. Toca firps {aiuropurpurxS; plane violaccocolorepi3e^c*
 eft. Floret I unia

Similmferti. fedmultodtlutiori^colorisolimobfervarememinonmoddiniilvail^
 agnMompellianiJnqiiactrnobiumGtamontdiflurn, fubllicisarbonbus, fedaJijip^
 nlquc 6l vis.

Othk
 Libij
 Gea ni
 u r u if
 aliaf
 MY*

Nondubiumcflquinhisadnumrandafir, tfa quamLobcliusOrchidcm abortivatn*
 GermaniaJtegcic6«^ BclgzI>e«W«-n^ appellant, quamqucDOnnullh Coagulu^ terra
 PlinJefrc. arioUncur, iujt!smemJnit.lib.^xvn. cap. viM,

PorroOrobanchisitltm lcginirizDio(coridij, five<J,uo<fw^«/Tlieopluafti, variz funt
 Ipccij. Aliz emm clatiorecs, alia: hunnles^alazcitalbidi colons, alia: flavefcenris,
 aliz



alirfiibca:ru!et: nonnallzaliarum ftirptum ndicahasadnafcuntut, plurimarper/ciubfi-
 ftanc,5i (bla* nicer alias plantas 6c gramma nafcuncunplerarque autem omncs unico iimpU-
 cique caule funr prffidit.c, interdatn ramoibm &: multifidum ilium habent. Omnium veto
 tmaximapaffim in omnibus Europe iilvh nafcitur, u:cxift(mo:ccrr.c nullas adij ,quin ipfam
 rmurpercnm.: eamquiaapudBelgas Ixpim GtrnLlbcvulgarisradicibusinnafcitur, Ha-
 bariotum turba Rapum Geniftasappellat, Belgx%fmt<pt/ Vngari,quiare&aafTurgit&:
 riioiicft, Mistgyerthy,m\A~zte\ncandelain fiuocereum appeilat. Qux fubcarruleocU flo-
 re.cardui vulgaris inter fe^ctes iilcentis tadibus inhxrciucm olim cruce niemini, ciim
 Mompcllij viverem. TrbhukhMiw autemaliquoticsoblervabam inficcioribusquibufdam
 pratis,&: nupcradmodum ad me mitcebacum aliquot atijs iiccis ftirpibus AmpliJs. vir la-
 cobus Ant.CorttifUs.dequanonullos/ufpicariaiebat^apaverfpmTicucflcJolaL'aratione
 nixo^quod recens rtata,tota molicella tuiflet & lalei ficre candons: fed tnfirmac(t I lie i ;i-
 rio. Ccccrum Orobanches inajoris,Rapmn genift; nuncupate, rfcicatx& trir\pulfcreni
 ex tejido vino haullm-n.pra;lens ad coli dolores remedium e(Te,Belga; predicant.

Orobancha:
 Orobancha:
 Orobancha:
 Orobancha:
 Orobancha:
 Orobancha:
 Orobancha:
 Orobancha:

FREQJENS cftctiaminLcyrcnberg,atquealijsfilvofismotuibusurbiViennxvici-
 nis, turn mukisPannonixlociSj vel circa fepes, vcl ad filvamm marlines intervepresca
 planta,t]uam aborbiculata radicc, &c fubtusnonnihilexcavad vulgo Radicem cavam no-
 mina[it:qua:florem habceautcamci rubrivedilutoris colons, magnacxparrc.vclomni-
 noalbi.auceizrcgic&faturcrubetitis, qui raroconfpicitur. Acminorem ilbm Germanicis
 & Hclgicisofficinisapprime notan^quxquep.ifl]m inGermania& Belgicainter vtpres 5t
 fruticesnafcitur.nufquam inAufnavicimsqueProvincijsvidercmcniini. Ccccrum ma-
 jor tllaex carneo rubenteflore, & albo, frequens circa Funcofurcurn, ctiara in lion 15 f i u-
 flifcrisarboribus copJj ciS/intra urbis mocnia.

Radix cava
 major.
 Radix cava
 major.

ELLEBORINE RECENTIORVM. CAP. LXUL.

SPVR 11s prchidibus cognata ftecap Ianta quaxa Recentioribus Dormullis Elleborine
 cognominatur, a foliorum cum ELlcbori albifohtspocius Gmilitudine .quarn abcHc-
 I:u.Ejus autem aliquotobfervabam genera foil orum ampiitudinc,&: rfonstulore variitn
 PK IM x. &otnt]iuraelcgintifrimxcauHsefl: fingulans,pcdalisa Licm:ilon! ,lungitudi
 Pit.firrou^aliquaotulamla&uginofostqucmquaternaatquamaambfontfola^fft
 tcboii albi folijs fimilula^nratim u: in illo dilpolitaj iubhn(uta,6i: atnantancis ii

u
 u
 u

Ellebofinc reccairioruni i.



folioli quod extremo cauli N, filic, nonmim-
 quam & ex proximi, sinu, prodit florumicus,
 longa
 9-1--~<><<iASH, quatuor folio! is cruets
ronnadecufatis, obkjngii& aiocro Dariseon-
itans, colons ejtpaiparinicricalkjs, quorum
[upcrBna& infemmm^urcflfei/uiit, lateralialia
 Vert., ad modu.71 angusta, & mtenorc parte la-
nusinofitf* horum umhlicocniergit& pro-
 tubetat mzo
 "•*• «"I"iuani, rumens, con-
 cavu. <Juc utneuius, columbinuni ovum fere
 *quansmauniciidinc, (upriorcpanefccua-
 *iucn unibiltcuiT) nonmhi] apertis & hians,
 in ItaroiicolipatLihoris^ui color autInrcus,
 an^tpallidus, intt:rn:(nonnihivilli>/ui, infcfdnd
 a«Kmpirrpureisquibu(aam vemfeciindum
 longitudmeindiftinaus: hiatum regit duplex
 an^i.ula, quaruin[uperiora]ba, tcnenor, p(irpu-
reuque maculiiconfperfa, inferior veroden-
 u, herbidi colons, & vtlutj cancerorum ocelloS
 •nlatcnbiHhabensrippi-flosnonpenirusodo-
 pccapini lumillifuccodensoblongum^
 umi digin cr.i/fitudinem xquans, triangu-
 (um, tencuc &: vcluri pulverctim fctncii conn-
m, inftai Orchidum:iad« Digra, non valde
ciwa H i Itmgitudincm& laiitudincin obli-
 que rummAtellurcide **fpaigens, mulrisqufi**
 h U sjk dora dupl uo d i m a i o t d i m a c i u t i l l i i n
 precii. i vc(ljgurennens, c]ualja in pludocoral-
 frorerereconfpiciuntur. cxtrematibusfcni per
wnovum germcnx tubcrantibus; amariu C
 Cullglltus

Brateshorf demonstrante Ill. V. Augerio de lousbeque primum observabam de quo de apud
 Closterneburg pruto quodam dechvi sub coryli fructibus, & in silvis Entzestort vicinis
 crevabam: omnium autem abundantissime nascitur in Pannonica quadam silva, magno
 militari ab arce munitissima Nemetiwayar Ill. V. Balthazaris de Bathyan. Deinde ruzo-
 romz muliercula in Viennense forum inferre ceperunt, postea quam a nobilibus matro-
 nis expeti intellexerunt. Ab amicis etiam intellexi in Hercina silva, praeterea circa Fuldam
 aliisque Germaniae silvosis locis copiose nasci.

Varietas.

Sunt qui albo flore inveniri dicant, quam sane nondum vidi, nec eam quam in campis
 tinis montibus lervasse ait doctissimus & diligentissimus Matthias de Lobel, purpureo
 utricolamam esquam nulle stirpes vidi diversis locis et
 habuerunt flavum Cujus etiam color

Nomina.

ice Pannonicae etiam similis quae & in Hercina & reliquis Germaniae silvis nascitur.
 GERMANI Mian fowd & Pfaffen fowd appellant, Virgati *Ecorithyus fia*, id est, tunc
 lebonam herbam, quasi *didymum* dicat

Cf. faim.

C. V. Gesnerus in Eoissolarum lib.
 reum

q f m o f a L i f e ^

forma 11 refircHiw, & pnd. sccu ! K f

dfceoojet, kd hmcl ffStte&V

Similitudo.

lohas item Simlerus ad calcem Commentarij de Alpibus, illius in haec verba meminit.
 Sicuti alibi cubitum fermczquat/ alio Plantaginiant Ellebori albi, terra aut quaternia per
 caulem folia habet, ex quibus erumpit ut in perforata, in summo unus flos, raro duo, si lu-
 teus est, oblongus, luteum ovi exprimens, concavus, quem ambiunt apices, seu folia potius
 ignita rubiantia: motu motum habitus procul constitutibus refert, aut demotum larvas, &
 dente flosse semen in siliqua continetur. Damafani aliqua species.

Itihrimi.

PEDALEM habet Altera caulem aut amphorem. 6rmu(r), qufmpcrinterua, Jlaip. w!
 vunt inordinata folia sena aut septena, nervosa, Ellebori folijs similia, sed angustiora,
 ingrati & amari gustus: flores in summo caule denos, ut Jonall

utdur denos, spicatum congestos, al-
 bos, quinis folijs

labro, nonmultumaborcl. idugcnenbusdificamej^
 odoros: angulosa etiam, striata &
 contorta

contorca habstfut iliac) capita, minim jm femcn 5: fcobis inftu continentia: radices craU
fiLj(culis, fibro(as, cxuio vclacicapire pro Jcunces. airpiilaSjIubrufecdtii colons.

Proveninnnp3cisGallia:, Germniix, Auftrix, Vngiriilocis, eti3mi[iPaanotiui nrc- ttttl*
amnijinter Dravura & Savum flumiru. Hxcduogenerapracocioradinc reliquis, 4: Maio
plcrumque florcre folent.

Elleborinc recentior n r.

Elleborinc tecentior vtl



PART est Tertia magnitudi ne, pauld lerioribus folijs, minoribus floribus, quicttaro
quinque follii conlhnc. Si gilcohm cum prominentelabroample£unciir, coloiis que funt
fierbacei, iotenusncini <hileandii; amis, nulliusodons, quibusiorofacoat Druquccap.»

Elleborin
IK..

iubfanradixfecundzninilis.

In venicur in quibu Ida m Auftria & Pannoms ficcionbus pratis, S£ in Nonbergenfi GI-
vaurbvicina^adLacomias.

Natalis.

Qv A. RTogctieri minor est alritud^ timiut mteraani (OMa, nonnamquarn maltola«
tiwvfi ores auc omnirw purpurafcc: i.«, aut propc carnei, fcundi generis flonbus protfus
fitd BssjncradixdifFerc.

WtheriH
• ill*

Crefcit in montanis pratis feexdms filvis Auitria:

Natalis.

Lthbrmir.

CVBITALEM alttcedincmfuperatQiti'Ka, & ampliflima omnium funt illifoliaatque
oblonsapurpurafccntium riorum (pica

Natalis.

Nafcitur in multis Pannma: &c Auftriz filvts, & ad montanorum pracorun margines:
a nufquam frequenrius, quam in ca filva. in qua Primaabundjt.

IZüernt
»I.

SEO incadcmfilva, alij(qiZolloi)ockvicinis, Sex[umgenuscubitalicaule. tenoi, rown-
ris folijs non d, qucmin(mgulisgeniculisalEcrnatiinaDibiuntanguRafo[ia. SccUHdigcne.
aur pluniam in (finilia. erucrcmcmirujuifumnniscaulisdefiicbarinfpicamfcx. octo,
tempinet quz terdura riorum, quinis folijsclcganciffimi dilutiq; purpura: colons conflan-
re parte ad litcbacquardanivelutigalcola. mufcaTumprobocidilimilis. labruinferio-
fultineban nexutn habens, xqualisfcrcca-nfoliisloigitutlinis, catidicans, iniusftnacum,
turij flows aagu. oto. »rtili, hrruc6qi« nonnihdcapitulo: radix lili fibrofa, Sc-

Cundxfimilis.

Ttmfm.

Florenthxcquaniorgencralunio. nonnamqaarii criatj lulio.

Elleborina

Necine WameftElleborinesRcccentiom tlludtencllumgenus, quodGuliclmusde
Mcra^Idicus. cxIuliaccdienSjObfcrvab^KmihieciaEaFrancofurtidonabacEratverd
illud

Til,

iHudpedalisfercaltitudinis, gracilicaulc, tribusfolijsprardito, EUebornesvulfarisfcltjs forma limilibus.&quinquencrvis per longirudmemeorumexcuirntir/us, fcdlonpcnii- nonbus utquzcirciterunciamlongafiniduntaxat, /cmunciamlata: lurrmusc suits in fpicam florumdefinit.Orcliidis&Elleborinesvulgarisfloresimitarmum, Tcdtninoiuro; radix fummiquafi tellure (pai/^crafliutculas/uccLJcHULqije tibias gcgiai.

EHeborusalbusexalbido flore.

EUcborus niger lcgitimus.



Elleborus al- bus ditrum genium.

CETERVM Elleborusalbus, tamquialbicante, qulmquicx ruSranigricantcflore pxdituscft, frecuensadmodum in Auftna&vicinisregionibus: flore ^Ibicatitequidem inpratisViennentSurbi proximis,&ad Alpium radices iicisjrquepliftfque \jngaiirpatis:accxpurpuranigricantc,in omnibuscarduifilvisincdito aut inrollibusfijis. ^p

Vtrumque Gcrinaniaa3ttf<7li(C)>>wfil/ Gilli EMere bUm, Vngari/r/r/^v/^appel* Uxw.Hifyvni redtgamlrt blame. <*

Ellebor. nit legitimus.*

EUcborus item niger lcgiiimusatbo atnp!6quc fimplicis rofe ir;fajJT(ii<y Wfi marccfcenspurpurafcir.valdc frequenseft vicinis Reiciiaw, NcubergnrflpRtbans domtH quatuorfupraNcapolim AuftrizmiHaribus,&:SrarctnbergM-ig^{ci} 13 de Heulenltat cemlociSj&pJcnfqucalijsad montium radices, ubi primusilJu^dbftrvabam : nate ante illis (gaotaera^&aUcriuscujufdamplantxradicibus utebantur|(bariuacop3!i,ut fequen* lehbrodicemuj.

Veratr. nigr. ti-DuUa.

Non minus ftequenseft, {edvicinioribusViennaelocis, Veratrfimaliud nigrum viridi florc.quod Dodonzi (ccundum eft; copiose enim creliric ad Vienneniis (lvus initium, qd Vienna ad Carrhufianorum coenobium Maurpach.fii Tulbingam iicreft, umbrofii k, &vicinonbusetiam,adfilvaruin margincs.

Stmit.*

GertMniS^l/wwf*/quod ipfabrutna.circaClirifli natalem dirn flores f remere inci- piat; Galli Efftfortxotr-, Hifpani,rf Jc^JwAr* >igre> yytrna dt FaStfltttt; Vngan, fiken w^ .nominant.

Veratr. nigr. l. l. g. r. r. d. m.

VeratrmnaudemniETurnTertiumquiburdam nuncupatum , quod ronnutlirtiamPl¹ nijconfiliginemappellant, Germani flufBhau/ quodpediculosinfrimerccredaturfer' indeacSraphifagna.quamfodem nomine indigcunt, in Aulhia Sc Pannoniaobfcvsrc nonmemini: at plcnfque Germanise locis(ponce nalcens frequentiflimiim, cufjusO' Bcm «iam hk (uDijectcmbm puia^),ur,<i.utn mtcUigam, Lefioicsaj>norccrc^ueant, ft

Veratr. nigr. III L.M.FI. g. r. d. m.

AbudporrdcjusgcnuinupradmotimnobfcivaiuiDjnon valic difliiinlcfoin i,pcc re- liquis

Vetcratrum nigrum n.Dodon,



Polygonatum lacifolium.i.



liquis notis: folia earner paullo atriora quam in prascendenre mi hi videntur: deinde riorum, qui herbacei ctiam func coloris jfe^xque folijs confiant, &r.inrinnabulorum mfbrcncavi propendenc,or£,pre/err.im trium interiorum, ex purpuranigricant: medium autem floctn Occupant binaaur ter na cor mcula, numeroŭs llaminuliscin£h,Utinprjecedentcgenerc.

Percnne non est hoc genus, urnec praicc- dens: fed prodotto (cminc plcrunjqcpei- re (oltr.

POLYGONATVM. CAP. LXIII.

MACNA ctiam in Polygonato variccas. Naprxivulgarcillud Lacifoliu,quod momnibuSjquasunquIadij,Provincijsfami- Liac etc.Sc Angustifolmm ,five minus Herba- riorum, quoa plcrifcque Germanixlocis na- fcitur: aliquot aliagenera in Pannonia,&Au- ftra obfervabam,nuHi (ut in Pannonicarum (irpium HiftonadiiSumJadImc,quod fciam, deJcripta:tamctli Secuddm Corduslib.i. Hi- ftonede Plantis.anguloti Poly gonati nomine force infigniac,Quartimi lacifoliii Matthiolo notum fuitTe vidcatur. Nosporroomniage- nra< induoprimariadidin^uctrtus, ucmpe Latifolium & Angulifolium.

PRIMUM Latifolium, forma fimile pane Vulgari,tnduplo majorem came altitudinccn cxerc(cit,amp!iorahabeufofia, longcplures flores, majores baccas, crafftores caulcs,& radices.

Spontenafcitur,vulgari perm ixtum,inqui- bu (dam Auftria:& Pannoniacumbrofis locis.

ti.firm^nonvaldeinrkxi/edrectiferme.tb- lsa vul'Mri im)ilia,epde'nicljniodo, hoc ctjil- ten]atim,citcacauiemdifpofica, brevioribus tamenquam in illofpatijs.minora etiam, fir- miora.ingratiguftus: ex fingulis alarum finu- bus.duo aut tresexunc fiores, brevibus, ma- gniq-,cx pane Cngularibus pcciolisinhs:ren- tesjvulgari,cum furma,turn colore^fimilcs, vetiim majores,&odore[qui in vulgari nullus eftjfloris fpina; Appendicis.five Oxyacanth* vulgo credit*: bacca: deinde vtridesinitto.SC fphcrica:,qucmadmodum in vulgari.majores tamen.polkannigncances.rcmcnconcinentes ofleumjdurumjradixlongajobltquaajcnciru- lata, Candida initio dum recens erura, deinde pallcfccns.nonuntjuam etiam purpurafccns, prsfereim circagerminaj vulgari radificere par, tamecfi ctiam aliquantulum renuioi in- veniacur, interdum vero amplior, ubi vidcli' cec pinguius & bene fiibaclum /blu naftactf.

Frequensctf innemorofis illis montibus, vulgo Leytcnberg nucupatis.iiipra Mandcu ftotf, fimctctfoct, &in plcnfque alijs Panno- niKmonribuscrcans-danubianis inter faxa, at- que etiam ultra Dravum inPannoniz inter- amnis moribus, prefercim ad arcem Greben.

ed nuper admodum ibunde nafccns repericbam in filvi qucreubus confita ad I«va M GC-

Polygonati
multa ge-
nera.

Polygonati
latifol.

Narain.

Polygonati
latifol.

f
Tatalt.



ni 8uvij,paulloinfraurbein Impchalcu Frapclfittuqai" qua &: Fraxinella,& Cncwrut¹¹ Matthioli crefcit.

Tnpr.

Floret Maioibaccat maturr fun: A uguflo:inre nra. etiam multa hietne, atque ipa pncbruma.ccaulependentesconrpictuntur.

Polygonat. latifolia.

TERTIVM , (uperion fimilem tubcicaulcm .ejuf<J. mense vel magis etiam altitudinis, non adeo tamen rectum, fed magis inflexum.folia duplost. ad El-lebonalbi foliorum amplitudinemnonnumjuam accdi.-: ma dora. laria, dilutius vuctwa.ncquc fubtus tncaaa.uc fupenocum .nonnihil acidt gui acris: Rotesaiteri (imilcs.inodoros tamen,ncqucxiingulanbus nosauclpuresexoblongiorcped.iculodcpendncrcs,utin vulg.in,c habei:radiccm albam.longam.obliquam.gfniciilatam, fupcion QMfljd

Matthioli. Timfnt.

Crefcit hoccopiose umbrofis locts inter Brunnam 3£ Wcylpach, a nisilvisfupraVicnnam Auflnx. Floret cum fupriorc. Jfc

Polygonat. latifolia.

QVARTI latifolii caulis,pcdalis dhnoiunquam cubital is rotar. vus vulgarisinfar.inunumautahcrunijintL'rduni ctiam tenium rJ

tematim,Perfoliatæ vulgaris fetē inftar, amplectuntur folia Polygonati folijs fimilia, molliora,(ubcus altqiiantulum iucaua.faporis iiiiio dulcis,dtiridc Q actiadi finguloruni foliorum exortum^ubipdsfolijs.atqueadeofcilloruni (encxcuntGnguUrespectiolijlongi^xtles.iiiLurvi.cxqiiibusflorespropndcotfiiiaWB concavi,Ocnanrhes,live Ltlijconvallium flonbus perilmilcs.fed magishfates,atquPj J9 lacinuscxtrorfumreflexasdivifi.incerrorepartcni gncannbusquibufiia maculisafpc/ * odorati: frutlusPoJygonat i anguftfohj fructm iiniTis, trigonus,Hiicio vindis.per^mT^{ar}IL tcm paulo obiongior & rubefcens, parvaque corna interdum arquans, in quo multa a canciagranacongclafimt:rad ix a vulgari Polygonatradicedirlet:namque eta fl'i ncqueadcd candidJ.fedcxilis&nodofa.Gvcin frequenresnodostxtubcras.pluriniiscr*

ttttbt.

fishbn»conlUr,utThalietriqnr damgencia, qucmadmodumpidor(cicLadmociiim p^{re}ciret.n.fedfculpcorfuancglL Sentiicorrupt.

Florentem unam aut alteram ejus generis planta in umbrofis montu Wccnfccl Ulw J indc it) Durrenftcin inter laxa& fractal mcfibas Iumo & Iulio anni M. D. LXXVI, m V bam.quzin liortum tr3n(L.irar,fru<2uinad matuntatem pctdiixhjt: frequenriorctn ntopoft[n.i^namque,&inmultasala<;divirarT,uoibrolisquibLi(dam Icroibusinter ftirpevndiccicnfu Durrenftctn, pau!6fupra map aha a m6wni5pafloribushabnauK. bG^



¶ jenfibus florentem Augufto. Rami verò cum fru&ti nobis ex Stelfia ulque (ubi frequen-
tem nafciavi <i> } prius commutabamur a Do& iflimb viro Fridrico Scbaio, DucK Bii-
genfis Medico; dcindectia. Ji aliquot radices in crannifimilir. Perfiftu in jiorcis, umbrof6
locor copofita, fl<rc's< } ic ^fenuna fuotempore profert,

ANGVSTIFULIVM poid Pnum, ; ib Herbarionim vulgominus nvmcupatiimjqvjogno- *pcjymntr,*
bis ordine Quintiijn cmj Ciiijilque ccnuia folia Rub ; emodocaulc per intervalla am Biuiit, *Angustifol.*
fructu inirin vericolori ^qualis est Graminr spjnafiqiiorur Kiimjfive Vmfolijfru (5fts, dc-
inde per maturitatem rubros in monranis quibus Ja S(iri, r p viii, circa firmices & in urobra
abunde nafcus obfervabam. Eius hiftoriam, cum ab alijs dit de fcripra, non retexerim, ma-
gm< utamen lubijciemus, ut difcrimen, inter illius, Si L-quencis Polygonati angufublij,
phntas commniodius conTpici potTit.

• H*BET Alfferum Polygonatum angudifolium ^obisor Jinc Sextum, caulc cubitalem,
angulofum ; Innwjfas renucsalas divifim, qua: a: qualiter ex fingulis angulis exoriuntur, *Polygonat.*
quatenus interdum, nonnunquam & quine, pro angulorum, qui in caule, numero: ramuli *vi. Angustifol.*
tenentur.

Mongis & angustifolii sobfihljnt. binis, terms, aurquaternis, arquatcer in circuium
protifeuntibus, in quibus (lores Quintofimiles, paull6 tamen minorcs, brevipetit)!o depen-
dences in cer foliorum aras fparfifim; quibus luccedir fm&ri5 totodus, ruber, pulpa plenus,
aliquot ofleagranacorie inens: radix vulgarilimiliscftj CandidajnodofajpropaginsaJ late-
fa fundtfn, & candicantibus fibris obfi<.

< Mihianno M.D.LXXX: comirtunicacum degantifimil hoc Polygonatigenusa Doflifli- *Nasat.*
Joviro Achille Cromero Silcfi Ojiiiiric Brunneniapud Moravos Poliarro, quodijfdcm,
quibus faxacitem R. ubuni, lociscruifcaflerbat.

NVLLVM nomen vulgare iftarum plantarum novimus. nifi quod rres priores, rKi2otomx *Ronina.*
ntlicculr. qiiif in forum Viennenfearura radices interdum venales adfi. Tunt eodccum
vulgat: ~\Polyaonatonomine 23? tif> > n< jappellant: Vn^ arifitmltoct, ut Tulf'w & *
dicit, id est, Salomonis figillum, dicunt. Quarta tam illis, quam montanis pafforibus & ve-
aronibus, profiisignota est: Earnadumbrare videtur Matchiolus Lauri Alexandrine ap-
telbetone: *ter&m* neque effigies lactscftc exprefTa, neque cjus iiiitona tradifca. Sive vcti
e^im Incelligit. qtiam nos hic damus, five altam .nula ratione ad Laurum Alexandrinam re-
ri potest. quam Dibfcoridci non inter folia rru&um ferre dicit, fed e>fi Am^, m medijs fo-
Jis, Thcophraftus autem expreflius *i7ri\$tt,* Awutpmt applclitlib. i, cap. xvi. Ac lib. ip.

cap. xvij. Hiftor. Plane, ubi earn Oy my rfincs five Ruicimodo fruclumferre air, eix/

TQU

Commodius itaque, meo j udicio Polygonati gencibus adferibctor, quam Lauro Alexandrins. Nifi quisibicL'adldaeamradiceni Diolcoriisrercendampuct: fedciimvalde mmUathejusdefcrLppto.difficiteccffccxiftiaio.cctttquidpiampoflcftawere.

CETERVM ruirari dicit, quid^u&orem magna: iIlus Plantarum Hiilorix moverit, ut liocPolygonatum (Civc Laurum Alexandnnam Matchioli, mcamcniiconem vidiflc, auchiftorjainJcgiiREVixputo)MypoglofruinDiofcoridisnevclit,cujustextumCccmen-
dandum centet: vTrfyhticvwSaiJUtifrHofci)*yp7ivti dyt>ia *aiArarTf (meWusteuxii) T^<p(/AAa QpQto<,\kb/*tn>SiiKfivStiS^*itfi (TT atx.f>ov,HJ clamphri'yX&'ri'tant,7rapa\$y3-fi<;<<«lwisi/> roTgq>vX~ Ao<. Gat.item Ijbrovm. Simplicium u7ro^A<uap ^Vcjuarew jwis vra^on 7rupa\$u'ffSi\$ Crr^ ctx-poKfoirtopuf>£6K7rcii~i'r<tiyAceojapim, id cit, HypoglofTum fiennomiiicumclt,q^{iiia}p^{ro}- paginesjfarv.irumlinguarumiubliiiiimiscorymbisproiiucit.-cxquibusverbisintelligre licet^^yrniTas five^Aaw^/ajligulas^oti folia in medijs folijs nalcentia.Hacc ille.

HypoglofTum
Diof.
Diof. im-
bulas.

Noniiificusquidcra inms,Hypogloflum, a nonullis Laurum Aloxandnnam creditam, habcre ^Aaa7*pi<<potiusquamfotaiinmedijs^olijs,quaiiquani &:foliafinc.led minuta.cx ciiusfubimajori folio planca:inliscnc)i]nunarcuDa'r,ut in Rufco, Mores bini incerduin, deindefruftusorbiculans.infatcoratlijrubcrjOiteuninuclcuincontincns. Sedhaiaclflir-
pem, quamproPoiygonaro Quartolatifoitoexhibemus, HypoglofTunicfrepoflnegec nms raulns dc cau(is:ptimQ,qtiod nequepungeutia tint llli^ctiuc dura folia, ted valde ic-
ncHa&molliardeinde,qu6dligu ljsnonproducatfubcorymbis',fedfingularcs,ucdixibac-
cx, exfingulispetiolisadfoliorumcxormmdependeflnt: pofhcind, quodfruccxnon(f ftmpcr virens, inltar Lauri Alcxandrinas, fed totuscaulisadradicra uiquepreatfingulis anrjiSjpciindeacijreliquisPplygonatigencibus.

T-lygnU.
> ii i. Uu-
fit ncntfl
HypoglofTum

Laurus Alexandrina Tlicoph.n.

Laurus Alex-
andrina.

VER A>i porrbLaurum Alexandrinam.nvin-
quam vidifle i ngetiui-fatcbor, fi ab ea qtw: vul-
gouiiiflnguadicirur, &HypoglofTura Diofco-
ridiseiTeccnrtur, diverfafk. Thcophr. enim
nuf^nam Hypogloflimcmmitt, fed Lauri Ale-
Wndriasduataxat.locLSJamnotatis: Silib.i.
cap, xvi.Hill. Plant, exprefcecam rcccnfct it>
ter x<(Mro?oplt pLivxfy 73 piiAvifWia TO* xafurbr,
hoc eft j frudifcrasqua: Habent frufuroquali
arumvolucum, &interceptum.

Pr^tcrea Plinius hb:x v. cap. ultimo Natur.
Hiftor. Laurum Alexandnnam ab ahquibus
Idaram vocari cradit, abalijs Hippoglotcion,
Carpopliyloio^atqueinterfoliafcraenrubnini
ferre. Ipfcvcr&: Diofcoridcseaminmonti'
busnafci rradunt, HypoglofTi autem natales
fubicucruik.Certe Billingua, qQaoi Vjenn-
fes muliercularaulftHHotappcJljiirjin monti^¹-
nalcturj&abundanterquidem, inmonteiui-
ninenti oppjdulo cui nonicn Divi Georgia i>
transDanubianaPannoniajtribusabuchVPO;
fonienQmilianbuSjinveniturundeRIizotomi
plurirnam adfeiumViennam,§i e)is urbis mul-
licrculisvanduEinam magnoilliscftinufuji-
cipucautmaduviprocidctiam.Nonniin
coptofam dcinde obfcrvabaannoM. o, LXXV.
iiunoniibusnonproculaZollonockIII.Dn.de
Batthyan oppidodiilitis.



Laurus Alex-
andrina
Ficaria

HypoglofTum

Laurus Te-
za Pliu.

Chama-
fimtDitfc-

Hanc Dalechampius Laurum Taxam,cuju
Plinius Natur. Hift. lib. xv.cap. xxx. inter alia
Lauri gencta mcmint,e/Te feribir,eandemque Diofcor.Ciamxiaphncm facit.

EjusauremLaurusAlcxandnna,quambaccisinmediofoliorumimpre(ris,necuII3epi-
glot tide tecttis.cxhi ber, valde m i hi fu l'pcQ.a cft:an ipfc fim ile m vidcri t.me latet, mihi certe
nu mquam confpe^a.

A T anno fiipra millcfimum &quingentefimn nonagefimo fexto, mittebatad mevit
cnditiffimLs Simon de Tovar Hilpalcnfis Midicus/peciminis gratia Vcrg Lauri Alcxan-

foliacumfiisbaccis, adThcophraffi dcfcriptionem paullofupramernoratamad
m congruence: namillaHypogloaiquidcmfolijsmagnitudine&formarcfbon
KjVcnim gbfharijsfive [iguliscarcbanr, cam etiicmedioiieruo folium fecantc bacca:
rubrxtcnuibus pctiolis propenderenr.ininores quam in Hypogloflb.fed ofteum etiati nu
Wcum continences, nonnnnquarogcminuni: acquepolfea abijsqui ex Italia redierunr"
«tic in ^mbufdam horns (atisftcquenrem cam plantam inveninadmonirus luit. *

P A E O N I A.

CAP. L x v.

P A E O N I A hiftoriati plcriquedcdcrunt:eam life repette HOB eft opncprena Vc-
mm quas pnetcr illas obtetvabam.vcl (emine natas.vcl almndaccpcpa^prWmitten-
aas cue non duxijfed peculiare capuc illis cnbuenduin.

Pa:oniaByzancinai.



ELEGANS potd est Prior. folia ue habet fem;t.
Paeonia vulg. iis feminx, aucejusquSETO- ««»*»•
A^i/A^^eft/olijis nondanilia, paull 116 mmmt.
tamcnrafflorarcaulcsillifimiles.autam-
pliores:floremfummo faftigio fufinentes
uaicuin,fin|plicioao,dcconi,aicplunmn
interdum foliorum textiura confitem.non
purpurcorumucA^A^fdb cn-
»„„„™.^»iuij radicc m mukis
iiodis oblongis five aphodeiinis bulbis pre-
ditaiUjPaeonia: fem ina: irftan

Duorum autccft generum: Nam Vnius Pri*.
germina, cum incutire VCTC prodireinci-
p;unt, caulesctiara, &foliorumpediculi,
inttio rubent, paulatimdeindeprstatem
remittentefcolore: folia exarrovir^ft-n-
ra, &prona fupinaq; parte fplendentia funt:
flos ratiw^ubcc, binaque, tern»)r i' quattr-
nalonga^ijyBcdiohabccc capita, multii U-
minibus paragrafcntibus (c) :um apices
aureifcndi, quz matura d

ucoltendffHBMtelum JWum. ~
is Paconi^d JKiu ^^f-

bc fu nonna pccat to na fuprior. illi
tius Virca (u per(i,.) ne
non minia nansfp
etiam ^ d i l u cior
ritj p o r c p neditus eljr; j
breuiore. fcmin-arotundiorj, minuTS,—

! fplndentia.Ha:c notiadeoliberalised In proferendis Honbus iicfuprior. Vcratiue n?
Cafeminc Byzantio mtttoScaiahknomine. Floret Maiocum alijs Pieonjacgcnribus, auc
cum illsfiorercdcfinunt.

Iftaminfemincmihinacacfuncaliquotplants:anno M. D. xxcvij. quarum nonnuilx
matremfolijsrefcrunc.binsvcromuitoamphora rarioribusque lactnijs djvifi habenfo-
lia: qu.t triennio pofl Horcsdcdcrilt fecundogeneri fimiks.brevcseriam craffifq; (ilicjuas.

TENVIVS di(Tcaa& bciniatahabet Alcerafolia.magis mucronacajaversj paite brevi la- p_muai
nttginepubefceatia&candicaima, advertverovirentiancc fplendentii, muhisvenha#*»><>;<mi.
medio nervo in htra foliorum excurrentLbus.ut in reliquis Pxoniargcnribusicaucisgra-
cites, &dilucius virenres, fingulosfaftntesunicum florem, aliorum gcnrum flonbus
Paulo minorcmjfiinpliciofiofoliommfcriconfantem, purpurcum, hoc eft, minus ru-
bcniemq; iamqui plenus eft, fed non minus odoratu^mQlcisfi-iminibus candid is, quorum
apices fUvi, bina cornicuU mediacingemibus prsditum, qua: maxurirate dclufcentia fe-
oiençoiitinc reconpçiciunturyulgafisPioviXjinitiofubcxruçum.fcminisTiniinftran-
dixijfperiorifimilis,minustanicraflis, fedgracilioribus bulbis confans.

NaramihieratfcmmecxHifpaniamifTo, crrtioqua fatu annoprimumfloremdedic
M Jio menfe cum atijs.

Paeonia III. ELEGANS ctiam est Tertij priti nymame confp cfla anno M. D. xx. c. in horro Toarnis Mylccpharmacopa: vdiligentillimi, adauricapitisymbolum, Francofurti ad Meruni. Folia autctii Prroiiiartemiiii Letpaulodilunusii Mra Kiaquam in <ffio* e4 <Ji k V. & ii, fplendci Hia, perorasnoimihilcn[pa, mft-inc-cmc racci colons: flos simplicik x foliorum lcncon(bt, ut vii Igans^ olonscaincidilunori Sjnquo Havcfecnstenni iterelucerc vidcatur, breuitercum co]urcmrefrcnti 5, quem Viennencfsmatrona, y'i' i iicrt: iitjfflrbcognoii] inant, & qua! cmnie dixquxdam Tulips obiincnc: cormcukviridia medium Horcm occupant, & multisalbis ftaminibuscinguntur. quorum apices aurci: femer in corniculis njgrum: radix bulbaccis afplioddini (quciubcnbusconfat; UEI' lena, &: fan llla vuljaris. Florer Maio.

Paeonia III. QVARTAM prxtca habco muncrc lo. abHoghclandc, cu jus flos nondumeonfpeftus [nam iuperiore duntax MYCvcillam accipiebam Jicdeodcin Hogciandio icicrent Cj Vao- nia jmanst' fledcbcc Tcaulisililatis firmu Sjfolia jnternasaladi Vjta^ uxtotidcm fo] jagcr Liubrevioi' a& magisorbicul 3raqumaliarum, atc] uciiaa] iquotlacniusfciflij/Lipeincdi- lutiusvircniia, infetnepnberccntia&cane {ccnua, adcoq-. (imilia Aquil] Ln. Tfb] ijs, i } tpmo intmcu pro illis accipi podintjatque li inter eas reponatui- hac ftirps, prinium emerges, cos cnam qui mediocriter in pLi Karura cognitione vcrfati (uni, fallerc quca E: radicc m Jiaber nuilcis bulbij longis prsditam uc Proma rcrnina.

Ptimia 1. Idem fcncbac Pitronia in apud Bacavos inveniri. cujus flores intenfum cfTentc. amici coloris, nonnunquamonti]o rubri, aliquid etm: n folus vel media ex pane ri; bn*. a) jae arnei colord, vcl lura q uicc jire d q f m t p d i g u f n a l i o p d v m contit: Sib- nem Lucium Daniltain Lugduni Bauvorum, nLfiartificio eumco Joren3 induxent.

Pi'oniaplcnofiorcalbcfcence minor. ^ ^ ^ T "

Paeonia III.
Paeonia III.
Paeonia III.



Paeonia III.
Paeonia III.
Paeonia III.

CfITERVM, qux pro album plenum profce- rene doremibidonaraefljumiliorcU illi q ^ p lum ex rubro purpuialcciuci: rle- rumque habet fluicm Sftijk in quarli ii
folia qii il c: n gault facinis ur al- tennivis Id angulibonibus: flores etiam mi- noris coloris adu piam, utpote quales: mini autkfi uagratia suborono dancium rano pcrct, 11 in vulgari plena • Jor nli- quandoquarercncicnn l obervare metiine- nm. Hujus color in^tiodilute purpura Tecns, & dno ammodo carncus, deinde p uatim clar g rcfccns, exalbidus fit, tandem toi%fc- remveus, excepta toioaim bafi & infimi partc, qua: carncuraquodan] inodolorcin retinc[: binaaut temaj Ut plena Tfulf, nis, ha- becin medio flore cornicu] a, minora tamen, quae aninterdum, utihaltra, /emina prs- bfant, mibL nondumpbfervarelicuit. Pccii- Jiarc m ctiam habei ejusfios notam, uc illi folia non facile defluant, led diutiflirac h* reant. tmo donee cemponduicurnitaceni- gre {cant, marcefcant, &: ficciratec < Sntrahan- cur. cum vulgarjs plena, floris folia raro ultra o hduum retineat, fed ilia abijciar: radices ctiam liabet bic, minores & graciliores, < juam vulgaris.

* ALIVD Paeonia: pienocarneo floreporro genus in Belgicainveniriinte Jligcbam anno M. D. xcvi. longt' ampliors flore quam modo defcriptum, ut qm Purpurje plenac flori non cedatnagnitudine, cju(dem tame cum iilonaturae, diutif Timc nimirum foliareti-

nens. r. emporis fuccem] etiam albercentta. Illam floreme viderunt in horro Domin^ de Ti- fciiac PraGdisvidua; anno fupramillciimium & quingentc (Imum nonagcioio fexto Bru- xcllis, non modo Illurtri Jlimus Comes Arcmbergius, fed ip(cctiam loannes Boifot Pra' fi- disviduarfrater. cum plerifqucalijs jfc ribens ad me in hax verba i Uto porteate credere te- lti bus ocularis omni (uc puto) exceprione majonbus.

? t miraplent P^our* aurem pleno flore futuri rubri colons aliud genus invenitur, cojas folia alte- rius roliis noii ab familia. fuperncviridia & rplendemia jniernc- carfijqj odammodocoloris, &: lanuginis expertia: flos acierius flore minor, nee aded plenus, illi pane qut carni c qlois plenus

¶ Inuseft, par, non minus canicn facurirubricolorisquam majoriSjfedcujus folia interiora venisquibuiiam nigncaniibusa!jx.'r!aconfpiciuicui: medium florchi occupant conicu- lanulhs ftaminibus obika.

Vulgarisporrò please genus excare intelligo, cujtis incerdum flores aibashabeamoras; quod an illiptatuarpecuiurcu'r, l^no: hoc verò inillo flore obfervabam , ucvetu fbuc finguhfoha per oras languidioris^anc colons & £ quodammodocxalbescant.

Hie infuperadiji-ieiidumputavij vulgarisquaeplenum fertftoremfeminemihinas plantas, caule, folijs, tadice maticm planè refcrencs, quarum Vna tertio anno florem dc- ditmacrisHoriquidemconcotorem, fed fimplici fex foliorum ferie constantem: Altra autem Byzantinarprions florem imicantem , hoccit, fimplicem oftofoliorum ferian ha- bntcm. colorcmamenmagisrubrum&(iiturum,Scud nigredinemquodammodoccn- dentem:Terciaflorem plenum tulicmacriconcolorem^elctiam tnajorertij&fingulisaii- nis cornicula five nucesquarum ahq ax (cm \AC prregnantes fucre.

P^IONIAM etiamitiventam inRcgni Navarremontibus, quxflorem feratomnioni- yeum,(ed fimplici foliorum ferieconstanterdjVulgariinoremjr radicesillaniinoresetiam liabntcm,ex Boijoti litrcris non ita pridctn intelligebam.

CYDO<IA CretscfcribcbatadmeCI.V.HonoriusBellus anno M. D. xcm.ifticincel- filfimorum monciurfi convallibusprovenireabundèPa: onianialbam, promi {ciia:natur,'c, hoc eft.qusnequemas,neque reminaeffee: neutram enim Illarum,totâinfiilâ (quxdih- gCQtctabco perkilcataetl j vidiffe, quetnadmodum neoucrubricoloris, licet nonfatis confancer fimilem inveniri ruihci quidam illiaflercriw- Psoniaautem Cretenfibus, ipfo

te c, Pifqum vocatur.

Pavia (emi- ne juxta ma- la varietas.

Pavia (fex- folio fere.

Pavia Cre- tica.

FINIS LIBRI SECVHDJ.

23

CAROLI



CAROLI CLVSI
RARIORVM PLANTARVM
HISTORIC

LIBER TERTIVS.

BVLBA c E i s atquetuberofisjiirpibmeUgantifierepr& ditu Jitcedere debent reltqm coronariz, & tilts congemres\ adjicietid&pr&tereaaalt<juotplanu₃ non contemrtendafiorum pukhritudine donat&& alUgrato odore commendata. HARum omnium hiBoriam tertio hoc libro deferibemm₃a CaryopbyUeuftonbtts, quipimunu inter coronaria* lomnummtQfibi vendkant^m-tiunufacientes.

CARYOPHYLLE I FLORES,

CAP. I.

XT ON carenra cilflimimontcsprarrupnquefcopulifuisctiamdclicijs: feddiverfigene- X.^ mHolculiselcgantifllmisodoratifllniisquckrpiiTmiecxomancLu. PorroCarvopliyl-iei vulgo Herbariorum vocati.ob miram colorum varicacem, fubcunciiim ea iueaocujos maxime recreant.Eorum vco.prarEer vulgo cogni_{wj}i(ti_c multa generaobfervabara. Caryophylleus iilvcfiris I,

Caryophyl.

q



Xsta'.tt.

Caryophyl.
16.

PRIORI dodrantaes funt cauliculi, tectes, geniculatt: folia infingulis geaiculis bina i n ccr Jc oppo iicajOblonga.angiilta, d a ra, niucronaca.coiorc quaii ca?(io: flos c cahculo tubetiteemergciiSjlfifigLiliscauliculis uaicus plerumque inlidec.fititcrdum bini) tjuincjuc folijs confkns lente fitnbriaiis, colons in diluca purpura rubentis, circa umbilicum bir-ucus,&(aturatiore purpura nicesatquodorus^xcujusniedioumbilico duobreviaftaminulapromincnt.icmenincalculispalca- ceum.fufcumrradixlonga^eoucsfibraspar- ges,c cujus capire plures cauliculi lace in ambicu & confertim feic diftundunt, fibrilque fubindeagunt-

InveniturinHamburgenfimonte.duobus fupra Pofoniutn,infra Viennam autem,oflo miliaribus. Floret iftic MaioanJiortosvco trandatum, etiam Aprili.

ALTERIVS, breves etiam funt cauliculi, tres unciasrarocxcedenics,geniculati: folia infingulijgeniculisbiiia, fuperionbus breviora,molliora, viridia, deorfum reflexa,(ple- denitj iunovellisautemgerminibus, lacis copiosecxcadm radice nafcentibus, majufcula, latiorac lue; flosentgricanre&:craffiore caliculoemerges, fummiscauliculisLnfidec, unicus, f upenoribus majorj quinq; eria folijscoftans.paulo faturatior priore,circaurab- ilicum longioribus villis hirtutus, Sc ele- ganti ex fatuVa purpura albo mifla, varietate

g^ratus,inodorustamen: femem inlongisvafcu'isqua:maturitate liautia,palca ceum,fu- fcum,aliorum Caryophylleorum modo contineotjradix fupriori liimhs eft.

Frcquen-

Caryophy Ileus Glveft.n, CaryophyUgus divert, v'



Frecuenri(ficnum est in Sneberg,monre,ob perpetuo infidrcs illi nives, Gc appellato,Sj
aliis Auftnacarum Scriacamq;alpiumjugis.Florecautem iftic sub Iunij finero, & Iulio:
fed in aiicioralocaddacum.cum (upenore Hores proferc.femcn ver6 Iunio.

1. Illipcroinniaferc OmilecrrcitaltiifiniojugoEtfchervocato^ifi paulologioribus
e(Tjcfotiis&cauliculis.florepleri.k]ueraajorc,neceouiico,fcdge[niio,autnplice; pra-
tercaftib vilHs umbilici™ ambicntibus.inacqualcmquandamj&infrequenresmxandrc*
excurrencem lineam jmprcrtam habet,humam crantj (ucuram refcrentem3 colorc rubro
ratuticiore pra-ditanijUt priori? est.

3. IN eodem jugo.paucas liujus gcnri<;,in Sneberg verd (ecudi aliquot platas invenkbam,
quEabilisduntaxatflorisvanetaredirrcrcnc: namliccc forma difparnoncfler, color ta-
menalbuscrat,un]biliciambituspurpurafccnbusvillis hirtutus. Florebantilricpnum
Augullo,&: maturutn (emen interdom pra;bcb3nt.fed in hortos rranflacs (casenim cum
fuoccpiteadfercbamusJcLim liiperioribus /lores produxerunr*

T j,cailiculipauIoma]orcscrjlii(]rest]tJc.pedalip]cruiT)quca]tirudineafrugunr,
genicula
i]ingulic emiculaamDici]DustimsLory]p]rimogenerc]ongior]Dusa]n]on]bus,
ciquiO'tamodocolorisiexfum mis alis bini,terni,ilngulacimaudemna(ccntes]flore,
priori nun multu abfimiles.quinque folijsperoras lacinians .arque circa umbilicuarnea
JanLiginr-pubefcenribus.cotil]ntes]ubricoloris.iiulliscorniculisinflexispracditL.odoran,
quiccaiicuhsprimtLncmergentes,candji fucun videtur: flonbus/ucceduncornicula
uciscra{ra,feiuennigtin,planum,utcccci'ipiryophyll'i,coiKinen[ia: radixoblonga,fi-
brofa, acapiceplurt^urculosmorbemdiitLindLr, qaipleruniqucfibrasagctes, adcoil*
propagant.ut brevi cocas areas occupenr,

VndepimumitUtus.ignoro: fed in omnibus Auftriacis, Vngaricis, Bohemicis, etiam
Germanicisplenfque hortiscolitur,& Maio menfe cum reliquis florec.

CRASSIVSCVLAM habet radicem QuaTtutn genus, mgro conicc teihm, fans fibro-
fam,fupernc]n]aliquotraraosdiviram,qui (ummacelluremulta capita gignut,ecenuibus,
gratniscis^ircncibuscii]foliolisconflaca-interqu^profilunt aliquot tcnocauliculi,gcni-
laci.palmares, & ad iingulos nodos bina exigua foliola: caliccs in fingulis cauiiculis fin-
larcs,m.i]u]culi, cqmbusflos ruberdilucior, qu,iaque folijs nonnthil perambiturn etc-
natisconftaos,ccuju;umbilicobinainterdu]n]l]bfcfcntiacornicula ((unccriamquii]flia
^cintlcumaltqiiot]l]bmiii]Hlispro(ieHnt:fimcii,utinceteris,niffrum,paleaccum,
Cicfcit in Tauro Cirintlii* tnoncc.Floret Iulio.fcmcn Augufto maiumm est.

Qyjmro,

Caryophyll.
v.

QVINTO, cra(ra&nigraiadixcft,dura,lignc(a, multos ramulos humi p. rios un-
dem item illds **lerftSsqde**, & fubind c fibras ageutes: ex ijs caalculi exeunt dodr
tals, geniculaci, infinupaftegramincisquibuldam, brevibus; anguftis, coloreca-fijsfoliji,
binis iemperex aduerto inter fc oppolitiSjdeindc fecund um gcnicula am nodos ali)s rano-
ribusonultirextremiscaulicuhs incident longicaliccs, ut in alijsCaryophyllcisfilvefhibiis,
florencunentcsalbum, odoratum, quinquefolijsvaldclaciniacis' conltance-Bi. c quorum
umbilicobinacmerguMfUminalongiufcula, corniculorum papilionistllar inflexa: (c-
njcadeindcmlongioribuscapiculis pianum^uakrehquorumCaryophyllcoium.

N>Mirf.

Provenit (pontē m Hamburgeuimontc inter faxa, <jm Auftnam&Septenmoncm
pedat. Floret Maio.

Caryophyllei Si v. species altcia.

Caryophyll. Ml. vi.



Caryophyll.

2. Ilius etiam genus ibidem invenitur, longioribus cauliculis, & plures flores profertent,
superiori quidem forma & candore similes, sed inflexorum corniculorum expertes, atque
eorum loco dactem stannola ipsius floris superficiem paululum exasperantia habentes: ca-
pitula etiam, in quibus semen continetur.

i'trUta

Est & IO hoc genere, quod flores drcra **«mbilkUtn porporafecnte Unuginc hirfitos**
proferat.

x. f. v. m. u. s.

3. Aliud tertium pauld majus inve-
nientis, tertio fere a Vienna militat i: firmionbui amen & longwribuseftcauUculsTnia-
jore ctiam flore, licet non
ns omnino, aut dilutus r
umbilici circumferentian
decen i (Ummtbus, utmfupenoiepromincniibusralioquifolns. radicc .Ssiflowndi tem-
porconveniunt.

Caryophyll.
v.

SBXIVM plurc5j,biinaradiceprodeUrcsI abctcaules,ci,hr,lfs,tereres,muIt.sgcnii-
cuhspr_schtos:&inh_s,b.naf_e^crfo|acau|Cm ampl_cctent^ai.rami()ea,nn,cmn,ita?rquorum Cawophyllcorum folijsfere familia, viridia camen, non **incana ail t c*fa:flo<s** in
IUinOcaullsa hClm mllrf<.lnnmrit-nic(-).^..:u.i.us, quinq. u. e. b. i. p. j. e. s. i. u. s.
& elongn
aagasque lacinias dilicaos, autcand!dos; aut purtiradntes, (uaviflmi odoris,
quo nates fenentis, umbilicd virfcctc, & **parpuiafence** lanugine hirfiuro, e
quo aliquot Itarainu la prominent; in oblongisdccornit-ulisfeinenfertpalcaccum,
Pianura,mer>m. rel. m. nr., ^ Caryophylleorum morc:radix ribiola ell .Habent amem no-
vclli

veil: Oirculi, ante quam in cauls abcant jlatorapiildfoIajArmeriorumfolijs proximo,
angustiora tamen.nccadco virena.

SpontnalciLurinhumidionbus Viennensisagripatts , aiquectiamadcsduarumfil-Kattfwi.
Varuaj, pratis vicinarum, dedives margines, pleni que Auftr:e locis; feriusreliquisfloietj
"empe Ialio,&: toto Auguito,inrerdu m cciam ferius,

Caryophyll. Gl. v n. Caryophyll. fil. Vir.'



S v P i v M est Septimum genus,&: humi fc spargens teiluibuscauHculiSjquibus mulra,
utricnque &ex adverfofemper bina,adnalcunrurtenuia, brevia^graminca, virdiaquefoi
lto!a:inexcremisramufcu!oruinfatigijсна&cunturfloresriinp[iciquinquefoliorumfrie
prrditi, mbri, fed argencdsvelutifcinllisafpcrfrfcmnonobfervavi: radix cnuibusfi
bris confans,& in lateribus fe pangens.

Crefcere audio in motite Ulo non procul i Niclafpurg Moravia: diliiro. Vmbrofis locis v<<<
delji-TMcur. Ejusiconcm liertibjccimus.

IHLISelcgans genusepcriiur , per omnia ferefimile, cenuioribus paulofolij, utriquoque
criiimcx'aitverfotenuijnmoscauticulosvflicntibus.quirumaioraniuloruailiniiliterfa-vu.f
ftigio fiiftiaent Hores duplici folioru m ordine conftanKS.ftacisimrio.rubri cotoris.in quo P"-
argititexqusdam veluti micseelucnt: evadumilli temporis fuccflut nam tota zftarc
plants rise floretjadeo pleni, ut rumpantur, mediosque alios flpfcuios oftendant cenuibus
foliolis pri-dicos, colons quidem rubri, fed paulo diutioris. Su m ma cellure adeo fefe dif
fundtt hoc genus, ut brevi vicinos inambicu cepfttesocupec, tocaque hicme vireat: nara
f' totis p' ens est.

"Hacnoii'fboncenanim vidi.fed cultum in hortis IllnnpincipisCattorurnM'i]helmi,&
C.V.IoacMmiCamera[ij,MediciNoribergentis.

OCTA VVM crafliuicala&rucculentalubcifotia.iUmsplanraqv^vuIgoapHdBcl- c>yr?hys.
Ras Gramen marinum vocatur,felijstfe familia,ftequennffima&conftruffima, amariu. " << •
fcU&: interquxperioli veriusquimcaulicuheticant.uncixfemt'flei' vcl' <>a<n

unciam longi, genticulati, vna vna mca...
des (pro ftirpis proportione) & laxi calices, lanuginofi, ex viridi purpurafcentes, in quinque
crenas divisi, unde fingulares emergunt flores, quinque folijs conftantes, & rubro dilutioro
calore prrditi, in odor: fermen obfervare non licuit: radix fatiscralla est, turbfufca, aliquot
fibris donata, verum circa caput fuma tellure expandens fefe, & in plures ramos dividens,
fubinde novas fibras agit.

Provenit ijfdeim quibus Quartum genus locis, nempe Taurò monte Carint^{MX}, folo ^{Marin}
tenui

tenui&arenjrpientercfero. Floret sub finem lulij & Angufto.

Caryophyl.
15.

NON 1.folium efimnutiflimotn,graminei'imquc&quafipungens, vinde- adedaudem fe propagatjUt magnos interdum cclpitcsiegat, nō focusatqvc vnufius quidani totos illos obfidens:rlöfcu!i in iinguispropagmibus inter folia emergences cjuinquebirid is rolijsccrjs ftantescolorisrubridilutionsCvecarnei,tenuibus& vix tranlverfum digitumaltispctJun- cuiisinfidereconfpiciunturfingulijgraciirimolptdaculo.-fcmc in capiteJljsfu(cis,& Iplcndentibus.rcnisformalqua nota a reliquis Caryophylcis diftere, &: ad Lychnidum claTi m •accekrevuieturJcxiguuujiubrufu.m: radix longa,nifricaDs.&:muliaspropagineslLrrinia rellurcproducens.

K*rl*l«.

Sum mis Auftriacarum & Sciriacarum alptum jugi<= inuenitnr nudo petrofoq; folo. Floret luniOjfemen Auguflo plcrumque maturitatem adipifeitur. At in uortos tranflatus hie Caryopliy He uSjCCiaruib April is finem floret: nonnunquam ctiamlecundo,lubiieptm- brisininum.

Varieim.

1. Colorefloisvariatqui in ludcnbergccIfillimoSciriajmontcinterdumnafcitur, qui totusnivcuseftialiasrehquisnotiscumilloconueniens.

IUmint.

CARYOPHYLLEI nomeninvenitbareplaiuaapudHerbariorumvulguspraefc- autemdomedicumejusgenus)cjuiaKiusfloresaromaticaryophyllioJorcni pleruii, que jrmulatur.Sunr. qui Vetomcsm appellare maluir: necdeuntquiad Plini) Cancabi cam icfrendamputenc.Incolcquinquepnoragenera,3?iltncf;lin/ CThj ncjllvateftimrgUn iin.i:f- fcrentcrappel!anc,hoccf,filvcRres,inon[anos,&P^{ait}^oscaryophyllcos.Sextii^enus Au- ftriace mulieres, quibus ob odoris fragrantiam in delicijs est, peculiariter ~~te~~ ^{id est,} lacinatam live dillectam caryophylleum nuncupant, AngutUaralibroOpmionum MI. Thcophraiti J(icav3-a)facere vt detur. Nonumgenus, Gefneri in cpiirolu Mufcus alpintis forte crit.Gallisaudem omni ifta genera *Onsets & Gyrojilts fauttagefdici* puccmc. Caryo- phyileus verorlosingene TeVngans Pulgo^W'^* dicitur: momanusauuTn **Iariniaro&**: otioraro flore r?iez.t\$jetfitt. Hifpandomefhoscaryophylcos <*<*>/& Cmplicicrnormi- nant jfilvcVres autem tlaatlmat rnsnttjw^s.

Cm vi
fitvijrts aif
Uvir.)gtit-
rhl.

Pailirnin pratis/ilviSjagroruramarginLbusaUjsqueherbofisHungarix, Eohcmix, Au- ftriaEStiriaftjlociSjfpontenafcunturaTiquotaliaCaryophyllei Glvefrts, live Armerij flor- ris genera. Sed quia in omnibus Germnir, Gillia:, Hilpan^provincijs .acquccciam, utputojLalixobviafun^pcculiaremilloiuradcfcriptioncmhoclocodareopciafprecciani xionvidccur.

Vyphyl plena flo.SileGacminiac.

NON prxtermittendatamen eadomeficii Caryophyllei plctio flurc Ipmes, quae V'tennr **Auftria:** mihi ptimum conlpcctj, Sc ex Silicia ufqucmifla.

EA aucm nequegeniculatiscaulibus,nc- que foliorum formaautiicubalijsdoniefcicis Caryophylleisdirlert, (cd fioris color diverfus, ad ilium, quo lychnis (ilvdtris **byzantina** praedi- ta eftj quodammodo accedit, minus Caracn ru- tilus &L flamnicus, &adcanicum pocius ten- dens, qualisifere inquibufdam fencispannis **conpicint**, quibusGermanipotifTflityfflib no- men dedcrunt: floret cum reSiquis, femert etiam illis fimile eft nigrum, planum, quod fa- tum (aris telicicer prov^mt, non omnes tamen planer ex eo natK matris eolorem referunc^cd alia;album, aliErubrumhabcnc,alirnativmn rement, cumq;iaturaciorem autdiluciorcm: nonnullaruni item florts fimplici quinquefb- liorum ferie duntaxat conftant, in quovis colo- rum genere.

CETERVM Caryophyllcoru faculraccs (qui* bushauidubieprardmnpnnulli exi; squorum hiftoriam lioccap.de (ripil)dil(ocntiflj me pc* icquutus clleclcberrimus MatthiolusampUf- finiis in Diofcoridem commentarijs.

irijs.

ARMERIVS FLOS.

CAP. 11.

y*» ARYOPHYLLEisflonbus congener ^meti»s, c gallica appellatioe sume f que

receatioresherberia: rcifcriptoresmutuatHs, qui[ummocaulis&:*iamLJoiiu fastigiomul- thois

cosi

flam Sat-



tot flores conertos, & vclnti in umbellam five capur congefios habct/olio Caryophylleo-
ruoi icxrogenen iimilia.

Eius porro noftmr genera; Vnum fiinplici quinquefoliorum ferie prxditoshabctflo-
ss: Alterius dupiici, tripticivcfolioruni textuia-conftant.

Armeriusiimplici flore Pannonic.

Armerinspleno flore.

Armeria-
vialis gen-
ta.



Q^od simplici est flore. fuasctiam habct differentias: nam una elc gantieft fiore , e6que
aut plane rubro, aut laet candoris maculis asperfo. aut niveo. cujus one carnei coloris: al-
tera. quxratioreft, omnino niveo: tertiapauciores ut plurimum habet Hores dilutius ru-
bentes Sc carnei qugdammodo co)eris: quarcx flos purpurafcenseft, iingulis tamen ejus fo-
Jij Speroralbis. HLius femine quntamihinata, cujus Hores primo & fecundo quo aperti
finc Lt. U^cipror fuscandoris. feciuentibus patilatim cvanelencealbedine, tandem om-
ninopLirpuratuncilucincadem umbella confpicere liccathos (lores lafleos, illo sexual-
bidos S; media x parte purpurafcar. es, alio 9 omnino purpurcos, ifia colorum varietatc
oculos valde cccantes: brv iccr, niagna etiam in hoc flore varietal

Illius quod plenum habet flurem duas duntaxat differentias confpexi. unam. quivulga-
tior eltrubra & elegindadino. ILi Hore: altera, qoa; rarior, albo Omnium vero, tarn quat
fira plicem habent Horem quam qux plenum, femem planum, nigrum, Caryophylleorum
fcm iiii infarinavafculis concinetur.

SIMPLICIS prior fpecics ab Vngiris /? catij U, ide (l, Dcr fagix anucuparur, frcque'ns quei
Iponte nafcirur in quibusdam praris Ncmctfi- wywar 111. Balchaf. de Batthyan vicims qua
Occidentem Cpei Sat. Ccceros Galli \, Armoirts, Belgar < ! > { < tie vctnacula hngua appellant,
clique in horcis dunxaxac cukos vidi.

H vc proculdubio referenda: Cunt dust ilia; planw, quae a rei herbaria ftudiofis Belgis
Graminis marini majons & minoris nomine vocanrur s tametfi plenq; alijs locis procul
Graminis marini majons & minoris nomine vocanrur s tametfi plenq; alijs locis procul
kimri didicistiam (bonce Proveniant. Nam quod majus vocant in Jummis herboficuci
Aufnacavum Siliaca Lim^ uc alium jugis frequenter invenum erucbam- nemini citam
colligere in regio hio vivano Madritiana filva vulgo nunchupato; secundo ab urbe Lureti
mihan. undcerutum amicis in Belgicam mittebam: nusquam vero maritimis locis mihi
contpeaum. Quod autem minus vocant non modd in Angliae & Belgica: maritimis pro-
fentica in Moravia: collibus copiose nascitur: a que non procul Braga in nec vicinens:
Saxonizetiam quibusdam acridis locis rxtrem agto Wkbergensi videre & colligere
uiuaiin^ ante ruultos annos.

Neutrus

Neutrius verodefcriptio bicl tueexpeitaiubcn.; cum a CI aril; Vim Dodonxo & L. bclioctimfuisiconibus edita fit: a Dodonaro quidem, mmogramLnismarmonim utraquea LobclioCaryophalli inarini & montani appellations. AbiUis ergo require puceruncreiherbaria(tudioti. Nondcfunt qm i'lmij Staticen efleceenieanc.

LYCHNIS SILVESTRIS.

CAP. in.

Lychni (107-
wargg. MKK

T YCHMIDIS filveftrismagnaetiameftvarictacNamprartervulgares,tarnqua:fim- J^P^ciquuiquefoliorumeflflore ,qolmqua: mulciplici,OatUs. Dodonxo&aiijsdC' fciiptas, aliquot alix m nicis peregrinationibus fefe obttrferunt ,quarum hiftoriam operse- pretiumduxi hoccapitedefcribere,

Lychnis filvci tns i.

Lychnis Ctveftrts it



Lythntft.1. PRIOR, cradiufculos habetcaules, rotundos, geniculis, in multis salasdivi! {bs, quaE lento quodam liquor cobriarum Cunt, cui plerumque inharrenr culices & minura hujusmodi infc<a^: folt4ad fingula genicula Temper bina, ordiic Jrpofita, & exadverrorcfponderitia^ viridi candjeantia Sc quafi cacfa, fatis ampla: flores multos in umbella congeftos, pulchros, rubros, quinquefolijs non bifidis confantes: (emen in tenellis vaiculis parvum, rotundum, papavensrh^adiiinllar. cinraccicolori Sj Continetur radix crafla eft & fibrofajquani ubi planta floruit, fubfequens hiems corrumpere folet.

Lythntfil. ALTE R i, caulis eft genicolat<s3 paucioribus ramis donatus: folia ctiam bina ex fitigulis geniculis prodeuntia, foperioribus niseis vitidia, 6t fitmiota. flotes iij & ngulis ramulis fuperiori fere fimiks, majores, obfoletius rubentes, quorum que folia bifida funt: caliKraffus membranacea tunica dura & vakie fctiatitegicur, in quo (emeucineraccum, craffiufulcum: radicc nititur fingulari, non admodum fibrofa, quae eti» mingr Uentchicrae perit.

Lychni fil. E x Gngulis geniculis p^dals ramos profert Tertia, geniculacos, U in mulras alas, divifos: folia jam du& angultiora, fturavindute fcr^ nigncanua: flores quinifctiam foliolis conftanccs, rubentes: femcnicalicibus, fuprioribus fimilc, mmus camen, & fufcum: radacrafla, primxpar, quaro ^ubfequens hiems non minus corrumpit quam fupriorcs.

Lychni fil. VN i c vs initio Quarta* e(tc3tihs, pedalis, itierdum amplior, geniculai^us, ex viridi purpurafccns, bina ex fingulis geniculis iibi invicem oppofita profrens folia, longa, acuminata ficma, craffiufulcula, vindia, a medio ad fumum fere, muUis flibus ex alarum

finu in

Lychnis ilivefr. in.

Lychnisfilvefr.ini.



Lychnis filvefr. v.



finu in oblongis pediculis prodeuncibus onu*
ltus, qui quinis extremo divifis, fed in rotun-
dumbifidisfolijsconstanti&clegamifnmoco-
lore ru broad purpuram tendente rucijnnçcla-
tione diluciorque coronulamedium umbili-
cumoccu panic, nullo camenodoreprarditis:
his fucecci unc membra nacea, arcamenduriuf^A
culacapita.circapedicula manguftiora.&craP
Gate roucrone, qua: per maiimtatem dehi-
fcun: , Sifcmenolieiiduntincludum, minu-
tutn fldmoduin, ex rufo nigricans: radix cra-
fiufcula, nigra, mulcas fibras fpargit, & fingul-
lisanois novos, çbsque numctofiotcs caules
producit.

M v L T o s caulesex unâ radice proferr *Lychnis fil. v.*
Quinca, rocundos, loogiufculos, ceteris in-
ficmiorcs, interram procumbentes, genicu-
lacos; folia in fingulis geniculisbina, Jonga,
mollta, & lanuginequadam canfcctia, in-
ter qua?(lores akernarim fecundunmmulo-
rum longttudinem coafcuntur fuperioribus
formâ firailcs, fed majores, fldiutiore colo-
rerubefcentes, vcl, utiradicam, incarnati-
femen in vafculisfuperioribus par, fubrufum:
radixcrafla&fibrofa, quxtamcnplcrumque
alterum annum non fuperat.

S E x T A, omnium rainima, cauliculo *Lychnis fil. v.*
aflurgitcircitcpalmamalcojgeniculaco,tc-
nui, lanugitofb: adquorum fingulainterno-
dia, binatenma, longmftuU. Utmginofafo.

tnafcunwr: flotci inordinati jaltcraatimexiingulisgeniculisprodcun^parvi, purpurci
b colorii

Lychnis filveft. vi.

Lychnis filveftUm,



tytbakfil
*•v-Cmie**

colonspUcherrimo rubro mifii, longo lanuginofdqac caliculo inclufi:radix tenuis eft.
HVMILIS cuameftLydiaisfilvcftnsSeptinu, Ctencofeminc, Ocymoidisappellatio-
ne millo.nata: etcnitn ftatim aradic in mukos rarjfcice pJfe£s vd am™ mmores divi-
dicur,rereces,tenues,geft.culaios: folia ad ^" - y fr ^T r f l i f Xj M i i a i o e x i -
tuexigua.crafTiurciila.vilhsqiiodamraodoa^aditfmiramuliffITnK^ntlmfnbranaccutn
cahcU[iim]lriartujanugmeobfitum,mfimapartcangu[bor^i,fupernli'ffliriTi,cquo
vAiiiL UUJ vjuiiiioe IUIJS toians,in m m m o Ditidis colons inio rubelli, deno liter can-
dicanciSjinqaoftaminulaaliquotrlavefcntibusa quibz aradita: florefuccedatcap itula
femen continenria^mile Lychnidis liocenfif, m f i l i s c c n u i s , m m m m u b s d i v n r t -
cara:oofivivaxtamcn. FJorebat lulio M D.X™. & f e q u e n t e i i : m e d e c i d i f f l a t a ,
GENICVLATOS eriam IiabercaulcsOtbva.tenu
joxes:folia in fingul's geniculis bina, tornave, im
viridiscandido perfuli &:quaficar(J coloris: flore
lijs bifido mucrone praeditisconfantesanerna p
purafteitcSj&jancaqtjam oinnino labefcant k
cesadmodumduros, breves, fiibrotundoj, femeparvum
dis cincraei colonsconnntes: radicetnfacisraflam
nopereuntem.

Lychnis fil.
ix.

MVLTA fecundum radicem habet Nona folia, aijma*
ncm fefccxplicanria,fubc3(cremum niucronata.viriiija m
veftrisBorealbo.qi jarinomnibusProvincijsvuiMriscLM
longe camen anguftiora^cidiufculi gultus: caolefdicijdj
dosos & geniculatos: fingula genicula latiore pediculo amplectuntur bina folia ex adveffo
fica,alijsbrevior, circa(unimuincaulemadhuctninora, & mncronata: fumiufalijinnaci
longiurculiramuli^crnosplcrumqueveletiampluresflores ruffinencj quinq; bifidis, ^
«q«cadiimbi]icuindivifis, bina/quemucronatasappciidiculasircacundeniumbilicuni
nabcnubus.folij^contantes.albos.qmncqeftainulismcdiuiinjmbilicuciocclLip.itibus:
Moribusqui marcer.cntescontrahuncur.&intcnore partecnvolvunrur, utm praxc<)cn-
tc.iucceduntcrافلjiifcula&mucronatavafciib.fbineexiguo.roruncio.cincracco plena:
radix fibrofa & perfni\$, fingulis annis novos ex radice numero fiordfq«c caulw proittt, qu»
fecundum radicem fibrasagenres fachmcpangi po/Tunr.

Lychnis fil.
ix.

DECIMA, fingulis annis ex eadem radice novi
produntcauliculi, perterram pparfi, &
tubind

I.) chnii Hlveft, ix.

Lychnis iiJvcil, x.



fuhmde circa incernodia radices agentes, dcindc furfum denuo fefe erigentes pajnarlaltr- tudincgraciles.gcniculan.binafoliainfingulisgeniculisexadverfooppoficaferctes, longturculj^angufti.obuufomucronc.viridiajprominuIodorfbifloresinfummiscauliculisSi lareralibusramLiliselgantes.candidijqLiinquelaciniacisfoliofiscofanteSjinodon, quibus fuceduntobcufavafcula.cxi'guo.nigricancc^tanoquefemine (quanotaquandam affinitatcmewro AvracrijsHoribushabcTcvidwi) refma-. fibtofam hab«udi«m,quamfacU lepan ere licet.

2. Aliudejus geusmulr^minoribiis&angurtioribusfolijs, minorctiam flora, ceteris tiorisnndifpar.invcniturinfcop'ulofoUioprKrup'toque jugoDurtcftainnuncupatOjfe- cundofupraGamingammiliiri.

Omncs,ubiadolcvennu,kntoquodam&j;Litino(bIiumore, ftipcriorepartc, illitajvi- dentur IK priorfac cccia & quarta maxiinc) cui plcrumque & euliecs, parvxque mufcx & C fo : " m i e a : t i m q p i] a q n v i q f l l i q f i l i i .

Spontc nalcLinturtrespriorcscum feptiraa in arvis& inter (cgetcs plnguifolo,plerifque CarVcllrc vccrislocisriihortiscutr, florentcodemquolarxfuntannOjaMaiomenfeuf- qucin Aimitniiim,feptimaumc.Tdifficiliu5cicuiarivoIu!t:priinaaucem&:tercia,rponte ferunturScintcIuemem prodcunt. Q_i.nrc;iinomnibusferePannonia:& Auftrixinfcrio- rils montinis lilvis, editifque & herbids lads invenimr, atque emm Clvis Francofurto ad Mecnum vicinis Floret Majo,fcinc[i Iuniomarurumcft. Quintam, in marginibusquo- randam Cartel]xagrorum; Sextam,non mil incollibus Salmancicx vicinisinrcr(axapro- venientem obfcvabam.atqLicucramque Maiofiorentem. Oflava .nonmoditnci'duis Clvis, re[ctiamadrcftib]lu]m.if;roriim margines, nafciturpcrunivcrsam Auftriam infra Anifum.Moraviam .Bohcmiam , Paononuum, ukraqueMuram &Dravum, abunde ctiamfil vis Francofurto vicinis, Mcmini&inBelgicavidereLuizclburgcnilducatu.No- nn.pTovcnitadScinacirum Alpium &Sncalbenfuptacarnobium Neubergradicesiabun- dantivis tamen in Etfclicro ncpiuscommemoraco.

PRIOREM &Septimam SalmiticcnfesSe^appellabanc, rubrum videlicet&album: Alc?ram Ocimoidcs.Sed ad LysJuiidufilveftnXcuiperqoamfimilcsfan^omnibusquefc- ic nurisconveni tint, genera, commodusrefcGntur. Suncqaiprimam &terciam inter Ar- iQcros flores referrecupefem:fcmeri taracn Lychnidi (iniile, alixcjj noLT, eorum (entent- t i i n) C Q n v d N u s e N i f i O d K n t i n e m i p p i n m a i n e v a l l n f e i i t c n - tiacOdoiuicis Uifloria plane rctragatur, Vnga.fi Quanam&Oitavam.&rliquas qua: apud

Natalis.

Nemina.

^{gares}Lychnides silvestres, r[^]iti:/f>, id est, (ilvestre moryophylkorui Ti
herbam appcHantL nonnulliautem quaitam Nyvilzckfiu, hoc est, lepons Caryopby JIcam

Quibus faculcatibus in prxditar, compercum non liabco: omnes vero deguflata: fu
i a r i g a l t u s d e p h d O d l avam, quæ, ut diximus, acidi ufculi est fa. om.
Lychnis flyzantina miniato flore.
Odonticis Plinij fimplici flore.



Lychnis flyzantina miniata fl. ca. alba flore.

Ap Lychnides fitve res haud ^a referenda est ea planta, quæ a vulgo Herbariorum
Constantinopolitanorum dicitur, Dochilimus Puchius Scrutator esse censebat. Ejus hi-
storia ex recentioribus habetur. Illius vero generis habetur in Belgica missio natum, tenuius paulo, nec adeo
numerofas flores in umbellâ ferens, qui miniati non erant, sed omnino albi: ceteris nonis
vulgari, quæ miniato est flore, conveniebat: sed ætate non minus firma redditur ipsa plan-
ta, quam alterius.

Tertium item ejus genus in Bruxellensis hortis ali, scribebat ad me N. V. Ioannes Boissot,
hinc jam dicto simile, sed flore dilu-
tius, et tunc in umbella con-
tota, tunc in niveis evadit, sic
Edum dTfenTS S
flons, miniocandorc mirtopcrffiffi Si
plance quxda il f l' K a l b l -
ore non ita variantem tulerunt, sed dilutiore rubro co-
mixto præditum, five jocinoris colorem imitatem, aver-

tyth. kfU.

& Lychnides silvestris genus est, cujus delineationem & præparatorem Jacobus Pla-
reau ad me mittebat. Belsen alterius nomine, cujus vero esset coloris, minime indicat.
Porko, propter jam dictas sim etiam in Austria, Sciria, & Pannonia occurrunt cum
in ilv. s. ttim Pmonra n) S prans ^
Oltit' u b = n t & f b f
cente, quæque t
judicio Plinij Odontitis est, angulosum cente eadem habe
jpcnicu' atu. cxnicro vind

odmtukfu.

purpurarcentcm. tn gcniculis rtilia. purpurcum flotem
>&> Nobihbusouihum. im marronit Vipnom. /r
Ducis Hetruriz Simplicita, cujus flos multiplici foliorum serie costabat rubri coloris ele-
gantis: verum illæ plantas eadem ætate amiserunt, dum me momentem, ne mer
andoribus exponeret (tenelle enim adhuc erant) sed in umbra potius ad præparand
Similem hinc p M p e r nûr.
& Antuerpiâ epetram in pratis, ea Flandriz parte, quæ inter Gandavom

OJnt. plma

ta^fo^tM1, ^ (» vulgo appcHarur^upcr ad me ftribcbai loannw Bo. lbr,
cujuf

Odontitis Plinij plenoflor;

Mclatidryum Plinij quonmdam.



cujuscerebra { n his meis obfervationibus fit mentio. Quam liabco ejus muncrc p jantam,
 ^egantem Horcmlenuradcdic, carnci colons, anno M. O. xcir. cujus icortcm afTabieex-
 primicuravijliicreponendam-

NafciEurctiampracdkSisjamlocisillaplantajquxnuncOcynuirtri, moddOcymoidis, Polemonij, Papaven'fque fpumcinomenavarijfcnptonbus recemiori bus adepts lunt, LQ beli us qiundam affiticacem cu m Melandryo ,qaod Pliiuis N at. Hift.lib.xxv i .cap.v u. jocinorimcdcrifcribit, habereputac. Sedcum brevcmadmodum&mutilamejushirtonamrraJat^nhuicplantxquadrarequeat.dirHculterquenquamjudicare po(T<;cxi[limo^ Q^uidipotiusMelandryuniPhnij fie Lychnis ilia ilLalboflorcodorato: cujus genus floroplcno incultisinvenitur? Omninoaurcm ad Lychnidum filvcflriuni claffcm pertinercarbitror.ciim casformapulcherrimereferat. Duorum vcrögenerucfTeobfervabam. Vnum enini in montanis nafcens.altiusadolefcir, cra/flores liaber caules, qui cum laxis folliculis floremamplc<5lentibusexviridipurpurafcuut: Alcerius atuc quod in omnibus ctiam German ir praxis ob vium eft.diluciores & quafi albicanres funt.

Melandryum
 Plinij quonmdam

Ceteriim novum &clegans ejus genus ante paucos annos, km ine ex Italia m iflb Ocy~ Lyih, in fil. tnoidisarborei fempervirentisappeilatione, natum, cui multiabeademradice prodcunt i'''h''^nd. rami palmares,cra(fiufcuti .lignoiuiue quidem^d fragilcs, in quibus nafcuntur bina (em- 'Q'^ fua uddat per auverfa inter fe folia,bcllidis folijs non majora,abimo paulatim in latum expanfa, fed f,Z, fummo mucronata.viridiaadmodum Si fplendens:efummaliquot ramisalijenafcunturdodrantales.autpedalesinterdumramulij genicalati, graciles, binisinterfcoppofitis anguftioribus folijs ad fingulageniculadonaci,&fummo in alas cocrariolitu ucrinque nafcentesdrtvifi,quibus infident racmbranaceispinguibus caliculis inclufi flores,quinque bifidisfolijscon(tantes,colorisquodanimodocanei, cquorum medioternagracilia incurviqueprodeuntftaminairadix candicat,paucifqucfibrispnditacfr, pcrennisumen. Florerlunio.

NEC minus elegans Lychnidis filvcflris genus defcribit N. V. Fabius Columna in Plan- tarumnovarumHiftor.aquodocymoiden Lychnittnappellat,quemcon(ulendumccfco,

SED&triaaliaLychnidisfilvcflrisgenerafemincnacaobrcrvabatnannoM.D.xcv. prj. j. dm idci fil. mumaltiuscxrcfcensjucubitalivideliccautampliorecaulc jnodofa, bina folia alcernatim ailingulagnicula Temper ex adverlaproferente.oblongiufcuU.extrcmomucronata, ex quoru nalisexeuntccnucsrantlijenroquodam rorc,utexhmuscaulis, obfiti, velutiin

PicriR, JC Lyelmidibus Hlvcflribus, fu[tinen:cs ccnucs, longiufculos, ftriat(5fq. caliculas, d quibus

tuh
 Cim
 j. dm
 idci fil.
 nalis



quibus emergunt elegantes flosculi, profus nivei, quinque folijs, à summo mucrone orbiculi ad medullam usque per longitudinem sectis, constantes, in quibus decem stamina alba, tenuia, quorum quina flore sese explicante, statim conspicua sunt, & albicantibus apicibus prædita, alia demum exeunt contrahente se milviorum unguis instar flore: duriora caetula floribus succedunt, in quibus semen quale in reliquis Lychnibus g p
 fida est, è qua ramuli enascuntur purpurascetes, ferentes ad versa inter se folia, quadam brevi lanugine aspersa, quique facile propagari & pangi possunt. Semen ex Italia missum Mulciple appellatioe.

ii.

Alteri brevior est caulis, & cubito minor, rotundus, multis nodis cinctus, è viridi purpurascens, ad cuius singula majora quam in supero precedente, ramuli, lento (quemadmodum & Lychnis caulis) humore obducti, cuicijcicS & alia exilia in secl. quam visco irritata nonnunquam inharerent: ex radice secundum caulis omnino purpurascetes, qui non tremis ramulis possunt: summo cauli & expurpurascetes caliculi, è quibus

iii.

Annua est Tertia, hoc est, prolato flore & semine (si ad frugem perveniat) una radice tenui, aliquot proferit ramulos, tenues, nodos, quibus ex ad verso semper inharerent binis, quibus innaescuntur caliculi tumidi in seculum, & pubescetes, e quibus emergunt flosculi coloris ex albo purpurasci H₁S, five car₁₁c₁₁q₁₁m, qu₁₁cto to₁₁! s con { tan, e₁₁si, nqu, bmex, Iaft : k, nenprad vcrf, a mvalctud, nc_m, qu_a, r_ncf_u b₁ndcafrl, g_{irj} obfe, v_lr_e nonl, cuit.

iv.

PLANTACUJUSICONEMADMCMICTCBATLACMB
 damus, diS^JfM
 8Pr. jlu* nony, Ided. ffimiIia^ andidionit, mc8:
 ia^tiam illis cnffiuMenfen, &: (uccoabundancu: aitero demurn. 1
 fationW

fatione anno caute pro ducbar duorum aut mium cubitorum ain cudine, firmum, rocu-
dura. fucco quodam lento & glutino bobfimm, quo *mutcx & L* alia minucainfectam fidem-
tta detiiebatur magno numero. In furainis rarats plurimos proferebar Hores v duti in u
tribalism conge[os, etia in ad centeilmm hicerdum rmmrumj facis tame exiguos pro plan-
ts magmtudinc, qm nqiie fotijs bifidts confantesj coloris ex vindi fiavelcenus!

Ilius (etnen ad nos miffum memini ex Icalia, a lofephode ca(a bona Sereniflimi Ducis
Floraitue, qtnun ex Creta rcdux eflot, Mufcipul^ Auncul? urfi facie cognomine, cum plu-
rimis alijs fem i nibus ex ci percgrinatione relati s.

SESAMOIDES MAIVS Q^OR.VNDAM.

Setimoides magnuni Salraantic.

CAP. iiii.

Scfcmoi desparvum Salinanric.



A D Lychniis filveftixis ettam genera non inepie referri poffb puto cam plantam/ juam
-tjLn onnulli Salmancieje Scfamoides magnu nuncupabanr, aliquot cauliculis pedalibus,
in[crducubitalibusexunaradiceproduntibus, rotudis, gniculatis: foli; sfereolcxadfin-
gutageniculaexad. vcrfona(cennbLJS, C3: iycolons. floribus inextremocaulc&: ramu]is p-
icatim autracematim cogeftis. cxiguis. exherbidopallefcencibus: femc in caliculis (ubro-
tuadis Lychnidifimile. cinraceicolotis iradix fatiscraflajcandida. perennis. furom dtcl Ju-
rc multa folia, longiora, & mucrone laria fpargens fumiiuscaulis & extremi rj muli Icn-
toquodam & vicidohumore obfitiunt, qucmadmodum Lychnides tilvetres superiore
capice defcriptis. Tota aroara eft.

*Setimoides
Magni Sal-
raantic.*

Naficurlapidofo & arido folo circa Salmanticam, & Narbanenfi agro: magna *verb co- N*uln*,
pia AufriK (alebros collibus, alijs qucd fertis locis. AH ettam (blebatin Beigicishortis.
Eodena utcm fcmine plerura quc dua: diverfa: fpccies enarcunrur, nontlla: quidem formi *fa'inm*,
diffimtlcs/ edquarum unafiore meum quemajuiculum duntaxat profert, ftrili(q, eft: al-
tera feminifera minorera florem habet. Totaxlbtc florent.

EA, ucdixij Salmantice n Cbus magnum Scfamoides appellabatur: alij ad Papaverfpu- *s, miM*,
nieum rcfcrevolebant.

NON dubico quin illi usgenus fir, prxfertim (eminiferi, cujus iconcm nudam necullis *£j<ii<>*,
coloribus infclam ad me mittcbat Iacobus Plateau Behcnfiore parvo appellatione jadeo, "
quam defcrip^otn nibus fere notis acraula cunde floris autern colore, vel feminis forma ni-
wl adfctrc poffiim. quandoquidem nihil prseter nudum noracn iconi erat addnura.

TAMETSI fequentium duarum ftirpium fades non refpondear cum fupiorc: quia ca-
men utraque Scfamoidis nomine Salina aciccin lignic baiur, omnes eodetn capite com-
-tirnavi.

Sefamoides
Salmacis.
141^o m. 1.

DODRANTALES autem tres aut quatuor ab una radice producit Primavirgulas. rererces, circa quas folia tria, exigua, Crataea, inordinata: & inuit Vniis plurimos foliolulos. ipse effluuacem nuda Teo Hfertosclicibaccopurpuralcentesm Ki Ojdc indetenuibus capillamentis ex albo pallidioribus ornatos. in quorum medio cluti quatuor grana viridia conspicuntur, uexcu Cfo flore, in vascula excrefcunt, exili nigricante reijone plena: radix crassifolia, candida dura. vivax, lubit dectiam ante hiemem repullulat.

Matris.

In coilibus Salmacis proximis lapidofo lolo provenit, ubi Maio florcbac, deinde fimen profcrebat

Is T 1 c SefamoidespaTVum appelbba»c, ut nctiicum ejus defcripiione minime conve* niat. Ingrati & Camariu(culi est gustos.

Sefamoides
Salmacis.
141^o m. 1.

ALTERA icem Sclamoides parvum iftic nuncupabatur, cre(cens declivibus locis, cuido drantales virgex, multa folia Linifoltomraxnmla. majoraj & incana: floscopiofus, albus; radixeriam candida, fed non valde craft3. Floret lixe etiam planta eodc quo (uprior tempore: vvx cnam videtur, a Se(Jimoidcianicn nou minus Liaia, quam fuperior.

H E S P E R I S .

C A P . v .

141^o m. 1.

H E S P E R I D t nomen inditum. au flore Theophrasti lib. vide cau (is Plant. cap. xiv. quod not Se plus dot cat, quim interdum. Cui (u Stagatut Plinius Natur. Hist. lib. xx. cap. vn. Adquam vrcocarum plantarum jqux Siodienobis funt cogitit Kjpotifrimum Ltctride beac. plerique adhuc dubitant j cum nullas alias nocas reliquerint Vctres, quibus dignosciqueat.

Communistamcn opinio obtinuit, urca quam nonnulli Matronalem violam vocant, & inter Lcucoij genera referri debere videtur, Hesperidu nomen fibi propnum adfcjccret: quoniatncjus flos, sub vesperain prxfertini jgtatoodore narcsfcnat, nuerdiu, aucnulum. aut levif Timum fpirer.

Nos ergo vulgarem Herbariorum opinio iicm requiti, Herpcri de appellamus, qua; Matronalis vioa alio nomine dicitur, quod Macronis atque virgitiibus fit in delicijs. Ejus vet6 duo genera alia, minime ab alijs liatenus obfcrvata jn med mm pioferemus.

Hesperis 1.

Hesperis.



Matris.

Var MM

floris colore multum variare, nonnulli smarernum colorem rctmentibus, alijs aut diutius pallidioribus, auc magts obfoletum ad quicmibus, oinnia tamen folia cbris venis ex atro purpura fccimbut diftinfta habentibus.

CVBITAH Priorexcrefcit altitudine, melifquarais prxdit at fl.: quos confuibordine am biunt folia, Matronali violx fimilia paulo tamen latiora & crassifolia. acidiufcuto primum gustu, poilca acri & falivam cicte: extremis rani is in oblongis pediculis infidenc flores Leucoij aut Violg matronalis flonbus formafimilis, quatuor foliolis, utilli, confrantes, non explicati tamen jled le contorquentes, coloris admodu inclegantis & obfolctij loc est, pallidi & furvi, infinitis venulis scxatropurpuresiingulafoliolaintercurlantibus. odorcin Ecrdium illo, aiit ad c6tenuiucvix naribus percipoflir, sub Tc fperamaurecng ratiflino &: fuaviflino: Bori Hiccedunt longaj torofaqueut invulgari cnrticula, fcrctamcn quadrangula, in quibus dupliciferie continetur femenvulgari Hesperiidifirmi Ic, fubrur Tum; radix fibrofa, qu^ utp!urimum btennum non fuperat, fed postquam defloruit & fenientuht^erircolct: C tamen fprKc ifiscauhbus ad frugem pervenire non finamr, novagcrminainterdum producit.


Sponce nalcntem fiffennine prxgnantc pri' mimm inveniebam in Prellnberg Hamburgcnfi monti vicino. Vngatiar quicxtrctno. qua Aufnam fpe&at, menfelumo anni M. D. LXXVI. Ejus deinde fementerr^ comi(Tum fubfequicteverc, planwsmihi protulic, quaraltero anno duntaxac florucrunt Maio, & fequente hictnc perierunt.

Solent vero qux femine nafcunrur plantx,

IN Syria; marimis aliud Hdperidis genus crefcit, cujus feraen id Italiam allatum, deinde Viennatn mi/Turn^lantasproduxitjamdekripta mulr.6 VegctioreSjampliorahabentcsft>]ia,cra{liorescaules,m3jorefquefloics,quatuorramenfolijsctiamconian[cs cju(Z dem planccum fupcnore colons,(ub noctem valdc odoratos,imerdiu odoris eitpercesrquibusmu]tocra(fioracomiculafuccfrerunt, alioquiiuperioriscorniculisplurimurejporidntia ,(mcneri;uxi iinnletxintinentiaj (cd paul6craflius,quodmaciircfcerenonpr'uit, cjuiaferiusflorucriuiplaara;. AJicroetiaraajinopcnrelbJeiejusradiXjnoimuItuni priu' riabiimilis.

Hcfperis irr,

Viola Ucifolia,Lunariaodorata.



TERTIA vulgariMatronalivioIaradcofiniiliscft, utex utriurqucollattoncvixdificrimcnconrpicipoiTit:ctnim foliahabercundum radicemnon minus amplaquaiiila, fubhifuta.vtndia.in ainbiru ferrata:caulemcubiralem,niultisalisconcauurn ,adqiusalia breviora.&nonnihiladpediculumlaciniatanafcunturfolia: Horcsfn extremis ramiscopiofbs^uacuorfolijsconllaiiccs.exalbidosiquiatatisrucceflupurpurafcuiitjcorniculajfc-taiaz, radiceciam iplacuni vulgan omninoc;onvcniunc:roto Honsodore,cujus in liacnulaangra[i3m pcciperpcocui,di&runc.Soletccianiha?Cjaltcroplerumqueagcrminatione anno,&: 1 maturo lamine,perire.

Crefcicpaffim Vicnnenliagroadmantium radices, &vinctorum in collibus fitorum *tf*t*Ut*. margines. Floret cum vulgan,nempe Maio & Junio.

PRIOREM appcHarcliebitHcfpcndcmioitanam ; altenun, HcfpcndcmSyriacam tertiam verdHcfpcndem filveftrem.

MATRONA LEM aorcem violatn, tuflri, convulfis, &difficulcerfprii-antibus medcritradunc:urinasio fupcr5£ ludores propellerc, incidere, abftergsje &digrcctc;.

CETERVM qu^anonnullts Violalatifolia,aflorumcum Htfperidis&Leucoijfloribus fiinlituclinc.vocamabalijsauctdaLunariagraca&odoraca^uiatiliquarferainccxcu-foifczbjeocegu mcnco/picndidxCmt, Szcjusfiorcs Leucoij aurHcfperidisHorum odo. tcrarferant.inrmonnnisiltfisAuftriaE&StiriaejVicinatujnqLicalpiumfilvofistocis.atque ctiaminPannoniaiiiccramnirponceniagnacopiaprovcnic.QuxcumlplcrifqucaJijsdc- l e p f i e, e j u s h f t o r i a m h i e r e t e x e r c n o t i e f t n c c c f l e .

ISTIVI plantxduogneracUminHirpanijSjtutnitiNarbonenfiGalliaobfervabamus,
 Qium majus& magis luxurianjj altcium minus&exile.

Lcucioirn marinum majus.

Lcucioium tnarinum minus,



*Leucoium ma-
rinum majus.*

MAJOR r, caulLScftpedalis,inrerdum major, ramofusadmodum, & hucoiprocum-
 bents: tbiia longijcraila, mo]li3,canenria,& quodammodo lanugmooi, Cic fiorij aut Erucx
 modo d ivifi & velut prsmorfa: flores fecud dm r.ini ulos odorati,t]uatuor folijs ut reliquo-
 m'm Leucoiorum flores pr.Tditi,dikitions purpurg:colorc,(ed ad rubri vim feccs quodani-
 modotentis:filiquarlongK.crafliu{Lu]a-,p]ana: tamen ut uulgarisLcucioij,dupliccpla-
 norum &fcbru forum {cminum ordinern,interciitrentcmembranacontincncradiximil-
 tifida, led non perennis,poftcaquamcn!m planta florem & feme protutic(qijodalctropic-
 rumquca faruanno,incerduni&tertio fieri foict)perir. iEfhrc Horer.

*Lema'H m°
rini miatu.*

MINOR, dodrantaletereccs,fciiifatisfirmostiabcccauliculos, in plurcsramulosdivifos:
 foliapriori familia^molliaitem & incana.minora tamen, tenuioraquc6; minusdivifa: So-
 res inramulisfupenorcmores,quatuorfoliolisconfanr.es,coloris pukherrimdrubJtis,
 &,duni marcefcere indpuim.magis faturi, qualesLeucoij rubn vulgaris Hores, &odorati
 quidem illi, vcriim minusquam fLiperiorisxorniculalucceduntobtonga, teretia, exih&:
 rufo femme plena. Floret Iulio & Augufto,eodem quo fatum eft anno, dcindc pent.

Hafala.

Nafcicur ucrumque Mediterranci mais litcoribus inHifpania&iGalliiNarboicnfi:
 fed minus multo frequentius.

Nemina.

LEVCOIi marini nomen indidimus,quod fponcin maritimisnafcatur, unde ad Belgas
 dclarurj,in horciscolicacpirialueticamajusaliquot annis Vienna:, IcnuncexBelgicamif-
 fonaturn.Minusobcoloris in (loremutationciTt,nonnii)li,cum Mompelh) vivcrem,Trip-
 pohu vocare folcbant: tametfi ijMelocisnatumTripolium legitimuobfervare potufrent.

"liptimatt.

Vtrumquealtdoguftuct:fed minus fuacrimoniavehementiuslinguam vellicat.

*Leucoi ma
TinuntCrt-*

IosEPHvsporroCafnbonuf ex pergrinacione Creticaredux, (emenad nosmittebac
 Leucoij marini appellatione,e quo crediverfeplantsortx.

" - - "

EARVM-Maxima&Pnma.cauleshabuitprocumbentes.rotundos^uriufcuIos^tilcis
 ramis donatos,in quibus floculi quatuor folijscondamcsjimcto rubentes, deinde ex caru-
 JeopurpurafcenteSjCxtremobifidis.&cordiSjUtvtgopingiturjeffigiem propemodum re-
 ferentibus,qua(icx umbella,Inonis vulgaris inTar.Jerlim prodcentes, qui { ubi florisfolia
 Cpnjungeban:ur,raciiantein imiubanmr flavana ftellam:flonbus fucefleruut duaru m fere

tincjafiinil

1 (liquixiiv cornicula reertia, in qui bus fem en oblogiufulum eafhnci colons.
"Jpfmsvctoplanrx folia longiulculafuerunt,aTilafpifolijsnonvaldedirrcrena,nullts (in
in cauleprsfertiinjvidentibusrenisdonata.craifufulculaj&aliquantulumaniara.

ALTERA priorifimiliseratjniii flotculoshabuitTecdimidio mtnores,&: miriopror(iisal-
bos,deinde tamen paulatim purpureum quidpiam contralicntes, (ed nihilominus niagisad
albedmcm incljnantes. Floruit utraque Iulio.medio Vere.lioc est ApriEi.faca.

TER.TIA promebat inieio prxcdencibus duabus longiora folia, evidermbus& co/picuis
renis (ecundiim oras donatajLeucoij Diofcoridis Lobeliani infar, e quorum medio cxi-
itcau!iculusrecl:us palmarialtitude minor, quumflorercincipic.nempc Auguflo; ala-
tete yer6 plures fundebat ratnulos^in quibus flores, fecundo genen amplicudin pares, co-
lore tamen differentes. namproptuscedebanrad Lticoij marim Lobeliani latifblij co-
lorem, magisque purpura[centescranr,qujm in piimogocrc.

LEVCOIVM SILVESTRE.

CAP. VII.

Leucoiura fpinofum Creticum.



MV L T A fecundura radicem habec folia^eucoij^qood JUEOO est flore. folijs (milia. an-
gull:ioramen, viridia, amaricar) CisgufiLi,inct;ri]ua:unicu,5,intcidilp]Liresajrurgunc
caulcs, pcdalesaucampliores, fl;riati, carinatisfolijsobfiEi,ri]ultosfulfticntcsfloresquatuor
folijsconstantcSjfiavoSjLcucoij lutei riorum xmulosjed minorcs.minufqjodoracos: flori-
bm (uccedunt oblonga cornicula ut in foci vo,piano (emine plena: radix longa cft.candic-
cans&: multtsienuibusfibrisprxdita. An femincad maturitatem perduftoprcar, ober-
Vare non poci:nam natali loco florentem,fuaq;cotnicula nondum macura fecntem hanc
pla.icamobfervabamiBiennalemtamcnreffcpcto^aiainnulJisftirpibuSjCaulispricedc-
tisanni ulla veltgUonrpicicbam.

InvenLtarinmonnbusillisfupraBadenfcthermas.&inLeycenberg.falcbrofisprxfer- x*t*ltt.
tim & meridiei oberverlis loctis. Floret Maio.

COMMUDE Lcucoiumfilvcftrc appellari pofc *cenCco*: RliizocomjE«iammulicrculxA'«i»ijw.
SSito *eabttopi* vocanc. Sativum autcm Lcucoium luteumj Vngari *Sarga viilanuncupant,*
hoc cftjlutcara violam.

Quo nomine appellcm hanc plantam dubius fum. Nara aatem est etiam Iacobo Pla-
tau,lem inc peregre accepto.It lam cene nafenrem nen vidi, fed iconcm ipfi us manu de-
lineatam ad me mittcbatcum brevi dcfcripcioncidera Plateau. Eam videlicet ere fccrcad yfi no-
cubitalemc auc majorcm altitudinem,&: in mulws ramos duros &: lignofos ftargi,quoscinc-
grecat fulia confertim nafcentia, incani Sc cuieracci colwris, per oras nonnilul dentata: &a
fparGm

nt.

Leucoiura

ad yfi no-
Sicuti*

iparfim in ramis nultos flores nafci flavos ,quinque folij conflantes; eos aurem rannulo
 initio lads tenc!lofcfle,pau)6 poft ramen.duros &fpinofbjevadcie. Qiiateicrocnejusc
 fer,nonaiifer]bL-bat,fcd.dumtaxac[cificitabaturanH]ppoplia:ftumDio(coridiscffcpofle[.
 Sedciim Diofcondcsfuum Hippophittum.humiltm heibam cUcafTerat,fincaule, fine
 flore.inanibustanrumcapituliSjtolijsqucfpinoiiSjradiculashflbercinollej&crafl'as.cCiiii-
 bus,folijsetiam &capn:uK),{itccusexpriatur,&: in uluin adkrvctur^ncnvidcoquaraiio-
 ne itec planraejus defenprioni acconmiodari queat.

QONiAKf porrofolia, Ltucioij marini fohjs nonvaldediflimilia habuidevidebatur,
 Lcucoij fpinoli appellationem obtinere pofle arbitror, donee aliud niagis aptum, & jpi
 plants convenietis repenat, lamcdiflores cjuspluribusfolijs quam Leucojorum floxes]
 frxditifunL

PRIMTIA VERIS.


CAP. vm.

Primula v.
 tu. vulg.
 metis. lac.
 citra.

"-pA METSI inAuflij^cirix.Pannoni-T^ucpiatis.&ricicofismontanifqJocis. are
 l iilvisn a Ic.nuur aliquot, cj us plantar (quac vulgo He ibano rum Primula vens& Vjd
 paralyfisvocacurl genctu, qualia luntclatioiucraqueflotclutco&palJido, ai quchJ|
 paHiaoflore,illa:quc (Imphci foliorum texturi: pcculiarc tamenquoddagenusalunilK
 nofta prara uliginofa, humi, tenui & quatuor miliaribus a Viennenfi urbe diftantia, quod ob
 ilunj-iicleguntuin & venuftaem hoccapitcdcfenbemus.

Primula verisrubroflorc.

Primula verisalboflorc.



Primula v.
 rubra, flos.

GERMiNATAuremineuntevcrefolijsdenisautduodcnis^riitioquaCiDglobumcon*
 uaias^ua-fLicccfruteniponsfcfuc xplicanc &hi/dit^partie n-
 cana&vclutifarituquadamaferla, internavrdexvmdipalientia, aliquantulumcrifpa
 &dcnfu[cula,Herba;paratyfivulgnr] fere limilja,(cdminora,anguftiora,& minus rugola,
 acrisfaporis • cxhorummediounusaut pluresaflurgunccaulkulidodrantales, intciutum
 pe*ialcs,nudjjgraciles.fummofaftigtoitiani, qui fullntent ex uno veluri capire.& in um-
 bellanafcentcsHores.oflonos.denos^utpluresjPnmu^vcrisiftribusformaiimiles.quin-
 quebifidisfolijsconstantesjmagriaqicxparrecleganiidilutiorcquecupipuranitentes^aut
 carneicoloris

Primula v.
 rubra, flos.

steridum fatutatum habentes nonum um sed tard omnino candidus,&
 ctiamcxalbidoSjOmnesaucem circa umbilicum luteolos&aliquam lum odoratosfemen
 deindcinobiscngisvarculisadmodum t^Xilc.fulvcfeciiscotinctor. Illudauteminhecflore
 obJervab.^ucqm iriicnliusrubctjftiluiii prnrintentcin (ivcpiftillum lubcat/quemadin

dim so

dumnoiiulhrurnPrimularumnores: quivcro dilutionsfuntruboris,nullum. Radices
fiintcandicanr.es, fibrofe, adquarumcapucaliajnovsplantulxfccundiiminacrcmfubia-
acgerminant.

Primula veris Have flore elatior. prim u u vcrispallido flore clauor



Sponte maenl conia provenit in uliginofis & vicinis, ut ante recul. VienneciurbipratiSj KttM
• dHLmber^Waltertorf, Ebrdftorf, Mag^ W. Ntciomythk^>-!-!^Leopoldtorf>rcem Bot-
tenftorf, & fnpra BaJenlcs rkcrmas verfus Ncapohm Aufnac. Floret verd fub fincm Apr i-
lis, & toto fere Maiq. Habm ex ijs quas in liorum tranftaleram. plantam. quarex radiaflo-
rumurnbelk. cauliculuncialcm& ampliorern^lianiuinbeUamelcgantiflirDisnonbus

onLiframruftinentcmproducerc.
Hanceciamficcamadmcmiit C.V. loach. CamcrariuscSaltzburgenflagroerutam,
• Lbi. quem. idmodum& inTyrolenficomitanJ. abundanternafcifcribebac.
Annover6M. Kxxci. dL. rn. Londin. eiTcm. deC. V. T h o m a l t o Medico. intellige-
bamcopios^admqrufum nafci in Anglic Scprentionalibusprans liuraidis&pafcuis, qux
adco caufa fiit, ut DoftiOimus 5c humanillimus vir Richardus Garth Cancellaria: Londi-
nenfis Primicrius, in meam erariara ex Hexarchatu DerbyA^ybfey no procul Halyfurc <£•*<&-
urbe aliquot Cjus plantas fulsfloribus ad hue onufas anrc mcu m Londin .o difccflim ad-
ferricuraret, quibusenamadjunax fuerur, al, quotPinguicul, (dequapoftcajftirpes, cum
TroIlloHorevquas Antucrpriamadamkosmifi.

Quaiitum exguftiideprehendere licet, ijfaemficultatibusefTeprKditamapparet. qui-r^r^,,
bisalaPrimulxverisSpollent.
EAMDEMotnninoeflepuco, quamIofiasSiraleruscomctanodeAipibus. «C.V.C-on-
one<ftaneisdefcribitinhuncnodam. foff(r[i]iichrbapufilh, albica]s, Bldidis
ima; forma infummoplurimosconfertosflorespurpurcoshabet^raherbacandicat,
& attriwm anupulvcremexuic, afpeaucleg_ ans. CaEfar inter herba^autRegulus.

Atufticjsmulicrculisquseflorcscjasmampulatimcolligatos Viennamintorumdefcre-
banc, ij fque vendebant. quz fcrra & corollas neflerc lolent, *<u<<umni nuncupabatur, eo
quod Maio mfe circa M rem pus quod vulgari german. ci lingHa*>enmw^B(ce funt Ko-
gaebnes) dicitur, quareat PofeaHri «w'f*!>^l<<^n ninantocpicarhizoto.
mis mulicKulis. qucilliui ftirpesradicatas in foro vnalesproponcre inceprunt, ciim ani-
>nadvenerunt Vienncfes matronas elegincibus flonbus delcdan. A rufticis Ang]is, aDud
quos n'arcicur, *irrf<f>, hoc cft, avium oculi nucupanir. iefh: ^enn^0: *?^mTM ca em eq am
gwnine apud illos infigniturCardasine ill* praxnfis rionbusalbis, qijam Doctiffimus
Inchfius Ibendem efle ccnfcbac.

Primula veris pallid o flore humilis.

Primula veris
pallida
humilis



Auriculae fii*

V A v. i A autem apud rei Herbaria (tudiorum*)
fobobtinuit. nomina Primula veris vulgodi-
ca Belgis. Nam sunt qui (pAgus; Diofcoridi-
dTeputenc, Fuchius verbalculaverit. Alij
DodccatheonheibamjquaPlinms Nat Hist.
lib. xxv. cap. im. de IcTibitfolijsreptenis. U-
flucis iimillimis, cradice luteaxeuntibus.
VulgusHerbarn paralyim, Clavem S. Petri,
Itali Laducam filvestrem. Germani ~~Uff~~
fl / <3cf;ufic!Mimn. Angli 'priiuefru & *
flppft. Vnganhumjlcu & ~~Etutvtov~~ maxiinaco-
pta ubique in (ilvis caudis apud cosnaicn-
tchi, *KacavcTag* hoc est. pultis expanico aut
nullo confeda: (quamilli *Katha* vocanc) *Bo-*
rnci, qui apu his illius qua: pallidac (r. coloietn
imitatur. Hanc ceo, cum in Angli jrlic
ctiam in catduismvts abunde provetlit, lac
candoris rlore confpiciebam, scahquotfir-
pesamicismBelgicam indemitcbam. Sed &
ab Anghsprimum accepentntBdg «m liu-
milm quam clatiorem, quac florem % abent
mulciphci fblotum ferie conflantem, *tc* orri-
nes fere Teliquas coronarias plantas, quarum

flores

Pmulatn aute Veris vulgo vocara^j, No-
bilis irfemque Cl.V. Fab. Columns in ~~pp~~
ToSna-avu Alifm acis alterum genus apSdPii-
niumeflccnftt: qucmadmodum & cap. fe-
•quctedercripras Auriculas ad Alifinafive Da-
mafmun] Diofcondis irfert: cujiu femcniic
valde acquiefco.

AVRICVLA VR s i. CAP. ix.

V T O K dubiuraest /ijufnatiprimulanjm
IN clafcro referenda fit vnuftahacplanta,
adco fimiles funt & fomAa &: teroperatnto.
Ejusverd mulca genera oblervabau in al-
pinis Auftnat & Sciriae iugis, qu.t, ccrtaqoa-
aam fenc, hoccapitedclcribcmus, avulgatio-
re quidem, fed omnium odoratiflimi initiura
facientes.

ILLI vs folia. Primula: veris folijs fere re-
spondent, rugofatamen non flint, icdcrafla*
fbaria: foliorum inftr.coque aut farina: qua-
ii polline conperfa & prorUis incana, aut let-
ter tan turn canefcentia, interdura omnino vi-
ridia & Uc*ia, rurfus omnia velperambitum
(errata, vet nullis denticulis praedita jiuerdum
novella duraxatdentata, vctiftaminirncsom-
ma autem gufiu amara. Exhorum medio. aut
elatcribus prodeunt cauliculi dodran ales. aut
minores, nudi, velun quadam farina reperfj,
quidenos, viccnos, tnecnosque, inrerdu
eciam piores (pr? (ertim ii in horns colatur. ubi
admodum luxunat) flores fufinent, exuno
veluticapitezqualiter ptodcunces, feperiolis
(quos tamquam fquamulx qua-darn incanX
abinvicem fegregant) brevibus cjeue caticulis
inhatrentes, Primulx veris fimilcs, quinis aut

fenisdivifuris confiantes, dul «m & melleum quendam odorern (pirantes .colons aut lu-
tci, aut pallentis jacque vel majores Sc amplior s, vel minores, omnes autem intenus circa
umbUicum ^lbocuculo infignitos, ftilo intcftaminanonournquarn promioentc, inter-
dum nullo

Auricula
mfii.



dJmnulloftjmendeindefufcumjinxquale.bullacisvafculiinclufurBjqualePrimularum
»cris; raJixcraffact,&multisciaididisoblongifqueHbrisptaTdLtajCxqua,inculcisinpan-
gitur.pluresplanta:enafci lolcn.

^ Crcit in Sncberg,Neuberg,Et(cher,&: alijs vicinis Auftris ScSfrix alpibus.mont'que
Gleyfnteld imminent!: dande multolxciorem &£ vegctiorem ab^undaarer inveiMmum
fcopulo, Medeling oppido(quod duo bus aut paulo amplius nularibtsa^LUibe Viquia di-
ftacj itnminenti.qua Septencrioncm fpcdar,undc rhizotoma mullLrcuJB&tafloraai ma-
bt pulos.ciini ipfis fterpc^qtiasfciimca plcri/quc expect, adferunc.

Auricula Lirfui.



A L Tk R IVs foliabreviora funt,extremS
partelaciorapkrumque.&initioquafiroturn-
da, quse temporis fuceflii angultiora circa ra-
diccmfiut,craflaquidem ilia, led minusquim
fupcnori5,in arnbitu lcr^ra,(uperne vindu fe
lxvia,ihferic ex viridi palWccmia: inter quc
vdadquorum heusexcunt nudi ,dL-
longi,aut paulo ampliorescauliculiqtubus:-
fidc fcnijO&on^aut plures flores, fimu! in
put aut umbellam congefti ut in fupcriore, il-
ji(queformaCmileSj{edmajores,rubicolorc
nitentcSjObfcuioie tamen initio.quafi moro-
rum fucco infeclicflent.deinde cleganti SC di-
lucid.\ ru brique purpura graiiflimi,intus circa
uLiibilicumpallentes&exalbidijodorati-
dem illi, led minus fupciioribus: femen in ca-
pitulis longeminoribusjparvumjnigrunijina:-
qualerradixpriorifimilis.

Hanc fruftra per Auftriacoru Stiriacorū
que montium alciffiroajugaquarfivi: primum
autem mihiconfpecla eft in culcirfimoftorto
C. V. Ioan. Aicholtzj Medici KProf'efforis
Viennenfis,mei amici vereris, £j hofpiEis,dum
ifticvixi,chari(fimi, qu'amanobiliquadama-
tronaanre acceperat, ignari tamen unde illi
primum communicatafuiffc. InOcniponti-
nis aurn &: vicinis alpibus abimdenafci-
eaintelligcbam.

T E s. T 11 generis folia.qtiā fupriorismi-
nor3,tcneriora, minuscrafla, lubnirfuta, per m.
ambitumundiqueferrata,inrerqux nafcitur
cauliculusfupriori fimilij floresinumbella

pares ferens,&rubrosjxalbidisiamenmaculisafperfosjcujus radix fimilicerfibrofa^o-
vafque e lacertbus propjgncs fundens.

inTyrolcafibusjugiSj prxrertiminKitzfpilinveniriintelligo. Sedeam primam mihi ^JMSu
oftendebat cum multis alijs rarifitripibusquas in exculto(uoliorr.oalebaiC.V,ioach.Ca-
mcarius incluyt Reip.NonbergcnQs primarius medicus, Boris expertem, quam cameo-
demcumalijstempore aorcrcnihidicbat. AnjnoautemM. D.xxct. ex Anglia Viennam
'cvertentri paucasadnatasplancuiascommuniicabar, fed qua; in irincre ubetencesdande
pcrierunt.

Q V A R T A, minoribusefrquamSecundafblijs, carnofis, mucronatis, inambitunon
ferratis, fupeme latvibus & fplendennbus, inferneex viridi pallentibus & venofis,mi-
noreqvieacritnonia&aniritudinepntditi squamaliarumfolia: noresilliftcundogeneri
fimiles, prof undioribus lacinijs fecli, colore dilucius rubence, intuscirca vmbilicum inca-
ria quadam lanugine villofi, fitilo ptominente, bini, terni, aut ad fummum quaterni, fum-
*novncialis,rarolongioriscauliculi fastigio nafcences: femen in paruis vafculis rcltquis
Waius & fufcum: radix minor & nigricans, atque adeo nutnerofa lobole interdum fc pro-
Pff»nj, vchti/fimoj cefpiresoccupr.

inuenticurinSncbergjeliquisquevicinisjugis & Stiris alpibus frequentifllma. Pau!
ante mcum Viennā difceffum rhizotorax mulierculx fmgulis aanis in forum Viennense
Venalem inferre cocperunr.

TYROLENSI non valdeabfimiliseratQuinra, quamincuUiffimohartoIlil<mp,jncipis
Cattorum\WilhelmiCairellisflorcntemconfpiciebam anno M.D.XIC. ejuscnim foliacir-
cinara: fere rotunditatis.longi ufcula tamen & in ambitu ferratajlonge minora fecund* fo-
pjs,& minus viridia.fed aliquamulum canct'centia: inter qux tenuis & fexcunciam Longus
cauliculus

Natalis.

Auricula
Fr. f. - *

Natalis.

Amu. vif.

Amtit vif.

JTMI, vif.

Anrk vif.



Auricula urfiv.



Auric. Ur.
p. 11.



Auric. Ur.
p. 11.

iauliculus exiliebatjbinoSjCcnos aur plures
flores fufincns fuperiore minores, quinqtie
bifidisfolijsctiamcoftantes, medij inter It.
& III i. colorii: femē nō obfcvabam, nam
Aprilidumtaxacflorcncm videbam: radix
fibro/ieftjUtrcIiquarLim.

MINOR. cuamcftSecundogencrc, Sexta
AuriciiUjCujus uncam planram confpic*
ba in exculro horto ornans. viri Ph. Steph.
Sprengen anno M.D.xci. Maiomenc. q in
tern a autquina fercntem folia, craflifcuh,
dilute virenti3, nu]Iicrenis in ambitudona
ta, interqua: ptodireaiebac[nacaule & flore
orba[acrat]caulcmtviridicandicatcin, tres
unciasaucampliuslongum. nimmofaftigio
frcnrcctn quinos aucplures flores, flava: iou
maiqualcs, fedcandiJos: radix/iiperioribui
refponde?, aliquot fibris, ut il're, donara erat.
Hjusiconem quam hicfubjedinus, poftca
admemittebar.

SEPTIMA cradtufculd radice nitirur,
Quartz baud diflimilijtHuicis cadicantibu*
fibriscapillata: exquaangufra folia quina
aufcna, fucculenta, & pir!«u!a, QuartzftJ
lijs multo angnihora. i medio ad extremuin
ufquemucronem inambitu ferraca, arnari
que guftusprodcunt; cauliculus inter ea Hi'
fcitur tresunciaslonguSjnuduSjLTvis, fufi
nenscapirulum c foliolifcompactum, ondc
quaterni aut quini fioteselcgantiflimi^ilt)
ciusrubcates, quinqtie folijs bifidisutrei
qui con-

qui constant: que Uujus fcmenobfervare licuit.capitulatamenquarcxproxiniainilia
COmpicibam ,femen etiam fimile lubere verifimile cii.

Crefcit IKC in qutbufdam alpibus Cahnthix &c Scirix fuperioris, prafertim vro Tauro
Jnonre.& ludenbergjugis. *Florae Cub R netn lull}* .haceftjnwbtisiriimirtsillisjugisii-
q ic(c-nubus.R.,iran*c,quiaexproculdiiTicismoncibusdelaca, inuniusAicholczghorto
puicos aiiiios perdr uravi c,o III neni cultutn ira refpuens,ut numquam ad frugem perveniie,
iaio ae florem quidem deinceps proferre volueriu

Natalis.

Auricula utl vn t, minima.



OCTAVJB foliaungum magriitdirle vixarquant, inferne circa fedem anguftiora, fuperne & in extre-
hlotatoracrenatdqucviridiajnervorajfuperibribus
minus denft, amariguftus: pediccllus inter folia ext-
litvixdigicumcranlverfumaltuSjUnicumjntcrdum
alcerum florem ferensdilucius rubentis, fivecarnei
corori»,efimbriacocaliculoobiufioreprodeuntem,
inodorum, intuseciam circa umbilicum Candida la-
nuginc pubefcentctn.nullo prominence ftilo: neque
hujusfemen obfervare licuit,cim non quovistem-
porcjugin quo nalciturpropter difficukar.es con-
(cendcrepotucrim, nee in hortum cum fuocephite
uanthca ad frugem unquam pervenerir.rcliquarum
tamcnferminirefponderearbitror.-adnatismirurn in

Jurit. VT.
P. VII.

taodum je propag«, fcinterduramagtiocscfpitesoccupai, tandicantes fibrascGngulis
prop^ginibus demicccns-

In fummo Snebergjugo primus iftamobfervabam anno M. D. Lxxmi. neque ulloalio
vicinujugoporteamihirefcobrulic.InTairocameii&ludenbergcciam invenitur.&cura
ilia rarumahuti genus per omiiaquidem fimile, fed cujus folia magispalleicunt, floresla-
crejuntcandonsu

Natalis
VarietMi.

FloreiitomesnatalilocoJUnicinterdiimlulio&Auguftoduntaxat, videlicet ftatim
poffo?uras m ij<jiig(s,ubi crercunt)fiivcs,no[inuqu3m ctiam fubipfa quaff nive,§conca-
iri^rata nivis indurati crufta,reliqua,qua: fubtus erat.Solis radiorum rupes ferentium re-
percuftioneUirilnhortosvctrotranflatacApnlifiorcnCj&aliquandoicerum Autumno
fiauraittemperacior/IlisceptisqurvelcontabuerunCi Vclnulla,ucdixi,diligentiaaut
Culturaad rtoreui ferendum inducipocuerunt.

Temps.

OurN IA iftagenera prxcer tertium,quintum,fcxtum & fcpcnmuna,primusomnium Bel-
gicTrcomniLinicabamjmiirisVienna.adIII.V.ioannemdeBranciort, ftatrislocomihique
chariffimum, Sipodejusobitutu ad Magnific. V. loannem vander bilfc ejusagnatum,
complLrei quealiosamicos.eorumptantis^rimulavensrubroflorc.&rariffimisalijfalpi-
nisIlirpibut Prtoratitem qua:flavoestflare,jamzntezBelgicizingaihnafei^a/ucratlibe-
»<<<-v.VjI.r. AlphonfiPtj.

IoiiasSinn]eruscommencariodcAlpibus,aliquotcj us genera rccenf*,cxGefnericollc-
ftands,ut ip(e refcfc,dei umpta:nempequ2; liaberet florem, auclurcum,auc pallidum.aut
purpuracerjtem.velrLibrcrcnr.emfanguinimodo.vclciiercum.&atrumiquospoftremos
duos colores numquam nuhiCDnrpedoscfc in fimUi pianta,mgcnit'fateor, nih per cine-
reum incclligacquircumgenus,cujus fios mirefcct,prafertim pluviacorruptus, velutici-
neraccumcoloremqncraliijSiperarum, fecundi generis florem primum fteexplican-
tem,qLicininitidob(curiorem,(acurum,&:velutimorori]mrucocinfeclumeiTedixi.

Remiss.

Qvonomine vereribujdi&i fir hxc p]anra,mc fugit; mfi fir(or FabiusCoJumna^ufm-
admodumdiximus,cenfec) Diofcoridis Alifma. Recennorcsautem variailli indiderunt
nomina.Matthioluscnim interSanicula:generarecenfet,& HerbanjsAuriculam urfi vo-
cari tradic .Gefncruslibello de Lunarijs herbis Lunariam arrhricici appellare maluic. Alij
Paralyticim alpinamjmcuparunt: magis tamen vulgare apud rei Herbaria; ftudiofos no-
menert Auricute un*. HcltfccijsITuMiimft/hocft.rupium fidlculusdicitur. Auiniacaru Sti-
riacarurdqjflpiunrincolis.priorffif«fit«atrti)irt3rf)io meclh«urab cfFoJlu dicitur (commen-
daiucnim etW radice ufum,ad ioborandu capur,nc verrigincinprarcipitij* r.entctur,cujui
reicausi, caprcartirhSJibictitn veriatoribusnon minusfamiliarisquam Doronici radix)
Medlmgcfo.apud goos copiose nafci dixi,w>lfm«D)m6{ (Scd diffd Wuncid est, odoraram pri-
mulamappelliic: fccuhdaifetertiarotteO^iufFdMumrrtabincolisvoc3tuf: quarta@toJnwfi(n/
lioc eit,pectra!a rofula ob ven-jftaeem & roieum eolorem, turn quod in fcopulisnafcatur, i
marjeanispaftonbus nuncupacilr: fepcima apud Scirsarupenons incolas monranos9ttf*
fp*id nomen invenit.quati dicascquinam nardum,addirferentiam Nardi fivefpicxCelti-
fx.qaKabundancerincodemludenbergjuganafcitur.utinejushiiftoriadicemus.

GEstEn.vslib.de LjnarmerbiSiprionsradicem.vinum ^oodorecdinendarcfcibir,
R...veto,centum bonores,peccatis in ... juvate, capiti
c J
fingido

frigido & partibus nervolis prode flc. putnda ulcerac medar Cjfcifluras in cute hiantes, vcti-
icnim/rigoris auialia quapiaminiuna, fuccom cjinfti Jiatumbrevtflimcfanaro.

Matthiolus ad enneroclas & choraas vulnera, fi quondie in potu lumatur, ucilem cffe,
qutn & alia vulnera cam intus iumpr. am. quam ex ten us illitam.

Iftic ubi nafcirur, loli, ut dixi, momam venatores ejus radice utuntur: a reliquis negligi-
tur, prx[er]quamimulicreulis, quicxcjus flonbus fertafcorollas conficimnt. Deinde
cum nobilcs, tum aliac Viennen(es macronxqua: coronanjs fiirpibus dclcilamur, to fuos
hortos cum quarto genere inferre cocprunc.


SANICULA MONTANA.

CAP. x.

*T->EM PEHAMENTI, facultat Lim. aliar utriq[ue] iuarunda n[on] racione ^roximum ab Au-
J. ricuhs locum. quamum quidcm mihi videtur, obtinere debet clegaiulize planta.

Samcula montana.

Sanicula
montana.



« M v L T A folia promit, novo v[er]o, fati
cui ^pediculi nitentia, ad 6 f[er]e per oras
initio contrahentia, pronā ps[er]tic, urorbicula-
ta vidcitur, admodum nervosa 5c rugola,
ibpina v[er]i parte tumētia, crifpa q[ue]nt Lu-
iicanici ranunculi, aut La[te]ucapuat[er]fc>
lia, deinde ubi (cfccxplicarūt, in ambicu non
modd ferrata, (edetiā in l[ate]x aucplures la-
cinias divifa, ommnovirentia, (upemcquo-
dammodofplendcrma, inferncnequaqu; im,
fervidoguftu: tnterqux palmaris exitcauli-
culus. firmus. ercdus. nudus & iinc folijs, fub-
purpura (ccns, qui in fummo Primularu in AC
Auricularum inftar medio qnorundam fo-
liorum capite, ofto, nove, aut plures produ-
etc flofculos cocavos jcapanujac modo penfi-
les, & dcorum fbedtaces, quinquccrenis di-
vifos, elcgantiū morubro colorctaturo, SC
ad purpucam tedenre, fando in ciorc albo,
iriquuu lucangulos de Gnente, prodeur itibus
cximo quinc {Uminulis lurcicalbur' un-
dum non [i. ipcrannbus, & nicdijohlor] gum
lilunticomplctenribus, {navisodoris, ut fe-
re Auncutx urii rabra; five freunda: flores:
quibus deflucntibus, fuccedi int furreftaca-
pitulajtenue jfucum. utilla. fcmencocinen-
tia: radix n[on] timero Gs. logi Sjtenuibus. & nigri-
cantibus ribris ex uno capite produntibus
confat, fi nguli s anni i ad latcra auge (cens, SC

incrementum rumens. ut temporis fuccl Tu vcl un Aunculx & Pmulzaliar que iimilcs, in
plures ftirpes dividi & pangi poffinc. Toca planca hircufiore lanugine pubefcit.

Matthiol.

Promifcua nafcitur cum proximocapirc defcribenda, & f interdum, ciim adhuc tene Ha
efl, alcera pro alteracruiturreodemeciam teroporc cum ilia floret, licet in horns liac paulo
niatarius, videlicet Maijinicio.

iLLAM cflcomnino extflir nabam. quam CT. Matthio Ius ab ampliflirno Conufoac-
ptam Caryoplynatirubjccit, & Cortufam nūcupavit: vcnim cum ueque faac, nequctcm-
peramento ullam affinicatmcum ijshabere viacatur, coramo iius meo iudicio Auncu-
lis ^tdixij Coniungem ^ quibus nondiflimilcs habctt facultates. Hamaucero florum varic-
tatem, quam ipfe in Conusi invcnit fenbt, in hac noftra non deprchendi. Scd illud ob-
fervabam, peculiare quoddam exigua: erucx virentis atque tumida: genus tn ipla gigin
nbemcac,

CETERVM Manno M. D. xic. Amplifs. Virlac. Ant. Cortufus binas Cortuii Efficac ftirpes
ad me mi(ic, quibus hxc eranc ad fenpea.

Corruca

DiUgenier contulmus Corcufafirpem cum Sanicula jquamin Pannonicis obftrvano-
nibus defcribis. & Conufam fleccnfesiredillam nihil commune cum Coitusa habere de-
prehendi dimus. nntum ab cfi ut Lici Uaipfar Cortufebinas plancas miicocun] fuifolij, rlo-
nbus & radicibus, 3t qoe addo, Cortu(atn grato luavique odore pradicam inftar favi mcllii
aut odoratx alctiusrcicujufpam > imo lubtilem quendam odorem (pitac, qu< odorantis
cerebrum permeat atque reficic: lencriofa item foliare cens vulla & more rctenta, fcnim
Clloicm excitant, tanquam manducato pyrcit. iro, qui tatnen lubitoc vanclci, nullam

que no*



Sanicula montana II.



etiam fetius: in hortos vicrocrantita, muhi matunus.

que noxam adfert: recinria inregraque, non trita, mulicrum auc clicaiulorum malis impofita, & paulo pbit adcepta, gracum ruborero fine noxa inducunc, tamqua nobilitTimo ailquofucoinfe&z faiffenr, quo cvanefcenrc, nullum vefbgiuaut macula relinquitut, prxtercanonfplendentjncqueavcrftpartcpunftisinfartpolypodij diftmfta: floresnon propndentJcdomncSjVeleomm maxima pars, *iuncti* funt, coelumque fpcihnr, non minus etiam odorati quicn folia ,im6 majorc fuavitatc pracditi. praefertim dum funt rccentes: tz-dicescandidx font, non nigricantes. Haftenus Cartufus.

Quantum porrdcx ficcis quas mifit plancis conicerc licet, in cahiteo opintone, CnrtJfam, cuniSaniculaalpinamodddc(cnpp(nifi eadein (it) magnani affiniracem hiberc: nam folia, flores, radices, ipfum eciam teperamentum conveniunt, an vetd ea prxftarc poflic qux Corcufactn buuntur, nullum fecipenculum. Fatcorqudcm Sanicula: iconem non mihi fatifaccrc, piclore'mqi nimium fibi mdulfilTe, dum rugas 5t hircficiorem illamlamzginemcxprtmercvoluit, quit res Cortufiim Fccllit, dura folia a versa parte pundis dittin-*tz* purat: nam ii ulla habuiflbnr, in ejus (lirpis hiftoria non fiibticuifleci.

SANICVIA MONTANA ALTERA.
CAP. XI.

NATALIVM communitio facit, uthanc elegantem plātam Saucubeam de(cnptefubijciam, tametii ccoiperamento &: facie diffcrant.

MVLTa haber ilia folia, circinarsferèrotunditatis. Saxifragiauresfohorum artula, longis ptdiculis inhxicmia, pci ambitoirinci(ā, fupcrne viridia. inferneā. Jiquantulum exilbida. & valdchitfutatiftringentisguftus: caulcsdeinde piomitpedales, autintctdura ampliores, vitides, liijfucos, & inhis folia fupenoribus rcfpondentia: fu m mi caules in plures alas dividuncur, & fingulis rami\$ in GdenC terniaut quaterni flofcuh, fpina: appendicis I'linij, quata plerifque Oxyacantha cenferur, florura odorem refttences, quinque foliolij albiscōftantes, qua; vc! utif3nguincispunctis interiorcpatre notata funt: bifidavafcu lacfi decem ftamiciiibus medium flotem occupaac, Saxifragxalbx vulgo appelUtaccapiculis vaU de familia. qux macura, exile & minutum admodum, nigrumque femcn continent: tadjt quodammodo fquamata fiiperncj& crafliufcula, raukis candicanitibus fibns pracdita eft, \$Ca Uteri bus propagincs agit.

Crefcicin omnibus AuūriE & Stirixalpi-
bus umbro p oco, hpc e p crum pucti
vr in alpm m j ueis deiorw inci piu nt. cū Ranuuculo phtypnyllo, Geranio pullo flore, Sc fimihbus ftirpibus, qar umbra quim iolc m>g« gaudent. Floret lunio, intttrfurm r^»».

tmitt misf
altrius p
vna ll.

S i MILE 'feregermsinvnirurinSncalben, vicinifqnealpihus, fed mirVUS, atiguftiore
folio, & pcrexiremum ferrato jhirfutoetiam Biadfringenisguftus ,eolorisex herbaceo
•pailfcfcntis: e medio'foliorum prodcunt cauliculi enunciates, nudi,qui circa (iirtimVm ti-
fugium in plures rarmilos findimtur-, candidis flofculis (upriori fimilibus onuftos, vcruo
nulisfanguincnguiciSjUiilli,a[perfos: bifida luccduncapitula ut in Tupriorc,exiguum
nigricans (emencontinentia. Florcictiara IuniOjin hortisaurem M.iio.auimatunwſ.

Memia.

Mi HI Prior ahquanHom i fla fait ferraria MachliniamaC.V.AlphonioPancio.Sani-
CulEgu[ta:acnomiLic,quiacjustiores,ucdixi,fanguineisvclui:iniaculisa(perli(unt. Dubi-
toaneaficquam Lnbclius inAdv«rarijsGeunia!pinum vocat: qucmaliusqinfpiamfe-
quutus eftjdeinde pro Cocykdonc tertiachhibuic. Montani paftores & venatores fCpſ
e«nitc(appellhnc.apud quosnullum,quodJciam Vulgarenomen Alteraobtinuie: fed mm
•plerifqcalijsnegligtcur.

SM.it. f>4.
Xliii. nit.
D
nar.
Aubunila.
Saxifraga
alta.
Saxifraga
alia.

ABVNDANT ctiam Pannonii utriuique & viciharum Provincianim prata, umbro-
TJcfilvas&monteSjSaniculavulgatijDiapenliavuIgoappellata, SamculafeminaFuchfij,
iive Elleboro nigro Diofcoridis aflertor; Dodonxo (urramqueVngari Jaaicor vocanc)
Alchimillaj&ctJngeneribusplantisadmantiumautcm radices, lod(qucalijshum*idis&
umbrbfisSaxifragaurca cognominara; apceri vcrò gramme confci colles.Saxifragam al-
tam tubcrofaradiccalunt,cui,quimodo(iefctip(i,congnercsvidcmiiT, Sanicuhropot-
id v lurgarm Fab. Columna Sideritidem tertiiau effe cenfcc.

SOLCANELLA ALPINA.

CAP. XII.

F[Lo R i s venustas facie, uc Saniculis hanc elegantiſſimam jplantatDj&aliquoc alias non
contemnendje venustacis fubjungam.
SoUanella alpina major.

Soldanella
alpina.



Natalis.

Varia.
Xxxxx.

H A * E t Vero fena autoftona folta,cra(Ta,
tnorbem ferrcirciritatajBraflkf marinsCiquam
vulgo Sold-ineUam vocant,xmula, fed durio-
ta, (uperneviridia, infcrnediluciorc vindicate
/picndcna,guftu prtmiiim cxiiecante, deinde
acri&ingratoiflorcsgcritinlivi^udOjgraci.
lijfubrubro.palmariquecauhculojbinos, ter-
nos, aut plufſs, purpurx vcl faturx ,vel dilu tx
'colore,inoderos, campanulxmodoctforroa-
tos.deorlbmipeilantesj&propcndentes.uni-
cofolioinquinqueprofundasclrenas.fqu^ali-
iquannjhilmaciniatK funt) & totidem alias
fingulares di'vifo.confntes.e medic protube-
rance vcluri quodamumbone in longum iti-
lumdcfinente.quiinvafculum, velcornicu-
lumpocitiscvadit, oblongum,durum, mcra-
branaceu m.mucronatum,par vum,durum jVi-
reJccns,ſimul congefſum fem en continens ra-
dices fibrofſe.cand icantes, ex u no vclucicapi-
te dependnt.quod adnatis ft propagat.

Copioſenafcitur in Auftris & Scinſc alpi-
bus perptua nive obfiEis/nuTquam verb l?tio-
rem, autuberiorem confpiciebam, quamin
jugo Vrechfei nucuparo, fupraAichpangMa-
gnificivin Erafmia Kliunigfpcrgp. m. liben
Baronis: ubiannoM. D. LXXVI. uuicaniplni-
utn iadlei profus candoris flore invenicbarri.
Floret lflic Iunio,inrerdu Julio,& Augutlo,
nivium maturius aut feriusltquefceaciun] ra-
tiorte. In hortos auicm cranfiata.ctiam Aprili,
vel cum Primula vcrisrubrafloret:difficult
autcmcicuranpotcft.

4. Eſr&aliadgenus tminorefolio,nequecircapediculum ,quibreviorgracilior4ueft,
adedcircinato.fed lenſim ab ipfoinlaciditudincmxcreſcente.
3. Invcniebamctiam znno M.D.Lxxvni;inafcen(ii motis Herroalben (undepoficaicr
eftadclflimn jugum&ftopulum Durrciiflain.duobuilupraGamingatn nailiaribusj
umbrofis locis.quoddi genus ampltſfolijs,(edtenllisadmodum,quarinferioreparte non
vircbaa:,vcrua non mmiis rubcicebantqudm Cydaminjodorato Qote folia.

Soldandlaalpina minor.



Viola montana I.



SOLDANELL*nomcniri(iitum,qu6dcjus ^{Femina.}
folia Soldanelte marina: folijs iunt admo-
dum firoi'i •: Junariam minorcm cxmleam
appellant nonnulli: vulgare nullum no men
ediicece potuiabalpinis pafioribus & vena-
toribus.

Sed neque utlasipfius facilitates notas habent,
Nofter vero Lobelius, Erhpiricutn qucndam
folijsufum adaquasinafcitceducndas,vulncri-
bufque cicatricem obducen-
dara,a(Tcric.

VIOLS MONTANE.
CAP. XIII,

DVo Viola:rara,ncc anteamilii confpe-
cta genera in Auftriacis&: Stiriacis aipi-
bus inveniebã,qtia: propter vnuftatem fu-
dit>(tsrciherbarie,iiofafacrenondubitavi.

FOLIA habec Prior uigne viola: fcrefimi- ^{VttUmw}
lia,minoratamen,breuiora&^viridicolo- ^{"MI}
rcpallefcntia,calidoguftu: angulofoscau-
liculos.in quibus bini auc term ^{Hores} ex ala-
rum firm prodeutes, viola miriores, flavi^
inodori.quinque folijs conftanrcs, quorum
jnfimum majufculutn eft.&quinc radio-
lifivcnervisnigrisinteriorpar:edirtinflu,
reliqua ver6,exriore parte:(cmcn in cran-
lifcapitulis,qua: macuritatedeliifcunt,exi-
cum,nigricans,akjs violisfimile, prffertim
tticoloriiradixalba.crilffiufcula.mulcaspro-
pagines c latcribus procreat, candidifque &
Jongisfibrifhifutaest.

Abundanter nafcitur in omnibus Auttri^ ^{Natali.}
&Stirixaiibus: lunoatque lulioflorens,
in cultis autem Aprili. In Borealis c tiam Ang-
lorum montibus inveniri intelligebaro.

Exit AUerainfumruiSneberg jugi verri-
cc,perquamcxiguifolij,&:qua(icircinatfl:
rotundiratis, in ambitu leviter ferratis, cra-
ffiufulisjlongiufulo pediculo inhireti bus:
cauliculusaflurgitcmcdiofoliorujduasun.
cias longus,unicum florem fuftinens purpu-
reum, vulgar! fimilem,(ed logè majorem &
inodorumscui fuccedit iriangula filiqua: ra-
dix nonnihlferpit, & aliquot Hbrisonata
eft. Fiorct fub finem Iunij.

Hanc nonnulli Melanium montanutn
appellarevidncur.

FKEOVEMS in carundem Provinciarum ^{Viola latine.}
nemoribus occucrit clacioi ilia Viola mar-
tia, firmioribus&creftiscauliculis, quain
cur Mattbiolus arborefcntem cognomi-
narit,nullam caufam^vidco.

Nec prætermittendum elegans Viols genus, quod a ^{Doctiffimo Viro Gulielmo de}
Meta Medico in itinere observatum, dum ex Italia rediret, & mihi Francofurti commu-
nicatum M.D.XCIII. sed reficcatum, & (quod dolco) nullum retinens Horem.

PROMEBAT autè à radice craffiofulã, digitum longã, & frequentibus fibris donatã qui- ^{Viola monta-}
na aut fena folia longis pediculis innixa, nõ orbiculata, aut hederæ foliorum formã referen- ^{na laciniata}
tia, ut alia Violatum genera, sed multipliciter incifa, & ad Ranunculi, five Ancimones lati- ^{folia.}
folia tenuiora folia verius accedentia, erant enim in octonas aut plures profundas lacinias
d SSKSSaS
florem fuftinuerant, trigona capita, inftar eorum quæ in vulga-

n violã coafpicmnr.fcdmanujadliuc cetiUentes.

Violamontana in, five tricolor,


Visit mtnt.
montana 1.



Pinguicula.

Natalis.

Viola mont.
tricolor 11.



Pinguicula.

Pinguicula.

CETERVM non potui elegantissimi hujus flons.ncc ante annum M.D.LXXIX. mihi con-
fedi dclripcionem hoc loco no infejtre: li-
cet in Paniionianonfit mihi obierv&us, fed
cuscognitionem acccepram fram C, V. loa-
diimoCamerario.incuju shottoalc bntur.

PLVKIMOS porroexunaradiceproferebat
caules pedaleSj angulolbs, valde ramofbs,
quospcc intervallaambiebac folia mcoloris
violxfolijs fere familia.logiora.cralljora/ucc
plena, kvicer&ranusdentata,apophyfibus
ad latcraobl6gis,&profunde lacjniatis,ania-
nufculi guftus & nonnthil aens: ex (umms
alis longi oricbantut pediculi,ttiangularcs, te-
uelli, (inguli (uftinentes florcmoiuniuquoJ
iuhocgenereviderimmaximum, qmnisfb
lijs,ut vulgar is,confntem, quorum duo fi-
periora extremis oris ex c^rulcopurpurafce-
bant, circaumbilicumpallidictant coloriv
bma ilia in latcracxpama, illis minora, hitci
colorisjmaculisexcafruleopurputafcentibus
refperfi,irinisq";purpu reis radijs ex umbilico
emicaiibusinfigniti: infcrius folium reliquis
htiuscrac, aurei fere colons, (epicnis radijs
purpureisab umbilico intercurlannbus, ma-
cula
uralcente infimo labro
notatum,odorfuavifrimus :cra(Tiulcu)acapi-
iu!a,qux in temas parcesdchifircnria, femc
of cadbahtail j s u m i l e j p l u d u o
macuritate fufcu, uicoloris violx (niini pro-
3timum:radix fibiola,&: durabilis, qur faule
ctiam rainulis pangi polltr.

Spome in Helveticismontibus nafHferur,
undo IH^Pnnccps aCaflclo cruumacce-
perat.ipfiqXarnerario coramunicablL Flo-
ret pine toca xftate.

ALIVD autem genus per omniailli umile,
floriscolorcxcepio, poftcaCadcllisobir-
vabitu culriffimo horcoJU^l PrincipisCac-
totum Wilhelmi: nam qui in fupcriore varius
cftcolor.in hocomnino flavus,purpurafcen-
tibus radijs ex urnbilico cmicaribus, qui ma-
gnamgratiam flori adferunc: aliquantum
ctiam odoracior videbatur. Audio &rorum
purputcum reperiri; quam vanccatcm fetni-
nioacidcrepuco.

PINCVICVU. CAP. XIII.

TTEMVSIA Cielcgansetiah^ceftplanta,
V quacernaque aut quina ha bet foliola,
Genci anellij fere flm ilia,circaradiccm latiu-
cula,dcinde in mucrone dcfinentia/adscen-
fa.pinguia, luccuJencaque.ccnella tamen.K
ai utc virentia,amar cantis u lis: ex xorum
medi tuJlio unic us au c pi urcs exoriumur cau-
liculi, nudi, fere pal marcs, tend i& exiles,
qui bus infiden t fingulares flores vel albi, auc
purpurei, cauda live calcari prominere,
quemadmodum in Confolidx regalis vulgo
duftx.fiveCymbalanfflorcrijsfucccdururo-
tunda capicuta mucronato apicc prsdita.mi-
nutmn .longum.nigricans femc coruiiiccia:
raiiices ccnucs iunc, fibiofa: & caadicantes.

Quae

Vix albo est flore, fponre provenit non moddin Sneberg, Durrchnrain, aliariimque alpium jugis. in locis afflur arecens nive ad huc tudentibus: fed eriam illiquar purpurce est flore permixta in omnibus fere pratis lignosis, in quibus crefcit Primula rubra flore: ubi Maios floret, & Junio femer profert: in Alpis verò ferius. Natalis.

Quo nomine denda efl clia Ecpiantuladiu ambegimus: placuit tandem id illi relinqueri, quo a Conrado Gefnero in descriptione momis fradi non procul a Lucernâ cckbri Hclvectorum urbefiti, donaca est, donec corrnodi usaliquod reperiarnus. Lingulata

PICVLA, inquit, ut fis So a nobis nomine appellatur, florcm cz ruleurn ut viola martia profert, in odoruni; folia humida, mollia, l:cvia, abfque netvo [ni tailor) uclingulaca vel ophioglorius iufcitur in paluftribus, Hxc ille.

Quid ii vero Lingua vel Lingulaca Plinij ik. quam lib. xxim. cap. xix. & lib. xxv. cap. Xr. circa fantes nafa cradit? Verum nos nihil hie aflcimus, fed inquitendi duntaxac causa hzeferi bun us. Nonnulli cucullatam appellare malunt, sequi bufdarn Kpîa? Apuleij putatur. Nu Hutn vulgatenomen S monranis pastoribus, requca Viennenfis agri incolis, quod intellexenm, obnuit, Et baud fciò, an apud illostndico aliquo in fu fit. Lingulata
K^i. 4p. 11.

Referbac mihi anno M D. XXCI. C. V. Penn Eus Londinen (is Medicus, hanc plantula taracqu Eflorec gruleo est. auaiinqu Ealbo Jplerisque Angfiaj locis inveniritur Ipla experientia vertim esse postea me docuit, quomadmodum & tno O&avo hujus iibrica piteannoravi) & a ore alibus, apud quos Primulx veris rubra flore pcrmistacrefcit, ^vntiwmiiA est, Butyri ad ice m a pinguedine butyro simili, qua fistulas in vaccarum uberibus fanarc folst, appllari. a meridionalibus verò Anglis { apud quos etiam bafeicur) 22 typtw « vocari, quia oves tntetricit jfio cibipenuriam ill^ vefcantur. Naficus
in Anglia.

G & N T I A N A .

G A P. XV.




MVLTA Gentians genera alunt Pannonici & Norici monies: in his tamen tnamillaro lutco flore Veteribus defcnptam, & plerisque alpis nafecntem cõpiceri, mihoncontigit. Exillarum autenucoero quoin Pannonia: in òcibus & Noricis alpis { Noricas Vccerum Gcogrophorum more appello, casalps qua; Pannoniam & Auftriam mferior diatcingunc. imoe jus demoncanaquatdam, atque Srtrix partem comprehendunt) provenit jquxdam funca jsetian provinces communia, alia verò in illis, ut arbitror, pccularia. Earum historiani, quando quidem a Recenioribus defcriptas non inveniam, hoc capite dabimus.

PR/EDICTARVM autem alpium maxima, a vulgari illa majore qui lutco est flore nihil formAdrfferc: «enim amplahabet folia, Euborial bifolijshaud inultum ab familia^ edtneriora, & faturatione vindicate iplendenda: caules digitali aut pollicari inteidum craflitudine peditos. rotundos, cubi tales, nonnumquam bicubitalcs, genicu Utos, cjuos ambium limilia folia. aliq^ uantum ramen angustiora, ex adverso fibi oppofica: excreta caules ambiunt binar aut ternar confertorum riorum coronar, quon funt lutea utfellari, ut invigari majore jedipurnre majores, concavija fenas aut plures lacmias obtufas extraiisoris fcflj & purpure j squibufdam punflis inferiore & interiore p3rre» qua canaidiores fiidilutiones runt, diftincli, odoris expertes, totidem, quor funt lacimx, ftaminibus longum & bifidum vafculuni incerne ambientibus^ iiquoco iitine curcopiofum fcmen^ Ia Dum. palea*.

Ceu. minusquam in illa flavamajore fellato flore. subrufum: radix craffa, longa, forispierumqueft. iva, intusalba, impncscamara, digicalibus nbsfubinde prx ditacft, fingulisanis novagermina (quemadmodum major flava) proferens, & multos caules ex eodem capite prociucens, pfcflTi « cum adolevit. fcd qui alternis duaxat annis, ut plucimum floriferi esse (blanc, interquiescente nimirum uno anno S. parcu matre.

Exit fponre in Pannonicarum Noricarij pqualpium jugis abunde. Florec Augufto: fcmen Scpcmbn mat urefcit, novi nive in cajúga cadere incipiente. Natalis.

Geptiana major purpur- flore i. Gentiana I l.cxmleo flore.



*Gentiana major al-
bi flore.*

*Gentiana
H. Jufarpun-
da albi flore.*

*Gentiana
maior car-
leo flore.
Gentiana II.
Altiplana
flore.*

Variata.

Uttal.

Fbrisporrd coloremirum in modern valfat: nam Stiris fupcloris alpbis. vcluti in Iu-
deiiberg^Tauro Salisburgenfi Proymci? vicino, aliud ejus genus invcnitur. nihil quidem
a (up c note aut forma, aucmagnitudinedifTcreos; fed cujus flores, qui in lllo funt purpurci,
in hoc omnino ladci colorisconfpiciuniur.

Venim neque hoc genus, neque illud purporeo flore cicurareum quapotuimus, aut ul'a
dihgentia & culturae efficitur in hortis permancrc vellentjedum flores proferrc.

In Silefia: ver6 monubLs, eruit dodi (Iimus Medicus Achilles Cromerus Niireniis, ma-
wnitudine & forma plane fimilcm, cujus tamen flores, pauld fut ex ficca quara ad me mitt-
Dat plantadeprehenderelicuit) minorcs, colorcm habct pallitlumjfive, ucidem ad me scri-
beba^ obfoletc Iutcum. quampIurii nisnie Tismaculis intus & fonsafperium. Addcbar. ab
eo qui ipfum in moatana ilia loca dcduxirtet. fibi relatuai, ii) alio quodam praalto moiite,
aliam formanondifparireperiri, quica: ruleo floreelTct.

ALTERA. cabitalibus conftrramis. pluribus abunaradice ex euntibii Sjdurii firmifque,
in qtiibus mulca folia, bina femper inter (e oppofita, mollia, cribus ncrvis fecundum longi-
cudincm excurrencibLis infignita, nucronata, ad Afclepiadis vulgo credits folia nonnihil
accidentiaj dilucius virentis colons: a medio fere caule ad falligi u m ufque, ex alarum Gnu,
fingulaccsex adveco ficvexiliut flor«, intCTdunn bini aur plures, ob!ongi, concavi, in qum-
que angu los acu tos delinemes, &c veluti (c com phcantes, quein ad mod u m convolvoli flo-
res fere. Scmulta rum Genrianarum aliarurrij colore nunc purpiirco & faturatio rccarrulco,
mododiluCiore & velut cinrfcc OjquinquepsmdisilaminLbiisumbilicumocctpannbu*:
vafculum fubfequitur bicom^quo per maturitatem hiantc/cnic coiifpiciurplanum, pa-
leaccum, cincracei colons, fliperiore minus : iadixlutca, digica! is crailicudinis, multasob-
longas fibrasejufdem coloris? mlatu fpargitj fingnlis annisaugefcens, & novagernina pro-
ferens, valde amari guftus. Fertilior hinc /fupcriore^ cucillaintcr quiefcitj fed finguli S
annis, vetu (liorvide Hcer, mtiltos caules floribus onuftos producit.

Copiose Ln Pannoniaj Stiria. Auftria infchorc provenirjad monti Lim radices, umbrofis
collibu Sjnuquam vrdin fummis & apertis jugis. Anno etiam M-D.xci. ficcam ad memir-
tcbatdodtirs. vir Rudolphus Schlickius Kaufburnenfismedicuse Rhecicis moiitibus cruta
tam cum plerrfque alijs (eleflis (irpibus, ijs fimilibus quas in Pannonicis & Stiriacis alpibus
obfervaver. im. Floret Augufto: remcn, ur in i'uperiore, mature (cicmcnlc5cprembn-

Pertinax quidem ha:c et^ & fere mitiora looa refpuic. interdum tamen cura & diligentia
effeci mus. uc in horti3 comprchenderct, & : linguluannis rc pulkilarct & : flores ferret: at >-
menqua-

»inquaaff_njtivoacre & pabulo privata, atque tamquam corapedibus vindhj lugre vid-
batut,acpriftinivigorisbielegantixplurimum amittere.

. JtraquhicGelncronotafuifrevidetur, aquoTragus fceaccepiflfaterur. Majorem
"idcfcriptione Montis frafti Jt<pnc^tidm vocat, alteram ssofitHtt«w«rt^hoce(l, maiorem
amaratn radicem. Sclavonic! ruffici in transdanubianaPannonia nonproculCaflbvia,
svfitfg;^appellant quo vocabulo ijdem candelam exprimunc ,nimiruni quiaejusradices
JJivs, longse & tenues, ccreis candclis (qux in globum aut (pirasconvolvi (blent) fimiles
jint. EjtJsaucemradicisdcocoiSufclitercalculoiispropitiari .experimentofecomptum
habereaffirmant: nonininiisquampolygonigenusillud, HerniariavuIgoHerbariomm **BaaUti***
Ppcllatum, quod exficcatum & in pulvercm trrtum, bourn, equoru vulneribus atque al-
cenbus infpergere folent^d vermes i n ljs nacos abigendos & cneandos: nos prscer facul-
Mteoi qiiacalculoiisprodert, adverfus hernias etiam wnlem eflc feirous, aquibus nomen

q1vir:

lofiasSi micros ectADi^pffftttttrtm^voc.iri fcundamhancGencianam, tradit, e.ique
ftores uciad ubcra vaccarura, fi a raunbus arancis, aocalijs venenatis beftijs lxdantur,

Gentiana m. Cruciata.

Gentians im.fpecies.



TE II-T A eft,qua:vulgo Crucian vocatur: aGermanis.RKitjtwtti/*n6n»6ri0«. Vnga-
ris vcro Zent **L&z, UkiralyfittjA** eft, S. L.nillai **regis** herba, propter caufam in Nomencla-
ture pannonico adfciiipumi. H «jus hilloriani.cu'm a Trago atque alijs lit tradita, hie repc-
tercnoacftncefle.

iLLivstaincn Ju»atfFrenoci.isobfervafli:videonunaniramishumiprocumbennbus&c
itiinorcmlccraui Hrmis&:crt;C^LScanlibus,camque majorenLflorcsitcalcrius magisca-
rult'ifbcJtjncur.arqucillaruniahcraradiceni in fb rani inafclainminimehabet.

Na(cutuu[Mcr6c2perunivcrfamPannoniam,cumincolibusmontibi.i(qucap«rtisaf
graomcis tumliccionbuspraciSj&licrbofis.fccundiimpublicasviaSjlocis.

SECVNDAE altiaidinem noiiumquamQuartaacqua^caultlmqjhabetutillafatisfle. **Gtmu»***
xt>ilemjtenucnygeniculatii: f^oiam **ungalis** nodis inter Ce oppofita,lonp Si anguftapro-
ferentem,tnnerviauc **Ture** omnium Gentianarum: circa [uiiumcauleni aliquotexfo-
ltorutn alt's prodeutiramuli,elegantcs,CTRulcos,iiiquinquelaciniasecretaapartcdivifos
noies,&aliorum modoconcavosprofrences: **radix**crsflTiufcula,circaliimumcaputin
aliquoclongai, k-mJfquc&flavclccnrcsribrasdividiur j fteundogeneri ferefimil_es,fed
minores.

Crefcitinpratisadmonrium radicesfuij,no proculaStharcMBERGARCEGencrofi J3_jc
Hcufcnftain, apudBadcnfcshennas, Scumtiginoforumpratomm marginibuspoftax-
d ccmEbr-

cem Eretor in CO? (H Mag^{ci} Domini Hieronymi Beck a Lcopoldtorf. Florec Augufto.

Ejus proculdu bio genus eft, qujea Cls rifs. Dodonso Sti Tp. Hiftor. Pcmptaden. lib. r. cap. xu. Campanula Lii aurutnnalem nominat. & quod Augufto florum catarque Autumnno. a Ruellio Calarlii anaviola appellata eft, a Cordo Pneumonanche: humentibus erictis liscui do abucbc Brugeni miliari. Htter Maldegbemum & Malam. frequentiffima, ubi cam (niveo cciam flore variantem aliquando cni fpexi) cum Pseudoafphoddo luto Oj folio Xiphij, Roret luc Solis duorunigenenerunieruere t nemtni.

VT poltremsalterafpccics Autumnoduucaxac floret; ita fubfequens verno tempore fuos (lores proferre *lolet*.

G enii ana v. G entianlla major vein.

Quadriflorus
Gentiana
Pulsatilla

Gentiana v.
fux Gentiana
nilla major
venia.



Natalis.

Natalis.

CentUnj VL
five GmtU'
Ttilixiirmi
mmir.

Natalis.

SENA vero ant oflion a liabcc folia fiupra reram expaiifa, bina (cm per ex adverfo fcc ipctannajviridia, lxvta, dcn(a, dura & mucronari, Myrn[ati {fima; folijsferesqu. ilia, impenscamariguftus: ex homtn niediocauliculis exilit l l l f l dotee um paulo amplior, angulofus, quaternis plerumque foliolis mulcoruinoribus, binis tarjecti altematim lemper conerano ficu nafcennbus, obilcus, unde caliculus emergit unicum florem continens. magnum pro furpis proportione, calathiaur campanula; motio concavuni, longnm^ nquinqueangulosdcfinenrcm^ oii obcufts. quemadmodum pidura refer: fquam opcimca pidorcexpreffam fculpcorcorruptic) fed tuicrunaros, cum duabus utrimque, ubi laciniarfindi incipiunt, appendiculis, elegantiffimo & ni axinne vivi do ccm *lex* purpurx colore, pallido piftillo intus promtente, qui quinquequodammodo cofbs ex infima ipfios floris inceriefede produntibus fulatur: flo* Km lubfequirur longum & mucronnum vafculum, quod fde in duns jeqtiales partes aperiens, fenieioilciidirexiguuin, lliatum, terri colons; radix non admodum craillh, fla^efcentibus five pallidis aliquo E fibris donap, Sipro pagines ex lateribus producers.

Crefcit in **Soeberg** & Etcher abundantiffimum*, alijsque alpibus continurilic productis, perpetudque quafi niveobluis: ubi Junio & Julio, hoc est, primo mense Julii Tub hilt)

verofinem & Ausurtofcmen maturitate madipircitur : at nncioribus locis, uiquibus rarius invenni[Lir. a Eqncin liorcostranllaca, April! & Maio.

Illius meminit Gc fherus in de p M i o l i a n M i f t i J c t i , & : ^ i p p e r m i n i t & Traguscapede Gc[iana, ej Lisqucarcarpccics ell: dc(cribicctiam ilbm noller Lobelius inadverfarijs^ lingua flandricacxpreffa Stirpium **biftori5, tam<fi minus** tchicer de **lineata** icone.

S E x T A eciam verna, fingulari aflorgitcauliculo, **gracili**, aut fubpurpurafecentejaut viridi, in quo fena aut plurapaucior dvc foiola trinervia, bina fem per inter fc ex adverfo rpondcutiaicaliculutn fummofaftigtofcrt. equorios longus. in odoru Siexilic. cxtreinaparte in quinaveluti foiola dtvifus, ca: ruleicoloris adeoele & ancis **SCVtvidi**, uriplumceruleum, quod imitarur, proyocarvideacur: fingulx Rons plica: aut foiola, adlatus lineam candicanrcm h3 bent, & alia quitiamquam mucronatatiololaiiveapopliy (eslacinias Honsab invicctn fejungentes, pallcfcciuiaftaminuta medium florem occupant: flohbus fuccidiclongiufculitm vafculuramucronatum. cxile. durum jotundunifemcncontinens. Ex cadcmradice, quesc flavcf: ens & fibro (icftj & quod aramodo fiiminatcllurcrpargitur, plures alij plantukraflungunt: quarum nontiullajiticauliculum attolluntur, fefimilem floftulum proferunt, aliiduntaxat producunc folia humiftrata. & vlutt in orbem difpofita.

I w Cantabris & Pyrenxis Innc priimim obfcvabam, ad angulias illius perfofl monits, qucm Hifpauorum vulgus D. Adrianipottutn nuncupat, in iuo Maij florenrera: dcindo abunddprovncientem incc Ififfimis Sneberg, Snealben, Etcher, & Durrcnilcin jugifherbidofblo, ubi fublunij finc m florL-trat in roitoribus viciniscollibus & ficcioribus praxis, Maio, fem(?nque fubexremum Iuuium profeur. Minus hxc horcum fere potest, qulm fupcrior, & oranem culturani refpuere videtur.

Gentuna vi. Genciane J. minor verna.



VTRIQC Gentianell. T vernr nomen de- di, quod macunus reliquis floreant: 5; iilam quidem inajorem, hanc minorc mapp 5ltavi. ffatn Iofias Simlerus in Comntentario de Alpbis; hinc nomen nominare videtur, a colore, ni fallor, caelesti elegantissimo, nisi forte Vndecimam, qua: posteidcleribccur eo nomine intelligat. qux ceruko em colore przdi: a cft. Crelcit Sc m Rhcticis alijsq; Alpbis.

CETERVM omnes ilia: viva fe precenniradi- ce furit. hoc ell jrolato flore & (emine. inter- ire non lolent jfed vivaces funt, fingulifq; a finis ex eadem radice nova germina & caules producunt. Ac quarum mododefcriptionem dabimus, non fjnt durabiles. vcrum emarci- J dofl(jrc, difperfoque (emcl femine, ingrucre bru m iprorfus perire (ofcnr, & c deciduo tem me renafci, Earum auteplures fpecics ob- iervabamus, quas ugiuatum & tene quadam di/ponemus. initium am. ixiinafacienres.

CVBITALEM habec Primacaulcm, firmum, geniculacum, per quc mad imgulofii odos paffi func bina fc mperfolia, libi ex advrl boppofita, crincrvia j lacafcdc & fine pediculo iuli inhxrentia, feni > m que in longij mucronc in definen Eia iabimoferc-caulccxfoli Qit Jm alis nafcuntur dodrantes & palmates ramuli, tenues, minoribus folijs fepti, quinos, fepte- nos, aut plures riores. folijs cinctos proferentes n quinque mucronatas hernias di vsfos. exi- guos pro plantx imguitudiac purpurafcenis ex cxrulo coloris: iis (uccedunc l oga & an- gufta vafcula ccnut fcti lne plena: radix ilngularis cft jexigua p. iuci (firm is ribris pra-iitta.

Nafcitur in pratis herbifidique iocis ad moncium radices licis, montiumque chvis, Julio « Augufto flores proferens.

ALTERA fecunddm radicem mulra. longa, trinervia, humifufa, & in Qrbem difpofca, cTM(i a) j *Jibe[folia, equorum medio caulis ex crefcit pedalts, quajrangulus, ab imoad (iimmum in " ugiulis in cernodjjs, btnis ex adverfb nafcencibus ramulis prardirus, qin binis gc Jiiculism- T" i" c «- r^ epci, rcrnosaur. plures iingulifcrunc flores caiarhiaut campanuleferma. quarcogeneri :er^ parcs, in quinque ctiam lacinas divifb?, dilutori? ramen purpurei coloris, ilngu Jis la- cinijs infima interna parte purpurea lanugine pubefcens: fionbus fucced um longa cor- niculajexiliro tundo que fcmine prjedica: folucalem & ramubs in fingulis geniculis vc- itienria minora Scanguiflora fun^ magi Tque mucionata: radix cxilis eii, ex. albicante colo- repallefcens. rarique Hbris donata.

I rovenic ijTdem qmbus proximedefcripca locis. eodem etiam temfore floret. MWiffi lluus unicam firpcmlaftei coloris flore variantem inveniebamin ncmoroto quodam Vtrksm, monte apud Zolonockrii. D. dc Batthyan. anno M. rjxxcd. Sepcembrimenfe.

P A M ferme Tertiac! fcrccitalritudine, nec minus frequencibus ram is eft prrdita: cau- Omti***i- lis etiam quadaugulus, terni aut plures in iingulis ramis flores fuperiori fimiles, fed brevior. tes, ampliore fque, vircfcntisin] tiocoloris, dein Jc { ubc. rrulei: quibus longacorniculafeu ttiucronatamembrancea vafculafcinine plenaut in fupcnore fuccedunc: folia in fin^ ulis lodismulto !atiora, mucronata, trincrvia, ex adverfo inter (cilia, viri Jis facuti & quodam- modonigrifcanticoloris: radix fupenori fimilis.

Ob via lire ell in omnibus praus in f ubj im i fitis & montium } ug\ s, R ore rqu e fenus, Au- guffo videlicet.

Q V A R T A dodrantem non fuperat, cauliculis & ramulis exilibus, minoribus etiam fo- i Jis. Cftauri] minoris flori pene paribus: florfs minores habet, icet forma fuperionbus non f> " > Gfu. bSmiles, quia ut dilute purpurafcunt, auctxrulei coloriselegantiffimifunt. corniculafub- fl-ivoexili (emine plena (tint: radix licet tenuior. aduabus prxcedentibus non valde dirlert- Crcfcit jfdem quibus altera locis: memini & in Bntannia obfervare. non procul Doy- ^ imcnfe Septerabn. parcm dilutiore colorcflorentem. partim fcmine prxgnantcin. Eifi- niilis videtur quam Lobelius Gentiana: minimae nomine defenbit.

S E D Quintabngcxilior, vix trium uncia rualcitudineniarquar. licet mltis allsprx- dita: Alio UCentaurij minoris in fingulis geniculis. aliarum more ljcaliabet n Vesminoci f* J. f. Genti inc!!a: vcncc perlimiles vcnuffiffimocsrulocolorc prxditos: cornicula quaha fj- Perior. admodum exili & nigro femine plena; radicem quam in fuperionbus minorc m/cd "caucntionbus fibns donacam. Floret in Etfclierijugis Augufti inicio.

taforfi [ancft, quam Iofias Simlerus, urdixi. Commencanode Alpbis ^fmcl/tuis clap. Pell-«, quemadinodmn Octavam Jwttctfc & Jfi. Omnes vcfco impense amarariunt.



Gentiana
punctata.
Forsk.

Gentiana
xii. minima.

Natalis.

MINIME verò prætermittendum fuit elegantissimum Gentianæ genus, quod à me quidem in nullis jugis observatum, sed ejus iconem descriptionem C. V. Thomas Pennæus Londinensis medicus, pro nostrâ amicitia liberaliter communicabat, à punctatorum, quibus floribus punctatam Gentianam cognominant.

Caulem autem habet geniculatam, cubitalem, supra radicem aliquantulum rubentem, folia Gentianæ similia, ex intervallis bina, sed multo majora, pediculos rubentes habentia, superiora verò cauli sine pediculis adhaerent, eumque ferè amplectuntur: à medio præterea caulis superiorum cavus oriuntur flores pentaphylli, striati, utrinque tres, rarius bini, nisi circa summum caulem, quinque subæruleis constantes, nigricantibusque punctis elegantissimè notati (unde nomen) quinque staminibus, quorum apices lutei, præditi floribus succedunt vascula cum seminibus Gentianæ similia, sed minora: radix parva, multis fibris prædita, ex fusco lutca.

Provenit copiose in Bockemuto Suitensium monte, & floret Augusto. Amari gustus est, cui acrimonia quædam subtilis conjuncta.

ANNUIS sive biennialibus fugacibusque subjeci, quod ex radice conjecturam faciam (quantum quidem ex picturâ deprehendere licet) semine maturo planè perire, còque de caduo renasci: alioqui quinto loco reponenda fuisset, & forsitan etiam quarto.

LINUM SILVESTRE.

CAP. XVI.

MIRAM etiam in Lino silvestri conspici varietatem, satis ex meâ Hispanicarum Paternariam non intelligo, quæ aliquibus etiam hoc nomine appellatur, sed plantam floribus Lini similibus eodemque modo fugacibus, nonnumquam etiam Lini folia habentem. Nos singulorum generum historiam, concinniore qua poterimus serie, hoc capite dabimus.

PRIMUM ex eadem radice, quæ crassiuscula est & candicans, unicum, interdum plures profert caules, modò pedali, nonnumquam etiam majore altitudine assurgentes, crassos, firmos, hirsutos, superiore parte in plures ramulos divisos: folia quæ eos ambiunt reliquis generibus majora, venosa, hirsuta, minimum digitum lata, gummoso gustu, deinde amaricante: ramuli ab infimo ad summum floribus quinque folijs constantibus onusti omnium maximis, Malvæ vulgaris ferè æmulis, cærulei coloris aut vegetioris, aut dilutionis, cù quin-

Linum sil.
latifol.

que ia-

Liiium filveilre l.lanfolmm.

Linum fiivefteiin. latifohurn.



que intends fhminulisapiccm habentibus t quibusfiiceduntcapituladurajmucronara, qumque foliohs i! veapophylibus comprehend & quad mvoLuta,que maturitare hiant,fc- menq ue continet facivo lino fiinile,la[um,nigricans, fplendens: radix perennis est & vi- v.ix,(m^i]tsannisrcpuLlulans,caulicul6rqcetiamancehiemem proferens tcncllos,folijs multalanuginchirfutisonullos. Floret Iunio& Julio:fcraenmaturum Augufto.

FrequenscftinulcisPannonia: fuperioris& Auftris inferiorislociseditionbus&Cccip- ribus, gramineis tamerijucapud Pofbnum,Petroncllam,quEVctcrGm Carnunrurn cred- itur, Alcciiburgurj Danubio vicinum, item nonproculafilvaquaex Lcyteflorfad Enc- zcftorf, alongayalcc cognominatum , itcreft, turn etiamfupraMandcrftorfj Sipagum Lachn cum certio, qiiarto, quintoqccgenenbus,

Ttmpui. Ifatalt.

ALTERVM pedales,graciles,lanugmofos;trnosautquarernosabunaradiccpromitcau- les,inquibus Liiii latiu(cu]afo]i.i,crincrvia,adA/cyri formamferca(jcedcnria,ncc multum ^Pnonsfj[i]sdifercpintia,Eiiiuginofa:extremicau]if:u]iitibtnosat]t cernosramulosdivi- fi.&Hchotropij majorisquodammodoinftarcircumflex!, plenifunt flonbusquiabimo aprinincipiunt.Lini Korumdivifura.fedmajonbuSjruperiorisquallLbus, candidis, quos mulue purpureae *venx* interfcind <iv (eracn Sc capkula Lini familia:radix perenms est, cra- furcula.longt.caadicatis.raris fibris fepca.

Linum la- iijoi.n..

Apud Colibriara Lufitanixurbem, vulgoCoyrabradid>am,cc]cbriacadcmiiclaram, cam (lirpeindimraxatobtvarememtni, addefcrtumquoddam &c foli tan um tern plum, nicnfeNovembnrcpullulanccin.&inLliusannicauliculisfimencolccium in Belgicam **ataili.quocnafcommiflbfj** unteanobisplantanatacdecubitalcmexcedciis alticudnicm, &Jatioribusquamnatak(blofolijs,qiia: fingulisa[inisfubillatisfineni quidcmrl<ruit,fed nullum fenicLi **prxboit.**

Natali.

MVLTVS exun3CtiamradiceTerriumferrcaules,primogciierifercfimiles,p!crutnqc tatncnbreviores,Hypericononvaldc difTimiles,a]iquantu]umrubentcs,hrnios,nMjufcu- l>folijs,lati]j(cu]i(c);&crafriufciilis,priori fere paribus,nonliir(utistamen, fed durionbuj ftpcos.perquamamanfaporis^orcsinfunimiscaultbuscopiofosjmagnos.quinquectiatn foli]sconfantes,pcreleganttsrlavicolori<;,quLnqieftaminibusemediopiorumpenEibus &cotidemgracilioribtsbrevioribufqivi]lis;femeninco[i]preirior]buscapitulispaul6mi- nilsreliquis.nigricansquidcm,fednonfplciidens'utillorum; radix fariscraf]a,coniorta al- bicans,a!iquocfibrisdoti.ica,rtn^;u]i<ianr)i'STcpulluiatis,f)Ov6fquecau]csprQducens.

Vnumfit.t*-

Extabuadc in monre Badenlibus A i b d m m i n c i l o c i d i ^ccundam Natali.

(opes,

icpes, & plerifque alijs in montium illa ferie ad Danubium ufque excurrunt, locis: ad iit-Tulam item, Lachn f ago vicinam, cum aliquot alijs generibus. Floret *de femcti* prefers cum Primo.

Linum filvestre nigrum, angustifolium. i.

Linum filvestre v. angustifolium. ii.



Linum filvestre nigrum, angustifolium.

COMPLVR. EE. f. jnc. Quattro cauliculis ceteris firmis, adalibus longitudini. S. J. Viides. ff. c. q. t. c. n. ribus foliis. Lini farvi f. h. n. i. l. i. b. u. s. , ex viridibus x. r. u. l. p. i. s. o. n. u. f. t. i. , (ummo f. a. J. r. i. g. i. o. i. n. a. l. i. q. u. o. C. ramulos divisi. q. i. i. b. u. s. i. n. f. u. i. e. n. t. f. l. o. r. e. s. i. n. t. e. n. s. e. C. 3. e. r. u. l. c. i. , q. u. i. n. q. u. e. f. o. l. i. o. l. i. s. c. o. n. f. v. a. n. t. e. s. , l. a. t. i. v. i. l. i. n. i. floribus similimi, quinquen medio f. a. [n. i. n. i. l. i. j.] t. o. c. i. d. m. q. u. e. a. p. i. c. e. s. f. e. p. a. r. a. t. o. s. c. o. n. t. i. n. e. n. t. e. s. ; f. e. m. e. n. m. c. a. p. i. m. l. s. c. r. a. f. r. j. o. t. i. b. u. s. r. o. t. u. n. d. i. s. l. i. n. o. f. a. t. i. v. o. n. o. n. n. i. o. n. b. u. S. j. n. i. g. r. u. m. , o. b. l. o. n. g. u. m. , p. l. a. n. u. m. , f. a. t. i. v. i. l. e. m. i. n. i. f. e. r. c. p. a. r. : r. a. d. i. x. c. a. n. d. i. c. a. n. s. e. f. t. , p. e. r. c. e. n. n. i. s. , a. l. i. q. u. a. n. t. u. l. u. m. f. i. b. r. o. f. a. (d. t. f. i. d. c. r. a. b. a. m. i. n. i. c. o. n. c. r. a. j. o. r. e. m. p. i. & o. r. i. s. d. i. l. j. e. n. t. i. a. m.) a. m. a. n. u. f. c. u. l. i. g. u. f. t. u. s. , d. e. i. n. d. e. f. u. a. v. i. s. a. c. r. i. m. o. n. e. p. a. r. o. s. s. p. o. s.

Natalis.

Varijs circa Viennam Auftriacis / ponertaficitur, priferrimin gramineis acc. Jivitatibus. & juxta vias. Floret Maio & c. lunio, in cruda ctiam iota seflare: **temcn** vero roacurura est fulio*.

tr. n. (tij. angustifol.

Do DRANTALES^ on miroquam ctiam pedales habet. Quincum genus, cauliculos, graciles, firmos. rec. TroS; folia fan vilinij angulioraj duraj imcronara, virentia, amaricanna: Bolesinium mt. Scauliculis mu. Uos, magnos, quinq. folijs salbis prsditos, circa umbilicum quinc. purp. lineis diftinctos, totidem ftaminibus, Si quinq. fparacis apicibus medioumbilico prodeuntibus, odotatos: f. meninrotundis vafculis planum, nigricans, r. p.] c. n. d. e. n. s. , f. a. n. ' v. o. J. i. n. o. f. i. m. i. l. c. : r. a. d. i. c. e. m. c. a. n. d. i. c. a. n. t. e. m. , d. u. r. a. m. , a. l. i. q. u. o. t. f. i. b. n. s. d. o. n. a. t. a. m. , p. r. e. n. n. e. m. , & f. i. n. g. u. l. i. s. a. n. n. i. s. n. o. v. o. s. c. a. u. l. i. c. u. l. o. s. p. r. o. f. e. r. e. n. t. e. m. .

Natalis.

Magnopiala citurto Viennen (iagro, pk'nlque alijs Auftriacj & l'annonix editionibus locis, arque feci indum publicas vias^ ciam apud Lachn cum aliquo cfuperion bus genibus. Floret funio: /emen perficit lulio & Augufio.

Varietas.

In Auftriacis alpibus prxfertmi vcr6 Sncberg, aliud genus in vcnitur huicoranino fimilicauliculis rura & folioru ingracilitate^ enuitate^ oru mqiic forma & radicii in florum dufltaxa colore cft differentiaj quini vcinon funr, (cd cacru Je incandidum languerences, & quaficineracci: capicula ctiam ftoribus fuccedentialongeamplora, nec minora quam in farivo. Florbat vero i ilic Tubfinem Iunij, f. men ex rremo lulio & Augulro maturum.

Linum filvestre nigrum, angustifolium.

SEXTO, bins aucterna: Tunt virgulx dodra. ntales. fitmsE, licec valde gcaciles, quas foliola Jino multo angustiora & minora ambiont: fatilnais virgulis terni auc quaterni, nonnumquam plures infidem flores (upriori forma, Si colore (tic fi miles, fevi roinoics, fativi Lmi florem

Lorem non nrnku m exc edentes: qn ibus luccedu nt capitula & feracn lini, fed m ino ra, ra-
dix exilis, candicans, perennistamen.

Pntntim mihi hocgenusobfervatum in anteriore Madricianatfilva: pane, quE fecundo
b mbe Luetia lapide diftat, inter gramina loco aperco, & nu His arbonbusob(Ico, florens
Iulio, maturum tcrncn proferens Augufto: deinde agro Vjennenij andionbus grami-
neislocis.

FRVT 1 coSVM eftSeptimumgenus, atquedodranta!ibuspedajibufquefermcramulis
fenjpervirentibusprsditumeftjqnosnumerofafoliacxornantjmediEincerthymi&pfyl-
Jij rnagnitudinisj abalbida^flores deinde (upenoti paulo majores^uinque folijs ut ilu con-
antes.omnitionivcijiimmisramulisinfident, qui bus fuccedunt capitula femine plena;
adix dura & lignolii eft.

*Linum fl.
vii. f. utiq;
Juss.*

Exitdefertisqu[bufdamHiTpania*Iocis,foleiIluftratJs:floretIunio&Iulio,atquefubin-
h ftmen prafert. InBelgio (atum, tcmo dunraxat a fatii anno fertusfloruit, necfe-
#l en tut it.

JNatalis.

Omnium porro in Hifpanijs, Gallfi, Auftria Sc Pannonia obfervatoru m non modo fe-
Uninaadferrebain.autil" V.Ioan.dcBrancion, ipfiq; & reliqujs in Belgicaamicisanno
^a.D.Lxxmi. A u I true oru m 8; Pannonicorum m i ttc bam: fed ficcasetiam ftirpes cum ali-
quoralijselcgantibus&iuisfloribusonufi!s,pcrferendascurabam, utillarumformamfta-
tim vidcre po(7cr, nequexpdarc cogretur, donec feminc nafcerctur; inccrcus enim ad-
modumefipiurimarum (tjrpiumefationeprovencus: illeinfuperadmodum valetudina-
nuserar, fie, utfubfequensFcbuarius ilium nobisruaximocumnoftrodoloicabftuletit.
Ex ilhs aurcm quxdam icones imitate fuere, non e plantisc Gallia Narboncnfi pccitis.

Linumfilveftrevin.Clnmxlinum.



E x 1 L i, rocundo, dodrantab'que autpaulo
majore afflucgit O&avum cauliculo, quem ad-
veribfitu^cinHyperico. binalcmperample-
ftunturfoliola, Lini fativi folijs fere paria: in-
premuscauliculus in aliquot ramulos dividi-
turqui in oblongispediculisexiguosflofculos
qujnqufoliolisalbiconftantesproferuncju-
tcisintusftarainulis: flofculis fuccduntpar-
va capitula, lini vafculis non abfiroilia, minora
tamen, in quibus femine: radix tenuis, aliquoc
cxi li b us fi b ris donaca eit, led an pciennis SC re-
diviva.ignom.

*Linum j.
Jf. pludm.*

provenit in herbods collibus & montanis
Auftria:atquePannonix:florec Iunio,& Iulio.

Natalis.

Similemaltquando adnos Machliniam, d
Tornaccnfi urbe, toannetn Moutonum do-
itilTitnum & diligcciffimum Pharmacopzum
miccerememini.

P K i o R. A rria genera Lini tilvefttris latifolij
nomine appellare li^ebic: reliqua mihi
crunc Linum (llveftre anguftifolium five te-
nuifoliutn: O^avum ^affj^u^ivav nuncupa-
tipotcrit.

Nomina.

LINARIA ODORAIA.

CAP. XVII.

SINGVLARI hxc eft caule, c^quonon-
Numquam cubitali, in aliquot tenuesra-
mulos fuperiorepartedivifo. quosoblongafolia Lini inftarfe-
pant: quxtamen juxtaram-
dicem funiliumilparfa. loogemajoralatioraque, Bellidisfolijsfimi-
iia, fedperambitimi
ferraca, pleraqueetiamprcaulemfparraaltuujinGifa: flosexiguus, copiofus, caTrul<us, la-
vendljEpxnefloribusconcolor^liquanrulumodoratus^xcrctnpartchamultinodoin-
curvus (quempiaoraonfarisexaaexpteffic) virgulas feu ramulos (picacitn obfidct, ijs
fucceduntvalvularLinarixfimiks. fedminoies, fcmepufilhun. rufiimcontinences. Ka-
dice eft Gngalari candicanc. t. ninimi interdum digiri etaffitdmem zqtiamc.

*Linaria ofa.
Faisa.*

SponteprovenimontofisCaftellaclocislapidolo& ando folo, ubi Apnli florentem, **Sttiit.**
Maio Iunioquefemenproferentem legcbam. Inpelgicafata, lumoIuhoqueflorebac, fe-
men Augufto matuieiebat: raro fupraannuum fpauumadlervabatu^fcd prolatofloresc
femineplcrmuqueperire fotebat.

Linaria odorata.

Linaria



Linaria hispanica vulgaris.

Linaria hispanica L.

Linaria Hispanica L.

Natalis

Linaria hispanica L.



Natalis

Linaria hispanica L.

L r N A R. i A M odoratam quidam vacant, quia ejus flos Linariae purpurea: florem nonnihil xmulacur: iscalidiscrgionibusaliquant u IU m odoratus efl.in Belgici s hort is natf flos inodorus. SefamoidesmajusSalmanriceniibusctiamdicebaturjCimperindeejus description! conveniac, atquciilorumSdamoides aiucdefcriptum.

Nullascjus facilitates explotatashabeo; I; i guftaca, amaritudjnis particcps effc dcpreoeadinif

LIHARIA HISPANICA,
CAP. XVII I.

PR ^ T E R vulgarem & jam defcriptam Linariam, vanaaiiaej us genera in Hifpaniisnafcuittur:quorum omnium (qucqm detn anobisvelifticiurKO bfervata, vel icm ine inde miffb alibi nata nobis conTpcflafunt) hifforiam hoccapite crademus.

PH I M V M genusmultouberiusSicraffiuseftvulgarijternosquaternosquecaulesafana radkc prwferens fingukres, pedalcis, intctum ampliores. quosambiutitCeniaurijminoris folia, infima parte juxta terram plci uniternoord ine dsfopita, fupcma vetti, temerenulloquc fervatoordineparfa :cxtrenn rami lutorum florum vcluti ^picaoccupantur Lmarixvulgari fimiliuin, quibiis camcn iiAus lanuginafus eft, cauda five caicarpurpurafecntis celoris: lioslcquunaircnpitulacxiguis oculis iimilia, Jcmcn viderc miu non conrigitradicc est fingutan jalba^quan Uicme perire puto.

Circa Valentiam Hifpanis in pratis & loctis umbrofis, Marcio florcrem obfccvabam. dur. i ex caurbe ad litcusinanntim, cornice D. Ioanne Plafadcambuhtum prodijflem.

T E N V I B V S, frequentibusqueexeadem radicearturgit cautirulisAlccrumclcgansgenus, ijsqLicimbecLlibus & plcrumque proquinbeEUibus^uosvcftLLufrequicnria. tenuiaque admodu & molhafohola, aruginici quodam modo colons- Tum mis ramulis^cauliculis infidencaliquot flores, Linarii vulgiti forma fimiles, fcd pau!6 minores, elegantes, coloris ex purpura fere nigficancis, tuca nftum flavcfcentes, tenui odore pra:di[i:loribus fiicedLint rocundacapituia, cineraceum planunjqque femcn contineiuia: radix Candida eft, tenuibusquibuldam fibris & quadvilhsdonara, quam Vienn^femeni ihinaram (ublequen* Inems femper corrupic. Tota planta tenciU eft, floret a*fhce, femcn Augufto matunratem confbquitun incrdum etiatn diuriu flnrct.

Spoace nafceem hanc Lmariam in Hifpanijsno obfervavi: fed femine inde niiniTo apud BeJgasnacaqoibufdamaraicis, qni nobis illuti cotnmunicaruntj quo mihi plantx aliquones Vienna; nati.

S S M I N E ex Hifpaniamiflb natumctiam Tertium genus j cuimuJci eracilcspedal^{es} l^{uccau} l^{es} a^r radice pioveniunt, hosficquenna ambiunt

ambiuntfoliajanguffajlonga.exviridi canefcentia.ejujferccolorisqui in lavendute folijs confpicuuscfl: amariatem laporis: circa **fumum** caulcin mulci naOtSrurflors **utcam*** que o lorari,spice in modurnconferti/ormaaluperioriiiniles.quorurnlubreiiijm bifidum foliolium externi partexalbidicolorisefljinternapurpurci, n&usdcindca^Muno^i^wc albicansis ex flavocolorisjiirluro & purpurco labro, propendctibus tribus latiuifi-ulis pur- P^{ur}i(cenrtbusbarbulis: flori fuccedimvarcuUjfed plerumque mania, praefmim Franco- furti, ubi primum fljrcncem videcbamin liorto Ioannis Mullen phamiacopari, cm Icriicd conimmiacaveram. Floretzftate: vivaxeft&radiccfingulisannisnovosprofertcaules.

M/UTOS infra los,grjciles fundit Qtiarcumcciam genuscauliculoy,quos ambiuntfre- Linaria h-
Pant. 111. quentia.carnofa.tenuiajcnolliaquefoliolajcincracciqoodammodocolorii: extremis can- J'icuiis infidcr aliquoc floies fupcrioribus minores, colons errula dilutiorisad cincraccum plendentts,quoruin3usflAVLis:illosfcqiiunturvafi.ula,maturirarelnancia&:cincraceum planumcsiguum (cmericontinentia: ratiixalbj,tenuibusvillispridita, amiaua.

Hoc mihi primumvidercontigitanno M.D.xc.incultiflimoliorto 111^m PncipisCat- Natalis. torutn Wilhclini: femine percgrc miffb natum Caffellis Augufto mense fuo flore onufum, *f maturum femine in vafculis continens. Scmine inde accepto mihi nata fequence anno, > t a ,facc & autu m no floru i 18c macu ru m femenuit.

Linariahilpmicav.



PALMARJBVS cmQuinrum genus virgu- r. m. aria h- lis, frequentibus, liumifparfis, quasveftiunt ***11.Y. foliavulgan'sfolijs familia: exrcmos.ramulos occupantmulti floresilivi, vulgari minores, velutiin (picam congcti, quibus fucccdiuc capitulaminoraquam in vulgari, exiguo (c- minenigroplena! iadixtenuiseft&:Candida, vulgaris modo ferpens.

Salmanticensiagro, aridis locis hoc genus Natalis. pumilum invenicbam, ubi tora fere a-llate tioret.

Liuaris nomen primo generi indidi, nonafoliorum fimilitudine, qua: non convc- niunt, led quiaejusflores vulgari forma fimU les.&ejufdemfermetemperamentiint.Jiani commaducatanifestam acrimoniam cum quadamamaritudme conjunftam exerit ipia planta . Poftrama etiam valde amara eft, & ticmin». quia plerumque cum Chamspitynafcensrepenaiiir,adc6quepumilafit, Salmaitucnicis Chamspityos gctius effe cenfcbanc.

LIVARIA JANNOKICA ET VI-
CINARVM RECTONVM.

CAP. XIX.

A LIQ ^ O T ctiam habent Pannoniat SC vicina: regioneSjLinariadifferctiaspra- tertulgo notam, & omnibus fere provinces familiarcm)quasinalijsameperagransregionibusobfervarc non memini.

BICVBITALI intcnlum excrefcit Pri- Linaria PAN-
L. major. mamagnitudinc, refumtrenscaulcm, Ix-

Vcm.vindcfljntultis folijs fativo lino CmilibnsiFcumfeptum,quifijpcriorepartcmmuU tos tenues brevesque ramulos divifus eft , ferentes raros flores, Linarix quidem i-tilgaris fioribusrefpondentes, fed minores&:pallidiores, riclunormihilvillofb&aurco: femea in vafculisLinarivulgarifimilibusexile,nigrum: radixlongiufcula, candicans, **molds** tenuibus & maufculis fibris in larcaexpands nixa, perennis, fummocapircfingulis annis novos caules profert quidem: fed ex lateralibus fibris non germina: ut vutgans. To- ^{ta} amariufculact.

Crefcitinmontiumdcclivibusfecunddmpublicasvias, &gramine nudis locis, fupra Natalis. /onium adDanubium.Gumpoftkirchen.Leytenberg.atquectiam in Moravia. Floret nio&Iulicsinterdum ctiam Augufto,&fubindcfemcnprofert.

LOMGB miooribusvirgiscftWctra,viridibus.gucilibuj, <iuaajabiuntfrequentiafo.x;>-fMri.

LK>1A.:C-MMtkK

LinariaiiUiMoravica n.



tem&capitulumrudmientadunr.a*atprf-
bentem in Moravia: collibus invnieba cum
Secunda,anno M. D. XXCV: radix multis fibris
larefparfisconfhr.&prennemefleapparec

H A R V M nullum vulgarcnooen intelli-
gercpotui, non incommode rameneadcm
appellationcnuncupariipotetunt, quavulga-
us & ubique nota Linaria. Eam Germamcx
th zozoma mulieru. x # Item haec dicitur
hoc est. D. Virginis linmn. Vngariautcmr^
/>jiclcft, filvctre linum.

LIHARIA CRETICA,
CAP. XX.

CEMINE Creti accepto, nara fune duo
*Jalia Linaria; genera non inelcgatia: unum
quidem latifoliumijFracofurti in horto Ioan-
nisMullcripliarmacopKi: atterum tenuifo-
lijum, Lugduniapud Baravos in horro Ioan-
nisHogelandi: ucriufquehifloriam hoccapi-
tedefnibemus.

H A B E T autem Primutn genus.five Latifo-
lium, cubitaletn autampliorem cauletn, ro-
tundum.firraum.craiTiufeulumjinrimapartc
fubrubicetn, fuperniviridem,& in mukos
ramosdivifum;quemambiut,moddbina,in-
terdumrcmifoLia,adverfis inter io petiolis
ordincna(ccncia,a]iquandoincoi]dira,&nul-
lumordtncnifervantia, lactora qu3in inullo
genereLinarixividerim, ucquaruncialcm
laticudinem interdum habeant,canc(cetia,gu-

ftu.finundantur.imarLiifculorrumurncaulif.iltigiuni.extremiquerami, frequentibus
fiinbuiatiſoJorjEislunconutli.Linaria; vulgans don forma fimilibas,fedcoloris,fi]per-
nap.irce, live bi K J.i gula.&iplisciam barbuis^allcfcctiSjitifrariflumfqui lanuginp-
bu(cLCjaurci,ca!cariabo,in[cidum[itbcs:ruleo vetctianipurpureo:floribusfuccduntvi-
fcula.uc in alijs LinatiEgencribus.nigrum iemencontiiientia: radix digitalis longitudinis,
alba, dura, tenmbus aliquot fil^cincta, fummaparte, ex qua videlicet caules exohunturj
exEuberat,dcindegracilefcit.

Flortbac (ub finen) Lam: gj lul o,remcn maturumfuit Augufto.

ALTEKVM enus ve enui T uq, virgas pie qpro:ert ex una radice fatis copioſas, ro-
rundas, lzves, ſelquipedalis vel pedalis longitudinis, quos binis, aut ad ſummum ternis in-
tervalis, quaterna fimi]am:]in]folia, i]!gar]sLinanxfo]iisduploa]igi]iftiora, dcindcal!a

iingahria nuUofervatoordinc-virgts in nafcuntur frequences ramtllifolijsvaldetenuibus
donati.qm veluc ex urn belli cicigua (cujus forma paulatimevanefcit) Sores protrudic val-
dcxiles, quiqt]inquefolioli<;confhrc videncur,binis videlicetercft'S fupracalltdmalbi-
cantem vel emcraccam.bmis lacera occupantibus.Si uno propendenrc,cauda infuper, five
cilcari fubillisconrpicuo.antreirfumRBexo: femeninpericarpiis, feu valculisLinofcie
f i m i l i b u s c i t i e r a c c u m & p l a n u m , q u o d , d e c i d u o f l o r e j b r e v i m a c u r t k i t , e t i a i n h b
huc virenie. Florebac (ub fincra Iulij.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ τΙΝΕ FOLIO.

CAP. XXI.

L I N t foliorumfimilicudofacit, uclianc&alicjuotfubfequentes, Linarijsfubjungam:
tametfi quo nomine iflamappellaredcbcam.incertusadhuc Cm. Maluiigiturft^tv
recc qui^n nomine noufetsapto do Gareu LL Uſtamendecripcion em negligere
liti, quandoquidem anemine, quod (etiam, ante hicobrevatam exillimcm.

Pedales habet ramulos,duros,ex vindi pallefcenres, K in hismultafolia temere fpzch,
"ullGqueordinedifpofita.dura.angijfta.longiulciiLi, Imifoliorumajmula, ejufdemcum
ra' nulis colons, aut qualis i n ruta monranacluccT, hoc cftex viridi p.ille(cente,guflu non-
Uihilacidoprimitim, dcindcamaricate: extreini can lieu Ji in mulros ramulos Cive pedicel-
^Siiivtduncur,quiHo(cu]ofaibtcaitcsfiiftiiK-nt,qdinquit;foliolisfd!a]imdcuflatis,i.on-
lites,cum a liquoc inccrionbus thminulisj qui undcin in fingularia feminaerTormantur

pentagona,

Ananytnos Lim folio.

Natur.

Ananytnos
diaphan.

Polygala
vulgaris
varia.



Polygala vulgaris major i,

Polygala
vulgaris
major i.



Natur.

pentagons', duro corio five putamine mediil- lam aioam continentia.- radix candidas, mul- tirida, perennis 6c vivax, annnatim novos rani iilos live virgulasproducens:nonnunquaai etiam lepens Linaria: repentis inftar.

Copiosnafcirutconditionbusherbosifisqilo- cisagti Vienncnfis;tumcciamherbo/isco]li- bus Pofonio vicinis, in accli vitace Ham bur- genfis montisquaAltenburgum rpeffatjalijf- (jue prarterta plurimis Aullria? &c Pannonii montibus, etiam interamnis ultra Dravum. Floret MaiG.Mcmini& Madrinana iilva,fc- cundoab urbt Lutetiamiliarijcum Lino fil- vefirijHyacinthoque autumnali minoic col- iigererieillongexiliorem.

Quid fi cum Sefarnoide affinitaccm ali- quam habere deprchendatui?

POLV.G.UA VVLGARIS.

CAP. XXI I.

POLV.GALJE appellationem apud pl- rofque Recciorum etiam obcinuit plan- tula qua-dam (valdc tamendiflimilis iili d- quapnore libto inter fuiTrutices) ubique t- iuliccionbuspratisobvia, folijsliniaurbyf (bpi vulgaris,quxvelcxruJcotlore, ve\ pur- pureodiluciore,vdrube)lo,aiinterdu etiam albo variare confpicitur. GefietLtsincpiito- lis Amareliain ab atnavitudinc nuncupavit, T- a&us Dio feorid is TIOAHIOASV Sc-j.Aat/*« cilc

exiflimat De ea,cum a recentionibus, p- ttm aTrago dcfcrita-fit,vLilg6qyc fans nor.i, nihil liicagernus: led dc aliocjuscnc.rcm-i- jorc&elcganciflimo, quod inAuftri4&fu- periore Pannonia obiervabam,caniedi &vut- giris, totflorumcoloribus difcreta, pailmi tiam in ijfdca Provinces nafcatur.

Exeadcminterdomradiceprodeuntquin- qac am fex virgulredtiriufcol^, pedales, gra- ciles, lenta*& obfequiofe, folijs nullci dilijofitisobficac^nguftiSjHorisTindoij Vulgaris HyfTopi arj^ullifolij &C minoris.quoil ab Hifpanis Tfopiffc vocatur^ foliorumattuU' lis:floresconferti & fpicatim nafcentes, fum- masvirgulasocnpat, fumitem floribus non nmltiiLiabiirailes.loiigiorefcimen, Stdilii- tiortspurpleicolorts elegantiffimi, five dilu- tion; rubore pullicirraonitntci: lris (uc- cedunt penduli loculiptani, Burfx paftons valvulis fere Smiles, quos mcbranacca qu* dam velutial5inrcgunc,feminabinapierum- que continentcs.nigricantia, hifruta,longiul- cula,qua:aperienfibufefead lateramaturi' tace burfulisjddciduntiradixcra/liufcula.brc- visjdura, lignofa, vivax, aliquot nbrisonaw cft:& cota planta amaric^t.

Frcquenscft admodum in Ley ten berg fu- pra Mandcrdorf, circa Medeling, totaquil- Ja montium fene , qua: a Calcmbcrg Danu- bio fupra Vicnnam imminenti, ad Auftrias ufquaipesexcurric. Nufquam non occurric fiiniiterpcr Pannorjiani,ctuai inrcranem, ultra

Tolygala vulg. majoi II.

ultra Dravum flumen, Floret Maio & Junio. Aliquociens iliam ob florum venustatem in hortum tranfluli, & acurare volui: fed operam lufi-

Variat etiam quibusdam umbrosis & liumidionibus locis, floris colore aut caeruleo, aur. albo, non fecus ac minor vulgari Sj & perinde aflurgit ut modo defcripta, fed minus venusta precedente.

Tolygala vulgaris major



Osyris austriaca.

OSYRIS AVSTRIACA

CAP. XXIII.

CUBITALIBVS, auc ampltoribus interdum, affligit ex unaradicis virgibus, gracilibus, duris, nigricantibus, lencis, & fratribus contumacibus: quas nan quitia aut leni (ut Diofcorides lux tribuic) kd numerola ambiunc foliola, longitifcula, angufta, lino iimiliadura, mui ronata, faturavtriditatnientia, amari gustus extrema; virgas in multos cneus ramulos definitiu, quibus infident fingularia folio {acapitula, florem luccum, ex multis tofculis qumqueradiolis decufTitis, fliloquin medio prominente confanribus compatitu m, ampleaencia; deinde femnigricans, longitifculum, qualcferein Hieraciorum gencnibus, fuperné villofum pappi infVar, quod Icviffimovencocxculn, ejus arbitrio fertur: radix duract, ligno (a, nigra, aliquoc fibris donata, Gngu]is annis gera) inans, novásque virgas profertens.

Ex icon procul Phafianorum horto circiter miliarc infra Viennam, edtcioie quodam & ficcioie pratocum Linii ilvefris gneribus, Cy:ifo pritao, & alijs ftirpibus, fed humilior: iccunduro vero fcpesatque inter ftucices, major & uberior. Invcniebam multis item Parionis locis, etiam Iiucramnis fupra Dravum flumen. Floret Augufto ifemen maturum eft Sc ptembri-

Natalis.

VIENNENSES Ofyridem appellabant. Sed an cum Diofcoridis Ofyride convniat, alijs dijudicandum relinquo. Tragus, apud quem heino excoplari perbellc depidacil, Linariam tertid facie, & Intrauta forma, fl^ofo dfti Wtmni a floribus nu ncu pac, atque ad Diofcoridis Heliochryfum refert. N6nulli Chry^ocomen Diorcondis, & Curyfitin Ariftotelis eflc arbitrantur.

Nemita.



ELICHRYSON. CAP. XXIII

PEDALIS, nonnumquam cubitalis altitudinis eft planta Elichryfon, fruticofa, & in multas atas fubinde divifa: ei numero fa folia, Abrotono familia, candicantia, & cum gravitate odorata: flores in fummis ramis umbellatim coiigefti, lutci, Agerati floribus forma Sc odore perfimilcs, verum majuculirradix dura, lignefa, minimi digiti interdum cralfitudinem rruans, qua: fingulis caraen annis perit, nec vivax eft,

Elichryfon.

EJichryfbn.

Natalis.

Namina.

Facilitas.

Chryfocome.



Chryfocome i.vujgarir.

Chryfocome
alio a peregrina.

k

Natalis.

Chryfocome
Hrl 1* pert.
grana 11.

Natalis.



vctufis muris, pcr Lufitaniam, Beticarn, Granaccnfc regnum, in quo Martio, Valentino autcm,

Larto fbloproveni^&coprosccirca.Madri-
numitiiircComplurci)(i,alij.squcHilp<irjil
locis, in agris, ubiSept embri & Oqab rttttf-
rente m vide bam.

O IOSCORIDES IA/^pw'of, nonnullif, f
refe rente, prpuffavS-ftw, x'j dftapctpS
lane. Tlieopirafus iKitoypuvav, qucr
eftPliriiiis, Ga2a Aurcham verm. Hispam
yt)(ij«Ffd/ffwJjitle(t,Sct)pam foccidam abtjus
ufu & odoris gravitate nuncuparunt.

Vcnim cum totaliseplama fitamara, f; icipi-
Iceas facilitates obcincbitjqwas illi veteres tri-
butmt. HdpanisaDtcmnulloctfin ulu, nili
quodMadrinanoagromundatoriasfcopasad
aedespurgandasexcafaciunr : & quibnflam
alijs locis, illi in fa'ciculos congella 8i colltga-
ti, fQtmaccos, ut Plintano vei Soutar, pancces
(quos Hifpani upiatvocatit) integunt adver*
(us iinbrium injuriam.

CHUYSOCOME ALTERA.

CAP. XXV.

PER. ChryfocomenirndHgOjquam vulgus
Stechadem cirrtnaappcliat, muicisl'ri>-
vincijscommunem. Decaautcin hofcapicc
non lumacturus (aplcnfq. ctiimdivcrfisno-
mimbus eft defcripta] licet iconem oculi*
fubijeidendamopcrx'precium cfleduxerim, ut
quam firpcm inte+iigam, Lctl: orcsagno[cant:
feddcalijsquibuldam, quas vel in Hifpanij*
aliquando obfervarc memini, vel prius enain
in Gallia Narbonenfi, turn quam It: mine pe-
icgrecepto natam babui.

CVBITALES pterumque liabcc Pirrtavit'
gas. quando adolevir, gracils. incanas. & veluti
tomento quodam obfitas, quas incondica (c-
rieditpoGtaambiunt folia, longajgraciliajLi-
banotidiscoronarixfolijs (]milia, vclijsciam
aoguftiora, fupcmc nonnihl virentia, inferne
incana, ex quorum iinunafcunturromentoii
ramuli niinonbusfolijsprarditi : perfumms
viro virgasrariorafparia funt folia, quaruro
faftigijs multi infident (quamati flores, vulga-
risCliryfocomes fohjsminorcs. aurct vclflaiii
colons, qui marcefcentes fucum eolorem
conrrabunt, & femexileconcinenr. pappo
involutum nadix lignofa, dura, in aliquot ra-
mos diviia. Cum quadam non tnuavi grave-
olentiaodoratadt. guftuquccalidiufculo.

Salmanticenli agro frequens eft f memini
& Mompelliano viderc) ubitota3rftatcfub-
inde novos floresproducit. toraquc hie meco-
mam retiDet, utetiam in Bctgicam tranflaca-

PBDALIBVS, interdumctiamcubuali-
busaffurgit i^rf/«rjramis, candicannbus5C
Januginotis, quos Olcarfirmiliaiolia, longa*
moilia. canalanugine tcfia per intercvallaam-
bmnnorcsautcmexrcmisramulispallentes,
fquamofi, lit Agrati fere, infident: radices
funt nigricantes.

Abundenalcituran'dislonSjatquectiam in



Chrylocome altera.



Gnaphalium Americanum.



aucem.circa Aprilis initium florontemcon-
fpiciebam. Odorata eti^m hxc ell, & adtn-
aionis cujufdam particcps.

IISEM locis obtvabar-iTertium quod-
dam genus magispumilu, utquoddodran-
talem altitudinem non excederet.cui cauli-
culi cran t teretes, i ncani, fogis & angu ftis fo-
liolis, Prim* peregrine non valdedi(Timili-
bus ,& inconditoetiam ordine nalccnbus,
oblecpn , lumma parcc in aliquot tenuesra-
mulosdivifi, quibus infidcbacfungulaha, in-
terdu binaautcrnafimulconjiecta capitu-
Jafquamata, fufcicoloris, viliorosflokulos
pallid os coci nenres. Huic inbircntem con-
Ipicibamcufcucauiillam vulgodidam,te-
nuLITimiscirhiscam amplctienrem.

CHRTSOCOMESgeneraeffe,nemo,utopi-
nor.inficiabitur.Pnoris nullumvulgare no-
men intcllexi-. Alccia Murriani M,ir,c^i//a,
non]incChama:mcloc6niuni appclbbant,
Hifpale/es Romtto marina,li.e. Ltbanotidcm
coronariam maritimam , Mauhtani urbi*
Granatcnfis mco^x,fjii\$fcacij».

BvtTicirefercbant.Seci]dxpregrinacde-
coQu iTiinfiL-tol] doloribus prodefle ; qui-
bus facultanbus Primam eiiam cfle-pra:di-
tani.verifnri'leeft.

CETERVM Secudar peregrins non valde
diuimilis planta leminc ex Irahā mflb, fed
primū Creta allaco nata, fingularcs nonnun-
quam pUires emictens ex radice virgulas, te-
reres.fefquipcdalcSjaucubitalcs, mcana la-
nuginc Sc veluti tomentoobductas, quibus
fincordincmultaadnata folia, uncia&am-
phuslonga, uncirquadrantemlaca.fupcrnd
vircentia,inferne,fo]iorura pr^cedenns infac
alba;circa [uminas virgas^ex foliorū alis nati
tenucs ramuli.minoribus folijs prxdin:furn-
msaurem virga: defincbancin nudūramu-
lum,vclfingularem,velgcmiūlanuginc&
tomencocarentem,cui inlidcbantlingulani
capitulafquamis imbricatim difpofitsscoti-
ftantiainfar capitulorum Cyanr, ē quibus
prodierunc flores ex multis ftaminibus flavis
compoftin-

Mittcbaturaurcfemen.SrocchadisCre-
ticTappcItarione: & nacacxeophnta,fatis
odorata,(prefertim ejus capitula) florere cō-
pit Scxci 1151 n itio.

NON defont porrd,qui ad legitims Chry-
fbcomes hiftoriam con venire puren: vulga-
reiliudTargu:cujusinacetarijsufus:quave-
ro ratione dufti fie fentiār,tn ihi non conftat.

GnAPHALEVM AMER.ICANVM.

CAP. XXVI.

CVRITALES, autampliores habccGna-
phalium hcc s, ebf ue craffiuscu-
los, multilanugineCandida, tamquam to-
mento, obfitos, quos inxqualiter ambiunt angufta folia, digitalis longitudinis, externā par-

re if. ica(ia,interna viridia,& valde fplendens: fummuscaulisin multosnonnunquam ra-
tnulosdividitur,quibiii.ucfupremocauli.infidentmulticonfertit&tomcnroobfitirlores"
lunicrofsvclutiargenteisquamii imbricatim iibiincumbentibusconftantcs,qijibus,ex-
p]ieacis,interior floris difcus apparct fubSatus^ualis fere ID Gnaphalio vulgaris m tadem

Chrylocome
"-J^"
K^"

M. m. m.

Facultati.

Chrylocome
v. que Gra.
*'''

Targum
vulgare.

Gnaphalium

in pappum cui fetncninvoliKum abit: radix minimi digui craffirudinem aequat fert, Qigra, fibrisdonaca, (uramatellurcmlacra(cfpargciis, nov6iqucfingulisa[iniscaulesprofercns, qui primum emcrgentcsjtijlul nifi romentum cfle videntur. Tota arfate floresproducic.

Natalis.

• Hujus radices ex AngliamihimiflaEfbuffir.emanniM. D.XXCVIII. abopttmo virolacoboGarctOjtiniorc, nullaaddica3ppcllationc, quasexAmcnc;iaccpci(rc(cribeba:.

Agustinus.

SiadmftirpsnoneftiquamexnovoorbcdelatamGnaphalij A mcricani nomine, mihiqcanooiftogefjpiofupramillefimum&quingencefimum mi flam, aDo&iflimoliu-mjmiTtir.oqjviro V.RichardoGartULondinieniisCaicdclaritf^ nimirio, in Pannonica-rum Obfervauonum lib. HI. defcripfij& ap^ufOMJunfnuncuparipofledixi: certtillival-de affiiis.

SiipremacnimcauliSjqumtumaccipiebam, pars, cum ramulisqui Sores fuilinebanr, nmttoionicroobiiqranc. queroadmodumlegirimumilludGnaprialiuni, q^uodinniC direrranciiaristJctoribusnalciEur. longiufcuIa&anguftafblia^bryfocomeitolijsproxi-nia.fupeni£ viridia, pronapatreiiicanaSftomenroobdu<fia.- fin^utiramuli vcluticotnam florumcxiiingulanbuspediculisdependentiumgeibbaritjCjui. cuiiTiiondLimpxplicarief fcn^mhil aliud videbanEurquam capitula numcrofis argaitcis foliolisfibi invitem incum-bentibuscon(tantia, iiccaainodum, quacdigitisrcclula, inmediotcnucmquandaiiii(ub-flavcfcentcm lanugincmdve pappum concinebanc, Ievi(fimo ftatu avolanr^pi,

GNAPHALIVM.

CAV. XXVII.

Gnaphalij variag- nca-

GNAPHALII nuka funr genera, quorum aliquot ab alijsdefcripra. Noseorum, „qua: hadtenusniinime obfervataefTe putaraus, rtiftoriam dabimus^ab eleganti alpi-noaufpicabimuri quod in Pan nonicisdefcripfimusjlliqucduas alias icones fob; jcienu^t lacobo Plateau miffas.nudastamen, fequiousGnaplialijakrius nomcnduntaxaraddi-tum: cumverdipfasfirpesolim ob(crvarcmeramcrim, quatcnicunquc dcfcptioncm ctiani adijciemus.

Gnapluliuoi alpinum.

CntjiaUim nip.num.



Natalis.

DODRANTAUS auremcfalpiniGnapha-lij lapula p eroqn u j et j n n j r f q s qz humi fu(a, Pilofellx* minons Fuchij rere, iatcrnipirtehifutis, excciorevero, onimno incinis& comccois guttu cxticcante &rama-ro.caulicuh ipfi & ea qux iltosambmiu folia multoetiamtomcniobitairummoautem faftigio, cauhaulifuttiieitquina, fcna, ant plurafbliolalatoria&cxpanra. adedcomen-to(a, ut mini niii tomenium iint:cx horu medioemcrguntquaterna, quina, autpluracapitellignaphalio familia palleleenribus flof-culisconfantia, quos incccurfant nigri quidam villi, foraminumvc(ligiaquodammodo ementicnte^: radix laciscrafl'aeftjnigra^fU' (cisaJiqootfibriscapillata.

Provcnit in fcopulis lummorum Sneberg, Durrenfianj&Etfchrbergjugormn. Florec Iulio& AuguHo.

Ego aliquones natali folo crutam cum fuo cclpite in mcum lionulum, qucm Vitnn* habobam jtranlluli, & proptcr elegantiam ci-cuurevolui.ftdinancmoperain lanifi: per-manfitquidcminterdum in alterum annum, valdcautemiinmutabatur, iniopiancalin" cflc ccfuiiTerrij nifiipfc collegium & i in hot-tulum liuuliflem.

Leontopodium M-tthie I.

A F F 1 x 1 s videturilli plantx, nifieadcm iit, quam Matthiotus pro vero Diofc. Leon-topodto exhibit. Scd iine dubio Gnaplialij duntaxat genus eft.

Quilicij nca.

Iosi\ SimlcruscomaientariodeAlpibuscjus. mcmi nithis verbis. SDB(6IWWII Hos odo-tatusclt. folio PtlolcllLcircarupremum cauliculum folia multaimparia, candicanria, la' nu^inofajmcdioorbequinquevelfexflors. intc^uosmcdiusplcrumqueandus: exfin-gulisluteiapices cmicant; radixaridaparva, fmmoccfpicehxrens. Tomenti fpeciem arbicror. Harcille.

Leontopodium I. 175.

LcQncpodiumautemiludnigricanrescxufucovio]accogcfansfiors, quodLobcliuS in arduisGermanizItalizej; alpintsA Baldo Veconenu invenin rradic, vidtrt non mciai-ni, qm ppc qui I: aliam numquam Cm ingreflus.



Gnaphalium legitimum.



P., uue uel etiam majores habet **Primum** a Plateau mi (Tum Gnaphalium cauculos, quorum alij furredh, all) fecundiim terrani uittxi, ccerctcs, villoll, qiosindigfto online, mollia, ineana, tatioreinfima parcearnplc&iinctir folia, extremomucrO: naca: mulca fummo cauliculorum ralhgio jnlrient capicellacandicanti.n, flave(i.enj:e lanugineplena: radix rraffiufcnlactf, (ub-fufca, fibrifaliquot prsdica, quacanvivax Ct.afTerere nequeo. Aliquid autem affinitatis liabere videtur cui Filagtnc unnorc D*idon3Ei.

VN ICO affar^ic aliud genus cauliculo. aliquot ramulis in diverfa fc contorquentibus prxdito, quos Uincindcfcpiunilmufcula, mollia &: uicanafolia: ad rainulorum internodiana fcuntur, inter fbhorum **figricim**, quina fena. autplaracapitcllatimu 1 congeita. esflavocancfcetia, inultalanugmc plena: radiK **Laacilis**, (c idcd duo (etnttiCj novae plamxtingulisanniscnafciincur.

Priorem plantam dcfertis quibufdam & ficcionbuscolliculis nafcentem aliquando obfcrvabam. Alteram etiam inlicciis (quancum memoria fijccurncjagris. prater tun demcfTis fcgctibus.

GNAPHALH ItvcCntunculi generibus G* < plantaj quidmadfcribipofTunt vcz plantae: fedle- '«f'''» gittmurn cenferi nequeunt. Id autem circa "•"•"•

Calpcn, Malacam, S<: Valentino icgno, Mcditnanci maris lictorefrequens obfcrvabam, dura cas regioncspcrluftwbanoA multisannis antc. cum Mompelij agerem, toto illo mi-

filofilla minor.



Tropaeolum

F. filifolia

Stratiotes millefolia flavo flore'



F. filifolia minor variata

Stratiotes luteiflora

Natalis

rinolitrorcaContinence, ftagnis ciifunflo, quoHaboppido Aigucsmortus vulgo nucupato.ad Set ill iilqac proairrir: untie iconeni •n]eafmanudclincatai TJ, & ipfam plantain Go eanVcum pterifqac ahjs clegaubustfirpibus ad mcos Beigasdefcrebam, ipiam etiam icoiicm C- V. Dodon£ocommunicabam, aiin illius deScirpibusCommentanos vernaculS linguaconferiptos, ante quadr.iginu annos Galiicos tacerem, Eainvernafulamaltcrani cdittonem (ouxcorrciSior &auclic) rpoftca cvulgata) fuit illata, jdeindcin Peptadcs: ope- tæ pterium autem cflcduxi illam liic inkic- re, ut e j ^ j a m defcnprijj differcna facilm^s animadvert! poffit.l

TNA6 AAI0Y porr6apud Diotc. brevis est de fcripno: ↑ u f j l i i j s b d h l i a . qui.inquit.protomentoutunturj&ttficacitcrillabibuncurin vino aultero ad dylencerias. Quam cote facuttatem, auc ilh proxiamjaliansnirpcshoccapitcdelcriptas liabrcnnonciidubiuiu.

CETERVM varijs cari'ndem alpium locis invenitur idGtiapbalij genuspcdaliaut.TITI- pliorecaule, flonbusanicdioadfumniu u(- quefastigiam inter longiucula,mollia,inca- naquefolia nafcentibus, quoda Matthiolo Pludoleontopodium , a Generali vero ilia plancaruni Hiftona , Chryfocome lanugiiW- ii nominatiir. Quemadmodii & mirionbus HugartiCjSciFii.Auftria.'MoraviE.Bohenniac jnu[anis& coll) bus herbofis.duoauctriacjus ftirpis, qui a plerifqac ali js & .1 Fuchfio PJO- fella minor appcllacuTj genera, Horc videlicet auiomninoalbo, aucpurpureo, autcxalbo purpurifcentCjfi vccarncoiquiicq omnibus cdittonbuscarduis & apertis per Grcinatiiani filvis,atqucarenofiftun)uliifercctobvia.

SIRATIOTES MILEFOLIA LVTEO FLO.

CAP. xxviii.

PALMARI efthafcStratiotesamplirudiniff, duobustribud'eabeadem radiccflulicil- lis, infima parte {c(lilibus& fibras fubindc agentibus, quibusaltcriusStratiotis&Cha' tna:meli modo Ierpunt, ceteroqui radix ooica est & dura: cauiculos autem ambimit io" lia vulgaris Stratiotis foijjs familia, mol^{to} mot iola, dn d ia, & ieiuis le a: Bot& fummis cauliculis infident in umbellam di- digefti.altcriusfloribusnondin'tniiles, paulo ramenminores Si coloris lutei , tarn difcut^s quam fojiola in ambitu nafcentta.

Crefcit Murnano rcgno , ubi flores obser- vare no poeui,quippequi Martio menfe i^p iterfcccrim : fed iirilem multis anteann^s florencem crucram edtloco, Si lapidof^o fterilique folofecundum csduara qttanda¹ filvulam, ciim Avenione Nrtbaofuw profi- eifecrer, Mompclutm reditums, o o l i fe.&cx plantts, qux jam florem i j cccerant, ajftimarepofiTiucciaiaMaioflorcrt.

Similis

Similis femine ex Hispania miffo clacior
 & pjuribuscauliculispraEdita, quihumidiffiifi, prxter medium quia/Turgebat, fi-
 orasageb,inr,& folia profcfebaitiitiou minus incana&ccnuirerincifajquam mododefcri-
 ptifiijfolia.cujasciam femetiad maiurirarcmpervenir. Sedfubicquctisanmafpera
 iicms matrcm cum proiibusfemincnariscorruptir.

Iftano eciam liabcbat in cultiflimofuo liorto^HimsprincepsCattoriim Wilhelmos.cum
 fecjuenrisanni Autumnoapud ipfum Cafl'liiscflcm: cxfeminc iftic collecto ,criam mihi
 "ai:xp!anta:,qi!afanno M.D.XXCVIIi.&floremdedfrunr, &icmen, quoddcinde Franco-
 turn terrEcommiflutn {namilloipfoanno Viennacoperveni; miliiqaidcmnoncftna-
 tum.fcd alij.quibuscoLiimunicavcramjaliuiot firpcs lubucrunt.

DrciTVR, porroGr^cisffaTiff'r^a^Awf/AAo^Latmis Milliatit:nullumvulgarcnomen
 feio.Poteratctiam ada^AAt/ocDiofcoridisreferri^uod lutcoflore inveniri fcricbic.Verum
 parutn refert.utrum Achilleam,an Scratiotem appellaveris, ciim utriufquefaculracesfint
 fimilcs,&ajvulncrajutccra,pfoflut'ntemt]uclanguinmarabxcouimcndentur.

Remina.

MILLEFOLIUM ALPINUM.

CAP. XXIX.

ELEGANS eftctamhxplantLila, dodrantalcu five palm arcmtalicudincmnon ex-
 ccdens.multisfolijscircar.iditem fratis.tenuiilimciuciiis, &vlucicmultisminutif-
 fimis alatis foliolisconfantibu^notinihil incanis: candicant<cauHculi,'fanscraffi, hujuf-
 modifolijsJ^ieminoribus,&tenuiilinicincifisob(iti:urnbellaflo(LuIoriimden(iillrna,
 qualis in vulgari Millefolio, led dituciore rubro colore five carneo niceiuium: radix vix a
 vulg<mdifferec,fibrofaadmodum,&fummarellureferpens.

Millefolium alpinum.

Sponteprovenitin Iudcnberg&Spical,i^cirixalpibus,atquefforesproferr Augufto; na-
 tale'snecaurafintifilius varictacis.au cul[ura,nc(cio.

Natalis

AbioctamendilFerrevirumell, quodinjiorcisalebamus, cumin Belgicaviverem, fi-
 mill propemodura Bore. Scd & vulgarem circa puMicas vias & fcoaitasnafcenKm farpifli-
 Weflorcs variantemobfervavi, ucplunmxpianra:Boreoninino nivcoprarccr difcum mc-
 dim.qui CC.TC emcracci colons eft,conrpiccentur, alisc [uaverubecicm fencot, a j d i r i
 interutrumque colons.

Millefolium favevaruta

Millefolium rubro co]ore.



ANNO autcmM. t>. xcr. multxMillefo- Mi8*r*n<n<mi
 lij plata:, quas in fuo horco fevcrat prscden- "*/.*/*.
 reAucunino lonnncs MvlerusFrancofurren-
 fis Ph irmacope.us, nata^folijs vulgari tenui-
 iibus,quxfloresdedcruht, noqualesexpe&a-
 bjc,vid.-licccHavos (nam eoloco flavifloris
 fcmen terra:commiiTuni mihi refcrebat) fed
 rubrtcolons,dum primumapetticrant, tie-
 gannflimi.quipaulacim fcnefccecc florcelan-
 gucfcebat, &ui)dcu carni quodaiimodo
 colorisvadebat.Hallucinacus fjenc'cne in Cc-
 rendo.milii non hqucc. Sin miiius,mira fane
 metamorphofis.

CHRYSATHHEMVM VALENTINVM.

CAP. XXX.

VNico plerumque affurgit Cliryfan-
 themum valencinumcaulc, pedali,raio
 amptiore,ramolb: folijsfbcundum radicem
 aamcrofis, deinde temere & fine ordinc per
 caulem fpariis^ulciferis.Scratiotis paulo an-
 te defcripca:fbhjs pxnc fimilibus, lamiginofis
 &incanis,quidegQ[tuaralivamcient,&aci-
 duk funt: flos m fingulis ramulisunicus, tu-
 teus,velpotiusaunfplendorefulgens,quiquc
 re(icca:us,mukisannisnativumcolorcetiati
 recinec.tnedio Anthcmidis difco five umbili-
 co major, & fine radiatis in ambitu nafcenti-
 busfoliolis.odorisnoinjucundiitadixunica
 candicatis,urina,&adivicia

*Cbtyfntht **

Valentino regno ad arborum marginesj]xta femuas reptum cruebam.nufquam alibi x>t*u.,
 mihi obfsvaiuai. Florcbat iftic Martio.

ChryfonrhsmumValeaiinmn,

Bupthalmum vulg.Chfyfatit.cong.



Herms.

CHRTSANTHEMVM vocabant Valentina: urbis pericjores, longē tamen aDiofcoriJi*
χρυσάνθημον diverium, & ad Buphthalmi genera, meo iudicio, potius referendum, nisi quis
αχρυσάνθημον (fpccicni cflc raalir. Matthioli camen Chryfanihemum effi- nego, ticci id fentiar,
qui magnam ilUm Plantarum liilioriam. LugdunieNprefKim, concinnavn: led ipfum val-
dcfilliaepreliendct, emittuisd. digenciusucnu {tjuc hiitoriamtoHtulciit Et (anc, niagii (b-
lidumjudiciuminilloviointurdutn deddcro.

*i<,ph:h*li>n*
Narbonen

Cetetum hicplanra (he quisfallacur) plurimum a BuphthaimoNarbonensis Provin-
ci«miliifanenon ignoto.differr: nanj id obfervare & erucre memini apudcpidum illui
vulgo Aqua; mortuarnuncupatum, n6nulli Foflam Mananamiquam aptc.nclcio) appel-
lant. Habce autem id Buphthalmmn radiacosSores Anttienvdj vulgari (iroiles, majordp
mediuirtorbcmlurciimcingciKibusIutcisfoiis, plcrumqucfiibus noniui purpurafL.cn-
tifcuisauiubrubenttbits. Chryfanchemum Vatenciiiumnulhradiarainoibisarobitulli-
bctfolia , fedijtcarctnonfccusacCliamannelumillud Chryfanrhemumodoratitm: w-
metflvalentinum majoribuscapiiiibusitpraedittinjUonramcnadcdproiuberantibus, O'
animadycrcrcpotcrunt! quitjusdefcripttonem mmusorcitamrclegcm, &iconeenaffa>
brē ad vivum expreOain apericifTimo piciorc.cum ilia exaiStius conferenr. Prxcerca Chry-
(imhemurn valcttcinutn rccio affurgit canlc. rnuioraquc habettolia: Bu phi halm o vi*
fem Njrboncnfi, ramuli plerumcjue humifufi, & craffiou funt folia.

Buphthalmi
virgata, cy-
per satialis

QVIK porto in Buphthalmi mentioticm incidimus, vulgare iUudBuplithalmum cubi-
tatibus & am plioribus virgis alacis folijs^orc Cliamxmcliuo majorc^uri mftar fi iligente,
frcquenriffimumeft per unwerfam Pannoniam, cciamillamqiuEuhraDravum fomen
eft, atque cocā Auftr.a; memini^: id agris, & fcundiim vias pafllim na/ccni Mog untiaeo
agro obfervarCjCum Viennam.aCadarcMaximilianoaccrfitus.profici/cercr : annoau^
tern M.D.txxix.in Belgicam negociorum quorundam cautiiablegacus.in ea Mocavix,Bo-
licmixqueparccquamih) iter faciendum fuit,&: Nonbergenfiagroccianiconfpctiebam.

Nomina.

Rhi2otonMe AuftriacsIrnulicrculs ^t(b>fst!<mm vocanc:Vrigari 'eki> tow. Cioarx(quo
mm uxorecam (tirpemicam utilirervuhicnbusimponcreaffeiumurj kiththt ^fictib,
hoc eftjferpentis herbam appellant.

Buphthalmi
Dolens
Picudocellu-
ri blanchi

N e c minus vulgare cflomnibijapriciscoll'ibgs, &ficioribusurnnrqur Pannoniz &
Auftria:graminciscamp»jBviphilialimjmDoiuiixi,five Picudocellbwum Mattholi fo-
ljjifor-

Buphtal. Dodon. Picudoelleb. niger.



Ctiryfanclium alpitium



lijs foeniculaceis, flore'que Anthem idis, majorc, auri fulgore /pkndentc, cujus radices, incegrasetwm plantas rhizocomt in foro Vienneni venales babere folcbantj&pro mgraEllebo* ro proponebanr magno errorCjCiim infra d uodccimum. imdetiara fepmumaburbemilia. re(utfupen6relibrodixi; legitirnuElleborum nigrumabundenafcatur, & indecomodc mini mi(q; fumribus inferrc pot uilfenc, Sedcdm anccmcum in earn regionctn adventum, illis effTet i gno :utp (nam pn m us, ut an te di ft u m elt, illius cognirionem ipiis dcdi) nihil minim li recepta conruetudinc ntrctur: perpauci enim pliarmacopxi hdrutnalcbant, (ctf arliizoromisticcflarias in quocidianum ufumitirpcs reditnebant. Deincepsramcn, memonitorc, lcgitirao EHeboro nigro in pharmacoporum officinis uti caeptum est.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM.

CAP. XXXI.

* Li A porrdChryfantliemigenera, dum *ch, yf*ntb, -*
Al. Viennxvixij invanjs AuftriacarurjnSti- *mal alpinum.*
 riacariimq; Alpium jugisobfervabam, qiiibuspeculiarecaputtribuendumcflcduxi.

HORVM Primum, multahabec /ecundiim
 radicmlongiufculafolia. Abfincllioumbelli-
 fero. quod infra defcri be [ur, fim ilia, craffa, pol-
 licaiiil6gitudinc, inlacinias aliquot divi(a, viri-
 dia (in novellistamenquarda canicics con/pi-
 citur) amari faporis: caulcsaliquot palmares,
 rarioribus & tenuibus difle<ais folijs ornatos,
 friarios, in quibus veluti umbellKdcnum auc
 duodenum lutcorum flprum, Iacobxxvulgaris
 floribusnonmultum abfimilium, &^ju(i
 dem odoris: radix craffi u fcula est, m u Itifq; can-
 dicantibus fibriscapillata.

Provcnitin Iudcnberg, Spiral, & alijsqui-
 buid. itn Stiria: jugis, CUQ: Lcucandiemo mox
 defctibendoreodem ctiam tempore florens.

ALTERi numcrofa proximradicnafcun-
 tur folia, Abrotoni maris folijsrefpondemia,
 diluciarevinditatenitentla, & odore, fi reran-
 tur, Jia<d ingraco, (aporevero amari c5 cc & mi-
 nimegraro: ex hiscaulesexeuntpe^alcs, mi-
 horibusfolijs onufli, in aliquot inteidumra-
 mu l os di v i fi, q ui fingulo aut gem inos fuUne c
 ftores Chamaimelovulgari majores, inodoros,
 omninoflavos, Koceft, mediiiiorbcm luteurn
 cingentibus ctiam luteis folijs, fatislatis: radix
 fibroia & iigricanscft. plure'fque a latcre fpar-
 gitramos.

Invenicur in Etfcher, Snealbcn, Vcytzalben,
 & celfifalijs AJpium Sciriaejugis. FlorecAu-
 gufto.

CVBITALES Tertio funt caules, firmi,
 lxves, ex purpura virentes, fjpertbre parte ia
 aliquotramosdivifi; folialonga, tenuicerad-
 modui Ji inci/a, Achilleac Mattioli, Gvc Abro-
 toni maris foliorutnaimula, longiorat. imen,
 aaffiora Siviridiora. qa^nullumgratumodo-

rcm fpirant. guftatic, ingrati fapors depr^henduntur & amariulcula: fiores in extremis
 WntsunibcUatimdifoUci, lutci, Iacobeafloribiisfermcfirailcs, jed(ninores8<: inodori-

cutices

Chryfanthemum alpinum it.

Giryianchemum Tcgetum;



radices flint fibrofe.candicanres, nov6fqucauleselateribus proferunt fingulisannis, <ju
fummacellureplcrumque fibrasagunc,

Natalet.

Crcfcit in Snebr g.&:reliquis jugis in quibns Alterum genus invenitur: in hortos tranf-
latum feliciter provcnirriorecque Junio. illic auctem Augufto.

Chryfanthe-
mum fegit.

AD pra: difterum autem A^pium radices, in arvis, quem admodum eriam per univerfi
Aultrw. Stinx. Vngans. Moraviz, Bohemia: agtos, quaqi idcm cii er facere conii git,
inter egetes flo minus frequenseft Chryfanthemum illud. Germanicatque Belgic? vulgare,
inter legctes nafcens, quod eam ob caulam Chryfanthemum fegctum a nonnullis cogno-
minatur, folijs BelJi Hcm majorem quodammodo armulantibus, fed mollioribus & idila-
tius yircnubus, Horc fimiliccr Belfidis majons, led omnino flavo, cujus iconem hic
adjecimus.

Semina.

- N O N in epteadwyn^, Chryranthemigenerare ferripot Tchasftirpesat bitror. Hi-
hi J tameo (tauo. lcd has, ut & plerafque alias, rei herbaria: ftudiofis dumaxa propono, uc
corum exquiram iudicium.

CMR YSANTHEMVM CRETICVM.

CAP. XXXI r.

Chryf*atht
tai Crttm

SEo & femine Cr«ami(ro, nobis nata duo alia elegancia Chryfanrhemi genera. in eroi-
ne hactenus defcripta: quajetim annua fint, & decidua reminc (pontcrenafcancur", fi-
cile fuum genus confervant.

Chryfanth.
Cret. 1.

H A B E r autem Primum cubitalesaat ampliores caules, fatiscraffos, friatos, IOCUS
fungofos, in mulcasalas d: vifos, & frequentibus folijs brevi pctiolo in qualiter narcenti-
bus omatos, qua; in varias & profundas Ucinias divifa, easdenuo valde difflcfta habent
extremis cauli & C ramis innafcuntur amph floiescfquamofocapite prodeun: cs. duodeni*
aut plunbus folijs confantes fati latis, flavicolons, & latiufulum difcum ambicnti-
bus: flonurcumque odoratofuccedunc capiraē mulcis mxqualibuj longiufulifque (c-
minibus compada.

Chryf*ati.
Cut. 11.

N o M minus fruticosum minufve altum eft Alrerum gentis: minus tamen craflbs ha-
bccaules, fungofos & ftuacosetiam illos. quos ambiunt folia non adeo difliia, (ed in
minores lacmus & rajiusicci" asdivifa, propjus ad Qiryianihciw um fegctum accdentia:
liftineft

Chryfai;tlicum Crericum.



Leucanthemum alpinura.

fuffincnt exritnus cauiis & rami fquamata & cjuati imbricacacafea, e quibusnafcuntur flavi (tores, totidCm quot inpnmofojps conftantes, an^uflionbu s ca;ncn & rnptfuB orbemaurdttuftingnubus: >ubteretiam fuccid i r (em enum ire^SfK quantum minus.

H v i c noi valde diffimilis fuffe videror caplanfa^uji is; consem ab iplo adumbratam mih* nfi^ttbat honeflif... vltinque d 11 igenti ffUm u^fti rpi Lervator; facolis Plateau, cum' variis alijs conitus... quorum potilTi... partem what mea Scrupum; Hi- (torri...)

LEUCANTHEMUM ALPINUM.

CAP. XXXIII.

H ABENT vnam Alpej (uar Anthemis des; verum a vulgaribus diversis; ut tu penore cap ice x x x i" patm; cononitramas, parti rq etiam ex hoc c^pTcc ap pa re bit.

LEVCANTHEMI porr^Jftipini fqlia, priorisChryftntlicmialpini , pauloantede- fcnpti. folijs non muitum diffimilia (unt, nifi paul6magis incifacflent, cra(Ia&lucculenta (uti funt multarum alpirmrumlljrpimn folia, qnemadmoduni&niarinarum) amariuf- culi faports, &T nulliusgrati odoris : caulrculi dodrantalet, tnfirmii, in quibus fingulares flores, cham?melo majores, lutcu m orbeni ambientibus viccnis aut plutibus albis folijs- Late fe (pargic hate planta Anthemidis modo , & fi brofas radices habet.

Crefcirinludenberg, Spiral, & alijs cjuitu(dam ProvincixSoiixjugis, ubilulioSi Augufto floret.

M v L T v M accedere viderur ad cam plantam , quam pcriffimus Anguikradfi- ienbit Leucantlicmi Pliniani nomine, un- Lrut^*nth, m. decima opinione : licet ille fuum Leucan- W<*>TM Ai^*a^u- themum odorarum faciat, ego veto in hoc nulium raanifcflum odorem depichen- denm.

FLOS ADONIS VVLGO.

CAP. xxx 1111.



H V i v s Stirpis nonmemini (Tcm, quin- doquidem & Floris Adonidis, & Eran- therai nomine ab alijs est dekripta , nifi viderem illos qui minus ftrupulose obfer- varunt, duas plancas , ejufdem quidem generis , fed colore flons vanantes, in unam con- trahere.

N A M quam Belgacdcfcibunt, ilia ipfr tiuAienib; est. quas in hortis intercotonanasalitur, cau- lem proferens (triarumjin frequentes alas di- virum: folia anthemidis fcre, viridia, hinc inde perramos nullo ordine ppar(a: florcs in exrr- mis ramis, non ma^nos, oonis aut plunbus folijs conftanres, Mature rubentes & quafi nigricantes infar humani fanguinis reficcati inultis nigris ftaminibus am villis u^mbih- cum occu-

Flos Adonis vulgo.



Flos Adonis

Parthenium

Parthenium alpinum.

Anemone
montanaParthenium
montanum

rum occupantibus qui marcescere incipiente flore intumescit & in caput crustum oblitumculum colorem ex multitudine feruntibus extremis parvacum in iati Sjinicio virentibus deinde, ubi maturefcere incipiunt, subfuscis, Stfacilcafummo (primum) capit deflucibus: radix candkat, & raris ribns donacelt .ncchiemem (upcrac, (eddeciduofemine fingulis annis renascitur. Jpfa vero pl.ua Maio menfe florere incipiens, subinde novos ramos prorerendo, i» Autuainum ulque flores producere non deficit.

Hujus iconem Dodonus & Lobelius in suis Plantarum hiftorijs exhibuerunt, etiam candem hic subjeci. Scd illam nufquam in ponic nafcentem ubi cravi, vciim HI hortis duntaxat cultam.

AITE RA verolimiles quidem habet cauks Sifolia. fed dilutius virentj Caiile etiam rariobus ah sprxdin, foliapaulo meliora, nec adeo multifida: flores longioribus foils confiant, & coloris funt plio nice!, dilut Lorisciam quam sine Anagaliidis flores, viilis nigris fimlter umbilicum occupantibus, in quo facim, vix coiam nperro flor, caput xuiberac, in mi' jorem deinceps longitudinem excrefcensquam (uprioris, ill6q. gracilius) femine tamen confans adcoiimili, ucncucii abalcerodifcerni qocac: radix fupnori fere Gmilis, quod ammodo flavescens inftar radice fumi terra; fed fugior altera, qnera admundunj & totaplanca.

Sponte frequentissima nafctur inter legetes, non modo in Gallia Narbonen, icd etiam Hi per univcrsam Hispaniam: in Italia etiam nafci apparet ex Matrhio Commentarijs, qui cjus quidem iconem exhibet minus fcite Xpreffam, nullatnaudem descriptionem addit, fed nudam duntaxat, Adonis appelktionctn- Poftca non minus frequetem omerv abam interfegetesciam in Auftria & Moravia, at que ixpius Vienna femine jus ad amicos in Belgicam miG, quod, an illis fit natum. me ftigir. Stt- periore item anno qui fuit nonageimusp^m mus fupra ni illditmim & C qmngcut elumum, non procul Wormac ij in agris frumento coo* fitis, Rheno fluminis vicinis^ Maio florenter fl confpicibam.

CVM Mompelij viverem, pro Anemone* ftudiofis habebatur, & licet eam nomine, no* fter Lobelius in Ad verfarijs pol uic.

PARTHENIVM ALPINVM.

CAP. xxxv.

MULTIS ex fibrosa radice Chamemelli modojfruncatramulis, pedibus, VIH- dibus, : quos a mbiunc folia Anthemidi ptoivis finnlia, multiplici incifione divifa, Corole aut Matricanx fere odore, guflu calido, i itta men non ingrato: extremis cauliculis meli flores iniident umbellatim conge(tu. Ablintnj atp^{l*} rM, quod poftca defcnbemu Sjrloribus| proxime accedentes, hoc est, exigua capitella ex albo & pallido

pallido commixta, umbriatibus ea senis aut octonis latiusculis albis folijs, ejusdem cum i psi
 herUiodoris: ranii/ivceau]iculihumiprocumbunc, & cxuna, uidi xi, ri¹ diccprodeunte 5f
 i K fihrasagunt, & nova germina procreant.
 In vcnLuriiiSntberg, Snealben, & Durrenfcin jugis, magnacopia; flore'tque duncaxat Natsbr,
 Augu Qo; namcuminacclivitatibus & cjrcafcrobesnafcatur, quasdiutius inildetibLec
 riuillud rlorceneceflceft.

HA KC plantam monrani venatores Vnfr \$rawcn(tt)»axt} tfw & nominedonarunr., ad al-
 teriusfirpts dequapoftra, differentian^quamwcfotaut? appellat. EgoParchemumalpi-
 num *voco*, a Diofcondei Parthenij odore, ad cujus etiam delcriptionem fans accede re
 Videtur.

Sapiclitam cicurarevolui, tranflarise locona«li ptannscumfuocefpit:e, & in hortum
 illans: fed ultra alcerum annum non penmnfit, licecconimodo & naturejus aptoloco
 tepoluiten. ij & omnifolicim dinecuraircm.

PARTHENIVM PLEHO FLOKE.

CAP. XXXVI.



NIHIL prorfus a vulgari Mamcari a vel for-
 ma, vel niagnitudine, difterthocParthe-
 nidm: cubicales enim aut amplk)resinterduni
 nabetcaulcs.ftnatos.in nmltasaiasdivifos, folia
 Vulcan perquam fimilia, &: mulus heinijs divifa.
 herbaceicolorisjvalidiodoris, & aman faporis:
 extreme atep luriaios florefcandidos, & multi-
 ptici foliorum (eric conltantes fetuntj nullo, aut
 perquam cxigLio in medirullio orbe, quemad-
 modum Cliaemaemcli pleni flores, quibus funt
 perCmi les, veletiampkniores & caDdjJorci:i:f-
 men Parihenij vulgans. fercundumjicetaiiquo-
 ncsfatum mihi nonprovenit: Uirculis autcm
 certiore proventu Tentur, Leucoijplenotiore
 lutcoinflar.

Londin 1 in Anglia primium mihi corfpedra eft
hacplanta, annolalutis humana: M. D. LXXIX.
 quam inde Antuerpnam defcrebam: ejusver6
 iconem & feminaadquirebam Vicnnae, muncre
 C.V. Richardi Garth Cancellana:LondinenGs
 Primicenj. & viri humanidjmi, qui rac **multis**
 bencficijsafrecicideindeloge frequentioremob-
 fervaba bienniopoli, ciim Londinum, feriorum
 quorundam negotiorum cauia, redijflem, toto iU
 lo femeftri quo iftic hard.

Florereincipit lumo. & totadeindeaeflarcflo-
 resproferrcnon deQmt, interdum adipfam uf-
 quebrumain, nonnmnquam (quamatacapita in
 mulra viridia roliola cranfeunt, praefctim Au-
 tu mno, c quorum medicullio cuueant nivei flo-
 resrehquismajores.

CETHEVM valdcferaxcft Angliahujusmodiflorum mnltiplici foliorum (erieconfan-
 tiim, quos an arte & mangonio adquirent, ignoro: nam & Chamamelum, & Lychnides
 ^"e flrcs. & Prim u las vcrisjA; aliaspkrafqueplantas 7roAt?i: M&> dare conn¹ antes, Belgicam]
 'Qdeprimutn acccpitTecontal

TANACETVM iNODOavM.

CAP. XXXVII.

GR. A c 1 L i BVS, firmis, duris, cubitalibus, interdum verofcfqiiicabiralibus aflirgit
 haijTanacetumcaulibus, per quos rara (parfa funt folia pennata, Tanacero vulgari
 nonadnidumdifnmlia. odoristamexpertia. guftulinguamvellicantc & fervidoj Circa
 radicem mnjoraarquc hirtutaicauhs fummo faitigio in aliquot breves ramulos nudosdi-
 ^iditur. quibusinlidrumagniflorcs. Bellidismajonsflorifermexqualcs^i Sodenisainvi.
 ^enisfoli)salbis, nunclongioribus, mod6brevionbus, mediumorbemflavum, utin Belli-
 deniAiorCjCint'encibusconrtanteSjqaibusmarcidisjuceditinmedijs capitibus longiuf-
 culum femem nigrum, quod terra: commiillim plantafii jgencrisproducit, & alias eciam
 nan difTimileSjquarumnos eft minor/ecundogeneri par: radix eft minimi digiti craflitu-
 din_c obli(}ua, Qoa in aJmm dciiiTa^nigra 6c aliquot fibris Jiirluta Si vivax^qm etiam pan-
 S'poffit.

Tanacetummodorum i.

Tanacetumincionim n.



Sasalo.

Provenit si in his partibus ut in Pannonia, & Aufirajnon Tibushumi3ioribus, & fimo, «, u Amunmofcrur, flores interdam productie-

Tjnuetr. ii-ter. u.

Exit etiam in istis locis aliud genus, floris magnitudine ab hoc diversum, qui Matricin* vulgaris aut Cotula fertur, flore non excedit: folia etiam in uselc gantia, petiulo brevior, eam inhaerentia, nullo etiam odore nisi heri- «cco pradita: nullum semen observavi:

If./mna.

An aliquo nomine vulgari praedita sit haec planta, mihi non est compertum, Tanacetum autem in modum nuncupavi, quia cum nullus manifestus odor in illo percipiatur, folia viil-gari Tanaceto quodammodo similia habeat. Secundo apud Valentiam Allobrogum observata videtur Lobelius.

ABSITHIVM.

CAP. XXXVIII.

Abfithij

PASSIM nascitur per Vngariam, Austriam, & in quas vicinas Provincias, & in Lim illud majus, quod reliquum opinor, Europae tam haec est. Inveniuntur tamen alia quaedam ejus genera, nulli adhuc Scriptori, ante meum in Austriam adventum incognita, quae hoc capite describere est animus: prius obiter mentione facta nonnullorum, quae vel spon-

K

SPONTE autem crescit non solum multis Pannoniae, sed etiam Austriae locis, atque Viennensi agro, cum in saxosis & calcareosis gramincisq; desertis agris, Absinthium illud cuiusdam Abrotani ferè folijs, vulgo Romanum vel Ponticum nuncupatum, mira facunditate radicibus fibrosis & lanuginosis, quibus se propagans, cujus duo videntur esse genera, nra. Vt Lirncij implancincium cft, & c. quod potissimum Viennenses officinae utuntur, tamquam nobiliore, ita eum sibi persuadent. Alterum purpurascens habet caulibus, folia non adeo incana, sed interna parte viridiora, ad nonnullis superiori praefertur: exillimo tamen natales istam varietatem duntaxat parere. Iucano congener esse videtur, quod Boissier ex Italia acceptam communicabat anno M. D. XC. & valde celebrabat. Vngari, cum hoc, tum vulgare majus, communi nomine Absinthij, ut est diversis locis advecta, sic tota facie inter se discrepantia. Nam quod Patavio allatum erat, folia habebat molliora, incana, lata, tribus, quatuor, aut ad sum-

iffstntli m.i.

AbGathiurnPonricumvuIbare.

AbInchiumAuftriactenuifol.



ad summum quinis lacinijs divisa. interdum etum **nulis**, ut Artem. fiam foho Lavendute
 quod dicitur grat. au. de modons fcd am an f. pons
 x Muh. n vcr n Mabm ukifida haba folia Juccufenta, non minus quam fupcnons
 inc **proxim cad Scrip bij. in Be** Anglix maritimis nascentis, folia accedens, gra-
 r. s camen paulo, & validioris. vr mini videb Mur. oJons, Scr. phij Narbonensis & Hi pa-
 [quoj nafquam mfi in mediterranci marisl. coribus ob crvarcm mmi) grave clen-
 tiat flq nodain mocjofeferencis, ac quccriacn; iporem.
 thij genus, vix palmi altitudinem superans, tenuibus au-
 modum cauliculis, quos circa radicem multa exigua multifida tamen & incana ambiunt
 foliola non injucundi odoris. Id in summis cauliculis quaterna aut quina
 Pertcanicala in Dal-
 -i-» tnc noicuiosutiupcuuiiij i u m p
 cl» mus Camerarius, cju fdcin urbis piimariis me (Jicus.

C_{Eq-ERvMa} de₃ generanon vulgim quxiii Aurtrii & S_ina Provincijs nascuntur,
 equat. nonnumquam etiam cubitalem
 in quodammodo
 qui superio-

4, cnuionbus, pro incanis, qaa: co, fafoordin u ambiunc, p
 in mulcosramulos, ex tenuiorum adliuc foliorum
 flof Ln, propendentiu corvmbis. radix fibrosa est, & **Grulis annis** novos
 resq ue caules producit: tota planta impense amara
 refert in collibus & apertis quibusdam locis Viennensium
 promiscue cum eo, quod vulgo Ponticum appellatur, ad Viennensium pharmacopolarum
 ficu ad

iu f v « S e l l Alccrum **Abfothij** gcnus. nccufquam n lfi
 Suib_u ft_a ra & xi ettatunt folia. toc3 incanJ laaeioc, fiiveluri teuenw
 «TM majora. Bclird^ amajors filijs non dedvffim. l^ amino. ahmen
 itn bei Um diftri biiti. flonbus **Achi Hexhoa difpares, fed** maiores, **fcptem**
 ^is foholi ^ malm morbcm. cx alijs cxigims flolcjlis luteo diloprid. tis
 genibus, constitit: semen deinde quale Abinthij vulgaris, odoratum: radix nigra est, ali-
 quot fibris donata, & a lateribus propagines spargens.

AbGnthium alpin.umbcllifemim.

Naradi



Artemisia alpina folia 1 r.

Artemisia tenuifolia



Artemisia tenuifolia

Artemisia tenuifolia

Iftud/ubfinem IunijannoM.D.LXXimfuis flonbLisomi(liim,pnmui>b(cr vabam&:eruebam,dunicxHohenbergcrin,pctruniiiuvicinaram Alpiumjuga^nsncalbcinederem.medio fere itinere,tn (copulis prari uptis, & in akif fimapra:cipitia(b.orrefi:orcferiis) propcudeiicibus.dandc illo ipfb ai)no,incfc Auguftcpau16fiiajoiecopidinEi(chrcrbtg&: DurrenuJun, ciim iiores, turn fcmmpixgnans, quod cum normullisplaiitulis inBelgu./ anucis niittebam, equibushscjcondclineatafuit: poltrcmo.exprt.(«&:cviilgatd tiu'al'annonicaruin ftirpium Hifloria, unain atqualccram ejusplanram lllvnicbaroin Sneberj; pr.rrupiis fcopuli?, dutn cjusm6[islocanondua me adira perlufkarem.

MONIANI venarores snfet\$stave«uaci!»²⁰ ttjife tacc» appellai, ad Parthcnij alptni diilerer runi,utinejus hiftonaute diximus. Ego A finrhij alpini umbcllifcii noincn indidi, qm multas habccnotaSjqaujUC inter AbiinLij jssnerarefcredebcam,mcimpellunc.

ARTEMISIA TENVIPOIIA, CAP. xxx ix.

Q V A s c v M Q V E Regiones peragraveritn, (llaf-uitAtili anll g ! q illam vu!»-arzni trim candidiorcm, turn fobpurpurafctetai & univcrlic,uc puto.Europse famijare, trt-(centem non viderim: vciiii & alias qualdam ftirpes obfervabam , quas ad cjusgcneia refern poife arbirror.

PEDis alritudine fruticat,vcletiamamplior cft.Prima.vir^is in muhos 1 anitu di vi.v, quibTU adnara folia Abroroni maris ex viridi candrcanti3,aman(apons:tloresx (uDitnisramis, Artemi.:e modo dependent, cujus autcm coloiis, nulii non coltat s radix lignoia in pturcs alas findicur.Tora pl;inta odoraca eft.

CKASSA admodum,ljgnola,inultifida;&rfa-tismultisfibrisminonbus donataradice coibc Alccra:cx qua plures rami f pargutur, ho mi plcrumcjufuli, incrdum ctiani reflaafTurgenres, lignofi,duri, &in hisinulu ante hiemcin nocti nafcences,cquibus folia emcrgunc in itlniidji3f tenuiterincifa, Abrotoni mans folijsprof cfimil]a,candicainta,faponlq;iiion atlmoduni infraci./cdpofcfafavam ahquantulum cicncis. InterlixCj lubfcquentisxftatisinitio,tenes vitisami's ejdem colons prallafj &lcnnioribusJaraniod6diflis,folijs(L-ptx,quiparvisvelucicoryinbispropendennbusonuih (unc, Abrotonitnaris, Anemiiixvc , aurAbiinthij infarvirefcentibuSjinterdum purpuraiccncibiis, qui explicati,ex purpura candicancem ortcdunt fiofculum AugutliinitiOjnonnumijuanictianLi Septembri.

TcRTiAimili pare modo cre(c)c'c,cd ucplurimum rcdioribus eft virgis, ij'tjuemagnacx patte lingularibu^jfirmis^lignofis, purpnralcntibus,&inramulos(jiili cokirettonatos difis;folia licet fiiperioribus refpondeant.tninus ram en mtana fiinr.fcd potiis ex viridi atque purpurconigracaritrtenuesramulijSexuli mcnlc, fuiscorymbis ,purpura(c;i;nubus uc plurimum,

onflj confpiciuntur, perinde ac in fecundogenere; ejuotempore, tocus caulis
 & fructu sicut in sarsa circa d. s. p. u. r.
 Pciore induncaxat videbam nonnullis Bxticx locis, Sc Granarcni Murtianoque regnis,
 ?cis <iecl Lvibus, ititer diimju Kcafluenta, aonn Limquain fecinidutn vias, (uprioris anniflo-
 ulosc ram' IUS dpenetir. es rennecm. Secunda & Terriapalfim nafcuntur fecund dm
 j & n> ras, arid(s talchro Ctsqaclocis Vagarix, Saris:, Auftrix, Morivix, Bohcmix, ctztn sA
 ^cunenfo utbis valium & : foflas, nonriumquam in vetultis muns & rudcribus, praefertim
 Tertia, qua: cciam nufquam non occurrit locis aridis & inculcis per univerfam H ifpaniam,
 L'Jluatiani & Galham. Ctcfcir & circa Francofurcum. iialijs quibafilam vicinislocis.

AN commode ad *fipTt/Mirtstv Xvn T'Q\$VXXV* , Arcemiliam cenuifbliana Diofcoridis har
 ftripes
 fio
 idctenuisfi; Tercix. ctiam ingracus. quemadmodum & fapor.

PMOR Granacoifibus Abrotoninominedonacacrac, nonnulli Somvulcari appellatio-
 ue nuncupabaiic. Secuntijs nullum vulgarnomen in cellxi. Tctiam , Salmanticnfes
 Am brofiam vocabanc, cum quatarncnnullomodaconvenit. Mompeliani Artemifiam
 ren uifoliam appcllare folebant. Vngari Je/Wiyfa. hoc cft/coparum hcrbam vocan^quia
 vulgo a pudillos^hexusvirgisfopsfiuntj Obqumctiam ufiim. nonnulli Auftrianncolx,
 praefertim
 no tinanc. m apud Napolim, vulgari ejus Provmcia; *fcanoac Tiatfittbtdi* <3am, *ftfcta-ttaut*

DIOSCORIDES fenbit Arthemifiam tenuifoliam cum amygdalino olcoconrufam , in
 Rialagmaris lencorem , & ilomacho laboranri impotiram, (amtati refticuerc, acrvorum
 S u c cruciaibus fuccum ejuscum rofaceo olco ucihter illini.

ASJIOTONVM FCMIKA VV10.

Cap. II,

E I v s Rirpis quam vulgus Herbariorum Abrotonum fcminam appellac, nonnuJi Say-
 tolinam vocanc. d QO lunc genera, plenqne horcis facis comm uma.

Abrotonum ferninavulg.



VNUM vulgarius, fruricans, & inplures
 candidos ramos divifum , quos ambiunc te-
 nuta folia, fivepotuisfoltorum nervi, inqui-
 hLiscundLLW lungitudinemnafcuntur qua-
 tuor ordinc breviifimorutn & minuriflmo-
 rumfoliorum, ut coca folia denticulata vidcan-
 iLr, incanaomnino, amari/apons, & guvis
 cumfitavitacequadaraodons: fumnioramu-
 lorum fastigio rert lucrducapirub fquamau
 lucreflorescontineada: radixraflaaf, du-
 ra. lignofa, & fubinde in brachia fifTa.

ALTER I vs ramieriamcandicant, minus
 tamenfreqocnEcsfunt. loBgioraliabeiir folia,
 quatuor fimiliter dcnium ordimbusprxda,
 initioquidem incana, minustamenquam in
 fupriorc, & qua: randcm omninovircfant,
 odor mitiorcft: (apore^adice^um jamde-
 fcripto convenit: Flores non obfervabam.

PRVETER. ilia autem, in mcis peregrina-
 tionibus quatuor alia genera obfervare me-
 mini: unuai in Narboncnfi Gallia, triain Hi-
 fpania.

NARBONENSE multum accedebat ad pri-
 numgenusjamdelersptunv. fedlongeftrigo. »i«
 fiusetat, feramosduriores, brevionbus, mi-
 nusque frequentibus folijs obfcflshabebat,
 colored! cdam incer *umimque medium* : flores
 in extremis ramuuis majores & pallidiores
 in fqiumauscapiteHLs: radix in duos Sdigno.
 fosramosdivaricataerac.

Tfud genus a me obfervabatur anno M.D. LII. Carcaflbnc Mompelium rcdceunte, cum
 ^••V. GuLiemo Rondclet Ojinter Narboncm & oppiduliitncuinomenaD. Nazario'fquo
 notidcktm Narboncdjvcrteraca Nobile quodam viroc vocatus) in acclivirare QUOTUIX-
 aam colliculorum, qua nobisiw faciendum crat fecund um fl. Attacis corou aJctrum.

k * * _ "

Abrotonum fcmin. Naiboncn

Abrot. fm.
1111.



Abrot. fm.

Abrot. fm.

TR i A verd genera in Hifpanianafcentia, tameifi riorum Iorma cum ilhs convenient, diverla tamtn cfle, ex illoruii defcriptione appaibit.

M VLTIS abunocefpircprodeuntibusramis confiat Primum, & tumbus, edalibus, can-
dicamibus, quosnumeiofaanibjumfeltaRQR
qua; novella incana funt, & r, ul' atcicinci/i
rarum vt-fligia apparentialiabcnr: aduka: u-
terajvindiorajongiora, Siquafiminuti¹ met
fundiftin^ta (unt, tr, ukum tamcnaSantpr
nxcredita; foijisdiverfa , aman gulius, i& ju-
cundiodoris: multaseljngu!isramisroduci
virgulaspalmares, rarifolijsrptas, atqu<:ir
lummoearu faftigio capitelta tioicinqLi' In-
teuraSantolma muJto amplierem: mature
autem (cmine, marce(cunt hz virgulx.- radii
cftlignofa.

ALIERVVM, flore, foijis, dcnique tota facie,
Prime fimi!c: fed per omni. i minus & graci<
lius: quod natalibus tnbucniiu non c ft, tjian-
doquidem uno, code'mque ill lofo ii^ul t a-
fecntes plantaiinvcnrfm, nc qccrrm *tati,
quia utiaout- fpccies, cx Jen. imbtis naiali loco
IquntfhmcoJc&js&repcfitis, & mccum m
JBelgifamdeiaais, mibinaraeft, i nagnitodine
& exilitate ungablt a non minus dicitet,
quam natali Cvh fuerat.

I L L i magnitudine par eft Te
dumctiam pau!6majus; ramuli DoniKinal*

ttrocandicanKs, ftdvirides: folia<ramviridia, & longiora, tcnuioraque, rciniiri]jqui'
ocmamarauaoj ilia, fed minusjucondiodoris: flospa]Je(icns, vuca-quaHorcmkilliiiX-
bant tenus maturo finine etiam arcfceblt. uc in fupcriorcxuius raocio, hmus radi

Donct' edmagis fibrolaet.

Kxt'tt.

Nafcuntur Salmanticensi agro, montibus Scgobiar vicinii, quos *tl futru tit G**dtr* **
vocant, & vcterem Cattdlaa, in vafeparanc, alijque afpens & klcbrofis H. fpania locis-
fioient Maio & Iunio: (emen maruruoi lulio. Omnes amcm *hxplant** perpciuofunt folio:
vio: vi. genuseriam nunc in horcoalo.

Hemina.

Diffum Plinij esse censent, potius a formis &
vulgari *at!onc* FW Wenim ill. sdifb) Ut Cxiitmo, quam ulum obcaufani:
nam cum Plinius nullam ejus auctoriam describat, sed paucas ejus facultates duntaxat en-
meret, ceru quidpiam statui vix potest. Legitimamenam Abrotonum feminae effe necjuir,
cui folia tenuiter incisa, Seriph] modo. tribihf Diofcorides. Salmanticensis quidem hifpa-
nica genera Abrotonum femina m appellat: fed vernacula lingua, tota Cartel U vet ere,
Tomillo perrano, hoc est Thymum ican Liium. dicnur.

Tomillo perrano, hoc est Thymum

E A K u £^{cc} ca?m: fticaicbant unlitcrpropinari ad fcabiem profljeandam: quod Ci>
cft. proculdubialiabendacfrationatiirarilforiim. quibus datur.

MATTHIOLVS fenbitiftiuifoliaficca. & Ui pulvcrem tnea. dari perquam utiliter exaqu*
parthenij, fcndrachmxponderc. ad fiftidaalabafeminarum profluvia, ficonrinuis dcccflf
diebus aut pluribus fumantur ajejunis & dciideinterpolais diebus

1 LiN. vs Chamicypanffomherbam ex vino poum, contra venena rerpentium on-
niutn/corpiouinque pollere testiseft.

SALVUE GENERA.

CAP. XLI.

QVVM ab omnibus. quidc Plantis fcripferutj Salviihifiotia fit tradita. fupcr Tacancuim
quenlebam de ilia Icriberertamerfi multacjus genera in nicis peregrino auombus obft*
vavmm. latifolmm videlicet fcanguflfolm. qijodfponic in Hifpanijs subtTtimeciftit, ^
nunc momnium liortis colitur cum latifolia Salvia folio vindi coq'i crifpo \ tl non crift *J
purpuralcncicverficolorc. & colanfolio. quodin Aiil Uiaprimum obfciva Lutandidisno-
rihus. cujus femeni tincin Belgium anicicis mincbamxquo nata-planw.

Sen qma duo genera d f nfc ieta Cn , n u & alicu sunt nata, deijfuc
gcfcm operapreium esse exillimavi,

Chamaepa

Salvia C& tica pomifen.

ialvu Cretica non pomifera.



^

M -TV;

Salvia Cretica angustifolia,




PRIOR Salvu, quæ latifolia & potnifera. nara Ta
 efitiemincc Crca tniflb aC. VHoorio Bel- ft, **Fluffrff**
 lo Medico. Fruticat ea altei ius, ¹ alvia; modo in P^a
 multos ramos parla^ uadragulos in uio & dcn.
 falanugiacobijtos, qui dciitdc in ligneani (ub-
 ftantiain cranfeutes, iftam quadraiura amit-
 tunc, tencriores au[cr:inu retinent. denficrcq;
 hnugine iunt obfici: fuliacxadverio, alternis
 nalcuntur, (cmper bina, mferna parte valde la-
 nugiiiofa, alcrrij, V]rcia, & vclunartnta, Salvix
 hcifohxfotioruinftar. appondiccs utrimquel-
 cundum pediculum hjbenria; & c vclu Liuunta,
 notiniiquamcciam appendicibus carentiam c
 tarn atnplaut ID Ianfola vulgari, necenaatii'ij
 angufta, utin vulgarimtnorc, qi. irauntahab. c
 folia : excremos ramos ambiut vtrcicillacin ic-
 oi & plures caliculi, in quibus florL-s, vulgaris
 • flonbus forma quide iinnlcs. fed colons ex al bo
 putpuralcentis: qmbuscadencibus. temmi ru-
 (cuntur in caliculis ternaa ut quaterna. cradio-
 raquam in reliquis Salvia? gencn bLis. & illos ica
 replcna. ut quafi bacc^ apparcant. Tonus plaiae
 odor pan tdcvctictentior qu Juialtenus Salvia:.
 In Crerabaccas, feu poma (qu^ durax; it quz-
 dam ex crefLentiaefiint) terruncialis nuftrjtn
 magnitudinis, multalaj UgincohfKa, orbicu!a.
 na, qualia ex Agypto olim accipere memini &
 ab Honorio Belloc Crca accepta, in prop<(it. i
 tabellacxprimicurabam Sed in luc provmtu,
 utpotcni[nisfngida, [iull. udluictulir.

A I T E U M , quæfic Anguftifolia, natcuntemnoticonfpxi. fedejusiconem vnisco-
 wnbiudepiaara admemiricdiligentiincus, & in Plantaruni cognitione cegtegit verljju,
lacobus

Jacobus Plateau, cujus frequens in hac mca Plamarimi Hiftoia oientio.' Nata SVJK m illi cratfemineCreta infuli accpro.

MVLTO porrottatim aradiceptofcrtralalos, lignofos, ex fufeo fubii) berrcs, qi'CS al- j>EMjnjoia. rernisbina temper ex ad vcrfbainbmnrfoiajongcanguniora^uam in ulloSalviJEgenre, in atnbu nonihil interdumcrenata, leu cri(pa,cC|Uorutn finu alij pufilli ramul; piocunt: nicdmscaulis in fpicam purpurcorum fiorum definit, nuJlis intermixnsfolicijs; radix dura, ligno(a, inramosdivancara QtiotL-mporeflouenr.&anfcmtr tulenc, nihilmilnabco iigniricatum; (cIramiSjalioruniSalvjagencxuminftarjiUamfangi fciTe, vcnlimilccft. Stoehas longioribus ligulis, Sexchas brevionbis ligulis.



Scaberrima
guttur.

RE v E M ritipctr lubctStoec luijamos autctn imerduo cubicalcs, fruticosos, duroSt lignofojftmper ex adverfo nafcentes, quos ftipant numero fafolia, fibi invicem ctian* Itmperoppofica, incana. Lavendularinfar, fedangtiftiora&niinora. atnara&caliiJaxxtre- mi rami !nquadcangulasv!rgulasdefiiJunt, nudas, qurecapitula fuftincionga&angufta, nonnumquam breviora&craftiora multis velut uamiscum Vana&qimBmnnini inptominentr)orcs, Lavendul, rferc, Iaturatori, amencolor. s: rummiscap, iclliscmncnr vdu-

Scab. en
itj j-ih.

iimcinbranacexquxdamligulx, cotrulcoautpurpleocolorc pra-Ar* admodum long* inierdu. fxpiffime breviorK. prxfertim inHifpjni^ fenicincapiellulKPtpermaturiw- UDI ljevca^xiguum, fufcum, qualcf«e Uvendulx: radix licnofa & mulnfida i ? " " * I TM I I 5. * chadlv aW«a™mra, hiobfcvaiuni, cjufdc mci i Curcriorealti tudin«I. gnofis, fraj; ilibus. ienuibus, quadranRulisramis: folijsetiaobfone« anputtis, ow-

extremi qu a anulesv. rguUs. nucas. quadiagulas. mc ajw K - qu * ipicamfuftmcrSKrchadc longiorem&rariorem , ad Lavendulscroinonsfpuampn fcedentem. c mulcis Gmiiiter veluti membranaceu lquamiscongeftam, cum cmtctib"* in ummoqmbufdamlanufculisfoliolis purpuracxrulcis, iirniupcnorc: flores ex fitt¹ gularum fquamuhnim tinu copwfi. piirpurci uc in rcedenc: (cDien ctiam fianl^qucinadmodumSd radix.

Katoh

CrCCIIIXcha, pluriinisHirp: inie, Lllfcani: f.&G2llizNaibonfnGs!ocii Florccific p .nonimmquam Ctiam A'Jtumno. Sccondum vadgenusnonaid infutnnciCalpcfpontcnafc&fuuflorihusonuftin¹ fru anomen (ciDvcnicba [Hcuplurunc!cgibib [ibmiin»

Steeffiāscrispo folio.



LavemlaU tiulciftdo folio.



mini coiWpeftu m Scintrx in Regi^ arcis horcu-
lo. quaruor fupraVlyifiponem leucis, flonbus &c
(em ine plenum.

Si^af^^o/^afGr^cisdicicur, Latin is Star- *KtmmM.*
chaSjHifpanisCjw/a^, Salmanriccnfibusa-
tem qui funcin medicuilio fere Htipania:, apud
quos abundantilime uafcitur locis incultis, pec-
uliariter *Tomillo.*

Scundogencri, ferrati vclcnfpi folij cogno-
men addipocenc ad alccnU5drifcnc:am, LuLi-
tani *tlich? in frames*, id dt, Rorcem annum Gal-
licum vocabanrnam pleraque pertgna l-'can-
cici vocabuio Licrignare *tuleni*, non locus iz
Germani fuo Ko<li

Hvivs fjiitu'tcsnoii i c>>xi: veriimcum
cjudemcum pnorefir tau^^tpemi, timiles
cciam *vires obtancie, verum ille ell.*

IL 11 v s porE^KociutT^hyflopimodo, ad
pctoris vicia ct^Vdlc Oiolcorides rcfhtur,
ant illo cis m i Icc^Hfjfcra orniua ab obflru flio-
nibus & farcha liberare. AildutHBkiorc\$,c)us
flores advenit ad omnes dolores, & om-
gidacausSJBt *om, valde miter effe.*

LAVENDULA MULTIFIDO roi.io.

CIAP, XI J PU

PRATER LavcJulasvulgares. quarum una
brevioreft folio & fpica: alceravcro logio-
ra habec folia, longiorcmq. & inBexam fpicam,
flarem nunc cxTuitmm five *purpwevm feten-*
tem, modocriam albu Invcmtur almd genus
iarumadmoduin, & anemineantedcltnptum.

CVBITALI interdum alcudinc id aliurgit,
quadrangulis & hirtutisraomlijquos muluhda
tenuit'rqincifa ambiunt folia, lanuginofa,
cinericuictoloris, crjsgultus, & jucundio. du-
n.^Horesinfummis virgulis quadrantfulis^iudis
& lang inofis *f icemily otin Lavendula con-*
gcfri, catulcocoloreprarditi, odorati: fpicaau-
cemahquantulum concortaccl, ic in quamor
velutivcrfusaut ordmesdigefta, atianterduni
cxalianalcns: radicem habctduram, ligno-
fam>& mulns t; iriultsiionauni, quam vivaccui
efle. facile mibi pertiiatciim.

NafciturcircaMalacam Bectixurbcm^bi
illamprimu inveniebam, colicquodam illi uc-
bi vicmo. Febuario menfe florenic. deinde cir-
ca Murciatn Marcio menfe, nec u(quam alibi.


NK^VE *htifas facilitates iunt* mihi coniper-
tx. Ciimvero cjus odor muko minor (it, & mi-
nus capuc feriens Lavendula, prsfercimcacui
breviorfpicaefl: credibilcft, quspotennain &
vires. codemcalortsgradUjquoillacUjnoncon-
filterc.

VERONICA ERECTOR.

CA*. xL1111.

IN fpicam congelli funretiam qustirpis
quam vulgus Herbanorum Veronitam ic-
iuNoticis. Scinx. Aufln.c^jugisobcrvjbam,
ftainappcllat, flores: cujui aliquoc genera
aolijscQuod (ciam)nondunidcncpca.

Cvnr*-



iHTuuu rA^{Cv} BITA^{ns} **PwfcrtcafilesPrimom.interdaiaetiani** ampliorc^non TaldeTamofos.fcr-
TmSr' lif ^m i Tlmisal.s.fcJ inultisnodis.prdsiros.foliacontrarijs inter ft pctiohs ad Cn(ulos
 nodosnalenna.duasauttresunciaslonga.unamlacj.cr.-)iTj,caero **india** fflendctiaque,
 acm-fu^{VIX}conr^P cu,scenisserr «a, gufwadraodQin adfrinRencisScxcficouitis, dcindfl

inmo caule spicatum crescunt multi conferti flosculi .oron<<: *rertxdiaxfl^{bus}
 forma similes, sed colore paulo diluiores, abinfimapattefpicaram wplicare fe.ncipien-
 tes,quemadmodum Teuerij flores, & alij p^{er} que
 fermen in planis vasculi q. u . jpic/.n modum cogesti **nascuntun**
 fin^{radix} gu isannisnovoscxUteribusaniesproducens. ^{fibris donata,}

radix nem non excedens, multifque in fummo caule
 ram^{predita,} cu^{re} upenonibus non minus ampla & cra **EistQt^dneque(plcndent,**
 neque adeo atra sunt.

3. Conspicitur & tertia species, secunde n5 va! dcdi(rimilis, cujusfoliacvidentioribuscrK
 nis serrata sunt, ramulique oblongiore florum
 fapor idem qui in priore.

ihftu.

Firma etiam est Alterius radix, lateribusque se propagat, novos singulis annis stolo-
 nes promens cubito non minores, rectos, virides, veluti nodis aut geniculis distinctos: folia
 in singulis nodis bina ex aduerso nascentia, oblonga, ejus L. simachur qu^{a:}cxrU:umf^{ere}

P^fim'Ha.redcraftiora.&fflanBbitaminuiferrata/guibpriin um adstringente &
 poeaaacnufculo: (uram.ramMnfpicasciiruntca-rulcolrum ^{florculari}
 forumq:ia:uoffoloscni

Natali.

2. Habet etiam secundum hoc genus alteram speciem, cui media sunt inter utriusque ge-
 nus fol-
 ia.hocdtjlop^iil.ibtioraallotamJanqustiora.cauk-MiitiLisr.imoi. dilliriorqitlo-
 ruTMP^Maporquidcadfringit&exficar, fednoiiadedTchernencrurinprii aspeck.

invenitur **otrumque gennscum faitpecibus, inmalcu Pannonacfilvofemontibus,**
 K>uaccq:imhra;ipriacaunive66,&A&fricaALiAlpnmiiidn;ts.bniru^{Kp} ecia m:
 Florenti

Vtrnitaftm-

PEDALIBVS est fuscus Tertium genus, duru, lignosis, lentis & flexilibus, sumi spar-
 sis & diffusis, ac veluti cinctis frequentibus nodis, unde ex aduerso semper utrinque ramuli
 evalescuntur

Veronica m, fruticans.

Veronica refla vulgaris major.



Veronica recta minima.



cnafiuntur virefcntes, inquibus bini inter fe oppofita rb! i o la, vi ridi3,craftju feu la, fplendc- Eujogiufcula.&minuriliscrnis (errata, amari faports; extremis ramults feni aut ocitoni inlident flofculijexalarum Una prodcuntcs,qU.1 tuor.ut pluri mil m.interdumquinqHc foli olu conftanccs, tirulci colons clegantiflimt, pal(-.iitcumbilico,&rubroarculoeum ambiente, undeduo ftaminula prominent, & ex medio veluti umbonc ftilus tafvex probofcidi fere iimijis,ftinen in larionbus maioribiifq; vulgan veronica vafculis,&compreflis,exiguum, nlaiiunijfuIvcfcens.Tadixlignofa.&mLitasfibms fpargens:quin & ipli furculi proxime radicem.atquccciatn lougiusaradiceffi paultilum terra opcriantur)adfinf5ulosnodoifibras& radices agunt,

Provenit hoc in Sneberg&ralpcflribus Stiria: jugis, ubi Iunio floret i at in hortis ctiani Maio.lcmenlunioadmaruritatemperducir.

NON dubium cft.quin pnoraduo genera,ad Veronica: vulgo vocata:, prx-fctinj qux recla cognominatur,(int referenda. Tertium.riqms inter Tcucna ponusrccenfere malic, non magnoptc refragabor. Nullum veto vulgare nomen ha&enus incclligerc potui,

Basile.

^GTERV< Veronica; vulgariſcum rectum fupinx.maximain Pannonijs,Stiria,Au-
ja infra Auifum,& Moravia,c(tcopia: nec ullx funt cxduxGlvx, "ulliaridiorcſcoHi-
&artimr*%quialcerti[:rumnonalant.

Illius vero, que recla cognominatur, duifpecies intcificdiferctarinveniunmr, Nam
aJiera

Veronica vulgaris.

**m. vulg.
"m.

altera majoreft. iatioraque Imbec folia ^longiorera florum fpicam: alceramirror.gracilio-
frem breuiore'mquc caulem, anguftiora folia, minoic'mquc fpicam. Veriutquciconera
criatiiliicfubjccimus,

Veronezautem Tpecies C. V.Fab.GoLad Alyflum Diofc.rferendas putat.

TEVCRIVM.

CAP. XLV.

Teucrium
vulgare

ALiciVOTftirpcsvarijsinProvi[icijsobfer7abam,qu*,meaopinione,plurimiimad
Teucnj hiftonam acccdunt • quas quiaancmtae ddaiptas vidcbam^peracprctimn
cncfa&tuiuniarbirracus(Lini,(icarumde[criptioncmmisob!crvarionibHsinferciciTi,ini-
ttum facietis iraro quodara genere quod in Hilpanijs mihi occurrit.

Teucrium vulgare fraticans ,five r.

Teucrium fruticans Batticum ,five in.



Teucrium Teucriim aurem appello vulgo receptaopini Dnc. plantato illamfiuticantemfragilibo*
ramis, quadrangulis, quae totia tert secundum nodos bina semper inter se opposita, latitudo
JajCrafTa. tnambitu Chamdryosmfhrincite & quodjmmodo fjuote, luperncvn idia &
fplendntia jtifernccancfcent'ia, UCQOdi(J rramur) odoris; Hores in luramis ramis i,
fcremododigcftos, maiufculos, hiantcsihfbrflorum Chamardryosrcpcntis, nulli tame"
galeateaos. coloris exalbopallelcensitametri pof tremodcfciprKin hoccapite^rop"¹
forfiran ad Diofcoridcam Teucnj lultorsam acccdant.

Teucrium
vulgare

H vie non valde difiimilceft Alrcrum genus, femine natum, & duntaxa mihi obfetvs-
tum anno M D. XCIIII. nani pennde ucilludin fruticem aiTurgit, ramis ramen renuoiribu*
& incanis, quos ambiunt per irncrvalla bina lemper foliacoucrario iitu nafecnuua, Teucnj
qmdem vulgans folijsforma(imilia, fed inferneiTiagis incana. fuperncminus virentia^
Iplendntia. arqueeriani minora: florescx fingulis fofiorum linibus produnt uti iculisi";
ciufi quaterniaitr [ciit, Horibus Teucrj] vulgans fornii non difpares, nifi paulo minore SCI*
fent, % colore purpurco: femeni [griimroti indum. Totap] anta odorau Lit.

Teucrii Bt.
vulgare

Mitce batur (cmen Crta Chama-dryos majons appellatione.
I L L s aucem priori bus duabus ilirpibus, valde affinis c(l frutr x ille. quem in Bactica^{o b ^}
(crvnbam, proindea incTeucrm B. ticum appdheus. qui hec huinaia inrcrdum rltu-
dinafTurgac. plerucq timen liutnilto reit, umcoflolonc minimidigin crjjjtudme
dicantccomcc obdufro, &: in aliquot : amos divi (6, qui tali (eric digeni iunr, uc b mij
tun (Incinviccmoppolici . qucmadmodum in fupenore, incuni: loliapra-ccdcntiik-
majora paullo, iuambicu noamtul iinuata (quod pifto Jion exprific) externa pa^{rtt}:


omudo

ortnino incana, interns veroetc atro virentia, non tamcn folcndentia ut in prmogcncrc, guftu psrjmm amaro: rl >s candidus eft, labns infctnc prom meruibus.uu ll.igaka luperius nnmitiente,ahquotoblong!S fta:nimbusiive vithsex mcdioHoreexiliencibus. Pcrpccuo Virct.non fecusac vulgare reucrium.

Monubus circa Calpen.ad Herculeum frctum, & Bxticx maritimis, in fepibus &c inter aliosfrut.es invcmcbini; rumctiam Gadibiis,capartcquaconc<<ncnrrcccnsconjiinfla tumerat infulapontcuJmiribiluvulijoPutnu JfCwjftfdiao^cdhumiliorecim com>> mcmor.Uii locis. Florebac t'cbiuano,

Tcucrium mi.

Tcucrij niLctctiafpctes.



^ VBITALES arquetiam ampliores habet Quarrum caules, admodum frquenrcscJt UatuJccpvoclcunccSj^uairangolos/ubhifutoStnodisclittinfos^ tolaChamacdiyiirc pina, aut illius folijsqux A. nonnullis Sacra licrbacxiflimata elt (dequaad fcqcutntis capi- sCi]ccti) fimilima, binafctnperin(crfeoppofita, pcrambitii rorra[a, aniani (aporis: iummi ^ulcsinaliquot ramosdivjduntur, gctantesobJongam fpicam florumcarrulorumqna- oljlnhtiutn. quorum. quod fuperiorcm pirtem obnctjlatiulculum temper ilr, qdifrindun]. duobusituusftaminulisi: ftilo, qui mara-fcciesintegridcfluunt: pitclla demdc btftida, pl. mi, ur in Vcronia^gcncnbus, cxiguo (ctmnc plca.-radix h'brofa QfnoJuineftj&vivax. quotannisnovoscaulesproducens^uiinficuapartcfcundiim ma- Ctin fibrasctiam agunc, fcfefcpropagan[.

Crefcit in omnibus collibus & montibus Pannonix, cjus ct'iam quac ultra Dravum eft, Aultra, MoravisplerirLjuc&BojicixfithbfittnJlQCs&interfru rices. Usgenminvemcur interveptes, non minons tongitudinis virgasferens, tcnuiorcs ta- r, ut^in. busfolijs & diluione flore.

Tcrtiuni partcrea in hcrbofifcollium jugispaul6 liumilius, anguffioribufque folijs, in teris alioqui cum illisconvencns. florciit ocs hx fccics Maio: Pnor &: Sccondacoam

M V L I A S ftinmJradiccfundicQuintumvirgulai. dodrantalcs, purpurafecftes, tnt- Procumbente^quasalcrnarimbtaicnpercxadvcrfota, amplcdunturfolia, Cha- minors ramen,

gullo anguam exiccante, dcindcanunufculo: futnmzvirgulz iuninuloidivifx, nu- mcrofus

Tcucrium v.



Natali.

Tcucrium v. can-
dicatiflora.

Tcucrium v.
junilum.

Tcucrium
montanum.

Tcucrium

Romana.

Tcucrium

microfos flofculos in (pics formam nafcen-
resgeftanr, quatuorfoliolisconfntantes, eo,
tjuodfupcrioremflons parrem occupar, reli-
quis majore 8dlatiore,cui circa umbilicucn
duoftaminiiJainhxrenr, fillifque c medio
umbilicoprocnbrac, integr deindeflofcu-
li, quifuntaut caemlei colons /aturanflimi
&(*legantifTmii, aut dilutions &quali cine-
racei.fporucdccidenres^ucmadmodumir
Terno , filiquulas relinquam planas, cxili
fubruiTo femine plcnasr radix etiam valdc fi-
brofa SC V! vax, fingulisansms, ut Quarta.nO
us virgutas produccns: quin&ipix virgu-
Ix nonnumtjuam fecundum radicemrabra,
agunc.

Nafciur omnibus fere ficcioribus agri
ineukis, herbofisque aggenbus & collicu-
Jis, Iccundum vias publicas inferioris Au-
frix,pr^rctim Vienncn(iagro,&apud N<-
polim vicinam urbem loci naturamuniti
mam. Floret Maio.

Vnicam hujus generis invenicbam plan-
tamannoM. D. Lxxtx.ad radices Montis pa-
go Glafcnfeldimminctis, fecundoaNc:
poll jam memoratannlian , quxrlorecmc
cameocandicaarctn habercc, tircaumbili-
cum canici coloris venis djftmclum, Si ejuf-
dem colons flamina &c flilum.

AT infummoEtfclien)ugo,neufquaffi
alibi, Sextum quoddam genusobfervabirn
pumilum admodum , fcmipalmanbus vif-

gulisquadam lanugine pubefcentibus, quas bina, fen per inter (coppofita, vt ftunt folia
minorts Cliamacdryos ioiijis latis rcfpondentia , inter cusclummiiVngulisobiongiufCLil¹
nafcentur t Lurbatis caliculis flores ,a. (upriorum forma diverfi,concavi enim funr,cxtre-
misoris]acuiiati,la«ores,carru!citaroen etiam coloris,equibiis duo ftaminu la cum longo
fii!oexeunc:dL-rliicntibtsintcgri5rtofculis,fucceduntcraffiores&:majoisfihquae,cxifuo
(cm inplenar: radix etiam per |limmaierpit,tenuibusquefibnsprxdita eft.

Hujusgeneris Sialiamplantulam policaiveniebamintummoSneberg jugo, quxin-
flarfinnorisilltus Gencianx verna; clegantis, cxcodemradiculantm capite , bttvesr**
mufculos in ambitu fundithumircumbentes , &(u(tinctes quaccrna aut Itnafoliol*
alternisquidcm6bioppofira , fed adco arcle congefia, uteodemexortunafet Jiarcau-
liculuscxilitanciaus , nudus , gracilisadmodum , fummoafhgio binos, inteidoom*
ntma foliola , produccns flores luibncns , fatis amplos , Quinti generis flonbits fora^J
fimiles, ctuerci colons, qui etiam inccgti defluunt, ijsque (ucccdunt tnajulculaquam **
illo loculamenta.

Florentambofulijinicio, priorisfrmen maturum Augufio, quomenfeetiam alterius
naturafecit venifimile eft: ego plantulam florentem & loculamenta adhuc inania habent
Km legebam.

TETKPION GricijTcucrium Latints dicuntur hx planrx, aut eo nomine donari p^{0,1}
funr,pritrctinuJuanun)genuscui»fuisfcccibus,&o,uinii3.Nani DiofLendesTcucroi⁰
herbim cfcait, virgarrettrentem cffigcmTriflaginisfiinilinKliDe^qmin &: Chamxd⁰
anonnuIlisappelJanfchbiC.cuictiamPliniusfurraratur. DodonausiXhamadrynafluf-
gentem vocavit. Nuilum autcm vulgarc nomen ittarum flirpium intelligere potui.

Difpiciendum vctoanTertium genus ad Puicrotaherbam , cujusPauiamasinConn*
tlii,ilismeminitjreferripoflit.Nam i(lie,P?deroris folium minus quamfliluli, <r>r;v,msiui
qu.im lhcisen crete, triguramilium, quoniam flilij, atque altera partem nigricant, altera il-
biimjCUjuscolorfolijsPopulirfitcomparanpoflitacrtenoftriftiipii folium avtrfnpar^
incanum.popuhalbifolialterampartemcandoiavaldeclmitaiur. NihilftaiLO^cdftci*
fiusilUcorddffldol'sdiiuaxatfirabto

TEVCR 10 porro,Diofcondeshaf.icultatectnbuit. Reccnsetm f ofca, autandifer
vefaffi Jus, potu Ucnem potentcrabfunin; licnofis cum accto & ticis Illumurjiuffi fcrpe⁰
tiumtuorfibui ex accto IbJo, fine n"us.

Ji Er fHiS fijnrTnJenuTn&CJun).Tdrv'.afqi]tfac{cda/finci,t!r\cter(?s,Tciicnum
 ••cti.m Ch.iti; ••lyn,cor-trj.CltJnix-dryn TcnchmB appclbiinc, proptcream qua- in- Chamadrys
 t f r t g i q i d h i d f e d f m i c i k s .

Cu A M ^£ DR YS aucem.dcqiuobisounclirrho.quiijuc fercomnibus nocaj.im est OxMO
 fttirimisregioaibaseftCumliani: frequenoffiraacmmiu Vng.iri.Suru.Auihij, vicimf- •"k"»
 que ProviKiii: riuthenini j^rorum puulo (.•ditioreclofioruni.iuufi vunrtoru luntmar- ••*****•
 bnes, qui ci 1911 ftbundnc led 5d inaarfum, iecundmii pubheaj via!, gramincis locis na-
 citurOuorumporroctlgnerum.

.Chamadrys vulgari5, five i r.

ChamaMrys m.fivemonuna.



VRA, vegetior & uberior, longioribus, crassioribusque virgis, amplioribus & succulen-
 tionibus folijs, lon^iore florum coma ma quibus us & dilupus ut irascentibus floribus.

ALTRA, miiior, gracil»nbus virgis, mi»oribus folijs, brevior Horum coinâ. & minon-
 nis. (Aturatiulqticrubentibus Honbus: vul^atiorctiam, ex qua videlicet in plenque An-
 gl.T locis. arc. iniiii in hortis fpatia claudontur.

Warneandido Horc irartaacein, apud Monasterium Holtzkirche, infra Wirzburgum,
 ni Nonbetga Fiaocofbrtam anno M. D. LXXIX. proficikrer, menclulioobfervaram
 erueham.

Omninm autem radix iarcierpit, L. inugmcpubfcuntvirgz, quxhumidiAufic, fibras

k u S f u c f f a b u l i

CHAMA ru degansaliud genus invciirur, quod dodrancelibusinrcrdumferpitrarnulis,
 coforexfuli: orube: Hejir. r> Jnis, duris, lignofis, folijsnuUa (criceo5ii[iibLt;ncibus, Chams.
 orycn Icgitiim foli. ircti-rainbus, fed paufo roiiionbus, 5C fubrus incanis, guftu admodu
 *J(lringtn:e&ex(iccni)rc: Horesillnoblongispedicutis Uiriutis fingLibtes, albi, (ex, ut
 P^urinaum, mtcit!oinefi>i>oaoJ3autdcnis(adfoprolocinawii subertate aliquando Ju-
 riat folijs constantes. Cisti feminæ floru pæne magnitudine, multis flaminibus in me-

>io prxdid. inodori: q 11 i bti s dectdentibus, v 11 lo fu m (uccedit (emenjquale fere Caryophy U

•lr<-i!ninx aureo Horc. librov. ticfi: ribend. r: radix dtdurajignofa, indiverfatendens, &
 (1^ ibafdam Qigicantibus fibris ftipau: quin, &: incrdum jiumi procubciites & c Ipari rarai

Chamaedrys quorundam filvefris,

Statua

Natura

Herbario

Icono

Facilem



Ocimum Indicum.

Chamxirp
filvefrut.



Chamxirp
filvefrut

fibrasagunr, utintegrinonnumquam cespites ea teQi conficiaruur.

Frccjuemcftinfummi5 Aininaearum & Snriacarum Alpiumjugis; floret Iumodernpe (blutisificnivibus, iemcnad macumactrnpervenicaugufto.deindepedicultomnnoxarc(cunc.InhorcostranflarafubijUmbrololocotnuiquefolorcposflia,aiiquamdiu*pcru'(r.ic) raaturius floret.

G R A c i s porft priora duo genera x^aP^Am
«%cwa.tJptn-l> 'n MbJ'pi'S, quibuldametiam
LatinisTrixagoaucTriffagodicuntur:
I tal is, J^utrciucla. G al li s, Gtrmandrit & Cbf-
ff^ («:Germanis, ^*ll; > i'S< (Hifpanis^ Camdrts.
Tertiam Gclheruslibellode raris & c admiran-
disherbis, indecriptione Montisfrafti, Hei-
bam cetviexquorudam (cntentia, ni fallor,ap-
pellatt&IofiasSimlerus CommcnrariodeAl-
pi bus, Syittivmti Sc Chamardrin alpi n am.

A N vtro ad Leucadem, quam DiolcorideS
Cliamat(3ryifubjungit,&cjusduogenera Tacit,
unam op nvvir.altcrani Stifipoji^xrcrcni potTit, ia
tanti brevitac certi aliquid flatucre difficile
eft. Verum quidcmeftLeucadifrnourans fa-
cilitates, noni-iullis carum relponiicic, quas
Clianiidrysobeinec: nam h.15 illi tnbuicDio-
Icorides. Recentem in aquadecoflam, potu
tuffibus, induratolieni, urinzdificulraci,in-
cipa-titibus hydropicis, auxiliari; menftscie-
re, partus extrabcre, licneni ex acctoponm
con(umcre:arlverrus ferpentiuura vcnena, ex vi-
nOjputu/illitiquccfHcacillimam&c. Lcucadi
aurem, utexvino, contraannaliumvuiena,
prxcipuc nxannorum, opitulctur.

VVL CARIS prxterca eft tori Pannonia*
etiamintcrarni,Stiria, Auftna,Moravia,B^o
hemiaque, phnta ilia Teucrij gner[busqui-
bu((.liiu.ilTinis, qurpaiTunin Hifp.iinis, Gal-
lia, Germania, Belgicique licrbofislocisna-
ficonlptCLtur, floreczmtcopulclicrinio, fo-
lijspencCliaxdryos & c jusnomine.iliquan-
doavulgo donata, asqaetiam inufuiurccc*
pta:quam nuaplchqucCham^dryn filvelticO*
appellant.

OCI MM 1NDICV.M.

CAP. xlvu.

P L A N E novumcft hoc Ocimi genus, Sc re-
minccx Italia luillbprimiini in Gcrmania
nat m,unnohonagel mo qniam clu Km
quingentefimum.

I N pedalem autcm,vcl ampliorcm altitudi-
n m,c (g, T, q^ ual f d, l f at (ne u r p
reijiii plurimum,&ij].juuigracaiin%co:ons, in-
terdum ex vindi Juutaii.it purpurafccotrSi &
plnresalas, modo in hair, niodo in alti a parce,
exacker(o Jempti iitas ,divifo: ail Jrtguiosn&-
dosfivegenicula, naicODturcx aducrioamp'*
folu, duasuuciasauL unipliuslata, trtslong3,
pectiolu

petiolis longis in rixis. in ambicu profundius mcifa & ferrata, pingua five den (a, Sc fuccu-
 lenca, riugna ex parce xacropurpurca, incerdumpurpurets maculis, majonbus & fre-
 quentionbus, vel minoribus & rario fibus duntaxat iife < Sa: ilimmus cauhs in florum /pi-
 cam definit palmum longam, exatropurpurafcence in , quivenici! latim pel mcrvallafe-
 nieum ambLjnt. lioceftjex parvorum fohorum alisutnque terni, colons (dum explica-
 li (unt) alb'i purpureis venis diftm&i i femeii in vafculis, quale in reliquis Ocimi gcnetibus,
 atrutn, rotundum, cra{nu!culum : radix mukiscapillamentis ficmara. Elcgani hxc plan-
 ts eft, Sc toca gravicer odoraca, ut cetera Ocimi genera, illorum euam infiar hic me pene:
 novaigitur (Ingulisanms(acione adquirend3.

Floret cum reliquis Ociniis, quoruui magna est varietas.

CLINOPODIUM.

CJAP. XLVIII.

QVALE fit Icgitimum Clinopodium Vcceribus defcriptum, nondum Iiquet, Neot-
 ricis diverfas ftirpes pro Clmopodio proponentibus. Ad cjus umen gen as ahquod re-
 tern pofle arbitror, quam hie fubijeiam plantam.

Clinopodium Auftriacum.



DODRANTALIBVS CZ est CaullCulis, Cgg<vfi—
 tenuibus, qd a ratis ius, benignitas, An, 1641.
 quosex intervallis bina {imuladlingu-
 Jagenicljlafemper ambiuntrolia.con-
 trarijsincer (epediculis difpolita, Ser-
 pyllto vulgari fere Gmlia: icdmngisad
 Clinopodij vulgo crediti, (ive Acini
 FuchlJj fohorum formam accdentia,
 IDincracamen, Sfrans crenults ferr.ica,
 vindia.non injiicnidi oJom.faponsati-
 icm ahquantulum acris, ficut fernie
 jamditlum Clinopodium : floresfum-
 niiscauliculis ad lingula genicula pro-
 rereCiinopodio vulgironon dilTiciles,
 fed multo majores, vi rpureo (acuro (cu
 viol'accocolorcprsJjtos (tamctfi non-
 numquam invfnianturaibi) anroi (mil
 maxima ex parte propendentes, 6£ con-
 verlbs: quibus lucccdunc valcula, qu.i-
 lia indteto Clinopodio, vemo(a, in qui-
 bus terna auc quaccrna nigra k-mm.i,
 Calaminth^aut vulgaris Clinopodij (c-
 niinibusxqujlia: iiumerolns ha bet ra-
 dices, d uras & : mulets fibi ts camll aias.

Crcfcit in montibus, Badf(ibus tlicr-
 misimmmntibus, fiicetensvicmisad
 Danubium procurrentibus: vanjspra-
 tercaalijslocis. Floret Maio. ienien lu-
 niomaturum.

NVLIVM vulgarenoraen.apud ruf-
 ficos illius regionis adhuc invenrat,
 cum oblcrvabam, ego Clinopodium
 Auftriacum nuncupabam. quia mfuU
 Aultna inveniebam: non miniis cc>m-
 moJc tain en Acuion Aultnacum for-
 ficandixiflem.

porro Clinopodium, cujusmod6 memini, five Acinos Fuchfij, vulgarcctin
 Pannonix. Auftrix. Vicinarumquere regionumlocis aridis.

PASSIM item in crduis filvis, aut inter fructa, & ad flvarum raargmes provenit Cli-
 Hopndium Matthioli: cuius duo genera in veniuntur.

* Vnum enim est, majouque folia, & longiotacapitellahabet, acque illafxpius
 in tijulcas coronas difpolita.

Clinopodium vulgare.

Clinopodium Matchioli.



*Hum**. i. Alcrum lmmilius. minoribus folijs. & brevioribus capitellis prardiracfl. Folia, & quadrangulicaulesurriq. incanila HUGuiepubcfcum^spuipuralciijr adixi multib. capillaca/crptt. Vtrumque lumo florcc.

CmUmtath S VN r qui Cajamentuminodurum appellant, tamen fiomnino in odorum non fitce P
MIHM. fendum, quando quidem m rerdum odorc quodam non ingraro lure? perfundac. Non de-
Anna. funt qui Acinon vocare nultint, !cd Otokondci Acini hiftoriarefragatur.

CETERVM quia in Acinimentionem incidimus, minirocprxrermittendam ihi vide-
 turelegans quxdam p!antula, quam anno M.D.XXCI mcnie lulio Hortntctn in Anglu ob-
 fervabam jdur ncommodum navigandirempuse pefl jnsjad III. Dn. de Cubhani. Gartcrij
 ordinis Equitcm. & quinqueportuum Pra:fc(3uni proficifcrr: nullam cnim h, ; ilcuos vi-
 dcre mmini. quare dxtx Acini Diofcoridis in Uotiam mcojudiciomagis accedat.

*Acini Die** PAVCOS liabctliar amulos dorrales. tcnue Sjiicco Sjfubr Dbentcs, quadranplsrc*»
 frequentibus nodis ctnftos, ad quo; bina tern per ex ad verfo fita foliolana fcmur, Foclifij
 Acino non diffirailia, ied mmora & fucci] lcntiora, neque in ambitu rerrata. Clinopodij Au*
 ftri acifolia valde rcfcrencia, grati cujurdam odoris & Botrym quodammodorffcrenn**
 (cd non ad validl & gravis: (iimmos ramulos exornant verticillatim difpofiti utricufip
 quales in Acino Fucofij, dcinde limiles pendflofcoli, magiscamencxtzrulcopurp¹¹
 rafecntcs.

¥4<>ltMin. HAS auremfaculracs Diofcoiides ruo Clinopodiotribuit. Bibitur herba, 8injccct cja*
 decorum, ad convuHa, rupw, frangurias, (crpentium itlus: mcn(cs & paTtuspellit: 6t'Fcⁿ
 files verrucas, quas achrocordonas vocant, cijcit, aliquot diebus poium: alvum illicit deco-
 & um ad terms, potrimque^ ex vino. ii abltl febris, fcbriim auteni (encientibus, cxaqua.
 Acioo vetò ifbs. Mcnfcs Sialvumpotafiitit: illita, panos, fat: tumque igncni lanac.

TKACORICANVM.

CAP. xtIx.

D V o Tragorigani genera ftJU it Diofcorides. quibus bina as perfimiles plants*, fnifi j«-
 dicitum mcfafitit) uififpanit. amciprcgrinauoncvtdecicijict Jiini: dcinde teruani*
 quarati Sccondum genus rcduplicottll.

Tragoriganum r.

Tragoriganum alcenim.



TragorigaEiura ii.alcerafpccics.



V?V5

P E D A L i, aut fcfquipedali altitudine fructat Prior, mulcistenui bus Silignofis furculis, acquccircum tllsfoliaadlingulainccr' nodia bina ex advcrfo refpondentia habet, minoraquam tint Majoran3rtblia, medtx inter Origanum & Seryllu filveftre magmtudini SjOmnino incana. odonsjucundi^acris (aporis: flores verticillatim excremosfurculoiambiunt, vcl illisctiam in lidentexigui, tMiididijIenicii m inn rum inc. iliculis fuis occultatum gercntes; radix lignofa multis fibris capiHata Tota odorata eft, & Tempervirens.

Tragorig. 149.1.

M I N O R E S funcAlteri (urculi & candidiores^enuior alongiotique foia^Iiquantalum incana. acris guftus.- odorminus jucundus quam m Priore: flores cnam vrtici Uatim circa fummos ramulos nafciit urexuriculis prodeun Ees, majores aljs & gaicati, candidi: (cnic nob fervare non potui: radix priori tinnlis jignolaj dura. multifida.

Tragorig. 149.11.

T E R T I A, quz Secunda: genus, n('quo xtn^ forma jneque magm rudine valde ab illa differt. UJf. iti. \ ferens mvenitur, (urculi taincn nignonbus, magis Infpidis & aris folijs, actju flore minorc purpurco. Vtraque etiam perpetuo vi- ret, fed pofterior hxc lon^codoracior^jjqux album florem fbr.

Prior muttis Hifpaniaclocis provenit, arido & perroib iolo, cum Stocchadc pennilla: nuncctum inquilina fafla multorum hortarum, cuinin Gallia, turn in Auglia & BeU

Natalis

gica. Alrieriusucramquepedem felo Valentino agroobfervabam Martioflorenrem, I
Ipontenafccntem. Quaveropurpleiimfiorengent.inBclgicishortismihietianipollL-a
coafpc&a,& quibufdam Germanici\$, fed vix iftic hitmem ferens.

Romica.

'Ti GrsecisutruEnquegenusdiciturTragoriganum Launis:Secundum eci :
à nonnullis VPfafiijmfluod nomen fortafte fecundarejus fpecieiconvenicc. Caflcl-
tenipmu/cantiquoiiominealceruni utrumque vulgoappcllent,nonjme!lt.xi.

Clinopodium

Macrum

H. lani. ed.

rac. Longe.

Amica. Jap.

ca.

Non dciunteciara qui priorem plantanominem Clinopoilium :p!enquctamen pro MJIO
lubsit, aliquiHelenium Theophrasti efic augurancur, cujus lolu nomen apud ilium Au-
floremxiatinterodoratasplanrascap. i.&vi.!ibro vi. Plantartim Hiftor. Iftius femcn
aliquandocommunic3tum III^CationumPrincipi w i l h c l m o , A n i b r a d) c x
qao nats tpli plants, goaium unam deinde Cccam cum {eraimscjus ahqui pane_, Vieti-
nanti ad rac pro GJS clcoienriS mittebac,

FitulttHt.

TKAGORIGANVM autemcxalfaccrc, urinamcicre,mcnfes traherc, decb&opotobi-
lemeijcerc,4ienofisexacctobibi,&comraixixvencnax vino^penpncumonicis.tuificn-
tibus,cxmcIleineclegmaredaficnbitDLu(corides. Gracamacmitccflccjuspotionem:
quare cibum faflidicnubus, 8C Itomatho indn luclanti isubccilkique tradi: tuiuorci cut
polenta illitumdifcutene.

H Y S S O P V S S P I C A T O F L O R E .

CAP. L.

Hyffop vulg.
genus
1M

HYSSO vi iJliusvulgarisqui in omnium hortisaJicur.rtiainvenirigenera^olore Bo-
ris duntaxaunterfevanantia, etiamhortulaninorunt, vulgacilfimura,cieruleo; bi-
na alia, vel niveo , aut rubetctHe, qua: (atione in cum qui ca;rulcum fert florem fepiflnc
degeneranc,liccnonnulla;plania;matricoloremadquiraiit.

HiSnt.bi^

ALVIT aliquandoBctgicaaliud genushurailius &rencriux,hifpanicofeminenaconi
alioquiformanonmulEumdirTercnsa vuigan , cxnilcisflonbuj , quodz/i^ovocabant*
quianitnruin femcn, ex quo iuium.taU nomine infer iptumfmflcr. An veto id genus tft^
ctiam nunc alacur,me later.

HyfTopusangufifol. fpicato flore.

f
Hyffop vulg.
comf.



N V N C Quincumquodtlam genus **S**
vcnitur.nonquidcrameconfpedluni;
cjusiconad me miffa (cum tcnellis ip*
flirpisramufpicaruafloromonuftisiHilT⁰
pi fpicato flore nomine, Londino ulque, a)
opcirno viro Iacobo Gareio juniorc. Value
aucem fiuticat hoc genus, nec mindsqoi*
vu)gare(uisvirgiscfpropag.it, qux lcliqui
pedaicsmterdum funt.durj gnoiaomul-
tos, vTid«S, icnuefquerosdit q.
obfident anguftioraquam in vulgan foij.
vindia, cahdiguttus, alternis&cxad^{vtrflo}
interIcnalcenm: lumnnrami definuntio
/picam florum tllos verticillatini 3mbicfl*
tium,vulgari forma fiintlum, mino^{riJin il,}
men, colons carrulei: radixdura, Itg⁰*
multifida plurifnifquecapillamentis firmit-
ta, ex qua etiam plures narcentes virg* " "
munterdum procumbentes, fibrasagⁿ
Totaplanta, fidigitisatcratur, odorata^{ct} •
Similem deinde plantam naiftus fum^{n i u n *}
relioncfli&:oppiimiv]n\V'iHcluiiP^{ardg}r
Middelburgenfis.

MEMINI&:altudHyffopi genus
re in Anglia, anno reparata: (alutis^{h u r p a}
M. u xxci.vulgari non admodutn dirTim^{l c}
ledquodad Quartunullud genus P^l(Pⁱⁿ-j
cofcmincnatummagisaccedcfct.cxcep
ramtilu, qm in virgarum f.irtigio numc:r
in latam comam Ipargebantur: propte
Hyflbpt comoii appellationem mdcbaoi.

genus mm tempoiiviciaamtransferrc volebam, fed initinere mii" cormpuim.

THYMVM.

CAP. 11.

Thymum legitimum.



Q VFFRVTEX estThymtim, pedcm ^{Thymum le-}
 O interdura akus.multis ramis lignolis, l''''****-
 tenuibusj & candidis prseditus, quos per
 intervatla ambmmt folia fibi invicem
 oppoCira, angultii, ccuin, candicantia,
 acmgu(ius,quzquibii(dam locishieme
 dccidunt : namubicumquc fponena-
 fecntem hanc plancam invemebam.feu
 hicmc, feu vens iniiiio, folijs viduam
 conlpiciebam : fed utrinqucab exortu
 &vdtigijsfoliorum,prommebantvelu-
 tioblongacapitc!la,itiitareorumquTin
 Origono Onid funt, ex tcncllisfoliis
 viridibus coogesta, aded coiifertis fii mi-
 microfis, ut unicum longiufcutum fo-
 lium apparec: lpfacapitllacumflori-
 bus in ptantavirenreobfervare non po-
 rui, jam crnm deciderant, fed illorura
 dunraxarveftigia fummis virgis five ra-
 ni ulis,in omnibus plantisconfpiciebam.
 Hilpji autem , ubi maximus ,eii ejus
 proventusfnamaliudThymum non no-
 runt) magniejusjam re'ficatt fafctuli
 demonrtrati funtcum fuisfoltjs&lon-
 giufculis capiccllis fuos purpurafcentes
 fiors ad hue rcinciubus , graciiTnm
 odoris; illoeninainaquadccottoutun-
 turaddolia, quibus vinum aflervatur,
 clucnda & rpurganda : non minoris
 eciam ufus est ad conciliandam odoris
 grJtiam ijsvaais, quibus condita: uvz af-
 il-r van (blent.

Cctcrum non modo circa Hifpalim ^{Natali.}
 copiosnafcir.ur,(cdGad>busetiam,qua
 pirteinfulapontejungituccominenti.todinruperBfftica inmantimis coilibus mendiei
 obverfis.

TH rMVM verdvulgare, quodnonnulliduriuscognomant, quoqnc, reftectiam ^{Thymu coly-}
 Plinio libra xxi.cap.x.NaturalisHiftorix.lapidicampi in Narbonenfi Provmciareferti ^{varietat.}
 fnnt:&ncditerraneis(qucmadmodumSalmantencnfiasro)acalijshifpani3fllocis,fponte
 crefcttgracili &C falebrolo folo^nunc purpurco.quale in Narbonenfi Gallu.&Aquiunic.i,
 nunc abficante flort.

P R. i M v M ' Diofcoridis 9v(Mt est, Latinomm ctiam ThymusautThymum, Barticis ^{Thymia.}
 ^W^Qmplidcer.mcditerraneisHifpams.gnocum^tquenarnun.verfeGalha:. Alte-
 ter_{um}PiJ_Ur.hymumnignusciTcvide:ur,&illudquodD.ofcondescap^dcEphymodu-
 fiasappellac • nam in hoc, aim in Hifpanijs, rum in Galha Narbonenfi, cufcutatn illam
 'ulgaTemddicatulam rubrifilis cop.oscnafoencem ^capillamennsleiUi unplicanttm
 collicerememini CaikllanihocEhymutnw<w&/3//<w,aut^V<>>firopliciKr: GaUi,A
 **>TlcahrA>>>>Gerniani«Wmii»i*cr>>dfi&<A«ii w appellant.

D i o s c o R i D & autcm teftc, thymam cum acco &c fale pituiiario per alvum dextra- ^{Faculiat.}
 hit: eiusdecodtiusprodellorthopnoicis.&anhdatoribus,tineasvemrisexigi^mcnfes,
 partus He fecundas pctlit, atque unnas dec; cummcllc in eclegmace faciliores effie
 cxfctationes - recentef tumores dilcunt, cum aceto illitiim: concretum fanguincin
 diftolvic verrucas penfilCJ toliitcumaccto:ifchiadicis cum vinofic polenta impoQcuni
 fubvncir hcbstibusocuhsinciboprodcft, &c. Paresilli faculties tnbuitPlimus: infip-
 peraddit'daricomitalibiis.quoscorreptosolfaarus excitac thymi: virisconra inflatio-
 nescutnrncllcacaceto.Scfi venter t,irjTeat,teftesvc,autvfica: dolor exigat :arciculanbus
 morbis &c luxatis, trituax ac lanae infporfuin ex olco imponitur: danc &c pocionem articu-
 Uribus motbis cri'um obolorum pondere in tnbu cyachis accti Sc me 11 is.

TH Y M B R A¹ legitima.

CAP. LII.

Thymra legiti-
ma.

Thymra



Serpillum filvefrc Zygis Diolo

Sermina.
Serpillum
Serpillum
Serpillum



Serpillum
Serpillum

Serpillum
Zygis

*"pHYMO fubijciemusThymbram J. legitimam, pnmummilnconfpftam&cxadle notam anno rparar^ (alutishumanx nonagefimo quince (upra millefimutn & quingenreimur, ut quKmihiillo iplbnata, femine aDo-«i(Tinio reiquc herbaria: pen tilfimo viroHonbrio BelloeCrcta ufqucni{To, libi Cydonia: Medicarn artcm exrcct. MvLTisearamis AanmAradiccfrucicatjThymi infar. quadragulic, (ubafperalanugineobductiSjpurpurafcentibus, quibus innafcunturalternatem femper cxadverforamuli. folijsejdem feriedigellisy g j enpini foli s ne iiiiibus, iubhirfuns, oJoratis, medij quodammo inter cuoilam & Thymumodoris. acnufculiq; (apons : fummos ramos verticillatim anibiunt nliquotcapitulamuliisfolioiisconflancia, incerquxcalicult, c quibusemrgunt (uivitrpurpurafccntesHofculijTI-iynn flofculisiiailcs, inquatuorlaciniasdtvifi, quarum infioulatiorefl&rcpanda, (u prem a eti am I ati, led brev ior, rel t quxdusminores, prodcuntibusemedioquinqLic ftaminuliscaidieandbos, quorum apices fufci coloris, & niedio ftilo bifido. O(3: obri& Novembri duntaxat floresproiulit, caobcau(am nulum feme prabere potuit: e quo camen nataplanta, pufillum, nigrum ,Thymi femnisinltar: radix durajignola. ijuam apudnospcrcnncmfuniram ,vix mihi perfuadere potFum, licet ramiprocu mbentesfibrascgnnc.

G RÆCVM nomen 3: ~ Latinum Thymbra: Cretenfcsetiamnum hodie Sttjfn & 9-pt/i appellat. Dio/coridcs ca(dcmillifacultatestbnitquaiT!)vmo j ficodem modo l'umatur. Paulus autcm, ficcare & calcfacere in rertio orditiefenbit; liinc oleum inquodecoquitur, rigoresfbriucircuitu retneantes difcutrc, flores idem priftarCjquolum decoiaum mentis cicac Sc firius extrahat.

SER.PYLLVM. CAP. tirr.

SERPILLI duo generaVeteres feceruntSativuSiSilvefrc. Sarivum i (rpendodicitraditDiofcondes filvefrc non ferperc, fed in ahum crefcere. Plmius contra lib.xx.cap.xx i i.Silvefrc ferperc (nbitiSacivum non ferpere/cd ad palmialntudincm increfcere.

SERPILLVMauterafilvefrcZygisapptlituni , quali* Dio/coridcsdferibic* obfervabam. nifillurjinOftellavctri, ijilicm

Serpyllutn vulgare rcpens.

Serpyllum Pannonicum I.



Thymo duriore five nigro, cui perquara fimile est figura, ratnis, altitudi
& radice: folia verd pauld latiorahabecquam Thymum, minus odorara, fed gravius
Honnihil olencia, u pocce quorum odor fere fe inter Abroronuii & Stocchadem medius:
viris item rjmuJos, qui flonbus vrticillatim nascentibus vcfiuntur, coloris ex a! bo
pigru^{tafcen}tjs, qua florum difpoficione & odore, iTliymodi'cerni pncduiuaxatp
V Minor est prxcicacj us aenmania quam Tliymi, quippe <ux liquid adfth&onis
admixtum habeat.

C A f H pnetr hoc, ahudettfilvctre, quod vulgariter crefcit in omnium quas
rouinctarum nudis collibus, gramineis campis, am llicioribus praris, viarum juq
herb^{is} marginibus. Ejushifloriacumiplenqucfirdefcripia, minime re-rexendam du-
cimu^{*i} iconcm tamen subijcimus, atque iria alia genera mixrim cum illu in Vngria,
Aull^{ia} & Moravianarce mia. Uoccapitedcfcribercinfituimus, quia ab alii snone flcob-
ler J? ata video.

M V M est admodum fimile vulgari in omnibus, ut opinor. Europx Provincijs nec-
ti i craffior ament & magis acra liabcc folia, qua: uita, citrij tnali, vel meli Hipliylli
Wrcfcunt, Sccapitellapulomajora, magtlque purpurafcenria, fimilibustamen
lispradnaicrafliores rannulos^uadrangulos.patmarea, perterram tufbs, adfin^ula
Knotiafibras agentes: radice m vcr6! ligno! am, multifidam, fibrofamque, numero fbs
P^{ro}fcrcnccm cauliculos/umina cellure in orbem fere fparentes.

I AN G V S T I O R A Secundo func folia paulo que longiora, viridia, pljbra, rarius per cau-
culos fparfa^inafemp rex ad verro, fed alccrms, nafccntia, quem adnidum niagnrixi
partinccteris ftirpibus qua: quadrangtilofun:cau!c, aut virgis: cauliculifrcq
b. l? "> humifufi, & fublllde ad Mr. rnnfli: lftlri: l: (Afirrimipes, «M
reuti ipicata in fum: << WKMW P. ... » << ... » rixqualibu, referta: radix ligno-
fa est, dura, & multo fi J. Totaplaua uaucnis juglatidis folioru nodorem quodammodo

refrc.

refert.interdum nul'o mamfesto ociorc ptniua dep rchenuui: lolinc *mutatione, an auz*
 varianusafHati) id accidatjtr.c later.

Scryllum Pannonicum in.

*Scryll an-
gula in agri-
moyd. folia.*



Tempus.

Nomina.

Facilitas.

Dispositio.

LATE ferpk Tertium genus, & magr.oscefpicei nonnun quani occu-
 pac. Nam Iretduram&lignotam Iia-
 beat radicem, ut precedent]a genera:
 renucus ramen, quos in circuin Ipar-
 git.cauticulijubindefibrasagun^qu;
 teinporisfucefflu, in radices non mi-
 rids duras& iignofcs evadunr, I:llam
 fit primaria, atque alios dcnidcfun-
 dunt in an.bitu cauliculos folijs non
 minus quam *rosm5 r cedentis,ob-*
 longis, & ijs quidctn atigufsttonbus,
 preditos, iucana molliqnc lanugine
 pubefeetibus r lonpa in (ummistau-
 iiculiscapitella a fecund) generis ton-
 go glabroque folio capitcilis uondif-
 terunt, &c (imilibus flolcnlis plena
 func: (cnunain villofis rufefcentibus
 utnoJisparva, rotunda, tufa colons.
 Tor.i(tirp5 pineum quodacinodo *fi**
 ve re (in ace u m odorem tt ita refert, *tC*
 calidoguftueft.

Omnia lire genera eodem temperc
 florent, men (c vi Jclict c Iuaio: nacales
jam ante ducicats.

DIO^CORIDI ?FTI/AA0(aJi<0<
tSH Kvyk vocatur quod pnmum de-
 renpfj: LacinisScryllum, &Plinio
 quidem domefticum quod ferpre ne-
 gar: vulgare autem paffim nafctns,
 ctiamScryptlum abommbusappella*
 tar: quo nomine, alia qua: fubjeciin
 Auftna & vicinis Provincas nafcen-
 tia,donanpotciunc:nain,quantumcx
 temperamentoconijcere licet, fimili-
 bus ctiam facu Iran bus crunrprzdita,
 aut cerre non multum inferior! bu;

SILVESTRE aurcm fativoefficacius e(re,magisexcalfacere, &r admedendi uTum
 aptius cflc tctiscft.Diofcondes: proinde menfes irahcre, unnam pntu cicre, tnrmini-
 bus, ruptis, vulfis, & jocinorisinflammationibus auxiliari; adverius ferpentcs, *po-*
iu illitiive: capitisdoloresmulcerafaccoincodum, &inacetomadcfac>um rmaxime
 verblethargicis&phrencticisconvenic. Cruentosvomitus fedat fuccus drachm is qua-
 tuorexactopotus. Pliniusadditex aqua bibi ad jocinoris dolores. folia obolis qua*
 tuor dari ad henem ex aceto: adruentas exfcicationes teri in cyachis duobus, accri
 filii

Ceteriim inScryllidefcRIPTIONcapud Diofcoridem, mendumcfTefufpicorin hisver-
 iis,(pt^AAwi7r*pwA(«o^toiCLP^7D>i^Va, lcgendumqueopi^<t>a>arbitror: nam quxaffinitasfo*
 Loium Rutar cum Scryllh folijs f accuratius hie locus coilliderandus.

P O L I V M.

C*. UIU.

PLVRA quim Vcceres tradidcrinc nunc invcniri Polij generacertum est, caquevel *Polium wa-*
 furculorum f *rikat, v f* *biolum am* f u duc; vel iniorum *varietate, acque in* taper co-
 tills ihrpis colore inter fe differentia*

Poliutn montanum I.

Polium montanum m.



v HVM. palmares aut ampliores. ex cadcairadic lignoia & duriproductau Ucutos, *P(Linn 1.*
 in mulcasilas diviros jiumifparfos, quos difpofito ordinc, & ex adrerfo, (empertcnraara--^j!) »w.
 P*utit*folia, loneiurcula, angufta, oris mexternam partem rcflexis, & leviter denticularis,
 ad cutvix nifidiligentrobfcrvantibus, denticuli apparcanr, incanis: c quorum exoreu
 tI Unumcrofaprodeunt foliolamagistend Uacincana: Summis ramuhscapitellafencx
 mulriscaliculi icancfcntibus & C tomctofifcongcfia (undc flofemcrgit albus) & quat (c-
 men continent per maturitatem nigricans. fubrotundum .fatismagnum pro plantar cenc-
^{ti}tat, Tocaplantafuaviter olcCjCmu gravitate quadam non injucunda. Februario &
 Marrio flore mcmobfcrvabam.

M v n i s ^itijrum fruticatramiilis. fupenorehrmioribus. non humifoi JS. fc dere Ltis, *Polium r r.*
 otundiurculis, incanis, palniaribus, plcrumque <iam longioribns: folia fuperiorc angu-^{/#>} <<.
^{ft}iora, frcqtici inora, cxtiuerv. -illi scoturanofici ramulos ambiunt, cxtremaparteduntaxat
 dertata, fed miniisquim in Pnmo: majorain (umms ramis haber capirmla longorar
 que. Uuoracamen. ncque ad cocompaaa. in quibus flofctiam albiis. dc inde fimenprio.
 << firtle Kon minus odorata c(t hie planca, quam prior. Apli Horct, intcidum

TERHVM trt-nusmediicfl interprimum & lcaindum magnitudinis, minus fruti-
^co(um, minulquc firmis ramufis fecundo ^rmioribus aut cm pmo: nanipartim prociu- *rtiamlt t.*
 ^enrescoshaber, p,ircmctiam crefliores, omnino incanos, magisctiam quam primum;
^fQliaitem utroqu L-amniiora, & cota Candida: cncclliramcnramulicapite Ualba |ampro-
^{tr}udrc incipientes, cum ipOs folijs flavcfcent lanugine obducunt, pemideac ipfa

Integra

integr^o oblonga capitia quae candem luteum florem profert: lemen autem alijs simile, uel ex coouo apud Belgas alebamur deprehendi. Florbat veronatali loco Martiomenfe, apud Belgas fenus.

Poliu v. purp. fl.

Ex istiusponfeimnein Belgat canato, & a Generofo Viro Ioan nevander Dii ftp. m. amiofingulan, Vienna in Aullrucadnicmiflb, natardint mihi iftic planta Sjtjuaf, aJtero a (arioneanno, Horcs mihi protulcrunt, non cos qm iitm lurocs, Jive pallidos, quaks ma- [cr. lcd modocandicances. uiodointcriuspalliccncnes & fonsexalbido SjComiimquectiam non minus quam folia canefccncem, veileviffimepallclcfncm; alioqui, latioribus & in ambitu cnfpisiucanis quefoiis, Sic andidalanugincpnbclccntibus virgulis, marrem rctercbau, quarucplonruu Djinmajorenilongnutlmc Eicxercice Dces, humifuxcrane, nnnorcs vero iurreicE.

Hoc genus aliquot annU in hotculo, quern Vienna: cole bam. confer vavi, lev iter ad ve- fufhiemismjuriascegcndorenerionbusabiagnisramis: fed alpcrailiaanui M. D. XXLVI. hie^o nscorrupt, cum ielt; chlliinifali } s(utaliquotjcsn}cmiiii)(Urpibiis.

Poliucn motuan, v. purpureo flore.



Poliu v. purp. fl.

Q^u i N T y u profiistenciumcn:, exilibus & rdodrantalibus ranuilis, **humi** fufis, mulu hnuginc catuuda tcilis, **qta** fubiiide ad nodos **ndioa ttiHK**: tolia illirununc- dizmterpnum & klccundum genus magnitudinis, brevtciauji >cn, **dcnaclata**, val- dc'que tomentofa, quz adrocjufaed ut in cncllts folijs nulladentmm vcfhguconfpt* ciiniur, niliadiligentrobicrvjmibuijcpitellaiupcrtonbujpaulominorj, wtiqucto- mentoli, mqtbu^o tiospurpurcus.

Poliu v. l. alba fl.

SOLA tencnr. u firpu, 3: flonsvarictas inter proxitnedefcriptum, feScxrum hocg^e* nus, dirctmenfacu, quodilbisflonbmelt jTxdtum. Vcruraquccnmignusliiiiilfreniu totnencum funt, & odorifuavitare rcliquagencra (upcrant. VtrumqucfuisflonbusonU- ftmMaTriorcpericbamjncdift'crentiamanimadvrtiJrero, nifiilonfcolor, dxlignem confcTendi fifigubjplanras, an/am pnrbuffce.

Poliu v. l. alba fl.

M V I T A S ex eadem radice pro mi t Sptimum Polij genus **ntgalfl**, pnmigentf- risvirgis Jimiles, (ed bre*ior < Sc magis fruticosas, fupra ccram (parfas, folia in his per interval la, bin a fem per inrer Ic oppofita, Libanocidis coronana: folijs fere sequ* lia, tninoratainen, (uperc vindia, interne canclccntia, millis crenis per oras nota- ta, amarigurtus SJucundiquideniodoris, attamen minus grati, quam quinlegitiimi POILJ moncamfolijs pertipitur: florem extremisramulisgcritcopiolum, album, akcrius Polij flonbusform. l' **iod** nbfirnjlem, non ramen Ipcarinftar creKeDUM, (cd vcluti in cap- puttoigcftumrfemendL'ttKictnvalculisexiguuro. ntgnansjiadixilliiluraJignola. rouU tifida. nfmInscapillaribusfibrisprxdica.

Qjuia porro illudcom, quaminPannonicisObfervationibusxbtbi, nullifloresad' din fuerant, fed (ob vafculaicincncoiuiuencaj aliam iconem adycercvolui, in qua qui

demBott

folium vi, cum

flme.

Polium Pannonic. vn. cum fcmioc.



Folium moncamimvi 11



demfloresbene cpxreffi: gravius autem pcccaium in foliorura pratpoftrA fine, quartemerc per virgulas Ipar/j f(Tc **Don** debenc, (edalternaum **utmctcrisgenc-** rihu; dit, ofita.

SE DCtiamcftOclavumquoddam ge- **r.usr^ti.**
 nusomnium minimum, duarum uncia- ***tbeftn mi-**
 rum longitudmcm VLX **fupcrans,** exitibus
ramutcuLs^ nquibus, nonminusquirnia
 ioperionbusordine &cxajvctfb **oppofi-**
Binafcuntar folioUdoriora, lircvioia&
 angudioranun **denticulaca: ramulutnfi-**
demccrni ant quatcini **Bores** alh, (upc-
 nori forma It miles, (ed **minoresihujusfc-**
men nonob&rvavijfedSeptitnogenari fi-
lmic eflcpuro: radixtti-iin fibtoQcft &C
 i i (i Nlli vclioo dntfgd i
 commndabiliscftliaccpbnta. Flurci au-
 tem fcnu5, [unio videlicet.

Neutrain liarumpollrcmarL flirpium,
 licet fqpiiiscumfuisclpitibus in hortum
 iranflatam, unquam cicurarc potui, (cd
 confuetopabuloticftituti.tempercortu-
 pta; **Cant.**

Pctmum,nafcit<t in maTitimis Bstricx,
 Valentiniqc Regni, & Naibonclii Gal-
 In. Alterum, nonnifi inmediterrancis
 •Hifpaniarobfcrvabamjlbloexili&petro-
 fo, incoUtbuscrcfcens. Tercium, rcj>no
 Gr*iaaECTili&: Valentino.Quirtum. (emi-

ne Teruj

ncTertij milunatum Vienna: Auftri«ica:;utpault>antè dixi. Q[^]irtum&Sextun), Mur-
cianoregnoduntaxatinterLorcafc Vdezclrubio.inacclivitatibijstuniuicrumarcnio*
rum • Scpcimum copiosè inveiitur in ascnfu momis Hamburgcnlis, qua pane Aufstiam
five Septentnoncm fpe&ac, o&o infra Viennam milliaribus: icd muttd abundanuiis in
monteBadcnlibusAurtriacistUcrniisimmtneiucalijfqucmontibusikeisaiialcbrofisjin-
ter faxa,qutbu5ddedan videcur; in tenin camen (bio (moncium videlicet) undc graminei
cclpitcs exempli funtjlongcubenusprovenircolec. (Xlavuro, nalcit LE publica via agio
Vienrenfindenam.autccrceilli valdc finiilCjin Allobrogumct^hbuSjLcmanolacuivici-
nis,& mcridici obves iis aliquando obfetvare meiuini.

Remina.

DiciTVR IKCCplantaGrxcisiroAioi'.LacinisPolium, Pritnumgenus,adDiofcoridis
moncanum,qucid *lpiccfivh EcrtJ^pioy* vocat^referri poflc v:decur;hocBx(ici ^Jtuappcl-
Jant. Alccru in ,ad ejus Iccundum genus,quod fruticoC uspriorc cfic dine, mm tamen mi-
nusodoratuni pnmo: id *Hifpmkdichur*lt4rt>tz.J.* Tercij,nuUum nomen Vulgateintelle-
xi.Quincum SiiJexcum.inolarClwmpicyncflcputabanc: vulgarc autcm nomen apud
incolas crac *fitmvilla*. Thermarum accolx Scpcimum »U6(Qicimort/ hoc est, filveflrem
Korem uiannum nuncupabant.

Taxitates.

CETERVM Poliumvilccaoblruftionibusliberat,uiin3m&raenfescict,inantid>'
ta nufcccur/uiHtum & itacura fcrpentcsabigerc.illicu vulneuglutinare creditur.

*Polij ramuli
ut purgatiur.*

ILLvD porr6rciherbarixftudiofosobitcradmonitos volo.omnis generisPolij ramu-
los in terram umbrofo locodepados, fine difficultarc radices agerc,modo iptacciwbnc
lib 41§ Crepurgatalit; utui ilitjio; ejus gentnbus peuculum icci,

FINIS LIBRI TERTII.



CAROLI

CAROLI CLVSI
 RARIORVM PLANTARVM
 HISTORIC

LIBER II- QVARTVS.



Sedusc Sc*bidf<arnm-> & AJterum_a aliarumcfue quarun-
 demullislimium, inelg anfes jnt's lore mmobcaufam,
 Qvarillv ro erunt comprehendend₃ cum nowmlluqu t nan
 vjucando, & Ujcf,ifgravidorepr&dit&funt. Hisadne-
 ventur. Sed penera, con tures itfis/irpes, & alu crafia tuber of A-
 lut



F -- CAFVT I.

MACNA fane cfl Seabiofarum varicras:
 uam nullas Prouincias adirc mernmi, in
 quibusejusaiquod peculiare genus non inuen-
 nem, iKexrjsJucub[iriomfcijjqj.jisi(i Intern
 aruca emifi , aujuc criam in hac Scirpium Hi-
 ftoriavidrelicer.

PUMVM locumdabimusScabiof^piijo-
 ri Hi rpanicar.qu* folia, vulgansScabiolima-
 joris folijsfim ilia habcc.lacunaca videlicet, alic
 incira,moltia,lanuginepubc!L-entia:caulesno-
 dofos,rotun(io<Qtrd»Mn cubitales.c quorum
 geniculisfoliaiiiterfi'oppolici: (uinuis ramis
 capirulaiDfident^maJwealieuJrtinembEana-
 ccisii^pjlceiscompoiha,quiiin^uiarei flare
 res contincncandicanres, quibusdceiduis, is
 mediaquifl fiiiKulorim c.iliculorum umbili-

quacuur, quique, auc TEX micrd^ni
 confans-paulanm vero In caliculi exrLi:cn-
 xpaduncur.doneclmcn biriotutn & craf-
 v^m^lll >]l^o ciloculi(uHinc[Kiir] macurefcerein-
 ^apiat;radixcandida,crafl*a,vulgaii fimilis.
 ^ Creteic iuxra Vincarum margines & c icmi-
 ^ri^locifqiicinculcisagroSalmancictii ,perre-
 ^Uquam eciam Hifpauiam.haud dubieSi in aliis
 idioribusregionibas. Florccfliecnfc lu-
 mo.Apud Germjnosvero.qunlKiiti (cmincx
 Italia miffo interidum naray column, ferus, fed
 cum rm\$;iii ex parte circirer Autunmũ flores
 prxbciclolcat, plerumque inane fucceditfc-
 ni ea, { licet aliquando bene marurti ni colligere

^ftnincrim^&rfnbfccqiienshtemiftirpescorrumpic. Viditamquiramis in terrjmdc-
 millt >propagare^:confervartMluducrun: fedopram InTeruiu.
 , A ti A inuenitu!-cipcrih]i[is,&ro],imagiiLCudmedifferens:cIciiiimperomniaminor,
 *il: iattinjiii]s]k,;i]cahculi&r!(jresmt!ioresexr»rrulcopurpur.i(ciint.
 ^fdemcum (tiperiorclois lulatur, atqiiicotlmetiiaiuinporc floret, &: femead
 ^«tu lMtem PerJucJt.
 r' fcti AE tiibicak^runtecaules/otundi.nodoriltvepcniculati.nonnihilliirfiirixoi.
 Oavi t' gcuuufi L'iiiAiuu]bMcuu: ff-TCV>...
 'oiarum, (cd law,in ambitu tamencrenau, Vi tic* folijs interdum majora, breui)x-tiolo
 b'tjlrtrfcH
 III.



pendentia, colore viridi dilutione praedita, amaro & acri sapore: ex alarum sinu rami etiam
 prodeunt foliati, qui ex lateribus pediculos protrudunt, floribus, semodo
 congestis, ornatos, coloris rubescens, nullius odoris: deinde tenui ta, angu-
 lola, bifida, cnicifere interdum magnitudine, stellata corolla in muni di-
 giti crassitudinem nonnumquam aequat, longa, nigricans, statim te quatuor fibrat
 latis magnas spargens, & subinde ex lateribus novos caules producens.

QVARTA magnitudine illam superat, majoraque & nigriora habet folia, purpurascen-
 tem ex nigro florem: in reliquis satis conveniunt.

Provenit utraque in omnibus fere caenis siliis, juxta sepes, locisque umbrosis per uni-
 versam Pannoniam, Austriamque infra Anisum. Floret Maio & Junio, quo tempore se-
 men plerumque etiam maturescit.

QVINA aut sexta habet Quintum genus folia, humi sparsa, Scabiofae vulgariori, & in-
 ter segetes nascenti fere similia, minime quidem villis obita, sed carnosa admodum & ve-
 tur lenio, & gummoso, deinde aliquantulum acris: ex horum medio crescit palmatis caulis,
 aliquando paulo amplius caulis

cauli, nfd«capm,krout, n »U,Jan ffab,osiftre,i,mul,,s & " * , " , , folto K.
 flantibus congestum, quorum exteriores majores sunt, eleganti colore ex carruleo purpu-
 ralescente praediti, villis quibusdam nigris singulorum flosculi oruin icdcmambientibus: ra«
 dix longa, nigra, crassiusculis albis fibris capillata.

Invenitur in summis Saeberg & Saealben Austriae & Stiriae alpium jugis in tenui grami-
 ne nascens, ubi floret Augusto: similiter in depressioribus nudisque circa Viennam collium
 supercilijs, ubi Junio & Julio floribus onustum legebam.

CYBITALI aut ampliore affurgit Sexta scabiosa caule, latis gracili qui in multos te-
 nues ramos dividitur, extrema parte velati umbellam flosculorum in ca e-
 stantes, exterioribus flosculis, quinque lacinas divisi,

quemadmodum & intencres Bofculi, qui minoicsiomnoi sutem colorisclegancis rubri 6-
 tun, & ad purpureu ijiSc«bi
 ram generibus, semina, in caput meae forma congesta. Fo !ia noo abfimil.a habet ilbf

conspiciuntur in rc < 5 uen, tca n « on, « ^ > ^ ^ : 'un, cnJmiJm, l, ccrinc, (a, viridiora ca-
 men, & splenden tia. caucimacqcramos infingubs Jiucrnodijscxadvcdo a



An radix vivax flet & perennis in illo dubitabam, quia anno primum. r. n. xcr. floret. nioblervabam femini mihi niflcnatam eodem anno. Scdfequens annus

Florccyrtate S: Autumtio: femcn fubSeptembrijfincm, aucOvlobrisinitiuramacu-

AceipicbamiJftmcn ex Italia, Scabiofielt. ItC5 nominq quod quibufilamamicis com-
unicum, flordm vanavlt, quifur, illisrefrcctibus, multodilutor. Memnietiam
i miln miflum Scabiof^ feme ex Hifpanijs, quod floresdc dicitodem anno quo li-
]: fed illi criam rubri diluiores.

^•VBirAi-Esfunt Septima: caules, rotundi, graciles, firmi, virentes. nodofijeosadfin-
^Ugentculaampdclntibusbinisfolijscxadverro femper refpondentibus, quartnui-
Us fepfundislicins adeo divtraruntalauvidcantur, co!orexcincrcct>virefceris, fa-
q e i 6 (ccundum radicem nalcuntur, anrequam plantaincaulema^
Uorafunt, minonbufquclacinijsdivifa: exrutnmisalisramulo5ferttcimes, &
qui (iflmcc plana capitul. T. ccandidis live pottus u-xpabtuifaiycxfriim ante quim
Cx plicruur) modorifque Honbus (imul nalcntibns congella^oi qoinis foliolj\$ (quortici
Jf'ilHfcroniajurculafuntJconstan^aucistntusftaminulis: flonbusfucceduntfiirfura
aris (cjbiofx femmiLius tntnora, in orbicularccaput congcfia: radix minimi
dmein inierdumxquans, raultilquccxiguisribnsinlateribusprxditaj vivax
^t, & Gngulisannis novoscauksprofert.

Nullumc (IAu(lrja: tnferionspratumficciis, editioreVc]ocofirum, nullusagergrami-
ci*) nulli fere arborum margines, in quibus nonnalcatur hoc Scabiofegenus, adoSque
le cfl tti gerendis flonbus" &: pertinax, ur fob bruma tliusluxuriam coerecat, alioqui
nto florere incipit: freccjuensctiam est in Moravia.

Meininitn I3eli;icis]ortispaTnciimilcti]a!ifolitam, cujustam<: nfloresc(Icrjtcandidio-
fes: Aliamprxrccfaljctoribus folj!, firmionbuscaulibus, &: Horutu nivcorutn capitulis
mtrrduii, (ingularibus. pleruquctamenbttnisauteniis cohsrcibus&fimulna.rcntibus

OCTA VVM porrogenusinvciicurquodbicubitaliautamplicorafrurgitcaule. tern
nmo, rotundo, mulnsalisprxdit6, perquem Tubnodisparfafuncfolia, jamdff'
'Jinonvil^cdiJTimiHaviridtoratanicn&duriora.nccin.idcdtenuelaci niazdivifa, infe-
riora vero q non refpondent, fed lazota funt, molliora, hirtora, & in ambitu duntaxat fer-
tata, ut li qui nalcuntur

planramconpiciat. aliam pzncaScabiofajudicct: florccxtre
miiramulisinfidcDuncaput coiiipachjalteriusflonbusfirmles.uno lcmpcr (prxfertimin

Scabiofa alba Bds»iroi hotrorom

Scabiofaix.five ami: alin



exterior ^o*cil>ccfKcicntibiJs)maiore&liore,nontamen uc in precedences
tat, ledonuiint **nivci,ftaminulisinomniuna** umbilicocmineniihuscolorisrandicii,^{^y}
tibus ante in liilKaTulcis,quibusdciduiscapitulailafubro[tind.iriint, &vclutirquam^{8,j}
fa.contiic'ntquelonpiifculaangulotafaiiin.i, colorem fufem DiaturnatcatquircnP⁸
radix non est vmax , **ted** hicmepcric, femine camendeciduociufciiirur **novella:** plant^{''}
quxlequenicanno Horesproferunc.

HancScabiufam primumobfervabam annoM. D.XXCII. **Augafto** menfcHorcmeOi*
m.irurumicmenproferciKcm circa Tim3viamPannonia;cranvtf.ini)hian2.-11 rbein,atquc
ctiaafecunduniipfiusurlMs vallum, qua Mernlicm ipecht - Scniinc tndcdcl.iro in horn*
coli ccepit- **Mcmi**ni & ejus lemen in Bdgicam amicis mutcre,&: ex co **oatas** plancas inat^{rt}
nles|xjllfjilticco[ilpiccre.

H v i v s pnum nafcentisformam & fquamata capirula.in tjuibus flores,v2ldc refer
Scabiofa Nona, cujus iconem feliciter ab iulo (ur & pleraque alia) delineatam, a
pettebat octonio poli, honeftus vir, & in Stirpium cognitione egregie verit
Plateau Tornacensis civis, Scabiofa nova xftivalisnomine. Nam folia ha
jrimium, ut dixi, nafcentis & inferioribus non diftinguiba circa ediculum ali
atiata.acJndcftnati.caulmtricobitalemaut aropUorem, (utadferibebaxj r
hir^irum.inmulrosamos circa fummumdivifum .**qncmalternatim** bma fcinp
vcf(barnplefriinrurfolt,ivindi.i.inrimis(iir)ilia,priterca<ju.TinramiS)minoraenim
jIU.non laciniata, non inciia i fnmmis ram is mnafcunrur (**quamata** capitula, (Libcar
floculis plena: quibusliicedunt longiufcula albtcanrta lcinarad **capimlorum**
feridijUfinUtiisapuli&O.HofcedipiituisKnoicmiiprttiiiijdciiKJeenarncxiuu"-
tij: radix camiicat&fibrofacft, Ted non_rediviva,namfxcuiTo/cniinc pern c(blec»vel»"
fopenor,&ilkdciduo/**penndcutilla**)fitjgulisamrisrponrcna/citr.


Exq(iibusiotisf.icilemi!iiperfuadco, **illamtxcoftminc** pnmiim **inBelgicanaMi**[^]
quod ad amicosame milerara. Hlmsautem iconem a pemo artifice imitaiarn fubij<^r
***oloiuipfiashiftoriaeadncllipofSt**

INVENTVNTVR aucem in Auftria pleraque Scabiofarum genera alijs cnam I rovin
cijscomunia.cum inter It-i^ctcs.turn in pram&filvis. Provcnn k paflini Ikoortbusaro
rum margtnibus,&juxtaicmitasScabiofa **rnajorMatthioli,cujiuipItiKas,ad**^{^e'ncni}
pagumagroVtencnfilium.alboflorevariantcserucbaTnannoM.uxxcrin. ^ " ^
verofpontenarcnKmconipexi,quzTnihi (antequdmicCx(a.rc Maximitiano JI. frlici-
mcm. Viennara acCtrfrcr) mcultioibusBelgicishortisobfervaca, (loribusea r^{ur}P^u£

Scabiofa prolifico

tiore,

Scabiofa x.Gwe repcns.



subcaerule si na p en ptiis, adju us latera in orbem fundebantur multi longiulculiy» ^{^i.}
kolijCquibuscependebatalij in mores rlores majonhus colore li miles, & ex his imerdum M
 ctum tert d - dmp et di; prim[^]Horibus fuccedebanc lcmifii Scabiola cv. iimilia: radix
 subfufca & multis fibris praedita, sed non vivax.

L A T E serpit Decimum genus, & interdum magnos cespites occupat, dura & nigra ta- ^{Scabiosa ma-}
 dice sepe per flammam tellurem spargente & tenuibus fibris firmante: ex quibus multi qua- ^{tan repens}
^{1722.}
[^]avcrfum expanduntur rami, humi diffusi, & subinde fibras agentes: folia satis numero-
 — deuta & carnosa, brevia, viridia admodum, Bellidis folijs, aut Globulariae, quam Anguil-
 lara Aphyllai itcinappell. it, (imilia, nullomucione praedita, fed cordis (ut vulgopingitur)
 formam potius referentia, herbaceum quidpiam, non inam certum tamen tedolentia, ob-
 lotigopcdictilo^r tuftu atruro & quidctn acnuculo: alicjuotdcindproduncunncrfblia
[^]drantall[^]cauli Lili, reretcs, l]nguh fuffineritscapitulum Globu! .ih; l inajis & : planius.
 multis crassiusculis villis aut hofcatis hirsutum, Succifae, five Morfus Diaboli similibus, co-
 lotis purpurei, nonnumquam adeo diluti, ut carruleus quodammodo apparcat: icmen
 Globalatae se mini proximum.

Naturatur in omnibus [[^]annoni 3r & Au%iaf monti 6us gfabns & arpem, inter faxa & ri Ic-K«»*/r;
 bta sparia graminea etiam quibusdam siccioribus in culae que agni, ve luti supra Neapo-
 m Auiirix. Floret Apnli & Mato: fcmcn Jul 10 & Augufto maturefcit.

S

KVLLVM porro vulga Tcnomen ilrarum Plantarum intdlexi: nec amen profusno-
[^]i lccarcan[^]arum noftntilli; Latinum addam, urcademopcrarcli quits Scabiofarum
 Rencribus[^]ua; ib albsdetripra. t. filtingui podint. Prior igitur fir, Scabiofa major Hispani-
[^] Alten, Scabio J minor Hispanicar Tertia, Scabio lacifolia Pannonica rubro Horc:
 Quinta, Scabio Alpina: Sexra, Scabioia Indicarubrolatoroflorc: Septima, Scabiofa
^{*} ^noniczdy/oMtJgt;.: OdUva, Scabiofj major Pannonica albo Horc: Decima, Scabioia

P

[^]muana minor repens.
 Ceceeri in orulub[unic{t, quinfj rilemficulatibus fint pra: dirx, quibusrciiqua Scabio-
 fana* gcucr. tiq Lun Jot'juidernomiiumi dl idem tcmpranienrum.

SCABIOSARVM **rdgncra,*non** Icvibus decaufis ad Phycuma Diofcoridis refc- M n
 tenda esse censet Nobilissimiq; doctissimus vir Fabius Colonna in suo de Plantis libro.

PASSIM porro per A[^]iftriam in Pannoniam in gramincis campis, filvis fruticibus;
 arboribus paulo liberioribus j iuctum ciam graminol Ji vutum & [cmitaaim niar" ini-
 bus.co

Globularia.



Globularia
luzula flos.

bus, copiosecrefcir ptmilura illud Scabiofegenns, quod apud Herbanx rei (tiidiofbi Globulana: nomoi vulgo inre- mt, Angmlljra (urdm) Aphyllanchenappellat: Vicnnenfes macronx'Sttiu?lucra«io/ hoc est, caruleam bellulem nuncu- panc, quo nomine ctiam in Beli'inslionis culca dictbarur: Gallis x.JMArgHtriHsbltH'is. Ego V icniicnfi agro, niveo Hore vanantcmnonnumqLtaraconfpicicbam.

IACEA

CAV. li.

NV U V M rei herbaria; ftucJiofum aJto renuespn gref- fusin Stirpium cognuionc fctfle arbirror, qui^{lucen} vulgoappcillas, ad Scabiutarum claficai pert mere^{lucen} nohagnofcac. Earum noonulla genu in l'jnnornu> ^{Stit-}

piumobferuationibusdedimuSjaneminetuncliiEcrisproJirar ijJdcmuuncScabioi i^{rum} Htftorixproxmium caputtiabimus.

Luzula flos
luzula flos

PR I O R igiturnumcrofaabeademradicepromitfnlia,oblonga, vulganflma;hexc baud abliniilia,ncccatluminusarpra,laporn6mlnlcalido, (ubaotUingLiuciamcn; cM- lcsplerumquecubitalcs.flriatos.ramoloSifohjsangtifboribus ,& uueidum paucislacinijs fecundumpedLculumprxditisobfitos, ut in vulgatiffima:capitula in extremis ram is LTI- iiora,non lifrfuca.fcd multistquamistenuibus^, (I vel digitislcvitcraituigai, crepiratiti- bus prxJitj.inferncandicinna.rupcrnc vero.qtia (c Hos explicat.fu&a: flos muJusexigu¹¹ r(jho'tscxpurpuracantlican(ibus,inquinquelaciriiasdivifisc«ii(Ut,cqLiorum medio pur- purafccnstubulusexilic.m fummo velutifannaarperfus.qucm ambmiitpurpurea iv4o- ralongiorii.Jiicfol)ola,quinqueina^ualibuslacini)seciam confhutii.un vulgatffima, fe* men Cmcorbma linule, (edcxiguum, nigrum, paulo majus qiJ4tn vulgAns, liibadftnO' gentisgullusradixenamvulgatmimziimilisclt.ribrofj.nigriLans.

Floret Julio 8c Augufto. 5c fubindcfemen profere, quod maturum ftatim e vM'culis re- "WnSjficcum floremexcitur.

Luzula flos
luzula flos

AL T E R A ftTCpcroronia6mili5,paul6tanienliumilior, utquxrarocubiialem ^{superet} altitudinc m ^{caus} f o v a l p u l p i n f a n l e l o q u i t o r i o r i f u n e m i - ijfir,^,ic vnigro,lcdcantcanc&C!ncraceo,linguainetiaRi magisxcalctacime. Matur- rius plerumque floret,&: femcn Julio pci ficit.

Natalis.

Provenit vtra^uecopiosciti moiuanis l'aononix& Auftrii pntii. **P**E R E C R I N O fctninc,hoccfCrccaallato.ScibioIznomine, nataefthrcp!anti:nii- tii autem ericTeninm laceae geAus, quod, c utu reliqm s Iacex \$c S roebe* a me dc icnpi i* gencnbus.proculdubio ad Scabioforum claficm pertmct.

Luzula flos
luzula flos

HA B E T vtro multa longa folia,(iupra tellurem expan(:i,iii[br tnajoris ScibioTie Mat- thiolijjcrasflb ncrvo pwpdipi,& fecundum illius longitudinem, non mod6 multipliciwrU- ciniata,fcd ipfectiam lacini: in niinores alias (cdtzcauliscindemcr:itubulu's&aoi plior,ftriatus,durus,iiondi(fimilis Iacc^pcimoloco, Ijoccapit:edcfer:p:a.pcf qnem (par- jafuntfoliajjamdielisminoraj,minuslaciniata: finditurdcindcinv.'inosranio5,R)in^m ribusadhucfoli).<,&ranusc(:"li5prxdieos rextreirinami luftncur kjiamata capita, qu* producentdeiiiderlore m mulnslongioribuifloft-ulispurpuralcfiitibus.interluniomni- no albis, Si valde fectisconflantem.ex quorum mediocixifit (li! us pal leftcos: evanido Hor- ritfuccedilfctBCQnonduiitnilpriorisfemini, multa l.mu<;ii)cmvolutuni: radix (iris cral- ij,&iibnsquibufdam pwdita.inittarradicisStoches Hilpanifar,quxan vivaxfii.roc la^c-

I* t* » men-
iftmvi'Jsf-
tsptt.fivrj
tin.tmtfir.

VE N v s T i b s t M A cfl Qiurral.icca.lata.juc & longa tiabccfulia,fuprior(btis inajo- r a) i g p l b b i e t f e n d t e 3 n m a o c l a i q r u a h v i b d f) (d l b " amaritudinisnoncxigaaricaulcspiuresexcademadicejworoit, cubitales vel etiam am- pliores,4ti^r<;rdumminores,angulolosi:ftriafofiCapKula[frniaucplura contigu* r^e ir,exroulrisfquoam]iitnbricatiindi!pofii,scnftanria,qganini^ufpides ex ten in reflexx, in adco crebra tenuiaque fihmenta.iive pocitis muhifidam barbulam definunt. ur ip& ^{c**} pirac!ej;an:i(TJirioSi renuifliraoreticnlfi («Jufa vidcantur, mtro Natureartificio: &o^{ei} Priori virtules, purpurei, paulo tamen majorci: femcn macuruin cinrei colons, frnctlo* oblongitifque priore,Cyani /emini fererpondens: radix pnun nonabiimilis, vfvax, K mulris mgricaiitibus fibris donata.

Luzula flos
luzula flos

QV I N T A longclmnnlioreft,cubitale maltitudincm vixattingens:alioqut,folijs,vil- Jo(\\$Sc retts inftar formacis capitibus, aique adeotlotibuj magaan finihtudiDcmCiiO¹ Quariahabet:lcaicnvanac,quodnigricanscft, & paulo trafilus![^]

Iildem, quibuspri ores dua: loci s.enam hznafcuurur. Florcni InlioK Augufto: fc ^{men} item turn illu profcruiUAiuoJ EUturita:c ficcumflorem« calicibus exeunt.

Iacea 1134. Aufriaca viliofoexp.

Iacea Aufiriaca vi.



Carduus muncatus, vulgo Calcitrapadifus.



FOLIA Sextx sunt vul arifimil g j secun- *Ineit m. vi.*
 diim radicc mlevicerliani. ua: cauliscubita-
 lis aut amplior^ racilis. firmus. ihiatus, nonni-
 liihnrer Ji. impurpurafeens. inniulcasaks inc*
 qas Jiirus. perquci D, fufing, p
 wftint foliaj, imdidt? minora, anguftioiacjuc:
 flor! iiii (Ummisrair: c (^uunatahilfuto^i
 g u c capi te p *deutes, vulgatiffima Iacea*
 noribujomninoijiniles } & fuperioribus pau-
 16 latutanorciieincn priori jt *quale: radix alijs*
 fil

Crcfcicperroixtacum fupcrionbus, atque
 codcmctiamtempore Horcscji JSCxplicantur.

MoLLio RA (unt Septmat folia quAm *f<f< mint.*
 vulgatirtimx. quxfccLiidiimradiccinCunt, *schmact cap.*
 imada, C l cl ro de v l f i a C v d i u *svvru.*
 murcato capite folia accedentia: caules ciibi-
 talej, anguloj, friari, in mulcasa! asdivjfi: cap-
 itals bine indeper ramulosconfnfboidmc
 fparfajogiulcula. quam plurimisvjtiamiicon-
 Kaiuia, qus inmitmres ccmiioiTque quam
 Calcicrapa aculeo\$, ebsquev, ilde baibatofde-
 finuntr flosIaccseautCarduimuricatipurpu-
 heus: fcincnonobfcervavi: radix Calctcrapx,
 iiveCardui (tellaci vel re<3ius muricati udi-
 cem srmlatur.

Ad raontium radices. nonnmquamfccun- *Matelo,*
 diim vias nafcitur inAufni infenore & Sti-
 Ti3: S>c Auguflo menfc floret cum Caliitr. ipa.

II H auRmnon mnlnun abfiroilli videtur, quam ana mukosaimos nobis in Belgicana- *a*
 tam memini, femine ex Italia miffo Hyofcridis Pliniaz nomine. *flap.*

Serratula Matthioli.



Carduus
serratus cap.
hippophae
hippophae.

Serratula
Matthioli

lacca luteo flore.



Lacca lutea
Carduus
serratus
luteo flore.

Stachys

Lacca lutea
Carduus
serratus
luteo flore.

I A c E * appdktionc has fiirpm indigra-
vi, propterlilitudmemqu.un liibuucum
eaqj;vulgo lacca-appellationrm obcinjc,
quamimmucarenoJui ,donee aptiorem ali-
quam accommdure pu/Timus; cercii tarocn
cltjScabiolisproxiitiasetle. E.inini nmepn-
m.im , litcc.im monranam fquamato capite
nuncupavi: TertiamJiccaCrciicajn: Quar-
tan),! accarn cnontanana villofo rctiforETuduc
capiK:Sextx,htr(iito capite: Septanz;echi-
oaiocapicc cognomen addiJi.

Scdquoniam in Calct[rapE,five CarJui
muncatocapcc (quod HippopUxftuui, five
Hippophaes Diofc.cdc (ulpic.uur Fah. Col-
lum.jiiicnioncm incidimus: crefeiiquJem
ilia unnullis Scinx & Moravix locis, vcrum
non adco frequens ut in Gertnania rclitjuajSC
fielgicz Galln Provinces. Nufijuam vctb
nonoccurric in lilvis Pannoniar & Auftriz,
acquetiam in p p
iiguis,eaplant:i, quam Maitlnolus Serratu-
lam cognommavic. Vtrauuetiam milii fre-
quetis conlpcfta Francofurrefi ayru.Scd tin
abalijsambifinrdcfenpta:, i)l.iritniltoriai
likrctexcrenoncxilhmii vt **necfle** : non in;
confuTrccamen me fathir.imi putavi,fiu<tu^
que iconcm lubijccrem.

IACEALVTEA. CAP, in.

A C « s i CE i quidcm generis capita ha-
berh.xcpl.una, perindeatque Carduus
»lc muncacus: reliquis taiuen notis prorius
2(1 fcabiofis&congeneres illis ftirpes pociii*
referenda.

LOS ^ AS, cubitalcs, major^sve fert
gashzplanta,quasfccundiim r.\dic*miD
C**ccQttorij** majors tjuod muluhtlo est (blii 4^s
lactniarofimiliaanipleducitur, mitiustanK¹
ampl.1, fupctiora vcroqux pervirgas(pa^{ra}
fuoc.laccz nigrac Limiiaa.durioraaliquaiituto
& candicantia.gultu utcumque acido: •
inluininis virgisCnicililvcllnsnjaii
hornda, c qui bus flos luteus Attraity i
men in capsibus cincraci colons, cxipfuum
> moltalanugine invoitum : radix est long*
jdba.(uceufeaa,dulc]Sj Eryngij vulgansmr*
Flore Tendcentc & cvanirfccc, ex **mediocy**
pirc.vclutigummiquodtiam rirficoUjri: non
permixcitm **protubertt** vermiastmnn modo
couvolutum, **aucinfarTfagacantb*** officii
nammiindoccejtionemfuuipliflcputo Sal-
manacenfes, utillamTragacao charappel-
tarenc: in quorum agro Ftcqncn nalcncr, ad
Vmctonim **osarginu&atiw/blo.** 4
lio.fcnicn Atij'i'ltomacunimcO-
5VPERIOR t non multu abfamilis abun-
dantiffime invenitor agro Granateni & Va-
lentino.Iocis humcdii & uinbrotis. to
ridiicandicantibus, iamiscubitalibu\$tt»
xibtlibu^iaquoniui lu in mo capita fiiuam*
w

florem deprmentiipurpuicum:radix vaMrerafliellonj
(iRA.'sAiENSitvs vulco L'irt*H*dicitur. & proponebant nonnulli, demistit
crato,

tram , prn PottVio, ciimtamen ejus dcfccpcioni cam rcfpondcar, quimquoJ min'ime. FlsirL-bac Martin.

PrioreminBe!gioaIic]U.ind(ihabuimusrcraincnatJin,quodcxHi/jianijsad;imicosmi--fram: fed pauciv perfittic annis.

SIOEBE SALMANTICENSIS.

CAP. IJIT.

NE MO ibit inficu^quin & ftrpr?, quai hoccapitedefcribere adgreddimur, ad Sfarurti ebflcm finrticfcrcnflar, ciitn illarum forma platiraum JJ Scabiolasac tf real lbs lacchfobijccre vohii.

Stoebe Sjlujautica i.

Stocbi- SaSmantica 11.



P M o R laccifimilis.foliahumi ftrara habet.ScabiofeJacczqucfol.js latiora.ad Cr- ft r
cf:ion,fij!1,inccecdenc.ajm«]Iia,!anuginora;afinterdumcand,cantu:aliquorexcade,nra- B
^>ccoul«txL'.ntcub,tal«aui ampliore*. multisal.s bracluati .quibiisinhirentminora
indiddrfla falcocrcquo nafa cun t u f i i r u m m i s r a
Centaunj majorisimulum ,led minus: radm est long^cand.da^ .gm i

SILCVN PA ?_liaomniahabetmollia&Unupnora,Erucxinftarlaciniaw,pauLemin- w
fifmumraniofum.micrramprocumbemem.cujufloresfuinmis ramisinnarcentnripc.-wm.it.
(Wiewajorej h.irbulisc«cnoribusCyanixmulis,purpurcis (quibusinterm.xti villiqui-
<!aniIutujmcdiufloremoccupaniibiisifemenfHperLotifiraile.vclCyanifcmini: radix
*gitalisa!bicans,non vivax.fcdquain fiibftqueusliiemscommittit.

TE KV i A numcrofapromiifolia, fceundumradiem liumiiparfa, incana, oblonga, *mli tal-
magnis & profundis incan- b m is, nnon>ittr CfTKinfirum, afnrimis laci- mli.....
niata: caule
»«tmajncs infrcciuentesramosdiviibs:f»hapetramos(parfjaWqmdcm incifa, uiea fe-
rtqiaTccunddnradicem nafcontur, fedmmoramulto^ brev.ora, inque molliciquoC
«lamaculcosd,finctia:ramorum falligijsinfidentalicuhargentasydutifquamisfibi in-
viceiBinibfcicanmiiK«mbentilm5compaai, undcfloexiliiCyaniforma, fedpurpurfdi.
lutiom.&mcdivillonKifbcmcnlanuginequadamincludiwrutmomnibuslaccarunige.
»enb>,<«eCyanis,cxiffOum,niRicans, funimocapitvUorum: ladixUngulans, craUa,
^onnumqjarofibirt.iln.iitoc/cdpaucisdonata.

ALES ai v x, ante quam Belgicaxcc: Jercm, in liortu C^uarm quoddain genus.fe

Stoebe Salmantica 114

Stoebe Gallica & Albanica

Stoebe Anagyris

Stoebe



Centaureum majus vulgare.

Centaureum majus



minenobiscGilliimifforvHum, Tcrroa
foliis caliculis qui tam elegant
argenteo colore non splendens, secret
ntbatur. Upofca, vei cccrcvaltlt-limitefre
quennftiraiiin ubicrv.»bain Vicnocniagr&a
arvorum tmrgincs, 5£ ficcionbiK gfan
locis. Hilluciiurmu etgoilli qui cam
ram cum Cyano minorC'ConfunJuiK. diVcr
f* emm fiinti neque tram miflctc altimtii
ne crefcncem VIII qu.< Vienncnfi ajjronaft
tur, tjuam cluxGalvicofeminc fntaic B'vi
cis horns.

Sed incollibus, 6c montibus VicniHili ot
bivicims, proveintalmd genus mufro Jiur
hiis, magis incanum , termionbmqoe virg^
quotl nonmulcum difterre vidctur « mmo
illo Cyano, de quo f.imo.

Nafcuntur omnes prxtrr quarco loco dff
fenptam , abuncic Salma»ntiitii .igroin atvo
rutii Si vinetorum marj^inibus. PeltremaaU
temciimin (jalliiium cucaVieimam.

Fforontoninci limiOjJuliOjAu^ulto^fob
inde Icnicn proferunt. In Belgicii autt-m no
aicro a faru anno fiorenr.

SALMAN TicEMics pnmam. & tritium Stoc
bes nomine infignicbanc, quod extremal
q
generarcftrebanr, rcrtra ctranpro Sc
uibaniur.Pnorvulgo iflic Cabfmit*, hoc est
"pitulum dicitur, ex qua fcopat f d b
gandts & cvcircndis idoneas cten
apud Belgas ex Bctula: ramis, aut frira.

CEKTAVKIVM MAIVS,
CAF. V.

CENTAVXIVM nu^miin qualc i
fcoridedeicripumcft, vulgaris omfti
cftnoticn: illiusproptercahirtonam noa
bimus, fed alteriuscujufdamairn
men iconem Lemons oculis fubijcere volui,
utdifcriinentantofociliusagnoi ci poiTiz.

ALrERvM L-ro Cencaur:j magm cenu*
rahabctfolUjDoninlaciniasdivifaut
raum, Ted ArnioraciKfolijsnondilDniiha,
ad GLabi fot:orum Imnii expanforom iimi
tudinem plunrnum accdcnnaipcrambiru
tarnenfernu^frurarviriditarii.&amariufci
li /aporis i caules incer folia prodeunt cuhiW
Jesaucamp]iores,rotuodi,circa(timnium bin*
diaucttifi di. fiitmmata capita flifHncncs.P¹⁰
fuCentaureij majortsxniula: florem vil'ofi*
colunsalbf lcentis.inftar Primi: femcn Ci¹⁰
frcfimile/cu, utveriusdic. im, Primi, runii"
hirfiitum, & mollilanugine tnvolutum: radi
c c n j v a I d (D d l o n g a t D d c n
DcctctaiDj fons Qoidem nigro, interna verò
parte flavdtetuc, (uccimque croceutn
oante , qui cum amaritudiniquadain arotr*
titus est.

Supra

Cencauriura unjust i.fivcLufitanic.



Ptarmica Austriaca.



Su pra Olyfipponcm, lapidofu s j u xta Tagu m colljbusd.UQtaxat inveniebam, inBelgicape-regniULD ooinino: nam tamctil radicem ad amicos, inde miserim tuufco tnadido involu-tsm ,utfcicilius cotervan po(Tct.&: poftea ctiam Olyijjponc accepcriim , nu mqtiao i tamec iftic perliflere,aut ilium acrcm ferrc potuit. At Pn-rauii illud vulgare t'oljjs diflcdis ia omnibus hortisconfpiciitir.

GRACI Xtrrcuj'pior /uuya, Latin i Ccn: au-riurn magnum appellant. Luficani,Tagiacco-Ix, alterumgenus, quodapud illosinvenitur, Rtponat, hoc eft, Rhaponticmn nominanr, vulgarera Pharmacopolarum errorcm fcquuti, qui, notius illud Ccntaunuin majus, eo no-mine don ant.

PTARMICA AVSTMACA.
CAP. VI.

VEITAL i affurgic Ptirtnica Auftria-V-jcaul^cantlicante, Cyaniacmulo: folia illi infima cauiisparre fecunduniraJiccm nuerola, longiufcula, angufta, (uperne vindia, iafcrncmoililanuginc nicana, acidiufculifa. poris, in ipfo autcin caute ranora: caulis in aliquot ramos (c Ipargic fufmentes capirula, e lquamis velutiatgencis ltnbricatim iibjinviccm incumbentibuscontexta; cijuibuscmrgit Hoi veniutus M eleg-tmSjduodccim autqua-tuordecim folijsconlbns,duvis, ficcis, mucro-

dammodopurpurafcentis, autilluisarmulj qui inSc&moiau minorisMacthioli florechiccr, nu]loodoiccommci)datus, led Tola venuftate grarus, & immarccflbilts ; culoris cntra gfanam retinet permulcosannos ctrabe (ufpen-Tus, aut inter chartas rtpoficus: in ipsa veri plants [finoncvellatur) lcnfcfcns fubfufcum contralmcoiorem: ftmennon mulrutu abfl-mileScfamo'idi minori, tenuiustamcn , & copiofum.intcralbam lanuginem latec: radix fin-l i f t i i d o t i p l a b u b u t u dam fibrifcpta.icdaniua.

Exit plerifquearidislocis Vienna: vicinisfc-cundiiniagrorum margines, omnium aurem copioliflimc adScrudiuram illammagnificam aCsrMaximilianon.inchoatam.fednooab-fol.itam, quarn ad Phafianos cognominant, aut novamStruftoram appellant (ctiam incre ipfa pomcria in quibus vanj generis atborcs funtconiuz] atque ctiam ficcionbusquibuf-damgraiaineiscampis, lingulis annis femine dcciduofponte renafcens. floret Julio.

P T A R v i c K, nomen huic plant^impofui, aon quddftenmtainenta movcat,fed quod re-liquis nous fans aptccum DiufcoridisPtartnu caconveniat: tcnues enini habctVirgas, folia olez incana, molltoratamcn, &: Amhemidis panic florem. Auftriacamcognominavi ,quia pninum in Aufliiinfra Anilum iimuen , p r z .

uopolim,lpoQWna(ccntcm inveniebaio: coo-fpicbaro

fpicibam ctisai inPannoni.itransdanubiai.i.TirnavJerIntincic. A rr,ijl'frcuji<;; 17070-
tis Scabiola appellatur, hęc aq̄e iiHotLiinaiiuirnfcivatur.&lvcnalisprponiuir.

Sibi autem pctuadent, illius decoctum jct^ f b up ps ,ri i i d n v t r i os fatci-
nationcs valde utile cfle.

Ptarmicavulgans.

Pcarr. ica vtilgaris pleno flore



*Pyrcihrum
sua Pteridi-
ca pteridi-*

C E T E RvMj Pwrmicaillavulgarisnotitir, in Belgicispracisnafcensrolijs longis,*^o*
guffts.iuambitu ferraris, riore Antlicniidis^lbo, quam nonnulli Pyrcihrum jvvcttn
f.cllant, pairim in Germanta, Bohcmiar, Vngari3e, Auftria:, & Mwraviarpratis rimilitercre-
icit: Creclittciamin Anglia.

*Pyrcihrum
pateridi pteridi-*

AT **iftkctiam** in quixildam pratisreperirceft aliudc jusgenusclyans, referentc iM
ncftovirolacobo GaretoIacobi F.Aromatario Londinenfi, quicjusiconcm, quamii^
cumvutgaricxprelTamdamuSgadmeniiticbat.

Ex cadem radice. qu^vivaxeftj& plurimis fibriscapiltarajnafcunturfingulisaniiisp'¹¹
resnovzvargasinfarvulgarisillius. qu. isnulUicriedirfriburaanibiunrlitiiliacriamftJ^
longa. anguftajinambituicerratajCxquormnaEistrcqucnccsprodueiKrami.rcnucs. u
bus, tnLnribListamcnfohjsornan, quorumfingul! in exiles pedicellosdciuuir, M^ act-
tesfloresPyretluoyulgariiiivcftri quidemconcolores, fed multiplici foliorum Iericcon-
ftjncc^&plcnos- Q.uoremporerloreac, nonati(cnbebaquiiconcmmittebac: vxnlii"»^c
tarucnft, cum Pyretlim(ilvctfrifimpliciriote, (uosflores5explicare.

A S T R R.

CAP. vn.

A S T E R I s non parva est varicras: nam in rncii peregrinanonibus obrevata- tin In C^{ont}
alcgantesquxdirn p!atHX, quarad)lliusgtnrcar(.ft.Tri poflevidentur. N^a i n t a s
delcrtbc: nus, iniciuniab<i Aftercf. icientes, quod omnesdotioreslcgitink

*Asteriscus
hij ficut.*

V N i co, plcmmtiuc alfergit Primus Aftercauliculo ,pedijt, dunore&: quodammodo
l, gnoib, lantigihcpubecicntc, qud (upcforcpaftLihramulo J. Vidittri: fu
quorum extremis (quamarainndentcapitula. folijsquinque nt pkirimu in **longiSiNnu**
rigtdiufcuUSj&radiattmexpansifubtuseornata, in mcJit> vuofiosChryfauthcim,
AnihemLdiSiaureusifDliapercaulcmfparfamollia. bniipincita. caotliciitia^t **LychoWI**
fere. feda^ulliuorradixdurabtiis non crt, utqua: (ingulf anmspercac.

FrcquemifTimuscfi hie After Cran. itcn(i Regno , & ngro **SalmanrioeDfi** in nrvis.uo
Mioiclnunio floret: metniuetumolun Miinpcllunoagro, turn JIiiliautbevictv""•

Alter I.

Alter II. fupinus.



Alter III. Auftriacus I.



tJ portam D. ^gidij, non p'rocul Augufli-
Heofrun cccnobia, acque alijs locis urbi vi-
cinii frequenter colligre.

ALTER (tppmusft.cauliculismuhisab
unaradiceprodcutibus^ioiitit, humima-
gru ex parce (trjtis &:diffjiis, birfucis: foHs
numcroiis.fuperion p.tnc limiibus.lcd pau-
16 vindioribus: linguli rami durum & folio-
fum (uftincncalitiuiinquo Hus luteuscir-
cinararotundiratis, BupthalmiJUtChri-
Qnchemi xmLilus:quo cv andecnte, **calicult**
in ide6 Jura iSifigtiifacjpitulacvadunt, uc
uague vixfrangi poTti if, atque femer, quod
inijscontmcturitfiimitci nihrcc,eximi.

lavcnxtat hoc genus quibu/ditn **CtftcUx**
nova loci r m H x r p l m Tu unatum
eciam exctcvit, & fichhbus aliquot annis ob-
fervarum./ed poftca **exemptum** tctA&h
tocommiflum, (iiblequciuc hicmc **contra**
pro m eft.

TERTIVS, exradicnigr^obliqua,!!!).
tUalbicanibu! fibris cjpillad, fiilateribus
propa^incs fundcutc, multa ioitiu promic
f. l a. Sca b x, aut p'vctio S icam
folijsGmiUa, diluciorc tamen vindicate, 6c
tenui enam incrdum lanugmc prxdita, gu.
ftillaSCrl

M o : inter
q u r p i s cubitalisaut amplior.ter-
res, pleioicjue rubefcens, pcrqueni fp'afi
funtfolia.lim diclanguftiora, mucronatj,
l l d : isextrema parce in ali-
f f t r f t

Sorci,



flores, ex multis quinque foliorum luteis bosculis, atque in orbiculare caput congestis con-
flantes, quoniam per cucurbitaceam ambiunt oblonga, latiuscula, plana folia, elegantissimo
colore flavo, nullo autem (sunt certe perexiguus) odore praedita: floribus succedens semen,
inter villosam quandam in capitulis materiam latet, angulosum & quasi triangulare.

Matris.

Passim ad Alpium Austriacarum & Sarmatarum radices aprico loco, nonnumquam etiam
umbroso nascitur, ubi Julio floret, Augusti in Bilin fff: at in Lvcnbcrg.
multaque alijs collibus Viennae vicinis, semine Julio.

*Alpin.
tin.
il mi.*

Cvbitales habet Quartus caules, striatos, firmos, virides, multis folijs Tertio angustio-
ribus, fuliginea serie referentibus, nulla ambitu tenuiter serratis quod a pictore pretermissum est, nec acrimonia carentibus, predi-
tos, superna parte in ternos aut plures ramulos divisos, sustinentes capita e multis viridibus
foliis sibi invicem incumbibus compacta, quae tandem in flores numerosos amplios quam superiores,
minore tamen disco li-vc mcdroorbe, & af. guftionhuscuin
ambientibus foliis, in extremo bifidis Jutei colo- s^aditcmnigricantenijfibroiini. adna-
tis se mirifice propagantem, & sub tellure serpen- cm.

Matris.

Frequens est in montanis siccioribus, una cum duabus succedentibus inter
que prais c.vduis filvjj, montibifque Vienn< Wci-
rdumnaicens: etiam in MoraviS. FJorcreinci-

*Afterina
v.*

vs multis etiam ab una radice affurgit caulibus
tibus aut purpurascens, subhirsutisque, quos confuso ordine ambiunt frequentia
folia longa, saginis similia, viridia, transversim digitorum lata, ad terram nonnihil reflexa,
lata sede caules amplectentia, molli lanugine obsita, sapore subamaro & acri summo cauli
insidet capitulum multis foliis & veluti squamis constans, neminem
nema e plurimis luteis, mucosis bosculis compactum, in ore commixtum, S, t
numerosa ambiunt longiuscula foliola Helenij florem ambientibus foliis similia, angu-
stiora tamen, flami coloris, sed dilutiora, quam medius ordo: circa summum caulem, a fo-
liorum exortu, tertius interdum aut plures exeunt ramuli, summum ipsum caulem
superantes, singuli florem annalem sustinentes: resiccato floribus, semen exiguum
in his capitulis congeritur, quorum, cum pappo, sive villosa sua caelata a vento dis-
cuntur: radix admodum fibrosa est, nigra, subinde novas propagines e lateribus produ-
cent, & recentibus fibris sese firmant.

Provenit **picnque** Incis ad moncium Scolhum radicej fecundiim vias, :groVienneti l. *not. alio.*
*tc***AuJQ** Pannonis **lilvis**. Floretetiam Jun;o /cmen lulio maturum.

Aftrvi.Auftruc.iui.

Aliervn.Auftriv.v.



Hymilia est su p iore Sextus edal mahitudinem radsu etiam numerosas à radice *Altera*
(non minusbrosaquam Q' uarn, nee pauciores ilia propaginesagtriic) profcrensvirgas. *scilicet*
gracis, d, s, v, j, es, suas i'coent ledconFufoordiicnafcenciaainbiunt folia j supe
nora an' altiora ni p'ora duriora i'ueropata
ni dlveltrc vulgodicitur. non diilinulia , tinnimc tamcii peroras **fettut**, amjimfculo
*porc, cui nofiniliii acnmoniaradjundlum lit: litmnits vir^is infidentflores, (upcion for-
^limiles. attamL-nniinorscapicccctiainfolinEo, fivecrtbrifuliolisinibricaro: ramofai
*tuincirca fumnum funt virg, fed rami niatrem ranusfnperant: **feroco fupciori** finnlc.
r t t urbi viennrvJCinorumpnKiSjinipfisciamcollibusherbosifjac- **««*»*
quein silvula ad Dmubiurn flea **paaldf»pra<Sf*jwfarcein** linperatonam^primocmnc-
misse ab urbt; Vienna mtliaricopiosecrelcic. Floret pau 16feriii*poftciorc.

Mytra sunt Septimo generi folia, circa sedem angusta, per summam oram latiora, cuspede *Altera*
obovata & quasi orbiculata. Bellidis folijs non valde dissimilia, superne atque inferne lan-
gue quadam nonnihil pubescentia, gustu primum exsiccante, deinde amaro: ex horu me-
dio caulis exit dodratalis, foliosus, hirsutus, capitulum in summo gerens e numerosis, mol-
libus, & purpurarccmibus foliolis conflacum, & in co magnum floreni, multistenuibus
cxtxrulcopurpurafencibus folioli Sj^ivomorbemvallacibuSjCQaftantcm^qui
longique maturus in pappjm evancfcic: radix dlBcilidis aucScabiofj, Jatcnbuspropagincfun-
b f i b l l ara.

Oritur herbolis Aufnacurumalpiumjugis. Floret lulio. Inhortostranflata, subfi- *Natalis.*
nem Maj & lun- ofloruit .subfequensdcindchtemsabftulit&corrupit: exearum cram
flirpium est ^eurei-iiiicuituravixmirfcrcvolunr.

H > a. lijiciniis Octavum Aflerem vulgaris nottri^qiii florem habet can Clantcm piir- *Altera*
pucis seu potius caeruleis foliis orbem luteum ambitibus i nam tamen a p f que alijs
descriptis sit, Liuiatamen rtilcis Pannonix & Auflix Iocis & in ip factiam Moravia f na-
cm nble rvabatii vel Utiorc folio, vclangu Riurc prxiirum f duorum eri in generum
i t j Utifolium ^dem Vienneni agro, fepkniqua! jx(ccio T) bus loti 5, ai; eu Ri fo-
un: iycr6; cujuj & p'ffilum, genuseft inqmbuld» in monocibuj & rratiss: fuum locum in-
rel^u^ Aliens genera **ilium** obtinere vojui.

^ K - ic ii porr6«Vi_p»TT«acj^jS«e««r: Plinio, A(lcr&: Bubonion, no Dnullis Ingui- v«
BB 1 tula.

After vin. Italorum S^FuchCj.

Doronicum latifolium



Doronicum latifolium

DotoQicum laufolium.

Doronicum angustifolium



Doronicum angustifolium

Doronicum angustifolium

n.il.is.\fompc!lianiPritmtmappellabamOculum Chrijti.qsio ilhcvivcbamtempore:Hilpani *Beb*<n, quam vocem a Bubonij v<xabuio tio duibm pu to , auc quod Ingmnum tmnonbus, quosilli (*erj*>*soi.a'.ii*, mcci.j.itur: tmiie ciatu Latinis InguiruIu.Reliqtioruni geicium,nul lum vulgarcnomcn intellcxiab mcoliseansm Provinciaium inquibuscrefcit: Secundoautem Supini cognomen potTce adijci. An Tertius Lobelio Adverfaritum p.i^uia i^S. notns fuer, mclatct, turn ilk luoinicum flortin tbnatjhicplntesfloresFL] (linear: ilium camen Pjnnonicuni **maforemvocarclicbrt**: Qi:arcun:;Alterem Pan. (altgncofolio; Qjiintum, P.n.{ubhifuroral(CL5folio: icxtum, fan.acigudiorc folio: Septimus, Virfiuno Amclb quodimniodorefpon^erevUlcuur, **flifot&ao Amcllusalpinusdiciaucat**: nam in alpinispr:itis,ucdtxi,na(cmir:Octavus,l[.itornii 3c Fuch* fij After tit.

DORONICVM. CAP. niij

T T A R I A Doronici genera in Pannonicis * Nonci[que,liveSiiriacisAlpibusnalccntiaobfervabam, abillisquiin Bei^icis horti* alebantur,dive **6 B l d A i** nlla acis (quibus anrea ignota) accerfitis mea opera e Belgio ufqueorumi larpibus, communia fiaha.

LATIFOLIUM, qualcin Belgicis horis alebatur ,in Allobrogicarum AlpiumfcopulisfipraLemanum lacum fpontenafcenscolligerfi meminiaimoM.D, **tun**. dunc Narbonciifi Gallaper HelvctiO? in pacriain rcitircm. W LobelijTertiumdlinObtcrvanonibus.

Eivs ordine Pnum , longiote folio, a° Plantaginis folium quodurnmodo **accedeOKi** munere Panficiis ciijfdain **hortnlaoi**, q^i Burdigalz vicims locis delarura **affercbat**, pfi; mus Perro CotUcl>ergio Phamiacopxo dochilimoLutetLaredicnscommursicavi •, is turn in SSitrijai&MitvicinoAnnierpicpago horcil albar.

EORVM autem Dnronicigencrum,qiKin Aultriacis,Suaicis isa me obfervata, Primum(ucaminoribu^ imtiuni facumiis) caule est brevi, pedali duotaxar, molli, hirtuto, striat^tbliaillirafa^Mva.crafla.**loogiufcula.fup**

.ll parte admodum virilia , & quodamnio° i l d . t , **omnino camen** villofa, prona autcm lcvia, d utiorvicia, at qui l can em >>> pons: fufntno catile unicii plcruoique terr **florcTertioLobdianofimilcin.fcamagisafI'** rcum, quoevancrecciu, (tjcccditexi^uum Icmcn **nigrtearu** , **tanugine** & pappo **coronatuoj*** quadexto uacacxuripi & c i i t i a r b i t r i o t e tur:radixparvi, **genicoka**, **fcswernodijsfli-ftmaa**, **americas**, tr. flortbus **candicanribU** aliquot fibriscif>tuu.gu!luaroma[co.

Primum id cibfervabam in Snberg, iirin^lc iuSncalben&N^ciiMLTwnufquam vco **majojc copiaqiaminfamrno**''

ja.tenuimgiaque ccrd Icvtcr tecta. Floret Iulio, nonniunouam **CtiamAuga^** - quo mentie femcululindp maxuntaicm conicquiuir.



Doromcum iin. Stirtacum,



ALTER. VMcaulcmhabccalLqiuono'eubit. 1-
 lca, totun em, intus cap-
 cavu. capitulum in ful&tno cattle magnum, ex
 mu qq uecto-
 nisdiviliscongclij, quod abalijslongui feu! is
 &:mexrcmocrnatjsfolijs,fulj;:ircauri Iple-
 der. tibus. inibitur, non mctioiu: (cmenfupo-
 rioriiimi]c, cuni fuupappo **Facili evanefceosi**
 foliacircaradjCc!u[v^Q peliculo mbxreutia,
 orbiculata fere funr, leniim r.unc;] 3. **pediculo**
 in latitudinc i'cfc cNplicaqt, in ambmi **dentaca**
 & fctrata, qua: vero cjule anibiuut, longiora,
 & **abipra**{buim pcJiculi **fedein larilexpanla**,
 omnia (aporisacrisd: **araari:radi**« ex **vtridita-**
 te car d cans, m d mium r. otu cal i, pemcu-
 l;ua, & q uan (**quamaia**^**BterDodijsq. diff,**
 fed nodislurfumtendencibus, non uiferiit^d, ex
 inferioregeniculoniniparte **longas** agens fi-
 bras, **albas, & mciailas, &c propagines in Uteri-**
 bus. euflufercfucci c glycyriluzx radiceex-
 predi^dcdln
 Invenirunn Etfclier, Durrenflain, & qm.
 bulis al j s Aufnac q u, Sniacum Al iun
 jugu, interfjxa, in profunJis (crobibiii, ubi
 yc **rpetux** (Ljncnives, fed illisrpercufTioic u-
 j **Soltsrapa** Ss tax a **firricntii, foluts** p. ir-
 telaxi v na & rvelutiitiro filicem cocame-
 ra i%, **nufcjaam** tanK-nabundantius **qu**,
Durrenftain. Floreflattjinitio, iatet»tn ic-
 nus, in hortos v<r> **cranflataa**, ubi nun diu
 perminct, M. iiopleniniqin>,
 Hymilays plor jmqiietUTortiu), \capi[eri(nisinjjo:c.to!ii'.apedi{;iito **Ebtimprn**^
BB i oibio.U **



apparent] a u t a a f i X ^ f e S ? ? r o C C d u n C , m o d l u t e m » ^ * P * <

Nasabit. Nascitur in Veytzalben supra Neuberg in Stiria: & eodem quo præcedens g;cn us tempo-
 re floret.

DORONICIS etiam adnumero tres sequentes stirpes, quarum Prior in omnibus ferè pra-
 tis sublimioribus ad Alpium radices, tum in ipsis Alpibus Austræ sitis frequens est: præter-
 tum verò in Wechsel, ad cujus radices Maio florebat, in ipso autem jugo, qua Septentrionè
 & Orientem spectat, ferius. Eruebam etiam his proximis annis in cædis silvæ d Mocnm
 amnem sitis, circiter mille passus infra urbem Francofurtum ad sinistram Mcmin.eriam
 in montanis Belgicæ cædis silvis erutam, ad nos Mac am aliquando adferri, Damala-
 nij appellatione.

Doronic. v. *Germani.* Ex termau aterna summa tellure fundit folia, Plantaginis latifoliz ferè qua-
 lia, long Digitalis, lateum seu P* U! ? a o l c m f e i c n t l s , * * * * * f f f o
 tuJincm magiac«den,ia nervis distincta, mollia, villosa, supernè nonnihil villosa, infer-
 nccandidiorS&Uviora S na semper ex adv bitalem, nudum, rotur. quum, qui superiore parte in paucos
 caulem habetferecu bitalem, nudum, rotur. quum, qui superiore parte in paucos

luteis in quatuor foliola divisis, constans: ei « ^ T M « b i quinden. aur plura foli*
 Doronico latifolio similia, latiuscula, & per ex um crenata, co-
 men floribus succedens, ut in Doronici generibus, in pappum evascent: radix in minimi di-
 giti crassitudinem pene æquat, nodis quibusdam informibus distincti, multique fibris do-
 nata, lateribus propagines fundens, & singulis annis nova germina profertens.

Doronicum *Pannonicum.* *fræ vi.* T L L non valde dissimilem satis copiose nascentem inveniebã, vicinis Nemeth wywat.
 tunitissimè x III. Balthasaris de Bathyan arei, cæduarum silvarum declivibus: plura tamen
 secundum radicem habebat expansa folia, minus nervata & angustiora, angustiora etiam
 qua caulem ambiabant, perinde tamen ut illa ex adverso nascentia, que cù suo caule poti-
 nihil hirsuta erant: ejus suprema pars in alios ramos dividitur, sustinètes irliiosca-
 nen aurei elegantissimi, duplici inter-
 rumlnconconstanci:r adix gracilior est Superiore, non paucioribus tamen fibris adnascen-
 abus

obus donata quam illa. Uioeriam flore bac. An porro hoc: genus Montana Da&il Timi viri Siruon Lsdctovar.jnalceann [ccundolocodc Liptuin;

Doronicum v. n. Auftriac. it!.



SEXTVM genus omnium maximum, bicti- bitalem in rrdum aur. aiupiore habet cau- lem>xninimidigiri picrum quocraflucidit K-... quod atasdivirum: foia arcaradice roorbic- ulara, longo pediculo inhxici Kia, rug6 Ia, &: nonoihil hirfuta, qax vronullo ordinedi- geflacaulem ambiune, amphora iint, mu- cronara. in amhm L'nirer dentara, pediculo nullo, fed inftar foliorum Peruani Hyofcia- mi Utifolij, Tabacum najus vulgovocati, cau lc m latiore bafi ample Ctentia, v ir id ia. hit- fata: Sores extremis alarum ramulis infident siagnij Vicenis aut rriccnis oblongis folijs, & orbem lacislarum ambitibus conflantes, larei colorij SjOdons experces: femerum Doronicigncncurriftriatum. vircken- ns ta:nt'n coloiis, quod cum (liopappo. aurt lem flata defluit, initium ab exteriorc ambi- tufacis, quemadmodum&: inrc!, qui E Do- ronicigncncrbm: radix ex viridicandtcans, nodofa, rq" illul* fitniliieft: icdubipi' pappi- nibus aufla cft^ radior fie, & ex mulcis velu- ti irorporibus inunicum confiat, &coa- Icfic.

Doronicum maximum Auftriacum

Secundm rivosc montib Lislabentes Jo- cisurn broiis inde cenfu jugi Wechie] pn- mum obfervabam, undcin lionum tranlla- tioni mibic gregic propagatum fuit: fcd po- ftea longe majore copia, declivibus, filvofis taoen, locis Etfcheti & Hcrrea alben inven- nicbam Augufto flores proferens, cum in Felipe! floret lanij inicio. In hortis culcum Maio flores dat, veluri Sc in moncanis filvis ultra Dravum .Pannonia interamni, ubi anno M. D. LXX IX. fYeque in immn etiam obfer- abam: fcm en in Iwrtis lunio niarui inn.

Natalis

Felipe! florert lanij inicio. In hortis culcum Maio flores dat, veluri Sc in moncanis filvis ultra Dravum .Pannonia interamni, ubi anno M. D. LXX IX. fYeque in immn etiam obfer- abam: fcm en in Iwrtis lunio niarui inn.

NULLVM Primi& Quartigenerum in Auftriacis Sc Striacis jugis obfervatorum vul- gare r tomen mthi compertum clt: Venatores, pa flore' f que montani Secundm n & c Tertium genus *5nif<»nrtj/ hoc eft, Rupicaprarum radicem appellant, &: ad verius verrigini non Winus commendancquam Auncul. r urlu flavo florcradicem , viribiif que firmandis ad pri- °ic utilem dIL ferunt. Chiartum genus, ut dixi, Altfnatis feu Damafbnij nomine ad nos Diiflum jncabnmiic vidctun lli plantz quam Matthiolus pro Alirnf titcx libct. Meni init etiam hujus, nifallor, Iorus Simlerus ad calcem Commentarij dc Alpj bus. W p... q'ubufdam liliu. vrluti plantago quxdam Alpioa, fotijs)iantaguis, lci)icr hirrutit, flore Dorontei, radice acomaticâ.


Genus r tuta.

CONY2 A. CAP. IX.

TRi ? Li c E M Conyzam facit Diofcortdes. majorem j minore j nedia m: binas priores in calidionibus regionibus ip, in rena (cncccs obicrvabam: poftrema etiam vidiflc puro. MAIOR plures ex eadem radice emitrit caules, feiqui cubitales plerumque, aut mayo- rc^d Liros. ligitwto Sj hirfutos. ptngue S jobfolcticolons; folia in his muha, inordinata, alter- nifcaulem ample dntia, duplo quam Olcarnajora, hirruu& pinguia, feuglutinc quo- dan i & c piigucditic obllra, ex viridi paltencia: flores ut pluritnutn extremis ramis f pica: m- fta r onnaicantur lutei, rotundi, Senecioni ferè fimiles, & in pappum, ut illius, evanefcentes: ^tnc nexigu Lim, cincreico!oris: radix crai Ti. fibrofa, vivax& multisanmsperflans, quo- taunis novospitirc' l quccaules prot'crens. Totaplantapmgui Sj glutinofaj& odorata cum quad" Lprav Ltate. Suprably fipponcra ftequenti firm ad collium Tago flumini imminentium radices, Murciano iem Valentnio queregno. atque ctiani Narbont-nfi agro jfuxta vias k vinea- rum marg. •iej. Ali^uan Joap ULiuoun Bcl^ica' fidilj busi' au provenit, & c gregic Ho'es protulit, vido e florentem e in vndari curabam: verum cum in mema fupiequens illam abftuliffet & torrupiflbt. non potuit radix adulta expnaxi.

Græca v. lina m. flet. com f. d me

Natalis



Conyza mi-
nor.

Minor, raro plus uno affurgit caule, cubitali, plerumque minore, ramoso, hirsuto etiam
& glutinoso, sed magis virente quam superiors: folia tunc triplet minors, ad Lmax folia
accidentia villo (aramcnpingitii querciam illa: extremi miili frunduni Jongicudincm,
vcluri in Majore. flores fuftmcnminores & loHge minus splendidos, in pappm iimilicf
cvane^emci: radix (omnium quidcm quaiob/crvavicju^ generis lhrpmniJ Jngularis, Sē
innua. Tota plinra odoractor ell Priore.

Conyza

Ctefcu autem frequentiffimcin agrison procul Kfadritio^iaqui ToIctutn trur, Me-
mitM etiira in Galld Nirbonenfi fepe legc« infra filvulam illam/ccumiant quatu vtact
iMorapcUo PcfaultagntsadjaceHtcmpagum, dumad mamimamlicrbanonciv>iirofi-
ofecret. V^nnx Aultnacciam mihiruca.fcmtncxHifpanijiKcepto, aliquid annis in
hono pctiliti.c^ femindeciduorediviva. Floret auicmcum Majoie, fub Autumnom
videlicet, 8ffubinde icrnen profett.

Conyza mi-
nor. Conyza
major.

VERVM C.V.Lconivirdus Rauwolfitii Doftorphytit-us. aiutiliujusgenuscirca Tripo-
lim Syrixobf^rvavit. quod primolibmtLiī Itujerarijdcfcrit Ins verbis.

Eo loco conlptcicbaro Tithymalum paraliū, Coiizarpretcrcajnnonsgcnus, p!ur«
ex eadem radice proferēs cauliculis, circiter pedem aut paulo amplius altos, quorum non-
iiiiilli foot furrecii. potiirimavcropars ImmipfOLunibir. iio gilq-. fibu^ agens, fubinde alios
c * u l i C L i l o r s Δ c t Δ l c c f c i i * , ungula, ruonitura, fatis gravis odoris,
cuiutmen iliavitas quarJam admixta iit: jl.otjai flotibus & ceteris notis Majote non val-
de

TERTi *. u autem Iegitimamncmtn! adUucco; ntramathittabat, cum Ht(pantc*srtilf
pilm Ob(cr*auoncscvu!gibam, ^uia hoc nomine abalijs exhibit*, mihi nō fatifacibacj
fid nccadhucmi^iptobaripoteft. Porteatamen in Aufliiiverrans.dupcm quanda (poa-
te n.fcentcin invent ,qvi« tion incommode refern poitē iiiiiciur ad Conyuu Teitiam
Diofcoridi de feri plas. nō r i g i t f c r r a n t e , r e f c e r e m .

Conyza iii-
Auftriaca
Dff-

Pt DA LES verb h. ibct ina-rdum caucis, redos. firmoi^uroi. incana ianugine rcflo.cjuib-
bus lon^n inbacreoi folia, Conyza! majohsfoliomin amptitudme, mollta, mcana, hirfu".
dtjftiiprominentcion^orca-cjrcaradicern funt.pediculo. f. u r a u t ē f u p e r i o r e m c a u l i s
partem amplectuntur, brevis aut prius nulloca trita, non injueundum fpirant odorē, gu-
ftata amariffima & acru- finuli d f p r e l i e n d u n t u n f i o r e v f x t r t n i o c . i L i J j j & r r a m u l i t j H i j n h . T -
reniibus iuidem riapni. Hclcnij riorum formi, multisfolii Jislutctsmcdium difcum(t-ti
orbem pattefcntctn^ambicncibuijiullo odore prrdti.-radlx lonca, tenffis, nitticans, fe»
perr, fubinde ad ipfa capita, unde caules r o o r u n t , m o l t a s c a n d i c a n t e s n o r a s u n o i q u e f p a r -
gens, refinatcum quolpiam otct, guftataq; iiniafii & a; us d<prchcui Jitur, vivm & pcrennis.



Exit sponreficis & iridis locis, herbiferis tamen.decliubiiscollium ad Zimmcrin.quA
 8- l'ialunorum irer ell,primo ab urbc Vienna railian, ad Badenes themus, Radftun,Pc-
 Ironeliam,atque. fccuiulum viaspublitas. Floret lunio.
 GRjtcis porr61.ccpIa[.c.i-.otii^_t.l)t:itur:PLniusConyz.i vocat-SCmajorisradict! _qni-
 .ouJa Libanytm. appcllafi iradir. Thcoph.af_sfe).u ctiaidiftmguit,inajorcni oominas
 "arcni,mmorc,feminam.Ga2.i pnlicanam vcrtir,proprccam tot (c quam illi Diofcorides
 cnccadltbustnbuicf-culwtcmiiJLnah.icfIPuhcarratii^taobrotitniscmii pulicibiu
 similitudinom .HiJpani qmiiam ytruA puigra, mmmum ob lianles, quas dixit, vires vocanc.

CETERVM frequentifTimaeiiamcft.inomuibus.» ginnibus quas peragravi, locis riguit,
 Cotiy7.,iillavulgirK.,]bo:n;iibusTerciaOLolcondi..iut Mediacedita. queduDramcftge-
 &G Um,Maj or 8C Minor: u-racjuepro ration, natal mm hum idiom m.iut Ikciorem, luxu-
 'larisiiiiibenor.aucrerrarrula. Hujusnullum vulgarnomciiinctllexi, ncccjus facilitates
 'nihirutitcomp_r[r:r: iconcui taoseu Lciilorisoculisubiicere volui.

Qv* vcroa Matrbiolo Conyza;majorisnomin cxKibet-r,Conyzaeffe nonporcft: fed
 •nDiofL'oridisBactlianmaL-CL-dcrnonintp.L'forlicanquisccnrear^roquactiaiTi Mom-
 PtliaiiL.ciiiiui.iii; VLVerc.illj[nhabebant:Sa!Lnancicc].rcsver6,nelt.Dquibus_rtionibu'.in-
 "u^ti,Hck"!Jiain voc_biiit,nullif tanicnnonfcol.venic:ficibu5.R,i_icein porr6xviiiode-
 cofta_m propinabani (Jia.dam vtula. ad proriigandam fcabicni; in quem u'lum &: nonnulli
 tc)a?r.ulicc&:folijsur.giientijmp;irabaiu.Narcitijretiam hctcfpont-plerifque
 5c AulliiarcA'ifuisinonunisililvisiii- illiuMconcniliicadijciendain cxiuitnavi.
 ALI AM aurcmplainamolilervaflicndlect.ruLibanimontisrcribitRauwolfTus.xH.
 >P-Lib.M,ilii Iciiicranj.quarplurimumad DiofcoridisBjcchaffLmaccdcrcipli vifactrex
 "ocijtamen , quisttlttribuic, ponusadcaGnaplialtjn.omaiii genera referenda videtur,
 i Fucilio Si alyf plerifque Piloll-llac miooru appellancur, cum quibus tpe
 que a doctiffim
 etiam Rauwolfi
 jsmagium (ratione r_orum) affiiiuatcmhibtrnjfert,

IACOBAEA PANSONICA, CAP. X.

VVLGARISS Iliam.iltisProvmcJl';pUnta,quiabHcfbarii5ljcoba:aappell.U.Lir,
 A o i n i s, Auftrii, vicini^ueJUctionibusnafcttn firequcndflioia. Inue-
 pcri^alij;(brpes,cur,mcoj_dicio,a_eju<clafll_rnreferripoflunr.
 imobzx vul^irradraoduna iimtlis, niii toiamolliotcircc.fau.cm ljabercid>
 lafcoi, 1^*'-



Mlero, friatum, in multras alas in qualiter dividijni. fub quibus folia valde lacinaura, moll¹, & tene Ua raporis amaricantis & acru (culi, oduris non in juvendi: flores in exrrt nmrarrtu tanore aamin vulgari, muiore Tejue & pallid lores ,qm maiun in pappum & laiiugmcin relblvuncijr. cm fubeit lomen vulgariimik: radix, tamct(i valde fibrola. non dt pei crm. fcd fjngulisannis pcnc Totaltirpi mollibus vilhs, He pinguique Hatnmodolen roredloblira.

Radix.

Crescit in Pannoniar & Auftri; r; rduis flvis, pra: ferrini in Leyrcnberg- plfirrnm i tiam oblervabam id ulva, Zohonock Hl.D. de fiathyan oppido, vicinia, haud pfocu lacai bona* Tijstotnacibus. Floret luni Oj & fetinedcciduo quutannii pomrenatcmir.

Stm d'fmi d*.

Quibusdam Scncio fctidus dicitur. Nec multij mabcadir terrevidetur aua Tin maritimis Belgica aggienbtis fpon te provcnit; minustaincra (Tactl tuqucaded fucci plena.

Iacobxa vulgaris. li.

TES. N« quaccrna iutplutahabee Altctafolia, U« u(cula, inaii bitulcw! Ccrd(iauf. lem cubitalcm plcramque ngulorum. gracilem, perquem in ordman Iparfa sunt folia ,iri' fijnis paul6 niinora, atin (upremo, arigun: ior3, ht3 bafip Jii fnanil' lc ficia: iJiluminocaulc Quacmialut quini, taniaquamimum bellanafium rufis, Iacobxa vulgaris flonhusi K'H mulrumabiinnlf Sjantcquamcxplicitur. cxatrarubcfccnK-s/fdubi aptiti /unr, aun fii'; gore fplendenres , quosin ambnu lbpamqu' indcna aut plura toiola pei extrenmm »c4>

iupcfncpcnicc3, iubtus ver6 quodammodorubentia: ijf. cm involucumcft femcennigricans. oblongiufc Lilumj vulgfris Iacobrar Jem mi tAdix non valde magna, nigricam, tenuibus fibtiicai iic; umbvis i oiouca. (iibAu nova denuofolij Iac) or3, ad vrcnscaulis fcdcmiugujisannis producic. Toup Jan Nni licula, & quadam la(iugincobfitaconrpicitijr; anipncantisau[cm est laporis.

Nafcicur apud Nemctfiwy warni. Bahafaris dc Bathyan. alijstiu c Pannon^ & r^ iifri* infrcions montofis & caudis filvis. Floret lunij initt Oj & fubejldeni extremqni fim" fvmen marurum cfl.

Iacobxa vulgaris. li. j. j.

CVBITALI iuerduinxcrcfcir Tertiacaule, firmo ftriato, quem ambinnt folia la<a, gofajmucronata, peroras ftraca, Minia latorc baf. fii' veluti appcdele, quibus dain f dice germmant, rurundilora fual Si majora, led nullas appondecj tiabed, pende t it' icrrata aique fupcnoraifij iimuscantid dividitur in atiquor namufos, qu' florei owauit W' fent Infhcnr 1 > «; ik » » . i / i . Tir! (imil' s mliirnM m rnm m i Fi , l'irl' fii oJit ji.: !n 11 . 111 1 JI' . " dinetm accedentes, maritate in pappus evanefcentes: lomen obfervare non licet: radix latis cralla

Radix.

«canaicans, lii bindehbws, vulgari iacooa' xiii inr. iniatcr. ic) (panL) ii. tiu Auftnaciiii ruafijuc Alpibus; nufquam uuii. ii. ibundimii J5. quim

Ijacobseaiii.latifoliai,



Malva trimestris.



Herrcnalben, qm longus ascenfusefr in Durrenflcin. Copio'cenaminvcnctirnon praul aZollonok. Floret Iunio & cluho, m loitostranfhtajCtiam Main.

CKESCIT in tjdcmontibus) fed prefer- tim]uxtarivulos&:(lijcntcsai]iias, lacbara Quartajongc major ,aniplu>ril>iis&.*magis muiroiunstbijs.pronapartcaliquaniuluta incanis,csraleplcrumque bicubirali: cctens notis Cere CUKI Tertia convewt. Sed matu- tius quam tl la Borcc

HAS binaspollrcmasjnitio awn/f^TC- linquebam,cum utillumnomcnifojiidicio (ans aptum illi^ rnbuerc podero : a Horum tandnn finilitudine, inter Iacobarargenera rcfcre,& Iacobcaslatifolijs monunas cog- notninareplacuit.

Gefhcru in dofcriptionc Montis trafli, cjus menniMir videturinsverbis. Cony^x alpinrgenus,(elijiiicubinauE ampliuj ro- cvritarc.corymbis (iorum lurtis, hbris r.n.i- cum albus p^l b us & confertis subaxillaris: a pecorenon attingitur. Paltotum plerique Boni vocant, ali^ui^Ss^Fnt. H^oesdem Sioltrusaufi;icin Cotumirtarij de Alpbis,

MALVA TRIMESTRIS.

CAP. XI.

PEDAT, I altitudine crefcit hoc Malvas genus^uIcorandiucnlo^crtijViridi, lanugine tamen aliquantulum obQ'o,quctn rjra &£ null.1 cceci fcic diltri bucaam hmi fo- lia,reocla,viridLi it; rm^,infcmidilurora: infimocaali ndnata^rircinat^fertr.c liintro- ttiadicaris,iaaajibuterrata:iuprerou[Dcau-]em & rann! ov amp k l l l f l untr, **album** Alth x form f p ene accedan- tin: Bores flimin:s ratuulisinliaercT (atutt)9- giii/IuinquctblijscxtnnapaiTf [anaetscon- ftances.purpurafccniicolons, unguibusfa- turaciorepurpurainfcflw , pruduncibus ex umbiUco Ranvintbus palltdis, villibpiirpu- rciK (cmeninfolucetscapitulis plenum; i- dntcflparva.candicansjtjcnuibufibris j rrd- jca,innuacam£,aut poems trimdluSjCjuain ^{sub} juens lucms cotvuv pic.

Hijjusficc.itn phntmi luisfloribus onu- ft.im .Sicliarciimplicau nut; ^{bar an} HO N. V. [oannesHoghcLuidiasannoxxcii (u- pra mi llcfi LULL] & quinj^jml lll u m.cx quj iubjedUmicohcindclinciticLrabam.

ALIH-IA PAKHONICA.

CAP. it'll.

VULC AKIS perP,innoniame5,agro- d,ucVicnncn(i,AlthzailIaBelgicf pra- lisiinuludjucGermanii lociscommums.

ALIVD autcm genui oWbrvabam, & etiamju Moravu.quod, licet fohj<; ton iuc rnerctiqui ricic cum vul^ari coaveouc: flonibus tamen pLunmu^b cidiflert, qwtppo

Althaea Pan.
LXX.

Althaea Pan.
LXXV.

Althaea ur-
bera Lobel.



Ahlirafrutex i.

Althaea fru-
t.



Althaea fru-
Kit.

qui po admodum sunt. Alce floribus etiam
majores, color item illi vel reffondentes, * cf
omnofere candianres. cjutbuslcinen vulgari
fimilcalicibusincludum (uccedit.

TE HT I VM quoddam genus est, huic for-
ma non vadediflirmJe, tola in Honbusdiffre*
cia, quitmores lunt, vulgaristamenflonbu*
aliquantulum majores.

V £ R v M & Quartum genus i flic rpericur,
cujus folia licet ificana &c mollia, in tres lamcn
najorcslaciniastivifafuii: fiorcittiam paulo
in i nor es fupciorc, Belgic? fevulgans flb"
magnitudine refpondentes, fed colorc di p
res,ncnipe(Jui ioticarnei, five incarnati colon
funr. multis intus ftaminibusnificantibus: ce
teranotxcum vulginconveniuc,

Gaudenthumtdislocis, & Iccuudumrvt
lofins. Florfntomncslulio.

V N c A R i vulgarem fejtr malua, hoccf
tlbam m a l v a m : / P i a n t.

ALTHAEA, FRVTEX. CAP. XUI.

QVAM DodiffimnsLobeliasAlthir*
borear nomine exhibct, ca nobtsaSKjuan*
do Machlmixna: a femine perepre m: lTo, ftli*
citerptovenit, atqutcxradicccral>a!cntaque»
quahs in Alth^a vutpri, duriore taci-n H q^{u0}*
dammodo tienofa (umma pane, aliquot ftolo-
ncs proculic humane proccncatis, qu i ad vem*"
tebrumamarccfccebaiK, fingulisocindcann*
novo vcr plures ptotrudebant: fiore Aog^{11^}?
deiQum ptoeducntes. femcn Septembn, quo*
ventjj excufib & decituo. ali* ctia (irpei fl<^{3*}
te renafecbanrur.

S E D aliud genus in Hifpaniaobtcvabi'iji

fiuculo fupite, lignofa, in multos magnosque
ramos divifo, qui in alios minores, duos etiam,
lignofbs & minime obrcquente Sj CorticC
reo lenroque teflos, findebantor. cjuif f¹³ Al-
tha-rfolijs familia. minoratamen. magisrotu*
da. valde mollia. & prorfus jncana; flofextremi*
ramolis. & inrcrfoliorumcxortusnaftensdil"
(C purpurcus qmnqucfofitscontbns M^{alv} z
vulgaris florinondiilimilis, & ma) o quim in
AlrTui vulgan: (etncn plann m, Altlirr (in
liUm juxcaurbcm Horiuc' lam ranriiaJj^{ex}
tremisiimitibus Valentini Rcfni, Murciano "
niitmi, obfetvabam Mania florentcm, ap[^]
Rhamni priorisalceram fpeciem, dcqu»^{1^}
pnmo: anver6pcrptiaafretfroriL'e, rum n¹
fpanicaruftirpium bifloriam fenberem, 'g⁰ J

ffTftconrprfta. Multi^autera poflanni
furpe.oua: frmine mihi a peritiflmo rei "f^d. *
ri* V dilteentiffimo loicpbode cafa bona ni'
(o, Franeofurtiad Moenumnitaell. KPW
mum in teHacco vaft adfervtta, pcrdo»vit. fi
pwhendi ifiani plan»mfolia "on a b j c r ^
a l i i s n i s, ut que in p
• fronde virem w. ficcie c^b ^ (u ^ c _ r ^ ^ fl) i (J r m

Nov minus rarum & elegans est Tertium Althaez fruticantis genus, quod in
obfeiracmn, fcdcujiB iconctiisdmeinitccbatljacobusPlateau- Fruticis modo affareit,
Kolombus

Althaea frutex ii.



Alcea fruricofa Cannabino folio



ftolonibus lignofis, corticenigricameob-
 tUiht, quali enani vefttnramimqLiosito-
 lon« dividuntur: his nullo ordine difinbu-
 ta adnafcuntur folia, an g p
 ciniasdiflcfta, in ambitu(errata, fuperni
 admodam vindia.inferne quodammodo paU
 lefcencia: (Umaitsrjmis innaftuntur flores
 Rox inftararrtpIijelegantes,qiJinque folij
 con(lanccs,albiS)qu^ multis purpureis venij
 pra:dita/but: ungu« putpura fiondiorc,
 quaro in Sabdarifs (dcqua paulopoft) flo-
 rc,infc { 3i:cxumbilicoprodcuntmultafta-
 mina tf avaj8& ftulus al bus multifidus: an (c-
 tnen apud cum tulcrit, me lace:, vix tamen
 puto,quandoqi!tdem ad me fen be bat, fub
 Septembris finem ill• demum flores protu-
 lmc:folia illi decidunt Novembri,extremo
 Aprih nova denuo germinare folcnt. Faci-
 Liusfeit rhgtdiorisaerisinjuham: nccadeo
 tencreaft, utSabdarifa-

Nata forfitan hxc planta femine, quali
 me donabat (iipcnorc anno iofeph a cala
 boiu, Alttueratbomduorum generuap-
 pcl!arione,rcc^s ab ipfb in Creta infula col-
 lecto.Vniexamisquibuscommunicaba, " * " .

provenit p ————— quente anno, nempe
 x c n i . Ii ipra M de a d o l e v i r : nam ram-
 osprotiliit bicubitales, corticeviridiic-
 dj^ . cuiinlperfacftplunmaincanalanijgo,
 feu pocilistomentum. utinpriorcquoddc-
 fcnpfi generc folia etiam habet incana, an-
 gulola, & per oras dencara, illis tamē majo-
 ra: flores mmores, Althzz vulgans florum
 raagnitudincm vix fuperantes,quinquefo-
 lijscoflanresinfar rcliquarurn malvarum,
 colons rubn valde dluci, & ad cameum (fi
 itivocare licet)irtclinantii, niulnsftamim-
 buscxalbiipallelcctibusmoWongiurcv-
 lo fcerafTiafculo ftilonafcetibus&umbi-
 licumoccupantibus: Horibusdcfluentibus
 fuccedunt plana capiti.ur in vuljran malva,
 femem in orbem fcric quadam diftributuo.
 concincncij.

A L C E A . CAP. xiur.

V A R 11 s quas pcragravi regionibus,
 VulgiremAlccam fponterefcentem
 trtvcni:ciim autem abomnibusquiPlanta-
 rum hiftonani (enpferunt, cjusmentiofit
 facl;-i,n6c;x)ftuinavidiucJus iilitRltntAaodū.

Cirilusumen itlud,quod cxradiciscapi.
 te plur-i cralfas be lencas alia; radices Al-
 tharzinftarfundente, muttosftolones (cu
 vir^scraU. res d bh
 t intcidum d bicuhiulespio-
 ducit, quibusinliarrcnrfaljamagislacinu.
 ta qua (imvtilgaris, ad Cannabina ferc ac-
 cedenna, & flores mnafcuntut vulgansflo-
 ribus majores, plunbus Vngana:& Auftiar
 locis circa fepes nafecsob/crvavi: his etiam
 ptoitimisannis in Haffia &ctrea Fiancofut-
 tum ad M oenn m con fpx i: ut au teni faci-
 liihagnofcantlettoresquarn intell gamjl-
 Lai iconctn odijciendam effe cxiitmuvi.

SE D pcregrinum quoddam Tenium genus meminobis in Belgica *Batista*, flmine l C.V. Alphonlo Pantio FL Trariamiflb. quodancniincadiucdefcripiuniarbitror. Illud ip- fumetiam Vienna; Auftrisdu in horto alui, aiquectiam Francofuni & Lugduiii spud Eatavos.

Alcea peregrina.

KECEVS igitur natum, folia habct filvciris & errfiticar Mai vx pxne familia, circma- tscqoodamodorotiuiditatis I deinde radicem Hiimidigiticraflirudincmafqiante &: m ramosdevaricau. & fummocitpitemquaiitiodosa. excuntvirgzc Libitalesauramp JioRs. iiii ramosdivili, quibusinna (cunturfoliajadjamd) ftKmodumlacii) iata, (ecui Klumvciut. x- trenioscaulcs & ramos, teDuiHsincifa & multifida) ad verbenx folia fermeaccedentia Jo- resin liitumocau Jcfc ramoru in extremis copiofi Siconferti, quinq; folijs con(tanres, fatis magui, dtJutiorispurpurico }orc, & quail albicances, intercurfantibus tsmen purpu- reis veins: fiortbus fuccedunt capicula, femcn planum &: compreflum comtntia, altcnus cjuidem *feminiformafimilrjfed* multotmnusfl.; nigium. quod maturitate dccidens, pro- ximo anno novellas plantas producit: vivax ramen eitbujus planrxradix, & niuitoi aiui* ferduratju'ngulisaniisnovoscaules profcreiis.

ALCEA AMERICANA.

CAP. XV.

Alcea Ame- ricana.



L ICET elegantiUma hare planranunc di- vutgarisnotitii: qiiia tamen videoeiuq hiftonaui a recentlonbus facis leviter adum- br.itam, atquecjusil- uiu-mnon fideliter nni- taram, operx prctium me fadurum exifti- n]avi, n' paul6ati: uratnisill. imdekribicni, & iconcm felicius exprefTam, qualcm i la- cobo Plateau accipicbam, Lectoris uct:l« fubijccrem.

C A v L E M autem habct rcftrum, flria* tum, pwrpurafcntem, b[i]osaiitthenioscubi- tosaicunij Veictiamaltiorem^ in horto. pin- gui fblo, lcratur {infiSiiibusiatabcviorcft) quem ab imo mutca ambiunc vindia folia* nulla obfervata feric, bine mdc fparfj, infi- maferrataquidem in ambitu,, icdnonlaci- niata, qua: mediocauli inharrent. in rres laci- niasdentatasdivifa. iipreniaauttiTiinquin- que, Cannjbinorum rolioriinfar, difsecta, fumrao faftigio, veluti in genimularum & angultorum fblioruni fpicim defuncem: fingubres fen in fiogulisall's caic« mollitct CLhmaios, cquibus exit flos magnusqu¹¹* quefolijs pradicus, colons exalbo pallcicnt- tis, quorum unguis farura&. mgntante pur- pura, radiatim in folia fcfpargenic, infefli»

ut in Alceqillus vesicariq seu Hypocoî Mâ- cliioli flore, floris umbilicum occupJt muJt* ftaminaapicibus flavisprardira, & fcilusr»c- dius fupremâ pacte tamofus, albus: Horibus valde fugacibus(nam i^cpoj funt) fucceduc

brevia, cchinata, acuminata capituiapenragona, interius villis albts obfira, feroen conti- nentta' qualcfere Stramonix: radixquidem multiscandicantibus fibris ut plurimum co«- ftac fed non est vivax, nani iequenre liicrne pent, Si fingulis annis nov. i fan one & <iquirvd* apod nosraltem, quibusuri(iime fere !emen: etenim cum (eraadmodum, ncmpe Tub Au* Jufifincni, vel Septcmbris initio florear, & frigorii fit i mpatiens, primar pxuina; illam cor- jUmTM inc Solisorienris radijsdeftarividetur, & frequenti rigatione.

*SdUrij**

Ejltaliapritnum femcn adnos miffim Sabdarifx appellarione (nefcioantalcnomen apud quo^fponce nafcitur obnneat) deinde ex Hirpania. progencre Malvx Indic^ clegaf- tis: haud dubiad Malvx feu potiiis Alecafclaffem referenda, propterca Alccatn Ame": canam nuncupavi.

AICEA JCYFTIA.

CAP. XVI.

*Bomba del Cayre. Alcea eg- ft.**

jjERiCRiNVM cciaroest hoc Alccr genus, ex/Egypti Alexandria primum ^w"* * communicatum, inde Germaniz & Belgicæ, Bomba del Cayre appellatione. ROTUNDO autcaffuigitcaule/eflo, vitckentc, fcfquteutitali: cuiinhxrcDtn"lla etiam

Alcca & gyptu



PliflntnsLychnitis.



FOLIA autico iIuprjtdiutCLufiifluucrafl"mfcula, Silvia:tenuif(>li3:pa:neli(nilia,fongio. CC i rataioca

etiam feriedifpofitafolia.circa infimam quidcmcaulis parte Malvx folijspauu iimilia, angulola & in ambitu (errata, a medio v&caukadfutnmuai, inqumqucprofundasljcinias,infarfoliorumSibJ.uifj.:Lfivifa,d!lutiusvirentia:Rorcsina!iinafci!ntutSabdjtifequnicni forma Si colorcti-re limiks, pal-lca:ntc5 videlicet, minoxstamcti, icdnnon miuusfugaccsiUiiuuccdi'iterairmfceuh.Ion-g a j p r a y o n a v l h b l i & m u c r o n a r a c a p i t a, f e m e n O r o b i, f e u p o c i u s L c o n r o p c w l i l e m i n i s i n l U r c o n t i n c n t i a, h i n u g i n e o m e n q u a d a m l e v t c r t c i l a: r a d i x i n a l i q u o t f i b r a s i p a r l a, n o n v j v . i x r a m e n : O a m p n m z c t i a m p r t u I I X c o t a m p l j n r a m c o r i u p u n t, f i e u t n o n i n i r u m l i e, f i a d f r u g e m p e r v c H i r e n c q o c a t. H u j u s c c u m i c o n a J a c o b o P l a t e a u m i f l j, a d i l i g e n t e p i d o r e i n l i g n e S t a b c i l a. m e c u r a n t c, q u e n u d m o d u m & (u p r i o r j c x p r c f l a e f t.

DiLiGENriistMV's Profper Alpinus qui librum degyptiacis plaoris fenplit, ilhus cciam mcrairm, D.imniiaaic]; appcllac, & fit. - quentiffiroaminjEgyptonafct traJir. Prxterca earn ceate CB, illiuslc minibus, nonfecustjuam Europe ex PliafiohSjpfifSjalijfque Ji'; Tiiniinibusferciila pararc3ic, t'rcqj]ciit[t]i-mcaute hisfercuhsvc-(ci in jurecarniumpalatisr frigidafld huniida in pnmo gradu apud jEgypnoscenfert, habcicque vim refolventcm&emollJcntcin: proindepeftonacpul. monibusconvenire, vtrem cmollire. ac lubiicum reddere, fomenti velcmplaftri modo foluappolKJ infl.mimaciones refolverc, t'oloifsmitigare. tuniorescmollire ,conco-cjuvc, acad iuppuracioneViippurandos, moverc. Muliercsad uteri dunciem, ip(b referente.fomentisjemplaftris, infcflumbus, ex Jolijsaiffuflibujprocuraris. mijltacuimjtilitacc tituiur: in rnum vem inJamrnanonc, &ca!colisxijfdcm paratum Hccoflum j-<r oscumfaccharo candiJo liimptum aliquibusdicbus profelcdifllmoauxiliohabcc: ad ophthnlrnm tu5, tinua fluxione, decoftum collynj moda ulurpantjarqucumcofovc-reclatusdolcnsinplcurtcicisfolent.

NON dub'umcft, (.juin ilia ipfa fir plant! quam Rawwolfius in icgetibus nafcenrem cum alijsquibusda ftirpibusobfervabat non proculabAnaurbeadEuphratemfita^tre-^ t l b u c a p v f i k i j & l i i ^ £' ->^(nominc,liocefl,Pha(ioliindici, cogmram eiTeafllTit,ex mulcisaurenotis.Theoph.raft i ipu'vi/AQT cflc cenct: quam vocem cur Gaza Trionum Urine xcddidcrit, cauiam *** non video.

PHLOMIS LYCHHEIIS.

f. s. j. -TV 1 t.

NON fumij;narusvarias(rtrpcspmPKlo. midcLychnitideproponi ab Herbaria; rei Scnpconbus: nulla tamen , mco iudicio ad Diolc. dcfcriptionem propius accederc videtur. quam quaranobispropojurur.

CC i rataioca

Vtib.ifcum fil. M:mliic)i,



Ucaclwn.

Ucaclwn.

Ucaclwn.

Harea i n u m (ilve ftre i.

pi M.

M.



J.v.

tin it vu.

Ceteru

ni »J l lormini Clvctrii clafTeni fckttuhs cnam ccr

ra tfvmen So ipguftiora, candicar^i-i , ii feriore pane dtnsa &ctCK&vb& k nagine pnotus abfta: inrcrli.cc exeunt cauiliculi iJodramales plourmour, iiueidum pivulu itiajiircs, quadtangu li,viElo(i Kcanriicanccsict-jioiuuii pcnieuli;T» natolia loftpuicula, fup croribus timilia, inter fe oppoi ra alt CTnati tn 11 ai Lur, caulicolumm fall L, bev O(d h a f , & ft ^ e l a t i u l e u l a p r a d i i a ' H o r e s L i i r j u j , l u c c i c o l o n s , c i r c a e x t r e m o s caul i i v t r i c i l i a c i m e x d e a f a L o u g i n e & q u : i i v i H b f d a m p a l l d J e u n , c o m a k r a m q u e u i l l e x a & u r a n t e : r a d i x n i g r i c a n s e i t & l i g n o f a .

Exit hae collibus, ficcoribusque & petrosis locis per unvici Jam Hifpani.im & Lufitaniam: obfervavcram & ancea in Natboncofi Galtia.

[l.(irci NLi y&Iunio, fcmen auremfubru- fura Verbafeo filvctfiSalvia: fuliofere limil° in vafchj Julio profrc

pHt.OMii hsrc Gratis Av^fiVit.aquibu^OI r9pi/aAA) iappfJatur:La[iniis Ljxhnnis&Tli/X" allis:Mompe!!ianijdu apud eos vivebam, vcf- batcum filvcthc vocibant: C^ftellanis Condi- lera, Granacenlibus Menthera, eadem prope sa- rione dicj[ur.cjma Jclicct ejus folia, non modd GcCfj icd tiam recentiaoleoitnpoGracIlycb* njj vicem fipplercBo]jiiciciacciidantur,4UiKi tci.im illis rriDuir Uufcorides.

AN ullas alias docef habeac, acmincm vcte- rum feubctenicmini.

ILLV D vcii hlc adijeendum pmavi, Vctb** fcum Mjtelnotiijlvcitrc Salviz folio, & ^100, rundarn alionirn, niagn.icopja illjugM »)* monuwm qui Luliiiauiam aboctica diHcfn'i naric,nafci,i,Ln ,ib incoiisM^tuhradctiar. fun^ aurem illi monresparscju^, qui Htfpani*^*^*l^ TJ mprena vocaturJiocft.tiKM aiger, & V«e- mm MoiuManamiscflecreditur Toractiaifl

Becna Silvefri IIIOVCI bafi oabudar.qtio po^; rt) nomine vulgariBoctici appellJt.nd inedic*1

HORMINVM SITVESTRE. CAP. xvm.

H O R u i N i fih'c/Srtiappellat:onc,c<Jin' prrhendoScarlcam vulgo Herbariorutn nuocupati, tora cam qua; i nonulUs Cofu*Jo, vis vocatur: functnim revera Hori])inignfnc^ra-

ScarJcam porrolponte nafirentfiVidcitiTM ffictntntifcd ta honts dutni,inat cultam, & J*J' (fcfjmiliarem.Qit.x" vcroprarpiogn'bus^ .en' ro biimpreciuomodoperfulJs eft r3[i>Sj^Jv° floTc, Coluique lovij cognaminattff i P^ctuv^i verfam Pannoniam adeo liequens eft, ut nima iiUvulgatiuJlita^coilium & montmtn ra^l- ces,it(iuccciam ad faHimioruni Keditiore lo^ & colkotum liuttutum tnargmes,inter fepes arborea. Nafcitur & multis Aufriac locis atque nicminiantciiMilrosannos adlacum Lenia'^ num fl>om<: nadentem obfervare.Eftpry^tir rcrrium genus vu'go n

otum, de quo tuo loco, fco nonnullas alias fupes,

Hormini (il,i [.lores. Hormini GLu.caulis cum radice,



Horminum filveft. t II.



Aliquot habet Priorcaules, cubicali interdum longitudine allurgentes, quadrangulos, nonnulli villosos, firmos, gemulatos; (olia ampla, hispida, mucronati, in ambitu ferrata, rugosa, singulis geniculis ex adverso adnascencia, Scarlea: folijs haud multum abliimlia, minus *urn* cana. Si: odore minus gravi. ex alarum cavisoriunrur ramuli, fioribuj purpurcis { minoribusquani Scarlexflores, 6c Lavenduli vix majoribus) VLTiciJlatim ufque ad extremumofti, inflexam&: vcluti procunibentem acjuc nuumem fpictincfTbrmantes: fcinenin valculispuliliini, **oigricati** radix sil magtiajpoliicancr. iihcudintⁿnigracorciceobduSa. dura. vivax. fiugulisannis nova germ ma producers,


Invcniturpaflim Vicnnenfiagrojoxcavias, in montanispracis circa Manqctlla& S. CrucisAbbatiamⁿupraBadcftⁿsilKTti asⁿplcnfque Alpcftnbus Auttria: atque Stiriac locis*. quinctiamapud MarcomaiKiSj&apud Hirtz-pach pagum fen i **fodinis** nobilc-m, (upra Nonbergam Pragnll uincit **ceperie** nicmini. FloretJunio, lcmcn Iuliomcnlcperficitur,

iLLivsporrbbilvertnsHorminⁿquodGalltⁿtnchum quidamcognominant, i)on meminif. feni, quiaabalijsjani **exhibits** *: nili plurscjus fpecies& flomm color.&folioru forma nonnulli inter se differentes inveniti observasse.

LONGA habetPriortccundiimradiccnilo- lia, parteinferiorelaiiora, demde fcnlimin fedⁿpe:orasumiax. itferrata, (upcrr. cviridia,

'Qucronemdcfiaentia. tiullislacintjsdivifa,

Hormini fil. ini.primalpeccici. hwmiflifiL mi.quarts frcwe*



& nullis villis obfitj, rugofa tamcn, inferm! aurem viliofa,odore reliquorum Hormini ge
 nerumgraTi^Apolicbaarbuaaliscutalcs^uadrifingulos^cinsulsditil^bssvilibob
 fitos, quos ad fingulageniculi.binafcniper folia interkoppofiu ampleftuntur/upriori-
 bus pauld minora: extremuscaulis plcrumque purpura[cit,pinj;ui(que cft,& defimt in lofl-
 giufculam.pfi-psii gucmqjrpicamfiorum hiantium ,galcaque cditione pnedicoium.colon-
 spurpurei f3CuratoriscicgantifTimi:frmendeinde incalicutijjTOtundum^igtuni: radix
 crafraeft,nigra,mulc]sfibnsprardita,'vivax,fingulisanniin<v.igcrininaprofcrcns,nov6r-
 qLCTaulesproducens,{ccundum radicdm (ubinde fibras agentes.

Htrmini fil.
 11 it.frcut
 mini:

ALTER A cjus Ipeccis, ilh quidem (imilis,led floriscoloic variat,qui ptorlus nivcus est,
 fbliacciamincana^onvirenttainreliquisnoriscnvciiunt.

Hujus unicum fuprem Maio menfc florentem primilm obftrvabftm anno M- D. LXXI .x.
 inficcioribuspratisSopronioPannonixvicinis.&crutamdefercbam ViennaminDAic-
 holtzij «ornim,ubialiquotannispectmanfir,&:dcciduo femioc mulciplicacacA,atqual>I
 com muni jfacta.

Hormini fil.
 11 it. frcut
 tertia.

TERTIA fpccicsmajorcaltitudinccxcrefcit^aulequadrangulo^trcliqu^rpeccicSjSifo-
 JijiadlingulagenicuUexadverfonafcentibusJcdejuscxtini-iparsnonpurpurarcit^eriin*
 virecfi-cnscft:huresumetQforma Gmtles.dilutioris funt colons: foliainrcriora tnajores ha-
 bent incifuras.ut nonnihii bciaiaata vidcantur.reliqixnoraconveniunc.

Padim infilviscaiduis^ontanispratis, viarumquemargiriibusfpdenafcituicumPn-
 nia^non modo in PannomsS; Auftrii. Scd in Bohemia, Moravia, toca Germania, &aty
 plenque Provincijs. Floret Maio.inrcrdum ctiam Junio.

Illatu in horcis FrancofurcnfibujfTU&ifens arboribus confitis, florem variantern con-
 ipicicbam.ut qui neque purpurd colons (aturi .neque diluti ertet, led quafi albefccnnsW
 cincrciiquzcoloruindivcrfitasfaciliusoblcvari poterat.quia divert* lbrpshiscoloribuJ
 priditx.inocdcin interdum horco mixtim nafcciantur,

ttwmei fil.
 11 it. frcut
 quarta.

QUART/M fponc nafccntem non vidi, fed rnhu Viennanaraanno M. D.LXXXVII.K*
 mnine ex Italia miflb.Terrixpeciei valde difTimilisoncft^ perinde cnim aiTurgitcauhbuJ
 quadrangulis .gqniculatis,in quibus ex adverfo, ut in alijs gcncnbus, nafcunturfoisa rtigo-
 ia ^ H duirdrcnn^floTesverti^ilocaulefciamisna-

Iecncs/rjulilcm cum pncedentibusformar.gaieatos habet.minores ramen & coloris ru-
 bn, Icmcnalicultiextlc, nigrom : t2dix viyax,fin"ulis ann is nova germ ina product.
 Floicbat nulu Junio,



SED & Quintafpecies Hirpanicofcmincmihi Viennat Aufitznata. illi' non valdedif-
fimisxtcnincaulcshabMnonininiisaltoSiquadiangillos. iiodiscinaQs. vdlis^uibufdain
obfitos & folia in (ingulis nodis ferefamilia;pau]6i:amcnduioia,lcuioia,anguftibra,angu-
^raquodammodo^Tiucronc magis obtufo, & laxioribui dentibiu prardtra, pncferttmquc
ftcunduin radicem oaTcoocur c caliculfajn extremoculc [bmmilque ramis vercicillatni
nar«ntilnis & velutiinfpicamdcfincntibus, cmcri*unifloresrciquisfpacabuslongcmL-
— sjLavendul2: Horumfercxmuli, ncccolorcabi Uisvalded!ft; rentes: qmbusdeciden.
tibus, fuccedit femen nigrum: radicem habet fupcrioribus figilem: & tota planta fimili
^unireliquisodorcpra; diu. Plorrcctiam lunio,

Nafcitir & liar (ponce in An<lii: nam cum ncgotiorum quonindam cnusa, anno u. D. ¹⁷¹⁰
^ix - in cam infulaui cflcm profeaus, & in auli, qua: turn Grenwycij, quarto infra Lon-
dum miliiii crac^erfarer.fansrcqQentem ad Rcmxarcis Hippodromum mvemebam,
5ptembris initio Ciii afloren Km, ni Dafcminconurbm.

PED, LipIcrumquecft Horminum fil «» «C^muma It <udine, quad_raguliscauh buir <^_
kgnicuLm.rcii quorum genrcum infar^lia ad^ngulos nodos bina, fib, mvicem oppo- £ £ # « *
ta. — - . ' . * . — ^ — i ^ nontamcnmcana. peroras nonni In Uerrata^uta,
^ftu scxticcauns & aman. odoris ver6, quanii folios defcnpra. jitci indions: flores ame-
dio caulcad fifti'ium ufque vercicillorutn infar in orbem nafcunture purpurcis caliculis
cx euntcs Salviz femiles. fcd minorei, cleganu colorc prxdici cxcxrUlco piirpurafcentc, SC
quaii violacco interdum ctiam diluioie, nonnumquam ver6 quafi clncracco^ftnen in ca-
liculis ni. Trum^teliquis^cficibus minutr adix digm minimi crallnudine a Jiqmndof quar,
n^groqnc corricctef hft, interiorc pancflavelccnte, mulu»(tng»iis annis producit cau-
l<, interiorc i: rerrr vicinore parteliumi prociimbentcs, atque c nodis tadici proximio-
ribus rubindefibras gentcs. Totadeniquep Uniaafpefluelfgans.

Vb^lque circa Viennat Aufitix nafcitur, touque Pannani J, fecundijiii vias, in agroruib.,
*inctonimque marginibus. Integra xftjt florcr. & fubinde kmen ptofert.

^ Eft huius cneris alia (pecis longemajor, duorum cubitorum aliinj d in emplcrumque
attia Bcns. i Mrcduraciam fupaani Mpfiuscaulcstriplocrafliores. quadrangulitanini. aE,
uciahcrms ecmculati: foliamulro majora, & crafliora, altus maculis magni ex parte
diftmaa, qualibus &. Sal>iz cujuidim, Sc Menthaftri folia notau vidercmcmi; [pi-
ca florum lwn gior & crartior, floram vcio foima, coloreque, atque ctiam femine, fa-
tu coavenmnt.

Rartor est hanc speciem Priore, nec nisi in pennis herbosissimis locis, ubi glebi uberior, inuenitur: & pinguis lemnia altiora incipit.

*Hieracium
Jit i fiv
iditufi-
tiivn Crull,*

NEC ita legans est Hornmullvcltns genus r'ud minus fupinum, quod feniinc ex Crcti primium allaio, deinde Lugdvmm Baiavorum ad Ioannem HogeJandum mffo, till Hh turn clr. inno?4., D.xcm. Sifubextreruiim liruclirefii hi hum flares uiuit.

EJLIA nuroni prom u per terra m (trata pollicarilongituctincminora, fecundum pediculis) ariguft. i. d' indcpaular-iiQ in iaiitudincm c'xpatila, ruj'oJa, per eras rrcnata: irauls <<aliqu. inruh'n) angulofl, intjuibusper icre rvallaiiaL-untur bitia ic IT, per folia fibi opposita quibus in i' bem difpofitis incumbunt feni flores albi, Cattariz vulgaris floribus forma. & ramplitudis pares. TorapUnrainilpidaest.

Hieracium

Sn iTitRis Hormini, JfiuWTBfip^w.utd:xi, generavideri hasomnes! antas, cenfcot nemini l'ant'... r.cvulojfdiinliht_t, (JUJ ntiuiinecasdonarc vclit, liberum rclia... Mihi v'cl' Schad' v'volgar' live Si Lirej^itv^uidamdicere malutir^tiani Gall

Q'Lfic

Orax... ri Zint lanes... S-liunnL^herliam, vocaur, i-torminum iilvcllre P'... Colus loy... roribus. H'm: mum ii I v' f' re Secudimi! licet quidani Galicopum... cam votafe... E, iiocisrclamaiuibusanu-n: Quod nil hi pnm loco de-

Herb. Gal.

criptum est, Tercium... Quod secundo, Silvestr. • Lobelijj Gallinithum vuls; d' dtilum. Tra-go vera... Calcey/Quartum... cum quinta... r'rcicsftrouices Ktfpaoijs millo Baccharis nomine mihi nata, magnn aitem iT^plaiuaruin hi Rona. qpecneanio pofclvulgawsmeaj Pannontcarum llirgiiU^ttfc^tiODCS in lutem podijt, Sidcritidcm quernfolio appllare videtur: Quod a HB o^ u i n i o loemicicnpii, mihi Q^iintum cr;t: rhi^ocumx nil' lierculx AultnJCS »ro ^N^j'/t/tft agrcftcm falviam nominant, vulg6que vtналcon propjnujK, cum alijs balncanbus hctfts. Matchiolus fecunditnejus (peciem, Honiiniuin jlivtilrc vocarc videtur: Lobclmsincer Verbafei genera recenferemaltiit, & C Verbalcuro mgrum (alvifblumappdiac^quod jnlicuoflore vaner. nuiiquamobktvaicmcmijai. i e-xtutn autcm crit, inpni ura illmi Creico (cm me natum.

MENTHASTRVM.

CAP. XIX.

Mentha sil-

Mentha sil-

Mentha sil-



N Vit. AM Provinciam adircmemini, in quanouconlpeccrim Mentliallrum. liv o iiluellreui Mentham, Gr.-tcis Hjioo-^orax* dictam, sponre fecandiini aquas & nguis locM nalcncem; Binas vxitalias, prarter cam... tasoblervabam, partim in Pannonia &... locis fonte nifceoces, partim... accepcomihi Vienna: tiacaSjCJut ad cj us chile... periinerevidentur.

Cv B i r A L i, aut ampliore Prima afliirgit cat) ic, quidrangulo, raedaUa pleno, multis... coanamc, ex quibxis bini fempci tx af... onaocm ramuii iinnlitr qaaoargolij... quouum extrcmas paires oblongar (pica?, verti- cilla[imcotiifoiij[iscaliculiicon[brm.'F,inqu] bus Hures Mcinha* iiU^tUns aut ilhtis...

E Calamindue, quanivulgoCattanamy HoribusrimiJcs, exalbut. graiioiori!:: folia ad- vci/isinttTlepediculiscjulem&r. imosad ijn- gutosnodosambiuu, Moichailio I... tedmagisad CattantfoliaaccdeBtia, colore tamen tntiuiatbicsQtequatn iHa.aurM... ftn.tcdpomisvindi. mentliaricoicnircfc- rentui. acreiii&calc-fjeicmcuitaporrmr radix dura,&fcgno6iexlacet! busprop<gincsfpa' gif> utrchquarcoDgtnrciplanrx.

Sponte nrfccatein wnc plantain iovenie* bam, pnmiimad Aiiftnacwum Alpiumra^d inprairntionaflenoS. Cruci(rkam>, <" licnawPrjtfuliNcBbergcn&afcetD.

Hitfciicm : dtiide niaxijij copKiuii

aHra. licesfen'i. iliJriotinexrnflaellnnnitinimaarxNcmctliwywar. GeriTiatiit^P ihA, III* Vu-j Biltlinfarisc Barrhyan p. tn qm. dum vivclutjierciiitami^ Ar<... fcrertt Regni Vngarue, & S. C R^ Q. *M" aCon(ili;s: tumccum inLevien pra Mandrcrtofff Iumo florentcm, quo-tempote (imiliccr, in hortos tran] res producit.

ALTE

Meruluftrumii.Montanuoi.

Menthafnrim tn. wbciofaradicc.



ALTERA, quae mihi Viennae semi-
 ptum ex Hispanijs Calaminthae tertio nomine, cubitale **W** lcat, qjadrangulof, r e
 atas, frequenter abas, ut superior, nodis cinctos, subterfutos: folia longilicua, rugola, in am-
 bitu nonnihil nerraca Juperiom M. vithaltinfotj^ is tamen incana, non
 saava odori aman&acris fcpmw, iingi. los nodos* quali, fcdoppoffioinccrfcfiwam-
 b i u n t i i t i r o p c a p k > m o l l e s c a a c f e o t < > h u m f o U o r a r o p i c a i ^ -
 nunt. SciDtercaviTCicillorumritucompositinafcunturcaliculi. equiouspiodL'UHiHolcu.
 candiJ. Cattarizfotumwnulirbs maretdis. f j e c c d i r l e m c u . I J . p a r . e x . I e n m n u n : r a d ^ x
 eraifa, fucculenta, caphano ferdsequalis, forisaLauantalam fofca* in mukosiiinc indead
W u q u a f i £ a J n a f c n i c s n a j o s c t u b c r a . & e l o n g i u f c a l i s f i b r . s d o n a t a e s t . p e r -
 ennis, i plurcs(iii): ulisa! miscaulcspi<ftrens: imoip(i_cuain napia tnacre a b r u p t i o n s
 obnirunovasiiKcrdumplantasprocroatit. Klorctlumo.

& rugola, & adnati in lateribus **V** « d l t a w f c magistumentes, & fibræ omiffæ, quas ad-
 ditæ oportuit.

E O D E M p o r t o t e m p o r e q u o s e m e n , e x q u o h æ c p l a n t a n a t a , e x H f p a n i j s m i t t e t ,
 additum erat etiam aliud Calaminthæ primæ appellatione inscriptum, ex quo pulcherrimum
 Cattarizæ genus enatum, cubitales habens caules, quadrangulos, geniculatos, multis
 J a » i s p r * d i t o s : o b l o n g a , a n g u s t a , p e t o r a s t r c i
 vulgaris EoliisvebcmennoR . f e m d o s u l t u : H o r e s f p i c w i r a i n e x t r e m i s r a a u s n a f o m e s ,
 cat^idos vulaAnsCattau^fioribusvcfpondentes: deinde fementnaxilibuscalKibusm-
 y u m , C a l a m i n t h z f e m i m p a i r a d i c e m d n r a m . f i b r o l a m , p e r e n n e m , f i n g u l i s a n n i s n o v o s
 caulesproferentem. Floret lunio&Iulio
M E N T H A S T K V M m o n t a n u t n . . n n o i u c u m a p p e l i a n p o c c r i c P n o r : A l c e n . c u b c r o f x n -
 d i c i s c o g n o m e n a l d i . C H l a n i c z t c h m f o h s r n o m e n a p i a r i

MARRVJIVM.

CAP. XX.

L E ; I T I M V M Marrubium muldstocks Ircquensciefi3t:atinAulbia&Pannoair»
 accertisdu aaxarloasys^uejMgcislpoaicBafcitur. ABud vcree g«nuifre- <<*<*<
 quecuilliam iffit coiffpxi, ouod (dutr Paniipmcarum ftirpium obfervacionescvulga-
 bam.nc-

Mirrubium vulgare.

Marrubiumakcruin Pannonicilm.



tTJYiy

ham, nemini adhuc descriptum fuisse ab hisce. Hist. in hoc capite dabimus: sed legitimi iconem proponere voluimus. ut uterque cognoscatur, & quae sit differentia.

IUS, U t U C r ^ I I ^

ite dabimus: sed legitimi iconem proponere voluimus. ut uterque cognoscatur, & quae sit differentia.

Marrubium vulgare. F. T. G. tumtim.

Mirrubium vero ex eadem radice profert Pannonicum caules cubitales interdum quadrangulos, firmos, nodulos, in plures ramos divisos: folia ad singulos nodos bina, conseriitu nascuntur, duas uncias longa, unam lata, in ambitu serrata, legitimo Marrubio paxillimilia, sed angustiora, nec adeo orbiculata, imò paulatim à petiolo in latitudinem excreta, scilicet in mucronem desinentia, profusè incana, non in rudiis tamen manifesta, & acrimonia: flores candidi, marrubi floribus similes, in molli- bus & canescentibus caliculis nascentes, verticillatim cum legitimo convenit, quae singulis annis novos stolonos col- que ramos ambiunt: cum legitimo convenit, quae singulis annis novos stolonos col-

dic

quae ramos ambiunt: cum legitimo convenit, quae singulis annis novos stolonos col- mar: f i ^ j i ^ F ^ 1 ^ 6 ^ u v i n d o m m a g t o n i f f i ^ u s u i b i . " i l q u a b s q u i s f u n t Natum id apud Belgas, non Hispano semine (nullam enim similem plantam in Hispa- nide memini) dicitur Austriaco. An porro, Marva tantum Serapionis, cujus meminit lib. de Simplic. Med. ex plantis, c. 195?

ALYSSVM GALENI.

CAT. XXI.

Etopt r r ^ leni nomine circumferuntur plantis, nullam profusè inveni, quae b i c r o r , q u x i h u s d e l c a r i o m i r a c x X o ^ f c ^ 1 " f l e r e r i t 5 « i o n e q u a d a m o b s e r v a f l e a r - u t q u i n i l i u d i p r u m f i t , n u l -

bw.

PEDALI vero est altitudine, quadrangulo caule, statim à radice in multos ramos, visis, canescentes omnino, & veluti tomento obductos, circa quos, ad singula genicula bina folia contrarij inter se pediculis semper enascuntur Marrubio similia, breviora tamen magis, que crispata & incana, inodora, amara, calices per intervalla verticillatim ramos ambiunt, quinque plerumque aculeis horridi candidi, & quibus Marrubi flos exilit, sed colore di- versus nempe purpurascens: femina aculeatis vasculis subrufum, Marrubiano femini par: radix dura, multifida, vivaxne an annua, istuc observare non potui. Sed semine quod ex Hispanijs attuli, apud meos Belgas nata, coejuo floru. tannoplumou. fenjt: Ic mine au- cctn & *'

Alyssum Galeni.



tem maturo sponce dcciduo fingulis atinis rnafcba^ir adhuc,cum inde cxc/fi: acque enim nunc in qmbufdam Belgicisjiorns e6r fpici puco.

Vnoduntaxac Hifpani* loco(iSw'ctfi non dubitcmplunbusHiv&nirOliaticplanramna (ccntcm oblervabam , ad Elda videlicet pagum j incaemeteno, quo plurimacernotanhiaArabicishtreterisicuipuvidcrehcer, Valentino rcgno.fcptem fubHoriutfa {O.rcdt vcccribusdiAa) mihanbus.fiveleucisHifpanicis,eami}ucflorenteni,& famine maiuro cnultatn, medio Martio.

CETERVM primo confpcctu Marrubiuit cfTcccnfcbam, dqnc&acu!caticalicul!,8f flosipfc.in memomm miliirevocarct Aiyfon quad Galen u»]iii (ccundodeAiuidotis inhuncmodutn dclcribn: AlyfTunherbact Marrubioimilis, asperiores cam en &c magis fj>inofos in furcuorumiummitatibusqrbes liabec, flotem adcrulcum vergeneem profere. Hanc inter canitulx xltus colligcre oportet.

Noiuuiis autem rationem , atqut ipfius etiam facultates libro fcxro Dc fimp. medic. icfert. Nuncupata (mquit) elt hare herba dicitur, quod mtrificciavet demorfafieane rabido. Sed&rabietmquoquedata .fxpcin. tocum fanavLt.irgUc hoc ex totiiis fubflanti* (imilitudineeflicic. Diftumpriuscft.ulcm facultatem ex folaprcipi expertentia,&pUmulca experiatur, cognofctfacuicatem Jia-

ne nulla constare methodo. Quod fiquis ad bere medioctet reficcantem & d. & viriliginem, & maculas facit a sole proгна F. PAVSANTAS in Arcadicis eandem nominem assignat Alyfso: eandem etiam Pli-

ocvut^amcah.fpamcarum^umH.ftona.ViderimqurNobiliSjdfmquea. ^FabiectolumnarcnfpcriildeAIy^AoroniVCoi^ nam, ut initio capitis dixi, nullam He m vidcrememini, qux nroximiusaccedat ad illms Alyffi h^onan^quam hxc. Mir. r i 4 m SrSISJS n p<5cft.quia nee odorem habet Mamib.j,wcuwicU>knBut.IIUd, ft dar_peros & pungotcs, florei que purpurafcentes,nonialbos.

GAIEOFSIS.

CAP. XXII.

NVLLVS Recentiorum quorquot deplamis fcripferunt, m.hi fat.sfacit in .cone Ga- Icofis faifori*add.ta: n.im vel Lnm'j genus .l' .quod. vel Scrophu arum vulgarc.n

M p-5Gakopfi,extrad.eefibrcfa&fingu!.,on«a.gcfcenre muiras fert v,rg3s, quadranniG, quibusattenm iobwpt folia ex M « « ^ » » Icdnonmordacia: fummum virgarum falHgiumquodammodoinfpicamdefi. [l]qllcambt^rqui, isaut^cn,siimulna[cenubuIca].cuI.smq^JmqllClacI- iums aqmbusproduntlongiufculifloreiinlUrflotiiim Lam.) h.ariKS,Icdlongcmi- ^KScxapurpurafca.ns.propendennbuslubcH.s.alb.squ.burdamvcriisno. ^is^cminaincahcuisquaccerna.niatuniatetiigra.utiiiSidenndei.

T o u p C ^ S od^nsdt, Jra:lercK11Umb,ofisloc1sna,xc,usvcrdqux,nat>ert.ori. b^locis,uunreccnsrucc.risiilv>s,ercra,rcmiflioreftodor. Floret Iumofclulio. Cvs IT A L , autCmc(lAl[criOalcopf«caulc,inwrdum«iamiiiajarc,quadran(tuIo, ?afib, fecundnradicem rubenic.frequeniibuigeniculispradiio .cquibusbinafempei Wtoftoopofiuoaliunturfolia, VrticxfolijiluuJabfiruiha, pcrorasiinuliter crctiara, (#1 Inn.

GaJeopfislegitima.

Galcopfis maxima Pannonica*



fed longi majora, palmarem que impl iridittcm fiepi ffi me fupcrant ia, infuta quidem, ita
non mordacia: amediocaulefurlum verfus, ad linguosndos orbicuuui>i ivin, v-
nonnumquamdeni rufcunturflores, nonfimul, fed fuceflivcfefccxplicantes, Lamij «.?"
ribus multo majores, faturc rubri & tamquam purpurei, gale* inftar hiantes, labro ini
rioreCcujuslacimaraoractbirido^ffeqcuntibusadlateraljarbuliiprardirojrjccriorcr^16
purpuieis & icandidis lincis depi&o, quatuor (hminibus cumftilolubgalcalatentibu*
pdorc gravi, & ingraco, un coca plants, fi teratur .guftu cciam inluavi A; amaro: lacing*
vafcula.drciduis flonbus, quaccma fcminaconcincrc dcprdiendunur Molluccac {imi
radix crjCi.fibrola, perennis.fingulisannisaogfcfcnspluresque ftolonesprofrens.

Maximacopianafcitur in fitvofisillism6dhus,arciG[cbc'n III.BalthafariideBjttliy^
inPamoniainrccrammltta; vicims, fupraWarafdinum.ubiflorcnrem Maiomenlccr^36"
bam anno M o LXXIX. & indelata in hortum Vienna: transferebam, in quomu^10j
pcrfutitannos mirifice augetens, fcfcminccciduonafceotibus novellis plantis, viciff^5
areolas & pulvinosimplens.

GRACIS porro dicitur Prior plants raAJa-^n yx^&oKoK Plinius Galtfopfim & G*
Icobdolotiappelbt.atque iificm vrbis, quibus Dio'corides, totiui ftirpis biftoctam i^cJ^
que facultates delcribi. AltciiusimlluainomcJi miellcx.

L A M I V M .

C A t . % x i i i .

T T R T I C A I illius innoxir & murrucarentis. quiim Plinius Lam iurnappd'at. varia
V ^nt genera, cum foliorum form i, tiim floris amplitudinc, cxilirate & eolerc
fediftrciuia : ca ciim lint abalijs propofira, hue mferrc non tft neceffe. Sed alias q«^3"
dam ittrpciin medium adfene lubet, quarnon oinorc m atHnitatni cum Lamio liabc^r
vjdcntur. quani ilj.

P I D A U S & majores interdm habet Priotcaules, quadrangolos, hirsutos, Lamij
Um>*»r*ram) dos quibus perennant. J. J. ad vrbis C. in fpenpediculis, hircine lin Mt Vatio argm
re, in ralc untur folia, Mclif Toph Tllot Tcfim Tlta, rugn(a, ana vi rid irate oitentia g
atiq uanrulmicn; tioces ex (inguiunodis inter folia rcn i autqiat rra pbiicunco
antrorfum pfaantes Sd p r p e n d e t i t e s l o n g u l u l i j r i b o r l , L a m i a f l o r u m f u o d a n t j f
arinuli, majores umen, Zc nulla galci infignm, fob labro inftitrc pronuflb, & r^cl^
y is

Lamium pannonic. i. v. coloro flo.

Lamium Pannonic. i. albo flo.



Lu]SfquqtnqLJiburdjm nont'uxesai00pu purarcunr,3[itdijutiorepurpuranirentjmajo.
lc]piupureicotoris:utricu]iexquLbusfloresprodeunr,(atLsIaxi&capaccs,exviridipal!en-
'cvfmcnma^nun^nigncans^iiaarqualeconrincncradixcradiifcula.&aliquamulumno-
oo'a>malusfibrasagir, & fingulisannis novos caules profert, inftra V mae, fcaliarum
umiltum plantarum.'

Co... Leyceiiberg.monrcBidenfibiischermisimminentijGumpofUeirhc.Mede-
medicjsAufria:&Pannonia;!ocis,umbrollsS£{j]vofisinvcnLtur Nalciturctiam
in cdtii illis (Uvis Francofbrro vtcinu ad dextram,Scpcntnonem vcrfus. Floret Maio^o-
F^inutumnicftlutiiio.Rcpcritureuam nivcoflorec,fdranfl]rna. ApiidLaiif.imiam verd
'n Albbrogibus, nullamaltam ilirpemvidercmcmini, quam quxalbum tioreni ferret,
ar»novij,iiCct M. D. Lini.dumc NfarboncliGallLipcrHclveriosinparriainredircm.
)• Ejusin Auftnalpeccicnia'ccraiii ob(crvabanijnoiivaldcabilladi)ferentciTi,nifi quod
'fmiores haberet cauk'j.frcejuentioresetiam, ex radice fingulis annis rcpullulantes,fo-
ha item paulo anguftmra.

ch si vs fIC Tragus lunc plantam Meliffbphyllon appellarunt, cum tamen exigua
odorisgririaprdsitafit,ncc apes ejus flonbus valdedele^entuni:haud la oan aptafitad
ay canai[usconfricanda, allicendarum aut retinendarumapurn gratia, ui eft vulpris
O!*^flf, E)ui6u(damcitrago,abodorcciiirijma!i, difla, qua:omnium Dodiorurojudicio
vcrum [uiA/fr^K?]j]ccn(eturEso ad Lamtj genera potius referendam arbitror.

Exotica cib Altera, cui, dum primum nata est, subtota nuda sunt rons, utrice: iolijis fimi-
lima, uti ampliora ut plurimum effeant, molli lanugine villofa, pingui & lento quodar
«torciviterafper(i, duni novella (unt, inambuuferrara, lon^i: pedicu [is ful ta, inter
^u*a]ticroannocmcigitcaulisvel(cxangulusvelquadransuliis (Htnulque enim rorma? f(r)mYiw

ficuntur) molli lanugine pub(cen5,perquem ex intervallis,-equal
in nod is fp.ula(unt.ft>lia,mod6terna,niod5bina,fupenoribits minora,& breviori-
bus petnli'.k-TM^ ^«,,n... ali^nuncbint.nioddrcn^profoliorummimcrOtCXiliunt
pediculi, unciales, tenues, firmi, hirsuti, ternos vel quinos flores sustinentes, concavos, ante-
r)A cparccnonnili!^utesxxi^iio]jbel(oproin)ntVj& :iciltllftlocum,bmirittl-
?CncPPr*ditos,co]ori5Cvindtpa)lclteius: floribusfucccduntcapiusla.LtniferL', autpo-
lusicro pb.ut anr vul^ini.nujcronata.cxjli nigro (cmincplena: radix urnczfinulis, obli-

H^*&multisfibr, capiiiata,co)uscaulshicmcpccunc, (cdnovovccc, interdumctiam
We iucmem alij plarcs ex ca aj. latus renafcunt ur.

Lataium Pannonic. n.exoucum.

Lanium Pannonic. lib



Hanc stirpem primūm florentem observabam Viennæ Austriæ in meo hortulo ad parietem natam nescio quo

Jem , feddeciduo IhnMpSSSSIfesi? " 111 fu|? «I^u«^B ^ms^fcKb,: ^

anno aliquot plantæ, quæ cœcum ab

alicui perit. nonnumquam tamen ex radice etiam te

Si quis me hanc plantam minus aptè inter Lamij genera reposuisse putat, liberum illi

est, vel ad Galeopsin, vel aliam quampiam congenierem referre.

111. Lamio 111.

Sed & ad Lamium forte referri possit elegans hæc planta, quæ ex radice

mibi relatum) urticæ simili, plures profert cauliculos pedales, teretes, quadi

quæ ab his nodis cinctos, ad quos alternatim luna contrario situ in longis pediculis æquali-

ter nascuntur folia, Lamio, sive Urticæ non mordaci ulvari, & feracis

est, simili, proximus tamen ad Hedera terrestris, inter quæ caliculi terni, quaterni aut quini,

ter floribus forma proximos, hinc ita, nulla tunc

taxat folio reflexo, mixtis coloribus cæruleo, albo

Nascentem vidore contingit: sed iconem sui coloribus

anno M. D. CXXIX. III. Da. de Batthyán: mu

ce, uti hic expressa est. Aliquot post annis radicem urticæ similem

tamen & sine radi-

tellexi.

BETONICA.

CAP. XXIIII-

NVLLE sunt in Pannoniâ, Austriâ, vicin

siue purpureo: quæ duorum generum est. Vna

maturius florec. Alteri

caus non flores sunt

ctericce, quam

excolatur.

Vnum illis mihi observat

in ambitu terrarum, Betonice vu

ditate nitentia, sed diluitoria: quadrangulata cu

iJqueProvmcijsmontfs librbofi, niillarfil^

"CmeproveniatB«onicaufitata flore rubro

emm breviorcm florum spicam Jiahcc.ftS

juet molliore, & magis f jft.i(rftflorimfpit.i. ilJiq<

terea hæc postrema in nujorem altitudinemi c<

co utraque sponte nascatur, vel eadem puluino

"us atnuila, non adco tamen fijfcavin-

•s.geniculan,lubliff[i]ex illonimmedio

excunr.



Sideritis r.



exeunt, & in pedalem alricudtnem excre-
feunt. i^tiide excrema parte in alas (efcdi-
viJencs: fohau lingulis genigdliscaulein
C juali luuajjbiujj], humi r. i. i. l
lopediCLilo tulta, odorara, fi admodam
& i]la, giillusamancacis: fummiciuks&ra-
mi in denfau ciliculomhi fptcun definunt,
cqmbusflostmergit vulgari forma fimih,
ted colon; omnino albg fenjen dcindcin
vaicuh, Bconicxvulgjiirisclifltti par, fu-
(uhaadix non d d l H H i s , x i ^ d i s an-
iaisaiiL; cJcens, & plurc caulesproducens.

Cretecitinafcenfu montis Neuherg, Ec-
fchenjugi&alijsquibLn'damcditionbuslo-
t i s l e d o b d n] ' u p a Z c
hof, magnt^ltra Gamingatn miliariger-
manicc), qufterjell in Hcrrt-nalben Si Dur-
rcnllaii!. Fl: < rct i * r e l u l i o . i n h u r t o s t r a n f l a t a
niatutuis aliquaiuo. ubi cgrfpicaugercit.

* Hu|<s memimt ditim-ntiflimus'peritiJT-
miil!]ueCor.luslib.ii.Hill.Plant.cap.CLix.'

SIUERITIS. CAP. XXV.

SIDEKITIDIS, multa, ab his qui Stir-
pura Hiftoriam fenjifcrunc. adferuntur
genera, qux foriit. in non omnibus aefhue
cogmca: qua; dan] cam en in mediumadferre
eft animus, qua: adSidcrmdis PritiixDio-
l'oridi Heracles cognominati-jClaffem re-
ferri poife videnuir.

PRIOR caules habet quadrangulos. cu-
biralcs, hir(uros, geniculaios, folia ad fingulo
s riodo^ bina. Ci adverfo nalctfita, rogola,
vihs<jbfita, TertLifolijsmajora, pcr a' i i b i -
tum
cantis & actiuofcul: ramuli ad fingula pine
genicula nafL-umur tninoritius foijfotfiii:
flores fumum caule verr. al at b am i e t e r e s
in Ipicam A Gnunt. galcarialiquatuluoi,
canJidi, ddoraci, biatiHiu (ivtriflum fangut-
neisnottscon(pcr(um tubences: femer in
penta^ont5V3fcLiliSLia: qualc, ni^rum: radix
diir<i, l]gnoft, cxfummocjplTcpluK5jncr-
dum profrenscules.

Paflimin Gallia, Germania, Pannonia, X**/!**-
Aufna/iccionbusaiirorum & Glvarum cj-
duarum marginibLim>bviactf, !ixcSidcri]is.

HUMILIOR est Altera. ncque ped>!cm
excedit altitudinem d l = l
folijs priori iimilibus. mollioribustanic¹ flo-
res ampliore Sjalbi. pallercntt labro, & pau-
cis rubns punflis apherfb, *cr[icillatim in
utriculisculem (uprcmorqjeramulosam-
bteoceSj breviorcm quam in Aipi-riore, &c
quad mucilatam Ipicaoi couficiunt, ut in
Pranellivulgodiol

Nufquam non occurritinaf;ris, & inter
fegctes multis Pannonia: A: Aullriar locis:
circa Triebswinckel autcm **freqantifUma**.
Floret litlio,

LONG TORE efl Tertia folio quim Mar-
rubium, f. irisad **Salviatfolium** accedjte. mi-
norc tamē, qucrni feu: folij diviura, ftabro,

DD i Yiliis

Sidcritis in.

Sideris IIII.



Sidrim *,'

vilis quibus 3 ampr 5 diro, nec in jucun Ji',
!lus nee odoris can lcs fimidit quadrangi iloi
p.ilmum ut pluninum excedctc^, jnrerdin*
procambentes, duros, hirres, candican fcsj
quotum fummitates per interval]* vccricil-
Janof bescoronant, ut in primogenere, or-
bes vastulis constant, itujiiibus flos pnofi
par. excandido nonnumquam purpurafces»
t]uo cvanc/cnrc, femer in vakulis nigri-
cans reper: tur: radix duraj tgnota, vivax. ,

Frequens occurrit aridis & perosis Ca-
fte lla Tvcteris locis. ar tate flores. quibuldan*
etiam jocis, in Aucumnum ulque flonb"*
on Ltfta confpicitur.

AL i QXO r habet Quarta ramos pro-
cumbent^s. quadrangulos. cneus, villis qui*
busdam obficos, quos per unervalb contra-
rio femper fitu bina cingunt folia. Prime fe-
te similia, auld tamen nymota a medio ad
p
cxrremum ferrata, nonnihil tiam villos*
fumos ramos verticillatim ambiufit v*
fculj in quibus fiore, pnonbuv format fio»
l«, quancuni ex deliucatron colligere P0*
rui. propterea de colore nrhil pronuntio, nC'
i qucdcfemine. quod fupenorurn frumpaj
cITvcrifitiiileclhradix novidnutvtvax. fci
coanno jquoplanca flores pronilit. perire.

Q v i N T A, medium caulem haU-t foC-
icaum. quadrangulum. dc mdc , iimm arJ-
dicc, mulronnlateraiparrirMtnos, huni>
f u u, U r r e s . quibui Jam viUuip*
center,
bcicccci,

Sidcritis

Sidcritis IT.

Sidcritis V.



Sidcritisvi.Pannonica.

Siikritisvii.



bescentrsjgemculiui.Liuri bina fem per inter fc oppofita, ad fingulos nodos, ampleflun-
tufol.,*, praxedctis folijs pgnelimi^mmus tamen ferra.ta,interquc,ab imo ad fummutn
Ifquc jverticilloramritunafirufurinvafulisflores.fupcnonbusctiamformafimilesjqo-
'Umcolor(nifa!lor,nam inarvisBcIgcicajillainolimobfervaffcputo) albus: nchujusra-
dix vivax eife videcur.

Harumduarum poftremarum , cum illiusqux feptimolocodefcbetur, iconesad me
toittebac Iacobus Plateau anno M. D, xc.iplius manu clcgatercxpreJTas (qucmadmoducn
^plerxqucalia; abeoaccept*) quarum prioresnuxomnino, IbloduntaxatSidcritidis
^Aenusnomincadrcipto:ccitia:auteniqua:flamnotxad)Ciax.

S E xT \ pedalem nonfuperatalntudincmcaulisiltiquadrangulus,abradiccf latim ra- *sulititkru*
O'ofusifotia fecundiim ndicem,priori ecnrc nonbreviora codem rgodovcnofa.Gvener-

em &ramosambiunt.breviora; flolcuhftaiim aramorumcxonu,ipfos&caulem.in
caliculisquinqlacinijsconfantibusvciticillatimambiiint.primislongeminors.&c
^(cutisvixprominentesjformatamcnillisfimiles.fuiciciloris.labelloautcparcinter-
riore pallido: femcn (upriorum feminc minus, nigricans: extremos porroramoscaulem-
9ue,toliolorumpallcfcentiscolonsconuoccupat,totaq;adc6plantaniollilanugmcpra-
ditacltiradixalbcfcensjignora.aliquotfibrishirtajfednonvivax.quippcquammaturofc-
^incfiiblequcnshicms pcnitus tollcrefolct,nonminusquam Altcram&: Quartam.

Frcquencifllrnacffin Pannoni^ Auftriarq;infenorisarvis&: inter fegetes^acio&ftrili *Natalis*
*o'o. Floret Iunio & Iulio.femcn fubinde naaturum etiam Iulio.

PLVA.ES excadem radiccpromit Septimacaules,pedals,quadrangulares,lignoros, fur- *Sidcritisvii.*
j^SiinquibuSjadlingulosiiodos.binanafcuncurfoltajfibiinviccoppofica^ngufta.liyr-
Kpi vulgijfifoliorumquodammodozmula/aturatiusvirentiarfloresQuintijminoicsA:
Lavciidula;tlonbusnoiviIded.ilT!miles,noiinih[lpaUcfccntes,jinorbcmafcentes, inter
'atiufculajbrcviajerrataquefoliarummoscaulcsambiunt, iiiiiaxtreincorumfoliorum
vclcit^adixlongaefit.duraJignofa^allefcntisufcolnfccii colons aliquot annis
•fr,n.,t.-auchs hiemem in hot to ferre potfl.: Floret Iulio & Augulo

Dicitur. Grecis o'io ipitit f... in Gallia & Germania, Tetraht & Herba Iudaica: Tertia ctiam apud Hispanos Tetralul. *5^*"*
Vii<;aristr/i/i/yf<idcrtynobilisherbadicitur. Prima&SottarliizotomisVienncn' *WM!*"*
fibus mulierculis Snc pferrau. Quarum&Quintamfudix) **SideritidifaEteriBiomi-** *\$W»Ttn*
DD; *trant.*
nacci-

ncaccipicbam:Septimam ver6proA]pina3fivennmaiaSi(lcritidc:caa!liquid2ffinchabere mihi videcurcum SideruideinontanaLobelij.

Talidatit

Sidricicidis iltita folia>refc* ence D&feondcjuaprc vi, vulnera fine inijamfliationis periculojungunc. Prinium&SextaminufumdcficcatanindfL-rvaiurliizocomimulicrculsr. Nam pccrcrjaam quod adver(uscapicidolorem,c)ucmS[inJ"«F(i'ap<.-lt;iLit(inidc];(r-bfinomcn J ipfbmdcctxSoilliuslavariunleccnfenc, aneicioquoindocioempiricocdo-Hx: carundctn ciim ilccotto pedes & alios artus defangaros, aut alioqui rigenr.cs, utilicer fovcnprxdicaic.Hocequidem ItiOjquofdamadcrurQmeiytipelata {Bc«itf6*»opfc/ Germani itcrottappellant Jcuranda, Pnmar recenscollet SiaJhuc virem is decora non Cine felici fuceffu QioscrtCjCrurafovendo.auidtcoifit fumo lcnieido.

O CIUASTRVM VALENTINVM.

CAP. XXVI.

Qtimflmta

Valentianum



A PpfcLL/BAwr hancplamaro Do&iorcstin j t \ ValentirjaHirpamaEnademi3, Ocimafirum,ramerii Diofcoridisdefcripttomexacre nonconveniac: malai umenlioc nomenilli rech'nquerc, quim aliudaliquod indreinctrum.aurplaiirxcuipiamavctcnbusdefcripta: minus relpondens. Nam qu u 6d n onn u Hi, ex (b-lopitudun intuicu conjc&uram faciefiresjanc mc.iui iconem , quain ex vcree planta exprimi curabam, MarrubioaptarematLicrintjCaufani nonvidco,quandoqu]dcm hujus (blia, camelii frequcibus venis pr^dita.Marrubij folijs fuit multomolliora, & minus craflaj nequculta odoris gratia, qualem illi fuo Mamibio tri-buunt.comtiicndanrur.

V T v T camcii nominate libcat,pedali est altitudinc,ramisqundrangLjl(S,vi]loobiJris: folia illi ad fingulos nodo^ ex adverJb Iit.i, Ocimi medij, fornii&magnitudine, guftuadltringence: circa Tummos ramosrlorcsproveniunc in orbcsdifpoliti.Marrubij inftar^cimi flori' busfiiniles,i]iva(cul!spungribus.(cmcn,quia-leMarrubio, nigrum: radix Vrnca-aur Lamij radicumzraula, anvcro pefCnois aucannua* nihil pronunfiarc poTum.

PROVEH IT copiose circa nvosex flu mine GUAMHUU vuigoappdlaroj idtft, album flumen du&os,ad urbemValentiani in Hirpanijf, ubicam intrioAprihs Horentcm &: feniinc pr^; gruntem obfervabam, nulquam alibi mini confpc<lam.

ii poTr6,quodquietam(p:A<T</pwcoj;nomin3nt, femeninvinoporom.vipcrarum.ccccrarumqucferpentium moriibusmedcurjtcfteDiofconde :&cum melle, vino, myrrlia.d: pipere Ifclnadicidatut.

Quoniam
quodlibet

PRVNELLA ET BVC VIA.

CAP. XXVII.

D Ij. i M v s in Patmonicarum & Aufriacarum ftirpium Obfervationibus,cadcm Pro-ncllxt&Bugulargcncraapudcasgenres inveniri ,quarahs Provincijs c^tBianii (ant nonnullatamcnctiamiitica(ci,qu*abalijsmi]mco]b]crvatafleapnnlecbjm,deqijibuspculiarcecaputinftitucraraus. Ctimaudem incademnunctiamiim le(irentia,Llluo ipfomeapurhiLrcptercvoluimus.

Prunella
in vulg

H M5F. T aucemi!la'umplancjrumPrior, caulem qiadrangulum mollirer liirfuturHignicidaam:foltaQfinguli\$genicaliibiia,exadverfofita*(>onihilviHoia,viiIgaiisPni*ncU*fo!iisfenDeBe(pon3eotia,gnftnaaiatkanic: capitulain fummiscaulilHiscraffiora quim in vulgan: flores illitiS fionbus forma quidem fimiles.frd longi nmjores.ntc ingrati odoris,ven[re(quodpifloronobrcrvavii)laxiore,galcaquc(.in!r3riusp]crnmqucpcrpu-rafccnce,tadKUnnvenianturalKiuandodila]lorcs,& quali cxnlbidi^nierdumctiamiu¹-cincrcicoloris:lt-mtnainilngults vafculis, utplurimumquarerna: radicciiiiujjram.niit^{1,5} crafTiureults&candicanubusrlbnsprxditam,jiovivquepiopsgiiiiibusfcic.annii iingulu

£cncr.cm.

Eam primiiiruin Vacua &c Auftrii,dcindcctiam mulcis aJijirrovincijijiafcntcm

cntcm in-
vciicctw

Natalis

Prunella 1.

PruneJta II.



Bugulacarncoflorc.



MI



veniebam edioribus & ramineis locis, minus mactuberem & luxurjatcm, quaniqua: in Aiillnacrcicit. Floret Iumo, litlso, & Augfro, (emeu Iulio & Aucfto maturum est.

ALTERI dodrantalessuuihter & quaitrnn-
gult fujiccauliculi Villisobliti. ramofi, cfin-
gulls uodisbnta cūtrariolc mpertnt Cflc flū
profrentesfolia. nonurv Dlgarisfiibronindn,
fed longa, & in aliquot profurtihu laciniadi-
vi(a, puftu, quwtlniodum in vulgan., u!(Ir-
gentt: floresfuajmocavlc funimifqueramis
fpicaturinvulgarjtafcotefaqubsqi-
dera forma non differunr, fed color fubinde
variannana vcl niveusefl, vcl ciueraccus, vcl
carnci colon s, vdpurpurcus, qt! aljcolorcct; a
Mompellianoagro, poll monaftenum Egrc-
montnuncupatoiD. adlihule Qiargincm Sc-
ptentnoni optiftii olimcolligerc mtinuii:
feme alteti prlimilemclix fibrofa cft, ex qua
prndcuntes fiagalii winis novz virga:, fibras
plerumque agre (blent.

Gaudet & hcc herbolis & Tframmcis locis,
liett & alijsqiiiifluminibus nonjiimiqL tam
inutidancur. iiterfaxainvenctm. Florec ma-
turiusupcnorc, ncrripc Mxio, tancitiiერიანი
Iunio.

TERTIA, nondiffert ab caquam vuljro imtr
BuguUtn & Conblidam tnedunn vocir, vcl
forma, vcl viticulis furami td lure repctibns
qua^ocnuncfiorccatruicoioterdi^
reo, atqueaiotnninoiuvcomvenicut: ilhs
nmea

tamen b^ec pauld tenrior est. flor' lque habetat ijs quos enumeravi, colore diversos, sunt enim in hac rubridituu, fivccarni.

Florcnrem cum a Jis congenenih primu obfervabam anno M.D. ixx vt J. non prooil Zolonoock, in acchvi nemorosi eu jufam collm: deinde verum tubfequente anno, ad monafterium Maurpaclicpraco quodam aliquotc jus plantascrubam : conffpicb. im denL qucanno M.D. xti. incxculro Jiorro Phtlippi Stcphani Sprengpn Palaiinalis Pliam copsci ctiam Maioriorcntctu, qui mihi referebanllam frequentem nafci circa Hcidelbergam, utidettanfulfleccquam in fug hortoakbac.

CETERVM qux Bellis media a Matc[i]olo, major autem a Lobdio nuncupatur in Obfervarionibos, & avulgocx Confolida: minons gencribus cenfcetur, ff'quentiffima citta Alpini pratis, unde illam feptus in hortum tranftulimus, cum Viennæ agerem.

PARIETARIA SILVESTRIS quormidatn.

CAP* XXVIII.

CV». hanc nonnuiii Parittariam filveftrem 2pptllcm, caufam H0twHeo, cum ncuq: ad ite Sncqucad macris ffwniopotius locacultafugiat & iilvcftribof gaudcat, Quiatamcn aliquam affiniratcm cum proximdcfcritishabcre videtur jproximum ill* locum dare vifum est, & jtlam in tres pecics diitingucre.

Pariccaria illvcftrisi,

Fariecaria filvefUL.



Parietaria silvestris. Anon.

QvADRAWGVLo Priorafluigitcaulpcdali jnodofb vilfi < quibu (aamhirto, m quo alternaim ad nodos binafempet ex advetionafcumur lonpa folia, fcamdem pedicolum lata» & fenfim inmucronem definentia. aliquancolom fillofa: fummuscaulis & tamidcftnunt
lmm L. . t. ni. m ^ r t f l i i t i l / 11 H e T I O T i H I / * ± ID i r t r i T T k 4 r l n f J j . - M] % m 1 i M I H i f l a n M i M . M . I I I . . . H I I l * r i t (*
gine pubefcentium, coloris purpurei, nunc dilutionis, modo clarioris elegantiffimi: & violacer inter que bini femper inter fe oppofiti flores nafcuntur: angiores, concavi, aliquantulum hiantes, fupiore labro nonnihil reflexo, & villofo, inferiore latiusculo, & deorfum propendente, coloris initio lutei, deinde omnino aurei: omnes tamen, licet alternis contrario fitu nafcuntur, antrorium expofecti & fpeclantes, quod pictor no oblectavit radix candidans est, quam fubfequens hiems corrumpit.

Parietaria silvestris. Anon.

ALTERA caulem etiam habet pedalem, raro ampliozem, quadrangulum, nonnihil interdum purpurafcentem, ftatim a radice in ramos divifam, qui alternatim, aequali femper, attamen contrario, fitu nafcuntur: fub fitu expanduntur folia oblonga prioribus fete fimilia, virentia, ingrats & aliquantulum acris faporis: flores in fummis ramis inter pennata & angufta



Verbena vulgaris.



angufi3fblianafcuntur,ut in priore, minores,
iucei colons, qui rarnē in marcefcntibus ex-
albefeir, *i, lu* maucntclutco: radix cuin iu-
penore conuenit.

Crefcunc in (epibus *ic* filvarum margmi-
bus, umbrorisqticlocis Vngaria:, Auftrix. Mo-
ravian, Bohemia): atquetiam GLRmanix.

Ao has referenda cflc videtur, quā in omni-
buifere Provincijs inter fe grates natcttur Ere-
nim fupcrionibus quodam modo fnniliitft, li-
cet anguftior habeat folia, & quæ comatn
efficiunt, renuiusctiam heniata, tof aqii cru-
braaoc carnei colons: Hores item prioribus
forma (inile Sj Coloriscsmt van): nani labrum
infcifusnmgalcoia & cxtn.-macauda, put-
purafcunt, media pan, quar circa ri&tmi tur-
get, lutea eft: iucedunt in caliculis v.iicula
fufcum lcxrcn connenna.

Suncomnesannux & rmarurofcmint) peri-
refiikni-florentaut-m Mai<i& Junio.

Qyo nomine lurdonari dL-bean. mctgno*
larcfaccani Lii Hraincnqiiipnorem lilycthem
Parietariani appellavcnrjidcio iuratione
dufti. Alteram Cratogeomum Tctiam
cum vacCnum, & Mclampyrum *Si^iXt^Snt*
Tlicr.ph.lib.dcPlantisvii.cap.x.quem Sc Ic-
q p P m. l xx. l a . b . i . i . i . r . p . carat re
«enrt:ocdcfuntqai A Iopecurani Pliny c i Te
patent. P i i i i a i e n . A . l . i . ^ q d . l .
eenterperpendat, à Theophrasti Alopeccuro,
J i a L d ^ u f a q p r u r : Atrbates
met a comxculurc *reugtHrbf*, ideft, ru-
•bram herbam co^nominiine.

Nullinn, quixi fciam, tn medkiru uTutn ob-
tiniiciunc: led plcruniquencgligi (oleiu. Po-
lilerions aurem (etnen, in Occidental] Flan-
dnar parte, ubt copioddlme jgceifcgt-ccs (ru-
flicorum pleruquencgljgcmia, qtiicam tempe
(livcnoiicv«llunthi.i(cuur, pancm vinarc
iolct, & magis attumreddere: qurnimoijsqui
CO vefcucur, capuc graved tno plerumque ten-
tari foler, noii (ccusacque fi d h v i d i f f e n t.

VERIENA. CAP. XXIX.

COMMUNEM Verbenam in omnibus,
quasperlufravi, regionibus nafcencem
roDfpxit tedaliudelegans gcnunn mcopt
Hifpaniasitinerē obfervabam, cujus hii-
loriam hie damus.

QVATERNI autquinifLintiilicauliculi,nn-
f ulofi fivequadranguli, quales **vulgarijVer-**
h b f & i m n c r
enahabettKnuiorecianuntfupj
ram procumbenrcSfDodofi (cu gcmculati: ad
fingulcu nodos nafcuntur fub ramulis folia,
eolorc qoidema vulgaris folijs non diirerrn-
tu.redmulromagisincifaj&mLilcifida; flores
in (urnmis ratnuns fpicx in modum congefli
n.ifcuntur,utinulgari,e(iamexccrulcopur.
pura(cenrcs,minores camenifcmcn illi xqoa*
]cilt,riec radix difpar.

Salmantienfiagro frequens.& quibufdam
alijs Caftell* loci, juxta lctnias, ubi minor,
extucca to. iccorrida, turn ctiam dediyibu^
fiumiaum-

Verbena fupina.



Verbena fupina
M. J. B. 1685

Heliotropium
majus

Uthelufium

Heliotropium maju*



Saraleis

Heliotropium

Heliotropium

Heliotropium

Identftn.

fl'riinumq;ripis, prarfertim vcoadfluuiuffi Thormim,qui Satmanucam & Albam urbs alluic,ubi major & C vegccior,

Florebatiftic Idio&: Auguftoj&fimulfemcii fcrebat,quoin Belgicam dcUto.&T terra commiffij, mtz (iintnobis aliquot plantx, qux cu«iferiusfiores dedillciu, illarum icmnon potuit... nobis peris illudgenus... acnimefrpUn- ta,que femine productio petire [olcuiaialibus etiam locis.

G. A. C. 1685. «ft» Sacra herba, &... lupi- nadigitur, pnlercim... ieaus: nul- lum vutgare illius noAicn...

Fjufdem cum vulgari cit... peraBierti, proindeadeadem ulef... M... Si aliquamo force cificicior.

HELIOTROHVM MAIVJ.

CAP. XXX.

HELIOTROV 11 majorisInfloria,abornni* bus,qui de re Herbaria fcnpcruMt,c ft era* d... Inca d... b... i... no... b... so... f... v... t... h... o... c... e... d... e... f... e... r... e... c... i... p... m... u... s... t... t... u... i... v... l... g... a... r... i... s... i... c... o... n... c... i... u... i... p... r... o... n... e... r... e... v... o... l... u... i... m... u... s... .

Es i vci6 genus illud quod oblrvabaiu* M.ijort perquam (imilc, minus tamen: graft, liorcsenim fett ramulos,in miiltasaU'; divi' Cot, nliquantulum lanugmos, humi (vnios) fniiamajoi. fapore. ttlnrc, forma familia, ^!- noratanicn.&Ocyimi fDli; ^proxima:extt; rii ratnuli (corpionis cauda; mftar cciam incur- vantur. cifqucordincinridcnc/ucinmajore) candidiftofculi, cjuibLisfuct-ditftmen, noO quadrifauam, utini!!ojdivifum, autquarcina fimuljunfla, feduntcum krefemper, inter* dumgeminum, t]lomajns&:oblongitif, fa* fcum, quodamcomcc fivcmembranaum* quari) pencarpioinclul'uni: {ulitbliſaliquan- doctiam latentpedicelli, terna autquaicni* dumraxatfnciina (ufhrtentcsradixpaiva,fa- ns ntrigicans, liictncperirj &dcciduoferjain* fingulis annis novy planra: renafcUDtur.

Adquorundam agrorum margines.pnftf* tim ubi Mclopeponesieri Co lent, Sal marine* rpericbamr Fiorbacfub floem lulij&_ Au* gufto,quo mcncf,& interdum Sepccmbn, re* menciusadmaruritatem perduci folet.

PROCVLCVBIO Helicropij majons genu* eft, licet nonnullicerebrofiusafleierc malinj Heliotroptum minus eft: minus quidem eft altero, (cdaliud minus proximo capitedabi- mus.Grzi5*(;fT>0t/!Df&]u6dram u l'cumo * ribus fcorpionum cauda: modo infleltantu* & fatvf&jrtot, cjtKidejus folia cum i'cle cu* cumagantur,appel]ant. Pliniutctiatn Hcho- ftop & Vtenciam vocat: milii Helio- troptum fupinum enr.

CETERVM, U[cjuſdem cum m... temperamenti, ijfdemetiam viribus... ^ crifiltl Diofcorid«pon6 fcrib... jore est pollera... it deco- tum licet.

Hdiotropium fnpinum.



Heliotropium minus Tricoc^{om}.



f^{ff} & L^L potu
££[£] *?%£•
frumhcrb2² exaqua, farcic' u! omanusplene,
, pituitam, bilt/mqucperalvinii oxe r a.

here: contra fcorpjonum iclus ex vino po-
tum[^] illicum prodL- iTciadalligariad tonce-
prusarcendos: toliainfantium dfftilaciont-
bus, qLias (ynafeis vocant, podagris, luxa^f if-
quc. utiliffime^l ilhni: menfes tiers: partos, irH
cam & impofitamjpellere: illicum femenfor-
micantej verrucas pcnfile^l ique & thy mos, Sc
cpiny & idascxliccat: pra! terea, aiunt, inquiry
per honm unani ante accelfiones, (emins
gram cjuatuor cum vinOj quartanas: triave-
i6, rertianastimrc. Pliniusaucemaddic Magi
Hdiotropium quarcanis quatet, in tcnianis
teralligari jubenr, abipfoafgro: inplerifque
alijsr aculta Eibus Dioicoriii luffragatof.

HELIOTHOHVM MINVS TRICOCCV?

CAP. XXXI.

MINVS Heliotropiitu unico afTurgit
caokpcdali[^] ramofoiijhusfoliafupe-
riorum tolijsdilTiiiiilja. nonnilil ad Xanihij,
plurimum vroadSolani (bmniferifoliaac-
ceduDt, cnoUia&candicancia: fiospufillos,
raccifratim cogcflusjutcolos, inutUis[^] quip-
pc qut One femine perits vcluti Bos Ricinj, &c
quarundamaliarum (hrpium, qua (ia (emi-
jucflonbusnon producent: ex alarum ta-
incn cavis dependent ex longis peiiolis, Tub
foliji quail occultatx[^] inc riorc *cn&tx* iiliqu[^]
criangula[^] qualesTjclmnaIorum, fed afpe-
riuftular, (cabrsr, nrgncaiites, inquibusfe-
mencincrarei colons, quod dchifcnribus
filijjuiliscxilit j quemadmodumTithyma-
lorilm &: Rtcini femina: *hxc* capita five fili-
qua: palinis alFricat*, Hondo vtridi colore
cosinficiunc, qui temponiDomento in coi-
rulcuii, ciimquelegautcm, niuacur: radix
inunlis, nee vivav. uc qua: (mgulis annis, uti
pnores, pcreat, & nova plantar, femine deei-
duorenafcantur.

Salmanticensi agro frCquemiffima eR lie;c S*t*Ut.
plan ta, nja!ri { que alijarefiqnzHifpaniarlo-
cis; nafciciiretiam copiose in Gallia Naibo-
•ofi. Iulio& Augulto floret, &c (ubinde fe-
nienetiammatiifeeit. KobisinBelgio, ac-
que Vienna? Auftrix fa:pius (ara, & aliquo-
tiesnata, adfrugem numqoam pctvetur.


HAiOTp9Tiw/UMip>Gr.rciS, HcliOtrOpiuOl iJuwjii
minusLattis dicitur: PlinioeoamTricoc-
cum, q<ieiushiftoriam cuScorpioidc Dio-
fcondiscot' undit: Callcllanis *Terxaf, l, Nz.*
bonenfibus *TerntM. qnxvoccsaGTxco* no- Totelo
nitiicdcduilx videntur.

DIOSCOMDES ait. IKTbamcum fuolcmh. v*t*U*
nepotam .adjc[^] ionKroJiyfropo[^] aRurtio
& aqua, latas tcrete^f quc tineas excuierc.
pcniiles verrucas, achrocordones vocataj
cum laic illium, tollere.

PHYLLVM duplex est Vercribas, quitameninejus descriptione: diffTentircvidnrur.
 Nam quod Theopluafus marificum facie, id Diotcoridisfcmmificui
 terca TlicophraftusPhyllo Ocymifolia Eributt,DiorcoridesOlca?. Nost-x ipfls veris&Ic*
 gitimisplancisquas trequciiter vidimus &: collegtmus₃ ucriufque generis defcnptioncfl
 conctouabimus.

Phyllum marificum.

Phyllum feminificum.



Phyllum marificum

MARIFICVM (Theophrasti enim fenrentiani potius fcquemur) pedal i, i^{te} plurimum, cu birali inrcrdum eftcaule, qu ad rangii'lo, firmo, ramoib: folia ilh Oltx, leu vcrius Zia^{ph} Cappai oaje. incanajanuginofa. mollia, bina lempercertooreiinc& perintervalla fuiif omnibuspjencquadranguUrcmcaulem habentibusplantisanimadvertere licet] dilpoli- u. acidi Sc (alii guflus; interquai, iuxia ranmloi, nafcunur bini globuli, uni & cidem pc[^] culoinlixrcntc5, ut in Mercuriaimarc, vcl (utTheopiiraltusait) fructusucutoliva. curft primum ex mafco, five flore, emergit, geminus, telficuli hominis inftar, quo continetur (e- men Titliymail fl- mini non dillimile, rotundum, cinerci imtiocoloris, qui tandem ad Cf[«] neumvergic: radix minimi digiti craffitudinem & C longitudmcm nonnumquam x<v^u^{il}> durique el[^] lignofajcandida, in multos ramos tifTa

Phyllum feminificum

FEMINIFICVM, quod Diofcondis ell Manficum, fiiprioriprorfufcft Cmilc: altiusta- menplerumquca(rurgit(licctinfirmitoiibuscaulibus:&numL-rtjjiarahabc:folia: pr-i[^] ca. fibsolcxmodomu(cofns&exherbaccopallescens coloris, longistenLibutqucinter folia petiolis inGdet (quem in Marificovixobfervare licet, fruduft'acini ex alarumcavi* enafcente) femencque raro admodum perficit, quod p'lobulis etiam, nunc bimis, modo plu- nbuscidentepiiculinhatrentibus continetur. Puio camen ex prioris ft; mincutrunc]''[«] planci genus naki, qucmadmoduin in Mtrcuriali, Spinacijs. Cannabi, alij[^]uc nonnullis l'ljntisaccidit.

Notandum

VtraquecaliJionbusregionibus. inqntiufponte provciiit. totflincanaefrA'q^{0^} modotomentitij, loigcque[^]inoiibusfoijs, qu; iniiirtij. vdionbLis, i» birar6 vivaxcft. i' ludcnamucriquc communcum Mercunali, Cynocranibc, & HcliocropiominoiCi^u crut. triiiecs, icmporislucc(luca: mkumcoloremcontrali. i]r. • j
 NalciurutraquemutisHifpanix. & GaHirNarbKincnfislocis. fecundiimvni: «ⁱ Aprii, mterdum ctar[«] matunu<; floret- in Belgicivcro, non nliacftatenobisfloresdJP. It
 & lingulisannis, ex(craincedciduo novas plaptas prod uc«bat.

Gal. v.

CANTABRICA quotundam.



GRÆCVM nomen huic plamarctipi/AAor &£\
iλαρφυλλον Latini i) Phyllum: &pr: mūqi
dcmgenusBpfitro)6for,altcru&i-A(^Ofv Thco-
phrauo:cocravcro Diofcondi.utdiximus. Hi-
parriagro Salmanticnfi utramquevocabant
Ytr*A acSitnttt C7*>fM,(jranatcfes vcr6,C**/r*,
Arrlieno"oni potumafculi fexui fieri par-
tu"', ucTliciygoni fcminci, Tlicophraftus &:
Diofcoricicfcriptuin reliquerc. Saimanricen-
fesurriutque dcco&um, quibulcumque ani^
malibusacancrabidodcmordij propinabanr,
magno, ut inquiebāt, fuccellu Granatentibus,
> M.iuricjnif pr;r(crtim, ad mulicbres morbos,
frequent tin uflicrac.

CANTABRICA quotundatn-
CAP. xxxHI.

MVLT is renuibuj, adcoque juncu% ex Cmuhin
cadem radice producbibusatiulis, p * - i'^i'''
dicact hare plaruajiumi procumbenuibus,pc-
d.ilis, interiiumcubiralisloiiigitudiiiiis, duns,
flexibil)bustamen,larniginofis, quiinfummo
aliquoi flores profcrtur purpurafecntes, inodo-
ros.convolvoijemulos, mmores.unico folio
conflaccs/cd itaimplicato^cquinquevidcan-
tur, Horuniorisincoridem angulosdcfinenci-
bus,&dUBi clauduntur.complicatis: folia pet
ramuios nullo ordine funt fparfa, longa, angu-
fta,cenu!lanuginocobdufla, falicifolijschaud
abfamilia, gumofa fi quis tnordcat, &: aliquan-
tulum ainara:radixcandicans, fingularis, infi-
n)apar(cramo(acft,&: vivax.

Convolvulus Altheat folio,



Frequenscft mulcis Hifpanx &L<fitani:e
Iocis, mtliiance inGalhaNarboncnfi obfer-
vata. Pollca illam etiam in venicbam in colic
Thcrniaruni urbi, vulgo Baden, immincmi,
quartodburbc Vienna Aurriacamilian. Flo-
rec Maio 6c lunio, nonnumquam &: Aucum-
no. Apttd Belgas, (emincex Hifpanijsaccepto
naca.non nifi lulio &: Augufto,'ubi tmlum fe-
mca pcrficerc obfervabamus, tamcrfi magna
dihgcntiateftaceisconfervatam : calidionbus
aucct] Iocis, in quibuspontenaicitur, femer
fert in v.ifculisconvolvolongab(imibi!s,mi-
noribus tamen/ufcum^ngulofum, inxquale.
SVKT qui hanc Canrabricam Plinio lib.xxv.
cap.vui.appelhtani pucnt.Incadem,inquit,
HifpaniajinventactCanrabrica.petDivi Au-
gufii tempora aCantabris reperca. Nafcuuc
ubiquCjCauIejunceo^cdali^nquoflofcuIio-
longi, velutcalathi: in his femer perquam mi-
nucum.Eteodem capitc.cjus, cum pi<3amno
&: radice Ariftolochia:, drachmam in vmi he-
minafipms bibendam jubct, contraftren-
num morfus.

CONVOLVVLVS Alchezfolio.
CAP. xxx MI I.

FLo& is cum Conuolvulo fimilitudofa-
jir,uthancplanca, alioquinonc6gencrcm
(ii pcrion, nec forma illirefpondentcjubnedta.

Vt PKiBva atquefiuticibt! sadnafetturhxpl.inra, illiiqueconvolvj[ur, ilioquiliadmi- Cmmdm
niculis caret humi jacet, nec fele attollit: nam infirmioribus est cauliculis feu viticulis gra-
cilibus,

cilibus p[^]alibusauccubitalibuSjVillisquibuJam obfiti;-folia hahctinordinara-Hftlcnr
 auc Altheastolijis *er& refpondcnMa.minonijintana[^]nao; bitu cl
 ta, & a aqua p[^]culuog]Anldiorgifigimdbfigulbunibacni bamara:llorescxⁿI. 1nm
 untiproi-nirlonj;ispfdn,ii!sn)liarenrcs,convo!vulifpr:[M]-, fjmilcs, linico folio infer ca-
 kih4UEcampanuJapconfanKs{rcdjtaioplicato,ut<cpIuribus folijs confarc vidcatur)
 ex purpureo candjantes.interdnmomiimopurf urafccutes: radix Ecms.cxiliSjfuka, pel
 fumniosccfpircsrpfit.&fubiniicaliaspkmasproducir.

Convolvulus minor.



In cullibus juxta Taj;um flymen Lyto fl^o, in
 BxticS, phntnjfijucaiijsHifpanieliocisnalci-
 tur. FloTet Manio & Aprili. AdTagtun au-
 tem, ctiam Dcccmbriflorcntcm invenicbam.

An i;u.i:nfiirpcm Veteribusdefcriptamtt-
 fern ILTC phnta, cui, a viciculis, vicinis frutici-
 Liusaut herbis fc implicantibus, Convolvuli
 non-enindidi.poiTIt.ienoro: nillqinsforrc.Ia-
 f i p a q P l p i i t x b p i u
 IILC,(Tccxiftimec. Valcnrri couvolvoium fl-
 lio Althaea: Hifpani vulgari nomine *Campant-
 I'*, idert Campunulam, Lullcani rrr[^]iZaap-
 pellabantj&ad vulneracuratidatritiifaciliniatn
 tilFetracbatir.

VOLVB i L?M porro illam minorem ftjuando-
 quircm inConvolvuli menrioncinincidimus)
 quiam Dodonaus Smilacem [xvem minoretn
 rominat, paffim in ctiltis arvis na(cciKem,frug-
 gibufquefcconvolventL'&implicanrcm.non-
 numqu;iiinctMmininentlis,&:ad agrorunuf-
 gines crefccnccm, florcem valde variare agro
 Fr<incofnrrenfioblcr'abam: Nam vclomnino
 nivcuserarjvclalbusqtitdcm/edinquofoceoi-
 dumejuinque ¹coltTphacionumlongitudoem
 iu hmpurafcJs color elticebatjiimbilicoedatn
 albo.aucominoptirpurco: vclprorluspurpi¹*
 rcus.radijs fecundii m complicanones abis: vel
 medio inicruoofquecolore: vd radijsradio-
 nLius,fatmatiuspurpuraicentibus,rcliquapa^r
 teal bis.

LVS iMACIIIA. CAP. XXXV.

P[^]\-[^]TER Lyfimaclias vulgares, quarum
 luciconcs,piupcuiinuis, lufiorijmaateno
 tradimus, quiaabalijs (acts luculttei cilde[^]cri-
 ptarluteatn videlicet,purpuTca,filiquo&s cog-
 n o n n[^]uarunjaliamnaTdunuaxa[^]ah[^]
 vivaccsJoDge iacctjLic ferpente radicc dorwt*
[^]t,&inrtliasquaraC.V.ConradoGcincro
 Chama-ncrionvocata, florenivcointerditrii
 merepcrta, rumquepcTrulcocfrflorc (nun^{*}
 bacotaoesin P.innuni[^]&vicims Auftridataue
 Srriarcgjonibus, vel fecundumrivos, vclm
 monranispratisipontcnafcuiHur)duoa'liagc-
 nra, dum Vienna: A uftriarvivebam. minimi
 aolijdsdefcriptaobferTabain.

CVSITALI plerLtmqucaflurgitPrimumcau-
 l'interdumctiamampliore.firmo.durpjanu-
 gmofo,& villisobfito: hunc ambiuntordtn[^]
 q^d r i e q u a t e r n a l e r n u e j i m u l n o n u m q u . m i c c i a m t e r n a a d v e r f i s ; n e c r (c p e d i c u l i s , f o l i a , m o l J i a , a l i q t i a n t u l u m i n c a n a , v t i w ^ * q u a - l a t e o f l o r e c f t f o l i j s m i n o r a , a c i d i i n i t i o (^ p o r i s , d e i n d e J i l i v a i u c i e n t i s , i n f e r n a p a r r c i i i - g , * p u a t s i t s d i f t r i c n d i a i o i r a c a u k i e * ' ' ' g u l o r u m f o l i o r u m i i n u p r o d e u n t v d r a i n u i ' a l) 4 u o t f i o n b u s . c n u J t i , c u m i l u g u J a i i b u s a l i - q u o t

Lyfinachialutea communis.



Lyfimachia purp. communis, major.

Lyfitnaclia filiquofa, major.



Imacl. filiq. III. Chamænenon Gesn.

^J
(^imL

S&n JrPuf MV*^
ji&ialffi



quoc fforibus, Vcl fingulares dtmtakat flores, pre.ertim ("ummocaulisfastigioJuteijCiimquadam gravitate odoran ,velun qurnis nuicronatis folijsconstante\$, fcd(juitanien infimafcdecohzrent.&timuldeHuunt, cum totidemftamL nibus Havis" radixgeniculata, ex iinguis ut pliumnum geniculis novaspropagmes **prodUCENS**, &fubinde ribrasagens, quibuicclluri firmiter inliarsct.

Creclitin AlpiumAiiiftriacarum^liariimqtic vicinarumrcgionum cijnvallibus, SLpratenfibusloctspluhma, atqucetia in mc^duisquibufdam Illvis.quxad montiumradicesfunt: obfcryabam praccra non procul Vienna plerifque Jocisfccunddmaquas. FloretIunto.

Hv M i n v a est Alterum genus.vulgari RubrafivePurpurca, cubitalem alitudmcm raro fupcrans:caulesillitenciorcs.gracilioreSj quadrangul,cacuminc in plures ramulos. ex adverbintcr l; na(centes,dLvifi: **foliawilgarimino. ia,&** anguftiora.fibi invicem ctiam oppodta, fitiordeaiHur, jenta&quodanimodogummola, dcinde noniuhilacrimonii&amaritudinis excrentia:quxin(Li(iimisraniulisnafi: Ltntiir, confum lubenc orJuiem , neque lenem ulla Servant: interqu.-c caliculi emergunt ranores minores, nequeadcobarbati aurverticilloruni infbraulein ambientesutin Purpureavulpari **Lyfiroachi3** , plcrurnque hexagoni, ex quibus prod it fios lex foliis confans, colore rubro,



J^u)

'S«ot ftaminulis ex umbilico prodeuntibui: radix dura, Itgnofa, non rcpcns ut fuprior!

Lyfimachiacenileoflorfc

Lyfimachialutca n.



Lyfimachiapurp.il.five minor.



Lyfimiubi.t
lutt* M1.
£Att mintr

sed ex
IS a m m
codem corpore rouscaulesfingti
profrens, & fnbnde Jatcnbuife
Propagam.multrqcfibrismiarrrens

i toremt raulris Pannoni* locis, ii, humi-
ntiffime

> ultra Pofijniurn. vul'o Presbajr; At-
dom, stincte Tirnavientij. Florercum vul-
gan lu-
nio&Iulio.

N o N dubiumcft . quin ad **Lyfenachi***
gen.era

adeo Il facie sunt fimiles.

S E D nec a Lyfimachiarum cla/Tc for^an
reijcwnda **clgaos** plantula, cujus **bcctm**
"Tpcm , cum plerLfqe **alijs** Kaufburnoa^
"PCs uto ad me mirtcbacFrancofurcum an-

... vir Rudolphus
Schliekius Doctor Medicus, poftcaquam
Heidelberga, ubi Prefcfbrispulici mu-
re tung ebarur, ad jllam urbem evocatus est,
ut voca fa/a(cTcc, j s > dumvicinos m ontes

(quatum
quiter-
ut ex-
m m g r a c a d & J f f l
uu.ud, g'ratia adit echitmt, plurfrn3>
• - J^uasadmefitdeprcllendi; ill⁵
timilcsqnasinAufnacic&StriacisAlpiN*
opfcryatas.inPannoiucarum ftirpium liifto-
" *Af • P ilu,enic . Scinterreliquasctiam
cujus hiftoriam quarei exaacficripo*
& iconem fidchter expreflam, TM^c
fubjciato.

H A B E T autem illa pedalem caulem, ro-
nuem, ftriatum, cavum, multis nodis feptum,
ab imo

Lyfiouchialuccam. five minor.

LyftmachialuteaaltraLobelij.



irino breuibus binis folijs, vcl potius vaginulis, ad fingulos nodos ex ad verfo mfcntibu*
j-^fturti^tiqcircamsdiumcaulcmnaJcuntur.longLorafantjanggfb.tcnlla.ex vindipal-
cf:t.cncia,tc[iuibusquiburdamvenisoblic]uc lct3a.es quorum ilnii, enafcunturunciales
pcdLcelli^eiueSjfufincritesfloru mufcofbruiYi, fequinq. flavisfoliolisoiirtantium (pro-
^ntibuscxnied[olongiufci])istenuibusftaminuliscuniapit'caurco)vcluti lpica:fadicc
n^titur longa.liac iliac (c fpargente,adcu jusimeniodia frequences tTelcmictnueSj&quail
c*pillares fibrx, quali bus plerzque aquaticx (brpes donatx (unc: adtiatis Cc propagac.

^a(cicurha:c,SchiliLkio rcfrccc,nguislocisad Alptum Kaufburnovinnarum radicefS.
TANDEM L(TC puto,cum ilia, autcrtcillivaldediinlem.quamnofterLob-lms, in Ap-
pendiccadalcem Stirpium luftoria:Teuconicoidiomatecvulgatx,ticd^fcnSit,exhibita
ipfius icone, qufm nosctiam adiecimus, licet radices & infima caulis paiSjnon fatif
tjij cxpreflx mihi vidcantur.

AMrEqLittiquenniujnquit.Alterum hoc genus Lyfimachi^lutoefrcqiiicisinvnicbara
huivientibusfofncscircaGandavuro.eregioncpalanjPncipis/teiiideitKerTncmiun-
*m &: Gaudavinn:anno aotem M u xxci. m.Holiamdiacirca Anite I ad am urn magnaco-
pia inter hamuJincsc quibus xdium prxrexa conficiuntur. Radix fibrola, rubris maculis
Jifecta, hac iliac repitvulgaris Lyfimachia:in(rar,c^ulcmfrcnspcdalem, quem ambiunt
o^na&binafblu,communisLyfimachiacfoli«llgu(lior.i) ex viridipallencia, inter quas
li nafcantur in longacapnulacongefti, rrombus illis (aliciscapitellis luteo flore prx-
ditu non diffimila.

^ALEMCVUTAE LylTmacliisfatiskicuknteraLobeliodclcriptarnonmeminif-
fcm^oifi akcr.i!n lili congenrem vidcre mihi contigiflct, le&am in Itnrc a Docri/limo gib
j^dicoGuhelinode Mcracx Italiarcdeunte,-irinfporculisadfervatam.Lobeltancporr6
iillifloresexfoliorum .contranoficum cauliculis quadrangulisDafcentium , linibus
ProdcunreSjfcemperinanciiorempartemprompendenradeoxqiJalicer.&contigu^ittex
o^dcm fi_mi orn piJcantDfjquodpidor in mucoduntaxacoodo>iiculo obfervavit,
PaOttmdelineando. N-icitureciam illacoposcinVngana, Auftri.^Stiri^Moravia, Bo*
"Cmiaquc.fcundumrivoseraondbusdcfiuencKs, rufticisncgieaa,

A T quam a Mera accipiebara.dodrantahseft alncudinistatimfecundamradicem tjfimt&b
^niuto5inlaccrafi!iiJcm,^raales, viridcsJrcqantibusfoliolis,aii(;uft^i[1^arf_o]_inrull]r,i>P,-
j^m, fcdbreuionbusjobfitos. interquxrttfcMnturifingulares, incerdumgcunualiculi

Valeriana Indies.

lonjiureLili,qualesLTcinLvfini-ichiar<br a
minore j equibuscmrg:c ftofculus quini
foliolis Civilians ex purpura ccru!eis:quibu
dcHueiuibus, fucccdunt capnufa membra
naceacalculisinciufta, cxili fame cr
canrc plena;ra<iix ioiigiutcuu/ulca, ali quot
iibns duu.ua.

VALEJUAKA INDICA. CAP.XXXI/1.

SEM i N F. cx Italia mi(To Valcnanx Indi
ex nomine, naca cil tia:c nova, & paucis
abhincannis Europa: cognitaelcganspl¹¹
ti qux priraam ex ctniencigcosjnon val
dcabiimilis eftilli.qusm Belgarodt-freppci,
id cftjcamptrlhem Ui^ucam.appJlat, Lug
duncniis plantaium hiftoria,Pojyptcmm»
CilTiatii in Geoponicis ctle,affrcrc vtdfr
cur, Lobelms Phu minimi appcUarionc da
navit. Inter media folia caulcm promit pe
dalcu,nonunquam cubitaleu,concaupm,
tenellum,angulofum,nodoium,& ad fingu
los nodos in binabrjchia,ut (/<..u.ii).,—
uifum, adnafccncibusucrimqueexadvcrfo
fingulanbus folrjs, binasunciasplerumque
iougis.unanilaciSjinoIlibus.crallmicuiis.ii
nuolisincerdri.&inlatenbusaliquantum
inciliSjinfiptdt fere guftus: fingulateinde
brachia cxgeniculisprodcutia, inbrcves
alios ramulosdividucuriferenrt's fuminofa
ihgio multos nic.ipiitcongctos flotculos,
Jongiti/i-tilos,extrem.i parte apertos,&^{fl}
quinqJaciniastiuifbs.qiari'iduxfupcrio
res, brevioresKJatiores, infetiotcsaurem
ramtjuam iabry penJuhe, & media rliqu>s
Idgior, colons omnes vcl r.unci, vcl profus
n i vet,odorisexpncf!fingutadeinde capita
femenq; ostendat crassifculum,lingofum,
nigra:radix parva est, cadida, quam fubfe
quente hiome perirc,ipfa expentia docuic.

Florccincerdum MJIO & tunie macun
(ara.fubindtt tamen m liiemem ufq; floies
& (crncnproferentem vidimus.

VALERIANA ANVA, fc\cMHiv3.
v CAP. XXXVII.

HAEC ftacim i radice multa foliapromic
humiiiiifRifa, virulia, infar tojorum
C i l p f g a p p e i l a c f f i C ardui mu
ricacocapice, Eacimata, inter quxpredeu"*
aliquotcaules rotundi,cavi,iamoG,biti0S
cubicos fere aid, virentes,quem sd fingulos
nodos urrinque ex advcr/6 aropleflunfuf
rolia Inferioribusmioora, JaciniaractiaPi
Valeriana: lilvcfijs vutgations foliorum an
n i u l a : f u . i i i s e x n i t i c u c c o u l e i
ienturcmejLMii) unibcHa^cjrunicquinqC
n)lijsconllantium,nondjillnnliimHoribu*
Valeriant- Indie? anteriore enpue dcript*.
colons ruhn dilutions ad carnum tt-iiden
tisanramulosexercfcuncrandro] tUxvctu
ii umbc[li,&: (cmcnftiunt^ualc fxtit Va
ciiaia: rubrx.icdm'n:us:ndixnlba,A: /h*
] gu oft,

Valeriana
Indica.



Valc'ana anuua aJrcra,

Valeriana
Anva.





Valeriana fil. alpina s. latifolia.



Figno, qaamumenfub&qu&hiemsc*-
rumpit. Floret e.face.& fbbindcin Aurum-
 DLjn ult^ue floribus&icroineonultacon-
fpicinir.

N.iraefl Francofurci ad Mernuminex-
 cultwborro Ioannis Myleri Pharmacopsei
 ditigerti'itTimi & rei hccbarixlliidoftffiuut
 Jcniinc illi communicito, quod eBelgica
 accppirram a Iacobo Plateau, anno, ni tai-
 lor, M D xc.

VALERIAWA ALPiMA&rSaxa-
 tilis. CAP. XXXVII t.



NON minu5 vulgaria funt in Auftria,
 Stina, vicimsque Provincijs duo ilia
 V ilcnanc filveftris genera a Ncocericis pro-
 dita, **quitrn m** universiiGermanii, &a!ijj
 pleri ique rc^tonibus.Vcriim duo alia in Sci-
nagis & Aullriacis Alpibus **obfervaflecx***
 ftn10, quxalibi mihiconfpeflanon fuere:
 quibus vulgariu koncsprxfingendascen-
futmns, uc excollaunedLfaimcnfacilius
 agtiofci polTr.

PR. i M v M afTnrgicpalmaricauliculo,
 interdum etiam ped.ili,cerccc,rociindo,viri-
 di.quc m **ambiant** oblonga folia in binas ant
 tenus crenas proiundiores nonumquam <T-
 vil:a: alia veromotoracra dscpradund ad
hiictorafrachelifveformamaccdentia.tni-
 nor.inimen&tcncnora, amaii ^ti(lus:lor-
 r« in (ammo caule quafi **umbellatinjna-**
funttjr,tic in alijs Valerian* <ncribas,p<-
 lu alijs tilvtfnbus Vakrianis fimile:

Valeriana
 filveftris al-
 f*Ai.l*ti-

filii, albi, quibus succre dixerignum semen, forma

rid ice

ValerfenafiUlpina u.faxatilis.

Nardus mont. primim germinans;



radice ser... nodosa albicante, odorata, & cum aliqua adstrictione amariuscule, ex qua ali-

quotcapilUrcsfibri dependent. Cretic in ipfis Auftrii & Stiria Alpibus, locis umbro (is, inter (aynnulquam ramen ube- t' msquain Durren/ tcfn. in quoomncsalptnfp lam^ magLsluxuriarc&adoIc/ccrcvidc ("f- Floret Iunio & Julio, deinde femem paulatim maturelcic.

Valerian, Sl. mifa* u. fi- ve faxati

ALTE RI biiia auttma aradice cunctolia^ ellidismontanxtolioruin BwicoaU* U, cquorum raddiocalis affurgit pedalis, gracilis, rarahabens foliain rrc fcoppoita, aii- gftioia, & minora: fupremus cauhs in ramulos finditur, qui flosculos fuftinent albos, rcli* Quis Valerian* filvellribus limiles, lemen, quod fubfequitur, non ciaru diverlum: ejus ri' Axaliarutn Valcrianarum Alpinarum modoin faxoruin fcrccomniil Tunjferpit, nec mi- nus odorata clt (bpcrior.

Provenit inter (axaadflumen Myrczquod monafterium Neubergalluic. quacxcom O- nafterio iccreft in H' ghenbergenn 8c, Spiral. Invenitur & in altjs locis. fed iftce primium ok- (crvabam. Floret (ub lunij finem. & Julio, interdum maturius, nonnuraqi UDi frrius, pt° ceh & acris narura acque tcnipenc

DE Valcrianis confulenduniccn (co Fabium Coltimnam virum accnimirtidicij.

MONTANA M Nardum in illismontium iugis invenit non contigit, tametit summa diligentiaperqoifimHOI. Vet dm anno MDXCII. ram ad me mitrcb. it Neapolitiodiffiin^{11*} vir Ferdii undus Ianprams monte Virgincoerutam. cxquannum crorasofti' anaclusfi!!¹¹ plantas: quin & (e in edecida oplcrsmi jefclie « ornaccinnjeohorro,

Nardus mi- lora.

TVBEROSA M porr« jhabct caradtccmqua: quotannis adnflitalisvat (ielcproprgatf fnnlti^ uc & qualicapillaribus fibr Binfim 4 parte & faminocapitepr? tliueft, cx quaf tolon- ncs non miurfolij icxarro vircinrbus fupcrne & rplndentibus, nccin ambitu ferratston*¹ nra parte, omittj, deinde alij in lacinijs diflectis, unipone Valerianaz majoris folia, fed mi- nora, quoque ftolones magis adolefcunt, eor magis diflecta veltiant folia, ex adyerfo fem- per fita fumino caulis falgio confertim nalcuntur flores Valerianaz filvellris floribus non dimmiles, odorati, minus camen quim radix, quxiii veltii Valeriai Ktradtcnrontlorc⁰¹ V. lldc xmulatur.

Hijjtis atucm quain propenimus iconem, nrmexaduhii, (cdcxprimiimg crotinatice pUaia, altctopoftquam ilUmactepificinanuo, Francofarticxprimtcurabair.

M IN I ME dubium est . quin haec plantula ad filicem Valerianae . . . ferenda, adeoillasodor, &nonnihiletiamforma, prxfcrimfaxanlemraodddc- Nardusalpina.



^ ^ ^ ^ ^ B t
/**v ^-J^ " ^ ^ S H ^ B ^ L ,
^* *_ a> ^ l " ^ ^ > ; J X I ^ l l t k f
V 2 l f % ! y f s ^ f i m ^ k L
^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r v . ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^

INTEGROS interdum cespites occupat ferpendo, & are fummar. el Jure feie inter mil- (cum dirfandi-do: oblongi procumbentefque humi ramuli, tenucs, plumis veluti foliolis, aut Jiccis /quaniiscircumlcpiMubrnde fulcas 6c nonihil capillatas floras agunt, lummapar- te in unicum,aur bina ternavccxtu berant capi tula, aliquot longis, fecLndum caputanguf- tis, dcindeinlamudincpaulatimlclclaxarr- tibusfolijs, krifquccraffis & fucculeecis pic- na.colorejdumprimumemcrgunt, viridi, ac- indelubAutuniniuium.jiKjT ~ natis florem, flavcfcente, gufluinariu(cn!o: r. alman. r. dodrancalLsj.normnumquam edam major inter jftacniergitcauliculus, (adsfirmos, Qtintui- nucioribus Valerianjsiilvcdribusgenicnlatus, bina ad fingolos nodos inter fe oppoicaha- bens exigua r'oliola.cui.circa funnjum.ex fin- gulisalis cnafcuntur pediceHi, binosautter- nos flofculoscoloris pallidi lufcincres, quibus fucccduntftminajVak'rianxfilvcitri Alpinic, faxatili prxrertim, fee undo loco fiipenon cap- itcdercnpzt,proxima,paul6ramcnminora. Tota plantula aromanca efr,3f radicem Valerianasiilvcftrisodore m asmulatur.

Copiosnafcirur in Iudenberg fummo Sti- riacarum Alpiumjugointerinulcum ,l'axois locis.undeplantascumfuiscdpitibuseiuras, plerafque alias elegantes Hircps reifeibac & ahnoM - " txxvi. C. V.Dodor Ioannes Aic- holtziutMedicusacProfi-'fTorVicnnenfis^e- tereamicitiamihi CONjunflus .quarumnon- ullas fuo horto aliquotannis aluit. Nafcitur &: in Tyrolcnfibz au)uc Saltzburgenfibz "lonnbus, tctc C. V. D. loachimo Camcrario, Inciyta: fteipublica: Nonbcigeniis Archiar.ro. Mcnfe Auguftofloret fubipfisferenivibus: foliadeindcpromitcumilla;diflolvi&d!f- cre incipiunc Legiturautem ab incolisfub Augufti fincmj&Septimbrisinirium.tiim folia flavifcerc incipiunc: turn cnim lummam habet odons gratiam , qua caret dutn folia pnamim promit,&: adtiuc viridis eft. Incol /g @pfi(fappcllant,nomineclaiinavocedcfumpto:Pannoncs,qiibtisfrequens cuvm.wi in capitis lotionibus, Btcbfyfu, hoc eft, Vicnncncm liepbam nonunant, quia "cnnacopiose ad eos transferor.

T R i v M ScA\ genrcum hiftoriam Diofcoridesnobisreliquit, mtjoris, minoris, & ter- tij.cujisfacuUatcsarcliquisgcnenbusfiIntdiveriac.Mjjonsdefcriptionemhoccapi- dabmius, minorisproximcfqucncr. M A i v s, ftritexflpocius,quam herba,duorumciibitoritm nonnumquam altitudine, chialitudinimultofchenscrasasp. HpbiseraflididiSajumajores. DulcasaladividuntirdigitaliseraTicudinis, fummoftigiovluci morbcmdefinres, P^Itisfolijsconferriini&trnbricarim iibi mutioincumbntibusconlbntem , perindeac "lScdom3jorc viilgan, iiveCotyledonealereraDiofc.Carnola funtautemca folia, fucci pfena,&:mgux j,nllat,erfo^mata.hoc eft, ab infima ferdcpaulatim inlatuin lefdilauntia bitUjcrebns& minutis velutideticulu adcolcviter fe^rau [it vixappareargulbj pau- lulum adstringente:cortice denfo,carnofa,fucculentototus frotex cinclius eft,cujus mem- brana exterior fubfufa, maculifque , feu potius fedis foliotum veltigijs refperfa, ut in Ty- thymalo chatacia. Interdum fummis majoribus ramis emergit crallus & veluti foliofus quidam

Sedum majus legitimum.



tmmin.

quidam pediculusj ranquam tlyrfuni pereni mulurum gemmarum, quxfucce{Tu tempo* risinflores lefeexplicant ex flavo palklccntes, (leUarumiiifhr in aliquor folia divifos, cumfuisftamintlis.. lam maturefcerc incipientibusfloribusj &adfcmlnLseftbriat: onempioperantibus, gracikleic hie pediculus: fcmenexilceft&nigrum. Semperviretlvrc plama: namanrequam verera roliaabijciatji nova /ernper product: : 82 facile lamu" pangitur.

Conipedlus mihieftprimiim hie fruxci; RoyiiclosLuiiranicoppidulo. dum Madrino Vlyflipponem proriectrer, dtinde Vlyflipponc& vicuislocisfrequieiuflimu inxaW⁰ te&is & muris invenicbam, fponre ctiam 0*ⁿ Jcentem prxrupto & Icopulofb colic, non procul a Scyntri arce regu. quin toab Vlyflipponemilliari. Denique Hifpali in fiJtifibu^ NaCctur & in Italia; nabco enim fcfqmcut>iralem fiuticcm ex ramulododrantaliad me milTbnarum. ismiln nondum Horucratduni hacc (enberem : cadecau(a nihil de ejus floro proiunciare poflum , firne candid us . utqoidamfcripsLTCjanejus, qui inLu(itaniaf^{te} fciCjColorcm rfer.it. ApudBellas, Luiitaⁿ3 u#)ueatDemiflbn . ilucrunc aliquor an msⁿ1 fetilibus,rci hcrbausc lludioii: fed randem p^D* nj(TeexiftiiDo, vclneQligentia (namnon volgaricuraindiger; velhicmisinclementia, Inemis enim mjuriamferrenequitfrigidioribus

regioibus... IUS iltm: propterea in vaporano cofervare fblebam cum Opuntia vulgo crpdita, qix a <t>ⁿ nuH'sFicus Indiacognomtnarur Hilpanisver6 7... & C i d i ca. Flrba >j... Decmbn& Ianuario: apudBelgasnumquam florere voluit.

LEGITIMVM idest Sedum aut Sempervivum majus. Uioforidi duTuor TO jut>«^{di} um, nemocftquiinficLasircpofTir, Gin Stirpmm cognitione mediocriter verlatu/it-Nam quod haenos pro Semp vivo majne babilium c[1, & adhuc & quibufdam habefi nihilalwJ cft, quam Cotyledon alrcra Diofcwrdis. Sedum autem maius Lufitani E>(*?)* vocnonnihil vcrerem Sediappcllaionem rferenre, H\bxiiYtru* punur* (tominuo¹ tum Cocyledoncalteranominejvocat.

Fniynn

Fxctitatii.

VB TBRBS Senspervivumajomfolijsad en-fiplata. hcrnercs. fclrlilecmonasiinfi¹¹ emmad ambofta&podagtas per level euro ppkni4dUt.s:q>phorJ etiSn folia ifflp<*>: tayeUuccum inanflum podefctradunc, & plera(que alias facultates siribuuii, quas ipu^d iplos Audorts requirereliccc: Liiiiaiiicxnmhercs addrcr^n^nc^^.ii^, jt, 7i-nurean* dos dences ulurpat

SEDVM MINVS.

CAP. XLI.

Sidummi.

MINVS Seduminduogenaadfe^ it Diofcorides. Primum, quod temperamento &taclicat. [buiiina] oricifimile: altemmauodviarM^n-<TM,i.,>TM D*^... varigunt fpecies ab ^U^ab'^^osaliquocincmineprodiu^ntequam mcaiv, ^... c vulgareni. ad^c Qius. iiterpolitistamenqiiarundamiinaginibusqucabaliis/unt defer¹ pta- quia in ijsIVovmcijs. ubtlisnalcuntu^eriamadmodum (untvuleares

St Jimiu. rut.

ILLARVM igitar Prior quarum iconcs (umdcpifla:, quar&trnhis Sedum minus P'f mumfwunimeit. vulgaris illa est mmunscdirifque aridiotibus & rabulofis nalcens. vu' Eovera icu UnscognoiniittU, aiwenbus, brevibulque, vermiculorum modofoli)*. ^ lio tiore.

Stilum minus u.

ALTERA, cujus pene similia sunt folia, sed frequentiora & densius in caule stipata, in montis & maceris etiam nascens, sed proliquis, humi procumbens & fibris subinde se firmans. Sic mihi haec etiam... DODRANTALEM habet Tertium genus Sedi (quod in Pannonicis observatio nibus secundo loco mihi descriptum) cauliculum, subrubrum, succulentum, tenetum: fo- liola

Stilum minus nulli i. Jim

Sedum minus u

Sedum minus u.



Sedum minus u ifivepaluftc.



liola longiufcula, fubhitfua, fucci plena: flo-
 cuJofiuJumniiscauliculis quinis foliolifcoD-
 ftantes^urpuralcentcSjautcameicoloris.cum
aliquot internis&atniriibus . totidem tuccdi'ic
 comicula quot fuerunt in fingulis flofculis fo-
 iioJ.t.initiy viridia, *dcutdc* purpurafcentia, Ce-
 mcn cxilecontinentia: radix exigoact& inu-
 tilis.fctundiimquanipCJJfnfimocau/c, fiitcu-
 lorum propagmts in orbem humtdiffiifirLnit,
 muitisextgnis foliotis Scmpervi minoris fer-
 vid, (quod Oftavum genus cm) fere fimilibus,
 ninonbus tatnen, anguftionbus, &obru(iorc
 mucrone prjedicis, cindi, (iporsi infipidi fli
 aquei.

Tlorens hoc genus obfervabam uliginofis lo-
 cisapudoppidulunnFreyingquaPragaitercft
 Noribergam,fiib finem lunij, ciim anno M. D.
 LXXIX. in Belgicam & Britannia proficfcer.

TijRTiA vcruni Dio/corjdisSedum minus *sri**—*,
 eft.cretibus .craffis, fucco plenis & mucrone
 praditisfolijs, H^visHoribui. Vulgo in *honis*
 ahtur, atq;ieausfolijsfoienrGalhinaccaiijs
 tiuetnadmodtim Porculacx¹ *folijs* utt; fed *fc*
 fpontctiafcirur inHiTpanijs inniunsSiniacc-
 rijs. Ejusvrdduofuncgenera: Vnumcujus
 fummuscaulismramulos divifus Tcfcinfcidit
 intbrfiimmitum Scorpiuri live Heliocropij
 majons, id mihi Q««tum Sedi minoniKnus

ci i t i A j us tamun tumo taligio non
 incuivancnt ,quodmilu Qu antom Sedi mino-
 ris genus cfto.

Sexti

M Sedi njnorisgeft(ij,i« Pxmonkis abfervationib«sprimolocopofirum,affinc

CftjUB

Sedum minus tin.

Sedum minus v.



ScJum minus vi.ilvcalpinunj i.



t iuin

elt jam memoratis: nam fummarellure ^{sep} p^o utilta, numerofis que & fucculcnris ramis p^o ditum cft, quos ambiunt longiu! culi 6 cin U' crona [3 folio Ia, Secundo Dio (condis Sempe^r vivo, quod Gilli *TrKjutmadamt* appellat, ^ illisin ufuc lTe jam dixi acciarijs confident haud mult Limabl Jmilia, minustamen crau> i planter.) & guftu valde exiccante: flores if^d cauliculis palmaribus rmrocol., majulculi> quinq; folijs confantes, cx luteo colorca¹¹ qnantulum pallefc trees: radicem habtt in d^c bros ramos divifam, qui, per :crram fparfi, ^o nucs fibras agunt.

Crcfcit in Sneberg alij fque Sriiacarum & pium jugh, m Tauro monre Carinrba: & I^u denberg: & Montibus Kaufburno vicini** Florec Cub finctn lulij, & Augufto.

I H rupibus vcccribii fque muris nafcitur Sc* ptimttm geniisetim in Hifpania & Luficani¹¹ cum in Gailia Narbonenli prifertim Mot¹¹ plij ubi id obfervabam qti aiido iflic viveba¹¹ in muris fuburbiorum, ad portas urbiiprote O' fis. Non valde ab (imiicc (t Stmpervivot^r Diofcoris: fed foliapau 16 craffiora funt, caiid^l ciiora, tencfior. i, nfC, util! a, fervidiguftus, ^{ic} d¹

vinbus Secundoterpon Jentiaefrigidaiflosircmcjus wrididus, qui in T e r t i o C r¹⁵ luccus ^ cmcnxiguumcit-jfeciibriiifiit. Floret lBtwckincnluJiomanttum. OCTAVVM *gnas, eii Diofcoridis* Terrium, <juo (J) bsjiqmhu jartyr %om > m & r n d <pta> wscariaflic, a Romanis illecebram. Habcc id. crafla & (uccu! enractiam folia, ircqu^{cn} cia. fibi invicccn ferc incumbiua: flores luceos. Vulgaris (ft potiiiz; ram pafim in^{tl} ^! f^o muris K pciris nafcitur. cuam in aggeribojj (akbrofij ic aridis locis quz [enui graminc

Stimmimnt
TIM JVI
Diu/C. II I.

SVium minus viii.caufricu.na. Scduin minus ix five alpinum in.



a: adc63utemviv3X,uttenuiffiraaramtilommfracimentafacilimer9dice(agant. Vim
 ;xLiit«uunum.acrcm.oc:exuiccr4(uem,tclclJio(coridC)5fplacxper;ntia.
 -^"M, quod Tertiuin est in Pannonifi(jbrervationibus,cotT7paflis& libi invicem
 "WidetKibuscftfoliolis, valdcexiguus, craffis, cincrci colons adcxrulcurnquodammodo »*.".
 ^noenris.uttotaplantafqua-acidifaporjsctfjiihilfrrenilimurciisquidatii vidcatur: pe-
 ^Celli c medio fofiorum cxiliunr, duas pxnc uncias**longi**, gracitrs, juncci, in quibus terni
 PierumqmcHercul', **quinquefbliolis**coof**Unres**, candidicolons,cumaliquotintusluteis
 "inulisrciirninfcmnabcuntfloreSjCaulicijialiquantulurnexrelcunc.Miruminino-
 "Jrnpropagimbuserpit&radiccs agit alceriusCotyledonisriru^ntcgrosccfpiccs, cujuf-
 q⁴w **mufci** Hidir, **iuterduin** occupans.
 . **PranrupcisSocalbenjugilocis**, zc**qneimcrOixanzfcitur**, quadefccnfuseftad Monaffe-
 [UmNeuenberg.atquccciaminSncberg.Invenitur&inmonteFradOjteftcGcfhero.lu-
 HO.t. A. **gufu** floree.
 MI fui!apaul6roajorarunr&longiora,craffiufcuIa,inambituvuiUisobfita, giiftu
 atnprinnimacido, deindeamariufculo&excalfacientc: adnatisfepvopagai, atque
 ediofiorumjhirrutumpedicDlumprofertjlongitudinccumprarcddntcparcmjinquo
 "plerumqucvclurinumbelladifpofinfuntcandidiflofculij quinquefoliolisconiUn-
 Cs;
Smblicoluro
 Inventur in Soeborg & v **icinis jugis**. Sub finem Iunij 5i Julio iftic floret,
 NI>ECIMVM longiora **lonnihilhabcifolia** graminismodoangufta,dura,viridia,i?via,
 subacidiinitio faporis d **indeingrati.** unicus ant alter incr folia crumpteauliculuslf vis, •"•*«•
 gracilis,tonceus, triun **i fercunciarum** Irntitudini5,rar6niajor,incjuunicus,in(crdum bi-
 ni funt flofculi, fupenore majores, candidi, medio lutei, quinque toll **lis**, cordis, ucvulgo
 r¹ngia)rjfbmamrefercDnbus,prardiri.
 ... ^{Scr}pic 8; hoc reliquoram inlbr, jfdc'mqiCam Dccimo loeisrefett, acque codem cum
 "otempore floret.
 D>NT etuin Dtoriccimoangufliora folia, rigidiora,aliquantulumhirta, abimafedein **sedum m**
 "cultumfcfccexpandenti.i.Cotyledonisalrcntis.&rciiquorummonranoriimScdimino- **muu**
 Re<crum modo, guftu quidcm **adfringente**, nonniliil tamen amaro: ex **horum** medio
 "lcsexeuntpediculfirtni, nudi,quilunniofaftigioquinqucaucfexflofculoscoloris
 "nc **Seftant**.dcindecraffiufcuIasmucronatafqaefiliquulas,ftmen exile, planum.ru!vc.
 "tel **plantulas adnatas & fimul junctas** producit.

Sedimtnixiusx.alpin.itn.

Scitum minus xn.alpin.vi



Naxalis.

[nfurrtmis Aufnac.-uum&StiriaMnrm Alpiumjii^i; inter fixa proverjit. Memini dLiiiiolimeNarbonciiiiiGalliiperHclve[tosint!ulciHimampatr!.imi<:direm,inA[lobro- gum Alpiuscumalijsplenlqui; vcnuftisftirpibuserucr

Hujusctiam obiter memmit Getncrusin defcnptioneMontisFracti, Hidoriam vco tradumPena&Lobtlius AdvcriatoruDilibro:cum aurem in fupu memoratisAlpiibus frequetccrtiamcollegcrimjhtiiccapitijCiJm reliqm'sSedt minonsgcnenbus (camedt Tor- tenon per omniaejusfaciocrpondcatjinfererelibuir,

Sium mi-
-KIII.

NVMEROSA hubccDecLmumieruiimgonustoliola^cmisprofundisincifurislaciiiiain, uc Ajugscfere folia, nnonrar:imen 6c viriutura., neque ulli lanugine velrua, quorum l'apoz ad modum adftnnijens & cihairui^ uiitcxiks. binstranls gu os, li- ve /cfqunciam longL.(inguli (iu^ularcs fiiftinenrci flo/ctslosex hcrbaceo *pallefcetes*, quon- quefoholis conftaows: radicc icipu multiscxv«uls tibitscapUtaa, & tnuU&s ptopag *mesè* lateribus generate, uc inrc^ioscdpires inrcrdū occupet, *muCt* umq. quendam ennerurur

Crcfcit in fammo Sncberg jugo, inter !axarecenter a nivibushbera. Floret Augusto.

Qvo noajincamoitanis *palloribmB£vcna.toribu\$ omncs ittx pvtmx* in Aufnacarum Alfuuni ju^is na(ccntcs,quas hie ordine dcfcripfi,donac* fint, hafitnus intelhgere nōpo- tur&tuuJfcioanillisullLininomenindidcnnr, folctucnjmcjufiiiodJminutancgligt'rft E^oScdi parvigencnbusatinumcrandascflc cenfeo Si cut auceni mea /cuiemiamimnic plicet,alioq;i]OinincinligiirenultC)pcrne(emperUccbit. Scptimum porfti, Daiccbam- pium / ^ u i s isfuerttqm Generalem iliam PlnntaruniHtlionam Lugduni cxpreflan) icrjit, ^ / ^ « ' g A q C p O gn q n j m n a r a v j s d e s i e r f t d J ! i b S g J i e - rit}usquotum folia funtcratTa & denfa no minus tjiiam, ill ipeculiariter, con venire potcit I dud vcr6 mirum,quo<l Duodccimum genus non inter Scdi genera recce/cat, ramertijur dem temperament'.cflcatrcrarjfedrhyilumArllimogonum DiofroridistfTevclir. *corus* q.p. h l f i f f i D a i s , b i i p S m i o j i i o n f v i e u f u n t , d i f - picendum rrlinquo.

Familia.

CETERVM DiofcondesHqules ftcultafestribuitScmpervivoparvo, qiiibuspolleema' gnum precedencecapitriclnptumrTcrCJiim *antzwgCIUSMUOd* III IjOCCapifcOfiaVUflI cft.illitum cum axungia.ftumasdifcurere ait. Nifiqmsfu ppohtitasefl'c has facultates di- ctu,Sc Dtofcoridis textui infertas.ut non fine judiciocenfet Fab. Columna, qui vulgarem illam Scdi quam *O&ivolo*co repofui fpeciem,tiodtjyaw nominat {fimilescnim funt £»"- nium Sempemvorum Lculracs) *Ccd* facie at'woorcfirre dicir, &: Plmij alterutn »el<tr; tium dactylum,quem poitremo cap.lib.xx:131. Natur.Hiftor.defcribit, esse fufpicatur, cui opinioniacquiesco.

Dactylus pt-
99. 1

COTYLEDON.

CAP. XLII

VMSii-ici VENERIS, fiveCotyJedoni.tiiftoriamalijtradiderQnrrnieiranicD¹? ftiruriefle putavifquandoquidem alrcri cjugenctj peculiare caputdaujiis) hoc capi- tebrevem illiusdctnptioncm retexerc.

Pinklins
1707.

HABET autcmuUafoliaaradiceprodeuntia.fimimarcIlureconferrimflipaM.inace- Mbuliformamcomata^iocefl^orbiculara.&in medio,umbilicijirt^r,de[>rcflit. iuccule** ta,cenra,inteiqi:arexircariiftion valdcfirmus,alK|oorfolijspr:ttiitus, nonorb:cui::iii* irifciosa,(cdlongiu(culisj&:extr(;mapartequa:latij{cii!acf>, craffii^nc icfucci plena i'°

trci

CocylcedorijVmbilicusVencris.



Cotyledon altera i. Sedumvulgare.



tres plerumque cremS divifiv j ex quorum ilnu proccduutintetdum ramulijCju^cum caule.i medio ad Tummum fastigium multis flofculis funt onufti longiufuliscocavis & propndētibus inftar pufillomm tmcinabutorum,co!orisexherbjceocandicaii> tiSsqm firniiterinhircntes,unacum caute ilccantur,&: tandem pereuc:ma:unflorculli occludunt parvas iiliquulas plei.as exili fufco femine,quod fpoiuedeciaens,numerofas circa matrem, Sc in vicinis, liquad fjtnt, valis fiailibos.gneranc plantulas: radix est tuberola, non bulbi modoeffbrmata, fed pocius orchidis plcniot^m radicem referens, modo orbiculaca, interdu tuber;s autAcomnhiberniradici fimilis, utillius inftat confringi, & fragmenus pangipofik.

Sponte veronafeiturnoiimoddiu -riuris vccenbus&parietinis: (edctiam inrc^iSj tmirisfive pariecibus, ex argillaformace>., faxisa: rupibus, liumi inEcrdum Colo fertili,ad Olcarum, CbamoEriplKs, & Cocrudx radices, atque etiam in annois Subenzar bonbus sponte crefcētem obfervabam ple rifijucHiipania: & Portugalhe locis.

G R. itcis hie planca xom^n <£&t dicitur, ab aliquibusM&Ta^Ao^abalijsxti^Ga^A/c!" I)IQ* fcondc referctitCjLatinii Vmbihcus Vcncns, GaliLarinos/cquuri *Nembris de Pannu* appctlant;Salnianrii;tnfium *vulgus^ afflor,* id est acetabula aut vaicua nuncupabant a cavafolij capacitateacuiabulu rcterentc.

Sacrisigmbus, ftrumis, inflammationibus, perniombus,illitu auxiliari.IVumactii ardo> rem refngerare, folia cum radicc coman ducata,calculos frangere ,6i urinam cicre, atque hydropicis ex melle dari, auclor tft Diofcondes.

COTYLEDON ALTERA. CAP. XX.HL¹

ALTERIVS Cotyledonisnomine mtcl- ligoSedummajus vulgare,cxDiolco- ridis mente, cujos in Auftra: montanisaha inveniebagenemiliex Neotricis Scriptonbus, quod iciaian^obfcrvara, quslxic ordincdcribcmus.

Primus folia, circa radicem denu, Accra- boloalictijfive Sempervi\u vulijavi majon (cujusiconem prtnximus, ut differentia confpici poifit) (imiliajtninora ramen,& in ambitu leviter dentata, fucculenta, &: guflu acido:interqu:c mulia in aoibirn capita cfunilibus fed tnonbusfblijscfigftacxonunrLir, Jongispctficulis inliiTfiina, q^x tandem auCh in novas piantas cftbrmatur: Ct ipfius mairis umbilico emergit caulis dodrartalis, foliofas, tc&us, feres in raniu- lisflprem alrcrhii Cotyledonisinfatalbi- canretn,magnum, fexfolijsc6flartccm,cui fuccedunt oliquac, 'cu t afcula totidem an- guhdtfcrcia.feminecxili plena; radix

Sempervivo vulgan majori ltoiilis, minus tamca

Natalis.

Nontrilde

Vulgo.

Familia.

O'A

tamen crassa, candidans, subinde nova s plan ns prater Jam dictis e lateribus fundens.
Frequens est in omnibus jugis urbi V icinna:vianis,atq ue in Auilriacis Stitiacisque Al-

Rarior

Alma Jp
viii.

2. ILLEIS ipis locis invenitur aliud genus huic valde simile, per omnia ramenminus,SC
cujus etiam folia magis sunt dentata.

Cotyledon altera n u

Cotyledon alcrauii.five Marcii.



Cotyledon
altera 111.

CONFERTA, frequentibus, pinguisque sive crassis, ue in orbem distensis est etiam
Tertium genus folijs, Superioro tamen minoribus, nec dentatis in ambitu, metis aliquan-
tuloni luspida appareant, sub quibus, e radicis capite, tunc in ambitu, gnetis aliquan-
tate, in orbem sese propagant, & radices agunt: e matris umbilico, palmatis, nonnumquam
etiam dodrantalis, exilit caulis, succulentus, rubescens, multis crassis succiq. plenis & mu-
cronatis folijs cinctus, angustioribus quam superiora, & mucrone purpureo, qui supre-
ma parte in ramulos dividitur, multis floribus superioris Cotyledonis alterius floribus for-
malimilibus onustus, minoribus tamen, duodenisque, ut plurimum, angustis, mucronatis,
stelleque instar decussatis folijs constantibus, coloris ex rubro purpureo, tondem sili-
quulis in caput aut veluti cotonam compactis, floris umbilicuni occupantibus, & vicinis
quaternis staminibus eam ambientibus: semen illis siliquulis sive loculis adeo exile, ut octu-
lorum aciem propemodum effingat: radix mediocriter crassa & fibrosa est, alterius Coty-
ledonis modo. Plantae quae florem tulerunt, cum in hac tum in superiore intereunt, perin-
de atque in Cotyledone altera, sive Semper vivo majore vulgari, succedentibus matris reli-
quijs, norbcmprolibus.

Rarior

Cotyledon
altera 111.

Crc/cit in T-ionnarum Apium jugis non procul Salzburgo: ubi floret Julio, in bestis
autem, in quos translata fuit cum reliquis ejus generibus, etiam Maio.
Hic etiam numerosa & conferta sunt folia, oblongis ligulis similia, crassis senla, mu-
cronata, nonnihil per ambitum crenata, candidata, acido adstringente gustu: e quo-
rum centro, seu medio foliorum exortu caulis interdum eu- s, ut plurimum autem pe-
dalis duntaxat, allurgit, superiore parte hirtus, brevioribus usoli^inotdinatimiia(cciitibus
sepeus, summo fastigio ex singulis foliorum alis pedicellis emittens, quibus insident bini
aeterni floris colore albi, e quinque folioli
asperis, umbilico pallido & splendente decem Laminiis cincto: semen continetur in ca-
pulis exile, nigrum: radix sube e alix in
orbem adhaescentur plantae, ut intfruni cdpitcmaJiquandotcganr, vuJgamScdi mayo-
ris instat.

Nascitur

Nascitur non modd in Sneberg, fed & in rctiquis Auftrii & Stirix A Ipbis, fa>is & fco-
 jHihsmlixcns: in quibus floret lunio&: luho;atmhortostran(latuin, Maio .- femenpro-
 *ttlulio, ^ut marunus.

IftiusQuarti generis Cocyledonis akerinsdcfcriptionem pratermirrerenon poem, li-
 cctaMatchioloi&alijsejushiftoriafitprodiU, quameojudiciofuccinctior apudcosefi
 quamopoiTcb.it,

Qvj sTVM ctiam genus inuenituraffine Quarto, fed mollius, anguftioribus & longiori-
 bustolijs, noii dentans, fed alba duntaxatlantiginchirrutis, minus ctijm incanis, breuiore
 cr,ul!:)req. pediculo&mulctsfolijsfepco,qua: plcruque tam iupcrne quam mferncnon-
 Oihil hiriuta [nnt:paucioribus flonbus hinc indcfecundiim caulcm ad lingula. cialas(pail)s.

Obfcvabam hoc genus inE[fchLM-iintsjugis,menfe lunio fins flonbusonufium. <<W <<

GR AEC I s vocauitTv:<MT/(A<Ni)icaptaT]Caquam vulgusHcibariorumhafercuspro
 Sempervivo majore babait: Lannis Cotyk-don alccra. Eandem ticenciam fibi fumptitin
 Quartohnjusfciieresquam in DuodccinioScdisminonsgenrejquiHiltoriam illamGc-
 ncrakm Plantarum fcnpiitjvultenim PhyllumTliclygonum Diofcoridishoce{re,quem
 admodum illud Arrheoogou m.

DIOSCORIDES pmro Cotyledonem alteram (cribitadeadem utilcmcfic,adquarSem-
 pervivumcmcciidacur.

R H O D I A R A D I X .

C A P . X L K U .



MEDIAM quandam naturam obtineie tba
 quodaminodo videtur Rhodia radix,
 inter Cocyledonis alrcrmspiora genera, Sc
 Telephium vu!^onuncupa!um:(cdTelephio
 ni.i.^safHnisjudicariqueac. Proprcrcailhpc-
 culiarccjpur inter iiramqnelitirpc dare vo-
 kumus: non quod c jus U(totiam tradere ha-
 bc.imus inanimo, vulganscnimeftnoriti.r,
 atqueabalijsdefcripta. Qiiiatamcnaliquo-
 tics fponte crefcentem confpxi & erni, face-
 renonpotuijquii] iliiusractionem facerem.

Illamaurem maxinKicop).inafcenremob-
 fervabam in fLopuis jugi Durrenftain, cujus
 in hac Srirpiuco hiitoria crebro mcminimuSj
 &floremvanantcin mcnfibusIulio&Augu-
 flo: namqu^dam planx ilium pallcfcentera
 habcboar,alia; vcluri i ubcfccncem: femcn in
 cxiguis va/culis, quemadmodu in Telephio,
 cxik-,<.iu.ififcobismftar. Qu* in hortisah fo-
 Jei,maEunusnWr.

VOCATVFI porrd hxc planta Gra?cis paS'ia. f
 pf'a, Latinis Rhodia radix , quod reficau
 ciusradix.rofam redolcat: eoce nomineOf-
 ficinis nota. Montani p,aftores,ubi iponte na-
 fcncem obfcvabam, eriam ab odorero/x*,
 illara appcllare noveranr. Weft' tcttrj.

Dioscorids capitisdoloribnsutilif
 fimameflctradit, iirofaenmornento com-
 mix ia, fronti &c ccmponbus imponatur.

T E L P H I V M .

C A P . x I . V .

NOH ignotoarnbiguumclTe.anquashoccapitedeferibamplantas^ommodcadTe-
 lephijiiiftoriam accommodari polTint: aim ramen illarum plcrxquc, apud rci Her-
 aris feriproces talc no in en obtinucrinc, malm illud retinere, quam nullo nomine dona-
 hs earclinqrc.

H A B E T aucem Pritna,duos,tres,pluresve caulcsexradpec prodcutcs,cLibitalcs ,fuc-
 ulento<;, in latus fc inch nan tcs, in quibus ordinaca fuot folia, hoc ett, ex iniervallis bina
 temper advcrCis podiculisna&cntiajcrasla.fucci plena, ut in Craffulamajore, fed majora,
 & mams carnofa- flos in extremis ramisquafll umbellaiimnafcirur, quctnadmodumin
 Craffuli majore,paUidus:radiocsilli plorima: ghndulofa^Craflulx vulgarifitnilcs.

Nascitur inHlfi-vaniarurnbrofisquibufdam locis:undcad Belgasdelata,facilecompre-
 "CQditScaaacft: valdecnimvivaxclt, ut ctiam turn incrram depacli ftatim radices

FF } agant:

Telephium l^hifpaicutn.

Telephium u, vulgar.



agintream ob caufim, pauci apud Belgas eranthorti, cijm illinc exccdemjn quibus non afercur. Floret cum Craffula.

Telephium

Illi omnino Gmilcro, r fido eadem non Gr. ad Auftriacarum Stirtacaruraque Alpium radices jlocis unibrosif ponce nafcentem inveniebam.

Telephium vulgare

A L T E R A ^{q u x} vulgo Fabana & Craffula a folioruro craffitudine medicum, promiccia in pluris a ra^hccaules fucculentos, pedales au caⁿphorc^s (at s. **ftagi J. M.** & folia in tll. J in ordmata **Gve** bine inde fine ouhne per caulem fparfa, craffi quidem & **faaukata**, Hi jpanici Ick-phij folijs tamen minora, ficquentiora & magis conferta: flores in fummis caucibus con^utos, coloris albi, radix nodofa est, & multus veluti naris confans, ut fuperioribus juactiam floret.

Alitur hinc in ortis, fponde etiam in veteribus muris Sept^{en}ionⁱ "pofitis naf^hntem obfervabam.

Telephium m-ftir^hm- fira.

T E R T I A huic non valde diffimilis, a me confecta ad agrorum margines inter vepres nafcens, via cavā & umbrofa non procul a Rotenburgo Hefliae oppido ad fluviam Fuldana fito, cui rariora tamen erant folia, flores etiam fuperioribus colore diffimiles, qui ex purpura rubefcentes erant.

*Thplam**

Qv A R T A M obfervabam anno MDxc. in montibus Francofurcovicinis

, quā antis

E x radlccamcm crafnufcda. & bulbismftarparvorum naporum, multis aucmro

fcuntui folia fads ftcquenna. inoidman Secund^h folij **ii S S S S K**

b a l

in am^umen nonn^u crenata & veluti finvofa: fumma virga comata, umbellae fctar, foliorum quinque foliolis conftantium, fetunt, coloris graiffimi ex rubro purpurafcentis, quibus evanefcentibus / ^{ta p 1 t n} J a p c ^{n 3} o n a , r , q u ¹ b u s t e n ^{i 1} f f i m u m m ' u m r i n g r u e n c h i c m e m a r c e f u n t j l l i c a u l c i & p e r e n n r .

Telephium v.

H vie non valde diffitnilis vide ^{tor 2} Q ² a r a Lobchus x l n b c c p u r p u r c o f l o r e p r x d . c a m , l i r a d i c e m h u b r e t p a u c . o n b u s f u t m i h r q u i d e m v i d c c u r j n a p i s c o n f l a n c m .

Telephium

extum genus non Te-

Telephium

dicaturum nul

Telephium

lam expra Jais proximiui ad Teleplnj a Dio/condenobis propofitihiftoriam accederc^h uarn. ftanirhabcccnirneauliculoshum. procumbentes inftr Poriulaca: . uustrepana, coloma: r a g m e m n q u o d a a i m o d o r e f c t e n E i s : f l o r e s i n e x e r e m o c . m l c

confer DW

Telephiura

Telephiura vi. Cepra Paticij.



f clephium legiciniufn Impri vit.



conferrim *nafcemes* inftar flomm Craifu-
 lz five Fabarie, coloris purpurafcentis mul-
 rashabet radices fibrolas, atque ipG cuam
 caulesprocumbctes factefibrasagunt, per-
 indecacScmpcrvivailia pnma minors. Hoc
 aurcm peculiarc habet uta p.^rj, qui dnul-
 la hiemis mjuria offcndatur, fed brumam SC
 prQinascnntemncnSjpcrceptuainfuo Tigore
 fitviriditate permanear.

SEPF[MVM Telephi]genus, mihi Victmx
 Auffnasnarufnanno M PXXCV. firroincFJo-
 renciamiflbi lofephodeCafabona: poftca
 etiam Francofurnad Mocnum ctevit loan-
 ni MyleroPharmacopacofemine, quod ac-
 ceptum Ncapoli i DodlifTimo humanifli-
 mociuc viroFerrante IttipctatoTeleplitj Ic-
 yitimino metpficoaiunicabam : ex cujus
 Myieri horco plantam unam crucba, quant
 piiSofi expritnendam darcm. Siccam vcrd
 hujuj pUntam etiam ad me Francofufum
 mirtebarcutnalijstirpibus Ampliflijnusvit:
 Jac, Anto. Corruu^IgnQtaeadfcridnoti,
 cjuam tamenapudeosfrcquentem in hor-
 ti5nafciaflcret.

MVLTA autem a fummo fadiciscapite r. «
 I producittenucsvirgas/ummatellurediffa- nTfoil.,
 fas, pedaks, inrer dum breviores. aliquando I)^{hi}^i »
 16gioces, non fuptenim omnesa: quaiis loa- *
 \giaidinis, qiminc6dico ordine fcpmnt muU
 tafolu, prarfemm novel la s. & qux nondu m
 florc m fertine (namqtXZ fioces dant, rariora

Plerumque lubent folia) mmonquam reliquorum genaum, minus crassa, neq; adeo fue- culenta,

culcnu. Deque adcofra^ilia, colons quidem vincjis, cui **xrugincum qtudpiam a** dimixtum
fit extremis vitge, multa floicalis quinque folioli albis constantibus, & contritio nascen-
tibus, quibus marcescentibus succedunt angulosa vascula exili, fusco semine plena
radix minimi Jtetti crallitudinctn mterdum ad quint, lenta. candicans, in aliquet rjmusdi-
Tili. & quibiirdam fibns donaa, vivax, &: finguliinnis plorcs novas ?irgu picxiucens, ve-
rributconupas. Floretcum CraiTulis.

Rosula.

I* R. i M v M gL-nuivocabantTetcephiamHirparv. Craffulis five Fabari| sadnumcran-
danrnatnf. i: icincukatibus rctpondent. pнораquatuotgenera. Nomncptctaincnad
Telcphi) difTem rt tern ctiam poflinr, prr {ertim Scxtiim, ucdixi, «enus, nobis, ante nultos
annosin BelgicamittftmiCV. Alphor ^{do Panco} > Fernenti Medico Cepex nomine,
Gernum Secudom, & Tertiumwnusriia (tntrjm. 2? ««Mra <yjrti*» ww/Sc!m <twii(Nil. Q*
turn rubcnfidi tpaMtappellanf. Galh (ccundufnO^*. Grcis Teleplnum *dtctairruXifiof*,

Tacit. to.

TELE PH u aiitcmfolia, refte Diofcojide, fcni Jhorisilliu, vmliginenit. inant. l<. "Jpoft-
ealocushordcaciafanniiSlinidcbct: pemofta exactoin folc, idemqii oiqitepriibnt. fcd
ubi mitucrui, abftctgumur. An porro Telephu (jencra hoc capiteddchpca, 0111< bus 11-
culutibus iint prxdii, me latct. Hoc aucem oblcrvavi, pнора duo gencra^b emcunoa
niinusplenimqucinfc(lanfo!ita, quam Bra {ncaj.

Cepaw Matchiolu

Cepa.



Tacit. to.

*Bistorta ma-
jor.*

*Stitwtmca
±/Ujt. feiti.*

*Bistorta al-
fiat minor.*

Radix.

SED quoniam in *Cepax* mentionem in-
dimus/requens in Bcl^icis lioricis alilolc bat. fe-
mine ex Italia milibnacaplata ilia, qtiani Mat*
tliio Iuspro Cc^pcapropo (uit, cauliculododr. in-
tali. ex parvA & inutili radice prodctinte, in ter-
ram procubente atque in multos T Similosiffo»
cm ad fingulas alas adnalcuntur folia craifuf-
cula Pofitulac^fotijs minora & afgaftiora: (iirD*
mildeinde ramulis albi floftuli qtnnque flt: O-
lisonitntes, quibus fuccedunt tenoia, ucin
Cr. iflulis, capiculaxili, Icobu inllar, (eminff
plena, Annua autem eft. fingulis annis dcciiu G
lemine fponce rcfurgens. liitnc vero Icgnuma
I Diolcondis Cepxanec ne, bxreo, atque alit*
rum actione iudicio eclinquo.

C E T t R v u Diofcorides. five Cepa*? folia,
in vino pota, urinc, ffillicidie, & veficac fcabic 1*
! boraiuilmsopituli in ienbit, maxtmcaurcmfti
prae{tarc, (i cum dccoi Eoafparagi qu' in v ^{uaz}
Soy, hoc est, comedam vocant, bibacur.

BISTORTA.


CAP. xLvr.

AD Auftriacarum ScStriacarum Utn Alpium
jug. 1, acclivibus locis &c circa (copu lorum
radices fponte nascitur Bistorta ilia major qu*
vnlgo in horns alt foke, folijs p^ne Rumicis. m-
ferneincanis, nodof beaulc, fpicatollorcjub-
purpurco, quat tbrca Tenonincommode Dio-
fcoridis Bntannica centenpofllt. Ejus iconeni
hic subjunximus, quia de altero ejus genere pu-

niilo nobis, in hoc capite, crit fermo.

CAVLICVLVM aucem protnitdofantafeminterdum, (cdut plurimum palniarem,
tenucoa, gcnkulaeum, gercntem fummo fastigioexiguam candicanttum fiofcolorum (pi-
cam: folia vulgatis Bistorta: majons folijs multo minora, unguis humani latitudinem rarS
exccdentia jfionnotti quatntaincnpaw lomajora^onga^ura. venofa^eroras rflexas vc-
nulis quibusdam i> difttnfta, ut fcri! atavideantuf, iiii perne? irentia, infcrnd vrcincaiu*
non fceusac majoris folia: excu (to flore, quia! buseft, paulo grandior fie fpica, qua pL-rii in-
qic {mili, quo major, (cmine onufta cl. rjon raro tamen, wminis lQ^CQaltafotiotabr^
via & yiridi incapi EuIa^congctapofert. qLiibus Jponredcciditibus. plantulas jufdeni
genctis in cadem in qua alebatur arcoti, &: vicinibus nacas fepe vidi: radix vuteari *Ion-*
geminor, contortata men Sigenticulata, foris nigricati Sjinnisalba, rounstcnuibus fibris
capill3ta, gurtu, uti totaphnta, adfringente.

Nalcitur in fuenmis Auftriacarum &c Striacarum Alpium jugis tenuigramine vedi-
cis: Horctque lulio. In horcos vctJ tnnflata (ubi formam & rtiagnitudinem non immu-
tat) niatimus.



J E R T v M est i jdem farutratojsctTe pradiramjquibusmajor: dcquamultaahj Scri-
 ptores, qurnoneft operzprctium hicrepetre.

h/HTMiKh pord Bricanicam, vim habere ad(tringentem, privatim depaicientibus oris & >***<
 tonliliarumulcenbusaccommodam.&valrcadreliquaibusadftiitiioneftopus^cri-'
 bicDiollohds.

R v Micts antem^ui huicplanticongenervidetur. nonniinisvariagcneraobrerva-
 ve memini in jugis illis Alpium Autriacarum & Stinacarum, quam in alijs Rcgiombus
 'tivcniuntur.

AT ogsA^o?, Oxalidisgenus in jugoWcchfclobfervabam, fativomuHomajus, folijs
 *alde ampli; cui hoc peculiarecreat, ut incaulis nodis & geniculis, fubinde vcluti tubera
 quosdam adnafcerentur, c quibusfolia tandem icfc explicarent: qua tubera tellure obruta
 (periculumcnimfcci)rui generis plantasprotulcrunt.

NASCITVH etiam in omnibus illis jugis, prarfercim circa hum idiorailla loca, ad qua;
 armenta flacionra iftic habenco xHivu menfibusaquationisgratia convenirc fblent, fte-
 Huentillimc macnuintlludLapathumaniplis&arcinansquodammodofolijSjnonnullis
 perperamRhacftimatum.Scd non habcradicem ^alii vulgo pingitur.Raphani ant Hip-
 PoWhimodo in tcmmprofundcdmiffam: imoiumatellurcAcorifcfcclridum
 Jnaar iacet brachialiinrcrdam craflitudinc, fibrisubmdc fe finnans, antenus ut Acorum,
 *: Polygonauaugmentum fumctis Seprogrediens.incujeJlutco purpurafcens.Eareficca-
 '.Rhafublbntiam atDiulata^ncc m.nusco Inficit.

ARISTOLOCHIA.

CAP. XLVI r.

T R i K AriftolochiixgeneraDiofcoridesconfituc, ronindamjotigain, Clematicin:
 Pliniusquartumadfit.piftolochiam.

ROTVND^ utiicatn(pcciemvccrcsfaciunt, AnguilLirapluresinveninTeribir.cgobi-

Prior mulriscvuna wd. ee germinibLi^cubitahbufq. mterdum paJmitibusconn,t,qia.
 d. ingul,s quibus ex intervaltis, folia inberenc, media: interrUaWatk hederac folia magni-
 tud mis.molha^diofaxolorcexvirKii ttigriCMtC, brevi pediculu: his jncumbumoblongi
 flor. cavi tuba: infar, ex piirpuranign. ccftcDiofconde quorum labrumprominolum,
 (eu extioiapars.l.uior cft.qiam in iongx autclematitidislorc.&toea_mgncans: hisfucc-

E fru^ujrocundtis^arvt Mclopcponisorma^ui mukagranaconnctordincedifpofjca,



laca.nigriscarnia.inrcrcarfantibusquibufikm membraiijis.&matciciaetiam fungosa,aJba»
 fmguhsggramsmrerpofita, quodrduis Aristoglochiaegem'nbus commune est: radix **est**
 ampla,tuberofa,rugofa,foris fulco, intus buxo colorate pzedita,cortice crallo,& (ut Theo-
 phnfhisatjearni jd lucre ntc.

Statutu.

Crefcitpingui(*olo,iiipracis3<; hti million bus agrorum margimbus -Hispania*, Narban-
 enclis G.illia.&.ficu **incelligo.etiam** Italia: Floret calidionbus regiombusuicume Vcre,
in Giirmanis&J'BelgicanonniJi MaiOisi Innio.

*Aristoglochia m**i>iu*

A!tr.uamulosIL-U p.ilnmeshabcc **prioris**, fed freqacntiores&breviores; folialong*
 Gulden fbrm.im &ci>I>rem.i;mulaotM₁fed majorajongiorequcpfdiculoquaiu luperio-
 ris fultat:rem ex albo purpuracentem, intenus fulcum, Longe non parte similem: ejus
 fiuctu;-pnort tongior,pyn in modtim turbinntus.gracilmrequamin ilhmcta: JcmtnpJa-
 nutn.Lninmprioru&rufuinradixlupenunfimilis. roriicttamenmagisflavo.

Floret paulomatuiiisfupenor, umnrqucfemen **fcreabjecit**, quandopriorismarurc-
 fcerciiJCipit.HanoniiiiitcampL-ftribusArinterfegctcsfpoiirenalcentemconfpicib^m,
dcindecultam uihorcoPharmacop^nrufudam Vifnricn(is,i.ui,atqjJcttaiTi ipiisDoflur-
 rtbus,ignoiumeratprimum genus, queniadmoHum&cetera ^ristoglochia:genera, pra;cef
 Ciemacincprimam Superiorfirmioreit.&injunarumhjcjnistoleranrior.

Aristoglochia longala.

L O N G E caiiiculictianiquadranguikduoipalmoslnngijinterdumlonciiorcSj in mill-
 tosramosdivifjhumi.ufi Rotundc^iftulirfoliaquamiHiuiminora firmiora,dilntiotis col-
 lons JongiorepediculoofultaSoldanella'foliorumpx¹cforma:rloliiii litter oblogiis, con-
 cavus,cxviridtcandicans,Rotundxalteriusfl)ruintfiigic. fedexnmipane, coiori¹; mJgis
 herbacei,intus,ut reliquorum,villis obitus: froctuspyri in morem turbinatur, fed no adeo
 tenui metà, ut alterius rotunda froctus, qui maturitate delufcens semen ostendit latum, ru-
 fum,&ctandem fufcum.Hujusradixdigitic.ifTitudinceliDiofcondi,&dodrauijJ long¹-
 tudinc,quoJ Jctncnnibus&junioribtlplantisintelligendumauro; namadularutrt
 longcampiormagnitiido,etcnimmulras<;ruerenicmini,quarcraflitudincbrathium,!on-
 girudine pedem acquirent. Adulcsvero omnes plcrumqucxtrenia pare obtuix **Cunt**, &
 xqualisfcrcpertotamlongitudincmrafrimdHnSjJubindetamtn cuipidtramofa.-junio-
 resgraci.c!i;unc multafque fibrashabenr.

Hutu.

Trovcnitcampcftribuslocis inter(cgercs, &quibndam vtneinNarboncnfiGaNi;!:
 mclniniSinovovLTeriorcentemcrucrcininfDiamedijiin **ftagdisfiti**, ubi cmplum Mi'
 gjlotianimecup.unm, ohu EpiIcopiMompcllumfcdes, circaoppidulum Vilianovano-
 initiatumJccuadoaMoinpclhorailan.

Aristolochia Cleisaticis vulgnris.

Aristolochia Clematitis Sstica.



Quaedam et in differentia Aristolochia longa observari potest; ium illius quam in Hispania obtinetur, nonnihil differre de prelienditur quippe cuius exiima pars in reno pane purpureo s f i c q i n i n a p i n d e a J r b a c H r f n d U g l a c i s n n o
 ^llisplanns^talccry/cdpkrumqucobtuiior.&ipi.i radix brevior.
 Nascitur in Hiberniis inter vires, regno Val-ntino frequenter efflata, ubi Martiofiorenci incipit, cum in Germaniis, tum in Scythia nascitur in pennis, & diligenter in arboribus videtur. Aliquod in Vienna; pen- u i i m f A c c r t . v o l u i j a n h i e m e m i n h o r t o f e r r e p o f l e c . e t i a n a b i c t U f r o [i d e n r i b u s r a m i s i c - c r a , u t r e l i q u e , q u a s h a c r a t i o n e c o n s e r v a r e s o l e b a m . p l a n t a : s e d o p e r a m l u s i . & : (e t n p e r c o r - r o p e z s u n t . I t a q u e a c c e t o d a m n o r u d e n t o r f a c t u s i n v a l i s f i c i t i b u s o s t r a f e m e r a l u i .

CLEMATITIS p p p p

pra;cc4ntes magnitudine tuncra, canctn hnbet firmiorem, rerun- jfrfl
 rn, friatum, fopratubifalcmalnttidLnrcmafriijTeiicin : huij folia reliquunnnfolij CUmittu
 ltoatnpliora, ex viridi pal lefcentiajorigoptditulofiiha, form iLorg.T,t]pot!usRo **i*lif,
 lccnusfolia referentia s flospaMidus, copiofus in fingulis alis, qti in alijs genibus
 i J i & BorisfurnmamqJodamniodorfcrens, quocvantfcncnc fitecdir frufus
 (quaram fructu majur, exrgui mall magmtudiq, fetnencqntinensqualecftreijquarum
 *>ristolochii. ium /cd majus, Hujusradix , qtx iciiquiscum graviratquadam clodora-
 lOr i t e n u ; s S c a d m i n i m i d i ^ i n c t a f T i t u d i i i L - m i u n q u a n i a c c d c i i s . l o n g l a f c O i U c f e r p i r , * :
 c C u b t e r r a m e r g i c u r . a d c o v i v a x , u t e t i a r i i f r u f l u ! a t i m c o n c i f t , r . i c i l i m e r c n a (c a t u r ,
 a d f f i i i u a r u r i q u a i c c a u s a f t i b i n d e t i i o l c f t i a i n i j s a d e r e , q u i j l l a m (c n i c l
 orros recepc rune.
 Editiora amat 1 1 1 , f e n o i i n u l l i s N a r b o i i c n f i s G a l l i i v i n c t L s a d c o f r e q u e n s c f t , u t v i n a K t m \ n i
 ab illis odore vitium contrahant, venter in p i i q u a i n a l i s i n t e r , o g a t i e ,
 Germaniz superioris & inferioris, locis. 1 1 1 G 1 H V
 Florctum reliquis.
 A L i v D ' A r i f l u l o c h i x g e n u s c i r c a H i i p a l i r n i t i n c r e O l y f i p p o n c n i t . p I u r i m i s q u a l i j s
 B e r t i c a r l o c i s , i n d u m c t i s , v e p n b u s , & v e t u f t i s q u i b t i l d a m o l c i s f p o n t n a i c n s c b l t r v a -
 b a m . q u o d a d C l i n a c i t i u m e t i t o r e f e r n p o f l e v i d c c u r .
 Illi longa, ramosa, tenuia, friataque habet (armcna, quibus vicinas fepes & interdum ar-
 butculari operat, ut se cōvolvens & implicans Convolvuli aut Lupuli modo. Foliz illi reli-
 quarum Aristolochiarum folijs familia, feu potnis generis illiits Apocyni, quod in manti-
 « i s a l t e u s , M o m p t H u n t S e a m m o n c a i n m e o t e m p o r e c a p p l t a b a n t , c x t i e m o m o c r o n a
 t c u m i n a

Aristolochia longa.

Aristolochia Clematitis.

Aristolochia Clematitis.

atu i inito, ruprrnc'a:via& viridia.infernc'expitpHiaalbicantia, lonpopcdiculoinnixa:
 Hos Auitolo.hixiotigaiincurvuSjOblongtJ^expurpuraiiigricalis.intusreniii li n c p l e
 nus,longi(luno omnium pediciilotnlideiisifruftus [itrexiihusiud.'iBcnrcicrilgeit l'coit)
 retiquaruni Anflolochiam fructui iimilis, talecciamcflcfcncn, cxcquod Doth!,
 VirSimonckTuvar mittebat obfervavi,fruilus vcroxque irngntisac in Cletnatiridca
 gata,&àpe d i l d l l d l l S i l l l t (m c u
 craffionbusfibnsmagnarn habccarfinican-m) nunc per lumma fcrpens,niox akt- tubterra
 fecondens, pallidicotoris,nonuigracL(apons, guftat.iemm,jliquaritiiju>i adfringensa*"
 preliendirur, & mamfelbr acnmoniar, Tota plamaodorara eft.

Notata.

Nafcttur pi^gm iolo, ijsqtia-commenHiravi lotis, (cmpeftic virens& IanuarioFc-
 bruanoque HUK nsxtiatn circa Cord ubatn mihiobfervata.

H v i vs nemincm faccre meiuionemfcirii.tuimHilpanicarutnquaniidiim Stirpiua
 Hiftoriam piiblici juris face re m, prarterunum PetrumBellonium, quicam niCrctaob-
 fervaflc fenbu lib. i. Obferv anon urn cap. xvii. Idem Duncdenouaücro:ii&C me me
 quod.qm GLneralem illam Platuaitm Httforiam Rovtlianis typisLiigtkiniexprefTic, fcri-
 bit.HujLis nemincnimcmtnitTcaitCluliusprxter Bellonium&c. Dodonmsertnicn can-
 dem Ciematitidis nomine depinxit &c. f-actur Ciuiius, led a k- icceptum, & totain iideo
 Aiiflolochiatutn hiftoriam , ciim Purgantium hifloriam mediraretur Dodonx
 beralircriut&plcr.iqucah.i.icommunicairoait.Scd&:ipfe DodoDZtisifticcsprelSi
 circa Hiipaiim blunmisqueahj^ Pviic.irlocisjndumtt^&rvcpribnsCarolum Cl
 fendiin."addic Clufiustococtiani<)cccmno,anrequ.im ilte Purgancium Hiftori.im i
 rct.Et undequarfo li.rc haufflet Dodoixus,qui mm cmponspcleni eBelgicanur
 extulerat, quamabhisqui peregnnas tuftraflentregions? Sed ca c(KJuurundaoi
 n glicntia, nedicam,(bcoidia,ut (blaiconum tnlpedionccontenti, taiuuuotiumf¹⁰"
 (unianr, utipfirum Stirpium hiftoriam legere dign entur. Seddchuiatis: i
 Ariftolociiiarum Hiftoriam.

Pullochia

Notata.



Notata.

Notata.

Notata.

PULLOCHIA cauliculos magna ex parte pe-
 dales habet.nonnumquam majores,angulosos,
 fnatosj & ut Anliolotbia Longa.vjnw1"^^.
 nuiores tamen: folia LongstfolijsnoQdiffic^{1*}
 lia,n!griora, minora niagi5rugofaj1&
 t'U'liii loan biUiJ'II'aUfa:rlorcM
 t< iiiArrqua^fa^niinorc) t!
 domgrum, inrtnlum cx^biC^KKfitic^
 tem'iuuQum Rorundx^in:3\$/j^\\EusefBp^
 veniai minorem.'fenicnena^^nilerdcniii*
 radiscisrapillan cntisjoDCi.utredcPliniuia'^
 plenioniCTjftia:dinc,buxco colore.

Oritrn in Oiivecii,& perrofii Hitpaniz £>*/
 liarque Narbonenffsioas.ScrimflorM rcl>q^{uff}
 Anft< lochiarum genenbui : acbocpcculiart
 L-ji)irriiEli<ihaber,ut ,dum macuruic ,ca,*j^o
 prdiculoadharrct,pane, dehficai utin B*¹⁰*
 Clc-maritidei longa* vcio, & rfliquaruin,¹³
 extrerra.

NOWM auremSipercgrinum Aristolochiz
 genus circa Halcpum Syne/imcroliueta obier-
 vabat C. V. Leonhardus Rauuuius Augusti-
 nus MCKUS cujus mennit Lib. i. (ui Hock-
 poricicap. ix- ab incolis Rb^fuicRm nigi ap-
 peltatum.

Idodorquidem pnrditum, fed illo ingrato,
 habebatcjuamor cauliculos albicantes.pr°P
 radicem fili infiar j^iaciles, quibuscircafup^c
 rtorern partem utrinq. inharrebantfcpteni^{VC}
 oflo folia fibi in vice m objepla, rciiflla^incrd

coloris , magnitudine & incifuris flori SorarFfcicisfolijsvaldeGmilia.Difi quod infiBiap*¹¹*
 &caoltculisprox!tna,rorunH3svclun auriculas adnaras habtrent.Dt ft mir.onS.ilvid:inf^{ef}
 inferioravcro folia , qo*³¹¹° t^ainre irtciffliitiosbinviet ni diftart .flares Anftoloti¹¹³
 aliquid tamen maiores.cn'orc magisfufto, & lorg ore pedicitlofubniki:rad>x Jansf^r or
 fundedemifTa.naftroPyreihroplane familis,guftuaniara,undecolligercllicbat,(-3(H¹⁷),
 care, ic nonnihil calefiicere.

Notata.

H^c portd planti Grecis a^reA*
 nuncupatur, qv oil, ut refert Diolcarides, & p...
 2021000

Cjideft. optima puerpense xiftimcrur: ^omanis Pltnio teftc, Maluro terrae. Sed ij *Mulitrrt.*
 •WHICH rrj[undipotiuscofivcnic, qux Grxciset proAo^/«7|ooj.j, («AM, S3'MAT;« Arilloloclna
 ; fotunda & rtirminavocatur. Secunda *dja^oho^jxnan^a.iiapp».* Anil: olochiaionga&: mas
 t Ppellacur, iteni anuniuliiS(f(tJfTuA<T<c>dad, ¥liri: s Tcrtfa«AwwaTJT/(, Clemancis, quaHSar-
 Ft aenticiacognotnina curt & pnnimnquidemc jusge DUSjaplcrifque, pro ifginma Longa
 urt iipacum, Gallis^drrj/7w, Narboneniibus Fjft^r^diciturj Gertnants Df<tu tfej?. alteruni
 autem c; u?genus Boccicx ruhcis in cpte CA'C*partlld, quail rubusvtricula. Qiiarcam Pl.
 "tus Piftoluchiam vocm > quim nonnullosi uuuicrolis radios capillainemu *TreA Jpfufy*
 ognoimare fcnbit lib. xv. cap. viii.

C E T E R V M Anftolochtx radiKrefte GaIenolib. vi. de Simp Mcd F. cult. mulr. oeftad ^\$\$
medicationes utillifima, amara & fubactis. Sed ex illis omnium fubtiliffima ell rotunda:
 *ongaminu5 quidcniienvitatis obti[ict, quam Rotunda, abftcrgens ac digerens, fed non
 Ti[rmscilfieics, im6 forfan ptosctiam. Ititjucin quibusij fuseft modicacabilerfionis^uuii-
 ^odacfl longa: acm quibus crairum humorem validius extenuate oportet, illic ufusft
 totunda-. Qua: Clemautis appcHatur, frjgtantiorclt, itaque ea ad uuguenta utuntur un-
 guentarij. fcd ad (anationes mfirmior.

Paulus yEgincca Anftolochnam Clemaririninter medicamenta fimplicia quar bilcm
 ?"rgant, recenfet. Aecms Tetrubibli prinlar fcrraoie tertio, pitmtam ac bilcm cvaouard
 tefta est.

Clemaritis autem primisj five vulgatoris folia, inter plana fiixaconfrafla & triia, lig-
 1 casa fruUs, faina (quccorpon, Jnfixasad poffta, va[cmrc<i:»aherq, in(iaminariancsfub)c-
 •**Uicascuraic**, experimci uodidicerat doi3iflii>usvir D. Michael Lingcliu; , Medicus &
 • rofe flbr Vicnnenfis. •

Plinius, Piftolochia. mconvu!(is, comufis, ex alto prxcipicatis^ radicc poca ex aqua, utilif-
 im amc fletradie.

A R I S A R V M .

CAP. XLVI t r .

D V O R V H eft generum ArifarutQ, tamenfi Vctercs unci hiftonam poftcricaci
 'rtliqucrint.

An { arutn lacifolium I •



V N V M , Hcdera aut Stnilaciifcrefo Jiaha-
 b et, enjaut quacuor, viridia, mollia, facis tatnc
 carnora. acrisftporis^ blongopediculo innixa,
 ancciore parcc^ uapediculo adhjrctir. utnni-
 qucpinnata , An foliorudiinfiar, fcd obtulo-
 nbus & qLialior bicuhcisanguhs: inter qurpew
 diculj dua^ uncias longns, mulus rubnsnu-
 cuhs diftiitlusemct; it, cuiob Uingus flos infide-
 dec, monachahs cuculhtive Arifto Joehia- Bor-
 ris modocf Tbrmatus, amplior tamen, extrema
 parcc fulci colons qut deorfum radiatim redic,
 incetcris albus, caninumolens, pftillum obtu-
 (um, incurvum, & vcluti excuculio piofpicies
 connens, uc piflura demonftrar, qur ex illd,
 qLiamipfcupl triftjucalijs in HiTpatiica mci
 peregna uoncob/ervacis exprimcbam. fiiicli-
 tcr dclineataeft: radix rotunda, globofa, Aro
 minor, fonsnigricam, intusalba, aliquando
 etiam tubcrola & oblonga, imno dulci Sj deinde
 acris. minus tamen An radice { licet verercs
 contra fenriar) fibras aliquot fupracatn expna-
 fis, nt mOrchidibus.

Altudcius eenusciam invenitur paulo am-
 plion biis rolij5, & rorundion bus aliquantulu-
 ratque moll ion bus , plunbustuberculis /c prop-
 agans, oblongifque & craffis radicibus Icpius
 tnlatum Siobliquum fpargens.

ALTERVM diversa prorsus est forma: nam eius fl i l i r & f i t u a inftar fere
 Plantag m u a n g u o f i t i t u o l i n i r a q u i p a q p q u e o i j
 Cullus longFor & mucronauis, re: rorum in rlexi Js5C3lbicans proffit, (ccijus riti) a obtorgus
 v c I u u l l h « i i t r d u m] g t u d n e i n f l e x u s c o l o r i s a u t p u
 aut ex purpureo virefcens non ille quidem oboculus extrema parte, sed mucronatus: fructus
 facem inftar co t fercui. albf non rubet, ut quidam, qui non obfervarunt, prodidère) vix
 tc rra Cmergens suo icmpore fubicquitur*

Arifarum angustifolium.



Arifarum
 Angustifolium
 Linn.
 Fossilibus

Arifarum Byzantinum.



Arifarum
 Byzantinum

Latifolium in collibus Luiiuin & hequet
 falcbro(6&: la pi do (b io!o) in lepibui & ju
 xtavias: ubi Novembri & Decembri flori
 busfuis prxditum cruebam , atqic eiam
 nonnullis deturze locis solo fructib & pu
 gui,lecudum publicasvi.isScliorrorutnzg
 gces, ubi lanuano SiVcbruano, Alccrum
 auccillius genus umbiofis Jocis na/ctbatur
 ad Olearum radic« pone urbem Vlyflipo
 ncm Inde in Btlgicamtranfiata,nurnq«ai^
 HorcrevohicrunELimonifnagnadiligencia
 & cura, scililibus, ut pleraque aliq planta ex
 fervencionbosrfgionibusdclatx^dferven
 tur,percunt.

AngustifoliumrpDnre nascens non vidi,
 (et ad nos peregreddatum, in hortisaleba
 museum in Bctgtci, turn Vienna Auftri^
 forcbat Verr: tulio & Augufto fine folij
 frudlumproftrebat. Vivax magis doc
 neque tantacurS uidiget. Uluri anno M. D.
 x c I i, accpicban^ab Imprara, Neapoli
 miffum.

GAUCVM hujus plante nomen est a pto
 pto & a ple: Latinum, Arifarum: sed & Aris Pl
 niodicitur. qui eam duplicemfacii, alba⁰¹
 gminocan]c, a]ceramunot3ntum. Lr⁰¹
 nis Ure dtcebatur, quod nomen ctaiiu Aro
 commune est. AmatusLuGtanus/r<i/i
 idcl,fratercu!osHi(f>anis appdteri aiTertj
 quia, forte, c]usflosmonachakm cucoJJu⁰¹
 scmulatur.

ILLIXS jipraas fiftere tr
 des
 cacia. AmatusLuGtanus/r<i/i
 contra pctisi
 non polTuii), • j
 Anlamm ton Belgtex fucnrmcognitum, ^
 anno demum M. u^t,x v. quo illud A •
 piarnad amicosOlynppone mit
 Ianuariojiftie inhotctere ceperi
 Angustifoliu vcrd^ofVrfnciim ex Hifpaui
 rcditum ex Italia puimtnaacciptcbamui.

ARVM BYZANTINVM.
 CAP., IL 1 X.

CVM ante aliquot annos liu os Ari turwr
 cum alijs tu
 nopoli alUtis, Vicnrw acciprem.hrrcbam*
 urrumadAri:aaArifarigenusrefcrrcm^f
 indecutn folia proferreccpic, primis
 busannisproAndronifaliohabui, du««
 te me in cam fentcDcam foliorum c
 ic me in
 fi m ill m Jinc N am eacontpicicbam
 Anfan latifolij folia accedentia, nee v*
 nmctonau.ftd pocius orbicularcm figur*^{u1}
 referentia: nec radicem valde diiHtm ^
 i y^{crti} m postquam ca augericcpit.digica!
 \ Jongicudincm adquifivit, muUis wbc¹ ?
 inarqualem, & uncialcmaurampliore cr*¹¹
 ficudnem, roulrafq; proles adnaws l<t>¹¹

ioiiancmpiQtulitlongcmajora.adAnfohorumformamplurimumaccedentia.iKC^U¹
 minusiplendentufupcrnc & infern«: cjujautcmflorcHjduunant viiJerc corrigienP¹⁰

*. D. occvi. licc toto oaennioatuealufler^Gngulisannisnovo vrcemergenrem. arqie micrdum ctiam ante bruraam. In vernis camenfolijsquandatu diicrcnciain ob(crvabam» «n quoj ad formam & figuram attiaetfijMpnim ilia prorfus firmlisforma, led ifwqualis magiitudois&iquptivaldcmirabarJNquibuldamplanns. licctexcadcmmatrcabruptis ^ni^mfiquidcmxufeiCon^DtmopoIiaccJp<bam,)foliacrawtmgrisaItquQEexi!ibus t=r^C^t !^s^! ncta, aliamimmc; cumeci: 11, n^o scoiorevanac, namp! ar)t3: m3culisnignsno' «cafoliaiiabentescpeuiajluiii purpurcum follKuloinclufum lubucrunc, alix verocandi- nnc raMaiomcnfeaoiM.D. xcvi. atquepoftrcmatbIiaantebrumamplerumqucgr- ra«ureiolent, altciusnovovercdunitixat.

COLOcAsia

CAP. i.,



QVATERKA aut quina ha bet folia, (ednervofaadniodutn ,3cplLInbusvcnis five fibriscmintnonbusexteriore pane concxta, inc3naqucamplicTtm. i, utplcrumque Perlonaic folia magnitudtQc Puperciyum* quam madentia, cciam (i aquis immcrgan- curlongiSCraffisfirmifudil/b xa: radice craflir. maj^na, dupfici ut plumu, &Iagenulx mibr cfformata (altscenr- I rutbam plcrafque radices ad Wbnaftenum Pera lontra, & ex illis baac iconem ipfe iftic exprimebatii) quaralijs adlatcraadnatisic propagat, & fibnsaliquot ninair.

•Frequent^ multis Luilranixloriscirca t. vos. cx Aftich. iH inrelligbam .pcimum cd delaca. Videbam euam omnium maximam, Stampifliniis fbUjsHifpali in artis Regia; liortoibiqucMnicvclrloreru. autftuctuin ft-re negaoant: jjercoubar eiiitn i'eno, quia uulium in omnibus plantis riorum radi- mentun] aut vclligium coiifpicib. ni).

LVSITANIS MaQrltanos {equutis/«i perprcam dicebatur. Barticis K^UOUAZ vox proculdubio a Colocaiu deduct.} clt, CaftclUnis ManU dertutpraStnora, idcQ, ClilamysD. Virginia (afolij mmirumam- pliruJinej quxtamenappellatio, illi ctiam Tuffilaginis generi, quod vulgo Perafices

itr, communis est - Cii m vtro \xc p!< ta plerifque notascum veterum Colocafia Coru, rnlmes liabcac, nilnla]tud mihi pcrquadrcpoirun^quasn illam ipfem dTc ,qua; Grx- f^toAoKoEtTiadicitunecmemnvecquodafij ArumyEgyptiiniappcllarcmal^uerint. Nam *F< Lusitaniam valde a mncipijs. Aethiopiabus expectur, cuquo cruda & cocta vcluntur. - 2. EL LONIVS lib. M. Obfervationmcap. xix. referc Colocafiam Alexandriae urbibitlqLeA**'''''' ^pagisvicinnfrcqutntiiTimani in forovenalem invcmri, jSgyptdfque raro cihuin fii- nicre jCluinCojalaliaadponaturcum cami bus co&a: propterea magnum cjusvclligal per 2^ Crata^Bgypum circ. Capiccaucmxxvin. cjiicCden] lib. negateamauc HorcmautrU' tpmi fcrsa j?jus verba i^; (ubijciam, quia Veterumde FabijEgypciafenicmiainfu/pc- x^GM. - inquit. pluntnislocis. Oryzii. PapyOjMusaarborecraneconfiti, inrcrdum ctiam ^W^ {UvQuiaver6hufusCo!ocatia!, quseeriarii Locus& KibayEjrvptiaappellatur. rVu- F<I> ^ni. inajntidiligencia-truftraperquilviiiuiSjilliulqucinqulitione Cairiincoltsridendos?''*- Oospn-bujmus, occalioncm (utDpiimusinquirendi, cur VctercscamFabamvEgypttam i itiarint. cii m febas nosi FLTIC: tandem hanc erroris onginem efle deprehendimus. Hc- ^HaUfSor vctulhflhnns. duarum StirpiLiin in Nilonafcciuuum mcininit, quarunial- t rotunda radio: i qitxGolocafiaeft) altera qitidpiiiiolivaruinndeiafimiIe, qoQu quicaptivcrat. Reliquipoll' i'iraauclorcs. aitraUrnus vcrbaii- quiti. ad arbitrumdein- de dolo cryptant. Nam quod T n-opraftus (pinofam illi radjeem tribfil. teffl alicr Ic ha- bero. ita experientia docet. Dioscorides de Faba Egyptia agens, TheOpfertfti. vcrbafkrd q'pralio. & utrumque interpretatur est Plinius. Hac Bellonius. Quo loco ctiam addit -' nalccutem ai nvtilus in Cretic inveniflc, Agyptiqs voro magr i a^ avulgata Hispanicatum Scirpium Hiffoia, meam & Bellonij fententiam con- GG 2 firmabac

firmabat Mag^{tk} & Gcnerofus vir Hieronymus Beck a LeopoWstotFF, Liber Baro Austria-
cus, Belliesannoaxper Vngariam Priftdus, CxfniaConfilijs, idemquemuftispregn-
nationibus ctarus, qui aTerbat hanc piantam Jjb Arabibus *Ceka** appellari in jEgypto,
ifbcque adeo frquentem effe, ut nullus fitrufticus, qui magnos ejus accrvos non habcrat.
Ejus r.idicc coda, vefci illos, perinde atqc Germanos raris, quibus tatnen in inus grata fit.
Nullam vcrdahamcjusfationemintellexifle, quamerHicleisadlarera adnatis : quosvel
avellanx.velnucisjuglandismagnitudinelutovelargillainvolutoSjinrlumentccundum
ripam demi tram. Has poltea crefcere, Si. novam meflem generarc.

Coicw.

S E D & doctiffimus Rauwolfius ,qui illam toco anno venaiem Tripoli SyriKConfpexit»
utquaïnco'se frequenter vcfaiitur,& tanta copiam Halepo coli aiTerit,utejus radice non
minornumcrushominiimalatur.quam inGermaniarapis.Iketillis.&fiavapaOinacanone
careant: aditt in rivulis ffonte nalcemem obfcrvafic , florcem autcm vel fruflum num-
quam vidiflc.

P O S T R E M V M ornium,adconfirmandammeamdeColocatiacententiam,acce-
datteftimomumC. V, Profpen Alpm, Medici Itah, qui aliquot annisMedicamaitcm
iu >Egvyptoexercuit. Is in eo Libro qucm de Plantis ^Egypti fcripfit,cap\X XX>11. in °. uo
dc Colocafia, fie ait.

Culm.

N V-L L A plantamagisnoraiEgyptijSiColocafia.quamilliCK/f-w (pronuntiantund
a , ucou.Italorum&Gcninanorum more) vocan^ncquemagisinuft^quandoomneii
hujus plane* radices in jure coflas, atqc alijsmultismodis in cibisparatasaflicducentnt,
non (ecus, quatn noftn rap*. Agri Colocafijspleniibi fpeftantur, arqc,quod tnrabi-
ius videtur, nemoillorum aliquam ipfarum piantarum flonbus vel frudibus ufquam pr**
ditam vidit. Egoexinnumensiilis vivenubusa mcfâ?pcin(pe<fus , nullamunquamflo-
reiuem , autcumaliquo fruflu , velaliquocaulevidere potui. Exquodubitandutnvi-
derctur, campUncamcflcGra:corumFabam iEgyptiam. Ptanta lizcibifpeAarurfoltj*
NenuphariSjlongioribuSjAriproxim is ,finccaulo,florc,autfruflu:ejus radix magi>a,crafla,
C]iinarradicibusiimi]iscernitur,faporc(ubamaro,&:acricuniahquavi(cofitate,cjuaco-
da dulceficit: quondic paffint toto anni temporepcr urbem innumcrac radices venduntwr,
viliori prtio. Hjnc fane mulium Temper nmratusTurn Diofcoridcm , ^Egyptia: fab« *Bores*

Dhjisritlit
la.*.

acque ttuctustnbuere, &eam Colocafiarh (fle prodere: quart) tamen nulquam , utdixj>
floruifll,nullumque frudtim dediifc viderim,aut aliquem vidiflc unquam audiverim. *Sea*

Thm catur.

hancitem aiijsdthmendam libentt{Hmcrelinquo. tarn tumcrudam, turn coflam ,avi-
diffimēvenen indulgentes mandunc, quiaputant&mertnucumgignerc, *Sclibidincta*
prjvalide movct. HJCC Alpmus.

Faba Aegy-
ptia, five
Colocafia,
non est A-
gyptium.

F A C E S S A N T tgitur , quicamquamexhibeopUntam , Colocafiam five Fabam
•Egypt'am eflc negant, quia flore& fru&ucaret j fed Arum jEgyptiumcfcic ,cerebrosc^
pcmnjeiccr cooccadunc.

Qj^ r A porr6Dio{corid«Lorum^Egyptium quibufyamnotiscumFaba jEgyptia fi-
veColocafiaconvenireait; audiamusquididem Alpinusdcoienciat:nam(ubiequentO
cujdem libri capire fie fenbir.

Lotus Aegy-
ptius.
Nymphaa,
Nuphar.

P R O X I M O dcColocallâcognitocrrore , hicaliusdeLotOiEgyptioanimadvertin^{11*}
quando h.rc planra planecadem tit, quam noftri Nymph*am, Arabes *Nuphr*appellant.
antoro ^U¹¹dein Hdminc Nilo ^Egyptia loca fambentc , millaalra planra eff inventa, q^{11*}
nocasLoti prsfè ferat, quam Nymphara ip(a , quarprofefctofimiliseft (utde Lotoaffir-
mat DiofcoridcsjColocafia:, feu Fateifcgyptiac, floremquefertalbum (loquorderna*
jore Nymphata) Lilio valde fimilcm, quem clariusexprcfFuTheophrastus, qui dixit: &
flos candidus , lihjsfoliorumanguftiaproximus : vrceniraliicmajoris Nymph*aflos
eft, qui Sole occidente clauditurSi fubaqua occultatur, oriente verd fupraaauam afTorg-
gtt.forasexit, &apcritur. Q^odnonmodoinjEgypto,vertiminmulciUtalra:locisinhaC
phntâ obfervatur, Ec quid i nonneetiam ex flore caput producitur, Papaveris capit'bu*
valde fimile.in quo rnulta(cminaminuta,qualLavcremilijexiftunt,continentur,radix4^{ue}
crafTaea/ Nonpoflurrinon vehcroentcradmirariTheophrastum , Diofcoridem&al^{10c}
omnes,quidiffiititTimiscapitubui Lotum ^Egyptium a Nymphaa fejun<rint,cum W³
quc unum at iuc ^L* m plan^ ic * & tnrari, dxad Solem converfioncsdc Loto celebrate
exdem lint .quarincommuni Nymphiaab omnibusantmadvertuntur.

Vetrum er-
venedof an-
%L>***
-- 11

exdem lint .quarincommuni Nymphiaab omnibusantmadvertuntur.

Rj«nit.

>(EgyptijcailesrudoscumflLiiscapiibus,per2;ftatiscaloresmandunt:iubdulcesnitrt
funt,atquehurmdi,vahieque refrigerant & humefiant;eos appellant *Rtftntt*.

UH Aw-
% P¹¹ fertir
facimisei.

Vtuncurpractercraflonbus&folijs conni(isadomnescalidastnfljmmationes,&ucc<%
> ad demulcendos dolorcs a caufa calida obortos, lafle atque rofaceo oteo mix<>
codem itidem modo,oleoquod ex flunbus parjnr, ad calidosdolorcs,inflammajones,eK-
ulliones, ulcra, Scdolorescaptminfebcncicannbus, vigili|,tuTncxtenusofliac<nti¹¹*
applicant : tumejusuccocumoleo&acetnfrontem8£temporaillinunt: adconciliaD-
dumaurcm fomnum, fyropura excoparatum ufurpant,&tum lcnnum turn radietp¹¹
vercinaegrotiscvmcjusdecoClwexUibent.Vfusradicij.lennuiDeiuefcerctilcobabetuf

apud

Nymphza alba. Lotus -fcgyptia A Jpinf. Nymptiara lute a major.



apud mukosjadgonorrhæam, & in mulicibus ad album profluvium firmandum & addy-
 nteriam, Multi vero ab hujus plantæ usu abstinent ejus loco alia potius usurpantes, me-
 tuentes ne si venens de fœderum & vires imminuantur: apud cosenimomnes compell-
 unt, (et nunc He radices usum, homines reddere valde fingidos & ad Venerem tardos:
 eam ob causam multis ibi (Nistis hœc in sinu fœfle audio, ut facilius ex libere vitam
 ducere queant. Hæc Alpinus.

ut detur us, plerumque non notasque ad Dioscorides & Plinius Loto Aegypti tribuunt,
 per se etiam convenire; radices autem hujusmodi. Quia autem in ca Alpinus topini o-
 s Nymphæ utriusque in comæ dicitur voluissis, illius ne in pœqua? florem album
 et radices: alioque affabre delimitata fœctac, nekio qua incurid fuerit corrupta,
 alterius cui flos est luteus.

BATATA S.

CAP. LI.

TR. i A hujus plantæ sunt genera, quæ Bxticam prægrans observabam, colore externo
 interdum differentia, etiam gustu sui virare: naina LK Corct exteriorius quodammodo ru-
 ptebat fivè Lirp Liracens crar (Sihoc genus præftantidimmi judicabatur) aut pallesc-
 t jautibus cratringulat. in incencia albam interius carnem lube bant.

PRODUCUNT autem illa Cucumeris (ilvefris modo fatmenta humi dirTu/a, fatls
 Cræfra, facculenta, Ixviæ quibus inherent folia meum que carnola, ex viridicanescencia,
 flijs, feu potius Spinachij haud dissimilia: floreno an fructum ferat, a nemine mrelli-
 gtepotu radice caucem fitlacio: ca plerumque do drantaliscft, grandis raphaninonnum-
 linn amplitudine (nammemini Londini meineunt anno M. t. xxi. recentis admo-
 J* Lit n, & optini quidcm generis merc, quarum unalibræ & amplius pendebat) in aqua-
 is, cui rara; & breves ad narar lmevc luntibr bin autem jcrnxj Vc lpiires ex codem tam-
 Jam capite dependunt aliquando radices, Sifens radicum infar, ve3 cciam fingiilare Sjimi
 pircobcufiores. dc indruirun progræ Aendogracciiores.

Spontaneæ citurum novo orbis, vicinis quæ in lulis, unde primitim in Hispaniam delatam
 mt: nunc in multis Bxticæ maritimis locis ferit, vel integra, vel in tallcolas facta:
 riticipitum autem obiect Malacæ nata, qua: & Gadcs, 8: Hirpalim, imò Vlyflipponeni
 tUmufquede Ferri (blc]. Habuimus etiam aliquoties in Belgio factis recentis, (ed quæ
 terminate nolucrine, imò brevi corruptis sine, r'rijidiore nimirum regione. Scd Scquas

Batatas.

Inbanc LuGianorum.



Camotti.
Amara.
Aysi.



7/4.

Londiniembamjdiuturniorcmora* (nam VicnaindefcrrevolcbamJantcquamKlluncomrait-tercpofTcm .corrupt* funr.

AN Vcteribusfucritcognitahacplanta, bxrco, propterea nulluni nomcn gnrcom aut lacinuo) ad- do: Hifpam Batatas, nonnulliautem Camotts^ul Ametts, quidametiam 4ti, tamccfinonnilil. uj atunt, in[Cr ft difFerant, fltque Baracas radix longe cenerior&Juuviior.

Efturveroabipfisincolis, autcruda, autcoi5iJ nuncHifpaniseciam in dclicijsobfapous **variaIB**

extenore tencllocordccrepurg. ita. dcinde m orbes concifa, ex paiwillo vino, **ffilla»nj4^{Bn}** **ro&rum** liquons&racchanmomentocdatur. Suncquioxoleo. accioA Inlecfcicnt: nee defunt qm radices recentcs coftas & repurgacas faccliario condian_{CI}&: in ufum **fervent**. **Scd** & radix noncoda, dumcortumpi incip.t, ficultrofcctur, nonJccusro(amt#, W*m lpfarhodia radix.

Q_vi pluradehacradicevolct.confulat C.V. [ulijScaliKriEwrcitarioDem **CLXXXI** cap.xvii.lib.xv deSubtLlitateadCardaimm:inprimisv«6cap. nn.lib. vn. Pi m^{ix} partis Hiftoria generalis^nacuralisFerdinandiOviedi.

LECTORI porro non ingratum fafturumcxiftimavi.fi gMtdthiftori*, alrcriusc^' damcrafi radicefenpnonem rubijcerem,quandoc.mdem IndueOccidntahs&: U»*/ larum quarundam rncolis **tamiliafi** in ufu eft.

Ignave fua
lobumca
pri*.

V A R I * autcminterdum eft forma radix ilia, & Ign*mt, five JW^BW appellations **c*** U.Thoina;in(uIa),rubxqoatorefira, nonproculaprovinciitJM^fcw_ie* <:onincntc **de la** ta anno M.D.XCVI. Nam monrehoneftidimi **virWiJlelmi** Parduyn CMLS Middclburg^f **l** "nWaUclmaZclandixinfuia. dcindcdofliffimivinThobizRocliijcijiitlcfnurbisM^o **diCl** r-><iccslijbui, qu-irumnoiinu]lafpeda]cniaurampIiorem longicud! nexquaban, W*-ctiialcm aintcm craQicudtnem. vcl. ctiam quarum diametrefTctquacuor unciarum:rlff^x, quedo(JranEalcm]oiigit, HinemvixattiDgereiu, nccearum diameter bmasunciasec^xreda- rctjiiiquot ctara breviores led craffas, U in aliquot quafi breves napos infiauparte **protu- bera ntes**

ranr«,ie3asomne\$(cabro&ina:qialicctrice, utAristolochix long* legirimx radices, miiltisexjguisfibnslpriimnafceimbuspraediras; ipfaradicisfiibftannaalba, lenta, 6c jicculenca e(l,atque veluci grumofa,ccncra tamen, nee ingraci lapons (crudara cnim gu-abam)exiguoaur.em potlmomcntonumhilarperi:&acnulculi:ailaver6(nan]& guftarc vti.utcemus oblvare *poftem*) cenenor cfl caflanca ,& pyri inftar,cui grumofa fubftan-tia,edulis.Qiiatcm caulem,aut folu Ivibeat.non iotdligebanitunam umenradicem cum Bmriineactpiebam,fed vetiuraabrupto, quale in cadru cabellacum radice, quam com- mo e dru jx rbnc am,



D.TUomxinfulanostaafsa & clixa vefci intetligebam ,ejiifquerci gratia Lulltaniqui- a[n,qu]cnukosiritcum viros.ium feminas&pucroscmcrant, ut Vlyfipone pro manci- Pijsvenderenc, Iftas radices in naves intuleranc: in tuiferorumalnnncum, prxtercanuccs Suarpiam,quibuscuin radicucujufdatn farina vefcerentur. Oinnsciuccra illis naves co- dem anno in Walachciam deiatx.

SEO & aliam abeodem Willitlmocum fuperiorcaccipicbam, necforma,neccolore, ticmagnitudineruperioridifTimilcin ,quam *Igsamectiam* vocabat Lufitanus, quiillam ipfi d ibac, licec aliud genus cflc nun in ficlarecur: *fed* rot ius rad icis cortex magis inxqualis Crat, & vclutiqmbufdam cuberculisoblitus: cquibus comicsfibrar emergbant, prztrea tadix (Lunmocapitcpaullijcratrionbiis.dutifqje&pedalis five palmarislogitudmii'fibiis, feu vcius vitLCuliSjCiagna ex parte ipmolii erac prardica.Nunnulli *Team Peru*.

ARACHIONATHEOPH. *focie*,PapasPeruaiiorum.

CAP. tn.

Araclud.Thecoph.forte,Papas, radii.



ESCVLENTA etiam est radix hujusnov*, & ante paucosarmosEuroparprimum cognita: plant^vctribusumcn.meojiidicio..nonignotx.ucpoftaeexijsquatin medium pro- °remus,apparbit.

PKIMVM autrcnxcbulbofqui Apriliplerumquefcendusapudnos,nonmiturius)paii- **P»* hi- ^sdiebusaririoie,foliaprornitexacropurarcntia,villof;i,qua:deindcexplicata,v]n^M- jj^m coniraliunc colorem, quina, feprena aut plura in cadeni ala nafcentia, a Raphani fo- "I^s nonvuldeulieni.iinpan it'in per numero,incerleftisalijsminoribusfolijs,&:imparcx- *rc"iam3l.un|e,npcri)ccupante: caults pollicaricralfitudincangulofuseft, lanugine ob- ^L^as,quinosauclenosintert{mricubicJS longns, *iroXv&Xarfts*, &inmultosramosdivj-> ^longosjinficmos &ni(iridicaauralijsadm]nicu l is(uftincantur,pondrefuoincr ram pccumbentes,&laté *cfp.irgcnccs!exraraorum ahsprodeiiintpcdalescrafl,anguloli pc- diculi,denos, duodenos.autpluresiijicsiustficiuus, clegantej, uncialisamplitudinisau- majores,

Quinca. il ve Blitum majus peruianum-



Canna Indica.



Hts castanefarum aur pafinaca: in modum paratis, vefcebacur, utintcliigo, Lcgatus, ad firm an das vires, quia erac valde imbtxilte valetudine: nonminiisauccm alereputoquam caftancas & pafinacas.flatulciicas tamen cfle, propterca, ad proritandam Vcncrem, nonnullosuci Egoelixas, dcinde, epsdermideverius quamcuccpurgatus, facilinieenimccdir., & inter buns lances, naporumaut raporum pinguiorevervecis jufculomaceratasdeguiraba: &c fanenon miniis fapidas & palaro gratas deprehendebara, ipnsnapii. Crudas vcro, nirmis asperas & flatulenseile xftimo.

Q. VINVA, five BLJTVM MAIVS
Peruinum. CAP. Lin.

QVID porrd fir *Qumaa*,.cujus Petriit Cic-fajUtdiximus^cminic.tamquamtertij alimcci,quo (c luftenraot Quito incolx, opcrapreciumcficchixi, hie explicare, heccjam multoempore univcrfx Ejropae rucric vulgans, id hoc nomine ignota.

NIHIL igituraliudcit j^»/ff<^,quim majus illudBlici genus, liumanaalcitudniem interdum fupcriiSjCaulccradbjfirmo^n multosra-iXw, mosinatqualirer nafceces di vifo, vulgaris Bli:ifolijs, fedamplioribus&longioribus.fumnio caulis fastigio multas ferens fpicas, five paniculas, palmum & amplius longas, nutantes, extremâ nonnumquam partelauufculas&quodammodocriftatas, inftar coma: Amaranthi crittati, colons cocci nei obfoleioris°eneris, quas mat u rx, m u ka gran ula al ba rotu ndacoiiinereconfptciuntur. Quodgranarubra fere, numquam vidi, fed alba grana ferenlisiconcmLectorumoculisrubijcimus.

CANNA INDICA, CAP. t u n .

HVIC plants unus pritniim, deinde pluresftolones ex eadem radice prodeunt, cubiti uniusjnterdum duorum alcirudine, digin vero crafiicudinejliarundinis modo nodofit :quemcircafingulagenicula ambmntampla folia, nervofa, & firm^quidem ilia, foliorum Mufaenttar, (cd tenma.licrbaccdvirirtiratcpallefcntia, exrcemomucronata, qua, dum primumerumpunr, charracomcuculorumin moremcircumvolutaconfpiciuntur, gutlaca autcm berbaceum quendam faporeni inkio lubentjCui paulo poll nonniliilacrimon i x conjunttu deprehendi tu r: extreme cau li i, infidcc aliquo t flores, Gladioli flonibus forma non valddifTimilcSjledclegarifiiini mini] florido colore nicntes, & capiculo inhere tes cuidam liino, quod cum fuofioicnoJumaperto Suuillar fluviatilis iive marina: coftxcliclanj quodammodo refert: deciduis aucmarcidu noribuSjaugentunftacapitulajrluntqucrrianguk&moilitercchinata.capitulorumRicini tierc inftar jin quibuscontincturfcmen rotundum, Fab* veteru m, ii ve ftuflu s Loti arboris magnitudinc, plena macuritate nigerrimum : radix nodo(a, & :crafrrioribusfibrismpata, alios

icij nodos adiufcences Iubcc, qui ftolones cciara raatri fimiles profciunt.

Luficanix

ihufdaiTi monallerijs valdefrjquenrem vidcbam .fubftillicidi^adrru
iirumoflorentcajmuiicpaflimareiiicibanai/tudiolisniinHii. fi&ilibtt
omatos tras. ,raro tam en .ipud Bclgasadfrugcm pctvcnir,qu6d feroadmodum
net .LTreiflicporisiic, in in fcquentem annum (ervecur. Vienna: autem A
multisannisinfidili alcb.imus^ingulisannisfioresprofrcntem , &probum femem inter'
dura d<ftcm',licctn\$Ki adc6 mgTum , utquod incaliJvoulMisrcgiorubustKku, fed hifci
dumtaxac color is, mirificceiiam fcfc r.idice propaganrcm,a<ieb;L.t.ilteMii;>nr]ms/iftilicxi'
mercj&nqdosdivel!crecogcrernur,eararione,plurcsplantasexunaadquirentesr verutn
hieme in liypocantum feu vaporanom rectpicndacjar,&: proximo fen
acre externo per nmulas ingrediccc nonnihi! vefici poiTct/rigidions apeiri
camencTtcliiinipaticniilcnlaudemjaLirbisadfummunijLingLilisliebcJ
fnlc: a,riganda. Illudeti.i[ii!nhacpl!aiii;ioblcrv.ibaiu3 evetu(hsh)lonihus,cuai
m:ir in v.ipornriopra:fcindunajr,lacrymamcxftillart:albam , tragacanth.i.a.*rm-
hxi, RifcdOkeqa & lentam; atque inipiisfolijs ifticctiam fnefcctitibus, cene quodam
excrementum nitri (ipore.

Qyo naminc VcceriL>usdiftaftiliarplanta, roeignorarcfateoringenue.NonnulMiac
artatejquja illius Sos nondum apertus, cancri vulgo dicti chclas. forma & colorc, u:
mLJs,referar,florcncCanrinunciipariinr:alij Cannam Indicaui.quiaexAincricapiimurn
dclatafit, &ejus(ro)ones cannarunifive harundinummoddnodofifunt, appell
Iticrunt: Hifpani &c Lulitani CHF>//wdicuni;a numero, quod ex Uujusgranis jphcruLcsd
rtunicrandaspreccjidouefEjfierifblcari^nonlccusacex tenclhshiiialisarantijs.

Flor. Cantri
Cannam

LIMONIO CONGENER, C A P. LV.



Limonium

PER. E c R i N A prorfus, & elegans est hxc
plants, cujus i co no m Sc reCccatu foli m,
Lur,etiaufq;ad mcrnittebat lunnanusvirSi
diligetillimusPliarmacopacuSjCIJiidiusGo'
fiier,quiliccamea,&:confratlocalcmuti!a,
VI)4Gponc;vcluiadmcfcribcbat,accepera&
SVNT vco huicptancx;Claudio tefic) fo-
lianovem decem, autplura, a fummo radice
cnpicprodcuntia, quorijfarma, abomniut<
quasunquam viderim ftirpium foijdsiverJ*
eft, quia cava fiir.t, floru Ariftoloclna: inftar,
tomete alvo & vcluti paleari pr^dito, gibbo
dorfojinfima pane angufto, feniimci; in laxi-
tacecrefcenWjftiprem^partelaxiore&aper*
to, c]uafi(na]ieniicyt:lum format a : to tu fo-
lium • jifctaquamciiEaccunijiiiprC'
niafolij paraaperra, internemultisraftsvo*
m s ex arro pui pureisdiftin&aiinter folia pro-
dibatcaulis confracti, tic pi&ura refercbat
parsinferna:radix no valdernagiia,&inquo^
dlramosdivifa: qujles!¹ orae qui dvesfemen
proft;rar,nonfuit adfcntUjfiataki non indi^
cari,ncqie quo reinpore floresdet ,ncitatuui<
AJqu.iraporrO itirpiumclalTem hjperc-
fericdbeam,b.vrco . rbliorum earner crif-

fitudo,vcl(15 ita loqui licet) carnofitas,&: alia; quardam nptx,hie (l-re compel lum
mooijM^tlhioIigentisaIiquodreferendamcenlcam:potcritguc (mcaopinone; J.iino-
nium prrcgnnum r.anti[pcrmincuparijdonecaliud nu^ispropuum, ex cotiui plants
gntiore obfervarionc,inveniac.

fileatitcft innoftis Stirpium Obrcervationibuslocumiion]abcret,aJillir'.im Q;
Litricalcern,ejus liiftoriam rejccirous.

Limonium
ftmtium,t5<

CETBRVM, quandoquidem in Limonij Matthioli mentionem ii
jH (nirislittonbus.pndertim autem Mcditerranei,trequens[l,c
pumilum aliud genusobfervabam inultisexignisfolioli
infstar, eliiramaridicjprodconribusprxditum, inter qi
bus,elegaiitibu'qiicrlotcu!i5onu(ti". ouiraiiixbctarradtciprfimi
fiibnbri. An illiirmilcalccrumpomihLjmonijpenus,qiJod Dociiirimw Lobent
Cokciiruta (cobicrvaiJe anno M. n/ »cvi.

CAROLI CLVS I RARIORVM PLANTARVM HISTORIC

LIBER QVINTVS.



CABIOSARVM,, atiammcjuenonimlegantiumforum
Hijloria abjoluta, §lmnttm librum adgrediemur ,quemj a
Narcoticitaujpica bimus: Witfubijciemwt dcletriafacuita-
tepr&lita4 > diafque quaram folia Incifuris earumformam
imitzntur: dewdeacriguf}udoffatas, moltes praterea qua/Ham & acu-
^ta4: poflremo aUaramfirpium conger hm.

HYOSCYAMVS.

Hyofcyamusnigervulgaris.

CAP. I.

Hyofcpmus Aegyptius.



NIGER Hyorecyamui, vulgaris (InotitiTjCujushiftoria ab omnibus quiderchrb2-
ria fcripferunc efraditaiqui averddecjusflirpifalijs quibusdam gencnbus hoc capt-
te fumus a Suf, d i f l i i f i N i g i i c o n c m p ^ i p o n e t e m , & *
Albi etiam adderem, ut differentia eo facilius dignofci queant.

P M V S aut fm conifngncrum quiderc riber volumws ^ercgrinus cft. aicubiralij
al5itudinii, minimiq; digincrafllicudinis caulem adquritin horn<; firmum, molli inca-
Jjaque Imagine pnedimm. per quem hinc itidefparfa funcfolia, vulgaris folijs novalde ab-
'i l i a ^ c d m o ^ f b l i i j d v U K n u i q u e {dum ad huc ncia func) Sc
longi

H
P
ff

alis longinfulnar cunctur pcciolli. lanugin cobdufti, fultjncces longos caliccs, iuquin-
icini as fupcrnartedivi (os, in quibus flos cavus, quinq (. icafiamif^tiis; iJCquLniffo-
nftarc videatur. Cjiiorum terna (iipenora, majora & fl.ivi colorii funrjinfernaduo pal-
umbilicus nigra purpura nicens feofim cvandc Lt, cx quo quina ftaimna emcrguc pur-
puri (c nria, quorum apices Havefcmir, dcindcltlus oblongtorejufdemcoloris, initiore-
" u S d i n d : fl o n d c c i i u o fuccedunt bullacacapuula, (cmiaexili, inftar vlea-
aspicua.

Animadvertcbar porrdin hac planta Hogelandus, omnes ramos protuliflc flores Soli ad-
• vcrfbs, vcrum, quoni marcidi eflent, illtaverfos, uicacaulis partequa; Septencrioncm
af picrcc.

DE Hyofcyami Peruani utriufque gcncrc, inr>offris adcaput dc Tabaco / c liolijs, lib. *Bftfyt**.
Nicolai Momrdisc Medicament. itmplicibusex Occidcuali Indi adclaci Sjfatis abunde '*»»»*
loquut Ifimus.

CTI" £ K v M i, V) tlawof Gra. 'ci, Apollinarem & fabam fuillam Lacini, Iufquamum Of- <<<>>*.
ficuar, Itfqnimo It. ih, FeU'w Hilpani, Vaisdjnt Galli, PiLrones vero & ATidcg. i venfes, ver-
fjaculo (brmorie, /' tferbeaux u?nts, quafi dicas hcrbam adverfus prunginem: lolent enim
jllarum Provincktruin rufctie iftam plantain jam maniram, &: feniinconuilam, incamino
'uipciiikrcjdeinde liicmc cii ill is maris frigore tument, citinoscjus carbon i bus iniprcgc-
re, fumu mque exliancem mambus excipere: iflo enim vapor non modo tolhnir W-
uum tumor, fed etiam prarigo illa molefta, frigore contracta ut me docuit CLV Lufephus
Scaliger, magni illms lu'ij Sc'aligne F. ^Bull Ek<t Germani, ^Bilvi EroptBrabanci appellanc
hanc plantam, Vngiri Bdend; <ux vox Hifpanica: vaide affinis.

HYQSCYAMVS omnis refrigerat / oponfc i cll, & dolores fedat: adverfus acres calidifque F*c<liMia,
^fiucivHics oculorum aitarii mque parciom prodeft: fanguinis erupnoncs & mulicbna
P'o3uvia coropeii: it, & ad testium aliarumque parcium inflinimauones adhibetur.

SOLANVM SOMNIFERVM.

C A P. II.



HVi c Sohno piures ex eadem radice pro- *Solanum som-*
Jeuntcault Sj Cubitales aut arripiiores, fa- **'ferim -*
tis craffi, rocundi, in aliquot ramos candican-
tes &: lanuginofbs divifi: quibus inharrent nu-
microfa folia bina (emper ex ad verfo lira, mali
cotonei folia fimilia denfi mollia, lanu ino-
(a, Sfguttu aliquantulum catida: flores terni
aut quacerni in cer folia; pallidi, longiufculj,
quadrifariam divifi. caules & iramos ambiunc,
quibus fitcedit acini, in molli lanugine pube-
fccncibus folliculis, maturitate vel rubricolo-
ris, vel x rubrocrocei: radix fibrcflonga, craff-
fa, dura, fufcicoloris cor: icedonata.

Naftentem videbam hanc plantam in infe- *Natalis,*
riore arce urbis Malac3c, vulgo *Malaga* didx,
ad mare Mediterraneum in Hifpania iitar, lo-
cetrofo, &: inter rudera: florentctn & femc
mature pr^ditam Februario Jtic vivacem,
& plures annos perdurare certi] (n cftmam Co-

D I O S C. ^pt'yvoy bTrrurixfo & a^nUtXaCof *N. m. m.*
appellat: Thieopliraftus Af ymnirrei Sw: La-
tini Solanum Ibmnicrum. Plinius ctiam Ha-
licacabii [nvoat & Morion. Malaccnfes Or-
Vitt diccbanc.

R A D I c i s corr. cx, tefte Diofcoride, in vi- r<r<.


^o idraclima; pondere potus, fomnificam vim habet, Papaveris fucco mirtorem, & ejus
^^ usve bementern rinamcit VenJoijUCr^ Plinips. aoxiliacjtis non functai fUj ut ijs
co tnm memorandis diu (iusii) liircndum fit, pra: lertim tantacopia innoxio rnm.

SOL. ASI porT dgen mtilu 1 quod lethale vocant, & Theophrasti Mandragoras fcl, a ^ *Lech,*
quibus am non inepte forte cenfetur, apud vulgus Italarum *Beffa donna* nomen obtinuit, *m Tbtpk,*
d
H H apud

Mandragora femina.



Apocymra Syrucum.



decre mctini , nee de frmne qut dem, quod ex Hifpanijs defcrebam, germ mare unquam *voiuu*.- uc nee inAufna, quod aliquotiej ex Italia poftea accipiebam.

MoteJpajiptic UtAac Graccisdicirur, &c&ptfm*iat atoliorum La^ucx 1L rmlcudiic. LatimsMartdragorasniger& femina.

HA B fcx MancJragoras, ot ftripfitGalenuslibrov 11. Simpl. medic, vincntcm faculiarem rcfrigratonam, adcout tciuj ficordJniscrfrigramium ; in pomis nonnihl calons & humidicatis ineffcaic^ proinde foporem conoliandi vim habfrci&radiciscorticcmjCuoifie valentirtinn.is, non tancum rcfrigeurfd&dfi ccare.

Mandragora
femina
Mandragora
niger
Temperamentum.

APOCYNVM SYRIACTM

font. CAP. mi.

PRIMO Libro non incommode repom potuifler halc Stitps, capitede Apocyno, (i frutex cflit loogu Viciculis prsdicus, quas Diolcondes Si Plinius Apocyno inbuunt, licee iiederacco non fitfotio Cum aurem multas nocas habcat Apocyno non difparcs, nori incpte, meojudicio *Apocynatn* nuncuparepotenraus five Syriacum, five Palzttinum, Sc forte ctiam ^Egypttatum: quandoqdidem in ^Egypto, ut poitca dicemus.cretcu.

AssvitciT autcm , rrfcrente *Afmy** Do&iffimo viroChriftophora Wei-Syr, *Xto Medico* {qui illaro area HicriconifcentcmadnLimcnlordanen] obfervabat & legtbar} adduoruni cubitonjm, vel ttiam ariiplorem altitudinem.(jt)srra{To flolone, in aliquot ramos divifo, quimuito (ucco ex candido pailefcnte abundant. Quatum vero ex reficcatx plants: parre { qium iple Weixius ex Aegyptnaca, Synata, & Co.nflantino* nolitana pergrinatione redux^mili Vienna: Auftnx communicabat cum uno frudu, & alijs exoticis} colligereporui, ftnarocfteaule, cui afcrnatim bina fimper, concrarijs inter fe pediculis innafcuntir folia, fatis magna, craffa, t£ quotiam modo *cuzacca*, ex viridi pallccntia, aliquot nervis, ex mediacofta laticrafiacfc fpargentibus, prardi/obcufo mucrone, gnivis odoris.ee-

HH i tis.ee-

ris, tenella folia extremis ramis adnascentia prorsus incana sunt: ex foliorum ali, alter. natim emergunt. crassi & longi ramuli b... tiolis innitentes, unico quid... fo, instar florum Apocyni... cere licebat, foris pallesecedunt singulares, binæ, aut ternæ crassæ, incurvæ, binas uncias lonhiscentibus, sub summâ siliquæ cute, inclusa apparent membranacifrequentia & quasi imbricatim disposita grana plant, qualia fere Asclepiadis, & Apocyni vulgaris semina, quorum extremæ & angustiori parti inhæret candidissima & mollissima quædam villosa materia.

Beidfar.

Sine perennis an non, nihil affirmare possum. Qualem autem à Weixio accipiebam plantam, ut commodius describere possem, paululum in aquâ macerabam, deinde crassâ minervâ delineabam, observatâ in fructu addito eâ proportione, ut dimidio minorem exprimerem, quàm ille qui à Weixio mihi donatus. *Beidjar* autem ab incolis appellari dicebat.

Beidfar.

Non dubium est quin ea sit, quam doctissimus vir Prosper Alpinus Medicus cap. xxv. Libri quem de Plantis Ægyptiacis evulgavit, & circa Alexandriam Ægypti observatam de rucosam, multis stolonibus ab radice rectis, sursum ad duofese attolentem, folijs longis, latis, crassis, & candidis, parva, lata, Scmanum fructum habeat in quo lanugo, & semina

Facultatem.

Est autem facultates esse ait, ut folia contum apponantur, frigidis tumoribus & doloribus: que tamquam esca idonea & pabulo, ad ignitatur: lacteum ejus succum calidissimum & exurentis facultatis esse, quæ plerique quibusdam valis excipiant ad depilanda coria, nam dani. Lac quoque puzanter corpora solvere, dysentericos autem fluxus lethales facere: præstant poris maculatos si eo partes illinantur.

DE hac porro p quâ multa diligentissimi Tertiam ad me epistolam, in

HACH*L IKDI, sIVE ADMIRABILIS PERVANA.

CAPVT T.

fiff*

H VIVS Stirpis iconem ante aliquot annos dabam, atque qualemcumque historiam adumbrabam in Notis ad Aromatum Garcie Historiam, paulò post quàm nostræ Europæ innotuit. Eam postea in Pannonicarum Stirpium Observationibus auctiorem fabricabam. Nunc licet ad eò vulgaris sit notitiæ, ut nullus ferè sit hortus, in quo culta non reperitur, etiam à rei herbariæ imperitis, ob florum elegantiam: ejus tamen descriptionem hoc loco repetemus, nonnullis additis, quæ interea circa illam observavimus.

Admirabilis versicoloris. fl ora.

PRIMUM igitur emergit Ocy... Luterianæ ferè modo: deinde ca... interduam ampliorem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flavescentem, frequenter, uti Balsaminæ feminæ caulis, geniculatum, & in multos ramos, eòsdem verso o... partem g, q pntnum t. nentes, hoc est, uctertiuj, quintus dxtus, & octavus (si modò tot primarijs ramis planta sit natur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis binascentia, Siliqualtri folijs pæne similia, viridia, satis carnosa, succulenta, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliqualtri gravem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, longi, concavi, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci floribus non valde dissimiles, non tamen in mucronatos angulos, ut illi, definentes, sed in obtusos, Convoluoli florum instar, Tabaci etiam floribus ampliores, elegantissima interdum purpurâ, sive kermesino colore nitentes, nonnumquam lateritij, aliquando flavi,

sffi

polfemus, Sr com peri mus exrubriflorisfenuicnulhsaliasftirfcsprognatasj quam « oox rubros flores darcnt,

Admirabilis
flaviflora
atrorub.
inflert.

* Idem penculunifecitnusdegranisfiavorlorcgrriitis[^]uibusprovncireobffT^uvavim^{is})
qu[^]uitllosaliosftoresdarent[^]uim fl.ivos:finiil(.cinmdcalborumfloriim femm. factual
periculum. exquon.itzp! iir.t, albosqwdcm initio florcscdederunc: fcdquifuii Auruin-
num prim tun expitcabantur doorum colotum evadtbnE,cotnmilttis in code ni florcaalbo
&:purporco,minustimenquam in verljcoloreprimumdciwripM,

Illud prxcerta obfervabam in ifiadiftinda lliuonc, exfolis plans rubra: femine natis,fta-
timabcsortusinitioagnofc) potTcjquosflorcsciint'acura,: exyerficulorum auceir;, flavo-
rum Sealborum (ernincprovenicntibus.nullumcerruniindicium, amixnm *iiaiUtx*, m-
mipotrc,quataejufdem omncsiunccolonsia i

nt.
tafru'a ttilTo.

AdmirabilisPeruanaalboflo.



A L i v D porrd Rubw genus mihi Vicfl-
Dacnatum,JemioceX Iraiiaallato *Lifmiit* ">f*
y?,hoccl,i.iiiiini ntbrl nomine: in i^uchilibus
quidem natiplanr; . pulilla & humiles erit,
late nihiotninus ramos fundentes: qux au-
te in horto *lktx*, fuperiori genen rol 101 Ho-
rtsgrcntilongeampliores , &cljtiiTime ra*
mosfparcncs,eacdm lncquain fufradc-
fcryptisalternatim nafcentes, cundc'mqjor-
dincm (cruaccs, ut videlicctalccmis in idfD
Jams temper vergerencatqucfpe&arenr,ip>
iimihtercum (iiocauleadmodum fiicculen¹
ti.&fccquentibusnodisfivcgeniculispredi-
ii,atquc magna ex pat Cc pitrpurafcenics: fo-
lia in hocgenrcrmagisatrajmagisipltndc
tia,interdum maj p,altera parte magis pro-
cniuk, &infcnsluum exorcum in nevo
habentia J. p. l. tamen cum fu erioibus &
uduns, & fapons: tlorsc alijs forma pares,
demqjtnodocx poftrcmarum alarum fiuu-
bus nafcenrcs,oblongiores tamc.tcnmorcSj
iEicolorcdiluciusrulicnt[^]xtremaetiapar-
tc minusampli , fcx finiiJitrcftaminulacu¹¹
filoinmeditulliocontirtntcs, fuavemque
odorem lpirantes: ft me in taliculis rubr>
alterifimltr.hocclt.angulofum &ctubercul*
obficum,fcd brevius&magiscrafTum: radix
etiam brevior Sc craifior akra, interdum io
binosauttrntJsramoscraflToscivifa.

Magis ferocina c(l rdiqvis,& iiiiLj fblc val-
deapneum habeat, vixadfrugem pervem*
infgidionbusrcgionibus. Exradicibusta*
mcn.pcr hicmem in fidtiti, ficca terra plcni
confervatisbco calido,plantas Vienna: liabui,oua: inaturii femcn protulcruc: fed ciirn p^{ct}
nicamabrcntiam.ckhortonoctTcncnitificvailjahicncanni M.D.xxvico^urruptjtiuiti
ic genus illudmihiintcridic;Lugdunivcr6apudBaravosfemincpercgrca[:cepto,dcnud
natum M. D.XCV. Sedilludmirum in omnibus his plantis Sc obfervarione dignunii
quod ,ciim rablccreincipium:,prjmm folia, deinJc incegri ramorum articuli Cmul dc*
ddant, & circa nudos jam rcmanctesnudos, Candida quxdamcfllorefcncntiamcrduni
adnafcatur, quxcmporislbcccfTuconcrcta, falisguftum referat: cujuspofbembz n[^]*
C.V.D.loacInmusCamcrariuspro noftraamicitiaprimus me admonnr.

Namita.

CETERVM peregrina&: veinjiUhraplanta.varia.prore[^]ionumdivrcfitatcobn'nuit^{10*}
mina: etenim cxHifpanijsrcmtn primu mtflum cfttoirdtflj* detPr*appcllvione , p²⁰,
per p i m i b i l i m f i d t i i d c u f * v a r e t a m 4 » n r o m e n n i t u t e x
Italianunclndici,nuc Mcxicani L*/WH>/nomineobfuave videlicetejusflor
Bclgx *SeUrmmodertftum*, a folioru cum Solani folijsfimilkudinc, &Eriorum otloris
vocarunt: *Pegu* [lips agii] bus in i i f c m c a d H i r r a n e s p e r c a i t , H v r f f (* W W c r a r g a & l > p¹¹
to formatapronunriat[oncnominarcintcllgo:MulLrcul[^]Viennenfcs,flpudqLas etiam¹⁰
dclici)seil,&cfif)ct(f3nbt*nifici)tHvmlid eft, vctliculorcs Indicosfloresnuncupanr.

Hachif indl.

AM apud quos fponc nafconcur hx ftirpes,medico in ulu finr,nondi.i intcllcximus;n¹²?
auteleganria:,&hortosfuavcnuftarccxornadica^u5a,abomnibiisaItarbicror,ouati
tatutn utionc.Scnebb.it tamed me Patavio ufq. amplift, vir iacobusAntonms Cortii^{ms}
ejus,qu«variocfllorc,radicisbinasdrachmasinttisfLimtas,cf;rcgica(.iuascduccTe. An
fir,nullu fcci penculum:hcrbaru tamc[^]ognitione lcfc oblcflatcsdc cart adraoncre vo^{ulp}

PAPAVER CſtRNICVt ATVM.

CAP. yi.

PRAETER vulgare corniculatum Papaver quod flavo est flore, & omnibus man fl mis
 «i., ... of Ifomm reo.onmi, (poinenalcicur-duoaliagcneraoblervabam abaj7,7 P*^1" v^{est}.
 glance mePlantarom Hillarum ferip(er_{un}) nondum produa. *U)S, TMfc
 PapavercornicuUcum flavofb. Papavercorr.utum pLcc_niccoflc.



V T M folio e(l,Erucx foliorum inf^{ar}.iaciniaro & alee- incifbj vulgar! minore, tenuio-
 *inon ad6 incano, fed hirftiCo:caules rnterdum vulgari non minoresjicnciores tamen &
 ^cilioresprocumbi-ntincerram: Horesquatuorctiam folijsconflantes, minores, noif-
 f^{an}iq uam intenfo colors rubent,&illi prim funt,quos planta Horerc incipiensproduci:,
 interdum langu idirej;&quodarnitiodopali.ritccolorc .medijsfbLJ.adphcDiccum ten-
 dentibus,qualis fere in altero florisgenere quii vulgo herbariorum AdonisHos dicitur,ni-
 miram quando mediam atatem tuperas planta jam dehete incipit, & mituta illa in cau-
 le & folijs dilabi: alioqui si quis vigentem & flores pnnium producentem plantam con-
 S^rciar.deindejimad-
 r^{at}ia,vel gljhritiafacilequisdiverfasctfestirpesfjbi perfuade.it, atque utverum fatcar:
 jJ taihi,duiu S.ilnian[ic -viverem,impofuit:prarJongaaircmflonbus(ucccduncornic-
 "jCluibusinfidentaliufculaquardam vcluti operculavel capita, fallen in his nigrum , ru-
 °fum, Papavere raajus:radix ionga eft,alba, (aricrafTa, & inramos interdum divia,3, qu
 "nicnperennis nonfi.fed plerumqueprolato femine, perire fequciuc hieme foler.
 Nafcitur agro Salmanrit:(i fecundiim vias&agrorum marginibus, ubi florbar Junio,
 f^{em}en utcm Julioproferebat. In Belgicaratum .nonnifi Augullo&Septembri florere
 v^ouit,i[Kerdu m etiam fenus,nec nifi alteroa (acioneanno,ut plurimum.Vienneni etiam
 *S^o,& per Mora viam atque Bohemiam (pontc nafcens etiam obfervabam & flores pro-
 crens Junio mense, inarvisavenaconfitis, prserferim (Lcuiidim viaspublicas. Omni bus
 •"tern ij^a loeiscroccum in illaplanta fiicum videreniilii non contigic; ramctfiioude-
 "nciquilimili fuccoturgerccamplantam putent.
 r ALTERI foliafuncniltomi[iora,tencr[ora,valdcmini]rimdifl'c<5.i,noncandicantia,
 fed viridia: c;mliculi tenclli/ubliirTun: flos fuperioit non minor, quaruorctiam folijs con-
 ^coloris ex purpurcocarruler exfaturati, &: nigrx violi pxnezmuli, fugax admodum,
 &qu•laevifrii aur(iexaititur: huicfuccedunt cornicuhdigitali duntaxat Id mc
 pltiicaipicrumquccrianjlucviorj.cxilia^uriulculajrigido,fcquclirliatiaprTditnjnqui-
 HUcontinctLirfcmvaldcxilc,colorisexcincraconigricanc«: radix termiseft ic inu-
 ""s.nec fupraannuum fp.nium perdarat.

Iavenicur



It trait i.

Invenitur hoc multis Hispani¹ locis, sed non nisi inter fruges: Maio mensis floret. Apud B. Gasracum. multo ferius. Sed quod tardum admodum germinat, tamen. & in Aufstnanon- nullu horcis fatum. f. emendat frogem pervctiir, S; in terrain iponte deadens, novas plants* prquodcit: sed longd minor «3irenciores, quim ubi inatvislpontenalcirur, quod contra e<remfolec in rciiqii TernincHifpanico tiatis, quKplcrurpcjUcobmuhtalioieticopiarr¹ frigidior enioiLruincocloj&humidiorc ff)!o, valdcad6lefcunt. Memmetiamolim coll" gereagroNarbonenfiinagrisavenaconficis, nonprocut Laccra, {ccundiim HmncnLc- dtim.paulo infra MompelTium.

Herma.

GR £. c i s hxcPlania/umuwxffBTms.LacinisPapavercorniculatumdicicur. Nornen vulgare nonintcllxi: Castellani tamen, genusillud quod C^TUICOLive violaccoeft flore» JEij/rt/*, nonnulli ^Amap»latmoraiia^At% Papaverraticum purpureoflore, Sfucci rn^o rorun^colnrcappellabant: nans erraecum papaver, Hifpanirf«w^*» vocauc. Mompcli* m.cumapudcos vivebam, inter Anemonesrcfercbant.

ItmtiUii.

pAp^vtRii autem ccratitiradicivimeaniinefTcDiofcoridcsttadit, utina qu3 deco- fti3ddimidias,coxendicum&jocinorisarTefl;usporu(aiiet, proficque his quit f a n ^ dam.afpera, autarancofacu in toiorcddunt; femcnlcnicralvLinipiirgaic, acciabulo^o aquamulsi pocoreruftasenriarginarciliitacxoIcofoliajfloicfquejKargcmaacnubCUW¹ jumentorum perunaas.abllergc.

PA P A V E R , S P I N O S V M .

C A P . V I t .

ffim.

PERELEGANS & plane novum est hoc Papavcris genus, nemini. quodfciam, --huo defcripcum . Cubiralc m veroaut amplioremadquintcaulem (p!ancarnaiHemq^{ual}? apud Ioannem Miilcrum Pharmacopiutn Francofurtenfcm in horto pcnfili uacm^{vij}!> defenbo) digitaliscraditjdmis.rocundum, infernicandicantem, quibuldam (pinisobft- tum,perquern ltiordinacanarcunturfolia.nuHopedicuioilliinlifrenriajfed mediupi^v*O' dam m odo atTiplchccitia, fmuofa & C lac mi is aliquot divUa, ipCu be uu)s& crems oras folio* rumambiencibusinfpinasdefincntibitis.tnferncanefccenna, fuperne viridiaj a!bi^{tran1}<r(i venis per foltorum&laciniarum longitudinem cscurrentibiis, intlar foliorum Cardu B.Minxvulgonuricnpati.miniisautcmampla:-ex liommalis nafcunrurrami (pn- nilibustolijspriediti.lcdmioribuSjinquoHim&cailtsr.irtigionarcituicapituliioi 111110- pularc.rninatorum in ttes majores firnjoic'clqtic fpinas delina, quo dchifcCDCC 6cdeflyCD* i flos to.

Papaver spinosum.



Hypocotyl legirimumu.

flos fese ostendit fenis folijs confam coloris flavis; Corniculati papaveris vulgans floris instar, odorem Chelidoni; majoris quodammodo referens, caducus admodum, in cibus medio se fe exerit capitulum spinosum peragortum, mulcis (tam inibus flavis id ambicibus, quod fannapartrubescit diti i cencillum elt, marurum verb Sc vetustum nigricat, & pollicaris ctra flit Lidinis sefucialis longitudinis, frequentibus firmisque Y spinis obitum, femina continens rotunda, rugosa, nigra, feminis Papaveris ceratitris m bello florinstar, cui Sc per flum luber radice m: qij xan vivax fit. me later. Totaplanta riavfcentc (ucco. instar Chelidoni] majoris. abundat. Florbac Iuho & Auguftaj nno M BXCIII.

Hvius pbnt? capitulum reficcatum cum paucis femine, Londinofque primad mer Bittebat Ucobus Garctus junior. nallo addiro nomine: nam cum alijs reb JS navi alatis accepit. Id rmenter x commiilum, nongerminavit: quod vero Londino attulit Ioachimus, magni illius loachuni N. Ioachimi atchiari Noribergenfi F. Camcrarius anno M D XCII, iticeodem annotuni, fertile fuit, & hancquam de feribopl. in rafh protulit. Notn in abacautem *Fict atita** *firt* > «\wz est, Ficum infcma Jcm.

HYPICOVM LEGITI-
WVM. C A f • V I I T.



FOLIA sunt huic plants mulcis incifuris divisa, figura, to! ore, & apcllu Ruta: folijs valde finilia, molliora tamen, & interdum longiora: cauliculi aliquot, qui in multos ramulos divili, pufilis floribus onusti funt fl. iuis, (atisodoraci? / cnisfb! ijs confra tibus, fed miranda figura, & a reliquis floribus diversa: nam duo folia h. ibct reitjuis mftjora, nrvovindiforis extremaparcc [qui obrufior est, & vcluti comprcifa) prxdira, quatuor alia per exigua (unt, & vix, niliflote expanfo, conlpicua: cornicula fuccedunt in fingulis ramulis quarerna, aut plur. i, longa, plana, articulu di Gintla, & falcis inftr incurva: ferocnm fingulis internodijs nigricans, longiufulum, quod dif Hculter admodum eximiporeft, continent! a: radix fingularis» fubriivj. interdmn bih Ja. annua tamen, nec Vvax; tota plaiua ingrati admodum fapons.

Pnmiimiftain plaiuaniobfervnbii in Gullia Narbonenfi anno M O L J i. fupra Ncmaufum urbem. inter Aimargues S; Vovcr, Arelatenfi itinerc rdc inde valde copiofam inter fegetes, agro Salmanricenfi. totaque Cartella, Granatenfi iccm Murcianotjuc Rr^no. Florebat iflic Martio & Apnhjcmcn Maio maturum erat. Apud Bc! gas & Vicnncnfes fata, provcnic quidem, ied longctenrior, quam ubi f pontcnafcitur. vduci pa paver illud coinicu Utum violacco fl Qrc. cujus paulo ante

Hypocotyl
"«"•"
Natalis

xcvj GAROLI CLVSI RARIORVM

ante nieminimus: (eriusctiam fiortbat: Icoicntamen plcrumquac plenaci nuturirate pencmtbar.

Remina:


C v M initio hanc plantam obfervabam, ilicse mihi vifa est ad Hypccoi hiftoriam plun-
 mum accederc,quo<i GraciS(N<ltoc) kwòQio* dicitur: & ccertc null a mihi haflenuscoJpC'
 ttj.ttnmillarumquac hoc nomine a Rci herbaria; Icriproribusproponiirur ,qxadDio*
 feaudiiHypecoummagisaccdatjaitaquiticmopinione, NondtiunttameDjquisdCu-
 IVLUU (ilveftrealterua) Diofcondidclncpum icferremalintjicctfacilitatesfintdifliffi*
 lcs. Vocaiurautem ha:cGrAnatcnUbus& Murrianis caddy,

D i O k C U K i D i , Ptiio, Galeno, nauraejuscademquxPapavcmfucco.

ACONITVM LYCOCTQNVN,

C A P. IX.

Aconi turn lycodlon. vulg.luieo flo. Aconitam lycoft.flo,Dclphinij i Silefiac.



imltjiri-

P R ^ T E R vulgare Aconitum Lycoftonum,quodplerifque Aufirix&r ^{Striz monti-}
 bus umbrofis fponceprovehitfr^fertim ver6quodain jupo fupra Pctclftorfad Sept^f
 trionem obycrfo, fecundo fere a Vienna miiari, ubi copiofi/Hmc) variaalia nafcn^{tur}
 jfdem ProvinrijsLycotSonigenera.nufquam alibi mihiconfpcla,qmomi3 hocnon^a
 capite Qiiinti Libn defcribemus, nonnullietiam additis, qua?, iliunde mifla,in^{no r}
 aluimus. Ini:io autem,vulgarisflorelutoiconcmpra-fipenrtam cenfoim us,ur tahto fi^{i r}
 Jiusteliq uorum ab eo diaerntar obfervari pfit p r j m e h d c a a b i m u s i l l u s p e r e g r a -
 ni.quodfoliorumfimilitudine'maximcifJrrelponrfcc.&floriimelegantia i figne est.

L. B. B. B.
 fl. Delphinij
 varietas, Sile-
 fiae.

CvBTALi iguaurautamplioreafjrgitperegrinuillud Pirinum genus cable, firmo, ^{lavi,}
 incuscaro.fonsexpiHpuravirefccnr&rqttatifarina?pollinleviterafrefro.ii vccoco ^{lo,}
 risflott, quin prnms.& pTeriique ali]Sfmflibus .Tuliparnmquefolijs&caule, ^{rxl di, m}
 mano tifxis clucefcit, Icvidimbque tafu dnergitq folia longis pdiculis innxrfna > ^{n,}
 ordinarcaulemambiuntjDn^cabejiisLvTochimi.quodflurcDclphini? vulgocopon^l
 natur.cujuiqueiconem huic (ubijcicius.ft)ij^l;diverra,ubliiT(tita,ni!nonbiJsquc& ^{minus}
 profundvs incifbtvsdivifa, LycoQoni lutep ^vl pallido fiore folijsfamilia»(uperc ^{tamen}
 inagisatra:llimum caulem exornar oblonga fiotum fpica,quipedtculis i ^l
 qh a p i a n t u r , l f t l a c e r f a a r m ! p (c u l s r s i i d i s & i n t e r e s a n t e


1

ispurpurcilque, interne Ixvibus&elegannffiaio exrulco colore prarditis, colorq; e vindi pallefcente: aedium florum occupanquacuorali a foliola fusca & nigrcamia, quorum bina iupenora jfura, & quasi in vnuni coeuncia. fornicem referunt, duo alia mferne propendnr. niolJiora, teo partim villo. parcim atbo hirsuta, mu !tis **ftaminibus capillateis** lubtus **dditefcftibus:** ^culTo florifiiccdunt trigoi. ia filiquofacapita fimulcoiixreciaut in alijs Aconitis, mqui busiemcniniquale. fufcum. rugolum: radix cranaj tubcracea. inftradicisaltcius Lyco-

lcn! f)tmiltstcnuibLis, ru!iginos3qielanugin^pubc(ccncLbus "libris pradira, ad cujus latera 'cctin<jum inhmm caulm, (ingulis annis novagerminare pii-)ant. Nafcinirreference doctiilimo viro Achille Cromero Medico, qui cjus plantas anno *****O.LXXvii. Viennara Auftriad nosmittbat, ftcquer<in** inoocibusterritonj Frcywal- piKlsmSilclia. & abincolisayoirwurt.j/hoc cft, Lupinaradix appellatur, ubi iti tricubita- f minterdijma [ticudinmexcrercrc & Auguftoflorcreaiebatj quod ab occrtcmif Tura, ¹⁰ liorto colgbamus Vienna: [**unio** Moe bat) & Icfquicu bitaltm akitudincm prinio amio non fupcravit, ac fubfequentibus bicubitalcm, aut majorem attingit.

Aconit. Lycoft. flo. DcIphinj n.

Aconit. Lycoifl. nn. Tauricmi!



Hv , c fubiicimus v a W i n Belgicishortisgenus illud Lycoaoni flore Delplumjal-

P F o u l Secundopcregrmo. five Quarto Lycoaono emergununcunt Vere fatiscraf. f* • quinque **ioafuris** ofque ad fum mura pediculu m divifa, & in multas dc inde profundas •acitias diffeaa minustamenqaam Napellivulgaris folia, acravindicate fupcmc-prardica, ^{no} nmferne ucrimquctmncfnplcndcniiaiqu Kalccrnatimecaulctiiambiunt, tenuiusali- ^antmncifa/unr coderntamcnnio Aofplcndeni: caulupufentalis. autlerqwcubitalis ^{le}>utuque fir, ius, mcdiillofus, la; vis, rplcndens, fupernaparc in aliquot ramos dmdictir, ^uco flo<s ferentes. viil^ans Napelli Boribus ftwma Cm iles, ctiatuor? idelicctfolijs con- ft-intes & h m l i c a r i l s N a t o g e n t a e c o l o r a v i b l a r u c u d f i g n a t o g a m i n i f i f e c c d u n c ^ i n d e q u e m a d m o d u t n m v u l g a r i . t I a c o r n i c u l a f u f c a . a n g u l o f i i i i i . r u g o l u a i . n i g r i c a n s f B - m K , i **continentia. 7 adix xigui** rupi magnitudine, mulus longis hbns, tenui, fuhginouque *»**lonslaugine** pubefcentibuspr^ditacft, inlatenbusahofamilcsnapospromccs, qui ***igulisannisnovosferccntescaul<piofi:runt.**

Irivcaitur in Tauricis montiumjujjs, non proculiSalisburgo, in qmbusflorcE Iulio, in **adds**

Natalis.


Lutetia. fl. Delib. pur- purasc. fl. 11. Iquod jua- can Tauric.

Natalis.

cuhis verd muUo maturius;imo reliquis Lycofloni gencnbus pncocius, ccaipc MaiC, terduro menle.

AcomcumLycofl.v.Ncubergcnfe.

i AconicXycoci.vi.Napellusvulgar.



111.
Lycobonum
Nimbergi.

LATIORA vulgimNapello liabct Tertiumgenus peregrinum, five Lycoclonnm *Quin-*
torn, folia, licet iimtlcerincifa&Iaciniata, magisatrahmiliter&fpIctaicntta.caulcin r-
ftun^firmuin.rotundum.triura imcrdum cubkorum altitudincsequancem ,&in 0***
tos tamlostuperiovc parte fxpcnumciodwilum.^u^ flotes.tpitac mftat co>gcfos,fcf unt>
colorepurpureos.Napelli vulgarisfloribusplant-refpondentes ,hoc est, quatuor folijs con-
stantes
occulncti^amiiiuinramcn media congeries magis fu (ca ell.-Horum fpica i
Ic na(cens,rliquis oblongior e(t,& magis cxpanfaringulis flonbus terna fucciiuiK *COT*
cub.iiicrdum quaterna&: quina in caput unum congefca, Icmcn atnim & icurquak co^
tiiiciuairadixilli volgans Napelliinfhc, parvonapoiimilis, cm iniacenbusadherent i^l
napi fibrifpr^diri.quLbuscprofin^sc.

Napello.

Crefcit in montis NeubergDucacus Scirisjugo, ad vaccarunijfticiftivismcnfibuspJ*
JiicntiumJUBula. Floret pauldpoftvulgarctii.vsJtlicct Iulio.

Napello
vulg.
Napello.

VVLGAIUS porr6N;ipcllns frquentiflimuscftinSncalbcn,&:aliorumquorund-i^h
monciimiugiS U biternisilHsiftLvis mufib&ALg& All^varc ^1,1,3
ftabula h abencinqhoftcredpiamurjfic ut fimipinguedinc,& hubuli ftercoris illa elu-
vicjeum prarcedente dcleflari vidcatur.

1111.
Lycobonum
Lycobonum.

MEDIVM quodammodo incervulgarcmKlapellum , & genus Aconiti ill *utnprxcC'*
dt:ii5,Lvcoftom Qaarcum peregrinum gcnus, five ordine Septimum c(t: folia ennn iH^slln
milimaobtinct.ciulii inter illosmcdius.infirmiortamcn.&ruperna pane ahquantulJf>
mitan5:floresur,riufciucHoribusprofufrefponderenc, niticadisrupraquatuorfoliaemi-
nens, magis rublcv^aretur&hiarctjroftroqucmigismucronatocfTciifemina ID terniscor-
niculisifimul junitisiimilia: radixeriam non muitum vanar.

Napello.

MitTumfntViciinamhocgenusaC.V. D. Scopiop.m.cLincsanismontibuseruttimf
quod poftca in hortocum re!iflms gencribus aluimus. Floret cum fopcrioribus, 3Ut pa**
loenam fends. Prosiinc accede re vidctur ad id Aconitum(ii ex iconejudtcjumferrelitci/
quod Martliiokss (cpamo loco depingit.

1111.
Lycobonum
Lycobonum.

THIVM nmimnquani cubitorum almudine aflurgit Quintwm genus pcregrinum
dve OAavum Lyco&onnm.c.iuie tauten factsgracili, rocundo,fupenoreparrec in multos
ramosdivito Scnuance:lummo caule lonpra riorum rpicamfert^ycoiiic
gata

Acoaii.LycocYx .Thora Italics.

Anthoia

vulgam.



dtlutiorem habet c, nee ejus galea, licet ceteris akior, ad Sexti peregri ni floris longituS^{ca} & amplitudine macedonic. Erit autem nobis Lycoconi Decifium genus.

•it.

Vbercimnaficur ad Monslerium Neuberg, fecundatorrenremqui MonafcrioW alluir, & proximcaiti (num ilium Ucum. magno Germanico miliari fupra Gatningaffi, i«») Zehofvillitn (quxab' pfolacunomcnrumpfitjfitum. Floret Hic Augufto.

Forfitan Aeoniturn O^avum Macthiolicrit, malcedepiflum.

•it. *Synonyma*

SHPTIMI peregrini .five Lycofltoni Vndecimifblia, media quodammodo funt int<*> Thora: IraJicE, fcTcttij generis peregrini folia, Thorat quidctn Italics foliorii quafi xtnu; la, non nihil umen ad Tertij generis peregrini folium formam acccedentia, nee Nstn> nusampla, atriviriditarerplendentalupcnc: caulLsillibicubitalis, cra {ruj, firmi)s, (triãtitf> Yirc(ccns&(plcndes, rLimmoftagioflorum fpicim. Tertio peregrinogenri fere fimilen* gcftins; q uibus etiam liicedunc pares filiqux feu capita, & fimile ienien: radix ill] us ctiam radici par, pccrnnis, & mulcisad latera adnads fe pro pagans

Alofaamus hoc genus in Belgicã, a Pccro dc Ouerfbaetediligeci Pharmacopola Bmx<< Jenfiprimuincommunicatun)jdeindemeadopra Viennamde]aturn, Cjusurbisclcganior- rcfhorrosornarccocpit. Florebacfnis, neinpe Augufto, camobcauiam Napellum Au* tumnale appellare fblebamus.

IHiLisonmeiniflem, ailianoflnsBcIgtf, qaiStirpiumhifloriamfcripfcrunr, neg'c* ãum aniadveniflctn.

•it.

LYCOCTON i gencribusvaldecaffiriiefijquatvulgoAndioradicitur. cujuscautiscU* biralctninterdumaltitudmemacnngit, numcrofisfolijsteniiusinfri: i3]squã inulloLy- codtoni genere, feptus: flores Lycoiloni floribns pcfimiles, colore pallidi: femina in rttnil- buscapicuh, tliusfemini par: radix ctiam illiusradicinonvaldc diflimilis. Qusromni* cam diligcnrer confidero, Anrhora: hujui uftim valde fufpe<um milii r e d d, p m f i r i * anticopiaaliorumremcdiOTum, qLioruni ftcukates jam lunrcxploracar.

GtUHIVM,

CAF. X.

y YcOCTONIS Grania fubijeicraus, quiananullahorumgeneramaganiof/n JLtCmilitudinem habent cum Aconiri Lycoftoni j. quodlutco eft flore, & Silcfiaci foHj*¹ Noftri tamen noncfl inftituti. omnes Graniaj vancrates defcnberc: mulrorum enim %e' nermhftionaabalijsjamcllcontexMifedcadunuxat in medium adteremus, qux Alj* antea

...ntea observata non memini, p, < u i l l i u c i u f e M n d a c c n r m , q u i a
...ante natiencia observab am .n .jsrregionibusq Uasa J, j, c u m in BelgicxcultioribusHor-
...tantaxat alantur. Insi m autem facimus ab eo genere quod folia habet primis duo-
...bus Lycofloni generibus n. adifimilia.

Geranium i. pulloflore.

Geranium ii. florum minus.



ill iL

CvntTAi. n frequentc'fquecxunaradiccproductitPi'imuncjulei, firm os, gen icu *-
^os. virides, Panguineis tamen vcluti gums aipcribs, Unuginc pubelcnces, in aliquot ra ^T^'***
""sdviiios; in quorum fjtjgjo, atifingaL-i<i-iricula]ong)cnafcuTmixpci5icu)i, inqubus
^I' finres, quinquelaciniatis (prxrerrelqLiorumGeraninru.nl uficaiam formam 1 foliolis
^iflances. colore famracias rubente, fie quad aero, medium florc moccLipantibus mulris
filo prominence: fcmnde inde fuccedicia valvulis mticro-
natis (quæ maturitate, ut in reliquis Geranijs, dilliliant, & circumvolvuntur) fofcum ; folia
ill
^ ex radice multa. ampla, inollb, tanugicc obduft^, extern^ partc nervofa, Geranij B<-
^que ad umbilicum, deinde per ambitum ferrata, qualia etiam ad tingulos nocios fub ipfis
cuticurfminoratamcnjacquefubindcadiinguhs incifurasnigricantibus maculis
eiiiLuJradiceni titit magnrijin multacrafTarubenriaqnc caj)ita, & multas fibraj fpargen-
^extuberante. Gngolis cciam annis augefcnte & novos ftolooes producentc.

InveuiturinStiriEalpiibus, ubi (ilvsdcfinere folct: & floret lunio: iohortts vero. inqui-
^Us rc!ictfHmeprovenit&: luxuriat, Maio. Anno stem M.D.LXX IX. maxima copia obferva-
-i*" Maio mcoft fuis floribus onuHum in filvofis Illis montibus Pannonii inter Dravum
?Savmnh[x, &: proptcrea, Interamnicofjnomma[¥, Scm]neauicm Viennaadamicosin
e]gicain miilb, natisex eo planis iftic innotefere ctrpic.

ALTERVM produntibus radice frequentibus longoque pediculis folijs u.
^ousfcre.ruRofis. rubhitfutiSjinaliquot profundaslacinijsdivifis, dcindc in ambitu lerra*
^, quarguftata initio adfringere, &]inguamex(Iccarc, dc mdcnonnihs]caifa ccre dcpre-
^idurirur: caulccubitaliucpluriim, firmo, rotundo, geniculato, in muJcasaladivifo
^uibufubnafcuntur folia (uperioribus minora, paucionbufque lacinijs divifa, perinde ta-
^ciinainbitu firrafarumiTiirami inoblongispediculisriores<Tc(lantquinqucfolij) con-
wtites. Geranij bacrachiodisquoJ in Belgictshoriisalitur, flonbus forma pares, pauJ Jou-
n, t, *iuici, vcriimexpurpurlrubentes, decem ftamiuuliscum (hlo
"t urabilko flons pro Jtuncbas: dcinde oblooga creiUquc roftra, non inficxa aut inclina-
ca, quia is

Geranium III. *Barbapendula* majus.

Geran. inj. bulbofum Pennsi.



ta. quinisurriculisadeorumbafimturgentibus&femencontmentibuSjquod maturita^l exilit,ationim Geranitrum more: radix fuperiorifer&refpotider,&fimmnc]lure in pl^u* racraJFa, incernc'que ru bentia capita excuberat, qua: fibras etiam agentu, iingLlisanniS augentur.

Matales.

Crcfeithoc in PannonicisStiriacifquealpibus.nufquam tamen abundanmis.quain f** pra Gammgam,inilloa(ccnfi3 ex Hcrrcnalbenjugoad fublimesftopulosDurrenibin. Jⁿ quibus flocc Iu'io & Augufto,in liortis aurem Maio.

111.
Geran. L.
1111. 11111.
Matales.

* GERANIVM auceni **tilud** Bicarachiodeftnaius.cxnilco flore,quod in Belgicis tiortis ale* bator,fponte provenitabunde in pratis ad Corenncuburg non procul a Damibio,bmis fo* pra Vicnnam millianbus,ali]lque Audnspratis, turn etiam maximacopiain pratis Brun- nacMoravixiiiibivicinis, atque etiam Boiicmia:, non procul ab oppidoWcrawn , trib«^s millianbusaPragrid"tfu[iti,VLcini(qiicFrancofur[o pratLS&horcis^ramineconficis.

1111-

Qv ART i, quod faliorum fimilitudine Secundum referc, iconcm mihianno M. T.XXXI. communicafatLondiiii C. V. Thomas PennxusejusurbisMedicus_o cum hac defcriptionc.

Geran. tut-
1111. Pennsi.

Geranium bulboriim^radicem tiabctcxmultisparvts&longisbulbisconftantcmjVC) - fuslumnum fibracam^auicmcubitiitemjgenicvilatumjuxtaradicem&gcniculaparuii riibentem: efingulisgeniculisduofoliaJongiufculispediculisnircentiajinquificjuc prx^i- puaspartesdtflefa. quarumllngulxinambituiraqualiKrinicifxrunticfingulisjunfluris, juxta foliorum exorcum quinque foliola mucronaca exoriunturr flores in (ummis **ramufis** conju^itimp.irvispedicullSiiiiiftentcsrorei, exqmnqut;folijscon(tantes, colorecxj"U^{tr} purcorubc{centes,Geran]j carruleisflonbLi5rimitc,s,red paulominores.

Barbap.

In Dania provenit agro Hathicnfi undcoiftiffimusaciniliianiiciflimusTurncrus.M^* dicusAnglusattulic&miliidonodedk.

1111.
Geran. mdo-
1111. Pennsi.

ALIQUOT aradice promit Quintumfoliajtatisfirma, ininquelacintasalcedivif*^l inrcrquibini autterni caulesa(R)rgunrpC(ia)«,graciles,exfu(copiirpurafcentcs,gcfl^{cl}, [aj gr nodofi,binaad iingulos nodos /eu aniculos frcntcs folia ex adverfb fita,in tres dun' taxat lacinias fe&a, dcinde c medijs alis longiores prdiculos, in quibus bini (emper Hor^J conjugatimnarcentcs,quinquefolij.5bifidid(utm3lvacci)conftantcs,purporcoloris,c^l* quibusdaai faturationibusvenisdilbndi .protuberantcinmediorubroumbone, lunim^ fattigioinquinque partes fiflb. quim longiufculutn dcinde roftellum **rranfit**, quodinferⁿ³ partcintumcncctbusuiculisfcmcnconunec, matunute, utinrchquisgcneiibus(pcin^{cC}

Geranium v.nodofum Plateau.

Geranium vi.mbriferum Plateau.



Jj^x.ticens. Tadix nodofa est & geniculata. aliqoot prxtrea fibrisonata. Floret Maio & tot!
dciticps ajfUce in Autumnmn ulque flores, 6f femer, fcrre non definit.

Hanc planum un. icum iconc, Francofurcum Mccno flumini imp ofitam urbem Impc-
"iletn, ad me mittcbat tioncliffimusvir, ScinStirpiumcognirionecregie cxercitacu[^]
•Jacobus Plateau, qua: femincfponrdecidcnce fatis felicirercdinc fete propagavic.

PftjCEDENTI nonvaldc difTimilcerarScxtumgenus: namcaulesnodofbs, circageni-
cu[^] a rubentrs, foliatiatn in caule nata tribus duntaxatlacinijsdivi fa habcbat, Tadics item
Car[^]?-K mulcis crafilis fibris.fufco colorc rube (ccnte pertnixtoinfctis, perinde firmatii, Huic
jamcii folia eradiscapite nafcentiamajoraeranc, & in quinquelacinijs ftcla: Soresiji
^nniisramulis, nonbmi, (cdplures, cresvidelicetacquaniorfimulnafcentrs, a (iipe-
tionis floribJS forma flicolorc nondifcrepantes : qiiibusfuccdebantlonga, ucinilio,
toltra, femer in uculis, quod maturitatecxiliebat. coniiicntia. liludituicm fingutare lia-
bebat, ut ex ipu- is Plateau littcri5 (quihujstianiconemfufcoJoribuseleganterepren-
tu Franco) um ad raemittebatanno M.D.XCIII.) ituellex. quodfrodi[^]isfioribusSC
^*rtiinibu5, circaSeptembrcm&Oclobrem adnafccrcmurinradicuro Tupcrficie, caulibm
Cr «imis, mtikaveluci cuberajalbiLiitiocoloris. infarHorum Bratlcxflondar. fiveCyptia,
S^ucame[ifupt; rveniencibuspliJVijs, eluatur, tiibraci: iamdurt; rcaic. A tubenbusaurcm
'HisoccalioiitmrumpferatPlateau^eraniumtubriferijm cognoniinandi. Infqcent
ta men Septembri reribearidem Plateau , hoc Sextum genus a Qiiinto non difterre: fed
genusfle, quoddiverGscemponbnfnifletdclineattini: nimirum, cutnip(utn mo-
dem genus milii vidcri, nulla veroinea planrac[uamadn]cmiftratton(pclla
unum
nuiffem i
fuitte tuberi. Iconem tamenjam expreffam addere volui.

SEPTIM, • Mulct r«ncaulcsadmodum ramofij&rcfrequentibusnodisciniacijyinisobfici,
fuperii. qua Solem fpcflant, purpuraicnrcs vd rubentes, folta, ad fingula^enicuJaj bina,
fontrarijpediculisnafcentia, Geranijcolumbinialteriujfolijsliaud multumabilmilia,
'^quinque lacinijs ad umbilicum fere divifa (qu«emagna ex partein tres alias minores U-
citius tneife funt) lanugine pubefcentia, fupcrne virentia, inferne nonnilnl canefcentia,
gu(tu linguam exdecante: ex fupcrioribus alis oblongi nafcunturpediculi, unicum futil
ne ntes {i [iguliflorem, inccrreliquaGeranij genera maximum, qumqucfolijs con flan tcm
Cifti mans fion ferme parcm, colorcclegann rubro, dccem intus ftaminulis: deinde capita

^ncronnra. reuollrapncagona. fcmcnfutircliquajincumcfcentibuiutriculiscontincn-
fia^iuodmacurumcumfbnitucxilitjCircumvolventibusfefquemadnioduminceteiispe-
fceribm) ucncolorum muctonifaus-radix fatis crafil?, rubc(cens, aiiquor fibrisonata, novas

77.
Geranium
mbriferum
Plateau
quod est et
cum Quinta.

77.
Geranium
mbriferum

Geranium v n. a. l. S.



Geranium

Geranium v n. a. l. S.

Geranium Salmenit. v. r. r. r.

Geranium Cruu,

Cariophyllata vulg. Gcum Pliiij.



Nonius.

Empicof. culiat.

Ycair. Pa. toxis.

Ycair. Pliij.

fab terrain propagines fingulis amissad late
rafpargtt, qDa; n6 modo fimiliter fibrasagi
fedctiam craflionbusradjcbusimerduniie"
(cfirmanr.

Nafcirur in omnibus Pannoniar. & Auftt'S
JnfVaAnilunijCsduismoianisfilviSjCditio-
riibifque gramincis locis: mons praetercaarci
Gr^bc'n immincnsultra Dravum inPanno-
nta interamni, torus fere co Geranij gener*
coniicus^qua parte Occidentem fpcitar. Su-
vxetiam Francofurroad Mocnum vtinceo
abundant. Floret Maio, & plerumque wd
fublqcuentc/Eftate,

2. Similiquidcmflorc. difparibustamcnro-
Jijs & Batracbiodis Gerani) foliorumpou)
xnmlis, invenitur aliudgenus adpratoruirt
margincs umbrofos Sc inter vepres, ad pa-
gum Caizcret, fupra Nonbergatn itincie
PragenG.

PfRPVSILLVM aliud Geranij genus, Si-
mancicragens, obfervabam in vicinis uli"
Thormimamnemcollibus nudis fere Sip
erofii. autfalrcm tenuigraminctcftis; en
puffilla illiLycImidelilvefrivj. mihi li"J"
niftoriaiTertiolibio defcripta: & Colchico
montano, cujus iconem 8d defcriptionem li-
bio Scundo inter Colchici genera dedi • 1*
autemjRanunculi fere folia liabebat, purpu-
rcum cxiguum florc, & longiflima, crallit-
iimaque (profhrcpis tcniiirate) capitula ro-
ftraca, Geranij Cretjci {quod MompclianO
agro etiam fpote naftiturjrofrtris parncx^ua-
lia: fenien obfervare non licuii: radicem ve-
rovaldeexilem.

TRACO Septimum genus non ignoti fui*
fe vidcrurifedabco^towii^appellariccfco-
Reliquorum hoccapice defcriptorii nullum
vulgarcnomcnmihicognicum. Vngarivul*
gare j geranij tenuiter incifis foli s Varyu Lib,
idefr. Cornicispdcmmucupanr, ut Colum-
bmü G>ltah'em, \noct\, Ciconixunguent
GermaniOto, i(EV[jn<il'f(/, ideft, Qcomar ro-
ftrum ; Galli Bttdt Grue, hocft, Gruit TO*
flum; Hifpani, PhdtCtgu ite, quod fii fi
cat, Cicidiatro rum.

SLAVONICS mulieres Sextidccoelux |pro-
fluenreaqua, iiiiinfkec6mendanrin< apitis
gravdirte, iifpcipur, ubi dolor cfi, eo abluat-
tur, dcindcherbadccofta (upcrimponatur,
podrenio f quod fupcrftinonc non caret) id
profluenrcm un<ic aqua haulta. abijciatur.

Diolcorides Geranionnullius inmedtcini
ufbfeleait: Plinius autc tradir invinoalbo
potum, proRuvia feminarnm fifterc^quod
verd tocilda eft radice, cjus radicem rclrciei*
tibtisfcabimbccillitate^tiliilimam.

CARYOPHYLLATA MONTANA.

CAP. .XI.

G i EVM radicularcnes habcre, nigras,
[bencolenteSjiradic Plinius. Recctiorcs
quinon inffliciterinPlantarumcogmrione
verfiiti, no abs re vulgarem Caryopliylla<tn
effe ccnfent. Ad illius genera rcfcrri dc bent all*
er. iam {tirfcsuimontanisnafccincs. qua-
ruuiqui'

effe ccnfent. Ad illius genera rcfcrri dc bent all*

rum quidem radices. oJurisgrariacumilliusudicibLis notCiinc comparand^ fedreliqui
notis latis co ivctnuniIIIimnlxt[toriatnhoccapi[Cdefcnbi;ams .

Caryophyllata moncana. i.

Caryophyllatambntana if.



P R. I Mv M radicem habetdi*itili, autpo! icari, mterd'imi crifTitudine, furtitna tellure
Soften cein, craflb ^purptirarcnccccotricetedlam^'mpcnseadilringentem, nodorum vc-
•»gijis quenudinodLim in Acori radicealtrnis diltintla. antcrius fillim iiii flar) nrogeccien-
^ m. ^ inulnsnigricantibus fibr,s, non injucundi prorl'us odois, feJ aliquantiUuin ad VuJ-
8^at'isradicum ojoremacednctbus, firmatamjruprcmapartcinaliquut capicadivifam: e
^ u u u n s l u i Eupaorio, emergmicofiorum alar, tnuttis minonbus virentibus& iit
ambitu ferratis fol. js. mod^iquaLtrjmodo inordinatenalcentibus, uirinc|uconOantes,
extre aiaaia in mijratiiafolia, aliqu3nruimperoiaslaciniara, & infaturaliorut] in airbi-
lu Errata, rcmpcrdclinente, quorumccr(ium (^uodSipofiremuai) reliquisniajust ll, &
^ isorbiculare. gufluxexficantis: inter has atas. pmcrguntpedales^nrcrduinctiamnu-
JP'escaules. firmij rucundi, brevioribusminoribufqucfoliorualislatarecccosampledk-ii-
^ busobfin/uprcinlpartcpurpuralcentcs. in aliquot rafnuloslimihcoloreprafditos. & dc-
0^ fum infixosiffcnuMntcsdivifi, ^uipropendentesuftmeiuflores, quincie, utpluri-
^ u n i f l i a m f e n i s a i j t f c p t c n i s n i a y i t e r r u b c n r i b u s & i p i b c u l t f e
S^{oll}ftanccs, oblongiore tamen& angufto ungue, numejua fecxplicahtibu5, autcalicuKini
Jl'Psraribus, tciqwdammoioipfoiacluiii, medium occupantevillcmzcongench nts
aminulisobfita, quxpaulatimpiirpura{centemcolorcincontraliit, & tandrin fefecrig-
& explicans. maturitacc femi cui inhBfit. Utio vu jgari Caryophyllata oflendic. To
^ p. U. l. l. e. b. e. f. f. e. s. r. _
rallia III m iumcluo i. antui i. fu ei. s. _ _ _
Crefcic media ferē montiutnrcgione, locisudis & riguis^: om eo Saniculxmontana'ge-
fcrc, cui taitei (unr flores. vcluti fangmncismaculisafperfi, & Ranuncoloilloplatyphyllo,
"u b ip(Js arbonbus. Floree iibc Junio; in hortos tranflata, Maio, aliquando ctiam maturius,
S i M H i etiam propcmo dunitationcferpic Alrenus radix, fupcriore non minoi^ar. ra-
rui i tam oiulra capita exruberansx quibus fimihter m ulta: foJiorum alx nafcunturj (up-
"onbusnonbreuiorcs. fedfreqictioribusmiriorLbusfolijSjinambitofcfarii, utrinqucor-
JJ^{ic}*, uncoduntaxar, Sc quodammodocircinato folio, in trestamen plerumque lacinias
r^{lv}i(o1&in_{am}bjtui(i;rrato, ««rcmamalamoccupante, qii3:(plcdet & diliniusvirctquim
Jl primogencrc: ni(iuiKurccia iTi inter casfoliorurnaiaspced]escauJcj, gracilioresquam
& upcion, minoribus, raagirquclacimatisfolijsotnati, quifingularc^pTcnimque, non-
"a |«ain ctiam plarcs, ciliculos iullinenc, in quibus ilores aurci, quinqc folijs vulgari

v.
Caryophylla
in alconano
ttntf. st.

Kalalef.

IT
Ctrip!) St
ti f
rtjttn.



oajoribuspriditi, florisCifHfcmnramplitudinem interdumarquantci, medium occupant multa luccaftamina,interquaclatct villofa quardam congeries, quxcxcuflbflorcléfe explicansmolliorcflfupriorcAfcctnenplanumadnatuõilcnditfqusdiaturitatcfulcuin fir.Tou «iam planta lanugine oblira,& adftnflionis particeps.

Herabo.

Hoc genus in furomisduntaxacAlpiumjugis.nccin omnibus tamen, fed inter grameOi vclfbtruncibusmfcitur. Floictifticlunio, femcn Augurto marurura: inboitismaturusomrtiacum fupcriore.

SFm&M-tuiGtjavi.

• MERITO hisconjungendaeftelegansaliaplanta^uamquideranarcntemnunqiiatn confpxi,nccisquiconcmfuiscoIonbusdepiammihihicomunicaba[Pcnnxusnoflc« (cdexC.V.ConradiGefneTidepiitoherbariodcfumpfi frcfatebatur.

Foliaquidem Carjopbyllata: (tinr, fed an l^nutnc pubefcant, expiflura colligere non lieu ;t, quemadmodum ncc qua lit radice prjedira.ncc qualia fun qu\$ ex ci prodeunt folia: foVt enim caulcicum floribus unique aut alcero foliocauli inliircntc depida fucre: fiorcS fancelegantLS&fanguineifpntcoloris, vcluriByzantinusRanunculus. Duorumautcirt vidfturgneruminamaltrciusflosmultiplicifoiioruDi textura&ffrieconfat:alteriusvc* rø, GmpTici cantum : utriufq; ca men medium occupat villofa congeries, non fee us ac in aliarum Caryophyliatarum Honbus.

*Nimfir**

NVLLVM vulgare nomen lflarum flirpium inrelligerc poiui: fed fecundu genus à Marthiolo,Co_mmentarLJsiniin.lib. Diofcon'dis, Caryophyllata; mcnianienoniincdkribi' tunpiiSuratamcnnonvaldefelicirerexprefiã.Tertiziconiadfcryptunierat, Geumaquatium flore fimplici & multipl ici. Vulgarem autcm.Caryophyllatam .officina: Garycphyl' laram appellantiquod ejus radices C*ryopliyl]osaromaricosnonnihtl redolcant, nonnol'j Ecnedidam, exquavocccGalli fuum *Bt/witte*, GermaniTcnebUHjifrautSt ~~Quendicere...~~ muruatifunt.

Cifaenl-tuns.

SVAi habeantfacultatesbinsrillxhoccapircdefcriptje amontanispsfloribusrolicuit fligerc. Gcum autem!ciiibitp]iniusn6mod6pe£iorisdoloribusaitlatcnsmdcii,f^f^ &cruditatcsdifcwKrejucudofapore.Sinnilibuspa'ncfacultaci bus pra:di tam ajuntRecentioresfuamGaryophyltatam. Ejusdecoflu ex aqua, anivinoaquadilmo.gruiDOsfargu^u nisdiflblvcrejnternaquc vulnra curare predicant,fibibniur.exicrnaetiam vulncr*fi^{co} clunncur Decoflumexvino.vencriculuQi roborarc^oncoflioncmjuvarc, jccorisobfiiu* 5ionesapcrrire,peftusniundarc&purgarcab hunioribuscraftlis&piuuofis.Raditcro^{ac}* cam ex vino lump cam ad vcrfus venena^ colt dolores u til cm t lx.

C O P I O S E nafcincur perPannoniam & AuftriamvariaPenraphylligenera, multis
 'alijsProvincijsctiam vulgana,qua:,'cumabalijsdefcriptacrciit,lupcrvacaneumdu-
 ccbamiiis,PannonicarumStirpiun)oblcrvaiionesicribcncr,cs,coruriihiItanamillbincre-
 re,Pfopcereadeijspeculiar! c;pucdmnaxacegimus^ua-ancmtnc (quantum quidcm in-
 teilexiiTc-mus)adhucranecvulgata. Nosigitur,caqusciim commencanlumus,hocca-
 iitcrepctemus.

Quinquefolium.i.majusalboflorc.

Quinquefol. u. minusatbo flora



W

NvM, multa folia liabetQ^uinquefbliovulgarifiriSia, in quinque partes ulque alpe-
 Scutum divifa,tnambiturninimicicrrataut ilia, fed cxrcmisduntaxatj
 Scutum quoadam lanugine pubescencia, guttu unio pannoio & empiaico, deinde non
 nihil amaricante: aliquot sub his exoriantur cauliculi, exiles & tetnes, quadrangales, humi
 procumbentes, in fimo* refoscut. 8. areo s r roferentes penta byllo volcau
 miles, fed prorfis aibosrquibus excui l s, appai gr c. ilrx Unugi ne ODCIUCIUS, lemen ^ntians
 planu mjIetninisranunciifL'rcimuhimtin rocEmentum fragi congefum : radix cra
 cuJa, nigricans, inarnbicu(cfd!ffundit, & mulctsfibriiirfutaest, *

I.
 Pentaphyl-
 lum majus
 ilbfim.

Provenit non modo in colic illo ncmorofo ffpn Mandcrfoijf oppidiilumrcpidarum
 usrum (caturigine nobilc:/i'd etiam in omnibus iltfenotofis ijffis.quara Danubio pro-
 currentes, ad Alpes u (que pctiiigant. In illvis item fupra Nemthwy war, & Zollnncfc,
 aP"d Entzctofr:&: plenfqe ficcionbuspratis, unoab urbc VienS miliarmn Moraviiprae-
 terea, atqtieinmtmcibusultraDravumaninem, Pannoniiluccramni. FloretApciliK
 Ma i.interdiifii denuo Autumnno.

Natalis.

AL i v D, exadem radice, qas nigraeft, mnltos plerumque cauliculos profcrrc fb-
 ct,cunfcftim nafcentibus, fecundum radicem, iucanistbliolis.formaluptrionfimilibus
 onultos,gracifc^naiihuinifufbs&procumbentes, /cdredos, &runimofafiiigionmltos
 Bolculos priori(imiles. Superiorigenusvidcttir.fcdperoniniaminus,

II.
 Pentaphyl-
 lum minus
 firt.

Etaebam hoc inter &xa& fcpulos^ummis Auftriacarum & Stiriacarum Alpium jugis.
 FIntet sub finem luntj, interdum cciam Iulio & Augufto, proutjuga ilia maturiis aut'fe-
 iusanivibusfunclibL-ra.

TERTI VM, cxr.idiccfibrofa&ntgncauter.imospromithumiTefpargenres.&fubin-
 acoblougas alias fibras agentcs; qui fummocapiie, multafoliaprofcrc Pentaphyllo v.ul-
 gacion

nr.
 Tmapbfl,
 furtc firt.

Quinquefol.in.aurcoflure.

Quinquefol.iii.flavo fla. i. species.



Quinquefol.nii.flavoflo.n.fpcics.



Htultt

1741.
Zuccab re-
pens minus
lucisflor.

gatorifcrefitniliainqumqucprofundasfif-
iurasdivifa^quarunifingul.T inftar vulparis
Quinquefolii peroras (errata; funt) mollio-
ratamen.aliquanrullini incana& fplendcn-
tia,adstringens gustus: ex horum medio cau-
liculicxunt p a i n j multifidi, qui p u o s t i r-
pisexilirace fans roagrmrlor: p f i n i font,
elegann& plane aurcolore, **multisintW**
croccis ftamimbus: femer aliorLtm **Pent****
phyllorum more, in fiagi rudimencumcoii'
gellom, utcum, ex i g.

Crefcit hoc fimiliter in fummis AurtrU-
cartm Alpium jugist qui tamen **berboft**
funt, & fub Iunij finem floicc, **in liorrisau-**
rem Maio.

• Qy A R r o , molta exennfab ytiu radice
capira ramofa, humi tufa, aliquot folijs IVn-
taphyiii vulg,ins&elations forni;i Jimitibu*
pratdita, *hoc ell*, qua? qujnqc folsolis in .1111-
bitu ferratis, molliquc lanugine pubc*kemi'
busconfanCjfed non, urillaA.inc.inis, gultu
jnirio exficcante, demde nonnihl Itngnao'
vellicant::ex ijscapitibusprotteuntdurfta"-
talesinterdi

nbii5,f<ij)s ornaet. gcfanres in (umri:oi)til-
tosfloreslutosclegantifTimos^yinquco*
J)js,tit(bperiorim, ciinstantu, mediirmfi⁰ⁿ
rem occupantibus multis luteis flaminulis:
femen in caput,& vdti(ragrrudnrentum
conect, tlan
crafta, fonsnigricans & tenuibus st rido-

natacofed SC rami illi humi fufi plcmmqve fibras agunt, & vicina loca occupant.

Nihil

Nihilillovulgatiusfecundiim vias, locisficcis & nudis Pannoniz, Auftria; inferioris, Moravia; & Bohemia. Florere incipit incimtc propemodum Vere. Xntaitt. "

i. Cumconafcituracquectiamflorejtjinustamcnfrequens. aliudhujusgenushumi
familiariterfufunitCijjuscauliculinonvircent'edpurpurafcunc&gracilioreslijnt.fbltaanju-
ftiora, magisvillo(i&illoruorxalciis-(ierrati: florcs«iammagisaurei:c«crisc6vcriunt.
t^uinaucfol. v. fragifrum Pentaphjfl. fupia, quorundaraPotenuU* facie.



QvtNTVM, habetiquiriqM, fex, autplurcsfoliortfmalasaradicc. prodeunt«lioceJJ(v.
a;c<rfUstrubentes, quibusquinque, utplutiii)um, folia, intem
*ent, contrario inter (cfuliorum exurtunalcncia. uno, quodcx ErcmxaUr infider, impa-
itm numerum facientcifunt autem ca rugora. villofa. p. troras febrata, fupioa parte virena,
rforroali quantulumincan OiFraganx vulgaris foliorumpxncinfar. mirioraranc aOUnt-
tniltmrappiis: oflureitdeiad* no. Lisgrae Hisfirmiis, p^Adi SMitini
Plantulum apotisia Mur. itacir jaccanis gracilis. nrmul. p^idiisiu^ iipiui. iu-
nuofparfa turn rara folia inf«rnis minors, quinque rain cut illajitfmero, fed ar-
^iusconiinaa, fummoautcmfi Jligio, ubiinquo Wamraniuloidi» idiJu Meniataiiniini
Pcd. culo inharemiafcrunr ver6 ij ramuli. livc virgula, lbs Horcs, vulgans fragar. s Bon-
i>i«p«>rfusfiinics, nitinaul6 minoresei Tcnr, quinquefoliolis, ut»lla, conltantes, & jii nie-
^oluteaftaminaobciiiicntesrquibmfuccditfrausfragonodiffirn^s^mmortamcn^KC
Vllifai>pr, s2raqi3c6niendabih. s, qi! iincxtguarufe (ccnria, & faci]cd, rHuctiarem. narrani: t:

d1x^iscri^ Jo nga, dur_a J. gno (:, rubc {c, r, & n1 groad [lrmgrnrccorr, cc, cchc (l.
Nafciturin Leytzenberg .locisymbrofis ,ad arccm inmedia hlva fupra Mandcrftorffi-
^tn. quolocoprim^ & aliquotdcindeannis dunwx atoblrvabam. Sedanno M. D. LXX. x.
^opiosd nafci v. debam inter Rabam. Moram^ Dravum Pannonix aumina; omnium au-
tem abundanriffimccirca Sakniniyalli^ Comitide Znnoarccm mumniniani. qi^ fi-
^ eft inter Muram 8c Dravum : crctcic vero iftic noil modo in cxduts filw, fed cnam gra-
tineiscampis. Anno autcm ilium fcquenccturaiepcriebam aliquot etusnrpes in til vis
^upra Petelltorf fecundufere a Vienna railiari. Floret Maio, frudus paulo (cnus mature-
^at, emuiintque, utdixi, fcmina, quemadmodum inreliams Qainquefohis.
PRIOR is memini fcevidetur diligentiflimus Anguilara. opinionexn. Alterum forre
defcnbitnofler Lobclmundoa^ mnsadverfarijs; noftrum tamen floras habet fraganx
floribus maenitudinenoiiinfcriotcs. Potricautcm eodem nomine, quo life fuono vocavit,
infi Bniri. Pentaplyllon minimum & pctum. Tercio. Pentaphyllialpi Difloreaurcono-
»co indidi: licebir vero pro arbinionome muMie-Commodc Quandumdici poterit Pen-
«*phyilonrcucnjminus. Quintum Plinio forfiannonincogn«um: namhb. xxv. cap. iy.
Natural*

Quinquifolium
Kunz.

Natural.Hift.Gefcribit. Quinquebliummilli ignotu est, euro ctiam fraga gignedo cem-
mendetur. Vulgans cercè tragana Era duntaxatfoliahabec, nec verifimileftejus fhrpil
formamaPliniaDOTemporemutatam, quare ad eam plantsm,cujus Plinius jam di#c to-
co meminit,minime referri posse arbitror: hujus vero fructus esui nò aptus, facit, ut Quin-
qucfolum Plimj cfrc, noftramhocqutntum, aflrcicn6aufim .Nifi fbrtccoloco LPlinius
laplusfit, &Frag3ria:hiilonamciimPenraphylk> confudeyt; quxenimpoflcaaddit,ad
Quinqucfolium vulgareprocuidubiopertinent. Vtut fit hocmeum Pentaphyllojfragt-
ferumtaQtilperappcibbo, doncca hud3ptiusnomenmihiauE3lijslbcciiirac,

torr. 1. 1/2
pays. P. com.
tilia f. m.
A. ferina
Tragi.

NtMi VEM portoexiftimare vclim, hoc meum idem cflccutn Pentajjhylo fu pi no Tor-
mentllf facic,ciijus iconem & hiitonam Lobelms in fais&JJ|(brvationib'usexh.bct; natB
illud ctiam frequensctagro Viennenfijn extremis pratorfmnjUjgmibiif.reccu diimfilvas;
&nonnihilaffinit3tiscum AnrcrinaTragi,IeuPotennftiFuchlf|habec»otjusvidetur,
qn.im cum Pentaphyllo, tiincti neque incanafii piin4,Ticque tepat, fclfcumiduntaxit
diffufafit.

* V

MVLTA facultateftribuuntVctetesQuinqucfolio, quascxipfommjibris pcrercpo-
teruntfludiofi-Au vetoquas hoc capitedicnppfirtirpesfiiiiibusvinbus iio|pia-Jnaf*, tnf
IaKtiomncstamenadfiriclionisparticipes.exquaqualuaTccolligerepoflumusJnquinbul-
dam,cum Quinqucfolij facultatibus convenire.

HEPTAPHYLLON.

CA y. XIII.

Alchimilla vulgaris.



Pentaphyl-
lon.

BIMI autternijhuicPlantSjTarouliabeadciTiexeuntradice^ teretts, firffii, ptdalesj
plurimae aliquotgeniculisdonati,cuquibusctiamfolia, fixp<cepta autplunbusdt'
vifuns infeda ad pediculum ufque,totaincana,& veluti argentca.adftnngctis &reficcan-
tis,ut& coca pl3nta,guftus:cxgeniculisfimiactiaprodcintfolia,(cdmmor.i: circa extr**
mos & futmos ramulosgloraeratim nafcutut numcrofi flofculi,Ole<j flonbus peitinnlc⁵*
parvi,(iclati8f albnradix illt fatiscraffa/onsnigricans.dodrantalts.

Stu.Mitt.

Provenit in Pyrrcnqisjugisapud Cantabros:memini & ante in Allobrogum Alpibus*
riu^ florentem viderc,ciim apud Cantabros Maio floreat.

Q vo nomineaucVctenbus.autNcotericis, autettamavulgoappellcnirhaccpUntf>
milu mcompertum est. Heparaphyllinomenclaturam indidi,qu6dplcrumqucrepieni*ft|
li)scxeodmpediculodependentibus,autfo!io fcpriariamvel infeptcm laciniadivi
con^{ct}ft-HiftonaillaLiniverfatisPlanrarum,quropftmcaruniHirpantcarumObfervatx**
oumevulgationem in lucem prod ijt,Toriacnullam candid am vocn. Ego id Alch ""l"*

Alchimilla
vulgaris.

vulgo dicitur (quametiā in albo flore variantem aequando videtur nemini) genus aliquod
potius referendū ad ceteros forem, raracti Alchimi haec fohanoa habcattam alit difletta: <te/
quasi iuies tamen nou fun: diifi miles.

PLANTACO.

CAP. XIII r,

PLANTAGINIS varia sunt genera, fons vulgaris nunc noritise, quorum cum ab alijs
tradita sit histona, ab ijs defenbendis abflinbimus: quia: dam tamen videtur meuni,
quorum in mentione nemo uodfciam jha'ftcausfectt. Ealiocapitcoraprcbdeic volui,

Planrago major incana.

Plantago peregrina latifolia. Garetii,



collibus Salmanticae vicinis, alijsitem CaflcllKlocisaridis, dumifticivibim, Pn-
mgenus ob{ crvabam, vulg. irtminu Sjfoltsincanis^ultraquclanugineobduftis^utni
is, maxima anni parte cjuic pduutn, & floris expers: inter mulcas tamen plantas, non-
p illas animadvercbam Maiomenferentes exigua fpicam Plantaginis inftar, mino-
etn. plenam flotumpjllclccncium. Ejus radix tenuis, longa, & nigracrat.

t.
Plantago
Salmanticae
vicinis.

ALTER t multifunt becafolia nervofa, illisfcinicimilia qixincogencrc. Planr3ginis
conspiciuntur, qux^ capite numcrofis foliis fibiinvicem quafi tmbrcatim incum benti-
Pusconstant, & ro(am plenam quodammodo ementiente, Rofcavulgocognoniatur:
Jfiterqux, quiniautfeni progfdiLinturnudi pediculi, capita mirum intiodum vanantia
lu(tincates. namqu3rdamRi)fcxpUnt, iguiiscapJraxmulantur, aliarpicxinftar flint effor-
JP³a, nonnul! aexmediarosabrcvemvclutifpicam producunt, mquibufdam. cx infima
F^ciparte, aliacapiu! adpcndcncr, aliaahter (unteffbrQata. To[aaudetn plantamagis]ii-
C a i (i n vul^irisrofca.

rr.

TERTIV M multifamilicercx radice promit folia Anguftifoliarplamagimsfoiljsnon
diffimila ijiterqKtremcrgunt nudictiam. titinpracedentCjpediculi. iivcpotiuscauliculi,
fomofaftugio ill finctes capita multilongiufulisfolijsfminoribus tamen & anguftio-
r^ws, quimqua: cx radice nata) con(tantia, neindeinterdum ex illisfoliofiscapitibus pin-
rcS: »lijpsd]cu[ic]uorum fafligioiniarc. untur, lpicaru loco, aliafoliaccacapitulaiprodcLnc
ta men, & alijcx radice pediculi, foli, iceaduntaxatcapitul. iruftinenrcs.

iii.
Plantago an-
guftifolia
radice.

; Scundi 6c tertij iconem ad me mitcibat Londjno. lioncftidimus vir. & idcmrci herba-
fludiovaldefcoblefans, Iacobus Garctus junior tnhiamiciflimus, anno M.D.XCII.

vnde nullus.

*ci j tamcn planumiplain virtuera anccconfpexram Londini incx cultohorto N. V.

PlsntagoanguftifoJ.Garctiprolifera,

Ed wardi Points Angii, anno M. D.XICCI
 vcroutrtmiqucgenuslemen ferae, ignora
 bam dum hie fenbetem . Terrium camefl
 pangi poflc putocapitibus fohofis in-cerra
 depadiiSjScforfitantiamSeciJdum.Vcrrur
 que genusdeinde alui Lugduni apud Bat
 VOs.&latrfoliiHTifcmcnpra-bercobferV^
 iDporrd.cujusprimolocoineiTimtjiofi
 mc;l Icgitimum Diofcoridis Cynogloflum
 e(Te fnlpcatLis (unuetenim ii fpicam **flotuffl**
 CquaDiofcoridesfe*Ecnou()bicrvav]r.ci;rji.
 u[dixi,niaxtmaanni\|irre **Qaecaule&floc**
 confpiciamr) dcmas,nullamhaclci)uscjus
 defcriptioni exa&ius couueniamu, in^
 tam vartasplantas,vidcniemna

CETERVM huicc.ipiti,nonincomodcft
 fitan adncdi puicrit, Phntaginisquaci
 elegans genus, **Plantagni aquaticz** huro
 Lolieljj congener, quod **obferuabat** & Icg-
 bat Do&ifs. G Ltiehius de Mera MedicuSj
 dum ex Italia rediret M. D. XCIJI, miluqi
 Francofurti donubat.

Toca autcm liumi Fufacfllixplantuli
 &foliola producita radicc, iongiufciila
 angulla, longo pediculo **innixa, atque xi**
 illamiilcostetiucscailiculos.humijacenti
 unctalis.aut pauloampiiorislongiindmis,
 capicellu dc(inenri:s,quod .exiles fibraspa
 gens, ijsfctclluri figic, altaque minor
ijrofertunrei quxiquini aut (cni (ilorem **iosl**
 cofpcxiiorbiculi,Tciiuiflioispetitilisinnixi.
 qui in binas panes lnantes/emcn valdc **CM**
 oftendtincrexijfdemcapicellisnafcitLir & C2
 tercapitellorumordejjfolia&orbiculosad
 hue m i no res proferens: radices nil ntl cxi
 fibrxfunc

Naicitur, urapparer, uligino/jiJoris, Vel
 ubi inrcrdum lacuu^,ab imbnbus lubirc-
dentibuijCxorc&crunb

HOLOSTEVM SALMANTICENS.

CAP. XV.

NON ignoru varias oftendi ftirpes
HoicSea, five Holoftio, quacuni u
 lam ad h f f r i - puto,quz Holoftij
 ridefcncpcionicxadeco^emat. Qua: tamen
 inter reliquas proxmnuvctciu dtfcncpt)
 niacedanc, illam cfTearbitroi:, cjuam ciif
 Mom elliani tumSalmanticenfes co nom
 nedonabaite.

ILARVM autcm prior, Hcrbula eft fm?
 ferePlftncaginisangultifoliar, **vetiin**), long*
 &minonbus&;angu(tioribus, ctebris,
 terrafraris, incanalanugineobiitis, iu
fhingftegufta: inter qujquini aut{cnic4U-
 iiculi, feu potiuspediculi nudi cxiliunt, p³*
 munalttjqaiocreamedioadfummuulS¹¹⁰
faftigiura .niultis&iefemur.uocontingc*¹
 tibus fl o f c u l i s ex herbacco duri ^
 orti.ti funt,uti Cutonopj fpic: quibar dem-
 defutcedic (**emcrj** Pl ant agini femina valde



Cynoglof. Duysfort.

Plantagi aquaticae marina.

Holoftcum S^lmanticenfis maj us.



Holoft.

Holoftium Salmanticenfis frinwn.

fmile, theculis inclusum: radix est longa, tenuis, dura, & quodammodo lignofa.

Arid IS coUi bus Semantics-vicinis provenc. NufqaamcatneriBiajoremautcandidto- x*t*In.
emob(civabam quamjuxraValentiam Hilpam.efeaisvias. FloresproferebacSalman-
tiz Miao: Valentia autem Martio & Aprilis initio.

•HoIoftcmnSaimantic.minus.



CMSCIT ijfdemlodsalibdcfusgcnn,mtilt6mi. y.
nus,cujus folia Piyllij fohorum laciditudincmnoxc- *</<'''>>
cedunr, longiora urn en, & villofoquidem ilia, fed *'''fua-
minusincanafjperiore.incetcrisprorfusiHifirnilc,
eode'mqmc tern pore florens.

• Id genus ctiam olimobfetrare memini Mompe-
lianoagrolocisincultis&aridis.

VTRAQVE hac planta Salmanricenfibus Holo-
fteumdicebatut: poibrioretiamapud Momplia-
noshocEiomincinfignicbatur: mini utraquePlan-
taginisanguftifolia: genus potiiisvidetur, licet (at
dixi) nullx proximius adHoloftci defcriptioncin
accddanc.

HOLESTII porr6meminitDiofc.lib.il i * Hote-
tis cxrra crram fupcreinincns, fblijs vitiiclifq; Co-
ronopo autGramini proximiSjguftu adflringentibus.Tadicealba.prxtnui, ufqucin capil-
"mannfpecfcn^longitudincquatuordigitorum. Nafcuurincollibusterrcnis.

PLINIVS lib.xxvu.cap.x. Holoitcon licrb.ime(rc'dicitfincduriti.T,cxadvcii(T(fivcpcr*^!W>>>>
jtrTj))pa5-<)appellatum a Grxcis.deutfeldulcejrliaqua.iit Diofcorides. *'''>•

V s v s cjus ad rupta,in vino potx; nam & carnes coguncur decoftionibusadditS.

LEONTOPODIVM CRETICVM.

CA D. XVI.



FORSITAN &adPlanMgtnisangufti-
folia¹, fimiliimque cta0cm,rercrcnda
ca planta, quam Fracofurti a duobusami-
ciscx Italia acdpicba,diver(aappetlatione
Inli^niraLn.Ampliflimuscnim viriacobus
Ancomus Cortufus miccebat eam adhuc
tenellain, vedigiaautcn] capitum adhuc
rctinentem,unacani iconc,ip(am firpem
facis fcite referere, addito Catanances no-
nunc. Iofcpliusvco aCatabona ipfam
plancammacuram& aridam, ac rccense
Cretadclatam.JLeontopodijappellarione.
Diligencer autem confrensutiamq; t um
Leonropodij &: Catanances defcriptione,
animadverto notas aliquot habere fatis
inter feconveniences. Nam quantum ex
tenelli ilia planta &:icone, a Corcuromif-
fa.colligrclicer, herbukefttatimatcr-
raprofcrensquaternaautquinafolia, lon-
ga.angulta, ccnelhadmodum &lanugi-
nofa, incer quac multi emergunt pediccfii,
breves plane lanuginoi, ad terram inHexi,
fummo faftigioruitinctes aliquot capiru-
Ja,mulca lanugine oblica,in quibus flos, no
faciscorpicuus,ut,qualisu't,dcicribiqueat:
radicis luminu capuc quodammodo fqua-
rnatutn,aquodcincip(aradixderceud(;s
pauiatitn gracUercit,& in multas Jibras de-
finit, fufcocoloreprjedica. Plantaaucem
macura Sc iicca a Ca(a bona tranfm ifia, in-
fimamfoliorum partem duntaxatretine-
bat.cum crafflore radicis parte fibris orba,

r-dicuios dcinde breviores, craffos, maxima ex parte lanugine fua dcftitutos, Capitula fc-
re ntescra(fiufulca &brevia in quibus apparebantquidaalbicancs fiofculi mgncante um-
b ilicoprtditi,quandamforaminiimrpec]empra:bcntc:pediculiaiucmilliadc6i»cnrva-
bantur&cQncraliebantutadipriusradiciscaput, uclconnum quodammodo pedemrc-
rrcnt(undc force AH'To^o^oinomenJautnilvicxanimaticontf.iaisarticulispedcm ex-
^Qjrcnt.quapoftrcmanotaaffinitatccumCaiiUianceprinjahaberctjreliquisverdnois

Le onto pod. Creticu n al iu d,



Leontopodium
Ditj.



Catanan-
cena Dt /

litnliiins

Catanan-
cena

LIBRO autemxxvn.cap.ctiamvni.CatanancestntLonernfacie.CarananccnTlicfra- lamherbam.qualisfiCjanobisdeferibi.fiJpervacuum eftxiimljtcjusnfusad amatoria tan* turn. IlludnonabiecfTdixifTe, addctgendasM^giccas vaniratcs, eleflamad hunc ulum caujc&ura.quoniamarefcnscontraticretfcad fpcicm unguiummilviexanirtsci.

Tuflilagoalpiaa i.florc aperto.

Leontopodium
Ditj.



Tuflilago al.
find CM!

plurimum ad Leontopodij dcfcriptionrra accedercc. Vtriuque autem luftonnm ei Diofcdric proferam , addira tab<...> utramque plancam rccenrem vidli...> Sc<...> dam exprimi cuYabam, uc Leftores utriufque adminiculo faciliis j iudicium ferrc qucant.

DJOSCOSUDES igicurlib.m i. Leonropodiumfle dcfcribit. Leontopodionduorum digicorum herbuiaeft, folia icrens ingufta, longicudine trium quatuorvedigitoruii, vil- lola, Sc juxta cadicctn majore lans flocco incanarcapicula in (ii mmo caule qnaih perfo- raca: inqu;bus flores nigr: fcmn ufquiced {pifalanugine involutam eft, m fcephllit: ridiceparvamitur.qtumtrauut jppenfani ad amatoria prodefle,^ tu bercula di leu re re.

CATANANCEN autem prim am rcruo Tub' fcquenteapice,hocmodo. Catanancc una, toluCoroiiopUiabcc, longa, radicemjunei inflarienucm , capirulafcnautfcptcna, itt quibusfcmcciorobo fimile. Arcfcncscurva- tnirraterrain, &fimilisEt ungbusmortui milvij.

PLIWITS eciamutriufque rncminiciLeoa- topodij quidemlib.xxvi. Nat.Hift.cap.vtiu Leontopodion^Hj Luccoron,alij Doryp- ton.alijThorybcron vocantjCujusndixal- vum fiftij purgatque bilcm ; in aquam [inil- famaddico pond^re denariorum auim. Na- iciturirjcampeftrit&grjcili folo.Scmcncjui poturq, lymphatca funnia faccre dicitur.

H^c cum de Leontopodio com menratui cflem,niifitad mcDoctifsvit HononusBellu* Cydonia,Cret*e inful^urbLcontopodij fuis coloribuscxprelTam icone, cum aliquorjus plantis Gccismulto veljti tomento obduhs, quarum nonnul Ix folia acthuc retincbanc an- gufta, trinervia,capit3 floruinflexa&incurva, ad fpeciem milvinoru ungaium , &: unici fpi- cas florum integras uncialis longitudnis ncc C&raSas aot inilexas habence: ex qui bus no iis apparet hancplantam cgcncribusPlantaginis anguftifoliarcfTe. koncm quamad memitte* bat.fcutpedam curabam, addita in eadem ra- bclla cjusplatx figura,qux fpicas integras habet, Scd leflorem monco, ncipfum pigcat confulcreprimamHonorijad me epiftolam, quam ad hotum Commentariorumcalcm re- prier.

TVSSILAGO ALPINA. CAP. XVII.

B E c H 11 Alpini pcrclfgantia doo genera in Autriacarum ic Stinacarum Alpn^o jngis oblvabani, quorum deienptionctn hoc capite dare voluimus-

Qvj, NA aut fena liabet Primum folia.circi- natx fere rotunfirntis, Clianixciflb vulg^{an} non valdediflinjilia,inambinin6nibilfinuo- h,fc crenaca, iiii^crnc ri)gpfa,& nigiu ate ^r¹,

q|itaterplendcntia.infernccanJida&jniiioquafi iementcel;(ir:),cxficcanc< initioqfturn

deinde

deinde am... roxauliculus nudus scftj palmarij Concavus. in canalanuginc pubc Tce Sj Utiiuim
florum su... tinciismufcorurapurpuraica) tera, macuricatcin pappumev 3nciccnrcm; brevi
folia at^ a ty pentiscauliculu Sj Urcr Ligoannirempotej linccaucp Uniacon/pidatut:
Mtxfibra (ilcrpit, & in latam tc diffundwms, muluspropagin.es agit icnuibus fibns kfe
firma res.

Orirurin flimms Auftriae S^ Sciria* jugis, & torosinrer dum cefpices, cum Soldanella Al-
fia. cujus Tercioli bromem in^ occupat. Sub lunij finc mutpluriipunstioietji Dtercium
ver 6 n m Augufto. menfe, pro aeris ratione & coiffittttone: in hortis, toatuntjs, Apnli
videlicet. in quibus cura cauhculus magis adolcicit.

Tuffilago alpina. flarc c vnzido.

Tuffilago alpina.



SICVKDVU a Primflnonrfturum dffidcrj fj^ iracnitn foliorutti ezdem effepor idem,
nvis funilicr purpurafcns, radix tiam fummacetlurcierpens, iio vaique plantas fubmdc
Pducens: foliadumtaxarpaul 6 ampliotanonfiumquam confpiciijtur, ncqucade 6lp! cn-
d e r i c i l c r f a s a d r i c a ^ r a d d r a d u l u s v a l i i u o b f i t a l u n t.

Invenitur in dnfupiore collis partepoft Monafterimn Ncubt'rg ad radices celi ilimi
Jugicu Cdem nominti. Poftea etiam ob/ervabam inferioribittjugisa Jiaru Alpum, grami-
tjicis lucis. Inicio, A farina effecxitimabam, frulliatamen requirens flofcoloruiriqtios
tyacchiolus fax Afrinx adpmgir. veltigiaifcd flores in nonnullis dcindc planis confpccii,
°timem dubiraionisan (am prscutarunt, ut certoftatuere poflern Tuffila^inis mentanz
S^ nus effc • Maio floret in horcos tranflata & Aprili, ubi formam non immutat, qucm. U-
^odm ncc fupenor. -Ijujusenam caulicufus paulo longior cfi fupriorc.

Sed fub bac men renicogitatio, cam (tirpem quam Matthiolus Afrtrnam appcIJat, hoc
bechium fecundii effc po(Tc, & illi u's iconem non (atis fideliccr fui fice Kpref Tamjin qu a tor-
tan pittorex arida planca, ^ anre quam in flore abiret lefta. emc r^ titis prim um floris ca-
Pitulum difcernere non potuit: certenatales (atis coveniunc. Sed nihi. (pronuntio: licet, lun-
^ Jtmonerc voJuij Ut Lectoribus occaifione in prjcbrem, dc hac re accuratius cogita Ddj,

GALENVS Tuffilaginis (cuiushasp Untulas generacft Tenondubico) meminic fibro vi,
"inpl. nicd. his vrbis: Bcllium ideo fic nuncupatum cft quod ^ w^ as, liocft, tulles, & or-
^ lopnas juvare credim fit, fi quis videlicet folia anda lumcio Sj aut radicem in pruuis ac-
^ ciidens. at cenderitem indcfomiim inpiratu attrahat. Efl autcm modice acris, ut fine mo-
^ ftia. noxiye. omnes thor. tcis ab fcd Tusium per credanir. Sane virentia foliapartes crudi
^ flatnatione obfeffas, illituc xtrinfecus adjuvant, propter aqua: tmnidtraus admiftio-
^ ern. qua omnia viridia ^ encra quc paricipanc, alia plus, alia minus

MATTH IOLVS porro fuam A farinam aflerir, modicam abftcn* endi vim babere/ cd attc-
^ Handi. incidendi ^ pcnndique magis prxftantem: potam drachma; pondere ex mulsa, & -fi-
^ coxymclitca U^ umexolvere, ducce' que craflam pituiratu & atroshumores: idco novos
• Suofdam herbarios pvxferre ad luis venerex dolores & arnculorum mnrbos: danunh-
* bydiopicis, & mot bo regio laborantibus. ncc dteffe, qui ad com itiaics &: rcfblatos cam
Pfpomandam confubnt. nempe authcrbaro perfec, aucejus decoflum: urtnam tierc &
^ cnfes, & verracs intcftinorum necare.

CALTHA paluf: ris quo fundm » fivc potius CHAM^ LE v CE p fenofore. CAP. xv m.

D LANTAM illam circa rivos aquarura SC uliginofis pratis nafecneem, quam vulcus
* Hcfbariorum Calcium paluftrem nonnulli Chelidonium aquaticum appellant, Do-
Vi Tii'. us Anguilara Opinionum lib. xn. C, hama: luccro Plinij fc lcc xiftimar, ij Cienque
ad Juic

Natali.

Tuffilago al-
pina fl.

Afarina
Starchilli

Dachlum-
de Jiltum.
Eius quatu-
partes.

Afarbu
fuit tate.

Calthae
radix.
Chelidonium
ell'.



adhucnominiboseognitamdcit Patavino agro, ouihusPtinius Lib. xxn it. cap xv cam doiat.nempe Frani iPlm.FarraM;& Faifugi] Cl. MatiholusconjmemarijsiiiL'b. I' • Diolc. cap de Tuffitagine, ejus opiniononi alienatur, affentuntor & alij.

Cum verò ilia (utquxm ìngulnirgintiubujii allacur) om.nbusnoca fit, & à reliquis qui Stirpium Historias cvulgarunt, delcripta. fupervacuum cīTei ejus hiftoi ian, hie n- p- terc. iconem tamcn (ubijcerenecefjarturji duxin-us.utconfpiciqicar, qualcediicnn.cnlit in'er ipfam, & aliam quam obfervabam, cujus nunc hifloriam dabimus.

Caltha palustris pleno flore.

MVLTA autcm habet, Ali'id illud genus ì me obfervatum, folia .circinanfcreK^ tundicatLs.fUcculenta, venofa, in ambnu nnnniJul. **vulgansfbitorum** inltar, ferrata: *pt* & dcunt inter ilia pjlmarscaulcs, inccrdum ctum (li udopinguiqucfolo nafcatur] pedaks SC **majores** , obliqui, in aliquot alasdivifi, **qua:** uc plumnum, vulgans more, f fiinpino gencilobmosprofcruntflorcs, uncialibusptiolis inmtentes, mulciplici folio* runt texturi conrtantcSjColorisplane aurci, quorumquinainfenora, reliqua vcfunfU' (tinctiria& amplciSentia, majutculalunr: raHix, non minusquam vylgans, multiscacidi- dis crafliu(cuiisquc fibrisprxdicaeft. Floret codtm, quo vulgans, ctnipore, inccrdum cnam denuo Autmno.

Natalis.

Ex Saltzburgenlibus prcisf in quibus copio^ nafciintelligrbatn) primiiim Viennani **Auftrizdclata**, Nobilibos MatroniscepiceiiemdclitijSjCum.iibc vm-remrpoftca *rtt^tn* c^ Aiiit;ufb VindcficorumaccrllJca: venimnonadeoelcgansut prima, (cdpautohunn* lior: ejus item folia minusvegta, &quafi pallcfencia: flosctiam dilutior , & magu pa" lens. Auguftana? fere fitniles planta* paucnr, invenz iuntprat^quibufdam ulgin»i¹ Francofbro ad Mffnum vicinis, annoM D XCI. aliquot ctiam floreqmdcmpleno, l«* tanoribus folj?conftante, qux in horcum illarar, **feqarsccanno**, fimpjia florum cxtu^j raprxditos**culcrilOtfom** ,mftor vulgans. Abijcerc tamen nolui: nais expenn vokbai¹ an anno M D xcm. il .npl'tcflores porrd ferc pergenr. veriim prr informmumnofl¹ cuirrqum autem LugduniiniBacavorumdetuli.ucilticctiamoblervarcliecrct.iitnpi¹* flurem mibi femperprxbuie.

Chamaecitrus
Zoodiazi.

CETERVM Plinms Chamarlucucc radiccem imptini fenbit catbonibus Cuprtfl' - arqueum mdorctn per infumibuluni uubibi in vetctt tuiE,

AD Tuffilaginis cciam genera, hauddubiercferendaest ptantailla, qux, inomtii-
Ly; Aullnaxis Stiriacisque jugis obvia, anonnullhsCacaliaappcllatur, cujwduo
gcaeraobfervabam.

Cacaluincanofolio,

Cacaliaglabro

folio.



VRRVM mnlnspriditumfolijs, Tuflilaginis vuigarisfolijspxnefamilibus, majoribfls
tamen , medixque inter illius,6caltering majoris, Pccaicis vulgo credicr, folia. quodaioi-
^odo magnju d s. i r e i a t x f r e d t u i t a i s , b a m i t u (c r r a r t s , l u p e r n c c l i l u t i u s v j r e n -
l o u S j i n f t n e m e a n i s , i n q u t b u s m u l r a : a p p a r c i n v e m (i v e n e r v i , g u f l i t s m g r a t i . a m a r i u (c u -
: l) ^ c a l d i , i n n i r u i u r a u t f u p u r p u r a f t : e n t [b u s & f t r i a t i s p e d i c u l i s : c a u l i s i l i b i c u b i t a l i s
j ^ ^ d f t n a t u s , p u r p u r a f c e n s , n o n f e c u s a c f o l t o r u m p e d i c u l i , c u p e r i n t e r v a l l a i n n a t u r
a l i a f o l i a o b l o n g i s p e d i c u l i s p r a r d i t a , f u p r a d i < a t s m i n o r a , m a g i s a n g u l o f a , e t i a t n
^ m b i [u f e r r . u a : f u p r e m u s c a u l i s e x t r e i] i q o c r a m u j i p u r p u r a (c e n t i m m ; a p i c u l o r m c o n -
S c n e m i n f a r u m b e l l a r u m f e r u n c , i n q u i b u s t e r n i p l e r u m q u e f l o f e h q u a t e r n j s f o l i o l i s j i
q i j c n i] o c o n t a n r e s i p u r p u r a f c e n t i s c o l o n s , o d o r i s q u e v a l d e t t i u i s , n o n t a m e n i n -
g r a n t e s - q u i d e m d e i n p a p u i n l e u l a n u g i n e m a b e u n t (p e r i n d e f e r e u t E u p a t o n j a q u a t i c i f l o -
d i m > i n q u a o b l o n g i i m l e m w t e c e r a d i x i n m u l t a c a p i t a c x r u b e u r , f r e q u e n c i b u s q u e w n -
S . l o n g i s f i b n s d o n a t a c f t . f i n g u l i s a r m i s n o v o s c a u l e s a d l a t e r a p r o f e r e n s .
A i , T t , K l v s f o l i a m a g i s c u e j c e a f u i i c (f i f i e l o q u i l i c e t) & d u r i u r a , (u p e r n c f a t u r a t i u s
l r c d r i a , n e e (u b t u s i n c a n a , n e c a n t r i o r e p a r t e , q u a p e d i c u l o i n h z r e n c f i m u l c o f f u n t i a
O t n p r i o r e , p e d i c u l i s v e (t n a t i s i n m x a , f e d r o c u n d i s & : h r v i b u s , * p e r i n d e t a m e n u r i l i a f r e -
S l c r i t i b u s v e n i s o r n a c a , & i n a m b i r u f e r r a t a . i n g r a t o f m u l i t e r g u f t u , a m a n u i c u l o & c a l i d o :
C a u l e s o j j o r e s , & : f l o f u l d i l u t i o r e s : i n c e t e r i s c o n v e n i u n r .
N a f c u n t u r c o [i i e m o r . i t i s j u g i s a d f i l v a r u m m a r g i n e s , i n c e r f r u t i c e s , S C u m b r o i t s
l o c i s .

Cacalia vul-
garia (Cacalia
folia)

rr.
Cacalia gla-
brofolia

Watales.

J ^ B S E R V A B A M S ; a l i a m q u a n d a m p l a n t a m i n m o n t a n i s p r a r i s n a f c e n t e m , f e c u n C a n t e d *
a l i n v i l l a r u m f t a h u l a , c u j m r b l i a p u (f r e i n a : C a c a l i ; e f o j i j s v a l d e e r a n [f i m i l i a : n e q t J c r a d i x t ^ m T i * m * t
i l * l n e u r d i l T i m i l L s . V e r u m a ^ < f A o P L l a i n (e m p e r d f p r e h e n d i : i i e c u n q u a m a b i l l i s r a o n -
l a ^ l s h o n i i t n b u s i n r e - l l n ; c r e p " t u i f l o r e m n e f e r a e , a n n o n .

V M E T S I p o r r o d u b i c a n p o f f i c , a n q u x C a c a l i z n o m i n e v u l g o a g n o l c i t u r , c u m C a c * f j J i j
a u * U i n g a i i d i d e f e t i p a , S i P l i n u t u (q u * & u i n q u e L e o n t i c e n u n c u p a t a) c o r w e n i a t : e ^ t i M t l i e

facuhua

Pctafites

florcns.

Pctafites fine flor.



Pyrola i. vulgarior.



Pyrola
vulg.

Pyrola
alio flore.

2.
Pyrola vulg.
diferentia.

facilitates tamenurque ^{flor Cacalix tribuit à}
T f f i l i i (h d d ^{ostia Caca-}
lia genus estfaculcanbus non alienas. Scnbu¹
enimDio/coridesLib.iiii.cap.DeCacaliA,ei<*>
radicem in vino madefactam ut T r a h i d e!
irrfiu & manducaru per ft cufibus, & arerit
fcabritijsmcden.Pliniusauteni Lb xxxvi.Nat.
Hjft. cap. vi. radicem aClir commanduca-
tam, & c m vino madefafam, non toffi cantiiD*
fcd & faucibusprodcflc.

ABVNDE ctiam in PannoniS,Auftria & Snn>
fponre crefcentem repericbam plantam ih^{arj}
qucvulgoPctafitescreditaest,do<5tionimtam^{e.1}
omnium jtidicio.intcrTiJ Tilaginsrefrcndarn*
& a foliorum amplitudine Tufiilaginemmajor
rem nuncupandam. Eam albo flore vanand^o
aliquando v iderc mem mi.


PYR OLA.

CAP. XX.

V L G A R I S Pyrola binas observabam dif-
ferentias unani .fatis amplum molle & fo-
litum h a erbem: l teris n & us duras. Sol-
danelhe alpins: minutifons folio ferme
Je , nafcentem utramque plcrifque "annoniz,
Aufnst & Scinac Ions, ciimpaulo editioribus
Jmetfrutices, turn herbidas ad quoi undam fic-
ciorum pratortim umbrolo margines romni
autem copiofissime in vobis quibuidam puvia ad
Maurbach Carcfia norum coenobium in Vien-
nensifaltu fitutn, atque ctiam in filvaarci Entzeltorf im langbetliall proxima, quinto ab
urbe Vienna germanicomiluri, fivc fluii rediei it mere. Sedciim vulgarioris historia, a
plcrifque

nensifaltu fitutn, atque ctiam in filvaarci Entzeltorf im langbetliall proxima, quinto ab
urbe Vienna germanicomiluri, fivc fluii rediei it mere. Sedciim vulgarioris historia, a
plcrifque

alijs fit prodita, cam retexere non est operarpretium, ejus duntaxat mentionem crevoluimus, utprolati ejusicone, trta alia genera iplidibijceremus, aneinincante Suam Piiinonicaruro Scirpium Obil-ivationssia'publicunicmiitrcin.adiiucdefcripta. Pyrotan.tencrior. PyroUm.friucaus.



DIFFERT aurcraPrimumgenus!vulgarijcauiculorumgracilitarcj&foliorumflo- »•
u uccnuttatcihujusciii m folia non adcofracanioiaqucfuutjed tenuiaadmoduoj, j ^ *
«onac,i.inambicu tenuilTimckrrau.atriorajpynqucfolium rferentiarftos incaulicil^
garispyroxlJori liinilis, minortanien.&rfrequentioriei fucceduntpentagona.utirt
capitufa ftilo promptneDte, radix etiam (cypit, non minus q Jsm vutgans radix, & C
de nova germinae longis pedicuiisub mutco lacenttbusprofert.
tin AlpiumAufriacarum&rScinacarumjugis.locoumbrofoinrtrfruticcs rou- **'•«
uniquetcreftrem, iedubcrrimcmtiivaiJlajam niemor.-irAarciEnt7r{lorfvicina. Mc-
iaaaolim colliigercinjugis Lfiofann^AllobrogumadLcruanriiilacumproximis.
^cturjjo^jyji,^ interdum ctiatn Augufto,
Miroraucem quid Dalchchampium movent,ut liancinter A mbro fiasco! IjPct, Am bro-
g u e monamm nncupct.quam fi deguftatTcc,non dubitOjquin fenceucUni rautaffcf,
longe a!iatjIiujilSUC.rnPcrameijm nqoam Ambroxif.
E C A N r j s s i M V M est Akeruragenus, iocerduquodammdofruticans: nam
novelli brevesque ramoli, fingulis annis succrefcentes, aliquot annos firmi virideique per-
m-
«nt, 5; (upta tellurem eminent, donee tandem pondere fuo depreffi, humi procur-
J & mutco fe condanc, fibrasque interdtim agatit: fotia ut pliiimum ad iingulainter-
Ubi novi ranmli fuccrefcunt, binajterna.autquaterna lnbct,carnofa, Tupcmc fatu-
nr ^ Virctlti* ^ fpl^{erK}*L^mia Chamsdaphnes(quam vulgusLauceolam vocat) folijs, for-
^ j m:1 gni{ij]dinc propcfimilia, iuambicutarnenicrraca, guftu admodumcxficcama,
camarjesnre, urreliquarumPyrolarumfolia: cxhorum mediofoJent Apnltnova
ic ^ taprodircquefoliolis vclutifquamulispndita,in virgulas tandem dcfinitit^uibus
l qbartmij]jurdumctiam quini in (ideitflores,vulgarijPyrokflonibusfimiles,paulo
DijD^{nm} ajores,exalb()purpuralcentrisquihiihexcufllis,(uccedunrpent3gonacapicula,tc-
incin ^ rfcubts P^{ena} . t jux c u m flits v>n;ulis liicmc cxarefcum: radix, fivepotius
cauliculi fub m /co Jatntes.longe lire^ . fumma tdlure fpargitur,& fubndc fibrasagunc.
Abundè provenit in filv^{is} Enczeforf.generofiDn. WolhjChriftophoriab Ent2cftorf
atci ante memorate vicinis, vii
primium obfervabam, & ab incolis D^{un}ngota (quod hieme vireat) i corumuntcum vulgan'
nomine

Pyrola mi.tnima,

2111,
Pyrola mi-
na.



Natalis.

Lunaria botry w>minor.

Tamul. 1700.



Lunaria mi-
nor 1710.

oonainc appellari intdligebam. Audicbaffl & m Bohemias lilv is r:cqucn:cm , mihita-Mcnilhspcnetranti.dumcodcmanno Yict^ nã iter facrem Pragam , SC inde Noriber-gatn, vidercpoulicuit. Sed &: in Silcfia n>UEQ fimilcm plancam*, iconecsamadditSj fcquctcanno adnosmitrchatdo&ifs.vitFn-dciicusScbizius,DucisBrigenfisMedicus.

MVLTISttam ferpit TerEium Tub fuffl' ilia terr^ cure viciculis,qu*ternaucquatCf na codem ortu mfcentia interdum ^erut to-Uola, Pyrolxprimi, nonvulgarisfvcilliu* tencioris qua: ante hanc certia cft,folijs fot-mafere Gmilia, redJongemiDora,tenuiora> magisorbiculata, 6inarabiCLi.ctiam (er** xa:inter qu^ pdiculus eminct binas fere un-cias longus,nudus, tcnellus, fummo faftig⁰ (iithncns unicum florem /atis magnuq¹, que mucronact^f folijs conftantem, Grao) nls Pand i m i d C do H o l u f e y cam atbam appdiac, florem, propem odum forna referentcui, tteccm rencxis ftatin^u lis medium orbem cxornantibusJ&capitul⁰ in tuedioprulxrante, Itilumquccxrcntf coronuliquinque ndijs cofamcornatuf- fiunt eacapiculatcrnponsliicocfTu fi c w' p g q p i il m i l e menrnutifflimum, fcobislignia vertnif¹* erofi in {br,continct. Toca planta aroaritu* ^dinis mamfece particrps.

Nafcicur umbrofis locis in Alpibus Sitt^g berg, Hochbergerin,DurrcDfla'n&3lij^{sV1}, ciaucirca radices l'ummorum illorum jug⁰ turn. Floret fub fiucui lunij & Julio:fe^{d1} Auguftomaturum.

NON dubium eftquin omnes hz plantz familibuscum vulgan Pyrola facultatibus lint pra-dita: ,quaiidoquidcm eaf dem quali-lares habent.

DESICCAT autem.adftringit, &glorinat vulgari Pyrola Folei l'clui m, recen-tiavulnra&ruc. Idemctiam preftant folia. Eorundem ex vinodcco&um,ti bibaiu^{f1n} terna vulnra fanare creditur,propterca ^ l- ecu njs potion i bus addi 16 let.

LVNARIA MINOR RAMOFA.

CAP. XXI.

CRESCEtiat in Pjnnonicij, Noti-cifque, ex vcterum Gcogtiphoruat &-fcricpionejugts.prafertim vero in prans¹ Clvi5crnguntur,anrequam (iipremaA^p iu m fupercilia attingas, Lunaria illa minor, quz & botrytis cognominata, enjus hiflorã ple-ri^uedcfcriplcrunt, & facultates mirè com-mendartintninternisvulnribus •• <quamq; C.V.Fab. Columns Epimediuro Dn--- cenfet. DciJUautem hie agercnoncK^ mus, fed de alia cjus fpccicranTima, <* quidem nullibi nafcentem vidi, fed it¹ Sit- me fix cjuodam monte natam,&: erurarn.aa i mittebaatVicnnam Aufri^Doaiflii¹³¹ Vi- riFridericus Sebizms&i Achilles Cr¹*TM

Medki.fidaamicitia mihi conjunda ixiim PannonicatiiStirpium Hiftoriam defcrib<cm

DOCK**

j

Lunaria sive motramosa



DODRANTALIS autem est planta, statim radicitus, unara aut aliam foliorum slain, five folium raniosum & multifidum/requibus folijs, vulgan Lunaria: mii Qrisfolijs fere finilibus constans, sed longioribus & craffiusculis, crebrique inci(uradiviis, colore, ut in vulgari, viridilutiore & quodammodo pallescens: fecunda alia, iu quae cencrior, & postremo uaca, tenuiquadam, k'drar. iadmodu lanugncpu bcicre videtur, fijecculentiorque est phma. -cx cju squasi utero, secundum radicem emergit cauliculus pmguis & succulentus, sustinens nuilicidara & majoreni uvam (flonsnc 211 frudticre debcajiarco) quam vulgari, alioqui admodu unifilicm, quian-iiialbam farinam, quem d d u i i i f l f a f i n t i a t n o t i a u f i m, quandoquidem nondum mature erote fuerant, quas accipiebam plantit, inter quas una fuit quae cernos botros protuierai: radix vulgans mflar, multis fibris lae in am bittnn rpnrlis. craffionibus tain c, constat.

Lunaria *****

In altis Sildix moitibii. sgigmtur: apparere autem Siflnrcr^l eodem turn vulgari tempore: nr) bis significabant. loantes Aicholtzius Medtceus Vicnncnsis. ad quem cciam mittebantur ab i) (demamicis aliquot recentesejus plantar, fxcpc in hortum suum intulit: fed comprehendere noluerunt, omnem enim culturam icfpucrc videntur, quoadmodum f) lera: quae alix montansc.

LUNARIA * minoris aliam elegantem speciem mettam ramofam exhibet C-VI Moachimus

Lunaria minor ramosa C. V. Moachimus

lefrins loach. F. Archtaeros Noribcrgenfixe Anglia aliam, in Epitome Matluoli ab i) l) : ili^, nterau; li < Locuplet. ua.

Ceterum * > Irfi) (uam illam ramofam Offitit i & btiffioaf appellant, hnceft, Trichomanes legitimum. Vulgarem veto Itali Lunaria d d g n p a l t : Germani SKwiMHtt & Montant

Statibi

V. INERARIAM aucem esse plantain, omnes Recentiores rei Jicrbax feriprorcs ni- FWMW; d) A : p) CI, TI, inmo/ccascorporistadaras curare, & : cxrrmfcc3sillitam: mirceiam con*L f) idamrad pucorum encciocehu: cota planta in pulvcrem contnta ex vino auftero pot* ul) A esse perbibetur dy) lencricis, & albas men fluxioncs, timui ttiam iubentcs, i) ftere.

DENTARIA, vulgodifta.

CAP. XXII.

Flvs Planrx quae, a dentata radice, apud Recentiores rei herbarie feriprorcs, Dentaria* nenobtinuit, varjae Lintgei) era, amquidc varijs in regionibus observata : (ednon > aia Hefcripca, quia ex his nonnulla etiam ab alijt prodita memonx. Smguibruni tamen. qu) obfervabamu Sjmenonem hoccapitcfacictnu Si abijsexordium facitnr. esjujeradi- ccc) ni aximcdentatam habent, & atpfM* flint.

Dentaria variegata

l) < i vi A. autem Cir ilia, quae Cordo, quae Matthiolo, fiit cogni: a, longa & crassa radice, ex multis veluti dentibus squamatis compactis, constante, nullum caulem, nullum folium ferens, sed succulentum pediculum duntaxa't promens, pedalem, Leimoduri pedicu) ofere) qualem, flonbusctiam Illisforma limilibiisonuftum. coloriscarncclegan- p o i i. illuicucicui abcuruibus, marceditcaulis. nulloque alio plantz vctigiore h d t o, r a -) l i q u o t e n i p o r t ; f u b t e r r a l a t c t .

Dentaria simplicis

Uis loci? nascitur/requentem tamen rep^ricbam in Leyrano saltu, five Leytenberg supra oppidum I VInndcrflorf, & Vicnncnsi i) l v l. interfruiices umbrofoloconafcenrcmj^ i) ^rcutctn. Poftea illius radii. r s f o r t c) i a i n e r u e b a m l i t m o a n n i M. D. xc, m n i o n c i - b o n F r a n c o f u r o a d M r e n u n i v t c m i s & e i u r b i a d S p r e n t r i o n e m o b j e d l i s (c i i m a l i a s t i r - p e c u r a m i i c w e l l e n i) f u b i r b n r f a u s & : r r t i c i b u s c r e f c e n t e m .

Statibi

LT E H * tut. itent-[lae] t. radice m quae habet carididam, emultis veluti denticulis con- o, a) i i i . c a u r c u l i i m , f e p o t i u s p e d i c u l u m p r o f e r e n t e m d o d r a n t a l e m a u r p a u l ^ a m p l i o - p l e n n m & q u a f i r r a n (p a r e n t e m , e n d i c a n t e i T i , f o l i o r u m t p e r t e m , q u i b u (d a i T i) m v e l u t a r u c u l i s i i i U m t l u m : q u i f l o i c s i u m r a *) f a f t i g i o g r e b a t b i n o s a u t t e r n o s a l -

Dentaria simplicis *****

teraanm

Dentaria major, five ἀφύλλος ἰ.

Dentaria coralloide radice/ive ἀφύλλος ἰβ.



cernatim difpositos. ex albo purpurae cenre Sj OigrxvioIx, aut vcrius orchidis fcu lei moda
florum Kmulos, & valtie tenellos.

Hist. nat.

Florentem Augufto nicne inueniebamus ad radices Etcheri jugf (dum illud anno
paratxfJutishumaiarM. D. LXXVIII. pcrfilvamconfcnderemui) (ubabietibus, alij
hujus generis arbonbus. qud fol vix unquam penetrat, nullasque prope alia; ftjrps nafcu
tu: Similcporrò cciam Auguftomcnfcflorcncm pcdalis altitudiuiscaultctiEofaccU*
Irnto. plures fiore omnino nivcos ferenre, fimili forma pnditos, prominentibus ex h
purpurae cenre villis, majorccoptarubabicnbDi& fagisumbrofbadmodumlocorep
ri<bara, dum quinquenio poli. ex Sncberg. cmuitc ibicum venarore irinceris ducc, per
jugum in Rchnaw detccnderem. Scd & ilia amplioradhuc, plunbufque floribus onufi
annoM. D. LxxKix. cruchJturinGlvulaFrar>cofurcoadMocnumvicina, Iuniomenre.

fit. tri*
Dm. V.
mag. J.
pallid. i.

TE RTI * floresruirqui (iqucaucfi. -x, minores, orchidis pumilEfloribusp. iicsfi
tercx licrb^cco pafcfccntes [labrotamen propendcnreexa)bkio, & circaumbilicump
purcisradijsin(Jgiiito;iooJori,fpicixinfpecieinpalmarirauliculocija(ecntcs, fo!
t&rubfiifcisveiuci vaginulisrecoiiditoiradijillratalliiftpoiusalbf
plena, nu His fibriscohirens, amarmrculi (aporis.

Hist. nat.

H. in Cduntaxa: obfervabim Maio menie florentem, anno M. D. xxcin filvS:
pauid iapTA Entzctorf mi langhc thai ante memoratâ.

i if i.
Dentaria
coralloide.

OfIJ-ONG A ieTpit radiceQjiarra. dentatâquKlem. rcdvcluticxmtliscinodiscOti
te, albâ, incrdum ctiam pupurakente, fltbiocexhrenbusnovasprapagincsgeiiCj

oo pediculo, five corice (quæ iccuminiâ terram purpuraicit, poitea vitidis eit) uniz, cna fo.
Fia. quâ pcrumque inteT dum pluia, magmc>i pane inter lc nppofira, altct6q; latere tan-
turn crenatj, co, quod imparcm numerum, & extremæ anz innidet, altaxat utrimque
cre n a u r i o c i d o o f t e i n U f t e v a u l i c u p a l g e f t. r a d i s, n o d u s, q u e m
circa medium bin. r aurternzalx. interdum plures, extnbus ranruniniodorblis, j ^
Jcriptisrefpod' Jennbus. conihntes ambnint, (upema vcr6 pars oblongisanguifq;
nunc le d 6 h l i f e l t d o b i f t t e l i l e d n r q u a
ni. qmnt. aut plures flores, Lcucoi), aut Hesperidis Borum quidem amuli, led minores, quæ
tnorfolij-ialbis aut excandidnlevitcf purpurae cenrebus, præditi quibus fuccedunt fibque
fen cornicula, Sinapi corniculis fimilia, breviora tamen, quæ, unacum suis pediculis, mar-
tescentia, plerumque decidunt & pereunt, nonnumquam tamen crassefcunt & matura, fo-
men se-

Dentaria tri. baccifera.

f. Demaria v. ...




Jen femnt Hefpctdis Temini fere par. quod di/filientibus corniculis excutitur, Sed pnrer
 af cniem >a Jiingulorum fer& folior Lnn, quarcaulcm ambiuntala^& exortum, tubercula
 v?if^am a^na^curit Uf» bulbulis Lilij crucnti illius quod Marragoji pulbiferum vulgo ap-
 baur, baudab familia, ac vclutefquamis compact^initio viidia, deinde pulfa, ingraii
 admodum gulus, qa. «faci) imdecuciantur, fepruaturaf pontdecidunr, ccraqucfe-
 polta, novellas plantas gignunt.

^•pentur, ut putol ioc iicnus in omnibus Gertriana imotanis Clvis. Nfam memmi cr-te- s*t*Mi
 c^Uisbulbulijotmftum anno U.D. xtvil' l. cornice C V. Andrara Hyperio, in filvis Haii^x
 loti prugl Marc purgo, & do& ifs. vtr Ludovicus loachimi F. Camcranus, plai Kam aridam
 ^tucmctcm Vieunam, in Miftiainvcmiifignificabae, cgovero, dumt^icagrem, aJi-
 luotics vicinis Viennxtaltibus. opacitque filvis Aiiftnx^nnx, Catinthir, Paniionijcque
Kvabim ,dcmm ctiam vicinis Francofortoad Mcenum montams Glviscum ilia pri-
 ti/AAy; fi'd& anno M.D. XCII. vir doftilimus idem que polificrinius Ferrantes Inipc-
 Fraricofurtutnadiernittcbac Neapoli Apulia: cum alijselcgantibus ftrpibus. Flo-
 re re a rem folet Aprilr. bulbulinigranres Maio con (pici .alarum cavisinhxrentes.

CA v r. E M protert Quinrapedaler. firmum. rotundum jlevcm^uem, !!! lummoferc,
 *^biunrtrcni pedicuh (rariffitneplareslfinguli terna folja fiirtincncjjatnpla^nucronata,
 ^anibiturerrica, f. ituratcvirentia, ffa(iufcrvido: rummm Ticaulenixornancquiniaurre-
 liflotcSjquacuorfoijs confntances. Dcntarise Heptaphyllifloruma Emuli. deorfum fped: an-
 te s& propndcnr. es, cotoreex herbaceo pallcfccntc; Horcsfcquunturo blongacornicula,
 torora, tnucronata, qualiafunt Dentariam PeBtaphylli& Heptaphylli cornicula, &c in
 •*«ecjam fimilfcmen, hoccd. Hefpctridis fere, fed craflus atque virfcens. quod diffilicn-
 |^{Lo}usconiiculis exilir, antquam probematurum vidcatunatiaprjcrereafoliaaradicopro-
 erf, ternj tanciim in tnguhsob]ongispdctculis nalcenna, rupcnonbtiimolroamplora,
 'cdbrevi Qr. i: radix novellaalbaeft, vctuf lanigrca^multisarciculiifidiftifila. utcplun-
 m' cncibijfcoa^tncntat. i vidcatur, Dcntariiet(p/XAtradici nori valdc abfimilis,
 Ex in umbrolis Aurtnr, Stiris, Carinthi. -c, Pannonixque filvis. non modoad monriu »
 'Ccs. fcl ctiam circa mediam eorum rctfoiicm, ubi praraltarum arborunj filva: ut pluri-
 mum, u^l Atpibushujfmodi/dci Tinerc folent. Invcnmbam&: ultra Dravum, mmoiuc
 Grcben 'mminent, cum Quarcogencrcbulbifero' acque ctiara HerCLniafilvaBohe-
 la
 tn ambience.

Fiber Aprilis • icinis Vicnr^Aufriacscfilvi Sj& alijsliunnltoribuirfcmncprxgnanselt^
 t in rriontibus j lize omnia feritis.



vt. **S**EXTAE à radice nodosa, & in plurimos articulos distincta, tenuibusque aliis uot fibris
 ex articolorum distinctione prodeunt, ex quibus aliquot tota, longis pediculis mixta, in quinque profundas & ad pediculis
 scabra & tactu aspera, saturè virentia, inter vallo folijs, alijs partibus, donata, ambo fastigio quinos aut lenos uores bulbiferæ flores
 ribus similes gerens, colore tamen pabes Viole latifolia non viracis. mian

•It. modum prope Primæ radii, xasperata, & raris fibris inter illas nascentibus prædita, ex qua
 prodit caulis rotundus pedalis, in quo per intervalla quina folia longiusculo pediculo sub-
 nixa, longi, in ambitu serrata, molliora quam in superiore, neque adeo larua viriditate præ-
 dita: flores in summo fastigio Sextæ floribus pestimiles, quatuor videlicet folijs, Leucosij
 florum instar, constantes, colore Sextæ floribus non dispari.

OCTAVAE aliquot ex radice exeunt folia, quina interdum, sed maxima ex parte sepe-
 na, longæ costæ inhzrentia, foliorum fraxini instar digella, hoc est, ut ex aduerso bina sem-
 per respondeant, folium impar extremam alam occupet, omnia in ambitu serrata, dilutius
 virentia quam Sextæ folia & subtus candidantia: caulem etiam pedalem, rotundum, binæ
 aut ternæ foliorum alæ ijs quæ à radice prodeunt non dissimiles, ornant, ejus autem sum-
 mum, flores Superioris floribus pares, quatuor videlicet folijs constâtes, candidi tamen co-
 loris corniculâ quæ succedunt, etiam paria, simile semen continentia: radix minus squa-
 firmata.

Sextam & Octavam ad Allobrogicarum Alpium radices supra Lemanium lacum, sponte
 nascentes observare memini, ante quadraginta annos, dum per aliam Narbo-
 nensi, in patriam redirem, præclusâ per reliquam Galliam viâ, inter Imp-
 Carolum V. & Galliz Regem Henric. II. Septimiam autem Ma-
 tem consp-
 ciebam in cultissimo horto Ill. Viri Ioannis de Brancioni, mihi semper carissimi fratris loco
 habiti, ex Allobrogibus aut Italiâ acceptam. Quin & doctissimus Vir Ferrantes Impera-
 tus, in eo catalogo stirpium bulbosarum & tuberularum, quæ Neapolitano regno nascuntur,
 quemque mittebat ad Ill. Virum Ioan. Vinc. Pinellum (qui meo nomine hoc ab ipso
 petierat) enumerat Dentarias Quinquefoliam, Septifoliam & Corallinam, quam vulgo
 nuncupant

2i

Dentaria VIII. *δενταρια*



nnnciipariat^wi/j^wwdj&a^ levibtsqui-
budam mulierculis ulurpari addmatom. libs
ufquiEii in Paniioniaauc vicims rgioni-
tusconpicerehicit.

Sequitur Ro-
mana.

*AN porr6vctenbusfucnntnot*hsPl.inta:;
nontlum mihicotiiUt.Priorem Cordus Anbla-
tum cognominavi: 1 Germanica voce ditWat/
quaridixilIccfoluiramcKpertcm, quianullain
caule five pedieulo fiore liiftinetuc, nee ex ra-
dicecxunn.iconrptcmntiir, inhacplanta, foli-
a: M.-itc[]iolui,aradiccdt'car3,Dentariam ma-
joremappellavic:mihininoninoniniodeDciKa-
riaa^Ao? major dici potTe videtur^rhizoco-
mis mulierculis 6 .tScwjj n-iirtcl/Uoc crt.S.Gcor-
gij radix nuntupanir, quod forte circa diem
D.Gorgia nuncuparum ,inrcrdum germinare
confpictacur. Alten *Dentaiixdtpubhov* fe^undx
fiveminorismctictidi.vulgarcnullum nometi
inrclexi:c}iieamadLTiodum necTertise,qu? Dcn-
tanaafuXXoe-MpaMwfk N radice corallmi ra-
ini fpccicmreferenrcj a me cognominaracft-
Quartam, Dentariam bulbiferam live baccifc-
ram appellari polFc arbitror: ca aucm cflc vide-
tur,cjnamCorduslib Hill.Sitiipmm u.cap.CXI.
Coralloidemappeilac: Auftrisc viciiiarumque
rcctionum incolaewifi 3<tnkf4/idcft,I>aniculau
alb.im,rht2otomxautcm mulicrcular.qnc mul-
tas ftirpesin Vienncnfi forovtnalcs proponere
fletit^inwi'«i/a f'.cuk.itjbusquibuscam pol-
Qincam imtio Dentariam
lere putant, vocant.

Germanica.

δενταρια cognominata veram, quia tres ille foliorum alae contrarijs inter fe pediculis in
lummo fere caule nacentes, & fingulae ternis folijs praeditae novenarium numerum exple-
bant: tunc *τριφυλλος* appellare magis placet, quoniam terna duntaxat in fingulis pediculis
folia nacentur. Sextam, Cordum Coralloidem alteram, dixiffe, nonnulli arbitrantur, Mat-
thiolus *δενταρια* *δενταρια* prima a foliorum uni pediculo
thiois
inhen
Ber

Coralloid
Cervi adve
htittt mi-
ny Marti

SEPT I MAE Sc oauxmeminicIoliasSinilerus adfinemCoimcnra

ha verpis. *δενταρια* *δενταρια* herba e
diculo septena habet folia, fupremo caule
tge dant axat conpexi] post quos cornicula fubnafcuntur icmen continentia m7hutum i[*<<
fata caude abftrua] *δενταρια* nam *δενταρια* femini difpar non e] compreffum: radix fubell
alba, alabaftri modo fplendens, fquamca. Altera quinque folia habet uno pediculo, [*florcm*
qui *δενταρια* purpurea fcant, flore, vel *Lanaria* *δενταρια* inodor <ef, nen vidiffe xijlime] alias fu-
periori non diflimilis: tota fubftantia iufcuc acris cft, finapi arnutans. aun raplianum. Ad
cubita altitudinem crefcunt, umbrofa loca amanc & laticcs, primo Vere ftatu cracrgunt.

Aliqui Pulmonariam hanc vocant.
Haeo Simlerus, ea Gefnero,
Ioanni Fabricio, & Benedi&o Arctio, veteri mco amico. ac-

Ceteram nullas altaram
piamarum, qixlioccapiredercriptxrun, facultates compc-riWft-ffj#

pr<er cas, quas Viennenfes mulierculae Quarto generi attu-
buunEjiicmpe^Liid cjusra-
dicu decoctum, pueris tormina patientibus propinatum, utile effe credant, undcnomenab
illis plantae in *δενταρια* & quae Matthiolus *Dentaria pentaphyllo* adfcribit Commentarijs in
Diofc. lib. iij
praefectum ad
Lcapwayui^... ^cmpemBOtion^usadencerocclaa^nternaqucvulficr^
ca qux to thoncU cavicatem penetrarunt^radiccs prodefle.

PtvMBACoquorundara. CAP. xxiiu.

M V T O S ab una rad
parte, ad fummum ufque, ramis lentis & feq-
nora, flatidis fere, viridia, fuculenta. iacibus divi(os: folianabet Lepidij, mi-
ramulis confertos, membramaco, & hifpido. tinc'que quodam obfitocaliculo incitifos,
quinque foliola constantes, ex purpura caruleos: (emLi ntrurii, cxiguo avcna: dcglubacx
LL z grano

Plantago

Plain bago quorundam,



Draba I. vulgaris.

ttpiimm
tmittt
MtiybUa*.



Draba pedunculata.

Draba pedunculata.

grano finiile: radicem albam^ongam, digiti-
Tiscrai Tirudmis.unicam, in novella (qualc
hu: exhibemus plantam sed, ubi adolevit, mu-
tifiadam, longelareque icic si pugn, a 9
ad ipfunij Uidr propagines ifte depcnd*nt, c*
put, oovoscaules fepenumcro protercatem-

Provenit plerique Hisparua: & Lufi W*
loci wralidiobus juxtaviavarijsitem Grihi
Natbonctis, & c jusquam vocat Provii K%
obfervabam. Serius aurem floret: in Belgica
cercc, rari) admodum, ftnon nifi Septe Kife^
cique de causa, rum cti florear, fecin adiu-
tantacem nuiqnaifticpervenircport.ft. Vieii-
mautem de una atque alera, quani icniinc
natam akbam, plantam (cum zftaifervidij 0*
curum colligere meniini.

ANIONIVS Nebriffenfis hanc fl. latam Lc-
pidium vocavit. Sunt qui Molybrfinani, h^{oc}
eft, Plumhagnicm Plthij putent: vulgo Hcr^
S. Ancouij di CLtur. Mompellianismeoretn-
pore Dentilaria appctlabatur, quid denu¹¹
dolori mederi crudetur, ctiam manu rcten-
t*. Granatenfes vulgo Belefii vocant.

PLINIO, Molybdca commanduci¹
oculus (ubindcc) i ligatur, vel (ut alij nialiu^{il})
liniatur, plmubi! ni (quod cft genus vitij^{c*}
oculotollitur.

DRABS.

CAP. xx II

SATI s vulgaris notitiam est Draba, & ab
alijs ctiam de (npta: qui i tam in Aultra
valde frequencem obfervabam, no potui
hilloriam alijs cogencibus ft Lrpibus rtonad' J;
cerceprsefertim cum dux all* ftirpesfcie m¹¹
obtulert, sub ejus claffem, mea opinione
ferendar.

PEDALES igitur triabec Drabaca <« ftri >-
tos, tencus, rimos, quos inxquale ordine am-
biunc uncialia folia, in ambitu tjer rara, et
pt-diculum Jaciora, cx riridicineracca, g¹¹
acnuculo tquxaie in lccudim radictim*^
leuntur, frequentia funt & majorz: (iipretoi
cauicsin mulcos ramulos zqualis logicudmi*
divifi, & flofculis quaruor albis foliolon-
ftantibus onuftij fambucium bellam quex Jain-
modo referunt: floribus fuccedunt xtuacapa-
picula, curgidula, & veluti duobus thculi*
confaitia, mucrone, qui cosicparat, protni*
nenc: in ihgulis utriculis uniuin kencon-
tincurradix candicans. tenuis jongelarcqtic
ferpic & quibuidam fibris prardicact,

Nulli fere agrorii margines circa Viennaflii
totaqucadco inferiorc Auftria, liac planrino' J
furnobftij qu? fubinde in ipfa ctiam arva l¹
iiirepit. Florct Maio & Iumj incio. femcn (u*
lunij finem macurum eft. Meinini rciani ^ac
plan cam legere in infula ilia quain hen Rli^o.
danus in duocornua divifus inter D. ^g' ^ij
phaimii & Arclatcm, dutn Mallilum prob
cifcer.

MVLTO s ex eadem radice ramulos huW>
fufbs, profert Prior ilia planta Drabx genfri-
bus ad nuni CMnda. qui terra obruu> aut fubilla fefecondentes, wqc ctiam (uimatell<^c>
ffent*

Draba II.

Draba III.



Serpentes, subinde fibras agunt
Draba folijs formâ & colore inuicem
tio gustus, deinde acris: ex horum medio
res, recti, teretes, videntes, hirsuti, aliquo
donati: floret in extremis cauliculis spicæ in speciem
stant, quibus deculentibus, plantæ oblongæque, ut in
sine, pusillum, rufum semen
liculorum
fondentes.

ttiidckderammocapitcnumerofafbliaprodaDtymost,

nuiicali exeunt palmaies, nonnutnquam majo-
tiniioribusfblijslatioiebafeiosainpleftentiboi
rtafcentes, ^uatuoralbistoioliskon-
mapif fucce(cuntfiliqui, dupLci

commences: rad.xcanc.da fibrosa que est, «qu1, «JJJ
ex^^Talu'cnafcunturramul^ fimilibas fi>hj* P^drn, in toccra fefe dif-

Inuenitur in Tauro monte: memini & Ferrariâ in Belgicam nobis missam ab Alphonso

Pancio, Leucoij montani nomine. Floret maturus superiore, nempe Aprili.

FREQVENTIUS etiam ramulis, prædita est Altera, ex eadem radice prodeuntibus,
tenuibus, dnide in caput extuberantibus, ex quo aliquot folia quasi in orbem disposita
prodeunt, crassa, succi plena, atâ vinitate
est carnis coloris) folijs magnitudine & forma ferm
bus dentata, acrig
Ucilis, quem per intervalla amb

fpicnd''ent; Auricute urfi Quata (qua: flore Jf - " " -
" icrcipoudcnria.lcdnonnilulmlacen-
c: cxhorum mediopedalis aur major
iunt acample^unturfoliafjpsrioribtismi-

Ucilis, quem per intervalla amb
entata, acrig
Crescit in declivi montis Herrnalben, supra Zeehof, villam Cenobij Gamingensis: ubi
sero floret: at in hortos translata, maturus, cum præcedente, nonnumquam etiam ante
hiemem. Fa forsitan est, quam Lobelius in Appendice exhibet pag. 163.

sero floret: at in hortos translata, maturus, cum præcedente, nonnumquam etiam ante
hiemem. Fa forsitan est, quam Lobelius in Appendice exhibet pag. 163.

ap^foIio]3jon7isped.cu .sn,xa ^

^a»strr_sdcS

^Hibwtmencarentem, mihi FrancofiirtidoBabatanno M.D.XCIH,

LL ;

GRACIS

Territur.

Draba cum pituitosa, ad pituitosa pectoris vitia. Semen aridum, pro pigris oblongis misceri, scribit Dioscorides.

TVRRITA.

CAP. XXV.

I. congener videtur Planta illeceatantur, Turritæ nomen Stipiun, cogDinonc & Audio pyramidis effigiem desinunt. Eius autem hinc observabam genera.

Turrita vulgaciior

Turntamiyor. Platcau.



HABET vero Prima, quæ & frequentior, & vni uncias longa, succulenta, hirta & aspera, saturatior, conferta circa radicem folia, bina aliquando etiam cubitales promit cau, colore viridi præditæ inter quæ pedales, latiora, deinde in mucronem desinenti, WΛuoVnQrdin_ataqmbiuotfolia »cirapCJicnliiin scuntur. multi exigui flores, quatuor fo. conferta & nitida: summo caule confertum nantes: quibus disculis, alij apparent, caulis asphigio. senum, veluti in metze for. ^fciittollente, uc tandctn frquentibw lon- gisculis corniculis conspicitur, quæ pusillum, tutum, acre semen continent: ta- dix illi alba, multis hirta u

Maior.

it.

Turrita Major.

Natalis.

Sponte provenit in n^P r que am n n: c n vivacenic ^ n on puto. Floret Maio, semen maturum est Iunio. M V L . A etiam promit Altera secundum radicem folia, Prioris folijs maj i n ambitu nonnulli crispæ & sinuosa, minus tamen aspera, & color dilutius virescente: inter quæ caulem dilutius virescente: inter quæ caulem promit, interdum plures, bicubitales ut plurimum, in æquos ramos divisos, per quos inordinata nascuntur folia, valde larâ sede eos complectenti quâ proximè sequente capite) propò instar: summi rioris floribus paullo majores, quatuor etiam pallentis & sordidioribus, aliquando omnino nivosi, subsequeuntur conferta, ut in prioribus longa cornicula, semine altero aliquantulum cæca plena radactalba^riomradicj crassior & durior, paucioribusque fibris donata, nec vivax: nam altero plerumque à satiatione anno, caules prolato semine exarescunt, & tota planta perit. Rarius invenitur priore, & umbrâ magis delectari videtur, quare facilius in caeduis silvis, quam apertis collibus (quibus prior gaudet) nascitur. Floret Aprilis & Maio. Hinc valde simili (nisi eadem sit) nata Iacobo Platcau, semine nescio unde accepto. Illius ad me

EnfTra campeftris i.

iconcrjn etiati cum varijsbjijs mitrebar,

N O N videiur abfinnlis Braffica: vtgratz ^{Braffica vicia} Cordi, Hiflor. pJjnt. x. cap. xxxi. ^{**a Card.}

BKASMCA CAMPESTRIS. CAP. xxvr.



P E D A L B s haber. hxc Plants catties, can-
liicames.touim^os, aliquot Tam is pixduos, ^{fil} fblia.cxincervjllis, Perfoliatrfolijsnon valdc
ditiimilia, olbicantia, &colorcfereBraffica:
ufualis , caulem iicample&cntu , ucrencfce
pljnrcad Perfoliacam plurimiim accedanc,gu-
ftu { crvido: Eamuli c latcnbus proicu^ces. (u*
ibncntaliquot Horcsalbos, Brafficsrfloribus
limides, deinde cornicula longa, quadrangula,
in quibus continetur fir men Brafficjefeniinc
minus, ex rufo fufcum.

ALIVD ciusgctiu5c(vitfmioribusvitgis, nec ^{BI} adcoramoli>,cujui folia in fummoaliquantu-
lum (errata, reliquis notisaPnortsfolijssoon ^{ft} differunr , &:fervitioctiani funt guftu : Horcs
Prioniflaribusfimlies, majores tamen , Lcu-
coij a>t Hirpciidis fluribus nui>niiudincp>-
rcs,colofcaurem Lunariargra-ia: flori, purpu-
rt-o vidcliccncomicula luccetlenriapfioiibus
'lmi!i3&;liiiiile/cniei)cun,incntia.Ra(ltxtrn
1 hoc quam in alto, Jicer dura i ^{bnisque qui} vjKi.im pridica (it, vivajctatnci ^{non est, fed}
jiroUto Ictmn* pen re fblec.

Frequent rfrurrumq. genus Murciano re- ^K pnt>, ad Eliocrotnm urbt-m, vulgoLorcadi-
iliin,rnarvis&rfeciidumvias:ubi Martio flo-
rebat. Scd Scpamavn^genusfpontccrcfcnt
obli< i vabam magnacop:a, in arvjj Vicnncfc
agrOi Matoflou-ns

BK AISICAM campefbem Iiancplantara ^{*rimia} nuncupavi, turn quia in agris S£ campeftnt'is
nalcntem conspiciebam, cum quia apud quos
n;i.irur Mofciani.ColJcjonappelljbanr.ideft
Br.iAiculjni.Cordusprimam fpecicnonigno-
raviir;ii.iinBrafficam agreftem vocac.quam ve-
nfimilci-'ft apu;t fuos in agris fponce nafec-
tem obfervalle, propterea a greftibz nomen indi-
di<Tc: non ds;(untqui Brifficam femine qua-
drangulo vocent, ineptera cormculo potius,ia
quo(emca,nani fcmcnquadragululum non eft.

Hujus plantæ acrimonia, proximè ad Braffi-
ex tacultatscedere m<iicioeCt, &illLa va-
lucuoem tortitincte.

CARDAMINE ALPINA. CAP. xxvir.



P R A E T E R Cardamines Vulgaris genca>
qugin Pannonia,Aliftiia,viciniqj]rcgio-
rrtbus,non minus lunc obvia,quamincliq\is
Pruviflcjjs quas ante pcragraverim : aliquot
non vulgaria ettarn oblervabam, qu (ilentio
mininic premendaduxi.

V N v M , nigricancibus expurpora ramulu
per terram fcrpit, in quibus, oblongo cjuiden
colons pedicu Jo.tcma perpruo folia mnuun
cur.cirtapediculunguitiora.pcroras latio-
u&quiti orbiculati, in ambitu nonnibil cre-

,in: no tenella& viridia,dctndcdura, nipncantia^aciduloprimumgu/h poflcaacri:
caulic i

cauliciteretcinccro!iacrumpi!nrexpurpiiranigrtcantefjpalmarcs.nul]]!;ai:tr3TifH
(quirnaeciameidcm pediculomlixrcnr) folijsprarcliti-. mucsextremisrciininiider
candidi,quatuor foliolis con}antes,Cflr.dnn)incspraterfifjQi!am tuchlius Iberidi'rij
en pavic, rion bus pertimilcs; bis fucccduncrorofx6<: oblongs filiqLia!,five cotnicnla,
tjrurun) comiculispenc (iniiliii.fcd niinora/crnincetiani {iait}j3licctminorc.plena!
fummatellurcferpit, &:(ubindeparvascandida(que fibraiugic, Ccucafaceramulictr?
obmrispangipofljr.

Natali.
111.
Cardamine
alpina m
ma.

Invenicijnnirivofismontibus.nudofolopotiu^quam hcrbofb.ad Abictura &prxalra-
rum arboiuradiceSjrota hiemceriam virens. Florer. lunij initio.inculcisvco,ecia A-pit-
ALTEHV M, habetfoliacleganriffiraordineinorbcmdifpofita,diurumfercuncia-
rumlongitudine.profundioribuscrenisincira, Sdlacinuta, utSifymbrijcardarains, five
Nafturnjaquaticivulgovocati.folia.hirruu&afperajupernevcclucicinereocolorcafpe-
ra.inferneacrem viridiora.guftuinitioaliquanmlumacido.dcindeacriufculo: ex quorum
medioproditcaolicuiusdocirantalisa^enuis^ilbosfiofculosinrLimmisramulisfcrcnsidcin-
<^ cornicula teretia,parva,ft:menoblcrvarc non licuit: radix longiufuladt,a!bn,qui,biil-
dam fibriscapillata.

Natali.

NaicicurinSciriaeinferioriscopulisadCoenobiutn Ncuberg,quod Alpium cjus PrO-
YinciiCjugoipfiunminenci nomenimpofuit. Florebat Augufto.

Cardaminicalpina in. minima.

Cardammc altejafimplici fiort



111.
Cardamine
alpina m
ma.
Natali.

MINIMA &cenemmaeftTertijplantiila,cauliculisunciam longis,inquibusumb
laflofculorumcandidorum.quatuorfoliolisconftanciumifoliaalata^xternis, quinis,*11
fepccnisfoliolisunicofta:adherentibuscol:liflaca, viridia,guftjagri&f(,rvido:radixalba)^{ai}
tis!anga,quibufdam (ibriscapillatacft.

In ipfifcopulif^{umtl} iijugiSncberg,dum pirnivcm glacialiduriticconfriflam,ft^{riCI}
uncisadpcdcfaliigatisdciaDor(i{ticenitn,cjiicmadmodum&inreliquisvicinisjugis,pe^{ri}
pectus funt ni ves a multis fecuhs col!cdtx3caque,radijs Solaribus funimam fuperficiCDJ "[^]
folvcnibus.adcolubricar.utCncuncispceastngredinenaocjucaEjinvnicibamfiorentcfl
Aueufto,ubini vesjamprinumdifrolvL metpicbant. Invcnirrectatn inTyrolcnilbss[^]
que Saitzburgenfibus monribus,refteD. loachimo CaincrariOsqui cain iiecam ad ^{memi}
sebat.Ex C. V. Geflwri Epiftolisapparctetiam in Helvericis alpihus nafci.

Cardaminicalpina

VVLG ARE nullum nomen lftanptaitatum accipiciam: (ed nou dubium clt,ad C s
mines fat Srfytnbrij alterius genera rferedaseffe. Priori- mcmiiii nobis Machlmiaiiii" • *
fiiini ante multos annos ab A If on fo Paitio^aniculx trifolia: nomine: a quo tēpore tn flofij
nullisBelgicishortisperdurarcbitior.EamcommudmSjrDcoiudiciOjMatt bias del

nofter inter Gardamines re[^]flfuiE, trifoliatnque cognominavit. Tertia Bii Gefnerus, quantum ex ipfius verbis colligere Iter, in Epiftolis Naft urc iolu m appellat.

274. *notia*
Iwm.

CETERVM plantam illam Cardamines, five Sifymbrij alcerms Diofcondjs armulacritpaC-
fimuliginoi hlocis & humidioribL isprati Sji. itcrduractiam hortis fruftifcra arbore confims
tufecntem, quam Fuchfius Iberidem arbitratu efi, prato quodam Occiore, nonnullis ta-
fticndeprefTioribus locis humente, colligere memini floribus multiplici gloro crara quefb-
liorutn (eric condantibus onuftim, anno M.D. LXXI 1 r. Maio menlc, trimclln videlicetance
quam Belgica excedrem Vicnoam Aultrioiefd hurus.

Cardamine caltraplenoflore.

Plantula Cardamines alcerius zemula.



. Similem nunc in Belgicis hortis adiligentionbus rei herbaria: culioribus ab, memone-
^tante bicennium Iacobus Plateau, qmejuscriam iconem manu propria dchncatamad
"Kmitrebat Francofurtum. Eam postea in lignea tabella x priori, & fculpicurabam, uc
^t vulgariis qux simplicieft flore ^cone hoccapite infererem.

*Cardamine
alcerius zemula*

OBSERVABATUR porro a me al. a plantula in Erfchenano jugo fcopulis inhzrens ^uam
'nad Cardainines alterius. anad Suiapi porius claficm ^cic rredcbercm. hercbam. necdum
^pud me conititui in quam clafT. n referenda: ne tamen nutlum locum in his Commcn-
^js obtmere chuicnter acapiciadijciendam cenfimus.

^cnaver6auc {cpcna. humi fecundum radicem expan ^habet mafohola, Belbdis Foho-
nondi { nmilia, rnenorata men, «leviacrimo mapra; dita: cquorum med. o, Knellus K
^aci • "isprodit cauliculi. rarifoliolis fepnjs. palmaris auc pauldakior. incujiis finimoft-
^neptenicrant flofculi, quaioralbw foliolis confiantes; in quibusdam pUntulis coci-
de mftic flore filiqua: five corniculafatis rrgna ptoplantulx ratione, duplici (enc, quem-
admodu: n in Cacadmtncs altenu & fimjlicnicorniculis, femeo conunctia exiguum,
planum, rufefcens. nonnulla acrimoniapraeditum: radix furaru tellure ferpens, nova ger-
^t lafubinde piofen.

*Sinapis
alpinia*

NASTURTIVM SUVESTRE Valcentium.

CAP. XXIII r.

V r N i c o |LK: planta affurgit 3 uel fcd ftatim andice, fi praefolam, inultis alis diviro,
V hirtuto acarpere. vi Kntc. rotundo. pedalis longirudini Sjinferna folia qualia fine, pro-
Mature uon pot Tum. aaijam itiferncn magnacx partec vaferat planracum obfervabam:
^< tamen fubalis cauli inhxrebat. tenuiaciant & muUifida. Nafturtij vulgatis, 8c Iegiti-
Dil. follo-

*Nasturtium
si Valenti-
num.*

Kafmrcium illvc.ftrc Vjlcminuwi.



Thlaspi montanum 1.



Thlaspi...

Thlaspi...

A • mi3t"olroi'uimpyn^ffnm!a,fem]iorat3fnfni
 vindia,4aigulhi,utNafhir;inm:cxrK
aisfettuitttos, (pic/ciffifpecie,m*"<ongcfc
 floculos, q p
 Jt3iiccs,inqi.ubiistoci(Jc ftamina, q
 nclcentibus, (uceJuTit lili(liii)lxbtvo'idua
 bus valvulis five utriculis con flames oijm lO
 gulh promincurejcon cjuidem ftr/gm
ucrcliquarum congenerum, dd
 flexar inquibus Ndftuitijxmuluni **femen:rt"**
 dix est fugiilariSjCandicniijiatis craifa, no»-

Eodernloco, eodem njttempore, ncm[
 Martio, florentcii) h c plantam &: Iti
 jani p eni mvcnieb; 'h, quo Alyilon C
 i, Valciicito vidcljcc regno: & quia leral
 quenotassum Naftui 10 communes
 conlpici Nafu Kjnoinc'n indJW = et
 fqaantu in exgultu judice fe licet perruiles
 ifacultate: hat er.

H v i v uca iententis, nomen inmutate
 non de buer.it Lube-1111, qui ipfo inre anti
 quibus conl. * vit * tflrwi lant nali. itci\$
 notis & pimum obleraus. Eff dnter
 mnlcuariffj bodanum do m. m. acm
 re non (bfft

reliqua necce Ian a mac] ire qua"
 aliquam illi rem certo nomine donat adgre
 die, ut facile ammadvent, quod hinc meaf
 lucet rufones dilio huc & fedato antio le
 gent: ma cenio dnter 5 mlpfas]

ihii
 jorerSBffinitatcmhabet lixe plani
 ca, quamtuni Nalturtio^ Siquisu
 ItirpempatioiLidicioconferct, inveni
 £16mc^onlineprobabiicauli. Nafturtijl
 vcftrisnomenliuicplantajdctii/k'.


TMLASPI MONTANVM. CAP. XXIX.

EX illarum numero est lisc Planta, in
 quaiurngenenbus maxima varictr,
 fjiicitnr,uccxcorum Lucubrationibus collig
 gere licet, qui Stript ImHistoriasferip^
 Eruetiam quzdam genera obferval^
 l^jnnonia.viamfquercgionibus, nufqiiS's"
 mrhiconfpelta.

PEDALI afluigitPrimumgenusrnll*,n^
 nunquamalrtorc, gracili, (irmo, folijpene
 Erallix campeftns, iptiim anipleu; embus
 minonb jstarhcriirnoliioribiiSjdix-il'
 thimallij, quali funtetiameaquarftarii
 dice prodcunt: flosin extremis ramults fi
 ipiofiis atbMs, qtiatuorfoliolistron
 pdoriscxpers: quodeadente, JJtx, **plap***
 propendent fiJique, five tieca:, non bifi^
 inalijS Thlafpigeneribus,fc-dcircinatcf(-"rc
 mnditatis, & m oibem, pcl[xinftrar, cffoi

Thlafpi monunum n.

Tlilaipi ni.pumilura.



unicum in ipso centro n. nentesime, g. flavescens, vltu amaro & acris: radix alba, fi-
 rofert. Natalis.
 ofa. tcauis. fu. nma inter dnm tellure ferpit, *: nova ad latus gcrmira P. acce ad Sneeberg.
 iQvcoiturumbto & locis ad anrem Stichenftain, bqual. Kerckfrt. " Natalis.
 q. rc «» cullulo «
 «adamicos B. m

in maturitatem pervenit. nem in Belgica expressam, vel ex planta ed missa, aut semine istuc nato, tamen a
 non adeo feliciter, ut necesse erat, retinere libuit & hic inserere, ne Typographum nimis
 expensis gravaremus.

NvMiROSA sunt Secundo folia, hami strata, parva, crassa & succulenta, saturâ viridita-
 nitentia, quafiq; ^c ^{ce} ^S ^{coto}; Globularia, quam Anguillara Aphyllantem appellat, fo-
 lio proxima, cuspidate orbiculata, acris gustu: caules plures, rotundi, pedales, aut etiam mino-
 res, paulo brevioribus & magis viridibus folijs stipati: quilibet vero albis floribus ex quatuor
 foliis compositis: quibus marcidis succedunt compressæ theze, Thlaspi vulgaris vasculis
 similes, in quibus semen (subrusum, Thlaspi Cretici semini par, nisi minus esset: radix can-
 didans, fibrosa, lateribus in propagines sepe explicat, & diffundit.

Provenit in declivi montis illius glabri, qui orbi Badenii (in qua calidatâ aquarum sunt
 scaurignes) innotet, quarto à Viennâ militari. Floret Aprili, semen fert Maio & Junio.

At quor habet Tertium foliola, per terram sparsa, Brassicæ campestris foliorum for-
 mam & colorem parvo imitantia, sed longè minora, quæ verò per cauleto sparguntur, qui-
 singularis est, & palmatis altitudinis, raro major, rara sunt, latiorè que pediculo ipsum quo-
 danmodo amplectuntur, Brassicæ campestris foliorum instar, & gustu aliquantulum acris:
 flores pusilli, albi, quatuor foliolis constant, summis cauliculis insident, quos subsequun-
 tur com- in Cretico Thlaspi conspiciuntur similia, superiore parte sit-
 la: duob granula flavescencia,

* Credi h' petris. & fi isq; ibuia, m, umbrali! «tn, n» A, uftnx coll, bus. Floret Aprili, Natalis.

v \ ^ r ; f o m n ; a , . p
 apud collem recepifini. non iit clexi.
 ME MIKI .olimin Allob»g. bos .ciim p:t H: vctios m iUi effecircr in Germaniam
 Thlaspi

Thlafpi mi.parvuraoderato

flore.

Thlafpi v.Hifpanic. albo flore.



W

Thlafpi incanum Macilimense.

1111.
Thlafpi Al-
labigo Cre-
tici pat. albo
flore.

Thlafpi par-
vuraoderato
albo flore.

VI.
Thlafpi Hi-
spanic. albo
flore.



Thlafpi

TKlafpi genus invenirc, Cretico v^Ide simil-
tjus rsmcii floresnu client pacpucci, fed on*
auio uivci: foliorum tatnncnacnojiaj C reu-
corcpondens.

St u &: TUbfpj binageneta licobo Platcaa
rciiunc nafa, lit tpe ante biennium ad me feri'
bt'bat.& ucriuTquc iconcm ad me naittcbat.

VNVM humile, fingulanbus viigisailuTgit*
rotudiSjinpluresramosdiviis, perquos, utp^{cf}
caulcm, fpacla-crant angufta&exrcmiif^{llf}
croiLicnaca folia, Cretici folioru armutj ,act
guituprardita: fummocaulc&excimisr^ni^{ll}>
luk'cbtincur velutiqusdam in unu caputcon*
^ilrxumbi-ilcflorum nivcorum,odoracorun'r

v^Zs\$ (c)ijjs Jmiks j in quibus femen: radix cci*¹⁰
W^— Cretici infl.ir,non vivax.

ALTERVM statim a radice multas emittit vi-
gas inaequales, fce uentibus ramis donatas, folia
illius ang, st mucronata, nullp servato onit
ne,caulem &ramosatribiunr, (a is manifest
scitacoo s: txircm\ varn muhos aibos fti&
levin caput congestos ferunt ubus exculite
fubfecjuunturplanaf ihecarin /pics i'pecic
fccDtes, fupcnonbiislimiles, duobu5utric^{lls}:
con l b b f i d f l i r c n i ^
dura,non vivax.

Pnoi is iconi adftripru cratj Thlafpi pa
floreenn ta • Altcriusaurem , T ilafpi
Hi<panicumfiorecadi3o:quod,an affi nitatem
al>Mm ItabcatcumThilalpi frucicofo :itreo
U!

Thlaspidypeatum,



Alyssum minimum.



femen continentes: radix caudicat & fibrosa e

Lobelij. exiconibusjucJlcLum ferrc nequeo: ejusramenquamexpreiTaln lite damusicon, vafcula bifurca hab« , quaha fere in Cretico: fruticosi vero, fimpliciafunt&mucronata.

NASCITVR etiam plcrifqac Auftrie.&: Moravixlocis, fccusvias&agronjm margines, gram ineifquincultislocis, non minus quam in Belgica, Thla!pigenus illudquodnonuU li Madiimienfe cognoininane j quia juxra Machlimain Belgic* celeb re m urbcm , in qua fupremutn omnium illatora Provjnciaru[nConciiidm, pliuimurnaica[urpublica via qua Anrucrpia m itur.

Habet vero folia unciam longs, dimictiam iata (inx'qualiterai iuortiinatc taulc ampleftencia cauleuipcdjlem aut ampliorem) cineraceicolons & acris faporis: caules inramulosdivifi. exrrremis albos flores profcrunt, quatuor bifid is folijs cofbneis, in caput congestos&quafi umbellarimnafiente^ quibus dccuflls, pauJatun ilia capita fticcrckunt&: producuntur, varculdqucoltendmit HSBCIONatajbrevia. femencdtinciHiarradix albicans, fibrisquibus prxditacft, Tub terra late frprip, Drab* inftar-

SVPRA B. iden Ccs eciam ThermJU vicinifquccollibus, adeoc]; tota illa Collium (montes cnira appellarc flo polTum, fi ad alios iongeccfliores in illis Provincijs cofcranrur) catena, qua: dc inde per Lcytenberg & iipri Madctitorfad Danubiu ufque vclbs Orientem excurrir, copiose nafcitur ilk-dThlafpi genus, hirtutis & veluti circum crofis folijs, quod io fummis cauliculis & extimis mmulis, Bores ex lutco pallefcures profert, deo dcbinavafcuL-iorbiculaca, plana, clypci infatctotmita. mediowtgidala. in quibus c-tnen, qualc nolter Lobclius in AJvcrfarijs ddenbsr.

CETERVM Thlafpi bflcm perfuperna & inferaa purgat, ac tabuli menlura patu. Ifchia dicis inclyfterc infiinditur, porum fanguinem ducit, Sc interiores abiccflus ruuipic, men

ALYSSVM MINIMV^f. CAP. XXX.

np H L A S P i gncribus quodammodo conl genereTc videtur ca Plantula, de qua hoccapuenobis inficutuseftermo.

MVLTOS exeademradice (incredumunicum tan[um] proferre fo!cttl]acau!icos, do d^antc mfttorcs, tenues, magi\icx paice putpurafcentes, perqoos fine ullo ordine fparfa futnumcrola foliola, licj foliolis liaud majdra^ncanajfubacidigufhufhed fahvam quodimadociencis. -rummirjmulijComaHofculorum exornacut. qnintiu epL-rpufillislutcohs foLolifco[i]lancium: ca coma paulatim di de veluti in fpicam Cijplicacur, flbifi

ccduhoribulata& mpr(rxqmdcm, fcd in medio turgences peltutar. five parmulx. initio virides, deiiide (ubflavA-j exiguum rufuoi ^attamen annua

Enjcapefegrina.



Androfacc altcu Macthiolr.

Inuhtm
ft mount.
Lemnu nui
ria-tataviit.



Doanihkciam dentatorum, &: lanuginoftrmn, unde quint aut plures cmc rgunr

NVSQVAM non crefcit Victim
ad arborum.vincorumqv margined,
i publica via feparantar, quinciam *tkcisSi*
gramineis agris non moddAuilri^ fed ctiaO
Moravix, S&Pannoni*. Floret euro Apnlii
incerdum ctiam Maia-

AN nomc aliquod vulgarc obtineat apua
eos populos ubi nafcitur, non **intellexi.** aft
nitatem aute habcfvidcturjCuni eaplaf-
u, quaravulgoHerbanoruin, **Diofcorid**[^]
Alyflbn cflcciditur: aliud etm c^ Galeni
Alyflbn.dequolibry (upcriore cgin<s>

E&VCA PEREGRINA, CiP. XXXI.

AL i QV,OT caucis ex una radicc pr-
dcuntcs.liabethaccplanta.fcqquidJ-
lcs in[crdu,rotundos,graciles,& in his m^
ta foliajObloriga ,angufta,cofta prominentfi
incana, n 6m hi I in ambitu vcluticitutnf*
(**a,acriguftu** prxdita.ui&C]ua; IIUIHfecun*
dum radicc m fufa (unt, qua; pleruquc am-
pliorafunt: floresin furainiscaulibusfia¹⁰
congeftos^utcos, quatuorfolijsbifidiscoD*
ftintes.ErucxfativarfloibiiSiniiiiores.Lc¹¹,
coi] fttveftrisTertiohbrodefaipi floribu*
magnitudine quidno rc(pondcnccs, form³
ramcdiifimjles: ijsfucccdiuafculaicufo"
liculi fubrotuidd, tumcnccs, in binas pait:⁵
divtfti.prominenteinxtreco.mucronc.rc¹¹
ftilojfcmcii fubrufum, acre,com]nentes:¹¹
dix ad minimi digiti cralftitudinem excc^{en}
(cit,candida,nonnullis fibris prxdita.

Crefcit quibusdam Caftcilslocis **iod**>-
tis,&juxtaTias:iibi Maioflorcc. Seminc¹⁰
Belgium miflbnatajnonnifili&H¹⁰.

S v NT qui, Lcucoium fc
vulgo vocarinc: ahj Patavinum
Lcucoion, ob aliquant, ut puto, quam *efi**
folia cum Lcucoijfolijs iimilicudinc) h^a
hcm.Scd mihi inter Erucz genera potius^
fcicndi videtur. Vulgarc oullu nomen no*^{hl}

ANDR.OSACES ALTERA MATTHIOtf-

C A p. XXXII.

ISTAM Plancam in Commentanos
ftros inferre animus non cratjCA
Matthiolofitcxhibica.Veium **cum** illius danta-
xariconcm, &camquidctn non fans
ex p; fllhfliddS

riccamdefctibrenon pigebic.utrci li
x fluidiofi plenioicm ejus cognition^{60*}
qp

MVLT A fucilli folia, b u m i p
/iiorumPlanraginisarmula, fedroinora,¹¹
" nervia.colorecx viridipallefcctc, in amj^{1*}
tude U r i f l f i m f t n w
tamen,locculenta,guftu aliquantulum acru
interquarfeni.inccr fii plures alluy **unc**^{^0}
licul, p i m l e s, verbarci coloris, aliquando
purpurafccntcs,nudi,aliquanuiUimvi
quifumtnofalHgiOjCarollam
que, ut plurimum, orbiculatorem foliacum,
pedicelli,
liculum

placum fortiter, hanc in quibusdam locis in quibusdam foillis donatu, five inqu-
re facit, asidit in irem, & in eius medicullis, flocculim album, in quibusque cinas lectum:
Dareu deinde in irem, & in eius medicullis, flocculim album, in quibusque cinas lectum:
difpar, fcdmajuscapirellacum folijsprKniunla, adlinngcnsnmio^ufhis, pajlopoftaria-
riictcrisdcplfelienduncurradixillunica, teouts, pauciKenuibusfibnscaPilka, nonvi-
«: nam prolaro (emine toc^pfa nca peric.

HAVC plitiwm pro AndrofacealraexhibctMatthiolus, abamtcoaccepram, quix
Syriaallaram referbat. Veniinnonnecciccrat ilium tam procul petre^juaadoquidcin
Auftru in qua vixit, abunde (ubmiiiftrjflct: copioscnipt iiarctur inter fegetscirca Ba-
denfesthermisiTEpnis, mcmoTatasTarqiicadcyJulisVjciicnfiurbi viciins. Aprihfloiut,
fetnec verd Maio&Innio marurum fit.

NVLLVM vulgarcnomen iMiusinrlclxr negligunturcmm plerxquejuriiiodiflrpt;sa
fucis, nilicarum illi aliquasviresexploraslateanc.

AN pon6 hxc fimilesobtinere poHt facultatesquasDiotcondes sua: Androfaci tnbuir,
tncfugit: ^ Medicisiddifcutiendumrelinqua Diotcoruk-sautem Androlaccojdr>chtms
duabus ex vino pocam Jydropsciscopiolanmnamciere : eun di l l d d l p L are ^
2 e i p i t u & l e b f 5 c l r o p e a p d i g i l i i t e r i l l i m i f e r i b i t .

ATRIPLEX SILVESTRIS baccifera.

CAP. xxx lit.



ELEG AKS est hac Pknta^nicqtiideni in
Hit * r e t -

Hifpanijsnon ohfemea,ferfarte b)
niutn artda&d me tudYt FrantofUrfoin,a id-
cobo Ptarcau, ai notay adfcripserat e quibus
qualcanqucillius lufturiacancuinavinms.

AS>=VRGVNT a Cngulanradicc ,putcisfi x'''
brisprzdua (quxvivax non videtur) term ^* 9
aut qu.iternicaulcs,interdum umcus,flatim
afummoradiciscapitcdivtfusinaliquocra-
mospede aut circiter longos, inxquales, an-
guloloSjin terram procumbcccs, mir.oribus
alijsramisdonacos, inquibus, uc^innia-
jonbus, /ingtibia aJccmisalcunciir fcJia,
modoinunum lati>5, modainalccrum dif-
podtajangulota^ualia in Atriplicisquibuf-
di genenbus, incana ad quorum exorcum,
mulci in unum caput congefti orbicuii jfru-
ctusmori rudimentumquodammodorefe-
rences, qui , macuncate,rubcllum coldrcm
contrahentes ,exigtuii morum ementiun-
tur, atq magnani foci plants addunt venu-
ftacem&graciain^uiguliauteni ilhorbiculi
feinencoiuincnrxi guuiii.rorundumjCinc-
ricci color^quslcfrcia Pjpavcrecratcc,
violaccum florcm feronce.

Qui roictebat, Hifpanico femine ipff na-
rain a^ifcribebac; quo autem temporejRorc
&: femer darctjnnullam nictionem facicbar.

SIMILEM poire>pl,intamiiiTyrolenlico,
mitatu repenfle fe affirmabat Doflifs. Vir

Meta Medicus, dum ex Italia redidns per eam regionem irerfaccccanno
M D xci 11- fub extremum Aufuftum , magis fruueamcra , S: luti fmittibusonunam adeo
cigantibus, uciptumctiamadvefcenduminvitarenc.

Secundum etiam in L u p j q
si plama, quam FrancofLirnaccipicbamcKCuiTb.que iiiiemem fupcranresjufequLTHCaiino
valde luxuriantes frequentes cubualesq. H e s i j m u o s t a r o s i l o s j o t u c r u n t , p l u r i
•^osfrullus rubente? in unum caputcongestos ad foliorum exortum nafcentesJubuL-runt
^tafctCKftate ;denique fub AutumnUmuum contabuercunt.

Rvta MONTANA,

CAP. XXXIIIT

•lyf 0 VTA v A , c a J c m ^ . i I ^ . ^ P a c a p i t c d e - R ^ - m e a
5"/cnbic (edejus, cipitcdcRuca, rnenoncm Ucit.herbaclinultisfoLiji per rerram
ltrausiBit)[ndvii?expalUdavir[dititccadicacihLisgravi!Tiii^
Pdonigab radice, que longi est, candida, lignosa, & minimi interdum digiti crassitudine, os-
M M z nosaut

Ruta montana.



KuWU.

Harmala.



Ruta Silvis.

Harmala.

Ruta montana.

KuWU.

nos -tut ternosaliquando fertr Jules, in terrif*
aut quaUTnosramulosfe/ofupcnoic [IKC JI*
videntes ,qui flofciiftinment, hoiKtili •
km ,tnitiortm tame a, &cx lutto p,illefti n-
tem;dcidDc capita quadrangula, in ijuits i<i
tuencontineturtxiicjUigruin, acre.

TotaphunagravifUmi oiionselt, tannq'uC
acrimomXjUt pcrtnpliccscliurothtcasad vo
ginrismanos pencrre, non fenickxpnuJ
Dm! S'i quis, quaeam dL-cctpfir manu. tartiu
demulccat, ilicovchemfnteinflamm; itiontm
excitatjqucniadmodureflidime kripiuD¹⁰*.
fi ondes. Memiui fane, dum Mompellii wij**
bain. Germanuftudioium ,qui m bcibationfl
comitem fcimhiadjunxcratjmonerc. nccitlc-
Et faciem tractaretis quidem a facie ablinuic
fed cum vchemensctctajftus, &: vcrfarcnnor
locoapctto ,a(bUnbusrad(jivaUc illutUaW*
Jtriliq; 8idefero, ijbinullaa!iafiend)um to-
pTa, mcnonanimadvrcnrc, ramorunj hv) Oi
iutxteneriorum, manum plenam Icgit. capit
imponir, dcindcpetafumindticitjcxiflitnat¹*
hac rationCj Solis ardorecapite arcrc poffc:
vcurrt bevi fenfit raodanmo cju^namflcl
Platx acrimonta. Nam & caputiili vchemR*
rer xikaarc cep'tt, & C ea partis frons, quar f tidor c
deflucntc tafta fuerat, totavclutieryfipela^{te}
corripi, excitatis mulcis rubenribus papulis u^f
in urbc rediens. aptis icmcdijs fueric curandus.

Siccis aurem pcrrofsifj; & Sole adullis toff
fpantcnafcirur, ciiiTiinHi(pariijs, tiimGalli*
Narbonenfi, aliJ5qi fervidis regiombus. FlorcC
Innio&: Iuli6, AugLfla femcn maturum cfl. Irt
Belgio aliquoties (ara, altero tancutn i faunc
anno floruit, atq. ferity Seed frigoris fit impa*
[ictLffima, plerumq. prolarisflonbuscorabilif

AB hac difftrrcnon vidccur, quarieminaS
Crptaalliton. it: idtamico, anrto M Dxcit. 0*
roicfequente, nifi quod vcgcriorfucrit & i^**
^is luxurians, cjtia in cultd loco nata: na&-(>
ii a V; Kic tenai cer incifa, & gravis ad nxxld oclon-
ns, florespallidi, quacuorfoliol) sc6ftanrcs, c>'
pitum ruditncca (floruit enim Tub Align ft 6*
ncm) terragona. Miffum vcrd (cm en Rutx fi*
vcftns nomine.

HANC Dioscorides rcsj non ipud & dypcr
vocac, id est Rut. im motanarti &: agrefle, ejus
Ver6 radicem KuXuijnrlr, hoc cfl. Molj' mon*
tanum: forte RuramasPyth3gor* apudP) f¹
nium. Hifpani abhorrccli nondifccinunc, ft
communicum ilia nomine, Ruda appellat.

C m s damnatam refert Dio(c. cccnim<
copiofiusedatur, interficerc: curem, dunicol-
lgicur, inflarc, &! rubore quodam inficere c¹¹¹
pru'Jtufl: vehctnenm inflammationc: in fa*
cicota autem cjus fcmen commode addi.

RUTA SILVIS. HARHALA. CKT. XXXV.

FRUTICOSA h?cc(tplata, multosabunl
radice emittenscauiculos. plunbusranH¹
donatos, pedales, ex viridi nignCantes; i" q¹¹
bus folia oblonEa, dcnfaf, fivcpingua & fcarnolii, faturevircnria, muliifida, Napclltcnof¹⁰
Jijtqucmquidam AntiroramvoeantfoliMiion valdc diflimilia, guftu lento, guinofo, am^a*
rt), aliquatulum tamenmofici. ram scan i, qu oque ximcdjffita j¹
cos, mu

bus folia oblonEa, dcnfaf, fivcpingua & fcarnolii, faturevircnria, muliifida, Napclltcnof¹⁰
Jijtqucmquidam AntiroramvoeantfoliMiion valdc diflimilia, guftu lento, guinofo, am^a*
rt), aliquatulum tamenmofici. ram scan i, qu oque ximcdjffita j¹
cos, mu

Scorfoncra majoi Pannonica i.

Scorfoncra humilia latifol. Pan. u.



Scorfoneraliamil. angustifol. Pan. nl,



1477.
Scorfoncra
majoi angu-
stifolia
Pann.

folia Tragopogo fimiiaj firmiora tamen. bre-
viora, & cju (Hcnv: um precedens fo)is, co-
loris: intercax crefathumilis, palmum vix
excedenscaulis, aliquot brevibus folioiisfc-
ptts. cavusi Borcm in fummofaftigiofcrens
navum, altenferclimilem: iemendeindciti
longionbus cahculis ScorfbncrxHifpanieS
fernini par, minus tamen, quod maturirate,
leviffimo aura: flatu excutitur, flicjusarbi-
triofertur.

FR. Eqv, ENTU funt Quartxfolia, Io«
gTagpogifblijs thihora&ah tui in
rerqoarcubicalis aflurgitcaulis .cavusquid
ille, fed firmus^urus, viridis. aliquotoblon-
gis fblis fcpus, & fupremi parte in binos aut
pluresramulosdivirus, ferentesin longion-
bus calicitjiis, florem St-otfoicra: Anguftifo-
liz floribus non diflimilem, nifi quod paulo
minor iic, & coloris ex cirulco purpurafccR'
tis, jucundiodoris, pafillorum c benzoin^
corfcilorum nidorem quodammodoxniU'
MfKU) /cd fugacis admodum : fena d«n-
dc, oftona, aut plurain fingulis calicibusfc"
mina ScorfoncraleminumsmuJaquxma-
fura, cum fuo pappo a vento cxtinuntur:
radix (ingu)ans, minimi digiti craflitudincta
aquae, dcnfifquc, foris nigricancc, Sc vugoio
cortice obduh, fuprcmaparte hirfiita, *
*iUofa, c)ii:rvu!ncrata, fuccum (.xftillarinic
U a d i d f i f f p. gu a p r i m i u m
gtwnmofo ^ polica aliquantulum acris: vVIX
ell, us

Scorfol. angustifol. elatiot Pan. mi.



Hieraciurni. lati folium.

est, ut reliquarum radice; vetustate crafilora
evadit, & (superiore parte in plura capita lub-
indocciubcrans-

Similis planea est, quae in colle oppido
Stanipfen vicino, duobus ultra Pofoniū Vn-
pari ecclebrem urbem miliaibus inveniri:
nilius campriauangulhorafoia haberec, cal-
licos breviores, cimen cralliuSjbreviuSjCnici
ferine (cminiaequalc.


PRIMUM genus, inHamburgenfimonce, *t**t*Ut.*
ofto infra Viennam miharibus herbofoquo-
dam loco & arboribus circumfepio obferva-
baili Alternm. irimonccB. idciiHbustlicrmis
iraminece vicinir, Juealijs. Ti. TCium 8c Quar-
turn, noiimod6in HarDb'. rgenGmonre, qui
parccglabereft, & c tenth graniined' intaxac
tedus, & qua Autnath (peclat, fed etiam in
vicrao Prelknberg, Lcyteuberg, catenSilla
iiiiontiuin a Calenberg ad Alpes excurrenti-
u Si plenlque Vnganx locis, nascuntur.
Florent *AptiUuMaioiCctnea* interdu Maio,
aut (iib lunij initium maturefcic.

SECUNDUM porf6gentis, Scorfoneram bk
mitem lattfoliam appeiUre liccbic: utTer-
riumhumilemanguftfoliam. Quartumau-
tem, Scorfoneraclaciorangudifolu purpu-
rofloresco^ nominari pocent.

An verd Offili bus faculracibus pr^dica* fine
hx Scorfdrierx^u i bus celebre illam, & t ad c
decantaram Hiipnicam pollere aiunc, ne-
minem adhuc periculum fecifle arbitratur.

HIERACIUM FAKNONICVM.

CAP. xxxvII.



IN sic Ni i etiam in Hieracio obfervatur
varicta SjperPannoniam, Auftruui, vici-
tialque regiones: nam prartercaqu^cum alijs
Provincijs alunt genera, nonnulla obferva-
te mem ini, qua; nulquam alibi fcfe mihi ob-
tuleraac.

PRIMUM autem lonim Latifolio daho, *H; <r^s(*
cuiquinaaaiiclnafunrfaliajiuitii (irata"; la-
Umfof.
ta. Incybo fativo laifolto, non trultum diili-
nulia, in ambitu noni ihi Uiuuofa, interdum
cti3tn laciniaca, mollia, hirlbta, nigricantibus
maculisfxpiflime infeda, aiiquandonullis,
b»9eofuccot0rgenria: inter cjuarcaultsexit
cubitalis, cavus/ arisfoijs fcptus, in quople-
rumqucunicus (nonnumejum alter & tei-
tius) Bos exeraJGSufcQlonigr&q; lanuginehir-
futocalicccnicatjHedipnoidisflorilimilis,
fed pallidior, plenus, nonnihilodoratus: fe-
mendc mdcoblongiu/culLini, comaincana
pappi tnftarpnditum, ut Tragopogi femem,
quod maturum levidimo flatu difpergitur:
tadiKilH minimi digtti cra(Tnudine, tngio n-
quccraflbcorttccobduflaja^teci facci plena.

Invenitur plenque Vngarije, Auftrn fal
I prioris & inferons, atque Moravix monci-
bus, gramincis & fimul apnas locis, ficaori-
biifque pratis. Inveniebam etiam & maculis
lividis, & nullumacultlutignicofolio, fic-

cionbus

cioribuscirca Francofurtum pratis. Floret Maio, (enaenicrumquematurum *Junio*.
 CVBITALES atquectiam bicu bi tales imerdijm funt Aicccraulcs, firmj, rotundi, qu-
 dam lamiginc obfitt. quos mordinara, five confufo ordine nafcxntia, multaambiunr foli
 tresuncias aut amplius 16 ga, unamlata, mollia, in ambitu dentata, lac^e orucco plena: fun-
 jnus catilis in aliquot ramulos finditur, fuftinentes imbricata capitula, c quibus prodeunt
 flores lutci^e nis. duoden JSjaut pluribus foliolis h^e excimapai ft: incifis. confances, medium
 occupannbus mukislucis fibns iradix minimi dfgiticraifitudinc maiquat, muliifq; remii-
 bus fibns capillata, f Ingulis anni JSaugefcit, & ad latera novos, frequenore lqicaulcs proferr.
 z. £jus genus inventur gracii iore caule j angufti otibus, Si vixi « nuucia in lii Uifolij, irt
 rdi quis conueniunc

Hieracij ni. genus alterum anguflifol.

117.
 Hieracium
 m*ui tain-
 fift.



Hieracium

int.
 Hi r/temm
 Bistanciu.

TERTIO cubiralcs criam af Turgunt cau'cs. TO-
 tundi, fuperionbus minus crafi^e Ti^e reueneriori but
 durionbuf que viltiscibitij quos fini iliter confufo
 oidincambiutit inulca folia, (upriorib^{is} angu-
 ftiora, breviora, duhora, non minus ran. in h^e h^e
 turgentia: (uinniuscaul^{is} etiam findicurm ramu-
 los, imbricata capitula teretes, e quibus exorun-
 tur flores, fupenori fere iimilcs: radix ftiperioti*
 radicc minus trail3, perindetatrica/ibrofa, & in
 novis prolibuseducandis **fertilis**.
 i. Illiuetiam genus obfervabam anguftioribu*
 folijs, & multo tongi ori bus, licet non minus dur-
 ris, quodalioqui, rota quodarn modo facie ip^l
 rclpondet.

Magnam verd affinitatem lioc genus habet
 cum graudiore Hieracio apud Uclgas fccuidun¹
 pubheai vias inter frutices nafccnce.

Narcunturomnia in extremitatibus ficciortJ*¹¹
 pratorum inter vepres, ctiam ad cxduarum fi*
 vamm margines.

PILANT^{jin} vM fimilitudofacit, ucdubusp?
 ftremis gencribus, Qjiartuni fubtjeiam, noi¹⁰
 Pannonia natum, fed in Britannia anno *¹⁰ D^o
 xxi. ob Jervatum.

CVSN ALES vero habet id genus interducaul-
 les j triatos j digitograciliores, ex viridi purpura*
 kentcs > quosnu! laferiedifpofica, fed inordinat*
 ambmntfolia. Conyzf majoris folijs nondi/ti¹¹¹
 lia, nonatie 6 tam epingua, lata fcdcaulcmani-
 ple deiuia, in **circuitu dentata**, cxtremo iriuer⁰*
 riata: Caliculi fummocaule ex folioru alisenicr¹
 Ics. lefc explicancijs Tuccdtt (emen oblongiufculum, flriatuni, candicans, quod cum p^l jr
 polcviauradirpergitur, utin congeneribus plai]tis: radice ft vivace, inu Itis Jongis, crafi^{um}
 culi Sjnigricantibukiuc Jibris confante, qux lingulis minis nuicro fio xcm caul^{ium} (ob-
 km procreat.

genus, oblongi-ipediculis in CJentj Vittoffi, qui in lutos flores rcliquis Hieracij fercerfi¹¹¹
 Ics. lefc explicancijs Tuccdtt (emen oblongiufculum, flriatuni, candicans, quod cum p^l jr
 polcviauradirpergitur, utin congeneribus plai]tis: radice ft vivace, inu Itis Jongis, crafi^{um}
 culi Sjnigricantibukiuc Jibris confante, qux lingulis minis nuicro fio xcm caul^{ium} (ob-
 km procreat.

Impcascamaraertliicplanca, nufquam fpontenarcens mihiconlpe^a: fol Londini
 duntaxat. in hortisdodtiflimorum virorum Ioanffis Ricl ni & Hugonis Morgan Pharm-
 copolarum Rcgiorum, quidcliorcum motitanumnuncnpabant, exborcalibus Bi^{ita}
 nizregionibus, inqutbus rponctcrefcit. dc Ucani. Floret Junio & Julio, femcn Augu^o
 macurum.

Cichorium
 otouuuiiU.

ALI QX⁰ T Q^{into} ^"tfoliacradice prodeumia. uncialis ferelaturudims, oblo¹ S¹
 molli crif paque lanugine admodum hurfura, & quodammodo incana, lafleo fucco pr*^d
 tajnterquz prodiccaulis. pedalis u plurimum. villorus, quern per incervalla ambiun j
 ha, ijs, qux ad radicem nalcuntur, breviora quidem, at triplo latiora, & in mucronem celi-
 nenna, non minus quam ilia villofa, amladleo fucco turgenria: unicum fert fuminof ali-
 giocapiculum jemolnshirfutis & incanis foliolis cornpactiirnt nonnunquam auteni in¹/
 teribus alcerum Sc ternum) quod fcf explicat in fiorem Hieracij fibnbus iimilcm, & l^{us}
 folij^l luteo colore tintis con[tantem, & tandem in pappum cuonfuobrcvi, nigrofcj m^o
 cvanefcentem: radix mt; ricat, multis ramencan (Jicantibus fibrisp< dita, i jngulis anni no-

v.
 Hieracium
 tftlit.

vos caules producit. Tora plantavalde amara est.
 Invcnitur in h<boiis Alpmnijiigis, ubi Iu] (o, interdum tantum Aoguflo floret: in H^o
 tis 30-

Hieracium

Hieracium v. viUofum.

Hieracium ri.moncanuta.



tis autem, Maio, semen Iunio perficit. An porro ea planta quam Dalechampus Sonchum lanatum appellat?

Sexti radix digiti crassitudinem interdum æquat, longa, nigricans, tenuibus fibris prædita, summâ parte, in plura nonnunquam capita, extuberans, quæ summâ cellure sena aut plura oblonga folia, semunciam ferè lata, & nonnihil incana proferunt: è singulis radicis capitibus, prodeunt inter folia, singulares cauliculi, duri, nudi, dodrantales, aut palmares tantùm, unicum florem sustententes, è multis oblongis, extremo infectis foliis, luteoque colore præditis, constantem: quo defluente, semen oblongiusculum cum pappo levi aureo flato excutitur.

In omnibus illis montibus à Calenberg (Danubio imminenti binis miliaribus supra Vien-

nam) ad Alpes excurrentibus nascitur. Floret Maio. Aliud ejus genus invenitur, cujus folia nonnihil in l. foliorum Leucosij marini, minus incana: flo- saurco colc vis rutilat, alio Tui per omnia simile. Veriusque planta lacteo succo plena, & amariusculo gustu est.

SEPTIMUM genus, in Pannonicis Observatio fueram, nunc, propter radicis cum illis dissimili referendum censeo. Angustis autem id constat foliæ proximis, carinatis, colore cinereo, digitalis lōgitudinis, lacteo succo plenis, amariusculis; ex quorum medio exilit tener cauliculus, dodrantalis, per quem sparsa sunt rara folia, alijs minora: it in aliquot ramos divisus, sustententes capitula, aliorum more, squamata, quæ in luteos flosculos Tragopogo similes, sed minores explicantur, maturitate in pappum evanescentes: radix nigra est, multis fibris albis capillata, latentibus propagines quotannis agens. Copiose nascens illud duntaxat observavi in saxis ad Garingam Carthusianorum

conobitum, Julio flores proferens.

Ex radice obliquâ & rogosâ, minimique digiti crassitudinis, tenuibus fibris donata, aut plura nascentur folia, unius, duarum, & trium unciarum longitudo, & crassitudinem excurrente, mollia, & angustiora, supernâ vel in medio, bini aut terni emergunt, sustententes flores luteos, semine maturo

Hieracium moncanuta

Hieracium

Hieracium

Hieracium

GrtefcinLeytcohe. HorAqueJunio.

O v A t E *



Utatum
it.

Q^ATERNisaut quiima raJuc prodcNonum gentisfoUjs.Hieracio vulgari forr.3 noti
d.i(liniihbu5,led mollioribus, tunc magis villous, inferne parte glabris, lacteo tacco pie-
nis, & subamaris, inter quae prodir caulis pedalis aut amplioris longitudo, is, grscillis. liipi-
di, terens in fu nmo velun umbcBamquandanncaliculortimctiam vil!ofbrum, quide!ii-
(ccriics, o(lcadurfloiesHicrac') vul^iniflonbuspxnellmLles, leticolorclongcck-gantio-
res, nempeinip<?nscflivos, &: quaiij'jrcos, muhisfoliolisexrremiciifpidecncnatist ^fan*
tcs, inccf qujHiVjihintna, odt>nsijii ingratrlemenin pappumaliorum cotigencrumin*
ftarevanlcci^: radix pi^rcnnis, inuluscanditin fibrisprxdita, fctubindcadiuus Virgo!*
humi fpariisfcfopropa^ins. Fibresp(Oiml lulio& Aii^iifto.

N«mn hoceljpuJ'Baravcs, renune Vienna Auftrix accepto.

Hittuthtn

ALTRA cciani plantaiftic iiiiIn nata (etutneex Italia miffo Hieracijintybacciappdi*
tionCjquaijmcaop rtOMV^vcnusfld Cjchotijgenerarefercodividrrur.

iwitijct I.

EiexlijgularjdiCC ftanm .nultipromic folia Cichonolilvc-fln iimilia, erucc mottoi*
lateribustiivila, ^: vclucr crol, i, deinde^nttrilla nmko'. brevt. 'scauliculo-' minonbus folijSr
minutq inL[iscindns, & in frecnentesramulosdivilbsdodrantalcsauc longtor<<na<ios^
Jiimino feftigiofafliaemscalicwm iivL-capitulum (eprem audKio fquamishirfertiscoO-
ftans, eqtiurtiisexitdcrii^autduoJenis folijsexrenonbus, rorideminrertns, nunonht^
pnditus color s elcgaimsex purpurarubciuu, cui ituccdit pappus, inquooblongum St
graciteftmcnftifcum.

Annua vtJcturplanta, fubin^ctamennovoifloresprofrens, uttotis[lacc, 1mderiam
in medium ufque Autumnum.flondaonipeflafit.

II.

IAM defer ptiscouj jngenduineftpufilluniljfdHieracijgenus. cuju'iiconem ^~: ipfani
deftTipnoneni etiaro Londini mihicommunje-ibitanno M. D.XXCI, ThomasPenn^u^
V.C. liisvcibis:

Hieracium
minimum.

Hieracium minimum pUnra Jodrantatis, aurpaul^alrior^adicefingubrf, tenat, alia,
pauts fibris vctira:foliaabra^iccqmnie lex, (l-prcni. quandoqueplura, bell idi fere, sed
paulblongiora & i (crr. ita: equorom mediocauhsexic unicus, quadoqueduOjVt I u u, >>>
omoino vidui, fiftnlares, jax[J radicem rubentes. interdum versus lumraun ramnli, ratnfS
juxta exortum rubentibus: caules omnes versus capitula, contra fere quam in alijs plantis
oxmberaiwca(liorc<iijcftiunt .finguii fingulacapituta globolalufu^eiUfs, ex quibus flo-
res par v i, lute j, exapicibuiconftautcs, ^undeinpappeicntcscxununtur jL
aiiunufculatlt.

Præcedit



fecerunt, ut maguacxpartraajoribusfolijsorbaconrpiciatur: extremitami flofculo⁵
 exigoj rbv[^]ivucuruace in pappuru cvancfcenresfullinenc: radix oblonga, la&eo fuff*
 inatut. ti vulncieur[^]iicmadmodum&totaplanta. Floret quofuprior tem pore.

Katalin.

Coufpicitut S.il<iuuticnfinon moddagro, poft mclTcs in arvis, & ad corn m margin[^]*
 Cud plurimisaUjs regionibus. Nafeitur fijcopioseperunivcrfam Pannoniara, & vanjs Cc^l
 mriar locis.

Honia.

NOMNLLI HifpaniPrimungenuSjCodem Honiinenppellant, quoPIiyIII mab Uhsv[^]
 cari dixt, videlicet Ynm d(S. Gmtrif: nullum aliud vulgacc nomen novi. Garcir^{'''}ite^{'''}
 wtfy[']Xn[^]xjpcuaiar fl tripn; nuncupatur.

Alrcrum ConunUa: genus viminij', Salmantccnfcs Junqtrina vocantaliq A,
 Nott prartermittenaacftetiamekipusilUpIancaCiclioriteajCujuscoiic'njruisfuJ"
 ribuscgrcgrccpre/I; in, cumreficcataplantaadinmtecbatanrit>M. D. XCHI. iacobM
 PUieau₃cii]usin UisCotentarijsftcqueBS mentio. Eam propter vim males raasosproxii
 Condllam viminalem coJJocarc placuir.

Cmilia
jugina.

ALI QJ'OT aucem illiefumnioradiciscapiteprodeuntfoliahuniifufa, Cicriorijto^{lw}
 rumfacic/cdanguftioradongajinainbicircumrofajqualibusetiamfuntpraedita*, j[^]"¹¹³
 partetuenesviminefvirgar[^]ntcrlhflacimaradiccprodcuntes. pedalis aut amplio^{"^}11,
 gitudinis, nodofa!, quarum ratnuli bifurci incufpidein definunt. nodis fupenortbus virg*"
 rum, in!-crent breviora, minora, ncccircumrofafbj. III ipfisautem virgarum alisnafcul*
 turlongiunbricatalices. eciuibusprodcunciingularesfloresquinquarbljirumniip*¹*
 telcviter inciG₅conlliinteSjCariileicoIonsjaliquorflavis ftaminulis medium flote⁰1⁷
 paiLibus; ra iixi! ltra (fiufculadenfocoHicctedaforLsalbicaEite, longiufula&ransfibnS
 pridtra. TorapLinwlaacofuccoturgr.

Itt>ti*tn.

Semincpergrccepto nau fibi fenbcharTed an femer porro dcdifTet, nt! adrcricbat'
 PRIORI, eafdem facultaccftribuunt Hirpaniiquasriyllo: nimiruinjilliusdeco[^]uiO-
 prjEmotfisacancrabidoutiliterexhtbri.

CONURILL[^]C guratnicum myrrhatntiimaiHnteoappoficum. indarolix/cmil^l**
 rummenfes trahcreauforcftDiolcorides, & inordiratos pilosrepliar. Ipfiusradices
 in vmo potam contra vipcrasproficerc: quar faulcates cum ijsconveniunr, quas (axScot'
 ibncrxnbiiuncHirpani.

Belloniushb.n. Obfcrv. capxci. feribttCondriillfgumriinSyriivulgafacfle. eoqid¹¹*
 licres uci MaUchis loco. Libro item i. cUp. xxxi. aic tabris lignanjs glutiiiis vi «ai przw*^{'''}
 Alteri^{'''}*

Condriilxgenus elcgacs cznileo flo. Condriillaalrcra Diofc.pucata,



Alterius generis in Usum fuisse apud Satmanticenses; quum all scopas confectio habeat: SC
pura, ad parandum ex ejus radice cum nigro melle, viscum, carduelibus aliisque aviculis
capiendus idoneum. Arbitror tamen ipsam cum pro facultatibus pollere. Et Fabius Col-
um^a Cotidril.!. Diofc effecisset,

CETERVM M Do&Lilimus vir T^rranres Imperatui Neapoli ad me mittebat) superiore
Autumno, aliquot tubera feu bulbos Cichorij illius renelhs & gracilibus cauliculis, parvis
foliis & flavo flore, quod a plerisque C^reram ab ipso sumptum, Condriilx genus aiterrius apud
Diofc (toridem censetur: tamen non deint, qm Perdicion, cujus raemithb. t. Hist. Plant.
c^a P^xt. Theoj->hra (t. its; Perdicionem in quo Aoflore Jeger non memini. J^ef T^cjudit t^ent Ple-
t^utiam. inquit, h^cibaccorum ejusmodi radices habent, ut Afbalax, Crocus, & quod
Perdicion appellatur) ci sunt radices crai T^u& pluresquam folia.

Urm Vieff
Impriuti

Perdicion
Theophr.

Herodot.

Mam autem Condriilx nunc nunc bac Imperatus in sepibus, via qua Neapoli Pua^o-
Oⁱ iter est: illic Scrofularia minore, ab alijs Herba di Utte, a Pandestano Stridula dicitur.

Isam etiam anno M. D. XGVI. Hi^upaii accipere Jicbam 3 Do& iflimo viro Simonc dz Tovar
cⁱjurbis Medico.

Doc Tissi Mvs tamen Leonhardus Raw^urolflus, duo alia Condriilac altctius Diofc
Corid-genera observabat vicinis Halepolocis, ut cap. ix. Jib. i. itinerarij cus apparet. In
Mvis, inc⁵uit, ratis abundantia invenitur aierum Condriilx: Diofc. genustadiccl^avi, ex fu.
foflavefcence, fupernapartecirciter minimum digirum crafra, quinq^e vcl etiam oflo
tan versos digicos longa, infitn^apatietenuiore, cuunhxret rotunda alia radix castane^a
ft lagmtud⁷ne, a[#]eo fucoaded plenaut turgeat. Superna radieis pars qua fe in trescauli-
tulos dividit jini Uahabi oblonga & g^uatr inis infar angusta folia, simul narcentia, ad ter-
tn valde inclinata, in crqua T^rprodeunt cau^u(Culi, aliquo loco Iij sonu (t^e equorum alis, Ion-
fufcui exeunt pediculi. fingulj florem fuffistmrcs ?iilo Cdlxmi) om (aux Auricula nmr
avill gonuncupatur) rlonarqualem flavuiti. Non procul inde, a prioribus tamen madf.
*l^ucpctro (s) locis, nascatur aliud infuper Condriilx alterius genus, radice & flonbus
cum superiore convediens, cujus tamen folia latiora, magis villota & cineracea, Holoftei
•Aompelliani folijs ferescimi Ha.

(Writff ml.
utTA frit ft.
Harv. p. 12.)

CONDRIILX alterius cauli Scfolijs concauendivimrribuit Diofc. ejus vero succo, ut
in unguentis palpebrarum pilos restat.

10cullmti-

NON mtnilscopimcnafcunnir inPannonii, Auftria &vicinis Provinces', vulgat Sonchi gctiera,cj«am in alijs region i bus: aliquot tamen ixviorisgene ris iftfc pr^ter obfervabam.quxrilnciominitnepremcdacxiitimavi. Ea/cricqu3d3mH»ccap:icdefenbemusnllorum autcm Hiftoria:lfvvpri5 vulgatifTimijqm valdc laciniofa h*bct tolia.bi" na icoacs prarhendas efle cc.tifuimu^ticcoaiinodius inter fe confcm pc-ffinr.

Sonchus lxvior vulgaris i.

Soochus Uevior vulgaris 11.



C VB IT A 11 autcm vet artiploireMercfcit Primus,quern non vulgarc m obfervaba^ Caulc rotunio, ftrico.lanugine oblico,intuscavo: quem ambiunt mulia folia, dmpla, ^ quotprofundisJacmijsurriiquedivife.extremomucronata.lariorepdciculocaulema^ pkclencu, in ambru nor.nihil dentaca, fubtus aliquanculum incana, Jailco fecrople^ plunmos.tn fummo caulc, flotes profert .purpitrafcentibus & villofis petiotit inhircntcS viceiistblij(urpKJrimum,conftantci,Sonchila:v'js vulgaris i. (cujujifonprsefixaj flo^ bus non diffimiles, (cd elegamiffimi colorisc*rulci, qm per maturitatem in pappum f^ /cniinc cinerco exiguoevancfcunr; radix pollrcari< cflcrafTitudinis, oblonga, non in p^ fundumafla,(edobliqua,candicans,dura,vc l uiiinternodijsdiflir,£la,mii]tasat cumqua

Abunde nafcicuf in Durrenflain locii umbrof!*, in Etftrhero iu^o , paul^i Iufiri Gim,in Sneberg&Sncalben.apudretorridum &pumiltoncm ilium Pmaftrum.

Floretniciluliofif Augufto.qoomenftctiam icmcnad macuntarempervenit. Jn loswan(atus,inatwnusiimit6,imAinterdum tticnfc luliidenuo flotr.

ALIS firrealtimdiniifuntAJfentiuiiiiquarKJo.cjdlc^grjciJiorcirame/),i huanr aut villofi,vel intus cavij, sed pleni & limi, latu tamen tractu contumaces: quos am huanr minoraquim lupcnonsfolia,necadc6inlacinusdiviTa,angu(lioraprarfff3,tri dio lanufcula.dcinde fcnfim in mucronem Jcfincna, in ambitu dentata.lafleo fuccof^ i.euflu amaro: c fjmmis foliorum alijjxeunt tenues firmfq; ramulij quart rno^ tes,co!ore purpurco.mediurn occupantibusaliquot Haminulisflui dcinde in pappuni c fuo fcmine abconi:radix fibrofa,vivax,prioris raJicc tninor,non pauciores tairen,qu^ pis novoscaules produccni.

Cicfcitcuin fupcriorcjaulifupraGamingam abundanter: crecic & alibi,velinu» * ^

2. Sonchus vulgaris

Ittim.

rt. Sonchus vulgaris

Ittim.

I (Sonchus lacvior Auftriacm. c. ruleotio.

Sonchujtevir Pannon. an. purp. flo.



Soncrulsevir Aulriac. v. altifs.



k

Su^{^^} ^-^
fiss^{^^} t'fK! * * *

radix

t

^ juxta piscinas, Sectagnaiitcsaquas[^]upraBaaiJUii Aulinzurbeni, viaqu« Ncapoh^{um}

• NN a

nonia & Hircinia filva, fed minor. Floret ple-
 rumque Julio, vel micrdum paulo marunus.
 HVMANAM altitudinem (uprac Tcnius,
 caule polf icaris craffif udinis. firmo[^]riatOjlz-
 vi. necullisfpinisafprojqumtrcqucntiatb-
lia, quatuor aut alicjuando binis untiim **buii-**
 mis arqualicrrespondentibusdivifa, lata bafi
 & umnque appendices liabentc ample[^]tun-
 tur(dc ijs loquorqu? in inrintio & mcrfio cau-
 lcfunt/upremaenimnullalacitiiashabent)
 omniafpiniindorro, fiveofta, carentia, durl
 tame, &c in ambitu crL*bcmmisarpcri(q. dcri-
 ticulis (errata, fupeme vindia, in/ernc fubci-
 ne rea. laftco (ucco plena: iu premuscaulisvi U
 lisafprfuscit. & inaliquotrarmilosdividitur,
 qui flores xquali alritudinc, & quafi umbelta-
 lum ritunafccn[es, fuftiner, nonmagnoquid-
 cm. pro ftirpis amplitudine, fed Sonchi vul-
 gari[^]ivislutco tiore, vcl cjus qui cxrulcu fere
 florem, pares, Gmilicrdcaliculo villo/bpro-
 dcuntcs. multislurcis&percxtremumincifts
 foliolis medium orbemcinge-ncibiisconiisn-
 zcs, nuzuciofishi mc-dtEulliu flaniimhus au-
tcfs. qui maturiinalba/atiugiHemrcfolvun-
 tur. in qua latet feme, cjus, qui cxmlcum fer?
 florem, Ccwini, valdefimiic, ftriarijm, cinra-
 ceum. quodcumtulanugineavctorapitun
 radix crafu. candicans, fibrisdonaca, fii]gul^{is}
 annis novos ftoloncs proferc, & adnatis ad la-
 traefepropagat.

Sonch * /-
-u-
-mat.

Natalis

Aulinx

Aufttiar'Jucir, & mpraTricbrwinckclpagutn, quib'usduntaxat Ioci4cbf>n^pabair.
ret In Ho.

CVM porroliat plants Sonchifint hand dubie genera, ijWewetfanafcultatibi:
ditasc(Tc,vc;ri(Liikcft.Diofcofidcsautem,V'riu(qucSonchivim reitfgraic.modiccq
adfringere audot efliproprercaacfluanti ftomacho & inflirnatonrKis tilitu prodcllt; ^{hie}
cum.Stomaclii rofiones, lbrbitione niitigarclacliccre, inlanairpofitutu, (edis ac vo)¹
toMeflionibus,opitahri, Herbam auccDi &iadiccm,(:rnplaftri niodo jrnpoitani,(corpt
num iclibus fub venire.

C I R S I V M.

CAP. xt.

SED &p!ura!nvemunturCirfijgenera,quoram (quarabalysnondcfcriptacompric-
Smrs) hiftonam hoc capite pertexemus.

Cirfium Pannonic. i.p ^{rasenfo.}

OrGutn Angiicum n.



1.
Cirfium pan-
nonic.

Natalis.

• t.

Cirfium pan-
nonic.

Qvi »A autfeniPrimumgenusftatiroi radiccpromitfolia,circitertr<u[icras¹⁰
ga,unam lata,(cnfim in mut ronem definencia.latiore vero circa pediculum bafi,fubhirWi
&cKbrisfpinulispercircumferentiam pra-dita.carfij coloris:ex horum tnedio,caulis cm*
cacpedalis.autetiamcubitalis.renuis.firmus,jjnugincquadnm obfitus (perquem ^{fyif}>*
funt folia jsm diais minora) unicum in fummo pterumque fcreiis capuc,nonnunquani 3i-
terum &: lernuoi,mulcts (quamulisimbricacimcompadis,nonnilnl purpurafcennbus*
acutisarperum.queKl in ftamincum florem expanditur.vulgarium Ciriiorum moio,colo*
repurpurco: femenciam illorumfi-mini nondilTmilc, multa laouginc involuluoti n³*
fcens: radix raulcis nigricantibits te du rts fibrisprzdita eft, eamque fupremo capite hirfu-
tam,verufforuna foliorum ncvi remancmcsificiunt.

Nafcitunnrerarborec indeclivi montium iipra Panoniz urbem Soprontumrfcdl moO'
tanispratisquslcundum Danubiumcxternlumur.mulcoaburidantiis. Iumo floret,[^]
fu bj nde ft m en c tia m profert.

PROX i MVM locum dabimus Alccri Cirfij gencri non tnintis elcganti, cujus defcripcio*
nem&iconem mihianno M. D, xxci. communicakatLondiniC V. Thomas Peon*¹¹¹
Loadincniismedicus.

Singularicaulccfthxplanta.cubiraliaurampliorcjfoliapcrcaulcmalrerna, long*.¹¹
mbitu'pmula minimi pungcQte* iiab^atiajqouiii fupma: panes virciu, proox^bital't*

lanugine obducuntur: in tummo cauliculis unum carduonimmodocft, Ban ex squamis mucronatis compactum .flore (ultineis facis magnum, ex multrisapici-
-lorccx rubro pmpurafcence, ac tandem in pappum abeuncem: radix est nigcans.,
-doque pec m agnas ft bras ic prnpagans.

Pravnic in pratis ad radges montis Engleborow totius Aoglix celfiffimi in Comitam
kQtaccnil. Floret Iuho & Aliqufto.

Cirfium ni. oiontanuin.

Cirfiov. congener. Card. bulbor Monfp.



M'vITK ctiamptofert Tertium/olia^blonga. Cenraurij majorisoonlaciniati. folid-
tu «i proptertidum actnula, braflica: folionim colore & viriditacc -, fatis carnofa, ID ambitu
Cre brisacalcis pra: di: i: interquxmedius exitcaulis, cubitalis aut amplior, fttiatus , queni
411 crne ambiunc folia (uperioribus minora, latiore pediculo eum amp! cftcmi 3, 6C vc] uti
memb: anai. cas qualdam a]as, ad proxima folia. lccundum caulis, cui adnar* funr. longiru-
dinem] rodncr. tia , cl dcausicaules quodammodo alati appaent: (urnmuscaulis 10hi-
fpi dnmj mulusquequamulis imbncatum caput definic, quod tandem in flamineum flo-
re h purpurco colore rubentem explicatur, & propendcr. in [iipriorifusalis nafainrur m-
tetdum ramuli quadam lanugine oblki^ milcs fufnncntes Hores^qtnde inde. malij. in pap-
Ntnacbnugine mrcfolvuntur. rfmcnquc in carcliquis iimite oculcaui radix minimi ni-
terdum dtgiticraintudine^liquo: KbnsonataK vivax, iingultsannis propagincse Uco-
LJUS fundit.

Crcfcns hoc genus obiervabamin rromanis quibusdam filvis Pannonis, ut fupra Po-
nitim Si. Memetliwywar, alijsenam ad Alpeftendcnibus, fupra Badenfes videlicet
TJicmas, & vicinis. Fiorbat Itino.

Hujusmetnitiit Dodon-tusin Appendiccad Purgannum Stirpium Hiftoriam, quam
fcorfiin. anccquam Pentadescvulgarci^ publici juris, fccrat:& pnraopolcalocodciert-
Pfit cap xix. Lib. v. Pemptadisv.

VVLG ARE ijfdem Jocisceiamcft montinum aliud Cirfiuin , quodaliquando in Bcl-
* horcis ali memini j Caulicimo, folijs paululum laciniatis, raolioribus quam in (up-
libus tamen floribus, radicc criam fibro(a& vivace.

^ b Cirfi] procu Mubio genera referendum cit id Cardui, five Spins mollcgenus
9^uoii in bicubicalem , & majorem interdum atitudinem excreftit pollicaris craflku-
Jjmiscaule , ftnatOj mcana tomentaccaque'. ljnugiricobfito : foliailii majorsquatnin
j fperianbus genenbus , magis camofa , (ucci pleni, viridia, in arabicudentata, in ol-
ibusque (pims In rta : capita in fummo caule fummisqucramis majora jam ilcfc'ripis,
S«« ia flammcos purpureo colore mcmes florescxpanfa, ou tunc in pappum rtfotvun-

tu.
Cirfium ni-
oiontanuin.

Ratal*.

111r.
Cirfii
ncM. It.

y.
Cirfii m«>.
ntiUftl.

i;M.M.u.

terra.lixfnultLScrafT!sr!bris, Afbodclinos bu]bosfertreftrmibus,&ob!ongis firma
Nafckurinmontariis pratis, cuamadpiJanaruin udos margincs^ inter falices amc!
nasquoque,&harundines. Floret Iulio.

Cardus mol-
hoi i.

Simiicmpanram , Jed longeminorem-mpmisuroi Mompellianaevicinisolirrx
remcinim , quam cum nonnulli , quiinStitpium cognition^ egregte^l vertatieflcnrde-
bantur.ptomontani NardonobisobtrudcTevolcbant;RoficrLobelliuspoficaCjrduutil
bulbofutn Manrpclhctiium appellavit,

Hermin.

K(33-JHpot6 nomine Gracis,Cir(3j autem, Latinis,commode, meojudicio, lixfirpeS
mincupan poltunt: nullutn Vero nomen vulgareillarum intellexi.

A N vcro CirCj veterum facultatibus rcfpondeant, lgrrorare me fatcori&judiciurfl
tie ijs ferrc difficile. Nam ncque Diofcorides fuoCirtioullas virestnbuit , nisi quia ex
Andrea •defcripfic

d'ftm

Cardus

Dodonat.

Ymitsm.

CETERVM non minusvulgarisastroViennenfi , multisqucPannoniarlacis&apu'l
Francoturum, est, quam in Zelandia, Flandix Hollandiaque maritimis, Sparsilla quam
Clanfs. Dodonarusinter Cirfij genera tertio loco •« cuin, magno, valde spinolo, nura-
ceque capite, cquoflosmultis purpureis elegantisTimisqieftaminibusconflaifemergit
&<rxplicatur : floret cum CirfijgenenbusIunio,& Iulio, quibusctiamperfiniilcfem^
tiabec. Id niveo flore variare aliquando mcmini.

CARDVVS M o m b R .

CAP. XLI.

C A I I D V I nomine has I l i p e s a r • p e l l o , t a m e t f i inter Acanacei generis plantas recet-
fendi Non vidcantur, cum nullo l i n a r u m v a l l o m u n i t a f i n e : p r o p t e r limilitudincrrt
timen , quam cuinmollionbusquibusdam vulgansnotitis catduishabenc , in illorum
classe, rejcci.

Carduus molhoi i.

Cardus
molhoi i.
chutiofel



Nvlls.

it.
Cardus
molhoi i.
partifolia

P R ! M v s, multa fecundum radicem M"
bet folia, cum huim)parfa&j.icntu, cum
(urrecla,interneccananiolliqucl. imagine ob
Cta, (upercvirencia.vaidclaciniAta, & ad
medium uique nervum diffcila, Calcurap*
iive cardui muncaro capite , mollionbus ^
tenerioribusfolijspxnelknilu, nit!ttsram^{cn}
fpinisorrentia , guflu primiiim cxliccanW*
dcindeaiiariufculo : equarum medio¹¹¹¹
aut alter caulisafTurgiccubitalisautampli⁰
teres, rotund us, itriatus, purpurafcenSj^
mollu uadam lanugine obitus inferiora fo

q

liapcrinHmumcanlem fparfa.ettam lacin^{**}
ta lunt, licet jam didis minora, qux vero (i>
P
nullislacinijsdivila, mucroieutpUinnii^{*f1}
purpurafecnte: extremi caules inahquot i^{na}
moj incerdum dividuntur (magni u m c n¹¹
partefingularesfunt, unicumque !uflin^{cn t}
caputjquicapitula/uftnicnr.cxiiiultis ten^U
bus fquamisimbricacimdilpofitiscorn^{0m}
ta, moljitrecbinata,quorum medium,
cupat [bmineus & villofus flos , colons p]J^r
purcielegantifllmi: Hori flaccido& euan^{**?}
(uccedic lemen angulolum: radix digit) ci^{*1}
luidinem nonnunquam arquat , fafafu^{*1}
lk>n^a.aliquot hbrisdonata.

InveniturrouiJlamontiumcarena.qi^{**}
Calenberg&Danubio.cuiiminct.ad A^{l*}
i?es ufque extenditur, Sc dcindc per Ley t[^]
berg, rurfumque per Prcllcnbt.rg &c H^{**}
burgerberg ad Danubium duobus /upra I^o

fonium milianbuselle&inur. FloretMaio, fcmcnperficiclunio &Iulio.
PEDALI afTurgit Alter caule, urcumquccraiTo.ftnatcnonni hi IJanuginof:toliz¹
circa radicem majora,L:ipatlifo!ijs fere Umilu.aur potiusillijplantx,qu.ijn vulgo i
tam bonam fiva
B o H H d c l g d q h p J i c u A a A e n t a t o r a¹
dammodoanglofa.cxtrema vcro pane mucronata, in ambiualinuatmikim
mollibusvctutiaculisoblitrupinapirtevirentiaproiuverdomjitnoinean
Gruata, &
a, foliorum
albu

CarduusEaolliorn,"



albacPopuli in [tar, it detlsalanuginc obfira, guftu initio cxliccanc^cmde amarmfculo, qu^ verocaulctnampleftuntur,minDra flint & anguftiora, ex quorQittiu circa (iimmum caulem ramuli exeunt, term, quateriM, aut pliuafuftinentes capirula (quamata, Cyani, aut Ijccarcjpicullsrcfpondentia,qu3c,dii expandunturfloi^cm pro Blunt ex caerulco purpuraiccteno, &C feineu deinde continent lanu^ineinvollitumj cyani fsmiini nonvaldc diffimile, fed paulomajus, candicans: radix nigra, aliquot tenuibusfibrisprxdita,dura, vivax, c latribus propagines Ipargit.

Huncruebjin,circafccunddm Sncberg, ^{Natalis.} excelfi admodum montis, jug^ini inter (axa nalcentemcum Auriculaurii Havorloreia-cano folio: deindectiam in Eitchero. FlorebKutroquelocomclelulio. Vicnamrelatus Sc in Itorco repolicus Icmtt; tulit Augufto,dcinde perije. Vbi tamen rp5cc nafcitur> vivax eft: na rupcriomannicaulesaridosretinenrcm^umflorerec^cprchcndcbam.

HVMUOR. hiccft,ncque palmarem alcitudinem excedit.cauleno minus craffTofermcquamfupertoris, niulcislongisfblijsexornato/upernectiam virentibus,infernccana (non tamen ade6densi, utfupertorisfolia) Unugine vcfritisj Simollesqualiiam fpinas in ambitu obtinentibus,gu{tus etia amari, initioautemadfringentis: fummocauli JnlidcrfingularccapituTu rquamatum, majujquam pneederiscapita,exquo fios mul-

clti»*t
mof»n*
"i^"
*""

Uanugrncxca*rulcopurpurafcentcpubercnsexoritur:fcnienobfcvaren6potuL:nani injetfi aliquot ftripes in hortomaguadiligentiaexcoluctiin,quailoconatili & florentes &:nondum tiorentescrucrani.ad frugem tamen non perveneru^fedpaulatimflaccefcen- Spror[us tandem concabucrunt &i. pericrunt:radix nigra,8i ficqucaubus lubnigris fibris *dita3fubindcnuva germinaclltenbusproducit.

Ctefcit infummisSncalbenjiigis, cum Auricula urdquarta, quxgJabro&fp/cndcnM ^folio,canicolicoristort:. Floret vtro Julio Si Augulto.

Natalis.

GENERO atque Benedico Arcno notus fuisse videtur Prior, exrcJatione Simlcriad Comrocntanjdc Abibus,quicum fe defcribit.

f ardu / interCar C 1051 eciof pimus foja habet mollia ab ura radice ercau- m rara,qux retrcrur folia herbs quao Cll6Mum nominamus:alcitudincubm jnaltum irgicauifmsmo Chafafignula^Qrordubing^Qrudea^ubinoq^hjaq^tbc lura p a , color colhct mixms viridi tu in capitibus,tum in fupremti foliolis. Mollis eft 3U,&: cciam Ipinisquas xmulacur,iiam non pangunc. Radix fubeft ionga & bifida.

Ebditid
Gifum.

UtamHorum varier;irem in mcononob(crvabarn,ft:d tocoillo,qticui dtxi, traflu&cirulojuniusdunraxat colons ferenterti florem,ncmpe purpureumelgantiflimum.

CARDVI etiam molliorisgenuselegans.prxaltom^radicccrpenec, vidcrememini in :ulti/ntnohorcoC.V.Ioaciiimi Cammrij Rcip-Nonbergenfis Mediciprimarij:cujusdc rcripnoncumplcrirqucalijsfummadiligenciaobfcvatisinlhidororumrcihctbarixgra- urn breviufluccemifTurum fperjinusitamctfi inadornadi^ Matlllioli Comcnrarijicjuoi acermanico fermonc loquctes fecit,& valdc illuibavir, Sc iifdera in Epiromen contraheni- iisUtinc(criptamegregiam jam collocanroperam.&multasnovas icon esintulent.

Cardus
wmuc.

DE i(trtrumPlajirarumfacuItatibusnil-'ilpronunciarcpofnim,ciin.idcillii,ncqucaru- icis, ncqueamontanisvnaconbusquidplamiiitellcxrim. ExearumtamcnqualicatU &ccniprame[uo,pcaorc;snicdicifacilejuditabunt.

C N I C V S.

CAP. XLIt.

LiCiTiMvsCnicusvuIg.iriscftnoticirc,atqucilliujurus,omnibusraticognitus:decout ganiusjnoaefloperxpretiuminainqiotquotdc rc herbaria rcripferunt.&cjushifto- nicJerjnt ac icuncmpropofuerunLEiin umen hue intulimus,quia dealioCmei ge- nre,quod in Hirpanijsobfcvabam, futnusa<2un,cum quohujusicoacoDfernpolTit.

VNICVS

Cnicusvulgarii.

Cuicos alter Chijt, cxruka flew.



Cnicus vulgaris V H 1 c v s plerumque, Alteri Cnico est caulis: interdum flatitn a radice dividitur in H-
nos. trinosaur quaternos ramos, cubitales, firmos & r Ijgnolbs, permdcaci p'e caulis, nulli*
umen, aucquhmpauciilimimalijs ramJ5prxditos: folia pxneCnicivutgaris, candidior^,
paul6longiora, & pluribus venisd]ftinc^a: capituhCnicijClq'jamiN, imbncum inftar, fib'
jnvicem jnipofitiSjConflatajC quibus fios colore di verfus: nam luteus nun ettjk'd ex multis
lhminibus xmk'icoloris conlbrfemenCnicifcinine minus & iubrufum: radix pollicis
lis cra(Trivdrv« tft .carnota^licculcmajfotis fufca, uon atinua, m vul^icis radix, fed aliquot
annis iucerdum permanens.

Carole Circi Cordubam in (egribus & agro Htfpalenfi tnventtuf. Floret Main & c Iunio.
NOMEN vulgare, quodfciaijnnon liabet: (edeuratotapropcmoiumfacie vulgarcro
Cnicura rcfra, t, Cijicum alccrum inncupavi.

Maritima CNICVS autem legitrius Grxcis MKW. Mauritanis, f^r/i)ff, aquavocc Officin Car-
tamum appellarunt: Ita!is, Saff*rjae Sorsnefcj; Gallis Saffrun bajj*rd, grA! »c di Per,
qntidc jusicmnc Pfictacos aleretbleant: Hifpanis, tUftr, i^CMfrsBfatvajr; Gertnani*
K&r Oaffiaiii Alterius nullum nomen vulgarcnovimcque ejus facultates Lupertas babco>

Yonicata DIOSCORIDES verofcnbitjScmimstuC&cxprcfnrucum, cum iquaniaJii»^{v^c^u}[C
gallinacci, alvum purgatCj led liomacboaJvcr/ari: lac togere, & c magis ipliina rc/oiveiw*
alviracukatcdonare.

JCOLrMVS THEOPHRASTI. CAP. UHI.

Scolymus THEOPHRASTI Scolymusa Dioftondis Scolymo valde Jirrcrt, ur peritiores qui-
J. nescocofent: nam Theophrasti Sco]ymiisi^tiotustviii'l'c vidfrurDio(ci>jidi.O
dis autem Scolymum probcnovit Tbcophratiis^LiiCadi appellationrcumdonat.
autem de Theophr3(riScolymo hoccapiteagcmuSj&fubejusfinem, Diofcondis Sc>T*
mi mentioncui (ubijeimus.

Scolymus ALIQUOT autem prof'ert ab eadem radice. Scolymus Tlicopli ratli. caules cubitaic
ramofbs. fpmis horrentc5, a(J quorum fingulas alas naicuntur iature virentia folia, tif^o
Cc albs fpinu hornda: flos illt luicus, Cntci fioris ferme inftar, quibus fuccedit fmcnlatum jtbliaccum. l^uamatimcohaTens: radix autem I<n|aeit>
gitalis cralficudinis, carnofajdulcis, qua(acsnon minus libentervcfcurur, ^quamit T^
gtj vulgarisudicc. utcjoai Kiuotics conrpexi, dum, Salmanicx vivens, ubi cax
an
lupium



ScolymusDiofcor. Ca&osThcoph.



fürpi'um cauia.vicina circa eam urbem loca.per-
atjrrart'm.Tou vcro plant^rccens a'dhuc lacto
fucco manat.

S.ilniaiitict:n{iajro,tctac^acib^Castella.fre-
C'lentiflimaest haxplaata Integracitac floret,
mterduai etiam Aotmutio, /ubinde /cmenptot-
terens.

IL L t fimilcm vidcre memini circa Mompc-
lium.fcd multmagiiluxuriantcm,lo!igioribus
ramis.mmus tamen frequenibus Bon bus,3c cui
folia veluti laileis niacuhsalperla (int.

THEOPHRASTI OTtoAy|Uo?i:flcpiitatur,cui ra-
dicemti | nit lacte b succum emittetiem eam-
que vefcendam tum dcco&a, tiim crQdam (cri-
r b i c Jib. vi. Planr. Hiftor. cap. iv. Anguillara
i Eryngiutn Vegctij clfc arbicatur, qux, ni fallor,
j^caufafuic, uc.inonnullisLryngiumlucum.Tp-
Ipcijjretar. Salmancicenfcs Silylnmi nuncupa-
bjnt (Silybum umen Diafcondinoact) ver-
naculalingua Ctrdaxlechafivctechar^dcft^iT-
duumlaitcura.Belloniuslib. (. Obfcvationum
cap.xvm. &xxv.aCreccnfibusvulgjri Grrco
tetmone a<?xo*vfj.£pasdici tradirragro autcmRo-
mitio Spijj *#-^j;atque vcceribuslatinti Grrco
nomine Glycyrrhizonnuncupatum x fli mat.

S l 1 d i n s l u c p a n t a m,
&Cprimum germinantra, cum ipsaradiceclo-
tam, crudam, autcutncarnibuscodtamcdunt-
ipfusla<fleo fucco omncflaltjgenuscoagulaiu*
enamejusflore crocum adulterant (tatnetfi vi-
cintslocislaudatum crocum abunde mftatur)
ut qux. J am a hz natiouci cnici flore

W^fJmM Srijf
•£- j
if
•A

f
Sifhm.

Cardon iis

...r"n»- fpontc na'cimr pin^uibus Luiiranixarvis, praclertimadAnarn, veienbusapf cILCun; 1 f*;*j.k. nicn.vulgo *Gnadt-triLfiL* plcnique eriam Bxticxlocis.

I LI. i vs radix Diofc.tcftc, graveolnciamalarum,rotiifquecorporisemcndatj illic item li Jeco&a,in vino bibseur.Coptoiam autem urinam furtidJinque expeihr.

C A R D W S ES.IOtEPHAI.VS.

• CAP. XLIIII.

Carduus
arvensis.



HVic Carduo mulca initio lunt folia, humiTparla, magna, tonga, valiyclacini- nioi.i,fp)iiiiiorrcn[ia.pronaparrccanc(ccO; tia, lupmiiuacem, vindiiquidcm, (cdrenui quadam lanugine obiitaunrer qu^fCubitaliSt nonnutnquan) longt arnplior excicfcican* lis, cr.iflus, flnatuj, inmultosramosdivirus folijs autiimilibus ijsqoar perterram fparla, aut minonbus, inord mate cum & ratiioi cingentibus: lummis ranoij innalcuatur fli capita, mukis aculcis piardiu, *td* ed denta lanugine involma, uc ipitiarpa ululum dmtaxat fuijncant: apricniibus i'uic c *spitibus*, tioscmergit mukispurpuren ffatni *nibruce* ftans: cui liicceditpappoinvolutum *femciit* *fploendens, longiuicolum, quale m mu.Ji5C** r- duis: radix l«nga, paucu fibrispiardita, *polli-* carem crailitudincni excctfit, & foris fofca clt^uibultiamfinquibuslpontcnatctcuTjlo* cisvivax,iiialijs minimi?.

•Obfcvabam primiim hanc plantam anno M.D. LXIII. Salmaiuicnfiagrolocisapcujs & nonculcisa nacentem, cjulquicicmcnami- ris in Belgium mictcbam, addita infcriptto- ne, forte *Cerona ftttrum*, quia multixnutil rcfpondere videbam, cum ca plants, quam Mi)nachi, Commentarijsin Mcfven, fibiiⁿ Hifpama contptiSain, Coronam fratrum »p" pcellalR-nrj quoniam rami^quali p*n£akitu* dine nafcentes, & fiiis capitibus erioplori*

onalti, medium caput, reliquis majus, fummo

cawli innatum, quodammodo in orbem cingercut, ut monachi fuum Abbatem aut Prio- rcm fbleiit.ExquotemporeduiapudBelgas (ubifelicirerprovcnir, & inmajorcmaaip1>' tLiJincoicvaiic.nullSfcrvataramorumextremorumacqualmcc) Coronxfratrumnom^ obtinuitipulcatafnacapitibuscandicaiHclanainvoluciSjCOnvenicnciorcappcllatibnC CuduuseriocephalustiiicGcpit.

IMilt*1.

lum dettidentainusvegctum&Luxuriantem, quam in Belgicishortis, fpentcre- fecntem repen mulfis AuJtriai&SririariJocis, prxfertim vcoati Ncuberg& finnljum Ai- pium radices, ubt interdum floiem vanantem, & albis ftaminibus conftantem fer- reconipexi.

QVIBVS porrofaculratibus peculiaribus fit pra:dutum, ncquego intellcxi,; neque qucnquam fecifle pcciculum arbiiror.

CHAMELEON SALMANTICEN.

CAP. XLV.

Chamaeleon
Salmanticus.

•r; X Acanaccorum getierc eft hare plaiwa: caulcm autcm pedakm liabet, ii interdum Jd etiam cubitalcci, multis!isliveramiiconcavum, flnatum, & quafi fvMeJdxr, o~ rum tamen&rirmum: folia nutncrolaJonga^anguOa.candicantia.lpinishorndariummi* ramisveluumbcllaquxdamexquinisautrenisca!iculi<. (ivccapUL-llis (pinolisconfitao- tesinnalcuntur.inquibusflospurpurdituno^qmdnaturofcmincjfbindcinpappu¹¹¹ evanc(cit,reliquorum Acanaceorum more: femenc(tnici(cminisforma,fedmi>us, f°' ris fuboigmm am cincrci coloris,intuscandidurD,dulcc: radix nigra,dura,,fi guftctur,dul' cis.Tota p^anza.ctxMt!uJ'nic{l,£ rirmarum ipinarum vallo munita

XMilt'.H.

Agro Salmanticcnfi frcqutrns in arvis.cum Scolypo Theophrasti. Floret Julio, i cimen Augulto matumm est. Apud Belgasnatu/cmme ex Hilpanijsa me miflb, *altius affargo-* ba^ncque adc6 candicabat, & fem en raro ad piaturicatcm per ven i«bar.

Chamaeleon Salmanticensis.

Cbamlconatb'Diofc.^Thcoph,



Castina elatior, Chamxlconalb.vulg.

VocABAfvRa SaTmanriceriibus Clu-
milcon.tamctfi hiftoria profuficfirageiur: af-
fimitaKm tmcn hiberc v.dctui ,cum A plan-
ta, quam **AnguHbn** pro Chanwreioitf oigro
Dtofcondisxhibct.



CETERVM, Chamxfcor.albusDWcpri-
dis a»cJsl»Tlieophart:csiilnnams, in I an-
nonix, Aulbrs, **SEW MOH** andcctmbus
imobrervabitur.capittamplo.ecUinato [ex
quo flos mulris ilbw folijs ctrca orbem me-
dium nafcemibus confansjnGnwraule c medio
folionimlipjifulorum.tongowmSemambi-
wlnaotonim,acquefpinis«maiorumeiirt-
gen:c: radicc craTa, dcnfocottice obd'jfta, »

Chamaeleon
albus Diofcor.
in 2. cap.

SED mulco frequentiorinveniturAlrcril-
Ic ooi itedalcm caulem adqum, angular*
h b f l i j **inmoltasIaciniMdivift,** non pau-
cioribusta a, aculeis
horrida, caput in extimo cau- s amplum,
floréoque minoremitadix perinde crassa ac lu-
pationis, fons etiam fusci coloris.

UTRAQUE Carolinz, à Carolo Magno,
nomen adepta, sive Carlinz, qui illius usum
primus demonstrasse creditur, Germanis Eley
wuz dicitur.

Castina
Ebenurtz

ALIA verò est planta à •qujbfadam Carl,
na minor appellata, humilis LZ ut plurimum
caulis exsert, folia habens, Secunda Carlinz
folijs non valde dissimilia, saturatus tamen i-

Castina
minor.

Carlinaminor, purpureo flore

Carlini
minoris

Carlini
minoris

Carlini
minoris

Carlini
minoris



Carlina filvest. vulgam.

Carlina
filvestris

Carlina

Carlina

Carlina



rentia, li^m mollioribus spims p^a dita: capita mu-
tp minora, & purpureum florem. Hare fr^q
in prntis montanis & fkcioribus, ctism in «-
•cliviranbus hcibidorum collium.

LOBELIVS Carthinm Sceptentrionaiiuni
Cnceaulc, Chair; deoncm album Cordi &
Chamarltoncm exiguum Ttagi apptilat: Ger-
mam fUin-fb«wBttj: Exqiipro noam autem opi-
nionc, non vidctur diffimilis cfo Chamslconi
Tlicopli raftij cujus merninir lib. Hiftor. Pbn-
lar. vi. cap. ni.

CARLINA SILVESTRIS.

CAP. XLVI.

ST qiiisdilt genter conferar vulgatilfimain!
3im Ipinam, qua: circa publicas vias in aivo-
rum marginibus & aggenbus, ubique ferena*
feitur, cum Acama Thcopli rafti .cujasin en)^l;
cit Plan ca rum Hiftoriarhb. vi. cap. 1111. k^{ts}
verbis. it J^l* axa^a. > iofoftp^t^d^clisr Xue, u'9*^l*

iWi^*5-op K, Af&af. oij hoc eft, Acam a, quanti o
(impliciter expriner clictr, afpcdu enicod^m*
tliclico fimilis eft : colore flavet cens SC p^{ld}*
guior: non valddiflimilis fotte reperit: * &
laltmad Eryngium illud referri poi Tnonne
gabit. qnod Aettus de Arc Iiigenis icntentiade-
(cribic, folsjs Aitradilidis, durionbus, *^e*
candido pailitoribus, multris ramis abuna[^]*
dice cubiialibus: flonbus buphcaltno fimil^l*
bus, (cd oculi formam { lamina in medion^{**}
/centia pertutbanr.

I L U V S aurem hiflofiain. hoc alpine
non repetc nms, eft enim non modo ab »^{if}
defctipta, (ed etiam ipfaplanta otutilbiis^o n^o
ctfTima. Iconcmtamen lubijanius, quia^{*ci}
gans aliud cjus genus in Hifpanica mca p^{*J}
grinatione obicrvabam, cujus hifloriam^l
adponcndatn oprar precium c(Tc dtixi >^{icc}
anrein Hifpaicu Obfcivatiombus fuerit cvⁿ

gat a
P A I M i verb altitudlncm ca p^lanta non
ftperar, cauliculo renui, unico, cana J^{anug}
ncobfio: folia iHi Carlmx filveftris (cuj
do meminimus) foliorum armula, ^{minor}
incana, fpinishorrida; fummocauiculH
gio, binaut plurimum, fertcapitula (Pⁱⁿ T^l
(nAnnunquam ctiam inalis) in quibus flos
teus otb^{*m} ocu Ji imiians, media Lanugif[^] P
tida, quam ambiuni rigidiufcula icc & W
foliola, cotoris flavi: radix tenuis, ruff^{cd}
Vivax non eft, fed (ingulis annis pent.^l

Nufquam hare invenicbam, quacn^{af} dia
quibus cam pctrofis que ic defenis cica, 3[>]
tnanticnfcm uibem lacis, pronii (cucia^c ex
tem cum thjmo duriorc, & Augulto »^{ch}

orientem.
V v L c A R E cjus nr men non intellc^{*^}
imo ipfis ettam roedieis ifticigrota. "riD^l JJJ
vero. Carlina mlveftrem nonnullivocan[^]
Theoprafti esse cenent, CUJUS^lth^l

Carlina filveltinnor Hilpan.



Eryngium cimpetUe, vulgare.



aculearasmeminit, PUntarum Hjftor.lib vr.'
.cap.iu- Germani SMptotM/iS''''^! appellant:
Viennenfcs rhizotoma: ©atrflunonnant ab
effeftu, quia non mo661Jli us Gccx i] vc rccen-

caucium accenfionem ex nimia crapula&bi-
lisrcgurgicationeottam eflepucio) iili, vulgu*
iftic iibiper(uadct, & experimento probatum
afcrit. Ccrtcaligoandoobfcvaw, Nobilium
viromm faraulos mcquis hcros (uos praccua-
tcj, hujusherbaroinpilcisgeftamcs, urperpc-
tud nimirum illam licri in con(pc3u haberent,
&fi cornpercentur cu vicio.ab illo libeurentur.

ERVNQIVM.

CAP. XLVII.

PR«TER, vulgare Eryngium fingulis no-
cum, 3cin omnibus, quasadij Provinci;^,
frequencerobvium, obfervabatn ctiam pecu-
lianaquordam alia genera, quorum Hiftonam
hoccapircdabimus.

BICVBITALEM autem, vcl atnpliozem
JtubetPrimiini a/titudinem, caulcrnhrmutn,
friatum, medulla alba plenum, acvcluti nodis
d/itinifhjm, prxfertim qua pane earn ampJc-
ftunturlata&membranacea(cdcfolia,tresauc
plures uncus longa,duas laca, viridia,vcnofa,in
ambitu {errata, ^afperanonnihil, (libainaro,
acriufculoque guftu : qui ver6 circa radicem
na/cunrur, longiorj Janoraque Tynr, &oblon-
gispediculisinnitumur: fummuscaulisin ali-
quorramosdivifus.bre^iora folia habet^eaquo
inprofundasbciniasdivifa, &niollibus/pints
prrdira: fummzdcinde al.c in aliquot ramulos
dcfinunt.ecfiinaucapiculaferciites, (phcrice
fercrotunditacii, in quibusmulci csrulciflo-
culialbicanribusilaminibusprafdiri, fubipSs
aucem capitulis novem auc plura oblonga, an-
gufta,a.culcatafoliola,ftellinnarexpaiia:ipfa
porrdcapituiacum fummisramulis,fupreina-
quccaulispartciiterdumvctudatecxrum
profus colorem acquirunc: radix in novdiis
plantis digtti crairicudineni Si. Jongitudincm
xquat,aliquot fibr'isdonatajforisrubfufca^ in-
tusalba, carnofa, goftudulcicQla, perindeac
Eryngijmariniradix: vctuftate fubinde gran-
delcit, K in plures a ltas radices extu be rat, fin-
gulis annis ex latcribus frequentiores caulqs
profrens: aliquando ramra hoc in ifia planra
obfetvibaro, utproduftofcrnine, fubfequens
hiems illana profus corruppret, prxtertim
culcionbuslocis.

Frequensnafcifurin pratisadDanubLumfu-
pra & infra Viennam fit is prom iftuc cum Afpa-
r: W Si bhonos ilJatutn feliciter provetur.
RZrczlonio&luho.

[Simile plane in Silefiacis montibus Tpontc
nAtum ad me mittcbaiViennam Achilles Cro-
nierusMedicus: nechuicfortcabfimilequod
Pena K Lobelms in Advclarijs defenbunt.
Idcmveroproifusefl cum eo quod Matthio-
i ipfi prim lira dcaonfra-

"* > *. v.l'auloFabritioMedico & trium,clcss.Matbcinatico.

Eryngium Fannontcu m latifol.

Eryngiu m pu(lilium planum Moutoni.'



7*mtm.

Ejus autem floreni triare, mihtctisc (iN. V. loanrscsa Hoghelande, quisnoM D. Xcn non modo icn bcbat, babere (cplantam femine ipu' natam, cujus flores non crulc'i fedalbi cflent, caulis non purpuraferm, fed ex viridit pallefcens, verim ctam caulis h\ v^c mam partem aridam. & femine codemanno Francoriirtura admcmittcbat.

tt. f

A. L i v D ctiamell Eryngi) (planicognon natiju; cnus, non amcquidem natali oct¹ fervatum, fed m ex cultu hoitoll. vin loannis de Brancion crelcens confpedlum, loann's Moutoni Tornacenfis Phannacopidiii flm J^ & in Stirpiuai cognitione xerica

I D autem liumilccrat, ftatim ad iccin plures ramos divaricat Lim, tcretcs, i rotundis, procumbentibus ad quorum iingula vcluti genicula nafcebantur in ordinaia folia, extr laru (cula, circaped cukim anguftiota & crenata: qu* verbcircaudicem, forma qu illis familia, (cd jmpf IOIJ. unciam lata, buias ant amplius longa, ex viridi pallefcntisc f is: frequentes ex alts ram uli nafcebantur, ad quorum Cngulos nodes foliola, Seech vircentia que capitub esoncbantur florem obfervare non licuit, qm nondum Te prod cum fubfequentem Autumnum Viennam cvocar: radix fatiscra (J'a, & aliquot fibr n. iu: quin & procumbentes cauliculi plures, Iccundutniadiciscapuc, cu liuifculas i agunt, quibus fubinde cfe fiimant.

Et funxtwn Hrfmmt.

T E R H V M genus quod in Hispanijs obfervabam, parTim agro Salmanticensi in c u n d i c i u s i m p u n q u p r e s n d e l u g i n e a g u e r a i n m u l t i s r a m i s , e x a d v e r u t plurimum nafcentibus. przdito: foha circa radicem in rot* fpedem humi fpaig toajurcula, laciufculaj&: molliora: at^u^ in ipfo caule inb alis nafcuntur. multifida f n u i a , in ambitu ferrata & aculcata: ramulorum fummicibus globoraiifjdenr. cap⁴ o^oplcrum que fpinorum foliorum mambiru ftcllxinfar circumvallau, ipfaciam i n o (a: flos & tota capitua cum fuis foliolisea: m b i c n r i b u s c a : r u l c i (u n t c o l o n s : f i c c r e l c t e p l a n t a , f o l i a (e c u n d u j r a d i c e m i n o r b e m j i a (c c i i a n i a r c c f c i j n t , d e i n d e a l i a c . i i i l e m a . b i e n n a c f i c c a n r u r & d e c i d u n r . u t r a r d p J a n t j m (c d m d e f l o r u t t) c o m f o h j s , P r i y . l i m u l j f c n o r i b u s . r c p e n r l i c e a t : r a d i x d u r a q u i d e w & l i g n o f a , f e d q u z n o n v i v i x f i r , S i i m g . a n n i s f e m i n e m a t u r o p e r c a t , f e m i n e ' q u e d d e c i d u o r n a f c a t u r .

Mata. Eryngium

Port m Ocs plerumque mvenitur, quo commemoravi loco i nufquam alibi vider mini: femine quidem inde reiato, narum cftapud Belg; w, fed fenus flores protulit. qo lum femine dederunt. d. ctnd color ille crulcus longe fui (retniflor.

C E X E R T M Eryngiu genus natum mcmi ULViro loanni de B r a B e i o n i c u A J

EryngiiHii pumilutn Hifpanic.

Eryngium marinum



r

tionem fed, femine Gallia miflb Eryngij montani nomine a Dofifs. vira
S i t G t l i n N l R (i T (i d n m l a i n i f o d i f f g i o R a t i q u l a n & c
am fumorum ramorum & l • capiulorum coltre, <juic)cganscx-
tollentat jaiiixcmin non minus craffaJonga.lub tetia lecondci.s.&rcpens.

Qvob verdmaritimisIocisnafciturEryngmm, amplis&craftiifohjs, minimum Jacl-
5 ramen in ambitu.fii fpinofisfiiii ctem novella dm] n6 modd in caltdiorum
g»onum,quales funt Hifpanta, Italia, GalliaNarboncnfis&fimilcs, fedetiamngidio-
&adSptencioncm vergentum, UE Tunt Angia. Bc-Igium,HoJlandj», aKjucaliaejijs
g i d i i i f r f & a d i c e r u b i c n a v a g j i u r

EXYNGIUM ROND, Gt
radice
SUUcaulisdiccatu&:abruptiis, a vcnw impelli Aprovolvi folct, prarfenim toejis
Pwnis ^ a p C r i j s : Germanis55?«(i"t^r(i/&WT(lin* mredicatur: vulgarc vocant orHcina:,
ri" gum:nonnulliCentumcapira.

radicesErvngij tufe, prarcifisncms, Scvulcnbusglutinandisilli-
aum,«iarnncrvorumaffc^ibusprodcft.CamfrariusadditctncllisE]ngi;
ijsaquam fliibntiam fieri, ijsapprimc urilctn, qui moibi Gallici ulceribus laborant, ii
'uciusquotidieea utantur in potu: Multas jiwttrea altas facultates recenfct,quasex cjs
rbntarum Epitome pctere hec. Mcminiautcm C.V. Gul«rlmttm Rondclctium, marini
jadices (quaspotiiTunum u(urpandascnfcbat) faceharoconditaspra!(cribercrolerc,mu-
««ibus frigidiorc ucrtJntemperic laborantibus, ad juyandimi conceptum, pnus camca
P" ttga[outdcercorpore&:ilfffprfni' ffi'

A L O E .

* CAP. XVIII.

y/^Lc A R E M Alocnrpontprovcnienti obrervarcminijnvctcribujmurirar-
Y "sVlyriipponenfis.quadcfenfufctadpr^Timunitcitiplurriindcclivifiturn. Intelli-
ctiam Valeniix,in vicinac Sagunti vctufttmsuns&:macerijs abundamer provcni-
Uc, Ha tamen liic no cil nobis inftitutus fernio¹ vcriim dc American^cujus delcriptio-
etT^{13titC multos} annos in noflns ad Aromaium hiflonam (cholijs polliciti lumuj. Tam-
^ u autctn hie non f_{uo} ordine rponi vidcatur, 'qu6d, cum craffa admodu m radice lit cu-
ol" potiusfui(r«adijcienda:ngidaHmcnejuif«ie\$,ivulBariA!oeplan4diverr»fa'cit

Aloe. Aloe A me tic in*,



Aloe vera

MvtTAfuntillfrtlia.humanatnlongitudincmatteringentia.raturatvirentiaqui dem, (id quibus in fper (as videtur) cine race i quid piatn colons utinTtiliparum quarunds in fo- lijs, Ixvia, circa infimam fedem crium iikejuacuordigicorum rranKerfwruni cratli udina, <3Hodammodocarinaca, valdelaEa, mLituo{eampte^cn[i3, inlt.tr foliorum vulgai Aloe aut Asphodeli, tenlim in mucronem detinentia, qui nihil aliud est, quam spina, fusca, cras- sa, unciam cum semisse interdum longa, & adeo firma, ut Americani pro subula uti sole- rent, & cuspidis ferreze loco ad sua vela adaptarent: foliorum latera tenuiora sunt, & spina cuJtDem colonsalpera^edbrevionbus.laia bad predim.&dcorfurn incutvitutin'Rbam- no terrio, inciere pane fibrofj (unc hare folia, & fucci plen;), fed no am an. Ex coru ru f' diocaulcincrtafciiriteIcxt(nullum enim vidO brachralicrjffitidinc, & b rev ions Ian** alctudine: radix estcratTajlortga.curva, veluti internodijs articulata, equibus ad Jatcra P* fcuncuralcernisalizplanrjr,ucinArundLnumnodisj;crminafeir.Kemira;funtjdjft>lif^.

Primum in Iiancplantam demonflrat C.V.D. loannes Placarucdirus^pretil' in Valentia Hispania: Academi, pnrnoaburbc Valenciãmiliari, incrnobio D. Viff!' facro, cui cognomende IESV indicum, eodcmquoPerfcacrcfcu horculo: postca*^ etiam locis obfervabam: erjtam autem.omiurn maxima radiceconfpiciebam \V-^u ^ fcano ornatiffimi viri Petri Alemani civis Valencini, cujus hospitio exceptui cram ,duurH^ videlicet cubitorum fermelonEitudtne^dcujuslaceracirciter triginrapuini lepS-if^^{cl} rz, ex quibus binas detrahas in Belgicam deferebam, & unam quidem donabam Genero- foDn OroloaDivo Audomaro. viro rei herbariar. fcomnium Naturz miraculorui^^h diofii Timm&peritiffimo, quam fecundafubfccucnshicm scorrljpit; alteram verol « CouJcbergop[urmico polxdo6tifrmo, Aptuerpixad Campanxymbolum comm^{ur}i ti, quam dm in fi&iljbus confcruavit: namcx ilia hanc iconem expnmi curabno • e(1,raul[6(qucannosdurat, radicemultiprjcterrepropagans, cujusfcigratia, & fpinarum ngidicatc fiveafpentarem Indos j>u Americanos, circa agros cam (crere\ VifTc, adcosi: omniu[iicndtjm, &: furesarct"jdum(LirapudnosfcpiLisrpmoiariim f fieri folcc) tncmonx prodcum inveni Noncamu!cisa!iturin fi&ilibus: adcoaur lifica cfl.ut alternis annis, Vienn.ii agens) uximere cogrcr, ad Ibbolcs detralH-rdum, fecusackmtimxAloi, quxcnamproliufnvaldcfenix, fed circa radicis (umnuicm duntaxaf.

Nemina

VALEWTIN I W; j^vocabant, id?ft, filum & «ui, quia foliorum extrerT1*^{fa} c^;

acus: fibr .mrem iuciores fili vicm pncstent. Atalricani L% agay & Meil appellanc
nonniul litic Hitpant Ciirs & ^ abaculeorum j iicpinorj f Teqiencia.

FK EO^VK NTI autem in uliifuiilcapud lado*, refrrtGoinaraadc'alccm Mexicans
iftoriar^uju; vciba, quia in regrain hujuiplaitxhiftonamcuncment, latina facre, & : hic
ad. (cri here volui.

METL, nonnullis *Mazury*, alijs *Cardes*, arbor est duorum hominum altitudine, aut ma^{Met.}
jorciffurgens, luimatiscoxa: craHlcudinemarqiians, inferior parcet adlot & denfior, ^{MaS^m}
dcinde paillariminy'ratnidalemformamdcfincnsinfarCuprc(Ii:quadragcnail]Lfolia, te-
gularuinaniplitiidncpropmodum.&codcmmodocavinata^cdcinfiorccrairajdc inde
in raucrcm iieimenna, laceribuscmiiora, cra(siautem Ipinamucronemoccupante.

Tamaiftic (videlicetcsra Mexico)copiana(u[ur, quaniMf ud nosvitesifaciifpicartii
flore, & icmcn. Exeaigncni ftruuiK, cjus cine res parandolixkja idonci; truncus lignivi-
cra prabet, folia regularum aut imbricum.

Cardre cam flentaate quam nimium adolefcac, ut radix in majorem craffitudincm ^{l;f v<< 344}
exrelcat eacnimcxca'jatri, quendamliquorc mco]liguiH, qiii fcrapij infar iltcodenfa- ^{*'''}
tur: i^levi dccodione inelficj depuratione accliarum rdilutionCjacetun^&addito *Qtpak* ^{Oca}
(radixcaft^ua^pritantia. vininicdicinavocaturjvtmimullisquidcni in uiu, (edparum
falt]bre: etcnimvaldecapuiccnrac, & inebriat: nullura autem cadavc^nullaimpurafctina
Ka foeccc. ut illoru m artlicicus qui co vino inebriatt Bcrint. Ejc hujusgerminibus *Sc* tenejlji
folijs fit conlerva. Foliorutn prunis aflatorum liquor, recentibus vulncribus au t ulccribui
in(iullatus, brevi ceturat. Germinm & ; radicum fuccus, cur: 5 ablincbi] illius regionis (uc*

jus, i per arum ^{ortibus vultur i m uatur,}
Illius folijs p. iratur cliarta in nfcni vulgarem (acrificiormn fc pidorum : ex ijs (lini vide-
iccc aut cannabii modo paratis) fiunt alpergates [calcci genus H i fpan isadmodum familia-
exfuiicu Uscont; xrum] froriar, chlamydes, cingula, capiftra, & fbncs: dcniq; cannabini
nil vicm iHisprzbcUC. Horum foliorum cu(pidej(i. u fpini. adcofiimarrunt. ut illisacus
ftucfur/iu]^ j o c q g n t ^ HbrTautem fili vicm (upplcant. Ij Idcm Sacerdotes illius regionis
pungere & vulncre (folenc in (acnficjs, carum enim cuspison infringirur, & quantum
puscft pccrat, exiguo foramine fa&o. Non contcmnenda Tanc ptanta, qua: ad cam V a-
riose ffeausliomniibus urilifcft. Hadrcnus Gomara.

-A. DDvNrquidam, Americanos vncrcaliicni hujuspnt? ufucurare folitoshacratione. ^{ad vncrcm}
Ejus fragmcticum. in minutas partes scaomjde inde onx. cantharia q iiscapacijmpofi- ^{*TM}
"o ni, oiurn liororum fpatio decoqacbanco Na piius luto ob(trLi fta: decoaione fafla, ollam
apud * grum collocatam apcriebant, ropiofus inde fumus exhalan;, multuni (udoreni ex-
citabat. Aut jFoliutn hujus planti prunis impolitum aflabant, cujus fumum xger excipic-
bat: fed adco vehemences fudores liuj us icmcdij ufu excitabantur, Si vires collabebantur,
Ut iger vix ferre poffl-c, liceciriduo duncaxat ut cccur.

H v j vs plan^fi3liorum fibris, comextun) amejHo (pitis fbrore T Cticalurn, n) ihioift<i-
S^amr. ciim Valentizcirem. Intelligcbainc Liamjindufiacixi sparata^ ifpaliurbc Bzti-
^^ccIcbriEtnporio. vcnaliai invcni.

CYNOCLOSSVM.

CAP. XLIX.

V i. c A R E illud Cynogloflum, quoddcwaio r<& in Stirpium cognitione cegfegi^ ^{Cynogloflum vulgare}
ercitati non fine probabli ratione legitimum effecent, uc quod ceccris notis (atis
coi. i venieitibus, aiularumctiam (itannorurainccrdum, ancc qolnacaulem pprferat. in
omnibus quas percani regionibus miliifuit obviura. Idcuminccoruni qui Scir-
poriam (criperont, lie ptactermifum: illius defcriptionem a mccxpclare non est
necesse. ^{quorum alia genera obfervabam: quorum}
quam vidi, fed in quorudam hortis femine natum duntaxat, quod ipse etiam fapius in meo
alari, arque nunc adhuc alo. Secundum, etiam in hortis tantum: Tertium vero, frequen-
ter fponc 'ia (cense Qnfpexi. Sincalotum liiftoriam quapo Krimus pcrfpicuit Ec & facili-
tate, hoc e

PROPERT ignir Priia ^{umifuminoMjiciscaPiK} cnulra folia, longa, vulgaris folijs niul, 6
ftigufiora. vni? aliquot fc cundG loneiudine excurtibufpr? dita, ex viriditate canefcen-
? * ncerqurna fcirocau] isin^l% iidiicramtudine non «tiiigeiwp crqtte in
inordinato fitu, nalcuntur folia, q; quz a radi- ^{o Jc u i bre vio l r a & : g p m q u o}
damodo amplectentia, ex quorum alis circa fo- ^{m i caule m a f c u n t a r a m u l i . a i i q u o c a v o}
is. in q uinq. lacioias per cxiremai orai i ^{ius. onufli. vulgaris quide floribus forma fi-}
milibus, fed minoribus, & dilutionis coloris, in ^{poru medio quoq; flammula fature ruben-}
tia: fingulis floribus fuccedunt, ^{qero admodu j m v g . q g p n (e*)}
fingul ^{coll. un^} (prominulo cxilloruramcdi (fBlo) vulganstamen fcminibus muiora. fed
non ^{tnin equi illa v c f t l b u s} Mtingentiumi ^{hxtenv*:} dixeftlonga, Sngularij, candi-
eiifli* t? r ycculentocor[] cobdufb, ^{mmi tamencute fubfuliri, minimidigiti}
uitucunc^traucohtmax: ^{iii. icmbu fibis pcr tota m long l t m i n e ^}

Cynoglossum Creticum I.

Cynoglossum Creticum II.



Nobis prius haec planta naceftin Bdgica/eminecx Italia miffo Cynogloffi Cretid nomine, deimk fpontedcciduoconfervara: Floret Maio,atquecnam Iumo,quo linnlitr tntnfc mature feu femer.

II. Cynoglossum Creticum I.

SECUNDVM, primo anno, ex radice longa, infra digiti minimi craft tudinem confi' fentc.rariquefibrisprlonguudincm (parifprxduA ,crafliu(culoque corricefoij fu (co ami<fta,multapromitfolia, palnumautamplniflonga, unciam JaCi^linmi fula, molljaS tenui brevique lanugine tecta, nervo latis craTo ilia per longitudinera iqualiter (canrci mtct qua: alcro anno prodit cauliscabitalis am amplior, ftnacus, Brmus, reclus, mo!h lanugLncobfirusqueconfufoordincvflionfoliajamdiclisCai ilia, fed quxbreviorafunt, (luopropiusadfummumcaulcmaccedunr,cxvindipallcfcentia:fiimiTmscaulisinmult<3S gracilesramosdividiturfmnofalligioScorpiun auc He'iotropij majorisinfatinflexos, i a quibusplurimi caliculi quinqc Ucinijs conflances, unde flores emergiic Primi flon but breviores,illistamcnampiores, inquinelacimas orbicularesdivtli, candicantisinitio colons, fed mulcs cenuibuspurpurafcentibusvcnis (qua:vctuftatcinca:rulcumcolorerJl tran(cunt)ornati:dcflucntibusfioribus,conpliciuncurincalculisquatuorfeninaconjun' £h,ai in Priore CynpglofToCretico,rugofa&aspera, equorum medioproditftilus.

Tota ftirps mgrati odori<; eft: lunio floret:cjus radicem vi vacem no cflc arbitror, ftd h>"- mc.proriivium (eminisinteqnentc^orrumpi, & femine fpontedcciduo renafci.

HoegenusinTuo hortualebar FrancofLrti ad M<rnum Ioannes Mylerus illius ubi* Pharmacopxus, quod femine Cynogloffi Cretici nomine ad fc miflbnatum affTerbat.

) n. Cynoglossum Creticum II.

IHTHA ptd.iletna!t!Lidinempl<:rumqicconfilfitTerciurn, tamctfnoiinuquatiifi¹- peret,cauliculus un unguis,renus,nrmus,rotundus,tubirtos,inteme purpurafcent,ur pcnc virefcens,per quem fparfa font insquah fitu foliola oncialta.angufra.cmincm (a,roolli lanugnic reb.coloreferemcraccq, guftu altqiiantulum excalfaciete: i iummi caulicuh in aliquot ramos divi^untur.qui^qirpiuri modo contorti, flofculos ex foliorum adverboprofrumBgdoflo vulgan aut Cynogloff Tojam defcripto dimilit, minores,cafl' Icicoloristquibus(becedi3ntquaternacnam"(i^tnuljuna:afcmia,in uniboncmptotube rantiaj admodumcchinira Siajpera: radixionga^eauis,, rarisfibnsdonata, quajaHOi¹ duntaxarfupreflc.& port femer maturum.penrefolct,

Sarale.

OeJcit ad viarum & agroru margines circa urbem Vicnnam, in nudis Sc falcbrofis] ¹ iuicurbivicinis,plcri(^,aridisPannori.clocisadarvori'ifubIcvatosm.irgiic(1rum ecu Moravia:, prxfcttm veriadaxecra vtbisBriJriaemciProvinciafit^Floret Maio Sc lunio.

*Cynoglossi, pumil. five Auftriac. alterum.

" Lithopermum rcpens majus.



Echium vulgare.



A H verohoc (pemy Cjno l ofina plan-
tata fit, quam Plinius Naiur. Hiftoriz. lib. xxv.
cap. v J 11. fen bit CynqglofTo fitnilcra & qux fe-
rae lappas minutas? cujuftj; radix ranis & fcr-
pentib JS adverfetur?

VVLGARE Cynoglofliimappcllanrtali, Ci-
lva. & Lengua tdnina: G al ti, Lattgue de chien:
Huipan;
Beliz, Senayur tondo- rangu.

CYNOGLOSSI potro folia, cu fuillo adipe ve-
teri, canum mor(ibus, alopcijs, & ambuilis mc-
dentur: alvum cmoltic decorum hcrbx^cx^1 vi-
no potum.

ADMODVM ctiam frequenseft in fJvubad
Laclinpnmoaburbe Vicuna miliari, & Vicn-
nen(israULsa! ionimq. monti ULjrbivicinorum
radices. interfrutices Lichorperrnuilludmajus
vuli; o nuncupatum, cujus faimcta humi fufa
fubimic fibras agunt, & mire fe propagant.

Ntc minus frequens varijs Tannoniar. & rAu-
ftriar]oci5, aliud illud Litholperrn j gen uskgtn-
iyum, lamine cadido, cujus ID officinis. ufus est.

ECHIVM.

C, AP.

VARIA, prstet vulgare fube*rulcofiore, &*«*«*«*
quod Vtcnncnfi agro & vtcinis locis fre-
quiffimum; Ctiam variance in fubincrcum
vqjlornino album colorem flore, interdum re-
perciif, nafcuntur in Auftru Echij genera, ci-
que elegantia.

Echium pullo flore. E< hi uin rubro flore.¹



PRIMUM pedalem lubetcaulemjfrtacum.vinofum.folijsEchij, aui Ba^loiU filvctriSi
m u l c a s a l a d q u i d e i d c i n b r e v e s r a m u l o s f e f a f i n d e n t s f m u l t i s f l o r i b u s c o n c 3 w i i s
extrema parte in quinq; crenulis divisis, rotatisq; ex atro purpureo cente praxitis, onu
funt, qm c vafculis aiohi lanugine liirfutis & inter folia larcucibus pt odcunt: (cmcn u: i¹
hujusmodi generis plancis.vipennocapitifimilciradixobJoga, minimi digitica/litudine*⁰
jncrdumquat^orisufuca.pauciitjtenuibufiLKisprxdita^apitcuadccaulisprodireX-
tubcranrc,6f praxcedentisanni caulis vedigia fervanceiprajmanfa folta.nulium initio fnar»*
fcftum iaporem peculiarem pr<bent:fed pofiea nonnilulacnmonixliaberevidentur.

Crelicic multis locis ViciniJE vicims, rotactiam infenoreAufina,&Pannonia;parrciiC*
cionbus praxis,& gramiacis locis ad collium radices, aique impfifcolhbusnudis, Be ten¹
duncaxacgramineqjafitLS. Floret Maio.

ir. OBLONGA & anguftalubet AlccrumfoHa.villofa^uIgamEchij Folijsferi fimiliSiP^{311,1}
Id tamenlitorajinmi frataxauleni moddpedalm,ali<niandocubiraicm,fiimijm ,H^{fl**}
tnjlttt. (uro,lJiuginofum,macultfq;pufpurciscortfperfuin,qucniinL"6ditoordineniu]ra3mbi^{it}
folja.mfrniibreviora&rangufiiora.non minus tamē iiirlutaifummumcaulemoxornafjt
mult! brevesrainuli in reveluticonvollJti^tq;Scorpiurtinfarinflcxl.plcntflorum v^{**}
giti^Echij flonbusfamilium, (cdolorcrubrocleganti pratditorum, qui pioximcaul^P
priaumaperinicipiunt:excuiroHorc,fcmen,otiinalijiEclijgoncribiJs,3pparcincali*
culisni^itimjviprinocapitifiniileredminus: radix ratis!onga,dura,&lf;no/j,nigrocor'
ticerceia.fuinmocapiicomltosinterdumcajlcspromcnjfedmaxiiiiidcjcpartedunWJ^{3*}
unicura.

Abundcadmoduin.ficciapratifupra & infra Sopronium Vngarix urbem.nufquam^{ve*}
r<ifibt;TuncplantamobretvabamMaio^m;;ntem,huncraturatērubentctn,mod6oJlU<¹
ciore colore pixdicam.

JJINA porrd alia Echij generajCrcico fc^iine,quod mittcbamjnatajCrevcrunt
^ A^Mria.inicioliabui^c^ditcbatPrimum^lia.mcdir.interplantapiicni&biigli
Zilmm Cn RMIII. w.humi frata.inccrcqu narcbantiycaulesrotundi,(cabn & fpcri.ftequer
alr don ui,quosainbi. bit niord'inata folia,rpinorajurta^xtreiniramicircu involve
rur&inflcabancur, Echij & aliarum Anchafarum infar, gdhluntq, calicutol q» W
foliolu anguftjs &hirtts conftantcj.cx quibiu cavi floies,Echij fionbus non^{diSidiT^}
nX/

r. coloris rubridilutiele ganc Uj in quifl que !. iciniisfi) minisaris: t. 'ifi fquo\$mcceftu
mporū, p-jr purafcci Hcmco!orc: fncu italicirc, obfervabar) e quorum, i m' ilicocxilic-
rantftaminulacx rubropurpurarcatia. apkibus palliftis. Scnedmsgraciiisftilus. exalbi-
*us, 5c bifurcus: fl ni fucecflie (cmcn, cchij femini nO; dilTimile. Flaesdedttulio & ic-
quentibus mcnfibui.

CVLES Alrcrim. igis (cabri*eranr, quam Prion^rotundi^arvismaculis rubris diftindi,
^rpentaria: fercriru: Voi ja promebir quaternas aucqtiiiMS pxue Lindas longa, unam lata,
P>Hidionbus maciilis affcrr; flotes extremis rami^nafcebanturegrecgicrubentes. narivafn
lud bedinem, etiam adukirctinentes, cquorum un i b m j ord of atunl apdo bant,
^iani in ora. qnorunitertium jeliqm nus, omnia autem apicibus albis pcedita. Fla-
re fcincipicbatlubextremutn Iuliura.

Accipiebafnauterafcmina, cx quibusharphntxnat3: non Hchijappclb. tione; red An-
^Ofi, cujus femene Credallacumeflet: ciim vero Echium magis ret crane, quam An-
nad Echijcap Htrcijiendi adis p d i w s t r e d i x i

is hac plantai^or, Latinis, ec Inon ; Iralis, Bugtcfia falv4tka: Gd\vi, Ew>lc (e
Fferhrauxvifirrti'. H^inis, L<ng>adtbutj. faUagt. j Tfri/4dtIM biverat: Ger-

ECHII radix, tefte Diofcoride. percuffis alerpencibns, non moddex vinopora, pro-
d ftfj fed eos qmambicnnt/cririnon pacuurrj Fotia&tc mcnj fimilcshabenc faculcatcs.

ANCHUSA,

CAP. LI.

T\lose OR IDES & Plin! nstria Anclmfx genera defcrt bunvjuorum Alterum genus,
JLyillis Onochils dcluni. mihiduntaxacco^nitumefreingcneufacor. id aucm ciim
^GiUia Narbanenii frequenter Icgrec memnn, tutn pleri (que Hi Ipanis SiLuficam. elo-
s obfervare. Scd ciim ab alijs hujtisavi De re herbaria, fL nptonbas ejus icon & icxhibita,
& hiftoria tra'dita, ad eos Lcttores ablegabim us.

K

Anchufcexalbidoflore.

At IVD vcr6 genus obervab. im. cainu-



microfalia. palnuristongitudinis, valdran-
bitalis. crassifculus, fmi) us, hirtus, i f mtho
ramosd viris, in quibus breviora multo, h
i'pidj; folia: extremis ramis pcedunt, c va-
gi nulis hirtutis&afprlsj flores wymphitina-
joris floribus quondamni doijrnk' S. albij aut
ex albon Onaiiil pallecet'cs, five&i^>AH/jfo*,
inangulos quioque diviii, quibus dilcullis,
fencin vagiuulis confpiciur vipennoca-
piri aur Echij (emiiM lirnile; ratiix minimi di-
giticraftitu Jincmarquar, nigraqicutt- ttfla
cft. qua lublati, omnino\ uber, &: elcgantn Ti-
mocolore inficic: ad c6 autem carnolaest, ut
radicum Buglofli vulgaris infiarcondinpo-
fic. Jukti tamen &: inupida.

Nascitur arido Si (alcbrofo fblo. ut in mote
Badenlibus chermis immiticnte&aiijsviti-
nis. apud Cartiuntupr^crea^annonizolitn
amplifHraam urbem, mine autem vile oppi-
du!um, Petronella vocatunn, maxima iropia,
cum plerifque alijs Pasioonix, Auftria-q. Cic-
cis&aridislocis. Floret Maio, & fcmcn tu.
pio profert: dc inde p rircarbitror, ut Echij
:: genera.

J GR^C I p Ari Anchufam Latinis difram
! iyxvaa *J wt/fita& wxAwv appellant, Sc-

Vi^quibusdam dici fcribic. Nullum no-
is rivulguc novi. nifi quoci Secundum genui. nonnullis Hirpaniarloris. ^f^mu/, vocatur.
PMont i>eneri Ta^cct nadftritigci Kem (ntjtit Dio'corides; adambufla. & veteraulce-
exoten V^, s. ca3 - am - n*., i. n j f acrttceu ^polc n tamederi: Icpri&vitiiginibus
tialui ex aceto, partus extrahere, vulvz tnditara: cjijs <lcooare D<m vicijs. licni, & bile fuf-

is rivulguc novi. nifi quoci Secundum genui. nonnullis Hirpaniarloris. ^f^mu/, vocatur.
PMont i>eneri Ta^cct nadftritigci Kem (ntjtit Dio'corides; adambufla. & veteraulce-
exoten V^, s. ca3 - am - n*., i. n j f acrttceu ^polc n tamederi: Icpri&vitiiginibus
tialui ex aceto, partus extrahere, vulvz tnditara: cjijs <lcooare D<m vicijs. licni, & bile fuf-

dxv]

C/R-OII CLVSI BARIO-RVM

fufisdari,&ficbrisfir,cx aquarau-Jsa: folia alvuni fislre in vino pota. Radice pignicrf riosatt adunguentorumfpiiftmema. iijrulcifeiefactjltatecstrit uitctirm IJiJTinitis. *cundumaurem'genus vim [labTccjusecontrsvjrusrcliqtori'mrcrptnunnjfi'letum au-
tcm viperarumauxilieturjfivecibo^vepotu.fivealligatu. Venfmilcaurtm icll'fmilibur huic (ecundogenerifaculat]buspollerc,quamhoccapiredcfaiboAnchufain.

Cum GranatacefTem , venalcs confpicibam pyxidula's urgentoplcna scx >Anchufa, qu x in ea Provincia frequens nafceit radice rubraparato, ad fucandajn &CKin (quod iflic ufitatumcltjidonco.

Anchufa li-
gofie.

C e T E R v M, non incpr ad Anchufæ genera forfan referri poffit quædam planta, aridis lociscircafrurices&dumcranafcenSjinLu/iraniaanicobJervata, tres verb autqu3ri'P' ab unâ radice producebat virgas.pedcm alas, tenucs, duras, Be lignofas, quas ambich¹¹* frequentia folia, Anchufaf folijsimilia,r)igticantia ruperi]aparc&hirlura:liirrmij virg'fi ijua:Scorpturiinfarincurvantur, mnatcunturblongiSores, Anchufa: flonbusfi'mife** inrensecirulc]arpeftupuldieHinai:r3dixdurac(r,lignofa,dcraftafummacuM'nigrctan- ter«bcfcens,temperatiguftus. FJorcbatific lanuario inter ScintryarcemRegiam Si fc» pulumcuinotncn A^T«y]« Jefiflr* tf< Up<n*, acidijus radices fcequctitioc. Ab iacolit Ttaf**' gweranuncu abatur.

Tumaret-
w.

Nonablilimilii ci videturquamDo&iflimusLobelias Anclwfam lignoGorcmanq folium appliatjiiii forte cadem fit.

SYMPBITVM TVIEROtyM.

Sym phi turn tubcrofum m a; us.

Symphicam cubcrofum mints.



t/mftbm A NeviosvM & quodammodo pentagonum habet caulem, rarillimè pedalem al- tudinem fupcranrcm, fucciplenum, icrqucmrriora, quaminSymp^hitonijorc» (puf&func foliajlUfa, minorsftenciiott & ti,inus appet a,i nfpido fere gullu: floies in tui»- in is ramispallidoSjOblongos^ymphinmajfmior]buj forma Cmiles.cocavos.ioodoo** extima parte in quinque crenas di vtos, qui^que ftamini bus in medio flore, vclun in un- boncm tendentibus.protuberate in tncdioftiJo: caliculos dcinde tnajorisSymphiii inftar. in quibusfmen.Echij femincndifp^r :tadiccm longam,ramofare jicnerara&f^S^ lemjinimidigiti cralTitudme, (ubindcinfiberacxerdcntemjCXjguisrlbnscapiliat^ pdiculi,calices,caulrsarigu!o(i,&fo'lia iiiiucafunt.

<<*

Invenitur in omnibus Pannoniz6iAuftri?:filvis,umbrofoloco,pr^fcitiimfcrofwbff<<- ticibu<<

scibus: repericbam etiam in Pannonia intcjarani.ulifa Dravura rlumen, in Grebe'n arcis
Ememoratxmontanis. Primum vero innotuerac Bcleicatincolisanno M. D. LXVH I.
plantarum, livirecc Machlmiatnadnos miflaaC.V.AIphon^ PaticioFerriticfi Profellure.
Eivs hirtoriim & i(onetn mini me dedi (Tem , Oiii \$it minus diligenterabalijsdcferi-
fta fuiflcthiftona.auc icon non fansfcitecxpreffa: tamctfi & in ea quam cxpnm iufli, pi-
Sorofoeunti^ meritoaccufarhpoiBc. NaiB ladicem nimis [cnuem illidedic, & cobera
•miik: utrimquctamen hicfubjecimus.

De facultatibus, nescio an quispiam periculum fecerit: verifimile autem est, iisdem pol-
lente, quibus Symplicium majus.

CERINTHE QUORUNDAM.

CAP. LIII.

HVIVS stirpis, quatuorinveniunturgenera, forfitanti amplurai triaobfervabam,
quajrcumabamicoacptiebam. Nos (ingulaordinceddnbcmus.

Ccrintliequorundammajocveriitol.Hu. Ccrnuhcquorund. majorflavoflo.



QVATVOH autquinquerosivcecaules habec Primum, a fimmoradicis capite
ffoduncceSjrotandos.rucculentoSjincerduracubitalcs, quosarnplc&uncurnumcraafb-
lia.oblonga^irca pediculum laciora, mucrone obrufb, colore ex viridi ad exulcum quaii
;lidL- iue, candidismacultsa(perfa, nonnihilvillofa: efoborumfinu nafcunruralii ramuli,
leliocropijtnajorisramuloruminfarfereincorquentes, pleniflorum fecundiinramulo-
Um longitudinemdirpofirorum, longiufculorum, concavorum, amedioincxtimampar.
Jm. fiavorumjalrera. quacalculisinliirentjCxrubropurpurorum. quibusapesvaldcde-
l: daniur: htsdecideitibiisbinap]criimquenicodemcaliculofcminacon(piciuntur, ni-
K^ .ErviraagnitudinCjfcminisEcnij^ utCiccnfariccini forma: radix alba, oblo[iga, & (itis
craffa cft, ati vcr6 perennis, ubi fponc nafcenfmcbfervabam, ignore.

Crleicit acem nonnulli^ Luluanis locts, (</> & copiose per to: am Bzticam . Floret no vo
Vere ft Marcio. Apud Belgas in horns fata mjlr0 (criiis. videlicet fubzifacis finem, & fub-
inde flonbuscra: in hieime ufque, tum perij) & dcciduo ftmine fingulis annisrenafcitur.
bus fcaet in h q. p
r. Li mmabfimileell Akerumgenus, haf denim medium caulcm furredum , Sc fre-
^ciitesramosirunimorjdiciscaptrcprodcu. res, & humi fulos, quos, uti & caulcm am.
P'eftuncur alcernis, foliaqualia in lupenorc, I on adc6 tamen amplacirca pediculum, fed
PtrinHemaculisalbisinrccb. & vetMticcnellis fpinis oblica, atque naollibus viUis in ambitu
; caulis in al w aoc numlos (upctac dividitur, c foUotum fiau pcedunces, qui ext-
aiapcte

£''' »' *
' ' ' ^ ' A *
itimfin*
Natali.
Cirinih
> quorundam
? " * * ? " " "

roiparcnutant, Kefingulisfoliic-aunalis Bores profie runt priori forma&tna^
parcsjfdomnino flavos.fcmenpr^ccSencilimile: radix crailiufcula,alb.i.a:qt)alii cun;;
periorclongitu^nis^rcqncntioribi^tamenfibrisonata, quamlubfequcnsetiamhic
corrmnpere fblet in Uelgicis homs^1

Nas^o III.

Spontc nafcentem obfcvabam Valentino Regno, & florentem Marrio, atque ApuH^o
inn 10. Semitic tamenex ItaliamifTonata in Bctgicishortis. nonnili luniu&iu'lio, at^uc
cttara fen us rlorebatA fubindc in hicmem ufejuc.

III.

T E R r i V M genus nequcfpontenarcens.ncqueinhortiscultomconfpxi: fedhne-
ftiilinus&in ftirpiurncogmrioneverfatiflimus, IacobusPlateau Tornaceniiscivis, in cu-
jus hortoculcilmocrevit, iconem mifit, addiisnons, exquibus, hancdefcriptionem
concinnabam.

Crinthe
maior qm
rond folia
caulis pteru
raff.

I N bipedalemjautcripedalem.utplurimum, afTurguncalcitiidincmaules, fivevanv',
ftirimabradiccdviii.quosambiuntctiamaltcrnis folia, jamdefcnpii5pau]6minora, <x
viridi&cjt:nicoquaflcoimixci colons, fupernemacuiisetiamalbisconfperta: fupremi
rami nutantjHoreiqucfingulosinterfoliaprofruncincalibibuspurpuraicentibusfatuns,
exrubro purpurcos.quibusafperfauidcaturquardamalbedo, lungos, cavosinftrarpxe-
dentium:quibusdceduis,3feo]cn in caliculisnigrur»,Bojr.iginisieniini forma fimile.radix
iirailitralba.brevior tamen & minus fibrofii,quam prxcdencium.

Sentur,tcftequi ad me iconera mittcbat,Februario,MartjOjApn]ijpro acris verili tcm*
peric; huimJo folo dcle^aturjpropterca.cum artivi dies inCfpiunc, & arefcit folium, cre-
bns rigatiombus indiget ut augmemum iiniat:naai ut piurimum Autumno duntaxat flo-
res profert.ciim videlicet de cx\o crebri tmbres cadcre inciptuut, Annuactf.

Ccrin the quoruadam minor flavo flo.

VIII.
Ctrin:kl <]ta-
i i i i
ur flavo fo.



Italia.
Kamca.

GRACILIOREM modo defcriptis, habet
C'iartum genus caulem^ubiiale m aut am-
pliore[n,ruLunduni,in pluresramo divisum
foliacuacn alternispcresulem sparra,mil)O'
ra quam Tertj), & angustiora, albis fimilit^{ff}
maculi5con(per(i: (ummiramiinflcluntUf
Scrutanc, frquentibusfolijsniagismiicfO"
i f l j l i f i l d n t
fioresIuiscaliculisinherences, superioribus
longe minores,extremisotis eticulan,proci-
lun Ha vi r quibiSsdceduis,3 femcn in caliculis
contincturmgrum ,altera minus, formã ta-
men iion difpari: radix ctiatn alba,& aliquot
6bris prxdita,non tamen vi vax.

Alcatur etiam in Belgicis hortis, quando
Viennam cvocatus fum : nec ante ipoateP^
fcntem hanc plantam confpexeran), qu ^
io Auftriam venirem , in cujus agris atq^uC
cnamSciriscopeiosecrcfcit.interdumeti***
hieme in lua vmditac permanens.

De hujus nomenclaturã, variz sunt inter
Neotencosfententia: NamalijCcnntbf,
cfievolut^arationcjni fallorjdufls.q¹¹⁰^
apibus grata fit, & id de Ccrinthe refa^{IB}
Virgilius in Georgia's, turn Plinius lib-***
cap.xn.VulgushcrbarioruMemithaP¹¹*
gnocnorcvocavit: Mcmithacnim Arab^{um}
nihilUliud est quãtnGlaucium Grrcoro^
Necdefunqui Maru.five Almaru Avicc&
nxhb.11,capji. defcriptumpotent, p^zie
timquartumeiusgenus, quonomincti^{lon}

Secundi femcn alicjuandi)ad noamfTum ex Italia. Sed,meafentcnuã,nihilco loco vid<
turAvicennadcfcnbre.quamvulgareriVftumBugloffum.autBorragirtcm.quibus
ftirpxa.cojui pacta dc/cnpii,ttinpcfamcco proxiroam exiftimo.

PULMONARIA.

CAP. II in.

Pulmonaria
maior qm
Parisiæ.

Q^uv^o p^ull v^on^o n^o a^o v^o u'gonuncopatur, ^ foliacindicantibu? maculis nowu J
fclulo, cum in
tera aliquando confpicere memini. De cã autem, quandoquidem av anj uenat
niz & Anitiz filijs ipote nalcitur, cum inter Krumpacn & Gleif-
Waniqw^ituivar, s locis: bu usflotcmaivcoelpreviⁿ

moncin

Pulmonaria vulgaris maculosa fol.

Pulmonariam Aufriacsu



jjnetninfitucre nan est animus: feddcalijs aliquot gneribus, quarantequam in At-
"jam pervenirem. miht confpc&a non fuerc.

. P. R. i M v M igitur quod abfervabam genjj. fc& inter Pulmonatias Secundutn, ex radice
jB^ra, mttiimidigital Tirudinefcncxqi Jantc, obliqua, & multL Scraflitibus fibns, qua-
^utit vulgiri^ Eibn. do iutajplura frc capita. cquibi wprod cunr folialongts pediculsjn-
^* >, vulgans fohjs non valde diffimilia, minus canien ampla, afpera etiam lanuginctc <3a,
^ . quojni i gnum difcritnetl faci^ nullis albicanibus macuiis rupercncinfcfla, profusvi-
m dtlutiora: dc mde caules pedales, angulofbs, foJij: angti ltioribus, rH5 mi-

Fu^mmfia
ca. 10 non habet
ultra.

wmcn vuioii Sj inarquali (itu inlizrcntibus prxditos, qui fuaimo failigioin breves ra-
^u Ios Jivj Juntur. fufHncntescavoscalices in quinquelaciniastvtfb Sj Cqutbuscmergunr
"° reslongiu (culi, cavi, ons in quinque crenasdivifis, colons ioicio rubefcentis, poftcaad
f* rulum trndentis, p(rindcatquc Pulmonariaevu[garis] flores: illi; cadentibgs, apparent
JJ > loculis vctuft. ue j. im Iaxionbus/cinina capurviprimjm rferccia, ma[uritat] nigra: ra.
"3! vivax est, &: Imgulisan nisaogfcit, non minii squim Pulmoruriar maculofscradix.

Narcitur in Viennenfi (alto oiixtinn cum vulgaH. femultis alijs Germania- locis: in illvis j
iam Francofurcovicints frcqHcns. Floret Apnli. fcmen extreme Maiomaturum est.

Notabilis

Ex i LIT Terr Juninovoverc. florum que congctforunithyr funafrc cantefolia Fromir,
ixfuntangufta & vitlisoblita. Buglortifilveftris. Ecbuve^uc Anchul^faltjs non abfimi-

Pulmonaria
vulgis f. l.
varietas.

li. molliora iamen, nequctanoafperoviiohirfuta, nullo pediculo prxdita, fed medium
= ulem ampie Sentia. qui paulatm fuerc (cens, angulofus &: liifpidus, interdum non nihil
purpuralcens, in polalc m tandem altitudinem excrefcit, in cujus fam'gio mulci pentagoni

^licuti. in quinque purpijrakentesc laciniastviii. & fubhirfutinafcuntur. continentcs ob-
"n goj, concavns flores, Buglodi horcenfiv, ayt Pulmonarir vulgaris fioribus formifimi-

Jes: iqui per oras in quinque orbiculares fere kf inias divi(i,co)rc, anrc quim apciancut. ex
purpuri^ bent^ dciid^ quando explicati fuui, cserulcoadct Jclcganti nicent, ut Gencia-
nella: Vernx Hons venustarem. fi non fupcrarolattimcn proximcar mutin videantur. odorc
autern nullogran: ij maturidccidunt intc|ri, Sfluemadmodum Buglofnii ortcnfis & fimi.

fiores, acqueccalculam inanem cum uilor Jkqitatuorrcminutnradimetorelin Quunr
niatuntarenigmcvadic. Echijaut BufJofTivalgaris reminirefpondens Adnafeun!

fiatuntarenigmcvadic. Echijaut BufJofTivalgaris reminirefpondens Adnafeun!

glandis. j a u t Anclutrifoltj slatoria, mol io^ quc. inrcr qu« (licet ficca fint) fubfe-
T* ente vere prodic caulis fuis venustis flotibiii onustus: radix crassis carnofijq fibril on .

Karolin.

Pulmonaria
vulgaris

Pulmonaria
vulgaris

Karolin.

Nimosa.

Pulmonaria
Gallorum
Hortulij
fusa.



Trachelium vulgare.

Trachelium
vulgaris

Cervicaria.

Cervicaria
T«lfjejt-

fntulm
i.v-urji



percaulesgracUcs fpatfa^guUoribu^ipica jongiore aut bf^viorc flonimjcoloru vdi » JJ

diract, urPulmonaru primarnaciiJofofio
Jio, initio cand icitibus, deinde vetustate forit
ni^ric.innbus,dulci fapore.

Nascitur pallim pci P aunonia &c Aafir^io
inferlorem, te montanar & cadali, flon
diutissimè floret.

IWENTVJ* & quibsdam Pannonar locis,
Quartum quoddam genus, jam descripto fe-
re simile, nisi crassiorcm, majoremq; caulem,
& laevia folia habeat, flores similiter, ad
illu J,ra:njreml'i-i-'pulcherntnc r ubates:alio-
qui &c ridiccK tsroperaniento t onvniunr.

Quintum gen u s, forma 8t
amplius. Quarto respicimus, cupis flores
initio rubent, ut in Tertio genere, deinde ca-
ruleum, colorem latitudinem contrahunt.

Crescunt postrema tunc duo genera ad ex-
duarum, ut in marginibus, ut profunde &
ceteris, ut in tempore florentis.

Quo nomine disci i ftcnc Vei
Planr:i,jpcignorarc, inpciLeKatc
glolli i tamen genera retenti posse arb, fros. Re-
cenciore Puj^ion iriam appellarunt, quia Dif-
miram PiJtSonum vitijs auxiliari tu^atur-
I talis Polmw&Tii d i c itu r, Germanis & Eng-
lomis, Statistrais dicitur, i Gallis, hoi*
aux pleons: Belgis, Pongimedi maculosa autem,
Cusurporeu nuda fup, dr.

CVM Lutetia; vivcbamjnihiproPuImo'
nanadcmofrabatur (foliaemmalbismacu*
iisconfperfahabebat) HicracJjquoddamgc*
nus, in Vivario illo Madnciano, ad ii|vu)a:in*
grflumiquiutcrinarcem, NortcrLobclm'
iconcmedic.PuImonari.TGallonjni i-J;tJ'
cij ficie appelbtione: fed njaculasiu folij*
noncxprlTitpt&or.

TRACHELION &^APVNCVLVS ALPIN.
CAP. LV.

'TRACHEIH & Rapimculi varia in Panne
I n!a,AuHria,vicjni(quercgionibus sponte
na/cunturjzcueu. Nam i'ulix montolx sunt
silva, quod
nonmillj Cervjcanamj alij Vvulariam a ppe-
tapt, fubezruleo flote non alant; bllimora
iuga,uiSicberg &:aliaiimilia, idem quodaJ-
bo florccll:aliud prxrcrcagenus, molliorjbjf
folijs.oblongaminorufloorurrvnarcnoits
parrem vetgenciu & fpc&ancium fpica, cuUJ*
radix alioqui craflaScinftrarpxccdentiscdn*
lis, tenuibus fibris mire (erpit,& novas l'n
ta r ub egederati vju {re cu a, liiqui te
Iei5riores flores & coronas fupes duntaxat
-Icolunc, fatisexofa: genus item illud flonbus
fumo caulis & ramorum fastigio c onferam
i& q uafi pi lx infar in orbem nalcencibos, ca*
'juscnam fecundum genus est paulti m)n^S
/ flores fingularcs per caule fparfbs habens.p^S*
I terfphzras ilbs liimmo caulis fastigio ir^1*
^fecntcs&r omnibus prope filvis famiJiarW f^1
y.punculoshtioribus inrerionibus folijSj 1^*
percaulesgracUcs fpatfa^guUoribu^ipica jongiore aut bf^viorc flonimjcoloru vdi » JJ

Tnchdmat minus.

Rapunculus alopecuroides longiore spica.



Campanula Perficse folio.



vel violacci elegantis ^faturi: tum rapunculos vulg.ires,cum Campanula ilia, mali Perfic:efolio quibusdam cognomin^ta,quam C.V. Macchiolus Phyreuma effe cenfci, nunc cxruleum, modoalbum floremproferentem.

• O W N I V M porri illarum ftirpium hiftoriam hoc capitedare no eft animus: quemadmodum nequeTrachelij illius,Be'g^{is} majorisappcllatiojiccogniti, nequeViola: Mariana: qmbu(dam Medmm credicr, qu^ ut plunmuin violacci colons ftotes geftat, fed timen ctiam albos, imcriiui* exalbidos, nonaucjuara cineracei coloris,atquectiam verficoloris,hoccf,exalbo5f violaccD,vc] maculacirn, velradiatim commixros; neq;Campanu!xillius majorisladefcctis d<fctc, qua Pytamtdalem nonnulli appellat, cujusfolia&ipfeetiala&cusfuccusvirusolcncr, Siradicis fragmentsfacilepangicur, quasquidem tres ffonte nafecntes uunqua m obfervavi, fed in hortis cultas duncaxat colpcxi; lunt enim ab dijj aut jam dcfcrupta:,aucillarum icones cx lubiEx. Sedcaftantuniftirpcsdrcnbcrcf flituti rii^quasabalLjsproditasnonatbitramur. Anit quam tame carum defcriptionctn adgrediar, n(on abs re fucurum exiftimavi, fi jaradidarum atlquot icones inicio hu jus capicis i nfererem.

iP n ion. auremcarumquarummihitraden-1 d-1cftliiftoria.dodranraliscftplantula^aulicu-

lcJftri.ito,inpluresramulosdiviro,quorum Gn- bliliLin:incnflorc

Panilxin in ^'^'^"umj'nquincangulost^/incriccm.queaadmodumvulgarisTra- J,aut Latnpanulx vulgo dGtx fios^inijeco colore pixdicutn: floribus fuecdunt capi- tulafa*

Campanula Perficse folio.

Trachelium majus Dig. Viola Mariana ex m

Campanula latifolia Pa. ulata.

Trachelium majus Dig. Viola Mariana ex m



Campanula la&efcens foetidior.



Swalt.

11.
Tuchelium
Belgarum.

Walt.

tula fan's rnagna, trjgona, nutantia, fcu deorfani
 ipcdanna, qua: continent femcn vulgans ira-
 chclij femini nō difpac.fcd minus&exalbitliinii
 folia qua.'per cauiiculum (parfa (uni, btiu (culi
 oaricm amficctunt, & in vobigutu macten-
 nem defuunt: que verò lumina tellure fupri in-
 hirentjlatiulcula funt, & longiore pedicuo in-
 nixa; radix pro plantxcxihtace (atisniagnacan-
 dicans.fupernaparte in plura capita extubtransi
 & qui bu (dam films hi rf ura. Tota plan ta lanugi*
 ne pubfcitjlade^que fucco abuiidat.

NafcicurinSnceberg, aliarumque vicinaruU*
 Alpium)ugis. Floresprofctt Iulio.

M v t i A habctAltcrfolia, angufta, hir(i-
 itaque, Echi) folijs fere familia, inter quaeexori-
 turpcdaliscaulis.iirmus, minimi inteidum A-
 giri cra/licudmc, frijtus, & multisanguftis.ob*
 Jongis.hirfucisqicfolijsfcptusiacu jusnicdioad
 iummum, tliyr(us, (cu potiusflorum interfolie*
 la latentum pulcherrimo ordine difpofitorunt.
 Trachlij auc Rapunculi flonbus fim ilium, id
 miaorurM.pallercnnsq; colons,craffa fpica na-
 fcijtjr: evanclecentes Horcs tn capitu!a rranfeunr.
 ciicfubflavinq; femcnconcientia; radixciaf-
 faci, digit) amphcudmc , rugofocortic u ^ i
 carliicans, &:aliquotcr, iffionbusribnsdonat*
 Tata plan taladco lutzoturcec.

JONrinSneberg&alijsvicinisjogi^ obfer-
 vaum criam in akenfu Neuberg adli (vulam
 quscineditiore tumuloe Tirupratrnoitoiri:
 n an»lo M D ixxv. teaxitna copia in amploq^{ll}5:
 dam monranopcato, Sli<*&*> appellate, q^{o a*}
 Jlvco

CM Gmlt-
nam C. H.
Z. B. B. B.



Stylus.

Stylus.

luncaria Salmanucniis.



Stylus, ja-
traa, Matu.

Stylus.

Stylus
Salmanu.

M VLT I s fruticatramulis paimanbusu plurimutn.incerduiiodramalibits.fir mis,totundis,purpurascentibus,qui densi so- lij<; flipanturErica:(majons felicce) crafli" culis, succulentis, amantuculis, serie quadam interdumdifpofitis.aliquandoaurctu il'ordi- natis & incoaicis: fpicxautcapicuU on remu ramulis inlixrent, ex innumens caliuilis in i]uinqueniucronesdivifis,& rondem maculis rigriSjin lmgulasdivifiones impreflis, coftzv- tia, e quibus flos emicat non inodorus, purpu- reus, autcxpurpuracarrulus.clegatuimin^ quafi immarceffibilis colom, Ljuatuorfoho^j bifidisoftanSjCjuorum duoiupcfioiarcliqUiJ majora Cunt: fenicn dcinde in caliculis noun^m lulpungentibLisconti^{netur rotundum, nigri-} cans: radix era (la cfl, [pro plantae proportione, palmaris iongitudinis, fons rubra, u rquatio- t'rdum linci panni etiam tnfici pofTmt.

Floret Maio mcre.noiin'iiiquam ccia Ma^r tio, ficcis qyibufdam circa Salmanticam^f Mompdljum locis, maricimis item Yalcntii^{6C} Gailts Narbonellsjubi tacarna.jor.cra(Go iifueculentiortialirirurjUtfcTefblencomi¹ es rnaritimsfirpes.fi cum cis,qu3: macro 4: a^d* do folo provenmnc, comparenrur.

HAJJC Mompdliani mcocmporeCoffl^l vocant, cam q, cii^q exhumant: ca^l

p f y b r r appdlanc, cujus fart. defcri- ptont mulcs notis refpondic videtur. Dio- f d i C i f i E i i b k t i i c i n s, Tamancis, pingua five craffa, dcinde fuavita cfTedicic&odoraram (deflorcid inrl)ig^{en*} dumptitoj Pliniusaculearaniefieaddirjl¹¹ les Hint hu)us caliculi qui fenicn continen^l.

DoftifJimus vir Ioannes P.J.ica Medicos* ProfefforValencinusapudHifpanos.doni^u* rarias ftirpes in illiosurbis maritimislcg^{cr} mas,Afypum cflecefebat: Hifpanivuij^f nomine^l"/^/appcllabant: Alccnuial[^]J^s n.icionis null um icio, nee quenquam^o rodere racmioi.

AD hanc autem plurimum accderC vide- rur, quam Cljffilitmis Macthiolus Syro pbyu Pctrn nomine exhibuit, m(i mca m- fallit opinto.

CETERVM Coridisfemen potum, if enfee & urin3StraJiit: contra PhalangioruiP^{trro} fus, ifchiadicis, &opifflotomcis ex vino P^o tumauxiliocfirhorronbusexpipcre.opi^l ho- contctsexolcOjuntiffime illinri

IVNCA.MA SALMA : : C .

CAP. LVII.

F OLIOLO RVM q uadam fiquilicudo ta- Salmanuceni- cit, ut eatn Hcrbam quam orma & grac- licta juncorum cau. oia enim jon- cilitate Iuncariam appellant i. ce»cft,fedEquifea(no<Joafpeta<fget>^c^ ftajproxii nocapitedefcribcdarprarirg¹ l'bee aucetn in iingulis genicuhs bm^{to} x jdverfofita, Afperu! e odorato flore folijs quodam:

^modo Qiiia, b... & Linifati... familia: fr<|i]ra Msramu:
" rx a) uu, Gnu prods nut firnilibusfolijs prsediti (copio[os, palcaccoscandicarsrckf pro-
" wlfocf: rca3endeiade cxile, nigncans: radi^ pimcff, candicaj Mji6vivaT, fed fiii.
guiajnms femmedccicuo, tiouLIU-planix cnalcu^ur, ilio jpfaoanio ctumiLbfinem
icniis Augufti.

ProvcnitlocisjrcEiofis/nccrvinctajrccundoa Salmanticamtliaii. Florctulio, femc-^
" " ^ulto inaturm est.

^GENERALIS ilia PiantariimHidoriaqu^anrepaucosannosLugdtiniGaliixcelcbri
" iporioeypisexpreffieft, hujusiconcsiSmeisObftrvat. Htrpanicu deliampum^incer
^nanchicsfpcciesrcferc: Syoanc bices aucemfulto hamlcgeiehoamemiai.

GALLIVM KVBRO FIORE.

CAP. Lvn



Afperukodoratofiore.



T) KUR s vs novim, Siancminc, quod fciam, adhuc defcriptum cfl hoc Gall ijgenusi *GtSmm r<*
* ^{tc} crius cfl vulcari. pcdalis aucnia ionsakitudinis, cufusca iliculi iimuleos lamulos


ru c... ~~...~~ ...dividuntur, ... ~~...~~ ... ad gemculia, qua-

ii, fem, auc plures. rcelli admodum &: pufilli, qu. U. ior foliolis rubris mucronatis conftan-
tes. micanre in meditu. lio aureo vel flavo punflo: ijs fuccedunt vel fingula. ve! gemma, ro-
rundap. irvagrata, in itfovin Jia, macuritatnigric. -t: nia: radix vulgans Gallijradicis inftar
rubelcir, quascricanj coucufa rubrum fuccum reddic, mukis autem tenuibus villis prxdii
cil, & vivax.

Hanc tirpenj primus in Italia obfervabac cruditiflimus adolcfens Steplianus Sicif.
< undu5. Sprengerus, Philippi Stepliani Sprengeri Aulac Palacinalis HcydelberfwPhar-
^ UcBpoci F. iplimque plantam cum femineuv£? triam referebat. undemento Gallium
^ P^ ngerianum cognomiuri po(lit. Florcc sltacc/cmcn lub Augufti finem maturum est

^ V ^ ANDO QJ IDEM porrd novum Gam i genus defenpfimus, ^rpjusiconemcslii-
Ul, J) 11", non ab< re trie, ubinasiconesftirpijm, GalliofoIioruroffijnilitudinb Quo(IamI
^ oaffiiiium ^ Ilifubijc Umj Arperulxviddetodoratoflorc. & Mollngini ^ quasltecc
P^ finis Germatiaalocisfponteiiaftentci oflervavmtB, non minus ramen frequentes
" V Auftria, vicinilque Provincijs Ill flivisquidcra Alpcru! am<() or. iH) Hore
cQfurrud Moenum {ubi < iam plur R! f! 3 nul flrv V appellatin ciduij

Mollugo.



Rubia marina.



Rubia spicata.

Alp... & in Molluginem, cujus genus quod plirihusgnicutiscfinlhit, foliaqf ha* bet ceteris molora, (thizotomxilt... rum non modoirequcmia^edcxiam a facultat\hus, (Et;tiE:<twnno>naiit. nam eius deco- dumd.idfvodhosiSc firfnahiiòs arms, valde uale esse ferunt.

RUBIA MARINA, ET SPICATA. CAP. LIX.

QVADRANGVLI Turnhuic plantae cau- k'rrijpalmarcs nut'.ia ex pane, interdum pedales,geaiculatf, dun &ligiK)(i ad quorum iiogulagcnirulj, quacema folia, inferne, qua C3uli inhxrent, lacmfcula, cxtrcm aparcc mi* cronara^ignJiuCculi, candicantia, ftdJa: in#at in orbcm adna&mntur, &c fiilinde in alis '*r nuli numcrolis fblijs breuionbus & v.ndc conferritn nafccncibusornaci^nqoibusoblo" gi flofculi,rjiiiaci,pallidi:;idi\ craira^uia/"!* interim nibcc,incus ru fcitit.

IN Medicirnni traris^uod Hifbaniatn K Galliam Narbnnclcm allmtjitorc.frncuei* nafcitur,prxfrcim vcrocirraCilpcn ^Valcn^ tiam, ubicaminpcrcgnn.itionc raca Hitp^ni' cacolligcbam, Sf. (spins emm anic,Imoicil*? tj uodfuprattagnumadPcaulcft, ac in mof- icm ufque Set mm extndicur: ubi floreat z- ftarisimtio.

Habuieam aliquado in Belg, ca femine mi- lti prognatam, ex qua lianc (ubieilain i conem cxprimi iu^nunis aliquot iiumi (pjrds, peda- iibus, med 10caulcadurgntc cubicali, infu- miore tamen iji)am vtk liiftentarcpofTc. Pre- terea logc tencriorerac & minds incana, quam locis vbi fponie provenit: & ciim fecundo imierius (lores protuliffct, (ublcquciw buena eorruptt.

Hv ic conjungendi cxiimavr femine Cr^{en} tiaJlatocaum,quam lolcphus DcOfaf^{10,11} ^ui plamam ipfani m Cvcta nafccn:cm obl^* vabata fimilnudinc quadam quara cjus *tia cum Rtibii folijs habcie videnrur, Ru biam nominauit,& fticatarcognomci: addidit, quia furni cauliculi & rami in ipice fo mam cca- nurr. Cumaotcnitot. plant. nonnihil alpera ficnonmmiiscomi fic fuit in Apuzia, vel Arpcrgoappcthi poru

Ar.idicc porro,qi: -fit.' ubi b' 8efr<qt>fttbusrenmbtt(quefibriscapil euocmulricaliculi.nodofi.qtiadranguli.a') riufcult,ftacim ibtnfimS paric, frequentius tamulis, ad fu sex aduerfo nafcent- cpnr diti, qoosctiam m orbeffi in' p'ia pe- l b n a , n l c r t lura le- ra folia, breuia & nonnihil alpera: fummic- Hsi: ramuli dffinuni in rongam.tcnuero, W rooi'cxilcs & Jixconfpicui. wloreqpefal^ cntcs.altcrnahtncontrano intff fciitu



Cortuda prior.



durum

Radices ab uno capuc mulcij Crafljejni Ur' Apparagi ahiljs, fed bre viorej. natcuntor.

Flncrb.it in hortis in quibus nata , AugtaRo: frnienobfervarcnonhcuic , qihafubexitura nicnfisSeptcmbiisfcqucnirisciuinFrancotiir- to difcedrem, noiidum erat maturum:cenuc tamen & obiongmlculum id cflc pofica de- prdicndi.

R VBIAM marinatn vocabantpriorcmil- lam Mompciliani & Valcnrint,qma ad Kubi? JcgLtimxformamquod.inntnodoacccdir:qui- bmautcm faculcacibus lie praedra, mini com- pertumhabeo.

R VBIAM pond Icgicirjim fpomc naP;en. n*t;*t'- 'cmobfervabam in quibuMam pratisad Da- mi biumfi cis. pr^ferti mincer I^ofoni urn & Tu- ben Qpidulum ad confluentes Moravs Fl.Mo- raviam perLuan & D b iuf i rum.

Co a a v D A. CAP. LX.

V N V M filvctris Afparagi genusIvece- bus dclctiptuai mvenio : ego tmpr Hifpanias obVervabara.

PRIOR frucicofaeflplanta.duabus, tri- nautpliibusvirgiscandidis,ligiio(is, fir- tnis&ramofispraedita, circaquasqutnauc le- 4ia foliola fimul (emper conjunda nafcuiitur, breviam,rigidiufcuj & pungentta: flolcuh luta nsfolioljsconstantcsiiibalisirHerfoltac- :|aicu»cur, odorcjucundo, utiviolxmarnx: raaccaenitiovirelcunt.dcindccincrcumcolo- ;cn:tepntrahunt ,fcincnq;Conr]nciitniGriini

Abuncc



Ulcio.

Abundat in agro Sillmanti j^{nfi} locbptroffis, torquefti*Caflfeltt&G»nac«i\$ regno, nⁱ modo in fepibus, fe^Enumc!uc «nminarviscultii:vidietiamNarboneafi agro, inprimis autem juxta fepes. foret^u maturercente, hoc ^ Augufc., femcn O&o- bri maturum eft.

Alebatut apud Belgas à quibufdam rei herbariz studiosis, ante quam inde excederet fed fructum non proferebat.

6 m *
*UWM.

Favricosvs etiam eft J>Vindibus & mollioribus"mis, fi ve virgiamollis, [ros aut quatuor spinas ab codemfcieowmi prodomtes nine inde fparfasprofhojsfc- vides itidem uti ramifunt: SorCmnullum in hoc conrpiciebam, fed frequence* renens, U imtioVtrides, deinde P" mairicatem nigricames, fi* co & pulpa vitente p mtCrUm bina: ra des ^ b p ut f, ca |, | o ^ as, fuperior b ut ut plurimum unicum, non valde diflimiles

Maria.

Frequens eft ad Fagus, u. in Lufitan ii, atque emrainBrtici, folopctrofo, incolk bus & fepibus. Novembri^u mme onullum inveniebam. Crevit & ite quibufdam Belgis, femine à me è Lufitanià delato.

111.
Corduba
nulla

TERTIUS cubitales habet virgas, ramofas, ^ So a, P H ori fimilex, candican- ribus, firmis, deorfum fpedantibus spinis alternatum, & fecundum virgarum ramorumque inaequalium inflexionem hon idat ad quas quina aut fena folia ex p^ul^uta^u ite fimul pro- deunt, ut in Lence, P^uonia^u fPa^flwftfcsfo|ijslongionmoil»raque, Larrgnisrolij*D(« dift^u nilla, quæ command^u at, ^ abdulcia, & aliquantulum gummofo deprehenduntur: flos inter folia ex alarum f^u !Ti^uoneotCnuicIuc petio l d d ei, ex v lid pa l l f ^ i d o fructus pene rotundus, f^u ctur (tameti unicum granum magna ex parte continet, raro bina, fons nigrum, intus candidam, firmum, ut in fuperioribus) initio vite- fcens, maturitate rubefcens & carnofus, fivè succum & pulpam continens lentam & vifci- dam: radice firmatur multiplici, inflar alioru^u filveftrium a fparagorum, longa, craffa, intus alba, f^u llar altulis afparagi, qui illorum

Ulcio.

modomaodunturcrudi&cofli.cmnoico.iccto&falc S^u abundantius. quim /upraOiyfi, poncm falcbroffislocisjvmavjas, nor p ocul à^u etia^u sub dUrbf, pubI, vldTa ^ imminente, antequim in Oceanum ft <* oneret. NaClUr^u ^ 1C^u & allj5 Lu fi (i^u * ^ & t^u ifc Binci Novembri cum fru ctu maturo in Lufitanià legebam, raris aliquot floribus liuc inde per ramulos f^u etiam onullum.

Nulla vero cultura aut diligentia facere unquam pinguis, ut illius semen a pud nos in
velet. Sed duo lupcriotes. u. d. Xij. A. Gf. n. crolr. Sc. vere nobis viri Dn. Ioanms
r. Dilfcukilimoviridarioconfpicibatiru^cuiinmulcisaIijsraciniwisftirpibus. qua-
m omnium Nature miraculoruoi, c rat ftudiofi flings.

D! c 1 1 v R hie Afparagus Gpx Cl Sainrtifsa^ Oi Trtrfkt To^ yj p<e>jc<r-3<< id cft, AfpsragU; pc-\
tve filycftris, & Murina^ Bina. Phniuj cciam a Lacinis Corrudam. ab alicibus Lybi- *
cum Ab Accis Ormmium vocari tradit. Corrudam quidem oonnulli didam vqlunc tctie
Ruellio, qudd, utn adolevic. facile corruicdeciditvc: iic Hdrminium «Vo TO opj<w, quod eft
f, Lybicum autem, a patna. Hpani in tiffertuer Efpirragcs, Hnctfi mitcm Ejp
fr «w (quiainagnsfrumenco conficis apud eosplerutnqnc crcicic) appellant. Galli,
d J. L. tali, ^4\$4raga[dTMUcv. G craani, i8!?![* (r 3p<wgvii.

Afparagus mannus.



SECUNDVM genus intgero videtur
Theophrasius (quca) fequaiui ttl Piinius)
ciim aic lib. vt. hillor. Plant. cap. i« AcaJeatorum
all a ex totoaculci (unc, ceu ATparagis
{corrudamintellige) & SebrpiusfiveN<?pa.
hxc enim nullutn , juxu dculeum , folium
gerunt

TERTIVM vitfetur in Creta obfervafte
BelJoitus". KamLib. 1. Obfervationumcap.
x vi 11. fie fenbit. Vix coEa Craainvcnias
Afparagum altilem : filveftremdunraxarha-
bent, Corrudam vocaram, quac paffim nafci-
tut. Prxiercam ramen, iliudgenusifticinv-
nicur , nomine vulgari & antique PoJytricha
dictum.

Q^A M MatthioIusexliibet, Co<udanon
eft, fed A{para^talrLlisgenus, quodnos (quia
irariiimisdccJivionbus&ierbidislocisfon-
tprovenic) marinum vocamus. caule brevior
Cjfirmiore, folijs crafGonbgs, firm ion bus, ex
cxrulco virentibus: bacosmajonbus, quam
vulgaris hortcnJjs, non adco coriHij inftar in-
cenii rubentibus. Forte isentqucm Galen.
lib. de Aliment, facul wci bus 1 JAWPFJ id eft pa-
luftrem nominat,

Simiiem obfervafTe videorin prat is ad Da-
nubiumfiEiscum Vicnn^AuiViaeuiualaCx-
(ansverfirer , unacumioqunfticcriam fre-
quens nafcitur, altitl reftpondens, cujus etian JJ^
inagnacopia, & crafRoribu5quidcm cenciiori *»»
biisquegerminibus. in quibufdam xditionbus
"*****"

prati invenitur, paulo fupra Clement, Sc Enncftori im langhc thai Gciierofi Da. Wclfi

RO Corradiiccauliculi jacobocoai, venfrcmernoIliunt, & : urinamcicnt; radices
um contraurinidifficuhates, regiuro morbum , renum vitia , & cpxndicum cm-
CI «min potu proficm cum viaoaurcm , phalangiorum moifibus. Breviuthujcfficca-
f: iof vis quin domeftit.

FINIS LIBRI QUINTI.



RARIORVM PLANTARVM
HISTORIC

LIBER SEXTYS,



V i N t o *Lihro abfluto JupereU Sextu** (lexemli-
hm rariorumfi'trpiumhfioriamcomprehenderehab^{emiss} it
ammo) a mifcelUneispia^tit, quastn commodum ordinenu
redigerc nequivtm tss jttiHt inttiumfafiuri. EasubfeqHentt
latfeofuccommandates: detndcumbettferA, atquealuquidamtcnutfo-
Itortm inc'tjur Apr &dit &. jiddnturpr&tereagramimii & arundmaceis
foiis donau, legumina ^tnfoliortingencra, & altarum (lirptum fat"
r<*go i cum nonmSisptlagkis., %\$ in Aqua nafctgaudentihtu.

CENTAYRIVM ~~PARYVM~~ flavofiorc.

CAP. I.



Centaurea
partium
no. f. 10.

tr«.«.t-

'T' A M B T S I Centaurij oi3jorishiflori.imcap
1 lib.iiiJ.noftrarumObferi'anonumdedenmi**
& lux plants obnomims affiiitaccm conjunpp⁰
1 tuilTct,qma tartien pletalquc rotas illi ditfimils.*
cum proximo capitcdefaibendamagiscomrouⁿ*
habcc,eara (cjungerc libuif, atqueabillaRarior^{utn}
ftirpiuminobisobfervatarumhb. vi-comprchen*
farumhifloriaminciperc.

MVLris porro foiis Saponarix vulgari non diⁿ¹
miiibus.minoribustamcnSc candictntibus.pertj¹¹⁶
terrain rparfis,hrcp!anuprxdit3cfl:incerquxc^{aJ}
Il5 exit rutun Jus, pedalis alt tmlinis, gen icu latoJi*
exlingulisnodisibliaCentarij minoris,auc H/P^e*
rid imula.bina femper inter fe oppofita, & Gc cofr
jjntta, vellimulconirentia, ut caulstipfa[raij^{icr}
vidcatur:lbmmirainulialiquorflorsHyp<i^{clm}<1
ribus ferc fimiles.Sacurations luti colons, U pl^{*E}
aurcos, (ultincnr, kmendc inde in vafculisten¹
mum fcobisinfar.nigruiradixCandidaeflcnuli¹]:

PROVENirI^to (bloincollibusjuxcaTagunT⁰
ab incolis *Stmper.* »tva dicitur.qudd toto ferme a^m
no Hofcar,qualiquercnafcens conlpicatur. *Obi*
vabam eti.im alijs Hi (pan ix loci:, atque olifⁿ *b^{ro}
Mompcliano:fed&annodcindcLxxi.fup^{r4} n ij
Icfitnum fequingentcfimiiiai in Anglia,£^{ne}<icⁿ
comiatu, in Hornamicnfi vivano, JuxraTlwi*
dium.florqncra Septembri :decennio vero P^{of} i co
picfam conⁿ iculoquodim,inter Gravefcndam«^l
cé Ill^o Da. de Cobham quinq. Portuum Praefec
in eudē Angliā, Iulio floribus onullā confpiciebam.

MEDIOCRIS calorupanicpicl^&aliquanciitumanoar».

HYPIRICVM SVPIKVK. [>

CAP. II.

V VLC U M Hypencilii[toriaamu^i5prodit.icft,ide6 quo illam hic repetere non est
ricccfTc: fed aitiid genus in Flifj ania mēā peregrinatione obfervabam, cujus hifti
nam non negligendacn cfleduxi.



%cric.riipio.iit.minimum;



EST Verdi[h]d f[ra]m[W]j ramu[us]is, irrut[us] hu. H ^
 mi flatis prxdicum, nuTierofiscpnferrifque fit***
 folijs illos ambientibus, altciusfeu vulgarif
 Hyperici folijsfamilibus, fed plane tomenro-
 fis&incanispidior in villw exprimendunc*
 gligensfuic) cjusfiores (ccunduni ratnulcf
 lurei, pallidiores tamen fiiminoresafiquan-
 tuluoi, qu2i^tn vulgari: quibus (uccducca-
 pitulafcu vafcula vulgans capiculis familia:
 radixeft dura&lignofa; fed ipfi ctiamrami
 per terra /parij^jbindc fibras&radices agut.

InconvallibusqaibufiJamnonprocul3al-
 tantica crejeir, ubi Iulio menfc florentcS
 plantas inveniebam, ade6laterparfas&dif.
 fufas. ut ampli petafiorbcm squarepoi Tert
 Martioverdfequctr. inmaritimis Rcgni Va-
 lcrinilocij. crialfloribus onuftas confpicibi

INT£ * Hyperici genera referendnm effe
 hanc firpro. non eft dubium: nam plurimai
 noias illi refpondentes tiabet: imbccij Jioria-
 men clt, & vulgari minus odora,

Vi R dofliflimus Ioannes Plaça, medicu

clcberrimuJ & Profc (Torin Acadmil Valcntina. rutam fikeftrem Dioftoridifcfffccn-
 fcbat. qurl cluccllio interno Erurcjc & icft. undc dcfcripcionem ejus peter licet; Salman-
 t' « nftibus vulgo Cw fcaj tiffodictari, perinde ac vulgare Hypericum.

ALTERVM effe Hyperici lupini genusciamon tomento obbitum, anoflro Lobelio obfer- M>,-ih-
 vacui^ Mo: npelliano agro, quod palmo non majus efaaf Terit: meum autem, moddde/cr- /-• J^i?
 ^" ^t CfTc quod cnc rear, milii injuriu^ cfl nam plantz diffimiki. & meum effe a Gcro. quoi
 In^ Dfervati billi ufprominimofappios dpt enriyobuUitopci piciartl vforpavit.

DIFFER enim plurimum ab illo Hyperici ut illud lupinum Belgicum five Septentrio
 na]e, quia tota plan ta valde tendit lacft. raras haUeramulos, raraque folia, nee ila incana" ?*'''
 rutt^ ue obfervare me mi Qijillaminagrorum a^gentus pofl mcfclilfeens.

Paronychia
fig.



Italica.

Kenina.

LOKCE elegantiflimiefhzeplanti. i mul-
tas viticulashumi fratas spargens, dodia-
nales magnā ex parte, interdumtamen c
pedales aui foiores. nodofas. quibusadnascuti
tu r folia Polygoni mans, m i nora jfc virid la qui*
dem in noveHupLnus. fuccerTu aurem tempt
poris numcrofa & confertiflima. caqjacerola /
membranacca, profusalba, ficuttota plant
argenteis fejuatms conflare vidcatujgratifTirufi
spectaculo : flos illi candtdus PoJygoni vulgaris
floris instar, sed adeo exilis, & inter membran-
hi ifijs lacens. ut vix appareatf r eme Polygoni
radix oblonga. graciliSjCandicans.

Hujusiconem. quia vctuHas&perfcflrc
pl*: itas, inrer chartas repofitas, ad maiRjm no"
habcbam, ex novellā, flt femine tmhireccsn**
t. i, qua: pitcaccas illas membranulas nondutn
adquiliat. exprimicurabam. atqueapudBd*
gas, ubi muturrxlcandore luoremitut,

NviOVAM abundantiu, quam in petrofis*
Cccis colltbus SaJmanticT: vicinisobfervibanit
trans flumcnThormini. ubi &: CoJchicumon-
taniKn cap. xi. lib. ii. dcfcriptum copioscptO'
ver. it: tu(rfetiam circa Valcnriam & Murciani
obrvareetiimernini 'lapidofbtlocampofii'
praArclatem, non procul a Divt Martini diver*
fotio, quā iter Maffilā est, sed multo minorem,
& unciales ramulos seu viticulas vix habētem.
Rorcbat Maio& lunio/cme'nque profercbat-
SALMANTICENSES& Valentini irtuAwy**
ParonychiamjVocabanirmeoramJudicant-

hil aliud est, qulm Polyjoni man's genus pccultare, crenim ciim feminerccns natapro"
dit, aSanpunariāv uigarinihilautquam minimum ditTerr: 5£comnunducata, codcmf^u
flu depTehcdituTiitaque viribus rmltum abfimiLs Paronychia. qux tctcGalenolib. v ii>.
Sitnpl. tenuram jartitim est, exficcirom & moifii vacans: talia cmm finrofOrrct, quXI³*
ronycln. isfimanr. Murcianorum vulgui[^]r[^]vocabat, abexfuccorumfoliorutn, uti
•conijcio, a(pentarc.

Anagallis
florosa.



Italica.

An
furtitmt
f

AUKCALLIDIS, pnter vulgarem phoe-
nicco & cxrulcoflorc, doo aha genera ob-
[crvabam floris colore inrer fc diffcrena.

DODRAVTAIES funt Ptreri ramuli, cubetcJ>
tenerj. fucci plrnijhumi (parfijin quibus tnulf*
folia, Anagallidispiicncfoflorcfblijstni)Of»
bina femper inccr feoppofita, acidiufuli Tapo*
ris: ex alis produnt flores Anagallidivulg*
forma Cmiles, quinqc folijsconttanrcS) ^o
coloreprarditi: capitula dcindeurgentia»*tc^
riusAnagallidis capitulorum imula. tninort|«
men, femenetiam nondiflimile-, tenui¹
ferpenteest radice: quinetiam tptira¹ muli . . umi
fparfi fibras agunt.

NaCcitur in Hogbergctin funimo ferē jugo
inter a- b o r e s , a j k d e m e n t o m s c h e r , n
rcnflain, vicini(c)ucjUgis, redloci opacii. F^{lor} ex
lunio. lulio. fc Augullo.

ALIERVM, tota facie vulgarellud, cuip>
fici aut carulei lunt flores, rcfert. suosci^
* uinqc foholis ftcllatim eapanfis coni&
; ab«cum totidfm in umbJito flatnlnul^
ris [amen color divctfui, cam cbJwlctep r^



Alfincrepensimjor.;



reus est, cuius herbario p q p p c n n i [i u i n
conspicitur. Floret Iunincum vulgari.
ID [u]hirponn jacum Francorurriannore-
demptx Qiuris humanr nonageiimo Aipra
mi l i k & g f i t h u a n t b e c ^ e a
ttbusdcindcanni Sjtuum genus deciduo fcni-
n c c o n l e r v i V i (i L d u n i a p u d
Bacavos.

AI SIUE RE PENS. CAP. V.

CARMENTIS verim auam caulibus, ijfq. *Alfincreps.*
L- * nu merohs, prardta est hxc planca. genicu-
lans, flexibilibus, humanam alcirininiem pJc-
rumq; (upfrantibus. pr^lrciin ii frutices, quos
(cadre poffir, vicinos habcar, alioqui, piopter
infirnoitatem, haH> idiffufis: bina fingaiiige-
niculis & internedrjs adnafcunrur folia ex ad-
verfolka. Alfincs vulgaris folijs figura & colo-
refjmilia Jongctanienmajara. & ad Helxines
foliorum amplicudincm accdcnria, mollia:
fiorescxcalicibus. fcufolliculhprodeuntcscx
herbaccocandidi fex fblis confanc, quibus
fucccdiirati iiii Piperis nigri, antgranorum lu-
nipen vulgarij magnitudine, foi Uculo illo m-
cluli, initio vindes, per maturitarem nign fe-
mine cxigut: & piano pleni: radtx candida, val-
defibrofa, longa & / armruina: qusrfitjrulis
annis novos caules promic, alijs per hictnem
nncidis & corruptis.

Copiofa invenitur Salmantice nfiagr Oj Um- *Katala.*
brofis locis & circa fepes. Noftis etiam nunc
in Iio rets freques & primulas fca^dcas. Aliquoc
vero poft annis abunde obfervaba pone arcem
Ebrcllorf Magnifici ac Gencroli Dn Hicro-
nvmi Becka Lcopoldstorff. C^rana Coniilijs
& Annon 3 co Iimp MVngaria Prvfca l'
iudofa interarundines. Floret cocaarfruc.

S v N T quibus! /KVjwiro? tr^« , Cyltaminus *Nemina*
alcera Diofcoridis (quatnnonulljx/wra. ^-^, , , ,
»x; ajf(j)t; AA9i^ Vocant) dicatur, quoniam mulcis
cum Dioicoridis dcicriptione notis convenit
creditur • guftus tamen infpidus & herbaccus
facit. ut catnad Alfincsgci Jcrareterendampu-
tcm. Lcaoritamcn libe Tumrdinquo utad
quam volet cliffem referac.

CYCLAMINI porro altctius acinos, drach-
martinm spanderc cum vmi albi cyatbis duo-
bus potos per quadraginta dies, liene, per uri-
nam & alvum abfumcre te^scft D. ofcorid.
ad orthopnerambib), Sc reliquiasa partu re-
purgare.

ALSINEN aurem, vim refrigerandi adf} rin-
gendi q. obnncrc, oculorum in Hamationibus
cum polenta illini, fuccum aurium dolonibus
infundij & omnia jqux He Jxinc. emendare.

ALSINE CORMICVLATA. CAP. VI.

PAZ MA RI s hxc cfl! icrbula, unicocau! & qui in aliquot ramos dividitur, con(rameo
ato. ccncro. Iubhirfiito. ut AHihcvulgans: folia AUinesfoliordarinula pau i
lo longiora, ibhirata etiam, inter se csp. h. & ex iocit, v^« «gemina: alarum ca» isinfi!
dent pufilli uores, candicw Kcs^uibus Iucc Pduni. ncmbanacca & iianrparctiarornicula

Q. Q. ¹ gallraacco.


Aliinccorniculata.

Matain.

Alfina
Zia.

Matain.

Aminia
muri
Zia.



Facultates.

nionon placet, certè Amines genus esse non difficile bicur, quod Diofcoridis testimonio, nonnullis sciam wfoijo Vadici cur,

Po R R6 ii. 4x Auneulxrmirts illita, «gi!opia fanat Diofcoridi. Galcnuscamedificare ordine secundo refertrecterim nullam evidicium caliditatem polljderc. At Plin jus vim ci septeam tribu it, & exutcratricem: quasi lane, in ca quam propono planta, non invenias, cumporiusejufdemcum Alfincfictenipcramenti,

K v l c caput adjungendum putavi Al fines quod dam genus pelligicum Mictorale, anno M.D. xcv. primum mihiconfpeclum & obiervatum infabulofis illis Hollandia: collibu* OccanoobjctUs, & quimarinis undis incerdutn alluunturj adPagum^gnienft op i fan6 vulgodiflum.

Longelatquecummaarenaidferpic, multilque ramisliumi jacenribusprarditumcfl* tenmbus, lenns, flexibilibus, quadrangu)is, quosmu]taambiuntfolia, Anagallidisvel AlfincroJijs nondL(lim]ia, (trdcra(TaadmoJun)&fucci plena (utfuntp]craquepdagicaruni ftitpium; foliorum pbitulaca: pjrncin!Ur, bina Tempercxadverfoaltevnaumnaferiua. Tai de viridia&falfogiifu^inter qua; extremis ramulisflokulivircfcntesquinq; foliolis con(tintes, & in hisquinquedftaoiinulapallida.

gaUinaccorurncalcarimn forms, quæ Inro quddam confperfaliumorcicanenribusdeprebenduntur. femcnin illisc5ciguum, matu* ritate nigrum: radix in u til is Sc aiinua. Tota infipidaest.

Inter fegetes frequens Salmanticenfi agro, ubi Maio mense flores producit, Sc {cm en maturumprabet.

SE D & aliud Alfinesgenus non vulgare, circa TertK dtUfientra, alijque Bzucxlocis oblerabatn, caulcfimpliciut plurimum SS, finguliri, interdum multiplici, geniculato, ped is dadrante m al to, (ubrubicntc^liq uoc ra* mulisprardicoifolijs fatisanguflis. fecundum pctiolutn ramen lacionbus, &: extrema parte mucronatis, dorforaagiscminente, nullalalanugine oblitis alterius in(tar, (cd Ixvibus & L faturatè virentibus, geminis femprad iinguJos nodoscxadvct(b nafcentibus: extremiramuli veluti capicalis intlar Symphyti perff i. onufitterant, quæ oblongis& purpurcisEoribus referta: radix mediocris, candida.

Nufquam alibi quam commemorato loco milii con(pclt x est li^c planca, Ianuario mense Hores profrens.

A D Auricul^ murishiftoria, quam Gra:ci f&bs(Jr/Jaappellar, multum accedere mihi vi(a: rolusflos, qui noneflAnagallidis. nequecsruIcuSjrefragariporL'rat. Sicuicaopi*

CHAMÆPITYS AVSTRIACA.

CAP. VII.

TAMETS i meum infirurum non crar. de Ajugaquidpiam commenrari, quandoquidcmapterifquealijscjushiftoria estprodita: quia tamen cjus genas, ab alijs neutiqu3ra obfcivatum. dcprchendi, illius hiftonam noti negligendam duxi, Jed hoc loco cTe proponcdara.

Ajuga
Zia.

CETHEVM primonereLcfVoremvohii, Ajngamluteo Bore totaAuflria ad6quC Pafinonia. frequent^imamc/Tc in a^ris&:graminciscampis;quinctia&:il]ud genus multifklis folijs & rubetcente Horc, quod CI, viris Fuchfio & Dodonaco tertmm est, multis eorum Provmciaiunij&aliamum Regionum loosinveniri.


Chamæpitys
Zia.

EST autemidgenus, cujusliftonain defenberclneconficui, clegantiiTimum: numC- lofoSjCum adolevit, profrens cauleSjpedalc^onnuquam etiam duntaxat palmarcs, q"3, dranguJos, firmos, lanugine(quampLaornoncxpreflit)onufctos, freqiictibii. snodisciniK*» quibusutrinqueCbiopposita in nalcunturfdliathamxpiryosvulgaris folijs familia. latio- rari. rncn, & in quatuor aut plures tncrdum he in us di vifa, fupcriic viridia &c fplendciti*» llibtus net vnta & i. nonnihl incana, odoi is non injucundi, guftus cahdi, non ingrati titncO: ex fingulis alls nalciuntur ramuli Cmili .cr quadranguli, frequentibus folijs Aj ugc finu

libur
p»

Ckimxpitys Auftriaca.

pfeudoclutnzpitj'S.



spti, dimoribus ramen, quide indcalia oblongain atisfoliola, angusta, mucronata, Liba-
 notidiscoronanatfencrcntisfQUorumpsnrcrtukgetunc: fummosraaiosvecticillatien
 srbnbiuntrigidu/culicaliciili, cqui bus exeunt flores Ajugiterciafflonbus forma non di-
 CtiileSjfed longc m ijores Sc elegant! (Imi, coloiic (atun purpufx, Sc violaceo, infcno« ta-
 picn&propendenrelabronnonnihilcandicancc, &{anguineisgutcis refperfo: ftminain
 6ng«tiscahalcalis plcrumquc quaterna, oblonga, anguloiiii, colorenigro 8i fplndentcprx-
 "iw: radix nigrajdura. mulcisHbriscapillaraj&linguljsannisoovoscaulesprofrcns.

Satisfreqvensnnciturinfummo jugomontis illius, quipago Radaun immct, non ¹ *italia*
 procula Pcwrftorf, fescuiinilianaburbc Viennadift&ntc, tenui tiigv6que Colo, qualcuc
 plumum est vicjnorum monnum, atquc etiam Alpium illius regioni-: ncculqaam alibi
 aliquorannismiliiobiervatum, Atanno M.D.LXxxv. ^&fequentr^nalioctuodamjugo,
 lionproculiStamberg copiose nafi deprchen ft est, mulcc>vegcnor, afque inter mulras
 iliiusthrpes, nonnulUs rubri dilutions &rioridi, unam etiam cincracet coloris floribus
 prrditas, qualioqtiiiccfoimijnccmagnitudinc, abejusquam modddc CctipCi3. oribus
 differebaa:-

Flores profert sub Gncm Maij&Iunijimtio, quoctiamojerifcfcmen plcrumquc ma- ³ *impus*
 turkacemadquiric.

HISVENITVR. poHfpanijspufiHaqu*da.nsplar\taAjueEva!dcfi[niUi]cumcau- ⁷ *italia*
 culiSjtum folioruni trifidorum formi. fiirfuca roca, Tubfalfo gultu, & inodort, nifi ingra-
 m quidpiam 8c Wcvbaccum olerev. flores cutiemis ramis ex alis piocunt Ajugx flotibus
 ondtfnjiles, n) ajoresramcnpaul6, &albi: fcm]narubfequunturquacernainfingulisca-
 culis feu ucnclis. cincraci colons, majulculaSifermcoibiculata: radixcraftiuculacV,
 ibalbidu. &pcrcnnts. quanrum contjcerclucit.

Proirenrilocisinculcis. arUtefioresproducens.

HISPANI obrormxfimilicudinc minter Ajugasrcfcrcbant: fed ciimejus tempera-
 »tutn non rc/ponilcaEjPlcudo-Chamspityspottiiscnfendaeri^donccclcgnum no-

VENIAT.

921

ANTH.

Anthyllis
mlirm.

Statale.

Anthyllis
luta
Hera, crina
Yuanthilla
si,
Fenclatis



Anthyllis Valentina.

A I v G JE congener flate planta, pro-
pterea proximum illi locum dedit, Ha-
bitauit rariolos humi expansos, tuncios,
villis obito d f g l ralis longitudinis, folia ob-
longa, viridia, villola, exrima parte in ambi-
tu (errata, & Chamsepnos foliontu quo-
d. uiniiodaciiula. binalcinper exadveilo Ie-
ricquadam difpofia, puftu nonnihilferui-
do odorcfatisgravi: dorem in lidguin to-
Ijotumalis Ajugxiioribusperijinrleii}, pur-
purcitamencolons: fenina in finguiisva-
faihsquaccniaiani l l conjunda, oblo
fcuIn, emraceico Joris: raJicem cianlm,
fubalbidaii.

Nafcuur lirofolo adTagum flu men'in
Lufitarm. GranateniictiamrcgnCj&GaJJji
Narboncnfi, iibi, dumiflicvivebam, illam
fepe legerc man i n i Flo ret aril-arc & rAu tu ni-
no, Granatcnruamenagro matunus.

G R M-CIS, hxca. v Sv? u l U hipa. -, Latinis,
Anrhyllisalccra: Lulitanis, tfervatn/iadic. I*
far. Mom pel ha in i Bcotempore Tvam mo-
l(, » « ») appellbant,

fi i B i T v R ba-c, teflc Plinio, mdvritia
viilfarum, & in rormmilut/, m comitiafti-
militcr mocbOjCum mcUe&acctOj. cjuatuor
drachm is.

Lufi[am& Granatcnfcsmihi refcrebant
ejusdecexfhim, ad repUTgandum (aiiguincm
unpuruin propinan.

ANTHYLLIS v AiEMTiHi.

CAP. IX.

Anthyllis
Valentiana

Statale.

Anthyllis
luta Flava.



L I GET hare plnca codem nomine quo
fuperioi lit tnfigniia: quiatamen facie
illiditfimilisdt, peculiar! capuc cjushilto-
ri am defer i be re volui.

Ex unuaveroradicenmltosprofertcau-
liculos five viculas dodrantales hurm (Ira*
ras, ramofas, fubriibentes: tbiola Ientiscesi-
gua. fcu ponus Chamariyccs (cm toca planta
adcu fimiliscft, utptimo afpectu Clamsefi-
ccn pucarem, illam tamen diligemiusccni-
derans, latlcoluccotarcredcpichemJi) 8i
plcrumque cum fins rabiulis vcluciquadaui
falugine afperfa, fed enam ipfa (alii gn-
ftus: rloresiruenpfafoliaenafcunturpLjiilli,
quacuorfoliolisconftanrcj (licet pic>ori]C-
cam plantam expnmerc volens, quinqoC
foliol i liabemcsdepinxerit) exalbopurpU-
ira(ccnt<:radiccinungularem liabet, nigri-
cantem.

Hanc plantam nufotiam alibi context >
quara ad fo(Tas urbis Valentirin Hifpanijs,
juxta cam porcam qux Regiam arccm fp<
dat. cam mihi demonfrante Doilorc Ioan-
nc Plica e]O] orbis Medico & publico in
caAcadenua Profclorc., Florcbat April¹
inino.

Af&t/AA<T<, Anthyllidem idem Placa vo*
cabat, eamqucad pnum genus Diofc-ac*
fenptum refcrebat. Eci autem inter Amny**
lidei

Chamaelyce.



lidesprocul-dubiorecenfridafi^primnata-
men effe nequit , qux reflisramulisaliur-
git, ciim h:ec repentes , utdixi , ramulos
habeat, totaque facie *Chumxyccu* piopc-
modum referai.

CHAMAELYCE. CAP. X.

FACIE perquam familiseftfutdiximus)
proxime dclcnpta: hxc plania: nam *Sc*
tuptiacit, & humietiam procumbens, nu-
tnerofo/queramulos, ccreccs, quaternum
d igt torn in tranfverforum, fivepalmiincr-
duniLongicudine, veleriam longtorcs,no-
dofos, Icugeniculisincrcceptos, p^trpura-
fcenccs , qui in orbcm di.fufihuni^iacent:
folia habet puiilla , Lenti aquaticx forma
pcrfimili, l^eplidisfoliisminora&icncno-
raiflos ilh PeplidisantTichymaliCypartin^:
fruftuscricoccus,Peplidsfru<Su minor^ub
folijs rcondicus: radix cenus & inutilis.

Ladi fitnilcmfuccumcmittitliarcherba
vulncrara.non minmqum Tublcquntibus
aliquot ca pi ti bus defecti be ndx.

Copiota ubiqs agroSalmaruiceni, fqual-
lids&petroGslouis, atqueeti atn intertpfa
vincra (quem.idmtiduni& circa Mompc-
liam)& plcnflJuealijsHifpania!locis.Apud
noftrosBeigasfcmdata inhorcis , prxfer-
tim macrofolo, mature feniine fpontede-
cidcrnefingulisannisrcnafci solebat

JLan< *trJxmappellit *Gix^hSi*.crrawjUt Pe-
plum : Latini, Gra;camvoceinrctinenrcs,
ChamxyccQ : SalmanncciWes *NogunutU*,
quafi pumihm nuce'm exprimcre vellenc ,i
fcrninisnimiram, utipLKOjformi.

ABSTERSORIA fiiacrtafaculcatcpol-
l. **T** **h** **h**

PEPLIS. CAP. XI.



LACTARIIS ftirpibus congener est
Peplis , tota enirulaiieofucco turger,
illarum lnfb^non tamctiilflurgi tut ilia*, led
comam humidiflu/amhibecquemadmo-
dumChamxycc : ramnli functidigitalcs,
rcretcs.nuncpurpurci.nuciu'rbacei colon's:
folia inter Portulacam filveftrem & Cli-
ma:fyccii media, hiscrafliora&major.i.illis
VCTO minora 5ctenuiota ; flosxlitibcco
purpurafcens: (cnicn pufillum in criaugulis
valvulis Tub folijs latentibus:radixpu(ilki).

Abunde ha c nafciturinomnibus Mcdi-
terranci marts)ittoribustuniH]rpanir,tum
Narbonenfis Gallir: in Occam littonbus
nunquam oblirrvavi.- *imbnc* in culnflimis
qudcinBelgfcishorcismthiconfpefla.

O i O S C O K I D E I lianCTTIT^aVO.
est,& ab aliquibus a d e e x o a g r i a , ab Hip-
pocrate vctō a e r d i a d i c i t u r : SEViribos

Pepto refpouiacr.

TITHYMAI VS.

CAP. XII.

QVAMQVAM nunc plura Tichyroali genera inveniuntur, quae Verribus prodita finiiCOsumtamen luftoriaconlundendanon est, Icdijam con;niocli0initfieri potest, ad illorum descriptiones referenda.

Tithyvolli g'ltt.

CHUHACI*, quemadmodum & reliquorum Tithymalorum in varias prope inobferuare metnini quas cum ab alijs descripiarint. rasrcptercnoneit tiffellii Vnius Eannrii Claracia TjOuprrectensdescripioni Diorcondiseconuencuvidcuir, hiftonamhicadijccitltbijCum altera (pecic, qux in Paononii Sc AuAna mihi duntaxat coDfpeff*.

Tithymalus characiast.

- Tithymalus characias m. Aufiriac,



Tithymalus Characias L.

VNICVS porro Characi primogeni, magnac parce, est caillij, in crdum plures, cubiales, ampliores; rubentecortice tefli. minimi digiti craflirudincm itjuanres, mfimi parceglabri, foliorum duntaxat vctigijs indgtuti, ve]uti infc&i & vulncratieflenc, qualcs il]i Diorcorides captrede Sc dotribiit, (upcrn. iucr6, folijs duris Ja: vjbus, vindibus, majoribus quidem longtonbiis quocquam iim Olcifulia, mi) onbus tamen quatu Amygdala, nrnati, dcindc in phjres juncc O5 & firmos ramulos umbelljcin modum aivifi, quos ambiunt vcluti acetabula uccavcolxfolij sba Jancarum fimiles, & in his flos, non fub] utcus, aut patldus, quemadmodum itia ijs, fednigenpoftcafiudus rricaceus. in quofcmen pcr matLriatctn cxilieis reliquaram Lailanarum feminis infar: radix dura est Si. lignofa.

Natalis.

Na(cic jr id genus in asperis monocofis que per Hifpamas, Valentino regno, & circa Malacam, atque tiam fupra Arclatem itinere MafTilienli, & quibusdam alijs Natbonenfis Gallix locis Totaptanta Udcofuccoptaediacftj & Martio flores profert.

Characias L.

ALTK B.7M genus est fere iitnilc, cui camcnpiures caules ab unaradice produnc, folia moll lora \$C lanugine pubefecntia, florej pall idi.

Hast'v.

Grecit id etiam in Hifpanijs, dcindc cam in Narbonenfi, quam reliqua Gallia, turtcciam apud Hclvctios ceterosque Germanos. Apud mco.s Belgasin lionii fcmcl fatuni, copiosdprovenit.

Ci* t'ia 'ii.

MVITOS ab uniradice pTofert TerEium genus, in Pannonia obferuanim. cmles, pcdales. notnunquam etiam cubicales, fmos, lxvcs, infimap, i[tenonnililpurpi]ra(ct:ntrs, & foliormn, quz cicctdcrunt, vctigij Jnotatos, ut in Primogenere: lios dcindc ambiunt confu(bordinc narcncia fo lia, crafliu(cuta, l* ia, dMasinten l uraimci 3slonga, nuicronata: iummicauics jamillwivirgulas interfj': aemergences di yidunrur, qux buia fubrouinda

lea quo-

Tithymal. myrfiniteslegicimus.

> Tichyma].inyrtitesValenr,inus.



eu qqodarnmodo circinara foliola > Sr quail varculumfeulabellum* mirantkfuftincrit, in quibusflores reliquorum Tithy malorum floribus (imilcs, qui cu m fuis virgulis & vafculis Pallido fubtureove colore prarditifunt: fuccedunt triangiilacapirula femine plena: radix longa^igitaliserafir-udiniSjinfiinaparrein aliquot fibiasdivila. MaturoIcraine caulcs fingulisannismoriuntucinovo aurem vcrecencs alijradicegerminantjq uifubfcqueh- te a^no ftoresfcTunt.

Nafcitur plerifque Pannonii locis: fed Vicnefi agro rant A copia. in gramineis Sc ficcio- Natalis.
tibusparcuis, ut Lunio menfc (turn enim floret) onino pallefcerc vidcantur. Tocaplanca lafteofucco curget perindeac reliquaTichymalorum genera.

MVRTITEN legitimumHifpanis&GallisignotumcflcarbitronnamValentinorum Myrtim.
Myticem, non defunc, qui inter Cliaraci*genera referre malint. Sed.legir.imus in horns
lenticil fatus, (eminc deciduo fatis feccundc nafcitur.

LATI FOLIVM Tichymalum vrutin icgitinoimqucinHifpanicamea peregrinario-
neciam obfervafic puro: nullum enim genus amplionbus fblijs ufpiam videre memini.

EST autemPlacyphyiJosTicIymalusrathicredituspicali.inrcrdum majorcalcicudinc, Tithymalus
laticaulis.
ioaliquotaradiceaivifus ramos, nonnunquamfimplicicauleafTurgens, quemanibiunt
am pla folia, rotundiore & quail orbiculatomucronepradita, ad ifacidisnovellxfoliorLini
formamaccdcncia. viridia. craffiurcula&aliquantulumcarnofa. pallercentc&acri/ucco
turgemia : fiosramulisinfiderexflavopurpuralens, ac velutiaceabullsfivcbalincjum
fQlioliscomprehen[us, ut in reliquisTithymaligenenbusjradixerafla est S& Candida.

ViioValcniinoregnointerJiiar&Huentiniarc , viifalcbtosa, inter mediosfmitics Natalis.
Martio menfe Borntcm duntaxatobfervabam.

CETERVM Tub meum Francofurcodilce/Ttim, ad mcmitrebaeIacobusPlacnuvir
jn ftirpium cognitione diligenter vrclatus, Tithymali cujufdam plancam ficcara, de qua
incipiilolaadditaCefcribcbam.

OBSERVABAM eciam in meo horto plancam Titbymalo Cypariflix Dodonii non Tithymalus
pergrinai.
valde4i(rimilera, qu3tnoninlegansmiliivifaest, nccaqiopiam hattenusdefcripu. VnU
SUMillapromitexradicecaulcin >recluin jCubicalem, (Jtisfirmum, infrequenrcsramos
divifum, ut p:rvum fruticem ? mulari vidcaruniadix non fcrpit Tithymali Gypariflix Do-
doniitalien **Lnfar,**(cd fupcrvcnicrKeafproJclu gerLt:fcminc tamen fponce deciduo Im-
gulis annis
cna/citur.

Non incommode fotfitan (mcaquidcru opiniom. 1 ad Pepli genus aliquodrcfcm poffct,

Tichymalus platyphyllos

Tichymalus
Lactuca
Lactuca ca
pina
Lactuca
na
Lactuca
capitata
Lactuca
capitata
Lactuca
capitata
Lactuca
capitata
Lactuca
capitata



Tichymalus

Tichymalus

Tichymalus tuberosa radicis Ifchas.

Tichymalus



Tichymalus

niri stirpis majoritudo refrapiri vMererur.* mulcasmro notas alias cum Pcplo communes lubct.

Ti&iffAaXaP porrdj au&orePlinio , L3&1-riam, &Laflucam capmam Latini nominant. Hispanis, Leche treasa Sz. Arababaly dicitur: Germanisi Srfjffitllr!): Gallis RvtiSt-

Mas prior milli defcriptus, ^*pax/ac, id est, vallis; xantixi;, ab ampla & cfsui cotnit apvyfaAQuSic, a folioru forma, & xiq&i&i; COgnonunatur.

Latifoli um Greci 7rA<III//AAof a foliot um amplitudmc appellant; necnim uiuus, uC Plin ian is verbis urar.lauora funt folia :plcri- quecttam xcpv,uEtTr',i,

Peplus Grecis TrhrXtx, vocatun vulgo Hcrbariorum£(ularocunda, Gailjs Rtvnllt-mA' //flrfiff/gwrj-ffrequentifTimeenim in vincitil nascitur) Germanis Coiffila uulq; id est dia- bol[cun] lac.

TITHYMALI aurerootnncs.teficGalcno, vincentem habent acrem & calidam facul# tatem^ncquamaritudinis iuncc xpartes.

ΑΙΙΙΟΣ, sive TITHYMALVS TVBEROSVS
CAP. XIIII.

ISCHAD is, cujus meminit Dioscorides I b h i f t onis nemo a me expectet: nam latis luculcer cam defcripfit ipfc.& alij ctu¹ Cjus iconem exlubucrunt.Qijia tamcii^{lei} poll ejus (iirpes aliquot accipiebam a dodifimo viro Ferdinando Imperato cum a¹³* plantis bulbosis&rubicrosis, non potuin⁰¹¹ facere illius mentionem , & quin iconem In* infererequam Cl. V.Dodonxusa PetroBcilonio mutuatus i quia aliud ejus genus n¹³ capitdefcribereconficiui.

Adfertur autem Dioscoridea l'quez Gracis dTTioicy J^a^Graccisdicitur, & Ci nullis xa⁰ (Mied?Mtof) ex Crcta, ubi Bellontus crefce¹³* temobfervabat ^aMa(W<Totfllicvocari f¹³* bens: fed Apulis ctiam peculiarem cflc m⁰* ncbat Imperacus, & inNeapoliuno regn¹³* efolaritendo appellari.

ALTERIVS autem,cujushinoriamtradep cupio, iconem accurate fuiscoioribus^P¹³* ftam ad me mittebat Tornaco, Iacobus 1 »* teau mihiarmtusiingularis.

RA D ICE autemcaontartuberosa.no in pyri formam tutbinata inftar P¹³* ar equali propemodum ubicque craflitudn¹³* unciam, incedum ctiam binas uncias long¹³* << cujus extrermapars in quatuor alias radie £ live craflis fibras fenfimgrac.Icfecntesdcj nit.arpaucisfibris prxdiiwest,co]oreforiJ lea, intnscandtdft, h&eo i>cca B "gJJ Tltfaymalt. Ex fummo ejus capirerke quimauc feniramuli interim procum

Ifchasaltrea.



neondito or Jine eos atnbientibus pnedici: illi deinde in minores 5c gracili&res dividuntur, bina folia pauld rocundiora, Be con crario fi ru nafcentiamftineaccs, in quorum medio exorittl flos ex flavo ru be (ccns,cui fuccedir capimlum trigontf. utiri Tithytnaligneribus^iigofum & tu berculis obfitum, in quo (emen.

Quo tern pore flares proferat non adferibebac; led (cminc peregrc accpro fibi nacatn dunmataicbat.

FACVLTA TE &£«nperamentoreliquis Tithymalis refpondet hzc plants,ac pcrinde humano corpon nioelta& noxia eft.

VMBELLIFER^ .

LACTARI A5 Vmbetiiftrxfequitur turfuarum nonnalk Ucitt ttUmfucofr*gn*ntesfwtt. JM&fntututtmin-Vdrijs Prormcijj UYHIH efi provtntM; num frttr pltrAfaut tb dqsdescriptai, nonnutUs alutsptcuiures in Mis rtgiombtu, qmu peragrspi, ob^iTPAb*m; qunrum htflorism, ptbftquntibus aliquot captttbtu, quam ACcuranffimēpotero, trddm condor, inittm * tilde j/ercjrrinafitciett.

TATARIA VKCAMCA.

CA>, XII 2t.

NOH vulgarisellkxplants I qu«radicem hatjctcratirTimam&longifTirDam: ram retttU r». brachialiscrallitudinis.Kcubitalislongitudinis, autctiamampliores aliquot accipe-
re memisi ab Nk Du.BalthafaredcBitthyan,qui inineanigratiamexVnganātranS'Da^ nubiana aifctti iuflera^utinmcum hortum Vicnntziansferrem. Hts autem foliacm-
feru^{ne f}api folijs non valde diflimilia incifuns &: he unjs .breviora tamen, &: venus ad Pa-
na^{na}cts Heraclij foliorum formam accdcncia, rudi atque aperl lanugine prxdita, ex viridi
P^alfccntia,alia deinde paul6nQinoribusincirunsdivifa,acc minus a(per3,interquaraTur-
Kcoacauliscubicalisautatnpliorislongitudinis,pollicansvrocrafitrudinis, ftriactis, con*
Cavu^s8inodofijs, pcrindeaferac folia, quern Utopediculoampleclebariturminota folia
Jjniultrida.arperactia.-nlanugineobrta: fiimrnuscaulisinumbellamdcfGncbarjPanaciJ
*craclei umbellis finnlcm.in qtiibus flores & forma pares fccolore, quibujevandis, fuc-
CeJcbancraratnamiinguliflorcsnonfuntfarcundiJfemina.valdcrafla.nccvatdeabfimi-
* femim illi magno Sc friato Libanoridis cachryferz. Bicnmo quidem eas radices alui,
tKequitnunaillarum&caulcm, florcJique&femenproferret: deinde coiruptx func>
^tnque fctidum odorem exhalarunt,ut ex horto fuennr cjjciendt.

H v l v s porrei radicc Vngari Agria vicini, acquecciam ulterioresi Dacic concerni,
jnannonarcaritare 6C inopii, vefcumur atrerius panis penurii, uc mihi ifferebantnon tno-
*& Herosille Illuftris, fed etiam alij nobiles viri qui in ci Provincia vixerant. Qyaeaiic6
r«cftccit, ucdubiusctTem, an eademeflet cum Btltytn in Tartaninaftentc, cujus me-
^ifijr Iofaphat Barbaras Patritius Vnetus in epiftola ad Petrum Barocci Epifcopum Pa-
*71 nu m, q ax adjecti eft ad calc c tn ulum i capicis Narration is ipfius quz cv ulgau eft. De
c;u5 in Periidem profe&ionc.

"ALTR.ACAN, inquit, folia Kabet Rapo familia, cquorum mediocaulU aflurgit pollica-
cudi nis,& brachtalis alcitudinis, cornc obduclut c vindi flavefcnte, qui per ma-
il finditur.K a ligno recedit, ut in vitis palmitibus, per quem rara (parfi funcfolia:
femen f3Cnictili, fedmaJus, Talidiod<jnj, iucunditamenfaporii^uadccaufaGncfalcedi
potest:unicaconfl«ridice. Tartari folia ejusdecoquunr in aqua, decorum in vafculain-
nt.rcfriffiratutn mfi.v virii bibunt.atque refngcrandi f«cultate przdicuin amnt.

Maxitnoeft inufu apoj TarCAfoslwcpuaci: namabfqucci.pcrmagnaiillasfoiitu-

dines,in

dines, in quibus nihil edule repentuj ter facert nos pofient i iu que eã natã, fuis peregrinatio ncs infti mere (blent.

Vinum
Cbiu

ATartaris forte hujus radice suo ic dodi funt Vngari. propter faTd^f^romcnillifl*
derunt: 7*4/<J>cnim (ut & Germani) vulgo appellant, qui nobis Tartari dicunt il;
A H vctdhuicimi Us, radix Ck*r*, qualacii admitti, Crfarii railir. esinopiam levtfcc
legimust.

THAPSIA'

CAT. xv,

Thapsia



Radix

Stem
radix

Thapsia

Thapsia

Radix

Thapsia

Radix
Cathartica

PERVIACEA habet folia, viridia, viU<J> fe u lanugine quadam obducta, humi vel luriid orbẽd iftu fa, ingrati faporis jnr crquz cubiralis, interdum cuam bicub. uli sexilit caulis, digitalis crasficudinis .nodofus, intut cavuj&fungofui, raris folijsprxdicus. fummo fastigio magnam & latam luftincnsimbellamluttorum feu flavorum riorum, qu* dum maturuit (cmcn^quod latom &: accrofum est. gernienq; habet longu & angudum, sph^ricam Sfoibicularcm figuratn quodanmodo referc: radix crassa, longa, fu^mmA pafte capillataj Ut pler^q; ferulacd generis, crasfiore hbio vefiita, forij fubnigro vtlfulco, interiorc parte candi^cante, lacteo fucco pic* na. giiftuamandimo & 'acrij nau fcam tame" moventc, adc5 ingr3 tactr, mediusc jusnerVus fungofus.

Gaudcccollibus petrofis, qualcs funt nO n procul ab ostio Tagi lupra Vlylpponem, I c mulcis altjs Luficann, Hifpamxq; locls denoribus Srincultis. floret Augullo, non nunquam macuritis.

V<um mtrarifubit quofdam inveniiri, qiii <<de6 proclives funt, ut non expen Cis probi ilirptum fingulis noris, fed ex Ic vibus duntaxat pifuræ cõjecturis, statim de illã judicium ferant, quod ufuvni f Teijs video, qui juvius mcr Thapfix iconemjad Scfeli Pelopoiien- (15 hiflonam acconirjiodarc non funt verity Ccilliquidcm, qui hanc nunquam ere fecn-

tc m vidcrunt: ut tacear autriu (quc plantz facu Itatc jci Te diit miles.
i n n t M porrd, quibus dixi, locialiud Thapli* genus invenitur cubitali caule pr<<ditum, gracilioreramenquam ruperiorrs, umbellieciatn limiliflorum & fcininis, fed trwii^re: folia illi multo tcomora quam illius, Focniculi pxcn foliorum indar, nuliam infignem qualitatcm liabentia: radix longa, digitalucra Tictjdimis, fbdimigra, inti JS Candida & fun^0 la, icris, fummo capite villofa.

TE <T i v M prztcrea Thapfix genus obferuabam in HiTpanicã mei peregrinarioni longc majus fuperioribus. ut potc caulem habens trium aut quatuor digitorum cras Titudt nemxquante in. in Jlarcaulis ferul T. & rxi pifime humanamal cirudincm fuperanreni: florem & iemcn Pn Qiogenerinondiflini illiaifolia. antequam plai Jtaincaulc aflurgato Juli* ampliora, in orbem tamcn son fecus acilia humi d)ffufa: radrem etiam enfliorcm.

Nalcirur ca non foldm ngro Salmamicnli. lcd circa Pinciam, vufgp Valladolid diclam, & totã veterc Caftclla, ad I*^rarcosufquemoncej,

Sed nec pium hailucinantur, qui hanc plantatn, Cicutariam maximam & fœtidiffimam Lobclij Tecenfent.

EODEM Salmantien Gagrofcvicinis loci snafcitur ferulaccigenis quxdam plan* folijs Libanotidis. per terrã fimilicere xpanlis, Jento quoda & glutinofororc femper afpc^ fis. Iaturã vindicate fplndentibus: radicc crassa, longa, tenera & fragili, foris nigra, iof^ tlbã, lafteo fucco plena: caulem nullum obferuabam, fed cum ferrc diccbam refuati. ic* nuem, &: in co umbellaa floruin pxnẽ in globum coalam,

Totiplan racrcrimtodoriscfr; unde verifimilcc ille conijcio non minus eficnoxia P^1 quam fir. Thap(ia, ad CUJU genus referenda vidcrur.

CETIKVU ^<4^srnt^TXCis^A_*liri^set^am^ia^P^na^e^TUT^P^»^na^iMurci*nis^&^Valentinis^cdmtff*^fucci.ni fallor, abundanriadicior: reliqui Hifpani Cathartica, appellant, quBin voccm omnibus ferulaceis pla-atu (quacum futocaa varietas pect univ^am Hifpaniam) tra-

*m) tribuunt: nam Ferulx, & Libanotides illi etiam C4nii&cjd dicuntur, qui videlicet
runJioaccum caulem liabent. Tertium genus Saimancicniibus etiam CaMhtjt est:

Twm,
tmU*

uarra naucem *Tatnr.*
i rjiur nses imperiti Pharmacopoci, priori J radice Ioco Turbith tnagno errore utuntur:
os autem difcrimen ob(ervare norunt. Vetulx Satmanticenfes medicinam ifticex-
s, Tercia: radice ucuncurad provocanos menfes, alii quodejflioncs molindas.
I*ntaurem vicumfupeme, turn interne puigat, ut fuaacntcsia maximum periculant
tepenumero conijciat.


SESELI MONTAHVM.

CAP. XVI,

TRIA hoc cipicc defcribere conftituimus gncrain montanis *Auftria & Pannoniz*
obfervaca, pLnc inter icdifcercnciq uorum

Sefcli i. montanum Pannon.

Sefclj n. tnontanum Pannon.



PRIMUM dtapi»hab«f4iakmirp3rfa,&5ininultasalasdivifa, SefehPcloponcnfi * & '*•
fere familia/upernS rndia & (blendntia, inferta parte minimiferulat odore,acri nec ad-
fodumgratafapore:caulciadeiLidclcfclucubicalmaucampliorcm, "aHum, Ilatum,
'ntusfungofum ,nodo(um, acmulcosramosinambicux/ingoltigeniculi*, kaoodisfc-
reficeiii.pcrqrctrfp^ria func foliafupcrionbus rclpondentia.lcd mmora:extremi rami in
<iagiiiasumbellasfloculorumquitiq;folioliscandidisconfantiumdelinunt,odorisfer(i
*ambucini:Honfaccedit(emcngcmellum,ftriatum,flavfcens), aromaTico&fervidogu-
fttt.-Hdttraffaefit&fiwtinigtajijaac (aziapkcifqucctuhceiscontingeie folcij icnune
prolato petit, nee nilialtero aut certio a fatione anno flores produccrc folct.
Crefcitince UisSneberg&aliarumAufnscAlpiurajugis.ubiliciorafuntpafcua.-HorctNaf^.
fubfi nem Iunij,auclulio:rcmen ver6 Augufto.veleriam feriis maturefcit.
BRACHIALI InarchumiiititurA Uenuin radce piperimfiUncheuiftapitC Ucnfio-s,^,,,,,,
rc s fc iuniorcs pollicarem habenc) inaiiquot ramosinferiore parte donata, cratto, ruglo,«««.
"grojicortic Tepca.gummofo primiiin icnwSqc fapore prxdita, dcindeacni Si falivam
cie,nK;quxfua) mocipiKinmulucapica«tubcratvi«ofa,Queffladmodiimfcreomaes
f^ulaccjgeaer)stirpcs,u.)dc exeunt LnagnaT&fatisamplxfof.otumak.altquotfoJijs per
"inbirufn^crratis&noimlilinciris, unicoftae inKarencibus, Ted ex adverfonafcncibus
Co;iitl3ntes,colorcfupinapartediutiuvircn[c,&aliquaruulumlplndente), pronafubci-
oeraceopi'xditis: interquifcrquicubiMlisnotyinquamemeigicauhsJlratus.pollicaris
^WrdaincifficudiniSjSemculatuSjin aliquot tamosdivifus, quern ambiut ad fingulos no-
KK dosfive

dos siue genicula minores foliorum alae, summum caulem atq; extremos ramos exorant
 umbellae paleiscentium foliorum, q; Inuenitur ferè in omnibus Pannon
 que persilato, Julio & Augusto floret
 nemini ad Allobrogitarum Alpium radices.


Natalis. TERTIO multa sunt foliorum alae, Foeniculi foliorum instar in multa folia tenuia, illis
 tamen crassiora & breuiora diuise, virides admodum, inuicrone omnium foliorum candi
 cante & duro, calidi gustus: inter quas enascuntur cubitales caules aut ampliores, digitalis
 crassitudinis, striati, geniculati, in aliquot ramos
 amplectuntur foliorum alae: flores in
 ti nascuntur albi: deinde semina gemin
 junctim, ut in omni^b umbelliferis, striata,
 Angelicæ semini non disparia, gustu feruido: radix multis crassis & oblongis fibris late &
 oblique spatis constat, quæ singulis annis summo capite novas propagines ad latera facit.

Natalis. Nascentur in plerisque Austriæ inferioris & Stiria montanis pratis, atque Julio floret.
 ISTE... Salsi...

"—A k Altn_{ap}r_U,in,_UrSa_{lt}udiSibctS? I J ^ P " 1 ? ' ^ > « iordinfctfium
 p-Ji,,. frttjucnriusetialn J_{loc}nornu^ doncn: Tc mm ' T / V ' ^ " r Jbelhferani fl₁ ^ ^
 Matthiolum aliquantulum
 chisciam potius esse conten
 nomen illa, quemadmodum
 (seruabam, quod equidem sciam, obtinuit,
 Ubanpidem [fiosioridti &
 apudcarum Prouin_{am}, % N_Hutn vulgate

Sciri Athiopiaim Matthioli.

Astrantia.



Seseli potitò athiopicum Matthiolo nuncupatum, uberrimè nascitur per omnes Vn
 gariæ, Austriæ, & Stiria silvas. ubi illi uifolia in ranta maiori diuina
 ut palmum æquate possint: habent uero magnâ ex
 taxat folia, uno extremam alam occupante
 peramhmi (errata, supem^trov^ntia, in
 ternè subcineracei quodammodo coloris
 ptus, & supernâ parte in aliquot ramulos
 interco
 um um
 bellas, qui in oblongiuseculi & angulosum semen transeunt, cum in u aut fi montam P
 men odore & sapore referè: radix pollicaris aut amplioris est crassitudinis, crassioribus al
 quot fibris prædita, & crasso cortice. sapore initio dulci deinde amaricante. summo capite
 linsuta (ueteru foliorum, quæ marcida
 •vaD,uaunt, fibrisca_mhi (tutic faciëtibus) perennis.
 VERVM



Archangelica.



lata, amplioribus

VERVM hujus Sefelialiud præterea genus est fatis vulgare in illis plis Prmoncijs: quod nusquam tam abundanti usque in Calenberf. Majorcsid habet foliorum alas, hoc est in pluratolu. iicm p bina & vicciu plerumque, (upcrtonbus magnitudine kmgd ceddiu adivids, qui uperncrplendcnria minus virent, & pronâ parcc cineracct profus sunt coloris, omiia iiiiambicu non modicæ fupcrioris /crrara, fedcriam JacinJjs difleQa; xqnalem cum fii p rior habet caulcm jnodis iimilitcr in rceptui Tijflorum umbellâ limiles, fcm npar, radicem nondiflimilem.

Hoc Germ an i Qclfaarti ip*timmi/hoc est, nigram cctvi radicem, iHud aurem CIBqfj ftiij b'unj/ideft. albam cervariam appellanc. Sum quimrcr Li banotid is genera rcccnfcnc. Florcrruraque lunio, interdura ctiam fends, femcn Augnfto macurum cii.

Producunt cciam prata ad radices mocium Alpbis Au(rnacs & S<riacs wcniow magna copia plantam ill am acri S& aromacica radice przditam, quam vulgus Herbariorum Afranciam five imperaconam appellat. Germani 3J?<rij Thwunj/ai4cultatibus quibltz pollect, nominant.

FREQVENS etramertmoncibus Aufria cis Siter: ar nu Iqui abundamiserdecre memini. quâ incoqui Badclibustlicrmis immihec. Vbi. i: iirtlijs vicm collibus, atque urbi Vicncpro Jcilnis. vul^arectia cft Orcuklinij;

AKCHAK

quadi Angelica, ft>liorum alts, i' dura

ICA autem à nonnullis appellatenez adhuc fant, fubpurpureis, caule

est aliud...

Schwarz...

Afrania...

Siter.

OrestHanm-

Archangelica

Peucedanum.

caulhumanam altkiindinem fuperanre, bra-
chulisautarnpliomcraftitudini5,ftcquentif
fimaest in montibus vicinisarci G re ben III.
Herois Bahhafaris de Bathian, fax in imer-
arnt Pannonia, quaGermaniSifinMfcft tot>
appellant: ex pan fa cnim est inter Dravum Si
SavLmflumina.Solecca,qucmadmodum Si
Angelica, perdufto ad maniritatem femine,
pen re, atque illo in terrx finum (ponce rec-
pio,rcnalci.

PEUCEDANVM PANNONICVM.
CAP. XVII.

QVIA Peucedanihiftoriaproditaestab
om m bus qui de Plans commctati sunt,
ilia lic repcecrnon ell nccceile: volui tamen
ill E us mentionem facere,& cjus iconem ocu-
lisfubijcere,antequim altrmsPeucedani,
quod in P jnnonia obfervaba, defcnpi IOIC
in darem: nam in omnibus, qua: adj,)octis mihi
cotifpeclact, nuTquam tauten hcquentior
quatu in prat is ad Danubium litis infra Ra-
tisbonanij&StraubingaannoM.D.Lsxxviii.
cum adverfo flu mine vchcrer Ratisbonam.

S t D Peucedanum quod in Pannoma ob-
icrvabam/adicernliabVtpollicaris.utpluri-
niini cralTitudiniSjinterdurn minorem,non-
nunquametiamaoremjogam.craflbcort-
tice,modocandicanre, modofufco&nigfi-
cantc tc&am, guflu initio Padniacae, dcinde
nonnihilact, tian(vtriiis&: obi.quis aliquot
emllloribus fibns donatam ,fupremo capite
hirluiam:cx qua quint); vcl pluraexur folia,
Peucedanovtgan & Icgittmo fere ilmilia,
(cd minora &C bretfiora,colorc ex viridi carru-
lco,non,ut illa,nigricanr.e, fubatnaro faporc,
&: odorc rereignavonihilquc fingulare refe-
rente: caulistnrer illaaffurgjtcubitalis, to-
tundus,gracilis, in mulcosramosdivifus, in
cjuibusumbdlKcandidorum fiorum s (emen
Seliniferc.breve&craflTiufulcu^eminumuc
in omnibus pane umbclhferis .cincraccio-
ioris, faporis vcr6aliquanrulli amari&acris.

Provenit multis Vngarix &Auftriz in-
ferioris tocis, niontium aidivitatibus pctrofo,
& falcbrofo folo,ubi Iunio floret: at in illaiu
RegionumAlpibus(ubictiamnafcitur)Iulio
&Augufto,&lubinde femcn ferrc nodefinir.

Now multum difterrevidetur aSaxifraga
fecunda Matthioli.

SAXIFRAGA PANNONICA,
CA», xvni.

MVLTO minorPeucedanoestSaxifra-
ga Pannonica,&:breioribus folijs pr?-
dica,capin foliorum ferexmulis,quorum fa-
por&odor, PeucedaniPannonicifioruffl
odorem & fiporem quodammodo referunt
pauldracn acnoralunt: inter quaccaulicu-
li exeunt pedales,graciles,geniculati,aliquot
Qkigllis folijs exorna^ iummofaftgiocan-
didorum flofculorum umbeliam fuftinentes:radixPeucedani radicinon multum abfaji-
lis> fed

Peucedan.

Peucedanum
Pannonia.

Saxifraga Pannonica.

Matthioli.

Saxifraga
xii. Matth.

Saxifraga
Pannonica.



didorum flofculorum umbeliam fuftinentes:radixPeucedani radicinon multum abfaji-
lis> fed

Saxifraga, Pimpinella Germ an. major.

Saxifuga. Pimpinell. Gennsm. tmuor.



Pimpinella Icalica major Sanguiforba.



li Sjfed brevior, ac fior falivamque cicns, rnilra
hi rfiin capita fa pern u partcproducens, e qui-
bus folia SC caulscsmertinr.

Invenit ut tldem locis quib' JSpucedaniini) Natalis
prarfercimvrom aprco & glabro illo monte
<w medium quafi [pacium iitcr Hatuburgum,
& Alccnburgum Vngariarurbes occupat, ccia in
c mccijs (axis p^rumque erumpens. Scd & col-
Jiculo juxta Zimmenn, itincre ad Pliafionor-
um, juxta Lachn, & pterifque alijs circa Vien-
nam locis crelcic. Floret Julio.

CEIERVM vulgaris admodum est per Vn- Pimpinella
vulgaris
Germ an.
Saxifuga
gariara. Auftriam j Sciriati, vicinamque Vovin-
cias Saxifraga vulgaris, a Germanis Timpincila
nuncupata, major & minor & utriusque in
inveniuntur dinterentia foliorum forma ituce
fe difcrepancs^rrfertim in mmore, qua: inter-
dum fingula folia laciniata habent Cj Sutanguftio-
ribus & oblongis incifuris divifa. In majorcau-
tem, tamctli magna ex parte foliorum forma
non varieifomnifl cnim ti: ambitu icrrataiun Cj
& pcr! asord) ncdirpo (ira) unum tamcn genus
ex arro vrentia caobcinctS: fplendentu, alia
mtnime: genusq; aliodinvenitnr, cujus folia in
hciniis funcdivifa; prarterca Etfctiems mons
alrCj Cujus flores clec gaccr expurpurarubcfcur,
cum reliquorum fint candidi.

Piropinellam vero Germanicam ubique ta- Pimpinella
vulgaris
Tragacanth
Turkis Dile
mennafentem, Sc Icalis PimpincUam Jurct-
nam didam. Tragium alterum Diofcoridis clef-
fulptcaur CV. Fabius Columna.

Vlmaria.

Fonjuel.
Dial. Sanguis.
Sera Ciria.

VrntriM.

Barbarat.
oculij.

Dauci
millanor.



Daucus, Meum.

Dauci
githor.

Dauci
vulgaris.

Carm.

Meum vul.
gata.



NE c minus est Frwjuens, ciim in p,
nt ficctoribusilkrum i p (arum Pro vincia-
rum lociSjPimpinlia Iralorum &Ga!lorum
major & minor, quas G^rmani Sangu/or-
bas appellant. "

ALvNT ctiam carundem Provincurum
prar? humidiora & torrentivim rips, Vima-
fiamabulinaccis folijsvulgoditbm, tein-
peramento, atque etiain odore Pimpinell*
niajon Italicarquodammodo respodentem.
Ac cponunz filvjc Barbam caprinaun Fuch-
lij&Tragi,ab Vlmanidivcr(ao),

DAVCVS HOKTAK7S*
CAT, XIX.

ELCANS cftjd D.iucigci)U5, quod in
Alpimn Auftri^&Stiri^lijblimibusprafc"
Cbnafcitur. Illj cnim ex radtcc prodcut qui-
tix auc fcixtenuiorum foliorum alx, Scfiru
pratenfis (quod abunde intocius inferiorif
Aultrispransnarcitur) alatis folijs pa:nc fi*
miles, fed longc minores.nequcpalmiam-
plitudincm excedetSj fed proxime ad Acus
patkins vulgarisfoha accede ntes,a<imoduni
vuides: inter quas proditcaulispedalis, niid-
Ls^riaruSjftisgracifis.quifuinmofaftigio
binasaut tenus(uftinetparvas&: bendcon-
fertasumbellas flofcolorum c rubro dilud
purpurancium , livecarni, vt vulgoloquU
mur, colons, quinque folioi.s conllantium*
tjuos excipiujuSclini liorecnils xqualia te-
m ina: radix digitalis eft longicudmis, cortico
foris mgricante, rugofo, firuuliis tcouibuS
fibris paxdita.

Toia planra Daucum vulgarem quodat*
modo redolet.&d illius gufhim ctiam referc
Floree Iunio,tn hoicis cciam Maio,

AT icgitimusDaucLS.CrecicusappIIa-
tusin Durrenfts in frequens: Ecfcherusra-
nicnillomagisabundac; nafcitur iliic inter
fata .cnui foloafperfa, utdifficukcrejusrar
dixintegracruipoflit,cincracci colorisfi>*
lio, &vinbus, cum co quod In Crcta infuU
crefcit,f>rocul dubiu conferendum.

VVLGARIS autcmDaucus.pa(Timinom*
nibus his Provincijs jam numcracis prove-
mt.&oflficinisinuruct. Quemadmoduro
&Carmn, quoprxfecim ficciora Vngari*
praraabundant,& raagnâ feminiicopiamjo
quotidtanu' ufum Gngulisannis fuppeditant;

AVPIVM vrô juga, Meum vulgare tenu'
folio, quaJe nosluc lciloris ocufisubijci*
mus.alunt: fed nullibi frequentiusobferva*
te mem mi, qu am in Durrenftain.

ANTHRISCVS FLIKIL. CA,P- *X*

ANVLIO Recenciortim haftenuf Aefcr^
fenpta arbirror hujus futpi offt⁰¹
quz nata Lugduni Baravorum in Academi-
co horto anno M. V>.\C v.fcminc e Cretx Cy-

donia ad me miflb a Do3ifs. V iro Hod oho Bello ,cju s uibis hUJk.

DODRAN:

Anthriscus Plinij.



DODRANTALIS est plan tula, ftatim aradicetnm, longā, albā, paucis fibns donatā, multa folia in multiridas tenucTq; alasincifa profercnSjpxncinfarfoliorumScandiciSjnoInjncundijfi teracurjodoriSjncque, fi guflencur, faporis, qualis fere Charrcfohj vulgar ii, inccr qua: breves prodeuncauliculj. quadama-nui lanugine prrditi, qui in breves, virides, gracieTqucrannilosdividuntur, (uftmenrcs urnbellulas

ne aut lex florum

quinqueroliolisalbisprxditotumtin quorum medio cxtle quidpiam expurpura nigricans: flofculis fuccedut.fcu venus fiofculi (uftmen-curjafilisquiburdamgracilibus, quipaulatira inuncialcm longitudincm fuccrcfcentes. formam referit thecarum femims Pefinis VcnerisvulgovocatsplantS) five Scandicis filvctris.

U Fbr«&femcnffed immitumm) ptotulit Junio; De hac turpe confulenda Hononj prima dme piftola, ad calcem hujus ftirpium Hiftoris pofita. Plinius item libro xxn. cap. xxii. in Scandice,

SEtINVM PEREC MHVM.
CAP. XXI.

¶ 7 MELLIFERARVM [f prarterThapfias Se V alias enumeratas, duo genera Sal m anticefi agroobfervabam, qux ad Schni geccr3 commodē referri poffe arbitror.

PRIMVM Coriandria ut Elaphobofctfo-
lijf familia habet Folia. per terram frata. mter qua: caulis exilic cubiial is altv «dinis, in multos ramos divifus. flores in umbellis ferens candicantes, deinde femina Petrofelino vulgari fimile, ac rC) & aroniaticum: radix longa, digitalif^ctaffitudi aiseft; candida, odorata, Se U-

Na(citurovinctorum marginibus, iuxta vias & femitas. Floret men(e Julio, (mcn Augu-
gufto macurumelt.

ALTERVM, multahabet abunaradice prodeuntia folia, Cicutsefolijs noindiffimilia: fed qux cauJem ambiunt, mtQoia funt: cauleracubitomajorem, faepeunicum, nonnun- S^amp KireSj&iHhis umbellascarltdorum flommjqmbus fiiccedit femcnlatum, nunus lamenuam fcrulx: radicem digitaliscEiarnctafTicudinis, albam, odoracam, & uccuri' quacrcm.

Provcnirapficis&iSolciliiii(IratisLocis: lu!ioflortj Augo do fc men profert.

Mirummodum unnamciete plant* decodum, aucaguam in qua radix macerata, F<>/rj<#>, mihi iftic referebant.

I Lt is non pofTum non adjungere umbelliferam quandam pianram, quam Salmanti- centi quidcm magro cum rupenoribus obfervavi: fed multos annos ante. ettam agro Mom- pel I iano, & toco illo tradu Mafliliam ufque^uz mihi plurtimum accede re vi fa eft ad Sele- li Mai Tilicniis hiftonam a Diofcoride rraditam.

Confata utem ea folijs Anethifer^, exilibui& minutimincifis, Run Colde: ca ulen habet u nicum .interd um cu bitalem, fed fxiAl me mi norcm, tn al iquot ramos divifum, qai umbellas Horum candidorum aut purpurarcentium fuftincnc: quibus fuccedit Apijfcnicn; radix longa crat, alba, digitalisctiam mterdum craffitudinis, fatis odorata.

Mompelliani, ciltu iftic vivebam. Focniculum tortuofum appellabanc • Caftellani vcr6 pa<> vku

Euxalmet.

Se illi MAC. filiofje Duff.

SELIMVM MONTANVM pumilum. CAP. XXH.

A Lt vD porrtiin montanis obfervabam ScLinigenuscxite&pumiliim, quod aliquot aradice fpargie folia, foenicuii aut pucedanifohjs forma quidem fimilia, fed longē maiaora, & rar6 plutiUksquim quindcnis faliolis-^)^nUticia, quorum medi o drantalem cia i Tum qua

Scilinum montanum pumilum.



Natali-

Cicutaria Pannonia.

Cicutaria v. Igaris.



Natali-

Vjov

caflumque fert caulem. in fruirosamen rani losdiv-jfum, fubqurbiisali>ful; oriifiai. tf n3inoresnafcuntur. novenirquedunraxacfoliolis COD flan resjlacabati caucim am plcfl un- tur, pafinaca: iivc ftaphilini guftu &c odor: finguli ramuli cxiguoram florum qiiFiique candidis foliolis pra:dicorutncuni cotide (w- jninuliSj&odoriscxpertiumumbeUulis/uiic onuUi iquibusfucceditfenicn ScJiniftmini nondifpar: radix luprcma parrcinraiRim caputexcuberaCj multii'queviJlisqiiifolio- mm fupcrionsanni fibrx(unt) hirluta, bre- vis, quafnj in orbemconvolutaefl.intus fun- go/a & alba, cxtcnus fu/ca& rugo/a, infernI partebifidaplerumque, & in raras fibras de- Cncns.

Invenitur quibusdam ficcorum deferto- rumque, vicentium tamen, agrorum margi- nibus, & innudis gramincifque motitibus m' fcrons Auftria:& Pannonia: flQrcque Ma.ij inifio. Biennale m'rcarbitror, uti plersque funt um bellifex, qufcpiolaca fero inc pcnw fofent

CICVrAMA finMONICA.

CAP. XXIII.

L I c E T Gcurariar quoddS genus in Pan- nonia &c Au(tria nalecotjs hiltonam hoc capirc defcribere milu duntsixat fucric ani- mus, vu!garistamcnj & in omnibus ijs, quas adij , regiombus fponrecre[ccntis iconcprse- figendam cfleduxi , nort hillonam , quando- quiticmaplerifque alijs cftdcicripta.

Qy i N A porrd fena, auc plura promiti radiccPatinonicafolia, ramofautiSelinum vulgare minoratamen & c. r. u. s. ol. i mu- tum ad BulbocafVani vulgo nuncupati, folia accedentia jfaporcaliquaniulumacri.: caulis inter ilia emcrgit pedalis ferme, iotcrdufti ctiairi) (forcundum flblum na^us) cubiralis, circa nodos cratlior, umbelhm ferenscauli- dorum fl ofcolorujfcmendcincoblongunf, Ciiarrefialijvul^aris fereinfar: radix tubcro- factBulbocafaniradicis pacne acmula, icd rotundaSc aliquantulum mtrna pane cur- b:nata, at Ariftoloctuxromndi radix qu« albancmfert florem, fivefecund*, intus alba, (aporc&: odorcPaltinaca:, livcEUpho- bofcipropemodunijhifco&nigncanrecor- ticetc^a, quac fucrefctntccauk , mftarcia- pi longior fit, & magis uurbanara. flaccidaq"; 4i rugofaevadit: atquetandemirututofcroinc peric, c femine tamen fpotuc deciduo lingu- lisannificatens,

Novo Verc, in hortis & herbis Vien- rienfa agrilocisprodit: nafcitur U qmbu- (dani fimilibus Vngariar locis: co tempore ra- dices firmiores & magis fucculenta; cum no- vellisfuis fblis in VicnncnfiforovenalesK- f*criuntur: coquCitiJrcnim, & cum oleo, acco- to, ArfaJcprimismc^ iftic vulgo inferun* ««r, quam latubri cibo]nfcia

floret

Floret Aprili & Maio, lunio *femen* plenam maturitatem adipiscitur,

Qvo nominetara plantam douarero. diu ambiguus fat: acturutiif undem notiscjus perpeniis^uccurrit^magis propnum (*mca*, quidem opinione) nomen dari non poflc, quam Cicutiar: quia frequensejusufusnoalioenoxactf, &capitigr<>vcdincmdolor^icqLc, uccxpcrcusfumjnducit.

VVLGVSAuftriacum P^effn appellac: Vngari *fJMagtAre fd&ta*: mm & illi ejus radice ^cpcrHrt. M^{ca} 4c tenecu foliis in acctanjs vefcuocur.

CAUCALIS MAIOR.

CAP. XXIII.

Caucalis albotior.



CAUCALIS ha>comniu maxima, multos a radice producit fiolonesjre&osjbictibitals, ScetricLtbitales Interdiimcriam quatuor cubitorum altitudine attingit ncesjflriato SjintUscavos, geniculis intercepcos, & in p[ur]s ramos dLVi[os]: ("ub quibus lata fcedadna (c[ur]wur niagna alata que folia, in ambitu incifa S: ferrata, infhr foliorum Angelica, ex atro virentia, fummis ramis innafcuntur umbellx candicantium fiorum, [ubtus non Dittilpurpi Jrafcerum & ad carnum colorem accedentium: quibus fucceduni lara femina, fere ut in Sphondilio vulpri, fubhirfuta, & fii[i]imomucron bifida, aculead qinftarrpinaruin: fadicem habecalbam, duram, lignofam raris fibris prarditam.

Qui illam ad me mirtubat tacobus Plateau, (cribebat menfc Septembri c/Tcfcrcndam: ftam dico emergere. viride mque deinde permanere tota licme. qnam percommode ferre poteft: fubfcquencis anni Iunio Horcsproducere, deinde maci! rum fcincn. fubcxiruni Iulij & Augufto: tatidem *perfcto* ad maturitatem perdufto femine cotam penre. Dubitabat > utcm, an, propter femine gemellum, Tordilij genus aliquod potius referret.

P* o x JMVSAuremad Diorcondis Caulid macedderemihi vifa^u^a Clarifs. Do-C* ^{caucalis} ^{clijc.} aonxoe Khiber<r, in arborum. irginibus atque incinerf(; gtes vincra qiiena iccns, caulicup ^{caucalis} ^{clijc.} lopdal^ aut majorc Hterdum, folio apijfere. umbellam ferens florum candidorum, quofum extetna folia majora funt reliqtiis, deinde fetnen geminum, hippidum. Similem fed ^{Oncalis} ^{clijc.} Jiajoribus alartsq uefolijs acquead Pimpineljz Germanicz folia magis accedebus, agro ^{caucalis} ^{clijc.} rancofurtenfi abundanter nafcenrem obfcrvabam, florem variamem, qui major crac, & *q<alis niagnirudm^ fli. i obtmebac, lature^uberie col ore.

A ptima Uarum vulgariu Caucahdum, non valde differe **caqux** femine ex Hirpanjs i ^{caucalis} ^{clijc.} alia to



Aoifi PbiflppmaruminfaLumbelJa.



anifum vuJgarc.

Anifum vuJgarc.

Anifum vuJgarc.

allatonaramiliieftaliquado.cumapudBel-
eas.tum VjenrcAuftriz: cauliculosnim ha-
Dcbatfrtatos&arpcros,umbelbs ver6cidi-
dorum flofculturum minores, &qLiafi inor-
bicularc caput coadas: femcn etiam craffiu-
feulum.valdc friatijnon liifpidum . Annua
CM eft plj«: ui maturofentne perirt toler.

CAVCALIS porra Grxcis ttawtetPiU dici-
tur, aucus
filveflris.

E A D E M facukate pollec,qua Daucus, ftre-
nue cnim mo vet u rinas.

ANISVM PHILIPPINARVM infularum.

CAP. XXV.

VVLGAMS Anifiiconē huiccapiriprar-
figo, nonquodejus liilonampoftcoc
ahosquide Planns fcnpferutjtraiJertJjbear¹
(cdduntaxat ad (Jepionfrandum, quanta fie
inter i Hud atqucaliud genus, cujuimco cio-
nem faccre infituojdifferentia.

PLVRIMVM enim ditFct avuleari Anifi>
quode Philippmis Infiihs {quardecctoruni
ferc milharium mtervallo a Smarum regio-
ne diitant) allatu ante paucos annos a Naii-
cleroAnglo,cui nome Thomas Candi.ciiw
e fua navigatione, qua totum or be in circui-
vit,redi)(let.Dchu3i]sauterD radicc, cau^{ff}»
•folijs vel etiam flonbus t^uidquam pronun-
ciarcnequco, quandoquidem mini horun*
iiJihi cfi/peflum : flL>4clemmibus& unibfl*
(iuiopdft Cuidiredituia, abcpimis& ho-
ncfli*

I larumparticulis, quaj Londino accipicbam^

nellis viriiHjgonc Morgano Regiopharmacopa-o, & Iacobo Gareroaromatario, qua-
Icmuncnqid mutilam cjushitl'uriam concmncarclludco.

Erant pond ei umbellx iacis latr, Arclunglica: umbellis non minores.fed ut com'jerc^{A*} / (See Plu-
licebat.criam laxiores,aliqubtpedii:uiislatisca(Iis:&:firmisinorbex fummoramoruni ^{fl} in. oram
iaftigio nafcentibus conthittesjqvoruin fingali, non geminum fcmen, qualc Anifi vulga- Ji
ris,fu(tiricbatit, fedpluraifior&cm unciani latuminterdumjfericquadamdtfpofjta, vide-
licet fena,o£ldna,iut plKa,fu(ci colons,rugo(ajn binas zquales partescompada, qux fu-
f'craparcedivila;utpluritnunlininiatpcnij[uur,9!iquoctamenplenadprchendurtur,&
cm^n unicutn concinencia.live, rplendens,cineracei colons orobi pamē magnitudinc:/a-
poridcmqui in vulg^ns Anifi fetnuie,acqucr.iam odor: quam ob caulim, aB hisqui mit-
tebant,Anifamappdlatum:proprium camenqiodnatalilotbobtner,efft)jwir(addidc-
lateaim Girtus appellacionein, unius ex Infularibus, qucm Candi advexerat manu cxa-
fatamSitunischaraitenbisJqoosiniitarineqLiivi/edcrauidiidi perpendicularita a lum-
mi parts ad Infimam, vulgato in illis Provincijs ici ibendi morc^hoc modo, o

Dattiz.

CHELIDONIUM MAI VS.

CV. XXXVII

Chelidonium majus vulgare.

Chelidonium majus laciniato flore.



Vo VeteresagnOVctancChciidoneift«ieravaldcinta,ffdfh,jus & minus. ^{Chtidtois}
Dc iieutroi(torum,cdmcuilib«fintradsognita,hoc capice agerconflituimos; fed
dcmijorisqioiamgea:rc , cajus natiriamancepauca annos adqifivi Francofurti ad
^astumvivens.mLfsaadmepliataaPhilippoSccliiano Spreugero Palatiiuh pharma-
«"ptso,iicaiushortofpon«:nataeracHcidclbetgs.

A vulgan³Ut^{cra}Chelidonio majorc non differt h^c pUnra,vel forma.vel magntudmc;
folavarictasdeprchendit in toliji, qurlongc tenuiu? incifa &:rcne'la funt, & flonbus,
S«iejufcicm quidctnluntcumvuigiricoloris.flivi videlicet, &quatuorut plumnum fo-
"jsconfant.illis tame nnon,uuuvulgari,incegris,fed per oraslactniatis.hisfucccdunt Ion-
S*.quemadnodum in vulean,cormcula,tetiui mtbranadivifa.cxiguo,mpro femmeple-
^oda*fl*ccflorct,&;subinde Tcoie pcofct^femirefpontcdeciduo ante brumam rcna-
««&genusuuraconfervarr-nam *daggia* anriisprddLiao (cminc penrc arbitror.

Chlidm
majus laciniato flore.

cciiij

CAROLI CIVSI RARIORVM

Nomen

VULGARE n.ijus Grsecis dickur, ^iJi/JWf&psi Larinis Chclidonium irajus: Cfai nis Clclidonia: Gallis Chltdotr, e&c, F/V/ <rr, afacultate: Gernianii^^tft

IKudvcToaltccummajonsgenusjcomiiiodenominaripoffaGhdiooniuinajusinul tifido folio.

Tffnhsiti. £> E vulgari autem Chclidonio majorc hocexpericbar, Jims fuccum in Icriaquexur <que vulnera reccmia infillatumjCiinface conferre.

AQX¹ I-IN A;

Aquilina pkivo Horn

CAP- XXVII.

Aquilina pleno inverfo flore.



Aquilina
major

ISTAE PLANTAE non meminisse, miniscnimvulgttiseftnoritix, ncculiuminVeflirt tor.inquOjobBatifilrgwiciam.nonitJ.itur-; namprirerillamquaEiimpli' quicin multirabntanifmvis cxrakoflorefponrcnafcentemfegcreme- tifficepericurplciO Sdtnulus comic u Una v ice m Lnfectiscotiflatite Aorcqui wcl cxculeuS est proCusJVi ^lolaceus^elcincracus, vcl biandt rebens, vel (aiurcruber, velalbuSjVel exarbo Sc caru]co,vio]ace<5vc muliifariam commix(us,ve] alccriusco!oris,quts cnim oto* nescnumercL'intcfduractiamLitnacuMliniitJcorniculisinveifisconfians.hocfl^cortii* culorumconortismuccoui bus omnibus ex flotiscentrotpticanti bus. - •

Aquilina
minor

VULGARE aliudclegansgenus, paucisabiincafiiiifcniincnatuniofervabain, cujo* florescolorcmquidcniinfstarvulgansmucanr (naniaibi,carociiiveblandirubeiitis,cxr⁰ Jcique colons rcpriuntur)fed alum rorm am habent. 'c a r c i t e n i i i J h i i ¹¹ [lar mflexis, fi£ plana duntaxac hahent tolu.cjuaU* (uiu ea,quxi pici cornicula ab in- viccm (egreganc:con[tanc vero Horcs vcMimphti oifto aucdccc Foliorum ordme di p¹¹ tormufcnejVcleainulriplicataadfcanumauiftptenariumnumcrujmhocft.ucfiRo¹¹* Iis ill is odo aut dctcin folioium ordimbus.fcna vcl icptena alia incumbant.interdu¹¹ ni .elegantt fpcdaculo,notialternatitn cofuta ut in Rofi plena.paucifftaminibuscuB* culis.quemadiiodiii'n invulgare, florismednjoccupantibus, & {imi]inigt¹¹ de K¹¹ quicmip¹¹ fteris. lucadem planraconfp¹¹ fere licccnomiunquaailHores, Quoru¹¹ pnmi & lecundafoJiorum fenti cak-an (c.*u.corniculoilloconrorcocarcc,inrcnorarcl<] inftar v>]j;ariscorniculamtteKI lubent. Sed etvam hoc genus mitum in modum Ired i k H f i t o ! o r e i i J e c I u b ! I p q i n a u , u z c a u m , r u l c u m , a l b u m , r u b e l l u m , f u a v e r u b e m e m , .jnciatecum, purp urcu rcoufliim vcl (atv

Aquilina pleno rofeo flor.

Aquilina degencr.



Puliumque, Scquodammodoobfoletumflorcmtulejint, eumquevel fimplifiibliorum ftie vel multipliciconftamctn.

HANC plantain, alioqui wuly-its: formarefpondentem, primumconrpiciebam anno no-nagcii mo quarto (upra quingentefimum&niillchmum, Maio menlcfuoS.florcsexpli-canteni. apudloannemabHogdandc. LiijduriiEacavorum.

Degenerqmdem appclUri pofTct hxc Aquihna. quiaHorisillius fornavuigaridtJTim'-^{ls} imahm tamcn Aquilinam rofeo flotccognominatc, Hectmultiicata folia iiiooriitic Huan in rote pleno Bore fintdilpofira. Se[^]alueflqux Aqmlsnadegtnerfc&e v[^]eripoC'^K Earn ante vigincLiex&plurcsannosconfpicercmeminixiguzrofsformamxmulan-tesflores ferentem, coloris vclomnicio viridis, vcl ex viridi purpurafcentis ^ mutaca viddi-^c «priftinaforma, iivcpotius vicio conrra&Oj cxtirptum inicmpeftivaexunoioicin >lwimwafMionc.

Qvp nomine porro Veterlbusdicta fit Aquilina, five Aqitilegia, quojquothaftcnustle lirpibuscommentati ru;ir, igaor2(Tevidco, pr.T:terN, V.Fab!um Columnam, in colibro *Jui*irt-oC«(rxwsinferLbiur. iseniucxadpcpercnfis&cxaminatisejos Aquiiinafqusfim-^lpliflorect.noris. ITOTropGf, Ilopyrum l'iolcoridis ctTcenfet, cujusjudiciude Aquilina, qucmadmodum Side multsskliu (tirpibus ,dc qmbus in eo libro agic, miht valdc probatur.

CETERVM quacde Aquilinx facultatibus antfc tngintaatinos accipiebama Dofti/Timo viro Francifco RapardojurbisBrugcnlisin Flandriaprimario Medico(tamerljut medicina-^lnamfacerem. nunqoaminanimuminduxifrem mcum)libctluçcriberc:nimiriitn Aquilino: vulgaris (emen cnuimc conitufim.&ex vmo propinataura, n)ulieribusin parcus dif-^cScukatecum Optimo fucccflli exhiberi: G. prtotumeu liauftus minus fuetitefficaç, alium Smilem propmandumclTc-

DELPHINIUM ftuCoofolidarçgalis.

CAP. XXVIII.

H' A M r ftirpem (lefcipfetunt plerique, & iconem etiam przpofuerunt. Ncc ejus me-^lmini (Ten), ncaftum agere vidcar, mfi poftcvulgaiof aliorum labores, quafdam non P[^]nirendascircailUmnotasobfervafTtm.

Dvo autem tut omnibus noui) {untOelphuiijaplerKquevoc«i, (cuConrolid[^]Tega-^llis, ut vulgo appellatur, Veneti. uigateJarafios fe pp m;pa im nfer cçetes pçtena-^c«s çqulei colorislegatis ti ore, Alterum majus, in aku fe acioliens, & muftis quidcm alis P^f<ditum, fed illis ecum [urfcCiis, in loicis cult urn; k quo pnmiira agcuius,



Delphinium clatius

Delphinium ektius

Delphinium clatius plenum

ELATIvi ergoijbicubicalemplerumqii alritudinernafrurgic, interdumctiamma-
 joremjtionnunquam infra illam confi ftit. Caulem vcro haber rc&um, firmum, iIriarum,
 qucm nidifcriniinacim ambiuntmukifidafolia, frequeanoraqiam in vulgari.cquoruuali*
 prodcunt ramtvir(de5,fiint]ibusfolijsoufti, defincntesinobioogaflorum/picam ftxfo-
 I j l i y u u n n, quorum qiurcrna in latra expand untur, quinto infupernu hcauda aut
 cilcart in pofteriorcm partem prominente milgnit^rehciuis majuSjCin (ubeftextum me-
 dium flormoccupans'. extimapartelongiufculum&bifidum , dcinde per larera alarum*
 mulcafnminaumbiticumfloriioccupantiaccgensjflorifuccedunt.ucplunnumjijngula-
 na, rari05plura, lungiora&craftloracornicularcmeninacqualc, ntiacuritatcnigrum, ct)nn-
 nenua. Colorflon*:, in hoc genere, rairuni in modum variac: namautniveuseft, autcxa!bi-
 dus, autcarneus, ifq. vcl farur.uuSjVeldtlutHs, autcincraccus, aut purpurcus feu violarcu**
 atqueisvldilutifr vel iicuratiior, nonnunquacci3m vcrficolor, hocceft, vel media ex parte
 purpureus, alcerā incarnacuSjd ve foave rubens. tntcrdu etiam attera parte albus, qualcs mi-
 ni Francofartinacos memirn. H^caucem varietasfationeadquincur: n.ira unius generis
 fenne omncs hi colores mi In nan. Alisd pnetcrea in hac planraanimadverlioncdtgnuro
 •crtjillam videlicet Invcnirifloribusmukiplicifbhorum numcro cortantibus, omoimi]fu-
 pradidlorum coloru m , nullo auc p rexiguo caican praeditis, quibus liiccdut minora quitn
 ID (ii pen ore conicula. bina, terna, autquaterna, plcraque inania, raraqua* paucum ft-men
 prsbeantjcqutbusterr^commiflls rarat nafcuncurplanxplenu florm ferentcs, plerxque
 iimplicLn. quarum tjmcn(emine(ponredeciduo, denuonaf(:acurfquodniirum)qua: ple-
 num florm profcrac, ut mi hi aim Vienna: (ubi primiiim illam phntam obfervabam; tuin
 Frjncofurticoiitigii: quod(ibietianiaccidi(rc, deeamucationeamepra:ii)onitus, cuinill'
 ftmcncomrnunicarcrn, annoM.D.xC[]]. IoannesabHogcladcadmc{cnbt;b.ic, inagnani'
 que colons varietacem in ifloflorehabuiflc, nempealbura, fuaverubence, ruDc]luni, pu-
 pureiinjexpurpurcovanurD. fcminedeciduo a Ventispertotuniliormmdifprco^uinSi
 cirulcos flores fcmiplenos ipli natos eflc.

*Delphinium im-
 inpn.*

SedaliudeflElauorisDelphinij genus raultdubcrius rupcriorc, arqucinterduadc6aiii-
 plum, u[humanam altitudinem ruperet^umcrofioresramos profcrens^ plura raajora^;
 folia, fivefoliorum alas^on minustamen, quamfupradfcricprum , inreucslacinusdiVi-
 fis Hujus flores fuperiorisflonbus forraajmilesjtedlonge ampliores, & colons aut exU-
 lcicJegantifrimi, auceKcxmleopurpurafcentis: corniculafloribusfuccedctia, craftiora, n'
 grum inxqualefcmenqualcajccnus cotinentiajquod fatumj genii sUmtn confer varefern-
 perobfet-

Delphinium vulgare pleno Hore.



per obfervavi. nulli profus eploris muratso-
nefa&AiiicecHogdandus rubuiflehripfo-
ticad meatiquanio, cujirshoresvelutima-
culisalbisicu radrjs diltin&i fuerint: illius
tamen [eminc (quod ad me mittebat) Dace
plants aerulcum florcem prorulcrunt. quam
obcaufam, fu(picor cos flores in qutbus ma-
cros obfervarat, vicutosfuiile, autfhlici-
dio ex arbonibus, aut pruina, quam fequutus
fitnuuius fervor folis, quod in hoc gencie
interduni accidit.

MAGNA etiam eft coloris varietas in Vul- £
gacioris floribus, camet(i neque rami Sjneque
tblijsabeo quodin (egetibus sponce naf-
tur, dilcrefet: nam pra; terca: [Lileum, qui in
arvis, invcnit Lir&alboflorc, &: candLcate, &
l-ubrOi&dilutius rubccc. Sed toto illottic-
nio ante quam Francofurto exccderem, na-
ra: alihi planta: rtorcm fuave rubncēferen-
tes, qui limplici quidem fcxfblorum textu-
rā couftabat, fed terni, quaterni, quini fimul
coti][nixtiinnnfcbanur, roMdc m brevi Jli-
nns calcanbus prxdici. m^jore tamē& gran-
diore in extimo tloflorc qui Tliquos vcki-
ci coniprehendebac, & ample<iicbarur: ideni
miln accidit ucanno M. D. XCH t. &c (equente
Lugduni Baravorum iquin&aliquorpiarx
Jenitnc illius nata: c^ulcos oinnes Bores
magna ex parte interius plenos habuerint.
Vtrufq; autc generis &c!ations Sdvulgacis
pleno flore icones huic capi ti i n leriuii us.

*Delphinium
nigricans.*

*Delphinium
humile, je-
% - vulgare
" ni plus fa.*

MELANTHIUM PLEHO FLORI

GAP. \XIX.



Vo Melanthij genera jam dudum ifi ^{Melanthij}
horcis culrafucr-. DL- his agere non c(i^{d"}>£">)*.
hcecfTe, fed binisahjs non vulganbus ITC
capitcagendum milii efre. oprcxprcciiidu-
xi. qux paucis in liortis obvia cfle fblcbant,
tctnpons iucccfj tamcn, latii flicih ucgotio
Illisinqmlinafaia.

PIIMVM, virgUfolijfqja fativo, cujusfe- <sup>Melanthium
vulgare ple-
ho flore.</sup>
j3ienodoratU[ii,ri6rquccvfindtcandicarj Di-
hilvelquim minimuditll-rc: floresramen,
qutiniativoiimpliceifunc, in hoc, tnplici
autquaduplicuiovcmaiitdccc m foliorum
ferie conltanr, exurgi; fibasii medioltanii-
nulis & petagonohexayonovecapite into-
tide corniciila inflexa iuperne divilo ,qu
intercursacibus incerncmebrinis, plcrmcft
(emincrotundo jriigro. oilovato. u* i ulgans.

ALTERVM cauliculos, &: foliavalJf <sup>Melanthium
Dioscoridi
filiu fte.</sup>
terdint*aa habet, inllar illius filvi-fns quod
D mafcunum cognominatur, am hores au-
tem fupcriore flores, plitrimislacinians, &:
elcgantia culcocolorcxrditis flijjs con-
ftantes, antquadupliciauc frequentiore
fcie fumdirpofitielegami (pe^aculo, nullius
tamen, quemadm odd nec (implex, odons,
pjura longiora^; in medio liabfites (lamina.
Florem ambiut, Sc quodammodo fudinenc
aliquot ccnuia multifidique folia in orbem
difpofira, magnam gratiam & vcnufratetlH
addencia: iadc futcedunc, imi medium flo-

Mclamliinn Damafcn. plcnoflorc.

Mclamliinn
Damafcen.
Gentianus.



Capnos tenuifolia.

Melastem
artica

Capni
gna-
ra.

Cetacea
Wartia.



Natalis

lavcniturplcrifqueHifcaox rceionibus'-inarvorum marginibu*& juxuviasacem¹
rai.non-

rem occupant pentagons, inrerdu etial
hexagonal hepcagona capita laxa, in loti
demeiouortacormculadeGncntia,&fcmel
iugrum,rugolu(n,inodorijmccncincnti3.

Floret ucrumquegenus lunio & lulio: ft-
men maun um til Augufto.

JHudanre multos annosin hornscuitu
ohfervaba: hocverodrmim anno M.D.XCI-
quibufdam in bortis Fracorbrtauis, unde ic-
mine a me miitoamicis, illorum bonojof-
narecorpit.

H i s adijciendutnputavialiudMclaniuij
genm Cretico femine natii: cujus pnma fo-
lia, Dclplnnij yulgo vocan folijs n6 multum
ab(imiliafunt,anguftioratameii:caulisdcin-
cic brevis emerges, pau Id fupraradiciscapuc,
in plures ramos dtvidttur, tcnues&rereres,
bipedalis vel amplioris logcndinu, valdc in-
firmos,&: vix fuftmercie valcncti.cui bus in*
nafcunturrara foJia, paucis tnciluns predica:
dividunturruifumilliumi in atioi minnres
ramulos, qui finguli fingularcm (uflintf fio*
relii,inquinquetolia,iitplurimum,divilum,
cviridicandicantia inictu,ut Nigelkc vulga^
ris,deindoexa;bida, podFCmdczrutei noni-
lul conrrahchna, mucronibus interim fuato
vi iditatcm rctinentibus: c floris med:ocxil
caputinquinque,(ex,(eptcm,dcfinen5cor-
nua, ut in vulgari Nigcila, &inarnbitufre-
quentia ft t m ma vi rid ia quoru m apices c^ru-
Ici:infra(taminaporrd,fuper ipfafolijicx-
panfa recumbuo ofloalia foiiola bifida,pari
oiftantiaabinvicem fejunfht.quorum petio*
luscun: (ua bafi carullcus eft,bni£ [i.infVerfx
venarfufcae, quod inter venas nicdtii eftcvi-
ridi3avefcit:radixctiam flavcfcuinfarratit-
cis nigellarum ,riec vivjx eft/cd hicnicpfit

Illi non valdc diiTimilij,(i non cadē,inveni-
tarinarvKpoftdcmciTaifcgetcsrotaPanntv
niā,Auftra,reliquaque Germaniā &Belgio.

CAPNOS^VMVS TERRÆ. CAP. XXX.

Dalbo flore,viticuhs feu capreolis fepibus
vicini5fcimplicantcm,d£ terciam split I tali*
difla, alia Fumi tcrx genera obfervare mo-
mini. Qjiorum primum quidern, inter Stif-
pesi me per Hifpaniam obfervatas defer-
ptumfuit: Attcrom, Creticofcmincmili>
poftca narum. Vcnulqvc ver^hiftoiani iif-
capite trademus.

UoDRANTALs hcrbt]Iacfc,Primum il¹¹
genusame inter Hi (panicafirpes defcriptu
cauliculis mollibus& quodamrnode tranf-
parentibus. uin vulgan Fumani, firmoiti-
bus tame n&furreftis, non procum bet ibo^s
quibush fertnel tanto licd alcafi *
ficcnuinimeincifa.vulgaris folijs candidio-
ra^ummos cauliculos exotnaru maufcuW
purpurafectium flufculoru vulgafis floribi*
minOrum Si 16fertim nafcentiu Ipcox: radi-
rem habet exilē.Totavcrd plan ta aniara df-

rai.non-

his nonnullis etiam Narbonensis Gallix locis observaremini, praefertim supra Arclat-
m jdiim M. i. L. T. lta. per camurbcm^ nno M. D. Lit. Mompe Jium redirem.

HANC quidcm in Hispania Sidencinertiam facere voiebant jnefto quibus indicijs du-
fli TVulgoanonnullis Pdlamiffi^te. Ptiemtnt: diciuir^nomincuni Fumana vulgaricdmun

M A i v s e (t illud genus quod fernine Creta allaco natum, nee minus (uccu Tenros habec
cauliculos vulgari. angulolos. cncro Sjprocumbentes. foliaminutimincifii & capillacei Ut
H]spanica, rc< idunora: flores confectim in oblongiufculifpicanafculturextreniisramis,
vulgaris floribus candidiores, deor(umfpicantes, extremam Vifcicncncmpartem occu-
pante fufca macula: illn (iicedicfemen quale in vulgan, quod niaturum facile dccidit: ra-
fixcenuis, Hnfcrcens. Annuaeftutyulgans, & lunio lulroque floret, atque fubindefemen
profertjquodl pontccadens jnovcllasplancasptoducit in Icqnetueaa annum.

PitomiUi,
Palottuna.
Captui Crt-
tit*.

SCROFULA&I 1.

CAP. XXXI.

Ruta Canina.

Scrofularia Cretica 1.



I>R. ^TE & Huo genera omnibus Tatisnora Plan rarilius qux vulgo Scrofularia appella*
tuncjus Vnum cuberculis quibusdam radicem habet obiicam: AUerum nullis griimi
ad radicem adnatis pndicum est. Bina alia obfervabam fern me nara, quorum hiftoria hoc
capiretradecur.

flm^MM

Cretic

PR i MO autem generi prodeunt initio folia hura icxpanfa. Scabi otz primis folijs non
ValdedL [Tim! li, l: deinde lefquicubitalisa {rurgiccaolis, quadrangulus, cavus, vtridis, angulis
purpurafcentibus, i nterdm etiam rod cA parre qua: a Sole illuftrara est, purpureus: en j us
infimam partem abiu tlonge ampliora folia in mulra lacinias divifa. cxadvrronafcenti-
i. dcLmlercliquum ca iilemaha. quxa Utal'unt & Filicis aut Alefloroloplii foliorii inftar
ferc, multislacinijs pra*dita, quarrurnjsinalias longeminores & in annbitu ferratas fecan-
tiitiamedio caule ad fumurncx alarum finu nafcun rramieriam quadrangoli ,mino-
Tibiisfo] jjs prxditi, & itli (imiliter in alias ramulos divifi/uf tinentes flofculos inftar utricu-
lorum ,cavos, Scrofulari. T vulgaris flonbus non ablimiles. ex flavo vircfecre s, fex folijs con-
ftantes. quorum binam fima valdefunrcxigua, & inferne aliquantum reflexa, qui inta-
teribus funt panlo quidem alcnis attolluntur & rtiprcmapartcaliquatulum purpurafciinr,
fed bina fuperna ma, ora funt reliquois & quodammodo refl«a, purpureique ex atro coto-
ris « paucis & bre Vibus Tavisft. iminibus ex umbilco produntibus: radix pollicariupxrii

smfntgrla

Cretica 1.

crallitudinis est, in multas crassas fibras divisa jua Mcmiscolons: an fit veroprennis, nihil

SS)

affirmaro

affirmare possum. quandoquidem fubneum Francofu[Todifcefrum, primum obfemb 2 flim loannis Mullen horto. natatn femine Creta accpro, ftutacfilvefris appellatione-
 H v ic non velle tli(limilem, cum Lugdunum Batavorum perveniffcm, ad meadferebat emdirus vir Theodoricus Clutius DelphcHtL turn pharmacopola, quam fubfequens hicmsabftulit.

*Scrofularia
 7 gemina
 Tam.*

*Scrofularia
 Cretica 11.*

SED & aliud Scrofularix genos Cretico feraine narumfcguent canno confpicibam* aliquot ftolones a radice profrens cubicales & ampliores, quadranguJares, es atro purpurafcentesj quibus folia inrquali & inordinario ilni innafcbamurlongiufulculo pediculoap-
 penfa. urtica: folijs non di dim ilia, fed Ixvia, non mordacia, fenfque mollia, ilipcrnc (atui viriditate nitentia, infernc nequaquam, ex quorum alis breves emergcbantramuli, quadranguh, in limiles alios fed longemiores divifl, fuffinctKcsparvos caliccs in quii Kjiich-
 cinias fectos, & in his ftolculos coloris ex atro purpurei, quatuor lacinijs conflantes, fupcr-
 na bifida & furfum reflexa, inferna ut labellum propendente, duabus alijs laicracbudentibus: ijs fuccedebant vafcula five globuli duobus sulcis tanquam divifi, excimaparte ali-
 quancuium mucronati, in quibus fcaen vulgaii fimilc. Toraplanta vulgarem illam rckrt, cujus radix nullisgru mis pradita eft; fed odorem magis foetiduii fpiarc videtur.

ALECIO ROLOPHOS ALPINA.

CAP. XXXII.

*Allectorolophos
 alpina
 nora.*

TT ANC phntam Scrofulariz voluimus fubjungere, propter foliorum quandam cumil-
 Jius primafpeciefimilitudinem. EiusaiJtempluta genera in Aufbiacarum & Stuiacarum Alpium jugis montanifque pratis inveniuntur.

Alectorolophos alpir a.

AUStreU-

3.



*Allectorolophos
 alpi 11.*

*Allectorolophos
 alpi 1 n.*

VNUM enim plures ab una radice pro-
 mit cubitales caulcs, minimi fere digiti in-
 cerdum craflitudine latves, per quos (parfx
 foliomm, Filtpendulx vulgaris folijs non
 vaide dirt! miles alx: flores innaft urur Aim'
 miscaulibus copiofi, oblongxfpicinxlar,
 qucmadmodum in Orchidibus confertim
 nafcentes, & illarum floribus perfimiles, c
 caliculis pentagons inter minutiora folia
 prodeuntcs, exalbido colore: tjs fuccedunC
 mucronaracapitula, macuritate dchifecii'
 tia, ferae' nque oftendctiacxiguum, iniqi]a-
 icjCincracci colons: radix crafliufcuta eft,
 perennis, utcx praccdentis anni refanti-
 cuscaulibus dccistamen, conicctum h-
 ciebamjncrafTas fibras Arphodelinis bulbis
 pxne fimiles divifa.

INVENTVR & aliud genus per omnia illi
 fere fimile, fed longemollius, cujus flores
 modo pallidi, rnodopurpurei funt: radix
 eciam *cradk* Si fibras Afparagi radicibus
 miles agens.

Vtrumque genus infummis Alpibus Dor-
 renftain, Etcher, alijfoc celfis & berbosis
 jugis na/citur: pofterius etiam in inferiori-
 buSjUliginofisq; pratis. Mcmini 5c in Flan-
 drixpiatishumidioribus, atque eciam pr-
 tts Gentilly pago vicinis, non procul Lute-
 tia Parifiorum obfervarc.

TERTIUM inijfcJemciamjugij quibuJ
 Primum. crefcit fcdlogchumi LuSjUtquo
 palmarem akitudinen) non fuperet: iU^{os}
 cauliculi graciles, & raris minonbufque fi

lijso Dfiti funt: florum fpicabrevioTj&rclcganti rubropurpurafirenrc colore nitens: calicul
 florescont!ncnEcs, laciniati, & vclucicfoiioliscont«ci: quacfloribus (uccedunrcapitula
 majoraquam in (upcrionbus, & vcjuri rofrata, angulolum & in rquale (cmen etiam con-
 nentia: radix miminidigiucraflitudinem interdum xquat. fibnque candicantibus & !*"
 Dt exams donataeft.

flut i II ft-

111111

Ad illius genus refcripoteft tencnoraliaplanracauliculis angulofis. & lanugine, noo
 eusquam floria (quac minorafuntj caliculi (j4c (quibreviorcs & * minorcsj fubc (centibu
 flores

Alc florolophi ni. genus alterum.

Filipendula vulgaris.



flores simili purpurifere nitent, fed minores Sc hjntilioregaleaprrcediri Cum: capitula vix ccaliculisemergunt & radix non adedfibrofaeft.

Eamingramincislocis, (kcioribus^ucpracisuperioris&inTeriorisGermania^fepius obfcvaremcmi Maiof)orentcm,cum Iulioin Alpiibusflorcat: Sed&anno U.D LXXXI. Aprih florentem,atque vel purpurco, vcl btandc rubente, vcl albo flore variantcm colligebam,ad Groucz pncdium C.V.Richardi Gartli,fupra Londinum.

VVLGO hxcanonnullisFiltularia^caulis^topinor^avitaccvocatur: quidam etiam "edicularcm appellant, prxferrim aliquot Germanixlocis, in quibus vulgato nomine morbo»corripi: diciturctiam illis Co&1 pnt U*m Sotct. Priorem defenbere videntur Pena & Lob«tiu\$,in Adverfarijs Filipendulxalterius montansc nomine. ForGran & ilJacic, cu-

jusJonasSimlcrusadcalcemCommentarijdcAlpiubsmeminit his varbis:

Herbafolij ATplenoperfimilis, cauliculisabimaradicequinquevelfex, duoifcrepal- mos longis,Si fpicam florum fuftinentibus,ut orchis fer^.

Hauddubic Alcaorolophignuseacftplanta (licetfoliaejusdiflicnilia) queseinomi- nibus ferme ficcioribus pratis nimis llJXuriat,cofaqe xftacc flores producit pallidos,cui Cn- fta» gatlinaccaretiam nomen indidcrunt Reccntiores, inferiores Germani £«ntfa«intift«e. ««„.

Smic qui Mimulum Plinij cftc cenfeanc.

FILIX PVMLA SAXATILIS.

CAP, xxxUI.

FOLIORVM qu:edamfimitudo&divifarafacit, utclcganshocFilicisgenus, Ale- <SorolophoAlpinoprzedentecap.defcripto, (ubjungam: idautem inmarcm&fe* "Utn diftinguimus,Thcophrafti fcatemiam lib.ix.cap.xx. Hift.Plant. fequentcs.

F:lix j'umik faxarilis t.

Filixpmnila faxatilis 11.



Lonchicis altera Marant h.x.

FilixpumiU

ma.



Filixpmnila
fm.

ttt.lt.

tatubitu *)-
tit* A/*r*o-
aha.

M AS igitirradiceferpicnigra,tenui,lon*
ga.in obliquum fesc fpargente, raris fibris ren-
nutbus & duris capillata, valdeadftnngen-
tisf.iporis: ex qua produnt multi pcdals
cauliculi, divifi inquofdam alatorum folio-
lum tamos, fivefrondes, FiUcisiTiansniajo-
ris(Fcmina! vulgo Herbarioium creditar} in-
ftar,mult6ramen minorum,tcnuuilejic inci-
forum, 6c yalde rendlorum ,prona parte muJ-
tiSjUtp]nrimum, nigrismaculis,qucmadn]O-
dum,Filicisfeminxfolia,diftiniftorum.

FEMJNA qtinos ant fenos habet caulicu-
los cerctes, re&os, initio virides, deinde rem-
poris fuceffu omnino nigricantes, palmarcs,
amedioujiicam foliorum inltftorum alain,
unico ad fastigium ufque, artu porreftam fi-
ftinencs, cademqua inmarcvulganfortni
& facie, multo vero minorum tenuiorin-
que, fapore nonnihil adfringente, proi^
cttampartemukisnigtis mactilis (quxvetu-
ftatcefflorefcerc videnrurjafperorum: radix
vcluti in caputcoaila, ficut in marc vulgar:,
BimultisnigrisdurtTqucribriscapillatacfl:.

Prior copiofiffime nafcitur in laxis,norno-
d6 ad Gamingam2£ Ncuberg: Jed ad om-
nium ferc montium radices Auftrif & Sriri**
Altera ver6 in prierupcismontibus, inter ipfo
fata inventmr, vciiim non adco frcqucas.

FiLicvt/E porr6 elegans illud genus
qbodiC. V. Bartholomxo Marancha, Lon-
chttisfti-



Phyllids Ucinario folio.



chitiscalcera nūcupatiir[^]ibundeMmodum na*
 fciturin Sttnacaru Alpiuii] jugis. Sed qua: vulgo
 Lonchitisaltenusnomcnobtiiuit. valderam
 in illis jugis itivcmtur, licet per univeriaji
 Gctmatiamitfvctjuciuiiflima.

PHYLLITIS. CAP. XXXIII.

NVLL A Provincia mi hi cftperagrata, prx-
 (ernmqaz mōtofa fit, in qua Plylhtidem,
 vulgo Lingua cervinanuncup[^]fam, non obfer-
 va

puteis, interhpiumiivelaterum commifTu-
 ias:cujus mentionem non feciflem, neque cju-
 iconem propufuifTem, niti tic alccroclegaiiti
 cjujgencrc mihifaciendus fuiflet Jermo,

SOLA autcin foliorutnformā. a vulganPhyl-
 litidedifferri! lanovulgans, a[i]oquircliquisno-
 tis ci pcilimilis : proacunc verō ipf3 exradice
 nialcisinigrisfibris & vcluri capillamentisprsc-
 dica, fenauc(cptcnafoliapalmans longitudi-
 nm , cjujdem cum vulgans folijs l*voris & vin-
 ditatis interni partcrac externS, nutlis auc ran-
 finns traniverfis lincis infigniu, extinū verd
 parremultipliciter diflefla.

Hanc in Cantabris, rupramonrem D. Adria-
 no nuncupatum, quā pcrejus fpecum, & for-

*iccm cranfituieftin Hirpaniam, locisumbrofis in ipfifrupibusobfervabamjiaram catnen
 ^uctplcufque alias vulgares:at[^]ueipfiusfoha, aliaftlijs per exercmumvelplun bus lacinijs
 VcIpiucionDus crane divifo.

• Mcinini&olimplanramunamcGobennismontibuserutam. MompelijjnC.V. Gu-
 "eltniROJJCJCCI MedicicclebernmihortutA, hm'cpinefirailcm[^]ranftuliflc.

Scd&qucadnosmifEifuiccxAnglia,aDo£li(IimoLobclioHemionitidisnoinine,pC)f t-
caquam bicnnio,ob cencntatcm.in fithliadrervaca fuiiTer, tandem in Phyllitidcm folijs U-
cimacis evafir: vcriim non adeo niul ciphcirer diiledam ut hæc eft, cujui nospifturam da-
hmSjrcdiribusduntaxatautquatuorlacinijsfoh'ainexrciTioidivilafercntfmiqvan) qui-
dcci meratnorphoiin,liitismirannbnpotui. Ecenim pUncuhrquasad nosmittcbac ,1,01z
tencII.^&nioliiceilaeraanCj&pluriniim ad Hcmiomtidisfi^uram acctckbsnr.

Annoaineni LXX I. iupra Millcfimum&quingcmdimum.cum Bi]flo)tjcficm,doxit
me ad Ipecum illam Divi Vincentij, unde crucrat, idem Lobdius, c q ua aliquot plaetulas
meismaiitbusevellcbai'n,!51isqiiasniiferarji][nilcs,liocccftotas(ci]dlas&m(il]cs:qiiibua
pares aliquot decide confpiciebam ex Anglia in Galliam redicns, pucc cuodam IOP pro-
culBononia,dummihiexpctanduseftcquus veredarius,quind proxiiramquomm ml"-
tamiorum ftationcm me vchret:deindcctiani Machlinii in Biabaima.pitcoillilisdivd-
forij,cui fymboluni *ialcaaurca,frumentanof6to,u[ttftu mihitum fuicllluftns vir Ioan-
nesdcBiancion,'cuicas demon ftrabam.

Tabl. 100. VERVM Phyllitidis folia in vino pota,fcrcncium morfibus3uxiliantur,fcftc Diofco-
ridiciquadripedibus veropcrosmfuia j auxilioiLjit, \$£m tiylciKLTiaauircolurjalvoULJ-
licrcpqtuidantur.

Hfionionitis peregrina.

CAP. xxxv..

Hemionitiwera.

HemionirispercgnD*



fa

MERITO conjungendarafuperiofiplants Jcftimavihanccle^antem Hlemionitidea
qmum Romzcx veocrtsCujufdam Theatri mtttis cruram dntitlTn nus idemque sum-
moanirnicandore prrdnut Medicus Ioannes Hcnncus Gandavcnfi;, mibi amiciffimus,
ex Itahi redux anno M. D L X V I. done dabar, quam dm rum Phyllicide laciniato folio, Si
plenfq.ah)sftirpibos,quasinmcKpereggn.itionibuscol!cggram,amcanum M D.LXXI"
quo Vicnamad CiLrcm Maximilianum bujusnominis II. vocacusfum, repofitam l^"
b uirfed Belgiu m rclinquens lftic deftrui.

ffiuim,

Hvi vs folia quaternordigiorumtranrvcrfbrum^clcircJtertrium unciarumloo*
girudinem non excedebant, fctrei vcnabuli mucroms formam explicantia,ii;fVnorc ba(c,
quaruopctiolofuft;inebantur,duplicate[napophyCn habenna ,&xcimSpartc mucronara:
patceinternal^via, &dilLua vindicate prxdita, exicrna verd linetsfcu verilbus ob!iq^{ills}
exutraqucnerviparceinfigmta,quemadmodum Phylitidisfolia, gufluacrrbo& exfic-
cancnt perinde atque Phyllitisi radicesilli nigw, fibrofi, qualcs in Icjrinna Hemioniti^
confpiciebam Ronn ulque mi(sallt^loatini dc Brancion a Clanffimo codemque ho-
ctifTimoviroHtppolitoSalvianoRomano Medico, quamque in fitiiliadhucakbat, i:um
Belgicadifcedrem.

*apitvra
exditiis.*

GRJECIS porroM3iovrT/()^(r3^A>i;oi>dicitur,Lacinis, corum nomenclaturam i(cquenti-
bus.Hemionitb & Splemum *. Officials ignota.

Enclitatu.


Hemtonitis aucem tx ace to poia, hencm abfumerc credicu; . .

Typhapalaftrismedia.


Panicumvulgarc.



Panicum Americanum.



TYPHA MEDIA. CAP. XXXVI.



T)EcvLiARE quoddani genusTyphes
A veluti medium obfen-abarn anno
M. D. LXXXI. copiose nafccnspalurti
quadam fofsa apud Tyburn facellutn,
no procul ab co loco, in quo /epeliuntur,
quibus ob malcficiakqucoguJa
fradiaeft, primoab urbc Loidincnfi
miliari,qua fpcedatOccidncem.

E R A T verdTypha illafolijs mult6
an^uflioribus quam Typhx vulgaris
foiia.&graciliore chva,majore ramen
qulm minima ilia a D.pcnno inccf
ficcasflirpes quas inter chartaccas pa-
ginasadfervaba^raihioftenfa,&a Pc-
nd Lobdioq; indofttTimisAdverfarys
exprefsa. Alioqui a raajore non differc
pulloillotomentoin clavam compa-
fto,& fiorum oblonea fpica, ccnui fla-
vo polline repersa, tuipra clavam ena-
(ccnte. Florcbaclunio.

PANICVM. CAP. XXXVII.

M A c N i per univcrfam Germa-
niam.Vngartam.&Bohemiam

an
P
in
ciufuse(l: eKnimalimentumccdic&puitesexcjufeminedeglumatofiu
S^rati faporis.De illo(umctrnconem infcramjnihil commemorOjquiajam a mulcis in-
et
P^sc s est dferiprum:feddealiognetccx Peruana Province ante ngefijutn annum
n
A
uropam primilm illato.

ha
A B E T
autem ideulraostonge craTiores, firmiores,altiores vulgari Pantco, &plaoi
*^rundinaccoS)Ut quos humanam altrudiaeqi atringere, inrcrdicciam fupcrare pleruni-
TM
idenm,rcbrisgeniculis&velutiamcu!isprxditos& lanugine obfitos: folia hanifi-

dioacea

dinaccac'ingulisarticulisprodunt, longa,lata, dura, Mclicziblijsnonvaldedifljmtfia: intrcugprodeantegeniculisahj vclutibreviorcsculmijimihbusfelijsofbtjcdlncrites in Ipicara digitalis longkudinis, noinunquambreuiorem, &duntaxatpollicatem, demc compachm.&requahspropcomodum ubtqucraHitudinis: fcmjnaoblongiutculisgracilibutqipcttolismmxaproferenKm&capiUaccisvclutiglumisinclufa, quae extimapartec glunfnsprominente,craftiora,magisratunda,S&quafiorbicula,tafunt.la;via,Iubc5ruKit.oioris,qui in calidionbus regionibus magis Tatar elr.raio tamen vcl in Germama,vd in BelgicaOniltiscnniiProvinciisfrpc terra: mandavieiusfemina ex Hifpanijsaccepca) adplenam macuntatera pcrveniunt;radices ejus fibrofa: iuni,validiores &c majores^quam in vulgariPanico.

Panici Arachc. fefquipedalis fpica.

Lachryrna lob.



Panici Arachc. fefquipedalis fpica.

Iftius porr6 generis Tpicam craTam, valde firmam Sc benccompafiam, non ublqac Wmenrqualem.icd'paularim&fcnfmexnmaparte s>Tacile(*;cccrD,fcfquipedclongiorcm. nectaaicnintgram ad memitteba: Londino lacolius Garciusanno M. u. xcna NauCie* ro quodatn Anglo ex iua navigatione reduce cm pram .CUIUS femina.no mulro majora m.' hi vifa.quam illtus Panici Ameiicani,cujis modo memioi, ceteroqui prorfus familia: n''» pluralimuljunaa&hipidagiumaticlufabrevipcdiculoinnicerentur: ilhus ilirpcmn* icciicem videre non lieu it, nam ferere neglexi, quiavetuftatenimiscrficacumcxiflin^{1*} bam, fpicam tairien in lignearabelliFrancofurti exprimendam curabamapento amB', ce.ut hoc loco infreremjdignacnimihividebatur.cuiusafpeftualijctiamfruercnf^{1*} PtoximscutccniequentcannotcnlKbizad rat N. V. Caroius dcT&ffisVcicdanotuTM Anruerpiz Prefdfcus,ipfi natas irtic planias (erainc quod ab eodem Gareto accepprac, no valde diflimiles illis, aua: jam i rnultis itiBelgicishortisfuntonipcaiiinccdifli^{1*} W^{1*} etiam rpicusiivepanicubsprotulifTc.

Lachryrna lob.

D & hic,accommodiore quidem loco,hifi mejudicium fa!lir,quim cum fbrp« Pf. Hifpainiasoblcrvarasdcferibercin.LachryvHzIobi vuleo vocaxiconem liibncere lit* tune enim , Iscc pcculfirem ejus lulloriam dare dceru'ffcro , quia multis Hifpaniis IO^w mini pbntaob(crvata,&jam mulnscriamanteanms.ncropeM. D. L. Beduobusicqucn bus Mompclij lefla. Scd cum illas obfervationes e vulgare, Lobehus & all) quidatn"P» planram exaaiiTimedcfct.pfjncnt.luprcvacancum vtdebaturejushiftomtepcicrc. ^ mam nmenipfiuskoncmurndclmeaum& Tculptam habebamcum alijsquarum w loco mcmiai.anicquimdoaimmz Lobcli- lucubuuooevinuMusaltcnusqui mem nem te.

feciflet, in lucem prodirent, locum dabamus tunc ipfius iconi (quia in eaopella non Joteramcomraodius)interGraminisgenera. Nmic verdciimaliquot harundiaccamm iirpiumhifloriam, quapotuimusdiligentia, confcripferinius, hocnoftroODiervationuni xto libroJ Jusiconem capitede Panicorevocare voluimus.

VT autem vulgo ab HerbanjsLacbrynia Iobi vocatur Uarc planra. quiaejus feminala- cbrymarum exoculis procede. itum formamquodammodoarmulantur; i[aHi(pam La- ifiMad de oSMtfr/MjNaxbonenfes GalJj Larmesatrij^ireDam appdJant.

L. g. rimus de

GRAMEN.

CAP. XXXVIII.

Larnei Je N.Dime.

VARIA Graminisgeneranunc funtcognita, fcfubindcalia abalijs proponuntur& defcribuntur. Nemo tamen illius Graminis iconem exhibu]t, quod in magna Euro- pa: parte, pr2fertim perHiipanijs&Gallias, ante quatn Stirpium inHifpanijs obfervata- umhifloriam vulgarein. Quoniam vero ob illms turn clegaDtiam, turn ulum, cogni(u- d- ignum erat, illius derctipcioacm & iconem turn dabamus: nunc cciam caldem ob cau- fl- slucrepetimus.

Gramen legitimum.

Ifcharmon PJinij.

3



PEDALIB vs autem aflbrgit id Gramen culmis. rotundis. purpuracentibus, genicu- us: qmbusanguftapromitfolia, in. icumcnfaftigiata, dura: ipfculmi, five calami, in- ^aternasautquinasdcti iuntpaniculasjmixtixatiopurpurcoquecolorisiradicibusfir- ^turlongis. nodolis. geniculis intetceptis. candicantibus, fbbdulciscum quadamadfri- me fap- ris .quxlongelate' queferpentes, fubindeplunmislocisgermant, novofque culmos & foliaproferunt.

Gramen legitimum.

Hoc gramen nihil vulgatiustotaHifpaniaaiGallia, inarvis, vinctis, atque «umma- ritin- *i) n qmbus raulto lartius & ubcrius crecicic: nam C)us radice*, interdum digiti craffi- tudin- r- na: quanre serueremcmini.

Katalis.

ItcITvRGrcisa^!ys-(?. LatinisGt. imcn, GallisChitn-dtnt. SunrquiIfchzmonen- tiolib. xxv. cap. v 111. nuncupatum e(Tc putent • quorum fententiam pro bare non poff- u^-. Etmult6qmdcm aprius Ifchaemonishifloriarquadratedvidetur Milij genusillud fil-]^trc^ftipinum, inhumidifnalcens, folijsafperalanuginocobfifis, quodcelcberimus WniolusPanicum filveftrecappellare videtur. Serpit. inquit PLinms, c terra Milio fimi- lis, toll- * afferis & lanuginofis, farci tur in narcs.

ItcITvRGrcisa^!ys-(?. LatinisGt. imcn, GallisChitn-dtnt. SunrquiIfchzmonen- tiolib. xxv. cap. v 111. nuncupatum e(Tc putent • quorum fententiam pro bare non poff- u^-. Etmult6qmdcm aprius Ifchaemonishifloriarquadratedvidetur Milij genusillud fil-]^trc^ftipinum, inhumidifnalcens, folijsafperalanuginocobfifis, quodcelcberimus WniolusPanicum filveftrecappellare videtur. Serpit. inquit PLinms, c terra Milio fimi- lis, toll- * afferis & lanuginofis, farci tur in narcs.

Quod fi ad PI i nuii gramini ullum ahud genus referenda est hzc planta, aculeatum i U T T lud po-

Gramen,
Dactylis
Ficula.

lud potius <irjCLii,quod in cacumineaculei funt plurimum quiniijDadyli nomen in ditum
elle JicLib.xxini. cap.ultimo, &r illiusaculeosconvolucosnaribusinlerijCXtraluqcfan;
guimsciendi gratia;

Talium.

RADIX Graminis,inquitDiofcorides,trka&:illita,vuIneniconglurmat, Dccoflurp
cjuicpotum, tormuubusedccur, Giunna:<lifficukacibus:calcu[QiacciacieAcicmait
comminuk.

Gramen amouKtccs,

Amouettes tremblantes.



Crtoim
Amsurtris.

EREJ.E ? *Ms et,4m Graminis genus inveniri dicebamus nonnullis Hispania; lot is
andis & fabuloffs, quod fupenon foJijs &Tculmis non valde diflim ile cR, fed pamculas hi-
bere breviores.craffiors, & numeroftiores, ejuftem quodammodo cum fupenor colon J,
&: radicem non nodofam & ferpentem inftar illius : veriim fibrofam potius & capillarcOJ-
Mminictiatn id graminisgentisobfervare & colligere Parifienfi agro, nonprotul J tjaet-
tubequana:, qu^rcceftexadverfomonaficnj vuJgo&&i Lesion fames, fecundum fe?
mitasfrcquenti/fimijm) ubiamfticisnon cbu».Jeift>Ced^m*urmtt ippclluut ,obpa-
nicularum, ut opinor J clegantiam.

Amouettes
tremblantes.

CETERVM aliud Graminis, feu veritis Poae, genus in omnibus quas unquam lufravi
Kegiombus,prata (ucccter^herba-) mulrislocis vcttics.cuifimilspaniculxferc, bre-
viores ramen & ab exortu latioresclummis culmidcpndent. IdGalli& ArthcJij ft"
Acrebates mci populares Amtwnnes etiam appellant ob panicularum eleannam, fed vo-
ccm /w/^i^/ad.jciunt/ad Altenusd.fFerentiam: quiaVel unico velplunbusciuscap'i
manurerenti^omncsejuspaniculKperpetuotremulifunr.

GRAMEN MOWTANVM SPICATVM.

C A P. XXXIX.

Pariagrami-
no genera.


ATAR>* »JJAuftriacisStiriacifque Alpbis, locijquemontanisnafciagraminisj^{gencti}
V icnpdinPannonicarum Stirpmm Obfervationibus i acduorumdunuxachi^{toriam}
codem capiredareconstituifle.

Gramen m-
tanum Jic-
caulium.

PRIMUM auresmLjltiicaptibusextradiccdigitaliscrafficudinis, hifda inrerdu &
tnhda, rnultifurtcnuibufibnsfupremaiparte fairlutaprodcuntibuscon'tare, quorum
ongulaproferrent fena aut plura oblonga, crafta& nonnihl carinata folia, CznohyWf
Ilius.quem vulgo Gramen marinum majus cognominant, folijs valde (imilia,infirate<lc
lelcinvicemampludentia, gufiuamrmicvloffacriufculo : ex riorum mediododranra;
lem,nonnunquam & pedalem exire caulicium, firmum,lxvcm, inudum & enodem, qui
lummo

Gramen montanum spicatura.

Gramen monoc. avena-femina.



Summo fastigio, multos florulas spicas in braccis gestos, herbaceaeque colwe prxdiroj proferret.

Inveni in montanis quibusdam pratis, duobus in praesens Badenfestiermas, miliaribus. Si-
Ailema uterain Flandriae manmistrquent rlcgrttmeminiflc^uam vul^us^nimemo-
a Jabcicur, Sudcnapellarcr.

E L E C A N S etiam huiusmodi batur Alrerum genus, quod ante illud tempus nondum

gustisque folijs sepi-
ti, fuminofadigtodcliiiiintin ten nemo bio ng.imquc&nutantern fpi-
Clrt), inlanugino (isglumis, grananude Aveixllmilimafcrentenirradix tenuiseftjmurtisq;
°olotigis fibris prxdica, iitigulisanrmanrcius ferpecs, nCL Sparcum & junci.

Nascitur (ccundum vias, in montanis umbrotis juc filvis Pannomz, Aufstix, & Bohc-
^•^femen autem lulio mense maturum observabam.

SPARTVM FLINI t.

CAP. xt.

F AM Primolibro diximus, Spartum Graminorum fruticem esse, illudque a Plinio Geni-
tam appellari huncrumus ad tunc calio Sparro, ne in pice Latmorum, a frutice difleren-
c> utt|uoj dunuxacherbaeftgraminaciafolia profceriis seiani; obcaufam Graminis gc-
ljbsubjmginius. Ejus autem variegata obiecta vabam,

j MMVM, quod Plinius dicit, numcrola^cnuia, juncea. viridia quae habet folia cubitalia sp, t

"S' tudini exeadem radice prodcuncia^u^ dum novella funt. laruifcula confpiciuntur, *''*'

^fiteriore patie canescencia Xucec fructu citempons Lontrahuntur & convolvuntur un-

^juncea, dura, Hcxibilia tamen, & margibus rima conjunflis, urvix rima apparcat, nili

gentius observet. Inter hae culmi exiliunt ipse folijs paullo longiores. qui Vcic&: iE(ta-

P^arvam arundinacampaniculam ferunt, nrnilipropmodum cura illaratione fiort-n-

Jt^e inde oblongum (cmen, umonnulla Graminis genera: radicibus nititur fibrosis &

P^finibus. equibus multum simul nascuntur plantarum contiguum modo. ut in crd um

j^^P^nta, fivc multarum firaulconglutarum plantarum cum Jus, duorum pedum /pa-

et illocciam amp l i i i i nambuoc Lipcr.


fed CCJUCns nascitur collibus arenosis inter Vain^&^Inj (al-Res to un) j i j s Baticz Locis: »

* Omnium abundanti Timcab iaiao Gramen foregn'i, five Bxticar Itoiiiibus, uiqucad

S^l n urbem, vulgd Mur^adiiatn, ut noa fine caufa totus illis tra&us vecenbus appe J-

Spartumherba.Piini.

Sparraherbaalcerutn.



Spartum
Citrkagt
if *r turn.

Spartum
Fily.

AIPOKUSH
t>u.tmi/>
,,t,t* u>.

SfMtibr-
**

K

Natali.

Abstr.

lura.

Iltus fir Spartan us campus, quoetiam nova Carthago, vulco CarUftia, J? .? [i] C O
connctur: li-x cti.nU a nonnitllis Sparrana cognommaia c(t,ob (parti (ut credit i1,01 >
agto nalcentis abundantiam. Nafcitur & C Valentino regno,acque illud quidem lup^{cti}orc

£ s T vco Spartum hoc,quod Hirp.inis,apud quos nafcitur, «iam nunc ^ r i d , c ^
iliudipfuniquod Plinmslib.xix.cap n.dcfcribit. Eodcmcnitnulu nuceflap^{ud} " ^ ^
nos,quofuit IMinijtempore. Namexcrudo&exficcarorapctesfeuaulia, ftonas,cor
ri!dent«ali<iiqiifuncsconriciitnt:corbesctiam LlhinquLbusficus&uvxp^{affc}.advei
tur,ex(partocoiitexti/unr. Scdexilloaquajnfartarlini.maccraro, deindciSccatoKt J
t>u.tmi/>»- calceatntignus, quodiptif/w^f^appeilanr, paracur, luncscciam&al^{rau}buo

ALIVD Sparti penus nafcitur M urcianori-gno,humidioribusprarfefim locn.ft'P
t«ncrius,cujusval(icaruscftufus, utquodrtorjfsauthujuimodioperibusconfctiedi » m ^
nificfidoneum: plurimusaatnicjusufijsincarcgioncacllincoslaccos^qu⁰⁵^risrub-
fternant, implendos, ntnosframinc utjlolcmus, qLOniammolliorcH-nuiorcq;¹¹^" ne fl(
qoaniprLmiimjpaiHcuUmferrebrem.&rpericarpioquodan^fiveniembranaccoto
io inclafam,Uti Narciflorum &L iimIJium fere flores. . . aQicS

Nj(citurcoden),quofuperius illudad rultaiJtilc,modo: TMnlAramenD^{atortius}

product: nam Martiokiisflonbus onuftumlcgebam.
I NCOLve «w^/^^^«vocant,ne(cioqoa<rotirarionc,nifiqn6tirottciliSfi
craffiore pannocannabino conredas, quas ipfi dtUrdtt appt llant, jutucntu inn-
iihifpartoimplcanr.

Sso tranfcamusnuncadOccanum^uivicinialiquotProvincixnoncarii l¹¹^ F^{ff}
licet non adt-6 uttl .id ea pnftanda, *f qua; fupcriota duo dixi cflc idonca, nonclt t
cjusulosprorfustnutilis^cfuolocodicemus.

S t ART VM igiturT:rtiutn,GvcOccaficum Primum.qnia nonnulliifialliJ.
uelocis&al)gg'bisullis(abubis)Oscocombicijicmvenitur:/*>»abin
bndns vncarum :quod Priori Hifpaniconon valdedifTimileeft, fe
dius, crunbuscorum.quibuspercöfagijercslincocrcisitercft, permoleftura:
cnitti&cutimpnctrantejusfolia.

Crefciredcm modoquofdpertora.rnapiuanierilatircipttEromJnismodo-fp
tern tertSecalu p>i;imbr: cjasufos utlatis luiscefltibu^ Be vaideconiorti5a^{lic}
queTpaigcunbus Icfcradicibus, arcnam firuorcmm reddaicollicstinaggenb¹¹^



Spartum Aufnacum pomatum.



facile marinis undis & fluviis cluatur, & facilius resistant rempeftibus, quoniam Oceano crebran

QVARTVM aurem orJine, five Oceanicum Alterum ja Tertio minimcdtt Fertotiplanra; forma. radice Tque sob arena condendi, lateq; fpargendilicndicjustamen fpica: breviores videntur & Phalandis potiis qua in Secales panicu Usimitari. Id Batavis, quibus valde faniliarc, ijrde' mqueufibusfc; rvicquibus Occanilum Pninum. cciam Hdm dicitur.

Sprutum hrb* 1111.

HiLm,

I A M fupercft nobis deftnbendum Quifi' turn fpartum, non ialocisaura marina amatis natu m, (cd procul a mari, procul ab arena & illisagenbus^ onrectiam crefcens. Habctvcrd id Folia pedalis logicudinis, gracilia, vihdta^ nncrora, planainin6, (cd quorum limbi tandem coeuntjunci modolxviacrcitq; fiunr, SpartiHifpanici fohorum in(W, quibus non multuabflmilia funr, fcdmiiiora & gracifiora: inter caculmi exeunt graciles. foliorutn faftigium non fiiperantes, qui fpicam ferut altjs dii Timikni, ledtribus autquacuorobiongiufcu lis grams, longaco[itorcaq; caudain(igiit!; duntaxat conftanteni, quar in tiodrancalm, im6 pedalcnnnterdum vcluti pcnulatn , tenuionbus alarum avis illius Mamucodiats five paradifi vulgo nuncupatx, pennulis fenne reponderem defmit: radix fubeftc mulnsca piliani: nnsgraminci(q; fibnscompQfiw, Hiuc i (parci radicts inlar.

Urit v.

li**r**I*.

Abumj hoc genus provenit in montc Badtnfibus thermis imminent!,cotaque ilia carenS montium qui inde ad Danubium ufque procurrunt.prxtcreaad filvulam Lachn , alijl- quacaptis&grarniricis locis Auftria;& Vngana:: fedumnium ubcrrime inVivario jllo Neapoli Auilnaca: urbi contiguo,in quo ubcriui la^tiifque provcnit.Semen maturum Iu- nro,vcl a Ixvifllmo aux flatu excutitur, atque cum ftiapcnnulapaululum volans, ubi de- ciditjilatim per graraea irrepit, & terra fe condit.

LEGVMINA.

D E S C R I P T I S *barundinaceis^grummetsaliquot^tr^i^but^nohisadlega- minA congener efque i l U s p i b e t d n d u m .*

PHASEOLIF.

CAP. XLI.

PHASEOLI vulgoappellati, muJtainveniunturgenera, Ientis ^obfequentibusfar- mentis,folio nimvcrorina&rcliquonarccndi modo.nonequidem Inccrfedifcrepan- tia, fed quorumHores,licet forma fimilcSj&Piiivi/lgansfloruxnialijColorcvariantj qini" pequi plerumque niveij interdum palleicntcs,nonnunquam etiam purpuralcentesj live amehyftiniconfpicntur. CeterdminfrutUjiiivefcmnCjrcnumformamquodaminodo exprimentc.& oblongis filiquis.five lobis incluftb, longc major coloris vanetas deprehcdi- tur. Nam anno M.D.LxxXH.narccbanturmilii autpror(usnivei,aHtnigri,autflavi, autex Oavoobfolctt,autpurpurci,aucamthyflini,autCKrujei,autrubri3autlar. eritij fere coloris, vcl albi nigris veins & lituris diftinEri,atque etiam cineracci ,& carnei colons,iim ilibus vc- nisinfignes.

Phafeolus eni...

Attamen prxtcrjamenumcrara gencta, aliquot alia,dum Vienna; vixi,obfervabam,/c- mincabamiciscommunicaconiilunacai nccancequamPannonicas obfervaiioncs fcti- berem mi hi coufpeda.

Phafeolus peregrinus r.

Phafeolus peregrinus r.



C A v L i s in Priore, ftatim a radjeeiu dff* quotobtongafarmentadividicurjenta, vicinosftipites&virgultaretiquorumPliafco- lorum modo ampledctia: in fingulis alister- na folia vulgiris Phafcoli folijs limilia, **atrio*** ra tamen, ex eodem pediculo nalcntia, <<- **tremo** (ut in vulgaribus) impari: ex ijfdem **alts** breves ramuliprodcunt, nmltisHjonbuS vulgan haud abCmilibus.minoribus tamen, albis, uvacin moduni congefitionulb • q^u busibcccduntob!ong^(iliqux,(culobi,vul- gjribus multo latiores, coutinenrcs ternos aicquareriiosfru^uj .pianos, com munibu* Phaitolislanores,albos, fcd **tnuhis nigris aU-** cults five vcnis,ab hilo inlaciditindem ductis **elcga** Jitiiimedpciclos.

V A L D E (erotina fuit tixe ptanta anno M. D.LXxvi.fenimea C, V. Gcorgio Purkif- clieto Pofonicnfi in Vngaria Medico pin³, no, mihipronorttaamicitiacomunicac^o **pan:** qu.\dccaus^ad frugempervenire no^u potmt. At ipfi **PuAirchfio.du** vixitA P^ caejusvori (naraad pergulas, aprico ^l edit. fata) fingulis anms maturum frufum d^u M^h h e i i e d n n d m & i x l x i i . q^u u o r t e . **quentibus egregieprovenerunt** a^u l i q^u i t^u . l i r p e s , q u a r u m m o n u j l x l o h o s d e d r u n t q^u m a t u r a f c m m a p r o t u l c r u n t i n i c r d L i n i c n a ^m **quos ad maturitnem pervenire P^o^^^** mabam, ob Solis radio^um defiflnm/ ipf^u nieam fruftrati hint.

T O T A formafnaicndi modoivugari haud differt Alccnnn genus: vaUc ^{ratiosa} *t,r,Tm.* it- r n j m habercartncnra,quxvicijjispertii'i.sfeC^adTolyont.cifque^{K.amll)} i i) " " o n g a t p e - ^{promentia, in} diculosexfoliotumfquxtcmperternajUtiiiTulgari, 'umut malcutu' hnu ^{quit}

Phafeoli peregrin! j. genusajterum.

Phafeolusperegrinus ir.



Phafeolus peregrinus 111.




quibus bini, quare nJ, in rerr* uiii eciam fenafunturflores. ex advci lo fempr fiti, vulgaris Phafeoli floribus magnitudine & forma rdpndenres, initio, dum recens apcrti funr, candidi, poftca vcrò pallefcetes; qQos excipmnt oblongar, & propndentes, utin vulgari, filiquifeulobi, quina, feptena, & pura interdum cadiflilima & quaii ex cboro tornata femina cotincntc Sj minora & cumidiora quam albi vulgans.

Iu jio florec, frudus Augufto. nonnijquam Septembri demii m maturuseft.

H A D E T & Ternum genus oblonga farmenia, ex fingulari caule fatirri fecundum radicem iplam prodeuntia, & in mulcos ramos divifij lenca, oblique fecomorquentia^ Si humi procumbencia, nil! perncis aut pedamentis fultincantur, qinbus fcfecircumvolvunt, rliquorum Phafcolorum modo: purpura fetir ea juxca alas, ad quas criam adnafcuntur crna folja, tminus amplafupcno- ris folijs, & dilotiore colore virencia, longo pctiolo inlixretia, qm ca parte qui fotta hC- tincet comi fao cum a farmeni S ihi Tet, ex ar.ro putpuralcir: flores in oblongis peciolis plerumque bini, r Dagni, Pjfi forma, forts ex candido pallclecc Sjin reriore vcrò pjrtt expurpurac 3erulci: his fuccedunt cotidem prxlongilobi. ccrctes, S^ quaficylmdracci, itiquibus frit^ us reliquis Phafeotis minot', Ain^ ytidis legitima: fru^ m pxni firailis, rubefcutis colons,

PhMtu (m)
nΓ(,,,n,



Scmineex Kifpanijiniiflbnatuseciam mihi hiePhafeolusanno M. D. Itxxvi. seriusquidem, utfri]ftijspicnam tnaturitaternnconfcquinquicvnt: proximo tamen subfcquoite anno (acus. non modo maturius flores dedit: ied cj us prarerea frullus ad frugem pent-nit.

fharttht
Jungo. 1111.

Dissimilis est Quartus lupcionibus. Caret enim irmgis illis (3rmentis, quibus ill* pT*tliti, iibicvi firm6quccaoleonftat, pedalem longitudinal) raro cccdtnte & Inbtvifliaiosramosdivi(b, ad quorum exorcucnfoJtaquidem ruperiorifimilianafcunttiriKrK* nuncio, Ted breviotipcdtculo inherentia, cjuinonpuTpucfcit, utinptoximedeftnpto: ped iculi ex alisprodeuntelongi^rartiufculi, firmi, binos etiam rlarcs. magna ex pane fuf tincnr. forma, colorepr*ccdentisflori (imJlimos, dcindcbiiioslobosi! liuscylindraceisfi' Jiquis paullo longiorci Sc teretes, in quibus frullus forma par, fed colore differens: nani ni- vi-u?eft, circa Inluai nigramaculainfignitus, Siquibufdatn nigris pumflisinterdum in U' ten bus notatus.

Satispra-coxliicff. necullispedamenrisgcg^urn (utdixi) brevi. firmoquffitcaulc- Crevitctiam hicmihi ViennaraiinOM. D. LXXVI. donatusa C. V. Rembc(ioT)0<ion3to S, C. M''rum Medico, quicjusfruLlumprxcdenteanno, duniPragicfcr, in, Arcis hot- to obrivavcrat, & legerat.

Idem frutlusctiamcxHifpanijs mifTLisfuitCatrarifcquenreanno, cum tertio genere, in quo tripUccm colorisvatiewtem obiervabanv. nam autiubetcibat, aut]allefcebatur, aut pulla nigredine nirebat.

Tbtfnlm
puy. T.

TEN vi A habec QuintumgenusarmentajexlinguUricauIcftadmproximè radicem tnafcntiajeaquevalderamora. cxvindtpurpitrascntia. quxvicinisparticis&pcdanien- tis (cfconvolvunt: folia ex eodem pediculo, m i n aliorum Miafcolotum genere, fempl' terna, longccamen minora. & Trifofij mocniant rhts (quodin umbrofisS: ubtregleban»' fcitur) folijs perquam finulia, ex atro vircnria, circa pediculum purpurafemia: Aois it* fpicar modum congcfi. magni. PiC\ vulgansforma & magnitudine ferc. toloris fiavi. inob- longocrafliu(culoq; pedicoJoadfoliorumcxortumprodcutenaft: uniur : labosnonob- fervabam, quia Bores duntaxat prodoxit ipTa planra, c6iq. valdc caducos propttr ads'cilif O' tia frigora: breves tamenangiillofque eftc intelligebam ab his qui confpexcrant, & \^criti aut quaterna rana continere, vixvero acci lebam arva erant admodum. Laburni gra- potius ex n ti non majDra, ueroque Hinen mucrone picrumque obtufiore. puJii coloris, feu ni^miubviTfecnics.

Pidlornullosloboj in hac planu CJtpr/Gt, fed Boies dunuxat quos in ilia

florente
vidit.

vidit: ipfaa uem quxi] Ud cderam fcmma, ocad planexhta \$cxprim «et, nefcf6 quaincu-
ri J & : i K - glij; c [icia inco quii ntra { upic maia f lo f Lini 'pic ad t fld
Piufeol. peregrin, vi. anguftifol.



ANNO aurem of } ogcfimoprimerupra mil- ^{Phafeolus}
kiimumequitigcnc Uuimii, ip(o Aurunino ^{f* n i m I u t t}
dunicx Angliart'dibam. elc^asaliud Pliafcoli
getiuiuidebam Colon'rt apud nobilem ma-
tronam C.V. Ioacumi Hopen, Præfidis Bel-
gicim Hifpania Conlilij viduam, (armcns
perinde atque (ccundam genus pergulas Sc
perciasfcandentem. ilijqucfcadvolvencem,
fed anguftioribus folijs, froctu vulgaris Phafeo-
li friittb minore & planiore, lubrubri colons,
(cmmenaru ,abil!acx Hi(pauis accepco *fn-*
zells *Gratel* appellatione. Id mihi erit Sextum
genus cu q' o' p' h' m' C. V. Reqibertum
Dodomutu nobis d. iturum fprabam,
cumhstelenbrem: nam ille haud dubicip-
kmptaatanad Fcagetn pcreniflc (Afervare
poiuc, quandnquicvn imfftemporis Colo-
mxvivebat: cdua tatnen rova fua Snrpium
H i i t o q u q u j a m j p p h h b a t . c o m -
feri illiusiconcdunaxat propo [Ui!Tc cap. vi.
l. b. n. Pemptadisint. ^m

IN luccmemifsiporro tnci Stirpioro apud
Pjiuione 5vicin 6fq; popu! usoblervatrum hi-
floria, lcx mihi naca func Vicimx Auftnxatia
Plialcoli genera, feminc pcrp^rc accepto, fe-
ptimucn rrancoturti ad Mctrujm: quorum
lufloriam prardiiiisflKJciemus.

MVLT A autem habet pmnus Phafeolus, ^{tf > » f' i »}
qui nunc mihi ^{Pr. I. Vi. >} cñtor dinc Septimus, farmenca
ftatim i radice prodeunc*ta, Pur^irciicriani, fi-
ve in ordine PriLniPhafcolimodo, qua:, licet
cadem ration i vicinis perucisefe circumvol-

^inr, non tamen adeo luxuriant. autala'afTurgunc. Ad ho rum nodos folia enafcuntur ter-
j¹* numcro. ut in alijs Plialcoh j; cncnbus, mult6 tamen anguftiora, Sexti foliji, quem Co-
Onix apud Hopen vidudmconrpicicbjm, non valde difHmilia: ex borum ahscmergebant
P'S'talis longicudtniscauliculi, parvostiores in uvxinodum con^ctos fufinentcs, albos
J*itio, fcd, UDi fencfcunc, palleicnccs: ijslucedebancplanarlatxque vagina? Primi lobis
f're pares, brcviores [.imen. inicio vindes, qux macur. c. hilvefcunt, feme'nq; continent pte-
tum, Purkircheriani, (l'u Pinni grams minus, fcd (imilibusct>loribus albo & nigro vjrium,
nunc; in longiru iinem extenilsnigns flrijs, nunc confulb ordincfpatsfiiacu! isnigris mi-
j«iDUsaut minoribus per univerfum phafcolicorpus: nonnunqAam intc^ro fru&u n'gro,
vel exiguis albis maculis confperfo, aut dimidiã duntaxat ex parte. Flotebat mihi Julio &
^u gurto; [I'inenetiain m. iturum pncbereincipicbai Augofto.

AL T ER. feuordinc Ociivus, piunbusetiainfanncnnsafrurgir. ejufdemcumfureriore ^{TH'^}
^{lon} & iudjnjs, qua: vicinispahs (efcapplicant, & cosfcandunc: ubi (cfe in ramos dividunt ^{f'}
sdnafcuntur folia Primi folijs (mTilia. tcnianumcro, fed paullo mtnora: florcx alispro-
*rtaiml'uikirchenani, fcu Primi flt) nbuslimilc<;, albos, veru {l. irepnllcicnres, uvarin-
^arnaft. entes: quibus& plana: unnc ppxcedent, fuccducvag!na; , il]iftiaudmajores, coiv
^Octices bina, rerina, autquaternagrana, plana, fuprioribus magnituiiinc rcfpodenna, nc; n
^acocandic3ntia, lcdcoloreinterdumcxatbercente, aliquindoni^ricannbusfirgi: lifc*
CQndiini longitudinem, velcontusenotaUjinterdum totoctiam pxncfruclu {uc in (upt-
riote) nigricante.

TE RT. Vi#, rivcordinc Nonuro, acquirebam femine, quod N V. Ioannes Boifotex ^{Phafeolus}
Hi'P'niaceperat, mihi communcatonarum: eratvcroisfructus Purkircherianoma. ^{pergrin. 1. 2.}
Or. fc [itotus albus, nifi quidam radi] fpjrii varium quodam modofccfientrctrt creditum
ict. aen. p. odijr. crevitque Purkirchenani inftar, fiinilibuslarmentis, folijs, floribus & Vagi-
næ (fd ciim xLLs (iiblequerrtur tardior, humidior, & frigidior, neque hie, neque alij quos
leveram Phafcoli exotici. ad fruj; em pervenire potuerunt.

QUAR TO, mihi ordine Decinio, multicriat>runtabunaradic* afrjrgencesrami, fupe- ^{Phafeolus}
rioribus quidem altitudine æquales, & fefe circumvolventes, ex vindi purpurafcentes no- ^{pergrin. 2.}
?oli<c>ncicuUu, quibus adnafcuntur (olu Gitavifolijjs familia, (ccundiim uoicnar'ticu-

ladones qurfcusconnexafunCjpurpurafcentiajexaliscetiamprodcunt digitalis longitudinr
ramuli,ftofculo« (upenoribus magnitudine & formijrelpondentes.uve, quoque jnilar cor-
gestesrcrtntes,fed quorum galca feu cafnsobfbletcurpuiafcitjbinalateralialiafolia.coJor
lunt floridioribus fuccedunt plana, late, fulca & nigricantes vaginz, femina continens

Phafol pe-
reg. 22.

plana PmkirclicrianiSjiive verikoloi ibus Afncanis mmora,per matumatcm proriisnigt.
NON diilimiliahabct C^uincus, five Vndccimus^armciica^lteeetiamanurgentiajfimi-
lia folia, & r]ores in d igitali bus ramulis uvx modo concertos ,paivos, Oftavi floribus fimi-
ks, aibos; vaginas Septimi &c O&av i generis iobis iimlcs, iq qui bus femina terna aut qua-
terna, plana, diluta rubcdjnc prxdica. que nigris venis five radiolis feennum longitudinera
diftn&a I unt, nonnunquam magnis vel csiguis nigris maculis confuse aiperfa: inccrdum
unamutrinqueprorlus, vcl, alteraduntaxat ex patte^igrajemicantibusiparfim parvis ru-
bentibus maculis, ut ex marmore aliquo ~~cruxidq~~ tornata videantur.

PtnftA.ft-
icET. XI.1.

Sextus, hoc est Duodecimus, nalcndimodo, & reliq]isfcfenotis, illipromni
fcime limilis: fed cujus fiores Dccimi floribus valde iimlcs, paulotamendiutiuspurpur-
fentes line: fhidiusaurem magisdiluta rubedine prxditus ,icgubrumqueco!oreni qu-
dammodnr«ferat, qucmrara; pcr longi [udiiicmnigftfftricevanumfaciunc, a!iquando* u-
tem p]urima^tocumparncatrumreddunt. Hocgenufmihinarum, feminequodcounirtu-
nirabat C. V. loacluimis Camerarius luc Wta: Rcip. Noribergenfis Medicus pmarius; rc-
luituafrullex Hifpanijs mifio. FlorentautcmfrudLii^quepiofcrunt'odcmremporc.

ffmitl. ft
reg. 21.1.

H v i c Septimus, hoc est, ordine fervato, Decimus tertius, addi potest, Decimo, fermen-
tis, folijs, floruit color & forma non dilimilcrqui tamen fuccedebant lobi, longiores, &
t]uali tyluidracci, non fufci aut nigricantes, ut illius) fed per matuntatcm, mgrjs dtmoxat
venis confuse f]axi> infign ici, oculo, noVi m aut plura inccrdum continentes ftmina, rents
quideni for mam expr. imcntia, fed longiora, tu midiora, atri om nino & fplendctuis coJoris.
Floret paullo maturi]s fupenoribus, camob caufatn fL-mcnfacilius admatunratempei*
venit. Habcbam Francofimi hunc Phaicolum natum icmnc ex ItalianuflbPbafcott
xehiopici appellatione.

Phafol pe-
reg. 21.1.

ILL I nonvaldediiUmilisO^ravus^cIfordinerervatojDecimusquartus. milnLugtii-
ni BJtavorum rras anno M. D.XCV. femine ex Itali3 acccpio finull appellatione, ob ngr**
dinem, ut verifimile est, vel forfitan quod ex Ethiopia prima ejus origo.

L o-N'e A vero Slcnca habet hoc Phafcoligenus farmcna. reliquorum generurflin-
ftjr. quibus j]pcticis & pcdamctis fli adponantur) iecir Gumvolvir & innititurali' oqui a do-
tnrriuajUr. hujaii procumbant, & fe fpargant: ijsinnafcentur folia numero terna, longopcdic
u [oibfixrCtKia, Dtin vulgaribK Phacotis]& ejafdem cum illis amplitudinis. Dervofaj
in farr. euto Tum nod is unde produciunt folia, nalcuntur oblongi pcdicufi, in quibus fl^ofl^o
bini. quaterni. fenijnterdum etiam oc^onijcxadvetro ut plurimum nafcentcs vulcariorn
forma, hoc est, fionspiilinllarpxn<; forman. colo¹ rspiirpurafcentis, (cu vcrius amarthift-¹¹*¹¹
<iutbus fuccedunt to(ii/emo[>longi, terctes lobi, inttio viritics. dcindemacurate flave^^7"
res, in quibus bina, terna^uina^cna, vel triad oflona grana vulgarium quidciii foriHS¹⁹
referencia, fed minora, & coloris, quandomatura, nic Ei.

Floret cum vurganbus, **telctiam** aliquando paullo maturius.

Phafol pe-
reg. 21.

S E D eadem appellatione Nonum. fi veordine fervato, Decimam quintum genus *accf*
prtbam tHoiplbanno. aDodiffimoviro Bernardo Paludano, quodctiam **inibi** natum, facie:
quidein &: forma nondffimilc iam dcrLTipr.o, (cdcujus farmcna purpurafcentia eflent,
terna ilia longopcdiculo^nhxrenna folia pro parvis appendicibus, qua: in **alij** B generibus,
bina interdum roliola adjun&a haberent, flos ctiam magis fatur, & priorius amxtlnfti
lobi prxterea intiio quidem virides. fed paulann purpureum colorem contralicentes n aw-
riuccrantom purpureum (acurum, &: fcrnigrijm: frudus inip]jscomprehcfus inriopu*
purafccnSjdeindcatriomnocolois ut prxcedens: cam obcaulain vcrexthiopicusnun-
cuparipotcft.

Tbmfut. f*.
t' tr. xvi.

H v IC addipotcflDecimumgeriui, quod, fervarainftiinuferic, Decimtmfex^{tun1}
ciit: cujasquidem lobumnoncon(pcx, (e'd ipfum fiuflumduntaxat fuolobocxcmpW^
annoque M. p. xcv. ex Guinea dclatum, qui a plerifque llo ipfo anno cerx crediri, n^U J
tKcnim communicatus fuit, uni Cornelio Mannio, pix mem. Pharmaeopaco²². lobent
ad fpecuhymbolum .crevitad palmarmaltitudnrm, cauliculofatis firmo6ciown^
binasque aut ternas foliorum alas protulit, in quibus, ut reliquis phafeolis, ternafolta,
valde crafla & d **pineuia**, longc'que minora, trifolij aphaltitis foliorum magnitudinern n
excedcnria. Ipfephafcolufcmuncialcm magDitudjncmnon fupcrabat j]atiidcnfus &c
fus^olorisfu/cicumlpadicocommixri.

Nomina:
Phafol Pe-
reg. 21.1.
Phafol
reg. 21.1.
Phafol
reg. 21.1.
Phafol
reg. 21.1.

P R i o R i s frugum Purkircchus primus in Pannoniam inferebat ex Neapolitano^d ^
g^r todclanjm, fingulisque annis colebar, uti ltiis (ut dixi) genus iftic conlcrvavcrir: carij
^*ufam, apudrcilierbaria: illius regionis lludio f6s, Purk-irclicncognomcn indituni, * ut
i (wfcotus Putfcirchrianus nunciiparetur. obtinuii. Antemultos vero annos flinlci^P
ncjnghi mJ Tum memini phafeoli Afri, ania⁷ pellatione: & cx Afrkaiulos primuoiacc
piffe, verifimile est. Alter ex Hifpanijs anno M. D. lxxxj. milus *fraxela blanca de Guatimala*,
hoc est,

hoc est, PhafeoialbiexGuarimeIafqiznoviorbisprovinciaeftjnomine, mihiqueadem annocommunicatus. fubJepuenievcrerjtuscrcvitj&adftugcm. quqdairmporcperve- lit. Proxi ma duo genera ex Hifpanijsaccepracum hac infcriprione*aiui/aa de Indiai,* & eft, lobi Indici: quam etiam habueruntSeprim us & resilluiofequcnr.es. Qu'mtusinihiPata- viomittebaturadociiflimoviro Bernardo PaludanoFrifiopnmario tiuncurbisEnchula- nx Medico,tunc vero ex Syria & Jsgypro reduce,atino videlicet M.D. LXX VII I. femer tera committcbamannoillutninfequente, fed cum fcruisprodijffet, non potuicommode ipfam plantain abfervare • Tctaodcmuuii pofttaanoē fcminibusconferv;itis&:teniircre- ditis, natae alise plantx, quarum una Septembri menfe flores protulic: quicalonsino- pia ad frugem pervenircnon potuerunt: Jioc femer a Paludano accipiebam *dvdu^of*: at deindeexIralia^Egyptijciphafeolinomine (ImilemifTum : &L forte Dolichuscft Eelionij libra 11.cap. Xix. Obicrvatiouum . Sextuna jamdixicxHifparujsmiirmn/j/s^M GHAIH inferipuonc.

Alubiasde Indias. Phafeolus sicut. Dalit hut Bfinny. Friiules Guatcli.

thafeolus pefegriniis x 11 n. Lcblab.



AL i v D porro Phafeoli genus cum Quinto mitte- bat idem Paludanus, cui *Ltplap* nomen inferiptū erat: fed nec turn tcmptois.necpoftca aliquotiesacceptum & terrasoportunotempore credkum nafcivoluit, K- fpuensforte rcgionumSeprencribnaiium frigidiorcm aërcm. Illiustainifbcum fuo femine vaginam feulo- bu tt exptiini curabam, ut Leftoris oculis fubijecrcm. Brevis&lataerat.quycrnaque granaoblongiufcuh, nigra, hilonihilomin'isalbovaldc longoprarditacon- tinebat. Dc amo dcinde pQft ar*to, accipieba Lugduni Bacavotumab Illⁿⁱ vita iQa^m^incentioPiidlo duo Lablabganera a DofniTimo Profpero illicomuhicata: unum videt i d d d / i l i t e- rumrufum, -^f

Ltplap.

LA BLAB aurn, feviPharcolinigrircocfnifftPro- ipcr Alpiiuis libro de PJatuis^Sgfpti, capit^cx. i>hsc vcrba.

Es T arborfarmentofa. quxcrcfcitadvirismagnitudincrfff, farmcnn'fcucyitismodoex- ftditur.ac expanditur fojhs, figuniquc fimilis eft omnino.Tulgari p!<!afeolclW(jlt>ferc bis in anno, Vote ac Auiumno.phafeolorum flonbus aliquateriusfi"miles, a quibusTiliqu^ lon- S^iinltirque fabarum latilTima: cernunrur,qu5 iemina nigra phafcolis plane (imilia conti- icnr.qnormn alia nigra, alia fubrubraccernuntur. Ha!c 3rbor vivi: annos centum, & amp- lltis [*difficilt trtdtntjs, qtipba?toloritm &ieouinum fiatulram norunt, prafrtm mihujUt ^g/pturn non vidt, non to tamn tn\$Li:ts , (ilvtfirts plerafque rtfjiibils tft , viviquit rtdice alt- 9**' Annu ptrdur<irt\$ngults tttmen^jrum farmeitU ptrtunt ad radUtm^cr ftqtuntt ncv4 repul- </i>r]perpetuoque-virct. ^Sgyptij phafeolbsillosincibo frccquentant,nortrifquenon mi- nills guilmfuavescxifhmc. Mulicres utunturdecodo cum croco adexcitanoosmenfes: pr*recauttlceftadtujfim,^:di(pna:3m,&adurinanifupprefframmovcndam.*

Ubbb trt. tytn Alpiak.

CETERVMLondinoaccipiebumclcgantiilnnumqucdamPhafiolHutarbitrorjfruauni *IacoboGarctovuoIiumamHlnio^ujusiconcm &brcvem liifloriam" propref venufia- ^e>i & rancatem .Lcdons oculis fbbjccre volui^r^fertim ciim *Phaftoii tx Indu Ormldi* wfeitionem habior.

Phafeoius peregrinusIndicus.

PhafcolusIndicusaliCTjMatca.



1? autcmPonticanucepauliominoreftjinmediotumidior&pulviriatujzvis^plcn- T^s.durus.folKius^oaquatUbfidcnstCxumapatte {quanimirum (iuevagina:autlooad- j*^) vc|u|, diducln &:hianti ofculo lupernc paulio clatiore & aquilmo prarditus, duobus a Uri Caxatcoloribuscoftans:fupcriGrenimparsabelatiorecro(tcIliparte,quaillineaadaltc- ^Wremittatisinfiniaiafructupartemobliqueduai.totautrinqucatracft.cbcninigre- ^^^nitorc.infenorvero.oinninoaurca.cuiaJmixcumfitpauillilniinij.Gvepfafmatu. J?^Ti^aiaurcicolorcm refert, & lit altera niter. Ejuspulpamdcfcnbere oequeo, ciim con- ^nJIRCrenoluo:in,utpotcquiunicusfit,incerreliqioscxocicosfrudlus etiam fervandus. ...H v i c mCfn ranflimofrudui.altcrumjcu i Matesinferiptiocrat, adijccrcclibuir, licet miusmcisuiGarciamnotismeminrim, &mterpregrinosfruaus<iecimiim ei beude- acriinLV^Uoniam u m c n c j u s p ^ u u meo judiCio ftfic ptobcxptcfla noafuit, rucliorc hoc

n. Alpiak. t^u^

Mara.



Lupinus fiavo florc.

loco adponere volui. De varijs autē Phatiolis alij5Cxottcisvclabamiciscommunicatis,vel meo arre redemptis,no5, Deo vicam tnbucntc, i nter fru&us exoticos, quorum bievent dcriptionem meditatur.

LVPINVS.

CAP. XLII.

L O N c o jam tempore Belgicisiiorti?ID* quilinafafta funt cria Lupinorum genera :unum videlicet lacivū, quodiuaquamccraro, utamarirudinē dēponar, p]er5qucna' tioncs vclmicur, ucVlymponeobfcrvabain acthiopicamancia, &tcnuis fortune honiincs, & vulgo in medicii ufum cedit: bina alia filvcdria, quzpequevefcalmr, nequcaded frequenter in medicum ufum rccipiuntuf-

Sati vu m non nifi cultum vidi:Silvc(tnum. dum in Narboncfi GaUia vi vcbam, alterutn genus, id videlicet quod cirulco efl flore, m' noribusq; folijs&fruftu conftat. interfegctcs non procul Mompelio ultra flumen Lcdurfl fpōtē natum obfervabatn: quod verō flavurn Ji J bet flore m, cu in q. odorafu, d un tax at cultum inliortis confbexi ob elegātiā & odoris fuavitatē. De illis porro non efl miht nunc fermo, quandoquidem ab alijs plcn/que tradiracdcorum hiftoria. Iconestamen fubjccrellibuit, quia de quarto quodam Lupin* generc agendum roirtelt, ante annum M- P- scv. anhi non confpefto.

Natum id fuit Ltigdunt apud Batavos fcminc peregriaccepto J Crevuqiinaibiu Iemjutn iajore multitudinē Xatis firmo fcapo^ in raras divifb przditum: cui, ut in alijs Lupini goenbus, inhziebanc folia ex uno longo

Pedcul*

TtukLmpi-rtoti % tint*

tit (am: I it



trnfini*-nm ml.

minc peregriaccepto J Crevuqiinaibiu Iemjutn iajore multitudinē Xatis firmo fcapo^ in raras divifb przditum: cui, ut in alijs Lupini goenbus, inhziebanc folia ex uno longo

iculo dependruia/cptena aut plura, moltiora tamen, quam in eo qui flavu profert flo-
 tn^paulaeciamlatoria longioreq; lanugmeobika: florextremucaulem &:ramos,trib-
 bus,quacuor,autplu^buso^dlnibusambliUIU,vc^cicil)acim,aucoron9l:tf^ in orbem dif-
 'fici. quaterni&quini. ijsquialbifunt, fciCEqtiales, fed coloris ex cacruleo purpuofcen-
 &ekgants: quibusiucccfTcrunrfiliqux nondifpares vutgarifarivo, inquibusfruclus
 a nun ininor,vcnim alerius coloris Florebac Iulio mefc,femen Sepcembn macuru fuir.
 Cum anno M. D LXVC Lufitanid per Biecuriam in G'ranarcnfe regnum cranfirem. memi-
 ni Fcbrufirio menfe agros Lupino conficos vidcre, cujus rlores albi, aliqmd cxrukicom-
 mixtum haberent: anhujs tueric generis ji. ^{gnoro.}

P i s v M filveftr.

CAP. XLIII.

Latlyrus filveftr. Dod. Clym. Matth.



NEc farmentis, nec folijs vulgaripi (b, quod in arvis reritur, multum difFerc: numcro (a p^{um} / J^{ca} -
 cnim & oblongae Jicadcm radice profert farracna angulol Jftriatu-jfrau^contumji-j^{ca}
 M^s foliademdc Lncialia. mcmbranacea. -virtidiaic, binafc mper, modohincni odo illinc
 iplafirmnta ampieclenria, * quorum roedioalacxr editur quatuor aucfcxfoliorum con-
 tr'anofempLT[]cunafLcnUuni, quosincaprcIoos, quibus refvcicinis pUntis iniplicat, defi-
 nitirum mafarnicntaii mulEos de inderamos dividuru^ quicxfoIiprumalis oblonga str-
 nueTq. **virgulai** promiinc. in quibus **multi** exiguicandicant % rlores fpica? infarcongcfi
 ^ **Icuntur Cicerisfil. Martlioli** (quod palTim in Pannonii & Aullria: inferioris pratisac-
 qucfecuiidi millorum. quibuscinguntur/epespontecrefcitjRofculisprfimilcssquibus
 c*cu(T5_S, rucccduntloIn pifi vulgaris vaginis paullograciiorcs. conrinentesgrana Clymeoi
 ^atthioh **fitrcLathyrul. Dodonacigranumilia, rufca, ingrati** faporis, meoquidem pala-
 to. qiiicrudispifis autfabis nunquam^cfiroli^ niiTadix lignora. nigicans. minirnidigiti
 Cr^{af}udincni interdumKquat, 5: tcniiibusfi Brisdonatacft, pcrennis, & (ingulisannis no-
 va^a (irmentalonce lubicrram (crecondentiaprofcrens. antequamgerminent. —

Primiim milu colbeaa est hqcplanta ultra Dravujn flunicn in Pannonia imcraDi (cujus s
 pars3Bintnfcjrr((«6nuiicapacur) iugisarciGreben vicinis. anno M. o LXXIX. copioseinter
 ^anarcnsundepoftealll^HerosBatdufardcBattyau. quimeincamProvinciadcdi.
 xerat (**nara ejusea arx crat**, & pagi aliquot vicini) macurum fruautn raihi adferri curavit,
 ou*plcn(queaniiciscurninBelgica, tUmalibiviven[ibuscommunicabarn, Subfequentc
 =indc anno alii s locis Viennx vicinioribus obfervabam, vclutt in filvofo llo monte **fupra**
 •umpoftkirchen, **item** fupraPofoniura ad Danubipm, & in Leytenberg. Floret Iunio,
 t^cnmaturum est Iulio.

Clymenum
if jin (C):C
Lactyrjil
Dilobus,
Ervum /st
CtriU.

SPONTE etiam gramintis locis ficcioribusque Pannonia:, Auftria' & Sciria* prans in
scatur Clymenum Mircluoli.live Ladivrus (j).Dodorm,velErvum iacivum Cordi.cuju
duo genera oblerjabam, latirphuin, & C angustifoliuiii; illudquidem in Auftria duntaxa
hoc vero Francofurtensi ctiam agro.

QuiJ verò (U Clymenum Diofcqui iioffc (icfiderar,confulat Plancarum hiftoriam Fa
bij Columnar.

OROBVS PANNONICVS,

CAR. XLIIII.

ER vi i, five Orobi nomenaputi reherbaria;ftudiofos obtinucruntaliquot plantar, quòs
perPannoniaSjAuftriam.Snriani.aliifqueProvinciasnafcentesobfervabam, &ane
njncdcfciprasuncmincra,ciimiUaruniiltoiam proderem. Eam hoccapiterepctemui,

Orobui Pannonicus i.

Otobus Pannonicus n.



O'vil EJ
mntimj U

Mvtros habebatpriorcaulesabunradi'ceprodcuntcs, pedafcsaurampliores, »^{r*}
mos,er ftfids.in o quibus hinc inde fparQ funt oblonga & pennata folia^{e*}
lenis,oclonis aut pluribus folijs, aut vobus, aut vobus, qui congcronatis, oc hinc in vicem
pofitis, congefta: flores in furculis ex alatum finu prodeuntibus fpicce inftar nafcentes, pili
aut vicie florum axillos, coloris purpurei elegantiffimi, deinde ubi evanefcere incipit, ca
Tulci: quibus fuccedunclongicylindracci Jobijfufcijinquibus fcmen rotundum interdut¹¹
& ex ig b h i f g l o j on bu ai um d q d i o n Juro o ' i ' i' aut v
plerifque ejus generis: radix vi vax eft. longa. nigra. dura, per inccrvalia extubcrans, f
& ex larcnbus novos ftolones (ingulis annis produccns. Totapknacrimonia: cujuft³⁽¹¹
parriceps,

Orolus P
mentat i i

ALTE R A tenuioribus & gmcilionbus confabatcaulibus. rjrmistamc. cubicalibus. iP'
guloiis, & in multos ramos < Jivifis: folia alata funt, hoc eft, fcna, oclona, & in rerdunid^{cll}
unt cortsinhi Tentia. Superiorts folijs longe minora, & Lenticularfolijs haud majora¹ *
nella. vindia. guftuamaricancc & calidiufculo; flores cx rrioribus alis numcrofi. log¹ *
n bus periolts inlixrentes ^ uprioris floribus forma fimiles, minorcstarocn, purpur^{3le} en
colons. qui vctufate in exrulcum eciam commurantur: lobi (unt longi, mgri, coruincn^{cf}
oblongiora majora ^ fcminaquam habct fuprior, ^ ibfu (ca, & iTiacurirate iiii^{lcr} *
lientes atque fccntorquentes: radix dura. lignofa, fibiofa que eft, in diverfatendens, v^v
vaXjfc linguis annis pi u res caules pr&fcrcnj, Copiofe

Copiosenafcurmirm montana illaiilvaLT/ceubsrfgupra Mandrflorf, firmiliter fiupra
 feJchnj&roinnibjrnnoncanisiUisiilvisqLiadamfr zic productis Danubio adAlpe, va-
 ruf icca Pinnantaclocis. FiorencApriJiatgucecidiaMaio:femen autem proferant Iunio.

Orobus Pannonicus in.

Orobus Pannonicus mi.



G a A CUES promi: Terciacauliculos, rci3: os, flrmos, angulosos, pedales & cubitales: Natalis.
 Ka per innervalla. unicods inlixrentia, quaierna plcrumque exadverb fita, creda, an-
 i(14, triumfcicularum longitudinis. guftualiquanculuaado inicio, deinde amanurcu-
 nuHis capreotis pra:dita, qu6d caules. fatis firmi. adminiculis non cgcanc: flores in longis
 Icuntur/urculis Tpicjinflarcongefri. riorum prfiau vlc mforma, fcni autoitonijcandidi
 coloris: dcinde oblongi lobij nigricanus. prions lobis pares, femine nigro, interdum ctiani
 Haculofo pleni, qui per macuricatcm cum ftrepicudnifcentesfcmen abijeunt: radicibus
 iititurqujnisaucleenis minimi digtclongicudtne. craffiu fcuits, Alphodeli, aut Paronis fe-
 iiriinoris. oblongisbulbisfcrcfamilibus minoribus camenjforisnigrisjuutis albis.
 ciiicunmgaacopia in pratisonprocul Walterfor^Maurpacli. Medclingj & Ther- Natalis.
 iisBadenfibusaU(lrij: viqiiiis, Obfervabam etiain non cofisu Ura Danubiunilocis, ad
 vcluarum (ilvarutn margRcs. Floret cum fiiprioribus. fcmenque perficit Iunio,
 Q V A R T A, abunawdice prodeunq aliquot caules. cubitales fixati recti, folia alterna-
 tum proferen: cspennaca, quaternisfolijsrai: isamplis & mucronatis conflantia (quibus ad-
 l. if C[urati quaniioirix trem; l alaquinrum) vindtibus, perqux aliquot venxcratifverfim i
 ^cdiotiervocxcurru. fubaCLdi quidem inicio guftus, ledpo(leaaniariufculi: flores ex ala-
 ujn firm brevi petiolo iniiiten tes prodcunt quini aut feni, antrorfum fpeiiantes, viciac flo-
 (bus noji dilTvniles, albo coctc prxditi, qwibiiiisfuljolufurfunj reflexispalje frit, odo-
 *experces: lobi quales in primo genere refere, in quibus Tcmcn fufcum. niajusquam in relt-
 ^Uis g"neribus: radix [iimmcvivaxclj fcdprolatofrudtuprcircfolct^ucflerifque Lcgii-
 ^in encribus accide.
 Katam li. hpEjiic. nnu Auf triptimum in vcaicbamjncnifi in Alpibus illius Provinciac Natalis.
 nate in dcdi: Ka, & thorcum tran(jata, altero anno flores mihi protulic Aprili, SC
 Mno, dcinde le incn. Anno vero M. D. Lxxix. obfervabam Maio flore mem maximacopia.
 in ei Pannon n pine quae niter Dravum Sc Savum eflrumina in Danubium illabciitia,
 que q; ob eam t. ufaai Inccamnis Pan[ionianuncup3tur, iamontequodat« iilvotb Gre-
 ben arcu vicino.

*E CYNOM porro genus in Bo/gic's hards alitjuando Vidre mcminij &c Aphacse no-
 VV i minci

tninearei herbaria: ftudiofisappellari. Quartum autem ad Phafeli filvcefris, aut Viciz ge- nus aliquod co rumode iefern pofle exilii mo.

CETERVM Orobihiftoria, mihi inmemoriam revocat du as alias rtirpes, qua* femine ad nos hacappellatione Vencrijs priraiim miflb, in Belgicaprius, deinde Vitiuix Aufln* funt »atar: qui quoniam a nemine adhuc detcnpta; cranr. illarum hifioriam, Cap. dc Oro- bo in me is Pannonicaaim ftirpiui^ Oblctvatinyibusinlcrebam, quam codem capuc hit, eciamrepctimus.

Orobus

Vencus.

Onobrichis

Dodonari.



Orcht y'l •
111. 1.

MVL TOS excademradicePr. orfonditramo^pedaks. angulos. & fldingulasfolia- rumalafjmoddinhanc. nuncinaltcramparteminflexosjiujn'iquucupliirimura^iftufos: foliainfingulisalifqtjaternaautfcnaunicofla: inhxrecia, bina(ernpercxadverfofita, niit- loextrcmoimparcmnutncrumfaciecc. OrobriPannoniciprimi folijspxncfamilia, (cd di- lute virentiarfioresoblongisvtrgulisex alarum cavispK-dcuntibusinna/cunrur. numernfi, - incomaminflexi. pufilli. quatuorfoliols urrcliquoriimJcguminujn floresconfntantesJioC eft/uperiorclatiorelurfumquerefixo&expanfo. binisrnJnGr. busadlatera, quartoinf' horc cavo. &quodammodcartnato, colons purpurci; oblongi lobi, mucronati, vicix Jo- borum parne«muli, totundiotes&: magis tercccs. maurirate ruferecctcs. fcmcn continent orobaceum. oblongiLfculum^lbicantLscolorisiradrxdurajlignofa^multisfibrisindiver/a tendentibusdonau. vivaxeftj&iingulisannisrcqucnciorescaulesprofert.

Orttut Vi-
tilt 111

AL T E R A dunraxat differt a prarcedente foliorum & lamomm color. qui ex viridi pal- icfcit. & floribus quip Torfusuntalbi.

Florent Maiomcne, cum atijs plerifque^fdem generis.

PLV R I M JE porroalixflirpcsad Leguminum&familiumclafTcm pertinenrej, ffonta per Pannoniam, Aufiriam, Scirjam, Moraviam, Bohemiam, alulque Provinciasna/cef¹¹ tesobfervabam; quarum licet fit ab alijs proditahiftora, nominatamenreccnfeich^ locovoiii.

Onobrichis
Dodonari
CUxJttur
it Urn •
Pannonia
Dodonari
Austriam
Xm»&

Gramineislocis. ficcionburquepratis nafcunttir Onobrichis Doc?cra; i, rtir Braban¹¹ ^MitruncntcMi/linguavernacula, idcil, Criftagallinacca CPgnominaiur: Gbndciterre frce, five P/cudoapiosDodonaci flore purpurco odorato, alia ci congener lurco f5oc A¹¹* thjllsleguminofaLobclij. cujusgenuapurpurafccitc floicFaratiaameinuJtosanijos^* cipremcminiiC Y. Alphonfe Pancio.

Glaux vulg. Glycyrrhiza fit. Gcfncri.

Galega vulgaris.



Infilvi?, pr, itorum mar (finibus umbro {is, atque eriam interdum in pratis apertis Fecnum Fa»um \$Tt. scum fi Keltrc Tragijfi W Gefnen Glycyrrhizaiilveftris: Ciccrfii/cfirc N-atthio H. cujus ^1, T"fi' antem cmin L. exilicandicanteflorej folliculiflumentibus, in quibus exiguum feraen: & fj, St/*TM. Galega vulgaris, quam nonnulli Rucam caprariam, Fracaftonus Onobrichin appellant Q«i/t (qiojiomincejits femem nobis ctiamcx Hifpama miftruni Seplanta nata) fed hxc om- ^1'''^*/ "um abundanciffiniectefcitu Kei' Muram & Dravum fluauiiu, paullo fupracorumcoa- & i' i* TM, t. fluentes. tU,

ASTRAGALVS.

CAP. XIV.

Q V o N A M hanc plantam referrem, diu multiim quae apud medicos abam: fed nuL Univctenbus defcripami veniebam. cujushiftoria illi per omnis quadrarec. Ciim vcr6e Tutelgalis, & icmtnicx recentioribus, quod fcircaj cognitx, ante quam Stirpium Pct Hifpanias obfervatarum hiftoriam cvulgarem. operx precium in c'afurum turn puca- otn. fi illius iconem cum hiftoria, cap. de Afragalo fubijcerem: quamiimilicapitunc rP«o.

C v B i T a T e S autem. SC ampliorcs funt illi Afragalo (cui primus ordine em) cauks, im I, minimi ferdigiticrafludinc m^ quantes. penragoni ^j vean ^ulo fi. durij fubrubi He Sj & C lanuginoli: folia lanuginofa & incana. in longacofta ex adverfo femper inter felcoppofica, veluci in Vicix & Cicris folijs, i; MRupriniim adftnngente, dcindcfervido: florefcopioli, L^u pifiaut Fabx vulgaris flonmixmuli, fecundiitn oblougos ramulos ieu virgij sexuala- m finu prodeuntes nafcuntur feric quadam digefti. albi omnino, fed ante quam apenau- ro tor & xp! icentur ex lure foris iigtcaites: ftiidum ferredicicur (nam florenrem dunta- xat ob fervabam) in lobis Fafelom' in ori Dodonx fii Enilem. qui ^uftjctis. taucet ^s ^ lin- onctorqucat: cum anno M. D. XCVI. accipiebama Dodiflimovito Si- guam inflammato- mone de Tovar: radix, profitirpis raagn Ltudinenmplifiiijia, brachialis nonnunquam cra- fitudinis. p mans s vero longitudinis, deinde in binofant tres ramos divifa, foris nigra, ru- d & lignola ingrati raporis, quare fa (33. comuduritie fit perat, S^iintuscandida. dura, & ingratu ingratu raporis, quare fa (33. comuduritie fit perat, N. Hulf, ' . Pfirmim lunc plantam collibus quibusdam fupra Vlyipponem, quos Tagus fluvius al- J. Ult. in cer vepres obfervabam, arque menie Decembnemebam anno fexagefimo quarto I^pramillcimum & quingentelimum: deinde fub exitum lanuarij in fequentis, filvolis ° es non procul Hifpali. dum Gades pro Hic fecrer. flaientem inveniebam. Allibea Gae ravaucillo.

^VSUAN Alfd vocabanclixtici aut cifl, Cj» r4i'4fl < //w, hoc eft, Cicex exile.

V V i

Si facul.

Afragalus Bzricus.

Afragalus Mompellianus,



Jpuynam
Arumt-
Arumt-
ita.

Afragalus
ii.

Natali
Diefi.
Chomabr
Lentis
Afragalus

Natali.

Gnrbruk'u
TUjt
H-rva Je
S. Lautcoio,

Afragalus
Mompellianus

Sifacultates, quae ex ejuſtempoeramento coherari deprehendere] cct, non rFragaren-
tur] cgin noum Afragaluro efle cenferem, cum cujuſhif totiaplurimis noris conu-
mr. Videtur porro ealfe. quam Amatus Luſitanus Apocynon facit, & Luſitams x^Airmocoes dt
M», idcft] LLiptnoſcaninos vocari air.

CETERVM Afragali nomine, multas plantx hodie inſigniuntur: null? tamen, meo judi-
ci] ad Dioſcondiſdeſcripſionem propniis accedere videntur, quam illacujus Inſloriam
nunc dcdi, & alia quam in Cantabris, Helvecciorum aipibus, atque etiam Pannomcis ob-
ſervabami ramulis aliquot ex unaradice prodeunctibus, gracilibus, intL-rduni furreſſis, ut
ptunnum autem procumbentibus, folijs Cicens ſohorum inſtar in ali ordine diſpoli-
tii, ſed rarioribus & longioribus, nec nambicui cracis, (cd valdc ccednubus ad Oro-
bi pnini, praecedenti capite deſenſi folia: flore Viciae aut Ciceris Bori fimili, ex ca-ru-
Jeo purpurafcerte, cmfuccediuu lobi Arachidii quibus Praepares, in quibus Lmen conti-
oerur: radix eſt tuberofa, nigra, dur3j cm propagines adnalcuncur iarmentitijs radiculis in-
harcntes, illi Gmiles, fcd minorcs.

Na&itur in motibus, quos dixi, vnto per flatis & apertis, & earn flcxiflimo, quam Fa*
bius Cotumna, pro legitimo D]o (coridis Afragalo, exhibe:] inulcu in diſfl: rnce in a Cha-
m5 balano, feu Glandibus terrcſtribus.

HiſpANialiam quandam plantain proponebant Afragali quidem facultatibus reſpon-
dentem: led forma radtcis mimme. Natn tamctfi puiilla habcret Ciceris aur Lentis foliaj
to t a n p a c u e s. d u a r o s j & i n e l i s f l o f & i n s p i d i f i u n a f i i l o s u l f i l l o s. c o n c
llos & purpurcos, furamis ramulis in hirenr. es: radix ramcn. ur plurimiim ſingularii, &: nul-
lam afnuitatem cum Afragali radtcce habens, on: iiiinci repugnabat.

Creſcebat ea in vinetorum Bcarvorum margibus Cccub vias, per Luſitaniam Sc Hiſp**
niatn. F]orebat Aprili.

DOCTISSIMVS vir Ioannes PIaca, Medicus & Proflf Tortn Valcntina Hiſpanix Aca-
demia, Onobrichin eTe cenſebat, diſcrſpaitamentu iſtoria. Luſitam Hervtat. Lanrt»^
nuncupabant: arq; icil] ius in libanoliccata: pulverem, vulneribus & u]ceribus: i]itcri^{di}
ſpergiaſſeverabant.

Illam aliquando alrcm emini in horto, dum in Belgicavivcbam, una cum Afrnga*
Mompcltenibus vocaco: ſed ilia toto triennio ante quam ſlipium in Hi(panijs) ſob Jci^{va}
tarum hiſtoriarapublici juris faccrem, perirrat. An altera porro adhuc perdurr, qua^{cr} JL
folijs ruprioris quidern folijs p. cneirnilis, fed rntis in canis, ma]iſculiſloribus: curvis*
in flifhliſidliſti]ibltundiu
lum, radice perſimili, me latet.

Vicia per Pannoniā, Auftriamvicināque regiones inuenitur Vicifiluestris genera, alijs Provinces eiam communa: duotamen tue obferuafiea bicror. quia U-

bi videt no imcmini.

Vicia.

Viciafd.alboflore.



MvLTO5 excadem radice, quiprenniseft, protert Primuigenus ramosteretes, uiafos, pedjles, etiam cubitales interdum, quos anibiunt fl> liornnala: quemadmodum ; n
ic'a vulganlativa & c filueftri, led dcnfiore lanugine obduflr, Scquafi incanr. capreolis,
S^ibus vicinogramim (cimplicat. extremamalam occupannbus: rloresin fupermsfolio-
um alis term plerumque Vicia; vulgans flonbus perfimiles candidicoloris, fuperiore ta-
ftipn folio, obfbleti colaris venis mternediftintto, inferiore roliolo cjutdem coloris: flori-
bu; (uccedunt filiqua; fcu vaginae planxfquantum videlicetex illarum rudimentis colhge-
clieur, nam Maiomerteflorentemanno M.D. LXXIX. duntaxat obferuabam] vicisevul-
gwis filiquis fimiles: radix fibro laaft> tuberc Lifqueut Leguimnum plerstjue radices vi-
*accs, donata,

Vicia fl. al-
bo fl. frax.

Na(citum inarvis defertis apud Chytregoppidum Magf viri N. Bamfy, in Pannoniafi-
tum, olim florens, ciim vcro itaciter facerem magni ex parte exuftum, Siobcontinuas
Turcorum in ea loca excuriones, omnino fere defertum, non procul a Ktta fluvio.

Vicia fl. it.

CvBiTLiBVseIlaltercram! S, (tnari5, lentis, infirmis, & humi^nilicapreolis fefc fufi-
^ancpror'-ii'bentibus^bliqucnjodoinhatiCjmodoinalterampartem. fecundum folio-
Utn a]as, inrlcxis, ^qibus frequentes plerumt]ucramulienalcuncur: foliori]m3la: oblon-
f*, tenuc5, Heorfum incuruacfeu aucaaces, ffl in binos capreolos dcfinenres. duodenis. vice-
ms, vicenis lentis, aut pluribus interdum oblongis angulifque foliis turrectis, & ex aduer-
fo nunc aequaliter, modò inaequaliter nascentibus, praedix sunt: flosculi elegantes, fuperio-
is floribus forma non difpares. minores tamē. & Onobrich'dis quartx flosculis propemo-
um refpo[it]itkntcs, colon sexca: ruleo purpura {centis, viceninon nunquam aut plures. fpt-
^iriftarin oblongi nudis ramulis. ex fupriorum alarum Gnu excuntibus^afcuntur: dc-
ir> dcuncialis longitudinis filiqua; ecxiguu mrcmcn connnefs: r^iix tenuu. Utclcrpenj,
*cfubteliu refecundens, fingulis annis novos frequentior Tqueramos profert.

Vicia fl. it.

. Pa(Tim in at;ris & inter vepres, illis fc implicans crefcit, per Vngariaro, Auftriarrj, Mora-
Viam Sc Bohemiam. atque Maio floret.

Vicia fl. it.

VNGARI cum ruperiorem. tum lianc fquacpturimum I Belgica vepribus fe implican-
te differt) atque denique omne filueftris vicia; genes, Waryw berfe, nuncupant, hoc est, cor-
nicis pilum.

Vicia fl. it.

t

CICERCVLA ÆGYPTIACA.

CAP. XLVII.

Cicercula Ægyptiaca.



Natalis.

Ad P. G. Cicercula Ceteris. P. in ceteris. d. in S. a. L. y. r. i.

Securidaca vera.



Securidaca regina.

Securidaca alba.

distincta, quemadmodum Polygala

NEC est folijs, ne uecauliculis, reliquis-
 vc pambus a fanva vulgari Cicercula
 valde differt ea, cujus historia hoc capite da-
 Tvmlbniunanicauiictilos babctinfirinos, & jji
 niii (iustineantur, hiimiprocumbctes, iniqui-
 bui hinc inde bina adnalcutur ex ad vclrb fita
 toliola, e quorum finu prodeunt oblongo
 p'diculo inrlxa bina alia folia angusta &/ur-
 ivchi, ac tandc is pediculus delink in capreo-
 Kmi nonnunquam mulfidum, quofefe vi-
 amsberbis & virgultisimplicat : floseuani
 l.imvc ifon non diflimilis, fed color diverfus,
 qu la qui in fativaalbus, in hac interne clegas
 cltesruleus, foris excincracoppurpGrakes: j
 qifodeHuentcfubnafunturm longistcmii-
 butq. petiolis alatavel fapernepinnaririli-
 c, i q tea lobi, in qui bus bina, cerna, rare plura
 coniinemurgranajdomefticacterculatgra-
 noru magnitudine, inarqualia, frequentibus
 nigris macults infignita: radix, ut incjufmodi
 ftirpium gencribus, tenuis, non vivax.

Primum mihinara esthareplanta Vienf
 AultriiannoM.D LXXXVII. fetnineinjfg.
 pro ledto, *: Conftatinopoli miflb. Florcsc
 lte Junio & Iulio. atq. cciam inScpttnibrem
 ufq: (emen mamrum fuit Augufto & Sep-
 tembri. Natametiãarbitrorplen/qucamis-
 cis, qutbus (emencommunicabam: nam SC
 Francof urti fmgLilisannis provem^flores m-
 llii & femem maturum produxir.

Græcis porrò vocatur hoc legumen A*
 Supra Lathyrus Plinio & Columella, Cicercu-
 la, (facivam intelligo) Galli Ctres cept*
 cc, ts appellant: Panficfes quoui. igroabun-
 decolicur, dtsSan, An veroquam dffertbo
 ea est, quam Bellonius cap. xix. lib. il Obser-
 vationum intetkguminarcccnfet, & aGrar-
 cis vulgo Laiyri appeltan fenbu ? cercç ip*
 appellacio ad Grxcam alludic.

SECVRIDACA. CAP. XLVIII.

ALIVOT plantas in meis peregrina-
 tionibus oblervarc memini, qux no in
 commode, mcojudicio, ad HedifanlivcSc-
 curiducx hiftoriam referri po(Te ai bit an.

MVLTOS, atque oblongoscxcadem raj*
 cefundit Primacaules, liumidiffufos, viri-
 dcs, friatos, intus cocavoSjValde ramofbs: fo-
 lia alata, cniultisfoliolis, c6jugatim, & arq*
 li, contranotamcn, litu unicotfeinliarrenci-
 bus, con(tantia. ibloextremoinipan, Hcdy*
 fan legitimi folijsperquam fimiha, aman /a-
 poris: e fingults fiiperiorum. florum alts, ob-
 longipediculiprodeunc, coronam flofcuto
 lulegitimiHcdilari Horibus forma iimiliu'
 grav]te'rq; odoratorum fuflinctcs. non B & ^
 utilti, colons, (cd varij: namfupenorafoli'i
 carnci, uc fie appcllem, funt colons, hoc est,
 blande & dilute rubentis, larcrum ala: nive*
 & carinainfima, licet alba, roflrocftpurpu-
 reo. filiqu^ flores fibfcqucnrcs, non fiinc p<-
 na?, (ed tereccs. oblonga*, rofratar. internodij
 longiufc*¹

Sectmdacxij.prioripccies.

Sectmdacarii.alcerafpecies.



longiufculum, faporis non minus in mari quam legftimi femer: radii rancr^non arimaut
 s. fed maxiuc vivax &: fibrofii, longc Jaccque (ub terra fe condens, & £ vicina loca occu-
 pan; atque eciam c tenuifllmis fibris renafcens,
 Vu Igacifliiaahicflp cruniverfiiu Pannoniam, Aaftriam, Snriam .Moraviam arque ***
 ohcmiati.cdm in pratis.tum in agris.Scicciiduni vias. Floret lunio, mteidum tora etiam
 te: fcmcd mnrurumefl !ulio& Augufto . Vanatcttaminterdumflotucolorc, qm vtl
 totus candidus e:ft.vclcxalbcfcit,ve) jntcufiuspurpurafci *

ALIQUANDO nobisin Belgicam miflumfuit IHijasfncicn,G3lc-gcalrcrLisnominc,cum c'x'ga
 qua. (iliquarum facieduticaxataffinitatem babec: mihittultisnOtu Hcdytaium feferre "4
 ^eturjcxccpciscorniculis&rfcinine.quar.utdixi.plananon (unr.
 o apriusfordtanHcdyf.indcfcripnoni convenict caplanta cujii5.iconcm Sfdcrcri-
 ptionem c imafijsftirpibusa C.V.ThomiPeanxaaccipicbaai, quam DiofcoridisSecu-
 ridacem ell- tpiecealcbaci

CVB ITA 1.1 s.cocftL',e[lp]lanra, autalrior, mu'toscaulesramofosabradicclignofa& *m' d'era
 perenni emitcens.foluqj babencicccris modo (ccundiitn oblongum nervuni bjaaim dil-
 lo fita, uno impari excremitatccjastenciHC.cicerc minora: florcbin Cummifcaulbus glo-
 ^ratim cohiTnceSj excandidorubentes: iiliqu, ifufcico!ori5, fecurisformaniquanno5
 > 9uif: vulgo appellauiosfangltcum eft vocabulum ^/AoBi/^quopuratoriarn fivcarbora-
 1° falcem exprimunc) probe referentcs, velcultri genus quo nolln& Belgici fu tores uti
 'Cnt:lingula;liltquxunicum (emcncjufdcnfiguraronnncnr.ffjc fee*tt»epUntd^uam
 muwciifa\dtftbtm, (iltqtutl n*»»nmjvam tsgierfs effe, & fupraftcuriculamftu fal-
 cem illam) alium itr tic alum Uttgiortm obttatrt, qudm txtftmd fuptrie > is fiiij Ud htocctt,
 > oiumnicontaidir<rt>ta"/J Totaainara. eft. pr. i: fctim fitiqux& femina.
 CrefcercacibatagroGencvncfinonproculaPonte tremulo, inter dumcta₃ nufquam Natib.
 alibi ipfi conftant.

Ad p' d'era
 fitGrajcis, Hcdyari & Securidacc Latinis difla:c]a{rem fecerri pos- ***<<<<
 f: ^rbitror liasplantas. N'jlliuftamenrcmenaptius vctrom Tccurim mco jLidicioreferr, ~ d'era
 q' im ejus qu^ abotnnibusHedyariJ legitimum cclctur, & aliquot locis inter feceres ff>on- J' d'era
 tcnafcerem irl meaper Hirpaiiampcrgnationcobrervabam, quam obcau(am ejus ico- " d'era
 icminitiocapitisliujusprxfigercvohii. Nam infraMadmium (ccuresvisicrc cicmini, Securi hi-
 b) x liu^ femmielFenc llnilltmx, nempc in ncdioquamaubriumtraijeicur, beadapta-
 jer*flioi:cs,fc uuinque in planani acicm delineates.

ad Ficulum flumen fituni paullo fupra quam in Dantfbittit fc
 iiny!ulare p b m isin^uliiicisduntaxat cruciifloicntes Ma,
 atquebieoniopoit
 In hortum cranUre, Maio emra florucmnMtquetotarfeincepsffftate^Auguiioteirien?
 fed.Tgredmodum protulerutit, mmium videlicet propert-eaducistnignaexpar ic flori-
 bus.antequam in (iliquasfonnari pofcmtjipaplanta, uticonijcib, hjxuriante^ran;^!
 lolpimgdcme fc linniditate
 Onobrickis mi.

Onofaiikk



Onobrickis.

Qv A R T A multa folia prom it abeadcm
 radce, Lencicula;autTragaca[hafoliJ5prt>
 xima,uni fimiliter colhe inhzrentia, mollio-
 ra [.iun-i),vimlia quidc illa.fcd fanagin e qua-
 dam candcanc publcctia, Lenro pi m m m
 g^t^> ^cindenoniialljunainaritudinemre-
 lmqucncjpoilremo lriguam vellicante: m~
 (cuntur nicer foliorum alastauliculi fere do-
 drantals.fupinijCXiles.quadam lanuginc oh-
 dudi, aliquot flofculisonufti, vicia:Glvctf>^s
 aut kmiculsflorum magniTudine,colorc^x
 cxruleopurpurafcnc: quos exciptutifjl*
 qua: pufi Urge minis ccUuiiconlbntes, fc'
 nmic (cju^dcuro adhuc imtnatum flct.
 probe nonpotuiofbecvarejplenjc: multas ex
 c d m d l e f u e l n g i t f u c u l a q u e e f t .
 & obliquasfibras agit.propagines & ramulos
 dodrantaes,humifulos,inlareraemittens-

Crefcit in fummoSneberg jugo, atque in
 Etfchenlummisfcopuli^quibusduobusl^*
 cis fli-^l-mc & filiqua*jam formantem cruc-
 bam Augurto.

Ntc minus forfitan rata erit,quam Bn^0-
 rticaannt M.C.LXXXI. peregrinarione, L⁰¹¹,
 diniin dodilUmi viri loasinis Richxipbaf
 macop^i Rc^ij dorto nafcentem videbacUi
 addefcript:uum huccapite fljrpium clifleni
 proculdubioreferendam, ciim proxime a^
 Qiiartum genus accedat.

Jmnilimaetenim b.ibcbat folia, mollia,in*
 canalanugine pubefcentia, ut Tragacanthae
 legumae folia, & eodem modouni coflxin-
 hafrentiajqiiidena&plura.interdum cria¹¹¹

vicna qitina, unoexrrcmam coflam occupanxe: caLilit uli tatnen in liac oblongiores funj
 fufirocorticc cGdt.lenci.fraclucotumaccs.rmmifui^&plcrumquenudi, quiexrcm^pa^
 cc frequences ramulos filis alacis folijs onuftos profcrunr, & in unciali villofoque pediculo
 mulcosflofculosincapuc&globum cnngcftos,Trigaca[itbxrloribusproximQS,candi<r<i^m
 tes.deindemembranaceasilliquuIaservilitquulisininoreSj&Dorycnijvtilgaiicernuritu-
 parifiveHiipanici valvulisparsjfungulanafeminafocnogrxfomiliacontinenics.

Florbac Julio & c Au«u(ti inino: (cminc deinde Londmo ad me miflb & terra; coin tn>
 lo iurx pUnra,qus feliciccr & Mores & Ten en infequente anno prorulcrunr.

A nullo autcm defrtpcas fuiffe has ftirpes exiftimo, ante quam Plantarum in Pannon^{l*}
 vicini^uc Provincijs obfervatarum hiftoriam in lucem emittcrer: nec cciam aomen vD^{ln}
 garcullu'n autfoculutesa rufticisvelaltoquopiaminteUigercturn Itcuit.

Si quis verotion inter Onobrichides, fed inter Afragali congenresplantas, praefcni^l
 duo pofremagenerajCum quibus magnanj fimilitudincin habere videntur,referrc nial>^l
 Afr3gali funto; prior Alpinus, alter pcregtinus.

G t A v x.

CAP. U

» r V L T A s plantasGlaucisnominejaRccentionbusproponij&clcfcribinonignorO^l
 J V 1 nullamtamenadhuc(mcoquidemjudicio) magisadGlaucisliiftonaniaDiofco^l
 detraditam^efpondentera vidercmetnini^aquasameliiccxhibetur. vhat

Glauc Dio

TERNIS autern³vclquaternisaradiccairurgiccauliculis,dodrariternalris,gracil'c) ^
 incanalanugine pubefcentibus: folijsferiequadaoifecundumcoftxlongiitudinem v^{im}
 qucdigeft¹s,tiv^calafohoruinillosvefticnccOnobnchidis, autAfragalipnorisinmD^{*i}^³
 mollioribustamcnjfulpernc vircentibus, infvmecanalanugincobfitiSjguilunonmn¹⁰flor

Afragal.
 aquiu.
 Afragal.
 pegrin.

GlauX Hispanica.



Tribulus terrestris τριβουλος Thcop.



10: flos extreme cauliculorum fastigio innafci-
[urconferrus. capicuh. fpitarvc breuoris & obtu-
fuiiftarj Glycyrrhize vulgans riorum forma,
& c colore perquam timilis: radix candicans eft
& C exihs. quaj. an vivax iir. aflcre nequeo.

Nufquam enim alibi, quam ad ripas fluiuii-
nis Thormis Salmanticam allucens. paulo in-
fra cam uibem obferuabam, nomine vulgari
carentem, niefte Iunio; verum is locus procul
a man diftac juxta quod Dioicondes Glauctra
nafci radtt.

GR* cis j- W^ perind carque Latinis GlauX
appellarur hxc pUnta: qua: appellatio, li qui-
bu(dam minus probabitur, p^rciicfant quartu
Glaucem Hifpa Hicama Cliiionuncuparitan-
ti/per, donee magts aptum nomen iuenerit.

DIOSCORIDEI porrò Glaucem cum hor-
deacei faring, (ale & oleocoqui ait in forbitio-
nc. ad reuocandam extinfla laftis ubertacem.

TRIBVLVS TERRESTRIS.

CAP. I.

HERBA eft Tribulus terrestris, multis vi-
nculis gracilibus, hurmifratu, pra: longis,
cubitaibus plerumque, quas frequences nodi
diftinguunt, prxdira: quibus adnafcunturalau-
folia, (cu numero fafoliola unioftxinhxren-
tia, Ciceris foliorum inftar, qmbus valde iimi-
lia font, (ubacd guftu cum quadam adtrifjio-
ne flores ex fingulis folioru alis nafcuntur long-
ictiolis innixi flavi, Potneillx flonbus (ot-
iua pares fed m mores: frt. Sus eji Wq uinque pat-
ritodiuifus quatuor autem ipinis fingul^ di-
fnra: qu2 gibti* & dor(b eminenti funt, con-
ftant) (ub folijs latens, in quo totidem fcmina:
radix interdum minimi digiti trafit uincin
xquat.

Ad arborum fcnicas, in quibus M elope po-
nes Salmanticx (cruntur, frequenti flime pro-
vL-iifcteni rpericbam, hortulanis valde mo-
leftum & cxofum, quouia iiii frudus cut (qui
pec macuncatem faciledcplai: aaejdit) firmis
accdispedei illorur nudi graviter offenduh-
I tur. Florbat iflic Julio, lemen vcr6 Augu(lo
& Scprcaibrin)aturum. Meminietiam olun
Mompcliano agro obfcruare, Tub ipfis fere ur-
bismccnibus inccroliveta.

E i s E autem hanc plantam Diofcoridis V-
CoA» ^i w« 7ov, id eft j Tribulum terreftrem, af-
firmare non velim: fed op cime quadrare vide-
tur altcri ex terretribus Thcoplirafco delcri-
pto lib. vi. H iflorix Plautarum cap. v. Tffijii) vi-
deticcc, tametfl hie non fie valde prarcox, locis
falcm quibus fponce nafcentem obferuabam.
Hifpani abrtys appcllabanr.

SALMAKTICENSES ejus decorum ad pituitam crasflosque Lumores incidendos & eva-
cuatvdos felici fyccfl'u clvftcrbus injci ptxdicabant: ciim camen Galenuste iteam Si 6v
gidam qualicatctn Tribuioterrefntnbuat, Dioicoridem nuairum (ecutus.

TRIFOLIVM SPINOSVM Oecicum.

CAP. LII.

T> Ro R s v s novum & f legans eft hoc Trifolij genus, a quo flrprmm qurr inrcr rifotia iwffl**
rccnferi poflunt j hiftoiatu aufpitan volu^ ius: ccne milii ante annura nonage6mum ^/
XX utitium

Tnfohum fbinofum Creticum.



Medica legitima.



quidlibet.

Centipeda.

Diocoridis.

Medica legitima.

tertium supra aiiudimum & quingc... m non confpedum : cujusprinmin cog... tioncm acceptam feiodocliitiroo viroPe... tro Spehrerio Rⁱⁿⁱ Si IU^u Elcdoris Mogun... tincn(:sMedito, quiejusramum, brevcrn... qudcem , fed (ecundum radice ni refciiTum, & pluribus aliis stimulis rapiti/m quif ^ flo... nbus&rcapiiulis onuftiub Augulti finem, MoguntiaurqueFrancofurtumitrebacpaU' loaiKeirieumexearbcdifceflum. quem in tabcllaligncaftat]incxpnmicurabam, ut hk-propomtur. Nata aucemerareaplanta Moguntix in R^m* cjusCclfitudinisriorto, feminc ex Jtaha quidcm mi/To, led Crcta accepto.

H v M i autcm fparfa fuerat in orbem to... ra planca.tcnuibus ramisquadrangulis (qui frequctibusgeniculisxvjndipurpurafccn... tibusindicraiu) pra-dita, adquxuriinque iabi oppoilta nafcebaniur tcna foliola inn pccilooblongiuculo&: piano inhxrenua, ang. ftrid a cu a, vir. ia, mucronata, ro... mmcncjbus jn fitigulis nodis feu geniculis, quaruorfpinuti5, bin is fupernc, totide infer... ielpctlantibus: m fingulis ramulorum alis nalcuncur fingulares flores, quioque foliolis conltances, colons purpurci, anagalJidis Horc majores, quorum medium occupandcecfH ftaminulaflavoapicpraedita, capimlojntet ca latentCjquod [epons fuccifj, in quinqc angulos five pinnas formatur.uc icrr-cam c)av... am fqualcm avorumnollroriixtarecqui... tes geftare (olebant, & adhuc Vngari geflac) (peciem quodammodo referat:cadeindecca... pitula, incurvatoptiolo fub ramisfecon... dut^&matura, in fingulisar.gulisfcupinnis, unicum femcnconcinctjplanuDi, nigrum... qualisfiiejusradix^clatctinaracum unica cfler,ei qui ramu mitcebac,nacap]anca,eruC' re noluit, Tou autem -yamnuS'<<: eft, & fte' quentri Ha s ramulisprdxica.

Dircedensau[cm FrancoiurtO , nonnul a feminaabHonorio Belli c Crcta accipiebā, curante Mlufriviro,eodemq;criidiciffim o&c humaniflinioIoannc VincenuoPinello, 10- terqu^genusunu opfi7-o^ofTonomine,cq^o rerne commiflb infequnte Vere,nata L" g* diini Batavorum planta, illi, cujus modo hi; ftoriam rcripfi,prorfus(i[mlis:vcrum ciinK^ jeltare jn graviitinum raorbum, qm me fre r f t i i i d f i l i e f i l i u a n t i q u a n t i t a s p l e n i u s o b f e r v a r e n o n p n t u i .

SE D ciim multas notasTribulo terreftri Diofcoridisnon repugnances habcac (liceat quxlo liber&fine prajudicio meafinno- nem inmedm adfcre) harrcM. anlgitin^{11,5} Diofcoridis Tpf<<^ct ^epo'st'o^cfler, aut W¹ tern ad genus ejus abquod referri polfer.

MEDICA FLAVO FLOKE. CAP. Lin.

LEGTTIMA Medicanon modovarijs H<- fpann locis fponcc cretic: i'ed etia ple- niqucdiligentercoli:uriapccudumi>abulKm, (cdmaximccquorum, vice focm, u'tqut)"» propfC^

Medica flavo flore.



Medica marina.



propter ubertatem, singulis annis aliquoties de meti possit. De illâ autem nobis non est sermo (nam à plerisque tradita est ejus historia) sed de alia quadam sponce etiam nascens, quâ in meis peregrinationibus observabam. Placuit tamen legitiro iconcm LeQoris ochsettam subijeere.

MULTOS porro Medica, de qua nobis sermo, ex eadem radice profert ratnos cubitales, aut longiores. humi plerumque substeres, virinales & flexibiles; in multas alas divisos, folia cerna unipetioloinhaerentia, legitit Medica: folijs respondentia Bidorfb eminente, sed longè minora. flores in extremis ramulis confertos, alterius floribus forma paros. flavo tamen colore. non inodoros: cornicula decimie plana contonaj coroiculoium icgitima: Medicae infhr (qax perperam à pi&orc fuere expre0a) angustiora tamen quam ilia: inqtibus grana iaciva: granis familia continentur, fedpaullominora: radix kgirimacradicipar, cramfulajate sparfa, fibrofaj perenni Sj iingulis annis no vos caucis profert.

Nascitur tota Pannonia

& quibusdam Bohemisc. Norici, Franconix-que locis. Floret auge in lumo & Julio.

MEDICA MARINA.

CAP. Liiir.

CAVLE sive ramulos habet h?c Medica tres aut quatuor pedales, humi fufos & procumbentes: folia trifolij, aut Cytifi Maris folijs minora, in XCUjainuli Stomachosi lanugine obduunt: flores extremis ramulis in hirsutis suis petiolis, ex alarum finibus exiliunt quini aut leni limbo conferti, Medics; aut Sertuhecapanxfloru in fbrma, ccoloris flavi. filiqui deinde glomerate & contortifive inflexi, in quibus lemen continetur subrufuin, Medicxfeminiimilc: radix ralliufcula, perciinis (cu vivax. xcandido pallefcit.

Provenit iixe passim in Hispania & Gallia Narbonensi, ad Mediterranei maris littora: inveniebatur etiam in Oceani hntore, ad Tagi fluminis ostium, ad D. loannis propugnaculum nondum tunc absolutum & Caxcays, sub Olyfippone Decabri florentem anno M.D.LXtm. Floret alioqui arstate & Autumnno, & Cilibinde femem profert. Apud Belgas [ata, aquibusdam rei herbarie studiosi scilicet baturante meum in Auftriam abitum, longioribus tamen ratnis, neque adeo densa canave lanugine obduis (ut plerumque stirpes e suis natalibus transfats, degenerare solent) ferius ctiarn florcbat, & raro femem dabat.

MARINAM Medicam nuncupabam, quod MMu, Medics ciim fit flmilima, matitimis locis Meridiei praefertim oberfis nascatur.

Cum anno M.D. LI. in Gallia Narbonensi maritimis cam plantam primum confpiccerem: & legerem, parum abfuit, quin Helenium jEgyptium Cratvac Diofcoridi cap. de Helc-

nio descriptum, TJ mihi psruadetem: multas enim habere videbam notas. quoad Helenium illud a: co[anio Jr ipo Jiiti U^un tca^liculi intfrdur QCubitales, perfolum difruti &c

repentes, folia Lenticu Jc numero fa & rrcbra, radix minimi digitica flutidiriem aquans, pallidiulciila^perjmaccnui Sjtupernccraflfor^rtetereajquodinmaririniisnafccretui.' Nam licet Diofcondes corticem nigrum radici artnbutj in Crate\xt\cmphun6 invenin Angulara Jenbir, Nihil tamen in re dubiaaffirmo.

Zoolratti. CETERVM ^EgytjijHcIetijradicera in vino p^tam, contra (cipentiumiftusauxiliari tefhseftDiofcondes.

OXYTR. i PHYLON quorundam.

C A P, L V.

DVu Mompeljvvcbam, Trifolij genus cubiwle aut amplius^quodammoclofruti' cantoblerwate roemini ad Ixvani points luvnalisquj, id Grammontiam^jlvam iter . OxiiTtlyl- dfe, iff Lcdi Huminisripam, quodnonnul^XDxytrijpr^lloniicnbonij nuncufabant, aliqui £w>fA#7 J[-^{o:um} lilvcftrcm: nee det'ueruntqui niter Cytiii genera rcferrnt.

Oxytrijl- lvdapam.

Si M i Lt Mporm fereplantam (li non eandem spud Granatenlesobfervabam CUI N^A^11 tuudinc, & mulnsramisprarditam, pet quosiccuncium nodos & ramulorum divaric; itio- IHS fpairierancterna Temperfoliajuni pct!oloinha:remia: floresfijmn. isramisna/ceban- nir,pu*. 'lli, canJ: cantes, iiglobum quooammodocongelfi: quibusfuccedebantcornicula liye loin femenxiicrorundLim. nonnunquam oblongiurculum continctes. Ejusaufin otaiuxduplexeratgenas: unum catitiidioribusramis&ialbaradic: alterumcaule&ra- u i c x s l b o p u r i c i b u s, Cmilter&radice, cjuajcamcnin quibusflarnplarismagis robere videbantur.

Peregrina j'ainm.

Enzivat.

Itates.

Lfilwfiusi tafat.

Gratiatensis quidam Medicus Lagopumcflc volebat. refrngantibustamennotis. Ioan- nes Blaga Medicus & Profclbr in Acadmia Valentina (nam6c Valentinorcgnofrequen- cc'iiiodicri' aliamjPrempnanam Arabum vocsbat, camq; ciuplicem facitbai: prima, hu- midisnificnicm, Gran. ucnli !mitem: alterani moncanambnuginofamque. Granaten- fes M. iunr. Kii FnzivarCtu lingua appellabant, & cxutriufqueradic, quxf. itiscrafia, & magni? adfrutitionis particeps cit; pra; (crtini autem ex rubekentc, Icrapuim conficicbanc addy(cnrerum utile.

Hujuscemdc inde ex Italia mifium Lotifhnicoi nomine & nata: ex eo plantar.

Latom pra- fisftiptt

TRITOLI autem genus illud rercitibi" viticu Jishumi fparfis, florepifi pallido, fan'sma- guo, foli (<perpetio terms uni pediculo inhxrentibus, &: molli lanugioe pubefctitibos. ra- nusper viticubsfparfis. quod Moinpcljiani, dum ifiicvivcbam, afiliquarLim magnitudine, Lorum praten/^rnfiliquoruincognominabant, m3xinicrcqucnscfl in omnibus Panno- aiae & Aurtrii pratis: (ed Narboneni paullodunus, quantum quidem milu videbatur. Lotus liliquolus rubello flore.

Latom jll- quifurto- talo jitt.

Pijmra- lioax.

Lafilia rader.

Wzjzjvdr- tes.

Wzjzjvdr- tes.

Wzjzjvdr- tes.

Wzjzjvdr- tes.

Wzjzjvdr- tes.

Wzjzjvdr- tes.



¥J

ILLIVS vero genus inventiifrequenriorj- busramisprrdiwmjumiutplurimufufisjquo- v A rum ex ere nutates nonibil fesc atcollit, in qmbus litnc inde TpaJa (unz folia terna Temper unipe- . J noloinh^rtntia. n-iollia & quadalanugincpube- fcentia. ex quorii alis. bievcs craflflufculiq; oriun- tur pediculi ternis etiam folijs paullo minoribus praniiti, bnos ut plurimum flores fulVnetes, rio- rum Vicixsemulosxleganti colore pra;ditos, qui ad icricum villofum (aturerubrum accedit: ilhs fuccedunt longitifails filiqua; feu lobi, lupcnc Sjinferncbinis alis fa: mnagnisac (inuofisprx- diti, quibus reliccarisjlobi quadranguli quodain- modo apparent, granaqi ContinentjrotundajCt- ncracei colons, ptfbminora: radix annua eli, quam fubfetjuenshiems tollercfoler.

Noribergarpmumgenus illudvidebam an' no M • D . Ljcx IX. in horto Oellingcri pharmaco- pcci & aromatarij qusurhisripfcpifum rubrum nuncupabac. -poftcamifTumfuitejusfemcnLu- pinirubri nomine, licctejusplantaLupinopor- fusfit diiljnnlis: nonnulh Ttrpciyor & XoGov & Crt- TpstXotpov cognominarunt ob filitquam quatuor alisfive enftis pra'dicam : non miniisapre ratur <Bmfuy&i\$»vririTpt7rTfptv forfitan appellare hec- rect. Poltrenioex Italia milfuni aliquotiescju- lem en Siriddtdi appeilaiionc

CRESCEBAT etiamineju Idem Oellingerihorto Trifolij qii oddamgenus fatis amplis Trifstia
Ujsprop Satracexiguicate, quooiamagriis < 5cmembranaccisvcficiis quibus (emencuru *vtmrhm
ipericarpiocontincurveicanam appe llabant, etiam Mompclij, ubijn nudis & pstro-
luibjfdamcoliibyscuin Hyacjnr Ji waurumas Jimiflorea Jiqttoticictocre racrami. id
tea plerifque Germanix liortis vuigaie .adum.

TRIFOUVM KA-IVS.

CAP. LVI.

VARIA sunt Trifolij genera sed tria majora, spicose forma & floris eolote inter scfedif- rw/i/jm.
rentia pallim in Pannonia & vicinis Provincijs nascencia observabam.

Trifolium majus I.

Trifolium majus III.



PRIMUM tetnis, aut quaterni 5imcrduma/rurgii v Jrgis autcaulicui?fi, pedabhu s, fir- Trifittam
mis, redin, teretibus, circa quosnaicuncurrarafolia. oblonga^ngufta. durajnervofa , cari- nmjitt I.
nan, & Jorl behiore, ternafemper abunoexortu prodevmtiaj utinreliquis Trifolijge-
nsribu5, iacaiu, in ambitu vcluti dcntara, ab radicc frequenciora, S; majora: flores extremis
ram jlis^nquoscaulicuiifeparantur, inherentparvi. frequentesj Confeni, & fpicamquo-
tlammodo tor mantes, albocolore, & nonnu!loodorepracditi: radix vivax, minimi digiti
craslicudinem xjiuns. fufco Sc denfo corrice teflia. longa. aliquot fibris donata est.

ILL i non valdediffimile est Alrerum genus, vel amplirudine, vel forma: folia ramen
piulo anguftiora, & crador flofculorum, qui confestim nafcunrur, fpica, caq. fummo cau- Trifolium
mftftigto inhirens fineullo perioli veitigio, &: quafi inrcrfolia latens, cui plerumqucad- nmjitt II.
tufcitur alia brevior. rariffine ter Lia: flofculi verodiffFerunc cotorc, qui non albus est, fed ru-
ber. Si odore cujus funcxperres: radix. prioris radici ferè par.

M K i ORE maltocrcfcit Tertium altitudinc. quacpleruque cubitaliscft: caulesctiam ; Trifolium
lubrcraf Tiors. nodofos: folia ex fingulisgeniculis alternatim prodcuntia, longa, friati- nmjitt III.
que, dorfbmagis eminente & elato, laxaquadam veluci vagina in binas appendices defi-
iv: ticc, caulemiaiplcllentia, dc inde cerna numero ex eodem petiolo nascencia, fuperiori-
^Jsduplolorigiora^Uis tamen non minds dura, &: pcoras denticulara, guftu non nihil ad-
ftringentcrhiicfpica oblongior, &: major, eleganti (fi) tia, riibrorum flofculorum ccaliculis
hipidise mergentiur arcricomposita- radicem habet fuperiorum radici iimilem, viva-
cem, & (ingulis anni < plurc^caules profcfcntem.

*• Hujus generis alia est species, qu2 vel tuagaitbdinc Ycl foliorum 8c florum formã aut j
XX j colore,

Trifolij majom m.altera Jpeucs.

Natais.



Croffet
Cepollis.
Cytium
Tragi.
Lagopus al-
ter Lobelij.

Lubera.

Lagopus maxim us Lobelji.

Lagopus ma-
jor Lob.



Lagopus Ma-
jor Lob.

cotore, m^ovil, aut quicn minimum differt: falia tamcn anguffiora illorum longkudsncm all-qaar.culum excederc vt dntur, & floium fpica longiojefie.

I ^ E N i v J.V v R iion modoin Harn-
burge Pamioniat *mentt Jiii* ilii vicino Prel-
lenbery, fed aijs cbamP?iffionia; & Aulliz,
Stitaeque unta. *issouc* *issouc* *issouc* *issouc* *issouc*
filvis, (ccundum & cerciutn utrumque genus
pracftum: priora ettaui duogenera, ^B<io-
nibus ptatis Vienna: vicims, turn p^ores in
MoravtS & BoliCnn!: Florcat M^oio
& lunio.

T R A G vs Tertij generis *rtctto Cf* *eciem*
CjefTa SpftHoe/ hoc est, fflagnum hiici Atn t<-
foli um, & Cytiru in appelUvit: Lobelius, ahc-
rutn Lagopum nuncupate videtur. Dceo au-
temqucm Lagopum maximum vocat, pro-
ximo capicc Deo voIcn teageiaus. Vngaripor-
lo vulgare Trifolium *to here* appellant, quia
cquis in pabulum ccdn.

LAGOPVS MAIQR,

CAP- LVII.

Q V t u Lobelius Lagopum maximum
vocavit, Belgics primum innotuic An-
no M. D. LXX. C. V. AlphonG Pancij muncrc,
quiejus femedum M^chlini^ viveremus mit'
tcbatj c quonobis cum natac planer, qux ciinl
anni J5fint, & matunus fuutn femcn perficiant^
/pontanci/atione genus fuum utmiftic, run*
toto Belgio haftcnus confervarunt.

M V I T A auieui illi Tnfoliolcu Lagopo,
faticus ar *ssouc* *ssouc* *ssouc* *ssouc* *ssouc*
oblongo pedijflonalcncia, psene orbicul*
ta, inoltja, difutius virennaj intercux pda*
Us aut amplior nonnuo Quam aifurgic cauhs,
inalicjuot ramos diffi^Blq Hibiis adnafcun'
cur (iiuilia folia, nonaawuincn orbiculata,
fed paullo longiora: extreni is ramis infident JO.
quinque Iacinas anguftas dtvifi uwiculi, iⁿ
iongiufculum caput, feu/picam congcfli, £
quibus emergunt floJculi colons eJgantiffli-
nii, exptirpurarubrt: quibusexcui7]s, f&0&~
dunt in utriculis femina, in fingulis iingula,
flavefcencia, rotunda, craffiufcula. Floret
totaitarc, nonrmnquam eiiam in Aurum-
num ufque, & fubinde femcn piofert, quod
fpontedecidens, ctiam ante brumam novel-
las plantas procreat f iniequenns annexfaco
fiores daturas, ut Lugdum apud Bacavos ob-
ftrvabam.

AL 1 v D porro Lagopi majoris genus, fc-
mine ex Hifpanijs accepro natum, cujusico-
oem ad me mittebailacobus Plateau; Id uni-
cum ferccaulem gracilerji & fatisfirmum, nO'
dis quihufdam diftinauro, & in aliquot ra-
mos divjfum, nafcentibus ad fingulos noHoS
pedicuhs, fatis laxa fede caulem &c ranulos
ample&cntibus, quorum extremis tenu infi-
dent; folia ut in (iipcrioic, non orbiculata ra-

Hicn/cd

Lagopus angustifol. Hispanicus.

Trifolium pratense Salmaritic.



Hepatica trifolia camil. flore



men, fcdlongiutcuta & ang\]fta, carinata
five dorib clatiore, canefcentia inftar folio-
rum vulgaris Lagopi: fammi rami defirmoc in
longascalicu Jorum fpicas, e quibus emergent
flofculi vulgaris floribus formi fimiles, & feti
coicolorcs. liocft dilut rubentes.

Simile, vel force illud ipfum genus ob Ccr-
varcin mini Salmant'icnii agro j duminca
urb civvibaro, ad vinetorum Jgges.

TRIFOLIUM FR. & TEUSE Sal-
mauticum. CAP. LVUI.

Lic ET non nultum a Belgico vulgari
TrifoliodifFerat illud. quod paffim in pra-
tiscirca urbem Salt nanciam nalcitur: quia
tamen quafdam notas habet dil' Tihiiils, Uhus
hifloriam negligendameflenon exiftimavi.

Cauhcus autem cft pedalibus, quibus aut Trif-
fenis, humi fparfis, folia terna fimul conjun-
fla habec um pctiolo in hrrenna, ut j Bcfgu
cum, minora tamen, in am b tu i fra & p ar-


vilividiufcula maculainfignot: virgula! terecesexalaram finibus prodcunt, /uftinentes
capitella flofculoru i Tielegantidimap Lirpurarubcnrium: quibus fuccddum membranacei
folliculj, & i, his femeti exile fubrufutn: radix qualis in vulgari Trifolio.

T H f i W ^ ^ 8 f i l i i i T i
& cetera Trifolij genera, vocant.

CETERVM, quoniam in Trifolium hiftoria verfamuro birerctiim meminif Tehoc
'oco iibuit Plantscillius, quam nonnulli Trifolium nobile, vel Trifolium aurcum (adimi-
tationem Getmanic appellaiionis C & WU) & l Heparicam mfoliam appellant. u*

Earn 'f'

Hepaticarri foliarubro floic. Hepatici tri folia c*rul.pleno flo.



tjut vtrictia **Pam** flore vel, cfru!e<j, vel ad violaceam tendente atunr BeTgici horri: altint & flore ru*
 bflo&albo muncrc AlphonfiP. incij, quinobisutramqucmi[tebat Machliniam : arque
 woXutuXhtof toreciruleo, bisautter: fed<^ax nunquanicomtirlienifire voluir.

NiU'u. Ooimes. iu[cm, prxrerea(n quxplenonurecft, V ^ g ^ f e ^ mo j ^ gnaufcentes obfer-
 vaLam N:im Viennenfis (ai(us, & carrukam prxcocJ^I Wi^n^Roicm ab j brea-
 ram tf ndentem h. ibet paullo ferius florentem , alit, tur ^ Ku. r. incarnato five rubello,
 tuma!bofuntflr)rc, ubi a l i q u o t e a r u m f t i r p c ^ c ^ ^ j x i x q u e r a m o u x
 niveoptOTiuscft Hnrc (ciiverlamabcaquiaPann^BB^fttiJB B tftt¹⁹ d Gamangam
 coenobium Orcufianorum. Priorefterddu^non iliWo Viennc ^ ^ ^ i t o ^ a n b u s

Mntfr iri fl rubula fua. Pannontar & /uftrr inferioris filvis abundanrcr proveniunt: qu^aun m tabelli tft flore,
 apud NilTam SU&^JK^ lcnam Thunngisetiactn(pontcnafci ab amicis mcll gcbam-at il-
 bo floreprsditamapud Sabaudos, fuperaro monrc Scnis, qua ifPrfaciunt qni ex kal>3 "n
 Galliamproficifcuncur, nonproculapagoLunenburg, frequentiflimain nati miln rfe-
 rebat D. Balthafira Nerden Medicus. Annoautcmoflogclimo(extofinpra millefinmtn
 & quingentcfimum&icquc»tibus, jam venalcu proponere^prant fztis frequitrcm
 Viennenfifororhizocomz muliercuJareinonranis filviscruram. Portm cum vro Vienna
 difcc/Turtij inventa eft apud arcemStarnbeg Ma^' Domini deHeutenfhn in (ilvis illis
 ejux ab ilia arce ad Nivcum montero extenduncur, etiam ilia quy plcno cfica-nilen flore,
 ut iplius Dn. de Heufenftain uxor Franrofurtum ad me perfenbebat, qm & r florem iU<i\$,
 nedubitarem. papyroinvolutum&'cpiftolarinclorummiErcbat, brviadmiratmidjarri
 cjusplanta: (quamunicamhabebat) parcem, uifi ruracumineaprovniciabellura fuil-
 (ecexoitna.

Oxys FtAVO FLORZ.

CAP. LIX.

Oxy: fava fua.

AD TrioliorumcciamclafTempcmnctiafcelegansplantula, quif ramulos
 tcm pedis longos habet, tnrcrdum longiores .graciles, rotundos, ru bentes, nodotos,
 perterram reptentes, &: fubndcad fingulos IIOCHS radices agentes, nov6(qtJC (urculos & ra-
 mulos proferentes: folia illi oxydis vulgans ternain(Ingulis pctiolis. lfd minors & ex pal;
 lido virencia, acidi faporis quac fob vefperam^ui: in^ruente inibre. complic. intur, &: vt lun
 iuumboniscujuftiaaifiguineocunc; floiet'inoblögispediciiliJterniaurtuaterni (imul
 cnaicuntur,

Oxy&ivo Hots.



eiialcuntur,quinquefoliolisflellatimdecuffa-
tis confpicui, vulgari minorcs, flavi colons:
jqubrisfucccdLinc oblongiora mucronaraque
capitula, five cormcula, [eminc exili, rufo, pie-
na, quod (permaturitatcmdehifcentibuscor-
nicul;) extlit, Sireceni:cs plantulas, infequente
res & femina prolacuras, generat: iadix
capillata, fingulisannis pcrit.

Vm, rofis quibusdam circa Hilp. i
j: olim (imilem criam viderfl^H
tpeltj in horro D, Guichardi, pf^H
^I' Jnilla Acadcmia, quern in urbequu
dem, fed ad mania ficumcolcbat, in quofle
Cyclaminutn folio hederaceo & C an^uloio
confpriebam.

Apud Belgas, arque adc6 in om ni folo fa^H
provcnit, quin & femel fata, poftquam florcre^
coepic, rotadeindca: ftatefloresproducit, & fc-
men fert: planix camen omncs, uc jam dixij
hiemisinclcmctiapercunt: fed & iemincd
ciduo renatx (ii rigida hicms fu b(eq>atur) ph
rumquecorrumpuncur, prorfutq'
terir^frigidioribusprccfcttimregior

O X Y D I s Plinio, ut putant, di
eft hsc planta, quam tcna babcj>
difflurum ftomaclium dari, rttqucaJcfus
ciitcroccclnedijlib.xxiiu.cap.xii.fcriR^

MufcusterrefftisLufitauicus.

MvSCVS TIRR.ESTR.tS.
Lafitaakos. CAP. LX.



TENERRIMA lier^ula eft lltC MuTcUS, Mufcmtr.
dodrantalibusautpedalibus'interdumrc-
txfsviricuiis fito tenuioribus, numerousutiin-
one adnatis ramulis in obliquium expanfis, &
iubindecapillanbusquibofdam, quasprodu-
cunt, fibris, terraeinhasrentibus. Omnesau-
temviticulartcflxfunt frequenuffimis folio-
lis, five squamulispotiisienuifliniis Si cenerri-
mis, pulcherrima (eric digeftii, dilutiore'que & C
qaodammodo paJlcfcente vtriditate piacditis,
tadtuquidemmollibus, fedvy-uti llccis, ad-
ftringente guftu, cui tame grata qu3:dam dal-
ccdoadmiHaiit.

Nufquam hoc Mufci genus mihi confpe-
tum, quam in umbrofisaggeribusOlivero-
rum, ad Colibnam Lufitanix uibertij & Aca-
demiam totius regni eclcberrimam, vulgo
Coim bra didam, trans flumen Mondcgo, La-
tinisMundanuncupatum, nonproculadcler-
to quodam facello, in colic lito, juxtaquod li-
num filveftre latifolium alterucn legerc me
dixi, & pone ipfum facelhim, Rufcimi iuis bac-
cisobullumobfervaremniini,

PELAGIC & quacdamSi A Q, VATILE S plantar.

T R A D i T A Terreftriuwftirpium hiflorU^ro Coronide Sexti & Vltimi mu-
rumObfer-vAtionumLibrt y pkntas quafdam adijcere'voliii, qua in man &
aquu nafcigtstidenti mtef qttasprimumlucumobt'mebtmt tns degnntes peregre ad
mijx.

Mvscvs

Muscum ma-
rinum.



Palma mari-
na Theophr.


TT A R v M priora, Musci roarini gcmn
 Jrtl quoddamvideiur, tjuacuorunciaruni,
 autopaullo amplioris logieudmis. m frequen-
 tef&latcfpajtsrainosdivifum. quideinde
 in aiu.s plurCS m snores & multifidos den-
 sitate usque loborum n Cham tm th, vcl fi qua
 melligentiora sur tenuius incit: molles
 imtio, & sicile granj arent: p
 ponantLr, virides irfiiinaparte, (upjemave-
 ripcrpuiafcncres: led net icficccjuplantai
 Jicctalpetier ficcitate n
 cfl u c Conilina et. rfi 3J ejus
 aliquod n nil ijnnil inni iliimff inj rff
 faporctntamen valdcfalium retinens, & j^
 aquae initncigatur & aliquantulunf maccr*
 tur. denuomollfcens.

Illam Neapoli ad me mittcbat T) o & B i
 mus vir Ferdmandus Intreracus anno Ml
 xxi. Palmz marinz Theo. brassi appella-
 tionc: fed quifquis vn- cap. lib. 111. Theo-
 phradi de Hiftoria PJantarutn leget, & Pal-
 mx marin^ hiftonam cocapitcdcfcriptadi
 diligentercxpendet, nullas hanc liabrcn°-
 tascumPalma marina conveniences c<m*
 periet: & forlkan ad Brii genus quodpiad
 potius e f r n am, profunc a it.

L I C M F V MARINVS.
CAP. LXII.

Lichen ma-
rinus.

Lichen marinus.



P A L M A R E s habet clogansharePkiif*
 ramulos j quaqua verlum in latera e**
 panfos/oliaceos, quiafingula folia alia p^{ai}
 riuntvcl fingularia. vcl binaveletiamci. i¹¹³
 interdwn, e f * i h dcinceps alia, fie u i
 planca mmuits pra: ditafit, qui foijis fuper³ⁿ
 teroinfidentibus confant, ijfque planis*¹
 orbiculari fbrni^ crx ditis, fibunvicem fl U*
 teni ita connesi^^t tenui. aliquo filt> vix
 corifpicuo duuaxatfrajcdla vidcantur, ad-
 mirando (peftaculo. Infimaporrof¹
 laxis adherent, fufci (unt colons, reliqua
 candicant, extima (ut qua: novella) dilutius
 virent: omnia vero Tplcndent & livia
 ctiam inter charwceafaginasaliquer³¹¹¹ⁿ¹
 adfervara: vetuftate tanien tevorem
 prstfinum amittunt, & rugas¹
 a(perioraq: fiunt, faUcdinem aurero
 Eamecianaad mecum fupcriorel
 li mitccbaclmpcratus, iconcmver6infr¹
 tercxprefTamjAmplifTimusvirlucobusAn*

tonius Cortufos, curanrc Illuftri viro T an-
 ne Vincentio Pmello. Imperatus quidem,
 adfcriptS crtulari^ nomintjq: uia veluti fer-
 turn alicjnod auc corallam ipfius mi* »*
 connexa rcp r?rcntam: Cortulus veroc Cor-
 iica plantam accepiflc feribebat Coralim
 latifolia: appellatione: nomenauteiri ill im-
 poftiffle, Opuntia: niariniclitcoralis & rax*
 tihs, (atis (mcaquidemftntentia) commo*
 dararione. Nam Theophrastus libroi. cap¹
 t e x n. Hiftor. Plant, fcribit circa Opunret>
 her b latn

Serrilania.

Cavallina
latifolia.

Crucifera
marina.

bulam esse quandam, quae ex folijs radice mittit. ac cum suavitate mandari potest. Pit-
 oms vero ipsius (equucus. lib. Naturalis Hist. xxi. cap. xvii. circa Opuntiam, miqui, Opun- ^{opantl}
 left herba, etiam hominibus dulcis: mirumque, a folio ejus radicem fieri, ac siccam nasci. ^{lib*}
 certum creditur, hanc plantam refoverunt Limacero, fak & oleo, vel siccam sine (ale,
 an minus suaviter potest, quam portulicam marines; (imitium folia.
 C E T E R. v M qui Curculum plantam < j Coriicain fulam irtebar, & Corallinam latifo- ^{*!««*™}
 liara nuncupabatur, addidit quibus facultatibus eam pollerit. Cj quibus reliqua Cutallin*.

MYRIOPHYLLON PELAGIVM Cortufi.

CAP. LXIII.



SUPERIORIBVS non minus elegans
 & peregrina hxc Pfanra, cujus icottem,
 cum caulis infima parte & radice, abo-
 dem Cortu(o accipiam anno M.D.XC ii.

Qj Ab TVM porro ex ipsa pictura con-
 ijerelt cebac, fuerat dxc plants cubiculis
 altitudinis c. iulirecto, facta tam engrauili,
 prd Edica. m. Iarcsia oios, feu poriiis, uc Plin-
 ian outar vrb Ojramulof iifbtadivifo. fo-
 liorum BYicispncfonn} & cfligic, led lon-
 gecerjuiora, nutancia inftatramorum Pal-
 mr, colorcpallc(ccnte, fummuscaulis mi-
 noribus folijs obfitus definc bacin nuculas
 qualdam vcluti in capur congeftas, qua;
 nullum aliud remcncntin credcprcilenfr
 funt, quam tenellas plantulas jam fotma-
 tas, macri tacicfimiles, quae cadentes infi-
 niitiii marc pctunt, deindd crefcunt, & in
 eandem magniudinera cvaduc, quam ma-
 tres obunent: ipfecaulisquam plurimiste-
 nuiffimis & C plufquam capillaceis fibris,
 tanquam radice nititur, non fuper Taxis, auL
 of freorum teftis, utplc;ra; que alta: pelagica 2
 plantsc, fed fuper arqna IUC) uto in imo mi-
 h fito: fragilis est caulis n^n mindsquam
 vitrum aut Coral linajdum Qccus est: at vi-
 ridts, & tcmne adhuc inliserens, lencus est 6c
 flexibilis inftar fparci.

Nafcitur in altif Gmis gurgi cibus maris II-
 lyrici, unde pifcatorcs excra hunthamis Si
 inftru mcotis, <ua: ipd l'ernt appellant. To
 taplanta etiam ex ficcus j falicidinc m fuam
 recincit.

[[PSE Cortufus valde capto nomine Myriophyllum pelagicum appellatur: Pifcatorcs Ve- ^{J^TM»}
 ro Penabio dtKt Nnft^ SC P>t/ma dt Nmtwt, qmdam etiam Sottrrfu Neu»»o iwzn* ^{Paf(, aj}
 CU pabanc, ^{Netnaa}

REJEREBAWT praeterea utilem esse ad verus morsum omnium (crpentum marino- ^{Sc «uo d}
 rum, & virulencosi & uspicium: applicacami supra leviam accenriavulnra, ca viginci qua- ^{Nettuno,}
 ruor Jioraruro spaciocurare. Corcus usucmcjus periculum fecisse fenbebat, ad vermes ^{Familia}
 necandos Sceijeidos, iMamque non minoris effecit acis dprchendiile, quam quavis
 Corallina, etiam Lii in orcu amittat datam.

MYRIOPHYLLON AQ_VATICVM mJHUS.

CAP. LXU II.


VVLGARE admodum est in Pannoniar, Aurtrix, vicinarumque Provinciarumj ^{fiur}
 violis, quorum a quibus versandarum molarum causa lecincentui, Millcfoti Uto iflad* S ^{«*™}
 atjiaticum] florea] bo, aKcotricis dcrcriprun).

SE D in lacimis seu quod Lim rivofitis. nec profundis, exiguum aliud genus obfervabatn, ^{Myriophyllum}
 late fc fundentibus scapis praeditum, qui rorundi, virides frequentibusque nodis intercepti ^{aquaticum}
 funt j equibustenuescapi Haccirque hbtas fpargi^ quibus telluri inhscet: fupenor (capo-
 rum pars palmum iupra acjuascroincr, quam ad fungulos nodos quj nartenuium parvisque
 foliolis prarditoru m foliotu m alx am biunt, vix u ncia tn longa f, virides admodu m, qli t ftn-
 ficacirca scaporutn fumoiitatem minuuo iur, ficutin pyramidalem qua G formam scapi
 definanc,

Myriophyllum aquaticum.



Tnbulus aquaticus minor.



Tr. lili. a. p. 10. in sum. al. 1714

definant, qui fummofafligtotidem flofculos, quoc foliorcm alas iniingulisiodis ferunt, puiiUos valdCj oftonis candid is folios lis i]mnljunfti<;, nee icleexplicannbus, practices, q in deinde in quafdam tubercula quatuorradiolosincapite habtnciarxanfeunr.

Flora S; femine onullam conlpiciebam hanc pljntam m'cnfe Iunio.

TKIBVLVS AQ^ATICVS MINOR.

CAP. J.xv.

B TcvBiTALES, tricubitalTque, autlongio- i cs.pro aquae altmidine.ex raiiice pi otete ha^cpJanta,(caposj cenes, pumcanns coloris^ljias^nodolbsCqui reficcacijenti fuutfi flexibils) circa fummum divifbsui plurs ramos, alcernacimfercncisnlingulis nodis fingulariafoliajduarum intercSura unciaium 16gi]udine,& (emiuncial; lacidudnic, tenuia &qnaiirranfparenuu, in ambituadcorifpa &(inuo('a, uciaciniata videantur, colorecx viridifubpunico: pdciculi exiguos candi- S canies flofculos uvxque in DIOICOI cogctos ^ fufinenteSjOblongi crjfliufuliqj func,&: inter foliacxoriuntur, qua: binalemprexad- vetlbiica nafcenturjContrarioquam reliqua inferiors modo:fingulis flofculisplcrumque fuccedutquaternaaculeara grana fimu) co- hxrencia, paucamcadidam mcdullamcon- rineria: fcapiinflmaparcead fingulos nodes oblong^ j C a D r e i s f i b r a s a g u n t, quibtis firmanrur,&:alliiictumieccflarium attraliunt. Toraphntaaquisimuicr^icur.

PRIMUM in ftagnisspud Ncmch-wywar, maximacopLa,inrcrdu tribulum aq uaticum majorem fructu eduli, & Nytnphaeam flore albDn; ifccnTcm, atc]u]unij linitio florcceru, & ft mi tie pragnantcm obfcvabaai ano M. D. xxc. macoriustanich Horere eifti mo, quia ointies ferme plants femine abunda- S^banr. deinde eodem nienfe Viennam rever- lus.incjuSurbis fbiTis, ad portara qua: vulg^o tribulum nuncupatur, crelcentem, de po- te prospiciebam.

S i M r t E M dcicdefcreplanramilloif fo nense videbam apud Ebrictorf Mag^{ed}Dn. HieronymiBeckaLcopoldscorf arectn [ad cujus hortu, in muro meridiei obverfo plu- S rimas veteres Infcriptions latins in Panno* ~!iareperr<j (enequadam fiintrepodr.r. ij] Nobilis ille vir rorius Anctquiracis diligt's est obfcvator) in lacunisfcundiim pu- "oo-."* S^quKvosdcurrentesnarrctem, fcapis au- cem non planis, fed rotundis, codctn tamen modo geniculacis, binafcemper inter fe oppo-

Ijratoliola, ad(jngu!osnodosfercntenjpsrioribus breviora, nmcrona!: a; inambttuminin3^h cnrpaveHmuofarflolculosdeindcternosvclquaternoSjpufiUos^ufcarell^Cordiflofculis perfimils,tcnuibrcviqucpctiolo infidenres; femcn non obfetvabarn, qutanon licebat miliiquovismomentoiftucrecurrerciferpichKCj&ad ramuloruin nodesarquealaj rutnqucfibrasagit.

A P P E N D I X ,
AD HISTORIAM PLANTARVM
CAROLI CLVSI.

Qui A nonnulla plant & demumkmefant obfervatx^amtradita
TyPograpboftt cuderetur/riea Hi(loria₃ eas inAppendicem con-
rrendas cenfui, qu& ad e)ud cdcem accederet, indicate cafite 0- lihro,
qttibts inferi deberent.

Con. At ARBOR. ad finem Cap. ix. lib. i.

Pro pTER foliorumqjandamcum Siliqux filvefris folijs fimilitudincm, peregrinz
X cuiufdam arborisInftoriam adtjceie volui, cujus tres aut quatuor ramulos, Hifpah ad
me mifitbat doflU2 musvir Simon deToto, cjus urbis primarius Mcdicus.

Coral arboris ramulus.



E A M arborem in hortoaicre fenbebat, (e-
mine ex America accipio ipfinatam, cui no-
men inditu cset Coral, ob flores Corallij ? *Cef alate-
ribilita-*
mulosjedcomformam non addcbac; IUuddum-
taxatin rpartola adfcriptum, binas ipfuni ha-
buiffie arbutulas, qu.t fiorem tuliffent_a in qua-
rum aduicioreetiã filiquxfivlobinaci effent,
pragrandibus phafeohs pleni, rigidiffima au-
tern, qua;ifticanno praecedentefuerac.hieme,
non modo illam arboreui, atqil^cctcras Indico
ferDineoatas.verumeuamplerafque alias plan-
tas, ipfipeniffle. Quandoquidem porro lobos
profertea arbor, conjeftiiram facio, ejus flores
pifbrum floribus forma nõ eflẽ diffrinilcs, qifa-
les in Siliqua filveftn, vulgo arborc ludaenun-
cupatana (cuntur, fed altenus colons, videlicet
rubriutcoralliũ, prifertim quũ in Indice horti
ipfius, qncmad me anno prxcedente tñiferac,
adfcriptum eflbt, Arbor indica.^icla Cernl, ob
cjus rlorem fimilem Corallp, -cujus foliatialdc
iimilia fiint folijs arboris Iuds, fed fpinasilia
haber, quibus lize caret. Et ccrte rani uli quos
mtebat (ecenim ramulus cumfolijs mittere
feribebat, duplo aurem&rriplo majora arbo-
rcm etiam proferrc) folia habebant, arboris Iud-
sc folijs non valde diffimilia. ied bievioie inni-
xa pediculo. atque ex adverfo nafcentia ,extre-
mum ramulu m , qui aliquot fpinis, uc hamus
recurvis, prarduus erat. occupanre Gngulari fo-
lio: anvero hi ramuli Gnt dumtaxat foliorum

coft-g_{au} tveriramuHjha! teo, quia quotq; iot mittebat, terna folium modo folia habebant:
facile autcmmihiperfuferim. duintaxacfolia fuiffe quumextrema cofta in uniu folium
dcfineret, & infima unius. inter ceteros^ramuli pars, yefligium adhuc retineret, quo ramo
inha>G(reviriebatur. Nihil ver6 aflero, quin, ob brevifubiequitatejus, quirniHcbac, mor-
tem. ncmofucrita quopercontari poffem. Foliorum tamen aliquot forma oi, ut ramo ad-
nata fuiffle coniecuratn faciebani, incabella ad pofii acxptimicurabam.

AN veioiftam adumbrare voluerit CV. Matthiolus iconc Acaciã primã^uscfpinofa, *Acacia i-
14m mi -*
& folijs, arboris Iudae foliorum asmuliseftexprefTain Commentariorum ipfius in Diofco-
tidem pofftcmã cditione, ignoro: fed flhanc arborem voluit, picloricone Di fideliternon
expreflit.

Guayavzaiborisratnus.



Guayava
arboris lib.

Dorycnium Plateau.



Dorycnium
arboris

Dorycnium
arboris
rut.

TAMETS I haec arbor nulla affinitatem
cumpEuno,cap.xxix.Ub.i mzx Plum-A-
rum UiUonaeufcicnpto, lubeat, qma tamen
dufoiuseram cuniam arbon incahiiloriadc-
(criptx, illa fubijctrepoilem, jam didotsn*
dem capiti acti3iiiiiaidam rfli: Leniut, pra>
f q i j T u d u i . puJpjm ptunonun
dii!jimlem lubuifTc viJcjtur, licei odiculi
expertem. Quodli hanc **Phnuru biftonam**
recud ^, pcculure cjput JII d JII po-
terit. Secommodioicordtncicpuni iocciCil
fruatut benevoJus ledtjr ejus in hat Appcfi*
hftociljflciMi adpofio iconc.

cciani rjmuluni a^inc nuttebat vir
£mus Simon deT Air, adfluaiplins
ructu.fcdprt. 10, &, otopi-
natufu,6**.

^ Jiat anem is rainutus, Cijus iuimnapjr-
teu cum fiudu ciprfi^Sftadi, [^Jjiis
ion ituJiniSjquadrangui^BHcnntimbinis
folgs: x ad v trio (emper dnsobfuu^ quatuor
uncias longis, utumcum (ennfle vt! biofl
interdum Uu, laurinorum tul:urum furna,
fatu firmu ^pp ronã arte, tuncite nervo

fxundiim longicudincaA "i' lateracxcur-
rencibus venu crant inflgnua, ciocnKXi^j K
incani colons, iupjni veto Izviora, m niusqj
apparennbus venii, iJur confrafia, licet ve-
lll (laclient, launnoiumfohorum oduicad*
hue rc^incbariE, acctiam quodannodo(a-
porem mauducau: fructus.utdixi, nã^ s
crar, & I f i , quia ori tan immaturus, exigua
mali magnitudinc.oblongiulculus, fonsni-
gncansmftar pmnotum maturoruiu , ititus
pulparubcfccntcplenus, acidiuCLli & p<S>
in ejus medullio molta rana candicantia
coag:fta crjnt, mdij, ant ^ranorum, cur in
h^ubus reperiantur, magnitudinc.

Guayjbiporrò Inibrum defcnbit Ferdi-
nandus Ovidus cap. xix. lib. vii. **Parte**
partis Hiftorie generalis Sc nacuralis, quam
Lector reperier niter per^rinaspantuar-
rum Hiftoriãex vanjsAucloribusconcinna-
re (Deo vitã concedetej in animoã bnu*

DORYCNIVM VERVM Iacobo Plateau cre-
ditum.adCap.LXviti.lib.i.anteli;-
c>ionem, VETERE S potio.

CETER v M aliud Dotycnium propone-
bat ornatifimus vir Iacobus PlatcaJi
ipfiftminenatum.quodjciusopinione.lcgi'
timum erar. Sed quum ipfc plant) m lia^ccD-
remnaconfpcxcnru, iiiiilproniBiciarcpo*
fuiTicjustamenqLlalcnicunquedcicTtptiO'
nem ex notuquas ipie Plateau ad me niitt-
hatunacumramulis*oh*ctiamtiu^ rcinciv-
libus, Siiconeipfiusnuiiiidclmcaca, con-
ctnnavimus, quani frjbjtda criain tabcU
exprefTam bkdamns.

EST igitur Dorycnium iHud, plantsfruticera, adduoruBiautriumpedi)ma]titudinem
aflurgens, 6c inultos ramos lignoibis fpargens, non valde diffimilcs tenclli ram is Zy^{zi phi}
alba,

albar, cui etiam finilia folia habet, lioc est. in canalanugine pubescentia. Yeriim minora &c firmiora; fammis ramis multas florum gemmas proferre veluti in umbetlaw congeftas. que; deinde aperiuntur in hris florum convolvohauiframoniz. fed faris fugacis. quia unomarcifcenc. alrcrfcfeexpandereincipit: fruttum (eobfervare non potuifle fcnbcbac, quoni: n niv. i. l. u. i. flonbus JccLduisfi]Ccc(Tifrt,ipl]im deinde planum pcnjflc; ftuciccm tamcii ef: ~~empere direntim, 7~~ & folia non abijcicutou

ASCLEPIAS CRETICA. ad Cap. LXxxix. Lib. r.

AMETBI in mea Plantartmi hifloriade Afdepiadenonagam. quia illa mukise frde- X (cripta: quum tamen ejus quoddam genus Cretico femine natum obferarim ab alijs nondum prodirum, illius hittociam in hac Appendice ponendam cflb exiflimavi, qua ad calcem capiris Lxxxix. lib. i. mcxP. lancaruii hiltorix adijcipoffic; Uloenim capite quatdam congenere plantac conti neniur/

MVLTI pored abeaciem radico virgtsaff Turgiclenris, flexibilibus, graciltbU5&: viridibus, quas acrn Mijpabiunt folia. vulgaris Afclcpudis folijs nondiilimiliajbina ur pluninu. contrarijs interpediculis nafcentiaj diutius virentia: inrerquacterniaut quaterni prodeunc folculi brevibus pcciolis nccentes. quin uttpaltidij foholuconftantes, quibus fuccedut interdum (ingubrcs. noanunqua gemirur filuux, breviores quam in vulgari, fed craffiores, ftriata, bifido mucrone, cootinentes ferncn planum (ua lanuj^inc involutum, pcrimlcatque vulgiris. Totap[ancagraviseftodoris, -bjxcun^i: cf^rentis. Eainmufctspcrn]ciofatnct lideprecheinicbam, quando quidmillas flonbusi^nfitienteS) enecatarcpcricbain.

LILIVM MONTANVM FLAVO FLORE ad Cap. mi. Lib. ii ante fclionem Lilij pond fivefrs. Si vero conngat Plantarum hiftoham rufus cudi jpeculiar Caputilli dan potent.


LECANIS cfHioc Lilij montanigeniui quod proximis his annis demum obferuatum, nea quopiam haftenus, quod fciam, defcnptuin. De hoc enim prim dm ad rec fcribebat, in Plantarum cogntione cgregte verfarus Ioannes Robinus Sreniffimi Regis Galliarum atque Chriftiani jfimi Simpliciul-a, ut vulgo appellant, Luretie Panfiorum hatitans, bulbosejus (ehaberc fignificans anno M. D. xc: vni. meiii Febuarii OjUnumcxLllts fetnil Turua] pollicitus, quem infcquente Novembri accipicbam, fed valdpcorruptum, uia pyxidui terra plena: fuerat includus, cujus atntu ex gcftatione (quat^a: plunmutn afHKasLterrartamen creditus^omprcliendit. & fcquente anno caulem cubitalem protu^tjnu Uum florem. rigidiflimadci Hdeqtiz fubrequat hie m sprorfus corruptit. ut & fclcthfimasplrafque alias plantas. SLribcbat vtro, florem rubere exaurco flavo ccmem, fblijs infar Li]ij montan]i, aut Byzantini miniatireflexis, diitnd }ummacuis nigris, ut funt Li]i) ^ontani. five Martagonis Matthioliflores. Cteriim illam ipfam plantam Gbcnfcbam, «qua Nobilis vir Joannes Boifotad me fcribebate jufdern anui menfc Augufto, his ver^st Superioribus diebtis. mcus vicinus accepit N. Bidau^nepoteloaniis Bidaucatio^cijnfiilani^ilij montanipiauram. cujus exemplar ad tcmitto. Is ante leptonium. vel circiter, in montanis Pompeiopolipco Jtimis, regno Navatra:, (eminacujuf^... ii i-ili; n: ontanijfticrepci co!cgerat, dtim tadice m, qua: nimisalredc]net(a, autni. 5i isticticr hx^cns, cotruodoin [Iruentodeftitutis, cruerenquire cobmporis anguftam, quia cju^ otnites jam longius pro Gcflerant, quos afflequicupicbat reafcminapatruomittebat, qui plantarum culeuravaldedelct Sabacur, quas partim pfefercbat, partim alijs communicad. inter quos fuit Medicus Infulanu SjCui anno M. D. xcvm. binx plant* ilio (eniinc nata: florcfctuk Tunt, non nihil (ut memone bac Iacobus Plateau, qui eas florentes vidrat) differences: naticciam binx Canonico, fed qua: nondum flores tulerant. Boifotoetiam feminamiferat cui unicaplantana ta/cdabipfoncgleita^onccpiftjraravideret: cum demum requi Gtatn plantam invenit. Habcbataucem, tp(oafTcrente, radice «i Lilio albo fimilem. auc. fi quid flavi admixtunij niodicui id erat: cerce quam accipicban^albaerat, Cm alius color admixtus futritj corruptus is erat exatntu. Scd & alij bulbi quos poftca mittebaramicu5, albis U) iiamiscr. int prxdici.

Ceterum piauraquani Boifocus mittebat. anguftiora folia habeb. it, quam Lilium Byzantinum miniatum, quod etiam aOerebat Bidautius. incondito ordine (uc fequente anno fl^t mcaplanta obfervabam) percaulem fpafca, & (quod tile omittebat) diluciore vircdine P^* ditaatque panefupinamagis fplendentia, quam in Lilio miniatu auc vulg. iti cruento: ^cu) u5 fummo, bini inter folia nati Horcs, tango pedicuto fubnixi, fex folijs reflexis conj^ P. ^ss> infartiorum Lilij Byzancini miniatu, colore flavo, nigripun&is circa umbilicum

rcf] Cens^ur gcbat, Gu^* ut Nicander Gcorgicorum fecundo apud Athenarum hbro xv. ap Fitat. turpearmentum rudentis atiiii. Anautcmiadulre plantx plut Ci flores proferant, »gnoro. f. d. kmpusn OjdocbiC.

Lilium flavo flo. nuculis distincto.

Lilium montanum flo. nullis maculis distincto.



CERTE eaquamilloipfo anno Robinus donabar nobiiffimoviro Philippo Mar-
 xioSancV-Aldegondio (exquaadpofiram iconcmexprimi curabam) quatuorflv>re-
 fummo caule, t, c Liliuoi Byzantinuro mintatum, abcoikm exorti nafcentes .colorc flavo
 dilatiore. ScquatipillenrCjCircaumbihcumnigricaiicibusmaculisdiftincio. & fexJramin*
 spicibusminiacisdonata^iabentes. Florcbactxtremo M'aojfcnulluni icmcferebat.

Lilium flavo
 flo. varietate

▲ y v M porrdha:cdcLiliomontanoflivumfloremerentconin3cnraiu seflcm, mit-
 tcbacadmeBurdegast eiuditiftimusvir loachimusVencnus, quatuonltiusLilijc^fto⁸
 bulbos, monebjtqueduurngencrumcflc. alterumcnirn altero magis pratcoces flores
 pror'erre: addebacm Ut per fc aiud ad hue genus obfervafle. cujus flores null is punctis interne
 diftinaijfedomnino fhvicflent. ilimsqueunicum bulbumfeduntaxachaberc. Ip(o^{aij},
 tem teffe, na^citur Lilium iftud de quo agimus, in Cagire en haretbi nuncupatis locis, atque
 Pyrenaeorum montium aijs. undeciprrectiilerat. cijmqubufdaraaijsclcjijniibu^pl^{m111111},
 quoscinnillisTOonr^usfpouieprovenmnr Pluresdeindehujus Lilij bulbos a) ip(o lupeno-
 icMaicioaccrpicbaD], quosamiciscommunicabaRi.

Lilium montanum
 flavo flore
 nullo macula
 distincto

I CEIEHVM quatuorilli priores bulbi hoc anno centesimo Tupraroi! c fimumn<-
 restulcrunt, non, uc ad fenprumerat, alij prxcousualijs, fcdomnes cadem hebdomonia Ja,
 binirernos, terriusquemos, quanusfcptenosiquiternos, cxriuiocaule Af eodeme^{ortu}
 natos: qui plures, pauloinfracumcaulisfaftigium , inalabinoshabocunt. Erant
 porroomnes flores fquum primum apricbanrur) colons ex vindi pallens, dcin de pallidi,
 tandem flavij fexfolijsconstantes rurfum reflexis & convolutis, tntrarflorurn Lilt. Byzan-
 tini miniati & montani, a nadio ad umbilicum interne punflis feu tnaculti ex airo p^{pu},
 reisdifiindis, fexfEaminibwsvircencibus, miniatoapicpr, Tditiscimptltillotri. Iijg^{lla}
 cralfiufulculoexumbilicoproductibus, quopiftillononnullosflorescarere at, ^{trondvetro}
 bam, etiainineadcmplantaquaali) r odor medius intergtavcmA: fuavem, qualis fere in
 Sambuci & quarundam Indumflonbus. Caue^ flores luhncntes, hicub^{tales aut am-}
 pliores fucmitjrotundij Virides, quos incondite ordine plurinia ambicbanr^{li-ij} 011^3^
 guffia, vtrtdia, mollia, ttmcrvia, oris albicantibus, & velunlanugi[Kquaduniohtis: r^l
 crit Timultisfqijamispridira, infbr radice Lilijalbi. FlorfSpioduxit dumtaxat (u^{luc}
 anuusferocinusjLuiito^aturistamenByzanuflo&iiiiontano.

FJHTILLARIA PYREN^A. ad Cap. xi. Lib. ii, Plant. Hiftorix, ante
 fcflioncm, Qviadmepriumgcnt]s.

MITTEBAT idem Veneriuscum Liljmoianiflavoflorc bulbis, paucose
 t a x J u i f d i r i a p m b f l e b t o s , c i u j s f i c q o i ^

nam Fr-
 e-10-
 no pro-

» Drofercbat,divctfani cTc obfervabam ab ijs quas cap xi lib. i r. Hi ft. Plant, exhibui.
 B VLB v M quidcm liabebac Fntillariariltocap.defcripcxformafiuilcrrt,minorcm tan-
 ncn.exquoproiiihjtpedaliscauliculus.gracilisjViridis, fenisautfepccnisToliift-pruscx
 'indi cineraceis,qualia fere Cunt in aiijsiYinllirij in cujus iumnio faftigio natcebaiur flos,
 tliarum FritillanarumfloremiorjfxfoJijsconfans, quexcimasorasnonnihilreflexas
 ubcbjnt, utparvitintinnab'-hformamexprimeret, quorum terna ceteriora, incrmis
 sratit aligufH'jra,omnia obfolc'li foris color'l.circa oras tamen (pradertim interiora) veriis
 quibusdam flavescrbmsdirtin&a , interne vcrò ex vindi flavescntis&: (plcndenns: i
 medijs porro fotijsad ipfos ufque ungues{qui fimiletn colorem habebant) plutimis macu-
 lis laru ratcpurpurafecubus teflebcimdifpofitis nocaca: exurobilicoprodibantfcxbr-
 'iaHaminaloi'igisapicibuspaUidLspradita,crifulcoft!oc media illorum nroccente: odor
 fjusgraviSjquali phalliodorem refrciiSj&proxiaicadeum^uiinipaculafccctidaprcipi-
 :ur,acccdei }s.

Florcb.irMniocum Fritillaria ferotina: nullum femcn tulit, aliuncfe tamen accipie-
 m.prorris fimile FritilUris vulgaris lecnini, a quo nata: quinqc aut fex plantula:, qua:
 ubiadolevnr, atrinatrifimilcsrioicsdabunc, autabilhsvanantes, tempusnos ((i vvc-
 tnuS;doci;bic:iinminLis,aJ)os,adq iioi ear pUntxpervenient,

NAUCISSVS IVNCIFOLIVS MINOR.. adCap.xn.Lib.u.Hift.Plant,

EODEM tempore, ab IIIO ipfoaccipiebamNarcifli juncifolij akeriusgeneris binos
 BulboSjquminor,adaliorumdirTercnuamvocari potent.

PRADUCEBAT autcmisNa.rciflus,exbulboa[iorum NaccifTorum juncco foliobulbis N*^Tigλ<m-
 fo rminondilimih, valdcamenpiiiillo,quinqueauc fxfoha.anguftaquideni illa&jun
 ce^aliquanrulum tamen plamor^dodrancem accpedem longa,nonnihil propumbensia
 iridia: inter qua: prodibat unus aut alter cauliculus,graciiis, nudus, vindis, pedalis longi-
 tudinis.fummofaitigiogeftansfolliculumtncmbranaccutninfcaraliorijm Narcif(Torum,c
 *uo e l. b. t. u. n. t. l. fl. l. diclo inxu5ft>rma juncifolij vulgarj flb
 fjuo exlic-bat unus aut alter flos longopcdiculoirjnxus,lt>rma tunofolijvulgans flonbus
 fiinilis,(cdpaull6minor, flL-xfo!ijspallidionbuscondans,cummediocalicflavo.maiore
 a'iqudntulum&magispa:ente,quiminvulgari5 NarcifTi juncifolij flore.ecujusun.b li-
 copallidulabrevtiqucfUminaemergcbanccmedioftilo prominence; odoratusquidcm est
 flos, paullo tamen gravioreftejusodorquam vulgans juncifolij Florcbac Aprdi.

HYACINTH VS MAVRITANICVI, adCapxxvi.Lib.n.Hift .pfant calcem. SinhancHiftoriam denuocudi continget, peculiaricapiredonaiipoterit.

EX ea Mauritanix parre in qua Fez* & iMareccs urbes fitx,initio anni nonagcfim i no-
 ni fupra milledmum & qmngenrcfim, cum ahjs bulbaccis plantis adfcrbatUP
 acintlit genus exoticum , IIII non valde diflimile, quod in'H ilpama nacum, xxv 1. cap.
 ii.mca: Planccarum defcriptuta cft^uum fo!i]s,tuni flonbus: omnia tamen in hoc pau-
 Jpnajora. Nam liujusfolia Hyacinthis.aut Ormcnogalt Arabicilfginmifolfjifansre-
 iPONebant -^intcrilla'prodibatcaulipedalislongiudinisautamplior, craffiorqulmin
 "fpaico.firmus.impeiiie vindis.viccnos interdum etiam plutes floras (uftinrAs.tex foliji *»M> *
 c<>nflantes, quorum externa tria nonnilul explicancur, interna quodsmm',do cocunt.^ &
 trils. j. d. i. i. formam exprimunt, extremitate tamen a. Krtiiititititit p. flitit. Vtlliri in XT*
 fpanico jam dicto, coloris autem magis obfoleti & fufci: de femine nihil pronunciate pof-
 fum, quia nullum tulit: radix bulbacea, alba, Hifpanici radici non diflimilis. p o cameo
 »Uor,8<: ad Orntchogali Arabici legitimi radjeem vatde accdens.

FloresdabacMaioinfcquenre: plantas veroomnescorruuiupcbat cum mul isalijsfin-
 lulanbuj,afperri(fta qux fubfequebatur hiems.

Hunc cum alijSjurdixi.bulbis^MJuritaniaacceptum.honcftiinmiviri WillclmusPar-
 duyn.&IoanaesSomrcrLVcsMedioburgen(esin'Walachna,amiciscommuQicabai)t.

INTER reliquos porro bulbos, fuerunt NarcifH , quorum flortsjam prarrericranr, & t f e
 Sifyrini:hij majoris genus, quod mihi Horesprotulit^ifyrinchiomajuriquodin Lufiran.a
 obfervabam,formaprotusfimiles, nontanientxrulcos, utillius, (ed purpurcidilutionis
 colons, valdceiiam fugaces&cphcmeros, quorum rcnnamajorafoluindexi& terram
 f'pcaantia,a)ba macula eram inijgnita.

ORNITHOGALVM MAXIMVM. adcap.xxxtn.lib.ii.HiftPlant.antcfca.ALTERVM.

TAMET SI cap.vxxiir.Lib.H.mcxPlantarumHiftorLaTicripfcnin, Ornithogalum
 iHud,quodC. V. Do*ionxus Afphodclutu Galcniappellat jomnium maximumc&:
 nuntamen fentenciara muto. Nam pofteaaliud genus milu confpeaum cthllolongi
 lus,cujus liiftoriam in hac Appendice Ledori proponendam cenlui,

L I? IT A id uieimcc vac abudice producit folia) longa, dilutius vin;ntia, litioriqtte, l
 *Y 5 quam

quim Narbonense & Byzantinum jn rer qu^preditref quicubiufis^ Jirri Jor litretum, cauliica (riis, viriuis, ia: vis, ni3gnaii longamque florum (picam geife Sj Urc emcnc plicre stncademfp'icanumerarcm eininerim, fex folijs constanres, niveiprorfus candoris, & nullo nervovtndi .ucaliorum flores, inffgnicas, qui mterdui explicanttir, (exqueftamina brevl & famleu bal f avsapc ispre ita captu i mteu gonum cingentia & m bilicum occupnn[iaoitendunt, noclu vrcoprrahuncur. iV/orom inlbr: floribus excullis, (uccedunt trigona capita, (emeu rotundum. nigium contirjcnriairadix bulbofaj Craila. caridida. t lati (eac mulias fibrasmittens.

Tempus.

Floret cum all jsnitijoribus Mai Ojinterdum cciam Iunio. proanni tartocioris^ utm n^ is ferotini racione.

EVM butbum accipicba Ornithogali Arabici Lilij Alexandrini appellatione in (gnitum: qucmadmodu in ctum Byzantitiu eadcm appellatione non femi ex Italia ad me unillum.

ORNITHOGALVM MINVS cPyremis.

adidem Cap. xxxni. Lib. n. anrefe & ionero SEPTIMVM.

Ornithogalvm
minvm *->
res.

Tj IN os ctiam Vencrio exiguos bulbos in Pyrcnaeiserutos accipicba Hvac Inthi stel. O laialbt cannbus flonbus appellitione infigmtos. quorum flores quon hec aiim. M dg. conlpicerc, non Hyacinthi. fed Omitbogali parvi cu deprchendib; m: ctern & (irr. ilimafolu. & flores nodillimilcs Ornithogaltniioris FLXtolotc KJecirfiicap. xxxiii Jib. ii ncar Plant. Hift folijs Si flonbushabuci-unt: in eo dutaxat diflene mihi v, tiebs: mt. 01100 iltiu. sflores paullo majores apparerent, (ex ctiam fohj scorflantes, utillLS, quoit^ in (! £^U, lafons nervo, (cu vena {ubcariuleafccuddmlongitudjiiLn] r e r m c d n t m c f l t t d ^ let itunuloium apices in hoc fuivi, qui in illo violacci. Florebat Maio,

ASTHODEIVS MINIMVS.

ad Cap. xxxix. Lib. ii. P. Unt. Hid. antefetlionccn GR. seis a Vp d a r e c.

NOVVm porro Aphodcligenus, & 1 ncmine defcriptu, femine natum fibicf Tefcri bebac iacobus Placeau, a quo icon cm ipius minu dciincata xxi. Julij hoc mmo M.P.C.* accipicba cum aliquot nott\$, quatuaiadnii Diculohai]ch. {lon3m conciniabani.

Aphodclius
minimus.

Aphodclius minimus.



Tempus.

Colchicum
minimus
alterum.

MINOR est Tenioj < n d e f c r i p r o , & ab cepluriirundiffere: namgratiu Ictasia habctinfar Secundi genctii, lice! nmnn" c quorum capit prodcuoiq' uinaantfc i w f e " * v l d e a n g u f t a & l i ^ u f f l a i n u T r u x a f l ^ r - gitcau heculus ruaitfus a o d r a n t e p f altus, linguans, necullisramis [rx d n u s , 10 quofptcarin modom nafctimuroiatao^ f" albi. fexftilijscndai Hes, quor f i j a l o n t e n x & ' e x t e r n e v e n a q u a d a m l e c c u n e | g i t u d i n e m f u n t n o u t a , p e n n < i c a c T r t ' j P r c r d e n t b f i b r e s .

luhj mitio flor < p r o f e n - c i n f i f e r * i r i c * b i r , q t i u m r e l i q u a g e n e r a f o o t ^ c c c i n d u m : p r o p E c r a m n g i s j l l i s l e r o c m n t B c t n f d e n t i o a d q u i - n i e i c f o l i a a m m e r e , & u o v a r r e c i r c a A p l i s I n i n u n i .

COLCHICVM alterum. ad Cap. xL. Lib. i. i. Hist. Plant. anto

(tci. Q V A R T V M g e n u s .

A L I V D Colchiciv < colore flonrg nus accipubamab honflo 7? J bo. folijs. cunivulpanfrorufusonventft^ i * * t & perindcalcaffuigebat, H O < < > P r o f t r ^ v o l u g a n s H u n b u i f o r m a o u t d e G m i l e s , l e o u a v r e - (o c u l o r e - c x a l b o v i d e l i c e t a f p u r p u w l e c e n t e v a r i o , d i f l i m i l i t a i n c n a p r c e d e D K , q ^ o i a i n h o c c o l o r e s m a g i s p e r m i x n , S C W T ^ o < i b b * d i l u t i o r : b i n o s v e l t e r n o s l u l i t H o r e s , q u u l g a i s c a p t i b u s r o n d i f l i m i l i a J n 3 e n t

faccefferunt longa, crassa & trigona p ita g p

Florebat cum vulgari, paullo niaiunus precedents

p o d c n *

Eodem capite, ad finem fecloms PAVCO S porro Olchici.

Ex illistameniplis, binoshabui buibos, quorum finguli quaicrno aut quino5 Bores pro tule rum anno M.D.XCVIII. & eum mtequente, nonadcoalcc j]urgenicsutin vulgari, led breviore Sjqnonimqucfolialucioppolika^cflcllatimdinindaappartbant^cfmdcfi-n: ac in diluicior Frinllanx flore^cmcn etiajn abundepncei id genus, led in miuonbus bre- voribufque capitibus quim u. gare.

Eodem criam capite, ad fineni fe&ionis, ALIVD porro elegans.

Hujus autem Colchici picnos Bores anno M. D. XCIX **obfctvabiin** cite vcil]colores, & foliakibereiiinihbus colonbus diftmcb, quibus **Colchicivrficoloris** altcnus floicidi- fiin&i funt, hoc est, ex albo & dilutius purpurafcente mixtos.

CROCVM VERNVM capillari folio.
atlCap.xLii.Lib.n.Plant.Hift.ante feiS. NONKVLLI.

MITTEBAT prztereaidem Venerius Croci vero tern pore florencis genus capillati fuho. quod Burdegalsnfi agro Iocis defertis naici fenbebat, Siduoruni generuoi in- venin: unuiUjpurporalccnLeHore alterum [qi]odrarius).ilbo.

ID antem exiguum ridicem habebatjbulbofarnjduro fpadiceocortice redhrn,irjftar il- liusquodinHifpaniaobfervabamad Anam flu men, velejus, quodCalabonusniucebac: \ cqtiainfqueiueannobinaaucernaprodibancangijftiflima & quali capillaria fbliaviri- dia, furctt.1, inter qu^pediculus veriusquam cauliculusuncialis longitudinisauipaullo major, abunaparceplanus, (uftinens (emuncialis **magnitudinis Botem** fextblioliscon- fiantemjuorum cerna exteriora paullo longiora,erant,&: purpurei colons,ttibus venis (a- turatoribus fcundiim longirudinein extcnusdiftmcia, tria ituerna breviora&diluriore colorc prardLta.omniaauteni interne dilucepurpurafctbant, &:ungeshabebanrpallidos, terms venis dilindos, pro Jeumibus ex umbilicotnbusltaminulisbrevibusJ lotigo apice

flavo praditis, & medio filio extremâ parte diviso.

Florem proferebacinino Maij. qui ible splendenteaperiebatnrjubnoclmautemclau- dcbacur, &:paLicosdicsdurabatjnnull!us, autpcricnuisodoris.

STACHYS SPINOSA. adcalccmCap.xx.Libiin. nifiquispeculiarccaput illi tribuendumexiftime^quodftatimpoltcaputde w-jr^wcollocandumcflcr..

QUANQ^AM hujus plants defcriptionein EpiJtoIis C.V.Honorij Belli LcQor inveniet: quia unit: Jacobus Plateaejus iconem cii aliquotnons (nam Sc **ipG** nutaerat, & mihi noa confpe^lacxiUnnabat) milK,eam denuo, <:ii **icooc** in cabella txpreiia, hie (ubijcimur.

Stachys spinosa.



PIUMO quo hxc plantamih natafuitinno, ad ScaclydcinaC. V. Matcliolo propoliftjn valde accedre videbatur: ctenim folia tlli non dilfimilia h.ibcbat, oblongiufcula vitieliccc, in- cana lanusineteda, nulloautem grato odore prx- dita; fecundoannocaul'culiracrefccebant in cubitalem psnealtitudincm./jtin plures ra- mulos dividebantur, in **mo'ics** quafdam fpi- nasdefincentes, ad quorum **Hotius** binaciad- ve ito fem per nafee bantu r folia , prioribusmi- nora &: anpi ftiora; flores rari per ramulos (parli narcebantur, floribus Teucnj Ba-tici non valde dirtlmiles, minores tamē, qui valde caduci, nul- lum femē tu learnt; radix lignoU& dura.Stfrain- ne porro ah Honorio Bclloc Creta mifTo, **Gm-1** ^r/^wfl, hoc est, afiniiii thymiappellatione na- ta Uarc planca, priorc anno tou luemc vireas in horto pcrmanlit. eo loco ubi (aiafuerar^itred vate tecla: altero anno. ramuli negligcnria, qui, utprxceperanijhiemcnonceie/ac. perijt. Ejus qui. plaii^apud fectiamCreticofeminenatat, iconem ad me mittebat, opiniononc (cui^tiani nica accedit) non incommode Stachys Tpinofa dici poccrit, **quo** nomine ctiam illam exhibe- musjdonec ahud magis aptutn occurrat.

PISTOLOCHIA altcr afempvirens.
adCap.xLvii.Lib.iin,anic[caioncrn
NovvMau:em&c.



Plantarum. hiftoria frequens mentio. Isautem annoxcentefirnofupratnillefiniurnana-
to Chri do, illiu s aliquot ramulos cum eicone ipiius manu delineaca .additis qaibuldain^{no*}
tisadmemittebar,

*PittUthi**
aliera.

Mulca porruiefummoradicumcapite proferre fcribebatrenm'a (armcca,pcdero autp^{lu*}
vcl minus longa,angulofa,friata,ramo(a,lcnca, fraflu contumacia.liumi fparfa, &cxatro
virentia.inquibus inconditoordine naicitur folia nervofajfupriori fituilia, magisnrticn
mucronata& ad fmlilicisafperx folio rum formamquodamodoaccdcncia.minora.atrap
& immarceflibili viriditacc prxdna, oblongeis pediculismtentia .c-quorum finu nafcunt^{ff}
longi caviqj^orcs, Ariftolocnaclongarfloribus forma timileSj faturatamen rubdincto^{ff}
magisdiftintli, interncvr6aliquantu!umflave(ccntcs, oblongisq;pediculisinhirtcsjri^{ff}
(urdiffr^usAftlhlffSidftillfd, minor numero^{ff}
ecnus habct radices mftarprarcdcncis, vcl fmlilicis alpca-, verum graciliorcs,& fibrif)^{ff}
busdamtcnuibusdonatas.odoratas. Floresprofcrremoncbatlulio& Augufto.

HIERACIVM PARVVM, CRETICVM. ad fincm Cap.xxxvn.Lib.v.

Q E M i N E natum etiati efi Iacobo Plateau iftud Hieracij genus, CUUS iconcm vivisc^{o*}
Olocibusdept&araTQtcueaad memittcbatquilem tabula (yb)edi proponvenus.

Utrifij par-
va. vifera.

E L E G A N s autcm efi plantula.cujus lenaautplurafolia fumma tetlure diffundu^{ff}
quaparteradiciadlixrent, anguftiort, extremapartelaciora,perambitumincia, "acdio
nervo purpurafcente: interque nalcunrur bini aut terni cauliculi,circitcr pedcm alti^{eno-}
dcs.prjcterquam (uprema fere parte,ubi in binos ramulos dividuntur, liiboafccnbus^{par-}
visfoliolisvaldcincifis: floresinextremisafctiejsnafcunturfatisgrandes proplantx^{pro-}
ponione, ex mulctsfoliolisfibunviceminctimbentibusconfctentes fumtapanarccn^{ar-}
albis.lubuscarnci {fi iraappellarc licct)colons: radix efi fingularis, obloigtufcula, " P ^
nccr^flor.dciidc pad an m ad mimum vfque gracilfcenSjaJiquot lateral ib us fibrifdo^{ff}
ia, iniUrradiciscichoujfilvefris.

FVNGORVM
IN PANNONIIS OBSERVATORVM
BREVIS HISTORIA,
A
CAROLO CLVSIO ATREBATE
CONSCRIPTA.

ILLVSTKI HEROI
 IOANNI VINCENTIO PINELLO, &c.
 CAROLVS CLVSIVS ATREBAS.



EMINI, Illuftris Heros, ante annum mead te (cribre, occupatumeffe in concinnando de Fungis Commn- tariolo fabrcverò mohicumj Clariflimumvirum VyC- fem Aldrovandum in codem argumētoyerfari) refpon- dere, deijsdunraxatagcre inftitunTe, quos in Pannonia variotempore obfcruafTcm, qui, licetalijs etiam in Provincijs fint communes, fiericaincn pofle, ut: quEEdamnotxmihipetfped-afue- rint, ab alijs forfitan minime animadverf^Ecranenunquam exifti- martem tot tamque varia genera in una. Pannoniarcperiri, ant illain adebdiverfaspecies diftinguiporuine.

DvMverbificveirfabar/ummameacurafLutjiitinillis obfervan- dis, viros **mih**i adj ttngerem, in eorum dignotione induftrios & C adpri- mcexercitaros, 'qui moneret, quales innoxij, quales perniciofi efflent: nam, nifl valde exercitatis, difficile eft Fungos dignofcere, cum plcri- que inter lethales reperiantur eiculentis pcrfimiles.

^{II} SINGVLORVM itaquCjCumcdulium, tumpernicio {brum, quae ob- Jervabagenera, nativiscoloribus a periröpi{tore exprimi curabam, fumptusrácienrellUiftriHeroe Balthafare de Batthyan^i Ereditario DapifelprumRegni VngañxPricfe<3:o, quimeunice amabat.

. CETEILVM omnium brevem hiftoriam concinnavi, eamc^ in duo ftimna capita diftribuen dam cenfui: Primo quidem c{culentos fun- gos defcriptuni SjCofq*, in varia genera, SC ilia rurfus interdum in fuas fpecies diftributurus, addito etiam apparandi & condiendi (prout in* Ijlllexi) modo: Alrero autem, perniciofos Sc lethales, eorumque varia genera & fpccies.

HVNC porrò Hbellum Jllufttris Hero Sj tibi nuncupare, mearq-, erga te obfervantiac publicum teftimonium flèvolui^ertomihipcrfua- dens, minime ingratum tibi futurum. Deum autem Opt. Max, oro, uttequamdiutiffimc ferve tincolumem. Lugduni in Batavis v n. C511. MaiJM. jj. IIC.

F V N G O R V M
IN PANNONIIS OBSERVATORVM
B R B V I S HISTORIA,
a Carolo Clufio confcripta,



VNGORVM, cum Vienna < *Aufri & vwererru, multa & varia meis in Pannonias peregrinationibus ohfervabamge* nera, quorum magna partem^ cunu in vkinisjturru dijs Provinces etiam crefcere non dub'ito: fed quia tftic diligentis [fubinde in frtta, c&duasfihat, nemora, montanaque & afertz loca excurrans, cum tjsqnoxtos & perniciofos ab efculentudifcernere noran£j) ohfervare potuun(m inutilem operam me fumpturum extftimavi, fuorum bre'vemb Boriampertexerem

ILLAM porio in Unafumma capita dtvidendam efejudicaviut/ci- licet Trimodetjs fun^agam^uiedules^mmimepbrnmoji£fihnan tur. qtamqtiam (ut ait Plwim) qu& voluptastanta ancipituctbi? oJttero autenu eos percunam. qmbus nemo uefcifolet' -fidpernicioftunt^

FVNGI ESCULENTI

'CAP.,' I.

ESCVLENTORVM Fungonim, quos primo hoccapitcdefcribere inftitui, varia funr ncnera ac quofineulorum divcrfe etiam interdum fpecics. Singulonim autem generum hiftoriam protempsons, quona fcutur, ocdme, uadendat nexiftitnavi, atque eorum fiagulagncra. m lias fpecks (fl quas babebuntj diftibuenda.

PRIMVM CENVVS, »

APR, Li crfc. t genm Mud, quod apud Vngaros, a W ^ ^ univerfam Germaniam Jcl in ddiris Et fib trajeflum & in corall as compotauu cdayo iufpen^t & figg? adfervencuctia, mcdiahiem_eoovefcipoffinc. Vocanirauten> abVDgar» & ^ ^ a Germaniis^ut^tm Cujus quatuor ohfervantur fpectes, colpie & mag Qiwdinemer fcj*.

I. Le^m. pollicis^trcmumirnculumm. gn. tudmerarofuperat, valde rugofa, & iafifaviini brnce. Jtulas dlthnaamcbranaceacute. color. falb. caadsquaful. gmcu)- caiprx fertitni [lmsvctisr Ligo & & proniinentes, pediculo, quom mur, cavo, ut & wt [ftn

fu pus. ^ Srpno rem magnim dmenomup^q uantulum contractior est, & pyri in clvbano cofti inftar rugofa, vel poiuis tubet aut radicem Anftolochiae rorunda; vetuftate contratiat Simiiltis rugis pridiuni, valdementiurj Coloris exrufo fufciicujusrci causa Germani Spont itu « r(t) (mcognominaiu, rwm Primk formanyndifrmii LS. redduplo amphor^rbicuians pIcrumque. prxrcpcdiculum quofuftmetar Mn Cerdum autem uiriumunc. arum longitudinem^ qualcmtjue aut ampl Lem Saffitudinem excrefcit, ejaodem cum ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f rugofa, & c vctuti in cellulas d. ilmda, mtctoe etiam cava: Gcr_m ai» s © t « t ^ u ^ m

d i * recensna^ figura. quodammodo ad Terriam^uEQrbicuIameft, acccdic fed ru^rmamstL. rbatis & compreiris^cinSecu. ida. colorctua im^ . scandican^ & pcdiCU- 1 « [Tlongi Sr. Paulo adulnot ve<i, in tongirudinem excrefc. tmeti in lbr^ut pile, ifive pctafii Germwici longioris qu. limbo earet. cujulque pMd eos ulusdunuxat hicme, fons ctiam rugofa, fifin cellulas dd linda, qux colorcui pallefcncem veluci fuhgmcquadam infis

i. Gei Kiiscfculemoruin Fungorujfpcies.

Delmann
cutten.
J. n. n. n.



Fungus
Spong.

Morillet,
Spongiolc.



Ferendi
ca.



Alia
fungi
ca.

in. Genus efulncorum Fungorum.

Terrâ
fungi
ca.



Natali



Ferendi
ca.

fcflurr, habct: incrnâ autem parte cavaK
hiante: Germani illa^el nuuKctmi nominal.

Nafcituraicm Prima fpecicsapud Vn-
garqs plcrumqvc sub abictibus, in cu metis,
arcjue pracis.fci in hisAltra pre/ertinvTcr-
tia vcrô & Ouarta sub quercubus, magna
cxparre.

videiur porro hie fungus isefle, què Da-
lechaps Jpongiofum cognominat, in a(pe-
risSc(axofisnalccncem, la:pe tauicn adCa-
ftancaru radiceSjColarcfulvo,corpore spon-
giofb, figura in mccam deliucntc, fuavflimi
guftti;;quam ob remindelicijshaberivarijji
modisprpiratum, uc heminum palatii va-
rijscondttntis obkdatur. Galios vocare
Mm/es,indc fortafle, quod ad mon frudui
figuram nonnilnl acccdac.E t qu«m BapttfU
pona, a Ncapohcanis Rpengioisi appdlan
fcnbit.

CetcrumWJatr<tc^i rcccotcs fblenc Vn-
gari aflare (upra craticulam , vcl ex olco de-
coquerv : fedenam reficcan [orrori poflunt,
pnustamen ni.iccratt; qui verdelixis vcici
mavuli,inaccraiinon oponct.

GENVS II.

TJTLTRA Balaconcm lacum Vngarisc, jn
V parva infula cui nomè Favet, Simidien-
ii Coin itatUj April jcrum menfenaJciimel-
ligebam Fungi genus delicantffimi faporis,
cujus no men indicare nemo poteratr fed illi
fimilisefle fcrebatur.qui inter pernicioibs SC
lchalesDecimumfexcumgenus est, & ab
Vngans Kygio gmb*, a German is STatfC
fcctwmen dicitur: pyramidaii tamen do-
drjncaln.]; npicc &:angultu liunc fungu cilir.

GENTS HI.

TERTII generis, quod Vngari Szent
GjevrigamtaU, Germani i 0<mt<St&il
fitNammtn appellant, qu ia cii cad ic D. G eor-
giofacruni(quiuvicefimum tertium Aprt-
lisincidit) inveniturj unicam obfervabjm
fpeciem,

P.irva autem ilia est, diiarum unciarum am^
plitudinem vix acquans, orbiculati fere for-
ma , fuperncquiciem aliquantulum excubc-
rante.&quodamodopulvinacajnferneverd
concaincraca .&quibuldam veluti vemsdif-
tinfla,pediculocraffo,brevicK, colon* cxal-
bidi ,cui flavi quidpiaro admiAum Jit.

Creteitin ficcionbusatque pafcujs pratii:
& fortafle is crit fungus, quemHora cms (*-
tyraqarta lib. 11. Sermonum, optimum
pronunciat his verbis,

fratctsfihus optima fxngti
Natiiraetf: alijs malt creatiur.

hftveroTtcreiurn liocgciius.aliorunirljn-
gorum mo'o preparandus, qui reputgati,uc
pluriinum elixan (olene, & m fmflaconci-

di, qui inter binas lances rcpofira.inferpo olcoolivarutn vcl butyro, He pip ere addito, fu-
perprunascoquuncur: aut cumlando injicicurjufculum txlailii cremoicf araiuni, quod
Germani Jliirfroun appellant.

GENVS IIII.

QVARTI gneris, V gneris, dicitur quia pib ru (arbo) G dicitur r mi.
 maicum nomennulum novi) plurseuam iijnt fpecies. N#rn aucparvxiunt) au: < / > •
 med: Oeres, auc majores. SZ.IK.J
 aha.

in i. Generisefculenc. Fungor. j. fpecies



r. Generisefculm. Fungor. i. fpecies.

/r/ww.uncialis duntaxareft magnitudinis,
 autpauioamphorjrcrairofubnixapticulo,
 infenia pane convex a, &c **goali** fornicara,
 fulcis veifrijs quibufdam appjrennbu-
 tata: fupcrnaauiē in **mucronem** quodain-
 modo vcl mctam raft]giata, coloris albican-
 tisfufcoiiniti.

Media fpecies paulo planior eft, quafi in
 orbem circmaca, duarum unciarum, auc
 majoris amplitudinis, **ioferni** parcefimiii-
 ter fornicara, & frijs quibu { dam vcluti exa-
 rata: color idem qui in fupcriorc.

Ma)vr, qua: & Tercia, formam quidem
 Primsfimilenaliabet; ctnim fupcrni p.ite
 inraucronem faftgiaracfl., inferniicava
 & fornicara: *led* ejus magnitudo plerum-
 queeftriumunciarum, craffiorcque pedi-
 culo nititur: color liujus magna ex pane
 magisufcus eft, Sinotis qmbufdam inter-
 dum difliiiiSus: deindcfupernapary, u[p!u-
 rimdra laccra& (ciflaapparct.

GENVS V,

PLVR.ES item habec Quinrum genus
 differentia:, fedorancs uno nomincap-
 pellacas: ab Vngaris quiden; *PezJric^a*. Ger-
 manis vero P*(irtitt(i. Sola porro carum dif-
 ferentia in magnitudineconfittit, quando-
 quidemforma, niatcria, & colore p*nc con-
 veniunr.

Q Trims autem fpecies anguiofa rTgura eft,
 quatuor unciaruru amplitudints, brevi &
 quafi nullo pediculo, (ed co valdc craffo: in-
 ferna parscandicante& fans < jcn(a **tnateria**
 conltat: fu perna vcluti fpongioi* ?^, & villis
 quibufdam obfita, color' Sex rufofulC.-.

Micrtt magis orbicularacft figura, craffio-
 reSc paullo longiore pediculo pr^dira,
 qu in as auc pi ures uncias lata .tocidem longa,
 inferne Siiupernc aPrima fpecie nonmul-
 tum differens: materiJlautem, feu corppre,
 paulo craffiorej& magnitudini re^pondente.


Terti longe majored, orbicularafere fi-
 gura, intrescamcnlacinasdivila, urtrifo-
 lij frondem quodammodo rferre videatur:
 fex autem aut plarcs uncias in longitudi-
 nempaict, tondernin) acitudineni • craffio-
 rc ctiam ea confat pediculo, unciimq; la-
 to, btevi'tamen: coloridem qunn (upcrio-
 ribus, inferno; fed (upernc, dilutior **iiNs**, &:
 fpongtofis quibufdam craffisq; **villis** five po-
 tius frydium rudimentis ex fufcopallefcen-
 tibus pr^dita.

In VI morum, Populique alba? caudicibus
 dejeftis nafci folet, fid bis plerumque, etiara
 ter in crdum^ in anno ptovenir.

W AAnautcmqenusilludquodPliniusGracisPezicasdici.&finradice.finepedicula
fciafleritr
m. Ceteriim *PezSrick* repurgau.eodem modocondiri potTunt, quo *Pfvf" S/ dc quo inn a
Dccimo (Optimo vefcorum ftingorum genere: (ed&elixiconaduniur, atque in lance
compoltui tmlbSj land um acccnium initill.mij ;

GI

v i. GenusefcuIentorumFungorum



Ex i G v A est in Scxro genere diverficas: aut fi qua* est in magnitud ine differentia, cam
ex scare duntaxat proven ire arbitror, Hocauiem peculiars lu bet iftudgenus,quod
non finguiarc,(cdcontctrim pluresiimul pierumquocrefrunt: nam vcl bini,tcioive iimul
fungitonjundt'.T) nalC"ntur,vceletiam quiniifcniucautplures-

Sunt autem omnes ferè orbiculari formæ, planæ tamen, infernâ parte albi, & striati, su-
perna aliquantulum procuberantes, mediautem nomuhil deprcfli, ut umbilicum cxpri-
nercquodaninitKloviticantur,colorcmag!sfufcoquaminfirna. Minorcs,circtterun-
ckm laci luntjaucpauldamphores: Mcdij^inaruin unciarmlacitLidincDi adquireunc, vcl
cxplentiMaxniiosfluatcTiiarumctiamunciarumamphtudinctnruperarecxiftimo.

Omnesverolix Vngariconoininedicuntur *Szi/fütermewralja*, hoc est, adulmosna-
(tens fungus: rametfimidirfercncer ad ulmi,quercus,cerri ,f3gi,olhix (quannGa!liHf//«») Germani^.
oiibiic(ciiappellant) betuix, populialbx,&jug!andistadtccs,auteanimcit:|e-
ftitarum caiw^teSjCrcfcantiGtrmani 5?uct)ciift)U'aimiini/idi:ft) faginQsfungos nominant. Vn-
gan ji-n-Jm eum qui ad Oltna: radices nascitur, coloreque magis fufco *tin&OS* clfc vide cur,
peculiariccc *GilvM %yertyknf** ferment appellant.

Magna etiam cupia nascuntur in truncisrefciiiis fupradidarum arborum,pra:fenim ve^
ra ulmi&rjoglandis.fi Icviiier :cn.i,vcl ectam (oioftramine iepulti & te&ipucrciac. Q uod
valde contbnum eilcum his qua: Matcluolus Commenc.in E3iofcorid.Hb.i.cap.de Populo
icribic :cujusverbainftudioforumgrartam, liicadrcnberelibuic, ncquisvanaciTecxilu-
met.qux V ngati tic fungi modo deientpti tia^alitm aium,

Atqui,inquiC.praccraquaraGalcnode Poputi facultatibusfcripcasunt, fciantvclim
rci medicxItLjdioii.populumalbamjliumorenuiscdamadradicemufque.&aquacalidi,
in qua fermemunifuenrdiflbliKuir^perfufain, infra quadnduumfungoscopiofosciiere*
dutquoqae gratiffimos.

Repcnturautcm anovo VcreinAtitumnumufque.

Si mi l, porrb tanonc apparatur hie fungus(nccam repetere cogar) qua Decimum fcpti-
um rruic-prorQuii penus Geimams Acpf<lincl/ Vntiari* Vr aamha, dithim: Ullde pctC-
nmimiculencordii genus Germanis Vngaris Vr *gomb* * didum; uodc pctc-
h

C^E " I M [generis forma duplex effemihivifaest: Nam vcl pianos conrpiciebam fu-
"Jpcnupartnonniltunientes, interdumeciainambitu bceros, colons aittalbfu-
fcupcrmitti, vclmacujLsqutbuidaindifinai: inferni nonnihil convexa, & telm *tit*'*)
five

vii. Genus efculem. Fungorum



viii. Genus efculent Fung. 2 species.



fi ve folds, 3 pediculocrafliorcin oras uC-
cjuedu&is, cjaraca, fu'ci colons. Auc
Oibicul an p?pc figuiajfupemCjimiio
cotafuperfictc, candicantes, ur ovumcx-
calptum exprimerevideatur, prsfrcn
adcmpto pediculo.

Hoc genus Vngari *Cb'bf'drke gamba*, id
cft. tuberofumfungunj. appcltan: -Get-
mam 2fingertitij/ quoniam jn ficcionbus
pratis, fivepalculSJmtapagosikis {qua:
ipfi 2Tnfermnominant] provcniat. Terau-
tem in anno reprecitur.

Scd&iftudgenusnonincomode for-
fitao referri poilit ad illud Horatij, dc
quo in Tercio genere.

^ ENVS v i i r.

OCTAVVM genusno ineptcintres
ipccics(mcaopinjone)qutsdividat:
quarum Primac&:(ccundae difcrimen in
fola magnitudine confittic, nonmlil &
colorc: omnes tamentres.finiinifomia:
Vngari, A'f/frfw^iWi^hoccft. amarum
fungu: Germani, "Piff^iingi Galli, C^i/w- i
p jgnox \$CPotiren vocani: tametli inuni-
\trfum **omniapand** Fuogorum genera Pouran.
ijsnomimbusdonent.

Prima ergo fpecies, bioasfercuncias
laract, planx, fed oibiculatx figurx, fu-
pernecamenquoJammrldopulvtnara. SK;
candicas. inferne vcluti camcraca &: con-
vexa, Itrijsquibudania craflb pediculo
in ora **du&is diftifi Qi.**

Altr*.bijic profas Jimili^fed amplj'o-
ris magnitudinis, ut qua: quaternasauc
plaresui)cias2rquec. eju(HemcumPrima
figurar, fed crafliore pediculo fubnixa: fu-
perne albicutc, cui InfprL'bliquot mac-
culxfu(cx8£ flavefecntes •.-fernc Have.
fcensaliquantum .^magiscou^Riis
ftrijspediculoincxncmas oras p'rodu-
tus, exarata.

Tertias fpeciem Vngari *Vere's Kefirnxr*
quibz Germani eadem de caufa Robe-
pfiffg^nomioant, quia magis ruber
pricedentibus: fed & Vngar *Eik alya* di-
citur, quod fub fagis imcrdum ciccat.
Amplioicft hxc Secuttda fpecic, & ma-
gis circinatxrotimditahs, longiore gra-
ciliorequefubnixa pediculo, Sicoloreijj-
perna &c inferna parre ex fufco (ubru-
bence, Don miniis evidennbus & con)pi-
cuisftrijis, apediculo in orbem dirufisjn-
feriusdiftinfta^uam Secunda Ipe^ies.

Omnesautemtpccics, ut pliuimum, *Kitiit.*
in exduis filvis na(cuntur, ci reitcr Pente-
coften, hoc eft, (ubextremura Maium,
aut lutij initium-

"-Prioresduarpcccics, pahto gratscflc *****Jus.

cruncur, acqui tuntureodem tno'Jo paracis, quo Dcctraum leptmum ge-
Tertiam edtmte nonnulli, (cdpcipauci.

11. Genus
F. m. b.
Caemling

IN Nonogenere pluresetiam obfervabam differentia Siquas ordinc describ©: fed omnes uno nomtne dicitasc<hn apud, Vngaroj, ipm apud Gernanos: etenim illi • *Hertnch*, hi *Kremlins* sua lingua appellant.

Frier autem species, Decundo generi vaJde abumilis non e#; n>m circimar in piano reefrotunditatis, unciamaut binasmagna, (upmapircepulvinsca&candicins, mfernc autem mag!se(tfu[ca, Sicvidentioribus Itrijsdonata. quam Secundum genus.

21.

AdQuincig'-'ncrisPriniam speciem pluriimim accedit/tftt'M species:ecenimangulofa efl, ledamp!ior, utquatr unciastuar. uoraur. pureixquarcexiftimem, (upernccr. iama[bi] cans, non, ucilla/ufca: interne veionō IjEvis&glabra^infartilius, am alba, fedcraillislrijs ab umbilico. five pedicu]o, in orasduflisjinfignita.

22.

*Terti** magnam affinicacem habet cum Oclavi generis *Alter** fpecicquiafereorbiculara est, & ariuafls pine roagrtitadiois: fupcrne tamen in albedmc magis fufcact: infcmcilli nondi(Iimilis, ntfiquodejusflrisrainorcsfunt, & pediculus illani (u(linenscraflior, brevior. atque magis nigricans.

23. I.

Voros He
tench.
Oiotte
ttmttng.

JolamagnitudincabOclavi generis *Tertia* fpeciedirFerchujus^wfr/iffpcies Illaenim anipliorcfi, hare minor, utraqueautem circiucacere in piano rotunditam: illi fiipcmc' rubefLcnS) hsecniilromngisrLifcl'cens, eimque adebob cauiam *VngtzisVeresHerentk*, Germanis *OtotttSxtnttttgAiStZi* graciliore illa pediculo fubnixa, hreccradiorc& magis albo. ut etiam mferna hujusparstandiorefll illa, & minusvidentibus ftjnjs exarata.

iiAiait

Nafcuntur autcm omnes eodem, quo Oflavi generis species, tcmpore, atque in carduis, ut plantatum, nvis, quemadmodum & uiz.

G t s v s x .

LCB J J J
t/culle.fmg.
ing.

MANIPESTVM cfl inter utramqueDecimi generis fpeciem f binas enim ejuspeciesohlerv, lb<im>dif(.rinjen, jicrmagnjturforere(lt,-Ecjualis. *omen utriq; N apu J* Germanios ^i>!<ti>s>quaficcrvinum dicas. Vngari ut vocent, ignoro.

x. GenerisefciilenrorFungor i. species.

Nasch
bisfing.
Cchewarje
bisfing.

it.




Prima species pediculo binas uncias longo, minimum digitumcraflbnititur: iplus verd fungisorbicularisin piano est forma [enjo*] dumetr duarum unciarum aut amrJioni magnitudinisest) ruperncnonnihilcxtuoic* scens, &c vcluti friceis villisobfita, colorc pufiiceodilutiore, & vclucicarnco, orisin informaii) parccm valdcreflexis, qu«exalbo rufclcit.&mulris (rijs, niftaraliorum fitngarumdifincla clt. Hanc speciem German* *Ojucfc J>f(jiii3* hoc est, hirtutum five villofutn ccrvinum fungum. quemadmodi Alw* ram fcqsjentctn ^comiw^t i)Ufcll^S/ quod fignicat nigrum cervinum fungum.

Ahem species longiore conlht pediculo, ejufdem ramencum fupcriorecraflirudinis. (cd inficua hujus pats ciatfior est 6C v<...*) Jim bo circumvoluta: pncerca in Jiac bini plcrumque fungi conjunttim ex eodeo pedc oriuncur: orbiculans etiam in piano (unt figure (practerquam qua parte icfc mudo comprimunt)c)uldcmcu luptnrc magnitudinis, aurpaulcamprior, paululumcxrumurcerts fupenoreparte.&glabra, colon sc* rufb fufci,-oris non adco in mfernam parted inflexis, qux non minus frequent^busftnj* est pradica:» quain *Prima* species, colored* palliHonigrefcentc.

N alcumur in carduis fiWis, codemptope-niodum tern pore quo Nonuo *genus*.

GENVS XI.

x i. Genus c&Ltlcacotucn Fuagoram,



I s D i M locis, atque odcm quo Decimum tempore repemur Vndecimum genu S, cu-
jus sunt cam/pecim vidc rcm mini: aut, {jqu; e est differentia, ex fungi arateduicaxai
f rovenit. Genia iiii fi? l<ci* "Whocft, caprin Lni pedcm five ungulam appellanc, ab Vngans
nullum nomcn in L-lligere pot<i, nifi iudi Gennani 5 mutuacum.

Iriitio quidem in zquili clt fi^ura tuc fungus, migis taten ad orbicularem tendente. per
or: * \Acei, tUurum unciam Ucitudinc, lupenie **Cubifca** colotis, infcitic candicantis, &c
ftrij dilli (3>. Aduli Luraucem, magis orbiculata; cft figurj:, Siperorasma Jislact-ra: quaiu
recens nacu SijUm longc amplior, HE cujus diameter lit quatuor unciarum: ej us item colur
magu f QICUJ iuperne^albicam iDferne, cui fufcedo qux Jiuu adanxta,

GENVS Xti.

T) ROVENIT ctiam in filvis Duodecimum genus, &c reperitur circa Penrecoften. Id **tu. Oum**
German! S? tt^ 8' quali Caprei> lifui igus d: cttur: Vnga Jfaam nomen **mihignotam,** *ibuilt frag.*

Vuicam tci. im hujus Fungi (peciu oblervabam, nec forma, nec ma^nitudo a Prima
Ptcic Oaavi generis valdc differentem: (cd color diverlu Sj qui fupernethvefcit jhferncx
nivorufelc Kjr iiii que habet in fupcriore iipcdn- iilt fluit' imifu Hinet) p. irrtij uique pro-
^u^as. illafque in cum ij Jiatit dttucentes: yracshor amem iscil pediculus, ijuaji Piaa-
VI generis.

GENVS xni.

DECIMI-TERTII generis varix (unr fpecics; eam ob caufam apud Vngaros & Ger- **xi. C'M**
manos vaniobcmoir hoc fungi genus cognomina- gneralia utc mappcilatione Va- *xi. C'M*
E^ns GWawi & rajj. Germanis Teubdhi^ dicitur. *xi. C'M*
Nalc nntur aia-mo .mcic jufpcc. es promifcue in filvis, felunio Lu Aiuc menfibz *xi. C'M*
inveniuntur. Germanorum pon 6 dii liauioncm **fcjtjwntcs, quinqtichaiigencmfpe.** *xi. C'M*
cics faciemus. *xi. C'M*

Prim*, omnium ampliflima efl, utcuju? plana Oiperficies quincuncialcm dumctrum
habcw, orbicu Uns, uc pluruniim, efl ems figura, digitalis **tangitodinij** redirulo unciam
craflb, fubmxa: fupemaparre protuberante, colorccx albo vircfcence prxdita • infer
"a candurame & fnata. Idara Germani ftawtrn Miiw/ hoc cft, Dominarum
dominant.

Alterim paullo minor efl amplicudo, ut cujus diameter quaternas uncia non excedat
orbicularis **eriam & plan JBcftijux,** fupernetumefcentis, (;din medio & quaiiccnrro
non nihil cornpre (rx, uc umbil] cum mentiat. co! crifex c Trult. -o, vii., li, 8<: fu] i. o comm^
xti-
ma. Hinc Vngari, *Kerk galambicza,* Germani *Blaw Teublinge* quod ejufdem efl figurificatio-
nis, cognomen dederunt.

xi. CMM
xi. CMM
xi. CMM

xi. C'M
xi. C'M
xi. C'M

xi. C'M
xi. C'M
xi. C'M

xi. C'M
xi. C'M
xi. C'M

Xiiii. Generisesculent. Fung. 2. species.

111.



Wierwag
Kocher
Kocher
Kocher

112.



Echinarze
Tubellunge

Nacht
Kocher

Atquais fere cum superiore est Mam-
pitudinis (Inrcrtum autem vix binas uncias
li' per accjus diameter) sed paululuin a Lgulo-
colorit fupernc elegant is, iircjui expurpu-
& facuratb ru'oro commixtus vidtatur. c-
micannbusultt, uando, (ed rarisalbismacuii, J,
quas cotralu arbitror Horc il to ex to iadiu de-
terfo: inferna pars candicat, & fulcis ftjns ex-
araracft, orisinambLCiiparu&dilurt'furpu-
raiLncibus, extremisnempc lupcnix parcis
oris ahquatulutn mflcxis. Vngaris Faev/s Ca-
jl/fzrfj Germanis Tvott twidmjc; quod idem
est, dicitur.

jhttrra Ipccie; minor est Tertia, neccjus
fupercieitqiaeorbicuianseftjguia^diami-
trum binas uncias excedere puto. Vncialis
longitudinis pediculo lurtineturj graciliore
quain fuprior: ("upcrnaparsquodammodo
pulvinata, in mediononnihilc6pcilrtj& um-
bilici formam c>primens, colore flavclccnrc,
veluti fuliginc inhrfto: inferna pars alba, tu-
fcisftrijspediculoadcLrciifercntiamdiflin-
fla. Germani 6c&u><"ifC<iWfiicy jdc11, ni-
grum cogominant.

Quint*, fpcciei cognomen dederit Vngar
W&ras gahmbuza, Germani Omile t t j /
quat i d r , perum. ^ Eli i autem est cum
Q artana ngidinis, circuprcin dano vo-
daimmodo rotunditatis, fupernc etiatn intu-
me(cens & pu linac(a pcorq; re idur f pe-

cirhus, coionis fuperncex albo fufci: infemverdparre, candJcancquidcni, fcdquam fu*
for Has in 012s excurrentcsj veluti inficiunc.

GENVS XII.

113.
114.
115.

T7 OnEM, qiT. ofijpcrioris generis species, toporcinfilvisori[ur2>(iffil><iw^tfjfrf//TOc(culcn-
£1 corum wngorum genus, quod Vngati A1/w/^wfo, hoc est, Leporinum fungum: Ger-
mani Olnk<Wn/ Leporinamaunculam, appellant. Vidctur autem induas species pofledi-
fttngui nifi quis foriiranxcatcduntaxatdilFerreputat,

Triothepecicifibrona aigulofa est, roagistamen in orbccitcinaca, unciam, aut pauloam-
plus lata, & re-i crasq; pediculo fubnixa, fuperna parte extuberans, pallidi coloris, qm
flavazaliquobn lacula; vaiium faciunt: infctna pars flavcfcit/ufcisque Itjns exarata est.

Xtiii. Generisesculentorum Fungorum fecunda pecies.



y4//ff, (fpcciesduploma jor, noo mirustamen, quam Prior in ambitu angulofa, & vcluti
craliionbLisquibuluamkcinijsic^ajluperna parte non pulvinat^uciuperioiijk-tl pot ius

xv.Geactis efulcnor.Fungor. z fpecies.



cava.itautjfi quis man... oblique Jivce-x ljtrediinta.k'ac coiuyiciat, flavum (namcaliseflejus Color) florctenere videatur : infernapars^ukisftnjsinorasexcurrencibus& prodiu&ls, iuGgiuuctf, croceo ^ue colore infcfla.

GENVS XV.

DECIMO-QVINTO gneri.nomcndederrunt Vngan Ditznogtmka,\OQQf{,Su\\stuhgT. Diuugobi,

NasciturinfilviscodenijquoDecimum-quartum genus,cempore. Duse autem sunt ejus species niamfelto difcnmine inter Ic diJrcntesiquarum



Friar orbicularisferee(l figure, circiter quatuorunciaslata.brevicrafiore'qucpediculoofulta: (upernè nonnihilextuberans& pulvinara,colorisfubalbidi,icd vclunfuligire iMfe&i.perquem spar^ funtaliquotalbie inaculj::infernapars^ubalbietiamtftcoloris fuligine infecti, mulcis cralTionbusflijs nigricjntibus , apediculoincircuicumexcurrentibus,notata.

Alter A Pnocmamplitudine fupcrat, Sc ejus oraein interiorè partem nugis rcllxx, orbiculatxquodammodo figurae, cujusfupenor pars pulvinata, coloreque cinda purpureo,cui ruber faturatior com mixcus, in meditullio tain en flavefee ns, &£ fecunduro oras, albtmaculisdiftinita-vnfeno.Tparsexalbo fufca est, &: tenuionbus itrijsxarataj pediculo.quàm in Pritnâ, longiore.

xvi. Generisesculent. Fungor. 2. species.



Germani hanc postremarafpecicmârubro colore Olott etjwanWfina nominanc.

Tametfi autem nan valdc probecurhoc fungigenus: noiidefimt tamcnquillovfrantur.adcoimtemperancisgulxreperiunturquidam. An porrò hoc genus.cRtiumi iludPlinij,quodxxi [.Natural Htjrorixcap. x x 111, venenisaccommodatithmunycirc a(Tcrit;Cercè nomenconvi.hit: licet ille form am non ex preffent.fed circa radices quercus, roboris, cuprefli&pini, gigmlcnbir. Ioannes BaptistaPorta , Suillosantiquum nomen apud Ncapoiitanosadhucctineric aic, acque illis Silli dici.

G t u v s xvi.

DECIMO-SEXTO vefcori fungorumgc- nri.nomenfacisobfccEnumapud Vn- garos:nam ilii yargxxyaappellant: Germani autem33idt\$/qujapediculi, quofuftinctur, parsinflma,in majorcm crefcatamplittidinem quâra fuprema,ad ejus pene fagitte, wram, quac craffioreSi vcbtiorbiculatacft ciifpidc, ipfis tSI| nuncupate, Gallis autem water ax. * Repemur in iilviscirciterextremmAuguftuni.

Ejusporr6tresobfervabim species inter fcdifferentes; nonnulli quartam addcbant.fed tampropterforraxditfimiltudinc.idaliudporius fungi genus rferendâcenfui,dubiam<j;? feci,reponeas inter Vndvicelimuiu &c Viccfi.uunj pernicioforura fungorum genera.

Frim*

Prima v. no quatuor jncias longo fulcitur pediculo jupernaparec fatigraci B. & min' ro'i digiti erati) '•••'••• vix lupcrjnt L. infernacraflbj Ut quincialis fit aut an. plior, colons vane mixti ex txx Q'o, viri li. & fulco: (uprior fungi pars orbicularis in piano est figurar, turnciens & qual pulvuiara, cujm diamerct trium unaitum aut pau) o major, color ex candicante (ubtuicuii infenuc. pjis. i' uipediculus iihitci .nuliijilrnsdclwrniataest, led plana flialbaiauamobtaufam /ngan/f«T^jr?Aii*; \hoc est, alb" m. cogno Diinant.

11. Secunda species breviora conitat p g sed eo / m e q uote uam prima, ut qui ditalem crassitudinem (upcmcartjuccvclcuam fupcrct, infernc, binas unciascuHi semisse, & coloris xai botlavercentis; ipius fungi caputorbicularata: quidem cft figuix, fed iniqua- l' & q' i l i n l i u s d a t e r c d i e p l f i l p d o i v l a de fu e- rat, coloritque est ex navo rubelcentis: verfiip^rsnonnihil camerata est, colorifquccftix flavo rubelcentis, nullis striis exarata. Vngaros appellari deberet, mea opinione ij i / ^ j t ^ j i d e f t j u b e r d i c i t i i r . c u m v o j i d t i t . H n v u s : n i t i t b r t t i c o c o g n o i u i n C

111. Tlrr/wlpecididupicxftidi/Ferentia. Nam alia est junioris 5ircensnatnEf3Cies, alia adulations. lumoris porro figura pmrfusorbicularis est. diamccrum duarum circiter unciaruni h. ibens, valde in rotundum elata fupeme, & fufci admodum coloris, fulginoiique: mfemfi tav, i Sitocnicata. , colotis albi & rni Uis ftijs de forauu: pediculus tllam futiitens binas uncias! Q' figusc[t, iutp. Tu! 61ongior, fupremapartepo] licariscraflitiidinis, infina, duorum digeorum. Adultior autem Jongcani plior cil: natiu] Uatcfnas aut quinas uncijslatuseft, ternas fercalcus. & in rotundum quad tafigiattts, coloris fupcrncx fufco rufefcentis; inferncpbntis. xquali Sjalbus, necullisfriis exaratus rpediculus fulciniternas uncias longo. **lupernapartunciam** craffi), infeni abinas, colons exalbicantefufc]. **Iftam fpeckm** Germani **pmtt** biati cognoianr.

Habvtverti hoc fungi gcuus aliquot notas. obquas Pauli *afitttiria* cftc liccat conijeere: ctenicnculore **fuliginoso** lunt **tjus** (pecies, orbectiam quarum Jam [am amplo, ui (arpei' - manom caputzquci Ujpedicatio omnium crasfijbinfracolorentgro vi rc(ccnte.

Cccrum hic fungus apud Vngaros in hunc modum apparat iulet. Repurgatus conciditur, truttapaululuni in chbatio cxficcantur, de Lndcina quacixantur: ijsdem decxeniptis. panis vulgirjs. quo videlicet familia uti folct. talca-fupcr craticubmt oflx, in prxdiilo jutculo coquantur j ddei Dum jurcutum cribrof arinariotuccrnuir poflremo, Jiuiccontimento [quod nec tenuenimiuin, nec rjrum ni in isci* edebet] clixafungi frufta impountar. addiroqueace Eo. pipcris. gingiberis. atquccaryophyllorutn aromaticorum polh^c edunrur. Ti-nuisantem frtunac numines & ruflici, illocumpanicircni incpultis ijiit^{af} dccoflo. S: piperc denique infper(o, vefcuncur.

xvn. Gcnusfcfulent. Fung. ptimnprodicnj.

prti. Genu
afitit. fung.
Kaiatit
Ve genba.
Kypfiting.




AD nobiliffimum porro cfulenti furg» genus (quod, (ecundiim **Ofdineja** a nobis oblca^a:um, Decimum Icpoinum e») tranfeamus.

Ptovente aute id in Glvis rari quercu confjtii, i]5queca; duispr.r(citit)], & £ editioribus (iccoribulque locis, bis fingulis annis, ctrea trefTera videlicet, & ante vindemiam. Vn^ri propter excellentiam *>>£««&*, vetou 5 (u- ceres Dominorum fungum, fcu primaru fungum: Germain obcandemcauftr fcrJiurjappellant, quafiCarfa reum, quod inter fungos principarum teneat. Et sane adeo elegans est. ut non miridum fit, fi cosqui I ben- us icr fungis vefcuntur, prx cetcits genenf fungotum. adfeedendum in vLrcc. (^ ^

Jilius unicam duntaxat fpeciem vr obfervarc memmi: licctcx xtate d< quodpiam efle vidcatur.

Primume terra criipentis hujus ingi ma. ovum quodammodo candore & hgura r fcit. alitra aut tertiadie Jaceratur lure al- catit, feu (ut Plinj vocabulo utar) volva, (it- pernapane. & vclucio viiucum often^ indeniagiscxcuberat illud lutcuni, & t¹¹ b formam mduir, paulanm SC icn Cim^{ev3} n b- fe«ue pccucc'que volvi: magmudoauc cra tangi

xvii. Genus esculent. Fung. jam expansum.



fungi fuavolvainclr^tt^suiicias inlongitudmem paret, b, ihas in laritudincm. Coniumptavolva, fWjusinplanamorbiuarera fefccxplicat forn'am, cujus diameter quatuorpsencunciar imelt, cujus (uperna pars aliquantulumirmimfcens. aurcumfivcroccum colorem elegantiffimum lubct: infernaflavact, & mulcislrijsa pediculo inextrenas oras productis inlignita i pediculus fungum fulhnes, digitalis)ogitudinis&cras iit udin is dt, tkviq. colons. Atcumjamatiolevit, paulo amplior est cjus magnitudine, & in ternasauquaternas partes fcitiditur, colonsq; illurnflorem&clegantiam deperdit nam fuperne, Ungmdiorls cftaurci colons, infernejOmnino palhdi.

Non dubium autctn e(i jquin hie funguj, Ilcille Veteribusadco celbratus Boletus, a Principibusviris fie in delicijs habitus: nam ii confcranturquaide Bolecto fcipfic PJinius, cum hujtis hiftormj familiscficdprehendetur. Infiimisauicm, &immenfoexcmp!oin crimen adduflus fuit, Plinio tefte, quod TibcriumClaudiura Cx(arem(quiBoletoruia cfu impcscdelcftabacur) cojunx Agrippina^ bolero veneno illito, fuflulcrit, ut Ncroncm filium ipfi fuccctforcin Imperiodaret .Hinc iHi luvenalisinfatyrii falesdefioleto. Natn fatyraquinta,

Vilibus amipites fungi penentur ama's,
-Boletus demwo.-fidqualem Claudius edit
Ante ilium uxeri\$, post qu&n, p'iampliu edit*

Et fity la fexu, ————— w « « * w, ?* mems erii ^"PP"TM

Boletus ;ficuidem unius frxcordia. prepit
llkfentsjremuliimqut cafut descendert iuft
In otlum ————— 3

Scd & ipfc Nero. Bolctutn Deorum efle cibum cavillari folcbat. quia illo pcrijlei CUudijugCarlar. & defunaj Cafaresin Deorumnumern referri folent.

Ceterim ad BQJcciparandirationem. quali Vugariuntur, nunctranfcamus.

Heccntesboleti ('uaviotescnim&: delLcaioresilliriiDtadultionbus) repurgati, in aqua clixantur, dcinde in tenuia frufta conciduntur : fruftaconcifa injufculumcwemore laflis confeauni injciufitur. adiedtis felinifolijis minutim fcclis&pipcie. Vcl repurgati ^rarcifo pediculo invcnuEitur, & fuperprunas pofiti, addiro oviluceororrentur. Vclreccntesciam (cmundau videlicet) rccifispediculis, fringiturcum butyroatqueovofimul infartagine coais. dirolutisfic fimul piixcis, inftarejus ferculixovis& butyro in (attaginefrixis patati. quod Germanised in delicijs¶tufacile^llis-ernWf^riuncupatum. Scd&exficacaci fervantur: demde ovorum infat coquuntur, aut in aqua clixantur: turn demum, ut prarcedens genus, cutn condimcto illo ex lpforum julculo SC pane toQo para[o, additjsacetopipe rging oris, butyro& y hum hronit curum no id. e untur.

MEMINI anno M. D. xxciiii. ad Illuftrē Heroem Balthafarem deBarthyan sub vinde-

mixtepusaccerriru(folcbatenitnillebnautterfingulisannis, mifsa, quavcherer, rheda, ad fe cvocare) in cjus atce firmiffima Nemetji Wy war hofpitio exceptum, atque fortefor" tuna femcl in mcn(.i. duni pranderemus, ad pofuum kunc fungū in lance cum fuo jure clixum: turn ega, qui fungis in inimc veici folco, & ignarus ctoceam illam tinduram i boltti fuccocTejgallico fermouead ipfum fpluresenini illeHerosperegrinaslinguaj prater vcr iiaciilampafedccaHcbat. Larinam, Itahcain, Galticam, hifpanicam, Germanica"lnj& Vandalkam. fivcCtoacicam. ab Vngaricadiverlam. Jvatdcroatum. fivcrocotindlumcft Wjurculum^quamJIIfcua vitendens^dNobilesvitos. quicjusmcnraTaflidcfcoliti^T"1" crant oflo aut decctn, con vcrfus: Clufim Vram)Gc eft, Dominus Clufius f & cetera vcrba Unganco idiomatr proloquutus) cxilhtnai hoc jufculu, croco in co diflbluto effc tinflutn • tuinomiiesillicachuiniufiiftllerc&mtari. nihiignotambolectinaturam, prxfertini -Umfc Trent, &: il[o] & pt. Tcedentibus aliquotannis/diligentcrobrcrvafle, pr3ctcr alias mul. KUciegaatcsftirpesjfungorumquxapudeosnafccrenturgenera.

xvin. Geni » c f c u l e i ; , Fungorum.

1777 200.
1777 200.



r. mt*.

Wolffling

xix. GencriicfcuIcrit. Fung. 1. fpecies.

CDMCCICIC.

1777 200.
1777 200.
1777 200.
1777 200.
1777 200.
1777 200.
1777 200.



1777 200.
1777 200.

1777 200.
1777 200.

1777 200.
1777 200.

N V L L v M inter fungi ,qui innoxusafK-
matur, genera eflepuro, quod longiore
jneditum pedicftloj quarn Decimum-ofla-
vuro : eft enirf tJc inGi3oautnoveniuncia-
jum longitudmem porreflus, digiti minimi
crafliruduie, rcfius, verficolor, & < sroiitiM <;
f h b u i d a m , & maculis parvis & magnis,
ex albo, rufo, & fufco colon bus commixtis
diftin&usmannoris varij inftar. Ipfumverd
fungi corpus pilei feugalcriforru quodam-
modoreferr, valde laxisoris, dcinde fen Jim
in turmatam mctatn definens, aJitud.i;C
trium unciarum, aurarcpliore , orarcn dia-
metro uncias ferè oflo occupantc,cardican-
tisfuperne colons j roultLsrarnitmaciilisma-
gnis&exiguisM fulco lufefcentibusinfefi,
iupremotaiiigioprorfus fufco: inferna pats
cavaadnodum & camerata, candicans qu i -
dem, fcdpluriroisftrijsfufciscb!iquc&velu-
timcincinnoscompofitis, diflincla: duabus
autemfcrc uncijs infra fupicmum pediculi
fafligium, corolla digitalis clrciterl;uici;di-
nififum ampleftiuir, undc corfotisipfjus
fungiorarabruptx videntur, dum in IOAIU-
tem icic diffudit.

Hujusunicamfpeciem obfervabam, qu
inarvisplernqucproveniLTrjbusvciddi-
verfis anni temporibus interdū nafci intelli-
gebam. Vngari £wz>Ut>, hoc eft, caprcoli pc-
dem. fatisimpropriojUtmilli quidevidetur,
nomine appeHant: GcrBiani aP*#Hf^

An aurem ille fungus, què Ioan. Bap. Poita
à N eapoli tairi Cvneuielle v oca n (cr i b it ?

G E S V S S I X .

S E T E M 8 R i menfc (ub cotylis nfcii gaa-
dctVndeviccCmum fungorum cfculcn-
torn m genus: quod Vngan Szarw as tenth*:
Gtrmani Wjoitflto6cre«f«t«rt (quod tdcn
eft, urraquccniro vojtcaprinam barbamfi;
gnificat) tum O^teriinfappellant: uonnulH
ctiam^irf(t)l(H5/ codem quo Deciraum g-
nus, nomine.

Diverfe porrò à reliquis fungi gencibus
cftfortnar. carqueelegantisjquodin ncfpec-
cies colors inter fe d>fferencres, nonihil ctiam
formadividipofTc arbitror.

Frimum aurem locum daboilli, quK&rc-
Jiquisclcgitorvid<tur, & colorcmagiscon-
fpicua. Ipsum corpus binarum fercuncia-
mm crafficudmem habet. intus ca vuin, colo-
ris fufci& fuliginofl, in quo clucet albedo
quzdatn pallido mixu: dcinde corpus illii*
in plurimos tenucs ramos dividitur. duas aut
amplius uncias lorigos. eolonsfupremaprtc
flavi elegantis, cui irirperlicrocca: macul*»
floftulorum formam quodaromndo expri-
mcrevidenrur. HancGermani?<lt(f Eigm
tflrt/id clt. flavam caprinam barba, aut
linfit'opnominant^aaquoruitnitacioncm Vn-
ganij vga Szarw as gemb d icpof tje fii mo.
Non mi-

Non minus crassus est *Ahem* species trunco, colons tamen albi: in eandem iri; erdum magnitudinem crefciccum Priore: nonnunquaro brevior est, aliqui indj? ^ . ? * - i x binas uncias alci. videlicet p n m u m naca. cujus rano unciales, & illi ferre p c: orfus diltiter ubefcentesi jam aduha verd. candicantes ramos habet, quorum excimx parses rubefcunt, formamque fotum fungi corpus habet, quale cerebrum brai Ticx Cypriae de jeneris, Si qux ob prxmarcuras pruinas ad frugem pervenire non poavit. Huic Germani Wott (& s6a Ti) hoc ett, rufx caprinz barbæ cognomen indiderunt, five *Notte Hirsching*.

Minus crasso corpore est *Tertia*, coloris ex albo pallidus, huius rami longiores & crassiores fuat quannin binis superioribus speciebus, & aliquanculum rartores, colons, uci pfe truncus, pallidial bocommifti: exficcatam Si marcidam camci Tc, quis credere poter.

Affinitatem quandam habere videtur hoc fungi genus, cum iltis fungis quos Bapt. Porta c (axis ex Gargano monre erucis nafci scribit non pileatos, fed t u rioucs ut aparagos, & in nmosdivifos.

G E N V S X X ,

VicEsimVM genus efulentifungirurfusadvulgaciorem fangorum formam redit, & sub extremum Autumnum in filvis, plcrumque autem sub abictibus nascitur: cuius rctcaufa Vngan *Fcmoalyag* > mb & *Gcm Ztti* "Chanitiffi" appellat, licet illis © (Triis eciam dicatur: nam *Vngmsfnye-fa* Abies est. acque Germanis *tfcutnm&a*im idem significac. Hoc autem genus in tres species dividem us.

xx. Generis efulent. Fung. j. species.



P « « * , orbiculata: f plans tamen } est figurx binas auttenias uncias lata, fupcnie, colons vel dilute ad modum ru be us, auc lateru ij, venis quibusda fie exarata, uc hirta videatur, non (cusac Dccimi generis Prima species, cui valde fimilis est, in medio non nihil cotnpreda, & c veluti umbilicata: inferne pallidus, & multis strijs fufcis apediculo (qui unciapaullo longioreft, minimum digitum crafliis) in orbetn duflis, in ignira.

Attrg, Prtorerr magnlmdinenovaldefuperat, paullo tamen craffior pediculo confatj magna etiam ex pane orbiculata est, fed non comprefla fapernè, immoporus sxtuberans, colons ex albo, pallido, & fufcopermixti. inferne candicans, *H*. ftrijs fuligin© coloris, a pediculo inoras produifis, exarata.

Tertia, iongcamplicior est bi Tis superioribus, orbiculata tamen perinde, arque iliac, figurx, cuius diameter pxnequincuncialis ell. pediculo Tubnixanon major quam prxcedemcs dux: fuperna parre etiam extuberans. mixtique ex albo, pallido, rufo, fuligin© r6que, coloris: inferna pars ptana est, rubefcentis colons, craffij ftrijsexatropurpurarentibus, apediculo in auibitum excurrentibus notaw.

G E V V S X X I .

\ g ONSTRVM verius fungi, quam fungus cenferi porcft Vicefimum-primum ^ genus <t.j> # / « . Adefulentorum fungorum. quia adeo vitte interdum est amplitudinis. ut inccgrietiam £' ; / " * £' M / « . familiam ex plere & fariare poffit. TMimaudiebam (dum liunc fungum in Vn-Sana obliervibini) circa Lcwa Dominorum Oobooppidum, in extremx Vngariihmitibus Croatia: vicinis, tanta nonnunquam amplitudine excrefcere. ut bigam facile imp^ret, praferim utaicbant. liquis prztencens (quod fuperlht. on non caret) admirabundus subfiibe-immd (quod ma<isridiculum) aucfcbant nonnulli, convinjs prorcindendu in cflc, ut n r « i » m M ; i l m n w » . fcat, loan, manere ineamagi *utudif* ic, qua primum *conipeaus* cft. qua Gzercfcrcntcm fene eligi.

Afcfa Sffn in Vngan sub extremum * * » ^ j £ * * / £ 2 * 2 E £ *

Notte
Geibhart.
Notte
Hirsching.
Fungi
na
iw
Erffling.

u i

s * t » t t s
g j

potilsnullopediculonicanr.ur,fedcaudiciarboris inherent,r.utfingularey,autgemi-
a,mebranacea cute constantes implicata & sinuosa,coloris exciterag...
gus auriculam IuttenoininaCjCaicilagineaenim & membranaccV'eHfubftaiitia ,quomad-
modum auris. Vngari Bo^afa tertnew. Germani Sp6b,x fytwm-Jni appellant, quia in Sam-
bucicaudtCL'naficicur.ciiin huicarbcTi prir!umprorumpun[fo.jia.

Autm? *
B" aa f^ ier-
nt>;i' <<
Hofter
fchymmen.
Fuculain.

Sokz is fungus.tmecefi non eiculentus,a pleriJqueadiervarii ^xliccatuSjin ufum: nam in
gaturiiitunmnbus, acetuminquo inaccracusflcj exhibercfb.tnt, adgargarizandum&
guttur eluendum.

GENVS IT.

SVB Pruni arboribus novo Vere nafciturSecundum genus idedqueab Vngaris Szilvra
4^4nuncnpatur.

u. o << iur
xodr fung.
Suilvraaya.

Illhunicam fpeciemctiam obfervabam^umero/amexodem pcdc,nullotamenpc-
diculoconfpicuo.confertim nafcentcmjVariAmqgnitLidine&formarnamfungorumnon-
nulli.bmas aut rernas uncias lati ruiit,acqucer.iani ampliores.vcl orbiculata: figun.atir an-
f'ulofie; alij paulo minores,nonnulli vix unciam laci: omnes coloris ex albo, paikdo, & i a-
(cocommixci.

GENVS III.

TE RT r v M genus Vngari C^flw/Germani Wifl f^m^mmot appellat.quoniam in fter-
quilin!j;nafcicurprimo Vere.

u. i. Genus
nim fung.
Cunqua.

Vu Igarisadmodum eft lite fungus,propccca nemini no norus, format orbicularis in pla-
no.velari circino duda:, exiliife tenui fultuspcJiculo, tcnai noncraftbcorpore, candidus W
omnino,& veluti fanna confperfusciim inferne, turn fupernc: pars tamen averla feu (upi-
na,ruicis stris, a pcculio in oras ducet,autincta est.

<£
Widmra.

GENVS IIII.


QVi K novovercpost prEmarurajpluvias plerumque nafci folct in Salicum caudici-
busQuartum genus, idco ab Vngaris Fiz-fi^gamba, a Geimanis veco Jdfff fcjuamoi
"Vocatur.

IIII. Genus
in alic fung.
la polia.
§clter
tytoalmen-

Eft porro hie fungus confercim fialccnSj&caudicibusSalicum firpiterih<rcns,Liche-
nifinlhr, in corpus tuberoiumexcrefcensvaria forma & magnitudine: nam plctaquetu-
berauncialemmagnitudinemnonfuperanc, alia binas & ternas uncias interdumampla
funt, coloris eJegantis&: vane commixci'- nam ineis&albedoconfpicuaefl, & pallor, & C
fuave rubens color.&facurjatque ctiam flavus, addo his fu(cum fivefuliginoumcolorem
hinc inde ipfisinperfam.

GENVS V.

v. Genuspernicioforum Fungorum.



NASCITVR. ctiam novoVerciaputrefcentibus Ccraforum caudicibus, Quintum
gentispernicioforumfungoruro: cam obcaufam apud VngarosRewsceref>jefagem-

v. Genus
in alic fung.
Reveras.
<£o << G
womb.
Kestbaum
fchwidman.

Pluresau:em fungi extodem pede nati,imbricatimjfive tegulaium inflar,aher fiipe-
terum confe, LI \ aiu..-"r-, infmiaparte unciam Jaii, dcindt fenfim altitudinecrcicci
ternaramautquaternaruL.n imciarum inextremisoriSjpalnumaetcmlogi.Sijpernac
• poris fungi pars varijs colof bus infecla efi; nam circa pedem ex albo pallefcit ad unciali
altdudioem,deinde tranfiiVrficoloresfccmr, fex fiavorubroquecommixri, pofteaflav
fuprailium denuocranlverftm lecant colores Savus&ruborfmul mixci: hofequitur iat-
vits coior,quibufdam rancVi veluri fuliginofis rhaculis infe&us: extima: orac (atura rubedi-
ne nitent, quam nonnihil focdar lincaquardam veluui farina con fperfa: fupina vcro parte
atpaliclcit, aur flavuscl.

Sed &c luc futigus.tametd hominibus noxiis, alicujus ramen efi ufus: nam R<ftici cxfic-
camm rcondere iolcnz, quia llius poliincm cuin ialc 8c pabulo mixram, xgris bubus &
VICCIS falubnter dari,flbi ptrfuadent.

GENVS VI.

vt. Genus
necur (Mg)
Muyere
mya genit.

SE XT v M genus, quia Tub corylis crefcit, Vngari Momarodyagimba vocant: orbicularis
Samc melt figuxz, bi nasuncias laws aut major, fupernenonnihiltuniefcens, extremis
orisin lupinarn paicem ticxis,coloris ex rublccciKcfjiuiginofi.cuialbedoquxdam permifta
videtur, mterdumetiam oninina fuliginofi & fufci:interncnonnihil rubefcit,flrijiqueex-
aiiiumeft, a pediculo gracili binas unciasJongo, inambicumdudis, crafliauculis, fuiti
coloris.

Invenicirciter Pencecofienjioceft Ma!O,aut fub Iunij initium.

GENVS VII.

TILGBIMJ
f~*
x. Jvis RiitrolyTumbx^
ifrmams S.witeii(tjivatnitidicior,
utnifque liniuj.*
nominibuseari"
deni rcm li^inh»
antibLis,nimirumrubL*
ta.,vulgobufFoni5diciaJ,
fungiiri3i
Cujustresobie'
vabars (pecie&
Vnmi valde gracili .&
plus quam daas uncias
longo pediculo fultam,
pilci five galcn*
pame figurain
mccaii) fubbta.uncrth
fertkrucimejOraruiii
vero circitrcncncali
ainbicu,coloris
albi fuligme quodammodo
in^i-cti,fummo fafligio
flavfccece:inrerior
6i cava pars fuCc*
cilprorfus^
nJgristrijSja
pediculo in erasdmSis,
exaraca.

IRCA idem rerpusprompittciam Sctimum fungipernicioilgenus,qnod Vnga-
nexam tsng x. Jvis RiitrolyTumbx^ ifrmams S.witeii(tjivatnitidicior,
utnifque liniuj.* nominibuseari"
deni rcm li^inh» antibLis,nimirumrubL* ta.,vulgobufFoni5diciaJ,
fungiiri3i Cujustresobie'
vabars (pecie&

Vnmi valde gracili .& plus quam daas uncias longo pediculo fultam,
pilci five galcn* pame figurain
mccaii) fubbta.uncrth
fertkrucimejOraruiii
vero circitrcncncali
ainbicu,coloris
albi fuligme quodammodo
in^i-cti,fummo fafligio
flavfccece:inrerior
6i cava pars fuCc*
cilprorfus^
nJgristrijSja
pediculo in erasdmSis,
exaraca.

Alter** inaglfsotbictjlati>&: tumentecorpore, crafliore pediculo fubnixam: fupernaK
tumcicens parsduasiiKcrduni uncias duntaxccflainpla , nonnunquamctiam tres, niodo
fuiiri omninocolons, ex albo pallefcc[itis,modo fiavi fuligine infefli.finguli autem macu*
lis albis & nigris fumma parte notati, ut rubete colorem, praefertim fufcus.valdercfcrevi-
deatur: pars inferna alba eit, levib' fibrjs fubfufcis, a pediculo in oras excurrctibus, diftincta

Tertia reliquis majorefl.&orbiculatrprotfufin piano figiirx, cujusdiamatertrium un-
ciarum efi,fupeme alba, cui rubefccnsaliquantul um color efi ad mixtus, &rarxpallcfce"*
tes raaculj- inrperfa:: infema pars quodammodo pallefcit, & frequenribus fuligiuiisfrij*
apediculaminimumdigitum craffo, id extremas ufquoras icda.

GENVS VIII.

vt. Ci>i
necur (Mg)
Nerfagon
byz.
Dierben
fdj>>ur<t

OCTAVVM genus etiam circa Pen rcoften provctjit in filvis, ad betularum caudice*
&truncos,cujus rei caufaVngari A)rf&gemb&yA.German ^rtjcnf^waitmwn appellant,
hoc elr.betulaceumfungum.

Orbicularxpzncctffigurx/upcrnepauloclatoris.aibi colons IcvifnIigineadumbr3O»
inquo macula:quxdainrofefccn^sjaticudoduarunsuiiaaquum:injfrnaparstota alb3C»t
cxceptis(Ir)js,qu*fuligineinfcla:, a pediculo binasunciaslongo&graciliduflaf,in«oc*
mas oras delJnunt.

GENVS IX.


vt. Genus
necur (Mg)
Nerfagon
byz.
Dierben
fdj>>ur<t

CIRCA Solftitium xflivum invenitur Nonum perniciofbrum fitngorum genus in
visnafens:quod Vngari,5<7>y<g>(i«Aii,Gcrmaiij,«stf^f«fi»wiimcMnominair, quia
f^jj^rcl-alYog^ tuiicnce fic corpore: nam lacisbrevi cilpediculo, uuciamnon m
perante, digteitm aut pollice m craflb.

Ejus licet birue videantur Ipecies, rtatc tamen inter (c duntaxat diffcre arbitror.
ftjtveri.utdi^ijcranb&procuberantccorpore.fpbericxquodanimodo&orbicubsn^11
rx.binasuncias lato in minoribusiinadulcionbusautem, tres atq- eciam quatuor,velctiff
ampliore, colore fiiperna pane ex arro rufefccnce: interns, exalbido ,&* multis frijs rute-
L cut! bus;a pediculo ad uras u djuc dud is, iqfigmto.

G E N V S X .

x-GenuspcrniciororumFungorum.



Bis in anno rerieritur Decimum noxiorum fungorum genus, circa mefcm videlicet, & videro iam, mdlvisproveniens: Vngari *Kef-ir \$mba*, Germani *Capfe* *©(jtoimm* appellant, hoc est, caprinum fun gum.

*z. Clava
noctis (h. g.
Kake gub.
bl.
Cepfo
fchwamet.*

Valdcoxilis est hie fungus : namptimume-
mergens, vix uncialis est magnitudinis^inter-
dum (ingularis, nonnunquam geminus, id est,
biiii simul nascens, ipfo fungi corpore, mini-
mi digititmguem vix 2quante, rufe (ccntiscol-
loris: cum adolevit (jrpus, in uncialem magni-
tudinem excrefcit, interna pane valde pedi-
cuto friata (*hfe* invenence, adeout fuperna
pars vtlui camcrata &: cava reddatur, & curn
(uo pediculo, parvum infundibuium meniiri
viicatur: color Ha vefcit tam externe quam in-
terne; & (iiperna pars jam in umbilici ipeciem
contrafta, rufis maculis est diftin&a.

G E N V S X I .

E O D B M Kmpore, iirailibusque locis repe-
ntur Vndccimum genus, quod et rripri-
nium erumpens, valde bo]e [uiii tmicatur. im-
miquodammodo meriticur, Vngaricum no-
me» iuillum **intdlexjt** led Germanicum **c(l**
Timtafytmtaml ac ildiceres fatim velfa-
tuorum fungum, quoniam force, dquis vefca-
tu r, mentetu r betur, qund facile cotingre pot-
teft, ad **ejufcum** invirante pr^errim pirmiim
nfeentstancacum boletoiimilitudine.

*il. Geam
noctis (h. g.
Kake gub.
bl.
Cepfo
fchwamet.*

Corpore dum efuavolvaeru rnpic, cft boletodi (fimi Jij longiore pediculo fubnixum mi-
tirnndhguo graciliore / efc uncialis latitudinis ^ nmccamadurgens. fuperna paitect didj,
wferni cimcraca, ^: multis flrijs, a pediculo in arabitum productis ^ iocau.

G E N V S X I r .

N Ec hujus perniciofi D uodeci mi generis nom en Vngaricum mihi notum est: Germa-
ni. flt (JCjifci) iwinnicia PDclacioncm dedcri intamufci, quiflud val <jcappctunt, & pk'-
'unique imicini ident. iion lineipl Jruinpernicie. iiquid L-i Tiquotquoideguaai Hiritreunt.
Vaciae autera funt cjuspecies, omne excreino Scxcilnncxdmsii Wisprovcaieites: quaf
hac (eriedefenbo.

*lit. Ceam
noctis (h. g.
Kake gub.
bl.
Cepfo
fchwamet.*

Pnw^fpecte iduas obfervjbam dir Tercntias. magninidirjc quidem coavenientes / cd co-
lore diyer (as. Oi' bicularis & quai circinoduddcutraq] uee (lfigurx, unam iuerdum, (3rpir-
fime bims **unciaslatse** : Vni. color **fopernepan** i **paJklens**, cui quidpiam ru bedims & fu Ji-
ginis admixtum fiti Aferiaurem Kiridus & fuligine infetti i Sj CLii in fperfxalbt cantestnjcu-
lx atropermixt. T, non **tcusac in Scpcicoigenci is pernicioforum** Sceunda fpecie: pars fu-
pituin **uncaqupcrfiraiUs, hoc est, alba, exarata camcn** fulnsftnjs, a pediculo (quigracilts
eft. & circicr fc unciam longusjad extreniasorasdu&is.

i.

Pa LI 116 major est ///; f rpecics, & lmi giore cralliove]uc pediculo fubnixa, ut qui minimi
^ giti longitudinem & crafi]udirjerna: rect: ejusa Licem formapxntorb! tulaia rujus dia-
m^m ter **trtente** pauld minor. color (upcrnc **vanus, hoc est, ex pu rpuri dilutiore** & Taura^ru-
fo. pillido. & albncoioribus varit-mixtus: infernc pallet, Scntgnscraflionbus Uriis **auedi**
ciilit; — xtre masoras duds

ii.

Vr/, ipccies differentiam habec ex irate perptuam : nam primum emcrfens conrra-
" oelt corpore. cral Foi; Linciali, quaiiq; in radice nientiente. pedicilofultafduas uncias
u^u i) to] idem **longa. in** n c: x fbrm. im (ubhra, culons rubri, Cive potiu Jjtennj, frequenti-
albi La! Kibuscoii perla (un > mo [amen faftigiopallida; Adalcior verbpalmari
q g j , p b m c o m i s l b f b n l g f i i
cmfigunicairjpolituuH cujustianiccaquatam uacias iivcrnentem lacuf)

iii.

per

perorasinterd ira fiiTus&:hcer,colorispronapar[crubn,&albisquibufdam maculis infe-
iti.oraerufaefu>ti(ufi.rjaaiAciJi,albaprorfus, ftrijscamen lvi fuligine iniiftis,a\ediculo
inambitumprociurentiDij.

xn. Generis perniciofor.F^ng. 4. fpecies.

I MI.



XMitt.

T.

Omnium elejjatiifima *cfjihtrtd fpeciei*,
cujusabe.rateduf'itaxatquoddamdifcrimen
eft: lumoris enim & recens natx corpus mi-
norem habet orbem, & binas uncias flum-
modolatum, rubro colore valdefaturo infl: ar
concretifanguinis rinQum.prcujusiuperfi-
ciem frequentes exalbida: funt cdfpcra: ma-
culae: Adulior in majorem latitudincm pat-
tct, ut quse quincuncialis (it 1 aut amplior tu-
mida fupernc, rubro ctiam colore, fed paulld
remi]orc, quam in juniorc]tin£la, obkuno-
nbus veluti undis intcturfantibus difiinfla,
& crebris traexalbidismaculis infefla ipedi-
cu lo amt confine protuberante infima pane,
deindctriencmlongo.unciamcraffb, iquo
infernapartecraflxnigrx firisdudrinam-
bituni: bint interdum ex eodem pede con-
juntSimnafcmitur.

Invenitur ctiam hxc fpecies inczduisiTI-
vis Francofuno adMocnura vicinis.unde ru-
ftici mulieres leflam, in ui bem defcrunt vc-
nalem, cum no[i]gnorcmplerorqucempcu-
rosaJmufcas necandas: naracium, utaixi,
mufcarlibentcrilli iniidcat, divuifam infra-
ginenra, vari]s in conclavilocis ante fene (Iras
(pargere (olct, ad qu^ invitata: & excici mu-
i« (Liccum fugunciipiis perniciofam, & pau-
lo ostetiam Icthalcm.

CraGb ctiam est *Quints* fpecies pediculo,
nccminiis longo, quam fuprior: atque cx

scatcconfpiciturctiam ineaaliquoddifcrinien : nam Recens nata, bmas uncias vixcftla-
ta, in tocidem unciarum metam aflirgens, colons ex rufo fufci, & fuligine veluti infedi:
Adultioriscorpus longcmaius eft, tnencalcml videlicet btitudincma.at ampliozem habes,
inmetr f (rbami rge&, iorivadclclsi, iors ipclne bixfeda b,ri>da o,
fufco, mixtura vcl radianm, vel maculis du ncaat infperfis, confante: color inferna parte
profus fuliginofus, quatuor uncias (trii, apediculo in excimasoras ductej]tericant.

GENVS xrn.

xiii. Genus
perniciofungi
W. selen
pombi.
fuit.

DECIMUM-TE RTIVM genus noxiorum fungorum/ccundiim vias&fcmitasinc-
duisfilvisprovenitextremoetiam Augufto. *VnganwtfeUm ttrevsmgetnbn* Jioceftj
ad iemitas nafcentem fungu m; Germani autem Jwfc^n *fiml/* quafi ranarum federa, appel-
lanC]quoniam rans his libentcr infidere confpe&arfiint.

Inhocgenereobfervari porcftdifcrimen quoddam, fed illud ex state duntaxatprove-
niens: nam Recens naticorpus,adbma:um unciarum latitudincm non pcrtingit, Sd fupcr-
na partecandicans/uiigincquadani infedura eft; inferna etiam ejnfijera colons, fed raris
frijS] vixqueapparentibuspraiditum l ubiautem Adolevir, majorem habet latitudinem,
quatuor videlicet unciarum, & :iuoibem ferecircinatumelt, immaculatifupernccando-
ris, nifi orbis centrum palleret: inferna parsettarn candidaest, multis purpurafcentibus
ihijsexarata:pedjculusgracilis&Jongus.

GENVS XIIIID

inn.Granf
X tempore invenitur.
Vngaricum nomcn in relligtrenon
ticut: fed Germani <3fli>
appellant.caufanomsnismcJacct.nifi
Quidirus appellatiodefuroptavidetur.
Eiosautc^
binas obfervabam fpecics,
nugntudinc, &c infernx
(eu fupinx pattis colorc inter ie
differentci.

TN csduisctiam (ll viscrefcitDccimum quartum genus, atque cndru quopratceden*
X tempore invenitur. Vngaricum nomcn in relligtrenon ticut: fed Germani <3fli>
appellant.caufanomsnismcJacct.nifi Quidirus appellatiodefuroptavidetur. Eiosautc^
binas obfervabam fpecics, nugntudinc, &c infernx (eu fupinx pattis colorc inter ie
differentci.

(

pW«*»infqualem habet magnitudinem:nam Recenter nat^coi pus,uncia m^iju non est, n
ftigisEuniColorisalbiftjliginc veliKinfeftijUiicialislongicudinJ^f^iu'ji'iniuum au-
temdigitumcrairo,fubaixmn,interdi]mgeminunnexcodem pr*^cja(cens: Adultatnunc-
cialcoidiamccrQmiiibcr^norbemflTecrrcumlcriptafigura, (ipernc alba qti idem,fed i'u-
(cocoIoreinfca^JVof-ifltgio.Lrtfijrneveidpallida^tiifullnjja pediculocxcurrencibus,
exarata^pcdtFulustiiigitalislortgitudinis&crafTitudinis.

"Alteritts forma, qrbiculat^, & veluti circino circumduflx, eft rotundtC3tis,cuj,us diamc- ».
tertrcnrcmlacuseft,pedicuiobrevipolliccmquecrairopra:dita,fupcrnapartccanditia,cui
maculzparvxuftZj&flavefcensnonnihil color, infperfuseft.&orisaquantulumijn-
fernam pattern coavcrfa/iifcra ipfa parre pallida/ufiginosis^ue ftr ijs iniignita.

GE'NV S XV.

xv.Generisperaicioror.Fung.i.fpccies.



DECIMUM-QVINTVM perniciofi fungi
genus, quo^Vngari *Tt nergemba*, Ger-
mani @*wt ft^mmen appellanr. pcrinde ac fi
unguinofum fuiigmn diceret.ncardLiisquo-
que lilvis crefcit extremo Sextilt.lioc eft,cir-
ca diem D. Baicholomarofacrumrcujttsva-
rt.c dicunmr invcuii (pccics:ego binasob-
icrvabam.

Frwrem, triuncialisamplicudiuiscum fuo
pediculo, alioqui corpus ipfum fungi unaa-
lem magnitudinem nonfuperat , pediculus
autem binas, fuprema parte pollicaris craffi-
Eudinis, lutirriialcft-iicialis.inbulbifotmam
excrefcens, colons ex alboballefcctis: ipfum
eiam fungi corpus fupcrnc palliduro c(t, fed
niuolis dilute iigricamibusdiftinclum , at-
que orii in fupinam paVccm ir&cxis: inferne
iftultiftnjs ex pallidofufcis, a pediculo iti
ambicumponcdLS.diftituSum.

H i i f e r i i r i d r, eft,albam, V }- fcywiior.
garico^nominau.

^/««cognomendcderunc a nrgro colorc,
Yngari,*Fcketcti/jor;GeTman* &(\)wattifmt
ffytanmtm. Informishzccftfpecics, &rvaLic
tctncoloris,urveriusligni,fiverad;ciscujut
dam nodofum Sinigrum fiagmctum videat-
ur, qaimfungos, quo I ctraque manuvix
com prchendiqueat;craflbbrevique pedicu-
lo inniitm.

GEKVS xv r.

EXT&EM o ctiamSextiliprovenitfubcorylisDccimum-fcitumgcnus.fetidiamdo-
dum odoris,quod VngarisA'^^Germani^crtc^nmfn/ quafiferpencnum, %g
dum b^odis,quod VngarisA'^^ f b f b qp d %
five colubrinum fungum appellabant. Ejus porrotresfpccicsobfcruabam magnitudine
Mne inter feigualcs, fed colorc & fotmadifpares. fidet initio veluti ovum exalprum, in CHI
b l h p l i d i c u l o c u i f i n
cialis magnitudinis, coloris albi fufci. p f i f i f t e r n a p a r t e , n i g r i l i n i a t i i n f e r n a & f u p i n e
deinde, oras explicans, fcluncialem amplitudinem adquirit, in pilei parvique galeni fimi-
litudinem f j f t n a t n , a l b i f p e r n e c o l o r i s , f r e q u e n t i b u s f u f c i s m a c u l i s d i f t i n c t a m , a t q u e
ipfo fufigio veluti fuligineinfeclo.

Altera iuxta... i corpus.Mrvigilcrifiguraformatum.yix
Ongucmaju^nWdauLiorcfalh^mcmfcaamMmunchsd c m n a d o -
Wicgalcriaiam forma, cotorciupernaparccacrafuligmen
turQiciscaracata,&nigrisfrijsexarata,queniadnaodura&jurior.

XVI. Generis perQicioforum FuDgorum j.rpecies.



in. T^wcorpus.ejufHeraCumruprioremagnitudinis.valdchccrisctoriSj&quodaaimo- do in lacinasdivifu m ,rufiinterd urn colons fLiprne,fuliginous ftnjsnotatu in feme: noa- nunquam autemalbi colonsfaligine infefli rapernc.&ntgris ftrijs exaracum infernc ; ali* quandoetiam infema Sc fupini p*rtedco io versa & rchcxa,rurte&tfique lacinijs,uc fiorem aliquemcxprimere vclm en t in v idca.ru r.

G B S V S XVII.

XVII. Generis pctxiiciof Fu ng. 1. fpecies.

XVII. Generis pctxiiciof Fu ng. 1. fpecies.



C I R. c i T E n diem D. Barcholotnaro fa- crum, planis & apens locis provcnij Decimum-fcptimumnoxioitim fungomra genus, a GermanisJfio;! jptpUcnappellatuni, Vngarieum noracn nemo mihi indicarc po- tun , &anullumctiam apud Vngarosobti- nucric.haudfcio; quandoquidem magnacx pane negligere folent eosfungos qui no June clciilcti. Ejusaucmduasobtcrvabalpccics; Primam, dodrantalem amplirudincru i ba- bentem,& minimi digicicraftitud ineprxdi- cum pediculutn,binasautternasunciaslon- gjrn , ex civjus iraoplerumqmc fubnafctur ex igua proles-orbicular fere eft figurx, oris in mfenorem parrem nonmhi! innexis, co- lorefupemaparcrufo ad Digredincin ten- denic, cui flavescens circa medium adn- xcuseft •Mifema parspallidaeft, ftrijfqucfli- ligi noils exaraca.

S<curxittm,C)ul^mcum ilia magnitudinis, fed graciliore pediculo pixdtram, circmat* eciam rotund i cat is, mulaceras lubrcctora* inanibitu: color in hac fuperncplancluri- das.hoccfjtexpallefcntefuliginofus^ ve- nis quibufda exalbidis maculolus, ipia fungi fubftatia,fubcxterna ilia cure, ommno atra, utctiam eft pars infima, fie ta men uc craife nigra: ftrix obfcureappareanrHanc (pecieto ©Amar^c W &tp{(tn Germani cognomioarC poffenCjUC Priorem 7b>> box garzden.

G E N T S XVIIt.

XVIII. Generis pctxiiciof Fu ng. 1. fpecies.

E O U E M quoproximèprzcednftemporcrcfcit Decimum-oilavumpernicioforuo¹ fungorum genuijnGlvis provenien5, &aGermanis^wrlr>j jppellatur :quoniata vac- cevalde appetunt.

Longc:ninoreft liicfungus Decimo-firptimo, necunciatemaut fefcuiicialc'ni roagni-
Idnic'm (up^rJt, pilei five jurvi gihri figuram exprimt:fuin inecam quod-immOda lubla-
Im.colorisru'ptirnerafijiiterncexjtbiji/ufcbftiijdsdifliiickupcdic^ilusgraciliscftjiibinas
srualVe Lindas lonfnis.

t E i v s Fungi perniciofi quem Vngari Vwginys appellanc,duocompctogenera: Vnum
Gernianis 'StirjliiiLn:i:uitmlco:Limab ijfJan 33it[*nuncupatum; quoddiicnmen,non fi-
ne judici<jabi]£dem factumclTcenfco; namal'iaeftPrimi,alceracitSecuudtfaciei. Nos
Germaiiorun; diltiuelionctii Icijueniur,^ bina genera conftitucra us.


Englin.
Quilj.

GEKVS XIX.

VNI>EVICESIM» M ergo pernicioforum fungoram genus nobiserit.quod Germa-
ni iiii.ii;Tiii jppjlianc, Iccundumvu^A:iaquercccis nalcens circaCalendasScprcm-
bres.Hujusautem tj mulcz Iunrpecics,oinnefque perniciofic.pr^fcnr^mq; interdum mort-
tem ijs inferentes,qui velcunEuriquiafimititudine,quamcmxvi.genere Vfcorumha-
bent,illecti,illos ab iinoxijsdilccinere non (iveruat.

III. Gener
maxim. / Ang.
Quilj.

x n . Generis pctniciofor. Fu ngor. i. (pecies.



Prhna, valde gracili fubnixa eft pediculo,
binas uncus au: amplius longo, iutlinente
jpfum fungi corpus orbiculare formar,fe(cun-
ciini btum,aliquatulum iniupmain partera
inflexum, coionsexflavo.rufo, fuliginofa,
commixtirupernc,expallidofulcijnrnc,&
niulcistrijsexarato.

Alter* amplioreft.necadedgracilem liabet
f>cdicalum; orbiculitXcttAtn eft figure, pau-
ulumruprnciumfcens,& colons vel ruff,
raris quibufdam maculis confperii, velfufci
omnino & fuliginofi: infcmc autcm paltidi,
frequentibusfuicis maculisnorati, vel ex fu-
fco pallidi omnino, nee iſllisIrijidiftnai.

Tertitt species, Q^iarti generis cfeulentor-
rum Tertiam fpeciem plurimum imitam:
crafTbeicnim prjcdita elt pediculo , unciani"
longu ,corpore in me cam afiurgente, uncial is
magnitudinis dum recens nau, &ex cinra-
ceofufcicotons-adalraaurcra, btনারurrmn-
ciarutn, coloriftjucmagisexalbidi, fenotis
quibufdam diftincta, lacera & hians.

^ gata species, du lex esse videtur
Vd infra du.irum unciarum magnitudinem
confilbt.crafTocorpore.graciHorquepedicu-
loprxdica, fupernccx atro rufefcerjctjcolo-
ris.inferncflavi.frequenciffim is parvis macu-
lis infpsfi?: Vel tentalcmainplicudincro ad-
quinc.crafTo&protuberanrc corpore, fufco
fupernc & Icifluris quibufdam albis lacero:
inferneex flavopalltlLente, ftriarumque ex-
perce

Quinta species satis informis est, tuberis (dam junior) gura, fupernc valde fufca, inferne
rubra fatura & nigricans, circa oras flava & ochraz colore, binas uncias lata: in Adulta ma-
gnitudo amplior, quatuor videlicet unciarum, orbiculatae pzne figuræ, per intervalia pro-
uberantis fupernc, & fufci coloris, in quo dilutior rubel: ens color quibusdam locis elucet:
iferneautein ex rijbroatriacucobrcuri.ftrijscarntc.pediculo valde craflb,ina:quali &
ul to.iprum.iutem fungi corpusconfractumcirulci.vircrrenrcincrccepti, eft colons.
species,magnificyclinainituber valdcrcfert, tumamplitudine, tumcolore, &
qualirotundlute.-infeniaucemparteochrscolorceft, venisquibu(dam rubofecnti-
s aut rubufcis-diftinfto, nullis tamen ftrijs. Hanc ipeciem Vngari Baba Varganya
appelliant.

Omnia...i autem amplifllmaeftStptimaefpecies, utqufefequipalmaris fit ,inxqu»lita-
bitu)(upcnicmagnaexpmepurpurafeenriscolons, cui permixn lint rufus&fu-
i.ipfu*uiatenic corpus iubcATuki col jMSjUcccum pars rupmacuipediculusii;

v.

vi.

Robo Vao.
gaya.

vii.



fir: rliquapars inferior fhvaeft. binisaurcernis raagnfi maculisrufis irtfcla. Iunior vcrdK primummemergens. tongcminorcft. duammvidelicecunciarum duntaxai, [upcrne&nicnt: cj utdem cuen Adulci ore colons.

ANTE quam adViccfiaii generisnoxiorumfungonimhiftoariandefcribendamarcclam, opracpretium mcafl:urum arbirror, fi dubij cujufdam fungi mentionem hoc loco faciam, tanquam ejasqui a non null is inter innoxios rrponebatur *nommc Fargafya* inignitosimearamenopinione potiis ad precedens non vefcorum genuirtferendi.

Thuncialiautem iseft pediculo, digitalispxvc craffitudinis, albicantiscoloris, fedmultisufcisvenisvarij: ipfefunguscircinata: in piano rorundiratis, tresunciaslarius, fiifcnic aliqLjantuurotumens. & laterinj colons, propterqueni Germani SourrbuItj cognominabani. Jinfcrnâpartecincraceum quodamraodohabetcolorccnjnullisfriis dirtiniium. Sunc tamen. quiinterejusgcncns^uodproximedcfcribamj species, referendum ceulcnt: quorum ftiueiuiuai cum improbare non poflu m in re dubia.

Vargaria dabo g. au.

Otottet bultj.

"=

GENVS xx.

jnt. Generis perniciofor. Fung. i. fpecies.

11 Otm nmm. fung. Vargaria. Zultj.

Statia. u

(Stafs M 11.

Ujt.

.11.



TTlcE5iMi Fungorum noxiorum generis (quod, ut dixi, Vngaris, Fargaria etiam dictu Germanis vero Zultj) crunde ac

xvj. vefcorum fungorurtfenu5, ob ifticexpreflicaufam) vanxenam fute cics, qua; codem quo Vndviccfimu genuJ, t p i d i j f i i p i c o r

Craflbctcorpore Pnma fpecies, in nu-c* forma m furre^o, cincracco (upcrn8 colorfi infemeexrlavopallctitc, nullis (trijnsmo (o. brevi, fi; d cra (To pediculo jioc eft, l (uciai» longo, unciam craflb; a cr Gati. Bazo hultj cognominatur.

Lon g p eeft Alira ediculo, non tamen cradb, parccrrrxproxima, autem, graciltorc: ipfum fungi corpus era f u b i u j e l s t t i e a m i n m e i a q u' dammodoa (Tingens, colorc, vel expallido fufco, velfuliginofoprorius & inc!cgati ferna pars nullis flnjs notaia, ocluacco!o cft. qnamobcaufam ab Vngaris farga Fargamd ippelhtâ. puro, licet aJix (r. ches etiam interne Havx fine j led noo adco elegant loreprrditr.

Trut fpecies craTo flmiliter confat p diculo, parte terra: proxima- corpus ipAJr) I' primum naco fungo fcfcuncialcm inagmt dmem non excJit, & rufo colorc e^X^i^, ulco duarum uiiciarura, iaut amphioru rat dicit,

SjCircinatcutctquercercrotundicans,5£nonniliitextume(ccns:infernap.irs(tr^jsctiatn
t,&:coloreinochra*fuliginep«fufam habet. GermanuQtotttfru^vocant:, n6n minus
lumen propi
4 nuncupatur.
Qumx tpecciei orbis trium unciarum est,inelegantis colon's, uttjui ex rufo & fuliginofb
>miriixtus(iC)podiculofubnixusbinasfercunciaslongo,minimidjgttica(ritudine:infct-
iparsfubrifo eftcolore, 8'. prater fuperioris generis omncsfpccics, hujulquereliquas,
multis fuliginofis fibrjs fcilla est: cujus rei, ut opinor, caufa, Germani; *Wulst* hujus/hoc est, fil-
vifiths cognomen indidere.

Stete
buly,
©g¹*?*
i, " 14"
Wulst
b. 114.

GENVS XXI.

C V B extreinum Sepcembrem ptovenit *Vuefimum-primum genus* fubter abietibus. quem-
A-*admod«m8i Viccfimutn genus efcu!entorura,cuiperfimilecft: fcdquoniam intenore
parce hirfutum cdjreijcitur. Germani *fuk* & "S^fl'i'S/quart spurium nominant: Vngari,/?-
" *mlyxganbn*, hocell_h(u.babie[ibusnafcentemfungum: fedaddtishisduabusvocibus,
3w/o,uc folent omnibus fungisnem vc(cis.

xxi. Genus
necior. fung.
fulcite
f^d'^^
gonia.

Recens nacus hie fungus uncii non niulco major est, *Sc* oris valde in fupinam parcem in-
fic^u s, crafljufculocorpore, &: veluricraflisquibufdam venisfubrudentibusinorbem fu-
cdudisooraro in *albicanze* planide -• Adulrusaurem, Viccfimi *cfukmi* arapJitfidi-
Km adquiret, fupornejufdem cum pi imum nafcentecoloris, & pari ratione fubrudenti-
usvenis in orbemduclis intignito, oris tamen magisimqualibus: inferna pars dilute ru-
b^c^nm!tisrufisfrijsexarataeft: pediculusdigitalis fercraffitudinis, binaiq.unciaslon-
giSjquiconfractuSjrubrafubftantiiconftatedeprchenditur.

GENVS XXI I.

V I C E S I M T - S E C V N D I generisnoxLOrumfLngoru,quod VngarisdiciturT-tttf^frf/ai
^w^,Germanis'X'»*f*to*mf(Ijw(tmm(ti (quodnomen Vngarici inrerprctationcmcx-
pnmic)quiaadSpinarum,qua:vc[ufatecoi'rumpiincip!UiK,atquinterdumctana(cun-
Ar: mules (unt ipecics.quarum proventus circiter CalendasOclobris.

11Mi c^{nm}
m^uio (fung.
Tum alpa
pomba.
Quedez:
f^d d^um^um.
Starata.

Prims fpeciei.feni auc icpteai nafcumur ex uno pedc fungi,longis & gracilibus pediculis
fulis,orbiculato fere corpore (fornicato tamen,feu camerato inferne) vel femucial,vel un-
Ci, colore riavo. quemadnjoduraipletiampediculi. quimaculisramennigrisdttiincll.

Confertim otiaca nafcuntur in *Alters* fpecie, oflo aut novem fungi ex uno exortu, bre-
vⁱore&perindegracilifubnixipediculo,inorbem veluciexpanfocorpore,quodunciaaut
fercunciam latumA/upernc pre(Ium,&tanquam umbilicatom, colirisfla-ilrufofufufi:
wferniautem parteBava,&: multisfuliginofisftriisdifiinaa.

Rufi colons [unt, qui confertim emm in *Tertu* fpecie nafcuntur fungi viceni & pluret
^xeodempedc, gracilibus pediculis fuUi. ipfiuscorporis fungi forma orbiculata est, latitu-
^o jna:qualis,pro ztacisuc arbitror vetufhte: nam & inveniuncur ungue n6 n)ajorej,& un-
ciacs,&icf unciales,omnes rufocolore tindli (uperne, infernefufenftrijsexarati.

rr<
IMI,

Quar iifpecics plutimoshabetexeodemortu provenientes funjjos, tncnos videlicet
aut plures,pejficulo,profingulorumactace, breviantlongofuSultos, orbiculatxomnesfi-
gure, magnitudine tertixfpeciei fungus pares, colore tamen inter fe variant in bSc fpecie:
£3tn vel flivi funt, mulco tamen rufocolore perfuff,aut omnino rufi, fed nonnihil tumc-
j^ctites *Sc* fufci:infern^autem nigricantibus itrijs notati. Germani ©ttff(f;wvnmtn appel-
-ant, quia in ipfis truncis humi jacentibus nafcuntur.

©x*?
fynonim.

xxii. Generis perniciofomm Fungonim f,fpccics.



bb Majorca


- tr. Majo cm orbemliabentjfw/*fpcciei fungi, quippe cujus diameter fir duamn ciarum.kqmndeniaiLcpluresexcodemortu nafcuniin fimuljdodranralilus.gracili catidicauc.bullrue pediculisfuln.cotore fupernaparcevclhifo.velex rufo dilute albefe:inferniartje,cjuaja!i5'juantuluin cameratacfr.,fubalbida,&: craflis fufcistrijs dilln L
- vi. Turbinato,&: quaii in mctam aflurgente iunt Hexu ipccieifungi coipore, ieni aut i res ab codcm exortu nafcentes,&:ob!ongisgraolibulqucpediculiSj incdi.iparicraflilul-CuliSjiofiarcauUscparocnjfiliti jlatitudincmhabcntesuncialcm, autdunrumunciarufflt fupcmc cincraci quodamodcx rufo colori5,auc fukianferncrafl'is nigrijs flrijs tsaratJ.

GENVS XXIII.

IR CA idcmreropus, cumfecundum vias, ruminlignisputridis&paluflribusLociJ wex&rfuMf, V-J provenmnt aliquotalia fungorum genera, quorum norrna Vngaris& Germanis, u cxiflimo.ignota^ertenulliusnomenabipCscdoceripotui.NoseaomniarubVjccfimatr tertiamckrtbm perniciofbrum fungorum reducemus.

- it Prmm, uncialisHiagnitudim'sliabctorbcm.fupcrDctumidumj&rubripereleganrifcc- lons:inferncalbicanccm,fu(cis tamcaftnjsexaratuin, micialipediculo, non valdciamc gra-tili fulcrum.
- ii. ^//TjOrbicularaectiam eft formar.pau!6 ramenamplior fuperiore, longtoic'quc j pedico- lo (ubn\us,prolem fungiabexortu plerumque proferentc: iupcrncrufi, &ad Iatcritium tendentis colons; inferncdilutorj&frquentibuslrijsdiftindus.

XXIII. Generis perniciof Fung, j.fpecici. xxm.Generisperniciof.Fong.y.fpcicis.



- ... rnodumveluticolleflocftcorpore'Terius,inferne fornicato atque camerato, fuis oris pediculum uncialis craflitudinis,duarum autem unciarum longitudinit|ringntf&:a*''
- mi. plcfleucc, colon-; ex albo, rufo, & fufcivarie commixri. p parte caudicans ex ciceracco, interne humiliter j fcd fufcifiurijjs a pediculo ad exrimas oras prodit&: pediculus & crallus. brevis
- v. Quintus, informi p^it^f-puncmergic,tubcrisin[Var:dcinde rupAiUtc*tcma metne n'l.iive volva,rtilusexi!]tpollicari craffitudinc.digitahautem lonpuudine , penis autver cri canim innar,& ranquam uncialiglandc fummo faftigio prauliri^fnirioquidcm cX3 vircfccmc,dcmdenigra,&: ccllulis cjuodariodop<dit<i, qualcsfue in Piitm generise

lent Mam fungorum speciem confyiciuntur: ea aurem fuotmpore expandiur, & flrijs, inferne distincta est. Volva ipsa cineracea quodammodo est coloris, interdum etiam subru-

Pho... de...
Fungus...

Ab his porro omnibus saporibus diversis est fungus queniit «Wtioi» Vocabo, & omnium minimum elTi existit: aam vix (ciii unciam) alms, Aucumno plerumque nullo perioio fulcu Sj lignis cab HL Spu Ivinos & arcol^ uihortis ab invicem [egregantibus] adnascitur^ i-

Fungus...

neracci vel xalbi colons, forma pinegroflum immacuram refrens, rminimidigiticx-rcinuinarciculi magnitudine Sicra Ok Lidinc vixa Equati Sj fin^ uljris plerumque. vcrquan-

GENVS XXIII r.

V I c £ s I M V M. Q V H U V M fiingorum noxioru CTenui Germani J^o Iti (d) Witm m ap - pellant. quoniam Oiftobrimcnf Cjii putridis de jedarumarborum' raniis crefcit. Vn-

Genus...
Fungus...

g.inti]ii nomen mihi ignotum. Trecsauctiicijurpecies obfervabam : quarum, Prmareliquisat AJOtin majufculis ramorum fragmcncis liimi jaccncibus nascitur: fo-

Jsa Pnmogcn Sti noncfclentormn fungorum haud valdedtllimih, (ed colore) egantior LMicmperubio. uncialis aut duirum unciarum magnitudinis: interdum plures simul co-

Genus...

hjerentes, Sc in unnm corpus ve]u:icoale(ccn[cs, valdetamen (ercmicccnccolorc. ^/fr.tlongcexiliore(:;S<:ungLitsIat]ntdinc minterdunonrttpra!is, nonnurj quactiam

in...

«Lor,(ingularisa]iqiiaanda, interdum bun fimulconjundi, forma vcluciuperne xfc alpta, coloris egregie rubencis, & adeu floridi, uccoccineuni provocare videtur. Inlicret plerum-

GENVS XXV.

quctenuibus ramorum litimijaccitium^ iut corticis illorum fragmenti Sj in vijsob (curis & abarbonbus obfeffis. qux Solis radios adimunt. Prorius rugofbcft Tt/M Corpore^ nciahsaliqii ando magnitudinis. nonnuquam fefcun-

Genus...
Fungus...

cialis Tinterdum binifimulcoherent unciaminores^ lerumque eeriam terni. & illi quiderv. ^lganciore aereo colore prxditi, reliquii flavo: adnifcumur fimiliter^ tenuibiis vel ramufis co tutu fragmcncis liimi jaccncibus.

GENVS XXVI.

I N putridis deje & arum arboruni caudicibus crefctr Vicefimium-quintum fungorum nonfcukncoruii^ tnniopcncialium gncus circa Calentias Novembres. Vngan^ fr Jzir <i> Mifcimlt. ijicandorecognonnat: Germani wllt. tyti Ql]lin Sl id cft, (jlyc/trem cervtnum l'ungun^ adcjusdit Ttrentiain. qui Vnde vicelimovcfcorum gnc redcleri' ptuseft.

Genus...
Fungus...

Semipcdali^ magnitudinis est hic fungus. aut amplior. elcgaririflirna: forma: :nam fruri-

toruseft, £cininnunicros quodammoduramulos divi(us, candoris immaculati, quorum ftoiinullabi cgnorum ramulorum fi^ uramcxprimui Kjadcoutiifplcnderer^ e jcpuro puro argentocoti Satumquis xftimare pofiricialiquandonu Muinhabe cpedicuium jfcdip lidc je-

fi earboriscaudic Uuhxrec interdum (cluncialifulcitur pcdiculo, Elus autem tres sobi LTV jbandit Terencias, oiagnitudine, non nihilctiam fotma inter fc oift re panics. Pritus omnium valgjiffima etiam ipfispuetis nota: nam inomnibus, quas dij, provin- *" J^ siu (centemob {crvat meo} ini. Bolcum terraprimiimcrumpentem valdc mentitur ^ intabeximi jeandoris est: dc inde vane fcntccandido colore, ficccdc alius pallcfccns' tanquam Fuliginifjr Fafus : intemum corpus alba. fubftantia confaiedprchnditur per medium [tflum. Ciim verdmaturuicft^ cccraftum Scpreflutn, pulvcrulentum qucn-

Genus...

damfumumeflundj'tj utmeminimepucrum frequenrcrobfervaic, cumarciitalics I denteminficcoribuspratis (ad qua: nos la-pi ufcule deducere felt bat r.oflcr psrcJagogi animirelaxandi gratia) inquibushacrpeciescrefcic&certamem, uterpJureshujuiiu: gosmaruros ex ci mo pcdc propel leret^dpulvcrulentum ilium fumumexcitandiini.

xx vi. Generis perniciof Fung, jipeccij.

IV



•II.



Alters, in carduis filviscrefcirimple- rifque, utcredi bile eft, Provinces: *ted* mini in Vngaria duntaxat obtcrvna. Magnoillaconftatcorpore, amplitudine capitis puen aliquot annos nati, cinracea cute tecla: fed quac dcinde, multis locis laceia, fubftantiam oftendic fpongiotam , colons pror(us fuliginot), ouxcomprefTa, multum pulvcrumcindic.

Tertiam fblaamplitudinea Sccondi difftrcarbitror: namcutis illaicnella ipfum corpus tegriSjCfufdem clt coloris, Scpennde atque ilia varijs locis lacera, ipiumque fungi corpus ilia amiftura & te&um, plane etiam fpongiofum.fuiiginesiqc colons, pulvcret i ,(i comprimatur, non fecus acillaeffundens. ExcreJcichzcincerdu m infofii pugillatorij, quem vulgo balloncm appcilant, ampicudincm. Eam exiccant, &omnipulvcre, quemconcnibat, vacuam,adfcrvare fbleot tonfbres, illaque uti ad fanguinis fluxum in vulnibus reltinguendura; quam ob caufam infuisofficims pcufilm cosliabete plcruniqucCuam in Germania multis locis oblcrvabam.

Is T A ctiam dc perniciofis fungis in medium adfene libuit. Quifquisautem perfeclatn & abfolutam fungotutn cogaitionem adquicere voce: hit adjungat, Ac diligenter cvolve qua: Pliniuscap.vm. lib.XVI, NaturalisHectorix, quxitem cap.xxn. *Scxxvi*. libxxii- ejufdemNatural.Hiftorixfcripfird^fungis:quac(imiliterDiore.cap i xxviii.lib.ini.ai- quecap.xxim lib.vi-deijficiemfungistradidit,arqueMatiholiineundemComments- rios.Dcinde.Achenzilib.il. Dcipnofbph.poftrem6quicap. ixx.lib. x. Villa: fuxferipfit Ioan.Bapc.Porta.virnobilis&inPlulolbphicoitudiorunima&uirjlaudeverfamSjquiom- niu m diligentiflitne, quidquid Vctres de fungis fcriptum reliquerunt, pcoiljati comple- xuseflcapic.

Q_VIA veropleriqueejuslibrum forte non confpexcrunt, aut etiam coofpccclum ad manum non habent:tionabs re me fa&urum exiftimavijfijiQiUorum gratum,totum ill⁴ capathicfttbijcczctn.

DE



D E F V N G I S.

Caput Lxxⁱibri x. Villa? Ioan.BaptiftasPotfa; Neapolitans

*



INTER Cirtilaginearcerfercnus&: fungos: nec nifi fupra terram totweft. Diodes Cariftius inter rufficas dapes rccenfet apud ArhenEum. Nuncaucem fuajucund irate tam morofo divicum palato placent, ut eos in mortis difcrimenfepiisadducanr.. Euripides, quum in Icarum infulamadnavigat

*Sol, qui ferpetuo cwtornm tramite currk,
Vfn 'vijunfnrms bukfimile ante tibi eft?
tars titdem lucU geminos mm -virgme ft at res
^Abfittlit_i& matrem: quatuvr urnategit.*

LibuitPlintocoqtiendi dare aliquascommunes inomnigenere obfervationofi,qiⁱ ando iprjcfuistnabibusdeliciarpriparanthuncbibumrolum.&cogitationeantepafcuntur.fuc- cineLsnovaculis^utargenteoappantiicomitanc.NoxiJeruntfungi.qmincoqucndodu- liores fientiinnocentiores, qui nitro addito coquentur, fi utiquepcrcoquentur. Tutiores ficnEcuracarnecoai.auccumpediculopyri.profunc&pyraconfestimfumpta. Debellae cosSiaceEuiatura.contrariaijs. DiphilusMedicusijs.qmhoccibofrangulanturjremedio e(TediClt,aqua;munic,nitri&;acctipotLim,itautin vomitioncredatur: itaquepararide- bntexaccto, aquamulft, velme!je&:(ajc,cx Athenzo. Apirusdefungorumapparatu

hxchabec. Fun^tfarneiclLxi.calidi.exficcatiingarocumpiperccxcipimiturjicautpipe- cum liqiiamineferatur.Aliter: Infungis farneispiper,carenum,acctunn &:oleum laudan- Wr. Vcl.fungifarneiexfalcoIeOjraero&coriannoconcifoinferuntur. Fungos boletos, carcnm.faficuliim cdianniviridisubi ferbLicrint,cxcmpro faficulo inferes, Vcl, boletoi- tum coliculoSjliquaminejVel fale afperfos inferunr: vel, boletorum tlyrfosconcfos in paccllamovaquep'erfundes.additopiperceiigufticOjmodicomenej&liquamine.tempera- "isoleomodico. Placinacoqucndi rationesaliquas affert. Cum fuccofaillachyrfiparte, S^a terra: inhireCjin aqua primutn cum excavacopanc.ctimquepyris.aucpyrorunrftircii- lisjacpediculifcoquendiruiit.Aliumquidamindunt.qnodabflare^cnenispucatur Elix^c faliti.in oicoaut licjU3mine friguncur,frLiti,morero,quod falfam vocant, aut alliaco fuf- funduntur.Sunt eriam qui cosablacapelle.aur fuperiore folliculo (indito file atque oleo) furfum verfilm in carbonibus decoquant.piper'queauc cinnamomoafperfs devoren&v

G^{rec} i^{ad} enfis capu!o.vel fummo vcrceic vaginam occludente appellarunt. Si^K^{im} fismanubfium, ficutixHcrodoliquet, unde& Myccnas nuncupari ^ q t a Perfeo fine condiri Mercurij prscpto,ubi excidir gladij manubrium. *02tx₅,M),o!?!;vocant,hoce(lcrrana:os:n,tm quorum pater ignotuse(t,filios terra: voca- folent.Q uod Cicero ad Atcicittn in epiftolaconfirmac. Porphyrius -&fs-p6?oi/c,X>conuti filios,qu6d(inefemineprovncircvidcantur.Latinifungosvoca[ic,nome'nquc(aliquoriJin pinione)afuneredcducitur,qu6dfuovcncnoadfunusvcrcentesducant. Inhsfongbi.

'Nuncgenus,(iis vero parcularcm tndarionibus fpecies fuberibemus, TheopKraftiis corticejraedulla^crvo^vncacarcmdixit.acradicepnicus. SedAthenxusTheoprafti t e f^{tion} of^{us}. l^{evi} cor^{ice} eflc dicic.fine radicc: fed p^{nc}incipium habere fu^{spu}llatio- <is caulcm in longirudinemri propenfunt, atque per ^{ipfam} ncrvum fe exrenderc. Pbanias vero.nequeflarem.nequefcminumveftigiadcmoñirare. C2 uod falfumefTe, jam alibidi- Ximus,quippe ft:men ferunt.

... Fnjigorumpcnciofanacura. Nospaucisgeneraperfringemus. FungommgenusjVel^{0mm1*} nscurx, vel artis opus. Suntcnim acgiritx ex induftria, utdicemus. Naturalium duplex F<<<< MM. difcrijnen,Dio[coridcau<Sore:aitenim.Quimanduntur,aliquandopernicialcsrunt. Lc-^{mm dupla} tales mulcifariam viruscontrahunt,vel ubi clavus ferreus,in quo fit rubigo, vel ubi putridi*^m panni, vel fcrpentum latibula & cava, vel fi juxtaarbores erumpunc, qui noxiosprivatim panunt fungos: omnibusque ijscolluviesquatdam infidec,3f: rpuma,ijde"mqc acarpcu cc- *eritercompm:refcunt,arquemarcorevitantur. PlinmSjaDiofcoridc&alijsexci- piendo, ^c!iabct.Pernicialiaptotrusimprobanda:fi cnim caligatis clavus, fernvealiquarubigo,ivrBiii&> *u^mtpanni marcoradfuert nafcenci, oranem Hlico fucciim alicmim, faporemqc in^erAc-^m *^{gnc} umconcoquit, dcprehendificquenifiagreftespoftunr, atque qui colligunt. Duciintipfi^^{at} ^tiavitia, nuncquidcmfiferpcntiscaverna juxtafucrie, ftpacelcencesprimoadhalavric, ca^{ca} pacivenenorumcognattonead virus accipiendum.itaquecavericopvncict priusquam fecondantferpente?. 'Signaerunctotberbx,to:atbores,fruticcfque,abcmeriucarumad Mtcbtram ufque vcrnantes: & vel fraxini tantum folia nee poftca nalcntia, nee anre deci- "cntia. Quorundamex hisfaci!eno(cuncurveneia,dilutorubore, rancidoafpeflu, livi- do intus color, f^{ota} i^{ra} bai^o peram^{lum} N ro. n funtha:cinquibusdatn: ficci-

quc & nitrifi[T>ile.?,vciUttguttas in vcrtrice albas ex tunica fbagerunt, Vnde à pcrtris regio nutnlegendi font

Qua arboris
mcc-i fungus
pariat.

Arborum verd,qu;c varios fungos parere fbient,qui cibus abdicantur, (parfim AuthorM
me,mincre. Nioandcr in Gcorgios fuis Athenaro cepte.

al i i i i i ca p p o p a g o,
Quercit^ & funky mslc triffipff,
Illicibi jqtie vemt fungus gra<vis humulu>S
Lcttfer.

Plinius^obu^cuprefluSj&ptnusnoxiospariunt.itemfagus. Theophrathis;robur e radi*
cibus,& juxta radices cmctit fungos.Avicenna, exolcainprobos. Platmanoxiosemitti.
Sedcdulcs amunnalijvel vcrno tempore nafcuntur.

Fungus
davit

Dicemusdc Aiuumnalibus qui pnmis imbribus nafcuntur. Horum genus tripliciter
particmur: vel ctioi in prans.vet aibonbus,vel lapidibusadnaicuntur. Dicemusprimo d

Natura est, alijs male creditur:
Pratenum optima, qui e pncLpatumrenent,boletifunt difflaLatinis,aGr2cisve-

ro^ Galeno ^ Paulo^EginEt^fuoafblcla:. SuncquidicJumvolunra^iEro T < ficote,
quodglcbam,& privatimrjbncam illam vulgo bolusdic\am,lignificac,undecolobolc-
ti.Ncapolitam ouoleHtbolocaeli vocant; ica cnim ovorum vitellum dicunt, cojusfbinuoi
fix.(ctcruuit. Qj.iantiolini cxiftimatifuerint^indicatvelillud Martialis:

Argentim at one aururn facile eH,tenantj, tegamfo

Mittere: peletes mitt erejtiffciUdt-

Boleti.

PliniusjIntcrea. quatctncicinandmuur.bolctosmeritopofuerimroptimifopitnijqui-
dcrohoscibi 3 fcdi[nmen(ocxemploincrimenaddudos,venenoTiberioCiaudioPrin-
cipiper lianccoccafioncniacnjugc Agrippinadato. Origotatis eft. Volvam terraob hoe
pnuşg'gnitjipfum polteainvolvajCCu inovoefluteutQ : nee tuniac minor gratia jncib*
infautisbolcti.Rmnpiturhajsprimo na(eentc,mo>cinped]culo corpus abfunmur,rar6quo
unquamgeminisex uno pede. Origo priinacaufaqqieelimo ,&:accfcente{ucco madentis
terrx,aut radicisfermcglaadtferas: imtioquc fpuma lentior, deirj corpus membranxiitni-
le.mox part us.OrtuSjOccafiiqueuejusomnisintra dies feptem eft, Roburboletosproducic
circa radices. Glaucias (tomacho utiles putat bolctos.Galenus: omnium fungoru funt mi-
jiii>enoxii...SedncquislargiiseisuratLir;pravtenimfmKnjcci,atqiieinterimc;rcpofrunf.

Qua arboris
Suilla
Farni funt
li

VaricondiLr3rur.ut'ea,qiijs null.t inligni qualitate pradita funt. Eademque Paulusalferic
SuccedunzquosGrxet dfjaviTas vocanc,LatLniSuiios,quosadhuncrucqcdt'cin Neapo-
"tani vocantfili Sc ammonli. Apicius fameos fungos vocat, à fatno roboris generc, uc luf-
piuor.Dixitcnim Pl;nius,robureosproducere. Proximibonitatejamdifflis.Galenus:Se-
cundi pofitK)s(itntamanita:,EcPaulus:Colorcruuiufij!tgi[ioro,pedicuIoomniumcra{ro,
orbe^tfrpehumanumcaputKquentjinfracolorcnigro virfcce. QuumelixantiuliuC
mucofi, Nafcuntur infilvis,ubi(olum incultnm, Nicandercum non torrcridebercdixie
cxAthexo. Plinius rvencnisaccommodatifimum. Fami]iasnuperintercfcncrc,&..rota
convivii,Anna:um Sorcnum pne&duñ Ncronis vigilumj&i tribunos Sicctufiones Qu^
voluptastanwatxcipitiscibi? Siccan[urpendentes(uillijuncotransiixi, quaicseBithunii
veniunt. SuilligulastioviTimairLtamenra, Circaroborumradicesgriuhur. Tuiiflinii
qui nibenr callojminus diluto rubore,quam boleti. Mox candidi, velurapice flaminisin-
(lgnibuspedicuHs. HosNeapolitaiiicCOTfrrW//fvocant,longoenimprodeuntpcdiculo*
c.tllo corporis in turbinem mucronato: à ncto fuibrum glomerc, tmah'ia vulgo ditSo, ir*
appcltantur, plac'nrrque morofodivitum palaro. Suncin fungorum generc à Gra: cis d>fti
Pezkje, qui fine radiceautpediculo nalcuntur,ex Plinio.

Cono
cthid

Nuncalicjuosfubjungemusamiquisjndictoj: Ellfungorum rppcies.NeapolitanisG^
nacch vulgo di&a , mirabili profectoforma,ucncfciascuiaflimiles: ad magnamercrciral*
tiruciincm.utbracliijsdiduEiis vixhoinocompleftipoult,pondus{exaginia]ibr3rurii,noⁱⁱ
orbicular: forma.utcecerijfedvclutt nianusindigito5pluresd'ldufla,urquercusfrondibo*
Galinella. affimilcturalbi.callofi.utvixintgrouniverJ.ifaiKilia vefci poiñt. G*fi>c&vcr6patvac**
Piperium. ffjrmajfpoigijs vel na'ceniibus porris fimilis.quariior digitorum longitudine: nafciturA^
tumio locisumbrofis,Eft Sdfungusquern pijicritim vocanc :quia vcfccndolinguam vel*
Peperella. licat, ac fi piper voraremus, ac fauces incendit: na(citur ctiam Aucumno, colorisalbi, vul*
gôque peperfdii Eft&candiduSjOdoratiffimus. otbemvixutraquecanudidu'^1*Richione. j ollice & indice cin g es,tam eñi iavis pudcu d se abar: it etur agnis nno è, nco
G lucf.. HuhioxevoCATvz,qualimagnumfungorumregemdicas. Qui v u g o l u x i d i c u r t
dorisfunt immactilatijbini^autrcniab uno pediculojuncti,forma non rotundi,fedvelu>
ti g.illi crifts.uiide nomen funtpifTe fufpicor,croci odore.coma vetut vil!o(a. Sg ncinok*• ftiijnus,furt)maeft,quod unaquxquergio fuosopn lares habet,

Fungus ar.
borum.

Nuncadaluidgenusdcvnciidiim ,qitodicilicetcirca arborcs adnsfcimr. Nicander
maximè fungos, qui fidi a nafcuntur, laudat, inquiens:

Quum

Quum fuerit jiaumultofubficrtoretecla,
Si moxpcrp^uo flnxn cenfyerferu il/4m,
Irmocui [urgent radkibr**undiquefungi,
El uos in ^ aed i x e m Ctdito nuf lam.

Plinius non folu in ex ficus a bore: fed jis aberit in uis ven g i a n m . c q t u { j } { n i
liorfuentaibonmi tici.CMiidamdifcreverearborum gcnenbus.ficOj ferula,&gurmntfe-
lentibus. Populusalpinahnisnafcennbiislaulanffima. Quercuspmbatiflimos,inquic
PUnius, Sed apud nos noxij fiinc: nefciocur quercus piobacilhmosab eo producere dica-
i«r,robiirver6noxios,qi]umejufdeni generis licjnedicatn idem. Dipphilusmedicusifami-
liars&innoxiiircduncurreccLues,minuriflimi,molles,friabiles,quHnulraisi&piccisiia-
icuncur,exALhcnj;o.Scd omnium opcimi,qui m Sambuciradicibusadnafcuntur: cos hic-
needimus.

Poftremumgenusefaxisna{citurPra?cidituradcrum. aliusfubnaTcitur/cmperqinovos
producic,re(iibili foecunditate: fcpem dicbus perficitur, fcxies anno dementur, Terra do-
drance operitur.Neapolim affcruncur ex Vcfiivio monte tapides:Surrentum ex Fagecoal-
tiflimo fuitraiSus montci Abellini,ex Partenio monte. in Apulia.ex Gargmo ,& ceHiori-
bus monciurh parcibusnam (axa,ubi fcmel produxifle videnc/ufFodiutic,!^ venum expor-
tanc.Nafcunr.uraLicjtianononpiIeaiijfedturionesutafparagij&itiranosdivifi.

Nunc & genera indicabimus^ua: verno nafcuntur rempore. PJinius: Nee non &car- y«n; ve m §
noraahquaappellabimus.utfpongiasinhumorepratorumenafcentes.NafcunturMartio t" > t° TM ".*-
menfcetfquevcfcimurquadragctimalibusjejunijs. Aipongianini finulicudinCj/^c^w/rfa"^^^
dicimus. Strobilos magmtuctine &cforma pneferunt ,ut tnum hbrarum pondus ixpe ex-
pleant;foramtnibusperviae, &:vacusfunt.Simu)&cumhisna(cijn[ur,quas vu\gomona- Monac
teUe vocamus.colore nigrOjCauli icx foliolis rotundis per centrum annexis harentibus,fed vicui.
ftpore irjfenores.Sunc&; omnjum fungorumoptimi,qui vu!goF;ra;dicuntur,quodverno
temporena(cantur,Romanis/w»o//;primisAprilisimbnbuserumpunc,odor.ui ,guilut Prignioli.
iuaveSj&innocuirnafcuntur in ilvisfubarboruminnbns,&"bi nafcuntur, quocannis re-
pulluianc Aliquando,ca:fHarbortbus,elocoevane(cunt: {bluminquoctcicdtcincreico-
orts.Hermo)ausinnocenciffimosdixit,quierubisverenafcunturrorundicateclufili quos
inde^raw&&j^/»a/svoca[K,&ccarduis,quosindefW«f/w appellant.

PotfrmcocosprofrcqicmurjqosarsreperitL DiolcondcstraditeiTequidicacutriuifque
popuh, albx nigrarq; cortices in minutiasconcifos, & ftercoratis [egetibus inperfos, fun- I* > &
gosutilesinnocente(qucpareretoto anno refribiles. Ait TarcuiinusiFeim^ntoinipfis po-
pulinigra^ttuncisjuxwrrram reciflsaquadiluto, protinuscoaicfcunfc^/Wiadaitque, Ac^r^
fimontanurnarvumjtniTlciscalarnisjllipuiisj&fruticibusfcatecnSjqut^uniimbrespar-"
turitjincendacur.permttlti fpontenaturprorumpent fungi: ii tamenarvo jam iggef/tef-
fercto, non fubrequitunrober,quiimpenderevidcbatur, aqua linteorar6ftilfatim,imbris
lmitationconffergenda ijs incenfis locis, nafcentiirquefungiquidem, tedaliquamo de-
'cnores: liquidem raeliores in hoc genere rLint,qui imbre aluntur.

Hactenus Ioan. Bapt.Porta, qui,quum Athcna*iverfionempofixemama C-V, Iacobo
Oalechampiofaclanimukisalijis Villxfua: locis fit (cquutus, eamtOLolibroDeciuiunc-
glexifle yidetur; qux tamenlonge elegantioreft^ magis probaia.

FVNGO-





V o N i A M Typographus aliquot fungorum icones jatu
fculptM habebat qm hut C. V, ^Matthias Lobelia* adcal-
cem fui Herbartj Germanu inferiori Idiomatice conscripti
ufks est t eat hic subijcere, atqut ^ t Uius descripttona ^ utt li-
huit. Fatemur mmen binas in nofirum Commentarium inuhjfe, qu &
foU ^ adeorum, quos descriptfi? nus; Fungomm Htftoriam accommodari
potuemnt; ad primttm videlicet fcctdnt orumgenus \$ ad poflremum
Pernicioforunu; quorum quiderru kones ^ vi vis coloribus expreffastoti-
dem habemus, < tcutrmfquc _ j generii (pecies defer tpftmtu: Jed paucas in
mbellUfcalpi ^ voluimu \$; mmmijsjumftihus Typographu gravarenms.

E vernaculo Lobelij Herbario defumptae kones
& de(c)ripciones.

VVLGARES EDVLES FVNGI, PLANT, ET IN
METAM QXODAMMODO ELATI. A.

Vulgaresdulcs fungi. A.



VVLGARE \$, quibus ferme pas-
sim vescuntur, fatts funtcognti-
carnconflanc itli profus alba, dum
lecences funt, & inferne fubruber;
VclLftare vitium contrahunt, &, noxij
fiunt, gravem odorem contrahentii
& fQ/cumcolorem. Deglubaticlixan-
wr, deinde condmmur butyro, vcl
oieo olivarum, omphacio vcl aceto
minus nocent. fl pipertntuni inperga*
tur. Nascuntur Vere & Aunimno fa-
bulofis rccens ftercoratis agtis. fubinde
etiani infiniccis, inqmbus inlubres
oriuntur,

Herumftmgerum in tXlmU delinea-
Urttm, «lij ad Tcrtittm & < 3uartum gent*
Tungermn tfulentvrttm i Carole etitfi*
ttefcriptortimrtftrri feffent, mitresv(TO
*d ottai'i gexertf frtmam fyi m.

SIUVOSI NEMORVM
FVNGI. B.

I N filvis SC nemorofis locis nafcu-
tur quidam l fungi fmuofiforis, fup***
DC pallentes, & maculifubnsini «tij
interne lubalbidi & (tnati: qui £ n^{on}j
millis. primum repurgari clixantur, *11^
fnguntur, dWii quecduDtur; a ipd' ^
de ptobancut j utatij ejufdem gtl^{erl}
propcarboics, aut fubillis ^{na}*Pf^{pl}Tj
qma punons iuia iiatuti-, & ab^{un}
terreis

Sin u oli rtemoium Fungi- B.



J

Amplusnorum Fungus. C.



ferreis clavisaut putrilaginosis locis: nisi foras
subpernicio Gsarbonibus, Sicirca serpentin
latibulacrescant.

AMPLVS NEMORVM FVNCVS. C.

ISDE M locis reperitur aliud Fungi genus
planuni, quod in cruditam in tantam ampli-
tudinem excrevit, ut lancem implere queat.
Id aliquando profus album, nonnunquam
fusco maculis mgris & c rufis dilinitum, in-
ferna! bum & nigris trijsexaracuro, pediculi
infictiote patte nra.

VVLGARES PERNICIO-
SIFVHGI-t


ExitES PERNICIOSI FVHGL. D.

PASSI M iftinascuntur, in agris. prlus,
borcis, & vccenbusxdificijs, tpii facik-a
supenoribusdignolci pollunc.ut&rclijua ge-
nera. Horum aucem,

Quid am fune exiles, in rotuodicate oblon-
giufculi, & prxalci galericuli instar concavi.
colorc Bavo prxditi.

Alij amphores, albi, aut cineraccis fuscifve
interdum maculis notati, itiferne aut mcavi-
tate mgn.Sunt ScplatimtaccubuLaj tionnulli
cciamparmislmiic

Exiles pernicioii Fungi. D.



Fungi:lij Clyr.eiforroespernicioG. E.



HORVM" forma planaquidem est, fed, ugofa&peror*s reflex a, flavi colons-, p^dciculisfufcii, Innalcumut plerumque putrifiti bgnis aur sflcribus vetuftarum jedium ruiticanarum & flabulorum.

Ijfdem locis & fecundiim ruffico- rum calasinvcniuntitrectiam alij ejut demqmdé forma', r>!an^& otbicular, fcdqui non funtreflexi,quotum ctiam aliqui perorascrenaii.

Invcniunturadiuic alij his non val- deditimiles in arborum aggcTibtis,fulj fcpib»s,rubncoloris, quoiLmncnnulli nutlo peculiari pdoic tunt fia;diti: alij veto mofcht odonun qLodamniO- do rcfcrunc. - * w ^


FVNGI IN ARBORIBVS NASCENTES.

ARBORVM FVNGVS AVRICVL^

IVDA. FACIE. F.

EX vctufhrum arborumtrunciso- numur qi.a'dam.alia Fuigorum genera , quorum alia alba futitaufla- vefcentia, rugolaque & carnlaginolai inftarAunculjcIudivulgoappcllatx.

Arboru m fungus auricula: ludx facie. F>



Aiaa<i3mrpongiosam3teriaprafdira,omi,fubftantia&formaAganconov3ldcdifli- mill,colorequo fpongi:r,aiir.e> Havo fufci. Hoc^cnusaliquoncsin lixiviococulum & recti- cl:um,autihaquaadditiscinctibiis,cxficcatiir,& paramraeHychniaconficicnda.oainJg* nem tovct,adc*6utnonnti!Iis locis igmarij vicenifupplcar, Vidi cnim ufurpan j&ipfeufo* {iirr mcaftnsigniatijfomLtisloco ,adfclopumexplot)cnduni. Solebat Antuerpix venalis nriadpublicam porcicum.quomercatorciffinffulisdicibiisbisonvcnrc lolent,cum ^nicabulisad ignem excipicndum.FoncIuccrnx fungus Cornanj.

'Frequenter & mtgxi topik htiufincdifungttmpr.ipitr/tttim in foro t'en.tlan expofitum fingulit hebdomadibus ccxfpexit C&rohu Clufius, & interdum emit ,tr.tle'timbiber»o tempere, ad h>it Jcintih'its chalybeateftrrs txcitaias excipicndtm,tmqunm fennit t*J rui, at fulphurato fiamant txcittret.

Glaus feu cspptellum P i¹ A L L I.



Marius, C. C. H. S. O. N. U. M. V. C.

INTER. Nacura: miracula celebratur hie Fungus apuii Batavos, anno M. D. LIX. Ancverpiamadnosmiflus. Similctn dcindefepreuniopoitarcnofb loco ad Ligerisfluvj] ripamnon procul Bxds repten bam Scpcmbri.Copiose crefcicin Hoi- i lantiiaradicibusparci, &clinab indigenis appellati (quemadmodum inGalliaNarboncnfiHypociftis exCifti radicibus oritur) diverfisfabulofisaggeribus fpartoitlorudi conficis, prafertim verò ijs quiHarlcmo& Alcmansfuncvidni. SedquandoquidemHadrianusIuniuselegarer&pro- luc ilium defciipiic, breviter cumadumbrabimus.

§ It' batavica...

lhfrku

§ It' batavica...

Folvafive matrix, glomusauc (crotrum formarefcens (equalcapus exilic) gcniiro involucro prxdica est, albo, dcindc iuleoHavefcenc, infidēspediculo perquem alimennimcxugcrecredibilecft. Eftvrcdca volva plena frigidiffinio.ftccidojgravi SC coagulato fucco,qui quodammodoliqucfciCjVoIvacterracruta: coles arreflus, cavUS, & bipalmaris, maculiscincraccisdif[^] tintus,&c media volva ptorumpenSjbre- vi etiam Haccelcic, quafi deftitutus fuo alimen[o Sinacurali feminc: liaber autem per mediam longitudinem a:qua!e anguftum foramen, in extreme tamenanguftius, ia

joffavlflamina: fumnumcapurveitugalca tedium est, tamqohm penisglandem expnmens,a!biiiiitio colons, dcindc vetuftatefurci, foraminctn verricepredicurn, ex quo foetidus odor exhala t Suntqui a flerant frigidiffimum ilium volva:coagulatum& tenr...V' mucurn valdeucilem cflcadpodagramcxhamorccalidoprognacamprofligand[^]nMu.-fc-evaLdeappBtuntliuncPlulluLn.prindeacquealiosfoccidosfungos.

C»« anno M. D. xcV n. Amflersdam' cffi? Carotus Clttfim Septemhri menfe, ofiendebtmur illi < diverftt aliquot t) ufmedi velvd recess ex arenafis tgeribus eruta, qua omms db & erant prater "nicamjn ankfutumfcens & vcltiti atrnetu color elucbat: fed omna tdtbfriguUjttmttm reti- Jifrt[^] miJis rUorc & vduti t&rmcm qitendam illi in tk induetrent, atjueji tarpedtnem ap- Jmbendiflit: hatttm uniper mediumJecfi, apparuit coagulates\lle_j & crdffuf,hitmor infidr taciit totvuloi, & inipfo medttnllioliuormdumpellttddminsi.tr mrvl optct tn oath. Sedciim vol- 'v*UUfAmt(inm fvuid[^]mtujhrn ial qwdummodoexatmct ,diligemim cbfcric/arz[^]fu[^]erfidit. Phallus parv' i e vdvAfrominMemmttuM vidit.

HONORII BELLI

V I C E N T I N I ,

Medici Cydonicnfis inCreta infula,

AD CAROLVM CLVSIVM

ALICLVOT EPISTOL^,

De rarioribus quibufdam plantis agentes.



&Verta(cofimiii, minoraverd, 5uotalanuginquadath, Eth o ydisfolij operta cau]icu¹iiii(Linty"ct!, floribuslutcis, Verbaicoauib]atcaris:inii]busonuf]j: quibusfijcce- diiJKpi.tula; roKindx^arvx.BktcariaefimiJeSjinqmbLsfe^rinaparvacontinenmr: prove- nic inter .ijjiaA^perparietes, Nomine caret.

Smyrniac
Cefalon.
C. 311111.

SMYRNII hujusvirenreplancannonvidi^dinitinere.ittCefalonijftminaexficcis umbellislegi,ait]ucarufticiscjufdem Infula...ocayaudi vi.

C. 3111111111
pa n. 1. 1. 1. 1.

CHRYSANTHEMVM hocvocatur *fi&TiX't'S'a*, Scarufticis editur: mihi ramen fapore& odorepauimprobaturjhcetinmulriscumlegittmoconveniat.

Arifolochia
Cl. 1111111111.

AaismLOCMiA Clemacitisharc,nififallor,optimcdefcribiratelib.n. Hifpan. fiirp. cap.xxiii.eamaucmlegitimamClematitidejneflccciWeOjlicet hilloneDioftoridisnort conueniat:textuscnimcorrupttiseft, utetianialijoptimcaniraadvtrcrunt.Nara Plinius, nequeThcophraflus,ncqueAficic]uorunialiquisii!lamfoliorumdiffercnEiarnfaciijr^{im*} mcorredio ccxtusTheophrast a Dodona:0)OpEimcquadrat Imic : nam folfafimiha hcl- xini cyffampelo profert:adde,quod Pliniuslib.xxv.cap.vin.rcribic, ArifolocInamCle-

Mjiplahti
mar. Bit
Ufa*

tidem vocan Creticam. Scd in Crcta liucutque nuilum aliud Arifolochis eenusob- fervavi: iongam enirn aut rotundam nondum vidi: led na:c ubique proventtcopiodllime, 6>:adliucap(e-oAoxKappc]latur: hiemefoliarstinct, &toiaodoratifliinaeft, radicemte- nueinjlongam^dorariiTimamquehabetjColorebuxeo.

Hippomara-
lorum.

HIPI>OMARATMR.VM foliatctiua,fcEniculoquodammodo familia,profert,caulem lie* vcm,duosauttres cubiroslongum,iriiniiTiidigiti cralfirudine, geniculatum: florcm]u- tecum in umbellis.ut Ancthutn,lemina magnacachryi familia:radice nittor firma,magna, o]orara Vocatur<!rAaT>]tcjV"o > quod latum cumituiTfbuat. Hujus (euicii vulgaricrs mulicnbuscoquitur in lixivioad capiilosaurco colore tingendos.

LeMofr.
Mum.

LEONTOPODIVM liebulaeftparvajfoliafcrensquaruorautquinqLicp]anragini angil- flifoha:(im]]imaJongituduicqiiatuordigi[orum,c3i]liculostrcSj quator, quinauc, ali- qmndoplares,binos digitos longos: in quibus contmentur flares p:ri, mgris punHis dif- tm<Si,quibusfuccedunrcapitula]incana, lanofajrcmtnparvumjpfylioimdc continentia: radix vero minimacr.Ciim are(cit,C3pitulainlecoi]trah.nnturad]pecicin unguium mil- vicx3nimaci,ucinCacananceprima Diofcondis: fed Cacanancenoneft, nam folia Coro- nopinonfuir.nequcfbmenOrobofimikhabEt. Siautcm li^c duo ha beret, Jegitinjaifa Catanance.Vtunturhacvulgaricradfolvendosquopucant ex maluficio venci utinon fon^c:namhcrbafiiiperprunaspo(ita,cerpacienref]nntufumperfumumtr3nfirefaciunt,&: totiut"iivicibusindullumc]usfumigdn: &iindubioliberuuiamak-ficioforcpra:dicar.

C*/<»a»
Diofcor.

VHUHI.

Antbtt]t*
U
Eius n. m. s.
v. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

ANTHRISCVS herbafamilimaScandici Icgitima;efl,folia ferens tenuiora, crebriusdivi- fa.odoratoria mulcoicaultculiejus dodrantales, flores in umbellisalbi, femina longjj (cd mmoraqiiamScandicis]teraplaniafuavifli¹ Ttigu(luscft:provenic]setiscolhbus,]ocisfic- cis,& niter faxa:manditur in acetarijsvere.&:ma<imeappeiitur.Venercm mirumino- modumcxcitad&adjuvat, tdeoT^A/^of/^anomine oblca^no vulgo vocatur, quod vulvae purgamentum]fignificac.Meminit AntlirifciPliniuslib.xxii.cap.xxn.bisverbis. Eadem crac Anthrifcus.fi tenuiora folia & odoratoria haberec, &c quxquidem vcrba corrupts funt,&rhoc]f]noc]olegendaccnfeo Eadem crat Anthnfcus.nifitenuiorafolia&odorario- ra haberec.Nam fi legatur(^)&non(>(/?) Anthrifcus e]ftTc Pe&en Vencris vulgaris:cui noa conveniutit vires a Plinio tn]bucx Anthnfcu.Nam Pcflen Veneris ncque odoratuseft] que a u o come itur: vocatur aut e & σκαδ(ιχ-), qua; comedirurqu idem led ip]ancquc Venerem excitat.ncq]iefatigatoVenc- recorporifuccurrit. Vndeapparcterror Andrxxtiraquelh comment, m IcgemConnii' bialcmr qui Scandici hoc t]nbutr,quotW^Itnius Anthrifci peculiareefle fcripferat. ScandiX abexc^{mo}Dodona!oaf]rabrepingicir.Hancurcm her bam, AnthrHcum e]ffe,primitisSilvc- riusTodelchiniFundaiiusagnovic]virincognitione ftirpium excrcitaiiTimus,tuiq;ftu* dififn]ajmihiqucoftendi^atquccxcellenLffimopiamcmoxMclchior]G]idino Pataviummiic.

Eliechry-
sum.

ELIOCHRYSVM hoclegantiffimaplantaefl^otatomencofa, foliafertlonga ,angufis» (r^ulesdodrantales.inq]iibusinruntumbellatifloies^urcijpulcherrimi.coryniboriiaimti' ••j.-.quiin]apposrefblvuntut: ijautem prcpetuoduranteodcmaureocolQrc fulgentes,U loco ficcocondantur.

RANUNCVLI
var. 40111
v.

RANUNCVLI hi,quiaclcgantcsflores proferunt,&copiofiffimi incollibusvernorem- pore]peflantur, ubieorumicmina&radicesmittendas duxi: namplurimum tempo^{ris} effb]fxduranc.

BRYONIA harcdicoccosyquentiflimeinCretaprovenit: elegantstfcditercabaliis*****A
quaralibtnafcuntur. I I! ««"•

CAVCALIS, hic & in tota Graecia vulgarissima est: vocatur χαμκαλυτρη, & eadem est, quae Causalis.
pro Tordyllo accipitur, & quam Bellonius lib. III. Observat. cap. XLIX. legitur. Nam cenfet. χαμκαλυτρη.

AN leonimi Tordylii famina hae sint pelagia: nam falia... Tordylion.
ta nerbaeratanda: fed cerra^committam, & dUigenter obfervabo: quod Sc tu facias, etiam
atque etiam rogo.

CHAM/ELEON albus, gutnmi, ucM. iftix, ferens, copiofiffimuseft. radicem habet n]axi- Chamaleon
mam^doratam: Iunio & Iulio circa echinii aigummi di[K]at, quod pucril cemit, & ali- albus.
juantulum mafticacipofteadigitistevigant. & complanancoi DpHcaiuaique in veficulK
ro' nwmj Cupralcerammanmfortiterimpellunt autcxiaii veficulatuuii pacur & cre-
piwmedat: quoludimnere, fi immopere pueridclcaaneur. Quod autem ucferibit Bel-
lionius loco mafticis id gummi dentibus atterant. nondum fetre potui: nam hic Cydonia
nquelegitur, neque caracur: radices vocantur xeaAet.

DAUCVS tertius folia Coriandri, fed minora & crassa aliquant m profert, caulcm scf- Daucus ter-
quicubitalis longitudinis, flores luteos in umbellis ut Anethum, fcmqi Vere uenit.
manduntur radices & folia, quae aromatici gustus sunt. Vulgo appellant κουρβανωδ κουρβανωδ.

ANAGYRIS passim fecus vias provenit, differtque ab ea, c... lib. I. Hist. Hispan. stirp. Anagyris
ca ne in cretibus ut
capKE&owj femcvxaKe, toliahuJ Dsdcpafcant Jicctodonsrfcing Eaeifrifni, & po fka «
hammlaeca fei is conncatur: quofifortaignarus aliquis vefcat^ aut lac b... (brim
M, mulu in vica Edifcnmcncvncrunt: eam obcaufam ftwv[hic omnibus est exoitw.
iffime acci-

LYCIVM hoc Creticum^ uIgovocar HrAc^ frarex est ad quatuor aut quinque cubi. t/*««
tos affirgens. toius spinis horridus. fpmasqitres fimul fuinberberci vulgaricernuntur jpro- Cri-
ferens^ o lia habecparv^ ad buxifoliorum formam accedencia jeviter ferrata^ ores copio- ^1^"
los, luteos, iiii (lar Pahun, red minores, quibus fuccedunt firmae aliquantu Imnlonei ut Ber-
beris fruaus^ oloris autcm nign/aporis in ceracidu^ dulcemm^ iJMn quibus vclunum
vei duo granulatmcntar. cortex hgninon livisut Berbeti. fed asper & pallidus ea ma-
teries ligni lutea. atque radix ip(iuselegantiffimolutcoinficit: opitur in altiflimorum mon-
tium convalibus: differt autem a Berbers, cujus folia majora fuDt, & frudus ra^ uacirn
nafcuntur. Legitimum vero Lycium non est, quia fructus nque rotundus ut M5er" ncauc
amarus est. Propterea potius vocanda erit Berberis alpina aut comnana, qilm Lycium

quemadmodum Silverius Todefchini cenfet: qui hunc fruticem frequentiffimum in Li-
banomonte etiam invenit. Ceterum duo alia Lycij genera licreperiuntur, quoru Vnuni
J?aximchiflori Econvenit: idetiam in Libanomonte ontur: cujus Umad manus neque X!
«: mina, nequerami (int, ideodeipoinpra; fentiavcrbanonfacio. AlEerius ver6 Famosfic-
cosi mulcumejus frua nondum matorum ito vocatur Aa^ pij & TrfTpoa^ a Aahoc^ A.
est, perna amygdala, licet cum am vgdalis nihil commune habcat: rru tex est ad duorum «^w -
a ut tnum cubitorum altitudinem aflurgens, densus, folia parva firmoque fern: («n« m ^
tus plenus est, & frua mrotundum ferre, parvum ut piper habet, cum ad maturarcm
pervenit. nigricantem: radix lignosa est, maxima, ea que firmiffima; Hebrari ex huius fru-
«u elegantem luteum colorem parant.

ASPALATHVS hic est fecundus D^ idis verus & legitimus: at iue in tota Graecia no- X DbZ
men ad hue retinct: illo fepes conficiunt, & integri filvs hoc fob cc iftare fpeftant unieni
p53terics alba, diirinima & grave (t: nieditai autcm lignij nigrefcit. odor carnis: flores
nabet luteos, gftnifxaw naltw, parum odoratos: venro autem [piranrc, eorum ojior facts
(uavis manclongiiis percipitur; fuccedunr parv^ filjqux) in quibus tria quatuorve femina
concincur: folia Rutx familia fiunt. ternafimul jiantta: fpinis rotus frutex Tcarct: radice
"iticur firmajignofa, odonsexperre. Exc^ Matlii olu^ mnc fruticem non fine rrorc
Acaciam alteram appelUt, cum fit Afpalathus alter Diofcondis.

GYTISVS Creticus frutex est rotus obliquus. ad quatuor aut quinque cubitorum^ itu
ncman; i rgens folia profert te fna f in luna a, argent^ ea folia, mulador fo h^ i
d' gporerte mafimuluna, argent^ ea folia, mula, dor fo an qm^ i
tulu Inpromine i re: Hoers rifolfj majoris, ad huctamen majores, rubros, inqt)ibus sint rmi-
xi luntaliquidam villi, quiftruthiocameli pennas, catque in minutiffimas partes di ViT^
^mulantor: caratione flos eleganti fit nus apparet, viderenim expurpura, & arento
quodimmodo anatura formatus: fuccedunt fminamiliomajora: matens ligni miera
ouriflinii quccft: cortex cinereus, & cocas profundis ciffuris plenus. Oricurubique in

afperrimis roliumljLcis&: pr&fcipitijs,vocaturq;Vulgoap^(3v^o^o,quodnobi!elignum fonat.HunvfrtiticfTijCycirurUj&fortaireJeginmumcirejiidici?.

H JEC fu'>tVir(flarJffime,qua:iibinuncmitt.endaduxi:<jt'?fitibigratafuiffeintelle-xeco:alia&ca**csifttamlinrereafialiqtiodefemeiipercgrinumr&i>cs, ut&: mini portion-culam mittas,eiamatqueetiam rogo. Deusopt.max.incolunienc-tconfervet. Cydomar Cretarxxmi.Seprembris M< D, xcm.

QvANTO autemcumrneo mwroreh&comniq, aueruminepifloUmemisi/^Perierwt:fitisdf-claravi (ap.Ni x.ffl. i .mearum objcrvanonum^uodOenoplia hijtmam cbmplellitur.Sedmchetiri-
prtuniwm intettexijjim: nifi ipfe ad taUtrnJux epiflaU b&cfrequentia ad)etiffit.

HANC epistolam fimtilcumfeminibus&herbisficcis IU^mo Pinellomilcram, uttibi reddendam curaret,eimq; Silvcrio Todefclnni Fundano qui navi Venetias petcbat, com-mendaveram. Sed, ut,audio,navisipfa, maxima tcmpeftatevexata, inSiciliamappellere coaftafuit, adeoafflifta, utad amplrilsnavigartduminutilisjudicerur: quarcrimens, nc herba:, femina &c liteiae perierint: exemplum carundcin litteratum mitrcndum fhtucram fimul cum aliqua portione corundem ictrimm .qua; inihi,nefcioquo cafu fijpererant: ut, nil! omnia ad tc petvenirent.eorum faltcm porcione non priveris. Exemplum autcm jam cosifcriperam,mequcadcomplicandumparaveram:quandoiua:mihiredduntur,CoLo-nia: Agrippinae xi. OiSobns fcnpa;: qua: mihi mitum in modum graiar fuerut :ex ijscnim cogiioviaimituicandorem,& quantum remp.juvarccupias.Propccrcafi Dcusopt.max. incolumemmerervabitartacefutura^ibiretnnaherbafcjueficcasmittani^omnicna-tuefficiam.utadtcpervcniant. Siliberquemmifilijad manuspervenerit,eumlilbentilfi-mepcrlcgam,& inter carsora rcondam,atque dijigenti(lime,ut noltr^conirada: amicirise pignus,(crvabo. Bencvale,Cydonia;Cretx,xxii.Ianu3rijM, o. x c mi.

A C C I P I E B A M autem ipfum hoc exemplar xxv. tjtfatj in fequeittis > & pridie Calmd. lit-
m ³ respondcbam.

CLARIS S, V. CAROLO CLVSIO,

. . HO. NORIVS BELLVS S. P. D.



AM annus est, quod tibi aliquot femina miferitn: fed navi qua: eafercbat, maximareribiliquetempcftarc inSiciliamejciSa.omniaperierunt. Qjiod ftatim ut intcllexi, xxu. Januarij tibi irerutn alia»#fi, fed non omnia, qu^a non (upererant: ilia an acceperis. &quiddc his fentias.pergratummihi erit intelligere. Sedquoniam,iitaliasfcripfi, opuscuumjuvarecupio, aliafir-pium aliquot adhuc(urputo) incognitarum femmanuncmitto, fimul cum illisqua: dcerant, & quorum hifcoriamdedi: addidiOenopliflorennsramulum, & Leon-topodij iconemfuiscoloribuspiftam. quai oniniaj UtcreaOjnonprorfustibtdelpicicndavi-
dc ubi tu, nova ena & m i n t, l a n d of quod : i f m, j e r p t a.

AhtHct*- ABE LICE A, cujus femina nuncmitto, arbor est magna.refla, multisramis prardita, ape-
flupulchra, cui folia Alacerni, (edrotundiora, profundc (errata (quosfloresprofratigno-
ro)nu&tusmagnitudinepiperis, figuraquafirofundus, colore inter viridemfiiinigrum me-
dio: materielignidura, & paululuodorata, pulvii enim hujus(ancalaimitatut, undc-Pfeii-
do fantalusCreticajureappellaripof Tet. Arborha: cinfoifismontibusLcucts, eorumque
Pseudo (a) < e* aluflimsjugisprovent. & b p f i u h t: Antiquis ignotamfuffeputo, nifitu! mus
N al < nZ > m < > 9- montsnaThcophrafto dcfcriptalib. deHiftDriaPIanc.nl. cap. xi in. fed folia ncquclevi-
tana. antlyxia.
teifcrratafunt, oequcraagna, utpyri, vcrunflongcminora. vocatui) «ViAjx*a.

PVLCHERRIMVS frutex, cujus femina etiam micto, ad duoram cubitorum altitudinem
aflirgit. inorbem diftunditur. pcrpetuoqi Viref. folia habet longa. rotundiufculatamenin-
ftarfoliorum mali, rirmiora,]xiillimc virentiarupcrnc, tnfcrius veto alba quadamlanugie-
nobsdufla, utargenieavideancur, caulicu!osalbos, lanuginofos, quosfolia utrinqueam-
biont, inquotumq;extremitareflorescunrurfpcietnyrl ^tinfaonaria vulgandif-
po^ .^ fed figura Cyani. colophoeniceo^allicciamenlongiorequam Cyani.fquamatOi
"j^ & rubrodiliKocotorepntiitio; floresin papposrefolvuntur, (emen longiusquamcy-
Natalis. ,, ioi calice fqueiinperenns. Inaltiffimiiprcipitijsinterfaxaprovenit: quonamine
? - i: m vocetur^ nondumfcirepotui.

ECHINOUDA, vulgariffimaplantaest, & mulcumcumEtinacea tedefcripta conve-
nit. iufi quod hare folijs carc[, 5, flores) utcosprofert] to[aque colore viridicernitur, mor-
b d f i

bemdiffufa, &erinaceum mpm in modum multitudinespinarum rcyrasfentari. Huius ftirpis meminit Plutarchus Sjoapo&acan lib. i. quatfione quarca, & Uli.de Auditipne quaii circa finem,antiquum huju^modidiftichum citans.

Ω ς α ρ ε γ ρ ρ ρ ο

QvavjLi (taKuxav tvd~ta AIBYKOTAN

luter EtMnopodas <udut, ajptram dr inter onanin
inUraum hefiunt mollui leuco'ia.

Meminicetiamhujus Atheiiauslib. Dipnofophift. tertio, perinde ac fi fcmperinterechi-
nopodas &: aferam ononin verferis.feci fallituiin margine Dalechampus Achenasi inter-
pres.quod pcechinopodam Cardui Chij genus intelligat: nam Echinopoda cam hie Crc-
ta:quatninfuLaChiototaq;GrxciaulgariiTimact,noncarduigenns,fedfrut!ciscen-
fenda:& hancfubChenopodis nomine intcllexifle Pliniumexiftimolib. Natural. Hift.x i.
cap.vni.quodetiam ancc meantmadverrerat Turncbus vir fumma laude dignus Adverfa-
riorum lib.xxtn.cap.xiijiam licet hate plStacopioffimosflorcsproferat,&ubiqueona-

Carduus
chh
Chenoput.
Echi
nopoda
non at-
tingunt apes.

xl, & ius canthi non capes non attingunt quomodo dicitur in Plinio. Echinopoda p. m.
MclchiorGuilandtns Ecllinopodam non novit. :nam epiftolaad Langium earn inter ig-
notas ftirpesenumerac. Bclloiiius verd lib.t.Obfervat.cap.xvi i i.ipfam nouiflveditur, fed
non defcripfit;nequeita congener eft Afpalathoucip/eputat. Nam Afpalachusfrwex fa-
tis magnus vifitur.folia terna fimul junita ferens,licecc feftace ipfaamitcatjUtAutumno alijs
induatur,nec fpinis adeo crebns fcatejtUt ifta.

Afpalath.

ELEGANTISSIMA Planta,quam (ni fatlor) nonnulli Poterium perperam appellant: alij
PimpineIJamfpinofam,cujisfcmnanuncaccipies,lcgitimambiofcoridisStcpcnc(re^^^r
contendo,licet ipfe nuilam Stoebsdefcriptioncm reliquerit: fedaffinitate nominis fretus, fpt;I

Poterium

quod in coca ferē Gra:ciaadhucretinet,faulfacibufqtjequasinMedicinahabetjalirjqre
non levibus conjeclurasadjurus,non vereor affirm are legitimamcTe;diff-errequemultuni
a Scebe Galcni, quam hbro primode Antidotisdefcribit. Planta ifta perpctuo hie virer, stah o^k<

UahDufi'

multotqueannosdurac.inorbemdifTLifaJfurculofaquicad cubitalitudinem aflurgit,folia f>-
ferenscarnofa.divifa.inunopediculopluraucrinquedifpofica.quarcuAutunnnoprimtim
erumpun:,infecontrac l:a videncur,&;Afpleni foha quodammodoim itancur,fcclongemi-
nora>c\xtatnenfucceflu temporis majoraapparent, Sc Pimpinellam forbafteliam voca- pimpinS*

Stah o^k<

tarn fohorutn poficu \$L divifunsactnulancur,minora verofunc. Tota plancacrebris, firmis />*****
&tcn'Jibus fpinis featcc.TcminafLiftusrubiautmoriimitancur,plures enim fimul conge-
fti font,inidovirtdesjpoftcaadrufumtendecēs: floresparvos,carnoros,exjfiridirufe(cen-
tes.mulco/quefimulcongeftosproferc. Super hancftirpera nafcitur Epithymum.quemad-

Epithymum.

nioJu(nfuperthymum, &jfJca5q;collibiJsfrequ. entiffimeinvenicur,inquibus&iriyinum,
&chymbra,&:alparagusproveniunt:minquamauteminveniturpaluftris.Adftrin,55^,ia'ivi
pollec.vulgaricerqtiein recaGrj:cias-o'€^<<vocat. Quodautem fitDiofcorwis'Stabe,

tt&tU,

clariffimepatebi^ubipriuioflencro phleos &Stcebeunum& idem eflc.&bbt aculcata-
'umgenere cTe.phleutnaiitemnomine neutro multumaScebedirterre: nam plerofque
dottiffiinosvirosxconfiitruKorumnominumin maximas tenebras incidifle compe-
rio.Omnssenim qui phleos\$phlemnepudTheophr. confundenteseademeiTeplancam
pucatifcuttraftebencogiiofcereconittfunc. Nam phleos qusvocaturftrxbc,aThea-

Phleos five
*nec fpinis
fa planta.

Phrafolib.vi. de Hift. Planc.capite I.enumeratur incereas ftirpes, qua;prater fpinam fo-
*Um habent,ut hxc Pimpinelia fpinofa: & non, ut vertit Gaza, qux ju'xtafolium aculea-
tumjaheroquoque folio conduniur:eamquecornparatOnomdi&:Tribu]o:qua:quidctn
piileos.fire ftaebe/olio confat carno(o.in ramosparfa, multifque radices habet, non ta-
menalcedefcendit,germinaccum vergilijs.primoquearatro una, nec folia dimictit, non
enimannua.fcddiuturnioceft.utidemTheophr.lib.vi.de Hift,Planr. cap.i. affirmat. Ec
Plutarchus in vita Thefci circa initium.Stcpcben inter fpt isenumeratiMenalippijinquit,

filius Ioxusornyto Tocius deducendar in Cartam Coloni' rfuit: unde Ioxidesoriginem tra-
Xerunt, quibus mos eft paciur nque fpinasaparagi, neque ftoebes igne cremare, fcd lio-
norc & cultu profequi. Aciius vco libra tefcio, capite vigefimo nono, fuperftcebem epi-
thymum nafci affirmac. Quod autemTheophr.cap.ui.lib.vi.de Hift.Planr.tribuat phleo,
cappari&tribulopeculiare,quodnonfolumhabeancaulemaculeatu, fedetiam folium
hifpidum.menduinclTefuppicor: nam eodcm libro cap. v.Inturi five cappari hoc peculiarc
efle voluic &;manifeftc inbuit phleofolium minimo pungens: dicitemm necphleum &
ippophiumacnautaturquKfolijsmitibusconfarit.Pliniusetiaralib.xxi.cap.xv.norireflc
anitnadvercensqu^Theophr. locisciratisdephleoreuftoebefcripferat,erravtt&ip^,&:
multiserrandioccafioncmprabuit. Phleum verd.longcaliadvcrfaque plantaeflib^

Phleum pa-
-it. a plant-
ta.

be.&ab antiquis Grxcis non inter fpinofas.fed inter paluftrcs ftirpes enumeratur. Pluu/
chusenim Naturaliumqufcitionmifecunda.PhleiiDipaluftremftirpcmfacit.diccns.V-
noravicLaytus.quodetiam paluftrcs flirpes.utfunttipha,phleum, &ulva, ncquegermi-

naiit,neque au^efcunc.Ltbi imbres (ao cempore nondecidunt. Idem fecit Ariftophanes in
Ranis: Cbocusnrim aitjfaluvimus pet CxpirumSCpUleOjgaudecescantibus.EtTheopri.
lib.int

lib. nn.ca^,xr.deHifior.Scirpiur«Phieuin inter lacusOrcii3mcnijftirpcsehumcrar;eju(- que gener. itatuit,taarem fructiteram,& remnam,iteriem ad nexus duntaxat utiem:fru- ctus hujus Phlei A) bella vocatur,quo ad lixivia utuntur: estq;e placentaceum quoddam molle,&rubidum quaz quidem planta adhuc mihi ignota est. Ex his liquido constare arb- kror, Pimjirsllamlancfpinoiam, fiveGracorums-oA^a le^titinum DiofcoridseiTe StrbcninamhaccplanrarefliflimeTheopliraftidcfcriptionicopvenit,ciimex aculcata- mm fa genere,& vulgaris nocitiae, fjcultarisadfaingentis, & adhuc in (anandisalvi fiuori- bus id i (in teadu f i s h r p e t u N i r q d u s f i a j u a i e c o j o r e j n b u n b i & n t , s a m o r - tula.- bo.ucaiunt,liberaiuur:praetereaantiquumnomen quailretinet; nam s o i b n d a a s o i b n d e - rivatum eTe cenfeo.

GttLptm. BVLBVS hicquemmi:tp,Gethyumantiquorumeflcjudico:namfoIijsconcavisconfiat utccpa,i)"que longi^florciquc & (cminaccpis (imilia profert: capiteanipelopraii (in)illi- museftjguihiqueccpam &porrum xmuatur. Cepamagrefcnaolimputabain : fcdPH- niuslib.xx.cap.v.negatcep? genus invenirifilveftrc. Licet aurenTiieophrastus Get hyum line capiteeile (cripferirlib.vii.de Hiflur.PJant.cap.il 11.SidiintaxatccerviccJongaconfle- re; capitati ramen genus inveniri,xeodem Theophr hinc,inde colligitur.Nam lib, i.eap. x.ait,radixcnimbulbi&Gethyicau!comniiiocareb!t:&:lib. vir. cap. ix. &alixmukis tunicis confiant.ut bulbi,fcillac vel cujiilvis generis bulbofi: adde cep^ &C Gethyi, & fimi- lium: Sceodem lib.cap.xi.Cribit.ac Enfisappeltaci radix, rotunda bare est, &: finecorcice, capillamenris Gethyi modofibrata: ex cjuibusapparctapudTheopiiraliu Gethyi genus extare capita tum,cui folia m cepasconcavafunr. Idem eniniTbeophr.lib. i.dcHiftPlant. cap.xvi. ait,peculiare inoleribus.ceu cepa & Gethyo,foliorium concavitas-Atliencns vertj Deipnofophfl.lib.ix. clariflimcGethyumdelcnbitcapitatum.ciimait. Quicimcapita- tum id effc volunt quod Gctliyum nominant. hujus meminit Phrynicus in Saturno,cujus fabulsinterpres Didymus^mpeloprafisfiiniliatradicercGethyajuq^&Gethyllidesvo- cant: licetfpenctusapud eundem Athenaeum , porrum capiratum Gerhyllidem vocarit: fortasleob fitailitudinembulbi. Ge thy Hides autem Laonas tacras credidit aniiquitas, quoniam Latonam, ciim Apollincm utcro gercret Gcthyllidem cpxetiviflc, memoriae mandarunc.

Gethyllides. STRVTHIVM legitimumDiofcoridishancherbampuro: fad ejus defcriptionem ntno defcriberefuperHuum mihividetur :cumexcelentifo,p,m.Melchiot Guilandinusrctif- fimeipfamdefcripuepiftolaad Maximilianum ILCxfanno M.D.LXXII .Sed rantiimad- dam quod intot,iGrcciacvocarur^[/wc*niquautunturfiillonesiiitingendoferico liiteoex- cellentiiTimo,cujusquidem^i/^sm?fitmentioapnd AfluariuminterrecentioresGrxcos, librode VrinarumdirFerentijscap. v m. Atveropoftquamaliquani tinturam urinarca- piuntJotig^aciudiratcdircedentes.primumpiccarexiftunt.deinderpiccaTjitautaliaivi- dcanturfimies^t-f/firriqummediocriterfocritinfufahiitnori : ficcnimlegendumcftjion bilii&iratnmanufcriptoantiquocxemplanlegitur. Interprcautem ignoransqujmam

lierbaefletj;ju>>>rcpofuitxoAJi. AddametiampquodPhyteuma f Antirrhinumvidlicec filveilre Dodonri)cujus folia icfliflimccoparantur liuic Strut hio, vulgariter adhuc ufiir- paturaGrxcismulicribusadamatoria,eatn niu!totiesconjnranes,filentelunamanufi- niftracolligentes.demum (urpcndntesfumigan[e'fque,&:alijsraodisutentes:vocaturque Cydoni € r e t a x a c k o u s a .

STRATIOESMillefoliumitalegitirrifleft.&ilcDiofcoridisdelcriptioniquadratjUtipfi aliquidadderejupervacuurnihivium(it:feminaigiurduntaxatmitto:vocatur/wp(o?/Ao.

THYMBRAM Bellonij, Anciquorumlegitimameffecfco.'vetusnomenadhucetincr, vocaturenim \$-vp£pi& &pu£t: liiper hanc frequentius invenitur epithyrium qukmfupcc Thymum.

ATMOANZINAPI, liocest,Cynara(ij^cflrisplantafievu!govocata,exacuietara- rum est genere,cujus echini utCynararprimovere, ante quamaperiantur, ab omnibus & crudi&clixiedumurexfaie,olco,&pipcre,litetfpinofifTimir3nt: fed mira facilitate rufci eos mundant.Stirpem nondefchbo: nam licet vulgariflimaiitiCJusiamcn forraam non rctcmemoratiteneo.

SEMINA autetnLeontopodij.DaiicitertijjRonsmariniTheophrastioTtoT^afavocati, anagVidiSjCytifi.Anthnci, Afcyri, CoriSjfinedefcripcionibiisniitto: eorum cnimanno cUfA hiflorias dedi,

AB III^{mo} PinelloIibrum tuumaccepi,proquogratiasagoimmortaIeSjagamqueduni viv>.,& ipfum intercanora fervabo. ValeeCydoniaCretx,primaOd jobnsM.D.xcnn-

CL^{MO} V. CAR^JOLO CLVSI'O ALIE & ATI
 HONOF AIVS BELLVS S. P. D. |




ROSTOVA aj ventisrelu&antibusnavis ex hac infula folvrc non poruit, hec dei:iceps Tragijqu:e(ica(erhmafeorfim mitto, qua: non minus tibi grata fore judico, quam reliquajtjuiaa nutloforfanalias miffafuerunt, autobfervata,

TR A c i VM porrdfrutexetre&iisafpe&ijpulcher. adtria, nonnunquam &quinc]uecubitaairurgcs, brachialiiiiircrdii[iicraffitudine, petpctuo vircons, folia fcrcns glycyrrlnzj: aut Terebinthi, larto virore prsdita, flores in umbel-
 lis lutos, Hypcrico (imilcs, icd quadruple* majoresj multis ftaminibus luteisjongispicnos: quibus [ucccduntcapitu'laoblonga, rotunda', terebimhino fru&ui arqualia, tenuiflino fc-
 *ninereferta, ^qua; a plants non decidunc, fed ei perpetuo inherent: cortex ligni ad rufum tenditjaeflatcquerefiuain funditjfedpaucam. Secus fontes&rivulosprovent^ec alibi invenitur. Toraplaniaitahircinum virusolet. utlongiuipercipipoflit: vocatur a ruficisce-
 powTi. Sed quoniatii Diofcorides Tragium, frudum, folia, &: virgas leiuifco umifia profcr-
 refenbt^verdm minoraomnia: mendum ineiTcxexPliniolib. Natural. HiItioiz. xifi. cap.
 xxx. conyinci potest, qui Tragiofruticem Terebin'tbo, non Lencifco fimilem tnbuic: Gui-
 dinkJueopinione raproboJegenfis^jtq6Tfp6nq^4p6Tfp«Qihodycradipitua
 bum vulgo appellatum Tragium fie, mini me concedo. Nam Diptamum album lurci do-
 rem non fpirat/ed gravem. nequc intota Cietaid invenitur. Vniverfam p nimirum infulam ipfc
 iufiravi. diJigc nttf Timcqj TragiLiper quifivi. nLillolaboriparcens^cdfultra: niillumcni
 aliud Tragijgenus invciiirepotui^uamiftudmecetiamuIlunicomperi, qui Diptamum
 album in hac infula vidifict. Ditfl'rc hxc arbufcula a Ruta filveltri Dodonari: quoniam hoc
 arboris in morem excrefcic, non antem licrbaeft, nec fatura vindicate mgricac, fed tetc vi-
 rc^nonlanuginem in folijs habet. nonfangm nar mulum fuccum redditi j iuctiucejus femi-
 nare in am olent, fed liircum, quem adtnodum &c folia: unde hanc Tragiam eflc, jurexi-
 tinaari potcit,

Mittotiaaifcmina Galoftivi Jxfic vocat T. obfimi ltu i inem quamcurn Stividahabet,
 ^ultitudinc videlicet fpinarum. Sedejus defcripuoncm in prajfentianouaccipics. quia ad
 m'anumpiantanoae(t: oritur enim in patteauftrali infills, qua: quinquaginEa milliariibus
 <iifit a Cydonia: ncejus forma redd memini. Sed alias diligenti/fi: ne dcfi. nbam j interca.
 femina terra mandarc poccris, & ipfe cam obfervarc. Vale cCydonia Creefe ultima Odo-
 ris. M. s. x c t i n .

POSTREMAM utramque hance piftolam accipiebam Lugduni apud Bacavos^iVi. Mali
 ati Qi in frequenti Sj&xv. Kl. Nove in briseju Ciemannirer poadcbam. T

CL. V. CAROLO CLVSI O
 HONORIVS BELLVS MEDICVS. S. P.D.



RV C N D I S S I M A E mihituat literar fuerunt, quas Leonida frater Colenii
 Agrippina, ubi nnnchabicat, in columes mifit, & j (ialias dabis, ut mihired-
 f dai Hur. diligentiflime curabic. Quod autcm feminatibini ira. obKcgionis
 intempericm non nafcancur, difplctct fané plurimum: namii ftirpes vivas
 I obfervare potuiffes, magnam voluptatem accepiffes, eandem enim ex ficca-
 rum iniuitu percipere nopoces, Nunc autem tibi mitto hiftorias quarundam
 'lirpium peregrinarum. quas in fi&ilibus (ervo^femine ex ^Egypto tinflb natas, carund' in-
 S^ereminacum hsr bisiicci Sj nec non quarundam hienafcentium^uajomniagrati flina
 iore fpero.

Mitto etiam frufum quendam peregrinum nomine *Abavo*, quem amicus Cayro mifit,
 ^Zetlanobili ^Ethiopis emporio extra Erythrum marciro, allatum, Esr autem liic *Eius*
 fruc^us magnitudinema Hc trij medioens, denfoduroque cortice ut Cucurbita veltitus * > *
 lullis ex cutrentibus fulcis, fed tantum extrcmæ jus pattem mucronata. qua arbori adhi^ce
 pediculo craflb &: firmo, fulcorum rudimentum cernitur^ n qui bus lanugo qujedam niefi,
 quemadmodum in Cydonijs malis videre licet, reliquo corpore larvis: altera nou in rou-
 Koncm, fed in obtufim rotund tatem definit, ut primo afpectu Cucurbita ficca appaiè; ;
 cotorc fulco T pulpam continec fiibrubram/riabilem, ut facile in pollinem refolvatur. aci-
 ftam on gratam, adltnct'ionis expertcm ,perquam fparfafunt lemmarenibus animalnim
 fitni Ua, feminum Anagyridis acnmla, dmocjrcice, qui rubetequadammembranate j'itur,
 qua

Guanabano
fructu Scali-
geri.
»ob
»an
Alp.

quādemr/ta femtl/ fufca,ad nigrurft inclinantia, & fpleiidcti^ccrnutitur, inrus medullsm
albam cqjrinenria; .?dulem,Avellanxguftu: vcriim leminac&umbilico fibris non fuffen-
duncur(!tt^tprp;ilpammulta:fibraerefbcexciitta[it) utfer^fyafru&usquem tu Guan-
batioScalig=ri||[^ilcmcx Mozanbiqueallacumfpcflandumproponis Convenire autem
niulcum mihf viderurcumfructu ,quern tu Guanabatiofi mile m,;x The veti Americade-
icnbisfolio ficiifed luc longc minor dt. Affitmatem etiam kabef cum Bahobab ab Alpino
defcripcopanibusinrcnis;fed formadifferentin Bahobab uirinque mucronatuseJLpul-
v. pamejuecontinet (utilleferibit) non acid am rant limut hie, fed adfhingenrem Lcmniae
tcrxmrar.quaenotainhocdefidctatur. Sedquoniam vrcor.neobdifH^ultatemitineris
Hjnu Pincllustibifrustummittcreportlt, ipfumrogavi, uc Patavij dclmcandum curet,
iconemque (alrem Si femina mitrat. ^Eftate practenc^ hujus fruclus femina terra;commi-
(i, quorum nonnulla feliciffime nata j eaqie bina rotunda folia protulerunt cis fimillima,
qua: Staphifagria efcmine prodiens fetreconfpicitur,at majora, in quorum medio caudi-
CLS rudimenium appamic,tjui fenlim incrementum fumens, folia malo citrio fimitia pro-
duxit,fed fine pediculo.-augefcere auem caudice,aucla (Lit &: folia>pediculocjnit coepc-
runt; ac ubi caudex pedalem longitudinem accigicjllico ramos fpargetc ccepit, & folia ip-
iisinhirencialongiorespediculosadtjuifiverutjnequeiingulana tantiim lingulis pedicu-
lisinhxfecunt.fedinitio bmajpollcatc^Tjquatcma&quina, eomododifpofita, quo fna
profruntPencaphyllum,L<pinus, CaKancaequina^rcliquKquarhujutniodifblijsprad-
itar funt,co quod medium locum occupat fem per majorc apparenc, deinde alijsduobus
qusutrinqueipfi proximaj ipO magnitudineccdentibus.poftretno reliquiS(Juobus,utin
ficco folio quod m ittoobfervareporcris.Radicefirmaturrotund(ijtuberosa,ovi ma^nit-
udine.appendicibus paucis &c tenuibus uErinqueexeuniibuSjCortice tenui vcfita, quern ter-
miffimapellicula fuliginei coloristcgitjfacilt'quedigiciatritudctergitur, utcuncradix
albaappareatjcar nolajubllatia raphano iimili,icd cencrior,in qua per tranfverfum iLfla,a
centroad circumferentiam multiciticjeducularconfpiciunturjucinrapjiaii radice. Pia>
manfa,tota fere in aqueum vccritur.iubduicem jtcnei odoris^uique in ore adflri-
»Snonem quandam relinq»it,non fine exigno calo^is fenU) falivamque fatiscopiose elicit.
Hocinunicatancum radice adhucobfecvavi ,mirumque milii vifum ttt, ai boresirperiii
calt .:adicc prarditas.Martioarbufculas in vindarium trafeTamj& an omnes hujaimodi rj-
dicLbtispradicxmit.diligentiffime. anitnadvertam.- nam,utdixi,infic^U)Ubasad(ervojatn
ad lefcurpcdalcmlcitudinemelatafpollicaricraftjtudine^orcicealbo^cabrcquc,medul-
la magna abundantes. Ligni materies fans infirma eTe videturjquapropterinter easarbo-
res hanc recenLndam judiccqua: brevi incfementum fumunt,&fortaire brevi (enefcun-
turn intereasqua;perpctua frondenatalifolo virent -.NamhieCydoni-EpertetumDe-
cembrem folianonami(it,Iludaddam,planras licetfemineexuno eode^mque fruclux-
emptf?^ terra: commiilo natas,diverfa tarn en folia protuliffe; alia enim malo citrio fimi-
Itma fueruht,minimeferrat3)alialongiora& ferrata,plurimum ad Caftancae folium acce-
dentia, fed inodoraomnia: untie iifpicari licethunc frudtum diverfi generis aibores
generarc.

Olar.

O S S A R frutxcftfolones mulros a radice profrens redos^otundosjevcs^enicula-
tos,quibus circa ge'niculainfiint folia longa.rotunda.crafla, per quorum medium nervus
excurric albus,cquo utrinque vena:exeunt averfa foliorum pane iatis confpicua'.fohaa-
tern ex intervalhs binaitemper inter fc oppoGta(inepediculis Irolonesundiquambiunt,
ex quorum alis mulci rami nunc erumpere incipiunt, non quidem ex omnibus, led alter-
natim.itautli^aprimoinitium fumens, lineamab uno ad almmducas tifqucad ultimum,
perfedifllmclmeahelicendefcnbes. Radice firmaturvalida in mulrasfibrasdiuifa,lu[
FOS
floreprofert.frucliifque mali magnitudine, cordis figura, colore virides, binosaut tern^s
ex uno pedicuto pendentes,in quibus femina lata.lanuginequadam mollifllmocandidjffi-
nioque (encofimillimainvolvura: Caules&foiiaincanafiincantl ne ud anfige da^t
crafliorequapiamfanharocaplantaconfpcttvidcacurjquasimbribusclmrur.eckiut tcm-
porefortia&cauliscoloremexviridiadaibumrcndentcecontrahunEiparscaulisradicipro-
ximaalvocorticercdaeftjfungofo, rimisdiircflojUrSanibucicaulisvideripoiritj&illaii
infarmulca medulla alba refertus eft. Stolonum cortex Si foliorum nervus copiotioiafte
amaro&acriabundantibrevitercotaplantaafpcclupulcractj&quasinficlibuslervofc-
inincx^gyptoaccppronat^is^dtiunicubitorum akirudincm jamexcrevnmf.foliaci
hicmerctinent:nondum autem vel flores vel fnidum tulcrunc.Planta hare in^gypto vul-
garaerO^rappellarurjfruiSus vtiobddchjfir, hoc eft, ovum ex oflar, aut Icalce oi^edd
(^r,Jn^fenitDAiabicdoTOMfigaificat,&</eftarcicolas,qDi halitediaturpe/Hujusfr<-
/^.us lanuginepulvinariaimplentJacleautemcoriadeplant.Sincedu bio, harcpianta ilia eft
(i;pcrquam Avicenna&alij ArabesSaccharum Alhu(ar(mannifpeciem) inveniri (cri-
bunt: Siquam Serapio ex AbnantfcfeiiteuEia,Mutoiio interprerc defcripfc his veibis-

Scid clofar
Vfu.
Serapio
Huc est
Alhu
Serapio

HAOSER.fcu Alaftr.feu Al li u far, plan ta eft que Jatahabetfo'ia,fingulis an n is fti cere fees
facc haru ck ramis exte ans, f a) lorum cavis quo icop o l inie celtur,non du vi em
amareicns;

atnarcfcens-poniaprofrcamelorunitcftibiisnondiflirriiajaquibusresqiatdamcaufti.
caadurearveemanarcautorijsnaximcaccomCKiaexquaet3&:cli^&Ivina-
nafulciuntur .plantacujus Ciprca nuncupatur: folia auiem Haofer incif^iumorem de-
filUnt in Maio eolligi folitumVm quocoria depilantur, adcojqcxludat, uty&quar:* capa-
ciffinumexunavelalcerae^prcffioneadiiiiipleartinligiiumveroHaoler.levetrccraflijm,
Mefturn^pulcherrimu^cnoUinj^riafuiscarminibusumbrachia.tutncruraformoiarum
lanè iTuilerum,lignoHaoferPoi^ca: bellecommparcent. Eft&caliaplantaHaoferinoinaca
exTiihynaliuorinquitdemgcncrc. HarcSerapio. Sedanimadverte dumeftjVeteremSc-
rapionisinterprecacionemrectiushuicplanrajquadrarejmiam Minoni,utur.ramquecum
noftraconferenti facile patere poterit. Defcribitur etiam hie frucexab Abembitar Medico
ArabcHifpano,in (ua Simplicium Hiftoria,&:a Malahyfah Medico Perfa, qui Abembitaris
Hiftoriam in Epiromen contraxit:qioru libros manufcriprosapud Haym Abenxux-
ietimedicumHebra:umHtrpanicoferraonevidi, qtiimihiOflaris hiftoriam cxcoium
feriptisadvecbum hoc modohumaniffimeinterperatufcft.

Chera.

Haofer a-
i nld £4 > m

Abembitar
Medicus.
Malayab
Medicus.

OssARfrurexeffTithymalaceus.longus&partciuperioretenuis,foliahabcnslata,fu-
iperqu^decidit manna qua: ^>f«rf/o/?Srvocarur{fioremfertOIeandrofimiIem)hocad-
dit Malayfah: Abembitar en i in nuliampflons tentionem facit,fed frucluduntaxat: folia
ipfiusplana&icviafuntjCaulemhabetviridcmjConcavumifertfrutumquedamiiinifcm
faculo pendenti, qu i iuuu continet parriculas albas unas fuper alias, quibus utuntit Ara-
besadaccendendumignem,nthilqi { dicuntip {i}adhocmunusperagcdumpraTftantiusin'
Veniri po(Te:pulvinaria etiam hac mareriaimplent.Oritur in monrium cavitactbus,fcilicet
ubi monsjungitur monti,quanJoqueeriam in arenis nafci confpicitur. Sicaulem aut fo-
lium intidas, Ucmagnacopiaemanat, itautquatuor& am plius libra: ex unaplatacxeant,
quod quidem eft acre, catiaum&ficcuro,corrodit &incidir,uc fit in principio quartigra-
«us calidi tatis, planta ver6 ipfa calida eft in fine fecundi aut principio tercij. Habitatores

Aha off*
W < *

8*Mfa.

-\$*'''>&*

'''*'''''''''''

Mcchfpiloscxrrahuntacorijs.depilant videlicet coria cum hoc hae,ea in ipfointunden-
tes: quod quidem eft vehementius lafteomnium tichymailorum: drachma enim una&
ftrnisperofafl^mptainterficiteuacuando&excoriando: foliaveroinpulveremredafla,
&infprfafuperulcera maligtiaatquocorrodentia^tnpliusprogfedinonfinunticxficcat
ulcra forrida, hutniditaieni excrementitiam, came'mque fuperBuam coifumit, laccon^
fertmacutiscuteminficentibus, HujufmodiftirpesnonnutlaTripolirepcriumur,non-
hulla:etiam Cayri.Sedcavenduinnepropinquiusaccedasipfij, aut fob umbradormias.

BeHoniuslib-u. Obfervarionum cap. LX. hanc ftirpem forte intellexit fub arboris lanigeranomioc,nonca,neridefcipfit.Si veto hanc lanigeramefleTieeof)hrafti, '*utPlini)pu-
tativitvalde hallucinatuseft • nam lan-igera:Thcophrafti nihil aliud funtquam Goffipium,
Suod in Arabia &>Egypto arborefcic, &mulros annosdurat: fed inCretahicmperit.
Atpinusquoque huficruticem tfecribere videtur libroquem deplantis^Egyptijs <didit
fub nomine Beidcljkr: fed utingenuefarear,ipiusdefcripnonemnonfacisaflequ£-f. Nc-
fcio enim quid commune habeanthujus planta: folia cum Aloes folijs, quibus ipfa com-
P^{at}at, neque in quibusfeminahusconvenianc cumlaftuca:fcminibus: &:iconquam
P«CiandamproponicdiligentiorempicT:oremiequirebat:remmaver6&:fruaufacisrecl-
C³pre(Ti: at majorcs iunt his quos ex &%fpTM accepi, ut ex ficcis folijs Si fru&u quem cum
f ualanagine&:(cminibiismitto,ob{ervatepeccris. De faccharoautem quodfuperhanc
ftirpem inveniri fcibunt,aut ab ipsa manare, nihil adhuccompertum habeo: nam in no-
v^uHis plantisillud obferbare non potui. Illud tantum animadvem, quod lac detra&o folio
e.fnanans, fucccfTu tempons circa vulnusconcrofciiinfargumroicujufdamalbi,Traga-
canthae valde fimili,dulcedinis tamen experte.

Arbor lani-
vTM > lva-
hr * ^ /

At Mi-

SOFERA fufTrutexeft,-adduorumtriumvecubitorurnaItitudincaflurgens,caulefir-
'Qo.recto, fibrofo, multosramos firmosefoliotum alis undiqc fpargentc, in quibus folia
^lyrti folijs fimiliaquidctnjveriin anguftiora^lata.hoc eft, in longo pediculoutrinque fi-
ta^contranjsfemper inter fepctiolis,numer6qucparia,ut in Lentilci folio confpicere licet,
fu^perne lartcvirentia.inferneveroratura vindicate pra:dita ,gravitr olentia.vcfperi, fuper-
^folijparte qua petioloinharrctnjCoeancia^nferna pane terramfpcct:ante,icqueclaufa,
ro^ca noftt permanent, manè vetò circa Solis oitum denuò expanduntur: croceos fert flo-
re^i> inodoros, plurcsin uno ramulo pendences, mulraque intus ftaminacum filiqua; rudi-
^lento coritinentcs, in caulis& ramorum fitmmitatibus nafcences: quibus fucceduntfili-
^"xrotunds, digitumlongaj&cxlum fpe&antes, plurimafemina continences rotunda
Sl'quantulum comprcfTainonomnes tamen filiquasad perfeccionem veninnr, fed pluri^
atitedecidunt, Elcgans planta eft, diutiffime'quc floret ,_fubindenovos_&rccmcsnou»
Pofercus,fempcrquc virens: radicem habet multifidam.li^nofam. Scmine primiim nata,
Quo.utoblervavi.duntaxatprofrcfolia.deindequaiuorjongopediculoinhscrchia.utrii!-
S«c bina.poftea fex.utrinque terna, atque itadeincepsquemadmodum caulis augetur.fo-
liorumnumerusrcfcitj caquemajoraapparentiduodecinjum tamennumeruni nonex-
ccduut

Sofira.

ceduntca qua; c3ulemambiunt,Kocest,utrinquefena:naiiramotum folia ta:metf eedem modo numeroc*refcani,decimum tamen non iuperant, qu^a videlicet utrinque. Hicinc (quamfaciscor^riodferre poflevidetur, litiiligens aliqnsj^ curaadhibcatur &locoquodam caMiore SI a ventis Itbero.idfervetur) facile a ventis pialcrtim fepcentrionahbusla; ditor, quiuA'a&: Bores exficcant,ea tamen, licet iicci(Tima,a ffmis non defluunt,ut in mihinaciiplancisoblervo.imo fere ftatim nova folia SiramosprfVerreczpcrunt. Hoc eodem nomine Alpinus plancamdeknbit, qua:tamen pluTimum ab hacdittetrevideciur,ueX ipilusdefcrtptione &: icone colligete licet.

S'iera Al-
pini.

Ntrdat N A RD vs Cretica herba est Valerians fimillima, odore, caule, flore&forlltanciam CruitM. fe mine, quod l on giufculum &deprelTum est, figuraadLini temenaccedens&inpappurfl deincns.-foliaprime herbacei mnt coloris, rotunda, ut A fart esse videanrur,interdm mi- jora, craffa, fucoplena, qua:deinde fubfequuntur paulo longiora funt & nonnihil incifit* quibus alia magisfe#afucedunt ,&fimiiter alia, ut tandem ukima, ante quamcaulisq' mergat,Valenanx mnjotis foia rectiiTimexmulentur. Caulcm Valenana; perfimilem hi' betj concavum , ad felquicubitalem altitudinem aflurgentem, qucm bina folia Valerian^ divifurautrinque per intervalla ambiunt; Mores albos in umbellis Valeriana; fitnilcs, majtiresaliquantuii)m,odoratos: radicemtuberosam , exprimariaenim , cuicaulisnititur, minimiq'ue digitieft craflitudine Si longitudine, tenues qu^dam radices per terrain fparguntur, quibus alix tuberosx adnexx, ut in Filipendulx radicibus, nardi odorem refe- rentes: totahiemeviret, & novo Verecaulem mittit, qui AprihauMaiomarccfcit,^ exficcatuntOEa aoccm xffate radices fub terra latent, & Autumno pnmis imbris gcim'; nareicipiunt.Oriturhumentibuscolliumlocisjitivcniturqueeciam inter faxa. Ad Nar^ genusaccedrevideturAntiquisforteignotum.NamlcetGalenus Lib. ix.decomp.m^ die. fee. locos cap. n u. dum PhilonisTarfenfismedicamentumcxponit, NardiCretic* raemerit,tamen prarternudum nomen, nihil aliudde Nardo Creiicaapud ipfum lege* remetnini. PliniusvcrfoLib.xn.cap. xn. Nardigenraenumcrans,Creticumrcenlet> quod a nonnullis agrium, ab alijs Phu appellari fenbit,folio Olusatri, caulecubi[ali,ge^* culato,inpurTJ[aa!bicantc,r3diccot]Jiq'tja, villosa, imitanteavium pcdcs-quarquidcmde fcriptio, non huic nofra: Nardo, fed Valerians, five Phu a Diofcoride defcripto quadrat, licetnulfann floris Narciflb fimilis menroiie m fiiciat , ut Diofcorides. Daleciampiusa^* rem Annotationibus in Plinium ad calcem cap.xn.legentium ctnfet in garco Diolcon^1* textUav-S-wa^o^T^To^x/aroT, quodoptimconvenire aitcolori& figurx, Nonmclat^ nonnullos legiffe a^i^n apoc^ta^s^apoc^s, aliquos etiam apoc^ta^s^i^ap^s^nos, fed ultimx le- flioncsminimeplacent. Qjiocunq'ue tamen modo legaiurdefciptio,no(trar huc plant* convenire non viderunnam radices repugnant. Hoctaniumaddam , inhacInfulaNaf- dum/rcquenterinveniri. Valerianam autein minimam frequentius, ubiqucenim oritup alia: vet^ fpecies admodum rara: funt.

Nardus.

Phu.

Cichorium
pinusum.

CICHORIVM rpinorumfrutexeftinmaririmisproveniensi,iccirquecollibiis,82arenO- fisleicis: folia fereifcichoracea,profundedivifa,cra(Tioraramen&minora, magifq; aipa- ra.quam cichorij vulg<iris;caulesdociranrales, albos, in orbem diffufos, crebrisalbis (p^t)^s icatente^erinaccum qucmadmodum Echinopoda to[S facie reprefentans: flores inter(pi- rms fi^ura Ciciiorio fimiles proferre colore cyaneos: quibus (ucccdunt feinina Cichorij^1^ dice iumatur fin^ulari, magna ut Cichorium. Rccens femine nara, antequam in caulem abeat.in acetarijs manditurjed durior& amariorell Cichorio. Vocatur vulgo ?a.ffi-tLj<^1^1^ hoc eft, Hydria? fpina, quia vulerit in tota Creta fietilibus hydrijs utuntur ad haurien- dam aquamfontibus,quashaenerbaobturant, ne muresalii'tavcanimal intuspentrarc poiTit.vidcturenimadhocmunusiftaplantaanaturaformata.nam femper rotunda figure cernitur.Hydna vulgo d.iciEur?^)* teayxn fpinam iigmficat, nomine ab . *xat^n^cumm ptoiquibufdam Infulalocisdiciturcttam paxix > z-t&ia, hocft,radice ftivida, ob fi- militudinemquamcumcichoriohabet, quodin Gracciavulcariter vocatur, & Stoebe qux dicitur s^i^is a. r^i^us uis in defectu cichorij.

Hydria?
spina

Stoebe

GALASTIV-
IDA

GA.LASTIVJDA, cujusfemina aliasmifjradicemliabetmultirfdam ,lignofam,rirmarr't lpngam,mukoscaulescoD)undim proferens,inorbemdirTundi[ur&: latefrucit^cde^1^?1 alticudinonen excedens,cau!esalbi funt,crebrisfirrnifquefpinisprafdi: inter quos folia leicoij albi foijs iimilijacet minora,& quadam lanugine obfira:flores verbafoau t Blat- uriz fimiles.albi.pauluJuin ad flavum tendentes>in quotum medio fiaminaquedam pur- pura. flonbus fucccduntcxilesliliqux,rotundx,tenuin^jmm femen continences. Ruffici ^.(tmendumignem calefaciendiqucfornaces cautuntur jobfionilitudinem verofp IDA^ , TUUII, quam cum Stoebe habet, &c album colorem, galam ftivj'dam nuncupant, non qw> I^,fcmittat. Sed& alia eft planta ex Tuhymali genere, lioc nomine donata, qua: fpina* ut harcprofectjutcoj flores/oliaparvarotmida^accopiofuiHeiFuodenSjradicc (Grfle me- mini)carnosa,cujus hiftoriam alias dabo.

vj^t.

Galastiv-
ida

M i TT q etiam fcaitu Molochis.Cypri Plimj/ivc Alcanna:, Bun^e* qua in^Egypto M,i, <hh. P^>tLonisilt>dgenusconf:citsf Cavcvocaturi)prarcercaScysbanfrutic)S^!chcrnmi,jam Qyfwfii modd cum epiitolam lc.nbebam ex jEgypto accepta.

M i TT o fimi jite rranp3mfloribus&folijsqnuftaro,fitiulciini fructulignTtlius Rho- Li gnu Rha. dijquodclarfs. Matchiof.^O^ivafrum, nonnulli AgaUochum vocalic, aquamplurimis 'w/'n etiani pro legit!mo AfpalathomTheriacisufiirpatum: cxctT)usmtuitu facili me cognosces <^>*/<^> •I quantis tenebrisoinesadBuc vcrfcntur. Nam lignum illitd neque fpino/um e(t, ncquc *-^ °Icar, &mukominus Afpalatii:fed veriScIcgitinn Cytifi, perquam nmituCyitifo Ma- r ancha defcripto, fie uc cundem cflicredain . Oritarhic rrurex in Infillis RUodo propin- sstlltt. S^ul's,&R[iodoipsa,underan3OS&truncosaccpi:freqiienriustamcninparvaqua(JanJin- »ula propc Rhodom Ofa, cui nomen Aftathid, ubi fingulisannis quampJurimi carduntur fri nncif m e r c i m o n i m u m e n i J j U j R l u d e & P c h & G o r i f p a i u i n o o l i m q; loca afpurtantur: nam Turcas vutgo pro manubnsenfium conficiendis ufurpant, & Caloien Pachmi in ipherularum precanarum uluin convertunc: florescroceosfect in ex- tremis ramulis,ciuibus fuccediit falcat^ filiquar ut Maranth^ Cyu(i>,(cd aliquahtulu mino- ^ s q u a t i q u u s d e r x a r e p t b : b n e n i f q u o d M a r t e f t i o , & n i l i a m u l c o n j u n c t e n i h] l d e i o g r a p h i c i t i a u t u a c a l f e h o u d i n e n i u p c r a t , b r a c h i a ! i q j a n t m a j o r e e f l c r a f f i c u d i n e : c i i m f l a r e : a l i q u a t u l n m a c r i s e f t . q u e a d m o d u t n A n l i o t e l e s h b . i i i . d c H i f t a n i m . c a p . x x i . i c r i p c u m r e l i q u e . T h e s p h . v e r d i i b . v . c a p . u i i . t r i b u i t C y t i f b m e d u l l a m f p i T a m 6 c D i g r a m , u t E b e n i p r o x i m a v i d e a c u r , q u o d i n h o c l i g n o o b f e r v a r e l i c c . i d e m e t i a m a f f i r m a v i t P l i n i u s l i b . x v i . c a p . X L . ! i c c t e x H y g i n o l t b . x i i i . c a p . ^ x i i n . J i g i i o n u l l a m g r a t i a m t n b u e r i c . E x q u i b u s c o l ! i g i p o r e f t e r r a (T e M a r t h i o l u m c r c o e n t e m & l i g n u m f p i n o f u m e f T c , & o l e x f p e c i e m : n o n c u c a u t e m A f p a l a t h u m r e f t e j u d i . ^ a t , E r r a v i t & A n g u i l l a r i u s c u m r u o R ! o i u i e n f i p a t m a c o p * o , q u i i l l u d f u (F u m i g . (g e n u s ^ o t n n i a v i t , l i o c e n i m (c i r e d i i i g c ! i t i f f i n i c c u p i e n s , m e n d a c u i m e f l e d e p r e h e n d i . S e d o m n i m m m a x i m e i n e r r o r e v e r f a n t u r , q u i h o c l i g n o i n T h e r i a c i s p r o A f p a l a t h o r e i i c u t i j u d t C a n t j t j u e m a d m o c i u m c c l e b e r r i m u m P a t a v i n o r u m c o l l e g i u n i i & m e q i o q i t c r r a l l f c o i i n c d e p r e n c n d o , q u a n d o C y r i f u m e r e t i c u m d ; p ^ ; O T T o 5 ^ A o i v o c a t u m , c u j u f c n s i n a t i b t m i f i , & ^ u r n c u m r a m o f u i s f l o r i b u ' o i i u r t o m i t c o . l e g i n n m m f u i r t e p i i t a v i . N a c i d i f l i a a b h ^ * o i i j s q u x l o n g i o r a & a n g o f t i o r a (i i n t , n e q u e f e m p e r u n o p e d i c u l o t e r n a f i m u l p r o f e r t , f e d l ^ a t e r n a & : q u i n a , u t n u p c r o b f e r v a v i . f c n i e n q u e n o n i n u l q u i s . t e d t r i f o l i j m o d o ^ q u o d 0 - E i n ^ * < c n - S l i f i c a r e n e g l e x e r a r a ^ p r o f e r t : l j a n c o b c a u (j m , n o n a m p l i u s C y [i J u m , (e d E b e n u m C r c t i - ^ * * ^ a t n v o e a n d a m h a n c f t i r p e m c e n f i o . M a c e r i e s e m m h g n i p l u n m u i t t ' b d E b m u m a c c e d i t ^ o ^ o r e n i g r o , f p l e n d o r e , & : d u n t i c , u t e x f t a g m e n t o a d j e t i o j u d i c a r e p o t e r i s .

^ * c t i b i n u n c m i t t e n d a h a b u i . q u a e n o n m i n o r e m v o l u p r a t e m a l l a t u r a f p e r o . i f l t a m j j i m a . Q u o d a u t e m r o g a s , u t t i b i p e r m i c t a m m e a s c p i l l o J S p u b l i c i j u r i s f j e e r c , t j b e q u i - ^ C l n g r a t i T i m u m t n i l i i c f T e r , m a x i m a f q u e t i b i g r a t i a s a g e r n n , q u o d e a s t a n t i s f t i m e s . u t (u t s d o a i f l i m i s c l e g a n t i f T m i f q u e (s r i p r i s a d i j e i e n d a s j u d [c e s . S t d q u i a o p n m L ^ n o v i . q u a m P a r i a i f a c i t n d i a v a l c a m , & q u a m c o n f u f o o r d i n e (i n t (c r i p t a : v e r c o r n e t u z H i f l o r i a t , q u a : ^ g - > n t i (T i m o f i l o c o n f c r i p t a c f t . p l u s d e d c c o r i s a i f c r a r u , q u i m d e c o r i s : a t r a m e n c u m t u a : ^ i q s u t i g r a c i a m e a s c a n d i d i f T i m o a m m o f c r i p l e r i m , i s v d u t i i u i \ u i a r i s l i c e t : i n t e r c a ^ c f e l i x , l a c q u e c u i a m a m i f f i m u t n a t n a r e p e r g e . C y J o n i x C r c t x o t v . F e b r u a r y M . D . x c v i .

H A N ^ - t f t f i e t d m L u g d u n i S d U v e r u m a a i f i e k i m i x . M a t j e j u / a ^ e m M M , & p t i i t C a L l u n i j r e f p o n d e b a m .

CLAR!SSIMO CAROLO CLVSIO ATREBATI HONORIVS BELLVS P. S. D.



X tuis licteris pcnultima Maij nuperprarteriti fcriptis vidi, meas xv.Febraua* nj ceaccepiflc cum aliquibus icombus, & (emtnum , qux tibi mifeiam, par* tc,quid miht maximam lartitiamattulit: licet eas fciioaccepeiis.mirumini- hi viliim non etl, locorum enim diftantia, &£. icinens incommoda haccffi- ciunt.fatifeftteminanonpenjflc: nuncautcmpaucatibimittOjimphcituV j. * cnim rebus fainiliaribus,&:u^ori^sinfim^nutatc,quadtuturna.fcminibuscol- S^cndis vacare non potui: addj etiam quod hoc anno in hoc climate, ex nimio diuturnU g^Ucatftuprartercon(uetudinem,iiccia[ccqumaxima,&imbriumini)pia, omnia fere her- arutnfvugumquegenerapenerunc, ica utnuncca rcrumomnium lit difficultas, utin- com^n^odismultisxian^escogantur: imdiEgcimarisinfuIxabiipiisiQcoisdcieix relinquantur, qm hue Si illuc^nc fame pereant,confugiunt.

0/24

Nunc iconem **Ossaris** rami florentis suis coloribus pictam accipies, ex qua facile unuf-
 quisque percipere poterit Malaisah, Alpinumque non recte hunc jus stirpis florem descripsisse:
 te: nam neque **Oscandro**, neque **Ranunculo** similis est, nec minus coloris lutei, ut alias mihi
 relatum est. y ^ d **Wocxi** jramoopttmcd{cribitur: con[tatent] unco folio quin-
 que profundis iaci(uris) diviso, colons foris quidem pallefcntis. ij'rus autem circa culpide Sj
 incifuratur purpurascens, incujus medio quinque vclur tai Si-na firmamaximo artifi-
 cio *confetti* cemuntur, colorc obloctc purpurascnte, quibns succedunt fructus. Hujus
 fruticis stirpes ofto in fidilibus maximis alo, qua: jam ad quinque cubitorum altitudinem
 fublax, Innumeros flores protulerunt, fcd omnes inanes deciderunt, ita ut in hac infu U.
 frudhirnferrenon poflec Fedam; mine tamen tres fru&us unopediculo inhxrentes feire
 incipit, ex quibus femina maturum colligere pofTe spero. Quod autem fenbis a Nve jio te
 inrelaxifTe hanc stirpem mulco fucco, coque pallefcnte abundare^ hoc plane falsum est,
 nificirca Jordancm aliterius fit naturx; nam in^Egypio, & hie Cydonia, lacccandidifl) mio
 abu«dat, non pallido; nec minus plantagris est odoris, imo profus odor tota carcer. Cif
 ca finem lulij a nicdio cauleradicem verlus, folia dccidunt, ita ut crunci omnino folijs nu-
 diconfpicia otunradice finnaturalbainultos ramos diuifajera flucortice vcllita, laflcq)
 albo. plena exquanovi (lones continuof creerumpunt.

ABAVI

ABAVI plantarum quatuor^ dhuc mihi superfunc, quas in fidilibus magnis fenfo: alias Mw;
 tio in vindarijstranfluli edaquarum defecclu (nam ex anni mempcie icci JT iurap Iij rami
 fones, quibus irrigari {olebar} cviridaria, arucrun) cultoidum qm iicnc gligcriu apcriuui: h<
 orans radice coni Ubatittubcro/a, unaeadm quc figuradaborata, quod maximum mihi
 mturx miraculum visum est. Sed ilia; quads domi (ervocirca Solititum tantum folia emi'
 ftrnchoceflj Circapincipium nicnfis lulij . fed ita diverta^ rncmo j qui planias anno prx*
 lento videri, ignarusque fuerit ex unico ftuclu fatas fuisse^ nunquam congenere scarbo-
 rese fTe judicabit. Nam una folia aliquantulum fertata, ad Caftanca: folia acctdentia, Cr*
 gulana, auu bina, vel terna ahquando unico petiolo inharremia profert: altera folia imi*
 me ferrataeque bina aut terna unico petiolo con Qantia habet s tertia familis cil huic. (6*
 folia aliqua quinque alijs fohjsex unico petioio pendentibus pr^ dita fert: quartafingwl³
 tia tantum folia brevii Timis petiolis hxrentia profert, caque minime ferrata, illius generis
 niah citrij folijs familia. quod Limones appellant. ita ut merito affirmare possumus Abavi
 arboresdiverforum genitum inveniri. folia vero qua? nunc proferunt, minor flntijs, qo?
 primo anno protulerunt: hujusetiam Abav tres plants luliomen fcmihinata: funt/etnie-
 neanno clapforrrs commiflb, & : fortai Tcalta: nafcentur.

NUNC aliquot plantarum hie nafcentium (emmatibi mitto, qua: in hactemporis) gu*
 ftiacolligere potui: funt autem Agavani Calochierni^ aidarothimi, Pliafeoli novum gc-
 nu Sjscordotis, Agriopafinaca, & Agnoftari, qux omnia fortas flctibinovaeiuntj Siidee
 valde Brara.

AGAVIANVS

AGAVIANVS plantae ft pino fa, folia habens aliquantulum nlata & : fpino fa, ciules bj cubi-
 tales aut tricubiales, in quibus capitula Echini xmula, efoliorum quarcaulcm anibu^{re}
 cavis^ cex extremocaulcxeuntjn quibus Jores ob flctaj purpur^ e inde ft mfnrotun-
 dum, alj quantulum coinpreffum, c2nnabis fcmncolorea^ mulans: vulgaris ednotis f^l
 hactn(L)la, & : antequ^ m in caulcm abcat, comeditur. Hanc flirpc m Acanon Vctenbus di-
 ftam fuisse judico, aquareliqua fpinarum genera Acanacca nuncupata: cujus quide^*
 Acani licet pauca ab Antiquis prodita sine (fotta flc qoiavulgatiffima: plantac omnibu^⁶
 cognirarnotas de icriberc fuperrlium visum fuit) tamcn ipfam legitimrm Acanon eflc^m
 firmare audeo, conjeduris non de spiciendis fretus: nam acanus inter \$VXXCIY. MIS \$8. rccen-
 (etur a Theophrasto lib. i. Hiftor. cap. xvi axofia, «{ti/ar} g'oi?); avoc. & vi. Hidor. Pla Daf-
 cap. i. Alia constant folijs aculeatis, ut axaci; ?), ifl^ ycp, xi K) loc. Acanusenam apude undt¹¹
 Theophrastutndicitunllud quod vclutimalum extubcrat in fpinarum genere, a Dioic^o-
 i. j. e. i' o, nuncupatum, vcl axai' 5' «' ir» w \$ «' «' : ut patet apud Theophrastum in defcript¹⁰
 ne Chamxleontis, quem Gaza vermlaginem interpretatus est: dicitem Theophrast¹¹⁵
 lib. IX. cap. XU. i. de Hstfor. Plantar. th \$ * xt Qa Miti \y \i op. Ma* a WW p t j a t o v & \$ * i a t a W * *'

Att + \n *

Att + \n *
mro
mollitiam

lib. vi cap. ini. c. jufdem Hiltor. de Ixine vrbafaciens, dixit, a' «ro d' e t p e r i z e s m i o t e s
 o p e r i a t i k e s a k a r o s i p e r i z u k e n, u p e r m i l o n : hinc a>>^ i / p v o c a n t h u r m o d i a c 3 n o n f e r-
 re, ut apud i p u m e o d e m l o c o a d a i l i e t h a k a. Ex quibus Theophrastilocis clarifli Jf.
 colligitur Acani nomine apud antiquos Grxcos duo significari; uno herbam vulgat^u/
 mam aculeatam echinos profrentem j fui generis plantam : altero ftudum quatunda^u
 slmrum fpinarum, qua: omnia huic Agavano conveniunt re & i Timé. Nam het bacfi^{a c}
 Tleata vulgans notitia, echinos fcrens, & cft ful generis planra: & agavani appellation-^{v i i}
 ganter omnium atiarum fpinarum echinos vocant, un6cuc & codcri niodoa Cretenli¹
 nunc Agavam nomen v furpanir. cjuo veteres acanooiifucrc; unde Agavanum^{a ^ ^ c ?}
 corruptum fuisse credo, ftirpc m que hanc leginmum eflc Acanum. Quod autem Be¹
 nms Obferva Eionum lib. i. cap. xviii. 3 f Tcritacanone in Creta acanachiavocari, ipfi^{i n : 1}
 fitum fuisse clulpicor: nam hoc nonien omnibus cumnobilibus cum rusticis signoruff).
 licet enim innumcroi interrogavrim, omnes tamen hoc pomennunquam aliis^{3 U d i y n}
 conie^o

confessi font Hoctamenprajtercutdum mihi non videtur, Guilandinurft virumdofliffi-
mum, pra. - eforcciiiq! e(eaiprcolendum, commient: acLodcPapyropag^fi'8. aflircreixi-
nemaThcophraftoalio nomine acnon vocan, unde (ecundum iplutffixine & acanus
Ununi & idem cfler, quod mihi iullo niodo convcuirc pofTe videcur.' HoVe&iam addam
mswo vulg. uitra Ctecer\$bus vorari ariftecufpidcm alpram.

Huius femine ab Hanoio accep'o natae sunt mihi anno M. D. XCVII. aliquot planta, quae ad se f
quicubitalcm altitudinem excreverunt, & florem purpureum in echinata ca. uibus tulerunt; (eg
nate: hmfe? rAnf> crficrent, TiMtire(tfpcrviewensLelHabfiulit. Con-vmiebantMtcmpUnUm
ftm ea, qmm ilegatiftmc Ueaonus hac tffif' eU dejmbit.

CALOCHIERNI, fpinaeft Atraclylidi & Cnicofilvclfrifimilis, majorramen, echinos &
ip(aprnfarcis, rtorc. snoav! di: iijmtota]ccaerjt, fcmendmuaxatc(jlic'gt. Hxcctiamari-
fticis antc qna. il caulcs exeant. cotneditur, & nil] acarna five acorns ficThcophrafti, inge-
IHC me earn rgnor. irc fateor: interca (cinina terra; committc repoccris, & earn oblcrvarc,
vocatuxaAoWJfi'Mija^hoccitaciiivafpiLia

Calochierni.

Et haec femine nat, <pt* ante quimflarempoftrret ,ge[it corrupts, wide autcmjimills k^iint-'
ffjliih.

G*»»» AROTHRMO, plaau Icganriflinaaefit, & priasnova, pedalis, in orbempertcr-
ramdi { tufa, mulcisliiisiive. iculeishorrida, tbia longa. digiralimagnitudincaliquaiWB. 0*'^*'''
'umangiilhabfquepetiolis profcn - ns. quKcaulcs undiq, (cdinordmaraambiunr, cau-
'csquadranguJifunt, incaniquCraadroadomfoHa, itauttotacolorccincrisapparcar ra-
moilLtrrimqueprofercnsfiguraquaacRicis. quunfpinasddlnunt. & in aliosramulosom-
ne; dividLiiturJpina. qu? medium locum obnnet. majore alijs femperxiitcutc: flores lal
Vix color^magiiicudinc & figuratimites profertinhKpidistjtiibuiaamcaliculistcTnosau
y^cfnosrimiiijun£tos, quLbusfticccdiit(cminaina: qua! iaco]orenigra: perpcr[ioviret5(:
U'tofloret, totaquodorecarce: radicc mLiabctmagnam proportioncpliii]t9 & lignofam'.
ninopoda miru in modum .enmlacur multitudine fpinaru, fed colore tota alba appafcr.*
pafcituroccidentali parte itifuls circa pigum Lori* vocnruu , qui trigmta (ex milia \>zk
uiuni diftataCydonia, locis ficciffimis ir[er thy mum & thymbram, neque alibi vidiffe
ni cmini. Ignotam profufuifle antiqiiis credo: vocatur arufiicisj, <j<r< s5-^, quodafini-
"umthymLImibnatJicctOiliiltumthymocommune liabcat, niifolum in quo oritur.

HscfUnts. anno M. D. .x. Vfi'X. fatiifrcquens uhi femine nmtt eU, /jtu il!o artnomtdtx dunU-
xzTfoltjS p'aditAfuit intum's & t/mupne obftik fdiA* nnnori non dif& milibm nulfopetiob, mnt
o wet/ijsimofultit, me w caulcm abyt. mines autanplantat, Mam torrttpit ,pr-ter trcs, que f
intEnnocau(esproiuliruntff) aMEntt\$abeAdemradHiprodeutes: fikfM'm'valdein
nam feli: prioribus longc minora fuerunt & omnes ramu qui in alios ramulos ex aduerfo femper na-
fcentes funduntur, in ffinas definunt, quarum media femper crasfior & firmior est: sub ramulorum
feparatione bina femper nata fuerunt foliola thymbra folijs aequalia fere & incana. In firmioribus
fpinis circa medium nati sunt inter foliola fingula: es duntaxat caliculi quinque lacinyis divifi, Se-
pmbri men'cjn quilufios S*! <vufiori nD afimilis, fed fuperna parte repandus & dilutionis colo-
- Ctmferhtarde admotifofespetulmiffifimen a dfrugmpcrvenire nequit. An porro
" * ~~Itas inprok nium aridum~~ ieniq' vdr cpeter Q, dii \$nx detcbl.

NOVA prori^ & elcgantiflimactiamhicflplantajqux apud menondum nomciim-
Ttit. fed inrcnm ob fimiuidinem tjuadam frminis, quatn cum pbafeolis liaber. Phafeo-
nnum genus vocare mihi liccar. Adfcquicubicalcm aflurgitalitudinem, modofim-
plicicaule, modo pluribus ftolonibus ab una radice prodeuntibus, digiti minimi crasfitudi-
ne: folia illi pinnata, hoc eff, longo pediculo utrinque harentia, femper contrarijs petiolis,
lentilei amula, fed mucrone obtulo ut securidacæ folia; e foliorum cavis filiquas fert ro-
^dasjpollicaricraflitudinc. iumeiies & niultoacrcplenas. colorembra. mquibus con-
nc!uur lex autoilo femina ad luceum tendentia, comprelTa, phaleoli figura; quos flores
P^<) furat, compertum mihi non eft, nam cam ffonte naicentem in Spagia infula adverfus
^acoiicm Pelopondifita, frecquentiflimam invent M. D. xcn. dum Venetias pctcbam;
nicnf(-. Aprii, quoteniporefiliquza Jinatuntac£ m nondumpcrucnra[K: k nautisgrana
Cludalibentfliin(: edebancur, grx cequelupinosiilveltres vocabant, licctn[hilcum lupinis
co mniunchabtra: hu)uspJanta; femina his diebus ex cadem infula abamico acccpi. quen:.
^tolljgercE rogavcram; nam infula haboribus caret-, & nonnifiadverfis ventisatri-
tcil iibus pciitur, & apiratis: eain obcaufamicminacitiushaberc non potui,

Phafeoli no-
vum genus.

Vdde-reftondet'ktcpUntu (a. vneatitm(mintm't(Jemlhinoteeodem cumJuperiertLjaKtie)
Bijl uoit(IrisigfcpquimimthiEftioAskplutidjufpfi, & MXXLV. miki hujusJloniuprum
dd i i e(um

leum obitmt ^a.vJum qmdem ex **ejmfiac** cony cm licet: fupertorem hiemem in hsn\$ pertitlt, 6 va%o ^ereder^nin^tt ^nuliutn tamen f^aruJ^ecimin adhm dfidit; nejcio A^postme Anneif per hiemum conjet: are p

Scordoti
Plinj.

SCORDOTIS foliaromcnrofa, Menthaftro Marrubioquealkofimiliaprofert, pcrterram moibenidifTundLtiir.mulrisrainiscradiccquaimagna&pcrennisclt.prodcontibos, quadrangiilis.ninifintdalboiibiicisutmarrubiura, inquoVuni lumiiiiiiibusfloiciniarubijalbi inquadam magna&denfa/pieaha:r-ciu, quibus /iicccdit lomen nigrum: tota pJauta niftjotSterairioteitSfordio vulgari. Nalcitur ubique interiaxa, fecusvias, &in ni^rginibLisagrorum;al[i]jodorenj,ut Stordiumjrcfertj&intorafeieCrcra (cplaliarijpf (cordiopromicuchachcrbautuntur.Hantherbam.legitimamScordotini PLnij cfie sile-re: nam re^i-nrmcdcfriptioni ipluisquadrat. Sc forrartē ncmni adhuc cognitacty ti^AC jarnofloawtnovcmabhincannys, (cmina- Vicemiain, PaMviumqucmifeiil). LobcliuS) Pena, & Dalcchanipitis, profcordOTiftacliyndiokondis, faiviamfifTflrem, &galitnchlumoflioinaFHm dfrct]buiiE,qna*cfwidcm ftirpcGrnnes¹ notlixfpurisque lunc: namn^{e1} queallijodorcmpiraiic.icqueviribtisaPlin-ifOittnburisrclpondent.Scordotisinquitip* ll^mifcecurajicidoti^uinimiitonaftjrrio&refinacum melle tufa&afidaopitulatur,^{huca} & per fe faciles excieatioires, ftbniachum corroborat ejus fuccus, iiftit alvum rcj^{ntis} drachma cum vino trira. vcl decofta potu, vecufta vulnra cum niclle purgai, ^{farina ejus} carnesexercfcentesperic(in(perr3C)nlumLi,menl(*s&,kuiorcsprovocapoiu&: ilii[u,F^{at} tusatedcratpocadiaclimafucciin aqua mulacy.uhis quatuor, vcnenismagicilij.Bci¹¹ cancaciombttsadvci(atur. Hujus platicae aliquot fnlia in hac cpiiiolao'cclufa iiii venki >^{ut}* anlegicimaijt.judiearepoffis.

Vi iflaepijleUprijt (cu)u\$ hoc dunt nxdt exemflur pofti/tmiffim) fie etinm eafelia /tdtta ^{ejus} autem femina j'meepijloU accepta ,cum (fnibnfdam alys <tbt-lonorio eodem tempore mifus& credijsianfu/st n.tt,i,camsb caujamde ca mhilprofuuci&reffojim

Agriopalli

AGRIOPASTINACA vitlgaritef liodicvocatur inCrcta licrbaqiardam petrofclino vul- Jaiilimillima, mliquodminoreft, ftJiiuceifdcmetiaminafuris prxdira);cer habeat, trunora tamen \$L aliquainuluin cratnora profert, caulis petrofchni tit, flort's in titn bellis albos fuftinens, quibuj fuccediuc (cmiiu petrofdini, (cd minora, colorc ad arrum acce- dcniaj railicc (irmatur unicapollicismagnitiidine, fem per figuralonga, corticc rer: ui re- da, qutdigKiattritufacilirocaradice fepar.uur,quo:Candidaeduli(queft, buibocaU³ⁿⁱ guftu,:tQtahienc viret, Icnie'nquc Maio profere, ppftca totaarefcit prxter radicem ,ju⁷ terralate^SipriinisAucumniimbribusgerminaprotrudereincipit. Hujustir*^{is duo re-} periuoturgenera,colorecorticisradctum tantumdifferentiainatn uniusrufus,alterius ni- gercoui-rpicirur. Nigrtim genum montibus to.tiusCrct&:ctiam in Da'niac^v provenit. Acrufumabundantiffmtantuniin (copulisCrcxpropinquisincer (axa , ^{ad-} **Scopiose** moduminquadaminfulaparva.nijncffr^tf/^i vocara OccidentahCrcta;partcuta.uPi^{lx} munitiliimacxiructaef,quam infulam unam-cxrrjbusMiiiraqonsiPlinioapP^{cuaf} s^{elk} judico, Hjecherbaad B.iilc-linonaPliniolib.xx.cap.xii.dcfcripcurnaccdcrcplurin^{lu} ^ videturinamdiifcraPcrrofdino brevicate caulis &radicis colors rufo: aScpbuanj^P^ ^{ore,} faxifragia ulur ^{ore,} tinaca^ qua tamen longediltcrt, pafhnara filvefrisadhuc in, CrctaJegitimetDnomp' tiict,narncam>_alf^,i.ovvocant,frcquentin^ime'qLicradic<;S<:herbaco<Sa,v^{crnoCenlf} vetcuiuurraliici.

Enq. gemi
na.

Moffagoria
Inful.
En eison
Plinj.

HJCapnoM.v>.xcv\,fem'ncmihlndtd,ffdeumvde(era^ermim(fct,&rriaxnt(t(ne ^{lla ak} hucesset pUnia.Iricms proxime (L-quexs corrufit,ut objervAre mquivmm: frant vert ()#* I^{al} Atrofflendentia/ion mims quam eleejltni.

Agriollari.

AcmoSTARf, quod triticum (ilveftrefignificat.frcquenridimeinCrctainvenitu ^{rnc} gligitiirque. Herbaertri[ict>familis, folia:&cauicstrLrici ft'rens, Tpicifque aliq^{an} luniafpcras, nigriores ,i5iarifl.isbrtviore, cjusgranannora(untntico/ar.ivo, & • ^ parrcobtufa, icaurfcalci grana potiisquamtriciarmnlentur. Hicferman^{ulla} caulflicibimicto.niiiuttibicompercumlicnoninfolafiriliatntictimoririnlvc ^{tre} ^{QC} admoduni Vo&x rradidcrunt: & quod non abfque rattone Crcceles trincum prim[^] rrc in Crcta mventum fuiffc- fibi periuafennt, quemadmodum Diodorusiicu^{lu} Bibliothecxlib.vi.fcnpumrliquic.

Telmftme & afaxddmer miffi n'ata tmhxplAntn, fed anttiptk^{m caules proferre} inciperet, ahoccm^{urgen i oris curam} i rrepdhrtwipr0^{Uthbvulj*cr} abjecta fuit, licet ferie qua- ^{dian} & ad normam, quemadmodum fata erat, nata.

Ileg²no,

Isa /n, rrifolij, auclotigcnuseledule: in foro enimejus filiquavancquamdure-
 scere incipia,!: venales reperiuntur, apueris&foErmnis libenciflime^duntur, fuccofi
 sunt, &:dL]lecs.pifirceentisguftu:multosr.cnucscాలుesa radiccprofefr/ulia triiblii an-
 gula, craffiufculaj aliquantum mucronata, terna fcmper timul con/teetV, floreslu-
 teos piii, quibu5 fuccdujr filiquororundae, falcate, ac, pro ratiune plantar, magnar inter
 fccci; invenitur, & in msrcinbus agrorum frequenriffime, hetbaqLie omnibus nota eft.

*Hu*tu€itm fatten (quod ^Afr&gdtriMonfyettimfmm non multum abftmikj fidebatur)
 «*afys abHenorio accept it terrx commiferam -jednon est nation.*

litlionuperpratcritocx^Egypto'feminaaccepiOcnoplix fpinofe, Bamiar ab Alpino
 rcripcae, Lcplap diverfi ab co qucm inPannonicarum hiftoriadefenbis, Balfamiipe.
 *, &c Pfaafeoli ex Iemcn, id eft, ex Arabia felici, qua; omnia terra: commiffa felicit
 Jjnie nata funt, maxima mea voluptate,-&tibi nalcitura confido, nam recctiffima
 iunr.

OENO-PH^ fpinoGeoflarotundafere figuraexiftunt&duriflima, in quibus duplex
 feniperitivemturmdollamduabusipfiuscjufdein offisquaficellis oflca membrane dif-
 tin<Stis, itaucexijsrerta: creduis bina: fcmprarborcsnafcrancurparum inter fediftantes:
 folia in nuper narisaliquantum ferrata (u.nt, & fpiais acutiflimis circa petiolos munitai
 qiiarfcmprbina: circa (Ingula folia vifuntur,liocft,utnnt[iicina: folia figura&hervisii-
 milia func eisqua: Oenoplia fine fpinis profert, ac non ade6 finnanec parte averfajneana,
 fortalTehocinnovellistancumcveiiirccredibileelt.

BAMIA, folia: iialva: fcr,alic]uantulum vil]ora, maxima, itautadCucurbirarfoliaqua-
 fiaccdant, longopediculoinherent, &proculintuenti malvaarboreavidetur florem
 nialvsptofert magnum, quinque folijs conflancem, colore pallido inrer luccum & album
 medio, inumbiicopurpleum .cuifucceditfrocluscucumerifih'cflrifiiuilimLs, akera
 Parteacutus, quinqueangulisdiftiiflus, plcuifeminibus rotundis adnigrum tendehi-
 ous. magnitudine Orobi: ad quinque cubitos aflurgit. & in Creta hieme penr. H. inc Trio-
 num Theophrasti, fie ioterpretante Gaza, LeonarJus Rauwolfiisin Appndice Hiftorip
 g^neralis R,ovilij, appcllat, fod quim redc. nefcio Ignoram veteribus fuidejudico.

LEBLAB, fructu, iiliqua/^coldrediffcercaboquemmdcfcipifli: qamhic filiquas
 pfofert magnas Jongas & Utas^aiiliscolorpurpurcusad nigrum tendens, pediculi & ner-
 ifoliorumeju(dem(inucolqrjs, flores plures unopetiole inherent. AbAlpioreftc plan-
 tadelincatur: fed florsvaldediffVrunt^nam non in finecaulium, ftdciblorum cavis
 ^Xeuntlongopediculopluresquafifpicatim, magni, figura aliorum phafcolorum, fcdco-
 Watropurpleo, quicalicc/^^^udicicur, plufeolijue ad fubrumtendunt nigris
 ^aculis infigniti. longohilofutnigrj&aibo.

BALUMI femem idem eft cum eo quo vulganter utuntur: fed ego recens fimumri
 ^cepi. quod opobalfamiodore maxime fragrat. ejuldcm que odonsrelinaficcamultis
 fit: m[businha: rebat: led brevi temporcodorfcrevanuit, itautnunc obfeure fentiatur,
 t^i> iB^atame ninoreccnta, lcvitcrquem anfa fuavem odorem relinquitnt, te jebintho

P^{oximum} Ex liis fcm inibusterracommissis quumque plantula: mihinata: /unt, qua: duo
 folia figura quafi rotunda protulerutu, in quorum niediocalicula affurgenrem, folijs
 pmo fingulanbus, & porteaternis, parvis, longotcnuicqucpedjculoharcntibus prxdit-
 ^, colore ex vindi albefecnte: plantula feptem tantum folia adhuc liabent, tarde que
 ^fctmt- caulis nunc craffioraliquanwlum fieri incipit propeterram, ita ut quafi pyra-
 ^dalifiguracematur, colore ad rufum tendente. Hii justam nobilis plantar novella:, fi
 tibi iconcm ad vivum deheatam mitterem, grati/Tiniam fore]judicans, eadem magnitud!
 ^quanunc fpeflatur, majorc quapotui diligenna, ram dclincavi: adultxenim Alpinus
 P^blicavit Htc meminhac infula ferre pofre confido: nam Crcta & Hierichofub uno eo-
 ^el iique free]imar funt, & fivottcotn pofri 3m, diljgenriflime eas obravabo: folia opo-
 ^[larnumolcnr. licct ad coparvafinr.

PHASEOLOS ex Iemcn ab Alpino Tub Abrus nomine dcfenbi puto, beer ipfc fru-
 ^tui^ non recte (meo iudicio; defcripferit: nam figura phafcoli non eft, Jed ovali, oro-
 P^granis paulo major, nee totus corullij colore, fed parte, qua filiqua; aut fuofruau ad-
 yxtet (nerdo enim quomodo ortacuri hebeni nigernmi Kernirur: duruseft, & diffici-
 ^C i cuiibus cedit, fapore legumina tmitatut, & iuf uavisct, in cibo Tque vix admitti pofTe
 ^3 duritiem credo- Hujus tres plantas natat funt, qua: folia protulerunt in iliajs qua; in
 A^Pni iconc fpedantur, & ad Solem in minim in modum conuercuntur: nam folia qua:
 P^ nata funt, hoc ell;, longopediculoliacrentia contranjs pctiolis, & femper numero pa-
 ria, parte avcrfa unum contra almdarclif Time circa Solis occafum clauduntur, itaut mu-
 ^ro fics foliorum rrram fpeftent. pediculi que longi quibus folia hzrenr. noctu terram ver.
 lus iQclioantut, ita ut cauletn fere tanganc, & fie totanodte permanent: at cum Sol ori-

CCCXUI] EPIST. HONORII BELLI AD CAROLVM CLVSIVM.
tur, pandun[urj&L.pediculi fuo in (itu ad angulos ferè rfloscum raulconven'jntm: Circa
mendicm pauLuiiii folia cilum fpe&areincipiurit ,&niendiepartenjper]Oieunu.rn£on-
traaliud mvicem clauduntur ira ar.£)e,urunuma)iuu tangat, mtrone'fque caelum fpe-
dent, conrrajcip^rorlus modo qup no&u permanent_a poflea inclinantejani Sole pandun-
tur. Hsc foliorum ad Solem converfio mirabilis &c obfervatione digniflima mihi vifaft-
&i,dcQparti..cularitertibtJigni6candamduxi. -...» •.«,

Ha:c, virclariflimc, tibi fcibendahabiii: alia Deb opririjp tnoximo faverrc alias fcri-
bam, interea vive feUx,mc4uc,uc Coles,ami, Cyddnix Crctx die~xv,- Augufti mort vc-
teri M. D. xcv.i.

*S<tmi>imt,quarumh^cepiJ}fflaf7)emlmt,parsfubaKni M' D. xcv i;fintmmhi fuitredditt,
ftdePifteia- mtnimh qtiedcitm illiftgmjtAJjhn x x v. lunij&nni infequeMis, hoc illiueftioU t&
eTxpiarcu/nfequetfteepifloftddffiejKiJ/t x. Cffe frrisejttfarm anm'M; D. XCV 11. fedqti*wi»*
dentum reddha (curAnteipjttfratre Leonida) x x v 11. Augujli w. B. XCVI 11. Ad
que autcmreffoxdcbAmv i.Sepembrtiinjequntis.*

CtAKISSIMO VIRO CAROLO CLVSIO,

HO N O R I V S B E L L V S

S. P. D.



E P I E M S S I nuperpricriroepiftolam tuam accepi xxv.lunijfriptflnij
quacrtiorfa3usfum,tcfeminatantum acccpiflè.litterasvcronullas; qup*
mcmaximaadnriirationeafFecit,ipfiscnimrucratad)iindaepiflolajCUJuscX*
cmplar ireriim tibi mitto.Ecfi tardius forte, quatr defideras, ad tepercvHi'
> locorumdiftantia:ad(cribendun }ent:nam'fi,tiiaturiuscertiorfaflusfui/rc'
> citiusctiamexemplarmififlem. Curahacflilillumremenaccipies.namuxo-
rismorte, qua; tin. Nonas April is accidit, ita male aftcflusfui, lit per toramarftateni nul-
' lum confolatlnni locum reiquerim,ncque fcminaco]ligcirirfi,neque ftirpes indagandi vo-
tuntas adfuir. Qjarenicexcufarumapud tce/Tcvelim ,fi proniirTtsfatisfacrfcnonyaJt'^
xftatecnim furura, abundctibi tatisfaciam. Sedquiaper tcmporisangufiam plora
licet, Vaic,in'e4^ utfoles,ania. Cydoniac Crera: ad x.Oflobns veteiccalculo*f
XCVII.

CLARISS'

CLARISS°. VIRO CAROLO CÆVSIQ,
THOBIAS ROELSIV &

&/>; Mzdiohwgenfis Medicus

S. P. D.



VPEH.IOR.IBVS menfibtisadccrnamjmihiapudPharmacopoeum
a'fiicafflindidaim, acceflilibens: adquamaffinismcus loan funior,
florum imprimis fludiofus venerat, in quacorporis noftri vires varioac
tauto ciborum appararu reparabantur, & convivarum animus turn vi-
vacontemplationeherbarum, ac omnifaria riorum amoeniraterefo-
ciltabacur (quiscrcdat hiberno illo temporeapud Mamacamgemem,
2clandoshodievocant,Anemonescotcineasadupliccs,Narciflbsjmi-
eifolios, Antirrhinum, &Caryophvllcorumfioruth Species Romiffe

paffinhortisjqonalicerquairiiEftace mediate cadidaLeucoia^flavenrialuroinaCal.
thac.ut loquitur Golumelladculcu hortorum fib.>}} turn honcftoac utili de floribus (er-
tronc deleaabawr. Ex his fermombus delapfi fumus in peregrinas & exoticas plan tas: Sc
dum in frequenn convivio farpealiernantur vcrba, opportunè mentionem fcci epiftola:
mar, amicorumoptiincqua peris acmones.utde fruduCaryoces^e fannacujustibi ali-
tjuando (pcimen mifi,& d. /CC /^*wlcnfcam aliquid, ucvrmsdehii hiiibrtaicti-
fcccrcqucas.

Oftendit nobis hofp«& dominusconvivij Wjlhclmns Parduynius.ciim in fuaarte peri-
^frHiiut^umdiligentiflimuSjraditemcrafram.dodrantaleri utnnc obtufam, aozab'
^trerna&obttiioire radicepartefexfepte'mve(armeifaficca,humidiffufa,&mu!jsexi-
guisfpinismunitaprodRxerat.Sarmentispunmafolaiah'rcnt.quinqueaufexdivi/uns
mfc^a, funtqueeapalmari amplitudirie: vertim non licuit fdliavidete. Radix habetey
teriorcm cpticem nigricantera, pattern vcrointeriorcm atbiHlmam; virgultum hJz
B num,quodnuicribtmitto,aradicepra'cidi, e'flquc, utviderepotes, lignoium, rotun-
*Ur n jlentumacvimineumjfpinilquefrequenribus quidem horndum, fed admodumexi-
E°is. Admonui, uchancradicemadtcdafet (quodipfumfcciffccognovi) ^ua?quidem
ab ipfopro7>*<<<<habitaftuit: fedaliterab IndorumPrarfefto, quiafam^itium lum
«uodctrnraancipatosnigro*ab InfulaS.ThomaTadduxcrat,cdoflusfui.Qi)umenimex;
^tJsmntarioneinmotbumincidiffet.mevocavitfanitatisrecuperandarcaufaiatquehac
^nicornmodaoccaiioncoblata.itudu^LeniHnidabipfisrefcure.quieadhii bnarninam
5*eftareit. Atque ipfe hancradicem affirmavit illam eilc, ex qua ht farina, quam radice
^anyoucarfarinamnoininant.&abadvcnisMandiocaperperamdicnur Manyonca-ra-

Manyonca ferendaralis.

novel l i t c t r nradicem crassam & ma namefformatur in vltis ut plurimum
*nn is, & nonnunquam fcmefnbus intervallis, prout folum fm. rftfbecundum Fccu nditaj
*oil faciDU radicesimerduti induorum dodrantum longitudincmexrrefcant. Ca-terum
panyoucaantepaucosannoscBrafiliain Infulam D.Thomaidelatacit, quasjEquarori
oiacetinlongitudinisgraduxxxni.

Notnncquidem legitimumapudincolashujus Infulaceii:Manyouca: fedeorumaliqui
*uimBrafilianisnominari volunc. Nondubiumqmplantarhujusnomenaveteribus
gnorurum fuerit, ciim nequidem occidentales iftationes fatisfpis innotucnt.

Manyouca Yuca.

^3diciiduntaxaturusefiiliisadvidumneceflarius:continetradixiucciiniltha!em,&
lanicn ab efu radice non abitinr- Verum ita preparare norunt, ut fat ma &: panis e radice
Joflatuscdatorinnoxie. Cortice prioumabrafoJecant radices cultnslapd
r^colas, (o liqueexponunt Aligp
«i> scontunduncj
«i> iinuti[rim3spartescomminuunt:dcmdc/acciscorçiceraris, vclanVammeconce-
*Cisr nponuntacpcdibus(ubigunt, donee omnemexpreflerintliquorem.qui non Jinevi-

Manyouca paranda vult.

^ttrirmcdeguftaripodit. Nonpotuix Nigrishiscognofcere.huncluccumull.ira-
ttoncpo(Te fieri falurarem.ncco&tne quidem, quod tamende YucateftaturdoflifTmuf
Medicos Nicolaus de Monardes Hifpaleniis incolibello quem defimplicibusmedica-
^nrnisnoviorbisinrtituit.&culatimumfccifri.SedaliosquoftJamdeMaiiyoucaconveni,
Jj'x itnevero naftam iftum,qui in Hifpaniola Novj orbis Infula, triennium caprvus fuit>
^Chcirurgiim^iiiiMnum ,quiaburbeS. Djminicijfudem In(ul«, ante paucos dies ad
^yenit.quimihiaffirmarunt.huncfuccuincrudumvaldeefrcmutifcrn.maxirne'quele-
^cm.exuercnihilominujomnemqualitatemnoxiam.lirecenresradiccs cumcarnibus
c etur, ut ipfius accipit dicit quod qui cum m t i gr s gnotatuz. Fieri etiam
potest

pot[^]faliquam radicem pro Yuca babiram , esse innoxiam -.sed quasm mulrum i *fla differat* ab ca Dfdicejde qua nuncfit fermo,dicemuspaucis,ubi *da* Inhamc.

Cazabi.

Mtnytuu.
farina.

Oetrum panemfcu placentamfonnaturi, fumunttotamhancmaflamcompreflaiiJ) qua: fimiJis^{^4}MmygdalatuiTicongeriei,cui oleum reccns fit exprflunj[^]utplanècx fucft reddatur, furnisimponunt&ficcant; arquehiceftplanusilleacdcprefluspanis&libuttr Americanum t[^]/difittirri) quonunc American!milltis[^]ecislisvitamfufftentant, Farinietiani exeadem mafiaconficiunc, quam noninfurnis.ficcant, fedfubaclam&dili* genterexpreiTamminutimdivid>nt,8dnibleficcandamcollocant. Atquehuicpropriurfl & indigenum nomen est farina Manyoucar,quam ad te cum fuprioribus litteris mill. Vix dici pot[^]It quantum rume[^]cat&inrlecurchicpanis , fi liquor aliquis iHtaffundatwr, &ali' quamdiu maceretur,utxiguahujusficcailurnptamolesabdomenturgeremiruminmodumfaciac. Acqueadeohincfa&umefitjUtpublicisdecretisedich'squccautum fit in Occidentali India, nequis hunc panem in menfa apponac, quin aqua vel vinum adfit: nequiedantnonmaceratHmjfedabfqueliquorciicunajliiifocationispericulumincurrant.Conimode hi panes iucorruptifervanturmultotempcirc:quarectiamnavibuSj qua ab India in Hifpaniam appellimc,imponuHtur panis bifeofti vice,pro alimcno.utdc Yuca fcribit Nicde Monardis.VcrummagisnobisravitamaCeresAjUCpoerrfabuIanturjfruguminveninx,qu[^] nobis largiacftccrcales fructus rabbriores,qu i plus alimonjXj& almicntum Nature faniiliarc,ab(queullafacuJcatenoxiafuppeditanc. Quodip/um abrqucrationePe* trus Martyrrefragaruriib.vii.Decadisni.ubideterriniusnaudirafacundKateficfcfi' bit. Sicuti animusaliquandofuic.de ferendo in montibustritico, ubiparumpcrfrigorisvigcat (in piano minimc[^]bnimiam agrorum pinguedinem) est incredibtlcauditii, fpicaro iupcrarelacerticra,Ilimdinem,fpitliamalongLorcem, granaquenutric quam libet duo mil' Jiaampliusa(reverancerinqinunt,&jurejurandoaffirmant.Sedfalubriorem Infular panem Yuce przfertim ajuntj quem vocant Cazabi,quiafitdigeflioni apior. Haclenus Martyr* Quod etiam ab ipio fenptum est Lib. Ix.ejufdem Dccadis. Et *to* modojinquitjcxijccacaj conditaque & dedudla in Cazabi, panem prsbct ftomachis humanis tnticco faniorem* quod aptioc fit digeftjoni.

--Sedciim Jlarum panes exiguamoleplun'mum ponderis adferant , rardiffimefanedei:iar.tur neceilum est, Cxtcrum quod hi panes denfi fint, &a furfuraccis, *quosTrrtv[^]* Grarcinominant , fintalieni , peripicuumeft quodidcirco ScfermentocopioGoreind^{1*} geant.omniumque maximcfubigerc eos oporteatjneftatim poft feimentum & fubafti⁰⁰ ncmaflate [^]utpulijhrdc ejufmodi panibusfumum illud Medicorum decusGalcnus fcripfit. Ve[^]um barbarics apud cos tanta est, ut non norinc cibum gravem tfficere ad coquendumfacilem&fuaviufum, inquoEpicurxinoftrxgentisprimas tenent r/cdpcP⁰ cant rurfusjn adverfum , dumnullumincibis&potionibusmodumfcvantj&wntupJ fpecibi atque potionis adhibcant,ut opprimantur vires.non reficiantur.

Inhame.

Ejus ferendi
:

AlteraradixcxInfulaS.Thomxallacaipfis Inhamc dicitur. Inhamc autem illud ex un* radicegerminafatiscrafla.candidaj&ficculentaniittitjUtiplantaunaofrenditquamadt⁶ (jedi:hujU5foliaoblongafunr,amp]a,& non incifa.Qiiofcunqueconvenij&florem&ft^{11*} flum ft-rc negant. Plantarur autcmgermineftatimaprima germinatione , nonalitef quamapudnosinSiiarofativofic:turionesfunttanquamfemen,hienimaradicibusmcciW & terra recondici,repullulant,atque inradicemtratifeunt,quam fingulisannisprficiuitt^{*} incimqucmolcmbreviexcreranrjquEneceiTarialicad ufum vitx.Binas has radices Vfteribusfuiifleignotasputo,&ideonullumnomengrarcumautlatinumprodirum. OcctdencalesIndiacHifpanihanc vocant Inhamc, Illam Manyoucam. Ego conveni IndoS quam plurimos.nec ullutn inuenire potui[^]qut aim nomine has radices appeUaret. Prxtet⁰ quam quod Indorum Pra:feftusdiceretipram Manyoucam eiTeradicis Inhamc fpecifni> & effc in fua patria alias Inhamx fpecies:practer has binas radices) quar inter fe parum differant.EditurabipfisInliame radix cruda vel codaj&codioneamittitlentorem[^]ctnaceti¹

humorem,quem in fe habet,fitque cibus ficcus,& fatisetiam grarus.Interim cuiquam *toy* turn videti poffit, indigenasS. Thorns neglexiffe ufum Inhamx, quac tamen intioxiaefi* poftquam ad ipfsvenit Manyouca,qua;u[prafmonui,aconitolahalicrem infeconcinc¹ fuccuni. Sed hoc factum intelligo,quodfentiantcorporis tcturam,h<jusquamiJliUS^{u,11} firmiorem fieri. Nec dubium,quin alimentum folidum^a natuialinoftrcalore fuperatuf) reddarcorporafortia, &cad labores ferendosapra. Exemplo fint agrcfes noftri moralcSf quicibisduris,&carnibuscrudis,moreLconum, Vr/arum,acLuporum vi&irant. Q^{\$°d} auremillorum ventriculus cibum hujufmodi durumacgravemferat[^]acitroultum¹^I³ confuetudo. Tamecfiipffamiliarcm ufum Manyoucsincant, obranoncmallatam,h²¹ beni nihilominus Indici Amend ufuetiam Batatas,&: fuavifimos fructus Ananas.acg[^]^¹ iidimi faporis plurimosalios: prartrea habenr 8c Indicas NDCCS prargrandes Palmac arbo⁰ tis, qua; , uttctacurin AromatumhifloriaGarciasabHorto, humanisufibusaptio^{rCt} quam ullaarbor. Porro ciim Manyouca fit Inhamc:fpecies,& icrendi icuplantandirat⁰ fere

ferè eadem sit utriusque forma, externantriufque racicis mulrum fit diffimilis, facile
aliquatenus in errorem abire poterit, ut, quòd diversis radicibus illud describeretur, uni tan-
tum attribueretur. Btenim Inlume fa' iubns & minimò noxia est. Matiyoucaperniciofa &
leebals: si ne haxc Bric[icnfi um Yucix Hiidoft] frmic C]ufidijii Jica^ dum^ lincim
Auctores aliqui describatit Yucam omnem in Continenti nascenrem salutarem esse eandem
in omni h'c Jus infulis prefens & venenum, Manyouca verd cruda neque incontinent!
f' jcin m'uils facultatem {o' lituri inquam salutarem. In hanc autem ubique & cruda
& tofheftfrinnoxie: ibominibus nigris novi Orbis. Sed prolinoxifurn, quam parfit.
C^uarehinc ad fructu in Caryoces five Onryotfb venio.

Thruftus est? ali' na3arb: H[s, qua: addiffercntiam reliquarum TiPalmaruti TaNigris S. Tho-
m% dicitur Palma My. Triplicem n'iba istam lula Palmam: quartam una fetrdattylos, & fu-
•" ^ ipfls nominatur Paltna Tamaraquod daitylum fbnac: nam T^wjr Arabica lingua da-
rtylutn fignificat. Etnorum fatis est omnibus, hanc Palmam Tamarani longè diverfat
cf Tea Tamarindifcra arbore; licet nonrc^e fen forte in Nomenclative {uo Hadnanus Lu-
nius vir alioquidum ductissimus spo^ «at A «coc Diokoridis, officinarum Tatnarindum
fuisse scribat.

Altera Palma Cocoi h'c ab ipfis dicitur, & h'c est Indica Palma prargrandem illam nupcm
Indicam producens, cui Lulkam nomen Owindiderunt ob tnaillatbraminum vestigia,
quibus Cercopitheci, auialterius similes animalis caput repr^fentat, atque h'c Cocoi h'c
dicunt. Habui ha)us Palmæ aliquot imces integras, cum suis villis corticibus, quacum
in incruva (nucula) germinare cepit: licet in arboribus binas microalrciius nucis corcicetn
l'uftuli, ut graminis exortur», Sie iust demradicarionem potest videri cominodius; ter-
tiam cum germine nucem penes me fervaveram, cujus praxdurum a ligno putamen
nucem apertens, ex hujus medulla germen traxit initium observavi: nucleus five me-
dulla conclusa in {en6 habebat aqua (qua: nucibus Indicis reccnubus & non germinan-
bus ineft Temper) sed aqua cutn tilud in maceriam fungofam excreverat, dum forte in ger-
minis alimentum converti coepit. Germen ex itenucum harum forani in tertio j& mox
extra foramen, facimab exortu per corcicem extenorem crastumac villosum Yl quinas fe-
nif veradicutn ribras dimittit in terram jper q'ias alj mentium fuaf naturæ conveniens attra-
hit. Germen quod per foramen emergit unicum, (imilicr per foram villosum cortice):
Mn unius nucis colone vestigia foliorum arundineorum conspicitur, qua: bifida
binas funt, & vix altè invidetur ha Sere laritudinem, quod quinq; vel sex plicis
nmi (Ta (int: folia primum in vagina larum videntur. Equa prodirunt nec, dum expan-
k, sed plicis commissa, uci metipfe hax omnia in alrcra liacquam mtr'o nucis contemplari
Potest, cu[us] germen in longum excessu videbis trium palmarum mensuram. De creve-
ra Indicashas nucis dum recenscul' l'nt, rrrrx committere: red per arborum frequen-
tiam negligi, nec putem germen futurum alicujus evidentis magnitudinis, vel admodum
po(Ti; exercere ac fuperfit commanere; quandoquidet Mclimacis noftri rempenes ar-
borum tuturis advertefetur. Hæc Palroa omni tempore fert Indicas nucis, viretque coro an-
> fruilibus femper alijs subnascens: alia: enim prax carpuntur, alia: maturefcunt: &
Sod Pontanus alibi in Hefperidum horcis, de malis Otrijstetatur, de h'c ad iadi-

Palma tri-
mera in Lu-
nia S. Tho-
ma.

Palma Coci-
bus.

ft
j Tim nova fmscr, femfer quoque felih'cs ducta,
Hujus Palma: arboris formam atque figuram nobis ex libris Ioan. Huge Lincottus ca-
p. LVI. fuit Itinerarij: attamen nucis rotundas depingi curavi, cum ex Guinea, ex In-
y^ S. Thomæ, & occiduis terra: tractibus triangulares ad nos advelianrur quod dic-
rim aruerunt ha: nucis triquetra: at fucco plena? forte funt rotundiores, non ramet
Oni ni ex parte putem ease {re rotundas, quod tamen * vigilantif Timi Luifcoti figurave-
t' r mnuere. In hujus arboris defcriptione mulra videtur Garcia mucuatus. Sed hoc 2 6 2 S
?? dic: Arboris truncus nudus est, nulli in eo sparguntur rami, prsterquam quod in
imitate folia excrefcant fimiliter extensa ac in Phrnicca Palma, & nucis Com? * > > > * &
di a s conjunaim profert, aliquando de eam vel duodecim conneftuntur, raso folita- ^ ^ ^ ; -
rie confpiciuntur crevisse, qua; exeunt, fubter foha trunci cum pediculo annexis. Jit
Cæterum ctianarbore fuit excelsa: altitudinis, non habent radices nimismagnas, in-
quit Lincotius Atamen firmiter terra? lment: quod mirum videtis, quumament P** TM* •
lolum Brenofum, in trum alias: extimandum ideirco profunditas radices agere. Sunt
ern, in q'it, arbore tam valta? al mudinis, ut non line hoirone po(Tes quinquam videre
af cenjerit em, tarita tamencelentate eas confeendunt Orientates yovu Yi Canarin, ut ve- ** f*****
r h G m. z Quam homines cTe videantur. Arbore incidunt ad modum graduum, per ^ 1 ^ ^

quos venies d'om-
d'nt. E. m
fchlyp ad

••••• miffiititit J<cler' i h' m' i m' m' o' i s p? Anq' l' h' a & a m' i' u' < i' v' i' > > > m' i' d' i' m' v' i' d' i' m' , n' o' n' (i' n' g' u' l' u' n' t' l' i' m' o' c' e' a' m' t' i' x' ; t' i' t' i' f' f' i' l' l' u' m' i' t' r' i' l' i' u' -
••••• f' o' r' m' i' t' i' n' q' u' m' r' i' , i' t' m' m' t' u' r' n' t' e' t' n' t' u' i' ; H' * t' i' t' m' t' & V' i' ^ f' i' f' i' m' { ? A' o' e' r' f' t' * h' * b' m' f' f' i' m' i' n' t' m' i' , f' r' i' m' k' m' t' s' I' t' i' d' r' * O' i' i' t' * i' c' A' i' t' t' # , M
••••• t' i' n' t' t' a' t' i' T' < U' i' - n' a' j' u' < U' i' r' *
•••••

quos nullo negotio confcendunt, quod tiullus nunquam Lufitanus tenere aufisfuit. Karie confcendend; arborero Palmam a Gaicia defcripta videtur effe cum minori a criniine. quani prior modus. in quicomm, *ut ex altior bus iam sdo igantv no fom liquo-* rem, arborem confcendunt a p t a t *ci cora dibus & d p q j aut falsijs vinculis* qmbufflanrarbore per intervalla colligames. Hunc liquortm *furam live Srti* nani. Rurfum Linfcotius pauio pofteo demcapite jnquit. ^lunturhaiboresi iudpli' cctufincm: quaedam uc rruftus Cocos fersnt, &c quadra ut vinuni abijs clici fcftt- Ciim propofHerint negligerc Cocos, flores icfccant, & anfpullam rotundam cui fitpri. fr cimn Ir[i(Sum, O//^n0Qi]nant, ailiganc, SiarailimcclaudLntargilla commiffionisaiigt]* ftiffimasnmas, utarceantomncm cxtcrnum aere tn, & impediãt liquoriscxhalarjoncni: acbre viimplecurampullavinofoliquorcPaim^, quern *Suram nommant*, eft que gratis poris, Hinc patet Autori. «. fci Hentiamcflc, quod ex ijfdch) arbonbus potinn *Suram* colliganc, cx quibus alioqui provenirent Indicxnuccs, nili pra: Garprentur tiore. *Suram* hac colligendit arbori divedrabe aquam Garcias & Lufirani rferunt, cu JDS infra mcinil *cro.*

Palma ady.

Tertia Palma, Ady nominata, arbor valde cella cft & infigni procentate, arboriue truncuscrafrus ^udus. & i crfcus est. non suffruticat, ipfaque Pin um fupcraralitudiiiC) fit mihi avarij rclarum fuit. Trunci arborum in materics rara clt, succo praegnans; fo* ljs prioris Palmx fiini hbuscoiiftar. In vcmce plurima excrefcunt germina, quibus pi* ciis vel exfim larfis, V3 aliquod idoneum appentiunc, in quo lachrymantem colligant fuc- cum, qui vint vicem apud Indos tencc, & facile inebriat. Duke hoc vinuni tft, venim pcv paucos dies accfcit. - Non omnes Palmx hunc vinum iiquorem fundunt, fed earum iuroqi j e Ady 3 bip (is Nigris nominatur: nec idcirco fructus suos faccre definunt ejufdem arbori* rtliqua germina, quafacerint at Samanfcunt. Hujusaurcm Palmar Ady geimc DP⁰⁰ cdunt JR col ^ ciltius iiflux, quazquidem tñajori cura & diligentia percontatus fum, quod apud Garciam legerim, incolas rrgionum Oientalium, Palmarum germinibus vfcii: & t > quod fublato genuine pereat Palma. Sed hac Jpfe de Pa]ma Indica generatim loquitur. ..

Abanga fru
Abus Palma
Ady.

Nunc Tupereft ut de fructu Palmar Ady aliquid /iikijciam. Integer fructus Lulitanis ^ citur *Caryoescc C&rioffg*, ab indigenis nigris iftius infula: ^, *^^ nominatur: qui *afione* producit arborem. Abangz nucleum ad te mifi, cui etiam tum putaminis praeduri pars *z* habebat: putamen hujusmodi tegit pulpa seu caro fulvescens, ac pariter luteus ell ex- terior cortex. Itaque cortici caro subest (non aliter quam in malo Perfico) quam puilum putarnen oi Tum fequitur: hoc vero intus nigrum coininet nucJcum cui ap- turn, qui adempra pellicula candidus est. Fructus integer forma & magnitudine cfti Ci- trij iftius maii quod vini Atn five limonem vocatit. Edunt ipfi hos fructus inaf Tatos. frequen- reretiam crudos: Caryoces nucleos integros interedendum mifceni farina: Wanyouc S* Hos nucleos credunt ipfi mirum in modum rparatc languenres ex tñorbo vires, adeo u^c fiis agns bis terve in die confortandi caufatres quatuorve Abanga: nucleosexhibeant- Quod ipfis tam familiare est, quim nobis ell ovum forbile. vel pullu & ga Umaceus, utiaffc* rcbdiu Lulitani, qui Indorum Prxfccio tune temporis aderant. Prxterea ipllcx boc fru & u oleum conficiunt: nempe cut carnianucleis avul ^ adijciãta qux ferventi bonao* pancm; deinde jube Mi H pulpain leberedi agitctur, commifceant rqi Je exacle fuferig* H^d *rtj. n e m t Jc inde remotum ab igne betem tanto temporis inteivallo faie Cnunt, donee** murca omnis in fundum subfecim. - tandem oleum squa: fit pernatans cochlean exci- piunt: quocxl ^ aufto, irerum aifusa aqua fervente bene commifcent ut prijs, & post- quam decoxerint. quid quid olc puri fupernatavent vafculorum fum excipiunt. Olei color croceusest, quaieni Ciryoces pulpam ciledixiniu Sj cujus nbinunc ipeeimc * mitto jⁿ vitreovafe, concrevitque ex frigore noftrparria:; alias autc mliquidum efi oleum. N^l vcrcrepiftolaj limites nimis excedere. ni ovcrem quarttionem, qua: inter fenbendum of C^{urrc} t^{ac}* Curnimirum oleum in aqua tuper narct' dicunt ai quicorpora ob gravitatC⁰ fubmergi, & ob levitatem natarc. Q⁶d autem corpora non pondem aut levitatis rst' C- tt < n > i *gt4 ne nacent, vel subfideant, (ed pro eleraentorum, ex quibus conflam, proportionc & ** v minio ^ oclim n terclme H tapetant; parvus fcni pulus in fluminc oftendit, qui ob tcrea ^ & compacta m apidis subftantiam fubiidet: in juo ingenstrabsligneaj obacream fju* ^ porofam (ubftantiam fupernatat. Sed his priteritis ad oleum Caryoes rector, qui- ' r' % i * m ' b' famem non minus tollerc potc (V, quam cilivarum oleum & butyr Bin noftum vaccinum: Ts Zfl' ifTM* quare pranfuri vel coenaturi, (iiscdulij slioc oleum mifcent. Etcum apud nos Mediobur- ,, am virt gj cflent, pifces, carnes, pyra, poma. aliaque cibaria ex hoc oleo in fartagine torrebant, at- i r m t A q' eadomnia obr< j nia iania {iaqtiam clixã adhibebant liocoleum Kifirar, ad quã videlicet cernebant noftras venusta ^ ancillas butyrum addere. Sed butyri noftri c?; Batavia al-

Abanga ali,
Caryoes pa-
H^d *rtj.

^
• Simile etiã ad memilit. vir hancif- fimus Fran- ci' cum Peni- • in fivo V tt < n > i *gt4 fion pura pu- tami no tcllo, qualem nu dum vagua ' r' % i * m ' b' Ts Zfl' ifTM* ,, am virt i r m t A q' cernebant noftras venusta ^ ancillas butyrum addere. Sed butyri noftri c?; Batavia al-

lati fupor & odor magis mihi placet: iplis ^ uf profefld aneillis nigns Gelliadeformioribus * * ut: iolcoillo infR-utta fercu Jaepula. fc] iic hibens relinquam. quoufque olivarum & an') ^ datarum oleum, atque butyrum pra Hans Batavia: &c Zclandiar, ancilla:; roleogctiarim tW b ^ re dccora:; appofuerint.

peihujasapudipfbsetiim vulgarised ad inungendascorporispartesrigidas.atque
* ontr.iaasimprimisqticncrvosdiftenco,ircl.ixaredicimr.ExercLtatosetiani!,&qiiofvisla»
korceffostotocorporeinyngunc: nempequodexercitiji fini dares corporis partes excifi
ancur,& colliquidcunt: quod ipfum liu me acetone hta impedit hujus olei perfhudoriaac
lubrica fnftio. Hoc ipibrum acopum est, & inilgnc lafflicudinis remedium effepracdicant.
Olim hiccorporum inun&io faquenti in uju fnt cam apud prfcosGrarcos , quam apud
Romanos.illorum in dclitijs ^ aawstSc habita cercefbt ndn poftrerta falubrioris Medici*
nieprophyladic^ideft.tanitatiscioifcrvatriciSjpars.utpaffimGalcnifcriptapcrhibeoc.

HujusPalm:r Adymeminitaurordecriptionis Guinea*, Mamcongi, Angohe&vicina*
rumregionurnocciduiOccani, ubi dotes regrii Congo rerert, inquiens,Incampis prove-
fitutKpocrmulr.:c&vari:ePalnn;e,utpote, qua: Nuccs fere Indicas, &quse da&ylosgnignitJ
Crefcioprxccea alia ibidem Palmifpecics, nonmiilrumaduabuspritrn!sfronediverfa,
cxquoaleum,vinum,acetum,frufus3canemcollLgunr.. Per viamcxpreffionis fit oleum;
cfmSuspulpaa,ut!^xolivis fieri fojet,colore&(ubftantiafimi)enoftroutyfo,pr^terquara
quodevirtuoinflavumcoiorem magisdeclinet, VcuncurjpfieoprobutjroacdleOilampa-
dum flammaseo alunt, eodem oleo fua perungunt corpora, tit glabra & agiliareddantur.
Demquecibi viccm gent neceditatistemporejUtinobiseveni^qui fame perijflemus.,nifi
hoc oleum habuifTemus. Hujus Palma: vel fructus nomen non refert: verum ex oratioms
ierie {3cispatet, lianceffePalmam Adyqua;fructum Caryoflbfert,excujuspilpafielftud
croccutn oleum.

Ecjam difptciendum duxi operrrpretium, an hi palmxfructusab Indisallad Veteribus
innocuennt.necne jquod/ummacumcautioneperagendum. Sa:pcnumerbenim rebus
S^ibul<jam (tint inditanomina^uctamendefcriptionibusVecerumnonconvnciuntqrut-
btis nominitibus idcircononnimis fidendumest, ucoptimc&pulchrccmonetvirgraviTi-
^us, doftiflimus, &c fuperhareoccupatiflimusPetrusBelloniusliboproimo(ingularium
&mcmorabiliumObfervacioimm,quasturhiClitliilatTnasfcifti.

TheophraltusdcPalmarumgcncribus, Genera, inquit.Palmanjmplura. Primum
et)l ni, \$z quad difcriminemaxinno, quod aliudfrudliferum,aliudflerjle:&paulo port ad-
&r. * FrmSuum ipfonim differentia;plures, alij namque fine ligno intus, alij cum ligno.-S^ ,,
^ij duro ligno, alij moHi proventunc: colore quoque interfedi(crepanc:alijenim candiji, ,,
^ij nigri,alij flaviradfbmmam non paucioresquamficorumcolpres.aibatfblurcgenera <
ftatuunt. AdhxcdifFerremagnitudine figuraque volunt.'quofdameniminmodumerte ,
In alorum,magnitudincqucrantos,utquatuorantuminrpicamteneantur,a,liosminutips >
c)erummagnitudine.Denique.paucistntcrjed:is,inquit. Genus aliud est in Cypro, quod ,,
^folium amplius habct, &fra(5lummulroampliorcm, difcrimine'que pecuhari dilcre- >
^tir >, niagnnudinemalipunici,figuraoblongom : nontamenfapidumtanquaincxcera;, >
fcdradiciBusfirailcm.utnoP.devorctur, fedruccotantiimexpreflbexpuatur. Hadenus A
T^ophrastus. Quifanelocus.dcfumptuscxHiftoriaPlantarumlib.il.cap. vm. Caryo-
Ce^sfructum utcuq; proponic.quemantcdiximusefieex Palmafruf.r.iferu.& haberedu-
rro^tislignicorticem,cuiinfcditpulpavacumcju(clemcolorispliciicula,magnitudinem
eCl^amilliusefremalicitr!j,cujusiicformaoblonga. Quomododeni quepra-ternucieum
Pulpajexprflarincaturufus, in oleiprTparatione oftendimtis. Itaque apertiflime patet
^^nuliiscumPalm^cujufdamftudtuTheophrastinotis, huncCaryoces fructum con-

" Videtur intrdum Gaza mgligentis interfrcti^ officwfunfui, aut dium Gracum codicemfe*
ϕιου*: meate&imfickabet. tu^rar^iTeSvwtv-'srathet<pop>u^uouQ. olfAvyap tiirImvoi ,oi <Ti
καλακοσυρινοι, και τας χροια coifmM, % x elattra
χρόματα φαση είναι των σικα εγέθη και κατά
τα χυματα. και γαρ σφαιροειδ εις σφιδος ωσαν η θηλικουτους, ως τέτταρας εις
τη σα^υνηται' επ'α δ'ε

Amfogoprtered an Theophrdii loem de Vdma Ady fit intelligendut. Sed&Cdriotas Disfcon-
dit &Gdemntlnldmdeffem6, qttkmpalmultf• fiveAsBylosquiadnos dderuntur, quiquidcm
ir »maturi fieri & adfrufiUrispdrtia^ufi^atftri autem diilmftnguts &fit«uUnti.

Hujus forte meminitDiofcerides, dum Caryotarum , fiveCaryotidarumPalmarum
mentionem facit: inquitcnim lib. t.cap.dePalma. yuth^a.S tu jue/w«VJ^ft<&ioMcj«iS/n-
fiiCffi fpcritariadit
f Earundemcminit&:Galenuslib.ii.dealimntorumfacultatibus,ubiPalmasfructus

*" Sxx, si/^om^, aScarip oi aiyyvTioi% TJ>1 (£/ua^axo *) tfj^of ij>Aw«?c, ci'airfp ai xtpvoTo) 3t«A<-
μοροι :7d est. Non paucauccm in ipfis est differentia: quacdam enimfuntficcan&adfrin-
genteSj ut ^Egypciac: qux di vero molles & humidajSi dulces, ut quae Caryotx appellatur.
Oleum

Oleum prartereahifccCaryocis fiveCaiyotis in fle paulopoit hisverbjs approbat: *if*
Oo/c^A/rapc;a^pox<pt(i>T5f. idclt: ficcus jutcm qui ab iplis HI corpus d ille buitar eral-
jus quidemocpmno clt, habet antem Sc liquonsquiapiarn, iibi palma pim
Caryoca^ Qjain&antedixeratCaryotJScI](;cxiguacadtntionispanicips:q«od
mulcum oli-l corn mean c, &CvzldcHiiniaguincix. £.xhisnoj:-absrelnip;t.uiquispjittf»
tosfrti^usveteribusinnotuiiTe.

VtrdoSiffimus de re herbaria oprime mcrirusP. Andr. MatllioFus in ruisioDiofcori-
demlongedotSifliinis Comroentarijs, nonvuieturobferv-andidifctinicn, quodDiolc.&
Galen, ftarucrunr inter Caryotas& reliquos palinarum frudlus.dum inquir, Venetiaj Pal-
m mafructus nonnullis jalmupe ali juibon ar Oz vubofdam veq dacty lidiquntur ex
Syria& Alexandriav£gyptiadvehuntur,acecia:nex Neapoh .i.UucpriLiscx Numidiaim-
portad.Quodtamcnd icrimencelcbcirimuslo. RuclliusquemaiHcHiLioiiymimTra-
ganiijLeonardum Fuchfium, &: Macthiolum fcnp(ideexiffiaio)annocavreiu pmo (ioli*
broflucBitlenaturaftirpiumeleganterjdotfle.&copioseconferipfic.

Inticwargumcnro.vifdo^ifllrnc.przrerniorciriprolixiorfuj.quddfpeculationumorn*
niumquxiontin Medicina, eapropmodumlicotilidima.quajcircar'acuUatcsvcr/acur
qu*alimctisinfunr.Namaljsprat(idijsnonomnitmporciuiini!r: finealimentoau[Cri]
ncvivrcquidem,ncquefecunda, nctjudadvfavaletudine pciTimus. Vakfcltciterifi
multos annos,&:me, utfacis,ama.. McdioburgiWakchria: pofhidieNonaium Malj
M.o.xcviir.

F i M i s,



m

PLANTAE,
feu SIMPLICIA, ut vocant,
QJAE IN BALDO MONTE,
ET IN VIA
AB VERONA AD BALDVM
REPERIUNTVR;

Cum Iconibus 6c nominibus quamplurimarum
qua; à nullo antè sunt obfervatae : nunc à
IOANNE PONA Pharmacopseo Veronenfi
repertae, defcript^a Sc edit#.



ANTVERPIJE,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Ioannem Moretum.

c1o. 16c1.

CLARISSIMO VIRO
CAROLO CLVSIO
IOANNES PONA S-



RAESTANTISSIMAM Medicinam humnogenim cef-
 farum effem deconstat, quod uti in Ecclesiasticolegtur, o m
 A libris Casigattwttw purgantittm loannis Mesttxi) ipfi propter
 tJM fragiLm, £? c adttc Am n&tur am if urn/nor trumopifitede-
 mentffime futrtt elargita; constant siquidem bomtnum carport
 Lex element IJ carrtptiomsubjeclw mvtcem agentiius, & patien-
 Uibtujx quibus ^htr Attorns ^& affist' tones necejartb bomimbit*
 occurruntj quarum T? A&wmsfactiltaturn, organorum mimfle-
 ri<t fimitariampartiuMt3dttra!cJ eife£im omms varies modii Uduntur; fncipja ratio-
 vnh's <xr?im& Lbeficlatts inflrmntntu (qua.fi dentata doUbra) in openbm (uis) irca
 artes omnes^ icn^as b f d p f n, q l g d g Be / d i j juum unum creatorem
 dcficeresiepe cogitur • antma nawqtte nofira hue camea vesle obvoluta bujit* cor pom m-
 firmmtu (continueetumfluentibtu) utjua perfaat munera. indtgerehadijfrficoti-
 spicitur i vam quo modo tmagn&tione corrnpta, (itwmnt4 memona dtjeurret^ & ratioci-
 nabitur } fttm agnofcet autforem, redemptorem, atque IUI obtempiraltt ? xgrotum vera
 corpus q^o modo bomini artes cotfvementes exerccbtt ? procnldubto autbtcedwjnutf-
 tractabit, aut depraVdteprtffl'tbit: 6 njere infeelix btunana natura^ (.ampropemnurfk-
 tis etumvilitijr tot^Antu'q^morbumifeirimefubiaceas\HistamencaUmitatibiu om-
 tybusarte ipfawedtcanobtt a benediSio Deo benignffime impartita obriamivus > gg*
 * <£ Tfsedswur. H& cetentmpnceptAifp* mduamentapropomt, ac exhibit, qu£ dogma-
 iff rationablite'rque ufurpata, quantum hommt licet, pr<efe>tem tuetur, £? • deperdi-
 tat^fanitatem refittuit -jam verb tj£.mdtcx matenx (kabttibmtUiiprxwrnfl'ts s qtt\$
 exfontspbdofiphuebatt#ntar)cuvtab elementu jodinis, *nimanubut> alijsqtie bujuf-
 V'odtrebitsnataralibmpromAnant^ turnpr<£cipui>a fi'mplicitum, pldntarumqueadmtra-
 t'hVirtutefumufftur, Hitigitttreopmmavideoperamna'va^vmm,turn, utexbcrum
 admirabili nattra,ariiftao, (\$• effefitbits cattjatitem am ft em inteUigmm, admr rar-
 que: tum, ut bxccognofcendo, dtjceniendoqtiepo(f:rn(quodmneri! tftnoftri) ufiUter,
 & non a dulterine, qu£ ab Excel?™Media) in bomttm uuliUiemprifipinntur, ge-
 nuntat' t mltipm aut miferendiqe exponit) ubi ^ e p f i q p (q ue or-
 ^peperci, ut wgetabthumptrcipuA {oca ftudwse invtferern, qu£qx\$ tbi adboiftaentia
 ^matur^ uerjtãpoffeindels gentiapq^ q g. uerit q ur e c / J o erem hter
 * <r igitttr cum tfteru dote if? a mtnime featndtis fit M o N S nofur B A L D V S di-
 e * ,ftddfu(mqum) am altitudmeUtttttdine^mocmtate, ac pukbrittdme tngnis in
 ^fllojfkAm b m / l p i n s i n f l b t j f f a r a ^ u f p c i p f u f p e i a -
 uir Jnu\$£? : itqttt w agro Veronerfi > ab ipf* »rbe Verov* vtgmti mililbm pajjuun, di-
 fi^ s: q p Peter arces^ mæniatit' t f a c f j m u n ^ U o r t ^ e t u H A t e f u n d a t o r u m / e -
 r^IMritjte, amcentfirmcol/tbtuJlmmepulcberrimoA (bestJdC(tBet3Aco(quic(rtk
 *i*i*£it, cum joins Carpionesscgwsptfces & producat £r alar,) fcdibus, / t t p e r b o A m -
 f^heatro, tU9SirpbuTemplu, ttrr£ qnbu qufruhjfm^cutortim ingmioru, feraci-
 ^ k k f q n <£ uadtm naturally m d i t i V i n i * T M ^ A R o m o n t e j m q u o V A T U A C p e r t -
 Z' * » * plants abundeconfrrkutntur >prtfl dntiffim* c'mtastxifit. Humttaqueipfum
 (u^p(rplures Vices una cull/^nbM^xcelkatijJir/Jtsq^atqueadmodamRR.D.Pa.
 tre ^attro^ D. & efarejltTo qtiidcm fiatre, dlterofihoptractujfimi tntegtrrimiquit
 l u r u c o n f u t i D. Fabij de Nkb(foiisJjujuj(efiVtt <itis, gemmjJ)[e!jdoreJortun£ bonis,

cccxxiiiij PRAEFATIO AD CAROLVM CLVSIVM.

& literis primatibus ipse: D. Nuolao Mdrone A^HetToreMojcalta farter Vrhuns-
firx Medtcis darij fimi: D. Hiero > jymo Caldermo cheno Siro doflttf.nw: DAoackiW⁹
Jttngermano Konnbergenfi' fcdtcisrecordj.ttoñt3) 'Pbilojopbo, Medko., & Herbaria f^
cult it u p*rit' \$mo; a quo velutt afcientiflino Duce pluipmim & cogntimis, & Atiij
fimphcmm omnium mibicotnp & rarv'r. D. Pafcale It Coq. Gal/a, D. Ucobo Zittnghtro Ba-
jiltenfi, & D. Georm Rtntzto Vuemfpergenftionrntbtu" Vhdojopbu, & Mtditm*d < > -
£? oribas, atque xn pLnurum noittU rverjauffimiu*. & cum per plures (inquAm) f « "
montempftm Baldtta, peragrajjem, in'vefitg4.ndo; rrttiAfidoqueddtgcnUri, 'allts, VrAti,
SyhMyRitboSjFoyeaSyCavitates^upej, Vrtkejifue^maes prxcpites, atque faxofos-,
nequ < eiter Atofrpe Uboreconqut furamjemporu tnSiu e memorU (jfluermt, aut cojjit-
nejcerent^c demum cu!p < t mortis intererentjxec de maxmo boc Baido breviter Adnetart
nan ab re fore Arbtratta fum: turn praferttm > cummtmrofiorA fimplctAipfequam *fy
bucufque obferVA' PeriwjHmpotijfimum etiAm; cum pLntas Aliquot novijimi tbi ego ad-
hpveaerim, qtt* hABenm metdttj nec cogniu ab aliquo (quod (ciam) unquam futnt-
quAs etiam me parttm & uttlttAtis, & puiebtitudinu herbtrve jupe ~~Et~~ ~~allat~~ ~~at~~
ejfe mibiperfttadeo.

Memor ergo (ingularis bumam'tAtu tux^quam tu mihtAliquAndo ~~diff~~ ~~mis~~ ~~epistolis~~
tuit > fimplieiumaltctfjus difficult atis enodattontm trA & Atittbiu declaraft, inique eorttm
perfeSiiorfcientiA adauxtjit: optime auefaens quAntum tnplantAr'ia faQuilipoliceat;
quandoquidem JcientUttue prxflAntm cuique expradarifjirr-u tuis ajoluTfimi bus satis
pAtetflmbutprtR teftrs wcomparAbitiA ftudtAjeigthas peregrinAtwnefq% (jmc parat
d£CAitfafubijJe: eifdemq; ma} } tfejaj, te mirabdi ord'me, & eloqueti AfvouUri, m-
fingttL defenbendo mentis oculiiquUm juts tconibits referenda eculis cor ports jubijeert.
' Sultbre itaque cognojeesje Medic* materuc tAnttprofmjefjpfamq; tibi inf.mte debtrt,
i rAtiont Ahenum non ejje cenfai ttt b£c tibit um dtcarem. prout ettam infuturum^iq^
occttrrent jme fAElttrum polltceorjtt apicem peffeccionis tarn in cognojeedu, turn in-ujuf-
pAndis (impl-cibui (ft fieri pofi'it) Afpqui mibt lice At 5 boc Auttm eo twentiusfeti, quod ad
idmt (mterc£teros) Pertllufirux, & unde quaque Clafiffimw, Ac omniumftitnwrt***
genere inftgnu XoAnms Vmcentitts Pinellft Sypracipims ac fingUris meus domtiH.^ bono-
rifictfirvitutiftneaergA tefcelix imtium eft cobortatm, Hie Vtr prtflArttffime repe-
ries Iter^Vil/as^LocayStttUyJ^eclus^friemque omnem aenomiaa berbArumque fin-
gttlis in tacit "pert exoritntur. PofibAc < -uero; ac prcpediem (ttfyero) Deo ben-
te^ingularum ipfitu BaldipArtium imagines^ locorum efftgtes depiSias accipies. Quo-
mam Autem nobditas^ cAndor Animi tui, mibi JAmprtaem perfyebus efl, quo l&borts
has meos quAlefcumque amplexAri non dedtgnAberts-, plmtbts boc a tun btmgntdte cCB'
tendere fupervacAneumexifimA'pi. Satis tdr. iht erttfifignum boc cffe me & ptrpetut &
gAte obfirvantt eyprocertobabuert. Interim Deum O. M. ut te quam diuttjime tncolU"
memtue Attr; ro£o. cnrAHtVAleas. Veron& Idibus Augufli, M. J>. X C Y.

DESCRI-

DESCRIP TIO MONTIS BALDI



ENSES Yernaesciimjampraiterijffent. quiproptermohtiumqua-
litates in r>Sfri Baldi regionibus, quain in planitiebus tardius feci ma-
nifestanc, tempusad iternoftrrfmfaciendum oporrunitllmumvifum
est. IraquecirciterldusIulijabVrbedifceflimusOccidentem versus*
&egreffitatemperamplamagroruplanitietn,abfqiicvitus,aliifvc
arboribuscultamprogrcdimur^nquaabuudamerconipicitur:

Eryngiummontanum, MaKhioli: feuvulgare.

Tithymalus Cypartffias Pens: perpe-
ram Etula minor halorurr^Lobellio.
Spina feu Stella Iblftitialis, Pena:
Atra&ylytsmultorum: fecudiimaliquos
Gnycus fylveft. Gaza Fufum fylve-
ftietn vocac.
Onopyxus, Guilandini: Carduus vulga-
tifs. Lobel.
Acanthiuno, Diofc. feu Spina alba fylveft.
Fuchfij.
Ornithogalon, Diofc. feu Bulbus Leu-
camhemus Dodonaei.
Rhamnustertius, Matthioli: feu Palm-
tus, Penac: frequentiffimus.
Pulegiumfioribusverticillaris: pcrpe-
ram Calamimha officinarum.
Carlina fylveft. minorjClufij.
Gallium luieum, frequentiffimuni.
Verbenacavulgaris, &: M^{3uU011}
Polygonū minus, Matthioli: a quibul-
dam Herniaria vocata: ab alijs Herba
Turca: Tragus, pro Empetro piopo-
iit: Cordus, Millegranam vocai, ab
• aliquibus, Hellebonna Diofc. futata,
& Herba Cancri minor cciam nomi-
natur; ab Italis, Centograna.

Verba^a t^b c^u m^l f^r m^k jⁱ cuVerba-
fcutu ramotum candido tiore
Verba^l a^t iⁱ fⁱ
us, Dodonaei, Matthioli.

Blactaria, Plinij Iuceo flore.
Hyofcyamus primus, Matthioli.
Menrattrumvulgare/cuMenwsfylvcIt.

fpecics.

Plancago aquatica, Herbariorum: n^{ca}
nulli verò genuinum Alifma j feu D^{a*}
mafconium Diofc. autumant.
Cabmintha tertia; feuaquatica, Mat*
thioli.

Et pervenimus ad locum, qui vulgo Clivus dicitur, quicftprncipiū planitieicujurdanl
magna, faxofa, & ut plurimū incultax; latitudinis circiter octo millium paffuum, & lōgitu-
dinis quatuor-H<coraninoarqualiseK, aCTcia, u^{Ut...} jw, «.FW» ««^u. 1Maa. J... tu^
dam a nuore perfitleres, & perilled permeares, emimuabfque impcdimctoprofpicis
hmdn3e Villas; & ipfum Baldum; in hac autcm deambulando adnot<ur:

Sideritis pratensis rubra, Dalechapij, SC
Sideritis etiam luwo flore ejufdemcon-
ipicitur.

Eruum fativum, Cordi: Pifum Gratco-
nim, Trago: Matthiolus, pro Clyme-
no pingit.

Camclina fiue Thecophr. Eryfimium, t£

Verbenacaretra Fuchfij; fipemas.
Erythrodanum. Graecorum: Rubiatin-
tonim in Officinis,
Centaurium Coliinū, Gefneri, Ioachi-
molungerraanoi Aphylladies quatta,
Dodonxi.
Dipfacus (arivus, vel Gallcdragon Xc-
nocraris, Anguil!ario: (eu Spina ielc-
nitis Theopn, Guilian<Jtno.
DipfacUs fylveft. major, Fuchfij:
Ranūcutus Hortifis fimplex, feu primus
fuchfij: Ranunc. echinatus fylveft.
tertius, Dodona: i: feu Ranunc. arvo-
rum. Lobcllij.
Heliotropiurh (iipinum Clufij.
Anrhemis, feu Chamacmelum.
Buphtalmum Matthioli.
Sideritis prima Matthioli : Pena \frd>
Marrubiū aquaticū feu palufte facit.
Stachys Dioftor. Bi Scordoris Plinij Xo-
bellio.- à Tra^p Marrubium agrefte
vocatū: ataMatih. ^aP(eudoftachys.
Echium Matthioli, flonbus rubiis.
Item albis floribus.
Echium Lonicerij feu Bugloftum vulga>.
reofficinarum.
Chamszizypha. feu Zizypha fylveft. fre-
quentiffima.
Echium Ftichfij. t : ; ; ,
Gnaphalium vulgatiffimum.
j^eylops Theophf. feu quartum genuj
Roboris, Dalechanipij,
Hyofiris flore cādido, five laceae Panno-
nicspecies, Clufij.
Sideritis prima Fuchfij; perpera Herba
Iudaica Avicenna:, Herbariorum.
Sideritis fecunda Matthioli.
Lafuca fylveft. Matthioli: Endiviaqua-
rundam officinarum, PeD<<.

Diofc. Myagrum Dodonjro: a Mat-
thiolo. Pseudomyagrum diiaai hica-
bundanter colitur.

Convulvulus minorfpicasfolijs, Lobel.
lij: aquibufdara, Scamomum tenue
Plinij, creditur.

Convulvulus fecundus, Clufij; Canta-

bricaPlinij, fecundumaliquos: à Dalechamplio Volvulus terrcctris di&us.
Onofma Macthioli.
Anchufa lutea Dalediampij; frequen-
ti ima.
CentauriumparvumDiofcor. à Dodo-
naeo Panax heprophyllon Plinij voca-
tum; abItatisBiondella: Quibufdam
perperam Lymnefium Cor3i videtur.
Blattariaflorccerulco, dcgantHlima.
CycifusTragi: àLobellioLagopusaUera
pinnato folio di&us.
Ctftus annuus alter Lobdlij.
Hyacinthi fpurij varia genera.
Ampelopramm frequenciffimum.
Lagopyrus Dodonaei; feu Lagopum fpi-
catum.
Puianlla vulgaris; feu Anemonefilveft.
Fuchfi):Ranu nc u lu m decim u Cordus
facie: LuGcanusperperam, Alopecu-
ronvocai.
Betonicapafim-
Cotious, Plinij: Cocconelia Theophr.
Clufio: Coggygia Plinij Camerario:
Chryfophylon Pnfcorum Lobellij:
forteBarbalovis PlinijGefnero.
GlauxGuillandini: iEelgii Anrhylltsle-
gumiiiQia; feu AnthylUs prior Dov
donxt.
rithymalus platiphyllus Pens;: à qui-
b< fdam Characias vocatur.
Holoftium Matthioli.
Mufcipula altera flore mufcofb, Pena:
feu Sefamoydes magnum Salmanti-
cum quorundam, Clufio: etiam Clu-
fius ipfe Lyclinidis lytvct. (pcciem cf-
fe pucac.
Aphyllanthes Anguillarar: à Pena pro
Bellidccxrulea exhibits: ItalisBoto-
nariaj à Monfpellienftbus Globa-
laria.
Armeriusiostertius. Dodonari.

IN hujusdextra parte prope flumen reperitur

Colutza ThecoparaQi; à quibufHam
Cy tifus creditus.
Saxifragiaalba, feu quarts. Matthioli,
Polygbnatum Diofc. feu Fraxinellaha-
lorum: SccaculGeftheropuratur.

IN cjusfluminisoppofitapartejcopiosepullulat:

iUiusObfontorum.&ConanorumjvelSumachifcdtamenfterilifeft.

ET cumjampervenimusad finern Ipacioihujusagri, adla;vam manuoi pagum Buxo-
lectum rcl'inquimus (Ita vocatum excoptotb Buxo V\ fpoie nafcenti, cujus fylva etiam io
prxfencia in tlu minis npa confpiciturjquo in pago in veniuntur plants; divcrfe, vidlicez;

Abrotanu m mas com mune.
Abrotanum inodorum, Pena:.
Abrotanummas, album.
AlylTuin, Matthioli! an potidsTlilafpi
Ipccies? fortaTe Aly(Tuin minimum
Clufij.
Borrys/requeniifs.
Antirrhynum fylvtft. five Phyteu. Dod.
Chamazncrion Gefnrri: à quibulda Del-
phinium Diofc. & Linum fihjuofum.

Lago us, feu eslc oris.

Oinopodium Ldcuna; Peru: idem Pe-
na Acinon facie: Bctonica Pauli quo-
nmdam; teu Qigopodiom ptimum
Matthioli.
Climopodium minus, feu VulgarcfOcjr
mum fyivefti, feu Acifios Dodonaci: vel
Pu g ui p r u s f p i : erpera
Calamincha montana, Tragi.
Trifolmm cochleatunvcu Nedicq fpe-
cies^enac.
Item Medicafpinofbfolliculo.
Sympliitum petrseum Pena: ConfolicJa
- minor a Matthiolg: firunella altera
Dodonxi:
Iccmflonbusalbis.
OenantlisFuchfij: Filipendulamulro-
rum: & ditbitatPena, an Plinij Molon.
Thalidrum nigruru Cordi: Dodona-us
Thaliftrum magnum facie: à quibuC-
dam Rura pratends, & Saxifragia Gal-
lorum.
Ofiris. feu Linaria vulgaris.
Sylibom. feu Leucacantha Loniceri.
Aplyllanthes prima Dalecliampij.
Syrinrchion Theophrastli, Cordot 'feu.
Bulbus efculentus, Lacunae i Bulbits
fylveft. Fuchlij: àLobc!lio, Ornitho-
gaHonluteomvocatijquietianidubt-
tat an iit Vomitorius Bulbus.
Lafluca fylveft. veraDalecliampij.
Laclucafylveft-Fuchfij. & lMatthiolijtcu
Picris anguftifoha Diofc. Pena:.
PeftenVenerisRuellij: autforraflè fuc
inquit) Anguillara, Scandix Vetcrum.
TdrdyMrn, Scfeli creticum Lobellij.
NafurtijfrtecieSjGefneriillaquiaTra-
go i Fuehfio, &: Cordo pro Scriphi°
Germanicopropofitacd: à Pena forte
Thalietrum Diofc. feu Sophia Chy-
rurgorum: à Dodunxo etiam proTfaa-
herropida.

Flammula altera Dodonxi, **feu Cisma-**
ris refla.
Stratiores, feu Achillezcongener Clu-
fij; forteHdyochrifcs Italica, Mao
thioli,

Ladanucn (eetum Plinij Dalechatnpioi
rubroacalLiofioreinvcuitur.
Anitolochia rotuoda genuinaj frequo-
tiflima.
Itc Clcmatitis, PenJrj)erpera aiiquxOf-
ficiuarcredunt effe genuinalongam-
Thlafpi parvum Hieracifolium, &c Lcu-
coion minimum lureum pens: iDi-
jeglumpio pro Lunaria lutea p
ClufijThlafpi clypeatuin vo<t, in
fui*

Obferuat. Pannonicis: a
' qui bu fdim, BiTcntdli; >., -
cpeta, Tragi: Mv iRa ?^{atfi} » ^ Cattaria
tnultorum.
Iberis, feu Lcpidium Diofc.
Tithymalus verrucofus Dalqr Hampij.

Mox defcendimus ad /fthe Gm, in defeniscoo junflis navigij ^ pendentibus cx longo,
- affoj Si mobili fune, ^ ui a Utn fimilem funcm ampleditur, magaisarbotum ttiincism
utraque ripa infix «alligatum, in Paguni tranfvehimur Sctptimum di(3um , quod ab Vrbe
ditlctip Kyn millibus paf Tuum, quod magnam voluptatetii Tpe ^ antmra oculis ^ oblc-
gantiam adfert; pergentibus aut cmperil Jafetnitas repriuntur hxplanra::

Onobrycliis Pannonica prima, Clufi/
feu, i> tegodicer£, Ciccr Afl: ragaloides.
Heliochryfos fylveft. feu Chryfbcome,

Hinc pofftiugifetos altquos camposiogrediturui vafum fiipatitrcincult flagrum,
parua ab co diflimilem , dc quo in initio icineris, ubi adnorantur:

Euphragia, paffim.
Linum perpnfllij Horibus luccis Lobellij.
Item lylveli. Linuin flonbus albis..
Eupatoriutii Grccoru(n; cu Agnnoniai
Erygerum magnum^l, feu Iacob ^ a Scne-
neciimi Lobellij.

Hchiiu Cif Tampelos.
Felix mas, frequentiff.
Iris vulgaris.
Anoius ltea Catnerarij : Natrx Plinij,
Quonmdam : perperam mulci Phar-
macop ^ oru r^o v^{cro} Mehlotu ut U Eur.
Lotus ftiva Matthioli.
Ocymoides M atthioli -, flore albo.

Perce sler Anglorum Penx.
Sapon ana Rec Cunde Avicenn* Vale-
IN quo loco ctiam confpicimu Si

Ciftu m annum flore guttato, no ftum.
Ciftu anau Us Hore gu ttato.

Efulaminor Tragt.:
Polypremnum Ualcchampij .- fcu Poly-
goni fpecies.

Origanum fylvcft- fcu conitnuncinoffi-
ciliis:
Lap pa major Matthioli utraque.

Tragi .vcl Amaranthi luteif pccies.
Verba/cum m. Matthioli.
Cynogiof Tum Vulgarc.

randi, ex Lobellio.

Conyza Helenitis Cordi: feu Baccaris
Monrpcllicnfis Penx- Matthiolus pt»
Conyamajore pingitj Uti ctia Dod.
Hormum lylveftre Fuchfij,
Millcfolmni lmcum, a. n Agraci (pecies?
Polygalla Diofc. Dalcchappio: feu, Ono-
brychis Dodonxi: vel capur Gal Jifla-
com Belgamm Pena:.

Sideritis prima Fuclifij: Tctluit & her-
baludaicaj Herbanorutn-
Sarxifagon Pauli, & Diofc Guiland^l .o,
& c Ofteocollum Abfyithi: eft Sa ^ ifra-
giacoraraums.

Corruda.
Cicet fylveft. alt, ctum Dalcchatnpij.



A S s v R G i T ic Qio furculam ap,
quadrato, hirfuo, vircfcentviciu propc
terraro folia multa Oca: effigic, deinde per
intervalla ad oppoficalatera ahcrnato fitu bi-
na, ad medium ufque. deinde per aliquos or-
dines terna fpedantur, duobus tamen ex his
anguftioribus, equibu 5 fl6rcsmuki, colore &
forma Hclianth ^ mi. Sed hoc aniplius in fin-
golifolijs giuculam Unguiacam (btui, ad
inflar Pyropi, auro fummartex excepti , tura
futnmitati , tutn Fcdiculolongio (culo & ca-
piilancalibus affixi ha *rcnt; horum tamen
aliqui fine folijs unicum florem in (uprema
parte obtinent cspl. intam fimunt. qux radi-
ceunica, cxili, lignofa ^ acaparum fibmaali-
tur. Flotetinitiorulij ; fapor, & femina ut in
alijs Chamaeciftis jprovenit in piano Agroal-
tero jfdrcquennonn opi Jo Ciani.

ET li Kcinveniuntur Pontonum ufque i Ert
autcm Pomonum rui am dntmi mt }uo jam
di < 3:orum Nichcfolarura funt per ampla pr ^
dia, K egregiac idcs, ap: ? 3dcxcipicndos pto-
prcr varia illarum exculta omamenta, vacij
g p is fopenc < aikm Siabrolutsc < md i-
tates quofvis Illuftri/s, Viros, uti fapillime
contigit: adjunfta imibilibd
P l . h . y . d p ^ T e r
ordmes Ircquem ifijmar u C upreffuum , & i n-
fci EOnim

c'ccxxvñj

D - E' S G B' r \$ T U I O

fertoturjifelediffinooram.diligentercolunruriftxnobi'lesplanw: (inter quas digniores & magis p... a Pral T... i m o Viro Ioaane V... P m e l l o u... antmiffz huc: luac.)
 Acanthus aculcatus Lobcllij: feu Mon-
 fpeHicnfur,! Chamarleontha.
 Caucafort,fcu MolyIndicu/n.
 AlthxaflorelurebjautThcoph.Ibtfcum
 Lobellij:feu Abrkilon Avicennar.
 SantculamontanaCluiij.
 Aconitum Iycoilomn Mntthtolu
 Aconitum batrachoidcs Penie.
 NapcIIus Matthtoli.
 Naptllus Pcnā,
 NapcIIus racemofus.
 NapcIIus Moyii Avicennx,Matthiolo.
 LeucoioacrenufiipulcherritiHi:i],for-
 tē Leucoionccerulcura Diofc.
 Tamaiindus vcl Dcrelfidc /Egyptio-
 rum,Exc"* Profpero Alpino.
 AcatiaJEgyptiagenuinaAntiquotum.
 Stctchas altera Pence.
 Paliurus Athenfi, feu Nabca jEgyptio-
 rum.Alpno.
 Aquilinaquacuor diverforum colorutn
 pleno flore, five degencr, hoc eft, ex-
 pers corn iculo rum in flexor urn,
 Ia'm,qtjacuordiverforurncolorum,plc-
 no flore rofco,fi ve degencr.
 Hyppomarattum.
 Dicramrtum crcticum.
 Erycaia crerica.
 Hedyfarumakcruni clypeatum LobeJ.
 Thlafpi clypeatum Penz,
 Itisbutboucolty-elutcopallefcett. (cior.1
 Iris bulbofa verficolor anguftifbl.faiuta- I
 Iris bulbofa verficolor latifol. faturacior. j
 Iris bulbofa violacco flore. I Clu.
 Irisbulbofaflo rerubro. S fij.
 Iris bulboia flore rubro elcgantior. j
 Pfcudonarciffijs pleno flore. |
 PfcudonarciffigsHifpariicusrhmor. j
 MirrillusGernianica:' • • • •
 Afterpratcnfis,fcu V.Clufij.
 ScabiofaHifpanicaClufij: a FabioCo-
 lumnajPhyteuma Diofc. credita.
 L,irio-a(priodelus albo flore.
 Anonymos Buxifolia.
 ScfcliMaflilienfeDiorc.
 Panax Heracleum Herbarioruro.
 Panax Afclepium Diofc. Guilandino.
 Aloē utraque.
 Trachelium majus,noftrum.
 Tragium crencum Bclionjr feu Andro-
 femutn fruticosum Camerartj : vcl
 Ruta hypericoirfes Dodonzi.
 Ifopyrum Matthioli: fen potius ad Me-
 lanthijtylvert.fpeeiejreferenda. • •
 Eruca peregrma Clurlj: feu Leucofon
 -? marinumParavinum- "••••
 Im patietis Dodon'aii;
 Trtfoliurii Aphaltires.
 Viola matronalis.velDamafcnaRcc.J
 Fachflo pro Leucoio albo p'ctia qui-
 bufitru HesperisPiinij credita.
 Centaurium majusgenmnum Diofc-
 Smysntam Lacuax. ',>--' •

Hemerocalles Giilcedonici. 17 ••••
 Digitalislutea,flore amplo, "10:11J
 Item purpurJ.
 CytifusM^ranth*.
 Biyoniaereuci.
 PeuceJanym magnum Itaiicu Lobellij>
 Htraciumintutiaceum flore carne.
 Verbaicumquanum Matthioli.
 Draba Dodonxi; feu Dryophonō Pjinijt
 cjuldetn: nonnulli vcr6,Thlafpi Can-
 \Ux umbetlacum vocanr.
 Myrrhisparvaaltcra Lobellij.
 Super ba Aufhiaca Cluiij.
 Cacalia Pcnā*.
 Lf ontopetalon.c Crcta.
 Tanacerum acutum album Tragi: ftu
 PtarmicafoIioTaraconii.Pcnā:: vei
 Pyrethrum fylveft-quorundaou
 Ocymoidcs arborcum, feu fhiti<>fiurff
 Camerarij.
 Cardiac* Melica Pen* \ Teu Molu<<
 afpera.
 Tanacetum non odorum VeTx, feu per-
 peram Siderjris Iialonmi LobeUio.
 Cliamarrhododendros.ilpina^c-na'.
 Corona imperialis^mplici ferieflozum-
 Lilium Sufianum Cluiij : quidatn Li-
 Jium Perdcum vocant.
 Potenon Diofc. Pcnz: a quibusdā Pim-
 pinctia fpinofa.
 PthoraValdcnfium.
 Lychnis ClialcedonicarScarlarca vulgō.
 Thapfia Macthioli.
 FeruiaGalbamfca Lobellij.
 Ranunc. poiyanthos aureo tiore.
 DaturaTurcarumGarziar: Solaniima-
 nicumColumnafacir.
 Mufchari Turcarum: Matthioluscxhi*
 bet pro Rulbo Vomiiorio.
 Eryfiraies,Plinij.
 Ocymoidcs repens polygonifolio, Penf>
 Hel lantha: flore candido.
 Acorumgenutnum Antiquorum: pcf-
 pera tn Calamus aromaticus tnukoru*
 Rhodia radix.
 Siliqua.
 Iafmynum Cathalonicum.
 SyringacrrruleaLufitanicaPenx: Lilac
 Turcatum, Matthiolo.
 ArundoIndica, vcl Cannacorus quo-
 rundam: .ICamcrario Gladiolus Ind*-
 cusvocatur.
 Cumynum fylveftre primum , Dio/c- ,
 Calcitrapacandida,&rubra,flore dupl*
 Cnicus alter Clutfj,
 Cnicusfylveltris primus mukorū: Aw*;
 clylis vera Dalecliampij.
 Cliaiophyllatamontana major.
 Item Alpina minima nofra.
 Iacobara n.
 Item, ni.PannonicaClufij.
 Caltlu (cu Calendula, pleno amplofi*"
 re: ClymnumDw^c.FabioGolūn*'
 Soldanella

Scorzi>nera Hifpanica.
Ircm.V.PannoriKaClufj.
O.nicho^t'onipic3turo.
Dentana: minoris Marthioli, *tes* ex Fo-
horum numero vanccaces.^
Item:
Stoebc Capitata Ro(in inni folionoftra;
cujus Icon is ddcripuo teqweur.

Sterbe Capirata Rosmarini folio.



^k*fi noftrum, vel cfulcatus Cyperus:
Pulcichinū. iGuillandinovocauum:
^DodonatoproCypero daldi propo-
fitum: Fabiu«Columna Neapolita-
ns, Malinatluilam Theoph. cffe au-
'UmatjUti ctiam Anthalium Piinij,fa-
cit. Hie planta propriē Veronensis
c^u null. bienimintouEuropajpras-
terq^o aptud nos fponc n afciturPro-
venie ver6 copiofilTime propc Vrbem
»d meridiem ,inquaicidemparcefiir-
Euic hx,quē hie defcripex fuai:

Rv RS v M rrajeimusflumenhieprxfertim mpidiffimum, & aliqua in partevorrico-
m vel flexuofum, antediftisanne xisanfraftis ,&: (ic incediido relinquimus dexcorfum
At hffim, & Arcem illam rationeloci inexpugmbilem .fitam in faucibus montium.nobis
PpcUatam *hebiufa*; nam cum olim montis (ohdatctntegri tutiflimolapido(oq.pane:c
Atheftclaudererur.arque 3li6,nonautem Veronam pctflueret.mons hominum arre, ma-
n^u]ueapertusruit,partc[llaqua:#lvorc6laopponiturintegrar.eli£la, quam ira violcncr
ip^u* aqux labentcs'fcnuuit, & ab obijce montisrqctta: tanto impctu relabunmr, uc rates,
^uibus merccs utriufq^{ue} Germania: advehuntur Venctias, Veronam, & alias in civitates,
^nandoque omninoibifubmergantur, Temper tamenpars anrenor in alcum per ipfum
m^ontem afcendat, pofterior autem aquis immergatur j quo fitutmcaparcc rriorantes
^u^onaliorumnfu, nec finefuoperculoadgenuaufque madefcant: convcrfum mrim
^umenaddeKttram ablatur, acdnuorcco jiverfiinj, cortuofe anguloscquicpfum per-
vium, acarco faitam os ingreJitur,ac Gncimpedimcto perbbitur. Per hanc Arcem per-
pciuo

EX albicanteradice lignofa. & aliquan-
tulutn fibrofa, varij cfferuntur caulej
terctcs, modo coronaria: Lybanothidis,
triumcircircubitorum, quadamcanicie
afperii.profcrr folia uci ipfa Lybanothisjed
lonzioramuko, Sfacuminatamagis, qux
pauTulumfliccidafad.i, ita fcfecoarflant,
KCoimno appareant Pinafhi folia;quxque
fupniefubvirefcuntjinfercalbicanCjCUin
quadam lanugine/niScanliculi: in ramu-
luruna fifligijs edircapitula qucadniodutn
StaebcSalminticaprimaClulij, quafima-
gnitudinis Cciuaurij majoris, cui eriam
rios(irnillimusent,niJqu6dmagispurpura-
fcic: *femen* retinecCuici, fed mgticani;
pereiiniseftpl.uit.i.H.mc fubnomine Cha-
niipicrisnuhi milit D.AntoniusBerthio-
lusDucisManiux Pharnacopacus perinfl
rinms,obfervacoaiuc infignis, ut ipi de hac
fencentiatn meam diccretn: ego vcr6 rario-
ncinullafcuripta ita vocarideberet infcl-
ligens, iniodium viderem Rofiiiarinum in
folijsxmulari,ac Stoebis formam obcinere,
acqueremperamenti/in, (cam adfringens
& exficjns guftu *fentiitur*.) non cUcprx-
rerratiouemarbitracus Turn, nomineMOC-
biiCapitawRofinarinifoliocaminfigniri.
donee venusaliquod inventum fit, cui me
fubferibere non reculabo.

Cliclyloniim fyl veft Cordi: feu Caltha
paluftris, Gc(hcri:MatthioliJfproFar-
fugiopingit.

Phalangium Cret^Saloncnsis *Pcnx-fca*,
Pfcucteafphodelus ,* vcl Aphoddus
minor Dodonxi.&: Aphodclus in.
Clufij.

Lotus cetragonolobus Camcrarij. Vbi
criacn abundinterconTpicicur,

OlcafterGermsnicus, Cordi: feu fut
muki cxiftimaic) Rhamnus primus
Diofcondis,

petuo praefidio Serpnifs-Senatus Veneti cufloditam , & per ca-llem hunc mntjbo's^Ju*-
rentem partimfrce, partimoatura extruatum, itcrfit in ipfamGerimnuin Vmviajfta*
invenitur;

P^hyllon j^{tr} & n^{iffimum}.

jEgylops Penae: & pnma Matthioli,
Alceavulgaris,

Alcea Veneta Tragi: Alcea pcregrina
iblifequa Penar ; /ccundum ahquos
Veiiicaria Cordi: ! Matt hiolo pro Hy-
pecoo exhibit.

Bryonia.

PhyteumaDalechampijfrequentifs-
Ch'amsdrys/requenciis.

Ferfoliatarubra.quorundamj'Gefnero:
Tamecnemum Cordi; VaccanaDo-
donxt.

Dofycnium Rondeletij,Pena:.

Tribjulusylveft-DaJechampij.

Terebinth us .frequentiffimus.

Mahaleb Gefneri,&: Matthioli.

Leucoionfylvcfl. PannonicumOufij-
Lycium IralicumjMatthioliian infedo-
riaSpina alccra Clufij?

LoJm Fuchfij: GitwgoTragi :NigeI-
Jaftrum DoJona-i: a qmbu(da Vleu-
domelanthium,&Lyclinoidesfcgetu.
Clematis altera Matthioli.

Campanula arvenfisminima,Dodona;i;
quam ip(e olim pro vca Onotricliide
ex hi be bat.

GWiolusvulgaris.

Gakga,feu Ruta Cupraria: a. Clariflmo
Philofopho ac ctkberrinio Medico,
Hicronym9 Fraciflorio Onotrichis
diiSla: aquibL[tiamitalis,Lavanere.

Trio,feu Eryfimura.

LytopfisLonicni/ylveft.Bugloincon-
gencr.

VvularaTragi; Cervicaria, &Trarhe-
lionuiultorum: aquibufdamArclun'
geijca.

RhcfedaiPlinij fccunduma!iquos:dubi-
tatanGantabricaPJinij Pcna: abla-
lis.Erucaperegrina vocata.

DentellariaGc(ncri;Dodona:ils,Eryge-
rumquartumfacir.Pena.proniimma
Conyza exhibit: Matthiolus pro mi-
nore Conyzapingic's -& Phyllmtn,i

VeronicafceminaFuchfij, 5r Matthioli:
.. Pcna veto pro vca ElaEineDiokond.
pingit-

Lamium Plinij; (euiners,acmortua Vr-
tica..

LamiumPcnar: perperam aMatrhioIp
proGaiei>pli Hcrbanorum pi&a., uc
Lacuna affimar.

PerfoliataDodona;i.

POSTE A ver6ingredimutPa»«mCapr1f)trri, nobilem, multum feracem, pluribus
fotuibuscaccatcm,¬>ilibusiiabitatioaibusexornatum HicobkrVaimir:

ArptenumDtofc.CetQchArabutn.

Poiyncchiira.urrumque.

PhyllftisDiofcondis.

Hydropiçi Diolcor.fcu Perficariinon

Drypis Dalecdampij.

Drypis Loniceri.

Fraxinus.

Populus L^bica, Nigra, \$c Leuca.

Rubus. .%

Prunum ^-lvcftrc ex quo fit Acatia vul-
garis.

Liguftmm vulgare.: anonnullis Cyprus
vocar.ur:fivcPhiilyrcaa Dodona;o.

PhalangiumramDfum Lobellij.

Fulanum iiortrum: Hvonymus Theoph.
Lobellio: Tragus pro Carpine Tnct>-
phr. proponit: Cordus vcid Anony-
monvocJt.

Lotus arbor Diofc. a noftn'saureni Per-
laro vocaiur.

Fru mentone nollrum jfea Theophrasti
Eryfimium Pcnar vel Ocymum Vcte-
rum Tragi: aquibuIdaLampfaHavo-
catum,hiccopio(iftlimecolitar.

Melampyrum Theoplir.Coido, Trago,
& Dodon^Ojfcu VaccinumTriticuiiii
h. Clufio Panetatia (yiveft. P.intiomci
tertia: Alopecuros Plinij Lobellio: ^
ScclephurovPlinij, quibuldam.

Telcphmm Diofe AnguiHano, & Guil-
latidino -. Scorpioicds Macdijoli: K u,
Tclephium Crateuac,Lobch'io.

Braf da ian je nis Culi ij & Pifoliara
fitiqnofaAnglorurii.

Caryophyllta vulgaris, an (urinquit
PenaG emp (pu) aqu: uida Chry-
fogonump>olc.

Rapunculus fylvcft, cocruleo flore; feu
fylvc(T rad: d onRus apumf yl-
vcfl«-racit.

Ocymaftrum Fucli(Ij:Ocvmntn fyiveft.
(eu Acinos Dodonari: a jPena.proCly-
noporio vulgari odore Pulegij exhi^
tum : Tragus Calamintham monta-
nam fac:t,(ed male, nam Cal.imi>th*
monuna veraabHta dtveriffitnaclt.
ut infra aHnorabimus.

jLappaagrcftisTragi: aPena, Caucalis
albo flore vocata: After Diofc. Pen*'
alterMattnolo: Bubonium Galeni,
Dodonxo.

After primus Matthioli; feu Amellus
Virgihj.

Calcitrapa Cordi:

Chamamelum Eranthemum, Fuchfij:

Contolida regalis, quou undam

RucaCaninaRcc. aptertia Scrophula
na Dodonzi?

Galium floribus albis.

micifolia : perperam Craxogpium

Cortli.aliciu' vocanr,.

Hyriopiper RuLlhjtj. (pu, Hepaonum

Cannabinum vulgo, perperam He-

patorium

*a trfium Avicennse creditum.
 ydropsiper alrxrum Heibariorum, Da
 lechampio: à quibusdam Chryfan-
 themum.
 Androtemum Matthioli, Pena:, &c Lo-
 belhj.
 Afcyrum Matrhiolh&multOHjtn.
 Lyftmachiaakera Matiholi: feu (lit Pe-
 na in quuj Lyimachiapurpurea, an
 veroPliniana?
 NummulariaReccntiorum: an (ut in-
 quit iple pena) Ereftedanū Theoph.
 a Gefalpino BorifTadi&a.
 Artemifiimajor,feu vulgaris.
 Centauroides vel Lymndium Cordi:
 forte (utinquit Anguillara) Papaver
 fputneu: Grariola,&: Giaciadeivulgō.
 Anagallisutraque.terreftriSjacaquatica.
 S y m p ^{purpuris.}
 Solanum Halicacabum Diofc.
 Hedcraterreftns Maithioli.
 Hermodaflylus, five Colchicum no ve-
 nenarum OtHcinarum: quorutidam
 NarciffusVirgihj-
 Stiphitum medium,& minus.
 phygloflbm, Fuchij •, (eu Enophyl-
 Jona Cordo lingua Vulneraria: Ligu-
 'acaniPlinijGefaerusautumaciaqui-
 burdamCeratiaPlinij.Lucioiaetiam,
 »c Argentina nuncupara-
 G ntitella in foffa vjlgari (Tim3:an (ut
 Pcnainquic)LuteaPlinij? a Tragoper-
 ^ pcrum pro Ferula propoda.
 • °tntilla minor, tea Argetnone quo-
 r ^{ur}
 Vitisfylveft.Matthioli:an (ut idem Pe-
 n» itiquit) MelottonTheoplvcu Cy-
 c'afninus alcera à Dodona:o: Siliqua-
 feum Plinij Giiillandino : à quibusda
 r CircajSi Dulcifamaravocatur.
 ^^{ur}VfaneKemurn DamocratisFuchfidr'
 p Ranunculus verticillatusApulleij.
 ^^{ur}rlcariapuftlla Lobellij.
 ^^{ur}fiutn Matchioli.
 ^^{ur}titauriumluteuvcICitrium.Merues.
 VrticaHeracleaTragi s falso Scorodo-
 niaCordia quibusdam credica, nam
 Scorodotiaabipro Cordo exhibitaa-
 ija platua non eft quam Sal via fylveft-
 Tragi.&Splice[us Dodonasi.
 D ^{ur}rypteris fce uentiffima.
 Calluta Plinij: Linodcfmum Gefneri:
 i ^{ur}ve1 Cufcuta vulgd: quidam, Oroban-
 -^{ur}henvocant.
 Ujt ^{ur}yacantha Fuclifij: perperam Berbe-
 -^{ur}rs multorum.
 "xyacantha Piofc.&Matthiolijefl Ber-
 berisgenuina Arabum: a TragoCy-
 nosbatos: ACordo, Sorbusaculeaca:
 •, Spma Appendix Plinij,aGcfnero.
 il ^{ur}qua fylveftris Cluffii: an {ut Pcn in-
 q«it)CrcisThcophrafti?e(tillacom-
 ^^{ur}ntitjaAcacuptima, a Matthiolo
 picta.

Condrilla major, Dodonie, & Lonicerij
 feu Ap.ite DalechampYj.
 Periclymenum Diofcoridis.
 Periclymenum redum altcrum Cluffij.
 Penclyinenum non perfohjtum alte-
 rum,Lobellij.
 Xanthiumjeu Sirumarla.
 Caucalis Matthioli.
 Tuflilago feu Becliion,vel Farfara.
 EqutfettvariKfpecies.
 Phu parvum/eu paluftrc.
 Acer MonfpesTulanum.
 Erica major flonbus purpurafecntibuj,
 Lobellij: feu Erica altera Cluffij.
 Gracien hyrfucum, forte G ramen Leu-
 canthemum Dalechampij: à quibus-
 dam Combrctum Plinij diftum.
 Circa Lutetiana.
 Orvala tetria Dodonfi; feu Colus Iovis,
 velGalcopfis lutca, feu Hormmum
 fylvefi.quorundam,
 CoiutcaScorpioid.es.
 Cycifus Hifpanicus alter,Cluffij.
 Itemquarcus.ejufdem.
 Cytifusalrer.Pcna;.
 Cytifus albus fylveft. Cotdi: an Cytifus,
 Gcfneri?
 Valerianarubra Dodonari; & Ocyma-
 flrum Valerianthon:an (utinquit Lo-
 bcilius)C5durdum,PlinLj:fotte Nar-
 ciffus Virgilij & C Columcllx: Scrutian
 ab Excll^{mo} Aldroando : &a quibusda
 Ben rubrum creditum.
 AnaTheopbrafti, Daleclnmpio.
 PhyteumaMatthioli: à Pens Campa-
 nula perficifolia, vel qua: Iafone à
 Thcophr.credita.
 Viburnū Matthioli, feu Lantana vulgd.
 Daplinoïdes, feuLaureola.
 Digitalis Luteaparva.
 laceamoncana Narbonenfis.Lobetlio.
 Anemone tenuifolia Cordi: Eranthe-
 mum Gelneri,& Dodonai: Matthio-
 lus,Adonis florem nuncupat: LobeU
 lius(p^{og}, ideft, PhfoxTheopLuafiti,
 autumac.
 Orobus Venetus primus, Sial[er,Cluffij;
 feu purpurco,& albo flore.
 Galeopfis Diofcoridis.cujus radices quia
 albo Helleboro pcrfimtles funt.hafle-
 nus pro ipfo Hclkboro in Officinis
 perperam exhibirsfunthujus effigies
 a tiullo cercids relata eft, quam ab Ex-
 cellentiiTmoCamcrario, in Epitome
 Matthioli.
 Geniftella aculeaca; fort£ Vlex Plinij,
 Pcn:.
 PncumonantheCordi.'Gentianarmino-
 fis(pccies,Penx: àDodonxo, Viola
 Calathianadt^a.
 •Geranium Bathrachioides Dodonzi;
 vel Gratiadci Getmanorum,Lobel.
 Geranium Hemathodes; feu Gruciale
 fupinum Lobellij.
 Ch ^{ur}arzd ^{ur} us 111.Pann.Cluffij.

Hyfibpus Om Vinarii, velpotitis Tlytnbur (pecics. p.
Anonymosi in folio Clufij.
Clematis ccrta Matthioli: feu VitsfyU
vcl LDatechampij.
Ocymoides repei) Spolygonif blio, Penx.
Iuniperus minor, feu vulgaris.
Taxus: Milos Theoph. Pena, feu σμίλος,
vel j-«Aag, Dio(c. & Galeni.
Leucacantha Monfpellienfium, Dale-
champ io. quibufdam
Afarum, perpcram Baccara mu Uorwn.
Poiygah Matthioli, non Diofc. Aftra-
galoidem, Lobellius tacit: an potius
ad Lon fpecics referenda cii?
Lotus fyIveit Angui] Jara:, & Ma«hioli:
feu TrifoItum Aphalclia: um, Fuchfij;
vcl odoratum TnfoJium, feu fativa
Lotus Dodonari: an Mel frugmn
Theophr. ut Pena inquit?
Calamintha montana; &: alcera Cala-
mint. ha. Matthioli.
Lampfana Dodona: i.
Clymenum Plinij quorundarn: Dodo-
nasus, Andro/a; mum facit: vel alte-
rum Androfa; mum Fuchfij.

L o c v s Corona;, eft in anguftijs duorum montium jquiconflau ex folido faxo, fen»
milliaris altitudinis, adamufiirnp perpendiculari rercctt, acafcpc^lu hornbiles, fupranic-
\dinm (inifhi quorum exporrca ell magna faxofa portio, hortulum pcfiieni rpratfenianS)
"iriacceiribilis, nifi perfunem abakrtudine fuperioridemitarris: aut via hominum induftri^
parara, afpra, & difficili circa latus dexteri montis dcfccndendo, cx hoc ad finiftrum *tt&fa*
casper lignum pontem, valida Tdias fecminaz arbore bifurcata fultum, qu3: Tilia ad c5
magnajyvinum profcctd) ex vivo faxo exoritur, ac alimento a fimplici lapide fuggefton"
tritum, augeti] ^c genni! iar, p3ndens ita nobiles illos duos ramos, ut ponti viiidc tegumen-
tum paret; hinc perardam fennraen in montis latere gtadacim e jcfam, & unica: pafol MC
defervientem fcandu rad naturale podium jiiibi perpulchrum, neque parvum Templu™
DeiparXj (emper Virgini g!oriofa: ercftum eft, cun&is non folum vicitiis pagis, fed etiam
remononbus oppidis, & vrbibus venerandum, ad quod prafertim decimooclavo Kal-
Sc fexto Idus Septembris turbac hominum copiofiffima; confluunt; quod ab Hercffi"
ra quodam venerabiliter cuftoditur, quare ab aliquo etiam probo viro fblitudinis co-
pidohujefcmodi 3p:a contemplationi loca intti Qtn (umpffiletrcdibileert: hie Omnipo*
tenti Deo mentis clcvatione aguntur grati^ atque divina; dementia; beatsque Virgini lo-
corum indagatores femetipfbs commendant, fubindc benecukus hortulits rcligiofih⁰*
minis invificur: J3m verocum fuperius denuorcditum eft, in initio defenfus confilendo,
dcorum profpicientibus (efeor Fcrtad modum amoena Vallecub Brentini, a^ns vitiferi, ^
optime cultis in fignita, quirapido, flexuofii Timocjuc Athefi fmma cum voluptate fcca*
corficiuncut; in hoc admirabili Corona; (itu **III**E plants virfewnt:

Corydalis Galeni Artguillario: feu Fu-
maria tertia Matthioli: Splitb, vel
montana Corydalis quibufdan va Hfur.
Lobellius inquit) Phragmires Actij.
Scorzoneran folia. feu Hifpanica jerij
mistantum faxorum erutupens.
Crocodiiium Fuchfij: a Gefiier Q, Echi-
nopus vocatum: a Cordo, Catduuj
Sphirocephalus: a Trago, pro vero
Chamsleone pittum: Pcnaver6, Ri-
trofcu Rutro Theophr. autuman Do-
donxus, pro Spinaperegrinnpmxir:
Spina alba. quorundam: feu Spharro-
cephal' nsannuus, Camcrarij,
Fabana, feu Fabainverfa, vcl Cr, iflula: a
Trago, pro Scrophularia exhibitn, ut
in cuic Pena, quam Telephium Gri-

Chrcphyllum, vel Chzrophyllon &
lumdl; r, Dodonxo: a Manardo, Mir-
rhys credita: Oreofelinum Anguil-
lara: & Cerefolium, & Gingidiuin,
multorum.
Marrubium a^refie. Tragi: feu Stachys
Diofc. (uc Penainquit) & Scordotis,
Plinij.
Herba lacra quorundam Dalechampio:
feu Melliflbphyllon Tragi. & Cordiri
perperam Melliflbphylloti
Fuchfij putata; nam (ut in ilii viderur)
Melliflbph. Fuchfij, eft ipfam onran*
Ca!amintha, Pen^.
Sphoiidilimu K. ee. feu Acanthus Ger-
manica.
Cicura.
Serpium. utrumque.
Pohutnaltcrum Macdioli: a quibu(^
dam Iva tnofcata.
Anonymos flore Colutex, Clufij, five
prior.
Caftaneajatque Carpinifte quemift.

ET ha* plants, ufquedumafcenden-
dopervenimns ad coronam.

corum ipfe purat.
Saxifra^iamagnaltalotum jfrequentils-
ex fcif Turis pullulac.
Polmonia petra: a Gcfheri, loachi B¹*:
: lungcrmanno.
Fiftularia pccara, feu **Alecto rolophos**
tertialpina Clufij.
HyfTopus monrann.
pjrictanafylvefr. prinia i P. **ihnonic***
Item lylveft. altera. J Clufij. **!"***
Saxi & 3gia Bavarica **!" lun^1***
Saxifragia hircinaclegatiffimar manf*
Epimcdium PcnXj & i Dodonarii Lunar¹*
• media (ccundum aliquos. ;
Enphragia alrera, Lobcl, & Dodona: i-
Cannabis fylvcft. pnma Lobcl.
Conyzam uior^ media j Matthioli

Compenij La'El*ophyllos, Jungcrmani.
Sedum magnum pallido flore.
alantium ramofum jam di&tim.
lutca Scorpioides. frequenciflima.
aleopiis aquatica, verticillatis floribus.

Tanacerum non odorura Peaa*; fro-
quenrifimum. i
Androfemum Matrhioli: frequenti/s.S:
Trachelium petrziirn majus noftrum.
eciam hie pullulac, cujus Icon hic pro-
ponitur.

Trachelium majus petratum.



A Radicelignofa. & rugofij Colorcpal-
lido purpurafectue exeunt cauliculi
multi frtati/ubhifuti, cubitales, Secum
rubore virides; qui inordinate emitruc fo-
luoblona, crenaca, nigncanda/ua pari-
terlnrfucicommunira, pine pronapor. it
fi rau m, u bi eciam albicanc, & Salviac folia
rcfrut, magis ramenangufta, & mucrona-
ta; incerqua: parvulaquxdam folioiapro-
deunc: in (ummocaule (un: rloresmiiti
accervacim congefci, qucadmodum in um-
bellata Cervicaria Penar. & inferiuscx
codem g!obuliquidara, at minori numero, 5C
infenus magis inccrcaulem, & folia, a!ij, &
adhuc pauciores; formamrepra: fentarillo-
rum jam di&æ Cervicanaj/L-d minarcs. al-
bi, & in quinque, & quandoque feptena
mucronacasciffurasdiviii; ç quorum ctn-
tromultacxcunrtaminafiiblueca, quo-
rum ununtn modo Probocfidis egreditur,
verfufcacumen (atis craffum, quoddutn
nucnatijr, bifiircarum *Staduncazuni* eva-
di: . decedente Augufto florensconfpicU
tur, acqueraiispcrpluresdiescon(crva: ur,
unde hadcous femerainimc obfervart
pocuit; iaterriaciastllo tuma^errimorura
upidum Buldi/olum circa Corona; Tera-
plum pullulat. Trachelium hoc non acre,
aonamm, fed canriim adflringens cftc
fenfu dignofcitur, multoque magis ipfa
Cervicaria.

/* v Ic contiguali quomus funt quorundam hominum urbanorum qui Cruciat
at>tUr, in quibus hofpitia aonincomra ad prolocorum rarianchaberipofluit: Hinc
Cccdit nusad Vallcm frigidam, feprimocranifimus perquadam praca, vulgd Prata Baza-
Wa. dc inde ad Bj/ianafn, *Ulm*, quat funt Valkula: Meridiem fpci2antes, admo-
T^s terbo & in quibus grege pcedum. & a mtorum pascuncur, co par fertim temp
j^{nt} ciim in montes tendunt atque etiam, ciim incunt frigore ab alcioribus descen-
i & r>oc nequid l frigidis subianiucatione animaliapatiantur: Qux Valtcs multus
Udicibus, Accrum: Ariarum Theoph. Viburnorm, Corylorum, Fagoru, & pullulantiuin
j Hcircumna^rjj^j^ inter quas' frequenciflima germinat.
OnUnaCa!amintha vca Antiquorura. a Pena. S: Lobelliodc bra Wjlive Melliflbpfeyt."
^vermn Fuchij.

Hic etiam virefcunt plantae hae.*

Biforta major vulgacitima: a Gefnro
Limonium: a quibusdam, Bricannica,
exiftimant
Carl^{ij} *i* alpina Gemeri: Planra^o alpina
ab³ⁱ JS- an Celcica nardus altera Pc-
na? & Rondellcij? forc Chry famhe-
r, Utⁿ Dodonxi: Si Dorontcum qtr-
rUn> Cluaj.
amleon albus Dioscor H-ixine Pl-
nijlg Uillarij, Sylibu^ G, filcri, K
Carl^{ij} vulgo.
Margaritis, «a pjrparci Litij, Vitix
fpecies.

Hyacinthus Germanicus liliflorus, &
Hyacinthuabifolius Thcoph. Pense.
Aphodelusa Lbus major, frequencils.
Verbafeum Tragi: *Cyanus major* Lo-
belUj.
Cyanus fupinus Lobellij.
Cirfium Pannonicum primuna Clafij,
Orobancha: varix.
Panax *Heracleum* Recentiorum,
Myrthis alcera parva Penx; perperatn
DiUCQies Cordi. LobcUio: quidam
pro vco Scfeli-, alij pro Liguftico ge-
nuitxo in pharmacis ponunt.

CCCXJTxiáj

D E S <J R .1 P T:-I Owi

Ate<^Gloplios, PliDij, feu Ciittagalli: ab
aliquibus Alliaridifita. , , , * , * , *
Cirlumi AiTglicutn'Penx.
Afcf&piasfiorcalbo, frequentifs-
Hcliocbryfos iilvcftijsJragi: .yel Chry-

locoine Germanic, LiaUa...
tlioloPfcudoleontopodiumdiila-
Onopordon PlimjDatechamio : foi(e
Garduus Erioccephalus Glttfij; 4# 8
bufdam Coronafratrum. • •

ET ficpervenimus innobi! iflimam, a comnilaudedignam frigidarn Vall^ovtui sola-
ri expofiram. hic font pianinos nan parvas berbif abut: dan Ves, quibus a Maio, ufcjue ad Sep-
cembrem menlem animalia copioiii nutriunturj hicadfunt cavitates quadam , in quarum
duabus pluviales aqua: confervancur, in rencia autem (alientes aqua: petpetuo fcacitriunK
his armentapropQtuutuntur. Ineidem copioscluxuriat,

Potamogctum , feufomalif :perperam MalabaihrumLulitani.

H; i c funtliumiles, & paftoraies. cafa: ftu Tuguria ex viniinibiiscortexta, flantitiis ven-
+«pcrvia, palciscooperta (Ba-ito) ab Incolis ditSta, fubquElacdcfcrturarque aflrvatur, ^
fub his, & ab alijs partores ipfi (eferuntur; injftapianitic frequentiflimactf,

.AichtmilJa, feiiStcIlanamultorunT, feii
. i-epntopodiuini Brunclftij: Drofium a
Gordonuncupatum.
Sol dnd a montana Clufij, paffim.
Briunica Fracaftorij: anpotlus Hormini
filveft. fp; cies?
Veronica fupina, Lobellij.
Carduus Condryloides Dalccchamij.
Hyerabotanaema Sj& femina, Dodonxi.
BelUs crrulea magna.
Hcljeborus albus, rI(jiibus pallefcenrib.

Primula veris prior, & alccra, MatthioK;
a Fabio Columna Ncapolitano , Aii**
ma fylvarum, & praEorum, voeicatur.
Polygala, Tragi, & Dodonaa: feu Or.o
brychis, Dio!c. Lobellio.
Item fioribus luteis, ab Exccellentifs. P**
cobo Zuinghero invenca,
Acom'tum Lyco<3onum vi. Clulij-
Lotus encaphyllos Dalccchanij ; muh'
ex noftris ptarmacopciis. pro vero Mc-
lilocoutuntur.

QVIBVS per p g g redimur afcenfum, (& difficilem fanè, licet talis non videatur)

ad (copulor um latus, atque iimu! hare iimpiicia a nobis colle&a,

Loti. varfa: rpecies.
Helleboruylbus flpribus atrorubctibus.
Aconiravana.
Pilofellafjwribus rubris.
Graracn parnafli, vcl Lilijconvallij (pe*
cics Dodon'i: aut Monophyllon mul-
torum: Cyclaminus alteta Diofc. (cu

unico folio Dalechamij : iron redc
Lobellius Granien' parua ffi Cbidi t-
cit. nam (ucipfc Cordus feiibic) igfi
rari affirm at. • •
Bethonica alpina albo florae.
Juniper
Jupina Clulij.

ET ciimjam ad cum locum perventum eft, vulgò Saxa Yallis-Frigidx appellatutii>
quarardaa, pnerupta, acalitubi valdc difciftafunt, laborandur ocftiningemifclclariij
p]ancaium copia, qia: hic am<eni {imc vivunc, acqie vird' cunt, fiquidem oblerpantun

CrocodUiua Monfpellicnfium Dale-
•(-chaopio.
Echiunronranuai Daleciiampij: ftu
uccgodicrcm, \ crvicariam onrana
Thirfbides', feu Tracheltura Alope-
euroidcJ.
Scabioif mo nun a omnium minima
Ptnx.
Lonchitifa pcr a major. Ghini, & Mat-
ch 1011.
Centaurium majusalcerum Clufij : 1
qmbufdam falfoj Cencaurium majus
D o i f. de itum, & Rebal d i s
- quorundarn: hic frequentiflimum. v
Veronica mas Fuchfij, & Dodonadi: Lo-
bellius, Bethonieam Pauhfacir.

Carcius Araropylios Dalechamij •
Chamfelcon vcrus Trag# : T<rtalix p i no-
(a Lugiduncnfium. • • u j . i . . ^
Vigla Mamafijqrctis rauliculHPen'f-
quibufdam Viola aiborca.- .
Martagon, feu Liliam moowiw** jz
loru: vcl Hyacintijus Poctarum T^S.
feu Aphodcllus fqc m i i a , pu' c I ^ J ;
Dodonaro. Lilium fylvc ft. Yccaturo*

Veronica Dalechamij
Veronica refta minima, Lobellij
Leontopodium, Lonjccn: an Myofotif
Allij montani h i i i gies duz, Clufij;
Scrutula < Rcc. frequentifs.
ragi: feu Acaothus
fylveft, Lugdunenfium. cr. V

Polygonacum latifolium.
• Item minus, multorum ; ffu angu f i f q -
l i u a : d M u t o n o , h a m z a p l u n c D i o -
fcoridis creditum.
Bellis maxima flore Anthemidz: fce
Bc Dismajor Labellij- j f .
Antip h d r a / c h u k n d i m a y * y
Napellus verus crruleus, Penz
Napellus vulgaris, feu Lycocftionum fati-
vum Ericarpum, Cordi.
r z , Dodonax.
Panax Chirontum Tragi: feu Ifcophylen
Cordi, vcl Bupkureum alccrum latif-
lium, Lobellij.
Bupkureum

itn Pen* ;fcu anguftifolium.
AIL- lateus, fcuOculusChrifiti major
 Dalechampij.
 Achilleafidentis Matthioli.
 Iacobeaa akera Pannonica Clufij-
 DrabiPenz.
 HypogloiTura miiltorum : Fabius Co-
 lumna.Radice Idaram facie.
 Luiwria Magorum Arabum Pcni: ten
 Oxalysfcutiformis, velfaxatilis.
 Onagri Rec, an potiiisLyflmachia; fili-
 quola: ipecics? quibufdam Chatna:-
 nicrisGefnenpuratur.
 Digitalisprima- Tragi ;fcu amplo Bore:
 Dalccham pius Verbafei fpecie facit.
 Pleudoafphodcllus Pann.Ctufij.
 Dauciakcrum genus Fuchfy: i Lobel-
 hd.LybanorhisTheophr.vocata.
 Daucicercia fpecies Fucnfij : TeuLyba-

Clematis Crutiataalpir a.



Scdum Pcuxum noniinum, Pc'tix :
 champij.
 Campanula minor roGundifolta,, I-obcl
 frequenriflima.
 Auricula Vrfi Matchioli; Britanica, CeH
 Atchritica , Anguillarx: Lunar#Ar-
 tlinnca a Gcfnero: a Fabio Column^,

; Indidernpnttreamirabiliter, ac elegantiiflimè exfurgint ptantacharnoftri, cones
 \$^Tatmn,fc(fcfcriprioncf,fiint qux fcquuntur;

nochtsalceraDodonri: & minor Lo-
 belfij. 1
 Gelcopolis Cortufi: Scrophularix conge-
 ner cit.
Linum fylveft.Pann.alterum Clufij, vel
Ciftoydes Lmum.
Lychnis quarca Clufij.
Flamula & Clematis ttSta,
 Trachelium majus,& minus Fuchfij.
 Scorzunerav. Pannonica Clulij.
 Succia Ftclilijfcu Morfus Diuboli.
 Ormthnpodiuin Dodomi.
 Cundnlla cacrulea flore pulcherrimo;
 feu Sonchuslacvis primus Clufij.
 Paflerina Linanxfolio, Lob. feu Chry-
 focomealcera.Miitoni.
 Galcgamontana,Dalcchampij. >
 Vbietiam;
 Clematis Crutiata alpinanoftrajveni-
 tur;cu) el g f e a t c i c r p t i o f e q u t u l

A Sarmenrofaradice cgerminantmul-
 A t i a h a i v i s i n f i n b j u l q e s u a m
 inalijs Clemacidibus j lignofi , angularcs,
 knti ,& tncubitales; c qmbus furculi multi
 adhuc magis fubtilcs quatuor digitorum
 altitudihis, qui xq'nliter bipartici ad latera
 di vidunturjnguhqiobtinenctria folia ii*
 fto intervallo divifa,&: pediculo bre vifljmo
 adnexa, forma mir. ea, tamen majors, fans
 ptofundeperambitumdiSa, nervota, ni-
 gora'.inacqualis magn)cutdnif, nigroque vi-
 rentia: eft ilji flos Cruccm ttrp?lcntans,fo-
 lijs mucrcnatts, lanugmoGs.^feruleis albi-
 cantibus.cujus medium accrvulo quodam
 exrrcmulisfoliolis futi in Ro'a Alexandria
 naapparet,)decoratur. Eft farmentofa, a^
 perenni radice. Onturin alnonbus Baldi
 rupibus,quibusEurusdommarur. Bruma
 arc liriint folia.Plantaaliquanmlvmacn fa-
 pore: radices vcro intipidx exiftunt.

Ex Gmplicibuscotibuscgerminant:
 Phyllum Arrhenogonum majus Dalcch.
 N^rdu^ Crltica.ircqucimflima.
 Daucus.primus, Dioicor, feu Creticus vo-
 c3CUS.
 Saxifragiamajor,frequenri(Iima.
 Umbilicus Vcncriis alter,frequemiffimus.
 Rapunculus njajorlatifoliuSjfeu Alopccu-
 rosTheoph Dodo mo.
 Rapunculus n.onranusanguftifolius.
 forte Phyllum Arrhenogonum primum Dale-

progenuinoAlirmatcproponitur.
 AizonmontanumDalcchampij, &
 Cncorum almdThcophr. Matthioli.in
 poflrctna Commentarioriiitu Launo-
 lumeiditipnc.

TrachHum p etrxum minus.



Veronica pectinata fempeii virens.



pUnta. wetbi, & austeri saporis cflc gultu percipitur.

IN ipGus Baldi altioribus fummirati-
 bus, cuiusvis alms plant*, aTrachelio
 pctr^o mmori, (lenli/fimis, inter praxipi-
 ceullas cores ib cifdeclim cadenubus
 pendens, germinacTrachcliii iHud, lig-
 nos.i, palliila, ac valdc rugola radice, fcf-
 quipalinari, aqu3 folta numcrola pedi-
 cvili quacuor vel acj lummuquincjudi'
 girostranlverfosakis nixa, Cyir.lialjn*
 folia IK plurimum acmulantia, non ica
 crafTa/cd ncrvoiora, & profunJiiilaci-
 niaca, atqucin viridi colerenigracinna;
 &cxquafeparatim cauliculi tnulci, te-
 nucs.lxvej, nigruvircntcsprxdaaralci-
 tudinis.cum tolijs aliquot fuLfbnua
 cum fupenoribus, quorum aitquando
 unum non longo pediculo circa me-
 dmm caulem Cfflicat, rliqua H
 fcmprcircumvolvunt, led hie ^{arem}
 ftiora, &niagis laciniara prio ^{ang-}
 fiuni; interquar umbellarvic ^{ribus ext-}
 jyctbus breviTimo pediculo comcuti
 prodeunt innigro purpurafccnce ^{floraca-}
 cxi-
 ci, Chymica: cucurbitx vitrex iimjlli-
 mi^uicqucinciforas obiincms ;u B16*
 diocorporis tumorc,qua: ntque ad col-
 lom pervemunt, nec totum corpus ad
 cajycem ufquedifcijnJunt: in cufusin-
 dio multa fi'amcnu nutruntur, quo-
 tum unicutn ilims logitudinis eft, ut aJi-
 quanculum crafTum collnni, imdcum
 egrediotw, &quod niatuncaccbilurca-
 tum fit: Floret tepiporemajoris Trachc-
 ij noftn : lemen nendum confpcximUK
 perennis^ a(tnngens cfi plants.

Item:

Veronica pctrzafeiriper virens.

EX fci/Tnrisimplicis&omniHO ^{nudi}
 fixi Bildi.li^c narcitur, quinc, fc*j
 vel piuribusctiaoicaulibus rotudis, noo
 ramof i,j dnu nui rliqu p tinacs, qtn-
 busfoliob bina exeunt, (hccet aliqua ma-
 gnarepcriantut); rquali ordine difpofita,
 Lt Chamxdrys, ratrpn non fie pre funde
 incifa.admodumcrasla.fplcndjda.fup
 ne virentia Sc lanUginc quadam donaW*
 infeinc vciolbicaqtia: fort in funnnit*"
 teniultosfloresad tnllar fpiraf, quatet-
 nit.qtjinss, &rcpceniitolijsi<rTu|toco;
 Jore,aliquantDloma]bicantibus; quibu*
 cadennbusrdinqLmur calyx, ifiquo^i
 men continetur, ut in alijsVciolios ot-
 JHabi-t radices parvas fibiofas ac nigr>
 catUK, qux tta faxis liUs hottidispauqlH-
 tnaconijixurerraiiKluduntir, &ad-
 h^refennr, utdifficilimeciam lig<mbus
 evdli pofTmt. Florciinino Julij, & circa
 fiieminatuHturlencii. Semper ^{vJ<rti5}
 efl, fiecleganti/fima pulhciiim»q ^{UB}

Item:

Veronica minor alpina, Serpilli folio.



Item:
Veronica Serpillifolia omnium minima.

VERONITA minima folto Serpilli, ortctlt in alctoribtlis (imm itari bus Baldi, Ofientem verfjs, mulcisraitiu(culLs(iirculolit.rocunJis &lj:vibus; alcitudinisad fuiTimum unius cum dimidio pal mi: fert folia SerpiHi modo, fed aliquanto longiuf alia, mnigrocolorcvirentia, nonferrataj licet aliqm nJo (fed raroj aliqua divila confpiciantur. in fummitate abtque alic^uordinehabetflorcs, cum qaiois, nuc (enis, & tjuandoque en am quaternis tanturn folijs. limili Colore Honbus petrel Veronica; fed dilution . Calycem feu Vafculum, Jam (lores deponic ,t<inct; in quo clauditaifcmen rotundum, tniimtum atone niEjrum ; radix eft lignofa & fibrofa. flort-t luho menfc; femcn Auguflo m>tuntate perficitur. Pcrennis narurx plantactj licetfrigoredcpcrcancomx. tou planra, & femcn guftu adftringenu deprehcniliicir, nullapercppraacredinc, autnior d.icitate; imde in fljxibus&nquibLisad ftringerc fine calidiratcopu^c(t,aptnmefli medicamentmn judican potcii

Saxifragia alba petra.



Item:
Saxifragia alba pctnca.

HABET ha:cccncritrtapUnti radicii femipaUnmn altim ac rut'^cntcm, a qua plura folia fubflauca, ac forma alb*Six>fragi.c^ntdtuira ta(nmi,ac prohmdiiisdivifi< c quorum racatn caulis atTjrgit ceres, noJofus, lc vitcrhirfutus, dilute purpura recns,acd;>Jr.mtaU.i. hmcinhrrent ramufuliplurimi ab imo aJ (ummutn inordimcedifpoiiti: in fiijnniirarcfr^ucccsfudC fl,}fculi quinqc cindidilTi ins tolijs confitues, quorum' centrum quxdaii) pallcfccncia fiUmcnoi occupant; i(Us cakntibu^ rcliiv^aicur calyx femcn comincns minucifTi nu n, uti in Saxifragia magna Iratica. Florec tamo rrtentf ad ftnem -, faallime lm^ic'cic, ac deperditur: initio dulccm cuftimes.podeavcro jcriunonia pccipitur.

Item:
Thlafpi petrum Myagrodcs; cujus eft hredclcripcio.

INl fciin%CrctiS'« fn'gidj-Vallis puilulant laraltcecapillari folumulta humi ipirij. Kpjanbitumf,cti, atque unicuquedran gularis caulis atro virefcens, ad tres palm >ikas, 1 miJioad fuinnamin varioram^lt:aim Jivifut , in cujut fn nrnirate flo(cuiilbi foliorum quawot; quibnsdc-
tf J calbu

Jhlapfi pcpum Myagrodcs.



Pirolam alccrimPatu? Clufij forcè Am-
brosiam montanam Dalcchampjj.

Item quartat^Pann. Clufij.

Item Pyrolam Macthioli: & Liraonium
Fuchfij.

Hepaticara albam Cordi: feu Gramen
Parnaffi Hederacco folio Lobellij,
Salicem Placiphyllcos: Leucophlxi
Dalcchampij.

Salicis Pumilx gemisquartum Clufij.

Balfamum alpinum, &c Rofam alpinaiq.

I N medio vcr6 ipfius Vallis ad Orientem ptovenit frequens.

Filixmas.

Cacaliapencsc.

CacaliaprimaPannoaicaClufij.

Aconiti varia genera.

M A s B a fbm nocxperreai, orientejam fble exhospitio (Bai:o videlicet) (candimus denuopxvorfum umcnjjam diftasdiruptas rupes.ac pervenimus ad verdeem montis ubi (quoniam terra nonnihil videtur dcprefsa) & finum quendam efficit, idcovulg6 Os Navolx appcHat ur, xpositus autem est locus ifte ad Aficutn five Lybem, quo cicum circa provenm

Pulfatilla albo flore Penx: feu Ancmo-
nc fylvctr.altera Pann.Qufij: vel Sa-
molum Plinij Dalechampio -, uc in
fuo Hortomedico Camerarius te/h-
ficatur.

A B haçaliquantulum defcendendo venimus in qucdam prata ad Occidencem fpcilan-
tia *Vmauia vocaii, qux pktifiiiftis oimmut;*

eidentibm rclinquctur vafcula otn nino re-
ferentia Dqdonsei Myagram. Floret ad cxi-
tutnlunij. {apons acrimonia nulli Thlapfi
generi cedens.

ALi^yAtiTVLVM aurcm fupraipfanon fa-
tiscclabrata dirtlpta fexa, in dextera parte
fcaturiunraqz gclidiflimx ad Notumcx-
rofijbENfeft* ons avo nomen e qua-
rum frigiditatem manus vix ferre poflunt,
imd quandoque virrea ipfa vase, ad refrige-
randum potum in ij fdem immerfa, quoca*
lores propter difficultem afcentum contra-
Aum, leniaofiti*, rainimo temporis patio
perfrafla funt, q uz quamvis abundanter facts
fluant, perihm Montis parceradimidij mi-
liaris altitudinis ad Vallis fhgids phnitiem,
attamen ad hanc non perveniunt, ftd tota
ab illa terrarum fuperficie abforbentur j circa
fontem iRum nullz furgunt plantar, quxali>
biobfervaxnon Hut.

A p dexteram autem Font is, est Vallcu-
la qu^dam appellata [*U Voile del Safhnjqubd*
oliiflibi tnagnus murus in fornwm propU'
gnaculix dihcarius, ad traiifitum Germano-
rum retardandum . Hanc percurrentes dura
defcendimus ad diverforium, ittparte dexte-
ra Navolxcontigua, Zephyro oppotlta, fre*
quencilfima vidimus:

qucrundam: an (ut Gefnerus inquit)
pocitis Lcdon alpinum ; ^Dalcch. im-
pio Evony mon Tlicoph. creditum rab
Excllentils. Aldroando N cnum alpi-
num di&um.

Chamxrododcdron AHobrogunij Penir.
Idzam Vitem Theophr. Dalcchampio:
at CluEius in Pannonicis, alteram Vi-
tern Idzam facit: ab Anguillano Vva
Vrfi dicia: Dod onxus, Vacc ia iam ni-
gram vocat: alij Mirthylum.

Tuflilaginis alpinx Clufij, duas *fpcticyfj*,
Pinguiculam caeruleo, ac albo ilors.

Tuflilago.

• PARS vcrd cj«rdero finiftra, fterilit
exiftit.

Torroentillacandida frequentidifna.
Ranunculus in i. lutco flore Fuchllj: fi-
ve ^anuDe. ac oiorafus lutcus, Dodo-
next.

Item Ranunc. glocncrofus frequemif.

n verum minus prim. .SIW^ n .;ri m-j .• - i^ueini(Tima.
 K.anu-nctilusbijIbflisPenaji fitu'Tube-^-J- - Oenanthealpina Penl;:pafllm!
 rofus D adonze-• aut Saffithiulw AujBtiJ.- Serapias candido floreLobel. five Cy-
 pdeij. i i. '...:j!3:ilii . noforchis inontaha folio;maculofo.
 Ornithophora candida Gemmbtcf & •••• • G^aidix. f'yjvprjm'i.

H r NC Aquiloriene vt;rru'spcrean(lcm-haticpartemmontis, inaliapraraamplifllma,"
 jrbfofrima'-juctranfivitnPTjBsldeiiiiibusea Vallts Vaccaria.vocatur,qu6di]licopjrmispa-
 (cuis aluntur innmncrabilia boum armentaidivesautcm'eft locus ille fonte pererini aqua-
 m... .., quae inuolunt non romm-patorious, atque armenus ad exanguendam u-
 tim,verum & ipfis pascuis ad humum,irrigandum: surgunt hic

M3Jor. TOinqr.;5ffriiniri]aGentfa'naMa:-"

nium nuncupatum: Anguillara Ly-
gufticum alitumac : Cordus, Stru-
thionfacjtrabaliqubusImperatoria,
Oftrutium,&Magiftran]ia.

Pleddprehis BiM umfDofomq: A' ui-
bufdamOphTj'sPlnii: GrariicitPar-"
riaifi-quafondaffiiLobcHio.

Auricula Muris.ftequenrifs. -/
Pacoriaafoemina. ' -'-'

Coriaffdrum fylvbf.Myco*ii;M- .

Spliondylium laciniatifolijs.
Orchidisvaria genera.

Liriafplibdelusalbd {lore: fetrHemirp^
^calesDalcchampij.

Saxifragia unibslhfcra Pena: .

Thapiia MatthiOfh,

Galcoplis maxima Pannonica Clufij.

Acqnitnm terriiiti Matthirfi.

Orni;hopodiom Dodonici.

Acbnicum terriiim Diofc.frcciuentifs.

DriibaaleeraPannonidaCluGi.

L r :P tiumFdchirj : a Trago Smyr-'

•••At iftisauteJLnherbofinin>i?pratisbhbccidcncmverfus,Oatimafcendimus{&:labo-
 riose(anc)adcacXitiiemmontis,a Vaccariavalle'uniumilliarisalcitudine'perpctjdiculari-
 tercicvatumjeuinomeneft, Mons Major, quoniam omnium[vicinorummonciumalci-
 tudinem fuperac: luclhntesBenacum detcgimus, qui a SarcisTridentints'initium (u-
 IUens.dcfiiiitJHMinriumflumcrtPifchcriainngredicns&eandem in duas panes fecans:
 Hie Pifcheriae [ocu-s,mcetiibus,propugnaculii,& mole rutiflimis municus eft: die nume-
 rofxAnguillaTi'acTrofla:niaxrniarabundantil?)]mecapiuiuurapi[caroribus: Ccrtumus
 fi.ibindeSyrmionempeninruIaiTijnatalccljlmCatullinofnPoecas^ubinson longcfiibip-
 fis Benaciaquis,fancesfulphureicreduntur effe .exhalationem cepefulphuris, & Ccns,
 &Uauisnatibus. .Vktiuscftin coufpeSu Dcccotianutn quaruajcummie frugum em-
 porium magnum. Pra:cereaSa'todium,cluodadurbisdigniratemproximcaccedit, oculis
 fceoffertj hicroerxdealbatifilt, ejufde'inqucfubtiliffipi advtfteslincafencfucndasiSC
 acupingendaSjCOpiofifTimecxerccur. Oboculosquinetiam vcrfatur, Matcrnum,&Tu-
 fculanum. Histrbtusm lons.ubivitalisfaluberrima^ueqifraducitur, ommarccacindii-
 friaeoluntur V'ridaria arborm pKftantifliaiamm",utfunt Malus Citria, Malus M«-di-
 •ea,&"Mafillica. interquasfunteriarnquEdamquaeingeiuesfrudus fetunc, Poma Ada-
 mi vocicara, propecca quod in inferior! parre cicatricem obtineant, poft morfuni pnnii
 patris,{utferunt)reli(3am. H^quidemccWbrandsplants"quovistemporeflorent, &to-
 tum annum acervatimfructus confervarit. he rum locorum parietcsx Lauro&Mirto,
 quafiaulcisquibuWarn mireteguntur.hisSihoirorum via:concinnadmodumcxornan-
 tur: arque adeo abundant Lauro locailb, uthac, vice Jignorum ,ad in'frucndum ignem
 «ia,m poputares urantur. Ex quibus amacniflimis viri(farijs,prxterdelitias, fummi quo-
 quopjroventusexcipitur, ciimfrufusiftinonfolumnobis, &vicirnscivitatibus, veium
 etiam GcrrmarisipliscuniulacidlmeiniparEiaiiur. Papyrus fcriprorialucctiam in magna
 cepjaconficitur. HinccorupicirurparvainfulaMonacUorummorum D. F«nrifci,in
 qiwabundantcrprovrnic,

• 'H«»um albis, & rabis fidribus,ex faxis nudis prope aquatn pullulans. •

ApfecluictiamtcfcofFcttyBoiacumjubipifcatorcsCarpionumprxcipucdcgunt. Vke-
 riusVicusCampioni, quoinlocoadcxcoquendumferrum, ferramentorumque genera
 otiiiiia-cxruenda.Kdificia variafabricata font, habent namqae liic aquas ipfis infervientes,
 "tt]uefadina<:ferreamarenaexubeLantcS; arque ut paucis totamrempercingam, hie
 "cshtemplari licet aquas divcrficolores : (eieftarum olcarum olivetafrequentia: Naves,
 (ouxcamennavicl^apparen:) tumab afpirancibusventis, turanautis rcmigannbus,
 LagifiiimhaacVeronetiiKGrx.illam adoppidumTridentiniRips impulfam: prarero
 rivulosinurmjrantiumaquarun^Piftrnisadmolendasfruges^crocularibusvarijsdfer-
 Vientes:praEterL-outprolixicatemcvitcm,diverfosaliospagos:taccotcmpe[htesprocel!o-
 fasj ac rcpentinas, ouibus Lacus ifte connmoverit, obcontranos ventos tempote codem
 •nfrcfecconcurrer.es. ytjureViigiliusLacumvcrbisiUiscompellarit.

Thu3ibui,&frmituaf]krgen\$ Bemcc marino.

Adfiimtmj.m.huinauisclitijsjacvitffalubritat^orah^clocupletilTiirjaBcnacenisoppor-
ttntntfliiifti t.

Ex hacctiamftccuiave, utiabaJtiilimacmincentiffimaqueArcc, Yeiom, custer, x
 filimjAtbcfisqucjcixuolJffimusoculisfcfcconflx'tamtnj] fubijciimtjliiminolocnani,
 icTenoque cxillentecclore motiores vtbcjfed adhuc magisindifiinclCjatque rorju/cap-
 parent. hiclocusdilbraBenacoconfuetoinnereflex millianbus, Ferpendiciilanterveiii
 duobus: in hoc itidem monuscacu mine planities est lierboia, »bi oves, ^, capra: tantum-
 modo pascunturjin qua invenitur Tiifolmm auguftifolium alpin: iro, quod ita dckubo.

Trifolij anguftifoly alpini icon.



NAsc i T V R Trifolium istud in eo-
 dem Majori Monte; ea parte, qua:
 ad Orientem spectat. cujus radix Jongi-
 tudine est fere quincunciali; extenus
 quidem color pallens, interius vix
 albido: ligno fauctum, & nuntiobitda
 comis: fapore fubamaro. Surgit ab hac
 unusta dtumcauliculus, omnibus pro-
 fus folijs nudus, rotundus patitur, cavui,
 ac xvvis, fcmipedalu lon^irndims; qui in
 fummo fiiiordine flores emitrit, quo-
 rum forma ad Vicix flores proximaccedit,
 in quibus color purpureus admodum
 venustus nitet (cit. E fmmoradicisca-
 pice excunc supra terrain quinquac plu-
 res etiam pediculi, ternas tert- unciaslon-
 gi, quot Lin finguli, c mcci duos barbu*
 Jase mittunt. & in fummo foliaria, a: quft
 inter iz (patiodij lintta. Horum vcllo lou-
 gicudo fclquiuncialis: ac forma nngu-
 ita, acummaca, ac nervofa. Planta ipfa
 admodum rara cl, & pcrtnii, Floret au-
 tem raenfc lulio. Illius (ctnen nondi mi-
 hi confpeilum, neque vires fans cognitX
 funt. parte autem occafum fpeflante fon-
 ticulus perpetuo fcaturit, cujusaqux la-
 bentes per montis crepidities in Vacca-
 liatn vatlem. paulatira abforbentijr & ad
 niliulum rediguntur: in parte vcris Se-
 ptemnonema (picicntc (empcrnivesja*
 ccnc. quas aliquando, cum nirmn altx non
 funt, planta: pencirant, & caput fitra

ipfassefer^tes ineis virescunt, flo-ent & femina ferunt, quod ego ipse manu tollere
 In hac eadem planitie ac contiguis alpeis rupibus exurgunt plantae iofra fenta:

Alcatorolophus primus Pann. Clusij.
 Chamrka Germanica, Tragi & Dodo-
 nri: an { ut Penainquitt) Cliamacdaph-
 ne Diofcor, Fuchsius, Daphnoiden
 facie: iquibufdam, Mceicum Ger-
 manicum.

Tormentilla Candida Dalechampij: feu
 Pentaphyllum alpinum pctorum mi-
 nimum Lobclij: five Stellatia argen-
 tea, vel Argenraria pctrxa Gemcn.-fcu
 Alchimilla minor Camerarij.

Lunariaracemofa, feu Lunaria minor
 Marrhioli: i Columna pro Epimedio
 Diofcor. exhibitur.

Gnaphalium alpinum Clusij; Matthio-

his Leontopodio propenit,
 Leontopodium parvum Lobclij.
 Pinus Tibulus Plinij j vel Pinalligeras
 ftenle: Iuti Mugo vocant.

Anagyris minor.
 Cncorum Mactliioii: an Olcandruum
 fylvefr. Avicennaz? foit «Tliyroelc»
 minor Cord i.

Ranunculi montani primi, fpc- j
 cies prima C Clusij.
 Item pnmij fpecies altcia 3
 Gentiandla v. Pstrnomca Clusij: i Da-
 lechampioj Hellcborinavocata.
 Gencianella fexta Clusij; ircquentif-
 fiouk

vb i ctiam plantae hz nofra exurgunt, quarum effigies sc dcfcipticnes se-
 quantur.

Ranunculus alpinus Coriandri folio.
CluUo, Ruts folio.



Ocymoides mufcofus.



Ranunculus Alpinus Coriandri folio.

EX radscibus longis teretibus j fibrosis, canditiis & quodam splendore ornatis, quatuor ad (nummum) fere effrunt folia remipalmarij purpurascens pediculo folia Coriandri referenda \ aitamen minora Amagis laciniata. & adimilitudinem Fumariidifpositai Jirerquar ex. urgir unicus pediculus roidus, lac vis, pal- < i: in 5, florem cotinens, circa cujus medium foliolum unicum cil, in fummirae autem flos ex duodecim, & partibus etiam folijs compositus, (uti in Buphtamo) albis subpurpurascens, ac venulis finguineo colore percurrentibus, ab alijs viridibus foliis exceptis, calycis vicem gerentibus; in cujus dextorelcentis medio remanent femina congesta ut in alijs Ranunculis: floret ad K. i. Julij. Nafci Hiriu Majoris montis cacumine, Occidemem versis. pcrenis est; & aliquantum macris.

Item:

Ocymoides mufcofus.

EX unicaradic lignosa, pallida. sipe non parte in plures Bivifuras fere, uti in Sedisatpinis CluHj ^ merguut frequentissima foia super vicin terrae qualiter, den Gffitnt fque cooperiencia ad Molcifimilitudinem, pulehrrimaviriditate prardira; inter quae frequentissimi florent, suis pediculis ij^ que brevissimis ijngulimxi a folijs fecundum talyccm unii in elevari (untj fortwa) Calyce, & colore Ocymoidis repentis, (minore stamen) quare Ocymoidem mufcofum appellare placuit. Sic Mulcus iste exornat terram, ut tapetepukhrrimum referens oculos summo predeut keat. In Iugurium Majoris montis provenit. Floret circa Kal. Julij. guttu exdecanniis facultatis esse percipitur. pcrenis est planci

Item:

Geranium alpinum longius latcatum.

HABET hsc plantaradicem craflam bipalmariem, extenus nigricantem, intus albam. fupercin pluri partidi VLfam. atque in loco, unde folia exeunt, tuberosi farri; folia autem unicopeditulo tereci > gracili, lanugine argentea pubescenti, palmarumque mhxrentu, exquinque,

Geranium a^pinum longiradicatun.



Carioph; llauaipina, omnium minima.



O

que, autfcxfolijSj tribuilarinijsprofundcfedisacinollibuscolhiiuaiLini-cocoa mnudoc

que, Alti. xcolcrevairsj|3nguii, cisdedidi; in medio ifirmna ficuci in R>ns habentes, qui vaf l o qq u e f a holia mucronat is connencor, &: deflienes in breve roftym delinaOT] qicmadfi-wKUim in reliquik Ceranijs. Nalciuir. iIpimsrupibiK-M.ijon.sn ontisOrierVteni apficfnfibuSjacibiArfim. Floret initio Inly, femcn K-i guffhperficiEurPcrenQi^ttrterMiyj dixapiarmreola, acqwadam .iubj|ji

oriata.

Item

CiciophyHaraalpina, omnium minima.

Radice etasswscula ^n fibris varias dbftja-tmpalroon aliuidine, &:a!bicante, pullulant prope terram muJtafoJistnum digicorum altitudine Agrimoniar fbrniam xnuilantia, (arqualircrtameD-tnTerna folioli vclutiala; utriiKjudifpoficaj; (criatt per am bit um ,miilt-s liibcispcordinnmlactffatnoiiITer lanu inola aliquantulum criipa, (Jturate vncntia: ac splendore quodam. nirenria: lattt Avx quidam ad hanc pcedatn formatn haudpervenit C.cx horii meduo ielc at- tohcunicus, & l g ars fif j q un- que aurci colon's conriutus (in quorum ccncrolutcaftammulajcalyccnonab- iimiliabalcnu? Canophyllaca; mou- ranx Clufij continecur, arcjuc pediculo lannginorotren ,acad i um mum pal- mari infid>t. Floresprofert initio lulij. percnniseftjacGtculcatc exficcawtu. In Iugo Vicicatisad Occidencempto- venic.

Item:

Clinopodium alpinum.

PVLLVLANT ferpendo ex fibro- filimis radicibus varij canliculi quadraftgularcs, hirtuti, acfelquipal- marcsiquibusbinafolia hirtura , ft** rara, Ocymum minus acumbntia, c* adver/b&dire^c firafunt, inter q u:tf aliaparvafoliolaexifkint: flores niu* ti atrorubentes, ac Calaminthz mon- tanz

Climopodium alpinum.



tan[^]genuin*forma, inter ibliacornnija* globulum reprzfenrant; floret in initio *lulji* est acri fapore. Provcnit palltn non procuj, & Wajon montCjUbi perentiat.

H i N c ulrerius pergentej pautd inferitii defcendimus in Va *Hol am xerem in v bus*, &glacis maiori ex partcecontciflam.cujus inferior parsconstat ex confra&is &ita cnobili busfaxis, ut fuper ipfis nuilo modo confiiH poffit, adeo ut lupi, & urlu mortui adiaventi fint, quando hacraniire volentes, laxisfub com pedibus motis, nullo ciim roodo gradu cotinrepcoirenCjunacumcotibusprarcipitCJ corruerunt, qua:faxaciimactrita.&:Candida fint.vanasq; fertiantur Hguras non abiimiics' denudatis oflibus, a vi ici nvs V allisotrmt, nominatafuic:in hacValle contigulque pratruptis locis hxc exurgunt fimplicia:

AlpignaCharn?rhododedros,PeD<<:aGuiU landino.Terionarca Plinij putata.- Gcfncrus, Vitcm Idaramrubrisacinis, nuncupavit: Dodona:us,pro Vacciniatubrapropo nit: Mihividetur.AnoDymQS^BalUraialpini folio.

CotomderGefheri.
Caffia poetatum Pensc,
Ilex.

Pthora Valdenilum, frequenti(fi)ua.
Heptaphyllon.

Qianophyllara montana ajtra Clufij.
Scelel pratenfe Monfpcllicnfium, Lob.
Lfliutn Cf>nva]liu.n,frcoLictiiTimum.
Syringaflorealbo; anPhylladelphus Athcnaei. OftrysThcoph. quorundaro^ maleramcn: namCanierariusindo-
•Aiflimo fuo Mcdicaro horto, aha noa ciTeOftrym.vcl OftryaaThcoph.defenpcainputat,quatin plantainillam, que proCarpinoa Matth.pingitur.luc paululoinferiuscopiofift-coiifpicitur.

Chamzcerasus montana Gefneri:Xy\o-
ftcum aiterum quorundanv
Anemone tubcrofa radice Pcnz: five
i tertia Dodonii:vd altera Clufij.
AnenioneflorealboClufij.
Lycobphylos focminaCofdi: a l'ena,
5*mbncas aquatica: a qmbuidain
Tdraupalus Thcoph. credita,
Sambucusfylveft/cuCervinaTragi;VCI
Satnbucus racemofa Penjc.

Scdum alpinuni vi. Clufij.

Adhvc pauld inferiis huic Vallecuscontigua funt praca in larere montis kec extenfa, a&nodum 5ditiola,cd.n ptopteiapnicum &u_m)tum cjuia funt .nftat Viridanj, ubi cratae acTMpIanw,qiixpa(nmtowin monte furgunt colledx rtfuMur. Cujusrei.cavidetut eflbcauhiqaddeuin in dijslocis.praM^ieditionbus,& his ipfis immin<ibusherb*quo-

isemat ac if itzq; & in fccum redactz non plauftris, non jumentoru dorfo
^ << r bco"umⁿdXu!Sci, convehidomum poffint, fed castiahiper ttu am neceffe fit.
& per hxc prxcipue prata tranfitum haberediinc fir, ut vana (cmina decidant, ijfdemque tnōx-nalcntibus,omnigenis herbis loearcdudent. quareturn per quadam d.gn.tatcrf, aecxccUcmiamabfoIute.Knulloalio.adjeaqnomineaMalleCncnfibiu Pratavocantur. numerusautem pUntatum in his ipfis luxunantium,hic elk

After v.pannon.Clufij.clegantifs.
Lirtorphodelusalboflore, frequentifs.
Pblomos Lychnitis alcera Synaca ,Lob.
Ocymoides magnum flore purpurco.
Caltha alpina Gcfneri/requentifs.
lacea montana Narbonentlum, Lob.
Verbafcum Tragi, copiofilimum.
Ornithogalonficatum^utcopallercen-
tc flore.

Clynopodium Aufriacum Clufij.
Ranunc. quanusDiofc ftu Aconitum
Batrachoides Pen*: hie frequentili.

HyacinthusPoctarurrijTragifCOporus.
Lilium purpureu majus,&primu Penar>
Hieiadium v.Pannonicum Ctulij.
Condr yl la cerrulea purpu rca.
IuncariaSainianticcnfisClullj.
Doronicum v.Pann.Clufij,frequentift*
Mirrhysalrcraparva,Lobel.
hcabzx Panonicat CJufij,oinnccnu<<.
GeririaneUarvaria:.

Aconitavaria..
Sphondy humlaciniato folio.
SanicuU montana Clufij.

Panax Heracleum.

Cpniſta Nucis (Dalcchampi)
 Aphode3us major, fre, qſicn[iis, v
 Acjuilciifurcofiore^ji^v^Tri . ^,wj,^
 Herba Parldis, ;...-_-
 Machaleb Gefneri.
 Liinarialutca Dalcchamfiji . 1, : : : :
 Anagyns minor* : it:xli?V ; ;
 PtnLiyTDCinrcchdu^fpejcs : :
 Cytffivarwecncra . : : : :
 Serrata CoJ-dijab alijs RecemionbusSo-
 : lida^aSaracaicanuncupatai

OrobſpřitmſPinh.Glutij.
 Hepatica nobilis Dodonri.
 HellcborinaPenx.
 CottibrctumPlinij, quorundam.
 • Gentiana major freq̄ientiflimi.
 Geraniamulto jumgcncrum.
 CacaliaPcnie,
 • Pajoniafccn-inafreq̄uentiflima.
 Scorzoncfav.Pann. Clufij: frequētifs.
 Sefrmoides magnum Salmatiticum,
 Clufij: n altca Mufctpulafiqre mu-
 fcofo, Pena:?

^ H i t C pariter filenrio non eft prstcreiinda Via ilia F; i^orum acclivis valde^riu millia-
 Riuntjongicudineconfans, mod6liac, modoillac, 3ngucmdumferpittfemicontr3<3umr6-
 fercns; exutrocjue larefagisirigcnnbus fepta, qtmrum caciimma *I'eCe* mufuò vincientia
 veluriforriu^meffirigantjqcyiatorcsabardeiitiifirmiSolisaiſtu.ifeimperuptuviarumali.
 quomodotireri podidc. Ab hisvcr6 pratisufquead montis fummuin dorlum -, Culmcn
 Malcfininocitarum, infraſcripcxfutitplanrx; ^, •

Libanothys Cheryophoros Trmicftits.
 Item Strilis'.
 Lit; uiiicum Matchiolr; tionullipro Silc>
 re, amScieli MalTilicntcumtimr.
 Soldaneliaalpina.
 TuilJlagmſalpinx Clufi; duo genera.

Anon^m)s Baſſami alpini folio.
 PuHatillafloralbo.
 Scfeligeninum Madilicnk.
 Mczercum Germanicum.
 Ot:nan:he alpinaLob. Irein:
 Ciematis Cruuaninoftrajinvenitur. •

In hoc EiamculninceftpIanttiesfatilatahetbisrefcrtinjmajUbiptoptervariospro-
 ppeflus jucundc indagatores animutn atquoculos pafcuncm hacaccircumcircajgermi-
 natfrequētift.

ChariophyllataaJpinaiibfra.
 Cotonalfer Gerncri.

Lcdum alpiniirri; Sc
 Soldancllaalpina.

E x hoc fſtigio defcendiraus *rc&a.* verſus 5cptomrrionem in femicircularesquadafau-
 ccs, inccr jam dictum Culmcn, &: aimmōtem A!riflit: mnmominatum, ticctilca-dcelfi-
 tudinetn Mdjoris montis non perveniac *QUX* montis in Lunac formam excavara portio, Oi
 Nayen.e dicitur. hie Brnaci adime muia parſcemitur; im6& fonorus bombus aquarum
 Erafiiluminis, abundantiftiind exBnxtcrUibus montibus cregtoncmontis altiffimi, de
 quo agimus, jn lacum prxcipitantiumclariffimccxauditur, licet inter b.£loca, & illaqu2.
 luormilliariumpanumuertic. His in locu diccudx plant* copiofx attolluntur;
 Scfcll MalTilicnc genuinum, frequen- AiliumVrfinum Manhioli; ArAo{coro-
 tiflimum ; foccc Meum Italicum Lo- don Gefncri.
 bellij. Lunaria odora, vel Gra:camajor.

Daucus Creticus.
 Panax Afclepium-

Lunaria Chymiftarmn: feu Viola latifu-
 liaBolbonach, Dodonxi.
 Orchidis Serapiadisvanagencra.

Abſynchium montanum odoratiffitnum.

I N hoc Alciftimo ubi Baldus ccrminatur, nullx nafcuntur herba: quarum alibi non me-
 men mn s.

A B his tancibus ambulamus per montis latus admodum herboſum, & cui Oriens dO'
 minatur, pulchcfrim3spUmas(cni perob(crvantes alibi, tamendcſcriptas. Inplamtettt
 undemdtvenimus, ubi alias ingens, &: pulclierrimafmt fyl i'a. Brenconicenfis diaa, Abic-
 tibus, Pinis, lHcibus, Quercubus, alijs que innumens arboribiii, acprzcipudpaculis Fagis
 refecta. nunc *verb*, utrum fert vidficudo, trlrtci tantum ipficrafliflimiramis omnibus
 refci(fis, ne(cio quid magnum iudic, iuics, cernmnr.

Impatienshcba DodonacianJutipfem-
 quic) Aefchynomcnes Plimj: Mercuri-
 alis fylveft. altera, Tragi: Pena Pctfi-
 cariam filiquoram, & Noli me range-
 rc, facit. perperam E(ula(ylvc(l. Tragi,
 multorū abaliquibus Pftudoapocy-
 num difla.

Muteiina Gefneri. & Camerarij: aq̄i-
 bufdam, Meum Alpmum diflum.
 Pulmonaria Lichcnis facie,
 Filix faxatilis criſpa; forte Pceridion foe-
 mina Cordi:
 Filix faxatilis Tragi.
 Saxifragia aurea Ltchenis facie, & Eryfi-
 miſpecies Aldroandij Penc..

Radix cava Herbariorutn: a Cordo Cap-
 num Aetij; &: Capnos PhragmitcJ,
 Plinij: i Fucfio, Piftolochiacredu:
 i Pcna, FumariabuIbofa Plinij. votl-
 taiMAttmolus. proalccraFtimaiiatx-
 hibet.

Cacalia Penx.
 Phallus Hollandicus. pro Satyrioprmo
 Diofc. Excell⁰ Matthiolotribus folij*
 Rumicis arte aflixis. venditus. prouC
 Clatiflimus & Excellemirs. Philofo-

phus, ac Medicus, Ludouicus Fumanel-
lus. qu: hunc, &: ilium qui ad Mat-
thiolium est misit, clavi aperte re-
ftatur; facile auteiu fukdecipi, pro-
pter fummam utriufque, ancequam

AB hac excifa fylva pergimus per eandem femitam verfus Meridiem, ac ingredimur
Valtem Attilonem, qu^ mul isfcaturiginibus falubrium aquarum irrigatur. Cujuspirigui-
bus herbis copiofillma armenta xftatetotap^ ifcutut^ efertiffima est numero fillimis plan-
tis, quarum multas fikntin partentbo, cum alibi adnotatae finEasfolum reftram, quaraut
copiofiores hic nafcuntur, aut digniores relatione funt. Abundantiffime igitur hic nalcitur:

Coraltoides Cordi: feu minor Dentaria
Matthioli: vel Atabaftites nemorofa
Alpina. Penae: & Viola Dentana, Do-
docuei: Pencaphyllca, ac Eptaphyicaj
flore albo, atque purpureo, hie invc-
nitur.

Helleborine, five Epipactis, Penae & Do-
dona; i.

Polytrichum autcum majus, Si minus
Herbariorum.

Filix focmina,
Item, mas.

Primula fylvarum Lobellij-
Cynocrambe, vel Mercurialis fylvefris.
Iacob^ aterna Pann. Clufij.

Sanicula foeraina Fuchfij.

Solidago Sarracenicaj Lobellij.

Mater Violaru Dalechampij: alij Viola
furreftis cauliculis vocatur: a quibus
dam Viola arborca.

Satbi Capra, Herbariorum: a Brunfel-
fio, Picnemonctedita: ab aliquibus
Rhodera ab alij Melandrium Plinij:
Italij. Viivaria A Croctofanaria.

Tanacetum non odoru Lobellij: Atha-
nafia Lcucanthemos quouiundim.

Virga aurea major Dorix fl^ ribus.

'cem. minor.

• fhellandrium Plinij, Guil Undino: ab
Herbarijs Angelica fylv. vocata: Cot-
du Sj Smyrmoi facit.

Geraaium fucum Clufij.

Geranium Malacocicis, Rec.

Geranium Barracoides Dod. Qve Ger-
manorum Gratiadei.

Geranioru communior Uj Vatia grucra.
Pulmonaria vulgatiffima Borriginis fo-
lio, major, & minor jicccacriteis, atque
purpureis flonbus: Cordus. Symphy-
tum fyveft. facit: & Pulmonarii Pii-
nij, Gefnerus: perperam Potamoge-
turn Diofc. LuGtanis.

*-ythofperum Anchufefacic, Lobellij:
forte Pulmonaria major Dalechampij.

Auricula Murii major Tragi: a Dale-
champion Corchorus Theophr. Galli,
Pulmonariam vocant.

After non Atticus Tragi: perperam Aco-
nicuia Pardalianches Fuchfij: Gelhe-
rus, Solanum Monococcon fact: a
Cordo Aconitum Monococcon vo-
catum: a Pena, Solanum terraphyllon:
ab Herbarijs, Pandisherbaditta.

Aconitum alterum Matthioli.

e terra erumpat, fimi; i' eud'inem.

Sanicula alpina guttato fiore Gefneri

Sanicula montana Clufij: forte Cha-
nophyllar folio Hederaceo Pen; c.

Item, quartum ejufdem,

Napellus verus coeruleus Lobellij.

Napellus racemofits Dodon? i: an (ut Pc-
nainquit) Aflea. Plinij? aquibus Hacn
Chriiophoriana dida: ab aliquibus,
Hellcborus niger,

. Sambucus palustris, Lycoftaphyllon fce-
mina Cordi.

Rubus Id*us Diofcoridis.

Rubus Id^us Ixvis.

Rubus alcer Ixvis, an potius Chamzrti-
bus? Rubum Idxum Gefnerus facit, 5£
Rubum faxanlem Clufius.

Mirthyllus Germanica, frequentiffima.

~~Cornu diena Clufij.~~

Chariophyllata montana Matthioli.

Item. monrana Dalechampij.

Seolymos Thieophrasti, Clufio.

Muteus arboreus-, a Grycis, Bryon.

Wufcus terrestris Tragi: (eu Clamspeu-
ce. Gefneri: vel clavatus Mufcus, Lo-
bellij: Dens copinus, fecundum aliquos.

Mufcus terrestris reperis Clufij; fond
Mirra, BorufH: a Lobellio, Mufcus
alcer dcnriculatus.

Mufcus terrestris denticulatus prior Xo-
bellij.

Oxyslutea Clufij: feu Oxyscorniculata
repens, Lob.

Oxys Pliniana,

Virgapa lrori Sj Mat Ehiol K Labri Veneris
fpecics.

Tithymalus Characiacj v; Dodonzi.

Item, Heliofcoptus.

Item, p[ariphyifos.

Pithyufa Dodonzi.

Mezereum Germanicum.

Solanum majus^ cc. hie non Iblum fre-
quentiffimum est, fed admodum ve-
getum furgit. *

Fragaria,

Myrrhis Fuchfij.

Pyrola Matthioli frequentiffima^ irao^
nium filveftre Tragi.

Hyflbpus ntm ore tills lutca, Lugdunen^
Hum.

Nepctia quarta Tragi: feu Calatninth
Mentaftnfolia, Penx.

Ranunculus primus \

Icem^ lter' (Matthioli.

Item, tertiu)

I { em, quintusque Icem: non usapud Cor-
dum: Bulbolus Apulcij Dodonaro.

Item, i, qua[tus Dia tc. copiu[Uj.

Item,

IternjGlomeroj^salpinus, Lobel. Flos
 . Trolius, a Gelhero: Sxtus, Mar. thiol:
 feu, ut ego diccrctn, Aconitum cer-
 tiumDiolc,
 Mollugoaltcramonrana Dalechampij..
 Paraiyticaalpinaanguffifoliamajo^Lo-
 bellij: 3 Fuchfio, Vcrbafulcum odo-
 lumditlum.
 Viola lutea montana Clufij.
 Primulae arborefcntis varia genera; a
 Fabio Columrja, Aiifmafylvarum, SC
 pracorum, vocata.
 AraclJanchierGaJlorum, PenE: Pyrum
 Cervinam, Gefncrusfacit: Ciurius, iti
 Obfervac. Pannon. iubnomine Ldxx
 Virisdefcnbit.

Abiea.
 pinus fylveflris feu Muflo.

Ex dignioribusverdhaefuM:

Lamiumprimurn.&alceru Pann.Clufij.
 Cacaji3pann.feuglabrofolio, cjuftdem.
 Anemone v. 1 Dodo-
 Item, Anemone trifolia j" nxi.
 Rubra Is vis TaurinenfiumjLobelhj.
 PliyllumTlielygoiRim Dalechampij,
 Saryrium Erythronium Herbariorum
 Penx, 5i Dens Caninus: a Dalecham-
 pioSatyrium trifolmmfeualbum: 4
 Otjfio(inPañonicis) Dental: vocatur.
 Satyrium abortivum Lobeilij/perperam
 Orobanchcsmagnaquorundam.
 Circia Dalechampij. ,
 Sedumalpinum temum T CIn-
 Item^quartum • \$ fij.
 Oreofelinum Clufij: (eunigrum Scfeli,
 uorundam. ' : : : :'
 Abdnthiumalpinu, feiiVmbellifcrum
 florfbusalbis. . -i ; »'-
 Sanicula raas.Fuchfij- a Matthiolo Dia-
 penGavocata: FabiusColu."nna, pro
 vSidrite cercia Dioicondis propo-
 nic.

V X T E R I V S introiruslatitudincmquandamquxNoveziaab incolis appellatur, tn
 quafrequentifMmuscl:

Crocus Vernus primus Clufij.
 Denrellaria.Gefheri.
 Solatium majus : feu Bella Donna Ita-
 lorum : vcl Mandragota Morion
 Thecophr. quozundam.
 Tuffilago.

IN cujusfiniflraparte,quaKlamina:qualitates magnarfaxearexiftunt:interqiias'v.iri*
 cavitates conformantur Novezia cavitatesvulgo didi'te in uibus,

Cicutaria Utifoli.ifoctidifTimalobellij:
 a quibusdatn PcloponenfeSeiclicrei
 dita.
 LunariaminorMaEchioLi:feiiBotryr.ci.1
 Trifoliumaureum Dod.florepitpure.o.

P R A T E R harcNovczianmontispartedextrorfum adOccidricem, tribbfcd otara
 eft Valleculis, quarum capira ufquead Majorem ipfum jam diftum tridntcm perycmw<5
 JiarurtiVallecularumprimaappe!aturLo(anna,quzlicccparvafit,divestameneft.rariCl*
 misplantiSiinhujusconvexaparteonentiexpofitaalcendcreincipientibusintjeintur:

Holoftium Catncrarij:forteHoloftium
 quorundam Datechampio.

Carpinus, MattUioli; vel Cftrys Ptimj
 Camerano.
 Fagus.
 Bctula.
 Acer monrana, feu Acer major Cordi:
 Clinotrochi Anguillarar, Lobeclia.
 Sorbusfylv alpinaPena:& Matth. Sor*
 bus Torminalis (ccundum aliquum:
 Dodonxus, Ornum & £. Fraxinum fyl-
 vefremvocat.
 Sorbus r«rminalis Martliioli, Sc Penx*
 feu Cratigus Thtophraft. Angml-
 lanc
 Aquif«liLm, vcl Agnfolium , & RufcuJ
 iylv.mulcorum.CratafagonuTheoph.
 Plinij: Lacuna vero, Palmtutn lecuu-
 dumvocar,
 Liru^Agaricum.

AmblatumCordi: velDentaria major
 Mattbiolt.
 Dentana rubra Dalechampij.
 SolidjgoSarraccmcatertia Clufij,
 PetafiiesmagnaDalcchatnpij.
 Tuflilagomoiuanacjufa'em,
 EnfitaksDalechampij: perperam Mi*
 thridatiaPlimj. (Icundum aliquoi-
 Baccaxis Diotcor. Matthiolo.
 Kibes Officinarum.
 Apium montanum Dalechampij.
 Belliilurcaeiuldem.
 Thimelax species, Myconi.
 Ranunc.montanus albus, Dalechamp.
 Ciftus, & Hypociftis.
 After mojuauus Penz.
 Damafoniumnothum: CalceolusMa-
 tiz^cSacerdotis Crcpida, Rccctio-
 rum: Amarus LuGtanus tub nomine
 Lonthittdis primar pingit.
 After'mantanus hitfutusPena;.
 Aizoon (erratum prinum J Cordi.
 Iccm, alterum

Pcrafirejalpina.
 IacoU'xa altera Clufij.
 Aphyllanthes.
 Batrachij varia genera.
 AfphodenusluteuSj falter Plinij Do-
 dona;o.

AlliimangumMatthiolij'i
 CacaliaPenaecopiciffimai/ I'
 AcooiU:variagera. -,, a^
 Item: ,>ientn

Cicmatiscrutiara no(tra. . . . t. \tt : : : :
 Aconitum aliidDalcchartrplj. " "
 Pseudoafptodtluj-Clufi}. Er dum

ET dummagis ascenditur.*

>

Gham^ciftusquarcusMyrtifoliusCluCj.
Nardus Celcica frequenls.
AcaaijCuinPanl^eaiichcs, Pluiij.
Aconicum Pardaicandics Anciquorum
Dodoiwro.

Phtorxdtjacpecies.frcquenrift.
Doronicum vulgaciftmun*.
DoronicumPannon.primum \ Clu
IcemPannoarertiurn 5 tij.
Clinopodium Auftriacum ejuftdem.

IN dexteravcrdejusparteNorofubyeftacopiofarcperitur;

Pinguicula,Gefneri<:oeruleo flore; feu Cucullata Dalcchampij: a quibulHam Crias Apul-
kijrcdica.

IN Gnifiraautem quEGrxcum Orien:cm apfcic,peculiariterptovcnit:

Pinguiculafiorealbo.

Item:

AuriculaVtJ purpurco flore frequencifs.

Clinopodium alpinum noflcum.'

AT circumcircaabtindantiflimaefit:

Genifta IlucnfisDakliampij.
TufTilrigoaltcraalpinaClunij.
Tudilagomoritana altera Lobellij.
Soldanella raontana Pcnaj: feu Lunaria
alia minor Dalecliampij: a quibuf-
dataLunariadinari vocata.

Bitorca minor Clufij.
Verbafeulus alpihus coeruleus Dale-
champij.
Carum.
Lonchitis afpera major, frequentiffi-
ma.

D v A R v M reiiquarum Valtecularum altera Lonzia vocatur,in qua nihil noratu di-
gnum d«egicur,aiflqu6d in ea

Phtora major, atque minor frequentif
iima.

Doronici Rcent.vsrta genera.
Salicis&xatilisduarpecies.

ALTERA verdBrutanuncuparur, inquaNives&Glacicsperpettddoininantur. io
ipfam prsetercaferardiverfejLupi prxfertim, ac Vrfti feft recipiunt; in hujus fummo vcrce-
ce inaccceEbili,prominenci,& fimpliciter fæxco,cavitas qua:dam exiltit (Crv*ljittfi)di&ta
ccujurimis,

Tracheliuminmpetrxum, & } fcfccxcruntJ
Veronica pe:raa temper virens

Quarura I cones, ac delcriptiones, habsne r in defcripioae frigid* Vallis.

Seduro petrxum Buplcurifo(io:Sofe verius.

Iccm:

Sedumpetrxum Buplturi folio:
• flore verius.



EST illiunicaradixcraTa,rerei.fi-
ne fibris, fed quibufdam quad
tuberculis hinc inde crumpenribus,
craflb corrice obvoluta, intus pallida,
extra in rubore nigricans, ad (um-
inum cubitalis, fupernepartita, (ul
inGeranionoftr^alpino:] ibliaangu-
lifolij Buptcuri omnino ilmilia ex
protuberacibusillis partitionibus co-
)ioscemanancia, &in circuitum fe-
!e expandentia: flores autcm ex fe-
pecem foliolis aliquantulum mucro-
naris, inluteopallcfcentibus, profert
infummitaceauliscertis, nudi, fc
dodrantalcs; inquorum mediofetni-
na umbellz modo graviter fpirantia
exiftunt; acque hacc uti in eodem Bu-
plcuro. Fiorcc Idibus lulij: &Idibus
Augufti colligitur femca: guftu r>
fert Cytutzfaporem.

D v M autem de/cndicurab hac dextrorfum, vidcre licet,

Cenrauroidera raagnam, Gefneri: for-
ce Cencaurium Notlmm Dalccham-
Pij-
Gentianam folio Afclcpiadu.

CirfiumSpinofum.
Cirfimm prioum Pannonicum, Qufi).
Buplcuium apguftifolium,

AT noftranfeutes via inter Maonum .fcCampedlumpcrvenimusinFcrraiiuiDpa*
gum.domibusac hominibiis montaniscuicirrimura : mquviafrequentiffimum,

Vincecoxicum albo flore, confpiciur.
Vbictiam:
Phalangium Matchioli,
Cyclamini dux fpecies.
Ctuyfulaclunum, Dodonzi: Totabo-

na, & Bonus Henricus Matthioli.
Oxalisrotundi folia frec^uentiffima: 1
Rovillio pifla, fed non dcfcripia: for-
te Lunana Magorum Aiabum.Pc-
nx.

A T Q U E itatandemarteraiMotoriifavore pulchertiroui fpecurdiffiir.ufque, Jiatur*
f c o r t u j , MonsBalduSjCircuhnierperfpcttuSj & tumfuH-, ma adiniranctic^ G u j t a c
diligemcr obfnvatus a nobis eft.

F I N I S *



INDEX GRICVS PLAN TAR V M

QVJE IN HAC HISTORIA

•GONTINENTVR,

A Γενλαία pag. 27.	Ελαία	30.	κόπτη	177.
αχρωτη ccxvij.	ελαία	26.	καυλάων	l.tij.
αγγα clxv.	ελαία	51.	κροά	- so B*
αδραγυ 48. 49.	ελατι	34.	κροά	209.
αίξων Ivij.lxij.	ελαγυσα η ελαγυσα	26.	χρῦ	3'i.
αήλαυ iS.io.	επταλιε	61.61.	καυλάων	dxxxii]
αήλαυ 101.	ερεση	46.	καυλάων	Ixij.
αήλαυ 270.	ερεσορε	173.	καυλακω	126.
αήλαυ 87.	ερεσορε	360.	καυλακω	71.
αήλαυ clvj.	ερεσορε	iS.		
αήλαυ U.	ερεσορε	18.	καυλακω	8.
αήλαυ 93.	ερεσορε	51.	καυλακω	ccxixyj.
αήλαυ *i.	ερεσορε	201.	καυλακω	35*
Ixxxv.	ερεσορε	clxv.	καυλακω	352.
18.	ερεσορε	360.	καυλακω	87.
clxv.	ερεσορε	29.	καυλακω	xxvij.
54.	ερεσορε			
62..	ερεσορε			
αήλαυ 62.	ερεσορε	ccxxxvj.	καυλακω	Icxxxvij.
αήλαυ 93.	ερεσορε	ilvi	καυλακω	15.
αήλαυ 48.	ερεσορε	18	καυλακω	4.
Ix, clmvij.	ερεσορε	ccxiiij.	καυλακω	xcij.
260.	ερεσορε	cUx	καυλακω	cix xix*
246.247.248.	ερεσορε	cxci	καυλακω	ckxxxiiij.
197.	ερεσορε	I*	καυλακω	4.
clxxxvj.	ερεσορε	Ixxxvij.	καυλακω	07.
104.105. 323. 324.	ερεσορε	xxvij.	καυλακω	cxxxxvj.
cxv.	ερεσορε	3	καυλακω	16.
126.	ερεσορε	Ms ! ^ ' " ^ -	καυλακω	100.
cxv.	ερεσορε	87.	καυλακω	
Ixxx.	ερεσορε	3J7.	καυλακω	
528.	ερεσορε	xlvj.	καυλακω	Ixxjt.
txxutj.	ερεσορε	-214.	καυλακω	61.61.
lxiiiij.	ερεσορε	CCV.	καυλακω	chr.
341.	ερεσορε	110.	καυλακω	clvj.
clxxxix.	ερεσορε	CXCI.	καυλακω	cl.v.
18.	ερεσορε	civ.	καυλακω	xxxij.
109.	ερεσορε	ch v.	καυλακω	is-
XV.	ερεσορε	Ctj.pcij.	καυλακω	64.
197.	ερεσορε	3j.	καυλακω	
111.	ερεσορε	14.	καυλακω	17*.
JJI.	ερεσορε	1.4	καυλακω	CcxxXvij.
237.	ερεσορε	87.	καυλακω	clxxxvij.
201.	ερεσορε	70.	καυλακω	ibid.
xv.	ερεσορε	14.	καυλακω	126.
lxix.	ερεσορε	cl.	καυλακω	189.
xxx ij.	ερεσορε	7CT.	καυλακω	xtvj.
xxx vj.	ερεσορε	cxliiij.	καυλακω	33.
J30.	ερεσορε	12.	καυλακω	cxxxxvj.
cciiij.	ερεσορε	87.	καυλακω	
jo.	ερεσορε	clij.	καυλακω	37.
266.	ερεσορε	14.	καυλακω	18.
3.	ερεσορε	8fi.	καυλακω	364.
xxvj.	ερεσορε	17.	καυλακω	cclx
	ερεσορε	17.	καυλακω	108.
	ερεσορε	Ixxv.	καυλακω	?J<
	ερεσορε	48.61.	καυλακω	i6.8^
	ερεσορε	cxliiij.	καυλακω	
	ερεσορε	* XXJ.	καυλακω	
	ερεσορε	ckxiiiij.	καυλακω	I, O.

INDEX .

ῥιζώδης ῥοδία ῥίζα	71.	&Q-	14.	ῥοδία ῥίζα	21d
Σατύριον ῥιζώδης	hv.	Τερμινθία ῥιζώδης	IJ.	ῥοδία ῥίζα	21.
VWr.-i	I Jo.	ῥιζώδης	I'.	ῥοδία ῥίζα	28.
ῥοδία ῥίζα	xlj.	ῥιζώδης	coJiitj.	ῥοδία ῥίζα	31.
ῥοδία ῥίζα	117.	ῥιζώδης	ccxliij.	ῥοδία ῥίζα	33.
ῥοδία ῥίζα	171.17*.	ῥιζώδης	362.	ῥοδία ῥίζα	2lix.
ῥοδία ῥίζα	dtijxliuj.	ῥιζώδης	CAC.	ῥοδία ῥίζα	109.
ῥοδία ῥίζα	xlvj.	ῥιζώδης	92.	ῥοδία ῥίζα	esc.
ῥοδία ῥίζα	Iaiij.	ῥιζώδης	92.	ῥοδία ῥίζα	118.
ῥοδία ῥίζα	£1.	TfXyIJ/99	92.	ῥοδία ῥίζα	332.
ῥοδία ῥίζα	11.	T{a'^	92.	ῥοδία ῥίζα	332.
assfjiu	Io j.	T&fifyarQ'	316.	ῥοδία ῥίζα	64.
ῥοδία ῥίζα	ccxiij.	ῥιζώδης	CCxIj.CCXLj.	ῥοδία ῥίζα	317*.
ῥοδία ῥίζα	IIv.	ῥοδία ῥίζα	lxxxv.	ῥοδία ῥίζα	117.
ῥοδία ῥίζα	345.	ῥοδία ῥίζα	cl.oiiij.	ῥοδία ῥίζα	elxxxvij.
ῥοδία ῥίζα	331.	ῥοδία ῥίζα	Jtciiij.	ῥοδία ῥίζα	85.S7*.
ῥοδία ῥίζα	lxxxv.	ῥοδία ῥίζα	7'.	ῥοδία ῥίζα	ccij.
				ῥοδία ῥίζα	326.

INDEX LATINVS PLANTARVM
QVJE IN HAC HISTORIA
CONTINENTVH

A BIES pag. '34.	Anclufa	dxv.	Aphodelui	19i.197.cdv
Abtesmarina Jf.jf.	Andtoface altera Matthioli	exxxiiij.	After	xijij.iiij .xv ^ v j
Al'rototium tcmi ni 541.541.	AndiofaceBdionlj	gi.	Aftragalus	ccxxxij.cccxxxij.
Abfinthium }8-)9-)40.	Anemone hortcn(is	248,149.	Afrantia	ccxiij.
Acacalis 46.	IJO.IJI.Z^ .I54-M5-M-		Acriplex filveft biccifera	135.
Acacia l.Ma:thio}{ •	2j7.ij8.1j9.160.161.161.		Avellana Byzantina	11.
Acer j>.	Anemone Mompelliana ? 3^.		Auriculauifi	301.303.304.
Acinos Diofcor.	146.147-148-			305.
Aconitum xciiij.xev.xcvj.	Anonis miiior	99.	BACCARM Diofc.	**j
xcvij.xcvij.	Amfum	ccij.	Baccharis Rauwolfij	ibitl
Aconitum bacciferutn	Anchora	Xcvij.	Benedida	<<<*
Ixxxvj.	Anthriscus Plinij	excix.	Berberis	1:0.
Acotum ljo.iJI.	Anthyllis	clxxxvj.	Btllis media	<l>fi*
AdafaPlinij	Anthyllis leguminofa	ccxixij.	Bctonica	xxxvij.i.*'1*
Jxxxvj.	Apharca	48.	Biftoru	Ixvij-l'1*.*
AtlminbilisPeruana	Apocynum	114.115.116.	BlitummajusPcuariuiT'	1**1'
Ixxxix.xc.	Apocynum Syriacum	Ixxxvij.	Boletus	cc k k i j c ^
Adonisflos afij. J3 J.jtf.	Aquilina	cciiij.ccv.	Brafficacampcftrii	ccxvij.
Adrachnc 48.49-	Arabis	ccxv^.	Braffica virgau	ccxvij.
Agriomdea 6j.	Arachidna	Ixxix.	Btkaanica	Ixvij.
Alarcims \$°-S'	Arbor filici fimtlis	j7.	Bruta Plinij	37.
Alcea xxv.xxvj.xxvij.	Arbor Gadenlis	2.	Brya filveftris	41.
Aldiimilla cvtij.joS.	Arbor Iudz	13.	Bupula vide Prunella	
Aleftorolophosalpina	Arbor indta	jo.	Bulbus criophorus	1?2.173.
ccx.	Arbor vitx	jfi.	Bupthalmum f J*-Sf *	**2.
cxj.	Arbutus	47-48.	Bucomon	
Alfiumalpinum 190.	Archangelica	cxtv.		
AlliuiTiiirfinun^	Aria	11.	CACALIA	cxv.
Alnus u.	Arifarum	Jjtxiiij.lvxiiij.	Calamentum inodormf	354.
Aloe clix.cix.	Aristolochia	lxix.lxx.lxxj.Ixxij.	C ale i trap a	*ij.vij.
AlopecurosnomiuHonim	Armerius flos	187.	CalJiapaluftrit	ccij.
xlv.	Arthemiffa rcsuii folia	340.	Campanula	clxxj.
A figena ^4.	Arum Byzantinum	Ixxiiij.	clxxij.	
Alfirie clxxx-ij.clxxxiiij.	Afarina	CMIJ.	Canna Indica	Ixxj.
Althxa xxtij.xxiiij.xxv.	Afdepas	u6.edv.	CantabricuPlinij	xlix.
Alypum quorundara 91.	Aspalathus alter	105.106.	Cantibric.i quorundam	ibid.
AlyTum Galeni xxxiiij.	Asperula or'otatoflorc	cixv.	Caniaminc	ccxvij.cxxvij.
AlyTum minimum cxxxij.			fixix.	
Aminita Pauti celxxij.				
Ambrattulcii }jtf.				
AmellusVjrgilij xvj.				
Anabafis 91.				
Anagallis chxxij.clxxxiiij.				
Anagyris 95.				

Carduus

I N D E X

<p><i>Carduus eriocphalus</i> cliij. <i>Carduus mollior</i> cl.clj. <i>Carduus muricarp.</i> viij. <i>Cardina</i> clv.clvj.clvij. <i>Mryophyleus flos</i> 281.285. 284.285.286.287. <i>Caryophyllata</i> cij.cij.cij. <i>Casia quorundam</i> <i>Castanea equina</i> .7' <i>Castanea peruana</i> 8.? <i>Catanance</i> cxj.cxij. <i>Cattaria tenuifolia</i> zxxij. <i>Caucalis</i> ccj.cij. <i>Caucon</i> ?% <i>Cedrelate</i> J9- <i>Cedrus lycia</i> ibid. <i>Cedrus phoenicea</i> <i>Celastrus</i> .1. <i>Centaureum flavoflore</i> dxxx. <i>Centaureum majus</i> x.xj. <i>Cepcea</i> lxvij.lxvij. <i>Cerastium avium</i> 6. <i>Cerastium aurca</i> .3. <i>Cerastium Macedonica</i> 64. <i>Cercis</i> .13. <i>Ceruus</i> <i>Cerithe quorundam</i> clxvij. clxvij. <i>Chamaebalanus</i> ccxxxij. <i>Chamaecerasus</i> 64. <i>Chamaecistus</i> 74.7\$.76. <i>Chamaedaphne Diof.</i> 278. <i>Chamaedrys</i> 351.352. <i>Chamaegenista</i> 10 J. 104. <i>Chamaeris</i> 114.11j.z1ff 117. <i>Chamaeleon</i> cliij.clv. <i>Chamaeleuce Plinij</i> cxij. <i>Chamaelinum</i> 319. <i>Chamaemepilus</i> £0.6. <i>Chamaemorus</i> 118.119. <i>Chamaepeuce Cordi</i> 81. <i>Chamae y Austriaca</i> chxx- .ij.clxv. <i>Chamaerododendron</i> 82. <i>Chamaeyce</i> clxxxvij. <i>Chamelaza</i> 86. <i>Chamelazefolia</i> 82. <i>Chamae radix</i> Cxcij. <i>Chelidonium</i> ccij. <i>Chrysanthemum</i> 3J1.J J2. 3.3.334.335. <i>Chrylocome</i> 326.327. <i>Cicer silv. Matthioli</i> ccxxxij. <i>Cieereula Agyptiaca</i> ccxxxvj. <i>Cichorium verrucarium</i> cxliit. <i>Cicutar</i> . <i>Cinnaberis Diof.</i> 1. <i>Cirsium</i> cxlvij.cxlj.c. <i>Cistus annuus</i> 7tf77. <i>Cistus femina</i> 70.71.72.73. <i>Cistus ledon</i> 77.78.79.80.81. <i>Cistus mas</i> 68.69. <i>Clematis altera</i> 1n.112.11j. <i>Clematis daphnoid</i> 111. <i>Clinopodium</i> 353.354.356. <i>Clymenum Matthioli</i> ccxxix. ccxx. <i>Cnicorum Matthioli</i> 89.90. nic^ clj.cLj. -032 uhn, terra Plinij 170.</p>	<p><i>Coccus infectoria</i> 24.25. <i>Coggrygia</i> 16.17. <i>Colchicum</i> 199.100.101.20i. ccvij. <i>Colocafia</i> . Ixxv. <i>Colutea Theoph.</i> 14. <i>Coliitea fcorpipedej</i> 97.98. <i>Colytta Theoph.</i> 14. <i>Condrilla</i> cxliij. cxliij. cxlv. <i>Connants Alexandrinorum</i> 17. <i>Confolida regalis</i> ccv. <i>Convoivolasalches fol.</i> xlix.1. <i>Convolvulus minor</i> .]. <i>Conyia</i> . xix.xx.xxj. <i>Coraldrbor</i> . cdij. <i>Cocallitiilatifol.</i> ecl. <i>Coralloi des</i> . exxij. <i>Coris quorundam</i> . ctxxij. <i>Cornus</i> . 13. <i>Corona frattutn</i> . cliij. <i>Corruda</i> . clxxvij.cJxxvij. <i>Corrufa Matthioli</i> . 307. <i>Corylus</i> . JO. <i>Coimus Plinij</i> . 16. <i>Cotonafter</i> . 61.61. <i>Cotyledon</i> . lxij.lxij. <i>Cratxgus Theoph.</i> . 9. <i>Crarxogonum</i> . xlv. <i>Crista gallinacea</i> . ccxj. <i>Crocum monannin</i> . 208. 109. <i>Crocum Termtm ioj. io^, 10j.</i> 205.107.108.cchx. <i>Ci-oton Anguillarse</i> . p j. <i>Cuci</i> . j. <i>Cuprefitu marina</i> . 3 c. <i>Cyclaminuj</i> . 2Cj.i54.i(Jj. <i>Cydonago</i> . 62.. <i>Cynogloffium</i> . clxj . cxij . cKij. <i>Cytifus</i> . 33.94.95.96.97. ccxlvj.</p>	<p><i>Ericha</i> 41.42.43.44.45.46. <i>Erinacea</i> . lc7- <i>Ervum Cordi</i> . eexxx. <i>Eryngium</i> . diij. civ., clvij. clvij.clix. <i>Evonymus</i> . jtf.;7.8i. FABACO !\$ <i>FabayEgypua</i> . Ixxv. <i>Fabafuilla</i> . lxixv. <i>Fagulus</i> . S S* <i>Filipendula</i> . ccxj. <i>Filixpumila</i> . ccij . ccxij. <i>Flammula Macthioli</i> . i.M. <i>Floscancri</i> . IxxXij. <i>Flos Perficus Sifynrichio con-</i> <i>gener</i> . 27- <i>Fecniculumtortuofum</i> . excix. <i>Fecnutn Graccum Tragi</i> . ccxxx* . "). <i>Fraxinelk</i> . 100. <i>FritiMaria</i> . ij 2.353.cclvij. <i>Fruce coronarius</i> . j j. <i>Fumus terr*</i> . ccvij. <i>Fungi efculentu</i> . eclxiiij. eclxv. & fequentibus paginis vftuc adccclxxvj. <i>Fungi peniiciofi</i> . cclxxvj.& feq. pag.v(c)uead . ccxev. <i>Funguj Latinis Iuccris inferi-</i> <i>ptus</i> . cdxxvj. G A L E c A ccxxxij.ccxv- vij. <i>Galeopfis</i> . xxxv.xxxvj. <i>Galliun^rubto^ioxe</i> . clxxv. <i>Genifta Plinij</i> . ioi. <i>Genifta vtilgaris</i> . 103. <i>Genifta cinfortia</i> . rol- <i>Gentiana</i> . 3u.3ii313.514.jj. 316. <i>Geranium "</i> . xcix. c. cj. cij. <i>Geum Plinij</i> . Clj. <i>Glandes twreftrei</i> . ccxxxij. <i>Glaux</i> . ccxxxij.cxl.cclxj* <i>Globularia</i> . vj. <i>Glycyrrhiza rol.Gefneri</i> . c c- xxxij. <i>Gnaphalium</i> . %tf, j iS,jl'.j. 330. <i>Gramen</i> . ccxvij, ccxvij. ccxix. <i>Graffularia</i> . 120. <i>Guayav*</i> . ccliiij.</p>
<p><i>Draba</i> . cKxiiijcxXV.cxxvj. <i>Dracoarbor</i> . 1. <i>Draconisfangnii</i> . 2. <i>Dryophonon Plinij</i> . 17. <i>Dyq xios</i> . 61, ECHIVM chtij.cxluij.elxv. <i>Eleagnus Cordi</i> . 86. <i>Elcchryfum</i> . > ij -ji^- <i>Elleborine recenciorum</i> . 27(• 2727J . <i>Eileborus</i> . 174- <i>Elkborus nigr Diof.</i> . Podo- mo ., 308. <i>Ephedn</i> . 51.</p>	<p>H U I M V I Ji.JX. <i>Hedencilicia</i> . ii)« <i>Helenium yEgyptium</i> . cclii j. <i>Hcliotropium</i> . xlvj.xlvij. <i>Hem trocall is</i> . 129. <i>Hemerocallis Valncini</i> . i(87) <i>Hemionitis</i> . ccxitij. <i>Hcpatteairifolta</i> . ccxlviij.ee- xlvij. <i>Hcptaphyllum</i> . cviiij. <i>Herbaccrvi</i> . jji. <i>Herba ludatca</i> . xlj. <i>Hermodactylus Syriacus</i> . 202. <i>Hcfpcris</i> . 296.297. gg Z Hicta-</p>	

I N D E X .

Hieracftini .ontxix.cxl.cxlj. cxlij.cclx.	Lilium Byzanz. miniat. 131. 13 ».	NAPILIVE vu.garfj xcf.
HippogloiTuroValenfinum 50.	Lilium convallium 190.	Narciffiis 1 j4.15j.15rf. & alij*
Hyppophaes viij.	Lilium fatuum i)<	quot paginii fubfequenubij, & eclvij.
Hippophxfium ; 00 .viij.	Lil. Perfieum 117.118.129.	Nardusceluca&rmontana Ivj.'
Ho] oft cum cx.ocj.	Lil.punicenni i}6'	Ivij.
Horminatn filveftrc xxyij. xxix.xxx.xxxj.	Lil.rubrum -1?!	Mafturtiolum exxix-
H^aanthus 174.17j.17fj.177. lyh 179.1&0. iv J.I 81.183. 184.1 S j.cclvij.	Lil./ilv.fivc moman. 1 j j. 1-+; cdvj.	Narturtiura Valentinum exxix. exxx.
Hydnophyllon 77.	Lil.Sulianum 115). ijo.	Natrix Plinij ' toa.
Hyofciris Plinij /, viij.	Itinx 6.	Ncpa 10C
Hyolcyamus kxxii j. lxxxiiij. ; rxxsv.	Limones <A*	Ncnonalptnum 9t>
Hypecoum legitinum xciiij.	Limonium peregrinum lxxxij.	Nymphxa Ixxvj.lxxvi/.
Hypericum ftipinutn clxxxj.	Linacia il. 0.120. xxi. xxx. xxx.	OctMASTitvM Valentinum*
Hypociftis 68.79.	Linum filveftrc ^7.318.519.	Xlij. ;
Hy^ogloiTum 278.	LirionarciiTus Hemcrocaillidis racic 1^7.168.	Ocimum Indiciim 312. xvj.
Hyflbpus vulgacis 3 /6.	LiriomaltcruraTheoph. i(fj. Lithofperrum -clxij.	Odotuio Plinij 292. 190.ccxj.
I A c E A vj. viij. viij.	Locuftar inulmiradkibustj.	Oenanthe 27.
Iacobrea scxj. xxij.xxuj.	Lonchitis ccsij.ccxij.	Ocnoplia Bcllonij
Iafione Plinij]	Lotus ^Egypr- lx.wj.	Olca i j . jtf.
Htecebra U,	Lotus Athctisi i9.	Oleafter i<f.
IleX 21.12.	Lotus Lybica 27.	Ocobrichis carxxij. ccxxxij* ccxxxvij-ccxxxix. ccxL
Iris 117. 218.21 p. 123.221. 2ii.ii.; 214.	Lotus Pharidis 2.?	Opuntia marina cd*
Iris anguftifolia 21\$. 119.230.	Lotus fcc.Theoph. j.	Orchis atf7.i.<f8.i69.27*»
Iris bulbofa 205M10.111.. 212.it}. 114.215.	Ijiiiiiifiii^uofus cclxij.	Oriofclinum exev.
Iristripolitana 227.	Lunaria cxvij. cxix,	Omithogalum 1S6.187.1 SS< iSj.cclvij.cclvij.
Ichftmon Plinij cexvij.	Lupi " 214.	Orobanchid 170. 271. ba
Ilfhas cxc. exej.	Lupin ii j cexxvij.	Orobuz ccxxx.cccxxj.cccxxij*
Iuglandis genus 10.	Lupulus 11*.	Oftria 55-
Iuncaria clxxiiij.	Lychnis ill veftris 288.28^. 3J.O. 291.292,29}. 274.	Ofyris 91.
Juniperus ", 37,38,	Lycium 111.	Oxalij maxima xix- 64.
LACATMA Theophr ^f.	Lyftmachia 1. ij.lijJijj.	Oxycedrus 39- cclxiiij.
Lachryma lot " cevj.	M A l v A trimeitiis xxij.	Oxytriphylon cclxvij*
Lada Si.	Malum terra lxxij.	Oxys cclxvij*
Lagopus ecxlvj.ccxlvij.	Malm aurea 6*	PADVS Theoph. <fj*
Lamium xxxvj.ixxvij.xxxvij.	Malus raedica J.^-7»	Pactos 0.
Larix H-JJ.	Man Jragora femina txxxv*.	Paronia 275i.s80.281.
Lachyraj/it. cexxix. cexxx.	MandragorasTheopli. Ixxxv.	Paltna marina ccl>
Lavendula mulcili Jo folio 545.	Marrubhini xxxiiij.	Pancratium 17*
Laurocerafui 4. j.	Managon 136.137.	Panicum «xv.ccxvj- xcj.
Liucus A!e\andrina 378-	Marva Ian tufa Xxxiii j.	PapavercornicuJatuni xcfj.
Laurusfilveftris 50.	Marum jj(>.	Papavcr fpinofum xcfj.
Laurustaxa 278.	Maftiche 14.	Parietaria/ilvefhis xliij.Jlv.
Ledon 77.78.79.80.81.	Medica cclxij.ccxliij.	Parbnychia Hifpanica clxxxij-
Lcdumatpinum 81.81.	M clam py rum xlv.	Parthertiutn H^ -HV
Ledum Silcfiacutn ti.it.	Melandrium Plinij 291.294.	Peplis ckxxvijf*
Leimodorura 270.	Mclanthium ccvij.ccvij.	Pcrdtcion cyh*.
Lentifcinarefina 15.	Mciillbphyllum xx.tvi;.	Peri cly menu m J7-J8-/9*
Lcnrifcus 14.	Menthallrum xxxij.xxxiiij.	Perfca " J.J*
Lcontopodmm j18.cxj.cxij.	Milltfolium 3 j l. eclj.	Petafitci cxvj.
Lepidinm Nebrifs. cexxiiij.	eclj.	Petromclis <8**
Leucanthemuni alpinmn j } j.	Mimulus Plinij «xf.	Peucedanum cr.evj-
Lcuc.is montana j\$z.	Mollugo dxxvj.	Pczjca fungus crfxvj.cc^C*
Leucoiu bulbofum 1tfs.itj.170.	Moly 191.192.1pt.194.jQt. 196.	Phallus Iunii cclxxxvij.ccxv*
Leucoium mstrinu 29Jt.cxxxiiij.	Molybcdn* exxiiij.	Phofeoltis ccxxir.cccxiiij.Jt*!1*
Leucoiam filveftrc 299.	Mufcari 178.17^.	quotfequenubuipag.
Leucophlacos Dalccchamp. 8j.	Mufcipula 2p4- :9(. ccl.	Phillyrea J1.J-Jj* //*
Lichen marinus ccl.	Mufcus marinui ccl.	Philyca xxvi. 108.
Lili-aphodeius 137.	Mufcui terreftrii cclxlix. 36.39.40.	Plirnyion cccxiiij.
Lilio-narciffiis r 57.15S.1 ;o. 140. & aliquot paginis (c- qu.	Myric* 41- 36.39.40.	Phyllium jclvij>- v.
Liliumjlbun Byzant, 135.	Myriophyllumpelagicam eclj.	PhyiennaDiofc. Picea
	Myrtociftus 6%.	
	Myrtomalii <T«	
	Myrtus ¹ 6j.66.67.	

X N O E X.

Pilofella minor	33.34.7	Rubus Idaeus Sefixatiliij	117.	• X AfSJA ORT v Kf inodorum;
Pimpinella	76.77	Kmncxhtifolius	Isix.	337-338.
Pimpinella spinosa	cjevij.	Rutacanina	ccix.	Teda " 33.
Pina'iki	109.	Rutamontana cxxxv. cxlvj.		Telephiura lify.j^j.kvij.
Pinguicula	31-32.43.	.\$ AB 1 HA baccifera	37.	"trc&intliinarefina 15.
Pinustibuius	310.	Salix	85.86.	Tettbinthus M'^T
Pipertis fblgUa	„ J4-	Salficortcx-	18.	Tetrami xl.
PHtofoclia	cxij.cclix.cclj.	Snlvia	34>-J+3-	Tttralix 46V
Pifum filveftrc	ccxxix.	Sanainuiida	• 88.89.	Tcuctiuin
Picydes	5i-	Sanguiforba	exevij.	Thapfia t excij*.
Plamago	CIX.CK.	Sanicuh montana	JC>&ioy,	Thlafpi cxxx.cxxxj.cxxxi
Platamis	y.	Sanicula trifblia	tvxvij.	cxxxij.
Plumbago	cxxiij-cxxiiij.	Sa-Kifra^a	joS.cxcvj<C*dvij.	Thora Italica xcvj.
Potmm	361.jj62.56.	Scabiofa	j .ij-n; iij.v.vj.	Thyrobra 355.
Poiygala	98.99.jt4/jtJ.	Scamnotiea Vaknc.	1L6.	Thymelra 87.
Polygonarum	175.176.177:	SaVh	>7<.	Thymara 357'
Polj'gonu'mqiiianum Plinij	31.	Scolymus	clij.cliij.	Timis 49-50.
		Scorodoprafon	190.191.	Tipha cxxv.
Polytrichi	clxxix.	Scorphis	106.107.	Tjthymala; clxxxvij.cxxxix.
Poterium Dalechampi	108.	Scorfont-ra	exxxvij. cxxxvij.	cx.
Primula veris	joo.joiijoi.		exxxix.	Tradititum clxx.clxxj.clxxij.
Pruna	4.	Scrofiaria	ccix.ccx.	Tra acantha altera 107.08.
Prunella	xlij.sliij.	Sernridaca	cexxxvij.ccxjtvij.	Traei<m akerum Diofcorid.
Piunus myrobalanus	4^47'	Se<ium	lvijJvij.lixJx.lxj-hij.	cTCVij. 93.
Pfrudo-apios	ctxxxij.	Selinum	cxcix.rc.	Traeri anum 355.
Pfeitdo- afphodelui	1 j-S.	Scndoftctias	x*ij:	gg
Pfcudochaniipitys	clxxxv.	Serpillum Tilveftrc	3 58-3 59-	Tragum vulgare 3^7*
Pftiidoleontopodium	5 lo.		360.561.	Trbulusaquatiaia minorclijj-
Pfeudonarciflus	164.165.166.	StrntulaMatthioli	vij.	Thbnlus terreftris cclxj.cclij.
Pulmonaria	clxix.cjxx.	Scnulaia	ccl.	TrifoliLim 100.1 • 1 .cclxij.
Pyracantha	^4-	Sc&moides quorundam	2?j.	cxlv.ccllvj.ccllvij.:
PyrAfter-Id*	61/	ScieVi	cxciij.c.;ciiij.cxcix.	Tuberes 25^
PyroU	cxvj.cxvij.cxvij.	Sideriris	XXXix.xl.xlj.	Tulipa I 37.138. &frauentti
Pyrus cervina & petra	62.	Siler,	85-cxcv.	bus aliquot paginis ukjuendi
		Siliquafilveftris	1 J.	Turcira exxv).
Qvjnevslatifolh	10	Sinapi pilmilum	exxix.	Tuifilago c'ij.cxiiij.cxiij.
Quejcus marina.	10>1.	Sifyiinchium	t16.2i7.CcWj-	VACCINIVM Plinij 6y,
Q^ercus f em per vi tens •?		Smilaxafpcia	Ii 2. u j.	Valeri.tna ltiijv.lvj.
Quinquefolium	cv.evj.cvij.	Solnum	Ixxxv.	Veratrum nigriim j. ij.ij.iiij.
		Sqldanellaalpma	3C8.30?.	174;
		Soachus ~	cxlvj.cxlviij.	Verbafeum (ilveft. xxvij.
		S Ol bus	?•	Verbena xlv.:lv[.
		SparganiumPlacx	1^4	Veronica 34*-> 3 47.
		SpacuumGraecoruni	101.	Vicia cexxxv.
		SpMtuai Plinij	ctxix.ccx.	Viflorialis longa i8\$>.
			cexxj.	Viola Mariana cl^xj.
		Spina appendix Plinij	12 1.	Viola montana 509, \$ 1 o.
		Spinainfectoria	Ifl.	Vifcum zo.23.16.34.J9.8 j.
		Spirxa	84.	Vitislaja 61.61.
		Spongiofi.fungf	eclxiitj.	Vitis filveftris m-
		Stachysfpinioia	eclix.	Vlxnaria exevij.
		SiSs	34-	Vvamamu 5fi.fZ.
		StcubcSsImantica	ix.x.	Vva taminia 122.
		St<chas	344.J4i<	Vva urfi 63.
		Stratiotesmillefolia	3 30.	XVPBIVM 130-
		Suber	*'•";	
		Suilli fungi	cckx .ccxcj.	Zi ZYPHV s alba 23.jo.
		Symphitum tuberosum	clxvj.	Zizyphus nicilj 2.\$.
		Syringa feutex	55.56.	
RADIX cava	171.			
Ranunculus gnitnofa raclice				
2 J 71 J8. & p' j' mis aliquot				
fcquecinbns.				
Ranunculus montanus	254.			
215.236.237.				
Ranunculus praecox	13 a. i J 5-			
Ranunculus silvarum	246.			
247.248.				
Rapunculus	clxxij.			
Rhamnus	109.110.111.			
Rhodia radix	lxv.			
Rhu'j	17.			
Ribes	115.110.			
Robur	18.13.			
Rofa	115.114.Hj.n6.			
Rostnarcus filvdIriJ	83.84.			
fcabia	clxxvj.clxvij.			

INDEX CONTINENS PEREGRINA
PLANTARVM NOMINA QJJB IN HAC
H lifo R kfa DESCRIBV NT V R.

A ^{BB EIS}	237.	Azadarac	3c.	C. lorya	xciiy.
^{beta}	34.	Azal-Xochitl	1J7.	Cafelale	150.
Abbd	17.	Azehudie	27-	"	64.
AbiVctj		At-edarAeth		Camarittkra&Cawmidnts	6.
Abrejas	tcxij.	Alette d< mat A		Camatet	Ixxviif.
Af.jrattfahütg	ulj.	Azte		Camparilla	ti(T./.
A.tro	9>	Azule		Candiitra	XXVIq.
Afofet "as & Atoftift	19. & AfU-			Ca&Miji	(x<%.
faj ^{*, •}		BABA PATZANZA	ccclxxij.	Canweift	.545-
Amct nas amarillas	164.	Bagoly gomba	clxxvij.	apavilla	11
Albafter	9.	Baquenaudier	14.	Gardo (orredor	ii.x.
Albena	17.	Blaw Baldzian	181.	Caidon	(Ixj.
Adrada	48.	Baltacan	cxq.	Cardan tethM	ciu.;
Ahozn	9*	Bamia	xxv.	Carra	xltx.
Aus	lxxvij.	Barboza	9'	, Carebe& Ca'tblt	, 14,
AjodecigmmM	180.	Barcnblat	81.	Carouges & Carouges	
4jurjera	(Xllj).	Batagan	Ixxxf.lxxvij.	Ca	J1.
Ala er	clq.	Bawengel	351.	Cijia%iiadi avail*	8.
AUder	57.	Stideeuf	Of.	ad Ca anefi	8.
Aiejt Suptm	221.	Bel in	lvj.	Cj Vrtij Life	150.
ALttnu.	51.	Sehtn	292.	Caucufon	191.
Alb *r din	clxx.	Beidclfar	kxxvij.	Cebolia albarrana	171.
Akokaz.	lxx:\	B:Vnit	ibti.	Ceboltadecuiebr*	
Alter no qnc	li.	Belin holtz	39.	Ceboliiiu	
Alzte		Bel	lf.	Cecapofet	20.
Alfabec*	tfxxxy.	Belbo	P2.	a. Ceeftanefi	8.
AlgAXOVO	13.14.	Belend	uetxv.	Verifier itim	64.
Alii britt franc fI	34 f-	Belfft	txxvij.	Cents	tixxxrj.
Mifter	9-	BeSaAunna	Lx.cv.	Chamepidu	1xx.
Altfa	IS.	Bellair	icp.	Champgnm	ccclxxvj.
Jlkg4 (am	113.	BeBors	3jt	Cbxfagut de ch'yal	8.
184	137.	Benedicten Prant	fill-	ChtUdmt	61.
Mae	12.	Benedicten wurtz	(*) *	I Cbtif*	20.
Atyergat	12.	Bei.oitre	9;	Cberme	55.
Alpnjen	tlxxix.	Bergrofen	cxxxvj.	Cbettttpt	41.
AhamxiA	82.	Berkinye	lxxvij.	Cbefiue verd	23.
Alubias	304.	Bf4	ccixvj.	Chepiette	352.
Alubias	ccxxvj.	^ulte "3A licit	lxxvj.	Chopörke gomba	clxxvj.
Ama lat	xcj.	QPiltit frupt	lxxvj.	Chaltwurtz	274.
Jlmtlauibn	62.	cin	tAxmii.	Cimmo	ixxx,
Atnvttt n/im	167.	Bvz de & Bvzante :		Cbypkefa	
Amotet	txxrij.	2A becin	cctortXtf.	Ciden fari	KJ4.
Amour tut	uxrtij.	2A (fci) frfwamrtwn	313.314.	Cidras	
Angerling	ccrvij.	2A wurtz	241.	Cinoploffa	clxuj.
Arabifche Jacinthem	186.	2A wurtz	clj.	Clavellinas	216.
Araghoen		Boga	96. & Boxe.	Colias	txxv~).
Aibeld' amor		Bt>i) a fairr lardvitet	57.	Copombillos amargos	(xxxvij.
Jrbetparajffo	30.	Bokzoigomba	ccclxx.	Collejau	
Artujitr		Bom quibir & jbugiet	16.	Collajan	(xxvtj.
jübrede \lt	3?*	Horfosgemb*	ccclxxvij.	Cnmriettl	ccclxxij.cccx.
Ardivujx	75.	Borafaurtriwt	ccclxxvj.	Cm» ^ambach	
Argamula	clxv.	Braehen dijfel	"*.	Coquitloirdts	i€6.i£o.
Arniotüts	287.	Breco	* 6.	Coraconillo	dxxj.
Amabelle	ccx.	Bvcm rappe	271.	Cor<i-r	10.
Arveira	15.	Bvust beclit	29	Cormtubra	15.
Arzolla	Tf.	Brtjtert	4J)*	Ceromlla defraylt	91.
2	10.	55:: Am ftfuwmintn	Kij*F.	Ceror.ittadtXtf	pp.
Afparagt	clxxix.	Bugloffa fylvatica	ilxv.	Coecj.	24.
Ajilli	ilxxij.	Bugloffa fawage.	ifa£	Crafitraut	301.
Atoi	46.	Buhurmeneiti	264.	Crrfpwo	H I.
Atramocwdecan	rtxxxtij.	Bult; cclxxj.cclxxij.cclxxij.	ccclxxvj.	Cuentas	lxxvj.
Auhe (pme	111.	Burhalaga 89.	311.	Culcas	lxxvj.
a fi fca Ca	278.	Butter wozt	x.	Çummaque	17-
Anlag	106.	CABEÇVELA	39.		Çum il
Aulnt	11.	Cade			12

IN D E X;

Cypres	txcix.	G A O I L	17.	gemeine Haisflonge	elrñf.
	34*	Gaiambic ^A *	elcex.	Hohen Schwammen	elcexvñ.
↳ AIADER		telxx.		Holder schwammen	elcexvñ.
Damar	elcñ.	GalitiactU	aixñij.	Holtz schwammen	elcexvñ.
Devebolini	156.162.	GatipoitUli *	263.	Holzschullen	elcexvñ.
Dizno gomba	uitxy.	Galazinya fa	121.	Huale á majiic	15.
Dizno repa	264.	Gamarfa	(xxxvij.	Hundolcer	, Mb
Hit	13.	Gamencifcs & Gamints	Ij>7.	Hundofrechen	59.
Vihum	204.	GAHJOU	elcexvij.	Hundzung	drñf.
r'OifftUt	elcexvñ.	Gardvancilfos	((xxxij.	j'unnrtaub	8i<
Doinwurtz	50.	Carlobo studen	62.	Hutref	274.
Davulo	fttv	Garoupe	86.	Hys	KM*
	*	Gaspeldoze	104.	Hysynum	24.
Eberwurtz	12.	©tit bttierf	104.	I A R O	txxijñ,
Ecdidifid	65.	©lfbcftee	106.	Iafmin roffe	xx.
Egorfa	174.175.	©t(6 Lowtm\$6 humtn	186.	Iauge	107.
the		©elb Merez blumen	16C.	Uvorfit	9.
Elcxen	39.	©eel tydelofen	pl.	Teger beer	ti.
Elleboze blanc & noir	39.	©emfwurtz	39.	frrgr trout	1)7.
Enchro	lvñ.	©encvve	24<f.	Igluze	104.
Eufayon	313.	©ettgrofafoatic*	352.	Ignams	Ixxix,
Kleine Entlian	18.23.	Gttmid.ee	men *	Ihar e	9.
Exalinos		Wpft Haw	elcñ.	Ittn	51.
Enzina	11 IV	Wepfz schwammen	CffT.tr.	Ilyan zuet	137.
Enzise	Si*	Gylio	274.	Iphathe	Ixxvij.
Erffel		Gyllo marine	167.	Icye marin	107.
Erdt apffel	46.	GtiepTo	39.	ivAquttitt	159
Erdt pfawumen	107.	Gtroptsfauvagn	214.	Imp	rifer.
Frica	12.	Gingiole	29.	Irom	338.
Enzo	95.	Gintl	262.	Irim b&bara	121.
Erlbaum	elcñ.	Gitdraut	elcexvñ.	ifien njrU	287.
E cabon	elcexvñ.	Golbzwurtz	134.	Iujubitr & lu'jubtt	29.
Ifchirt	>21.	Golta hore m	en.	Imtquemu	elxiñ
E la rotonda	70.77.	Gouwoatel	elcñ.	tufquiamo	Ixxv,
Efparragos	106.	c<iw d'ftt&latte	24.	K A C H C H I Jefealch	332.
Epim rkettt	elcexvñ.	GtAtue dv perroquet	ilij.	Karran	elñ.
Efleba	272.	Granadctittowes	14.	gelbe Käseblumen	132.
Eulatia	16.	Grafelting	elcexvñ.	Kechke rafifi (A	JV.
Ely Lab	Ixxtij.	Grumwurtz	elcñ.	Kelber	18.
Eze erbyjw fia		Groote nafcape	elcexvñ.	Kemurüberf*	wammen elcexvñ.
		Guardalobo	91.	K. fere w gomba	elcexvj.
F A E L		Guindouler & Gtiindmti	29.	Keske gomba	tiixxSx.
Tatitme		Gtlatumer	16 2.	rofo Keffen	1.
Fay goory			263.	Kepfens	287.
Fay faska		GyeWuzj Wyrag	190.	Kepferlin	301. elcñ.
Seper feartwas gomba				groffer gepe Klee	elcñ.
Selber		HABHII		Knaben kraut	elcñ.
Selber schwammen		Hachal Indi		Unetherms	118.
Selcher grafing		Hadhaba		Körs fa	8.
Fenyo ayugomba		Hagbozn		Köz. fix. fa	8f.
Fenyo fa		Habada		Krenning	elcñ.
kerotios Fenyo		Halm		Kreutz blumen	301.
kür Fenyo		Hanebane		Kreutz wurtz	
terufkei Fenyo		Hanenbuche		Krotten schwammen	wirtftff.
rad Fenyo		Hanekammenen		K ueling	elcñ.
wafz vnd schwartz fcrent		Harmala		K omba	fixity.
Feflu verag		Hafen olein		iLygtohagma	180.
Fette henue		Herba dlatte			
Fenchten		Herbeaux foulmont		LAB LA J	
Sieber kraut		Herbeauxtignes		Laimtta	V-
Filyuero		Herbe aux vtperes		LagrntM it Moyfn	€tnj.
Fix. fa. gomba		Herbe aux vtperes		j.4fc ben'ede	263.
Flambe		Herti de S.Utircnv>		Langue dichien	elcñ.
Flacken kraut		Hcfire		Larnesdt K.Dame	rmj.
Fliegenbert		Hepden		t4firi	elcexvj.
Fliegen schwammen		Hepden ffop ...			
Flubtelir		/pepl alter «Kt[R««t			
Flublanne		H er			
Follado		Hmeffa			
Frañillos		Hurfchling			
Franboisier		wilde Hurfchling			
Frisoles		Hirtzwurtz			
Frefchen fluel					
Fuefpeckkraut					
Fufan					

I N D E X

<i>Langna de bucy Salvag</i>	elcv	<i>Mustral</i>	18.	RA ISNIS de mar	pi.
<i>Lenouvie fora</i>	ibctif,	<i>Myra, Myrre, Myrto</i>	67.	<i>Rapontu</i>	xi.
<i>Lei ho</i>	104.	<i>Myrtus baum</i>	64.	<i>Rijfnl</i>	lxx. j.
<i>Ltmimht</i>	4<f.			<i>Rausch</i>	82.
<i>Lentipone</i>	50.	<i>NABCA Alpini</i>		<i>itt' JH/d</i>	tlj.
<i>tem.y.ida</i>	99.	<i>Nap C' Ndf <4</i>	21.	<i>Rcheling</i>	<Cirsr.
<i>i-enajto</i>	14.53	<i>Narajtu</i>	5.6.	<i>Rekety, fa</i>	Sf-
<i>Lentijquo</i>	14.	<i>Nariff-</i>	162.	<i>Retama</i>	IOJ.
<i>Leplap</i>	14.	<i>OTattTett r?(tfit</i>	161.	<i>kevei' Je matin</i>	ext-
<i>Rechenbaum</i>	it*	<i>'JTjKjcn fffwanucit</i>	Witfc	<i>Reylla hitey</i>	21 j.
<i>Licje</i>	21.	<i>5rtatt<f4wanimc></i>	eeffiff ((mt.	<i>Re nblunnen</i>	
<i>h'muu y Limnti</i>	6.7.	<i>dep</i>	27.	<i>Rhon</i>	. 7.;
<i>fiift.iirt</i>	325.	<i>Neurinos</i>	39.	<i>KoUe</i>	18.
<i>Ltmtrntt</i>	52.	<i>Niwi zek fua</i>	292.	<i>Nobel vnd braun Nobel</i>	.
<i>Ltrio</i>	213.1X17-184.	<i>Niwj gomba</i>	elxx.	<i>Jiemrro</i>	So.
<i>Ltria cardftio</i>	224.	<i>Koger, <da</i>	dxxxvij.	<i>Return mannt</i>	j 17*
<i>tmt ejpad^itui</i>	2 i j.	<i>Kambritdeytus</i>	Nii).	<i>araj Rosa</i>	
<i>fyries jjtlei</i>	ibid.	<i>iiDZitlhtf</i>	U7-	<i>Rojeila</i>	70.
<i>Zifch</i>	224.	<i>Hm.dlti pequnai</i>	208.	<i><6-?lofra</i>	117.
<i>Lobere</i>	cxvij.	<i>Nnfbar</i>	lxxvj.	<i>fUMIKI Of Ct</i>	1)5.
<i>Lo WkeWschin</i>	245.	<i>Nyrfja gomba</i>	cdxx.	<i>piinntmltTiefn</i>	116.
		<i>wilden Schenzung</i>	tb*.		57)
<i>L.Hüte Eitdp</i>	xxi'ij.	<i>ttU-uuiii</i>	26.	<i>Rosenwurtz</i>	
<i>Lunaria del grapolo</i>	cxix.	<i>Vijavages</i>	286.	<i>wilde Rosmaris</i>	364.
<i>Zpnen</i>	111.	<i>Zum</i>	332.	<i>No</i>	
		<i>Zum</i>	26.	<i>Roi-ejerbe</i>	xiv*
MA5 v c AS	217.	<i>Olivastie</i>	30.	<i>blaw Nuckartza</i>	vj.
<i>Maidr. Fa</i>	48.	<i>Olivella</i>	86.	<i>Ruda</i>	cxvij.
<i>Maguey</i>	elxj.		26.27.	SAAR /s?	S f.
<i>Majatro salata</i>	el.	<i>o>vo</i>	27.	<i>Sabd.irifit</i>	xxvj*
<i>Maisferwurtz</i>	cxv.	<i>Openuw</i>	lxxx.	<i>Sadur Serafions</i>	27*
<i>Walbeerbaum</i>	9.	<i>OctiroctorW</i>	cxlix.	<i>Sa</i>	
<i>feyerMuivit</i>	xxix.		Ixnij.	<i>Safran bafr.trd</i>	
<i>Homey</i>	3.		xxvj.lxxx.	<i>wilde Saft an</i>	chi.
<i>MdHcamRt</i>	3:7.	<i>S steelutjep</i>	364.	<i>Safrano /r.zeinefca</i>	ibid.
<i>Manno teew</i>	(Hr.			<i>wild Salben</i>	xxij.
<i>Manta de N, Sr&nt</i>	lxx.	<i>PALMA dtKtttmo</i>	elj.	<i>Salgueditrof</i>	14.
<i>Marabillas del Piren</i>	xc.	<i>PafomiUa & I'domm.t</i>	cxix.	<i>Sa fice</i>	85.
<i>Hitrefnta</i>	f4-	<i>Papas</i>	ixxixjxxx.	<i>Salomon ffchtit</i>	2? 7*
<i>Margendaechen</i>	17.	<i>Panitant</i>	dtx.	<i>Salfero</i>	157.
<i>Marguerites oleuce</i>	vj.	<i>Piffjlcirt</i>	260.	<i>Sandtlida</i>	tixhij*
<i>Martenfchuch</i>		<i>Pafternig</i>	cxvj.	<i>Sanguenht)</i>	
<i>Mafbece</i>	9.	<i>ler-uhodeUt Ninfe</i>	elxj.	<i>Satiguin blanc</i>	ibid.
<i>Mafsch</i>	15.	<i>Penacbio PerfJtit</i>	1 jo.	<i>tottf Soiiieftl</i>	ML
<i>Mata</i>	14.			<i>©ant 'S<ig (c&wammai</i>	tctfmr.
<i>M. it tilerj</i>		<i>Pherlin</i>	el.	<i>Sant Johans braut</i>	14.
<i>Maurachen</i>	cxliij. cclriij.	<i>ierdtpfr*</i>	74.	<i>Sant Peters wurtzel</i>	ff<llif.
<i>Ma ola</i>	xxxvj.	<i>Perlaro</i>	30.	<i>Sap</i>	34.
<i>M J ; ^ I dicnvaltero</i>	cxliij.	<i>Ptztrvx.</i>	caxy.	<i>Sa in</i>	ibid.
<i>Melese</i>	3 f.	<i>Pfifferling</i>	cxlvij.	<i>Sarg4viola</i>	299.
<i>onfer ezowen Melch freup</i>	dm	<i>Pimisrl</i>		<i>Sarrisa</i>	316.
<i>Men hera</i>		<i>Phode Ciguti*</i>	ff.	<i>Sarr, tijtte</i>	Ixxij).
<i>Mestl</i>		<i>pic de borro</i>	209.	<i>da San</i>	t<xxz\.
<i>Meiitte</i>	67.		17.	SAUU	h
<i>Mezey zech flu</i>	286.	<i>Pitted</i>	elxxvij.	<i>Sauze</i>	ibid.
<i>Mifcagiu</i>	327.	<i>Pino dvxt</i>	37.	<i>Sawbzot</i>	264.
<i>Mierda cruz</i>	88.	<i>PIK CAIAX</i>	33.	<i>Sawtachen</i>	elxxx.
<i>Mgedega</i>	101.	<i>Popug</i>	elxxxvij.	<i>Sebab</i>	179.
<i>Mife yerrhya</i>	271.	<i>Potnires</i>	7.	<i>Scambrones</i>	1 10.
<i>Miffichrammen</i>	cxlvij.	<i>Porriom</i>	166.	<i>Scheberling</i>	
<i>Nodelger</i>	315.	<i>Potiron</i>	elxvj.	<i>Schelfraut</i>	cxvij.
<i>Moleffo</i>	50.	<i>Tffak&t</i>	2S1.	<i>Sdjlujfd blumcti</i>	301, 105.
<i>Wo/mo</i>	107.			<i>bfretOIGgische rot Schmalzblu</i>	1+4.
<i>Molrebeeren</i>	119.			<i>men</i>	
<i>Monfraut</i>	cxix.	<i>QVE mo</i>	4<f.	<i>Schonerwurtzel</i>	lrfif.
<i>Montrauten</i>	cx.	<i>welfaer Quendel</i>	317.	<i>Schofwurtz</i>	167.
<i>Montan</i>	238.	<i>Quercivola</i>	322.	<i>Schraubbeeren</i>	60.
<i>Montaro alya gomba</i>	aJxxvij.	<i>Quexigo</i>	18.	<i>Schwalbenbaum</i>	cxlv.
<i>Morilles</i>	(dxij.	<i>Quinus</i>	lxxx.lxxxj.	<i>Ctuwcvtd</i>	224.
<i>Mort au chien</i>	201.	<i>Quiribuela</i>	4(f.	<i>Schwindelkraut</i>	305.
<i>Mortella</i>	67.	<i>Quiruela</i>	73.	<i>Schwindelode i(Xtmo</i>	elj.
<i>Mothwell</i>	170.	<i>Quiffel</i>	201.	<i>Scoba brautenda</i>	316.
<i>Mouges</i>	70.			<i>Scobas</i>	103.
<i>Muschio, recu, & Musfc></i>	wmi 17^.			<i>Scopa</i>	re 1,

I N D E X.

Segn ad.	91.	Tertbinthe		Weisse ba'balan	19.
Seisfium	30.	Teuberie	119.	Weiß horungo blumen	170.
Sen, et novā	rfxxx.	Teublinge	ecclix. ecclxx.	Weiß Jacinthan	
Wolff u. Sciff	ecclij.	Teuffels abber	237.	Weiß rauch	140.
Sep er ju	> 1.		ere.	Weiß veil	170.
A vita Romana	exxix.	Cfjanncfriij		Weiß wurtz	277.
g**»	* 3 8.	Channen	..14.	Weilche ho ber	55.
St in cada	163.	Thym, Thymo, Thymus		erdt Weyprel	64.
Eiben hambozen	190.	Til Lara		flain Weyprel	< 4.
Scimpre exxuta	11.	Tiz tās ju		Whit root	311.
Eigwurtz		TomarpucTit		rechter Wiberthon	ecclix.
Smoej Jhwanmen	ecclxxi.		345-357.	Wid gelb veil	199.
Snetroffen	170.		341.	Wid fu<m	si.
So bolaw	10.	TmiUffalfert	357.	Wild Saffran	201.
Spargen	ecclix.	Tcāada	162.	Wild neglin	286.
Sperio	ecclxx.	Torna/ol	xlviij.	Wolfs wulch	eccl.
Speick	lvij.	Tw&ejbl	ikti.	Wolfs wurtz	eccl.
Speirbaum	to.	Tortr.jM	**pi*	Weflem terewnt gomba	ttlxxx.
Speerwerbaum	10.	tvvifct	si-	ayunMraut	328.
Spina lora	clij.	Trebi/ā curmāsi	5.		lvij.
Spindelbaum	12.	Trebel	ecclxij.	XAGVARCA	78.
Spine	110.	Tribi & Ymbri	358.	X rco	80.Si,
Spongule	ecclxij.	Trisue madama	lx.	Xara	77>
Stain aldel	18.	Tuert	ecclij.	Xara-estepa	70.78.
Steinber	118.	Tttrmtr*	77.	Xara-xarguna	72.
Stein negelin	286.	Tusa	127.118.120.	XCTM	78.
Stein rāschlin	90.303.	Turu alya gomba	ecclxxv.		
Stichendpfeimen	104.	Tuffihuchi	lip.	VYERVA de Us limit	dxv.
Stoack Janabel	clij.			Tmt de s, Gment	11*(«./»)?.
Stoack schwannien	ecclxxv.			Terv* del quadrille	77;
Stridula	ecclv.			Terva de Vallesteros	274*
Sugaro	it.			Tervapulger*	xxv.
Sultan Zambach	12.			Tervapwiten	
Sumac	11*			Tervatvrn	lor.
Syfam giule	13 c.			Ynieffa	103.
Szarmas gomba	ecclxxij.			Tfopfla	356.
Szedör	118.				
Szedi Szedör	118.				
Szemerchyeck	118.				
Sz	118.				
Szent Gijty, Sm & Q*	tdxij.				
Szent Janos kenyere	20*				
Szöw: alya	ecclxv. ecclxxvj.				
Szil fa termw: alya					
TAMARICK	41.				
Tamarisfen baum	4*				
Tamar: us	1bd.				
T*moxt, lam*txo, Tūm)*	111.				
Tfaratos i	lxxx.				
Tar.	41.				
taroboUs tttmn	24*				
Tatarisij	22.				
Tataria	ecclij.				
Tely fa	20.				
Tely zād	46.				
Terbaick	16.				
		Unfer saw hat		Za nabo	30.
		Unfer frauen schuch	J7*.	Zarneh	ibtd.
		Unfer frauen schwarz rauch	337.	Zaros	I U.
		Vogel beer	9.	Zel Ju	286.
		Vogel neß	170.	Zilnnt-ft	65.
		Vr gomba	telxx;;.	Zenfelatht	30.
		Vrguet: a	46.	Zent Janosf ye	XXXij.
		Vn	ibid.	Zent La kyal fya	313.
		Vvadcpm*	yo.uj.	Zeodiihom	137.
		Hein Waldwurtz	eccl.	Zttm cadi,	162.16.
		Waryw borfo	ecclxxv.	Zigenbaers	1&XUif.
		Wreibe: fift	ecclxxvii.	%inntd	231.
		SSoica	8j.	So6t>(tiKarlin	286.
				Zupmart	137.132.
				Zumbul	175.
				Ztmbul Arabi	186.
				Zttramtb	30.

A P P R O B A T f O .

H.E RarioramPlanrarumHiflorixCAROLiCLvstiMccJiciexpertiJn. mi, nihil noftrs Catholica: fidei contrarium pra: fecerunt. Quare ante obicumAudorisinlucemprodircpofTunc, vc precibus piorum, ipfc manorfus prirax plancationis,iam finem fuum certumfaciat, quo fecurior viam vniucricarnis iugredi tandem valeat. Itaccnlcoiy.Fcbruar. an, 1601.

Eghertw Spitholdius Tlebanutty
Canomtus Antuerpienfts*

MemU qua Ttfeegnphwrum eperarum oudos effugeruntfn h&c Plantarum H'fiorUfte erunt ememasdf: Pw? nurmrtMf&ginamfigmjcat, Alter verfum.

p.2.v.63 ferchar.
p.17.v.14. acelos p.i.J.Y^O.rotunditatis p-14, V,i.I. fertm
p.17.v.6.2
p.j. f i.icolore v. jo.Girindodtet p. jtf, v, i'ift Tellinata
p.jf.v.4.Ccne*K p.4S.» 4j.Leti)«nha p. j<3.Xi».Lenta,
gine p.li.y. 17.Guguenio p^-f tfrf.&ppiX.Qbimxcifti
ini.deT.ttSlpoSiK p.*+v»,tt^bi.v^i^l-Vi!>urnuin p.gi.
v.12.6. b.0.1.f. j.v.8.3C. chajur p. >vii.l f ezit lnd io.
v.37. fiap p*4^.) 2. etle aminum p. 100 v.21. tsmio Do-
RYCNIVM p. u o.v.i j.p.jiilijus& p.H4.V. 16. ttanilawt,
p.17.v.15.18 jfT>»s "OA»»s VTio.Jixrt ^114. v.49.
pingot 322020
C. p.lj T. [v]TapgurtmpontTliui tituiui Ll-
LitMMINUTVM P»AICO3(AHeTSTIIPiIVM.p. 144.
v.4.inijJeflics p.iji.»«.biilbiHos. p.iu.v.ij.habcthoHiT,
p.17j.v. J.indeno! p. J77.«,5.proficifcehtr: P.17S.V. i.«.
ptemetid* p. i8o.»i(Hyae.ComoCa!tio p: 1 ite.T. 14. tj uctn
p.i»i.v.6i.parens. p.iu.df. Itishuibofflavoflj. iitec IT.
v.13. Litio Carden p.n),ir.j.CaroliaS Audotrarc.^114-
desiles thernias.p.17.v.9. acornibp.17. ...
1111 fa.p.144.v. 42. acris p. 259. v. 49. ^A<le diUmilise
p.186.v.16. asteriusrob.f. 271. d. d. f. V. t. r. r. i.) g j ; w r .
quam additam ope
680. fig. 1. p. 179. v. 4. olle. mi p. iKj. v. d. 2. fere banoBp. 1. 5.
v. 6. f. supra fig. 2. Caryophyll. fil. v. 111. p. 291. v. 27. P. I. O. R. E. M.
& O. M. A. V. A. M. Sal. p. 199. v. 9. incipiet. p. 304. post v. 20. debnif-
fua in/ari verba fuj Mintil.
...
SiiTtME iu!ia)scrjntfiaba.] uz Primum ; 2)us fla-
toige dnoT«hibet,j>r*{trrtinii is qmcind leant, fcvcluti
fij Alilii m li u n f i t t p i K u S i a m f i m f l a : «u i S (f « i j n .
valistangua faruna etiam asperifus) fum(nofa(ligjo multosflo-
res in quinque lacinas divifos (q faet quarum! nqu x in ex-
tremo crenâ sunt anilî tam emi-
noret, colorifit' cnibnii nrneopf r^ft odurctn hibec Puna,
In Bataviampibiconlpicieb3mriAngliaprimilmaltaiuii
esse intelhibent g e n us; an vero f'pote iftic nalcatur, an
almndcilijum. iccljcc:.

Deinde f job f » OcTAVAFwSEfIIMJi(J. i_N marf,
Auric, i'f'fii ii <\$,pij> .joj/iiprijj:j.AimcuJaitrfix. irfl-
iiri:3J: v.S.NoNAT jir<OtTAV*1,cyi7i*fj Aiteicuiji 11,
p.J1S v j o giora sa, v.n.JciiKi.ifjcon p; (4.1. f'wifjine
Chamxycypariffus Pitnij repari diimtiU i rtfuot (ciicnti
Pl:1 N1V5 Chz.p.349.v.1. primo genete, p.336. v. 36. dux,
liguofr in
r;
TriwpeSlnieTüiaUbrUmtitAt* rjl tuirntrerna ratiq
• qut xiifit in mmdu corrigenJu fnt jajutnda.
p.ii;v17,macitetie>rap.xj.T.I lapidolifjuxtap.ivij.0Mr>
j«»» Pionon i.c.f.11 T i j . r . j 4 . B « j c a v . (» , B a ; i f t a . V 4 0 . B x -
iicip,ijiYil.t.Si Laufannjnp.iliij.v.iS. torrampir.caj-
liij. margini Sedum minus. 1 .p.U>; v. iR. babewt p. livij.
v.3.minor f oq. p. 171. v. 53. f e c e r a t p. 122.v.18. i o n -
GAE p.122.v.8. p. diltentia p.0.v.34. Nicolcz jxxv. v.2. vi-
tciibusa.p.lxiii(» .iy.Tfu&am.p.lxifj.S.putgataSv.54.Suil'
lxj p.cxiij.y.i^peig«ent;p.eixv.VI.J.deinde inp.cuiiilj.
Tjoneciui.p.ciiij.v.j.varcubp.c
frilptimayun mifrtm p.cxlij.tit Hietrachij. x.1. maq.
p.cilii.v.ii.alatnisp.cl. v.n.munit* limp^chjiT.tt.au
Pljn.v.i4."diffimil«Y.f.j.qffibuGump.iiij.'V.ij. nim fab
in(cq.p.djj-T.i.nonnullip.elxv. Y 1 d h j & 1 6 v. 5 £ J y -
X>twi>>^ p.clivj.v.7. (tuod i l H a u o n i z i n g i i b u s u l i v .
i v . t u l i j o i p . v . i S . l r m j i j i p . d i i i . v . i . l i . t i l j e L l u m [j . e l x x i i j .
u r i u f u e g u r d i i u o i o t t u u C p . h x x v . v . 4 2 . C h a m x y . v .
46.2
cic; 1 j . 7 . j 0 . f i t b t u i , j . c e f e H j . v . y . F h ^ I i 0 n - p . c 1 e v ; 1 j . v . 5 5 . c j t .
(ciüi^Mtl tce^9>fuagfJamp.cc.v.i(4 inferni pane p'ecj,*ii.
Pnoxi n i v , s p . e c i i j . v . i . * . C h e t i d o n i j p . u i i j . v . 1 ? b b t u M
tub pjee^ . v . 1 . w p t C L W ^ c r u m * p . e ^ j r . v . j . u i d a n : f » K I Y i l j .
v . ^ . d i H i m i l e c f f t i ^ . j . o . b e r e t b t e p , t e w j , t , i , t j u * ; i n f , i f ,
plumulim' . p . t e T i i i t > v . i . t . e c g n u a . p . c e x t v . * . I S . q u i c o c .
icm'm p.ccl.'V.tö.jHBij p.cclviiij. v. n.Aiabidvd l:lfj
v.i9. gliudololisp.ccljX.T.4l.dctothy^io.pxch>2.v.36.
primum.

Series Chartarum.

' A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X r Z .
a b c d e f g .
AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN O O PP QQ
KRSSTT VVXXYYZZ.
9a bb cc dd ce ff gg.

Omnes funt Territoriesjr & ter Y Y Duemionem,
g, & > ££; Qmternioms.

ANTVERPIAE,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
APVD IOANNEM MORETVM.
ANNO CID- ID CI,

Erricuse Abrijsche



Hon. v. d. Landt van den Landt van den Landt


van den Landt van den Landt

Den 21. dach van den Maend

in Maend

van den Maend









B




D

C

A


Von Ablactiren





Vide pag 9. merer Instr







Malus Adami.



Malus Linnæi.



Citrus



Malus Linnæi



Ficus Indica Spinosa.



Syrinx Carulea



Sambucus Rorca




Palma

Siliqua Sylvestris






Siliqua






Abtheilung der Garten Beete





Modelleken rumen felder



pag. 14



Modellen
Blumenfelder




pagis




Modell
nummen felder




pag. 10.





Mod 





Hummenfelder

pag 18

Medellen d'blumen seller

pag 29





M. B. H. L. L. L.



quien sellar

pa. 8. 20


Garten Bett nach dem Winckel.

pag 23.



Modellelven
dunnen felder

pag. 272





Medellen de



3
cu' fan feller


pag 23





Modellbuch

Seite

pag 54







Madellen



Blauen Färb

1620

Moklin dar




biarnen felder



paqan







Modellen der





Selder


pag. 28













3



Vater zu ziehen




Oben zu ziehen


Z



4




1



MERIDONNALE

Ad Elevatum

Pol. 42 Gr. 30 m.






Horologium Horizontale
Anno MDCXXV

5 Meridies



OCCIDENTALE



Z

3

4

5

6

7

8

Maree Citeat sue

C

Suldeas in Ambra

4

5.6.7.8

9


D

10



RIENTALE


pag 39








III . Λ . II . IIII . V

SEPTENTRIONALE

VIII . VII . VI . V . IIII





pag. 2. 44
Wegwart.



Fig. 2
Nesseln.




Fig. 3
TaubNesseln.



Fig. 4
Eghekrantz.



Fig. 5
Schelwurtz.



Fig. 6
Singrün.



Fig. 7
Hundsziung.



Fig. 8
Saubon.



Fig. 9
WeisLilje.



Fig. 10
Sollbey.



Fig. 11
Eisenkraut.



Fig. 12
Rosen.



^{Fig. 12}
Odermüßig Finßfinger.
Kraut.



^{Fig. 15}
Spitzwegge



^{Fig. 13}
Breitvegerich. Goldwurtz.



^{Fig. 14}
Nalckwurtz. ^{Fig. 16}



^{Fig. 24}
Osterflücy



^{Fig. 25}
Holwurtz



^{Fig. 26}
Eppich



^{Fig. 27}
Wermut



^{Fig. 28}
Stabwurtz.



^{Fig. 29}
Beißus.



Fig. 21
Meusohr.



Fig. 22
Eschlauch.




Fig. 23
Wegerich.



Fig. 24
Boberellen.



Fig. 25
Borrich.



Fig. 26

Haselwurtz. Hasenklec.



Fig. 27
Ochsenzung.



Fig. 28



Fig. 29
Bethonica. Teufelsdreck.



Fig. 30
Aron.



Fig. 31



Fig. 32
Saurampfer.



Fig. 33
Gelb Lilien.



Fig. 34
Ibsch.



Fig. 35
Sinnat.



37
Camillen
Brennstein



38
39



Balkenkrout

40
Cartensteln




41
Basilien



42
Ringschnur



43
Wasserkol



44
Cordobersden



45
Mangoll



46
Rittersporen



47
Moren



48
Waldwurz





Coryiander

Sanickd

GelbVio. lene



Blutwurtz

>*

Wulffkraut



Wulffkraut

Springwurtz



Diptan.

part 10



Dumbwurtz



Alantwurtz



Korbeln

Lungenkraut



Wolffsmilch

Augentrost



Epich



Erdtrich



Fenchel



Brunkres



Fig 74
Erdbeerkraut.



Fig 75
Süßholzwur.



Fig 76
Santel.



Fig 77
Lindwurt.



Fig 78
Gruwkraut.



Fig 79
Almraut.




Fig 80
Malerwurt.



Fig 81
Tofen.



Fig 82
Santel.



Fig 83
Lindwurt.



Fig 84
Santel.



Fig 85
Hylschich.



Fig 86
Brombeere.



Fig 87
Santel.



Fig 88
Almraut.



Fig 89
Nihil. Hirschtorn.



Fig 90
Brom.



Fig 91
Hylschich.



Fig 92
Hylschich.



Fig 93
Brombeere.



Fig 94
Santel.



Fig 95
Tofen.



Fig 96
Nihil. Hirschtorn.



Fig 97
Brom.



Fig 98
Hylschich.



Fig 99
Hylschich.



Fig 100
Brombeere.



Fig 101
Santel.



Fig 102
Tofen.



Fig 103
Nihil. Hirschtorn.



Fig 104
Brom.



Fig 105
Hylschich.



Fig 106
Hylschich.



Fig 107
Brombeere.



Fig 108
Santel.



Fig 109
Tofen.



Fig 110
Nihil. Hirschtorn.



Fig 111
Brom.



Fig 112
Hylschich.



Fig 113
Hylschich.



Fig 114
Brombeere.



Fig 115
Santel.



Fig 116
Tofen.



Fig 117
Nihil. Hirschtorn.



Fig 118
Brom.



Fig 119
Hylschich.



Fig 120
Hylschich.



Fig 121
Brombeere.



Fig 122
Santel.



Fig 123
Tofen.



Fig 124
Nihil. Hirschtorn.



Fig 125
Brom.



Fig 126
Hylschich.



Fig 127
Hylschich.



Fig 128
Brombeere.



Fig 129
Santel.



Fig 130
Tofen.



fig 98
Burgel.



fig 99
Ribenel.



fig 100
Hedelich.



Wingeyra.



fig 101
Eherwurtz.



fig 102
Nachtich.



fig 103
Tornental.



fig 104



fig 105
Burgel.



fig 106
Burtan.



fig 107
Hegewurg.



fig 108
Mancypen.



fig 109



Fiskyan.

fig 110
Mentru.



fig 111
Muckthen.



fig 112
Sindereck.




fig 113
Rojmarin.



BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No...CLU±r...Acc. No. *B-8611.*

Author *Clusius.*

Title *Rariorum plantarum historia*
1702.

Name of Borrower/Code No.	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

